

REPERTORIUM
BOTANICES SYSTEMATICAE.

AUCTORE

GUILIELMO GERARDO WALPERS.

TOMUS III.



LIPSIAE.

SUMTIBUS FRIDERICI HOFMEISTER.

1844-45.

SYNOPSIS
SOLANACEARUM,
SCROPHULARINARUM, OROBANCHEARUM
ET
LABIATARUM

— —
i>
BUTAKICORUM SCRIPTIS AD HUXC DIEM EDITIS DESRIPTARUM.

CURAVIT

GUILIELMO GERARDO WALPERS,
PHILOSOPHIAE DOCTOR,

ACADEMIAE CAESARRAE LEOPOLDINAE CAROLINAE NATURAE CURIOSORUM,
SOCIETATIS REGIAE BAVARICAE BOTANICAE Ratisbonensis SOCIETATIS ETC.

— — — — —
LIPSIAE.

SEMPERIBUS FIDELIBUS HOFMEISTERS.

— — — — —
1844-45.

W C. Gu
- r fie
B321

G. BENTHAM

VIRO

DE PLANTARUM COGNITIONE OPTIME MERITO,

MONOGRAPHIO DILIGENTISSIMO.

TUA TIBI.

Lecturis salutem!

Tertio nunc tandem **Repertorii botanices systematicae** lomo ad finem perducta baud inutile mihi visum est, pauca quaedam praemittere — vel rectius postponere, quibus opprobria quaedam et iniquas interpretationes repellerem, quae mihi libroque meo facile oriri posse suspicor. Quum mense Decembri anni 1843 secundum Heperlorii tomum ad finem perfraxissem, nihil certi animo consilii, qua ratione librum meum continuarem. In elaborandis enim duobus voluminibus prioribus non in mea potestate silum erat, qua ratione singula plantarum genera et species enumerarentur quibusque limitibus describerentur, nam ad *Vandouei* Prodromum systematicae naturalis vegetabilium mihi in animo erat dare Supplementum, quo continerentur omnia ad hunc diem usque descripta vel iterum illustrata genera et species additis simul novis specierum jam cognitarum iconibus vel generum ordinumque integrorum monographiis post *Vandouei* ceditis. Aliis autem fere semper] ulia suadenibus simplex et probabile hoc consilium non semper exequi scutus sum, nunc ipso hoc re male contentus confiteor, me fere semper non lemisse, sed consilio neglexisse, quae recentiores florulae de plantis Europaeis et iis Germanicis non duntaxat. Sub cuius] generis inscriptione, cuius eliani in Germanid potestati h]ccis, citavi paginal Florae Germanicae

VIII

excursoriae auctore *Reichenbach* et primae editionis Synopseos florum Germanicae et Helveticae auctore *J. M. Moench*. Sed bene rem mihi indulgeant critici. Quum enim in edendo tomo primo sudarem, edendae secundae editionis Synopseos florum Germanicae ad me pervenit fama. Non frustra et ego et omnes mecum botanici tunc credebamus, praecclarum *Moench* omnium illarum specierum facturum esse mentionem, quas inde ab editione prima in nullis diariis doctorum societas etiam et in (non) specialibus novas descriptas saepeque aegre ad synonyma jam notarum redigendas, dispersas invenimus. Propterea malui species has omnes intactas relinquere, quam certa incertis miscere et synonymorum turbam repetere iterum iterumque corrigendam. Caeterum paucos tantummodo viros doctos futuros esse putaverim, qui plantas indigenas examinaturi Prodromum Candolleanum et meum Repertorium consulant, quum in codicibus florum Europaeae uberiores descriptiones et synonymiam locupletiores sine ullo dubio reperiant, quam in utroque hoc libro conspectare possunt. Multi praeterea botanici illorum generum, quorum mentionem *Heisterhoff* nondum fecit, cluaciles in Repertorio meo frustra quaesiverunt, iudeque mihi oriri opprobrium censent; sed caute illos omisi, nam vel *Endlicheri* Genera plantarum, vel *M. Leisneri* Genera plantarum vascularium nulli botanico incognita credidi noluique res jam omnibus accessu commodas recludere ad taedium lectorum numerumque voluminum nimis augere. Nullas me omnino fugisse plantarum species summo jure citandas vel de dolco, sed earum numerum, si respicis a me datarum incertam opinionem, certe eximium fore conleudo. **Inve-**

niunlur quidem, qui, quando exploravcrint spcciem quandam saepc insuper miserabilem mihique incognitam, ingentis suac doctrinae conscii me librumque meum omnino dcspicere simulent, nihilo tamen sccius diagnoses cum citatis ipsisque erroribus typographiis fideliter transscribant; paucissimi vero reperiuntur, qui quas non sufficienter descriptas vel omnino deficientes indagaverint species mihi nuntiarent, ut eas in posterum adderem. Atque adeo etiam etiamque omnes botanicos humanissime rogaveram, qui libro meo uterentur, ut mihi literis nuntiarent, quae corrigenda censerent. Quos graviores errores in tomo primo deprehendi, jam in lucem protuli utque corrigerentur humanissime rogavi, paucos qui in altero tomo irrepererint, mox pronuntiabo. Ad hunc usque diem id, quod in tergo fasciculi duodecimi promisi implere non potui. Quae *Wullroth* de libro meo pro rustico suo more dixit, a me postulatus ut injuriarum suarum rationem redderet, ea, „ quasi tempore nocturno et inter pocula conscripta sphalmatque typographicæ ortii" ipse revocavit. Reliqui fere omnes botanici Ueprlorium meum laelo animo nec sine applausu exceperunt, ejus utilitatem benivole agnovcrunt nullique libenter professi sunt, Reprlorium meum non ultimum illorum librorum locum tenere, quibus botanicæ systematica quam maxime promola sit.

Hisce praecipue judiciis impulsus apud me stalui, ut librum hunc conlinuarem, quo modo in terlio *hoc* voliimine perficere conatus sum. Singula Prodnimi Candullrani >olumina tanlis inter\allis post incljli aucloris mortem |ublici fiunt juris, ut terminus i^rofeclo nullus conspiciendus sit, quo praeclarum illud o)us ad finem productuin esse gaudeamus.

Quia plerique consent, opus illud nunquam ad finem pro-
 ductum iri. Sed plantarum novarum copia in dies adeo
 augetur et synonymorum cohortes plantarum etiam satis
 communium disquisitionem quotidie magis magisque impediunt,
 ut nullus hujus perurbationis sperandus sit finis, nisi cunctis
Reperlorio botanices systematicae, quo species omnes hucus-
 que descriptae ad optimorum auctorum fidem conlineantur
 additis simul iconum citatis descriptionibusque, quibus species
 minus notae vel incomplete descriptae vel in libris pretiosis
 rarioribusve illustratae, denuo adumbrarentur. Omnes enim
 (ere post *dMittlertCMH* enumerationes plantarum omnium
 hucusque cognitaram, excepta insigni *Mülleri* Synopsi,
 valde mancae sunt, et jam propterea nullo modo laudari pos-
 sunt, quod diagnoses brevissimas parumque sufficientes prae-
 beant neque auctorum citatorum locos afferant.

Tertio hoc volumine quatuor ordines percensui more
 hucusque insueto. Solanacearum, Scrophularinarum, Oroban-
 chearum et Labialium genera et species ad optimorum et
 novissimorum scriptorum (idem exhibui, quantum ipse polui,
 curata ab incertis secretis et cuius speciei locum ut mihi
 videbatur naturalem tribui. Ubi potui, specierum minus no-
 tarum diagnoses ad specimina sicca amplificare vel emendare
 conatus sum, speciebus jam cognitis sacra nova synonyma
 vel descriptiones ad exemplum siccum vel iconem laudabilem
 confectas addidi librosque vix nolos excerptos reddidi.

Generis Solani diagnoses a me datae vix ulli sufficienti,
 mouere aulem velim, omnes Solani species extriculis dillicillimas
 ab ipso *Müller* in utraque sua hujus generis monographia male
 debita. sicutique *Kuhn* sicpius *u* *n* *ksimis* *c* *mim-*

scriplas esse, illa, licet Solana plurimorum herbariorum fere intacta reperiantur. Quam rem mihi opprobrio verti posse non credo. Scrophularinarum et Solanacearum synopsis novissimam edidit *GeorffioUH MBon*^A quem saepissime secutus sum, fortasse non sine meo detrimento, nam nonnullos auctores ille omnino neglexisse videtur. Sed nihilo secius specierum descriptarum et a me non commemoratarum numerum exiguum sane futurum esse spero. Magno aificiar gaudio, si quando monographus fatebitur, sibi Repertorium meum non sine fructu fuisse. Orobanchae duce *WaMUrothin* a me recensitae sunt, novae quarum cognitionem habui species suo loco adjectae, plurimae autem Orobanches pessime descriptae esse nos omnes dolemus earumque synonymiam deficientibus specimenibus ipsis ab auctoribus descriptis vel iconibus illustratis ad scientificum commodum numquam eruendam esse, jam dudum apud omnes satis constat. Nonnullas fortasse Orobanchearum species me omnino fugisse facile confiteor, cum omnes floristas evolvere mihi contigerit Labiarum monographia auctore *GeorffioBeHth&Ml* a me illic odita cum paucisque tantummodo iterata hanc editionem fore ingratham spero, nam pretiosus ille liber per Germaniam et Italiam parum divulgatus esse videtur, duo fere lustra insuper elapsa sunt inde ab illo edito et multa idcirco nova genera et species descriptae sunt, quae illo non continentur. Haec omnia, pro mea cognitione suo loco adjecti nullaque iconum tum recentiorum tum antiquiorum citata adposui, quibus omnibus *Benthamfi* monographia adeo amplificata est, ut quinta parte aucta sit. Synopsis generum hoc in volumine descriptorum adjecti, ut iis satisfaccerem, qui hoc libro sicuti synopsi Solanacearum,

Scrophularinarum, Orobanchiarum et Labiatarum uterenlur. Characteres generum distinctivi ut facilius a lectoribus cognoscantur, literis Italicis redditi sunt cosque semper, quantum fieri potuit, in verba pauca contraxi.

In elaborando tomo quarto, cujus fasciculus primus haud longo spatio intermisso sequetur, studiose plantas siccas et vivas cum descriptionibus auctorum comparabo multarumque novarum describendarum larga mihi data est occasio.

Si quaedam in hoc tomo inveniant errata, mihi indulgeant lectores, et si susceptis meis favent, per epistolas nuntient, precor, quae omnia vel falsa repererint.

Nec tamen silentio praeterire possum, quos jam in praefatione ad tomum primum et secundum grato animo commemoravi fautores, benevolentiam suam qua hunc librum hucusque sublevarunt in posterum quoque in me conferant, oro sibi semper persuasum habeant, me eorum liberalitatis numquam immemorem futurum esse. In primis autem iterum gratissimo animo commemorare decet Summum in Borussia rerum ecclesiasticarum et ad eruditionem publicam spectantium Ministrum Dr. *Eichhorn* et inclytum *H.F.Mjink*, qui pro sua humanitate numquam languescente amplissimam suam bibliothecam explorandam mihi numquam denegavit.

Valeant qui mihi favent.

Scribebam Ierolini Calendis Januariis MDCCCXLV.

Dr. G. E. J. Faipers.

**REPERTORIUM
BOTANICES SYSTEMATICAE.**

TOMUS III.

Relata refero.

TaciL

Ordo CXXZI. UNTIBULARIACEAE Lindl.

(UTRICULARIACEAE Endl. Gener. plant, p. 728. — Alph. DC. In A. P. DC. Prodr VIII.)

Ordo CXXXH. PRIULACEAE Vent.

(Endl. Gener. plant, p. 729. — Duby in A. P. DC. Prodr. VIII)

Ordo GZZXni. HTR81NAGIAE Lindl.

(MYRSINEAE R. Br. — Endl. Gener. plant, p. 734. excl. gen. piunb. — Alph LMI. in A. P. I C. Frudr. VII!)

Ordo CXXXIY. AEGICERACEAE Alph. DC.

(AEGICEREAE Endl. Gener. plant p. 731 — Alph. L.C. In A. P. L.C. Prudr. VIII)

Ordo CIXXT. THEOPHRASTACIAE Alph. DC

(THEOPHRASTEAE Endl. Gener. plant p. 707. — Alph. DC. In A. P. DC. Prodr VIII)

Ordo CXIXYL. SAPOTACEAE Jus*.

(Lindl. Gener. plant, p. 720. — Alph. DC. In A. P. DC. Prodr VIII)

Ordo CXZZTIL. EBENACEAE Vent.

(Endl. Gener. plant p. 741. — Alph. L.C. In A. P. DC. Prodr VIII)

Ordo CIXXYni. STYRACEAE Endl

(Endl. Gener. plant, p. 742. — Alph. L.C. In A. P. DC. Prodr. VIII)

Ordo CXXXLL. OLEACEAE Lindl

(Endl. Gener. plant, p. 742. — Alph. L.C. In A. P. DC. Prodr. VIII)

Ordo CXL JASHINEAE R. Br.

(Endl. Gener. plant p. 570. — A. P. DC. Prodr. VIII)

Ordo CXLV. APOCYNACEAE Lindl.

(Endl. Gener. plant, p. 577. — Alph. DC. in A. P. DC. Prodr. VIII)

Ordo CXLVI. ASCLEPIADEAE Jcq.

(Endl. Gener. plant, p. 596. — DeCand. in A. P. DC. Prodr. VIII)

Ordo CXLVII. LOGANIACEAE Lindl.

(Endl. Gener. plant, p. 574. — A. P. DC. Prodr. IX)

Ordo CXLVIII. GENTIANACEAE Juss.

(Endl. Gener. plant, p. 590. — Griseb. in A. P. DC. Prodr. IX)

Ordo CXLIX. BIGNONIACEAE R. Br.

(Endl. Gener. plant p. 708. ex p. — A. P. DC. Prodr. IX)

Ordo CL. GERANIACEAE Jack.

(GERANIACEARUM subord. I. 'GERANIACEAE', r. // Ueiu. r. plait p. 716 — A. P. DC. Prodr. IX)

Ordo CLI. SESUVIACEAE A. P. DC.

(SESUVIACEARUM subord. I. r. // G. : - r. j. l. i. l. p. 700. — A. P. DC. Prodr. IX)

Ordo CLII. HYDROPHTALACEAE R. Br.

(Ladl. Ocntr. p. 15. — Alph. DC. in A. P. DC. Prodr. IX)

Ordo CLIII. POLYMONIACEAE Lant.

(Lant. Gener. p. 15. — Alph. DC. in A. P. DC. Prodr. IX)

Ordo CLIV. CONVULSACEAE Endl.

(M. f. ' - * - t * - " ' V ' ' i D * T d ' ' IV)

Ordo CLV. BORRAGINACEAE Juss.

(BORRAGINACEARUM subord. I. r. // G. : - r. j. l. i. l. p. 6M. — A. P. DC. Prodr. IX)

Ordo CLII. SOLANICEAE *Bard.*

(Dartl Ordln natural phnt 1°3 — Endl Gener plant p 662 — G Dun
General s>st of gard and bot IV p 397)

Subordo I, *CVMIVJEMHMiYMAE* Endl. *Enchlrd. bot. S30.* — *Gener. plant. §npl. II. p. 60.*

Tribus I. *NICOTIANEAE* G. Don, *General syst. of gard. and bot. r\\4G2.* — *Endl. Gener. plant, p. 062.*

Embryonis raagis minustc curvati cotyledones semicylindricae. Cap-
sula bilocularis, loculicido-bhal>is. — (Cf. *Sicotianae* sect. IV.)

3838. **FABIAN** % *Kz. et Pav.*

(Rz. ct Pa\ Flor. Peru>. II. 12. — Mcisn. Gener. plant, vascul. I. 270. II 18J. —
G. Don, General syst. or gard. and bot IV. 4H7.)

1. F. *IMBHCATA* Rz. ct Pa\ I. c. f 1.122. fig 0 - Per*. *Enchir. I. 170.* - G. Don
I. c. no. 1 — Hook. *Icon, plant, t. 340.* — Lindl. *Bot Regi>l. (>e* Ser) XII.*
t. 50. t —.Foil, parvib ovatis setsilib. concavis squamaeformib. imbricate; nonb.
terminalib «olitarus; corollac segments limbi broil) obtuM*; rcb>xi». o — Fru-
tex ramosissimus, corolla lilacma fere pollicam. — Cresul in Chili.
2. F. *LANt'GIV>S* Hook el Am. Dot Beech \oj. 35 e\ Pr>l. *Report bot s\st. |.*
17. — G. Don 1 c. no. 2. — **Ramulis tomvnto albo lanuginosi*, foil fd>cimlali>**
lioeanb. oblUMb&imih carnosus patentib.; caljce lanalo, corollac limbi senmenli*
oblongs rflexis. ^ — Ramuli fill formes; folia usque seiquilincarij, llorcs pe-
dunculali axillares folia subacquanles. Caljcis tubulosi sogmenlis ^ ina<Mjialibui>
bncanbuh oblusis*; corolla glabra* stignialu oblongo capilalo. Cre^cil in Chili
ad Coquimbo.
3. F. *YISCOSA* Hook, el Am. I. c. JO. (in nola) ex Prsl. I. c - G. Don I c. no. 3
— **Pubescenli-vibcosa: foil, sparsis angusir bncarib. patentib. oblusis, dorxo ca-**
naUculalis; peduncollt terminalib , fruriiforis orciis. > — III<OMH audilur IHcho-
nilla. — Capnula bivalvij, oblonga, culjce perbi^lenlc parlim treca bilorulariu,
placenta centralis, >alvis margine introfic&m. — Affnitt nequenU. — Cresnl in Chill
ad Barasca.
4. F. *TtnMIFOUA* St. **IIil.** Mom du Mus dñiM. nal. XII. 317. 1. 0 ex (i Don I c
no. 4. — St. Hit. Pl. romarqu. du BP-MI. 220 t ^ 20. — Pilo^a \iscosa foil, par-
vis lineanb. eoenns sparsis oblu*>i>, pedunculib subaxilljnb , primum ercciis,
demum recurrls. 6 — Corolla ad basin lulea, supcrae bordidc purpuroa — Oescil
in Brasiliae provmcia Rio grandc do Sul.

3S30. **MKRKHBERTilil** *Rz. et Pav.*

(Rz. et Pav. Flor. Peruv. II. 13. - Mei<n. Goner, plant. I S76. II. 183. — G. Don,
^ General s)sl of gard. and bol. IV. 468)

1. N. *CALYCINA* Hook. *Bol Mag* 1. 3371 t - s*et, *Drit. lion. gnrd. (New St<4*
IV. I. 310! f — G. Dou I. c. no. I. — Dietr Synnps. pi I Otil I'uhcsi cnii-
^Inndulosa: caalib. herbacHs procumbeuiib.; foil. oppoMds aUcniisq nbo\jiiN
poliolalis; pedunculis solitarus laleralib. (extraaxillanb , r.ihni nii^nis ratu-
piinulalis, loins obo\alis folnrns l|. — Habiinl in \mlilnis < hilensibus ad Men-
doiam. — Corolla c raljce magno cnuTgens, limbo .ilbo, bisi luleo, tubo \u\cs-
cente. — Habitus Pelumae.
2. IS. *SPATH'LATA* II. B. K(h >o\ gen. el spec pi III s , - (i Don I c no 2
— **Caulib. lignosis rcpentib.; foil, pcliolalis ellipdco—paibulalu glabnt, jumortb**

- lanuginosis ciliatisq , segments calycinis laeaeolatis acutis, Inferiorib paruni minonb reflexisq , capsulis oligospermis 5 — In IVova Granala ad Sand too de Bogota et Loxam allit 1000—1300 hexap — Caulcs fihformes proslrati, ranm brevib ereclis puberulis Folia boliiana v bina, apice obtusa v rotundata Mo-res pedicellali Calyx basi pilosus, parum curvalus Corolla glabra, tubo gracili poll dimidium longo, calycem quadruplo excedente, limbo campanulalo-infundibuhformi Stamina glabra membranacea hnearia Capsula in caljciu >entn-cosi basi
- 3 N REPL> Rz cl Pa\ Flor Peruv II 13 f t 123 fig c - Spr Sjst \eg I 614 — G Don I c no 3 — Caulib basi repentib , apicc ereclis, hliformib , Toll fasuculalis quims seni!>ve oblongis obtusis pilosalis, florib. sessilib , capsula oligosperma 24 — la regno Chilensi ad Conceptionem — Folia scraipollicana, 2-3 linear lala Corolla alba, fauce lutea lineitq tribus purpun.is in limbi segmento quovis — *ftcohana minima* Molina, Hist Chil (ed 1 15J — \ N tpa-thulata jam folns fasciculatis diffTert
- 4 "\ AISGUSTIFOLIA II B klh 1 c 9 f t 198 — Spr I. c 615 — (. Don 1 c no 4 — Caulib herbaceis cacspitosis diffuse, foil sessilib linein-lanceolatis glabns segmenlis calycinis linearib acutis aequalib , capsula poljspirma 2I — In Mexico — Flores oppoMtIToln breviter pdicellati Corolla glabra alba, tubo calycem excedente, limbo campanulato-urceolalo non plicato
- 5 IS PIBESCI>S Spr I c 615 — G Don I c 460 no 5 - Toll oblongo-Imeanb glanduloso-pilosiusculi* capsula poiysperma bnalvi caule lignoso dff-fuso *> — Montevideo — *IS grai eolens* St Hi 1 PI nm duBrtsil221 -ft 21. fig A
- 6 IS GRACILIS Hook Rot M*u t 3108 | — (. Don I c no 0 Sweet, Brit do* gard 2 Ser II t 172 t — Lanuginos>a caulib herbaccis erectiuscuhs folnsq anguste hneari-subspathulatis pubescentib , segmentis caljcinib lincanb obtusis, corollao tubo mulio breviorfb , florib in ramulis junionb termioalib , lobis corollae rotundatis capsula polysperma — O²*.' — In Bonana
- 7 N FILKALLIS I mdl Bot Rig t UM) | - Bot Mag t ai70 t Sv^eel, Brit flow gard (2. Ser) HI t 243 f — G Don I c no 7 — < tuk horbaceo erecto uliformi folusq hnean - lanceolate glabris, pedunculis oppositiTolns umflons, corollae tubo filamenlisq glandulosis 2I — Habitat in Mexico — > *lineartfolta* Grah in Fdinb >>* Philos Journ \II J78 | — (aules ascendenles Corollae lubus gracilis, negmenta ciljema acuminata, corollae lubum adaequaotia Limbo corollae lilacino fauce lulea
- 8 > ARISTATA S^MI, Brit [lo* gird II scr III t ZV> i - G Don I c no 8 — (ilabruim uh Toll hm< anb atuimmiis caljce subulato anntato corollae lubo bretiort stiginiU peltito ^ — Habitat in Bonana — Corolla alba, purpuno-sriata, txlus glandulosa

Speaes e genere excludenda.

N SUBDEVTAT* Me)en, Rcise I 314 - BOISI)l\ \M\ (OX |>>\ b Sparh cf Rppert bot syst II 89) — >ccs ab tsenb in Nov. act acad Leop (arol \IA Suppl II 482.

\HAO PETIMI Juss

- JUNS Inn du >Ius d Insi ml II 215 Mutn den plant vascul 1 870 II IMJ — ^{s1}r ^s)^{s1} >k^Tt I 017 (I Din, diiural sW of gard and bot I\ 467
- Didr SMiops phnl I Wh! - cf huj lomi p 126)
- 1 P M<Olimi<lim l.imr >i<ot monoKr 20 M< r\GIMFLOHV Jus> I r. t t 47 fig 2 Hot Mi* I 2-MJ ^wirt, Brit flow gard II 110 Trail lab 72. (I Don I c k< n> I lit rl>u 1 I IIIITIM \illo<o-k'lan(lwlo*a ||s~nda full infenorib alurm« o\3lo-oblongi» oblu*i» pubc>ceaub , b%ai in prtio-lum aitenuaii», foil floralib >c>>ihb cordalo-o\ali-> o|>po<iti<, prduni u|i% sul>-tnfloris folia superantib , tobo corollae ealyeem mulio furdrnd , limbo lato obtu^o "4 |tcoiana axillani I am Illuitr pi no 2^7 IUmosa (aulii j dlosys Folia pube*centia Prdicelli VIMOHl ba^i folus 2 oppo>in< »iip<lj (JIJ*

- pubescenti-villosus, segmentis foliaceis oblongis obtusis patentibus inaequalibus. Corolla magna alba viscosa, extus lanugmosa. — In America australi ad osia Rio de la Plata.
2. P. (NIGOTIANA Lehm. I. e.) PARVIFLORA Juss. I. c. 210. t. 47. fig. 1. - Spr. 1. c. — G. Don I. c. no. 2. — Herbacea prostrata: foliis subfasciculatis oblongis obtusis crassiusculis; corollis calyce parum longioribus, limbi segmentis obtusis, pedunculis brevissimis unifloris. — Gaules ex eadem radice plurimi villosi Galycis segmenta oblonga obtusa foliacea, palmata. Corolla medio coarctata rubra, limbo plicato. Capsula a calyce inclusa. — Rio de la Plata.
3. P. (NIEREMBERGIA Grab. Edinbgh Philos. Journ. XIV 175 t. — Sweet, Brill flo*. gard. 2. Scr.) HISTERMEDIA G. Don 1. c. no. 3. — Pubescentia brevi glanduloso-viscida undique tecta. foliis linearibus obtusis dense pubescentibus, corollae tubo vix calyce longiore, lacinis emarginalis; stylo clavato, capsula baccata. — *Salpiglotis unearx* Hook. Bot. Mag. t. 3256. adn. - Gresil in Bonaria. — Corollae tubus sulco-striatus, fauce venulosa, limbo quinquelobus.
4. P. VIOLACEA Lindl. Bot. Regisl. t. 1028. t. - Hook. Bot. Mag. t. 3556. - Prostrata, pilis viscidis veslita v. lanuginosa foliis ovalibus breviter petiolatis acutis, corollae ventrosae segmentis ovalibus acutis; floris solitariis axillaribus pedunculatis. — *Salpiglotis integrifolia* Hook. Bot. Magaz. t. 1111. — *Jsterenbergia puncea* H. B. K. — *N. phoenicea* D. Don in Sheets Brit. flo*. gard. 2. Scr.) II t. 103. f. — In Bonaria. — Segmenta calycina lineari-spathulata obtusa foliacea. Corolla magna roseo-purpurea, limbo irregulari. Stamina medio tubo inserta Embryo brevis reclusus, albumen copiosum. — *ft. Alhtnstanta* Foliis ovatis acudusculis; lacinis calycinis ligulatis; corollae tubo calyce duplo longiore. — Planta hybrida e *P. nyctagmiflora* et *violacea* orta. — *bierenbergia Atknsiana* S. & Eet, Brit. flo*. gard. 3. Scr. III. t. 2b.

Il generis excludenda.

P. AGUMINATA Grab = MCOTIANA ACUMINATA Grab

3541. M C O T I W I Linn.

(Linn. Gener. plant. 248 — Mcisn. Gener. plant. fasc. I 270 II. 1A3 — Lchm. Histor. Sicot. 1818. excl. sp. — Spr. Syst. Veg. I. 010. 1. II. W. — Dirr. Synops. pi. I. 001. — G. Don, General Syst. or Gard. and Bot. IV. 402. — cf. huj. to mi. p. 120)

Sectio I. TABACUM G. Don 1. c.

Folia magna. Corolla infundibuliformis rubra, limbo patente acuminato v. acuto, fauce inqato-ventricosa. — Uerbae glulosae. Floret in racemum multiflorum brevis dispositi, racemis paniculam terminalem subcorymbosam efficiunt.

1. IS. TABV(XM Linn. Spec. plant. I. 258. — Willd. Spec. plant. I. 1011 — Spr. 1. c. 610. — G. Don 1. c. f. — Black* Herb. I. t. 140. — kmph. i. cni. 1. t. 55 — Ludw. Ectyp. pi. 1. 167. — Knorr. Del. I. t. 11. — Sabb. Hort. Horn. I. I. HO — Iam. Illustr. t. 113 — Wood. Med. bot. I. 102 t. 00 — Sin. et (Imrb. Med. bot. I. 1.37. — Schkhr. Hdbch. I. t. 44 — Afbeldingen der Artbenjicruaten IV. t. 111) Herbacea foliis oblongo-lanceolatis acuminatis sessilibus, inferioribus decurrentibus, fauce corollae subinflata, limbi lacini acuminatis. — Lanuginoso-viscida. Folia semiamplexicaula. (calycis oblongi segmentis lanceolatis acutis inaequalibus. Corolla extus lanuginosa, limbo roseo. Capsula calycis longitudo v. parum longior. — A. *Ilaiansu* Lag. Elencb. hort. Madnt. 1700. Bull. Herb. HI. t. 285.

- o. *attenuate* Sebrnk. in Hppc. Bot. Zcilng. (1. Scr.) I. 1807 200 — 1 longi allenualis; foliis lanceolatis acutis subdecurrentibus, basi attenuatis (mfrion) lationibus. Flores rubri.
0. *mart nphylla* Sebrnk. I. c. — (foliis oblongis, lacinis limbi obsolete murronatis, petiolis brevibus. alii, dum dilatati amplexicaulis — < > non differt *N. macrophylla* Spr. Indx. hort. Ilakns. HU7 p. 4. Willd. Knum I. 220. — Lehm. Hist. gener. Sicot. 10. r. - *X. laticoma* L. Cat. pi. hort. Monsp. 1813. p. 128. — *N. gitanica* Ennm. pi. hort. Dorp. 1814 — Florei palide rubri

- fluborbfcularcs •. obsolete pentagoni. — Sprengel fpse (Syst. veget. I. 01(5))
bane non specie diffërre affirm at.
- . *pallescent* Schrnk. I. c. — Corollis aculis; Ml. ovaiis acuminatis, basi attenuatis, sessilib. subdecurrentibus. — Corolla alba, margine rosea.
- d. *alipet* Schrnk. I. c. — Gorollae angulis (limbi lobis??) acuminatis; foil, ovatis acuminatis, basi in petiolum laic alatum altenuatis, alis reflexis, demum semiamplexicaulib., parum decurrentibus. — Gorollae rubrae. Folia omnia maxima.
- £. *serotina* Schrnk. I. c. — Foil, ovaiis breviler acuminatis subpctiolatis, auriculato-amplexicaulib. parumq. decurrentibus. — Sero floret.
- C. *gracilipes* Schrnk. I. c. — Florib. acutis; foil, lanceolatis aculis, basi valde allenualis in petiolum breviter alatum allenualis.
13. *Verdan* Schrnk. I. c. — Foil, petiolatis ovalo-lanceolatis aculis longis, petiolis semiieretib. ancipilib., basi subdecurrentibus. — Flores magni.
- #. *Lingua* Schrnk. I. c. — Corollis longis aculis; foil, ovaiis pctiolalis longis aculis, petiolis longis obsolete marginalis, basi auriculatis. — Crescit cum varietalibus in America australi.
2. N. LOXENSIS Kth. in H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pi. HL. 3. - Klh. Synops. pi. II. 147. — G. Don I. c. 464. no. 2. — Foil, sessilib. decurrentib. oblongis acuminatis glulinoso-pilosiusculis; florib. paniculatis; corollis infundibuliformib. calyce triplo longiorib. albo-virescentib., lobis limbi acuminatis. O — A specie praecedente vix diversa, nisi florum colore. — In Nova Granaia aliit. 1000 hciap. ad urbem Loxam.
3. N. LANCIFOLIA Willd. lib. ex Lrh. I. c. 20. f - G. Don I. c. no. 6. - Foil, sessilib. lineari-lanceolalis angustato-acuminatis glutinoso-pilosiusculis; florib. corymboso-paniculalis; corollis infundibuliformib., calyce triplo longiorib., lobis limbi acuminatis. O — JV. *Ybarrensit* Kth. in H. B. Klh. I. c. 4. — Klh. Synops. pi. II. HH. — Tola viscido-pilosa. Corolla purpurca v. rosca. Calyx tubuloso-campanulatus capsulam includens. — Prope Villa de Ybarra Quilensium, alliludine 1180 hexap.
4. N. FRITICOSA Linn. Spec. plant. 258. — Spr. I. c. - G. Don I. c. no. 3. — Lchm. I. c. 23. t — Caule suffruticoso subsimplici; foil, petiolatis lanceolatis oblique acuminatis; corollae fauce inflato-ventricosa; limbi laciniis acuminatis. ♪ - X. *angulifolia* Ehrh. Beitr. V. 100. — JV. *Lchmanni* Agdh. ex Steud. Nomencl. bot. — ? Mill. Icon. t. 185. fig. 1. — Foil, lanceolalis acutis sessilib.; calycib. acutis; tubo floris longissimo. — Crescit in Promonlorio bonae spei.
5. N. CIINKNSIS Fisch. mss. et Linnæa XIV. Lileralurb. 160. - Lchm. I. c. 18. | G. Don I. r. no. 4. — Caule suffruticoso; foil, petiolatis ovato-oblongis integerimis; corollae fauce inflato-ventricosa, limbi laciniis acutis. 5 — A. *fruticosa* Lour. Fl. Cochinch. I. 111? excl. syn. — JV. *Turcica* Haberl. «l Steud. Nomencl. — Pubescens viscida, apice ramosa. Calyx oblongus, srgmentis subaequalibus laureolato-acutis. Corollae limb us rosca. Stamina parum inserta. — China.
0. N. ALIUCULATA Brterro mss. in Moris, Stirp. Sard. clench. Appendix 7. — G. Don I. r. no. 7. — Foil, oblongo-lanceolatis acuminatis, basi omnib. auriculatis aiuplexicaulib.; corolla ad faucem inflata, laciniis acuminatis. Q — JV. *maxima* Holtmannsegg mss. — Habitat in Sardinia verosimilior introducU*

Sectio II. ROSTICA G. Don I. o. 464.

Corolla lutea infundibuliformis v. hypocrimorphia v. tubulosa, semirubri limbi obtusis v. acutis.

S. 1. *Corolla tubulosa v. infundibuliformis, tubo apice inflato, ad os contracto.*

7. N. PISILLA Lino. Spec. plant. 258. — Mill. Icon. t. 185. fig. ± - Lrh. I. c. 29. t - Spr. I. r. — G. Don I. c. no. H. — Caule herbaceo dirhotomo; foil. Mmilib., radicalib. oblongo-obovatis; calycib. brevissimis; corollae tubo subinflato calmer triplo longior, limbi laciniis acutis. ♪ — JV. *tenella* Car. Deter, pi. 105.

- sec. Spr. — G. Don I. c. 467. no. 36. — *JV. humilit* Ehrh. Beitr. V. 169. — *ft. *u-milis* Iehm. I. c. — Gaule bumilion villosa; foil, angustiorib., basi dilatata; florib. minorib.; corollarum laciniis oblongis obtusiusculis*. — Crescit in Montevideo. — Planta pubescens. Folia radicalia rosulata 2-3 poll, longa, caulibus semiamplexicaulis. Racemi terminales. Calyx villosus quinque-dentatus, densis aculis. Capsula ovata obtusa glabra e calyce exserta. Corolla parva lutescenti-vindis.
8. N. GLUTINOSA Linn. Spec. plant. 259. — Lchm. I. c. 32. — Spr. I. c. 616. — Andnas. Bot. Reposit. t. 484. — f. caule herbaceo; Toll, petiolatis rotundatis integerrimis; floribus racemosis secundis; calycibus subbilabialis, lacuna suprema longissima; corollis subnatis, limbi laciniis acutis O — Vicodana *militans* Linn. Act. Holm. W. 44 t. 2. — *Tabula cut vindis* Mnch. Method. plant. 448 - *Sauanibus glutinosus* G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 767. — Crescit in Peruvia prope Guancabamba. — Corolla rosea, extus pilosissima.
9. N. TENDULATA Rzed. et Pav. Flor. Peruv. II. 16. f. I. 130. fig. 6. — Lehm. I. c. 31. — Spr. I. c. 617. no. 11. — G. Don I. c. 404. no. 9. — Caule herbaceo angulato; Toll, petiolatis lanceolatis undulatis; corollae tubo longitudine bilabiaii, limbi laciniis ovatis obtusiusculis. Q — *N. pulmonartoides* Kill, in II. B. Rib. N. gen. et sp. p. III. 2., Kth. Synops. p. II. 140. secund. Spr. I. c. — *JV. brevisifolia* Poir. ex Steud. Nomencl. bot. II. 194. — Lanuginoso-viscida. Flores in racemum terminales dispositi. Corolla lutea, tubo corollae acutis, apice dilatato, ore contracto, limbo brevi. Stigma bilobum. Capsula ovata a calyce inclusa. Calyx subbilabialis quinque-dentatus, densis superioribus magno longissimus. — Crescit in Peruvia.
10. N. PIMICILATA Linn. Spec. plantar. 259. — Linn. Act. Holm. XV. t. I. — Rzed. et Pav. Flor. Penn. II. t. 129. fig. b. — F. Cuill. Obs. I. 717. t. 10. — Spr. I. c. 617. — G. Don I. c. no. 10. — Lchm. I. c. 30. f. — Caule herbaceo subsimpli; Toll, petiolatis ovatis cordatis inaequalibus, corollae tubo clavato glaberrimo, radice nullius longior, limbi laciniis brevissimis acutis. O — *Y. iturh/lorae* C. & Kl. hort. Madn. 1803. — Herba pubescens viscida. Folia petiolata. Florum in paniculam terminalem disposita. Filamenta basi lanuginosa. Capsula ovata glabra. Corolla hypocrateriformis ad faucem contracta Tindis v. Mndilulebens.
11. N. CEIUMHOI DB6 Hornem. Cal. boh. Hafn. I. 214. — Lehm. I. c. 38. f. I. 2! — Spr. I. c. 010. — G. Don I. c. 405. no. 12. — Caule herbaceo a basi ramoso; foil, petiolatis ovatis inaequalibus; corollae tubo clavato pubescente, catenulis nullius longior, limbi laciniis brevissimis acutis. Q — Crescit in Brambia (ex Spr.; — herba lanuginosa-viscida. Flores in paniculam terminalem dispositi C. & Kl.) quinque-dentatus, densibus inaequalibus. Corolla tubulosa luteo-rosea ens ad faucem parum contracta, segmentis limbi subrotundis rotundatis acutis. Stamina subaequalia, ad basin villosa. Capsula ennea obtusa, calycem parum excedens.
12. N. GLABRATA Grab, in Dol. Magaz. t. 2837. f. — G. Don I. c. no. U. — Arborea erecta ramosa glabra. foil, inaequaliter cordato-ovatis nudis glabris longe petiolatis; paniculis terminalibus; corollae tubo recurvato, ad faucem subinflato, ore contracto; limbo minimo calyciformi, segmentis brevibus acutis. 6 — In Bonana. — *Indique* in aca. Folia interdum subsinuata. Corolla viridis, demum lutea, molliter lanuginosa. Calycis obscure angulati densibus acutis inaequalibus erectis subciliatis.
13. N. LAEGSDOFFII Wrinn. mss. ex Room, ex Schull. S. Jst. (CRPI) I. 323. — Spr. I. c. 017. (V. de i. * - Rrun bot. I. I. 1. - (G. Don I. c. no. 4. — Caulis herbaceo ramoso; Toll, inferioribus ovatis petiolatis, superioribus sessilibus subdecurrentibus; corollae tubo clavato, in tubo segmentis obtusis) — *crucii* in Brasilia. — Planta lanuginosa villosa Mscula. Inflorescentia in panicula acauda undulata, superioribus lanceolata acuta. Flores terminales paniculae virides

v. luteo-virescentes. Denies calycis duo superiores longiores. Corollae lubo pollicari, limbo subplcalo. Pollme coeruleo. Capsula ovala oblusa.

§. 2. *Corolla hypocraterimorpha, tubo in/lato cylindrico.*

14 IS. RISTICA Linn. Spec. plant*258. — Koch, Synops. Fl Germ. (I ed.) 500. — Lehm. I. c. 30. - Spr I. c. 610. — G. Don I. c. no. 15. — Black*. Herb. t. 4)7. — Bull. Heib 1. 289. — Sabb. HorL Rom. 1. I. 00. — Afbeldingen dor Arlseny Gcvtatsen I. t. 38! — Bol. Magaz. I. 2221. B555. — Caule Icreli; foil, peholalis o\jiii> integernmis; lubo corollae cylindrico calycem superante, liiubi lacimis suhroiundis obtusis, florib. flatescenli - vlrldibus. 0 — Herba MIOSO \isrida. Folia rassa subcaroosa. Panicula e racemis lerminalib. composita. Siamina basi VIIIOSQ. Capsula subglobosa oblusa e calyce parim exserta. — ? *Asiatica* Schult Obs. 43. — Lehm. I. c. 34. — Foil, inferiorb. ovalis, supertonh. cordati*, uinnq. pilosis; corollis oblusis mucronalii(!) — IV. *Talarica* Horl. Cracov. — IS. *Stbm'ca* Horl. Parm. - *N. trabra* Cav. Elench. horl. boL Madnt. 181). — A\ *rugota* Mill. Diet. no. 7. — Cre&cil in America aubtrali.

15. Y ILMILIS Lnk. Enum. pi. horU Berol. 1. 178. — G. Don I. c. no. 16. — Caule subsimplici; foil, ovatis oblusis repandis, basi aequalib.; corolla tubo cylindrico calyce duplo longior hirsulo, limbo quam lubus quadruplo bre\iore. Q — Cf. Schrank ad Roem. el Schull. IV. 310. — Simillima *N. rusticae* L., at corollae propo.liones aliae el habitus lenerior. — (>on esl JY. *humttu* Ehrh. cf. JY *pu-illam.*) — Credit . . . ?

16. >. PILMOY\RI0mrs Kill in II R. Kth. >o> gen. rl «p. p| III. 2 | - Klh. synops. pi. II. 146. — G. Don I. r. no 17. — Toll, peliolais OMOIRIS aculi*, basi in peliolum decurrentib. pilubiusculis; florib. paniculalis; corolla hypocraterimorphis calycem paullo superantib^ limbo obtuso. Q — Herba >isculo-pilo>n. Calycis quinquefidii »egmenlis ovalis acatis. Corolla viridis, lubo ad apicem >rn-Iricoio. Capoula subglobosa acuta glabra, a calyce inclusa. — Crescil in cullis prope Rio Blanco inter Guachuro el Tulran all. 1620 hexap.

17 >. A>DICOLO klh. in H. B. Kth. I. c. I. t — Klh. S>nops. pi II. 140 — spr. I. c. 017. — G. Don I. c. no. 18. — Foil, sessilih lanceolatis acutiusculn. ha>i angustatis gldbriusculx; paniculis lerminalib. subsimplicih. pitwlis tclutino<n-p||osis, corollis* bubhypocraienmorphiscjlycem paullo buperantib., lobn limbi obtudin «>nnrjinatis. c) — In summis Andibu« Peruvia. — begmonta faljru ovala (litusa. Stamina basi pilosa. Capsula glabra a calyce persisione terta.

1* V |)E(IRR>s Tausch, Flora \I\J** - Foil. OTAI« undulatii^ basi attenuallf decurrentib. x^rosis, r.iule pamcuKilo; corolla infundibuliformn, nd rourrm indatJ, limbo aequah 6-lobo acnuusculo (virescenle). — iV. *ptseudodecurrnu* Moud. m<s. O — CreteiL . . . t

Stctlfthll. PBTUn0IDK8 0.DtaLe.4e5.

Corolla hypocraterimorpha alba, lubo lubcylindrico, limbi nrgmrnti« obtuse * acuiis. Herbae dense %iscido-\illosae. Flores io paniculas t. racemos terminates disposili.

10 >• ME\IC4>4 Schleichd. Linnaea X\ Lilerbl. ». - Lndtqac gtandulo, o-pilo>a: foil, acutis, infimis o>ub>b in peliolum fore aiiKu^lali, supriorib. «vr<us bavin angustatis, ipna basi dilatata subaurn ul u i ^rmi.irapk\icaulib., <iimmis rllipticis lanceolalis^e »«Mstjib, paullulum uirwnj ilnurrnlib ; panicula «tibdu hntoma CQ-rymbote racemusj, calyre sulire^ulan at m. ><dent.n<i, toroliae albar tubo elongalo, supra medium ampliato, hnibo p.ml\o in launia* 5 acuti>>ima4 ar<jualrt partito; cap tola ctlycem aequante - lu Uruco.

20. N SLAVEOLK^S Lehm. I. c. 43. f - Spr. I. c. 617. - G. Don I. c. no. 10. - Toll otalo-oblongfc andutalU villo>iu<rulis in petiolam drurrentib, saperionb. amplicrca> acamiiialis; calycis denltb. tequalib. acuminalis; lubo corollar longissimo gracill, limbo sobtnaeqatli oblusio; caule tmbtiapUei ffloto — A*

- undulata* Vent. Malm. I. 10. - Jcq. Fragm. bot. I. 56. - Bot. Magaz. t. 673. - R Dr. Verm. bot. SchrfUi. III. 1. 303. O — In Nova Hollandia.
21. N. VINCAEFLOA Lag. Cat. horl. Madril ex Lnk. Enutn. hort. Derol. 1. 170. — Spr. I. c. — G. Don I. c. no. 90. — Foil, aubaeailib. oblongo-lanceolalis, utring ailentialis subserrulatis glabris; calycis segmentis aequalib. acuminatis; tubo corollae elongato, limbi lacinus ohlusiuculis; caule superne aspero. Q — Yalde affirm pracedenti, sed differl caule glabro, superne praeserUm verrttuculoso aspero.
22. N LONGIFLOA Cav. Descr. pi. 106. — I). Don in Sweet's Brit. flow. gard. (2. Ser) II. t. 190! t — G. Don I. c. no. 21. — Scabra: Toll, caulinis amplexicaulib. cordaio-lanceolalis acuminatis; corollae lubo longo fliformi, calyce <ubfoliaro qumquies longiori, limbi lobis ovalo-lanceolatin aculis. O — In Chili ot Bonaria. — Corolla primum palhde alba, demum purpureo- v. \indi- flatsceciili picIQ, tubo cxius puhescenle, limbo inlus albo.
23. N. JNOCTIFLOA Ilo,ok. Bol. Mag. t 27851 f - Sweet, Brit flow. gard. (2. Scr.j III. 20*2! t — G. Don I. c. 400. no. 22. — Glanduloso-tiscida pilis>c|. adpre«>i« w»n-lila: foil, peiolaiis oblongo-lanceolalis acutis undulalo-plicalis; corollae lubo cjlindraco caljccm mullo superante, segmenlis limbi aequalib. obcordaio-emarginaiis. 2I — Flores in panıculas terminate* di&posili odori. Curullac albac, infra purpureac. — Chili.
24. N. PKKSICA Lindl. Bol. Reg. t. 1502! f — < Don > « '» 23. - Glulmoso-lanugmosa: foil, radiralib. oblongo-spatbulalis, caulinia ses»ihb. semiamplexicaulib. acuminatis; rnljelb. acute 5-6dis, tubo corollae hpocraieriformi« gracili clavalo, fauce venlcota, limbi laciniis ovalis emarginalis subinaequalibus. Q - Folia radiralia basi rordala. FlorM racemosi o\iraaillare«i bre\iler prdlrollaii, ineunle nocic odorali. CorolUe lubo limboq eilus \indi, lunbo inlus albo — X. dvrurrrnM Agdb. nee Tsrh. — In Portia rulia.
- &- V (PRTLKIA Grab. Edinb. Ke« Pinion. Journ. Jun. 18m ACI'MINAP\ Grali Bol. Magai. t. 2010! f - Dietr. S>nopA. plant. I. 602. — (i. Don I. r. Hti. no 'I| — INecs ah Enenb. Nov. Act arad Leop. Carol, nat. curios. XIX. Suppl I. MI , — llrbacea erecia viscoso-illu«n: foil. Inferionb. mednsq. petiolaiin, i|||<* otatia y. o\nio-ol>longl», basi cuncaiis, bis lanccolalis oblums, stiperionb lanreola\«-lincorib. nessiltb ; flonb. trrmlntlib paucii alterni« prdunculaii*. corolla ABgusla calyre mullo longiore, limbo broi inaequah obiuo. — Proximo arced i I ad N. UnsUam Cav. el A. divrrtifoUam N. ab B. — Corullac limbo paicnlo •Ibo. — In Chili ad Valparaiso.
26. N. A>r>lsiin>MA Ri. *t Pat. Flor. Peniv. II. It. f I. 130. flff. a. - Mem << (imé\o M. MI t \. 3. fig. 5. at — Spr. I. c. 616. — Lebm. I. r' iV f - G Don I. c. no. ±'> — Caule herbaroo ramoso; foil, petiolalit lancooUMs; superiorib lincanb.; corollae lubo superne amplialo, limbi larimis palrntissiniis acutis. — Planta pube<rrn< \iscida. Rami gracilei. Flores in paninilam iirmnlnn diffusom diipoHtu. Scgmenia calycina macqualla lanceolalo-lineana arui.i. rorollio limb. lacU'o huba«M|ualit tubo \irescente. Cnp«uU conira obluta. S>t hanr specim lamquam A. longiliorae Cat. i)oon)mum vull consider an. — In Chili cre^ciu
27. N. DILATATA Lnk. Knam. pi. faort. Berol. I. 170. * O. Don I. e. no. 20. - Caule lublomjfaioio mcoto; roll, sessilib. laoceolaUa, versus basin attenuate, basi dilaUis reptnUks corollae lobo calr<* mulioUes longiore subrhtaio, Imibi larimis acntls. O. - F#Ua loirriora longisslma pedalia « ultra, 3-4 pollirrs l,i,i, caulina rninora, basi dilauu, omnia looge acuminau subtomrnlosa. Calxin v_c^_menta acuiata; corollae lubus eitus Inrsuiu^ limbi lacinus aculiv>imi<* jlbi». - Creont . . . I
- 2B.<. PLIMHA(iI>IFOLIA Vis Elench pi. horl. Dinrgro 20. t. 5. - ^.lld. r.nutn •I. horl. Berol. I.'230. - l.chm. I. c. 41. f - G. Don I. c. 27 - Caulo hrrbarc., toll, sessilib., loferionb. obo«alo-K|iathulalis oblu»i», lupenonb »cmiampicnt-caulib. undulalis; corollae tubo loiigisattno lubelavato, limbi nrgmnuu ovatis

- obtusis. O — Planta scabra pilosa. Rami graciles. Folia supenora oblonga, suprema lanceolalo-Imeana. Hacemi in paniculam terminalem dispo*»ili. Calyx 5-fidus, 10-sinalus, segmenti* maequalibus. Corollae limbo supra albo, infra fuscescenle Ca|»ula o>ata plabra, calycis longiludine. — .V *aeuhfoha* St. Iil. — *N. cn*pa* Pers. Sjnops. I. 217. — Jcq. Fragm. bol. 57. no. 187. t 84. — *A. cennthotdet* Vitm. nee alior — Credit . . . *
29. N. REPA>DA Willd. mss. ex Lehm. I. c. 40. f t. 31 — Bol. Mag. t. 24*4. - Spr. I. c. 616. — G. Don I. c. 28. — Caule herbacco; foil, amplexicaulib. cordaiis spalhulalis subroiundis repandis; corollae tubo gracili longi&simo, limbi lacini* o\ali* aculiusculis. O — *JV. lyrata* Klh. in H. D. Klh. I. c. III. 4. f — kill. Sjnops. plant. II. 148. — Planta glabruscula, ciceptis foliis junionbus, quae sunt lanuginosa. Flores disianles in racemos terminales digesli. Calycis segmenta r> aequalia. Corollae tubas apice clavalus. Capsola ovata oblusa, caljce broiorc. — In Cuba insula prope llavanam.
- 30 N. VISCOSA Lcbm. I. c. 28. | — Spr. I. c. - G. Don I. C. no. 29. - Caule herbacco vi&coso; foil, sessilib. subcuncifbrmib. oblusis, tersus basin dil iini> semiaimplexicaulib.; corollae tubo cylindraco calycem bis excedente, limbi I icinus o\itis oblusib. O — Caulis nngolatus. Rami axillares brctes, (lore (erminati. Tolu 2-3-pollicana. Segmenla calycina brevia oblaia. Corolla alba f?;, a<l api— tern parum dilatata. — In Bonaria.
- 31 > BO>ARIE>SIS Lehm. I. c. 27 f t. 11 — Spr. I. c. — G. Don I. c. no .W. - Taulc herbatico, full. scsMlib. lanceolatis acutis, versus basin Inlionb. Mihrepan- <«<, corollae tubo >ubr\liinlrico, limbi lacinus o\alis obtuse O — IMinia |>i- bcM'enli-pilosa. Folu ban semiaimplexicaulia. Flores racemosi, racemis in CJUO rami>q. ternnalibus. SegmcU cal)cina subaequaha angusle lanceol.ita aculi Corolla lanuginosa alba, tubo apicem versus parum dilatata. — In Bonaria.
- & N. COMMUTATA Fisch. et Mey. Linoaea XIV. Lilerb. 100. t - Foil, ovads im- liusculi in petiolum ahlum aitenuatissimum senudecurrentib.; cal)ci> lacimis liue(ri- lanceolalis acuminatis corollae tubo glanduloso-pubescente, cal)ce triplo k>n- giore, fauce inllala, limbo semi-quinqueGdo, lobis subacquahb. o\alis OIHUMUS- culis tubo subtnplo brevionbus. O — An bujus loci? — Corollae color nou memoratur. — Cre&cil . . . ?

SecUo IV. POLTDICUA 6. Don I. o. 466.

Corolla tubulosa, bafi ventricosa v. hypocratriformiH lixda. CapsuLi 1-mul- tivalvis. Floret axillares folilarii >cl in paniculam lenmnalem di*po<in

^ I. *Floribus panicutatis.*

Si. N. 6OLAMIFOLIA Wlprs. mss. — Caulr fruticoso rirno<o rnm<)<n, MI Inngi* petiolatis obloogis, oblon|?o%c-otuli* obtusliimis carnoKuli<, uirni'i M^IWO- glandulosls, margine subrepandis, uodulatis; llonb. in panirulas lixis irrmonst< diHposih>; corollae hypocralerimorpbae limbo demum redeto \irni loins obtu- sissimis; capsulae ovalae acutae >alvi> quaiuor? \$.

Caulr in specimine vivo, quod In bnrto reglo llerolinrnsi \i<h, plnrlijim|jli cirno»o fruticoso, apice pirre romoso, dense folmso, v basi ad .ipid'iu u*<«< m'tinnjs r.muliferns prntrudenie, foliorum dehpсорutn ricatrinlms noi.u.», %ur J|O, i;landuloso-|iM ido r du approiinata loiue prliol.ili, prtiole lafnlnam aiM|iiaulf |e| ram ionnumquam Miperatiic, len'i, suprrne srmitrreli, rr.isso, J unlul.ixo- vi^ndu, I-*) |M>III *»> longo. I inniii ipsi <|k n^i \ n|j(0->o Mon^i J-o-|in||u lri^i pollicr* I-4 |.iii, r.trnosuli In'ii* iirnlIH, |»| s U'L.IIMI il >M% lit I11ni« |irrii%imi< ulrinq. molliirr, praenpue infn SH^M riii *»- wslia MIUMM W, tiLir^iH' i«»»v^r^ |r| subrepanda, undulala vel unduljto-pUrata. Folia ilh« nniinullorum K..hno- rum rrutirci>orum haud *dU*imilia •dpmtimala in r#m>s »ul<»iii jiinioribus u%r0' >il)>>Tlirillna |iH Pamrul.1 irrnmulM laxa rlongala pedali^ n ulir.i Pcduu* mil, pedirrlli rt cal)cc« glamluloso-|iiridi. Prdirrlli brM<>inu fliformc*. (*.. IM is -sufu'l''! si drntri quinine ina^qual^, nuprrmo <ri|iri>l lation, omnibu*

lanceolatis acutis, post anthesin aectis, ovatis acuminatis Corolla virescens vel vindi-lutea livida, calyce quinque longior. Corollae lobus intra calicem contractus angustissimus, tunc abrupte dilatatus cylindricus, sensim amplius, ad oram contractus, pollicans vel ultra, longiludmaliter stans cum sicco lutescenti-viridis, extus lanuginoso-glandulosus. Limbus patentem vix demum reflexus. Flos lincas latus quinquelobus, lobis aequalibus ovatis obtusissimis, intense viridi* glaber. Stamina quinque aequalia, corollae tubo basi inserta, filamentis ad basin demum lanatis, tota longitudine sparse lanuginosis, tubum fere aequantibus, antheris indivisibilibus, polline flavo. Stylus staminum longiludmicus, stigma capitatum (apicula ovata acula glaberrima a calyce vix tecla, quadmalvis *) albis ovalis acutis charlaccis. Semina plurima minima — *ISiccotana* spec. no. Molmng, Preiss-courant für 1843 der K. K. Gartnerei von Guatamala in Arnstadt in Thüringen p. 4 no. 179. — In Chili, Port of Penna blanca. - (Vidi specimen floriferum siccom et vivum absque floribus in herbario regio botanico Derohncensi cultum)

S. 2. *Flonbus axillibrabus solitariis.*

33. N. QUADHIVALMS Prsh. Tl. Am. sept. I. 14. - Iehm I. c. 45. | t. 4! - Spr. I. c. 017 — Dot. Mag. t. 1778. t. — G. Don I. c. no. 31. — Caule herbae ramio, foliis petiolatis oblongis, corollae lobo calyce duplo longiore, limbi lobis oblongis obtusoscolis, capsulae quadrivalvis. subglobosae. O. — *^oia p¹ania p¹o¹* so-vi! cida integrale old. Folia nupura subsessilia. Calyx profundi* quinquefidus, septicentis inaequalibus. Corolla tubulosa, infra alba — In America boreali ad fl. Missouri

34. N. NANA Lindl. Transact. of the hort. soc. 1. Ser. M. W. — Bot. Rgist. t. 8. | — G. Don I. r. no. 12. Di-annuatio foliis lanuginosis pilosis, radicalibus quinque (lobis solitariis axillaribus longioribus) — *nrnl e lutm c j i mi < »l> l<»nion*, lacinis obtusis O. — *^al)x turbinatis, fimbriato-(MIOMIS (mill alba, r. tun lanuginosa.* — In America boreali, Rocky mountains.

35. N. MULTIVALVIS Lindl. Dot. Rfg. t. 1057. | - G. Don I. c. 407. no. U. Piii* Xscidii tecla v. lanuginosa foliis carnosis ovalibus lanuginosis, inferius partibus lobis, lobis solitariis axillaribus calice multipartito, capsula multiloculari, rotunda RCRmenlis obtusis obtusis — *mosi< O* — Calyx lobatus comatus. Corolla bant ventricosa, limbo plerumque inflexo. Stamina totidem quot limbi adnati urgentissimi — In Columbia. - An rede hujus generis*? — Forte Integra hanc sectio d. genus proprium convocanda erit.

t. *Spectei non BQUM notae*

JO. > riUM'V (iv. Descr. pi. 109 - G. Don I. c. no. 34. ~ Foliis Uncifolium-linrnb umbruljis MSCOSIS petiolatis, pinnulis dichotomis. O. — In America boreali

37. i> | I \ T \ Ink el Olio, | bldngn \ selln Plln/n OL — (G. Don I. r. no. r) — Laule oreolo glanduloso piloso, foliis oblongis lanuginosis r* pindo-dentatis, sabbriH glanduloso-oliatum, calycin denibus longis acutis, corollae tubo longissimo, segmentis limbi obtusis Q. - In Brasilia.

•W. N. ThNKLI A. < i \ Drsrr pi. 105. - G. Don I. c. no. JO. Caule herbaceo liliiformi; Toll. sesmilibus aculis, radicalibus inferius rutiloiv otalii, superioribus lanceolatis O. — A. *punUoe* Linn. e* < e duntur nymnum. — Crescit in Mexico

3^ N. BOTUKDIFOLIA Lin. Bot. MMC. 110 ad Dot. Rrglil. (New Ser.) n. Dleir Synops. glant^L WL no. S3. - Patenti-villosa* caule paniculato, foliis nirsriiib. ovato-oblongis; filamentis 4 inaequalibus, capsula calycis lobis Kitudnu* (resert in >o\ a lollandia)

40. N. FOHSIKI KM. m. d. sdml S\ s\ ujii IN. 420. - (G. Don I. r. no. 17. Foliis Inneolis sulcatis lobis ample | i < uilili, || > M > irutis ', < mle fmiiono > — *.V fruhema* Forst. Prodr. fl. ins. ausir. 17. - In insula AuMnla^u *

41. N. UICOSA Mill. Diet. no. 7. (G. Don I. i. no. J) | < . || o> ali4 | itio Uti < rugo < i < — *fructu* *

ft *Species e genere excludendae.*

- N. AXILLARIS Lam. = PETUNIA NYCTAGINIFLORA.
 N. MINIMA Molina. = MERENBERGIA REPENS. %
 N. NYGTAGINIFLORA Lehm. = PETUNIA NYGTAGINIFLORA.
 N. PARYIFLORA Lehm. = PETUNIA PARYIFORA.
 N. TOMENTOSA Rz. et Pav. - LEHMANNIA TOMENTOSA.
 N. URENS Linn. = WIEGANDIA PRURITIYA.

t t t *Species excepto nomine incognitas.*

- N ALPINA Poepp.
 N. ANISANDRA Vest.
 N. ANISOLOBA Sweet
 N. BERTERIANA Sweet.
 H. BRASILA Hort.
 N. BRASILIENSIS Lnk. et Olio.
 N. DIYERSIFOLIA N. ab E.
 N. FRAGRANS Hierab.
 N. MARYLANDICA Scub. Ubi.
 N. NEPALENSIS Lnk. et Olio.
 H. PETIOLATA Agrdb.
 N. RURALIS Arvabida.
 N. SANGUNEA Lnk. et Olio.
 N. SILENOIDES Salm Dyck.

3842. LEIIMAWIA Spr.

(Spr. Anleitung. zr. Kennntz. d. Gew. 1817. 2. Aufg. 1. 438. — Melsn. Gener. plant. vascul. I. 270. II. 183. — Spr. Syst. veget. I. 017. — Dielr. Synops. plant. 1. 002. - G. Don, General syst. of gard. and bot. IY. 407.)

J. L. (NICOTIANA Rz. et Pav. Flor. Peruv. II. 10. f. t. 120. fig. a. — Poir Suppl. enryrl. méth. IY. 04.) TOMENTOSA Spr. I. I. c. c. - Frulex subviscosus ramosus: foliis lanceolatis tomentosis; floribus paniculatis viscosis purpureis. — fruscil in Peru via.

3843. NECTOXIA JET B. Kth.

(H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pi. III. 10. f. 1. 103. — Kth. Synops. plant. II. 1H. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 270. II. 183. - Spr. Syst. veget. I. 009. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IY. 454.)

1. N. FORMOSA Kth. I. I. c. c. — G. Don I. c. — (quod genus *Nelonxiam* appellat.) — Herba annua (secund. Spr. pereonis) ramosa: foliis cordato-obovatis; periculis neuralibus; floribus flavis. — *Airopa artnaria* Willd. Beliq. et Rocm. et Schult. Syst. veget. IY. 106. — In Mexico prope Real del Monte.

3843/2. LAFBERM Schkhtd.

(Endl. Gener. plant. Suppl. 1. p. 1404. — Schkhtd. Linnaea VIII. 513. - Moench. (inrr. pi. «cul. I. 270. II. 183. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 487.) I. L. MEXICANA Schkhtd. I. c. f. - Folia ovata v. late lanceolata, 4-4 poll, longa, 2-3 poll. lata. 0 — Crocil in Mexico, Hacienda de la Laguna.

3844. MIREXIA L. Rich.

(L. C. Rich. Acl. soc. b. n. Par. 107. - \. Itirh. Dirt. cl. X. (H. r. ic - Meisn. Gener. plant. vascul. I. 270. II. 183. - *htmarckea* Pert. Knrbir. bot. I. 2K - *Lamarckia* flpr. Gen. pi. no. 7W, Syst. vegrl. I. I'll

I. M. LAMARCKIA Pen. I. r. - LAMARCKIA Spr. i t) COCTINKA L. C. Hierb. I. e ~ r. ill. ovaio-oblongis nilidii; Qortb. coccineis. 6 — In duiana (Ajajne).

Tribus II. *DATUREAE* G. Don, General syst. of gard. and bot.
IV. 472. — End!. Gener. plant, p. 663.

Embryonis magis minusve arcuati cotyledones semicylindricae. Capsula Y. bacca incomplete quadrilocularis, dissepimento primario medio v. prope angulum parictalem utrinque placentifero.

3845. *DATURA* Linn.

(Linn. Gener. plant. 240. — Linn. Spec. plant. 255. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 276. II. 183. — Spr. Syst. vegct. I. 027. — Bernardi In Trommsdorf, Neues Journal der Pharmacie XXVI. 140. sq. et Linnæa VIII. Lileralurbl. 115-144. - Dieir. Synops. plant. I. 687. — G. Don, General syst. or gard. and bot. IV. 472. — *Brugmantia* Pers. Enchir. I. 210. — G. Don I. c. 474.)

Sectio I. *BRUGMANSIA* Bernhaxdi 1. o. (Linnaea VIII. Lileralurbl. 137.)

Calyx angulatus, apice quinquefobus. Corollae anguli mucronati. Antherae (non semper) conglutinalae inclusae. Stigma utrinque linealim decurrens. Gapsula bilocularis? Semina opaca obsolete Irigona in lateribus plants luberculalo-rugo>a, in latere convexo subcosolata, lesa suberosa crassissima. — Caulis arboreus. Flores penduli; fructus reOexi. — *Brugmantia* Pers. Enchir. bol. I. 210. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 474.

1. D. *ARBOREA* Linn. Spec. plant. 250. — Mill. Did. 7. - Feuill. Cluill II. 701. t. 40. - Rz. cl Pav. Flor. Peruv. II. 15. t. 138. - Cav. Descripl. pi. 10J. - Willd. Enum. pi. hort. Borol. I. 227. — Rliz»ch. in Olio et Dicir. Allgem. Garlenzeitng. IX. 300. f — Foil, ovalo-oblongis inlegris peliolisq. moll Her puberulis; calyce tercti puberulo; corolla magna Candida nuLante, lubo corollae tercti, limbi lacinus quinqc longis&infm; anlhens dislinclis. 5 - Crescit in Pc-rima. — *Brugmantia Candida* Pers. Enchir. bol. 1.210. — Roem. et Schult. Sjst \egel. IV W7. fr
2. D. *SUAVEOLENS* Uumb. et Bonpl. nus. in Willd. I. c. - Poir. Enc)d. m>lli. Suppl. V. 225. — Roem. el Schull. I. c. — Kliz»ch. I. c. f — Full. ovato-oblongis iniegvrnmis peliolisq. glabns; calyce inflalo angulalo glabro; corolla magna Candida nulanle, lubo corollae plicalo, limbi laciniis quinqc brctib.; anthem congluinalis. 5 — *Brugmantia tuaveolent* G. Don, General fc)st. or gard. and bol. IV. 475. (cx. d. sp. 1. ct 2.) — *Stramonium arboreum* Mnch. Melh. Suppl 173? — Crescii in Mexico.
3. b. (*BRUGMANSIA* D. Don in Sweet's Bril. flow. gard. [2. Ser.] III. I. 272! | - The Botanist 1.1.20!) *SANGUINEA* Rz. el Pav. I. c. 15. - H. B. Klh. Nov. gen. el spec. pi. III. 0. — Spr. I. c. 027. — Arborea: foil, oblongls acumioalis obtuse denlaio-hinuatis pubescenti-hirtis; Qorib. pendulis, dentib. corollae acuminato-lincanb.; cap»ulis inn nub. glnbris penduli*. !) — *Brugmantia bicolor* Pers. I. c. — G. Don I. c. 475. — Hoi. KCRISI I 1730! | — Crescii in Poruvia. — Calyx 2-3-lobus. Corolla srpicmpollirans puhenila, roslis 15 longiludinalilor prominenciibus sanguineis noiala, lubo contllac ha>i virc^renle, dein lutcscenlc, ad faucem srn^im in colorem intense sanguineum iranseunlc.

StcUe II. *STRAMONIUM* Btmiurdi 1. e. (Lioruca VIII. Lilerailil. 138.)

Cal^x supra basin peliaiam perhulenleui circumcissus lubulosus acute qulo-quanguliiK, apice acute quinquelobus deciduui. Corollae margo (limbus) acute quinquaiiK'ului. Stamina inclusa, autbens di>crctU. Capsula erecu oval*, apice bilocuUrii, infra apicem q<adrilorularis (in *D. ditcolori* M In basi biloculan'?) regulariter quadrhahlt. Semlnt comprcssa renifurmia nigra opaca scrobiculato-rugus.i, lesa Crustacea. — Herbae annuae: (oliit ovalis denlalis; flonbus obhqu s %. I. Vorolht ertuM purpurascntibus, intut albi.

4. It. MM.OI.OK Hrrnliirdi I I c r -- (i Don 1. c. 471 no. 1. - Foil tublm incano-pubrscntib. argute \$>inuato-clematis; rapsulu bilocularib. *} muncilo-aculeali^ 0 — *Sli amonium Ammcanttm minus Alkekengt foito* Tourncf. lottil. 110. — Boerh. Ind. I. 251. — *Stramom** (umttartca Kumtitor Hyoseytm folU Hem. Paradis. Lugd. Baiav. 2B. ctm Ic. - Ovicit m India oriental!.

- g. 2. *Corollis albis*.
5. D. INERMIS Jcq. Hort. Vindob. III. 44. t. 82. — Bernhardi 1. I. c. c. — d. Don I. c. no. 2. — Foil, ovatis angulalo-dcnlatis glabris; caule fistuloso herbacco; capsulis erectis mulicis. O — JD. *laevit* Linn. Suppl. 140. — *Stramonium laeve* Mnch. Method. 456. — In Abyssinia.
6. D. FEROX Linn. Amoenil. academ. III. 403. — Mill. Diet. no. 4. - Spr. I. c. — Bernhardi 1. I. c. c. — G. Don I. c. no. 3. — Foil, cordalis sublobalis sinuatq-dentatis pubescentib.; capsulis inaequaliter aculealis, aculeis quatuor summtff maximis erectis. O — D. *Chinensit tpinotistima* Zan. Uisi. 1. 76. — *Stramonium ferox* Tournef.'Institut. 119. — Bocc. Flor. Sic. 50. — *Stramonium seu Datura ferox, porno erattioribut aculeit robuttioribut* Herm. Lugd. Bat. r>83 — Mnch. Histofc III. 007. S. 15. t. 2. fig. 4. — *Stramonium longioribut aculei** Barrel. Ic. rar. 100. c. 1112. — />. *Stramonium fl. eaneteent* Walt, in Rxb. fl. Ind. II. 220. — Crescil in Cochinchina.
7. D. STRAMONIUM Linn. Spec. plant 255. — Bernhardi 1. I. c. c. - Spr. I. o» — G. Don I. c. no. 4. — Koch, Synops. fl. Germ, el Ielv. (1. cd.) 510. — 11/. el Pav. Flor. Perm. II. 15. — Prsh. Fl. Am. Sept. I. 141. — Sm. Engl. hot. t. 12M. - Curtis, Flor. Londin. fasc. VI. U 17. — Svensk Bot. I. 43. — Flor. Danic. I. 4)6. — Woodv. Mcd. bot. 338. t. 124. — Afbeldingen der Artsenygcwasscn IV. t. 3(i)0. - Hayne, Arzneygew. IV. t. 7. - Blackw. Off. Pflin. t 313. - Bull. Herb. t. 13. - Sabb. Horl. Horn. I. t. 92. — Jcq. Fl. Austr. I. 43. — Foil, ovalis glabris innequaliler sinualo-dcnlalis; capsulis ererlis subaequaliter aculeatis. (J — *Stramonium vulgaluru* Grlnr. De frucfih. II. SMB — *Stramonium culytir?* Mnch. Mtmhod. pi. 450. — *Stramonium fnetidum* Scop. Fl. Cnrniol. II. 252. — *Stramonium spinosum* Lam. M. Franc. II. 250. — *Datura loricata* Sieb. Coll. scmin. — *Datura Psudotrmonium* Sieb. Ub. fl. Martin, no. 286. — *D. Capentit* HorL — *Stramonium fructu npinoto oblongo, lore albo* Toornef. loslilul' 110. — *Stramonium foliit angulotisy fructu ereelo muricato, calyce pentagono* Hall. Fl. Ielv. no. .V0. — *Snlanum porno tpinoto oblongo, (lore calathoide, Stramonium rulyo dictum* Raj. S>nops. 205. — *Datura Turcarum* Bessl. HorL Kyst. ant. III. 2. fol. 12. lig. 1. a. — *fi. Chalybea* Koch, Synops. fl. Germ, et Ielv. '1. ed.) 510. — Caulr, potiolii nenisq. foliorum saturate violaceis; calyce violacco rolore suflusa; corolli* dilute violaccis. — (cf. no. 10.) — *D. Tatula* Linn. Spec. pi. I. 250. - Crsrst in America boreali et inde introdocta per totam Europam et Asiam n Afrnrim borealem ad hominum domicilia provenit.
8. I). TRAPEZIA Nees ab Esenberk, Trantarl. of the Linn. soc. XVII. 74. - G. Don I. c. no. 5. - Herbacea: Toll, trapc/oideo-otaiis aruli% repando-dontAtit caulcq. pubescentib.; fruclib. erectis spino!t. (•_) - *D. Stramonium* Wall. Cat. Suppl. no. 278. — Ad ripas praeuptai Irawaddi Qu\ii in India orientali. — An \ar. *D. fattuota*? a qua praeler pubeiceniam el folia minora ac bre\iorj prae»ertim dilTert capitalit tpinosif.
9. I> BOJKRI Delile, Ann. del te. naturelles VII. 286. - (Hujus rssr %idrtur Inn.) — Caule erecto laevi 3-5-pedali dicholomo; foil, lair o>alis aruiis drnlato-rrp.indis; disco basi plerumq. inaequaii; corollis folia ^uperiora longiudmr nrquan-iib.; limbo 5-dentatn; 'frurhb. jumorib. echinulatis credit, ailultit glnbo»i» tuberrul.ilo-muricatis nutantibus. -- Crescii ?
-]. .J. *Vornllim violaccis; caule purpunucrtf.*
10. D). TAIH IA I inn. Spr. pl. 256. - Mill. Dirt. no. 2. - S«rrt, Brit. flo«. nard. I. t. H3! — Brnhardi I. I. r. r. - spr. I. r. - <;, Don I. c. no. (i |>rh. Fl. An. tepl. |. |4|.i Full, ntali* i;lil>n« .ingijl.ilo-drnt.ili*; r.iji<uli« %ubarquahlpr acolealit. 0 — *Stramomtum Tutulu* Mnrh. Mnhod. |.l. U |, |ti,nnnnium frucim tpinoto obtongo, lore purp«r#o Tournrf. I. c. — *Stramonium majus purpurcum* Raj. Ili>t. 748. — *D. Slrmmomium «ar. fi. chalybea k«»rh, s\noj.». n. Germ. ** Ielv. I. ed.) 510. — Cum *D. Stramonio*, ted rrinu* fW«»rM ppm-mi. H*
11. P. {Jl KHCIFOLIA II. B. Kih. >ov. gen. n »prc. plant. III. 7. kill. Sjnop^ plant. II. 150. - Bernhardi I. I. c. c. - G. Don I. r. 474. no. 7. Ilrrbarea: foil-

sinuato-pinnatifidis, subtus In venis hiriellis, dentib corollae acuminatis capsulis
imequaliter aculcalis, aculcis supenonb majonbus O < resell locis Itmpi-
rtus rtgm Mexicam propt* Zcluya el Molino de Sarabia allii OJO hixap

Sectio III. DUTRA Bernhardi 1. o. (Linnaea VIII 1 icriibl 140

^ supra basin pcellim sub capsula persislenlera circumscissus \iniricoso-
lubulosus angulalus v lertliusculus, ip ce quinqiiclobu> deciduus (orolla mar-
gine quinq- v decemdenlala Slimina intlusi v subtxstrta, anihens rein (is
Capsula subglobosa magis minus\ t nutins > rilkxi, apicc bilocularis, infri ipi-
cem qindnloculans, pltrumque irngulanter dthiscens Simun pallida v sub-
brunnei opaca compressa subtrniformia, in disco pi mi, in margine (nimxi i osii*
tnbus rugulosis circumdala, teMi Crustacea — Hcrbac inniiat, in t ild mo MI pi
perenn nuts, fionbus obliquis speciosim

12. D \LB\ ISee* ab Fscnbeck, Transact of the Linn soc WII 7J — 4i Don
I c no 8 — Wall Cat Suppl no 200 — Foil o\ His icumimlis repando-di-
nalis, basi inacquilib c.iulcq herbacco plibnusrulis cipsuli* nulinlib milt ilis
O — *Stramoma Indira pnma teu Datura alba* llmph lib \mboin > 212 I 87
Cg 1 - *Datura Melel* IUb II Indu II 2J8 — \N ill < al 2UM — I liming in
Asiatic research M 103 — *llummatu* Hheule, Hlorl Malib II 47 1 28 *Daluta*
llummatu d mutteala Bernhardi I I c. c — *D muncaln* lie rnl mil, < ilil
setnin hort hrford 1818 — Vues baiten Maga/ II 4 p 10J cum M Ink
Enum plant horl Berol I 177 — *i>* Don I c 474 no II — *D hyndu* Im
Prodr⁹ — *I) humilu* Isf ||>r| Par — *I) laeitt* Schkuhr, lldbch I t 140
D fastuoia ft albo Dop, Prodr 140 — *Stramonium fastuotum fl alto* Miuh
Method 4W — |> *Melel d tnnoxia* Mill Diet I "> — *Stiamanta* Hi s| I |s| \m
v II fol 11 dg 1 a — Crescit ubique pir omium Indiini orient dun, in V | iln
Silhet, Ta\oy etc

13 I) III MMATU Bernhardi I I c c (exel \ar J) toll ghbris, cahn qmn-
quangulan, corollae saepe duplnatae cl triplicatae limbo quiiKjui- \ M<IUI
tato, siamimb inclusis O

a dubia tlon violaceo fructu Incrmi, foil intrgornmis — *D dubia* Pi rs
S)nops p| 1 210 - G Don I c no 10 — *D fatuota 9 rapsulit m tt* M
Poir Lncjel meth VII 401 - *D Talula fi* Poir I c - *Stramonium Vi-*
labancum fructu glabro, flore tmphet tolaeeo Tournef In>lilul 110 —
Stramoma foetida Alalabartca, gemme pallido, porno glabro, flore ampini
t wlacea Hlorl Lugd Bol - *Aita lllummatu* Rhecde, Hurl Malob II 40 i .H>

Sub\ir b More duphcato ct tnplicato, cxlui purpureo, intuH albido

3ludtla-hili-llummatu Hhitdc Hurl Malabar II 51 I. JO

fi fastuosa Mori tilus \iolacco, intiis albo fructu tulx ret litn nuiinti f II
dentalo-smuitis *D fmlucsa* I inn Spir plant iiO — Kill S\n<|is |l II
140 — Spr I c — <• Don 1 < no 0 — *Stramonium fastuosum* Much Mi-
ihod phniir 4W - *Datura t onlarena* Pro%p Alpin b.\s| 181 c ic *Da-*
tura ieyyplara \is| Plant Aog>pt p iOJ cum ic

r rvbta More \iolaceo fructu muncato. MI flinualo-dentali* *straw -*
mum fructu tptnoMo rotunda flore violaceo stmplct Touruef Iniiitut M^{II}
Stramoma Aegyptiaca foetida, temme pallido, porno ipinoso rotunda fl II
vtolaeo iimplct Hurt Lugd Batav

Subvir b More pleno *Ihitra rubra* Hmph lib Amlm n \ j|j ,
87 dg 2 — *Stramonium teu Datura Aegyptiaca flore plena* Ponae Mo-
ris Ox hist III 1,2 fig 0

S *partiflora* \ a s ib I M nbick Irinsid <f ilk linn so< \\\| ", < o.
rolla nnnorr, cihn tub > e r >llu pi is di| I» bn \ion Will <n suppl
no 270 In Indu orunlili, Milabana <l in \ig>plo luijwv > .|MI<I \in<i< .
IPS pro\iiiiin

14. D. METEL Linn. Spec. plantar. 2VV Spr. I. < \ - Ucnihanli I. I. < \ c. - < i. Don I. c. — Corollae limbo derenidrnalalo; cañre loreli; caule foliimj. intoRfrimis dentatisve pubesceniibiii. 0 — #* frulicota llrnem. llorl. ll. ifn. 21-2. — />. *Guyaquilensi** II. I). Kill. No>. gen. el spec. pi. III. & Kill. Synops. pi. II. 1>1 — Schlichd. el Cham. Linnaca V. 111. — Spr. Sjsl. vepet. 1. 027. no. 9. et 12. — (I. Don I. c. no. 12. el 13. - Sv>eel, Ilril. llow. gard. £. Scr.) IV. t. 3*0! | *Dutra niyra* Rmph. lib. Amboin. V. *243. — Kniphf. Cenlur. 1. t. 24. — In letfionibus ralidi* Indiac oricnlali» el Americac meridionalis.

Sectio IV. CERATOCADLIS Bernhardi 1. c.

(*Linnaea* VIII. Literalurbl. 143.)

Calix ad apicem rima laterali dehiscent leretiusculus. Corollae limbus deromdenialus. Stamina subexserta, antheris conligi>. (lapsula obotata inormis pendula. Semina compresso - subovala futcescenti - jrisea nihdula M'ab>riu<>cila, testa Crustacea. — Herba annua: foliis ovalo-lanceolalis dentatis, Mibtu* mcaois; corollis albis, exlus purpurascemibus.

15. D. CERATOCAULA Ortega, Decad. plantar. II. - Dernhardi I. I. r. c. - Jcq. llorl. SchotMibrunn. III. 48. (. 330. — Pers. Knchir. 1. 210. — Spr. I. c - Rot. Maga/. t. Vr>2! f — G. Don I. c. no. 14. — Ilerbacea: foil, ovalo-oblongi* %. ovalo-lanceolali> eroso - sinualis, sublus glaucis, limbo coroll:ir infundibuliformipatenle angulalo-deciMndrnlaio, denlib. acutis; capsulis incrmib. pendulis 0 I), *macrocauli** Rth. RtMfr.ipe 1W. — Prope urbem Moxici et in in^ula Cubi.

† *E gen ere crclmlenda,*

▷. ^AR.MEMOSA Lam. ^= *Solundra granth/lhra.*

f † *Mon nisi nomine notac.*

D. ERINACKA Arrabida.

D. (IIRI^iMANSIA Pa\t.) WACIMA^M Sleud. Nomcncl. bol. (ed.) II. 4*4.

!SAi\ HOL% \DRA *Strrtz.*

Swrl7. in Arl. Holmions. 17*7. WO. t. 11. el Fl. Ind. occid. I. -^7. I. 0. - Mn*n. lleiirr. plant. ta*cul. I. 270. II. is.1. — Spr. S)«(s. \c^ciab. I. 701. - Dicir S>imp<. plant. I. 711. - <2. Don, (irneral <)st. or Kard. and but. IV. 475.

1 S. SWAUT/IV (Jmel. Syst. \i-act. W). GKAMXFLOKA S^rt/. I. I. r. c. Rrhh. Flnr. exotic. II. 41. t I- 134! — Spr. I. r. - 2. Don I. r. no. I. ' ; - Jrq. llorl V hoenbrn. I. 21. | t. AS. — Sal. in Transjirt. oT the Linn sor. \|. KH I. 0. — *J:in, Exoi. hot. t. 0. — Rot M.:is.i/. t. 1^74. - Tuss.ir, Fiori* di< Antilles II. 4ft. t I. 12! Foil, allernis a.'gir^ilis \isridis pubr<>rrnlib. peliolalis obo\alo-oblongiH .iriiiim.iliH; florib. IrrnniMlib. pleruni(|. solil.iru>, r.irius 2-3 **aggregatis**; Liriniii rorolLie ol)lulisHimis; anlhrris ^ublunatis quadricornil). apirul.iis, **bas** parum fissim. j — S. *Mcantens* Willcl. Rrlig. in Rorm. el Schult. S>si. M^Vf. IV. 700. — *Datura sarmentosa* Lain. llly<ir. II. 0. no. '20>t. ('.inks r.iiniqiir r.idi-r.inrs. Folia, rann Irnuce el rahro>> |.inui{in< iisud.i terli i'i\| «1 petmli p.illidf purptirasrenli-ur'enle-i. (!ahx liibiilo<>im rornuhit, ad .IIKUOI ina<^i|ii.ililrr J-J-li<ltiH. t'.orolla 7-M-pollirarit, lubo p.illide \irrsrrnti-luiro, surMim Kr.id.ilim .niipli.i o *)-r<>rni, hmb<> ,ill>o, p.ird* indi\i<a obnololr 10-roriii, r<irnuhu% 5 lilo nliMiiir purpureo apimlal'i, sr^mrnli> rxtiin ptirpurris, intrsiilui pant* nubor-liiniLiliH nliahs. (itMul.ili.i etsert.i. Fnirlun p)r.iniulalis lulrsrrnli-Mrt<^ri>n<i. luloculariv apirrm \rrsu<> Hiili(|uadnl<i(ul.iri<>. st*iuin.i rriuiforinia In J.nn.iir.i.

2. S. MTIDA /urr.vn. 4 nil. in Rocin. < ollrrt. II* no. 40. — <* D<ui I. < \ no. 2. ; ~ Foil. Klabfrimis niidis in |M*U<>IUII allrniMii* a^rc^ilis OIIL.IH^IH atuminali<. margini* rr<oluli<; liorib Irrm lulib , pli^ruiii<| su|liaru< UIIIIMH, r.iiu<> 2- I ' >> KrrKAli^ anilirn* Ulrralib. birurnuh*. j - *I'orliamda gramiltfnra* Hurt. IIMa*. *Datura Marmmtota*'fi. Lam. I. r. — Prlioli <iolarri, pili* p4iid> ob%ih. l.al< < l i.'InliduH, %r<mrnli> inar<ualib., m-tricuir %rin<>si% |irumiri<. <.ur.i|j \rnupe<, it ilis luiisrrnli-alba, nrr\i< 0-7, mtu% br>iniir.i, rxiu* nndi*. tubu 0-7-angulalo, I i-ilo u-7—lido, ^egnrntit rotundjln rrenjlo-unduljli*, citus <iulacei>, prinum

- ercelis dcumq. revolulis. Sigma capitatum viride. — Differet a pracedente foliis glaberrimis nilldis; antheris bicornulis et calyce corollaque exhis ^labris-
 —Caulis arborescens, rami clongali flexile* divaricali, coilice decidua. —
 Crescit.?
3. S. VIUDIFLORA Sims, Bol. Magaz. t. 1048. — Lnk. el Olio, lion, plant, select. I. 101. t 1.47. — Spr. I. c. — G. Don I. c no. 3. — Foil, elliptico-oblongis, ulriq. allennialis glabris; florib. lerminalib. sulitariis pedunculalis; calyce quinquefido, segmenlis lanceolalis aculis aequalib.; corollae tubo abrupte inflato poslaque parum conracto, segmenlis clongalis revolulis. 5 - Crescit in Brasilia prope lio de Janeiro. — Folia deridua. Caule foliorum lapsorum cicairicibus iccto. Corolla viridis debilis. Genitalia longe exserti.
4. S. GITTATA J. Don in Hot. Keg. t. 1MI. t .** <* I>» I. c. 1M .4 " Vial Ialis elliptico-oblongis aculis, sublus lanuginosis; floribus icraiin.ilibiii solitariis; corollae segmenlis crispalo-crenalis palenlib., lubo calycem subduplo excedente; calyce tubuloso triloWo. § — *Tecomaxochill* Hern. Mexic. 40K c. ie. — Frutex erectus ramosus. Itami Foliorum lapsorum cicalribus hispidi. Folia acula v brevilier acuminata 3-0-pollicariaf 2-3 poll. lata. Flores erecli breviicr peduurwiali. Calycis lobi ovali aculi, lerlio minori. Corolla ampla inrundibiilirmis pallide lutea, maculis purpurcis in fauce nolala, limbi lobis lalissimis roluinalis. Ovarium qijadrilolularc; sigma capilalum. — Crescit in Mexico.
- † *Species vix nota.*
5. S. OPPOSITIFOLIA Loud, llorl. Brit. 71. - <i. Don I. c. 470. no. V - Foil, oppositis; corolla magna alba. 5 — Crescit in Zcylania.

Trihus III. *HYOSCYAMEAE* Knell. I. r. p. (1)4.

Kmbryonis rnopis minusve nrcnali cotyledones setni<>lindirar. (lapsulii kilurularis, operculo circuinsciso.

3s47. *HYOM V. i m* Tournef.*

(Toirnef. Inslitul. rei herbar. 42. — Linn. Spec. plant. 257. — MESH linier. plant. vasrul. |. ^70. II. 183. - Spr. Syst. |egel. I. 015. - Dieir. Synops. pl.ml. I. Uil. - Či Don, General syst. of gard. and bol. IV. 471. — *Phytorhtaina* G. Don I. e. 470.

8ectto L *HYOSCYAMIDIUM.*

Calyx lubulcus quinquefiduM penidlenK, bani vontriropKuf*. Corolla cnmpanulalu-inrundibiilirmis, limbo obliquo quinquefido, kegmenlis oblu%i?», uno rHiqui«« nuiltto majori. Stamina inclinaia. Sigma rapiUUum. Capnula ralyci 'imm n^ biloeularU polysperma opcrrolata. - Herbac \iscido-lanalaie concscenleh fociidnc: foliis d<-(-urrentibis amplexiaulibus vel petiolalis; floribus aiillahbun srsMhlnih w| brc\itei pediecll.iis IMMfi.Uilms srorpioideis alternis, pallide luleis, purpureo - \rn<isis \<| luleis rundoqiit* olisruro.

- I. II. MGKII Linn. Spec. plant. i^7. - Spr. I. r. · Koib, Syiif»s. II. Grrm. I. <€ WW. — G. Don I. c. 471. no. I. Siurin, llfl. 3. - Flor. D.uur. t. IIV2 sm. Kngl. bol. I. MI. - Wood\ MIMI. but. 111. t. W. - Blurk». link |. YM. IMurk. Icon. t. 07. - Foil. ovato-<iblongis |niinatilido-Hinuati«*, inlimis iuMn>lili». r.iulnn% semiamplexieaul.li., floralib. ulriug. 1 - 2 - dentatis; florib. nil>M>silib. .-ixill.inb.; Corolla MiilpburiM, \cnis nigrift in faure atropurpurrii lalinrib(|. perrurs.i. 'o. et / — If. *ayreslis* kit. apd. Sebull. Ö«ir. Flor. I. JKL — II. *Yrrrimaig* Lrjeune, Flor. Spad. I. 110. - // . *linhrmirui* Srbmidl, Flor. Bobem. no. £». - G. Don I. r. \| no. ± - Mert. et kill: Fl. Germ. II. '£». - 8«rel, Brit. I|<>*. gard. I. I. '27. - // . *ftarui* Fchs. Hist. slirp. 4.«. — II. *niger* Sira-t, Bot. Mag. t. UOI. - // . m'7,, ' » . *tujreilit* Nees ab Ksenberk , Transart. of the Linn. Soe. XVII. 77. - // . *fulhihu* Koch I. c. · Florib. uniololorib. |i.illwlis. — // . *juillidut* W.il.Kl. r| kit. «\ Willd. Knum. plant, boil, llrrol. I. ^ >|r. I. <: (i. |<.n |. r. n ., ;; - i, r M 1, p.,, tolam Kuropam, in (.HICIMI .M in Indii Ixircili ad \ia» in limcuv
4. H. KETICri.ATI'S Linn. Spee. plani. I,I. Spr. I. r. loll, r.uilinis priiol.ili* Cordatis sinuali» aeuli», lluiahb. iia<-ic*rrini»; flonl. Mil.ju-aucirulu^; corollae

- ventricos reticulatis. O — Similis praecedentii, sed folia caalina otala repanda, supra migis gluhra, floralia ovaia SOSMILI Integra. Pedunculi brevissimi Floret rubn pulhrehre ob!»curcque relieulali. — // *peculiant* Cam. Ilort. 77. I. 22. — // *Aegyptus* Kaj. Hist. 710. — // *peregrinus* Clus. Pan. 702. — Crescil in Aegypto, Sjna et in Creta.
3. II. ALBIS Linn. Spec. plant. 2^b7. - Spr. I. c. - Koch I. c. - G Don I c no.4. — Lam. Illusr. t. 117. fig. I. — Mill. Fig. I. 140. - Sibthrp. et Sm. Flor. (iraec t. 230. - St Hi I PL. fl. Fr. 45. t. 5. — Cull. Herb. t. 55. — Sabb. Ilorl Rom I. t. 191. - Mark*. Herb. I. 111. — B»sl Ilorl. Eysl. 8. t 8. fig. 2. — Foil, omnib. pctiohiis subrolundo-ovatis, sinuate, oblose lotalis, supenonb. repando-dentatis, florib. j»ubses5.ilibus. 0 — Crescil in Europa au«»traliori.
4. H. \ VKIA\S Vis. Bolan. Zcilng. 1829. 7. — G. Don I. c. 472. no. 5. — Lanatus »BCKIUS MI. potiolali» smu.Uo-lobatis obtusis, infenonb. s-ubcordniis, supenorib. o»ali!», basi allenualis subintegm, florib. racemosis secundi* sub^essilib, infe— nonb. longe pedicellalis, coroll.ic tubo incur*o, inlu» obscure purpurasarrote, drmm \indi, limbi lacimis irregulanb., supenonb. tnhus laliorib plains Q — H)lm«lu» Mdetur ex // *albo* el // *aureo*. — Anlhrac lilacinae, demum albac. — Ot¹ oil in Dalmatia.
5. II U HELb Linn. Spec. plant. 257. - Spr. I. c. no. 8. — G. Don I. c. no 0. f. 41. — But. Mag. i. 87 t — Sibthrp. cl Sm. Flor. Grace, t. 231. — Icon plant, in China r.asrenl. 17? — Dull. Herb. 1. 20. — Foil, pcliolatis- o\alis aculis ank^Tilalo-dentatis MIOSI^ (v potius lobalis, lobis inciso-crenalis ciliali< ; florib. pedunculatis; ci rmlac aureac lirinn» Inbus mnjonb. undulalis. ^ — II (*relirus luteus major el tn.w,r* Tournef. Inslitut. US — Mor. Hist, heel \. t. 11 fig 4. — // (rr/irui Park. Theatr. 302. fig. 8 — Alp. Exol. 09 I 98. — Tota plania pilis vi»cidii \eslita est. Folia undulala. Denies cal)cis brevet rolundalo-ovah mucronati. Corolla luica, basl obscure violacea. Slamina el anlbrae violaceae. Cap^ulae panae — Oescil in Onente el in Europa ausrali.
- f) I! CUIKIUHII Fisch. et Mry. Lmnaea XII Lilerbl. 100. f — Dirnms pli (MIOSO-MIOSUS foil, ovalo-oblongis, basi attenuatis, infiniis peliolniis pinnatilMlis, reliquis subsessilib. sinuatK v. (floralib.) subinlegris; Ilorib. axillarib subsexsilib.; deniib col)cini?» lanccolalis pungenlib.; limbo corolla** reliculalo cjalhiformi; shlo exscric; stamimb. mcluj»is O ~ Habitat in Persia.
- 7 II SKNKCIOMS ^illd. Kuum. plant hort. bot Bcol. 1. 228. | — Spr I c. - (I Don I c. no. 7. — Foil. peliolati» subtnlobis inciso-dentatis; florib p. dunc.ihis, Linruis limbi coroll.ie aequalib. plains- ^ — Tola plinta piloso-nscosa. foliDrum lobo medio lobulalo, laieralib. dentalis. Corolla aurea, Tundo \io\acco, im tintiun .id uiseriionem staminum purpureis. Filamenla violaciM, anthrar .ilb.ie. (al)cen frurlifen penduli. — Valde MDIII U. *aureo*, »cd noiis indicatis sntis tuperque diTrU — Crencll in Aegypto.
- N II MI rid S Linn. Want. pi. 45. - Spr. I. c. Old no. II. - (I Don I c. no 8 - Full peiolatis o\ali« acute angulatis, florib. pedirHI its cahec muncb; hr.ic(ei» IIKIIM4 / — // *albus AttjipUacus* Alp Exol. IttJ. i |ft«« _ // *minor* Mill. D <; n > 4. — // *brutacofotiu** Lam b<ct III 320.— I anuginosu* Con>lh nlui luici, inius obsciin* purpuri'i, se^mentis 2 infenorib minontt albit, drmm omn bui .ilbis, liuiSo (NMI SUIIIIM purpurca. -- Crescil in A«n'»>»io, \rabia et in «ru ni*»
- 9) II l)\h)U\r Forsk Desrr 4«v trih ^ - f. Don I c no <) I .II „rii,- lats ovato-I.UH fo|.i:is dentil tilatiH, llmb snb>Nes«ilib, foil (I rail) v bractris udaviv, — \ MUMIN (ah\ «<in j »» I«MM U^ 11 >rrs in »pu i- longA, »crnn-das disp(»%iii, m caulo quo^M h'rnas (• mlli ntns ^• 11 si luli«rin«, mlu> »io— tare i. inirr srgmrnla inferior* alba. Stamina hi*! %illo»a Corolla pUntae iilitai* vsi lulra, fundo viuUrrn — K«««e ndrlur hare species \rycnthet Ilomerl* In desertis \rg\|li prope Cahirain ^
- in II I \>|HIINs|s ker, B>1 llegisi. i ISO - (, Don I r no |0 — Frulicotul I iloiui> f 'I lufiorib c<jrdaio-o^ati« obluoi^ ni^ulaio -dentatis superior!^

ovato-oblongis integerrimis pilosis; florib. subpedunculatis; limbo corollae maequali. Toll. (loralib. ovatis v. ellipticis inlegns. 5 — Crescit in Canarus. — Corolla lutea, macula obscure purpurea v. nigra in fauce.

11. H PI SI I LUS Linn Mantiss. pi. 330. — Spr. 1 c. 010. — G. Don I. c. no. 11. — Plucken Phytogr. t. 37. fig. 5 — Caule herbaceo; foliis lanceolatis pinnatis glandularibus petiolatis pilosis; floribus pedunculatis; calycibus omphalibus mucronato-dentatis, limbo corollae inaequali. Q — Folia floralia Integra Calyx fere corollae longior. Corolla parva lutea, (undo Molacco. — Crescit in Persia.
12. II WU IUMIIS Ldl) mss. ex G. Don 1 c no. 12 - Foliis, petiolatis oblongis, radicalibus pinnatifidis, caulibus dentatis v. inlegns; floribus sub-essilib; calycibus dentatis mucronatis Q — // *putillus* Ldl). Fl. Alt I 228 nec I inn. - < aequalis simplex v. ramosus parce pilosus. Calyx basin versus attenuatus, dentibus elongatis lanceolatis mucronatis. Corolla parva in calyce longior lutea, fundo obscure Molacco, limbo parte inferiore fere ad medium usque tubum fissis. Capsula calyce brevior. — Crescit in Allai et in deserto kirghisorum.
13. II. AURIC ILATLS Ten Fl. Neapol. prodr. 10. — G. Don I. r. no. 11 - Caulis erecto simpliciter, foliis ovatis petiolatis mucronatis acutis, petiolo* natis, basi auriculatis; floribus sessilib; corollis luteis, fundo venis purpureis reticulatis O -" " regno Neapolitano. — (Spr. 1. c. 015. no. 8 hunc cum // *aureo* consociandum esse credidi)

Sectio II. PHYSOCHLAINA 6. Don 1. o. 470.

Calyx subinflatus quinquefidus, denibus^ O^UH oblongis. Corolla campanulato-inflata lobulata, lobis brevibus obtusis SMmna 5 exsertis, filamenta fundo corollae adnata, basi pilosa. stigma dilatae Amherstii Kiludinaliter dihiscentes (.ipsius bilobulatae open ulua — Hurbae peremien caulibus simplicibus, plunibus ex eadem radii r I olia allra solitana inlegra. Flores fabiculati Cdjulalo-corjmbos terminati (corolla obscure purpurea.

14. II AIKOPA Georgi, Beschreibung d*. Huss. Krirkh Nchrg 201 - Physaloides (JIAI>A (. Don I. e. no. 1.) PHYSALOIDES Linn. Amoen. arad. MI I 0. lig. 1. — Linn. spec. pi. AW — spr. I. c. - Dot. Uagai I. MM — hucel, llnl flow gard I t 11! f — Foliis, petiolatis ovatis acutis subrepandis v. inlogerrimis, floribus pedicellatis terminalibus capitato-ror)mbn»is; gemmalibus corolla parva brevibus; calyce fructifero inflato nungulato glabro mulico, capitula multo majora — Itadix subrepens. Tota plaua glabra. Folia obscure viridia glabra o\ala, basi truncata, integerrima v. repanda. Corolla purpurascens->iolacea. (.re^cil in Sibiri, \ll.n el in deserto Kirghisorum
15. II (Physoflil \>A G. Don I. r. no. 2.) ORIENTALIS M. A. Hüb. Flor. Laur. Cauc. I 101 - Spr. I. e. Hoi. Migaz t J4I4 ^ ni, lint llo* .:ird I i |' { — Foliis, petiolatis deltoideo-ovatis acutis lanuginosis. floribus »MIM llalis (.itdiulalis capitato. corjmbosis, gemmalibus parvis exsertis, eaee fructifero lundin lanuginoso muero, capsula multoties majori ^ fauli* MIOMIS i orolln pmlldo purpuro-rnrriisrns \.i|de afnii pncedenli, differt tamen Haiura r<bus-llon, folns palhdionibus magiM]uc laiuiginovim, ralje longiori, corolla Kradaiim ampli.u.i, gemmalibus pleruniqu exnertiH cnlyiequ<* fructifro minu» inflato, r<|>-ulani duplo oxidente. — *lyoicyatnui ortentaht lirlar folto tuberosa radico* Tournef. Cor. p. 5. - Crescit in Iberia prope Naraiwim
10. II I'tAEAITIS Wlpr<. mss. - Foliis oblongo-rlioniboideis repandis llnnli lize pamrulic, corolla Mndi-lulescent; capsula cnhie nindrano sub r< r< n< iudusa. O* *Illiuva pmcalln* > tie niss m Jrquem \o\ a^e but \ HI t. 1.0! — *Nicutum dubta* J< < ut in niss (rtN(H m ludiae urn ut ih» r< g<ouubus borcalibu

t *Specus c (fiticre t nlusa*

II ^OPOLU Linn - SC.OPOI U < AHMol.K \

tf *Species ignotae.*

II MXSII G. Don

H. PICTLS Bernb

II. PSEUDOPHYSALOIDEb Bih.

3S48. **IMSODIS** Lnk.

(Lnk. Icon, select, pi. hort. Berol 77. — Mcl**n. Gener. plant, \ascul I 270 II. **18J**.
— Spr. S>w. yeget I 099. — G. Don, General s>yyst. of gard. and bot IN. 457 —
Ntcandra Lnk. et Otto 1. c. t. 33. — *Whitleya* Sweet, Brit. flo*. gard II t. 125
1 *
LIKIDLS Lnk. 1 c. 77. — Spr. 1 c. — INecs ab Escnbeck, Transact of the
Linn Soc. **WII**. 72. t — *Ifieandra anomala* Lnk. ct Otto I. c. t. 35! i — *Physalis*
Hithleya S*eeet, Brit. flo*. gard. II. t. 125! t) *slramontfolta* Wait. Cat. 2U32 el
in Rib. Fl. Indie. II. 212. — *Anisodu* stramonifohus* G. Don in Loud Hort. BriU
61. 21 — Crescil in Nepalia, Emodi, Gossam Than.

3840. **M'OPOLII** Jcq.

Jcq Obscrvat. I. 32. I. 20. — Meisn. Gener. plant. ta>cul. I. 270. II 18J. - G Don,
General >)st or gard. and bot. IV. 470. — *Scopohna* Schult. Oe>tr. Fl I *14)
I Sr I UIMOLICA Jcq. I. c> — G. Don I. c. no. 1. — *Scopohna ahopoulct* Schult.
I c. — *Hyoscyamut Scopolta* Linn. Mant. pi. 40. — Sturm, Fl. Dculschl. lift. 21
St. Iiil. IM 11. Fr. 20. t. 0. — Bol. Magaz. I 1120. — Foba o\alo-oblonpa Integra,
caulina alterna solilana, ad ramificaciones terna \crlicillata, caulina bina, (lore
sohiano pendulo inter foliorum pana orto. Corolla extus nitidj Cusca, interne
opaca olncea. ^ — In >>hi> (.armoliac el llunganae

Tribus IV. SOLAI\EAE Endl. I. c. p. 004.

**Kinboonis magis miousve curvali cotylcdones semir)lindricac. Bacra
bi- plunlocularis, placentis centralibus, rarissime capsula e\al>».**

:H50. M (i\ D R I *Adans.*

4d.miN Families des pi. II. 210 — Mcisn Gcner. plant. \a<<cul I. 277 II 1*4 —
Spr. Sjsl \eget I 090 lexcl. sp. 2 | — G. Don, General s>st of gard and lint IV.
457. — *Calydermot* Rz. et Pav. Fl Perm. **1144**. — *Alkekenyi* Fcuill Perm 724 1.10)
1 > ' ATKOPA Linn. Spec. pi. 200. — Jcq. Obscn. bou \|. t. (H.) Pins\|<)|DES
Grtnr. De fructib. el seminib. II. 2J7. t. **131**. — Per*. Enchir I 210. spr. I. c.
no. 1 G. Don I. c. no. 1. — Bol. M.ipa/. I. 24-V — *Radix fibrosa* l'oli.i glabra
Miiuala, Mmilia illis *Itaturarum*. Corolla magna caerulea radi.Ua, Tuuido allio,
maculiH 5 ol>cure coeruleis noiaUi. O — (*alyricrmns rr<>»us* IU. i* Pa> I. r. —
Physatis Pet m tana Mill. Diet. no. 10. — *Phytalis daluraefoha* Lam Dirt II 102.
no 15. — *Alkfengt ampio floie uolacto* Fcuill. I. c. — Crescil in PtTim.i el inde
teroMimliler introducla pro\eml sponlc eliam in Virginia el Penus\|anu

i E genere exctudendae,

> *AMKHK* Willd — POTALIA AMARA.

> .\NOM\LA Lnk el Olio. « AMMIDls LI Rlhl ^

> IM)K.A Room, et Schull. — PIHS4LIS LNDH.I

351. PHYSALIS Linn.

I inn dener pi 2M), **p<f plant 101 — MeiMi Gener. pl.int \i^< ul. I .:, II <|
— Nee* ab KM'nberk, I innara \ 411 4M — G Don, denrril s\st of ^ 11< .ind
h*1 I \ 117)

Sectio I. **PIYSALODENDRON** G. Don I. c. 448. I miesd-nir., 11 TIIMIH .%v'iew'His
I PH. SOMMIKR4 Ink Kmim |l hurt llerol | \HI .> .ib l.^rnb. I. c. 4W ,

Frutu iNa LH inioderrriiin<, fli>riti tonfrtris

a flejuma <.aulc magis n>iuoso, full pubrHi i nlih > put>eM.ciili-lniu< ntnsi%,

onti iiiimrib , Ijritiim <al\ri*> tultuni siium .n i|u.iiili|nis /r/ **fnunta**

I inn sp_M pi | 201 - >MU ^per |> I *UtJ*) Jr,j \\\r£ \ | ii

Rxb. Fl. Ind. or. ed. Wall. II. 240. — *Ph. tomentosa* ? Lam. Encycl. meih. II. 09. — *Pevetti* Rhedc, Horl. Malab. IV. 113. t. 55.

• Caulc foliisq. pubescenli-tomentosi v. etiam glabrusculis. — *Ph. flexuosa* Wall. Cat. 2635. A. B. C. II. — *Ph. Sagunda* Uamill. lib. — *Ph. Alpini* Jcq. Eclog. 1. p. 39. — Prosp. Alpin. De plantis exotic. 71. t. 70.

•* Caulc tomentoso lanato; foil. pubescenli-tomentosi, canescentibus. — *Ph. flexuosa* Wall. Cat. 2635. E. G. — *Ph. somnifera* var. *Indica* Humb. mss 9. Caule minus flexuoso; floribus dimidio majore; calycis laciniis tubo nunc brevioribus, nunc eundem adaequantibus».

* *communis*: Caule floribus tomentoso-lanatis; foil. pubescenli-tomentosi* glabrusculis, etc. — *Ph. somnifera* Linn. Horl. Cliff. 02., Spec. pi. I. 261. Sibthorp. Fl. Grace I. 23J. — Cav. Icon. pi. II. 2. t. 103. — Jrq. Eclog. I. t. 22 — *Physaloides somnifera* Much. Method, pi. 473. — *Solanum tomentosum* var. *reticulatum* C. Uuh. Pinax. 160. — Moris. Oxon. Hist. pi. III. 520. no. 26. Sect. 13. 1. 3. fig. 31). — *Alkekengi fructu parvo verrucillato* Tournef. Instil. rei herb. 151. — *Physalis* Diosc. Mat. Medic. IV. cap. 02. — *Physalis arborescens* Thunberg. Prodr. fl. Cap. 37. — *Ph. tomentosa* Sieb. lib. fl. Mauril II. no. 2-20.

** *tomentosa*: — *Tola tomentosa*. — *Physalis tomentosa* Thunberg. I. c. Willd. Spec. pi. I. 1021. — *Crepis* in Graccae insulis, Cauarns, insula Mauriln, in Promonlono bonae spei et in India orientali.

2. PH. ARRORESCENS Linn. Spec. pi. 201. — Willd. I. c. 1030 — Nees ab Esenb I. c. 456. t. — Fruticosa (caule arborescente): foil. repando-dentatis; floribus aggregatis pendulis; corolla quinquepartita. — Mill. Diet. no. 8. t. 216. fig. 2. — Inter dubias planas rejicienda est. — Crescit in Mexico.

Sectio II. EURYSTORHIZA G. Don I. c. 448.

Fruticosa (?) vel herbacea, radice alata cauleque basi perennanibus. Flores solitarii. Alabastrum dum clausum, ratione corollae magnum utriculosum

3. PH. VISCOSA Linn. Hort. Cliff. 406., Spec. pi. 1*1 — Willd. I. c. 1021. — *Ischaemum* ab *Koenig*. I. c. 457. — Herbacea: radice perenne repente, pilis brevibus. 2-3-furcatis scabra; caule dichotomo; foil. ovalis integris dentatis; floribus. Mibimaculatis; calycis laciniis inaequalibus. late ovalis.

a. Folia late ovalis subcordatis integerrimis repandis, obtusis aculeis glabris. — *Ph. Pennsylvania* Linn. Spec. pi. 1670. — Willd. I. c. 1021. — *Physalis* Fl. Am. septentr. I. 157. — *Alkekengi Bonariense repens, bacca turbinata viscosa* Dill. Uort. Elth. 11. I. 10.

ft. Foil. ovalis repando-dentatis, saepe aculeis minoribusque. — *Physalis viscosa* Jcq. Horl. tution. II. t. 100 — Roem. et Sibthorp. Sjss. Vogel W. (72) Olin — *Physalis viscosa* Lnk. Eniini. pi. horl. Berol. I. HI. — *Physalis viscosa* var. *repandens* caule procumbente; foliis majoribus acute dentatis, peltatis *ptotrichis* longissimis Mill. Diet. no. 3. — Crescit in Brasilia, Virginia, Piansa, etc.

4. PH. CLAVATA Linn. Hort. Cliff. 02., Spec. pi. I. 201. — Willd. I. c. 1020. — Nees ab Esenb. I. c. 400 f — Fruticosa, pubescenli-velutula (pubescenti simpliciter articulata). caule erecto; foil. ovatis repandis; floribus. volutaris Imnariis; calycis bursae Lirini subulalis. — *Physalis angustifolia* Lam. Illustr. grn. no. 28K — *Physalis angustifolia* var. *repandens* *Solano anhuorum simile, foliis Onyam tubincani* Moris. Oxon. Hist. pi. 111.527. — Plucken. Almag. 352., Phyllogr. I. 111. fig. 5. In Curasao. — Differt a specie praecedente, cui quoad folia simile, pubescentia simpliciter, calyce dense hirsuto minore, Kicimis brevibus) subulalis praedito, corollae fundo pallido.

5. PH. ALKALICEM Linn. Hort. Cliff. 12., spr. pi. 2(2. — Willd. I. c. 1011. — *Physalis* ab Esenb. I. c. 461. — *Physalis* knrth, S-nops fl. c. 1. — *Physalis* Schkuhr, Hndbch. I. 4V — *Physalis* Afljeldmgen der Arlsrny Hassen III. t. 298! — *Physalis* hibthorp. el Sm Fl. Grace, t. 234. — Blackw. Herb. I. 101. — *Physalis* Plcnk, (off. Pflnm. t. 124. — *Physalis*)nc,

- Arzneigew. VI. t. 4. — Herbacea: radice repente perenni, pilis simplicibus. pubescens caule subsimplici; foliis, deltoideo-ovatis acuminatis, venis imbricatis, calycibus fructus ovatis coloratis, laciniis subquadratis — *Physalis* Scop. Flor. Carniol (2 ed.) no 280. — *Physalis* Tournef. Infill. rei herb 151. — *Physalis* Dioscor. fJPWedic. IV cap 72. — Sabb. Hort Rom II. t. 6J. — Calycibus fructibus saturatissimis sanguineis. — Crescit in Germaniae, Italiae et Japoniae scrobibus.
6. *PHYSALIS* Lam. Musc. gen. no. 247. — Roem. et Schult Syst. veg. IV. 674. — Née ab Esenb. I. c. 461. t — Herbacea perennis, basi luberosa, pilis simplicibus. cano-lomentosa: caule erecto duobus; foliis, deltoideo-ovatis angulato-dentatis; corolla maculata; antheris violaceis; calycibus fructus ovalibus pallidis. — *Physalis tuberosa* Willd. Enum. pl. hort. Berol. I. 2J2. — Rchb. Hort Dotan. t. 221. — Crescit in Peruvia?
7. *PHYSALIS HETEROPHYLLA* Nees ab Esenb. I. c. 403. f — Herbacea, radice perenni, villosa: ramis diffusis angulatis flexuosis, foliis singulis parvis albis maculatis. ovatis cordatis acutis; corollis maculatis; antheris luteis, calycibus fructus ovatis angulatis pallidis. — *Physalis pennsylvanica* Willd. lib. — *Physalis tomentosa* Wall Fl Carol 00? — *Physalis nutans* Wall. I. c? — In America borealis
8. *PHYSALIS PERIANTHATA* Nees ab Esenb. I. c. 404. f — Herbacea perennis, pilis simplicibus. dense pubescenti-villosa: caule erecto subramoso; foliis, cordatis acuminatis. integris v. denticulatis; corolla maculata, antheris violaceis, calycibus fructus ovatis subaequalibus pallidis.
- a Folium minus denticulatum. — *Physalis esculenta* Willd. Gesellsch. naturf. Fr. IV 107 — *Physalis esculenta* Willd. lib. — *Physalis tomentosa* Act. Acad. Pal. IV. 184. I. 4. — *Physalis peruviana* Rxb. Fl. Ind. or. ed. Wall. II 241.
- ft. Folium subintegerrimum. — *Physalis peruviana* Linn. Spec. pi. I. 1670. — Nilid Spec. plant. I. 1022. — *Physalis pubescens* Linn. Herb. — R. Br. Prodr. fl. Uoll. I. 447. — *Physalis luberosa* Zuccagn. Obs. cent. no. 43 in Kocm. i. lliwi 1J0 — *Physalis latifolia* Lam. Illubl. gen. no. 2407. — Roem. et Schult. s. v. 676 — *Physalis Harbadentia* Lam. Encycl. melh. II. 101 — *Physalis edulis* Mniz, Hot. Magaz. t. 106S. — *Physalis heterophylla* Ledeb. Rchb. Flor. excurs. p. JS.). *Solanum vancouverianum* radice crassa Mexicanum flore luteo (oztomatl sive Solatium pallent Heccht. Moris. Oxon. Hist. pi. III. 525. 17. Set. I. Mil. t. 5. fig. 17 — (rescit in Peruvia, in India orientali colitur, et in America boreali, in India orientali et in Nepalia
- Sectio III. EPETEIORHIZA 6. Don 1. o. 449.
- Herbacea annua, radice infirma. Flores soli. Alabastrum dura clausura, rarioe corollae parvum ovatum.
- t Calyx fructifera vesiculosus clausus.
9. *PHYSALIS PUBESCENS* Linn. Hort. Cliffort. 02., Spec. pi. 202. — Prsh. Fl. Am. sept. I. 157. — Esenb. I. c. 407. t — Herbacea annua ramosissima, pubescenti-villosa. foliis basi inaequalibus. ovatis acuminatis denticulatis, venis maculatis. antheris violaceis calycibus fructifera ovalibus acuminatis acute angulatis, laciniis subquadratis. — *Physalis rarrana* Mill. Din. no. 0 — *Physalis puviana* Hb. Fl. Ind. ed. 241. — *Physalis heterophylla* Willd. lib. Hi. g. II. pro. I. — *Solanum Knr-ciruum* (tanjintanum procumbent annuum folio luvuynso Moris. Hist. lor. p. III. 21. lit.) fig. 24 — *Physalis heterophylla* Willd. lib. Hi. g. II. pro. I. — *Physalis pubescens* Linn. Spec. pi. I. 202. — Willd. I. r. 241. — *Physalis pubescens* Jacq. Misc. II. 350. — Jacq. Icon. pl. rar. I. I. 30. — (Nilid I. c. 101) — *Physalis pubescens* Prsh. Fl. Am. sept. I. 157. — *Physalis heterophylla* Willd. lib. Hi. g. II. pro. I. — *Physalis pubescens* Linn. Hort. Kith. 12. U. 0. flr. 0. (rescit in America boreali, in India orientali et in Nepalia

- 10 PII FOrTE>S Poir Encycl méth Stipl III 349. - Spr syst veget I G77 - Noes ah 1, 1 c 469 t — Herbacca annua Mscoso-pubiscens ranns dichotomo-difTusi>>, foil (nato-elliptieis, basi inacqualib acutis grosso denlids, corollis nncuhlis, anlhens violaceis, caljce fructus vcntncoso-o\alo aicpiali " — *Ph foetulissima* Lag' Gen. et sp nov diagnos 10 — Roem el Schiill I < 0\0 — *Ph nodosa* I am Illuslr gen pi II p 29' — Crescil in America tropu i
- 11 PII AEQL\TA Jcq fil Lilog 2 — ISIts ih I senb I c 470 f — Herbacca annua taulc dicholomo runisq credit siniis lalerc hirlo-pubescent11) foil o\ati!> oblongii>e sinu ito-Mnali* ghbns c< rolli* matulalis, anlhens \ioldceis, cal>cib fniclus o\alo-s>ub\{lol)osij> lae\ib , pedicellis brcMb Inrtis — *Ph ueo-carpa* Hrot in DC Ilorl M< nspcl Catal 181J ex Ilornun Horl Hdfn Suppl 26 — (rscit ?
- 12 PII IINKIANA ISees ab Esenb I c 471 | — Annua gl ibn t mlc ramoso Mib-difTuso foil o\alis acummalis s>inualo-scrnalis glahris, sirraluns inuironilis, corollis immaeulalis, antheris violaccis, caljceib frudui o\alo-acuminatis mjnlib , pedunculis elongali!> glnbris — *Ph dulna* Ink Lnum \ hort l\< rol I 181 (ncc dmel) — *Ph txorarpa* Hort Bonnens — *Ph anyulata* Horl — *Ph arenana* Hurt \ratisl — *Solanum testcartum* Indtrum n return fnoho lent annum >lon<, Oxon Ilitlor plant III 5J0 no 22 Sect JJ t J fig ±2 — Cnscil in Diasilia
13. PH I \>(IK)IH NCPS ab E-enb I c 471 | — Herbacca annua jslibrnisiula caule diiliolomo, foil lanccol ills, ulrinq altenuatis Mibdentatis, corollis iiiimaculalis, antheris cotrulesctnlis , caljceib fructus pendulis ovalis acqualib (' , pedunculis longissimis puberulis — *Ph angulata* \i el Pav Hor Peru\ II 42 — *Ph lanccolnta* Mulix II \m bor I 149 — Ilium el Stliull I t 07J' Cnscil in INrima, M(\iio el in \iurui bon ill
- 14 PII AM.II \T\ I inn Horl <liflort 52, Sp< r phnt II 202 -WilM I < 1022 — \ces ab Fsenb I c 474 , — Il(rbacca annul rimosissinn iz\ ihra foil o\ His oblongisM acutis grosse im< quililer dentilo-si mli> in \ ir i sulfinh g> irmns , corollis immai ul His, anlht ris pillule coerulesecnlib , (il)<ib fnulus ciuii<ji m— gularis, hisi iruncatis, laiinnn sub anlhesi irmiKul in -siibul His, lubum -ium aequinlibus *I'h obsrura a ylabta* Prsh II Am sepl I f'j7 *ikthnyi* *Indicum ylabrum (hennpodn foho* Dill Hort I Illi H t 12 (IR 12 s (<unim trticanum imericanum, caule tjuadt anyulo folio *Stramomae minor e Miltf wall* *Hecchi* Moris Oxon Hist pi III ⁵²⁷ Secl lj t J lig 27' — *Hahea<nhuM ndt-eut major alhui* Kmph lib Ambuin M 00 — *Inotd Inodten* HIKMIIC, Ilorl Malab \ W) I 70 - *Phytat Petuttana* Wall Cat 20\M' A h (> II *Ph minima* \ ill (it 2GJJ *Ph flexuota* lib Ross — *Ph flexuom* el *Synundn* lib 11 limit u p)
- /? Foil ohlongo-lanccohlis, hasi apiceq icumtnihs, cauli dilTus> *I'h j i-lula* Mill Diet no 0
- Y Foil obi ngi< itubinlegerrimis — *Ph angulata* ji linn V\ III <l I i \>l — *ilkvktmji* *Indtrum ylalnum (aptn folio* Dill Ilorl I Illi 12 I II li< II - <rtsui in India uiraque
15. PII IM)\(A I im Knijrl metb II 102 — Nfoii nh Enrn I r Art | H< r-bacea innui i mlc erecto dnancalo-dicholomo rimmq flexuoMs piimlisii ir-nuitMme viscxlo-pubencentib srbriusrulK, foil o>atm oblonRu^c subduilihs corollis imoiaculiiK, anlherif luleig, ealjeib frurtus o\alis Mibanguhllis, IK inns sub inlhesi tnangularib , tubo cluplo bre\ioributi
- a loll itigusiinrih , caljeib fructus ovaiis - *Ph paruftora*W Br Prodr 11 > >| Hull I 417 <d > ib> I .IM — |(o< in 11 s< hu|| | c (so />h fgn— Niwif K\li II Ind MI Will || z\l (I Mill Dirt no II \ *nulra In-dtra* llouii (t Si hull | i u^ s damtm *tiMiearium* In h um ll< rm Ilorl LUKII Ilili\ VM I '»I •• - *Maluaeahu** lit hrus nnn< r ntjn Rmph lib Amboin \ I 01 l 20 lig 1 (opiimi' *Phytaht ilikikmyt* I our H Lorhm

- I 164. — *Ph. pseudo - angulata* Blume, Bijdragen TOG — *Ph. angulata* Willd (ex p.) — *Ph. Perutiana* Wall Cit. 26M K
fi microearpa Horib. fructibq. duplo minoribus, calycinibus fructibus subnotionibus.
 — *Ph. dnancata* D. Don, Fl. Nepal. prodr. 07. — *Ph. Peructana* Willd (at 26M G. — *Ph. angulata* var Hamilt. lib. — ID Gochiutiina, J.na, India orientali coacti DcnUili et in >o\i Hollandia.
- 10 PH MINIMA Linn. Hort. Cliff. Tori 02 - Rxb. Fl. Indie, ed >%all II 242 - Nee* ab E>enb. I. c. 479 f — Herbaria annua laxa villosa ramoso-diffracta full cordatis ovalisve acuminatis serrato-dentatis sabinlegem miste pilosis, corollis* immaculatis, antheris luteis, calycinibus fructibus ovatis angulatis hirtis, lacinis >ub antheris in angulis acuminatis, tubo brevioribus. — *Ph. patula* Lag. dm. ct spec, nov diagn 11 — *Ph. Lagateae* Roem. et Schult. I. c. 1\ 679. - *Ph. xitlisa* Rih. Nov. spec, pi 122 — *Ph. Rolhmannii* ROPID. et Schult. I c 027 - *Ph. Perutiana* Wall. Cat. 26M B. J. - *Ph. pubescent* Willd. lib. - *Ph. Inolula* I nod ten Uheedc, Hort. Malab. X. t. 140 fig. 71? — p. Fructibus minoribus ovalibus subglobosis foliisque subintegerrimis. — *Ph. parviflora* Willd. lib. — *Ph. Abyssinica* lib Berol — >era Cru*⁹ cl in India orientali.
17. PH PROSIRATA Merit. Stirp. DOT. 43. t. 22. — Jacq. Collect. I. 00. — Jrq. Icon, pi. rar. Amenc. I I. 18. — Andrwe*. Bol. Repos. L 75. — >& illud I. c. 1024. — Nees ab E^enb I. c. 480. j — Herbaria annua caule ramosissimum prosiralum foliisque cordato- v. ovato-ellipticis repando-dentatis longissime petiolatis villosis, corollis* coeruleis amplis; calycinibus fructibus globosis membranaceis costatis. — *Ph. limentii** Relz, Obi>ei\ V 22 — *Physaloides protrata* Murr - (*ambusa protrata* Bernbardi, Linnaea XI\ . JGO f — In Perm in.
 tt Calyx fructibus malum aperius, a fructu repletum.
- 18 PH PHILADELPHICA Lam. Encycl. méth II. 101. — Pruh. Fl. Am. sept I 17 - Ntes ab Eacnb. I. c. 481. t — Herbaria annua glaberrima caule ramoso dichotomo ramisque strictis; foliis, oblique ovalibus acuminatis repando-angulatis, rotundis maculatis >enosisq., calycinibus fructibus malum apertis, bicamernis. — *Ph. chenopodiifolia* Willd. I. c. 1023. — *Ph. utrifolia* Jacq I ripm. bol V* t *}. fK a. — Poir. Enc>cl melb. Suppl II. 148. — *Ph. orata* Poir I c — *Ph. megstlocarpa* Zuccagn Obs. cent DO. 30. ei Rom. Collect, bot MO. — Lre<cit a No\ia Anglia ad Virginiam usque.
 Sectio III. AHOMALAE G. Don 1. e. 451.
 Radices praevalentes Caudices herbacei Corolla campanulata infundibuliformis non plicata tunc in sectionibus prioribus. Forte distinctum genus
- 19 PH ONIVH KNEMES II R Rib. >o>. gen. cl spec, pi III. 12. | - kih S>Rop< plant aequum IV) — (* Don I. c. 451. no. 22. — Caule herbaceo angulato foliis ovalibus subaristatis, basi inaequalibus, nervis in nervo veio<que hirsutis, (longe Kemini>(?)) calycis dentibus acutis; corollis infundibuliformibus campanulatis. Prunpe fanchana et calaraciam Alurensium ad n.p.im Onnoci.
- 3) PH WILAPKENSIS II B. klb. I. c. 13. | - klh. I r VA - f, Don I <• no 23 (-IUI* horba<eo angulata; foliis oblongis arummalu pilosiusculis nudiis, longis umbrantibus r.ihns donlib aculis; corollis infundibuliformibus canaliculatis 3,* — Inter Pen>t> <t \alapam Mexicorum.
 I bpectifera dubiae et trifidulae.
- 21 PH ITMCOMIT Mirhx M. Bor Im I IW - (i Don I r 4t* 00 4 - illumine lanuginosa foliis hirsutis ovalibus lanugine subnerviis. utn^q Mridib. laBugiuo<i>, ratiM* \ill.>so, e*n\y dirh<>lomo !|. Pk)ittpnuir%a M|| Dirt. 4. t. 20B fig I — Folia basi gradatim 10 petiolum atenuata. 4 urula tubulphurva, fun do ohtcare purpureo.
- 22 PH HALTERI N<tt Joorn. arad PbiUd MI 111 - (i Don I r no '> l'rr-trnu< puberulento-tonnaloM ramo<i>»ima dirhotoma full grmmu Uu< u<aU< >htu> longe petiolatis idlefru, pedunculis liliurns nulaatibus, corymbis fructifero

- glabrusculo. 2]. — *Ph. lanceolata* Ell. nee alior. — In Carolina australi. — Folia supra tilnhra.
23. MI \N(JI^TSTIFOLIA Null. l. c. 113. — G. Don I. c. no. 6. — Perennis glaberrima prostrata humilis' Toll, longissimis linearibus. carnosius bobilanis, pedunculis nulanlib. filiformibus. 2]. — In Florida occidentali. — Folia Inpollicana.
24. PH. OBSCURUM Michx. Fl. Am. bor. I. 149 - G. Don I. c. 451. no. 24. - Folia Mibconlntis fere orbicularibus. acuminatis inaequaliter demissis; caule herbaceo distans ramosissimo, ramis angulatis. O - In Carolina lock arenosis. — *Ph. obscura*, *i. pubescens* Prs.li. Fl. Am. sept. I. p. 7. - *Ph. angulata* Mull. Fl. Carol. 90 — *Thaia discolor* a. Corolla lutea, maculis 5 brunneis notata, antheris COLTUCI.
25. PH. PATULA Mill. Did. no. 12. - G. Don I. c. no. 20. - Inflorescentia pauciflora ramis angulatis glabris; Toll, lanceolatis pinnatifido-dentatis. O — Folia lanata Flores parvi albi. Hatca pana lutca. — Vera Cruz.
26. PH. VILLOSA Mill. Diet. no. 13. — G. Don I. c. no. 27. — Ramosissima ramis villosis, Toll, ovalis acuminatis serrato-dentatis. O — Floretis parvis palis luteis Bacca globosa luteo-virescens, *Cerati* magnum. — Vera Cruz.
27. PH. COUDATA Mill. Did. no. 14. - G. Don I. c. no. 28. - Caulis erecto ramoso; foliis ovalibus serrato-dentatis; pediculis longissimis. (j — Folia demum purpurascens. Floretis parvi albi. Bacca magna cerasiformis lutescens vides purpureo-olivacea. — Vera Cruz.
28. PH. MAXIMA Mill. Did. no. 15. — G. Don I. c. no. 20. — Caulis erecto ramoso, foliis ovatis lanceolatis vides; fructibus magnis cordatis. Q — Folia glabra in pediculis Folia longa petiolata. Lores parvi lutei. Laccis palis luteis - Nigra.
29. PH. LIKIA Meder. 4cl. IM. l. Pliis. H. - G. Don I. r. no. JO. — Folia fructiferis parvis. CLIVMS bacca subrepens, corolla non ulata. AT-finis *Ph. tescota*, differet calyce fructifero oblongo 10-angulato. — (rosarii ..)
30. PH. RAMOSA Forsk. II. Aog. Arab. 3M. - G. Don I. r. no. 11. - Toll solennis gennis (laic ovalis arulis «inuato-dentatis» villosis. Q. Folia *Ph. ilkrungi*. calycis aulem albe inflato pentagono. Corolla lutea. — In Arabia.
31. PH. MTA Wall. Fl. Carol. 00. - G. Don I. c. no. 32. - Folia, alu-rim ovalis calyce angulato tomento; floribus ovalibus nulanibus. (j — In Carolina.
32. PH. MICRANTHA Lnk. Enum. pi. hort. Berol. I. 1H. - G. Don I. r. no. 34. Folia, rordatis aculis dentatis; pedunculis axillaris demum reflexis; calycibus antheris luteis, corolla duplo fere minoribus. O — *Ph. patula* Willd. Enum. pi. hort. Berol. — Criterium ... ?
33. PH. imit. OPHILA Mart. Flora XXIV. Dribl. II. 86. — Caulis distans ramosissimus villosus el pilis glanduliferis viscidulo, ramulis paucis Hoxuosis. Folia praehertim villosa villosulo-pubescens late ovalis oblunsculis inobscure. M. aiiKiilaio-driiialiH, apite rariun produrim, bafi rolundahh, inferioribus »arpe sub-orbicularibus; calycibus fructiferis ovalibus ramulibus. quinquangulatis. — In Brasilia.
- ft *Species e genere verotimiliter excludendae.*
34. PH. AKBOHN (KISS Linn. Spec. pi. 161. — Spr. Hyt. tege U. I. 0B0. - Folia ovatis Aubangulatis, iube lanatis; floribus solitariis; caule roborecente. — «rescili in ova Hinpania. 5 — (cf. spec. no. a. — IWct ab Eienb Linnaea 1. 4M)
- J5 PH. MBTRIFLORA Rr. el Pav. Flor. Peru*. I. U 178. Hg. 0. (G. Don I. c. no. 25) — Caulis aiiKulatn, foliis ovalibus acutis inlegerrimis villosis, pedunculis 2-J-H<»ris, fructibus parvis n — «n» it in Peruvia
36. PH. MK.RO.NAIA Willd. hnum. pi. hort. Berol. Nupl. II. ab «i» di «no» i f I' *Species nomine tantummodo notar.*
- PH. ADULTERINA Fiel.
- PH. RLLBOSA Willd.

fftt *Species e genere excludendae.*

PH. FRUTESCENS DC. = WITIL4MA SUBEROSA.

PH. PERUVIANA Mill. = ATROPA PIHYSALODES.

PH. SOLANACEA Mert. = SARRACIA PROCLMBENS.

PH. SCIIRADEKIANA Bern!.. - SIRRACIA VISCOSA.

:J851/j. M.t11Ci/1RAVmiJS *Schlehtd.*

(Endl. Gener. plant Suppl. I. p. 1404. — Schlehtd. Linnaea XUI. Literalurbl. 90. — Mcisn. Gener. plant, vascul. I. 277. II. 184.)

1. *M. SOLANACEUS Schlichid. I. c. - Hurt. Helens. I. 1. f t ! - Credit in ter-
ris Mexicanis locis calidioribus. Q

*KV2. NAURU' 111 *Rz. et Pav.*

(Rz. et Pav. Prodr. 0. Peruv. 31. LJW. - Mcisn. Gener. plant, vascul. I. 277. II. 184. — G. Don, General syst. of gard. and bol. IV. 451.)

* *ierbae annuae.*

1. S. (DELLMA Roem. et Schult. Syst. vegetal. IV. W7. - ATROPA Cav. Iron, et rlesc. pi. I. 53. I. 72 — Jcq. hort. Schoenbrunn. t. 402. - SO LA MM DC. Fl. Fr. III Oil.) PROCLMBENS *Rz. et Pav. Flor. Peruv. II. 43. t. 180. fig. b. - G. Don I. c. 451. no. 1. - Ilcrharea procumbens: foil, geminis inaequalih. ovatis iniegrimis, adullis plahris, juniorib. margine costaq. media villosis; florib. umbellatis, (ilamcnlis glahris. Q — *Atropa plirata* Rlli. Calal. bol. II. 24. — *Phi/saliM snlanarea* Mctt. — C.iulis dicholomus sulcatu* lanuginosu'i an^ulitiK. Folia ram *>oli(irii. Podunruli a\illars 2-3-4-flori, pedicellis calyrihusque tillosis. Corolla larlca, centro viridis, margine lanuginosa. Dacca nilida, pisi magnitudinc. — Crescil in Peruviae valle Canta.*
2. S. (ATROPA Rib. Catal. bot. II. 28. — Jcq. hort. Schoenbrunn. t. 401. — IIKLMA Roera. et Schull. I. c. G88.) LMBELLATA DC. <:atal. hort. MoitspH.]S[3. p. 142. — G. Don I. c. no. 2. — Sweet, Brit. flow. gard. I. t. H3! f — Ilcrbarra cri'cta pilosa ramosissiraa: foil, ovalis rugosis nilidis inlegris aculis scaltris, floralih. geminalis; florib. umbellatis; filamenlis basi barbalis. Q - Caulis s<>litariu* dichotomus. Folia Mibtus canescenlia, supra viridia, intogra, interdum siiban-gulala. Umbellae prdunrulatac axillares 7-10-florae solitariae. r.orolli plicaiia lirrM v. >iresrenti -alln, cpiam ilia sprciri praecedentis minor, llacc.i oliscure purpuroa. — *Atropa Kothii* Poir. Suppl. Kucjcl. nirlh. I. 010. — In Peru\ia.
3. S. RELMMA Roem. *! Schult. I. c. IM. - ATROPA Spr. S<il. \eget. I. <>.) CO>TORTA Wi. cl Pa\l. Fl. Peruv. II. 180. fig. a. - G. Don I. c. 4V2 no. 3. - Ilcrbacea crrrta: foil. o\alis angulalo-dcnlali* lanugino>is Intogerrimis, Miporiorib. floralib. grniinalis; florib. umbrllatis pedunculalis; fiUmentis bini MIOSJH. (*) — Caulis Hulcalus glaber ramoKUs, basi livido ->iolaceu* dirholomu**, ramis LMiuKmosi<i. Podunruli et pedicelli conlorti. Corolla lalea m.ijitcula. B.iccj ni^ri globosa pi^iformis. — Crescil in Perutia.
4. S. JMTOMATA Schlrhld. mss. in Stcud. Nnmenrl. bot. (ed. 2.) II. .i:ii. - Fruclu rdiih; Toll. k^<unnis prliol.ilis <>vatis ariimin.ili<, basi in prliolum nn^u<io rl satis (>u'<* dt'curreritil). siihmlrk'i'rnm* Mibrrpondisxe in ncr'o ni.<ru'nnq. pu\>rruli*; tinilx'liiN axillaril). pfdunnillalis .l-0-floris, pciolum dimidiunnr (CIUKU .iripianlib.. pniim-uliH prilicclliq. pubrruliN. ! -- Corollac >irescentrs, r\Uis pulirrrulae, lobin >. an^ulis aruliN. Slimin.i rur<>llac MUDS M\ alliiik'i'iili.i, hlanu'iiliH >asi aliquantulum dilat.itis iliiq. puhnriliN. Mlu<> sUtiiuult. hrrxmr. Hirra dcjrr<><4i-globona nilida <ra_f cortex uti in *SolaniM pliinmiH mo<> e<>l*, MICCO purpur<> tin-gitur, caro aulrm viridi. — *Jaltomata edulis* Srhlrhtd. Linnaca XIII. Lilrralurlbl. (M — Crrgrit in Mviico prope lot Ballot del grandc.

*' *lrrbae frulicota*

V % (UKI.IIMA Room cl Schull. I. r. 0**. ATROPA Spr. I. c. UK PI'NCTATA
Rx. ei fa*. I. c. II. I. >• I^4. G. Don I. <: i'ri. no. 4. Suffrutico^a crecta;

Toll, ovalo-oblongis integerrimis supra glabris, infra puberulcnlis, pedicellis uniflori!> maequalib. aggregatis axillanb. terminalibq.; corollis maculate 5 — Ranu angulali, juniores lanugmosi Pedicelli corolla parum longiores. Calyx glaber Corolla magna campanulata, extus pulverulenta lulea, maculis pam* purpurascenlibus nolaia. — Crescit in Peruvia

- 0 S. ZUCCAGMA'NA Room, el Schult I c -G Don I. c. no. 5. — Frulescens erecia caule villoso 4-5-angulato, foil soliarus \ gomims ovato-cordalis villosuli* mlegns, pedunculis MIOSIS, inler peliolos foliorum geminos orlis, flores umbellatos gcrenlibus) — *Ahopa erecia* Zuccagn. in Room Collect, bot 120 - Caulis anguli Molacoi Folia supra glabra Miblus ad ncr{o<> margimbq >illosa. I m-bellac 2-3-4-ilorae. Caljois segmenla ciliata. Corolla \irosceiiti-lulca rotala, macuhs obscure vmdib. in fundo nolata, limbo pentagono ciliato re\oluto Filamenta basi villosa. Dacca globosa glabra 2-ocularis — In America australi*'
- 7 S. (ATROPA Zuccagit. in Rocm. Collect, bot 130 - Roem et schull I c. 0*4 i VILLOSA G Don 1. c no. 0. — Caule frulescenc, foil, cordalo-oxalis auiminatis intcgemmis tillosissimis, ramcalib. binis maequalib.; umhellis axillanb. nulliflons caducis, corollac limbo quinquefido. 5 — Caulis penlagonus, ba>i xioloceus sulcatus ramisq. telragoms VIIIOMS Pedunculi solilarn bon/onlalcs inlor folia oricnics, pedicelli8—0 papillosi. Corolla urescenii-lulea roiata, limbo ponlagono, segmentis ciliatis. — Ad genus *Sarrarha* evidentcr perlinci. — In Pornua
8. S. (BELLIMA Rocm el Schult. I. c. m. - ATROPA Spr. I. c 000) DEM VTA RJ el Pa\ I. c. 43. I. 140 fig b. — G. Don 1. c. no 7. — Herbacea procumbens laniiRinosa: full, Integris dcnlalisq. ovalis in peliolum decurrenlib , pedunculis quadnllori!) pubscenlib., laleralib lerminalibq inclinads (orollis MIOMS I Pcdioli inao(jiaU^ bre\os (oiolli albo-\jolaeea tampauvilala, miculis r> \in—dibus notaia Baica cupre.i, pisiformis — < rescit in Penma
0. S (RLIMM\ Room el Schull I c. 080. - ATKOPt Spr I c 0^0 RIFIOR\ Rz el Pa\ I. c 42 I HO G Don 1. c. no. 8. — llorbaroa eroda lainimno«»a foil. o\ali<* plerumq geminis, pedunculisi axillanb 2- rarius 3-flons, flnbn pcnduhs I|. - Rami angulati. (orolla luie>centi-\mdis Stamina (orolla duplo lon^iora llacca alba piniformo parum compressa. — In Pertmae auns.
10. S VISCOSA Schrad. Cat. semiu hort (Joelt. 1832. p. 4 - D. Don in s««oi«. Brit, flovk. gard. (2. Ser.) IV. t. 32.J! f - G. Don I c. no. 0 - I ndiq gl mdu-losopubescens foil, cordalis acumlnatis sinuato-dentatis geminis, rorollae fauae lanala; ralyre fructifero coloralo; eaule sulTrutiroso j *Phytaht Schra-tlenana* Bmihardi, Cal. liort. Erfort. 1K10 ex Linnaea XIII. 301 — The Botanist I\ (1(^1 t — 1 mbellac solilanac subscssiles. Calyx quinquoridus ma^m«< Corolla inagua, lobis atulis, aeslnaione vahatis lacteis, basin \ersis matulis)>luninis olnacoiH nolaia Antlicrac tordalac \iolareac Bac<a (< rasifonuis — Crosoit in Mexico.
- II S (BELLIMA Roem. el Schull 1 c G'0) PI BLM K>S \NillcJ RHiq ox Room el Sdiuli 1 c — G Don I c no. 10. — Fruioosa lanuginosa foil otalin aiulis umbellis pedunculatis terminalibus. %S - Crescit in Peruua

f *Species mdescriptac.*

S BR\S|||KNS|s KIt/sch. Li^naoa XIV 200

S MK1UM1U hi.. Catal. hort. Monapl. 1811

8. PKRUVU>4 D. Dictr. Gierlnerlexicon Mil *>&.

38 >3. UITIHKHI\4.i1A *lhril.*

filenl Nerl \n<lor I 33 t 1 — Meisn Genrr plant \a<<cul I. k27 II 1*4 sm S>1 \egel 1 07i - Dielr sjnops plant I 711 G I)»n, General sjst „f KLin| ami bot 1\ |'i

" *II uticaiur*

- 1 W. DIM.ILsltOI 1A KU/iOli. niss in lib rv\$ Roiol SuTrulK o»a ramin trrc-Ub. siibglabris, ramulis pubfcenlib , foil o\ali«> .iculi\, basi abrupli* aiirruitis ulrinq sparMm pubestenlib., plerumq K<Mnini<, altcro oblu»U*imo duplo tmnon

- pedunculis axillanb. solitarm, calycib 5-dentalis; corollis lulcis 5-fid is 5 — In Mexico. — (Floruit in horlo Derolinensi botanico mense \pnli anni 1841)
2. W STRAMOMFOLIA II. B kth. Nov. gen cl spec. pi. III. 13. — kih Sjnops. plant, aequin II 154. — G. Don I c. no 1 — Arborea ramis subuLUo-angulatis, ramulis pubescentib ; foil ovatis nrummalis inaequaliter subcordali* dentato-angulalis hirtclhs gemims, allcro dinndio brevior, hlamenlis apice barbatis £> — Folia 4-5 poll, longa, 2-3 poll. lata. Floret nutante* pcnlamen pcnlandn. Corolla lute»ccns, exlus pilosa, maRmtudinc illius (apmct frutescenti* Dacca globosa rubra pi*iformis. — Frequentissime in Mexico ad Xalapani crescit.
- J. W UUSSIFOLIA Dunal, Solan. 108. - Spr. I. c. 670. — G. Don I. c 4JJ no 2 — Cdñle frulicoso piloso sarmentoso; foil, ovatis inlegm v smualo-angul<iti!» oblu*iusculis; paniculi* subdichotomis reclinalis. 6 — Kami Impiduli, apiccin >e^r sus angulati. Folia pilosa. Panicula subcymosa sublerminalis. Mores pcnia-meri pentandn Corolla violaceo-purpurca, limbi segments connivcnlibus O>III» Anlhrac cupreae. — Crescit in Promonlono bonac spci.
- 4 \N. Pl< T\ Marl. Nov. Gen. et spec. III. 74. t I- 2*27! — G. Don I. c. no 3. — Arborens ramis ramulisq. patulis folusq. late otalts breviter acuminahs, basi acñitiu*»culis pilosis visciduhs; pedunculis solilarns aul nonnullis avgreKatis axill- linb , quam folia brcvionb lacinnis calycims lanceolatis, corollini!» antberos Imeare^ quadruplo superantibu*. 5 — Habitat in Brasilia.
- 5 W DM AKIL\TA Mart. I. c. 75. t t. 228! - G. Don I c. no. 4. — Suffructuosa, toi.1 suhliliter pubescens foil o\ato-lanceolatis o\atis\r acuminatis, biM sub- roUmdals, racemis simplicib paucidoris alarib folia superanlib., Kumiis calj- cinis otatis aculis, rorollims anlheras inflalas lauceolala* duplo superantihus. ^ — Crescit in Brasilia.
0. W. DIPLOCONOS Mart. I. c. 70. t t. ^0! - G. Don 1. c. no 5 — ^ulTrulirosa glabra foil, ovatis acuminatis, ba»i cordulis, racemis alarib. folns luiigKirib , lacinnis caljcmis oalis ocutis, corollac scnnquinquefidtic lacinnis iriauguiarib. anlheras o>ali^ ventruosas apice glandulosas duplo Muperantib., pishllo (onuni unerMim in cono referente. — Habitat in Brasilia.
7. W MACKOPIHLLA Dunal, Synops. Solan. I (cd. inedit. t. 77 I II B Klh I. c 14. — klh I c 155 — Spr I. c. — G. Don I. c no 0 — Fruticosa ramis siib- anguldllis tenuissime puberulis; foil ovato—elhplicis subariimimalis siibrepan- din glabnuHriilis, supenonb gemims, allcro minore, umbelhs srssilib pniolo di- midio brcMonb , lilamonlis barbatis. .> — Folia octopolhcana urnirr 4 poll lata, «iib(us in \enis primarns lanugmosa Mores magmtudinc illorum sotant niyii leirameri tetrandn ('orolla Mridis, segmentis o\oln acuti«. \nilirrie ovato- lanceolaUe. Barca Rlobo«a rubra pisiTormif. — W, soiamareae siiinlinii, differt tamen caule frulicoso, folus majorib. raroisq. tjabriusculis, umbellis pi in»o hr<» norib , florib. minoribus. — Crescit prope Turbaco >ovo Granatnisiuni
8. Vt (II.UTA II. B. Klh. I c. 15 - kth. I c 1W - Spr. I (<, Don I. r no 7 Frutirosa ramis terelib. glabns, foil, oblongis acutm, bisi numisiitU inicrrnmiH cihali» glabns geminis, allcro dinndio minore, pedunmlis c\ir.i- axilhris solilariin aul gemini** elongatis i — Cum Solano ithillynwdi prno a(hj)><(lu ficihler confundenda Ramuli juniores LIUUAHIM | ion% prntamiri pcnlandn i al>x laiui;iiioMiN >-dentatus i orollae allrn* loins icuti* I IUUH tili glabra, anlhrac oblong.ii¹ oblutac < rent it in 4ndibus fn^i lis Pyston usibus
- Novae Granatae.**
- 9 W MOLLIS H B kth. I r 15 ; - klh 1 r - spr. I c - (, Don I c no H — Fruticota ramiH irrtrtib cano-lomcnlo«n%, foil nvilit, uiring atlcnihs in- tet{i>trimt«, supra pubirruuib , subtua mullitr pubr«crnti-lomi*illiifti« cjrnrscn- libq grminiH, alii rn minorf, podunrub* grminii trrnin aul (luii<rnis clon^ali^ i l-oln 1 - 2 - polliraru Moro« nulinh «* magnitudini ill irum S<<im m<r> pentum ii pi'iKandri Cah\ quinquedeilaliM pilo%u«i i nrolta i \lus piloM, UAn* acutis \nilurii ublongai obtusae ùlanunto xlabro Barra clnboia Pisisiformis
- In hiuwi >n>tc (aiampirca

10. W. RHOMBOIDEA Dunal, Sjnops. Sol. 1. - n. B. Klh. L e t — Klh. I c. f₆ — Spr. I. c. — G. Don I. c. no. 9. — Frulicosa: ramis lercitib. lomenlosu*; foil. ovalis aculiusculis, basi rotundalis et inaequalib. integerrimis, supra molliter pubescentib., sublus cano-tomenlosis geminis, allero mm ore, unibelli» sessilib. 4-6-flons, petiolo longioribus. 6 — Folia pollicana, supra vmdia Flores magm-ludine illorum *Solani nujri* pentamen pentandn. Calyx lomenlo piloso \eslitis 5-dentalii*, dentib. lincanb. rcmods (orolla glabra 5-fida, segments ohlongis aruiis, apice pilosis. Anthrae lincan-oblongae. — Crescii in lemperalis Andium Quinduensium.
11. W. DI>ETORUM Dunal I. c. (cd. ined. I 79) - II. B. Kth I. c. 16. + - Klh I c - ^|r. |. c. — G. Don I. c. no. 10 — Fruticosa ramis subangulais, ~~pubescentib.~~ rib. tomentosis, foil. ovalis subacuminalis, basi cuneatis, supraj hirto-~~pubescentib.~~ subtus hirto-lomentosis et canescentib., supenorib geminis, alit' to lunr minor**, pedunculis geminis nut terms uniform, peliolo multo longionbus. > — Folia 12-10 poll, longa. Flo^cs penclamen penUmdn. — Crescii in dumctis regni >o>ao Granatensis.
12. W. IUPARU H. B. Kth. 1. c. f — Mh. I. c. - Spr. I. r. — G. Don I. c. no. II. — Frulicosa* ramulis angulalis(?) hispido-pilosis; foil, suboblique obovalo-oblongis ammmatis, basi aculis glabris, subtus in norvo pilos geminis, allero mullo minore, florib. extraaxillanb. congesiis pctolum subaequantibus. .S — Folia 2'-3'A poll, longa Flores extraaxillares ~~pubescentib.~~ Lycit *barban* arquant. Calyx obsolete 5-dentalis glaber. Corolla virescenti-alba glabra, tubo infundibuliformu, limbo 5-parti to. — In Andibus Quinduensibus regni Novo-(iranalensi».
13. W. A>GISTIFOLIA Dun. I. c. I. (cd. inedit. L 80.) — H. B. Kth. I. c. 17. | - Kth I. c. — Spr. I. c. — G. Don I. c. no. 12. — Frulicosa ramis flexuosis terelilib., nmulis lomentosis, foil Idnceoldlis acummatis, basi aiutis glabns, ricemis paucillons subi^ominis. .S — *Solanum hetnanlhera* Willd. m^s in Koein et Schult Syst. >eget. IV. 003. — Folia solitana ^k2-2V.-poll'caria, juniora lomenlo canescenti \cslita. Raccmi extraaxillares bolilaru v. gemmi. (.i!\\ qmnqurfidus lomenlo piloso \o>litus_T segmenlis ovatis aculis. Corolla roerulea, exnis pilonolomenlosa, limbi 5-partili srgmenlis oblongis. Anthrac linean-oblongae. Ilarca filiflora, roagmtudine illarum *Solani ntgri*. — *Domut* hanc *periem pro genere satis bene dislinrlo habel. — Crescil In locis areno»i» ad radices monlis igin\<>rui Cotopaxi (juiivtisium.
14. W. PEISDLA Roem. et Schult. Syst. \egel. III. 522. - G Don I c. no. II. - Frulicosa' foil, ovais integns acuminatis, supra glabns, sublus lomenlo lanuginoso tectis, raecmis termiaahb. pedunculum longis reflexis. 5 — *Solanum pendulum* Ink Herb. — Caul it angulatus, apiccm versum pubescent! -iliosus Folia inpollii an.i, 1« poll, lata cransiubcula subrepanda ciliata. Pedunculi inpollirares Idiui^niusi Cal)x gl.ibnuscus bemisphaerims obsolete 4-5-lidus Corolla 4-5-partii.i, segraentii Imcari-lanceolatis oblusis. Anthrae 4-5 plcrumque mnequaled. — (re*ni in Brasilia.
- H. N^b SAIK IIOLK Hook. Bot Misr II. 2JI. - Frulicosa ramis elongatis, foil, anguste l.nueolalis acuminata inlegerrimii!i \. superne serratis, pedunculi« nolitarns % buns axillanb. uniflons. ^ — Crescii in Pennia prope Limam
- * *Ilrrbaceae*,
16. V. SOI ANACET rilent. Slirp. I. 33. I 1. - Lam. Illuslr. I. 82. - Spr. I. c. 67V — >J Don I c. no 14. — Radice e luberib. fusiformib composiia; caule nuhbaceo piloso angulato; foil, ovalo-oblongis v. ovato-lanceolalis pilo^ulis, superiorib geminis; umhclhb axillanb. scssilib. peliolo longionbus. % - Folia .KIII.I inlrpMi pilosula Flores telramen. Corolla pallide lutea, tubo suburerolito ob-luse te r.i^ouo, gibbosilaiihus quatuor arredentibuh Mamma alba e\tus gLibra, uitus pilosa (resot m Vmeru i aijNiü.ili
17. V^ ASIMHA Spr I c 070 no 11 I .iilc semdentp trretiusrulo as|>>ro_q foil, opposilis aequalib peliolatis o>alis luu^errimik aspens, pedunculis raccmom folia acquanlib.; fionb. secuodis %^ Cre>cil in Brasilia

18. W. UMBELLATA Dunal I. c. 2. (ed. incid. t. 27J - Spr. 1. c. 070. - G. Don I. c. no. 15. - Caulc herbaceo alalo piloso, foil, utrinq. attenuate smuato-dcnlalis pilosis; racerais axillanb. subsolilams; pediccllis umbellate. 2]. — Scgmnta calycina 5 acuta. >aldc affinis trquonli. - Crescit in insiila Hispamola.
19. W. MOMA>A Dunal I. c. - Poir. suppl Encycl. mi'lh V 1305. - Spr. 1 c. - Loddig. Dot. Cabin, t. 120-2 — Dot Magi/ t 270*. — G. Don I. c. no. 10. Radice tuberosa; caule herbaceo folnsq coniato-ovalis ropando-dentilis pilosis; peduncuh* axillanb. uni- pauciflon*. 2]. — *Papa Permianorum Solatium-mnntanum* Linn. Spec, plant. 260. — Dunal, Solan. 145 — *Solatium tuberosum ymniis atnphcis folio, tulgo Papa mnntana* Feuill. Peru\ 111. 02 1. 40 Caulis bifurcatus. Folia longc peliolata subcordala. Flores in caulis, bifurcaliombus. Corolla cimpanulala 5-fida ro»ea. Stamina purpurca.
- p. arenaria* Dunal I. c. 146. — Pedunculis mulliflons bractealis; Toll, lohnlis. — *Solanum mnntanum* Rz. et Pat. Flor. Peruv. II. t. 100. fig. b. — Forle propria species* — Crescil in Peru*ia propc Linidin el Chanca*.
20. W. PIHLLAMIA Dunal I. c. - Poir. I. c. — Spr. I. r - G. Don I. c. no. 17. — Ilrbaceum, hispido-pubescens: caule credo; foil, solitarns decurrenlib. o*alis obtusis angulalo-lobatis, c bas-i obtusa in pcliolum alalum allenualis; riccmis serundis in ramo oppositifolio monoph*llo terminalib.; cal)Ci» bre\is lacinnis ovatis obtusis, rorollae I.iciuiis acutiusculis»; bacca... ? Q — a. *minm* Foil, pjucilobio; racemo simpln i *p. major*: Foil, plunlobis dentalis; racemo bifido. — *Solatium phyllanthum* L.i\an. Icon, et desenpt. pi. l\ £. t. J-iO. lig 1. — Ves ab EstMib. >«»\ Act jcad. rie> Leopold. Carol XI\ suppl I ,W \ - Hadix fusiforinio I oha apue qum(lucluba, lobis o\,ilis iculis Pcdunculi e lamina foliorum (JcrurroiiN¹ nasrenles. Ca\lx quinqut'Hdus Corolla pallide cocruoloa palen* quinquangulala. Bacca pisiformis. — Croskil in Peru\ia.
21. W. PIMSATIFIDA Dunal I. c. - Poir. I. c. 500. — Spr. I. c. G. Don I r no K ² — Caule herbaceo alato; foil, pinnahfldin pilosiusculis dccurrentib., l.innns obtusis smuatis, pedunculis pamculatis ebracleatis. ^ - *Solatium fniitmlifidum* Rz. et Pa*. Flor. Peru*. II. 37. I. 170. fig. b. — Flores nutantcs. 4 i\lx <|iiri(jii«*partitus, scgmcnlis linranbus oblusis. Corolla pallide coemlea v. alba H.irca lutea pisiformis. — Cresnt in Peru*iac locis arenoMs propc Limam, Chanca* et l orre blanca.
22. W. MI ITIFIDA Dunal I. c. 3. - Poir. 1. c. - Spr. I. r - G Don I c no. 10 - Caule herbaceo; foil, bipmnatifidis pilosuisculis in petiolum di>riirmitil> , l.i-cmiiio obtusis dentate*_t pctiolis amplexiraulib.; pedunculis p.imrul.iiiN rlongaht, infra medium foliosis I\ . *Solatium mullifulum* Rz. et Pa*. H<>r Prru*. II. 37. t. 170. i\£ a nee Lam. — Dun. I c \l* Pcdunculi multiQdi irrminnlci et la-trcak's lon^issimi, infra medium folio integro *. trilldo ob>iti. Corolla IUUM. Batca cal)ce major. (.resell in Peru*ia_f in provincia **Cumana**.

i* Specie* indscriptae.

23. VN COMCA Sleud. Nomencl. but. 2. ed II. 74*.

21 \N. PI RP1REA Loddiges, BoU Cabinet t. 1*02

: K*J 4 . C % P <|< 1 M *Tourntf*.

Tournef InMilul rei herb. 00. linn spec plant 270. — Mt*_tcn Grnor pi.int. **vascul** I 277 II HI FifiRerhul, Monngraphia grneris i ipsu i DuiHrlilnrpn \<| Ito (•inil.ibb 10' <• Don, (t(Mirr.il §*st of gard ,ind b«»i \ \ \ \ \

I. Fructibus ereeds v. crectlosculin.

»' I t U i l i h u S at l<itt Jit

I C ANMtM Linn Ilorl (lid V) |u;x|x| \|. n..v'r ^rm r Tips 12 , t 2! Ilerbarrum full rllipln is \ o*jli« aruimn.iti« inl<vris Klaltri^ ial)<r rrrnlu «• rrrritiusrulo prnUgono glabro, drnlib. rrrcl % acuiinnali* nliiu<>iiM(nils, fnutib

• **Synonyma** *Amte-ltnnarnna mnnta* r» *him nmi plnrruit, ilia pturrii/ur* rt<'* <luren hau t mrplr credit, ifuae ad tpeciem xlluttrnmlam ulonra tint

laeuusculi conico-oblongis, basi dilata calyce amplificato insidens, apicem versus allenualis biloculans, dissepiment placens. — Black*. Herb. I. 120. (mala). — Kniph. Bou in ong. Cinl. II. I. 230. — >cej» ab E&nb. Offic. Pflzn. Hfl. 1. — *Capsicum fructu surrecto oblongo* Tournef. I. c. 152 - *Capsicum fructu comco oblongo rnajori* P. Br*n. Jain.iic. 170. — *Piper Indicum capsulis surcitis el oblongis* C. Bauh. Pinax 102. — *Piper oblongum erectum pyramidale* Kaj Hsi. plant. I. 677. — *Solanum mordent fructu longo erecto* Weinm. Phjlanthio/. IV. 349. 1. DZ e. — (>uiya-uca Marcgruv. — *Qutya sue Piper Jirauln/ne* Pis.0, Uuil. nal. ri medic, lib. IN. Cap. LI. p. 225 c. ic. — Miiiluu \ariat quoad habitant: 1. Laule simpliissimo liumilion. — 2. Cuule ra-luobis^imo majon v. el sup cine tantummodo ramoso. — J Foil, iiajurib niagu acuminata \. luinonb. atio-\indib, palleconlib. nec mm, »cd rarnis, \m< gati». — 4. Fruclib. majorib. longionbq. \. minorib. ad o\atam quidem subcordalaine furmam tendentibus. — Variolates certac M*quenc» cimmanlur.

? *rugulosum*: Fructib. coined lalis ra.tju^culis, basi dilalau cal)ci insidondb. hubrugusisi rubns. t. 2 fig. b.

y. *acuminatum*: Fruclib. conico-acuniinalis creciis, plorumq. niinonb, ba>i amplificald calyce inhidenlib. rubrit \. lla>o- fl rubro-tarit'tfalis. 1.2. fig. c.

Piper Indicum medium longum erectum Ikssl. florl. K)st. O. I. f. 11. (i^ smisi.

o. *suhangulosum*: Fruclib. comco-iruncalis angulo^o-lurulosus, apxc plciumq. bihdi) crecliusculis, pracedente paullo uerioribus. t. 2. fig. d. *Piper Indicum bifurcata siliqua* Bessl. florl. Ejsl. Anl. O. I. fol. 8. fig. hinistr. — *Solanum mordent bifurcata siliqua* Weinm. Phjlanthioz. IV. 340 t 1)28. a.

f. *ovoideum*: Fruclib. oblongis ovoideis majusculit creel is laeub. lld\i» aul riibns. |. 2. fig. c — (*Juiya sive Piper Jtmihuse* I'isu I. c. cum ir.

C. *ubbrmatum*: HanioMN!»iiiiiii: fruitib. u\alis> >. Loidiformib. creel is subru-go>» rubris. i. 2. li_n^f. f.

r. *olu at forme* • (iracilo: fructib. oxalo-oblon^iN (tlivarforub. CKMIS ruluiv

I. 2. fig. g. — *C. annuum el oluaefoi me* Uoein. el Schull.? — *Solanum t ap- xicum fructu credo rubro rot undo* Weim. I. c. I. O. a. (J — (.resiil HI America mendiunali el in India oneniali.

2. C. COXUDF.S Miller, Kngl. (iarlenb. I. W.) - Iloeni el Schull S>si \egel IV 502. - Fngrlil. I. c. 14. t 1. J. fig. b. e. d! — Fruleicent. full, ublongo-laiu ei>|im» acunnnuliH inlegns bubciliab; cal)cc ereclmsculo iruncalo »ubpenlagtMio, drulib 5 breuib. aculis, dciuiiu bubc\ancsceniib.; Truelib. ubloit^is lae\iu*culib p>r\ulis, basi t.il>cc amphQcalo ctnclift, superne »ubaUenuali« oblu»i» 2-3-loculans, dissepiineilo leuuib., ulrinq. acquahbus. 5 — *C. comrum* Lam. Illunlr no. 2KK) — Poir. Lii()il melh. V. 327. — *C. minus fructu parvu pyramdati credo* Sloanr, Jamaie. 11J, Iial. I. 24U. I. 140. fig. 2. - 1. *ercedum* \ar. aunui Marl l.mnier. horl. Kilang. b5? — *C. trasifoime* ,i. marrocurpmn Hesser, *»» Inirl Kr/« m ^7 — *Piper Indicum minimum crtdum* Itessl. Hurl. h w. O. 1 f. 1 8 li_n^f 1 ilnlr. — *Solanum mutdens minus datum* Wtmni. riiijlanili. ^4U. b.

f. *sulcatum*. Tiuclyb. uiinurib. eietis utroq. Lilere hulcii longiludinalib. nola-li>, unde apex frutlus 2- \. 4-lnu«» e\adil. - U. fig. c.

y. *ihoulalc*: Truclyb. teuuib. erecliunculit vlongalis (12-15 Im. longis], apre iruncato roiridaiitt rubn». — t. J fig. d. — In America cl lndn».

3. C. PtitAXIDAI.K Miller, Kngl. Garlenb. I. 100. (ex p.) - Rorm. cl Schull. S>sl. vegas>t. IV. 500? - Fngrhi. I. c. 15. | I. 3. fig. c! - Frule»cen». foil. o\aiis au-inmalis glabnu; caljre ^ubpenlagono credo glabro, »uperne hubdilatain iriinaio, deulib. . I'umiiiaio-aculiubculis; fruclib. oblongo-p)rjmidalib. obuise .III^UI.IIIH. basi calxe t HM Us »ul>liilnril.u !>., dissepiments irregularib tenuih. endor.irpiuii \ersus SUHMCLISS ids. > — (' minus flat um Hinpli lib. AHMHII I ^ fi^ I

J. *taiulotum* Iruilu .III^MII iio- KI;<IMI p\ratmd.ili - (. toi ulusum florl In India oneniali.

4. C. DICOLOU Jcq I'ra^menl t W dg I. lldem el Ncl>ull I i Vil. - Fngrhi. I c. 15. | I 3. li.f. a! — Frulescen» full ublongo-o\alib acuiinaii* glabns

iviolacco-maeulatis), calyce rrcolmscnlo, MI p erne j»ubdilalalo truncalo pentahciagnno, dcnlb. breuib. credit amti», fructib oblongo-subcomcis, jpice obulso rolundalis basi calyce amplificalo cinctii biloculanb, div>epimenlis plarcn-lam versus mcrassatib. § — *C. xiolaceum* Ilorl. Madrit. — DT Cat horl Mun^pel 1313. p. 37. — *C mgrum* Willd. Enum. pi. bort. bot. Uerol. I. '242.

3. *purpureum*. Fruclib. oblongis erects mucronalis; petioli* glabm, caule fruticoso, rarais divancatis. — Hornem IlorU Hafn. 1 224. — trefoil. . . . ?

5. *C. COMCLV* Mejer, Primil. fl. Essequib. 112. — Boem. el Schull 1 c. \dd. IV. 809 — Fngrht I. c. III t - llerbaceum Toll, ovatis acuminaii* iniegrrimii» scabriuiculis; calycis glabri dendb. breuib»nms. fruclib. oblongo-comcis erechs caljci mtidcnlibus Q — Crescil in plaDlatiombus Esscqueboiwrnibun.

0 *C. FRITESCENS* Willd. Spec, plant. I. 1050. (excl. syn. f.lus.)* - Lam Illusir no. 23M. t. 110. fig. 2. — Fngrh. I. c. 17. | t. 4. fig. c! - Frules>cens foil otali* subacuminahs integns glabns; caljce suberecto subpenlagono subtruncato glabro, deniib. bretissimis acutis; fruclib. otato-oblongis oblusis laevib., basi a calyre cineds biloculanb., dissepimenlis aequalibus. 2l. — *C. frulescens* Linn, Ilort. Clff. 59. — *C. majut rubrum* Rmph. lib. Amboin. V. 247. U 88. fig. 4?

0. *minus*: fruclu o\ato obiuo minori. — *C. rubrum minimum* Rmpb. I. r. fig. 2. — Crescit in India orientali el in America boreali.

9. *Fruetibut tubrotundis.*

7. *C. CLMA>E>SE* Fngrbl. I. c. 17. j — Frulescens: foil, oblongis glabns; caljer glabnusclo obsolete quinquedrolato; fructib. subglobosi:> nnniiiiis suberpriis, basi cahec cinclis ?-loculanbus. o — 6. *baccatum* klh. binuj)N. pi. acquin. II 178. nee Linn. — Crescil inler Cumana el Bordoncs.

8. *C. BACCATUM* Linn. Manilas, pi. 40. — Willd. Spec. pi. I. 1050. - Fngrhi I r 18.11* 4. fig. a! — Fruiesrcnn. foil, orali* v. oblongis aruminatK interns glabnn; calyce ereciusculo laovi glabro, deniib. subulalis obiususrulis pntulis, fruclib. pams globobo-o\atib creclis cal)ce cincCu», jumonb. biloiulanb, diosepimenlis lonuib. opposilis. £ — *Capsicum minimu* fi/iyuif Dodon. Pemptad siirp. >. Cap X\M 704. cum ic. X)lo,r. — *tapticum brer ton bus sthyuts* Lobel. surp. obs. 1>2- cum ic. — *Stb'jucutrum rotund urn angushfottum* Taberoaoui kruulcrb. edit, ij Hauh. I. Cap. 1J7. p. W4. fig. 2. - In lodia ulraque.

9 T. *MICROL4RFIM* DC. Cla. pi. horl Monspel. (181J.) 86. — Room <l brliuM. 1. r — Fngrbl. I. c. 19. | I. 4. fig. hi — Frutoscons foil. o«aii« acuruinahs pubescenlib, ral)cc ercriiubculo nubprnlagono p loso quinquelddo, larmnn U-reuusculis subulalih patenlib ; fruclib. o\alo-suliroluuili*, bam cahec cincii* lacub. mnloculanbuH. j — *C. etiiare* ^illd. Enum. pi. horl. B>rol. 1. 243. — (rc<cii. . . . !

*) *Speciem hanr tt undertmam Xttu mh Escnbfck aliis nods nrcumstripst*
 I. *C. FRITESCFhs* Linn, ilorl. Cltff W. - Arr# ab Fsrnb. *Transact of the Linn, Soc Mil Al* — Htllid *Spre.Pl I 1051.* Horm rt Srhull *Sysl truirt I I *VI* — *Hlumr, Ujdrayen 7(M.* — *I alyce fruetus cyllntlnro tubhunnUn,* prdunruhs frurtifrns snlitarus; barea comco-attenuata tnrna, foil omlib, uttm./ acutmnntu, pittolis ramisif. anyutahs pubesrcnti-hirtts i apsirum iiiiui% rul.runi cl II mini Kmph lib Amboin. f JM* / W< fty I I - Tipn Molago Hhrdr Hurl. Mhib II UtO t 'A - i resnt m arenost Indme onentohs*

i(/ iSII, l ill y Hlumr. Ihjdraeaen 7W .Vfi ab rsrnrbrk I r iA - hntiesrens rnmis trlnujnnu fiiMtitjmtis <In cryrnlih pubrirrnti -* ibm mh/ e [t ur— lus Mubrtfimttrn ttunnlo, pntunrulu frurtifrns subyrmtnt ttrrts. l>«ma o^loitgo-cylindracea rrcitt, foil otalib lancmlattst r, iIMIH/ U ununnhs mtui' *trnjaiq-nltatts - I mi in mum Rih H Indir II Jfil H,i/1 tut >H I //

— L. irulr«rrn« /inn. *Sprp plant I 111 rjcl syn Kail I i'ff Hmph rt Ithmt I*

» Fff&*' mss, e rrr/ Partly tt/mon - C bjccalum lib Hamilt rt Hall

» virft 7« IrMriI o' i' W«« oneniait

I, * JI * fe # ^ * ^ ^ bees ab Ksenb I r 05. | Ramts subltrayonti mnlraelil yl'ihris ralt/re frurlus laxn ampin rtipyltformi mlfjrrrtmn, prdunruht mUlartt*

rr, i*, hji 0«*» 9i'»>»** f*>U lancrolahs ytabris - i irrj-ilorur /'«ir fnrfr/. tuilh } Jii. (nee Mi/id.; — *C. purpureum* Ma/i tat *Suppl no. JUX ex tt I* - ttesnt in India onenlaU

10. GLOBIFERUI Meyer, Primil. O[^]Essqueb 113 - Koem et Scbuli I i\ VdJ 808. — Engrht I. c. 19. f — Frulescens- foil o\alls acummatis glabnusculis, margine subcuhatis; calyce crecto subintgerntno glabro; fructib globosis erceti§. . . . ? § — *C. baccatum* Rodschid. Obtcrv p. 38 — Cre&cil in planUtionibus Essquebonensibus.
11. C. CERASIFORME WiUd Enum pi borl Berol. 1.212. - Willd Spec pi. I 1050 — Engrbt. I. c. 17. t 1. 5. fig. b! — FrulCiCcn* Toll, subovalis acuminaiis glabns, calyce crecto, supcrnc dilalalo iruncalo subpenla- hexagono, drnlib. 5-0 acuminatis erclis breMb , fructib. globose, apicc fovealalis laoissimis, b<asi caljcc amplificacio cinctih biloculanb., doscpimeniis ulrinq incre»saii». § — *Solatium Capsicum dictum perenne minus erectum* Wcinro. Pbjlanlb. IV. 349 I 930 fig I — *fl. minus-* fructu minon'lulco \. rubro. — Bess. Cal. borl. Kizem. — Cre&cil in America australi el(??) m India oncnlati.
- 12 C MILLERI nocra. el Schult. Sj*t. \cget. IV. 503. - Tngrhl I c 11 t - H<r-baceum: Toll, ovalis/cuminalls integns glabris; calyce crecto pent igono glibro, dcnlb. quinque acurainatis oblusiuscuh^; fruclib otaio-subrolundis, bnsi ci ho insideniib. lacnb. bflorulanbus. 0 — *C. eerasiforme* Mill 1 <* — ^rcscit in Nova Hispama.
13. C. STRICTUM FngrhL I. c. 21. t t. 5. fig. a! - Uerbaceum Toll o\atii> acuminalis glabris, calyce ereclo subiruncalo subpenJagono, dentib '> l>rr\ib jruiis, fruclib. Iae\itissimi8 c basi dilatau cl impressa oalis cordiformnb , caljci amphificalo insideniib., apice rolundato foveolatts 2-ocularib., di>seliment!> utnqq siibincrass»atis Q — Crescit ?
14. C. GROSSI M Willd. Enum. pi. horl. Berol 1. 812. - Spec. plant. 1 10V). (rxrl sijn. plur.) - Pngrbt. I. c. 21. t I. 5. fig. c. d. b. b. fig a b! - llrrlnicctim f<ell elliptics v. o\aiis ucununati^, cal)co crectiUNCulo pcnLigono plabio, dcnlb 5 erectis, apicr iicias^aliM, frurlib stibglobosib iruncatis aiignl>io-rugosi<i, n\ n insidentib. Iriloculanb , disppimentis plarentam (cniralcm UTSUS subilh^uati^)
a pomiforme Fruclu globoso mgovo magno rubro. t. 5. fig; r < *grossum*
a. globosum Bess. Cal *hhti* Kncm - Rocm el Srhult. I c
9. oialum: Fruclu subo\ aio permagno ruguloso rubrn v Uitco t ^ fin d
V grossum fl. luteum Bess I r. — *Solanum mordens fructu ntcto ror</i>formi rubro et luteo* Wcinm l>b)lan\h. I. 920. Og c. v\ h
T- cor datum: Fruclu cordiformn angulalo-rugosoq rubro. (. 0. fig. a *Solatium mordent fructu rotundo* Weintn. I. c. I. 9*. fig f.
d. angulotum: Fruclu minor! magi* depresso angulalo-rugo^o t. 0 fig b - *Piper Indtcum maximum rolundum erectum* Bess I. Hurt E)»l O I fol II hg dextr — In India oricnlali.

II. Fmctibus nutantibus v. pendolli.

a Iruclthut oblongis

- 15 C CERATOCARPI M Fngrhl I c 22 t t 0. lig. c! - Frulosrcns Full o>ii<◊>- adimiuaai*, Mibtu% ad nenuin medium subpilo»i»; cal>re nutanto iruncniu pvni.i-gnno biibu'irutuloso, dcnlb 5 broub acummatis; fruclib. rlongaliH <ib|nii|to-comcis Talcato-IIH urns, bine uide inarqualiler hulcatu fowolahri, ILL>I caljte clnctis, apicom U'|-MI< attonuolit obtuma 3-ocularib., dittepimentih u-nulb arcunto-dexuosis irrvgulanbuM. i) — Crehdl. . . . T
10. C. VIOLACb(M II. B. Kih. IHov gen. ci spec, pi III 39. — Etb. fynop* phut II. 179. — Engrht. I. c. 23. t — Foil, ovato-oblongis acummati* pubcrulu, rnl>rc piloso-pubesccni< septemdenlaio, dentib. acutit; frurtib. oblongo lonmssmus, basi rahep run in* polyftpernifo . . ? 6 — Crenell In cullin an JIIMIII ^MIIO
- 17 (. IOX.IM)((al bort Mnni'sprl.]R13. p 80. - Ilorm (tsdmii | r VW kiiiphr Hot in Onh' ^lu.l | 1J9 1 n^rht l e i) , t 0 fig d I 7 fin a b e ! - Hi rbjccuin foil < \ali<◊> .KUIUII IIIH, (al)ic su|m muo tiunr.iio pouidgono quinquerdentlato, dvntib rrr<lis .uiriiij ihi oblii>iUHruLi<, frudili (oniro- v nub-c>lin(IriLo-acuminati5 nubincums)>euduli5, ba>i ul.>ci uncii> b>- tr loculanb,

dissepimentis cra<MU<culi<, endonrpium >crsu? inrn<ati<> C ~ C annum
 ^illd r\ Room el Si hull I I r r P\ p - f recuru* thquu Dodon Pcmptad
 slirp \ lib IV 704 cum ir — Piper Indicum mannum longum Bcssl llorl
 F>sl O 1 fol 0 fij sinistr ol d<lr - Solanum MMII* ttu <anncum Mori*
 Oton IIIM °ecl MM I 2 lis . ' 6 - Solanum mordent sihquit oblongis recur-
 <i< Weinm I c 1\ M9 I <K7 bj d

£ tnerastatum Fruclu rrisiore rrchusrulo obtti<o t 7 fip a — (npticum
 siltquts Inngix propenden'ibut Tourncf. Inslitut 151 — Bapl Monndi, Ilisl
 bol pharimir 107. t 152. ic 7. — Capsicum annum Guimpt I el srhlrhd
 \bbildg u Rechreibng. I. 16 (excl var plur) — Piper faleculicum I ebs —
 Solanum mordent fruclu propendele obi on go cratto Weinm I c i 927 fit; c.
 Y laium Fruclu oblongo obiuo luleo t 7 fiff !• — Solanum mordent frurtu
 aureo lato Weinm I c. t. 928 fig. b. — Piper Indicum aureum latum Hess!
 llort. Ey<t O I f<I 9 2

9 rectum' Fructu oblongo mm ore redo ochracco 1 7 fig c — Piper /nrffi-
 cum sthquis flant Rotsl. llort £>st fol 9 1. — Solanum mordent sihquitt
 flans Weinm I c I *S fig c. — In India cl in \menca mrndionah

H r PI NDUIW Willd. Knum pi hort. Bcrol I. 242 — Fngrht I r i> | I. I
 pT d' — I rulesrens foil ovalo-oblongi< acuminatis glbnuculn cilyrr sub-
 mil into subponticono % hexagonn, stiperne ^ubdilato truncato quinquo- sp\
 dinlito, drntib ereris obtiouisrulis, fructib oblongin, ulnnq subattonuitiH
 nluuiss, |>.isi ril\r<' cmrtiH bilorul.inb , dissppimrntis Irnuib irregulanbus ^ —
 (giottum,3 ShuM Ob^cn W

1 jHtnu* Fn riu olilmigo somipnllinri — C UaxanenseW R Klb >o\ g<n
 oi *per pi III JO — Klb >nop<> pi sequin II 17* — i rescil in miriimiss
 prope ll.i\anam in insula (uba.

r tnulosum Frurtib. oblongi< acuminatis compre^id, »uperfici* Ptuosih ri
 mb^reulK punrtiiling nntati* «plendenlibu<. — (apstcum rubrum minus Kmpb
 lib Ambom IV I K< liu 1 - Oesnl in Amboina

19 < II TKI M I im IlliHir. no 2IO2 - Room rl Srbult I r J\ 'III - Fngrht
 I p ,li ; I 8 lie P - Fnilesrens foil cllypiiris | oblongo-ovalm icumioctis,
 n!\(< inilinte Mihlruntnt subponlagono pilnstu<uto, drntib nltos erectus-
 rnlis, doniMm rum nlvris marpine dilalalo nlloxin, frurlib o^ato-rllipiini fo-
 <iohtn-rugnsiH pendulit, bini calyce nncin, trilocularib , dis<rpimrnhs irreju-
 hnb arnnln-flntuoKn., plnent.ini «er<u< ^ubinrras^tK > — Solanum m >r ten*
 nit fapunitn fmetu (tarcscente Weium I r l\ MO I 9J0 lip a — t rp>nl in
 Iri'li i ori< ni ill

Jl I s|M,,\s!. J(| Mori \indob III t fi7 - Will.l sprr pi | ior,| - Fngrbt
 I r Jt | l S h* d I riitr<rrn< foil o^ah<> arumin ilm tubrrrpandi*. «ublu<
 il Reno* pubrrulm nhrr Mibnulinlr irunrato, supernr »ubdihlilo li<-i^onti
 vlabro, drnlib brrtib , drmuni «uboan*rrntil> , frurtib «ubn\it<. -n|i|nni;<v
 ipire obtU4iikrnlis< penduh<, ba<i rajre rrrrim^rulo nnrli bi- irilnru inb ,
 <INS, pnlu mix irrotjuhnb armato-nr^i<, plarrnlm ^frsii* iititmiK i - I Inna
 Jl I \M.I IOSMI MilVr, 1 n<l «irt<-nb I 100 R..<m •I srlmli | r V,|
 I iisr'il I r J< I •< fitf a b llprbinum foil oblong,-!,* ui< ghbri* ci-
 |\<i mitiitt* i | i rid il i Mibtnim itn I'liin.-uin, drniib quinqu> brmb | iuli<
 nhiisiu,(U'IH frin lib « Id njis » << His rnjoM4 «kill no-ln^tiiuis iiuml <. iptre
 rttiiHO bi - Irilnlis IHM MJIH|I| itil.i o h a HIM Irntib | i^nduli< Inl rjhnl. .h>sr-
 pinirniK | i iri'im »ir>m nur ISMII* / jmrurn I urnrfrtn Ui >»i r <,t
 bort kr/< in

fi rontrum I rurli cbl r n I-I oniro pmd il in.: il * • rubr i I (furanum Mill
 r oralr Iru.iu nblong i %abr <lundo prndulo ruu'o^o-jncubi> rubru I •• lij! b
 - i rescit

,I Fmrt*bus iul>nlund>s

21 f O\ ITI M l>f in hnri Mon<pil |t|| *t) |(„ m it\schult | c 361 -
 Injhrf I i is ; 1 V Hf b¹ Inil^ren* foil %iibM*M.>-tohrc,|jii, rucumabw

glabris; calyce nulanle truncato penlagono glabro qumquedcnlato, dentib. brectib oblu«iusculiv, fruclib. ovatis, basi calyce subcinclis subbiloculanb , dissepimnli* utnnq. subinerassaii*. 6 — Crescil. . . . ?

23 C SPIAERICUM Willd. Enum. pi. bort. Berol I. 241 — Roem et S< bull. 1 c Fngiht. I. c. f * 0. fig. al — Frulescens: foil, oblongo-lanccolalis \. oblongo-ovalis acuminaliH glabns; caljcc nulanle Iruncnio pentagono glabro quinquexdcnlalo, dcnlub. acummalis crectis; fruclib plobosis pendulis, apice subfovcollalis, basi calyce subcinclis sublnloculanb., disscpimentis placenlam verb us incrassatis.) — Crescil — y

24. C. (OUDIFOIIME Miller I. c. 100. - Roem. et Scbull. I. c Fngihl I. c. 2Q | t 0. fig. c. d. c. t. 10. fig. a. b. c! — llerb.it eum roll. o\alis \. oblongis acuminalis repandis glabns; caljcc nulanle, supcrnc subdilatalo subtruncato pentagono-hexagono \erruculoso, dentib. brewb. superne subincrassalis obtusis, fructib. ovalo-cordiformib., basi imprcj>sa caljci amplificalo nisidentib. inlocuLirih , dissepimentlit placenlam versus incrassatis. O — (\ cordatum Camcrar (la-tum Fchs. — Piper cordatum Raj. - Piper indicum cordatum Hcssl Hurl i;w fol. 13. fig. simsir. — Siliquastrum quartum Fchs. Hlistor stirp 7H.

f. subangulotum: Fruclu cordato magno subletragono pendulo rubro. t. 0. fig d y. majus- Fructu cordato oblongo majon pendulo flato aut rubro, nhlo persistente plerumq. lcrminato. 1.0 fig c. — Piper Indicum cordatum oblougum Dcssl. Hlort. K)sl fol. 13. fig. dextr. — Quiya siee ihper ltrasihense Pino.

d. minus: Fruclu subgloboso-cordiformi minori rubro, »ljlo persistente mlcrdum apiculalo. t. 10. fig. a. — Piper indicum rotund urn aculeaium Bestl Hlort. E>st. fol. 12. fig. dextr.

c otuaeforme Trued! niedmcn olnaeformi flavn aul rubro pendulo. 1.10 fig b — < npsicum sih'jua oliuicfonm lournef Institui.

C. globosum Truriu sub(!oboso pendulo (la\o. t. 10 fig c - Credit in Indus el in America mendionali.

25. C. TETIUC.OM'H Miller I. c. 100. - Roem el Schult. I. c. 501. - rngrlit I f 30 f t 10 fig. d! — llerbaccum foil. o\atis acummalis glabns, <nh<e nulanle, huperne siibdilitalo truncalo pentagnno-hexagono Rub\errucul<>so, dentib. brexib superne inrrassalis patulis; fruclib Mibglobosiii depre^Mn siibtetr.igonis, anculis obtusis rolundalis, e basi dilatata caljci insidenle apicem nubquadrilulam fo\colalamq. versus decurrenlib. tnlocularib., dissepimentlts placenlam >ervu» attenuatis. Q — Piper indicum rotundum maximum Bc><l. Hlort. E>^t. O. I fol 10 fig. dextr. — Solatium mordent seu Piper indicum maximum Weinm. Pbjtonlb l\ 249 t 02^ fig. d. - Ciesch In Indus el in America meridional!.

•f Species ultcrius cxuminmidnc.

1. PIPFR IM)I(I M caule pilosn. flore ni.ijnn. V lliuti Pmax 103. Piper indicum caulr pilts albiit praedilo (uner.ir - l'ngrbt I <)I
2. C\PM(LM fructu non acn tugoso lonyo pendente rubru Miller, Engl. (iarl< nb I. 100. - Fngiht. I c
3. CAP1IUM AMERIt \M M I.ATIim.IMI fructu oblongo credo candulo Miller I. e. — rngrlit. I c.
4. C. ^IIHENSE Willd. lib. ex Roem. et Schult. Synl. tfgeU IV. 301. - Fngiht I. c. — Pedunculis HolitmiH; frurtib. subglobosm ccrnuin, %enit foliorum »uhiu< ramuliRq ferrumnoo-iomentom*. ,S - Crescit prope urbem \)u\|o
- 5 C ACCREGATLM Willd. Mb ex Roem el fcrhull I. c. l'ngrhl I c 12 Pe-duiu ulis .iggregahs folnttq pubescenlib., Miblus inrano-t<ont« nl«>sis , (irscii **
- 0 (COLKI I Ls(K>N Hcsscr, C.ital. horl kr/em. 27. - Fnerlit I < _> |tu-tus dilTiiriiiH oltiuse iijjililul riliisii. «e ilium aurailiaius ||liue \idclur (' pyrawt'tah Miller — (r< s< il
- 7 < TO\lt VIII M Poeppig HI I rorn p s Nolut n IUS dun <n>i.< tlr >atur- und Heilkunde \\\11 2^ I ngrlit I < IrutKosiini mnulis pub<rrnlih , fall o\ali< aculis. basi rolund.dis, ner\> subtus \illosu-barbatus, peduneulit solataru<

unifloris fructiferis deflexo: baccis quinqueangulis obtuse tetragonis torulosis acutis.
5 — Crescit in Peruvia.

8. C. CEREOLUM Bertoloni, Hort. ttononiens. plant, nov. I. 6. f t. 2! — Fruticosum: foliis ovalo-lanceolatis acuminatis; pedunculis recunatis; baccis (capsulis) ovoideo-conicis acutis laciniatis. 5 — Crescit in Brasilia.
9. C. UAMILTOMI G. Don, General sjst. or gard. and bot. IV. 447. no. 30. - Caule suffruticoso bienni subtripedali suberecto violaceo; foliis atro-violaceis; baccis immuturis rubris, maturis atroviolaceis obtuse conicis baccibus 5 — *C. violaceum* Dsf. Cat. hort. Paris, ex Desv. in Hamill Prodr. 25. uel H. B. Kth. — Crescit in hortibus Noisiensibus.

3855. SOLANUM Tournef.

(Tourner. Insitut rei herb. 02. — Linn. Spec. plant. I. 203. — Meisn. Gener. plant. vascul. 1.277. II. 184. — Dunal, Solanorum generumque affinium synopsis. Monspeli. 1816. 8vo. — Spr. Syst. veg. I. 677. cur. poster. 71. — Ant. Spr. Tentam. supplcm. sjst. veg. 0. — Dietr. Synops. plant. I. 606. — G. Don, General sjst. of gard. and bot. IV. 400.)

Diversi I. IXEKMIA. — Herbae v. frutices inermes.

Seotio I. POTATOE Dunal 1. e.

Folia imparipinnata, pinnatifida, ternata vel integra. Floret corymbosi icriminales, laterales et axillares.

% I. Foliis imparipinnatis; racemis corymbosis terminalibus.

1. S. (LYCOPERSICON Mill. Diet.) TUBEROSUM Linn. Spec. plant. 281 - Dunal, Sjst. Solan. 5. — Sabine, Transact. of the horticult. soc. V. 249. t. 0. fig. 2. et I. 11! — Blackw. Herb. t. 523. — G. Don I. c. 400. no. 1. - Radice tuberifera; caule herbaceo angulato; foliis pinnatis, foliolis inaequalibus, alternis minutissimis; pedicellis articulatis; corollis quinqueangulis. 2! — *Solanum tuberosum esculentum* Bauh. Pinax 167. — *Papa* Americanum* Bauh. Herbar. pi. 621. c. ic. — *Papa* Peruanorum* Besl. Hort. Ejs. t. 3. I. fig. 1. — Clus. Hist. 2. 4. p. 70. c. ic. — *S. esculentum* Eck. — *S. Parmentieri* Molina. — In Chili et in Mexico crevit.
2. S. VIKRANTOSUM Schlecht. Hort. nalcns. I. p. 3. f. 1.2. — Indx. semin. hort. Hal. p. 11. — Herbaeum perenne inerme: rhizomate repente stolonifero tuberifero; caule angulato; foliis pinnatis, pinnis 3-7 majoribus dorsum decrescentibus, oblique ovalis v. lanceolatis acutis, interjectis minoribus; baccis caeteris parvis (c) sudulentis globosis glabris albo-verrucosis. 2! — Crescit in Mexico.
3. S. OXYLOPHLUM Schiede in Schlecht. Hort. nalcns. I. p. 5. | t. 3. - Herbaeum perenne inerme: rhizomate repente stolonifero tuberifero; caule arbutiforme; foliis pinnatis, pinnis 0-11 dorsum decrescentibus, oblique obovato-lanceolatis ovatis; baccibus calyce credo persistente fuffillis ovoideo-cylindratis acuminatis. — Crescit in Mexico.
4. S. STOLOMFERUM Schlecht. Verhandl. des Vereins z. Befordr. d. (Jardn. in d. Pr. SI. IX. 317. f. I. 2. — Radice annua stolonifera, stolomb. longe prorur-rens hinc inde tuberiferis (tuberibus. pamp. roryli magnitudine; caule crasso ascendente subgemmulato parce ramo terminusculo, apicem pili crispatis obfuso, colyledonibus longe petiolatis lanceolatis; fullis, caulibus uiformibus simplicibus, rotundato-obovatis, turn auncularibus pinnatifidis, pinnis albis inaequalibus. Ilirnis oppositis latis cordatis obtuse aruminalis inlegris, supra libris, multibus pilis hirtibus incum pellucidis, pinnis inliens (stipule raris semicordatis, corjmbis irregulanter dirhoimis lenuilor IKMUMMLIH su-raa-illan), demum ovifoliosis, pinnatis drum pt'idulii, apice sulciatissimis, rotundis corollae. hinciac. alluo. spgrii actiniinalis, inlberis basi Hamillii. batcii vindib. deprostito-globosis diametro Iran-er%ji lungiludialcin uoo aliingenlo 0 Cr'rit in Mexico ad radicem moni. n Orujbae.
5. S. MEXICANUM Molina, >alurKChb. v. Chili ed. Lip. 1751 (K Mhrleid Hurl Halen. I. p. 0. - A *S. tuberosum* differ. foliorum majus pinnis bijwkis [net J-4-jugis] iiiiMjuilicris rhacbi scmiadnalo, lalere scilicet pmarum infor. oruni

- in rhachin subdecurrento, su pen ore aulem oblusiusculo, paucas lincas anie nem s peioli inscribentem finilo, pinna icriminali nunc ad basin cuneala nunc cunealo-subcordala, nec pinnis omnib petiolalis, basi obtusis subcordalisve, pinnarum facie utraque pilis dispersis obsila, nec inferiore densius pubescentc, stylo longiusculo exserto, nec incluso v. brevissimo exserto, corolla consisistens albis, tuberibus parvis non ednlib. saporis amaranthalis 2|. — *s. luberotum* Poir Coll pi Ghil I no. 72. — Crececil frequenlissime prope Valparaiso in regno Chiensi ad mans litora chvis argillosis saxosis
- 6 S PAISTHE Poir Coll pi. Chil I. 7J. e\ Schlecht. I. c — Villis brevissimis albidis druculatis mollib. palentib omnes fore pane* in pinnis superioribus cum inflorescentia occupantib. vestitum foliorum pinnis 4-5-jugis, basin versus deorsum oblongis acumimib, basi maequalib subpetiolatis v fere somiadnatis, in superficie minus pilose, interjunctis pinnis* alii* multo minoribus obovatis, basi fere cunealo-subpetiolalis, pinnae impansae basi in petiolum acuta, florum quam *S. luberoso* paulo inflorescentibus; calycum glabrescentium lacum ovalis acutiusculis; antheris exsertis puberulis; stylo longiusculo exserto, bacca Juniori globoso-ovoidea glabra. 2(.
0. *glabretcent* Poir Coll. pi. Chil. 111. no. 02. — Omnium partium glaberrime majon (pili minutissimi paries caulis juniores al imprimis paginam atersam folis occupant, in superficie autem foliorum, in pedunculibus calicibus >aldis dispersi), ramis inflorescentiac hinc laxius elongatis; antheris glabris Caetera non discrepant — Utriusque forma* rhizoma, radix, tubera, fructus et semina plana ignota sunt. — Crescit in regno Chilensi "Rio de Aconcagua" in Andibus de Antuco.
- 7 S^o CAIU Molina I c e\ Schlecht I c. — Caulis inermis herbaceus, folia pinnatis internodiis, florum albis nectano magno luteo campanulatis • *) pedicellus subacquinatus, lobis cylindricis trilobis 2|. — fructus in regno (Chilensi — ^ind. *) *nitentanum* Solanorum nescimus
- B. S. EILLIKKOSLM I incl. Dot flogm I 1712! t - G. Don I c 406 no 2 - Rhizomne crasso subterraneo etuberoso; caule herbaceo, foliolis maequalibus complicatis undulatissimis approximate, allernis minutis, pedicellus articulatid*, ramulis corollae 5-angulatis glabris % — *S. tuberosum* Bert Herb 1 2H — Habitat in Unli
- 0 S COMMERCIO Poir Fnycl. méth. Suppl. III. 746 - Duobus 1 c p 3 (ed 2. medil t. 13J) — Transact. of the horlic. Soc. V. 240 t i 10! — G. Don I. c 400. no 3 — Caulis herbaceus; folia pinnatisectis sablyralis pilosis, pedicellus articulatis, ramulis quinquefidis. % — Radix ignota O v 2|. T ~ Differt a *S. tuberoso*, cui videri infine folia profundim pinnatifida, foliolis Hessilib., nec allernis inaequalibus, foliolo terminali maximo, corolla quinquefida nec quinqueangulata — Crescit in Montevideo.
- 10 S APPENDIU LAM Dunil I c 5 (od 2 inclid (84) II R Kill >ov. gen et spec pi III]>. — Kih s^nops. pi aequin II 1W — Fruticosa/ terdens folia, quinato-impannataid, basi trilobalis, foliolis oblongis arominalibus, supra adpressis pilosiusculis, subtus inaequalibus pubescentibus, corollis terminalibus paucifloris, corollis quinquefidibus albis Klabin ^v^ — Crescit in regno Mexicano juxta la Puente de la Madre de Dios inter Tolomco el Grande el Aclopan.
- II. S. MUUIMUM Me^en ms^ ex >ec< ab Escob Nov. Act. acad Caes I cop Carol. XIX. Suppl 1 J84 t — Puberulenta-srabnuculum caule herbaceo rimosissimo diancalo, folia succulentis pinnatifidis innatis hnearibus obusis, lacuna media brevi, lateralibus integerrimis bauxe deorsum undulatis, rimoso terminalibus dixergerulo, corollae lacinis aiutis O — Simile *S. pinnatu* (IN , sed differt in mi puht s<< ntn U re jr inulosa (corollae c ocruleae, lacinis K u') > >ibus Anth< rae liberis crinae Uta lobosa piformis rubra — Crescit in (hill, Copiapo in littore mans picidu
- 11 S. PIAATI M Lav. Icon el decept plant \ 21 t 4J0 fi^ 1 - Dunil I. c - G. Don I c no 5. - Caulis herbaceus sulcatus; folia imparipinnatauseeuf, segments

decumbentibus; racemis corymbosis dichotomis. 0 v. 2 J. T - In Chili ad Coquimbo.
— Caulis foliis decumbentibus subalatus. Folia ternata. Corolla obscure lutea.
Dacca glabra nigra pinnatifida.

- §. 2. *Foliis imparipinnatis; racemis corymbosis lateraibus.*
13. S. CALDVSII Dunal 1. r. 0. (ed. 2. mcdil. t. 85. fig. 2.) — II. D. Kth. Nov. gen. el spec. pi. III. 19 — Klh. Synops. pi. aequin. II. 158. — G. Don I. c. no. 9 — Caule herbaceo; foliis impari- el aequaliter pinnatisectis (pinnate) mollibus. tomen- natis, sublus albescens; racemis dichotomis cymosis. 2l. — (rescit in Quito. — Differt a *S. ochrantho* caule herbaceo, foliis minoribus, foliolis ternatis, racemis pinnatis, supra cymosis, cymis longioribus lloibusque majoribus.
14. S. JAMESII Torrey, Ann. Lye. New York II. 227. — G. Don I. c. no. 7. — Her- baceum pilosiusculum: caule erecto inermi; foliis imparipinnatis, foliolis ovato- lanceolatis, basi abrupte angustatis obsolete sinuatis; racemis extraaxillaribus paucifloris, florum albis. O — Arkansas.
15. S. OCHRAMHII Dunal 1. c. (2. ed. inedit. t. 85. fig. 1.) - II. B. Klh. I. c. 20. — Klh. I. I. c. 159. — G. Don I. c. no. 8. — Fruticosum scandens: foliis, interrupto imparipinnatis, supra hirsutis, sublus cano-lomentosis, foliolis oblongis subinte- gerrimis; corymbis lateralibus subdichotomis longe pedunculatis, folium subaequan- tibus. iv — Crescit in Quito prope Chillo. — Foliola opposita ternata. Co- rymbi pilosi. Corolla quinquefida lutea, exclusa pilosa, segmentis acutis subin- aequalibus.
16. h. JI (if \M)IFOLIUM Dunal I. c. (ed. 2. in edit. 1. 83) - II. D. Klh. I. c. - Klh I. c. — G. Don I. c. no. 9. — Fruticosum scandens. foliis, imparipinnatis, supra hirsuto-scabris, subtus hirsutis, foliolis oblongis orbiculatis integerrimis; corymbis lateralibus dichotomis divaricatis. 6^ — Foliola opposita ternata breviter petiolo- lita, terminali maiore. corymbi pilosi. Corolla quinquefida alba?, exclusa pilosa. In Nova Granada in humidis provinciae Pasloensis prope Tusa el Cufficj.
- §. 3. *Plerioidea Dunal I. c. 0. — Pedunculis axillaribus aggregatis, pinnatisectis bicuspidatis; foliis imparipinnatisectis, segmentis integerrimis acuminatis.*
17. S. MITE Hz. el Pat. Flor. Peruv. II. 38. t. 173. fig. a. - Dunal I. c. — G. Don I. c. no. 10. — Caule herbaceo radicante; foliis imparipinnatisectis, segmentis oblongis, racemis axillaribus aggregatis, baccis globosis. Q — (altrum Caule ob- tuse angulato. Flores parvis secundi albi. Dacca alba pinnatifida. Folia 8-10- pollinaria. — Crescit in Peruvia (Panatahun, Pozuro etc \
18. S. (OMII M Hi. el Pa). I. c. I. 172. fig. b. - Dunal I. c. - G. Don I. c. no. 11. — Caule herbaceo, foliis imparipinnatisectis, segmentis oblongo-lanceolatis; pe- dunculis axillaribus subternatis spicatis, baccis conicis. Q — Caulis pilosus, apicem versus angulatus. Pedunculi solitarii, bini v. terni petiolo subaequantur, apice recurvi. Flores parvis secundi lobatis. Corolla quinquefida. Dacca lobata. — Crescit in Peruvia ad Chuncio el Cuchero.
19. S. DII FLORUM Hi. et Pav. I. c. 37. I. 171. fig. b. - Dunal I. r. - G. Don I. c. 407. no. 1 — Caule suffruticoso; ramis diffusis; foliis imparipinnatisectis, segmentis oblongis, ramis axillaribus paucifloris. > - Habitu loto hand dissimile *Jitmnus fruticosus* < ramis ramosis angulatis. Pedunculi et petioli linugmosei. (oroll. 1 \h) | jre. i qmquahob. i. — Crescit in Penniae proMna luaiMfo
20. V sKtrOKIIUtM M Andr^n. Hot Hrpos t M |)n. il I. c. 7 G. Don I. c. no. 1. — IOIMI; Rol Cibm t 971 - (lule st. inlcite hrrbarco. foliis, pin- natisectis undulatis, supponibus sinuatis I u (colalis, ramis axillaribus rymojn- paniculatis, mirrimum petiolo longioribus. Zl.w — Floret carnei. lola interdum ternata. — In insulis Barbados.
21. i. 1KK>ATIM Hi et Pav. I. c. 38. t. 171 fig. a Dunal I. r G. Don I. c. no. 14 Caule «suffruticoso» letragono scandente radicante, foliis cuneatis pedunculis axillaribus paucifloris, pedicellis nubumbellatis. ^ (ilabrum folu longe petiolata. foliola ovato-lanceolata, runcio maximo. Pedunculi compluro

.aggregati, flores subumbellati. Calyx quinquecrenalis parvus. Corolla purpureo-violacea profunde quinquepartita. — Crescit in Peruvia nemoribus humidis*.

§. 4. *Fohis pinnatifidis integrisque.*

22. S. LAGIMVTUM Ail. Hort. Kew. I 247. — Bot. Magaz. I. 319 - Dunal I c. H — G. Don I. c. 407. no. 15. — Caule glaberrimo bicco, basi lignoso, Toll pinnatifidis, segmentis linear-lanceolatis, terminali elongato v. inaequali linear-lanceolatis; racemum pauciflorum, folio brevioribus simplicibus v. bipartitis; calycibus corollaeque limbo semiquinquefidis, segmentis corollae emarginatis, bacca ovali. 2* — *S. pinnatifidum* Lam. Did. IV 202 nec in Pav. — *S. auculare* Pers. Enehir 1 2 — *S. reclinatum* Hort. — Placenta glaberrima *Lactucae perenni* habitu haud dissimilis Corolla coerulea magna Antherae discolorata Dacca subglobosa depressa virescenti-lutea ciliata, magitudine fructus *Potum domesticae*.
a I rulosura aul herbaceum Toll, pinnatifidis. — II. Dr. Prodr. fl. ov. Hoi I. 415.
ft. Fruticosum. Toll, indiviso. — R. Dr. 1. c. — Crescit in India, Isoa Zelandia et in insula Diemensi.
23. S. QIERCIFOLIUM Linn. I. c. 204. - Dunal I c. - Feu. II. Observ. II. 722 t 14* — G. Don I. c. no. 10. — Caule subherbaceo angulato scabro flexuoso, Toll pinnatifidis; racemis corjrabosis v. cymosis. 2L — Habitat *Solanum Dulcamara?* Caulis erectus Rami angulato-alati, alis denticulatis. Folia subciliata, solummodo Us plerumque 5 ovatis, infra scabris, junioribus pilosis. Corolla violacea, maribus geminis vix ad segmenti cuniusque basin noiala. Dacca ovata. — *S. runctatum* Rz et Pav. I. c. II. 36? T — Crescit in Peruvia et Chili.
24. S. TRIFlorUM \u|f. Gen. pi Amenc I 128 - f. Don I. c. no. 17 - Caule incrui herbaren piocumbente, folio denticulato - bipinnatifidis Klavis, veniculis acutis undulatis, margine magis minus reflexis, pinnulis oppositifolius 2-3-floris — Floret parva «linearibus». Dacca cerasiformis, malura iridis (aules pilosissimi diffusis. Folia runnata. — In America boreali (Fort Mandan Me).
25. S. IUDM \>S Linn. (il. Decad pi I t 10. - Dunal I. c. - (I Don I. c. no 18 - Caule herbaceo licvi prostrato subterre radicante, Toll profunde pinnatifidis, sinibus oblongis; racemum rymosum, peliolos «obacquantibus» 24 - Caulis deinum ascendens, peliolis decurrentibus. angulato-alatus. Racemum intortum, nec terminis semper, oppositifolium. Corolla parva violacea. Dacca globosa pisiformi rubra — *S. radicata* Ry. et Pav. — Crescit in Peruvia.
26. S. r, L\Di: RRIUUM Dunal I. r. (ed. 2. ined. t. t. 133.) - G. Don I. c. no 10. - Caule glaberrimo sulcato, folio raro integro, saepe pinnatifidis, lacinia terminali elongata r. nemis a Kregalis multiflorum, corollae quinquefidis, laciniis aequalibus 2. — Habitu simile *S. lacinalo*, sed diderit racemum majoribus (floribus) copiosioribus, calyce quinquepartito, corollae si menalis acule nec emarginatis — (reuil in insula Timor.
27. S. RECLIN VII M merit D\l cull (ed 2 III 100 Per* Enchind 1 ->» - Dunal I c 8 — (f. Don I c no JO Caule glaberrimo crasso NUCCOHO, folio pinnatifidis, micridum integris; racemibus lateralibus. folio brevioribus., corollis rmi-quinquelidis, lannibus emarginalibus. 2. — (aulam sulcatus. Folia In pelmum aequalia, segmentis linearibus*. Pedunculi 2-3-floris. Calyx profunde quinquepartitus» Corolla arurca. Dacca viridis globosa edulis, pollicem diametro liabel — *S. laeintatum* Dunal, Solan. Monogr. 1JO (scil. «n.) - *S. pinnatifidum* Lam Illustr gen t in h« 4. (ic. mala) — (rescrii in Peruvia.
28. S. SMMKMIODI M Hnpe. Mem. de sa> et de Si. Plrshrg II 12 (Don I c no 21 — loll pinnatifidis, lousis ovalibus obtusis internis \ IKISODentalis, ilnna(| pubescens) pinimlin ddiotnibus dnarn illis I iti-ralibus, folia supermini) cornibus quinquefidis, (uile Inrlti(eo <redo inrim 2L lous obscure undia, plerumque sepiemloba. Corolla obscure Mulirea (reuil in China prope urbem Peking

§. 5. *Fotius ternatis vel simpliribus. .FoUis foiiolisque ovatis vel ovato-lanceolatis.*

29. S. HEBEPHOIU'M Dunal I. c. p. 7. — II. D. Klh. Nov. pen. el spec. pi. III. 21. — Kth. Synops. plant, acquin. II. 150. — G. Don I. c. no. 22. — Herbaeum: ramis anguliculis puberulis; full, ternatis, ulrinq. sericeo-pubescentib., foliolis oblongis aculis; pedunculis lateralib.(?); florib. subracemosis. 2 — Calyx quinquepartitus. Corolla quinquefida. Pili in hac et in speciebus quatuor subsequenlibus simplices. — In frigidis Peruviae prope Caiaraarca crescit.
30. S. MIHCATLM Ait. Hort. Kew. I. 250. — Dunal I. c. — II. B. Klh. I. c. - Kth. I. c. — G. Don I. c. no. 23. — Caulis suffruticoso radicante ascendente, turionibus muricatis; foliis oblongo-lanceolatis pubescentibus simplicibus, internodiis iriseclis (ternatis); ramis terminalibus bifidis. 2 — *S. tabrum* Lam. Illustr. gener. 2:344. — *S. variegatum* Ri. et Pav. I. c. 32. t. 162. fig. a. — *JUehngena lamifolia fructu turbinato variegato* Feuillec, Peruv. II. 735. I. 20. — *S. parrifolium*: — Crescit in Mexico et in Peruvia.
31. S. DIVERSIFOLIUM Dunal I. c. 8. (ed. 2. t. 88.) - II. B. Klh. I. c. 21 - Klh. I. c. 100. — G. Don I. c. no. 24. — Fruticosa: ramulis puberulis; Toll, imparipinnatis ternatis et integris hirtello-pubescentibus, foliolis oblongis acuminatis inlegerrimis, terminali maximo; ramis extraaxillaribus simplicibus; calycibus magnis corollam subaequantibus. — Rami glanduloso-pilosi. Racemi foliis breviores. Corolla lobata subcampanulata quinquefida alba, segmentis ovalibus aculis. — Crescit in prope Caracas.
32. S. CUTIRF.NSE Dunal I. c. «. (ed. 2. inedit. t. «0.) — II. B. Kill I. c. — Kill. I. c. — (t. Don I. c. no. 25. — Fruticosum scandens: ramulis villosis-pilosis; foliis simplicibus et ternatis elliptico-oblongis acutiusculis, basi rotundatis inlegerrimis sericeo-pilosis, basi auriculatis; racemi extraaxillaribus et subterminalibus simplicibus aut bifidis. 5w — Folia 1'A-2-pollicaria. Calyx quinquepartitus pilosus. Corolla rotata alba? quinquefida. — In prov. Cumana ad coenobium r.ripense.
- U S. BILBOCASTAM'M Mo?, et Sess. Fl. Mexic. inedit. ex Dunal I. r. r.l. 2. inedit. t. 21) — G. Don I. c. no. 20. — Radix luberosa; e. iule herbario; foliis ovalo-repandis hirsutis, basi auriculatis; pedunculis uniuersis simplicibus terminalibus. 4 — Tuber solitarium, magnitudine illius *S. tuberosum*, infra in r. iulim simplicem abiens, absque aliis radiculis. Caulis teres. Folia uniuersa. Potius basi foliolis 2 sessilibus auriculatis. Pedunculi villosi violacei. Corolla alba, segmentis lanceolatis obtusiusculis. — In Mexico.
- 2A. S. OLHIAMIUM Dunal I. r. (ed. 2. inedit. t. 90.) — II. R. Klh. I. r. 21 - Klh. I. r. 110. — G. Don I. r. no. 27. — Caulis herbaceo scandens: foliis ovato-oblongis, basi inaequalibus subcordatis lomenonibus auriculatis, inlegerrimis, supra glabris, subtus molliter tomentosis; pedunculis terminalibus paucifloris. — Pubescentia atellata. Folia bipollicaria, auriculae sessilibus oblique ovato-sinuatis, foliis similes. — Crescit in ripis Orinocensibus prope M. i. pures.
- §. li. *Pachyphylla* Dunal I. c. 7. — *Folius pinnatis. pinnatifidus rW intpyris, foliis foliolisque cordatis natis crnatis, pilis brevibus simplicibus hispidis; racemis rymnsis pendulis; corollis quinquepartitis; bacis oiaUbus.*
- 3V S. PKMU'M R*. et Pav. Flor. Peruv. II. 30. I. 174. fin. a. — Dunal I. r. G. Don I. c. 40. no. 21. — Caulis fruticosus; foliis simplicibus. — Irritatus. — Plurimatis, egmenibus hirsutis; ramis drupiferis furratis. — Ranunculus pilosus dirhologi. Folia ulritujur puberula. Corolla lobata purpurea, segmentis acutis. Bacca magna ovata lula. — Crescit in Peruviae provincia Panatahua.
- 3V S. OLLIYRIUM Ri. et Pat. I. c. ». t. IW. fig. a. — Dunal I. r. - t; Don I. r. no. 30. — Caulis fruticosus; foliis cordatis obliquis. — Rami ramosi reclinatis; ramis purpureo-violaceis. — Crescit in prope M. i. pures.

- pubescentia. Pedunculi laterales. Calyx quinquefidus. Bacca oblonga, uncinata. — Crescit in Peruviae nemoribus*.
37. S. URIDIFLORUM Kz. el Pav. 1. c. 38. I. 173. fig. b. - Dunal 1. c. - G Don I. c. no. JO. — Caule fruticoso; foliis cordato-ovalibus, mucronatis, venis venis dependens. folia subacqualibus. 5 — Villosum. Calyx bicuspidatus. Corolla viridis. subquinquepartita, segmentis reillexis. Bacca magna oblonga turbinata villosa lutescens* — In Peruviae nemoribus crescit.
38. S. BETACEIM (a). Icon el descnpl M 500 I 524. — Dunal 1. c. — G Don I. c. no. M. — Audn's Ilol Hcpoil (511 — Fruticosum ramis cauleq. erases succulentis, Toll mapnis coidalis* o\ato-oblongis, ulunq pilosiusculis, margino undulatis, racemis cymosis pendulis peliolis subacqualibus) — Folia pollicana, petioli maculati Racemi axillares el supraaxillares nullius bilidi, miedum simpliciter tndique. Antherae luteae. Bacca ovalis junctis »inm, lutescoriti->mdks, maculis brunneis longiludinalibus oblonga, demum rubicunda. lola planla mala old, fere VL\ *Datura Stramonium* — S. er awful mm Onega, Dei ad plant. 117. — Crescit in Ilo*a lli»pama.

Seotlo II. Folia lobata, aagulata, stannata, dentata vel Integra.

§. 1. *Folia lobata et integra.*

39. S. LKP1AMUIM No. (ct Sej)s. Fl Mexic. inedil. ex Dunal I. c. 0 (od 1 h<d I. 28) — kill. I. c. 101. — G. Don I. c. no. J2. — Caule tereti herbaceo glabro, foliis oblongis uindulato-reptandis in peliolum desinentibus, racemis dichotomis, apice cymosis, corollis pentagonis 3l. — Corolla parva. Calycis deules aculi Bacca parva gibbosa, rubicundo-violacea. Erectum V. procumbens.
- ft partifolium* II li kill I. c. 24 — Foliis, ininonb. »iib><tMlib, raceoioi podicollisq bn'Monb, corolla pallide Molacea nec alba — Lronl in IN TUMJ inter <.ix.uuaK.i cl lldgdik'iu
- 40 S I INKII (J Don I. c. no. U — Folia lanreuhhs sub<*>imiai<*> sub<*>muMilo<*>i^ \irenli), pedunculis paucifloris, <> inns tal^rinis o\aiis acutis, > — Kami ^ 1. i lli Peioli pilli, siliolalib luvutihHiiniH ohsiU, folia acula undulata, MIUIIUS I- { d iud profundii, oupra pilis >UHalo spami, subtun crobrioribus IN'dunrulus bn^ii, p<*>di(elli 4-0 Im. longi nulaoten cum cil>ce HublomenloHi. (oroll.i semM\iuiiqin lida plicata alba. — S. *ulujanikum* Lnk Kuum. pi. borl Derol I IH2 MM Dunal — S *launfultum* Ilorlor - 4, re>ci(. . . ?
41. S COK(MD)(StM Jcq Colled, but I. 78 — Icon. pi. rar. I 1 40. - Dunal I < — G Don I c 400. no. 34. — Caule suffruticoto, foliis o\ato-lanceolatis *integriss* bublolMiisu^l, lacmitf CmoM> oppo>iUfoln», rorollis quiaquepartitis. ^ ~ Habi- II> S *Dulcamarae*, romu ex parte procumbentibus, ex parte irrecht*, *angulatis*, folds glabris fut iitjjs Hatonn 2—J—4- fidi. Corolla panta covrulta & violacea 5-fida Ki< i pitifonuis rubirundu-.mrantiaca .S *nrnymfn{rrum* dun I Sj>A \t^got .HI — S *pamflumm* Nona in I slon, Annal. M 51 (ri<ui in l'onoia prope Ijnm.
- 42 S (IUKIOSI V Dunal I r 0 id I imdil t. 01 II II kill I r 24 kilt I. c. 102 — (J Don I c. uo > - I luliroKUt n tcandciik cirrhooni foli itji'KriH (cl inlobn.' obloti^m acuminaii^ intrgerrimu glabriH, racem* lerminalib paniculalib. >w - Hlibi4u» S. *Dulcamarae*. (glabruni. Tirrbi ipiraliler rr<oluii ctilra-axillarios 1 olia iniegra, lernaia \. Inloba. I loret rosei magmtudie illorum S *nign*. Coljx par<u> anRuUio-quinquiedenUlui Slamiaa noanuoiquaoi adsunt >ex — V. *salignum* ^illd. mil. in Roem. el hebull. b)>l u*gel. IV 00J — (JVS-cil in umbroKiK prope Cumana.
- 4J. S DI H AMAKA Lino. Spec, plan! 204. - 6m Eogl bol 1. Wi - (urhs I k<r londiu I I 14 - Flora Dame I 007 - Dull llrrb t 2) — It-it <t \), (t ; j. Dreves cl ll('ut', Off IMli/n I 00 (JUIIIIMI d SrhUhld OT IMlu/n t 12 Honk, OT Plln/n I III) >Nrusk but t J) \S.M,d\ M< di<. bot U7 I. JJ bav Mai. medic. 47 I 14. Murui, DuiUrbl 11 lift H Dunal I c - (• D<ui I. c. no. JO — koch, S)iiop> (l U'rin ct HoU I cd W Krhb Hl *escurs*

- p. 392 no. 2050- — Caule fruticoso flexuoso; Toll, ovato-cordatis, superiorib. hastatis; cymis suprafoliaceis oppositifoliisq.; baccis ovatis coccineis. \wedge v - Flores violacei, maculis 2 viridibus albo-marginalis ad basin laciniarum, raro albi. — *S. scandent* Neck, Gallob. 119. — *Dulcamara flexuosa* Mnch. Method, plant. 514. — *Solanum scandent* scu *Dulcamara* Tournef. Institut. rei herb. 149. — *Amara dutch* Gerard, Kmac. 350. — *Dulcit amara* Trag. Hist, slirp. 816. — *Clycipicrot* seu *Dulcamara* Baub. His tor. II. 109. (c. icon.) — *S. scandent* Lam. Fl. Fr. — Crescit per lotam Europam, Asiam et Americam borealem ad vias, sepes loeisque humidis.
- ? *tomenlotum* Koch I. c. — Caule foliisq. lomentosis. — *S. litorale* Laah, Bot. Zeitng. 1819. p. 413. — In Helvetia australi, Tyroli, et in Pomeranic insula Isedom prope urbem „Swincmtindc“.
- y. *rupetree*: Caule erecto; foil, ovatis integerrimis; racemis paucifloris dichotomais. — *S. rupetree* Schmidt, Flor. Bohemic. 96. — In Bohemia.
44. S. KIESERLZKII C. A. Meyer, Verzeichn. der Pilzn. am Caur. 113. - G. Don I. c. no. 37. — Caule fruticoso inermi erecto; Toll, glabrusculis sparsis petiolalis ovato-oblongis integerrimis acuminatis, basi angustatis; racemis lateralibus paucifloris; corollae segmentis 5 reflexis, basi bimaculatis. 5 — Crescit in Caucaso prope Lenkoram.
45. S. PKHSICIV Willd. mss. in Ledeb. Fl. Altaic. I. 237. - G. Don I. c. no. 3d. - Caule fruticoso tereti scandente; foil, pubescentibus ovalo-lanceolatis cordatis integerrimis; racemis cymosis lateralibus glabris; corollis quinquepartitis pallide violaceis; baccis rubris ovalis. W — Proximum *S. Dulcamarae*, sed folia semper integra nee umquam hastata v. auriculata. — *S. Dulcamara* Pairin. Flor. Bernaul. inedit. — *S. attimile* Friv. (rf. p. 54. no. 122.) hue perlinere dicitur. — Crescit in Persia et Sibiria prope Barnaul.
46. S. TEGORE Aublet, Guian. I. 2K. 1.84. — Dunal I. c. 10. — G. Don I. c. no. 39. — Caule fruticoso hirsutissimo; foil, inferioribus pinnatifido-sinulatis, superioribus cordatis. § — Folia inferiora roajora, longius aculis, superioribus minoribus. Flores panis virescentes in ramorum furcationibus corymbosi. Bacca lulescens globosa, coryliforinis. Antherae coalitae. — Crescit in Guiana loci* cultis.
47. S. LYUATLM Thunberg. Flor. Japonic. 92. — Dunal I. c. — G. Don I. c. no. 40. — Caule herbaceo erecto lomentoso; foil, utrinque lomentosis, inferioribus lyratis, superioribus hastatis. % — Foliorum segmenta subopposita quaternaria v. plura integra, terminali maximo. Flores paniculati axillares et terminales, pinnatis subdichotomis*. — Crescit in Japonia prope Xagasaki.
48. S. PV(İMAELM Cav. Icon, et descript. pi. V. 23. t. 419. fig. 2. - Dunal I. c. - G. Don I. c. 410. no. 41. — Caule pollinari herbaceo; foil, trilobis. lobo intermedio elongato obluso. ^) — Caulis simplex, floriculus dumbus plerumque terminalis. Folia parva. Pediculi primum erecti, demum deflexi. Corolla pallide coccinea & fida. Bacca parva villosa globosa. — Crescit in Bonaria.
- §. 2. *Foliis sinuatis, angulatis* vet dentatis.*
49. S. GRANDIFLORUM Ri. et Pav. Flor. Peruv. II. V. t. 168. flu. b. - Dunal I. c. - G. Don I. c. no. 42. — Caule arboreo lanato; foil, ovatis sinuatis integerrimis, supra hispida, subter lanuginosa; racemis cymosis recurvis brevibus. 5 - Caulis lina strillata fulva tritus. Calyx defloratus auctus. Corolla magna violacea 5-partita, et lris hntis notabilis. Bacca magna lanata lustrata drj.rudens. - Crescit in Peruvia.
50. S. UUTKNSK II. B. Kih. I. c. 35. - Kih. I. c. 102. - But. Mat. u. 1. „?»?»«). - Suffruticosum: foil. Mibcurdjitis sinuato-angulatis, utrinque 1<MHMU>S>; raroniis lateralibus brevibus lris hntis; barrin u'N'bosis. „ — Pilosis Kiiiiuii. Folia magna, tragmenta arula, potiolis nrrxis*, purpurea rrrntibus. St'gnionta ralyrina acula. Corolla magna, inlu* alba, exlu» violacea. Bacca globosa, auranii minori* magnitudine et colorr, Junior Una brrvi Irrla. - S*. (*Juitornie* Lam. Illustr. gen. it». — Poir. Enr)d. mnh. Suppl. IV. 2M. - Dunal I. c. 10. fed. 2. inrdil. t. 92. fig. b.) — G. Don I. c. no. 41 — *S. angulatum* Ri. IM >av. 1. r. II. :U. I. 170. fig. b. - Feuill. Observ. III. 01. t. 46. - Burn. Plant. Amrric. 219. I. 224. fig. 2?

- (excl. syn.) — *Lycotpermum arboretens foliis angulatu, fruetu aureo* Plum. Cat. 4. — Crescit in Peruvia.
51. S. TWEEDIAMJM Hook. Bot. Mag. l. 3385! | — G. Don 1. c. no. 44. — Pubescenti-viscidum: caule herbaceo; Toll, cordatis, basi angulato-dentatis sublongo petiolaliu; racemis umbellalis; flonb. (inter majores) nutantibus. 2|. — Habitat in Bonana. — Corolla magna quinquefida pallide coerulea; pedunculi oppositifoln
52. S. HARTWEGI Bib. Plant. Harlweg. 498. — Fruticosuro, inermis(?): ramis flexuoso-tomentosis, foli petiolalis amplis ovalis v. oblongis subundulato-repandis integerrimis, basi rotundatis, supra velutino-pubescentibus. subtus albo-lanatis; cymis pedunculatis lateralibus. multifloris albo-lanatis calycibus. dense albo-lanatis semi-5-lobis, lacinis lanceolatis. corolla ampla profunde 5-fida, calyx tomentosa; antheris subaequalibus; bacca nuda globosa glabra. S — In Mexico.
53. S. SAMWICSE Hook, et Arn. Bot. Beech. & J. 02. ex Prsl. Hort. bot. s. 1 I. 30. — G. Don 1 c. no. 45. — Caule fruticoso; ramis teretibus, ramulis cernentibus; foli, angulato-sinuatis ovatis, supra glabris, subtus pubescentibus, racemis corymbosis terminalibus. v. lateralibus; calyce minuto quinquefido; laminae aequalibus. 6 — Primo aspectu *Lycopersicon* praesertim & fert. — Crescit in insulis Sandwichensibus.
54. S. TOPHA Dunal 1. c. (ed. 2. inedit. t. 02. fig. 1) - II. B. Kth. 1. c. 25. - Kib I. c. — G. Don I. c. no. 40. — Caule herbaceo teretibus; foli subrotatis acutis sinuato-angulatis, basi inaequalibus, supra adpressis pilosis, subtus tenuiter cano-tomentosis; flonb. extraaxillaribus aggregatis; baccis ovalibus. 2|. — Folia 0-10-pollinica, 0 poll, loba, angulis acutis. Calyx tomentosus. Corolla virescens, segmentis subinaequalibus ovato-oblongis acutis, excluso tomento stellato velutinis. Bacca quadrilocularis edulis. — Crescit locis humidis prope San Fernando de Atabapo in confluentia fluminum Ormoci, Atabapi et Guaiaras
55. S. MUKOUZUM Linn Mantis, pi. 205. - Mill Icon t. 2M - lam. Illustr gen. & Pl. Spec. ic. IV. t. 224. fig. 2* — Dunal I. c. - (G. Don I v. no 47 — Caule herbaceo glabro; foli basi cuneatis sinuatis glaberrimis; pediculis paucifloris brevibus. — Folia magna repando-sinuata, oblusa > acutiuscula Segmenta calycina longissima. Corolla magna coerulea subcampanulate quinquefida, saepe sterilis. Bacca carnosa globosa lutea pomi circumscripta. — Crescit in Pennia.
56. S. PEINACTYLIM G Don in Loud, Hort. Brit. 72. G Don, General sW. of gard. and bot. IV. 410 no. 48. - Caule erecto & flexuoso glabro; foli, runcinato-sinuatis segmentis acutis glabris, supra nitidissimis; corjmbis brevibus terminalibus. in caulis bifurcationibus; baccis magnis ovalibus, protuberantibus quinque ad basin sessilibus. — Folia magna. Bacca magna lutea. Floret mediocres coerulei. — Crescit in insula Irimtahs.
57. S. CALMAYI Moy. et Ses* Fl. Mexic. inedit. ir. e\ Dun. I r 'ed 2 in lill t. 20 j Poir. Encycl. méth. Suppl. III. 717 - G. Don I c no. 10 <aulicniliuo> glabro crasso; foli, sinuato-repandis, pediculis brevibus unilobis sessilibus. calycibus post androanthem crescentibus. 2|. - Habitibus simile *S. maemcarpa* Segmenta calycina nempe nullis sinuosis perrurra. Corolla rorralra quinquefida lobata. Habitat in globo terrarum, pomi minorum magnitudine - Crescit in Mexico.
58. 8. BAIEHIAMM Endl. Prodr. fl. Norfolk. 4. - F. Bauer, Iron pi. t. IV - G. Don I c. no. 50 — Inermis fruticosum foli oblongis acummatibus angulato-dentatis glabris; forjmbis terminalibus laxiusculis; pediculis cernentibus. S Folia 1-2-pollinaria. Corolla alba. Bacca ovato-oblonga. — In insula Norfolk
- i. 3. *Pseudocapsira Dunal I. c. II. — Folia angulato-repandis utrigulis; corollis subquinquepartitis; baccis sphaericis toruosis sen hie* ibus.*
- 50 S. HILMI (MUM) Linn. I c II (G. Don I c no 49) (a) ille l'irrb. irro glabro, foli o^atis n. indo-aii Kiil. ilis M. ibris, ramulis lateralibus. b. nns sulcatis. O — Planla tola pilis numerosis obtusis sessilibus (m) ille l'irnlis purpura-centi-suffusus Folia crassiuscula Itaremi niulnlori polliro longiorci breiore<vr

- Calji sc*«ber. Corolla alba, eitus» rosca. Dacca *Solani Aethiopici* L. forma, sed minor. - *S. tcabrum* Jcq. Hort. Schoenbr. HL. 45. t. 333 (nec Yam¹). - Credit...?
00. S. ^LYCOPERSICLI Mill. Diet. DO. 3. - Barrel. Icon. 110*) AETHIOPICLM Lion. Amoen. acad. IV. 307 - Jcq Hort. ^ indob. 1.1. 1-2 — Dunal I. c. - G. Don I. c. no. 52. — Caule herbacco; Toll, otatth repancJo-angulatis «labni», pcdunculi* subuniflori* cernuis, bacCis lorulo»i». O — Folia palmana. Baccae »na^nae rubrac depre-sae. Cor)mbi pauciOon. Corolla alba. Cor)mbi ciijusquo lion* uno plcruique ferlili, rehquis btenlibus. — *Pteudocapsicum torulosum* Much. Metod. pi. 477. — Credit in Aelbiopia, China el Japuma.
- j. *tufiacrum*: Inerme: flonb. \iolaccn; bacci* albis v. purpurein. — *S. ŷthiopicum* Lour. Flor. Cochincb. I. 1J0. — Flore» solilarn. Cal}\ el corolla » «-fidi. Bacra magna sciloba sphaeroidea edulis. — Forte propria erit ipt>rie«.
- y. *aculeutum*: Caule aculcalo; Toll, subtus lomentellis; umbel I is axiilanb , calyce laevi. — *S. imUgrtfolium* Lam Diet. IV. 301. — *MttUn Aflhmptca* Raj. IihU 073. — Dodon. Peniplad. *lirp. 450. c. ic. — *SoUtnum pomifrutn htrbanorum* Lob. Icon. SEM — Moris. OK. Hut. Sccl 111. p. 525. M>ct. U. t. 2. Pluk. Phyt. U 226. fig. 4. — *Lycopersicum fruclu iirialo duro* Tournef. In»Ut rci herb. 150.
01. S. ZLCCA(iMA.MJM Donal, golan. monogr. 140. t. 11. - Dunal, Sjnops. 11. - G. Don I. c. 411. no. 53. — Caule sublierbaceo; Toll, ovaiis angulato-rcpandiH glabns, basi maequalib ; peduncuhs subumflons cernuis; baccis »ubRlobosi». % — *Inu* planta MTHJIS, »ub lente ^i>a u>rruci;» minuti»»inii» crjaLilluiis ob»ita Corolla 5-partild alba, scKmcnds acutis. Bacca rtTasiformii rutunda subumbilicaia inuiTonau, ma'ura rubra. — llabitu simih* eot S. *Arthtopiro*, diffVrl TOMH iinnutifrsimr verruco»i», bacci» mullo minonbu« glabrif \. profunder »nraiiH. X. *tcabrum* Zucc. Cenlur. 50. — 5. *obtuiftoUum* * illd. Herb. — *S. scabrum* /ucaga. — *S. Wtildenottii* Boem. el Schull. I. c. — CrociL....?
02. S. TRIQI'ETRL'M Cav. Icon, el descript. pi. III. 30. t. 250. - Dunal I r G Don I. c. no. 54. — Caule frulescenle Inquetto; foil, cordato-di Mm.Ins .KU-nmiatis glabrw; unibelli» oppoMnfolns prdunrulatx. > - Caulc% nr.n k s inirrdurn ererli, inlerdum proslrati, jumorrs triquptn. Prdunruli brctiHMim. |MIIMPIII 3-4 debiles. Corolla pan a alba Mibquinquepartita, spRnii>nti» lincanl»u> llarca nulan« ploboka piniformiH. — Crcicil in >0^a Ili^pama.
03. * MICHOC4RP1 M >ahl, Symbol, bol. II. 40. - Dun.il, Solan mon<:r ||<J I 10., Sjnops ||. — (a. Don I. c. no. 55. — Caule frutiroMi. (nil olilonuo-lux n»liii« subrepandit, racrmis hlrralibuv j - Folu -M-polln .iru nruln clabrj Itjrrroi extra villares polharcH. Floren >whr\nmM Corolla alba quiu<|ur|>.ir(iU. r|lu« pilo^a B.irra plahra rubra piperiformi^ S *Psruinrnpurum* ,i mimtrar/iun Per- Knrhir I £14 - .S *dtpkylmm* Fur>k. Fl. Arg. Arab. 6J. In Arg>pio.
- W. S. PSKIDOLAPMUM Linn. Spre. plant. «U. - Sabb. Hort. Rum |I i V) - Danal I. c. — G. Don I. c. no. 50. — Caule frutiro»o; foil oblmi^u . |inrr<i|jii« »ubrrrpandi»; peduuculU •ubuni0on« eMrafolMerit. j (•labrum (-.f.lh |.jn-> alba 'i-partila. Barra glul>o«a rubra rrra«ifornu« Ptru l'ra_{fb,fun} un</M/u/a-folium \lnrb Method. pi. 477. — *Sylamum fruticosum Utrrtfrum* \»uxuvi Instil P'l hrrb II'J. S. *arhorrsrrns* I ar*alp 2E. S(ryckmoilrmdn,t Itiult lli«lor. Oil li«'»sl Hurt I |%| MI I 11 fi - f'tru'lnrapurum Doifun I'niipijJ *tirp« |> >H i M S WTNun Ivi/ unnum l>ilnli Il«>rt I ujj.l |jja% k^> . mn ir. * ,i. BJTI i> hdmH I'oir linorl. nn-ih Mip|>l \ *<| >(r« ah | M nb> >«* Acl. luil i,jrs. Imp (JP.I \ | \ Huppl I M .S *f iipitcailrum* I i.k ID " (rtirit in in«uli \fjilrir.i
05. S. P*KIDO-1>! P% si fill ,i < jnr%> |>|JIII u% dn llr< «il I .T <: Don I. r no. ai. 4.«ul« aiborro inrrni MI Ui)f*olaio-ol»li>pgi* AiffEu»> acultu inlrgvrnmit, »upra glabnt, «obiu» in atillit nrrnofum U»nruljwm %oll>»io, ror crmi\ «'iir«aitlUrib. bre«ib. mono- oligocarpi*. cal>rU»u* gUbri« j t.rccul in Brazil ir pro%mr«« hU. Paulh - 4.ortn taMe amara Iwru I ki*A* cum suc- c«»u p>»p>to AJ (ebre* »edrndu» ab inroht adbibclur

- 00 S GRAGILIPES Dene ID Jacquem Voyage bot 113 t t 110! - Folus rotunditis subrepandis, pilis lcpidolo-stellalis inspersis, in peliolum ffracih m fllenuaiis fionb solitams axillanh longe pidicellalis 2|. — (.resell in sjhis *»alMdomi in India orientali
- G7 S ATHOPAE Schum Dansk >idcnsk Selsk Afh III 144. f — ^ubhorbiceum nierme Toll obotalo-cunealis angulato-repandis acaliuiculis glabns, pedunculis oppositions subgemims uniflom 2I. — < re*cil in Guinea
68. S F 1)1 IE Schum 1 c 145 f (nee \rrabida) — Sobhcrbacenm loerme: foil otntis repjndo-lol>alis obliquis stellate-tomenluMUiCulis, pedunculum geniinis, cil\cib subjucukalis 2I. — (rescil in Guinea'
- §. 4 *Waurella Dunal* l. c 12 — (aule herbareo aut subhrtbacco: *fa-lus utrtuque acuimnatis; racenus breubus ptdunculatu mfrafohacen piducllts pamculalu uul subumbellahs mttantibus, jlonbus pants, to rollis ulbis aut dilufe uolaceis; bacas pants globosts.*
- 09 S M)DIFIORIM Jcq. Collect. II 288 - Icon pi rar II t 320 - Dunal I < 12 — G Don I c no W — Caule Miffrutieso, ramis teretib klibrx, Toll U t-bns ovalis intpgcrnmis, florib fubumbelladii > — Kami ad nodos inrra»sah Foln semipedalia Segmenta calycina oblonga oblusa Corolla alba, ad ba*m lutea, sepmontis lanceolate aculis Dacca pana nigra. — > *thtdum* /urtai;n i enlur 1 90 — *S mgrum fi paiulum* Linn Spec plant. 907 — Iresrii in India, Brasilia, Mauritius, Guiana
- 7a S DKS\A1\11 Hamllt Prodr 0 Ind occid 20 | - G Don I c no 50. - *i aule snbbipedali herbacco, foil ovato-lanceolalis integemmia hubrepandi**. bacca ni-gra Kldbosi minima — *S nodiforum* Deivx mm — In Antillis (in insula >rrrn> 71 s 1)11 IF MI Scliull Oenir H id 1) I JIM - lloem U Sdmlt s>M Mpt || 580 Ilihh Hor ivrurs tt)l no Art) -Plant crit l\ no 1^> (. Don I r no 00 — (aule herbaceo ramis liritib subanRulatin Toll o\alo-owlib *csuu* fructiftris irrectib U — Inpedale vl ultra, folia *Ilrlladonnar*, butii *na,na*re atro-mtidie, ante maturiialcm oli%acear albo-punctatae *S procmut patulum tuhjan fi urtu* Dill llorl Kith J07 t US lig JM — *S ngrum I paiulum* \Kild ^\nc p|ml I IQii — (resell in llungana in MIM* Maine
- 72 s \ll(It)M>M(\im Dunal I r 12 rd i medil t VL G Don I c no 01 < JUU* torch herbaceo glabro, foil noliiari« geminu^e o\atit nubcord iti» int(*Kri« RlabriH mtidm, raremis »nbumbellati« O — Crrich *
- 73 S (>11>LF>sh lam Illusr no £00 — Dunal I c - G. Don I c no W. Itthb Hor eirurti JOI no 2640 — Caule berbatco, ram it angolatm, OH«UIM dent ids foil htt o> iin Iniegernmik umbellu infraaiillarib mulliflon* nuiaio-tibus — I-Inn s |>aru e\ albo nrc^cenle* \ >iola!»cenle», baccae maitnar ni^rio berbi i-4-p< <l IIIH *S dtimcente fi uclu matjno instar* (trasi Dill llorl Hlh 100 U 274 (IK UI Bross |uuu t || *S nujrum* < *duiucrnle* I inn spt» plant '200 *S Mrmphilicum* Marl nh« IMMII in duux i
74. S ATRIIMK IKH II M Gdli^ m«n <x >i <» ab hM*nb >>^ Act acad 4 ic» 1 eop (arol \1\ >uppl I WJ } — llrrbaccum ramofium, lotum puhorulrnto-puboct ns ciul« angulaio, anguli< nudu, foil Q\MU* tubcordaliit aruii* approvt-mato-drniati» racniu« puboirenli-birsullt, podicellu pedunculo rommuni ^alido brevionb aut eundrm arquantibu* O *fi minus* Foil prliolo adjrrto MX pol-licarib , prilunculn coromum br«*»iori floribq minonbus — In Andibut «d Mm-do?im, *ft* in Peruvta ad lacum Ttiraca — DiffVrl a S *ntgr» foln«» hli«»nl»us* MI r<;uhnl(r npindo-doniaiii^, drntibu* UttuiruU* oblUM*t, bati taiKnm n m v(m-ptr %ulnord itis, apirr hroi i>patio intcgris dcn>r puberutu, flonli d i) I m>j»-rill illtts | t t| ||< IIIH |M tl (« U**«| Mil H|S
- 7) S M U U M I urn S|IM |lmt *ii h mil I c 12 Mn I n j I t i Ai| — < urtis I I ir Idiidm II I H\ I I >r Duur t ki() IMuik l< u pi mi die II 17 t 15) Hull Herb t 07 S\<iisk b I t 01 vturm D<UIMI>I II lift 1 hcub Plant cm. crit \ <) I W no \XL Hclib I lor c\cur*. 3W no. 3045

- Koch, Sjnop. 0. Germ. (ed. 1.) 508. - G Don I. c. 411. no. 03. — ITajne, Terrain, bot t. 28. — Schkuhr, Handbch t 4G — Herbaccum angulis ramorum prominulis tuberculatis; foil. o>atis subdeltoideis sinunlo-dentalis cauleq. pubescenlib., pilis incuno-erertis; racemis simplicib.; pedicellis fructiferi* apicc incrassalis deflexis. O — Caulis ramosus ramulisq. angulato-dentatis. Pedunculi brocs. Flores pauci 5-0 aggregati albi. Dacca nigra, rarius lutca. — *S. officinarum* anms ntgncantbui et luteis Tournef. Instil, rei herb. 148. — *S. officinarum* lannich Fl. di \cnezia I. 268. — *S. tulgalum* Willd. — 5. *hortense* Blacks. Herb, t 107 — Moris. Ox. Hi*!. III. 5-20. sect. 13. L 1. fig I. — Lobcl. Icon. 262. — *S. pterocauhn* Hchb. Pl. crit X. ic. no. 1284. (non Dunal) esl forma ramorum angulis magis munculatis.
- £. *Perennans*- Scabrellum Toll, integns leviterve denlatis. Derlolom, Flor. Hal II. 634. - *S. moschatum* Prsl. Delic. Prag. J7. - Prsl. Fl. Sicul I p \ \ \ 1 \ . — *S. parn/lorum* Morelli, BaJar. Osscrvat. in Giornal. di fis el di Conf. o Bruqn. dec. 2. VII. 361. — *S. officinarum* Cup. Horl. Caih. 202.
- y. *melanocerasum* Dunal I. c. 12. — Ramis angulalo-ricnlalis; foil, otalis dentails angulatis glabris; racemis subumbellalis extrafoliaceis. O — *S. melanocerasum* >N *lld. Enum. pi. hurt. Bcrol. I. 237.
- ñ. *atnplicfoltum* Dunal I c. — Foil, sinualis angulalis. — *S. atnplicifoUum* De<>porlc* mss. — Cf. speciem praccdentem. — Crescit per lolam Eiropam, Aiiam et Afncam Ions cullis.
76. *S.* (not gen ' ULOGOMM Bcrnb. mss. in Linnaoa VIII. 252. - G. Don I. c 414 no. S2. - (orolla tmdscenli phjsaloide; caljre amplissimo auclo palento sub barca piTsistenlc cauleq. angulalo-alalo. — llabilal in Mexico (*). Species a Hi ins *S. nujio* L.
- 77 *S. FI^TLLONIM* Rich mss. in Dunal I. c. 12. — G. Don I. c. no 04 — >ccs ab Esenb. Transact of the Linn. Soc. XVII. 37. — llerbaceum ramotum oaulc flstuloso angulato, foil. o?aiis, acuminc obluso subrepandis, br*»i in peiolum angustc decurrentib.; pedicellis fructus pcdunculum communem aequ.iniib , pol-linc fl1a\o. Q — a. Baccis nigns. — *Solatium nujrum frurtu nigtn e hungony* llamilt mss in Wall. Cat. 2615. F. — *S. Hhmocerotis* Illume, IlijdnigtMi W'') ft Hiccis rubris — *S. rubrum* Gmel. Sjst. \eg 3K4. — Vtilld Sjnc plant I IUM — *S. eiythrarum* Dunal, Solan, monogr. 2J8. — *S. ntgrum fructu tubro* llamilt. in Wall, (at 2U15 II. — Crescit in India oriental!
- 7^ *S. IM.KItTIM* Dunal, Solan, monogr. l'>5., S)nops. 13 — G. Don I s no a> — VM>> ab Ksenb. I. c. 3ri. - Herbarium ramnsum dilTuMim raulr .in^ul.ilo, au-^ulis laoib dcniculalitr, Toll ddiuideis v. delloidrnbloiuus trunguljri-acu-muiatis, medio sniuato-diMii.iiiis, jHMlirellis fructifcns rolle\is prdunrulum comunem arquantihus Q - Flores albi. Baccae rolundalae pisiforme*.
- a toll, angustiorib argute sinuato-dentatis; fructu rubro luteo^e; caule sca-brello. *S. ntgrum* Hall. Cat. 2015. ti p. — *V. flarum* Kit.
- fi. Foil, late deltoideis parce angulalls >. suhastato-angulatis.
- *Fruclu rubro r. eroceo.* *S. nujrum* Forsk Fl \t<ir. Ar.ib 4> *S. mi-nunmtum* Bernh. in Willd. Fnum. pi bort Irrnl I tit* Hchb Fl. rirurf-TOI no. WA Plant crit. IX. 31. I 006 fig *Mil* llerlolnm. Flora Italian II (st'i , - *S. nllorum* Re, Fl Tor I 141 - *S. rubrum* I ma. llort Pan Ktt ml<- Mill *St,hinum nffinnatum annts pumrriM* Sabb. llort Roman 2. t. 01 "Srhin Iijunda Hbrede. Horl. Malab X I4> t 71.
- *liurtu mjFo* *S. ntgrum* *ar *mrlannctatum* Will I r
- Tresnt in India** nrrntali* arrnosis, \ ir - in >rpil.i
- 70 *S. Rt BKI* \i Mill DKI no 4 \il llort Km I JI0 Dun.il I r II Vr> ab K^mb. I. c. 10 d Don I r n» t<i llrrbari'iim rjmoMim dilTusum riule ingulato co>laq. fulinrum anguli* dcniculalm. foil o\alo-ublongi%, b%a apiroq.

* *S. HldXM f ROTIS* Mum/, Hij<li<vjrjn (AT* t*ubn. ens muU < i * < - \, f_in hnrro filulnso trhmjnnn, fnil tmiltM nbtusiM, bm% cun.alu ml* yri t unit fl Tib umbri-l tin rnnuis (j (rnrtrt %n uml>n>\$ts Jut i nrrt)

attenuatis repando-denlatis, pedicellis fructu* ditancalis, pedunculo commun
gracili broiorib , pollinc luleo O — ^glil Icon plant Ind or II t '44

o. *Baccis rubric crocci*^e, (lonb nunonbus

• *Caule folusq glabi tuscilis* - S *rubiumRxb* Fl Ind II 210 S «i-
giumf rubrum \^illd Spec pi. I 10J0 — S *Humphu Duml*, Sol mono^r
157 — *Ilaltcacabus Jndicus mmoi ntger* Rmph Hb Ainbom \1 I 20 fi^ 2
— S *asperum* Hornem. mss

** *Caule dcntafn folmq hit tutu flit cm*o-denta(ti* — S *Rumphi* Blvime,
Rijdn^cn 00) me Dun — S *chnmpodionht* I im. Illustr gen no 2340
Dunal I c 1)7 — I cuill Perm II t 14 It leene aquosc pallidac)

ft Itaccis ni^ris, florib maianhils — S *n'uarrum* llich in Duml I c 12

Rocm el Scliult Sjst \o^el l\ VH — In India orunlili, J i\ i <1 i >1 forma

80 S rUMUHGX^AHPLM Mejer, Pnmil llor I*s<quob 100 (, Don I (no 07
— (luidb perenmtib , foil. oblonno-o\alis, uinnq arumimtis mi<;<rrinn** n-
ccmi>> subumbell UIH witorfoliaceiH 2). — II ibilns S *mgn* ciuli^ r mnq obscur^1
anpulali pubcruli I olia gemma v solilana puberuh \ glibnuicula < jroll i
albi puhcrula, scgmentis ohlon^i** icuiis, but le p(ndulae, | i^o minoris lui< ic
nilidac — (resell in rulli!> rssequi bontnsibus s *mluum* Linn sW \e,,et
l\ 15 p 173 *)

81 S I UK \TIM Poir Kncjel im Ih Suppl III 7^10 Duml I i U - >rts -\b
Esncl) NON Art acad (>nes I cop (irol \1\ Suppl I W ! - d Don I r
no CS — Hcrbaeum bubdichotomum glabrum \ ^uhlilicr pubmilum caule an-
gulinlo, angulis denlalis, foil Renimis dclloideo-o\ali*(T basi cuncala sinualo-sor-
ralo-dentalis inlgermni&%c conrolonb racemis plensq bifidis puberulis, pe-
dirchis pedunrulo rommuni bre\ionbus O

a *aruidtntatum* \ns ab I senb I (JM Pul)« scens f<h ruin duihb ip-
proMinihs .Kuhs nulls nn^ulis \il<<> denlihs ririnnis fire oniuib Ilr« it*»
ft *ohfuscatednfutiim* V < i a^1) I sinli I r Pulxscms \ ^1 ibrum f tlmruui
d(iilib piucis el obtusionl) , ricemis alns furcalis, olus ^iinplirib | uillo
^rit ilioribus

/ *fubdmntatum* >ees ab Esenb I c Foil oxilo-obionps obloimisq irrepu-
hrl< r dent ids intr^ernmiMj rmle subdenlnlo dicbolomo rtumis biii'lis
pubescf nil-hirltHis

ft *tubmtegeritum* >ees ab F'^nh I r toll n\,itis grindiusrulin, Insi ru-
neiii», plcn<q inc normis, caule pirco dentalo, racemo furcaio C re^< U
in (bill et in Permtn

82 S IMIHO(\IM» Duml I e 11 Klb Swi >ps p| nequin II 102 (. Don
I c no 00 (nile herbiceo rimisq iiiiKiihlis d<tililis ^riliriN, foil MIIOMIHH
sinualo-infill iti*» II rib ^ulnunbi II ihs It mi pulx inli annnlis ••wbuli ilis
ciliirum b IM \<rni(ulos i I li^ h l ri (ilw put < nilus (mlh ill i |tm m
pallide Mohrn Ilirrie rotundie m^i u pisirirmis \nih<ru Ind w s m-
grum c *Ingmtruni* linn **p<< | I itit JI*» — S *Anhui* Mill DKI no U me
alior) S *alutum* Mncli Milbod pi int 171 D ll<n llori 1 lili uu (*7 t li i
fin 2>» — (reseit in \m< nei nundiotiali >o>i And IIIIM • il in >n\ i llollindii

83 S J I D A K m Sdiull OiMr H (oil 2 I JOJ — Koem ol Srhull Syst v. 1
IV Wl — (j |)on I c 4IJ m» 70 i wlc berbaccu subinernn, nmis **angulato**
muneaiii neulcolm inrurMs, foil o\iip> sinu ilo-nngulalis, ronml>i« ilisin Ins
nutinlibiis () (.IUIH toH'i iusculus | oln ghbnusculi < orolh III • • \uili<ri<>
lull ie (onuocntes disiinet ii P< dicelli di'lh\i II iera« i iipne VuMi i i, M, ,i, i, i,

84 S S I I I 1(1 IK O s MI Kilioiish niss inV^illd Knun phut h>rl H<r< I I/U
Duml I < M — d 1) n I i [i > 71 (itili im run v^umulu < s (f,|| (\ ms
di nt it »- instil ills siil J i| ris i Mi i s II ill MI! | mi. DI His UIDIM Ihs i \trif tlii-
ceis >> duiM ililis |l MI it 11 ill ^ \ c 11 • i ii iuuul in - il ill ptlhlis n< mpr
decurrc niibus , m^ulis ihuiii s I « hi nn:ni | mi i supri JUIIKUI pilis **mollibus**
>oslna I l> res ilbi II iceie m^rie < nsul in It whina

- * S yi \DIUMiLARL Thnbrg Pudr II Tip 30 Dunal I c - G Don 1 c
 M0 72 — fault SUUTUIICO^O tetruino Toll o\atis integns anguhtisq flonb
 pinieuhli«» i < mlis sober, inf,ulis umliluis Fohn glabra Hortis cotru-
 Itx tntes — ? I'll hnceohlis inkgris — < rtscit in I'romnntono home spu
- 80 S TRUNGU \RI I im Illustr gen no 2-142 — Duml I c - (. Don 1 c
 no II — (luk hrrbaceo ingono Toll oWongo-(valis inlegernmis nudis flonb
 p IIIK ihtis O — fiulis> tngonus non ahius Folia acuti, mollia (oroldd pana
 I illicit tiolacci st gnKntis rellexi* Dacca pisiforrois virescens — S *quadran-
 julaie* vnr *triangulate* Pers Fnchir 1 225 — Crescit in India oncentili
- K/ s BIUCTFATI M Tbnbrg Act Gorensk 1812 ex Fl (ipens II 57 — G Don
 I c no 74 — Caule inermi fruiicoso telragono foil o\ahs semiis riccmis fo-
 |10s|s j — Ciulis slnrlus gfaber angulis undulati* Folia glabn Briclne fo-
 Inreie convolulac sprrualie (iljcis spgmenta acula Baccae nigru < rescit
 in Promonlono bonae spei
- SS s III Mill* Bernhardi in \N ill<1 Fnurn pi hort Berol 1 230 — Duml I c -
 d Don I c no 75 — Koch, Suiops (1 Germ (1 ed) 508 — R<hb Flor excurs
 j<| no 2&P2 — Plant critic X ic IJ25 — llerbaceum rimosum angulis ri-
 morum subobsohlis subtuberculatis foil ovalis subrhombcii ropmdo-dpni ids
 ciuleq subglabris, racemis ^implicih , pedicellis rrucllTeris apice incrassaim de-
 flrxis O — S *pteroaulon* referi habilu, sed folia magis minus>p profunde
 sinuitif rami demum proslralo- diffusis, biccic ceracco-(la\ie, seniim inn^lu-
 t ontu S *t mlescens* llorl — S *luteo-urescem* drml \ Mor Bidons \ 177
 S *nurum* J Mort pi Koch, DPUUCIII Mor II 2J(1 — In rmltrilis it id vias
 ptr toiam I uropam mediam
- 80 s HAMM Kilaib rass in Schult Ocstr Flor (2. cd I no 871 — (• Don
 I c no 76 — Rchb Ilor excurs 301 no 2053 — Plant critic \ ir no H20
 (lule herbaceo, ramis nngulato-denlatis slngoso-pubesrenhb foil ON K >-rlioin-
 bti» sininto-angulatis piloselli** umbellis nmlantih Inccis lul«o-(iirnn —
 II il>itu> S fi//o<i, sed obscure virens caule olnaceo, foln brp\ion M <l non
 t r n s t o r f r i pidicilli exlrorsum magis incrassiti (orolh bisi ochroleun stmina
 t r n s l u c c n l n — S *ochraleucum* Hist in Ds\X Journ bot III 20 Duml I r
 14 — (rescit in llungana el in (• illia australion
- 00 s VIIIOSIM lam Did l> 280, Illustr gen 233H — Duml I c (, Don
 I c n) 77 — Sabb llorl Romn II 12 t 01 — Dillen llorl Fllhim M t 274
 lu l>J Koch S>nops (1 nrni I id W7 — Rchb Fl txenrs 301 no 2>52
 (mil herb irpo angulis r morum subobsolchš subtubt rrul itis Toll o\ili*
 smualo-dtnt »UN cauNq subl imenlolo-Mllosis nccmn simplinb prdicelli*
 fructif<ris apice incrassati« d(flexi« O — Barrae luteae Hore< albi % siib\io-
 lascente* Ilerba canencens mosrbum olei — S *Iu4eum* Gmel b\ Bid I '»\
 V *nigrum* r *ttUomm* Linn Sppc plant 200 — A *Aegypharum* l-orok Desrr pi
 \r« 10 — Crescil in Furopac mediae vns, ruderalu et in \ik\plo
- 01 s IIIKs\TIM Dunal I c 14 — G Don I < no 7* (niU runisq trretib
 f II in((i« rmmiH hirsulis flonb subumbi llatis I mlullae nuiinlm Baccao
 i lilts DifTtrt a S *itlloso* bacon mgris foliisq inteRt rrimn S *ntgrum* *
 h ituturn \ ibl S\mbol bot II 40 - S *irgypluicun* ,i tor^k H Aigtpl 40
 S *mimphiliium* dnit I s*1 NS — Crescit in 4<E%pto
- 02 s KITMBMM s, hulUs O<str Mor td 2 I Wi (. D n I c no 70
 < iulr hirbac«o folusq toment<so-pub» sronlib r r>mbis pnuill ris Dif-
 frrl a specie prii*r« di n< folns f<rt poll cinbus IHM smuil «• I hnif fu<<rs-
 renlen 4.^ umb«*llatai* N *trnanum* Kit n>ss (rrrnit in Hun*ini
- 03 s RhSSRRI ^nnm HIM m Roem ft Schull S)H \rgrl l\ M3 — G Don
 I r no 80 — < «ulr hfrbareo nubangulalo, foil o\att% arumimli^ inlrsrmmiH
 I il i ^rpntib raremu nubumbllati« rtrafoliarri% ppnduliH V In "i-d-pol-
 IK »rn (orolla alba v roeruleirent «rnmn»< rrfleis Baccai* nnenitudini it
 r>l re ilhrum S n%gr% — frp<eil in Amrnra

Sectlo III. BOLOPHYLLA G. Don 1 o. 414.

Folia inlegemma solilaria. Calyx quinquepartitus Stamina aequilia

& I. Racemata terminalibus.

- 94 S EVO^NYMOIDES Sendln in Flora XXIV Beibl II 87 t - <™lc tercli, foil pelioldlis majusculis hnceohlis, ulnnq acuminatis, cymis terminalib pedicellis elonpatis divancilis in ciljcem incrassalis* cilxcis lacinus ovatis brcxib corolli quinquepartiti, lacinus acutis, antbcns trunialis subaequalib , bacca glabra 5* — llhcos in Biisilia
- 95 S I4LIIM K/e Pugill pi inedit I 7 — (iile frulicoso nmoso, ramis. fle-XUOSIJ, supra sulcalis, foil spirsis peliohtis lancioljtis acumimlis ghbns, supra niidid subtu< \enosis, margmc siibiinduidlis onus lermimlib multiflons 10-12—flons florib sccondis, cañns lacimo oblusi*, baccis obscuris \iolacus j (resell *
- 96 h PLKSICALIOI II }l Mart Beibl ?ur Flora \ \ \ 78 — Suffruticosum sub-seaiulcns glibrum i IUC angulalo, foil .ingusle lanceohlis acunnnatis aul I in-ceohhs, ba^i acutis, inlcgermis aut levissime repando-dentitis, cymis terminilib , lacinus calycis ovalis, corollis coerulcis semiquinquefidis piieniib in-thens aequilibus £w — In Brasiliac prov St Pauli ad urbem Sebastianopolm
- 97 S SIIIIIE Rz el Pav Flor Peru\ II 35 I 167 fig a - Duiul, Suiops 14 — G Don I c no 81 — Caulc frultoso glabro, foil oblongo-spalbuhtis ncu-nnnatis scssilib glabcrnmis, racemata icrmnalib recurxis S - dlabrum tolii pedalia. Corolla alba Anlhrae obscure purpureae Bacca alba ccraufornm Pedunculi terminates spnbamaci — frescil in Peruvia
- 98 S AM m noi IIM Dun.il I c f> fed 2 inedit t 90 II R kth No\ gtu ct spec pi III 27 — kill S\nops pi lequin II }>) (• 1) >fi 1 o n > } Arb rium foil SOIINIIN oblon^is •Kuminalis, basi acutis inliprnmis , supra stibullais, subius m axillis xunrum pilosis corxmbis lerniin ilib rim M^ 5 — Rami tereles lolia quinquepolliciana. (orolh alba ^ sc<cm<nalis ovilo-oblon^is obiusis — In npa fluxn M<gd ilenae in reguo \o\o-dr nnnh IIM
- 99 S P viIIIM Pers tiilur I Hi - Dunal I e i> Don I c no 4| (iule fruluoso ramis puherulenlib, foil oblongo-lanreolalis, ulnnq , pr i< upue subi }> puheiuUnlis, raumiM hxis terminalib llonb penunali^ •> — S lanrmhitum liz el Pax. I c jj t 104 fig a nee (av) — Folia subpeliolala, fere ^> pollicis longj C ilyx pulveruleniub Corolla magna glabra xiolacea, e\tu» puherulmu BiCd ni^ra cerasiformis — (re>cil in Peruxiac nemonbud
- 100 S rilMRUEMLM Pern I e - Dunal I < (, Don I r no K> < ml, frulicoso rums puherulenlis, foil linreolalo-lineanb , subius ntnosis undul-lahs pulxlluh niis ni inns pul^erul< nils pedirellis gemin His -> (mlis r nuo-•isMinus (oroll i illieseentli-Mol u < i exius puhiruli nli DIM I ni^ri siili > \ i i pisi miKtiludiiie S anyustifolutm 11/ el PJX I t H I 10i ti^ b <i<s a in Peruvia in nemonbus Huanueo el \i im igo
- 101 S I (>N,H IOIU M \abl, Lcl<<^ I 20 - (• Don I i no hi) - Mole fruii-coso, foil oblongis, ulrinq , preeipue subtus lomenkllis, ricemis bilidis <m>—sis, corollis ^-p.irlhiis %) — Rami tere(e«, apirem xersus cum pedunrulis, ptdi-rellis, fohis cihdibusque pilis nnnulis rigidis tomenlelli Folia inaequaha I > poll, longa relic xi, undulalo-repinda, supra xindia. Corollae c eruloMuili-xiolaeene begminlin angustis obiusis, exlus tomenlosx ('al)cin denies subuhii R inn juniores Kubinde aculcos modes habent 1 ink, hnum pi burl Ik< I I |N4 — S lorujfoltum Dunal, Solan mono^r 103 t 0 exel s\n I im Dtiml Sxnops f> S submenu? Jcq * — (resell in duiana
- \frl s MTIDIM R/ it Pi\ I lor IN ru\ II \ \ t lui (^ -| \m\l | r 1, (1 Don I c no *7 — € mlt fiulnoso rums gl ibns mtidis full u\ |o-\ HIM o-lilil aetis raemis subMmosis IOIHH ntoso-puhi ruleniis) | nli I inii^ri * repanda Corolla alhido-Muhrei exlus pul< ruk< nta Rirei nigri pim formi* (rescit in Penmac nemonbus

- 103 S. \>(iL'SIIFOML>l Lam. Illustr. gen. 2M3. — Dunal 1. c. (ed. 2. medit. t. 32) — G. Don 1. c. no 8* — Caul¹ fiulicoso; ramis subherbaceis; foil, angusle lancuolalis glabermnis nhlusiusruli*; llonb. comnbosi*. o — Rami glbnn, folia petiolata illis Lnun sIDIM Pedunruli longi rdmoM Corolla alba**, se^mcnhs ovalis ohlulis, <mllierne nn-rnje lute.ic — In Bonana
- 101 S. STEM)PI1\LLI\I Dmidl 1. c. H cil. 2. inrdit. t. 97 ^ — K li S>nops plant, aequin. II. 104 — d Don I. c. no. 89. — Caulc subherbdceo ' puhcrulentotomcnloso, f II angutti* oblongo - lincanb. subscsihb , suprd Rlabermnis, sublus puhrrulento-tomcniosis; raeemi* coarctalis. 2|. — *S. pulcrulentum* Per*. 1 c secund. Spr. — Cicscil in Andibus Pt-ruMdnorum prope Olleroi i'l \.mlo.
105. S U>\E\SE Dunal I c. 10. fed. 2 inodit t. 9-8; — Kill. 1. c. — G Don I c. no. 90. — Caulc tomcnloso scandenlr; foil suhcordalis otalo-ldmeoldlis, suprd hirsutis, subtu« lanuginnsi»; raremis tetminalib dnarirali*. ^^ / — Cdiilis angulatus M\ alatus, ha si puberulus. lomenlum stellalum dlbido- lulescens Folia breMter petioldia, hd>i inatqualia. I'lores subpamculdi. ^(^menla cdl)cin.i trunrata mucroiiuu Corolla parva dlbd ⁹, se^menlis oblon^is aculis. - Cicscil dd I oxam <t np.im Calama>i in iv^nu (Juilensium.
- IOi s (UIsPl M Hz. cl Pd\ I c. II 31. I T'S «[:. a. - Dunal I c. - Bot. Regist. t. 1510. f — (i Don I. c. no. 00 - Lodri. Bot. Cabin t. 19⁹. — Caulc fruticoso; foil ovalis cordahst] un'lulato-cn^pis aci)mwnh>; raccmis uorjmboms ,> — Pldnta ,im<iri, ab mcolis >a/v appellate. (.mli* (;laber. Cah\ 5-dent.itiit Corolla pal— lid(> roenilea \i\ puberul i. D.uca l'itea slobos.n pisiformis Crescit in rudc- i ids (liilei)Nilti'N
- IU7 s \l nr.l >l I) in il I. c. - Klh I. r <i Don I. c. no 92 - Cdiile fruticoso \>lul>ih, foil, petiolalo o\alis, supra mli'iis, subtus pilosiusculis, raronns dichotomy inmentobii fusco-aureis. ^>w — Caulis tomenlo puhcrulento fuho-aureo cum racerais, pedicelli.«> cal)cil>q. \estitu>. Racemi pamculato-cor>mbosi (on>||d \iolnccd, sp^mento lanceolalo, margmc rc\oluti!». — Crosnt locis fn^hidit .id radicem nionl>> (Imnbora/n.
- 10^ s MV(MVMIKHIM Moo., el >es> Fl Mexic ir. medil ex Dunal I r ed. 2. inrdil t 100 - II. I) klh .Not pen. cl spec. pi. III. 2S. 7 t. IUJ — (i Dmi I. r no. 01. - Bol Rb>?. NTH Ser. M\ .t 7! 7 — Frulirosum srandens foil s'hi.iriis lon^e petiohiis o\,ti> dcummdtis, basi arulis inle^errinus hirdllo-puheoi enlib., |)UIM''IIS terminalib. ramos s; florib. MibrorMnbosis ,)w It.mn sul).injuh pulirNiiwiles. Fol .1 .J-.J poll loiu'i Pdinnilae c.ilwe-q siniiato - quaquelobi |)IIPN(enies. Corolh \IOIIM I mi^niludine illius V lulu I on, glabr.i, segmentis o\ahs arulio li 11 r,i ^lolios.i ruhr.i, pollirem didinetro Inbet - .V dulramatotdes Poir. r.nr\() mrih snppl. 111. 7)0 In re^no Mexirano prope (uern.i)ara.
- Im S P1KIFOMMI lam Illustr K<MI 2H'>. Dunal I c. ed. 2 inrdil 1. || - D Don I. c. no. OJ - Caule subherbareo; full. lon<e peliolatis oyMw inlegits, nlrini|, glnbrin; raccmn painculatis; c.ilu is ^cfffmentis obtusis murrnii itis 2 Corolla alba, se^meiKis o\,i|ibus obtu>is. Cnhx glabcr, se^menti<) obtuse n iix"li M.irlmira rresi it
- 110 N HOMIK>si: J<q PI Amene. 40 - EtloR t 24. - Willd. Spec pi | 102) Dln.ll I r ed 2 inrdil t 101 — (, Don I c. 4H no. W Kill I r U> — I ruin osiirn: foil sohiirns l.mreol.ilo-oblonpis, utrinq. anu'n^lalis ci aruti* siiburi'ltil ill's plibri'*, (onmbis extrd.ixill.irib trilidin ^ dlabnun I nli.i iripol-lirin.i P< dunt uli oppotitifoln lernnntileMjur ' • pollirnrns, r.n • inMsu-iiiuln ll.iti Corolla alba, exliis \ir<%ns, sejinentiH o\ iin-o|i| »m'«> .leulis, nnrjincui \ersns pulieruli^ Cihx (|iiiiii((iedentdlus MIH ih.itiis « rrs< it prope Norm, Re^Lim el Omitlan Mrxir.inorum
- HI *t. PI HK.EHI \l Dunul, Solan, nmnofr. l<0 1. 6. — Kynop*. p. 10. - CI Don I r no 00 — Caule ererlo frulico<o; foil ntnto-lnnreolati*, utrin<| allrnti.ih* pubesrentib , r.iremu 2- l-rhninmi< ' > CIUIIH minute tuberruLituH Himi ||-rides puberuli subinffulati Folia undul.ito-rep mdj iLireini r r)mbos<i pulir<<- centes I <irolli pir^i alba nut.in<, setfrnenti* o<aii< re(lexi< C.il)x 5-drn(alu<

- Bacca nigra pisiformis** — *S mxrocarpum* Lag blench hort Madrid 1803 —
S Cenantesn Lag Gen et spec pi nov 10 — (resell in regno Mexicano
112 S 11UMINUE Torsk Fl Aeg Arab 45 - \ahl, S\mbol bol II 40 - Dunal
I c 17 — r Don I c no 97 — (aulc frulicoso dicumbenli foil ovato-lan-
ctolalis subintegernmis pilosi* umbellis lerminalibus 6 — Caulis verrucosus,
apicem versus pube^ctns Folia sublus Mllosa, ulrinq allenuala, marginc undu-
laio-deniiculala cilula Caljx quinquedenlalus, segmeniis lanceolali* obtusis
Corolla alba Anlhuc lulcac B\cca udem ac *S Dulcamarae* — Cre>cil in
Arabia fe Ili
- 113 S \SPI RIM >alil, riloR II 17 - Duml Sol in monojr 104 t 7 , S>nops
17 — G Don I c no 98 — (IUU fruluoso foil o\ ilo-dliphus aspens c>ma
longe pidunculata -) — Rimi pill* Mdljli- scibn I-oli l 0-po|licma, apirim
versus ramorum aggrtgala, ulrinq atlnuala, pilis nnuhs sldhlis aspt ra Pc-
dunculi didiotonn cum pedicelli*, cilycib cl torolli* pills» stdlais fla\ (s<tnli-
albis vejitiu Corollae segmenla oblonga acuta Batci subglobosa (rescu in
America mendioali Lajenn, Guadeloupe
- 114 S RADIMVahl, 1 clog II 10 - Dunal, Sjnop* 17 (cd 2 mrdil t h -
II B kih 1 c 29 — kill I r 1W — (• Don I c no 99 — 1 rutieosum foil
bohlaru* (l) oblongo-lanceolalis, ulrinq acuminalis inlegernmiv, vupn snbris
subtus caiRscnti-pubescenhb , corjmbis lermmahb (subihnb¹ dicboiomit
pilosib S — Rami cum folns etc pilis scllatis \slili Folia 2-4-pollicam srabra,
supra \india (jmae pubescenlia rigida vol tie bis-ter ditbotomai (orolh
parva alba, segmentis o>aii-> — *S tahifoUum* lam IlluMr gen no 2JOS — *S*
aspirum Rub Act s<c nil hist Virs 19 - (re^nl in npi fluvn Migdalomo
prope Hadillat
- 115 S irPIDOIMI Duml I < 17 id 2 inodit t 102 - II W Klb I < V)
Kill I c l(v^f) d Pi n I c no 100 — < lull II hurt ott nil fill o\ u »-luiuo-
lalis falntis, supra glahnurulis, suhtus (omentoso-lt pidolis (squamulosis uir IK[
nitidis nrcmis subdichotoinis *j — Rimi, ptdunculi, ptdiedli (il\us rorollauj
cum foliorum pigina infirion pilit minulis sldlatit sqiamulji formibiis rubigi-
nosis >pstih — (re Mil in rrgno 'Novo-dnnatonsi
- 116 S LALRIIOIIM I inn fil Suppl 14S Dunal Sohn monngr 10^{fi} (H sxnups
17 — G Don I c no 101 — (mlc irborco foil o\ ilo-oblon^i*!, supra gl ibns
subtua lomenlobis pimcula dubotoma podirollis tjmosis > - Rnmi lomenlosi
Folia br(\ilcjr pctiohia inlegerrima, subtus fuUn Pnmrul IC lomi'nlooc Ktg-
nunla cihuna mucronulala Segmrnla coroilina o\ati - In America austnli
- 117 S RIPVRim INrs 1 nclnr I 221 Duml I c - (. Don I c no 102
Caulc fruticoso fill oblon^is icummitis menus torn* ntoso-pulw ruk< utis n-
r\mbis termiulib didiotomis i |*| ml i mxli | pu|\< ruh nlo- i mn nd si < >
roll i pirn \iolan i Ilacra lulei — S <hcho(omum H/ d |>n 11 »r ISru\ II
34 t lob dg b (resell in PmmH pro\ lluanuco id npas (lutnmuin
- 118 S \LRR\S(iroillM I inn <%pr pi 1*4 Dun il I c Uilld Sprr \l mi
1 10-25 - Jiq Hi rt \mdob I 1) Klb I c — IWSabhsinb Innsin of
Iho Linn Soc \M1 40 | (, Don I r no 10) Arhoreum foil soliiirRH
o\alis uculis, basi anRiistalis inlegernmi*, supri pilosiusculi*, Kiiblus albedo-
tomentosis, axillis nudis, corynibis icrminahb duhoiomiH ^ — I ndique lomi uto
alho piilvtrulento vebliluin Folia lata, tmpra lutisirnti-vin nin suhtus illndo-
lultMiiitji < orolla pirna alba, bacen (rr<*i ramoris in igtiiudiut S jut! >
fnu IUI) I lor IUIM II 244 Rlumr, Ilijdrigon CW S (nan(hum I) | n
Prodr II ><pil 'h S lirnht Xs illd Kiliq a llonn d s# hull s^si \jfi|
IN Gul harm Ann ru 211 I 21 > Ii; 2 IMnki n \lung U\ I 111) h^ 1
- % *adullennum* Ilimill llorb loll parum hlinrib imgis < \ tiis nnuu^j to-
menloMs (rescii in Asii \mtrici rl >MI II llandn nquinociaali An
re *«ra sprues I tnnifjni"

- 119 S URICILATUM Ail Hort ke* I 246 - Dunal I. c. — ISee* ab Escnb. 1. c t — G Don I. c. no. 104 — Gaule fruticoso, foil, ovalo-oblongis. acuminatis lanatis integerrimis (omentusis, utnq concolonb , axillis folns pam* semicirculanb obliquis obsitis, corymbis subtermmahb dichotomic pedunculate, calycib. semiqmquefidu) 6 — Folia G-7-pollicana. Tola planta tomento lulcscenti vesliia cœt Corolla extus villosa, intus \iolacea. Bacca globo*a fltUCscen*. — Proxi-
raum esl S. *leibatnfoho* — S *Maurltanum* Scop. Del 3 t. 8 (absque stipule). — I am illuslr gen no 2307 — In msulis Madagascar, Mauritius el Bourbon
- 120 > IMBELLIFERIM Eschscholtz, Plant. Calif, in Mém. acad. Ptrtrbrg 1*26 p 2tJ ex Prs>l. Repert. bol syst I. 19b. — G Don I. c. no. 105. — Inerme foil, inlepemnm ovalib. aculis pubescentib , caule suffruticoso crecto, umbellis terminahb , caljcib quinquepartili*, staminib. acqualibus. 5 — Caulis orjN.ilis fistulosus angulatus, ramis tomenoso-pubescentib , folia petiolala usque st'squippollic.ina, umbellae 2-4-llorae, pedicelli clongati pubrstento, caljcis ljcimiao neulae Corolla Molacca, cal>ce tnplo major. Bacca ra.rgna purpurea. — (resell in frutireiis >o>ac Califomiae.
- 121 S DOMIMM Wlprs mss — Fruticosum foil, lanceolahs ninualo-dentatii plabris, umbelhs erectis. 5 — Cortex brunneus. Folia JV>—pollicana, I¹/ pollata acuminata pallide vindia Umbellae parvae laterales (??). Flores magm albi, scgmenlis corollae acuminate. — Dill. Hort. Ellh. t. 303. — S. *Bahamente* Mill. D ct no 24 ex G. Don I c. 410. no. 100. nee Linn. — In insuhs islhmi Hahamensis
- V I. *Raicnu**, *cynus t. conjmbts lateralibus non axillanbus ncc oppositifolus*,
122. S AsSIMILE Fn\ Flora XIX 430. — Caulc anftulalo, foil, allcrms jxMiolatis o\alo-cordati!» inlegerrimis; florib. cymoso-pamculalis violaccis; pamculis lato-ralib , baccis subovalis rubric. — cf. p. 44. no. 45. — Crescit in Kumcli.i
- 123 S MEG VMM |UTO> Marl. Beibl zur Flora XXI 03. t — C.iule ramixq (r< bris den^c el subochraceo-stellalo-tomi ntosis, foil. o>ati> •Kiinnn.itis, biM subcord iti mj<M|Udlib , subtus praeserlim in neno veni*»q promini'itib sldl iio-iomcn-tosis, siijira \elutmo-\illoMS, pedunenhs simplicib palentib. ex alls supenoruin folmrnm ojnoso-congesliN, laljcc magno membranaceo >emiquini(|uclido, sub ban.i plolxxa e\cn*scenU^a, corolla caljcis longitudine, oxtus \illosa corrulrn, la-IIIHS tmngulanb acutis — S *cladolnchum* \ellojo* — S *ptnanthnmija* \p|lo/o, II Mumin II I 1H' — Ilibitat in *<>lis ad Scb.isiianopn|iti in Hr.isilii
- 121 s s\((i \RPI M Mart el SiMidlncr, Mora \\1\ Roibl II s> - IIUTHU< ula-brum Lih-rilloruni inacrophiJluin c.iule |* rrli rarunso, foil pctfnl ids obtongM •iruiis, bioi anuustalis crassis, c)mis in pedunculis mcrass.iiiH «subumbellatus». «ihb.iHiriH obo^ato-oblongK, calycti lobi» brevib neutpisculis, mroll.i magna subinfundibuliformi, lacinus acutm; bacca obovata 5 — Ail Ilheos m Hrasilia
- 121 S i KLASTROIDES Sendln mss. I c. HQ. — Inerme ghbruin hirrifl >rum in-icgrifolium foil minonb , caule tercti, foil breuter peiolatx hiuo.hhs, utnq uldr ar'immalis, c>mi» scssilib. brcMb , alabaslm ovahs. cahcr Mituilo, n<-rib ptnio) Id Ilheos in Brasilia.
- I jti s \ Vd(M llr>nc mss in ^ all < a I no 2021 — >eo< ab Escnb Iran<a<t of tm* I tiin si" \>H 4^ - d Dun I c 41b no 107 Frulico«um inrrtnr full o\ iio-ol>lnn^is r< pindo-Miuali*, juimrib subtus ramulisq no|rlis pnhrulinio-tuiurnlosis (Miiis lalrralib bilidis rahjis IJOIIIIS |ou^i* at tiiiii itis, Intus pir-|i* globoiis > S *enrymbnsurn* W K^{II} ||<TI> sprrirs brnc di^lnnd .j] > afit-nibiife S *Inmjifolio* linn r(S *Itmnhnti* Ji q folns s(MiM>r rrpindo- an^'uljlis, •i prioro clam (lure niinorc albo, ab altrro caljcis launiif l«»iuis jt unii itis — (rrs u m India onrnali
- 127 s II TI'O-AIBI M Prm Enrbr I 221 - Dunal I r h - (i Don I < no ||<) I uilf fruliroso, foil o\nhs arulM, utnq pubmrnlib rjocmis (\mosis hit MMMIS (orolla p.Olide ht<M liarc.1 globosa nilid.i auranliici «epasi-formus II ibiuis S *pubftcentis*, <diffWt I a men (lorib o, nosis, cwnis rrmoois

- minus umbellalis non oppositifolns Segmenta caljcina dellexa acuta S *pubetens* Rz el Pav Flor Peruv II 30 I 160 fig b (non Tfllld) — (rescit in Peruviae nemonbus ad Cuchero
- 128 S CHLORANTHON Spr Syst vegeI I 082 - G Don I c no 109 - Foil oblongis, basi aienualis, supra nitidis glabemmis, sublus pubc stellata lomcn-tosis, pedunculis subumbellalis, corolla rainula vindi. ^ — In Brasilia
- 129 S LAXUW Spr 1 c — G Don 1 c no 110 — Foil ovatis aculis glabns ve-noms ramis cirrhiferis scandentib , pedunculis racemosis laxis \$w — Crescit in Montevideo
- 130 S DICHOTOMIM lour Flor Gochmch I 100 - Dunal, S>nops 18 - G Don 1 c no 111 — (aule suffrulososo pilos>o, foil conhlo-hnceolatis lomeniosis integernmis, pedunculis dicholomis o — Caulis diffusus ramobus |hc<J rubra pana globosa — Crescii in Coiluncbina
- 131 S ULtORME R7 \$1 Pav Flor Peruv II 31 t 159 - Dunal I c - d Don 1 c no 112 — Gaulc fruticoso, foil ovalis cordalisq oblusis pubescenlib , pe-dunculis filiformib bifidis 6 — Habitus *Salviarum* nonnullarum (aulis granu-losus riores pcduli Corolla pallide eerulca caljcem Inplo superans —(rescit in Peruviae collibus (Lomas de Atiquiba)
- 132 S MRIDE R Ilr Prodr dor ISO\ Holland. 445 - Dunal I c - (. Don I c no 11J — Suñrulosotn foil o>ato-oblongis aculis integns plant* membrana-ceis glabn<>, racemis lalerahb corymiosis simpheib v biparlilis, flonb (corolhO 5-fidis, calycib semiquaquefidis. — torie idem ac .S *itnde* Forsk Plant escul 42? — In No\ a Hollandia
- 133 S SLIUCLIM Rz et Pa\ I lor Peru\ II J3 t 101 fig b DumI I r 10 - G Don I r 114 — (IUIC fruticoso nnus gncilib , foil pjm* o\ ito-l m<< ol ms scnc(is mU_nirnmis, pedunrulis billons seu pauciUons c>mosis ^ Rum <<(ritei 1 olia pilosi Corolla cocrulesconli-^iolaci i, rxtus stricta Racca rubn Affine Mdi lur (tx R/ et Pa>) S *elaegnifolw* fortcq ba<>i spmosum (st — In PeruMae nomonbus ad Iluassen-Huassi crescit
- 134 S II>kI\MM Roem el Schult Syst vegeI IV 001 - d Don I c no 11') — (aule fruticoso rnmossissimo, ramis xrgatis crassis strigosis, foil o\ii o-hn-ceolalis, utrinq stngosis t>ubrepandis, pedunculis billons *) — Foln soM[uiPd]-licem laia Pcduncuh extraaxillares laterales pollicares delicti C.il)x quinqu-paititus pilosus, sogmenhs lanccolalis Bacca glabra pisiformis S *Hffusum* Lnk Herb — Crescii in Brasilia.
- §) *Rnccmis oppositifoliis, suboppositifolhs v. termwnhbru tomentotis pubiHLtitibus i l(proso-lepidohs argenteis, puherulento-puhcscenlibus*
- |V> S M1WS ||j it Pix Hor Pem\ II M t KQ (i^ a Dun il I c 1k) G Don I c no lid — (aule fruticoso, fill oblongo-o\alis acumiuids, sub in H lanugmosis, racemis cjaosis multiflons recunis brnisMtim) — turrugiiMMim R<imi grinulosi 1 oha inlegernmn, supra granulosa ghbnuscula Corolla pana ilba (aljxhnilus Bacca lulea globosa — In Percu>iae rudcratis
- 130 S >E>OslM Dunal I c (ed 2 inedil I 105) - II B Kth. Nov gen el uprc pi III 32 Ktb Sjnops plant aeqmn II 107 — G. Don I c no 117 Ar-borcicens ramis (loccoso-pilosis, foil solilams toroentoso-oblongis acuminatiR, basi acuiiH integerrinus, supra pilosiusculu, tublus pMoso-lnrli'*, corymbs op-positifolns | — Folia ^-5'A-pollicano, Hublus in nervo medio pelio|is<| flonosohnati < ihcis pnm segmenta roiundata Bacca nubglobosa - (nsiit m Vu-dibus Qiinduonsibiis in rtgno Novo-drimtensi
- 137 ^ s\ |HI/U\I M Rotm <l ^ (hull S|st |&c[1\ flo> (, |<MI I c no 1H Iriilicosum foil pdiohls OMIO-hnc(<l His int< gi rrimis- rnrnms ghbn>_f bublus pilis Ntrllatis paleolisq orbiciihnb fuho-mreis obsiis- ratimis solilarns lerroinalibus ^ — S *aurrum* Surti mss - Rami tercles ferruginco-lrpidoti Racemi quinqueflon, pedicellis deflcxn ferrugmeo-lepidotii Calyx pentagon<

- extus lepidotus. Corolla extus leprosa, intus obscure purpurea, segmentis acuminatis. Antherac purpureac. — Crescit in Brasilia.
138. S. OAPIALIOIDES Pors. Enchir boi 1. 223. - Dunal 1. c. - G Don I. c. no. 119. — Caule fruhcoso; foil. Kimcolalis repandis phibns nilidis; umbellis opposiloliim tomonlosis, baccis nutanlibus. 5 — llabilu toto *Gnaphalu** non disHmilc. Corolla \iolncea. Bacca obscure rubra. — *S. calygnapnalium* Rz. et Pa\ \ lor Peru*. II 31. — Cresnt in Perwia.
- 139 S. \ELLOZIAMM Dunal, Solan, monogr. 230., Sjnops. I. c. fed. 2. incdil. t. 37.) — <i Don I. c. 417. no. 120 - Ramis Ioproso-tomcnlosis; foil, maximis oblongo-lanccolalis, subtu* leproso-lomcntosis, supra glabernmis; raceme bre\ib subopposiifols nullifidis cjmosis ^ — Vandelli, Spicilcg. fl. Bras. 1J. ex Rocm. Scnptor. Hispan. 86. no. 4. — Folia petiolala pedalia, supra obscure \mdia, s>ub-lus raremsq. rufescenia. Caljx profunde quinqucfidus, segments obt'isis. Co-rolia parva quinqucfida. Stylus \illosus. — Crescil in Brasilia.
- 140 S. TABACIFOLILM Vello7o, Fl. Flumin. II. t. 89. «x Mart. Beibl. zur Flora XXI. II. 63. t — Cortex frulicis >. panae arboris virescens, uli folia lomenlo puhcrulento albido adpersus. Caljx qumquefidus. Corolla 5-fida, lacimis Ian-ceolalis palenlib., violacea %. violaceo-cocrulescens. Anlberac bre\ej> mclusac acqualei. o >• 5 — Cresrit prope Sebastianopolin in Brasilia
141. S. AKGEMKI'M Dunal, S>nops. 19. (ed. 2. inedit. t. IV) - (i. Don I. c. no. 121. — Karm loproso-arpencis; foil. o>nlo-oblonRis, ulring. rn(idi>, siibus le-proso-argen'ns, supra Mndib. glabernmis, ^rmnis in ramis pnmariis, solliarns in raniis scTundani". > IVdiinculi '2-J-ni bre\issimi cum cahcib mrollacq. pagma rxlerion argrntei umllon. Florrs pani. (alw qmnqurdentaiu^ (.orollao segmenta oblonga acuta — Crescil in Brasilia prope Rio de Janeiro.
- \$. 4. *Arbor es r. frutices gtabri; fob is saepe ge minis ylabris, raro in axillis nervontm subtus pilosis; racemis simplicibus cymosis nut c/j-mow-umbellatis opposilifohis; corollUs subquinqvpaütis. — Lctodeti-dra Dunal / . c. 20.*
142. S. IKCFOLMTM Pers. Kiiclimd. I. 223 - Dunal 1 r. *). (i Don I. c no 122 Caule fruhroso; foil oblongis aciirainatis iindulalo-repandi^, pedun-culis paucilioris breussimis *) — Frulex glaber. Folia Mipra miid.i. Prdunruli '2-4-flon. Cal)x quinquedentatus par\us, defloralus auctus (corolla quinqucfida, >r^m(*niis h.im.ilis — Crescil in Peru^iao s>|\is .id \itor
- HI s I.\I.\I(\TIM Dunal I. r ed 2. modil. t. M> ' 11 I) kill >o\ grn. el sp pi III il Klh S>nops p| ae<|um II. I(>7. — (i Don I r. no 121 I'ruli-rosum r.imuiis f.>lnsq cl.ibns, subius in a\illn \rn.irum pilose %o\iarns, bre\il(T petiolatus elliplico-ablongiH arummati«, ba«i cuncalu inlrciTnmis. umbi>|i<i op-postifolus pedunculali« paunflori*. ,S A S. tnt* non dmt-siim, nisi h>hts *o-litanis rt umbellis paunflons. Folia 4": poll, longa. '2 poll lii.i (ah\ qmnque-fidus puberulus, grgmenli« o^alin aculid. < re>rit in n irno No\o-(,ranalc>> propo p h'iim Tusaganugam.
- III s OBOMIMI Dunal I r 21. foil 2. inrdil t. 112 - II II Klh I r)>~ Ki*i I r IIJ) (' Don I r no 121 \rboreum r.imulio an^nlilis fusro-io-IIMU'HMN foil snliiiriis rlliphro-o|i|o|j^'is aruniiiijii«, basi %UM uncatu integer-rums ^'IIMIS, suldiis in aiilln ^riiarum pilosis, (lnnb «>pp«>ihf »lus ' umbella-ti«. fl«.ril) poh^iinio A Rimi lrrrtPH U'IITI I ••lii pi imi ii i 1-| -pnj|,r arid. I robriUr «rs«ilr« muliiflnrii' H>»t*« in <|ui\is uinllli I t | n nn, l.e J,ccillat fertile*. rHiqu brmus pn|ui<|.,t s (,niN .il,,rii|iH I'I.JI.. h .i <ihr<% fu*f<>* tomenloti. (aht <|uini|nrl .bus |.|. « Mu%oi« iiii*.| n:.|.u« I ,r Hi labroscula alba * , legmenm hmbi liirari-oM<ngi« aml« .in|UAlil», %ub J(M<r mucronato- tubrrrulali.. rrr%ril in ArnJibu* i.luilrn>ium |>r.>,r I ,,r,u ,
- I4> s ||KY>I AIR \rlloio. H..r Mirmn II t 110 \|.ul |, ,rj |, / XXI. llnhl I n> Frutn alm.idmr i.-S prd-un It,n,, |all . rii|lfr |p%I glabro- tuncroo Folia oblongo lanceolata cava a luro data acuta glabra tunc

suboppositifoliae 10-20-florae. Pedicelli Icrek-s urn- > bil>cria!os Lal\X alben* brevis. Corolla alba, lacinnis ovalo-lanceolatis, ulnnq allenualis Filamcna M-ridia brevia, basi subcoalila. Anihcrac paullo curvac flavac, Ires poslicac longiores. Stylus curvalus; sligmale subcapitaio, longitudine anlhcrarum vS — < rescit in Brasilia ad Rio de Janeiro.

§. 5. *Racemi v. cymae axillares, geminati v. solitarii.*

140. S. INCIRVUM Rz. cl Pat. Dor Peruv. II 34 t 104. fig. b. — Dunal I c. 21. — G. Don 1 c. no. 125 — Caule angulato herbacco, foil, ovaiis acuminatis pubescentib, racemis axillarib gemmis, allcro bmion, pedicellis incums. 3|. — Caulis ad nodos mcrassalus glaber, caclcrum pubescens. Pedicelli nmoM \iolacoi Caljx campanulalus profunde quinqueclnlalus (orolla •ilbesccnli-uohce.i r>-parlila — 5 *recunum* Poir. Suppl. Encynl. melb. III 755. — (.ri'scit in PeniMae ncmoribu<<

147. S. A>LLPS Rz. cl Pa\ . I. c. 30. t. 100. fig a. - Dunal 1 c - G Don 1. c no. 120. — (aule herbacco, Toll. oblongo-lanceolatis; pedunculis nxillarih. hinit tenrvc breMssimis; baccis conicis ancipilibus. 2I. — Folia lnlogemma pubrs-cenlia. Calyx el corolla 5-parlila. Pedunculi cymosi. Flores secundi par\i undes Dacca albida, apiecm \crsus mullangula. — Crescil in Peruuac ncmnbut ad Cuchero.

148. S. DASSOMA Rich. Herb. ex Dunal 1. c. 22. — G. Don 1. c. no. 127. — Caule fruticoso; Toll. ovalo-oblongis, ulnnq altenualis glabns; cymis partis oiillarib solilarus. 6 — Folia magna petiolala nilida, inter nervos supra rugo«n. Cjmao quam folia breviores. Calyx qmnquedcnlalus, dcnlil. oblusis. Corolla puhescenn virens, anthrac lulcae Racca ennea Mihcompressi inculaia \ircscenti-alha *Banana sylvatica* Aubl. Guxtiq 217 I S5 — Lam IlluMr gen (102 Willd Spec. pi. I 1005 - *Solanum nignsum* Kith lib — (,n^oit in <iiu mi.

§. 0. *Pedunculi axillares unflon sohtaru, gemini v. plures aggrequi.*

140. S. RKLMFOLIIM Dunal I. c. 22. (cd 2. incdil t. III) - II II klh I. c TO — Rlh. 1 c 100 — (* Don I. c. no. 128. — SulTrulicosura scandens ramis folutq glahns solilarus ovaiis oblusis obsolete cordatis; pedunculis Miboppositifolns umflons bolliarns. j^ — Caulis radicans; ramis subangulaiis. Folia 0-10 lin looga, foliohs uno \. gemmis axillanb. parvis accedentibus. Calyx 5-deniatiH, corolla pallide >iolacea, scgnienlis lanceolatii. Dacca globosa rubra, magoiiudino illarum S nign. - Forte td genus *Wilhermgta* periinet. — Crescii ad arbores prope urbem Ybarrac in regno Quilensium.

150. S II i\ VM:\si: Jcq. Americ. 40. I. 35 fed pict. I. 48.) — Dun il I. c II II Klh. I c Klh I c G Don I. c. no. 120 - Fruticosum ram is angulaii* f<-lnsq glabns lamcolato-oblongis aculis, in feme anguslalis subroriarns mtliiH, ranus gemmis; pedunculi* Mibaxillarib umfloris soli(arn«, barns nialihus .> Folia inlcrdum, sed ranus geminala 2':-pollicana Corolla coerulea pollirem diamelro lenens, segmentis latin bre\ib. emarginalib. llacca o\ala obscure cooruka nilida (Jcq \ globosa rubra (Klh). Pedunculi 2-3-flon (Jcq., umflori Ckh) Calyx quinqueparlituft. — Crescil ID insula Cuba prope Regla el Guanavacoi.

151. S. MONTE>II>E>SE Spr. Syst. veg I. 084. - G. Don I. c. 418. no. 1J0 - Foil oblongis, bast allenualis subrepandis, ulnnq. tcabris; ramis pulverulentm, pedunculis erectis. ^ - Crescil in Montevideo.

Vl s HOOKERIAMM Ant. Sprengcl, lent. Suppl. ad tyit. >eg 0 no 10 tru-licosum ghibnim foil peliolatm oblongK coriaceis nitidx inlegns \HKIMS J.C-duix IIIH (eriinn ilib .i\ill.inh(j , plemniq millions, corolla purpuriM enii-rdcruh a qmnqiielnha, seguu nils CIIMHHH< iihS, | lie i> HUH rouilis quam loin longionb , calyce 4->-partit() j S *nmctum* Hook Hot Migai I 20X { <• Don I c no. 131 - (.resell in Mexico

Seotlo IV. GEMMATA 6. Don 1. o. 418.

Folia integerrima geminala v rarus solitana ID eodem ramo, ranssime aggregata Calyx quioqaepartilus. Antherae acuales.

§. 1. *Pedunculi axiUares inn/Ion sohtarii, gemini || aggregati,*

153 S. CO\OC\RPIM Rich. Herb, ex Dunal I. c. (cd. 2. incdit t 30) - Poir. Encycl. melh Suppl. III. 748. — G Don I. c no. 1J2. — Caule frulicoso, Toll, geminis et lernis inaequalib. integns obtusis subsessilib.; pedunculis uniQon<> solliarns gemini;>e, baccis otalib aculissimis. ft — Habitus *Cestri*. Kami angulali lutescente*. Folia coriacea obotata v. elliptica. Segmenta caljcma o\ala. Corolla coerulca profunde 5-parlita. Bacca Ceraso duplo majqr edulis. — Crescil in insula Sli Joannis.

154 S.? CAPMCOIDES Mart. Flora (D. Z) XXI. Beibl. I. 78. — Herbareum caule r.imisq. di\ancatis, epidermide alucea pallida solubili, ramulis <ann-ptibcnlib ; Toll. otato- lanceolate lanccolatiste acuminalis, mterdum gemims in in ore o\ato oblusio, basi aculiusculis, sublus pubescenli-mollib., s\ipra pihs stellalis *teitthb* [*] sparse adpersis; pedunculis filiformib. solilarhs aut geminis, fructifens deflexis, calyce 5-8do, lacinnis ovalis; baccis subglobosis oligo^permis Q? — (re^cil in Brasilia ad Sebastianopolin.

155. S. MEMBRA>ACELM Wall. Cat. 2025. A-C — Nees ab E*enb. Transact or the Linn. Soc. X\II. 41. — G. Don I. c. no. 133. — Caule herba<ro dichoinmo, foil, gcnnnn* o\ali> oblongiste, utnnq. acuminalis, basi obliquis inaequilib, supra hirtis; florib sub^eminis axillanb.; ca^ns quinquedenlali dcnlib. subulais. 2|.4 — (re^cil in India oncnlali in jugo Vlghr).

VtO S I \C \E Dunal I. c ±L. (ed. 2. inrdil. t JG.) — Roem et Sriuli. Sjsl >ogct. l\ 007. — >ees ab Fscnb I. c. — G. Don I. c. no. 134. — Caule herbareo dicholonio, foil gemims o\alis(utrinq. acutu inaequalib. glabris, florib. subKPminH nxillanb ; cal)cis quinquedenlali dentib. subulatis. 2|. — 5. *membranamim* Wall, (at 2025. ex p. — Crescil in India onentali. — Pedunculi brctes <.ihx roria-CCUH. Bacca globosa, semi nib sublngODis punclatis.

157 S. \GGREG\TIM Jcq. Collect, bot. 1\ 124, Icon, pi rar. t. 32J. - Dun.il I. c — G Don I. c no. Itf — Lam Illustr gen. no. 2320. — Caule tiifruuicoso, foil subotah* oblusis aitgregatis; pedunculis uniflons gracilib, plunb e\ eodem puncto orti* inlerfohncci5, corolla caropanulata. § — Frutfx glaber Folia plunna agt;rtgata inlegerrima peliolaia, mlida polhciria. Pedicelh fruchfcri nulanirs, omnri Toliorum longiludinc. Corolla pallide purpurco-uolacca polliccm dmiutro h'nens, »i'gmenlis l.incolah*. Bacca globosa lud'a mlida bilorulans pisiTormiH — S *Gutnernte* Linn Spec plant. 205. — S. *umprriirm* Mill. Diet. no 25 SfiMif/i<j *solanasea* Pers. Enclurid. I 210 — *Atiopa solanacra* Lion. >l nu%* 20). — VN illd Spec, plant. I. 2019. — Vogel, Icon. rar. L 10 (onimel. llort II. 101. L 00 — In Promontono booe ipel.

IV). S. inGROPIIILIM Schlcbsd. Linnaea VIII 2M t — G Don I r no 130. - rruhcHum romis sub\illosi<; Mini suhgeminis, breviter poiolatis lanrcolali*, ulrinq a<u(m lute<renli-^iridib, supra pilosis, sublus subwllosi*, florib umbrilis breMHsinie pedunculala« pAiiiriflura^ nposiifofhas formanlib. rahci* deniib hlr % IIIH arulis, rorolli^ albis 5-(idIN, dnn rcllcus, exlun pilosulis, baccis glo-IXJMS KI>l^r^s — < orolla alba. Stamina regulari.1. Folia ma^nitudine inacquali.1, ni.ijora j poll Innga, I^/o poll lala. — (rricit in Mmro ad Jahpam.

§. 2. *Arborcs v. frultces glabri. Folia glabra t. intenlum subtus in axil-UM xenarum pilosa. II a mm simpltcci cymoti (. cynwsu-umbellalt oppo*if>/o/n. I orolla qutnqfnpnittra.*

1^ S MDI || Dunal I e. * (ed 2. inrdil. I 107 \- II B. klb. Nov gen. el %>cc pi III Sk - kth. Synop^r pi aequio. II. 107. — G Don I. c no 117 - Fruh-roHiim raro« follitq glabri* grminn, altero nulln minorr, «Ilipliro-oblongt*, ulnnq .iruminalif tntegrninn, umbelhs subupposiioolns breulrr *pedunculatit pauuflorit*, pctlicellis drmm reflecti> o — *s thphylo* \alde Mmile ncr dner-

- sum, nisi folus omnibus aculis saturate undibus pedicellibque reflexis — Folia 3-3'/.-pollicana, V/t poll. laia. Corolla alba, magmludine illius *S. ntn* Dacca globosa glabra, PISI magm forma. — Crescil 10 Mexico ad Jalapam
160. *S. DIPII\LLUM* Linn. Spec. plant. %4. — Aubl. Guian I 215. — Jcq Collect. II. 231., Icon. rar. t. 322. — Pluken. Almag. 340., Phytogr. t III n_b' 4 — Dunal I. c. 20 — G. Don I. c. no. 138. — Caulo fruticoso; foil, geminis, allero minore obovato, cymis brevib.; pedicellis flonferis cernuis, fructifens creclis \$ — Frulcx sempervirens foclidus. Caulis nigrescens teres. Folia subsessilia Foliolum majus 2-4-pollicare. Corolla alba, segments lanceolalis acutis. Bacca globosa pallide auranliaca pi si form is. — Crescit in America tropica.
101. *S. ARBOREIM* Dunal I. c. (ed 2 incdit t 198) - U. B. kth. I c 33 - Kill I. c. 107. — G Don I. c. no. 130. — Arboreum ramis flexuosis foln*»q glabris oblongis acuminatis, basi cuncalis inlcgerrimis, allero mimmo subscssili, c j-mis(*) oppositions parvis. \$ — Kami angulali glabn v. pubcruli Folia 7-H-pollicana, 3 poll laU, supenora geminata, mmon rolundalo o^aio pollican Cymae parvae simplices. Caljx quinquedeniatus, denlib. o>atis aculis. Corolla alba, segmenus aculis oblongis, calyce sexics longionbus. — Crescil in >ova Andalusia ad Cumanacoa.
102. *S. C4AMRAISA* Velloio, Flor. Flumm. II. t. 112. ci Mart Dcibl lur Flora XXI bO t — Glabrum: caule fruticoso inermi; ramis patenlib, ramulis lereliusculis subflexuosis tiolascenlib., full, saepe geminis ovatis oblongistc, uinnquo aculis aut acuminatis, allero minore saepe rotundato v. obcordato, subtus ad venarum axillas saepe barbali; cymis oppositions, florib. subdislichis, infenorib decidentib pedunculum cicalnsanlib., lacinnis calycims ovalis albis, apire \in— dib , corollac lacinnis ovatis obtusiusculis crassis; anlheris acqualib. corolla slyloq duplo breviorib , pedicellis fructifens sursum incrassatis pentagons, bacui ovalo-globosis ;> — Crescit in Brasilia ad Sebastianopolin.
163. *S. A< IMIVUUM* *Hi el P.i>*. I lor Peru* 11 v34 t 159 fig a - Dunal I (G Don I r no. 140 — Frulicosum; foil gomiuis ovalo-oblongis elliplu^q acurainatis, acummc slnclo conlorlo, racenns c>mosis multiflons o (jlk<brum Folia brcMlvr pclolala inlegernma, saepe nilida Racemi apicc rcur\ati, pedicellis gracilibus, ad apicem incrassatis Corolla parva alba. Bacca nigra globosa pisiform is - Crescil in s>lus PeruMac ad Cbincao.
- 1M. *S. FOETIDLUM* Rz. et Pav. I. c. 34 t. 105. fig b - Dunal I c 20 - II B K(h I. c. 3J. - Kth I. c. 108 - G. Don I. c. 141. -- Frulicosum ramis folusq. glabris, sublus in axillis venarum pilosis ovatis aul ellipticis brexiter acuminatis, bnsi aculis iucpcmmis, saepius geminis; umbellis opposihfolus brevicer pedunculatis 6 - Glabrum, inter digitos foclidissimum. Folia sublus venosa. Corolla alliesenti- > pallide coorulea; anlherae drclinatae. Bacca aurco-fulva Juglandis magmtudine - (rescil in Poruxia — Folia usurpanlur instar florum Sanibini el succus ad ulcora)a\ndnda adbibotur
105. *S. TRlhTK* Jcq Plant. Americ. 50 1.40 (ed picla t 49 - Dunal I c I\ G Don I c no 142. — Caulo frulicoso, foil geminis lanccolalo-oblongis vuhrcpandis acuminatis; c>mis brevib., florib secundis ^ — Folia pctiolata palmana Pedunculi laicrales pollicares mulliflon. Corolla pana alba v .ilbrscrnii-tiacea, segmeniu lanceolalis Bacca glnbona lulca pitiformn. 4 alji quinqueden-talus, segmenlis rolundalis. — *S obi on gum* Bz. et Pav. I. c. J4 i 105. Og b - Crescil in Perutia et in imula bli Marlinici.
100. *S. SPIRAI* E Bxb Flor. Indie. II. 247. — Nces ab Esenb. Transact of the 1 inn sor. \MI 40 — G. Don I. c. 143. — Caule fruticoso, ranm comprsso-anRiil ids ghilms, foil itemims oblongo-lanceolatis, b«Ri attenuate gialins mtc^i rrinns, altero duplo tri|»lo\c minore, racrnns subimosis sulMipposmdilns M uindi-, apicc rnotutis, cahtib nlaui<luU>NO-pun<ialis , ,s \ira/n/u Humli |), — Affine prjcediMili, diffnl iiracserlim minis .uipilaiis, folus IMM Inline CUIHMI*. aculis 4icc acuminatis svmporquo inlegi minis, flonhus nujonbus albi* ral)ri-busque glandulo<is - (resnl in India oncnlali

167. 8. CORMFOLIUM Dunal I. c. 21. (ed. 2. incdit. t. 110.) — H. D. Klh. I. c. 34. Klh. I. c. 163. — G. Don I. c. no. 144. — Fruticosuni: ramis foliisq. glabris elliplico-oblongis acuminatis, basi aculis inlegerrimis subparallele venosis geminis, altero minuto; umbellis oppositifoliis breviter pedunculatis. 6 — Rami angulati. Folia majora circiter tripollicaria, juniora puberula, minora obovala subsessilia. Segmenla calycina oMusa. Corolla alba, magnitudine illius *Lysimachiae vulgaris*, segmenlis ovalis acuminatis. Ovarium villosum. — *S. leucocarpo* e habitu simillimum. — Crescit in convalli fluminis Caucae inter Palavo et Popnyan in regno Novo-Granatensi.
168. S. LEICOCARPUM Dunal I. c. (ed. 2. inedil. t. 38.) — G. Don I. c. no. 145. - Ramis virgalis; foil, geminis, allero ter minore, saepe suborbiculato, elliptico-lanceolatis unilateralib.; cymis paucifloris oppositifoliis. § — Affine *S. tristi* differit tamen praecipue foliis, cymis unilalralibus baocisq. albis. — Glabrum. Rami terces. Folia ulrinque nilida. Calyx coriaccus parvus quinquedentatus. Corolla alba magna, segmenlis acutis. — Crescit in insula Stae. Varlhae.
169. S. PSYCHOTRIODES Dunal I. c. (ed. 2. incdit. t. 111.) - II. It. Klh. I. c. 35. — Klh. I. c. 160. — G. Don I. c. no. 146. — Arborcum: ramulis angulatis suberoso-verrucosis; foil, geminis lanceolato-oblongis acuminatis, basi aculis inlegerrimis glabris, subtus in axillis pilosis; umbellis oppodilifoliis subsessilibus. § — Simillimum *S. cornifolio*. Folia 3-4-pollicaria, allero minori. Umbellae 3-4-florae. Pedicelli fructiferi apice incrassati suberosi. — Crescit ad ripam fluminis Magdalenae in regno Novo-Granatensi.
- §. 3. *Racemi laterales terminates, non axillares nee oppositifolii.*
170. S. FLAGRANS Tenore, Annals des sc. natur. XIII. 381. — Arborcum inerme: foil, geminis, altero triplo minori, oblongo-lanceolatis, ulrinque aculis glabris, parallele renosis integerrimis; floribus racemosis; racemi simplicibus secundifloris extrafoliaceis; calycibus campanulatis 5-dentalibus; corollis (albis) quinquepartitis; laminibus inaequalibus; baccis globosis lotescensibus (magnitudine *Cerasi*); pedunculis incrassatis. § ~ Crescit in Brasilia.
171. S. CROTONIFOLIUM Dunal I. c. 18. (ed. 2. inedil. t. 103. fig. b.) - II. R. Klh. I. c. 30. — Klh. I. c. 160. — G. Don I. c. no. 147. — Fruticosum: ramis lomentosis; foil, geminis oblongis angustalo-acuminatis, basi rotundatis et inaequalibus subrepandis, supra canescens pubescentibus, subtus molliter albido-lomentosis; racemis supraaxillaribus bifidis; floribus unilalralibus. 6 — Folia scissili. Folium allerum dimidio minus, majori 4-5-pollicari. Calyx et corolla rufescentes tomentosa, Membrana corollinae lineari-lanceolatae. Dacca globosa glabrescens piliformis. — Habitu valde accedit ad *S. rebratcifolium*. — Crescit prope portum urbis Carthagenae in regno Novo-Granatensi.
172. S. FRAGRANS Hook. Bot. Mag. I. 3684! f - Arborcens: foil, geminis ovatis cordatis inaequalibus integerrimis; racemi soli ex axillis ramorum; floribus secundis; pedicellis inferioribus maxime elongatis; calyce cordato; corollis latis campanulatis profunde 5-partitis, limbo reflexo; laminibus geniculatis; stigmate dilatato concavo. § — Habitat in Guayana.
173. S. >AHK>SK Dunal I. c. 18. (ed. 2. inedil. t. 103. fig. 8.) - II. R. Klh. I. c. 31. — Klh. I. c. 160. (i. Don I. c. 148. — Fruticosum: ramis lomentosis; foil, geminis ovatis cordatis et inaequalibus, supra canescentibus, subtus albido-lomentosis mollibus, inferioribus sinuato-angulatis; racemis unilalralibus bilidis; floribus unilateribus. j) — Folia 7-8 poll. longa, 5-6 poll. lata. — Membrana corollinae scissili. *S. crotonifolium*, a quo non differit, nisi tomentum densiori, foliis lacinibus rotundatis, inferioribus sinuato-angulatis. — Crescit in ripa fluminis Magdalenae.
174. S. TRACIPIYLLIM Dunal I. c. (ed. 2. inedil. t. 104.) - II. R. Klh. I. c. 31. — Klh. I. c. 160. — G. Don I. c. no. 140. — Fruticosum: ramis lomentosis; foil, geminis oblongis acuminatis, basi rotundatis inaequalibus integerrimis, supra scaberrimis, subtus mollissimis canescentibus; floribus unilalralibus. § — Differit a *S. crotonifolio*, cui procerum videretur, tomento densiori, foliis supra viridibus et scaberrimis; racemis dicotomis floribusque paulo

minoribus. — Folium allerum minus, majus 5-6-pollicare, 2-2'A poll, lalum. Tomenlum ct pubescentia stellatum. — Crescit in provincia Popayanensi regni Novo-Granatensis.

175. S. TETRANDRUM R. Dr. Prodr. (I. NOT. Holl. 445. (ed. N. ab E. 301.) - G. Don I. c. no. 150. — Suffruticosum erectum: foil, subgeminis oblongo-ovalis integris membranaceis, pube rara conspersis; racemis lateralib. corymbosis simplicib.; florib. quadrifidis. 5 — Crescit in Nova Hollandia.
176. S. GEMINFOLIUM Thonn. Kongl. Danske Vidensk. Selsk. Afhandl. 111. 141. t (nee Schleichd.) — Suffruticosum inerme: foil, gemjnīs ovalis subrepandis stellato-pubescentib.; racemis simplicib. infrafoliaccis dislichis. 6 — In Guinea.
177. S. SCILECITEISDALIANUM Wiprs. mss. - SuiTrilicosum: ramis inflorescencia foliorumq. pagina inferiore tomenlo laqueo vcsililis; foil, supra viridih. stellato-pilosulis, geminis inaequalib. obovalis oblusis, majori ovalo acuminato, basi rotundato $2\frac{1}{2}$ poll, longo; cymis terrainalib. laicralibq. pedunculalis mullilloris; calycib. suburceolatis 5-dentalis, dcnlib. rotundalis; baccis globosis. 5 — *S. geminifolium* Schlecht. Linnaea VIII. 255. (nee Thonn.) — G. Don I. c. no. 151. - *S. gemini/lorum* Schleichd. I. c. V. 211. — Crescit in Mexico ad Jalapam.

§. 4. Racemi terminates.

178. S. PTEROPODUM Dunal I. c. 14. (ed. 2. inedil. t. 04.) - II. B. Kth. I. c. 20. - Klh. I. c. 163 — G. Don I. c. 420. no. 152. — Gaule herbacco alaiō; Toll, geminis sessilib. decurrenlib. elliptico-oblongis subacuminatis, basi valde angustatis undulato-repandis, supra glabrusculis, sublus lenuiter pulverulento-pubescentib.; corymbis oppositifoliis dicholomis; pedunculis alalis. 2l — Folia 8-10-pollicaria, 3'A poll. lala. Pedunculi multiflori folio dimidio breviores, mini ct pedicelli pulverulento-lomenlosi. Lobi calycini Iruncali mucronali. Corolla alba, scgmenis oblongis aculis. Ovarium glabrum subglobosum. — DistinRuilur a *S. tessili* Rz. el Pav., cui affinitate conjunctissimum, foliis lalioribu*, basi map's angustatis el crispis in ramos decurrenlibus, sublus pubescentilibus HOC glaherri-rais, pedunculis basi alatis, laciniis calyciis Iruncalis el subiuucronalis, anlberis flavis nee alropurpurcis. — Crescit juxta urbem Quito.
170. S. ORLONGIFOLIUM Dunal I. c. 14. (ed. 2. inedit. t. 05.) - II. B. Kth. I. c. 27. — Klh. I. c. — G. Don I. c. no. 153. — Iforbaccum: foil, geminis petiolalis elliptico-oblongis acutis, basi angustalis subintegerrimis glabris, sublus in venis pubescentib.; racemis subterminalib. bifidis. % — Folia inaequilatera, supra viridia, majora 0-7-pollicaria, 2'»-3 poll, lala, minorib. suborbicularibus. Pedicelli apicem versus incrassati ramique villosi. Scgmcu calycioa oblusa. Corolla alba glabra, segmentis ovalis oblusis. — Crescit in Andibus Quinducnsibu* in regno >ovo-(iranatensi.
180. S. PULCHRUM Dunal I. r. IV. (ed.2. inedil. \.M.) - Poir. Encycl. mnh. Suppl. III. 750. -- G. Don I. c. no. 151. - - Caulc fruticoso; ramis niKosis claimis; foil, oblongo-ovatis in petiolum desinenlib.; raromis magnis sulMirhnl(>nii<<. o -- Rami teretes glabri. Folia plerumque gemina arula v. oblusn, sub(us puberrula. Pedunculi rymosi. Corollae segmenta lanceolata acula. Dacca globosa. — AMnc *S. crispo*, sed foliis minus cordatis racemisque majohbus diff<tl. — In Brasilia.

Seetlo V. LYCIIIDES Dunal I. e. 22.

Rami spinoscentes. Folia solitaria Integra. Pedunculi aillares filiformes uniflori solitarii v. aggregati. Calyi quinquedentatus v. quinquefidus. Stamina in — aequalia. Semina ossea.

181. S. LYCIIODKS Linn. Mantiss. pi. 45. - Jcq. Icon. pi. rar. I. I. 40. - Dunal I. c. 22. - II. I). Klli. I. c. ;»>. - Kth. I. c. 170. - G. Don I. c. no. IV> - Fruticosum spinosum: foil, solitariis ohloigiis olttusis, basi mncatis ^latiris aut liirtin; pedunculis extraaillarib. unifloris solitariis lili(urmilius. j - Hami trrrirs glabri, ramulis angulatis pilosis. Folia 7-H liu. lon^i. l'rdirelli sulitarii. (:al>\ urccolalus iruncalus 5-dcnlalus, dentib. liucanb. Kubulalii lomolu. Corolla pallid*

violacea, limbo angulato-quinquelobo, fauce lutea. Aulherae lutca subsagittalac. Bacca globosa glabra rubra pisiforrais. — ? Foliis pilosis. — In Peruvia.

182. *S. CAINDICANS* Dunal I. c. 23. — G. Don I. c. no. 150. — Fruticosum: ramis spinescentibus; foliis, obovato-cuneiformibus, obtusis, sublus albo-tomentosis, supra scabris; pedunculis filiformibus, unifloris solitariis? 6 — Caulis spinosissimus, ramis scilicet in spinas fluriferas foliosas abeuntibus. Segmenta calycina appendiculata. Corolla coerulea, fauce lutescente. Antherae liberae. Bacca globosa rubicundopurpurea. — *S. lycioides* R. & Pav. Flor. Peruv. II. 41. 1.177. fig. b. — *S. lycioides* f. *tomentotum* Dunal, Monogr. Solan. 174. — In Peruviae argillosis ad Huanuco.

Sectio VI. IOLOCHLAIHA *) 0. Don I. o. 420.

Folia inlegerrima solitaria vel gemina. Calyx truncatus integer. Flores bini vel fasciculati laterales.

183. *S. BIGEMINATUM* Nees ab Esenb. Transact. of the Linn. Soc. XVII. 42. — G. Don I. c. no. 157. — Caule suffruticoso; foliis, inferioribus solitariis, superioribus geminis, supra dissile setulosis elliptico-oblongis, utrinque acuminatis, altero minori conformi; floribus laterifoliis subgeminalibus; calyce inlegerrimo laevi; pedunculis fructiferis erectis. 6 — *S. flexuorum* et *angulosum* lib. Madr. — Differat a cognatis fructu grandior, pisi eximii magnitudinis pedunculo crasso crebro insidente. — Crescit in India orientali.

184. *S. NEESIAMM* Wall. Cat. Suppl. no. 248. — Nees ab Esenb. I. c. — G. Don I. c. no. 15*. — Caule suffruticoso; ramis tetragonis, summitatem versus scabrisculis; foliis, inferioribus solitariis, superioribus geminis, supra dense subtilissimisque scabris, punctulato-asperis oblongo-lanceolatis, utrinque acuminatis, altero minori conformi; floribus laterifoliis fasciculatis; calyce inlegerrimo laevi; pedunculis fructiferis paucis. 5 — Corolla calyce duplo major crassiuscula alba (?), laciniis lanceolatis glabris. Bacca globosa, vix pisi minoris volucae, laevis rubra biloculari. — Crescit in India orietali.

183. *S. BILMUKI* Nees ab Esenb. in Blume, Bijdragen 096. — Nees ab Esenb. Transact. of the Linn. Soc. XVII. 45. — G. Don I. c. no. 150. — Caule suffruticoso dichotomo colorato glabro; foliis, superioribus geminis, altero majori oblongo, utrinque acuminato, basi interdum inaequalibus, altero minori ovalo, basi acuto; floribus aggregatis laterifoliis; calyce integerrimo. 6 — *S. violaceum* Blume, Cat. Hort. Buit. 55. — Crescit in insula Java.

186. *S. PARASITICUM* Blume, Catal. horl. Boitemorg. 55., Bijdragen 007. — G. Don I. c. no. 160. — Caule fruticoso nodoso; foliis, solitariis oblongo-linearibus acuminatis, basi acutis, interdum inaequalibus glabris; floribus aggregatis utrifoliis; calyce integerrimo. 6 — Crescit in insula Java supra arboribus.

Sectio VI. POLYHERIS DQBJU L c 23.

Folia integerrima solitaria vel gemina. Calyx decemlobus vel decemfidus. Pedunculi unguis axillares vel interfoliaci.

§. 1. *Foliis geminis; corollis plicatis S-angulatis; staminibus interdum inaequalibus.*

187. *S. IMFLORUM* Dunal I. c. 23. (ed. 2. iocedit. t. 42.) — Poir. Encycl. m. b. Suppl. III. 757. — G. Don I. c. no. 161. — Caule dichotomo divaricato; ramis glabris, punctulatis dispersis; foliis, saepe geminis ovatis obtusiusculis, supra glabris, basi inaequalibus, altero minori ovato-oblongo, altero majori ovato-oblongo, basi acuto; floribus aggregatis utrifoliis; calyce integerrimo. 6 — *S. dichotomum* Rich. Herb. — Ortil in insula Hawaii. Dommiri.

188. *S. MONANTHUM* Roem. et Schult. Syst. Aegrot. IV. 486. — G. Don I. c. ill. no. 162. — Foliis, plerumque geminis unguis axillaris; pedunculis atillatis.

- uniflora; calyce 10-fido. 2} — Herbageum, pilis disperse stellatis hispidum
Corolla obscure purpurea v. coerulea, calyce triplo major. Segmenta cylindrica
obliqua breviter. Bacca ovalis glaberrima, ovis parvis gallinaceis magnitudinis. — *S*
uniflora Lag. Nov. gen. cl. spec. pi. 10. — Crescit in Nova Hollandia.
180. *S. SPECIOSUM* Dunal I. c. 123. — G. Don I. c. no. 163. — Caule arboreo; rami-
bus flexuosis; foliis, oblongis acuminatis undulatis solitariis geminis, pedunculis
solitariis; corollis margine crenulatis. § — Folia venosa, superiora gemma Flores
speciosi. Corolla magna expansa semiquinquefida subpentagona. Bacca sphae-
roidea erecta, malura nutans. — Burm. Amenc. 242. t. 245. fig. 5. — Crescit in
insulis Caraibicis.
190. *S. ISEGLECTUM* Dunal I. c. - G. Don I. c. no. 164. - Caule fruticoso; foliis,
ovatis undulatis, pedunculis solitariis geminis; laciniis calycinis reflexis —
Dum. Plant. Amenc. 242. t. 245 fig. 4. — Plum. mss. IV. fig. M ex Aubl Guian
I. 217. — Ramosissimum. Folia integrissima Pedunculi in fenestris solitatis, su-
periores gemini terni. Calyx (secundum ic. cil.) 10-fidus - lenticulatus. Bacca ro-
lunda. — Affine videtur *S. geminatum*, differt caule non scandente denudatisque
calycinis numerosionibus reflexis. — In insulis Indiis occidentalis crescit.
101. *S. TRICOLOR* Moench. et Scrog. Ic. (1. Mexit. inediti ex Dunal I. c. 24. (ed. 1. med.
t. 41) — Poir. Encycl. méth. Suppl. 111. 730. - G. Don I. c. no. 163. — Ule
tertiis dichotomo; foliis, geminis, alio minoribus, ovatis obtusiusculis. lomeno medio
obductis; pedunculis quaternis, antheris 5, una reliqua duplo longiore S Affine
S. lento, differt maculis 3 vmdibus ad basin cujusque segmenti corollae,
antheris aequalibus etc. — Caulis lanatus. Pedunculi villosi. Calyx 10-dentatus.
Corolla alba subreflexa, medio violacea. Bacca globosa rubra — In Mexico
102. *S. PALCIFLORUM* Vahl, Eclog. I. 21. - Dunal I. c. 24 - G. 1) >u I (no 160
— Rarus MIOVIS, superne tomentosis; foliis ovatis integrissimis, supra 4 nervis,
subtus tomentosis, ramealibus geminis inaequalibus, c. hinc t. mentosis, < tunculis
geminis aequalibus 5 — Rami herbacei cum foliorum junctura p. l. t. m. a.
inferiori ferrugineo-lanceolati. Folia 2-3-pollicina. Flores nutantes tomento
ferrugineo lecti. Calyx breviter truncatus 10-dentatus, denudatis linearibus*. Corolla
glabra pedunculorum longitudinis. — Crescit in insula Su. Maritima.
103. *S. SILLIUM* Dunal I. c. 24. (ed. 2. inedit. t. 114 - II. B. Klh Nov. gen
cl. spec. plant. III. J7. — Kth. Synops. plant. acquin II 170. — G. Don I. c. no
107. — Fruticosa baccata foliis ovatis acuminatis, basi rotundatis Rubrepandit
glabris, biobtusis in venis hirtellis, superioribus geminis. (loribus extraaxillaribus sub-
ternis; calycibus decemdentatis. 6 — Rami pilosi. Folia subbipollicina. Co-
rolla magna pentagona, aestivo pentagono nuda. Stamina uno reliqua majora
Bacca globosa glabra — In silvis prope Cumana et Bordonei
104. *S. LINDLEYI* (H. B. K.) Wall in Roxb. Flor. Indie. II. 7. (excl. n. I our) -
Wall. Cal. 200) — Res ab 1. n. Transact. of the Linn. Soc. 44 7 -
G. Don I. c. no. 163 — Herbageum caule basi r. p. t. apice ramis asculis
liberis; foliis, plerumque geminis subaequalibus. ovatis, ulnariis, arutis imbricatis pu-
bescentibus, fimbriatis solitariis foliis interpositis, gibbosis; calycibus 8-10-
dentatis, dentibus subulatis fructum aequantibus. — Barbae corcinnae. (or) IU
alba. Habitus *lynmachtaef ntorum*. — Crescit in Indiae orientalis montibus
Sicopore, Tliundra-Giri et prope ChiUong.
105. *S. RHTIOFRACTUM* Vahl, Eclog. I. 21. - Dunal, Gener. Solan. monogr. 170.
t. 5. — Synops. 24. — G. Don I. c. no. 100. — Caulis fruticosus; ramulis axillaribus
r. r. fractis; pedunculis multifloris, pluribus. Umbellam aggregatis, umbellulis axil-
laribus terminalibus; calycibus truncatis denudatis glabris. j — Fructus xylololus*
(olia petiolata intoprima sesquipollicina. Calyx 10-fidus, segmentis imbricatis)
Mittit in n. d. m. m. l. i. p. r. l. u. c. r. n. j. u. n. l. i. c. u. n. d. o. a. p. p. a. n. t. i. m. i. t. u. s.
c. r. n. t. u. l. u. s. (or) l. i. (ah) r. i. n. p. l. o. m. a. j. o. r. s. t. a. m. i. n. a. a. n. j. u. m. In Amerrici tritipira
106. *S. (S. WDUOSIM) IT/EL* Pax Flor. Perm. II. I. 1. Id7 (> 1, h. n. ill. c.
f. G. Don I. r. no. 170 - (caule suffruticoso < in U. n. i. r. f. i. l. (* r. n. n. i. n. ^ o. i. t. o. -
cordatis, pedunculis 5-10-nerviis, denudatis glandulaeferis 0

— Folia brctiter peliolata >n 1 dc \enosn, Insi inacqualn falji turbmatus an-
giililo-slrutus, plerumque 10- ranus 12-14-dt ntalus (orolla alba pat(ns limbo
picalo Dacca globosa pallide rubra — Cre»cil in IVnmac ncmnonbus ad >itoc
in protincia Tarma

197 S (ITUL>M: II B Klh I c 38 - kth I c. 171 - f. Don I r no 171. —
Fruticosum scandens (> ramulis tomentoso-pubescentiib Toll gt minis ovalu
sulncuminatis intcgemmis, ulnnq scnceo-pilosis, sublus canescntib flonb
extrnavillanb geminis, lerminalib terms, caljcib decmndenlans ov - Similli-
mum *S lento* lav , sed differ I Coins geminis subacuninalis, ulnnq scnceo-pi-
IOMS, pit is simplicibus — Rimuli angulati. Folia peliolaia, allero paullo minon
(orolh sinuato-qumqucloba alba, medio violacca, cilus pubcrula — Crescil
in sjlus umbrosis Penmai prope \>n\aca el Rio (ulaio

108 S MACRODON Wall Cat J021 (. Don 1 c no 172. — ' Vn idem ac Rib
ex Noes ab Esenb I c 45'') — 1 ruicosum crclum foil infenonb solitams,
supenonb geminaiis, allero 2-J-plo majore, oblongo-lanccolalis utrinq acu-
minalis mtegemrnn, supra ramulisq pilosis, flonb soliiams.% fascicuhhs inter-
foliaceis calycib nulcalis decmndenlahs, denlib. subulalis bairam super tntibus
-S llabilu simile csl *S denhcutato*, difTerl auiem caljcis denlibus longissimis
(resell in Indiae onentalis monlibus Pundrea

100 S DL(FMDFM\TIM Rxb Flor Indie II 047 - Wall Cat no 2»U - G
D) m I c no I I - llerbaceum ereclum pen nne foil infenonb solitirus sti-
pmnrrib Ktmini« OMIIS, ulnnq acuds piloMs, allero minon flonb risrieulato-
iggrc g ñ« hl<nfoliis caljnb deremdentaiis pedirellisq ^HITN d< nub lim iri-
subulatis itquilib biccis pisifnrnnb ghbri^, malun> mmm^ 4 — (resell in
I lima el in Imlia oriiniali (Singapore!

300 s (RASSIPbTALIM Wall. Cat no 201H - Wall in Rib Mor hwlr || 2W
Nees ab hsenb Transact of the Linn Hoc |M| 4i — & D« n I r LIJ no 171
— truiicoNtim foil infenonb nolinm*, sup< rib geminaliH oMlo-dliloruis ulnnq
acuminatis cilialin, supra hirlis¹, allero mmori, liorib fiscn ulno - i.jr<uuiiH la-
lenfolns, caljcc subdecemdi nlalo pidicellisq lurhs, denlib siibuhtis ili< run
brenonbus 5 — (orolla purpurea ^ alba Dacca plobosa I poll diinuiro
tenet — *S denttculatum a* Dlume, Bijdragen C07* — *S parhiffulalum* spr s>si
vegei b> appdi 70 no 27K s *biftorum* I) Don Trodr II Vpil J» r&rI
sjn — lour Flor (ochinch I IW — Cresnt in Nopiln

201 s MOII IssIHIM Blume, Bijdragen «H - (. Don I < no 1;, — < uile suf-
fruticoso inermi foil geminis, supra lursiilis, mfn d> nsi loim ni >*s inijon
«lliptico - oblnngo, utrinq acuminilo nun n n\atn flnrrib i^,rrkiii« ljierir<>lu»,
calviib deremfulis) (re>nt in monianis insulae Ja\ar

f. 2. *hohn solttanu; corolla pltcata qxtuiquangulata, stamimbus tnUr-
terdum tnaequalibus.*

2 s MO(IMIM M Donal, Stnop Solan 23 od 2 inr.l.t t 41 (, |> ,, | r
no 170 < nile herbaceo pi|o«o, fill »ub%e«silib o\ u, - h n , , \us 1(1, |h |M-
lost* p< dunriiliH *olilani§, raljce 10-fido barn o\alo-o|i|oiu I "4 ' ' I¹ -
(IIIM uli ixilhrss folio longiorr« i orolla uolarra angulis umis \ml>< r H S ib-
si SMII s Biera lulesr* nii-<indi« — (re*nt in rrgno M« |i< in >

JII s M d \ \ Jrq (nlNri bot \ \ IZ1 , Icon ru l Ij| Dun il I r 21
I im Did >J li Don | r no 177 (ink fnliroso dirh i m • <l « in« il«
foil bur. hh% glabnuorulis pidunrulis s hum* nlui |n • n u » « r-
l^x nigr« *ri n< pun< I il >-hi«pnl ii I* lunruh i i rim i m rim In H inbu% ^ ««d -
po«iifo|n i M \ \ pirMh trun KM Hi *irnl<i« I r Hi muni illn m« l>°
mimla lulra quinquan^uUrl nolala, liora rirnlrr qmnu nuiuiini i \ jma paullo
|tn%{ rlauc«a, und<* Qotrrn »|<rillruni ftumlum r*1 I rr«< il in I uiri«

JIH S «*IH I tTt * Jrq | r III ±V | \ I % fig 2, lr>n ru I I | n i | e
Jl (• Don | c no | •< I aulr fruli u%i |CM| I* n Hi \ i f | i s t-
lanrr I iii% cUbn* arunmali* prdunnili^ | l« rwnnj c« in m% calvato no , dster



- dentalis. 5w — Frulex kcmperurens glaber \mdi« Pedunculi inlerdum soliiaru v. term Corolla magna clegans coerulea, macula Mrenti quinqn.mpulan, sublus prolubcranlc, nolala. Dacca globosa aurantiaca. — Proximum *S relparto el geminato*, scd diflért Jam caljcc inaequaliler dentalo. — Crescit. . . .*
205. *S. GEMINATUM* Valil, Eclog. 1. 21. — Dunal I. c. — G. Don 1. c. no. 170 — Gaule scandente; Toll, ovatis inlcgrrimis plabris; calycib. pcdicelhsq. glabris, pedicellis sacpius geminis; caljccib. 10-dentatis, denlib. linean-subuljiis.)w - Rami lercles, sub Icncle puUerulnh. Pedunculo uno reliquis majori. Corolla glabra. — Crescil in Cayenne.
200. *S. BIFLORIM* Lour. Flor. Coclnnch. I. IV). Dunal I. r. — G. Don I. c. no. 180. — Caule frulicoso; foil. n\iti* inlrRerrimis MIOMS; pedunculis ccnunis; ca- ljcib. dccemhdís, scgmcnlis subulalis, bactis pan is rotundis rubris. , < IOSCHI in Clnni el in Cocluntniia.
207. *S. PHILI/VREOIDES* Dunal I. c. 24. - II. R. klh. 1. c. 37. — Kdi I c. 170 - G. Don 1. c. no. 181. - Caule frulicoso credo dicbolomo; foil, solilains oblongis aut lanceolalo-ublongis, ulnnq. anguldlo-acuminali* integernniK, supra glabris, sublus pubebcndb.; flunb. alan!). aut laieralib. geminis aut quaternis, t.ihcib. subdccemdenlalis. .S — Raniuli an^ulati puberuli. Folia glabra, supra \mdia, infra pallidiora pubeiula. Corolla magmludinc illius *S. lyaotdis*. Caljci* denies lmeari-subulati remoti, allernis minimi*. Corolla sinualo-quinquangularis, medio tiolacca. Dacca globosa. — Crescil in contalli fluminis Magdalcnae in rrgno No\o-Graualensi.
208. *S. MUG ATI* M Lam. Illuslr. gen. no. 2310. — Dunal, Monogr. gen. Solan. 174. t 4. (cd. 2. inedil. t. 40.), Sjnops. Solan 25. — G. Don I. e. no. 1*2. — Caule frulicoso; ram is \irgalis; foil. o\alo- oblongis acutis, sublus tomcnlhS; pedunrulis cal^rilxi tomenlosis, peduiieulis plunb. avillanb. in ranmrum duliotomi.i nascentib , filiineitis inaequilibus. > — Inmenlum siollatum. F'oli i inle^rrnma Cahx 10-lidiis, se^int'iitis menibi.ina pellucida conjiinclis, altcnns brehinbus. Coroll i Molicea macula 'i-radialJ nolala, extus loiucnlo»a. Stamina quinque, uno ldiquis lonpore. — Crescil in insulis (.inariensibus.
200. *S. MONOI*\>AMLM \ is. Scnna llorl. Pata\ 1841. p 3 Frulicosum inerme niolhler pubescens. ruiiin dicboloiuit dnancai»; foil petiolalm u\alis ar>jminalis Inlcgris, pedunculis eMia.ivillanb el in duholomiiH HolilariiK aRgn'Rati^q uiu-floris, basi articulato-deeidui^; cal)cc truncato dccemdenlalo, denlib. hubulati*, alierms minonb.; corolla rolala; staminum filamenlo allero reliqui» duplo lon-Riore.) — *S. lento* Cav. afflne videtur. — Crescil in Mexico.
210. *S. LEMI* M Ca>. Icon plant, rar. IV. 310. t. 30H ~ Peru. Encbind. I 222. - Dunal I. r 2'). < Don I. c. no. 1H1 — rruticosum ncandens ramulis folusq. sublus strllul.ito-toincnlusis et IDCUIIH, supra strllulalo-pubrsrciitib. s<litariis o\alis acuiis inle^rrrimio, florid evlraaxilUnb. geuunis, ternuu.ilib t^rnis, r.il>-cib. dccemdenlalis. o^ F'olia supcriora Rennnala .' (oroll i siuu.ilo-quinquie-loba Mulocea, fundo alba, c\tus tomrntof>a. Stamen uniim n'li(UA quaiuor duplo superat. — *Solanum teamlens folu** (omentosu Plum. < at. 4* Plum, ed Ilurm. 'III. 1. 215 fig. 3 * Crocil ad Caracas.
- §. '). 'fo/nv yemitiatit; calyce deccmdtnticulato; floribus fasciculatit tel gcmnis laterifoliis.
- 211 *S. DEMICI'LATI* M Rlume, Uijdrsgen 007. - Ne<*> ab K*enb. Transact of the Linn W. XVII 41.- G Don I. c. no. 1H4 Caule kuffTrulico»o, foil uif«rioril> suliiariis, summis ^cniinis glabnuheulm, altero majori oblon^o, utrinq .ik unnnAtn, altero minon subo\iiu. florib fasnculato - flR^re^ilis Iiirrifolns. <al<< < nuno 10—tlt-iitii uLil » Milt .ilu i a l''|| JM duiK |i|s < il< IKJ luroiilis S *tuttun-catum* Wall tat no Jn.M ,i Pi IUUM ulis snlitirn-, llurili ab>irtu lrlr.in<lri« S *nanifuttilum* W.ill < it JtiH'' rf supt.i p (s| n<» JII I re^rn in Indian onenlali» tnuulibus SilluI ct in umbroKu altionbu^ msuhv Ja\ar

§. 4. *Folds solitariis, rarius geminatis; corolla quinquepartita; staminibus aequalibus.*

212. S. SCAISDENS Linn. Suppl. 147.. Amoen. acad. \ III. 253. — Dunal I. c. — G. Don I. c no. 185. — Caule herbaceo volubili; foil, cordalis otaiis dependenlib., subius niolhssimis flonb. subumbellalis lerminalibus. 2J.^ — Hacemi(?) compositi. Corolla rniata, segmenlis lanceolatis recurvis. Dacca globosa cerasiformis. — Crescil in Surinam.
213. S. SIDEHIOXILOIDES Schlhld. Lmnaca Mil. 253. f - G. Don I. c. 423. no. 180. — Incrme intcgnfolium: umbellis aiillanb. sessilib.; cal)ce dcccmndenlato; corolla 5-fida regulari; slamimb. 5 regularib.; fruticosum: ramis flexuo»is tomentoM>; foil, otaiis T. oblongo-o>atis acalis v. subacuminalis, basi obtusiusculis, peiolatis, supra scabriusculis, subius scabrido-tomenlosis, tomenlo sicllato ferrugineo-flavo; calycib. hemisphaencis dcnlb. brevissimis obtusis; corollis albis, citus lomentosis; baccis globosis glabris. 5 — Habitat in Meuco.
214. S. LAM'GOOSUM Donal I. c. — II. B. Kib. Nov. gen.'el sp. pi. 111. 30. - Kth. S)nops. pi. aequin. II. 171. — G. Don I. c. no. 187. — Frutico»um ramulis lenuiter lomentosis; foil, solitariis oratis aculiuscuns subcordatis integernmis, supra Mcllulato-htriellis, subias villosito-tomentosis el incants; flonb. opposiuifolus gemim» aul terms; calycib. decemdentatis. 5 — Cal)ce* lomenloii. Baccae globosae. — Crescit in regno ^uilensi prope Mulalo.
- 215 ». CIIRISOPinLLI'U Dunal I. c. (ed. 2. inedit. t. 117.) - II. B. Kth. I. c. - Kth. I. c 172. — (i. Don I. c. no. 188. — Fruticosum tolubile ramulis tomenlosis, foil. »olitani» elhplicis aculis mtcgerrimi^, supra siclluUito-pubesrenlib., subtus fusccsrenli-lomenlosis, junionb. ramul^q. aureo-ferruginen. flonb. subaxillarib. solaariis; calycib. decemdentaiif. \$>* — Tomenlum Mcllaium Folia bipollicana, tuperlora gemioau, tltero majori. Corolla quinquepariita, sogmenlis oblongu acutis. - Creicit In regno Qollensi.
210. S. PIUFEItrM Bib. Plant. Hartweg. 409. - Fruticosum inermr- rimis glibrn >. sparse pilifens; foil, geminis inaequalib. petiolaiis oblongis \. linroo|.iio-acuminatis inlcgorrimis, basi angustatis lenuib. viridib., supra el margins Hpar»e pilifens; pedunculis termioalib. unifloHs, apice incras^ain, in omam folio^am paucifloram approiimatib; caljce campanolalo truncalo, denlib. 10 linearib tubo iublongionb.; corolla ampla letiler qainquangulala glabra; anthori^ aequalib. oblongis obiusis. - Crescit in Mexico.
- 217 >. LAMOPHULLM Dunal I. c. - II. B. klb. I. c - Kth. I r 171 - C. Don I. c no. P*0. - Frulico«um ramn subdirholomis pilo«o-hi%pidi%, foil, gemioit oblongis, ulnnq «ubacumioatis inlegemmis, «upra hi^pidi^ . MII>IU» jrnceo-hi»-pidis el flave»cenlib.; flonb. alanb. et subaxillarib. •olilamt el gemmic; calycib. decemdeoUlm. o — Pill urophce*. Cal)j bispidus, demib. Imeanb. filiforaiib., alterob brevloribw. CorolU albetcentli-violaeca, ciloa pilosa, segmeolis oblongo-laneeoltUt. — U IridiU Andiam Patloentium in regno >o>o-<»rinaien»i.
- 2H. S. LOEATI'M Ri. et Pat. Flor. Perot. II. 31. t. 158. fig. b. — Dunal I e tf. — (• Don I. e. no. 100. — Caule frollco**; foil, genioaiit ovaiit acutnitiat* lioeali«, «ublu< villosn; baccis inlra lacimas cal)cit loclutit interfoliareu; calynb. 10-Wi'nialis. j — Pedunculi el caljces pilosi, legmeniu lineanbu» Corolla alba cal)n» magmludine Bacca funca pi»iformi«. — In nemonbut l'cru^ur.
210. S. BIFORVIFOLII U Hi. el Pa«. I. c 32. I. 101 hg a Dunal I r '20 - G. Don I. c. no. 101. — Caulr nuffruticoso fle\uoso, foil, grminis otilun^o-lanreola-Ut(oiinon orbiculan; prijonculn inierfoliarcn, cal)nl» drcrmdrniaiift; bacci* a fteipnenuit eal)ciDi« inrlu«i«. %> — Prdunculi plrrumque gemini, |rd inlerdtim etiam 3-4-5 aggregaU. Catycit bltpidi deoiet elengaio-liBearei. Corolla purpu* ra<cffUi-violaeca. Bacca luetettjii-nibleoBda pififormU; — CreieM in Peruuae nrmonbut ad Cbioio
- 220 S. A(I' TrFOMIM Hi. ei Pat. 1. r. XI 1. 109. fig b Dunal I r .- (; Don I c no 101 - Caule tnffhitiefo fletuoto; foil. frmim« t. lernn lanceolatis;

pedunculis interfoltaceis; calycib. 10-d*ntalis. £> — Tula planla pilo*a. Folia ulrinq. lmpiduU deflexa. Corolla alba quinqueparliia. Dacca rolundata auran-tiaca. — Crebcil in Peruvia ad Munna.

Divlilo II. ACCLEATA. — Herbae Yet frolicei acnleali.

Beotio I. Foliis lotegris vel repandis vel sinuato-angulatis; peduncalis >el ra-cemis simplicibns subsimplicibusve.

§. 1. *Leprophora Dunal, Synops. 20.* — *Caule foliitque leproso-albi-cantibus; racemis laterulibus paucifloris; aculeis rectis accrotis,*

222. S. ELAEAGMFOLIUM Ca\ Icon, et descript. pi. III. 22. t. 243. - Dunal 1. c. — G. Don I. c. no. 193. — Nees ab Escnb. Nov. acl. acad. COPS. Leopold. Carol. XIX. Suppl. I. 388. - (Willd. Spec. plant. I. 1048.) - Caulc fruticoso; foil, discolonb. lanceolalis oblusis, infra lomenlosis, infcnonb. sinualis aculeatisq., supc-rionb. inlegris inermib.; pedunrulis laleralib. paucilloris. 6 — Caules semores aculeati, juniores inermes. Aculei breves. Folia infra alba, supra luti'scenii-viridia. Calyx 5-fldu«. Corolla coerulea magna, exlus tomenlo pulveracco sicut ceterac planiae paries, tecia. Bacca globosa lutea glabra pisiformi*. Folia ill is *Elaeagni anguttifolii* simillima. — 5. *saponaceum* Hook. Bol. Magai. I. 2007. — *S. dealbatum* Lindl. Transact. of the horlic. soc. VII. 52. - G. Don I. c. no. KM — 5. *leprotum* Ortega, Decad. plant. IX. 115? — Roem. et SchulU Syst. \egel. IV. 614. — Dunal 1. c. 26. — G. Don I. c. no. 19}.* — *S. uniflorum* Mcjen mss. - Crescit in Chili (ad Copiapo).

£23. S. OBTUSIFOLIUM Dunal I. e. 20. (ed. 2. InedIL I. 110.) - H. B. Etb Nov. gen. el spec. pi. 111. 40. — Ktb. Synops. pi. aequln. II. 172. — G. Don I. e. no. 106. — Fruiculosum: ratnit aculeatis foliisq. argenteo-lomenlosis solliariis oblongU ob-lusis sinualo-ropandis, sublu^ in nervo aculeatis; pedunculu latrralib. eolitams billons caljcbtj. aculcalis.) — Tomcnlum stellalum. Aculei lulci br<*>rs. Caçi 5-6-fulus. Corolla exlus lomenlo albo \eslita, inlus coerulea, magmtudine IIIUH *Potato?*, sogmentis oblongis acutiusculis. Stamina 5-6. Bacca incognita. - In regno Mexicano propc Regla et Tolonilco el Grande.

224. S. FLAVIDIM Torrcy, Ann. Lye. New York II. 227. - G. Don I. c. no. 107. - Suffrulosnm, undiq. tomenlo luteo dense tectum: ranis calyribq. aculcalis; foil, solliariis oblongis oblusis sinualo-repandis, superiorib. obsolete linuaix; race-mis opposinfoliis, plerumq. tHfloris. 5 — Caulis aculeis sitnplicibus sparsis ar-matus. Racemi ad ramorum apices. Segnenu calycina tubulata. Corolla magna, lobis triangulari-lanceolatis. — Crescll In America boreall.

§. 2. *Leprophorit affinia Dunal I. c.*

225. S. FIRTRACKIM R. Br. ProUr. fl. Nov. Iloll. 1. 44ft. (ed. X ab E 302.; - Du-nal I. c. — (M. Don I. c. no. 108. - Caule frutico»o; aculeis acerosis, foil. an^uMc lanceolalis intcgermms, supra parcc aculeatis inermibuik\c glabm lar\ib., i>ub-tus lomento»is cinereib; umbelli» laleralib. 2-4-lions »c»sihb.; cal^cib. iniTinibuk 6 — Crencii in No%a Ilollandia.

220. S. PARVIFOLIIT&t R. Br. I. e. - Dunal I. c. 27. - G. Don I. c. no. 100. - Caule fruhco>o; aruleis acerosis; foil. angusLalo-lanceolalia iniegerrimu pUnii, supra glabrih, par re aculcalis, aubloa IOOMOIOSIS ealycibq. ioermib.; usnb<lli> lateralib. 2-4-floris sessilibut. 6 — Creseil in Nova Ilollandia.

227. 8. ORBITXATLM Dunal I. c. 27. (cd. 2. inedit. t. 44.) - Polr. Eaeycl. mtih Suppl. III. 702. — G. Don I. c. no. 200 — Caule frulicoso aculealo; aculeu ace-rosis rubris; foil. suborbiculltis, otrloq. leproio-tomenlosii panis; flonb. gennm*

•; S. LEPHOSVM Ortega I. r. — *Caule (rutiroio; foil, discolonb , omtub stnuatis, utnnq. aruleahs, tubiu* ptlosts. pdunruht paun/lont, calynb aculrads » Tola vlanla tomrnlo bren ranesrcns (aults aculratut. Acula rvbirundo-lu-teicenlti calynn apirr intcrdum stcltato-pitntt. Corolla majna jinlltar cocru-tta, extus puh rruieMo-pubrsecnt Harm \ufra cerasiformig Ihffrrre Hcttur f S. elaeagnifolio fottts omnibus stnualis, ulrmque cum nmuii, pedumcuut <*. H/ttbusaut aculeaii. — CrpMnl m rkkh.*

- aut solitariis breviter pedunculatis. § -- Kami cinerascenti-lutci; aculei longi, ad basin tomentosi, uno in quovis petiolo. Folia subpeliolata inermia, infra laclea, supra cinerascenti-virentia. Pedunculi et calyces ferrugineo-lomentosi. — Crescit in Nova Hollandia.
228. S. STELLIGERUM R. Dr. I. c. 445. (ed. N. ab E. 301.) - Dunal I. c. - G. Don I. c. no. 201. — Caulis fruticosus; aculeis raris acerosis rectiusculis; Toll, integris subinermibus, supra glabris laevibus, sublus loraentosis cinereis; corymbis lalralibus. siibumbellatis simplicibus. subsessilibus; calycibus inermibus. 5 "- Flores pallide cocerulei. Fructus ruber. Tomentum stellatum.
- a. Aculeis caulinis leviter curvatis. — Caulis et rami tomentosi. Corolla pallide purpurea. Stamina aequalia. Bacca globosa. — *S. stelligerum* Sm. Exot. bot. II. 57. t. 88.
- £. Aculeis caulinis reclis. — (Dunal, Solan, cd. 2. inedit. t. 57.) — Folia infra ferrugineo-tomentosa. Corolla extus villosa, pallide cocerulea. Bacca globosa. — Crescit in Nova Hollandia interiori.
220. S. DISCOLOR R. Dr. I. c. - Dunal I. c. - G. Don I. c. no. 202. - Caulis fruticosus; aculeis selaceis reclis; foil, ellipticis subrepandis, supra glabris, sublus tomentosis cinereis calycibus. ioermibus; racemis lalralibus. nullifloris indivisis. 5 — Crescit in Nova Hollandia.
230. S. DIANTHOPHOIUM Dunal I. c. - G. Don I. c. no. 203. (falso adjecto auctore). — Subinermis: caulis aculeis paucissimis acerosis v. nullis obsilio; Toll, oblongo-ovalis inlepris tomentosis inermibus; pedunculis lalralibus. bifloris geminisve; calycibus. 5-fidis, segmentis acuminatis. 0 — Rami cum foliorum pagina inferiore tomento stellato ferrugineo-lutescente lecti. Folia saepe geminata, supra obscure virescentia. Calyx lanatus corolla longior; antherae violaceae. — *V. bilorum* R. Br. I. c. nee Lour. — Crescit in Nova Hollandia.
831. 8. ELLIPTICUM R. Br. I. c. — Dunal I. c. - G. Don I. c. no. 204. - Caulis fruticosus; aculeis reclis, basi lomentosis; foil, oblongo-ovalibus. obtusis integris, utrinque tomentosis calycibus. aculealis; pedunculis subtrifloris. b — Crescit in Nova Hollandia.
232. S. HORRIDUM Dunal I. c. 28. (cd. 2. inedit. t. 46.) - G. Don I. c. no. 205. - Caulis lerele piloso aculeato; foil, longe peliolalis ovalo-oblongis integris, utrinque villosis aculeatis; pedunculis unifloris aculealis. 6 — Poir. Enryrl. nrñlh. Suppl. III. 70J. — Tota planta pilis stellatis veslita est. Folia supra cinerascenti-virentia, infra laclea. Segmenta corollae acuta. Bacca globosa Cerasi magni forma. — Crescit in Nova Hollandia.
233. S. ECHINATUM R. Br. I. c. 447. (cd. N. ab E. 303.) Dunal I. c. - G. Don I. c. no. 200. — Caulis credo; aculeis selaceis reclis acerosis; foil, ovalo-oblongis integris inermibus, utrinque tomentosif; racemis oppositifoliis simplicibus; bacca sobquadriculata, a calyce echinato indusa. § — A plerisque Solanis duplici charactero rcedii. — Crescit in Nova Hollandia.
- 2W. S. RODSCHEIDII Meyer, Primit. flor. Essequeb. HI. - G. Don I. r. no. J07. - Caulis fruticosus; foil, oblongis sinuatis v. integris, basi subcordatis v. aiienuatis, sublus lomentosis aculealis; racemis lalralibus; calycibus. muliris. 5 — Tota planta, exreplis ramis adultis genitalibus. pilis stellatis veslita est Kami, prioli et folia aculeati. Aculei solitarii mmpressi lulei, ramcales curvati, reliqui rrecti. Segmenta calycina breviter obtusiuscula. Corolla violac<-i, cxlti* ciicycnjue tomentosa. Bacca cerasiformis. — Crescit in terra Essequebonensi Ammicanorum.
- S. 3. *Persicaria* Dunal I. r. 2S. — *Foliis integris repandisve angustis oblongo-lanceolatis; racemis simplicibus elonyatis ejtnifoliaceis; ptdicelli* secundis, floriferis erectis, fructiferis cernuis; corollis M-o-partitis.*
235. S. RACEMOSUM Jcq. Pl. Americ. 30. I. 35 (rd. picl. I 50.) — Linn. Mantiss. pi. 47. — Dunal I. c. — (i. Don I. c. no. 3W. - CJUIC inermis fruticosus; foil, lanceolatis undulatis repandis acutis; racemibus simplicibus. 5 Folia niida priolau, infra aculrala? Racemi foiorum longiludim*. Corolla alba, seementa profuoda

- oblongo-lanceolata. Bacca parva pisiformis. — Crescit in insula Marlimca et in Surinam ad montium declivitates.
296. *S. IGINEUM* Linn. Spec. plant. 270. — Jcq. Hort. Vindob. 1.14. — Dunal, Solan. monogr. 182. t. 2. fig a., Synops. gen. Sol. 28. — G. Don 1. c. no. 200. — Caulis fruticosus; Toll, lanceolatis acuminatis, basi ulrinque revolutis, corollis quinquepartitis. 5 — Frutex interdum aculeatus, interdum inermis. Folia ulrinque, sed praecipue subius villis stellatis scissila. Aculei longi recti subulali colore ignicolutescenti. Corolla alba v. purpurascens, segmentis longis angustis* reflexis. Bacca rubra cerasiformis c\ Poir. j \. pisiformis (ex Jcq) — Burm. Americ. 241. t. 245 fig. 1 - Sloane, n. Jamaica. I Jd t 11 fig. 3 - Pluken. Almag. a^p0, Phytogr. 1.225. fig. 5. — *Solanum fr ulicoium laun folia aculcalum* Plum (al 4. — Crescit in insula Canbacia et in Guiana.
- fr. parvifolium* Vahl, Eclog. I. 23. - Differ! habitu, caule rarissime gracilibus, foliis minime rainusque acuminatis, aculeis duplo triplicem longioribus — Crescit in insula Sli Crucis.
237. *S. SUBARMATUM* Willd. Enum. pi. hort. Berol. 240. - Dunal I. c. 28. - G Don 1. c. 425. no. 210. — Caulis fruticosus subaculeatus; Toll, lanceolatis, subius subpubescentibus integerrimis, ad basin ulrinque revolutis; racemis simplicibus extrafoliatis*. 5 - Caulis fruticosus orgialis et ultra, quandoque parce aculeatus, ramis terribus, junonibus stellato-pubescentibus. Folia lanceolata bipollicana et longiora integerrima peliolata, supra glabra, subius pilis raris stellatis obsita, basi ulrinque revoluta, costa media interdum aculeo unico tubus armata. Racemi simplices stricti pedunculati pollicares extrafoliati. Flores albi. Laciniae corollae lanceolatae. — 5. *Bahamense* Hortor. — Crescit.7
238. *S. PERSICAEFOLIUM* Dunal, Gen. Solan. monogr. 185., Synops. 28. - G Don I. c. no. 211 — Caulis fruticosus, Toll, oblongo-lanceolatis angustis, racemis simplicibus, corollis quinquefidis. 5 — Caulis scaber inermis Folia infra in costa media aculeata. Calyx inermis. Bacca globosa nuda. — Differ! a *S. tigneo* foliis angustioribus. — Burm. Americ. 240. I. 244. — Crescit in insula Canbacia.
230. *S. BAHAMENSE* Linn. Spec. plant. 270. - Dill. Hort. Ellh. 203. I. 271. fig. 250. — Dunal, Synops. Solan. 28. — G. Don 1. c. no. 212. — Caulis fruticosus; foliis lanceolatis repandis v. sinuatis obtusis, margine reflexis; corollis quinquepartitis 5 — Caulis et folia villosa aculeata. Aculei brunnei recti. Corolla coerulescenti-purpurea, segmentis angustis reflexis. Bacca pisiformis lutescens. At One dicitur *S. polyacantho*, sed differt foliis latioribus flonibusque racemosis non loliatis. — *S. fruticosum* Mill. Di I. no. 18. — Sloane, Hist. Jam. I. 230. t. 143. — Crescit in ProMdonre, una insularum Bahamensium.
240. 6. (*RA* IIII OKI M Dunal I. c. 20. (ed. 2. inedil. 1.47.) - G. Don I. c. no. 211 — Ramis glaberrimis aruleatis, aruleis subrectis; foliis obovato-oblongis, basi inaequalibus sinuatis, ulrinque aruleatis pilosiusculis, pilis minutissimis distantibus, racemis brevibus cymosis-umbellatis. — Aculei lutescentes, apice indurati floresque graciles. Calyx panis quinquefidus. — Crescit in insula Jamaica
241. *S. Deltoides* Gaudich. in Frejcin. Voyage bot. 44M I. 58 ex Pr^o Report, bot. syst. I IK) - G Don 1. c. no. 214. — Frutescens: ramis ellipticis acutis, basi in peliolum decurrentibus integerrimis glabris, nervo medio subius cum petiolo ramulisque spinosis, flonibus cymosis *truncatis*; calycibus glabris, lobis breviter ovalibus aculis subaequalibus; corollis ixierne puberulis - lomentosis, lacinis ovato-lanceolatis; baccis globosis. 5 — Crescit in insula Pisang Moluccarum
242. *S. MOLLE* Dunal I. r. 28. - II. B. Kth. No. gen. et spec. pi. III. 40 Kth Synops. pl. ml. quinn II 172. - G. Don I. c. 21* — Caulis suffruticosus aculeatus, ramis mermin foliis subtus inaequalibus, supra cymosis-pubescentibus solitaris oblongis acuminatis sinuatis, nervo - obtusis aruleatis, ramis ubi oppositifolius subdichotomis calycibus *truncatis* — *ru* reus *IUM* Puberulis stellatis. Corolla alba, exius piloso-tomentosa Barra rotundata *indica* et albo-variegata. Crescit in provincia Caracasana

- §. 4. *Polygama* G. Don I. c. 423. — *Pedunculis brevibus unifloris (lores hermaphroditos gerentibus; floribus masculis racemosis parvis.*
243. S. POLYACANTHUM Lam. Illusr. gener. 2377. - Poir. Diet. IV. 304. - Dunal I. c. 29. — G. Don I. c. no. 216. — (Vahl, Eclog. I. 24.) — Aculeatissimum: aculeis acicularib.; foil, lineari-lanceolalis subsessilib. oblusis, utrinq. villosis; pedunculis axillarib. unifloris. § — Villi stellati lutescentes. Aculei recti, apicem versus brunneo-lutescenti. Corolla parva alba, segmentis linearibus, extus villosis. Bacca globosa glabra nitida, seminis *Coriandri sativi* roagnitudine. — *S. parviflorum* Gav. Icon, et descript. pi. III. 19. t. 230. — Burm. Americ. 218. (. 224. fig. 1. (excl. syn. Linn, et Dill.) — Crescit in insula Sli. Dominici.
244. S. MICROPHYLLUM Dunal, Monogr. Solan. 187., Synops. 29. — G. Don I. c. no. 217. — Caule ramoso; Toll, parvis ovatis integris lomentellis; florib. quadrididis telrandris. 6 — Habitus *S. lycioidis*. Aculei aciculares subsolilarii ad ramorum basin inlerdnm gemini r. intrafoliacei. Folia illornm *Thymi tulgaris* magnitudine v. majora, acola v. obtusa. Pedunculi extrafolii brevisissimi solitarii >. gemini. Corollae segmenta linearia. — *Aquartia microphylla* Lam Illusr. gener. 1604. (. 82. fig. 2. — Poir. Eocycl. mèih. Suppl. I. 410. — Crescit in insulis Caribaeis.
245. S. AQUARTIA Dunal I. c. c. — G. Don I. c. no. 218. — Caule ramoso aculeato; foil. lobovatis oblusis inlogris tomentosis; florib. quadrididis telrandris. 5 — Rami aculeis laevibus subulatis armati, slatu juvenili plerumque subinermes. Pedunculi laterales uniflori brevissimi. Calyx tomentosus, segmentis inaequalibus. Corolla alba, exclus tomentosa, segmentis linearibus oblusiusculis. Bacca globosa lutea nitida, pisi minoris magnitudine. — *Aquartia tomentosa* Lam. Illusr. gen. 1003. I. 82. fig. I. — *Aquartia aculeata* Jcq. Americ. I. 15. — Crescit in insula Sti. Dominici ad sium Bayaba in rapibai fralicotii marilimis.
- M0. S. CROTONOIDES Lam. Illustr. gen. 8333. - Poir. Diet IV. 300. - Dunal I. c. 188. I. 13., Synops. 29. — G. Don I. c. no. 219. — Caule fruticoso; foil. di-colorib. elliptico-lanceolalis, supra glabris, subtus tomentosus inermis; rarcimis brevis; florib. quadrididis telrandris. 5 — Rami lomentosi, apicem inclusus ferrugini. Aculei aciculares pauci recti. Pedunculi laterales ferrugineo-tomentosi, apice furcati et cymosi. Corollae segmenta linearia. — Crescit in insulis Caribaeis.
217. S. RETICILATUM Dunal, Synops. 29. (ed. 2. ineditum t. 4.) - G. Don I. c. no. 220. — Ramis apice lomentosis pulverulentis; foil, ovalo-lanceolatis* inaequalibus, supra glaberrimis reticulatis, Miblus venosis leproso-lanceolatis; pedunculis* unifloris. j? — Habilis *S. crotonoidis*. Varietas inermis et aculeata. Bacca globosa mucronata. — Crescit in insula Sli. Dominici.
248. S. POLYGAMUM Vahl, Symbol, bot. III. 39. 1. 55. - Dunal I. c. 30. (ed. 8. ineditum L 49) — G. Don I. c. 416. no. 821. — Caule fruticoso; foil, ovalo-oblongis subintegris, supra aculeis, subtus lomentosis. 6 — Rami cum foliorum pagina inferiori et pedunculis ferrugineo-tomentosi. Aculei recti rubicundo-lutei. Folia basi subcordata inaequalia 2-3-pollicaria. Flores paniculati. Calyx cum corolla inclusus tomentosus 4-5-partitus. Stamina 4-5-na. Planta polygama: floribus masculis racemosis, hermaphroditis solitariis. — Crescit in insula Sli. Crucis.
249. S. INTEGRIFOLIUM Poir. Did. IV. 301. - Dunal, Gener. Solan, monogr. 189. - G. Don I. c. no. 222. — Caule fruticoso; foil, ovatis subrepandis, infra lomentellis; umbellis axillaribus. ^ — Caulis aculeatus pilosus. Folia integerrima, inlrdum aggregata, supra glaberrima, aculeis pilisque hinc inde denticatis obtusa, aculeis parvis parvis. Capi «illo» quinque-dentatus. Corolla parva alba. Bacca lutea. Crescit in insula Sli. Maunlii.
- f. 5. *Kriophytla* Dunal, Synops. Solan. 30. — *Foliis repandis angulatis tinuatisvt, utrinque lanuginosis; pedunculis solitariis multi/loris aut aggregatis unifloris brevibus; floribus parvis.*
830. S. HIRTUM Vahl, Symbol. bot. U. 40 t. 21. - Dunal I. c. - G. Don I. f. no. 853 Caule fruticoso; foil, cordatis inaequalibus tomentosis aculeatis; pedunculis

- aggregate lateralibus. calycibus pilosis. § — Aculei pediculi aciculares. Canaliculi apicem versus tomentosus. Folia palmata, subtus albescens. Pedunculi suprafoliacei uniflori. Calyx corollae exclusi pilosus, corollae segmentis minus quatuor reliqua duo longioribus. — Crescit in insula Trinidatis.
251. *S. CORDIFOLIUM* Dunal I. c. (ed. 2. inedit. t. 135.) — Poir. Encycl. méth. Suppl. III. 764. — G. Don I. c. no. 224. — Caule piloso aculeato; foliis longe petiolatis cordatis angulato-repandis, utrinque villosis inermibus, racemis simplicibus lateralibus. 6 — Tota planta pilis stellatis simplicibus mollibus ferrugineis resissa. Folia basi aequalia; corollae segmenta aequalia — Differt a specie praecedente foliis inaequalibus, racemis simplicibus corollisque regularibus. — In Brasilia ad urbem Rio de Janeiro crescit.
252. *S. ERIOPHYLLUM* Dunal I. c. (ed. 2. inedit. t. 50) — G. Don I. c. no. 225. — Ramis albo-tomentosis aculeatis; foliis utrinque albo-tomentosis ovatis sinuatis obtusis breviter petiolatis; calycibus lanatis subcampanulatis. 6 — Aculei pariter graciles. Calycis segmenta oblusa, rarius aculeata. Corolla coerulea pentagona, exclusi villosa. Bacca globosa. — *S. lappaceum* Poir. Encycl. méth. Suppl. III. 704. — In Nova Hollandia crescit.
253. *S. TOMENTOSUM* Linn. Spec. plant. (1. edit.) 188. (2. edit.) 260. — Aubl. Plant. Guian. I. 20 — Sabb. Hort. Rom. II. t. 53. — Triumph. Praelect. 40. I. 0. — Docc. Sicul. 8. t. 5. — Pluk. Almag. 351., Phytogr. t. 316. fig. 2? — Dunal I. c. 30. — G. Don I. c. no. 220. — Caule fruticoso aculeato; aculeis acerosis; foliis cordatis subrepandis undulatis, utrinque dense tomentosis, partibus plantae lenioribus. Purpurascens pulverulentis. 6 — Tota planta lomentosa virescens luteo-vestita. Folia plerumque irripollicaria, pollicem latio, interdum inaequalia, interdum infra aculeata. Racemi petiolo breviores, demum nudi. Corolla coerulea-violacea. Bacca subglobosa, junior lomentosa, maturata lobata, sordide aurantiaca (sordide aurantiaca). — Crescit in America boreali, Aethiopia, Persia et in Protonotario bonae spei.
254. *S. HIBIUDIM* Jrq. Hort. Vindob. II. L. 113. — Dunal I. c. — G. Don I. c. no. 227. — Caule fruticoso aculeato; foliis ovatis subinermibus. repandis acutis, lenioribus. dorso margineque violaceo-purpureis. 6 — Folia repando-angulata pallide undulata, basi aequalia. Pedunculi violaceo-roseo-umbellati. alii unguiculati. Corolla pallide coerulea, segmentis 5-10-nerviis, nonnullis Menibus. Bacca rotunda depressa aarantia pendula. Aculei rigidi recti v. recurvi, in foliis nonnumquam deflexi. — Forte nonnulli praecedentis varietates. — Crescit in Guinea.
255. *S. CORCINUM* Jcq. Miscellan. II. 230., Leon rar. I. t. 43. — Dunal I. c. 31. — G. Don I. c. no. 228. — Caule fruticoso aculeato; foliis ovatis tobrordatis repandis tomentosis, baccis aurantiacis. 5 — ACUM pediculi subulali brunnei. Folia India, in medio pediculi nonnumquam aculeata. Racemi oppositifolii simpliciter tomentosi. Corolla alba. segmenta calycina ovato-lanceolata acuta. Bacca peltiformis primum rubra, demum glandulosa alba (ex Jacq. — Valde affinis *S. tomentoso*, sed omnibus partibus minus nee adeo lomentosa. — *S. tomentum* f. *coactum* Willd. Spec. plant. I. 1045. — Pers. Enchirid. I. 228. — Crescit ...»
256. *S. BREMPIUM* Dunal, Monogr. Solan. I. t. 31. — G. Don I. c. no. 229. — Caule fruticoso; foliis getnatis sessilibus obtuse angulatis, utrinque tomentosis; calycibus quinquepartitis. 6 — Differt haec species a *S. Jmmmicenn* pediculis, pedicellis calycibusque inermibus, calycibus quinquepartitis nee quinque-dentalibus. Omnes partes vestitae sunt tomento stellato. Folia utrinque lutescenti-ferrugineo-tomentosa, saepe inermia. — Crescit in insulis Indiae occidentalis Sili Thomae et Portonco
257. *S. JAMAICAENSIS* Flor. Ind. occid. I. 44 — Dunal I. c. 191, v. n. 31 — G. Don I. c. no. 230 — (caule fruticoso, foliis geminis cuneatis, medio latioribus obtuse angulatis, utrinque cum rhabdibus calycibus lomentosis, ralicibus quinque-dentalibus; aculis reflexis. 6 — Caulis et foliorum nervi mediani subtas eximie

- aculcati Racemi laterale* folio nullo brior» simplicis multifloro, pedicellis subnatis. Corolla parva pallide coerulea * alba, seumctis reflexis extus lomentosis. Bacca rotundata, malura nigra. — In Jamaica et in Ili»pamola
- 25* S TOXICARIA Lam. Did. III. J09. — Dunal, Monogr. Solan. 103 (ed. 2. ined. I 50) — Dunal, s>no) s>ldii 31. — G. Don I. c. no. All < diile fruticoso aculeato folio lobato-angulo»i» lomentosis, basi obliquis cmarginatis, aculcis ulnq. sparsis, racemis sos^ilib, lacinn* corollae sublanccolalo o — Vulci caulim >alidi recum. Folia plerumq. geminata Pedunculi, pedicelli, rhaecis corollaeque pagina externa tomento stellato vestiti ul chain inferior fohorum pagina. — S. *Junpeba poslenoi* Pis. Urajil. I 41 ? — Crescit in (jiiiani
- 259 & (INKIFOLIUM Dunal, Monogr. Solan. 103. t. 22., S>nops. 31. — G. Don I c no. 2J2. — Caulis fruticosus, Toll geminali» longis cuncalis, apicem versus sinuato-angulalis, angulis atuli;> lel mlerdum obtusis folnsq. indo subinlegris; racemis brevibus. o — Tota planta tomento stellato ferrugineo (ccla osl. Kami foliorumque rostrae mediae ad basin aculcati, aculcis validis reflexis, basi tomento. Folia inaequalia, maxima 4-5-pollicana, minora 2-3-pollirana Pedicelli pedunculo longiores graciles. Flores pam. Segmenta caehona longe subulata aculeata. Corolla alba 5-fida. Bacca globosa rubicundo-lulca S *croreum* Dunal, Monogr. Solan. 241. — S. *ilubtum* Dunal I. c. 240 — S *Jamatcense* Mill. Diet, no 71. — Sloan. Hist. Jaroaic. 230. I. 144. fig. 3 — Pluken. Ph>ogr t 226 — Crescit in fa>«^nnc.
- 200 s HFJKKOTRK IH >I Dunal, >olan monogr 102 t 20, *)>nops J|. - <i Don I c no 2JJ — (aulc tomrntnsn, foil gcmnis scssilib olah<» siihingul.itiH, pihs stellato tomentoMs, ncrli» bullalis, bullis pilis Minplicilnis obsiis » Hami pilis longis \cr>us apicrni stellatis lull N» ditibus \t*«ini. Arulei graciles recurvi l-olia infra lulcscentia, supra ferruginiMsa, nerli» infra aruleolis paucis obstitis Raceroi breves simplires roulliflori cum calycibus corollaeque pagina exteriori tomento stellato ^eslilii. Segments cal)Cina linean-Innceolala lon«.i i omlla quinquepartita, segments lineanbun. Bacca globoa. In tmciira impK i
- 261 s VULI DEM>WIAM M G Don I c. no. 2J4. — Tomenlosuni ,ul> fruiK(<o aculcato. foil, geminati!! angulalis cunealis*; umbelli» extrafoliacrin si'itihli . pr-diuuiliH cal)ctbq hispidis o — S *runetfolium* ^illd njss m ll«rn> «i sdiull S\.] \rgcl. I\ . Oii nrc Dunal. — Crescit in Porlonco.

§. f. *Mtcracantha* Dunal, *Synops. Solan.* .II. — (aule fntunso aculeata, aculets pan is brnibus recurvis; folus lautnlati* mtu/in \$eu stnuato- anyulutis, neno media suit us aculcato \ i arums stmphabu* cymosis crtruasillanbus.

202. s niPKI)IK>s Heinm sjllogr Kuisb II |(rl ,^L - toll *.>l.larn» elliptin* acuminalu, undique »tellilo-pilo»i«, supra inrrroib, nubius in nrr\ u incdio arulcain, racenis simplicib. rslrafoliaceii Inennibu* j* ^ (resni in Brasilia
- 201 s s(\BRIM \abl,Eclog. I 21. - Dunal I r n| .» iirrtM I 1Jl || R Kill N> gen et spec plant Americ 111.41 Kill Muops pl. iui mjuu II l\ (• Don I c no 235 — Fruticosum ranu« flrxuosis aruleah* glabns fill suMorms oblongi* aculis «inuato-angulati», supra sirllulalo-pulM srrnhb, subius sirllulJto-pilosis mqr nrc<> amlejlis, prdunrulis Ijlr.ilih pluriflorii nhubq arulrilis > \ruln < irsi rciur^i lutsrrnrts (,i\ \ itiniijui lidtis «nrn||.i alba, cxlui Inmrnlosj, scgmcnti* Liuri «! it • - Imrjril»u* I Ijin |>u>i kl l>«*«i S *adharrms* ^illd Rrlig ex Rorm el Srhull >)sl \«Vi I I \rt (nonq ad ^n Juan (arara^annruin
- 204 H HKThRorim I MI I am lilmr uam r no lhO. pair Dui \ MI Dunal I c H. fd i inc.M t ul (. Dun I r no ilb (ml.- fruticoso .iriilrato, full lrrm« inaiqtiAlib, *upr« *rabrm, »ubln« lonirnr|h% rirnn s > h<ih<| mi r mi bus > Arulei »ahdi subrrrum. K«ilu mi^ni «! iii»i« |ol>at*, nir^o inrdio arulratj I'r«lir« III tl ral\rrs tillosi *r^nn till iih(ni.i «»).in ob-lusa I «ir«>lh mauni ba% m us<n< IM » gmenn hnr 'jlo-Imraru olitu» pvtu»

- Pcdunculi fructiferi reflexi. Bacca rolandala pisiformis. *S. acanthifolium* Ilorl. — Crescil in Guiana.
265. *S. ATRENSE* Dunal I. c. 32. (ed. 2. inedil. t. 122.) — II. B. Klh. I. c. 41. - Kth. 1. c. — G. Don 1. c. no. 237. — Fruticosum: ramis aculeatis leniuter forruginco-tomentosis; foil, geminalis elliptico-oblongis acuminatis intpgerrimis, supra stellulato-hirtilis, sublus stellulato-pilosis, nervo medio calycibq. aculeatis; racemis extraaxillarib. simplicib. inermibus. 5 — Aculci compresso-conici subulali, apicc recurvi nitidi. Folia magnitudine inaequalia, supra virentia, subtus fusca sexpollinaria. Uacmi cum calycibus el corollae pagina exteriori lomenlo ferrugineo veslili. Calices aculcali. — Crescil ad ripam fluvii Orinoci ad cataractam Alurensium.
266. *S. NEMORENSE* Dunal, Solan, monogr. 104. - Synops. 32. - G. Don 1. c. no. 238. — Caulis fruticoso scandente; foil, petiolatis geminalis inaequalib., majori oblongo sinuato-angulato, minori ovato lanceolato inlegerrimo; racemis liliformib. longissimis. 6[^] — Rami angulati aculeati, aculei parvi recurvi luiscensio*. Folia subsessilio, dorso aculeata. Pcdunculi aculeati, fructiferi penduli. Calyx parvus. Corolla coerulea. Bacca ovato-globosa Pyri minoris magnitudine aureo-luiscens. — *S. lacinalum* Ri. el Pav. Flor. Peruv. II. V). t. 177. fig. a. — Pers. Enrhrid. I. 228. (nec Ail.) — In Peruvia ad Cbincau el Cuchero.
207. *S. VOLIBILE* Swrtz. Flor. Ind. occid. 1. 4W. — Pert. Enchirid. 1. 220. (oxri. syn. Lam. et Jcq.) — Dunal I. C. — G. Don 1. c. no. 230. — Caulis fruticoso scandente (volubili?); foil, angulatis, margine denticulatis; racemib. lateralib.; calycib. aculeatis. 5 v/ v. r | — Caulis aculeatus; ramis terilibus. Folia 3-4-pollicaria v. spiihamaca ovato-lanceolata, supra scabra, infra pilis ferruginis* hispida, petiolis nervisq. modicis aculeatis, aculeis paucis recurvis. Calyx quinquepartitus, pubescentia ferruginea inclusus arulpalus, s' - ^menlis reflexis. Corolla mamia coenociscimica. 'i-parvula, ciliis lomonosis, seginentis longis. Bacca umbilical*. — *S. scandens** Swrtz. Prodi. II. Ind. occid. 47. (nec Linn.) — Plum. mss. 1. 4. lit. M. VJ. Aubl. (iuan. 1. 217? — In sylvis insulae Hispaniolae.
208. *S. LAXIFOLIUM* Jcq. Icon. pi. rar. II. t. 320., Collect. bot. II. 2[^] - Dunal I. c. — (1. Don I. c. no. 240. — Caulis fruticoso scandente; foil, graminis lanceolato-oblongis, utrinq. alternatis scabrellis*, petiolis natisq. medianis minutis oculcatis; racemib. brevib. inermibus. 4, W - . Rami sarmentosi iridis natis rum caule foliisq. utrinq. subvilloti, pili obsoleti stellati. "Folia magnitudine inaequalia 4-8-pollicaria, inflorescentia integra, lobata sinuato-angulata, supra nitida, sublus pallida diurna. Arum solitarii Y. geminis lutescentibus parvis recurvis. Rami cum ralyis rorollisq. pagina exteriori tubvilloti. Pedicelli cymoni approximati. 4 - ^ - pnrlilus, segmentis subulatis*. Corolla 4-5-partita, Kegmritu laeolatis aculis. Andicrao 4-5 linear. . . V. sarmentatum Linn. Illustr. g. M. K. T. no. 23K5. — Poir. Did. IV. 107. exrl. (syn. Swrtz.) — In America impira. . - V. tetrandrum: Floribus intrametricis tetrandri. — *S. (Iruosum* Valil, Hrkos. 1. 11. — In Cayenne.
200. *S. VEXILLIFOLIUM* Dunal I. c. 32. (ed. 2. inedil. I. 123.) - G. Don I. c. 42S. no. 241. — Ramis sramicilib. pilosis aculeatis; foil, inferiorib. solitariis, superiorib. geminatis ovato-ellipticis* angulatis subsinuatis, utrinq. piloso-scabriusculis; nervo medio aculeatis; racemis simplicibus inermibus. W? — Crescil. . . . ?
270. *S. BRACHYACANTHUM* Dunal I. c. (ed. 2. iotdil. t. 124.) - n. B. Kib. I. r. 42. — Klh. I. c. — G. Don I. c. no. 942. — Arboreum: ramis aculeatis, ramulis inermibus; foil, geminis ellipticis*, utrinq. aculis inlegerrimis, supra sublus lomi'nilosis in fusciscenti-infinis inqum nervo medio arulcatis. racemib. l;itcrilib. simplicib.; pt-diculis calycibq. aculrali. S - Pubi'rrnli. v | *IMMUTUM* Mollitiim. Arulri bir'rs recuni. Pedirt-ili | >UJH Mtiili («'iales c. il'ri*si). .M' ilcoUili. Raremi, rorollae p.icia exterior rahrscj. pilntn-tomi'Mlnti. r. i | \ iitiuqurparlilus, setsmonlis obovalis cuspidalis cohacridbus. Curulli . ' » - j » nhl: i, *rnmcln linearis-oblongis aculis, magnitudine illurum *Otmh* <> < j < ih luti. — Differ! a *S.*

- mürncanlho* Lam. foliis subtus tomentosis, pedicellis calycibq. aculeatis. — In (Icr)miac montis Cocollar in Andalusia.
271. S. MICRACANTHUM Lam. Illustr. gener. no. 2382. — Poir. Dict. IV. 306. - Dunal I. c. — G. Don I. c. no. 243. — Caulc fruticoso; Toll. ovalo-lanceolatis acuminatis, sublu» tomentosis; aculeis parvis paucis recurvis; racemis brevibus. \$ — Rami villosuli, apicem versus tomentosi. Pubescentia stellata. Folia supra viridia, pilis stellatis sraebrida, infra cum petiolis, pedunculis ei corollae calycisq. patina exteriori tomentosa. Rami, petioli foliorumq. nervi mediam infra aculeati, aculeis interdum geminis. Racemi laterales, pedicellis cymosis. Calyx quinque-dentatus, corollis profunde quinquefidis. — Guadeloupe, Brasilia, Cayenne.
272. S. JISSIETI Dunal I. c. 33. (ed. 2. inedil. I. 52.) — Poir. Encycl. méth. Suppl. III. 707. — G. Don I. r. no. 244. — Caulc arulealo; foil, solitariis ovalo-lanceolatis, supra glabrioribus inermibus, sublus tomentosis, nervo medio aculeatis; racemis simplicibus cymosis, petiolos eicidentibus. 6 — Aculei breves recuni. Pubescentia (v. tomenium) stellata. Pedunculi, pedicelli et calyces lanati. Calyx 3-dentatus. Corolla profunde quinquefida, segmentis ovato-lanceolatis. Ovarium tomentoso-puberulum. — In Brasilia ad Rio de Janeiro.
271. S. J A VITESSE H. B. Elh. I. c. 42. — Klh. I. c. — G. Don I. c. no. 241. - Fruticosum: ramis aculeatis, ramulis tenuissimis cano-tomentosis; Toll. solitariis longitudinalibus aculeatis integerrimis, utrinque stellato-puberulis, sublus in nervo subaculeatis; racemis lateralibus simplicibus; pedicellis calycibq. inermibus*. 5 — Tomonii pili stellati. Aculei conici, apice recurvi lutescentes. Pedicelli unilateralis cum ciliis pubescentibus. Calyx quinquepartitus, segmentis subobovatis cuspidatis. Stamina et corolla illis *S. bnrthyanthi* similia. — Differetia 5. *Jutsirui* Dun., cut simillimum, foil, breviter petiolatis integris oblongis, utrinque tenuissime pubescentibus, saepe inermibus, nervo medio sobaculeato, aculeis, racemis flo* ribq. minoribus. — *S. montekopki* Umm Dunal, Syoopa. Solan. 33. (ed. 2. inedil. t. 124.) — In ripa Omlnom Orinoei et Tuamlo prope Carichana et Jaïla.
274. S. IMBROSUM Dunal I. f. (ed. 2. inedil. I. 120.) - II. D. klh. I. c. 43. - Klh. I. r. 174. — G. Don I. c. no. 242 — Fruticosum scandens: ramis aculeatis foliisque sublus tomentosis et tomentosis, supra villosis-pilosis, solitariis aut geminatis oblongis acuminatis integerrimis; racemis extraaxillaribus bifidis, pedunculo nervo aculeatis; pedicellis calycibq. inermibus. 5w — pili simpliciter ubercentia stellati. Aculei sparsi subquadrati pili lenticulati, recunati-recurvi. Pedicelli unilaterales. Calyx villosus quinquepartitus, segmentis obcordatis rotundatis. Corolla exclusis pili* stellatis hirsuta, segmentis linearibus acutiusculis. — In Nova Andalusia prope Cumanacoa.
275. S. JIRIPEBA Rich, in Art. Soc. hist. nat. Paris. 107. — Poir. I. r. — Dunal, Monogr. Solan. It*. U 15. — Dunal, Syoopa. Solan. 33. — B. B. Kir. I. c. — Kir. I. r. — G. Don I. c. no. M. — Fruticosum: ramis aculeatis pitho-rutit; foil, solitariis rotundatis-oblongis acutis integerrimis, utrinque stellatis-pilosis, sublus in nervo aculeatis, superioribus geminatis; racemis lateralibus terminatis. Pubescentia pilis stellatis. Folia bilobis cuneatis. Flore unilobata. Corolla violacea (ex Bonpl.) v. purpurea et Plum.¹, inu* alba. Aculei ramorum rerum atque nervi medii foliorum rerti. Calyx quinquelobus, lobis mucronatis. Corollae quinquepartitae segmentum unum lineare. — *S. obscurum* Vahl, Simb. boian. 41. — Willd. Spec. plant I* 1040. — *Juriptha prior* Poir., Rratil. IV. cap. 41. — *J. Folium* minui pilosum. — 5. *ligusticum* Willd. Rehg. in Roem. et Schull. M. d. veici. |V. QM — Plum. mM* I 4. Ag. 32. — Crete in mtula Pararumae et jutta caiaraciam Aiurentium In ripa fluminis Orinort.
270. S. RIBES; OHTI Vahl. F.elog II. 17. t IX - Duval, 8)nop. 3X - G. Don I. r. no. 244. - Fniicotum, undique lomenio ferrugineo lumen: aculeis recunatis; foil, ellipticis ovatis lorigerrimis, supra glabris, »ublu« lomenio»; ry* mi« lerminalibus*. j — Bami petioli foliorumq. nervi medii sublus aculeati. Folia



- 3-4-pollicana, supra obscure viridia. Pedunculi bifidi, pedicellus proincurvis reflexis. Calyx quinquefidus, segmentis linearibus lanceolatis. Corollae quinquefidae segmenla tubulosa. — In Cayenne.
277. S. VELITIMM Dunal I. c. (ed. 2. inedil. t. 53.) — G. Don I. c. no. 249 — Caulis fruticoso scandente (?) lomenoso; foliis, ovalo-oblongis, basi inaequalibus acutis, lomento senceo vevillibus, sublus parce aculeatis; racemis terminalibus paucifloris. — Differt a 5. *rubiginoto* foliis utrinque senecis, pills simplicibus luteis. Aculei breves recurvi. Folia supra lutescenti-vindia, sublus pallidiora Raccmi villosa. Segmenla calycina oblonga acula corollaque exclus villosa. — In Cayenne crescit.
278. S. CORIACEUM Dunal, Solan. monogr. 107 t. 14, Synops. 33. (nec nook) — G. Don I. c. no. 250. — Fruticosum scandens foliis lanceolato-ellipticis aculis glabris; racemis lateralibus simplicibus folia aequantibus. — Rami teretes siraulcum folis junionibus pedunculis pedicellisque pulverulenti. Folia interdum terminalia breviter petiolata quadripollicana conacca, interdum nervo medio auxiliata. Aculei breves recurvi. Pedunculi interdum bifidi, pedicellis secundis. Corolla magna coerulea. Calyx coriaceus quiquefidus, dentibus rotundatis mucronatis. Stigma bilobum. — Cayenne.
- Sectio II. SDBIEMIA Doal I. 6. 84.
- Caulis basi aculeatus; foliis sinuato-angulatis integris; racemis multiparvis, pedicellis cymosis; Oribus pluribus abortivis, in flore fertili stylus antheris longior, in flore sterili stylus longior filamentoroni. Corollae 4-5-4-fidat angulato-plicatis; baculis quadrilocularibus.
279. S. DASYPHYLLUM Thono. Kongi. Dansk. Vidensk. Selsk. «Afhandl. IV. 140. t — Subberbaccum, subaculeatum: foliis late cuneatis angulato-lobatis birsulis calycibus aculeatis; raceme oppositifoliis paucifloris. 2l. — In Guinea.
990. S. AOMALIM Thonn. I. c. t - Caulis suffruticoso aculeatus; foliis lanceolato-ovalis repandis subaculeatis; umbellis pedunculatis lateralibus bifidis; floribus leirandis. 5 — In Guinea.
991. S. AMOKMM Jngbn. Enum. gen. et spec. nov. pi. 18. no. 14 f — Caulis fruticoso cuireo laeti remio aculeatus; foliis, ovato-rotundatis, basi subsinuatis (ultrinq., sed sublus dense stellato-lomentosis, inferioribus pedicellis, profunde sinuato-dentatis ad petiolum nervumque aculeatis, superioribus plerumque mucronatis repando-angulatis Y. lobatis; corymbis axillaribus terminalibus; floribus niveis. — In insula Java.
282. S. VESTITUM Bib. in Mauod et neoslow, The Botanic Garden of Cambridge. U. I. W. t - Caulis fruticoso, foliis amplis ovatis angulato-imbriatis, ultrinq. raris aculeis uparvis rectis armatis ovatis pilis apice stellatis rufo-hirsutissimis; pedunculis lateralibus breviter racemosis; calycibus campanulatis birsutissimis laciniis brevibus ovatis, apice subrotundatis; corollis amplis profunde 5-7-fidis, exclus villosis. (> — In Mexico.
283. S. PYCNANTHEMUM Marl. Flora (B. Z.) XX. Bnbl. II. 1. — In insula Java. — Foliis ovatis aut ovato-oblongis acutis, inferne in nervo, timis ramulorum aculeatis, aculeis recurvis; corymbis terminalibus cum pedunculo incrementibus dense stellato-hirsutis-floribus compactis; laciniis corollae lanceolatis, ciliatis; cernis extrafoliaceis subdilatatis nulanlibus, baccis globosis. — In Brasilia in praeuripi ad Sebastianopolim.
284. S. ASTEROPHOBUM Mart. U. H. — Aculeatum, fruticosum, pubescentius adpersum: pedunculis oppositifoliis; caule fruticoso parce aculeato, aculeis recurvis, uli omnes paries pills stellatis adpressis parce adperso; foliis petiolatis oblongo-hembrhombicis subcuneatis, ample repando-dentatis; nervis et pedicellis passim aculeatis, corollae 5-partitae laciniis angustis, rariis stellato-tomentosis, cernis extrafoliaceis subdilatatis nulanlibus, baccis globosis. — In Brasilia in praeuripi ad Sebastianopolim.
281. S. INSIDIOSUM Mart. I. r. 79 — Aculeatum, fruticosum, pulcherrimum adpersum pedunculis terminalibus; caule fruticoso ramisque pubescentibus parce Mellaia asperulis,

- aculeis rectis v. aduncis; foil, oblongis utnq. sublnangulan-acutis, repando-angulalis, passim subpanduraeformib, ID petiolos subdecurrentib, pube stellata supra parca, subtus plerumq. tomentoso-incams, rbacbi aculeala, pedunculo termmali cymaq bifida; calyce brevi corollaeq. laciniis lanceolalis, cilus stellato-hirsutulib; antbens aequalibus. — la Brasilia ad Sebastianopolio.
- 286 S. VARIABLE Marl. I c. 80 t — Tolam pube stellata stipilata dense utcano- v. ochraceo-lomentosum: caule ramisq., ran us eliam pcliolis acult'jiis, Toll oblongo-lanceolatis, oblongis v. ovalo-oblongis acuminatis, basi maequalib. cordalis ¥. acutiusculis, subinlegemmis aul repandis, aot sinaalo-angul.itiss LCIQMS acutis inlegemmis r. repandis; pedunculo termmali Inerml; cyma muliiora; laciniis caljcis o\atis aculis corollaeq. semiqninquedae laciniis eiius in medio stellato-tomentosis; anlbens aequalibus. — Corolla ultra pollicem lata, albn, laciniis apicc saepe cohaerentibus. 6 — *S. repandum* Vellozo, Fl. Flumin. II. t. 123? — Grescii in Brasilia ad Sebastianopolin.
- 287 S. BONARIENSE Linn. Spec. plant. 264. (eicl. syn. Plum) - Dili hort. Elili 364. t. 272. fig. 351. — Dunal I. c. 34. - G. Don I. c. 429 no 2? I - FnHicoMim subinermem* foil, ovalo-oblongis sinuato-repandm glabnusculis, racemis corjmbosi* lateralib. T. ei Ira folia eels. \$ — Caulis vindis, basi aculeatus, demum incrmis. Folia interdura injepra, rarius aculeata. Corymbi magni. Calycis 4-5-hdi segmenta subulata. Corolla magna alba, eitus pubescens. Bacca globosa lutea 'quadnloculans pmformis. Radix repeos. — In Bonaria.
- 288 S FtSTIGMTIV Willd. Enum pi hort. Berolin I 235 - Jcq. Eclo* t 0. - Dunal, Monofcr Solan. 1W. I 16. fig. 2., S>nop». « — G Don I c no 252. - Caule frulicoso subinermi; foil, ovalo-oblongis integns %. <inuato-rcpandis pubescentib.; racemo corymboso terminali. 5 — Caulis plerumque inermi*, micrdum armalus. Baml firlda. Folia raro aculeala, loierdum Integra, pilis stellatis seabrida. Flores magni, fertillbas tlerillbasque minis. Calyx 4-5-6-fidus, sogmonii acutis. Corolla 4-5-d-fida magna pallide coerulea, macula Ha'i nMnformi inlus • notala. Anlberae 4-5-6 flavae. Bacca globosa quadnloculans, matura aurauiaculea — Crescit.
- 289 ^ POK4 Dunal I. c. M. (ed. 2. inedit. t. 56) — G. Don I c no. 253. - Rami> glabnusculis aculcalis; foil, ovato-lanceolalu subtnlegnt > sinuatn-anitulaus, utnque scabris, subtus praecipue tomenlellis inermib; raceme bnMib latrralib. paucilloris 5 — R*mi apicem versus aculeati. \culei breves rein gracile*, rarius nuum Race mi bifidi inermes, pilis ferrugineis obsili Caljx quinquerridua. Coroll.i c\|us lanata quinquedada, aegmentis lanceolatis aculis Pub<Mentiae pili blfilah — In in<u>la Ja>a.
200. S OPORIMM Willd. Enum. pi. horl. Berolin. I. 838. - Poir Encyel. móth Boppl. III. 708. — G. Don I. c. DO. SM. — Caule frulicofto, basi aculealo; foil, obloogo-iancooUUa repando - aogQlailis loiegrisve; racemis cjmosn lateralih ternnalibii«qoe. 6 — Btmi apice pulfenilenio-toracniosi, pih< breubus »tellau<i cinrrei \< ulei apice subreenrati. Folia magna pedalia inaequalia, basi nubror-data, ad nervum mediam petiolosque sparse aculeau, superiora subintrgra, Juniora infra rancscentia, marginibus convolulis. Pedunculi 2-3-partiu >irnle*, rum pedicelli*, calribu» ot corollae pagina eiterion pilis brevibus Hirllans nca-bn (a\jx quinquupartitu*, s«*gmenlis basi latis, apicc <iubulaii« (orolla magna coerulea, mtu« data, 4-5-fida plicala, patrn«, demum rrfirta Minmn subbilibum Bacca globona quadnlorulari<, matura fla\ a — *S. macrophyllum* DC. in Hort. Monspel — Dunal, Monogr Solan IW t lb,S)nopH M S yrundi/Torum Dsf. Arb. t 160. nee Rt. et Pav.) - *S. eymotum* Ortega, Derad pi I li — In Metieo?
- 201 H SI'BIKER ME Jcq PlaoL Amenc`aU I. 40. 6g. X - Dunal. Synop« 34 - G Don I c. no. 2V5. — Caule fruticoso subinermi, foil lanceolatit rlliptim inlegerrimx, supra glabris, subtus tomrnlellis, rymis fannosis, negmenii* caJ)noif obiu%ik« > - Folia 3-4-pollieana, supra glabra, infra magis minusve lomenio»#

- Racemi cymosi Calycis quinquefolii segmenta obtusa Corolla coerulea, segmentis lanceolatis. Bacca globosa. — Differt a *S. lanceolato* racemis minoribus segmentisque calycibus oblongis — *S. laurifolium* Mill. Diet no 90 — In India occidental!, Meno.
292. *S. ELATLUM* Lnk Enum plant, hort Berol. I 186. — G. Don I c no 250 — Caule aculeis reconditis, basi tomentosis armato fruticoso; foliis lanceolatis subtomentosis inermibus, sublongis junctis, pedunculis lateralibus bifidis, laciniis calycibus linearibus 6 — Caulis 6-8-pedalis, aculeis creberrimis brevibus Folia petiolata, laminae in petiolum decurrentes, acuta subrepanda, supra tenuissime pilis stellatis tomentosa virentia, sublonga densius, praesertim in nervis Pedunculi validi longi, pedicelli confertissimi tomentosi Calyx lomentosus. Corolla coerulea, extus lomentosa — *S. laurifolium* Hort. — Crescit
293. *S. OCHROEURUM* Lnk I.e. — G. Don I c no 257 — Caule aculeis ruscum armato fruticoso, ramis ferrugineo-lomentosis, nervis foliorum aculeatis, minoribus terminalibus, laciniis calycibus brevissimis, corolla 5-partita 5 — Caulis aculeis paucis parvis obsitus Folia 3-4-pollicana, sesquipedalem lata aculea integerrime subrepanda, basi parum inaequalia, utrinque pilis stellatis tenuiter lanatis nec incana, juniora praesertim lomento In nervis ferrugineo. Cymae pedicelli lomentosi breves. Calycis tomentosi lacinae brevissimae. Corolla coerulea, ad basin usque partita, laciniis 6-8 lin. longis. Antherae distantes longae sublongae.
- fi* Caule aculeis majoribus pluribus obsito. — Folia tenuis lomentosa minora, nervis supra et infra magis aenatis. — *S. eocineum* Hort. — In Brasilia
- 2M *S. ASTHOITES* Jcq. Eclog. t 65. - (Lnk. 1. c) - G. Don I. c no 258 - Caule subinermi, ramis aculeis paucis brevibus subrecurvis obsitis, foliis ovato-oblongis finalibus subrepandis, utrinque pilis stellatis adspersis, corollae lobis inrafoliatis duobus, segmentis [calycibus?] calycinis acuminatis lobulatis pilosis — Folia 9-pollicana Corolla quinqueloba violaceo-coerulescens Petioli aculeis 1-2 brevibus recurvis obsitis Bacca globosa aurantiaca biloculans — Haec species valde affinis esse videtur & Bonartenu et *S. fattigata* — Crescit in Cuba et in Peruvia.
- 2W. *S. MKXICAMM* Moench et Sess Fl Mexic inedit ex Dunal, Synop Solan 34 (ed. 2 inedit t 56.) — G. Don I. c. no 250. — Caule fruticoso lomentoso inermi v. subinermi, foliis ovalo-oblongis tomentosis, sublongis canescentibus, racemis subcymosis, segmentis calycibus subulatis; corollae quinquefoliae segmentis acuminatis — Caulis ad basin aculeatus. Racemi laterales et terminales. Corolla violacea Bacca globosa pisiformis aurantiaca. — In Mexico.
296. *S. LAXIFOLIUM* Vilm. Cav. Icon, et descript. plantar. III. 23 t 245. - Dunal I r — G. Don I c no 200 — Caule fruticoso tomentoso, ad basin aculeato, ramis piloso-tomentosis, foliis lanceolato-oblongis inermibus, utrinque raris tuberculatis inermibus, inferioribus sinuatis, racemis cymosis laterales majorem lib, segmentis calycibus subulatis, corollis pallide coeruleis semiquibus — Pubescentiae pilis stellatis Folia supra virentia Bacca globosa quadriculans aurantiaca-lutca. — In Mexico.
297. *S. GLOTTINOSUM* Dunal I c. 35 (ed. 2. inedit. u 51) - G. Don I. e. no. 261. - Caule fruticoso credo sparse aculeato, foliis, oblongo-obovatis, basi cordatis acutis, utrinque tomentosis glutinosi mollibus; racemis gluliosis lateralibus aculeis rectis acerosi; pilis stellatis apice glanduliferis, folia, pedunculi calyceoque pilis bimilibus vestiti, ramorum summitate viscidulae. Folia undulata in nervis v. sinuata, utrinque virescentia, aculeis in nervo mediano infra Pili prioldrum, pedunculorum, minorum calycibus ferrugineo-lutescentibus In nervis p. n. tamen Segmenta calycina oblonga acuta Bacca globosa coccineaiformis quadriculans flava — Crescit *
298. *S. FORMOSUM* Dunal I c (ed. 2. inedit. I 127 II B Kill No) gen et prepi. III 44 - Klh Synops. plant aequinoct II 175 d Dun I r 430 no 202

- Caule fruticoso aculeatissimo birsoto; foliis subcordatis ovalo-lanceolatis acuminatis tomentosis subinermibus; racemis lateralibus multifloris. 6 — Kami pilosissimi. Aculei recti acerosi. Pili rufescentes stellati simplicibusque intermixtis. Folia sinuato-repanda undulata inermia, infra pallide rufescentia, supra flavescenti-viridia. Calyx quinquepartitus pallide ferrugineo-pilosus. Corolla magis plicata quinqueangula, exclus lanata. Stigma capilatum. — Affine *S. glutinoso*. — Crescit locis umbrosis sylvarum Orinocensium prope Maypures.
209. *S. BROWNII* Dunal, Monogr. Solan. 801., Synops. 35. — G. Don I. c. no. 203. — Caule fruticoso; aculea recta aubaceroia; foliis, inlegris v. repandis longe lanceolatis subinermibus, supra ecabrellis, infra cinereo-lomentosis; corymbis lateralibus subumbellatis, breviter pedunculatis simplicibus; corollis calycem triplo excedentibus. 6 — Folia aequalia geminata. Calyx cinerascens purpureus, segmentis longis aequalibus. Corolla violacea. — *S. tiolaceum* R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 446. nec alior. — Crescit in "New South Wales" in Nova Hollandia inter Iropicos.
300. *S. ELEGANS* Dunal, Synops. Solan. 35. (ed. 8. inedit. t. 58.) - G. Don I. c. no. 264. - Caule tomentoso aculeato; foliis oblongis acuminatis, utrinque lomentosis aculeatis sinuato-repandis, infra albido-flavicanalibus; racemis simplicibus lomentosis aculeatis. 6 — Differ! a *S. Brownii* caule, foliis racemis calycibusque aculeatis. — Aculei parvi acuti recti, basi longe, apicem versus bracteati, lomentosi ut reliquae partes. Folia aequalia geminata, nervo medio infra aculeato. Calyx 5-partitus, segmentis subaequalibus cinereo-brunneis, demum coalescentibus. Corolla violacea. stylus incurvus. — Crescit in Nova Hollandia.

Setto LH. TORVUM 6. Don I. c. 430.

Flores aculeati. Folia integra, sinuata v. lobata. Flores corymbosi v. paniculati. Antherae aequales.

301. *S. GIGANTEUM* Jcq. Collect, bot IV. 125., Icon. rtr. pi. II. 1. 39B. — Bot. Mag. L. 1021. — Ann. of nat. hist. I. 30). f. 13. — Des ab Esenb. Transact. of the Linn. Soc. XVII. 47. t. — Dunal I. c. 30. — G. Don I. c. no. 265. — Fruticosum aculeatum: aculeis basi lomentosis; caule foliisque oblongo-lanceolatis, utrinque acuminatis integerrimis inermibus, subglobosis lateralibus dichotomis multifloris albo-lomentosis. 6 — Tota planta, excepta foliorum pagina superior!, lomento farinoso lenuis. In axillis foliorum magnorum orbuntur folia minora. Pedicelli floriferi penduli. Calyx parvus, primum quinquepartitus, demum 5-dentibus excrecentibus quinquefidus. Bacca rotundata rubra pisiformis. *S. nireum* Vahl, Sjuhol. bot. II. 41. — Thunberg. Prodr. 0. Cap. 36. - *S. fahnotum* Wall, in Rib. Fl. Indie. II. 255. — *S. argenteum* Ucyoc lib. — *S. papilionatum* Dumont. do Course!, Bot. cult. Suppl. 153?

f. Caule inermi (?); foliis, tenuioribus longius petiolatis, lomento partium (eniorum magis iaculis; calycibus profundius lobatis. — *S. fahnotum* Wall. Cat. 96ia b.

y. Folium aequalia fere pedunculata, quatuor pediculis latitudinis, forma lomentosa. var. *fl.* simile. — Wall. I. e. C — la Promontorio bonae spei et in India orientali (Dindigul, Neelberries) crescit.

302. *S. TORVUM* SwrU. Prodr. n. Ind. occid. 47., Fl. Ind. occid. I. 45ft. - Dunal, Monogr. Solan. 203. t. 21, 8)ops. 30. (excl. syn. Jcq.) - Des ab Esenb. I. c. 53. t. 1. (excl. »n. Jcq) — G. Don I. e. no. 806. — Wight. Icon. pi. Ind. or. III. t. 3451 — Caule fruticoso aculeato; aculeis subrecurvatis, basi lomentosis; foliis ovatis cordatis aculeis sinuatis angulatisve tomentosis orbuntur subaculeatis, aliter; pedunculis extrafoliariis racemosis multifloris simplicibus; laetitia calycis unguiculis aculeis; corolla quinquefida; baccis globosis. 6 — Caulis ramulosus tomentosus, aculeis paucis oblongis. Tomentum v. pubescens alba pallide lutea v. fangiBea. Folia utroque geminata. Aculei basi lomentosi. Baccae latius bifidae. t. trifida multiflora, pedicellis cymosis. Calyx quinquefidus. Corolla alba quinquefida, centro tubulosa nilida, affinitate lanerolatis aculeis, marginibus undulatis. Antherae lateae. filamentum longiusculum, antherarum longitudine, floris

- ferliliam antheras superans. % Bacca globosa viridis quadilocularis. — *S. stramonifolium* Ait. Hort. Kew. I. 252? — Lam. Illusr. gen. no. 236*. — Poir. Encycl. m&lh. Suppl. IV. 300. (excl. syn. Jcq.) — *S. ficifolium* Ortega, Decad. plantar. IX. 116. — 5. *acanthifolium* Dsf. Cat. hort. Paris. — 5. *tcabrutn* Rz. cl Pav. Fl. Poruv. II. 30. t. 175. fig. a. — 5. *ptseudo-iaponaceum* Blame, Bijdragen 702. — Pluken. Almag. 350., Phytogr. t. 225. fig. 6? — Affine 5. *Indico*, differl tamen foliis aculeatis; racemis mullifidis, pedunculis, pedicellis calycibq. inennibus.
- p. Inerrae: Toll, leviler repandis. — 5. *Silarium* Hamilt Herb, ei Wall! Cat. no. 2627. D. — 5. *multi/lorum* Rth. Nov. spec. 130. — Crescit in Benghalia, in insulis Bermudensibus et in Hispaniola.
303. *S. ROSSI* Kno*1. el Westsc. The floral Cabinet II. 141. t (absque ic.) - Caule fruticoso prostrato tereli gracili racemoso, aculeis compressis armato; foil. 2-3-nis inaequalib. pubescenlib. breviler pcliolalis, coslis supra acutealis, h.i*i inaequalib., imis oblongo-sinuatis, suprnob. cordalis obtusis; florib. quadnfidi* (cmnibasT?) telrandris(??) ternis longe pedicellalis; antheris aequahbus. 6 — Crescit in Mexico.
304. *S. FERRUGINEUM* Jcq. Hort Srhoenbr. III. 46. t 334. - Rocm. ot Schult. SysU vegeL IV. 634. — Donal I. c. 36. — G. Don I. c. no. 267. — Caule fruticoso; aculeis glabris; foil, ovalis lobatis v. sinuatis, nenro medio subtus petiolisq. acolcalis, aculis lomentosis; racemis corymboais. 5 — Folia Juniora ramiqur ferrugineo-lomentosl. Corolla pallide coerulea v. alba. — Valde afBne *S. lorvo*, differt lamem racemis brevlorlrbns et paacioriOorls. — Tomenlum rerrugineum stellaium. Aculei caallnl glabri, raro recurrl. — (Nees ab Esenb. I. e. A3. bane cum 5. *torvo* conjunxlt speclem.) — Crescit....T
305. *S. HERNANDESII* Moç. el Sess. Fl. Mexic. inedit. ex Dunal I. c. fed. 2. inedit t. 59.) — G. Don I. c. no. 208. — Caule fruticoso aculcalo toim»ntoso; foil, pemi-naiis profunde sinuatis acutis tomentosis; racemis laleralib.; pedicellis umbel-laiis; baccis sexloculanbus. 5 — Aculei pauci recurati. Folia ovalo-oblonga subcordata. Pclioli ct pedanculi aculeati. Calyx tillosus, segmenlis profundis aculis. Corolla alba, segmenlis otalo-oblongis acutiusculii. Bacca globosa. - Crescil in Mexico.
306. *S. TRICUSPIDATUM* Rich. Herb, ex Dnnal I. e. (ed. 1 inedit. L 60.) - G. Don I. c. 431. no. 260. — (Poir. Eocycl. m*th. Sappl. III. 771.) * Caote fruticoso, in-terdum aculeato; foil, magnis otalo-oblongis longe petiolalit, basi sabcordatin, ipiee sinualo-angolalls aculis, supra seabris, tiibtus ionentotis, nervo medio subtas aculeolails; cymis simpllcib. lomentosis. 6 — laml apice tomeniofi. To-roenli pili stellati. SegmenU calyciaa 5 acua. Corolla magna profoode quloque-fida. — frescit in Guiana.
307. 8. *MACCAI* Rich. Herb, ex Dunal I. c. 37. (ed. 2. inodit t 61.) - G. Don I. r. no. 270. — (Poir. I. c.) — Caule fruticoso vix aculeato; foil, ad batin submrdad^ sinuato-lobalis, subtus canescenlib., sinubus rotundatis, lobis sinuato-angulatis; c>mis simplicibus. 6, — ftami albi puWerolenli. Aculei recti. Folia longe pe-liolaia lata, subtus in nenro medio aculeis paucis, supra pilis stellaus distan-tibus obsiia. Peduncull, pedicelli, calyces foliorumque pagina inferior toneototi. Inflorescentia et floret illit 5. *trieuspidmiA* hand dittlnrtlea. Bacca rakra gloA>osa edulis. — *Maccai* Merian. Burin, t 6. — Crescit Hi Caye«D«.
308. 8. *OVALIFOLIUM* Dunal I. c - H. B. Kth. Nov. geo. el s»ec pi. III. 44 - Klh. Synops. plant, aeqnl. II. 175. — G. Don L e. no. 271. - Caul* fruiiro«o aculeato; ramis villosotoeatoals Inermib.; foil, solllarh* (?) obovalo-ellipiiris aculis, bani roiundatls sublnermlb., supra stellulalo-pubescentib., sublus tenuiirr canescenti-tomentosis; racemis laleralib. subdicbotomis brevib. cahrib<|. mcr-mibus. ^ — Folia repanda subundulata 3-4-pollicaria, neno medio »ul>tut aru-leis 1-2 rcrtis obsilo. Racemi, caljers cl corollae (rxlui) lomento albo kiellato teslili. Calyt quinqueparlitus, srgmentis obo>ati« arutm. (.orullie segneota oblonga lineana aruia. — Crescit in convalli flummif Magdalenac prope Honda in regno Novo-Granatenni.

309. S. HISPIDIM Pers. Enchlid. I. 228. - Dunal I. c. - G. Don I. c. no. 272. - Caule fruticoso aculeato pilosissimo; foliis lobatis acuminatis; racemis laevibus dichotomis inermibus? — Indique pilis stellatis ferrugineis lectum. Folia superiora ovalia inaequalia acuta, pauca sunt repanda, reliqua cordata 7-11 lobata, lobis acutis spinescentibus pilosissimis. Racemi axillares vel terminati multiflori. Calyx quinquefidus. Corolla alba, excluso tubo stellato ferrugineo vixita subquinquelobata. Bacca globosa flava. — Crescit in Peruvia.
310. S. LANATUM Dunal, Monogr. Solan. 305., Synops. 37. — G. Don I. c. no. 273. — Maund et Henslow, The Botanist II. 58. t — Caule aculeato arborico; Toll, oblongis solitariis v. geminalis; corymbis ramealibus subdichotomis. 5 — Tolum lanata stellata ferruginea tectum. Folia oblongo-lanceolata angulata nitida. Calyx quinquefidus. Corolla alba, excluso lanata. Bacca lutea. — 5. *aspero-lanatum* Rz. et Pav. Flor. Peruv. II. 39. U 174. fig. b. — Crescit in Peruvia (Huassanassi).
311. S. PAMCLLATUM Linn. Spec. plant. 267 - Aubl. Guian. I. 216. - Dunal I. c. 37. — G. Don I. c. no. 274. — Caule pinnatis, aculeatis; foliis sinuato-angulatis, supra planis; floribus paniculatis terminalibus. 5 — Caulis et petioli albo-tomentosi. Arvuli pauci recti nudi. Folia tomentosa lata cordata, inermia, supra glabra. Panicles terminales compositae tomentosae cum calycibus inermes. — Crescit in Brasilia et in insulis Indiae orientalis.
312. S. ACLILOBIUM Dunal I. c. 37. (ed. 2. inedit U 63.) - Poir. I. c. 773. - G. Don I. r. no. 275. — Ramis subinermibus tomentoso-pulverulentis; foliis, petiolatis rordatis sinuato-angulatis, angulis acutis, ulrinque pulverulento-ionipetos; racemis cymosis terminalibus. 6 — Affine *S. paniculato*, sed differt foliis pulverulentis-lomentosis. Kami lubricis, aculei pauci parti aculi. Tomentum sicillalium flavescentia. Folia supra flavescentia, infra albida. Racemi multiflori calycetibus tomentosis. Corolla nigra. — Crescit in Brasilia ad Para.
313. S. ALBIDUM Dunal, Monogr. Solan. 906., Synops. 37. — II. B. Kill. I. r. 43. - Klh. I. c. — G. Don I. c. no. 276. — Caule arboreo aculeato; foliis, sinuatis, inferioribus lobatis, subulcanis; racemis lateralibus multifidis Miliis. 5 — Folia juniora 7-fimbriata, adulta inuata, supra glabra. Racemi terminalis. Calyx panrus. Corolla alba. Bacca globosa parva lutea, intus nigra. — *S. mcanum* Ri. et Pav. Flor. Peruv. II. 40. U 175. Bg. b. n. — Crescit in Peruvia locis temperatis prope (Micros).
314. S. &PO>ACR:IM Dunal I. I. c. r. - G. Don I. c. no. 277. n. Hook.) — rank fruticoso aculeato; foliis, sinuato-angulatis utrinque; compositis lateralibus dichotomis; inermibus. — Aculei pauci remoti furcatis. Folia ovata v. inordinata geminata, utrinque pilis stellatis parvis obsita. Calyx profunde quinquefidus. Corolla coerulescenti-violacea, segmentis acutis. Bacca aurantiaca-loiea. — 5. *cabrum* Bi. et Pav. I. c. 30. U 175. fig. a. n. Vahl. - Crescit la Peruvia « In Cljili.
315. S. PLATYPHYLLUM Dunal, Synops. Solan. 38. ed. 2. inedit. t. 110. ||. N. Klh. I. c. 4V - Klh. I. c. 176. — G. Don I. c. no. 278. 1 Sultrivico Mim rimi « snilraii*? ; foliis, late oblongis sinuato-lobatis, basi rotundatis utrinque striatis, pilis inaequalibus inaequalibus; corolla ferebentis-lomentosa. — Folia infra putrescentia, 7-8 poll. long. 1, 5-6 poll. lat. Flores unilaterales. (ial) (jumquillibus, inermibus. — *Sapomarr* vanrila? — *undenmanjutare* Wilk. Hrj. r. lurrn. < > t hull. S; < t vesxt IV. 000. — Crescit in Urugua Orinoco-ibus mltis runlluruutu Mruni rlaraciam Mayporetium.
316. S. VAILLANTII Dunal I. c. ed. 1 inedit. I. 61) - Poir. I. c. 772. - G. Don I. r. no. 279. — felle siliabro aculeato, aruleis raris; roll. utrinque aruminalis inuato-lobata, supra pilosa, infra «cava»; ramis bifidis ramosis. — *Sapomarr* bare «prnr» a *S. taponaeto* foliis supra pilis implicibus nris obsitis Ooribusque paucibus. - Crescit . . . *

317. 6. PROCUMBENS Lour. Flor. Cochinch. ed. Willd. I. 103 - Dunal I. c. - Nee« ab Esenb. Transact, or the Linn. Soc. XVII. 58. — (J. Don I. c. no. 280. - Caule aculeato suffruticoso procumbente, aculeis recurvis; foliis parvis gemmatis breviter petiolatis ovatis obtusis repando-lobatis, utrinque tomentosis glaucis, nervo medio aculeatis; pedunculis lateralibus terminalibusque; floribus reflexis in quadrifidis letrandris. 5 — Habitu accedit ad 5. *trilobatum*, Doris non semper apice agglomerati, ut habet *Loureiro*, omnes autem, quos examinavi (N. ab E.) quadrifidi et letrandri crant. Corolla parva calyce duplo major, laciniis lanceolatis obtusis. Bacca pisi magnitudine laevissima. — Crescit in Cochinchina.
318. S. LICHENSTEINII Willd. Enum. plant. hort. Berol. I. 238. - Dunal I. c. - G. Don I. c. 432. no. 281. — Caulis fruticosus aculeato scandente; foliis oblongo cordatis sinuato-angulatis tomentosis, sublimb. nitidis, in medio utrinque aculeatis; floribus.....? {jv - Bacca colore et magnitudine *Capita annui*. Folia in planis juvenilibus aequali quadrifida. laminae, supra tertia, subius media, utrinque in medio aculeo uno alteroque piano armata, basi cordata, margine sinuato-angulata. — Crescit in Promontorio bonae spei regionibus intermontibus.

SecUo IV. KELOGEMA Duntl, Bynopi. Solan. 38.

Pedunculis folio brevioribus, interdum solitariis unifloris, saepius infero bifidis, pedicello inferiore e caule nascente, florem unicum fertilem gerens, post efflorescentiam cernuo, pedunculo oleria parie multiflora, florea aequum trinos gerens. (In Core ferili calycis aculeata, post efflorescentiam creascens, stylus antheris longior; in Core alerili calycis inermis aut vix aculeata, stylus longitudine filamentorum.) Corolla quinquefidia undulato-pinnatifida. Baccis 3-locularibus, plerumque 2-3 ponveio-concavis, ope laminae intermediae longitudinalis dissepimento utrinque ad axem affixis. — Herbae v. frutices, foliis glaucis angulatis lobatisque.

310. S. MELONGENA Linn. Syst. plant. I. 188. - Wall. Cat no 204. - Nee« ab Esenb. Transact, or the Linn. Soc. XVII. 48. - G. Don I. c. no. 281. 1 - IICT-baccum, basi lignescens perenne: caule foliisque ovalis, basi inaequalibus sinuato-angulatis, fere glaucis; pedunculis terminalibus, fertilibus tuberculatis, calyce campanulato, in fructu grossiocrato, laciniis linearilanceolatis; corolla angulata. 2. — Folia infra praecipue tomentosa siellata canaliculata. (folia 0-9-fidut. Corolla magna violacea 0-0-fida, inclusa macula flavo-nigra, nuda mon-IOM, segmenta lilla acuta. Stigma 4-4-0dam. Bacca magna glabra munda, m gallinacei magnitudine, apice obtuso umbilicatum, alba, loculis ovoidibus, plerumque carnositate seminibusque parva compressa alba.

a. Pedunculo fertili aequo, adjecto aequo racemulo florum trilocularium. — Nee« ab Esenb. I. c.

a. *ottgerum*: Caule, foliis calycibusque inermibus. — *S. ovigerum* Dunal, Monogr. Solan. 210 — Blume, Bijdragen QOK - *S. v. tfr/origena* Linn. Syst. pi. I. 188. - *S. pseudundatum* Blume I. c. 200 - *S. uhetcent* Madr. Ub. ex Wall. Cat — *S. Melongena* var. *otycrum* Lam Illustr. gen. 2348. - *Melomgma oro/a* Mill. Diet. no. I. - *Melongena* Blume. Herb. t. MO. - Lob. Icon. 1. 2088. - *Chunda* Rheede, Hort Malab. II. 00. t. 37. - Moris. Oxon. Hist. sect. 2. — *Melomgma Arabum* Chab. M4. (c. ic.) - Differt praeterea baccis variegatis colore baccarum; reperitur enim baccis violaceae, albae, flavae. pulchre rubentes.

b. *etculenium*: Caule, foliis calycibusque magis minusve sinuatis. - *S. nulentum* Dunal, Monogr. Solan. 208. - *S. Melongena* Linn. Spec. pi. JUO Plenk, omc. Pflm. I. 123. - *S. imsamum* Linn. Mantiss. pi. 40. ^Hd s» pi. I. 1047. - *Mia Barudena* Rheede, Hort Malab. X. 147 t. 74 IMukri Almag & .PjU,Pb)logr.t220.flg.3.- *Trongu* m Aor/nur Itmpb lib Amloin \ i v, \ anal rham hacc sub>antactas I. fruticulosa \mlarri<< ^Truncum Merca I albi<< Trongum Pun Kropb — *Melomgma fructu nhlango* i *tolaceo* s<bl>. Hort Horn 13. 1.05. oxcl. syn. Tourn. Lab. (o) rn E<I> I 5 p 105. rt Brtg Mai medic. III - Aubergine, Regn bot. ic. t 0* - a Harm oblongo-trilocularium*,

apice recurvis purpureis flavis v. cinereis. — *Melongena fructu in cure o* Tour-Instil, rei herb. 163. — *S. pomiferum fructu in cure o* Pluk. Aim. 350., Phyl. t. 220. fig. 2. — C. Daub. Hist. III. 316. c. icon. — *Melanxana Arabum, Melongena et Bedegian* Rauw. It. — 4. *Baccis nigris*. — *S. pomiferum, fructu spinoto nigro* Moris. Oxon. Hist. III. 524. sect. 13. U 2. fig. 2. — Bauh. Hist. III. 610 c. ic. — *Melongena tpinota fructu longo nigro* Tournef. Instil, rei herb, löll — *Melongena fructu roiundo nigro* To a me f. I. c. — Pluk. Almag. 350., Phyl. t. 220. fig. 3. — *Melantzana nigra* Rauw. — 5. *Baccis rotundalis*. — *Melongena fructu rotundo* Tournef. I. c

fl. Pedunculo fertili racemose-corymbose Iri- quadrifloro; eaole, foliis calycibusque aculeatis; fructu minor! ovalo v. tubgloboso, in quibusdam a calyce incluso. — *S. insanum* Rib. Fl. Indie. II. 240. (eicl. syn. Rmph.) — *S. undatum* Lam. Diet. IV. 301. — 5. *incanum* Linn. Spec. pi. 1.188. — Dunal, Monogr. Solan. 213. — Roem. et Schult. Sycl. \epet. IV. Oil. — G. Don I. c. uo. 283. - *S. Zeylanicum* Scop. Del. 1.1.1. — *S. Indicum* Wall. Cat. 2026. G. — *S. ineanum* var. *Zeylanicum* Pert. Enchirid. bot. I. 226? — *Plania canescenii-tomenlosa*; corolla coenilescenii-violacea. Bacca rotundata flava T. alba oviformis.

b. Floribus 6-7-fidis. — 5. *argyræanika* Dum. Courscl. bot. rult. (ed. 2.) III. 162 — 5. *marginatum* var. *argyræantha* Pen. Enchirid. I. 228.

Crescit haec species in India orientali, in insula Java et Zeylaoia, in Arabia (?) et in insula Sli. Mauntii.

320. *S. HIKTERACANTHUM* Dunal, Synops. Solan. 30. (ed. 2. inedit. UV) - Needham Esenb. Transact. of the Linn. Soc. XVII. 51. — G. Don I. c. no. 1M. — Herbacum, basi lignosum perenne scilicet birsutum: caulis angulatus aculeis eras-
*is reduncis; foliis ovalibus sinuatis, subtus incanis, plerumque valde aculeatis, aculeis reclis, laciniis angulatis; pedunculis corymbosis multifloris matculis cum floro basali fertili; calyce proctifero param grossifloro; corollae quinquefidae laciniis oblongo-lanceolatis } — *Solanum Melongenae* j. persimile, sed differit non solum aculeis validissimis recurvis per internodia in caule confertioribus, sed etiam foliis profundius sinuatis, lobis utrinque angulatis maxime quo corolla ultra medium quinquefida. — 5. *indicum* Hort. Calc. — Crescit in India orientali.

321. *S. MELANOXYLON* Lnk. Enum. plant. hort. Berol. I. W. - G. Don I. c. 433. no. 285. — Foliis cordatis oblongis, basi subaequalibus sinuatis arulcibus* (omentosis, supra iridibus, subtus canescentibus. Q — Arulci fusciscentes. Folia 2-3-pollicaria, 2-3 poll. lata. Pedunculi axillares solitarii. Calyx tomentosus acutiusculus, limbo obtusis. Corolla violacea, calyce multo longior aequaliter. Antherae spirales. — Crescit. . . . ?

322. *S. FISCATIM* Linn. Spec. plant 281 - Dunal I. e. 30. - G. Don I. e. no. 286 — Caule fruticoso; foliis ovalibus oblongis tenuibusque tomentosis; pedunculis lateralibus, basi bimis; basi gibbosis. 6 — Kami aculeis solem versus fuscis, plerumque brevibus atellatis diaphanis obtusis. Folia utroque aculeata, supra rubriuscula, infra tomentosa. Florit fertili calyx aculeatus, sinuatus, 5-fidus. Corolla pallide violacea. Bacca albo-viridique-integerdum flavido-variegata.

S. tamaritense Jacq. *fulcalum* Linn. Manliu. pi. 3M

a. *reticulatum* Tournef. Instil. rei herb. 149.

fl. *Acilicis* Illicit. luttistrati-albif. — *S. fuscum* Icon. rar. I. 42., Coll. I. 51. — *Melottogenu fructu rotundo cum tpinis albo-tiribus*. Tournef. I. C. Iri? - Crescit in America tropica.

323. *S. SODOMIFOLIUM* Linn. Spec. plant. JGA. - Lam. Illustr. grnrr. no. 115. fig. 1. — Sibthorp. et (im. Flor. Grarc. I. 2M. — G. Don I. r. no. 7. - Drrioloi. Flora Iuliana II. 530. f - Liuott, Flor. Sicil. ayaopt. I. 1M. t - Fruirum aruleatom: aenleis recurvis, basi dilatait foliis, oblongis tinois-pinnatis, lobis oblongis angulatis, supra gibbibus, aohis pilosiusculis, junctis. utnq. fannoso-pilosus, pilis tirlatis imptibus; corymbis paucifloris. o — Caulis valde nomen lortuosi erecti 2-4-pedales, Junctis intense virentibus uli folia uprfl

quae vero sublus pallidiora. Folia petiolata, aliquando bipinnatifida. Corjiubi 3-5-flori pedunculati extraaxillares, pedunculis pollicanbus v. sesquipollicanbus. Pedicelli 5-7-1 me ares allerni. Calyces parvi aequae ac folia aculeali. Corollae coeruleae calycem excedentes, diametro 7-0-lineari, laciniis acutis. Baccae majubculae lutescentes, demum sordide spadiceae Y. nigrescentes. — *S. atrophorum* Jan, Elench. 4. — *S. Hermannii* Dunal, Solan, monogr 212. L2. fi. — Munt Phjt cur. fig. 212. — Moris. Oxon. Hist. 111. sect. 13. t. 1. fig. 15 — Herm. Hort. LugJ Batav. 573. t. 575. — Pluk. Almag. 351. Phyl. t. 220. fig. 5. — Sabb. Hort. Roman. II. 12. t. 57. — *Solanastrum* Hei>l. Fabr. Holmst. 348. — Crescit in Europae et Africae regionibus mediterraneis (unde migravit in Brasiliam, Novam Hollandiam et Promonionum bonae spei).

324. *S. INDICUM* Linn. Spec. plant. 268. — Burm. Tbes. Zcylan. 220. t. 102 - Dunal 1. c. 40. — Dill. Hort. Ellb. 302. t. 270. fig. 340. — Nces ab Escnb Transact or the Linn. soc. XVII. 55. — Wght. Icon, plant Ind. or. II. t. MO. - < Don I c DO. 288. — Rob. I. 28. — Pick. Almag. 350. Pbyt. t. 225. fig. 0. — Fruticosum aculeatum: aculeis caulinis compressis recurvis; foil, solilanis geminisve otatis *inaato-lobatis pinnatisque, basi inaequalibus tomentosus discoloribus; racemis interfoliaceis subcymosis; calycis aculeati laciniis rectis; baccis globosis, corolla 5-fida. 6

a. Foil, basi canaliculata, truncatisve sinuato-lobatis. — *S. violaceum* Jcq Fragm. 82. U 133. fig. 1. — Roem. et Schult. Syst. veget. IV. 608. — *S. canescens* Blume, Bijdragen 701. — *S. Sodomewn* Hb. Russel. — *Ckeru-Chunds* Rheede, Hort. Maltb. II. t. 30.

ft. Foil basi truncatis canaliculatisve eroso-pinnatifidis. — *S. pinnatifidum* Rth. Nov. spec. pi. 120. — *S. tfeinei* Roem. et Schull. 1. c. 009.

y. Foil multinerviis, basi cordatis sinuato-lobatis. — *S. agrette* Rth. I. c. 130 Roem. et Schult. I. r. 068.

*. Foil, multinerviis, basi sinuatisve leviter repando-angulatis, caulo parvis aculeis; racemis saepe depauperatis 1-4-floris. — *S. pubescent* Heyne lib. — Crescit in India orientali.

325. *S. COAGULANS* Forsk. Fl. Aeg. Arab. 47. — Vahl, Symbol. II. 41. — Jcq. Hort. Schoenbr. IV. W. t. 400. — Delile, Descript. de l'Egypte 03. t. 23. Og. I. — Dunal, Monogr. Solan. 214. t. 2., Synops. 40. — G. Don I. c. no. 280. — Caulis fruticosus, foil, ovalo-oblongis sinuato-repandis tomentosis, infra albescentibus, nullo modo tomentosis, aculeis glabriusculis; pedunculis bifidis tomentosis; baccis rotundis ovatis, maturis flavis. 5 — Caulis parce aculeatus, apicem versus longe virens. Folia tomento brevi stellato vestita, supra virentia, lobis obtusis. Aculei recti v. subrecuni, primum subtriangulati lomentosi, demum glabri. — In Arabi.

320. *S. SANCTIM I* inn. Spec. plant. «H». — Vahl, Symbol. II. 40. — Dunal I. c. — G. Don I. c. no. 200 — Caulis fruticosus tomentosus; foil ovato-oblongis, basi obtusis, ulrinque pilosis; aculeis tomentosis, basi obtusis, bifidis lomentosis; baccis rotundis ovatis, maturis flavis. 5 — Caulis parce aculeatus, apicem versus longe virens. Folia tomento brevi stellato vestita, supra virentia, lobis obtusis. Aculei recti v. subrecuni, primum subtriangulati lomentosi, demum glabri. — In Arabi.

327. *S. DIBIUM* Fresen. Mus. Senkenberg. 1. 100. f. — G. Don I. c. no. 291 — Virens, caulis stellato-tomentosus; caulis fruticosus; foil, ovalo-oblongis, basi obtusis, ulrinque pilosis; aculeis tomentosis, basi obtusis, bifidis lomentosis; baccis rotundis ovatis, maturis flavis. 5 — Caulis parce aculeatus, apicem versus longe virens. Folia tomento brevi stellato vestita, supra virentia, lobis obtusis. Aculei recti v. subrecuni, primum subtriangulati lomentosi, demum glabri. — In Arabi.

328. *S. COINGESK* Lnk. Enum. plant. hort. Berlin I 17 i, Don I. c. 414 no. 200. — Caulis tomentosus, aculeis rectis armatis. foil ovato-oblongis, basi obtusis, ulrinque pilosis; aculeis tomentosis, basi obtusis, bifidis lomentosis; baccis rotundis ovatis, maturis flavis. 5 — Caulis parce aculeatus, apicem versus longe virens. Folia tomento brevi stellato vestita, supra virentia, lobis obtusis. Aculei recti v. subrecuni, primum subtriangulati lomentosi, demum glabri. — In Arabi.

- menlosij*; pedunculis lateralibus brevissimis multifloris; calycibus lomentosis, segmentis ovalibus obtusis; corollis quinquepartitis. § — Aculei basi latiores, non valde longi recti. Corolla corrulca, exclusa puberula. Antherae discretae aequales. — In Africa ad fl. Congo crescit.
129. *S. VELLELM* Swartz. ross. ex Roem. et Schult. Syst. veget. IV. WJ. - G. Don I. c. no. 293. — Caule fruticoso aculcato; foliis ovalibus aculeis integerrimis, utrinque inermibus lanalio-ioracntosibus, infra reticulatis; racemis dichotomis flexuosis. 5 — Aculei sparsi recti. Ramuli tomentosi. Folia opposita 2-3-pollicaria ferruginea, altero minori. Racemi terminales et ramorum furcationibus longissimi tomentosi multiflori. Flores aggregati subsessiles. Calyx tomentosus. Corolla coccinea, exclusa tomentosa, segmentis obtusis. Stigma oblongum. — Crescit in America tropica.
330. *S. MARGINATUM* Linn. Suppl. pi. 147. — Morr. Comment. Goetling 1783. p. II. u. 4. — Jcq. Collect. bot. I. 50., Icon. pi. rar. 1.145. — DuRoi, Solan, monogr. 215. t. 3. A., Synops. 40. - Bol. Magaz. t. 1928. — G. Don I. c. no. 294. — Caule fruticoso; foliis subcordatis sinuato-lobatis, infra tomento piloso pulverulentis vestitis, supra albo-marginalis; baccis trilobatis globosis. § Caulis aculeatus, apice ramulisque tomentosus, tomentum pulverulentum. Folia sinuato-repanda obtusa, utrinque aculeata, juniora nunc alba, demum supra virentia. ACIPI recti subulati flavi, ad basin fasci. Peltiolae, pedunculi, pedicelli calycesque exius cum corollis albo-tomentosi. Calyx 5-fidus. Corolla 3-lobata magna alba, in centro purpureo-maculata. Bacca magna irilocularis globosa lutea nutans. — *S. niteum* Allioni. — *S. Abytanicum* Jcq. Uort Vindob. — Crescit in Palaeatina.
- J31. *S. CAMPECIENSE* Linn. Spec. plant. 207. - Willd. Spec. plant. I. 1039. (excl. syn.) — Dunal, Synops. 40. — G. Don I. c. no. 295. — Caule herbaceo arulealissimo birto; foliis cordato-oblongis lobatis, lobis dentatis; calycibus fertilibus aculeatis; baccis cerasiformibus. Q — Caulis pateris soils radice exposita brunnea. Pili caulis foliorumque omnes stellati. Folia infra aculeata subquingueloba, supra viridia, infra tertiis-albescentia. Aculei recti albi, flavi v. brunnei. Pedunculi, pedicelli calycesque fertiles hirsutissimi aculeatissimi. Corolla exius pilosa pallida et violacea quinquelobata. Bacca matura alba forma et magnitudine Cerasi. — *S. acanthifolium* Mill. Diet. 15. — Dill. Hort. Ellb. 310. t. 208. fig. 347. - Crescit in America meridionali ad solum Campechiense.
332. *S. TRONGM* Poir. Diet IV. 308. — Dunal, Solan, monogr. 217., Synops. 4a * G. Don I. c. no. 290. — Caule suffruticoso aculcato; foliis angulato-sinuatis, utrinque aculcato; floribus solitariis extrafoliaceis; baccis globosis. O? — Radix dura longa. Aculei recurvati. Folia obscure viridia. Calyx aculeatus. Corolla purpurea. Bacca globosa cerasiformis. — *Trongum agrtste ipimosum* Rmpb. lib. Amboin. V. M0. t. 80. fig. 1. - *S. Mftomgtma* var. (cf. p. 310. BO. 91.1 Meet ab E) enb. - Crescit in Helvetia Inaojia.
333. *S. PRES6CM DUMI* I. I e. e. — G. DOB I. c. no. 297. — Caule subintrinseco; foliis ovalibus utrinque attenuatis aculeatis; baccis globosis subglobosis, verrucis plumbeis. O? — Caulis humilis, ramis parvis aculeatis. Folia geminata aculeata obscuris India. n. mis brunneis. Aculei breves. Calyx aculeatus. Corolla alba v. pallide rubra. Bacca tiritidis albo-maculata. — *Trongum pra m'amm* Rmpb. lib. Amboin. V. 241. I. HQ fig. 2. - *S. Melongmat* (cf. p. 319. no. 81.) var. Nect ab Etrnb. - Crescit in Moluccis insulis.
334. *S. ALBUM* Lour Fl. Corbinrb. I. 129. - Dunal I. c. 217., Synops. 41. - G. Don I. c. no. 90*. — Caulis suffruticosus lubinrmi. rami protirali*. foliis oblongis angulatis parce aculeatis; pedunculis multifloris; baccis globosis. > Folia 0-10 pollicaria longe petiolata cuni ramis partibus fructibusque puberulis filitiranli*-aculeatis pateris Proves. Pedunculis multifloris. Calyx barbatus. Corolla alba. Antherae luteae. Bacca tiritidis albo-maculata. *S. Mfhmgena* (cf. p. 110 no. 1) ab Etrnb. — Crescit in Corbinrbina et Amboina

Seotlo V. AOATHOPHORA Dunal L o. 41.

Caulc aculcalo; foliis glabriusculis villosisve pilis simplicibus sericeis, scu pilis stellatis tomentosis; racemis brevibus paucifloris; corollis quinquepartitis.

§• 1. *Baccis glabris; foliis glabris v. villosii, pili* plerumque simplicibus sericeis.*

335. S. ACERIFOLIUM Dunal 1. c. 41. (ed. 2. inediti. U 131.) - H. B. Kih. Nov. gen el spec. pi. III. 40. — Kih. Synops. plant, aequinoct. II. 176. — G. Don I. c. no 209. — Suffruticosum: ramis folnsq. ulrinq. aculealis el hispido-piloils haslalo-tnlobis cordatis, longe peliolatis; pedunculi* pauciflons; calycib. inermibns. 5 — Aculei subulali clongati recti flavi. Folia subquadnpollicana, lobis acumlinalis, lateralib. divergeniib., exlrsorsum ad basin obsolete angulalis, lobo medio maximo. Pedonculi aculeati. Corolla violacea. Calyx quinquelobus. — Crescit in No\|a Andalusia ad coenobium Garipense.
- JJO. S. MYRIACANTHUM Danal, Solan, monogr. 218. t. 19., Sjnopv 41. - G Don 1. c. no. 300. — Caole aculeatissimo piloso; aculeis mollib. acicularib.; foil, cordalia sinualo-angulalis acutis villosissimis, ulrinqoe aculeatis. 5 - Pili cinerei Aculei recti. Podunculi graciles 2-3-flori suboppoiiilifolii tublnermei. Segmenla ealycina oblongo-subulala, exlat villosa, margine ciliata. Corolla extos pilosa, segmenlis lineari-lanceolalis aculls. — Differl a 5. *aeuUaiissimo* foliis villosissim binuaio-angulatii non lobatla acaleisque mlnoribas gracilioribaique. — Crescit..'
337. 8. ACULEATISSIMUM Jcq. Collect. I. 100., leon. pi. rar. 1. L 41. - Dunal I. c — G. Don I. o. no. 301. — Caule frolooso aculeaUssimo; foil aabcordaila lobatis, utrlnq. villosis aooleallsq., lobis aevala denlalis. & — Aculei fubulati InaequaJes, villis intermixes. Pedunculi subinermes brevisslmi pauciflori. Flores plerlque aborlivl. Corollae albae segmenta acuta. Bacca parva globosa cerasiformts maculis vindibus albisque ad^pcrsa, demum flava. — Crescit in America tropica.
338. S. PLATAMFOLIUM Hook. Dot. Magaz. t. 2018. - G. Don I. c. 43ft. no. 302. - Caule piloso parce aculealo, aculeis recln; foil, quinquelobis, lobis profundo denlalis aculis, pedunculis lateralib. aggregatis plerumq. uniOorif nutantib.; baccis vanegalis. 5 — Corolla profunde quinqueflida revoluta pallide uolacea, margine pilosa. Caulia piloiui. Folia pubeicentia. Bacca magoa subglobosa, maculls albis vmdibusque pulcbre variegata. — Crescil in America anstrali.
330. 8. INCARCBRATUM Rt. el Par. Flor. Peruv. II. 40. t 170. Bg. a. - Dunal I. c. — G. Don I. c. no. 303. — Caule aculealo tilloso luffkrnticoao; roll, plerumq. gemlnalls cordatis slouato-angulaiis acuminaUs aouleatis; florib. aecundis; baccis a segmenlis calycinis inclusis. § — Acnlel Inaequales, basl compress!, apice subulali, aln fill formes minutl. Folia magnllodine Inaeqnalla albo-pilosa. Pedunculi >illosi subinermes, pedlccllls cymoso-umbellatis. Calyx villotut, segmen- tis reflexis liutMnbui Corolla pallide \iolacea. Bacca alba oblonga, *Ceratt* magnitudine. — C.rcsni in Peruvia (Chuncao).
340. 8. MAMMOSIM Linn. Spec, plant 207. - Aublcl, Guian I. 210 - Thnlirg Fl. Capens II. 58. - Dunal I. c — G. Don I. c no. 304. — Herbaceum: raule villoso parce aculealo; foil, subcordalis lobatla fillosls, ulrinq. aculeatis; baccis magms; basi mammosis. O — Aculei compress! flavl, basl dilatati, apice sabolaU recti t. incurvi. Folia magna, laniudine lungiudlnequt plerumque aequalia, lobis acutis sinualo-dcutis. Pedunculi inrnnes 3-4-ffori birves. Calyx villosissimus. Corolla violacea v. eerulea, aegmeniis aublinearibns. Aotberae coruiculaUf Bacca magna lutea mammosa ?. circa basin mammulota, eonica. — *S rtUotunnum* Zucc. Cent. I. 48. - *Powwm Sodat* Merian, Sarin. 87. L 27. - *Solanum imericanum molie foliorum aculeit el mtrvis /Uv\$icfnhbut, fructu mammosn* Tourncf. Inslil rvi herb 140 - Sloanc, lli>l Jamair. 38. t 12. fig |. - plum rass. t 4 fig .17. Pluk Alm.ii; 130 v Phjl 1 2» fig I. - Creicilin Virginia, Guiana, in insults Aulillanin Inriiacqur ocrnli'iilalid rl in Promonlono bona* »pri ill S. ACK.IIARE Swrtz mns in llorm rl Krhult S)>t >cgcl 1\ (M7 G Don I c no. 305 — Ctule fructinso aculealo, jcultm »ubulais aceron»; foil rolun-

- dato-cordatis repaodis acuteq. angulatis, ulrioq. aculeatid, tapra pilis stellalis hispidis, infra lomenlosis; pedunculis aiillarib. terminalibq. longissimis raulti-Doris. 5 — Aculei recti. Peduoculi solilarii foliorum longitudine pilosi, apice bifidi. Flores magni coerulei. Calyx seiaceo-pilosus. — Crescil in Brasilia.
342. S. CILIATUM Lam Illusr. gen. no. 2360. — Dunal, Monogr. Solan. 221. t 18., Synops. 41. — G. Don I. c. no. 300. — Caule berbaceo; foil, subcordatis sinuato-lobatis ciliatis, lobis oblusis; pedunculis brevib. paucifloris; corollis 5-partitis; baccis globosis subsuccis. Q — Differt a 5. *Campehiense* foliis non denlalis, pilis simplicibus cauleque aculeato nee hispido. Corymbi 2-3-, rarius 5-flori. Flores albi nutantes. Bacca Jaglande minor. — 5. *ciliare* Willd. Enam. pi. hort. Berol. I. 237. — S. *Capiteoides* Hort. Paris. — Creait ?
343. S. LIVIDUM Willd. Herb. ex Lnk. Ennmer. pi. hort. Beroln. I. 188. — G. Don I. c. no. 307. — Foil, subcordatis stauato-pinnatifidis, supra subtomentosis vireolibus, subtus tomentosis canescentibus; aculeis basi dilatatis. 6 — Aculei basi ad 4 lineas lati. Kami et pelioli teuiter tomentosi. Folia 3-4-pollicaria, 2-3 poll. I a la, basi aequalia anl inaequalia, aculeis in nervis. Pedunculi laterales pollicares 4-5-flori tomentosi. Calyx tomentosus aculeisque longis armatus. Corolla alba. — Crescit in Madagascaria.
314. S. BARBISETUM Nees ab Efenb. Transact of the Linn. Soc. XVII. 51. - G. Don I. c. no. 300. — Foil, geminalis ellipticis sinuatis, ulrinq. birsatissimis toleaiisq., laciniis angulatis; racemis lateralibus simplicibus multifloris secundis aculeatis; baccis glabris, calyce aciculoso-seloso tectis. Q? — Species *S. aculeatinimi* habitu, sed distincto facilis ob inOoreicentiam racemosam el fructum calyce velatum. — 5. *Melongena* Wall. Cat 2638. E. — Crescii in India orientali (Silbel, in ripa Allran fluvii in Ifartabania, in Tavoy).
345. S. gTRAMOPHOUUM Jcq. Mhccell. II. 908., Icon. rar. pi. I. t. 44. - Dunal I. c. 42. — 6. Don I. c. no. 300. — Caule fruticoso aculeato; foil, cordatis sinuatis v. acute lobatis, tirinque. Tillosis aculeatisq.; pedunculis calycibus inermibus. 5 — Folia pedalia longe petiolata mollia, aculeis magnis rectis recurvatisque obsita. Pedicelli cymosi Segmenta calycina parva rotundata. Corolla alba v. purpurascens, segmentis lanceolatis. Stigma subcapitata. - (Willd. Spec. plant I. 1044. excl. Ait) — Crescil in India orientali.
340. S. FLAVESCENS Dunal I. c. 42. (ed. 2. inedit 107. fig. 2.) - G. Don I. c. no. 310. — Caule fruticoso aculeato canescente; foil, cordatis sinuatis oblongis, ulrinque aculeatis et tomentosis, subtus flavescentibus; pedunculis, calycibus bracteisq. pilosissimis. — Taulis valde aculeatos; aculei foliorum longi rigidi, pili stellati, pedicellorum, calycum baccarumque aolem pili simplices. Baccae ovales fuscae. Calycis segmenta ovata acuta. — Valde affine 5. *Uuiocarpo*, sed differt foliis sinuatis, lobis recessibusque obtusis. — 8. *firox* fi. *flavescens* Nees ab Efenb. Transact of the Linn. Soc. XVII. 115. — Crescil in India orientali.
347. S. FBROX Linn. Sp. pl. 987. — Invenitur ab Efenb. Transact of the Linn. Soc. XVII. 115. (excl. var. *fi.*) — Dunal I. c. (ed. 2. Inedit t. 107.) — G. Don I. c. no. 311. — Caule perennante berbaceo, basi lignescente foliisque geminis cordatis sinuato-angulatis, ulrinque tomentosis lanuginosis aculeatisq.; pedunculis infrafoliaceis pedicellisq. abbreviatis; calycibus baccisq. birsatis. — Folia magna, supra v. infra subtomentosa, subtus racemis calycibusque tomentosa aculeata. Pedunculi axillares simplices breviter. Corolla alba. Bacca matura data. - Varietas calycibus et peduculis magis minutis aculeatis, aculeolis parvis subbirsatis quandoque latcortitas. — 5. *imtoiurratum* Buror, Bijdragrn 701. - *S. lasiocarpum* Dunal, Monogr. t. 2. - Boem. et Sebul. Syst. vegrl. IV. OK - 5. *kirtutum* B&h. FL. Ind. 1. *U. — 8. *mmmmium* Linn. Flor. Cochinch. I. 102. (impresso ad *S. stramonifolium* Jcq. rtialasa). - 5. *fmddeum* /Hsletecstf *wtmjdm* *tilioium totum*, *flrudibui erocfis* Burm. Thataar. Zeylaic. 21*. — *S. pomifm* *fmdntm*, *frmlu rotundo Kirsulo*, *foUU* *tOn'sifiM* *tpimohs* *H kirtutis*. *Non alko* Mont. Oxon. Hitt. ML. W3. sect IX t. 2. fig. li. - Crescit in India orientali.

348. 8. *ORINOCENSE* Danal_f Synops. 42. — H. B. Kth. Nov. gen. et ipec. pi. III 40. — Klh. Synops. plant aequiu. II. 176. — G. Don I. c. 430. no. 312. — Caulo herbaceo aculealissimo; foil, cordalis sinuato-angulalis, ulrinq. lomenloos aculealis; racemis inermib.; baccis hispidis, calyce oblectis. 2l. - Caulis el folia tomento stellato palhde flavescence lecta. Aculei longl subulali subcompressi, ban brunnei sublanati, aplce ferruginei v. lutei. Racemi laterales. — 5 *feroct* valdo affine, sed differt caule aculealissimo, folns utnnque tomentosit el racemis inermibus. — Crescil frequenlissime ad ripam Orinoci et AUBapl prope pagum San Fernando de Atabapo. #
340. S. *WIGHTH* Nees ab Esenb. 1. c. 51. - G. Don 1. c. no. 313. — Nees ab Esenb. Nov. oct acad. Caesar. Leopold. Carol, nat. curios. XVIII. 358. t t. 18. — Fascicnlalo-birsulum. caule (sufTrulicoso?) tcreti aculeis aciclanb. armalo; foil, solilariis subcordaio-ovalis ellipticisve slnualisaculissubaculealis; fasciculis paucifloris; pedunculis frnctus elongalis; baccis glabris globosis, calyce Inermi hirsuto tec'is 6 — Differt a *S. barbiteto* el 5. *feroe* pedicellis fructiferis et calycis lamemus maxlme elongatis neque aciculatis sed fasciculato-birlis. — Crescit in India oriental!.

§. 3. *Acanthophris affinia, corollis quinque/ldd?*

350. S. *CAMPANULATUM* R. Rr. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 440. - Dunal, Synopt. 42. — G. Don I. c. no. 314. — BoL Magat. L 36721 f — Knowles el Wetue. The floral Cabinet 1. 37. t t. 18. — Canle herbaceo; aculeis confertisslmis rectlt subulatis; foil, ovatis angolalo-lobalis, ntrioq. hlrsuils calyceibq. aculeaUssimis r ractmi* simplicib. armatis; corollis campanolalls. O — In Nova llollandla ad Port Jackson.
351. 6 *ARMATUM* R. Rr. Prodr. fl. Nov. Holl. 1.446. - Dunal I. c 42. (ed 2. inedit. I. 60) — G Don 1. c. no. 315. — Caule herbaceo diffuso; aculeis conferiis reriis selaceo-subulatis; foil, oblongis sinuato-pinnahfidis, lobis angulatin sinuati>te, ulrinq glabris caljcbq. aculealis; racemis 2-5-flons_f pedunculis solilarns. O — Aculei auranliaci. Folia saepe geminala. Pubescenlia stellala. Racca globosa. — Crescil in Nova Dollandia (New South Wales).
352. S. *PINGETUM* R. Rr. I. c. - Dunal I. c. 43. (ed. 2. inedit 170.) - G. Don I. c. no. 310. — Caule herbaceo; aeuleis rectis acerosis; foil, ovalo-oblongis pinnaltfldo- v. rcpendo-slnualia membranaceis, ulrinq. pilous concolonb. caljcbq. aculeaiis; pedunculis soliuriii gemimsve umflons. O — Corolla coerufesctnli-vlolacea. Pubeseentia siellala. - Crescil In Nova Hollandia.
353. S. *CINEREUM* R. Rr. 1. c - Dual I. c. - G. Don I. e. no. 317. - Caale herbaceo; aculeis reciis subnlaio-setaeois; foil, oblongis pinnatifido-sinoatjs, supra glabris, sublus lomenlo cinereo vestltis, utrinq. cum calycib. aculealis; pedunculis 2-3-flons. O — Crescit in New South Wales in Nova Hollandia.
354. <*. *LATIFOLIUM* Poir. Dirt. IV. 303 - Dunal I. c. (ed. 2. inedit. t G6 - G. Don I. c. no. 318. — Caule fuffrulico^o aculealo; foil, peliolatin eunralis o>alu maximls sinuato-^innatifldis, ulrinq. pilosit aculeatisq., lobis acuiis, »inubus oblusis; racemis lateralib. pavcifloris. 6 — Valde afDne *S. ngtdo*, ted minus rigidum, caulis alnor, folia majora, flores non terminates. Caulis viridis glaber; ramis apice villosi. Folia vindia mollia. Aculei riffiduli vltloti. Floret ferilloa iterilesque muti Caljx villosus interdum acolotlas, foris ttorilli »lerumque inermis. Corolla alba, segmonllt ovatis oblasis mocronatls. — In America troptra.
355. S. *CRINITUM* Lam. llnttr. ffen. no. 2396. - Poir. I. C.2Q7. - Dunal I. c fed 2. inedit t. 71.) - G. Don I. c, no. 310. — Caule fraUeoso aculealo; foil o\alis sinualo-angulatis tomenlosis, In nenro medlo aculeatis; peiolis, pedunculi» calycibq aculeis capillanb armatis; baccis villosis. 6 — Caulis villosisMinuo aculealissimus, aculeis nonnullis ngidis, alus usque numerosionbus npillanbut in pilos 5-6 scllalos plcrumque abeunlibus. Folia magna lactfa, infra albrniia aculeisque ngidis armaia, supra subinrrmia Florrs in pamrulam ipicaiam digesli. Calyx baccam includil. Corolla manna alba, infra tilloui. medium osquo in segmenla 5 o^ala obtusa dmsa Barca ovala frescu in Cayenne

350. *S. MACRANTHUM* Dunal I. c. (ed. 2. inedit. t. 72.) — G. Don I. c. no. 320. — Caule aculeato lanato; foliis, magnis subcordatis acuminatis angulato-lobatis, utrinque lanatis, infra aculeatis; racemis cymosis lanatis. 5 — Pubescentia T. lana stellata canescenti-fusca. Aculei recti flavicanti-brunnei. Folia interdum geminala, supra canescenti-Yirentia, infra rufescentia, nervis raris. Racemi simplices v. bifidi inermes v. aculeis paucis armati. Corolla magna, extus sericea. — Crescit in Brasilia.
357. *S. SESSILIFLORUM* Dunal I. c. (ed. 2. inedit. t. 73.) — G. Don I. c. no. 320. — Ramis tomentosis subinermibus; foliis, subcordatis magis sinuato-angulatis, utrinque sericeo-tomentosis; floribus sessilibus. — Tomenium ferrugineum. Folia ciliata, Junio ferruginea. Florea parva 3-4 aggregata. Calyx extus lomentosus. Corolla extus tomentosa. Baccae edules, ab incolis *Cubiot* appellatur. — Crescit in Brasilia ad arborem Para.
- Bectlo ?1. *LATHYROCARPUM* 6. Don I. c. 436.
- Caoli* aculeatis. Folia sinuata v. lobata. Racemi simplices v. subsimplices. Corolla quinquefida. Bacca parva globosa pisiformis.
- 35a 8. *MILLERI* Jacq. Collect. bot. IV. 200., Icon. rar. II. L. 330. — Lam. Illustr. gen. no. 2370. — Dunal I. c. 43. — G. Don I. c. 322. — Caule suffruticoso aculeato; foliis, glabris lobatis obtusiusculis aculeatis; pedunculis plerumque geminalis. 6 — Differit a species a 5. *Iriobaia* foliis pinnatis Bodo-quinquelobis floribusque multo minoribus albis. — Caulis nitidus glaber. Aculei caulini parum recurvati. Pedunculi uniflori solitarii geminati v. terni, foliorum lobis repandi oblusi. Bacca rotunda glabra rubicundo-flava nuda pisiformis (ex Jacq.), planta annua, baccae rubris (ex Mill.). — *S. iriobaia* Linn. Spec. pi. (I. ed.) 168. — *S. Mubbi-fiorum* Ortega, Decad. plant. IX. 118. — 5. *SdWrm-Sdktma* Mill. Diet. no. 23. — Crescit in Promontorio bonae spei.
390. *S. TRILOBATUM* Lion. Spec. plant. 210. — Dunal I. c. 44. — Nee* ab Eucn. Transact. of the Linn. Soc. XVII. 50. f. — G. Don I. c. 437. no. 323. — Caule frutescente scandente uocinato-aculeato; foliis, panduriformi-trilobis trilobis obtusis glabris, petioli pedunculisque aculeatis; racemis subumbellatis terminalibus lateralibusque; corollis profunde quinquefidis. — Bonn. Flor. Indie. 57. t. 2. fig. 2. — 5. *aceiatafolium* Lam. Illustr. gen. no. 2381. — Dunal, Solan. monogr. 210., Synops. 44. — Roem. et Schult. *Met. veget.* IV. 652. — *S. fusca* Lam. Illustr. gen. no. 2381. — *S. tinoium Jawwicmense glabrum, foliis pinnatis minus profunde lanatis* Pluk. Almag. 351. Pl. logr. t. 316. fig. 5. — Cognoscitur a ceteris ab omnibus sui generis caule flagelliformi anguloso glabro aculeis nullis aduncis obliquo. — In ora Coromandeliana ad viam crescit.
356. *S. ABUIKKTOSUM* Nees ab Benth. I. c. 44. — G. Don I. c. no. 324. — Herbarium: canto procombantibus armenis aculeato; foliis, ovato-oblongis rotundo-sinulatis lobatis lobatis; pedunculis nudo-teretibus Mibuni Oorit calyceque torbinato quinquefidis aculeatis, laciniis calicis subulatis. — Foliis pinnatis incisitis suboppositis ab omnibus affinis specibus differt videtur. Pannum exoleomque *Solani dufim* existimari possit exemplum, sed minus differt videtur ab hoc calyce, in Oerescentia et foliis. — *S. Mrlong**** Wall, fat. no. att. F. — Crescit in India orientali, Pulo-Penan*.
361. *S. RIGIDUM* Jacq. Hort. Schornb. I. 10. t. 41. — Dunal, Synops. Solan. 44. — G. Don I. c. no. 30. — Caule aculeato suffruticoso; foliis, tuberculatis lobatis, pilis stellatis fasciculatis antrorsis aculeatisque, arboribus raris; neomit paucifloris. — Rami subnudi. Folia undata, lobis obtusis. Arborum ree sinulata nitida laevia. Racemi lateraliter iniplicati. Pedicelli nudi. — *S. Mrlong**** Wall, fat. no. att. F. — Crescit in India orientali, Pulo-Penan*.
361. *S. AEGIDIUM* Lam. Illustr. gen. no. 2375. — Poir. Diet. It. JU4. Dunal I. c. 44. — G. Don I. c. no. 30. — Caule aculeato suffruticoso; foliis, tuberculatis lobatis, pilis stellatis fasciculatis antrorsis aculeatisque, arboribus raris; neomit paucifloris. — Rami subnudi. Folia undata, lobis obtusis. Arborum ree sinulata nitida laevia. Racemi lateraliter iniplicati. Pedicelli nudi. — *S. Mrlong**** Wall, fat. no. att. F. — Crescit in India orientali, Pulo-Penan*.
361. *S. AEGIDIUM* Lam. Illustr. gen. no. 2375. — Poir. Diet. It. JU4. Dunal I. c. 44. — G. Don I. c. no. 30. — Caule aculeato suffruticoso; foliis, tuberculatis lobatis, pilis stellatis fasciculatis antrorsis aculeatisque, arboribus raris; neomit paucifloris. — Rami subnudi. Folia undata, lobis obtusis. Arborum ree sinulata nitida laevia. Racemi lateraliter iniplicati. Pedicelli nudi. — *S. Mrlong**** Wall, fat. no. att. F. — Crescit in India orientali, Pulo-Penan*.

- Caule fruticoso aculeato; foliis ovatis sinuato-angulatis, infra tomentosis; racemis brevibus; calycibus inermibus. 6 — Baccarum parvarum glabrae rubrae edules. — Crescit in Madagascar.
363. *S. CAROLINENSE* Linn. Spec. plant. 268. — Jcq. Collect. II. 287., Icon. rar. II. t. 331. — Michx. Fl. Am. bor. 1. 150. - Dunal I. c. — Dill. Hort. Ellh. 362. t. 200. fig. 348. — G. Don I. c. no. 3*27. — Caule aculeato herbaceo; foliis ovato-oblongis tomentosis sinuato-lobatis acuminatis; racemis simplicibus. laxis. 2|. — Radix repens. Caulis pallide viridis, pilis stellatis obsitus. Foliorum segmenta aculeata, folia supra in nervo medio sublusque in venis primariis aculeata. Aculei reoti subulati lutei. Racemi simplices laterales et terminales elongati. Corolla alba v. pallide coerulea. Baccarum globosa Piso major; matura (lava. Segmenta calycina lanceolata acuminata. — Crescit in America boreali.
- J64. *S. CANDIDUM* Lindl. Dol. Reg. (New Ser.) XII. Misc. 7a no. 125. - Caule fruticoso villosissimo, aculeis rectis dense armato; foliis oblongis cordatis sinuato-angulatis lomenosis, subtus incanis, venis utrinque petiolisque villosis aculeatis; racemis sessilibus. lanalis dislichis sub folio natis; rachi aculeata; calycibus 5-lobis inermibus. 5 — in latine in Mexico.
365. *S. VIOLACEUM* Jcq. Fragment 82. t. 132. fig. 1. - * Dunal I. c. - G. Don I. c. no. 328. — Caule fruticoso aculeato; foliis lobato-sinuatis tomentosis, basi inaequalibus, superioribus geminalibus; racemis subsimplicibus; calycibus aculeatis. > - Differt a *S. indicum* foliorum sinibus obtusis majoribus paucioribusque, lobis integris nee dentato-angulatis, aculeis caulibus compressis recurvis, segmentis calycinis non deflexis, corollae minoribus, baccis globosis. Folia supra viridia, infra canescens. Pubescens stellata. Aculei basi brunnei, apice flavi, foliorum recti inaequales. Racemi pauciflori tomentosi aculeati, basi interdum furcati, ramis valibus reliquis unifloris. Corolla pallide violacea, lobis lanceolatis aculeatis. Baccarum cupreae. — *S. euncatum* Muhl. Modiod. pl. 470. — *S. Indicum* Lam. Illusr. gen. no. 2300. — Poir. Diet. IV. WO e (cl. n) n. Pluk. - Witld. Spec. plant. I. 1012. eicl. syn. Rib. Dill. Linn. Fl. (•!) - Ilurr. The*. Ze)lan. 220. t. 102. — *Solanum fruticosum Indicum frudu rubro* Tournef. Instil. rei herb. 140. — *Scheru-Skunda* Rheede, Hort. Malab. II. t. JO. — Crete a in Zeylan, Malabar, China et in New South Wales in Nova Hollandia.
306. 8. *PYRACANTUM* Lam. Illusr. gen. no. 2361. - Poir. Diet. IV. 200. - Dunal I. c. — G. Don I. c. no. 329. — Caule fruticoso aculeato; foliis oblongis angustis aculeatis sinuato-pinnatis tomentosis aculeatis, aculeis rectis subcoarctatis. > — Rami Juniores tomentosi. Pubescens siliqua Foliorum nervus medius supra niger, lobi subintegri acummati, sinibus oblati. Aculei reoti subulati rubri. Petioli, pedunculi, pedicelli et calices albo-tomentosi aculeati. Racemi multiplices multiflori. Calyx ferrugineus, segmentis ovato-oblongis. Corolla composita - violacea, stella intus pallidior, extus virescente notata. Rara ululosa flavescens-tiridi*, demum fusca Plum duplo magnitudine reredens. *S. pyraeantha* Sm. Exot bot. II. 0. I. 04. — *S. runcinatum* Wendl. Oben. 43. - *S. pyraeanthon* Jcq. Hort. Schoenbr. IV. JO. I. 470. — *fi. inerme* Sims, Bol. Magai. t. 2M7. - Pedunculis calyribusque inermibus* - In Madagascar.
367. *S. VIRGINIANUM* Linn. h)cr. plant 967. — tnh. Fl. Am. septentr. I. IM. — Dunal I. c. 45. — G. Don I. c. no. 339. — Caule aasmo erecto aculeato; foliis pinnatis sinuatis, atrinque aculeatis glabris, margine ciliatis, lobis sinuatis obtusis; racemis aculeatis simplicibus. 0 — Caulis subangulatus. Folia viridia. Aculei reoti subulati albetcenti. Racemi 0-7-flori. Calyx aculeatus. Corolla monomorpha. Baccarum parva rotundata-oblonga, immatura albo-indicis-arietata. - Dill. Hort. Killh. 350. t. 267. 0*. 346. - Pluk. Alma*. 351., Pb)lnr. I. 02 fig. 3. - Cre-m in Vmca boreali a > ir^inia ad Carolinam utque.
368. *S. J)CI)l IM \NilM* Spec. plantar. I. 1011. - Need ab Kteub. Transact. of the Linn. Soc. Mil. 50 ; — [ii Dun I. r no. 131. el p. 43H no. XH.) - Herbaceum perenne: caule procumbente ramoso aculeato; foliis lobato-oblongis sinuato-pinnatis, utrinque (jumph. saltern »tellato-hirtis aruleatis« q. marline

nudis, lacioii* aeulis; race mis rilrafoliarei* paucifloris calyceq. campanulnto quinquefido aculealis, laciniis laU* o. ilis cuspidululis, in fruclu palenlibus. 2J.

a. Caule foliisque parrius aculcalis, arlate glabriusculis, aculeis grnciliorib.; bacca majori pollicari. » rs ab l'.srnb. I. c. 57. — *S. diffutum* Rxb. Fl. Indie, II. 250. - Wall. Cal. 2013. A. - V. *xanthocarpum* Schrad el Wendl. ^eri. Ilannoteran. I. 8. t. 1. - Willd. Spec. planl. I. 1041. - Dunal, Solan, raonogr. 231., Synops. 43. - G. Dón I. c 438. oo 332. - Roem. el Schuli. S)1. vegeI. IV. 655.

9. Caulc foliisq. aculeia crassis talidisq. armalia; bacca minori semipollicari. Neos ab Esenb. I. c. — 5. *Jaequimi* Willd. I. e. — Dunal I. c 100., Synops. 45. — Roem. el Srhult I. c. 054. - Rib. Fl. Iadic II. 851. - Wall. Cat 2012. A-D. — G. DOB I. c. p. 437. no. 331. — 5. *Yirgimanum* Jcq. Icon. pi. rar. II. I. 334. — *S. diffutum* Wall. Cat 8013. B. C. D.

Solanum diffutum el *S. Jacquini* Rib. m̄ fariplalum nomine differunt »oloque aculeorum inGrmiorum indole el frucius ampliore mole diffruni. Ilaec auiem per gradus »en*ira scn»imque transeunt Varial caeierum baec species:

ly Aculeis caulinis foliorumque el pedunculorum parciioribu* el subulati* in folio rum nonnisi cosla media obsertandis (5. *diffutum* Rib.) iisdemque foriioribus t*l conferlis longis et crassis conico-subulatii«, foliorum cotUm el ramo» pnuiarios, peiiolos, pedunculum communem et parlialeicalyce»qutoccupanlibuii.

2) Peliolis modo folia aequanlibus, modo foliia brevioribu\$.

3y Fuliorum hciniut modo lalioribus rpandis et %ublobalis v. tubtrilobi*, modo **angustioribus** cl utrinqoc angulo uno prominrni** |>raodili> r. **sinuato-pinnatilibus**.

4, Fructu magnitudine *Ctrti* maiimi el *Grottutarimt* luteo v. albo viridique-variegalo. — loqatoDdam cril, nomoe *S. tmrwumictum* Meet ab Enenb. [cf. p. 88. no. 300.) Inter hojntce tpeciei varietate* pertineat Differre vidrlur a *S. diffuto* Rkb. leneritale, aculeif canllnif reconii, foliit luhintegri* suhnliaiK, pedunculii unillorij calycc et corolla minore. — Creicit in India onrni.ili, in iniula Su. Maunii el in Promonlorio bonae ipei.

300. *S. RICIURDI* Dunal, S)nop«. 45. (ed. 8. inedit. I. 67. 6g. I. - (i. Don I. c. p. 43*. no. *Stl* — Caulc aculealo Miiitq. ulrinq. lomeuloso-tcabn*. infra rinerei*; florib. panictilalii. > — Folia mato-oblonga, olriog. pili« »lallali» o|IMU, arulfi **paginae** %uperiori« recti, infprinn« rerurtali. Raemi timplire« ntetlain-piin«i rum **calyccibus** prdicellim|ue aculeaii. Corolla magna, eilu» villo«a, macula quinqut-radiata in ronlro. — <>r»ril.?

170. *S. IIVsTKIX* R. Rr. Prodr. Fl. Nov. Iloll I. m :d. » r » »b F.srnbl I 302., - Dunal I. c. — <i O»n I. r. no. 331. — Caulr hrrhareo diff««o; aeoki* conf»rti«»l-ml% tubulalia reclit; MI. obtoigta plimtitilo-MOMlit gtabrit caljclb^ antlef iiMi«U; Mrolta ftrmato. Q — Cntch In RMM BOHM^IM ora astrall.

t^tk FIL dTPTMAIfiW Dual, SyMpt, 45.

Fohi« pinnatildu, biplnaallMii ginMllaectiaque. Corollu quinqucfidu **Baclo** cal)ce aurio rl aeolealo lectif.

{. I. *Anthrrit aequalibus*.

371. s \ I liMíATI M I MIUI. But Reg. >c» Srr. \ I Mite 74. no. 117. ; - 1^ndiq. glabrum rl quati lirmrr obilurlum: cauli* brrbarro arukahtinn. full, **pinnatilibus** Idit riluiit, pholo rn*li»q. arulealt*, |O|M« ohloncit tubtinujli* aruiit. **umbellis** lafraaiillaribu* nuunhbut; antberu ar<li«libu% ^ Cre«m in i)»iuru.

371 8. REFRAtrtH Hook, rl Arn. B»i. Dcrrh. «o». 3ftj - truuomm r«r»»» **per** b««(cea)il-fcrrriigineit »r4hnt arulr«ii«. full. gUbrmtnili* profundr **pinnatilibus** eotta Bf4U ***** Acukah*. Urinnt remotu ataimub. lair lane#olau» **integerrimis**, trrmia«|i ajai«r»; rarraaia foli« longiorib. Uirralib. coapottn*, **ramis rios-** gale rrrfrartU, apir« praenpur Ouffrri*; Oor.b. «rrandi«. prdirrili* **Qotrm** ** **quanti** b. r«l)r« bemupbarnro-fampanulaio 5-dmuiu glabro, corolla **proful** ^* **3-6da** .i /rrtrit IQ Mmro

373. *S. DALBIBI* Dunal, Monogr. Solan. 2J2 I 3, Syuop» 4V - G Dun 1 c no 335. — Dot Mag t. 2568. f — Maund el Henslo*, The Bolanis I I 29 t — II B. Klh. Nov. gen et spec, plant. III. 47 — Kill. Synops. pi aequocel II 177 - Frnticosum ramm villosis aculealis, foil, pinoaiifidis pilosis aculraii*, ljcinn» a^uiis sinuato-dentalis, racemis laterahb. calycibq. aculealis; baccit oblectis, antheris subacqualibus. 5 — Tola planta piha aimplicibua vestiia esl, pilin apicc glandulifens. Folia molhier \iscida aculeala. Pelioli aculeall. Calyx in cram v aculcalus Aculci rclli subulali graciles flavi \. flavicanli-rubentei Corolla magna alba semiquinquefida Dacca o\ak\i ccra*iformis cuprea. — *S. decurrems* Balbis, Icon, el dc«cnpl. pi. I. 17 I I. — 6\ mcosum Lag gen. el «pee. nov. 10 no 145. — *S. tuymbrttfohum* Lam. Illustr. gen no *FW). - *S. mflalum* Ilorneni Cal. Hort. Hafn. I. 221. — 5 *brasstcaefoltum* Jcq Eclog 14 I 7 - *S. formatum* Hort Dorp a I. calal. — *S. Mourtttanum* Velins du jard de Pan* 21. I GO — *S. vuctdum* Schmeigg. Enum pi 07 — Marl. Enum. hort Eriang 04 — £ *Thomm* Gmel Cal. horL Carlsr 8M. - *fi purpureum* Hook Dot. Magaz U 2R2H - Tlorrlus purpureif. — 5. *Balbuti* Ker, Bot. Begin, i. 140 - Barca magna da\, calyce lecla. — Crescll ID declhilale Aodium Peruvianorum prop* Ayavaca cl ad ripam flamioli Culaci.
- 374 *S. TECTUM* Pen. Enchmd. I. 228. - Dunal, gyoopt. 46. - G. Don I c im 3J0. — Caulc frulicoso lereli acoleato; foil, blpionalifldo-iiouaiia MIORM, uiriug aculealis; baccia calyce villosio leclli 6 — Planla villota. Folia blpionaiiOda, obbis obtusii undulatit. Acolei eratsl albidl, graciliorea bruonel. Corolla lutea, e&los lomenloaa. Slamlna cum faaela erenit alieraaniia. Baeca globoia gtabra. Bacemi cymosf eitrafoliaeal. Peduncoli el calyces aculealiaaimi. - 5. *ttnumlum* Willd. Spec, plant I. 10M. — Pen. I. e. 827. — *Solanum fruclu leclo* Cav. Icon el de»cripl IV 5 1.300. — *S nllotum* D Dielr Gaertner-Lexicon I\ 341 Crescil in Mexico.
- |. 2. *Anthent tnacquahbus*.
- 375 8. (MCTERIIM Link, Enumer. pi. borl. llerolm I 1*0) IOBMTI M I am Illuilr gen. II. 2). no. 2387. - Poir. Diet. IV. 30*. - JUM Ann du Mus dhi^i nal III. 120 L 9. — Dunal I. c. — G Don I c. no. 337. — Caule aculrato glabrñ subherbareo; foil, plnnalif aculealif, legmentis plnnatifldit obluaf, aculeit n-gldia; aniheri* declinatla coroifonnibut, ioferiorf majori product! •• I ma, ^ — Folia magna glabra. Pedunculi et calycea villoti hasiq aculeatl Aeulel tubulalii flan, bail foaceaealet, caJycinl selaeai. Bacemi »implic» lateralea. Corolla magna flava Irregularlf •emiquoloueBda, aenMoUa rdtole. - 5. *UUrmmdrmm* Jam I. c. — *Nycterium cordamtnrfcUum* Vent Jard. de Malm. oo. 6S. — Cretclt to Mexico et in Brasilia.
376. 8. IIETERAMIRUM Pnb FI \merie. tept II. 731. L 7. - G. Don 1 c no. *W — Annaum herbacpum: caule foluiq. aculealin piloaia; foil, ovalia obtu»iii pin-natiOdif, ulrinq pilosia, segmenlx obtolele crenatif undulatUq, anthrm drrlin-natii dittantib., inferior! corniformi productiisima; baccit cahrt erhinalo inrlu-ala. O — Corolla lutea. Peduoculi lateralei mullifloH. — *Androcera lobaim* Null Gen. plant Americ. I 19. - *NfcUrtmm loboimm* Sweet - *NSci*rimm Imitmrn* Donn. — Cre«nt in America boreall (Htaao«ri, Arkaaaaa etc).
371. 8. BOSTBATUM Danal. Monofr. Solan. B i l K , B|Mpt. aj. - O. Den I. e DO. 330. — Caule berbaeeo anno aculeate pUoao, pills apioe atetlaUt; foil, pin-nalifldia, lacinila obtaala; eorollia irregularib.; aotberit declioalla eoroifotmlbuK. infima maxima prododiitima O — Folia utrlnque acaleatiaalma pilltque cinerru simplicibua et atellatia obalu. Aealel laaequalee rtcti aubulali fla^trfntr* Ka-cemi laifralei aimplicea. I'alyi villoaua acvlealaa. Corolla magna lutra, extu« pi-lota semiquinqurnda Barra globoia pisiformit. — Crescil in Mruro
- 378 *S* (MCTHlllltl (• Don in Loud Hort Bril 74 F<>T\M'.s|AMU Dunal I c 40. (ed 1 tnrdil t 70) - I'oir Suppl. III 777 KIT, But Regut i 177 - G. Don, General ty>t of gard aيتد bot I\ 430 no 340 — Caulr ftublignc»crm^ annuopiloto, foil profuodf pinnatilldia, tpgnrenln »inuati». rorollic aubrarralanb

anilicris parvis, infima apice subrecunrala subfusca. Q — Intermedium inter *S. rostratum* et *S. heterodoxum*, sed differit ab utroque aculeis recurvalis robustioribus, foliorum segmentis profundius sinuatis magisque uodulalis; floribus multinerviis magis regularibus sed etiam luteis. — Crescit in Brasilia?

370. *S. (NYCTERIUM) Lnk. Enumer. plant. borU Berolin. I. 180.) HETERODOX! M DC Cat. hort. Monspel. mss. ex Dunal, Monogr. Solao. 235. t. 25., Synops. 40. - 11. B. Kth. Nov. gen. et spec. pi. III. 47. — Klh. Synops. plant, aequinoct. II. 177. — G. Don I. c. no. 311. — Herbaceum: ramis foliisque pilosis aculeatis; foliis bipinnatifidis, segmentis sinuato-trilobis v. runcinalis; pedunculis lateralibus paucifloris cum calycibus aculeatis; antheris declinatis, infima majori productissima. Q — Foliorum segmenta acuta. Pili simplices fiseosi glandoliferi. Aculei subulati (lavi. Corolla parva coeralea, exto puberula. Bacca globosa. — *S. Sodomaeo vimillimum*. — Crescit in regno Mexicano prope Zelaya et Molino de Sarabia.*

Setto VIII. NYCTERIUM Dunal, Synops. Solan. 85.

Foliis cordatis integris v. oblongis sinuatis. Corollis subirregularibus quinquefidis, laciniis acutis reflexis; antheris inaequalibus; baccis globosis, calyce aucto non tectis.

380. *S. INCINELLUM* Liodl. Bel. Regisl. (New Ser.) XIII. t. 15. t - loerme herbaceum: full, inlegerrimis ovato-lanceolatis subcordatis obsolete pubescentibus; panicula terminali; calycibus campanulatis quinquecrenatis; corollae laciniis apice uncinato-hamatis; antheris apice biporosis, anthera infima productior. Q? — Crescit. . . . ?
381. *S. PIBKSCENS* Willd. Pb) L 5. no. 17. t. 3., Spec. plant. I. 1026. - Dunal I. c. 19. — Nees ab Esenb. Transact. of the Linn. Soc. XVII. 00 --- G. Don I. c. no. 312. — Frutescens ierme, lottum pubescent!-b ilium: pubescentia stellari; foliis ovatis acutis integerrimis sabrepandisve; racemis eorymbois laterifoliis; antheris inferioribus productioribus. 6 — Corolla magna purpurea. Maximo affinis *S. Yeperi Uioni* Alu, aed differit. Illa species eae aculeata; foliis cordatis floribusque saepe quadrifidis. — Crescit in India orientali.
382. *S. ESENBECKII* Steud. Nomenclat. bot (ed. 2.) II. 001 - Frutescens | inerme pubescenti-birium: pubescentia stellata; foliis ovatis integerrimis v. sabrepandis; racemo terminali; calyce corollae infundibuliformi; anthera uoae longior. S - *Solani pubescentis* moostrosus prolem Judicaes, sed nihil motu proprio in eo cognoscendum. p-rtica sunt corolla et stamina, aed bacca malura. Singularitas »ita« in calyce corollae a communi generis lipo aberrantibus. — *S. calytrinum* Nees ab Esenb. I. r. 00. (nee Hoc., et Scsv) — fi. Don I. c. no. 313. — *S. Meitamm* Diels. — *Solani pubescentit* var. Wall. Cat. Suppl. no. 67. — In India orientali.
383. *S. NYCTERIUM* Lnk. Eoumer. plant. bort. lrr«hn. I. h(O) \TC8PKRTILK) Ail. llo. kcw. 1. 2M. - Dunal I. c. 3k — Wcodl. HorU Hfrabna. 5. I. 21. - G. Don I. c. no. 341. — Caulis frolleto > foliis cordatis idugrit; corollis tuberculatis. plerumque quadrifidis; artibus fimbriatis. 5 — Caulis areolatus*. Folia »upperna scabra, infra tomentosa, peliis nervis medio aculeate. Tomruum pilosum stellatum. Racemi axillares axillares iomeolae. Flores leucis v. purpureis. Corolla coeralea, eitis lomeno»a. Antherae 4-5, infima elongata. Barr. 1 glabra Cfr. affinis*. — *Ayrtrium eordifolium* Vent. Jard. de Malm. H5. I. W. - Pluk. Almu. 11. Pb) logr. I. 310. fig. X — Crescit in insulis Canariis.
384. *S. TRIDYVIM* Moc. et Sets. Fl. Mexic. iedit. ex Dunal, Synops. ft. cd. t infidil. I. 75., - c. Don I. c. no. 345. - Caulis herbaceus areolatus inermis; foliis ovatis obtusis iomeolae; racemis simplicibus; rachis utrinque in ordo aculeatis: corollis tuberculatis; antheris (ribus) racematis magnum tunc cedentibus. Q - Caulis ferrugineo - olateo. Racemi terminalis ciatillaris. Segmenta calycis 3 acuta. Corolla siliqua »olaeae et albanit apkw. Bacca globosa. - CrMeii | Mexico. *
385. *S. MCTERTY* Uk. Eoumer. plant. bort. Brrolm. MHQ., AMA/OMUM Her. Bot. Regim. I. 71. - Dunal I. c. » infid. 2 inrd. i. *, - Q. Don I. c. no. 310.

Rchb. Flor. exotic. I. 807. — Loddig. Bot. Cabin. I. 358. — Catile frulicoso lomenloso inermi; foil, oblongo-ovalis repandis v. sinuato-lobalis; racemis cymosis scorpioideis; Oorib. polygamis monoids; calycib. florum feiilliam basi aculealis, laciniis calycinis inermib.; corollis irregularib.; antberis iridynamis. 6 — Tola planla piloso-pubescens. Flores magol paicbre coerales corymbosi. — Mexico.

t *Species non satis notae.*

I. WERMLL

* *Foliis iniegru vcl repandit.*

380. S. GILO Raddi mss. in Colla, Ilorl. Ripul. Appendix. III. 52. ex Prsl. Reperl. bol. syst. I. 189. — Caule inermi suffruticoso tereli tomentoso ramosissimo; Toll, saboblique ellipticis sabglabris, sublus tomentosis; florib. 2-3-nis inlerroliaceis brevissime peduncalatis; corollae laciniis lineari-lanceolalis; bacca aurantiaca subsphaerica solcata. 2]. — Crescil. . . . ?
387. £. VIOLAEFOLIUM Schott mis. in Spr. SysL veg. IV. Cor. post 403. no. 5. - Caule herbaceo radicaote; foil, geminalls fnaequallb., otrinq. biriuiii, allero cordato snbrolando, altero renifonn; pedonculis ioliUriisaxillarib.; calycib. 10-fldis. % — AfOne 5. *sylvalico*. [cf. p. 03. no. 103.] — Crescil in Brasilia.
388. S. ARDISIOIDES Blame, Bijdragen 000. - Caole fraUeoso Inermi; foil, subaliernis obloogo-lanceolalii, atrinq. acuminatis, supra basin obuse denliculalis glabris; florib. cymoso-umbellalls oppoiltifolila tetraodrisj calyee qaadriAdo. 6 — S. *Mrandrum* Blame, Cat bort BuJlent. W. — Crescil in iosola Java.
380. B. ULIGINOBUM Blame, Bijdragen 00ft. — Caule herbaceo Inermi, Inferne procumbente; foil, alirrnis ovalo-oblongis acutis, basi cuncalis inlegerrimis, ulrinq. ramisq. puberculis, umbellis lateralib. 4-8-floris; pedicellis scundis reflexii; caljcc obtuse 5-deniato. QT 2^T — Crescil in humidis Jafae.
300. S. DISTICIUM Schum. Kongl. Dansk. Vidensk. Selsk. Afbandl. III. 142 t - Fruticosum incrrac lomenlosum: foil, ovatis subrepandis; racemis simplicib. in-frafoliacci;* disticbis. 6 — Crescil in Guioea.
301. 8. CONCAVLM Lindl. Bot. Beg. New Ser. XV. 02. misc. 00. - Caole scandente; foil, oblongo-linearlb. obloils concavls glabris, margioe levisslme repandis; paniculis cymosis muliiOorii; calyee quinqueedotalo eanpanolalo; antberis aequaliboft. 6w — Crescil in Chili.
302. S. CAJANUMKNSE H. B Kib. NOT. gen. ei tpoe. plant III. 47. - Kih. Synops. plant, aequin. II. 177. — G. Don, General syst of gard. and. bot IV. 430. no. 347. — Caule fruticofito; ramulis hiriUus; foil, sollurlls tabrolondo-ofatla bretiler acuminalis cordalis integerrimis hirsulo-pilosls; raeemis sopraaxillarib. irifidii; florib. umlaialalibuH. „S — Corolla subrotata violacea glabra, segmenlis otato-oblongis aculis, margine infliciis. Dacca bipolllecaris o\ata acua uniloculann polysperma. — Foriaste ejuidem seclionis ac *V. eroionifolium*, an mrlus *Capita* species? — In sylvis Cajanumae el Unlosiogae prope Loum Novo-Granalensium.
303. S. ADENOTRICHUFF Dunal, Monogr. Solan. 2», Synops. 40. - G. Don I. c. no. 348. — Caule inermi fruticoso; foil, eordaiis acaoilnails, niring. gtaoduloso-pilosls Inlegerrimis; florib. racemosls. 6 - Vandelll, 8ptc fl. Brutt. ei loem. Scriplor. de plant. Hisp. 80. - Crescil In Brasilia.
301. S. DIDYMLM Danal, Monogr. Solan. 230., Synops. 47. - G. Don I. e. no. 340. — Caule frutescenle flexuoso; foil, ovalls; calycib., caale folilsq. pflis ramoiis ob»iis, foil, supra tuberculatis; florib. eymotla. 6 - Vandelll I. c. - In Branlia-
305. S. CLADOTHICtl'M Dunal I. I. c. c. - G. Don I. c. no. 350. - Caule mrrmi frutescenle fu'iuoso; full. n\ihs; raljcib., raulc folii»q. pilm ramosn obtiis, iu-pra tuberculatis; florib. rjniM^ . > Vandelli I. c. KV - žje»nl in Brasilia.
300. S. INTKGKRRIMI M Dunal I. I. r r - (i Don I. c. no. 351. - Caulr inermi frulicoso; foil, laic lanceolalis in«drrrimif», infra tomrnlosis; raccmn tfrminali-bui. o — Vandelli I. c. — Otucil in Brasilia

- 397 S FORBKALII DuRual, Monogr Solan. 237, Synops 47. — G Don I. c. 440. no. 352. — Caule?; foil villo»i» ovalib., basi obliquis, margine repandis 5^v \$• - 5 vtUotum Forsk. Fl Arab Aeg. 47. nee Lam — Crescit in Arabia
398. S. REPAINDUM Forsl Prodr 105 - Willd. Spec plant. I. 1032 - Dunal I. I. c. c. — G. Don I c. no 353. — Caule inermi subherbaceo flexuoso glabro; Toll. ovalis repandis lomentosis, peduncalis anllarib. cymosis. O^o I|>I — Crescil in insulis Societalis
- 399 S. PLIkEISETH Dunal I. I. c. c. — G Don I. c no. 354. — *Solanum Indicum launnu anguttortbut fohu maxtmum* Pluk. Phylogr. t. 227. fig. 2. — Crescil. ' 1
400. S ERIOCALYX Donal I. I. c. o. — G. DOB I. e. no. 355. — Caule inermi frulicoso; foil OTats integerrimis, ioblat lomontoais; ambellis ereclis lermmalib; calycis laciniis obiusis lanalis 6 — Umbellae magnae. Corolla magna alba. Bacca globosa lulea, magnitudine pam Cerasi. Folia 4 poll. loDga, I¹/_t, poll. lala. — *S. racemotum* Mill Diet, no 28. nee Linn. — Crescit ad Carlbagenam in America.
- 401 S UMBELLATUV Mill Diet. no. 17 - Dunal I. I c c. - G Don I. c. no. 356. — Caule frutescente inermi; foil lanceolatis integernmis, infra pilosis; umbellis erectis terminalibus. i> — Folia 5 poll longa, I¹/_t poll. lata. Flores parti Corolla alba Antherae porpureae. Bacca lotea pisiformis. — Crescil in Mexico ad sinum Campebiense.
402. S. AMERICAMJM Mill. Diet no. 5. - G. Don I. c. no. 357. - Caule inermi herbaceo; foil, ovalis acuminatis glabris; umbellis ereclis. O — Caulis angulatus, raml graciles patentes. Folia saturate vindia, parum dentata. Flores pauci pam Segmenla calycina angusta acumfnata alba, exlus purpurea Baccae parvae m-grae. — *Solanum Amencanum tulgart rimtle lore parvo purpuraseenle aetnu mgncanHbus mtnorthus* Rand. mss. — Crescil in Tirginia.
403. & AXILLtFLORCJM Dona], Monogr. Solan. 236., Syoopi. 47. — G. Don I e. no 358. — Caule inermi frolescente fleiuoso; foil. ovalis, infra lomeoiosis, flonb solilarlis alanbus. \$w — Folia bipollicarla, lesqnipolliccm lata. Corolla magna pentagona coerulea, angolis mocronalis. Bacct rubra pisiformis — Forte ad sect *Polymeru* pern net — *S. tcandens* Mill. Diet. no. 19. — Vera Cruz
404. S. WILLDENOWII Roem. et Schult Syft teg. IV. 061 — G. Don I. c no. 330. — Inerme herbaceum glaberrimum. foil. oYato-ellipticis obtusis intcgerrimis, pedunculis soliiarus v gemims. O — *S. obluttfohum* Willd Enunr plant hort Berol Suppl. 11. — Crescit.?
- 40ft. S. MEMPHITICUM Mart Enum. pi. hort Erlang 63 - G Don I. c. no. 300. — Caule herbaceo erecto inermi denticulalo-angulato, foil, ovatis; pedunculis eroclis Dultifloris, fnictifens nuiaoUbos. O — Folia peliolala puberula purpurascntia, vems infra rtolaceu. Pedooculi eorymbosi ft-7-lori. Segmenta caljcina oblusa. Corolla TioUeoa pam, sofsoatls caJjoea otqvo iatlt, ungoe flaticaoie; aoiberac foMie. Baeoa algra. — CrotoU.Y
406. S. DICTYOTICUM Roem. oi Scholt Sjst veget IV 661 - G. Don I c no. 361 — Caule frulicoso lomeatoso; foil, otalis, basi Iruocalo-eordalis inaoqualib., ba- ain fersus angulatis dentatis, sublus dense lomentosis; cymis txillaribus 5 5 *reUculatum* Willd. mss — CresciL f
- 407 S CITRIFOLIItf Willd Reliq. ei Roem. et Schull. I c 662 - G. Don I c no. 362. — Caule fruiiroso, foil oblongis acuminatis nilidis, infra tomenlo albo vettitls; aplcis lermmalib. dicbolomo-corymbo»is S — Crescil in America autrah ad ripaa la?it Magdaleoae
- 40B. 8. 8TIPLACEIM Willd Reliq n Roem et SchulL |. c. - G Don I. c. no. 363. — Caule fruiicoto; foil, laeoolaus lairfornnis lonaaloait; cymis peduoculalis alarib.; alipulis seailttaaribaa. 6 - Croscll In Brasilia
400. S. CUMAfEKSB Roem et Scholt I. c. - G Don I c no JW - Mule fruticoso, foil rolaadaio-otalit aculis glabnt denticulaiit. umbelli* lermioalibu* .> — *S umbtUaium* Willd. Ub - (.resell in (uiuana

410. *S. DIMETORUM* Willd. Reliq. ex Roem. et Schull. I. c. — G. Don I. c. no. 365. — Gaule fruticoso ramoso; foil, ovalis, supra pubescenlib., subtos piloso-lomentosli; pedunculis axillarib. unifloris. 5 — Crescit . . . ?
411. *S. GAMPANIFORME* Roem. et Schult. 1. c. — G. Don I. c. no. 366. - Fruicosom: foil, lanceolalis acuminatis glabris; racemib. axillarib. longe pedunculatis. 6 — Racemi axillares et extrafoliacei folio longiores erecti. Corolla profunde 5-partita campanulata. — *S. campanulatum* Willd. Hb. — Crescit in Brasilia.
412. *S. PEDUNCULATUM* Willd. Reliq. ex Roem. et Schult. 1. c. — G. Don I. c. no. 307. — Fruticosum: foil, lanceolalis petiolalis obliquis piloso-strigosis; umbellulis pilosis pedunculatis. 6 — Crescit . . . ?
413. *S. PRLMFOLIUM* Willd. Reliq. ex Roem. et Schull. I. c. - G. Don I. c. no. 308. — Fruticosum: foil, ellipticis acuminatis serratis longe petiolatis; paniculis terminalibus. 6 — Folia sesquipollicaria, utrinque acuminata eroso-dentata. Panicula d. varicata. — Crescit in Caracas.
414. *S. FLEXUOSUM* Willd. Reliq. ex Roem. et Schult. I. c. - G. Don I. c. no. 360. — Caule fruticoso flexuoso retrofracto; foil, ovatis, infra tomentosis; pedunculis solitariis axillarib. filiformibus elongatis. 6 — Crescit in insula Sti. Dominici.
415. *S. MICRANTHUM* Willd. Reliq. ex Roem. et Schult. I. c. - G. Don I. c. no. 37a — Caule fruticoso; foil, oblongis, utrinque attenuatis, lobis scabris viridibus; corymbis petiolo brevioribus. 6 — Crescit in America australi.
416. *S. MODESTUM* Roem. et Schult. I. c. 665. — G. Don I. c. no. 371. — Caule frutescente inermi glabro; foil, lanceolalis, basi attenuatis venosis, margine subundulatis glabris; floribus terminalibus corymbosis. 6 — *S. Mexicanum* Willd. Hb. — Crescit in regno Mexicano.

* * *Foliis dentatis, tinuatis lobatis vel pinnatifidis.*

417. *S. RUNCINATUM* R. & P. Flor. Peruv. II. 36. — G. Don in Sweet's Brit. do*, gard. (New Ser.) II. t. 177. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 488. — Inermis: foil, pinnatifidis glabris; paniculis cymosis; stigmate clavato; segmentis calycinis ligulatis recurvis; caulibus herbaceis diffusis; corollis violaceis. 2. — F. Cuill. Peruv. I. 722. I. 15. — Crescit in Peruvia. — Forte idem ac *S. pinna* (Cav. [cf. p. 30. no. 12.]).
418. *S. AFRICANUM* Tournef. Insulat. rei herb. 140. — Dunal, Monogr. Solan. 238., Synops. 48. — G. Don I. c. no. 372. — *Solanum baeciferum vulgari* (L.) Afric. foliis frequenter profundius crenatis Tournef. — In Africa (boreali).
419. *S. LISITAMCUM* Dunal I. 1. c. c. - G. Con I. c. 441. no. 373. — *Solanum Luteum perenne, foliis amplicis profunde crenatis* Tournef. 1. c. — 2. — Crescit in Lusitania.
420. *S. VISCOSUM* M. & P. Method. plant. Suppl. 70. — Dunal I. I. c. c. - G. Don I. c. no. 374. — Caule fruticoso viscoso; foil, magnis cordatis tinuatis crenatis, sinibus crenatis. 6 — Caulis leres, ad apicem ramosus. Folia petiolata, lobis rotundatis pubescentibus. Pedunculi laterales petiolo breviores, pedicellos 3-4 geminos, pedicellis fructiferis reoaxis. Corolla alba. Bacca rotundata ovata v. siliata. — Crescit . . . ?
421. *S. AYICULARE* Forsk. Prodr. 107., Plant. escol. 12. — G. Don I. c. no. 373. — Caule inermi fruticoso; foil, sinoato-pinnatifidis; corymbis terminalibus. 6 — 1. — Nova Zeelandia crescit.
422. *S. REPENS* Dunal, Monogr. Solan. 23a, Synops. 48. — G. Don I. c. no. 37*. — Caule herbaceo piloso tetragono membraceo repente; foil, pinnatis v. derursivis inegerrimis pilosis; racemis simplicibus. 6 — Vaodelli, Spec. fl. Brazil. e. Roem. Scriptor. pi. Hispan. 86. — Crescit in Brasilia.
423. *S. VALKNELEAE* L'Her. Mem. du Mus. d'Hist. nat. 11.340. - Dunal. Scoops. 48. — G. Don I. c. no. 377. — Italicis lubrifera; foil, inaequaliter pinnatis; racemis paucifloris; pedicellis articulatis; baccis glabris oblongis compressis. — Solonon proferunt lubra sapida kuboluoda alba. Caulis procumbens ramosus.

- nmus. Corollae segmenta revoluta — *Solanum (uberott)* L. (cf p. 38. no. 1.) esso videtur vanelas. — ID regno Novo-Granalensi ad fluvium Malave, Eloy Valeoiueta.
424. *S. SUBLOBATUM* Willd. Reliq. ex Roem. et Schull. Syst. vegeL IV. MS.*— G. Don I. c. no. 379. — Caule suffruticoso ramoso; foliis lanceolatis sublobatis nodis obtusis; pedunculis oppositifolios subinflatis. 6 — Crescit in Bonana
425. *S. CARACASAMJIM* Roem. et Schult. I. c. 664. - G. Don I. c. no 380. - Gaule fruticoso; foliis pinnatis, ternatis simplicibus iniegernmis; floribus racemose. 6 - Frutex decempedalis. Rami dichotomi, diYancali. Pedunculi ex axillis ramorum, in duos elongati. Racemi penduli. Corolla et antherae violaceae. — *S. heterophyllum* Willd. mss. — Crescit in Caracas.
486. *S. FUSCATUM* Roem. et Scholl I. c. — G. Don I. c. no. 381. — Fruticosum foliis ininterrupte pinnatis, infra lomenosis; siliolis falcatis; floribus corimbosis paniculatis. 5 — 5. *pinnatum* Willd. ross. — In America australi.
427. *S. THYMIFOLIUM* Willd. Reliq. ex Roem. et Schult. I. c. — G. Don I. v. no. 382. — Caule frutescente; foliis pubescentibus, basi auricularibus subsessilibus; pedunculis axillaribus unifloris. 6 — Crescit in Bonana.

D. AGULKATA.

• *Folium inttgris.*

428. *S. BOTELHO* Vamlelll, Faicic. 10. ex Roem. Script pi. Hisp. 85 - G. Don I. c no 383. — Caule fruticoso tomentoso subaculeato; foliis ovalo-oblongis integerrimis, infra tomentosis; racemosis lateralibus. \$ — *S. Bolthianum* Dunal, Monogr. Solan 230. — Aculei pauci brevissimi. Calices pedunculi et petioli lomenosi. Folia, basi inaequalia, supra glabra. Baccae glabrae. — Brasilia.
420. *S. BRASILIANUM* Dunal, Synop*. 48. — G. Don I. c. no 384. - Folius ovatus acuminiatus inermibus; floribus corimbosis; corollis pentagonis; juncibus divaricatis. - *Solanum Brasilotomum, folium Atisyro mueromalo glabro. Papas Americani floribus in swmmUaU eaulis* Pink. Almah. Appndx. I. 454. fig. 4. — In Brasilia
430. *S. CORDATUM* Forsk. Fl. Aeg. Arab. 47. — Dunal, Monogr Solan 10, Synops. 40 - G. Don I. c. no 385. — Caule fruticoso subaculeato; foliis reniformibus cordatis integris inermibus. \$ — Folia semipollicaria glabra. Corolla lobata deflexa. Bacca pulposa lobata pisiformis. — Ab incolis appellatur Jladak". — In Arabia
431. *S. NICOTIANAEFOLIUM* Ug. NOT. gen. et spec. pi. 10. no. 141 - <; Don I. c. no. 386. — Caule aculeato fruticoso; foliis oblique cordato-oblongis oblongis aculeis inermibus subundulatis fuscissimis. 5 — Censil . . . ?
422. *S. TRIFOLIATUM* Burro. Pl. Indie. I. 22. fig. 3. - (imel Sjust 386 - G. Don I. c. no 387 — Caule fruticoso; foliis ternatis ovatis integerrimis \$ — Caulis glaberrimus. Aculei pauci locustali. Folia alterna petiolata glabra. — Crescit in ora Coromandeliana.
433. *S. DOMINGENSE* Willd. Reliq. ex Roem. et Schult I. e. 605. - G. Don I. c. no. 388. — Caule fruticoso subaculeato; foliis ovatis integerrimis, infra lomenosis; pedunculis oppositifolios aggregatis. 6 — In insula sive Dominici.
* * *Folium dimidiatum, lobatum pinnatifidum.*
431. *S. ANACARDIUM* Blume, Bijdragen 70a - Caule subaculeato herbaceo; foliis oblongis, utrinque acutis sinuato-angulatis hirsutis (pilis serratis), petioli calicibus pedunculisque solitariis unifloris mollibus aculeis, biculis (bilobatis) globosis, calyce semi-obtectis. ^? Q* — • rutilans in orientis siccis Javanicis
435. *S. CHINENSE* Dunal, Monogr Solan 310, Synopsi 40 ii Don I. r. no. M. - *Solanum tmeamum Cktrmt minus ipinnatum, folium parns fere umbellatum, folium sm>rf amro* Pluk. Pb)logr I. 6i fig I - Tournrf Intlil. rri herb. 140 - In leioie eiuu rperianlor folia gtmioau, alter* ninorl, «iouaia, nm* medio aculeato; pedunculis numerati aggregati suboppositifolios pinnatifidus longitudine ricidentibus, floret parti — Crescit in Cina
436. *S. GLABRATUM* Dunal I. r. e. — <I Don I. c. no 300 — (caule fruticoso aculeato, foliis aculeatis oblongis dentatis inuatis glabris, calicibus glabris,

- co roll is ^lolaceis reOexIs; baccls globosls. 6 — *S. Bahamense* For>k. Fl. Aeg. Arab. 40. — Crescit in Arabia.
437. 8. ARABICUM Dunal I. 1. c. c — G. Don I. c. no. 901. — Caulib. annuis pro-combenlib. aculealfssimis; aculeis rectis; pedunculis oppositions racemosis. Q — [Hanc diagnosin G. Don hoc modo corripuil: pedunculis opposilis; foliis racemosis!] — Forte *S. glabrati* varietas quoram convenit foliis formaque el magnitudine corollae. Acutei numerosissimi albi recti paienles. Caules, peioli, foli or urn nervi, calyces el pedunculi aculealissimi. Bacca carnosa obscure viridis albo-^enosa. — *S. armalum* Forsk. I. c. 47. nee Il. Dr. — Crescit in Arabia, ubi appellatur *Bocheme* v. *Bokom*.
438. S. STRIGOSUM Vandelli, Fasc. p. 10. ox Rocmcr, Scnplor. plant, Ilitpan. 55. — G. Don I. c. no. 302. — Caule frulico&o slrigOM); foil. o>ato-sinuah*, cosla subaculeatis tomenlosis; calycib. stngosi*; bacca lomentosa. 5 — Caulc*, peioli et ca'yces slngis longis flavis undique tecti. Folia lomenlosa lata cordala angulala subaculeaia, aculeis flavis. Paocula lateralis composiia. Corolla infra tomenlosa. Bacca parva. — Crescil in Brasilia ad Para.
430. S. VANDELLI AM M Dunal I. I. c. c. - G. Don I. c. 442. no. 303. - Caulc Re-xuoso dichotomo frulicoso aculealo tomentoso, aculeis incurvis; foil ninuato-angulatis subloracnlosis, in costa spinosis; spicis solilarii». 6 — Caules fla{o-ti-ndes lomenlosi, lomenlo stellalo, aculeis inrunris rarls nudis, apice flam. Folia sublomentosa sinuato-angulata subpetiolata, costa spinosa. Spicac solitariae revolulae instar *tteliotropii*. Calyces tomentoti. PcUla alba. — *S. dichotomum* Vandelli, Fascic. 0. ex Roem. Script pi. Hlsp. 54. — Crencit in Brasilia.
440. S. MOENCIUM Dunal, Monogr. Solan. SM2, Sjnops. 40. — G. Don I. c. no. 304. — Caulc herbaceo piloso aculealo scabro, pilis scllalis albis; foil. o\atis sinuahs acuhs subpilosus, neno utnnq. aculealo; pedunculis creche lcrminahb. 4-5-flons, pctiolo loiiKionbus. ^ — Caulc* simplicc». Aculei fla|i dislanlc*. Pedunruti el c<l)ce» pilosi aculeis pauciftoirai* armali. Corolla magna alba. Aniherac discrcclao. SijIn-, .ilbu«, stigma viride. Bacca glabra lulea. — *S. stellalum* Mnch. Method plant. 475. nee Jcq. — Crescit. . . . ?
441. S. BKU'OKTIAMM Dunal I. 1. c. c. — G. Don I. c. no. 305. - Caule frulico«o tomento»o arulcalo; foil, profunde el finualo-angiriaiii lomentobii KubarultMhv; flonb. corymbosif. ^ — Aculei pauci brctissitni recti. Folia pctioht.n, basi marqualia. Corymbi lateralc*. Cal)i pilosos. — *S. Betfori* Vandelli, Fascic. 10. ex Roem. Script, pi. Ilispan. 50. — Crescil In Brasilia.
442. S. DANKSIAMM Yandelli I. e. ex Roem. I. c. 55. — Dona) I. I. c. c. - G Don I. c. no 300. — Caulo aculeato piloso herbaceo; foil, inferlorib. cordalo-otaii*, supenonb. pinnatifido-sinualis, aculm pilotis; aculeis ulriof. subreitis. 2).— Caulis herbarruH |>i{o!>issimus, aculeis crassis, apicr Kiiibfla«t«rmi hu», dcorMim ^ersis. Folia infenora cordalo-o\ala, superiora pinnailido- Mnuata acuta pilosa aculeata. Pctioli, pedunruli et calyces pilosi el hi dmtali. Baccac fuhac ~~ca~~ succae magmludine maximi Ceraoi. — Crescil in Bratilia.
443. S. ATROMRENS Dunal, Monogr. Solan. £43., Synops. 50. — G. Don I. r. no. 307. — *Solanum Indicum ipinosum airovirms ei *%diqu* glabrum, fotiU Brmmcha* urtinae dtvisuris* Pluken. Pbylogr. L 5i Og. S. — *Solanum pomifrrum \$p*-nosum huHcum, fructu \$ekinato, folns Cardut seu Ae**lMi »pino\$*i Brejn. Prodr. IT - Crescil In India.
- 444 S. CAPKNSE Thnbrg. Prodr. fl. Cap. 37. — Linn. fil. Supplem. 147. - Dunal I I. c. c. - G. Don I. c. no. 30ft. — Caule aculealo frulicoso tereti; full. Mnuato-pinnalifidiik aculeatis nudm, laciniis alternis ialegris obtutic. vS - Plant I lota aru-rlr< numrosiH ILMcantibuH roieur^alis armata rst. Folia mala cibiu»a t;Ubra Pfdunculi holilarn 1-2-flon nuUntes. (.il>i aculcatun i orolla cocrulea Dacca glabra. - <n*srit in Proinonlono bonar spri.
- 445 8. HOI STOM Dunal I. I. c. r. - G. Don I. r no. 100 Caul* frulicoido aculealo; foil, oblongis sinualo-pinnalifidis aculcalit, umbellis ic»»ilibui .* - %culd

- recunrall. Flores pam albl. Baccae rubrae magnitudne Illarum *Jumperorum*. - *S quercifohum* Miller, Diet DO 10. ex Houst. mss. — Credit ad >era Cruz.
- 446 S. ANGURItM Dunal I. I c. c. — G. Don I. c. no. 400. — Canlc aculealo fruticosOt foil, pinnalifldo-lacimalis tomentosus, utnnq aculealis, pedunculis axillarib. biflons. \$ — Caulis procumbens lomenlosus. Aculei longi flavi Folia subquadnpollicaria, 2 poll, circiter lala. Calyx aculealisslmus. Corolla magna flava. Bacca globo&a pi&iformis albo-vmndice vanegala. — *S. angustofohum* Mill Diet, no. 15 ex Hou*L M». — Vera Cruz.
447. S. VA LA DARES Vandelh in Roem. Senptor. planL Hispan. 55. — G. Don I. c. no 401 — Caule suffrulososo aculealo snbpiloso; foil, pmnatis inciais, ulrinq. aculealis, racetnis laterahb. composit. 3f — Canlis subpilosus vmdescen*, aculeis longis rectis acerosis rubris. Petioll, pedonculi et calyces pilo»i aculeali. — Crescit in Brasilia.
448. *S. ROTTBOELLIANIM Roem. et Scbull. S>st. \egel. IV. 008. - G Don I c. no. 402- — 6 — *S. foehdum* Rotlb. Act llafa. 1773. p. 287. - J Puihn Mat med •en regn. teget. 1785. — Dunal I. I. c. c. — Crescit in Surinam.
- 410 S RIGIDLM Lam Illustr. gen. no. 2373. - Poir. Enr>cl. meib. Suppl. IV 300. — G. Don I. c no. 403. — Caule huraili rnilicoso arulealo, foil ovalis <inuatoangulatis aculealis nudiusculis, utnnq. aculeis albis obsitis. o — Caulis slnctissimus erectus pedalis ramulosus subvillosus, aculeis brevibus rechs. Folia acula undulala, lobis aculis submucronatis subcihatis, fla>escenti-vindia v. pallida Aculei numerosi nudi subulali recli, basi purpura^cente^. Racemi terminalis. Pedunruli breves ramulosi tomenlelh. Cal)cis nlllo<i ^egmenta lanccolata acutissima, cal)i inermis v aculeatus. — Crescit ?
450. S AQLATJCI'M D>f. in Hoi. Paris, ex Dum. Courset, Bol. cult ed 2j Suppl 15i. — 6. Don U c. no. 401 — Caule bnUcoto aculeato crasso caraoso, foil cordatis profunde tinoato-lobalis, utriq. con poliol't acoleatls YMOAIA mollibus s — Caulis reclus simplex T. ramosus obscure purpureu^. Aculei rigidi subcur^ali Folia magna 8-0-pollicana pallide tindia. — Crescit . *
- 451 S QL'L>EUA>GILARE Willd. Reliq. ex Roem. et Srhuli S)>i. |c^/ \ 000 — G Don I c. no. Mtt. — Caule fruticoso. Ml. quinquangulanb pi|o» s pctiohiq. aruleis subulalis armatis, pedunculis plerumq. billoriH o (arar.is
452. S JLBATtM Willd. Reliq. ex Roem. el Scbult. I c C Don I c no 400 - Caule frultcoso pedunculisq. aculeatis; foil, rotundaio-ntjiio anKul.ito-dentati<v utnnq. pubescentib. aculeatisq.; aculeu selacein. — (rcscit ad ripas flumim« Onnori.

It Species nomine tantummodo cogmtae.

8. ADOENSE Hochftl. It. Abyu. ktrb. DO. 147. - fr - ID Abystioia
8. AETHIOPIOIDES Ca?.
- g. AGRESTB Brootf.
8. ALICATLB Eoltcby, Kb. mloD. IUD. DO. 309 - Cordofan
8. AMBLOPHYLLIM Hook. - ID Ferovia ad Lisoan.
- S. ARAMT(K:UA Besser.
- S. BERTERII D>f. Cat. horU Pans, ed 3 i 437. - Q - Cbili.
- h B|r1RUV llorb»l lib un HID. DO. »1. - In Abyssinia.
- S < \MPUA(A>TILV Uocbft. Mb. uo. itin. no. l i i - AbM>ima
8. (ENTRIFOLII II Fitrb.
8. CIXEREItf R. Br. in Sail's Aby%i. appends 475
8. BCHMOCARPIV Bredem - ^ - Caracas
8. GUI'CE»CEN8 Zu<car - A - Mexico.
8. GULCOPHYUtM inf. Cat kori. Parts. vc4. X m. - 5
8. GRACILB Olio.
- R. Gl LA Haailt - J - India orieolalU.
- b HABTIFOLIIIf Uocbsi. Ub. kouch DO. JBX - tordoUn.
- !> UERBMTIAMM Pail. Magai. |. 200. -- 3

- S. LIRIDUM Moric. - Bahia.
- S. MANOELII Moric. - Bahia.
- 8. MULTIFLORUM Rib. — India orientalis.
- S. PALUDOSUM Moric — Babia.
- 8. POGOGENUM Moric. — Babia.
- 8. POLYTRICHUM Moric. - Babia.
- 8. SCHIMPERIANUM Hochst. lib. UD. ilia. no. 902. - Abyssinia.
- 8. SCIURLSCHI'NA Miller.
- 8. SIMJATI'M Ait.
- S. SPIAEROCARPUM Moric. — Babia.
- 8. SPINOSISSIMUM Lodd.
- 8. STAGNALE Moric. - Babia.
- 8. STIPULACEUM Broasi.
- 8. SUB> ISCIDUM Schrank. — 6 — Brasilia.
- 8. SULCATUM Raeusch. — O — America.
- 8. THONNINGIAMM Jcq. - America australis.
- 8. UNCMATUM R. Br. in Sail's Abyss. Appdi. 475.
- 8. UNGUENS Weinna. — QI — Brasilia.
- 8. WILDIAMJM Wendrib.

t t t Species non descriptae ted iconibus iUustratae.

- 8. LIGUSTRINcTM Lodd. Bol Cabin. L 1083.
- 8. MYRTIFOLIUM Lodd. I. e. t. 1331.
- 8. CONGESTLM Arrabida, Flor. Flnmin. II. I. 00.
- S. GNAPIHALOCARPUS Arrabida I. c. I 01.
- 8. COROrSATI'U Arrabida I. c. t. 02
- 5. LACTEIM Arrabida I. c. I. 03.
- 5. IIAVA!SENSE Arrabida I. c. I. 04.
- 8. ELEGANS Arrabida I. c. L 05.
- 8. COMUJM Arrabida I. c. t 0B.
- 8. SERICEIM Arrabida I. c. I. 07.
- 8. DIFFtSI M Arrabida I. c. t 0&
- 8. DIANTHKRUM Anablda I. c. t ».
- 8. KLLIPTICUM Arrabida I. e. t 100.
- 8. TERMINALS Arrabida I. e. t 101.
- 8. DIFLORUM Arrabida I. e. t 108.
- 6. CERIMJM Arrabida I. o. t. 103.
- 5. BI L.MTI M Arrabida I. c. L 104.
- 8. SIBI MIPELLATI M Arrabida I. c. t 106.
- 8. FASCICI LATI M Arrabida I. C. t 100
- 8. INODORIM Arrabida I. c. I. 107.
- 6. ODORIFKRUM Arrabida I. c. t 106.
- 8. MGKLM Arrabida I. c. t 100.
- 8. COERI'LEUM Arrabida UL lia
- 8. BIFISbIM Arrabida I. e. L 111.
- 8. COBUUHTHUM Arrabida I. c. t 11J.
- 6. imiFLORUM Arrabida I. e. t 114.
- 8. FLACCIDI'M Arrabida I. e. t. 11A.
- 6. INAEgt\LE Arrabida I. e. t III
- 8. STIPI LATI M Arrabida I. c. t 117.
- S. ttMM>RHTM Arrabida I. c. t 110.
- 8. TKinmiLM Arrabida I. r (!>
- S. EDI IE trrahuh I. c. I 121
- 8. IIEXAMIKI M Arrabida I. r I 122
- 8. RP.PAMU'U Arrabida I. c. I I*)
- ft JIBEBA Arrabida I. c. I lil

5. OLERACEUM Arrabida I. c. I 125.
6. DECURRENS Arrabida I. c. t. 120.
- S. ARREBESTA Arrabida I. c. t. 127.
- S. SUBSCANDENS Arrabida I. c. t. 128.
8. BIFISSUM Arrabida I. c. t. 120.
- S. PARATYENSE Arrabida I. c. t. 130.
- S. AMBROSIACUM Arrabida I. c. t. 131.
- S. SIMPLIFOLIUM Arrabida I. c. t. 132.
- S. MULTIANGULATUM Arrabida I. c. i. 133.

ft ft Species e genere exciudendae.

- S. AFRICANUM Mill. - WITHERINGIA CRASSIFOLU.
- S. COMMUTATI Spr. - LYCOPERSICUM COMMUTATUM.
- S. CRASSIFOLIUM Lam. =- WITHERINGIA CRASSIFOLIA.
- S. HETERANTHERA Willd. =- WITHERINGIA ANGUSTIFOLIA.
- S. HUMBOLDTII Willd. — LYCOPERSICUM HUMBOLDTII.
- S. LYCOPERSICUM Lino. — LYCOPERSICUM ESCULENTUM.
- S. MONTANUM Linn. — WITHERINGIA MONTANA.
- S. MULTIFIDUM Linn. — WITHERINGIA PINNATIFIDA.
- S. MULTIFIDIA Rz. et Pa?. — WITHERINGIA MULTIPIDA.
8. PENDULUM Lnk. — WITBERINGU PENDULA.
- S. PERUVIANUM Linn. - LYCOPERSICUM PERUVIANUM.
- S. PIULANTIIUM Cav. - WITHERINGIA PIYLLANTHA.
- S. PIMPINELLIFOLIUM Linn. => LYCOPERSICUM PIMPINELLIFOLIUM.
- S. PINNATIFIDUM Ri. et Pav. » WITHERINGIA PINNATIFIDA.
- S. POMIFERUM Car. - LYCOPERSICUM PYRIFORME.
8. PROCUMBENS DC. — SARACUA PROCUMBENS.
- B. PROCUMBENS Polr. - LYCOPERSICUM PROCUMBENS
- S. PSEUDO-LYCOPERSICUM Jcq. — LYCOPERSICUM CERASIFORME.
- S. PYRIFORME Poir. - LYCOPERSICUM PYRIFORME.
- S. SPERIUM Balb. -* LYCOPERSICUM PYRIFORME.

3850. LYCOPEBATICIUM Taurnef.

(Tournef. Insl. rei herb. ISO. t 03. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 277. II. 181. — Dunal, Monogr. Solan. 103., Synops. 3. — Spr. Syst. vegol I. 077. — Dirr. Synops. plant. I. 711. — G. Don, General syst. of Ran. and bot. IV. MI. — *Volanum* Neck. Elem. 70[^]. — *Solan** .species Linn

1. L. SOLANUM Linn. Amoeml. acad. IV. 208., Spec. plant. 3. » j PIMPINELLIFOLIUM Mill. Diet. no. 4. - Dunal, Monogr. Solan. III., Synops. 3. — G. Don I. c. no. I. — Caule herbaceo glabro; foliis, decurrens pinnatis glabris, foliolis intricatim crenatis; pedunculis runcatis; g. audit. Q — *Lycopersium imodurum* iutf. — Cretsch. In Pravia et In Brasilia.
2. L. SOLANUM Linn. Spec. plant. *S7.) PERUVIANUM Mill. Ganl. diet. no. V - Dunal, Monogr. Solan. III., Synops. 3. — Roem. et Schult. Syst. vegol IV. 506. - Kuntz. in Lnk. Kltisch. el Olio, Icon, plant, rar. hort. Berol. 87. t — Caule herbaceo lomentoso; foliis, maequaliter inaequaliter pinnatis lomentosis, tuberculatis crenatis; pedunculis pedicellatis; ramulis magis saturate coloratis; baccis globosis pinnatis. Z[^]
 - a. *parr* *foh mm: foliolis minoribus, basi subaequalibus; frutibus pubescentibus. - *L. Peruvianum* Hook. Bot. Mag. t. 184. — G. Don I. c. no. ± *Soianum* iVermont Jun Jcq Iron. rar. II. L 337. — Willd. sprc. plant. I. IUM. — *Lycopersium Hymptum* His* *Samgmbif folto* Feuill. Pruv. III. 37. I. it
0. *eornm+mtmm* Spr. Syst. vegol. I. 6H. - KUACIL U L A - Foliolis roboribus, oblique ovatis nervosis rtpaado-erectis; racemo foliis Ingiore biudo; ramis divergentibus. fructibus globosis glabris, apice barbato *Solanum commutatim* Spr. Pugill. p. |. |H. - *Lycopersium eomuiatum* Roem. el Schult. I. c. 3D0. - *Soiumm ekrytooirys* Hon. Berlin. - Rarii pertom; caulit basi

- lignescens; ramis villosis, foliis obtusis. Racemi villosi, interdum simplices, interdum bipartiti laterales et terminales. Calycis 5-partiti; corolla in genere maxima. Bacca villosa pisiformis. — In Peruviae provincia Lima et Chan cay
3. *L. PYRIFORME* Dunal, Monogr. Solan. 112. U 26., Synops. 4. — G. Don 1 c. no. 3 — Pilosum pitis diversis caule herbaceo; foliis, inaequaliter pinnatisectis, segmentis incisus, subtus glaucescentibus; pedunculis pedicellisq. ebracteatis; lacinis calycis corollam subaequantibus, baccis obcomis. O — Racemi magni, superiores rami foliosi, inferiores plerumque ramo folioso terminali. Bacca pyriformis biloculans (ul in specibus 4 sequentibus) Pili & implices inaequales. — Tota planta male olet. — *Solanum pomiferum* Cav. Descript. plant. 112. — Pers Synops I 220 — 5 *tpunum* Balb. — Crescil ?
4. *L. (SOLANUM) Willd. Flor. bot. Berlin. 1. 27 1. 27) MJMDOIDTU* Dunal I t 112., Synops 4 — II. B. Klh. Nov. gen. et spec. pi III 18 - kih Synops. plant. acquir. II. 157 — Nees ab Esenb. Transact. of the Linn. Soc. XVII. 02. — G. Don I. c. no. 4 — Pilosum, pili diversis: foliis, inaequaliter pinnatisectis, segmentis incisus, subtus glaucescentibus; pedunculis pedicellisq. ebracteatis; lacinis calycis corolla duplo brevioribus. O — *Solanum Lycopersicum* Wall. Cal. 2011 B — Character essentialis in calycis lacinis brevioribus foliorumque pinnatisectis brevioribus minus allenuatis, aequalisque locisurarum magis oblongis praedilectis quaerendus est. Baccae cullura non minus angulatae ac lobatae evadunt et in *L. etculenlo*. — Gressii in provincia Caracasana prope Nueva Valencia, Victoria et in insula Cura lacus Tacarignena*.
5. *L. REGULARIS* Dunal, Synops. 3. (ed. & Inedit t 81.) — G. Don I. c. no. 5. — bubvillosum caule subherbaceo; foliis, regulariter pinnatisectis canescentibus, segmentis subinlegnis, pedunculis pedicellisq. saepe ebracteatis. O* 4 — Crescil. ..* (ex horlo Gaditano)
6. *L. DEMATIM* Dunal I c 4. (ed. 2. inedit. t. 82) - (i Don I. c. no. 6. - Subvillobum caule herbaceo, foliis stipulatis inaequaliter pinnatisectis, segmentis oblongo-acuminatis denatis, pedunculis pedicellisq. saepe bracteatis, lacinis calycis corolla brevioribus. O — Ex Spr. I. c. *L. Peruvian* fl.* et synonymum. — Crescit ⁹
7. *L. HIRSIFORME* Dunal I c 4. (ed. 2. Inedit I. 83) - II. B. Klh. I c. - Kth I c — G. Don I. c. no. 7. — Hirsutum caule subherbaceo; foliis, stipulatis inaequaliter pinnatisectis, segmentis denatis-crenatis; pedicellis Interdum bracteatis, lacinis calycis corollam subaequantibus. 6* — Pedunculi medio unifibrati. Corolla lutea. Bacca . . * — Crescil prope Loiam Novo-Granatensium.
8. *L. CKRISIFORUE* Dunal, Monogr. Solan. 113., Synops. 4. — G. Don I c. no. 8 — Pilosum, pili diversis, foliis, inaequaliter pinnatisectis, foliolis incisus, subtus glaucescentibus, lacinis calycis corollam subaequantibus; baccis sphaericis O — alde affine / *etculento* et / *pynformt*, differt lamina baccis cerasiformibus hiloculanibus subilloi, non longitudinaliter Miuali*. — *Solanum Lycopersicum* fl Linn Spec plant 207 — *S. Pseudo-Lycopersium* Murr Syst 183 — Jcq. Hort >mdob. I t II. - 5. *tpunum* Gmel. S)*i J6i. — *Lycopersicum Golem* Mill. Did no. 2 — *Amatuia flata* Medic.
- a. Baccis rubris. — *Lycopersicum fructu Cermst rukro* Tournef. Insul. rei herb. IML — *Cerasa amara racemosa ruhra* Bauh. Prodr. 90.
- ft. Baccis flavis. — *Lycopersicum fructu Cerasi luteo* Tournef. 1. e. — *Solanum racemotum Cerasorum forms, fructu luto* Tournef I. c. - In Peruvia
9. *L. ESCULENTUM* Mill. Din. no. X - Dunal, Monogr. Solan. 113. 1.3 flg 3, Synops 4 — Nees ab Esenb. I. c. 01. — G. Don I. c. no. 0 f - Herbaceum pilosum pili diversis, foliis inaequaliter pinnatisectis, segmentis incisus, »subtus« glaucescentibus, lacinis calycis corollam subaequantibus; baccis lobatis Q — Foliorum pinnatisectis lacinis calycis corollam subaequantibus ulcoquibus longioribus, corollae lacinis calycis corollam subaequantibus a / *Humboldtii*, baccae cerasiformes plerumque majores irregulariter sulcatae *L. cerasiforme* tamen in uperis differunt — *Solanum lycopersicum* Linn Spec plant (I ed. IML) Lam. Illustr. gen. t. US. Hg. 2. IML. Off. Pflanz. t. IS

— Irrabida, Flor Flumm II L 88. - *Lycoperncum pomum amoru* Mnch. Meth plant 515 — *L Galent* Tournef. I c. 150 t. 63. — Sabh Hort. Roman. 12. t. 02. — *Amatula rubra* Medic — *Pomum among* Black* lib. t 133. — Rmph. lib Amboin. V 416. t 154 fig 1 — Moris. Oxon Hist Sect 13 t 1. — *Mala aurea* Cbabr Icon. 525. — *fi. Baccis palhde rubris* — *Lycoperiticum fructu e rubro palletcente* Tournef I c 15a — y *Bacci* luteis* — *Lyeoperneum fructu Meo* Toornef I c — 9 *Baccis albis.* — *Lycoperiticum fructu albo* Tournef I. c. — Crescit in America australi

t *Species non satis nota.*

10 L (SOLAMJM Poir) PROCUMBE^NS Mill. Diet no 6. — Dunal, Synops. 5 - G Don I. c. 444 no 10. — Canle herbaceo procumbent, Toll, pinnatifidis glabns, flonb. solilanis alanbus. O — Calyx magnui profondc mallifldas. Flores Uctel Bacca panra snbeompresa. — CrescitT

ft *Species e genere expellendae.*

I AETHIOPICUM Mill - SOLAMJM AETHIOPICUM.

I DLLCAMARA Medic. — SOLANUM DULCAMARA.

L TLBEROSLM Mill - SOLAMJM TUBEROSUM

3857. JLTBOPA Linn.

(Linn Gener. plant, no 240. excl. sp. — Meisn. Gener. plant rascal. I. 277. II. 184. — Spr. Sysu vegetab I. 600 — Dietr. Synops plantar. I. 000. - G. Don, General sjsl. of gard. and bot. IV. 455.)

\$. I. *Corollae limbo decemfido v. decemdentato, loins t\ dentibus alternts minoribus.*

1. A. VIRIDIPLORA H. B Kth. NOT. gen. e4 spec, pi. 111.11.11100. - Kth. Synopi pi. aequalnoct II 193. — G. Don I. o. no. 1. fig. 30. — Canle saffruUcoao volubili, foil, geminatis ellipiico-oralls subacuminatis Inlegrrrimis hirtellis; pedunculis biflons, flonb nulantib; corollae limbo decemfido. ^S^ — Corolla tuhuloHo-infundbulirormis viridn, calyce 3-4-plo longior pilosa, ettun ad basin tuherrulu 5 notata. Filamenla glabra, basi dilatata. — *A. flexuma* ^ illJ Rehq in Roem ct Schalt S>st. veget. IV 0W — An baec el omnes huja< para^raphi <pecies ad genus dislinclum pertinent? — Crescit in regno No\o-Granaiensi in contaU Guaitarensi inter urbem Pailo el fhitanquer

2. A ASPF RA Rz el Vi\ Flor Peru^ II 45 - G Don I c no 2 - faule herbaccho aogulaio pilo^o, ramis asperin, foil grminatis inarqualib ovall-oblongif lanrrolati%q inl(*ffrmmiH % subnivalis pilo«i« pedunrulis umfloris nnUntlb, corollae limbo Uccrmfido ^ - Cautis dicholome ramm*»< Pedoneuli eittraanllarei in caulu dicholomiit. Corolla flaTMeenU-cotmlra, centra violacea, srg-eBila 5 aeitla, 5 altereb emarginallt. FilaaMnU pilooa vlolacea Bacra alba plalfonBlt, temiolboii rabrla. — In Peratla prope Limam

3. A. HI RTF. 11 K Spr Sytl. veget I. 000 no. 10. «- G Don I c no 3 - Foil o\ato-oblongi* acuti< tcabris, ramis aspens; pedunculis elongatis filiformib. oniQon« O* — Cre^cil in Brasilia.

}. I (*orollae limbo quinqurfido; cuttle frutesante.*

4 A (.1 IMHIOSA Hook Bo! Uitrell II 230 - Hook Icon pi t 106 — Caul subrrrrro fnilico«o, foil grminatM rordalo-o?ati4 lon^r prliolalM ralycibq profode quinqoepartiiM pobe«rrnli-glan<Julo«ii, corolla longi* tubulota. tlylo §U-mia)lb««q«e inrlu>i» :> - Ortcil in Prrutu

I A. HIR6ITA Meyen, Rf iw urn die Brde I 400 — ftee« ab Rsenb Nova act acad Caet Leopold Carol XIX Buppl. I 3» - Caole •affrmicot* ramotistinio diffbto foil ft*minaU* •ubrordato-ovailt long* pHlolallt eailycibq profundr quinqnepartiti« hlnatit; corolla tuboloia, anhent earn tiyli apice rt«rti% ^ — 8<-millima tan* praemimti, ted diffrrt ttatora bomiliore, pnberteentia non glando-b%a n corolla duplo aitoore pollican hand perfectr tubaloM aed apicfm »er-

- sus conico-dilatata — Gresclt In Peratla, in planitie circa Pisaeomam (altitudmo 15,000 pedum)
- 6 A *DEPENDENS* Hook Icon, plantar, t 107 — Caule pendente fruticoso, Toll geminatis cordato-ovalis breviter petiolatis glabris, calycibus tenuiter pubescentibus tubulosis quinquefidis, demum (fructiferis) ampliatis, binae fissis baccaque longioribus, corollis longe lobulosis, stylis siamimbusque exsertis. 6 — Creasil in Peruvia
7. A. *UMBEILATA* Rz et Pav Hor Peru II 44. I 181 fig. a. — G. Don L c. no 4. — Cauterutescent, foliis ovatis cordatisque margem clangulatis, pedunculis multifloris umbellatis natis corollae limbo 5-Gdo. 6 — Caulis glaber Rami dichotomi pubescentes Folia solilana v geminata pubescentia. Pedunculi breves axillares pubescentes (lores 8-12 pedicellato-ferentes Corolla luca mellifero, tubo calicis purpureo, limbo renexo ciliato Stamina trilobata Stylus exsertus Bacca albida globosa pisiformis. — *A. relexa* Dietrich Oerlner-Lexic. I 422 - In Peruvia prope Limam.
8. A *BLTLORA* Rz et Pav I. c. fig. b. — U. Don I c. 450 no 5 - Caule frutescente, foliis ovatis aculis integerrimis, superioribus geminatis, pedunculo luflorentibus (*), corollae limbo 5-fido — Frutex pubescent. Rami penduli subangulati Corolla subtriloculari villosa intata, tubo rinflorentium, albo • purpurascens, limbo virescenti-flavo erecto Antherae et stigmae coeruleae Ilarica alba subcompressa, magistraline Illiut *B\$Uadonnae* — In Peruvia Ions humidis
- 10 A *BILOLOR* Rz et Pav. I. e. 49. — Q. Don I. c. no 6 — Cauterutescent, foliis ovatis angulatis glabris; pedunculis 3->4-floris, corollae limbo quinquefidis. 6 — Rami angulati. Folia plerumque glabra acuta Corolla tubulosa robicundovirens, limbo viridi. — Crescit In Peruvia, locis umbrosis.

3. *Corollae limbo quinquefido; caule herbaceo.*

10. A *IFLI* (I) O > A I inn Spec plant 200 - Sm 1 npl bot t 502 — Ord Flor Dame t 7W - (url Hor I ondin \ I 10 - Jrq Flor \ustnoc \ t 300 Schkuhr, Lindbrh I 45 — Null Iron t. 64. Trunk, Iron pi off 125 — Rull Herb t 30 — Sturm, Deutcherl Flora lilt 3. — (• H rtm !) e fructibus et eminis II t 131 fiff ^ Ilajne, Ar/nrigew I I 43 — II Don I c no 0 - Kchb Flor rirtir* KM no 9013 Koch S>nop§ Fl Germ '1 ed) 50R — 4 aulr herbaceo dichotomo foliis Rminatim inaequalibus ovalo-ellipticis a culm pedunculis «olitaribus unidons 2|. — Bi-quadripedalis opaca Corolla livida, intus e fuce violaceo Bacca atro-nigra ceratiferis — *tUadonna bacetfera* I am Fl Franc II. 05. — *Belladonna trichotoma* Scop Fl. Caniitol. (ed. S.) no. Stt *Solanum milmoerasus* Baud Pmx 100. — *BeUadonna miajoHbui fiorUmt H f&hu* Toanief Inalitet herb 77 Blackw KrHaterh L 564. — Sabb Hort Rom I L 3. - A «>mmferum baenferum Cast Hort Mess 22. ex (iumione, Synopi fl Steal I W t - *Soianum Isthale* (IUH IIKtor II 86 — Moris Oxon Ilistor S<ct 13 1.1 fl< 4 — Crescit per totam Europam in HNIMS frondosum el caedum
- II A *RHOUBOIDES* Call n.sn ex Hook Bot Mstr I I tt | t 17 - (. (n I r 457 no 10 — Herbacea pubescent full rhombico-ovalis obtusis, pedunculis unifloris cernuis, corollis e&lus glabris. j — taulis subquadrangulariter ramosas. Stigma capitatum sulcatum tiride Bacca oblonga apiculata. Semina magna marginata Corolla parva alba. Stamina corollae mollo alUna adoau, quam In »pcie praecedente Si) I us el corolla Inlus pillosi - Trescll In Chill.

t *Spirits dubia.*

12. A *IBRBACKA* Mill. Diet no 3. - O. Don I c no II - Caule herbaceo, foliis ovatis, margine undulatis % — Caulis subexcavatus, apice rufus 2- | paxillis tuclis Folia quadripollicaria, 1 pollicis lata Pedunculi binae inicfoliacei (orolli ilba, quam ilia *Belladonnae* minor Credit ad »inum I am- pechensum

Species e genere *expellendae*

A AKUOHKV \Nild A(MsTl s \nBORI M L>^

A ARBORhMhN* Linn ALMbiU ARBORrX E\>

- A. AREIURIA Willd. - NECTOUXIA FORMOSA.
 A. ARISTATA Poir. — WITHANIA ARISTATA.
 A. BIFLORA Pen. — SARACHA BIFLORA.
 A. COINTORTA Pers. - SARACHA CONTORTA.
 A. DENTATA Pers. — SARACHA DEIS TATA.
 A. ERECTA Zucc. - WITUANIA SIBEROSA.
 A. FRITESCENS Willd. =- WITII4MA SIBEROSA.
 A. MA>DRAGORA Lino. — MANDRAGORA VERNALIS.
 A. MANDRAGORA Sm. - MANDRAGORA OFFICLNARUM.
 A. ORIGAMFOLIA Dsf. - PHYSALIS CURASSAVICA.
 A. PnYSALODES Lino. — NICANDRA PHYSALODES.
 A. PLICATA Rib. - SARACHA PROCUMBENS.
 A. PROCLMBENS Ca>. « SARACHA PROCUMBENS.
 A. PUNCTATA Pers. - SARACHA PIJNCTATA.
 A. ROTHII Poir. — SARACHA LMBELLATA.
 A. SOLANACBA Lion. - SOLANLM AGGREGATLM.
 A. SPINOSA Mejen. - GRABOWSKYA MEYENIANA.
 A. LMBELLATA Rib. — SARACHA LMBELLATA.

3858. WITH AIM. % *Pauquy*.

(Paaquy, Dissert de Belladonna. Paris 1891. ex Ferasar, Bulet des sciences nal. V. SM. — Meisn. Gener. plant, \ascul. I: 277. II. 184. — *Atropae* spec. Linn. - *ityp-nolicum* Rodigro ru>s. *Witlaria* Auclor. nonnull.)

1. W. / \TROPA Linn. Spec, plant. 200. — Lam. Illustr. gener. I. 114. fig. 2. - G. Don, General sysL of gard. and boL IV. 490. no. 7. — PHYSALIS DC. Flor. Fr. III. Oil. — HYPNOTICL'M Rodigro maa.) FRUTESCENS Paaquy I. c. - Boiss. .Voyage boL dans le midi d'Enp. no. IBM. — Caule fruticoso; foil, ovalo-cordalis oblusia pObetceolib.; florib. 1-3 aggregatis pedicrllalis aullarib.; rorollar limbo medium usque quinquefldo rflexo. 5 — Habilit *Phytalidit somnifrae*, sed differl jam calyre quinquefldo noribusque senes majoribiii, Tolus nunoribus bacisque a calyce non inclusis. Folia soliUria. Corolla fla>rscens. Vnlherac non exsertae. — *Phytalts tuberota* Cav. Icon, el descripi. pi. II. I. t. 101 *tlrlladonna frutescms ttispamcd* Toornef. Instil, rei herb. 77. - liarrri Icon. p. 1173. — Crescit in Hispama.
2. W. (ATROPA Poir Encjcl. mèih. Suppl. I. 609. - (i. Don I. r. no. rt. - PHYSALIS Ait. Ilort Kew. I. 244. — Willd. Spec, plant. I. 10JO. ARISTATA Pauqoy I. c. — Caule frulcHrcntf; foil, oblongis mtrgri« glabrrscenlib ; ramis, peulolit pedunculi»q. lanali«(pedunculis solilariis uniflons peliolos «is adaequanlib.; corollae limbo quioquefldo. 5 — Rani conpretal aubangolati. Folia solilana t. gemisau otato-Uaeoolaia acuminaiia. CorollaampaattUta lava, segmeniis Iancoolatit araailnalla. Doalot CALycial AiiaUil. Baeca globosa. — Crescit in iosulis Caoarieoslbos.

3850. MA!¥DmA«ORA *Tournef*.

(Tournef. Instil, rei herb. II — Meisn. Gen. plant, vascul. I. 277. II. 184. — Spr. Syst. veget. I. 000. — Dietr. Synop«. plant. I. 003. - G. Don, General «w «r card and bol. IV. 4*4/

- I. M. OKFICINARIM Linn. Spec, plant (ed. 1/ 181. - Spr. I r. Gtmnrr. stnopt. I. Sicol. I. 200 - Bertol. Commenal. Bononirn«. II >0 t. 24. - ll«ri«l. Flor IUIian. II. 00. t ~ Foil, oblongo-lanceolali* o^alibq. undulalu acuii* **obtusiv«;** lacinlia ealycima lanceolato-lineanb. elongalis acuminaiU, barram **oblongam** ffquanjlibtta. % — Folia breviora «. longiora OMgis niout«r rugo»a, supernr intense fdaoeco-vironUa, subtus pallidiora. In petiolom ailenuaia glabra t hir«uiiuscola ^2-0 poll, laia) iolegra. Pedaneull 2-5-pollicaret pubrrrnte» uli corollae colorati. Calyeia larmiae acutae ?irescenes carioalae, lubo ba»i atroroeruleo. Corolla pallide am Inionso tiolacea, eitus nenosa el pubesceos. Bacca aliquando

- subglobosa succulenta majuscula, ingrato olens, maturitate fere aurantiaca. — *M. autumnalii* Bertol. Calal. pi. hort. Bonon. 1820. p. 6. — G. Don I c. no. 3. — D. Don in Swecl's Brit flow. gard. (New Sor.) IV. t. 325. — *Alrnpa Mandragora* /9. Wtllid. Spec. pi. 1. 1017. — Siblhrp. et Sm. Flor. Graec. III. 20. (. 2J2. - Plenk, Pl. ofGc I. 112? - *Mandragora fruclu rot undo* Cap. Hort. Caih. 137. — *M. formina* Cast. Hort. Mess. 14. — Crescit in Ilispania, Gallia et in Iota Italia.
2. M. VERNALIS Berlol. Viridar. Bonon. \eg. G., Commenlat. Bonon. II. 388. t *• 23., Flora Haliana II. 618. f — ^pr. 1. c. — Foil, laic o>ai», primig oblusissimi?, scrionb. acutis; caljcib. bacca globosa brcuonbus. ^ - Rtnzoma magnum carnosum simplex \ 2-3-fidum fusiformc. Folia prima minora subroiunda obtusis«ima corrugato-bullata, succes»si)c majora o\ata aculiora, scnora pedalia, 4''> poll, lala, inlegrmma undulala []. denlc uno allcrove accedonle, subrrpanria bullala glabra \. »ubpilosa, foclida, lacle viridia. Scapi radicales plunni uniflon, folio Lreviores, basi tercles, apicc pentagon!, viltosi. Flores ingrale olonles, .ilbolirenles, subcoerulci. Calycis laciniae ovalae v. ovalo-lanceolatac acutac, cxlm subvillobac. Corolla pan a campanulata, cxluj, villosula, lacinu* oblongis oblusm, dorso irincmîs rcululato - venosis strict is. Bacca globosa grandit, pomi pam magmtudine lutca, cum Jucunditale qoadam gravcolens. — *Mandragnt a nmulit* Gaorln l)e fruclib. el seminib. II. 230. 1. 131. — *Air op a Mandragora a Willd.* Spec. pi. I. 1010. — Plenk, Icon. pi. medic. II. 21. I. 120. — *Atropa Mandragora Mas* Bull. Herb. de la France t 145. — *Vastiptiyn* ,a<; Dioscorid. IV. 74. — *Mandragora fruclu rotundo* C Baub. Pinx. 100. — *Mandragora Matchio* Math. (<*d. Valgr. 1585.; II. 1133. — *Mandragora mat* Fch«. Hist. pi. 530. c ic. — *Mandtagora officinalis* Mill. Diet. no. 1. fig. 173. — if. *officinarum* <? Don, donor.d s>^u of Rani, and bot. IV. 45*, no. 1. (ncr alior.) — rn^cil in Hispaiua, G.illia, Italia cl in HehelM.
3. M. PRAKf.OX S^oct, lint. (lo<. gard. II. I. itH , G. D<m I. c. no. 2. - Foil, lanceolalo-oblonffit nblusis undulati« bullato-ru^nxis Mln»o-pubr<r<*n(il>., rum flonb. simul radicalib.; scfimentis caljcini* lanccolaiis acutif rnrinaiit, corollac scgnirntisi patonlim rrtiexu acutin; icaplfl aggregalis. y. — *Atrnpn Mandragora fi.* Lam. Diction. I. 301. — Prr». Knrhirid. I. 218. — *Alropn Mandragora furtnntna* Bull. Herb. t. 140. - *Mandragora uffinnult* ft.* DC. Flor. Fr. no. &H0. — C urolla lanaia luleiceni-brunnca, coeruleo-lincia. — Florrt haoc sprrio* dun nicnx*! ante Jf. *officinarum* ^laturaque Jam molto minor! differre diciur. - Num »it distincta species dubito. — Cresclt In Helvetia.
4. M. MI(.n<)C\RPA Bertolonl, Commenlat. Bonon. II. 301. f t 25., Flor. Italian. II. 022. f - Foil- otato-lanccolatis acuminalis; laciniis etlycini* lanreolaio-hnrarih , bacca globosa lonKioribti». ^ - Radix praocedcnlium nod minor F'dia oblongo-lanceolala, prima oblusa, vuccc<vi^o ariita, omnia a(ro-m<'titi.i lurii. |<'ii<.|is passim purpurascrnttbus. Cal)x subliirHUtu^, larinni lon^o imminaii* nulirn urvulis. Corolla calyce subduplo longior saturate «. albido-|iol.iroa, t||i% birtrella, limbo profunde qumqucfldo, lacinns oblongis oblusis, dorno trincnn«, Irtittrrr-cunrif. Bacca omnium minima. — Jf. *autumm+it* Bertol. Kknrh pi. \n.tt. (etrl. •in. Willd.) Jf. *officinalis* Moris, Elcncl. flor. Sard. 1.33. — In in»uU Sardinia.

3MIO. HIMERA!«TIITH Kntll. mti.

(Meisn. Gener.' plant, vascul. I. 227. II. IHJ

I II RIVJMTI S Kndl. ms«. -- llerba Infrne radirann, «uprrnr axr. n>|vn* foil altemi« l>r>i<>-«.imiali<; pcduneulu axillarib vtltitariK uinnnn» t| Jahntma runnrmla Ink <((!<», |<i>n. |>laail *• In i.ir li il llrml)(! i |H v ,n (,rt>. fli.im I.mi Dirt III 1*«> <• Don. Uvu* i il *MI of w'iril .md |u>| | mi no J^c* Oosrit m Montr* iil<*o

3861. JABOBOSA *Juts.*

(Jus». Gener plant 123. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 277. II. 184. — Spr. Syst. veget. I. 700. — Dielr. Syoops. plant. I. 712. — G. Don, General sjst. of gard. and bot. IV. 461.)

1. J. CAILESCENS Gill, et Hook. Bot. Mitcell. I. 347. f t 71. - G Don 1. c. no. 1. — Cauhb. plurib. decumbentib; Toll ljrlo-pinnatifidis spinoso-dentate peiolatis; bracteis subulalis verticillatis, corollis campanulalis, intus birsuli*. 2l. — Radix longa descendens subfusiformis. Corollae lirabus patens, »egmeniis acutis. Gapsula globosa. Semint oumerosa oigra. — Creacil IO Andibus Cbilensibus prope Mendozam,
2. J. INTEGRIPOLIA Lam. Diction. III. 180., Illustr. gen. t. 114. - Bot. MagaE. t. 3489. — G. Don I. c. no. 2. — Acaulis: foil, peliolatls ovalib. submlegns; corollae tubo longo, segmentis acuminaiis. 3|. — Folia radicalia 3-6-polhcaria. Scapi petiolorum longitudine. Corolla bipollicaris. — /. Bonarientit Gmel. Syst teg. I. 38a — Crescit in Bonana.
3. J.? (FIIMERANTHIS?? cf. no. 3860.) RUNCINATA Lam. Did. III. 180 'num etiam Lnk el Otto?) — G. Don I. c. no. 3. — Plemmque acaulis: foil petmlaiis oblongo-oboivalis sinuato-pmnatifidis; acapit unifloris folio brevionb.; comllae campanulatae segmenlis acutis. 2|. — Folia illis *Taraxaei* similia 2-4-polliran.i, VII sesquipollicem lata. Corolla MI poilicaris, limbi segmentis patenlibus v. rellexiu. — Crescit in Montevideo et IJunaria.

3^02. JI' 1 M L L O A *Rz. et Pav.*

(Ri. et Pav. Prodr. flor. Peruv. 27. L 4. — Meisn. Genrr. planL tascul. 1.277. II 185 — *Uttoa* Pert. Each. I. 218. — Spr. Syat veget I. 606. — G. Don, General sjsl. of gard. and bot IV. 470.)

1. J. (ULLOA Pen. I. c. — Spr I. c — G. Don I. c. no. 1) PARASITIC A *Rz el Pav. I. c, Flor. Peruv. II. 47. t. 143. — Folns oblongis allernis acuminaiis inicgernmis, racemis dichotomy pendulis; floribu* rubric ,S — Crescit in Peruvia parasilice supra arbores. — Genus solis Rum o et Pa\onio noium, >n bujua loci esse videtur.*

380.). L Y C H M *Linn.*

(Linn. Gener. pi. no. 202 — Mei^n. Gener. plant \nscul I 277 II. 1^1. — Spr. Sjsl vegrl I. 700 — Dielr. Sjnop<. planl. 1.712. — G. Don, (icneral »jst of gard. and bot. IV. 457.)

Sectit I. IUITOIUIf 6. Don L e.

Calyx urceolatoa, irregulariter 3-6-fidns. Corolla Infundibuliforaiia, limbo quinquefldo patente. Sumina exserU. — Fralicet v. arborea plerumque spinosi. Folia spana. Floret eitraaxlllartt tollUuil ?. gemlnatl.

1. L. EUROPAE'tM Linn. Sytt. plant I. 22S. — Siblbrp. et Sm. Flor. Graec. t. 230. — Gussone, Synops. flor. Sicol. I. 273. t — G. Don I. c. 458. no. I. — >alido spinosiim. ciule erecto; ramis apice spinesrentib. declinatis Irregularer flrxuosis, foil oboiaio-cunealK »pathulatisq. glabns obliqueflrxis; ^taminib. imberbib. roro||ir limbo bre^ionb., b.irca tubglobota. ^ — Rami numrrosi «pinc«rrriic», juniorc< broMs*imr pubr«rente«f demum glabrati, «pmi<* >alnlar hortiontales saepius folnferae et basi flnnferae. Folia in ramn jumoribu* allrrna, in adultit fasciulaU. Floret tolilarii > 2-3 aggregalt breviler pedunruliuii (ahx brevittimut tubglobotus irregulartr quadndcnlalul, drntibu« ciliati«. Corollae lobu* *tro-eoeruleus, bati albidus, limhi lacioiit pallidionbut OTait oblutu »ubciliiali» Sumioa edeoiula glabra, lubum rtredenlia, ted limbo breviora. — *Jasminodt** *rkombifohmm* Nnrb. - *L saitnfohum* Mill. Diet no 1 t 171. 8« 4 ~ Mich. - Gen. p. 2W. I. IQ0. flg | /.. .Vimiiat. tcria in Roem. Archiv. I. W - a. Bar-eis Oans v ful*U. - 3 Uacns rubrif - Creicil in Europa australi, in Graeciae in«uln el in Africa boreali.

2. *L. BARBARUM* Lino. 6pec plant. 277. — G. Don 1. c. no. 2. — Wats. Dendrol. Bru. t. 9. — Caule frucoso; ramia dependenlib., ad gemmas spinosis; full, lanceolatis glabns planls acutis, florib. gemioalis extraaxillarib. pedicellalif; corollig Infundibuliformib.; slamimb. limbum subaequanlibus exsertis. 6 — Kami angulali Gemmae saepe fnermes. Calyx 2-3-lobus. Corollae limbus purpureus, basi flatefcens. Stigma bilobum. Bacca lulea. Stamina ad basin barbala. — Occurrit varieias corollis Imdis v. pallidis baccisque rubicundo - flavescenlibus. — *Jatminoides flaccidum* Mnch. — *L. halimfohum* Mill. Diet. no. 0. — *L. Barbarum a. vulgare* Ait. Horl. Kew. I. 267. — Schkuhr, Hndbch. I. 147. t. 40. — Iloyne, Termin. hot 1. 10. Gg. 5. — Duh. Arb. I. 306. L 121. fig. 4. — Crescit in Asia et Africa boreali el in Europa ausraliori.
3. *L. CniNENSE* Mill. Diet no. 5. — Lam. Illuslr. gen. t 112. fig. 2. — Wats. Dendrol. Brit. t. 8 — Bunge, Mém. dei sav. tlrang. de St. Plrsbrg. II. 12J. — G. Don I. c. 10. 3. - Caule fruticoso; ramla pendulis prostratis slnatis; foil, terms ovatis acotis, basi altenuatis; gemmia ipinescentib.; pedunculis calyce inlegro multo longionb.; stamimb. exaertis. 5 — Corolla purpurea. Baccae auramlacae. — Affioe sequenii, sed differt foliis late ovalis. — Baccarum infusum aqua praeparatum, v. decoctio cum vino a Chinensibut laudalur, ut remedium tonicam etc. — *L. Barbarum 0. Chtnense* Ail Hort Kew. 1. 257. — *L. ovatum* Duh. Arb. (ed. 2) 117. — *L. Barbarum* Lour. Fl. Cochinch. I. 165? — Crescit in China boreali.
4. *L. KITHEMCUM* Murr. Comment. Goett 1770. p. 2. t. 2. — M. B. Fl. Taur. Caucas. 1. 100. — G. Don I. c. no. 4. — Caule fmlicoso; ramis dependentib.; foil, fasciculaia lineanb., basi attenuatls, tubcarnotis; pedunculis calyce longiorib , stamimb. subexscriis, limbo aequalibus; ealycib. inaequaliier quinquedeniatis. 6 - fahx ranus 2-3-fidus. Corollae tubus albus, limbo purpurro. — *I. Tatartcum* Pall Flor Ros»ic. I. 78. t. 40 Cres&cil in Sibina el lljrcama locis salsis.
5. *L. SIMWII* Roem. cl Scb'ill. Syst. vegcl. 1>. 60J. — G. Don I. c. no. 5 — Laule frucoso, ram& <Jopendentib., apicelomenlellis; grmmis npinescenlib.; foil otaiolanceolalii^ cra^siunculis; florib. panris albis laieralibus 5 — Kami sparsi Folia brevia crassa sparia. Aculei ngidi. — *L. Europaeum* Mill. Diet no. 4. — Shaw, Afnr. J40 fiff J19. — Crescil in Barbaria.
6. *L. TREWIAMM* Dull Arb. ed 1) 116. t. 30 (sub *L. Chinese*, eliaro Pers Ench I. 231. no 9 — (J Don I c no 0. — Fruliosum e reel urn ramis diffun* angulatls; gtmu spinosts; foil pctiolatis lanceolalis aruti<; pedunculi* umflont §olilarns >. geminais exiraaxillanb.; ealycib. 2-3-fldu; corolla inrundibuliforaii, slamimb. exscriis. j — Raml rufoscenles. Splnae paucae. Corolla pulchre purpurea, cenlro alba. Filamenta ban pilosa. Bacca ovaia. — *L. Barbarum* Lam. Diet. III. 500. ex Poir. Suppl. III. 427. — Tre*, Ehret I. 6ft. (excl. s)n) — China.
7. *L. LANCKOLATIM* Poir. I. c. 420. - G. Don I. r.'no. 7. - Caule fruiiioso; ramis dependentib. reflcxis, gemmis spinescenUb.; foil, lanceolalis sub«es»ilib, utnnq. acutu, florib. solilarus cxlraaxillanb pedicrllalis; corolla infundibuliforrai, slamimb. exsertu. ^ — Cal)x inarqualiier quinquedenUlu> Corolla purpurra, fundo alba. Bacca oblonga rubra — *LI uropaeum fi.* DC. Fl. Fr. no. 2000 — Pers. Enchbind I. 231. — Duhatn. Arb. (ed. no?.) 123. L 32. — Ad *L. Europaeum* pertlnei ex 8pr — Crescit in Europa ausirall.
- a *L. TtRBIMATLM* Duh. Arb. (ed. nov.) 110. t 31. - Port. Enchlrlld. I. 231. (fxel syn. Lam) — G. Don I. e. no. 8. — Caulib. ereclls faselealatis; ramln dfprndentib. teretib, Ktmml* spinescentib.; foil, aotailib. laneolatis acumlnalis, florib aggregate pcdirellati* oxuaaxillarib.; corolla infundibuliformib; stamimb. cx<frtit>, eañiib infldia; baccls turbinatis. 5 — Corolla violacea, fundo alba. Baccarubrac. — *I haltmtfolium* Mill. Diet. no. 0T — *L. Barbarum fi* DC Fl. Fr. uo 2700 — (rest 11 in < him
- . *L. U1M1MI* Mrhrlild Linnaca MI 60 t «« Don I. c no 9 Frulieosttffe ramis rlongaii* subsrandrniib, ramulis uirrduum %pint*ronnl), foil, iparsis lain ovatis acuisdenticulalo-riliaiitglabris; florib axiilarib «o|j(ariiii brftit>rfoe pcdoculalis. calyels lacinus lineanb aiulu barram globosam tuperantib , corollu

- puberuli* infundibuliformib.; genalibus exsertis. S — Habitat in Brasilia. — Calyx profunde quinquefidus. Stamina villosa ul ID *L. Barbaro* Corolla purpurea' 10. L. OBOVATLM Kz. el Pa\ Flor. Peruv. II. 46. t t. 1SJ. fig. c - G. Don I. c. no. 10 — Caule fruhcoso, ramis patentib.; aculeis rigido, junionb. folios is; Toll obovati* oblUMs peiiolali* spares >. fasciculate; pedunculi* bohlarms cMraaxilla-nb. uniflori!> nulantib.; corollis lubulosis, limbo piloso crecto; caljcih tillosi& quin'juefido. o — Caulis emereus ratnosissimus. Segmenta calycina reflexa. Corolla purpurascenti - violacea Bacca parva globosa aurantiaca. Spinae adullao nudaе — Cre*cit in Peruvia ad Tarma.
11. L. M.ABRIM frees ab Esenb. No*. acL acad. Caesar. Leopold. Carol. nat. cu-rios. XIX. Suppl. I. 389. — Frnlicosum spinotam, setalis exiguin seabrum: foil, obovatis, flonb. soliiarus nulantib.; pedanculo calyce cupuliformi quinquedentato longiori; corolla subtrotala, tubo calyce brevior; slamimb. corolla brevionbus (exserti?) 5 — A *L. obotatio* Rz. et Pav. differ I calyce non hirsulo ejusq. lacimis distanlib. lineanb. obtusis nee acutis; corollae lubo broiore, pedunculo longiore. A *L. enno* Gill. pubc*centia exigua simplici nee ramo»a canctecnie, turn caulo »pmo*o nee iniTmi. - An *L. oboratt* \ar.? — *L. dtshchum* Mc)cn, !tn»e um dio Erde II. JO. — Fruticulus ad terram fere rescissus mutilus. — Cresni in Peru- >ia (Arcquipa .
12. L. SUM'tf Kz. et Pa\ Flor. Pernv. II. 40. I t. 183. fig. 6. - G. Don I r 450 no. II — Frutiro»um: rami» longis pendulis; spim» folio»is», foll.obo\ato-oblong- gH »c*Mlib, florib e\traaxillanb. nutanlib. solilams breviter pcdirell.ilis, corollis infundibulifurmil), <tamiuib. ex^ertis. 5 — Folia pana fiscicul<ia. (.il>\ quin- quedfiiiatus (orolla pana albescenli-purpurej, segmentis oblongis uluu*i> >is- cidis paicntibus. Bacca panra ovalo-oblonga acuta biloculans vix pulposa 8c- mina parva lotea. — Cretil in Peruvia.
13. L. TIUXBERGII G. Don I. c. no. 12. — Caule frolicoio; foil, lanceolato-fllip- tici>, ramis laxis subspinosiv. 5 — Caulis teres canus f reel us It .inn magis m>- nu>u« spmosi elongati, plerumque simplices. Folia plerumqur suhiana infra- Hpmalia ghbra, sesquipollicaria et ultra — *L. Barbarum* Tbnbrg. Tran>acl. of ibe Linn soc IX IV2 — Crscil in Promontorio bonae <pn
14. L. M4CH(H>ini.IIM mil. Plant. HarmcK TH - Foil, nblongn-lanccolatis v. ellipiiris aruminatiH U*nuib f junionb pul\iTulrnlj», adultis glabri-. pedirollis IQ ramuls >rr\iximiH fasciculatis; cal>co late quin(u<*dvMilio. deinum dilaiato v. fesso, corollae¹ mfundibuliformn breeder qmnqurlidar IJUIIIH recuno-palentib., stamibus limbo wx lungionbuH — (re>cit in Mexico
15. I. U111hW: Hortero in Mruu.no di Ton (to WXMII 133. t I. 44. Uolo •ubinernu trecio ramoto; rann> gracilib. cmrcu; (oil. nlieroU ipanitve bre- viMime peiiolalu o<alu-lanceolallt iolfgru v. lubrecurvit lenuiMime ciliatK, pedunculit toliuili 1- Boris corollam sabaequMtib.; ealycib regulanb. »emi-^ - fldi4 villoslutealls ereeiii; eorollae limbo 5-partito palulo, lubo longiore, laeiniii' ovalo-oblongi<; slamib. e faoce eieriii. j — *L. mutant* Poepp. lib. — Oiili.

SeeUo II. I80D0ITU 6 . D n U 459.

I ihx urreo|iin-c.impanulatu» arqualiter quinquedenuiui. Corolla infuodibu- 11 for mi N, limbo quinqurfido erecto Stamina incluM Fnitices Mils fasciculain; flonliu% jiiIUribus %ub%ohljriH — *Lynobatot* Endl. I r

16. L. «K%4II I. Mr)co. Knte um die Krdr I. \$40. - Vr« ab K«rnb. !\ov. act. acad. Car* Leopold. Carol nai runov XIX .suppl I &9 Inrrmr foil. Un- c^olalo-lmeanb. arutu%t uli*. ba<i ailrnua(i« glabri%, prduneulo toliuino, calyce brevl subulate-qmnquedriiui" duplo longiore; cal)cc lubum cor.»||ar jrqujnt<*, limbi corollim di«mnro alliuu.lm.in corollae superaie. ^ - Matimr albne S. /Ui/b/io Gill, e Pampu Bonanrn%ibu* allalo , »rd differ! foliit longmnb. U1.on- bu^que poll I loogU, |,n I Uti» acuiiUfCuln nequr oblu»i», pedunrulo l<m<ioh. corolla bre^ori el laiioh. quippe i linras ilU et 3-J¹, lin lala. - In Chili ad (opiapo crscil

17. *L. PARVIFOLIUM* Willd Rellq. ex Roem. et Schult. Syst. veget. IV. 008. — G. Don 1. c. no. 13. — Fruticosum spinosissimum: foil, fasciculatis obovalis oblusi* glabris; florib. subaxillarib. solitariis pendalis; corollis lubulosis; slaminib. bub-inclusis. 6 — Folia parva. Calyx obsolete quinque en talus v. subinlegcr. Corolla tubulosa parum cunau, calyce 0-7-plo longior. Filamenia capillacca glabra. Stigma incrassatum. Pedicelli calyce longiores. — *L. microphyllum* Humb. et Bonpl. mss. (nee Duh.) — *L. horridum* H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pi. III. 52. (nee Thnbrg.) — Crescit in Andibus Peruvianis inter Caxamarca et Magdalena.
18. *L. AFRLM* Linn. Spec. plant. 277. — Pl'cnk, Icon, plant, medic. If. 22. t. 127. — Lam. Illustr. gen. II. L 112 fig. 2. — Duham. Arb. et arbusl. (cd. nov.) I. 107. 1.20. — Mill. Icon. t. 171. fig. 1. - Sweet, Brit. flow. gard. (New Ser.) IV. t. 324. - Bot. Reg. t. 354. - Trew\ Ehrel. 4. t. 24. fig. 2. - Rich. Gen. 224. l. 105. fig. 2. - Niss. Act. Paris. 1711. p. 420. t. 12. — G. Don I. c. no. 14. — Bertoloni, Flor. Italian. II. 038. t — Fruticosum: ramis apice spinescentib.; foil, subcarnosis obverse lanceolato-linearib. fasciculatis; Oorib. pendulis subaxillarib. solitaris; pedunculis calyce longiorib.; corolla lubulosa calyce iriplo longiore; slaminib. inclusis. i> — Caulis teres creclus, corlice cinereo tectus, spinosus, splnis brevibus palulis, 4-5-pedalis, sed eliam biorgyalis occurit. Folia integerTMma, supra canaliculata e luberculo gem ma ceo pro fee ta. Calyx campanulatus, scissuris nonnullii inter denies profundionbus. Corolla infundibuliformi-lubulosa lucide purpurea, exlus limbum subinde viridescens, segmentis ovatis oblusis patentl-recurrulii. Stamina medio corollino adnata, basi incrassata, undlque albo-barbaU. Antherae sagittatae erectae virides, polline albido. Bacca globosa obiusa magnitudine *Cerati*, sulcfs longitudinalibus quinque nolala, matura lulca. — Crescit in Hispania, Africa boreal i rt in Palaestina.
19. *L. IMKICATIM* Iloiss. Elench. plant, nov. Hispan. 143. — Voyage bot. dans le midi de l'Espagne no. 1215. t — Fruticosum: ramis intricatissimis glabris abbreviatis, in spinas validas abeuntibus; floribus solitariis; pedunculo calyce aequante; calyce breviter quinquefidato, corolla (innuivis) breviter quinquefidata, limbo ad marginem subpubescente; Mphlo siamimbq. •iubexsertis. & — Crescit in Hispania australion.
20. *L. TEMK* Willd. Knum. plant. borU Berlin. I. 245. - G. Don I. r. no. IV Ynilicosum: foil, linearib. »ubrarosis fasciculatis; ramis erectis patulit spiniscentibus; pedunculis calyce longioribus; staminibus corollae limbum subacquantibus. § — Folia quam ilia *L. Afrt* breviora ei angustiora. Pedunculi calyce parum longiores. Calycis denies adpressi. Corolla ten £. *Burbari*. Summa limbo parum longiora. - Crescit ?
21. *L. PROPRIUM* G. Don I. c. no. 10. - Canle fruticoso; foil, lineari-ellipticis; ramis strictis; pedunculifolio longioribus*. vS - Caulis utricule erectus; rami sinuati subverticillati breviter sinuati. Folia fasciculata glabra -I^l - |>ollir.nri.i. Pedunculi capituliformes unguiculati florum circiter longitudine. Corolla breviter campanulata. — *L. Afrum* Thnbrg. Prodr. fl. Cipens. 37. et Transact. of the Linn. Soc. IX. 158. (nee L_v — Crescit in Promontorio bonae spei.
- B. *L. RIGIDUM* Thnbrg. Prodr. 0. Cap. 37., Transact of the Linn. Soc. IX. 153 I. 14. — G. Don I. r. no. 17. -- Erectum fruticosum: ramis strictis spinosissimis; foil, linearibus obtusis fasciculatis; pedunculis quam folia floresque brevioribus; corolla lubulosa; staminibus intortis; calycit quinquefidatis dentibus ciliatis. j — Caulis flexuosus glaber canus. Kami rugoso-angulati cinerei, apice pumosi Folia glabra runnta uncialia. Floret solitarii pedunculati nulantr*. ||| difTm a /. *Afro* HIM podtrilliH bren»Mtnif, habitu humiliori, fructu pauciori foliis pallidioribus — INMIKCH nolilam >. term. Calyci campanulatus quinquefidatus, denibus arulih. (corollis tubulosis) violacea. Ilacra globosa pauciformis bilocilans - *L. Afrum* fl. Lam. Out. III. M0. - /. It (*thrum* Mill. Diet, no 2' Tr*w, Ehrel. t. ii fig. I / *rarmum* Dulum. Arb. v\ Arbuti rd not |||. Pen Encbind. I. £11 - Croat in Promontorio bonae spei ad (ap To<n

- 23 L • MICROPHYLLUM Dubam. I c. 112. - Pen. ! c. - 0. Don !. e. no. 18. - Erectum spinosum rigidum glaberrimum ramis reflexis; foliis solitariis v. fasciculatis parabolicis; florum afflanis solitariis pedicellate nuianub (*); corollis infundibuliformibus; (slaminibus inclusis). 6 — RADII cinerascens spioa rigida terminata Folia glauca parva lineata(?). Bacca globosa obscure coerulea. — Forte ad bene sertionem non periret — Crescit in Africa orientali et in India.
- 24 L U>EREIM Thnberg Prodr. fl. Capens. 37., Transact. or the Linn. Soc. IX 154 t 16 - Willd. Spec. plant I. 1050. - G. Don I. c. no. 19. - Fruicosum. ramis terrib. paucis. filiformibus, ramulis spinosis brevibus; foliis lanceolatis obtusis* glaucis glabris fasciculatis; florum antheris. liliis nutantibus; corolla tubulosa; ianibus inclusis 5 — Pedicellus calyce brevioribus foliisque duplo maioribus Corolla purpurea* — Crescit in Promontorio bonae spei.
25. L. HORRIDUM Thnberg. I. I. c. c. L 17. (nee Klh - G. Don I. r. no. 20. — Caulis fruticosus, ramis strictis; foliis, oblongis carosis* glabris, floribus subsessilibus. 6 — Caulis inclusus ramosissimus inpedalis, rami nodulosis cum spinescentibus. Folia fasciculata J-7-na, supra plana, infra convoluta alba parva. Flores solitarii pedicellati, pedicellis liliis glabris, lineam longis. — Crescit in Promontorio bonae spei ad Saldanha Bay.
20. L. TETRA>DRIM Thnberg. I. I. c. e. t. 15. — O. Don I. c. no. 21. - Spinosum erectum ramis angularibus strictis; foliis, fasciculatis ovatis obtusis; floribus subsessilibus, corollis quadridentatis. 6 — Caulis convolutus glaber angularis rigidus canus, rami bonzonalis spioosi. Folia lineam longi More* solitaria breviter pedicellata e foliorum fasciculis orti — Affine / 4/ro, differt lamen folium magis carnosum florumque tetrameris tridentatis. — L. (aptus* Mill. Did. no. 7⁹*) — Crescit in Promontorio bonae spei.

SMUTm. AmOMITU 0. MB L <. M. 4<0.

• Calyx urceolatus aequaliter quinquefidus x. quinquefidus < Corolla tubulosa, limbo erecto plicato quinque- decedentato. Stamina subinflata — liliis incrementis foliis sparsis; florum sabaiianibus v. liliis fasciculatis umbellate — *Lynohamnos* Endl I r

§. 1. *lorolla quinquefidata, quinquefidata r. quinqueloba.*

27 L FI (IMOIDE* lumb. el Bonpl. Plant, aequum I 147 r t 41 II B Klh. >o\ Rin t< pec. plant. III. W- — G. Don I. r. no. 18 - (jul. fruiroko. ramiuli* puherulm, foliis oblongis obtusis* cuilibet ghn% umbellatis atillanibus terminalibus «r<9ihb. corollis iubilatis», limbo (quinquefidus, tiamibus. vii et<rrti« > Rjmi angulatis I lore* pedicellatis prunulis (,al) campanulatis* bilobis, lobo aliro bidrilato, altero tridentato t. loirgro (corolla purpurea 11-lamenta ba»i dilata nullo»a Sugma bilobis. Bacca otrata untorum polypeterna, a ralyrr ciocU. - Cretid in rfoo Quitenti prope DrU^, Cumbr t Curnta (aim 1100 betap.

& I (>EsNhRM»IDE< II. B Klh I c 53. - G. Don I. r. no. il ~ iUmuh. tillo*o-(oni«-nloMs foliis ovalibus acutis, infra glabris, infra puberulentibus >%dill% umbellatis nubaiianibus terminalibus »r<9ihb. comillis tubulosis (lobo 5-lobo puberulentibus. sUmimh tit r<rrti« %> — Ramuli tr<«*« (flabris r< tupra!) Prdirrilli tilloti I ahi q*jinquefidus puberulentibus i orollis lulrj hmbn quinque-lobo pluvio puberulentibus Barra a ralyrr rinru liUmrnla lu<i pjruro dilJU^ puberulentibus Miema tubraplatum tnl >bum In n<dilm» ^>uiti»ntibus loci* t<mprra<U propr M Vjrhm n |*||r flu<n Tnrhr rrr<m » I taBKIIATIM Hi rt pj« ||or Prrui II ii i Mi fi; (. r. Don I. *. no U. C^ale frunro«o. foliis puberulentibus oblongo-lanris .Uu« glabris, subtus

/ f 4PF.\Sf; MhU. !>•* no 7 - # Don I e ¥O - trmhfontm foU ohlomp
wraii' rrautmscniis mgfregahs *Ptmu riftdu f*ltot*j Ao/m tpmf iobl³n0
r fasnniUL* rras\$M B*UU* rrtJiS prnslmits / n kario (hobocum no M¹¹.*
foruit

putveruleollf i umbellis axllarib. brer Her peduncatalis; corollto tabnlosae aegmentis aculis; staminib. ioculus. 6 — Folia sexpollicaria. Pedicelli inaequale*. Corolla violacea, limbi segmenlit aculis. Filamenla glabra. Bacca globosa pUi-formis auraniia. Semina reniformia. — Crescit in Peruviae valle Canla.

30. L. CESTROIDES Schlichtd. Linnaea VII. 70. t — G. Don I. e. no. 25. - Frulicofuro: ramulis spinescenlib.; foil, sparsis, dein pseudo-fascieolalis late lanreolalis, utrinq. aculis glabris; florib. pedunculalis in summit aiillis fasciculaiim provenieniib., hinc inicrdum pseudo-umbellatis; calycis tubulosi denlib. brevib. Iriangularib. acuiissimis; corollis lubulosis glabris, margine pnbeseentib.; genitalib. inclusis; slamib. inaequalib.; bacca nubglobosa calycem suffulcienlem lateraliter fissum paullo superanle. 5 — Folia maxima 2-2'A poll. longa. Florrs DMgni. Caljx pubescens quinquedentalus, demum laleraliior fissu*. Cornllac limbus obiuse quinquelobus. Dacca globosa rubra. Semina compressa. Erabrjo annutaris. — Crescil in Brasilia prope San Jose do Uruguay.

§. 2. *Corolla decemdentata.*

31. L. LOXENSE II. B. Klh. Nov. gen. el spec, plant III. 53. — G. Don I. c. no. 35. — Arboreum: ramulis pubescenii-lomenlosis; foil, otatis subaruminalis. ulrinq. pubescentib.; umbellis subaxillarib. lenninalibq. sessilib.; corollac tubulotae limbo obsolete deremdentato puberulo; »laminib. inclusis. \$ " ~ Bami lereic*. Folia 3-3½, poll. longa. Pedicelli pilofolomenlosi. Caljx campaoulatus quinquedentatus puberuluu. Corolla basi parum dilalaia pubenila. Stigma capilaium. Bacra ovato-oblonga a calyce cincta unilocularis. — In Peru>ia prope Lotam.

32. L. CORMFOLIUM II. B. Klh. I. c. 54. - G. Don I. r. no. 27. - Arboreum: ramulis piloso-tomentosis; foil, rotundato-ovati* subaruminali* compliratis, supra puberulis, infra lomenlo molli ruffsrcnlo \ostiii«; umbelli% Kubaiillanb. lorminalibq. sos>ilih.; rorollae tubulosao limbo drrcmdenlato pulierulo; »faminil>. niclusis 5 — Folia tripollicaria. Pedirelli tomrninni. Caht puhrrulu* tubuloMicanpanulalu<i quinquellodus. Corolla pberula, limbo plirato, deniilni* alicrm< minuti«Mini<i. Filimenia ba<i pubemla. Stigma sublobatum. Bacra a ciljrr nnrta. — *L. orotr* Willm. Roliq. in Roem. el Schult. S)»t. veget. IV. 60« - «rc%cil in Andibui» QuiioiMMibiiii inter Tiscan el Alausi locis umbrosis.

38. L. FMBROSIM II. B. Klh. I. c. — G. Don I. r. no. 18. - Arboreum- ramu plo<ls; foil, ohlitu'i^ aruminalis glabrioscalis, floralib. ovaU>-rhomb>uidet«; umbellis subavillanb. terminalibq.; corollae tubulosae limbo decemdenUlo piloto; Maminib. sutuncluii*. 5 - Kami subanguUll. Folia seipollicaria. Pedieelli pilot*. Corolla eocinca, aptce ampliata, parum recurtata. Hmbl dentib<f oblutis flmbriato-cili.i(i«. Filamenta ba<i membranaceo-ditatata pubemla. fttigma ob<oleic trilobum. -liarr.i o\ala umlorulans polynprma. — Cre^rit in regno Ncno-iirflnatensi Ion* umbro>is prope La Vrga dr SI. loremo et Alma^urr.

i *Species minus cogmtac*

34. L. CAPM'URF. Linn. Amoro. acad. IV. 30*. - Willd. Spec, plant. I. 1001. - G. Don I. c. no. S. — Fruiculosum: foil. Uoccolatis Icouib. gUliri*; ral>rib. pedunculisq. puberuli»; perirarpio captulari. 6 — Baal irreiet, »p*oi» a&illaribv* paieUbus armati. Folia breviter petiolaia. Pedunciili simplires anllarcs uniflon, folio breviores. l'.al)j puberulus. Corolla rvlata. Stigmau 2 recta grarilia. Capsula ovata mucronau bilocularis. — Certe non esl *Lyrii* »pecies. — In Meiiro.
35. I. «AH(MMAMM Walt. Flor. Carol. HL - Michi. Flor. Am. bor. I. UV - (, Don I. r. no. JO. - Inerme: foil, angusll* spalbulalo-oblongU; flonb. qnjilrin<li° tetrandri» mrrrulrn. j - Crekrit in r.arolma, Georgia el in Florid.1.
36. 1. OUT! M M Willd. RHiq. v\ Rorm. el Srhull. M>|. |c*vi. || . w*|. <; |h, n I. c. no .11. KrulicoMim f<>|. <«!><|ah* lonc<* prii<ilaii%. |irU(inruli% a,jfT«g«u^k. ram°% «pino>is; flonb. trirat)dri< ^ i rr>cil in (,umin.v
- 3J. L. GliANhIT.OIIM ^illd. I. r. (. .lk.nl r lul no. 32. - Friiirimim. foil. ellipi;ris; petiunruli< agirrrg.ili*; ral)rib. Inlobi*. j - < arara«

38. L. INERME Mill. Diet no. 0. - G. Don I. c. no. 33. - Fnilicosom: foil. Ian-
"Ceolalis alternis persistentib. peliolatis. ^ — Caulis crassus lignosus. Rami nu-
merosi breves brunnei. Folia 3-3 1/4, poll, longa, obscure Tiridia. Flores albi.
Fructus.? — Forte non ad *Iyrium* pertinet. — Oesrit.?
30. L. COCHINCHINENSIS: Lour. Flor. Cochinch. 134. (ed. Willd. I. 165.) - G. Don
I. c. no. 34. — FrulicoMim in or me: foil, oblongis obtusis; cymis lerminalibus. i
- Frutei erecius ramosus. Folia glabra crassa alterna. Cañi quinquefidu*. Co-
rolla alba tubulosa, limbo qoiouefido refleio. Stamina 5 corollam subaequantia
longe pilosissima, pilit lubam eorollae recludeolfbus. Bacca rotundata bilocu-
laris. — Forte ad lecUonem primam pertinet — Creicil in Cochinchioa.

ft Species nennisi nomine notae.

- L. CAKUM Gillies.
L. FILIFOLHM Gillie*.
L. IMBRICATUM Boiu. — (Cerle idem ac *L. intricatum*.)
L. SPINOSLM Sieber.

ftf Species e genere fpxrllrnda.

- L. A(i)IRE(C)ATIM Rz. et Pav. - ACMSTCS ARBORESOLNS.
L. ARBORESCENS Spr - ACMSTIS ARBORESCE>S.
L. BARB ATI M Tbnbrg. - PLECTROMA VEMOSA.
L. BOERHIAVIK FOLII M Linn. - GRABOWSKYA BOERHAYIAEFOLIA.
L. FLORIBINDFM II. B. Kth. - Af.MSTI S FLORIBIMH S.
L. FOETIDIM Linn. - SERISSA FOKTIDA.
L. GAYAQILEM6E H. It. Kth. - ACMSTLS GAYAA^I-ILF.NSIS.
L. HETEROPHYLLM Murr. - GRABOWSKVA BOERUAVUEFOLIA
L. JAPOMICtM Thobrg. - 8BRISSA FOETIDA.
L. INDICIM Beta. — SERISSA FOETIDA.
L. mERME Linn. Bl. - PLECTROMIA VETTOSA.
L. SPATHLLATLM Ri. el Ptt. - ACMKTT'S SPATIH^LATI'S.

345. %r\IHHTIH Schott.

(Srhott, Wien. liter. Zeittibrfl. IV. 1180. ei ftebletd. l.mn.irj ||| . Lurraturb. M. -
Mnsn. Genrr. plant, vatcul. 1.277. II. IHi — *Alro/tar n /yr., K.,T. jurt. - . G-*
Don, General »j»L of gard. and boi. l\ . f»|

- I. |(.) . ITRoPA Linn. Amoenil. arar. IV. 307 I.Yi.ll M s,,r. s««i. *rgn. |. 701.
no. II. ARBORESCE>S Seblrbtd. Linn. VII. C7. li Don I. • n< L - Fruii-
eotuf «ubarborru«: foil, nblnngit. ulrmq. alienujin «loncaiii lotrgernnit aruii*.
»upra pub^rntib., drmau nrrqib., infra albo-ion»rnio«i«; rarenit umbellat.,
ri aittlit foliorua lap%amm ortnndU; UciniU corolla* rv^olulU; Mamimb. longo
•ucrtit. j». J'. - Folia 0-7-polhcana. Jnaiora p«h«mleoU, drnum eUbrtrterniia
vlhdia. Filamenu batJa) for* «••]•• Ubera. — *Lynum aygrfyalmm Hi n Par.*
Flor. Prmv. II. 41 f L KB. 0g. a. Ceslrm eamfntmmUmm Lam Ihc| | 644
trtlrum cauli/torum Jrq. Uori. Scbornbr. III. 41 . ; I. J2V Ir«uf«j canli-
florin SrboU .I r. . Airop \$otaimcea III. - BtUmdomma frutnermt flor* albo*
*Nicotiana fohts Plum. *p«x. I. irno. I 4u 6f. I. -- Ur»p* arbors* Willd. Hb.*
— *Urescit in in«uli« Vartimrj, Jamaica, in Brasilia rl in IVrmi* pr««pr | tmm.*
2. Ai| .MO k|*| IJKN>I* i; Don I. r. no .1 > Ar»»r«% ff.li r||i.i,m-oblongo
aculis, »opra pubtrrrnith., «ubtu« n,««dhttr loror«io%i%. umb»rilia catesavillarid.
vescilibus; f«l>fib. p«aUKoni«, »t4»inil. n»rrti% 3 RQII trrttr% canccentia
tomentoi. Stigma capitatum subbilobum. Corolla glabra *Sycum Guay-*
quense II. B. felfc. >o« c-o ri «>re pi III 30 Hb Synops pl sequo. II.
170. - *Crocod im r#tmo ^aiiro«i prop« Uo»»q«U Ion* bumidi**
1. UV%. FLORIBI'^DIH U Don I. e. no. X Fniiicotti* foil b|k«n«* *<«« <|a*
bnt. infra pub*«c#«U»4 ambrlli* rtiraatilUnb trtttilib jppmi,«,*,!.. .. **.*
gUhn albi. Fior^ t^ t^ ||, «penei prarr^rait m«jnrr« *Laja obtusa.*
Stamina etterta. *Corolla etas pubescens Stigma capitatum subbilobum. -*

Lyrium floribundum D. B. Kth. 1. c. 51. — Kth. I. c. — In Andibut Peru|ianii aU Gaiamarca cresci.

4. ACN. SPATIII'LATtS C. Don I. c. no. 4. — Glaber: foil, obovalo - spaihuhtH dispersis v. fasciculatis; umbellis subaxiltartb. sessilib.; corollac bCRtenii* neuin pubescentibus. ;S — Kami angulalii. Folia 1-2-pollicaria. Bacca rolundala rubescenli-flava pisiformis. — *Lyrium spathulatum* Ri. el Par. Flor. Peruv. II. 183 fig. a. — Oescit in Peruvia prope lluanuco.
5. ACN. 'ATROPA Willd. Rrliq. in Room, el Schull. S>st. vegcl. IV. <K0) SIDF.ROXYLOIDKS G. Don I. c. no. 5. — Fruticosus: foil. ol|<np-o><His utring. acutis, infra pubesrriiib.; umbellis lateralib. hCSHJlibuu. j — Cri'sril ad rip.it (lu|ii M@g·dalcnae in Perwia.

3715. GRIROIfttKYA ScMchld.

(Schlchid. Linnaea VII. VL — Meisn. Grncr. plant, vascular. I. 27< II. 1<8. - Genu« a 81. Endlicher ad *Ehrelieacearum* casira rvlaturu, a Keetl* iirruni ad *Solana-crat* revocalun).

1. GR. BOERIIAVIAEFOLIA Schlichtd. I. c. - Lindl. Boi. RfglM. |. IMS. - Hook. Rot. MAMZ. I. 3*41. — G. Don, General iy>U of gard. and Lot. IV. 4*0. no. I. (*Crabourskia*.) — Frulicosa ipinoia: foil ovalii tcuili glaucit; grmmit ipmrt-~~erantib.~~; flonb. paniculatlt. 6 — Folia glaucescenlia coriacea, gutta aaltugiDoto ina o. Corolla alba, in fauce viridi-veoota. Geniialia alba, iligma viridc. - *Lyrium boerhnciaefolium* Linn. Suppl. 130. — Lam. Diet. III. 510. — *F.hrrlia ha-UmifoUa* Ilrril. Slirp. I. 45. I. KI — *Lyrium heterophyllum* Murr. r.omitcnl. Guil-liii^ 1>1. p. 0. !. 21. — r.n'scil in Pennia.
- S. (ill. I.M.ini' DIMMIIV Mr>cn. Hriso um die Erdr I. 44^ II. 2*1 - >rc< nh KMMII). >I>\. ari acid. <Lir>ar. Leopold. <laro|. nalar. rurioN. XIX. Nnp|d. I. 'M|. I — Krccta riftida: ramn di>>lirlii< cinrrns ramuli>q. p4lenlu>imi< apic<^ ^|Mnn-»m; foil. o\ili-<D>lonins oblUHiu>culi< glabriscoriarru; flonb. »olii.irii<. pcdunrulo calyrcm raiiipanulalum quinquefidum acquanle paullo|e »uperan<*; rurulUe lubo limbcm infumiibulirormrm arquante, laciniis rrreiu nullo bre%omrr; ^Liminih. non eineriic. > — AcriMiii *lyrit* plunbut r.apfn%ibus, inpnmit I., *nguiu* lhn|><. el quoad 0orr> /.. *lubuioso*, ted differt ab onmb. hi*re folns ovali-ublungis conform.bu« (.1.* lin. lungi*) ri ranu •ubttmpllcibut loogii duUebe patraUttinii*. Cal>ri< larimae tnaogularea acuaiae. Corolla coerulea 5 tin. longa Mbineurva, tuho -2 lin. lonKo, lum limbo obconleo modlco dilalalo, lacinllt brevUiimu rotumiaiiH rrerin. Stamina incluta. Fruclut.....? — CretcU (o Peru>lae Cordillera de Tacnn
3. GR. (LVr.U M¹ MKVKM |V\ >ee< ah F^cnb. I.e.- - Krerla ni;id.i · p<mm.< ^.thilr Rpino%fti; bam (.ikrirulalo · fojiom% allio-lomenlosis; f*11 I.IIK< >, |||* dlunsis \$||-bns; (lorih. nohlarii* nuUnitb.: prdunrulo roljro l.nr ramp.ui>liio <|uiqudrn-lato duplo tripliive loiiKtorr, corolla lobulo>a, c<l>ce quinluplo l<»nprp, limbi lacintit brr^ib arulit paiullt; ftamiaib: laclaali. \$ — Fruin spr*otu», *Lyrio hwrrido* II. U K<h. pemimilu, divcrvnt aulem follU niniane obo>aii< nbovaio<e> oblonfU ted rev era lanceolalit omntumque patium mole majort. Gemma ha<i Ooero<o-tomento<a e qua folia confertim natcuntur, abil In »pinam coniram nudam pollicarrm *. te<qiiipollicarem. Apire* novelli ramorum rane<renti-norro<t. ~~Pedunculus~~ aullari* glaber 6 lin. loagut. Calyi brevi< glnber, 1>HM mhm.l i>. ~~laciuus~~ sru drnlib. '» l.ilu aequ.ilib. obiu<e rd<pidtlaliala, cu>p dull* nirvn· (ro||.i |IOLIIIM 1> Im. I -ns-i. Imilio parum dil.iMi». Kinuu* pairntili m.ir;;>]u l>. KIIIIIS ril.Hi*» II K r.i I'tw <lu'l<» niAj<»r elnlu^i mbra. calxrr jim in ir.jujilMrr ·1-1-|i.iriil'> I'.ili'iir MifTnl.t.i. *Uroj,,i tfin<j,i M<wn, Itrsr um <|ir Frde I 410 i rrr\ ni in I'rniMj, in planti i Lu* r.?ra l'i>irfm>m*

flubordo II. *HECTEWBJRWEJUB* Endl. Enehlrld. »•*. S3*.
— ttener. pi. Sappl. II. •O.

Tribus V. *CESTRIXEAE* Endl. Gencr. plant, p. 067.

Kmbryonis recti cotyledones foliaceae. Radicula infers. Bacca bi-ocularis.

3805. *CESTBIM* Linn.

'Linn. Genrr. plant, no. 801. — Meisn. Geor. plantar, vascular. 1. 378. II. IAS. - Spreng. System, vegetab. I. 073. — Dietr. Synops. planUr. 1.802. - G. Dun, General iy>l. of gard and boU IV. 480.)

§. 1. *FilamentU edentulii nudis r. interdum ad insertionem villosi.*

t Floribus solitariis r. aggregate srs>ilibus.

1. C. DLXIFOLIUM II. B. Ktb. Nov. gen. el spec, plantar. III. 57. - Kih. S>np<. plant, aequinoct. II. 183. — G. Don I. c. 4*1. no. 1. — Foil, .iprosimaiis elliptiris obtu>u>culis suhcoriaceis glabrii nitidif; florib. axillarib. toliariis termmalibq. congestis sessilib.; filamenlis nudis t> — Ramali fu*ce*cenii-lomentofi. Folia 7-H lin. longa. Corolla alba. — Crc>cil prope sanclaahum Monl%erraien>r locis frigidis Xovo-Granatenuum.
2. <. MAR.1^1ITK.\SG II. B. Klh. I. f. - Klh. I. r. - G. Don I. c. no. 2 - Foil. oblongis aculii mvnriranareis glabri>; florib. .nill.irib. \n|i(.ini<i irrminalibq. congestis »ub<(*>>ilib.; lacimit rorollae o>alif aculiv lilatiicniin mu<«>. :> -- Kami pubrsrenief. Folia 2-8 lio. loaga. Corolla alba. Bacra ovaio-elliplira pmrormi*. - (. 'BofotonM Willd. ftdiq. im toMi. ei Miall. KytI. vegocab. IV. H07. - Crr<cii prope San Ana H MariajvtU Tlovo-Granat<n>ian.
3. C. PENDULIMM Jcq. Borl. Scbornbninn. III. 42. t 347. - Pmr. F.nc|c|. mnb. Suppl. II. 181. - H. B. Klh. I. c. — Klh. I. c. 184. - G. Doif I. v. no. .1. - Kimm Klabriu>culi>; foil, ovato-oblongit »ibaruminatit hirtrlli<; liorib. in .ipirr r.imulorum r<ing>Htis tabfe*>ilib.; laciniit eorollae oblongi* nbtu<i<, muGinc inQrti<: filaments nudis. 5 — Ramuh puberoli. Folia btpnllicwa. Corolla \ r>es>enti-alba. Bacra ellipticj magnitadinr illiaf Corni atbi. rorrulr.v - t'rr<rii in Nova (innatn |>ropr Turbaro rl Mahatr*.
4. <. IVUT.IKIORI'M >rc< ab K%enk el Mart. Nov. art. ara<l r.ir<ar. l.mp. Carol nat. curi>* XL 79. f — G. Don I. r. no. 4. - Foil, ovato-ljnrr laii< aruii<. ulnng. pubrru||<i; florib. atillanb. •olnarn* >e>>ilib.; filaments nudi* rdentuh<. ki — Rami juniorr% munrali. adullii glabrali. Folia 3-4-polliraria. peliolit naririnaii<. icabrellit. Brarteola »ob flor^ lalerali* tubalala. OljeU corollae<|. trgmrnia angii<t# Itneari - lanrtolata rarinaU. Corolla fortacMi 4-5 Urn. longa. Barra bilorularlt leira<p<*raM. — C M*rful**s* differ! ab bac tperir folnt angaatio-ribut glabris, <r^mrulit eorollae lalionbuft irlabri^ ovati< ab omnibus mirm AIH< tprrii'bii^ >' pnuri/lontm differ! Bohbnt aiillaribu< ftoliianu. - Crr<nt in Brasilia ad llhr<>
5. C. CnK\\||i<i>(|l srhkt.'l Lmnara V||. 57. t -- G. Don I. r. no. | - CJUbrum: full. r;ii(>tiro- |. i.t...t 4to - lanrrnlaii*. bati runealu »ubronarrjt luridulit, brrvillrr prtir.|4iiv r.r>mbo Irrminjili <ub<e>tilt; rahn< %q|gljibri Jrolib. brmter Iriang<lanb. apirr lurbrll.iiM; r>r<il'i< <labri< tubulo>o-infun<libuli(oraib.. ca) Ijct trtie* longi'irib., limbi lannm JCJIM brr^%imi<. filamnii* Infrne in Ittbo Intortlt iMdrmq. %ll%i< barn* g<bo%i< ., lljbiiat in Uritilia.
- C VUPEtTIMH lion. M*I. i2#. . Jrq. HorL Vbornl.r III il i. U*. - M<rr- Nov. CoainiMi. GoMiing. v. || i n - Q% Don I. c. nu 0. UUbruto full. <*b-longi* ac<lit <<bnirnbranarri> opari*: florib •nbatilUnb. agfr^nu brmtK pnlunruUti<; larlaiu corolljr aramibalit rrrm. .> Rani lmin<*ni..i ioroll< <irr<rrnii-alba, >*gmrQii< an(u<ii< aemit. tabo lonjo fehrotmi. Racra ^crtit**-Florr% in »pica% brrvr* drnM< ditpotili (iilrmm comferimm Hill. DicC no. *-

- C. *Jamatcente* Lam Diction I 087 — C *ramosustmum* lloil Pjtuun Ja*~
mtnum bloane, Uist Jāmaic. II 06. L 204 fig. 2? - Plum c\ Uurm 150 t 1*7
 flg. i. — *ixora allemtfolto* Jcq PI Americ. (cd. picU) 10 t 177 lig 8 - Lrotii
 in insults Indiac occidentalis.
7. C. KOHEUM H. B. Klb. I. c. 50. t t. 107 - Klb. 1. c. 185. - G Don I c no 7
 — Foil, oblongit obtusiusculis, ulnnq. molliler hirio-pubescentlib.; peduncul*
 axillanb. et lermmalib.p) quadri- aut sexflons, flonb sessilib capitalo-cong
 gest II> mvolucrati!», caljcc tubuloso quincqGdo pubescenle, lacinim corollae ro-
 seae o>atis angusialo-acuminali», filaroentis nudis 6 — Kami Juniores molliter
 villosopubescentCN Folia 2-2'/'» poll, longa Segmrnta cahcma lanreolata acua
 macqualia, apice rcflexa Corollae glnbrae segmenta rrliria Dacca * —
 Crescil in Mexico prope Heal de Moran et Hacienda de Regla
- j t Flonbu* »picali& *. racemoM*. Spicis racemisqve oxillanlms et terminalibus
- 8 C D< BUM Stud IN o mend bot (ed. 1) I. 3J7. — Statnimb ed<ontuli», rarnnui
 axillanb. sessilib. folium subacquatub.; pedicellis alternis bracteatis ral)«rm
 obtuse dcnlalum subaequanlib, corollae tubo subfiliformf, limbi lacinns lincanb
 aculis connirenUb. mresccDlib.); foil, oblongo-lanceolatis subrepaodi* gtabris b
 — *Cetrum raiemoium* Tausrh, Flora (B. Z.) XIX. 387. — Crescit .. . t
- 0 C PhEIDO-OLINA Mart Beibl. tur Flora (B. Z.) XXI. II. 50. f - (i Lib rum foil
 membranaceis o\alis obtasiuaculis aul aculis, basl aculis; pedonculls apice arti-
 culatis, axillanb. aut in racemos 3-6-floros termloalet congMiis; calycis quani
 corolla 0-laplo braviorts deotib. corollaeq. gracllis lacimis acutis; Blaneniis
 edenulis glabris, longitudiic tubi \$ — In Provincia Brasliensl Rio Grande.
- 10 I. SIBPILMIRLLKMLM Mart I. c. 65. — Ramalls antics suberruginco-to-
 mentoso -puUerulenti*, foil lanccolatis arumtnalK, basi rntundaiiii, »uli(u« |»ili»
 stellatis parce puherulenh», (lorib axillanb. fascicolatik aal lornnnalib raromo-
 sis, braclci* nubulalis cal)ces bre<iter et late triangulari-dentalun Kubacqaanhb,
 corollis caljccet sefluplo superaolib.; filameDlis edenulis glabris supra lulu di-
 midium in>ertib» — Crescii in sjhis provinciae Sebatiianopoliunac in Brasilia
- 11 C. LII^CIMM Willd. HHiq ex Boem. et Scholt Sjst vegeL IV. HOI - II B
 klb. I c. 58 — ktb. I. e. 184. — G. Don I. c no 8. — Bamis folifsq. sobtu« »iH-
 lulato-tomentosis el ranesccottb, supra glabris el nilidis ovalo-ellipheU sub-
 acuminatis subrigidis; pedancnlis asillarib. lermiDalibq. plurlfloHs abbreviatu
 splcait; (lorib. sessilib.; calyce eloagal« qalnquefldo; corollis tooiefilosU(T); •
 lameniis nudis ?) 5 — C *trigiiUto* la. e* Pa?, sinlllimtim babltuqim a4 &***
 team acccdM — Folia 9-3-pollIcaria. Bfgoietta calycioa ovato-laaceolaia aru-
 aimau Corolla pallide >iridis. Sumlna ad apiceai tobi corollioi iaserta glabra
 ~ Lre>nt in calidm Prruac prope (fomanama et in Brasilia.
- I*. C. PETInl \HK II B kill I. r klb. I. c. - G. Don I. r no 0 RamU
 folu«q tubtut in nrm» puUeralento-tomentons, supra glabrii», l<>n>e |< uolatio
 elliptico-ubloogis sobacuminalis coslato->eoo»i», pedunculum aiillanb et termi-
 nalib. paufiflons brevissiaois spicalo-approximate, flonb. *r**i!»)ut ,s — Baoii
 glabn. flonfen rusre>centi -tomettlosi. Folia *-7-poll icaria, 2- t poll. lau. Pe-
 lioll folionim supenonin basi biaoricalali, aurievJis luocalit. Peduncull ad apirea
 lamoram spicaio-approiimaU tomeotosi. Calyris deotos bretes aruil. - f r<<-
 NOMHH Willd. Herb. oo. 4438. ei Room, el fthull. I c 807. - &<<« pHtoiani
 8pr. Syst tegeub. I. 584. — la Pot*via locis umbrosis inlrr Ayavaea H \ ania
13. C CONGLOMERATUII Ri. el Pat. Flor. Porav. II. «. U 156 flg. a - || R
 kill I r 00. kih I c. 185. — G Don I. c. BO. 10. — Poll ol>longo-Unrroraii»
 aculi» rctirula>o-MMju>ih, \enis »u!>(us talde prominelib , rigulu glabru *|nc|*
 axillanb abbroiads sc^Hiliti linnns rahrimt <>alib» arulu filameui% nudi» .>
 — Kami Mil>iri;oiüi I <la 1-4- pollirana ^pirac ad apirr» raiuorum approti-
 malar I orolla turrbrf>nti-flat<'>rrn«, »rgmentit o^aiu aruii% — (*rthvmlmm*
 ^illd Reliq rx Roem el Sriiuli I r 40* Cn»»nl in drrri%ilair orrid<*nisli
 Andium Prru>ianorum tntrr duanfamarra n i**c*%

- 14 C. AFF1>E II. B Kth I. c. 60. - Kih. I. c. 186. - G. Don I. c. no. 11. - Foil, lanrcolatis aut lanceolalo - oblongis acuminatis membranaceis glabns; spicis> anllanb. abbroialis sesMlib. approximate, florib. s>essihb ; lacinns corollae ova- ns aculis, filamentii nudis o — Corollae albido-|ircs>ccntes glabrae Kami tri- gom gldbri. Folia quinquepollicana, sesqaipolliccm laid C.iljrn denies otati aculi, marine pilosi — *Cestro Parqui* affine Differl a praccdcnle, cui proximi- nim, fuliis (cnuionbus acuminate, \enis minus prominentibus. — \n ccrle spe- cif* thbtmrla* — *C. Peruvianum* Willd. Rcliif. ex Koem el Shull. I. c. fl)7. — (restil in de\c\is montis Taiiguragae prope Pempe Quilenvum cl juxta Vjjtaca Pertnianorura.
- n. C DIUMti Linn. Spec plantar. 277. — Berit. Slirp. I. 74. — Dill, llorl Elib. ISO. t 1M. fig. 180. - II. B. Kth. I. c. 01. - Kth. I. c. 186. - G. Don I c. p. *42 no. 12. — Foil, oblongis aculis membraoaceis gtabris; pedunrulis axillanb. faxri- culati>; lacimi!> corollae oblu*i* rflexis; filamenis nudi> rdentulii. ,S - Folia iripollKana. Flore* odorali pam albi. Caljci* denies aciii pa rum ciliai. — Crescil in insula Cuba prope llatanam.
10. < ODOMOM'I IHIM h(J llort. Schoenbr. Ill 41 | 3il - G. Don I c. no 13 — dlibrum f II oblongis aculis subcoriact*i>, rareim> bmib atillanb ler- niinili)i|, florib Mil^e>>il b., corollae <egmenlis lanceoKilis arulis re^oluii-. fi- lamuulis nudis edenlulis j — \alde affinc (. *durno* sed flores node Umluni- modo oilon .s<^ujinj par>J compre>sa, lateralilor aplcr c* i>pr 1. r 674 no Si- deniculo noiaia. Folia 3-1-polhraria. Corolla alba, tub > r\lindnco, ad os in dilatdtn Dacca nigretreu*. *Pm minons* magniludine i rcsil '
11. C F\STIGI.\IIM Jcq I. c. I 3J0. - G Don I r no 14. - I oil. otato-oblon- gi> acuti* coriacc4> glabris, supra oitidts; pedunculis anllarib cloiicaiis, apicc spicalis, folia aequaoiib.; segmeatit corollnit ovatit obiosit rrficus quiuis >c- n>>>c; filamentis nudts edentalis. 5 — Folia tublos pallldiora. P>rudo-^npulao parrae obtusac. Floret albi sessiles ad apieem pedanrulorum fasiiniau, per diem noctemq. suaveokotes. Bacca rotundata nigre<<cens pi^fornif*. (reom * ^ C. FOtINDISSIUIM Jcq. I. c. 41. t. 320. - G Don I. c. no ^ (labrum: foil o>aiM lanceolaiuq. aculis peliolalis; pedunculis a\illanb t-runnililxj, p|c- rumq. J-6-flons racemosis; florib pedicrllaiis v >c^<thb . dmtib riUrmn gra- cilib, scKmenli< corollae brevib. ovalit emarginaii*. riluimii% b>M lurbatis ed. nulis ^ — i aulis punclulato-M>abrr ramo*i*<imus Folia 2-i-< iliinna foe- tidissima |>lores node odorali (orolla fla<<cen<< lljrn ol, ru '-olmdnca nigra, <i*mina '2 oblnnga. — (>c<rit in insult* Indiar orrnlenulis
- 10 (. Tr.MIFIORI M II B Kib. I. c 61. - kih I r |<) - (. Don I r no. 10. — loll. ovjn% Aruminaiis trnuiler nerobranareit, tubiu< in ^fois >obtomenu>>i>, spin* anllanb. talde abrr<ialU >r<>ililb. H-li-florit; florib. >>><tilib lub> co- rollae ienui>>>imo, laeioiis lasceolalU aconioaUs; ilaneois nudi* %> - Ramo* •latioium AttfratleotoM. feaaii ttrtlf* poWeml<iito-tomrnto*> l-Mia tubqua- dnpollicana Priloli rbacbladesq. tplearoi tonenloti Floret odoraii all.i ^hbn i :A|| glAtx-r irrnuUriier 4-5-dentatu*. Filamenta ad ba*in pil<>,j / /Ton- bun<lum HJLI Kfhq c| Rorm. el Srbal S)*t. irgrUb IV <U7 (.t almm ^>lld I (i re>cii in decli^iale monlis Duidae propp pagum K>rrralda< *Urinoensium*
- 0 I TIM n>HI(M Jrq |. r. 4U IN f, Don I c no |7 - F.II ovato-lan- crolaiM glabn< ininli<. rarrmi< anlhnb Irrmiuliltq florib brrtiirr prdirrlla- lit. corollae ftrgmrnti* lanrr>k<ii< arui>>, drmm rdirm, pnmuoi pairniiU, i- '•••••••••dn edrniuli*, |>rr p^uni %tuni ' n^iludmrm r<>rull>c lubo >th<>*. A — Folta eortarea tripo)|ir<ru I ur>IU alba >u4<ruka< |i>rrj ob<cur< %tolact* roiaodata. - Cr**eti prope (araea*.
- 21 r UTIFOLIIIH Urn. Illasir. get^r It ft. <•. tftV - G |).q | r no It - loll Hlipucis ae<u>, tupra glabrU, toblot poUpmkoio.i.ii..*,,, (•rrnn <alla- rib brem<tmi<. •ia<i_ni_r^ rd^nlulit ^ - prlioli rt ramt ram prdunruli*. *pedi- celho eal)ribq<e pulverulento - villosi Corollae tubus biliformis, segmentis*

lanceolate acutis. Stigma capiUum. — Differt a *C htrto* folni basi nun cordato, corollae segmenlis acutis nee obtusis el sligniale capiialo nee bifido — Crescii in insula Tnmtalis.

- 22 C I AF^ IGATUM Schlichtd I. c. 58 f - G. Don I. c. no. 10. - Glabrum foil elliptic^ acuminalis subpapyraceis subopacis peliolalis; racemis sutapicatis axillanb, folio mullo brevionb. (interdum ad fasciculum anllarem reductis, caljcis aubglabri marginc ciliolali denlib brevisbimis nullisve, corollm glabns tubulo»is subinfundibuliformib, calyce scxics longionb, limbi lacinnis obtusis, Qlamenlis supcrnr in lubo inserlis, in medio tubo pilo&ulis, baccis otoideis. 6

a *ciclutm* Toll majonb longius pcliolale, raceme c^oluim longius pedum u 1 nll»

ft *pouperculum* Foil, minorib bretius peliolatis, raceme abbreviate, flonb bine in axille inlerdum »ub»essilibus. — *I. racemotum* Hz cl Pa** I lor Perm. II. 20 t. 154 f.0 - Habitat in Brasilia

- 23 C AWCTTM Schlc btd I r (M f - G. Don I. c no 90 - Gtaberrimum foil lauccolaliH, utrinq. acutis lucidulu, pctiolalis; raceme subspitaie bretib brae-tealis, braclcis '/*-'/i floris aequantib; cat)Cis glabri dentib acutttt, apire ciliolulate, corolhs lubuloso-inrundibuliforroib., fauce loiter ampliatit glabris, laljcr sexi«* longionb, limbi laciniis ovalis acutluiculii, Clamniis superior! lubo inscrii), loro inserlionii fasciculalo-villosis el bine deorsum re^crio-piloke o — In Brasilia australi.

UL C. BIIACTEATIM Lok. el Otto, Icon, select pi. bort Berollo. I. II. f t 6.

Hook. Bot. Magai I. 8074. — Schlichtd. I. c. M. — G. Don I. c. no SI. — Poll lanceolate undulatis puhescnlib., flonb. fasciculis aiillarib trrminalibq pedicellate, pHrudostipulis oblique cordatis rcniformibus, braslos spallmUtis filamentis id bisin l>arbalis 5 - Baremorum longituqo \anat, sod >i| Hio longi(»rps occurrunl. Kami tomcnlo den»o \irescenti tecli Podnnruli pnllirarcf, pi'dicelle br\ibu^ . Corolla b)pocraterimorpha pallid** fla|a, tubo polhran, segmenütt o>aais acutis. — Crescii in Brasilia ad urbem Rio de Janeiro etc

- 25 <. S< III K(ITENDALII G. Don I. c. no. tt. - Glabrum full, rllipticis utrinq. acuminalis, apici* arutis subcoriacei opacit, breviter peliolatis. raremt« axillarib sub^picaui, ral)cis glah/i denlib. brevib oblu»is, margins dense ciMolulati*. Corollif extu* glabns lubuloso-iofundibuhormib., ctljce seies longionb, limbi laelnnns rf(l«'ki< triangularib. aenUs; filamenlis medio tubo imertit ibidemqu* \illoftis, (orollae lubo iotas ad ba»in imam cingolo villoao nouto. 5 — *C.muUiflorum* hchlc btd Lttnnaea VIL 50. f — *C. po^mmikmm* Sleud. mss. — Brasilia

I t', n.irrmi^ roraposis v. panieulatis ?. peduneutif racemoso-paniculati*.

- 20 C. PA 1,11 DIM lam Diction I. W - G Don I r no 21 - Glabrum foil »%adt acuiis, racemis compoMiis anllanb, fllarofntK rdentuh* bact% o|>o^ati« j — I lores pam pallide fla>i Folia «f»quipo||ic4ria obscure \india Ilieirmi den|i fulio breviores Corollae segmenta brr^ia obtutiutrula Barr* Molacta t ob%rurc rorruuca, lethal is. — *C rmtnatum* Mill Dirt no 0 — Plukcn Almag as., Phytogr t. 01. fig. 5. - Sloane, Hlttor. Jamaic. II. M. t »4 aeicit la insula Jamaica.

- 27 C. PAKIH LATUM Willd. Reliq in Roem. el Sebult Syst teg ft IV. m - II B kth No^ gen. et spec pi. III. 02. - Ktb hyoops. plant aequiaod. II 187 G Don I c no. 24. — Volublle, ftatko»um foil, grmloatis ovsto-oblongu aruti* glabri*. pantrulis terminalib. simpcticib; rtmis divaricatis, flohb prdir« llati*, lubo niollar lb»nui%«imo, lacinii< Imrari-lanceolatit arummatii. flamrniu nude \$r| — |iinn in uuularr* glabri Fnha interdum ««litaria, 1-4-polhcam pulhcet 2 lih H H > sm%t«q|entr% \ire»renh-albi (al\n\ drntrv o\ali acuti nhati - Cre»rii |un« humide ad npam flumme Gua)r«* pmpe C arara*

- V C S4.AM)FNs \ahl, Krlog | 24 - Vfilld Sper plantar I KOW - G Do© I è no 85. Ram « trantfentib. f°" ovalis attenuate glahre rarrmit axillanh

- subcompositis; filamenis nudis edenulis. iw - Rami tereles glabn. Folia peliolala remoia solilaria. Pseudoslipulae nullae. Limbi corolli&i segmeola subulata. — Crescit prope Stam. Marlham.
80. G. RACEMOSLM Rz. et Pav. Flor. Peruv. II. 20. (. 154. Og. 6. - G. Don I c. no. 90. — Foil, lanceolato-ovalis aculis glabris; raceme brevib. compOMlis solitarus v. terms aggregate, ID termed io longi»»imo; filaments edenulis(?). d — Truncus glabr sesquipedalis; rami eloogali. Pelioli parum conlorli. Caljx par\«». Dacca tiolacea globosa. Semina quatuor oblonga fusca. — *C. laevigatum* fi. *pauperculum* Schlichtd. Lionaea VII. 58? (cf. p. 117. oo. 22.] — In Perwia In nemonbus.
- JO. C. L(»GIFLORIM Rz. el Pav. I. c. 2S. t. 1M. Gg. a. - G. Don I. c. no. 27. - Foil, otato-oblongis acutis, supra glabris nllidis, infra Juniorib. lanatis; pedunculis lerminalib. paniculato-racemosis; corollae lubo longissimo cunalo; siaminib. cdcnluhs(? . 4 — Rami pubescentes. Panicalae rami (lores 4-0 pedicellato* ferenies. Bracleae solilanae lanceolatae. Corolla sesquipollicaris purpurca, limbi margine lanalo, tubo glabro. Bacca majuscula o\nta obscure purpurca poljsperma. Semina panra angulaia. — Crescit in Peruxae nemonbus.
- J1. <. STRIGILLATUM Ri. el Pav. I. c. 29. l. 136. - G. Don I. c. no. 28. - Tomcnlo brevi slrigono vest Hum: foil, eordatit aculis; pedunculis geminalis racemoso-pamculalis, altero breviori; filamenis edenulis. 5 — Folia pendula, supra glabra. Flores sub^essiles, bracleolis lernia panris praedui. Corolla alba, lubo longo incurvo, ala *Jaiminorum* baud disslmilis. Bacca Iruncala ovala obscure violacea. — Crescil in Perutiae nemonbus.
- Hit Pedunculis cor) m bo sis axillanbus terminalil>u>\c.*
- 31 C LAXLM Bib. Plant Haitweg. no. 207. — Ramit drrumbeniib. v dnancatit. foil, peliolalis ovaus ?. obloagit glabris; corjmbii lerminalib. lais pauciflons; calycia labulosl Uevigall jfenllb. brevib. lalis, vl* poberalis, rorolla 4-A-ies Ion-giore, lobo inios eilnaq. glabro, Itabi Uclnlia oblongis acnlis; siamimli. glabris ad insertionem incrataaiit. 6 — Cretcil in Mexico.
33. C. VESTITUM Hook. Ic. plant. I. 381. f — Foil, allernis oM<inRo - o\au* arulif peliolalis, supra glabris reiiculis inlegerrimis, tubius peioli*, ramulit, cor)m-bis Oortbusque tomenlo pallide falvo dense vrslilis; cjm n composius lerminalib densifloris; calyctb. obconms, denlib. 5 brevib. truncaii<; rorolla infundibuliformi, lubo gracili; filameois inclutu, bast gmculalis ovanoque pubetcntiboi. — In ^uilo crescit.
- M. C. TH^RSOIDEIM U. B. klh. >or. gfn. el «pre. pi. III. &1 - kih S)nops. plant, aequinocl. II. 188. — G. Don I. f. no 20. - Folits ovalo - oblongis aculis, supra glabris, subius ifnuissime pubenihs; pamculit irrminimalib. corjrobosis ranosissimis folialis. florib. sf<silib.; Inbo corollae calycem vit superanle. lacintit ovalis aculis, nargine inOriia; fllaotenlis ajndU. i — Kami trigoni, ptibe%rrnlia polvemlMU obalU, t&m—w^m. Folia > 4 polHcaria, basi in peliolum atirnuala Calyeli denies brevet ov*U n«MI Inaequoales. Corolla alba. — *C Parqm** affline diciinr. — Crescii In alia planilie Heiieana prope urbem Cbalro (aliiudme 1170 brtapodum
- 35 I. M RH 11. ATI M Hen I. Slirp I 71. I. 3J. - Willd. Sper. plant. I. IQEU - Rt. el Pat I. r. II *< I. Itt H a II. B. flilib. I. c. 63. - Kih I r. 1*7 - (i. |)oo I r no. 10 - Foil oblongts acuninatis glabris, prtliolu biaunrulaiM, rnrymbtt axillanb. approiinah*. corolla pubrrrrnlr, lubo trnui%»ino. larinn* limbi ovato-oblongis aculis, margioe inflr\i», hUm<nii« nudi* j Rami irrirrr« <l«bn. Fob* qvadrtpollkaria. Calyce*. prtluoculi rl prdirrlh pubtrrrnte* (.orolU jilba. - C. *Btdimnd** Urn. Diet. I. 6X7 - *Horm* el srhult. d)»i. |t%*i. |\ . V>I. — *Hedwada* ;imMi<M l>r< Fevill. Peru% II. 3& I. A ig. % - Crrsril loc«» tranprtrati* ~~inter~~ Loiam M pa<»ni Malaeates P*m<»o<r» H in Ckih.
- J6 C MILTIFMIKt'M Roeni. H ScbnL I. r &U ner HrhKbid - I. Don I c no J1 — Foil. ovato-Uoceolalis aculis giabnt. cor)rob % atillarib prdunculatis, folto dmidio hrr<tonb. (filamentis rdrntulu .> Rami glabrrnmi nrides. Folia

submembranacea 2/3 poll, longa. Pedunculi puberuli, pedicellae segmenta erecta acuta subconnivenlin. — Crescit

§. 2. *Filamentis basi glandula sessili praeditis.*

37. C. TOMEMOSUM Lion. Suppl. 150. - Ait Hori. Kew. (ed. 2.) II. 3 - <1 Don I. c. no. 32. — Folia, ovalo-oblongis acuminatis, supra glaberrimis, subius canescentibus. pubescentiaque pilosa veshlis; pedunculis axillaribus brevibus. 4-0-florum*. ad modum spicae approximate; floribus sessilibus; calycibus lubulosus quinquefidus cum ramis villosis-iomentosis?*, filamentis basi glandula auctis & — Rami lerele* cum pedunculis* villosis-lomentosis pilosi. Folia membranacea, supra vix glabra scaberrima, 5 circiter pollices longa, 2 poll. in la. Calycis segmenta lancolata oblonga acuta subaequalia Corolla glabra virescens segmentis o. His nervis, margine reflexo Stigma capitato-peltatum. Bacca ovalis, apice bisulca 2-4-loculans polysperma parva, calyce persistente subreclusa — C. Granadense Willd. Rellq. ex Roem et Schumk. I. c. 807. — In Peruvia m. Loxam r. inayacum.
38. C. PARQUI Herri. Slirp. I. 73. (30 Bo. 1. Vagai. I. 1770. - Vhroull, Ocmr Baumichl. III. 138. I. 15. — G. Don I. c. t. V o. 33. — Folia, lancolata glabra, ulrinque alternata acuta v. obtusiuscula *|ban^Ak|it; pedunculis terminalibus. rymbois; filamentis basi villosis glandular. tntir^o^b^ . ^ — Folia 3-5-pollicaria glabra. Pseudo-slipulae angustae. Floret *|bC^f^cali-Havi node incipiente fragrant I>Simi. Bacca magna tubglobosa. — Pedunculi et calyces interdum tunc nullo modo interdum eiceplo calycit on, nodi. Segmenta corollina plerumque reflexa, margine tomentosa. — Schleichid. Linnaea VII. 56. — C. Jamaicensis* ft. Lam. Diet. 1. 08A. — C. virgatum RE. et Pav. Flor. Peruv. II. 97. — Parqui Feuill. Peruv. II 72 t. 32. fig I. — C. auriculatum probability hujus e. f. m. vanelas foliis gemmarum primordialis amplifloris lunatis^que et racematis omnibus aequilantibus differunt Filamentis in nervo corum dentali, sed semper h. m. tantummodo dilatata et villosa in^eml^lect i>b Kttnberh, No^ act arad racvar Leopold Carol, nal. curios. XIX. Suppl. I. 101 — Crescit in Chili et in Brasilia aiMrali

§. 3. *Filamentis ad basin dente instructis v. ad insertionem dentatis.*

30. C. PIKENTII Tausch, Flora (B. Z.) XIX 3*7. - blamimb. dentatis, fasciculata pauciflora axillaribus, pedunculo breviter villosa suffultis; calycibus corollaeque limbi tegmentibus acutis; corolla lanceolata-ellipticis, ulrinque acutis tabronariis glabris. S — Laureola ImbfoUa florthu aikuoniibus odormis Piuk. Pbylogr. 1.9ft. fia. I. Crescii. . . T
40. C. SAIKIFOLIUM Jcq. Hori. Schoenbren. III. H. L. M. - Willd. Eoun. pi. horl. Berlin M — II. B. Ktb. Nov. gen. et spec pi III. 0L — Ktb. Synopi pi. aequin. II 107 - (i. Don I. c. no. 34. — Folia, lanceolata aruminata glabris; ramis atillanb, folio multo brevioribus, floribus pedicellate, filamentis denticulatis o — Rami lerrte% glabri Folia quinquepollicana, pollium lata, tnmbr.inaroa Racemi glabri. Bacca otato-oblonga magnitudine illius* BtrbertdiM. ba<i rj|)co cinrta Calyx quinque-dentatus. Corolla tiorescens-alba, tubo grande, segmentis lanceolatis acuta Filamentis aplice Unuisuio libera — Grectii IOCIB sabfrigidis prope La^enu graade Inter Caracas et paruai I* Guayra.
41. C. RUANTIES Schleichid. Linnaea VII. 00. f - (i. Don I. e. no. ». — Glaberrima foliis ellipticis v. oblongis, basi attenuatis, apice acutatis luridulis tabcoriam* peliolatis; racemibus axillaribus. tubo aequilantibus, basi foliatis calycis auberuli dentibus brevibus. obtusis, apice tosaenlos; corollis glabris lubutoso-lobulifloris, calyce »enr« longioribus, limbi laciniis oblongis obtusiusculis, filamentis paullim supra medium tubum inherens glabris subdenticulatis. 5 -" Habitat in Ilra%ilia
41. T. HIRM TI M Jrq lloft Srhnenbrun III 41 t Hi. - <i Don I r no .». Folia oblonga. . rullii, supra puberrima. Ribtu< lomontotit, Kpicu anllanb quam peioli longioribus, floribus »r<>lib, filan^rnlm ad banin drntirulo in^truritit ^ — Kami n calxrr, albo-pilosi Folia ulnque arutt J-V-p<>ilirari» ISrudostipulae falratae Fl<ros in mntnlm pim< anhrabut fa^neulati (.alji quinquerdentatu

- Corollae lobus glaber vmdis, segments palentibus lanceolalis aculis flavcsceotibus. Stigma capilalm. Filaraenta ad basin barbata. — Crescit . . . ?
43. C. ALATERNOIDES Desfoul. Cat. hort. Paris. 70. — Poir. Encycl. mèlh Suppl. 11. 163. — Hamill. Prodr. flor. Ind. occid. 25. — Roem. et Schull. S)«l. >rCL IV. 555 — Hook. Bot. Magaz. t. 2029 — G. Don I. c. no. 37. — Foil, otato-rotundalis obtusts \. subellipiicis undulalis conaceis, supra mtidis glabns, infra cinercis; flonb fasciculatis »essilib. axillanb. laleralib. lerminalibq.; filamcnlis basi denticillatis \ — Rnmi tprnlpa nnpriAi. FnliA cpcnmnullirjiriA^ fnnmhi nn.im fnha
- folium* Relz. ex Spr. Syst. \egeU 1. 073. no. 7. — In insulis Antillanis.
44. C. EXSTIPILATUM Ledeb. in Schrad. Neues Jnarn. fur Bol. IV. 65. - G. Don 1. c. no. 38. — Foil, acuminatis villosis; spicis tcrminalib.; filamentis basi denticolo instructis. 6 — Pseudospulae nullae. Babilu simile csl *C. auneulato*. — Crescit ?
45. C. INDL'LATL'M Hi. et Pav. Flor. f>./'HIT II. 28. I 155. - G. Don I. c. no. 30. - Foil, ovaiis acutis undulalis glabiy .s; »dunculi« axillanb. terminalibq pauidoriii; filamentis ad basin Ueniculo • ".*ltycfi- 6 — Truncus granulalu*. Pcdunculi pie-rumque 8-11 on. Corolla lu» 'ra» 'mboexlus puberulo. Antherae tetragonao. Ilacca violacea biloculans SubhexasJP^{er}QJa, Semina angotota iruucata. — Crescii in Pc-ruvia ad lluanoco locis vaslis.
46. C. SIBEROSIH Jcq. Hort. Schoenbran. IV. 20. I. 452. - G. Don I. c no. 40. - Foil, oblongis acutis glabris; racemis axillanb. lerminalibq. femposih^, flonb. icssilib. v. subses»ilib. aggregalis; Glamenlis ad basin denlc bilido inslrucii«. 5 — Truncus cinereus suberosus. Folia 3-4-pollicana. Flo res pallide lutei sua-veolenies. Sugma caplUlam umbilicalum. — Crescil ?
47. C. HIRTUM Swrti. Prodr. flor. Ind. occid. 40., Flor. Ind. occid. I. 478. — G Don I. c. no. 41. — Foil, tnbcordalis icalls, supra glabris, infra ramulisq pilosis, spicis axillanb. subracemosis brevib. 4-6-Dons; filamenlis ad basin drntirulo m-structis. 5 — Bractae nollae. Corollae tubus longus gracilis, srgmruiis o\aiis obiusis conmtentibus, absque denlicolo miermedio. Bacra nigra o\ata pubes-cens disperma. Calyx quinquedenlaius. — Crescit in Jamaicae *)his.
48. C. NOCTLRNUM Hfnt. Slirp. I 70. - Lam. Diet. I. 687. - G. Don I <. no. 41 — Foil otatis t. ovalo-lanceolati* aculis glabris; pcdunrulis sub.irnnsi* axil-lanb folia subaequandb., filamentis ad basin denlc instrurii> .> Irunn cortex cane»cen9, basi suberosus. Rami tereles glabn punctulati Mrides v. canescenti-fusn. Folia tllis *Auranliorum* simillima. Corolla glabra \irescfnti-fla\|a, tubo gracili curvato, segmentis oblusiusculis subirregulanbus. Bacca subglobosa pisi-form is alba. — *Jasmtnotdet foliu Pishammis, lore tireteenle, noelu otlarahtttmo* Dill. Hort. Elibam. 183 t. 153. fig. 18ft. - PI ok en. Phytogr. t. 64. fig J' ~ < retcit in insala Jamaica, in Chill el In Meiiioo prope Jalapam.
40. C. MACROPRYLLOM Venlen. Choix des pi. I. 18. - Pen Enrhir I. 210 - C, Don I c no 41. — Foil ovato-oblongis acumlnali* glabrnmis; flonb. faonru-lads KCNHiib., filamentis ad basin deniculo inslruriiif. 6 — AfOne *C launfoho* forieque ejus vanetas, folns tamen multo majonbus minusque aggrcKati« M\ co-riarns di^crepat. Flores in anlben lactei, demum pallidr fl.i\i v\ rrrmcinri, supra priiorum artirulaliones orti. Bractae Imraret ffrrugmro-lomrnlosao deciduae — <.resrit in Antillis.
- MI C \EstIOIDES Srhrlrhid Linnara MI to r - G Don I r 4'> no 41 - Ra-mit pubearrnib , foil oblongis »ub«rs<i\ib., basi lonr attenuate, apir<* «ub-obtUftis »QbcAnaeis, tupra Klalms, subtuc Iftiler puberulis. rarrtno lernnnali fohofto; calycis glabn deniib. bretlb. lalis sobbarbalo-murronulaii», corollis glabris luboloto-iofundibuliformib., ealye© ter qoaierve longmnb Irnibi hnnut ovati» obtusiuscalii, filamentis superior! lubo intrrtis, loco nñ/á rti >im drnir >il-loio praedili*. villotitate deortum citius usque ad medium tubi derrrscrnif j — **Crescit** in Brasilia.

2. A. LAMABKII G. Don I. c. no. 2. — Foil, lanceolate ncnosus subcoruecis florum fasciculis axillanb. sessilibus. *b* — Kami terctes stnali. Folia subsessilibipollicaria v. ullra. Cuiolla parva, tubo gracili, scgmenlis brexibus. — *Cestrum oppotitifolium* Lam. Illusr. gen. II. no. 2270. l. 112. fig. 2. — Poir. Encycl. mclti. Suppl. II. 182. — Crescil in Africa. . . . ?
3. A. (CESTRUM Lichtensl mss. in Roem. ei Schull. Syst. vegeL IV. 558.) LYCIODES G. Don I. c. no. 3. — Foil, cliiplicis oblusis, basi angustalis fasciculate; florib. axillanb. solitariis sutaessilibus. 5 — Hami obsolete luberculali, juniores ~~clih i fnllil!~~ r.nlyv nmnntipfiriue, RPffmonhs orftclis linearihlls ACUtit. enrlljiini ~~stnari. lallat. vix~~ i.nivv nmniipiiniic. KPirmnns nrechs iinirannus arum.. carnimni rcNolula. Anlherac incumbentes exsertae. Siigm capitalum. — (roscii in Promontorio bonac spci.
4. A. (OESTRUM Licblenst. mss. in Rocm. cl Schult. 1. t.) PI BKSCEISS G. Don I. c. 48. no. 4. — Foil, oblongo-lanceolaliu oblusis, basi allonualis, ~~fasciculatis~~ pnbescentib.; florib. axillanb. soliiariis tubscsilibuD. 5 — llabttus ~~praecedentis~~, sed rami rigidiorcs, ramuli breves apiceque pungentes, \el foliaii. hpmar more *Lydorum*. Flores magoiludino, forma el coloro ut illi spcciri praecedeniis, bcd calyx pubescens profundius divisus. * Crescil in Promonlono bonae <pei.

Tribus VI. VESTIEAE Endl. Gencr. plant, p. GG8.

Embnonis recti cotyledones foliaceae, radical! infer*. Capsule bilocularis.

3868. VEFtTIA Willd.

(Willd. Enum. plant, horl. Berolin. I. 206. — Meisn. Gener. plant, vascul I. 278 II. 185. — G. Don, General sjsl. or gard. and bol. IV. 4*0)

1. *V. JACKIDES Willd. 1. c. - G Don I. c. no. I. fig. no. 44. - :) *Cantua h-gustrifolia* Juss. Ann. du Mus. III 118. — *Canlua fovttida* PITS. Enrbir I. IK7 *Ptriphraymos foclidus* Rz. cl Pav. Flor. Peruv. II. 17. t. 132. (excl. rapsula . *Culrum vesperitnum* Horl. Valent. — Crescil in Chili ad Conceptionem

3800. MEHMEA Hz. ct Pav.

(Ri. cl Pav. Prodr. flor. Peruv. 21. t. XL - Meisn. Gener. plant vascul. I. 278. II. 185. — Sj>r. Syst. veget I. 583. — Dielr. Synopa. plant I. 610. — G. Don, General syst. or gard. and bol. IV. 487)

- I S. STIPULATA Rz. et Pav. I. c, Flor. Peruv. II. a t 11A. fig. b. — O. Don I. r. no. 1. — Frulicosa: foil, lanceolatis cordatit; pseudostlpalis magnU ovatis oblusis4 deculuiH; racemis axillarib. termlnalibq.; pedicellls corymbosls. 5 — Folia peliolala, supenorj angusiiora ovata acamlnata, 3-ft poll, longa, 1-2 poll. I a la, supra fflabr.1, infra albo-tnmentosa. Racemi el calyces lanati. Corolla xtlo^..n luica, calycem duplo excedrn^ . — Crescil in monlibus Peruxae.
- i. S. DKPENDKNS Ri. et Pav. Flor. Peru\ . II. 0. t. 110. - G. Don I r. no. 2. - Foil, cordato-oblongs; pseudostipulis nullis; racemls longissimlc pendolis; pedicelhs plcrumq. iriflons. 5 — Rami pendoli. Folia illit apeeih praecodenlb similia, ted infra pulverulenta, 3-4 poll. longa, 2 poll. lala. Cil>x pulvarulaalus Corolla lulescens, calycem duplo excedens. * ID Peruvia ad ripas fluviorum.

Species e genere cxpeUmda.

S. PETIOLARIS Spr. — CESTRUM PBTIOLARE.

:1H()9',. MKTTEBKICIIIA Mikan.

UiWan, Delect 11 or el faun llrasil III t I Kndl Gen plant Suppl | p IK>| — MeiMi (ieuer plant. >ancul I JOI)

1. M. PRIV.IPIS Mikan I e \rbor dO-tt-pcdalu foil jM-iu.lais UnccoUto> o\alib. inloKcrnniifc, basi aculi^. iiriuij. glabrif, florib <mlan> m.ijin u albm ^ — ~~Crescit~~ in Brasilia

dteaera dabra.370. COTYLANTHUS *Blume.*

(Blume, Bijdragen 702. — Meisn. Geogr. plant, vascul. I. 270. II. 183.)

1. COTYLANTHUS *Blume* I. c. — ^ — Crescit in insula Java ad arborum radices.3871. ISOTERES *ab Etenbeck.*

(Hec ab Etenbeck. Transact, of the Linn. Soc XVII. OS. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 9M. II. 184.)

1. I. PERMOLMS Wees ab Esenb. I. e. — Molliflora femiginco-lanala. Caulis erectus, medulla ampla alba farcibus. Corticis tenuis spongiosus candidus delcibilis, dense ferrugineo-lanatus subtomentosus. Pubescentia simple. Folia alterna ovata-runciformia acuta, in petiolo attenuata rotunda-nervosa laeva, supra viridia, Innervata sparsa, subtus lanuginoso-albicantia, nervo costisque ferrugineo-lanatis. Floret in foliorum axillis fasciculato-globose-nuunt. Calyx rictu valde laevatus. Corolla calyce brevior glabra. Ovarium fere duobus carpellis connatis, (bracteis utrinque ad axillam oppositis) dissepimentum connatis bilamellatum, deinde rursus usque peripheriam venit diagonaliter deorsum, margine ovuliferis fere ut in *Getneriaceis*, in receptaculo seminifero bibracteato pilatum transmittit. Semina malora desunt — ^? O? — (>c>cii....? Ind. or?)

3872. DABTI'N *Lour.*

(Urb. Flor. Cochinch. 1M. led. Willd. 1. Itt.) — Meisn. Geogr. plant vascul. I. OT. It 181)

I.D. FEHLAHCJ9 LOOT. I. I. c. e. — Q. Don, 6ceral tytl. or gard. and bot. IV. 400. — Fructus: raris asperantibus; foliis, oblongo-ovatis, infra mollioribus tomentosis, costis obliquis; petiolo nudo. 5 — *t^f^lar^nu oiler* Rmpb. lib. Amboina. VI. Cap. 02. p. 122. t 57. — Circul in Coebiocina et Amboina.

.1871. DOEAE'%' *Thunberg.*

Thunberg. >o». gener. W. — Meisn. Geogr. plant, vascul. I. itt II. M. l*L)

I. D. JAPONICA Thunberg. I. c. - Flor. Japonic. 0. - (aertn. b^c fructibus. r^l <?nin. plant. III 27. I. 1*4. — Arbor tripartita; foliis oblongo-acuminatis; Omb. racemotus albus. 3 - Crescit in Japonia.

3874. TMI-CBSIA *Cat.*

(Cav. Dissert II. - Meisn. Geogr. plant, vascul. I. 270. II. Kl - <: Don, General >>l. or gard. ind bol. IV. 4HL - Spr. 8ytl <eg. I. 001. - Dirtr. Hnoj% pi. I. 0374

I. TR. AMBROSIA *Cat.* I. c. appdt. 1 L A. - *Urn. tlottr. grn. I. IN. - G. Don* I. r. no. I. Lae sulcato-alata; loll, sopetioiib. obovatit dcnlatit v. teretibus pubescentibus. decurrentibus. O — Caulis teretis. Foliis radicalibus obovatis lalrgra. Pedunculi geminali v. biflorali. Corollae illae *Hyoscyamus* * until * *purpureo* >>> >>olacea, limbi srgnifnta rotundit. J r r * oau. Orupa %tra. *Frtymrr* * *barrois* Gael. fttUNB. XK - *Vrrttmm Oiltrkt* I mn. s... , p|<_i. &&Y : R.lb. *Crater* V. I. 17. ig. M. T-umrC. Ilm || .HL cum i< < r r < ni in Ili> pamar *provincia* AMaUsia pr<_M Cordovan

a. T>. I^ODOAU *Cat.* DIM. i. <pp4>. X - li. Don I. c no *. Full ovato-lanceolatis laciis glabris. tite^nts Oib— . ^ Tou pUnu glabris. Flores <uim parcedentu polcbtrr*. ubo brtort. f*ucr radn%qur p<liJe violaceis. |ol>i> nrqur arunistaiu urr nrurgioali*. arrmlu majon. oianun lotum fere r-rudeo(- In Iliipanu ran priori *crecit*

51. C. UIRTEIXUM Gchld. I. c. 02. f - G. Don I. c. no 4J Ramulls biricello, foil, lanceoldlis, basi aculo alicnualis, opice acuminate membranaccin lucidulis ptiolatis, Junionb. in nervo \cnisq. primarils ptibescentib, dcinde glabris, raceme brevib. axillanb. subspicaha; caljcis tubbirtelh dcilib. elongalo-lnangu-lanb. acuiissimis, margine ciliolulalis; corollii angusle tubuloso-lfundibulifor-mib., fauce subinflala, cxius glabris, calyce ocliet longiorib.; limbi lacimif an-gustis aculosculis; filamenlis superior! lubo insertii glabris, In medlo lubo den-ticulais. 6 — Habital in Mexico.
49. C. 01 WKTOIUM Schlbld. I. c. 01. t G. Don I. c. no. 46. - RamU glabris, foil, elhpiicis accumalifr, ba»i aculis el subinaequalib opacis, i»ubius puberulis ad a\illa> saepius barbalib petiolatis; racemis axillanb. terminltbq. bubgminiti; calyns vMOHUII dentib. arulis subinaequalib, apicc lomcnio»ift, corollis e\ius glabris, c lubo tenul infundibulifonnib., calyce U»r longiorib., limbi lacinut aru-lis; filamenlis supenon lubo inocriU ibidemq. deniculais glabris, lubi infcn parte reverso-pabe»centc 5 — Habitat in Mexico.
- tt. C. LAURIFOLIUM Ilcrit Slirp. I. 00. L 34. - Smith, Spirit, it 2 t. Don I. c. no. 47. — Glabrum^ foil, coriaceis nilidit ovalis v. filipuris oblu»is, flonb lupra peduncttlum communem fasciculalis pedleellatia; pedunculis qoam petioh breviorib.; filamentt ad basin deniculo in^iruets (Ltn.) v. nudis (Willd. Boom plant, hori Berolln. 945.). 6 — Folia obscure vlrldia aeiquapolliearia. Pelioll ru-fescentes Floras loteaceoles ad aplc«a ramomm In faseleulls sub»ctsilibus. Keg-menla corollae ovata obuuiuseula patafiUa. — C. vmmmtmm I am. Dice I 6M (excl. syn. Ro«m.) — Craeil In AnMria nMridionali.

f *Species vix notae.*

54. C. FOETIDUM Medic. Aft. Palatin. IV. Pajs. 193. G. Don I. c. no 4* - Co-rjubi» «rs«ilib foliosis, raroos lermnantibu* *» Forte idem ar f laprrhnum — Cresni .!
- 55 0. NER\OM U Mill. Did. oo. 3. - G. Don I. c. no 40 - Foil hiircoladt op-posite traus\er»o ner°osis, pedunculis ramosis. 6 — Folia quadnpollicana gU-bra pallule Hindis. Pedunculi axillares 4-5-Bori Corollae lubun medio inflatus, supra coarctatus, tegroenU lata plana paientia alba Inodora. - *Jatmtnoides imc-nVamisji tonri foho, flon aibo odormio* lloust. mss. — (.resell in America au»tra!i ad Cartbagenam.
50. G. 6PICATIM Mill Diet no. 4. - G. Don I. c. no JO - Foil, ovalo-laneeola-tls, norib. splratis alarib. t«nnloallbato»e. 6 — Folia 97. poll, longa, 1% poll, lata. Floras Inodori. Raeca globosa pnrpun*a plslfonnl, psjlpa edull. Seniloa plana. — Oenril ad f.aibagenam.
57. C MITIMI ^illd. Reliq. ei Roem. el ScbulL 8ysL vtfet IV. W7. - G Don I. c. no. 51 Foil ohtongK, utrinq acuminatis; pedtincutis multflont lateratib agKrrKaiv ^ — (nsrii in \mortra nu rtdionali in montr ^uindiu
58. C PARIIFOLIUM Willd I c. HP* - G Don I r no. H - Foil, cll.pi.ru fc»»b-undulalis glabris coriaceis, supra nitidis, florib. aggregatis teisilib. sublermina-llbus. b - Crenclt:.. T
99. C PALCIFURC M Willd. I. c — O. DOB I «. no. 13. — Foil, oblongo- ovalU pnboaconUb.; capitulis temlnalib. pMciflorla. 6 - C MMSmitti staid. Nosarl bot (ed. 1) I. 337. Croact «
- 00 C ANGI STIFOLIUM Udd. Dot. Cabin. L 918. - G. Don I. e. no. 94. - Crete it in Indta occidental!. — gprrls nondtm doacripu*

ft *Spenn nmmino dubiai indtcriptae.*

† ACUMINATUM Sweet

† ARV. N. I. Irrit. uli

† Will \UK VrnHih

† KI. OM. UI M llortor <(M, m) Nomrnrl b»| rd 2. I TD

† IAMU! «d»sIU M >UCCJ

†. VTIPI'LATIM Arrabidj.

†. M BSESSILE \rralud.i.

!" t' • *Species e yenere expellviulae.*

†. CITRIFOMIM Rrlz. - AkOk ANTHER A VENENATA.

†. AI'RANTIYCI'M M.jcr. » CAPRARIA SALIMFOLIA.

†. CAMPANILATEM Lam. - ACMSTIS ARRORESCENS.

†. CAI'MFLORI'M Ilort. Ticin. » ACMSTIS ARBORESCENS

†. FASCICI' LARE Olio. - AKOKANTHERA VENENATA.

†. LYCIOIDES Licbtensl. ~ AkOkANTHERA LYC.IOIDES.

†. NERVOSIM Mill. — TABERNAEMONTANA AMYGDALIFOLIIt.

†. OPPOSITIFOLIUM Lam. - AKOKAKTIKRA I.AMARKII.

†. PIBESCENS Licbtensl. - AKOKANTHERA PI'IHSCENS.

†. SPERMACOCIFOLIUM Willd. - BOTWARDIA TRIFLORA.

C. VENENATUM Tbnbrg. - AKOKANTHERA VENENATA.

3S00. DI'VtLIA II. B. Klh.

II. B. Klh. Nov. gen. cl spec plant. III. 55. i. IM. — Mci'n (iencr. plant. va<rul.

I. 27[^]. II. IH5. — *hirrbnrhia* Spr. S)»l. \ogel. I. 076.,

1. P. iDIERBACIHA Spr. I. c.) SOLANACEA II. B klh. I. r. - Klh. Synops. plant. irqumort. II |<V — G. Don, Gourral s)«l. of gard. and boi. IV. 4ffl **flabitus** *WUKringiac.* (k>ro» *Crslri*, «ib omnibus bnjus ordini* grneribus dftVrt **stamini-** bus tnp.irlitiH. Hnmi glabri. Folia prtialala ovatu-uhlong.i aruimnau, lia«| ro- Itiii'l i.i inarqM.ili.i, nupra clabra «iridi.i, »ubdorrmpo||jrari.i, itublui lomrno<a; (lorci umbellali. ,^ — Crencit in crripidiniba* umbrosi* rrgm >o«n-(iranalon«i« propr Fusagasuga el Ualo de Uetnado.

980?. nABBOTHAMSKrA *Endl. mu.*

(Meisn. Gener. plant TMCOL. I. 818. If. 1». — Jtoyento Schlcbl. Llnnaea VIII. 8VI nee Fleet ab Eaenb.)

- I. II. FASfir.I'LATUR Endl. msi. — Blh. Planl. llartveg. no. 309. Fruiirosu^ tolu« «ablomenloso-put>e«icenf: florib. cymono-faicirulah^ .,» Folia primlaia lair ovala acuta, magniludine inaeqnaliala, plerumq. lamrn 1-4 pull, longa, ' r/-2 poll. lala. Floren corrinri, ad apire* ramorum fatcirulatt >. raremoni. Barra ad ba»in runeata. Srmina (tecundum variam «uam povllionrm rl romprm%inii«*m) polymorpha longiludinalitrr rugo\$a. — *Mrymia [asriculata* Srhrlriid. Lmnar • \ III. 2'>l. ,^L <(*<rit in >I«\ico propr fbironquiario.
- i II. TOMENTOM s' Blh. Planl. Il.ut>rg. ail no. IW) a«lnoi. |.,||. angu«honb.. uinnq. dm%r l'tmrnio%i«« lomeclo r.ihru drn«i>ri «! rur>||.ir lirnbi larunu an- gu«(r lanrrn|ati«, drmm »arpe rrlrtit palentibu«. .> — (iresni in Metieo. — Affinit praeredrnh.
3. H. CORYMBO^iH Endl. m»*. — Fratleotnt, loins glaber. florib. in <rorymbo» eloagaioa 4laa>oaUa. 6 — Folia qaoad •tfoilitilhieai Inarquniui, manm.i **quinque-** polllearia, t poll, laia, se4 q«ani Bit If. *fksrirulmii* plrrumqur innmra. **Segmenta** rahrma fir«* ^ubulala. Corolla nibra v. coreinea. - *Meycniarorymbo*\$<% Si hk«t«1 I. r. I>I t r.r.r^ril in Menco rum praerrdenlibu«.
- I. 'II. ELEIf\>> Srbridvrii. m*%. Sprnr* buru»que **indescrita**

Genus dubium.

3>6? ,. AKOKANTHERA II h. Don.

(<i. Don, Grnrrol *)«(. of gard. ami b«l. || 4 » F.ndt (irnrr plant Suppl. I- p. I4M. — MeUn. firn. r plant, tatrul. II *|>| *| >' *f'rtrrt* »prrr .mrinrum.)

1. A. VESKftATA G. b' i I r. no. |. Krutir..* f :: |.inrrn|jio-i.bl.n^» r«ina- rn«; corjabls s^stilib. axillanb , plrrmmqne H-0«>n»' .i I«>L« miida jjUl r««.

Brarlriji* «nbeJaiav. Corulla fla«r>ceo«. Umbl »rf>rnu mtnotuu tubuUia rrrrta, ruHro>apirulaia, irmpnrp pnnwidiano e«pan«a. •• *i trtrum ftuamtaie* lino ro»«.

' «• r^wr><#i>i> Ibnhrq Prndr. (lor, I aprm IL , f.,r I »»m» I 191.

Leptogon nrifultum Rrii, pj>l. Bl. I. 3L — f rr>oi m Promuniuriu bonar **speco.**

Ordo CLIII. SCROPIULARIIFAE R. Br.

fKndkli. donor pi u. Ur. p. 'Źn — jVoisn. Uener pl.v.iUr vi.-Mihr. I :04
M x?|| — «l Don, General ryst o! gini. anrl töt IV t>^{nr}> HJH Vrt^J, P/sn\ tt
N it) K. — G. I-un 1 c. I-^{1*})

Tribus I. VERIASCEAE Bth. Srropbular. Indie. lfi. . . Endl. I. c.

Corolla lubo abbreviate v. subgloboso, limbo ciplanalo quadrl-quin-
quedido v. bilabiato non ringente. Stamina fertilia 2—5, taepius declintta.
Anlbcræ approimatae t. cohaerentes, nunc uniloculara, nunc sobbilo-
cnlarcs, lorulis divaricatis confluentibas. Capaala blvalvls »rpliride de-
hiscens, valvulis saepo bifidlo, disscipimenlo e marginibus vahricularum
iofleis duplicato aolubill. Semlna nuda.

387a WEMUftCTII JUiwi

(Linn. Genor. planL 945. — Meim. Gener. plant Yasrol. I. 300. II. 217. — Spr. Ry>i.
vegct. I. 018. — Dielr. Synops. plant. I. 098. — G. Don, General nyst. of gard. mn<l
bot. IV. 4*8.)

Dl vit U I. — Foliis juperioribus decurrenlibus.

t* I* *Folia penitit a folio ad folium decurrentia.*

1. V. TIUPSUS Unn. Flor. Saecle. 00., Spec plant. 892. - Koch, Synopi. II. f.ertn.
(ed. I.) MO. - Bth. Beropbalar. Indlr. 10. — Rebb. Plor. eirurt. 3W. no. 9818. -
Smiiib, Engl. bot. L 54ft - Oed. Plor. Danle. I. 031. - Svemk hot. t. 10.
RchkoBr, Hndbrb. 1. 130. L 42. - Woodv. Mad. bot 1. MI t IB. - G. Don I. r.
no. t — Bertolnni, Flora llallaaa II. 010. f — Foil. crenaUt tomentotia, toomto
Iut0nrente, omnih. • folio ad folium decorroatib.; raemo tubaollurio; pHioolla
norigeri* ralycc bretlorib.; eorollit retails; flaaaffla albo-lanaUt, dvobaa Ion-
giorib. Rlabri* v. luperne parco ptloais, anthera ana hlne longo 4ocurronlo iet-
qui v. duplo lonRioribus. J - Tri-ociopedale tlrlectam, dente ted tenae lonrn-
loium pallidit* \iren«. Raremut nubela>alut. — A teqnete differt florib. multo
majorib. el e&planalin. - V. *thaptiformr* Schrad. Monogr. I. t\ — Rrhh. I. r. no.
3610.^ - I', *m^pidatum* Schrad. I. c. 2X t. I. fig. I.") - Rrhh. I. r. no. *17. -
G. Don I. c. no. 0. - V. *indicum* Wall, in Rib. Fl. Ind. II. 230. - Wall. Cat. no.
9030. - Neci ab Btenb. in Transact of iho Linn. Soc. XVII. 10.(?)***) - ~~V. *lych-*~~

*) /. *TMPSIFOKMB* Schrad. I. e. - Aeffd. t c. - O. DM U. ««. M. 1 - AIT.
decunmHb. oralib.. nperiorib. uirina. meuiis ermOis trwt tom*do?i*:r*-
eemo ipicato; eoro&a* rolmtoilmndniisboimio-rotundiU; mikmrut b(mtt obtom-
git.rf - V. Thapins Afodr*. Urb. f. 800 — V. braeteatum hiehx m*s. - V.
KicViiianum UumorL Moml, BHgit. pr*dr. m. - V. dtOfiOorum P>U*in. Har
Veron. I. itf. — M Germania wudia. md ittmin, to Bum^nrria el in Italia.*

**) F. (*ISVWATIM* Schrad. I. c. ftckb. L e. — PoU. Jmrrentib. rrenulahi
I omen to tit, Muprrriorib. rutpidatit; raremi fatciemli* remotiu scuta; anikerii dun-
bu\$ oblonjtM. f - h'lnr. Ihinic. I. [K]0. — In Austria, Hungarta rl tn Saj-omta.

'** I. I.MtHI •/ null I r. (i. hnn I. c. wo. i. - Foil, decmrmhh. rthphco-
ubloiuitt ercnullt undulatt tmnrmiofn -ttnaht; rocrmo tpiruln </rn««; bractria
ralyrthq. lamili* cuipulaht. frurtu lonymb.; rot ullnr Mubrutatar lacinnis mb-
rolundu: anhrnt lubartfuahbus. ? Crr&nl in ludm ortrtntah tn i.modo mornU
ad OUM<IIN-/A>IN in Ar/irt/ia. I \ Ibaptut rrr/r dtMttmrlum dtntmr

- nî/û Schltz. Flor. Slargard. no. 185. - Blackw. Ifcrb. t. 3. — Moris. Oion. Histor. II. sect. 5. t. 0. fig. I. - Lob. Icon. I. 501. - I. *Linnaei* Pfd. Monogr. d. btihm. Verb. 83. — Crescit per totam fere Eoropam, Sibiriam, Tauriam cl Caucasian), in India oriental! et in Nepalia.
2. V. SCHRADERI Mey. Chloris Hannover. 3S6. — Koch I. c. 510. — Foil, crenolatis tomentosus; tomento Inlescente, omnib. a folio ad folium decurrntib.; racemo subsolitario; pedicellis Oorigeris calyce breviorib.; corollis infundibuliformib.; filamentis albo-lanatis, duobus longiorib. glabris v. saperoe parce pilosis, anthera sua bine breviter deenrrente quadruplo longioribus. ‹' — V. *Thaptut* Scbrad. Monogr. I. 17. — V. *Tkaptut a.* Wablenbrg. Flor. Sncic 130.
0. *Floribus paUidit.* — V. *paUidum* Nees ab Bsenb. Flora (D. Z.) II. 1. 205.
7. *Floribus albis.* — F. *Monogium* Willd. Bnam. pi. horl. Berolin. I. 223. — V. *neglectum fl.* Gnat. Soppl. fl. Sicil. I. 90. — Crescit in collibus incultis lapidosla Germaniae.
3. V. MACRURCM Ten. Flor. Neapolit. appndx. V. p. 0. ex Linnaea Vf. Lilerb. OH — Bertol. FI. lul. II. 573. f — G. Don I. c. no. 3. - Foil, decurrntib. ellipticis, utrinq. albo-lomenlosis crenulatis; spica deosissima longissima ut plurimum siraplici; braceis ovato-lanceolalis calycem subaeqnanlib.; corolla infundibuliformi (14-15 lin. diametro tenenle), laciois orbicularib., subtus dense lanatis; filamentis omnib. lanalis, Una flava; antheris sabaeqntlibas. rf — V. *thapniforme* Guss. Flor. Sicul. prodr. I. 800i — Habitat in Calabria citeriorl. — *Verbatco Thaptut* grandius, differt ossentialiier alis caulinis latioribus, foliis pariter latioribus sive elliptico-ovalis, corollis calyce circiier quadruplo longioribus, laciniis subroiundis, staminibus duobus insigniter longioribus, quornm filamenla sunt latre intorno lota dense barbala el antherae iraldo oblongaUe. Caecierum el hoc undique albo-tomenlotnm.
4. V. CBASSIFOLITV Lnk. et Hffmnsagg. FL Portog. I. 813. f L 80. — Scbrad. I. c. 88. — G. Don I. e. no. ft. — Foil. doeorreBtib. obsolete crenolalis dense lomentosis, soperiorib. acominatis; racemis spieatis densis; Glamentis glabrin; amheris 8 oblongis. ‹f — Tola planta tomento luteo-ferragineo tecla. Oauhs simples. Folia obovato-elliptica. Filamenta omoia glabra. — V. *Tkaptus* Brot. Fl. Lusitanic. I. 270. — Crescit In Lositanlae locis arenosis.

§. 2. *Foliis breviter vel semidecurrentibus.*

t Flores *Qari.*

a. *Lamm /Uamentorum alba.*

5. V. PHLOMOIDES Linn. Spec. plant. 851 - Koch, S>nop*. Q. Germ. (ed. I.) 511. — Rchb. Flor. rxrurs. &L no. 8013. — G. Don I. c. 400. no. 14. — Sibthrp. et 8m. Flor. Grace. U 8M. - Mneb. Hata. 110 I. 4. - Mill. Icon. L <7X - Foil, crnatis tomentosus, tomealo lotescente, supertorib. brotltter v. »enldteaiTentib.; rarrmo rabsolllarto; pe^leHHs lorisprfti carfe*frrvetorib.; eorollis rotatU; fillami*ntis albo-laoatfs, tfoobos toifiorib. gtabr!*. soperne parce pllosi«, anihrra sua bine Innge derurrente scsqui v. doplo longloribos. rf — Seaqal-biprdale, timplft aut tubramosum. Folia rugulosa. Tonenlam luteo-viride. Racemos btal Initruptus, «uperne densas. Flores maiimi, lobi latissiml. — V. *Thpsu** Plenk, PI. offlc. L 100. - *K pulremfmium* Spr. Flor. Hal. 833. - V. *Ikaptoidn* Vill. Fl. Djuph. I. 400. — K *tQmemioimm* Lam. Fl. Fr. II. 80Q. - V. *nnjulntum* Willd. Enum. pi. hort. Berolin. I. &t - V. *Italieum* Moric. Fl. Venn. I. HO. - Orrurru. snl raro floribus albis.

«• Foil. elliptici« brctiler drcurrentib., rarnj« laviore. - I. *pMomaidet* febrad. I, c ».

§- Foil. crt«aiis tomentosus, radicalib. oblongo-lancroUut m prtolum alternuatls, eaollKU oblongit arnlia doc«rr«iUb., tuperlorib. lai« o««ut eospidatis «cmidrrrrrrnih.; racrmi fascieolls remolls; anthrm dnadtM nMnnsit — *• *ausraie* ShraU. I. c .**..I i. - Brbh. I. r. 3K4 no. JDM G l»uo I. c. !00> no 13 — r. M«rmmm Tru. — (cf. supra no. 3,

III9ENBEBG1A Tausch.

(Tausch mss. in Hb. Fl. taurin. II. no. 100. - Endl. Gener. plant. Suppl. II. p. 600
Meisn. Gener. plant. vascul. Comment. 198.)

1. *II. EURETIA* Tausch I. c. — 6 — In insulis Mascarenis.

STIOMATOCOCCA Willd.

(Willd. Reliq. in Roem. et Schult. Mantiss. pi. III. 3. to. - Endl. Gener. pi. p. 600.
— Meisn. Gener. plant. vascul. I. 877. II. 184.)

1. **ST. SOLANACEA* Willd. L e f t - Crescit to Brasilia.

Tvbulf orae laertM codis.

•*DESFONTAINIEAE* Endl. Gener. plant, p. 609.[#])

3875. *DESFONTJUNIA* Its. « Pav.

(Rz. et Par. Prodr. flor. Peruv. 90. t 5. — Meisn. Gener. plant. Tatchl. I. 838. II. 102. ad *Aquifoliacea** relau. — G. Don, General syst of gard. and bot IV. 813.)

1. *D. SPINOSA* Rz. et Pat. I. c, Flor. Peruv. II. 47. I. 181 - G. Don I. c no. I. - Hook. Icon, plant t 33. — Segments calycis lincati aequae folia glabris. 6 — Fructus erectus ramulosis semper virens glaber. Folia elliptico-obovata coriacea glabra, supra nitida, basi inaequaliter, margine serratis dentibus magnis 7-14. Calyx glaber pedicello vili brevior. Corolla calycem quadruplo excedit. Dacca alba cerasiformis. — *D. jptaufau* Unmb. et Bonpl. Plant, acquin Amer. I. 137. t 45. — H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pi. VII. 274. - Kth. Synops. plant, acquin. IV. 207. — *Linkia Peruviana* Pers. Enchmd. I. 810. — Crescit in Peruvia.
8. *D. PARVIFOLIA* D. Don, Bdinbg. Philos. Journ. Jul. Sept 1801. ex G. Don I. c. 814. no. 3. — Foliorum costis infra pilosis; tegmentis calycis ovalibus ciliatis. § - Fructus ramulosis compactis semper virens: ramis quadrangulis, angulibus prominentibus. Folia ovata 3-7-dentata, rarius tricoepidata, supra nitida, densis imbricatis. Bractae basi connatae, margine serratis pilosae. Corollae lobis ellipticis. Stigma tuberculosa quatuor intractis praeofovis. — *D. fipmosa* Ri. lib. — Crescit in Peruvia monUbat ad Manna.

"RETZIACEAE Bart), ex G. Don, General syst of gard. and bot IV. 306.

(Endl. Gener. plant, p. 609. - Meisn. Gener. plant vascul. I. 273. II. 170.)

3870. *BETZII* Thnbg.

(Thnbg. Act loc Lund. I. U. t 1. fig. 1. - Meisn. Gener. plant, vascul. I. 273. II. 179. — 6pr. Syst. veget I. 580. — Dietr. Synops. pi. I. 863. — G. Don, General syst of gard. and bot IV. 300. — *SoUotligma* Kth. m*0., qui full boe genus referri ad *Stilbneae*.)

1. *R. SPICATA* Thnbg. I. e. - Urn. Illnair. gen. t 101 - Ltoa. 01. Suppl. 13f. - Caule fruticoso nudo; foliis, quater aliter lanatis obtusis serratis; floribus terminalibus. teulibus aggregatis bracteis. 6 — *SoUmo\$U\$ma Krausit* Kllzsch. mss. In Hb. Kraats. — Creell In Promontorio bonae spel.
2. *R. (OLEMONILM* Thnbg. Prodr. fl. Gap. & — Willd. Spec plant. 1887.) *CAMPALOIDES* Spr. S)9t. VORCL. I. 580. - Caule herbaceo ramoso; foliis, aliis sessilibus. InuMRI-lincolais intraxillis; floribus pedunculatis terminalibus. nudis. % — Crescit In Promontorio bonae spii.

*) (*i. Don* ((*rnnnl sijH* »*fq, trrf* nnd hot. II *Hi* *Urifontm* nit at *terlttm GE**) - *TAXEA* hni *efficre rreditl* *inbvm*.)

3. R. (POLEMONIUM Thnbg. I. c - Willd. I. c.) ROELLOIDES Spr. 1. c. - ii. Don I. c. no. 3. — Caule herbaceo villosa; foil, alternis scssilib. laeolatis marginatis scabris; Qorib. oxillarib. termioalibq. sessilibus. 2 — Crescit in Promontorio bonae spei.

3S77. LONCUOSTOMA Wickstr.

(Wickstr. Act Holm. 1HH t. 10. — Meisa. Gener. pi. vascul. I. 273. II. 170. — Spr. Syst. veget. I. 803. — G. DOD, General syst. of gard. and bot. IV. 300.)

1. L. OBTUSIFLORUM Wickstr. I. c. — Spr. I. c. — G. Don I. c. no. 1. - Foil, ellipticis, extns hiraulis; sepalis laciniisq. corollae obtusis; slyli* subdavalis Jticlusis. 5 — A w m M penkmdra Thnbg. Prodr. 0. Gap. I. 70. — Crescit in Promontorio bonae spei.
2. L. ACUTIFLORUM Wickstr. I. c. — Spr. I. c. — G. Don I. c. no. & — Foil, ovatis, extai pilosinscalis; sepalis laciniisq. corollae acollis; stjilis filiformib. ei-sertis. \$ — Crescit in Promontorio bonae spei.

Solanacearum synopsis quam fere Integra typis expressa esset, ires species sequentes onissae in manus venire, quas hoc loco malui addere, quam ad Supplementam alteram reponere.

PETVWIAE addatur p. 7. no. 5.

5. P. VIROSA Mien, Memorie di Torino XXXVIII. 135. t t 45! - herba, uodique pills Rlandnlofo-viseotit obtilla: foil, spartit oppositve Integerrimii, inferiorib. lanceolata petioUtif, nn><rlorib. aagaslorib. tabtettilib. acuminatin; peduncollis oniaoris folio brttlorib.; eroilae tabo calyee doplo longiore. ^ — IlabiUt in Chili.

NICOTIAWAE addatur p. 12. no. 2H. a. 6.

- 28a. N. SORDIDA Lebm. Delect semin. hort Hamburg. 1843. collect, adnol. - Foil. Inferior)b. fobdecnrenlib. auricnlatit oblongo - lanceolaii* aculU, kuperlorib. semiampleiicaalib. lanceolatis lineari-lanceolatitqur undulate; corollae labo tuperne inflato-Tentiicoto, limbi laciniit bretib. aruliutculi*. o — Ilabilai in term Mencanii. — Proxime accedil JV. plmwtbagimifohae. diffn foliit inferiorib. auriculatif tubdecumbeniibof acollis, corollae tubo nullo anpliore bravlorequ, limbi laciniit bre?ioribut tordide flatetcentibut.
- » b. N. ROTIF(DIFOLIA Lindl. Bot. Bef. (New Sor.) XI. MUo.ai.BO. lia - Tndiq pills paletjtib. Tillota: eaale panlevlato; foil, plaato ta potlotaw bretea decurvatib., tefsriorib. orKo^ohlols, wpotlorih. subrotsndlt; corolla* mbo eylin-draceo, eaJyeo iaplo tonfjtofo, Habo piano tubaeqnaH, lacinh« «ubroiundi« emarffinatis; flameoUs 4 toogtortb. adaaUt; captula otali biloculari calycn loo-Kitodioe. QI - IlabiUt in Nova flollandia

- y. Foil, aculis crenatis tomentosis, radicalib. oblongis, uirinq. attenuatis, caulinis inflexionibus lanceolatis, basi attenuatis, inermibus oblongo-lanceolatis supernonb. oblongis leviter decurrentibus; racemi fasciculi* remoliusculis; antheris duabus oblongis. — *V. nemorosum* Schrad. 1. c. 32. t. 1. fig. 2. — Rchb. 1. c. no. 2012. — G. Don 1. c. 400. no. 10.
- 5 Luleo-tomentosum: foil, imis ovalo-oblongis pedicellis reliquis sessilib. breviter decurrentibus, alis rotundatis; racemo spicaeformi densidoro; corollis calyce quadruplo longioribus, laciniis subrotundis. — *V. condensatum* Schrad. 1. c. 31. t. 2. - Rchb. 1. c. 385. no. 2015. - G. Don 1. c. no. 15. — Berlol. Flor. Italian. II. 577. - *V. australe* Moris. Fl. Vend. I. 117. (nec Schrad.)
- s Racemo valde intricato; foil, supra caulem nudum. — Berlol. 1. c. 570. — 1. *Sammhucum* Tenore, Viagg. in Abruzzo. 54. — Caecum hanc species *V. Thapsus* similima esse necque differt, nisi foliis brevioribus. — (resell per lotam fere Europam).
6. V. MONTAUM Schrad. Hort. Goelling. fasc. 2. 18. t. 2., Monogr. 33. — Rchb. Flor. curs. 384. no. 2011. — G. Don 1. c. no. 17. — Bertol. Fl. Kalian. II. 578. t. — Foil, crenatis tomentosis, (omnino lutescente; superioribus semidecurrentibus; racemo subsolitario; floribus solitariis fasciculatisque, fasciculi* 3-4-florum; pedicellis longioribus calyce brevioribus; corollis rotatis; filamentis omnibus albo-hispidis, 2 longioribus apice glabris, antheris sex, hinc breviter decurrente quadriplo brevioribus. J — Simile praecedenti, sed differt foliis inferioribus ovatis in priusculum abrupte contractis et fabrica laminarum. - *V. cruiifolium* Schlecht. Pl. aicc. — DC. Fl. Fr. III. 001. — (Mich. In Till. Cau hort Pisan. 170. I. 90. fig. 1. SL) - ».
7. >. SPIRITUM koch, S-nops. fl. Germ. (ed. 1.) 511. no. 5. - Foil, crenatis semidecurrentibus tomentosis, tomento adpresso cano; caule biperne atulo angulato, pedicellis calicem aequantibus; filamentis omnibus albo-lanatis, antheris arqualiter filamentorum longioribus non decurrentibus. <t — Rchb. habitu *V. Lychnidum*, sed ab hoc recedit foliis decurrentibus lomeno crassiore, floribus brevioribus praedictis ralicibusque inaequalibus. Videtur proci hybrida ex *V. Lychnidum* et *V. thapsus*. — *V. thapsus* L. W. et differt. ci Rchb. Flor. etc. t. 3. JUV X *V. Lychnidum* 3. *Thapsus* Sm. — 1. *Thapsus* - f. ydbmfu Merl. ft. Kch. Decur. bl. Flora II. 812. — *V. thapsus* L. W. cl. 110. msgg. — Crescit in Bohemia, ad Rhenum et in Italia superior!
8. V. RAMIGERUM Schrad. 1. c. 31. l. 4. - Rchb. 1. c. 383. no. U04. - Koch 1. r. 511. - *V. Don* 1. c. 401. no. 90. — Foil, cretula breviter t. aemuldecurrentibus lomenosis, lomeno adpresso canetente; caule naperoe acute angulato; racemorum fasciculis multifloris; pedicellis floriferis calyce longioribus; filamentis omnibus albo-lanatis, antheris kimentonim longioribus hinc breviter decurrentibus. Valde simile praecedenti, sed floribus triplo majonibus fere magni (ultra illud) *V. Thapsus* et antheris in altero latere filamentis coispirantibus differt. Videtur hybridum esse *V. Lychnidum* et *V. Thapsus*. — 1. *Thapsus* formae *chilum* hinc de De plant. h. b. 38. Crescit locis arenosis in Germania hinc inde (In agro Megapolitano, Baiana et Saonia).
9. V. PLANTAGINKUM Moris, Stirp. Sardoar. eleich. 1. 33. - Bertolon. Flor. Julian. II. 570. t. — G. Don 1. c. 400. no. 10. — Tonenlo albo fulvido deinde tectum caule inferno nudo, tuperne breviter aenulato; foil, ovalia crassa loiter subcrenulatis, inferioribus pedicellatis, superioribus aemuldecurrentibus, alis cuneatis, racemo densiusculo; segmentis calycinis ovaliter aenulatis; corollae lobis longioribus (aulis 17—2-pedalis, inferne ternis, auperne breviter alatis. *V. Lychnidum* radialis et rauhna inferiora pedolata ovata obluta, omnia parva crassa lumen cunctis Miula (I fere m: n, drusihsin et alia fulva) differt. *V. Lychnidum* (armu) (lra) rulu, interdum interruptum lraeae cordato-ovatae, inaequaliter. I loir tubercula. Corollae parva lula, eitis densitate filamenta cretae.

- albo-pallente herbata. Capsula ovoidea oblusa tomentosa. — Crescit in Sardinia nusirali a Cala d'Oslia el Tculada.
10. V. MVELM Tenore, Fl. Neapol. 90. I. 22. - G. Don I. c. 489. no. 7. - Bertoloni I. c. 580. t ~ Niveo-iomenosum: Toll, nvalo-nblongis rrenalis undulali*, imis pctiolatis, reliquis sessilib. acuminatis subcochlealis semidcurrentib., alis cunealis; racemo termin. ili densissimo; corollis calyce duplo longioribus. <f — Caulis erectus simplex J-t-pedalis v. (locis sicrissimis) podalis. Folia canaliculata undulato-flexuosa. Ilacmus terminaliis spicaeformis densissimus, infra interdum subinterruptus simplex v. basi ramulosus. Bractae cordato-ovalae acuminatae, inferiores majores racemulis sabaequales. Flores in quavis racemulo 4-5 subsessiles. Corolla lutea, calyce duplo major. Filamentum crocea, 3 superiora breviora, horum in medio breviori, omnia usque albo-barbata. Antherae aequales grandes incumbentes compressae reniformes. Stigma breviter clavatum. Capsula ovoidea acuiuscula tomentosa. — Crescit in Italia inferiori, in Lucania, Praetuliis et in monte Salviano.
11. V. MICKONAUM Lam. Diction. IV. 218. - Schrad. Monogr. 38. - G. Don I. c. 491. no. 22. — Folia, crenalis piloso-tomentosa, radicalibus oblongo-lanceolatis, caulibus oblongis acutius semidecurrentibus, superioribus ovatis longe acuminatis; spiris paniculatis. ramis glomeratis. / — Tota planta tomento piloso vestita est. Caulis apice ramosus. Folia radicalia 1/2-2-pedalia. Flores subsessiles. Corolla magna lutea. Filamentum omnia albo-lanuginosa. — *Yerbatum orientate maximum candidissimum, ramis candelabrum* <u nmlantibus Tournef. (l. 8? — *Cretil in insula Candia.*
12. V. <A>DIDISSIM (M DC. Fl. Franc. Suppl. 413. no. 2070. - ti. Don I. r. no. 101 — Tota planta nullo tomento: a full, inferioribus peliolatis nullo lanuginosa, utrinque attenuatis, caulibus superioribus ovatis acuminatis, omnibus decurrentibus. trinitate creolalis; racemii paniculatis; filamentum multioculis remotis. fl — Tomentum Oocotam In lontanibus interdum deest. Calyx parvus. — Forte idem ac *V. nireum* v. *mucronatum*?? — fl. Floribus approximatis; caule rubiginoso. — Crescit circa Monspelium.
13. V. ALWICI LATIUM Smith, Prodr. 0. Graec. I. 119. - Sibthorp. et Sm. Fl. Graec. 1.223. - G. Don I. r. no. 24. — Folia, crenulata elliptico-oblonga, utrinque tomentosa, basi auriculata, superioribus emarginatis. ramis paniculatis fleuatis; filamentum multioculis remotis; antheris nudiis. arqualibus. Corolla lutea. Filamenta lacteo-barbata. Antherae fuscae. — *Verratum orientale maximum candidissimum, ramis candelabrum aemulans* Tournef. Corollae? — *Cretil in insula Samoii.*
14. V. AKGYHOSTACHIOS Tenore, Reliquiae del. taffio fallae Abn. St., 8) 1-loge 107. Bertoloni I. c. 581. f — Mente tomentosa: caule medio rariore, superioribus nudis; Mente imo oblongo-obovata pilulosa, eallosa nudiis bracteis semidecurrentibus, ala conica, tapetala ttilibus eordatis, Mense supra nudis; caulis: raceo icrimali deatloro laato; bracteis capidatis; corollae laciniae aruminatae duplo longioribus. S — Caulis ererlu tern 1-2-pedalis, mento drierabili iertu, ubi quo tere purpuratilis, timplet v. parre ramiois. Folia (omnia tenuia, supra nudis rula laeteque viridia. ubi nimum rrenulata, raulina inter e remotifolia, superiora urceive minora. Rjrrmu drn. infrne ubinde ininterrupte baque usque ramo instructum v. Bractae cordato-ovalae arummalae rupidatae, rugulatae glabrae. Flores ubi. Srumenta cahna owio-Unruia aemioa Curo luro-aurrj, riu Unaia. lynn ubi ulibus ubruum Sunio 3 breviora, lurnii. uodique albo-lanuginosa. loncium l'irrr mirno Interior albo-barbata. Amber: oblongae ubrrmfonn adnae. l'p u ovoidea b-tu* albo-lanuginosa. - Oracil is moot Geoar to dilioor Roinana. to Aprutis rt in Lurania.
15. VIUIYME GUOQ. PUni. rar. 101. f. t. 21. Bcnol., o. |. c. >. * . . libe-j(Oronlo) uni ejulf kot.i, toferoe nudv. >uprre brenttime cmiaUlo. toll

- oblongo - lanceolate minule crenalis, in* atutis peliulalis, siiprnoib ~~acuminali*~~ subsemidecurrentib, ~~is*~~ cuncati*, racemo terminali simplm lanalo, basi laxiubculo; bracteis calicisq. denlib. acurinalo-cuspidali», sern nib riijosi*
 rf — Caulis leres snalus 3-4-pedalis, mulla parle nudus, lomcnlo UYICTMHII (sub quo saepe purpurascit) obduclus. Folia crassiuscula crebre crenulata, utrinque lomentosa, infenora scnslm longiora, caulina remotiuscula. Racemu« 1-I¹ - peddlis, basi bubinerruplus laxiusculus Bractcae inlciores ovalac, supcnon^ lanceolalac acuminalo-cuspidalae, cuspidc saepe glabralo Flores subsessiie* lutci C rollae t>egmenlo oblongo-obo>ala ublu>a staruiua J brctiora, filaments undique albo-barbalijj, antheris incumbentibuh, demiim lenifornnbus, duobus longionbus, filaracni* mferne lalerc interno barbata, .ml lima oblongs .idn.iii*, demum recurvato-cristalis. Cap&ula ovoidea turgida obtusa Scmn subiclr-t-gona rugulosa, ulrmqmc (runcala. — In raaritimis di Corighano in (.ilibna
10. V GOSSIPIMM M Vieb Suppl. fl. Taur Caucas 15² - G Dun I. c 400 no 11. — Foil decurrenlib crenulalii \mdib, supra r>ublanaii!», infra den<<c albo-lanatis; raicmis airaplicib., pedicellist fascicularis taljce Mibbrcti nbu> J - ilabilu simile <t V. *gnaphaloidi*, scd Tolils aogtistionbus crcna:urisqmc mmulioribus differi. Filamenia cupreo, duo breuora supra medium lana alba <csdi.i, tna longiora nuda. Corolla lutet. — Crescit IQ Iberia.
17. Y. D)K>hlFLORUM Hertoloni, Plant, rar Hal. III. tt. - Schrad. I. r 1 - G Don I. r. 480 no. 12 — Dcrtol. Flor. Italian. II 575. — Lutco-lomeniosum: caulr semlalalo; foil, radicalb. oblongalo - lanceolatis b re viler peliolalu, bail acnie subinclso-deDtats, rehquo margine crenaitt, supra nudiusculis, caulinin ovaii* semidecuiTentib, alis cuncalis; race mo superne den^issimo, infer ne subinirrrtipio, corollis enhec iriplo longionb, lacinus subrolundi% J - Caulis 4- *>-piⁱdili» vrrectus, infra I ere*, supra subangulatu-* Folia rad calia oblonnato-1 inc< olata, ultra pcdalia, 2 poll \ ultra lala, basi ongstala gro^c el >ubinriso - d< nti<i reliquo marline rrrnala, quandoque »ubrepanda* *upra nudiuscula Mrnh.i, sub-lus pallidiora tomrntella, caulina succc^she minora otala acuminala Haccmus supra denhiMmus ultra pedalU. Haccmuli usque 8-flou ci axilla bnrtci< o>alac acuminalo-cuspidatac orli. Calycis segmenla ovata acuta den>c iomrnto<i Corolla luica cal)ccm iriplo eicedous, extus tomenlosa. Stamina 3 brctwra, d-laneotii undiquo albo-barbatis, antbens rcotformibus; duo longiora, filamenti» latere loterno albo-barbatis, antbehs oblongU adnatis. Capsula oloidea obiu>a dense tomenlosa. - Cresnt in Italia (Massae ducalis in tertice montU Bruriasia ad fodmas srhisli tingularis^ — Valde afDne V. *condetuaio* Schrad. »ed certe differ re dintur
- ,I tana filamentvnm dilutiu* r toturahu* ttolaeaa
- 18 V. NOTUI \l Koch, Sjn<>» II (lorni (ed. 1) 512. — Full <r<>natis, broiler > icmidcrurrcuilli. lomentosis, tomciito lulro-cinratrvnlc, supiorib hinge rtispidalis, caule tcreti; racemorum fasciculi> mulliflorts, >i<dicelh> flori^eriH r \l>ccm oequintib, fillamrntis omnib. dilute purpurco-lanatis, antheri* QhmeuUtrum longiorum subdecurrentibus. J — Intermedium qua»t inler V *foctotum* rt I *Thaptum*, caeterum huic simile, »| folia decurrenlia el lanam filamentorum diluie >iolaeecam escipias. — V. *mgro-pmlrtruU*4um* 6n. Pl. Brit. 351., at Hurra magni ct panicula dense floccoso-puherulenia. — Crescit prope urbem Magontiacum
10. V. COUJMM Schrad. Moaogr. 35 I. 9. fig. c. - Korb I. c. - Rcbb. Fl eirurs 383. no. 9007. — Flor. Dante L 1811. — Ci. Don I c. 401. no I* - Full crenaUs scmidccurrenlib. tomentosii, lomcnlo lutescente, supenonb. oblongi» aruti», caule superne acute angulato, racemi fatclculis subquinquefloriN, pcduellis flurigrcri* ral>rem aequantib, filanirntm ouimb purpurro-lanatu, antherriik a<Mjui-lib, nullis decurrentibu% ^ - I *Thapio-mgrum* Schiede, De plant h)bnd .12 — I *ambiguum* Lrj Flor Spad 2J0. Rcbb I c no JOO - V *tem***fr* m* Fries — rre<rit in Germama borcali
- ». V. UOIE>A(KKRI Fi>cb el Mrjer, Liunaca XIII I ilrrbl 117 Tomcnloto-cansfcent caule teretiusculo simplici, foil crenulati», inferiorib. oblonp* m

petiolum allenualls, »upctorib. semidecurrentib. ovali* subcordatisve cuspidato-acuminalis; racemo laxo; pedicellis gemirm ternisve calycem aequantib; >tami-mb. aequalib, omnib. barbali; capsulis oblongis, sepala linean-lanceolata superanlibus. — Habitat in monlibus Taljsch

21. V. ADILTERIMM Koch I. c. — Foil, crenalis, breviter >. semidecurrentib tomenloMs, loiuento subcanescente, supenonb. cuspidate; caule superne acute angulato; racemorum fas»cicuh 5-7-flons; pedicellis fl on gens raljcem aequantib., filamenlis omntb. purpurco-lanatis; anthers filamenlorum longiorum oblon-~~g~~» deccurrenlibus. <f — Flores speciosi, magmludine florum *V. phlomoidis*. — \idetnr hjbndum e *V. nigro* et *V. Thapto*. — *V. Thapsiforml-nigrum* Schicde, De plant, hybrid. 36. — Grescu per lolam Germaoiam bine inde in fluMorum gla-rei* cl pascui*.

22. V. SIM ATÏ M Linn. Spec plant. 254. - Siblhrp. et Sm. Flor. Graec. III. 22. t. 227. - Koch I. c. - Rehb. Fl. excurs. 3M. no. 2000. - G. Don I. c. 491. no. 25. — Bertolom, Flora Italian. II 583 f — Tomento»o-pulverulentum caule paniculato, full, radicalib. oblongati!) pinnatifido-dentalis unuatis undulatis, caulinis semidecurrentib., raracis se&silib.; racemin interruptis; stamimb. omnlb purpurco-lanatu; antheris aequalibus. cf — Caulis erectus pedalis orygalis, plerumq. tamen 2-3-pedalis, nunc jam ab iino, nunc superne paniculato-ramosus. *Tomentum delersibile*. Folia radicalia et caulioa inferiora reliquis majora, frequentius sinuato-lobata, lobis crenatis, undulata, roliculalo->enosissiraa puherulentolomcnto»a_y supra lamcn parcius, caulioa infenora v. omnia leviler decurrenlia, alis rotundatis aul cunealis, alias vel omnia vel supenora, semper |cro ramca subcordala amplencaulia nullimodo decarrentia, in caetens similia fulns radicalibus. Eacemoa termiaalla inlernptaa patent pamculattu. Floret J-i ^rariet IV-7) glomerUU in axilla bracieae cordaio-ovalae aat cordato-lanceolatac cuspidata< Pedicelli brevissimi inaequales. Segmcota calycina lanceolata acuminata, rxtus tomentosa. Corolla lutea T. ransiime alba. Capsula pana subrotunda obtu»a laiiiau, cal>cis longitudine. — *V. icabntm* Pnl. Fl. Sicul. I. p. XXXV. (certe idem!) — In *allro Yerbaseo Malta*, ed. \algr. ao. 1583. II. 1£)7. c. ic. — *Vtrbascum sextum* Caesalp. De plant Lib. till. cap. XLVI. p. W7. — *V. nigrum foho Papperu corntcuiati* Tournef. — Moris. Oxon Hist pi Sect. 5 t. 0 fie. 0. — *V. mlubaeum* Tabern. Krirbcb. 050. — Cresot in Dalraalia, Istna cl in Italia

ti |. \IR(;.4TI M Roem. ft Schull. s>st >pket. I\ 430 - Kngl. bot. VIII. U 550 — (i Don 1 r 407 no 71 74. et p 400. no 71 Bertoloni I c 5*4 | - Pilonoviiidulum foil oblongo-lanceolalis radicalib. tuhlyratit, caulinit ioaoqtialiter dentatis subtemidrcurrenlib. tessilibusve; Oorib. breviter pedleellalis fasciculatit sohUHisque J — Canlit ereelot timplet v. ex imo ramosu<v> oblu»r angalatat, orgyallt v. plerasM|M mallo SBInor. Folia radicalia cl ima cauhna petiolata, lafra toblyrau, topame lobato-creoata, supenora acuminata, inaequaliler acui<* drntata, brevitr semidecarrentia, alit cuncati» denlatit, iel »c*siha, ba*i cordata amplexcaulia Racemu^ terminals timplet (v. ba»i ramulonoi) longu«, intrrupiUH Orartrae ovalo-lanceolaUe r. fupenores lanceolatai* Horæ% in aulli* brarloarum fjtciculali 2-5-ni v soliiarn brevitr ft inai*quahler pedicllali. So^mrnlj cal)cina ovato-lanccolata acula (ornlla grandi* lulra, in fundo purpurra, Ucinu» parum inaequalibu« oblongo -<>bo>jti» ohtu<i< Mamma 3 breviora undiqu*, i longuira loferne purp'irrn-barbjia. anhrac lonRiorum obloDgae, bre^mrum rcnifonm* Tap^ulj itlohotj ubluva — I *itsndutum* Ron Plant Eagan 10 - I *bhUanotdr** Sebrad < ommrnt (•orHinj \ I HO Rrhh-Flor. exrurt M) no «VH - Lnk el llffmntgg Flor Poring I 210 I ^ v *itsndutum* Pen Korhir I 415 - I. *crys(aUo\$ttmom* Wriom Cat hort Dorpal 191^ . - *V. ylamdmtonm* Thore » *giabrm* Willd Knum. pi hort Brrol I 815 I *laerigaium* Hort. PrtK » *BtaUonn* CM%% Flor. birul prodr I «U *

- K. repandum* Willd. Enum. pi. hort. Derol. I. 220?') - Schrad. Monogr 44. - G Don I. c. 490. no. 71. — Rchb. Fl. Germ, eicurs. 380. no. 2587. — *Btaltana magno flore* Lobcl. Icon. 561 — i. Bauh. pi. Ilist. III. appdz. 875. c. ic. — Crescit in Britannia et in Italia superior!.
24. V. HYBRIDUM Brot. Flor. Lusit. I. 170. - G. Don I. c. 401. no. 86. - Foil, tomentosis, raihcab. obovato-lanceolatis undulatis et subsinuatis, caQuu< *ub-decurrentib. cordatis oblongis acuti* crenalis; racemis pameculatis; flonb. glomerulatis, glomerulis tribracleatis. <? — Hybridum dicitur c *V. tinuato* et *pulrerulento* laulis e basi ad apicem ramosus villosus. Folia radica sesquipodalia, 7 poll. lala. Corolla lutea, fauce purpurascenlc. Filamenta orania purpureo->illo»a. — Crescit loos arcnosis circa Goimbram in Lusitania.
23. V. MACKANTHIM Lnk. cl Hffmngg Flor. Portug. I. 215. t 27. - G. Don I r 400. no. 12. — Foil, crenolalis lomentotis, radicalib. elliplico-oblongis, basi attenuaus, caulims oblongis acutis semldecorrentib.; racemorum fasciculi* remotis, anlhens gerainis oblongis. *tf* — Totum tomentoswn. Folia supra viridia, radica 3-4-pollicana Raccmi pedales v. ultra. Corolla magna speciosa lutca, fccgmcn-Us inacquaalibus obovato - rotundalls. Filamenla 3 breviora undique, 2 longiora, basi tantummodo lana cuprea vestita. — Crescit in Hispania septentnionali.
26. V. BASTARDI Rocm. et Schult. Sjsl. veget. IV. 335. - G. Don I. c. 401 no. 21 — Foil, oblongo-laneeolalis pubescentib.v. villosis crenatis snbdecnirentib.; flonb. gminatis v. glomeratis; caule ramosUsimo. <? — Caulis basi purpurascens pabescens. Folia praesertim Infra villosa semiamplexicaulla. Panctilae raml elongati. Flores pedicellati. Corolla lotea. Filamenta purpurascenli-barbala. — Affine dicitur *V. ramigero* Lnk. forleque ejun est vanelas. - *V. blattarioidet* ,i caule ranwstiuo Bast. Suppl. II Marne et Loire 42* — *V ramosistmum* DC Fl Franc. Suppl 410. no 4070 nec Poir. — Crescit loci* argillo»i» in Gallia propo Monlrcuil-Belfroy

It Flores rubro-rerruginci, lana filamenlorum ^lolacea.

27. V. VERSIFLORUM Schrad. Monogr. 30. - Koch, S)nops. 0. Germ. (I. ed ^ 512 — Rchb. Fl Germ, c&curs. 383. no. 2008. — G. Don I. c 401. no 10. - Foil crenatis breviter decurrentib. lomentoiit, tomento canescenle, caule tcreti, raceme paniculatis; fasciculis primarns 3-5-flons; pedicellis flonferis sesqui-, fructiferis snbtuplo longionb.; filamentis violaceo-laoatis; antheris Olameotorum longiorum subdecurrentibus. <f — Flores rubro - forroginel. — PlanU solis TaosjcbU et Mchrader* nota. — la locls ioculllt ad urbem caplulem Bohemiae, Pragam.

IllvlsI* II. — Folia non decurreniiia.

§. I. Flores fasaculati.

† Corolla flala, in vanetate alba.

a. Lana /xlamrnlnrum alba.

28. V. BANATICUM Schrad Monogr. II 28. - Rchb Flor Germ, excum. 3M no 2010. — G. Don I. c. 404. no. 52. - Foil, inferiorib. ovali-oblongis pcciolatis iriplicato-crenalis, basi pinnatifldis lotneosis, ctulinls oblongo-ottUi doplicauicrenatis subsessihb. t suptnorib. late otatis subcordatis gUbrisculis sessilib , racemis paniculatis; pedunculis calyce sesquolongioribus. ^ — *f. \$4mm*tum* var *Banaticum* Roch. Bxsicc. — *V. tinuato* simillimum, sed differt loprintl folii» •ion decurrmtibus, radicalibus ovali-oblongis sabtriplicato*crenatts, basi tanium lobato-pinnatifldis, calyce tomcoloto, sfgaentis glabris, capsula otali-c)lmdnea lomentosa — Crescit in BanatQ.

*) *V. RH'iwHM* Hi/rf I I r i Suptrne ylanduhto-ptlosum full tnfrtorth obo\ (Uo-ohltimjit, lmn attcnuahi sul>nnuuttM, cauhntt latt ot a(>atnplericavl*b grotff deniaht acuminatu, pcdunculu solilarut geminatatt t \natquaUbu\$ f - S/ric/um I -J -pn/n/r, taepe alltut ac \ Illallana, non ram ramntum drnstus fohoiium, folia luurnnra lahont angulato-dntala, yrdunrult brniorei ar ilhui longtoret ae \ bfaUanoidi* — i d%oia hct<*ntph)lli #Vr< trrht I 161 >rrbaicum Pseudo-Blattana Schleteh VI rxnee — fritnl m l+h etta

29. V. SPECIOSUM Schrad florl. Goetting. fasc II 22 t. 10 - Koch, Synops. 11 Germ. (ed. 1) 513. — Rchb Flor. Germ excurs. 382. no 2603 - Rchb. Iconograph X. 1129. — G. Don I. c. 493. no 39. — Foil, inlegernmis undulalis toraentosil\ tomenlo persistente, infenonb. oblongis aculis IQ peliolum atlenuaiis, caulint* aunculalo-cordali* sesslib.; ramis angulals; racemis pamculatis; filamenti* albo-lanati», anlbens aequalibus. </ — Caulis angulalus, apice ramosus. Tola planta tomento albo veslila est. Folia radicalia pedalia-seaqui pedal in Kacemi 1-2-pedales, fascicnlis multifloris. Corolla latca, filamenta cuprea albo-lanata. — I. longfohum DC. Fl. Franc. Soppl. 414. — fl. Caule ramosissimo. — V thop-toides Host, Flor. Auslnac. I. 115. — V. eoeruUum Schanx, Cat. Uorl. \indobon 1822. — Crescit in Austria, Gallia ei in Hoogana.
30. V. FLOCCOSUM Waldsi. el Kit Plant, rar. Hungar. I. 81. t. 71. — Koch I r 513 — Rchb. I. c. 382. no. 9002. — G. Don I. c. 493. no. 41. — Rcrtolom, Flora llaliana II. 597. f — Foil, dense lomentosis, lomenlo albo Oocoso deciduo, radicalib. oblongo-cllipticis in petiolum allenualis, caetens sessilib. obsolete erenatis, sapenorb longe acominalis semiamplexicaulib.; caule ramisq toretib, racemis pamculatis patenlib.; Blamenlis albo-lanalis. <f — Caulis teres 2-5-pedalis lomenlo albo-floccoso leclus, sub quo saepe purpurascit. Folia radicalia ampla, supra ex albo Tirentia, sublus dense lomenloia, ultra pedalia, caulina sensim minora acula v. acuminata sessiha levissime orenulala v. subinlegra, utrinque dense tomenlosa, supenora subcordato - oblonga, suprema cordato-ovala cuspidata. Racemus lerminalis ulplunnum ramosiksimus pjramidatus nonnunquam ultra pedalis) laxiQorus, 'ere tolus interrupt us Dractee cordalo-o\atae cusptdatae, supenores lanceolalae minores. Flores term octoni fasciculaii Pc-dicelli lenuiMini inaequales. Corolla lulea, extus ilellalim pilosa, lannnt oblongo-obofatis, calje« 3-4-plo loogioribos. Stamina omnia crocea, 3 brevwa albo-barbala, S loogloria tota lonf Undine T. infra nuda. Capsula ovoidea obiusissima. — V. Lyckmitis All. Fl. PedemonL I 105. — V. pulvfrulmtum Sm Rngl bot. VII. t 487. — V. heterophyUum Morettl, Plant I la I. dec. III 0 - Comol Prodr. fl. Comenn. 40. — V. laxiflorum Prsl. Delic Pragrnv 70 — V. mtxtum DC Fl. Franc, no. 2074. (nee Radarro). — V. pulnntatum Thuill. Flor. Pans. 109 - Rauh. Dist. pi. III. 873. c. ic. - Moris. Oxon. Hist. II sect V 1 9 fig 3 - Cre%-cit a Lusitania ad Italiam usque.
- 31 y PLLVERILEMLM V.ii Delphinat. II 490. ex Schrad Monogr II. 17 - Koch I c. — Rchb I c 3A2. no. 2001. - G. Don I c no 4i — Foil, crcnalif, supra lenue, sublus densius tomenlosis, lomfnto rancscrnlic, infcnonb oblongo-ellipticis in peliolum decurreotib., caeteris sessilib , superiorib acuminali*; caule , superne ramisq obtuse angulalis; racemis pamcalatis palentib.; flilamentlt albn-lanaiit. <f — Hybridan ex V. loceao el LyclmMd* ortom esse videinr - Dif-fert a V. LytkmMdi eaale Meplua bimilloii, follis supra cahr«centibus el caly-eibos mlnoribot, a praeedeau: lomenlo tenoiori cane«crnle, folu% raulims *ub-sessilibus ovato-oblongis aculioacalls sieol inferior! inacqualiter duplicato-rrr-oalis, summa polius serrala ioque acumen brevius producta. — I*. Bfbersletmt Bess. Cat. hort. Knem. - V. pyramulale Host — V. Lyekmits fi. liumgancum Roch. Ranat fig 40. — Crescit in Alsatia, in Italia supenon, In Ranatu
- & V LICUMTIS Linn. Spec. plantar. 235. - kocb I. c - Rchb I. c. no. 8000. - G. Don I c no. 43. - Rertolonf, Flora Iuliana II. 59*. t - Sm Kngl hot I. I 59. — Flor. Dame L 580. — Caule nudo, foil. ovalo-oblongi« crenatn, supra nudiascQlis, subtus albo-pubrscenlib. fannosisq, imis prtioilaiis oblusiusculis, basi euneatis, rehquis sessilib., supremis acummatis, basi roiundalis, racrmo dcosi-floro; pedicellis eal)ce loofionb., sUmioib. albo-barbaiif. <f - CUulis crcrtuJ simplex obsolete teres, sopeme anguilalos, 1-4-pedalis albo-pubrscens, Interdum sab fillo purpurisee**. Folia radicalia el caalina ima ovato-oblonga T obloS)-go-lanreolata brevttcr pvtiolata obtusa*. subinde pedalia, caulina rrligua minors sessiha, basi roluadata, apice acoU, suprrma »subcordJia acuminata, omnia none grosse, nunc minute itaeqaaliler crenaia serraia v inivrdum subidtegra. supra

- viridia nudiuscula, sublus albo-pubescentia. Racemus terminalis, demum la-
 xiusculus ramosus pyramidalis, lotus albo-pubescenti-farinosus. Bractea ova-
 to-lanceolatae. Flores fasciculi numerosi, pedicellis unifloris v. 2-3-lions.
 Filamenta albo-luteola, 3 breviora undique barbata, 2 longiora r. undique v. in
 laice interno lanlummodo infra barbata. Antherae ut formes reniformes Cap-
 sula ovoideo-oblonga oblusissima. — *V. thaptoides* Birol. Flor. Acon. I. 75. —
V. tricranthum Morelto, Plant. Hal. decad. III. 6. — Giorn. di flic. etc. di Configl
 e Brugn. (dec. 2.) V. 111. — Gusson. Pl. rar. Sicul. 101 t - G. Don I. c. no. 38.
 — *Verb at cum pulverulentum flore luieo parvo* J. Baah. Hist. plant. III. App.
 872. Og. p. 87J.
0. Flore albo, in sicco rubello. - *V. Weldenii* Morelto, Plant. Ital. decad. II. 8.
 — *V. quint urn* Cacsalp De plant. VIII. cap. 46. p. 347. — *Yerbatcum (lore*
albo pano J. Baub. I. c. — (*V. album* Mnch. Method, pi. 447.) — *V. Moenchii*
 Schulz, Fl. Stargard. Suppl. 14. - Moris. Oxon. Hist. pi. II. sect. 5. L 0. fig.
 4. — Tabern. Krttuterb. 050. c. ic. — Lob. Icon. I. 508.
- y. Floribus apetalis. — Crescit in collibus incultis per Europam, Asiam et Ame-
 ricam borealem.
33. V. GRANATRINSE Böt*s. Voyage dans le mldi de l'Eip. no. 1217. | - Totum lo-
 mento canescente non detersibile obductum: caule ramosissimo; foil, omnib. »es-
 sib. infimis magnis pinnati-lobatis aul profunde sinuato-crenatis% supra batm
 angustalis, supromis subintegris cordatis «»atis attenuate-cuspldais* racemis
 patenlib. teretib. talde elongatis; Oorib. per 5-41 in fasciculos disUnles dispositis;
 pedicellis per anbesin calyce breviorib.; filamentis omnib. albo-lanalis; rapulis
 saepius trilobularibus. 2L (?) — Crescit in Hispamae provincia Granatensi.
- at. V. SOWNGARICUM Schrenk, Enum. plant. nov. 20. f - Foil, albo-iomrnto^is
 subintegerrimis, infenorib. lanceolatis aculis in petiolum alicnualis, caulinit ses-
 &lib. oblongis cordato-auncularis», summis subrolundiji cu«pidati»; racemis pa-
 nicalis; nonb. fasciculatis; sepalis lanceolatis, pedicello vix breviorib., cap^ula
 o>ata lomentosa longiorib.; flamenis omnib. barbatis; antheris aequahbus. S —
 Planta data speculabilis faric *V. speciosi*, a quo opiula el ^al)ce baud aegre
 dignoscitur. — A *V. longifolio* dignoscitur antheris omnibus aequahbus et rap-
 sul.i sepalis breviorib. — *V. Bolyttachyum* Karel. el Kirtl. Bullet, de Mosc. 1842. II
 710. — Habitat in montibus Soongaricis.
35. V. LONGIFOLIUM Tenor*, Flor. Neapolit I. 80. t. 21. - G. Don I. c. 402. no.
 37. — Bertoloni I. c. 505. t — Lateo-tonenlosum: foil, subintegris acumloatis,
 imis oblongo-lanceolatis petiolatis, reliquis sessilib. ovato-oblongis basi rotun-
 dalis supremisq. subcordatis; racemo terminali elongato, inferne laxifloro; florib.
 fasciculatis crasse pedicellatis; staminib. breviorib. albo-barbatis, longiorib. nu-
 dis; captulih suboideih oblusis. S — Caulis obsolete angulatus nudus pedalis
 Folia radirnia el ima caulina pedalis el ulla, breviter petiolata, roluja niirrr<-
 «ive minora sessilia ovato-oblonga, basi »subcordata, Miprema subrotundata, omnia
 crassiuscula acuminata levissime crenata dense floccoso-tomentosa. Racemus
 terminalis simplex v. basi ramosus, superne de mi floribus, inferne laxiflorus*, ultra
 pedalis. Bractea ovato-lanceolata longe acuminata. Florum fasciculi pluri-
 Oor. Pedicelli subinaequales. Lacinae corollae inaequales oblongae, lobis basi
 lomentosae. Summa crocea, 3 breviora basi nuda, antheris reniformibus, 2 lon-
 giora tota nuda, antheris oblongis adnatis. Pollen minialum. Capsula subovoidea
 obtusa, calyce paulo longior. - Crescit in Aprutio.
30. V. GARGANICUM Tenore, Relat. del flagello In Abrai. 35. - Flor. Neapolit. III.
 217. — Bertoloni I. c. 505. t — Lateo-tonenlosum: caule nudo erecto subpedalis;
 foil. »ati» nlongisvrl o\i\<imc crenatis, imis petiolatis obtusis, reliquis ge»»iib.
 aculis supremisq. arunnato, ramis simplicibus lanatis, superne densifloro, bracteis
 lanceolatis, inferioribus »ab»ualib; staminibus albo-barbatis», rapnulu ob-
 tusis ^ — raulis inferni* trre«, nuporne oblongis angulatis erertu» nmlun sub-
 pedalis. Kolt.i cri>siu*cula le>nimo crnbla, radiralia et rauluu ima petiolata
 •ucceisne niinora, summa acuminata basi rotundata amplexicaulia Racemus

- simplex terminalis, basi laxiusculus, superne densiflorus. Flores fasciculi gemini-quini (subinde solitarii). Pedicelli brevissimi. Segmenta calycina ovalo-lanccolala. Corolla liava inaequalis, extus inferno dense lomentosa, calycem duplo excedens. Capsula ovoidea oblusa, calyce brevior. — *V. niveum* Guss. Plant, rar. Sicil. 103. (nee Tenor.) — Crescit in Gargano et in maritimis Calabriae.
37. *V. LEPTOSTACHYUM* DC. Fl. Franc. Suppl. 2670. — G. Don I. c. 402. no. 35. — Foil, oblongis tomentosis, interioribus. oblongis crenulatis in petiolum attenuatis, caulinis aculis inlegerrimis sessilib., superioribus. ovalis acuminatis scraiauplexicaulibus.; racemis elongatis; pedicellis calyce brevioribus. </ — Tota planta albomentosa. Caulis simplex teres. Folia radicalia et caulina inferiora 3-5-pollicaria, media 2-3-pollicaria. Racemas solitarias, fasciculi's 5-7-florrs. Filamenta omnia lanata, antberis aequalibus. — Prope Monspelium et ad portum Juvenalem.
38. *V. GNAPHALODES* M. Bieberst Fl. Tauric. Caucas. Suppl. 152. — G. Don I. c. 403. no. 40. — Foil, crenalis, subtus tomento denso floccoso vestilis, inferioribus. ovali-oblongis petiolatis, caulinis oblongis acutis subsessilib., supremis rotundato-ovalis longe acuminatis semiamplexicaulibus.; racemis terminalibus. longissimis; pedicellis calyces subaequantibus. </ — Valde affine *V. floccoso*, sed habitu multo robustiori foliisque evidential crenalis recedit. Race mi tripedales et ultra, racemulis paucis brevibus interdum accedentibus. Fasciculi inferiores remoti, superiores aggregati. Corolla lulea. Folia adula superne glabrata. — *V. Stevenii* Hort. Yindobon. — Crescit in Tanria orientali.
30. *V. ALOPECLERIS* Thuill. Fl. Paris. 110. - DC. Fl. Franc, no. 2020. - G. Don I. c. 404. no. 40. — Foil, crenalis, superne pubescentibus., infra piloso-lomentosis, inferioribus. oblongo-ovalis subcordalis petiolatis, caulinis ovali-oblongis breviter petiolatis, superioribus. oblongo-ovalis subsessilib.; racemis simplicibus.; pedicellis calyce longioribus. 2]. — AfBne *V. nigro*. Tota planta excepta foliorum pagina superioris tomentosa. Folia radicalia et caulina spiibamaea, duplicato-crenata. Racemi plerumque spallhamaei Y. longiores subsimplices. Filamenta albolantata. — Crescit locis aridis in Gallia. — [cf. no. 41.]

fl. Laha filamenlorum purpurea.

40. *V. SCHOTTIAMI* Schradr. Monogr. 13. I. 3. fig. 2. — Koch, Synops. fl. Germ, (ed. 1.) 513. — Rchb. Fl. Germ, excurs. 381. no. 2500. — G. Don I. c. 402. no. 39. — Foil, crenalis, ulrinq., supra Inmen lenius, sublus densius lomentosis, radicalibus. ovali-oblongis acutiusculis petiolatis, caulinis intermediis oblongis acutiusculis petiolatis, superioribus. ovalis acuminatis subcordalis semiamplexicaulibus.; caule superne angulato; ramis paniculatis; pedicellis calyce duplo longioribus.; filamentis purpureo-lanatis. ^ — Habitus I. *Lychnis*; folia ulrinq. tenue lomentosa, adpresie crenalo-serrata subinlegerrima, stalti sicco planisaima membranacea nllidula, ticot tota planta nigricola. — ID Austria, Bohemia et in Alsacia.
41. *V. KIGRII* Lion. Spec, plant 9U. — Koch, Synops. (I. Germ. (rd. I.) 514. - Rchb. I r. no. 8500. — G. Don I. c. 4W. DO. 51. — Sm. Kngl. bot. t. 50. — Ocd. Flor. Danic. 1. 1088. - Svensk bot t 500. - Hook. Fl. Londin. I. 101. — Rrrloni I. c. 5tt. t fexcl. Tar.) — Foil, crenalis, supra glabriusculis, tublus tenuissimis lomentosis; caulinis inferioribus. oblongo-ovalis, basi cordatis longe petiolatis, »superioribus. ovalo-oblongis subsessilib.; caule superne arule angulato; racemo clungalo; pedicellis calyce duplo longioribus.; filamentis purpurulanicatis. V -- Caulis inferne tritiusculus sarpe purpurascens 1-4-pedalicis. Folia caulina inferior* et radicalia longius petiolata, ovata, ovalo-oblonga, oblongo-lanccolala obluta ». acuminata, »upra alroviridia glandretrenlij. mire latitudine et Inngitudine variabilia. Folia caulina ienim minora. Racemus terminalis, sacpn se<quipedali laxilorus •implrx aal parce NBODI. Bracticae ovalo-lanccolaliac, »upermae lanceolite Onribus brtioret. Florrs fatculaii numero^i, inacquatiltr loik'iusrule pedicellati. Tauris tirgmrnla linearia aruta. Corolla pana lulea, fundo orpc rubro-tojuhio. Stamina aequalia. Anihrrae rrriformr*. — ^ *mUlum* Padarro, Giom. di fi<irti. eic. di f.onf. c Drugn. dec. 2. VII. 307. — V-

Austriacum Gomoll. Fl. Comens. I. 300. — *V. rubiginotum* Re, App. fl. Pedcm. in Memorie della accad. di Torino 1827. I. 180. — *V. Alopecurus* Thuill. Fl. Paris. I. 110. (cf. supra p. 130. no. 30., differre dicitur filamenlis albo-barbalis.) — Renealm. Specim. 107. fig. p. 100. — J. Baub. Hist plant III. 873. c. ic. — Sabb. Hort. Rom. 11. I. 54.

fi. gymnostemon Roem. et Schull. Syst veget IV. 345. — Suminibus glabris.

r. Floribus albis.

8. Floribus infundibuliformibus proliferis. — Gmelin, Sibir. IV. 01. t 47.

e. Foil, infimis ovalis v. ovalo-oblongis in peliolium contraclis sed vix cordatis. — *V. nigro-lychnitis* Schiede, De planU hybrid. 40. — Crescil per lolam Europam el Sibiriam.

42. V. ORIENTALE M. Bieb. Flor. Taur. Caucas. 1. 160. HI. 154. - Koch I. c. - Rchb. Banal, fig. 30. — Rchb. I. c. 381. no. 2505. — G. Don I. c. no. 48. - Foil, crenalis, supra subglabris, sublus tenuier lomenlosis, inferiorib. ovato-oblongis in peliolium contraclis v. breviler cordalis, Iniermediis ovalis breviler peiilalis, superiorib. sessilib. subcordalis; ramis panioulalis cauleq. sublerelib.; pedicellis calyce sesqailongiorib.; Olamenlis purpureo-lanaiis. <*f* — Caulis 4-8-pedalis longisiime vlratus saepe flexuosus. Folia opaca, imprimis sublus tomenlosa, er-nae mucronaiae; flores fere *V. Lychnitidis*; capsulae ovalo-oblongae. — *V. virgatum* Hochslelt — *V. tir\$N\$* Host ,

fi. Autriaeum: Foil, crenalis, supra glabris, sublus pubescenlib., inreriorib. el caulinii obloogo-ovalis peiilalis_r soperiorib. ovalis acutls subsessilib.; racemis panleulatis; pedicellts calycem subaequanlibus. — K. *Autriaeum* Schrad. Monogr. 22. — Rchb. I. e. 381. no. 2502. — G. Don I. c. 404. no. 47. — *V. nigrum* Plenk, Icon. pi. offlcin. I. 110.

y. Chaixi: Foil, oblongo-ovatis cordalis peiilalis crenalis, sublus lenuissime lomenlosis, inferiorib. basi pinnatifidis; pedicellis calyce Kcsquilongioribus. — *V. Chaixi* Vill. Delphin. II. 401. I 13. - Rchb. I. c. no. 2MM - G. Don I. c. 404. no. 50. — *V. nigrum fi.* Berlot. Flor. Italian. II. 500. — *V. urticaefolium* Lam. Diet IV. 220. — *V. denlatum* Laptyr. Fl. Pyreo. 114. - DC. Flor. Franc. Suppl. no. 2B80a. - *V. Gallicum* Willd. Spec, plant I. 1005.

4. *Reich4nbaehianum*: Foil, omnib. crenalis, sublus rude lomentosis, inferiorib. ovalo-oblongis peiilalis, supremis ovalo-lanceolalls sessilib.; racemis laiiis paniculais; pedunculis calycem subaequanlibut. — *V. nigro - ausriacum* Rchb. I. e. 38a no. 2501. - *V. Páruitnt** Thail.T? - *V. orekidtum* HoM.Tf — (Crescit prope Vindobonam.) -> la Germania ausirali, io lulia el In Oriente.

43. V. LANATUM Schrad. Monogr. II. «. - Koch I. e. 514, — Rchb. I. c 381. no. 2503. — Foil, sublus lanalo-lomenlosis, inferiorib. medlisq. oblongis pctiolatis subsinualo-duplicalo-crenalis, superiorib. oblongo-ovalis sessilib. acute crenalis; caule superne angutalo; racemo simplicic; pedicellis calyce duplo lonifiorib.; filamenlis purpurco-lanalis. </ — Simplex sesquipcilalc el uhra. infra albo-lom<>n-losum. Folia crassiuscula mollia. Florum fasciculi subremoli 4-0-flori, Ourcs fere *V. nigri*, corolla saepe ad faucem purpureo-maculala. — *V. nigrum* 7. Bert Flor. Italian. II. 500. - K *aipimum* Turr. Fl. lul. prodr. 64. - K. *ihynoideum* Hosl, Fl. Ausriac. 1. 280. - *Vtrbatcum aipimm 8dmr\$*— *indict foliit* Btssano In Comment Bonon. IV. 201. t 2. - Crescil in Carinlhla tt la lulla.

44. V. BICOLOR Badarro, Osservailona 3. - Berlolonl, Flora lullan. II. 900. t — Rchb. Flor. excurs. 382. no. 2300. — Albo-lomenlosum, soporao lanalum: caulo nudo; foil, radicalib. peiilalis elliplieo-ovalis acolis slmplicib. baiive pinnaio-auriculatis, caulinii sessilib., Inferiorlb. obloogts, superiorib. cordato-ovaiis aruminalis; staminib. purpurascenli-barbalis. 2|.?.^T — Caulit tercs erecluk 2-4-pedalis albo-lanalus, flocco delersili, sub quo purpurascit. Folia radicalia prima simphcia, succes^ixc sacpo pinnalo-auriculala, lacinia impari manma Hhpiiro-ovala acuta, grosse inaequaliier cronala, lacinii* lalfralibus pan it di>lanibut inlegris oblusi* v. aruliusculis. Racemun terminalii, inferno inlrrrupius, tupernc densiflorui albo-lanalus, simplex \. ba>i parce ramokui. Brarirae laorcolntae

- acummalo - cuspidatae. Floras solitariae v. plerumq. 2-3-ni fasciculati brevissime pedicellati. Segmenta calycina anguste lineata acuta. Corolla exserta magis minusve lomentosa, flava, intus nilida, fundo purpureo-maculata, laciniis inaequalibus rotundatis. Filamenta omnia purpurea purpureoque-barbata, villis apice incrassatis. Capsula ovoidea obtusa lomentosa. — Crescit in Liguria.
43. V. ROTUNDIFOLIUM Tenore, Suppl. 2. prodr. fl. Neapol. 66., Flor. Napol. 02. I. 23. — G. Don I. c. 402. no. 36. — Bertoloni I. c. 600. t — Tenuiter albo-lomentosum: caule nudo; foliis subrotundis, imis petiolatis, supremis cordato-amplexicaulis; racemo inermi; bracteis cuspidato-annualibus; siliis purpureo-barbatis; capsulis ovoideis obtusis calyce longioribus. — Rami fusiformes. Caulis erectus r/r-2-pedalis apice lomentoso detorsilis purpureo-acens. Folia ex tuberculato elliptica, magnitudine ? alde variantia (1-4-5-pollicana) apice rotundata, interdum cum acuminulo, lupulina acolora, omnia nuda leviter crenulata r. subintegra, leviter lomentosa. Racemus terminalis simplex v. basi remotus interruptus, leviter tomentosus, demum fere glaber. Bracteae lanceolatae T. tunc superiores solitariae. Flores T. omnes solitariae, omnes geminatae lenitate, superiores solitariae. Pedicelli crassiusculi inaequales. Segmenta calycina lanceolata-lineata. Corolla lutea, exclusa tomentella, intus fundo purpureo-maculata, laciniis subrotundis obtusis. Stamina inaequalia, filamentis omnibus purpureo-barbatis. — *fi.* Foliis ovato-oblongis acutis. — Guss. Flor. Stool, prodr. I. 202. — Oescit in montibus «di Casellamare» prope Neapolin et in insulis Capreae, in Sicilia, in Nebrodibus.
40. V. COMPLANATUM Moris, Stirp. Sardoar. elench. II. 7. - G. Don I. r. 401. no. 27. — Bertoloni I. c. 603. | - Dense albo-tomentosum: caule nudo; foliis elliptico-oblongis obtusiusculis, reliquis sessilibus. Males (surnmif ovum-mummtis imbiUcurrntibus ex Moris I. c.); racemo lasillo simplici basi raemo; bracteis lanceolatis purpureo-barbatis; capsulis conicis calyce longioribus acutis. — Caulis erectus, superius obsolete angulatus, siliis bipedalis simplex, tub. tomento delensibili saepe purpureo-acens. Folia inferiora petiolata elliptico-oblonga v. ovato-oblonga, successive minoribus ovata sessilia, superius interdum basi subcordata amplexicaulia, omnia crassa, subintegra v. inter crenata. Flores bini leviter fasciculati, interdum omnes solitarii. Pedicelli crassiusculi calyce breviores. Segmenta calycina lanceolata-acuminata. Corolla marcescens, extus interne lomentosa, 1/3 fundo purpurea. Stamina 3 breviora, filamentis undique purpureo-barbatis, antheris rufiformibus. Stamina 2 longiora, latere interno ad medium usque tantummodo barbata, antheris oblongis adnatis. — 3* Levius lomentosum: foliis, tenuioribus, caulibus subtomentosis basi interdum radulo-nervis. — Crescit in montibus insulae Sardiniae*.
47. V. SUMO-SMILAX Poir. Encycl. méth. Suppl. III. 718 — G. Don I. c. 401. no. 44. - Foliis, inferioribus ovato-oblongis cordatis glabris, superioribus ovatis panicola ramosissima glandulosa; lobis ovatis (an semper?) pedicellatis; calyce lobis glabris. — Pianta saturata viridis. Folia demum ovata-pollicana, superioribus amplexicaulis. Panicula 1-t-pedalis, ramis pedicellatis. Floret pedicello brevior. Corolla lutea. Filamenta purpureo-barbata. — Cretra . . . ? iverosimiliter hybridate ortum.
- 4*. V. VOSSII LAURENTI Pars. Kocbird. I. 215. - Scrad. Honogr. II. 2a 1/6K 2. - (i Don I. c. no. 45. - Foliis, supra glabris, infra lomentosis, ramis ovato-oblongis acuminatis aequaliter crassis paniculatis, pedicellis calyce duplo exsertis. — (eula umplei lomentosa. Folia raulioa inferiora sessilibus. Racemus terminalis bipedalis, laterales breviores, fascioli 7-flori, siliis tripartitis. Floret lutea - Crescit circa Marmarone.
40. V. OVATUM Ščaira. ttorl. GoettiAf. tut. IL SI. L IX, f. 21. - G. Don I. c. 401 no. 45 — Foliis, ovalibus raris, supra glabris, subius tomentosissimis inferioribus obtusis pedicellis. superioribus acutis sessilibus racemis paucifloris; calyce duplo longioribus; siliis aequo longioribus, obovatis barbatis. — *fi.*

Caulis plerumque a basi ramulorum, stellatim pilosus, indequommodo tomentosus. Folia radicalia et caulina inferiora 3-4-pollicaria. Racemi inferiores spithamei, basi foliosi, superiores breviores. — Oescil in Hispania.

50. V. DENTIFOLIUM Delile, Annalea dea ac. nator. VII. 287. — Undique tomentosum: caule 3-5-pedalibus, faperae paucifloro; ramis floralibus virgatis erectis; Una staminibus pallide violacea; foliis, caulibus late lanceolatis acutis, basi cordato-amplexicaulis, dissile dentalibus, radicalibus longe petiolatis obovatis obtusis nubsulcatis, saepe repandis, subsperato-pannosis. — Creasil ad portum Jatanalem.

51. V. HAENSELERI Boiss. Voyage bot. dans le midi de l'Esp. no. 1218. - Folium inferioribus petiolatis ovato-oblongis, caulibus sessilibus ovalibus, apice attenuato-cuspidatis, omnibus nervis dense pannoso-tomentosis; caule simplici erecto floccoso-tomentoso; floribus in axillis sessilibus per fasciculos 3-5-floros in paniculam laeviusculam, basi interruptam dispositis; calycis dense floccoso-lanati laciniis angustis linearibus acicillimis; Blumenbus omnibus purpureo-lanatis; antheris aequalibus. ^ - ID Hispania australi crescit

58. T. NEVADENSE Boiss. I. c. no. 1219. - Foliis ovalibus acutis, basi alienatis longe petiolatis, obsolete crenatis, nervis, iomenio brevissimum Yriseo detorsibile obditi*, floralibus minimis bracteiformibus lanceolato-linearibus; caule ramosissimo; racemis longissimis laevifloris; Bracteis in fasciculos 4-5-floras dispositis; pedicello etlycem subaequantibus; laciniis calycis lanceolatis flumen Ua Irribus brevioribus pinnatis barbata, dnoaa longioribus tabadla; talberis aequalibus. % — Creasil in Hispania Sierra de Nevada.

r. *Lana/Uawuttiorum flavescens.*

53. V. HYOSERIFOLIUM Schrad. Monogr. II. 31. t. 3. fig. 1. - G. Don I. c. 4tt. no. 55. — Foliis, tomentosum, inferioribus linearibus lanceolatis, basi acicillatis, superioribus oblongis acute crenatis sessilibus, supremis late ovatis auriculato-cordatis; racemis paniculatis; pedicellis calyce duplo longioribus. </? — Caulis erectus simpliciter tomentosus. Folia infra viridi-canescunt, radicalia et caulina inferiora apitbamae subsinuala, caulina superiora semiamplexicaulia. Racemi apitbamae pedalea, fasciculi 4-7-flori, inferioribus remotis. Corolla modicis Bava. Filamentum omnia lana Data barbaia. Antherae aequales. — Creasil in Asia minor.

^ . *Fommi&iommikus glmhris.*

54. V. CHRYSBRIUM Sebrad. I. e. 0. - O. DOB I. a. 4W. so. 33. - Pollinis, lalfferimis tomentosum, inferioribus obovato-lanceolatis, acicillatis, supremis ovatis auriculato-cordatis; racemis paniculatis floralibus fatcluu; podicolla calyceem aquantibus; antheris aequalibus. r/ — Lutescentia-lomraiosam. Caulis simplex v. apice subdilatatus. Folia crassa, radicalia et inferiora caulina 4-5-pollicaria. Racemi circiter pitbamae. Corolla lutea? Filamentum Rtabra. — Creasil in Palaestina.

f t Corolla rubescenti - ferruginca.

55. V. CANDEUBRIM Karel. el Kliril. Ballet de Mosc. IStt. II. 117. - Caule loricato ramoso polystachyo ramisque aplyllia adacendeoibus iomonloaia; foliis inferioribus petiolatis oblongo-obovatis, basi alletraaia pubescentibus, nervis lomaiosis, superioribus linearibus Manotolais saaslib. tomentosis; pedicellis UbiaU, rarius larais floralibus roela. q. - Creasil ad loraalaa Cldpbar el Tbabrak-Oaad.

50. V. RUBIGINOSUM WaldsL el Kil. PUat rar. Boogar. II. SIO. L. 107. - Koch, Synop. fl. Germ, ci HelteU (ad. 1.) 614. - Lebb. Pl. Germ, eicars. 370. no. iVU; — G. Don I. c. 40). no. 54. — Foliis, crassis, subulosis pubescentibus, inferioribus oblongis obtusis petiolatis, raulinis oblongo-ovatis acicillatis »ek%ib_M »uprioribus ovatis acicillatis subcordatis »fmiamplniraulibus; racemis paniculatis; prdirrllit ralyce multoties longioribus; hlamenn* purpurfo-lanatis; corollam ftrruRinnq. / — Floret nius rubro-ferruginis, in(u) nio-ffrugio^i » *T%H% tubum ulaceo-maculati. Florum fasciculi 3-5 - v. raut tt-flori, nupernr tarptus biflori. PubaMoatia 8-3-furcala. - F*. *Ptemdo - BUHti** Srbkirh. Plant, rtt. - V. Malta-

rioides 0. Gaud. Fl. Helvel II. 127. — *V. virgatum* Schleich. Eis. — Creicit in ticimtate Monacpii, in Hnngaria, Croatia, In Podolia et in Caucaso.

§. 2. *Floribus solitariis vel geminatis.*

57. V. WIEDEMANMANU* Fisch. et Mey. Linnaea XII. Literb. 1711. - Lanuginoso-flnbtomenlosum, apice glandulosum: caule subsiraplici folioso; foil, crenatis, radicalib. sabelliplicis, in petiolom attenaatis, caulmis soperionb. sessilib. oblongis, summis ovalo-oblongis; racemo lerminali elongato; pedicellis solilarus bractea lanceolata calyceq. bre?iorib.; lacinnis calycinis oblongis obtusiusculis corolla mulio brevionbus; filamentis aotberiaqie dispanbus. <f — Crescit in Natolia.
58. V. CELSIAE Doiaa. Voyage bot. dant le nidi de l*Bsp. no. 1221. — Superne valde glandnosum: caole aimpliei folioio pubcrulo tereli; foil, otnnq. puberulus T. glabrecentib., ioferiorib. longe peiolalla obloogis, baai alienuatit acute crenatis, caulmis sessilib., basi subauriculalo-cordatis, parte superiori attenuate-cnspidatis; flonb. solilariis, haxi tribracteolatis pedicello caljce tnplo breviori suffoltis, in spicam longam lausculam disposilis; filamenli* tribus bretionb., apico incrassalk, mque ad anlberas porpurco-barbatis, 2 longionb. arcoatis ad median partero solum penicillaiu; capanla rotnoda mocronata. — In nispania meridional!.
50. > PIIOEMCEUM Linn. Spec. plant 254. — Koch, Synopt. 0. Germ, et Helvel. (ed. 1.) 515. — Rebb. Fl. Germ, ezcirt. 379. no. 2561 — G. Don I. c. 490. no. 09. — Lam. Illostr. geo. L 117. — Girtn. De fruciib. et seminib. I. 202. L 55. — Jcq. Flor Auitnac. I. U 125. - BoL Magaz. t. 885. - Bol. Cabin. I. 037. — Bertol. Fl. Kalian. II. 587. f — Foil, subtnfl pabescenlib., radicalib. pctiolatis OTaiis oblongiste crenatit, caolinit medita et toperiorib. molto mioonb. minute crenalis sessilib.; racemo glandaloao-piloao; pedicellis snlitarnt bractea mulio longionb.; antberit omnlb. aequalib. non deeurrtlibo. J — Florea tpeciotti intente phoenicel (violacei), tmbi laresoente. Filamenta bint longiora porporeo-lanaia, mlnorum Una copioalor, Inferne coneolor, soperne ei albido tordide purpurascnt. — Eliam Tarietai albiflora indlcatar. — Planta pedahi gracilis. — V *Cisaiptnum* Biroli in Giorn. di fis. elc. di Conf. e Brogn. dec 2. IV. 2fti t 3. — V. or/arum f.aesalp. De plant Lib. VIII. Cap. 40. p. 347. — *Blattana pur»mre** C. Bauh. Pioax 241 — Moris. Oion. Hist. pi. II. Sect 5. 10. fig. 1. — J. rfauh. Uim. pi III. 875. c ic. — Tabern. Krlaterb. 980. c. ic — Lob. Iron. I. t 575 - Crrtrit in Sibma et in CaucaSo aeque ac in Europa oriental!-auitrali in Cannthia, Austria, Silenia, Bohemia, in Tbunngia, Saionia ad Parthcnopolin mque .
60. \. BLATTARIA Linn. I. f - Korb I. c. - Rebb I. c. .V0. no. 25M. - G. Don I. c. no 71 - Jeaumc St. Ilil. Pl. Franc, t. 409. Sin. Engl. boL U 301 - Sabb lion Roman II. t. 50. - Bertoloni, Flor. Italian. II 580. t - Caule nodo; roll, glabris, infrnorib. obovato-obtongis, basi atteouaUt sinaalia, cauliolt oblongis acuilis cfoaiis sestilib., toperiorib. aobcoHatia acvmlaeUs •mlmplfsicanlib.; racemo a>aedoloso «plloao; pedlotUla tolltavflt bractea sesqvi v duplo longioribu*. / — Floret flatl, bast InUM tiolaeoo-barbati. Filamenta violacro-barbau. > .irut raro floribns albis. PlanU 2-3-pedaiis. — Y. kHtropk^tmm Mill Icon. L G7 - *Blattana* Mallh. >d. Valgr. anno 158.) II. I2ia r. Ic - *verbascmm monmm* Tar«alp dr planlif Lib. VI. cap. 46. p. 347 — *Biaitaria tutta foUo Umgo tartmiaio* Mich, m Till fat hort. Pit. 34 - *BlaUaria alba* Scgu Fl teron I MI - *BUI-tana Ptmit* I oh Icon 561. - Moris. Oion. Hist pi II Sect. 5 t 10 Og 0. - Bauh pi III 474. <e ic i - *Verbasntm gtahrmm* Mill Iron I 07 Barrel. Icon. U Ii19. - V. *Hailkm* Hort — C>f«rtt in Kuropa media r\ autrali. in Tauria, Caucasia, In Palartiina el in Amrnra borrali
01. V. ANGISTIFOI. Il M Tfoorr. Prodr Suppl. 0. Krap II 64 Rorm n Sfbult Sy.l. tefft IV. 344, - G. Don I. C 495. no 57 - Bwtoloni, Flor. Iuliao II. *>* t Tenuiltfr albe-iomenl^tam caole aodo rraeto tMbpodah : roll laoccolaUf ' rrrnahs. «upra nodlv»rali«. imit peliolatl obloiU. rHiqui« «r««ilib ~~supremiaq.~~ ampktiraulib. acominalu, rarrroo drnttfloro. flonb «ub%ollianu. ~~filamentis~~ albo-hirhiit. rjptaltt acoti*. rahri aequalibu» / Muht ft tereU ~~obscuro~~

angulatus tenuiter tonienlosus. Folia rugosa, supra plerumquo nndiutcula lae-
teque viridia, sublus magls tomentosa, radicalia el ima caulina breviter peliolala
oblusa, caulina reliqua nesiUa breviora acuta v. acutlnala. Racemus terminalis
longiasculas simples densiflorus. Braetae ovalo-lanceolatae acuminalae, eilus
lomentosae. Flores subsolitarii. Calycis aegmenu ovala acula. Corolla saturate
lutea inaequalis, calyce Iriplu major, ezlus interne lomeniosa. Stamina inae-
qualia, Olamenlis albo-barbalis. Gapsula ofoidea acuu, calycis longiladine. —
V. CalabHeum Thorn, el Rich. Eis. pi. — Grescit in pralis Galabriae el in are-
nosis maritimis di Gioia.

02. V. SIMPLEX Labill. Plant, rar. Syriac. decad. IV. 10. t. 5. - Roem. ei Schnlt.
Syst. vegeub. IV. 350. - Schrad. Monogr. II. 32. t - G. Don I. c. no. 58. - Foil,
crenatis tomentosis, inferiorib. obovato -spalhulalis in petiolum altenuatis, sum-
mis ova Us sessilib.; racemo subspicato; florib. geminis solitariisquc. 2|. — Caulen
plures semipedales erecti v. basi declinati simplices tereles tomentosi e radire
crassa lignosa. Folia crassiuscula, radicalia ei caulina inferiors 2-8'i uncias
longa, snperlora majora acnlora. Racemus snbspicatus simplei erect us. Floren
inferiores el superiores solllarli, reliqui gemiai, rarissime teroi. Pedicelli calyce
breviores crassiusculi. Bracleae late otuae acoUe. Corolla V. *Blaitariae* at
minor. Stamina omnia lanata, antheris renformibus. Capanla globoso - otata
obtusissima. — Crescit in arenosis prope Damascus,

03. V. MAJALB DC. Fl. Franc Snpl. no. 9073. — Schrad. I. e. 33. f - G. Don I.
0. no. 50. — Foil. erenaUs tomentosis, Inferlorib. ovalo-obloafcis otUsq. petio-
talis, summs oblongo - otalls sobeordatis sesslib.; raemo sobepteato; florib.
geminis solitariisque; antheris aequalibus. <f — Tola plania dense floeoso-to-
mentosa. Caulis pedalis v. sesquipedalis simplicissimus leretiusrulus, dtjecto
tomrnto purpurascens nitidus. Folia radicalia ct inferiora caulina peliolala (abs-
que peliolo 2-2'A uncias longa) crassiuscula, superiora sensim minors, suprema
semiampliicaulia cordata acuta. Racemus subspicatus simplei solilarius. Flo-
res inferiores v. omnes (et turn conferti) solitarii remotiores, rellquis grminis
densioribus. Pedicelli brevissimi. Bracleae ofalo-tanceolatae. Laciniaa calycinao
lineari-lanceolatae. Corolla magoitudine *BI*Uaria*§. FilamenU 3 minora ei tolo
purpureo-lanata, 8 majora medlo tantum pilosa. Antherae reoiformes. Capsula
•ubgloboso-ovala obtusissima.

fi. loy\$braeieaium Schrad. I. c 31 — Digooscitor DOB solom bractels, prae-
sertim inferloribus, calyee duplo loaglorlb., s«d etiam rellquarasi panlvm
habito robustlori, soperficle mlnia IOBMIOM folUaqM erldenUoj ere*alls,
quae omnla luxurlantem Indicant ataUusi. — Cresdt In Pyrenaels, ad Hon-
spleium, Nicaeam aliisque locls Eoropae ocedenlaU-australis.

04. V. BLGLUEFOLHM Lam. Encyrl. méth. IV. 820. (excl. syn. Linn.) - Schrad.
I. c. 35. { - G. Don I. c. — G. Dum I. c. no. 00. — Foil, inferiorib. late oviti<
crenatis glabris petiolatt*, caulinis superlorib. lanceolalis acutin incito->rrraUs
subpilosis; racemo subspicato; florib. soliUriis; antheris aequalibus. <{ — Pedale
erectum simplicissimum subvillosum. Folia radicalia l'/i-i-oocia|ia oblusa gla-
bra, superiors sessilia sensim minora. Flores subapiealo - racemosl soliurii.
Braetea ad alngulos flores solluria lanceolata calyct losglor plkaa. Calyds la-
ciniae valde inaequales lanceolatae. Corolla dilute flridla flavescens, rasclis 2
purpureis nolata. Filamenta 3 breviora ei tolo purpureo - lanata, 8 majora non-
nisi medio pilosa. - *Biaimria orimimta BuguUu folio, /tort maximo rirfscemie,
ligaturis luteit in tetmicireukm tlrimto* Tournef. SUner. II. 83. C. ic. — Ruib.
Ceniur. V. 17. I. 32. — Crescit circa Bosporum.

&V V. COMPACTI M M. Bieberst. Flnr. Tauric. Caucas. no. 300. Suppl. p. IM. (e&r|
>yn. Tillj — Sshrnd. I. c. V>. (i. Don I. r. no. 01. — Foil, ovati* grosse crfoa-
tis, subtus tomrntofu, infrriorih. in petiolum aUrnuatii, raulims petiolatis, son-
mis sobcordatis »e»»ilib.; Rpiri* rompactis; florib. nolitams; anthciis doaboa ob-
loogls. r/ — Pedale, timplei t. uno alterote ramu ad apicem accedeoie. Folia

- grosse crenata, lupra demmn glabriucula, sublos reiiculato-Yenosa, Inferiora 2-3-udCialia oblota, superiors seosim minora, somma aessilia semiampleicanlia acula. Spica setripedalis densa, bati taioimmodo interropta. Braetea eiterior ovalo-lanceolata aeuta, ioleriore 2 paullo minores ftneari - lanceolatae. Calyces eam bracteis densius caneacenti-tomenloai. Corollae *Phlomoide* miores concoloret. Filameou croeea inaequalia, 3 breriora tola dilate aurantiaco-lanaia, 2 majora nonniai latere interior! piloaa. Anlberae atamiDam minoram reoiformes. Capaola late ovata. — Creicil in Tanria, In Caacaia el In Iberia.
00. V. OVALIFOLIUM Donn, Hort CanUbr. (ed. 4.) - Sims. Bot Magaz. t. 1007. - G. Don I. c. no. 08. — Caoiib. almplicib.; foil. ovalib. aeaallib. denialo-crenalia, »ublut tomentoala, aopr gUbriaealls; fplcta longia alnpllcib.; florib. solitarii(?) 2} — Babiio haod dlttimlle *CM—CrHUae*. Singall floret tribracteati, braealea media orbicular! aeamlaata, laterallb. partlt. Corolla magna auraniaco - lulea. Filameoia folva, 3 minora barbala, 2 nnda. Capsala globota. Folia magna. — Forte idem ae *V. compactum?* — Cretcit in Cancaso.
07. V. FORMOSUM Fiach. Cat. plant hort. Gorensk. (1812) 2ft. - Schrad. I. a. - Schrank, Hort. Monac. t. 22. — BoL RegisL t. 558. — G. Don I. c. 400. no. 83. — Foil, subloi lomenloaia, inferiorib. etlipiico-ovatis aobtripicalo-crenalia eaullnisq. peiolalii, aammii ovalia cordalif aianplicter crenatia; apleia elongatia; florib. toliUriis; anlberif aUminam loogioram oblongia. *J — V. cowpmHo* ?alda affiof, aed lomenlo deniiori eaneaail, tpicae minoi denaae et plerooque aaajorea, corollae najorei, faodo Mlarale porpuroo, flloaenU purporeo-barbau, folia io-aeqoaliler daplicato- T. triplicato-crenaU. — In Tauria, Caucaia et in Iberia.
08. V. BBTORICAEFOUCM Daf. Corroll. ad Toornef. 33. t. 23., Mém. de Mui. XI. M. c. ic — %—m. ei Sekalt Sjat tegeC IV. SI. — G. Don I. c. no. 54. — Foil. etOMlla Tilloaia, infariorlk etvllalaq. obloafia eordatia peUolatlt, anmmia oblonfo-lanetolatla atatlllb.; raeania apleato; florib. aeaallib.; antberia doaboa obloBgia. <? — Ttnoanm ertdoai 1-2-pe4ale aimplei. Folia saturate viridia, inreriora 2-3-unciaJia, aamma mnltto minora enonlala. Baremai ipicatat 2-3-nncialia. Braetea laaceolala, ealyce loagior. Laeinae calycinae lanceolaue acoetae. Corolla *BlaUsrim* minor flat a. Filamenta minora tanaia, majora dcllinata glabra. Capsola aabrotanda. — *Tirt—tmn ori**d*U Belomat folio*, /tort SJU-xiato Tonrnef. InatitnL rei herb. & — Cretcit in Armenia.
09. V. PTOICEI'M Schrad. Hort Goetling. fate. 1 20. I. 14., Monogr. II. 38 | - G. Don I. c. no. 05. — Foil, doplicato-creaatit pobrtrentib., radicalib. caoliniaq. infetiorib. ovatis cordatis petiolalia, tomnis oblongo-otaiis aetiilib.; raeemii etoagatia; pedicelli* tnbgeminit, braetea doplo loagioribot. > — Caolea ei eadem radice plarea ramoti erocti aagalatl pabeaetBtoa. Kami treeia-pateaait. Folia nsgoaa, Imprimia eabtaa paæaeaaUa, radiealia at eaallaa toftrtor* 4-6 naciaa loaga, 2%-4 aalaa lata ablaaa, teal oatlan, lobo tllero taepe prodaetfori et l a * abllqaa, aaparlita aHaata âteî'laaqaa potiolata, aamma settilia temiampleiicaolia obloago-otau aeaU v. aeaaiimaia. Bacemos letiier fletaotu» *trictot termioalit, pedalia *. allra, ramealea mnllto birtiom. Floret remoti laadori, eteepiit tapremiit geminati. Pedieelli gracile* aemionrialet v. breviom deato pobetceatef. Braetea* aolilariae pedleolla daplo bretiom o?ato-tanrrrolaia*t iaferioret tobterraue, reliqaae teiaferHmaa. Calyci* lanaiae lanreolaiaar aeaua. Carolla tordide pomcea. FitameaU parpareo-lanau. Antbira** milfonn**. Cap-tala ralyce vii major ablaaga t. rariat oblongo-ovata. Pubr»renita »Implet.
- 0- FaU. lalefioribaa aabtrtphfato-cTtnalit, tupenonbot apire reconi*. »omaii0 tftaft rataajaalla aoe eoNaua. - Cmeti in Karopa aattrah.
- ia V. SMCTABILB M. li«Wr»t Flor. Tevrte. Caurat. iappl. ISIL - G. Don I. •• •o. «• - floatad. Haajaf. II. 30L f - fell, tloago - avatia eardatit daplicato* eroaatia, Mara aas%Maia, aabtaa tillaaa-umeatotlt. iafenonb. H raallaia f~ UalaUt, aaportarti). •aaailib. aemlample^raalib.; raremo lrrmiaali elagaata; f~ dte • gemiaaUi aaHtarioej. bratuam tobaeqaatibaa. ^? - UmpWi t. •• •i

subramosum. Caulis excepto racemo terminali 1-2-pedalis, tix alior, lereiosco-
I us, villig ramosis laxe lomentosus. Folia supra viridia, tublui pallidiora, radi-
calia el caulina inferior* longissime peiolau 2Vt-3', uncias longa, lobis baseo*
approximalii abbreriaiif, caulioa media brevius peliolaia profuade cordaia ob-
lusiuscula, summa ovata acumioala limpUciier creiiiau. Racemus leninalit
caolis fere loogitudine. Flores remoitoscnli, inferior** geminali, soperiores so-
lilarii. Bractee lanceolalae acuminalae, pedicello fructifero fix loaglores. La-
ciniae calycinae lanceolalae. Corolla speciosa lulea, fundo parporeo-maculata.
Staminum siructura fere *V. phoenicea*. Capsula calycem aabaegatna globoso-
ovata — Creccit in montanis Tauriae meridionalis.

71. *V. TRISTE* Smilh, Prodr. fl. Graec. I. 151. — Roem. el Schull. 6yst veget IV.
350. — Schrad. I. c. 40. t - G. Don I. c. no. 67. — Foil, pubescenitb., infrriorib.
elliplico-ovatis cordalis subsinuaiis, inaequaliter crenalit peliolalis, cauliiii* su-
periorib. sessilib.; raccoio elongalo; pedicellii tolilarii patenlisfeimis, brariae
moKo longioribus. 2† — Species a I, *phoemieeo* di versa; ambigere videtur iolfr
F. photniceum el *V. puniceum*, buic direccioe el longiitudine pedicellorum, illi
ciroomiprlpUoDe (non f ero margioe) foliorom proxima afflniate Joncia. Floram
magnilodine el colore ab ulraque el • tobaeqoenilbot divertlaaima. Racemoi
qooque ad qaadripedalem fere loogilodinen^ extndllor, qood neotrl illornm con-
tenlu — *V. ferrifineum* Andrwa. Bol. Repotiu 1101 — Creael in monte Aihon.
78. *V. FERRIGINEUM* Mill. Diet no. 10. - Ait Hort Kew. I. 87. - G. Don I. c.
no. 08. — Foil, villoaulia ragoala, eaollnlf aobaeaallb. aequalitor ercsalii, radiea-
lib. obtoagia eordalla d<pl>calo*arenatla; raemli tplcaia; pedicellit gemlolt ao-
litariaaque, Imit lernia qoaternlaque aggregalit ftacleolailf. % — Folia radiealla
longe peiolala subinlegra, supra iolente vlrdia, infra pallidiora, caulina acula.
Flores ferruginei. — Trew, Ebret 3. 1.10. fig. 1. — Crescil in Kuropa meridionalf.
- 7a *V. SACCATIM* C. Koch, Linnaea XVII. «3. - Caule piucifolio moll.; foil, su-
pra pilis brevissimis, sublus pube molli oblaclis, Ooralib. subulalis; Qorib. nn-
gulia set si lib.; braceis ovaln-acuminaUs, calycis segmenla aequaniib. duabns
Insiroclis; corolla exlus villou, Into brevl, limbo urceolato ex basi aacalo, la-
einiis subconcavis; ataminib. porpureo-lanalia aequalib.; germlnt albo-laougi-
noso. q.1 — Medium inter *F. ferrufimtum* et *F. tomntonm* Flseh., sed buic
apeclei aumlna Inaeqoalia, illi oonlra Oorta pediceltali ei corolla ampllor, sed ui
In nosira specie ferrogina, oec flava. — Creseil In Armeria irana Anno alia.
74. *V. MOLLE* C Eoch 1. c. 9M. - Albo-lomenlosam: caule simplid ere«U polj-
pbyllo; roll, radicalib. peUoUla dopltolUr •ftmatla, eaolinlt ses^lib., sc^rwait
dcouiiis, omnib. oblongit; folt Ooralib. laac—UU * soboUUs; lortb. aaaailib.;
braceis lanceolalis; calycis segmenlis ovalo-obloagis aagvsiiiorib.; eorolla exios
villoia, limbo urceolalo; flameoiiis omalb. porporao-lanaiis; germine albo-laoo-
ginoso. ^ - AfDne praecedonii, habilo Umen *F. BUUtriae*. — Cmeil in Arme-
ria occidentalali.
71. *V. CLPRELM* Cunis, Bol. Magai. L 1995. - Rcbb. Flor. exolic I. lil. - (. Don
I. c no. 70. — Foil, cordailf rugosis cranalia, infra lanillai pedicellit soliiurii*
nnibraclealia. <f - Corolla ferroginaa. FilamaaU 3 bretlATi, pilis purpurascea-
Ubuu longit glaaduliferia obsiu, S loogiora na4a', aatbataa raniformes geraaUa.
Anibarae aiameoiorum bravlorom subrolun4*« ptfatan, — PIMU bybrida txisU-
malor e *F. pkonUeto* at *F. ovUfM* oria. - CmaH....T
70. *V. GRANDIPLORUM* Sebrad. Hort GaattJaf. fate % Mil. 13. - Rotm. at Schult
6yil. veget IV. 347. - Schrad. Moaogr. 1L 47. t - G. Dan I. a. 417. no. 75. -
Foil, grosse crenaUs, subloa pobaeanthb^ Infariorib. alliplico-obloagis in pniou-
lum allenualis, caulinis obloogia aculis seaailb., toperiorib. lale ovaais rordaiis
•cuminalis aroplexicaulib.; rarrmit spicalis eloogaUs; pedicellis sohuriit, braceis
brevionb. cal)cibq. pube»crniibu». J — Caulrs ei eadem radice plurrt i*4*pe-
dales siricll angulali pubesrenies, superne ramosi. Folia »upra glabra niuda,
radicalia el ima caulioa in peiololum allrouala, tpmrna minus crenaia. Ractail
apical! 1-2-pfdaks virfaii. Flores solliarn inodori lutei. Bracieae ad lores aia-

golos terhae pedicello longiures. Laciniao calycinae lanccolalae acalae. Filamenta 3 brcvjora barbala, antheris renirormibus, reliqua najora latere ioierno pilosa, antheris obloogjs. Pubescenlia. simplei. — Crescil.....?

77. V. PYRAMIDATL'M M. BiebersL FI. Taur. Caucas. I. 1(31. Suppl. 155. - Schrad. Monogr. II. 48. t — Rchb. Flor. excam. 380. no. 2589. — G. Don I c. no. 76. — Sweet, Brit. flow. gard. I. t. 31. t — Foil, saptus pubescenlib., iaferiorib. ovali-oblongis dopicato-crenata petiolalis, caulinia oblongo-ovatis cordatis aculis subsessihb., saperiorib. late oratis aeominatis seisilib.; racemi* paniculali*; pedicellis snbsolilariis bractea brevioribua. 3) — Caolis (pi. sponlan.) 2-3-pedali* erectus craiaus angulalas pubescent, toperne ramotn*. Folia rugolosa, supra demon glabruscula, radicalia tpllhamaea t. pedalia peiolata, caalina inferiora basi minof auenaata acollnscnla, aomma longe acuminate, acumine integerrimo. Racemi namerosi ad modum *f. migri* etc panicnlati. Floret remoti toaveolentes, inferiores nonnmquam geminall. Bractea aolilariae late otatae longe aeuminate. Calycit laciniae acutae, doabna longioribus. Corolla magnitudine et colore illius *V. Tkaptus*. Filamenta purpureo-lanala. Anlberac aequales. Capsulae calyce majores ovalae pubescentet. — *V. Caucasian** Hortor. — Crescil in Caacaa, in Iberia el quasi tponte in Banatu.

78. V. SPLNOSL'M Linn. Amoenil. acad. IV. 307. — Roem. el Schnll. I. c. 351. — Sibthrp. et Sm. Flor. Graec. t 920, — Scbrad. I. c. 40. f — G. Don I. c. no. 77. — Caole frutetcente tpinoto. 5 — Habita a congeneribut omoibut alieoum ett. Caulis circiter pedalit erectut ramoiiatimai fnticosut leres, cortice tcabro teftos. Raroi palrntes lerelea leviier lomenloti, per aetalcm calvrsrntfs ramulis patentim ditergcotibut fleioosia apbjllit apinetceniib., ut folia pedtinculi et calyces lomento dentiori eano vettitit. Folia ancialia paienii-recanra llneari-lanceolau In petioloni attenaaU oblaaa, atagla a^nnave tinnau earinau, toperne sentim mloora angvallora aetailla aesUoaeala aablnlegerrlma. Follomm fateleoll (nidimenta raninloraaa) la ailllia aapeiiorlbot, fbjllit doplo ninoribas lanceolato-cunealis obtosis integenimit. Peduncoli In ramolorom fxiremilaiibus <par«i 4-6-lintraret patenti-divergenlef spinetcentet, bractea etigna stipaii. Florr< pani. Laciniae ralycinae oblongae acotae. Corolla flava, exlu« leviicr lomentota. Filamenta albido-lanata. Anlherae renifonnea, pollinr aorantiaro. Captula ralycc major otata murrionala tubtomtnloM, teriat glabra. — *Verbaicum**(*rctntm tpinosum ftuUtm** Tournef. Cor. K — *Blaltaria Creleia tpinioia, fnliit l.rumji imramit* Moris, Oion. IlisL pi. II. seel. 5. t 10. Og. 8. - *lnteojum wpimotmm erunalmm* Alp. Etot. 37. t. 36 — PVrtWtim *tpinioium Crelirum* Lob. Illaslr. III — *Leueojmm tpinosum Crtticnm* Clui. Hist 90. c. ic. — Crescil in iosula Crela.

§. 3. *Floribus glomtratiM.*

n. V. UGUtl'S Fiach. ei' atty* Lhwata UIL Ltarb. W. - Cltmo-lomenioftm et Un«a»a« lonaiiaaimalogaoaa *immomm* «adlq»« leetom: caole «impleis»imo tplea tloanllel, baa4 nUampia lemtaatoi foil, ertavlatls arutis, iofertonb. elliplicis peiolalit, medlls ovalo-tllllpileif, timmis testilib. ovalo - »obcordaii« ros-pidato; flonb. tobgeminit trssihb.; calyru 5-partili lacinht lanceolalit arulu; mrollar manmae' lobls obovato - sabrotondit oodoUIU; Mamioib. ditparib., omnib. lanatis; captula ovata calyce pa rum longlore. V /? — Habitat prop* Bfantiom.

70 V. SYftIAU*at Hrbrad. Verb. ojaogr. II. «! l-1 fig I . C, Don I. c. 401 ...
^ . ~. Foil. is)tegerrimit lanato - tomentotu, tnfertomb. nji..«jtu-ijnrral«u«. »«-periohb. Unceolatu; %pira *mpliei. ^ — Tola planta drnr ionrnio«o - lanaia. <^4ll*a * tadvm radice 2-3-plur*t VI »#aiip<>dalr« a%crocd«oiet »inpliree tere-
liatevM. F*IU craat4««e«la n^Uia, iim u rvtiruUto-woo»a, radirada .1- 3% onriat le«ga •d4«sa la pMolsai atlea)MU, eavliaa a^dka attaora. ba«l minus ait'ouala, samaia MMIll« acuti«*fola. Gloaierall *piran S-7-0on. *oprrnr r«b- fertiorrt lor*«qa* p««ci«fr« gerentr*.' FlorM mediorret flan. Braciae ealierief lati* o«ata arm*, laiertorw dnplo Miaore* o%atae. Lacliaie calyciaat oblongo

- acuiæ filamenta omnia lanata, antherae aequales capsula subrotunda-obovata
obtusata — (rescil loci* senilibus Synac.
81. \ LNDLLATUM Lam. Encycl. meth IV 221 Room cl Schull I c J3H.-
Schrad 1 c 0 t — G. Don I. c. no 20. — Foliis, utrinque dense lomentosis, mfe-
nonb lyrato-sinualis undulatis, caulis subsinualis, superioribus oblongo-ovatis
sessilib.; spicis solitariis. 2l — taules 1-TA-pedales simplices >. tmbamosi
tomenlo&i. Folia crassa dilute ochracea, radice 3-4-uncialis perfoliata, caulina
oblongo-lanceolata aculeuscula sinuato-undulata, superiora sessilia semiimplexi-
caulia acuminata. Spica pedali*, glomeruli remoti J-4-flori Floren subterre-
flaw. Filamenta omnia lanata Capsula calyce nudo ovata — \.phcalum Sm
Prodr n tiraec. no 524 — Sibthorp et Sm. Horace t 220 — <. Don I c
no 32 — 1 *sinuatum* ,?. Linn Spot pi. 233 — *verbascum diarcum fruticosum*,
folio sinuato cantalutino Tournefort Itin I. 123 c. ic. — (rescil in Onente, m
instula Hjdra el copiose prope Albanas.
82. V. CERATOPHALLUM Schrad Monogr. \crb II 7 j t 1 fitf J - G Don I
C no. 30. — Foliis utrinque lomentosis, inferioribus Bubbinnaifidi*, nummis mic-
gru, spicis paniculatis; bracteis exterioribus iotegemmi*. c/ — Caulis setquepe-
dallit erectus rigidus, superne ramotus lenticulatus lomentosus. Rami pauciflori.
Folia ovata mollia, subtus reticulata-venosa tomentosa, radicalia abtque po-
tiali spiliatana, circumscriptione linearilanceolata profunde pinnatifida, laciniis
linear-oblongis obtusis, inaequaliter obtuseque pinnatifidis, laciniis MI-
penonibus confluentibus. Folia caulina lobulata minui divisa, summa testata
aemplexicaulia oblongo-ovata fere aequaliter aequata. Spicae pauciflorae pedicel-
atae ultra, glomeruliferae valde remotis 3-4-floris. Bractea eilicnora* laevigatae,
interiores lanceolatae Lacinae calycis linearilanceolatae aculeo denso tomen-
tosae (ovata flava \nlhrac aequales, polline aurantia. Filamenta omnia
floriferi-birbalia — Crescit in Onente
83. ^1M»ATRIUM \abl S>mb bo I. II. 30. -M Biebersi Fl Taur i auras |
401 — Sibthorp et Sm Fl Graec. l. 228. — Schrad I. c 8 | - <. Don I c no.
31. — Foliis subultrioribus, inferioribus bipinnatifidis, »unim pinnatifidis, Npi-
cm paniculatis, bracteis exterioribus kerralif. <f — Caulis pedalis v. te>quipedat
erectus rigidus lencis, superne subangulatus canaliculatus, »rii» c<hr*rrn-
Rami pauciflori dncrgeno* Oculi Folia Juniora »aepe tenuissime iotucnta
deinde glabra, subultra cum petiolo dente lomentosa, radicalia abtquo primis
3-4-uncialis v. ultra, circumscriptione ovalilanceolata inirrupie ti profunde
pinnatifida, laciniis majonibus profunde ioequaliterque pinnatifidis, laciniis lie-
rum pinnatifidis-oblatis. Laevigatae superiores confluent. Folia minora raulia
pinnatifida Spirae terminalia ipithameae, glomeruliferae 2-3-4-floris Flores ne-
silicis Uradfao oblongo-ovatis <crca(ac acuminatae. Calycis lacinae linearilanceolatae
aristatae lomenlo latiori obsilac Corolla 0a\ a inodora Filamenta
aurantiaca lana albida barbata, duobus niinonibus apice nudis \mhorae rnti-
formes, polline minialo Capiula rald< lonRiludino lah* o\iii <iiiu-j I
6i/>inn<ifi\rfifim Sims, Bol. Magai. t. 1777. — I *tnuatum* Uabl. Taur. 150. - In
arenosii maritimae Tauriae crecitur

4» t *Spezia non satis nota**.

84. V. GLABRATIUM Friv. Flora XIX. 440. — Caule ramotissimo pubescente tiel-
laia hispido, foliis oblongo-lanceolatis laevigatis creatis, aubla pallidioribus,
>illo densiore ramotissimo obalibus; pedunculatis, calycibus capulitatis. glaberrimis *4
Cremit in Rumelia.
85. \ IIOKKI Fn\ I r Caule ramoso lomentoso villosus, foliis inferioribus | r-
IIO|II< tordilis, superioribus subultrioribus. of nil*, omnibus inaequaliter rrrnalibus *u-
pra MIO sdllao publicenlibus suhtun nenen o-iomontoiif, prdunrult* lunKiuculi-
li» runt caliciln vulnjhl<»-!uio in>u\ \||OKUII<» % — (r<M il m ItuinHu
86 A Uor.UUIWMI Inn Mini \ml 43 ^rhr<d I c. II VI (> Until r
407 no 79. — toll. »ubl)ralis; floribus »ei>ilibus» C Folia »r>>ilia panim d<-

- carrenlia spalhulata, hasi angustala sinuata, supra nuda, infra tomentosa. Spica ejusmodi ac ilia V. *Thapsut* sed minus densa, bractea cuju<que floris plurimac. Corolla luloa. Genitalia purpurea. — Planta h)bridae originis csc videtur e V. *phlomoidi* aliaque specif orla. — V. *tuteum* Mill. Fig. 273. — *Vcrbatcum Blattariae foliit nigrum amplioribus, floribus lutrit, apicibus purpuratcentibus* Dochr. Ilort. Lugd. Dot. I. 228. — Till. Pis. I. 50? — Crescil in Europ.i australi.
87. V. IUEMOKKHOIDALE Ait. Ilort. Kew. fed. 1.) I. 230. - Schrad. I. r. - G. Don I. c. no. 70. — Foil, otato-oblongis, basi allenualis tomenlosis obsolete rrc-nulalis; raceniis spicaeformib. clongatis; florum fasciculis ebraclealis. ,t — A nullo recentiorum obscnralum et forte eicludendum, cum flores contra morem generis bracteis destituantur. — Crescil in insula Madeira.
88. V. CORDATUM Ds'. Fl. AUant 1. 180. - G. Don I. e. 509. no. 80. - Foil, tomenlosis, radicalib. cordalis pellolalis crenulatis oblois, caulinis ampleiicaulib. integerrimis. <f — Caalis simplex sabramosus tomentosas ereclus, digiii crassitie. Flores ignoli. — Crescil in monle Alias.
89. V. CLAYTOMI Micbx. Fl. bor. Am. I. 148. - G. Don I. c. no. Kl. - Glabrum: caule simplicissimo; foil, caulinis fere lanceolato-oblongis profunde crenatls, crenis ilerum crenulatis; florum spicis illis *Blaitariae* similibus. J — V. *TllaUariae* proximom forteque ejus varietal. — Crescil in America boreali (Carolina).
90. V. STRICTI'M Clarke, Trar. (cd. 2.) Pempt. 2. sect. 1. p. 802. - G. Don I. c. no. HÆ — Caule fruticoso erecto; foil, inferiorib. spatbulalo-ovalis petiolatii, superiorib. ovato-lanceolatis obsolete dentalis v. integerrimis sessilib., omnib. slcl-I.Ho-pilosin cane<cenlibq.; racemis elongatis; pedicellis di\ariralis, ralyee longionbus. † — Planla lomento.<a. Folia IV.—2 poll, longa v. longiora. Racemi paniculati. Flores magni flavi, pollicem diametro tenentes. — In insula Rbodos.
- Of V. LAXIFLORUM Prsl. Delic. Prageos. I. 70. - G. Don I. c. no. HL - F<D>L creoaUtis, alioq. deose alellato-IOBMOlois, radieallb. oblongo-ovatig roucrona - • lis, caolinis seasilib., soperlorib. ovaiis aemninalis: Do rib. paniculatii*; fasciculis mutli floris lais. (/ — Ad V. *loecotum* W. el Kit. pert in ere diritur. — (IX (Jimonc, Flor. Sicul. <)nops. I. 270.) — Crescit ad montem Aetnam.
- W. V. BRACTEATLM Prsl. I. C 214. - G. Don I. c. no. HL -- Foil, ovalo-oblongi* dentalis, ulrinq. viridib., sublut tnmenlellis, radirahb. aculit, eaulinm infenonb. petiolatis acuroinalis, *up<*norib. laneeolatn-Imrarib., florum fasrirulo^ atcgregatn* eiredentibus. / — Valde affine I'. *Lyrhntiis* forleque tju» wrictas. — In H "lirmia rrr»cil.
- ft). \. *itl.KUniM'* Delab. Journ. de santr et d'hisl. natur. do Bourd. II. 160. — G. Don I. c. no. <'> - • <Uule angulato ramo*o; full, glabrit obirure %mdib., radirahb. peliolalii ellipiiri* crenalis, raulim» subdecurrentib. cordalis aunculalis; fmctib. spiealM sessilib. bracieatis. / — Crmrii in Galha.
- M. V. AXML1 Mill. Diet DO. II. - G. Don I- c no. 80. - Foil, radicalib. oblongis integerrimis, otioq. obscure viridib., caolinis aratls sessilib.; florib. aggregallt pediceilatit. QT v. </f * Folia InfeHōra UKpolliearia, apire rotundata. Racemi lonRi laik tennlnales. Flores fasciculati obscure lutel Cap%ula nugna futca. — *Hlatlana amttua flort major* lm4*Q, eaptmla Hem mqjure* Mont. (Hun. Hut. pi* II. 40* - Cretint in SICIIIJ.
- fti. V. ALOPKCTROIDKS Div. Andr. Piani. inedit. 7. rt Gu«one, Flor. 6ieal. *)nop» |. 265. oo. 10. — Folia inferior* crenalo-denUla, drntibu* obiu%i«, petiolaU otau obluiiu»rula, tuperne glabnutcula, *ubtut pr.ir<rtim ad nrnoi flnceo>o< laoaia, a<rrndendo teftilia, tenui><ime rrrnalo-denUla jruiiu%>rulj, peimli dense floccoso-Unali r| albo rufeseentr*. Tauli* non anguUm* irre» »r<quipedalis, Inferne soecoso-lanalo», a*rendendo pilit flocruti* ad*per*u*. Spirj *rlongala*. lores 1-6 !• glomerulU »ubfa»rirulalit coadunati. infermre* pedicellaii, *pedicellis* •ubineanis Iliforaiibas 1-2% lin. IonOs, toperiorr% •ct>ilet, raru brens*im« *pe-* direllati. CJIJI quloqarlobut tubincanut, lobi« lineih-lanrrrohm arotit. Co- rolla ettus pabescnti - lanata. — Differt a I' *itnyeruro* lacinut cal)Cim< *non* *ovale*, sed Hnari-Uaceolatts. ^ t ^ ? * Oetcit in *Sicilia*

06. V. INTERJECTUM Pfund, Monographiac generis Verbasci prodromus (T<ub>'4j lanb<< ©Artlinfic obr flecttfrAuter [Jténigtferjcu] mlt bfonfcercr iyerúrftit*tigunq trr bô^mifa>cn flrtn. 3n dtonomifa • tCOuifSer unb nufcijtnlffyr <&infst bearcicct ten 9. ©rofen eon ©errttolb, in botanifa>er Don 3orjattu# f^funé. — Wit cincr Ik tyoftrapyirtcn £afcl. — \$tafl 1840. 8.) 48. f — Planta lomenlosa, lomenlo longo non denso; caule plerumque simplici; foil, basin >ersua mlnua drcurrenlib. o>ato-oblongis crenalis, mediis superioribq. basi inaequali lalere allcro omnino, allcro vix decurrenlib.; florib. slamibq. V. *phlomoidis*. <f — Crescil circa Pragam.
07. V. DEMDATUM Pfund I. c. 40. | — Foil, supra glabriusculis, infra lomenlelli*, repando-crenalis, inferiorib. in petiololum attenuate mediisq. ovalis broiler decurrenlib., superiorib. sessilib. (non decurrenlib.; lancculalis; corolla calycem 2-2'/:-plo excedente; slamib. inaequalib., omnib. albo-lanali<: anthem nequalibus. { — V. *spfciosum* Opili lib. — Prope Pragam, loco „WüM'hrad" diclo.
08. V. FLA(iRIFt)RME Pfund I. c. 51. | I. I. — Foil. tenuis>imu br^Mlrrq. tomrntoiaia \indib.f inferiorib. longe ovatii in petiolo dccurrnlib., superiorib. o>alolanceolalis, basi cordata scmiamplexicaulib. breviterq. dccurrentib.; corolla c,i-lyce 4-*ies majorib.; slamib. inaequalib., tribui breviorib. dense albn-liauaii*, duobus longiorib. medio lantum parce pilositi; anlberit tlaminum br^iorum reniformib., longiorum longe decurreoibut. cV — Locit ticcifsimit circa Pragim.
00. V. INTERMEDIUM Ruprecht maa. ex Pfund I. c. M. - A V. *nigro* dilTerre dicitur foliis inferiorib. non cordatis nee crenatis aed dentatis, infra glabris, racemo simpliciter longiori graciliori, florib. aoliuriit, ioferiorib. geminatis. — Occurrit in Bohemia prope Sadakam.
100. V.....T? Nees ab Esenb. Trantact. of the Linn. Soc. XVII. 80. — Ade*1 exmplum in *Deyra Dhoon Indiae orientalis* Icllum (Wall. Cat. 2030. E.) quod quideni ad spveicm a V. *Thapsus* alicnam perlincl, caule ramo&o fuliiM|uc o\ahs paruni decurrenlibus crenulali* >indibui» laic tomentoKts dilTert, sod llorrs dr-sunt ci folia inTeriora, ut idco nee definiri qucal neque rerd quid de co *>l si-i-tuendum. Caçcis sepala lancoolata HUIII.

ft *Sj)cnèn nomine tantummodo cognitae.*

- >. ACIMINATIM Scbrad.
- V. AETHIOPK:t'M Ebrenbrx
- V. ATHENIENSE Ilort. Angl.
- V. FASCICULATUM Ehrcoberg.
- V. NOVAE nOLLANDIAE Roem.
- V. PEKEdRIMM Fisch.
- V. SLAVOMCI'M Kit.

t t t *Speries e generc rrpellendat'.*

- V. ARCTIRI'S Linn. *, TELSIA ARCTIRI'S.
- V. DKRNADESII Vahl. - CELSIA IERNADESH.
- V. LYRATL'M Lam. - CELSIA LYRATA.
- V. MYCONI Linn. - RAMONDIA PYRENAICA.
- V. ORIENTALS All. - CELSIA ORIENTALIS.
- V. OSREUtl Linn. - TRIGL'ERA AMBROSIACA.
- VrpABVIFLORLM Urn. - CELSIA PARVIFLORA.

3879. CELAIA Linn.

iLinn. Grnrr. plant, no. 737. - Meitn. Gener. plant. ta«col. I. JOS. II. «I7. s,,r Sjst. >rgct. II. 809. — G. Don, General tytt of gard. and hot. IV. 40V

Sectio 1. P8EUD0THAP8U8 BUL Serophnl. lad. or. p. S.

Ilcrbac. Si.ium.i iluo lonuioia glibr.1, anlhcris oblnngi« adnaiio. dt|, brc^ior^ barba.i, anllicris nit'ililiis Inlorul.iriltiii. lurulis connMciitlmH.

I- C. CRKTICA Linn. MNI. pLiul. 400 IJct. M.iga/ I. 004 Helib Klor, rtoUr I. '200. - Vahl, S)inlu>l. hot. lit *Hi*. (i. Dun I. r. no. 0. — Foil, radirali. ly-rati«, «upriorib oblongi*. Ilonb »ubke>%ilib braricarum longitudine; segments

calycmis o>ah> MTrali*. J — Folia b up re ma (braclocaj cordata serrata amplexi-caulia. rilamcnl.1 2 inferiora glahrj. Corolla lutca magna, maculis 2 ferrugincis supra ad basin nolala. Tola planta pilosa. — In Africa borcali el in insula Candia. <± C. PIY>|TIHDA BOIHS. el Reut. Diagnos. pi. nov. Ilisp. 22. — Minute pubcrula caule simplici ereeto folioso; foil inferionb. in rosulam approximate lanccolads, broiler pcioloiis profunde pinnatilnli!>, lacinns acuhs mai'tjualib denlatis, rachi latit deutala, foil caulims amplexuaulib. dentalo-pinnalifidi*; braceis cordato-tn.injularib. dentate, pcdunculo raullo bretionb.; racemo clongato laxifloro; pcdunculi* patuh», apicc incuni*, cal)cc duplo longionb ; calycis glandulosi lacimis o\ali* parcc el acute denliculalis; corolla ampla lulca, bast parle superiori purpurco-maculata; rapsula globosa calyce doplo longiorc, slylo persiscnlc longc apirilala. ^- — Affirm praecedenti el subsequenti!. — *C. lanmata* Poir diffcrrc \idelur full ^uperionb. angusiorib. sessilib. nec amplencaulib., pcdunculorum breMtate, sepals br.ictisque inlcgns nec denlatis. — Oescit in pascuis urcis arenosis regionis montanae infenons Sierra de Guadaramma, circa r.olmenar \irjo t'l prope llortalrza in disinclu Malnlcnsi.

J < DITWIA KaHn. Somiol. 13.) DRTO.MCAKFOLIA D>f. Fl. AUant V^ - Willd. ^MM plant. III. iWL — G. Don I. c. no. 7. — Pilosa- foil. o>ato-oblongm rugosis en 'i illis floralib. lanceolalm semiamplei-caulib., pedicello brevtorib.; segmrntis ralynniss o\ati\$ aculis margine serralis v. inlcgns. / — Caulis simple\ |. ramo-fx« Folia K'abra >. pilosiuscula, bassi »aepe pinnalifida. Corollae luieae tegmenla *J supcrinra p'jrpureo-inaculala. Filamenta inferiora glabra. — *illattaria Ihspatiira masimo lore* Dodart. Icon. — Crescit in Algeria.

i. C !.\CI>UTA Poir. Knc)d. inelb. Suppl. c\ Spr. S>S. «rgol. II. 800 no. '» Foil, inferonrib. lacinalo-pinoalifldm, sopenonrib »cs»ilib. lancenhii«. pedum uh* bractcas tubaequanhb.; lacioiu calycit oblongis acuiii inlcgerrinn». ^> (re*cil io Africa boreall.

SecUo IL A10TUE08 BUL L o. 5.

Herbae. Stamina duo longiora glabra, brcMora loiter barbata, antheris ottnni-MMH medifiiiH bilorulanbus, loculis conflurniilnis.

5 T oniKISTU.IS l.mn. spec. plant. <W, llori I |>ol 170 t .' I am llmMr gen t \JL — ^iblhrrp el Sra. Flor Gract i fifii - srhkuhr, llmlbrh t IIF Krhb Flor Germ, excurs. 3T0. no £>O. <• D'ui I r ^ n<> | (h)ra foil cdIIIini^ bipinnatifidis, lacioiis denlatio > ll^rbj pedals ^r.inlis plihra \rl puderuli Fi>lionim %reni(*nla ncnsta. i il\ glanduloso-pubenilut Fk«x% brac-fc|s j«Mnr» s fli^ i. iridis pilliilmrr* *Ithittana onrntalis* Du\b. < mlur |. 14 I J) el | 17 t l I "ttrum onrntnl' *Sophmr futns* Tournef Loroll H. — (rr<rit in ('jppjdoria, Iriuonu rt in Pjlmalia.

6. <. PKBSI(* (' I Vryer, \rririrlm drr Pflnin am Caura«. III. - <• Oon I. c. no. ff. — Prrmnu pub<teot* foil, radkalib bipiouaiifldit, caulio« inn%oi«, pediceilit braeica tobUaMrl aollo loociorlb.; laclolit ral)nni« «ubltnrib , rapiull pynfurmi duplo br<vlorib«i«. — Crrnrnt in Caucato in monibu% TaU^rb

7 < 1KRIHM.I M Linn. Sprc. pi. 4M. Jcq. llort. tindob II 1.117 fnlumra. fVpbr II. MI I. *2 \Rr.TIRI< linn M<t pi VI - lloi. M«af t I90i G. |> m I r 199 no. 1 Roijrhr, I innarj \ Lileraturbl II — I'aulo fo|n<i| «ub< lanato - villosa, pilis rJDo%a%, foil, plrruq altrrm< <>blu|c *ub\crrali>-rrfn>l>>> inferiorib substrata, %upriorib oblongu, braririt *ubinirgrrrrinu« glabre nll-ill* prlrrllit brartn* luneiorib rahribq cljbn« mini.* ^ <i *alternifolia* |>%cb rl Mr) |iil\ hoft prtropul | i>» — *I nypnntfAui* ti%orh r| Mr| I <*

Prdtinruli JIU oppo%id, JIII %UM>ll%o%III % sp4r<i H«rr> nnn<rr>, 9 circiter luncas diamrtro irnmir*, bnnn* nugi* inarqiuhu*, bin • %u>rrnonbu» rcliquis nnnonrib», inflma ommbut major* Alpm ktui |%| i li» - In nuuU < aniba I M |M>ri.OHA iourlii I r «U<k folu%q <Uodulo%o-pubr* r, nith pilosioq, pih« simplirib . foil pkn*q oppo<ili> aralr «rrr<|o-rrrnaii* lufrrmrib Dri<l*» >upri<nib •>|lon|it, br<ch% •rrr jli» cUn<lu|.«%»-|iubr<rrnh|. . jr <icellit bractC* longiorib <stribq |Uoilul>>o.piib<*%irnlibu» '* U n n l m to<ula t aniba

- 9 t COROVA'NDELIAM Vahl, Symbol bot III 79 (excl diagn) t - Lnk Enum pi hort Berolin II 145 — Nee* ab Esenb Transact of the Linn Soc W11 80 — G Don I c no 4 — Cano-villosa foil, inferiorib lyratis, floralib cordalis bcniimplexicaulib, pedunculis calyce Iriplo longionb t lacinus calycis oatu subberratis O — Flores lutei
fi *helerophylla* Pers Enchind II 101 — I resell in ora Goromandeliana il in alns Indiac orientals provincus
- 10 C VISFOSA Rlh Catal II 09 III 50 - Vis ab Esenb I c 81 4) - Hook Journ of bot I 223 t 129 — 0 Don 1 c no 5 — >isco-pubescent foil caulims inferiorib lyratis, floralib cordalis scmiamplexicaulib, pedunculis flons longitudinc aequalib, lacinus calycis oblongo-lanccolalis Inlcgemmis) — Species pedicellis bre\ibus approximatis il tiscositate insigms — (*Coro-mandehana* \ ihl I c (excl dc>cripl) Corolla lulla ul ea speciei praccdentis — f rescit in India onctali

11. C. PVRMFLOR* Dem Ann sc nal II 254 t (nee G Don - Suffruticosa ramulis nudis, foil ad rarnulorum basin disposilis, ovalo-lanreolatis rcpindodentalis incanm, supenorib lincari- lanceolatis, basl el apice suballtnuali*, florib pams alrofuscis pedicell itn, foliohs ctlycims laoceolalis cxlronum tenuis-iiirae glanduloso-pilosis 2). — Crescit In monte Sinai

SeoUo III. ISFFLBA BUL 1 o.

Suffruliees Filamenta omnia barbata. Antherae omnes terminales uniloculares, \ I\UUIS 2 ovatis aetis dchiscentes — An genus proprfumf

- 12 f IAM EOLATA Vent Hort Cels t 87 — G. Don I c no &. — Sublomentosa foil lanrtolatis semlis, basi alletiuatis, pedicellis quam folia floralia brexorib launus (ihcinis interns aculis 5 — Corolla lulea, macula purpura^centibus ad biMii not it i — Crescit ad ostia Euphratis
- 13 1 SIBIAMTI Jcq tragm bot 79 no 247 I 190 - Bot Regist t 4& - <• Don I c no 0 lig 45 — Frulicosa, tomenloso-lanati foil o>ali-oblongis ob-tusis trtnitis rugoMs mollib, alternit pdiolaiis, > basi utrinque foliolis 1-2 sessilib auriis bri(tii!> sessilib aetis pjms subserralis, florib odoralis 5
t rescit

t Species ad iccltona nondum rrlatae.

- 14 C ACAI I IS Bory el Cbaub II Ptlonnes 978 I 10 fig 2. — Acaulis, pilm brevissumis hirta foil o\aiolancf>olalis oblusiusculus, basl subpinntUfidis, apice trunaty ircnaluns obluhis denialis, pedunculis radicalib folia ||| superantib, calyctiH foliohs ligulatis, apice dlalalls ^ — Crescit in PHoponnmo
- 1> (I) VI >/Mtl 1-oueho ft Uiaub in Dory el Chaub i c WO - Biprdalis roll lanreohtiH iutis pilosiusi ulis radicalib pinnalifidls, pinnis frrosie drntalo* pinnahlidis ipi<< r onftn utib c IUIIIH pininlifidn, pinnis Rome d< niitis flonb laxe rtreniosik, p< durnuli* pollu inb bro\it<r bracieolatis lacimiM|u<. calxims piloHo->Mndulis ^ i resnt in Peloponne%o
- 10 (^PhCIOSA Fcml et l-ridnrhshal, Rei^c durch Vu-Gnochrnlaiul JD (aule, pedunculis ca)cibq glanduloso-puberulis, foil bracieisq fordato-ovttit aruminalis, arguto sorntis, inlimis peliolatis, groise iocuit, reliquu aubaestilib > neasillb., gUbn< nitidis, pedunculit braeleas subduplo superantibus, ttrtrn palenlibus, fructlfrfis apice cernuis, sepalis foliarns ovatis * ovato-lanc^olatU, longc a< uminatis, infrnun argute inclio-serralis pout antbesin incresrrntib, (o- roll i nl>rem arquante ^ HabiUI in Graecla autiraliiori
- 17 i IMIRRIPTA Fre<en lion (B 7, XXI 005 Foil cauluiu interrupt.-piiiniin IXHI auri(uhti amplciK lulib, prdunculis brarlcac lanrcolαιο subulvta, suptranlib I i UIIH ial\ei% laim olatii mucronatif* Inlegerrimi> ^ In Abyssinia

' *Uttur rum f me tliHti njuu i it HrntliAiu. Srt i/ AM/ In lie 17 < | orftt. mamltliiua • *</ Hlh I r Inil mdtaih Iftahi iir ttrtht (rueU(er%\$ rap- tut a III lujjth hycanulitit taannin calynt nUanytt infrgrmmu < |i<cotA Hlh I = \rji ab I irnb / f*

18. *C. DONIANA* Wlprs. mss. — Foil, radicalib. pinnatifido-rancinatis, utrinque tomenlosis; caule ramoso subnudo; liorib. parvis. 5 — *Verbascum parviflorum* Lam. Diet. IV. 222. — Pers. Enchirid. I. 210. — *Celriapaniflora* G. Don I. c. no. 10. nee Dene. — Folia radicalia forma magnitudineque fere illorura *Taraxaei officinalis*, segraenlis ovalis v. ovato-oblongis acutis, integris v. subdentalis. Flores fasciculati. — Crescil ?
19. *C. (VERB A SCUM* Vahl, Symb. bot. II. 30.) *BERNADESII* G. Don I. c. no. 11. — Caulc sabnodo; foil, lanceolatis dentato-sinuatis glabris; pedunculis solitariis. S — Caulis glaber simplex. Folia radicalia namerosa petiolala, vix tripollicaria subpinnatifida acuta, segmentis lanceolatit dentatis. Folia floralia parva cordata cuspidata. Segmenta cnlycina inneqoalta deoticalata. Corolla lutea. Pedunculus pollicaris. — Grescil in Hispaniae monlibus Ortalezza.
20. *G. LYRATA* G. Don I. c. no. 12. — Pilosa: foil, radicalib. basi lyralo -pinnatifldis, margine angulalo-dentatis, caulinis inacqualiter dentatis subsessilib.; segmentis calycims serratis. <fl — Caulis flexuosus foliosus. Folia supra glabra v. glabnuscule 3-4-pollicaria. Folia caulina rordala acuta, suprcma amplexicaolia. Flores magni lutci breviier pedicellali solitarii, in racemum longum digesli. Segmenta caljcina inaequalia. Corolla diametro lubet tres polliccf. Filamenta 2 inferiora noda. — Forte eadem ac *C. Cretica* ? — *Verbatcum lyratum* Lam. Diet. IV. 222. — Crescil in Dispania.

ft *Species mihi prorsus incognilae.*

- C. AISTRALJS* Hort.
C. IIRACIIYSEPALA Fisch. <? - ID Natolia.
C. ERECTA Fisch.
C. GLABRATA Rth.
Ci GRAKDIFLORA Hortor.
C. SINUATA Ten.
C. STRUTIFLORA Hortor.

t t t *Species e genere erpellendae.*

- C. LINEARIS* Jcq. = ALONSOA LINEARIS.
C. I'RTICAEFOLIA Curt. = ALONSOA INCISIFOMA.

3880. A I. O \ N O I *Rz. et Pav.*

(Ri. el Pat. S)st. fl. Peruv. 152. — Mrisn. Genor. plant, vascul. I. 300. II. 217. — Spr. Syst. vcfct. II. 800. (Nub *Hemimeru.*] - G. Don, General synt. of gard. and bot. IV. 513.)

f. I. *Fruticosae. Caulibus et ramis quadrangularibus.*

1. *A. (CELSIA* Jcq. Icoa. pj. An. III. L 407. - Bot Magat. t. 210.) *LINEAHIS* Ri. et Pav. I. e., Fl<r. PemV. t. 99X ig. ft. — Sweet, Brit. flo<. gard. 'New Ser.) III. t. M0. — G. Don I. c. no. I. — Glabra: foil, opposing v. ternali* vprlicillalis hneanb. inlegri* •. remote denticulate. ^> — Folia juniora in aiillis adultiorum fa^cirulala; corolla coennea, fundo obscurion. - Variat foliin pedunculis(ju< * oppo^iik h>bridaque ^nloieur ei hac et *A. ineiifolia* et tune .1. *intermedia* Lodd. Bol. Cabin, t. 4VL - *Hrmimrru coerimea* Willd. Spec. pi. III. £Q. - *Hermitomu* frutteorus* Hrril.⁹ — *Hemumeris limariaefolia* II. B. Kth. Nor. (jrn. et 9pcc. pi. U 377. Klb. H>nop<. plant, aequin II. lil. — Oncil in Peruvia.
2. *A. Qt'ADRIFOLIA* G. Don I. c. no. i — Foil, (jn.itrmis t<*rtinllaii< ovatii: *H<*rlb. tertieillttis* raremosis. 0 — *Scropkularia commra* Linn. Spec planU ^M> ~ ~ Vera Crai.
- | *A. IMCISIFOLIA* Ri. et Pav. S)»L 0. Peruv 154. - - G. Don I. e. no. 3 fl*. 40. - Glabra- foil oppnuitit o<ati< aruti< profunde drntali^ %. %<^rriti<; pedunrti^K rlongatis 'ubracemofif. ^ — *HcmimerU Ohio* Curt. Bol. Magax. 1.417/ *urlicae-folia* Willd. Spec. plant III. *tt Credit in Club ad Coucclionetr

4. A. (HEMIMERIS Pers. Enchirid. II. 102.) PROCUMRENS Rz. et Pav. I. c. - G. Don I. e. no. 4. — Caulib. procumbenlib.; foil, oppositis ovatis serratis; flonb. coccinns. ft — In Peruvia crescil.
5. A. (HEMIMERIS Pers. I. c.) ACUTIFOLIA Rz. et Pav. I. c. 153. - G. Don I. c. no. 5. — Foil, oppositis? ovato-lanceolalis profunde serratis. 6 - ID Peruvia.
- \$. 2. *Herbae. Caulibus ramisque quadrangulari-alatis.*
6. A. (HEMIMERIS Pers. I. c. 102.) CAULIALATA Rz. et Pav. I. e. 158. - G. Don I. c. no. 0. — Foil, ovalis acutis serratis; caule ramq. alalis. % — Crescit in Peruvia. — Forle ad sequenlem prrnet.
7. A. (HEMIMERIS II. B. Kih. ISov. gen. et spec. pi. II. 370. — Kih. Synops. plant. aequm. II. 1J1.) PAR> (FLORA G. Don I. c. no. 7. - Caulc herbaceo subquadnalato; foil, opposing ovatis aculis serratis; flonb. anllanb. racemosis>. 2I — Caulis ramosus, apice paniculatus. Folia glabra, fere pollicem longa. Corollac labit inferiors lacima intermedia lalior obcordata. — A, *inçuifoliae* prouma, nee diversa, nisi caule herbacco floribusque mlnoribus. — Crescit Ions temperalis in monte Buenavista Juita Los Teques Caracasanorum.
8. A. (HEMIMERIS II. B. Kih. I. c. - Kih. I. c.) MUTISM G. Don I. c. no. 8. - Caule herbaceo subquadnalato; foil, oppoiltis oblongis, utrinq. acutis serratis; florib. racemosis. 2|. — Caulis panicalaius; folia glabra poilcacia, 5 lineas lata. Corolla et stamina ignola. — *Scrophularia meridionaii*\$ Mutts. — (Linn.?) — Crescil prope Santa Fe de Bogota.
0. A. (HEMIMERIS Spr. SysL veget II. 800. no. 4.) HIRSUTA Stead. Nomencl. bot. (ed. 2.) I. 60. — Caule herbaceo quadrialato; foil, ovalis denUlls, In peiolum decurrentib. pilosis (pilis articuldtis); pedunculis unifloris axiilarib. solitariis calyibq. subinaequalib. birsutis. 2|. — Crescil in Brasilia.

3SS0',. SCHISTIVTIE *Kmc.*

(Knze. Delect, scmin. hort. Lipsiens. 1841 coll. p. 3 — Endl. Genrr. plant. Suppl. II. addend, p. 100. — Meisn. Gencr plant, tascul. II. 308. no. 25/.)

1. *SCII. PEDIMALARIS Knxe. I. c. - > - Crescit in Promoolorlo bonac spei

38S|. JOIELL.IHA *Hi. el Pav.*

(Rz. et Pav. Flor. Peruv. I. 12. t. 18. - Meisn. Gencr. plant vascul. I. 305 II. 210 — G. Don, General *)»L or gard. and bot IV. 008.)

1. J. SCAPIFLORA R*. el Pav. I. c. 13. t I- 1& fig. 1). - G. Don I. c. no. I. - Foil otatis serratis; scapin inaequalib. unfloria. 2I v. G> (ex Bi. et Pav) - Herba pumila araulis; kcapi 3-5-palraarcs v. blpalmaret fliformet purpurei pubescontos, folia radicala o\ata, basi aitonuala 5-nervla, utrinqf pubescenlia; corolla luira, labium infrnus interne puncilt purpurels maculalum; filamenta et antherac purpurea. — Folia succum inurilaginnsum praebent. — *Baea plantaginea* Pern En-Chind. I. 15? — *talrrolana plantagtnra* Sm. Faitc. I. 2. I. *2 — Lodriig Rotame Cabin, I. 1402. - Cre>cit in Andibui Peruviani*i Tarmac el raiaatamlio.
2. J. (CALCEOLARIA Vahl, Enum. I. 177. - BAEA Pers. Enchir. I. 15) PLM.TATA Rz. et Pav. |. c. 13. t t. 18. fig. a. — G. Don I. c. DO. 2. — Frulicosa: ramu grt-cilib. glandulifens: foil peliolaiis oblongo-o><iii blserraiis glabrls; peduocolii aiilltrib. terminalibq c>mosis; pedicellis umbellatis. 6 — Fruticolus iripedalu. Caulis erectQt fragilis teres coupreslusculus; folia opposita dupllcato-terra la f subtni albida, nonnulla supra vllloat, floralia intrgerma, omnia ulrinque purpureo-puncuta. Corolla albo-violacea, macula palhda puncUque purpurns \.i-ricgata, c&mpanulata cytnbarformi< resupinala, tubu> t>ro\li basi MIOMIV IUIXIH bilabiatus, labio inferior! parum longiori, margne subinvoluta. fibnuuia r<rn-planaia lincana, nnlhrae reniformiCH. — *Gnnera fioribut maculatt* | MJI| Peru<. 111.21. 1.10 Formam li\hndain dejunxerr kn^U et W^Ur riio Flor.il (al.incl I. 21. T (* H* — Crekiil in H)\IH |Vni>iar el rtv'm (iilrn%is ad Conrrptionrm.
3. J. CAICF.OURU C.i\ k<on ri drscr. |d | II I I. 4W IIAI.I P&% En-chind. I. U) MOLACEA G. Don I. c. no. 3 Frutico-ta ramit MOUCCI>; foil.

petiolalis ovata grosse serratis, infra albis; pedunculis terminalibus. terminalis corymbosa; pedicellis 1-2-doris. 6 — Folia petiolorum longididinc. Corolla pallide Molacca, maculis obscurius violaceis infra adpersa. Corollae labium ulrumque campanulatum palens, limbo villosa. — Crescit in Clui ad Conceptionem.

4. J.? (BAEA Per*. Enchind. I. 15.) TRIANDRA Cav. Icon, et descr. pi. V. 32.* t. 453. — G. Don I. c. no. 4. — Fruticosa: ramis, pedunculis calycisq. margimb. glanduloso-villosis; foliis, profunde pinnatifidis, infra glaucis petiolalis; pedunculis dichotomis; floribus. Iriandris. — Cortex ramorum obscure purpurascens. Petioli folio breviores, basi membranacea caulem aroplectentes. Filamenta 3 brevissima. (hanum lomen)um. — Forte dioscoridii genus, donbus iriandris, antherarum lociis confluentibus foramineque delusculibus diutius a *Jovellatia*, hoc si accipitur, POROTIDDIA appellatur, proposuit G. Don. — *Porotiddia* (*riandra* G. Don mss. — Crescit in Peru via.

3882. CALCEOLARIA Linn.

(Linn. Gener. plant. 1288. — Meisn. Gener. plant, \ascul. I. 3^o. II. 210. — Spr. Sy*t. %egel. I. 43. - Dietr. Synops. plant. I. 44. — G. Don, General SJM. of gard. and bot. IV. 602.1

fc. 1. *Foliis pinnatis et pinnatifidis*.

- *intherae loculi connectivo transverso disjunctis, altero polinifero, altero sterile aut nullo.*

1. C. PINNATA Linn. Syst. plant. 05. - Act. Holm. 1770. edit 2^o. t. «. - Bot. Mag. t. 41. - (i. Don I. c. no. 1. — Herba, >isco<o-pilosa foliis pinnatis \. poims pinnatifidis, foliolis \. segmentis Jentatis, infertionibus pinnatifidis-inriferis; pedunculis geminis v. (ernis paniculatis). — Herba ramosissima. Folia petiolata. Segmentum calycis ovalo-cordata pateolissima. Corolla tulpurea. ()\anum pilotum. — Crescit in Peru* la locis humidis.
 2. £. CHELIDOMOIDES H. B. Kth. Nov. gen. et sp. pi. III. 370. | - Kth. Synopsi. plant. aequalo. II. 133. — G. Don I. c. no. 2. — Herbacea: foliis pinnatis, superioribus pinnatifidis, supra bispidalis, lobus glaberrimus, foliolis pinnatifidis-inriferis; pedunculis serratis ciliatis-glandulosis; floribus. alab. geminis, terminalibus. subumbellatis. (J — Krecia dicholoma ramo<a. Rami tetragoni. Folia \ul>petiolata. r<T.lla lutea glabra magitudine praecedentis. Ovarium glaberrimum. — *I' ennnna* Wittl. mss. — (re<cit in radicibus montis Jatirae prope l>uio. — Praecedunt *simulium*.
 3. ((IUCIMS H. B. Kth. I. c. | - Kth. I. r. - G. Don I. r. no. .1. — Ili-rbarra: foliis inferioribus pinnatis* et terminalibus, superioribus \ub<ini>liribus 4oratis%, supra hispidulis, \imul. ilbido-pilosis; floribus. alab. r. axillaris cernimur terminalibus. sul>ror>mbosis. ' ; — Herba gracilis dicholoma* ramo<a. Kami rubentes. Folia petiolata. (corolla pallide lutea. Ovarium glaberrimum. — <' ornlur Cat. valde »itnilis. — Omni in ripa flumioit Sao Pedro prope Dhillio ^uieotium.
 4. C. TRIPARTITA Ri. et Pat. Fl. Perot. I. 14. t. t. 0. fig. a. - G. Don I. c. no. 4. — Herba Mea ploma: foliis trilobatis, lobis ovatis terrain; pedunculis terminalibus. ror>mbosis; pedicellis 5-0-ovatis. CO — trullis tere* ramo*u*. F<>ia opposita tripartita, lobo intermedio majori. Ciliis bifidis. Corolla lutea calyce duplo major. — In armonibus peruvianis Panatahuat) en^cil.
- > I sCAHOSAKFOI U Sim*, Bot. Magai. t. 2105. - Rorm n srhtilt S)<t \rjrrl. I KS G. Don I. r. no. 5. — Pro<iraU: foliis inferioribus pinnatis, \uperioribus pinnatifidis< tlobis< v \imphrib., fnlmlis< oTalo-lanreoljii% arulis< n>iu<i<q. duple rain-<rrrjii<. infra albis. pubes<reuiib.. lobo terminali %rmprr mjum; prduocuh* terminalibus. rannibo<i< Z^ i <ah% ln|'<h!i* <»> ilnr irirjcuu* gibber VilloMuqu* K<*niruljus radican<, h)jlm». Hum dirboiomi folia opposita. P** tiolit eosatlt villost. Prduftrolis e) dicholonna <tillim|ur tuprrioribus* <olii.irii grtnioiqie ttniflori ropnboti Talyt f|u% \arf>urasrn% %illo<ut (urotla lulro-sulphurea magna radara glaberrima. bbio inferiori majori <rniriro<o - *Calceolaria fiUnt Season* rulgartt* Feuill Prrut. III li. I 7 III 1 f htrro,k;Ua Waid. Enum. \ bort Berol. |. tf - / pumalit Ri et P<i (lor. l*eru< I II t >- 19

fig. a. — Crescit frequentissimae in Penninae nemoribus humidis et ad margines aquaeductuum Limac, Chancay Tarmao et Huanuci.

* * *Antherac connectico elongato, utrinque loculifero fertili.*

0. C. MEXICANA Blh. Plant. Harl. *cg. no. 350. — Annua: caule credo subviscoso-pubescente; foliis oppositis petiolatis inciso-pinnatifidis v. pinnatisectis, laciniis ovalibus >. lanceolatis acutis inciso-dentatis; foliis, superioribus fere ovato-lanceolatis dentatis, orbibus pinnatisectis-hirsutis, sublimbus pallidis* glaberrimis; paniculis terminalibus dichotomis; antheris connatis elongatis, unguibus antheriferis. O — deest in Mexico.
- S. 2. *Folii omnibus radicalibus, plerumque rosulatis integris v. dentatis. Pedunculis scapiformibus. — Herbae.*
7. C. PLAISTAGIMU Sm. Icon, inedit. I. 1. 1 - [Vahl, Knum. I. 172. excl. syn.] - Hook. Bot. Magaz. I. 2803. — Acaulis pubescens: foliis, radicalibus ovalibus rhomboideis rosulatis serratis necrosis; scapis plerumque 2-3-flores pilosis; corollae labio inferiori majori hemisphaerico, superiori parvo bifido. Q - (*biflora* Lam. Illustr. gen. 1. 52. — Wlph. Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol. nat. curios. XI. Suppl. I. 307. — *C. obtusifolia* Ktze. in Poepp. Coll. pi. Chil. no. 5. — *C. nudicaulis* Meyen. — Crescit ad flumen Magelanicum et in Andibus Chilenibus.
8. C. NANA Sin. I. c. t. 1. — G. Don I. c. no. 7. — Subcaulis: foliis oblongo-obovatis subintegerrimis; pedunculis scapiformibus unifloris; labio superiori corollae magno pendulo. 2). — Folia vix semipollicaria. Pedunculi solitarii . numerosi bipollicares. Corolla magna lutea. — *C. uniflora* Lam. Illustr. gener. u. 15. fig. 3. — p. Foliis, majoribus denticulatis; floribus majoribus. — Ad flumen Magelanicum.
0. C. FOTIFRIGILMI Ail. Hort. Kew. (ed. I.) I. 30. I. 1. - Lam. Illustr. gen. t. 15. Pl. 1. — Bot. Magaz. 1. Mfr. — Caes. Iron, et descr. pi. V. t. 442. fig. I. Trill. t. 405. — (. Don I. r. no. 8. — Foliis, spatulatis integerrimis, supra pilosis; pedunculis scapiformibus unifloris. ^ — Caulis prope radicem subdimidius. Folia MX pollicaria, basi connata. Pedunculi solitarii . gemini ^iliosi >scissis, raris segmenta obovata acuta. Corollae labium superius truncatum, inferius quadruplo longius sulphureum, margine rubro-maculatum. — Folia crenata dentantur a *taraniletto*. — *C. Xerana* Spr. S) «l. vegetal. I. 44. no. IS. — In insulis Falklandicis.
- ia C. POLYRIZA Cav. I. c. 25. t. 441. - G. Don I. c. no. 0. — Subcaulis Till cuneiformibus parvis serratis acutis; pedunculis scapiformibus, pedicellis umbellatis. 2). — Sub umbella reperiuntur folia 8 panis. Calycis segmenta obovata 3 instructa. Corollae lobes rubro-maculatis* labium inferius subpollicare subincurva. — Crescit locis humidis in Insulis Falklandicis.
11. C. MOMA >A Cat. I. c. 27. I. 443. fig. 1. - G. Don I. c. no. 10. - Subcaulis* foliis oblongis marqualiter dorsalibus rugosis pilosis; scapis dichotomis % — Scapis rubris trifloris* Ins bifidis, pedicello obovato unilobato in furcatione secunda, pedunculis lateralibus quadriangulis. Folia 2 panis opposita sub *ultra* furcatione Segmenta calycina trinaria. — Crescit in Cordillera chilensis.
- 11 C. PIMFOLIA Cav. I. c. 25. L. 442. fig. % — ti. Don I. c. no. II. - Subcaulis foliis linearibus, margine rotundis; pedunculis scapiformibus dichotomis, pedicellis umbellatis. 2^ - Folia crassa. Caulis pollicaris prope basin divisis. Folia appropinquata pollicaria. Pedunculi bipollicares bis bifidi, folia % sub quadruplo divisa . lone, pedicellis intermediis nullo, lateralibus bifloris. Corollae lobes labium inferius basi contractum. — Crescit in Cordillera chilensis.
- % . :). *Folii* integra r. dentatis, radicalibus latissimis, plerumque rosulatis; raris ottogonis corymbois multifloris. — Herbae.*
13. F. RACKMOSUM O I r » I 44H - «. Don I. r. fl. no. L* - Foliis, oblongis dentatis-rugosis; pedicellis terminalibus bilobis, pedicellis raris . (lobes trisegmentis tomentosis ovatis bifidis Folia radicalia numero a rosula Tridunum utraque bifida bilobis raris intermedio umbrato Curolla Ubium inferius ovalum. - Crescit in insulis Falklandicis.

14. *C. CANA* Cav. I. c. 27. l. 443. Gg. 2. — G. Don I. c. no. 13. — Foil, cuneiforraib. pilosi* tomeniosis inlegerrimis, caulib. ascendenlib.; pedunculis dichotomis. 2f. — Radix crassa. Folia dense tomentosa, duo pafum supra reliqua elevata. Corollae parvae lucae labium inrerum bast angustatum. — Cre^cii in Peruvla.
15. *C. CREMIFLORA* Ca\ 1 c. 28. t. 446. - nook. Bot. Magaz. t. 3255. - Dot. Regist. t. 1609. — Sweet, Brit. flow. gard. III. t. 202, — Herbacea. Toll, obovato-oblongis inaequaliter serratis lomenlellis; corollae labio infenore crenato. 2|. — Caulis apice bifid us. Folia radicalia plunma, caulind pauca, 2 mferiora subpetiolata, supenora sessilia. Pedicelli racemosi unidori. Segmenla cjlycina ovata quinquestnata. Corollae lucae Idbium inrerum rubro-macalalura. Capsula chartacea fulva. — Vaneiates planmae bybridae ex bac et arflnibus ortae in horlis repenunlur. — *C. pendulo* Sweet I. c (New Ser.) II. t. 155. f — *C. anomala* Pers. Enchmd. 1. 10. — Crescit in regno Chilensi locis humidis.
16. *C. PARALIA* Car. I. c. 29. t. 447. — G. Don I. c. no 15. — Foil, inaequaliter deniaais, radicalib. cuneatis, supenonb. oblongis connatis capsulisq. tomentosis. 2). — Pedunculi axillares et terminates dichotomi. Corolla lulca, labium mferum faucem versus angustatum. — *C. Paraltntit* Spr. Sjsl. veget. I 45. — Crescit in regno Chilensi.
17. *C. CORUIBOSA* Ri. ct Pav. Flor. Perav. I. 14. 1. 20. Gg. b. - Loddig. Bot. Cabinet t. 1025. — Bot. RegisL t. 723. — Bot. Magaz. L 2418. — Rchb. Flor. exotic, t. 280. — G. Don I. c. no. 16. fig. 58. — Foil, radicalib. cordato-ovalis obtusij* bicrenalis, subtus albidis, caulims amplexicaulib. integemmis; pedunculis terminalib. dichotomis. ^ — Planta herbaccd hirsuta. Cauli* bipcdalis erectus teres simplex, infra nudus. Folia radicalia pctiolata ovata, interdum cordata obtusa ampla, subtus albida, venosa, nervosa, floralia distantia opposita semiamplexicaulia inlegernma. Pedunculi axillares terminalesque dirholomi raulnfleri, inlermedii oniflori, laierales umbellail. Corolla lulea lineis punctisque sanguineis variegaU, labio Inferiori major!. — Varietates byridae hortenses plunmae occurrunt. — (1. *Gelliana*: Florib. obscure cupreis. — Hjbriditate orta ex hac et *C. purpurea*. — 2. *hums*: Florib. flavis. — 3. *Hopeana*: Iljbnda c (*. corymbota* et *T. plantaginea*. — 4. *polyantha*: Hybnda e *C. corymbota* el *C. petmian*. — 5. *Youngn* Bot. Regist. t. 1448. florib. ocraceis. — Hybnda e *C. corymbota* el *C. arachnoidea*.) — Crescit in Chili ad Conceptionem.
- 18 (*PIRPUIEA* Grah. in Hook. Bot. Magaz. I. 2775. f — Loddig Bot. Cabinet t. 17U - Limll Bot. Regist. t. 1021. (Poepp. Coll pi. Chil. no. 115) - G. Don I. c no 17. — Herbacea. caulib. erect is ramosi* numerous; full, nigosis hispidis, rudicalib. cunealo-spathulatis sen-alis, basi integerrimis peliolatis acuminatis, caulims cordate decussatis, supenonb. minonb. integernmis; corymbis lermlnabb. mulliflons. 2|. — Caules plurimi ex eadem radice, pubescentes. Folia ulnnq. pilis paueis Hparsis longis obsita. Calyx pubescent. Corolla panra, tota rubescenti-tiolaeae. Habilns *C. eoryMбота*:
fi. picta Sweei, Brit. flow. gard. (i.Ser.) III. I. 244. — Corollis lutco-^anegtis. — Plunmao hujua^ speciei ocrarrunl ranelale* hybndae hortrnses. — Creseil in CordilleriH (hilen^ibui.
- 19 *C. ORIOMit R/ el Pav Flor Peruv. I. 15. f t. 24. fig b. — G. Don I. c. no. 1** — Caule Himplin, foil oblongis prtiolatis serratis, pedunculis Infidis, ramis 3-0-floriH J — Mania herbacea hmuia Radix fasciculLi i aulin simplicli«i»imus «e«qiiiprdili« teres. Folia bmlpr pctiolata, infonora J circitrr pollices louga, I , poll. lata. Calyx pilo«us. (orolla k'lahra lutea, intus punctn romnrrn vanegau, labio mfenorr roacno merrnato. - In montibu% PanaUhuis in l'eruuu.
- 20 *C. PLMCKA* Rx cl Pav. I. i 15. l. 24. fig. a. - G Don I. c. no. 19. Pilo«a. caulib. reptajtib.; MI. ovalib. serratif; pedunruhs Ierminalib. bifidis 7-^flons, pedicellis umbelUtis. % - Radix faiculaia fibrosa; caulis reprns lercs ramo->u», rami erecti (caoliformo', folia oppo»iia pctioUta nupra Rlabra, pcliobs connali», pfduncali tenninalf< bifidi, pedicelli inaequalibus umbellalis; corolla punicca glabra. * In nenonbus Panatahua\$ ad < hicoplaja in Pcruuu.

§. 4. *Folds denlalis crenatis vel serralis petiolatis, petiolis nudis; caulibus folio sis.*

* *Uerbae: foliis oppositi**.

21. C. SERRATA Lam. Illuslr. gener. I. 51. — II. B. Klh. Nov. gen. el spec. pi. II. 381. — Klh. Synops. plant, aequinoct. II. 134. — G. Don I. c. no. 20. — Herbacca erecta: ramis tomenloso-pubescentib.; foil, peliolalis ovalis acnlis, basi aculiusculis, argute scrratis, tenuissimc puberulis, sublus canescenlib.; corytnbis Icrminalib. subdichotomis; pedicellis pubescentibus. 2|. — llerba erecta ramosa. Folia sesquipollicaria, 0 lin. lala. Segmcnla calycina ovala aculn. Corolla glabra lutea, labium inferius reflexum, basi anguslalum. — *C. inflexa* Rz. el fav. Flor. Peruv. I. 16. f t* 25« !&• a? *) — Crescit prope Chillo Quiteusium.
22. C. DIVARICATA II. B. Kth. 1. c. 381. t - Klh. I. c. - G. Don 1. c. no. 21. - Herbacea volubilis: ramis divaricalis glabris; Toll, peliolalis ovalis aculis cordatis gtosse crenato-serralis cilialis glabris, sublus in venis puberulis; paniculis terminalib. foljalis; florib. corymbosis; pedicellis piloso-glandulosis. SJ.^ — Folia sesquipollicaria. Calyx glanduloso-pilosus, segmentis ovatis acutis. Corolla luica. Ovarium glanduloso-pilosum. — *C. flexuosae* afflnis videtur. — Crescil locis lemperalis prope Succhubamba et Ayavaca Peravianomm.
23. C. ROTUNDIFOLIA H. B. Klh. I. c. 382. f - Klh. I. c. 135. - G. Don I. c. no. 22. — Caule herbaceo simplici I-3-floro foliisq. tenuissime pubescenlib. peliolalis subrolundis obtusis grosse crenatis convexis craasia. O — Folia tosqulpolliearia. Calyx pilosus, scgmeolis ovatis aculis* Corolla lulea, faace pilosa. — In Trigidis Parami Guamani inter Chulucanas et Guancabamba Peruvianorum.
24. C. SIBTHORPIOIDES II. B. Klh. 1. c. f - Kth. I. c. - G. Don I. c. no. 23. - Caulib. herbaceis procumbenlib.; ramis hispido—pilosus; foil, petiolatis ovato-subrolundis aculiusculis cordalis crenalo-incisis, ulrinq. piloso-hirtis; llorili. terminalib. corymbosis; pedunculis glanduloso-pilosis. 2|. — Folia membranactff. Calyx glanduloso-pilosus, segmenlis ovalo-oblongis oblu>is; corolla lulea. — Crescit locis gclidis mo mis Gualgayac prope fodinas Micuipampenscs in Peruvia.
25. C. SAXATILIS H. B. Klh. I. c. f - Klh. I. c. - G. Don I. c. 001. no. 24. - Caule herbaceo credo; ramis villosopilosus; foil, breviter petiolatis ovalis oblusiusculis, basi rotundalis subcordatis inciso-crenatis, supra birlis, subtus incanotomentosis; corymbis terminalib., pedicellis pilosis. 2|. — Folia 0-IO-pollicaria; (lores magnitudine illorum *C. pinnalae*, cuprei. Calycif segmenta ovala acou. * Crescil locis saxosis montis Chimborao ID summa planiUe Slsgun.
26. C. LANCIIFOLIA II. B. Klh. I. c. 383. t — Klh. I. c — G. Don I. c. no. 25. - Caule licrbacro subcrecto ramisq. pilosis; foil, petiolatis ovatis aculis, basi truncato-rolundatis subcordalis, grosse serrato-crenalis, utrinq. adpense pilosis, soblus albidis; podunculis terminalib. subgeminis pilosis. ^ — Folia pollicaria v. sesquipollicaria. (alyc pilosus, segmenlis rolundato-ovalis aculis. Corolla magna lulea glabra. - A C. *bicolori* acre distinguenda. — Crescit prope urbem Quito.
27. C. OVATA Sm. Icon, inedit. 1. t. 3. - Vabl, Enum. pi. I. J82. — G. Don I. c. no. 20. — Erecla ramosa, pilis longis albis veslita: foil, ova lit obsolete crenatis v. serralis, brevüer peliolalis; pedunculis geminatis fliformib. folisq. longioribus. O — Rami Infcriores opposili, superiores alleroi, dichotomi. Folia pollicaria obsolete crenata v. inlegerrima. Corolla parva. — *C. inUgrifolia* Lion. Suppl. 80.

*) T. INFLEXA Its. e(Pat>. I. e. — Foil, ocofu QCUHM crenulatit; peilunculit inlexis 3-4-floru. Clw — Mania suffruticosa icandens. Caulu rnmotistitnus tern, cortice srbriutculo tenui Mecafnrnte tectut, tandem ffrruginen-purpuratcens laec« nitidulus, rami brachiati inflexi; folia petiolala orata acuta e medin ad #ipi-cem crtnulala, saype horizntaliter detlexa patenlia, sublus terwtUima subin-can a, pclioli contiali; pyduncuU nsilians vt lerminalcs brnrhiali injlxi longi 4- (saepe H-)/lori; pedicelli mbacuales umhrUaii, folia 2 vrata sub uuaris umbella; calyx i/uadnpartitus lulrsrens, Incimii lateralibus vis lalioribus; corolla luico-aurea; fflmnrnta duo lineari-subulala, lonyiludinc labii suprioris. — In Cantae pratructis eresHl fin I'cruriaK

- (nee Syst.) — *C. dichotoma* Lam. Illustr. gen. I. 52. — *C. bilora* Rz. ct Pav. Flor. Peruv. I. 10. f t. 20. fig. a. — Crescit in Peruvia.
28. *C. BICRENATA* Rz. ct Pav. I. c. 13. | I. 23. fig. b. — G. Don I. c. no. 27. - Erecta ramosa: Toll, breviter petiolaris ovalis duplicate-serratis v. crenalis, infn tomentosus; pedunculis axillarib. terminalibq. corymbosis, ad basin foliis geminis instructis, pedicellatis umbellatis pilosis inaequalibus. Q — Herba annua bipedalis: caulis teres; folia rugosa, superiora serrata. Petioli connati hirsuti. Pedicelli numerosi hirsuti. Calyces villosi. Corolla lutea, calyce duplo major. — Crescit in Peruvia in nemoribus ad Cuchero.
29. *C. HETEROPHYLLA* Rz. ct Pav. I. c. 16. f t. 21. fig. b. — G. Don I. c. no. 28. — Pilosissima crecia: foil, petiolatis ovato-ellipticis subcordatis serratis; pedunculis longissimis dichotomis. 2|. — Plants herbacea hirsutissima. Villi ferruginei biformes, longiores setosi articulati, breviores glandula terminati. Rami Gbrillosa. Caulis erectus pedalis quadrangularis ramosos. Rami creclo-patuli purpurascenles. Folia petiolata palcnlia ovala elliptica subcordata oblonga subrolundaque serrata, saepe duplicalo-serrata, sublus venosissima. Pedunculi lerminalis et ex axillis superioribus, viscosi, pedicellis longissimis dicholomis unifloris, 2 ex dichotomia inferiori inaequalibus, reliquis solitariis. Calyx strialus patenlissimus. Corolla lulea semiaperla glabra; stamina exscrta. — In Peruviac sylvis (Mufia).
30. *C. LOBATA* Cav. Icon, et descr. pi. V. 20. t. 443. fig. 1. - G. Don 1. c. no. 29. — Erecta: foil, cordalis lobalis serratis, infra tomento piloso vestilis; caule dichotomo rubro piloso; pedunculis terminalib. qualernis, 2 ccntralib. unilloris, laleralib. duobus trifloris. 2} — Folia petiolata villnsa quinqueloba, supra villosa, lobis brevibus. Petioli pilosissimi, folio parum longiores. Segmenla calycina ovala trisolcata. Corolla lulea, labium infehus loogiludinaliier linealum magnum. — Cretcil locii siccis in PeravU.
- ** *Suffruticosae: foliis oppoülis.*
31. *C. LANATA* H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 383. t — Kih. Synops. plant. aequinoct. II. 130. — G. Don I. c. no. 30. — Suffruticosa, densissime albo-lanata: foil, petiolaris deltoideo-ovatis aculis leviler cordatis duplicalo-crenalis; corymbis lerminalib. fasligiatis. 5 — Folia 2-3-pollicaria. Corolla roagna lutca glabriuscula. — *C. bicrenalae* affinis. — Crescit locis lemperatis regni (Juitensis inter Alausi et Pomalacla.
32. *C. STRICTA* H. B. Kth. I. C. #0. f - Kih. I. c. 133. - G. Don I. c. no. 31. - Frulicosa (?): rami* strictis, juniorib. glulinosis; foil, petiolaris lanceolato-oblongis valde acuminatis, basi anguslalis denticulatis glabris; corymbis lerminalib. jubdicholomis, pedicellis glutinosin. 5? ^j.? — Rami gl*bri mbescenlci, Juniorea viscosi. Folia glabra, infra pallidiora tubvifcosa quadripollicaria. Corolla lulea glabra; ovarinm glabrum. — Cretcit locif tenperalis inter Damen Vinajacu el urbem Loxae Jlovo-Granatentiam.
33. *C. PADIFOLIA* H. B. Kth. I. c. t - Kth. I. c. IM. - G. Don I. c. no. 38. - Frulicosa: ramulis subglutinosus; foil, petiolaris oblongis aul ovalo-oblongis aruminalis, basi acutis dentatis glabris; florib. lerminalib. corymbosis; pedicellis suhglutinosus. 0 — Rami (elragoni nilidi glabri. Folia subbipollicaria, infra pallidiora. Segmenla calycina ovata acula. Corolla lulea ripstilaqur glabra. — *C. drflexa* Willd. lib. — Cre^cil prope pagum Ayavaci Prruvinnorum.
34. *C. KKRKI* (,I\KA Moris, Mcmorie di Torino XXXVIII. 137. } I. 46. - Caulo suftruicoso elalo glabro rigirin ramoso; foil, opposilis lanceolato-linoarih. oblusiuiculis in pniolum allenuatis oblusiusculc denticulaiin, »uprrnr Rlibri«. inferno feim|inelf reticulaio-veno9i»Himis lacunotis; panirula terminal! lata, rami* subcorymbotlf; pedunculis uniOorit. 6 - Crescit in Chili.
35. *C. BERTRI* Moris I. c. HL — Caole suffhilicoto erecio ramo«o gltbriuffulo; rami« Mriclit; foil, oppositi* ovato - linqeolali* In petiolum atrnuaif aculi* serratis ulabri%, jublui pttlidiorih.; paniculin terminalib., rami* *»ubrorymbo»i«. \$ -- Crescit in Chili.

- 36 C DERLEXA Rz. et Pav. F. Peruv. I 18 f t 30. fig. b. - G. Don 1. c. no 3J. - Fruticosa ramulis VISCOSIS purpureis; foil. ovato-lanceolalis serratis, infra canescentib.; pedunculis axillaribus terminalibusque, pedicellis umbellatis villosis. 6 — Caulis biulnans teres glaber ramosus. Rami erecto-paluli, juniores viscoso-resinosi Millosuli. Folia deflexa breviter petiolata ovato-lanceolata acuta, supra lucida, subtus albicanlia, serrulata, summa integerrima, petiolis connatis; pedunculi axillares et terminales longi umbellato-dichotomi 4-5-flori, foliis duobus lanceolatis suffulti, pedicelli inaequales, (lores nultantes; corolla luteo-crocea, labio in fenon tentucoso incuno. — In Peruviae provincia Caxatambo ad Iorrenies.
37. C. VISCOSA Rz. et Pav. I. c. ft- 30. fig a. - G. Don 1. c. no 34. - Tola resinosa-viscosa fruticosa Toll, petiolalis ovalis aculis serratis, infra canescentibus; pedunculis axillaribus et terminalibus, pedicellis umbellatis; calycibus lomenosis. 5 - Caulis ramosus erectus teres, rami compressiusculi obsolete lelapom. Folia subting venosa albicanlia, aliquando biserrata. Pedicelli laterales triflori, intermedii uniflori tomentosi compressi; corolla luteo-pollida, exclusis leviter pubescens. — Folia tria *Teuenum Marum* redolent et amanssimo sapore sunt praedita. — Crescit in Andibus Peruvianis provinciarum Cania et Tarma.
38. C. FLEXUOSA Rz. et Pav. 1. c. 17. t * «& Gg- «• - G. Don 1. c. no 35. - Fruticosa, glanduloso-villosa: ramis flexuosis; foil, cordatis Inaequaliter et obtuse renatis, petiolalis remolis, supra asperis, subtus venosis; pedunculis axillaribus terminalibusque, multifloris, pedicellis umbellatis. 6 — Villosa, villis articulis glanduliferis. Caulis erectus teres ramosus asper, rami consimiles flexuosi. Pedunculi longi infidi umbellati 7-11-flori. Calycis lacinae patentes, lateralibus latioribus Corolla lutea. Filamenta labii superioris longitudine, post pollinis effusionem dellexae — In praecipuis Canlac in Pennia crescit.
30. C. MV4LIS II. R. Kth. I. c. 381. t - klh. I. c. 134. - G. Don 1. c. no 30. - Fruticosa ramis foliisque glabri* petiolalis ovalis aculis, basi aculeis crenato-serratis subconnatis, sublus flavescens; corimbis terminalibus, floribus umbellato-fasciculatis; pedicellis hirtellis. 5 — Folia 0-11 lineas longa, petioli pilosi. Calyx pilosus, segmentis ovalis aculis. Corolla lutea glabra. Capsula globosa. — *C. faictulala* Willd. lib. ex Lnk. Jbrbc. dcr Genchsknd. I. 3. p. 53. — Crescit in frigidissimis nivosis in monte Assuay prope Los Parcdones et planitiem El Pullal in regno Quilensi.
40. C. SCARRA Rz. et Pav. I. c. 10. f t. 90. fig. a. - G. Don 1. c. no 37. — Fruticosa luspida ferruginea: foil, subsessilib. oblongis venoso-linealis denutis hii-pidis; pedunculis axillaribus terminalibusque solitariis unifloris folia acquantibus 5 — Caules inpedales plures virgati teretes purpureo-ferruginei ramosi, superne dichotomi. Rami leviter sinuati bracteae axillares. Folia approximala subsessilia rugosa patentia, marginibus revolutis. Pedunculi ex axillis superioribus, fere corimbis efficientes. Corolla lutea panna — Crescit in Peruvia in praecipuis Tarmac et Muffiac.
41. C. HERBERTIANA Lindl. Rot. Regisl. I. 131J f - G. Don 1. c. 605. no 38. - Caulis fruticosus ramosus, foil oblongis rugosis crenatis pubescentibus, utrinque concoloribus; pedunculis terminalibus corymbosis pilosis; corollae labello cuneato obulso. 5 — Caulis pilosus. Folia inferiora ovato-oblonga oblusa petiolata, superiora sessilia. Corollae labium inferum maximum. Corolla lutea, intus maculata - *9. parviflora* Lindl. Rot. RegUt. L 1579. — Crescit in Chili.
- 42 C MORISII Wlprs. mss. — Caule fruticoso rigidiusculo ramoso, lana demum decidua villosa, foil, oppositis subsessilib. ovalo-lanceolatis, basi dilatatis, sursum attenuatis* obtusiusculis serrulatis, superne glabriusculis, inferne puberulis cum foenis "i-0 lincas longis" commixtis; pappi icmnnali subsimplici foliosa, pedicellis 1-doris, S — *C. mUnfaUa* Moris, Marmorie di Torino \XX\1t1 130 nec Rz. et Pat — (rscil m (Inli
43. C MOLLKSSIMA VMprs >o^ ail acad tais Leopold Carol nal curios XIX Suppl. I. J06 — Fruticosa ramosa villosa pilosiusculis, foil petiolatis ovalibus,

basi longe cuneatis obtusis, remote serrato-dentatis, utrinq. densissime tomentosis, summis sessilib. cordato-ovalis integerrimis v. denticulatis; florib. umbellato-corymbosis luteis. 5 — Fruticulus pedalis. Folia inferiora 2', pollices longa, pollicem lata, summa 8 lineas longa, 5 lineas lata. Labium corollae inferius ovato-globosum elongatum. Calycis lacinae ovalae acumioalae. — Crescit in Chili ad urbem Valparaiso.

44. C. PLLVERLENTA Rz. et Pav. 1. c. 19. - G. Don I. c. no. 39. — Fruticosa: ramis scabro-pulverulentis canescentibus; foliis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis dentato-serratis; pedunculis axillaribus solitariis, plerumque quadrifloris. 5 — Crescit in Peruviae provincia Cania.

45. C. SALICIFOLIA Rz. et Pav. I. c. 18. t t 19. fig. b. (nee Moris.) — G. Don I. c. no. 40. — Fruticosa glaberrima: foliis ovato-lanceolatis serratis nitidis, supra viscosis, infra rugosis canescentibus; pedunculis terminalibus geminatis; pedicellis quaternis, intermediis unifloris, lateralibus trifloris. 6 — Caulis sexpedalis erectus teres ramosus fragilis, duplici cortice tectus, exteriori cinereo membranaceo rimoso, interiori rimoso. Rami brachiati obsolete tetragoni teneri viscoso-resinosi. Folia patentia v. deflexa *Salviae officinalis* instar, duo sub singulis umbellis umbellulisque serrata integerrimaque. Calycis lacinae in fructu deoexae. Corolla maxima sulphurea pubescens, villis glanduliferis. — Crescit copiose in Peruviae praeruptis et umbrosis ad Huassabuassl, Huanuco et Pillao.

45. C. CUNEIFORMIS Rz. et Pav. in Willd. Herb. no. 399., Flor. Peruv. 19. | I. 27. fig. b. — G. Don I. c. no. 41. — Wlprs. Nov. act. acad. Caes. Leopold. Carol. nat. curios. XIX. Suppl. I. 395. — Fruticosa: ramis scabris ferrugineis; foliis oppositis cuneiformi-ovatis profunde serratis, supra venoso-linealis, infra pilosotomentosis; corymbis lenninalibus. 5 — Planta bipedalis birsula. Rami brachiales breviter divisi, raperne dichotome scabri ferruginei. Folia luperne inciso-serrata, margine leviter reflexa. Pedunculi ternales trifidi, pedicellis unifloris. Calycis lacinae ovalae acutae lutescentes. Corolla lutea; semina fulva.

f. canescens Wlprs. I. c. — Folium, utrinque molliter pubescentibus cinereis. —

C. foliata Meyen mss. — Crescit in Peruvia (Chuquito, Arquipa).

47. C. INVOLUTA Rz. et Pav. I. c. 15. t t 23. fig. a. - G. Don I. c. no. 42. - Fruticosa: foliis breviter petiolatis ovatis acutis serratis glabris; pedunculis axillaribus terminalibus unifloris; corolla involuta. 5 — Planta tripedalis glabra, caulis erectus leres ramosus; folia rugosa. Calyx reoexus. Corolla involuta calycem semitagens. — Crescit in sylvis Panatabuas in Peruvia.

* * * *Fruticosae: foliis oppositis ternisve tericillatis.*

48. C. BICOLOR Rz. et Pav. I. c. 10. t t 25. fig. b. - Lodd. Bot. Cabinet t. 1783. - G. Don I. c. no. 43. — Fruticosa: foliis oppositis ternisve tericillatis ovatis biserratis rugosis; pedunculis axillaribus ternisve bifloris. 6 — Caulis biulbatus erectus leres ramosus; rami independentes obtuse quadrangulares lignoti fragiles. Folia patentia ovato-cordata acuta duplicato-serrata rugosa venosissima. Pedunculi umbellato-subdichotomi multiflori, pedicelli glanduloso-villosi inaequales lenues. Corolla e medio ad basin alba, superne aureo-sulphurea. — Crescit in praeruptis Cantae in Peruvia.

49. C. DIFFUSA Lindl. Bot. Registr. t. 1374. t t - G. Don I. c. no. 44. - Suffruticosa, procumbens: foliis cordato-ovatis grosse duplicato-serratis petiolatis oppositis ternisve, subtus incanis, floribus terminalibus axillaribus compositis. Ramuli foliaque pubescentes. pedicelli pilosi. Corollae labium inferum superum in oexum, basi album, apice luteum. — Forte eadem ac *bicolor* Ri. et Pav. - *C. bicolor* Grab. Edinbg. New Phil. Journ. 1830. On. 300. n. Ri. et Pav. - Habitat in Peruvia.

50. C. IMFLORA U. et Pav. I. c. 10. t t 90. fig. c. — G. Don I. c. no. 45. - Fruticosa ramosissima: foliis breviter petiolatis oppositis ternisve tericillatis ovatis serratis pubescentibus; pedunculis axillaribus solitariis unifloris, medio foliis 2 inferioribus geminis instructis. 5 — Caulis suffruticosus quadripedalis ramosissimus inflexus;

- rami juniores pubescentes, alio laevis atro-purpurei Folia Juniora subtus tomentosa Pedunculi axillares solitarii, Icrimiales quaterni florum longi uniflori, ad medium diphylli, foliolis unumque pubescentibus Calyx pubescens. Corolla lutea. — Crescit in umbrosis Tarmae in Peruvia.
51. C. DENTATA Rz. et Pav. I. c. 18 t. 29. fig. b. — G. Don I. c. no. 46. — Fruticosa ramulis pilose, foliis oppositis ternisq. verticillatis ovatis argente duplicato-serratis, adulatione glabris; pedunculis terminalibus geminis bifidis, pedicellis in bifurcationibus unilobis, pedicellis reliquis racemosis secundis. 6 - Planta bipedalis hirsuta viscosa, caulis⁴ ramosissimus teres, rami virgati teretes, interne glabri Foliorum dentis acuti, folia adulta glabra. Pedunculi terminales corymbosi, pedicelli* tenuibus flexuosis. Corolla lutea glabra Semina fulva. — Folia sapore amansuculo (corlicis Peruviano accedenti) praedilecta sunt. — Crescit in sylvis ad Conceptionem Chilensium
52. C. VIRGATA Rz. et Pav. I. c. 20 t. 31. fig. a. - G. Don I. c. no. 47 Fruticosa: ramis virgatis pubescentibus, foliis breviter petiolatis oppositis ternisq. verticillatis ovalibus obtuse serratis pubescentibus; pedunculis axillaribus terminalibus multifloris 6 — Planta suffruticosa, *MeUttae Calamtnlhae* babilu, raulis bipedalis cretus teres ramosissimus; rami erecti oppositi terminales inaequales fragiles, juniores purpurascens leviter pubescentes. Pedunculi dichotomi florum longi multiflori, terminales quaterni, axillares solitarii, pedicellis unifloris v. aliquando bifloris. Corolla parva lutea, ore punctis purpureis maculato, ad basin villosa, ultra basin hinc transversali purpurea. — Crescit in Peruvia prope Canum.
53. C. ANGUSTIFLORA Rz. et Pav. I. c. 17. j. I. 28. fig. a. - G. Don I. c. no. 48. - Lindl. Bot. Rec. t. 1742 | — Fruticosa. foliis breviter petiolatis oppositis ternisq. verticillatis ovato-lanceolatis argute serratis pubescentibus, pedunculis axillaribus terminalibus oppositis | ternis | verticillatis, plurimum quadrilobis folio brevioribus, corollae labio superiore ad basin valde angustato. i — Caulis bipedalis* cretus teres ramosissimus belvolus, rami oppositi terminales fragiles, juniores hirsuti purpurei. Folia tenuia venosa, unumque pubescentia, foliola sub quatuor pedicellis opposita lanceolata Integra. Pedicelli graciles subaequales. Corolla parva lutea, basi intus punctis purpureis maculata angustissima. — Crescit in Peruvia ad vicum Obrajillo
54. C. VERTICILLATA Rz. et Pav. I. c. 17. - G. Don I. c. no. 40 - Fruticosa glabra foliis ternis verticillatis cordatis aculeis serratis, breviter petiolatis; pedunculis quadrifloris axillaribus. ^ — Caulis teres ramosus, rami erecti oppositi palmati colones Folia omnia verticillata. Sub singulis binis pedicellis folium unum. Corolla lutea. — Crescit in Peruvia provincia Canta In praeruptis ad Quil
55. C. TERMINATA Cav. Icon. cl. descript. pl. V. 30. t. 450 fig. 2. - G. Don I. c. no. 50. — Fruticosa foliis petiolatis ternis verticillatis ovato-lanceolatis serratis, pedunculis axillaribus terminalibus multifloris. 6 — Caulis fuscus teres, rami terminales verticillati. Folia glauca, superiores sculata, gemmae ad basin pedicellorum. Calyx quam in praecedente major. Corollae labium inferius baui alleolum. — Forle a *C. glauca* baud satis difleri. — Crescit in Peruvia.
56. C. GEMELLIFLORA Cav. L. c. 30. U. 430. fig. 1. — 6. Don I. * DO. 51. - Fruticosa: foliis petiolatis ternis verticillatis ovalibus serratis glaucis aabscissilib; pedunculis axillaribus terminalibus bifloris, folio brevioribus. 6 — Caulis ramosus Folia aculea glauca, ad basin pedicellorum geminata. Corollae labium inferius faucem auctum. — Forle a *C. angustiflora* baud satis difleri In Peruvia crescit.
57. C. MILITARIA V. (av. I. c. 20. I. 449 - G. Don I. c. no. 52. - Fruticosa Miliosa foliis ternis verticillatis ovatis serratis subsessilib, pedunculis terminalibus paniculatis ;) — Kami obscuri purpurascens Folia basi subrotunda. Panicula pedalis calyce segnienta terminali (corollae labium inferius faucem auctum) - (crescit in Peruvia prope Liroam

- 5*. *C. GLAUCA* Rz. et Pav. 1. c. 17. f t 27. fig c. - G Don I. c. no. 53. —Fruticosa: foil, opposite ternisq. verlicillatis lanteolalis maequaliler serralis, pedunculis terms qualernisvc umbellalis tnflons, ad basin folns angusle lanceolalis insiruciis. 5 — Caulis tnpedalis ramosissimus teres. Rami erecti term opposiliq lignosi fragiles tereles, jumores leviter pubescentes purpurascntes. Folia paicnlia >enosa, ulnnque loiter pubescentia, supra glauca, serraluris aliquando interruptis Corolla sulphurea, saepe ad basin inlenorem punclis purpureis maculala Capsula parva. — Crescil in Peruviae provincia CanU ad vicum Obrajillo.
50. *C. TRIFIDA* Rz. et Pav. I. c. f t. 26. fig. b. —* G. Don I. c. 000 no. 54 — Fruticosa foil cordalo-ovatis oblase serralis, infra canescentib., infenonb. opposilis petiolatis, supenonb. terms verlicillatis sessilib. glanduloso-villosis; pedunculis axillanb. terminalibq. 3-8-fions. 6 — Caulis 2-3-pedalis erectus ramosus glaber teres; rami jumores leviter tomentosi Folia crenalo-serrala, supra leviter pubescentia, subtus canescenlia, villi» glandnlifens. Pedunculi axillares et terminaliales solilam longi tnfdi umbellati, pedicelli intermedn umflori. Corolla lulea — Habet vires febrifugas el antisepticas. — In Peruviae umbrosis ad Chuchin.
- §. 5. *Fohxs oppostis serratu v. dentatis petwlatis, petxolxs membranaceo-alatxs; caule folioso.*
- CO. *C. PLECTRANTHIFOLIA* Wiprs. Nov. act. acad. Cacs. Leopold. Carol nal. curios XII. Suppl. I. 905. f — Fruticosa ramosa foil, conferlissimis imbricaiis ovalis acummatis serrato-dentalis, basi allenualis, peliohs basi dilatatis ochreacini connatis glabris, florib. corymbous. 5 — Frulicujus ultra scmipedalis glaber. Folia r/i-pollicana, semipollicem lata, pelioli dilatati membranacei, basi in ochream lalam persistentem amplexicaulem connali, lamina reticulato-tenosa rugosa, secat nervos infra ferruginea pnemla. Flores corymbosi, corymbis dichotomis. Folia in dichotomia piima Unceoltta Integra sessilia. Flores sulphurci, labiom Infemm globosum integram Inflalum, superum minimum — Crescil in Peruvia (Arequipa).
- 01 *C. PERFOLIATA* Linn. Suppl. 80. - Sm. Icon. incdiU I. 4 t 4. - Rz. el Pav. Flor Penn. I. 15. t I 21. fig. a. — Mulis, Americ. I. t. 3 — D. B. Kth. Nov. gen. et spec. pi. II. 384 f — Kth. Synops. pi. aequin. II. 130. — G Don I c 000. no 55 — Herbaea ramis pilosis; foil, triangulari-sagillatis acuti» duplicalo-serrato-inci»i», supra birlis, subtus tomentoso-pubescentib et incanis, peioliis membranaceo-alatis connalis, corymbis terminalib. subdichotomis, pedicellis pilotis. 2]. — Folia scsqui-bipollicana. Corolla lulea glabra. Olanum pilosum — Plania a RUIZIO et Patonio glanduloso-villosa viscosa folnsque spaibulalo-sagillalis describiur. — Crescit locis lapidosis Peruviae (MuBa, Chuncao etc)
- tt. *C. TOMENTOSA* Rf. et Pav. I. c. 15. f t. 24. fig. b. - G. Don I. c. no. 56. - Herbaea: ramis pabeteentib.) foil. spathuUto-cordalis inaequalier lerralis, infra tomeototis, petlollt mraibraBao«o-aUUs connatis, corjmbis irrminalib. pubescnubus. 2]. — Caulis qoadnpedalis erectus lercs glaber. Folia supra leiler pubescentia rugosa, peliolis connatis alatis serratis. Pedunculi lucti 0-8-0on, pedicellis umbellatis Caljces \indi-lulescentes. Corolla lulea magna — Maumam aflimlalem cum *C. perfohata* habeL — trescil in unibro»i» Tarmac, Muðac, Cu-chero et Huassahuassi in Puruvia.
63. (*PETIOLAR*fe Cav. Icon, et descript pi \ 30 I 445 - G Don I c. no 57 — Herbaea ramosa pubescent, foil infenonb in peliolum alaium altcnualis duplicato-dentatis, supenonb ovatis subcordatis ncessilib. connatis Ucniaio-sfr-ratis, floralib. lotegernmis, racemis solitarns anllarib v geminaiis lerrimalib. >Hian ternii, pedicellit, calycib. ovarntq glaodulo»o-villofis, corollac labile am* bobui subatquaiibus ^ — Planta apicera versus magis pubescent >isco»a Folia 7-pollicana, 4 pollices lata ovaia acumin«ta Pedunculi communes infra medium bib'ii, ramis iteram bifidi«. t.orolla pallide lulea pubcrula (*connata* Hook Dot Magai. t. 3970. - Loddig. Bol. La bin I XtjOl - *C. loutunda* Lindl **Bot**

- Regist. t. 1214. (nec H. B. Klb) — *C. paniculata* Herbert rass — *Baea alata* Pers Enchir I, 15. — Crescit in America australi (Guayaquil).
64. *C. RUBOSA* Rz. el Pav I. c. 19. t. 28. fig. b. — Loddig Bot. Cabin, t. 942 — G. Don I. c. no. 58. — Fruticosa: foil, lanceolalis maequaliter serralis rugosis pubescentib., petiolis alalis connatis; corymbis terminalibus. 6 — Planla suffruticosa pubescens *Saetae officinalis* habitu, bipedals erecta ramosa. Caules teretes. Folia bidentata rugosa, sublus venosissima. Pedunculi terminates et axillares dichotomi multiflori subcorymbosi, flores sulphurei. — *Calceolaria Salviae folio* Feuill. Pruv. HI. 13. t. 7. — *C. integrifolia* Linn. Spec. plant. I. 49. — *Calceolaria Salviae folio* Isec. — Crescit ad Concepcionem Chilensium.
65. *C. ROBUSTA* Alb. Dielr. in Olto et Dielr. Allgem. Gartenzeitg. I. 73. - Fruticosa: foil, oblongis, basi attenuatis connatisq. irregulariter crenatis rugosis, subtus subalbidis; caule calycibus viscoso-pubescentibus; paniculis terminalibus. 6 — Crescit in Chili prope Valparaiso.
66. *C. AITACHNOIDEA* Grab. Edinb. Philos. Journ. 1828. p. 572 - Lindl. Bot. Regist. t. 1454 — Hook. Bot. Magaz. t. 2874. — Loddig. Bot. Cabin, t. 57. — Rchb. Flor. exotic, t. 290. — G. Don I. c. no. 59. — Caulis herbaceo ramoso patentibus foliis cum pedunculis, pedicellis, calycibus ovarisque arachnoideo-lanceolatis, foliis imbricatis-oblongis parum dentatis in petiolum longe alatum attenuatis, petiolis basi connatis; pedunculis terminalibus geminalibus elongatis dichotomis 6 — Folia cum petiolis quinquepollicaria rugosa, folia 2 supra minora sessilia cordata ovata, ad pedunculorum insertionem sita. Corolla concolor obscure purpurea
- 0 Ian at a Wlprs. Nov. act. acad. Caes. Leopold. Carol. nat. curios. XIX. Suppl. I. 397 — Foil minoribus nudo-lanceolatis, pedunculis aphyllis paucifloris — In Chili ad Rio Maypu crescit.
- y. refugens* Sweet, Brit. flor. gard. (Neser) III. I. 227 — r. (*tortosa* Gillies mss. — Yanetales pluniae hibernicae hortensae ex hac alusque speciebus ortae occurrunt — Crescit in Chili.
07. *C. IMEGRIFOLIA* Linn. Act. Uolmicns. 1770., Sjsl. pi. I. 61. - G. Don I. c. no. 60. — Fruticosa foil, ovato-lanceolatis v. lanceolatis denticulate serratis opacis, infra ferrugineis, petiolis alalis connatis; caule calycibus pubescentibus, paniculis terminalibus corymbosis pedunculatis. 6 — Corolla lutea.
- £. *integrifolia* Hook. el Am. Bot. Beech, voy. 39. — Foil, ovato-lanceolatis argente serratis. — *C. integrifolia* Lindl. Bot. Regist. t. 744. — *C. rugosa* Hook. Exotic Flora II t. 99, Bot. Magaz. t. 2523. (nec Rz. el Pav) — *C. salviaefolia* Pers. Enchirid. bot. I. 15 — Cham, el Schleichl. Linnaea II. 5a). — *Chacaul* Feuill. Pruv. HI. 13. t. 7. — Crescit in Chili.
- y. angustifolia* Lindl. Bot. Regist. I. 1083 - Foil, ulrinque attenuatis prope denticulatis, paniculis longis pedunculatis — (*rugosa* ? *angustifolia* Martens Nov. act. acad. Caes. Leopold. Carol. nat. curios. III. Suppl. I. 307 — *ferruginea* Knze in Poepp. Coll. pi. Chil. no. 8 — In Chili ad Valparaiso.
- d. incisa* Foil irregulariter geminata-dentata — *C. rugosa* r. *incisa* Wlprs. I. c. — Crescit in Chili prope Valparaiso.
- *. *viscosissima* Hook. Bot. Magaz. t. 3214. — Suffruticosa viscido-glandulosa foil caulibus oblongis rugosis sessilibus cordatis v. amplexicaulis v. connatis crenatis v. irregulariter denticulatis; paniculis confertis corymbosis; corollae lobis subaequalibus. — *C. viscosissima* Lindl. Bot. Regist. L. 1611 — (*rugosa* var. *macrophylla* Honor. — Crescit in Chili.
68. *C. AS* (h) DE (S) Lindl. Bot. Regist. I. 1215. | - G. Don I. c. no. 61 - *aulo* suffruticoso ascendente glabro piloso; foliis ovatis petiolatis rugosis, denticulatis pubescentibus, infrenatis basi acutis, umbellulis paucifloris subramosis longe pedunculatis b⁹ — Caulis pilosus Folia superiora sessilia. Corolla magna aurantiaca. Calycis lacinae rotundatae tomentosae — (*integrifolia* n. *rugosae* var. *alida* affinis. — Crescit in Cordillera Chilensis.

69. *C. CEILOENSIS* Lindl. Dot. Regist. I. 1476 t - G. Don I. c. no. 62. — Caulo glanduloso-piloso; foliis, caulibus oblongo-lanceolatis undulatis argute dentatis, utrinque pubescentibus, superis integerrimis; cymis multifloris; calycibus bracteisque glanduloso-pilosis; corollis luteis. 6 — *C. spedabihs* Knz. in Poepp. Coll. pi. Cbil. no. 4. — Crescit in insula Cbiloc ad oram regni Cbilensis australem.
70. *C. PISACOEINSIS* Meyen, Reise um die Erde I. 469. — Wlprs. Nov. act. acad. Caes. Leop. Carol. nat. curios. XIX. Suppl. I. 396. — Caule credo ramoso fruticoso; ramis glanduloso-villosis; Toll. subsessilib. cordatis acuminatis grosse et irregulariter crenato-serratis, margine revolulis pennatis, secus nervos glandulosos, supra scrobiculatis; corymbis dichotomis subumbellatis multifloris; corollae labio infero maximo orbiculari. 6 — Folia 16 lin. longa, 8 lin. lata, petiolis (basi connatis) vix lineam longis, omnia serrato-crenata, suprema lanceolata. Pedunculus terminaliter bifurcus, in quavis bifurcatione umbellam plurifloram gerens. Flores brunnei, diametro 7-8 linearum. — Valde affinis *C. Chiloivi*. — In Pennia (Arequipa) crescit.
71. *C. POLIFOLIA* Hook. Dot. Magaz. I. 2897. — Lindl. Dot. Regist. t. 1711. - G. Don I. c. no. 63 — Suffruticosa, undique albo-lanata Toll. petalis v. oblongis crenatis in petiolum attenuatis, petiolis basi connatis; pedunculis elongatis terminalibus dichotomicis, floribus corollis. 5 — Labium corollae superius parvum palchre luteum, inferius obscurius luteum. Calycis lacunae interiores. — Crescit in Cordillera Gbilensis.
- §. 0. *Caule folioso, foliis distincte sessilibus.*
72. *C. MTIDA* Moris, Memorie di Torino XXXVIII. 239. — Caule suffruticoso credo ramoso diffuso glabro; ramis simplicibus; foliis, oppositis sessilibus nitidis ovato-lanceolatis, inferius. et caulibus remote serratis, superioribus integerrimis, panicula terminali laxa foliosa, ramis subcorymbosis. 6 — Habitat in Chili.
73. *C. SESSILIS* R. et Pav. Flor. Peru. I. 18. t — Lindl. Bot. Regist. t. 1820. f — Suffruticosa foliis lanceolatis acuminatis crenatis rugosis, inferius crenatis, ramis biternatis terminalibus dichotomicis; corollae labiis subaequalibus venosis. 5 — Caulis erectus teres bipedalis fragilis. Folia semiamplexicaula connata Pedunculi umbellati dichotomi Pedicelli uniflori. Corolla lutea. — Crescit ad conceptivum (hilosium).
74. *C. (MF: > T)* Lam. Encycl. meth. I. 50. - G. Don I. c. no. 007 no. M. - Suffruticosa: ramis villosis, ramis rotundato-lanceolatis sparsis, inferius pilosis, supra villosis; perianthiis atillatis. terminalibus foliis longioribus, pedicellis calycibus. ^i^ - ando - villosis, pedicellis ^parsim (unc)modis. 5 — Folia sesquipedalica illis *Rhinanthus Chnslae galli* baud diostemilia. — Crescit in Penna.
75. *C. AMPLEXICAULIS* H. B. Kill. Nov. gen. et spec. plant. II. 3M. f. t. 171. - Kth. Synops. plant. aequid. II. 136. — G. Don I. c. no. M. — Suffruticosa ramis pilosis; foliis, amplexicaulis. ovato-oblongis acuminatis cordatis crenatis serratis; pedicellis pilosis hirtis; corymbis terminalibus; floribus umbellato-furcatis. 6 — Folia infra pallidiora simpliciter pollinosa, demum rotunda. Corolla lutea glabra ovarium glandulosum. Pedicelli affini hirtis vix distineti. — Crescit in ripa fluminis s. in Prudro mirr. 4. hillo r. Connato.
76. *C. IIORIBIMM* H. B. Klh. I. c. 50. - Kit. If. - (I. Don I. r. no. 67. - Suffruticosa ramis pedicellis hirtis elandulatis, foliis ampliviraulibus laevibus ariiminatis rordianis drntur. ^, Mjbm hirtollis, ramis hirtis parrulotis ariiminatis; floribus simpliciter ^ - Folia supra hirtis tmdia, infra pallidiora vinda, simpliciter pollinosa. Floribus simpliciter ^i^ ullo. Corolla glabra luteo-aurantiaca. Ovarium pilosum. - Crescit in urbe Quito.
77. *C. THRSIFLORA* Grab. Kdinhrffh. Ph. lot. Jo. urn. f. p. H. rx. Hook. R. M. I. c. F. |. tiv. - Loddig. Bnt. Cabin. t. 1W9. - G. Don I. c. no. 6* - Suffruticosa ramis villosis foliis linearibus, utrinque alternis lineariter rordianis. ^i^ ^i^ . in rut lennatis. affurgatis; pedunculis simpliciter ombeatis. ^

Rami scabri obsolete glandulosi Folia 2 poll longa, 2 lin IJU di»u title s<err>»u, deniibus reflexis. Flores lulei aggregali, exlus glabn, intus puberuli — Cre&cil in Chili circa Mendozam.

%. 7. *Folia Integra vel integerrima; caule folioso.*

78. C. HOSMARIMFOLIA Lam Diet. I. 556. — H. B. Klh. I. c. | - Klh I c 1J7 — G. Don I c. no 00 — Suffrulososa volubilis: ramulis pilosiusculis, foil, sessilib., basi comialis lineanb., apice angustatis, margine inlegemmis et revolulis subconaceis, supra glabris, sublus aureo-loiuenlosi*, florib umbell<ilo-corymbose pamculalim disposilis, pedicellis piloso-glulinosis 6^ — Rom» terete* violacci Calyx pilosus vucosus. Corolla lutea glabra, labio inrenon magno. — C. fer-vaginea Ca\ Icon, cl desenpt. pi \. 27. t t 445 fig 1 — Lrc^cil in radicibus monlis Chimborazo prope lacum \anacoche
- 79 C. GRAMMIFOLIA H. B. Klh. I. c. J30. t - Kill I c. - G Don I c no 70 - Suffrulososa crecta ram is glabnuscilis; Toll, sessilib. lineanb. angusiato-aiuminalis, margine inlegernmis et revolulis, supra glabns el subglulmosi», sublus cano-lomenlosis; corymbis lermmalib InGdo-subdicholomi&, pedicellis hirllellis 6 — Rami tereles ad nodos compressi. Folia 4-5-pollicaria, 2'A poll laia (alix pilosus. Corolla glabra lutea. — Valde afDnis pracedenu. — Cretcil in regoi Quilensis comalle Tarquensi.
80. C. LAY A>IDILAEFOLIA U. B. Klh. I. c. t - KUi. 1. C - G. Don 1 c. no. 71. — SuQulico&j ramulib hirllellis; foil, sessilib. lineanb. oblusiusculis, margine inlegernmis cl revolulis, supra glabnuscilis, sublus incano-lomonlosis; Oonb lermmalib. corymbosis; pedicellis glulinosis. 6 — Rami tereles Folia 0-10 lineas longa, lncara v. se&quilineam lala. Corolla lulea glabra. — Differcl a pracedenie prachrlini magmludinc folioruni. — Crescil in devcxis monlis igni\onn Picliin-cbac el Parami de As^uay altitudine 1500 hexapodum.
81. t msSOIMFOLIA H. B. Klh. I. C t - Klh I. c - G Don I. c no 72. - I'ru-licosa ramulis pedicellisq hirtello-glulinoiis, Toll subsessilib. angu>lc lineanb oblusiusculis, margine inlegemtnis cl rexolulis, ulrmq glabn*_ir supra glulinosis, florib. terminalib. corymbosis. vS — Hamosissiraa. Rami icretcs Folia 0-10 lineas longa, infra pallidiora. — Distinguilur a specie pracedente folds ulrin<uc glabris. - C. canetcent Bonpl. mss in Willd Herb — Crescil ad radiccis monlis Chimborazo juxta pagum Calpi el planliem Laisa
88. C. UEMANTHEMOIDES H. B. Klh. I. c. 387 f - Klh. I. c 138. - G. Don 1 c no. 7J. — Fruticulosa ramis pedicellisq. canescenli-puberulis; foil, nubsesulib. suboblonpis, ulnnq. aculis intogerrimis glabrtrt, florib. terminalib subcorymbosis. 6 — I olia oblonga v. lanceoUlo-oblonga 6-0 linvas longa, 2¹/₋₄ lincit» lala, infra pallidiora Pedicelli puberuli. Corolla lulea glabra. — Cresni Inns frigidm Pa ram i de s.iriguru mlcr (lumen Tduchapa r(urbem Loxae Peru^ianorum
83. C. KRMOIDLs Juss m \ahl, Enum pi I 100-11 B Klh. I r j klh I r — G. Don 1 c no 75 — Frulicosa ramosissima mirrnph\|a nmn ruiiferiis fo-hisq ulnnq hirllellis sessilib lineanb , margine m rgernmis <i moluiis, peduncuhs axillanb. terminalibq. 1-3-flons hirhs ^ — Folia 4-5 lintas longa. Corolla par\ a luto puberula. Ovanum pilotum. — Crescil locib scopulosis monlit Igmvomi Pichincha inter scopulum lablahumae el Cataractam Cantunae in regno ^utienni.
84. C. LINEARIS Ri. et Par. Flor. Peruv. I. 10. — G. Don I. c no. 75. - Suffrulososa ramosissima foil, lineanb., margine inltgernmis re\oliusq icntilih , pedunculis axillanb. umflons pubescenlibui. 6 — Cauhs lupedalis irrecs friml^ Folia spssiha, supra nilida, sublms albicanlla. Calycet subbiomeniosi, corolla lute . — In colliuin dcrmiatibu* ad Ocopac collegium in Penniae proMin ia \au\ a
- 85 C ARGEMI.t II B Klh I r W t I 110 - Klh. I r - I. Don I. r no 7t — truhculosi .ilho-lanala Toll prlinlatis stiboblongis, ulnnq aruii<i inU'Crrn-rais, flonb> terminalili axillanbq subholiariis o — Ranu pur\>urat>rrriilm Folia 4-6 lineas longa Lorolla magna lulea glabra - I re>cil loci* obnubili* Parim de Guamani inter pagos GualcaquiUo et buancabamba Perutianorum

80. *C. LANCEOLATA* Cav. Icon, et descnpt. pi V. 27. t. 444. fig. 1. - G. Don I. c. no 77. - Ilcrbacea subramosa foil, linean-lanceolalis integemmis, radicalib peiolalis, caulims sessilib., utnnq. acotis; pedunculis terminalib. solilarns uniflons. 5 — Corollae luleae labium superum brevissimum, inferum longum, basi angustalum. — Crescit in insulis Maclovians
- 87 *C. ALBA* Rz: el Pav. Flor. Peruv. I. 10. f t. 27. fig. b. - G Don I c. no. 78. - Suffrulicosa re»inosa-ti:»cosa simplex: foil, lineanb. remole serratis, pedunculis racemoMs dichotomic 6 — Planla tola *Rosmarinum offxeinale* redolet Caules fragiles Mmplic* aurei. Folia confertissima subconnata lineana anguslissima [Pini babiluy denliculaia margineque scabra, plunma ex singulis axillis fasciculala. Racemi terminates subpaniculati folios!, pedunculi axillares solilani foliorum fere longitudine. Pedicelli inlermedii umOori. Corolla alba. — Crescil loci* andis in regno Cbilensi.
88. *C. ALTERNIFOLIA* Car. I. c. 28. t I. 445. fig. 2. - G. Don I. c. no. IV. - Caul foliorumque pagina infera tomentosis; foil, alterms lineanb., margine inlegemmis revoluus; pedunculis axillanb. Infions. 2I — Folia scssilia >II pollicana Pedunculi >ersu* ramorum apices disposili, foliolis gemioi* ad basin pedicellorum. Corollae labium inferum >enus basin angustatum. — Crescil in Peruvia.

t *Species a typo generis aliena.*

- 89 *C. SI>CLAIRII* Hook. Icon, plant I. 301. - Caule credo pubeicente; foil, elliptico-ovalis grosse duplicate-serralis scabns petiolatis; pamculis terminab., corollae pubescentis maculatae labns concavis, supenore (minore integro, mfcrior obtuse tnlobo, intus basi birsutis. 2I.? — Folia fere (orylt, pedunculi dicholomi, pedicelli gemim unidori in dicholomia, ramuli billon. Corolla aperla, obliqua valde acceden* ad illam *Jovellmae* (3881.). — Crescil in >oirae Zeelandiae jnsula Waibaki.

ft *Specks minus notae.*

C. HYPOLEUCA Erne, in Poepp. Coll. pi. Cblen«. I. no. 7. - Meyen, Rene oni die Erde I. 224

C. MIRABILIS Kn*Is. el WsUc. The Floral Cabinet I 35.117. - (Forma hjbrida,) f t t *Species e genere excludendae.*

C. PLAMAGINEA Sm. - JOVELLANA SCAPIFLORA

f P t V T m \ a h l - JOVELLA>A PnCTATA

V WOLKLYA Cz|. - JO\KLLA.\A VIOLATE4.

333. NCROPII t LIRI t Tournef.

'Tournof Instil, rn herb 71 — Mmn Gener plant va«rul. I. 300. II 217. — Linu. Spec plant 864 — Spr <tjt <rgoi. II 7H3. — W)dlr, M^moires de la socielè dt ph>sique ri d hisloire naturelle de Geneve IV. p. 110 — 170. cum tabulis 5;

tatto L imUA 0. Dta I. e, - (Wydler I. c. 14*

Staminibot quatuor fenilibot, qainlo deficiente st)loque cnrti<i, cip<uH> ob- |r>nKo-p>nforrnibu<, ral)cis lobis profunde inclsis, corollis fla>i>, |obi> conniventibus broibus. — *Ccramanlh** Rchb Flor. excurs. Germ p 370

§. 1. *Ihyrso fohoso.*

] s<K \KR>411s l.mn spec, plant «0i - Schkhr lndhrh II 107 I 171 - S o . Enirl b«l I V7. — llook Flor Londin I 70. Flor Dame t 411 — WaldsU M kit Phm rar. llungar 1.71 — Vtjdlrr I r 145 — Korh, s^nnp* flnr Urrm- (ed I 517 Rchb I-lor nrun J70 no &U7 — Foil ror* i4li« duphcalo-cre- •abt pybcscenlib . raulc* priinliftq villo%i« prdunruli* atillarib 3-7-florit. 0°* rib. corymb«»o-coiigrifit, lacinus calycit oblnngit acuti«ruli« immargmatU* apice r««artit. V — Floret flan in rolortn ?ire«centroi v#rgnrir« lona *upo« riora allerna ninora. Magnilado el forma braceanrai variat. Ctljru Urinia obtu^ae v arulae pott antbetiD paleoitatimae pHlocido-panctaiar, punctu mi* nuu»»imis Ovarian glto<duli« »liplltn» ve»uuum - *Seropkular** (lor* /<''' i. lauh Prodr Hi. ic. t Eifio. Monop irrtrf L 107. fig. g - f*m»*m Pannoni«m

Secundum exoticum Clus Histor 38. Ic. — *Serophularia lutea magna amplifolia* J Bauh Histor III. 422. ic. — *Serophularia lutea* Tabern. Kraulerbch. — *Serophularia annua folio Lamn luteo* Moris. Oxon. Hist 482. sect 5. U 8 fig 2. — *Galeopsu allera luteo ipalltda* Park. Theatr. 006. ic. no 4 — *Serophularia montana maxima latifolia* Barrel. Icon, i 273. — *Ser. eordata* Walds.1 et Kit Plant rar. Hungar. I 75 t. 73. — *Ser latifolia* Host, Flor. Austrac. II. 200 - Crescit in Europae humidis, praecipue montans et in alpebus Caucasiacis.

§. 2. *Thyrso aphylo.*

2 SCR CRITHMIFOLIA Bois« Voyage bot. dans le midi de l'Espagne no. 1227 f — *Glabemma caulibasi lignosis oppositis ramosis, ramis subangulatis, foliis coriatis eo-carnosis, inflorescentiis bipinnatis, lacinis remotis divaricatis, lobis lanceolatis-cuneatis aculis mucronatis, superioribus pinnatifidis, lacinis imbricatis, paniculae glandulosae glandulis brevissimis stipularibus, pedicellis brevissimis minutissime bracteatis; calycis lacinis subrotundis obtusissimis late membranaceo-marginalibus; corollae appendice nullo; staminibus valde exsertis, capsulis globosis-depressis.* ♀

? *alpina* statura minori foliisq. ovatis radicalibus. — In Hispania meridionali
3 SCR. ORIEISTALIS Linn. Spec plant 804. - Schkhr. Hndbch. II 100 t 173 - Wjldler I c f — G. Don I. c no. 3. — *Glabra: foliis, inflorescentiis pinnatifidis-incisatis, superioribus lanceolatis, omnibus regulariter argute ferrugineis; pedunculis subverticillatis, calycis lobis membranaceis ovatis. Stigma* — *Caulis 3-4-pedalis glaber ramosus 0-8-angulans. Rami axillares terminati v. caudicis verticillati. Folia leroa v. quaterna verticillata, inferiora basi pinnatifida v. appendiculata, segmentis pedicellatis», omnia acuminata Pedunculi terminati v. quaterni subverticillati, interdum alterni 2-J-fidi, pedicellis alternis Bracteae interdigitatae verticillatae Calycis lobis postquam anthesin clausi paulo accrescentibus. Corolla exclusa luteo-vindix, minus longitudinaliter purpureo-striata, lobis lobis superioribus minus brevioribus multo, uti lobis lateralibus Stili staminibus longior. Stigma subsimplex pilosum Tapsula oblonga cornea acuminata. — *Serophularia orientalis foliis cannabina* Tourn. Corollae lobis - *Ser. bulbifolia* M. Bieb. Flor. Taur. Ctucts. III. 415. II. 77[^] (nee Lnk) — Crescit in Oriente et in Sibiria.*

4. SCR. PALCIFLOHA Bth. Scrophul. Indie 17. - G. Don I c. no. 2. - *Glabra caule laxe angulato; foliis, subrotundo-ovatis grosse et acute duplicato-terracinae lobatis, thyrso elongato aphylo paucifloro, cymis abbreviatis remolitis, caretis lacinis lanceolatis acutis non membranaceis, capsula brevioribus; genitalibus inclusis* % — *Corollae luteo-centris laciniis subaequales. Capsula otata obtusa. — Habitat in Gossain Than Indiae orientalis.*

5 SCK HIRTA Lone, Transact, of the Cambridge Philos. Soc IV 21 - *Folium cordato-oblongum; arulis, basi subaequalibus excisis, argute duplicato-incisocrenatis, utrinque petiole cauleque truncatulo villosis, pedicellis latis subulatis appendiculatis» hirsutis, inflorescentiis ramis trichotomo-racemosis, racemosis ramosis; pedunculis glandulosis-pubescentibus, calycis glaberrimis lacinis obtusissimis», corollae lobis superioribus lobo intermedio retolulo, lobis prominulo minuto, superioris rudimento staminibus quinque papillaeformibus minutissimis brevi; genitalibus exsertis.* "4 — *Habitat in Madeira umbrosis.*

SaeUoU. 8000000000 6. Dai L o.

Slamine sterili basi adnato apiceque libero dilato spalulato tel marginali et remiformi, segmentis calycis rotundis vel ovatis, plerumque membranaceo-racemosis, corollis purpureo-virescentibus, virescentibus, purpurascens-albidis vel raro flavo-ceniibus, gemmalibus inclusis vel exsertis, anthesi fructibus lutem — *Radix fibrosa vel rari tuberculosa vel lignosa (caulis plerumque herbaceus vel rarus lignosus) HJTM laxi*

§. 1. *Thyrso foUoso.*

0 SCR LIRIDIFLORA Fitch et Nejer, Linnaea Mil I uerbl 115 - *villosa rostellata longis arachnoideo-lanuginosa caule erecto tetragono, foliis duplicato-crenatis*

- denlalis aculis, inferionb. ovalis cordatis, buperionb. ovato-oblongis; lhyr»o folioso; cymis axillanb. pedunculate dichotomy, pedicellis calyce sublongionb., sepalis lanuginosis subglandulosis obtu»is submarginatis capsula ovala acuta paullo brevionb.; stam. me sterili reniformi. ^ — Habital in ISatolia.
7. SCR. GRAISDIFLORA DC. Cat. pi. borl. Monspel. Hi. — Wjdler I. c. 146. - G. Don I. c. no. 4. — Foil, molhler villosis, infcnonb. inerrupte Ijralo-pmnalifidis, lobis alterms ovalis aculi* dentalis, lerminali raaximo late lanceolato, summis ovalo-lanceolate. 2]. — Folia interdum duplicato-dcnlata, dentibus cihaiis mucronatis Pelloli \iliosi. Pedunculi quinqueflon folio mullo brevior*. Pedicelli uli calyces villosi. Corolla maxima generis intense rubra. — Cre«cil ^crossimiliier in America ausrali.
8. SCR. SAMBUCIFOLIA Alp. ExoU 203. t. 902. - Park. Theatr. 012. ic 611. no. 8. — Munling. Phyu 45. L 238. — Mill. Icon. III. 154. I. 231. - Linn. Spec, pi 805. - Hill's Veget. syst XIX. t 48. — Mirbel, Elem. boL (ed. 1815.) U 30. fig. 7.A. c. el fig. 7. c. — W>dler I. c. 147. — G. Don I. c. no. 5. - Glabra- foil, infenonb. profunde pinnatisectis, supenorib ternatisectis \. mdmsis, segmentis otatis acute mceo-denlatis, lerminali maximo ^ — Foliorum segmenla inlerdum petiolulata, flores el fructus inlerdum parvi; capsulae valde acuminatae. Corollae purpureae labium inferum virescens. — *Scr. melitfera* \ahl, ^>mbol bot. II. 08 — Desf Fl. Atlant. II. 53. t. 143. — *Scr. vindt/lora* Poir. Voy en Barb. II. 104. — *Serophulana foho lactualu* C. Baob. Pinax 230. — *Scrophulana Sambua folitt, captuht maxtmts* Moris. Oxon. Hist. II. 483. seel 5. t. 8. fig. 6. — *Scrophulana Uitpantca Sambuct foho glabro* Tournef. Institut. 160.
- fi. h%rsuta Wydler I. c. — Undique pilosa canescens. — *Scr tambunfoha* Willd Eoum. pi. hort. Berlin. 045. — *Scr. grandt/lora* Rchb. hort. Bol. I 05 t 06 (nee DC.) — *Scr. maxiwM Lutitanica foUo Sambuci lanugntoto* Tourn. I. c — *Scr LuHitmiea maximo /tore, folii* diitectis* Ray, Hist. Suppl. 396
- r- *Thyrio apkylio* Wydler I. c. — Crescil in Hispama, Luitama, Corsica, Africa boreali el in Orientc.
- 0 SCR. PEREGRI>A Linn. Spec pi. 860 - (Valli. fomrn in Dmscor. cf. Strnrbg. Cat 24¹ - Cam. hort. 157 1. 43. — Koch, Sjnops fl. derm rd I; 517 — Rchb. Flor. Germ excurs. 377 no. 2550 — W)dler I. c 147 t — <• Don 1 c Wl no 0 — Foil cordatis, grosse subduplicato-crrnato-serratis Rlabris mtidis, siiperionb. alternis, pedunculis axillanb paunfloris, lacinnis cahris o\aiio-lancrohtin acuminatis immargmatis, florib obscure sangmiKMs ZI - (aulis simplex J-2-pedalis, inferne acutangulus, superne obtiiHangulus glabrr alro-purpurgus. Folia bre\iter pctiohla, mfenora oppo»ita, superiors allerna, oacpe ovato-rordaia glabra lucida acula pellucido-punctata. Pedunculi saepiMime 2-3-flon flhfomies. Bracteae parvae. Corolla panra >enosa, lobit omnibus deoiculatK, drnticulis • veoii parallelis prodeoolibus. Slylos apictm versus lnrlinatu< Stiemalis bilobi lobls sabrolondis vilde cohaereotibas, capilulum rffirintibus i .ipsiili glabra subelobosa, scmina rugo»a. — Foelet ul *Gerantum Roberltanum* I u ojis Dio^cor «*d. Sarr l> 05 ex Spr Grschrlit dt*r Hot I 151 *Scrophulana Cretan tentnda* (J\u% Ilislor. II 210? — *Scrophulana /tore rubro* (amrrant J* Bauh Ilistor III i±L ic. — Chabr Snag 470 ir — Vr I rhcarfnUa (Bauh. Pin\ ±U> Moris Oxon. Ilislor. II. 4*1. »crl ^ t H. fig I. *Scr major allef* elegans* Park Thralr. 010 ic. (•• — *Scr gemt/lora* Lam Fl rranr II J30.- *Scr. searamaiarts* Moch Method plant 4ii — *Scr mtnore* ^>i, H1 Pi»an H-81. — *Scr arguia* Ail hort ken. ed I II 412" i rr*m ad |ia% cl ID UID-brotis Graeciae, LreUr, Italiae, Oalloprovmciae ct in in*ulis Balrançi* ^n*⁰¹ in IstrUj.
- 10 SCR. SCORODOMA Lino. I c. 854. - Hill. V«*0L 9j%| XI\ I 45 - I •• Illuoir gen L 533. - F.ngl. bot. I. 2tt». - Rrhb I r 377. no iVM. - Wydler I. c IW. - G. Don I. r. 508. no 7 - Piloia. foil, rnndaio-inangularib. doplir¹⁰ deniatu aculis rogois, omoib. opposilis, ralyrit lobit ore tlbido-membraoacei^

extas piloso-glandulosis. 2]. — Panicula laxiflora; corolla brunnea. — *Scr. Scorodonta* Dsf. (Fl All el Poir. Encycl) differt thyrsos aphyllis et corollae magnitudine diblinctaque esse videtur species. — *Scr. scorodomaefolia* Moris. Oxon. Hist. stirp II 482. seel. 5 I. 35. fig. 0 — Pluken. Almag. 338., Phytogr. I. 59. fig. 5. — *Scr. melissaefolia* Tournef. Instil. 166, Peliv. Op. II I. 35. Gg. 11. — *Scr. scordnifolia* Gussl Vind. Lusitan 75 — (Gmel. Sibir. 111. 195.)

9. Folius baccis lacinalis lanatus.

Crescit locis humidis in Lusitania, regno Tunetano, Galicia, in insula Jersey et circa Nicaeam.

11. SCR. CASTAGNEWA Wydler 1 c 140. - G. Don I c no 8 - Coule angulato, angulis subpubescentibus, foliis oblongo-cordatis duphrato-inciso-dentatis acutis subpubescentibus, inferioribus oppositis, Mipnonb allernis, ciliatis lobis ore rubromembranaceis*, exclus glabris 2]. — Caulis sesquipedalis et ultra simplex fistulosus stnatus. Folia late cordata sensim minora pellucido-punctata, dentibus subulterciliatis. Petioli folio ipso breuius. Dractae folis bimiles, illae pedicellorum lineares. Calycis lobi ovati. Corolla major quam ilia *Scr. nodosa*, purpurea Anthera staminis quinti subrotundo-emarginata. — Crescit prope Byzantium.
12. SCR. URTICAEFOLIA Wall. Cat. 3022. ex Bth. Scrophul. Indie. 18. - G Don 1. c. no 9 — Pubescent v. demara glabrata: foliis, subrotundo-ovatis grosse duplicato-dentatis, basi cordatis; thyrsos laxo folioso; pedunculis oppositis J-7-flores, ralis lacinis late ovalia obtusis, margine membranaceis, geniculibus inclusis. %> — Corollae videscentes, labio supero lacinis inferioribus longiore — Crescit in Nepalia et Gossam Than Indiae orientalis.
13. SCR. HIMALAENSIS Royle mss. ex Blh I. c. — G. Don I. c. no 10 — Pubescent caule caulibus obtusangulo, foliis ovalo-lanceolatis subduplicato-dentatis, basi subcordatis, thyrsos amplo paniculato, basi foliosus, calycis lacinus ovalo-rotundatis membranaceis, glandulis exsertitis — Corollae Mre^ctnis Stamen sterile basi adnatum, apice liberum dilatatum spatulatum, emarginatum Folia rugosa. — Habitat frequentius in jugo Himalaeni.

2. Thyrsos aphyllus.

14. SCR. POLYAMIA Royle mss. ex Blh. I. c. IB. — G. Don I. c. no. II — Pubescent elata: caule subangulato; foliis ovalo-lanceolatis subduplicato-dentatis*, basi inaequaliter angustatis v. segmentis paucis lanceolatis auctis, thyrsos elongato amplo aphyllis; calycis lacinis ovalo-rotundatis, margine membranaceis; genitalibus exsertitis — Corollae virescentes. Stamen sessile basi adnatum, apice liberum dilatatum emarginatum. — Crescit in Mussooro.
15. SCR. LIOR Wall Cat no. 3921. ex Blh. I. c. - G. Don I c no 12. - Glabra caule angulato > elato (*alato*?), foliis, inferioribus ovatis, basi cordatis, superioribus ovato-lanceolatis, omnibus duplicato-dentatis, thyrsos amplo paniculato-formi subaphyllis, calycis laciniis profundis lanceolatis acutis non membranaceis. genitalibus exsertitis. 2f — Crescit in Gostain lian
16. SCR. KEMOSA Ione, Transact or the Cambridge Philos. Soc. IV 30 f - Folio subrotundo-oblongo arutis subduplicato-serratis, ulnatis caule angulato globosis, his inaequalibus, inferioribus appendiculatis: thymis elongatis aphyllis ramis racemosis, racemis elongatis flexuosis patentibus laxis; ramis pedicellatis uparibus subglandulosis; calycis glandulis laciniis obtusis; corollae lobis inferioribus intermedio rotundato 2l. — a. *longifolia*: Folius acuminatus — {t *puberula* Ione radicalibus junioribus subrotundis puberulis. — *Scr. aunculata* I * - bilat in Mad era
17. SCR. IIFKIKRULFLOIU Schreuk, Enum plantar no. ar 2) t - subrotunda radiosa crassa lignosa, caule erecto obtuse tetragono, foliis ovalo-rotundis oblongis inaequaliter simpliciterque serratis nerraturis pamelis, thymis nupillis ejunctis pedunculatis dichotomis calycis pilis glandulosis glandula longioribus idem propter sepalis oblongis obtusis reclinatis immarginalis, corolla tincta paulo brevioribus

- slamfnib. slyioq. longe exsertis; stamine slenli elliptico; capsula . . . ? 2l — In Soongana habitat.
16. SCR. LAISCEOLATA Prsh. Fl. Aiu. sept. II. 419[^] - ISutt. Gen. Am. II. 44. - Wydler I. r. 140. — G. Don I. c. no. 13. — Glabra: Toll, infenonb. ovalo-lanceolalis, supenonb. lanceolatis, omb. acutis serralis; pedunculi* bifidis 2-5-flons; capsula subrolundata. 2|. — Caulis simplicissimus. Folia basi non cordala. Pelioli folns breviores — Crescil ID America boreali (Carolina ct Pensjhanja).
10. SCR. >ODOS\ Linn. Spec. plant. 863. — Sturm, Deuschl. Flor. lift. 23. c. ic. — Flor. Dame. t. 1167. - Gunn. Norweg. II. 87. t. 4. fig. 1-3. - Svensk bot. t. 315. Hayne, Anneigew. V. t. 35. - Wydler I. c. 140. t — Koch, Synops. fl. Germ. (ed. 1.) 515. — Rchb. Fl. Germ, excors. 377. no. 2563. — G. Don I. c. no. 14. — Foil, ovalo-oblongis ovalisve subcordalis glabris daplicato-serralis, serratuns infenonb. loogionb. acolioribq.; caule argute quadrangulari; peiiolis exalalis; pamcula terminali; lacinns calycis ovalis oblusis angustissime membranaceo-marginali; rudimento Glamenli quinli transverse oblongo obsolete emarginato. 2|. — Flores tnste olivacei, dorso brunnei, raro ubicue \irescenles. Folia pellucido-punctata, punclis minimis numerous, interdum basi non cordala. — *Scr. major Brunt* Herb. I. 215 fig. 213. — Lob. Adv. 2J0. ic. 533 — Tabern. Kniulerb 030. ic. — *Galeopns* Feñs. Hist. 103. ic. 104. — *Octmasrum* Trag. (ed Hub.; 184. ic. — *Scrophularia* Dod. Pemptad. slirp. 50. — Riv. Monop. irregul t 107 fig. 1. — Black*. Herb. t. 87. — *Scrofulana* Mallh. Epil. 866. ic. — Duranle, Herb. 406. ic. - *Scrophularia tularu* el *major* J. Baub. Hist. III. 421. — *Srr nodosa foehda* C Bauh. Pini 235. — Morand. Hist. pr. 65 I. 37. fig. 2. — *Sctophulatta radtee nodosa* Moris. Oxon. Hist. 482. sect. 5. t. 8. fig. 3. — *Scr. major ruhjarts* Park. Theatr. 600. ic. 610. — *Brotcn Ftgwort* Peln. 103. fig. 104.
- fl.* Folm lernif. — y. Floribut viridibus. — Crescil locis umbrosis humidi* per tolam Earopam.
20. SCR. MARYLANDICA Linn. I. c. - Wydler I. c. 150. - G Don I. c. no. 15. — Caule oblusangulo; foil, cordalis serratis aculis, basi rotundatis. 2l — .Srr. *Marylandtea longo pro fund e terrato Lrttcae folio* Ray, Hist. Suppl. 300. — *Scr. nodosa fl. Americana* Micbx. Fl. Bor. Am. II. 21. — A *Scr nodosa >ix dnrsa*, sed caulis altior folioruuique denies profundiores. — Crescil in America septentrionali (el in Sibma[^]V
21. S(R SfOPOLII Hoppe, Cenlur. cxsicc pi. ex Pers. Knchind. II 100 - Koch I c >16 — Wjdler I c. 151. — G. Don I c. no. 10 - Toll o\ato-oblongis otalistic subcordalis, utnnq pube[^]rentib. duplicato-crenalis, caulr peiiolisq \illo—si«, pamcula tormmali; cal)Cis lacinns subrolundis obtunnsiruis late membranaceo-marginaiis / — Folia infenora permagna sunl el omnia pellucido-pnuctata. — *Scr. major ktrtuta* Touroef. losliL 166. — *Scr. aquahca montana molltor* Barr. Icon 874? — Ser. *urieuUia* Scop. Fl. (Urniol. (ed 2 / I. 44ft. L 38. (mala). — *Scr. Scorodonia* Hotl, Flor. AoslHac. II. 904 (nee I inn .Srr *ylandulosa* \Sildst. ct Kit. Plant, rar Hungar. III. 23R. I. 214. florihu* fu»co-purpurn<) — Rcht> Fl Germ, excurs 377 no 2558. — *Scr. orandtdenlata* Tenure, H >rapol. Suppl II 00 — Gu»« Plant, rar Sicil. tVt — G. Don I c M0 no 17. *Scr. rugosn* Willd. Enum. pi horl. Berol. Suppl. 42* .Srr *ncprhfoha* sm in Reet* i >d \\\|11 no 7. — /? Pedicellis elonffatn-filifornubui - <rr<ci in **alpinis** llunKdrue, f.arnioliae, Tram<yhaniae, in alpibu« Ipuann, P)rrnan», **caurici** •I (aucasici*
- tt. 80I CALIFORMCA Cham el Scblrhld Linnara II. 5K) Hook rt Am *BoU* Beech, toy. IVJ - G Don I c no M (aulr acute angulato glabm, rtrni« OonferU glaodalioio-pubetceolib., foil obloogo-iriaoRulanb acuiit, ban rord<~tit duplicaio-terralis, tupra glabm, infra pubetceoua Rlanduln«a parr ob>iU»; th>no apb)llo. irKtorolit ral)rim« ovilU aculis mucronali*, maricmf aifcu»l0 membranaceis, cap»Q||« ov«(i« ronicis ^ — .Scr *nodosae* cl *Marylandtcat* ma* lime affimt diciior. — Cretcil IO Mliforma

23. SCR. BEIOMCAEFOLIA Tourner. Inslit. 160. — I inn. Manila*. 87. - Hill, cget Sjm. XIX. I 40 — Spr Sjsl. >cget. II. 735. (e/cl. sjn. Hornem.) - Wydler I. c 131. f — G. Don I. c. no. 19. — Pilosiuscula: foil, cordato-oblongis aculis inaequaliter dcnlalis rugosis; caljcis lobis subrotundis, margine ferrugineo-membranaccis; capsula subglobosa. 2* — Caulis bi-lmpedalis fistulosus ramosus, saepo purpurascenli-Mndis. Pelioli dilalau carman ciliavi, folio dimidio breviores. lolia basi v. dcnlibus produclis \. rolundala pellucido-punclala, inaequaliter duplicalo-dcnlala v. ranus crenala, dcnlibus glanduloso-ciliaiis. Thyrsus inacidum foliosus. Bracleac saepius acule dcnlaiac ciliaiac foliiformcs. Cjmao 8-11-llorac Flos contrails longe pedicellatus, pedicello magis minus^c incrassalo. Caljc a lobi posl anllicsiu paullo accrescentes pellucido-punclati. Corolla \indiferruginea>. purpurci, lobi* c\idenler pellucido-punclalis. Anlhcrac slenlis Hindis pellucido-margmata magna Sljlus saepissime anlc staminum ctolulioncm revolutus. Sligma bilobum pubescens, lobis di\crgenlibus. — *Scr.enuatica montana mollior* Barrel. Icon. 274⁹ — *Scr. rugota* UorU Lugd — ? *ylabra* —) *Thyiso folioto*. — Crescit in Lusilama cl in inaulis Lanam*.
- 21 SCR. IIERMIMI Lnk. cl III Tmnsagg. Flor. Portuff. I. 200. - Waller I. c. 152 - G. Don I. c. no. 20 — Caulc hirsute; foil, cordalis el subcordalis o>alib. subduphcato-crenato-dontalis non rugosis pubescenlib.; copsula conica longa. ^ — T.iulis ercllus bi-inpcdalis ramosus. Folia longe petiolala. Caljx bre>>s, lobis par\ii> parum margmaiis. Corollae labium supenim dilute fuscum, fnferum >i-rens. Anlhcrac cl stamina 5 lulea. — In Lasilamae monlibus herra d'Esrella.
25. SCR ALTAIC V Murv. Comment. Goelting. 1781. p. ai t 2 - Wjdler I. c. 152 — G. Don I. c. no. 21. — Pubescens* foil, cordatis duplicalo-dontalis aculis, ra- lncis loins lale lanccolalis aculis non membranaceis, capsula subrolunda 2l — lolia sinuUo-dcnl.\la, dentibus aculis, caljcis lobi lanccolali ciliai. Sinmiiis slenlis rudiinrniuni Icm forme. Gcmalia subeiscla. Lorolla lulocenU-Njndis. — Crescit in alpibus Altaicia
20. SCR SMITHI Hornem. Horl. Ilafn. Suppl. 08. - Wjdler L e t — G. Don I. c. no. 22. — Pilosa foil, oato-cordalis multiplicato-inclso-crenatis aculi«, caçcis lobis subrotundis membranaceis (marginibus'l rubrin scu lutescenlib., capsula sub-ovalala. 3|. — Caulis quadrangulus atro-purpureus \alde pilodus ramosus. F<>ha scsqui-bipollicono, bublus pilis adpressis \alde pilosa. Petioli dilalali lamina inplo breviores. Capsula \cnoso-rugulosa. — In insulit Canarn* crenciu
- 27 SCR. GI ABRATA Ail. Hort. Kew. II. 341. (cd. 2) IV. 22. — Jcq. Horl. Schoenbr II. 44 1 IW - \Nilld Spec pi. HI. 272. (excl. sjn. Yahl.) - Wydler I. c ||| | — G. Don I. c. no. £) — Glabra caule buffrulicoso; foil cordato-lanrcolaiis aculis, duplualo- \ inpliralo-dcnlalis; ral)ns lobis margine albido-membranaceis, rnpssiila o\alo-^lobosa ' — I olia pelluridn-punctiM l'los priiiariis longe pediellnlUH. Caljris lobi siibrotundo-o\Ui, m IKIM* nlbiilo-nx mbr.in KM Corolla stalura ct magmludinc *Scr cantnae* purpurea \onosa Slaiuma cl si\lu* exscla, anlherac ru<>ro-marKinatae. — ?/* *pubescens* Caulc foliuque pubc*rrn-tibus. — *Set ticlnnicacfoha* DC Herb. — Crescit in rupibus monti* Pico in insula TencrifTa ubi *Yerba de (umbr* dicilur.
28. S(R. BISKERRAIA Willd. Knum pi bort. Berol. 044. - Wjller I. c. - G. Don I. c. no. 24 — Full oblongo-lanceolalii profundc cordalis, argute duplicalo-ter-ratis gKibris, panirula racemo>a terminali, pedunculii tricbolonns. ^ - ^imilm piacredonti, sed dnrsa folus semper argute dupliralo->erratis el profundo ((,rd.ilis, qium in praecedentl specie serraturae obtunae el irregulariler duitliciaa suit, (itMiique rcu'dil (oribus inioribuH obscuroribus. • (r nol ' .
- 29 si HI OI I IDA >\>llor \ c f'4 7 - (.. Don I. r no. 25. (Jabr- MI. o%ato-oblon^is innso-mullipliLalo-creiialis ^ . - Planla foelida. i IUIH mmlpt r<-miilosus, pidahs el ultra* similus lolia loiige pefiolala pellurido-punriaia, pctiohs lon,itudinc foliorum > paullo ultra. IIIJTM pcduiKuli alterni bilid' (I'-II!

- lycii» lobi lale ovati, exlus inlerdum glandulosi, membranls spadiceis marginati. Corolla lutea, roagnitudme illius *Scr. nodosae*. — Crescit ?
30. SCR. TITFOLIATA Linn. Spec, plant. 865. — Wjdler I. c. 154. t - G. Don I. c. no. 50. — Glabra: caule subsimplici; foil, ovalo- \. subrotundo-cordali* inci&odeniatis v. sublobato-crenatis, basi saepe appendiculatis (*ex auctonb*) v. profunde incisi*; cal)Cis lobis subrotundis, ore membranaceo rubro-albido; capsulis ovalo-comicis. O — Herba bipedalis. Caulis infra obtuse quadrangulatus, supra acute angulatus, decumbens nodosus glaber vmdis. Rami oppositi decussati axillares quadrangulares. Folia amplexicaulia (?) petiolata, in petiolum decurrentia heterophylla, juniora cordata deotata, dentibus rotundis, inius et sublus lucida, adulta obcordata, ad dimidium fere plures inrisa, lacini* acut* dentatis, rugosa, sublus pubescentia obscura, superne laete vmdia nervosa, nervis ad laciniarum apices produclis, inferne amphora 3-4-pollicana, 2/3 poll, lata, superiora sesquipollicana, pollicem lata. Petioli longitudine foliorum, hinc canaliculati, hunc conplexi. Pedunculi dichotomi aul plures dimidiati bispidi, pilis albidis brevibus, allerni pollicares, basi bracteali, bractea lineari integra indivisa. Florenricemio»i terminates rubicundi. Cal) quiquefidus, lacimis jequalibus ovalis concam, margine membranaceis persistentibus, 3 lin. longi. Corolla subglobosa resupinata, limbo in gmo reflexo albido, basi lacunae superioris nectanum cordatum minimum subrubrum. Stamina 4, filamenta albida compressa sulcata, 2 replicata. Antherae luteae apice filamentorum, superne valis 2 dehiscentes. Germen superum hispidulum p)iforme bilobum. Stylus recurvatus hispidulus. Stigma capitatum. Intra germen et receptaculum circulus luteus, corollae sedes. (conten. mss. in Herb. Deless.) — *Sir. Indica* Ger. Em. 710. — *Str. pereyina altra* Park. Theatr. Oil? — *Scr. Indica capitulata maxima* J. Rauh. Hist. III. 423. ic? — Cbabr. Sciagr. 472. ic. T — *Scr. subrotundo, crauo et nigricante folio, lore luteo-pauido, capitula turgida* Bocc. Mas. piant. 03. t. 00? (Th) r<o foho<o.) — *Scr. Sambuci folio, lore rubro luteo vario pulchro* Pluk. Almag. 338., Phjlogr. I. 313. fig. 0? (Thyrso folioso.) — *Scr. lacrigala* Vahl, Symbol II 07. — *Scr. appendiculata* Jcq. Hort. Schoenbr. III 10. I. 280. — 9. Folns laciniatis. — *Scr. appendiculata* Lnk. Enum. pi. hort. Berolin. II. 130. differ re Mdetur folns sobtat pubescentibus. — Crescit in montans Corsicae, Lusitaniae et in Africa boreali.
31. SCR. HISPIDA Desf. Fl. Allan! II. 55. - Wjdler I. c. 155. - G. Don I. c. no. 27. — Hispida* foil, basi pinnatisectis duplicato-crenatis, lobo terminali maximo cordato, cymis densifloris; cal)cis lobis*» albo-marginalis, genitahb. inclusis. ~4 — Crescit in fissiis ripium Allatili) propr Tirmsen.
- 32 SCR AIRKII.AT\ linn. Spec, plant W4. (r|r| sijn - Wjdler I. c. f - « Don I. c. no. 21 — Foil cordato-oblongum, basi appendiculatis, subtus tomentosis. — r.aulis se»quipedalis subsimplex quadrangulus, infra purpurus, antherulis acute membranaceis ex decerto foliorum formatis pilosiusculis. Folia ima indivisa, superiora basi auriculata, omnia longe petiolata lale otata subcordata (1/3-2-potlicaria) crenata, ercae mueronaue, praesertim infra ad nenas pilosiuscula. Auriculae panae crenatae. Petioli canaliculati margine carinaque pilosiusculati. Pedunculi oppositi quadrangulares bifidi. Bractearum late lineares subdentatae Pedicelli alternae. Bractearum lineares ariiminales. Cal) ad medium inermis, lobi* f)ubrotundi«, marame membranaceis rubris, ritis piandulotis (orollis v) stamina illis sequentis umilia glandula oae«escens«. Mtlos ewertus .iticuatu* Cre»cii ad fo»»a« in agro »icaeen«i.
- 31 St.R A^IAIICA Linn I c HOI Black* Herb t HO Sehkuhr, lndbrh. II. IM. I. 171. - Knigl boi. I *V4 - Hor Danir I W Sirm lHsch\ flor. Bit » - llayoe, ^rrneigew. \ i. 30. - i haumri. Fl medic, t J2L. - * idler I. c. 150. (etcl. tyo. Morneib. el Balb. — Korb, Synop«. II. Germ. rd. I M» ~ Rchb. Fl. Germ, cturs. 377. no. &H. - G. Don I. e. 510. no *». - Foil ntato-oblongum ovaUirr sobcordali* glabri* terralii, ferraturi* lofrionb. minorib » caulr peiolitq lal« alalis; panicula terminali; lacini* cal)cm subrotundi* obtusij*»imis lale membraaacfo-margioaus; rudimento filamentum quinti bifido, lacini»

divaricalis. 2p — Flores dorso purpurco-fusci el minus trisle colorati quam illi *Scr. nodosae*. — *Betonica aquatilis* Dodon. Pcmplad. stirp. 50. — *Betonica aquatlea* Dalcecb. Histor. 1350. ic, Tabern. Kraulerbch. 034. ic. — *Betonica aquatlea septentrionalium* Lobel. Icon. 544. — *Scrophularia foemina* Cam. Epit. 807. ic. — *Scr. maxima radice fibrota* J. Daub. IlisL. HI. 421. — *Scr. maxima strumosa* Chabr. Sciagr. 471. ic. no. 472. — *Scr. aquatlea major* C. Bauh. Pinx. 235. — *Sciaquatlea major, caule fimbriato* Lois. Pruss. 284. t. 75. — *Scr. radice fibrota, Betonicae foliis* Moris. Oxon. Hist. III. 482. sect. 5. 1. 8. fig. 4. — *Water Figwort* Peti>. Op. II. t. 35. fig. 10. — *Scr. caule alato* Riv. Monop. irreg. app. ic. — *Scr. radice fibrota* Morand. Histor. pract. 147. t. 08. fig. 1. — *P-* Caulc simplici; foliis lanceolato-ellipticis; floribus minus densis. — *r-* Thyrso folioso. — Crescil locis aquosis per lotam Europam el in Gaucaso.

34. SCR. BALDISII Hornem. Horl. Hafn. II. 577. - Koch I. c. (ed. 1.) 515. - Foil. cordato-oblongis rotundato-obtusis glabris, obtuse crenatis, ad basin saepe foliolo minuto ulrinq. auriculatis; caule petiolisq. late alatis; panicula termin. ili; calycis laciniis subrotundis obtusissimis late membranaceo-marginalis; rudimento filamenii quinti subrotundo-reniformi vix emarginato. 2|. — Florc* majores quam antecedents, loli purpureo-fusci, basi lanlum virides. — *Scr. appendiculata* Balbis Herb. — Crescil in Alsalia el prope Aquisgranam Irbem.
35. SCR. LYRATA Willd. Enum. plant. horl. Berolin. 545., Uort. Berolin. 1.55. (c|rl. s>n. Lnk.) — Wydler I. c. 157. — G. Don I. c. no. 30. — Foil, ulrinq. n|rsulii, inferiorib. interrupte Jyralo-pinnatisectis, superiorib. ternatisectis, lummii limplicib. auriculatis, lobo terminali maximo oblongo-ato subcordato obtuse duplicato-dentato. 2| — Folia crenata; bractcae glanduloso-piosae. — Crescit. . . . ?
30. SCR. EBI'LIFOLIA Lnk. el Hffmnsagg. Flor. Porlug. I. 270. (nee M. Biebrst.) - Wjdler I. c. 157. — G. Don I. c. no. 31. — Glabra: Toll, infenonb. Ijratiss, segmenlis subduplicato- aculeq. inciso-crenalis, superiorib. profunde pinnatisectis, segmenlis dentato-crenalis. C4 — >9 Foliis splendenslibus. — A f fin is praeccdenli. — Crescit in Lusitania ad maris litlora.
97. SCR. TANACETIFOLIA Willd. Horl. Berolin. 50. | I. 50. - Lnk. Enum. pi. horl. Berolin. II. 140. - Wydler I. c. 158. - G. Don I. c. no. 32. - Glabra: foil, interrupte pinnatisectis, segmenlis petiolulalis oblongo-ovatis inriso-dentatis. lobo terminali majori. 2|. — Anihera sterilis fuborbicularis lamellaeformii, anthracae ferliles atro-purpureae. Genlulia exserla. Calyx parvus, membranit (Ucinitrum margines?) albis saepe splendenslibus. Captula parvt lenlis magnitudne. Folia magis minusve carnosula, rarlus indivita, laepistlme pinnaunda. Thyrsus stnelus, lon^us >. al>bre^ialis. Pedunculi 2-3-fidi v. simplicissimi, pedicellis brevispimis filicm*. — Crescit in America boreali?
38. SCR. LACIMATA Waldsl. el Kit. Plant, rar. Hungar. II. 185. t. 170. - Koch, Synops. fi. Germ, el Hcl\ct. (ed. 1.) 510. - Rchh. Fl. Germ, excurs. 377. no. i^f^>. — Foil, glabris lobato-incisitt (cordato-oblongi* , basi pinnatifidi^ pinnatisxi*, lobis pinnatisq. inaequaliter dentatis; panicula terminali glandulota, glandulit breviter pedicellatis; calycis lacinis subrotundis obtusissimis late membranaceo-marginalis; rudimento filamenti quinti subrotundo - reniformi. % — (Willd. Herb, no. 11307.) — *Scr. lucida* U. Bieb. FJ. Tauric. Caocat. II. 77. (nee Linn.) — *Scr. verbenaffolia* Dgf. Cat pi. hori. Paris. 77. — Poir. Encycl. mōth. Suppl. V. 117. - Wydler I. c. 158. — G. Don I. c. no. 33. — Crescit in rupibus Huogariae, Croatiae et prope Fiume.
30. SCR. PURIMANA Wjdler I. c. 150. - G. Don I. c. no. 34. - Caulc Mmplm glabro herbaceo; Toll, circumscriptione ovatis, acute inciso-dentatis aruhs. inferiorib. basi pinnatisectis, Inhts acutis. 1|. — Caulis striatus. Petiolis brevispimis glandulatis glabra. Pedicellis aequalibus. Bractcae paniculae linearis Pedunculi 2-3-flores. Calycis lobis late ovatis. Corolla ut in *Scr. eantna*. Antherae steriles subrotundae albae. — Crescit in Datuna in collibus ad Ingodam rariMim< <t 00 stad. ad onciitem urbi> Scbiu

40. SCR. ILWE>!:>IS C. Koch, Linnaea XVII. 2M — Annuā glabemma'siraplicis-sima Toll, o\alo-oblongi», infenonb. petiolalis, c\ IMM rolundata (ncc cordata, nee angusiata) dupliciter dentalo-serrutis, thyrsō o\ato; segmenlis cal>cis albolucidoque-margmalis; corollae lacinn* inaequalib., supenonb. majonb., c\ basi appendice alba reniformi instructa. O — Scr. *Patrtmanae* smiths, sed bacc differt folns ex basi pinnalifldis — >?. *minor* \ix scmpedalis; foil, rugosionb. opposite simpliciter serralis. — Cre>cil in Somchelia in montibus Ilwensibus.
41. SCR. OLIUERUW Wjdler I. c. 159. — G. Don I. c. no. 37. — Caulc glabro herbaceo; foil. otatis inciso-dcnlalo-crenatis, basi magts mmus>c pinnaliscds, segmenlis peliolulali:> subroiundis. 2I. — Caul is pedalis subsimplci, basi lignescens stnatus alro-purpureus. Ramuli pauci. Folia lucida (*\ ima otala, superiora subrolundo-otata subcordata. Petioli valde dilalali. Bractcae inferiores lanceolatae dentatae, supertores Kite lineares. Bracteolae minulae. Calycis lobi subrolundi. Corolla forma, magmtudine el eolore Scr. *camnae*. Aolbera slenlis alba. — Valde accedii ad Scr. [*rullcanam*, sed diffcrl caħci* lobis lalionbus el petiolis dilalali*. — Credit in Oncnte.
42. SCR. I>CLSi Weinm. Ind\, Dorp 1^10 p 130. - Lcdeb Flor. All IF 412 7, Iron fl. Ross. All. I. 150. — (i. Don I c no. 35. — Foil, oblongis, utrinq altenu.itis petiolalis mciso-serrate crnssiusculis caulcq. quadrangulo glabris, pameiilar elongalae rarais \lloso-glandulos1s, infenonb 3-5-, supenonb. 2-J-fioris; si)lo deflexo stamina e\scrla superante. 2f — Aflinis *Srr. lanniatae*, sed folns basi numquam rordalis recedil. Caules ramique oblusc quadr.in^ularrs. Corolla el jnlberac obscure purpureae. Gomlalia exserla. Lacimac caljcis albo-maigninalae membranaceae. — In montibus Allaicis ad Arkaul el Tschm^islnu errant
43. SCR. DIVARICATA Lcdeb. I. c 440. t, Icon. 0. Ross. All. t. 121. - G. Don I. r no. 30. — Foil, enrnalis acoroinalu daplicalo-serralis, utrinq. pubccenlib, caule obtusangulo; racemis aiillanb. dicbolomis; genilalib. corolla broMonb., lacmii* calycims aculiasculis adpressis. ^ — Caules ramique obluse i<^iraponi, pihs plan-dulosis longionbusque simplicibus obMli. Caljcis lanniae marline meinliranacrae. Corolla xrescenti - lulescens. Capsula subglobosa acumiala — Cresdl in Iberia prope Tidin
44. SLR MICRAMIII d'i n. En \rcli. 7> - ^>dler I p IW - G Don I c no J* — Caule basi ramoso glabro ascendente. ramis drbilib. r>M p<u>latis ob-IOH^IH obiiimS, biM aunruhtH grosM* deni.itis; flonb minimi^ ^ - Ln-snl in rupibiH marilnni* in^ulae ITIMJI* |r>pe Ihrram — | Num forlr 1 adeni M' Set *imnanthn* IK>\ in llamill. Prodi 11 Ind ornd 47 — <.mk MibMmpliri, foil. o\ali< acutis profuudc donlalis glaberrnus, flonb. la&e spicalis >ublermioahbu4 ^ — Cretil in ins'ila Ilispamola J
- to SCR. IKMLI.KAYt W)dlrr I. r. 100. I i - ii. Don I. c. no. 19 - I iule HIHI-plici glabro berbaceo; foil, tubrolundo-cordah< •ublobati-*, ranus rnniiM. 2f
Caules numerosl simpliccs l-l'/i-pedalr* atro-purpurn glabri loin ,:lilri, 111-frriora in tanclale longo peliolala. Dractcae inferiores Mm *simk*<* llrrsu* .ipb^llus, pedunculiH allrri%; rjmin .J-O-flons Cal)v panun albo-marpnatu* (orolla par^a purpurea < jp*uli Kubrotunda
/9 l-oll infenonb noli*, supenonb rnrđalo-ovali«. nmmb ħrato-|>mn UINCC-III, st'KUK'ni* runealo-o>jlit pelioluUlin, li'miinali m.i\uno, omnib iun<>o-crenalis — ^)dlcr I r I .1 — \ *pr<< ir |-rinrdonlr \i\ dnrr%i forlrque cum ea conjun^endj. (reinl in rupibu^ << ad mur<đ> IIIIJC M*1<>^ ^
•d Tbram.
- 4A. SCR. \ARIEGATA M Bieber^l ta<p 177. Hor Taunr (du<u III 4lo - Rchb Plant enic. t ml III I fW *)dlrr I c. llo 4* Don I c n • W
Caule •Qffralicoto. full. o|>||* lotulo-drntali*, infrnorib ħa%i pinnaiih li< *ul> p>ibe<reolibas. ^ - Corolla »padirca# labu suprrrmru larinia alirr.i .niihri »<'"" ni% iirul labium infrrum albidum. - *Srmphularta irmrma minim > folio sub-ufund* d^o rournef Hb — |_n S<IO>I< Cauraki circa Ibrmat *Constantinomonlans*

47. SCR. AUI C. Koch, Linnaea XVII. — Glauescens glaberrima ex basi rariovi foil, oblongis densis in petioluni brevem attenuate; panicula dichotoma-gemculata, pilis singulis glanduliferis*, oculo nudo mihi Dime conspicuis. instructis; corolla c. appendice obcordata aut truncata ^ — *Scr. variegatae* M. B. similis, panicula aequali et pilis glanduliferis et appendice differi. Flores et capsulae sunt etiam minores. — Crescit in Armenia cis Araxera.
48. SCIT. KUPESTIUS M. Biebersl. Fl. Taunc. Caucas. II. 97. — Rehb. I. c. 3. I. 258 — Wjdlr. I. c. 100. — G. Don I. c. no. 41. — Caulis. lenticulis incano-pubescentibus; foil. oblongo-ovatis, utrinque alternatis densis* glabris. % — Vanis foliis inferius basi submucronatis et subulso praecipue ad nos leviter pubescentibus foris cum *Scr. tinctata* et conjungenda. — *Scr. orientalis* Habl Taur. 104. — Crescit in rupibus Taunac meridionalis.
40. SCR. LIVID\ Smith, Prodr. nor. Grace. I. 17 - Sibthorp. et *m Flor Grarr t. 601. — Wjdlr. I. c. 101. — G. Don I. c. no. 42. - Foil, pinnatisectis, foil angulato-incisis, omnibus conformibus; thalamo virgato; calycibus albo-marginatis, corollis virescentibus, labio superiori purpurascente. O — Crescit in Asia minore. — Planta 1-2-pedalis.
50. SCR. DICOLOR Sibthorp. et Sm. I. c. t. 002. - G. Don I. c. no. 41. - Foil, bipinnatifidis; racemis paniculatis; pedunculis multifloris; capsulis* globosis muticis; siliis exsertis 3. — Laciniae calycinae albo-marginatae. Corolla linguata, basi alba, segmentis lateralibus brevibus albis, reliquis sanguineis, albomarginalibus*. — Crescit in Sicilia.
51. SCR. MULTIFIDA Willd. Enum. pi. hort. Berolin. 040., Hort. Berolin. t. 11 - Wjdlr. I. c. 101. - G. Don I. c. no. 44. — Gussone, Plant. rar. Sicil. 250. (. 44 Foil, bipinnatifidis, pinnule acute inciso-dentatis; panicula terminali; pedunculis dichotomis. % — Caulis simplex glaber herbaceus. Fuliorum segmenta lanceolata, folia superiora pinnatifida, superiora bipartita, segmento medio longiora densa. — *Scr. silatfoha* Clarke mss. ex Spr. b) > L. Vegl. II. 700. no. 47 Cn. > in Sicilia et in Asia minore.
52. SCU. LUCIDA Linn. Spec. plant. 805. - Willd. Hort. Berolin. I. 57. - Wjdlr. I. c. 101. — G. Don I. c. no. 45. — Gussone, Plant. rar. Sicil. 250. I. 41. - tunc simpliciter glabro fruticoso; foil, crassiusculis luridis pinnatisectis, segmentis pinnatifidis rotundatis v. acutis densis; floribus densis. "4 — Facile dignoscitur ab umbellatis: pedunculi pedicelsque crassiusculi, calycibus trifloribus uniuersimque maris membraoaco laceratis. Caulis semper basi foliosus, laxis abbreviatis. — *Scr. peltata* Dioscond. edid. Sarrac. IV. a? ex Spr. G. > (h. c. f. dor Dot. I. 17). — BUONI. Flor. classic. 102. — *Scrophularia moitanae* nunc tenatae *temps intia* < (10MI. Oper. tab. aen. 10. fig. 144? — *Scrophularia Cretica puma* (Jus Mor. II. 200. ic. — *Scr. Imha* Ger. Hort. em. 710. ir. * - *Scrophularia folia films modo laetatis* if. *luta enna latifolia* (Hauh. IMx. 210 - Moris. Oxon. Hort. II. 4.). v. c. 5. t. 7. *Sci. < nica ludfulm* Park. Hort. 010. ic. — *Scrophularia tajratilis lunda Laserpitii* J. Hasfhrntts fuho Bocc. Mus. di piano 100. t. 117. *Scrophularia glauca folio in amptis lactis* divito* Lournier Coroll. 0., V. >. (nl. 1717.) I. I. 221. — ? Folus in KuMioribus Crescit in Italia, Gracia, in Onenle, in Iberia? et in Africa boreali.
53. SCR. MLLTICAULIS Turrian. Bullet. de Mosr. XIV. 70. - Paniculata full (z. i. bns bipinnatifida; panicula terminali glandulosa, glandulis plerumque stipitatae calycis laciniis subrotundis obtusiusculis, marginibus membranaceo fere destitutis siliis fertilibus longitudine corollae rudimentis quinque oblongis n. t. u. s. liliis superioribus corollae dimidium tubi aequantibus ^ - Habitat in Slum ad wulum H. i. airli.
- M. S. (H. U. I. U. roilV sm in Mill. Did. cl. ^ no. 10 sm Prodr. (I. < M. M. I. 410 — Ink. r. num. pi. hort. Herc. II. 110. N. Nyllr. I. v. 102. (G. Don. I. r. no. 40. Foil, radicalibus interrupte punctatis, sessilibus pinnae liliis lanceolatis, lobis acute dentatis, densis murronatis. Honi distantiis "4 < u. l. u.

bipedalis v. ultra. Folium radicale pedale, inlerrupte pinnatifidum, segmentis pinnatifidis lanceolatis, lobis acute dentatis, dentibus mucronatis. Thyrsus aphyllus sesquipedalis, pedunculis alternis bifidis brevibus, non incrassatis; bracteae bracteolaeque oblongo-lineares oppositae. Calycis lobi ovati albo-marginati. Corolla parva purpurea. — *Scr. Cretica* Rivin. Monop. irregul. t. 04. auct. Trevir. Linnaea II. 53. — Crescit in Graecia.

55. SCR. DECOMPOSITA Royle mss. in Bth. Scrophul. Indie. 18. - G. Don I. c. no. 47. — Glabra lucida: foliis oppositis crassiusculis pinnatifidis, segmentis incisopinnatifidis lanceolatis, inferioribus petiolulatis; thyrsi stricto aphyllis; pedunculis inferioribus oppositis, superioribus alteris brevibus rigidis 3-5-floris; calycis laciniis margine albo-membranaceis, rufis; genitalibus exsertis. 2l. — Stamen sterile apice orbiculatum. Folia crassiuscula, supra laeviuscula irregulariter denticulata v. pinnatifida. Calycis lacinae rotundatae. — An *Scr. lucidae* varietas? — In India orientali in Kanaour crescit.

Sectio III. CAIHA 6. Don L. o. 511.

Stamine quinque sterili lanceolato acuto. Segmenta calycina rotundata v. ovalia, plerumque membranaceo-marginata. Corolla purpureo-virens, purpurascens-albida v. rarius flavescens. Genitalia inclusa v. exserta. Antherae fertiles lutae. Radices fibrosae, rarius tuberosae v. lignosae. Caules herbacei. Thyrsi laxi.

§. 1. *Thyrso compositae; cymis multifloris.*

56. SCR. DESERTI Delile, Fl. de l'Égypte 06. U 33. fig. I. - Wydler I. c. 162. - G. Don I. c. no. 48. — Caulis basi ramoso suffruticoso; foliis oppositis glabris, margine cartilagineis, inferioribus sublyralis, superioribus pinnatifidis, laciniis angustis obovatis dentatis; calycis laciniis margine cartilagineis. — Crescit in deserto Aegypti.
57. SCR. FRUTESCENS Linn. Spec. plant 800. — Hill, Veg. L. syst. XII. p. 46. — Wydler I. c. 103. — G. Don I. c. no. 40. — Caulis fruticoso; foliis saepius alternis cuneato-ovalis lanceolatisve in petiolum breviter decurrentibus dentatis. 5 — Caulis quadrangulus. Corolla parva obscure purpurascens, segmentis laciniis albis. — *Scrophularia Lusitanica frutescens*, *Verbena folio* Ray, Hist. Suppl. 30l. — *Scrophularia peregrina frutescens*, *foliis Teucrii crastinulit* Breyn. Prodr. 40. ex Derm. Hort. Lugd. Batav. M5. t. 547. — ? Foliis incisim aut laciniatis. — Crescit in arenosis maritimis Lusitaniae et Africae borealis.
58. SCR. PKWATIFIDA Brot. Flor. Lusitaniae. 1. 202. - Lnk. et Hoffm. Fl. Pong. I. 260. — Wydler I. c. — G. Don I. c. no. 50. — Caulis suffruticoso; foliis lanceolatis sessilibus profunde crenato-dentatis v. basi incisim pinnatifidis. — Caulis erectus ramosissimus glaber. Folia plerumque alterna, inlcrdum opposita, basi angustata. — Intermedia inter *Scr. frutescens* et *caninam*, forsitan prioris varietas. — Crescit in Lusitaniae arenosis.
59. SCR. PIATA Karel. et Kiril. Bullet. de Mosc. 10ff. IV. 710. - Paniculata: caule quadrangulo, anfractuoso; foliis oppositis pinnatifidis, segmentis linearilanceolatis locis mucronatis, dentibus mucronatis; panícula terminali glandulosa, glandulis minutis pedicellatis; laciniis calycinis obtusissimis late mucronatis; rudimentis filamentis quintis lanceolatis lubis corollae labium tubum duplo superantibus. — Ad torrentem Tsrbrharak-A^u in Siberia.
60. SCR. IKTEROPHYLLA Willd. Spec. plantar. III. 274. - Wydler I. c. 161. - G. Don I. c. no. 51. — Caulis fruticoso; foliis oppositis pinnatifidis, inferioribus pinnatifidis, superioribus pinnatifidis. Inlobis hirsutis, mucronatis. — *Scr. (r)lira frutescens, foliis rario rraainrr* Tournff. Coroll. 9. — *Scr. frutescens* var. — Sm. Prodr. fl. Grarr. I. 417? . - *Scr. Stbthor-P<*m* Spr. gysl. veget. II. 7. - Arcerdis ad *Scr. frutescens*, in foliis oronibus sunt lobes pedunculati. - In Creta et in rupibus iohannibus Mrli et Ferrarum.
61. SCR. (AMXA) Lion. Spec. plantar. 803. - III. Veg. L. syst. XIX. p. 4. - Rchb. tconofr. If. Oia - Koch, Sym. p. 0. Germ. 1. 11rh. 1. 510. - Rchb. Flor. Germ. excan. 377. no. 2300. - Wydler I. c. 161. - G. Don I. c. no. 51. — Folium laciniis pinnatifidis. — Inmo-dentatis; pinnatifidis

lerronali glandulosa, glandulis sessilib.; calycis lacinnis subrotundis obtusissimis lale membranacco-marginalis; rudimeolo filamenti quinque lanceolato acuto nullove, tubo corollae labium superum ter superante. 2l. — Corolla minula violaceo-rubra, lacinus lacinalibus albidis, infima albido-marginata. Flores non omnino sessiles, quales a *Ltnnaeo* dicuntur, multo tamen brevius pedicellati, quam in sequentibus. — *2tdyptiz irspos* Dioscorid. — *Scrophulariae montanae aut venenatae species tertia* C. Gesn. Opcr. 1.10. Gg. 144? — *Rula canina* Dalech. Hist. 9J7. ic. - Lobel. Adv. 391. ic. II. 55. - Tabern. Krtrbch. ic. 13e. — Ger. Ilstor. cm. 1256. ic. — *Scr. Rula canina dicta vulgaris* C. Daub. Pinx. 235. — Moris. Oxon. Ilstor. 4J. sod. 5. t. 9. fig. 8. — *Scr. allera tuta canina dicta* Park. Thea'r. 610 ic. - *Scr. mulhæda* Lam. Fl. Franc. II. JJ7. — *Scr. atropurpurea* Morclli, Dibholh. Kalian. XII. 372. — *Scr. chrysanthemifolia* M. Biebert. Fl. laur. Caucas. II. 78. III. 416. - Willd. Ilort. Berlin. p. et t. 39. - Rchb. Plant. cniic. VIII. fig. 071. - Rchb. Fl. Germ. excurs. 377. no. 2567. *) (Secundum Cl. Koch ab hac nulla nota differt.) — Crescit locis siccis arcosis glareosisque in Europa meridionali et in regionibus mediterraneis.

62. SCR. IOPPEI Koch in Deutschl. Flor. II. 410. |, Synops.-fl. Germ. (ed. 1.) 516 — Foil, glabris pinnatis bipinnatisque, lacinus incisis dentatisque; panicula terminali glanduloso-pilosa, pili diametrum transversalem pedicellorum subaequantibus; lacinus calycis subrotundis obtusissimis late membranacco-marginatis; rudimentum filamenti quinque lanceolato acuto nullove, labio corollae superioris lubum dimidium superante. <? — Calyx duplo major quam antecedentis. Pedicellus capsulam plerumque aequat. — *Scr. canina* Hopp. Cent. plant. exsicc. IV. cl. Sieb. lib. flor. Austr. no. 195. — *Scr. canina* y. cl. d. Wjdlr I. c. 164. — *Scr. Juratenstt* Sihlctch. Cent. exsicc. no. 67. — Crescit in montibus Jurae, in Carinthia (auf dem Fels), in Helvetia et in Carnia.
63. S(-K. PYRAMIDALIS Wjdlr I. c. 105. - G. Don I. c. 512. no. 53. - Taulib. longicollis; foil, allernb, inflexis, lanceolatis denticulatis, superis pinnatifidis; thyrsus longissimus. 2l. — Præcedentibus forte æquantibus; pedunculi longioris Capsula oblongo-subrotunda acuminata parva. — Crescit prope Donnus bey circa Mare nigrum.
64. SCR. CALYCIATA Blh. Scrophul. Indie 18. - G. Don I. c. no. 54. - Glabra > lona pubescens: caule angulato; Toll, late ovalis denticulatis, basi inflexis. ror- (fittis, ramealibus rotundatis; thyrsus brevi denso tubapyllo; calycis quinquepartiti lacinus lanceolatis acummatibus pubescentibus, capsula longioribus; geophilis inclusis. 2l. — Stamen sterile basi adnatum, apice liberam ovulam acutum. Folia rugosa. <ab>x non membranaceus. — *Veronica?* Ukyrt/Tora Wall. CMUI. 63ft). - lherha vix ultra pedicellum. Corollae lacinae breves subaequales. Capsula magna acuminata. — Crescit in India orientali (Kamaon, Kanaour)

§. 2. *Thyrso simplicis; cymis pedicellorum abortu paucifloris.*

05. SCR. RAMOSISSIMA Lois. Fl. Gallic. II. 3K1. - Wjdlr I. c. IUV - G. Don I. c. no. 55. — Caulibus tuberosissimis ramosissimis; foil, oppositis subpetiolatis ovalibus oblongis inrius dentatisque. pinnatifidis; pedunculis 1-9-Quadratis. | — *Scr. fmltens* DC. Fl. Franc. III. 729. (nee Linn.) — Crescit in locis arenosis Galloprovinciae, Cormae et Scyri insularum.
06. SCR. CAESIA Sm. Prodr. fl. Graec. L 438. - Sibthorp. el 8m. Flor. Crier, t. 004 — Wjdlr I. c. 160. — G. Don I. c. no. 50. — Caulibus burnt lib. numerous caespit-

*) *Stlt (linSiNTHEMIVOVA* Jf. Biebert I. c. c. - Foil, caulibus tuberosissimis, particularibus ramulis dichotomis, ramulis demum frachijm, flonibus Mfssihh. sluninif) rnulla In cuonibus I). — Folia tunonum tpathulata itihwteqerrima, aim nvnata tnta lannwia minor a fl minus compinta quam tlla Srr. < itim.M', Mid num< i own a /NJunrw/i minus (glandulosi, in pamrulam rlongalam fuliosam (hsixmfi - srr bimlor Sin. rr Hchh I I. c. c — S< r oru'iii.iiH if I m-HanitiMiii folio, flnrc nniimo ^jnccito Tnutncf. Corall 9 Srr ranin.1 § Hild Spec plant III ^77. — bcr. pinnatis Jfi// Ihct no. i? - (retnt in Tauna el in Italia supenort.

tois, Toll opposite glaucescenlib lyralo-pmnafidis incis, pedunculis simplici-
citer dichotomis bi-triflons 2l. — Caulc* spiihaime i ^libri — *Scrophulana*
onentahs mtnor Mehssac folio Tournef (oroll 0 — Rn\b Ccnlur \ 10 t 17
fig 2* — Crescil m rupibus circa Athena**, in agro Lacomco el Messeniaco —
An a pracctdente satis dncrsa⁷

f7 SCR DFM4TA Ro\lc msj, ex Bth Sciophul Indie 19 - G Don 1 c no 57
— Humilis caespitosa ItMlor pubescent foil alterrm crassis oblongi*, basi an-
gustalis, apice mci<>o-dentali*, llyrso simplici piucifloro pedunculis l-J-flom,
genitahbus exserti* 2l. — Stamen sterile apice oblongum acutum Folia rugo»a
Caly<> hciniac margine non membranaceae — Afflnis *Scr cutactae*, scd *»alis
diversa — Crescit in India orientali (Kanaour)

08 SCR CRETACEA Fisch in Spr SysU xeget II ISA — Wjdler 1 c 100 t 4 -
G Don 1 c no 58 — Foil nltcrnis breviier pcliolalis lanccolalis serrais, ulnq
illcnuati!> pedunculis uni-bifloris 2l. — Cauli* simplex ghnJuloso-pulverulcn-
lus albidus Folia scmipoMiona siepc in piliolum diuirrentii gl ibn Rnleao
lineares Gorolli par>a alropurpurci Capsula Icnlis migmtudine lusca — Cres-
cit in Sibat monlibus cretaccis id Tuiaim

t9 s(R IIMERICIFOLIV »)dlcr I c 160 f t 5 - (. Don I c no 50 - Caulc
lignoso, Toll opposite o\iti» integerrimi*» in peliolum brcum dtnirrentib , pc-
dunculi> 1-2-flons S — Caulis lignosus g'abcr ramosu> Rimi iltenu bnchiati
dninfill, corticc albe^centc, inlerdum spmesemu>, sicpissimt foln-florifen
I oha par\>a inlerdum Uerna o\ati v o\>a(o-lan((oh(j Jibn//y/><M mum more
pellucido-punclala inlegcrnma Khachis glandulo^a, ptdunculis bn\ibu<> allcr-
nis umbracleais, pedicellis saepe abortiMs. spincactiilibii> Dnctiir ininulie
Calyx parvus, lobis subrotundis albo-marginahs Corolla pana purpurei stimi-
nibus exserlis Capsula sabrotanda, respectu Dons magna — In dej>erlo Arabiac

§ 3. *Fionbus captalis.*

70 S(R MIMM4 M Bieb Flor Taur Caucas II 79 — ^>dlir 1 c 167 — G Don
I c no 60 — Humili!) caulib siniplici!>simi>, Toll p<liohii!» o\ iis tublobalis
dentalis, cipilulo lernnnali dinso subgloboso 4 — Horo migniiudine Srr rrr-
nalit, corolla rosca, labio infenori pillidiore — *Snnphulana on<nlahs minima*,
flw tubrolundo Tournef Coroll 9 — Crescil in Ibirn

I *Species non satis notac, affimtulis dubiac*

71 s(R (IIM>s|s ^m in Rc<s <|i|op \\\| - \\\>dlir I c 167 — Foil
oMto-oblon<tjN s< mtis pubtscintibus ^f \n hujus giuins¹* In (Inna
72 S< R <<M < IM \ linn Spec plant 806 — »>dl<rl r — *roll quaternis o^a-
ti> flonb >erlicill tiis sjucalis ^ 1-orte *ilrmimertdi** ^picios? — (nsrittn
> era (ruze

71 MR AS< E>DE>8 Willd Enuro plant bort Derobn (Ml >\>dl<rl r 10^ -
toll lanccolalis, utrinq atienoatis profunde el mat(ii ihur duplu Ho- di ni ui<
^hbris ractni) Urminali Z. — (resell
,| si || |sTKTK Rif Hor Iudo<ic 41 WMJUr I r loll op| OMIIS | nffe
I<iiolaii<» oblon^is IINUI <> scrrads canesuciUb , H'ltus ram<< flonb | nm j| ili<
I ixis J. — i n ^rii *

71 s< R MMIV * \M - U | I 4 d I rville, tnumirit 7) - >\dl<rl < — (uil< cncio
<|ii3drani;illari tJjbrnmo ftll nulmi> pdi lalis <\ it i-jnr< hiis ir^wir<><r-
raliH bra IMS Idiiceol(i<> sul>>r<(iis |t Juiiriili^ | ul i M i nlib nmlill n* pjni-
cula elonffala ^ Mortn par|i purpuri i INduiruli Urqiidl<iU dieb i<>im —
* rrtcil cirra Trapr/unl

76 SIR M.PKTAM-OII4 Pr>l Helic Pragma I 71 - W)dlcr I r - < nib fm-
liroHo rami< quaUrjnttularib foil cordali* oblu<i< dupliralo- d< niali- uirrii|
ghbri* pnlunculm dichotomic iridorK > — Folu fero >rpri, tr calm tar l\orr*
quim illi Srr *aqualicar* duplo minorn lunch Oan capsula o>ala *Scr y*^d-
biala spr SJM v r R r, | -j^t _ trescil in lli<pama auMrali

77. SCR. SKELLII Spr. Syst. veget. II. 783. - Wydler 1. c. - Foil, lanceolalis acutis, utnng. glabns, acqualiler sernilalis, bmiter peliolalis, peliolis dilalalis; caule quadrangular! laevi, paniculac lermmalis ramis» inchtomis. 2J.? — Crescit... f
78. SCR. NLD1CAULIS Wjdler I. c. 168. — Caule simpltcissimo, basi folioso, superne subaphyllo; foil, pmnalifidis slngosis; racemo simplici. 2|. — Radix lignosa. Caulis superne glandulis stipilatis \estitus. Folia inferiors profunde pinnatifida, pilis adpressis subglauca, scgmenlis allcrms acutis denlalis, tenuiicr cilialis, caulina rara parva pcclinato-pinnatifida. Racemus lermmalis simplex, pedunculi allcrni longi unibraclejti. Bractcac panac. Caljx *alde glandulosus profunde quinquelobus, lobis o\ato-lancecolatis» acuminate, nnr^ino non membranaccis. CoroMa ct capsula desunt, ideoque foric ad aliud genus pcrlinei. — Crescil in Persia« inonto rUmd.
79. SCR. OBLOISGirOLIA Loisel ISou\ not. memoir, soc. Linn, de Pans \I. ox Ferussac, Bullet. 1828. edit, ex Wjdler I c. — Glabra caule lelrapono; foil oblongo-lanceolatis in peliolum nllenujlis serratis; racemo terminali nudo; pedunculis ramosis. t|. — In insula Corsica. — Confcralur cum *Scr. inulan* Moris.
80. SCR. UMBROSA Dumorl. pro dr. fl. Belgic. 37. — Caulib. alalis, foil, simpliciter serratis deruicnlib. glabns, infmonb. oblongs acutis, summit lanceolate acuminatis; pancula Unninali. O — Habitat in Belgia.
81. SCR. RIMLAKIS Moris, Slirp. Sard, clencl. Appndx. 8. — Wjdler I. c 100 — (auk¹ tctri.gono alalo; foil, ihflmis o>alis, summis oblongo-lonccolatis crennto-denldlis glabns in peliolum dccurrenlib.; racemo terminali subnudo; pedicollis ramosis. 2|. — Corolla obscuro purpurca, labello virescente. Facies *Scr. aquatica*, scd caulis peliolorumque ala magis con«picua, folus obtusiusculis obsolete denials difTert. — Habitat in Sardinia juxta rnulos in montibus
82. S(R. hLH\LR11(ILLATV Moris I. c. — Wjiller I. c. lb') - (aule Irtrajsono glanduloso- puiKtato; foil, oblongo-lanccolatis duplicilo-dontntis, inftnorib. pinnati!», racenii tomunalis subaplolli pedunculis opposiis ili>t mtih brcMb. dense cjmosis. ^ . — Contlla intense purpurc.i, folia sublu» pilosa. — libilal ad flam ma el rnulos Sardinia.
83. SCR. MERI1)1(»ALIS Prsl. II. Sirul. I. XXXV. Pedunculis nullifl.ins, bractcchs sclaccis, capsulis pyrifornub. aculis; sepalis linean-lanreolatis, raulo frecto ramoso; foil, cordatis gros»e denials, supenonb. alicrnis ^ . - In Sicilia
84. SCR. L\NCIFOLIA Prsl. I. c. — Pedunculis nullifloris, bracu'olm linean-lanccolatis, capsulis globosis mucronatis; sepalis cnato-subrotundM, raarRinc sonriosis, raulo ascendenle; foil, ex otala basi lancecolatis obtuse dentalis, peliolis aldli. ^ — Crescil in Sicilu.

i , *Species lix coqmntnr.*

1. *Scrophulana p<ilu\lms nnn fat tula sue <KMMM<< timiir (' Rauh. Pinx I\> - Rij Ilistoi I 70-1. \N\dlcr I r 107.*
2. *Scrophultnui minor Huta cantna dicta Moris. Oxou Ilistor II. 4KJ. — Raj Hislor I 700*
3. *Scrophulana antiua Scnectonti foho Morx. I. c. t. 35. sect. 5.*
- 4 *Scrophulana peretjrtnu Trlrphu foho non irtrcnpta Raj. Ilistor. Suppl. 305.*
5. *Scmphularta aunua Catalontca montis Srrrali 11 nj I p.*
- 0 *Scrophulana Hartana hbult folio unglulari Plurk. Mmml. 100.*
- 7 *Scrophulana Imertcana detuton scabro foho, denhcuh magit exttanhhbut n*-petata R.IJ Suppl. 39»*
- 5 *Snophulana .Vn choracentit flore tndi rubente, foho 11 hear at,n I sunn IS IJ I r*
- 0 *Sfinphulauti Stniodontuae foho maxima Xonlmiaccnsu flm uti <- purpurco*
1 Iilil I (
- 10 S f ifliuluin mnntami humtht un</u*ta iciiato ct asuusruln f, l, , %, nuir funm,
in nndmt tmjoit M«SM*r»ilim v\ \mniai Until JI - < n s_c M J r >»r Ln uui
iKh i in > |w|r| i

11. *Scrophularia foliit linearibus expinnato dentatis, floribus longe racemose terminalibus* Gmel. Sibiric. III. 104. no. 3.

ttt *Species nomine tantum cognilae.*

SCR. HIRSI'ITA Scbolt.

SCR. PROCL'MBENS Arrabida.

SCR. STELLERIANA Steud. - SCR. INCISA Weinm. - SCR. GMELINI Tarlseh.

SCR. SLBUASTATA Arrabida.

tttt *Species e genere excludendae.*

SCR. MERIDIONAL!* Linn. — ALONSOA MUTISII.

SCR. PHYSALODES Moc. et Sess. — LOPHOSPERMUM PHYSALODES.

Tribus U. *HEMIMERIDEAE* Bth. in Hook. Comp. Bot. Mag.
II. 13. — Endl. I. c. p. 672.

Calyx quinquefidus v. pentaphyllus. Corolla tubo brevissimo, limbo etplanato subrotato bilabiato v. personato late quariri-quinqueclobo, basi saccato bifossulato v. uni-birakarato. Stylus simplex; stigma parvum subcapitatum. Capsula bivalvis, valvulis integris bilidis v. bipartitis.

3584. TYLICA'TIA *Nees et Mart.*

(Nees ab Esenb. et Mart. Nov. art. acad. Caci. Leop. Carol, nat. curios. XI. 43. — Meisn. Gen. plant, vascul. I. 305. II. 210. — Bib. in Hook. Comp. Bot. Mag. II. 15.)

1. T. CAMPESTRIS Nees ab Esenb. et Mart. I. c. 44. — Blh. I. c. - G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 000. — Herbaria erecta: caule tetragono subpilato; roll, oppositiv ovalo-oblongis, apice serratis; floribus axillaribus lolularibus pedunculatis. ^ — Crescit in Brasilia.

3384/., CALLIBBERIA. % *Llave et Lexarza.*

(Llave et Lexarza, Novor. vetcelab. descript. fasc. II. p. 3. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 305. II. 216. i — Endl. Genor. plant. Suppl. inedit.)

1. *C. PROCLMBENS Llave et Lexarza I. c. — Meisn. I. c. II. 216. f - .Don Call da Puebla" incolarum. — Crescit in Mexico.

3585. ALIKLOLI *numb, et Bonpl.*

(Humb. et Bonpl. phnt. aequinort. II. 02. t. 1(H. — Meisn. Grnrr. plant, vaneular. I. 305. II. 210. — Blh. in Hook. Comp. Bot. Mag. II. 15. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. GUO)

I. A. P'IBESCENS mi). I. c. - Procurabrn* mullitr pubrrn<<: caule tereti; foliis peliolalif o<ati> .iruin rrmoto deniatin, cuju^q. pans nubacqualib.; floribus axillaribus. 2,? — Folia fere pmllicem longa tpurie opposita. Pedicelli longi grantet; floret majoret quom teqaenlit, miooret quam illi aliarum ^pccicrum. — la Braillia Iropla cretciu

2 A. rilySIDUM Srad. in Goettng. Gelehr. Anieig. LXXII. 7N t. 30. PROCIM* BENS >CPH et Marl. Mot. act. acid. Cart. Leop. Carol, ml. curiot. XI. 4V — C Don I. r. no. .1. - Blh. I. c. — Prmumbens >ubglabra. caulr unglato; full, nub* ^vsilil). o\,ili-obli*ngi4 amiK <rrrai<, cuju<q. pin< uldr inarr|ualih.; 0<rib. a\illiribu<*. ^ -- Caulr< arlirubh trichoiumi glabn, anguli< alali*. Kolta glabra M>irjuk>'>o-srrrjt3, petiole r>nnaai%, prnjectun* nlti%. Floret axillarit tnlitaril > icrminjii ||||% Calceolaria* <inullimi. prdirelli* folio brvionbu<. Calji pi'1* pauet* ngidit obirriut. C<rrn|jr tioUrrje l-ibiura tuprrum bmr (rilohum, lob|* errnulatit, labium infrum magooa inflalum intrgrum Semina angulaia. — Schelteria a r gut a |rr* rt Mart. Flora B /., 1821. I. 90. el 3JR - Credit in Bra<ihae \ ilia d<< Illi>o<

3 A MLHIRU hFOLU llurob. et Bonpl. I. f. - Ki>r. B>|. Regi%ot. I 4IV - >ib. I. r. U. Don |. c. no. I. - Errria pubrtrent: foil, laneolaiit >ub<rraiit. Do- rahh mfitim tubcoafortmb , plenty ovalo-lanrtolatit denutit. pe<luneulo< sub-

aequantib.; florib. racemosis. % — Floras axillares solitani pedicellati in racemos terminates dispositi. Calyx pilosus. Semioa oblonga cuneata, membrana reticulata la veslila. — Crescit prope Caracas el in insula Trinitatis. — Ilacc specie* eiiam in Mexico lecta est, differl lamem planla Mexirana foliis plerumque qualer nis %erticillaiis, supra srabemrais, pilis caulinis subadpressis fuhis nee purpurasceniibus, corollis purpurascenlibus pilosis.

4. A. IIRTA Cham, el Schld. Linnaea VIII. 27. — G. Don I. c. no. 2. — Bñ. 1. c — Erecla, pilis spares hirla: foil, lanccolalis serralis, floralib. plcrisq. late cordalis abrupte acuminjlis subinlcgrnmis, pedicello brevionb.; florib. racmosis. 2} — Caulis lelragonus. Folia basi aunculata, argula obsolcclque serrulata. — Crescit in Brasilia prope Bahiam.
5. A. ISTEGERIMA Spr. Sjsl. \egel. Cur. posler. 235. — G. Don I. c^po 4. - Blh. I. c. — Erecla glaberrima: foil, oblongo-lanceolatis fnlegcmmis; florib racemosis. 2|. — Crescit in Brasilia (Rio Grande).
6. A. MINOR Fisch. el Mcjer, Linnaea XIII Lilerbl. 106. — Pubescens: caule quadrangulo; foil, semiamplexicaulib; sepalis lanccolalis glanduloso-pubescentib . laminis nectariferis ad faucem corollae taclusis, appendice indmsa. Z\I — Crescil in Brasilia.
7. A. GARDNERI Ilook. Bot. Mainz, t. 3754. f — Suffrulicosa pubescent!-glandulosa: foil, lanceolalis acuminalis serralis, floralib. basi laliorib brariciformib., pedicellos superanlibus. 6 — Uabital in Brasilia.

3880. nEMIMEBIN *Tlnbrg.*

(Thnbrg. Nov. gener. plant. 74. — Meisn. Gener. plant. tascul. I. 305. II. 2J6. — Blh. in Ilook. Comp. Bol. Magaz. II. 15.)

1. II. SESSILIFOLIA Blh. 1. c 10 — Pubescens- Toll. oxaln-oMongis sessilib. t infinnis peliolatis obscure dcnlalis; pedicellis subfascicuKuis, laciniis <il>circm tribus oboalo-olilongis, duobus cord.ilo-o%alis oblusis. *Qt Z\."* — Z^arcland el Paardoberg In Stellenbosch Proiuonloru bnnap spci.
2. 11. (DIASCIA Spr. S)>t. \egcl. II. Mx)) MONTANA Linn. Suppl. 280. - Thnbrg Fl. Capens. 484. — Bib. I. c. — Pubescens >. ran in glabrata. foil, peliolahs oati* denlaiis; florib. pedicellalis, suporionb. fasciculalin; lacinus caljemii oblongi* v. angusle ovalis, capsula vix broioribus. Q — Herba annua humilis habiiu *llojstei umbellati* v. *VandelUarum Indicarum*. — Lam. Illu«lr. {vu |. 532. fig 1. — Pluken. Almag. 0. t. 331. fig. 3. - *Paederota racrmosa* Iluuui. Pflniosyst. V. 00 t. 38. fig. 1. — Crescil in Promontoni bonac spci locis Stellenboscb, Worcester el Clanmlliam dirds.
3. II. SABI M)SA Linn. I. c. - Thnbrg. I. c. 4*5. - Blh. I. c. — Lam. Illustr. genci t. 532. lig 2. — (ilabnusrula Toll peliolaiis oblongis inciso-dentaliH pinnniid-disve; pedirelli- siifirnorb. suhrasncul.itis; lannns calycinin lanreolatis oblongis\c, capsuli tulplo loiigionhus Q — Alfnit pracedcnli Sid eerie dislincla. - Caledon el Clanwilliam in Pronionluno bonac vpn.

| *Species e yenere exdudenda**.

- II. ACLTIFOLIA Pers. — ALONSOA ACTIFOLIA.
- II. CALLIALATA Pers. — ALONSOA CAL LIALATA.
- II. DIFFUSA Tbnbrg. — DIASCIA DIFFIbA.
- H. IIRStTA Spr. — ALONSOA IIKbITA.
- H. INCISIFOLIA Pers. — ALONSOA INCISIFOLIA.
- II LINKARIFOLU Ilumb. et Bonpl — ALONSOA LINEARIFOLIA
- II. LINKARIS Pen. — ALONSOA LINKARIS.
- II >l\(' HOPMYLLA Thnbrg. - DUSCIA MACROPHVLLA.
- II MI Tls|| Ilumb Bonpl. Kih - ALONSOA MI TISII.
- II. P\|t\IHO|U Ilurob Bonpl kih - ALONMli PAR\ IFLORA
- II PKDI M.LL4lllb Law. - DUM.IA DIFFI SA.
- H. PROct MBtNS Pers. - ALONMH PROCIMBENS.
- U IRTICAKFOIIA Willd - ALONSOA INCISIFOLIA

3557. Ditsn. % *Lnk. et Otto.*

Lnk. cl Otto, Icon, select, plant, hort. bot. Berlin. 7. t. 2. — Meisn. Geuer. plant, vascul. I. 303. II. 21G. — Dlb. in Hook. Comp. Bot. Magaz. II. 16)

Sectio I. BRACHICARPAE Bth. 1. c. 16.

Pedicelli axillares v. superiores subfasciculati. Folia basi angustata. Capsula oboidea \. globosa, \altula altera saepissime majore.

1. D. HETERANDRA Bib. I. c. — Foil, carnosulis profunde pinnatifidis, lacinn* inferiorum ovalis», superiorum oblongis; sepalis ovalo-oblongis oblongis; corolla bifosulata; staminibus inferioribus elongatis difformibus. staminibus. Q? 2! — Credit in Promontorio bonae spei.
2. D. (HLMERIS Thunberg. Fl. Capens. 483.) DIFFUSA Bth. 1. c. - Foil, pinnatifidus subpinnatifidus, lacinus ovalis lalis; sepalis late lanceolatis acutis; corolla bifosulata; filamentis inferioribus medio bifurcatis; lacinia altera antherifera, altera membranaceo-dilatata. 4? — *Uemimerit peduncularis* Lam. Diet. III. 105., Illustr. gen. I. 12 fig., 3. — *Paedrotin ilonae spei* Linn. Spec. pi. 207⁹ — Pluk. Phytopr. t. 20. d. 5. — *Crocium* in Promontorio bonae spei prope Cap Town, Saldanha Bat, \itiboni.
3. D. HILOMJAIA Dili. I. r. — Toll infimis pinnatifidis lacinus ovatis*, superioribus pinnatifidis, lacini oblongis \lacinibus; sepalis late lanceolatis acutis, corolla bifosulata; filamentis inferioribus medio gemculatis internis membranaceo-dilatatis*. *ihasriu Henjma* lib union, itin. no. 223. - ,i. pan iftnra: - Crescit in Promontorio bonae spei Olifants mer, Urackfonlein in (Jan^illiam, Piarlterg .
4. 1). PACIFICUS E. Mej. mss. r\ Bib. I. r. - Toll, pinnatifidus, lacinis ovalo-triangularibus oblongis; sepalis late subrotundatis acuminatis; corolla basi bisaccata; filamentis inferioribus medio locum dilatatis. ^ — Flores nunc mihi »que a partem quam affioium. — In Promontorio bonae spei Hoi rner.
3. D. KINCINATV E Mey. mss. ex Bib. I. r. — Foil, runcinato-pinnatifidus \ Manualo-dentatus, laciniis ovalis oblongis \e mtecris denLinq.; sepalis laevibus cordato-dilatatis \uhulato-acuminatis; corolla bifosulata; filamentis inferioribus medio bifosulatis. 2). — Folia (loraii paura par\i. Floro pani. — (rescit in Promontorio bonae spei (ZiUerfontem, Nematjaland .
6. D. CILIA I' M. j. m. s. e\ Dili. I. c. 17 — Foil, infimis pinnatifidis, floribus ovatis \idit olivaceis \nucibus sinuato-dentatis; sepalis lanceolatis acutis; corolla bifosulata; filamentis inferioribus medio bifosulatis. (rescit in Promontorio bonae spei in Iionliaj', \iuda^ m^r, \irrkops m^r

Sectio II. LEPTOCARPAC Bth. I. c. 17.

Pedicelli axillares \. \upen<re^ subfasciculati. Folia basi angustata. Capsula oblonga »ublinea> .

7. D. BERTIANA Lok. cl Olio, Icon. »elcl. pi. borl. Berlin. 7. t. 2. bih. I. r. - Foil. oblongo-tinaculo-dentato, basi aniculato. «epali» lanceolatis acutis. corolla bifosulata. Zf Habitu >. *runmular*, sed r ipsuLi tra(IIII tjtijijnr lineis \on<i Scapula angustata, basi saepe malila. - Crescit in Promontorio bonae spei < Intiilli.iiii .
- H. D. Fill Mtl. I. U. I. %N \ Spr. § w. w^el. II ^X). - Itl. I. r. |o|| ol., n^i« %inu. iln-di^ilJli%, bjsi ani; u^lali<. %rpali< Ijnre >IIII aciuiiudH rorolla lun^e bicilrjrjli *lr ll. ib. lu. foliis, rihrr ripsulstjur a|t n. undil .id pr. in rdnilroi. ul ab<qu<* fl >rib<i* d fluids sit disiuru h<m In/ir r/IINUIII /ouyi<.>i nt I hubr^ H-r, aprt<. 4M \m> \$ni lunjwunt* !* rs sviitips II |VJ i rrrrii in Promontorio bunar spri i lantnlliJin, ^uppertul, Olifanl* rrrr, nr. irkfuiiinn tic
8. D. T\> \ (.KHAs K. Hq. u, ss % Bib. I. r. Foil. pinnatifidus, laciniis oblongis \infraribus. trpalit basi ovatis \tenuis. apicibus tubulato-aruminatis%. rrr<IU Imigi- birah jrau. ^? - Iubilu corollaque ad praeredoln arrrrdit. diffri foliis cal>ribu<qu. (aptula ignoU — CjWil in Promontorio bonae spei Uoddrfontrin in >emaqualand

8eoUo III. RACEMOSAE Bth. 1. o.

Racemi clongatl minule bractcali. Folia basi saepius cordala Capsula oblonga, rarius ovoidca.

10. D. (HEMIMFJUS Thnrg. Fl. Capens. 484.) MACROPHYLLA Bth. 1. c. - Foil, petiolaiis ovali* subsinuato-dcnlalis tenuib.; racemis terminalib. elongate; coroll i> longe bicalcaralis; filamenlis glabns. Q ~ Ilcrba gracilis annua sexpolliearis v. sesquipcdalis glaberrima. Folia pauca, mfenora longe pctiolala. Pedicelli 0-9 lineas longi. Corolla quam *D. alnnsoidis* major, cakanbus circiler seilianeabus. Capsula J-4 linear longa oblonpo-lmeans. subcunala. — Crescit in Promontonn bonae s̄pei mtor Uockland el Ilanloin .
11. D. PAUVIFLORA Itli. I. c. — Full bre\iler petiolalis cordalo-o\atis rolundalisse inlegcrnmis dcnlalisq., racemis terminalib. Hongalis muHiflons; corolli* breviiier bisaccatis; filaments glabris O* - Raceuu longiores mulioque pranifores quam sequent^, podicelli flitfortnes fere semipollieares. lion's nulanle* rirciler 1'A Im. lali. — Crescit in Promonlono bonae spei (kotiabs mcr, Cedel territory, Ilex rncr).
12. D. ALONSOIDES Bib. I. c. — Foil, petiolaiis subcordalo-o>ati<> sub^inuato-dcnlali^ icnuib.; racemis lermmalib. elongaiis nmllidori!*, corollib broM^smio blfossulalis; filimenlis \»llosib Q — Ilcrba glabra 0 Im. >. pedoni alia. Pedicelli filiformes, demum fere pollicares. Bracleae innimac cordaiae r.orolla semipolliccm lata, segmouli!* rotundatis magnitudinrque subaequalibu«. Capiula 3 Im. longa oblonga, a pic em versus allcnuala. — Crescit in Promonlono bonac *p*e*l (S*nee*u*we*bergen).
13. D. HACKMtl.O^V Bth. I. c. — Ramis telragonis subalatis; foil, lalo conlito-oxalis dcnlalis; racemulis axillanb. tenuib ; corollis calcaralis; lilamentis el iliris Q — Habitu reced I a speriebus ouuiibus alu>. Caules surnuin ramnsi (oliosi Rjceini bre<> ^r.inlcs numerosi. Corolla fere eadom ac praecedentis, calcaribus tiimen di\Tgen(ibiis. - In Promonlono bonac »pn inter I miala M I rtmmtootu.
14. 1). C\PSI LAHIS Bib. 1. r R B.isi ramosa: foil. subs<'<>silib rnrdat<i-<i\itis \. o>nto-lanccolalis dentati>, racmi> terminalib. elongate; rorollin bicah.iratis, rapsulis oNoideo-oblongis, cal)rc bii ter>c longionbut*. T\ Ilcrba ped.ili\ prope basin ramosa. Kami acute quadratiRulares Folia crassiuscula. Pedicelli '1-1-pollicares. Bracleae minimac. Sepala oblonga \. lanreolnta, pili> paucis l^hindulosis obsiia. Corollae calcana recta cornea, 3 cimlcr lmeas longa, limbo 8-10 lmeas Kito. Capsula quatuor circiler lineas longa. - (rc>cii in Promonlono bonac spci I itenhage, Albain .
15. 1). RKIKMLNs i: Me>. inss. ex Bib. I. r. — Caul© credo elato itriceto; foil »rssilib. N. .imple\uaulib cordal'>.o\atis dentatis; racemit elongatis Irrminalib mulliilons, lorollis broiler bicalcaralis; capsulis subgloboso-o\alit> cahcem MI acquanlibus. ~4 (mils subramosus ultra bipcdalis. Folia majora el a< ulius dentala (juim *It dijisulant* sep.il i cblonja \ spalulata oblu>a, julis gl.induliferis. Corollae calcar \ix 2 lmeas Ionium I ihmenia glabra (ipsula iniun i MX 2 lineis longa ,1. *umjuHtfoUa* - Crssnl in Promonlono bonae spei kalnviersberR el Winlerber^, rm/imroolu etc..
10. D. DKM ICMATA Bth. I. c. — Decumbent full. sr>>>ilib. ovaio-lanceolatif oblongis\p oblusU paucidentalis; raicemis terminalib. brevtb. tubcor>mboti>, corollll broiler biraUaratis. C\ — Folia craimunrtita ul Kpcrrrum duarum praecedentmm, scd mnnora angusiorn obscure denuta. Capsulo ignota. — f>c<ni ti Promoniono bonae nprl inter I'mlaln oi rmmroolu .
17. 1> l>n:(;i:iiKIM\ l: Me>. ni<<<. e\ Bth. I. c. - Foil. limisMiiic pciiol.t., integcrnmi^, mfcriorib. o\o-linceo\ntis, <upcrionb. lanrcolato-lmc inl. nrr-ti,* rlongi,iis lerniin.ililb ; rorollis bicalcaralis; tapsulis oblongs calMe In* tmr |<n-(Cinnbus "4 \flims 1) *raptuhit* i s<. 1 gracihor, foln multo mmora aruutii<.%ima, Uores minores - (rcscit m Promontono bonac spci lafelbrg, VSiiibergrn

I *Species r ymerc fypellcnda.*

D ||OMA>\S'r - IIKMIMKRLs U Y A M

3888. JVEMESIA Venten.

(Venten. *Jard. de Malm.* t. 41 — Meisn. *Gener. plant, vascul.* I. 305. II. 210. - Bib. in Hook. *Comp. Bot. Mag.* II. 18. — G. Don, *General syst. of gard. and bot.* IV. 533.)

§. 1. *Corolla basi saccata.*

1. N. STREMO^A Bih. in Hook. *Comp. Bot. Magaz.* II. 18. - Herbacea erecta: foil, radicalib. oblongo-spaihulatis inlegris, caulim* lanccolatis iineanbu»\c denlatis; racemi* brctib. »ub<or)mbo»is; corolli* amplis, basi late saccatis, la< inns Jale rolunda(!>. O — Pedalis, basi ramosa. Folia pauca cum caule glabra. Folia flora I la v. bractae panae. Pedicelli demum pollicares v. 6c*qpolicares cum sepalis lineanbus pilosi. Corolla perfecte eipansa pollicem circiter diametro habet, auranliaca, lutea T. purpurea, labio mfero pilis longis barbato. Captula ovata 4-0 Im. longa, 3-4 tin. lala, apico subcontracla, valvig linea recia v. •ubidCiwrata oblique truncatis angulum oblusum efflicentibus. — *Anthirrinum itrumotum* Bnks. lib. — Cre»cil in Promontorio bonae spei (Saldanha Bay).
2. N. SACCATA E. Mey mss ex Dth I c 10 — Herbacea humilis, basi ramosis-siraa: Toll lineanb inlegrnmis paucidentatisq, racemis elongalis; corollis parvis, basi late saccalis, larimis roiundalis O — Herba vix sexpollicans glaberrima. Folia subcarnosi Pedicelli distant* semipollicem longi Corolla 3-4 IID. laia non barbata. Anihrrae MI cohaerrntes Capsula 2-2 * lin. longa lataque, opire non angu»tata, vahm apice rotundatii angulum patentc^imum cfQcienlibuf. — f rescil in Promontorio bonae spei ^oagas).
3. > LI< IDA Bih. I c. — Herba glaberrima foil cordnlo-o>ali< grosse denlatis, infiTionb bre%iter petiolati<; racemis rlongato pauciflom; corolli?* panis basi late »acratiss, laciDiis rolundali«. O — Cauies pedalfs v. ftCnquipedalesi quadrangulares fflabri nmdi. Folia pollicem fere excedentia. Pfdicrlh dittanies pollicares. Capsula 0-7 lin. longa, 2 lin. lala, apicc non contracla, valvis ^aldt* oblique trunratis, angulo extcnori acuto. Corolla praecedentia. — Cre»cil in Promontorio bofi.ie »pei (Constanlia,. — Sieb. *Ub. fl C apens.* no. 254.

§. 2. *Corolla calcarata. Flores racemoidi.*

4. N. BARB4T4 Bih I. c. — d Don I c \U. no. 5. — Herbacea erecta foil, radicalib. pelmlaiis o\ahs subinloRorrimiH, caulinx scssilih o\ali< oblonc^r dentatis, racemiH |aucill<oris rorollae labu suprioris larimi* hrcvih roluudalu, infit* re matimo |i| em.iri;inato, ralrarr brcti mmco Q — >ubprd.iliH, ba<i ramota glabra > pth* pauris glanduloois parlr mipriori rauli*. pnlunrulii calycibu<(ue ad<per<s Corolla forma tanabili*, sal labio MJMTO magno lato, ttatu ticro ob<runu» coloralo rrcngnn<rrendi Labium inferum barbatum. Cap<ula ovata, ban! angusiala, cornubus grmtnU broibu* dnrrgeniibus. — Croat io Promontorio bonae »pei (Stollenbo<(h, CUowilliam, Ohfanu rnr.
- ft. If. CHEIRASTIICS E. Mey. O H. ex Bth I. c Frerta glabra foil infimic ovatis petiolalis, ^upriorib. pauci< roraoli* *r%ilii. oblongs lanroolaiis |inraribu>tf, omnib paucidentati* intcgrrrimi<<<*, enrollae larinun supremit lanrrnljti< aculit labio infenore longlorib palato villosa, rah an bre<i conirn Q* — P<MJJI<, noB taldr ramo>a. Cal>re< el prdunculi inirrdum pih% paun% brr<ibu< ob%iii Co* rollae larimae 2 nupriorc^ 0 linca* longic, lalrarr* 4 linra% longer, ralrar bilnrare, labmm inferum laium rmarginiuni I JJ>SJJ incognita. - t.rrtcil *B Promontorio bonj< %pfi Olifjnt* rnr, Hrackf<»ni*in tic
- . N. AXISOCARP4 K H?) m^ r\ Bih I r KrrrU ^ubgbbra foil mflmtf petiolatit o^atit, supenonb. paucit remoiit* trMilib oblongs lanreoljii> hnrart* bu<te iBieferrimit dmUluq; eorollae Urmht tuprenit obloogit obtu>i<. l<^i0 mferiore longt<Hb., paltto tenoiur pobr%rroi<, caJeari bre*i rrcrn |ioeari-roo*^0 O - Habitu, fohit ealycibosque tilde arredil ad prior cm, a qua recedil eorollt* lacinlit tupertoribat nullo laliortbot oblutitqu* - Cretnt in Promoolono bon. " tpei (Mircokatuel in Claavillian ft Zilvtrfontin Is %emaqualand)

7. N. VERSICOLOR E. Mey. mss. ex Bih. I. c. 20. — Erecla subglabra: foil, infimif peliolaiis ovaiis, supenonb. paucis remotis sessilib. oblongis lanceolatis lineanbusve miegerrimis dentalisq.; corollae lacinus qualuor supenonb. oblongis obtusis inter se aequalib., labio inferior! aequilongis, palalo bicalloso pubescentc, calcan incurvo, apice non dilalato, labio infenon vis aequilongo. O — Habiius duarum praecedentium. Calcar circiter qualuor lineas longum. Capsula J lineas longa el lain, basi rolundaia, apice non contracla, valvis apice rotundalis, angulo eiterion apiculatis. — *fi. oxyerat* Calcan aculion, flonb. obscure luleis. — In Promonlono bonae spei (Olifantsrivier el Drackfontem).
- a N. LIGLATA E. Mey. mss. ex Blh 1 r — Ererta subglabra- foil, infimis peliolali; otalis, supenonb. paucis remolis scsMlib oblongis lanccolalis lincanbus/e miegerrimis dcnlalisq.; corollae lacinus supreme ohlonpis-, lateral!) obotalis, labio inferior! subaequilongis, calcan labio inferiore parum longiore, apice subfalcaio-dilalalo Q — llabilus praecedeniium. Raccmin pubescens. Flo res quam praecedeolis speciei minore«, obscure lutei. Calcar 3 lin. longum. — Crescii m Promonlono bonae spei (Hoi river).
8. N. CALCARATI E. Mey. mss\ ex Dlh 1 c. - Erecla subglabra • foil, inflmit peliolalis ovalis, supenonb paucis remotis <cssilih obtungis lanceolalis v. lineanb deolans; corollae lacinus supenonb. obovaiis (?) inter sc el labio inferior! subaequilongis, calcan reciu«culo, apice allenualo, labio infenon subduplo longiorc. O — Capsula JV. *verticolora*, a qua aegre diOerl corollae lacinus supenonb. el calcan sex lineas longo. — Crescil in Promonlono bonae spei (inler Hexmer el Draai).
10. N. PARMFLORV Bib. 1. c. — Erecla subglabra' foil, infcnorib. petiolalu ovaiK, supcrionb. paucis remotis sessilib, oblongis MI denlali*, corollar parvae bcinus supenonb. oblongis labio inferior! bre\ionb., calcan reclo, labio superiores subaequilongo; capsuli!» apice non dilalalis. O — Caulcs granlos subsimplices. Racemi laxi, pedicellis filiformibua. Corolla quam ilia *I manae stnplint* m longior pallide lulea, calcan purpurco. Lapsula 2 lin. longa laiaque. — Irocil in Promonlono bonae spei, in montibus prope urbem.
11. N. PINNATA E. Mey. mss. ex Blh. 1. c. — Erecla pusilla glabriuscula foil, remolis lineanb. profunde denUlis pinnatifidisvr, lacinus lineanb.; corollae parvae labio supenore brevissimo, calcari recto, labio supenore longiore, laferlore breviorc. O — *Anttrrhinum pttnalum* Linn. fil. Suppl. 380. - Habium if. *parviflorae*. Corollae labium superum brexsumum. — In Promoolorio bOBM spei.
- IS. N. GRACILIS Blh. I. c. — Erecla subglabra: foil, fnfrlorib. petloUUs ovaiis, supenonb. pauris remoiis ncusilib. oblongis tix denlalis; roroltae parvae Ucioiis supenonb. oblongis, labio inferiore subdimidio bre>ionb., ralcant recto labio supenore lonpore, capsule basi conlradis, apico dilalalis subbicornibus Q — Valdc affinis A *pantflorar*, sv|| (lonhus mulio tnijonlwis cap^ularumqur forma bicorm fecedii. — In Promonlorm bonae upci ^ (Mifauis rncr, Brackfonlun .
13. N. BICORMS Prrs Enrhind. II. 1M). - (i Don I. c SM. no. 4. - Bth I. c. - Erecla, pilit Mparsm brenb pubesrens « subglabra: foil, iofimit petiolaiu ovaio-oblongis, supenonb. paucis rrmotis «««ilib. obloogis lanreolalis v. Imeahb. dfntalis, racemis dcnuro ramokis, corollae lacinus qualuor superlorib. oblnngis oblu>i«, labio Inferiore bifido subaequilongis, palalo bicallo»o vllloso, ralan linean labio inferiore bre%iore, capsula basi conlrncla, apice dilalaia bre\iier b«corni O — ANinis A *icsicolon*, scd robustlor ramosior el in unnersum mitfis puhenceiK Folia semper denlata. Fruettbus maturis facile diUinguiur. rap«ulae enim habent formam inanKiilorum duorum recianK^ilnrum, qui laiere an;uli rrii alicro conimii sui>i, latus alierum efficit lineam cunaia in roucronem projerium deMneir.cm Corolla magmludine illnx *Itnanar tnatae* el in timilem modum elongaia palalo lamen mulio minus pmmincnie — *Anhrhnum* Girom# Linn. Amorn Acad. M 4fr. 17. Thnbg Prudr (1 Capenv IOi Burro Afr ill

- t 75 Gg 3 — Crescit frequentissime in Promontorio bonae spei (Heerenlogiment in Clanwilliam)
- 14 IS AFFIMS Bth I c 21 t - Erecla, subglabra foil inGmis peiolatis ovalis oblongisve, superiorib. paucis subsessilib oblongi* lanceolalis v lineanb, plensq denlatis, corollae lacinnis quatuor superiorib oblongis oblusis inter se et labio inferior! subaequilongis, palato tenuissime pubescente, calcan subrecto obtuso, labio in fen on subaequilongo, capsula ovata submulica O — Valde a ffinis i\ *tersicolori* et *bicolon*, habitus pnonis, differ! tamen ab ulraque cipsula longion quam lala, apice contracta, valvis truncalis — *fi I alt folia* Humilior et ramosior, capsulis longionibus — y *grandiflora* Folns lationibus flonbusque majoribus — In Promontorio bonae spei (Slellcnbosch)
- 15 > C*i*\NCHIFOLIA Bib I c — Ramosissiroa, diffusa ramis foliosis pubescenlib, foil peliolaiis ovato-lanceolatis obtu^{is} obscure siouato-denlatis glabns, corollae labio supenore Infido, lacmia intermedia breviter bifida, omnib obtussissimis, labio in fen ore vi\ longiorib , calcin recto, hbio in fen ore parum bre*viore* pihto glabnuscule O — 1 * habilu aflinis pratctdLni* \ar /? , sed folns omnibus peliolaiis inferioribus floralibus caulinis saepe similibus, corollae lacinnis lalionibus, duabus supenonibus supra medium coaluis differl Capsula incognita — Crescit in Promontorio bonae spei (in moniibus Sneuwebergen)
- 10 N VISCOSA E Mey mss ex Blh I c — Ramosissima, viscoso-pubescentis foil brevissime peiolatis ovato-lanceolatis aculis integerrimis corollae lacinnis quatuor superiorib ovalis oblusissimis, hbio infinore M\ longionb , cilcan rtclo labio in fen ore brevior, palato gfabnu^{culo}. Q — Humilis rjmosa, habilu Mlde accedens ad praecedentem Sepala hnceolala acuiissima (orolla quam in praecedentie minor Capsula 5 lin longa, J lin lata, apicc M\ anguslala, brevissime bicornula — In Promonlono bonae spei
- 1 N. LINEARIS Vent. Jard do Malm L 41. — Per* Enclnnd II 150 - Bth 1 c — G Don I c 534 no 2 — Percnnis v sufrulicosa j,labra ramis ascendentib , foil linoan-lanceolatis inlegerrimis paucidentatisq corollae labile subatqualib , supcnons lacinnis brevib oblusis, calcan redo labns brcuore, palalo villosa capsulae \al\ulis apice reclis 2\.* 5 » — Capsula variat longitudine cl I iitudine apiceque esMel recta vel angu^{tata}, numquam tamen bicornis, \al\is a\nc semper rotundalis — *inttrrhnum Capense* Thnbrg Flor fipens 431 — *linana* (*apenstt* Spr S>st \cget II 70b — Crescit in Promonlorio bonae spei (Karroo, karroid, Swellendam, titenhagc)
- 18 > FOETENS Vent I c t 41 - Bth I c 22 - G Don I c 13 no 1 fig 40 — Foil quaternis lincan-lanceolalis acutis sublnncmis glabns scrrulatis), florib racemosis tcrminilib bractcalis ^ — *Antirrhinum fruticans* Thnbrg Flor Capens II 483 — *LHiarta fruticans* Spr Syst vegcL II 480 — *IS'fnttm /; udeans* Bth I c — Corolla albeicens, palato luteo — In Promontono bonac spei
- 10 N DIVERGENS Blh I c — Perennis* glabn nuns isrrndcnlih Toll lincin-hnccolalis inti^{crnmis} denlatis>e, corollao lalnls subaujuall), supcrions hcinnis bre>il> oblusis, cilcan redo labns brri*viore*, palalo Mlloso cipsulis apirr birorn His ". • — Habitus rl con Ma ^ (*mean**, capsula *If baibntac* — < nscil in Promontorio bonae spei (Zwarlchoogdens in Vlbain
- 20 \ HOHIBtNDV I dim Imna<a \ Literbl 70 — I null Hot Htpst No^{sor} XI t 39 — (aule erect* glabro Toll OM(IN p> I I >l I I t ^ nblnsi strrilis gbnis, racemis multiflons rlon^{ili-} | ubrsri ntib flonb ^pirMs distmiib I n^{pi} dun'culalis, braclcis reflexus miiutis^{imis} j (rcsrii in Promont* no boiut spei ^). *Corolla calcarata. hlures axillares t. uinus racemosi. Folia /oia-ha infertortibus caulinis subcotiformta.*
- 21 > *Ui* MINATA Bth 1 c 2:2 — Procumbenn glabi ronn Inn h fill stssihb iordilo-o\aim longc acuminatis nrgute <l<ntalisi flonb in i\ilhs Mipenorib v ad ipicts ramorum racemosii, corollae labns subaiqualib , palato pube>cen(e,

- calcaris labilis brevior; capsula apice dilatata acute bicornuta. O — Differet a JV. *diffusa* floribus majoribus, foliis et praesertim capsula, quae est similis illi JV. *bieornit*. — *Antirrhinum scabridum* Bnks. Hb. — In Promontorio bonae spei.
22. N. DIFFUSA Blh. I. c. — Ramosissima, procumbens glaberrima, lucida: Toll, parvis breviter petiolatis ovalis v. ovato-lanceolatis, inflmibus obtuse, superioribus acutissime dentalibus; floribus axillaribus v. superioribus laxissime subracemosis; corollae parvae labiis subaequalibus, palato pubescente, calcari brevi recto. Q — Habitus *Linariae ramosissimae*. Rami et pedicelli filiformes. Corolla JV. *lucidae* similis sed calcari brevi linearis. Capsula oblonga ovalis, basi angustata, apice recta, vasis oblique truncalis non rotundata. — £. *rigida*: Floribus foliisque majoribus. — Crescit in Promontorio bonae spei (Stellenbosch etc.)*
23. N. CHAMAEDRYFOLIA Vent. Jard. de Malm. t. 41. - Bth. I. c. - G. Don I. c. 534. no. 3. — Herbacea: foil, subsessilib. ovatis dentalibus, basi rotundata subcordatisve, floralibus subconformibus; pedicellis axillaribus; corollae labii superioris laciniis brevibus rotundatis, inferiore integro parum rotundato, calcari brevi conico. O — Tota planta glabra, exsiccata nigrescens. Corollae labium superius tres lineas longum, inferius 3/4 lineas longum non barbatum. Sepala oblonga, utrinque angustata, capsula (3/4—4 lin. longa et totidem lineas lata, apice truncata) breviora. — *Antirrhinum macrocarpum* Ail. Hort. Kew. II. 335. — Willd. Spec. plantar. UI. 249. — *Antirrhinum scabrum* Tbnbrg. Flor. Capens. 483. — *Linaria scabra* Spr. Syst. veget. II. 702. — Crescit in Promontorio bonae spei (Tafelberg).
24. N. MELISSAEFOLIA Blh. I. c. — Herbacea, glaberrima: Toll, petiolatis ovalibus v. ovatis*-uniceolatis dentalibus incisivis; racemibus brevibus; foil, floralibus inflmibus caulinis subconformibus; corollae labiis subaequalibus, calcari lineari corollam aequante. O — Herba fere pedalis. Rami foliosi. Folia N. *lucidae* sed omnia petiolata. Pedicelli longi filiformes saepe fasciculati. Corolla N. *lucidae* sed calcari 2 lin. longo. Capsula 0 lin. longa, 4 lin. lata, vasis oblique truncalis. — Crescit in Promontorio bonae spei (Karoo, Fort Beaufort, Philipslow).
25. N. PUBESCENS Blh. I. c. — Herbacea pubescens v. pilosa: foil, petiolatis ovalibus dentalibus, floralibus subconformibus; floribus inferioribus axillaribus, superioribus subracemosis; corollae labiis subaequalibus, calcari corolla brevior. O — Crescit in Promontorio bonae spei (Graafvynet, Keurebooms river).

•
f *Species minus notae.*

20. N. THUNBERGII G. Don I. c. 534. no. 6. — Foil, oppositis linearibus. **giftbrit**; ramis clongatis; racemibus terminalibus. O? — *Antirrhinum Capms** **Thabrg.** Flor. Capens. 481. — *Linaria Capensu* Spr. Syst. veget. 11. 700. — **Grwelt la** Promontorio bonae spei.
27. N. (ANTIRRHINUM Tbnbrg. I. c. 482. - LINARIA Spr. I. c. 703.) PATENS G. Don I. c. no. 7. — Foil, opposita subsessilib. lanceolatis acutis subinlrgis glabris; floribus terminalibus solitariis (?). O? — Crescit in Promontorio bonae spei.
28. N. DENTATA G. Don I. c. no. 8. — Foil, sessilib. lanceolatis alteris; floribus racemosis longe pedunculatis terminalibus, calcari obliquo; caule subsimplici. O — Flores pallide purpurei. — *Antirrhinum denlatum* Polr. Encycl. mèth. Suppl. IV. 22. — Crescit in Promontorio bonae spei.

tt *Species e genere excludenda.*

N. LONGICORNIS Pen. - DIASCIA TUUNBERGIANA.

3880. DICLIS Blh.

(Blh. in Hook. Compan. bot. **Magaz.** II. S3. — Mcl>n. Gener. plantar. \ascular, I. 305. II. 210.)

1. D. OVATA Blh. I. c. — Diffusa: foil, late ovalis, basi connatis. 2p Q*. — Flores (quam illi speciei »equuli!» duplo minores. Capsula glabruscula. — Crescit in Madagascana.
2. D. REPTANS Blh. I. c. — Foil, subrotundis, basi truncalis cordatis. *)? Q* — Caule longi repentes^{aj} nodos sarpr radicanles cum folis magis **minutis**

pubescentes, interdum glabri, exsiccati plerumque nigrescentes. Folia pollicem lata v. etiam ultra, crenata. Sepala oblongo-lineariter subaequalia. Corolla (calcarei adjecto) 7 circiter lineas longa, labium inferum quam superum duplo longius. Capsula glanduloso-pilosa calycem subaequans, latitudine longitudinaliter excedente. — Crescit in Promontorii bonae spei provinciae orientalis (Van-staadenriviersberge, Zoereberge in (Jileuhage, Gafferand etc)*)

Tribus III. JNTIRRHINEAE Chavannes, Monogr. Antirrhin. p. 73. — Endl. Gener. plant p. 673.

Corolla tubulosa, limbo personate * ringente bilabiato, rarius aequali. Stamina quatuor didynamia. Antherae biloculares per paria appropinquatae. Capsula bilocularis, dentibus v. operculis debiscens, rarius parvalvis, nunc irregulariter rupta. Seminum testa solida y. laxa arilliformis.

3890. ABBUIH Dsfont.

(Dsfont. Flor. Ailan. II. 51. — Meisn. Geogr. plant, vascul. I. 305. II. 215. — Chavannes, Monographic des Antirrhinees. [Paris 1833. 4to.] p. 175. — G. Don, General sjsl. of gard and bot IV. 531.)

§. 1. Corolla ciliarata; folia ramealia partita.

1. A. (ANTIRRHINUM Linn. Spec. plant 860.) BELLIDIFOLIUM Dsfont. Flor. Allan. II. 51. — Lnk. el lffmns. Flor. Portug. I. 220. t. 32. — Koch, Sjnop. fl. Germ. el Helveu (ed. 1.) 524. — Rchb. Flor. Germ. excurs. 373. no. 2527. — Bol. Magaz. t. 9050. — Chatannei I. c. 175. f. t. ia — Glabrum: foliis radicalibus apicalibus obovato-lanceolatis incurvatis rotatis, ramealibus profunde 3-7-palmatis sessilibus, partibus linearibus; racemo gracillimo elongato; corollis albescentibus violaceo-variegatis. — Caudex brevis incrassatus, rami virgati bipedales glabri nitidi, superne ramuliferi. Folia radicalia rosulata cuneata obtusa bipollicaria vel ultra, in petiolum attenuata, caulina vix petiolata, saepius profunde trisepta, laciniis lateralibus bifidis, folia superiora parva fasciculata geminata, saepe bifida. Bractae simplices lanceolatae. Flores parvuli, racemum gracillimum ininterruptum efficiunt, pedicellis brevibus. Calycis segmenta lobum corollinum nequaquam, lineariter carinata glabra apiculata-hamosa. Calcar corollae gracile acutum arcuatum, interdum brevissimum. Labii superioris lobi ovato-truncati, inferioris reflexo-penduli, margine albescentes. Stamina fere aequalia; antherae triangulariter reniformes triloculares impressae punctatae, polline albo repletae. Capsula compressa tripliciter longitudinaliter chartacea glutinosa. Semina minima oblongo-ovata, letta morleata. — *Unmrim odormi** Dodon. Pemptid. ilirp. 184. Ig. I. - *Unmrim BM4U Wrfo Dal* «eh. Hift bert Logd. 115. fig. 1 - C. Banb. »fe4r. MB. le. - J. Bash. Mal III. 4» fig. S. - Cbabr. Sciagr. 481. fig. 5. - *Dodartia* Mill. Did. (ed. 8.) no. 2. - *SimbmtH** Ponk. Deter, pi. Aeg. Arab. 113? — *Linaria biuidifolia* Dum. Coart. bot colt. III. HI. — Crtseil in raderatlt homidisque Galliae (praeterium Australii, in Pyrenaeis, circa Logdoom, in Pedemontio, Lulliana, Rhelina propc Genevam) in Germania (inter Trarbach et Brnrasiel ad ripam Mosellae, in Syria propc Damatum vel in Arabia (an eadem pianu?)).

2. A. (AXTIBBHIMI Broder. Flor. Loill. I. 100. - Pert. Rnchirid. II. 150.) D1711-MINIUM Chairanaef I. c. 177. - Villotom: foliis radicalibus tobtalbalalia iocitodeaialia, ramealibus plurtiq. tripartite, lobo medio maiore lanceolato, vtrioque nagta mteata). dt«UeoUlo; eorolNa piloinaevlia albido-talhareli. r/ - Baml cauliformea phw« pedalet lemlatevli, pills almppleibm veaUtl. ftamoli aberecilt tarpe fattigiatl. Polia radicalia pobtteenlia oenrota terrau denuu t. acute erenataS-^pollicaria, ramealia «loralia infertora taepiot iripartHa 0-0 Nn. lonfajt lobo inlermedio lale Uneevolalo maeronaio, panitioniño* laltraliboa liotaribof «»

lineari-oblongis brevioribn* integerrimis acutis. Bractee ereclae obloogo-lanceolatae integerrimae villosae; pedicelli subnulanles, caiycetn subacquantas. Calycis segmenta linearia acnta hirsula, corolla iota duplo breviora. Corolla major qaam praecedentis, calcari incnrvo, tubum snbaequante. Capiula compressa, apice valde emarginala, valvis medio subcarinatis, major quam praecedentis. Semina oblonga fusca, testa rugosa. — Crescit in Lusitania boreali Inter Durum et Minium.

- a A. PEDATUM Dsfont. Flor. Atlant. II. 51. 1.141. - Willd. Spec. plant III. 901. - Spr. Syst. veget. II. 708. (excl. syn. BroU) — Ghavannes I. c. 178. — Inferne#glabrum, superne villosum: foil, radicalib. oblongis inciso-dentatis pilosis subrectis, rrmalib. profunde 5-9-palmatiparillis {*pedalis* Dsf.) glabris, partitionib. late linearib. acnlis; racemo abbreviato sursum attenuato; corolla hirsuta alba. *JI* — Herba pedalis et ultra; rami striali, superne ramulosi pilisque simplicibus obsiti, ramutls floriferis villosis. Folia radicalia basi valde attenuata 3-5-potlicaria, 6-10 lln. lata grosse dentata, subtus nervosa, ramealia valde approximate, partitionibus inaequalibus linearibus v. lineari-lanceolatis, rarins supra basin dentatis, 4-12 tin. longis. Racemua spiciformis, floribus snbhoriionalibus. Bractee linear!-lanceolatae aentissimae erecto-patentee villosae, floribus longiores. Galycis hrsnti segmenta linearia, tnbo corolloo dimldio breviora. Corolla alba, tnbo hirsulo, lobis ovalo-rotundatis, Inlermedio labli inferiorls lateral!b. paullo majori, calcari brevi gracili inenrvo. Capanla snbrotmnda. 6einiit,....T — In collibus arldis Algeriae cretfrít
4. A. LAXIFLORUM Boiss. Elencb. plant nov. Hispan. 153., Voyage bot dans le midi de TEspagne 1229. f 1.127. — Glabram: canlib. ascendenlib. simplicib. gracilib.; foil, radicalib. rosulatis spatbulalis in petiolum allenualis integris obtusinsve dentatis, caulinis trisectis, laclniis linearib. saepe inlegris; racemo gracillimo nnilateralilaxo; bracteis setaceis brevissimis, pedicello duplo breviorib.; calycis glabri laciniis ovalis aculis, corolla alba quadruplo breviorib.; corollae labio superior! bifido, inferiore longiore, lobia subaequalib. Integris, calrari arcuato; capsular compresso-sphaerica emarginala, oalyce trlplo long!ore. </ — Crescit in Hispania meridioof li.
- g. 2. *Corolla ecalcarata; folia ramealia (ntogenima v. deniata).*
5. A. FRUTICOSUM Dsfont Flor. AUant It 53. 1142. ~ Willd. 8pee. pUsUr. III. 861. - Spr. Syst veget II. 106. - Gbavannes I. e. 170. f - Glabra: etde brevi suffruticoso ramoso; ramit elongatlt virgills; foil, loftriorlt. tvMlfmifb. spathtnlatisve, plerisq. tridenUtlis, superiorib. oblongis v. oblongo-linearib. Integerrimis; racemo elongato interrupto; corolla alba glabra parvula. 5 — Sufroifi S-3-pedalis. Caulis erectum tortuosus nodosns, nunc cvotatus, nunc ad caudicem brevem reduclus, corticc rimoso lutescente. Rami tmtes valde elooKaai virgati, folia crassiuscula, inferiora pollicaria v. scsquipollicaria in priiolum attenuata, aplce tridentata oblata, Inlerdum Integerrima, superiors approiimata oblonga seu llineari-oblonga acutiuscola Integerrima. Floret eiigul aplealo-raemosl, racem virgaio gracili Interropto. Bractee linrares aentae ealyoeai aeqnantet. Pedicelli aplce incrassatl. Calycis minimi tegmenU ovato-lsnoeolaU aenla, margine membranacea. Corolla parvula, labio soperiorl abbreviato, Infeiore longiore, lobis rotundatis. Antberae oernlescentes. Capaola fere sphaerica subemarginau glabra. Semina minima oblonga fasea, testa paaetalo-seabra. — Crescit in AUanio prope Tlemsen, Mascar et Caffim.
0. A. PI'BESr.ENS Fresen. Mus. Senkenbrg. I. 80. — Glaoduloio-pubescens: foil radicalib. oblongis in peliolium decurrenlib. grosse dentalis lin«ulati»q. integerrimis, caulinis linearib., floralib. pedanculo longiorib.; caule erecto ramoso; ramis virgatis. </? — *lãrdiotheca pubetcms* Bhrenbrg. T? — Grescil in Arabia. — Speciea in^ufficienter dc>cripta.

3801. LIMABIA Vent.

(Yenlen. Tab), du rign. végét. II. 360. — Meisn. Gener. plant Yasnl. I. 305. II. 215. — Chavannes, Monographic des Anlirrhines 01. sq. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 517.)

Sectio I. CHAEHORRHUM Da Flor. Franc. V. 410. — Chavannes L o. 02.

Corollae palato magis minusYe depresso, labio superior! anlice produclo, nec erecto, calcari corolla breviori. Semina oblongo-oroidea iruncata, testa longitudinaliter sulcata v. foveolata echinulata. — Herbae pilis plerumque veslilae: foliis oppositis el alternis inlegerrimis; floribus axillaribus v. laxe racemosis.

§. 1. *Capsula chartacea, loculo superiori saepius altero multo majori, valvula unica apice dehiscent*, inferior* transversa, ritna basin versus tardius dehiscenie v. indehiscente.* (Chavannes I. c. t. 5. fig. 8.)

1. L. TENELLA DC. Flor. Franc. V. 410. — Spr. SysL vegeu II. 701. — ChaYannes I. c. 02. f — Villosa: ramis cauliformib. procumbentib. gracilib.; foil, cordato-atis oppositis aculis, floralib. alternis; calycis segmentis linearib. subcalicis; corolla alba, calcari curvulo, lobis limbi inlegerrimis. Q — Herba vii semipedalib. rami e raule abbreviate prodenntes pluros teneri prostrati, folia mollia membranacea distantia breviter petiolata 3-4 lin. longa. Flores axillares, pedicelli capitulares, folio longiores. Corolla 2-3 lin. longa, lobis rotundatis inlegerrimis, calcari brevi obluso. Semina oblonga, testa sulcata. — *Antirrhinum* (*Anarrhinum* WiHd. Spec, plant. III. 202.) *ieneUum* Cav. Icon, plant II. 01. 1.180. (nee Prsb.) — Crescit in Hispaniae provincia Valencia.

2. L. VILLOSA DC Flor. Franc. V. 410. - Spr. I. c. 702. — Chavannes I. c. 03. t - VUlot: folL ovalis Y. orblenUrib. oblongis bretiler petiolatis, omalb. oppositis; florib. oppositis looge pedicellatU; ctijels Mfnentis lloetri-oblongis subspatbulatit; corolla alba Y. pallide coenilea, llnels lnleniorib. jiotata, lobis apice emarginatis, calcari recto, supra basin ampliato. 2]. — Rami cauliformes di(Tu)i pilis simplicibus patulisque vestilli, basi lignescenles, 5-10-pollicares. Folia 1-5 lin. longa, 3-4 lin. lala, in petiolum brevem contracta villosa crassiuscula. Pedicelli biserti folio duplo triplore longiores. Corolla cum calcari 5-0 lin. longa. Capsula pubescens ovata. Semina oblonga, apice truncata longitudinaliter salcaia. — *Antirrhinum saxatile minus Origani folio tiscoso, lore albo amplo* Barrel. Icon. 507. — *Linaria titpanica liumulariae folio tilioto* Tournef. Instit ret herb. 100. — *Antirrhinum terpyliifolium* Pourr. in lib. Dsf. — *Antirrhinum of' posiliflorum* Poir. Diet. m*lb. Suppl. IV. 23. — *Linaria muralU* Slim. lib. — 1° llispaniae ora mediterranea (Gadibos, Geber Allari; crrcsit

9. *pusiUa* Boiss. Voyage dans le nidi de l'Esp. 450. no. 1233. ~ Villosa, vii Ylscosa: canlib* (enaiotib. abbrvlatia caespilosis; foil, floribq. minoribus. — (In Hispala aoatrtli.)

3. L. ORIGANIROLIA DC FIOT. Franc. III. 501. (excl. syn. Magn.) - Spr. I. c. 701. - Chatannes I. c. 04. | I. 0. — Pubescent Y. glabra: foil, oblongis aut obovatis* breviiertepiolatis, inferiorib. oppositis, superiorib. allernis; florib. alirrnit disianlib.; cal)Cis segmenlis linearib. Y. linear!-spatbulalis Yillosis; corolla corruleo-violacca >. rarius alba, lobis cmarginalis, calrari recto, supra basin ampliato. % — Herba pol)morpba 5-10-polliraris; rami cauliformrs ramulosi a»rendentet v. prostrati flnuo»i, safpe^landuloso-pubr«cenip<. Folia in pctiolum brctesn atenoala, 3-6 lin. longa, 1-3 lin. lala, margine rrvoluta cra«iiu«cula rrrdo-pateoll** Flores aiillarts racemum laiuro rffirientes, prdirellis fllifformibus brrflssne pi* lotlt. Calyels Ubo corollioo bretions segnenla obtota aisodaloso-pplloM, supremo najorL CorollU (tdjtelo etlcari) 4-6 Mo. looga, lobis •narffioails corruleif rubro-itriaUa, fosjM fava. Caprala flabrisjarala ottau, locvltit tilde inaequallbaş-Semina obloftgo-oYoidta, apico iniBC^U, longitudinaliter salraia. — *L. sarrHm \$trp*UifoU** Tomrf. lotUloi. rti borb. 100. - *AnMrrkinmm oHgmifioHum* Linn. Spec, plant. 888. - Abwrai lore albo. - Crttcil In GaUia tt **Hispania.**

- fi. grandiflora* Bth. Calai. pi. Pyren. 06. — Florib. majorib.; planta majori et villosiori. — *Antirrhinum villosum* Lapeyr. Fl. Pyren. 353.
- y. erassifolia* Chavannes I. c. 04. — Foil, ovatis subaculis glaberrimis crassiusculis; florib. magnis. — *Orontium taxa* Ule *Thymi folio, flore rubello* Barre I Icon. 1313.* — *Antirrhinum* {*Anarrhinum* Willd. Spec. plant III. 901.) *cratifolium* Cav. Icon. pi. II. 11. t. 114. — *Linaria erassifolia* DC. Fl. Fr. V. 410.
- d. longepedunculata* Boiss. Elench. pi. nov. Hispao. (ed. Erford.) 40. no. 148. — Caulib. semipedalib. et ultra; pedicellis valde elongatis capsulis triplo longiorib.; calycis laciniis oblongo-lanceolatis nee sublinearib., omnib. partib. tomento viscido dense obduclis. — In pinguibus Sierra de Nevada.
- «. *glareosa* Boiss. I. c. no. 140. — Foil, inferiorib. glabrescentib. carnosis, omnib. subrotundis; caulib. Oliformib. prostralis caespitosis; pedicellis calycibus birtolis; sepalis oblongis obtusis, capsula longiorib.; florib. maximis violaceis. — Crescit in glareosis humidis glacialibus Sierra Nevada in Hispania (allit. " 0-10000 pedum).
4. L. FLEXUOSA Dsfonl. Flor. Allan*. II. 47.1130. — Spr. I. c. 701. — Chavannes I. c. 05. f — Glaberrima: ramis cauliformibus filiformibus fletuosis implexis procombentibus; foil, petiolatis spatulatis ellipticis? oblongis, imis lantern oppositis, superioribus alienis; floribus dilutis; pedicellatis folio duplo triplo longioribus; calycis segmentis linearibus; corolla parva coerulescente, tubo. panthululo elongato; calcaribus obtusis recurvatis, lobis integerrimis. — Plantula 4-4-pollicaris profirata diffusiva. Folia inferiora 4-0 lin. longa, 1-2 lina, superiora multo minoralinear-oblonga. Pedicelli elongati torulosi. Calycii segmenta, linearia lubum obovatum aequantia obtusiuscula. Corolla *L. minorem* aemulans sed longior. Capsula ovato-globosa calycis longitudinali, loculis fere aequalibus. Semina ovala, utrinque truncata nigra, minute foveolata. — *Antirrhinum flexuosum* Willd. Spec. plant. III. 250. — Crescit in Barbaria prope Tunelum.
5. L. RUBRIFOLIA Robill. el Casl. mis. in DC. Fl. Franc. V. 410. - Spr. I. c. 702. — Chavannes I. c. 00. t — Caule erecto e basi ramis flexuosis pubescentibus; foil, inferioribus ovalibus oppositis approximatis, subultra-rubris glabris, superioribus oblongis alienis; calycis segmentis linearibus spatulatis obtusis villosis; corolla parva purpureo-coerulea, lobis integerrimis, calcaribus gracilibus acule divergentibus. — Herba 4-8-pollicaris gracilis breviter pilosa (pilis capillis). Kami alieni graciles villosi. Folia inferiora breviter petiolata glaberrima caulata ovalia v. ovalo-rotunda 4-7 lin. longa, floralia minoralinea. Pittas Uil, pedicellis corollam aequantibus, dnom aerescentibus filiformibus. Calycis segmenta linearia oblusa, quandoque subpaulata villosa, corolla breviora, capsulam superantia. Corolla (adjecto calcaribus) 2-4 lin. longa pubescens, ad faucem punctis 2 luteis notata. Capsula glabra v. pubescens ovalis, loculis valde inaequalibus. Semina oblonga truncata nigra ebinulata. — *Antirrhinum taxatile Serpylli folio* C. Bauh. Pinx. 212. — Magn. Bot. Monsp. & ic. 24. — *Antirrhinum organifolium* tiouan. UorU 301. — *Antirrhinum filiforme** Poir. Did. encycl. Suppl. IV. 27. — *Linaria organifolia* var. *rubrifolia** Bib. Cal pi. Pyren. 98.
- fi. humilis* Chavannes I. f. — Foil, oblongis tabsettilibus; calyce corollam tubaequantibus; corolla parva, calcaribus rectis. — *Ummim rmptrit* Qoss. Prodr. 0. Sicul. 103., loon. fl. Scul. t. 307. — Crescit in Gallia aotlrali, in Pyreoeis, Sardinia et var. *fi.* in Sicilia.
- \$. 2. *Capsula membranacea, loculis aequalibus, quoque loculo denticulatis tribus apice dehiscentibus.*
6. L. MINOR Dsf. Flor. Allant II. 46. - Flor. Danlc. t 502. - Gärtner, De fruenb. fl seminib. I. 240. t. 53. fig. 1. - Engl. Bot. XXVIII. t 2014. - Rrhh. Flor. Germ. eicur. 4. 374. no. 33. — Koch, Synops. Fl. Germ. el Helvet (ed. 1.) 521. — Chavannes I. c. 07. f — Tota glanduloso-pilosa: full, lanceolatis obtusis in pediculis alteoua, inferioribus oppositis, superioribus alienis linearibus; floribus solitaris atillaribus subracemosis; pediculis calicibus triplo longioribus; corollis dilute violaceis,

labiis ochroleucis, laciniis labii superioris divaricatis; seminibus oblongis solcatis. 0 — Caulis erectus semipedalis ei oUra, a basi ramosissimas breviter glanduloso-pubescentis. Kami inferiores oppositi. Folia oblongo-lanceolata v. oblonga 4-10 lin. longa, Orolia lanceolata obtusa, pedicellis breviora. Floret longe pedicellati, pedicellis erectis pubescentibus. Segmenta calycina linearia obtusiuscula, demum ampliata subpatulata. Corolla panra, palato prominolo, pilis aurantiacis obsito, labio inferiori albido. Capsula ovata a calyce tecla membranacea. — *Antirrhinum tertium* Camer. EpiU 022. ic. — *Antirrhinum minus* etc. Tabern. KrSuterbch. 1236. ic. — *Antirrhinum minimum* J. Baab. Histor. HL 465. ic. — *Antirrhinum arvense minus* C Baab. Pinx. 212: — *Antirrhinum sylvestre minimum* Park. Tbeatr. 1334. ic. — *Linaria arvensis minima* Rifin. Monop. irregol. 1. t 85. Ig. 2. — *Linaria pumila vulgaur arvensis* Tourn. Inslit 160. — *Linaria viteida* Much. Meth. pi. 584. — *Antirrhinum minus* Linn. Spec. plant. 808. — *Urraria Antirrhinum* Cberall. Flore gen. des entir. de Paris II. 442. — Creaoil in Europae aris incultis et in Caacaso.

7. L. RAVEYI Boiss. Elench. pi. nor. Hisp. no. 152., Voyage bot. dans le mid! de l'Esp. p. 452. no. 1136. f I. 132. fig. 6. — Anoa: caule bnmillimo simplici pilis patulis birsuto; foil, ovatis breviter petiolatis acutiusculis glabris aut margine subciliatis, subtus rubris; floribus paucis axillaribus, pedicello birsato calycem superante saalntis; calycis birsuto sepalis linearibus, basi attenuatis; corollae birtellae lateae calyce duplo longioris lobis submarginatis, calcaribus recto corollam subaequantem. 0 — Herba pollicaris aut sesquipedalis saepius onioora. Folia carnosula, superiora oblongo-lanceolata oblusa, basi attenuata. Floras 1-2, pedicello 4-5 lin. longo. Calycis lobis superiores paulo longiores latioresque quam inferiores. Corollae flavae labium superum subquadratum, brevissime bilobum, lobis triangularibus, lobis inferioribus lobis superioribus submarginatis, intus lineis 2 raris marginalibus. Falx linae 4 florum perma. Calcar rectum fasco-luteum. Capsula.? — Crescit in Hispania, in arenosis humidis regionis alpinae Sierra Tejada, ad 5-0000 ped.

8. L. LITTOBALIS Willd. Enn. pi. hort. Berolin. 041. - Spr. I. c. 703. — Sturm, Deotttbl. Flor. Hit 70. ic. aen. — Koch, Synops. fl. Germ. (ed. 1.) 581. — Rchb. Fl. Germ. excors. 371 no. 2531 — Cbavannes I. c. 08. — Tola glanduloso-pilosa: foil, lanceolatis obtusis in petiolo attenuatis, inferioribus oppositis, superioribus alternis angustioribus; floribus solitariis axillaribus. sobracemosis; pedunculis calycibus aequantibus, laciniis labii superioris sine clauso parallelis; seminibus oblongis solcatis; corollis laetissime violaceis. 0 — *Antirrhinum littoralis* Bernbardi mss. in DC Flor. Franc. V. 410. - *Linaria* (*Antirrhinum* Pert. Encbirid. II. 150.) *puUscms* Dsf. Cat. hort. Paris. — Species *L. mtoni* valde affinis. — Gioieil in Istria ad littora saaru.

•ttUtL OTMBAUBIA Omtronai L e. 08.

Folia polmlante aoploahM lobaU wage petiolata. Flores axillaribus pedicellis longis suffultis. Corollae fauce palato clauso (calcaribus obluso reliqua corolla multo breviori). Capsula falvnliajsex apice dehiscent. Semina oblonga, tesu talde nigosa (L 5. fig. 10.). — Plantae hypocarpogae pereones in roplam et maroram fitarii pleramque vigentes.

0. L. (ANTIRRHINUM Linn. Spec. plant 851. - Ball. Herb, t 305. - Engl. bot VII. t 502. - ELATINE Moch. Meth. plant 525.) CYMBAURIA Mill. Diet. fed. 8.) no. 17. — Slim. DeuUchl. Flor. Hit 70. ic. aen. - Koch, Synops. fl. Germ. (ed. 1.) •0. — Rchb. Flor. Germ. excors. 373. no. 252D. — Cbafannes I. cf - Glaber-Hma: flit fltarltjt. tlerab cordato-reairormib. 5-7-lobalis, lobis rolaadatit *eu^rotmlb. SMcroMUiit; p«di«tllia floriferia folio longioribus; calycis tefmeolii lineari-laacaolalaB aomUs, epaata minoribus. e#r^Ut ootnUtaentis palato flavo, calcaribus conolo. * - w^mi canllfonMt t rhtosiale prodeontes diffusi rtpamm radicaataf raautoti UrtUt la«?i p«rp«m««aU - virldta, Folia (janiora oppoail' miorerastinteIU, »»#?•• viridia, iaftnit porpvrastMia, afctq* petiol

6-15 lin. longa et totidem lala. Pedfoelli folio breviores, demum elongati capillacei. Calyx parvulus, tubo corollino triplo brevior. Gorollae superom labium paallulum reflexum, inferum patens, lobis aequallibus. Capsula globoso-Yenlricosa glabra, vix apice emarginala. — *Cymbalaria* Malth. ed. Valgr. II. 408. - Camer. Krftinrbch. 305. ic. — Riv. Monopel. irregul. t 80. fig. a. — *Umbilicus Veneris officinarum* Lonic. Krttoterbch. 46. — *Cymbalaria IUMca folio hedetaceo* Lobel. Icon. 615. — *Cymbalaria Matthioli* Dalech. Hist Lngd. 13BL fig. 8. (bona). — *Cymbalaria flosculit purpurascens* J. Bauh. Hist, plant 111. 685.4e. (florib. ccalcaralis.) — *Antirrhinum quinquelobum* Stok. Bot mat. medic. III. 385. — *Cymbalaria muralis* Bmgrtn. Slirp. Transylv. II. 906. — *Antirrhinum hederaceum* Lam. Fl. Fr. II. 338. - *Cymbalaria hederacea* Gray, Brit pi. II. 322. - Occurrit floribus albis (Ponted. Antbol. 249.). - Crescit ad muros aniquos in tota Europa, praesertim australiori.

§. *acutangula* Ghavannes I. c. 00. — Foil, minorib. cordato-5-lobis, superiorib. hastato-quinquelobatis, lobis euneiformib. acutis; pedicellis floriferis folio multo longiorib. aegmenlls calycioit linearib. obtusiusculis; corolla parum minori. — *Antirrhinum acutangulum* Ten. Cat pi. 1810. 52., Flor. Napolit II. 47. t 30. — *Linaria acutangula* Ten. Sylloge pi. 302. — Circa Fceapolin.

y. *hederaefolia* Ghavannes I. c. — Fell, taepas trilobatis crassis, lobis UUorib.; segmentis calycinif linearib. obtusis; lobis paullo majorib. quam in typo. — *Antirrhinum hederaceum* Polr. Diet encycl. Suppl. IV. 18. — Creast in Monte aureo Avemiæ.

d. *Sieberi* Chavannes I. e. — Foil, minorib., inferiorib. aliis ovatis integerrimis, aliis cordato-subrotundis, lobis minus obtusis; floribus minoribus, calcaribus duplo longiore el crassiore. — *Antirrhinum Cymbalaria* Sieb. lib. fl. Grecic — In insula Greta.

10. L. *HEPATICAEFOLIA* Duby, Bot Gallic. I. 344. - Chavannes I. c. 100. | - Glabra: foil, oppositis, plerisque. rent form ib. 3-5-lobalis, lobis rotundatis mucronulatis, intermedio maximo; pedicellis floriferis folio longioribus; segmento calycinis linearibus acutiusculis capsulam superantibus; corolla eoaeruleo-purpurea, calcaribus saepius recto. 2} — Herba 4-4-pollinaria et ultra. Basi cauliformes oppositi purpurascens ramulosi breves. Folia intense viridia longissime petiolo, limbo saepius trilobato, interdum integerrimo. Pedicelli folio sublongiores erecto-patentes. Calyx tubo corollino dimidio brevior. Corolla quam praecedentibus duplo eirciter major. Capsula globosa glabra. — *Antirrhinum hederaceum* Polr. Diet encycl. Suppl. IV. 10. — *Ant Cymbalaria* ft. Lois. Fl. Gall. II. 373. (ex Ipsa). — *Linaria hederaceum* 8Um. Hb. — Crescit in montibus Insulae Corsicae.

11. L. *PALLIDA* Ten. Flor. Napol. I. 32. 1.150. fig. 8. - Spr. I. c. 100 (exct. syn. Prsl.) — Guss. Pl. rar. Sicul. 246. — Ghavannes I. c. 101. I — Pubescens: foil, oppositis cordato-reniformibus. 3-5-lobalis, lobis trilobatis vix mucronatis; pedicellis floriferis folio brevioribus; calycis segmentis linearibus lanceolatis subacutis; corolla coerulea, calcaribus recto. 2} — Planta 4-6-pollinaria; rami cauliformes tenues graciles diffusi. Folia ovata opposita, plerumque lobata, interdum integerrima, rarius crenata triste virentia, petiolo limbo paullulum excedente. Floras odoratis. Calyx tubo corollino multo brevior. Corolla adjecto calcaribus 4-5 lin. longa. Capsula globosa glabra. — *Antirrhinum puberulum* Ten. Flor. Napol. prodr. 36. — Crescit in glareosa montium Aprili et Magellae.

12. L. *PILOSA* DC Flor. Franc. III. 584. - Bpr. I. c. 700. - Chavannes I. c. t - Foil, oppositis et alternis cordato-tubrotundis v. reniformibus. villosis 5-lobatis, lobis rotundatis mucronulatis; pedicellis floriferis folio subaequilongis; calycis segmentis lanceolatis acutis capsula brevioribus; corolla purpureo-coerulea, palato florum, calcaribus subincurvis. — Kami cauliformes? dehile elongati prostrati radicanter, molliter et albido-pilosi. Folia mollia villosa, interdum infra coerulea, limbum semipollinarem v. pollinarem subaequante v. eo longiore Pedicelli 6-liformes foliorum fere longitudine, pout antketiu valele elong-

garii. Calyi pilosns, tobum corollinam dimidiam aequans. Capsula globosa ventricosa. — *Linaria hederaceo folio villosa seu Cytinbalaria atpina* Tournef. Instil. 1.160. — *Linaria teu Cytinbalaria Clematilis saxalilis rotundo Hederæ folio hirtuto purpureo* Cup. Pamph. Sicol. t. 214. — *Antirrhinum pilotum* Linn. ManU pi. 740., Jcq. Obsenr. II. 29. t. 48. — *Linaria pubescent* Prsl. Delic. Pragens. 74. — *fi. pumila*: Foil, miuorib. crassis, tola planlula vii quadripollicaris. — Crescil in Sicilia, in paludibus Ponlinis el circa Neapolin.

13. L. AEQUITRILOBA Duby, BoL Gallic I. 344. - Spr. I. c. 790. - Chavannes I. c. 102. f — Piliuscula tenerrima: foil, opposite panrolis cordalo-reniformib. irilobatis, lobis rolundalia brevissime mucronulatis; pedicellis floriferis folio longiorib.; calycis segmentit linear!-lanceolalls capsula breviorib.; corolla purpureo-coaru lea, calcari reeto. 2)? — Berbola 3-4-pollicaris. Kami cauliformes lenuissimi filiformes repentes pUoL Folia numerotistlma approximala laoldo-viridia saepe glabriuscula, inferlora longe petiolata, petiolis caplllacels Ytilosis, limbo daplo triplove lon giorib as, limbo 2-6 lin. lonRo et tot i Mm lalo. Pedicell glabriusculi folio dimidio longiores. Calyi tubo corollino duplo brevior. Corolla (adjecto calcari) sesquilinearis. Capsula parvala globosa. — Crescil in monlibus (della Trioita) insulae Corsicae.

Seetlo m. ELAT>0n>ES OhawMi L e. 103. t 6. flg. 1t - fl.

Folia penninervia, saepios breviler petiolata allerna, imls nonnamqoam Cppo~silis (rarissime nallis) dentala lobalare, lolcrdum inlegra. Flores aiillares dlalaoles. Corollae palalo ad faucem promlnenle, calcari aculo corollam subaequante, numquam ea longiore. Capsula subtphaerica, operculis duobus circumscissis latere dehltccma •. ovaia doabusque falralit aplee dehisceos. Setnina ovato-lruncala T. rotondau, letu fovtolls inafrtaitbot a a m n T. granoloto-tabereolala. — INRbae vbigo procaoibcBIM anauae •. ~~radicosecentes.~~

- f. I. *Capsula subsphaerica, operculis duobus circularibus circumscissis dehiscent.* (I. 5. /ty. 9. et 10.)

14. L. SCARIOsa Psfont Flor. Allant II. 38. I 131. — Spr. I. c. 700. — Chavannes I. c. 103. f — Villosa: foil, oblongis v. ovaio-oblongis pttiolatU, infrriorib. oppositis, supra basin denlato-angulosis, superiorib. allernis intrgrrimi*; pedicellis corolla mullo brevlorib.; calycis segmenlis ovalo-oblongis scario^it; corollae luleae magnae pubescenlis calrari arcualo. 0 — llrrba 1-2-pcdalis. Rami cauliformes proslrati raroulo^i, pilis simplicibus dense teslili. Folia ererlo - paienlia brevier prtiolata, limbo 1-3-pollicari, 6-10 lin. lalo. Floret numerosi approii-maui pulchrl. Calyi blrsoios, segmentis moerooalla corolla d<plo brt* lor lbus. Corolla (adjeelo caltfari) 0-7 lie. loaga loiea, lalus Infra faacem veni< purpureia plcia, calcari liboa Mbacquaalt. CtpMla glabrluscala ral>rr ifria. Semiot obtoago-ovau foveolau. — *JknHrrhSmmm searlotum* Lam. Dirt, rnrjrl. IV. 3#> — *Antirrhinum denlahtm* Vabl, Symbol. boL II. 6U |. 37. — Willd. Spec, plant* III. 234. 'non Poir.) — Crescil in Ilispaolae el in Tuneli collibus ahdin.

15. L. AMIRRHIMM Willd. Spec, plant. 111.215.) ELATIMUDKS I),f Fl. All. H-30. I. l;i — Spr. I. c. 780. — Cbatannes I. c 101 t — Pubp>rm%: full, aliernlt ovaii« rlliplici<q. nbu<is, infertorib. denlalo-angulosls <til>priioUii<, superiorly æ<0%lib. inlegerrimis pedicellis corolla bretionb.; calirit tegmentis oblongi* •cuiit margine membranareic; corolla magna lolea; ralarari tubareoaiio. 0 -* Kaail caohormea 1-2-prdales prorumbentrs prostrali albe<cenii*t, ramulU tf rlllbt. Folia •Bnia alirrna glabra v. pobesceolia, lofrhora l-S-pnlliraria,* M* lin. laia, Wttli<r peiolau, raperlora mlaora •biaalateola settilia. Floret in 'H'* lis foliorum sopertorum »r*tHer pt4kttlatl. Calyi i<bo corollino mullo brevior. Calcar none reeam, naoc locurvam. faptnla glabra, cal)re paullolom loogiof. Semina ovoldea conula, leia futca lenuiier foveolait. - Cretcii in cullis UabrM prope M~~arar.~~

16. *L. DEALBATA* Lnk. et Hoffm. Flor. Portug. I. 231. I. 34. - Spr. I. c. 701. — Chavannes I. c. — (Boiss. Voyage bot. dans le royaume de l'Esp. 453. no. 1238.) — *Hirsula*: foil, ovalis v. ovalo-lanceolalis sessilib. aculis, inferiorib. denatis, superiorib. integerrimis; pedicellis brevissimis; calycis segmentis lanceolalis aculis; corolla parva, labio superior! v. foliaceo, inferiori albo, palato albescens punctisq. coeruleis notata. O — Rami caudiformes graciles 2-3-pedales ramulosi albescentes hirsutissimi viscosi, ramulis rigidis. Folia inferiora pollicaria, 7-8 lin. longa, superiora minora. Pedicelli vix lineam longi. Flores in axillis foliorum superiorum. Corolla *L. spuriam* referens, sed minor. Capsula calyce sublecta. Semina ovalia tenuissimè foveolata. — *Antirrhinum lanigerum* Brol. Flor. Lubil. I. 180. (non Willd.) — Crescit in anis Lusitaniae, Algarviac, prope Gadcs et in regno Granatensi occidentali.
17. *L. LAMGERA* Desfont. Flor. Allant. II. 38. t. 130. - Spr. I. c. (non Hoffm. et Lnk.) — Chavannes I. c. 105. f. — (Boiss. I. c. no. 1230.) — *Lanalo-villosa*: foil. alternis cordatis r. cordato-rotundatis mucronulatis lanosis, inferiorib. breviter petiolatis ad interdum vage denatis, superiorib. subsessilib. integerrimis; pedicellis folio longiorib.; segmentis calycinis linearilanceolatis aculis; corollae parvulae lutescentis calcar! Ineuno. O — Herba 1-3-pedalis. Rami caudiformes prostrati graciles flagelliformes villosissimi ramulosi. Folia omnia alternata lanigera, inferiora 5-8 lin. longa, 3-5 lin. lata, superiora multo minora patens. Pedicelli capillares villosi. Calyx corollae fere duplo minor, densissime pilosus. Corolla praecedens sed minor tubo. Capsula glabra calyce levi. Semina ovoidea minime foveolata. — *Antirrhinum lanigerum* Willd. Spec. plant III. 235. — Crescit prope ruinas Carthaginis urbis et in Hispaniae Sierra Nevada.
18. *L. (CYMBALARIA) Baumg. Stirp. Transylv. II. 200. - KICKXIA Dumort. Florul. Belgic. 35.) SPURIA* Mill. Diet. (ed. 8.) no. 15. — Koch, Synops. fl. Germ. et Helv. (ed. 1.) 521. - Rehb. Fl. Germ. excurs. 374. no. 2532. - Stirp. Fl. Deutschl. III. 70. — Chavannes I. c. 105. f. — *Pilosa*: foil, cordato-ovalis v. ovalis, apice mucronalis, inferiorib. interdum oppositis breviter petiolatis obsoleteque dentatis, superiorib. integerrimis subsessilib.; pedicellis folio longiorib.; calycis segmentis ovalo-lanceolatis, basi cordatis aculis; corolla flava, labio superior! alio purpureo, calcar! incurvo. Q — Herba pedalis et ultra, pilis arborum testibus. Rami caudiformes procumbentes, rarius erecti, diffusi striati. Folia inferiora integerrima v. supra basin denatis pluribus aucto, 1-3-pollicaria breviter petiolata, superiora multo minora semper alternata. Pedicelli superiores folio longioribus sobereclis pilosi. Segmenta calycinis basi subcordata lala villosa. Corolla adhaerens calcar! 4-5 lin. longa. Capsula pubescens calyce levi. Semina ovoidea circumscissimè foveolata. — *Veronica foemina** Fuchs. Hist. 107. — Mauh. ed. Valgr. 004. ic. — *Elatine Diotcoridis* Lob. Stirp. adv. nov. 107. ic. — *Elatine prima* Tabern. Kr. 413. fig. 1. - *Elatine mas folio tuberoso* J. Bauh. Hist. pi. III. 372. Q. 1. — *Elatine folio tuberoso* G. Bauh. Pint. 252. — *Linaria folio hirtuto tuberoso, flore ex albido flavescens* Moris. Oxon. Hist. II. 501. sect. 5. — *Linaria tegetum Nummulariae folio rotundo* Tournef. Inst. rei herb. I. 100. — *Antirrhinum purium* Linn. Spec. pi. 851. — Kngl. Bot. X. t. 001. - Flor. Danic. U. 913. - Labr. et Helv. Icon. fl. Helv. V. t. I. — *Elatine* rotunda* Gray, Koum. Brit. pi. II. 321. — *Linaria lanigera* Lnk. et Hoffm. Fl. Portug. 1.231. L. 31 (nec Desf.)
- f. denata* Chavannes I. c. 100. — Foil. inferiorib. et interdum etiam superiorib. dentatis; floribus majonibus, planta tota erecta firmiori.
- y. microphylla* Chavannes I. c. — Foil. multo minoribus sobrotundis lanatis. — *Petala* hujus speciei! occurrit, cf. Comment. Goetdng. I. 351. i. 15. (p. 4. - Sieber, Act. Helv. II. 25. t. 4. — Chavannes I. c. 1.8.) — Crescit in Europa fere (onus anni* et segclibus frequens.
19. *L. (AMIKIIMM) Linn. Spec. plant R5L. - Flor. Panic. I. 426. - Bull. Herb. I. 245. — Kngl. bot. X. t. 002. - CYMBALARIA Baumgr. burp. Transylv. II. 15. - KICKXIA Dumort. Florul. Belgic. 35.) ELATINIK* Mill. I. c. no. 10. - Rehb. Fl.

Germ, excurs. 373. DO. 2530. — Koch, Synops. fl. Germ. (ed. 1.) 521. — Strm. Fl. Deutschl. Hft. 70. ic. aen. — Prsb. Fl. N. Am. II. 421. — Charannes I. c. 107. t (excl. syn. Bernh.) — Pilosa: foil, plensq. ovato-hastatis, apice mucronulali* alternis, imis inlerdum opposilis saepeq. denlcalalis; pedicellis folio longiorib.; calycis segments laoeolalis acutissimi*, corolla praecedentis, inlerdnm coerulecente O — Praecedenti valde affinis, sed facile dignoscitur babila graciliore. folns plensque baslaliis (auriculis acuiis) minonbus el calycims segmenlis basi mimme cordalis. — 'EXarvi) Dioscond. IV. 40? — *Elatine* Matlh. ed. Valgr. 047. fig. 1., Camer Epit. 754. (ic. bona.) — *Elatine altera* Ger. Hist. 025. ic, Lob. Ic. 470. — Blackw. Herb. I. 170 — Tabern. Krtrbcb. II. 413. t 1001. fig. 1. — *Elatine folio acummato* Park. Thealr. 553. io. — *BUM** foemina folio anguloto* J. Bauh. Hist. pi. 111. 372. fig. 2. (mala). — *Linaria hirtulo folio acuminato in basi auricuiato* Moris. Oxoo. Hist II sect & p. 503. t 14. fig. 28. — *Elatine hattaia* Mnch. Method, pi. 521. — *Antirrhinum elatinoidet* Teoore (neo alior.).

fl. coerulea: Florib coeruleis majorib.; foil lationb. saepe dentatis. — *Elatine folio acumtato, pore eoeruleo* C. Baub Pinx. 2AJ. — *Lnana tegelum* JVw*i-mulartae foil aurtto et villosa, lore eoeruleo Tourn. Inslit 100.

r Siebri - > illotissima: foil, minorib., plensq. cordalo-ovaiis nee baslalis; segmentis caljcinis angustioribas. — *Linaria Elatine* Sieb. — *L Sieberi* Rchb. mss. in Flor. excurs. 374. sab no. 2531.

J. hamota: Florib. pallide coeruleis majorib, calcari hamoso; calycinis`segmentis sublineanbus. Planla crecliuscula brevior. — (Occurrt bujus specei Pelona.) — Crescil in Europae tolius segelibus frequens, in an is Tunelams, in Hadera el in America boreali.

20. L. COMMOTATA Bernhardi wi. In Rchb. Plor. Germ. exem. 375. no. 2431. - Rchb. Plant, critic. X. fig. 1101. - Koch, Synops. 0. Germ. (ed. 1.) 521. - Dif-fasa: foil, spareis haslalts, inOnis obotalis; caulib. proslralis; calrari subuncinato; pedunculis glabris. 0 — Corolla lilacina doplo major quam in praecedente. — Crescii in agris Ulnae.

21 L. GRAECA fhavannes I. c. 106. t — Villosa-hirsula- foil infenorib. ovato-oblongK T. ovaii< oppositis, snpenonb. ovato-lanceolaiii hastaii* alternis bre-Yissimf petiolaiis, pedirelhs capillanb folio multo longiorib, calycit segmenlis linrarib arutisiimis cap<ulara TU superaniib.; corollae citrinac ralcari arcualo, drmm recto, mrollam paullo «uprrante Q — Rami cauhfonnes graciles snberceii, drin prostrali subsimplicfs, pilis simplinbus albis restili. Folia mucronulata nlllosula 4-8 lin. longa, 3-5 lin. lata, ima majora, pleraqae motica, apice rotundaia, bloc inde denllenlaia, demum marcesceniia, saprema lanefolato* bafuata ri sagitata distanlia mullo minors. Pedlcelll Hgidall glabrrnroi, apice torti v. Beil. 8tf«ic«U calycioa Unearia aenilssima pflona, margine tubicariosa. Corolla [eieepto calcari amtllssimo, basi amplialo) 4-1 lin longa bre<i><im<* pubrsrrns l'ap^ula panrula glabra, calyre fere tecia. Semina ovoideo-romprnsa fu^ci graDuloto-tuhrrrruIjta. - *intirrknum Graf mm* Bory *t Cbaub H Prlop. no 700 t 21. — *linaria Elatine d'l n* Knom. 74 non alior) — Cresrit in Peloponneso, in insuli» Moecbadibus el in Sardinia.

22 L. MRRIOSA ^illd F.num. pi hort. Brrol k*Q spr I. r 701. - fbsvannes I. c 100 t - Pilo*a garillima* foil lanccolaiis n linnri-lancrolati* baiUllt allernis peliolalis, pedirellif folio longionb, puim riirhrtrcntib, ral)ris sef* mesUs linpari-lanc^Dlatit aculi«, raptula bre>i'>nb., corolla par<ula coeralet* cente, palalo albido, puncllt porpureit noUto, calcari tubrrcto, corolla broiori. O - Hcfbvla defans pe4alis et ultra gracillima. Rami cauliformes protirali rMrie flexl, pitit tlsiBiicibus vfttiiti. Folia omnla sillems battaia v *agiliaia, p<* tiolis dimidiom liabom atqoannbos. Pedic^li eaplllacei glabrrnml cirrbost, M* doplo longiores. Corolla (eieepto calcari lobom fobaeqoanle) I-I^1/, lin. longt. <Up_t|a caljce longior pabescens. ftemina minoU ovtto-trvacaU nigra lober-

- culala. — Grescit in Aegypto, ID insulis Ischia, Greta, Corsica, in Sioechadibus et in Gallia ausraliori.
23. JL ALSINAEFOLIA Spr. I. c. 792. — Chavannea 1. c. 110. f — Foil, integerrimis pubescentib., inferiorib. ovatis pubescentib., inferiorib. ovatis oppositis longe petiolatis, superiorib. ovalo-cordatis mucronatis petiolatis; pedicellis petiolo breviorib.; calycis segmentis lineari-lanceolatis acutissimis, margine membranaceis; corolla parvula lutea, calcar recto. O — Herba tola glandulia brevissimis stipulatis albescentibus obsila. Rami cauliformes pedales et ultra, ramolis fere virgalis. Folia inferiora pollicaria patentia, limbo petiolum aequante, omnia crassiuscula pubescentia ciliata. Pedicelli apice paullulum inflexi. Calycis aegmenla villosa. Corolla (adjecto calcaro gracili acuto) 3-4 line longa. Capsula calyce tecta glabriuscula. Semina minutissima subrotundata fusca granuloso-tuberculata. — Grescit in deserto circa Mare rubrum et in insulis parvis inter Corsicam et Sardiniam.
24. L. WEBBIANA Via. TOrto bot. di Torino 148. — Suffruticosa glabra: caule divaricato diffuso; ramis filiformibus; foil, alternia linearilanceolatis, basi hastatis integrisve, obtusis inaequaliter pubescentibus, longe petiolatis; floribus axillaribus axillaribus; pedunculis capillaribus patentibus; calycis lobis lanceolatis acuminatis; corollae pubescentis lobis abbreviatis lobis, fauce villosa, barba triloba, calcaribus subincurvis, filamentis villosis. 6 — Creta in insula Lancerota maris Galliarum.
25. L. MACILBENTA Dene. Ann. sc. nat. 11. 292. — Suffruticosa glaberrima: roll, linearilanceolatis, basi bidentato-sagittatis, supremis ovalibus petiolatis; laciniis calycinis subulatis crassinatis; corolla calcaribus subaequalibus, interioribus tenuissime puberula, palato glabro; capsula globoso-ovoidea, calycibus subaequalibus glaberrima. i) — Crescit in Syriae monte Sinai.
20. L. AEGYPTIACA Dum. Cours. bot. cult. (ed. 1.) 11. 02. - Ail nort. Kew. (ed. 2.) IV. II. - Delile, Fl. de l'Egypte 05. 132. - Spr. 1. c. 700. — Chavannea I. c. 110. t — Suffruticosa pubescens: foil, alternia ovatis, plerumque tricupidatis petiolatis; pedicellis apice flexis, demum in spicas abeantibus; calycibus segmentis linearilanceolatis acutis; corolla parva flavescens, calcaribus corneo bamoso. 5 — Caulis primo anno ad radicem ramulosa ramosque caespitiformes peltatis emittens, cortice rimoso ac florescente obdura. Rami cauliformes 1-3-pedales simpliciter brevissime ampliusque pubescentes. Folia petiolo alterna aenue lobata subpubescentia glauca, 2-3 line longa, 1-3 lata, in planitiebus annu longius petiolata nulloque majora. Pedicelli horiionulea folio nullo longiora, apice geniculatis, fracia dilapsa ut spinas rursus emittentia. Calyx pubescens capsula longior. Corolla adjecto calcaribus 4-5 line longa, palato maculis fuco-purpureis notatis, calcaribus fere corollae longitudine gracilibus. Capsula pubescentia parva a calyce tecta. Semina parva minima glanduloso-tuberculata. — 'EXGIV) Dioacrid. — *Antirrhinum Aegyptiacum folium oris glabris tuberculatis* Forsk. Descrip. Aeg. Arab. III — *Antirrhinum Aegyptiacum* Linn. Sys. vege. I. 401 — *Antirrhinum {Unaria Spr. I. c. 780.) pinetense* Vir. Flor. Lybic. 22. t. 27. fig. 2. — Crescit in ariditate Aegypti (Cairo et in montibus Cyrenais).
27. L. FRUTICOSA Daf. Flor. AUot. 11. 30. L. 133. - Spr. I. C. 780. - Chavannea I. c. 111. t — Caule suffruticoso ramoso; foil, alternia petiolata ovato-oblonga subaequaliter pubescentibus; baal raro ovatis. T. bidentatis, superioribus integerrimis; pedicellis folio brevioribus erectis; calycis segmentis angustis acutis; corollae flatae calcaribus recto v. arcuato. 6 — Suffruticosa pedalis. Caulis lignosus brevis tortuosus. Rami alterni teretes teretes. Folia 3-4 line longa, 1-3 lata, breviter petiolata. Pedicelli brevissimi glabri. Calycis segmenta linearia pubescentia capsulam superantia. Corolla (adjecto calcaribus) 5-6 line longa, lobis superioribus emarginatis subbilobis, lobis reflexis, inferiore patente. Capsula pubescentia. Semina minuta tuberculata. - *Antirrhinum fruticosum* Willd. Spec. plant. III. 17. — Crescit in Barbariae montibus prope Caffam urbem.

- §. 2. *Cap tula ovata, duabus vaivulis oblongis apice dehiscent.*
28. *L. RAMOSISSIMA* Wall. Catal. 3911. cl Plant. Asial. rarior. II. 43. t t. 153. - Bib. Scrophul. Indie. 19. — Glabriuscula: caudice crasso; ramis cauliformib. elongalis lignescenlib.; foll.alternis peliolalis glaberrimis, oranib. triangulari-baslati v. inferiorib. subpalmalineniis acute 5-7-lobalis; pedicellis rigidis petiolo longiorib.; calycis segmentis linearilanceolatis acutissimis, margine membranaceis; corollae luteae labio superiori abbreviato, calcaribus brevibus arcuatis; capsulae operculis oblongis valvaeformibus. 6 — Caudex nodosus terluosus, corlice lutescente. Rami cauliformes pedales et ultra prostrati pubescentes. Petioli limbo parum breviores, limbo excusso ut spinosae rigescentes, basi incrassati, limbo 4-5 lin. longo, 2-3 lin. lato crassiusculo glabro, apice mucronato. Pedicelli glaberrimi, apice flexi, demum spinescentes. Corolla pubescens, adjecto calcaribus 4-5 lin. longa, labii superioris lobis brevibus ellipticis, inferioris longioribus rotundatis, in medio subtruncato. Capsula glabra sub lente rugosa. Semina minima sphaerica nigra minutissima tuberculata. — *L. Roylei* Chatannes I. c. 112. | — *L. hattala* Royle mss. — Crescit meridionalis et petrosus in Hindustaniae Burmae, in provincia Delhi et in Coromandelia?
29. *L. INCANA* Wall. Catal. no. 391a et Plant. Asiat. rarior. II. 4a - Bib. I. c. - Cano-villosa: caulibus prostratis, basi lignosis; foliis ovatis villosis, basi subcordatis integerrimis subhastatisve; pedicellis petiolo longioribus; calycis segmentis linearibus acutis; corollae pallide fuscae inclusae purpureo-maculatae calcaribus...?; capsulae operculis oblongis valvaeformibus. 5 — Crescit in Nepaliae conallibus campis ruderalibus.
30. *L. CIRCINNATA* Sweet, Brit. flow. gard. (S. Ser.) III. t. 235. f — Suffruticosa glabra: foliis tagulii circinnato-recurvis petiolis acutis; tegmibus calycinis lanceolatis acuminalibus; calcaribus subulato redo corollae longitudine, palato biprominulo dense barbato. ^ — Habitat in Africa boreali. — Affinis est *L. heterophyllae*.
31. *L. HETEROPHYLLA* Spr. Syst. vegetal. II. 790. (non Desf.) — Chatannes I. c. 112. t — Suffruticosa: ramis cauliformibus gracilibus glabris; foliis, peliolalis, inferius oblongo-hastatis, superioribus linearilanceolatis et linearibus, nunc basalibus sagittatisve, non integerrimis; pedicellis folio longioribus; calycis segmentis sublinearilanceolatis acutis; corollae luteae palato lanato, calcaribus recto. 6 — Rami cauliformes 1-2-pedales stnati. Folia inferiora saepe opposita 8-14 lin. longa, 3-4 lala, »upenora angustiora, mucrone inflexo instructa, superne glabra, donec V, puberula. Pedicelli fere horizontalibus sub calce geniculati. Corolla (excepto calcaribus) 5-4 lin. longa. labio superiori subobliquo, lobis ovato-lanceolatis brevibus, inferiori patentibus, lobis lateralibus obliquis, in medio minoribus obovatis. Capsula rugosa calyce lecta. Semina ovoidea graecoloso-tuberculata. — *Antirrhinum heterophyllum* Willd. Spec. plant. III. 234. — *Antirrhinum tagitatum* Poir. Suppl. Encycl. nich. IV. 50. — Crescit in Instillis Canariis.
32. *L. SPARTIOIDES* Brouss. ms. ex I. v. Boch, Bot. Canar. Insul. 103. - Chatannes I. c. 113. | - Suffruticosa glabra: ramis cauliformibus, liliaceis apluribus turgidis, foliis linearilanceolatis T. linearibus integerrimis aliter, inferioribus peliolalibus, superioribus subseriatis; pedicellis folio longioribus; calycinis segmentis sublinearilanceolatis acutis; corollae luteae calcaribus arcuatis. — PUNIS pedalis bipedalis* Rami plurimi prorumbentes lignis irish ramulosi. Folia parte ad ramorum partem superiorem distincta, plerumque antice minima distincta scilicet moeroulata, 0-12 lin. Inga, in petiolum illiformem atenuata. Floret sessilibus raeomoi lamm effluens. Pedicellus flori admodum obliquus, spice flei. Segaeae clycios membranacea, nunc medio prominente, esptulm superantia. Corolla spirilodice /. Graecat pubescens, palato lana flata densa lecio Capsula ovato-globosa rugosa glabra. Hemisphaerica ovoidea fusca minute tuberculata — /. *ieopari** Brooss mss. in Hb. DC - Spr I c 719. - Crescit in rupibus sirris maritimae Teniffae et Cananse

Sectio m. UVARIASTRUM Chavannes 1. o. 114.

Folia sessilia alterna v. verticillata, rarius opposita penninervia, integerrima, saepissime glauca. Flores terminates racemosi spicato-racemosi v. interdum subcapitati. Palatum ad faucem corollae prominens. Capsula 4-10 valvulis seu dentibus apice debiscens. Semina angulosa v. discoidea, margine membranaceo ad bilum emarginato cincta.

§. 1. *Folia dilatata ovata lanceolata v. oblonga, verticillata seu alterna, flores racemosi aut spicato-racemosi, corolla ultra tres lineas adjecto calcari longa.*

a. Folia taepiut qualerna; floret plerique verlicillati.

33. L. TRIORNITHOPIORA Willd. Enum. plant. horl. Brolin. 030. - Loddig. Bot. Cabin. t. 1010. - Kn^{*1}. cl Wtsc. The Floral. Cabinet I. 40. f t.24. — Chavannes I.e. 114. | — Ramis cauliformib. erectis, apice decumbentib.; foliis lanceolatis acutis glaberrimis; floribus saepius ternis et quaternis; corollae pallide violaceae v. purpureae maximae calcari recto corollam aequante. % — Planta speciosa 3-4-pedalis et ultra; rami lignescentes glabri glauci, ramuli 3-4-verticillati. Folia quaterna, rarius ternis Y. quina, 2-3-pollicaria, sublimi glauca, margine purpurascens. Bractae foliis similes sed multo minores, pedicellit breviores. Calycis segmenta sublanceolata acutissima glabra, apice purpurea, capsula longiora. Corolla (adjecto calcari, pallide violaceo corollam aequante) pollicaris v. sesquipollicaris, tubo orato ac striato, labio superiori erecto, inferiore patente, palato purpureo. Capsula ovalo-globosa, dentibus 8 dehiscent. Semina didicoidea orbiculata fusca, margine tenui cincta. — *Linaria Americana maxima purpureo-pore* Ray, Hist. 1884. — Herm. Hort. Lugd. Batav. 370. t. 377. — *Linaria flore purpureo Americana* Riv. Monopel. irregul. 84. (bona). — *Antirrhinum triornithophorum* Linn. Spec. plant. 852. — Vent. Jard. de Malmaison. p. 11. ic. — Bol. Magat. I. 515. — Spr. Syst. veget. II. 703. — *Linaria Lutitanica* Mill. Did. no. 3. — Crescit in America meridionali (?) et in Lusitaniae provincia Minho.

fi. Folia aut omnia terma aut ima lanlum ternis v. opposita caeteraque alterna. fores aUemi.

34. L. LATIFOLIA Desfont. Flor. Atlanti. II. 40. t. 134. - Spr. Syst. veget. II. 701. - Chavannes I.e. 113. - f — Glabra: ramis cauliformib. erectis subsimplicib. virgatis, foliis lanceolatis, inferioribus ternis, superioribus alternis floribus longe spicato-racemosis; calycis segmentis linearibus, capsulam operantibus; corollae lobis calcari recto v. subarcuato, corollam aequante. Q — Rami cauliformes pluribus glaberrimis medullis, deinde fistulosi, paucis ramulosis. Folia subamplexicaulia IV:-3-pollicaria, 0-10 lin. lata glaucescentia. Flores brevissime pedicellati. Bractae linearibus lanceolatae patentes. Calycis segmenta capsula duplo longiora acutissima. Corolla magnitudine fere *L. vulgaris*, labio superiori erecto, lobis oblongis obtusis, dorso subapicalibus, inferioribus abbreviatis, lobis truncatis, intermedio multo minori Hubercio. Capsula ovalo-rotunda glabra, apice emarginata, valvulis 0 debiscens. Semina discoidea membranaceo-marginata. — In Barbana prope Mascara et Tlemsen crevit.

35. L. HIRTA Munch. Method. plant. Suppl. 170. — Spr. I. c. 703. — Chavannes I. c. 110. t — Villosa erecta: foliis ovalo-ellipticis subacutis, imis lanlum ternis v. oppositis, caeteris alteris; floribus confertis; segmentis calycis ovalo-oblongis obtusis, superiori majori, capsulam ovatam valvulis 0 debiscens superantibus; corolla lutea speciosa, striis virentibus nuda, palato fulvo, calcari recto corollam subaequantem. O — Planta 0-15-pollicaris, brevissime glanduloso-villosa, ramus cauliformis saepissime unicus simplex medullosus. Folia semiamplexicaulia crassiuscula pollinosa v. bipollicaria, 3-0 lin. lata, saepe omnia alternantia. Flores spicato-racemosi odorati. Bracteae ovatae paullo longiores. Pedicelli brevissimi erecti. Corolla (adjecto calcari 0-14 lin. longa, labio superiori amplo, lobis ovalo-oblongis obtusis, labio inferiori minori, lobo intermedio lateralibus triplo brevioribus) Semina subdiscoidea obscure triquetra grisra, scrobiculaia

- Antirrhinum hirtum* Linn. Spec. plant. 857. — Jcq. Icon, plant rar. 1.12. t. 117. — *Linaria viliota* Mill. Diet. no. 10. (nee DC.) — *Antirrhinum viseosum* Curtis, Bot. Magaz. t. 566. — *Linaria temiglabra* Slim. lib. — Crescit in Htfipaniae et Lusiianiae arvis cullis.
36. L. CAVAMLESII Chavannes I. c. 117. f — Villosa erecla: Toll, ovaiia subpetiolatis, plerisq. lernis; florib. confertis; segmentis calycinis oblongis, basi contractis, superiori longiori; corolla fere praecedentis, dilute lulea, calcari subincurvo, labio superiori albicanle, lineis fuscis nolato. O — Rami cauliformes pedales erecti teretes, superne ramulosi, uti tola planta pilis brevibus capitatis vesliti. Folia semipollicaria et ultra trinervia obtusiuscula, suprema fere orbicularia. Bractea spatulatae v. sublanceolatae, pedicello longiores pubescentes. Pedicell erecti breves villosi. Capsula ovato-globosa pobescens, dentibus 0 debiscens. Semina compresso-triquetra margioala griiea scrobiculala. — *Linaria Hirpanita UifoHa UUfoUa *ilio\$*a Toornef. Inttlt rei herb. 1.100. — *Antirrhinum triphyUum* Cavan. Icon. pi. II. 01. t 170. (excl. tyn.) — Crescit in Hispania prope Albaydam el Palomcra.
37. L. TRIPIYLLA Mill. Diet. (ed.&) no. 2. - Spr. I. c. 701. - Cbavannes I. c. f - Glaberrima glauca erecta T. ascendens: foil, ovatis ellipticisq., plerisq. lernis; florib. dense spicato-raccmosis; calycis segmentis oblongis v. ovato-lanceolalis oblusis, capsula breviorib.; corolla tricolor! coernlea, albo- et luleo-variegala v. rarius tola coernlea, calcari arcaato longitudine fere corollae. Q — Herbf 1-2-pedalis, rami singni v. pi ores medullosi gland ramulosi. Folia pollicaria, 0-8 lin. lata terna, verticillis longitudine fere folii distantibus, superiora minora, terna, opposita Y. alterna. Calycis lacinia superior major. Corolla (adjecto calcari) 5-7 lin. looga, labio superiori erecto amplinsculo pallide purpureo-coeruleo, Inferiore minore albetcente, palalo flavo, calcari oeruleo T. violaeo aculo. Capsula subovalala, ulriaque valde sulcata glabra, valvull 6 dehiscent. Semina prismatica sobtriquetra fuses retfenlato-excaviu. — *Unaria VatomHna* Clus. Hispan. 351. ic. Lob. Icon. 400., Obserr. 223. Ic, Ger. Hist. 551. Ic, Park. Theair. 450. ic. — *Linaria Hitpaniea* Clus. Histor. I. 301. Ic. — *I. trifolia* J. fiauh. Histor. III. 459. — *Linaria Simla latifoUa tripkylla* Bocc. Plant, rar. Sicul. 44. t. 22. — Moris. Oxon. Histor. I. p. II. sect 5. t 12. fig. 2. — Cup. Pamph. Sic. II. t. 57. — *Linaria /r>-pkyUa major, floribu* parvii palUscentibu*, rictu aureo, cateari tubcoeruUo donatit* Plucken. Pbylogr. t 00. fig. 4., Sabb. Hort Roman. III. L i - *Antirrhinum triphyUum* Linn. Spec. plant 838. — Cavan. Icon, plant rar. II. t 110. — Curtis, Bot Magaz. 1331 - Gaertn. De fruciib. et seminib. plant I. 240. t. 53. — *Antirrhinum neglectum* Spr. Neue Entdeck. III. 100. — *Linaria neglecta* Clarke ei Guss. Plant, flor. Sicul. rar. MO. t 305. fig. 1. - *Linaria glabrata* II. B. Kth. No?, gen. et spec, plant II. 302. - Ktb. Synopt. plant aequinoct 1L 122. — *Antirrhinum tricolor* Honor, (nee Pourr.).
- fi. co*r*Ua*: CortHlt fera •mule* «Mral«iti foil, angustiorib.; planta lou graeiliori. - *Unaria JhjpAyg*t* e—ntlaa C Bauh. Pini., Moris. Dion. Histor. sect. 5. t 12. fig. 23. — *Linaria n4q*lecta *fi.* Guss. Ic. fl. Sicul. t. 305. fig. & — Crescit in Africa boreali, in Sicilia, Corsica, in Italia meridional! (neo lamen in Latio el Liguria) in Hispania, Gallia austro-ocoideouli et in Pern?ia.
38. L. VIRGATA Dsf. Flor. AUant II. 41. I. 135. - Spr. I. c. 702. - Cbavannes I. 0. 110. I — Glabra glaucescens: ramis cauliformib. erectis simplicib. virgatis; foil-inferiorib. ovatis ternis, snperiorib. ovalo-lanceolalis, plrrisq. allerois; florib* tpealo-racemosis; segmeolis calycinis linearib. acuiiuimis, capsulam tuperantib.j corollae ainreae calcari recto ea duplo longiori. O - Rami medullosi gitbtrrimi ^-1&-pollicares simplices aui ramulis perpauci* iostructi. Folia glaberrima aouU mncronnlaU, 5-0 lin. longa, 3-4 lala erecla, suprema fere lin*arl~lanoelau. Bradeae angusUssimae aenue, ptdicellia dnplo Iripllove long*©'*** Pedicell brwrta trmi, post antrasln inerasaaU nee elongaU. Coroilae Ublum superum valde eUagtinm erectum pratande pariitum, lobis aajgnatis, calcar sobulaoiai loogiismum. Capsula ovato-sobrotuoda, denUbus 0 apto dekiscens.

- Semina tuberculata angulosa fascia acrobicnala. — *finana tnpnylla extgua, calcari praelongo* Schaw, Spec. DO. 377. — *Antirrhinum vtrgatum* Poir. Innerar. II. 102. — Lam. Illusr. gen. plant t. 531. fig. 4. — Creacit In Numidia el Algeria mler segelea el in arvi's prope Tripolin el Leplin magnam.
30. L. REFLEXA Dsr. 1. c. 43. — Spr. I. c. 701. — Chavannea. L e t — tilabra procombena: foil, ovatis acutis glaucis, infenonb. ternin, super! orib. allernis, Oonb laxe racemosia; pedicellia folio longionb., posl anlbesin reflexis; aegmenlia calycims sublanceolatis aculis; corolla pallide coerulea v. ranaa alba, palalo flavo, calcari recio, corolla duplo inlove longiore. O — R^{flmi} graciles caaiiformes procumbentes subsimplices 6-14 pollices longi. Folia basi alienuala glaberrima, 6-8 lin longa, 3-5 lata, floralia minora mucronulata alierna. Pedicelli flonfen ereclo - palentes folio duplo inlove longiores, fructifcn reflexi flexuosi Segmenta calycina imeana acula, deinde aublanceolaia ampliata. Corollae labiura anperam ereclum elongalam, calcar aubulalam acalissimūm. Capsula globosa, valvolia 6 demum ad baain naque produclis debiacena. Semina aubremformia fusca minalialme foveolala. — *Unarta procumbent pusitta latifoka, lore pal'' lido, rictu aureo* Ray, Hist. 755. — *Antirrhinum refaxum* Lion. Spec, plant. 857. — *Antirrhinum protratum* Cyrill. In Hb. Morlc — *Unarta rhegma* Spr. Sytt vegei. 11.702. — Varlal ellam flore albo. — *fi. pumUa*: Herba pnailla vli iripollficaris; foliia parvulis ovalia aculis crassiuscolls. — Creteil In Corsica, Sardinia, Sicilla, in Italia meridional!, In arvia Tnneli el Syrite.
40. L. PEDUNCULATA Spr. 1. c. 707. — Gbavannes I. c. 190. t — Bolst. Voyage bot dans le midi de l'Esp. 454. no. 1241.t132. fig. A. — Glaberrima aacendens foil, inferiorib ovalo-lanceolalls oblaaia, lernla oppoailisq., soperlorib. mednsq. oblongis allernis, florib. longe pedicellalis; pedicellis posl anlhesin firmis nee reflexis; calycis segmentis linean-oblongis oblusis, capsula breviorib; corolla azurca, palalo flavo, calcari redo corolla brevior. 2l, — Rami cauliformes foliorum lapsu sacpe aphjlli glaberrimi 4-10-pollicares. Folia 3-4 ho. longa, 2-3 lin. 4aia crassiuscula, basi alienuala, in ramulis slenlibus paullo longiora approx!-, mala, fere omnia alicrna, *Polygonum avtcuUtre* referentia. Floret lax!. Segmenta calycina margine scariosa, Interdnm subspaibnlala aculiuacula. Corolla magnitudne *L. ongantfoliae* aturea, calcar recium v. apice lanium curvalum. Capsula ovaio-globosa coropressiuscula calyee longior, valvulis 6 apice dehiscent. Semina parvula remformia olgra, lenntalme muriculau. — *Antirrhinum ptiduneulotum* Linn. Spec, plant 857. - *Antirrhinum tparfum* Slim. mat. (n* Linn.) — Creteil in Uitpama meridionall.
41. L. FLAVA Dsfont Flor. AUant II. 42. t 130. — Spr. I. c 702. — Cbavannes I. e. 121. I — Glabra ererta foil, inferiorib. ovalia v. ovato-oblongla lernla, aoperiorib. oblongo-lincanb alternis; florib. lermlnallb. paacis brevissime pedicellalis; calycis segmenlis late lincanb. obtusis, capnula breviorib.; corolla saturate flava, calcari earn aequanle. O ~ Hcrba 4-10-pollicaris; rami cauliformes erecii simplices subvlrgaii Folia inferiora 4-6 lin. longa, 3-4 lin. lala, superiora minora, omnia oblusa glauca crassiuscola. Floret ad apicem ramonim 2-3-nl aggregali. Begmenlum calycis supremum .rellqula paullo majua. Corollae parvae labium soperum ereclum mrsum refleium fulvo-striatom, palalum viscosom, calcar acomm. Capsula ovau compreatlnacnla, valvolis 6 apice debiscens. Semina anbrenirormla nlgra foveolala. - *Antirrhinum /Unum* Polr. IUnr. II. 101. — Willd. Spec plant. III. 245. — Creacll in arvia Rarbartae, Namidia, Coraiete, Sardtniae el in Ilispama circa Gades.
42. L. CRETACEA Fisch mss. in Hb. Delesa. ei Spr. I. c. 701. — Chatannes I. c. 122. f — Glabra foil ovatis subaculis glaucscenlib, inferiorib. terms, supenonb opposihs et alterms, florib spicalo-racemo*is paucis, calycis segmenlis linean-lancoolais aculis breMssimis, corollae luteae calcari brevi lubinctmo 0? — Rami cauliformes erecii flrmi 4-10-pollicares, ramulis ereclo-pa lend but. Folia approximate conterta crassiuscula glaberrima, 4-6 lin. longa, 2-3 lau, superiora el ilia ramulorum mullo minora. Eaccmi breves ptuciflori lobfletuon,

floribus brevissime pedicellalis, pedicellis erectis; bracteae minutae lineares calyce breviores. Corolla (adjecto calcar) 4-5 lin. longa, labio superiori erecto, inferiori patente paullo breviori, palato saturate flavo glabriusculo. Capsula? — Crescit in cretaceis circa Tanaim.

43. L. THYMIFOLIA DC. Flor. Franc. III. 587. — Spr. 1. c. 702. - Chavannes 1. c. f — Glauca glaberrima procumbens v. ascendens: Toll, inferiorib. ovalis oblongis ternis, superiorib. oblongis, plerisq. oppositis; florib. in apice ramorum paucis; segmentis calycinis oblongo-ovalis oblongis, capsula breviorib.; corollae luteae calcarum subaequante. Q — Herba 5-10-pollicaris. Kami cauliformes copiosi, saepe decumbentes, ramulis oppositis gracilibus foliosis. Folia crassiuscula, inferiora 3-5 lin. longa, 1-3 lin. lata, internodiis brevibus terna verticillata, superiora minora et angustiora. Flores conferli bini quaternive broiler pedicellati. Calycis segmenta oblonga v. ovala, basi contracta indeque subpalmata. Corollae palatum aurantiacum, calcar corolla paullo brevior arcuato. Capsula globosa, valvulis 6 profunde seclis apice dehiscens. Semina discoida membranaceo-marginata. — *Linaria taxatili* *Thymi folio* Tournef. Instil. 1.171? — *Antirrhinum thymifolium* Vahl, Symb. bot. 11.07. — *Antirrhinum glaucum* Thore, Cblor. Land. 205. (non alior.) — Crescit in Gallia australi-occidentali (Bayonne).

y. *Folia omnia aliena.*

44. L. LLSITAMCA Lnk. el Hoffmnsagg. Flor. Poring. I. 947. I 43. (non Mill.) - Spr. I. c. 704. — Chavannes I. c. 123. f — Ramis cauliformib. procumbentib. glabris; foil, confertis obovalis v. oblongis, superiorib. majorib.; florib. dense racemosis; calycis segmentis oblongis oblongis pubescentib.; corollae flavae tubo et calcarum lineamentis rubentib. pedicell, calcarum corollam aequante rectiusculo. 2|. — Kami pedalet et ollra. Folia oblusa Y. acioscula crassa glaberrima glaucescentia, inferiora 3-5 lin. longa, 9-3 lin. lata, superiora majora, omnia obovata t. oblonga elliptica. Flores palchri magni; pedicell 1-4 lin. longi parce pilosi. Calycis obliqui, capsula brevioris segmentum supremum reliquis majus. Corolla [adjecto calcarum] pollicaris et nullra, lobis labii superioris ovato-oblongis, saepe dorso applicatis, labii inferioris lobis ovalo-rotundatis, lateralibus fornicatis, intermedio minori obcordato, apice emarginato, palato amplo aurantiaco, calcarum apice valde ampliato, basi acutissime rubro-fuscescens striato. Capsula ovato-rotunda, valvulis 6 basin fere usque debiscens. Semina discoida marginalia. — *Linaria marina flore pulchra, caule copioso* Griseb. Virid. Lusil. — *Linaria Lusitanica* Lam. Diction. Polygatar folio Tournef. Instil I. 100. — *Antirrhinum Lusitanicum* Lam. Diction. encycl. IV. 301. — Crescit in arenosis maritimis Lusitaniae.

45. L. MICBAT'XII Chavannes I. c. 1M. t L 7. fig. B. - Glauca: ramis cauliformib. ascendentib. ramulosis; foil, lata obovalis mucronatis; ramulis racemoso-spicatis; calycis segmentis oblongo-ovalis acutiusculis; corollae magnae purpureae calcarum eam vli superante, basi incurvo. 3^ — Herba 3-0-pollicaris glaberrima; ramis lignescens loricatis, inferne nodi, basi ramulis simplicibus filiformibus interdum abortu ad spinas redactis aucti. Folia densa, apice fere (runcaia mucrone partulo instructa, 5-7 lin. longa, 4-0 lin. lata, inferiora minora. Bracteae pedicellis longiores ovatae acutiusculae. Segmenta calycina plerumque oblongo-ovata, basi angustata, tubo corollino breviora, margine interno subscario. Corolla [adjecto calcarum] sesquipollicaris, labii superioris erecti lobis brevibus oblongis saturate purpureis, inferiori patente, lobis etiam abbreviatis subaequalibus, palato magno lato, calcarum acuto, basi curvulo v. interdum recto. Capsula? — Crescit in Persia prope Ispahan.

40. L. FASTIGATA Chavannes I. c. 125. | t 7. fig. A. - Glauca erecta: ramuli* fatigati; foil, ovalo-oblongis v. oblongis, basi cauli adpressis, apice macro* ovalis; ramulis in spicam densam ac terne aequantibus digestis; segmentis calycinis oblongo-ovalis acutiusculis; corolla data, calcarum ei brevior tuberculato. % — Herba 1-ft-pedalis glaberrima glaucescens. Rami medullosi ramulosi. ramulifigialis subcorymbosis. Folia sesqui-pollicaria et erecto-patenti*

quinquenervia, basi subamplexicaulla laevia crassiuscula. Florum spica densissima. Bractee angustae erectae, pedicellum aequans v. eo breviores. Calycis segmenta margine membranacea, tubo corollino breviora. Corolla (adjecto calcarum) 6-8 lin. longa, lobis labii superiora brevibus acutis, inferioris subrotundis, intermedio minore, palato lanato. Capsula T — Crescit in Oriente, in Armeniae arvis cullis inter Bagdad et Kermancha.

47. L. PYRAMIDATA Spr. I. c. 796. (excl. syn. Lnk.) — Chavannes I. c. 185. t — Erecla: foil, oblongo-lanceolalis, ulrinq. attenuatis glaberrimis; florib. spicalo-racemosis, spica pyramidalis; calycis segmentis ovato-oblongis obtusis pabescensilib., tubo corollino multo brevioribus; corolla magna flava, calcarum eam subaequans. 2]. — Rami cauliformes 2-3-pedales et ultra, striati medullosi, dein fistulosi valde foliosi. Folia 3-4-pollicaria, 8-12 lin. lata, pleraque quinquenervia glauca glaberrima subamplexicaulla mucronata, superiora multo minora linear-oblonga aculissima. Bractee lanceolatae pedicello longiores. Calycis segmenta basi pilis articulatis obsita ciliata. Corolla (adjecto calcarum) fessipollicaris, lobis superiora lobis oblongis concavis, inferiora rotundis subaequalibus, palato valde prominente, dense flavo-lanato, calcarum recio acuto. Capsula t — *Linaria orientalis Ulii Pertid foliata, forma spica densissima et pyramidata* Toara. Coroll. 0. — *Antirrhinum pyramidal** Lam. Diet. encycl. IV. 380. — In Oriente.
48. L. GRANDIFLORA Desf. Coroll. Inslit. Tournef. 30. t 91. — Chavannes I. c. ISO. t — Erecla: foil, ovato-lanceolatis acutis semimplexicaulibus; bracteis deflexis pedicello longioribus; floribus approximatis; calycis segmentis oblongo-lanceolatis acutis glaberrimis; corolla maxima integra, calcarum ea paulo breviori recto. O — Herba 9-3-pedalis glabrescens. Rami cauliformes erecti fistulosi, basi lignescens, longitudinaliter striati glaberrimi. Folia approximata quinquenervia suberecla glaberrima. Pedicelli crassi bractea ovata acuta breviores. Calyx tubo corollino fere aequilongus, segmentis aculissimis. Corolla omnium maxima (adjecto calcarum) bipollicaris, lobis labii superioris ovalis obtusis, margine reflexis, lobis inferioris laevibus ovalibus v. rotundis, intermedio ovali subrecto, lateribus multo minoribus, palato ampliato saturate ovato villosa. Capsula ? — *Linaria orientalis flore luteo maximo* Tournef. Coroll. Instil. 0. — *Linaria maxima folio Lauri Dalmaticae* J. Baub. Hist. III. 458. — Buxb. Cent. I. 15. I. 94. — *Antirrhinum Dalmaticum* Lam. Diet. encycl. IV. 380. — *Linaria Dalmaticae* Rehb. Flor. Germ. excurs. 375 no. 954* (neo Mill.), Plant. critic. V. t 438. fig. 090. — Lindl. Bot. Regist. t. 1683. — Crescit in Armenia.
49. L. DALMATICA Mill. Diction, (ed. 8.) no. 15. — Spr. I. e. 780. — Chavannes I. c. 126. f — Glauca ramosa: foil, oblongo-lanceolatis acutis approximatis; floribus ad summitates ramorum paucis laxis; calycis segmentis ovalibus v. linear-lanceolatis acutis globosis; corolla lutea, calcarum recto ea paulo breviori. — Rami cauliformes numerosi erecti v. decumbentes 3-4-pedales laeves nitidi. Folia 1-3-pollicaria, 4-5 lin. lata crassiuscula mucronata, subulsa nervosa, folia ima et superiorum reliquis latiora ovato-lanceolata, interdum laevia, superiora fere linearia. Flores laxo racemosi. Bractee pleraque linear-lanceolatae laevibus, pedicello longiores. Corolla (adjecto calcarum) pollicaris et ultra, lobis labii superioris ovato-truncatis brevibus, inferioris lateralibus late rotundatis oblique truncatis, lobo intermedio paulo minoribus ovato truncatis, paulo magno villosa. Capsula T — Crescit in Dalmatia, in Creta et Armenia.
50. GENISTAEFOLIA Mill. I. c. no. 14, — Rehb. Plant. critic. V. t 435. flff. 695. — Rehb. Fl. Germ. excurs. 374. no. 8540. — Koch, Synops. fl. Germ. (ed. I.) 523. Spr. I. c. 700. — Chavannes I. c. 197. f — Loddig. Botanic. Cabin, t. 318. — Tola glabra: foil, lanceolatis v. linear-lanceolatis trinerviis acumine alato »parvis; raceme laxis; lacinus calycis ciliatis basi attenuato-acutis, capsula longioribus; corolla pallida lutea, palato lato, calcarum corollam »ubarquanic reciusculo; semibus ovatis trigonis aptens, angulis tenuibus ananiosanub. impresso-punctatis » angulis acutis impunctatis. % — Rami cauliformes plerumque erecti v. decumbentes paniculati subfastigiatum. Folia inferiora pollinosa et ultra, »ubtu«

nervosa, superiora oblongo- T. lineari-lanceolata multo minor. Bractee pedicellum vix superantes lanceolatae acutae. Segmenta calycina apice subreflexa. Corolla quam illa *L. vulgaris* paullo minor, lobis labii superioribus oblongis erectis, lobis inferioribus parvis, intermedio paullo minori, patulo villosa. Capsula subrotunda, deolibus 6 apice dehiscens. Semina fusca prismatico-subrotunda corrugata-eicavata. — *Linaria Pannonica prima* Clus. Hist. I. 321., Pann. 308. (ic. mala). — *Linaria Pannonica flore luteo minore quam in vulgari* J. Bauh. Hist. III. 453 — *Linaria flore pallida, rictu aureo* C. Baub. Pini. 213. — Moris. Oion. Hist. II. 500. sect. 5. no. 12 —* *Linaria Constantiopolitana Lini sicuti folio, flore luteo* Tourn. Coroll. 0. — Buxb. Cenlur. 1.16. t. 25. — *Linaria genistae-foha glauca, flore luteo* Henn. Parad. app. 0. — *Antirrhinum genistifolium* Linn. Spec. plant 858. — Jcq. Flor. Aosiatic. t. 244. — Sibthorp. et Sm. Flor. Graec. t. 500.

f. *proera* Curtis, Bot. Magaz. t. 2183. — Erecta firma glauca: folia, ovalo-lanceolata sparsis glandulis; racemus paniculato-paniculatus. — *Urtica flore pallida, rictu aureo elatior* Tourn. Inst. rei herb. 170. — *Antirrhinum genistifolium r-* M. Bieber U. Fl. Taur. Caucas. II. 74. — *Linaria chloraefolia* Rehb. Plant. critic. V. t. 430. 6g. 627., Flor. excurs. 374. no. 2541.

y. *plentifolia*: Ramulis minus flexuosis; folia, elongata; floribus parvis majoribus; calycis corolla brevior. — *L. tatarica* Fitch. Caul. Hort. Gorenk. 25. — Rchb. Plant. critic. V. t. 437. fig. 628. — Crescit locis siccis in Austria et Pannonia, circa Constantinopolin (tar. r.) in Taunae graminosis, in montibus Talysh et in montibus Altai.

f. 2. *Folia angusta linearia, Unaria lanceolata seu Unaria-oblonga, omnia alterna. Flores racemosi vel spicato-racemosi majusculi*

a. *Simina angustifolia*.

51. L. LIMBRIA Befeb. Plant. criuc. V. 14 KL fig. 600. (tsegmentum calycina linearia), Flor. Gern. excurs. 374. no. 993 (excl. SJD. Bochel.) — Chabannes I. e. 120. t — Erecta glabra ramulosa: folia, lineari-lanceolata aculis subternis; racemo stricto laxiusculo; bracteis pedicello longioribus; segmentis calycinis basi subovatis acuminate brevibus; corolla corollae, palato saturation villosa, calycis corollae aequante. — Herba pedalis et ultra. Basi cauliforme* terciae laetes, ramulis alternis. Folia linearis-pollicana, utrinque alienata, plerumque trinervis craesuscula. Bractee lineari-lanceolatae acutissimae. Calycis segmenta acutissima glaberrima parva. Corollae labii superioris lobi elliptici, dorso invicem applicati, lobis inferioribus parvis, intermedio majoribus*. Capsula subovata calyce longior, denticulis 0 apice debescens. Semina nigra prismatica subrotunda, tenuiter scrobiculata. — *Linaria onemianum tuigart timms, folio longisimo* Tooroff. Coroll. instit. 9. — *Antirrhinum hmitotium* Linn. Spec. plant 858. (excl. s.jv.) — Crescit in Orient* et in Italiae sarracenis.

f. *Simina angustifolia* — *Urtica merginosa*.

52. L. LOESBUI Schweigger in Eönlgsb. Arch. I. 238. ex Koch, Synops. fl. Germ. (ed. t) 983. — Glaberrima: folia lineari-lanceolata longe alienata, obsolete ternis, alternis remotis; racemis laxis; laciniis calycinis oblongo-lanceolatis breviter acuminatis, obsolete nertosis, capsula brevioribus, seminibus parvis, alariformi cinctis glabris. — Herba valde polymorpha pedalis et ultra. Basi cauliformes glaberrimae glaucescentet. Folia linearis-pollicana angustissima crassiuscula linearis-pollicana glaberrima. Pedicelli breves, racemus inermis pilis albidis et granosis vestitus. Bractee fere lineares aculae pedicellorum longitudine. Calycis parti tegmini tubo corollino adpressa glabra aut tag* glanduloso-pilosa* Corolla laete purpurea v. sulphurea, tubo linearibus duobus aurantiacis mixta* obovata, palato aaralio, calycis parvulas gracili subrotunda, nunc curvato. Capsula magna globosa magroseens. Semina congenerum matima. — *L. munita* Benb. Flor. tteors. 375. no. 2M0. (DC) - *L. jumea* Bcb. Plant. criuc. Y. 8g. 012. OIX - *Urtica maritima /tonhus odtrahs* Loosel. Borost. I. 30. - *Antirrhinum odoratum* M. Biebent Flor. Taur. Caucas. II. H - *Amirrhinum*

- odoratUtimum* Gttldenst Itin. I. III* alque veroslmile (??) I. *tinifolium* Linn. — *Linaria odora* Fisch. Cat. hort Gor. 1818. p. 25. — Chavannes I. c. 135. f et inde: *Linaria maritima Sedi folio sueeulenta* Bazb. Cenlar. IV. 23.1. 37. — *Antirrhinum juneeum* Pall. Hiner. II. 332. — *Antirrhinum tubutatatum* Cyrill. Hb. — *Linaria AUaica* Fisch. mss. — Crescit In Tauria, Uraola, Altai, Calabria et Sicilia el ad mare Ballicum. (Jturffty Waning in \$reufen, bet \$eub«be naff bel 2>angig umb in Comment.)
53. L. ITALICA Treviran. Nov. act. acad. Caes. Leop. Carol, nat. curios. XIII. 188. — Rchb. Plant, critic. V. 13. t. 421. fig. 608. — KoCb, Synops. 0. Germ. (ed. 1.) 583. — Chavannes I. c. 130. t — Tola glabra: foil, lineari-lanceolalis trinerviis aculis allernis sparsisve; florib. conferie racemosi*; laciniis calycinis oblongo-lanceolalis breviter acuminalis enerviis capsula breviorib.; corolla saturate flat a, palato lanato, calcari corollam viz guperante; capsula subovata; seminib. planis, ala orbicular! cinclis, medio luberculalo-scabri*. % — Herba glaucescens pedalis v. bipedalis. Kami cauliformes 1-plures ramalosi. Folia approximala crassiuscuta glauca pollicaria el ultra. Bracieae inferiores pedloello aaepeque flore longiores, ^ superiorea angaslissimae parvulae. Corolla L, vutgaris, aed duplo fere minor, *'' calcari levltter arcaato. — *Linaria hti\$ã montana Gmistae tinctorial foko* C. Baub. Ploz. 213. — *Antirrhinum Linaria* var. Linn. Spec, plant 85©. — *Antirrhinum genütifolium* Vill. Dauphin. II. 440. (non alior.) — *Linaria gtnOUfolia* DC. Fl. Fr. HI. 801. (ezcl. syn. omn.) — *Antirrhinum pot^gata^foHum* Poir. Diet, encyel. Soppl. IV. 21. — *Linaria angustifoUa* Rchb. Fl. Germ, eienra. 375. no. 2580. — *L. panicutata* Peyer et Vest, Flora (B. Z.) XII. Bell. 1. 30. — *L. linifolia* Roch. Plant rar. Banal. 60. t. 22. fig. 47. — *Antirrhinum Bauhini* Gaud. Fl. Helvet HI. 154.
- /? *angustifoUa*: Foil, ezacle llinearib. acotissimis; capsula ovalo-globosa. — *Antirrhinum angulittimum* "Loisd. Flor. Gall. not. suppl. 167. — Crescit in Tyrolia, Slyria, in Banatu et in Italia superior!.
- M. L. VULGARIS Mill. Diet. (ed. 8.) no. 1. — Bertol. Amoen. t. 101. - Spr. Syst. veget. II. 706. — Rchb. Fl. Germ, excurs. 376. no. 2551. — Koch, Synops. fl. Germ, (ed. 1.) 523. — Cbavannes I. e. 131. f — Glabra: rhachl pedicellisq. glanduloso-pobescentib.; foil, lanceolalo-llinearib. acolis trinerviis (plerisq. *uninerviis* Chav.) iparsis dense congestls; raemo Imbricato; laciniis calycinis oblongo-lanceolalis trinerviis acutia capsula breviorib.; corolla sulphurea, labio inferiorl vitellino, palato croceo, calcari earvulo corollam sobaeoanle; seminib. planis, ala orbicular! cinclis, medlo luberculalo-soabris* 9fr — Rhltoma nnoeum, mbereulis passim instructum. Raml eanlllbmies pedalea el ultra, btal llnescentes, slmptfces v. ramulosl. Folia pollicaria et ultra, llinearia, Inferior! et lliã sobolom aaepe dilalala. Racemus spicaeformls striotos. Bracieae lineares acollsslmae pedlcellos paullo superanlcs. Pedicelli icrelea crassiusculi. Calycis segmenta margine ez-tremo subscariosa, glabra, tubo corollino adpressa. Corolla (adjedo calcari) 10-14 lin. longa, lobis labii superioris oblongo-ovatis, apice sublruncalis, lobis laterallibus labii inferioris ovato-rolundatis, intermedlo minori. Palatum margine interiori pilis aureis barbatum. Calcar conicum acutum leviter arcualom, rorollae Jongliudine v. ea brevulus. Capsula membranacea glaberrima, dentlbua 6-8 aplice dehiscens. — *H)''_p^* Dioscorid. IV. 138. — *OtfrU Unaria* Trag. Histor. 357. — *Osyri** Plin. Hist, natural. 3W. lib. f7. cap. 12. - Fchs. Histor. 544, ie. - Camer. Bpit 020. Ic. — *Linaria Caeaalp.* Syst 350. - *Linaria prima* Dodon. PempUd. ftirp. 183. fig. 1. — *Unaria vutgaris* He, Bessl. Hort. Fo*t. ord. aett 1.114. 6g. 3. — *Linaria vulgari** nottrat Park. Theatr. 498. — *Linaria rulta rutgait* J. Bauh. Histor. III. 456. — Blackw. Herb. t. 115. — *Linaria rutgaris lutea, flore majorr* C. Bauh. Pinx. 212. -- Moris. Oxon. Hlstor. II. 400. secl. V 1.12. fi?. 10. - *Antirrhinum Linaria* Linn. Spec, plant, ft*. - Bull. Herb. 1.261. — Gaertn. De fructib. et seminib. I. 248. t. 53. fig. 7. — Lam. IIIIML gen. 1. 351. flg. 3. Sturm, Df uturM Flor. Hfl. 18. t. 13. — Engl. bol. X. t. GW. — Sxensk bot. t. 100. - Flor. Dame t 082. — Hayne, Arineigew. VI. t. 33. *Antirrhinum commune* l.am. Fl. Franr II. 340. — *Antirrhinum genütifotium* Lapcjr Abr. Pyr. 354* — *Linmria Goble...*

Besser in lib. DC. — *Linaria dliata* Lang in Hb. Gay (floribus elliptis). — *Linaria elongata* Dumort. Flor. Belgic. prodr. 34? *) — *Linaria Cyparissiat* Tausch, Flora (B. Z.) XIV. 221?")

fi. glandulota: Pubescens ac in arenosis saepe procumbens: calycib. glandulosis. — *Antirrhinum glandulosum* Lej. Flor. de Spa 320. — *Linaria prostrata* Böningb. mss.

y. speciosa: Foil. lineari-lanceolalis sabcoriaceis, obsolete trinerviis, subtus glaucescentibus; florib. majoribus; capsulis elliptico-oblongis. — *Linaria tpeiosa* Tenore, Flor. Napolit. IV. t. 150. fig. I.

A. acutiloba Chavannes I. c. — Foil. angustule oblongis •. oblongo-lanceolalis subtrinerviis; segmentis calycinis saepe acuminatis; corolla pallide lutea, palato intense aurantiaco, lobis non acutiusculis, nunc obtusis; capsula subcylindrica. — *L. acutiloba* Fisch. mss. ID Rchb. Plant. critic. V. 14. t. 424. fig. 611. — Oecurrit etiam hujus specie! Peloria, cf. Linn. Amoenit. acad. I. 28a, Engl. bot. t. 200., Nouv. Did. des sc. nat. veg. dicoyl. t. 31. — J. Th. C. Raizeburg, Animadversiones quaedam ad Peloriarum indolem et definitionem spectantes. Dissertatio inauguralis etc. Berolini 1825. 4to. cum tabula aeri insculpta. — Crescit polymorpha haec species in campis et arenosis totius fere Europae (var. *y*, in arvis Gargani et Lucaniae), in Sibiria (var. *d*. in Daharia) et in America septentrionali prope urbem Boston (certe ex Europa migrata).

55. *L. BIEBERSTEIMI* Besser, Ennm. pi. Volh. Podol. 25. - Rchb. Plant. critic. V. 14. t. 434. fig. 624. 625. — Chavannes I. c. 134. f — *Ramosa*: foil, linearibus. v. lineari-lanceolalis trinerviis mucronatis; floribus in racemum confertum et abbreviatum dispositis; segmentis calycinis oblongo-linearibus. subacutis pubescentibus; capsula globosa; corolla omnino *L. vulgaris*, palato villosa. *Q* — Planta finna J-3-pedaUa. Rami cauliformes teretibus medullis, ramulis subsessilibus. Folia numerosa confertim crassinervis acuta 1-S-pollicaria, 2-3 lin. lata. Flores breviter pedicellati, pediculis bracteatis Hincori-UnceolaU acutissima brevibus. Corolla laevis flava, palato obscuriori. Capsula congenerum maxima, membranacea nigrescens, valvulis 6-8 profunde sectis debiscens. Semina nigra marginalia. — *Antirrhinum Linaria* M. Bieb. Fl. Taur. Caucas. II. 75. (excl. syn.) — Crescit in Podolia australi, ad Mare Digram, circa Odessam et in Syria prope Damascus.

50. *L. HEPATICA* Bnge. mss. in Ldb. Flor. Altaic. II. 445. f - Ldb. Icon. 0. Ross. All. illustr. I. 01. — Chavannes I. c. 134. t — Ramis patentibus elongatis strictis; foil, oblongo-linearibus acutis glaucis confertis; floribus racemosis; calycibus glabri laciniis obtusis, pedicellis subaequalibus; calicari tenui recto corollam subaequantibus. 2) — Caulis pedalis, basi subdecumbens teres glaber glaucos. Racemi terminales solitarii, floribus distantibus. Bractee lanceolatae acatae rellaxae, glandulis tenuissimis apicalibus obscuris. Calycis laciniis (cf. diagnosis!), oralo-orale *Umgae acuminatae* glabrae v. rariorae elliptico-oblongae. Corolla majuscula hepatica v. sordide porpurascens, palato filloso et calicari recto corollam subaequantibus flavo, labiorum laciniis obtusis, labii inferioris media angustiori nonnihil porrecta. Capsula calyce triplo longior. Segmenta magis discoidea nigra. — Crescit in deserto Soongoro-Kirghisico. *

57. *L. PRAECOX* Bnge mss. I. c. 446. t — Ldb. Icon. fl. Ross. All. illustr. t. 431. — Chavannes I. c. 155. t — Caulis raris striato simplicibus; foil, sparsis, inferioribus brevibus superioribus linearibus elongatis carinis glaucis; calycibus glandulosis laciniis obtusis calicari recto, corollam subaequantibus; ramis caulis subpicalibus. 4) — Caulis simplicissimi teretes laevissimi, basi foliis

*) *Caulis* irietus; ramuli hinc et inde tritici; foil, oppositae tripartita. Unearibus planis glabris; hinc et inde imbricatis pubescentibus, calicibus longioribus; calicari raris. *nrro.iCresHumLix^burfi*. *I fnule erecta*; foil Mirni'ammuh limtaribus. sembrtis, inferioribus confertim. *racemum ramulis. pmm4e*lotis glabris. calicari hinc et inde equis. % Crritil prope Vautham.*

sempollicaribus v. brevioribus, lineam lalis vestiti. Folia superiora angustiora 1-2-pollicaria, vix dimidiam lineam lala, carnosa glaoca glaberrima. Florum racemos detnum elongatus 10-15- floras. Bractee lineares pedicello longiores vix glandalis stipatae. Pedicelli calyce breviores glandulosi. Lacinae calycinae oblongae obtusae subtrinerviae tenuissime glandulosae. Corolla violacea inlensius striata, fauce albida, macnlis geminis flavis confluentibus picta villosa, calcari redo sobolalo corollam snperante, intensias violaceo. Semina discoidea. — Crescit ad fl. Irtysch inter Tscheremschanskoi et Kransnyje Jarki in Sibiria Altaica.

58. L. MACROURA Rchb. Plant. critic. V. 20. t. 432. fig. 021. 022. — Ldb. Fl. Altaic. 11. 440. — Ghavannes 1. c. 137. t — C&eul erecto ramoso v. simplici; foil, linearib. plani? glaucis glaberrimis, illis sarculorum conferlis; racemo denso; calycis laciniis ovato-oblongis oblusis glanduloso-pubescentib. seu glabriusculis; corolla flava, palato intensiore, villosa, calcari recto corollam aequante v. soperanle. 2} — Pedalis et ultra. Rami cauliformes plures lereles, basi lignescentes, nunc simplices, nunc ramulosi. Folia erecta 1-2-pollicaria, in surculis conferU subverlicillata. Bractee lineares deflexae, pedicellum erectom sabaequant. Segmenta calyeina lubo corollino adpressa glanduloso-pUosa ciliataque. Corolla ampla glabra v. pubescens, lobis labii superioris brevib. ovalis acutis, labii inferioris rotundatis subemarginatis, subaequalibus, palato amplo pilis fulvis barbalo, calcari crasso acuto recto. Capsula ovato—globosa gUberrima, valvull 0 dehiscens. — *Antirrhinum linifolium* Pall. Ind. Taur. 161. (non Lion.) — *Antirrhinum maeurorum* M. Biebst. Flor. Taw. Cancas. II. 75.

fi. *Besseriana* Char. I. o. — Simplex: raemo paocifloro; florib. majorib.; segmentis calycinis latiorib. ac paallo longiorib. subpubescenlib. v. interdum glaberrimis; calcari corollam subaequante. — *Linaria macroua* M. Bieberst. CenL pi. rar. Rossic. I. t. 27. — *L. Besteriana* Rchb. Pl. critic. V. t. 433. fig. 028.

y. *ratnota* Chav. 1. c. — Ramis cauliformib. ramulosis crassiorib.; florib. minorib. laxis; segmenlis calycinis angustiorib.; corolla aureo-flava, calcari longo. — (Ldb. Fl. Alt. II. 447.) — Crescit in Tauriae et deserti Caucasico-Caspici locis siccis apricis, (var. ?.) in Bessarabia.

\$. 3. *Folia angusta alterna \$eu vertidllata, iurcuhum laiiora (lanceo-Utia v. lineari-lanceolata) vertidUata. Floru racmoH out ipicoto-racmosi; corolla {adjecto cakarf} ultra tru lineas longa. Herbae \$aepiu\$ erectae, turcuii sterilibus donate**

- a. *Slylut apice bifurcaiu**, *tUgmato bilobo* (ChaTaAief L e, t 5. ig. W. b.); ***** *trantverie corrugate* (Chafannef I. e. i. 5. fig. S.).

59. L. (ANTIRRHINUM Willd. Spec plant. III. 947.) APARINOIDB9 Gbtfanet I. c. 138. f — Slricta: Toll, lineari-subolatis, plerisq. alternis, surcQlorum plants 4-5-nis Yerticillatis; racemo villosa; pedicellis bractea longiorib.; calycis segmentis linearib. acutis; corolla sulphurea, palato croceo, lineis fuscis variegato; calcari stepius recto. Q - llerba 1-3-pedalis, surculis plurimis erectis *GaUum aparinoides* referentibus instructa. Rami caulifonnef laeves, apioe uaium vflosi, simplices v. ramulosi. Folia ramealia crassinscalt semiterelia aeoU 1-2-po Hi car la, Una interdnm verlicillaU, apice ramulorum Jnnlorui eonferta sabtoseicnltu, folia sorculornm 6-12 lin. longa. Racemos Una densa tacins (plantie ciiltae minus villoiu), pilis glanduliferis mollibus. Bractee lineari-spaiholae, pedicello breviores eique adpressae. Pedicelli pabescetes, post anthesin pa«Jlo accrescentes. Segmenta calycint suprt medium coarclala, marginc extremo membradacea, apice paullo rclfxa. Corolla magoitudioe fere *L. vulgaris*, labio superiori erecto, inferiori abbreviato, lobo iniermedio lateralibus minori ovato, calcari gracili acuto, quam corolla nunc longiori, nunc breviori. Capsula ovaia caljcc I eel a, denlibus 0 dchiscous. Semina nigra hubdiscoidea. - *Linaria Sintla tnuUicauU** *Molluginii folio* llocc. Sic. t. 10. (i#. I. *Linaria folio Ptyllii* Ri). Monop. irreg ic. - /. *heterophylla* |H| .Fl. Allant. II. 48. t. 140. - *Antirrhinum strictmm* Sm Prodr. 0, Grace. I. 4U. — Siblhrp. el Sm Flor. Grace. I. 504. — *Linaria tritUi*

Guss. Plant, rar. Sicul. 250. (excl. syn. Spr.) — *Antirrhinum multicaule* Ten. Fl. Nap. prodr. 36. (non alior.) — *Linaria reticulata* Rchb. Plant critic. V. 10. t. 431. fig. 630.

0. humilis Gogs. I. c. — Planta ascendens vix semipedalis, surculis sterilib. villosis donata. — In campis arenosis Siciliae, Cypri, Cariae et in Atlante.

60. L. CLEMENTEI Haens. mss. ex Boiss. Elench. pi. nov. Hispan. (ed. Erford.) 40. no. 150. — Boiss. Voyage bot dans le midi de l'Esp. 454. no. 1242. f t. 120. — Radice perenni; caolib. erectis simplicib. aul parce ramosis glaucescentib. tere-tib.; foil, caulinis sparsis sabterelib. linearib. obtusissimts, surculorum breviorib. laliorib., quaternaliB ferticillatia; spicis longe pedunculatis terminalib. conferlis subcapitalis, post anthesin elongatis glanduloso-viscidis; bracleis pedicello caly-cem subaequante breviorib.; laciniis calycinis linearib. obtosis; corollae tiolaceae labio snperiori maximo bipartite, lobis otatis obtusis, inferior! breviori convexo trilobo, lobia rotondatis, intennedlo mlnori, palato anrantiaco-maeolato, calcari recto violaceo pedicellom aeqnante; seminib. triqueiris corrogotis. 2} — Coll am radice crassum multicaule. Gaules saepe 3-5-pedales. Folia omnia carosa glaberrima glaucescentia, caolina 1-2-pollicaria, apice subcallosa. Pedicelli sesquilineam circiler longi. Corolla magna. Capsula panra ovau glabra, caly-cem aequans, mediom usque dentibus 0 dehiscens. — Crescit in collibus arenosis cal-careis in Hispaniae provincia Malacilana prope Carralraça, Yunquera, Monda.

61. L. RETIGULATA Dsf. Flor. Allant II. 48. - Spr. Syst. veget II. 106. — Charannes I. c. 140. t — Erecta glauca: foil, linearib. canaliculatis, inOmis et nurcu-lorum verticillalis, soperiorib. tparsis; racemo abbreviate, sursum attenuato pu-bescente; bracteis pedi cello longiorib.; segmenlis calyeinis late linearib.; corolla vendso-reticulata, saturate purpurea (palato croceo) v. lulea, lineis atro-purpu-reii notata, caleari ea breriere. 0 — Herba S-4-pedallt glabra, parte florifera , Untumoiodo pabeacens. Eaml eaaUfersMe teretea nedallosi ranulosl. Folia linear! -subulau crasaiuaeuli obtaaa. Ila Pimi tyltuirU referentia pollicaria el ultra, surculoruni 4-0 •ertlcilitU bre?iora el laliora. Flores conferti brevissime pedicellatl. Bractee lineari-lanceolaue oblusae pubescentes, margine membra-* naceae. Calycis segmenla brevller glanduloso-pilosa. Corolla (adjecio catotri) fere pollicaris, lobis labii superioria erectis oratis acutis, ioferiorii palulit ten reflexis rolundatis, internedio Binori, palato ciliato. Gapsula el semina L. mpm-rinoidit - *Antirrhinum pinifoiimm* Poir. Illo. II. 10X — *Antirrhinum reticuim-tum* Sm. Icon. pi. rar. It - Willd. Spec plant. III. M7. — Crescit ad littor* Africae borealis el Lonitaniae (O-Porto, Fauslua).

tt. L. (ANTIRRHINLM Linn. Spec, plant 860. - Jcq. Icon, plant rar. II. 12. t lit) VERSICOLOR Mnrh. Melbod. plant 983. - Spr. I. c. 1M. - Cbavanaea 1. c 140. t - Apice pubeccaf: foil, plants late liearib. seo liaeari-laoceolaUs obiuii} ioferiorib. taepc ItTgls, s«peri«cib. allenilt, aorcaloniB oppositis rt lernis; florib* racemosif; eajycla aegBeatls !>•—ri—obloajto oblaalaacolis; corolla pallide loietf palato croceo, saepe blpaeuto* ealeari violareo v. luro, corollas longitudes* eicedente. Q — RaBi caulifonnes pedales el olira, simplices v. apice ramulodV in pane florifera glanduloso-pilosi. Folia disUnlia glab«*rima pollicaria v. ~~cap-~~ quipollictria, infra 3-4-M ferticillaU. Bracleae lanceolaue icuiiutroUt, ~~brevifl-~~ glanduloso-pilota. Calycis sfgaenu margine membranacta, apice paollo ft-flexa, capsulam tuperantia. Corolla Bagnitudine L. *rmigaris*. labii BUperioria lo-bii ereclia oblongit v. ovalo-oblongis, infrrioris pairnliif lobis lalrralibot rolondatis obliqoit, inienoedio Bullo Binore (ere obovalo, palalo glabro, ~~inter dW~~ '•••••bipocuto (^ptula toliOTala calyre lfcia glabr.i. apire deollbos 0 ~~deho-~~ ceoa. StBiM Binuu, ban Iroocau rurvola. - Anlirrkinnmm bipmmcftmm ~~Hortul-~~ - Cmeli id Q«||iM aaatralto MofIU aareo.

<X L. SAUIUSINI fets*. Voyaft bot dans U Bidi de l'Rtp. 4M. BO. 1944. f t 137. - Anau bleasjlttt: fjmlib. nsBerotis diffftsU v. atrvadeoiiib. raaosis, parte la-feriori htrsoUs; |>y. gUbris, MreoloniB urnit quatersUte otato-laoceolaUf .arotis, canlioiu 9hm%U lftMrtb.; ractBk paocifloHa pe? ~~anthesin subcapluU*~~

dein elongalis hirsuto-viscidis; pedicellis calyce longiorib., bractea eis breviori suffullis; calycis viscidi segmentis lanceolatis obtusis, basi attenuatis; corollae labio superiori bilobo, lobis oblongis obtusis, inferior! paulo minori convexo trilobo, lobo intermedio minimo, calcei recto; geminib. oblongo-lanceolatis subreniformib. et corrugatis. 0 et <f — Gaules basi lanuginosi teetl semipedales v. pedales, surculi steriles 2-3-pollicares, folia glabra ovalo-oblonga acutiter genies. Folia caulina semipollicaria v. etiam pollicaria. Spilcae abbreviatæ, denum sobpollicares. Calcar rectum violaceum v. flavum. Funiculus inclusus velutino-ciliatus. Capsula ovata, calyce brevior, apice valvulis sex obtusis dehiscens.

a. violacea: Gaules ascendentes longiores; corollae violaceae labium superum infero longius. Calcar corollam æquans. — I. *iparte* *fi. violacea* Slim. Hb.

fi. lapa: Gaules numerosi humiles ramosissimi. Corollae flavae labium superum infero vix longius. Calcar corolla paulo brevius. — Crescit (tar. a.) in Hispania provincia Malacitana et (far. *fi.*) in regione montana Sierra Nevada en la Dehesa de San Gerónimo altitudine 4-1000 pedum.

64. L. VISCOSA Dum. Cours. bot. cult (ed. 1.) 03. — Spr. I. c. 104. — Chavannes I. c. 141. f — Pabescens: foliis linearibus, plerisque alternis distantibus, surculorum linearium-lanceolatis v. linearium-oblongorum qualiter; racemus confertus brevis; calycis segmentis linearibus. seae linearium-lanceolatis acutis? ciliatis; corolla luteo-fulva, labio superior! maximo, calcar! recto, corollam? x saperante. Q — Rami cauliformes pedales et ultra subsimplices, basi apiceque pilosi, sub racemo nudis, surculis erectis patentibus pubescentibus aucti. Folia ramealia semipollicaria vel pollicaria plantae obtusiuscula glaberrima, inferiora 4-5-na approximata pseudoverticillata, superiora alternata, surculorum quaternata, verticillis distantibus. Pedicelli bractea parva concava longiores. Corolla (adjecto calcei) 12-15 lin. longa, lobis labii superioris rotundatis maximis, palato intense croceo glaberrimo. Capsula ovala glabra, calycis fere longitudine, apice dentibus 0 dehiscent. Semina curvula nigra. — *Antirrhinum vireotum* Linn. Amoen. acad. IV. 310., Spec. plant. 855. (nec Bot. Magaz.) — Crescit in Hispania prope Gades.

65. L. ALGARVIANA Chavannes I. c. 148. t - Glabra: ramis canaliculatis. fere apiculatis; Toll, surculorum creberrimorum lanceolatis? linearium-lanceolatis ternis quaternisve verticillatis; floribus longe pedicellatis nudis; calycis segmentis non linearibus acutis; corolla pallide luteo-ferruginea. Y. prorepascente(T), calcar! longo mucositate. Q? %I — Rami cauliformes decumbentes v. erecti 4-10-pollicares. Folia caulina longe distantia parva, areolarum 3-4 lin. longa, inferiora aenitiuscula glaberrima. Flores apice ramorum 3-3 eorum, pedicellis brevibus angustis duplo triplo longioribus. Calycis segmentis marginibus membranaceo-scariosis parce ciliolatis. Corolla magnitudinis *L. alpimæ*, lobis labii superioris erectis ovato-rotundatis, lobis labii inferioris lateralibus rotundatis concavis, intermedio minori late ovalo, palato glabro. Capsula ovalo-globoidea glaberrima, calycis longitudine, apice dentibus 0 dehiscent. Semina irregularia, testa varie contortuplicata. — Crescit in Algarria prope Primonlorum sacrum.

66. L. SPARTEA Lnk. et Hoffm. Fl. Portugal. II. 933. f. t. 3f. - Spr. I. e. 105. - Rebb. Plant. critic. IX. t. 814. Bg. 1100. - Chavannes I. e. 143. t - Sicula ramosa: foliis linearibus-sobulatis erectis glaberrimis, inferioribus saepe ternis, saepe floribus alternis, surculorum planis ternis v. quaternis; lobis longe pedicellatis; calycis segmentis linearibus. ten linearium-lanceolatis acutis glabris v. pubescentibus; corolla ovata, palato saturate aurantiaco, calcei recto. © et <f — Herba pedalis. T. sesquipedalis maxime variabilis. Rami cauliformes plures teretes paniculato-ramulosi. Folia 6-10 lin. longa crassiuscula angustissima, superne canaliculata, inferiora et surculorum latiores 3-4-na. Racemus laxis flexuosus pauciflorus? prodirilis crassis 3-6 lin. longis, bracteis angustissimae glaberrimae v. pubescentibus, uti et h. i. Segmenta a ca) cina per fructus maturationem serpo ampliat, membrana membranacea. Corollae lacinarum nunc latiores, nunc angustiores, calcei corollae saepe duplo longiori. mox breviori, motu nubescens*. Capsula ovato-globoidea calyce longior glaberrima, \ahuli 0 apice dehiscent. Semina parva

- nigra oblongo-truncata curvula. — *Linaria annua anguttifolia*, /lore tnajore luteo Moris. Oion. Hisior. II. 490. — *Antirrhinum tparteum* Lino. Spec. plant. 8M. — Cav. Icon, plant, rar. I. 10. t. 32. — Bot. Magaz. t. 200. — *Antirrhinum junceum* Lam. Diet, encycl. IV. 352. — *Linaria juncea* Dsf. ft. Atlant. II. 43. — Rchb. PI. critic. IX. t. 813. fig. 1090. — *L. praecox* Lnk. et Hffmnsagg. I. c. t. 37. — Crescil in insulis Canariensibus, in regno Maroccoano, in liltore Tripolilano, in Lusitania, Hispania et in Gallia anstraliori.
67. L. JUNCEA Ait. Hort. Kew. (ed. 2.) IV. 17. (nee Dsf. nee Rchb.) - Chavannes I. c. 144. t — Glabra ramosissima gracilis: foil. lineari-subulatis semiteretib. crassiusculis, plerisq. alternis, aorcolorum lineari - laoceolatis opposilis lernisve; florib. paucis longe pedicellatis; calycis segmentislineari-lanceolalisbrevib. acutis; corollae panrae palato anranliaco, calcari recto corollam vix superante. O — Herba virgata, saepisalnit simplex, glaberrima, caul is tercs v. subangulatus paniculato-ramolosus, sareolii sterilibas paucis procambentibus iosrtracios. Flores ad apices ramulorum, pedicellis bracteola 4-5-plo longiohbus, post anthesin accrescentibus. Calycis parvoli segmenta margine roembranacea. Corolla qaam ea praecedentis multo minor, lobta labii superioris erectis oblongis aculiuscolis, inferior is lalcralib. patentib. subovalis, intermedio fere obovato minori, calcari acuto gracili rectiusculo. Capsula ovoidea valvulis 0 debiscens. Semina nigra ovalo - oblonga truncata conrala. — *Antirrhinum junceum* Linn. Amocnit a cad. IV. 277. — *Antirrhinum virgatum* Brot Flor. LusiL I. 103. — *Linmria miotumika* Lnk. et Hffmnsagg. Flor. Portug. I. 236. — In Lnsitania et Hispania.
68. L. BIPARTITA Willd. Enum. pi. borU Berol. II. 640. — Sweet,* Brii. now. gard. I. t. 30. — Spr. I. c 703. — Cbavaones I. c. 145. | L 5. fig. 28. — Glabra: foil, lineari-laoceolatis plants alternis el verticillatis, surculorum latiorib. lemis; florib. laie raemosis; calycis segmenis sublanceolatis acalis, margioe membraoaeels; eorollae viotacao-eoeraléae lablo superior! profunde bipartito, palato aurantiaeo, basl albescenta, caleari corollam ?lx superante arcuato. Q — Raml caoliformes paael pedales teretes glaberriml lacves, ramulis rreclis alternis, durculis slerilibas decombentibus. Folia 1-3-pollicaria, basi attenuata, ilia surculorum latiora el breviora, pleraque terna. Racemus latus paullu flexoosos. Flores speciosi sobnulanles, pedicellis 2-4 lin. longis, braclris pan is ovalo-lanceolatis aculissimis. Calycis segmenla tobo corollino breviora. Corolla (adjecto calcari; 8-12 lin. longa, lobis labii superlorii oblongis subrrflnis, lobis labii inferioris patenti-deflexis, lateralibas ovato-oblongis intermedium exrcrdcnlibuS, palato profunde sulcato pubescente, calcari saepe dilutius colorato. Capsula subglobosa, apice dentibus 6 debiscens. Semina minuta suboblonga curvula, tesu nigra transverse corrugata. — *Antirrhinum bipartitum* VenU HorU Cels. p. et l. fti — *Antirrhinum orehidi/lonm* Hort. Paris. — *linmria tpeeiota* Jcq. fil. Kclog. I* 14a t. Olt (noa Ttat) — *AnHr*nhmm iptionm* Dooo.CaL hort. Cantabr. IH04. p. 178. — *Linari* nmmlm* Hartal. — to MaariUaia at in regoo Maroccoano circa Tanger.
60. L. LIKOGRISSA LsA. at Hfmnifr*. Flor. Poring. I. «a | l. 41. - (.havaoos I. c 146. t — Apica pnbeseens: foil, linrarib. planis glabris, trrnis n alters!* surculorum brevib. lanceolatis ternis ci quaiornis; florib. lais looge prdicrllaliisS calycis segmentis linearib. angnsliissimis aculissimis pubrsconiib.; corollae caa" ruleao labio superior! rubescenle, palato aurantiaeo, calcari longitudine corolla* arcualo. Q — Praecedenti speciei valdr afflnit forteqoe ejus \anciat prculiariSt atlamrn-loo nalali foliis minonbus dislanlibus, calycibus el braclci« multo ao' gutuonbui, pedicellis longioribus, nrc nun pubrsceiia rt florum colorc diverst* — *Antirrhinum incamatmm* Lam. Diction, encycl. IV. J64. - *Linaria ineamt!* Spr. Sjii. vegat. II. 703. — *Antirrhinum taphirinum fi. ineamatum* Pen. Bncbir. II. IKJ. - Craacil in tabulosis Alfsrviar.
70. L. SAPPHIKIXA Uk. el Hffmotff. I. e. 1.9a% t. 42. - Cha%aones .l e t - **Poll.** linearib. plaaiia allaniis, surculorum lablancenUtis trrnis; raceno valde **elongato**, rbacbi pnbeteeate; calycis scgmenlis linearib. urutis pubasctnlib., corollae coa* raleae tobo fubeyliadrieo, labio infariori patenti - defleio, palato auraoUaco

punctulato, calcari gracill longo arcuato. O — Herba elegans pedalis v. semipedalis, parte florifera tantummodo pubescens. Rami cauliformes subsimplices, apice paullo flexuosi. Sorculi steriles numerosi decumbentes, foliis ternatis oh-siii. Racemus laxus, fructifer valde elongatus. Pedicelli capillacei, bracteola lineari triplo fere longiores, brevissime pilosi. Calycis segmenta capsula breviora. Corolla quam praecedentis minor, saturate coerulea, tubo paullulum elongato subcylindrico, lobis labii superioris oblongis angustis erectis, labio inferior! subdeflexo, lobis brevibus subaequalibus, palato ad faucem prominulo glabro aurantiaco fusco-punctato, calcari acutissimo. Capsula glabra globosa, dentibus sex dehiscens. Semina praecedentis. — Crescit in Lusitania prope Conimbricam et montibus Delia serra d'Arabida.

fl. Stylus apice incrassatus, tigmate submarginato (Chavannes I. c. 15. Og. 10*a.); *semina angulata subprumatica.*

71. L. ARMEMACA Chavannes I. c. 147. f — Glaberrima firma, supra bahin ramossissima: foil, allernis linearib. obtusis crassis; florib. laxe racemosis; calycis segmentis linearib. acutis; corollae coeruleae calcari praelongo arcuato. 2J? — Caulis fere pedalis strictus rigidus, basi nudus, infra medium ramosus, surculis aliquot accedentibus. Folia crassiuscula pollicaria. Pedicelli bractea minima acula eique adpressa triplo longiores. Segmenta calycina margine extremo seariosa glaberrima, capsula breviora. Corolla *L. Chalepensem* forma refer!, lobis labii superior! oblongo-linearib. erectis, labii inferioris ovato-oblongis deflexis, intermedio minor!, calcari gracill acuto, corolla multo longiore. Capsulae laxe racemosae ovato-globosae compressiusculae, apice dentibus 6 debiscentis. Semina magna subtriquetra curvula, testa nigra scrobiculata. — In Armenia.
72. L. CHALEPENSIS Mill. Diciion. (ed. 8.) no. 12. — Spr. Syst. vegetal. II. 703. — Rchb. Fl. Germ, excurs. 374. no. 2535. — Koch, Synops. fl. Germ, et Helv. (ed. 1.) 3S3. — Chavannes I. c. 148. t — Glaberrima: foil, lineari-lanceolalis aculis obsolete trinerviis, infimis verticillatis; racemis elongatis laxis flexuosis; laciniis calycis linearib. aculis paucis, capsula subrotunda compressa emarginala duplo majorib.; corolla alba, quandoq. obsolete coeruleo-striata, lobis ochroleucis; seminib. ovatis trigonis, transverse foveolato-rugosis. O — Herba elegans 1-1 Vipedulis, basi surculis pluriusculis; rami cauliformes 1-plures; folia 1-2-pollicaria, inferiora quaternaria quinquaria, superiora ternaria, surculorum breviora obtusiuscula, pleraque terna, interdum opposita. Pedicelli bractea linear! triplo breviores. Capsula denudata profundis dehiscentis. — *Oxyria alba* Lobel. Icon. 408. — *Linaria (lore albo* Riv. Monop. Irregul. i. 80. fig. 9. — *Linaria Chalepensis minor erecta, (lore albo, lineis violaceis* Moris. Oxon. Itiner. II. 302. sect. 5. L J5. Og. 0. — *Linaria annua angustifolia, flosculis albis longius caudalis* Triumph. Observ. 87. I. 87. fig. 2. — *Antirrhinum Oxyria* Cyrill. Plant, rarior. II. 22. I. 9. — *Antirrhinum Chalepense* Linn. Spec. plant. 850. — Sin. Flor. Graec. t. 50-2. — *Linaria alba* Mch. Method, plant. 521. — *Antirrhinum album* Lam. Fl. Franc. II. 545. — Crescit in Italia, Sicilia, Corsica, Isiria, Dalmatia, Gallia meridionali, in Syria, in insulis Cypro, Scio et in Peloponneso.
73. L. CANADENSIS Dum. Court. bot. cull (ed. 1.) II. 00. - Spr. I. c. 707. - Book. Bot. Magai. U 3473. - Chavannes I. c. 140. f - Foil, linearib. remotis glabris, plerisque alternis, surculorum simplicium oppositis v. ternis; nemo laxo gracili sursum attenuate; pedicellis bractea longiorib.; calycis segmentis aculis pubescentibus; corollae pallide violaceae labio inferior! deflexo, palato albo subdepresso, calcari subulato arcuato, longitudine corollae. O — Rami cauliformes subsimplices teretes glaberrimi graciles pedales et ultra. Folia semipollinaria v. pollicaria acuta. Flores pauci distantes nulantes. Filicilli filiformes, bractea linear! acula longiores pubescentes. Corolla fere pedalis calcari, 4-5 lin. longa. lobis labii superioris erectis ovato-oblongis, latius inferioris majoribus aequalibus, palato albescens. Capsula viliobosa calyce brevior, dentibus 6-8 panulis dehiscentibus (post dehiscentiam uti truncata). Semina parva prismatica-teiragoua v

- cuboidea late sulcata fusca, ulrinque Irancata. — *Linaria caule simplici, floribus violaceis, foliis Lini* Clayl. no. 256. ex Gronov. Flor. Virgin. 98. — *Antirrhinum Canadense* Linn. Spec. pi. 861. — Vent, Hort. Cels. t. 49. — *Antirrhinum pauciflorum* Poeppig lib. — Crescit in America boreali, in Montevideo Brasiliae, in Chili et in Peruvia.
74. L. PURPUREA Mill. I. c. no. 5. - Spr. I. c. 794. — Rchb. Flor. Germ. excurs. 374. no. 2537. — Chavannes I. c. 150. f — *Glaberrima ramosa erecta: foil, linearib. et linearib. lanceolatis, inferiorib. et surculorum 4-9 verticillalis, superiorib. ternis oppositis v. aliernis; racemo elongato; calycis segmentis linearib. acutis subpatentib.; corollae purpureo-coeruleae labio superiore abbreviato, calcarum arcuato corollae longiludine. 2}. — Collum tumefactum lignescens, ramosa emittens plerumque plures fructus nilidog 2-4-pedales, infra purpureo-virescentes. Ramuli namerosi folios!. Folia omoia glaberrima glaucescentia acuta, pollicaria et ultra, 1-2 lin. lala, folia ramalorum breviora, juniora fasciculata. Pedicel I i sacpe 2-3 approximali bractea longiores tereles glaucescentes. Galycis obliqui segmenta per capsulae maturationem reflexa. Corolla (adjecto calcarum) 4-5 lin. longa, labio superiori abbreviato erecto, inferior! palente, subtus pallide griseo, palalo conico magno profunde sulcato, margine pilis albis barbato, tubo paradeliter purpureo-striato, calcarum acuto subcylindrico. Capsula globosa com pressiuscula, apice emarginata. Semioia majuscula subprismatica, testa transverse corrugato-rugosa nigra. — Crescit in Eoropa australi (Italia, Graecia).*
75. L. NIVEA Boiss. et Reut. Diagnos. plantar. novar. Hispanic. 22. no. 41. — Perennis: caule glabro crasso erecto, parte superiori paniculatim ramoso; ramis virgatis; foil, glaberrimis linearib. lanceolatis acutis aliernis sublinariis; floribus numerosissimis in racemos breves dispositis; sepalis obliquis glanduloso-puberulis; corolla alba pallide violaceo-liliala, palalo albo dense longeque barbato, calcarum lubum corollinum aequitale; seminibus minimis prismatico-angularibus tuberculatis. 3} — *Polichorima* planta, floribus copiosissimis niveis lalos tractus ornans. *L. striatae* proxima, quae tamen abundantius differt: foliis multo angustioribus linearibus uninerviis, calycis laciniis acutis glaberrimis, floribus dimidio minoribus, calcarum corolla mollo breviora, palalo lacteo breviter parceque (nec longe et copiose) barbato, capsulis multo minoribus (nec ut in hac *Pisum subaequantibus*) globosis (nec ovalis), seminibus ejusdem formae sed triplo majoribus. — Crescit in Hispania (in regione montana superiori Sierra da Guadarrama et in montibus de Toledo et de Avila).
76. L. STRIATA DC. Fl. Franc III. 586. - Spr. I. c. 795. — Rchb. Fl. Germ. exctfrs. 374. no. 2536. - Koch, Synops. fl. Germ. (ed. I.) 522. — Chavannes I. c. 152. f — Tota glabra: foil, angustis lanceolatis linearibus uninerviis v. obsolete trinerviis acutis, inferioribus verticillatis, superioribus sparsis; racemis laxis; calycis laciniis lanceolatis acutis capsula brevioribus; corolla cinerascens-alba v. coerulea, striis violaceis perennis; seminibus ovatis trigonis apertis, rugis anastomosatis. Impresso-punctatis, acutis Impunctatis. 2}. — Rami cauliformes pedales et olia simplicibus, ramulosis, surculis decumbentibus foliosis acutis. Folia 1-2-pollicaria saepe glaucescentia, ilia surculorum breviora latioraque 3-4-5-na verticillata. Racemi laxiusculi Oores mine odori, ounc inodori. Bractea lineares, inferius pedicellis longiores. Corolla (riccio calcarum) 4-5 lin. longa violaceo-striata, labio superiori profunde bifido erecto, lobis subovalis, inferioribus palentibus, lobis lateralibus paullo reflexis, in medio mullo minoribus, palalo luto barbato valdeque prominente, calcarum corolla mollo breviora, interdum subevanido. Capsula subglobosa, apice talvulis 6 dehiscens, valvulis saepe bifidis. — *Antirrhinum repens* Linn. Spec. plant. 854. — *Antirrhinum striatum* Lam. Fl. Franc. II. 343. - *Linaria tricolor* Loraem. Hort. t. 172. ex Rchb. Plant. c. 172. fig. 610. — *Antirrhinum purpureum* Sebkohr, Hndbch. t. 172. — *Linaria decumbens* Mnch. Method. plant. 523. - *Orontium mpinum* Villem. PhyU I. 408.
- fi. Mompesimmm*: Foil, angustis, plerisque aliernis confertis erectis; palalo striato simplicibus. - *Linaria odorata Montpeulana* J. fiaub. Histor. plant 450. —

Ltnarxa capitaceo folio odora C. Baud. Pinx. 213 — *Ltnarta caryophyllata* Gam. Hort. 90. — *Ltnarta angustifolia flore cinereo tinale* Dill. Hort. Ellham 198. t. 103. Gg. 197. — *Antirrhinum Montpestulanum* Linn. Spec. plantar. 854. — *Antirrhinum repens* O. Fontpettulanum Pers. Enchmd. 11 100 (exel sijn Lam.) — *Ltnarta Montpetsulana* Dum. Cours. boi. cult. (ed 1.) 11. 95.

y. *trtttt* Foil, rigidulis tnquetns, dorso acatiuscule cannalis, facie canaliculalis, corollae palato flavo, utroq labio sordide albo violaceo-livato.

d *gahoides* Planta simplex v apicc ramulosa, Toll. 4-6 verticillalis., verticillis nunc distantib. nunc approximalis — *Antirrhinum gahoides* Lam. Encycl. meli. IV J51 — Crescit in Dalmalia, Helveia, Gallia australi, in Pyrenaeis et in Mauritania

77. L. BOISSIEU Wlprs. mss. — Annu aut biennis* surculis stenlib. nullis, caulibus numerosis ramosissimis; ramis glabris inlucis; foil alteris parvis linearibus. oblatis, parce hirsutis aut glabris, floribus subsessilib., secus ramum laxissime spicati*, terminibus congestis; calycis breviter glandulosi lacinis brevibus oblongis acutis, superiore longiore, corollae flavae labio superiori brevissime bifido, inferiori breviter irifido, lobis obtusis, calcaribus incurvis corolla brevioribus, seminibus minutis acutis, sub lente tuberculatis*. O? *cfi* ~ Kami cauliformes numerosissimi teretes glabri quadripollicares v. semipedales Folia (inflata aliquando qualerna) 4 lin. v. pollicem usque longa Spicae primum subcapitatae, dein elongatae laxissimae 1-2-pollicares, flonibus inferioribus remolibus, superioribus semper in capitulum confertis. Pedicelli primum vix lineam longi, demum elongati, sed calyce semper breviores, sub lente subglandulosi Corolla glabra, magnum L. *glaucae*, palatum glabrum. Capsula ovalis, breviter glandulosa, apice dentibus 0 dehiscens. — *L. ramosissima* Boiss Voyage bot dans le midi de l'Esp. p. 457 t (nec alior.)

0. *glutnosa* Boiss I. c — Caulis abbreviatus 3-4-pollicares dense foliosus, parlo flonifera densius glanduloso-pubescentes. Folia breviora glaucescentia — In Hispania (circa Matritum), var. 0 in arcibus Lusitanae trans Tagum.

78. L. GORIFOLIA Desf Cor. institut. Tournef. 32. t. 22. - Ghavannes I. c. 153. f — Glaberrima foil, linearibus-subulatis alteris, surculorum subverticillatis, floribus racemosis breviter pedicellatis; calycis segmentis linearibus acutis; corolla ex albidis violacea, lobis linearibus superioribus angustatis, calcaribus rectis brevis. 2]. — Rami cauliformes simplices pedales v. sesquipedales, basi surculis sterilibus aucti Folia angusta 4-8 lin longa conferta sparsa, folia superiora breviora latioraque 4-0-na verticillata. Bracteolae parvae, pedicello breviter adpressae. Corolla magnum L. *purpureae*, labio superiori erecto profunde bilobo, lobis superioribus acutis, labio inferiori abbreviato, lobis superioribus palato glabrescens, calcaribus aculis gracilibus Capsula . . . — Crescit in Asia minor I.

Y- *Stylus apterocrassus, stigmatum tuberculatum; temna ducoidea, marginata thata* (Ghavannes I. c. t. 5. lig. JO)

79. L. PELISSERIAISA DC Fl Franc. III 589. - Spr. Syst veget II. 795. - Rchb Fl. Germ excurs. J75. DO 2547. — Koch, Synops. fl. Germ. (ed. 1.) 522. — Ghavannei I. c. 154. f — Tota glabra: foil, linearibus., utriusque attenuatis, inferioribus quaternis, caulium internodiis ellipticis; racemis pedunculatis capitis, demum elongatis; calycis lacinis e basi latiori attenuatis acutis, capsula duplo longioribus; corolla dilute caerulea, venis tataribus., palato albo, lobis superioribus caeruleis, calcaribus corolla dimidia brevioribus. O — Rami cauliformes teretes simplices, surculis aliquot stenlibus aucti. Folia semipollicaria et ultra, superiora sparsa, caulium internodiis breviora latioraque semper verticillata magisque approximata Bracteolae parvae acutis, pedicello longioribus (corolla adjecto calcaribus) 0-9 lin longa, lobis linearibus superioribus erectis elongatis acutis (capsula lateribus!, alio sulcata, apice emarginata, utriusque carpellis cohaerentibus, denibus 0 dehiscens. semina discoidia come-conca, ciliis* longitudine aequalibus radiis divergentibus marginibus toto ciliata — *Ltnarta caerulea intorta*

Lob. Illustr. 103. — *Linaria coerulea cakaribui longis* J. Bauh. Hislor. III. 401. — Buxb. Centur. I. U 25. 6g. S. — *Linaria annua purpureo-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus* Magn. Monsp. 150. — *Chamaelinaria violacea* Barrel. Icon. 1162. — *Linaria tenuius ipanophylla Tithymali cyparistii folio, flore purpureo* Cup. Pamph. Sicul. I. t. 229. — (Raf. L 101. fig. 1.) — *Antirrhinum Pe-Usserianum* Lion. Spec, plant 855. — Siblbrp. et 8m. Flor. Graec. L 501.

? *gracilis*: Plantula simplex gracillima: florib. mioorib. laele coeruleis. — *Antirrhinum graeile* Pen. Enchirid. II. 156. — Creicil in Syria, circa urbem Byzantium, in Graecia, in Italia meridionali, in Istria, Dalmatia, in Galloprovincia, in Pyrenaeis.

-]. 4. *Folia glaberrima linearia Kneari-oblonga vel sublanceolata, inferiora verticiUala, superiora alterna. Floret minimi, apice ramorum saepe subcapitati, corolla (adjecto ealeari) vix ultra ires lineas Umga. — Herbae erectae.*

a. *Calyx glaber. Semina ovoidea vel oblonga.*

80. L. MIINTIFLORA C. A. Meyer, Verzeichn. der Pflnzn. am Caocas. ISO. — Cbavannes I. c. 159. — Annu glaberrima glauca: foil, oblongis acutiusculis verticil-latis sparsisq.; florib. subspicalis; laciniif calycinis lineari-oblongis acutiusculis, corolla (flavescente) exigua vix breviorib.; ealeari brevit ilmo conico recto; seminib, oblongis impresso-punclatis. O — Crescit in Caacaso prope orbem Baku.
81. L. (ANTIRRHINUM Sm. Prodr. fl. Graec. I. 43i - Sibtbrp. el 8m. Flor. Graec t 586.) ALBIFRONS Spr. SysU TegeL II. 7KL — Cbavannes I. c. 156.* f — Glauca: foil, sublanceolalis, inferiorib. ternis ?. qnaternis, snperiorib. alternis; florib. subcapitalis; segmentis calycinis lineari-oblongis obtusis; corollae atbescenit;?) ealeari brevissimo eunulo. 0 — Ram! caollfonnes semipedalea Y. pedalet erecii T. ascendentes smplicet *. aplee parce ramoloi. Folia lanceolata T. oblongo-lanceolata saporata polliarfa, 3-4 Ho. lala. Bractee lineari-oblongae pedicello longiores. Segmenta calycina capialam vix soperantia oblusa v. acutiascula glaberrima. Corolla calyce parom longior. Capiula globosa, apice vaWnlis 0 debiscem. Semina oblique ovoidea, testa nigrescente, tenue alveolata. — Cre>cii In insult Rbodo et in GraecU.

fi. *Calyx pubescens. Semina discoid** marginata, disco laeti.*

82. I. MICRASTIA Spr. S)it. veget II. 704. - Cbavannes I. c. 156. t - Glauca: foil, infrnorib. oblongo-lanceolatii ternif et qualrrnis, tuperiorib. allernis; florib. spicalo-racemosU; calycis segmentit linear! -spathulatii cilialit; corollae coeruleae calrari incunro. Q — Rami cauliformet 4-10-pollicaret tereles glauci virgati, turcolit slerilibns inierdum ad basin ioslrucli. Folia inferior! pleraque terna sabinnervia glaaescettlia poUicaiia, S-4 liau lala, superiora brctiora anguttiora acou alters*. Floret mJalal p«4letllali, p«dlcellis bractra longioribaff raccaio post anlbesla Taltdt ttoafalo. Caljels laclniae gl«odulo»o.puhftrfOtes capsala broiorrt. Corolla (adjecto ealeari) fix sesquilinram longa lirte cofrulra, palalo albicaioe. Captula subglobosa glabra, valvalis 0 profundp uretii debitceos* Srmmi oomerota sobreniformia compretta, late membranaceo-manrtnaia. — *Antirrhinum micrmlkmm* Civao. Icon. pi. rar. I. 51. t 50. Ag. X — Sibtbrp. ** 8m. Flor. Grate, t. 5r7. - *Limaris parrijlorm* Difont Flor. Ailaot. II. 44. t. 137. — Spr. I. c. II. 7KL — *Antirrhinum parri/tomm* Willd. Spec. planL III. 245. - l« m il Isjuellia in Hitpama, tNirdima, Cornea, Algeria, in in»ula Rbodo, in t)ri«t«
- * Is rtfionibuf Caucaicis prope Baku rrrtriL

- 81 L. ARY1N8I8 tHt. Fl. AUant II. 41 - Spr. I c. 79f. Rrhb. Fl. firm, ~~oscura~~ 374. oo. tMI ~ Kocb. SyioB*. fl. Gem. M Helv. ed. 1. ML - Cbatanoes I. ** 157. f — Glabra: calycib. t^dieeHitq. gUodaloto-pilotu; foil. Imearib., bat* apiceq. aueouaila, inforionb. qoaleraut; rae««iit pedunculatis capiuiit, teri«i •longaUs; UciailU calycinit Imearib. obtuslusculis, iaferlonb. eaptula obovaU ioiegra breviorib.; corolla pana dilute coerulea unit MtaraUoribot nouu,

paucis albidis subulter Ylanceo-reticulato, calcari cinnulo; seminibus planis, alba
 lata orbiculari cinctis glabris. Q — Herba maxime varians pro regionis et soli
 natura nunc simplex, nonne ramulis instructa, apice tantum pubescens, surculis
 aliquot decumbentibus donata. Folia linearia crassiuscula tempollicaria T. polli-
 caria erecta (in regionibus calidioribus) T. reflexa, infra 4-0 verticillata, supra
 plerumque allerna breviora. Folia surculorum parva 3-4-5-na. Flores pauci,
 racemum brevissimum efformantes, racemo demum elongato. Rhachis, pedicelli
 calycesque brevissime glanduloso-pubescentes. Bractee parvae obtusae, pe-
 dicelle fructifero vix breviores. Corolla minima, lobis labii superioris erectis,
 inferioribus palenibus subaequalibus, palato prominente glabrescente; calcari gra-
 cili corolla brevior. Capsula ovum respectu magna glaberrima, valvulis 6 li-
 neari-oblongis acutiusculis ad basin productis debiscens. — *Linaria arcentis*
coerulea C. Bauh. Pinx. 213. — Dill. Hort. Elibam. 100. t. 163. fig. 106. —
Antirrhinum arvense a. Linn. Spec. plant. 855. — Schkuhr, Handbch. t. 172. —
Linaria carnota Mch. Method. plant. 523.

fi. simplex: Florib. tuberculatis; corolla lutea, interdum interius violaceis ele-
 ganter notata, paulo majore quam in typo, calcari saepe recto donata. —
Linaria altera Moravica Clut. Hist. 321. ic. — *Linaria luca parva annua*
J. Bauh. Hist. III. 457. — *Linaria pumila folii* eamosis, flosculis minimi**
lavis C. Bauh. Pinx. 213. — *Linaria Mraphica luca miner* Col. Keph. 280.
 300. (ic bona). — *Linaria fraphica tenuifolia* Moris. Oxon. Hist. I. part II.
 400. sect. f. — *Linaria ortensis tulta parva, bracteis calcari, Umiflorum glamea* Cup.
 Pamph. Scul. II. t. 150, Raf. U 102. Og. 2. — *Antirrhinum arvense fi. r* Lino.
 I. c. — Sm. et Sibth. Flor. Graec. t. 500. — *Antirrhinum parviflorum* Jcq.
 Icon. plant. rar. U 400. — *Antirrhinum simplex* Willd. Spec. plant. III. 243. —
Linaria arvensis a. Dsf. Fl. All. II. 45. — *Linaria simplex* DC. Flor. Franc.
 III. 588. — Spr. Syst. veget. II. 705. — Rchb. Fl. Germ. excurs. 375. no. 2544.
 — Koch, Synops. fl. Germ. (ed. 1) 522. — Crecit in antris et fabulosis Euro-
 pae totius, praesertim australioribus, in Barbaria et in Orient*.

f. 5. *Folia angusta linearia, linearilanceolata seu tubulaceolata parvula,*
inferiora saepius quaterna, superiora distirna. Floret ad summilates
ramorum plerumque capitato-racemosi pauci, bracteis saepe simplicibus dif-
foxiis. — *Herbae vulgo procumbentes et diffusae, ramis cauliformibus*
numerosis donatae.

a. *Semina discoidia (disco latti), margins membranaceo late einda.*

84. L. MARGINATA Desf. Act. soc. Paris. L. 3ft. L. 7., Flor. Atlant. II. 45. — Spr.
 I. c. 70J. — Chatanne I. c. 150. f. — Glabra: foliis linearilanceolatis linearibus
 glaucis, imbricatis, caulis alternis; bracteis deflexis; calycis segmentis
 linearilanceolatis subacutis glaberrimis; corolla luteo-ferruginea striata, palato
 bimaculato, calcari corolla longiore. — Basi cauliformes pedales et ultra de-
 umbentes, paniculatis ramulosis. Folia inferiora 4-0 verticillata crassiuscula
 obtusa, pollicaria v. tetrapollicaria, 1-3 lin. Uta, superiora allerna subacua.
 Floret brevissime pedicellatis, bracteis pedicellos subaequantibus deflexis. Caly-
 cels segmentis linearilanceolatis, supra medium ampliatum. Corolla magnitudine
 linearilanceolata luteo-ferruginea, palato margine interiori albido-barbato, apice
 maculis duabus atro-purpureis notatis, calcari subulter aequalibus recto v. levi-
 ter curvato. Capsula globosa calycis longior. Semina margine binae conrato,
 illinc convexo, et uti cosuto cinco. — *Antirrhinum marginatum* Lam. Kncyrl.
 meih. IV. 355. — Crescit in fissuris rupum Atlantis prope Tlemien.

85. L. TRISTIS Mill. Icon. II. 3. t. 166. — Spr. I. c. 704. — Chatanne I. c. 150. t. —
 Glauca, apice tantum pubescentibus foliis linearibus et linearilanceolatis oblongis
 inferioribus qualernis et ternis, superioribus oppositis et alternis; floribus
 approximatis, interdum suboppositis; bracteis deflexis; calycis segmentis
 linearilanceolatis obtusis; corollae (colore lotae) interius luteae calcari crasso

sinalo, basi arcualo, earn subaequante ⤵ — Herba 8-10-pollicaria, ramis decumbentibus diffusis Folia pollicana, glabemma glauca crassiuscula Bracieae basi angustatae, pedicellis brevissimis longiores Calycis segmenta bracleis similia, demum ampliata, supremo majon Corolla magmludine / *tulgam*, lobi* labn sopenons ellipticis erectis virescentibus, labn mferions broibus rolundaiis subaequahbus, palato amplo, basi fusco v lutco, apice citrino barbalo (apsula globosa glabra >i\ calyce major Semina mgre*centia — *Itnarta Intht Ilispantca* Dill Horl Ellh 901. t 354 fig 800 — *Linana iupantca procumbent* Marl Hisl plant rar dec 35 Og 2. — *Antirrhinum trute* Lino 8)si tegel 405

/? *tenutfoha* Foil angustissimis, flonb confertis paullo minonb , corolla inter dura purparatente. — *Lnana Utsamca altera* Clus HisL J20 — *Lnana tenutfolta aerugimm coloru* C Baub Pini. 212. — *Anhrhimum aerugineum* Goao. Illaatr. 38. — Cretcil in Hitpama prope urbem Geber-Allan.

- 86 L. PLATYCALTX Bolta. Voyage boL dana le midl de l'Esp. 450 no. 1947. j t 130 — Glabemma cauhb proslralis simpheib aul parce ramosis, foil carnosis glaurescentib lernatis ovalo-ellipticis acutis flonb paucis laxe spicaiis, pedunculo calyce paullo longiore, lacinnis caljcims ovalis palulis inaequalib , corollae luicae labio superiori lateraliter plicato bilobo, lobis obtuswimis, inferiore breviter tnlobo, lobis subemargioalis, calcari incunro aculo corollam acquante, «emimb valde conceits laevib. late marginal is. 2]. — Rami cauliformes numerosissimi semipedalet simplicet T. supra ramuloti. Folia tuprema opposiia Flores termioales 1-4 lamsime spicali Calycis glabemmi glaucMceniiis lacimae carno^ae palulae oalae aculae enenres, dimidiam corollam eicedenie» Corolla Iqica glabemma magmladine *L. vuigaru*, Itbium tuperum infenon brevius, nd quart am pariem usque bilobom, labium inferam inteosias luleum, fere aunn-Uacum Palaium profunde salcalum valde prominulum. Fauis inloa linein 2 aurauaco-falrU perenna. Calear remote Dlgro-slriatam. Capsula ovaia biloba gl a acescent, calyce brevior, val? It 0 debltcens. Semina magna nigrescencia valde concava plana, I ale albido-marginala laeviasima. — In Ilispama in umbro<if regions alpinae herrama de Ronda prope Graialema en el ferro de San (nslo\al
- 87 L. SLPI>A Dsfont Flor AllanU II 44 — Spr. I c 70S Rchb Flor derm eicure 375 no 2M5. — Chavannes I c 101 | — Diffuse procumbent \ ascendens foil linearib oblois, i off north qualernis el quinis, ^nperionh alicrnn, caljcis «rgmenlis linearib seu linean-subspalbulalH pube<ceniiib corolla fla^a, palalo saepe bipunctato, calcari corollae longiluilme, stm* undi-mgrescentib notalo, lobo inlmedio labn infenorif subinciso ^ . — Herba 4-10-poUi<*an*» habitu, pube^renlia florumque magmludine el colore admodum %ariaim Raml cauhformes diffusi ramuloti, tub racemo nodi Folia 5-ft ho longa glauco-hnearia, soperiora magis dislanlia breviora Bracieae defleiae llineari-oblongae acuiiq<culae vli pedkello loafloret. Calyeit segmeota brevi»»im<* glanduloso-pilota Corolla aaeplat magoiUMliae *L. 9ml\$mril*, labio topenon rloncaio **erecto**, lobis anguMi* aplice retaodalla, labio iaieriorl brtviorl, palato \alde **prominente** solcaio cilrino, albido-barbalo, calcari aculo dilute purpura<renie %tnaio I apsula obovato-globosa Senina late conveique marginaia O<yru flora ffl-rrttru Lob Icon 110. — her Hist 553 ic — *Itmana U\$spamtra quimla* (Jo* Ilinior I 121 iron — *Qtt/rtt minor* Tabern krautrrbrh KZ7 \c mali It* *mana iutea parr** trrprms J. Baub Ilislor III 4)7 *Itmarta pumila tup**** *Imtea* (Baud Pint ill *itmana pumila Hispamrn* pjr k Theair 400 ie. — *Amitrrkimm* *mp*mmm I inn »»prc plant *VJ — Mblhrp rl Sm *rl drarr I 50. — *Ummrta fUfermu* Mncb Method pi HJ *inhnkimm* *btpumrlalmm* Thuill Fl Paris (ed i.) JII nee alior *AmUrrhimum itmpies* I ok in Srbrad ^eu<< Jour\$||| aoa - /iN<rtf *ThmMten* Mrrai. H Pan. ed 3. II 1<- Crescil per toum Irre Eoropam aosiraleai, preeactim aostrali-occidentalem, *l *n Africa boreali

fi *Pyr**S4** D<by, Bol. Gallic I 345. - tbavanne* I c 101 - Foil, **feriorib Imeari-laaeeoUua, ramis apice ralycibq fftaaduloto-pilo>is. flerib. majonbos

- *Antirrhinum dubium* Vill. Fl. Daupb. II. 437. — *Antirrhinum tupinum* fi. 7. Lapejr. Abr. Pyren. 352. — *Antirrhinum glaucum* Lapeyr. I. c. (nee alior.) — *Antirrhinum verticolor* Lapcjr. I. c. — *Antirrhinum Pyrenaicum* Ramond mss. ei Pers Enchirid. II. 150. — *Linaria Pyrenaica* DC. Fl. Franc. III. 587., 1c. rar. pi. Gall. I. t. II. — Spr. I. c. 704. — Gretcit in Pyrenaeis.
- T. maritima* Duby I. c. — Chavannes I. c. — Foil, plerisq. vertieillalis; segmen-
Us calycinis ovato-oblongis, capsula multo brevionbui*. — *Linaria maritima*
DC. Fl. Fr. V. 408., 1c. pi. rar. Gall. I. t. 12. (nee Rchb.) — *Antirrhinum ma-
ril mum* Poir. Diet, encycl. Suppl. IV. 23. — In arenosis manlimis Armo-
raciae crescit.
- d. glaucophylla* Chatannes I. c. 162. — Foil, lineari-ianceolalis glaucis, infe-
norib. qualerms; corolla albida, palato flavo. — *Unarm glaucophylla* LnW. et
Hffmnsgg. Fl. Porlug. I. 250. I. 46. — Crescit in Lusilama.
- s. Hfevadensis* Boiss. Voyage bot. dans le midi de l'Esp. 461. no. 1240. — Caules
numerosi procumbentes 2-6-pollicares, superne piloso-glandulosi. Folia
subsecunda hnearia acuta glaucescentia, inflma qualernala, supenora oppo-
sila aui alleraa. Flores subcapilali, Illia formae vulgaris paallo minores.
Calcar corollam subaequans. Semlna convexiuscula lale margmata, olnnque
sab lenie tuberculosa. — lo Hlspanlae Sierra Nevada.
- C- oblongifolia* Boiss. I. c — Caules erecti sobsemipedales. Folia quaternala
oblooga acuta. Flores aabeapltali quam fill far. c. majores. Galear corollam
aequaos. <*6emlna nlgra laevisslma, margne lato albo convexo cincia. — In
regione montana prope Alequera in Hispania.
- i). glauca* Boiss. I. c. — Gaules numerosi erecii 3-4-pollicares. Folia glauces-
centia qualerna oblongo-lanceolala acula, 2-3 lin. lala, semipollirana. Flores
lulei, cis formae vulgans minores, in spicam primum subcapii.iam, dein
elongalam laxam di»posili. Calcar corollam subaequans. Semina pana mitra
valde convexa laemsuna, late albo-marginala. — Creicit in amiosis raariu-
mis Hispaniae australd
- d. mim'fia* Boiss. |. c. — Caules 1-2-pollicares. Folia linearia qualernala aul
alterna. Spicac pauciOorae capitatae, dein elongatae. Flores flavi, eis /.. *al-
pinae* minores. Calcar corollam laeplua superans. Semina pana nigra lae-
vissima valde conveia laleque albo-marginata. — la Hlspaoiae Sierra de
Toloi crescit.
88. L. VERTICILLATA Boiss. Voyage bot dans la nidi de l'Bap. 409. no. 1«0. f
I. 138r Og. A. - Tola lomentella visclda: radlca paraool eaaapllloaa; eaulib. dif-
rusi» subtimpiirib. roliosis; foil, quaiernallm qolaailmve vartlelllatla ellipiicis aul
lanceolatist jculi*; florib. in antbesi subsatsillb., la aplcaa breves lermlnalet
pauciOoras suhcapilalas disposals; laciniis calyclnlnt lancaolalo-spalbulalls, su-
periori majori; rorollac pallide luteae labio superior! bilobo, lobls oblongis ob-
tusis lalcrallier plicalis, infenon bilobo, lobis rolundalis rormculalis, mlermedio
miuon, calcari incurvo corollam buperante; seminib. convens mgris laevib. albo-
margmatis. ^ — Collum vesigiis caulium aotiquorum vesillum, adeos caespiies
dansisslmos. Caules diffusi iripollicares v. semipedales aaapa simplicei, raro
apicem versus ramosi, lou loogiludine pilis cryalalliais lomenlelli. Folia so-
prama alleraa, omnia ulrinqua lomaolalla viacidula, semlpolticaria el ultra, 1-3
lln. lala. Floret 4-5 in spiculam damum subelongaum disposlii, padleallla vis-
cldls, bractea spathulata brevioribus. Calyi lomentello-viscidus capsula paullo
% broior. Corolla pallide Oavo-virens, stills loagiludiaalibus nigresceniibus per-
cursa, labium inferus intenslus coloratum, palato auranliaco profunde sulrato,
fauce inius auranliaco-veluina. Capsula ovato-didyma glabrescens, «ahulis 0
obtusmsculis basin u\que finsa. — I. *taxat\Ut* Boiss. mas. (olim). — Crescil in fis-
sunt» rupiuin umbrosarum regions alpinac in Hltpamae Sierra Nevada en la D«-
besa do San (icronimo).
80. L. ALPINA DC. Flor. Fraoc. III. 000. - Spr. I. c. 704. - Loddig. Bot Cabin.
t. 415. - Rchb Flor. Germ, eicurs. 374. no. 2X& Sinn. Flor. Deulscäl. Hit 51.

ic. aen. — Koch, Synops. fl. Germ. (ed. 1.) 921. — Chavannes I. c. 102. f — Glaberrima glauca diffusa: foil, qualernis linearib. v. lineari-lanceolatis crassiusculis, basi allenuatis; racemis ovatis brevib.; calycis lacioiis lanceolati* acutis, capsula obovald apice integra breviorib.; cnrollae pulcbre violaccae v. purpureo-coeruleae (v. imo rarius albae) gibbis palati croceis, calcari corollam aequante, nunc recto, nunc incurvo; semioib. planis ala orbicular! cinclis glabris. Q — Rami cauliformes crebri diffusi sabcaespilosi, saepe simplices, proslrati. Folia crassiuscula glaaca 3-5 lin. longa, saepe eodem latere dejecta et quasi unilateralia, inferiora laliora, oonDumqaam elliptica seu oblonga obtusa, suprema interdem alleroa. Bracteae lineari-subulatae, pedicello breviores. Calyx prof no - dissime quinquepartilus, segmenlis quasi liberis. Corolla (abjecto calcari) 6-0 lin. looga pulcherrima, saepe pallido violaceo, palalo albo, labio superiori erecto profunde bilobo, inferiori patent*, lobia rotondatia aabaequalibus, calcari conico aculo, plenimque recto. Capsula ovato-globosa calyee brevior valvolis 0 ad basin usque productis dehiscens. — *Otyrit purpureo-coerulea repent* Lob. Slirp. adr. nov. 170. — *Linaria Pannonica altera* Clus., Pann. JOO., Tabern. Kriiutrbch. 1208. ic. — *Linaria tertia Slyriaea* Clus. Hist I. 322. — *Linaria coendea rep ens* et *L. quadrifolia tupina* C. Baub. Pinx. 213. — *Linaria quadrifolia coervlea procumbent* Moris. Oxon. Histor. II. Ml. sect. 5. I 13. flg. 10. — *Linaria minor lore eoeruleo* Marget, Pfarm. II. 507. 1.15. — *Antirrhinum alpinum* Linn. Spec. plant 850. - Jcq. Fl. Austriac. I. L 58. — BoU Magax. L 905. (nee 907.)

fl. erecta: Ramif cauliformib. erectis; foil, angustiorib. et flMgis distantib.; flora saepe pallide colorato. — Creict in alpbos Helvetiae, Ilaliae meridionalis, Transylvaniae, Galliae et in Pyrenaeis.

fl. Stmina nwiformia & m — flow, *Urta rugosa* «crod*cnlstova.

00. L. (ANTIKRHimTM Fonk. Fl. Aeg. Arab. 111. - Pert. Enchlid. II. 150.) HAE-LAVA Chavannes I. c 101 t — Dfffuta glaucescens ramulosa: foil, linearib. erassiusculis, inferiorib. tern'ls et quaterais, superiorib. alternis; florib. breviter pedicellatis; bracteis deflexis; calycis segmentis oblongis acutiusculis ciliatis, demum ampliatis; corolla sulphorea T. eoeruleo-?iolacea, paUto croceo v. aurautiaco, calcari recto corolla longiori eaque pallidiore. Q — Rami cauliformes diffusi procumbentes v. ascendentes, 3-6-pollicares, striati glaberrimi ramulnsi. Folia semipollicaria T. pollicaria. Bracleae minimae ovato-laoceolalae, pedicello breviores, aculiusculae ciliolalae. Flores 9-4 in apice ramulorum conferti, pedicellii birtellis. Segmenla, calycina tubo corollino adpressa eoque breviora. Corolla (adjecto calcari) 0-8 lineas longa, lobia labii superioris crrectis brevibus oblongo-ovalis, labii inferioris rotandatis abbrevkatis subaequalibus, palato amplo breirissime barbalo, calcari sobulalo acutissimo. Capsula subovata calycis longitudine glaberriBM, deotiboa 0 dehiscent. Seaina minima rfoiformia, tesU grisea, tenuisaima scrobicolaU. — Greait in desertis Aegypti prope Alexandrian et Kahiram.

01. L. LAXIFLOBA Dsf. Flor. AllanL II. 45. t 138. — Spr. I. c. 704. - Chavansel I. c. 105. f — Glabra decumbent v. ascendent: foil, linearib. glauris, iron q»a-ternit, caeteris alternis; Oorib. longe pedieellatit; bracteit defleiiit pedicello multum breviorib.; calycis segmenlis nvalo-lanceolatit; corolla pallide coerulea v. albida, labio superiori elongato, calcari recto corolla fere duplo loniiorc 0*" §Umi cauliformes simplices, saepe bati decumbentes 4-6-po||irare«. »urrull» ali-jr ej«ot a«eti ad basin. Folia semipollicaria, tuppriora magi* di»untia acutiua^rula. ^' O a n pwnolae syblmeare* pedicrlllo triplo breviorom. SegmrnU ralynna bre-*I«t aiafgwe submembraDaeaa. Corolla magmtudine *L mlptmae*, lobit labii su« perloria erectia angvsUs aeotis, laferioris abbrttiatU >obaequalibu«, palalo ad faoem amplo VIIIOMUO. Capsala globosa lateraliler valde sulcau, calycis longi-Iodise, denUbM 0 tfeAiAcMS. Stamina parvoia angolata, teaU rogvloaa. - ~~ca~~ I circa Algeriam.

- r- Semina oblique ova* Ua, bañ attenuaia, hinc convexa, Mine concato, margine brevi eineta, testa laevi eeu tubereulit intructa. (Chavannes I. c. I. 5. fig. 35.)
02. L. CANDOLLEI Chavannes I. c. 165. t — Viscoso-pubesccns procumbens v. ascendena: foil, oblongo-lanceolalis v. ovato-lanceolalis subacuii*, imis ternwquaternisve, caeleris alternis oppositisq.; florib. paacis capiiaio-subracemosis; calycis segmenlis ovalis subaculis; corolla lutea breviter calcarata, palato bipunctaio, lobis labii superioris oblusis. O — Herbula 3-5-pollfcaris: rami cauliformes plures simplices, basi glaberrimi fereque apbylli, apice pubescentes foliosiqoe. Folia parvula 2-3-linearia, lineam laia, crassiuicula erecta sobpubesceolia. Flo* res 2-3 ad apices ramorum in axillis foliorum superiorum congesli, pedicelli* brevissimis, raceroo deroum elongalo. Corolla (adjecto calcari recto et acnio) 3-4 lin. longa, lobis labii superioris oblusis ereclis, labii inferioris brevi bus rotundalis, intermedio breviori. Capsula ovalo-truncata subpubescens calycis longitudine, valvulis 4-0 apice deblacens. Semina numerosa, tesia nigra laevi. — *Linaria taxatili* DC. Fl. Franc. III. 590. V. 400., Ic pi. rar. Gall. 5. t. 13. (nee alior.) — Crescil ad liitor.i Galliae occideoUlis el Armoraciae.
03. L. ARENARIA DC. Flot. Franc. V. 400., Ic. pi. rar. Gall. 1.15. t. 14. - Spr. 1. c. 704. — Chavannes I. e. 160. f — Viscoso-pubesccns ramulosissitna: foil, inferiorib. quaternis obloogis obinsls, superjorib. plerisq. alternis linear!-lanceolati* acutis; florib. pauoissimts racemoso-ça pi tails; racemo demum valde elongato; calycis segmenlla lanceolato-linearib. acjggs capsalam superanlib.; corolla minima lutea brevllor eaJearala, palalo Impõnctalo, lobia labii superioris acutls pallide coloratls. © — A praeedenii affnl In ipso loco nalali ramosltaie, foil Is angustioribos, floribas miooribus, palalo corollae impunctalo lotoque habitu facillime distinguitur. In arenosis saepe erecta. — *Linaria maritima minima riicota, foliit hirsutis floributque luieit* Moris. Oxon. Histor. I. 400. — *Linaria minor riteida flore luteo* Moris. Dies. 180. — *Antirrhinum tiscotum* Aubry, Progr. morb. arv. IX. 40. (non Linn.) — *Antirrh. taxatile* Bonam. Nann. Prodr. 60. — *Antirrh. pubescent* Pers. Encbirid. II. 157? — *Aniirrh. arenarium* Poir. Diet, encycl. Suppl. IV. SB. — Crescil in arenosis marilimis Armoraciae (ab orb Ligeri ad urbem Lorient el In peninsula Quiberon), in Nenstriae marilimis (usque ad Cherbourg).
04. L. SAXATILIS Lnk. el Hffmnsngg. Flor. Portug. I. 838. f t 40. - Chavannes I. r. 167. f — Viscoso-pubeseena procumbeos v. erecta: foil, inferiorib. qoatemi* aublanceolatls, auperlorib. allernls lineari-lanceolalis acuilisj florib. aubcapiutis; calyris segmenlis angusle lanceolailt hlrlrs; corollae flavae palato none duabas maculis v. lineis rulyls nouio, nunc Immaculalo, falearl bretiter arcuato corollaq. breviori. % — llerba 0-10-pollicaris, rania caollformibus ramulosls v. simplicibus. Folia crassiusrula 0-8 lineas longa, utrinqoe attenuate, inferiora mediaque lallora. FURcs pauci breviter pedicellati racemum subcapiiatum, demum magis elongalum efftciemles. Bracleae anguslae acutae pedicello longiores. Calyrlt segmenium supremum paullo majus. Corolla (adjecto calcari gracili acuto) 5-8 lin. longa, lobis labii superioris ereclis oblongo-linearib. obtusiusculii, laterali-bus labii inferioris oblique roiundalis, intermedio paullo mioore. Capsula ovaio-rotundata, demibus 4-6 dehiscens. Semina ooaiprfssa tosta nlgrescente miaule-que luberculata. — *Umari* rtitlosa H viseata hUe* tmsmHhs* Tourn. — *Lmsria Uispanica tenuifolia viUota et titcaa* TourneC InstiL 171. — *Antirrhinum M M - Me* Linn. Mam. pi. 416. (escl. *yo. Moris.) el Spec plant &ft. — *Antirrhinum Toumeformlii* Poir. Dick encycl. Suppl. IV. M. - *Antirrhinum Ifcpedioide** Linn. fl. Suppl. 270? - Pen. Enchir. II. 158? - *Unwim gtmUnota* Lnk. et Ufflmniirit. I. c. 238. l. 30?
9. *tricta*: Ramis cauliformib. ereclis firm is simplicib.; foil, strictis, basi ramo adpressis ac fere oranib. alternis; florib. minoribus. — Crescil in arenotis saiosisque LuMianiac el lli>)oniac mediae el occidental!*
05. L. 8AÏLIEJOIPES Boi>*. Voyage bot. dans le roidi de |'K>p. 403. no. Ittl. f I- 133. — Annu aul birnnis ?; mullicaulis: caulib. ereclis humilib. ramosistimis; foil, linearib. oblusis glaucesccnhb. glabris, inferiorib. Vflirillalis, superionb.

allernis; planla pane superiori tola pilis robrls glanduiois obsita; florib. laxo spicatis pedicello calicra subaequante suffultis; lacimis calycinis linearib.; corollae violaccae labio supiori brevion, ad basin usque in lobos duos oblongos diviso, inferior] tnlobo, lobis rotundalis subcorniculatis fere aequalib., calcari violacco corolla longiore; semimb. con\ens laevib. late albo-marginatis. O? </? — Collum edens ramos numerosos 2-4-polhcares glabros tereles erectos ramo- >] >] mos. Folia subcarnosa terelia glaucescencia. Bractee obtusae lineares deflexae, pedicello breviores. Calycis segmenla praecipue margine glandulosa, tubo corollmo breviora. Corolla glabra magmludine *L. minorit*. Palatum auran- tiacum profunde sulcatum valdeque prominulum. Faux intus auranliaco-vclulina. Calcar aculum subincurvum, corolla inlensius violaceum. Capsula ovalo-com- pressa, valvulis 6 medium usque dehiseens. Semina mgra semilunaria. — Crescil in Hupaniae meridionalis Sierra Bermeja, in monte Sierra de Toloz, ad muros urbis Malaga. — Habito refert *Saturejam kortentem*.

3. *Semina ditcoidea et orbiculata, margine brevi cincta, disco tuber culalo.* (Cha- tannes 1. c. t. 5. fig. 37;
00. *L. FOftTA>ESIA>A* Cbatannes 1. c. 168. f — Ascendens v. erecla: foil, linearib. obluis glabris, imis terms el qualernis, reliquis allernis; florib. subcapilalis; bracleis deflexi*; calycis segmenlis ovafo-dblongis aculis pilosis; corollae satu- rate flavae calcari pallidore earn aeqnlnlè. O — Kami cauhformes e collo in- cras&ato prodeunles plures., 6-8-pollitiffes, apice brevUsime pubescentes ramulobi. Folia craj>»iusscula. Bractee lineari-oblongac deflexae. Pedicelli erecti bractea loagiorea pubescentes. Cal)cm begmenla demum ampliaia. Corolla magnitndinc fere *L. supmae*, lobii* labii superioris erectis ovalo-rolundalis, labii infenons valde abbrevialis, apice subemarginalis aequalibus, palalo amplo impunclato glabro. Capsula tubglobosa YIX calyce major glabra, valvulis 6 profunde sectis debiscens. — *L. graciit* DsL lib. — Crescil in arenosis Valenciae.
97. *L. POLYGONIFOLIA* Spr. I. c. 703. — Chavannes I. c. 100 f — Procumbens: foil, ovato-lanceolalls v. oblongis glabris, Inferior^ib. qualcrms, superiorib. oppo- sitis et allernis; florib. capilalo-racemosis breviter pedicellaiis; calycis obliqui segmentis lanceolatis v. linean-lanccolalis aculis hispidulis; corolla alba seu pallide sulphurea, palato luteo, calcari corollam aequante recliuin ulo. O*. — Rami cauhformes nunc simplices, nunc creberrlmc ramulo»i, quadnpollicareji, &ab raccmo nudi pube»ceo(es. Folia 3-5 lio. longa, sesquilincam lala, *Polygonum actculare* forma refrenlia. Bracleae prdicellum superantes subdeflexae. Flores pauci (2-3). Cal)X*pihs uscidulis ob*ilus. (iorolla (supputalo calcari subulalo aculo) 5-6 ho. longa, lobis labn superioris angusii» ereclis, labii infenons ro- tundatis, magis minusve emtrginatis. Capsula subrolunda, fere calycis longitu- dine, valvulis 4-6 debiscens. — *Amtirrkimum polygonifoiium* Poir. Diet, encjel. Suppl. IV. 98. — Crescil in Hispania ad Geber Altari.
08. *L. (ANTIRRHINUM* Polr. Diet, encjel. Supp. IV. 83.) *BROI'SSONMHTII* Cha- vannes I. c. 100. f — Procumbens v. ascendrns: foil, linearib. et linean-lanreo- lalis, infenonb. quaternis, superionb. alternis oppotuitsq ; nonb. ti-J in apice r a mo rum congettis; bractcis pendulis pedicello mulio longionb., cahrin irgroen- Us hneari-oblongis acu(i); corolla saturate fla\ a, palato punm« funnn notato, calcari recto subulato, corollam superante. Q — Aami cauhformrs »implices decumbentes 4-6-pollicares, apice breviHoau* Rlanduloso-pilosi, bam rami» fur* culisve aliquot itenlibus aucii. Folia 3-0 lin. longa, in ramn flonfens laiiora, in turculis linearia »ubpatrntia qualernatim di<t|>»ita glabemma. Ilractee an- gutU lineares, obtusiusculae glabrae |, pubetccntet. (.al)cis obliqui tegnirnia post anibasin ampliaia glabra v. brevissime pubrrala, »upremo majori. Corolla fere magnluriae *L. mipinae*. Capsula ovalo-globosa glabra, valvulit 6 debi»ccns. — Crescit in Lnsitania (prop? I lysisiponem* ft in regno Maroccoano Barbanac.
00. *L. PAUÏPLORA* Bonpl. Jard. de Malm, el de Kav. I. 48. I. 18. - Chavannes I. c. KK - Glabemma glauca: foil, linearib. acutiukulis, inferiorib. qualeroii,

superioribus, alteris, floribus terminalibus pedicellis bractea minima longioribus, calycis segmentis ovalibus, margine ciliatis; corolla violacea (magitudine *L. vulgaris*), lobis labii superioris angustis, dorso invicem subapphcalis, palato albo maculis atro-violaceis notato, calceari arcuato, corolla in plo longior O — Crescit... * (in Hispama v. in Lnsilama??)

100. L. AMETBYSTEA Lnk. et Hffmnsagg Flor. Poring. I. 253. f I 47. — Chavanne* I. c. 170 f — Ascendens, apice pubescens: foil, subhnearib glabris, mferiorib quaierns et quinis, supenorib allerms, calycis obliqui segmenis oblongo-ovalis acutis, racmo paucifloro laxiusculo, corollae violaceae v albescentis (in var *fl flae*) palato albo-flavicanle punctis coeruleis nolato, calceari recto illam superante O — Herba 4-10-pollicaris Rami cauliformes saepius ascendentes, superne breviter viscoso-pilosi, simplices v parce ramulosi Folia glaucescentia crassiuscula semipolhcario, inferiora suboblonga Pedicelli pubescentes in axillis bractearum mimmarum. Corolla (excepto calceari) 3-5 I in longa, lobis labii superioris erectis angustis acutis, dorso invicem subapphcalis, labii in fen or is lobis roluodalis, lateralibus inlus concavis, inlermedio minori Capsula subrolunda vix calyce longior, vaWulis 4-0 dehiscens. — *Antirrhinum amethyiteum* Lam Diet. IV. 353. — *Antirrhinum tubalptnum* Brot. Flor. Lusit. I 106? — *Antirrhinum elegant* Dsf. Horu Paris, ex Pers. Jtyftchir. II. 156. — *Antirrhinum bipunctatum* Cay. Icon. pi. rar. 1. 90. t 33. fig. 1* (nee alior.) — *Ant. tapph%rtnum* Brol. I. c.

fl. flava Corolla flay a, palato pojiclijLalro-purpureis notato. — *Antirrhinum multipundatum* Brot. Flor LoslänrT 109. — *Ltnarta multtpunetata* Lnk el flffmngg. Flor. Portug. I. 254. t. 48. — In arris Hispamae el Lusitanlae.

- 101 L. GLAUCA Spr Syst veget II. 700. — Rccb. Fl Germ excurs. 375 no 2548 — Chavannes I c 171. f — Glauco-cinerea ramosa foil crassiusculis oblusis, imis linean-oblongis quaierns, reliquis subalatis, plensq. allerms, florb paucis capilellatis, calycis segmenis brevissimis linean-lanccolalis aculis pubescentib . corolla lulea, palato inlerdum bipunctato, calceari longitudme corollae subarcuato pallido, strns violaceis nolato (in var y loto violaceo). O — Rami cauliformes crebri erecli v ascendentes ramulosissimi. Folit 4-6 lin longa, pleraque llinean-subulala Bractea parvnlae subaculae inflexae, pedicellum longitudme vix acqnanies. Flores 2-3 capKato-racemosi, nonnumquam lolitarii. Calycis minimi segmenia lubo corollino multum breviora clliolata, supremo retiqui param longlore Corolla (adjecto calceari aenlo sobulalo) 4-5 lin. longa, colore variant, lobis labii superioris angustis paullo reflexis, labii Inferioris deflexo-patentib. abbreviatis subaequallb., palato ampliuseulo glabro. Captola globosa calyce longior yalvulis 6 dehiscens. — *Ltnarta Hispanic* qudr** Clot. Hlttor. 321. — *Ltnana folus carnoitt ctneue* C. Bauh. Plnx 213. — *Antirrhinum glaucum* Linn. Amoen acad. IV 277, Spec. plant. 856 (excl. syn. Buxb.) — *Unana bt punctata fl. glauca* Linn, et lffmnsagg Flor Porlug I. 255.

fl. bt punctata Palato punctis duobus alro-pnrpureis nolalo; ramis ramnlisq pubescentibus. — *Antirrhinum bipunctatum* Linn. Spec plant. 853. — *Antirrhinum glaucum* Cay. Icon. pi. rar. I. 20. t 33. fig. 2. — *AnUrrhinum captlellatum* Lam Diet, encycl IV. 358. — *UnoriaJHpumctata* Dam. Coors. boi. colt (ed. 1) II. 03. — Spr. I. c. 705.

?. *muUcaulu-* Ramosissima: florib. paullo mfoorib.; corolla pallido lotea, palato aurantiaco; calceari purpuraseonto tea yioltoeo. — *AnHrrtunum multicaule* Linn. Spec. plant 856. (noo alior.) — *Ltnana muUicauUs* Mill Diction (ed 8) no 7. — Spr. I. c. 706. (excl. syn. Brot. et Polr.) — *Antirrhinum tricolor* Pourr mss. — Crescit in Lusitanae, Hispaniae et Italiae anris incultm

- 102 L. DIFFUSA Lnk el Hffmnsagg Flor Portug. I 257. f t 40 - Chatannes I c 173 I — Diffujia pubesrens full lincarib plamusculis, inflmis terms el qualernm, supenonb sparse, (lonb maxunc diblatilib , rahcis segmentis lanreolalis acutis, corollae parvulae coeruleae palato aurantiaco, calceari incurvo corolla longiore O — Kami cauliforme* fere pedale* ramulosismmi, ramuhs omaibui viscoso-pube»centibus Folia supenon 6 lin longa, I in earn lala, inferiora pauca,

pleraque verlicillata, superiora minora distantia. Pedicelli 1-9 lin. long! pubescentes. Corolla (excepto calcar) 3 lin. longa, lobis labii superioris reflexis angustis, inferioris abbreviatis, palato parum pubescente, calcar conico acalissimo. Capsula parva glabra. — Crescit in planitie inter Abrantes et Punhele Lusitaniae.

t *Species non satis notae et incertae adhuc sedis.*

103. L. SEGETALIS G. Koch, Linnaea XVII. 286. — Anna glaberrima glauca: foil, inferioribus quidem oppositis, superioribus alternis, omnibus linearibus; racemo laxo; seminibus nigris. O — Calyx 5-partitus. Corolla lobis stamina didynamia includens, fauce minime ampliatam pervia; calcar horizontali-ascendens curvatum, corollam mullum longius; limbus bilabialis 5-partitus, laciniis subaequalibus late linearibus, labio superiori bi-, inferiori tripartito, palato interne convexisculam tuberculatam daabat barba intricatam; tubus breviter capillatus inclusus. Capsula rampantem, aemina triangulari-primitiva. — Crescit in aegales Armeniae. — Typum praebet lectio nova *Macrocentri*.
104. M. L. PERSICA Cavanilles I. c. 173. f — Pubescens: caule erecto ramoso; foil, ovalo-oblongis breviter petiolatis, inferioribus oppositis, superioribus alternis; ovaribus distansibus subsessilibus; calycis segmentis maximis oblongis obtusis ciliatis; corollae coerulescentis lineisque intensioribus, lobis palato puoculato, calcar brevis aculo. O — Herba temipedalis v. pedalis, a basi ramota, ramis oppositis. Folia obtusa nervis convergentibus percursa in petiolum brevis aenata breviter pubescentia. Calycis segmenta fere corollam aequantia. Corolla *L. organifoliam* referent, sed major, lobis labii superioris oblongis, inferioris rotundatis distansibus, intermedio minori, palato param evoluto tramineo panctisque fatcis notato, calcar recto gracili acalissimo. Capsula . . . ? — Crescit in Persia.
105. L. CAESIA DC mta. in Cavanilles I. c. 114. t — Glauco-caesia glaberrima: foil, linearibus aequalibus alternis, majoribus alternis, minoribus subsessilibus; ovaribus distansibus subsessilibus; calycis segmentis maximis oblongis obtusis ciliatis; corolla flava, calcar eam aequante. % — Haec eanlifomes prore erecti v. ascendentes spiribamaei tabaeqalet tenacitudo tralis, turculis multo brevioribus protractis v. ascendens dense foliatis. Folia brevia 2-4 lin. longa oblonga crassiuscula. Pedicelli bractea breviores. Corolla magnitudine *L. vulgaris*, palato >alid barbalo. Capsula . . . ? — *Antirrhinum caesium* Lagatca mtt. in Pen. Enchirid. II. 157. — In Hispania prope Cerro Negro et in Iberia circa Matnum.
106. L. CAPRARIA Moris cl Solar. Floral, insol. Caprar. 88. | t. 3. fig. 9. — Glaberrima glaucetcent decumbens ascendens: foil, crassiusculis linearibus lanceolatis v. linearibus acutatis, inferioribus tenuiter, reliquis sparsis; racemo laxiusculo; calycis segmentis linearibus acutis; calcar corolla majuscula breviori; atylo apice laevigato, tubus marginali; munitio. irretro-angulatis ragoto-iubercalata. % — Crescit in Inaala Gaptaraa.
107. L. CADCASICA Moench B M. In 8pr. gytt veget IL7HH no. 19. - Foil, tripartitis oblongis macrocalo-dictyophyllis; pedonibus axillaribus elongatis filiformibus; calyce* herbaceo aculo(?T); caule procombeo pilosissimo. O! ^.? — Crescit in Caacaso.
108. L. RI'PESTIIS C. A. Meyer, Verteirbn. der Pflanz. am Cauca«. 110. Perenni glabra glaucetcent: caulis gracilibus ramosis diffusis; foil. «parvis ulmaribus acutatis; racemis paucifloris laxis; laciniis ralicim» nulinariis obtusis glaberrimis, corolla (flavata multo brevioribus; calcar subulio «ubrecio, corolla tubrevis; taminibus discoideis alalulam» imit. ^ — Crescit in C. «u-
~~coel montibus.~~
- Mt. L. VEHOSA Liodl Bot tegitl. *Istm Ser* XIV. Pl. miscell. no. 131. - Perennit ascendens: foil, linearibus canaliculatis «ubcarn.» albido-glaucis; floribus laxe ractjmaia (foaeo-loieia alro-trialia); calycis «gm«nii» brevis linearibus obtusis; calcar eot^U brevioribus, palato adprttto pubescente. % — in India boreali.
109. L. APKMINA Tmueb, bylloite iatUboo. II. 917. - Foil. tripartitis rvinifloris. In vier qamquoclobia, Mb murroneis Inie^rnmmit ram pttolfta dtntt pabcteen-

- tib.; calycib. obtusis(?I); calcari crasso snbalato recio brevioribns. — Anvarlelas *Unariae Cymbalariae?* — Crescit io Apenninis.
111. L. FILIFOLIA Lagasca mss. ex Spr. Syst. TegaL II. 700. no. 78. - Foil, verlicillalis conferlisq linear!-filiformib. carnosis; florib. spicalis; calcari recliusculo sabolalo elongaio. 4? — Crescil in agro Matrilensl.
112. L. HIANS Spr. I. c. 704. no. 52. — Foil, linear!-lanceolatis ternis sparsisq; caale slriclo, superne glabro; florib. racemosis; fauce eorollae bianie; calcari breviusculo. 2|. — *Antirrhinum linarioidet* Linn. Spec, plant. 843. — *Linaria racemota* Dietr — An I. *vulgartt??* — In Europa ausrali.
113. L. OCYMFOLIA Spr. I. c. 703. no. 38. — Foil, inflmis quaternis otalo-oblongis. supenonb. linean-lanceolatis; caule tenero humili simplici villosu paucifloro; calcari brevissimo. 2I.? — *Anttrrhnum ocymtfoltum* Pourr. — In Hupania.
114. L. TENUIS Spr. I. c. 705. no. 72. — Foil, ternis sparsisq. lineanb. subpubescenlib ; caule tenero simplici paucifloro; calycib. bispidis; labio eorollae inferior! bilobo, calcari eloogato. ty? O? — *Antirrhinum tenue* Vi*. — Crescil ad roagnam Syrtim Afnae borealis.
115. L. DELPHINIOIDES Gay mss. in Eowls. at WsUc. Tbe Floral Cabinet III. 00. t 115. — Caale gracili ramoslssimo glabro i fall, alterala subalatis; florib. racemosis purpureo-striatis; calcarbi arçjytfs longtsslmls; pedanculit ealycibq. pilosis; eorollae labfi soparioria lobjs. obtosfs, loforloris lobls enarginatls; calycib. reflexis. 2IT — Crescit. . . . T "****%»
110. L. GLANDULIFERA Tan. lodx. semla. Hort. Ntpol. 184a - Annuu tillosoviscosa, pilis glandulirerta undtqae teela: eaolib. debilil.; foil, oppotilit ovato-subrolundis, inferiorib. petiolatis, interdnm vage dentatis oblusif, superiorib. »essilib. integernmis; florib. axillanb. solitarns subsessilib.; calycinis segmentis ovalis; corollis exiguis, labio supenore atro-purpureo, infenore palaloq. fla>o; calcan incurvo albo. O — Crescit. . . . ?

ff *Species e genere expellendae.*

- L. APHYLLA Steud. - UTRICULARIA CAPENSIS.
 L. BELLIDIFOLIA Dum. - ANARRHINUM BELLIDIFOLIUM.
 L. CAPENSIS Spr. - NEMESIA LINEARIS.
 L. FRVTICANS Spr. - NBMESIA FOETENS.
 L. PATENS Spr. - NEMESIA PATENS.
 L. SCABRA Spr. — NEMESIA CHAMAEDRYFOLIA.

3892. ANTIRRHINUM¹ *Juts.*

(Juss. Gener. plant. 120. - Melsn. Gener. plani. vaaevl. I. 905. II. 215. — Cbavaooet, Monographic des Antirrhinçs p. 70. — G. Don, General syst of gard. aad boi. IV. 514.)

Saotia I. ASARINA TavraaL Instlt ral barb. 17L t 70. - CtevaiMt I. e. to.

Folia palminervia lobala opposila. Capsula membranacea subglobota, qooqua loculo foraminc lato ac irregularan sub apice debiscenta.

1. A. (ORONTIUM Pers. Eochind. bot. II. 150.) ASARINA Lion. Spec, plant. M0. - Bol Magai. t. 002. — Rccb. Flor. Germ, eicurs. 370. no. 2552. — Cbavaonei I. c. 80. f — Viscosum ri villosum: ramls caoltforaiib. procasjā>anllb.t foil, opposilis laage patiolatis quioqueoenriis qalnqaelobia oordatis at eraaalls; florib. atillaHb.; aagmeotis calyeinis linaari-laooeolatia aeulla hirtnUa; eorollis albis v. rabaareajtib.; palato flavescente. 3|. - Raml eaullfonsaa (a caale sabterranoo) dlffvsi prostrati numerosi, basi ligaosi, pilis bretlboa slaiplieibiia at Yiseoals obsiti, at tola planta, viscosi, ramali •fridi-purparasceates. Folia opposlU, patiolis loniis ranahculoiiis, basi connatls, ambitu reniformia v. cordau, plerumque quinquHoba, lobis crenalis. Klores oppositi pedicellati solltarii, pedicelli calyri> longiores! Calycis sfgmenla angusla Corolla sesquipollicarm, tubo dongato glabro, bati atteoualo, dorso compresso, inlus pilis aureis brevibus dense barbato, lobis* labii superions rotundalis obliquis, inlu> conraxi, lobis labii infenoris sobovalis, io-termedio ovalo-elliptico, lateralibus multo minori, palato flavetceott, medio profunde solcato. Filamenta, anlherae el pollen alba. Shlus purporeas Capsala

membranacea pubescens subobliqua. Semina oblonga fusca corrugato-rugosa. — *Xafiatxiaaov* Dioscond. IV. 195. — *Atartna teu Bederula saxatllu* Lobel. Icon, t. 601. fig. 2. — *Anttrrhntnon* Caesalp. De plantis lib. \III. cap. 20. p. 334. — *Atartna Lobeltt* Dalech. HisL Lugd. 015. — *Hederula taxatllt magno lore* C. Bauh. Pinx. 300. — *Atartna Lobelti foho Hederæ terrettru* J. Bauh. Hislor. III. app 850. — *Anitrrhntnum foltu oppotttu eordatu crenatts* Linn. Hort. Cliff 323. DO. 2. — *Atartna procumbent* Mill. Dicuon. (ed. 8.) no. 1 — *Anttrrhntnum atartnum* Lam. Fl. Fr II. 348. — *Atartna cordifolta* Mnch. Method, pi. Suppl 172. — *Crescil* in Gallia australi, in Pyrenæis, Cebennis, in montibus Ligencis el Velau-norum prope Monspelium.

Beetle II. A. JmRRHIIIFASTBLUM Chavannes 1. e. SI.

Folia pennnervia integemma, inferona opposita, rarius terna, sopenora ple-raque alterna. Capsula lignescens •. ebarUcea fere pyriformu, basi ralde obliqua, apice inconra triflora.

§. 1. *Calycit lobi corolla multo breviores.*

2. A. MOLLE Linn. Spec. plant. 800. — Chavannes I c. f — Villosum ramis caulifonnib procumbenlib. gracilib. lanato-villosis; foil, opposilis petiolatis subrotundo-ovalis, flonb ad ramulorum summitates paucis; calyciois lobis lanceolali* erects, corolla albescenle, palato flavo. 2]. — Herba semipedalis *. pcdahs nulli-cauli*, basi lignosa; rami diffusi procumbentet, pilis articulais molluer obsiti. Folia b re viler petiolaia (5-0 lin. longa, 4-5 lin. lata) mollia glanduloso-mcosa, floralia minora, aliquando sessilia rotndata. Flores pauci dislantes, pedicellis calyce saepeque folio longionbat YIMOSIS. Calycis legmeola obtusiuscula villosa. Corolla pollicam, labio aupenon purpureo-striato. Capsala ovato-globosa char-lacea, duobus foramimbus carpelli infenoni interdum in unum confluentibns — *Aminrkmum Hupamcum tammtl** Dtdmmm Cretiei foho, /tor\$ albo Vaill. Herb — Creseli In Pyreaaeit Hitpaniae oonurminlt et In regno Granatentl.
 3. A. SEMPBRVnBNS Upeyr. Plor. Pyren. 1 . 7 . 1 1 - Cbavannes I. c. 82. f
Caule brevi taffratlcoao adaeendenle ramoio; foil, petiolais opposing elhpiicis Y. oblongo-ovalis fempervlrentib. subpubescentib.; flonb. laxe racemosis paucis; calycims lobis lanceolatis acutis. apice reflexis; corolla alba, labio superior! tuboq purpnrneo-notalo, palalo flaTescente. 5 — Suffrutex l-J-pedali!» ramosus tortuo-sus, cortice rimoso lutescente. Rami opposili subquadrangulares, ad onginem arlirulali, albo-Yirescentes. Folia decussala, (Jlorahbus saepe allernm), 3-5 lin. longa, 2-3 lin. lala, breviter petiolala obtusa subcarnosa, pilis simplicibus brt-vissiroe pubescenlia persisenlia. Flores pam laxe ramosl, pedicellis flonferis corolla mullo brefionbos terelibus pubescentibus, post anthein saepe elongaiis. Calyx pubescens. Corolla quam praecedeolis minor, tobo breviter plloso, labii supenons lobis magnw oYato-rotundatis. Capsala pabescent. Semlna nigra remfonna. — *A. moll** 8U Am. Boaq. Pyren. DO. 154. — *A. meonanthum* Lnk. et Hffmofgg. Plor. Portag. L MI. L II. — Greuell ID Lusitaoia, in Gallia australi et in Pyrenaeornm ealearels.
 4. A. IISPAMCIV Charannes I. c. 83. f — Villosum. ramis caulifortnib. ereclis sublignosis ramulosis, foil, obloogo-lanceolalis, basi coniractis obiu»iu<rulis, inferiorib. oppomtis, supenorib allernis angusliorib , bracteis lineari-lanceolatif. pedicello mullo longiorib., Oonb. laxespiciis, srgmenlis caljcinis oMnngis subacuiis, corolla purpurea, palalo aureo ^ — Herba pedalis ilanduloio-pilos*. Bamuli inferones opposili, supenores allerni crecti villo»i. Folia 10-14 lineas loDga, 2-4 lineas lala. Brarieae aculae villosae Prdicelli erecli bremnitni Ca-ljcU segmenU lubo corolhno duplo brcnora, apice paullo reflna Corolla vii pollicaris, tabo rilloto, lobis labii •unenoni o%alo-oblongi«, labn inferions ro-tuodaiis, laiemedio mioori. Capsula panra oblonga elongaia pubesceos. Semina priorla. - *AmMrrkmum Uufmcm *UU>9um Ongant fotto* Tournef. InsUt 108. - Crescit in Hiaajaaia.
- ft. K LATIFOUUM DC Cat pi Moaspcl- ^, Fl Franc V 411. - floce. et Balb Fl Ticin. I 28. I. 48. - Bcab Fl Geno eicurs. 3?0 no Siff*. - Cbaftnoes I. c M

t t. 3. fig. 28. — Caudice crasso torluoso; ramis cauliformib. ascendentib. v. ereciis villosis; foil, ovatis v. ovalo-lanceolatis peliolatis, apice late mucronulatis pubescentib.; florib racemosis, rbachi villosa; calycis lobis ellipticis pilosis ciliatis; corolla saepius lulea, lubo elongalo, basi valde gibboso. 2I. — Herba 1-3-pedalis saepe pluncaulis, rami fistulosi erecli, tenue longitudinaliter sinuati, basi purpurascens, pilis glandulosis obsiti. Folia pleraque ovata crassiuscula, eximie herbaceo - mucronata, b rev Her peliolata, infera opposita, limbo 1-2-pollicari, 0-10 lin. lato breviter pubescente ciliato, obsolete purpureo-maculato. Bractee sessiles ovatae concavae pilosae. Pedicelli bractea longiores distantes erecti villosi. Corolla magna 1-1 1/2-pollicaris, saepissime lulea, palato intensiore, lubo villosa. Capsula elongata pilosiuscula. Semina ovata truncata, testa foveolata. — *Antirrhinum flortbut luteit* Lobel. Icon. 405. — *Antirrhinum lahfoltum palado amplo Hare* Bocc Mus. 40 t. 41., Barrel. Icon. 655. — *Antirrhinum luteo flore* C. Bauh. Pinx. 211. — *Antirrhinum majut a.* Linn. Spec. plant. 850. — *A. majut fi. latifolium* Duby, Bot. Gallic. I. 343. — *A. diffutum* Bernb.

fi. hybridum Foil, elongationb., (lore purpurascens Y. iantom linen purpureis notato; calycis lobis ovato-ellipticis. — *A. laUfthum* Mill. Diet. no. 4, Icon. I. 98. — Lnk. et Hoffm. Flor. Portug. I. 900. L flQL (excl. syn. Tournef) — *A. laHfohum fi. tritatum* DC I. c — *A. hybridum* Bib. Gat* pi. Pyren. 00. — Crescit circa Nloeam, In Gallia meridional!, in Pyrenaeis et In Lusitania.

0. A. (ORONTIUM Pers. Enclind. ft. 1 & f MAJUS Linn. Spec. pi. 850. (excl. Tar. a.) — Engl. bot. II. t 190. — Schkobr. f. tndbch. II. 103. t 179. — Boll. Herb. de la France I. 277. — Koch, Synops. fl. Germ. et Belvel. (ed. 1.) 590. — Rchb. Flor. Germ. excurs 376. no. 2554. — Chavannes I. c. 85. t * & fig 90. — Caudice in-crassalo loriuoso; ramis cauliformib. ereciis, plerfoq. ramulosis; Toll, oblongo-lanceolatis, utrinq. attenuate glabris, florib. racemosis approximatis, rhachi pubescente, calycij* lobis late ovalis oblusis glanduloso-pilosis, corollis purpuris v. purpureo-roseis, rami us albis, palato apice luleo. J et 2I. — Caudex crassissimus, cortice cinereo v. albescente. Rami cauliformes erecii v. atrrdenies 1-J-pedales tereies glabri (ramus pubescentes) Bslulon, basi purpurascens. Folia infera oblongo-lanceolata, basi valde allenuata opposita 1-3-pollicaria, 4-0 lin. Ilia, supenora linean-oblonga v. linearia allerna, omnia crassiuscula glabra. Rbachi apbylla breviter glanduloso-puberula. Pedicelli pubescentes calyce paulo longiores; bractee ovatae concavae, interdum acutiusculae, pedicello breviores. Segmenta calycina glanduloso-pilosa eilia. Corolla 1-8-pollicaris, lobis rotundatis, tubo exius pubescente, palato valde promloente. Capsula pubescent 4-5 lin. longa, basi valde obliqua. Semina oblongo-ovata, testa foveolis inseulpta. — *Antirrhinum primum et teeundum* Matth. ed. Valgr. 1100. 1107. le. — *Antirrhinum vulgo caput canit et caput titult* Lob Icon. 404. fig. 2. — *Ot teonis* Caesalp De plantis lib VIII cap. 52. p. 350 — *Cynocephalus Plinn* Dalech Hist. hort Lugd 803 ic — *Geel Grant* Tabern KrUulerb 1235. ic. — *Antirrhinum purpureum tire album* Ger Hist. 540 ic. — *Antirrhinum* Dodon. Pemplad stirp. 182. ir - Riv. Monop. irregular I. 82. fig. 1. — *Ant. majut* Bessl. Hort Eyst. U 0 10. — *AnL vulgare* J. Bauh. Hist. pi. III. 102. ic. - *Antirrhinum mtjus aUerum folio hngiori* C Bauh Pinx. 211. — *Ant. grandiflorum* Stok. Bot nat. medic III 384. - *AnL muraU* Salsb. Prodr. 100. - *Ami. MonUtidentt* Hort Berlin.?)

fi. angustifolium: Foil, angostissimis, saepe revolutis, nonnumquam approximatis ternis; corolla magna purpurea. — Formas hortenses magnitudine et colore corollae varias plunmas eomutare dlsplioait — Crescit in Europa australi (a Silesia et Bohemia), in Barbaria et in Persia crescit in muris >e-tustis el flu>iorum glaricis

*) A WOXTKMDHSSE Variut m Memoue rfi Torino XJ^I^ 178 - foil terms terltullatmc lanceolatit iubfalratls glabru, Jlonb tpicahs oppntihs la-etniif calyeim glandulato-puhetctntib acutiussculu, corolla glabra, raule »uf-fruttcoMo errcto, rertut apieem tilhsulo 'flore magnx purpurascntt). o - iabttal in Montendro

7. A. TORTUOSUM Bosc. mss. ex Lam. Diet, encycl. IV. 305. — Ten. Sylloge plant. 304. — Cbatannes 1. c. 87. f — Omnino glabrum: ram is cauliformib. ereclis >. ascendnlib flc\uosis, basi lortuosis; Toll, lincanb. aculis opposilis lermvc; florib. racemoso-&picalis 3-4 approximate, racemo mlerruplo; calycis lobit. oblongo-ovalis; corolla ampla purpurea, lubo abbrevialo, labio »uperion maximo. 2I. — Planla pedalis el ullra glabernma. Rami cauliformes plures lorluosi ramulo*i. Folia lale lineana, ulnnque allenuala bipollicana palenlia, saepe reflexa, sufflmi el ilia ramulorum ererto-palenlia. Bracleae concavae aculae parvao erectae. PedicHli leretcs flexi, bracleis longiores. Segmeula caljcina clliplica v. oblongo-otala oblusa nervis parallels nolala glabernma. Corolla congenerum maxima, lubo crasso abbrevialo. Capsala quam praecedeoiiis minor glabernma. Semina oblonga foveolala. — *Antirrhinum majus angusfohum amplo flore purpureo Rommnum* Barrel. Icon. 038. — *Antirrhinum majus /for* rubro* Cast Hort. Men. 3., Sabb. Hort Roman. III t & — *Orontium Siculum fi. tortuosum* Pers. Syn. pi. II. 138. — *Antirrhinum eapiaium* Prsl. Delic. Prag. 74. — Crescil in ruderaleis ropibusque manms Sicihae, Ilaliae el Galliac meridionalis.
- a A. SICULUU Ucna, Pl. ad Linn. op. add. no. 17. ex Willd. Spec. plant. III. 257. — Cbatanne* I. c. 88. f I- 3. fig. 24. — Ramis cauliformib. ereeds flexuosis, apice pubescenlib. ramulosis, ramulis diffuu*; foil, linean-lanceolatis lineanbosveoppositis allerois v. ternif, ba»i in peliolum anguflalu; Oorib. laxe racemosls; cal)cis lobis lanceolalis aculis pobetcenlib.; corollis albi*» v. luiesrenlib., rarms purpuratcenubus. 2|. — Rami 1-2-pedalei el ullra ligncicenle*, corlice purpureo-irescenle, ramuli gracilet puberuli. Folia aculiuscula subcanaliculala cras»inscula lacvia, saepe reflexa pollicana •. letquipollicana. Pedicelli crecti fere adpreiti, 3-4 I in. longi, crasi iisculi puberali. Segmenla calycina acula, apice paullo refleia paberala. Corolla fit pollicaria, labtl tuperiont lobu oblique emarginaUf, inferioris breviboi, inlaimedlo enarginalo^ lubo pilotiutculo Filamenia compresa ciliala. Capsula pubeacent magniludine A. *Orontii* ted magif rolundaia. Seaiioa oblongo-quadrangolaria foTeolala futca. — *AnUrrhnum Iilu can'' dore* Cop. Pamph. Sic. II. U 76. — *Antirrhinum majus angustustmu folm, (lor* purpuroMceule mtnore* Barrel. Icon. 027. — *A. angushfoUum* Poir. Did. roc)d. buppl. 1>. 27.
- I. *glanduiosum*: Foil, lalionb.; ramn el calyce glanduloso-pilosn, rorollis luiesceniibui — *A. Stcuium r-* Guts. Flor. Sicul. t. 300. fig. 2.
- y *datum* Corolli* purpureo-lulen, planla lola elation ac firroion. — *A*hr-rhnum Ihtpantcum atUsstmum angustistmo folio* Tournrf. Inttitut III — *A. saturrjaefokum* >aill. lib. — *A. ongulifoltum* d'Imlle, Knum. pi. Arch. 540. excl. iyn) — Cretcil in nideralii Siciliae, in (alabria, %ar. ?. in lli»pandia el in Archipelago.
0. A. GLA*DI'LOSL'l Lindl. Bot RegitL L 1801 - tndiqoe pilif rap Hah. »obvii« cidit coopfertun: MLallernlt pciolallt angotie ovalo-lanceolatu, racrmo den»e **folio»**, ralycit lobie Uneari-lanceolaUs Inaeqnalibut. if? — In America boreali.
- f. 2. (*alycn tegmenta corollam superanha* †. earn *aequantia*.)
- 10 A. RYDITObPERVIV Fitch, el Mey Ann. tr. nalur. V 301 - tnnuura fubpi* |o«um foil oblongtt v. tublmearib.; florib. di«ianlib tub»r»»silib , lacinhi calyci» linranl), corolla longmrib., »emimb prifmaiicif undiq rugo»it. >j — Corolla par*a rorriiletrnt. Cap»ula tubglobo»a. - I *rydtloearpum* (* Don, General »ytU of gard and not. IV. 516. no. 10. — In Sibina, Tal)»rb in moniibui aridii*
- H. A. OftONTim Linn. Sprr plant. M0 Garrin Dr fruclib ri %rmmib. pl«^{nt} 1. J * I . J 1 - UD IIIQtr geoe. pi. L Ml flg 2. - F.ngl boi |||| I IIU " Srbkobr, Hndbeb. II. I0X L 173. - Sinñ. FI Druitcbl llfl. 27 - Rebb FI Grm. eicort. 3W. MO. 9544 . Koch> ftyaopa. Flor. Germ. (rd. I ' M - Cbavannr« I. «« W } t X flg. 18. tt 19. — Claole giabro ererto t. atcrndrnie ramofu; (oil <>b-longo-lanceolatla ?. Imearib. acmlntculit, utrmq. aiirnuaiit glabrit, florib. di«-Uniib., cal)dt Mf»eoUt lineari-lanceolatit maximU, quasi **digitatis, piquis.**

corolla rosea v. albescens porpureo-striata. Q — Radix sublignosa; caules pedales et ultra, basi lignoscentes nodosus glabri v. pilosoli, simplices v. ramosi; rami praesertim apice breviter pilosoli. Folia inferiora opposita decussata, basi attenuata linearilanceolata v. oblonga 1-3-nervi bipetiolata, superiora allerna, floralia minora vage pilosiuscula. Flores axillares a I terni breviter pedicellati. Calyx maximus corolla longior, segmentis foliaceis, basin versus piloso-ciliatis. Corolla 4—6 lin. longa, tubo (Rlis paucis glandulosis obsito, longitudinaliter purpureo-striato, labio superiori erecto, lobis reflexis dorso invicem appiicatis, labio inferiore palente lobis lateralibus subovalis, intermedio ovalo minore, apice incisus erectiusculo, palato purpureo-venoso. Filamenta glabra, medio torta. Ovarium dense pilosum glandulosum. Capsula pilosa, matura lignescens, calyce mollo brevior. Serrata irregulariter ovalo-cuneiformis, sub lente tuberculosa. — *'Avutftvov* Theophr. Hist. pi. IX. S3. — *Antirrhinum quartum* Matth. cd. Valgr. I. 742. — *Antirrhinum minimum fortan Archigenis Oronium* Lob. Slirp. adv. 175., Icon. 403. fig. 2., Ger. Hist. 540. Ic. — *Antirrhinum sykestre tire Phyteuma* Dod. Pemplad. slirp. 182. Ic. — Best. Hort EysL 1. p. 0. fig. 3. — *Antirrhinum arvense majus* C. Baoh. Pinx. 212. — Moris. Oxon. Hist. sect. V. I 14. fig. 5. — *Antirrhinum angustifolium sylvestre* I. Baoh. Hist. III. 464. (ic. mala). — *Antirrhinum arvense* Rivfn. Monop. irregul. t. 83. fig. 2. — *Antirrhinum minus flore cameo* Barrel. Icon. t. 651.632. — *Ant. humile* Sallsb. Prodr. 98. — *Orontium arvense* Pers. Enchir. II. 158. — Crescit per totum Eoropam, in Algeria, in Madeira et in America borealis arvis verosimiliter ex Eoropa allatum.

fi. Indicum: Folia angustioribus; floribus rasescentibus minoribus; bracteis seorsim foliis floralibus longissimis sobpatis. — Bib. Scrophol. Indlc. 20. — *A. gibbosum* Wall. Cat. 3854. — Asiat. research. II. 44. — In Indiae orientalis provincia Rohilkund, Delhi et prope Madraspatam crescit.

y. grandiflorum Chavannes I. c. 00. I. 4. — Floribus majoribus paliidioribus magisque approximalibus; Ml. latioribus; planta tota firmiori ac glabriore; corolla longitudine fere calycis albescens, venis purpureis v. roseis notata. — *Antirrhinum minus amplo flore albo* Barrel. Icon. 636. — *Ant. Orontium fi. album* Rth. Flor. Germ. (ed. 1.) II. 63. — *A. ealydnum* Lam. Diet. encycl. IV. 365. — Lnk. et Hoffmngg. Fl. Porlug. I. 202. u 52. — *Orontium catycinum* Pers. Knchirid. II. 158. — *Antirrhinum Jamaicensis* Fisch. — *A. elegant* Tenore, Succincla Relation del Viaggio fatto Io Abnitio 75. oo. 588., Sylloge plant. flor. Neapol. 305. — Crescit in roderalls Garganl.

t *Species maxim* dubia*§.

12. A. ELATIMFLORUM Wahlenbrg. Isis XXI.08B. - Pilosissimum: folia, tritngnlo-hastatis dentatis pedunculo longioribus; caulibus procumbeolibus. rectis. 2IT — Crescit in Thracia.
13. A. LINARIOIDES Linn. Spec. plant. 833. — Folia, linearilanceolata* ternis tparsisque; caule stricto superne glabro; floribus racemosis, fauce corollae hiante, calicari breviusculo. 2IT — *Linaria hians* Spr. Syst. veget. II. 704. — Crescit in Europa australi.
14. A. OCYMIFOLIUM Pourr. ex Spr. 8)si. vegeL II. 703. — Folia. Inflmis quaterois ovalo-oblongis, superolibus. linearilanceolatis; caule levero humili simpliciter villosa pauciflora; calcaribus brevissimis. % — *Linaria ocyimifolia* Spr. I. e. — Crescit in Hispania.
15. A. TENUE Viv. Flor. Lybic. ex Spr. I. e. 403. - Folia, ternis sparsisque. linearibus. subpubescentibus; caule lenore simpliciter pauciflora; calicibus. hitpidis, labio corollae inferiori bilobo, calcaribus elongatis. 2|t — *Linaria tenuis* Spr. I. c. — Crescit ad raagnam Sjrtem Africae borealis.

if *Species vix coy nit ae.*

A. AQUATICUM Lour.

A. ALPEM Noin.

A. CORDATUM Buch.

- A. ITALICUM Mill. Diet. (ed. 7) no. 5.
- A. OSYRIS Rausch.
- A. VARIABLE Lnk.
- A. CORSICUM \jlm.
- A. ORBILULARE Medic. BoL Beobacht. (1783. ed.) 842.
- A. PAPILIONACEUM Linn.
- A. PINNATUM Linn.
- A. PORCINUM Lour.

Species e genere expellendae.

- A. ACLTANGULUM Ten - LINARIA CYMBALARIA.
- A. AEGYPTIACA Linn. — LINARIA AEGYPTIACA.
- A. AEQUITRILOBUM Vivian. — LINARIA AEQUITRILoba.
- A. AERUGINOSUM Gooan. — LINARIA TRISTIS.
- A. ALBESCENS Medic. - LINARIA AEGYPTIACA.
- A. ALBIFRONS Sibthorp. et Sm = LINARIA ALBIFRONS
- A. ALBULA Lam. — LINARIA CILICENSIS.
- A. ALPINUM Linn. = LINARIA ALPINA.
- A. ALSINAEFOLIUM \iv - LINARIA ALSINAEFOLIA.
- A. AUETUISTELM Lam — LINARIA AVETHYSTEA.
- A. ANGUSTISSIMUM Loisl. - LINARIA ITALICA.
- A. APARINOIDES Willd - LINARIA APARINOIDES.
- A. APHILLUM Thunberg. — LINARIA CAPENSIS.
- A. ARISTATA Linn. — LINARIA ARISTATA.
- A. ARISTATA Lam - LINARIA ELATINE.
- A. BARBATUM Thunberg. - NEMESIA BARBATA.
- A. BAUHINI Gaud. — LINARIA ITALICA.
- A. BELLIDIFOLIUM Linn. — LINARIA BELLIDIFOLIUM.
- A. BICORNIS Linn. — NEMESIA BICORNIS.
- A. BIPARTITUM Yenl. - LINARIA BIPARTITA.
- A. BIPUNCTATA Cav. - LINARIA AMETHYSTEA.
- A. BIPUNCTATA Thunberg. - LINARIA SLIPARIA.
- A. BROUSSAIE Poir. - LINARIA MULTICAULIS.
- A. CUSCUTACEA Lag. - LINARIA CUSCUTACEA.
- A. (PASCALII Thunberg - LINARIA LINEARIS.
- A. (APITKIMTUM Lam - LINARIA GLABRA.
- A. RUCKERTII Tmn. - LINARIA UNGARICENSIS.
- A. CIRRHOSUM Linn. - LINARIA CIRRHOSA.
- A. (OTHELLEAE Urn - LINARIA YULGARIS.
- A. CRASSIFOLIUM Cav. - LINARIA ORIGANIFOLIA.
- A. CYMBALARIA Linn. — LINARIA CYMBALARIA.
- A. DAVIDSONII Linn. - LINARIA GRANDIFLORA.
- A. DENTATA Poir. — LINARIA DENTATA.
- A. DENTATA Labillard. - LINARIA SCABRIFOLIA
- A. DIBELLA Willd - LINARIA SIPHACIA.
- A. DIRIVIA M BroL - LINARIA DUBIA.
- A. KLATTING Linn - LINARIA ELATINE.
- A. ELATINOIDES Ten - LINARIA ELATINE
- A. ELEGANS Linn - LINARIA AMETHYSTEA
- A. FILIFORMIS Poir - LINARIA RIBRIFOLIA
- A. FUYTII Poir. - LINARIA FLAVIFLORA.
- A. FRUTICANS Thunberg. — NEMESIA FRUTICANS.
- A. GALIODES UB. - LINARIA STRUTTA.
- A. OENISTAEFOLIUM Linn. - LINARIA GEMMIFOLIA
- A. GIANDILOSUM Ujeon. - LINARIA YULGARIS.
- A. GUICUM Cay. • LINARIA CAPITATA.

- A. GLAUCUM Linn. - LINARIA GLAUCA.
 A. GRACILE Pen = LINARIA PELISSERIANA
 A. GRAELUM Bory et Chaub « LINARIA GRAEGA.
 A. HAELAVA Forsk. « LINARIA HAELAVA.
 A. HAMOSIM Passy => LINARIA ELATINE.
 A. HEDERACEUM Lam. « LINARIA GYMBALARIA.
 A. HEDERAEFOLIUM Poir. — LINARIA CYMBALARIA.
 A. HEPATICAEFOLIUM Poir. » LINARIA UEPATICAEFOLIA.
 A. HETEROPHYLLUM Schousb = LINARIA HETEROPHYLLA
 A. HEXAISDRUM Forst — TOREMA CRUSTACEA
 A. HIRTUM Linn. = LINARIA DIRTA.
 A. HISCARISATA Vent. « LINARIA LISOGRISEA
 A. JUNCEUM Lam. — LINARIA SPARTEA.
 A. JUISCEUM Pall — LINARIA ODORA.
 A. LAGOPODIOIDES Linn. — LINARIA SAXATILIS
 A. LANIGERUM Brot. - LINARIA DEALBATA.
 A. LANIGERUM Dsf. — LINARIA LANIGERA.
 A. LATIFOLIUM Willd. — LINARIA LATIFOLIA.
 A. LAXIFLORUM Dst — LINARIA LAXIFLORA
 A. LINARUM Linn. - LINARIA VULGARIS.
 A. LINIFOLIUM Linn. — LINARIA LINIFOLIA
 A. LINIFOLIUM Pall. — LINARIA MACRURA.
 A. LITTORALE Bernh. — LINARIA LITTORALIS.
 A. LONGICORISE Tbnbrg - LINARIA THUISBERGIANA
 A. LUSITANICUM Lnk. — LINARIA TRANSTAGANA.
 A. LUSITANICA LM Vent = LINARIA LUSITANICA.
 A. MACROCAKPIUM Ait — LINARIA GILMAEDRYFOLIA
 A. MACROIRIM M.B. — LINARIA STRIGATA.
 A. MACULATUM Moc. et Sess. - GLOXINIA AMIRRHINA.
 A. MARITIMUM Poir. - LINARIA SUPINA.
 A. MASSILIENSE Poir. - LINARIA MARITIMA.
 A. MICRANTUM Cav. - LINARIA MICRANTUM.
 A. MINUS Linn. — LINARIA MINOR.
 A. MONSPEULANUM Linn. — LINARIA STRUTA.
 A. MULTICAULE Ten. — LINARIA APAEINOIDES.
 A. MULTICAULE Linn. — LINARIA GLAUCA.
 A. MULTICAULE NCTATUM Brot. — LINARIA AMBTHYSTATA.
 A. MULTIBRACTEATUM Brot - LINARIA VARIABILIS.
 A. NEGLECTUM Spr - LINARIA TRIPHYLLA.
 A. ODORATISSIMUM Guldenst. - LINARIA ODORA.
 A. ODORUM M.B. — LINARIA LOESELII.
 A. OPPOSITIFLORUM Pourr. - LINARIA VILLOSA.
 A. ORCIDIFLORUM Dsf. - LINARIA BIPARTITA.
 A. ORIGANIFOLIUM Gouan. — LINARIA BUBRIPOLIA.
 A. ORIGANIFOLIUM Linn. - LINARIA ORIGANIPOLUM.
 A. OSYRIS Cyril — LINARIA CHALBEPENSIS.
 A. PALLIDIFLORUM Lam. - LINARIA GIBBIFLORA.
 A. PALLIDUM Ten. — LINARIA PUBESCENS.
 A. PARVIFLORUM Willd — LINARIA MICRANTHUS.
 A. PARVIFLORUM Jacq - LINARIA ARVENENSIS.
 A. PATESCENS Thunberg - LINARIA PATESCENS
 A. PASCALII M Ronpl - LINARIA PASCALII FLORA.
 A. PALCATORUM Pocz - LINARIA PASCALII FLORA.
 A. PEDUNCULATUM Linn - LINARIA PLUMBIATA
 A. PEDUNCULATUM Poir - LINARIA TRANSTAGANA
 A. PFLISSEKIANA H. & A. — LINARIA PFLISSEKIANA

- A. PELISSERIANUM Mont. — LINARIA GRACILIS.
 A. PIMFOLIUM Poir. « LINARIA RETICULATA.
 A. POLYGALAEFOLIL'M Poir. = LINARIA ITALICA.
 A. POLYGALAEFOLIUM Willd. — LINARIA LUSITAMCA.
 A. POLYGONIFOLIUM Poir. = LINARIA POLYGONIFOLIA.
 A. PROSTHATLM Cyrill. = LINARIA REFLEXA.
 A. PLBESCENS Pers. — LINARIA LITTORALIS.
 A. PUBESCENS Ten. — LINARIA PIBESCENS.
 A. PIMILUM Poir. — LINARIA FLAVA.
 A. PLRPI'REUM Linn. = LINARIA PURPUREA.
 A. PYRAMIDALE Lam. — LINARIA PYRAMIDATA.
 A. PYRENAICUM Ramnd. - LINARIA SUPINA.
 A. QUINQUELOBUM Slok. — LINARIA CTMBALARIA.
 A. REFLEXGM Linn. — LINARIA REFLEXA.
 A. REPENS Linn. — LINARIA STRUT A.
 A. SAGITTATLM Poir. = LINARIA IETEROPIIYLLA.
 A. SAPPPIIRINLM Irot. = LINARIA AMETHIYSTEIA.
 A. SAPPPIIRINLM Sicb. = LINARIA PELISSERIANA.
 A. SAXATILE Ronam. - MNARIA ARENARIA.
 A. SAXATILE =- LINARIA SAXATILIS.
 A. SAXATILE Irot. = LIYUtiA GLUTINOSA.
 A. SCABRUM Thnrg. - > KM ESI A CIAMAEDRYFOLIA.
 A. SCARIOSLM Lam. — LINARIA SCARIOSA.
 A. SERPYLLIFOLIUM Pourr. — LINARIA YILLOSA.
 A. SIMPLEX Willd. - LINARIA SIMPLEX.
 A. SPARTEUM Linn. — LINARIA SPARTEA.
 A. SPBCIOSCM Don. — LINARIA BIPARTITA.
 A. SPINESCEN8 Vhr. — LINARIA AEGYPTIACA.
 A. SPURIUM Brot — LINARIA RETICLLATA.
 A. SPURIUM Linn. — LINARIA SPURIA.
 A. STRIATUM Lam. - LINARIA REPENS.
 A. STRICTUM Sieb. - LINARIA STRICTA.
 A. STRICTUM Siblhrp. el Sm. — LINARIA APARINOIDES.
 A. STRUMOSIM Bnks. - NEMESIA STRIMOSA.
 A. SIBALPIM'M Brot. - LINARIA AMETHIYSTEIA.
 A. SIBI'LATI'M Cyrill. - LINARIA ODOR A.
 A. SLPIMM BroL.' - LINARIA UNMiera.
 A. SLPIMM Linn. - LINARIA SIPINA.
 A. TENELLtM CMS. - LINARIA TEN ELLA.
 A. TENELLUM Prtb. — COLLINSIA YBRNA.
 A. Til'ILLIBRI Merat — LINARIA PYRENAICA.
 A. THYMIFOLH'M Vabl. - LINARIA THYMIFOLIA.
 A. TOtRNEKORTII Poir. - LINARIA SAXATILIS.
 A. TRICOLOR Pourr. - LINARIA AMKTHIYSTKA.
 A. TRIORNITHIOPHIOrrM Linn. - LINARIA TRIORNITHIOPHIOra.
 A. TRIPIHYLLM Cav. - LINARIA CAYANILLESII.
 A. TRIPIHYLLrM Linn. - LINARIA TRIPIHYLLIA.
 A. TRISTE Linn. - LINARIA TRISTIS.
 A. LMLABIATLM Lino. - IKMIMERIS IMLAIIIATA.
 A. YBR8ICOLOR Jcq. - LINARIA VKRSK 'OI. OR.
 A. YILLOStM Lap. - LINARIA ORIGAMKOLIA.
 A. YILLOStM Linn. - LINARIA YILIOSA.
 A. YIRGATUUM BroL - LINARIA VIfcGATI'LA
 A. YIRGATt'M Poir. - IINARIA YIRGATA.
 A. VISr.OStM Curt. - LINARIA IIRTA.
 A. YISCOSIM linn - 11NARK YISIOSA.

3803. MAUBANDIA *Ortega*.

(Ortega, Nov. gen. hort. Malrit. dec. II. 21. — Meisn. Gener. plantar, vascular. I. 305. II. 215. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 532. — Chavannes, Monogr. des Anlirrb. 77.)

§. 1. *Faux corollae pervia**

1. M. BARGLEYANA Lindl. Bot. Regist. t. 1106. — Loddig. Bot. Cabin, t 1381. - G. Don I. c. no. 1. fig. 48. — Chavannes 1. c. 77. t t. 2. A. — Foil, cordatis acuminatis, jumbo. subhaslatis; segmentis calycinis linearis-lanceolatis acutissimis glanduloso-pilosis; corolla pubescente purpureo-violacea v. alropurpurea, lobis marginalis. ^ w — Herba formosa 3-O-petalis et ultra. Caudex brevissimus lignescens. Rami cauliformes laeves glabri ramulosi striati. Ramuli oreo-petalis flexuosi alterni. Folia inferiora mediaque cordata obscure quinclobata, lobis acuminatis, superiora subhastata, inferioribus multo minora. Segmenta calycina tubo corollino duplo breviora acutissima, pilis brevibus articulatis glanduliferisque dense vestita. Corolla sesquipollicaris v. bipollicaris, tubo pubescente virescente curvulo, lobis ovato-rotundatis emarginatis violaceo-purpureis. Stamina filaria apice subclavata flexaque, pilis glandulosis brevibus multata, antherae glabrae lutescentes. Stylus filiformis glaber. Capsula papiracea glabra, calyce tecta. — Crescit in regno Mexicano.
2. M. SEMPERFLORENS Ortega 1. c — Willd. Spec. plant. 111. 380. — Jcq. hort. Schoenbr. III. 20. t. 288. - Curtis, Bot. Magaz. L 400. - Spr. Syst. veget. II. 814. — Rchb. Flor. exotic. V. t. 201. fig. 1. — Chavannes I. c. 78. t — Foil, plerumque cordato-hastatis; segmentis calycinis lanceolato-subulatis glaberrimis; corolla glabra dilute violacea >. rubescente, lobis emarginatis. QJ — Planta glaberrima. Rami cauliformes plures ramulosi, petiolorum pedicellorumque volubilibus operandis. Folia patentia v. circulo-palantia, petiolo limbum subaequante v. eo longiori. Pedicelli corolla fere duplo longiores teretes laeves. Calyx tubo corollino duplo brevior, segmentis acutissimis, margine subscariosis. Corollae sesquipollicaris tubo >ano sulcalis pallide coloratus, lobis subrotundis emarginatis subaequalibus violaceis v. purpureo-violaceis, plicis palati locum occupantibus albidis et ad sinus loborum labii inferioris protuberantibus. Filamenta basi lanuginosa. Stylus subulatus, stigmate obscure bilobo. Capsula glaberrima calycem subaequans. - *Uteria* (*Maurandia* Pen. Enchirid. II. 160.) *teandtu* Civ. Icon. pi. rar. II. 15. 1.110. — Andrews, Bot. Reposit. U 03. — Crescit in Mexico.

f. 2. *Palatum ad faucem corollae prominent.*

3. M. (L'ESTIEUA Poir. Encycl. méth. Suppl. Y. 105.) ANTIRRHINIFLORA Willd. Hort. Berolm. II. p. et tab. A3. — Kth. Synops. pi. aequinoct. II. 121. — Sims, Bot. Magaz. L 1043. - Spr. I. c. 114. - Rchb. Fl. exot. V. I. 201. fig. 2. - Chavannes 1. c. I t. 2. B. — Foil, plerumque triangulari-hastatis; segmentis calycinis longe triangularibus acutis glaberrimis; corollae coeruleo-violaceae glabrae lobis intragerrimis. 2|w — Planta praecedentibus humilior glaberrima. Folia laevia (irmitia pollicaria triangulari-hastata, apice acuta, margine integerrima, lobis baseos (sua auriculis) acutis, petiolum versus interdum unidentatis. Pedicelli filiformes folio longiores. Calycis segmenta apice reflexa et a tubo corollino recedentia triangularia v. sub lanceolata, nervo medio prominente, capsula superantia. Corolla vix pollicaris, tubo supra basin coarctato ventricoso cosuto albido-violaceo, lobis labii superioris ovatis erectis coeruleo-violaceis, labii inferioris ovalo-oblongis distantibus concoloribus, palato evoluto stramineo pilis brevissimis in medio lineisque fuscis notato. Capsula ovalo-globosa obliqua, lobulo superiori altro saepe minori. — 31 *pmnnla* Si^{sr} mss. in L. IR. Klond. hort. Mairil. ao 1815. Nov. gen. 10. - OITM-U IUCIH nUs inter Salamanca Mexicanorum et convallent Sli. Jacob) (all. 930 hriap.
4. M. STRICTA Hook, et Am. Bot. Beech. 375. — Recta raraosa annua glabra, bantantummodo pubescens foil infimi[«] partii^{*} ovarii^{*} petiolatm. rfoliis Uncofoltti^{*}

linearibq. sessilib., omnib. integerrimis; pedunculis solitariis axillarib. unifloris elongatis recurvis, apice sarsum curvatis. O — Habitat in California.

3894. GALVEZIA *Domb.*

(*Domb.* mss. in *Juss. Gen.* pi. 110. [nee *Rz. et Pav.* — Cf. *Reperlor.* I. 510. no. 5000.] — *G. Don, General syst. of gard. and bot.* IV. 532. — *Agastzia* Chavannes, *Monogr. des Antirrhinees* 180. 1.11. — *Meisn. Gener. plant, vascular*, I. 305, II. 215. — *Dodartia* *Rz. et Par. Prodr. Fl. Peruv.* 56.)

I. G. (AGASSIZIA Chavannes, *Monogr. des Antirrhinees* 180. t t. 11.) LIMENSIS *Dombey* mss. I. c. — *G. Don* I. c. — Planta fruticosa 1-3-pedalis ramosissima; ramis allernis erecto-patenlibus ramalosis glanduloso-pubescentibus. Folia ovato-lanceolata petiolo brevi munita patentia v. erecto-patentia *Myrlum communem* forma referenda pollicaria v. sesquipollicaria, mucrone parvulo apice Instructa, crassiuscula, pube brevissima vestita, inferiora plerumque opposita, superiora alternata distantia, ramulorum fere omnia opposita magis approximata multoque minor, interdum ovata. Flores in axillis foliorum erecto-patenles, pedicellis capillaribus ac supra medium eleganter flexis suffulti. Corolla coccinea 6-8 lineas longa, pilis brevissimis pubescens. Stamina filamentis basi praesertim et apice glandulis stipitalis instructa, antherae glabrae v. leviter pubescentes*. Stylus longitudine staminum minorum, apice subinflexus. Capsula glaberrima chartacea, calyce multo longior. *b* — Crescit prope Limam in Peruvia.

3895. LOPHOSPEBIMUM *D. Don.*

D. Don, Transact. of the Linn. Soc. XV. 340. — *Meisn. Gener. plant, vascul.* I. 305. II. 215. — Chavannes, *Monogr. des Antirrhin.* 75. t. 1. — *G. Don, General syst. of gard. and bot.* IV. 533. exci. sp. 3.)

1. L. (BESLERIA Moench et Setsch mss.) 8GANDENSIS *D. Don* I. c. — *G. Don* I. c. no. 1. (nee Chavannes I. c.) — Folia cordatis acuminatis profunde serratis pilosis quinquenerviis; pedunculis ebracteolatis; caule herbaceo. Rami pilis rarioliter viscidis tecti. Folia 3-4-pollicaria, 2-3 poll. lata. Floret penduli. Pedunculi et calyces pilosi. Corolla magna speciosa purpureo-rosea. — In Mexico.

2. L. ERURESCEENS *D. Don* mss. in *Sweet's Brit. flow. gard.*; *Nesler's Scr.* I. t. 68. — *G. Don* I. c. no. 2. — Ramis pilis articulatis brevibus viscidis tectis; foliis cordatis magis minusve distincte quinquelobis pubescentibus, lobo medio magno, omnibus mucronatis, crenatis v. profunde serratis; pedicellis villosis ebracteolatis. — Planta speciosa 6-8-pedalis et ultra. Rami cauliformes nodosi, basi lignoscentet, cortice cinereo striato. Ramuli teretes erecto-patenles, pilis articulatis mollibus viscidisque obducti. Folia longe petiolata *Campanulam Trachelium* forma referentia, petiolo volubili, supra canaliculato pubescente, limbo cordato 3-5-pollicari, 2-4 poll. lato, nervo, nervis ab origine petioli palmatis, dein pennatis, folia superiora molto minor. Floret penduli magni, pedicellis mollibusque suffulti. Calyx breviter tubo corollino duplo brevior, segmentis inaequalibus aculis, interdum 1-2-dentatis, duobus exterioribus amplioribus. Corolla ampla speciosa saturate rosea, pilis capitatis brevibus obsita, tubo subtus albo-hirsuto, intus in raodum marmoris variegato, lobis naepe submarginatis*. Capsula pubescens, calyce tecla. — *L. srandent* *Hook. Bot. Magaz.* t. 3037. 30. cl 3050. — *Maund et Honslow, The Linn. Soc.* I. t. 17. — *Lindl. Bot. Regist.* t. 1381. — Chavannes, *Monogr. des Antirrhinees* 75. t. I. 1. nec *Don.* — In Mexico prope Jalapam.

† *Species? non satis certa.*

3. L. (SCROPHULARIA Mocino et Schum mss. — (a) THOMASIA *G. Don, General Syst. of gard. and bot.* IV. 502. — *Meisn. (Gener. pi. vascular.* II. 215. no. 5., *PHY-8ALOIDES* *D. Don* in *Transact. of the Linn. Soc.* XV. 340. — Chavannes I. c. 70) — Canlia «recina fruticosus. Rami teretes rigidi popilloio-sarabri. Folia a Hero* v. superiora subopposita «sessilia lanceolata acuta denticulata, aculeis minutis» imis callosis stabra, sesqui- v. bi-pollicana Pedunculi axillares solitarii ovati terete nati, foliis brevioribus. — ultra medium hirsutis doabus approxi-

• matis lanceolatis aspens mumti. Calyx asper reticulatus multifidus quinquefidus, lobis semiovatis aculis integerrimis. Corolla ampla sordide? violacea, praecedente multo brevior. Filamenta omnia glabra; antherarum lobis longioribus, superne confluentibus, basi tanquam I am divaricatis. Stigma simplex. Ovarium globosum biloculare. Semina . . . ? 6 — Crescit in Mexico.

ff *Species e genere expellenda*

L. ATROSANGUIWUM Zucc. — ~~immatura~~ ~~TON~~ ~~v n n m i f~~
L. RHODOCHITOS D. Don. - 1 ~~RHODOCHITOS~~ VOLUBILE.

3890. RHODOCHITON Zuccar.

(Zuccar. mss. ex Grab Bot Magaz. t. 3307. — Meisn. Gener. plantar, vascul. I. 305. II. 215. — *Lophospermum* ex p. G. Don, General syst. or gard. and bot. IV. 533)

1. RH. VOLUBILE Zuccar. mss. in Grab. Bot. Magaz. t. 3307. — Lindl. Bot. Regist. 11755. — Folia, cordatis acuminatis grosse dentato-serratis; calycibus semiquinquefidis patentibus; corolla tubulosa; filamentis simplicibus. 6[^] — Planta pilis articulatis nitidis vestita. Rami Juniores purpurei. Folia quinquenervia, viscida, infra purpurea, circiter tripollicaria, 3 pollices fere lata, petioli purpurei. Flores penduli. Pedunculi saepe volubiles, demum (cum calycibus) glabri nitidi. Calyx patens pallide purpureus medium usque deciduus. Corolla infundibuliformis airo-purpurea pilis albis glandulosis vestita, fauce cylindrica subventricosa, hinc lobis ovalibus connatis obtusis, inferioribus longioribus. Capsula sphaerica. — *Lophospermum Rhodochiton* D. Don mss. in Sweet's Brit. flow. gard. (New Ser.) III. t. 250. — *Lophospermum atrosanguineum* Zuccar. Abhandl. der math.-physic. Classe der Kgl. Baiersch. Akad. 1820. 30. edit. I. 305. f. U. 13. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 533. no. 3. — Crescit in Mexico.

Genus anomalium.

3897. COLLARIA Vuff.

(Null. Journ. Acad. Philad. I. 100. t. 0. — Meisn. Gener. plantar, vascul. I. 305. II. 210. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 555)

1. C. VERNA Null. I. c. t. 0., Gen. Am. II. 40. — Sweet, Brit. flow. gard. III. t. 220. — G. Don I. c. no. 1. fig. 51. — Caule erecto iterum ramoso; foliis lanceolatis, pedicellis axillaribus. solitarius quam floret multo longioribus; calycibus pubescentibus. corollam subaequantibus. Q. — *Antirrhinum tenellum* Prsb. FL. Am. Sepi. II. MI. — Corolla alba, labio inferiore coeruleo. — Crescit in America boreali-occidentali (Mississippi, Missouri, ad lacum Erie.)
2. C. GRWDIFLORA Lindl. Bot. Regist. I. 1107. — Hook. Fl. Bor. Americ. II. 04. — G. Don I. c. no. 2. — Caule erecto, foliis linearibus-oblongis, basi angustatis; pedunculis verticillatis floribus brevioribus; corollae lacinis dilatatis retusis; calyce glabra corollae duplo brevioris. O. — Folia glabra integra v. denticulata. Corolla, excepto labio inferiore coeruleo, pallide purpurea. — *C. tolacea* Nutt. Transact. of the Am. philos. Soc. (New Ser.) V. 170?? - Crescit in Columbia.
3. C. VIOLACEA Nutt. Transact. of the Americ. Philoi. Soc. (New Ser.) V. 170. — G. Don I. c. no. 4. — Puberula: foliis ovali-lanceolatis remote denticulatis, corolla aobconcolore, labio superiore quam inferius dimidio minore, segmentis apice bifidis; capsulis subdecaispermis. O. — Caules purpurascunt. Folia radicalia oblongo-ovata, caulina sessilia opposita, suprema terna verticillata. Corolla pallide violacea, labio superiore pallidiori. Semina minoribus quam illa *C. venae*. — Crescit in America boreali (Arkansas, Red river.)
4. C. BILOI OKIAH Transact. of the Floric. Soc. (New Ser.) I. 480. — Lindl. Bot. Resist. t. 1734. — Hook. Bot. Magaz. I. 34*3. - G. Don I. c. no. 3. — Caule erecto pubescente, foliis ovali-lanceolatis, hinc cordatis, pedicellis verticillatis racemosis. O. — Inflorescentia sessilis serrata, superioribus minoribus integerrimis. Calyx glanduloso-pubescentis. Corolla quam (*grandiflorae* duplo major, tubo labioque superiore albis, labio inferiore purpureo) — In California

5. *C. MIMMA* Nutt. Journ. Acad. Philad. \II. 47. — G. Don I. c. no. 5. — Foil op-
po:»ilis cuneato-oblongis oblusis subdenticularis; calycis segmentis corollam viz
dimidiam aequantibus. O — Pedunculi axillares folio longiores. Flores mmores
quara *C. ternae*, sed quam *C. pant/lorae* majores. Corollae labium superius
album, inferum coeruleum. — *C. vtolaeeae* Null, valde affinis dicilur — Crescit
in America boreali.
- 6* *C. PARVIFLORA* Lindl. BoU Regisl. t. 1062. — G. Don 1. c. no. 6. — Cauje pro-
slrato pubescente, foil oblongo-lanceolatis, inGmis o\alis^>eliolalis; pedunculis
axillanb. solilaris, Oonb. multo longionb.; corollae lacimis subaculis integns;
calyce pubescenle, corollae subaequali. O — Corolla parva purpurea el coerulea.
— *C. parvtflora* Hook. Fl. Bor. Americ. II. 04. — Crescit in America boreali
fSaskatchawan, ad lacum Winipeg el in Columbia).
- 7 *C. SPARSIFLORA* Fiich. et Mey. Indx. semln. hort. Pelropolit. 1836. ex Ann. des
scienc. nator. V. 301. — G. Don I. c. 556. no. 7. — Diffusa* foil, omnib. oppositis;
flonb. solilaris; pedicello calyce snblongiore; capsula globosa. O — Glabra, ra-
mosissima. Caules el rami fill formes. Folia omnia v supcnora lantummodo
opposita. Flores soliiarn, ranus oppositi intermedii inter Illos *C. grandt/lorae* el
C. paru/lorae Corolla pallide violacea, labn inferions scgmenla laleralia obscure
purpurascencia — Crescii in California ad coloniam Rnssorum.
8. *C. HETEROPHYLLA* Hook. Bolan. Magaz. I. 3695. — Foil. Infcnonb tnlobatis,
supenonb. otato-acuminalis, pedunculo flonb. brevior; calycib glanduloso-
pubescentib, lacinns corollae apice rotundais crenalis, lobo medio labn infe-
rions subacuto, labio superiori faoce subinlegro. O — In America boreali.

3897/1. *LEPTOBHABDO8 Schrenk.*

(Conferas Infra no. 380Q/L)

Tribus IV. SALPIGLOSSWEAE Btta. Revis. 2. — Endl.
Gener. pi. p. 675.

Corolla tubo saepitis elongato, limbo nunc bilabiato, nunc subaequa-
liter quinqaelobo piano. Stamina feriilia duo >el saepius quatuor did)-
nama drclinata, quinlum sterile vel nullam; antherao subbiloculares, lo-
calls apicc confluentibus. Capsula biloculans sephfrage bitahis, tahis
integrib |el| bifidis, dissepimento placentifero parallehs. Embryo rectus
vel magis minusve arcualus — Inbus a *Solanaceu capsulanbut* corol-
lac aestnazione irabricatha et stamine quinto imperfecto caute distin-
guenda.

3808. *ACHIBAIVTHCS As. §t Pavon.*

(Ri. el Pat. Prodr Flor. Pern*. 5. t. I. — Meftn. Gener. plantar, vasent I. 309. II.
215. — Dielr S>nop« plantar. L 54. — G. Don, General sy«l of gard. and boL IV.
400 — I mdl Bot. Regifl. [1t% her.) ad I. 45 adnoi

SCII PIN>ATI'S Rf ft Pav |. c, Flor. Peruvian I 11 t t 17 Hook. Eio-
tir Flora t 73 - krr, Bolan. Regifl. I. 725 - Hook Rot Uapaz t 2401 — Rccb.
Flora riottr I. 324 fig 1 — G Don I r no I — Pniunrulin fructifrrtf apice
inOeiH «rcundi« corollar labii infrinris nrgmrnti^ lalrralib inirrtncdio obcor-
dato longionb, rornllae «rgmenlis suprrriorib runoaiiH «*marginaii<) — t.orolla
rotea eeniran vemui albetcent, irgmrnla 2 lairrali.i in lobot obiu»o» »pathulato«,
inteHom emarfiMiot flfta, labiom infvmm rubicundo-porpurlum, labium su-
perani fariefauini, in rntro mamla porparea noiatum Caulit bipedalit ereclai
teret parct ramosat. folia alirrna broiler peilolatt intrrrrupte plnnaia, iegmen-
tis testllibat, majort lacinUto-plnntatflda, ninora lanceolaia Integra. Flore*
pamculatit, pedkelli* omflon*. Bracleolae geminae lanceolatae. FilamenU tie-
rtlia villoaa. — Crctcil In Chili in Esqnadron tt in Araacanoran Uaciu

- fi. humilit* Lindl. Bot. Regist t 1302. — Rchb. I. c. fig. 2. — D. Don in Sweet's Brit. flow. gard. II. t. 167. — flumilior: foil, lyralis, segmentis rotundatis renatis T. integris; racemis densioribus. Q — Crescit in Chili.
2. SGH. PORBIGEN8 Graham mss. in Hook. Exotic Flora t. 80. — Rchb. I. c. fig. 3. — Hook. Bot. Magai. t. 2521. — G. Don I. c. no. 2. — Pedicellis fructiferis partentib. rectis; corollae tubo calyce brevior, labii inferioris segmentis lateralibus intermedio longioribus, labio superior! oblongo obliquo. O — Corollae aegmenia lateralibus duplicata-lobata, lobis bifidis obtusis non profundis. Labium inferum violaceum v. purpureum, reliqua corolla pallide rubra, centro labii superioris tamen luteo. — Hunc cum praecedente consociandum censet Lindley (Bot. Regist. New Ser. XVI. adnot. ad t. 45.), in horto enim cullus ad illius formam dicitur transire. — Crescit in Chili.
- a 6CH. PINNATIFIDUS Lindl. Bot. Regist. U. (New Ser.) XVI. adnot. ad t. 45. — Foliis angustis pinnatifidis, laciniis rotundatis nanis integris; corollae labio inferiore trilobo, lobo intermedio cucullato bilobo, lateralibus falcatis spatulatis obtusis; labio superior! bilobo. O — Capsula *Sch. pinnati*, sed duplo major. — Crescit in Chili ad Coquimbo.
4. SCH. RETUSUS Hook. Bot. Magai. t. 3015. — Lindl. Bot. Regist. t. 1544. — Rchb. I. c. fig. 5. — D. Don in Sweet's Brit. flow. gard. (New Ser.) III. t. 301. — G. Don I. c. 470. no. 3. — Pedunculis fructiferis erectis; corollae tubo calycem excedente; segmentis labii inferioris lateralibus intermedio sagittato brevioribus, labio superiori rhomboideo-oblongo retuso. O — Herba laete Terebinthina. Folia ejusdem formae ac illa specierum praecedentium, profunde et interrupte pinnatifida subpinnata, ut illa *Pyrethri*, segmentis lanceolatis obtusiusculis, primariis profunde pinnatifidis. Corolla pallide violacea, lobi laterales concolores duplicata-bilobi, lobis obtusis inaequalibus divaricatis. Labium inferum obscurius rubicundo-purpureum tripartitum, segmentis lateralibus linearibus obtusis, segmentum corollae superum intermedium obscure brunneo-maculatum, subtile venosum, marginibus revolutis, basi cucullatum, apice lilacinum. — Crescit in Andibus Chilensibus.
5. SCH. HOOEERI Gillies mss. ex Graham in Edinb. philos. jour. 1830. ex Hook. Bot. Magai. t. 3070. — Rchb. I. c. fig. 4. — G. Don I. c. no. 4. — Pedicellis fructiferis erectis; corollae tubo calyce longiore limbo aequante, lobo inferior! longe bicornuto, labii superioris lobo intermedio long! aequante. £ — Tota corolla pallide rosea excepto solo labii superioris lobo intermedio. — Crescit in Andibus Chilensibus.
6. SCH. CANDIDUS Lindl. Bot. Regist. (New Ser.) XVI. t. 45. — Folia pinnatifida, laciniis linearibus undulatis integris; corollae pallidae lobis inferioribus trilobis, laciniis lateralibus setaceis, intermedia biloba icatiliima, lobo superior! alte bilobo. O — Crescit in Chili ad Coquimbo.
7. SCH. GRAHAMII Hook. Bot. Magai. t. 3014. — Rchb. I. c. fig. 6. — G. Don I. c. no. 5. — Pedunculis fructiferis erectis; corollae tubocalycis longitudinali, labii inferioris segmentis lateralibus intermedium bifidum aequantibus, labio superior! rotundato-bifido obtoto (ut in reliquis speciebus) cum labio inferior! lateralibus duplicato-bifido obtoto (ut in reliquis speciebus) cum labio inferior! linearibus lilacina, segmentum labii superioris intermedium lobatum, apice lilacinum. Folia praecedentium. — Crescit in Chili.

3809. SALPIGLOSSM Af. et Pw.

(Ri. et Pav. Prodr. Flor. Peru? 04. t. 14. — Meisn. Gener. plant. ur. vascular. I. 307. II. 218. — G. Don, General syst. of bot. IV. 460.)

1. S. SINIATA Ri. et Pav. I. c. — G. Don I. c. fig. 40. — Tota planta glandulotoplosa: foliis inferioribus petiolatis elliptico-oblongis sessilibus, superioribus sessilibus lanceolato-linearibus integerrimis; caule apicem versus paniculato-ramoso; ramis racemosis dichotomis; filamentis glanduloso-pilosis. £ — Corolla magna obscure

purpurea, Interdum fere nigrescens, centro aurantiaca, venis obscurionibus per-
 cursa. — *S. atropurpurea* Hook. Bot. Magaz. t. 2811. — Lindl. Bot. BegisL t1518.
 — Rchb. Flora exotic. V. I. 323. fig 3. — Sweet, Bnl. flow. gard. III. t. 271.

fl. ptcla: Glanduloso-pilosa. caule paniculato-ramoso; ramis dichotomis, foliis
 inflexis. ovato-oblongis obtusis rugosis sinuato-dentatis, superis lanceolatis
 acutiusculis undulatis inlegemmis; corollis eleganter luteo-coeruleo-
 rescenti-purpureo-maculatis. — *S. ptcla* Sweet, Brit. flow. gard. HI. t 258.
 — Rchb. I. c. Gg 2 — *S. strammea fl. ptcla* Hook. Bot. Magaz. t. 3305.

y. strammea: Corolla lactea coeruleo-venosa. — *S. strammea* Hook. Exotic
 Flora HI. t. 229. - Sweet, Brit. flow. gard. HI. t 231. — Rchb. I. c. fig. 1.

d. Barclayana: Corolla fusco-luteoque-striata. — *S. intermedia* Sweet I. c. II.
 t 112. — *S. Barclayana* Penny mts. — Crescii in Chili (ad Valparaiso).

1 *S. PROSTRATA* Hook, et Am. Bot. Beech, t. 153. — Sparsim glanduloso-pu-
 berula caule prostrato ramoso; foliis, oblongo-spatulatis integris; pediculis
 axillaribus unifloris, foliis multoties brevioribus. — Crescii in California.

t *Species e genere expellenda.*

S. INTEGRIFOLIA Hook. - *PETUNIA VIOLACEA.*

3900. *APTOSIMUM Burchell.*

(Burchell, Travels 1.260. — Meisn. Gener. pi. vascular. 1.307. 11.818. - Blh. mss. in
 Lindley's Bot Regist I. 1882. adnot.)

S. 1. Folia petiolata, detrita non spinosa; calycis laciniarum intus tomentosae.

1. *A. ERIOCEPUALUM* E. Mey. mss. ex Blh. I. c. — Ramis prostratis longe lanatis;
 foliis, longe petiolatis ovalibus glabris; calycibus lanatis, laciniis internodiis
 pubescentibus; capsulis fixis emarginatis. 6 — Geseit In Promontorio bonae spei (Gariepe).

2. *A. DEPRESSUM* Burchell U. Blh. in Lindl. Bot. Regist t 1883. t - Ramis
 glabris v. breviter lanuginosis; foliis, confertissimis petiolatis obovatis glabris, co-
 rolla multo brevioribus; calycibus extus glabris, intus lanatis capsulas emar-
 rinatas vix saperantibus. 6 — Caulis fruticosus terrae adpresbus in supina parte
 densissime ramulosus ac foliis spatulatis petiolatis minus confertis levis. Folia
 3-4 lin. longa hand opposita, sed spirata, crassiuscula obtusissima breviter mu-
 cronata glabra. Calices in inferiori parte ramulorum breviter pedicellari axillares,
 longiludine foliorum, chartacei pallidi ad v. bifidi, extus glabri intus, laciniis
 acuminatis palenibus, intus dense albo-tomentosis. Bracteolae 2 breves lineares
 pubescentes ad basin calycis. Corolla 8 lineas longa, exius pubescens coerulea,
 tubo brevi angusto, limbo infundibuliformi, brevi spatulo quinquefido, laciniis ae-
 qualibus palenibus brevibus. Stamina inclusorum filamenta glabra, antherae
 ante debiscentiam cordatae subrotundae, deinde transversae subrotundo-ovales,
 transvertim pauloque inferius debiscentes, labio superiori recto verticali, inferiori
 nodulato quadrilobato ciliato. Vertex lanuginosus albus cinctus. Stamina breviorum
 antherae coaeformes, dimidio duplo minus. Stylus longitudine staminum guber-
 natus apice incurvus; stigma trilobum. Capsula calyce tunc compresso
 rigiduloque transversa, apice incurva et subreclusa, longitudinaliter rugoso-venosa,
 in fenestris crassior rigidiorque nigrescens. Semina in inferno receptaculo con-
 ferta sabingona oblusa puncto-aspera nigra. Funiculus in siliolam brevis
 cyathiformem trilobam abiit. Albumen lenue carnosum Embryo aulis rectus,
 radice subcylindrica, cotyledonibus oppositis. — *Russeha depreia* Tbnbrg. Flor.
 Capes. T - *OkUndorffia procumbens* Leu. D. Lionaea XI. Uteraturb. 01. - Crescit
 in Proaomorio bonae spei.

1 *A. INDIVISUM* Burchell. I. c. 19 ex Bib. I. e. adnot - Ramis brevissimis; foliis,
 dense caespitosis oblongo-spatulatis glabris corollas aequantibus; calycis laciniis
 internodiis lanatis. 6 - *OkUndorffia rotunda* FTes ab Eseb. mis. - Crescit in Pro-
 montorio bonae spei in deserto Carroo.

§• 2. *Folia subsessidia, nervo medio valido persiitente, apice demum spinescnte; calycis laciniae intus glabrae.*

4. A. VISCOSUM Bib. I. c. — Herbaceum?: foil, late oblongo-spalhufalis viscoso-pubescentib., nervo medio infra apicem spinescnte, flores ler supcranlibus. 2f — Crescii in rupibos prope Gariepe in Promontorio bonae spei.
5. A. TRAGACANTHOIDES E. Mey. mss. ex Bib. I. c. — Suffruticosum: foil, angasie oblongis spalhulatis glabris, flores vix superantib., nervo medio infra apicem spinescnte. 6 — In rupibus circa Kunkunnuroab in Promonlorio bonae spei.
6. A. ABIETINUM Burchell I. c. 1. 308. ex Bib. I. c. — Suffruticosum: foil, linearib. glabris flore breviorib., nervo medio excurrente spinoso. 6 — *fi*> *elongatum*: — Grescil in Promonlorio bonae spei (Sunday river etc.)

3001. PELIOSTOMUM *Bth.*

(Btfa. In Lindl. Bot RegisU adnoU ad t. 1882. — Meisn. Gener. plantar, vascular. I. 307. II. 210.)

1. P. SCOPARIUM E. Mey. mss. ex Bib. I. c. — Herbaceum rigidum ramosissimum viscosum: foil, parvis paucis oblongo-linearib.; laelnlls calycinis oblongis viscoso-villosis, capsulam aequanlib.; corollae lubi parte atenuata calyce brevior. 2l — Crescii in Promonlorio bonae spei (Gariepe).
2. P. LEUCORHIZUM E. Mey. mss. ex Bib. L o. — Herbaceum rigidum ramosissimum glabrum: foil, oblongo-lanceolatls v. linearib.; laciniis calycinis apice subulais, capsula breviorib.; corollae tubi parte allenuaia calyce subduplo longiore. 2l — Crescii in Promontorio bonae spei (Gariepe). -
3. P. VISCOSUM E. Mey. mss. ex Bib. I. c. — Herbaceum rigidum divaricalo-ramosum viscoso-pubescentib.: foil, obovalis oblongisve; laciniis calycinis linearib. oblusis, capsula dimidio breviorib; corollae lubi pane allenuaia calyce subduplo longiore. 2l — Crescii in Promonlorio bonae spei (Gariepe).
4. P. VIRGATUM E. Mey. mss. ex Bib. I. c. — Suffruticosum: ramis rigidis virgalis viscosis; foil, inferionb. obovalis, superiorib. sessilib. parvis subrolundis, o in nib. subcarnosis leviiier viscosis; laciniis calycinis obovalis oblongisve capsula dimidio breviorib.; corollae tubi parte allennaia calyce parum longiore. i — Crescit in Promonlorio bonae spei (Namaqaa).
5. P. ORIGANOIDE? E. Mey. mss. «x Bth. I. c. — SuffruUcosuai gltbran: ramls brevib. lorluoso-prosiratis; foil. ovaUs v. obovaUs; ealyols laeJiis liocarib. aouliusculis, capsula obtusa vix breviorib.; corollae tobi paiie auanuaia vix exserU. 6 — Crescit in Promontorio bonie spei (Nienweweld at Sneewbergen).

3002. AVrnoCEBCIS *LabUlard.*

(Labillard. Nov. Holland. II. 10. u 158. - Meisn. Gener. plant, vascul. 1.307. II. 818. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 478.)

1. A. LITTOREA Labill. I. c. - Ker, Bol. Regisl U 212. — Sweet, Flora Anslralai. t. 17. — The Botanist. III. t. 102. — G. Don I. c. no. 1. — Foil. obovaUs impunctatls, margine laevib., nlrinq. ramulisq. glaberrimis; corollae laciis tubo longiorib.; capsula oblonga calycem bis soperante. -to — Corolla magna pallide Oava, inlus porpureo-striau. — Crescii in Novae Hollandiae ora aostrali.
2. A. ALBICANS Cunniogb. Appendix to Field's Geogr. mem. of New South Wales 335. (cum Icone). — Sweet, Hort. Britannic 205., Flora Aostralas. t 10. — G. Don I. c. no. 2. fig. 42. — Foil, oblongis oblois, otrlnq. ramisq. dense tomentosib; corollae quinqep.artiue segmenlis tubo longloribns. 6 — Flores fragrantib albi, tubo intus coeruleseentii-purpureo-srlrato. — Crescit in New South Wales.
3. A. VISCOSA R. Br. Prodr. fl. Nov. Holland. 448. (edii. Nees ab gsenb. 304.) - Bot. Magaz. lab. 2061. - Bol. Regist. t. 10*1. - The Botanist II. t. 5Q. - p_o||. obovatis glanduloso-puncialis, margine scabnuhculis, novellisrainulisq. lenulssimt pnbeseoolib.; capsula ovata calycem subaequame. 6 — Corolla magna alba. — Crescii in Novae Hollandiae ora ausrali.

4. A. ANISANTHA Endlich. NOT. stirp. mas. Vindoboo. decad. I. 80. f — Viscoso-pubescentis: ramis ramulisq. spinescentib.; foil, in ramulorum axillis fasciculatis oblongo-cuneatis, obtusis integerrimis; corollae laciniis tribus posticis brevioribus. 6 — Ramuli teretibus 2-4-pollicares subflexuosi, spinis alternis, 4-5 linearum intervallo remotis patentissimis 4-5 lin. longis. Foliolorum ramos v. spinas foliolorum paucissimas sapersani, plurimas in ramulorum, pauca in spinarum axillis fasciculata oblongo-cuneata, 3 lin. longa, lineam lata, apice rotundata, versus basim angustata integerrima crassiuscula, in nervis, dense viscoso-pubescentia. Pediculi ciliati et foliorum fascialis subsolarii filiformes circiter 3 lineas longi viscoso-pubescentes, at videtur ebracteolati. Calycis tubus subcampanulatus (an linea paullo brevior) quinque-nervis, nervis rariis glanduloso-pubescentibus in limbo laciniis ezcurrentibus. Corolla infundibuliformis campanulata, at videtur 8-9 lin. longa, tubo 8 lin. longo, limbo subgloboso eocincto, saepe amplicato, intus glaberrimo striato, limbo quinquepartito lobis anguste linearibus acutis, 5 anticae 5 lin. longae, tres posticae sesquilineae band longiores, reliquae paullo angustiores. Capsula orata acuminata, calycis tubo aucto dimidio longior bilocularis bivalvis. Semina papaveracea fascia scrobiculata. — Crescit in Norae Hollandiae aegro-occidentalis interioribus.

390V. ANTHOTBOCHE Endl.

(Endl. Gener. plantar. pag. 1404 Suppl. I. — Endl. Novar. stirp. mas. Vindobon. decad. p. 7. — Meisn. Gener. plantar. Yascular. I. 307. II. 818.)

1. A. PANNOSA Endl. I. c. p. 7. no. 0. f — Fruticosa: ramis pedibus oppositis ramulis tomento denso sordide cinereo pannosis; foil, alternis, junctoribus subfasciculatis obovatis T. obovato-rotundatis obtusissimis, basi nonnihil attenuatis (§ lin. longis, 4% lin. latis) integerrimis erassiusculis tomentosis; floribus. In inferioribus foliorum axillis solitariis terminalibus; corollae tubo sorsum ampliato, limbo rotato-aplanato, ad medium calicis lobis (lobis lanceolatis striato), lobis obtusis, natis. — praesertim ezta — lanato-pubescentibus; capsula calyce calicis abscissa lala basi sessili, Pisi minoris mole, biloculari quadricellata; seminibus oblongis serotinis fuscis. 6 — Crescit in Norae Hollandiae aegro-occidentalis interioribus.

#

3003. BROWALLIA.

(Linn. Gener. plantar. no. 773. — Meisn. Gener. plantar. Yascular. I. 307. II. 218. — Spr. Sjuec. II. 808. - G. Don, General syst. of gard. and bou IV. 477.)

1. BR. VISCOSA B. B. Kth. NOT. gener. et spec. plant. II. 373. — G. Don I. c. no. 1. — Foil. subrotundo-obovatis; pedunculis natis; ramulis calycebusq. viscoso-birtis; corollae lobis. Q — Herba diffusa. Folia obtusa pilosa pollicaria T. sesquipedalia. Pediculi ad apices ramulorum aggregati. Segmenta calicina lanceolata acuta. Corollae lobis oblongis emarginatis, segmento maiore albo-maculato, tubo terso limbo inflato albo. — Crescit prope Loia et Goniam (Nofo-Granatensium).
2. BB. DEMISSA Linn. Spec. plantar. 870., Hort. Cliffort. t. 17. — Sims, Bot. Magas. 11131 — Sabb. Hort. Boman. II. t. 100. — Mem. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève VI. t. 1. Uff. - G. Don I. c. 478. no. 9. — Foil, oblongo-obovatis, basi acutis; pediculis unifloris ramulisq. puberulis; calycebus glabris. Q — Folia pilosissima. Segmenta calicina lanceolata. Corolla pallide coerulea nitida, interdum porporascens Y. roscens, saepe in eodem spedmine bae troe coloria Yarietatos simul occurrunt. Segmenta limbi (at in reliquis spelebos omnibus) obovata emarginata, majori basi albo. - Decoctio bojos plaue •onm Upam, porriginis speiem adhibitor. — Crescit in aegro-occidentalis interioribus Croatiae et La Veota graedo.
- X BB. ELATA Usja. L. c. 880. - Curtis, Botanic Magas. t. 34. - O. DOB I. e. no. 3. - Foil. obovatis. aeomium; pediculis unifloris. Y. moluboris. O - Diffusa praecedens tutva majori, caulibus Hgidiobis rariis natis interioribus.

- Galycis lacinae glanduloso-pilosae; corolla obscure axurea. Kami Inferiores caulibus circiter sunt longitndine et folia floralia glabrescentia. — [*Sprmgeliui* bane cum praecedente conjunxit: *Br. IAMnaeana* Spr. I. c. no. 2. — Caule erecto ramoso; foil, oblongis, ntrinq. attenuatis; pedunculis axillarib. subnifloris ramulisque pubescentibus; calycibns glabris.] — Crescit in Peruvia.
4. BR. ELONGATA H. B. Kth. 1. c. 372. - G. Don 1. c. no. 4. — Foil, ovatis acuminatis, basi rotundalis; pedunculis unifloris; ramulis calycibq. pnbescenti-hirtellis. O — Herba ramosissima; rami angulalii pubescentes. Folia pilosula. Calycis segmenta lanceolata erecta. Gorollae limbus coeruleus, segmentis obovatis emarginatis, majori ad basin albo-maculato. — Valde affinis *Br. demissae*. — *Br. lactea* Honor. — In Nova Granata inter urbem Mariquita et fodinam Stae. Anae.
- ft. BR. GRANDIFLORA Grab. New Edinbrgh. philos. journ. XI. 108. t - G. Don I. e. no. ft. — Hook. Bot. Magaz. t 3009. — Gaule diffuso ramoso; foil, ovalis aculis; pedunculis axillarib. unifloris v. in racemos terminates dispositis; ramulis calycibq. adultis glabris. O — Gaulfs glaber viridis, infra pnrpurascens; rami patentes glabri virides. Folia ovata acuminata in petiolum attenuate, nenro medio venisque convergentibus, infra prominulis, supra eisculptii. Pedonculi recti uniflori axillares folio supremo minor! loogiores, in racemos laxoi corymbosos eollecli, Juniores glanduloso-pilosi. Calycis segmntnta inaequalia patentia linearia. Corolla hypocraterimorpha, Inbo calycem excedente, apicem versus snbinflato glanduloso-villoso vlresoenti-flavo, limbo albo v. paliide Illaolao, faoce lutea. Segmenta latissima in corollem subblabiatam eoallta, apice breviter bifida, labio inferiori semiciroulari oetolobo, superior! vix emarginato. — Crescit in Peruvia prope Yazo in convalli Cantae.
6. BR. CORDATA G. Don I. c. no. 0. — Caule diffuso ramoso; foil, cordatis'acutis; pedunculis axillarib. unifloris v. in racemos terminates digestis; ramulis calycibq. adultis glabris. Q — Caules diffusi teretes ramosi. Folia alterna breviter petiolata dtstincle cordata obscure viridia. Racemi seenndi terminates pauciflori, pedunculis ebracteatis pubescenlibus. Calyx oblongns quinqueplicatus, qolnqocdenlatus pallidus, denlibus et costis alro-viridibus. Corolla calycem duplo excedens, tubo gracili fliformi Inteo-pnrpneo, apice ampliato, limbo bilabiato plicato quinquelobo subaequali paullulum obliqno, laciois emarglnatis, primum pallide coeruleis, mox albis, fauce lutea. Stamina didynama, superiors arcuata faucemque corollae clandenlla, filamentis laUs plants pubesceaUbus. Antherae lobi snbrotundi, altero saeplus defloiente. Discus smtfMM etnttw cystalformis ovarii dimidium attingens. Orarium Mloelialiif pUoeata oentrall earaosa polysperma. Stylus filiformis eorrugatus. Signa qnadntom sWaUom subciculatum, supra foveolis duabus altis impressum. — *Br. grmfifior** Lindl. Bot. Begist. U 1384. (nee Grab.) - Crescit in Peruvla?

3904. FBANCISCEA *Pohl*.

(Pohl, *PlanL Brasiliens.* 1.1. 11—7. — Meisn. *Gener. plant vtsul.* L 307. II. 818. — G. Don, *General syst of gard. and bot* IV. 476.)

1. HOPEANA Hook. *BoUnlo. Magax.* t tttt. — Folt oblongo-laneeolatis glabtrrimis; florib. plenimq. sollUriis In ramia brevib. rollosls aoliUriis terminalib.; corollae porpureo-violaceae tubo ealyce campanulato paullolum brevloro. 6 — In Brasillae provlnoia Penambveo creseit
2. FR. UNIFLORA Pohl, *Plant Brasl.* t. 8. f 11. — Ranli diffuso-patenUb.; foil, ellipticis acutis; bractels lanceolatis ealyeibq. glabris; florib. soliUiils. 6 — Caulis cubitalis canescenti-caiias flexills ascendens, quandoque procumbens. Rami elongati, apice foliosi subrugosl. Folia brevisslme peiolau, utrinque glabra, snpra lutescenti-viridia integerrima nnda, duas et sesquiertiam unciam longa', unciam lata. Slipulae nullae. Flores brevissime pedunculali intrafoliacei. Brac-leae minimae lanceolatae glabrae deciduae, medio pedanculo subgenicmlalo in-•identes. Calyx campannlatns inflatus, dentibus ft lanceolatis aequalibas, apice vlrMibos, basi ferruginescentibus. Corolla bypocratoriformis, t«bo glabro albedo.

- apice inflato Inconro, limbo lilacino 5-partito, lacimis late rolandalis emarginatis undalatis, supenon caetens majori. Faux virescenti-albida oblongo-rotundata. — Crescii in ambrosis GapiUniae Rio de Janeiro in Brasilia.
3. FR. LATIFOLIA Pohl 1 c. 3. t t. 2. — Hook. Bot. Magaz. t. 3907 — Rchb. Flor. exotic. IV.43. L287. — Ramis brevissimis patentib.; foil, late ellipticis sabacutis; bracteis lanceolato-acuminalis calycibq. glabns; flonb. paucis subracemosis lerminalibus 6 — Caulis ulnaris teres gnseo-virescens corticalus, plerumque nanus, rami brevissimi, epidermide solubili tecli foliosi. Folia subrependo-Integra, utnnque glabra, laete albescenli-vmdia, infra canescenli-vmdia, tnuencialia, uncias r/«-l'A lata, bre?issime petiolata. Pedicelli brevissimi, ad basin subgemculati ibidemque decidui bracleati. Bractee mtnatissimae lanceolalae acominatae ses»iles caducae. Calyx inflatoj glaber albedo-vmdis. Corolla hypocraleriformis violacea, lubo inconrato glabro. — Crescii In ambrosis Don proeal Rio de Janeiro in Brasilia.
4. FR. ACUMINATA Pohl I. c. 4. f L 3. - Ramis erecto-patentib.; foil, oblongis acomtnatis, ad basin param atenuatis glabns; bracteis lanceolatis acuminatis calycibq. glaberrimn; flonb paucis subracemosis térmnalibus. 5 — Fratex parvus cubitalis, cortice virescenli-branneo lenai obteclas, rami paoci. Folia mteggemma margineq ad leniem vix ciliata, olrinque glaberrlma, supra albescenli-Yindia, subtas opaca minotissime asperato - panctalata membranacea plana, tnuencialia, uociam lata, bremsime petiolata. Racemus termioalis saprafnliaecos brevissimus confertas. Pedicelli brefissimi genlculari Bractee oppo«iiac lanceolalae acaminaue glaberrimae caducae. Calyx persistens Inflatus glabernrous reiicolatos latescenti-brunneos. Corolla lilacioa. — Crescit in umbroxs ad Mandioca in Capiltnia Rio de Janeiro in Brasilia.
9. FR. RAMO8ISSIMA Pohl I. c 5. f t i - Ramis TirgaUs; foil, lanceolalis, basi auenuaUe, panells etaratle aeperatie; braeoleolls petiolatit oblongis, basi attenuatis hirsutis; florib. racemosis axlllarib. terminal I basque. 6 — Frutex bicubiialis. Rami elongaii fastigiai, Joniores pilqsi. Folia integemma, utrinque punrtulato-asperata, sopra nigreacenli-firdlt, soblos loteo-vindia, ad cost am venasque birsuia, membranacea, brevissime petiolata. 2'A uncias longa, 8 lineas laia. Pedunculi elongati diffosi, medio bracteati nob to m id i et subgemrulati birsuti. Braeteolac solitanae obloogae, basi altenualae caducae Caljx inflatus nigreiceotibrunneus birsotus. Corolla hypocralfrimon^ha, tobo incunro albido, limbo lilacino, lacimis late rolandatis margine undulalis. — Prope \illa Ricca Capitaniae Mmas Gerafs et prope Rio de Janeiro in Brasilia cre«cil
- 0 FR. COFERTIFLORA Pobl I. c 0 | U. - Ramis suberectis; foil, subsesulib. oblongis acuUs, basi ailennalis pilosiuscohs riliaiis, bracteolis oblongis, basi atenuatis, bracteis lanoeolalit catycibq. ferrvgineo-pilosis; Oorib. conferto-racemosis terminallboa. 6 — Fralex cnblulis, epidermide canencentl-brannea solabibili vestitos. Rami ad totem plloscoli. In summiute latescenti-pilosi. Folia Integerrima ciliata, otrtqoe pagiaa aeabrlnaeola pilosioscnla, supra nlgrscentitlrentia, subtu< brnnneo-flrldia fenosa, eosta intermedia piloia, membranacea 4Vt nneias longa, I•s uociam lata. Petloh brefissimi ferrugineo-pilo<i Bractee minotlssimae lanceolatae. Bracteolae oblongae sessiles pilosae ciliatae ferroginotae Calyx Inlatus ferrugineus pilosns, quam reliquarum specierom longlor. Corolla lilacina hypocraterimorpna, tubo pilosulculo. — Crescit in Brasiliae provinceia Minas Geraft.
7. FR. DIVARICATA Pobl I. c. I. 6. - Ramit divancalic. foil brevistime petioUtittMftneje* lanceolalis, aplee oblasiusrulis pilosicutlit, bracieis lanceolatis birsotis; calyeln. IniaAla ferr«(1a)ee-villosis; lonb racemosis lermnalibus. ^ - Fr*1*1 eabitalia. CMIU epidermide teanl aolnbili alb^ceoU-bnjooea «eslims Folia bre rteelme petielaa ehinainse«Ja inteferrlaM, aapra aspera. subius luiescenil-villoMi membranacea pleaa, 3% nneias lonfa, nnam lau. Pedsncvll teretea iUiorwm* in medieute tnaMaJi genkolaU braeteeU fetmglnnee-villosl. Braetee opp*tM'' laneeeUtuae lirtnue a\$4neae. Braot«#Ue UneetJatae MrwrtM tfeidnat. Calj*

- inflatus tubuloso-campanulatus luteo-brunnescens villosus, serius revolutus
 lobatus. Corolla hypocrateriformis lilacina, tubo incurvo, ad lentem pilosculum.
 — Crescit locis umbrosis provinciarum Minas Geraes et Rio de Janeiro in Brasilia.
8. FR. HYDRANGEAEFORMIS Pohl I. c. 7. f. 1.7. — Rchb. Flor. exotic. IV. 44.1.288.
 — Caule subramoso; foliis, oblongis acutis, ad basin cuneiformibus. glaberrimis;
 bracteis lanceolatis pilosis ciliatis squamulisque aggregatis; calyce hirsuto; florum
 racemis terminatis. bemsphaericis amplis. 5 — Frutex ulmaris, boas generis
 elegantissimus et quoad flores *Hydrangeae hortensis* baud dissimilis, epidermide
 solubili albescens brunnea vestitus. Kami 5-6-nervi bis subverticaliter ag-
 gregato-foliosi. Folia mellea, saepe lutescenti-viridia, costa intermedia auran-
 tiaca, membranacea plana, 8-10-nervi subverticillatim aggregate, 6/10, uncias longa,
 3 oncia lata. Pelioli brevissimi glabri. Racemus intraxillaris sessilis, bracteis
 deciduis obvallatus. Pediculi teretes conferti persistentes gemculati glabri.
 Bractea minima ad basin calycis basi opposita oblongo-lanceolata sessilis
 ciliata decidua. Calyx tubuloso-campanulatus inflatus ferrugineus hirsutus.
 Corolla polychroma violacea. — Crescit Inter fructuosas locis umbrosis provinciae Rio
 de Janeiro In Brasilia.
9. FR. PAUCIFLORA Cham. et Schlegel. Linnæa II. 600. t — Foliis, obovatis ob-
 longis acumatis, basi cuneatis breviter petiolatis glabris; bracteis foliaceis, brac-
 teolis squamulosis. calycibus inflatis laxis glanduloso-pubescentibus; tubo corollae
 calycis MX superante; cyma terminali pauciflora simpliciter. 6 — Folia ovata polli-
 cana, juniora pilis glanduliferis ciliata. — Habitat In Brasilia.
10. FR. MACHOPHYLLA Cham. et Schlegel. I. c. 001. t - Foliis, oblongis acuminatis,
 basi cuneiformibus. rugoso-venosis, subtus pubescentibus; bracteis squamulosis
 ciliatis calycibus inflatis laxis glanduloso-pubescentibus; tubo corollae calyce
 duplo longior, cyma terminali composita multiflora laxiuscula. 5 — Valde affinis
Ft. hydrangeaeformi. — Folia subpedalia, 3/4 pollices longa. — In Brasilia.

3005. BRISFELHIA Plum.

- (Plumier, Icon. 18. t. W. — Meisner. Gener. plant. vascultr. I. 307. II. SIR. - Spr.
 Gyst veget II. 841. — G. Don, General syst. or gard. and bot IV. 47a)
1. BR. AMERICANA Linn. Spec. plant. linc. - Loddig. Bot. Cabin. I. 553. - Swartz.
 Observation. 00. L. 4. fig. 8. - Curtis, Bot. Magaz. t. 3N. - G. Don I. c. no. I. -
 Foliis, subpalmatis lanceolatis petiolatis; pediculis eiverticillatis pateentibus
 excedentibus; limbo corollae piano, tubo erecto, segmentis integris. § — Folia glabra
 pubescentia. Flores axillares solitarii, terminaliter numerosi. Corolla primum
 flatu, tunc alba, odoratissima. — Varietas foliis triangularibus et angustioribus. — *Bm
 n-feltia flore albo, fructu croceo molli* Plum. Gener. plant. Americ. IS. t. 05. — In
 insulis Indiæ occidentalis crescit.
8. BR. MEXICANA Swartz. Prodr. 00., Flor. Ind. Occident. II. 1035. - Andrews Bot.
 Reposit. t. 167. — Ker, Bot. Regest. t. 228. — Loddig. Bot. Cabin. t. 3R. - Rchb.
 Flor. exot. V. 4. t. 204. - G. Don I. c. no. 8. * Foliis. Unceis icutibus, utrinque
 attenuatis; pedunculis calycem connatis aequantibus; limbo corollae undulato.
 6 — Corolla primum Oava, delude albida. — Crescit in insula Jamaica.
3. BR. GRANDIFLORA D. Don, New Edinb. phlos. Journ. 180. Jul. ex G. Den
 I. c. no. 3. — Foliis ellipticis oblongis acuminatis; floribus corymbosis terminalibus;
 corollae tubo limbum vix excedente. § — Breviter vixt. Folia pallide viridia,
 3-d poll. longa, 1/2-8 poll. lata. Calycis dentes aenil. Corolla pollicis circiter
 8 diametro habet Stamina subaequalia. — Crescit in Peru via (Tafajea).
- t *Species tix nota,*
4. BR. YIOLACEA Loddig. Bot. Cabin. t. 702. - Foliis, petiolisque maculis obscuris
 purpureis oblongis, corollis Indis. 0 — In India occidentali crescit

3900. DCBOISIA *E. Br.*

(R. Br. Prodr. II. NOT. Holland. 448. — Meisn. Gener. plant. vascular. I. 307. II. 818.)
 1. D. MYOPOROIDES R. Br. I. c. (edit. Nees ab Esenb. 304.) - Endlich. Iconogr. gen. t 77. — Arbuscola glabra, facie *Myopori*. Folia allerna cum ramalo articulata integra. Paniculae axillares, ad divisoras bracteolis caducis instructae. Flores albi, tubo inclusis albis. Bacca parva ovalis nigra. \$ — In Nora Hollandia.

3907. DIPLANTHES *Bnkt. et Soland.*

(Bnks. et Soland. mss. ex B. Br. Prodr. flor. Nor. Holl. 448. — Meisn. Gener. pi. vascular. I. 307. II. 218.)

1. D. TETRAPHYLLA Bnka. et Soland. mss. ex B. Br. I. c. 440. feil fleet ab Esenb. 305.) — Arbor medioeris, coma irregular! diffuse. Bami teretes tomentosi. Folia quaternaria petiolata magna integra, saepe superne biglandulosa. Thyrsi terminales subrotundi depressi, pedunculis partialibus verticillatis» pedicellis trichotomis. Flores speciosi. Calyx semicoloratus. Corolla flava. 5 — Crescit in Nova Hollandia tropica.

t *Species e genere excludenda.*

D. TBIDENTATA Ad. Sieinheil. — HALODULE TBIDENTATA.

Tribus V. *DIGITALEAE* Bth. Revis. 2. — Endlich. Gener. plantar, p. 676.

Corolla tubulosa, saepe vel intricata, limbo bilabiato. Stamina basi adnata, apice saepe longe exserta, quaternaria didynamia, quintum sterile vel nullum. Antherae mucosae, locis demum divaricatis confluentibus. Capsula dura aequilata bilobata, talia bifida vel bipartita, disseminata et talia marginibus introflexis duplicata, demum bipartita, pleurae eductae vel demum solatae.

3908. CHELONIA *Linn.*

(Linn. Gener. plantar. 748. — Meisn. Gener. plantar, raicular. I. 308. II. 210. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 010.)

1. CH. GLABRA Linn. Spec. plantar. 840. - Hook. Fl. Bor. Americ. II. 04. — G. Don I. c. no. 1. — Foil. Obovato-lanceolatae inaequaliter serratae; floribus, dense simplicatis; corolla* albae limbo contracto. 2l. — Trew, Ehrh. t. 83. — *Ch. glabra* f. alba* Prain. Fl. Americ. sept. II. 427. — *f. Unusolaia* Nutt. Gener. Americ. I. 51. — Foil, lanceolatae conspicue acuminatae serratae sessilib., infra pubescentibus; bracteis vix dilatatis; segmentis calycinis oblongis. — Crescit in America boreali*
2. CH. OBOVATA LINDL. Syst. bot. 48. - Mill. Icon. «. u. 03. - Willd. Spec. pi. III. 228. - Ker, Bot. Begist. t. m. — G. Don I. e. no. 8. — Foil, petiolatae oblique lanceolatae serratae; eaeque pinnatifidae. % — *Ch. fuscipennis* Mill. Diet. no. 1 — *Ch. glabra fl.* Mnn. Spec. plantar. 840. - Mlex. Fl. Am. bor. II. 24. - *Digitaria Maria** Prsiae folio* Bay, Sepl. 307. - Plot. Mant. 01 t. 34 & fig. 3. - Differ! a praecedente radice minus repente, foliis laevibus profunde serratis, floribus parvis. — Crescit in America boreali ditionibus australioribus.
3. CH. LYONI Prsb. Flor. Americ. sept. II. 137. - G. Don I. e. no. a. flg. 0ft. - *Glabra ramosa*: foil, petiolatae cordatae ovatae serratae; spiribus terminalibus; floribus albis parvis. * - *O. wrightii* Sims, BOL. Magai. U. 1851 - Crescit laevibus borealis (prope Wilmingten) et in Georgia.
4. OL. UTIFORMIS Miblisberg. GauL ex JUL. Carol. II. 127. - G. Don I. e. no. «» — GWbrt: fatt. late ovatae f. ovalibus. serratae, abruptae acuminatae, basi aequilatae petiolatae; eaeque bellide breviter serratae; SUMEOTO sterili prope apicem barbatae. * - *Cuesam Hmt Homom* Walt. Caret. 171 - Crescit in Carolina boreali. ft. CH. NEMOROSA DMGL. mss. la. Uadl. Bot. Begist. t. 1211. - G. Don I. c. 641-e. ft. - Foil. ovatae acuminatae serratae, taperieribus. emplexicibus. cordatis"

pedunculis nudis trifloris pubescentibus; bracteis segmentisq. calycinis subulatis; corollis venricosis roseo-purpurascensibus. puberulis. ty — Antherac lanalac. — Crescit in America boreali occidentali*!

f *Species e genere expellendae.*

- CH. ALBIDA Spr. « PENTSTEMON ALBIDUM.
- CH. ALPINA Spr. — EPNTSTEMON ALPINUM Torr.
- CH. ANGUSTIFOLIA H. B. Kth. « PENTSTEMON KUNTHII.
- CH. ANGUSTIFOLIA Lindl. = PENTSTEMON ROSEUM.
- CH. ATROPURPUREA Sweet. = PENTSTEMON ATROPURPUREUM.
- CH. BARBATA Cav. = PENTSTEMON BARBATUM.
- CH. BRADBURI Spr. = PENTSTEMON GRAND IXO RUM.
- CH. CAMPANULATA Catan. = PENTSTEMON CAMPANULATUM.
- CH. CAMPANULOIDES Andrws. » PENTSTEMON CAMPANULATUM.
- CH. CENTRANTHIFOLIA Bib. — PENTSTEMON CENTRANTHIFOLIUM.
- CH. COERULEA Spr. - PENTSTEMON COERULBOK.
- CH. CRISTATA Spr. — PENTSTEMON CRISTATUM.
- CH. DIGITALIS Spr. — PENTSTEMON DIGITALIS.
- CH. ELEGANS O. B. Kth. — PENTSTEMON PULCHELLUM.
- CH. ERIANTHIFOLIA Prth. — PENTSTEMON CRISTATUM.
- f.ii. GENTIANOIDES H. B. Kth. — PENTSTEMON GENTIANOIDES.
- CH. GRACILIS Null. — PENTSTEMON GRACILE.
- CH. GRANDIFLORA Spr. - PENTSTEMON GRANDIFLORUM.
- CH. HIRSA Lion. — PENTSTEMON HIRSATUM.
- CH. IMBERUIS H. B. Kth. » PENTSTEMON HUMBOLDTII.
- CH. PENTSTEMON Linn. - PENTSTEMON PUBESCENS.
- CH. PENTSTEMON Mill. => PENTSTEMON LAEVIGATUM.
- CH. RUELLIOIDES Andrws. — PENTSTEMON BARBATUM.
- CH. ROSEA Cervanl. - PENTSTEMON ROSEUM.
- CH. TERETIFLORA Fraser — PENTSTEMON ALBIDUM.

3900. PENTSTEMON* *Herit.*

(Herit mti. u Lambert, Transact of Ute Linn. soc. X. U 0. — Maftii. Geaer. plant Tabular. I. 308. II. no. - G. Don, General syst of garj. tad tot IT. 630.)

BeoUe L VHUB O. Bam L e. — Anihertsj jltth—.

1. P. CRISTATUM Fraser, Caul. 1813. ex lfoU. Gener. Aaerle* IL * - G. Dra I. c. no. 1. — Pubescens: foil, radiceallb. Itaeolalle tanleolalle, eanUnla sesstllb. lineari-oblongis sublancoalis; peduculis aillarib. temlaalilNi. 1-3-floris bre-ittimig; calycis pilosiusculi segmentis linearl-Unceolallt acaminatis; Blamento qoinio sterili subcxserto, cum fauce corollae eimie criilalo-barbato. *A> — Corolla magna violacea venricosa, limbo paieole quinquefolio. — *Ktione erian-Ikra* Prsb. Fl. Am. sept II. 737. - *Ch\$Um\$ cruUi** ftpr. Bftt vegei. II. 813. - Crescit In America boreali.
2. P. COBBULEUM Ntttt I. c. - G. DOB I. e. no.«. - Gtabram glaucnm: foil, radicalib. sobllnearib., eaollnl. ••btoeeolato-ilnearib., omnlb. sessillb. laiegris, ad marginem aubpuberallf; podQaenUs moitloris; calycis SffmeaUa lanceolatis aculis; (lamento sterili bretl, snrsiim barbato. ^ — Corolla tttbrampanulaia im-rea. - *Chelone angustifolia* Fraser, Caul. 1813. ex Prah. Pl. Amerlc. sept II. 7M. — *Chelone coerulea* Spr. Syst. veget II. 813. - Crmell In planiliebu Missouriensibus propp Fort Mandan.
3. P. ALBIDUM Null. I. c. 51 - G. Don I. c. no. 3. - Humilc: foil. Otaio-lanceolalis subscrrulalis plabns sicsxlib.; florib. fasciculalis axillarib. terminalibq.; filamentis sterili gracili mterrupic barbato; corolla inlus glabra bubcampanulaia lobulosa, limbo subaequalier quinquefolio palenle; ral>ris pubeckcniin iCKmeoiK linearl-lanccolal is. % — Caul Is subanuulauH F«»ia appronmau. f.nroIU |>p-

- rumque alba. — *Chelone teretiflora* Fraser, Catal. 1813. — *Chelone albida* Spr. Syst. veget. 11. 813. — Crescit in planitiebus Missouriensibus.
4. P. TUBIFLORUM Null. Transact. of the Americ. Philos. Soc. (New Ser.) V. 181. — G. Don I. c. no. 10. — Foil, ovatis connatis denliculalis glabris; caule elato sabnudo; calycib. corollisq. viscido-pubescentib; segmenlis calycinis ovalis; corollae lubulo»ae limbo intus villosus; filamenlo sterili barbalo. 2I. — Folia radicalia elliptico-oblonga integra glabra, caulina versus basin sinuala, inferiora oblongo-ovata. Folia caulina parva remola, caule exinde subnudo. Corolla pallide alba, tubo el orificio villosus. Flores parvi aggregali in gloincurulos pseudo-erlicillatos coogesli. — Grescil in America boreali (Arkansas).
5. P. OVATUM Doogl. mss. in Hook. Bot Magaz. I. 2903. — Hook. Fl. Bor. Americ. II. 00. — D. Don In Sweet's Brit. flow. gard. (New SerJ) III. t 811. — G. Don I. c. no. 11. — Loddig. Botanic. Cabin, t. 1635. — Herbaeom: caale, florib. pedancalisq. glanduloso-pilosis; foil, cordato-ovatis ampleiicanlib. glabris grosse dentatis, inferiorib. longe petiolatis; corollis tubulosis; filamenlo sclrili opicce barbalo, basi unidenlato. 2P — Caulis herbaceus quadripedalis ererlus, sursum pilis brevibus subglandulosis albidis vestilas. Folia magna ovata glabra obscure virentia grosse denlala, caulina basi amplexicaolia, superiora mioora minusque denlala, soprema cordata Integerrima, radicalia longissime peiolata. Flores magis minusve composite racemosi, racemis oppositis c foliis Mipremis oriandis. Calyi glandulosas quinquepartitus, laciniis lanceolalis arqualihus. Corolla speciosa pnrpurascenli-aiorea, ezlus glandulosa bilabiata, tubo supra infletto. Faux pilosa. Filamenta curvala, antheris cordatis purpura*ccnii -albi«. — Crescit in America boreali ad fluvium Columbia.
- ft. P. PROCBBDM Doogl. nut. in Grab, in Edinbrgb. Pbilos. joiirn. July 18-20. ex Hook. Bot. Nagaa. U 8QM. — G. Don I. c no. 18. - Loddig. But. Cabin, t. 1610. — Caule erteto strict* snbslmpUd; foil, laneolalis integerrlmis, inferiorib. petiolatis, snperiorib. aessillb. subconnatis; florib. verticillato-spicalis; calycis segmentiis membranaceo-lacinlaUs mucronatis; filamento sterili edenlulo. 3. — Caulis erecius strictus pedalis, sesquipedalis vel (in speciminibus *ponlanci< bipedalis glaberrimus subramosus. Folia glabra lanceolate, inferiora in poliolum ailenoaia, reliqua sessilia connate, sursum gradatim minora, omnia inlegrrima oblique venosa. Flores in racemulos opposjtos subverlicillatos digesti, exinde inflorescentia tola ad modum *Labiatarum* inlemple spicalo-verticillaia apparel. Calyx profundissime quinquefldus, sc«menlis ovatis, albido-membranaceis, in apicem longum recunalum contractis. Corolla pane violasceoti-purpurea glabre, labium superum reflexum bifldum, inferum trifidum, basi pallide inmarulatam, rufescenii-pilosum. Filamentum sterile gracile album, venai apicrm supra ruberenii-barbellaloni. — In America boreali-oectdeoteli (Bocky mountains).
7. P. COFEBTCM Dongl. msa. In Lindl. Bot Boflst L 19B0. - G. Don I. c no. 13. — Foil, inlegerrimis glabris, raJioalib. spatbnlatis acuminalu louge petiolalis» svpenorib. h«*«iilib. ovatis aenmioatis; verticillis muliiflori^cooferlis nubapbyllis; eorollis calyce paulo loogioribns. %> — Ceolis ererius ascendent nimptet teres viridis lucens, pedalis v. bipedalis. Folia radicalia lanceolate in pctiolum atte* nuala integerrima longequr peiolata, cauline subemplexicaulia in bractras laceras mrmbranaceas acuminates demon motate. Flores pseudo-vtrticillaii ronfertisab»e«sileii numerosi. Cil)ei leciniee eculee morronalee sublarerae v. fimbriatae. Corolla lobulosa sobveotricosa ochroleura bilabiata. titut glabra. labio superior bilobo, inferiore pilis brunneis barbalo. Antbrrae Rlabrae, lobi» diveri* €*!.. SUEaials stenlis rodimentum spire horbetnm. — Crescit in Amciica boreali (Colombia, Inter Selomon river et Kettle Fells, Borky moonuins).
- * P. MICsURTBON RotL Jonrn. scad, fbiled. VII. i\ - G. Don I. e. no. 14. - Glabrom: fell llineari-lanetolatia eatls eemiamplctirauh. iotrgerrimis; flo^{ib} parvis vlomerue inierropte spicato-nanlcolalis; corolla tubtuboloia, lotos barbellata; flameoto sterili miooto vii barbato | segmentis calycinis laneolalis acoiis. % - Caulis gracillt. Flores purpurel minimi In tiomemlos 3-4 colloeti-

- Corolla lubulosa subcurvata, limbo subregulari quinquelobo — Cre&cil in America boreali (Rorky mountains, prope fontes fluvii Columbia).
9. *P. PRUINOSUM* Dougl. mss. in Lindl. Bot. Regist. t. 1280. — Hook. Fl. Bor. Am. II. 00. — G. Don I. c. no. 15. — Folia, caesiis, radicalibus petiolaribus integris dentalisve, caulibus dentalibus sessilibus; bracteis superioribus integris, floribus verticillatis calycibus bracteisque villosis; corollis glabris calycibus duplo longioribus, limbi laciniis* rotundatis integris % — Perenne semipedale Y. sesquipedale, andique pruinosa caesia irrorata Folia radicalia caespitosa pubescentia rigida, nunc — praesertim in speciminibus cullis — Inlegerna, nunc dentalia. Verticillata 7-8-flora. Flores cyanei — Credit in America boreali (Columbia).
10. *P. GLAUCUM* Grab. New Edinburgh. philos. Journ. 1820. p. 348. — Lindl. Bot. Regist. I. 1280. — Hook. Fl. Bor. Amenc. II. 05. - G. Don I. c. 038. no. 10. — Caulis herbaceo glabrescente; folia obovata glaberrima, radicalibus lanceolatis petiolaribus integris denudatisve, caulibus bracteis ovalibus lanceolatis sessilibus amplexicaulis; panicula thyrsoides; corollae inflatis calycibus exclusis glanduloso-pubescentibus; filamentis sterilibus porrecto barbato. % — Corolla coeruleo-purpurea, faucibus pallidioribus Y. albida. — *P. groenlandicum* Hook. Bot. Mag. t. 2045. (descript. exclus. Icone). — Crescit in America boreali.
11. *P. ATTENUATUM* Dongi. mss. in Bot. Regist. I. 1905. f. — Hook. Fl. Bor. Amenc. II. 07. — G. Don I. c. no. 17. — Caulis striato, apice piloso; folia, radicalibus ellipticis acutis petiolaribus superioribus ovato-oblongis amplexicaulis sessilibus, obovatis glaberrimis integerrimis; panicula stricta calycibus exclusis corollae pubescentibus, capsulis glaberrimis. % — Caulis sesquipedalis Y. bipedalis. Folia alvoluta glabra. Flores ochroleuci. Folia radicalia nunc cuneata, cuspidata. — Crescit in America boreali (Lewis River, Clark's River).
12. *P. DEISTMANNI* Dougl. mss. in Lindl. Bot. Regist. t. 1318. — Hook. Flor. Bor. Am. II. 00. — G. Don I. c. no. 18. — Caulis subsimplici ascendente glabro, folia, incisocrenatis, radicalibus ovato-oblongis, proximis spatulatis, caulibus oblongis acutis sessilibus, supremis subintegris; calycibus glabris, limbi plani laciniis retusis, supremis minoribus. 2l. — Caulis ascendens pedalis v. sesquipedalis glaber Folia glabra, radicalia longe petiolata ovata, inferiora spatulata obtusa, caulina oblonga sessilia subamplexicaulia, omnia grosse et inaequaliter incisocrenata. Flores arete paniculati orbiculati minores, calycibus corollaque glabris. — Crescit in America boreali-occidentali.
13. *P. DIFFUSUM* Dougl. mss. in Lindl. Bot. Regist. f. 11191. - Hook. Fl. Bor. Am. II. t. 05. - Hook. Bot. Mag. t. 3045. f. — Hamotani diffusum: folia inferioribus ovatis petiolaribus superioribus sentinatis minoribus. tomentosis acuminatis, omnibus grosse inaequaliter serratis; panicula foliosa; laciniis calycinis tubo corollino triplo brevioribus lanceolatis serratis. 2l. — Badli perennis repens. Caulis decumbens radicans ramosus, sesquipedales vel bipedales teretes glabrescentes purpurei. Folia sempervirentia ovato-oblonga inaequaliter serrata glabra atro-viridia, superiora serrata, inferiora in petiolum decurrentia. Pedunculi axillares pubescentes, saepius folio breviores, apice multiflori. Bractea pubescentes ovato-acuminatae integrae. Calycis lobis laciniis patentibus, margine argute lacerae, apice aristatae. Corolla purpurea nuda glabra, labio superioribus retusis, inferioribus trifidis, laciniis rotundatis. Filamentum sterile tubi longiusculum, barbata. Capsula ovata puberula. — Crescit in America boreali ad flumen Columbia.
14. *P. STATICIFOLIUM* Lindl. Bot. Bog. Ut. 11770. f. - G. Don I. c. no. 90. - Caulis ascendens pubescentis; folia, radicalibus oblongo-lanceolatis in petiolum longum amplexicaulis integris glabris, caulibus sessilibus cordato-ovatis dentatis pubescentibus, cymis subsessilibus calycibus tomentosis, corollis ventricosis pubescentibus, labiorum laciniis natis obtusis subaequalibus ^ ^ — Caulis subbipedalis, apice tomentosus et cymis subsessilibus verticillatis *Labatarum* referentibus obovatis Folia radicalia cum petiolo 7-pollicana Corolla violacea speciosa, fere sesquipedalis. — Crescit in California.

15. *P. CORDIFOLIUM* Bih. Scrophular. Indio. 7. - G. Don I. c. no. 21. - Gaule pruinoso; foil, breviter petiolalis lale ovatis oblongis Integerrimis, basi cordatis bullalis, sublus nervosis; panicala laxa; corollis tubulosis profunde bilabialis, labio superiori emarginato, inferiore (rifido; filamentis sterili barbato; antheris glabris. % — Crescit in California.
16. *P. TRIPHYLLUM* Doogl. mss. in Lindl. Bot. Regisi. 1.1245. t - G. Don 1. c. no. 22. — Herbaceum humile: foil, lernis qaaternisve glabris incisus, inferioribus oblongis, floralibus integerrimis lineari-lanceolatis aculis; pedunculis 2-3-floris calycibus arachnoideis; corollae laciniis oblongis oblongis, labii inferioris aequalibus. % — Caulis teres ramosus pedalis • sesquipedalis coloratus. Folia lerna quaternaria?e verticillata obtuse ineisa, inferiora oblonga, superiora iaceolata, suprema lineari-lanceolata acaia inlegerrima. Flores laxae pauciflorae, pedunculis 2-3-floris arachnoideis. Calycis lacinae obtusae aequae arachnoideae. Corolla subfenuricoa pallida roacea? enoaa, labio superiori emarginato, lacinae oblongae, inferioris trilobae laciniis oblongis oblongis aequalibus. Filamenta superiora basi dilata, radimento quanti filiformi barbato. — Crescit in America occidentale boreali (Blue mountains).
17. *P. BREYIFLORUM* Lindl. Bot. Regisi. t 1016. f - Foil, lanceolatis serratis glabris, summis sessilibus; panícula laxa brachiata; calyce pubescente; corollae labio superiori lineari arcuato emarginato TIBOSO, inferior! deflexo tripartito,¹ tabo calyce breviori. 2]. — Rami erecti glabri, brachialim ramosi glauci. Folia ovalo-lanceolata ant lanceolata plana glabra serrata aut dentato-serrata, caulina brevissime petiolata, suprema sessilia, in ramulis lateralibus nunc omnia linearia serrulata v. inlegerrima. Flores in apice ramulorum bini, lerni quaternarii, imo solitarii prope fastigium paniculae. Calyx glanduloso-pubescentis aequaliter quinquefidus, dentibus aequalibus. Corolla parva albida rubescens, labio calycis longioris tafandibulari, labio superiore lineari emarginato deorsum areaealobato, dorso glabro-filiformi, inferiore breviori tripartito, laciniis albis sanguineo-venosis, lateralibus revolulis, intermedia breviori. Stamina fertilia basi incrassata villosa* prope tubum inserti, labio superiori adpressa, antheris subrotundis, loculis basi divergentibus; filamentum sterile filiforme in labium inferius incumbens glabrum, fauce paulo longius. Stylus filiformis glaber, stigma integerrimum. Capsula obovata acula glabra, calyce paulo longior septicide bivalvis, valvula apice inlegerrima. — Crescit in California.
18. *P. GRACILE* Suit Gener. Americ. II. 52. — Hook. Flor. Bor. Am. II. 07. - G. Don I. c. no. 23. — Loddig. Botanic Cabin, tab. 1451. — Hook. Bot. Magn. 1.2045. (excl. description.) — Canis erecto gracili; foil, magis minusve serratis glabris, inferioribus spiculatis, caulibus lanceolatis, basi subcordatis; panícula laxa stricta pubescente; pedunculis plurifloris; corollae tubo elongato, labio superiore bifido breviori, inferiore porrecto trilobo, inta nudo; filamentis sterili fulvo-barbato. % — Floret magni parporaeatli-coeniiei, infra viridescens. Folia radicalia lanceolata-ovata Integra, caulina pungentia-serulata. — Crescit in America boreali (Arikaree, Fort Mandan).
19. *P. PIBESCEENS* Ait. Hort. Keweni. II. 300. - Sims, Bot. Misc. 1.1424. - Hook. Flor. Bor. Americ. II. 07. — G. Don I. c. no. 94. — Canis pubescentis erecto; foil* laeifolius lanceolatis serratis, in omni sulmipathulatis, nupremis basi subcordatis; panícula laxa recta; pedunculis plurifloris*; corollae tubo elongato, labio superiore bifido breviori, inferiore porrecto trilobo, inta filamentis sterili fulvo-barbato. % — Corolla albida-purpurascens, tubo longioris albidis. Labium superius breviter bipartitum reflexum, inferius trifidum rectum, lobis lateralibus reflexis. Filamentum sterile barbato. — (Willd. Spec. plant. III. OJJ.) . Owon# PtnUlemon Linn. Spec. plantar. 8sa - l>r*octpk*U* laUfoiu\$ gUhm- fyW*«dM«# lut** foUU Moris. Oion. II. tor. III. 417. sect. Ut. I. fiff. 1 - A-rim* erert* Mill. Dicf? M. K. W. - Crescit in America boreali% civiuiboa antralioribus. - if«o*#r (I. c.) spectem bane a sequenil re vota differt* nun credit.

20. *P. MACKAYANUM* Knwls. et Wtsct. The Floral Cabinet II. 117. f u 74. - Glanduloso-pobescens: caule gracili ascendente; foil, caulinis cordato-acuminatis undulalis subrepano-denticulalis glabris amplexicaulib., radicalib. lale lanceolatis petiolatts; pedunculis axillarib. oppositia multifloris in paniculam terminalem jllifTusam dispositis; calycis brevis segmenlis oratis aeolla; corollae com pros sae lablo superiori brevi, inferiore subelongalo, intus Tilloio; filamento iterili subexserlo, ab apice infra medlam barbato; germine glabro. 2I, — Caolla teret 12-15-polltearis breviter glanduloso-pubescens. Folia glauca tenala, superiora eordata amplexicaulia, suprema magis attenuata sublanceolato-acuminata, inferior a petiolala, radicalia tale lanceolata, basi attenuata in peliolum sensim abenntia. Pedunculi longi ex axiliis folio rum (lores 6-8 gerentes. Pedicelli breves cum calycibus corollisque minute glanduloso-pubescentes. Calycis segmenta subreflexa. Corolla circiter pollicaris pulbre violascenti-coernlea, fance alba Y. lactea, sursum longitudinaliter compressa, Infra trl-pllcata, lobls limbi rotandatis, iniermedio labii inferioris minori. Filamenti sterills barba pallid* lulea. — Crescil in America boreali (Ohio).
21. *P. LAEVIGATUM* Ait. Hort Kew, II. 361. — 81ms, Bot Magai. t 1425. - Willd. Spec. plant. III. 228. — G. Don I. e. BO. «. — GUBnim: foil, loferlorlb. inleger-rlmls petiolatis, reliquis repando-serrulatis settillb. v. seaiampiexlcaotib. lanceolatis; florib. paniculalis; oorollae porporaee oriflclo ad lablnm Inferlns pn-bescente; filamento sterill apice barbato. 2» — *ChHon* PmUtimon* I. F. Mill. Icon. 4. — *Chelone foUit infirioribu* ova\$6-amwtfm&tt\$ peUolmM* tntogerrimi*, superioribus amplexieaulibus laneolaHs dentatii; eoroliis palmSibus bilabiatit* Arduin, Spec. 14. I. 5. — *Digitalis perfoliata glabra, flor* violaceo minor** Moris. Oxon. Hlslor. II. 479. sect. 5. t. 8. fig. 0. — Crescil in America boreali.
22. *P. HIRSITUM* Willd. I. c. 227. - G. Don I. c. no. 25. - Caule foliisq. pilosis; foil, acuminatis repando-serrulatis; florib. pallide purporascentib.; corollae labii inferioris orificio pubescente; filamento slerili apice villosissimo. 2|. — *p. pubescent 0. anguttifolium* Marlyn el Mill. Diet. no. 2. — *Chelone hirtuta* Linn. Spec. plant. 849. — Moris. Oxon. Histor. III. 417. sect. II. I. 21. fig. 3. — *Digitalis jlor* paUido transparent*, foliis cauleque molU MnuHe imbutis* Banist Virgin. 192ft. •- *P. pubesceniis* esse vldelur varieUs, ires Igltur species nltimae In unam forte aptius conirahontur. - Cretelt In America boreali (Virginia).
- S3. *P. PULCHELLUM* Lndl. Bot BegisL 1.1138. - Uddlg. BoUile. Cable, t 1438. — G. Don I. c. no. 27. — Caule berbacto pubaac—U< feH. 'tatattlb. Hlaeart-ob-longls serrulatl glabris; panienla aimpllel M«oa4a; ealyetto. pobateeoUb.; eorollis ventricosi* pilosiuscolls eglandulosls palalo vllloto; Maaario ttaiill barbato; •taminlb. reliquis tubum aequantibni. % — Canlls erectos aeaqulpedails ramosus lev Her pubescens. Folia linearl-oblonga serrulata glabra, suprema sessilia sub-amplexicaulia. Paniculae terminalis simplicis subsecundae pedunculi blflorl, bracteis longiores. Calycis laciniae pubescentes glandulosae. Corolla tiolacca •. lilacina pobescens eglanduloia ventricosa albo-venosa, laoiniis tobaequalibus, palato maculalo vllloso. Stamina glabra, suprema lubi longitudlne, qoandoque osaerta, filamentum sterile his atajuale, ad apicem barbalun. * *P. {Chelon* H. B. Klb. Nov. gen. el spec. pi. II. 364. * Kth. Bynops. plant atqalnoct. II. 121) *Ugans* G. Don In Load. Hort BriUmle. II. *UL* — Croteit In Insula Cuba propo Havanam et In Pfova Hltpanla later Toloceam ai Tlaaglllo.
- «4. *P. ROSEUM* G. Don In Loud. Hort Britannic. Ml — 6. Doo, General syst. of gard. and bot. IV. 639. no. 28. — Herbacens foil, sostlllb. glabris ovato-lanceolali5 argute serrulatis acumlnatl, soperiorlb. lailorlb.; pedunculis pleramq. trifloris; rilanicnlis superiorib. basi planis; eoroliis piloiimculit, labio inferiori barbalo; (llemenlo iterili apice barbato. ^ — Inflorescentia glandulosa. Panicula magna (thick) mullillora. Corolla pana subventricosa pallide rosra glandulosa nl totios plantae summitates. - *Chelone rotea* Cervantes mis. ex Sweet's Brit. low. gard. III. t. £10. -- *Pentstemon angustifolium* Lindl. Bot. Regist t. 1122. — Loddlg. Bot. Cabin, tab. 1420. - Creieit In Mexico.

25. P. GRAINDIFLORUM Fraser, Calal. 1813. ex Nutt. I. c. 52. - G. Don I. c. 636. no. 4. — Glabrum glaucum: foliis, integris, radicalibus, subovalibus, caulinis amplexicaulibus, rotundato-ovalibus, abrupte apiculatis; corollis magnis, plerumque solitariis axillaribus; corolla campanulata, limbo quinquelobis patentibus; filamentis quatuor sterilibus ex parte pubescentibus. — Species pulchra. Flores magnitudinis illorum *Chelone purpureae* vane colorati. — *Chelone* [*Pentstemon* Prsh. Flor. Am. sept. II. 738.] *Bradburii* Spr. Syst. veget. II. 613. — Crescit in America boreali in planitiis Missouri et Mississippi.
26. P. SPECIOSUM Dougl. mss. in Lindl. Bot. Registr. t. 1270. t. — Rchb. Fl. exotic. IV. 1.1. 217. - D. Don in Sweet's Brit. flow. gard. (New Ser.) III. t. 250. - G. Don I. c. no. 5. — Glabrum glaucum: foliis, integerrimis, radicalibus, spatulatis, caulinis lanceolatis subundulatis sessilibus; floribus verticillatis paniculatis; corollae lobis subaequalibus rotundatis; rudimentis sterilibus filamentis quinque glaberrimis. — Folia radicalia lanceolata-teretibus integerrima, caulina angustata sessilia undulata acuminata. Caulis 2-3-pedalis. Flores speciosissimi in cymis multifloris axillares, ad caulis fastigium spicatis dispositi. Calycis lacinae 5 ovatae cuspidatae. Corolla uncialis coelestina in rubrum variegata, limbo bilobis, lobis subaequalibus rotundatis, palato prominente glabro. Stylus purpureus filiformis glaber. — Crescit in America boreali-occidentali.
27. P. ACUMINATUM Dougl. mss. in Lindl. Bot. Registr. U 1285. f. - G. Don I. c. 637. no. 6. — Caule ascendente foliisque glabris valde glaucis, radicalibus ovato-oblongis longe petiolatis integerrimis subcoriaceis, caulinis bracteatis cordatis acuminatis sessilibus amplexicaulibus; florum fasciculi subsessilibus; calycis laciniis acuminatis glaberrimis; corolla tubo infundibuliformi, faucibus lobis, limbi laciniis lobis reiosis. — Caulis ascendens pedalis - bipedalis glaucus, uti omnes panes, glaberrima. Bractee venosae coriaceae, inferiores longeiores. Flores in fasciculis axillaribus dispositi purpurei, ad marginem amplexicaulis. Calycis coriaceae lacinae valde acuminatae, demum ampliferae. Corolla calyce triplo longior glaberrima, tubo infundibuliformi pauculum arcuato, limbo valde obliquo, laciniis rotundatis. Filamentum sterile tubo brevius, apice leviter recurvum. — In planitiis arenosis Columbiae crescit.
28. P. PIMILLUM Null. Journ. acad. Philad. VII. 46. - G. Don I. c. no. 7. - Puberulum, caespitosum: foliis lanceolatis-linearibus, acutis integerrimis, radicalibus brevissimis paucifloris; floribus majusculis glabris; segmentis calycinis lanceolatis aruminalis; filamentis sterilibus apicibus recurvis barbato. — Caules non ultra 3-4-pollinariae. Morsum magnum purpurei. — Crescit in America boreali ad fontes fluvii Columbiae ad nasum Goddin.
29. P. COBAEA Nolt I. c. 1M. - D. Don in Sweet's Brit. flow. gard. (New Ser.) IV. t. 43. — Hook. Bot. Magax. t. 3405. — G. Don I. c. no. a. — Elatum puberulum: foliis oblongo-ovatis denticulatis nudis; panicula terminali foliosa; pedunculis 3-jugis, pedicellis bracteatis; corolla pubescente magna, tubo inflato, limbo bilobis quinquelobis, lobis 2 et 3 palatis rotundatis, intus linearibus; filamentis sterilibus infra bracteas calycis pubescentis laciniis oblongo-linearibus rotundatis. — Caulis bipedalis ultra erectus rigidus rotundus, oblongus angulatus vel tota planus, puberulus. Folia superiora oblonga vel oblongo-rotunda sessilia, radicalia ovato-spatulata petiolata, margine denticulata, mutua. Panicula irremissa (oblonga pedunculis oppositis ei foliorum atillata. V-flori, lorum breviter pedicellatis puberulis corollae tubas albido-purpureas, limbi segmentis quinque pairiibus, intus flammis) centibus. Ibis, nigriflorus. Capsula coarctata aruminalis bina. — In America boreali (in calceis Red) crescit.
30. P. DIGITALIS Null. Transact. of the Americ. Philo. Soc. (New Ser.) V. 181. - S. rei, Brit. Bot. gard. II. I. 121. — G. Don I. c. no. 0. - Sini. Bot. Magax. 1. 517. - Rebb. Flor. eolic. V. 11. 3. U. — Glaberrimum fullum, caulibus uncialibus rotundatis acuminatis repando-decalatis; calycis segmentis acuminatis

- reflexis; corolla magna subcampanulata albida puberula, filamento quinto stenli apice barbato. % — Affine dicitur *P. campanulaio*. Folia lala. Pamcula nuda. Ram oh ultimi et calyces viscoso-puberuli. Gorollae pallide albae, tabus exsertus, onGcio inflato subcampanulalo lereti, labio saperiori qaam infenus paullo brcvion coarclalo, labium Infenas tnlobum dilalalum. — Crescil in America boreall (Arkansas)
31. *P. LAUCIFOLIUM* Hook, et Arn BoL Beech, voy. 376. — Perenne caespitosum humile gl. iucescens glabernmum foil, angustissime lineanb. obtosiuatculu Integernmis nilidis, ad caulium basin dense congestis, supenonb. remotiasculis, race mis foliosis, pedicellis folio florali brevionb, snpra basin bibracleolatis; calycis lacinns ovatis acuminate, margme membranaceis; corolla glabernma, superne ventneosa, labio inferlori ad faucem piloso; slamine sterili piloso; anlherarum loculis divancalis glabemmis 2|. — Crescil in California (Snake Fort).
32. *P. KUNTHII* G. Don in Loud. Hort Briannle. 913. — G. Don, General syst. of gard. and bot IV. 63Q. no. 20. — Caule foliisq. glaberrimis linearlb. argute serrilatis patent!-recunralis; laciniia calycinit linear!-lanceolalis; corollis leviter barbatis; slamine sterili superne barbato. % — Folia sessilia tobamplexicaulia. Corolla purpurea. Stamina vii eiserta. — *Chdons tmgusiifoUa* H. B. Klh. Nov. gen. et spec pi. II. 369. t 173. — Klh. Bynops. pi. aeqnin. II. 193. — *PenUUmo** *campanulatum 0. angutHfolium* Hook. Bot. Magai. ad lab. 3884. — Creacil In crepidimbus obumbratis Joxta Moran et Omitlao Mexlcianorm, - Maximo affne praecedentibus et aequenti.
33. *P. CAMPAINULATUM* Willd. Spec, plantar. 111. 228. — Jcq. Hort Schoenbr. III. l. 302. — Sims., Bol. Magaz t 1878. — Hook. Bot. Magai. t 3884. — G. Don I. c. no 30 — Glabrum caule herbaceo, Toll, elala tnm lanceolaiis acuminaiis sessilib, suirimis o\ali», pedunculis bractealis biflons racemosis seu fere paniculalii, flonb sub»ecundis, calycis lacinns serralis; corollae fauce hlrsula, filamenio sierili apice clavalo hirsuto, longiludinc staminum ^ — Caulis herbaceus leres glaber. Folia valde acuminata, e basi apicem usque ^rrrala, suprnora tennm minora el pro longitudine sua latiora, In bracleas o\ a(as transeania Pedunculi plerumque 2- (interdum 3-)Don, floribus subsecundis. Corolla purpurascenlirosea, subtus pallidior, basi angu^iaia, lubo sursum campanulaio-inflalo, lobm quinque rotundatis. Fauis pilosa Stamen sterile longitudine fertllium, apice clavalum pilosum, omnibus ioclusin. - *OuUm* campa—dat** Cavao. leoo. p>lant I 18. u 29. — *Chelone eampanuloidss* Andnrs. Bolanle. reptolt t 40. — Creacit prope Santa Rosa de la Sierra el Lot Joares Vexleanoram.
- &l. *P. ATROPURPUREUM* G. Don In Loud. Hort BriUnolc. 943. — Loddig. Botan Cabin, t. 1420 — G. Don, General syst. of gard. and bot IV. 630 no. 31. — Caule suffrulicoso bubflexuoso nilido, supfrne glanduloso-piloso; foil. Rpssilib argtile HernilaiK glabns, mferiorib. lanceolatis, ulrinque atlenuatis, suprnonb o\ain acuminaiit amplexicaulib.; pedunculis axillarib subtnlloris; calynb. corollnq glanduloso -pubesceniib ; corollis superne barbatis, filamento sterili apice barbato. 6 — Flores obscure parporei paniculam efflicienlei. * *ChsUme atropvrpu-rsa* 8*eel, Brit, flow gard. III. t 235. - Crescit in Mexico.
35. *P. (CHELONE* II. B Kln. Nov. gen. el spee. pi. II. 269. f 1179 - kln Synops plant aequinoct. II. 123.) *GENTIANOIDES* Llodl. Bot legist (New Ser) XI t 3 - (el (1 Don I c no. 32. «o4#s» anno) — Hook. Bot Magai. t 3661. | - Caule elaiio, foil lanceolaiis Integerrlms glaberrimis, auperiorib. breviorib. latinrib acuti»simi<, pamcula clongata laxa follosa; pedonenlis elongatis subumbelhreriN, lacinns calyciins late ovatis; corollae lobls acutis; filamento sterili apice paullulum hirsulo 2|. — (aulrs)-4-pedalis snpra ramosus glaber obscure purpurancens Folia lanrcolaia horizontalia sessilia glabemma integerrimi, ««iprnora latiora o>nta acute acuminata minora, suprema bracteaeformia. Pcriunculi in paniculam magnam dige»ti \alde elongati, flores 3-6 umbellatos speciosot gerente* Calycis seKmenla late ovala acula \iridia purpnrascenlia Corolla nutaru rubicundo-purpurea ^punicea^ sunum ampliata subcampanulata, limbo bilabiato.

- IDIUS albido venis purpureis percono, lobis ovalis acutis. Genitalia tabum corollinum nequanlia. Filamentum sterile apice parce pilosum. — Crescit locis frigidis 10 mille Toluco Meciadorum.
30. P. MIRRAYANUM Hook. Bot. Maffaz. U 3472. - Elatum glaberrimum glaucum: foliis integerrimis oblongis, inferioribus spatulatis, superioribus seu bracteis connatis perfoliatis: floribus racemoso-paniculatis; corollis glaberrimis (coccineis), tubo subcylindraceo longitudinaliter laminatis; filamentis sterilibus imberbis. 2. — Caulis iridescens erectus teres simplex, infra parparascens. Folia *alide glauca, omnia integerrima opposita magna, radicalia 0-8-pollicaria v. ultra spatulata, caulina inferiora oblonga, sensim minora litoria, basi coalita, Oculi (sive bracteae) basi vaginatim connatis perfoliata. Racemi paniculati, flores 4-0 magni speciosi pedunculati ex axillis foliorum oppositorum. Pedunculi interspersorum longitudinaliter, floret nullus. Calyx segmenta patentia lineariter-oblonga. Corolla sesquipollicaris T. major corollae, basi lutea, apicem versus pallidescens, sursum unilobata. Lacinae limbi 3 superiores angustiores*, 3 inferiores patentiores ovales. — Crescit in terra Texana. — *P. genianoidi* proximum.
37. P. HARTWEGI Bib. Plant. Hartweg, 302. — Caule superne tenuissime pubescente; Toll, lanceolatis integerrimis* uberrimis; floribus racemoso-paniculatis; pedunculis pedicello longioribus subreflexis; bracteis lanceolatis; laciniis calicinis ovalibus acuminatis; corollis ample lobulatis in faucem vix inflatis, exclusis tubulosis pubescentibus, lobis imberbis; laciniis sterilibus glabris. 2. — Crescit in Mexico.
38. P. LANCEOLATUM Bib. I. c 184. - Pubescens: foliis sessilibus lanceolatis integerrimis; panicula racemiformi terminali pauciflora longe pedunculata; floribus in ramis brevibus binis axillaribus; calycis laciniis ovalibus pubescentibus; corolla tubulosa a medio ad apicem parum inflata; filamentis sterilibus corollae imberbis. ^ — Crescit in Mexico.
39. P. TEMIFOLIUM Bth. I. e. km — Calyx leviter pubescens: foliis brevibus angustis linearibus obtusis; pedunculis axillaribus unifloris bibracteis, ad apicem ramorum racematis; calycis laciniis ovatis acutis puberulis; corollis a medio ad apicem (supra medium) talde inflatis; filamentis sterilibus corollae imberbis. ^ — Crescit in Mexico.
40. P. UMBOLDTII G. Don, General syst. or gard. and bot. IV. 610. no. 40. - Caulis simpliciter pubescente; foliis linearibus integerrimis; pedunculis bifloris paniculatis; laciniis calycinis subrotundis ovatis acutis; corollis imberbis; filamentis sterilibus glabris. ^ — Folia oblusa 1-3-pollicaria, lineas 1-2 lata. (al) pubescent. Corolla fere eadem ac *P. barbata* Red imberbis et minor. Stamina exserta. — *Chfrott* imberbis* H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pi. II. 383. — Kth. 8)oops. pi. aequin. II. IEL — Crescit in Nova Hispania inter Puerto de Vanenios et pagum Sanlae Rosae.
41. P. BIRBATUM NOL G. a. Americ IL 5X - G. Don I. c no. 41. - Glaberrimum: foliis integerrimis, radicalibus et axillaribus lanceolatis; floribus pendulis paniculatis; tubo inferiori corollae barbato rotululo tripartito. 2. — Corolla coccinea speciosa, limbo albida, nutans. Filamentum sterile glaberrimum. Calycis lacinae margine scariosae.
- a. Foliis linearibus, radicalibus magis spatulatis; corollis coccineis. - *Chdon* barbata* Cav. Iron, plant III. tt. L *«. - Ker, Bot. RegiM. I. 110. ~ *Ckelom* rurUtodts* Andms. Bot. rposit. L M.
- f. Foliis angustioribus. Utiob.; corollis carnis. — Lindl. Uti. RegiL >rw Ser.) XII. t. 21. - Crescit in Mexico.
- & P. CKINTBANTUIFULIUM Bib firropolar. Indie, p. 7 aJoM (, Don I. c ... ** — Glaberrimum glaberrimum: foliis ovatis-linearibus integerrimis* bibracteis cordatis-amplexicaulis; panicula elongata, corollis tubulosis* prudulis* glabris. fauet nodis (eotclneit); Mammis slartli imberbis. 4 l^ulu J-;-pidalu lere* glaberrimum rubro-maeolaium. Folia glauca ovalia lanceolata oblusa glabra et laetia. Panicula saepe luogusima fraxilla filicosa. ramm omnibus brevibus* parvis divuis. Pedunculis filiformibus. Calycis lacinae ovales acutae *cuspidata**

Corolla tubulosa nullo modo inflata gracilis uncialis infundibularis cocnen, limbo subaequaliter quinquelobo bilabiali. Antherae oblongae, per paria quadrat in approximatae glabrae albae Filamentum solum apice dilatatum glabrum — *Chelone centralifolia* Bth. Transact of the Hort. Soc. (New Ser) 1 481 — Liudl. Bot. Regist t. 1737. — Crescit in California. — Affinis praecedentii

43. P. *CORDATUM* Bib Scrophul. Indie p 7 adnol. — Caule pruinoso, foli breviter petiolatis late ovalis obtusis integerrimis, basi cordatis bullatis, subulso nervosis; panicula laxa, corollis tubulosis profunde bilabialis, labio superiore emarginato, inferiore irigato; filamentum solum barbato, antheris glabris. % — Crescit in California.

Setio II. *ERIAHIERA* 6. Don I. e. 639. — Antheris villosae v pubescentes.

44. P. *HETEROPHYLLUM* Lindl. Bot. Regist 1. 1800. - Hook. Bot. Mag. t 38M - G Don I c 630. no. 33 — Foli glaucescentibus. integerrimis, inferioribus linearibus, superioribus linearibus, racemo virgato, calycis lacina ovata acuminata; corollae ventricosa imberbis; filamentum alabastrinum glabrum; antheris stigmatibus, apice bifurcatis. % — Caulis 1/2, 2-pedalis teretis glaucescens, basi purpureus Folia acaules oblonga vix unquam serrata Corolla laete purpurea glaberrima fere aequilata ventricosa, lacinae labii inferioris oblique rotundatis, inferiore intermedia laterali paulo angustiore Pedicellus supra medium bifurcatus. Filamentum sterile album gibbernum auberrimum. — Crescit in California.

- 45 P. *GLABRUM* Prsh Fior. Americ. sept II. 738. — Curtis, Bot. Magaz t. 1672. — G Don I c no 34. — Glaberrimum foli sessilib. ovato-lanceolatis integris, margine eis parte undulatis, pedunculis multifloris secundis, segmentis calycinae rotundato-ovalibus acuminatis, corolla subcampanulata, filamentum quinto stili infra apicem retusum barbato, antheris pubescentibus. % — Flores numero purpureae — *Penstemon enanthera* Nutt. Gener. plant. m. II. 52. — Crescit in America boreali (ad confluentem Quiviam Sibiriae et Columbia).

46. P. *GLANDULOSUM* Dougl. m. in Lindl. Bot. Regist t 1902. - Hook. Bot. Mag. i. 3088. — G. Don I. o. no. 35 — Pubescentibus-glandulosum* foli radicalibus ovatis grosse dentatis, ciliatis ampliusculis. ciliis subintegerrimis; Itinella calycis capsulae glabrae subaequalibus, corollae ventricosa; filamentum atherale glabrum. 2l. — Excepta sola capsula, undique parva brevibus mollibus glandulosa oblonga. Caulis strictus bipedalis teret. Folia rotunda ovata breviter petiolata grosse dentata, caulibus cordato-ovatis ciliatis implexatis, inferioribus paululum dentatis, superioribus integerrimis. Flores terminalis et tripartitis racemosis paniculatis, umbellulis pedunculatis saepius trifloris, foliis longioribus, basi bracteatis. Calycis laxi lacinae ovatae Corolla magna venusta, digittata insulari, pallide rosea, intus purpureo-violeta, fauce subcompressa, limbo bilabiali, labio superiore bilobo, lobis connatis, inferiore tripartito majore, laciniis lateralibus incurvis, super mediam subincumbentibus. Antherae albae ciliatae. Filamentum sterile rectum glabrum spatulatum. Capsula ovalis glabra. Semina angulosa — Crescit in America boreali-occidentali.

47. P. *VIBICINUM* Dougl. B. M. In Lindl. Bot. Begl. L 1300. - G. Don I. c no 36. — Caule teretibus erecto glabro; foli sessilib. ovato-lanceolatis acuminatis denticulatis glabris; floribus paniculatis; corollis ventricosis ciliatis; calycibus glaberrimis, antheris pilosis. 2l. — p. *diffusum* valde teretibus, differt lamina caulium magis tenuis, foli sessilibus longioribus rectioribus; corollae colore obscuriore, calycibus glaberrimis antherisque bifurcatis — In America boreali-occidentali crescit

48. P. *UNICOLORUM* Dougl. mss in Lindl. Bot. Regist. U 1121. - I. odd.* But Cabin, t 1641 - Hook. Bot. Vagat t 3301 - < aule herbaceo perenn. M. sessilib. pinnatis Odn. rahnibus glandulosis-pubescentibus, lacinis ovatis arcticis, corollae labio superiore bilobo, inferiore in lobos ternatis, pedunculatis

- 2-3-florls. *Q* — Caulis erectus v. suberectus ramosissimus, ramulis gracilibus puberulis. Folia ovato-acuminata obsolete pinnatifida pubescentia, segmentis angustis acuminatis saepeque dentatis. Ramuli numerosi laterales gerunt flores 2-3 pulcherrimos. Calycis lacinae profundae lanceolatae v. subovatae acuminatae palentes. Corollae purpureae tubae valde ventricosae, labio superiore bilobo erecto, inferiori trilobo palente. Filamentum sterile lineare compressum, supra obovato-ovoides, infra album, apicem versus albo-pilosum. — Crescit in America boreali (Columbia).
49. *P. DISSECTUM* Ell. Flor. Carol. II. 120. - G. Don I. c. 640. no. 38 - Folia oppositis sessilibus multido-dissectis, segmentis linearibus obtusis; floribus paniculatis. 2l. — Caulis puberulus. Corolla purpurea, labio inferioris segmenta quam superioris angustiora acallora. Stamina inclusa. Antherae pubescentes >. pilosae. — Crescit in America boreali (Georgia)*
50. *P. SCULERI* Dougl. mss. in Lindl. Bot. Regist. t. 1277. t. — G. Don I. c. no. 30. fig. 64. — Suffruticosum: folia obovato-lanceolata serrulata, superioribus obtusis; floribus solitariis axillaribus racemosis breviter pedicellatis, corollis >enricosis, lacinae limbi serrulatae; antheris lanatis. 2l. — Rami teretes*, ramuli pilosiusculi. Folia linear-lanceolata obovata acule argute serrata, nunc subintegerrima, superioribus oblongis obtusis integerrimis. Bractae imbricatolanceolatae integerrimae, pedicellis breviores. Calycis lacinae acuminatae pubescentes. Corolla violaceo-purpurea fere biuncialis >enricosa, limbo bilabiato, labio superiore bilobo, inferiore trilobo, palato aperto pubescente, lobis omnibus crenulato-serrulatis. Antherae lanuginosae. — Crescit in America boreali (Columbia).
51. *P. CRASSIFOLIUM* Lindl. Bot. Regist. (New Ser.) XI. t. 10. f. - Fruticosum glabrum: folia obovato-lanceolata integerrimis concavis, subtus canaliculata; racemis terminalibus paucifloris secundis; rachis bene pubescente; calycis glabrusculi lacinis ovatis acuminatis serratilobis; corolla infundibulari glabra, labio inferioris lacinae ovatis obtusiusculis, inferius tripartiti lateralibus ovatis obtusis, basi villosis, intermedia abbreviata; antheris villosissimis 5 — Rami rigidi doancati lignosi glabri, ramuli minutissime pubescentes. Folia carnosa concava, inferius obovato-lanceolata, superiora ramorum (longiorum sensim breviorum). Haeccum similes secundae minute puberulae, pedicelli apice bibracteolati, bracteolae scissae. Flores lilacini, corollis uncialibus, calycis lacinae minute puberulae acuminatae. Filamentum sterile filiforme apice villosum. Stylus glaber (lappula ovata quadrivalvis, calycis longitudine. — Crescit in ora America boreali occidentali-boreali. •

t *Species haud satis notae, forte ad distinctionem generis convocandae.*

52. *P. TOLMIEI* Hook. Flor. Bor. Americ. II. 06. — Buncium herbaceum caespitosum glaberrimum: folia lanceolata acuta subcoriaceis integerrimis marginatis sessilibus, sub lente impresso-punctatis, inferioribus petiolatis; verticillis florum racemosis densis; pedicellis plurimorum brevibus; corollis parvis, limbo lacini aculis subaequalibus, caliculis fuscis calicem subaequantibus. 2l. — >ix spithameum. Radices horizontales lignosae crebre fibulosae, radices plurimi caespitose. Corolla — umca tantummodo adest — vix semipollicans. Inflorescentia <ub>picata. — (rescit in America boreali (Carolina).
53. *P. MTKS* (K>S Lamb. Transact. of the Linn. Soc. X. 2W. t. 0. - Prich. Fl. Amerr. septentr. II. 42K. — Hook. I. c. — Caule fruticoso, ramiis anfractibus, superne pubescentibus, folia lanceolata, obsolete dentatulae serrulatae; racemis terminalibus subcorymbosis, filamentis simplicibus longiusculis barbato b — Folia 3-4-pollicaria, pollicem longa. — *Digitalis dasyantha* Pall. n. x. — Linalis h. k.
54. *P. MBNZIKHILLI* Hook. I. c. — Fruticosum homile >agrum ramosum folia glabra obovato-cordatae obtusiusculis coriaceis, apicem versus serratis breviter petiolatis; racemis terminalibus floribus >peciosis oppositis tubulosis campanulatis. S. — *Gerardia ftuhcoia* Prich. Pl. Americ. septentr. II. i. l. t. 18. - Crescit in America boreali (Utah).

55. *P. DOUGLASII* Hook. 1. c. — Fruticosum humile: ramis subfasiigiatis ereclis, Toll glabernmis obovato-lanceolalis aculib conaceis lntegemmis sessilib.; racemis lerrainalib., pedicel In oppositis; capsulis nigrescenlib. calcem paullulum excedentibus. 6 — Afflae praecedenti, sed distinctissimum. Folia 'A-'A poll, longa, exsiccata nigncanlia. Segmenta calycina ovalo-lanceolala serrulata, quam capsulae pdllfdiora — Crescit ID America boreali-occidentali (Bine mountains).
56. *P. GAIRDIVEIU* Hook. I. c. 00. — Fruticosum bumile minute puberulom: ramis subfjsiigiiais ereclis stnclis; Toll, alternis linean-spalhulalis (supremis lineanb.) conaceis inlegernmis sessilib, racemis elongatis, pedicellis alternis (III!) brae-tealis, capsulis rubro-fuscis caljce concolori paullulum longioribus. 5 — Grescit in America boreali-occidentali (Blue mountains).
57. *P. SERRULATUM* Menzies mss ex Hook I. c. 05. - Gaule glabro, foil ommb argute serraiis, supenonb. ovatis subhastalis; pamcula bi-trifurcala, filamenlo sterili barbalo. 2|. — Forte idem ac *P. dtffutum*. — Grescit IU America boreali-occidentah.

ft *Species dubiae.*

58. *P. ARGUTUM* Paxton, Magazine of botany VI* SH. o. icon, ex D. Dietr. Synops. plantar. HL. 505. no. 40. — Suffruticosum pubescens: caulib. numerosls ramosis-simis, foil oppositis partim connatis, soperionb. ovatis, inferiorlb. spatbalaiis irregularer serraiis, subtus pallidiorib.; calycis denlib. quinque aequalib. oralo-lanceolatis persistentib.; stylo apice recurvo, superne barbalo. 5 — Planla 3-4-pedalis Corolla bilabiata violaceo-purpurea. Filamenta alba. — In Mexico.
50. *P. ALPINUM* Ton- mss. ex Spr. Syst. vegetab. IV. 235. — Glabernmum foil oblongo-lanceolatis denticulalis, pedunculis mulliflons, corolla subregular, antbens Inrsutis 2|. — *Che lone alptna* Spr. I. c. — Grescit in America boreali ad Rocky mountains.

3000/.,. TETRANEMA *Bth.*

- (*Bth.* In Lindl. Bot. Regisl. [New Ser.] XVI. t. 52 — Endl. Gen. pi. Suppl. IV. ined.)
1. *T. (PENTSTEMON) llortul*) MEXICANCJM Bib. I. c. - Herba humilis babilu *Gloxtntarum*. Gaulis simplex brevisslmus. Folia opposita vlx petiolala, peliolis vaginatim subamplexicaullbtis, oraU, bati looge auenuata, acuta scrraU, nerto medio valde prominente, sopra glaea, infra mbeolla, ulrlnqae — at Tidelar — glabemma, crassiuscula. Pedunenli axillares blnl longluscull, folio brovioces, apice foliolis 2 lanccolatis inslrucli, Gores plurimoi (12-20) brevfttime pedlcellatos gcrenlcs Oorollae lubus rubicundus, calyce Irlplo longlor, limbo bilabialo, labio supenori apice bifido, labio inferior! trifldo, lacinus ovalibus oblusis albescentibus, purpurco-ttnalis 2f — A genere *PenMemon* differt solummodo stamino quito slerili deficienle. — Crescit in Mexico.

3010. BimSELIA *Jcq.*

- (*Jcq.* Plant. Americ. 170. tab. 113. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 306 II 210. Spr. Syst. veget. II. 811. — G. Don, General lyst of gard. and bot. IV. 513. sq)
- \$. 1. *FoMs oppotids; caulibus ramisque quadrangularibus.*
1. *R. SARMEMOSA* *Jcq.* Plant. Americ. 178. t. 113. — Willd. Spee. plant. III 344 — *Kth S>nops.* plant aequinoct. II. 110. — G. Don 1. c. 514. no. 1. — Gaulc ramisq quadrangulanb glabrts; foil, oppositis ovalis, basi rotundatis, supra pilosiu*»culis, corjmbis axillanb. pedunculatis 3-5-flons. 5w — Folia broiler pe-liolata o>ata aiuia dentata, supra pilosiuscula, infra glabra, 8 lin. longa, 5 lin lala (urulu carnoa \ puklue rubicuoda seinipollicans. — Crescit in s)|\alicii insulae tubai¹ propo (juuna>acoa.
2. *R. MULIFLORA* *Suns*, Botanic. Magaz t |M6 - G Don I c no 1 - <aul> quadrangular! glabro subscandenlc, foil oppo»ilis peiolaiis o>aio-ohlongi,

- acuminatis serrato-crenatis; racemis cymosis terminalibus. verticillatis multioris. 6 — Flores coccinei. Folia glabra. — Crescit in Mexico.
3. R. ROTUNDIFOLIA Gavao. Icon, plant. V. 0. t. 415. - Pen. Enchirid. bot. II. 164. — G. Don I. c. no. 3. — Pubescens v. tomentosa: caule ramisque erectis tetragonis; foliis sessilib. cordato-subrotundis crenatis tomentosis; racemis axillaribus bifidis secundis multioris. 6 — Flores coccinei. Folia crenato-serrata. — In Mexico prope Acapulco crescit.
4. R. SYRINGAEFOLIA Cham, et Schleichd. Linnaea VI. 370. t — G. Don I. c. no. 4. — Fruticosa scandens glabrescens: ramis tetragonis acutangulis; foliis oppositis breviter petiolatis cordatis ovalis acuminatis aculis mucronulatis; laciniis calycinis ovatis acuminatis aculis brevibus; capsula ovata acuta a calyce basi amplexa. 6[^] — Folia adulta 2¹/_t-3-pollicaria, 1¹/_i-2 poll, lata, pergamenacea firma, supra nitida glaberrima, nervis venisque primariis ulrinsecus subquibus impressis, iisdem sublineari-prominentibus, leviter reticulato-venosa, margine reflexa. Petiolus sesqui-trilinearis crassus pubescens, linea stipulari pubescente cum opposito connexus, pube in costam et venas folii vix ascendente. Cymae terminales et axillares multiflorae, more generis breviter pedunculatae dimidiumque folium subaequant, ramis pedicellis pubescentibus; calycibus glabrescentibus. Corolla 8 lin. longa coccinea, fauce et infra faucem uberius barbata. Capsula cum basi calycis fere semipollicaris acuta septicide dehiscent, valvis serius bifidis. — Crescit in Mexico (Papantla).
5. R. FLORIBUNDA H. R. Kth. NOT. gen. et spec, plant. II. 390. - Kth. Synops. pi. aequifol. II. 110. — G. Don I. c. no. 5. — Caule ramisque quadrangulis glabris; foliis oppositis ovatis cordatis glabris; corymbis axillaribus sessilib. multifloris. 6t 2¹/_t — Folia breviter petiolata serrato-crenata, infra in nervo medio pubescentia*, 0-10 lin. longa, 8-10 lin. lata. Corymbi foliorum circiter longitudine sessile* (H. B. Kth. I. c.)? pedunculata (Cham, et Schleichd. Linnaea V. 106.)? Corolla coccinea. Semina multum oblonge angulata fusca. — Crescit in Mexico inter fluvium Papagallo et Venta de Tierras tiolorada.
6. R. ALATA Cham, et Schleichd. Linnaea III. 3. f — G. Don I. c. no. 0. — Caule quadrangulo-alato piloso; foliis oppositis ovalis acuminatis in petiolum alatum decurrentibus pilosis; pedunculis axillaribus solitariis. 5 — Caules adulti prostrati, ad nodos radicales, e quibus oriuntur rami erecti pedales vel sesquipedales. Caulis alae ciliatus. Folia obtuse serrata, infra pilosa, 2¹/_A poll, longa, 1¹/₂ lata. Corollae limbus ciliatus. — Crescit in Brasilia iropica.
7. R. JUNCEA Zuccarin mss. ex Lindl. Bot. Regist. t. 1773. t — Ramis tetragonis erectis junceis; foliis minimis petiolatis ovatis subintegris; pedunculis filiformibus submultioris. 6 — Caulis iripedalis erectus angulatus viridis, ramis obsilium gracilimam tetragonis pallide viridibus, junioribus subaphyllis multinerviis. Folia saepe minima, semper parva, in ramulis distichis majora petiolata ovata acuta subtiliter serrulato-ciliata, aliquando denique alterove multinerviis. Inflorescentia primo ad speculum paniculata, deinde in ramulis racemosim digestis gracilibus distamibus constans, quorum apice insident flos unus duove pedicellati cernui. Calycis lacinae 5 ovatae acutae. Corolla tubulosa coccinea unciam longa, sureo dilatata, limbo subaequaliter quinquefidus, laciniis obtusis, duabus superioribus magis approximalis. Stigma bilobum, lobis oblongis planis. - Crescit in Mexico prope Oaxaca.

§. 2. *Foliis verticillatis; caulibus ramisque multangularibus.*

- & R. TERNIFOLIA H. B. Kth. I. c. 350. t — Kth. I. c. 120. - G. Don I. c. no. 7. — Caulis ramisque tetragulis pubescentibus; foliis ternis verticillatis obovatis acutis basi mucronatis, supra birtia, infra nervo-pubescentibus; corymbis axillaribus paniculatis multinerviis. 6 - Folia breviter petiolata grosse serrato-dentata, 1¹/_t poll. longa, 16-18 lin. lata. Corolla coccinea. - Crescit in declivitate montium ignivomorum Jonillo Mexici.

9. R. VERTIGILLATA H. B. Kth. I. c. 300. t — Kth. I. c. — G. Don I. c. no. 8. - Ramis subdecemangulanb. glabris; Toll, corymbisq. verlicillatis. 6 — Rami verticillati. Folia floralia rotundato-ovata oblusa, basi caneata, serrato-crenala pilosa Corolla coccinea — Crescit locis temperalis Novae Uispamae prope speluncam Puente de la Madre de Dios.
10. R. EQUISETIFORMIS Cham, et Schlbld. Linnaea VI. 377. f — G. Don 1 t no. 9 — Suffruticosa ramosissima virgaU subapbylla glabra: ramis verlicillatis senis terms* c el sursum oppositis, saepius geminalis angulalis, angalis prom Ineniib, florib in apicib ramorum oppositis, terminali abortivo, pedunculalis, lacmih calycinib inangulanb. ocutis; corollae fauce imberbi, capsula globosa, calyce ipsa angustion suffulla. 6 — Suffrutex Inpedalis. Caulis junior simplex 12-8-angulans, folns senis qualermsve verlicillalis. Folia petiolata ellipdeca acua grosse parceque serrate, qualuor circiler lineas longa. Serius evohunlur rami anllares cadunlque folia, petiolis sqnamaeformibm supersiilibus. In apicibus adultae plan la e folia bine inde observanlur minora anguitiora magis Iancoolata Pedunculi semipollicares. Calyx tub anlbesi parvus. Corolla 0 lin longa coccioea, genilahbus earn aeqnanlibm. Capsula diametro iransversali inlinean calyce paullo aucl al ipsa angustion suffulla, bilocularis, sepicide el simul loculicide dehiscens, stylo quadnlssio, placenU centrali demum libera. Seraina minula ovalia verruculosa dilute brunnea, Inter pilot albidos longos e spermophoro ortos, loculamenta capsulae farcientes nidulantla. — Gretcil in apricioribus Papantlae Mexicanorum.
11. R. EPHEDROIDES Blh. Plant. Hartweg. p. 60. no. 501. — Suffruiicosa, basi decumbens v erecla> rarais 3-4-nis verlicillatis slnciis junceis glabris, lerefi—stria—tis (polyedriit), foil minimis squamaeformib adpressis v ramealib parvis ovatis dentate; cymis verlicillalis densis pauciflons, corolla viscidula apice ampliata %S — Caules 1-2-pedal es glabcmmi Folia ramorum primordialium omnia ad squamulam linearem % lin. longam rigidam adpressam reducla, ex barum axillis nascitur bine inde nunc fasciculus e folns 4-3 ovali-oblongis 1-2 lin longis constans, nunc ramulus clongalus remote folialus, fohis verlicillatis 2-3 lin, longis Inflorescencia pseudo-veriicillata, squamulae enim supenores pleracque floriferae, cyma sub quavis squama 3-5-Dora, Ooribui brevlier pedicellate braceis paucls brevibus foliacels inlrmixiis. Calycis campanula^ deoten lanccolato-subulali, lubo subaequilongi. Corolla fere 5 lin. longa (coccioea TT) limbo ampliore, quam In caeieris speciebu. — In Mexico (Hacienda de Saota Anna)

t *Species mihi nomine tantum nofo.*

R. POLIEDRA Zucc. ex Steud. Nomencl. bot. (ed. 2.) II. 487.

ff *Species e genere espellendae.*

R AITERMFOLIA Per* - GALVEZIA FRUTICOSA (ex Steud. Nomencl)

R CAPE>SIS Linn fil. - VAULIA CAPE>SIS

R 01 DENLA>DIODKS Rxb. - VAHLIA OLDENU1SDIA.

R. VISLOSA Rxb - VADUA SESSILIFLORA.

3011. PHYGELIU9 B. Mey.

(E. Mey. mss. ex Bib. in Hook. Coup, bot Magai. II. 53. - Meisn. Gener. plantar
• aaealar. I. 308. II. 210.)

1. PII CAPENSIS E. Mey mss. ex Bib. I. c. — Frutex glaberrimus, paniculae tantum rhachi tenuiter pubescente. Folia opposita petiolata (fere *Teedtae*) otata subcordata crenata crassiuscula laevia Pauicula ultra pedalis laxa secunda, ramis laxc 3-^p>flon*i Uractae ad basin ramorum paniculae et pedicellorum breves Pedicelli apice rerurvi (alyres nulantes glabernmi. Corolla sesquipollicam speciosa glabcrnma tubo bupra ovanum conlraclio. Stamina exserla. Capsula ovala semipollicans \alde obliqua submembranacea, bisulcata glaberrima glaucescens ,S — (*re>cit in Promontorio bonae spei (^lilbergen in Cafferland

3912. COLPIAS *E. Meyer.*

(E Meyer mss. ei Bth in Hook. Gomp. bot. Magaz. II. 53. — Melsn. Gener. plant vascular. 1.306. 11.219)

1. C MOLLIS *E. Mey. mss. ex Blh. I. c.* — Fruliculus divancato-ramosissimuA ramulis fragillinn molliter pilo»is. Folia peliolata sabrotundo-cordata semipolhcana acuta inci»o-dentata v. palmaliloba, utnuquc pilosa. Peduncuh axillares uniflon folio longiores ebracteati. Calyx villosissimu». Corolla 8-10 Im. longa glabernma. Gemlalia brevissima. Capsula glabra calycem aequans 5 — Crescil in Promontorio bonae spei (in rupibus prope ZiheiTontein in ISemaqualand).

3913. IXIAVTIIES *Blh.*

(Bth. in Hook. Comp. boL Magai. II. 53. — Meisn. Gener. pi. tascul I. 306. II. 210.)

1. 1. RETZIOIDES *Bib. I. c.* — Frulex: ramii erecils birsutis. Folia crebra 4-5-naiim verticillata subsessilia erect* rigida lanccolata acuta, apico serrata, basi angustata mtegemma coriacea glabra v. juniora villosa. Peduncuh axillares uniflon bibracteali, folio breviorcs. Calyx 4-5 lin longus, sepalis Jacimis) snalis glabnuscult. Corolla circiter 10 ho. longa, valde obhqua, extus visco»o-villosa. Gemiaha corolla bretiora Capsula crassa semipollicaris otoidea acuta, profunde boulcata, matura bipartibihs. 6 — Crescit in Promontorio bonae spei (prope Tulbagh in districtu Worcester).

3914. REHNAWII *Liboschitz.*

(Libosxhitz mss. ex Fisch. Indx. semin. hort Petropolit. I. 1835. coll. p 30. — Meisn Gener. plant, vascul. I. 306 II. 219)

1. R. CHINE>SIS *Fisch. ei Meyer I. c. p. 30.* - Ann. ic. natur. V. 134. f - Lndl Bot. Regitk k 1900, - Hook. Bot. Magai. t. 3053. t — Knwls. el Wlsc. The floral Cabinel I. 01. f I- 44. — Herba pmnnli glollnoia pilosa, palmaris v. blpedalis, undiqoe livide purpuratcens. Folia obovata inaeqaaliter gnmeqec denlata allerna, sunum decretcentia. Racemus laxos, in planla culta 8-10-floriis, bi»i foliosus, in spontanea contractus. Flores In fen ores in axillx bractearum foliacearum looge pedunculati, supenores subscebiles. (alji tillosnomus campanulalus quinquedenlatus, limbo paullo obliquo Corolla tubulosa \illo<a vesquitua-cialis, tubn cxtuH fusco - purpureo, venire luptsconto, limbo frmiRineo-venoso, basi HanKinnrn, quinquelobo, larinix rotundahs, suprrionbus litionhus paullo re(l«\is, in for i on lineari, mullo angu»liori, utrinque phcila Siannna 4 <liil)nama_r versus ba^in tubi in^crla inrlusa glabra, antbrrarum oculis tubparalkli* mulrif Ovanum ovatum uniloculare, placentis duabus did)mi< reflr&i« pol)«permii> Stylus filiformis. Stigma bilamelUlum, lobis aeqaalibu* ^ - thgttaht lierardi* Bnge. Knumtr. plaoL (.binens. 40. (nee Linn.) — *Brhmammia* libo»ch m»» > *g'u-Umota* drtnr. Nov. eommeol aead. inpi-rial. Peiropoht. XIV. 544 t » - Crescit in China prope cjiptulem arbem Peking In nooloiis.

3915. DI«IT%LIH *Tournef.*

Toaraef. Instil, rei herb. 73. - Melsn. Geoer. plant, ^atcul. I W II 219 - *Spr-h)st* vrgeL II. 707 — Digilahun monographia, sislent hMtoriam bol*~mcam generis, labulit omnium specierum hactrnus engmtarum II* lustratam, utplurimum confectit ad iconrs *Per dm and t Bauer pnaes Gussoneum* CaU/<-y. — Curt JOABBIU Lndlry. - I ondim *F&I* f^o.
Digitalis el *I\$opUx%* (J. Dun, <icoi*ral %|%| of ganl and but | 501 500J .

•Mtto L DIGITAU8 Uadley I. e. p. 0.

CorolUt labiaa supenut nullo brevltut, ab infrmrr imbriratum

- I. D. PtmrURBA *Linn. Spec. pUoUr. 001.* * tirlnr l)« fruriib n .eminib I. 247. I 9X - Fet*. Mitt iUrp. gOi. I. (BOL - Moo. Prmpud «urp II I. II *Lob.* Icon L 57i. - Rivfta. Mooop. irregvl. 1104. - knipbf. t^oiur Icie - Blackv. Herb I. ftt. — Curtis, Fl. Londin. 1. t 4ft. - Zorn. Icon, k <W - Flor. *Dm* «< k 74. - Eogl boi. k M97. - Hayne, Anneigcw. I. I. 4fc - bum. Ducblodf. *Flor.*

- nfl. 11. ic. acn. - Lndl. Monogr. Digital. 0. f t. 2. - Rchb. Flor. Germ, excurs. 370. no. 2582. — Koch, Synops. flor. Germ. (ed. 1.) 518. — Foil, ovalo-lanceolatis crenatis, sublus caule pedunculisq. tomentosis, inferiorib. in peliolum angustatis; lacinnis calycis ovato-lanceolatis breviter acuminatis. Irinerviis pubescens; corolla ampliata-campanulata, extus glaberrima, labio superiore oblusissimo retuso v. Icviter emarginato, lacimis labii inferioris breviter ovatis rotundatis. <? — Flores purpurei, raro carnei v. albi, intus punctis intense purpureis albo-marginatis adpersi. Herba 2-3-pedalis. Folia rugosa mollia opaca, radicalia oblonga peliolata, caulina sessilia, basin attenuata, suprema integra. Raccemi secundi densi elongati. Dracacae ovalo-lanceolatae flonibus breviores. Capsula pubescens. — (*atnpanula sylvestris* t) *Digitalis* Trag. Kr. iulorbch. II. c. 125. — *Virga regia* Cicsalp. Do plant. 348. — *Digitalis flore incarnata* Bessl. Hort. Eysl. aest. ord. I. fol. 1 fig. 2. — *Digitalis purpurea folio aspero* Moris. Oxon. Hint, slirp. I. 478. beet. 5. t. 8.
0. *floribus albit* — *Digitalis alba* Lobel. Icon, t. 572. — Bessl. Hort. Eysl. aest. ord. I. fol. 2. OR. 1. — Creteit In Europae mediae lucis el ad viarum margines >ix ultra 02° lat. bor. — (De bujus specei forma montiroia tingolari conf. Vrolik in Flora (B. Z.) 1844. no. 1. L 1. 2.)
2. D. THAPSI Linn. 1. c. 067. — 8m. Eiot Bot. 83. t. 43. — R. Br. in All Hort. Kerens, (cd. 2.) IV. 28. - Lindl. I. c. 10. f * 3. et 4. — Foil, oblongit rogoiis crenatis undualis decurrentib.; sepalls ovalit; corollae laciniis otalls rolandatis; pedunculis gracilib. arcoatis calycib. moltum longioribus. 2|. — Praecedenti simillima, tantum differt habitu humilfore, adspeculo molli et incano, caule ramuloso (in tar. /?, tamt'ii omplici), foliis undulatis decurrentibus, bracteis lanceolatis saepius corolla brevioribus lacinnis calycinis otalis angustioribus mamsque tomentosis, lacinnis corollae rotundatis, demum antheris immaculatis pubescentibus, sed praecipuo pedunculi* gracilibus arrualis quam calycis muluim longioribus, capsulis minoribus glabris — />. *verbascifolia* Boer. Mus. 1(H. t. H5. — Barrel. Icon. 20. t. U8J. — *Digitalis Hispanica purpurea minor* Tournef. Instit. 105.
- fi. intermedia* Lindl. I. c. I. 4. — Caule simpliciter altiore; corollae laciniis obsoletit. — *D. purpurea* Tabern. Icon. t. 568. — *D. flos rubro* Betnl. HorU E)*t. aest ord. I. fol. 2. fig. 2. - *D. tomentosa* Lnk. et Hflinnagg. Flor. Portug I. 220. I. 20. - Sims, Bot Nagai. L 2101 - Creteil In moniots ElnirUe, 6a-baudia, Lusitanae el UUpaoiae.
3. D. MARIANA Boin. Voyage bot dam la mldl da l'Btp. p. 415. f t. 126. A. - Perenni*: foil, utrinque cano-iomeniotia pannositate petiolalis ovalis crinatis; racemo unilateral!, bracteis squamiformibus minutissimis; pedicellis per aotbetin ralyce plus duplo longioribus; ralcis tomentosis laciniis rotundato-ovalis oblusis mucronatis cucullatis; corolla campanulata, supra basin valde restricta verticaliter subcompressa, extus glabra breviter ciliata rogoi, infra brunneo-punctata, labio superior! breviter obtusissimo integro, inferius in lobo, lobis rotundatis, intermedio multo majori; rapsulit tomentosis acutis, calyce patulo duplo longioribus. 2|. — Caulis uncurvatus plures cretuli albo-lomocotosi simpliciter angulati rmpedales v. sesquipedales. Folia pleraque radicalia, ulrlaque molissime allm-grucolomentosa, infra reticulato-nervosa ovata T. ovalo-oblonga, in peliolum magis abrupte desinentia, caulina miobra acuta subsemliata. Racemus unilateralis 10-20-florus. Pedicelli tomentosi In antbesi calyce duplo triplote longiores, ad ortum n iterum »ub calyce fleii, bracteola triangulari, apice subulata fulti. Calycis ad basin u*que quinquepartitis lacinae rotundato-ovalis curvulatae »alde patulae mucronatae integerrime subnerves, exclus breviter tomentosa, supenon ancustium. Corolla magniladine *D. purpureae*) campanulata irrregulariter depressa, paullo supra basin talde contracta bilabialis, margine breviter nliata, inius pariter inferius pilis longis albis barbaea rosca, intus pariter inferius maculis brunneo-rubicis albo-marginatis taneicatis. Capsula ovalo-comra arutiutula, »tylo persistent? apiculata breviter tomentosa, calyce duplo longior. Srmma mgra

- minutissime muriculata. — Crescit In Hiopama mendionall ad ropes montis Manani vulgo la Sierra Moreoa.
4. D. MINOR Linn. Mantiss. 567. — Sims, BoL Magaz. u 2160 — Lindl. 1. c. 12. f 15 el 6. — Foil, radicalib bumi recnms lanceolatis plams denticulatis; racemis pauciflons; corollae laciniis ovalis rotandalis dilatatis glabernmis, superiore bifida, peduncuhs calyce tnplongionbns. % — Caulis simplex glaber v. pubescens Folia remole dentaU glabernma, radicalia sublus pubesceniia Racemus laxus subsecundus. Bracleae infenores flonbus subacuales foliiformes. Calycis lacimae lanceolalae pubescentes, infenores lubum corollinum aequanles. Corolla pallide porpurea, lubo quam praecedentium minus venlnco»o glaberrimo, raaculis plummis non ocellalis notato, lacioiis rolundalis dilatatis, superiore bifida. Antherae valvalae interior*! vittatae. — *fi. tmmma* Lindl. I c. t. 6. — Scapo aphylo folusque •illosisslals. — Cretcll In Hispaia.
5. D. PURPURASCEN9 Rib. Catalect, botan. II. 62. — Lindl. I. c. 22. I. 20. - Rchb. Flor. Germ, excurs. 378. no. 2576, Plant, critic. II. flg. 284. — Koch, Synops. fl. germ. (edit. 1) 518. — Foil, oblongo-lanceolatis serralis glabris, subtus in nervis pubescenlib., inferionb. in peiolum angustalis, supenorib. basi ovata bessilib, laciniis calycims oblongo-lanceolalis acuminalia Innervns, margine pdunculis cauleq. superne glanduloso-pubescentib.; corolla lubuloso-campanulata, exlus glabernma, labio superiore obluso emargioalo, laciniis labn inferiors ovalis, lateralib. aculiusculis, intermedia oblusissima corolla raullo brcviore £ — Corolla flava, colore dilute purpureo focata, ran us tola purpurea, intus pallida, ventre punclis purpureis magis minusve adpersa. — *D. longiflora* Lej Revis. de la fl. de Spa 126. - *D. purpureo-lutea* Mey. Cblor. Hannover 324 — *D. erube\$cen\$* Dryaod. DM. ei Hort Kewens. (edit 2.) IV. 29. — *D. lulea y hybrtda* Lindl. Monogr. Digital. 23. t 23. - *D. hybrid** Salt. Nouv. Bullet. III. 337. t. 0. - Joorn. Phys. 178. p. 285. t I. flg. 1. el 1 - *D. intermedia* Lapeyr. Abr. Pyr.T - Nam hybrid a inter *D. pwpuream et tuUam?* — Crescit in Bavaria (Kosel, in moniibus Navae), prope Leodinm el Malmondariom.
6. D. GRANDIFLORA Lam. Fl. Franc. II. 332. — Rchb. Fl Germ, excurs 370. no. 2580. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 518. — Foil, oblongo-lanceolatis serralis ciliaris pubescentih., inferionb. in peiolum attenuatis, supenorib basi otata simiamplexirauhb, laciniis calycims lanceolatis acuiis, prdunculi» rauleque sa-perne glanduloso-pilosis; corolla amphalo-campanulala glandulu<o-pube«rrnie, labio superiore oblusissimo emargmalo v subdenliculato, larinns labn infrnorls triangularb, inlermedio duplo longiore oblusoque v. aculo, corolla raullo hreviore. ^ — Corolla lulco-sulphurea, interne linen fuscis reliculaio-nrbulosa.
- a aculiflora* Koch I c. — Laciniis labii inferorls aculm — /> *ambtgua* Sirnn-Deuueubl. Flor. HO. II. - *D. ockroUuem* Lindl. Monogr. Digit 14. t i 8 (excl. tar. \$) - Variat. *D. ockroleuc** Jcq. Fl. Aasriac. I. 36 157 — *ihytialts In-lea* Tabern. Iron. L 567. — *D. /lor** *Imi\$o* Bessl. UorL Eytt. aeii ord I. fol* I fig 1 - *D purpurea* ?ar Knipbf. Centar. 6. c. ic. — /> *ambtgua* Morr* Prodr fl dneiung 62. - *D grandtflora* Rchb. Plant cnlic fig 280.
- fi. obtunflora* korh I c — Laciniis labn in tori or is oblu»is — *D. ambtgua* Lindl* I r 13 | ub 7 rxel synon) - *D ochroteuca* Rchb. Plant cm if II. 0f* 290 - In Auttnar, lleheuae rt Germamae nmbro«i» inHibiria* in Persia?)*
- 7 D MEDM Rlh Caiakrt. boianlc. II 60 - Rchb Fl derm etcors 378 no 2575., Plant critic. II flg 281 — korh I r - Foil oblnngo-lanceolalii* «erraii« ftlabrl' eiliatit, inferionb in peiolum atlenualis, tuperiurib *haw* otaia r.r.«ilit». ralyei* laeisilU lanceolali» uninertn» aruds, marline prdunrulu raulrq »uperc g'«⁰-dolosopubeteentib.; corolla tobuloto-canpanulata, rtiu« glaodulo»o-pulir<renir, labio siperiArt oblnto emarffinato, lobolls acolls, lacniit Uirralih labii inferioris triangularlb. aeoilis, inlemie4la ovata obtota corolla mulio breviore ^ -" DiITert a «equeat« corollit Utionbut maJohbos, inlus in venire obtolete brunneoreticulalis el ad iotenionen tUmioain atrioque fascia laia f«*mi||inra pirns. — &4n4ermedta Pers Rnebirid II. 167 /> *ambiguo-tnim* Meyer, t'blor. Ilmnover

325. — *D. ambigua* Lindl. I. c. 13. ei p. (ezcl. icon.) — Crescit in Bavaria (Kusel et Nideralben) et in vallibus Jurae.
8. D. LUTEA Linn. Spec. pi. 867. — Rchb. Plant. critic. II. Bg. 280. — Lindl. I. c. 23. f. 1.24.25. (excl. var. *r*>) — Bull. Herb. t. 373. — Jcq. Hort. Vindobon. II. 47. 1.105. — Ker, Bot. RegisL U 251. — Koch I. c. 510. — Foil, oblongo-lanceolatis serratis glabris v. basi subciliatis, inferioribus in petiolum allenuatis, superioribus basi ovalis sessilibus; cunctis pedunculisque glabris; laciniis calycinis lanceolatis uninerviis acutis, margine glanduloso-pubescentibus; corolla tubulosa, extus glabra, labio superiore acute emarginato, lobis acutis, laciniis labii inferioris ovalis, lateralibus acutis, intermedia acutiuscula v. oblusa, corolla multo brevior. *J* — Caulis simplex teres v. levissime angulatus, pallide viridis glaberrimus v. pubescens. Folia radicalia spalhulata magis minusve dentata, ad venas subtus pubescentia, superiora ovalo-lanceolata. Racemus secundus densus multiflorus. Bracteae floribus inferioribus longiores. Corolla calyce triplo longior pallide lutea, versus apicem puberula, laciniis ovalis barbatis, suprema bifida. Antherae pilosiusculae. — *Digitalis lutea parva* Lob. Icon. t. 573. — Moris. Oxon. Hist. bot. stirp. I. 470. icct. 5. t. 8. — *Digitalis angustifolia lutea* Bauh. Pinx. 241 — Riv. Monop. irregul. 1.105. — *Digitalis parviflora* All. Herb. Pedem. I. 70.
- f. micrantha* Lindl. I. c. — Calycis laciniis corollae aequalibus. — *D. micrantha* Elm. Mon. 40. I. 2.
- y. fucata* Lindl. I. c. I. 95. — Hook. Bot. Magai. t. 9085. — Florib. majoribus fusco-purpureis; caule erectiore. — *Digitalis fucata* Ehrh. Beilr. VII. 151. — Pers. Enchirid. II. 102. — Crescit in Europa calidiore.
9. D. LACINIATA Lindl. Bot. Regist. t. 1201. — Boiss. Voyage bot. dans le midi de l'Espagne. 460. no. 1255. 11.120. — fo. fruticosis, basi nudis, parte superiore dense foliosis; Toll. glaberrimis nitidis coriaceis lanceolatis acutis profunde dentate patulo-subrecurvis; racemis unilateribus; bracteis lanceolatis pedicello longioribus; calycis laciniis lanceolatis acutis uninerviis; corollae glabrae margine ciliatae labio superiore integro obluso, interioribus trilobis, lobis lateralibus parvis oblongis acutis, intermedio multo longiori porrecto subacuminato; capsula longe acuminata. — Caules 3-4-pedales ei, infra lignosum nudi glaberrimi, vesligiis foliorum veterum obsiti. Ramuli dense foliosi. Folia sessilia secus ramorum angulos v. strias decurrentia, supra plicato-canalicellata, apice iolegerrima. Racemus saepe semipedalis. Pedicelli glaberrimi, eicet inferioribus calyce brevioribus. Corolla basi valde angustata, supra campanulata, verticaliter subdepressa, eius navescens, intus aarano-ferruginea, reticulata intensioribus perennis. Labium superius integrum obtusum brevissimum, labreflexum, inferius trilobum, lobis lateralibus oblongo-triangularibus acutiusculis, intermedio mollo longiori ovato, extremitate acutiuscula. Capsula glaberrima longe acuminata. Semina oblonga albida subincuneata, nuda leniter minutissime areolata. — Crescit in sylvaticis Hispaniarum australis (Sierra Bermeja, Sierra de Mijas).
10. D. FLVA Lindl. I. c. 15. | L. 0. - Rchb. Plant. critic. II. 6g. 2R7. - Fl. Germ. excurs. 370. no. 2577. — Foil, lanceolatis ciliatis; bracteis omnibus floribus duplo brevioribus; corolla pubescente reticulata, laciniis ovalis acutis, labio inferioribus barbato; staminibus tubo subaequalibus. 3-? — Herba tripetalis simplex glabra. Folia radicalia in petiolum attenuata, ad venas subtus pilosa, supra laevia bulla purpureo-tincta, caulina lanceolata recurva disjuncta, sursum angustiora. Racemus laxus multiflorus. Corolla folva ferruginea-reticulata, quasi inter *D. ambiguum* et *ferrugineam* intermedia, (infundibularia ventricosa. Antherae albae intus puberulae. — *hit/Halt's media flore luteo rubente* Park. Parad. MI fig. 5? — *D. obscura-ferruginea* Kocl. AcL Pelrop. II. »|? — Absque duobus *hybrida* inter *D. ochroleucum* et *IP. purpuream*, altamen etiam e semine educata e*i*. .. Crescit in dilione Bueckeburgensi.
11. D. FUSCISCKNS Woldn. et Kit. Plant. rar. Hungar. III. 3Q. } i. 274. - Rchb. Plant. critic. II. fig. 288., Fl. Germ. etrusc. 370. no. 2570. - Koeb, Syoop*. (1.

Germ (edit 1.) 510. — Foil oblongo-lanceolatis remote denticulatis glabris ciliatis, inferioribus in pediculis attenuatis, superioribus basi ovata amplexicaulis; lacini calycis oblongo-lanceolatis acutis, pedunculis caule superne lanalovillosis; corolla campanulata glanduloso-pubescente, labio superiore obtuso emarginato, lacini laterales lobum inferioris triangularibus, intermedia ovata breviter aruminata, lacinia corollae partem aequantem <? — Corolla ochracea, rete rubro-fusco exclusis transparentibus. — *D. ochroleuca* 0. *fuscescent* Lindl. 1 c 14. — *D. lanota*-(*laetigata*-)*ambigua* Mey Gblor. Hannover. 320. — (*Meyer* hanc plantam hybridam e *D. lanata* v. *D. laevigata*, quam postea nomen lamquam speciem ab illa non separat, et e *D. grandiflora* ortam esse, existimat — Crescit in montosis prope Tieme et in Hungaria.

12. *D. LAEVIGATA* Waldst et Kit. I. e. II. 171. t. 158. - Rchb. Pl. critic. II. fig. 885. - Fl. excurs. 378. ** 2578. - LUMII. I. e. JO. I. 10. — Koch I. c. - Full lanceolatis remote denticulatis integerrimis caule glabris; lacina calycis lanceolatis acuminatis, margine corollae glanduloso-pubescentibus, corolla breviter campanulata, pone labium inferius gibba, lacina intermedia lobum inferioris corollae fere aequante ovata acuminata. <£ — Tota glaberrima. Caulis ramosus bipedalis. Folia nilida, radicalia obovato-lanceolata obsolete densata, caulina linear-lanceolata recurva 5-nervi. Flores spatulatis. Bracteae inferiores (longiores. Pedunculi longitudinaliter calycis. Corolla ochracea, vix fuscis sinuata et reliculata, labio inferiore albo, vix aquose virescentibus notata. — Crescit in ropestribus calcareis Croatiae et prope Flume.
13. *D. SIBIRICA* Mill. Diction, no. P. — Lindl. I. c. 16. f. I. 11. — Villosa ramosa foia, ovatis densatis densatis; floribus spatulatis pilosis. Q — Caulis ramosus, superne villosus. Folia sessilibus ovato-lanceolata serrata, plana pilosa superioribus integerrima villosa. Flores sparsi ferrugineo-rufo-fulvi. Pedunculi villosi calycibus breviores, lacinae calycis sabulosae tillotae. Corolla ventricosa birsuta, lacini oppositis transversis leviter, labio porrecto. Stylus basin versus pilosus. — Crescit in Sibiria et in TaUrla.
14. *D. FERRUGINEA* Linn. Spec. plant 807. — Lob. Icon L573. — Sims, Bot. Mag. t. 1838. - Rchb. Plant critic. II. fig. 880. - Fl. Germ excurs 378 no 2571. — Lindl. I. c. 17. t. I. 12. — Koch I. c. — Foil, lanceolatis remote denticulatis biciliatis; calycis lacini oblongo-ovalis rotundato-obtusis margine lato membranaceo cinctis, corolla breviter campanulata, prope labium inferius gibba, lacina media lobum inferioris corollae subaequante ovata rotundato-obtusata J — Caulis erectus parum ramosus dense foliosus glaber Folia glabra v. ciliata, radicalia elongata subulata, caulina sursum breviora. Racemus longissimus densissimus ramulosis. Bracteae inferiores flore longiores, superiores breviores. Corolla ochracea, inclusis ferrugineo-, in labio inferiore fusco-purpureo-maculata. — *thymus fion ferrugineo* Rivio. Monop. irregul. t. 105. - *I. pambur** Liodl I c — Floribus duplo minoribus. — Crescit in Pedemontio, Hungaria, Hispania, Iberia et fl) in Persia.
15. *D. AIRET* Lindl. I. c. f. I. 13 - Racemo multioro, lacinia lacini marginali; lobis inferioribus ovatis inferioribus denatis — Caulis simpliciter bipedalis pubescens, remote foliosus Folia radicalia oblongo-linearolata remote densata glabra superiora linear-lanceolata Rarum quam praecedenti leniuor, floribus paucioribus magisque distantibus (altris laciniaculis acule, lobis subaequalibus (corollae fuscis arruata inQata, et fusco-purpurea, inclusis aureo-reticulata, labio asperente ovato tridentato, lobis longitudinaliter *Ihyiluis* ***
*** — *ferruginea* Park Thesaur. I. 91 fig 0. - *fitigolts Intifob**, *fiort strugr****
Mans. O*o*. Ulor |. m. ^cl 5. lab M. - *O. ferruginea** Kibibrp el bm. Flor-Graec t 4tt. - Crescit in moobu* Pamasso el Ol)opo
10. *D. IFFI* fopimka gac Prodr Oor. Graec. I. 431 - Liodl I c |rt | I. 14. - Bjcemo dento cylindrico multifloro, lacini calycis lobis ciliatis, corollae labio superiore biciliato, lobis medio maximo uaguculato lunato (dilatato

- spaihulalo); bracteis linearibus. flore longioribus. % — Folia radicalia elongata lanceolata glabra, ciliata, subquadrangula integerrima. Folia caulina bracteis, con form la recurva sessilibus hinc acuta, fere bipollicana, ciliata, supra glabra (infra foris pilosa) Flores sessiles dense spicato-racemose speciosissimae. Corolla basi sulphurea, paulo supra basin curvata, iubo tunc ampliato venuloso, aurantiaco-lutescente, sanguineo-striata — Lacinae labii superioris brevissimae ovato-inangulares, basi angustatae (subrhombicae) angustatae, uli lacinae laterales, quae sunt us similes, at paulo latiores Lacina inferioris protracta maxima, unguis ex aurantiaco obscure purpureo, lamina bembilari nuda Stamina subaequalia, filamentis supra basin flexis, cunabulis glandulosis \nihilum didymum glabrae sulphureae Ovarium pilosum — Crescit in Graciac monte Alho
- 17 D. LANATA Khrh. BeitrJge VII. 153 - Waldst et Kit. Plant rar Ilungir I 70 ft 74. — Curtis, Bot Magaz. t 1130. — Lindl. I. c 19. f t 15. — Rchb Fl Germ excurs 378 no. 2570. — Folia, oblonga, raris lacina; calycis lacinae acutis lacinae; corollae labio inferiore producto piano glabro oblongo-ovato imberbi, lacinae laterales acutae; bracteis lanceolatis calycem excedentibus % — Sesquipedalis simplex simplicis. Folia atro-viridia ciliata-lanata, radicalia oblonga raris basi attenuata, caulina oblongo-lanceolata. Bracteis longissimas densissimas multifloras. Bracteis articulis lanatis. Calycis lacinae ovatae acutae villosae. Corolla pubescens cinerea reticulata, labio inferiore ovalo nodo albo, quandoque purpureo. — D. nova Wloderl. mss. — D. Wifuerli Rth Catalect. bot I 71. — D. feminea f Lam. Encycl. méth. II. 800. — D. orientalis Elm Mon 45 t. 1. — Crescit in fruticetis et ad vineas Hungariae
18. D ORIENTALIS Lam. Encycl. méth. II. 280 - (Willd Spec plant. VII 286') — Lindl I r V) f i 10 — Caule superne ramoso pubescente, in fern c foliis hinc interpernis nosis lacinis, floribus dispersis subsessilibus; lacinae ciliatae oblonga, lobum corollae arcuata, corollae labio inferiore producto oblongo inlegemmo ^ — Herba 2-3-pedalis. Caulis gracilis lacte viscidus. — Folia lineari-lanceolata recta acuta glaberrima trinervia, radicalia Tersos basin attenuata. Flores ditantibus in raris nodis flexuosa Bracteis inferiores recurvae, floribus longiores, superioribus versis basin ciliatae. Calycis lacinae obtusae rillatae, inferioribus dimidiis tibi longitudine. Corolla campanulata cinerea, etiam pallidior, intus interius purpureo-reticulata pilosa, lacinae superioribus lateralibusque minutis, intermedia trifida oblonga plana obtusa alba. — *Digitalis orientalis* Hb. K. *Tragopogon folio, fort albido* TOUQB. Cor 0 — Crescit la Asit minore.
10. D PARIFIORA Jcq Hort Vindobon. V. f t 17. — Bot Begisl. I 457. — Lindl I c 20 f t 17 — Caule simplici striato ramoso; folia, radicalibus oblongis triangularibus lanceolatis deflexis, omnibus nervosis tenacibus, integerrimis undulatis laevibus, praesertim margine serratis; racemo dense spicato longato, bracteis inferioribus. flores excedentibus; floribus horizontalibus parvis; calycis lacinae suborbiculatis pilosis obtusis; corollae lacinae abbreviatae oblongae tubaequalibus 2]. — Corolla fusco-purpurea. — Crescit . . . *
90. D. MICRAISTHA Rib. Caul. bot II. W(T) - Rchb. Plant, erlic. II fig 2rti. au. — Flor. Germ. excurs. 378. no. 1373. — Glabra atricia* folia, lanceolatis remote serratis; racemo dense aparao(t); corollae lobis obtuse quinquefidis, labio inferiori rotundato prorecto. d" ^ — Folia nitida glabra, superiora inlegemmo Flores nutantet — Crescit in Helvetia alpina.
21. D. VIRIDIFLORA Lindl I. c. SI. t L 18. - (Spr. Syst. veget IL 740 no W Glanduloso-pilosa Folia oblonga denudata; bracteis flore longioribus, lacinae calycis subulalis, corollae viridis lacinae subaequalibus ovatis. ^ — Herba tula pilulosa glandulosa, verohimiliter hinc nuda (aulis angustata Folia oblonga dentata plana Racemus elongatus «parsiflorus» quatuordecim inferioribus, ovae superiores lineari-lanceolatae \ lincart», fere omnem nonnihil lunmorri Corolla magnitudine /> parrotorae nudi», lacinae olati» \eno>i» Anihirac \m maculae Capsula glandulosa-pilosa»a (n*cia in draciac mouie Atho

22. *D. RIGIDA* Lindl. I. c. 21. f I- W. — (Spr. I. c) — Glanduloso-pilosa: Toll, oblongo-lanceolalis ragosis undulalis denlalis; racemo secundo nullifloro; corolla pubescens, lacinnis ovatis glandulosis. 2l. — Antherae tindescens sanguineo-maculatae. — Crescit . . . ?
23. *D. LUTESCENS* Lmdl. 1. c. 22. f t. 21. — Foil, cordato-oblongis plants crenatis impubibus; racemo secundo; corollae glabrae lacinnis obtusissimis; bracteis omnibus. quam Oores brevioribus. 2l. — Caulis simplex gracilis nudiusculus. Dracae, calycis lacinae et ovana parce villosa Corolla longa tubulosa glabra, lacinnis ciliatis, supenore bifida. Antherae flavae sanguineo-maculatae — Crescit. . . . * — (Secundum *F. W. Meyer* ID Cblori Hannoveranae haec est eadem ac *D. fucala* Ebrb.)
84. *D. OBSCURA* Linn. Spec, plantar. 807. — Jeq. Hort. Yiodobon. I. 40 l. 01. - Sims, Bol. Magai. t. 9157. — Lindl. I. c 94. t t. 90. — Gaule suffruticoso; foil, linear!-lanceolatis, integerrimis, basi adnatis; racemo paucifloro secundo; laciniis calycis ovatis; corollae reliculatae lobis obtusis 6 — Suffruticula caule simplicissimo glabra. Folia linear-lanceolata alrovindia nilida rigida inlegerima refracta. Racemas laxis pauciflorus. Flores alro - ferruginei subul et ad latera pallidiores. Calycis lacinae subaequilongae ovatae aculae, obscure umncaae pubescens, laterales inlenorei supenore minores. Corolla arcuata pubescens parum ventricosa, inlus aurea, lineis atro-fulvis notata, lacinia supenore emarginata, labio iofenore ovalo porrecto inlegrum, ad basin intus villosum Antherae ciliato-glandulosae. Discus iocoospicuus marginatus. — *D. angustifolia* *Bupamca* Bocc Mas. 130. i. 06. — *Digitalis Utsparica angustifolia*, *lore mgn-canle* Tournef. Inslu 101. — Crescit in rupesibus Hispaniae australis.

ttajlt D. ISOPUSfl Umdl. L e. 80.

Corolla eaupaaolaia, laelmia Inlrsiiodia labil idferioris labio aopriori aequali el In eo per aestivaUonem Incumbeole. Caulis fruticosus. Racemi pedunculati.

25. *D. (ISOPLEXIS G. Don, General sjsl. of gird, and boL IV. 500) CANARIENSIS* Linn. Spec, plantar. 808. — Mill. Icon. I. L 190 — BoU RegisL t 48 — R. Br. ID AiL Hort. Keir. (edit. 2.) IV. 30. - Lindl. I. c. 89. f t 27 — Frutscens glabra. foil, lanceolalis mucronato-serralis reticulato-venosis, racemo terminali, laciniis calycis lanceolate elongatis; labio corollae superior! longior hilobus, lacinnis reliquis acutis aequalibus. § — Caulis simplex pubescens. Folia perennantia lanceolata venosa serrata, subtus et ad venas pilosa. Racemus pedunculatus Mores densi aurei. Calycis lacinae subulatae, duae inferores majores. Corolla campanulata conacea bilabiata glanduloso-pilosa, lacinnis subaequilongis tubo aequalibus, supenore plana maxima obovala emarginata, lateralibus subulatis canaliculatis, labio iofenore ovalo porrecto ooo incumbeote (in aestivatione Stamina glabra colorata, tubo multo longiora. Ovarium glabrum penitus biloculare. Stylus filiformis glaber coloratus, apice incurvus. — *ihgtlalu acanthuses canariensis fruletcens (lore aureo* Comm. Hort. II. 105. t 53. — Pluken. Almag 400., Pb)ioigr* u 3Sft. 6g. 2. Crescit In Insulis Canariis.
90. *D. (ISOPLEXIS G. Don I. c. 507.) SCEPTRUM* Linn. Supprim. 2U. - L'Hent Sen Anglie 21. I 24. — Smith, Exotic bot. II. 27. t. 7a - Lmdl. I. c. 20 f t * — Fruticosa* ramis foliis oblongis acuminatis serratis, »ubtus hiriuiio, spic* comosa, lacinnis calycis linearibus, corollae obtusae labio supenore bifido, inferioria lobo medio subulando, lateralibus oralis duplo hion > Frutex tripedalif *t ultra: tronco 2-3-cbotomo ramoso, «ursum foliorum drlap«orum cicatricibus nouto, ramis Junioribus pilosis. Folia ad ramorum apicem aggregata sessilia ob* ovato-lanceolata coriacea tenosa denticulata, subtus *pilot* § Racemut pedunculatus thrsioideos comosos. Floret denti pendoli n aurco fuhi Bractea« linear** pilosae Calycto lacinae lineares apatulat pilosae, 3 »uprior«t brvior« Mrolla rampaulata pilosa, basin versus subtus utnque foteata reliculata, U* rinns oblongis rotundatis, tubo duplo brevioribus subaequilongis, supenore *Pi^{NA}* bipartita lateralibus patentibus. paullo minoribus. Inferior* conca *delosa*.

aeslivatione superior! adpressa nee Ineambeote. Stamina colorata lubo loogiora
Ovanum semibiloculare — Crescit in sylvis ambrosia insulae Bfadeirae.

f *Species non satis notae vel dubiae.*

27. D. LIBERTIANA Dumort Floral. Belgic. prodr. 36. — Foil, petiolatis ovalo-oblongis rugosis undulatis crenatis; calycia lacinus ovalis; corollae lobis obtusis, palato glabro immaculato 2|. — *D. purpurascens* Lej. (excl. syn.) — In Belgio.
- 88 D LIUSDLEYAISA Tausch, Flora (B Z) XIX. 380. - Foil, lanceolatis aerrulatis ciliatis, racemo secundo sriclo. corollis lubulosis subventricosis quadrifidis, lobis oblusissimis subaequilongis palulis, infenore latissimo; calycib. acuminatis,!)
OI — Corolla dilute purpurca, fundo faucis aureo tenuissime punctato. — *D purpurascens* Lindl Monogr. Digit I SO. (nee Rh •) — Crescit. . . . ?
9. D FISCO-PUNCTATA Tausch I. c. — Foil, oblongo-lanceolatis confertim denticulatis, basi ciliatis; racemo secundo subootante; corollis tobaloso-ventricosis (fundo punctatis), lobo superiore emarginato, inferiore porrecto rotundato; pedicellis calyce duplo brevioribus. 2|. — Caalis altior quam in *D lutea*, racemu* laxior subnutans, corolla ochroleuca, in fundo puoculis erebrioribus fulvis picia, duplo major ac in *D. lutea* et ei toto magis ad *D. purpurascens* Um quam ad *D luteam* accediL — Crescit. . . . ?
30. D. TUBULOSA Tausch I. c. 300. — Foil, oblongo-lanceolatis serrulatis glabris, racemo secundo flexuoso braoteis calyce obtusosculo brevioribus; corollis anguste tubulosis, fauce vix ventricosis quadrifidis, lobis subaequalibus obtusissimis, inferiore paulo longiore. 2|. — Toto habitu proximo accedere videtur ad *D. lutescentem* Lindl. — Crescit. . . . ?
- 31 D DENTICULATA Tausch I. c. — Foil, lanceolatis remote denticulatis, basi ciliatis, racemo spicalo, corollae tcntricosae lacinis denticulatis, tubus superioribus aequilongis, in fenore elongata porrecta oblonga; calycibus oblongis breviter acutatis bracteis adaequantibus. 2|. — Proxima est toto habitu *D. laetgaiae* W. K. ad quam tero se habet magnitudine corollae uli *D. litta* Jcq ad *D ockro-Ucam* Jcq Racemus basi compositus undique imbricatus. Floras brevissime pedicellari. Calycis lacinae oblongae brevissime acutatae virides non scanokae Corolla e flato in fuscum sordescens reticulata ?entricosa, tubo batuari aldo angustato — Crescit. . . . T
32. D ? COCHINCHINENSIS Lour. Flor. Cochinch. 378. - Spr. 8sysL vtftL II. 187. no 0. - Foil, oppositis lanceolatis inferrimis asptvtos Oorib. aillaribus aolurim sessilibus, lacinus calycis acutis, corollae lobis obtusis. % — Corolla pallida YIO-lacea campanulata, basi ventricosa, segmenta obtusa, superiori emarginata Capsula ovata acuta bilocularis. — Cerle *IhgittUu* non est. — la Cochinchina
33. D * SIK>SIS Lour I c - Spr I c no 8 — Foil, ovatis acutis serratis pilosis peliolatis, flonibus aillaribus solitaribus, laciniis calycis subulatis; corollae lobis obtusis ^ — Folia opposita nerrata. Calycis segmentum superius majus, interdum bifidum Corolla obscure purpurea campanulata quadnloba, segmento *u-penon maximo Capsula ovato-conica bisolca bilocularis. — Certè ad *Ihg|la-Um* non pertinet — Crescit In China.
34. D WLLERI G Don, General syst or gard. and hot IV. 800. no. 25. — Foil ovato-lanceolatis nervosis; caulis acaulis. % — Folia glabra, caulibus semimplexicaulis. Corolla lutea magnitudinis illius *D. wMgae*. — *D. onenalu* Mill Diet no 7 (nee Linn) — Crescit in Tataria.

*) I) *PtHI>IMSft)S Hth* cf supra p 256 no *) - Tausch I e W - hoU lanceolate drnhculalt nluitu tarrmo trundo flruoto foxo, corolla tubuloso-tenincont (juadn/ldti, tartntis nbtusissimis, infenore longiore porrecto oblongo pedicellari eulyeem a cut urn subaequanhb corolla ditule purpurta, fundo faans aibido, pvnehs crebnonbus uli tn 1) purpurea piclo

tt *Species indscriptae 0 genere expellendae.*

D DRACOCEPHALOIDES Arrabida, Flor. Fluminens VI t 101

D PILOSA Arrabida I. c. t 101

D. DASYANTHA Pall. — PENTSTEMON FRUTESCENS.

D GLUTINOSA Grtnr. » REHMANNIA CHINENSIS.

ttt *Species nomine tantummodo cogntta.*

D ERIOSTACHYS HorU Neapolit

Digitalem hybridam *purpureo-luteam*, e *D. lutea* L. et *D. purpurea* ortam fuse descripsit J. 9. H m l f t w in Transactions of the Cambridge philosophical Society IT. 257—278. tab. 15. ifl. 17. 18.

3916. PAULQWNI *Siebold et Zuccar.*

(Siebold et Zuccar. Flora Japonic. I. 35. t10. — Meisn Gener plaular. vascular I. 300. II 218)

1. P IMPERIALIS Siebold et Zoccar. I. c. 27 f I. 10. — Arborea foil simplicib cordaiis acutis quinqueoerviis integerrimis tomenlosis; pamcuhs axillanhus fl — *Btgnoma {InearviUea* Spr. SysL vegeUb. II. 836.) *tometUosa* Tbnbrg. Flor Japon 252. — Grescit in Japonia.

3917. ANAOTkUBE *E. Meyer.*

(E. Meyer mss et Bth. in Hook. Compan. botanic Magai. II. 54 — Meisn Genci plantar, vascular. I. JOS II. 210)

1. A. INTBGERBIMA E.Meyer DIM. ei Bth. I. c — Foil, integerrimis; eapsulit calyce dnplo longiortiMu. & — In PreaiMiUrle bonae ape (Amaponda).
2. A. SERBULATA E. Mejer nus. ei Blaü I. o. — Foil, argale serrulatis, capsulis calyce vn longioribna. 6 — In Pivmonlorio bonae spel (Amaponda).

Tribus VI. *GRATIOLEAE* Bth. Scrophular. Indie, p. 20. — Endlich. Gener. plant, p. G78.

Corollae limbo bilabiato TCI subaeqaali, laclniis sabplanis. Stamina fertilia gemma vel quaterna ascendentia, antherae biloculares muticac. Capsula bilocularis- locniclde vel septicide aut septifrage dehisrens bivalvis, Yah is iotegns >el bilidis, dissepimento placentifero demum libero, rarfus baccata. Seroina aptera.

3018. HALLEBIA Linn.

(Linn. Gener. plant HI. — Meisn. Gener. plantar, vascular. I 310. II 221 — Bib In Hook. Conipan. hot Magai. II. 54.)

1. D. LAUDA Linn Spec, plant 872. — Sins, Bot Magai t 1744 - Lam Illusir gen. pi. i. 540 — Bib. I. c - (G. Don, General syst or gard and bui IV 617) — Foil peliolalis ovalis acuminalis serrato-crenalis, basi cuneatin, calycib irllobis, corollae incurvae limbo valde obliquo 5 — Rami el folia tircsrentia, flom magm nolantes rubenles, baccae rolundalae — Bunn Afnc 214 I 80 flg 2. — Dubam Arb. (ed nov) fascic XX p 230. I. 00 — In Proraonlono bonae spei>
2. H. OVATA Bib. I. c — Foil, peliolalis ovalu crrnalu, basi roiundjillii Irunca-tisve; calycib qolnqoelobis, corollae rretlutculae limbo vn obliquo ^ — Crescit In Promonlorio bonae spei (Clanvilliam).
3. B ELLIPTICA Linn. I. c - Thnbrg. Nov act Uptal 4 30 - Biñ I c - Foil bretittlme pettotetls ovalo-ellipticis argulr serralM, ba^i cuneaiit, calycib quadrilobis, corotlae reetlnsculae limbo sobaequali 0 - Corolla rubra nuuns Fractus elliptiel. - *B. kutda ft* Linn I c - Burm Afric. 43. t 80. Sg I. - In Promonlorio bonae spel crescil

3919. *TEEDIA Mudolphi.*

(Rudolphi in Schrad. Journ. fur Bot II. 289. -» Meisn. Gener. plantar. Taiealar. I. 310. II. 221. - Bib. in Hook. Compan. bot Magaz. II. 54.)

1. T. (CAPRABIA Ail. Hort. Kewens. [ed. LJ II. 3W. - Willd. Spec. plant. HI. 324. — BORKHAUSENIA Rth. Cataleet botanic. II. 90.) LUGIOA Rodolphi I. c. - Ker, BoL Regist. t. 209. — Rccb. loon, plant coll. el colend.1. t Id. — G. Don, General syst or gard. and bot. IV. 616. — Bib. 1. c. — Foil. ovato-ellipiola, basi angusiatlt caulcm dilattto-ampectaniib.; oaale ealyeibq. glaberrimit. <f — Braeteeae subulatae pedunculorum longitudine. — *fi. parvifolia*: Foliis mi no ri bus. - Crescit in Promonlorio bonae spei.
2. T. PLBESCEN6 Burchell mss. in Bol. Regist t. 214. — Bib. I. c. — Foil, orato-ellipticis, basi angustatis et caulem dilalato-ampectanlib.; caule caljcibq. villosis. <? — Crescit in Pro m on tori o bonae spei.

3920. *FBEYL1NIA Bth.*

(Bib. in Hook. Com p. bot. Magaz. U. 35. — Meisn. Gener. plant ?ascul. 1.310. II. 221.)

1. FR. CESTROIDES Colla mis. ex BUL I. c - Foil, oppoiitit laoceolâiis planis, utrinq. longe angoslatis; florib. paacalalo-raeemoff. 6 — Folia St-3-pollicaria acnta striaia rigfda; corollae cupreae. — *Capraria knwolata* Una. Suppl. plant 278. — *Capraria talidfolia* Lnk. ei Otto, Icon, select plant, rar. hort Berlin. 11. 1.4. - *Freylinia oppoiitifolia* Spin. 8eb. not 13. — *BuddUa fto*#rr*##* Caul, hort. Taurin. 13. — Crescit in Proanonlorio bonae spei.
2. FR. DENSIFLORA Blh. I. c — Foil, inftrlorib. verlicillalis, snperlorib. sparsis oblongo-ellipticis subplanis glabris; raceno denso subpaniclato; corollis calyce 3-4-plo longioribus. § — Crescit in Promoolorio bonae spei (Swellendam, Scorge, Uitenhage).
3. FR. LONGIFLORA Blh. I. c. — Foil, opposllis sparsisve oblongo-ellipticis vii nndulalis glabris; racemo elongalo simplici; corollis calyce gainluplo longioribus. 6 — Crescit in Promoolorio bonae spei (Zwarteberg).
4. FR. (CAPRARIA Linn. Suppl. pi. 294. — Lam. Illustr. gen. t 534. Bg. 1. - Sims, Bot Magaz. t 1556.) UNDULATA Bth. I. C - Foil, ovalis; raeemis broib. sub-simplieib.; eorollis pnrpureia ealyce subtriplo longioribus. 5 — *a.carin*la*: Foil, •ubplanis glabris earinalU. - *fi.* Foil. gÜbrlt nodoMf. — *y. pubescent*: Foil, pubescentib. saepeq. undulaUa. — Crettl la Promonlorio bonao tpei (Langekloof, Zwartebergen el Swellendam).
5. FR ? (CAPRARIA Tbnbrg. Prodr. flor. Capent. 108.) RIGIDA G. Don, General ijst of gard. and bot IV. 617. — Foil, ovalis integrit glabris; florib. paaleilaUs. 5 — Crescit in Promonlorio bonae spei.

3921. *CAPBABIA Linn.*

(Linn. Gener. plant, no. 108. — Meisn. Gener. plant tascul. I. 310 II. 221. — Spr. Syst veget II. 813. ei parte. — G. Don, General syst. of gard. and bol. IV. 042.)

1. C. HIRSLTA II. B. Klh. Not. gen. el spec plant II. 355 - G. Don I. c. no. |. - Ramis hir»uiis; foil, oblongis serralis, basi euneatis integerrimisq. plloso-tiriis; pedunculis gomims abbrevialis hirtis. % — Corolla alba, aegmeolo inferi macula rubra pilosa noialo. Valde afflois *C. biflorae*, fed dirersa: caule birsaio, foliis mlnorlbui latioribus birsutis, peduncnlis mullo brevioribus hirtis, Ooribus minoribui, lacinlls calycins laUoribus. — Crescit In MezJco inter La Venle del Ezldo el portum Acapulcl.
2. C. BIFLORA Linn. Spec. plant 875. — Jcq. Plant Americ. 182. t 150. (edit, plct 70. I. 174) — Lam. Illustr. gener. t 534 Bg. 2. — H. B. Kth. I. c. 354. — Raima pilots; foil, oblongs berratis, basi angifelali* ei integerrimis ciliatis glabnuscullis; pedunculi!. gemims elongalis capillacoï* pilous. 2(. — Corolla alba. Pedicelli solliaru vel frequentiu* geminali, rarms Iprni. — *C. Curatsaonica* llerm. Paradia. t. 110. - Comm. Hort I. 70. t 40. - Pluken. Altnag. 237. t 08. fig. 4. - Crescil per lolam American) calidiorem.

3. C. SEMISERRATA Vahl, *Ecl. II.* 47. - Willd. *Spec. plant.* 111.324. f - G. Don 1. c. no. 3. — Gaule erecto herbaceo, Internis parce piloso; foliis, allernis lanceolatis, basi in petiolum attenuatis, utriusque glabris (ope lentis marginis ciliatis), apice medium versus serratis; pedunculis axillaribus terminalibusque 1-4-Doris, pedicellis allernis brevissimis; bracteis linearilanceolatis ad basin pedicellorum; calycis laciniis subulatis; corollas calyce longioris fundo villosa, laciniis 5 linearilongis; capsula oblonga calyce parum longiore. 0T — Folia bi- v. Iripollicaria, pedunculi ramulorum vix unguiculares. — Crescit in insula Slat. Marlbae.

t *Species vix nota.*

4. C. HUMILIS Ait. *Hort. Kewens.* (1. ed.) II. 3M. - Willd. I. c. 325. - Pubescens: foliis oppositis ternisve ovalis serratis petiolatis; pedunculis axillaribus petiolo brevioribus. Q — Crescit in India orientali

ft *Specie* e genere expectandae.*

- C. ARABICA Steud, et Hochst - ANTICARIS ARABICA.
 C. CRUSTACEA Linn. - VANDELLIA CRUSTACEA.
 C. DURANTIFOLIA Linn. - STEMODIA DURANTIFOLIA.
 C. GRATIOLOIDES Linn. - LINDERNIA PYXIDARIA.
 C. HUMIFUSA Hamilt. - CENTRANTHRA HUMIFUSA.
 C. LUCIDA Ait - TEEDIA LUCIDA.
 C. MONMERIA Rib. - HERPESTES MONNIERIA.
 C. MULTIFIDA Michx. - STEMODIA MULTIFIDA.
 C. MULTIFLORA Strud. - STEMODIA MULTIFIDA.
 C. PERUVIANA Feuill. — XUAHESIA BIFLORA.
 C. RIGIDA Tuckerm. - FREYLINIA RIGIDA.
 C. RIGIDA Hamilt. — GBENTHRA HUMIFUSA.
 C. SALICIFOLIA Lnk. «i Olio. - FREYLINIA CESTROIDES.
 C. SAXIFRAGAEFOLIA Cham. - POGOSTOMA SAXIFRAGAEFOLIUM.
 C. UNDULATA Linn. - FREYLINIA UNDULATA.

3tt21/, tiOMPIOSTIUMA Turcxan.

(Torcian. *Flora [B. Z.]* 1844. p. 190. — Endl. *Gener. plant. Suppl. inedit.*)

1. #G. SCOPARIOIDES Turcxan. mss. in Drège, *Coll. pi. Capens.* no. 8354. et *Flora [B. Z.]* I. c. — 2|. ? — In Promontorio bonae spei.

:U>22. XI'IBEMI.% *Rz. et Paw*

- .Ri. et Pav. *Flor. Peruvian.* II. 13. I. lil flg. a. - Meisn. *Gener. plantar. vascular.* I. 311. II. 222.;

- I. X. BIFLORA Rt. et PIT. I. c. - *Pert. Enchirid.* I. 170. — Frutex ramosislimn* KI a her. Folia lanreolaia remote serrata, in petiolum attenuata, basi intrgeriaia* Corolla parva albido-lalotcent campanilalo-roUU. 5 — *Capraria Per***** Feuill. *Peruv.* II. 714. i. 48. — *Creacit In Pemptia H in regno Noto-(iranaieo)^*

.IU23. PO«O»TO9i.% *Schrad.*

- ;Schradr. *Indx. nemin. hort. Goetling.* 1811. - Meisn. *Gener. plantar. vascular.* I. JIO. II. 2Jl>

- I. P. SAXIFRAGAEFOLH'M Srbrad. I. c. ex Schlfhtd. *Linnara VIII. Lilruralubl.* *> — Ramis birsutis; foliis, spathulalo-obovalis runealis, duplirato-iori»o-serratia pilosiusculis; pedunculis subsolariis abrruatit hir^ud*. ;* ? *Capraria ****~fttfoli** Srnlchld. et Chan. *Linnaea V.* 10V - G Don, *Grneral tv>]. of f »rd** and hot IV. 642. no. 4. - *Creteil in Mexico ad Vera Crut.*

3924. *WTEMMWtlumJk Blh.*

- (Bih. *Scropbol. ladle. 9D.* - Melts). *Gener. plant. vateol.* I. 310. II. «». - G. *Don.* *General »T>U of gard. and bot.* IV. 53H)

- I. PT. RI'BiGIJOSI'M Wlprt. In *Mov. act. arad. Caet. Leopold. CUrol. oal furios.* XIX. *Soppl.* I. 30. - *Paberoluai: eanle »inpliciatculo srielo; foliis opposite*

- petiolaiis ovatis acuminatis oblongis creato-dentatis, supra glabris, subtus ferrugineis, secus nervos puberulis punctatis; floribus axillaribus solitatis pedunculatis; pedunculis calyce duplo longioribus. 0 — Differ! a specie sequente foliis cum petiolo tripollicaribus, pollicem latis (nec sesquipollicaribus), infra ferruginei*, pedunculis 8 lineas longis, laciniis calycinis linearibus oblongis (nec ovalis acuminatis), bracteis linearibus (nec filiformibus) puberulis (nec villosis) orbibusque muho majonibus. — Caeterum illi simillimum forteque mera ejus variolas. — In regno Chinensi ad urbem Macao credit.
2. IT. GIUNDFLORLM Dili. I. c 21. - Hook, et Arn. Bot. Beech, voy. 204. L 45. — Fol. ovatis; corollis ample lobatis calyce plus duplo longioribus pollicaribus; floribus racemose. 0? 2? — Herba perennis erecta parca ramosa. Caulis ramisque obtusiuscule quadrangulares vitide pubescentes v. villosi. Folia opposita petiolo ovalia acuminata obtuse serrata, supra pubescentia viridia, subtus magis pubescentia viscida pallide glandulosa-punctata. Pedunculi in fenestris axillaribus superiores in racemum terminalem folia floralibus eantheris paulo majonibus multum dispositi, petiolo duplo longiore. — *Spathstigma glutinosum* Hook et Arn. mas. — *Gerardia glutinosa* Linn. Spec plantar. 841. — *MHgilaht CMnenns* Lour. Flor. Cochinch. (ad Willd.) II. 450? — In China (Macao) «4 In Cochinchina.
3. PT. (ADENOSMA Bib. In Wall. Catol. 38M.) WLOSUM Bin. garophular. Indie. 21. — Fol. ovatis aenanthialia v. ovalo-lanceolata crenatis nervis villosis; corolla calyce dimidio longioribus; floribus racemosis. 0 - Corolla 3-4 lin. longa. — Crescit in India orientali numquam in Sikkim at ad Tavoy.
4. PT. (ADENOSMA Bth. in Wall. Catol. 3B93.) MACROPHYLLUM Bth. Scrophul. indic. 21. — Fol. ovatis acuminate serrato-crenatis, basi angustatis flaccidis glabrusculis; corollis calyce dimidio longioribus; floribus racemosis. Q — Crescit in regno Birmanico ad ripas fluminis Irawaddi.
5. PT. SPICATUM Bib. I. c — Fol. subsessilib. oblongis obtuse serratis; floribus dense oblongo-spicalibus subcapitatis; racemibus distincte quinquepartitis; capsulis rostratis. Q? — *Stemodia capitata* Bin. in Wall. Calal. 3fc — el Bol. Regisl. adnot ad t. 1470. ex p.) — Crescit in Peninsula India orientali et in Zeylana.
6. PT. CAPITATUM Bib. Scrophul. Indie SI. - Fol. ovalis oblongis. flonibus globosis v. oblongo-capitatis; calycibus hispidis subsquinquepartitis; capsulis oblongis. 0? — Praecedenti simile, sed epantha et calyce laterali *Pierostigma ti Undenbregii* intermedium. - *Stemodia cymosa* Bth. In Wall. Catol. 300. - In India fere India, praetertim in Nepalia, Eanthon, Panlana, Bindotanla, Silbel etc.) crescit.

3025. LIADKXBEBtila Lnk. et Otto.

(Lnk et Olio, Iron. srlecL pi. rar. hort. Berolin. W. t. 4ft. — Melsn. Ciener. plant. vascul. I 310. II. 221. — Bth. Scrophul. Indie. 21 - G. Don. General *si. or gtrd. aud bot. IV. 530.)

1. L. (BO\KA Dene. Nou. \nn. sc. natur. II. 2S3.) 8INM(\ 1Mb. I. c. 22. - Dura divaricato-ramosa villosa: foliis parvis eubrotundo-ovatis grosse dentatis, floribus calyce brevioribus; racemis elongatis axillaribus terminalibus; floribus oppositis secundis. corollis calyce duplo longioribus. 2^ — Cretell in deserto Sinairo.
2. L. (STEMODIA Hamilt. in D. Don, Prodr. flor. Nepalans. 80. - Wall. Catol. SOM.) GRANDIFLOBA Bib. I. e. — Beandana villosa-pubescentis: foliis amplius inaequaliter ovalis acuminatis dentatis, floralibus corolla brevioribus; racemis axillaribus laxis; floribus oppositis secundis; corollis calyce quadruple longioribus. ^^ — faule plurippitaks. Folia 3-4-pollicana Corollae ultra pollicem longae. — In Nepalia.
3. L. (STEMODIA Bib. in Wall. Calal. JQt.) MACROSTACIYA Blh. Scrophul. Ind. c' 22 — Miliscandrus dura glabruscula: foliis oblongis acutissime serratis, floralibus ovalibus-lanceolatis nervis villosis, racemis elongatis multinerviis antheris terminalibus, flonibus tubulosis. corollis calyce duplo longioribus. ^^ - Folia 3-4-pollicana, quipollicarta, siccaia «compr nigr» raria. — *Adenotma rusptalum* Blh. in Wall. Calal. \W. — In India orientali (in Marlabanta, Oude, ad portum Kheer etc. .

4. L. URTICAEFOLIA Lnk. el Otló I. c. t 48. - Bib. I. e. — Erecia v. asceodeos annua villosa: foil, ovatis, floralib. coo form ib.; florib. solitariis axillarib.; corollis calyce vix triplo longioribus. 0 — Herba semipedalis v. vix pedalis valde ramosa saepeque purpurascens. — *Stemodia ruderalis* Vahl, Symbol. II. 60. — Bib. in Wall. Calal. 3023. — *Brachycorit parviflora* Schrad. Indx. semin. hort Goeling. 1830. ex Guillem. Archives de bol. I. 4M.
 ?. *major* Bib. I. c. — Gaulib. elongatis ramosioribus. — Crescit in omni fere India orientali, praecipue in regionibus monlanis.
5. L. POLYASTHA Royle mss. ex Bth. 1. c. — Erecia v. ascendens annua villosa: foil, ovatis, floralib. inferioribus conformibus, superioribus calyce brevioribus; racemis multifloris; floribus oppositis secundis; corollis calyce duplo longioribus. 0 — Affinis praecedenti, sed jam in florescentia differat. — Crescit in Indiae orientalis provincia Delhi ad ripas fluvii Jumna.

Stows Indeserlpfam*

3925/,. MITRANTHIXS *Hochstetter*.

(Hochstetter, Flora (B. Z.) 1844. p. 103. — Eodl. Geogr. plant. Suppl. inedit.)

1. M. LATIFOLIUS Hochstetter I. c. - 0 - Crescit in Abyssinia.

31)20. NTEMODIA *Linn.*

(Linn. Gener. plantar. 777. - Meisn. Gener. plantar, vascular. I. 310. II. 221. — Bth. Scrophular. Indic. 22. et Bot. Regist. adn. ad L 147a ex parte. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 530.)

Settle L MMIBTU tial. et Seâkôt, Unnaoa III ft.

Capsula localltda deâJacemt, valvolis se>Ueide blfidis. — Herbae saepe glabrae, habitata *GrmHoUs* vel *IdwmtþkiUt* afflaes, siceUle vix nigrleantes. Folia opposita vel verticillata sessilia vel breviter petiolata Flores axillares vel superiores in rapitulum vel in racemum approximati.

§. 1. *Floribus subsessilibus.*

1. ST. MKNTHASTRIM Bth. in Wall. Calal. 3027. et Scrophul. Indie. 1. - Krcia glabriuscula: foil, subsessilib. ovaio-oblongo, ulrinq. angustalibus, floralibus conformibus. calyce longioribus; floribus sessilib., supremis in rapitulum subglobo Mim glabrum aggregatis; calycis laciniis lanceolato-subulatis. QT — Crescit in montibus Mongbyr Indiae orientalis.
2. ST. HYPERICIFOLIA Bib. in Wall. Calal. 3KH n Scrophul. Indie. 21 - Gubrfl, basi radicans, ascendens: foil. tcs>ilib. otato-oblongis oblatibus, basi cordato-amplexicanalibus, floralibus minoribus; racemis terminalibus axillaribus; floribus sessilibus remold; calycis laciniis lanceolatis. 2}. — Corolla coeralea. Flores inbracteati. — *Cyrbantkera ronnata* Lamilt. B.Mt. in D. Den, Prodr. flor. Nepal. 87. — Crescit in Xepalia.
3. ST. BALSAMEA Bib. in Wall. Calal. 3028. et Scrophul. Indie. 21 - Caule procumbente; ramis subhirsutis; foil, ovalibus obtusis, basi in petiolum brevem aorustalis glabris, floralibus conformibus; floribus anillaribus sessilibus. «oliidru» >. uirioq* 2-3 glomeratis; calycis laciniis lanceolato-subulatis. ^ — Crescit in Tavoy 1° regno Birmanico.
- 1 ST. HESSILIS Bth. in Wall. Catal. 3030. et Scrophul. Indie. 23. - Procumbens fUhra: foil, sessilib. oblongis obtusis, basi angustalibus, floralibus conformibus; floribus solitariis axillaribus subsessilibus. cJ)cib. glabris, laciniis lanceolatis sobulatis airkUs; corollis calyce minoribus. ^ - Herba uligmota bamili radicans. — *Cr-ca* In India onesiuli ad Goalpara et Mo>lm)nr, in Zr)Uma.
5. ST. TEXIFLOSA Bib. IO Wall. Caul. 3040. et Scrophul. Indiæ. IL - rrocuss* bens glabra: foil aossilib. UicooUUs acutis serratis, basi rotundatis. floralibus conformibus; floribus aoliariis axillaribus subsessilibus; calycibus glabris, (acinus lanceolato-subulatis) laciniis; corollis calyce vix longioribus. % - Habita similis *

- Lythro hytiopifolio*, praecedenti similis sed magis pusilla, floribusque minoribus recedit — Crescit prope Prome in regno Birmannico.
0. ST. MICRANTHIA Bth. in Wall. Catal. 3030. et Scrophul. Indie. 23. — Pusilla diffusa ramosissima glabra: Toll, sessilib. oblongo-lanceolatis aculis, basi angustatis, floralibus conformibus; floribus sessilib. solitariis axillaribus calycibus glabris, laciniis lanceolato-sobolatis recurvo-patentibus; corollis calyce duplo longioribus. 2l — Praecedentibus quidem affinis, sed calycibus brevioribus sagittatis et laciniis recurvo-patentibus distincta. Caulis vix 3-4-pollicares. Habitus *Anogalidii tenellae*. — Crescit in montibus Silhet Indiae orientalis.
7. ST. REPENS Bth. in Wall. Catal. 1935., et Scrophul. Indie. 24. — Repens glabra submucosa: foliis sessilib. oblongo-lanceolatis, basi angustatis acutis serratis, floralibus vix calyce longioribus; floribus subsessilib. racemosis glomeratis; calycibus subglabris, laciniis lanceolatis, apice sobolatis recurvo-patentibus; corollis calice duplo longioribus. ♂ — Caulis elongatus, saepe ultra pedales. Racemi laxiusculi axillares v. axillares. — In peninsula Indiae orientalis circa Maderapatam.
8. ST. CAMPIORATA Vahl, Symbol, bot IL 00 — Bib. In Wall. Catal. 3932., et Scrophul. Indie. 24. — Erecta viscosa-pubescentis: foliis petiolatis ovalo-oblongis, floralibus internodiis lanceolatis; racemis axillaribus foliis subrepentibus. subsessilib.; calycibus pubescentibus, laciniis lanceolatis acutis corolla subtriplo brevioribus. 2l — Caulis basi floriferus. Racemi numerosi breves laxi robusti. — *St. eimieina* Bib. in Wall. Catal. 3083. — Crescit in Hindustanis et ad Prome in regno Birmannorum.
0. ST. PHILIPPENSIS Cham, et Schlectd. Linnaea III. 5. f - Pubescens: foliis pseudo-oppositis petiolatis lanceolato-ovatis, utrinque acutis argute serratis, basi integerrimis; spicis terminalibus multifloris; calycibus ebracteatis. 2j. — Undique, sed praecipue supra, pilis articulatis pubescens. Caulis teretiusculus brachialis ramosus. Folia pseudo-opposita, rarius alternata petiolata, e basi integerrima argute serrata. petiolus, 2/4 poll, longa, pollice paululum latiora majoraque. Petiolus pollicaris v. ultra. Spica terminalis, basi foliosa latiuscula, aplee densa. Folia floralia reliquis similia, at minoria, in bracteis abeunt anguste laevigata integerrima, calyces aequales. Flores oppositi alternatim sessiles breviter pedicellati. Calyx ebracteatus, fundo campanulato, eiliis pubescens, laciniis lanceolatis acutis. Corolla tubulosa bilabiata fere semipollicaris, eiliis pubescens, lobis rotundatis, intermedio lobis inferioribus minoribus. Capsula pubescens, calycem parum excedens ovale acuminatum loculleide bifidum, aplee dehiscent. Semina minutissima elliptica rugulosa, lutescenti-favescentia. — Crescit in Locis ad pagum Terra alia.
- §. 2. *Floribus pedicellatis, pedicellis calyce longioribus.*
10. ST. VISCOSA Rxb. Pl. Coromand. II. 33. t. 163. - Bth. in Wall. Catal. 3020., et Scrophul. Indie. 24. — Caulis pubescens viscosa: foliis sessilib. ovato-oblongis acutis, versus basin angustatis, ad basin dilalato-cordatis amplexicaulis, floralibus conformibus; floribus axillaribus nodosis, supremis subsessilib.; calycibus laciniis lanceolatis acutis; corollis coeclis. QY — *St. wuuiiwa* Beyne et Bih. in Wall. Catal. 3031. (see Linn.) — Crescit in Coromandelia et in Benghalia.
11. ST. HIRSIUTA Heyne In Wall. Catal. 303a - Bth. Scrophul. Indie. 24. - Caulis erecto hirsuto; foliis subsessilib. basi angustatis, supremis vix amplius glabris, floralibus pedicello subbrevioribus; racemo terminali; floribus solitariis oppositis; calycibus laciniis lanceolato-subulatis. Q — Crescit in peninsula Indiae orientalis, in Hindostania.
12. ST. DIFUSA Bih. in Wall. Catal. 3037., et Scrophul. Indie. 24. - Diffusa libera: Toll, sessilib. oblongo-lanceolatis, basi angustatis floralibus conformibus. floribus solitariis axillaribus; calycibus glabris, laciniis lanceolatis acutis; corollis calyce duplo longioribus. ^? — Slatura *St. micraidaea*, »d floribus pedicellatis majoribus et calyce distinctissima. - Crescit ad Taoy in regno Birmannico.

13. ST. GRATIOLOIDES Blh. in Wall. Catal. 3938., et Scrophol. Indie. 25. - Glabra erecta* foil, sessilib. oblongo-lanceolatis, basi angustalig amplexicaulib., floralib. conormib.; flonb. axillarib. opposih solilarus; calycis laciniis lanceolatis; corollis calyce dimidio longioribus. 2).? — Ad Tavoy in regno Birm a Quorum.
14. ST. M'RARIA Rxb. mss. ex D. Don, Prodr. fl. Nepal. 80. — Pilosissima: foil, ovatis acūM petiolalis serratis, floralib. similib.; flonb. axillarib., plerumq. solilams pedicellatis, calycis segmentis ovalis mucronulatis. 2) — Radix cae»pitosa. Caules numerosi erecti ramosi. Folia illis *ialamnthae* mmilia oppo»ila. Corolla pallide rosea villosa, calyce duplo longior. — Crescit in Nepalia.

Sactio II. DIAMOSTE Chan. 1. e. — Capsula loculicida

% I. *Calyce ebracteato.*

15. ST. (CONOBEA Spr. MOT. proTtal 13.) VIBTICILLARIS Lnk. Enam. pi. hori. Derolin. II. 144. — Spr. Syst. tegetab. II. 810. — Cham. Linnaea III. 7. t — Caulis erecto glanduloso-plloso; foil, •erlicillais amplexicaulib. lanceolalis serratis; pedunculis axillarib. subgemiDis, folio brevioribus. 0 — Rami — planlac cultac — numerosi erecti ramulosi, caule tamen semper simplici MX pollicari in planta spontanea. Folia opposita ternaque. Corolla panra purpurea. Calyx ebractecolalus — Crescit in Brasilia Iropica.
- Id. ST. BARTSIOIDES Lindl. In BoL Begist. adnot. ad tab. 147a — Suffruticosa erecta viscoso-pubescentis: foil, opposilis >. verticillalis lineari-lanceolatis, bast YIX amplexicaulib., floralib. calyce longioribus; racemo terminali; flonb. in axilla solitarii breviter pedicellatis; calycib. quinquepartitis, laciniis lanceolato-subulatis; corollis calyce ultra duplo longioribus, labio inferiori supra hirsute 2). — AfBoia Si. 9*rtidUari, sed folia ingotliora* Bee basi amplexicaulia; floret pedicellail ei eorolUo imai birtvUe. — Gmeil la pUtiiie Topelongo Meicanorum.
17. ST. CHILIRIBIS Blh. mu. MI UmH BoU Itglit 11410. t — Herbaeae perennis* erecta TISCOM: fell, oppotliis TOitkllltUsqie oblongo-lanceolatis acotis serratis, basi cordato-tmpleileanlib.; racemo terminali multifloro; flonb. axillarib. SC<Mlib; calycib. quaiqaepartitis, laciniis lanceolato-sabalalis; corollis calyce duplo longioribus, labio inferiore supra glabro. 2). — Radices repentes. Caule* c basi lignescenle plure« erecti subsimplices aogultti pubescenti-nscosi 's-l-pedales v. ultra. Folia ternatim verticillata, rarius opposita v. quaternatim ?ertirillaUv, 1-1' / -pollicana acua, argute et profuode serrata, basi vix angustata et auriculis rotundatis amplexicaulib. cordato-dilatata, utrinque pubescentia et >i«coia, superiora gradatim miora, floralia in calycem ^uperantia hnrari-laneeolaia acutissima subintegerrima. Flores sessiles oppositi et saepius ternatim verticillati %erticillat9 supremis approximatim. CalyxU oblongo-campanulati lacinae tiscoae, basi lanceolatae, apice subulatae, capsula longioribus. Corolla purpurea calyce vis duplo longior. Capsula ovulosa aeuia glabra. — *LoMia tfrhnUala* kotr nss* in Porpp. Collect. pi. Chiloat. 110. — 51. It*tjfo4*»< Lebm. Linnaea XI Literis* torb. 91. - Crmrii in Chill.
18. ST. ABKNARIA II. B. Ktb. Nov. geo. el spec. plant. II. 357. t I. 175. - G. P^o I. e. 541. no. 15. - Procumbens: foil, oppositis petiolalis otaiu crenato-serratis; flonb. lolitarMs aui geanioalis breviter pedoculatis; segments calycim IrtoerM/S nliati* ^obaequalibus. % — Berba ramotitiima; ramis pilotiutculit. Folia gUbnuscula 3-5 Mn. longa. Corolla calyce duplo longior corrulea. Forte cades* ar «M|urn«, sed floribus eoruln* folisque fsemper* oppo«iis differre dicitur. ~ Comoro orolfi Ilortor. - *Ctmobra pumtla* Spr. >ot. proieni 13. — tt*?***⁹ fl^M WUI4. Htrb. 11444. - Crescit in rip* moodata flomim Magdaleoeae prop* Banoo ti Bl PeAoi, iaier Motjpo et Morale*.
19. ST. PABVIPLOBA Ail. Hort. EevttJt. (edit. 8.) IV. H. - ti Don I. c no "• " Lnk. B«Qm p|. kort Berolli. II 144. ttd. sya plorib) - Procumbens ramosissima putiescenti: Ml. opposita t. itmis verticillatis petiolatis otatis crescenti corollis partim sibus, l*bo locur^alo % - *Ertmms* errfctftatoa Mill. Pletion. 9 ~~ed.~~ - *t.rttct* in Aojorica aatiraliol.

20. ST. SUFFRUTICOSA H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plantar. II. 357. — G. Don I. o. no. 18. — Suffrulosca pilosiuscula: foil, lernii verticillatis sessilib. oblongis crenatis; florib. axillarib., plerumq. geminalls pediceHatia; aegmenlis calycinis linearib. subquinquenerviis. q. — Folia 0-18 lie. looga, 3-0 lio. lata. Flores quam illi *Thymi Sèrpylli* majores. Corolla coernlea, exlus pilosa, tubo calyccm vix excedente. — *Columnnea* {*Stemodia* Rchb. Hort. botanic, t 1.) *UrifoHata* Lnk. Enumer. pi. hort. Berolin. II. 145. — Crescit in regno No?o-Granalenal Inter pagnm OBA el flumer Saraguru.
21. ST. JORULLENSIS II. B. Kth. I. c. 358. — G. Don I. c. no. SO. — ErecUpilooa: foil, ternis vorticillalis petiolatis ovatis; florib. aolitariis axillarib. longe pedicellatis; scgmenlis calycinis linearibns. 2|. — Caulis ramosas. Folia duplicate- et profunde arcualo-scrrala, basi integra, 5 lin. longa. Corolla calyccm duplo superans, coerulea? — Crescit locia asperrimis ad radices moniis ignivomi Jorullo in Nova Hispania.
28. ST. PALUSTRIS St Hil. Plant, remarq. da BrtoiL 210., Mem. Moa. XII. 314. - G. Don I. c. no. 21. — Radice repente; eaolib. asceadentib.; foil, opposilis v. ternis verticillatis sessilib. oblongo-linearib. acnMs, obsolete dentatis, soperiorib. angustiorib. sublinearib., supremis illiaq. ramoloraoi llinearib. anguiiissimis; florib. subspicatis breviter pedicellatla; oalycib. puberallf. 9> — Corolla coerulea. Palatum anilateraliter convexam, latere altero oonoavom, albwa. Capaala ealjela circiirc longitadlne. PlanU apleem versus pnberala. — Creaell in Braailla anatralli (Rio Negro el Uragoay).
23. ST. GRATIOLAEFOLIA St- HIL I. c. 217. ei 315. - G. Don I. e. no. 22. - Poll, opposilis sessilib. linearib. acutis; obsolete dentaUs glabris; florib. panlcnlatis subsessilib. in axillis bractearam pleramq. solilariis; calyeib. glsbriusculis. % — Corolla pallide coerulea. — Crescit in Brasillae provincia Rio Grande do Sol.
- 21 ST. FOLIOSA Bth. in Hook. Journ. of bot II. 46. - Annuu erecu villoia: foil, breviter pctiolalis ovato-lanceolatis v. oblongis v. infimis ovatis serrato-crenalis, basi cuneatis, utrinq. asperis subvillosis; florib. axillarib. breviter pedicellalis in racemos interruptos foliosos axillarea terminalefque irregulariler disposiUs. Q - Crescit in Guiana Britannic*.
- |. 2. *Calyc* bibracUolato.*
25. ST. MARITIAf A Linn. Spec. pUnt 881. - *Itq.* Plaat Aanerie, 181.1.174. fig. 00. (edit, plcu 201. OR. 48.). - ProcumbeiJ pilooa: foil oppotitls, basi batuUa M B I- amplexicaulib.; florib. axillarib. sollUriia aeaaUiboa. <fff — FolU vlscJda. Calyx basi bibracteolatui. Corolla coerulea. — Tola plaaU aasara^ aMaaatiee olens. - *Slemodiakra marHima odorata*, foUU wtmoriHu m*Mkm 4mHtmI*K\$ k*\$UUis, *floribus iolUariit alaribu** P. Br. Jamale. 201. L 22. fig. 2. — *Seordimm wu*Mwmm fruiicotum procumbent* Sloan. Hislor. Jaanale. I. 171. L 110. fig. 2. — Crescit in insulae Jamaicae inundatis maritimii.
25. ST. (CAPRARIA Linn. Araoen. acad. V. 370.) DCJRANTIFOLIA Swrth. Observat. 210. — Caulc crocto subhrxngono birsolo; foil, ternis verticillatis oppositisq. amplexicaulib. lanceolatis serrulatis; florib. aubaggregallt axillarib. subsessilibu*. f — Rami pilosi viscidi. Folia pubtaeeniia. Calycia bibraoMolati aegmenta subulata, corolla breviora. Corolla panra coerulea. — Pfciafyp— artcto. *foliit aeattli-bus augustis amriit ad mpitmm imraiit ofpottis t*u virticiUatit, foribut rim-guaribus alaribu** P. Br. Jaoule. 2D0. — *Veronica emfr htwmngulari, foiis 5a-turtjae tmis nraais* Slotoe, Ulstor. I. NO. t IM. fig. 2. — Crescil in Jamaicae Insulae paludosis maritims.
27. ST. IYPTOIDKS Cham. Llnnaea III. a t - Pobes<ttnti-birsata: foil. opposiUt ct ternaiis ovaio-lanceolalis argute denUUs, inferne angnslatis el basi auriculaU amplrxciculib. inicgerrimis; spicis tenninalib. densifloria paniculatis; calycib. bibracleolatiK. "4 - llerba habitu *Hypüdü* seu *MefOkat* foliit opposilis, rarius ternis quaternitve, ram is axillaribus ereclis raule brevioribua, pyrsmidato-pani-[^] culau, ex toto pubescent v. hirsuta, pilis in caule longioribus articulaUt crispata rigidulis- Radix raro siolonif<*ra. Caulis simplex obsolete tetragoous alnaris

T. cubitalis alliorve, sopra crassior, interaodiis l'A-2%- pollicaribos. Folia basi latiori rotundato-amplexicaulia, dein contracta integerrima, sensim in laminam expansawato-lanceolatam argale serratam, bine inde pilis delritis papillosam, maxima 2/3 poll, longa, pollice laliora, ramea mioora minus disrfficie aujculata el contracta. Spicae terminales densiflorae, infra relaxatae, floriferae subcapitatae, fmcliferae elongatae. Braciae (folia Ooralia) superiores lanceolalae acutae integerrimae, sapremae minores. Bracteolae 2 sub calyce, ejus laciniis similes. Calyx quinqnefdos birtns, laciniis angoste linearibus sabnlatis. Corolla exius le-viter pobescens, circiter 4 lin. longa, labiom su peri as emarginatum, inferius aequaliler Irilobam. Capsula calyee brevior ovoidea glabra. — Crescit in Brasiliae provinciis meridionalibns.

88. ST. STRICTA Cham. I. o. 10. f — Viscoso-pobescens: foil, obovalis acutis dentalis, inferne anguslatfc at bail tobдилаUta seMilib. el inlegerrimis, inferiorib. oppositis, soperiorib. ternis; spiaa lenrilMll tertlcillata; calycib. bibracieolatis. % — Caul is simplex r. parce ramulosus obsolete lelragonus strictus, pedalis ulnarisre, infra pilis articalatis crispatis hirsutus, supra viscoso-pubescens, inter-nodiis circiler sesquipollicaribus. Folia maxima pollice paullo longiora, 0 lin. laia, superiora sensim mioora, omnia interaodiis breffiora, subduplicoto-(inae-qualiterjserrata, basi obsolete auricolata integerrima. Floret quam praecedentis speciei minores (3 lin. longi) axillares solitarii bretiter pedicellali, spicam deo-sam viscoso-pubescentem sistentes. Calyx praecedenti omnino similis. Corollae lubus calyce fere doplo longior. Capsula. . . . ? — Crescit in Brasilia tropica.

f *SpeciB* vix notae.*

- ». ST. (COLUMNEA Rib. Flor. India III. 08.) MINUTA G. Don I. c. M2. no. 27. - Annum difost: caule qoadrang«^ri; foil oppositis sessiib. oralis cordatis serru-latis; lorib. aillarib. longe pedunsUU; ealyeib. qainqaeOdis; corolla ringente; capsula gtobosau 0 — CreseM ia tedla orientali
- 301 8T. (COLIMVRA lib. 1. a.) TOMBHTO8A O. Don I. e. no. 2B. — Annum diflusa: foil, plerang. oppositis aoMatls, margine serralis; racemls terminalib.; calyce amplo qolnqnefido; corolla riogente. 0 — Crescit in Benghalia.
31. #ST. EHRENBEGIARA Bchlehtd. BoUn. Zeitng. 1.109. - Crescit in Mexico. - Species indescrupta.

ft *Species e genere expellendae.*

- ST. AQCATICA Willd. - LIMNOPBILA RACEMOSA?
 ST. CAPITATA Bib. - PTEROSTIGMA SPICATLM.
 ST. GLABRA Spr. - GRATIOLA PERUVIAN.
 ST. GRANDIFLORA - PTEROSTIGMA GRANDIFLORUM.
 ST. MULTIFIDA Spr. - SUTERA MULTIFIDA.
 ST. MACROSTACHTA Bib. - LINDENBERGIA MACROSTACHYA.
 ST. RUDERALIS VahU mm UNDBNBER6U DRTICABFOLU.

3W7. SCBISTOPIIBA6MA Bth.

(Bib. in litleris ad SL AuWd«^r. — Melso. Gener. pi. vascular. I. 218.)

- I. 8CH. MEXICAKA Bib. nss. — Herbula bipollicarii ramosa: caullb. tetragonis glabri* •. ad angulos scabro-pubescentib.; foil, opposillis pinnatiseciis, negmenis linearib. subconeaiste Integerrimis r. incis; pedunculis axillarib. brevib. se-cundis unidoris ebracieolalis; calycis fix 2 lin. longi lariniis linrarib. rigiduli* ^ acutis »cabris sobaequalib.; corolla calycfm subdoplo suprranle glabra; capsula 9 lin. looga tenol acula. (Endlich. | 0? — Crescil in Mexico.

31128. ERI«i* Linn.

- (Lion. Qmm. pUolar no. 771. (excl. spec.) - Nees ab Eneob. Gener. pi. 0. Germ. XVI. t. M. - litlaa. Gener. plaour. taseolar. I. 310. II. 221. - G. Don, Georal sy»L of gard. aod bot IV. 3W.^

- I. E. ALPINUS UBB. fiote plaaur. 87*. - Schkbr. Bol. llodcb. I. 170. - Corti««
 B«««««gai. L M. - Ntes ab Bsenb. I. c - Mem. 4e Gta* VI. 122. t. 9.

fig. 3. a. - Koch, Synops. Fl. Germ, el Helv. (edit. 1) 584. — Rcb. Fl. Germ, excurs. 373. no. 2928. - Loddig. BoU Cabin, t 900. — Bull, flerb. t 5. - Lam. Illusir. Gener. t. 521. — G. Don I. c. no. 1. — *Caespilosus pilosns: foil, apaihu-latis profundiserralis; racemo laxo corymboso. 9}* — Pabnaris et ultra. Corolla purpurascērv. roseo-violacea. — *Erinut Hitpwricut* Pen. Enchirid. II. 147. — G. Don I. c. no. 2. (non differt)

fi. albiflorut: Planta minor, florib. albis. — Barrelier, Icon. 1108. — Crescit in alpig Germaniae, Helveliae, Galliae meridionalis et in Pyrenaeii.

2 E? GRACILIS Lchm. Linnaea X. Literb. 76. — Planta hirsuta: canle herbaceo ramoso; foil, pcciolatis spalulato-lanceolatis denlalis, bracleis lanceolatis cilia-tis, lubo corollae pubescenle, limbi laciniis emarginatis. 2l. — In Promontorio bonae spei crescil.

t *Species e genere excludendae**

- E. AETHIOPIUS Thnbg. - NYCTERINIA CAPENSIS.
- E. AFRICANUS Linn. - ZALUZIANSKYA AFBICANA.
- E. AFRICANUS Sebum, et Thonn. — HEBPESTB8 THONNINGII.
- E. AMERICANUS Mill. - BUCHNEBA ELONGATA.
- E. CAPENSIS Linn. - ZALUZIANSKYA VILLOSA.
- E. FRAGRANS Ait. - LYPEBIA FRAGBANS.
- E. FRUTESCENS Mill. - CAPRARIA CUNEATA.
- E. INCISUS Thnbg. — LYPEBIA IFFICISA.
- E. LACINIATUS Linn. - VERBENA EBUIOIDES.
- E. LYCHNIDEA Thnbg. - LYPBBU FBAGBANS.
- E. LYCDNIDEA Linn. fil. - ZALUZIANSKYA LYCHNIDEA.
- E. M AM TIM US Linn. - ZALUZIANSKYA MARITIMA.
- E. PATENS Thnbg. - LYPERIA VIOLACEA.
- E. PERLVIANUS Linn. - VERBENA CHAMAEDRYFOLIA.
- E. PROCUMBENS Mill. - UERPESTES CHAMAEDRYFOLIA.
- E. SELAGINOIDES Thnbg. - ZALUZIANSKYA SELAGINOIDES.
- E. SIMPLEX Thnbg. - LYPERIA SIMPLEX.
- E. TOMENTOSUS Thnbg. - MAN I LEA THUNBEBGII.
- E. TRISTIS Linn. - LYPERIA TBISTIS.
- E. VERTICILLATUS Mill. - STEMODIA PABVIFLOBA.
- E. VILLOSUS Thnbg. - ZALUZIANSKYA VILLOSA.

3029. FHJTEBA *Mtk.*

(Rib. Nov. spec. pi. 201. — Meltn. Gener. plantar, rascular. I. 310. II. 821.)

1. S. GLANDULOSA Rib. I. c. — Bth. Scrophular. Indie. 48. — Glaodutoso-pilosa viscosa: foliorum laciniis incis; florib. superiorib. alternii racemoiis; aepalla oblusis. ^ — Crescil in India orientali.
2. S. (CAPKARIA Michx. Flor. Dor. Americ. II. 22. I. 23. - STEMODIA Spr. SysL vegetab. II 811. - LEUCOSPORA Null Journ. acad. Philad. VII. 87. — G. Don, General s)i. of gard. and but IV. 042.) MULTIFIDA Wlpra. msa. - Caule diffuso ramoso pilosiusculo; foil. tripartito-pinnaUfldii, laeiniit llnearib. obtnsiusculii lubdentatis; pedunculii aiillarib. oppoaitit laciniiiiq. ealjeinlf capillaribus. Q — Folia Ijrala bit triflda. Capaala ovaU, placenta central! tngaita tubcolumnari; semina alba diaphana. Florea pallide rnbri cadueitsimi. — Creacil in America boreali (Ohio, Missouri, Mississippi, Arkansas).
3. 8. (CAPRARIA Delile, Decript. de l'Egypie II. 830. t ^ 38. 4g. 8.) DISSECTA Wlprs. mss. — (laule diffuso ramoso pubeicente ? iscido; ramis erect is lerminalib. racomoso-spiciferis, foil, dissectis, summit alternis in axilla floriferis; capsulis ovalis compress is; pedicellis creciiis. Q — Herba subviscido-pubesceus, 3-0-pol< licaris. Caulos plures ei oadem radice ramulis foliisque opposilis instructi. Folia piooaiiQda, lobis reclis denlalis. Corolla bilabial* v labio inferiori majori, lubo calyce longiori, nervis 5 roscis instructo. — Odorem bituminoium tpargit. — In *X<gypto prope Kahiram crescil.

3030. DODABTIA Tournef.

(Tournef. Her. III. 208. com icone. — Meisn. Gener. plant, vascular. I. 311. II. 221. — G. Don, General syst of gard. and bot. IV. 542.)^

1. D. ORIENTALIS Linn. Spec. plantar. 883. — Mill. Icon, fig' 127 & - Sweet, Brit. flow. gard. II. U 147. — Grinr. De fractib. et seminib. I. 245. t. 53. - Hook. Bot. Magaz. t. 2100. — G. Don I. c. — Radix repens. Flores allerni racemosi subsessiles atroporpnrei. Folia inferiora serrala, superiora integra. 2|. — Crescit in monte Ararat el in Talaria.
2. D.?? INDICA Lion. I. c. — Canle simplici foliisque o?alis scrralis villosis; floribos racemosis. 4 — In India orjenlali.

3931. MASVS Loureir.

(Lonreir. Flor. Coeblne*. IBB. ~ Meisn. toner, plant rascal. I. 311. II. 221. — Bih. Scropbnl. Indie. 20. — Manu O. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 542.)

1. M. (MASUS G. Don I. e. no. 1.) SDRUCULOSUS I). Don, Prodr. fl. Nepal. 86. - Slolonlb. repentib.; foil, incisio-crenatis rugosis bispidis subcrispis, ramorum bierilium rotandatis; calycis laciniis tnbo suo breviorib. ovalis obtusis; corollis ca-, lyce vix daplo longioribas. 2} — Herba pilosa. Racemi radicales pilosi v. scapi racemiferi. — Crescit in Nepalla et Kamaon.
2. M. (MASUS G. Don I. c, no. 2.) RUGOSUS Low. I. c. 385. - Sweet, Brit. Qow. gard. I. t 36. — Vii stolonifera: foil, omnib. oblongo-cuneatis grosse dcntalis; calycis laciniis otalo-laneeolatla lanceolatlste aculis tubum aequantib.; corollis callyce fix doplo longioribas. 0 — Corolla coerolea, palato albo ?. luteo. — *Hornemmmim hieolor* Willd. Ranmer. pi. hort Berolln. 631 — Rcbb. Flor. exotic. I. 25. L 37. - Mém. de Gtatre VI. 128.13. - Iteatfmfo *Impomic** Tbobrg. Fl. Japoale. fl6tf — *GrtipU \$**4md*W* Hanea- Boat. Main. 11 - Crescii in omni *kn* Isil* orfwalt
- Sm. (MASUS G. Don I. C BO. a) DBNTATUS Walt Caul. 3014. ex Blh. Scropbul. Indie. 21. — Non stolonifera: foil, oftts slnaatis; corollis calyce triplo longioribas. O — Folia majora latiora glabriora minosqae lobata quam in pracedente. Corollae duplo majores. — Crescit in Nepalia.
4. M. (MASUS G. Don I. c) PUMILIO R. Br. Prodr. fl. Nov. Uoll. 430. [edit. N. ab Eseob. 205.) — Hook. Icon, plant. U 567. — Corollae labio superlorc profuode bifldo; scapis 1-4-Doris calycibosqne glabris. Q?
 - a. Raccmns 3 - 4 - floras; peduncalis Jnxta apirem braceola setacca instructis. *fl.* Scapus oniflotus. — Crescit in Nova Holland!*
5. M. (MASUS G. Don I. c.) UEVIFOLIUS Blume, Bijdragen 75X - Foil, tpalbulatis repandis, ntrinq. laetib^ racemo terminali laxe glanduligero.Q*. — In J*^f*#

9WL LIMMOPHIUI It. Br.

(R. Br. Prodr. fl. No?. Boll. 443. - Meisn. Gener. plant. Tascul. I. :)ll. II. 221. - Bib. Scropbular. Indie. 0. — G. Don, General syst. of gard. and boi. IV. 54i.)

\$. 1. Axilliflorae. Folia emersa vix semipoUiearia.

- I. L. REFLEXA Bib. in Wall. Calal. 3001 ex Scropbul. Indie. 2S. - Caule I**'** glabro; foil, emersis, plerisq. oppositis iolegerrimi*; florib. tessilib. aiillarib.; deotib. calycinls brevib. muticis; capsulii demum rtfleii. (J? ^T - Crr>cit ad Tavoy in regno Birmaoico.
- t L. (COLIMNEA Rtb. Flor. Indie. III. 97?) HKTKROHIYMA Bib. in Wall. <*'- 3ML» tt Scropbul. Indie. 25. - Caule crasslnsculo glabro; foil, rrrrtit, pler^q. UrfttUa vetUcillatit serralaUs; florib. sessilib. aiillarib. «ubvrrtirilUn<<: drotib. calyetaMe MAVUto-acominatls. % - Cretcit in Nepalia ad Naipur et Gajpur).
3. L. SBSSILIFLORA Blame, Barege* MI - Bib. la Wall. Cat. JP01 - **091b** terelib. calyeibtj. t«bp«be«ee«llb^ foil, rabments tertkilUiit tetarco-**multiadis**. emertis trlpartUls Inciso-terraUs; florib. atilUrib. »M«ilib. solliariit. * - **Crescit** In inanU Jata et |> J|«paUi ad Goolpare, HilleL

4. L. VILLOSA Blume I. c. — Caule lereti villosio; foil, omnib. opposilis lanceolalo-lineajib. amplexicaulib. serralis pilosiusculis; pediiDCulis aiillarib. solitariis unifloris calycibusque villosiusculis. 2|. — Crescil in insula Java.
5. L. PUNCTIBX Blume I. c. — Caule terell subslrialo; foil, omnib. opposilis ternallsq. amplexicaulib. oblongo-lanceolatis serralis glabria, ulrinq. dcpresso-punclatis; pedunculis axillarib. unifloris calycibq. subglanduloso-pilosis. 2|. — In insula Java crescit.
6. L. GRATIOLIDES R. Dr. Prodr. fl. Nov. Holland. 442. - Blh. Scropbul. Indie. 25. - Gaudich. ad Freycin. Voy. 447. t. 57. fig. 1. — Caule glabro: foil, emersii opposilis, infimis triparlitis incisus v. capillaceo-mullifidis, superiorib. inlegrls serrulatis; florib. pedicellalis opposilis aiillaribus. ^ — Caulis procumbens, basi ramosus. Folia opposita, lerna v. quaierna, lineari-lauceolata, apico arguie denial* v. triGda. Pedunculi filiformes opposili foliis breviores. Capsula stylo persistente apiculaia, pilis raris albis lecla. — *Gratiola Iri/ida* Willd. Spec. plant. I. 104. — *ifoUonia Indica* Linn. Spec. plant 208. — *Hydropityon pedunculatum* Ser. in DC. Prodr. I. 42*. — *Coluwm** baUawuca* Rxb. flor. Indie. III. 07.
- fi. myriophyUoidei* Bib. I. c. 25. — Foil, fere omnib. muliipartitis, laciniis brevier capillaceo-mullifidis. — *Uwmoph. w\$yriophyUoid4t* Rib. Nor. spec. pi. 2M.
7. *elongaia* Bib. I. c. — Caule elongalo; foil, submersis caplllaceo-mulUfldis, caulinis dislanlib. fere omnib. inlegris. — *Uwmoph. dongaia* Bib. in Wall. Cat. 3001 — Crscil in Indlae el Arebipelagl Aslailol paludosis aliginosis el eiam in paludibus exslocalts, el nine valde varlal caule nune brevl erecio ramoso vix 2-4-pollicar1, nunc sesquipedali naianle, foliis omnibus capillaceo-multiparlilis. Herba lola saepissime glabra, rarius pilis nonnullis in calycibus pcduoculisque praedila.
7. L. (GRATIOLA Lam. Illustr. gen. I. 54.) CHAMAEDRYFOLIA G. Don I. c. 543. no. 8. — Foil, lanceolalis ovalis, apice denial is; Oorib. opposilis axillarib.?.; calycib. lubi corollini longiludine. ^ — *Ttieria Manga Sari* Rbeede, Horl. Malabar. IX. 166. i. 85. — *Gratiola trifida fi. integrifoUa* Vibl, Boomer. I. 00. - Ad varieUtes *L gratioloidi** perlinere videtur. — Crescill la bumldis Malabariae.
8. L. PINNATIFIDA Blume, Bijdragen 740. — Caullb. lereib. slrlatis, soperae calycibq. glandaloso-plloslusctills; foil, omnib. venclillais seiaceo-mulUQdts; florib. axlllaribas sabsessllibus sollurlli. ^ — lift.
0. L? ROXBURGII G. Don I. c. no. 0. — Btdlce repenle; caollbas annuls erectit; roll, opposilis subsessilib. oblongls serralis; florib. tollurlli axillarib. subsetslibus. O — Caulcs lereies, dlglil minimi crassllie ad nodos radclulas fibrosas v. folia flififormi-multiOda emillenies. Folia polllcei 2% longa, pollicem lau. Corolla campanulaia purpurea, labio superiorl lallorl emarglnalo. — Aromallce olei. — *Capraria gratissima* Rxb. Flor. Indie. II. 01 — Rbeede, Hort Malab. IX. U 78, — Crescil in India orienUli ad Cirears in rivulis.
10. L. SKRRATA Gaudich. ad Freycin. Voy. 448.1 57. fig. 1 (ex Prsl. Repert. boi. •yту I. 138.) - Foil, inlegris oblongis serralis. Qt ^T - In Insulls Marianls.
- §. 2. *Raetmiflora**. *Folia emtna sagpiui ultra poUiearia*.
11. L. RACKMO8A Bib. In Wall. Caul. 3007., ei Scropbul. Indie. 21. - FoilL emersls oppositls subverileillailsve iriaerulis Inlegrls v. ioflmls partlUS; raesso denso muliiOoro; calycib. membranacels laevlb. pedloellallsi eorollis purpurels. % — *CyriUa aquatica* Rxb. Pl. of Ibe eoasl of Cores. II. 47. L 187. — *Uwmoph. kyttopifolia* Rth. Nov. spec. plant. 807? - Cretell In peninsula Indiae orientalli ci in Benplialia.
12. L. (CAPKARIA Rxb. Flor. Indie. III. W.) DIFFUSA G. Don, General syst. or gard. and bot. ||. 543. no. 10. — Suffruticosa diffuse: foil, opposilis petiolaim lanceolalis obtusis inlegris; sptcis axillarib. terminalibq. folio brevionbus. 5 — Planla diffusa, partibus junioribuw pubrrula. Folia 1-3-pollicaria, iofenora polHeem lala. Cordlla pan a purpurea. Raremi «llc»ni uscidi. - IQ India orientali

13. *L. GIUTISSIMA* Bluræ, Bijdragen 740. - Blh. in Wall. Calal. 3906. - Gaule tereli striato; foil, omnib. lernatis sessilib. lanceolato-linearib. serratis; pedunculis racemosis calycibq. glanduloso-pilosis. 2} — Rheedc, HorJ^|Alabar. X. L 0. — Crescit in insulis Java, Zeylania, et in peninsula Indiae oriepaljs.
14. *L. POLYSTACHYA* Bib. in Wall. Calal. 3009., et Scrophul. Indie. 26. - Foil. emersis ternalim verlicillatis trinerviis; racemis ramosis lenuib. multifloris; florib. parvis sessilibus. 2} — Grescil in peninsula Indiae orientalis et in Benghalia.
t *E genere expellenda.*
- L. CAMPANULOIDES* Bib. in Wall. Calal. 3906. ad Genlianeas perlincl.

3033. *IVEDALIA* it. *Br.*

- (R. Br. Prodr. 0. Nov. Holland. 44a - Meifn? *fiener.* plant, vascul. I. 310. II. 221.)
1. *U. LINEAHIS* R. Br. I. c. (edit. ff. tb Etenb. 396.) — Foil, linearib. pedunculo aliqaolies brevitoribai. O? 2}.? — Crescit in Nova Hollandia tropica.

3034. *DIPLACTS* *Autt.*

- (Null, in Hook. Bol. Magaz. t. 3CW. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 311. II. 221.)
1. *D. PLMCEIS* Null, in Taylor, Ann. of Natl. Hist. I. 137. - Bot. Magaz. I. 36W. t — Knwls. et WslsciU The Floral Cabinet. III. 67. t 107. — Fruticosus viscosus glaber: foil, lineari-lanceolalis subconnalis vlx terrulatis aculiusculis; calycinis laciniis inaequalib. acuminatis; corolla punieea, lobis emarginalis; caute clalo ramosissimo. ty — Crescit in California.
2. *D. LATIFOLIUS* Null. I. c. 138. f — Suffralicosus viscosus: foil, oblongis sublanceolatif obtusiusculis serrulalis, toblus pubemlis; pedunculis brevib.; calycib. glabrit, laciniis inaequalib. tcutii; corollae lobit vii emarginalis, lalis. 2}. — In California eracit.
- 1 *D. LKPTANTHUS* Null. L e t — Frallcorat viscosus: foil, oblongo-lanccolalis i&illiusculif tobterralatii glaberrmls; pedancolii brevisiimii; calycib. glabris tubulonii elongatii, laciniis inaequalib. aculis brevib.; corollae lobis lalis, oblique emarginalis. 2}. — Crescit in California.
4. *D. LONGIFLORUS* Null I. c. 139. — Suffralicosus, viscosus pubescens: foil. II-neari-lanceolatis, utrinq. altenualis vii serrnlalis, margine revolulis, supra glabris; pedunculis brevissimis; calycib. villosis, laciniis vix inaequalib. aculis; corollae lobis lalissimis oblique emarginalis. ^ — Habitat in California.

t *Species e genere expellenda.*

D. GUTINOS 13 Null. - *MIMI'LIS GLITIMOS*'S.3035. *MI HI I LI M* *Linn.*

- (Linn. Gener. plant 783. — Meisn. Gener. plaour. vascular. I. 311. II. 221. - Spr. Syst. vegeiab. II. 7». — Bth. Scrophalar. lodic. ST. tq. — G. Don, General syst* of gird, and bol IV. 398.)

f. I. *Caule erecto; foliis penninerviit; calyce tubuloso.*

1. *M. LIKEARIS* Bib. I. c — Suffrolicus viscotissimus; caule ererlo ramono; foil* linearib. Integerrimis, margine revolotit; pedunculis subracemotis; ctlyclb. eloav-galis plicatis, denlib. lanceolato-linearib. oblusis inarqualibus. o — In California*
2. *M. GLI TlftOSUS* Wendl. Oli»rnaU 51. - Bib. I. c. «. - Vi»co»ui: raule erecto pubeteole; foil, supra, glabris, oblongis lanreolaliMr, ba«i angu»ui« eroto-deo-Ullt iolegerrimisve; pedancuhs folio brevionb.; c«l)cib. rlongaiu plicalis, denlib* UMtoltio-linearib. inaequalibu*. \$ — Floret auraniian, plrruroque in foliorum aiillit gemiMU. - *ihpUcus gutimotms* Null, in Taylor, Ann. of natur. bistor. •• 1*. — *Mtmnhu mmrmmiUeus* Cart. Bot. Magai. t. 3M. — In California.
- 1 *M. RMGRftg* Lios). Spec. pUBUr. «4^ Hort. I'pMliens. 17ft. t. 2. Curtis. BoUO' Magai. L 283. — Bib, I. c — Glaberrimos: uole erreto; foil, obloogis lanceoU' lisse subdeoUUs.btsi diUULit eordalo-ampleticaolib.; cilycib. tubalottt sub-lacurvit plicatis, deatib. Unceolato-liearib. loaeqotliboj. - Pluken. Pb|~~ter~~*

- L 393. fig. 3. — Moris. Ox. Histor. II 470. sect. 5. tab. 8 fig. 0. — Corolla violacea v. purpurea. — Crescit in America boreali e Virginia ad Canadam usque
4. M. ALATUS Ail. Hort. Kewens. II. 361. - Loddig. Bot. Cabin, t. 410 - Bin. I c. — Glaber caule erecto; foliis amplis oblongo-ellipticis acuminatis, basi in petiolam adferentibus; calycibus tubulosis plicatis truncatis, denibus linearibus 6 — Caulis foliis decurrentibus quadrilateralis. Corolla coerulea v. purpurea Folia inaequaliter serrata. — Crescit in America boreali.
5. M. STHIATUS Blh in Wall. Calal. no. 3018. el Scrophul. Indie. 28. — Erectus glaber foliis oblongo-lanceolatis obtusis subintegerrimis, basi vix angustatis cordato-amplexicaulibus; foliis pedunculis longioribus, calycibus ovato-tubulosis vix plicatis, dentibus brevibus ovatis subaequalibus 2. — Crescit in India orientali (Rajmahal el Kheev Pass.)
6. *2. Caule basi saepius procumbente v. repente, rarius erecto; foliis 3-5-nerviis dentatis; calycibus ovatis tubulosisve, saepe inflatis*
7. M. HIRSLTUS Blume, Bijdragen 750. — Hirsutus foliis ovatis lanceolatis serratis; pedicellis racemosis oppositis; caule erecto argute tetragono. O* 2. T — Crescit in insula Java.
8. M. BREVIPES Bth. Scrophular. Indie. 88. — Pubescent: caule erecto viscoso, foliis oblongo-lanceolatis linearibus subdentatis, basi angustatis subteretibus v. subpennatis. amplexicaulibus; floribus subsessilibus; calycibus ovatis plicatis binae fissis, denibus lanceolatis inaequalibus. % — Crescit in California.
9. M. LEWISII Prsh. Flor. Am. sept II. 427. t. 80. — Spr. I. c. no. 4. - Caule humili foliisque lanceolatis nervosis sessilibus denticulatis pubescentibus; pedunculis paucis terminalibus longe pedicellatis; calycibus denibus acuminatis; corollis magnis speciosis pallide purpurascens — Crescit in America boreali.
10. M. CARDOALIS Dougl. mss. ex Bib. I. c. - Sweet, Brit. flow. gard. (Scw Ser) IV. t. 358 - Hook. Bot. Magaz. t. 3360. - Maund el Henslow, The Botanist. I tab. 2 — Villosus: foliis amplexicaulibus ovatis, margine eroso-dentatis; pedunculis foliis longioribus, calycibus amplis inflato-tubulosis vix plicatis, denibus ovatis acutis; antheris villosis. 2. — Ex concubitu hujus cum sequente orta est siliqua hortensis hybrida *Mimulus roseo-carduus* Uis Maund el Henslow, The Botanist II L 51. — Crehd in California.
11. M. ROSECS Dougl. mss. In Lindl. Bot. Regist. t. 1501. - Loddig. Bot. Cabin, t. 1970. - Sweet, Brit. flow. gard. (New Ser.) III. t. 210. - Hook. Bot. Magaz. I. 3333. — Bib. I. c. - Pubescent: caule amplexicaulibus oblongis subdecaulibus trinerviis; pedunculis foliis brevioribus; calycibus amplis subinflato-tubulosis, denibus ovatis acutis subaequalibus; antheris glabris. 2. — Crescit ad flumen Columbia.
12. M. LITE US Linn. Spec. plantar. 884. - Lindl. Bot. Regist. t. 1000. el 1700. — Hook. Bot. Magaz. tab. J330 33*3. 3303. - G. Don I. c. no. 11. fig. 50. - Blh. I c. — Feuill. Peruv. II 745. I 34 — Glaber foliis eroso-dentatis, inferius longe petiolatis ovatis sublinearibus, superius rotundatis cordato-amplexicaulibus; calycibus ovatis fructiferis campanulatis, dentibus ovatis acutis, supremo maximo. 2. — Corolla lutea, ad faucem obscure fusca-maculata. Varietates plurimae hortenses hybridae florum forma, magnitudine el colore insignes occurrunt. — *fi Hvilaris* Lindl. Bot. Begist. t. 1030. — Crescit in Chili.
13. M. LYRATUS Dougl. mss. ex Blh. I. e. — Basi glaber, apice pubescent viscosus foliis eroso-dentatis cordato-amplexicaulibus; calycibus ovatis, fructiferis in oculo campanulatis; denibus ovatis acutis, supremo maximo; corollis calyce duplo longioribus. ^j. — Crescit in California.
14. M. GLTTATL'S DC. Cat. hort. Monspel. 127. - Rehb. Icon. pi. cult. el colendar. t. 901. Blh. I c. - Glaber foliis linearibus inferius longe petiolatis, superius rotundatis conflatis amplexicaulibus. calycibus ovatis, fructiferis inflatis ore contracto, dentibus ovatis, Miprmio latissimis, corollis caecis duplo longioribus. ^ — Crescit in California Surculi rrpmtes, corolla lutea, ad faucem fusco-maculata. - *M. luteus* Sims, Bot. Magaz. t. IMU. Vr*U Hort. Am. %U II 4<

14. *M. RIVULARIS* Null. Journ. acad. Pbilad. VII. 47. - G. Don I. c. no. 14. - Lod- dig. Bot. Cabin. I. 1575. — Slolonifer glaberrimus: foil, petiolalis ovalib. obtusis argute crenatis, caulinis similib. sessilib.; florib. axillarib. terminalibq.; dentib. calycinis brevissimis; corollis magnis pallide luleis. 2|. — Crescit in America boreali (Rocky mountains).
15. *M. PARVIFLORUS* Lindl. Bot. Regist. t. 874. - Bib. 1. c. - Glaber v. vix pubescens: Toll late ovatis eroso-dentalis, basi late truncato-cordatis, inferiorib. • petiolalis, superiorib. sessilib.; calycib. ovalis, fructiferis latissime campanulatis, dentib. latis brevib., supremo maximo; corollis calyce dimidio longioribus. O — Crescit in Chili. — Corolla lutea.
16. *M. PROPINQUUS* Lindl. Bot. Regist. t. 1330. - Hook. Flor. Bor. Americ. II. 90. — Annuus, undique glanduloso-pubescens: caule decumbente tereli; foil, ovatis deolatis, supremis sessilib.; pedunculis axillarib. folio breviorib.; corollae lobis obtusis, fauce pubescente, tubo calycis aequali. O — Jf. *glandulostu* Lehm. Linnaea VI. Literaturb. 11T — Crescit in America boreali-occidentali. — Diversus dicitur a Jf. *glabrato* H. B. Kih.
17. *M. GLANDULOSUS* Lehm. Linnaea VI. Literaturb. 11. — Annuus, pubescenti-glandulosus: caule procumbente ramoso; foil, late ovatis dentalis nervosis pallide viridib., superiorib. sessilib.; pedunculis axillarib. folio breviorib. ebracteatis; florib. parvis. Q — Cf. speciem praecedentem. — Crescit in America tropica.
18. *M. GLABRATUS* H. B. Kih. Nov. gener. et spec. plant. II. 370. — Bth. 1. c. - Glaber v. vix pubescens: foil, late ovatis obtusis eroso-dentalis, basi late truncato-cordatis, inferiorib. petiolatis, superiorib. sessilib.; calycib. ovatis, fructiferis inhato-campanulatis, dentib. latis brevib., supremo maximo; corollis calyce dimidio v. vix duplo longioribus. % — Corolla lutea. Surculi repentis. — Jf. *propinquus* Lindl. Bot. Regist. t. 1330? — Crescit in Mexico (prope Moran, Jalapam et ad radios montis Oriiaba) et in California.
19. *M. ANDICOLA* H. B. Kih. I. c. — G. Don I. c. 554. no. 17. — Glaberrimus: caule repente quadrangular(?); foil, petiolatis ovatis obtusis subcordatis dentatis quinque-nerviis; pedunculis folio longioribus. % — Differt a praecedente statura minore, pedunculis folio longioribus floribusque minoribus. — Crescit in declivitate montis ignivomi Pichincha prope Chorro de Cantuna.
20. *M. PILOSUSCULUS* H. B. Kih. I. c. - (Kih. Synops. pi. aequin. II. 12a) - Piliusculus: caule repente quadrangular!; foil, petiolalis subrotundo-ovatis obtusis subcordatis dentatis; pedunculis folio brevioribus. 2|. — Caules repentis. Folia 3-5-nervia. Flores lutei. — Crescit in Peruviae umbrosis prope Pativilcam.
21. *M. MOSCIATUS* Lindl. Bot. Regist. t. 1118. - Blh. I. c. 29. - Caulo diffuso lanato-villoso; foil, petiolatis ovalis v. ovalo-lanceolatis subdentalis, basi rotundatis pilosiusculis subviscosis; calycib. tubulosis, fructiferis oblongis, dentib. lanceolatis inaequalibus. 2|. — Herba diffusa, basi radicans. Tota planta exacte *Motchum* redolet. Floret parvi Intel. — Crescit in Columbia.
22. *M. FLORIBUSCULUS* Dongl. mss. In Lindl. Bot. Regist. t. 112V - Blh. I. c. - Diffusus, laxo pilosus viscosus: foil, petiolatis late ovatis subdentalis, basi truncatis rotundatis; calycib. (parvis) ovato-tubulosis subaequaliter truncatis, brevissime et acute dentatis. O — Crescit in California et ad flumen Columbia.
23. *M. ALSINOIDES* Dougl. mss. ex Bib. I. c. - Glaber diffusus: foil, longe petiolalis ovalis tubdeotalis, basi cunealis v. rotundatis; calycib. (parvis) oblique truncatis, brevissime dentatis. Q — *a. paniculatus*: — & *minimus*: PUau 1-3-0ora. — Crescit in America boreali-occidentali, in California et ad flumen Columbia.
24. *M. PRIMULOIDES* Bth. I. c. — Glaber, slolonifer: ramis floriferis brevibus; Miliusculus: obovatis obscure dentalis integerrimis; pedunculo elongato solitario terminali; calycib. tubulosis breviter dentatis. O - In America occidentali-boreali.
25. *M. PEDICULATUS* Dougl. mss. ex Bib. I. c. - Pubescens haanilia: foil, petiolatis ovatis anxitis nudentatis. basi truncatis* rotundatisve; calycib. parvis

ovalo-lubulosis, denlib. brevib. acutis subaequalibus. 0 — Crescit in America boreali-occidentali.

90b M. JAVANIGUS Blume, Cat. hort. Bailenzorg. 83. — Caule repente argenteo tetragono; Töll, breviter petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis, basi paululum attenuatis deotalis, utrinque scabris; pedunculis axillaribus terminalibusque solitariis unifloris, subfasciculatis. ♀ — Crescit in insula Java.

27. M. TENELLUS Boge. Mém. des sav. étranger. de St. Pétersbourg. II. 123. — Caule basi ralicante anguloso; Töll, petiolatis ovalis acutis, acute denatis glabris; pedunculis axillaribus ebracteatis, calyce membranaceo ampliato corollae tubum superante longioribus. ♂? — Crescit in China boreali.

§. 3. *Caule diffuso; foliis penninerviis tenuibus dentatis; calyce ovato-tubuloso.*

28. M. NEPALENSIS Bth. in Wall. Calal. 3017., et Scrophul. Indie. 29. — Glaber diffusus: foliis petiolatis ovatis serratis, basi cuneatis v. rotundatis; calycibus ovato-tubulosis, denlib. brevibus acutis, supremo parum majore. 2. — in Nepalia.

29. M. ASSAMICUS Griffith mss. in Linnaea XII. Literaturber. 199. — Diffusus subglaber: foliis obovatis v. ovatis, basin versus integris, caeterum argute dentatis quioquevenis, superioribus sessilibus; calycibus campanulato-tubulosis truncatis, denlib. brevibus subaequalibus, fructiferis amplius subinflatis. ♂ — Herba pusilla, basi radicans. Folia inferiora obovata, reliqua ovata basique attenuata v. obovato-lanceolata, dentibus mucronatis. Flores oppositi parvi lutei tubo intus rubro guttato. Pedicelli filiformes demum folia eicidentes. Antherae basi celluloso-papillosae. Glandula hypogyna nulla. Placentae stipitatae. Semina pallide brunnescentia oblonga saepius pilis brevibus hyalinis, apice 2-4-uncinalis bispida. — Crescit ad ripas arenosas fluminis Burrumpootur regionis Assamicae.

§. 4. *Caule repente; foliis crassiusculis integerrimis glaberrimis.*

30. M. ORBICULARIS Wall. Calal. 3919. ex Bib. I. c. — Glaber repens: foliis petiolatis orbiculatis integerrimis crassiusculis; calycibus ovalo-lubulosis truncatis, brevissime denatis. % — Crescit in India orientali (Ranzoon et Tavoy, in regno Birmanico).

31. M. REPENS R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 439. — Bth. I. o. — Glaber repens: foliis ovatis obtusis integerrimis semiamplexicaulis crassiusculis; calycibus ovato-tubulosis truncatis brevissime denatis. 3} — Habita similis eat *BirpeMdi Mtmnieriae*. — Crescit in insula Van Diemen.

32. M. GRACILIS R. Br. I. c. (edit. Nees ab Eiseb. 905.) — Olaberrimus erectus: foliis linearibus-oblongis oblongisve obtusis integris; pedunculis elongatis. % — in Nova Hollandia crescit.

t *Species e genere expellenda**

M. PERFOLIATUS H. B. Kth. — LEUCOCARPUS ALATUS.

3030. LEUCOCARPUS D. Don.

(D. Don in Sweet's Brit. flow. gard. [New Ser.] II. 1121 - Mein. Gener. plantar. vascular. I. 310. II. 221. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 549.)

1. L. ALATUS D. Don I. c. — G. Don I. c. — Caule erecto; ramis tetragonis aulis glabris; foliis connatis lanceolatis angustulo-acuminatis argute serratis glabris; corymbis axillaribus folio triplo brevioribus. 0 — *Mimulus perfoliatus* H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 371. — Hook. Bot. Magai. 13061. — *Conochea aUta* Grah. in Edinb. new philos. Journ. 1830. Oct. p. 3. — In regno Novo-Granalen*.

3037. ELLOBVM Blume.

(Blume, Bijdragen 740. — Meisn. Gener. plantar. vascular. I. 310. II. 222. — G. Don, General Syst. of gard. and bot. IV. 549.)

I. MONTANUM Blume I. c. — Herba radicans pilosa non satis nola: foliis oppositis petiolatis ovalis serratis; racemis axillaribus paucifloris; pedicellis fructiferis recurvis. % — Crescit in insula Java

3938. *MOBGANIA R. Br.*

(R. Br. Prodr. 0. Nov. Holl. 441. - Meiso. Gener. plant, vascul. I. 311. II. 222. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 543.)

1. *M. GLABRA* R. Br. 1. c. (ed. N. ab Esenb. 207.) — Glabra: foil, linearib. integris v. paucidentatis; peduculis floridis calyces subaequanlibus. 2|T — Crescit in Nova Hollandia.
2. *M. PUBESCENS* R. Br. I. c. — Pubescens: foil, lanceolato-linearib. denlalis; pedunculis floridis calyce brevioribus. 2|? — Crescit in Nova Hollandia.

3939. *SPHAEBOTHECA Chamisso.*

(Chamisso, Linnaea II. 605. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 311. II. 222.)

1. *SPH. SGOPARIOIDES* Chamisso. I. c. 000. f — Rami repens? Caules herbacei erecti solitarii tetragoniflori 2-3-pedales, a basi ad apicem usque ramalis, foliis floribusque ornati. Folia lanceolata acuta obsolete inaequaliter argutissime serrata, margine demum cartilaginea penninervis, utrinque impresso-punctata, nervis subpellucidis, cum petiolo bipollicaria, 2/3 lineas lata. Pedunculi axillares filiformes, angulo fere recto patentes, 10 lin. longi, caulini ramulo exteriori slipantur. Flores parvuli. Laciniae calycinae sesquilineam longae, subgrossificatione paulo longiores; corolla (coerulea?) tres circiter lineas longa, eitis pubescens; capsula diametro aequilina. Bracteolae ad calycis basin minutae aculae adpressae. 9} — Crescit in Brasilia aequinoctiali.

3939/. *ILDEFONSIA Gardn.*

vGardn. in Hook. Lond. Journ. of bot. I. 184. — Endl. Gener. plant. Suppl. III. p. 70. — Meisn. Gener. plant, vascul. II. 308.)

- I. *I. BIBRACTEATA* Gardn. I. e. 181 — Suffrutex erectus ramosus bipedalis: rami alterni oblato tetragoniflori; folia opposita lanceolata v. ovato-lanceolata, basi subattenuata acutiuscula glabra, nervis aequidistantibus, nervis 0-0 lin. lata. Pedunculi axillares solitarii uniflori, apice bracteati circiter 0 lineas longi, sursum deflexi. Bractae subulnae pilosulae. Calycis quinquepartiti laciniae lanceolatae aequales subfoliaceae nervosae, 4 lin. longae. Corolla campanulata semiuncialis et ultra violacea, limbi quinquefidi lobis subaequalibus obtusis. Antherae oblongae biloculares, loculis divaricatis aequalibus mucicis. Capsula subglobosa glabra. Stylus persistens, basi demum fissus. 5 — Crescit in Brasilia (Corcovado, Rio Comprido).

3940. *HEBPESTEB Grtnr.*

(R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 443. - Meisn. Gener. plant vascul. I. 311. II. 222. - Blh. in Hook. Compan. botan. Magai. II. 55. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 5440)

Botan. L. TOURIA Btl. I. e. S.

Corollae labium superius integrum v. emarginatum. Capsulae valvulae integrae v. breviter bifidae, marginibus inflexis.

1. *H. OTATA* Wall. Cat. 3806. ex Bth. Scrophul. Indie. 30. - Bth. in Hook. Comp. bot. Magat. II. 56. — Glabra procumbens: foil, petiolatis ovalis circiter; floribus subsessilib. solitariis bibracteatis; sepalo interno latissimo cordato. 2I - Tavoy.
- & II. *GRANDIFLORA* Bib. I. c. - Glabra: foil, ovatis multo amplioribus. deo- Utis; pedicellis solitariis folia subaequantibus. bracteatis; calycis scapularibus* Multo interno ovalo. % — Crescit in Brasilia (Rio Iraraima).
3. *H. CBAMAEDBYOIDES* II. B. Kth. Nov. KHI. et %w. pi. II. 300. - Kth. Synops. Paint. atq. II. 190. - Bth. I. c. - 'Glaberrima: raulibus prorumbentibus; foil, ovatis fectasis crenato-serratis; peduculis folia aequantibus v. parum excedentibus; calyce bracteati lacinibus interioribus ovato-oblongis acutiusculis integerrimis. ^ - *B. ektysmnos* Cham, et Schlecht. Linnaea II. 571. t - Caulis juvenis spithameo tetraquero debili erecto, demum cum cumbos, basi brachiatis ramosas. Folia caulina opposita nervosa obtusiuscula breviter petiolata fronsata, 20 li*-

longa, 3 lin. lala. Pedunculi oppositi filiformes iriquelri, basi foliolis oppositis spathulalo-lanceolatis integerrimis insruccii folio paullo breviores. Calyx sepalis Oexternis connivenlibus subliqueter. Sepalum maximum ovalum acutum, rarius denle uno alterove nolatam, $3\frac{1}{4}$ lin. longom, 2 lin. latam, inlima duo linearia. Gorollae luteae limbos calycem parum superat bilabialos, labio superiore emarginalo, inferiore aequaliier Irilobo. — *H. Cubentú* Poepp. mas. in Spr. Syst. veget. II. 802? — [Caule ascendente glabro; ramis virgatis; foil, peliolalis subrotundo-ovalis crenulalis; pedunculis axillarib. filiformib. oppositis folia aupe-ranlibus. O — In insula Cuba.] — *Lindemia dianthera* Swrtz. Flor. Ind. Occident II. 1058. - Willd. Spec. pi. III. 320.

fi. colubrina: Glaberrima: caalib. procumbenlib.; foil, oblongis aculiusculis, basi cuncatis scrralis; pedunculis folio duplo longiorib.; calycis ebracteati laciniis exleriorib. oblongis acutis integerrimis. ^ — *Uerpette\$ colubrina* II. B. Kth. I. c. 368. — Klh. I. c. — Adhibelnr contra morsum animalium venenatorum. — Crescit in America cenlrali (Texas, Quito, Mexico, Peruvia, in insulis Trinitatis et Cuba).

4. B. TENELLA Cham, et Schlichtd. Linnaea 11.470. f — Btb. I. c. — Herbacea glabra: caulib. prostralis; foil, breviter petiolatis ovatis acute serratis; pedunculis longissimis aliernis; sepalis exteris ovatis oordata. % — Caules tetragon! filiformes prostrati, bine inde radicanles spilhamaei, apicibus ramisque alternis crenatis fructiferis. Folia Internodlis breviora, Inferiora ovata oblusa In petiolom brevem altenuata, petiolis connatis, (4-0 lin. longa, 2-4 lin. lata), summa lanceolala acuta, omnia acute serrata. Pedunculi alterni capillares folio triplo longiores, ima basi foliosi. Calycis ebracteati sepala valde inaequalia, exteriora cordata laic ovalia acuminata acuta, interiora lineari-lanceolala. Corolla tubuloso-infundibuliformis, limbo aequali bilabialo, labio superiori emarginato, inferiori trilobo, lobis rotundalis, lana ad labium superius parca. — In Brasilia meridionali.
5. II. HERMARIOIDKS Cham. Linnaea VIII. 34. f - Blh. I. c. - Glabra: caulib. herbaceis telragonis ramosissimis humifusls radcantib.; foil. ovall* grosse paucicrenatis obiusis, in peiolom angostalis, peliolis connatis; florib. axillarib. sparsis breviter pedunculatis; calyce ebracteato, fructifero aucto laxo captularo valvis integris bivalvem non superante, laciniis obtosiusculis, exleriorib. ovalo-lanceolatis. % — Radix subligoosa simplex. Limbi corollae lobli longilodine aequales, forma subinaequales. - UbiUt in Brasilia.
6. II. CAPRARIOIDES H. B. Kth. I. e. 3fe - Blh. I. e. - Glaberrima: caalib. procumbenlib. repentib.; foil, ovatis obtusa, basal ooneatla efrato-erenaUs; pedunculis folium subaequantib.; calycis ebracteati Internu oblongis aentls subcrenatis. % — Corollae flavae, calyce longiores, labio superiorl emarginato, Inferiore bi(??)- tripartito reflexo. — Crescit locis sleds arenosis regnl Novo-Granalensis In ripa fluminis Magdalcae prope El PcBon.
7. II. FLAGELLARIS Cham, et Schlichtd. Linnaea II. 575. | - Blh. I. c. - Procumbens glabra: foil, ovato-oblongis paucidentatis, basi in petiolom brevem tngustatis; pedicellis solitariis, folio subduplo longiorib. bracteis; sepalo nterno ovato-oblongo. 6 — Caules flagelliformes Bliformea talrtfonl flexuosi pedales ulnaesque, internodiis l-1/-pollicaribus; rami Inlerdum adsunt digitalei alterni flexuosi. Folia opposita oblusiuscula in petiolnm brevem altenuata, petiolis connatis subintegerrima v. obsolete remoteque nerrata opaea, ad summitl % poll. longa,, $\frac{1}{2}$, poll. lata. Pedunculi literal fillfonnes tenues, In ramis ereclis Mini-pollicares v. pollicares, in nagellis usque bipollicaret Uxl, follola ad basin pedunculi indicant terminalem esse in ramo abbreviato. Calyx eitl palatus inaequalis 3 circiter lin. longus, sepala exteriora elliptico-lanceolata, Intina linearia. Corolla calyce duplo major, lineis intensius coloralis percursa, limbo aubaequali* labio superiori iruncalo mucronulalo, inferiori Irilobo, lobis ocordaila, Baals labii superioris iolus arcam proferl lanugine densa lectam. Cap«ula calyce flrtla part* brevior membranacea crassiu&cula. — Crexil in Brasiliae mridionalis provlncia Montevideo.

8. *H. RADIGATA* Bib. I. c. - Glabra prostrata: foil, oblongis sabdentatis, basi in petiolom angustatis; pedicellis folio vii longiorib. ebracteatis; sepalo externo late ovato. 2|. - Valde affinis *U. oblongac.* — Crescit in Patagonia (Port Desire).
9. *H. PEDUNCULARIS* Bib. I. c. — Glabra, basi procumbens: ramis floriferis erectis; foil, ovatis oblongisve serratis, basi in petiolum brevem angustatis; pedunculis folio multoties longiorib. solitariis ebracteatis; sepalo externo maximo ovato. y. — Texas, Rio Brazos.
10. *H. (MATOUREA* Bib. in Hook. Compan. bot. Ma gar. I. 178.) *MGRESCENS* Bth. I. c. II. 30. — Glabra erecta: foil, oblongis serrato-crenalis, basi longe angustatis; pedunculis folio subaequalib. T. supremis longiorib. ebracteatis; sepalo externo oblongo. 2|. — *Gerardia cuneifolia* Prsh. Fl. Am. sepl. II. 422. — *Gratiola aequinivalis* Ell. Carol. 15. — Crescit in Americae borealis 15 civitatibus australioribus ad Texas usque.
11. *H. (MATOUREA* Anbl. Pl. Golan. II. 048. t 290. - *VANDELLIA* Vahl, Eclog. II. 48. - Willd. Spec. plant. III. 343.) *PRATENSIS* Bth. I. c. 57. - Full, petiolalis ovato-oblongis aculis crenatis; pedunculis axillarib. solitariis unifloris; corollis coeruleis. 21 — In America australi ab insula Trinitatis ad Brasiliam usque.
12. *H. PILOSA* Bth. I. c. 57. — Erecta viscosa, mollissime piloso-lanata: foil, sessilib. oblongis subintegerrimis; pedunculis folio breviorib. solitariis ebracteatis; sepalo externo late ovato. 2} — Crescit in California boreali.
13. *H. VANDELLIOIDES* H. B. Kth. ROT. gen. et spec. pi. II. 307. - Kth. Synops. pi. aequin. II. list. — Glaberrima: caulib. procumbentib.; foil, obovatis acutiusculis serratis; pedunculis folio longiorib.; calycis ebracteati laciniis exteriorib. oblongis acutis, apice obsolete serratis. % — Crescit in fissuris rupium inter Moran et Omitlan Meixneraoram.
14. *H. (MOIGAMA* Spr. Sjæl. fegeL II 801) *CALUTBICHOIDS* H. B. Kth. I. c. 807. — Kth. I. e. list — Glaberrima: caulib. prostratis; foil, oblongis aculis, basi cuneatis remote dentatis; pedunculis folio breviorib.; calycis ebracteati laciniis subaequalib. lanceolato-obovatis. O — Corolla pallide rosea. — Forte melius *Lindemiae* species? — Crescit in arenosis juxta pagum San Fernando de Apure.
15. *H. SERPYLLOIDES* Cham, et Sehlchld. Linnaea II. 574. f - Suffruticosa: caulib. radicanlib. caespitosa; foil, sessilib. lanceolatis remote et obsolete serratis; Oorib. sessilib. alteris oppositisq.; sepalis externis lanceolatis acutis. 5 — Suffrutex glaber oppositifolius babilo *Tkymi Serpylli* eodemque modo radicans et caespitosus. Caulis simplices v. infra ramosi tetragoni filiformes digitales. Folia basi attenuata, apice obtusiuscula, serraturis 1-4 ulriosecus adpressis quandoque obsolete notata, 4 lin. longa, lineam lata. Flores axillares solitarii alii v. versus apicem oppositi, aequae sobseaeales, pedunculo rarius ad 3 lin. elongato. Pedunculi basi foliosi! (erit igitur ramosae abbreviati). Calyx 3 lin. longus. Corolla parva, calycis paulo longior tubulosa, limbo aequaliter bilabiato, labio superioris fixo emarginato, inferiore aequaliter trilobo, lobis rotundatis. Capsula ralyce miner membranacea ovata bivalvis aequifraga driscens. — *Merardomis* Mart. Nov. gen. et spec. pi. Bras. III. 10. t I. ». - Bth. In Uook. Journ. of bot. II. 4ft. — *HtrpnUs pusillim* Meisn. m>s. ex D. Dietr Synops. pi. III. *» no. 30. — Crescit in Brasilia tropica.
16. *H. CAESPITOSA* Cham. Linnaea VIII. 31 t - Glabra: caulib. caespitosis 4»* iofortela radicanlib. adscendentib.; foil, lanceolatis integerrimis ramosulis onli* •HtIU; nimmnulis in apicib. ramorum aequo, folio 3-4V-tuplo longiorib.; calycis ebracteati laciniis exteriorib. ovatis acutis. ^ - Habitu timilit est *Veronica* ~~apiculis~~, sed minor graciorque. Folia vix duas lineas intermediis excedunt. Sepala inaequalia, tribus exterioribus ovatis acutis, duobus interioribus ovatis emarginatis acutis. - Dabliai in Brasilia Mexice.
17. *H. TOMETTOBA* tthchbtd. *i Cham. Linnaea V. 100 | -- Candida lanata: caulib. repenlib. ramosa Bafelliforniib.; foil, spatulato-obovatis acutiusculis

silib., apicera versus subcrenato-serralis; florib. axillarib. sessilib.; calycib. bibracteatis; bracteis calycisq. linearib. acumioais aut aculis. % — Ioanisprope Yera Cruz habitat

Seotto IL OAOHOBEA BUL L e. hi.

Corollae labiam saperias inlegrom v. breviter emarginatnm; capsula oblonga acota quadrivalvis; sepala post anihesin vix aucta, externo lanceolato v. oblongo.

18. H. (CACONOPEA Cham. Linnaea VIII. 28.) GRATIOLOIDES Bib. I. e. - Glabra erecla: toll, semiamplexicaulib. lineari-lanceolalis integerrimis; florib. axillarib. fasciculatis breviter pedicellatis bibractealis; sepalo externo lanceolato. 2]. — Herba glabra. Folia in nervo el ad marginem pilosa. Caulis purpurascens. Folia complicata linearia v. lineari-lanceolata acuta, quam internodia longiora. Bractee seiceae. - *Bramia temiserrata* Mart Choix des pi. 11. t lab. 8. — Crescit in Brasilia, in paludibus ad Bahia.

19. H. RAZARIA Bib. I. c 57. — Herbacea parva repens: foil, semiamplexicaulib. ex ovato subcordatis, basi angustatis oblusis carnosulis, internodio breviorib. oppositis decussatis integerrimis; florib. partis axillarib. fasciculate, breviter pedicellatis; calycib. minute bibracteolatis. 2]. — *Mairia monnieroides* Cham, el Schleich. Linnaea VIII. 31. — G. Don I. e. MY. — In Brasilia prope.

Beottoin. BBAMIA Bth. L o.

Corollae labium superius profunde emarginatum t. bifidum. Capsula subglobosa v. ovata, rarius oblonga, quadrivalvis. BepaU post anthesis aucta, externo lato saepe cordato.

1. *Folia omnia uninervia t. penninervia, nee multinervia.*

20. II. POLYANTHA Bib. I. c. — Glabra erecla: foil, pedicellatis ovato-lanceolatis denatis, basi angustatis; pedunculis fasciculatis pedicellatis breviorib., versus apicem bibractealis; sepalo externo lato cordato. ^? — Crescit in Brasilia (Rio de Janeiro, St. Catharine's).

21. fl. CALYCINA Bib. I. c. — Glabra procumbens: foil, breviter pedicellatis ovatis obtusis denatis, basi cuneatis; pedunculis brevissimis solitariis, apice bibracteatis; sepalo externo lato cordato. 2].? — Crescit in Benegmbia.

22. H. SCABRA Bin. I. c - BubgUbra: foil. ovaU oblongisre >>>eMtjuUt lo pe-Uolum brevem angustatis el taepa ampl<xicatill-diUuUs peanlomis, rantt •••brls; pedunculis in axilla quaavU 1-t ealfoe loftforib., aplM t btacfaUg Mdlsve; sepalo externo lato subcordato. ^ t — GNMH. . . . f

A fl. STELLARIODES Chamisso, Linnaea VIII & (nat fwj - Glabra: caula erecto subsimplici laxo; foil, lubternis sessilib. lineari-unioctia, apice obsolete serratis; pedunculo ex quaque axilla folium subaequantem; calycibus bibracteatis fructiferi aurti laciniis majorib. ovaliter obtusis reticulatis. % — Folia quam internodia longiora circiter pollicaria, rarius opposita, plerumque terna tetralia templexicaulia. Bractee el calyces ut in if. *Montuira*, corolla Umen minor profundius fissa, segmentis angustioribus longioribusque oblongis oblongis. - Creceit in Brasilia (Bahia, Cayenne).

94. B. FLORIBUNDA R. Br. Prodr. fl. Nov. noil. 908. - Btk. I. c. - Glabra erecta: foil, lanceolato-linearib. integerrimis, basi angustatis unioctis; pedicellis in axilla quaque 1-3, versus apicem bibracteatis tepalo externo lato, demum tubcordato. % - // *Irmceokua* Wghu in Wall Catai 3800. ex Bib. Berapbul. ladle. 30 - // *linearis* Spr Sysu vegai. II. 80if — [Cane humili ramoso; *iol* liotrik. integerrimis glabris; pedunculis axillarib. geminis unifloris. — *fjathnfii* «*ctaw moidti* Nees ab Escnb. in Spr. Keue Entdecka p. 14. — In ora Coromandeliana. J — Crescit in Nova Hollandia, in Madagascar el in India orientali.

85. II. HAMILTOMANA Bth. Scrophul. Indie. 30. el Compan. bot Magai. II. 58. - Glabra erecla: foil, lanceolatis integerrimis, basi angustatis uninerviis; florib. multifloris. tolilarii^ bibracteatis: sepalo externo lato cordato. "\$ - gutanafhr in India orientali.

26. II. TUONIMNGII Blh. I c. p. 58. - Glabra, basi repens: foil, sessilib. lanceolatis serratis, basi angustalis uninerviis; pedicellis brevib. solilariis, sub Core bibractealis; sepalo externo ovato. % — *Erinut Africanut* Schum. el Tuonn'. Plant. Guin. 278. (neo Linn.) — Crescit in Guinea (Ningo).
27. H. SESSILIFLORA Blh. I. c. — Glabra crecla: roll, oblongo-linearib. lanceolatisve, apice serratis, basi angustalis uninerviis; florib. subsessilib. solitariis bibractealis; sepalo exierno ovalo. 4? — Cayenne.
28. II. MADAGASCARIENSIS Bib. I. c. - Glabra, basi repens: foil, oblongis v. oblongo-ovatis integerrimis v. obscure dentalis, basi ampleiicaulib. parum angustalis uninerviis v. obscure penninerviis; pedicellis folio dimidio breviorib., apice bibractealis; sepalo externo ovalo. 2j.? — Crescit in Madagascaria.

§. 2. Folia basi penninervia, nervis simplicibus vel rarius intermedio pinnato.

20. H. (GRATIOLA Linn. Amoen. acad. IV. 300. — Jcq. Obserr. boL 4. 1.1. - Rib. Plant Coromand. II. 41. I. 178. - CAPRARIA Rxb. mss. in Willd. Herb. 11320.) MONNIERIA H. B. Kth. Nov. gen. el spec. pi. II. 204. — Kth. Synops. pi. acquin. II. 125. - Blh. Scrophul. Indie. 30. el in' llook. Compan. bol. Magaz. II. 58. - (G. Don, General syst of gard. and bol. IV. 545. no. 89.) — Glaberrima: caule repente; foil, obovalo-oblongis oblusis inlegerrimit sobcarnosis; pedunculis folio longiorib.; calycis bibracteati laciniis exleriorib. ovalo-oblongis aculis iniegrimis. 2} — Corolla panra, pallide coerulea. — *Gratiola portulacea* Weinm. S)ilog. pi. Fl. Ratisb. I. 228. — Sims, BoL Magai. t 2557. - *Monniera Brownei* tors. Enchirid. II. 100. - *Monniera cuneifolia* Michx. Fl. bor. Am. II. 22. - *Monniera Africa*** Pen. Encntr. 11. 160? — *Monniera pedunculata* Pers. I. c. — *BerpesHs cuntifoUa* Prth. Fl. Amerie. aepL II. 418. — *Uerpestis procumbent* Spr. Ho?, protest. 88. et BytL T t g t ll« 9UL — *BorpttiM Brown** Nalt Gener. plant Amerie. II. 41 - *Brmnin Mfe** Lam. DM. L 450. - *CatyiripUx obovata* Ri. el Par. Sytt fl. Peru?. 104, — (Ehifc. Pltl. 114. fig. 2. — P. Browne, Jamaic. I. 200. L SB. fig. 1. - Sloan. Hilt Ian. I. 9B3. L 190. 6g. 1. - Rheede, Hort. Malabar. X. 87. t. 11) — Crescit inter tropicoci Aaiae, Africae et Americae.

30. H. LANIGERA Cham, el Sclbchtd. Linnaea II. 578. | — Blh. I. c. — Repeal: caule villosiflissimo; foil, ovato-orbiculatis amplexicaulib. iniegerrimis penninerviis el basi sobmultinerviis glabrii v. tubtus villosi; pedunculis solilariis folium tub* acquanlib., apice bibracteatis; tepalo exlimo ovalo cordalo. ^ — Caules prosiraU spilhamaci longioresque, brachialim ramosi lereies, pilis artieulais albis Unall. Folia seisilia carniola, loblos paullo pallidiora basique lanuginosa, apice* versus aequae ac supra glabreicentia, 0 lin. longa, 5 lin. lala, iniernodia caulln* aequanlia, Im apicibus saperanlia. Pedunculi axillaret solilarii oppositi aliernlva unifloii lanoglnosi, folia aeqaolat. Flos ft lin., calyx 2'A lin. longut; braeieae ad basin ealyela fliformet atioatae, 4enuoi reflexae. Sepala 8 exteriora max 8* cordalo-ovau obmslvteila laaequalia, 3 iolerlora lanceolata acua magis inaequalia, onnia, praeserlim ad basin pllotia, nargine patenlim ciliaia. Corolla t>" bolom subinfundibuliformif, lobo calycem excedente, limbo bilabialo 5-partiUN lacinllt rotundaii^ — *Veronica rotundifolia* var. *BratiUentut* Spr. Sytt veget I* 07. — Crealt in Brasilia aequioocliai.

31. II. SALZMAMI Blh. I.e. - Caule tillofiissimo; foil, ovatio-orbiculatis amplexicaulib. iniegerrimis glabrit obscure penninerviis mullinertiitq.; pedicellis solitariis folio longiorib. ebracteatis; tepalo eierno ovalo cordato. :j. - Cretil itoolUt ptPp* Bahiam.

32. III. (MONNIERIA Michx. Fl. AD. bor. II. 822.) ROTUNDIFOLIA Pr>b. Flor. A* septemfolia 473i - Bib. I. e. - Caule glabro v. villosiusculo; foil, obovalo-y' biculatis 880gm1au molUoeniU glabrit; pedicellit In atilla quaquo aolW¹¹, gealno ^ laJMt folio breviorib. ebractatils; tepalo exierno ovalo. ^ — ff^{oTis} parvi paHlde eotrolei. - lo America boreali-occideoUli.

33. U. MICRASTHA Prth. L c 4181 - Bib. I. c. - Glabra: foil, otalib. loieferri-

mis amplexicauiib. obscure muliinerviis; pedicellis solilariis folia subaequaniib. ebracteatis; sepalo externo cordalo. 2̄ — Flores minimi albi. — Daec species falde accedit ad genus *Lindernia*, — New Jersey el Bahia.

- 31 H. (MONNIERA Michx. Fl. Am. bor. II. 22.) AMPLEXICAULIS Prsb. I. c. 418. - Blh. I. c. 50. — Caule villosio; foil, amplexicaulib. OYatls obtosis integerrimis multinerviis glabris v. nervis sublus villosis; pedicellis solitariai calyce breviorib. subbibracieatis; sepalo externo cordalo. 2̄, — Corolla coerulea major qaam ceterarum specicrum Boreali-Americaoarum. — Crescit in Americae borealla civitalibus ausralioribus.

f *Species minus notae.*

35. 11. MORANENSIS U. B. Klh. Nov gen. el spec. pi. II. 367. — Klh. Synops. pi. aequin. II. 125. — Glaberrima: caolib. repenlib.; foil, cunealo-oblongis oblusis, aplccra versus obsolete remoleq. denliculalis carnosulis; pedunculis folio longiorib.; calycis bibracteati laciniis exteriorib. ovato-oblongis obtusiusculis integerrimis. q. — Aflnis *H. Mofmieriae*, differ! lamen sUtura majori el foliorum forma. — In Nova Hispania Inter montem Ventoao el fodnam Moranemem.
36. H. STRICTA 6brad. in Lnk. Enumer. pi. hort. Berol. II. 142. — Caule erecto; foil, lanceolata acutis duplicate-serratis glabris; florib. •erllctlaUff. 2I. — Caulii aabaimplex angalaios glaber. Folia In peliolum (6 lin. longnm) baal pubeseeniem attenuate, lamina 2% poll, longa, ultra pollioem laU. Floras 4-0 In verticillo, ramo simul excreaeento, pedleella 8 lin. longia. Sepala 3 ovata reticulaU sub-serrulata, 2 angoaiiisslma. Corolla calyce non mnlto major coerulea. — Crescit.....T
37. II. DOBINGENSIS Spr. Syat. vegel. II. 801. — Caule erecto glabro ramoao; foil, peliolalis oblongis, basi atlenaatis crenatis; pedunculis verticillalis; calycib. fructiferis relfculatis. %> — Crescit in insula Sli. Dominici.
38. H. IHONTEVIDENSIS Spr. I. c. 802. — Ramis ereclis flexuosis foliisq. lineari-oblongis obtusiusculis subintegerrimis; pedunculis axillarib. natanlib. folia superanlibus. 2j.? — Crescil in Brasilia (Montevideo).
30. B. OBOVATA Poepp. mss. ex Cham, el Schlbld. Llnnaea V. 107. — Caule lanato; foil, obovatis. 4 — *Gratiola rep<u* Willd. Hb. — *GraHola parviflora* Juss. — *Uydrotricke Bteeabunga* Joaa. — In insola Cobi.
40. H. LANUGINOSA Blume, Biidragen 787. - Unugloosa: foil, ovatis dopicatodenutia; pedunoalia peilolo brevlorlb^ caiyeib. blbraetMtia. ^ — In Java croact
41. H. SPATHULATA Blume I. c 748. - OUBffrimn: toll. spalholaus, aaporno obsolete serrulais; pedunenllt folio longtorlb.; ealyeib. blmoieitls. % — In Java.
42. H. JAVANICA Blume I. e. — Canlib. proenmbenUb., tlllotnaenlla; foil, ovatis inaequaliter crenalis glabriusculis, Infra doproao-poneUUt; florib. aubsesailib.; calycibus bibraclealis. ^ — Crescit In Java.
43. UT AMARA Spanoghe, Linnaea XV. 332. — Herba caullb. ereclis (1-ped. alt.), sulcatis glabris; foil, oppositis sessilib. lanceolata, obtuse acominalis glabriusculis integris; pedunculis axillarib. 2- aul multiDoris bibraclealis, bracteis minulls flifonnibus. ^ — An eadem ac *Curanga anuiraT* — In Insula Timor.

f *Spectit e genere excludmda\$.*

H. AMARA Bib. - CURANGA AMARA.

H. BRECTA Spr. — ACHETARIA SPRENGELII.

II. FLORIBUNDA Rib. Nov. pi. spee.». 1 . kmm•Um•••••

H. RUGOSA Rib. I. e. 20a } <> Aeanibtcteti penlnt

3040/,. BACOPA AM. ••

(Aubl. Pl. Guian. I. 128. t. 40. - Endlich. Gener. pi. Suppl. I. p. |«B. • Mei|n.

Gener. plant, \ascul. I. 311. II. 222. - Bth. Ann. of natur. history II. 441)

1. B. AyíA Tia Aubl. I. c. - Bth. I. c. - Foil, lancotatis; bracteis a calyce remoiis; sepalis exteriorib. in podunculum »ubdcurrentib.; forollae calycem »ubdimidio superanlis laciniit otali-oblongift. ^)? - *ihrpnl n tteUarioidtt fi. Ciy**-MiMii Bth. in Hook. ^lomp. but. Magar. II. 57 . r.rcwii in (iuiana ISallira n in terra Euequiboncn^i.

2. B. GRANDIFLORA Marl mss. ex Blh. Ann. of nat. history II. 443. - Foil, lanceolatis; bracteis calyci approximatis; sepalo poslico basi cordato; corollae calycem duplo sirperanlis lacioiis lale obovalis. 2l.? — Crescit ia inundalis el aquis signaolibus inter Alegre el Olbo d'Agua in Brasiliae prov. Piauiensi inferiori.

3941. CCRANGA Juss.

- (Juss. Ann. mas. d'hist. natur. IX. 310. — Meisn. Gener. pi. vascul. 1. 3ia II. 820.)
1. C. (SERRATULA Rmph. Herb. Amboin. V. 450. U 170. fig. 1. - GRATIOLA Rxb. Fl. Indie, edit. Wall. 1. 136. - CARANGA Vahl, Enumer. I. 100. - HERPESTES Bth. Scrophol. Indic. 30. — CURANIA Roem. el Schult. Syst. veget. I. 178.) AMARA Juss. I. c — Blame, Bijdragea 740. — SubgUbra: foil, peiialalis ovalis crenalis, basi cnoeatis; pedunoalii uillarib. folio breviorib., apice subracemosis 2-4-florib; florib. pedicellatis. % - *SymphgUiwrn.* t Griff, in Madras joorn. of sc I. . . . ? — Habitat In India oriental! (In Moluccis).

3942. ACHETABIA Cham.

- (Chamisso, Linnaea II. 366. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 300. II. 220.)
I. A. SPRENGELII Chamisso I. c 367. t - Herba perennis(?) oppositifolia, habiliu *Melissam* v. *Calamintham* quodammodo referens, praeler capsulam pilis longis articularis leviter hirsuta glandulisque minutissimis sessilibus aereis conspersa. Gaulis obsolete tetragon!, supra hirsutiores tripedales ?. aliores. Folia interodiis plerumque breviora ovata acala, in petiolam breviter attenuata obsolete dejectalato-crenolata, infra pallidiora, venis otrinsecus 3-4 eimie pilosis prominolis, adjecto petiolo pollicaria, semipollicem lata. Floras in summita Ubus axillares solilari oppositi breviter pedicellati, magaitadine fere *Tytm Aeni*. Braetae ad basin caljds 8 Uteraka ovatae obtusae ealyee breFlores. Ctlycli sepaHa saperta* eUptieui ftMnw, rellqais illformibos. Corolla exlos pilosa et glandoligera, labo Intot parelns pNoae, labo snperiort obovato, inferioris lobis rotundatis sobaequalibot. Capsula glabra ellptica snbeompressa obtusa, stylo persistente snperala. — *Herpe\$Us erecta* Spr. Syst. vegetab. II. 801. - Crescit in Brasilia meridional!.

3943. BEIWCHIA Chamisso.

- (Chamisso, Linnaea in. 21. — Meisn. Gener. pi. vascul. I. 310. II. 890.)
I. B. OCYMOIDES Chamisso L e t — Caule pnbescente letragono; foil, ovals, supcrne serratis in petiolum brevem allenualis, ramealib. ellipticis mlnorib, floralib. minimis integerrimis; florib. in tpicaro lerminalem densifloram foliAsam* demum elongatam colleclis; corollae labio utroque subaeqaall, soperloris margine inferioreq. reflexis; capsula membranaea OToidea glabra. ^ — Folia !/• poll, looga, * poll. lala. Corolla dreiter 4 Ho. longa, tubo calyceem paullo excedente. Calyx basin aaqoe qvlnqoe parlitas, laclnla postica minima fliforml» laleralibas lanceolalls, majoriboa *qum* antherae llneares. — Crescit in Brasilia meridionali.
& B. AJUGOIDES Blh. Seropbol. ladle. 0. adnoL — Florib. spicalls; corollae labo •npeiore retaso, inferiore tricreolo; geaiulib. inelosis. ^ - Cresdi in Brasilia ad Bahlam.
1 B. SCITELLARIOIDIB8 Bth. I. e. - Pvbescens: roll, panris petiolatls; florib. axillarib.; corollae labio soperiore bifldo, inferiore trifldo. ^ - Crencil In fra* sttia prope Bahiam.
4. B. VILLOSA 1th. I. e. - ToU Tillosa: foil lubsestilib.; florib. axillarib.; corollae t'tto asywloie enargioato, inferiore brrviter irifldo. ^ - In Brasilia ad Bahlaid.*

3944. ASTICHABIM Bndlich.

- 'Kndlich. Nov. sisrs). Mus. Viodob. p. tt. - Meisn. Gener. pi. vascul. I. 310. II. ¶*•>
I. A. CAPRAUA Steudel et Uochsl. In lib. an. ilin. Arab. no. 17. ARAIICA Bndl. I. c. 0. t, Iconogr. Geofr |l i « - llerba anoaa pedalls v. sttajoipedaHi

erecta stricta simplex v. basi parce ramosa, uadique subviscoso-glanduloso-puberula. Caulis teres, basi sordide purpurascens, superne glauco-viridis. Folia 4 linearum intervallis alternantia elliptica obtusiuscula (9 lin. longa, 2½ lin. lata) integerrima, in petiolum brevem attenuata, subtus uninnervia, utrinque viscidoglandulosa glaucescens. Pedunculi in foliorum, saepe plures ramuli abortivi foliola prima minata evolventiam axillis solitarii aniflori filiformes, folio ipso triplo breviores erecto-patentes, infra medium bracteolis duabus hinc inde muniti. Flores unis lin. longi. Calycis quinquepartiti lacinae hinc lanceolatae acutae, duae anteriores paulo breviores, omnes erectae confertim glanduloso-pubescentes. Corolla hypogyna tubuloso-infundibuliformis, sursum ampliata, limbo quinquefido subbilabiato, lobis rotundatis obtusissimis, intermedio antico ceteris aequalibus triente longiore, omnibus venosis. Capsula membranacea ovato-conica acuta substraminea, obsolete venosa bisulca, parvis glanduloso-puberula bilocularis. O — Crescit in Arabiae feliciis montibus (Sidr el Kasr etc.).

3945. HTDBOTBICHE Zuccar.

(Zuccar. Plant, nov. fasc. I. 109. — Meisn. Geogr. pL vaicut I. 309. II. 890.)

1. *H. HOTTONIAEFLORE Zuccar. I. c. % — Crescit in Insulis Madagascariensibus.

3040. «BATIOLE R. Br.

(R. Br. Prodr. fl. Nov. Holland. 485. — Meltzer. Gener. pi. vool. I. 310. II. 50. — Linn. Spec. plantar, p. 91 ex p. — Spr. Syst. veget. I. 39. ex p. — Dietrich. Synop. plant, plerumq. I. 39. ex p. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 534.)

§. i. Species Europaeae.

1. GR. OFFICINALIS Linn. Spec. plant. 84. — Oed. Flor. Danic. t. 303. Hayne, Termini botanic, t. 1. fig. 47. — Ball. Herb. t. 130. — Plenck, Off. Pflin. t. 15. - 8abb. Hort. Roman, t. 87. — Blackw. Herb. t. 411. — Hayne, Arzneigew. III. t. 13. — Schkuhr, Bot. Handb. 1. t. 8. — Grtner. De fructib. et seminib. pi. 1. 153. - N. ab Esenb. jun. Gener. fl. Germ. XVI. U. ft. — Rchb. Flor. Germ, excurs. 370. no. 8596. — Koch, Synops. 0. Germ, et Helv. (edit I.) p. 517. — G. Don I. c. no. 1. — Foil, sessilib. laevigatis trinerviis serrulatis, basi integerrimis; pedunculis ternariis unifloris. % — Radix repens articulata. Caulis supra tetragonus. Folia daemum 3-5-nervia, interdum integerrima. Corolla albida v. pallide lutea purpureo-striata. Filamentum ferulaceum barbatum. Calyx adpressus 7-nerviis. Capsula ovata acuminate. — Gr. cnidarioides C. Bauh. Pins* 879. — Or. 4a) pi. I. Baab. Illust. 111. 435. Riv. Monop. irregut. t. 157. — Morla. Oxontooa. aiatar. II. 479. aet. 5. t. 8. fig. 7. — Crescit locis humidis in Italia fere Europa, praeterquam in Asia.
2. GR. LINIFOLIA Vahl, Knumerat. pi. I. 89. - G. Don I. c. no. 8. — Foil, linearibus integerrimis sessilib. enervis; pedunculis axillaribus unifloris. % — Herba glabra. Caules ascendentes ramulosi. Folia amplexicaula acuta, laevigato-linearibus trinerviis. Flores purpurascens-albidi. — Gr. officinaria Brot. Flor. Lusit. I. 15. — Lok. et liffinosgg. Fl. Portug. I. 825. t. 31. — Geseit in Lasitania.
3. GR. CRASSIFOLIA Lag. Nov. Gen. el spec. pi. I. no. 6. ex Spr. Syst. veget. I. 39. — Foil, laevigatis integerrimis crassis; pedunculis anifloris. % — Crescit in Hispania ad urbem Salamancam.

|. 2. Species Americanae.

4. GR. AURBA Prsh. Flor. Amer. septentr. 1. 18. — Loddig. Bot. Cabin, t. 1399. — G. Don I. e. 535. no. 3. - Glabra: foil, late linearibus sessilib. obscure denueratis, supra punctatis; pedunculis vix foliorum longitudine. % — Caulis repens teres (ei Spr.) parum ramosus bisulcatus. Folia semilamplexicaulia. gemmata calycina apice glandulosa aequalia. Corolla aurea puberula. — Gr. Cnidiaria rostrata Pers. Knchmd. I. 14. - Gr. officinalis** Michx. Fl. Am. boreal. I. - Crescit locis uliginosis in America boreali (New York).

- *. GR. PERUVIAN* Vahl, Enumeral I. fo. - Spr. I. c. 40. Q. bo. Lc. no. 4. — Glabra: foil. ovato-oblonga* subquadrilatera serrata, flonibus sessilibus. % — AfBnis Gr. officinalis*, et folia breviora, flores minores albi. Capsula baccae

- Piperis* magnitudine. — *Stemodia glabra* Spr. Syst. vegetab. II. 811. — Feuill. Peruv. III. 23. I. 17. — Crescit in Chili, Peruvia et in Brasilia australi.
6. GR. FLORIDANA Null. Journ. acad. Philad. VII. 103. - G. Don I. c. no. 5. — *Glabra erecta*: foli, lanceolalis obsolete denticulalis aculiusculis; pedunculis folio longiorib.; corollae majosculae segmentis emarginalis. 2}. — Folia quam ilia *Gr. Virginicae* angustiora floresque mallo majores pallide lulei. Calycum illi sirailima. Calyces el braealeae panri. — Crescit in Florida.
7. GR. VIRGINICA Linn. Spec. plant 25. - Willd. Spec. pi. I. 104. - G. Don I. c. no. 6. — Caule ascendente lerele; foli, oblongis, ulrinq. allenuaiis subdentalis nervosis; pedunculis aillarib. uniOria folio brevioribus. 2} — Caulis icres, ad articulationes radicans. Calyx aequalis. Corolla albedo-lutescens. Capsula acuminata calyce lodgior. — *Gr. mmmSmatm* Vabl, Enumer. 1.92. (eicl. synonym.) — *Gr. neglecta* Torr. CaUl. pi. New York 80. — *Conobea borealis* Spr. Neoe Enldckng. II. 205. — Crescit in America boreali a Pennsylvania ad Carolinam usque.
8. GR. QUADRIDENTATA Michx. Fl. bor. Americ. I. 0. - G. Don I. c. no. 7. - Pubescens: foli, linear!-lanceolalis remote paucidentatis; pedunculis foliorum longitudine. % — Habiles *Gr. officinalis***, sed omnibus partibus minor. Caules lereles. Flores ebracleali. Calyx inaequalis. Corollae tubus flavescens purpureo-striato*, limbo albo. Captula quam calyx Iriplo brevior. — *Gr. ramota* Walt. Fl. Carolin. 61. - *Gr. Virginica* Lam. Illoslr. gener. I. M. t. 16. fig. 2. - Vabl, Enumerat I. 80. — Crescit in Carolinae agris arenosis.
9. GR. PILOSA Michx. Fl. bor. Americ. I. U. - G. Don I. c. no. 8. - Caule ercio piloso; foli, cordato-oblongis remote denlicolalis pilosiusculis; florib. subsessilibus. % — Caulis lent. Folia semiampteiicaalia. Calyx laequalis. Corolla alba purpureo-uacta, IMSJI TIUoat. - *Gr. Ptrmima* Walt Fl. Carolin. 02. — Crescit locis aqosla la CaroMaa et Georgia.
10. GR. TETRAGONA Billot, Carol. It. (nee Hook.) - G. Don I. c. no. 0. - *Glabra*: caule procumbente* tetragono; foli, laacoolalis parce denlatis; segmenti* calycinis subaequalibus. 2I. — Flores ebracleali. Corolla alba sriata. Capsula calycis longitudine. — Crescit in Carolina australi.
11. GR. MEGALOCARPA Elliot I. c. 13. - G. Don I. c. no. 10. - Foli, lanctolalis serratis pubescenlib.; pedunculis oppositis folio longiorib.; ftegtnenli* calycinis linearib. capsulam globosam aequantibus. ^ — Floras pallide lulei. Captula inter species maxima. — *Gr. atuminata* Prsb. Fl. Americ. septentr. I. 12. eid. <ynon.) — Crescit a Pennsylvania ad Carolinam.
12. GR. SPIAEROCARPA Elliot I. c. 14. - G. Don I. r. no. II. - *Glabra*: caule procumbente lereii; foli obovatis, basi allenualis »erratis; capsula globosa. 3- — Flores subsessilos. Filament* sterilia nulls. - Porte ad *NeUoniam* prtlineL - Crescit in Carolinae aolrali.
13. GR. HOOKKRI Wlprt. maa. — *Glabra*: caule tetragono, angulis obtute alalisi foli, laeaeolalif acute serratis, iaferne altenoatis subauriculalis; florib. »ub»essiUb* subspecialis. 2} — Perenolf. Caulis subsimplei pdalis t. ultra quadrangular** glaber. Folia opposita i'i-3-pollicaria lanceolata acuta, tupra medium profoode acuteque aerraia, iafra integesima angustata, basi ^ubaunculaia »r#»ilia, »upc* riora gradalim miaora, suprema e ba>i lanreolata «rrrau brarteaeformia. Flores panri racemum deotom pyramidalum rfDeiroic*. liahi |>rorunde 5-partitus, tcf- sioalis sabalalo-laaceolatik. Brarteae ad batin 2 »ubulalo-Unrco|aiae, c ff ^ Uoffitodine. Corolla coerulea («. purpura«ren», lubo ba«i inflaio pi|u»ulo, limbo bilabiate sriato, Ubiam »upenu« roiouodalum rmarginaiuro errrlum, inferius BJV^{MB}> '• laeiaias 3 cuaoaUs fltsam; orificio ft tubu inlut pilutit. Antherae 4 perfectae, sUmitibQt igilor alorUiboa aullU. OvaHum otali-oblonffoai, disco carnosio laloo iaamot Stylos tuboai corolNoum adaequans albus; »ligma ma pum compressaom (bilobam?). - *Grtiliol* Mrawona* Hook lot Magai. I. 3131 (o^{FC} EH.) - Species mellus forte ad *St*mo4i*m* refrroda - Io iooaria.

J. 3. *Species Australasicae.*

14. GR. SEXDENTATA R. Cunningb. Ann. of nat. hist. I. 450. — Gaule glabro procumbente ramoso; foil, ovaio-lanceolatis sessilib., extra medium paucidentalis pedunculum aequantib.; laciniis calycinis linearf-lanceolatis obtusis, capsula submarginata longioribus. % — Crescit in Nova Zeelandia.
15. GR. GLABRA R. Dr. Prodr., 0. Nov. Holland. 435. (edit Neei ab Esenb. 201.) - Glabra: Toll, ovalis obtusis obsolete crenatis integerrimisq.; florib. aessilibus. 2] — Corolla alba? — In New South Wales, ad Port Jackson et in intala Diementi.
10. GR. PUBESCEXS H. Dr. I. I. c. c. — Glanduloso-pubescent: foil. lanceolatis dentatis; florib. subsessilibus. 2]. — Crescit in New South Wales, In Novae Hollandiae ora australi et in insula Diemensis.
17. GR. PEDUNCULATA R. Ilr. I. I. c. c. — Pulvereo-pubescent: foil, lanceolatis, extra medium dentatis, pedunculo vix longioribus. ^ — Crescit in New South Wales, ad Port Jackson.

t *Species e genere expellendae.*

- GR. ALATA Rib. — BONNATA ALATA.
- GR. AMARA Rib. - CURANGA AMARA.
- GR. APUYLLA Rth. - DOPATRIUM NUDICAULB.
- GR. ASPERA Rth. « MORGANIA ASPERA.
- GR. CHAMAEDRYFOLIA Lam. — LIMNOPHILA MYRIOPHYLLOIDES.
- GR. CILIATA Colsm. — BONNAYA REPTANS.
- GR. CORDIFOLIA Koen. — BONNAYA CORDIFOLIA.
- GR. CLINKIFOLIA Rxb. — DOPATRIUM MJDIGAULE.
- GR. GOODEMFOLIA Hornem. - HORNEMANNIA BIGOLOR.
- GR. (IRANDIFLORA Willd. - BONNAYA BRACHIATA.
- GR. GKANDIFLORA Rctz. - CHIRITA GRAM) I FLORA.
- GR. HIMMILIA Commers. - BONNAYA HISPIDULA.
- GR. HYSSOPIOIDES Linn. - BONNAYA HYSSOPIOIDES.
- GR. INUNDATA Kit. - LIN DERM A PYXIDARU.
- GR. JUNCEA Rxb. - DOPATRIUM JLNCEUM.
- GR. LINEARIFOLIA Hrb. Madr. - BONNAYA TEN UI FOLIA
- GR. LOBELIOIDES Reti. — DOPATRIUM LOBBLIOIDES,
- GR. LUCIDA Vahl. - TORBNIA CRUSTACEA.
- GR. MARGINATA Colsm. — BONNAYA VBIONICABFOLL
- GR. MINIMA Rth. - BONNAYA MINIMA.
- GR. MONMERA L. - IERPESTES MONNIBRU.
- GR. OCYMIFOLIA Vahl. - BONNAYA OCYMIFOLU.
- GR. OPPOSITIFOLIA Rclz. - BONNAYA OPPOSITIFOLIA
- GR. OPPOSITIFOLIA Willd. - BONNAYA BRACHIATA.
- GR. PARVIFLORA Rxb. - BONNAYA PARVIFLORA.
- GR. PARVIFLORA Willd. lib. - IFRPKSTEH OROVATA.
- GR. PORTULACEA Weinm. - IERPESTES MOMMKIA.
- GR. PULGIFOLIA Vahl. - BONNAYA PULGIFOLIA.
- GR. PUNCTATA Colsm. - BONNAYA PUNCTATA.
- GR. PUSILLA Willd. - BONNAYA VAHLII.
- GR. ROXBURGHIANA Roem. et Scholt - BONNAYA VBRBENABFOLIA
- GR. RACEMOSA Rth. - BONNAYA VBRONICABFOLIA.
- GR. RAMOSA lib. Madr. - BONNAYA PARVIFLORA.
- GR. REPENS Smect. - MICRANTHUM ORBICUUTUM.
- GR. RPKNS Willd. lib. - IERPESTES OBOVATA.
- GR. REPTANS Rib. - BONNAYA REPTANS.
- GR. ROTUNDIFOLIA Linn. - MOH(IAMA ROTUNDIFOLIA,
- GR. RIELLOIDES KoniR. * (IRATIOI.) REPTANS.
- GR. RIGOSA Lour. - DOPATRIUM LURELIOIDES?
- GR. SERRATA Rth. * BONNAYA BRACHIAI K.

- GR. STRIGOSA Rib. - MORGANIA STRIGOSA.
 GR. TENUIFOLIA Colsm. = BONNAYA TENUIFOLIA.
 GR. TRIFIDA Willd. = LIMNOPHILA TRIFIDA?
 GR. VERBENAEFOLIA Colsm. — BONNAYA VERBENAEFOLIA.
 GR. VERONICAEFOLIA Colsm. = BONNAYA VERONICAEFOLIA.
 GR. VISCOSA Horaem. = VANDELLIA HIRSUTA.

3947. DOPATBIUM Hamilt.

(Hamilt. mss. ei Bth. Scrophul. Indie 30. — Meisn. Gener. pi. vascul. 1.310. II. 220.
 — *Gratiolae aphyllae* Dielr. Synops. pi. I. 40.)

1. D. NUDICAULE Bib. I. c. 31. — Uumilis ramosissima: foil, caulinis minimis acutissimis; capsulis oblongis. Q — *Gratiola nudicaulis* Willd. Act. Berolin. IV. 102. — *Gratiola aphylla* Rth. NOT. spec pi. 7. — *Gratiola cuneifolia* Rxb. Fl. Ind. ocell. I. 142. — Herba 2-3-polllearis. — Croseit In Peninsula Indiae orientalis.
2. D. (GRATIOLA Bell, Observat. IV. 7.) LOBELIOIDES Bth. I. c. - Caule elongato param ramoso; foil, caulinis minimis obtusis; capsulis globosis; corollis calyce quinuplo longioribus. Q — Habitus *Lobeliae Dortmannae*. Floret) Iongiuscule pedicellati ad apices caulium racemosi. — *Gratiola rugosa* Lour. Flor. Cochinch.?? — Crescii in Coromandelia.
3. D. JUNCEUM Hamilt. mss. ei Bib. I. c. — Caule elongato parum ramoso; foil, caulinis minimis obtusis; capsulis globosis; corollis calyce vix triplo longioribus. Q — Praecedenti simillimum, al flores multo minores, pedicelli multo breviores*, inferiores saepe brevissimi. — *Gratiola Juncea* Rxb. Pl. of the coast of Coromand. II. 16. t. 120. — Crescii in Coromandelia et in regno Birmannorum.

3048. BONNAYA Lnk. et Otto.

(Lnk. ei Ouo, leon. select pL hort. bot. BeroL II 2a. t 0. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 310. II 921. — Bib. SaropaaL ladle. & — G. Don, General sysu of gard. aid bow IV. 537.)

§. I. *Siliquosae* Bth. L e. — *Capsulis linearibus*.

• *Captulae erecto-patentes; flores racemosi.*

1. B. BRACHIATA Lnk. el Olio I. c. - Bib. I. c. - G. Don I. c. - Erecla ramosissima: foil, oblongis argutissime serratis; florib. racemosis; capsulis erecto-patentib., calyce duplo longioribus. Q — Corolla carnea. Capsulae semipollicares. — *Gratiola serrata* Rxb. Flor. Indie. I. 140. — *Gratiola oppositifolia* Willd. lib. 370. — *Gratiola grandiflora* Willd. Hb. 363. — *HuaUia anlipoda* Linn, (ex p.) — Rheede, Hort. Malab. IX. 150. — In peninsula Indiae orientalis, in Bengalia, in Lafonia crescii;
2. B. (GRATIOLA Rxb. Flor. ladle. L 140.) 1BPTANS Spr. Syst. fegeUb. I. 41. - Bib. I. c. — 6. Don U- Caule repente; foil, sobrolundo-oblongis in peiolom angustalis argute serratis; florib. racemosis; capsulis erecto-patentib. calyce duplo triplo e longioribus. O — Capsulis longiores quam praecedentis, saepius 8-10 lin. longae. Corolla magna pallide coerulescens. — *Gratiola rutuoides* König ex Colsm. Graliol. p. 12. — *Bonnaya ruiuoides* Spr. Sjut, veget I. 41. — *Gratiola (Bonnaya Spr. I. c.) eiliala* Colsm. I. c. 14? - *llenckelia Rojeburghiau** Lnk. Schwagr. fl Dielr. Spec. plant. 1. 57i — In Nepalia fit in insulis Moluccis-
3. B. (GRATIOLA Reli, Obsenrat. IV. 8? - Rib. Pl. of the coast of Coromand. II-30. L IM.) VERONICAEFOLIA Spr. I. C. - Rth. I. r. - il Don I. r. - Caule repente; foil, oblongis, inferioribus pedicellatis, superioribus serratis* ratiuulit: florib. racemosis; capsulis erecto-patentibus, calyce duplo triplo e longioribus. O ** Capsulae f-7 Ha. longae. - *Bonnaya rigida* Bib. in Wall. Caul. 3N0. - * *procumbens* Bib. la Wall. Caul. 3N0. - *Gratiola (Horn may a Spr. Syst. vegetal I* 4?) marginata* Colsm. Graliol IP - Caule repente; foil, oblongis carilaglio* marginalis argute serratis; raro in floralibus multifloro). - *Gratiola grandiflora** Reli, Obsenrat. IV. 8 (aor Rth.) - *Gratiola racemosa* Rth. Nov. plant. 1828

— *Bonnaya Rothii* Lnk. Schwaegr. el Dielr. Spec. pi. 1.556. — *Gentianella u/nuique fndiae impatient, foltis Aggerati, Snoppgratt Barbaddenbus* Pluk. Manl. 107. t. 180. fig 2. — *Crutta ollae major* Rrapb. Hb. Amboin. V. 160 t. 170. fig. 2 — *Peeltanga-pulpam* Rheede, Hort. Malabanc. IX. 115. t. 50. — Crescit in Illu— dustama, Nepalta, Silhci, in regno Birmannorum cl in China.

4. B. (GRATIOLA Colsm. Graliol. 0.) VERBENAEFOLIA Spr. I. c. 42. — Bib. I. c. — G. Don I. c. — Cdule erecto v. ascendenle; Toll, lanceolate inlegerniuis serratisve; flonb. racemo&is; capsulis credo- palcnlib. calyce duplo trtplove longioribus. O — Species *VandelUae angustifoltae* simillima ct saepe nonniM sluuinib. distinguilur. — *Tiltmannia Cohmanni* Blh in Wall. (a'al 3050. — *Torenia gracihl* Blh in Wall Calal. 3052. — *Grattola racemota* Rxb. II' Indie. 1 1J'). — *Gratiola a It at a* Commers. in Colsm. Graliol. 14? — *Bonnaya ciltata* Spr. I. c. 41? — (Caule credo ramoso; foil. lanceolato-oblongis» so trails, berraiuns aristalis; racemi!» pauciflons.) — *Gratiola [Bonnaya* Lnk. Schnaegr. el Dielr. Spec. plant. I. 550) *Roxburghiana* Roem. el Scult. Sjsl. vegclab. 1. 123. — Croat in Hindustama, Birmanma el in China.
5. B. PUSILLA Blh in Wall. Cat. 3801. — G. Don I. e. - Caule diffuso ramosissimo; foil, ovalo-oblongis sessilib. crassiuscnlli terralit; florib. ptrvif racemosis; capsulis subcreclis linearlb., calyces vii excedenllbus. Q — Creacll In Singapore.

•• *Captulae erecto-palntes; floret axittaret.*

0. B (GRATIOLA Rxb. Pl. of the coast of Coromand. II. 42. I. 170. — HENCKEII4 Lnk. Sch^aegr. el Dielr. Spec. plant I. 573) GRANDIPLORA Spr. I. c. 41. — Blh. I. c — G. Don I. c. — Caule diffuso subreplanlc; Toll, ovalis v. ovalo-lanrcolaiis sessilib serrjli!*, flotib. axillanb. opposilis; capsulis linearb. erecto-paicniib. caljee \ix duplo longionbus. Q — *VandelUae peduncular* % simillima. — *li»naya Hujhtu* Blh. in Wall. Calal. 3804. — Crescil in peninsula Indian onentalis.
7. B. PEDINCIMKIS Blh. in Wall (à In I 3865., el Scrophul. Indie. 34. - G Don I. C. — Caulih. elongatis lenuib.; foil remolis oblongo-lanceolatis tubinlegernmis; florib. axillanb. solitarns longe pedunculaiif; capsulis linearb. palentib , caljee vix duplo longionbus. O — An eadem ac *Gratiola pulegüfolta* Vahl, Enumer. I. 06.?) — Crescil ad SilheU

*** *Captulae rtfUxi.*

8. B. (GRATIOLA Rxb. Pl. of the coast of Coromand. II. 30. I. 155. - BBNCKELIA Lnk. Schwaegr. cl Dietr Spec. plant. I. 573.) OPPOMTIFOLIA Spr. I. c. — Blh. I. c. — G. Don I. c. — Erecta: foil, oblongis lanceolaiisTe lubserraift; pedunculis oppostlifolns, cipsuli* hncarib. rclflexis. O — Corolla parva cocrolea. Cap»ula linearis calycc duplo longior. Fi I amenta sterilia alba. — In Corotnandella.
0. B. GR4TIOI A foUm Graliol 8) TEMIHHJA Spr. I. c. 42. - Blh. I. c 34. — G. Don I. c 5)ri — Foil, linearb. subiiilegerrimis; podunculit oppo<*ilifolng; capsulis linearb reliexis. O — Cre^cii Coromandcia, ad Tavoy in regno Birmanmco el in China.

|. 2. *Brachycarpae* Blh. /. c. 34. — *Captuiis ovatis calyccm breviter superantibus patentibus. Herbae LiruUrniit similes.*

10. B. (GRATIOLA Linn. Manliss. pi. 174. - Rib. I. C II. 10. L 128.) HYSSOPIOIDES Blh. in Wall Calal. 3800. - G. Don I. c. — Caule elongalo laio; foil, oblongis lanrcolalisve romoli*; pedunculis axillarlb. elongatis filiformih , <orc.Hi> oeljco triplo (quadruplo>e longionbus O — Cautit 0liforimi< Iar\n rrrrtus pedali<, inlornodus folio plunes longionbus Folia opposita scbha o\alo-lanreolata lat'ua, infenonbus hmc inde scrralis. Pedunculi axillarcb altrrni umflon,

*) *B. (GH4TIOLA* ItiM. *Inumer I OS PUFGIIhOIH Spr I e 41 G th n I. e. nn M t aule filiformt, foli. oblongu tentitu enerutt. prduncui\| anilartout oppotilit ^ * — (mat in India unenlah*

folio muloties longiores. r.aljx minimus. Corolla foliis mullo major. r.resril in Hinduslania.

11. D. (GRATIOLA Rib I. c. III. 3. t. 903.) PAR VII LOR A Blh. in Wall. Calal. 38G7, el Scrophul. Indir. 34. — Ilumilis raraosa: foil, oblongis lanrcolaliste; florib. axillarib. subracmo»isve; coiollis calyce duplo longiorihus. ~.> — Crescil in Hinduslania el in regno Birmannico.

§. 3. *Sphaerocarpha* Bth. I. c. — *Cap suits tot undo tis cahjce brevioribus. Vandeliis sphaerocarpicis similes.*

12. B. (GRATIOLA Lino. Mantiss. pi. 174. - Rib. I. c. I. 304.) ROTIMIFOLIA Blh. Scrophul. Indie. 34. — G. Don I. c. — Diffusa: foil. sr*»j»ilib. late o\ahs subror-datis; pedunculis axillarib.; capsolts rotondalis calyce brevioribus. 0 — *Gratiola debilis* Hejne mss. in Wall. Calal. 3040. B.? — In peninsula Indiae orientalist.

13. B. BRACHYCARPA Cham, el Sdilchld. Linnaea II. 508. 1 - Blh. el G. Don I. I. c. c. — Caulc dccumbcule; foil, oblongis oblusiusculis, ulnn«*ecus siihiridciiiii-culatis, basi angtilslatis; pedunculis folio brctionb.; capsula <il\ccm subaequaiiic. C — Tola glabra, ramorum pedunrulorumque apires cum caljceibus letiler puberuli. Caulis dodrantalis telraqueler, demum prostralus. Folia opposii.i, ha*i anguslala, angusto margine quasi connata, ulrinque sublndenlirulaia, F> lin. longa, 4-5 lin. lala, pallide viridia. El allera axilla pedunculus nudus uniflorus 3 circiler lin. longus, ex allera r.imus abbreviatus, florib. plunb. bn'Miin pedunrul.m» inslniclus. Cal)x fere ad b>ib>jn quinqueparlilu» laiusrolus, l.irmns Imearib. aculis. Corollae tubulosae labium luperius creclum breviter otalum, leviter bilobum, inferius expaosum inparlilun, lacioiis subaequalib. obtusis. Stamina S sterilia labio Inferior! adjacent, ad faocis orlfleium penreniunt. Capsula cjlin—dracea acuminata acuta, ealjce paullulom brerior. Semina numerosa cjlinndra minula. — Crescit in India oriental!

14. B. (GRATIOLA Rlh. Nov. plant, spec. 8. MINIMA {.. Don I. c. no. 15. - Caulc filifonni ereclo simplici; foil, oblongin seasihb. remotis scrrolotin rum segmenlis calycinis ciliaris; capsulis oblongis, pedicello longionbu». ^ - (rosclil in India orientali.

t *Speci§s vis notae vet dubiae.*

15. B. (f.RATIOI \ CoUm. r\ Vohl, Knumer. I. 00. PI M'TtTA (i. Don I. c. no. 1& — Foil. lanrn>li(?)<> serrate enrniil, infra punrl.iii*; flonb. <r««ihbu«. - Cau- li« ereclu«v ba%ai repen« «imphcis«imu<. Folia te«%iha ^rmipollirana. Flore« 30- liiani npositi. Cap»ala rotundala parum conpre«4a, caljcn longi(udm<*. - I⁰ Java cre^cil.
10. B. VAHMI G. Don I. r. no. 17. — Caule umplicisOroo; foil main rrrnali* acuti%; prilunculi« atill.inb. uniflori*, folio longHmhuv O <mlk«> unciali* %im,, plicisstmus \ ranus decumbent v. ooo allero^e r.imo in%(ructu% i«Mr«K''»»» Piflo rarm obtiut. Folia ovala arula sub«e«silia raritr rrmata, niflrgiur »cabrt* IMaota vix ultra 3 folmrum pana profert. Pedunruli pñ%ai fo|n« loiiigiorrs I° axilln suprrriorun foliortin oppo»iii. Cal>x pilo«u« Cjp«ula »ubrotunda. ** (irotiola pusilla Willd. Spec, plant. I. 105. L, In India orirnuh ad tralungin^'
17. B. (GRATIOLA Conner*, ex \ahl(Enumer. I M IIM'IDI I A G D»n I• * Bo. IH • Foil. o%ahb. »et>ilib. rreoalit raulibq. |nlo«i». prdunruli* a»illanb. *P^ poffitU. c^ - r.auli« filiform**, apice bifidu*. Folia unpuirulana arula. infrj *J nenia. Pedooculi glabri folio loogiorè*. Segnenta ral)nna Imeari-lanceol. Capsola gtoba*a fructuua Corimmdri \$ahr% nagmiudine. - In India orirntall*
- I*. B. (iRATIOU Vabl I. r 90 fH:\MIFOLIA G. Don I. e. no. 10. - Poll, oblon- gi« integemnl, inferiorib. prtialalu; florib. raceno»i». - Caulis e bas! ra- no»u*. Folia inferior a pciolata, toperiora sesailia renota. Capsula globosa* "" Crescil In India oHenlali.

tt *Species e genere excludendae.*

- B. BIFOLIA 6pr. - CIIRITA BIFOLIA.
 B. GRASDIFLORA Spr. = CIIRITA GRANDIFLORA.
 B. PUMILA Spr. = CIIRITA PUMILA.

3049. MICBOCABPAEA B. Br.

- (R. Br. Prodr. fl. Nov. Holland. 435. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 300. II. 220.)
 1. M. MCSCOSA R. lir. I. c. (edit. N. ab Escnb. 202.) — Herba pusilla muscosa glabra oppositifolia; flores axillares bracteali minuti. O? — *Paederola minima* Kocmg in ReU, Observat. V. 10. - Crescit in Nova Hollandia.

t *Species e genere expellendae.*

- M. COCHLEARIFOLIA Sm. - PKPLIDIUM HIMIFISUM.
 M. MONTKVIDENSIS Spr. — SCOPARIA FLAVA.
 M. SPATILLATA - GLOSSOSTIGMA SPATHILATIM.

3050. PEPMDI1H Delile.

- (Delile, Flore de l'Aegypte 148. t. 4. Og. 2. - Bib. Scrophular. Ind. 32. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 300. II. 290.)
 1. P. MIFISUM Delile I. c. - Bib. I. c. — Herba repens glabra habitu *Ptolidis*. Folia opposita obovata integerrima. Floret axillares oppositi totlarit brevissimo pedicellati. Q — *Microcarpaea* [*Paederola* Koenig et Rolte ID Wall. Caul. 3020.) *cochlearifolia* Sm. in Rees's Cyclop, et Hook. Bot. Missoellan. III. Off. Suppl. t. 20. — *Hedyotis* (*Oldenlandia* Rib. Nov. pi. spec. 07.) *maritima* Lion. Supplem. 110. - Oescil in Africa et Asia calidiore littorali.

3051. MICRAVTHIEMIUM L. C. Rich.

- (L. C. Rich, in Michx Flor. bor. Americ. I. 10. t. 2. — Meisn. Genr. plant. vascul. I. 300. II. 220. - St. Hil. et Girard, Aon. sc. natur. XI. 107.)
 1. M. ORBICIFOLIUM Michx. I. c. - Spr. Syst. veg. I. 70. - St. Hil. et Girard I. c. t — Folia ovata acutiusculis; floribus breviter pedunculatis; filamentis basi binae et inde appendicillales. Q — *Anomymoi* (*Globifera* Pert. Kocbind. 1.20.) *umbroia* Walt Fl. Carol. 03. - *Pinarda* [*Gratioi** Sweet nst.) *repens* Vellozo, Flor. Flumin. I. i. 52. - Crescit in Brasilia et in America boreali.
 2. M. EMARGINATUM Elliot, Fl. Carol. Georf. 18. — Spr. I. c. 77. - St. Hil. et Girard I. c. 108. t — Folia orbiculata emarginata; floribus sessilibus; filamentis inferioribus filiosis, superioribus densius lacinatis. O — Crescit in Brasilia et in Carolina australi.

3052. VIXNIXLIA Linn.

- (Linn. Manl. pi. 80. - Meisn. Gener. pi. vascul. I. 311. II. 222. — Bth. Scrophul. Ind. 35. - G. Don, General Syst. of Gard. and Bot. IV. 547.)

- S. I. *Brachycarpae lilh. I. c.* — *Capsula subglobosa v. ovato-oblonga, calyce brevior r. tix longior.*

* *Calyx a* t\$ ankeii* quimqutdeUUu, eapsula calyce brevior.*

- I. V. OBLONGA Bib. I. c. - Glabra suberecta: folia, oblonga lanceolata, basi angustata integerrimis cratiusculis; pedunculis paucis elongatis subracemosis; calycibus tubulosis mibaequaliter quinquefidis v. semiquinquefidis; capsula globosis calyce brevioribus. O - Crescit in China prop? Macao.
 3. V. 'TORKMA Bid. in Wall. Calal. 3000.) MOLLIGIMIDES Bth. Scrophul. Ind. 35. — Glabra: folia, subsessilibus ovato-oblongis basi cuneatis, margine serratis; pedunculis sessilibus ovato-oblongis basi cuneatis, margine serratis; calycibus sessilibus quinquefidibus longioribus; capsulae binae antheris apice quinquefidibus, (leminibus irregularibus OIMS; rapulibus ovato-oblongis sessilibus brevioribus. Calyces rigidi 2 lineas longi. Corollae patulae longiores. In regno Birmanico crescit

- 3 V (TOREMA Harailt. in Wall. Catal. 3901) ALBA Dili. I. c. — Diffusa subglabra-
Toll breviter peiolaiis ovalis, basi rotundalis cuneatiste, pedunculis lenuib. fasciculatis, calyce sesqui-luplo longiorib; calycib lenuib, apice subququeden-
tads, demum vix fissis, capsulae oblongis calyce brevioribus. O — Crescit ad
ftathpur in India orientali.
- 4 V. (CAPRAIA I in Mantiss. pi. 87 — TOREMA Cham, el Schlehtd. Linnæa
I! 570.) CHLSTACEA Bib. I. c. — Diffusa glabra foil ovatis, pedunculis axilla-
nb. subracemosiste calyce duplo quinluplove longiorib.; calycib ante anthesin
quinquedenlalis, demum quinquepartitis capsulas ovalas superantibus. O — Ca-
lyces 2-2¹/₂ lin. longi. Corolla obscure coerulea. — *Graxola* {*Morganta* Spr.
Syst. veget. II 80-2. — *Torenia* Hamilt. in Wall. Catal. 3002.) *lucida* Rxb. Pl. of
the coast of Corom. HI 3. t. 202. — *Bornemannia* [Tillmannxa Rchb. Flor. exotic.
1.27] *ovata* Lnk. el Olio, Icon, select, pi. hort. Berolin. I 0. t. 3. — *Antirrhinum*
hexandrum Font Prodr. 43. (Willd. Hb. 11265.) — *Morgania* {*Grattola* Rth. Nov
pi. sp. 11.) *aptera* Spr. Syst. veget. II 803. — *Crusta ollae minor* Caranact Rmph.
Herb Ambom. V. 460. 461. t. 170. fig. 3. — *hatu-pee-tjanga-puspam* liheede,
llori. Malab IX. 113. t. 58. — Crescit in omni fere India orientali, in China ad
urbem Macao el in Luçoma.

•• *Calyx ante anthesin quinquepartitus, capsula calyce brevior.*

- 5 V. (TITTMANSIA Bib. in Wall. Catal. 3047.) ERECTA Bib. Scrophul Indie 36 -
Suberecta glabra * foil, subsessilib. ovatis oblongisve, basi angustalis, pedunculis
axillanb. racerosisve calyce duplo quintuplove longiorib., calycib ante anthesin
quinquepartitis v. profunde quinquefidis, lariois laeolatis membranaccis cap-
sulas oatas superantibus. O — *Tillmannia trichotoma* Bib in Wall Catal. 3047
(ubi cum *Bonnaya parviflora* miicilnr). — Valde affinis *F. limosae*, sed satis
distincta videtur. — Creicit in peninsulae Indiae orientalis, in Nepalia, in regno
Birmanico.
- 6 V (TITTMANMA Bth. in Wall. Catal. 3044.) ELATA Bib. Scrophul. Indie. 36. -
Glabra v. parce pilosa: foil, peliolatis ovalis, basi subcordatis, pedicellis racemosis,
calyce demum vix duplo longiorib.; calycib. ante anthesin quinquepartitis,
lacinis lanceolato-subulatis capsulas oatas superantibus O — Crescit in regno
Birmanico ad Taoy.
- 7 \ IIIKIT4 Himilt ross ex Bib. I. c. — Inluta foil, ovalis, inferionb. pelio-
latiH, basi angustatis, superionb. subsessilib, basi cordatis, pedicellis racemosis
raro demum duplo quadruplove longiorib , calycib. ante anthesin bipartite,
hinc lanreiiLito-subulatis capsulas subglobosas superantibus* O — Corolla
runculca - *Tillmanma ocala* Bib. in Wall. Catal. 3042. (non Rchb) - (*iratiola*
(*Unnemannia* Willd Enum. pi. hort. Berol. 654. — *TiUmannta* Rchb. Fl exotic
I 20 i .Vj *titcota* Hornetn. Hort. Hafn. 10. — Crescit in India orientali (ID
Peninsula, ad Goalpara, Silhet el in regno Avano).
- " > SCVBRI Rth Scrophul. Indie. 30. — Diffusa birsula v. subglabra foil sub-
sessilib late ovali, basi subcordatis rotundatisve, pedunculis axillaril) racemosis
calyce duplo quintuplove longiorib , calycib ante anthesin quinquepartitis,
lacinis lanceolatis*, capsulam subglobosam superantibus O — Inhitus I *crusta-*
rear, planla lota, praefertim autem calycis, mgrescit, similis etiam *Ilonnya'*
rutundifolia, sed jam inflorescentia in staminibus diversa - Tota planta pilis
simplicibus longis non articulate albis birsuta, nodi et calycos praecipue birsuti,
nargines foliorum el calycis asperi obscurantur Caules acute tetragoni, ad ar-
ticulationes nepe radicanlet. Folia opposita, superiora sparsa, inferiora
peliolum breviter alternata ovala obtusiuscula, obsolete crumata subintegerrima
in longa, 4 lin Ula Pelioluli axillares oppositi, raro plures ex eadem axilla
fuhorum circiter longitudine 3-4 lin longa, nulloquam elongati Calyx jam solus
inthesi basin usque quinquepartitus*, Ucinus Unceus acqualiter aculis
lobulosa nungens, labio tuperminus obtuso interrimo, inferius lobis

- tnlobo, lob is, subaequalibus rotundatis integerrimis. Stamina 4 didynama, anteno ra majora Capsula membranacea calycem subaequant ellipsoidea non compressa, axi diametrum transversum vix tertiam partem excedente. Semina numerosa minutissima scrobiculata grisea — *Torenia hirta* Cham et Schlegel Linnæa II 571 f — *Tittmannia pustulata* Blh in Wall Catal. 3945. (excl. lilt. C.) — *Tittmannia tulcata* Bib. in Wall Catal 3046 A — In India non in tali loco in Luc. non in a
10. V LAXA Blh Scrophul Indie 30 — Diffusa hirsuta- foie sessilib, basi rotundata subcordatisve, pedicellis axillaribus racemosisve calyce duplo quintuplove longioribus, calycibus ante anthesin quinquepartitis, lacinus subulalis hirsutissimam capsulam globosam superantibus O — *Tittmannia putilla* Blh in Wall Catal 3W5 C — An praecedentibus vanelas⁹ sed habitu calycibusque differt. — Crescit in peninsula India orientalis.
10. V. MOLLIS Blh Scrophul. Indie 37 — Hirsuta* foie sessilib oblongo-ovatis • otalo-lanceolatis molliter villosis; pedicellis axillaribus racemosisve, calyce duplo v quadruplo longioribus, calycibus ante anthesin quinquepartitis, lacinus subulalis hirsutissimis capsulam oblongam superantibus. O —* Calycet demum 4 lin longi, in aim plensque hujus scilicet vix 2 ho. longis. — *Tittmannia furla* Blh in Wall Catal. 3048 — Crescit ad Silet in India orientali.
- * * * Calyces quinquepartiti vel quinquefidu Capsula ovalis calves parum longior.
- 11 V (TOREMA Blh in Wall. Catal. 3050.) SBSSILIFLORA Bib. Scrophul. Indie 37 — Foie sessilib. rotundatis, basi subcordatis; floribus sessilib. fasciculatis, calycibus quinquepartitis, demum subfissis, capsulis oblongis calyces subsuperantibus O — Crescit in regno Birmanico ad montem Taong Dong
12. V MINIMA Royle mss. in Blh I. c. — Pusilla simplex erecta subglabra foie sessilib rotundatis, basi subcordatis, floribus sessilib fasciculate, calycibus semiquinquefidis capsulis ovalis calyces superantibus Q — Crescit in Mussoorec
- 13 V M UMLLARUEFOLIA D Don, Prodr fl Nepal 86' - Bth I c - Erecta ramosa foie sessilib. rotundatis, pedunculis axillaribus subfasciculatis unifloris ramosisve, capsulis ovalis oblongis, calyce subduplo longioribus Q — Crescit in Nepalia
14. V. LIMOSA Walp. Nov act acad. caesar. Leopold. Carol, natur. curios XIX 6upplem. I. 304. — Caule procumbente bicolorato radicante; foie, petiolo ovato-deltoides serratis; floribus pedunculatis racemosis-umbellatis; capsulis calyce vix longioribus. O - Crescit in China locis humilis prope Lin-ting.
- %. 2. *Sthouosae Bth. I. e. 37. Capsulae oblongo-lineares calyce longiores.*
15. V. DIFFUSA Linn Maniss. plant. 00. — Bib. I. c. — Transact. of the medicobot. Societate I 10 I I I — Diffusa pubescent- foie late otalis tuberculatis; floribus axillaribus sessilib, calycibus subquinquefidis, capsula oblonga dimidio brevioribus O — *Gratiola longifolia* Ait, Enumcr. 1 00* — *Bonnaya orthanifolia* Spreng 6yst veget I 42 — In Brasilia prope Balsam in India orientali.
- 16 V PEDICELLATA Bth. I c — Glabruscula laxa procumbens: foie ovatis, pedicellis axillaribus solitariis elongatis, calycibus quinquepartitis, capsula oblongo-lineari subdimidio brevioribus Q — *Tittmannia grandiflora* Spr. — Crescit in peninsula Indiae orientalis et in Zeylania.
17. V (TITTMANNIA Blh in Wall. Catal 3051.) ANGUSTIFOLIA Blh. Scrophular Indie 37 — folia laxa diffusa: foie, oblongo-linearibus; pedicellis axillaribus florigeris, calycibus quinquepartitis, capsula oblongo-lineari dimidio brevioribus. Q — trefoil in Nepalia
- f *Spectet non satis notae.*
- 18 V ((RATIO\ nth Nov spec 10) CHAMAEDRYIS G. Don, General syst of gard and hot h\ VI 0 — (a) dichotomo pilosiusculo, foie otalis obtusis in petiolo nunc utrimque trinervis, (b) obtusis serratis crinalis, calycibus obtusis pentagonis quinquefidis, capsulis rotundatis acuminatis* Q — Flores ad ramorum apices axillares densos (ilicet) acuminatis obtusi Forte *Sicmodni* *specie* (in India orientali)

- 19 V. (GRATIOLA Koenig mss. in Vahl, Eoumcr. I 07. - BONNAYA Spr. Syst. vegel. I. 42.) CORDIFOLIA G. Don I. c. no. 18. — Foil, subcordato-ovatis peliolatis» crenalis; pedunculis axillanb.; caulib. prostratis. O⁹ — Cuiles simplicissimi sesquipedales. Folia supenora sessilia semipedalia, infenora minora remota. Pcduncuh folio dimidio longiores. Segmenta calycina lineana. Corolla alba, fauce llatescente. Capsula sabulata, calyce dimidio longior. — Crescil locis humidis graminosis in India onentali.
- 20 V (UORG4MA Spr. SysU veget. II. 803. - GRATIOLA Rlh >ov. pi spec. 12.) STRIGOSA G. Don I. c. no. 19. — Caulib. dicbotomis ramisq alternis divancalis singosis; foil, opposilis oratis acaliascolis in petiolum attenuate serrulaUs glabns; racemis lermianhb. subnudis (axis; capsulis ovatis acuminli* caljcem parum supcranlibus. O — Floret parti. Pedicelli fill formes ad basin bractea minuta ovata oblusa instruct!. Calyx glaber, fere basin asqoe quinquepartitus, segmenlis linean-lanreolatis aetis inaequalibus, saperiori longiori et angusiori. — Crescil in India onentali.
- 21 >. ROXBURGIII G. Don I. c. no 20 — Annuu difflusa foil sessihb cordatis serralis, florib. sohtarns longc peduncilalis, cahcib quinquepartili*, filamenhs supenorib processo stenh auclis. O — landelha [Torenta Rxb. Flor. Indir III 95 dtffuta Willd. Spec plant III. 34J. (nee Linn.⁹) — In ora Coromandhana.
- 22 \ TOREMA Rxb. Flor. Indie. III. 96.) VARIANS G. Don I. c. no 21 - Annuu crecla (elragona glabra: foil, opposilis petiolalis cordalo-ovolis serrate, flonb axillanb solitanis; calycib. quinquedeniatis; corolla nngenie, fil.imenii<> longiorib processu sterili aactis. O — Cresclt in Coromandelia el in Benghalia
- 23 V (TOREMA Rxb. I. c.) MLLTIFLORA G. Don I. c. no 22. - Annuu crecla tc-iragona glabra: foil, opposilis obloogis soberraiis; florib. lenninalib.; calycib quinquepartitis; corolla bllabiaia; filamentis loperiorib. proceMU sterili aacUs, capsula ovata. Q — Cresclt io Benghalla.
- 24 V (TUTMtNNIA Bnge. Mèn. des MT. `etraog. de St Ptrebrg II 121.) (>BO> VT\ Wlprs. mss — Caule diffuso ramoso; foil, obovatis grosse denlniis suhsessihb glanduloso-pubescentib.; racemis termmalib. elongalis, pediccllis frurtifritf •rectn <mcli4 O* — Crescil in China boreali.
- 25 V f riTTMANMA Turczan. Bullet des natur de Moscou \l 1M ^ ST4CII\DI-FOII\ ^tlprs. mss. — Caule ereclo dense piloso, foil srmmmpleiicaulib lan-cooljtn denticulatis, subtus hirtis, mrenorib opposilis, prdunculis fructifcris errecti», dentib. cal)cim& lubo longionbus J — Crescil In China boreali

3953. TOBE\I% Luin.

- Linn Gener plant. 574. - Meisn. Gener plant, vasrol I 311 II. 222. — Biñ Scrophular lodic. 38. — ll. Don, General syst. of gard. and bni || 550.)
- I T RACEMOSA Bib. In Wall. Caul. 3*7 B. C el Scrophul Indir JH. - Ilimuia full o\atis aculis ni|osis; florib. opposilis raremosis. rorollis ralycc plut dimidio longioribu* ^ — Calyx fructifer 7-6 ho. longus Corolla coerulea (rcni io feilhrl, Prnanit
- i T FLA\A IUmili mss tn Wall Caul 3957 A. - Rth I c SuMiirovia foil, ovato-oblongis oblutis, florib opposiis racrmosu roroliis rahrrm M| ~~esse-
dentibus~~ "4 — Cornllar flavar* Cal)i frurlifrr 0-7 liu lon^us \d t,ualpara
- J T \M\TK \ LIDQ sprc plant W2 Blh I c l-n||-o.iii« « ovato-lan-
ceolali*. prduoculit atilUnb subfjifriculatis, rorolln r.ihrr oM.»uco, ba»i ~~ate-
Doalo lubduplo |nngioribu« *4 — *»prmo% hirsutir, fuliorum furma rt forull<^
magnitadine talde variabilit forlcque plurrs in unam lunr ronfu«ai* »unl. •*†
•pecimiBibos siceis ooo dUlingurodar I JIM frurufrr •*!() I n I •!><<• ^#f#T
»íá difv p. Don, Prodr II Nepal M. nrr R\b T eordtfolta Blh in Wall-
Calal 3QM. (Q_{oa} fctb • - T prtwmcuimrii Blh in Hall (jial IBO T ~~alba
llamilt mu in Wall t.aial TQ6I - T k>amt R\b M |n<lir III W T ~~ragans
Hib I < r kirtula ^ilM Hprrr plant III JBu f,#rt/i./i Hamnaya ^{5V}
••• %m-l I 41 Henekelm I nk Hrh ir.-r .ilHifr ^cr |>lam I ?! •.&*~~~~~~

- Rxb. Fl. Indie, (ed. Wall.) I. 137? — Lam. Illustr. gener. I. 21. fig. I. - *Luphratae affinis pustilla planta* Pluken. Amalth. 85. t. 37. fig. 2. — *haka-pu* Rheede, Hort. Malab. IX. 103. t. 53. — In omnibus Indiae orientalibus, in China
4. T. EDEMTLA GnfOlhs Madras Journal of litter, and science 1830. no. 1. ex Schlicht. Linnaea XII. Lilleraiurb. 200. — *Erecliuscula molliter hirsuta* T. pedunculata cordata-ovatis rugulosis; floribus pseudo-axillaribus fasciculatis racemosis. filamentis longioribus basi ciliatis. — Corolla calyce vix duplo longior, saepius coerulco pallide tincla, lobis lateralibus labio inferius parlim saturate azurcis, medio macula lutca notata. — Crescit circa Suddiya in regno Assamico.
5. T. (OKDirOLK II. Pl. of the coast of Formosa. II. 52. t. 101. - *Dih Scrophul.* Indie J9. — Hook. Bot. Magar. t. 3715. — Foil, ovatis, pedunculo axillaribus subfasciculatis, corollae calyce ovato, basi rotundatae «ubduplo longioribus» - *Caulis 4-8-pollicaris!» erectus acute quadrangularis v. quadrilateralis v. quadratus v. quadratus v. quadratus, ad triangulos persistentibus ciliatis. Rami oppositi decussati palmati*. Folia ovata, simpliciter inciso-serrata, supra pallide viridia parce pilosa, infra pallidiora glabra. Petioli canaliculati ciliati, folio ipso breviores. Pedunculi plurimum petiolorum longitudine. demum elongati folio longiore quadrangulares ciliati. Flores in apice ramorum subumbellati axillares, e foliis aggregate multo lucrum quasi confectum est. Calyx bilabiatus, labio superiori tridentato, inferiori profunde bifido v. ovato subulato, ala superiori in pedunculum demum producta. Corolla palide lilacina calyce longiora parte longior, tubo clavato, infra curvato glabro, limbo bilabiato patente, labio superiori crenato submarginato, inferiori tripartito, lobis rotundatis. Stamina didynama, labio superiori breviora. Capsula a calyce tecla. — *Corosinam* Rheede, Hort. Malab. IX. t. 08. — Crescit in India orientali in montibus Circarensibus.*
6. T. P4RIFLOI (Lamilt. in Wall. Catal. 3058. - Bth. I. c. - Foil ovatis, pedunculata axillaribus «ultra» ciliatis; corollae calicem linearem basi aequantium vix excedentibus. — Herba lenis, petiolis connatis oppositifoliae hypophyllae, vix umquam pedalis, repens, ad nodos radicans. Caulis teretis, multinodis, nodis glaber ramosus, irregulariter bifurcus, omnis axilla gemmam fert, nunc et ovilur utraque gemma axillaris pariter v. dispersa tunc ipsa gemma apicalis abortiente Y. ovilula, nunc altera tantum, nunc abortitur utraque caule longe elongato lolernodia bipollicaria. Folia internodiis breviora ovata v. ovato-lanceolata acutiuscula depressio-serrata, supra plana, nervis venisque tribus tenuibus tubus prominentibus. Follorum lamina tripollicaris, 3 lin. lata, petiolo bilineari. Folia superiora minora lanceolata. Pedunculi I-A axillares pseudo-umbellati, ramo ex eadem axilla subveniente pseudo-axillares. Petiole cum calyce 5 circiter lin. longus, ramus fructifer paulo auctus ejusdem fere longitudinis, subseptemnervius, irregulariter 4-7-dentatus. Corollae lobis subaequalibus. — *T. pedunrata* Willd. Herb. in n. - *7. rromcarfo* Ua Willd. Herb. 11540. — *Koriema Mada* Ootcanentit el. *3launtana* Pet. Th. (Gener. Mfd. 0. no. 17. ex Knrjrl. hot. XII. 10H. — *Aof/rni* M. *Ihouarm* Cham, el. Schlicht. Linnaea III. 18. t. — Crescit in India orientali ad tialpora, in regno Dirmanico, in Brasilia (prope Baliyam et ad Rio de Janeiro) inque insulis Maunlio et Madagascar.
7. T. JIKRPKSTKS Bth. in Wall. Catal. 3807.) POLYGONOIDE8 Bth. Scrophular. Indie. JO. — Procumbens* foil, subrotundis; pedunculi axillaribus umbellatis 3-4-floris; calycibus campanulatis late triangularibus; corollae tubo breviter exserto. — Crescit in India orientali ad Singapore.
8. T. OBTI SA Blume, Bijdragen 754. — Caule repente; foil, subsessilibus ovatis obtusiusculis obsolete* repando-serratis glabris; pedunculis axillaribus terminalibus ovatis umbricatis, corollae labio superiori obliquo, capsula calicem excedente. — Crescit in Java orientali.
9. T. >IIM TA Illume I. c. 7M. - (caule repente, foil breviter petiolatis) ovatis \ selaceo-lanceolatis subciliatis, pedunculis axillaribus \ terminalibus uniserialibus, corollae labio superiori emarginato, capsula calicem aequante. — Crescit in Java ad Builenzorg

10. T. (TITTMANM4 >pr. byst. vegeU II. 800.) SCABRA R. Br. Pro dr. 0. Nov. Hoi I. 440 (edit. Nees ab Esenb. 290.) — Foil, lanceolalo-ovatis scrratis scabris; caule ercclo puberulo; c;il)cc quinquedcnlato aequali. ^ — An eadem ac *T. scabra* Graham in Hook. Bol. Magaz. t 3104? — Cretcil in Nova Hollandia.
11. T. FLACCID 4 R. Br. I. I. c. c. — Foil, late ovatis obtiuis crenalis cauleq. gla-bns; pedunculis flore iripio quadruplove loogionbus. 2I.? — In No\|a Hollandia.

f *Species e genere expellen lae.*

- T. ALBA Hamilt. » VANDELLIA ALBA.
 T. CRUSTACEA Cham el Schlcblid. = VANDELLIA CRUSTACEA
 T. DIFFLSA Rxb. — VANDELLIA ROXBURGHII.
 T. HUBRIATA Grab. - ARTANEMA FIMBRIA IUM.
 T. GRACILIS Bib. — BONNAYA VBRBBNAEFOLIA.
 T. HIRTA Cham, el Schlichtd. — VANDELLIA SCABRA.
 T. MOLLUGINOIDES Bth. - VANDELLIA MOLLUGINOIDES
 T. MULTIFLORA Rxb. — VANDELLU MULTIFLORA.
 T. SCADR4 Grab. = ARTANEM4 FIMBRIATUM.
 T. SESSILIFLORA Bth. = VANDELLU SESSILIFLORA.
 T. VARIANS Rxb. — VANDELLIA VARIANS.

3954. ABTANEMA D. Don.

- (D. Don in Sweet's Brit. flow. gard. III. t 834. — Meisn. Gencr. plantar I. 311. II. 222. — G. Don, General Syst. or gard. and bol IV. 540. — Bib. Scrophular. Indie. 30. — Endlich. Gener plantar, p. 684. no. 3054. — *Ackimenes* Vahl, Symbol, bot. II. 71. [Don P. Br. - DC. Prodr. VII. 535. — Repertor. bol. syst. II. 710. el 003.]
1. A. FIMBRIATUM D. Don mss. in Sweet's Brit flow gard. III. t. S34. — G. Donfl. c. 55a no. 1. — Foil, lanceolalia acutls lerratl; corolla magna tubuloso-infundibuliforml; segmentlt calyciois lanceolatls mucronulatls; bractcisotaiis. 2j> j* — Cauhs erectus, basl pubescolia brevissima reflexa rigidj obelus, »uperne glabemmus, in lateribus oppositis sulcalus, a nodo ad nodum alternatlo; folia lanceolato-ovalia acute serrala, basi apiceque integra subciliata tenosa, ad venas deorsum scabra, apice glabriuscula. Cymae terminals paucidorac pedunculi erecti ebracteati ngidi. Calyx glaber regularis quincufidiis prrsiolens, segmenlis acuti» mucronulahs, Infra irabncalis, supra patentibus. Corolla pollicans violaceo-purpurea, lilacma v. alba slnata glanduloso-pube^rens rmgens, limbo dilatalo patenlc cronalo, labio supenore bi-, in fen ore inlobo, lobo inlermedio maximo emarginalo, tubo campanulato, infra inflato, supra applanato. Stamina didynamia, fillamenta dniania, prope basin pilosa, cum tubo fere ad fjuccro conuata, tune subito inclmata, longiore ad inclioatioms poncium processu carnosocapituliformi notaia, antheris acombentlbut. Captula ovata lumida, styli persittenlis basl murronaU. — *Torenia? fimbriata* Grab. Edlnbrgb. Philos. Journ. XII. 370. — *Torenia scabra* Grab, in Hook. Bot. Magaz t. 3101. (nee R. Br⁴) — Crearit IO IS ova Hollandia.
2. A. ANGI'STIFOLIUM Bth. Scrophui. Indie. 30. - G. Don 1. c. no. 2. - Foil, angusle lanceolatis; corollis» subinfundibuliformib. caljcc iripio longionbus. 0? — *Dlceroi anguthfoliut* Bib. in Wall. Catal. 3HHI - In Indu onentali ad Singapore.
- a A. (ACIIMKNES Vahl, Symbol, bot. II. 71,) SESAMOIDEM Bth. Srrophul. Imlic. 30. — Foil, oblongis v. ovato-lanceolalis; corollis »ubcampanulati», cahre duplo longionbus. Q? — *Columnea lomgifoita* Linn. Mantiss. plant. 00 - *threros longifolius* Pen. Encbind. II. KM - Blh. In ^ all. Catal. J8KL - *Snamum Jatani* cum Burn. Indie. IJJ. - *Bahel TspilU* Rhecede, llorl. Malnbanc IX. 100. t 87. - Caulis herbaeus. Folia opposita sessilia lanceolata longissimasubscrrata, utrinque laevia. Raceni termioales clongati reclli, flonbu» opposing. CaljX pentaph)llos ovatui erectus persiatena. Corollae labium supenus magnum, infenori Vnfido. Capsula suboboTtta. - Cr<#cit io lodia oriental..

3155. **IIETEBA** \TIIII ISees et Mart.

(Nees et Marl. Nov. act. acad. Caesor. Leopold. Carol. natur. curios.. XI. 42 t. J. - McUn. Gener. plant, \ascul. I. 309. II. 220)

1. II. DECIPIENS Nees et Mart. I. c. — G. Don, General nyst. or gird and hot. IV. 551. — Herba repens: ramis ascendentibus teretibus, pilis breMbus leclis; Toll, allernis suborbiculanb. oblusis subapiculatis inlegerrimis in pctiolum atlcnualis pilobiusculis; tlonb. racemosis; racemis exlrafoliaceis nudis subsecundis simpli-cibus ex internodns superioribus oriundis; calycibus coeruleis; corollis albis; capsulis ovatis suboompressis acuis glabris albis. 2]. — *Yrulitkia polygaloides* Spr. Sjst \egel. 111. 105. IV. 222. — Cre*»cil in Brasilia.

3150. **IIYDRWTIIEL** Lim Kth.

(Klb. in II. D. Klh. No\ gen. el spec, plant. VII 2QJ. t. 040. — Mei&n. Gener. plant. \a*cul. I. 300. II. 220.)

1. II. CALIITRIGIIOIDES Ktb. I. c. 203. t. 640. - G. Don, General <st. or gard. and but. IV. 552. — Herbulab glabra radican* fluilans: full, opposilis integrcnnii* 7-ncrvns; flonb. axillanb. solilariis allernis pedicellate minulis albis. 0 — In cataraciis Aluminum cl in missionibus Orinocensibus cresct — *Wxlllichia*..... **Mutisa**. m». ex Linn. Manilas, plant. 556.

3957. **ILYOGETON** Endlich.

(Endlich. mss. in Gcner. plant, pag. 684. — Meisn. Gener. plant. I. 311. II. 222.)

1. I. (LIM)ERMA R. Ilr. Prodr. fl. Nov. Holland. 441. [edit. Noes ab Esenb. 207.] — TITTM4NM.V Spr. Syst. vcgel II 800.) ALSIINOIDES Endlich. mss. - Toll, O\JIS jntepii> el pauudcntali*, caulims distanlib., Horalib. minulis tubo corollac raljco parum longion; caule credo. 0? — Crescit in >o\ a Ilollandu.
2. I. SI BLLATI >I Endlich. m>s. — Foil, laic o\ali< subinte^ns, infimis conferlis, caulims paucis^imii) minonb., floralib. minuti!»; tubo corolhno calyce duplo Ion-giori. 0? — *Luulcrnia scapigera* R. Br. I. I. c. c. — *Titlmannia scapiycra* Spr. Syst. veget. II. 800 — Cre»cit in No>a Hollandia inter tropicos.
3. 1. SDBULATLM Endlich. mss. — Foil, liocari-bubulalis inlegris 0? - *Linderna* {*Titlmannio* Spr. I. c.) *subulate* R. Br. I. I. c. c — Crescit in Nova Uollandia inter tropicos.

3058. **LINDEBNIA** Linn.

(Linn. Gcner. plant. 1315. — Meisn. Gener. plant, **vascul**. I. 311. II. 222.)

1. L. PYXIDAIUA Allioni, Miscell. Taurin. III. 178. L5. — Schkuhr, llandbch. 1.175. — Lam. Illu^ir. gener. t. 522. — Slrm. Deutschl. Fl. lift. 30. ic. — Koch, Synops. n. Germ, el Ilch. (edit. 1.) 532. - Kchb. Fl. Germ, excurs. 3H no. 2010. - Foil. oblongo-o\ali> iniegerrimu trinerviis sc^silib.; pedunculi^ unillorin; caulib. procumbentibus. 0 — *Pyxidana repens annua*, *ftoscuUs monopetalis umlubtatts* Lindern, AUal. I. 152. I. 1. cl 2. — *Capraria gralioloides* Linn. Spec, plant. H70. — *Anagalloides procumbent* Krok. Flor. Siloiac. II. no. 1001. t. 20. pag. ,108. — *Gratiola inundata* Kilaib. in Schultz, Flor. Auslr. II. 3i. — *Lindernia hitatbelii* G. Don, General sy&t. of gard. and bol. IV. 551. no. 2. — Corolla albida, limbo dilute carneo. — Cre»cil in locis humidis hyeme inundalis, ad ripas lacuum et (lu>iorum in Europa media.

f *Species inquirendae, verosimiHter e genere exdudcndae.*

2. L. MOM i:IDL\MS Spr S>st. veget. II. 7G0 - **Caulc procumbenlo ramoso**, foil sp.itlniKilo-lmc.ini). OIKTMIS, pedunrulis axillanb. millions; caqub. Tohacei^ Q> _ (resell in MonleMdeo
3. L. ,IIITMV>MV spr I. e SX) MOMICO! A Vilt (lener. Amenc I. 0. - Caul. ercclo di< holmim, full, raduahb. sp:nlnilili^, rauln is lnie.irib. remolis; prdun-culb vlongili*, fruiliferi* dellexis. {j* I.ri^ ni in Carol na borejh.

4. L. (TITTMANMA Spr. I. c. 601.) GRANDIFLORA Null. I. e. II. 43. - Caule prostrato repente, foil. subarapJexicaulib. crassiusculis subrotundis subinlegernmis glabernmis, pedunculis axillanb. elongatis v. eiam lerminalib.; filamenlis slenlib. furcads ^ — Folia aggregata. Calycis segmenta lineari-subulala. Corolla magna noljceo-coerulescens, labio in fen ore pallidiore Inlobo, supenore brevisimo bidentnto Filamentorum slenlium processus lalerahs profcl anlheram imperfeciam umlocularem. Capsula ovala. — Crescii in humidis Georgiae.
- 5 L. DILATATA MUblenbrg. Catal. el Elliott, Flor. Carol. I. 10 - G. Don, General syst of gard. and bot. IV. 551 no 0 — Foil, basi dilaiatis amplexicaulib. parce dentatis; pedunculis folio longionbus. O — Folia obscure 3-5-ncnia. Calyces pubescentes ciali. Corolla purpurea. — *Lndernia Pyxtana* Prsb. Fl Amer. aept. II. 410. — *Gratiola tnaequalu* Walt. Carol. 01. — *GraUola anagaUidea* Michi. Fl. Bor. Am. 1. 0. — In America boreal! (New York, Carolina, Georgia etc.).
0. L. ATTENUATA Mdhlenbrg. Catal. ex Elliott I. c. 17. — G. Don I c no. 10. - Foil, lanceolatis obovalisq., basi altenualis, pedunculis folio dimidio brclionbus. O — Folia serrulata villosa. Calyces ciliati. Filamenla stenlia tillosa — fresnt in Georgia

ft *Species e genere expellendae.*

- L. ALSINOIDES R. Br. - ILYOGETON ALSINOIDES.
 L. DIAISTHERA Swrti. - HERPESTES CHAMAEDRYOIDES
 L. JAFOMCA Tbnbrg. - MAZUS RL'GOSUS.
 L. SCAPIGERA R. Br. — ILYOGETON SCAPIGERUM.
 L. SLBLLATA R. Br - ILYOGETON SUBULATUM.

395^,. CONOBEJi *Aubl.*

- (Aublet, Pl. Guian. II. 030. i. 258. — Meiin. Gener. plant vascul. I. 311. II 222
 G. Don, General lysL of gard. and bot. IV. 552.;
1. C. AQUATICA Aublet I. c. — Lam. Illustr. gener. t. 522. fig 2. - G. Don I. e. no 1. — Caulib. procumbeniib. nodosis; foil, reniformib. dentatis tfmiamplexicaulib; pedunculis folio longionb. solitarus. Z. — Herba glabra. Corollae coeruleae. — Crescit in Guiana Gallic*.
- 2 (.. PL>CTATA Nees et H"t NOT. art. acad Caetar. Leopold. Carol. XI. 43. - G Don I c. no i. — Caule atctndenlf, ba«i radicanlr; foil, o^atm arutif irrattis, supra ncabrif,| Oorib. axillanb. geminalis, peliolo parum brevionbua. ^ — Folia pollicana v. aetquipnllicaria. Calyci« quioqaepartiii »cgmeota ovtlo-lanceolala acuminala, membranaceo-margioala. (orolla calycem duplo exeedil. Labn toperiorit »egroeota oblonga undulala. — Creteil In Brasilia.
- 3 C VISCOSA Spr Sjut, regeU II. 771. — G. Don I c. no. 3. — Caule erf no, »uperne tisco^o, foil lanreolatis argote serratis glabmimit; pedunrulu subgrminis folio brevionbu*. % — Crescll in Brasilia

f *Species e genere expellendae.*

- <: ALATA Grab. - LKI COCARPI S ALATI 8.
 C BORKALIS Spr. - GRATIOLA MRGIMCA
 C. IM)ICA Spr. — LIVNOPIHILA R4(KVOSA*
 C OVATA Hort. - STEMODIA AREN4RIA.
 C H7MILA Spr. - STEMODIA ARENARIA.
 C VBR TICILUM8 Spr. - bTEMODU IERTICILLARIS

MOPHBOKA % THE *Blk.*

- †Bih mLindl Natur SytL (>dit.S.)44&. - Meisn Geoer. pi. t aicul II ttl sub no. 00.)
 1 ^S FLORIDA^A Bib I r - Creteit io Florida. - *?

Tribus VII. *BUCHNERAE* Bth. mss. in Hook. Gomp. bot. Magaz. I. 357. — Endlich. Gener. plant, p. C84.

Calyx quinquefidus v. quinquefidus. Corolla limbo quinquefido v. ioacqualiter quadriGdo, Dune bilabiato, laciniis omnibus plams. Stamina 4 ascendeniia didynama, rarius duo approximate; antherae uniloculares. Stylus simplex; stigma parvum subcapitatum. Capsula bivalvis, valvU integris v. bifidis, rarissime carnosa indehiscens.

Subtribus I. *EUBUCHNERAE* Endlich, l. c. 685.
Capsula loculicida bivalvis, vahulis integris.

3059. *STBIGA* Lour.

(Loureiro, Flor. Goebinch. 127. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 313. II. 224. - Bth in llook. Compan. bot. Hagai. u 301.)

SeoUo I. 0R0BAI0H0IDB8 Bn4L toner. pL pag. 686.

Calyx quinquecostatus. Corollae tubas supra medium infractui.

1. STR. /BUCHNERA R. Br. mss. ex Endl. In Flora [B. Z.] 1832. II. 388. L 2.) ORO-BAKCHOIDES Bib. I. c. t. 19. — Glabra ramosa * foil, minuiis squamaeformtb., florahb. lanceolatis calyce brevioribus. 2* — Herba parasitica Irl-oclopollfcarl*. Radix luberosa, *Juglandis* magnitudlne. Scapus basl simplex squamis dispems teclus, »upra ramosus, squamis v. bracteis paucis oppositis Instructus, lotus pilis brevibus rigidis obsilus. Squamae v. bractee lanceolalae. Flores sessles bracteis terms slipaii. Calyx brcMler pilosus quadrifidus, segmentis lanceolalis. Corolla glabra pollide »cpiacca h}pocralcriformis, tubo gran 11 col) com tnplo excednlc, apicc incunalo, limbi quinqueparlili segmenlum inflmum maximum, laicalibus obotaii* subreclusis, superioribus reflexis minonbus oblongia oblonis 8tamina quaiuor lubo »upra medium insert a t gemims paullo longionbus, omnibus glabm. Ovarium ovatum »ubcompre*sum, ovulis numerosissimis. Sl)lus gracilis reciusculus, tubo corollino paullo brctior persistens; stigma incrassalum. Capsola ovala subcompressa. Semlna minuta ovalia. — *Buehnera hydrobadenstt* Rth. Nov. plant spec. 202. — *Bucknera gemertoulei* Willd. Spee. plant. III. 3J8 * *Orobancha Indica* Spr. SyiU teget. II. 817. (oecRxb.) — Crescll In Bcoegambia, Abyssinia, Africa austral!-oriental! et in peninsula lodlae orienUlis.

SeoUoIL KUPHRA810IDB8 IB4L L e,

Calyx quinquecostatus. Corollae lubus supra medium infractus.

1. STR. (BKOW4LLIA Fomk. Fl. Aeg. Arab. 12. — BUCHNERA Vahl, Symbol, bot. 111.81) III MIFL^A Bth. I. c. 362. - Proslrala scabra: foil, obovato-oblongit oblusib, spins broib. paucifloriH, caljcib. quinqueslriatfs*; coroltae lubo glabro Z|. — Foliorum forma ci caule procumbente differt ab omnibus bujus generis speciebus. — Crescit in Arabiae moniibus lladje.
3. STR. (BUCHNKRA R. Br Prodr. fl. !So\, Iloll. 204.) PARVIFLORA Blh. I. c - Pusilla scabernma foil, lineanb. integemmis strictis; calyclb. quinqueslrialu, corollae pubesceniis labio superiorl iniegro inferiore vix duplo brr>iorc. % — Herbula pan a parum ramulosa floriboi mlnimii. — Crescit in Novae Hollandia* ora austro-oriental! (Keppel Bay).
4. SIR. (EtPIIRASIA Willd. Spec, plant. III. 107. - BUCHNERA Sebum, el Thonn Kongl Darntk. \idensk. Selsk. Afhandl. IV. 51 f) ASPERA Blh. I r. - Foil I, - neanb. inlegcrrimin slnelis ramisq. callosotuberculosis el ptim patctib nmdi» ciliolads, cahcib. quinqueslrialis; corollis glabru, tubo clongato tenui, labio RUpenore emarginalo infenorr duplo broiore ^ — Valde affim« *Sir pam/forar*, differ I lamrn jam corolla duplo majon Ocsrit in \fnra tropica, duiuca
4. STR. (BICIINKHV R Br Prodr. (1 >o> Iloll 204. < HIM FLORA Il(l. I c Scabernma full elongatn-linrarib inlegvrnuu* «ut>palrnlib., calytib quin<u< •Inaiis, corollae luho pubfirfole, Uhio luperiore reiuio inferiure (repartito ter

- hrexioro. ^ — Habitu accedit ad *Sir euphratioidem* el *coeeineam* — Crescit in >o\ac Hollandiae ora boreali.
- 6 STR MLITIFLORA Blh I c 363 — Glabra ramosis«ima foil elongato-lmeanb palenlib, spin-, eh ngatisj laiiis; raljcib qumqucostjti*, oorollis glabns, labio supcnore bilitlo in fen ore tnparlilo paruni breiore. 2l — Habitu subdecurnbcnle florumque forma satis dislinctia. — Crescit in Auslralasiae uisiilis (Goulburn is-land) et in nia scpiclnlonali.
- 7 SIR BK HNERA Blh. Scrophul. Indie. 41.) DENSIFLORA Blh. in Hook. Cornpan bot Magaz. I. 363 — Ilumilis glabnu»cula scaberrima foil lanceoialo-lincanb. sub«quarro»is, flonb densis appronroalis, calycib. o\alis quinqucMnalis, corollis glabriN, labio supcnore emargmalo in fen ore bis lervc broiore 2l — Htrba pana ngida 3-5-pollirans ramulosa, re fere ns habitu scquenlem Mores recurva. — *Bucknera Ariaeha* Vahl, Symbol bot. III. 81? — (Linn. Spec plant 879 ex p.) — Crescit in peninsula Indiae oriental)*
- 8 STR THINDERGII Bth I c — Hispido-scabra sincla subsiraplex Toll lanceo-lalo-linearib creclis, floralib. lanceolals adpressi*, neno «ubtus margineque ciliato—hispidi*», spica densa; Cdljcib. quinqucslnatis, corollac lubo pubescente, apice rcruno inflato, limbi labns parum inaequalib, lobis oblongis ^ — Iligi-dior ereciiorque quam *Str denufiora*, differl lubo corollae ad apircm msigniter inflato. Corolla longiludine \anal occurntque 6-S-10-lineans. — *Buchnera isia-Uca* Linn. Spec, pi 870. ex p — *Buehnera btlabtata* Thnbrp. Flor ripens 405 — *Buehnera Uneartfolta* Sebum, el Tbonn. Kongl. Dansk Videnks Sel»k \fh.indl IV. 51. I — (Toll lineanb. inlegemmis; ciule nlycibq pilis adprcsMs; corolla exlus pubescente, lacinns labu infenons lincanbus aculis.) — \$. *grand*fora* Flonbus majonbos. — Crescil in Guinea (?) el in Africa australi exlrairofica.
Stella m. IQSniSA WfL L e.
- Calyx decem-quindecimcottiM. Corollae lubot supra medium infractus
9. STR. ELEGA>S Bib. I. c — Hirsoto-scaberrima stricla subsimplex foil lan-ceolalo-lineanb. ereclis subadpressis bispidis; floralib. consimilib. calyces ae-quaniib, calycib. decemslriatis; corollae lubo pubescrnio, limbi loins obngis, labio supenore bifido in fen ore parum brcMore. 2l. — Cresnt in 4fnca australi exlrairofica.
- 10 STR LITEA Lour Flor. Cochinch. 22* — Blh. I. c - Ilirsulo-scaberrima foil, cloiui'o-linearib patenlib, inferiorib lanceolatis; spicis elongalu; caljcib. 10-1>-N(niis, corollae luteac lubo glabro, limbi lobis obovalis, labio supenore nimgintlo infer lore duplo breviorc. ^ — Laxa ramosa, v. Juniori Mau simplei ngidior srmipcdalis v. pedali», exticcaia ranus mgrctcil. — *Buehnera hirsute* Wall Cat. 3ttO. — Bib. bcrophul. lodic. 41. — *Buehnera Attatiea* Linn. Spec pi. 879 ex p. — Crceil in peointtula Indiae onentalis el in Cbioa ad Canlon.
- 11 STH BI(II>ER4 Wall. Calil. 3874. - Bth Scrophul. Indie. 41.) PIIOK.MCEA Blh. in Hook f »mpan bol. Magax. I. 3UJ - Ilumilis \illosa senberrima foil, lanceolalis obluMS palrnlib; spicis densis; calycib decemMriahs; corollis phoe-mrcu glabns, limlu lobis oboalis, labio supenore cnarginato inferiors duplo brc\iore. % — \alde afGnis praecrdenti, a qua forte re ma non diffTt. — In Indi.io onrnialis peninsula crescit.
- 12 SIR i AVPILKJA Hook. Exotic Flora III. L 901 - III CHM-IH Blh Srrnphul. Indir 40. rl in ^all Calal. 3870 MM (I>K\ Blh in Hook I r 151 - blabriu»-cula scabra foil elongalo-lineanb. cal)nb oblongm drrrmMnatiH; «pictlaxi»; corollis coccinci* glabns, limbi lobis obovatis, labio nuprnorc emarginalo, lo-ferior* dupln breiore. ^ — Habitu ácrrdit ad *Str luteae* uprrrimina ~~laxiora~~, sed mafit glabra etl el ciicr.iU plrrrumqur mgrr«cil *Buehnera itiaitea* Linn. 1 r ex p. — Crtsail in Africa Iropira rl in A«da autirali India onenlali
- 1J. sTII <I ABRATA Bib I e - blabnusrula scabra foil rlongalo-linearib., cal)f.b oblongis 10-15-slnaiis. spira leoui, corollis eoerulesreniib • glabns. limbi lobi« nbloogU, |«hio sqprrtore emargmalo inferior* duplo br«*viorr %

Quam species praecedentes omnes multo gracilior, ad sequentem proximo accedii, sed differet corolla giabra. — *Buchnera Asialica* (Linn. I. c. ex p.) Blh. Scrophul. Indie. 40. — Crescit in India orientali (in regno Avano, in Nepalia et in peninsulae Indiae orientalis).

14. SIR. (BUCINEKA Vahl, Symbol, bot. HI. 81.) EUPHRAGIOIDES Bth. in Hook. I, c. — *Glabriuscula scabra*: Toll, clongalo-linearib. integerrimis paucidentatisq; calycib. oblongis subquindecies striatis; corollae tubo pubescente. ^ — A praecedentibus omnibus differet corolla pubescente et calycibus longe striatis. — *Muchnera Asialica* Linn. I. c. (ex p.) — Crescit in peninsulae Indiae orientalis.
15. STH. (BUCHNERA Hamilt. mss. in Wall. Calal. 3877. - Bth. Scrophul. Indie. 41.) MASERIA Blh. in Hook. I. c. — Elata scaberrima: Toll, integerrimis linearib. adpressis striatis; calycib. subquindecies striatis elongatis; corollae tubo clongato (enuiter pubescente, limbo amplo. 2). — Corollae quam praecedentibus duplo majores. — *Iluchnra Wallichii* Blh. mss. in Wall. Cat. 3876. — In India orientalis.
10. STH. FOUBKSH Blh. in Hook. I.e. — Elata scaberrima pubescens: Toll, linearilanceolatis dentatis; calycib. profunde fissis decies striatis, laciniis linearibus. foliaceis; corollae tubo clongato tenuiter pubescente, versus apicem incurvo. 2). -- Affinis *Sir. Masurine* sed minus rigida foliisque latioribus differt — *fi. grandiflora*: — Crescit in Madagascar et Mozambique.

Sectio IV. CAHPULEIA Endlich L o.

Calyx quinquecosiatus. Corolla medio infracta.

17. STH. (BLCHXERA Delile, Flor. de Paegypt. t. 34.) HERMONTICA Bth. I. c. — *Pilosiuscula scabra*: foil, linearibus; floralibus lanceolatis ciliatis; calycibus quinquecostatis; corollae tubo glabriusculo ad medium incurvo, limbo amplo. 2). — In Aegypto et Mozambique crescit.

3000. 1U<'11AERA Linn.

(Linn. Gener. pi. 772. excl. spec. — Meisn. Gener. pi. vascul. I. 313. II. 284. - Blh. in Hook. Compan. bot. Magaz. I. 303.)

S. 1. *Spica rara vel densa non imbricata.*

1. B. JUNCEA Cham, et Schleichl. Linnaea II. 590. f - Blh. I. c. - Herbacea: caulo simpliciter junceo, foliis quadrifariis adpressis teretibus; panicula brevi contracta terminali. % — Radix perennit brevis nigra. Caulis simpliciter junceus hirsutus tripedalis et alior, obsolete tetragonus, teretibus, deorsum puberulus, foliis oppositis quadrifariis vestitis. Folia uncinata-lanceolata, latioribus basi acuta, margine scabra, arete adpressa, membranacea firmius trinenria, inferiora latiora breviora, fere elliptica, in medio canaliculata aequantia (0 Ho. longa, 1% lin. lata), supra minima squamiformia, in nervis ibidem valde elongata. Panicula brevis stricta contraria c spicis densifloris constans, ramis floribusque pseudo-oppositis, rarius alternis. Uratiae calyce brevior, laterales angustiores, vix breviores, omnes nervo medio subraminatae, in acumen excurrente. Calyx nervoso-striatus 1/2 lin. longus subaequalis, dentibus acutissimis, anicis Kinu paullo profundiori disjunctis. Corollae tubus calyce paullo longior, exclus glaber, limbus subaequalis partus, lacinae lineares claviculae longae faacet Intus villosae. Capsula ovoidea apiculata calycem persistentem explens 1/2 lin. longa fusca. — Crescit in Brasilia meridionali.
2. B. (PIRIPEA Aubl. Pl. Guian. II. 028. t. 253.) PALUSTRIS Spr. Syst. tegr. II. 805. — Blh. I. c. — Scabra subglabra: caule tenui aubramoso; foil, angustis linearibus integerrimis v. inflexis parvis obovatis; spica laxa pauciflora; bracteis linearilanceolatis; corollae tubo calycem subduplo excedente; calyce fructifero recto. ^ — Flores purpurei. — Crescit in Guiana Gallica.
3. B. KLONGATA Surt. Flor. Indian. ocr. II. 1001. - Bth. I. c. - Slrigio-seabra: mule stibmiipliri, IKH fol. OSO; roll, oblongis integerrimis, KUprioribus linearibus; spica laxa pauciflora; corollae tubo calycem subduplo excedente; calyce fructifero recto. ^ - Plum. Icon. 19. \. 17: *Irinus Americanus* Mill. Diet.? - Corolla violacea. piirpura rufescente - rufescente. liauli« rufescente et ultra granibus

- firmus. Folia 1-3-pollicaria integerrima. Scabrites folia utrinque, bracteas calycisque nervos occupans in superiore caule et corollae tubo rarensens e strigis consal brevibus albis sursum versis, e lala basi callosa orbiculari orientibus. Spica laxa 12-24-0ora; bracteae subaequales acutae, antica ovala, laterales lineares. Calyx florifer tabalosos, fructifer ovato-cylindricus eximie striatus, dentes breves $\frac{1}{a}$ lin. longi acuti, antici duo sinu paullo profundiori distincti. Tubus corollae calyce dupio fere longior (5 lin. longus) limbo subaequali. Stigma eximie clavalum *Typhae* spadiceis instar. Capsula calycem explens eumque rariim dirumpens. — *fi. pilota* Cham, et Schleichd. Linnaea VIII. 245. — Tola pilis longioribus obsiia. — In America centrali et australi (Jamaica, Carolina, Mexico, Brasilia).
4. B. TENELLA R. Br. Prodr. fl. Nov. Holland. 437. (edit. N. ab E. 393.) - Btb. I. c. — Scabra subglabra: caule lenui subramoso; foil, anguste linearib. integerrimis; spicis laxioacalfi; bracteis ovato-lanceolalis ciliatis; corollae parvae tubo gracili calycem sabdopio eieedente; calyce fractifero vix incurvo. 4 — Crescit in Novae Hollandiae ora septentrionali.
5. B. LINEARIS R. Br. 1. I. c. c. — Btb. I. c. - Scabra: foil, oblongis, superiorib. linearib. obtusis inlegerrimis; spica rara; bracieis inferiorib. linearib., superiorib. ovalo-lanceolalis; calycib. pubescentib. vix incurvis; corollae tubo breviter exserto. 2. — Crescit In Nova fTollandia (Carpentaria).
6. B. PIBESCENS Bib. I. c. — Scabra: foil, inferiorib. oblongis, superiorib. linearib., omnib. inlegerrimis oblusis; spicis multifloris; bracieis ovalo-lanceolalis subciliatis: calycib. pabescentib. sabincurvis, fructiferis ore obliquis; corollae - tubo breviter exserto. 2f. — Crescit in Novae Hollandiae ora seplentrionali (ad Endeavour river).
7. B. RAMOSISSIMA R. Br. I. c. 438. (edit. Necs ab Esenb.894.) - Bth.I.c. - Scabra ramosa: foil, rameis Iniegenimis lineari-lanceolatis; spici» elongatla nullifloris; bracteis ovato-laoeeolatie aobciliatis; corollae tobo calycem fl or i forum incarcvom plot dlmdlo excedente, aplee plloio-hispido; calyce fructifero rectiusculo. 4 — Crescit In Novae Hollandiae oris orientali (Thirsty Sound; et borcali (York Sound).
8. B. DI'RA Bth. I. c. 306. — Glabra v. basi hispidula: caule subramoso; foil, infirois obovatis, superiorib. oblongis inttgerrimis, suprcmis linearib.; spica apice condensata nulliflora; bracieis ovaio-lancrnlati subciliatis; corollae tubo ei-serto; capsula calycem fructiferum rectum subaequanle. ^ — Crescit in Africa australi extratropica (Eitenhage, Cafferland).
9. B. <i>ABRATA Blh. I. c. - Glabra v. basi vix hispidula: caulib. erectis fubtimplirib.; foil, inferiorib. late obovalis, suprrriorib. linearib. oblongiste; spica condensata brevi; bracteis ovalo-laoceolali»; corollae tubo fxserto; capsula calycem rrectum dimidio sopraote. ^ — Crescit in Africa aosrali extratropica (Cape district prope Rondeboseb).
10. B. TRACILIS R. Br. I. e. 437. (edit. Ner« ab Etenb. «3.) - Btli. I. c. - Caule •implici glabro; foil, fnferiorib. obo^aii», tupeHorib. oblongis, omnib. obtusi* iotegriti; npica rara; bractis ciliatis calyre dimidio brrvioribun; cap»uli» apice exsrrtifl. 4 - Crrscit in Nova Hollandia propf Port Jarknon.
11. B. ASPERATA R. Br. I. c. 438. (edit. N. ab K. 2M. - Blh. I. r. - Scabrm»«: foil, infrrriorib. lanrrolato-oblongis paucidenttli^, ^uprriorib. lineari -|jnri>olalJ* inlrKerrimi*; braclrit lanccolalo-ovalif caltre dupio brrvionb.; rjlynb. fructifc- ris apice 'ore) obllquU; rapsulit inrlu«i«. ~4 . j. Fohn* an^uftionbui. — **Cresck** lo Novae Hollandiar ora •rplenrionali. 3. (toulburn i»land .
12. B. IRTICAEPOLIA R. Br. I. r. 417.,rdii. >. ab K. SBL - Rib. I. r. - **Scabra** glabrivfcvla v. pnbMceo*: foil. Infnit appro%imati% oblongi* obtu»i» **medilago** droUUa laneolatit dUUolib.; **tpie*** lata; brarin* lanrrolaii* nhait calyce **bro-** tiorib.; corollae tobo ralyetm t«bdvplo esredeatr; raptulae apic« fterto. 2
Cretcil in Novae Hollaadiae ora orienuli 'Port Corfu .
13. B. HISPIDA Haoiilu km D Don, Prodr. 0. Nepal. 91. Bth. I. r. P'l» **longis**
hispida tubfimplei, basi folios* : foil, obloogit •obdvntatit, tuperiorib. **linearib.:**

- spica laxa multiiflora; corollae tubo vix exserto. Q — Crescit in montibus Indiae orientalis.
14. B. AMERICANA Linn. Spec. plantar. 879. — Blh. I. c. — Piloso-hispida scaberima v. demum glabrata: caule subsimplici, basi folioso; foil, oblongis lanceolatisve subdentatis, superiorib. linearib.; spica laxiuscula; corollae tubo calycem subduplo excedente; calyce fructifero redo. Q — Crescit in Americae borealis civitatibus australioribus, Mexico, Panama.
15. B. MAGRANTHA Bib. I. c. — fubescens-scabra: foil, lanceolatis subdentatis remotis; spica laxiuscula; corollae tubo hirsute* calycem quintuplo superant. Q — Illic proxime accedit ad praecedentem sed floribus differt. Calyx glutinoso-pilosus. Corolla ultra pollicaris, limbi laciniis magnis latis. — In Sierra Leone.
16. B. PLSILLA II. B. Klh. Nov. gener. et spec. pi. 11. 340. - Bth. 1. c. - Hispidoscabra: caule subsimplici teretiusculo; foil, suboppositis, inferiorib. obovatis oblongis, superiorib. linearib. integerrimis uninerviis; spica solitaria; calyce quam tubus corollinus brevior capsulam superant. Q? — Flores subdistichi. — In regno Novo-Granatensi crescit.
17. B. DISTICUA II. B. Klh. 1. c. — Blh. 1. c. 307. — Hispidoscabra: caule ramoso subcirragono; foil, suboppositis linearib. integerrimis uninerviis; spica foliaria dissiicha; calyce tubo corollae aequo. Q — Corolla coerulea. — Crescit ad Santa Fee de Bogota.
18. B. ARGUTA Dene. Nouv. Ann. du Mus. d'hist. natur. 111.374. f — Scabra: caule ramoso tereti; foil, radicalib. lanceolato-oblongis obtusis subrepandis, ramealib. linearib. integris obtusis sessilib.; bracteis ovalis aculis calyce cylindraceo subarcuato dimidio breviorib.; florum limbo subregulari; capsulis inclusis. Q — Corolla glabra coerulescenti-purpurea. — Crescit in insula Timor.
19. B. LONGIFOLIA II. B. Klh. 1. c. — Blh. I. c. — Glabriuscula: caule ramoso tereti scabriusculo; foil, inferiorib. oppositis anguste linearib. elongatis inclusis uninerviis calloso-exasperatis; spica solitaria; tubo corollae calycem superant. O — Corolla coerulea. Folia 4-5-pollicaria. — Prope Santa Fee de Bogota.
20. B. LITHOSPERMIFOLIA II. B. Klh. I. c. Ml. - Blh. I. c. - Hispidoscabra: caule simplici teretiusculo, superne inbriagone; foil, inferiorib. suboppositis linearib. subintegerrimis uninerviis; spica solitaria; calyce quam corolla triplo brevior capsulam subaequant. Q - Corolla coerulea v. violacet. — Crescit in ripa exsiccata fluvii Magdalenae Juxta Melgar el Picala el in alia parte Bogoteni.
21. B. TERNIFOLIA II. B. Klh. I. c. - Blh. I. c. - Hispidoscabra: caule simplici trigono; foil, inferiorib. ternis linearibus lanceolatis apicem versus remote terra (is trinerviis; spica solitaria; tubo corollae calycem paullo superant. O — Corolla violacea. — (Crescit cum praecedente.
22. B. YIRGATA II. B. Klh. 1. c. 342. - Blh. 1. c. - Hispidoscabra: caule basi ramoso; ramis virgatis subterragonis; foil, oppositis lanceolato-linearibus integerrimis uninerviis; spicis paucifloris; calyce tubo corollino duplo brevior, capsulam bis superant. O — Corolla violacea. — Crescit in Nova-Andalusia in montibus Cocollar el Tumiriquiri.
23. B. ROSEA II. B. Klh. I. c. - Blh. I. c. - Hispidoscabra: caule subcaespitosis simplicibus teretibus; foil, inferiorib. oppositis lanceolatis obtusiusculis, apice subdentatis uninerviis; spicis compluribus congestis. Q — Corollae roseae. - Crescit locis temperatis prope Caracas.
24. B. MACROCARPA II. B. Klh. I. c. - Bib. I. c. - Hispidoscabra: caule simplici teretiusculo; foil, inferiorib. oppositis ovatis aculis, basi angustatis, apicem versus remote dentatis; spica solitaria; calyce tubo corollae capsulaque brevior. Folia trinerviia. Corolla coerulea. - Crescit in Nova-Andalusia?
25. B. AMKTIYSTINA Chamis. el Schleichl. Linnaea II. VW. f - Hispidoscabra: caule »impliri, in fern c folioso; spica laeva pauciflora; bractea externa ovata acuta; calyci» dentibus hirsutis. »ul>aequalibus». ^.? - Herba 7-15-pollicaris. Taulis granitii foliis subradicalibus paucis infloribus*, Mirtum fere denudatum. Spica laxa 0-12-flora. Folia 1-1¹ s-pollicaria obscurius nervosa dentata aul inirgramma. Folia n

- caulis par* inferior pilis brevibus rigidi* callosa basi orlentibus hirta et scabra. Bracteae, calycis praeterlim margioe) fohorumque uervi pilis similibus pubescentes. Flore* quara *B elongatae* majores Bracteae subaequales acutae, antica ovata, laterale* lanceolatae Calyx 4 lin longu* Tubus corollae calycem paululum superans», exlus parce pilos Limbi inaequalis lacinis maximae 2 lin. longae Stylus paululum sursum incrassatus — Crescit in Brasilia iropita
- 26 B LOBELIOIDES Cham el Schlecht I c 580. f — Blh. I c — Caulis simplici in femo folioso, spica laxa multiflora, bractearum lanceolata acutissima, calycis denique inaequalibus, antheris doobus majonibus 2l — Herba 10-pollicaris v sesquipedalis, e tolo hirta et pilis brevissimis scabra, in folio c culloba IWM oneolibus ngidis patenlibus, sursam curvatis uncinatis Caulis gracilis*, infra dense foliosus, supra denudatus. Folia eximie el profunde denata, denique paucis plumbusve in medio folio inaequalibus, alia longiora. Spica laxa 10-28-flora Bracteae acutissimae subaequales, extenuatae Inaequalis lanceolata, lateralibus Imeanibus Calyx subaequalis subbilabialis denique plicatus 3 minores minusque profundi, duo anticae lanceolatae, majores (interim circumaeque partem aequantes, omnes aruti, tolo* lubulosus 3 lin longu* Tubus* corollae quarum longiludmi* parte calycem excedens hirtu* limbus inaequalis, lacinae maxime j. esquilinearum. Stylus* subaequalis », hylmate aequalis (capsula oboidea glandulosa dracea, calycem aequans inclusa. Planta exsiccata lurido-Mindom Kenans colorera — (rescit in Brasilia tropica.
- 27 B LAV \ MR LACE \ Cham. et Schlecht I r }- Herb a r or caule simplici inferne folioso, foel inlegemmis subplicatis nervosis, spica densiflora 4 — Herba 10-15-pollicaris simplicissima Y. tripedalis spicaque turn ramulosa Folia rari* vili, subtus nervis valde prominens quibus pluiti, — in specimibus minoribus pauca tubradicalia — 16 circiter lin. longa, in vrgelionibus alius In caulem ascendens, major* ad 5 pollices usque elongata. Pili brevissimi rigidi curvuli, e lala callosa basi orti, folia lateralialia et caulis inferius partem praetertruncatam obtegunt el scaberrime donant, illos caeterum supra glabella spinosiusculi. multiflora densiflora, basi magis minusve relaxata Bracteae subaequales aequales, antica ovata, laterales angustae lanceolatae Calyx truncatus inaequalis 3 lin. longu*, denique acutis* subaequales, sinu inter antheras paulo profundius torollae tubi 5 circiter lin longus, exlus glaber, limbus* subaequalis, laevissimus (inter 1 lin longis Stylus distincte clavatus Capsula oboidea calycem expleat demum dirumpens — Crescit in Brasilia meridionali
- 28 B JIXTOHU Berlolom, Flor. (Jualimal 90. - Foel linoideiformis hirsutiusculis, rari* terminalibus lanatis; strigosis calycibus natis-epinulis K Zl. — (rescit in ijininnah
- 29 B. K) \ h>T() SA Blume, Bijdragen 741. — Sublomeolosa foel inferius oblongis obtusis grotse denatis, iuperioribus linearibus obtusis inlegemmis, bracteis semilanceolatis calyce brevioribus; caule subramoso lenticulo ^» — Crescit in intula Java
30. B. CAPILLARY Dsvx in HamilU Prodr. flor Ind occid 40 (caul erecto ramoso, foel breviusculis petiolatis raris aculis glabris, floribus ternis oppositis, pedunculis elongatis rapillariis», ralyre campaulato Mibscanoso ^ " Ad Hurhram pertinet nunc idem — Credit in ~~tabula~~

f. 2. *Spica densa imbricata Utragonu.*

31. B. STBK.TA Blh in Hook. (ompan boi Ujgai I 167 (caul abnusrula foel linearibus erectis rari* ipicae lragina imbricata subterribilis, lirateis oboideis UneoUht aculis nudis calycem aequantibus ^ i r r » ni 11 < Iniu — ⁷⁰¹¹ magna rari* quae in >equantibus obtruncatur huiusmodi tauli* >implis rirurr H.» . p o | | e a h t <
- 32 B • DILNMFLOA Hook el Km Bui Beech toy 2ttJ - \ n n < i a u m p l r t < a b r a MI inlegerrimis, rari* lib. owlib, raulim* inferius linearibus oblongis obtusis. superioribus linearibus aruniatis, sursum >irecentibus, spica oblonga

- pedunculata (a foliis remota) tetragona densa imbricata, bracteis linearibus, duabus lateralibus subulatis, tertia late ovata acuminata concava ciliata, calycem quinque-dentatum subaequale; corollae parvae lobis subrectis, limbo subaequaliter quinquelobato, lobis oblongis undulatis, capsulis inclusis. O — Crescit in China.
33. B. CRUCIATA Hamilt. mss. in D. Don, Prodr. fl. Nepal. 01. — Bib. I. c. — Hubsens: foliis radicalibus obovatis, caulibus inferioribus oblongis, superioribus linearibus, spica tetragona imbricata pubescente, bracteis ovalibus ciliatis calyce brevioribus. 2l. — Calyx fere cylindricus. Spica circumscissis. Folia radicalia dentata, caulina integra — Crescit in Nepahae montibus.
34. B. TETRASTICHA Wall. Catal. 3878. ex Bl. Scrophol. Indie. 41. et Hook. Comp. bot. Hagaz. 1 c. — Pubescens v. glabruscula data: foliis oblongis lanceolatisve obtusis integerrimis, spica tetragona imbricata villosa, bracteis late ovalibus calycem aequantibus. 2l.* — Calyx valde depressus. Folia numerosa spica bipollicaris densissime imbricata, fructifera 7-8 lin. diametro. Planis bipedalis. — Crescit in India orientali ad Moolmyne, ripas Salian et Phonas.
35. B. TETRAGONA R. fir. Prodr. fl. Nov. Holland. 437. (edit ISees ab Ecnb. 203) — Bth 1. c. 368. — Glabra elata: foliis oblongis lanceolatisve paucidentatis, spica tetragona imbricata glabra; bracteis late ovalibus calycem superantibus. 2l. — Differat a praecedente glaberrime, spica molto minus dense imbricata foliisque magis distantibus. — Crescit in Nova Hollandiae ora septentrionali (Goulbourn island)

f *Species a genere expeUendcu.*

- B. AETHIOPICA Linn. — CHAENOSTOMA AETHIOPICUM.
 B. ASIATICA Linn. — Ad complures STRIGAE species perlinel
 B. ASPERA Sebum, et Thonn = STRIGA ASPERA.
 B. AUREA Bnks = POLYUEN AUREA.
 B. BILABIATA Thunberg. = STRIGA* THUNBERGII.
 B. CAPENSIS Thunberg. - POLYURENA CAPENSIS
 B. CURVIFLORA R. Br. - STRIGA CURVIFLORA.
 B. DENSIFLORA Bib. - STRIGA DENSIFLORA.
 B. DIVARICATA Linn. - ZALUZIANSKYA PUSILLA.
 B. EUPHRASIOIDES Vahl. - STRIGA EUFRASIOIDES.
 B. FOETIDA Andrs. - CHAENOSTOMA FOETIDUM.
 B. GESNERIOIDES Willd. - STRIGA OROBANCHOIDES
 B. HIRSUTA Wall. - STRIGA LUTEA.
 B. HUMIFUSA Vahl. - STRIGA HUMIFUSA.
 B. HYDROBANCHOIDES Rib. — STRIGA OROBANCHOIDES.
 B. HERMISTICA Delile. - STRIGA HERMISTICA.
 B. LONGIFLORA WghU - RHAMPHICARPA LONGIFLORA
 B. MASURIA Hamilt. - STRIGA MASURIA.
 B. OROBANCHOIDES R. Br. - STRIGA OROBANCHOIDES
 B. PARVIFLORA R. Br. - STRIGA PARVIFLORA.
 B. PEDUNCULATA Andr. » STRIGA PEDUNCULATA
 B. PHOENICEA Wall. — STRIGA PHOENICEA.
 B. VISCOSA Ait. - SPHENANDRA VISCOSA
 B. WALLICUII Bib. - STRIGA MASURIA.

3061. DOBATANTHEB% *Bth.*

(Bib. mss. ad St Endlicb. — Meisn. Geogr. plant vascul. L 311 II. SM.)

1. D. SENEGALENSIS Bib. I. c. — Herba annoa erecta ramosa, pills brevis glandulosis, siccitate nigrescens, foliis linearibus, antheris integerrimis, floralibus coniformibus, pedicellis axillaribus filiformibus, sessilibus unilocularibus secundis, calycibus bibracteadis glanduloso-hirtis corollisq. venosis. O - [Endl. m. j. — Crescit in Senegambia]

3002. RHAMPHICARPA% *Bth.*

- (Bib. in Hook. i. comp. bot. Magai I 30K — Meun. (iener pi. atcul. 1.31X11 324)
1. RH. (BTLUNLRA V^glt msi) LONGIFLORA Bl. I. c. - Foliis pinnatis

angustie lineari; corollae tubo recto limbum pluries excedente; capsulae rostro subrecurvo. O — Herbula parva rarosissima glabra, foliorum segmenta paucissima dislanlia glabra. Pedunculi calyce plerumque breviores nudi, interdum eo longiores bractearum pari instructi. Calyx profunde fissus, segmentis longis subulatis basi laeolatis. Corolla alba (sicca coerulescens), tubo sesquipollicari, limbo laciniis brevibus latis truncatis v. emarginatis. — Crescit in insula Sli. Ludwigii (Senegal), in peninsula Indiae orientalis.

2. RII. (GERARDIA Linn. Spec. plant. 270.) TLBULOSA Bib. I. c. - Foil, lanceolalo-linearib. integris; corollae limbo tubo subincurvo parum brevior; capsulis truncatis, rostro brevi. Q? — Tola glabra. Caulis erectus pedalis v. ultra, parum ramosus. Folia glabra v. scabrella, uirique alienata, fere omnia opposita. Pedunculi calyce sublongiora. Corolla alba, exsicca coerulescens, tubo pollicari, prope medium subcorvato, limbo laciniis obovalis integris. Calycis dentes lanceolati, tubum subaequant. — Crescit in Africa australi extratropica (Uileobage).
3. RU. CURVIFLORA Bib. I. c. — Foil, lanceolalo-linearib. integris; corollae limbo tubo incurvo vix brevior; capsulis acinaciformibus. Q? — Habitus speciei praecedentis. Folia angustiora; calycis dentes longiores; corollae tubus magis curvatus, limbo latiori. Capsula valde obliqua. — In Madagascaria et Mozambique.

3963. CYC\HM E. Meyer.

(E. Meyer mss. ex Dñ. in Hook. Comp. bot. Magaz. I. 308. - Meisn. Gener. plant. vascul. I. 313. II. 224.)

1. <S ADONENSE E. Meyer mss. ex Bib. I. c. - Caule procumbente; foil, ovalis oblongitate; floribus sessilib. axillaribus; corollae tubo calycem plus duplo excedente. 2IT — Codicis pills brevissimis rigidius tectum. Folia sessilia, basi canata; calyx ultra pollicaris, capsula maturescente ad basin raptus, dentes foliales 3-4 line. longi. Corollae albae lobis 8/10, poll. longus, limbus plaus sesquipollicem diametro habet. Gaptula otama aompollicaris, semina numerosissima. — Crescit in Promontorio bonae spei (Olloanafo).
2. RACEMOSUM Bib. I. e. — Caule oreolo; foil, lanceolatis; floribus pedunculatis racemosis; corollae tubo calycem vix aequante. 2(?) — Habitu quodammodo refert *Melasmam teabram* Y. *Rhawthiarpam tubulctam*. Caulis pedalis subsimplex scaber. Folia sesqui-bipollicaria paucidentata, basi contracta, fere omnia alterna. Pedicelli breves; bractae lineares. Calycis tubus 0-10-pollicaris tripartitus, limbi laciniis lanceolalo-subulatae. Corollae limbus 1/4 poll. diametro habet Antherae approximatae supra apiculae. Capsula globosa esse videitur. — Crescit in Promontorio bonae spei (prope Silob ad fluvium Kliplaal, Wittenberg, Tambukiland).

Subtribus II. MAISULEAE Eodlich. Gener. planter, p. 655.

Capsula sepaloides, 2-lobis bifidis.

3964. BALVSILNMITA J. IF. Schmidt.

(J. W. Schmidt in Uteri, Annalen der Bot VI. II*. - Meisn. Gener. plant. vascul. I. 313. II. Si - *fycterini** D. Don In Sveel's Brit. flow. gard. [1 Scr. J III. I. §]. - Btb. in Hook. Comp. bot. Magaz. I. 300.)

f. 1. *CoroUa\$ laeiniae bifida, tubus tenuiter pubescent. Folia oblonga Unearia v. lanceolata.*

1. Z. (MCTEBIXIA Btb. I. r; r. ORIACE. 4 Wlprs. m). - Suffruticosa: foil, floralibus late lanceolatis oblongis deoatis crassis coriaceis villosis ralyre* roriaceos villosos aot duplo superantibus; spica elongata. % — Habitu accedit ad *Z. divric** ei *ptkM-m*, sed multo major rigidiorque est. Capsula e rorigeneribus maxima ligoeteas. - In Promontorio bonae spei (in montibus prope Cape Town).

& 2. (?ICTEBIJA Bta. I. c) 8PATHACBA Wlprs. mas. - Suffruticosa erecta: foil, obovato- v. oblofo-spalholatit, Infilms ulnenis, floralibus ampltxicaulibus late lanceolatis oblongis obtosis sobiotegerrimis uolnerviis, omnibus cohaecis, marfino 04 ad oerros pnbocentibus, caetenam glakris; spica elongata; calycibus elongatis,

- folio Ooraii param brevlorfbos. q. — Rami simplicea pedales rigidi. Folia floralia spatbulata pollicaria colorata, exsiccala ul reliquae partes nigricanlia. Spica deflorala valde elongata. Corollae iubus ultra sesquipollicaris. — Crescit in Promontorio bonae apei (Winlerberg, Kalrivieraberg, Wilberg).
3. Z. (NYCTERINIA Bih. 1. c.) MARITIMA Wlprs. maa. — Suffratlcoa erecta subglabra: foil, lanccolatis oblongisve oblusia subintegerrimia, Boralib. late lanceolalis calycem parum superantib., omnib. subcoriaceia glabria; aplca elongala densa muhilla. % — Aftinis pracedenti scd robustior. Folia cauiina nameroaa adpressa, spica longa crassa. Rami laterals — si adsunt — graciliores floribus foliisque paucioribus instructi. Forte speciei sequentis varietas? — *Erinus maritimus* Thnbg. Fl. 474. — Crescit in Promontorio bonae spei (Uilcnhage district, in ora marina prope Zeekoe river et Kacbu).
4. Z. (NYCTERINIA D. Don in Sweet's Brit. flow. gard. [New Ser.] III. t. 230. - Bih. 1. c. - EIUUS Linn. Suppl. 287. - Willd. Spec. pi. III. 333. fucc Thnbg. J — Bot. Magaz. 1. 2504. - Ker, BoU Regiat I 748.) LYCHNIDEA Wlprs. ross. — Suffrulososa: ramis adpresse villosa; foil, oblongo-linearib. paucidentatis inlegerrimiaq. unlenriia glabiuscolis, floralib. ampiexcaullb. late lanceolatis oblongisve oblusia paucidentatis inlegerrimisq., margine nenrlaq. ellalla; spica elongata; calycib. folio floral! brevioribus. 2* — Rami basi plerumque decumbentes. Folia magis rainutre carnoaa, majora semper densala. Corolla talea, inlua alba? extus purpurascens. - Crescit in Promontorio bonae apol ad maria littora (prope Amaponda inter fluvia Umlenda et Umtimeoolo).
3. Z. (ERINUS Linn. Manliss. plant 252. - NYCTERINIA Bib. I. c. 37a) CAPENSIS Wlprs. mss. — Herba dura: caulo erecto adpresse villosa; foil, inferiorib. lanceolatis, superiorib. v. omnib. linearib. paucidentatis inlegerrimisve unincerviis, margine nervoq. plerumq. ciliatis, floralib. oblongo-lanceolatis integerrimis, calyces vix superantib.; spica oblonga. Q? — Valde affinis *Z. lychnidra*, sed differt radice probabiliter annoa, caulibus erectis foliisque minoribus. Spicae plerumque breves pauciflorae, central! interdum elongata. Corolla gracilis vix 1/2 poll, longa. — *Erinus Aethiopicus** Thnbg. Flor. Capens. 473.
 a. *kirntia*: Ramis villosioribus; folia utrinque bilobata.
 fi. *gabriutcula*:
 y. *foliosa*: Foliis minoribus crebris; apice pauciflora.
 o. *tenuifolia*: Folia anguste linearibus glabris. — In Promontorio bonae spei (Neutral territory, Fonaqualand, Now Hanua).
6. Z. (NYCTERINIA Bib. I. c.) LONGIFLORA Wlpra. mat. - Herba: caule adpresse piloso; foil, linearib. pinnatifido-dentatis, floralib. lanceolatis densis aobviscoso-pubescentibus; spica brevi. O? — Differt a praecedente foliis profunde dentatis, a securis foliis angustioribus, ab utraque corolla 18-20 lin. longis. — In Promontorio bonae spei (Kamiesberg in districtu borcali Clantilliam).
7. Z. (NYCTERINIA Bill. I. c.) DKNTATA Wlprs. mss. - Herba erecta: caule adpresse piloso; foil, oblongo-lanceolatis ellipticisve, basi angustatis grosse dentatis semipinnatifidisve, floralibus late lanceolatis viacoa-pubescentibus; spica breviflora. QI — Ubius *Z. Capensis*, sed foliis latius profunde dentatis, basi saepe in potius attenuata recedens — fi. *kmrnalis*: — Crescit in Promontorio bonae apei (Capo Towo, Paarl, Zwarteberg etc).
8. Z. (NYCTERINIA Bib. I. c.) OVATA Wlpra. maa. - Suffrulososa divaricata v. procumbens viscosa-villosa: foil, ovatae grosseae floralibus oblongis, utrinque villosis; spica brevi. % - Folia oblonga, basi angustata, apice eximie mucronata. Corolla aequipollicaris. - Crescit in Promontorio bonae spei (Witbom in Caffraria).
9. Z. (NYCTERINIA Bib. I. c. P.L.MIU Wlprs. mss. - Humilis ramulosa: foliis oblongo-linearibus profunde remote dentatis floralibus conformibus; calycibus duplo longioribus, basi «ulxillatis; floribus antheris; corollae tubo » pubescentibus; ramis m.iii. roriacit. ^* - Specie illius innumerae libium «ii

dammodo refer! *Castillejam /Urifoliam, ?ix tripollicaris, sicca nlgreselt* — Crescit in Promontono *house spei* (Nieuweveld T. Kowp).

- J. 2. *CoroUae laeiniae bi/idae, tubus glaber; folia tpathulata.*
10. Z. (ERIMJS Thnrg. Flor. Capens. 475. - ISYCTERINA Blh. 1. c.) SELAGINOIDES Wlprs. mss. — Humilis, basi ramosa foil tyalbulalis, floralib. basi dilautis, corollae faace pilis ngidis coronala; glaminlb mferionb. abortivis. O — Herba bamilis 3-y-polhcaris, pleramqae pilis patenlibus rucosis undique tecta, exsiccata qoam species seclioms primae minus nigrescens. Folia infcnora obovala, snpenora oblonga T. lineari-spathulata Integra T. paucidentata. Folia floralia calycis basi adnata, apice paleolia. Flores snbdislanles, praeseriim in spicae basi. Calyx el capsulae membranaceae. Corolla 0-11 lin. looga, in var. *r-* vn 5 lin. long*, sob folns floralibas abseondtu. — *Erinut Africanut* Hb. union, ilin. 301. — a. *viUosa*: — *fi. floDr**; — y. *ygort^oro*: — Crescit In Promoniono bonae spei (locn arenosis Cape Flats, OIHants ei Zwartdoora riter).
11. Z. VILLOSA Frnz. Wilib. Schmltdt ex Csteri, Annalen der Botanik VI. 119. f — Humilis, basi ramosa: foil, obovatis, floralib. oblongo-spathuibatis; corollae fauce •ix pilosa; stamimb. qnataor anlheriferif. 0 — Radix tenais ramosa fibrosa. Caulis ad radicem inflexus erectus semiteres ramosus villosus. Rami radicates procumbentes. Folia caulina opposita obo?ata in peliolnm longum decurrentia Tillosa Integra rotundata. Flores In spica ovata terminali. Singulus flos bractea lanceolato-linear! caljce longiori obtnsa Tillosa suffullua est Calyx lubulosus membrancens quinquestriatns perslsteos bilabiatus, labio superior! 3-, Inferiore bidealato, ore Tillis cillalo, sob bractea abscooditus. Corolla monopelali infan* diboliformis. Tubas germen dngens longissimos filifonnin incunrns, Terras Urnbam fentrietata. Limbos qoioejvefjftitos aequalis, laciois biidii llaarlrbos. Fan pills COTOMU. FIUaMaU m t toperlori tobl parieU adaaU dee«rrentia, aniherae oblonffae ni can* tobl. Oeimeai enratam, stylos filiformis tobo paallo loogior, stigma simplex Ineorrom. Capsola oblonga acominau tecta biloculans biraltii, ntrinque somra solcaU ffcrlpta. Semfaa numerosa minata. Placenta centralis eompressa. — *Erimus AfHeanmt* Lion. Spec, plant 878. — Tbnrg. Flor. Capens. 474. — Bonn. Afric. 130. t 90. fig. 1. — *Nyctenma Africana* D. Don In Sweet's Brit flow. gard. (2. Ser.) III. adnot. ad t. 230 — Bib. I c. 371 no II. — *Habitus I itlaginoidti*. Folia in caolis basi magis aggregala. Spica deniior, folia floralia magis promineotia el imprimis dircrsa aolbens duabos mferioribus e corollae fauce sobeisertis. — Crescit in Promontono bonae spei (Carro, Carroid, Hex river, Winterbergen, Soeowebergen, Hermanns Kraal etc.).

f. '1. *CoroUae hmbi laeiniae integrae, tubus glaber.*

12. Z (MAM LEA Thabrg. Flor. Capeo*. 488. - NYCTERffuA Bth I. c.) DfVARI-CATA Wlprn mas. — Homllis Hgida, basi ramosa oobescenti-hirU foil, iofiml' longe petiolalis obotats, raptriortb. florallbq. lanceolatis deouit, tpeis eloagats. O? — Sicca nlgretcU. Corolla graeills deem circiter lineas longa. Cap* sola sobeonacea. — Crescit In Promontorlo bonae spei (locis arenosis prop* Capo To**).

II Z. (RYCTEanVIA Bid. I. e.) PEDHICCLARIS Wlprs. mst. - Humihs, basi folioia ramosa: foLL loflmU petiolatis otatis, eaolinis paurn lanceolatis tobdeau'' tis; spicis looge podoocalatis capitollformib paurlflom. O* Folia fpre omaiK in caolis basi colleeU. Raml scapiformet 4-0 poll longi Floret praeerdeoti*- Captolae sobeortaeae. * c *Bireutm*: - *fi Clabnmsmim* - i retell in fromoo* tarto botjto spei (Tboopolis it Albany, llaaienkraaltritifr

» * (KtCTIRIIIU Hå. I e) PfttILLA Wlprs. mti - Rrerta sobsimplex: f»N ftubfodlealib. patlolaiis lato otalis, floralib. obloogo-liotahb •paibolatisro; s>- rib paoeia diMaotib. v. sobaofrotimais. O⁹ - Uraeilior qoam fp«eie« praeaea* den»v, ramls aja ocapilormibot - *Bmekmerm famrifim* I loo Herb * - Cre[^]*1 in Promofltorio BOOM as*! to diMrietu Claowilliam bomli lotrr Hoi ft*** r1 •icreofatrrri

15. Z. BENTHAMIANA Wlprt. mis. - Canle erecto ramoso villosa; foil, oblongo-linearib. obtasis subintegerrimis; spicis basi Interruptis, aplice densis. 0? — Herba major qaam omnes boas paragraph!, exsiccata vii nigrescit. Capsulae submembranaceae. Stamina omnia antherifera In tabo Inclassa, ui in reliquis huiusmodi speciebus. — *Erinut villonu* Tbnbrg. Fl. Capens. 474. — *Nycttrinia viUota* Bth. I. c. — In Promontorio bonae spei (HaaienkraalsriTier) crescit

3005. POLYCABENA BtK

(Bib. in Hook. Compan. botan. Magaz. I. 371. — Meisn. Gener. plantar, vascular. I. 313.11. 9M.)

f. 1. *Corollas tubus calyce duplo triplove longior.*

1. P. (BICHINERA Linn. Mantiss. pi. 88. - MANULEA Tbnbrg. Flor. Capens. 407.) CAPENSIS Blh. I. c. — Viscoso-pubescent: Coll. linearib. oblongtsve integris paucidenulisq.; spicis laxinsculfis numerosis corymboso-pauciculais; corollae tabo calyem triplo excedente. 0 — Herba speelosa semipedalis floribus numerosis latels ornata. Corollae mbns semipollcaris, limbo qaam in generibus praecedentibus majori. Capsulae membranaceae. Doae ?. saepius omnes antherae subexsertae. — Crescit in Promontorio bonae spei (Capo district).

2. P. GILIOIDES Bib. I. c. 378. — Yiseose-pabeteos: foil, linearib. sabdentatis; floralib. calyces aequantibus; spicis pabosoontibus paucifloris; corollae tabo calyem duplo excedente. 0 — Habitu rolert *CUiem laHmittrnm*, maltoque graellior qaam species praecedens floribus quo dlmldlo minoribus Jam primo dlffert adsperta. — *Buehnera Capmtu ft.* Boks. Bb. — Crescit In Promontorio bonae spei (locis arenosis prope Paart).

f. 2. *Corollae tubus calyce lubbrm Aor.*

3. P. (BICHINERA Bnks. Hb.) ALREA Bib. I. c. - Viscoso-pubescent: foil. linearib. iniegerrimis subdentatisve, floralib. linear!-lanceolatis calyces aequantibus; spicis brevibus densis pubescentibus; corollae limbo tabo suo longiore. 0 — Differt a sequente foliis brevibus erectis et praecipue floribus duplo majoribus. — *Jfa-tmka Atikiopica* Tbnbrg. Flor. Capens. 4071 (excl. syn. Linn.) - Crescit In Promontorio bonae spei.

4. P. PCBESCENS Blh. I. c. — Erecta passim viscosa: foil. Majoribus sabovstit, superioribus oblongis lloaribusvo Intogorrisilt donuUsq., floralibus ovalibus UBCOOLATISQ. floribus sobaoqvanUb.; bracteis eaptriisq. paboseotibus; eorollae limbo tabo suo sabaequilongo. 0? — Bpica bracteis doae. Variet foliis totofrit dootatisqae. * Crescit In Promontorio bonae spei (HaateakraaJsrior, loodosaad, Illforfontein, Nemaqualand).

A. P. (MAMLEA Linn. Suppl. 985.) CAPILLARIA Bth. I. c. - Glaberrima: foil, infimis obovatis oblongis, ramealibus linearibus, floralibus linearibus obtusis calyce aequantibus capsulisque glabris; spicis fructiferis laxis. 0f — Herba somipedalis. Bami numerosi minutissime pabrali. Calyx lineam circiter longas. Capsulae et calyx fructifer longiores. Floribus parvis latei. — Crescit in Promontorio bonae spei (Capo Flau et Zwartdand).

0. P. BABIFLOBA Bth. I. c. — Tenuiter pubescens: foil, aagvsto HneaHb. sabintegerrimis v. infimis oblongis, floralibus loricis soporaatibus apldf raris paucifloris subglabris corollae limbo tabo suo breviter. 0t — Antelt praecedentium, tod foil it angastloribus floribus quo maioribus tfflbrt. Polloos qaataor . sot aha erocu ramosissima. — In Promontorio bonae spei (abtae Indicatione loel naulis).

7. P. (MANCULA Linn. Suppl. «0.) PLANTAGINIFLOR Wlprs. mis. - Erecta passim viscosa-pubescent: foil. Inferioribus obtusis, superioribus oblongis integerrimis ptaidentatisq., dorsalibus lanceolatis obtusis calyces soperanUb.; corollae minimae tabo limbo suo longiore. Q? - Bpice capitaliformes foliosae, floribus paucis In caulis infra aggregati. ToU planta sarpe non ultra bipollcaris floresque omnium *Bucknfrearum* ad hunc diem cognitaram minimi. — Pofyrortno *pimmlmairra* Bth. I. f. — *Crticix* in Promontorio bonae spei f Ifodderfontein et Zilverfontein In Nemaqualandi.

8. P. (MANULEA Bnks. Hb.) INTERTEITA Bib. I. c. - Proenmbens vUcoso-pubescentib.: foil, peiiolttis pan is ovalis dentatis pubescentib., floralib. ovato-oblongis oblusis pubescentib. calyces tii superanlib.; spicis globoso-capitalis sobfastigiatif. O? — Flores parti. Folia qaam in speciebus reliquis profundius denlaia. — Crescit io Promootorio bonae spei.

3000. PHYLLOPODICM *Bth.*

Bib. in Hook. Compan. botan. Magai. I. 372. — Meisn. Gener. plantar, vascular. I. 313. II. 291)

1. PH. CUNEIFOLIUM Bib. I. C. 313. — Caule pubescenli-hirlo; foil, inferiorib. petiolalis otalis obotaiiste Inciso-dentalis, loperiorib. oblongo-cuncalis, floralib. tii calyces saperanlib.; spicis floriferis capitatis, fructiferis oblongo-cylindricis densis muliifloris. Q — Caules lifnescotes. Folia cransioscula glabra. Calycis segmeoia medhini tuque membraoa eonnala. Habilus *Selaginis*. — *ManuUa cuneifolim* Linn. Sopl. 285. — Thnbrf. FL Capeos. 408. - Crescil In Promonlorlo bonae spei (Uilenbage, Algoa bay).
2. PH. CAPITATIM Bib. I. o. - Canla hirtoj foil, ovalis lanceolalit oblongiste birtis, superiorib. partis linearib., floralib. otalo-lanceolatis hirtis, eilimis calyces superanlib.; spicis capitatis sabglobosis t. demam oblougis densis multifloris. 0 — Ilagis pilosum apiceqne minos ramosam, quam *Ph. cuneifolium*. Spica densissima vii piso magno crassior. Folia floralia eiiima quasi involucrum efflcinnt. Calycis denies oblusi profuodi. Corolla miouta. — *Manulea capitata* Linn. Soplem. 281 — Tbnbrg. Fl. Capens. 409. — Crescit in Promontorio bonaa spei (in regionibos occideaUlibus t Cape Town adOlifant* rMer in Clanwilliam).
3. PH. BETBfcOPHYLLCM Bñ. I. c - Pusillum blrto, bati ramosuro: ramif reetia; foil, inimli peOolalif ofttit tnbdenus, soperiorib. panels linear!b., floralib. lintarl-lanceototia, esllmls eatyeea ellialos soperantib.; apicia capluuis, frnctlferlt oblongls Inlaealla i ttamlnb. limbo corollae bretioribos. O — Forte *Ph. eapiimii* varieUs, aed mollo gracillor, vhi ultra 0 poll, alta, capilulis florum laiiioribus. Corolla dilute flata. — *Mkmuha heterophyll** Linn. Supplem. »tt. — Tbnbrg. Flor. Capens. 400. — Cretcil in Promonlorio booe spei (prope urbett Zwarlelaud, Caledon).
4. Pn. PIMILUM Bib. I. c. — Ereetnm gtabriosculom: foil, petiolalis otalis, superiorib. oblongis, floralib. ovaiis obtusissimis pubescentib. caJycrm aquaoiib.; spicis capitatis pauciflori*; slamini. limbum corollar arquanlibu*. C) - MUU> gracilior quam pratredens species, capilulis minoribus floribusque majoribus differt. — Cretcil in Promonlorio booe spei (irofn river in Clanwilliam*).
5. PH. DIFFISCM Bib. I. e. - Glabrioscalom v. vii birlum ramosissiroum: fok ovalis oblongisve dentalis, bail ia petiolom longe anRvtUiis, floralib. NnearuV ealycea tit svptranlib.) spieis eJotgalis latls. Q - Bami semipedales t. pedal** procumhenle*. Sa4ea fltriftra Uta9 fraeiifera lere bipollicaris, capsulae Imea faf* ana dittanies. Floret majastnlt. — Creacil ia Promontorio bonae spei.
- 1 PH. BBACTEATIM Biã. I. c. - BamosJutmoai diaTosam: ramis pubescentib.; MI. peiiolalit ovalis dealatis glabria, floralib. coaformlb.; spirit longts; florib; omnlb. rtaoUss calycib. peiiolo folioram floralium tit loomonbu*. J * Rom; Ian loogi, MUmm floralium limbos late tipantut. — Io Promooiono bonae ***. Liieokage, prope Addo el Eaoo, UlifaoUork cretni.

3007. MPBE«%\DB% *Bth.*

(Bth. la Hook. Compan. boUn. Magai. L 373. -- Meita. Gener. plaour. tatcolar.« 3IX II. 2M)

1. SPH. (BtCHOREA AIL Hort Ktveaa. (tdiL I.) II. 3S7. - Curtis's BoL Magai. 6 «7. - aUftl'UU WiUd. Boom, plant aort Btrol. Ui.) VI SCO HA Bib. Io Lindl. .^t iyiL of boL 441 H ia Book. Umpao. bot Magat. L 371 - Soffrult erecta Ptdalia ifrum. a pibagraos; foil, pltrisq. opposiit obloago-laoreolalis pauci-dtouOa,florali*. qodieollo molto bretiorib. liberts ovalis iaionimis acotiesimo;

calycit hispidi laciniit lanceolatis; tubum parvum lubaequalibus. 6 — *Manuua coerulea* Thobrg. Flor. Capens. 407. (vix Linn.) — Crescit in Promontorio boae spei (in desertis Carro et Carroid).

3968. CHAESOSTOMA Blh.

(Bib. in Hook. Cuman. botan. Magaz. I. 374. — Meib. Gener. plantar. vascular. I. 313. II. 224.)

f. I. *Corollae tubus vix exsertus v. calyce brevior.*

1. CII. ROTTUNDIFOLIUM Blh. I. c. — Suffruticosum glaberrimum: foliis, partibus petiolaribus oblongo-rotundatis inciso-dentatis, utrinque viridibus. crassiusculis; pedicellulis axillaribus, calyce glabro parvis longioribus; corollae infundibuliformis tubo calyce brevioris. — Rami procumbentes. Foliorum limbus vix 2-3 lin. longus, petiolo vix 2-3 lin. longo. Floret parvis panibus, versus ramorum apices axillares. — Crescit in Promontorio boae spei.
- 1 GH. PAUCIFLORUM Blh. I. c. — Suffruticosum pubescent: foliis, petiolaribus oblongo-rotundatis dentatis, utrinque pubescentibus; pedicellulis axillaribus, calyce brevioribus; corollae infundibuliformis tubo calyce brevioris, — AbBoe praecedenti, sed floret talem duplo majore. — Crescit in Promontorio boae spei (Nieuweveldbergen in Beaufort, Krakamma in Ullennage).
3. CH. CAMPANULATUM Blh. I. c. — Suffruticosum villosum: foliis ovatis demum rotundatis; racemis laxis multinerviis; calycibus brevibus lanceolatis; corollae brevissimi campanulatae, calycem duplo excedente. — Folia tenipollicem circiter longa, plerumque irregulariter dentata basi contrae. Stamina per paria valde inaequalia, longioribus corolla coerulea brevioribus. — Crescit in Promontorio boae spei (Zuerebergen et Zwartehoogden in Uitenhage et Albany, Key river in Tambukiland).
4. CU. CALYCIUM Blh. I. c. — Suffruticosum glaberrimum: foliis, oblongo-lanceolatis dentatis glabris v. subulvis caescentibus; calycibus glaberrimis laciniis tubulatis corolla tubulata vix dimidio brevioribus. — Habitu accedens ad *Sphinctandra viscotam*, sed gracilior floribusque numerosioribus. Corolla *Ch. campanulatae*.

p. lawiflorum: Floret in racemum laevem ditotum, calyce multo minoris. — Fere dicitur etiam tpeiet. - Crescit in Promontorio boae spei (in dUtrictu Amarnit inter flumina Qebaa et Bathe, tar. 0. In WindhofelbOff).
5. Ca PROCUMBENS Blh. I. c. — Suffruticosum hirsutum: foliis, ovall-oblongis pubescentibus obtusis, utrinque viridibus. nervatis; racemulis paucifloris; pedicellis ita longe longioribus; corollae infundibuliformis tubo calycem aequante. v. vix superante. — Rami prostrati ad apicem puberuli, calyces parvis platis, lobis reflexis planis glabris. - Crescit in Promontorio boae spei (ad Fiah river).
0. CII. LAXIFLORUM Blh. I. c. — Suffruticosum procumbens tubulatum: ramis atcendens. fatigatis; foliis, oblongo-ovalibus tubulatis, basi longo tubo calyce brevioribus; racemulis laxis; floribus longe pedicellatis; calycibus glabris v. canescentibus; corollae infundibuliformis tubo calycem aequante v. vix superante. — Crescit in Promontorio boae spei (prope Kelikamma).
7. CD. IULIMIFOLIUM Blh. I. e. 37ft. — Suffruticosum hirsutum: ramis erectis albidis; foliis, ovall-oblongis lanceolatis subulvis, utrinque incanis planis; racemulis laxis; floribus longe pedicellatis; corollae infundibuliformis tubo calycem aequante v. vix superante. — Habitat *Mm*U*4 ime*****; rami ad basin denticulati. Racemuli tubaphylli, folia floralia parva iolegerrima. - Crescit in Promontorio boae spei (in deserto Karroo prope Graafreinet, Hamerkuil et in planitiebus prope Aastogtberg).
8. CII. POLYANTHUM Blh. I. e. — Suffruticosum v. suffruticosum, basi ramotium ramis apicibus pubescentibus. panibus; foliis, ovall-oblongis dentatis ad basin cuneatis, tubulatis; racemulis laxis; calycibus hispidis; corollae infundibuliformis tubo calycem vix superante. — Habitat et corolla

Ch. laxiflora, folia et calyces *Ch. campanuhti*. — Crescit in Promontorio bovae spei (Zwartkopuriver in Uilenbage).

9. CH. PUMILUM Bth. I. c. — Suffruticosom multiicaule glabrum: foil, oblongis, superiorib. linearib. integerrimis paucidentalisq.; florib. racemosis corollae infundibuliformis tubo calycem fix exeedente. % — Kami numerosi erecli 3-4-pollicares. Folia ad margioem subrevoluta. Pedicelli calyce glabriusculo longiores. Corolla patola at in omnibus bojus paragraph! speciebus. — Crescit in Promontorio bovae spei (Uilenbage, Algoa bay).
10. CH. DENUDATUM Bib. I. c. — Suffruticosom: ramis glabris ascendenlib.; foil, distanlib. linearib. integerrimis, margine revololis glabris; racemis paucifloris; calyce hispido corollae infundibuliformis tubo TIX breviorc. % — Habitus fere *Apterulæ eynanckiae*. Calyx *Ch. campanula*** . Corolla *Ch. pumili*. Capsula oblonga calyce longior. — Crescit in Promontorio bonae spei (Langekloof in »George di'striof).

I* 2. *Corollae tubus calyce bis terve longior.*

11. CH. REVOLUTUM Bib. U. Suffruticosum cinerascens v. pubescent: foil, linearib. integerrimis, margine revololis; florib. racemosis; pedicellis calyce vii longiorib.; calycis laciniis linearib. subulatisq. capsulam ovaiam subaeoaniib., tubo corollae bis terve brevioribus. ty — Herba pedalis ramosissima. — a. *glabriusculum*: — *fi. pubesans*. — Crescit in Promontorio bonae spei (Zwartebergen, Inter rivolum Zondereinde el Gauritx, Fisb river etc.).
12. CH. GLABRATUM Bin. I. c — Suffruticosum glabrum: foil, linearib. integerrimis, margine revololis; florib. racemosis; pedicellis calyce plus duplo longiorib.; calycis laciniis lanceolate-subulatis sobpabescenlib., capsula oblonga breviorib.; corollae tubo calyce bis terve longiore. 4 — Differit a *Ch. limfotio* foliis angustioribus capsulisq. longioribus lotamque caeteroquin glaberrimom. — Crescit in Promontorio boat* spot (ley rhor In Ttmbnkllnd, Kannaland In Zwellendam, ZwaanepooUport).
- ia C& LLMFOLIUM Bib. I e. — Suffruticosam: ramis apice birtellis; foil, oblongis lanceolatis r. linearib. integerrimis paucidentalisq., margine subrevolutis hirtis glabriusculis; florib. racemosis; pedicellis calyce plus duplo longiorib.; calycis laciniis glabris ?. vix birtellis linearib. capsulam subsuperantibus, corollae tubo triplo brevioribus. ^ — Intermedium inter *Ch. glabraluw*^ et *Ch. Aelkiopieum* forteque bujns Tarielas. — *Manuka Imifolia* Tbnbrg. FL. Capens. 406? — Crescit in Promontorio bovae spei (in montibus prope urbem Worcester et prope Brackfontein, Clanwillilm etc.).
14. CH. AETHIOPICUM Bth. I. c. — Suffruticosum: ramis numerosis floriferis fastigialis; foil, oblongis oratisq. paucidentalis glabriusculis; racemis brevibus laevibus; calycibus bispidis, corollae lobo bis terve brevioribus. ^ — Intermedium quasi inter *Ch. Umifohum* el *Ch. faetigiainm*. Folia fere eadem ac *Ch. imlgrifoUi*. - *Budmera Aelkiopiea* Unn« ManUss. plant 251. (nee Tbnbrg.) - Crescit in Promontorio bonae spol.
15. CH. FASTIGIATUM Bib. I. C.3H. — Suffruticosum: ramis numerosis subrectis foil, linearibus v. oblongo-cuneatis, apice profunde paucidentatis; floribus ad apicem ramorum capitato-racemosis; pedicellis plerisque calyce brevioribus; calycibus bispidis tubo corollae bis terve brevioribus. 3- — Suffruticulis humilibus habitu foliisque simillimis *Sahiae dentatae*, insignis racemis compactis 3-7-floris, calycibus bipinnatis.
- «. *Umifolium birsnus*.
fi-lasbis (oliisque glabralis. - *Mammlea cephaloto* Tbnbrg. Flor. Capens*410T — Crescit in Promontorio bonae spei (Babylonslorcnbergen prope OM*⁹ Hynrlvftoraboife).
16. CH. STIPITICATUM Bib. I. c. - Suffruticosum: ramis numerosis subrectis; foil, linearibus v. oblongo-cuneatis, apice profunde paucidentatis; floribus ad apicem ramorum capitato-racemosis; pedicellis plerisque calyce brevioribus; calycibus bispidis tubo corollae bis terve brevioribus. 3- — Suffruticulis humilibus habitu foliisque simillimis *Sahiae dentatae*, insignis racemis compactis 3-7-floris, calycibus bipinnatis.

- brevionbus ty — Floram spicae foliosae subpolhcares. Pedicelli omoes calyce mulium breviores. — Crescit in Promontono bonae spei
17. CH. MARIFOLIUM Bib. I c. — Suffruticosum procombens: ramis cano-pubescentib; foil ovatis crenalis, margine subrevolutis, sublus v. urlinq. cano-lomettosis; Qonb. brevissime pedicellalis opposilis subracemosis; corollae tubo calycem duplo excedente. % — Kami longi virgati. Folia subsessilia albida, quart) non quadrat cum descriptione Thunbergiana. — *Manuka vtrgata* Thobrg Fl. Capens. 470* — Crescit in Promonlono bonae spei (Vanslaadenriviersberge In dlsriclu Litenbaga).
18. CH INTEGRIFOLIUM Btb 1. c. — Suffulicosum laxe ramosissimum subglabrum Toll, ovaiis, margine subrevolutis iniegernnm paucidentalisq. glabns, Qonb. axillanb pedicellalis, supenonb. laxe racemosis; corollae lubo tenui, calyce Iriplo longtorc. 2|. — Ilabitu prope accedit ad *Ch. htsptdum* sed folus minoribus minusque denlaiis differt, caeteroquin tola planla glabrescil v. glabemma est. — *Manulea integrifoha* Linn. Supplem. 885. — Thnbg. Flor. Capens. 407? — *fi. porvifoltum*. (Tygerberg). — Crescit in Promontono bonae spei.
- 10 CH. CUNEATUM Bib. I. c. — Suffruticosom procumbent: ramis hirsulis; foil, subsessilib. obovalo-rotundatis euneatls inelso-denlaiis, utrinq. virldib birtis, florib ad apices ramorum axillarib. subracemoslsv; corollae lubo calyce bis ter\e longiore. 3r — Uabilo prope accedit ad *Ch. mmrifoilm* sed Jam folls et inflorescentia satis differt Folia longitudlne latitudlnequo aequalia, dentibus 3-5 profundissimis notaia — Crescit In Promontorio bonae spei (Holtenlolsbolland et Palmieler in Stellenbosh).
90. CH. HISPIDUM Bib. I c. — Suffruticosum: ramis procumbentib v. divaricate hirsutis, Toll ovatis oblongiste grosse dentalis, bam angustalis cunealisve pubescentib, florib axillanb pedicellalis, supenonb laxe racemosis, cal>rib hirin, corollae lubo Icr bretionbus 2} — Planla hirsulie foliorumque magmludinc valde vanabilis — *Manulea htsptda* Thnbg Fl Capens. 473. — *Manulea oppositi/lora* Vent. Jard de Malm 1') I 15 — Crescit in Promontorio bonae spei.
81. CU. FLORIBINDIM Bib I. c. — Ramis ereclls? pubescentib.; foil ovaiis grosse dentailt, basi cuncatis tenuiter pubescentib; racemulis subcorymbosis in ptniculam terminalem multiifloram dispositis; calyeib. breviter pedicellatls hirtts, corollae tubo ter brevioribus. 2|. — Folia fere eadem ac praecedanils at majors, floras etlam ejusdem magoiludinis. Ab omnibus bujus generis apteiovas roedit inflorescentia. — Crescil in Promontorio bonae spei (ad Port Natal).
82. CH. CORDATUM Btb. I. c. 377. — Herbaceum: ramis proalralli fnbradlcantlb hirsutis; Toll, peiolatis ovalo-rotunda Us dentails, basi trunealis cordalsve pubescniib, flortb axillanb. pedicellalis, calyeib. hispidis, corollae tubo vis duplo brevioribus 2|. — Folia scmipolhcem longa lalaque, corolla quam *Ch. hwptdt* brevior — *Manulea cordala* Thnbg Flor Capens. 47J —/? *htrsuttor*: — Crescit in Promonlono bonae »pci (krakakamma et Olifanshoek in lilenbaga, Rmgtevalci)
83. CH. RAEMOSUM Bib I. c. - Herbaceum? ramis erecUt pubescentib, foil petiolatis lale o\ahs denlatis, tenuier pubesrenlfib., floralib. mlnimls, florib. longe pedunculatis racemosis, corollae lubo calycem duplo eieedente. O — Folia icmipollicaria •• longiora, basi rolandata Y. coneata, floralia sessilia tis 8 lineas longa. Pedicelli patentes % poll, longi. Calyx glabnusculus Inaeqnallter ladnlatus, lacinlis apice subulatis. — In Promontorio bonae spei (Zuurebergen).
84. CH. FOETIDUM Btb I. c — Annum? ereclum ramosum glabriosculum Toll longe peiolatis ovatis inciso-denlatis; pedunculiraxillanb. 1-3-fions, supenonb subracemosis, corollae tubo tenui, caljrem bis tene supcrante. O — Folia semipollicana * pollirana Pedicelli infenorek cor)mbulum Iriflorum gcrenies, »u-penores saepe simplices, racimum irregularem folio»um efficienles. — *Bmehn+ra foeltda* Andrms Bol Itepokit t 80 *Manulea foehda* Difont mss. ex PITS Encbmd. II 148 — *Manulea allermfolia* Dtf mss ex Pen. I c. — Crctfti in Promonlono bonae »pei (v^orce§lrr et (hmullum

23. CH. PEDUNCULOSUM Blh. I. c. — Herbaceum ramosissimum procumbens viscoso-pubescent: foil, petiolatis ovalis inciso-dentatis pinnatifidisq., superioribus parris; pedunculis axillaribus longissimis filiformibus; corollae tubo teno, calyce dimidio v. subduplo longiore, limbo amplo. O — Caules intricati foliosi, pedunculi numerosi, saepe bipollicares. Florum forma similis *Lyperiarum*. Corolla (sicca) flavescens, fauce obscuras colorata. — Crescit in Promontorio bonae spei (Zilverfontein et Namaqualand).

3000. LITPEBIA Blh.

(Bib. in Hook. Compan. bot. Magaz. 1.377. — Meisn. Gener. pi. rascal. 1.313. II. 221.)

f. 1. *Floret tuberculata spicata*.

1. L. FRUTICOSA Bib. I. c. — Viscoso-pubescent: foil, ovatis oblongis subcordatisve integerrimis pinnatis, floralibus conformibus calyces superantibus; capsulis oblongis calyce subaequantibus. 6 — Folia sessilia 3-4-12 lineas longa, exsiccata simul cum Oorum spica nigricantia. — Crescit in Promontorio bonae spei (Zwartdoornrivier in Clanwilliam, Modderfontein, in planitiebus Gariep in Namaqualand).
 2. L. AMPLEXICAULIS Blh. I. c. — Herbacca? erecta viscoso-pubescent *. >illiosa: foil, ovatis dentatis, basi cordato-amplexicaulibus, floralibus subconformibus calyces superantibus; spicis elongatis mollifloris; corollae tubo calyce vix superante, limbo amplo. 2l. — Rami floriferi fere pedales, spica bujus longitudinis ultra dimidium exserte. Capsula glabrescens ? in calyce longitudinaliter. — Crescit in Promontorio bonae spei (Zwartdoornrivier, Natroet et Groenrivier in Clanwilliam).
 3. L. (ERINUS Linn. Snopl. 987. - Thunberg. Fl. Capens. 470.) TRISTIS Bib. I. c. 378. — Herbacca erecta: foil inermis petiolatis ovatis oblongisve dentatis integerrimis, superioribus oblongis lanceolatis, floralibus lanceolatis integerrimis, superioribus brevioribus spica florifera densa, filicifera elongata; capsulis calyce duplo longioribus. 3l. — Caulis crassus rigidus, saepe ramosissimi pedales r. ultra. Corollae tubus circiter pollicaris, limbi lacinae submarginatae. Capsula 4-5 lin. longa. — Crescit in Promontorio bonae spei (Cape Flats, Zwartland etc.)
 4. L. (ERINUS Ait. Hort Kewens. [edit. I.] 11.357.) FRAGRANS Blh. I. c. - Suffruticosa suberecta viscosa: foil, ablongo-lanceolatis, apice dentatis, basi angustatis integerrimis, superioribus angustioribus subintegerrimis, floralibus calyce subbrevioribus; spica florifera (Juncus), fructifera elongata; capsula calyce in duplo longioribus. ^ — Folia ad caulibus numerosissima, lata plania puberula, exsiccata omnino nigricant. Capsulae 4-5 lineas longae. — *Erinus iychnideus* Thunberg. Flor. Capens. 474? (excl. syn. pluribus.) — *Lychmides tillota* Burm. Afric. IX 1. 49. fig. 4. - Crescit in Promontorio bonae spei (Cape Flats, Zwartland, Saldanhabay).
 5. L. MACROCARPA Bib. I. e. - Suffruticosa: canle glabrescens; foil, oblongo-linearibus obtusis integerrimis, basi angustis tenuiter pubescentibus, floralibus calyce aequantibus; spica elongata; capsulis calyce subduplo longioribus. % — Habitus *L. fruticosa* sed folia integra et capsulae fere pollicares. — Crescit in Promontorio bonae spei.
 6. L. (ERINUS Thunberg. Flor. Capens. 474?) SIMPLICA Blh. I. r. - Herbacca erecta subsimplex: foil, ovatis petiolatis ovatis subdentatis, superioribus oblongis lanceolatisve integerrimis; spica elongata; capsula calyce in duplo longioribus. ^ - In Promontorio bonae spei >Falk Bay, Karroo.
- f. 2. *Hesperis foliis mm fasciatis; florum pedicellatis racemosus*
7. L. TENTACULATA Bib. I. e. - Posilla erecta tenuiter viscoso-pubescent: foil oblongis laevigatisve integerrimis pinnatis; pedicellis calyce panim longioribus. ^ - These plants have quadripollicares*, flores 8-10 lineas longi. - In Promontorio bonae spei crescit
 8. L. RACEMOSA Bib. I. e. - Erecta viscosissima: foil, ovatis argute dentatis, basi longe angustatis; floralibus pedunculatis racemosis; corollae limbo amplo

- dimidio tubo longiori. % — Herba circiter pedalis; corollae lobus 0 circiter tineas longus, limbi lacinae latae breviter bifidae. — Crescit in Promontorio bonae spei (Clanwilliam, Namaquatand).
9. L. GLUTINOSA Bib. I. c — Herbacea, erecta viscosissima: foliis, petiolalis ovalis argute dentatis, basi rotundato-lruncatis; floribus pedunculatis racemosis; corollae limbo dimidio tubo brevior. 2}. — Caulis quam praecedentium speciei gracilior magis glutinosus; folia breviora; corolla gracilior, limbo multo minori. Calyx viscosissimus quam capsula longior. — In Promontorio bonae spei (Gariiep).
10. L. (MANULEA Lnk. Enumer. pi. horU Berlin. II. 142.) YIOLACEA Bib. I. c. 370. — Decumbens v. erectiuscula glabrescens: foliis, petiolalis oblongis dentatis; floribus paucis subracemosis; corollae limbo dimidio lobis multo brevior; capsula ovalis villosa calyce duplo longiore. 2}. — Caulis glabrescens fere seipollicaris. Folia semipollicaria parum profundeque dentata. Corolla 7-8 lin. longa, limbi lacinae integrae. — *Erinut patent* Thunberg. Fl. Capens. 475? — *Manulea crystallina* Weinm. Syllog. plant. ad Flor. Ratisbon. I. 921? — Crescit in Promontorio bonae spei (Ueiriver).
- §. 3. *Suffruticosa v. fruticosa; folia saepe ad angulum fasciculata; pedicelli axillares v. tubracemoti.*
11. L. IIS CIS A Bib. I. c — Suffruticosa humilis ramosissima: foliis, petiolalis obovatis obtusisve incito-dentatis, utrinque ramisque. Tillosum; floribus pauca aubracemosis; corollae tubo calycem sextuplo excedente, limbo breviter 2} — Corolla ultra pollicaris. — *Erinut inaequalis* Thunberg. Fl. Capens. 475. — Crescit in Promontorio bonae spei.
12. L. CANESCENS Blh. I. c. — Suffruticosa decumbens ramosissima: foliis, petiolalis subfasciculatis oblongis inciso-dentatis, subtus v. utrinque incanis; floribus subracemosis; racemis paniculatis; pedicellis brevibus rigidis; corollae limbo brevis; capsulis calyce dimidio longioribus. ^ — Affinis *L. argentea* sed rami minus divaricati rigidiores, pedicelli breviores, Oeres numeroaorea mi no re*. — Crescit in Promontorio bonae spei (locis inundatis ad Gariiep).
13. L. (MANULEA Linn. Supplem. 2U. - Thunberg. Flor. Ctpens. 472.) ARGEMEA Bib. I. e. — Suffruticosa, divaricato-ramosissima: foliis, petiolalis subfasciculatis ovalis oblongisve inciso - dentatis, subtus T. utrinque scabro-pubescentibus. subincanis; pedicellis axillaribus filiformibus. v. aopremis subracemosis; corollae limbo dimidio brevior. ^ — Rami longi, ramulis nanerosis graevibus instructi. Folia inferiora fere semipollicaria, ramea minora. Pedicelli €-10 linea longi, corolla 5-10 lineas longa, capsula circiter linea longa. PUNta quoad pubescentiam valde variabilis, sicca plerumque nigrescens, nomine specifice rarissime respondet.
- a. Folia subtus albidis.
fl. Folia utrinque subtiridibus.
y. *Scabrior*: foliis obtusioribus. — Crescit in Promontorio bonae spei (Uitenbage, Vanstaadensberge, Bosmans rifer, tmlaU in regione Aakosa).
14. L. (BLCHNERA Andrews. Bot. Repert. t. 84. - MANDLBA Pen. Burchard. II. 181) PEDUNCULATA Bib. I. e. — Suffruticosa divaricato-ramosissima, leniuiter pubescens: foliis, petiolalis subfasciculatis obovato-cuneatis inciso - dentatis; pedicellis elongatis axillaribus filiformibus; calycis corollae limbo triplo quoad brevior; corollae limbo dimidio brevior. %> — Caulis praecedentium. Affinis *JL cumtata*; sed folia multo majora pedicelli ultra pollicem. - Crescit in Promontorio bonae spei.
15. L. PILOLOGIFLORA Bth. I. c. - Suffruticosa decumbens ramosissima: ramis, fasciculatis petiolatis oblongis inciso-dentatis pinnatifidisve leniuiter pubescentibus. glaberrimis; ramis lastis nudo - pubescentibus; corollae limbo amplo, laciniis emarginatis, tubo aequilongis. ^ — Differt a *L. argentea* foliis nonnisi profundius denatis a corollae limbo lain rtpanso. - Crescit in Promontorio bonae spei (Keiskamm.)

10. *L. CRASSIGAULIS* Bth I.e. — Saffruticosa, basidecumbensramosissima* ramis stnelis rigidis scabris, foil petiolatis ovaiis pinnaliseclis, segmenlis oblongo-cuneiformib. integns 2-J-fldis scabris; racemis slnciis; pedicellis calyce subbrevionb; corollae limbo brevi, lacinns emarginalis. 2 — Semipedahs v. pedalis, sicca nigrescit, glanduloso-punctata, panctis statu sicco albis. — Crescit in Promontorio bonae spei (Wildhatsberg et Witbergen).
17. *L. MOLLIS* Bth I. c. 380. — Suffruticosa molliter villosa. ramis elongatis procumbentib., foil, subfasciculatis peliolatis ovatis inciso-pinnatifidis pinnaliseclisve, lacinns ovatis mlegris incisive; pedicellis axillarib. filiformib.; corollae lubo calyce vix duplo longiore. 2], — Rami graciles; pedicelli 8-10 lineas longi. Corolla 4-5 lin. longa. — Crescit in Promontorio bonae apei (Grahams Town in Albany, Zunreberg in Uitenhage)
18. *L. FILICAULIS* Bth. I. e, — Soffmleosa pnbesca: ramis elongatis tenuib. procmnbenlib; foil. subfascoulalis petiolatis obovato-subrolundis inoiso-pinnatifldis, lacinns obovatis obtusissimis, pedicellis axillarib. Bliformibus. 2< — In Promontorio bonae spei (Witbergen) crescit.
10. *L. (MANULEA* Linn Supplem 286 - Thnbrg. Flor Capens 473.) *PLY\ATIFIDA* Bih I. c — Suffruticosa decombens ramosissima • foil, pinnatiseciis, segmenlis oblongo-caneatis integris denlatis pinnatifldisve; florib. subracemosis, corollae tubo calycem triplo quadruplove soperante. 2L — Planta maxime vanabilis vane tatesqoe infra enmeratae forte lolidem efOcienl species bene di>tinctas, sed statu sicco difficile distingnendas. Folia longitndine variant trilineana v semipollicana, segmentis pleramqae convolutis v condnplicatis. Flores pauci reele stricleque pedicellati. Corollae tnboa 4-5 lin. longus, limbos 2-3 lineas longus, segmentia obtasis v minale emarginatis.
- a. *edneseens*: Capsalls calyce vix dimidio Jongloribos.
fi. 9*bc**s9t*%s: Capsnlls calyce sobdoplo longloribua.
y. *vtscoto-pubneem*: Capsnlls caljee aubdaplolongioribns; corollis minoribus
d *subbipmatitecia*: Corollis majoribus.
*. *nteropylla*: Viseoso - pobescens. — Crescit in Promonlono bonae apei (Karoo el Karroid, inter Beaufort et Fish river).
- 80 *L. MULTIFIDA* Bth. I. c. — Suffruticosa procumbens ramosissima foil subfasciculalis bipmnalisectis, segmenlis plerisq peliolulatis* oblongo-cuneatis integris incisic pinnatifldisve, racemis pauciflons, calycis lacinns lineari-spaihulaiis, corollae tubo vix dimidio brevionbus 2f — Folia magis divisa, flores mullo minores quam *L. ptmahfidae*. — Crescit in Promoolorio bonae spei (Slernbergspruil et Slrombergen).
- 21 *L. FOLIOLOSA* Bth. I. c. — Frolicioia divaricato-ramosissima* foil, parvis fasciculalis lineari-cunealis dentalis pinnatifldisve, utriq. canescentib.; florib. subracemoais; corollae tubo calycem subtriplo excedente. % — Folia 1-3 lin. longiora mullo angustiora mlnusque Ineita quam ilia *L. pinnaitfidae t*, cui simillima — Crescit in Promontorio bonae apei (Karoo, Zwartekopf et Langekloop).
- 22 *L. CUNEATA* Blh. I. c. — Fruticosa ramosissima' foil, mmutis fasciculalis, apice 2-3-deatatis, rarios lotegerrimis glabriusculii v. tenuissime pubescenlib; florib. subraeemoait; corollae tubo calycem triplo quairuplove excedenlibus. ^j. — Folia intermedia inter ilia *L. foholosac* et *airopurpureae* Diffcrl a *L. pedunculate* foil is minolis sessilibus pedunculisque raro aemipollicanbus. — Crescit IO Promontorio bonae apei (prope Gauntz river).
- tt. *L. (MAHLEA* Bnkt. Hb) *PtRPIREA* Blh I. c. - Frulieosa ramosiuima foil ninuua fasciculalis lineanb. lategemmis v, rarius unidentatis, florib. subraeemoia; eorollae tubo calyces aexiea vel aepties excedenie 6 — Folia glabri ?• pubeeettita liaaaa unam v. duaa looga. Corolla fere polhcarit. Capsula quam apiecieran prtt<e4e<iiuBi aajor PlanU culta differ! solummodo follia longioribus. — Crescit |a ProaioBtorio bonae apei (Karoo el Karroid)
- M. *L. ASPAUTHOIDB8* Blh. I. e. 381. - FruUcoaa ramoaisaima foil minolis faaciculatis oblongis lineanbusve lotegerrimit; florib. raceaoals; rorollae tubo ca-

lycem duplo (riplove superante. 6 — Folia minora quam praecedentis, angustiora quam *I. microphyllae*, non imbricala. Flores circiter semipollicares. Rami pubescentes; folia glabra. — Crescit in Promontorio bonae spei (Grasrugg et Krakamma in districtu Uilenhage).

25. L. (MANULEA Linn. Supplem. 258. - Thnbrg. Fl. Japonic. 466.) MICBOPHYLLA Bth. I. c. — Fruticosa ramosissima: foliis, minutis ovatis integerrimis, ad axillas fasciculatis, ramulorum juniorum quadrifariam imbricatis; floribus versus apices ramulorum paucis. 5 — Folia vix semilineam longa. Flores circiter semipollicares. Limbi lacinae latae obovatae. — Crescit in Promontorio bonae spei (Karroid, Zwartkops river, Garlep, inler Ado et Zondag river).

3070. MANULEA Linn.

(Linn. Gener. plant, no. 1264. excl. spec. plnrim. — Meisn. Gener. plantar, vascular. I. 313. 224. — Bib. in Hook. Gomonan. bot Magai. I. 381. — G. Don, General syst. or gard. and bot IV. 503.)

§. 1. *Pedicelli uniflori. Corollae lacinae bifidae obcordatae obovatae vel rarius oblongae obtusae. Folia subradicalia; pedunculi tcapiformes simpliciter nudi vel minute bracteati, apice racemoti.*

1. M? NERVOSA E. Mey. mss. ex Bth. I. e. — Fol. ovato-oblongis ovatisve integerrimis glabris; laciniis calicinis late lanceolatis; corollae laciniis latis emarginalis, binis superioribus ultra medium connatis integerrimis. 2]. — Species distinctissima forte propriam effleat genus. Herba triquadripollicaris. Segmenta calycina latiora crassiora, corollae tubus brevior, limbus major minusque profunde cissus quam in ulla alia hujus generis specie. — Crescit in Promontorio bonae spei (Zilverfontein in Namaqualand).
2. M. SILENOIDES E. Mey. mss. ex Bih. I. c. — Annua: foliis, petiolatis ovatis integerrimis v. obscure dentatis; laciniis calycinis linearibus, Junioribus basi submembranaceo-connatis, fructiferis capsulam superantibus; corollae laciniis emarginato-bifidis. O — Habitatio *nervosa*, sed gracilior. Corollae tubus longior, limbus brevior, segmentis angustis. — Crescit in Promontorio bonae spei (Karakuls, Mircenksleel, Zwartdora river, Modderfontein in Clanwilliam). — *ft. minor* E. Mey. mss.
3. M. ANDROSACEA B. Mey. mss. ex Bib. I. c. - Fol. ovato-oblongis integerrimis subdentatisve; pedunculis glabris; nearis subcapitulis; laciniis calycinis oblongo-linearibus glabris capsulam aequantibus; corollae tubo triplo quadruplo superante, limbi laciniis obovatis retosis. % — Caulis rigidiorae *M. rilenoidis*, folia longiora angustioraque. Flores subsessiles capsulam compactam formantes. — Crescit in Promontorio bonae spei (prope Noagas).
4. M. CORYMBOSA Thnbrg. Flor. Capens. 472. — Bth. I. c. — Fol. ovato-oblongis obovatis integris dentatisque glabris v. tenuiter pubescentibus; pedunculis scapiformibus 1-2-foliatis; racemis fructiferis elongatis; laciniis calycis linearibus, capsula longioribus, basi margine membranaceo-ciliatis; corollae laciniis late obovatis. 2]. — Semipedalis v. pedalis. Flores saepe reflexae. Corollae tubus 3 lin. longus, orificio piloso. — Crescit in Promontorio bonae spei.
5. M. ALTISSIMA Linn. Supplem. 285. - Thnbrg. L. e. - Bib. I. e. 382. - Fol. oblongo-ellipticis lanceolatisve subdentatis leniter pubescentibus; pedunculis longissimis, interdum 1-2-foliatis; racemis fructiferis oblongis densis; laciniis calycinis capsula longioribus pubescentibus-scabris. 9]. — Pedunculi v. caules floriferi saepe sesquipedales, ramis interdum 1-2 instructis. — In Promontorio bonae spei.
6. M. LOMGIFOLIA Bib. I. c. — Fol. oblongo-lanceolatis integerrimis v. obscure dentatis glabris; racemis floriferis elongatis ramosis subnudis v. basi paucifoliatis; racemis fructiferis elongatis; calycibus brevissime pedicellatis, laciniis lanceolatis bispidis capsulas subsuperantibus. % — Forte *alitiwu* various, sed caules ramosi, rami parti corollaeque multo minores. — Crescit in Promontorio bonae spei 'Ebcneier'.

7. *M. BELLIDIFOLIA* Bib. I. c. - Poll, obofalif oblongisve subcreatis glabris • tenuiter pubescens; racemis fructiferis elongatis; capsulis remotis; laciniis calyciols laeaeolatis subglabris; corollae laciniis oblongo-ovatis. 2f. — Jf. *corymbotae* affinis, sed calyce satis distincte. Folia *BeUdii tylvettrii*. — Crescit in Promontorio bonae spei (Uiteabage, Kalriviersberg etc.).
- |. 2. *Thyrsiflorae. Racemi compositi, pedicellis fasciculate-pluriflori. Corollae lacinae oblongae integerrimae obtusae. Caules saepe foiosi.*
8. *M. INCANA* Tbobrg. Flor. Capes. 468. — Bib. I. c. — Suffruticosa humilis ramosissima: foliis, ad basin ramorum approximalis petiolalis oblongis oblongis, apice dealatis, basi angustatis, aliaque laeaeis; ramis Ooriferis erectis subondis racemosis; pediculis brevissimis 1-3-loris; calycibus. incanis lubo corollae vix brevioribus. 2f — Species distinctissima babilu *Chaenolomatis halimifolii*. Calyx 3-4 lineas longat medianae escae flssas. Corollae divisiones aequalia oblongae. — Crescit in Promontorio bonae spei tpti.
9. *M. CRASSIFOLIA* Bib. L. e. - Pereaalt: foliis, tabradicalibus. oblongo-ellipticis spalbulatis oblongis el oblongis sabdeatatis, aliaque. glaberrimis; caulibus subaudis; racemo elongato ialeraplo; floribus. fasciculatis; calycibus laciniis membraceoconnatis, apice lanceolato-laeaeis. capsulae subaequalibus; corollae lubo calycem duplo triplove superae. 2f. — Glaberrima glaucescens. Varietas magnitudine, J-4-pollicaris. T. pedalis sesquipedalisve. — In Promontorio bonae spei (Moogplais el Wilbergeo) crescit
10. *M. JUNCEA* Bib. I. c. — Pereaalis glaberrima glauca: ramis siccis erectis Jaecvis paucifoliis; foliis, oblongo-laeaeis. remote dentalis pinnatisve, superioribus. laeaeis. ialegenimis; racemo composito paucifloro drecte; calycibus laciniis sabalibus capsulae tabaapertae; corollae lubo calycem quaduplo qaduplove superae. % — Bami aim blp#dales. Baeml ft-7 poll, loogi. Calyx paberalas. Corollae labii clrcilcr sempolllearit. — In Promontorio bonae spei (Giflberge).
11. *M. BIGIDA* Bib. I. c. — Erecla seabro-pubesces: ramis divaricatis; foliis, laeaeolatis lacino-dealatis pinnatifidisve; racemis elongatis; floribus. subfasciculatis brevissime pedicellatis; calycibus laciniis apice subulatis capsulae duplo superae. lib.; corollae tubo calyce vli daplo longiore. 2^ — Habitus *M. junctor*, sed saprt raroosa: folia sessilia • amplexicaulia saepe erecta, nervo medio valde prominente. Pedicelli 1-A-flori. Corolla *M. jmmeeae*. — Crescit in Promontorio bonae spei (Olifants rier el Brackfoaleia, Wopperlbal).
- H. *M. DENSIFLORA* Bib. I. c. — Peraanis ramosa pubesces: foliis, eaulibus oblongo-laeaeis. sabialegerimis dealatisq.; racemis deasis subspicaeformibus; «** lycis laciniis sabalibus eepsulss sabaperaallibus; corollae lubo crataiasculo. %> — laflorescencia JH / » • • #, ted babita foliisque difert — Crescit in Promontorio boae spei (difsau rter at BraekfMMtla).
- IX. *M. PABVIFLOBA* Bib. L. c. - PervBaU: oaele tritclo aabramoso paucifoliaU pabeseente; foliis, radicalibus. oblongo-spetsbaulis obovaUsve, caulibus linearibus. ialegtrrimis paucifatalisq.; racemis elongatis laeaeis. maliifloris; rbarbi pubescentis; calycibus miouli laciniis laeaeis., capsulae truacala brevioribus. % — Afflali .V. mire* et *Uioslmckf**, sed mullo gracilior et corollae lubus *u duas lineas longus. — In Promontorio boae spei (prope Omlaia ia regione Amapoda).
14. *SI. IEIOSTACHYS* Bib. I. f. - Pereaais: caele ercio, basi pubescente; foliis pubescentibus., iaferioribus. longe petiolalis oblongis denlatis, superioribus. oblongis • Mtbalibus laeaeisve paucifloris; racemis malifloris elongatis caelae » • * era* glebtrrimis; ralyeis laciniis laeaeis. oblongis, capsulae tii brttoribus. * — BigWIUr BMgiscae ertcta q«em *M. rsitara* Soribuscae planbas gracilibas IB* siracta, amBmiam loiat ptaue gla^rae gMaeseaeies. - Crescit in Promontorio boae spei (Ce4etbofgea ia CMSjvilliam H Gaadraibal).
- ly *U. (KEMIA Borgli**, pt Capojs. 160.) BtBBA Uaa.ftappl.itt. - Tbobrf.rt.CaM*** 411 - Bib. I. c. - Poroaals: eaele eredo v. basi deeambealo tilloso; foliis. *** loBgo-laeaeolatis itiatatis. basi aagatialis. airiaque. pabescentibus. vtUoaiavti r » •

- inlerraplo subramioj calycis lacnlls llinearl-oblongis oblusis capsula subdimidie brevioribus; corollis calycem Iriplo Y. qaadraplo eicedenlibus. % — Flores semipollicares v. breviores. — *Manulea anguttifolia* Lnk. ei Olio, Icon, plant select bort Berolin. I. 47. t t- 20- — In Promontorio bonae spei (Hollenlolsbollaod).
10. M. OBOVATA Blh. I. c. — Perennis: caule basi decumbente pubescente; foil, radicalib. ovalis, caulinis obovalii oblongisve grosse arenatis subinclinatisve, uirinq. pubescent ib.; racemo elongato multifloro^ subramoso; calycis lacnlls llinearib. obtusis capsula subbreviorib.; corollae lubo calycem duplo triplo superante. % — Foliorum latitudine maxime variabilis. Flores quam in *M. rubra* multo numerosiores, corollae et capsulae ultra dimidio minores. — Crescit in Promontorio bonae spei (Algoa bay).
17. M. (SELAGO Linn. Spec. plant. 877.) TOMRNTOSA Linn. Suppl. MO. - Thnbg. Flor. Capens. 47a — Curliu, Botanic. Magai. t 322. — Lnk. et Olio, Icon, plant select bort Berolin. I. 45. | I. 10. - Bib. I. c. — G. Don, General syst. of gard and bot IV. 505. fig. 56. — Caule decumbente humili ramoso lomenoso-villoso; foil, obovatis oblongisve denatis crassis, uirinq. dense tomentosissimis racemo breviter denso; calycis laciniis lanceolatis-linearibus. villosis-tomentosis capsulas subaequantibus. at — Ram) breves rigidi; racemi 2-3-pollinibus. — Crescit in Promontorio bonae spei (Hollenlolsbollaod).
18. M. TRYRSIFLORA Linn. Supplem. 9B1 - Thnbg. Flor. Capens. 471. - Bib. I. e. — Caule erecto flexuoso ramoso tenuissimè pubescenti*; foil, obovatis grosse denatis glaberrimis; racemo paniculaeformi multifloro; pedunculis laevibus cymosis; calycis laciniis linearibus; corollae lubo calycem Iriplo quadruplo superante tenui, limbi laciniis oblongo-linearibus. obtusis. ^ — Racemus v. panicula semipedalis. Cymae inferiores oppositae, superiores alternae laxè dichotomae. Corolla gracilis, lubo tres circiter lineas longo. — In Promontorio bonae spei.
10. M. PAMICILATA Blh. I. c. — Erecta elata ramosa cano-pubescenti: foil, ovalis obovatis grosse crenatis; panicula maxima; racemi* numerosis, basi foliis elongatis multifloris; pedunculis cymosis; calycis laciniis oblongo-linearibus. obtusis; corollae lubo calycem Iriplo excedente, limbi laciniis obtusis. ^ — Caules crassi duri. Paniculae pedalis ramis erectis, cymis multo densioribus quam in *Jf. imbriciflora*, — In Promontorio bonae spei (Strombergen et prope Kraai rivis).
90. M. TLRRITIS Bnkt. Hb. «x Blh. I. c. - Caule v. ramis erectis ramosis hirsutis; foil, petiolatis ovalibus oblongisve induratis, basi aegris, vixque hirsutis; racemo elongato tenui; Orib. fimbriatis; calycis laciniis linearibus. obtusis. ^ — Corollae lubo gracili calycem quinquuplo t. septuplo excedente, totajilla oblongo-linearibus. obtusis. ^ — Caules pilis albis obsiti, racemi floresque similes illis *Jf. leioslaehyae*, sed folia et bibras diversissima. Basis fruticosa ease videtur. — Crescit in Promontorio bonae spei (in rupibus ad Nieuvekloof).
- f. 3. *Acuti/lorae. Racemi compositi v. *ubsimplicis. Corolla* lacinia* omne v. *superiore* subuloto-acuminatae.*
21. M. BIPELLATA Bib. I. c. 384. — Caule ascendente pubescente parce ramoso; foil, petiolatis late ovalibus incano-serratis pubescentibus; racemo elongato composito laxo multo; calycis laciniis linearibus-subulatis; corollae lubo calycem Iriplo excedente. % — Species elegantioribus auranlatis laceris seplenis^e in eodem pedunculo insignis. — In Promontorio bonae spei (Worcester) crescit.
- tt. M. EXALTATA Bnkt. lib. ex Blh. I. c. — Caule erecto ritaricali ramoso pubescente; foil, petiolatis laevibus ovatis inriso-serratis pubescentibus; racemu fruticulis paucifloris iolerrupis, basi foliis*; calycis laciniis linearibus-tubulosis corolla tubo dimidio brevioribus. ^ - Kami «racilfi; pedunculi brevitati 1-3-Qoriorum; (lore* quam illi *Jf. trillalar* dimidio minor?*. -- Crescit in Promontorio bonae spei Clantilliam, Olifanum mrr, Brakfunum in elr..
- O. M. (>EMIA Bergii*. Klor. Capri*. 100. LOBELIA Linn. Spec. pi. Ul) CURIUATHL'S Linn. Manliss. plant. 88. Blh. I. c. - Foil, tubradicalibus. ovalis ob-

- otalis oblongisfc; pedunculis scapiformib. ereclis slmplicib.; racemis composilis; corollae lobo vix eiserto, limbi laciniis saperiorib. longissime subalalīs. 2r — Laciniae quinque corollinae magnitudine sua valde differunt, unde nomen generis desumlum esl. — Jf. *rhynehanika* Lnk. Enum. pi. hort. Berolin. II. 142. — *fi. Floribunda*: floribus multo numerosioribns. — Crescit in Promonlorio bonae spei (Gariap river in IH'emaqualand).
24. M. PI'SILLA E. Mey. mss. ex Bib. I. c. — Foil, subradicalib. obovalis oblongisve snbdeniaiis; pednncolis icapiformib. numerosls subereclis; racemis sub— simplicib.; corollae lobo vix exserlo, laciniis limbi fix inaequalib. tubo subbrevioribus. 2l. — Affinis praecedendi, fed habitu floribosque multo minonbus. — In Promonlorio bonae spei (Zilverfonlein in Nemaqualandy crescit.
- tt. M. GARIEPINA E. Mey. mss. ex Bib. I. c - Foil, subradicalib. ovalis obovalis oblongiave; pedoocolis seapifonnib. eredis sabramosis; racemis composilis mnlti-Boris; eorollae labo ealyeMi pins dopto exeedente, limbi laeinlis loaequalibos. 2r — Prope acedil ad Jf. *Cktirrmfkm*, ted loribas differl, nliosqoe el etiam praecedentis laciniae corollinae Inferior* saepins v. Interdom omnes oblusae. — In Promonlorio bonae spei (in planiiebnl Gariap in Nemaqualand) crescit.

f *Species vix notae.*

26. M. ANTIRRHINOIDES Linn. Supplem. 280. - Thnbrg. Flor. Capens. 400. - G. Don, General tyst. of gard. and bol. IV. MM no. 20. — Foil, ovato-lanceolatis serralis villosis; capilulis globosis; canle erecto. <f — In Promonlorio bonae spei.
87. if. VIRGATA Thnbrg. I. c. — G. Don I. c. no. 87. - Foil, obovalis serralis villosa; ramis panicalalis; lorib. allrrnis remolis. </ — AfOnis dicilur *M. lurritu* — Greacil in Promonlorio bonae spei.
- tt. M. CSPHALOTU Tknbrf. U- Foil •blonyia aroso-temUa gUbris; Oorib. sobambellatis. cf T — (Cf. *Ckmmo&tomm fastigimHm* Bin. — pag. 318. no. 15.) - Crescit in Promonlorio bonae spet
88. M. HIRTA Thnbrg. I. c. — (i. Don L c. no. 80. — Foil, obovalis duplicalo-serralis pilosls; florib. axillaribun. <f — In Promonlorio bonae spei.
30. M. TIJtNBERGII G. Don I.e. no. 3a — Foil, oblongis serrahs lomenlosis; raule erecio piloso. </ — *Erimms tomntiotu** Thnbrg. I. c. 47H - Crescit in Promonlorio bonae spei.

ft *Species § gen\$ r\$ xpellendae.*

- M. AETHIOPIGA Thobrg. - POLYCARKNA AIREA.
M. ALTER.MFOLIA DWonl. - <:il,\K\OSTOMA FOETIDUf.
M. ARGEXTEA Linn - L\FKRIA (q)>ESCE>S.
M. ATROP† RPUREA Bnht. - LVPERIA ATROPUR†REA.
M. CAPEX†IS Thnbrg- — POLYCARKNA CAPE^SIS.
M. (UPILLARIS Umm. - POLYCARKNA CAPILLARIS.
M. CAP I TATA Linn. - PBYLLO PODIUM CAPITATI^M.
M. (EPHAU)TES Thnbrg. - CHARROSTOMA FASTIGIATEM?
M. CORDATA Thnbrg. - THAESIOSTOMIA CORDATI^M.
M. COERVLEA Thnbrg. - SPBRASDRA VISCOSA.
M. tRY9TALLISIA Wfins. - LYPERIA VIOLACEA.
M. (.1 >K I POL IA Linn. - PHYLLOPODII^M CI^EIFOLII^V.
M. DIVARMA^TATA Thnbrg. - ^VCTEII^IA DIVARICITA.
M. FOBTIDA Aodrwt. - CHAESOF†TOUA Ft†F.TIDI M.
M- HRTRROPBYLU Linn. - PBYLLOPODII II IKTEROPBYLL†M.
H. HISPID* Tbabrg. - CBAE!IO6T()iIA III>FIP1li.
* MTB††RirOLIA Linn. — CnUKKUnTUIIA LNTEGRIFOLIUM.
M. LUIPOUA Thsihrf. - CnUERO†TOMA UNI FOLIUM.
M. MK.ftOP†YLLA Umm. - LYPERIA MICROPBYLU.
M. OPPOSITIPLORA Ytsil - CHAEXOSTOMA RI&PIDUM.
M. PEDUSCULATA Pen. - LYPERU PSDUMCULATA.

- M. PINNATIFIDA Linn. - LYPERIA PINNATIFIDA.
 M. PLANTAGINIS Linn. - POLYCARENA PLANTAGIMS.
 M. REVOLUTA Thnrg. — CIUENOSTOMA REVOLUTUM.
 M. VIOLACEA Lnk. et Olio. — LYPERIA VIOLACEA.
 M. VIRGATA Thnrg. - CHAENOSTOMA MARIFOLIUM?
 M. VISCOSA Willd. - SPHENANDRA VISCOSA.

Tribus VIU. *BUVDLEIEAE* Bth. Scrophular. Indie. 42. —
 Endlich. Gener. plantar, p. 687.

Corollae tubo recto, limbo piano patente, aequaliter quadrifido. Stamina quatuor, omnia fertilia aequalia, antheris distantibus bilocularibus. Capsula bilocularis septicida bivalvis.

3971. *BVDDLIA* Linn.

(Linn. Gener. plantar, no. 140. — Melin. Gener. plantar, vascular. I. 300. II. 220. - G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 80S. — Spr. Syst. veg. I. 428.)

1. *Flor.*\$ axillare* verticillata* L.

1. *B. sessiliflora* B. B. Kth. NOT. gen. et spec. plant. II. 345. f. t. 182. - Kth. Synops. plant. aequil. II. 110. — *Ramia tereliba*; ramulis foliisque. Incanotomcnosis lanceolatis, ntrinque angustato-aequilanella integerrime ambiculis; floribus axillaribus glomeratis. 6 — Folia 8-3-pollicaria, infra ferruginea. Glomeruli 3-5-flori breviter pedunculati. Capsula obovata, apice pilosa. Corolla calyce duplo longior lutea. — Crescit prope urbem Meicel.
2. *B. scordioides* H. B. Kth. I. c. f. t. 181 - Kth. I. c. - Ramis tereliba. foliisque. tomentosis sessilibus. oblongis obtusis crenatis rugosis, subtus ferrugineis; floribus axillaribus. terticillatis. 6 — Habitat *Teucris Scordii*. Folia supra virentia fere pollicaria. Floribus terticillatis ultra globoia, nagnitadine Pist. majorii. Corolla campanulata lutea. — Crescit prope urbem Meici.
3. *B. verticillata* H. B. Kth. I. a. 34f. f. L. 1M. - Kth. I. c. - Ramis tereliba. glabris; ramulis foliisque. lomeolosis, tapra Incanit, aublai fafoeteefl. oblongis acutis, basi angustatis breviter petiolatis integerrime foribus axillaribus. terticillatis. Us. 5 - Ramis stellatis pilosis. Folia fere pollicaria. Florum ferticillatis globoia, denta, Cerasi magnitudinis. Corolla campanulata pallide lutea. — Crescit Inter Acaguisolla et Cibipamiogo Mexicanorum.
4. *B. brasiliensis* Jcq. 01. ei Spr. Syst. veg. I. 430. - Grab. Bot. Magai. L. 2711 — G. Don I. r. 507. fig. 57. — Folia, deltoideo-oblongis per petiolos deorsum connata, irregulariter crenato-dentatis; floribus verticillatis bracteatis; ramis teragomis lanatis. j — Caulis tereliusculus corlice rimoso fuscescente tectus. Rami decussati quadrangulares albo-lanati, lana tandem detersili. Folia opposita decussata, junctura oblonga, demum basi ampliata magisque aequilata ideoque fere deltoidea, Inaequaliter dentato-erenata, in petiolum latoae allonata crenata mollia praeseiim infra lomenloae reticulata. Flores terticillatae inferiora breviter pedunculata. Bractae ad basin verticillatarum parvae acutae. Calyx peristens albo-lanceolatus quadrifidus. Corolla aequali-lanceolata pilosa, tubo calycem ultra duplo exsertente, limbo patentis quadripartiti lacinae rotunda. Antherae in faucibus corollae subsessiles. — *B. Neemia* Lnk. Eoumer. plani borti Drolin. I. 125. - *B. Australis* Arrabida, Flor. Flaminens. I. t. 104. - Crescit in Brasilia tropica.
5. *B. diversifolia* Vahl, Symbol. botanic. III. 15. (Wall. Caul. (MIC) - Bib. Scrophular. indic. 43. — Ramis divaricatis; foliis, late ovatis integerrimis repandis, utrinque glabris v. junioribus ferrugineo-lomentosis; florum glomerulis axillaribus. 3-5-flori folio brevibus. § - *B. Indira* Lam. Diction. I. 908. — Crescit in Java (ande in hortum Calcaitem Inroducta est).

§. 2. *Flores capitati, capitula plerumque in paniculam terminalem disposita.*

6. B. GLOBOSA Lam. Diction. I. 507., Illustr. gener. t. GQ - Rz. cl Pav. Fl. Perur. I. 52. L 83. - Curtis, Bot. Magaz. t. 174. - Uope, Acad. Harl. XX. 417. t. II. - Ramis subtetragonis piloso-tomentosis; foil, lanceolalis acuminatis petiolalis crenatis, infra piloso-tomentosis; capitulis lerminalib. pcdunculalis globosis. 5 — Frutei biorgyalis incanos tomentoso-pilosus. Folia 0-pollicaria breviter petiolata, peliolis basi conoalls, supra ragosa glabra viridia. Capitula magna. Flores aurantiaci. — *Palqum* Feoill. Peruv. H. 71. t. 38. — *Buddleja capitata* Jcq. Collecian. II. 333., Icon. pi. rar. t 307. — Crescit in Chili locis humidis.
7. B. PERFOLIATA H. B. Klb. I. c. 340. - Klb. I. o. 111. - Caule hcrbacro; ramis quadrangularib. foliisq. tomentosls, sopra Incanis, sublus ferruvineis oblongo-laneeolatis acutis crenlit connaiis; capital is terminahb. (?) globosis. :|. — Folia fere tiipolllicaria. Capilola magnitndlne frnclus *Prvni tpinotae*. — Crscsil inter lacam Chalcensem et arbem Mezici.
8. B. CONNATA Rf. et Par. Flor. Peru?. |. & t. 81. flg. B. - Hook. Bot. Magaz. t. 8853. — Foil, lanceolatis serratis connatis, basi auriculatis, subtus pubescenti-tomentosis; pedunculis ternalim divisib; florib. eapitalis. 6 — Suffruticosa erecia ramosa quadn- v. quinquepedalis, rami obsolete aogulati, supra glabri. Folia nmima 6-7-pollicaria lanceolala serrata, supra glabra, infra albo-tomenlosa, ba»i attenuate Integra connata, margine ulrinque aunculata, auriculis tandem evanescentibus. Ei aiillis foliorum oriuntur pedunculi angulali, apice florum capilulom gcrooles, tii centrali apice ternatio dirisa. Bractee ad capilulorum basin parvae lincari-lanceolatae. Corollae tabus eitus pubescent, lirabi patentis segmenta obtosa, orificio pllosulo. — Crescit In Chili ad Valparaiso.
- 0, B. LAICBOLATA BUL Plant Harivtf. p. 48. no. 383. - Foil, broiler petlolali* obloBfo-laocaolaUs aeamteatls, aapra mediam seiratls, basi angusutls integerlmi«, supra gtabrlosculls, sobUis ramollsq. Incano-toniēntosls; panicula t««rmi-nali floribunda; florum glomeralla pedicellatls; caljce tomeotoso rorolhip tubum aequanle. 6 — Folia 3-4-polllicaria. — Crescit in Mexico tOmillan, propc Real del Monte).
10. B. SPITAERANTII\ Cham, et Schlcbsd. Linnaea V. 101. — Ramis comprcsso-telraffonis foliisq. basi connaiis sessilib. lanceolate acuminatc rrenati*, praeser* tim subtus rugosis molliter sub>r|ulino-tomenlosi«; florib. rapitali<; rapitulis bi-bnctcahs pedunculate aiillanbut. ,S — Species pulrhra, tomrnlc aorato in par-tibus emonenlibus albedo cinereoqoe indula, folia *Salnar* 2-27, poll, longa, 6-8 lin. lala. margine latiori angu«tiornc connata, hmr prrfoli.ita, sublus rele ~~vaseu-~~loso valde prominente, supra impre>«o< scd ob drncum inmentum m ~~conspicuo-~~Internodia brevia, apire snbinragona compressa, pollire semp«r udrnlur br*~tmra. Capitula florum etacte %identur globosa aoreo-tomento»a, diametro 4-^* lineart, peduneulo tii umquam semipolllicari soffulta, bracteis duabus lanceolatii tomrntosis capilnlit mlaoiibus luidenlia aiillaria oppotita. Corolla eitus aurtolomeotosa, intut glabra. — Crtszil in Metleo (Llanos de Perotc).
11. B. POLTCEPIUJA n. B. Klb. I. C. 340. t - Klb. I. e. III. - Caulr herbacao(t) volubill tatragono fohitq. tobtus feimginro-lomentosis ovato-lyratis acumin*11" rrrrnaii«, basi connaiis; capitulis terminahb paniculate globotis 4 *)*+ — ?^{o1}!* l)raia. bæ%ai connala, sopra pilis fermgineis obtiu, 7-A poll, longa. CaplWJ* magmiudine Cerj*i. Corolla calyce «u lontior fermfineo-lomrntoM. Capsal* •bovata. l>pliulnrurn panirula timplet - Affinis *B. ronmmlm*§ Ri. ft ?*^{o1}* ** Crvscit loela tylvalieit propr Ayavaca Perunannrum.
- 11 B. PICniftCBEMI* H. B kib. I. c. 347. t Klb. I. c. - Wlpn. Sof. act. a©if Onar. U«pold. Carol, naior. cariot. XIX. Soppl. I. 389. - Ramis ttrelib. >.* brit, ramalit Miiag. sobio* femsgtnao-toniMIMla lanceolalu arumioalis ~~crenatis~~ bretiter pHiolaUa; eapitnlu lermljalib. panlevlaUt gtobosi*. :> - Folia ~~supra~~ slabra, polheet d«+ loaga ?. ISM loaqiora. CUpUoU Ora«i *mloari** owirnitodine in paaltolam sisaplicni disf«s4ia. Cotolla campanoUu ealye# panini loag*«r»

- segmentis reOaxis. — Valde affinis dicitur *B. globotae*. — *B. integrifolia* Willd Herb. 8900 — *B. arborea* Meyen, Reise um die Erde 1.478. — In declivitate onenali moolis ignivomi Pichincha inler calaractam Catunae oi plamiem Verdecuchu.
13. *B. DIFFUSA* Rz el Pav. Flor. Peruv. I. 52. t 80. fig. A. — Subscandens ramis teretibus foliisque sublus flavescens-tomentosis subpetiolaribus ovatis subcordatisque supra pubescentibus; pedunculis aequalibus terminalibusque flores capitatos apte gerentibus. 6 w⁹ — Caules diffusi ramosissimi flavescens. Folia deflexa inlegerima r. ano allrove denle noUla, in petiolum allenaala. Pedunculis solitariis, geminis v. ternis. Stipulae reniformes requeae. Corolla lutea, ad faucem villosa — Crescit in Peruvia ad agrorum margines circa Huanaci.
14. *B. RUGOSA* H. B. Kth. I. c. 347. f — Kth. I. c. 111. — Ramis lereilib. foliisque aublus ferrugineo-lomentosis, supra glabris rugosis, lanceolatis acatis crenatis, breviter petiolaribus, capitulis terminalibus panicularibus globosis. 6 — Ramoli tetragoni. Folia 8 poll. longa, semipollicem lata. Capitula mогоiludine fructus *Prum spmotaе* in paniculam ramosam disposita. Corolla campanulata, calyce parum longior, segmentis rotundatis reflexis. — Crescit locis asperis frigidis Parami de Saraguru prope pagum Ofia Novo-Gratnatenilum.
15. *B. ELEGANS* Cham, el Schleich. Linnaea II. 904. f — Ramis terellusculis tomentosis; Toll, lanceolatis acatis obsolete denatis*, supra glabris nigulosis, subtuitomentosis; paniculae terminalis follosae capillatis hemisphaericis leninalibus 6 — Fructus cretas eorise eioDamomeo laevi tertium in annum dense iomenloto instructus. Rami teretibus sub angulo semirecto prodeontet obsolete tetragoni, ad nodos compressi. Folia lanceolata coriacea subacuminata acula, basi attenuata in petiolum breviter decurrenla, adula obtuse denatis*, apice basiue integerrima, supra glabra mitidula rugulosa, sublus dense molliterque tomentosa, margine crenulata, floralia inlegerima »pathulato-lanceolata sesquipollicana pollicana>o. Petioli margine membranaceo conreli. Panicula foliosa terminalis ex toto tomentosa, rami longitudine foliorum, internodus brevioris, supra medium sigulo foliorum pan instructi. Capitulum hemisphaericum 15-31-florum mогоiludine circiter *Cerast* fructus mioorii. Flores sessiles vix 3 ho. longi bracteolla linearibus stipati. Calycis dentes ovali obliqui. Corolla eilas ad limbum osque lomenloaa, limbi lacinae rotundaue obliquae eipansae. Antherae 4 in summa Cauce sessile. Capsula lomenlosa cyliodracea, malara. . . . t Tomeolum totius planae exsiccatae ferrugineae. — Gratiole U Brasilia nsjsjtMMiH.
16. 3. *Panicula terminalis; floru ipicaH, nu*moH ghmiraH* «. totUarii.
10. *B. INTERRUPTA* H. B. Elh. NOT. gener. « spec. pi. II. 348. t — Kth. Synopt pi. aequinoct II 112 — Ramis lereilib. foliisque sublus ferrugineo-tomentosis, supra incanis oblongo-lanceolatis acuminatis longioribus; paniculae terminalis follosae hemisphaericae leninalibus 6 — Folia iripollicaria • longiora. Petioli lineares 2 longi Panicula simplex semipedalis ferrugineo-lomenlosa. Florum terticillalra giobota distantia, pisi majoris magnitudine. Capsula lubglobosa glabra calycem eiciens — Crescit in Andibus Qullensium.
17. *B. BETOMCAKFOLIA* Urn. Illustr. gener. I. 901. no. 1488. — Ramis obsolete tetragonis; foliis, petiolaribus ovato-oblongis ereoulatis valdeque ragois; paniculae terminalis interruptae terticillalra 6 — Caulis lobereulosus Folia infra tomeotoM Rami paniculae oppositi, floras multiteretibus pabacentali, glomerato-terticillati — In Peruvia crescit
18. *B. BELLATA* H. B. Kth. I. c. 318. — Elh. I. c. 111 — Ramis tetragomis glabritulis; foliis lanceolatis oblongis acutis, basi rotundatis, crenatis, supra rugosis glabris miidis, sublus incano-tomentosis, paniculae terminalis ramis diffusis, floribus glomeratis j — Folia 4-5-pollicaria, petiulo semipollicari Panicula incholema sessile quadripollicans patens, (lores ad apices ramorum glomerati breviter pedicellati. Corolla calyce parum longior, lacinae rotundatae **patentes** *B. i*c**r* Ri n Pt> fcimilu - uetcit in Andibus **Qullensium**

19. *B. CORDATA* H. B. Kth. I. c. 348. t 185. - Kth. I. c. 112. - Ramis quadragulans glabrusculis; ramulis foliisq. sublus ferrugineo-lomentosis, supra glabris, OTOTIS acutis cordatis crenulatis; paniculis terminalibus. paniculis terminalibus. paniculis terminalibus. paniculis terminalibus. 5 — Folia basi inlegemma 3-4-pollicaria, petioli pollicares. Paniculae sessiles iricholomae. Flores ad apices ramorum glomerati. — Crescit in convalli GuanaualCDsi prope Marfil in Mexico.
20. *B. LONGIFOLIA* H. B. Kth. I. e. 349. t t 180. - Kth. I. c. 112. - Ramis quadrangulans glabrusculis; ramulis foliisq. subtus ferrugineo-lomentosis oblongo-lanceolatis, ulrinq. acuminatis serrato-crenulatis; paniculis terminalibus; floribus glomeratis. 6 — Folia 7-8-pollicaria breviter petiolata, basi apiceq. lomentosa. Paniculae sessiles iricholomae, flores odorati. Corolla calyce parum longior. Chamaecrista stigma pilosa. — Crescit locis aobfrigidis Andium Peruwaorum inter Tillam Monun el pagan 8ancue Croeis.
91. *B. MOIXIS* H. B. Kth. I. c. 349. t - Kth. I. c. 113. — Ramulis tetragonis Incane—lomentosis; foliis, oblongo-lanceolatis, ulrinq. acutis undulato-cordatis, supra glabris, subtus fusciscentibus - lomentosis; paniculis terminalibus ramosissimis paniculis; floribus glomeratis. 5 — Folia 6-7-pollicaria brevissime petiolata. Paniculae sessiles Incbotome ramosae, glomerulis 0-10-floris breviter pedunculatis. Corolla lutea calyce parum longior. — Crescit in apricis regni Quilensis prope Ilambalo.
22. *B. UMBOLDTIANA* Roem. el Schult. Syst. vegetab. Manliss. III. 08. - Ramis tetragonis cano-tomentosis; foliis, ovalo-oblongis acuminalibus, basi acutis, serratis, supra glabris, sublus ferrugineo-tomentosis; paniculis terminalibus patentibus; floribus gloaeratis. 6 — Folia 3-4-pollicaria breviter petiolata. Panicula sessilis Incbotoma. Florea breviter pedicellata. — Valde affinis praecedenti, differt praesertim foliis brevioribus acuminatis serratis. — *B. ocuwmuUa* H. B. Kth. NOT. gen. el •poe. plant II. MB. f 11ST. - Kth. Synops. pL aequinoct II. 113. (nee Poir.) - *B. PoirHU* Spr. Syst. Tegel. I. MI. BO. SL — HaWtal prope Santa Rosa de la Sierra Mexicana.
93. *B. DBCURRENS* Cham. el Schicbld. Linnaea V. 109. — Ramis tetragonis aureo-tomentosis; foliis, ellipticis acuminatis, basi longe in petiolum decurrentibus. subcrenato-serratis, supra glabris, subtus canescentibus-aureo-tomentosis; paniculis terminalibus patentibus; floribus glomeratis. 5 — Affinis praecedenti, sed differt foliis in petiolum decurrentibus el lomento laxiori quasi furfuraceo r. floccoso, in partibus junionibus aureo, mox vero canescentibus-aureo. — Eadem esse dicitur ac praecedens. — Crescit in Mexico ad San Andres.
24. *B. IMERMEDIA* H. B. Kth. I. c. 390. f - Kth. I. e. 113. - Ramis tetragonis pubescentibus, foliis, oblongis, ulrinq. acuminalibus serratis, supra pilosiusculis, subtus ferrugineo-tomentosis; paniculis terminalibus. ramis abbreviatis patentibus; floribus glomeratis. 6 — Folia in petiolum attenuata vincta, supra pilis stellatis obsita 2-2% poll. longa. Panicula aequalis 2-3-pollicari*. Floret sessile. Corolla calyce duplo longior. — Medium Uoet Inter *B. antimatam* el *B. occidentalis* an tart et a priori — DUUngitur a *B. emthctnyo*, cui etiam talde affinis. ramis tetragonis, foliis medio-bus el angustioribus, tubis ferrugineo-tomentosis (BOC incaoo-pubescentibus) ramisque paniculae abbreviate nec sensibus. — Crescit prope SanU Rosa de la Sierra Mexicanorum.
29. *B. OCCIDENTALIS* Lion. Spec. plantur. 102. - Willd. Spec. plant I 032. - «« el Pav. Flor Peru?. I. 41 t 82. - Urn. Illotr. geo. t 00 fig. I - Grtnr D« frucub. el sosaiab. pi. L 200. t 40. - H. B. Kth. I. c. 390. - Kth I e. 113. - ••aila loroiib. gUbrla, rannlis foliisq. subtus fusciscentibus - lomentosis oblongo-lanceolatis, alrinq. acutis serratis, spiels paucis, floribus glomeratis. 6 — Kami TitgMt Ftilit s-4-pollkana; corolla alba v. UUa (sec. Rs. el Pat.). Spica* In paucis Urminalea disposita. - *OpkiHftou*. *Am*nemm*m foka* »*J#«f mucronata *U*Um* » » » » *Bmrdm* — teafsMP mktm\$ *Imu\$imo*»%» PlukeD. Alaaaf 210. I. 210. fig. I. - CroMil lola losiporalU propo pagan Guancabamba Ptr«-O«««««t CarUageaoi «t ahis locis lodiat occidental!».

- SO. B. CALLICARPOIDES H. B. Kth. I. c. 350. — Kth. I. c. 114. - Ramis compressiusculis, ramulis foliisq. sublus incano-tomentosis ovalo-oblongis acuminatis argute serratis; spicis paniculatis subfastigatis; florib. glomeratis. 6 — Folia 3-4-pollicaria, supra pilis stellatis obsita. Spicae in panicula terminatae dispositae, glomerulis oppositis breviter pedunculatis. Corolla calyce parum longior. — *Buddleja occidentali* et praesertim *Americanae* valde confinis, differi ab hac magnitudine foliorum, tomento tenuiore incano, panicula triplo breviora tripliciter approximalis, ab illa: tomento incano, ab utraque tamen forma foliorum. — In dediviale orientali montium Mexicanorum inter Xalapam et flumen Chachucas.
17. B. AMERICANA Linn. Spec. plant. 168. - Willd. Spec. plant. I. 631. — Rz. et Pav. Flor. Peruv. I. 53. t. 82. - H. B. Kth. I. c. 351. t. - Kth. I. c. 114. - Ramis compressiusculis incano-tomentosis; foliis ovatis acuminatis, basi valde angustatis serratis-crenatis, supra pilosis, sublus flavido-tomentosis; spicis paniculatis; florib. glomeratis. 6 — Rami subtrianguli. Folia supra viridia, 4-8-pollicaria, pollicibus 8-4 lata, petioli pollicares. Spicae in paniculam terminalem fere pedalem dispositae, glomeruli subglobosi breviter pedunculati magno fructu *Prunus spinosae*. Corolla lutea. — *Verbasco folio iminor* m. r. kor, floribus ipiemiis luteis, semibus tingulis oblongis in tingulis vaseculi r. ceis Sloan. Hist. Jamaic. II. 89. f. 173. fig. I. — Crescit in montibus Peruvianis et in Insulis Caribaeis.
28. B. VERBASCIFOLIA H. B. Kth. I. c. 351. f. — Kth. I. c. 114. — Ramis tetragonis ad nodos compressis foliisque subtus flavido-tomentosis, supra glabris ovalo-ellipticis, utrinque acutis duplicato-serratis; spicis paniculatis; florib. glomeratis densis. 5 — Folia 7-8-pollicaria, 4-5 pollicibus, lata, breviter petiolata. Spicae 3-4 pollicibus longae digillimini crassissimae, in paniculam terminalem dispositae, panicula spilhamaea diffusa. Corolla lutea calyce duplo longior, segmentis ovatis acutis. Capsula obovata obtusa. — A praecedente, cui simillima, nonnulla forma foliorum diversa, an varietas? — Crescit in radicebus montis Quindiu prope Ibagu Mexicanorum.
- ». B. FLORIBUNDA H. B. Kth. I. e. 3XL t. - Kth. I. e. 114. - Ramis tetragonis glabris, ramulis foliisque sublus incano-tomentosis, supra glabris ovalis acuminatis, basi angustatis serratis; paniculis terminalibus ramosis divaricatis; floribus dense glomeratis. 6 — Folia supra viridia tripollicaria, petioli 1-8 lineas longi. — *B. eaiiarpoidi* et *AmnUamm** valde affinis. — An re? «ra distisjeuT — Habitat prope Tasco et Tehuantepec Mexicanorum.
30. B. DENTATA H. B. Kth. I. e. 3M. f. - Kth. I. e. 119. - Ramis teretibus, ramulis foliisque subtus ferrugineo-tomentosis, supra glabris ovato-oblongis acuminatis, basi valde angustatis argute dentatis; spicis paniculatis; floribus glomeratis. 6 — Folia 6-7 pollicibus, longa, petioli semipollicares. Spicae 8-3-pollicares in paniculam terminalem sessilem dispositae, glomerulis oppositis sessilibus. Corolla calyce longior. Capsula ovala. — Recedit a speciebus supra memoratis omnibus folds denariis nec serratis. — *Oja de Queso* iocularum. — Crescit locis humidis in ripa fluminis Guayre prope urbem Caracas.
31. B. PARVIFLORA II. B. Kth. I. c. 353. f. - Kth. I. c. 115. - Ramis obsolete tetragonis solatia glabris; ramulis pubescentibus foliis ovalo-oblongis acutis, basi angustatis crenato-serratis, supra glabris, subtus fuscis tomentosis; paniculis terminalibus tricholoma-ramosis divaricatis; floribus subsessilibus. 6 — Folia bipollicaria brevissime petiolata, Juniora supra pubescentia. Panicula sessilis 6-8-pollicaris, ramis ramulisque oppositis. Flores pan. I. Corolla alba calyce longior. — Crescit in montosis prope urbem Cuernavaca Mexicanorum.
32. B. HETEROPIUM Lindl. Bot. Regist. t. 1290. t. - Ramis teretibus lanatis; foliis sublus lanatis, inferius cordato-oblongis acuminatis denudatis, lupenosis, ovato-lanceolatis subintegerrimis; ramulis spicalo-paniculatis lanatis. 5 — Folia inferiora quinquepollicaria, petiolo fere pollicari, superiora minora lanceolata integerrima acuminata breviter petiolata. Panicula bipollicaria terminalis. Floribus bipollicariis, lerni in ciam quaiem aggregata, pedunculo communi suffulsi in

- fupremi solitarii. Corollae tubus calycem triplo fere superat, limbo patente, laciniis ovalis obtusis aereis. — Crescit in America tropica.
33. *B. MICROPHYLLA* H. B. K. (h. I. c. 353. t - Kib. I. c. 115. - Ramis teretibus glabris; ramulis foliisque subtus ferrugineo-tomentosis, supra scabriusculis ovato-oblongis, utrinque acutis, apicem versus serratis; paniculis terminalibus coarctatis; floribus glomeratis. 6 — Folia viridula pollicaria brevissima petiolata. Florum glomeruli pisiformes. Corollae albae. — *B. parvifolia* Willd. Herb. 2018. — Crescit in locis aridis montis ignivomi Jorullo Mexicanorum.
31. *B. ABBREVIATA* H. B. K. (h. I. c. 353. t - Kib. I. c. 115. f - Ramis teretibus glabriusculis, ramulis tomentosis, floriferis abbreviatis; foliis oblongo-lanceolatis, utrinque acutis inaequaliter serratis, supra aobreviatis, subtus ferrugineo-tomentosis; paniculis terminalibus parvis; floribus congestis. 5 — (Cham., el. Schlegel. Linn. VIII. 241) — Ramis breviter pedunculatis. Folia supra viridula pollicaria. Panicula sessilis subtrichotoma ramosa oblonga sesquipedalis. Florae breviter pedicellatae odorati. Corolla alba calyce duplo longior. — Valde affinis praecedenti. — *B. brevifolia* Willd. Herb. 2800. — Crescit in locis temperatis herbosis inter Pachuca et Real de Moran Mexicanorum.
35. *B. POLYSTACHYA* Fresen. Flora (B. Z.) XXI. 005. — Ramis tetragonis tomentosis; foliis lanceolatis serratis acuminatis, subtus ochraceo-tomentosis, nervorum anastomosantium prominente, ramulorum sobrius lanceolato-cuspidatis; splais numerosis in apice ramorum paniculatis; tubo corollae calyce sesquialongiore. § — *B. acuminata* R. Br. mas. n. Poir. — Crescit in Abyssinia.
30. *B. RUPA* Fresen. I. c. 000. — Ramis obsolete tetragonis tomentosis; foliis ovatis et ovato-lanceolatis acuminatis serratis, basi inaequaliter serratis, supra pubescentia breviter pedunculatis, subtus laevibus, nervorum anastomosantium parvis proaristatis; panicula pauciflora, pedicellis subremotis, tubo corollae calyce vix duplo longiore. & — Crescit in Abyssinia.
37. *B. AGRICGLATA* Bib. in Hook. Compan. bot. Magai. II. 00. — Ramis subteretibus, junioribus vix canescentibus; petiolis basi auriculo rotundato amplexicaulis; foliis lanceolato-oblongis, ovato-lanceolatis, apice serratis, basi angustatis, supra glabris, subtus albo-tomentosis; racemis brevibus paniculatis; glomerulis densis breviter pedunculatis; corollis tenuibus tomentosis. it — Crescit in Promontorio bonae spei (Wintlerberg in Neutral territory, Chumiberg in Cafferland).
38. *B. SINDAICA* Blume, Bijdragen 743. - Foliis oppositis (petiolatis) lanceolatis utrinque acuminatis serratis (summis intris), subtus albido-tomentosis splais paniculatis intermixtis terminalibus elongatis; floribus breviter pedicellatis glomerulis sub-3-4. § — Crescit in insulis Sundaicis.
30. *B. ACIWSATISSIVA* Blume I. c. - Foliis oppositis (breviter petiolatis) lanceolatis acuminatis, basi acutis, exiguè deorsum (summis integris), subtus albido-tomentosis; splais terminalibus intermixtis glomeratis, glomerulis approximatis subtrifloris; floribus breviter pedunculatis. 6 — Crescit in insula Java.
- «. *B. MISSIONS* Wall. Catal. MOO. ex Bth. Scrophular. Indie. 41 - Rarois pubescentibus; foliis oblongis, utrinque angustatis inaequaliter serratis, supra glabris laevibus, subtus pubescentibus; panicula ovato-pyramidalis multiflora; racemis oppositis; glomerulis tuberculatis; corollis truncatis glabris. ^ -- *B. arumifolia* Poir. buis affinis tertia — Crescit in Prinsula India? orientali ad Wynad.
41. *B. CIRVIFLORA* Hook. el. Arn. Bot. Beech. voy. 907. - Ramis irriscolatis tomentosis; foliis leniter membranaceis ovato-lanceolatis aruminatis subdentatis supra glabris, subpubescentibus, demum glabris; racemis terminalibus elongatis pedicellatis; corollae lobis elongatis, apice supra antheris inaequaliter. 5 - Racemus 6-8-nervecularis. - foris eadem ac *B. mcmimmi** Poir. f. idiosola Uo-Gbo la mart Japos)leo-C)ft(s)*1 eroacii.
41. *B. PAKICIUTA* Wall. in Rib. Flor. Indif. 1,411 - Bib. I. c. - Arborea: ramis divaricatis doase laetatis; foliis ovato-oblongis laevibus, basi rotundatis, subtus densis

- paniculalis; Oorib. aubsessilib. dcnssissime glomcralis. ft — Crescil in Nepalia. — Folia 4-5-pollicaria. Pctioli linea decurrenle conncii. Racemi breves rigidi, inflmi ex axillis supremis 2-3-pollicares, reliqui breviores simpliciores, terminal! clongalo, omnibus paniculam T. thyrsum elegantem sessilem compaclum efflicienlibus. Flores odoralis albi, glomerulo quovis bractearum elongatarum lineariam pari instructo. Corollae tubus ealyce triplo longior. — Greacil in Nepalia.
43. B. ACUMINATA Poir. Supplem. I. 745. — G. Don, General syst. of gard. and boU IV. 600. no. 30 — Ramis subquadrangularib. pubescentib.; foil. ovatis acuminatis remote denlalis, infra pubescentib.; racemis terminalib. brevib. tomenlosis paniculalis. 6 — Folia subpellolata, inferiora basi dilalata, supra glabra aubinicgerrima. Corollae pubescentis lubus elongalus, laciniae breves. Capsula parva ovala. — Habitat in India oriental}.
- §. 4. *Racemi v. spicae simplices, ad basin ramuloti interrupti*
44. B. THYRSOIDEA Lam. Illustr. gen. I. 891. no. 148ft — Schlichtd. et Chamiss Linnaea II. 504. f — R«nis teretib. flavescentib., apice pubescentib., foil, lanceolalo-linearib. acuminatis serratis sessillb., baai aitonoatls, infra lanalif, suprt nitidis; racemis thyrsoideis spicatis terminations. 6 — Fnilei elegans. Folia margfbc connectente basi conjuncta, non raro etlam infra medium texrala, noo floralia semper integerrima, pleromque serrala, omnia longiadiene et latilqdlne ralde variabilia, 2-0 poll, longa, 3-0 lin. lau. Panlcula in canle ramlsque termioalis vlx umquam digitalis, composita e cymis oppositis 7-15-floris pedunculalis, ramificatione abbreviata cyma umbellam quandoque aemolat. Calyx corolla triplo brevior, dentibus triangularibus acutiusculis. Corolla 3 lin. longa infundibuliformis, limbi laciniis rolundalis obtusissimis. Antherae subsessiles imae fauci inserlac. Capsula 3 lin. longa lanceolata tomentosa. — *B. taUcifolia* Vabl, Symbol, botanic. III. 14 (ncc alior.) — Crescil in Brasiliae proviociis meridionalibus Montctideo cl Rio grande do Sul.
45. B. SPICATA Rz. cl Pav. Flor. Peru?. I. 53. t 81. fig. A. — Foil, ovalis, utrinq. aculis serratis; spicis longissimis simplicibus. 6 — Raml obsolete tetragonl albotomentosi. Folia pcliolala. Flores veriicillati. Braeteao subulaUe. Corolla lutea, extus tomentosa, fouce bisplda. — Crescit In Peruvia, locls aridis ad Manna.
40. B. GRANDIFLOHA Cham, et Sohlehld. Linnaea II. M0. t - Ramli ottos* totragonis tomentosls; foil, aogutte laaoolalala obtuse dtntalis, nlrinq. rugoslt of torocntosis; racemi terminalis follosl podoncolis trifloris. 6 — Habllo slmlis *B. eleganti*, inflorescentia praesertlm dlversa. Folia angustiora, for* llnoarilaneoolalaia, otrinqe provecliori quoque aeiate tomenlosa nigosaque, supra tanen viridia, maxima 5¹/₂, poll, longa, 0 lin. lata. Racemus terminalis foliosas e toto tomentosus. Pedunculi axillares folio breviores triflori. Flores subsessiles, bracteis 2 linranbus sufTulii. Ex axillis foliorum superiorom racemi oriunlur terminali minores. Pedunculi rarius dimidio pollice longiores. Flores 0 lin. longi, bracteis ejusdemque longitudinis. Calycls laciniae lanceolatae obtusiusenlae. Corolla tola fxius tomentosa, ioius in tubo tomento raro vesliu, tabus longitudine caljcis, limbi quadrifldi laclniao lancoolalae obtusae erecue. Anthtrae sessiles ad limbi sinus. Capsula grano secalino similis, apice tomenlosa, basi calva, utrinque longitudinaliter sulcau, apice septicide dehiscens, valvis mox bifidis. ftemina numerosa irregularia angulau scrobiculaU bronnea. — Crescit In Brasillae mvrionalis provinces Montevideo et Rio grande do Sal.
47. B. STACIYOIDES Cham, et Sebleld. I. c. 507. t - Ramis tetragonis subalalis tomentosls; full, sessilib., basi cuneata inlegerrimis grosse denlatis, sublut tomenlosis, supra pubekcentib.; anlhuro lerminali, folus floralibus reOexis. 6 — Rami angulum semirccto minorem cum caule formantes tetragoni subalati, ad nodos compresji tomentofi, \ctustiores ralvi. Folia ambilu grosso ioaequaiiter •t obtuse dentala acuminata acuta reliculalo-venosa, sublus tomenlosa, sapra Pills irregulariter itflialis pubicentia, infenora ovata 0 poll, longa, *¹/₂, poll

lata, superior* minora angustiora lanceolata, floralia integerrima. Folia sessilia, marginibus membranaceo stipulari salis conspicuo conjuncta. Inflorescentia exaeque *Stachydis Germanicae*, anthurus ex toto lomenosus; verticilla alba inferora remota foliis suffulta densa magnis 2-3-pollicaribus reflexis, suprema confluentia, foliis bracteolatis inlegemmis fixis floribus longioribus. Flos 4 l. in. longus. Calycis dentes lanceolati obtusiusculi. Corolla infundibuliformi-tubulosa calyce duplo longior, lacinae ovals obtusissimae, tota exclusa tomentosa. Atherae in fauce sessiles. Capsula parva lomenosa 3 l. longa, corollam rimum dirumpeos calyce longior. — Crescit in Brasilia meridionali.

48. B. BRACHIATA Cham, et Schleichd. l. c. 500. t — Scandens: ramis brachiatis lenticulis glabrescentibus; foliis, oratis obsolete et inaequaliter serratis, supra glabris, subnervis leniter lomenosis; anthuris gracilibus subapicalibus terminalibus axillaribusque; glomerulis obovatis distinctis. 6^l — Kami palenissimi ad nodos compressi foliorumque cicatris lumbos amplectentibus nolati, ramuli lomenosi. Folia majora 3-pollicaria, basin versus 1-1% poll. lala, in petiolum brevem fere basin usque allenuata acuta subacuminata penninervis, ?enis a Hernis utrinsecus 4-0, adula supra glabra, subtus leniter lomenosa. Petioli medietate stipula foliacea rotundata cuneata, stipulis in ramis velut luxuriantibus. Spica gracilis fere 6-pollicaris sessilis solitaria f. accessoriis quibusdam et summorum foliorum axillis. Verticilli remoti et cymis abbreviatis trifloris duabus oppositis constant. Tota spica dense lomenosa. Flos 2 l. longus. Calycis dentes late triangularis acutiusculi. Corolla campanulata calyce paululum longior, lacinae ovatis aculis, exclusa rante ferrugineo-pilosiuscula, laciniis glabris, inclusae albo-pilosa. Antherae in fauce subsessiles, sobersertae. Capsula? — In Brasilia aequinoctiali.
40. B. MACROSTACHYA Bib. in Wall. Cat. Bot. Ind. 42. - Bami aequales alatae, fixae tomentosae; foliis oblongo-lanceolatis, utrinque longe angustius, apice serratis, supra glabris, subnervis albido-lomenosis; spiis interruptis simplicibus lomenosis; floribus sessilibus, inferioribus glomeratis, superioribus sparsis. 6 — Crescit in India orientali ad Silhet.
30. B. CUNEATA Cham. Linnaea VIII. 17. f — Ramis obsolete angulatis lomentosis, dense foliosis simplicibus; foliis oppositis rariusque lernis erectis sessilibus cuneato-obovatis acule acuminatis, lateribus antrorsum grosse deorsum crenatisve, subrogosis, supra glabris midis, subnervis cano-lomenosis; capitulis florum racemoso-subspicatis, spica terminali continua simplici s. basi ramosa; bracteis capitalibus subaequantibus; limbo corollae glabro. 6 — Bipedalis. Lignum album durum. Internodia pollicaria, superiora sesquialtera minora. Folia maxima bipollicaria, laticus lala, superiora minora, infra inflorescentiam sublinguiculata subcoriacea, margine ut plurimum recurva, reticulato-vevosa rugosa, supra laeviora, basi euneata irregulariter, nuuc fere elliptica, crebra seu densa subundulata. Inflorescentia praeter corollam dense USMOSA. Spica pollicaris v. longior, crassius pollicaris baud aequans, saepius solitaria. Capitalia breviter pedunculata subtrilobata 4-lobata, inferiora lalamos spicatos saepe elongata. Bracteolae minores parvae oblongae. Floret legiime tetrandra, luxuriantes penianthi et beandri. Calycis 2 l. longi deorsum met! ovati obtusissimi. Tubus corollae dentalis calycinosus kaad superal, exclusus lomenosus, intus pilosus, limbo lacinae rotundae oblongae. CapsulaT - Crescit in Brasilia meridionali.
81. B. VETULA Chaai. l. e. 18. l - Ramis obtuse tetragonis ramosis lalis, densa foliosis, summo tomentosis; foliis oppositis sessilibus lalis, lanceolatis acule obtusiusculis, basi angustius (inferioribus ramorum euneato-obovatis obtusissimis),
 l — Hic obsolete crassa rugosis, supra glabris obovatis, subnervis lalatis; caulis siliquis ramosis; ractibus subfoliosis terminalibus; limbo corollae exclusae majata; lalamos (to alcu) rafaMMU. 6 - Pedalis t. sesquipedalis rami semel lalati ad nodos sabaexuati, interodiis affluaribus. Ugawa titan solida. Folia lalata pollicaria ?. longiora, W Ma. lala, iasibiliter teviter profunde rugosa. In lorteaaila ex toto laleniis

- racemi e capitulorum paribus 2-8 constantes. Capitula densiflora semiglobosa v. subglobosa, inferiora pedunculo pariter longitudinaliter insidentia, foliis ipsa excedentibus. suffolia, superiora brevius pedunculata. Bracteolae angustae parvae. Calyx vix sesquialtera longior, dentibus ovatis obtusiusculis. Corolla exclusa ad limbum usque tomcolosa, intus pilosa, vix calyce longior, lacinae rotunda eoneavae. Capsula ovoidea acuta mucronata tomentosa. Semina minutissima subscoformia pallida. — Crescit in Brasilia meridionali.
- 52.3. CESTRIFLORA Cham. I. c.20. t — Ramo s. caule tetragono lomentoso; foliis dilatata basi infundibuliformibus connatis, lamina lanceolata acula crenata, membranaceis obsolete rugosis, subtus tomentosis, supra demum calvescentibus; floribus pedicellatis laxo capitulis erectis; capitulis racemosis, racemo terminali folioso; denique calycinis acuminatis elongatis acutis; corolla tubulosa elongata calycem plus sesqui superante, externis lomentosa, intus glabra. 6 — Egregia species inflorescentia paniculam *Cettri* cojusdam referente, quam eminens, ad aspectu deceptus, facile pro Solanaceae specie salutare posset. Specimina pedalia majoraque, rami herbacei medullosi. Internodi sesquipedalium tripollicarum. Folia 7-pollicaria, 4 poll., laeva, diametro infundibulum obtusangulum quod conata duo sistunt pellicem latum metiente. Racemus e capitulorum paribus 1-8 compositus simplex sen basi ramulosus. Capitula 10-12 pariter praeter internodiam imbricatam paginam ex toto lomentosa pedunculata erecta. Bracteolae aequales calyce multo breviores. Calyx suboblongus semipollicem clausus longus, donatus 8 lin. longis anguste acuteque acuminatis erectis. Corolla 1 1/2 lin. longi tubaeformis, externis tomentosa, intus glabra, limbo parvo palato, lobis brevibus ovatis obtusis. Capsula T — Crescit in Brasilia meridionali.
63. B. DISCOLOR Rib. NOT. plantar, spec. 83. — Bib. Scrophul. Indie. 42. — Arborca: ramis subtortilibus ad axillas compressis tomentosis; foliis lanceolatis subserratis, supra glabris, subtus pallidis. T. albo-lomentosis; spicis interruptis gracilibus simplicibus paniculatisve; bracteis lanceolato-linearibus; floribus subsessilibus subglomeratis; capsulis reflexis. § — Folia supra viridia, capsulae glabrae. *B. saucina* Lam. Illustr. I. SOF? - A. *Netum* f. Bib. In Wall. Cat. L0101. H-O. - Creata in Nepalia (Oude, Rungpor etc.).
54. B. NEEMDA Hamill. In Rib. Flor. Ind. orient. (t. Wall.) I. 411. - (Wall. Cat. M01. A-O.) - Bib. In Willd. Herb. Mi - Bib. Smptof. Ind. «. - Arborca: ramis subtortilibus ad axillas compressis tomentosis; foliis lanceolatis subserratis, supra tomentosis, subtus pallidis. T. albo-lomentosis; spicis interruptis gracilibus simplicibus paniculatisve; bracteis lanceolato-linearibus; floribus subsessilibus subglomeratis; capsulis reflexis. § — Folia supra viridia, capsulae glabrae. *B. struiala* Bin. I. e*fl. — *B. struiala* D. Don, Prodr. 0. Nepal. 02.
- f. *Philippensis* Cham, et Schlecht. Linnaea II. SOS. — A planitia Boxburgiana differens: corollis usque ad externarum lacinarum margines calycem dense lomentosis, in illa parte puberulis subglabris, praeterea tomentosis in notitia, ubi profertur, multo densius, in sicco lentic ferrugineum. Valla in Borescentium Tenos magis integerrima, mox basi aequalia, maxime laequalia in eodem spectamine. Flores sessiliae at breviter pedunculatae in eodem ramo. Bractearum longitudo aequalis. Conspicua in typo aequali genuina glabra atyloque brevis, summis in medio lobo inaequalis antheris sublaevibus albis, fuscis et lobi parte superioris albis dense vestitis. - In India orientali (in Pcinu, Oude, Penang, Deyra Dhoon), var. *f.* ad sepes prope Tierra alia in Insula Luconia crescit.
- U. B. MADAGASCARIENSIS Vahl, Symbol. III. 14. - Willd. Spec. plant. I. 013. - Lam. Illustr. gener. I. t. 00. 6g. 3. - Sims, Bot. Magix. L. MM. t. - Bib. I. c. Arborca: ramis subtortilibus dense tomentosis; foliis petiolo ovato-lanceolatis antheris integerrimis, basi rotundatis crassis rugosis, supra glabris, antheris dentatis tomentosis; racemis simplicibus; pedicellis sparsis 3-5-flores. 5 - (Wall. Cat. 400) — Tomentum ferrugineum. Folia bipollicaria petiolo. Racemi ad bann III.

- folds 1-2 parvls ioslroicii. Corolla aurantlaca, scgmentis rotundatis, calyce triplo quadruplove longior. Calycis globofo-campanalati dentes conniventes iriangulares oblusi. — Crescii in Madagasearia (unde io hortum Calcutlensem traducta).
56. B. CRISPA Bib. io Wall. Catal. 0404. el Scrophol. Iodic. 43. - Ramis divaricatis dense tomentos; foil. o?alo-laoceolalit, margioe crenalo-crispis, inferiorib. basi cordalis, superiorib. rotundatis, omoib. crassia ragosis, ulriog. molliter lomen-tosis; racemis brevib. deosit aubramosis; florib. sessilib.; glomerulis deosia sub-pedicellalis. 5 — Crescii la lodia orientali (Oude, Billet, iu montibus Syeo).
57. B. ASIATICA Loor. Flor. Cocbinch. 72. - Spr. SysL teget I. 430. - Foil II-nearl-lanceolatit subserratis rogois glabris; spicia longis termioalib. non Inler-raptis densis. 6 — Haml atceadentet. Floret albi. Denies calycinl subolatl. Corollaampaonlala, segaieBtis rotuodalle. Stigma loogum bifldum. Capsola oblonga. — Cffteil in Coebinchina.
58. B. LDIDLKYAKA Feetae* amis, in LindL Bol Regitt (New Ser.) XVII. Pl. mite. 85. no. 91 — Glabra IroUtoaa; Con. ovaiit aeomioalls aerraUs; racemia vertleilla-lim spicaiis lomenlosis; ealyola inntJk fcrttib. IriangoJarib.; eorollae tobo elon-gato, Infra medium fentrieoso, laeinUa oblaaia. 6 — Eaceml bipollicares, floret ipsi */i poH. longi polcbre violaeei T. lilaenL — Crescii in China (Chusang).
59. B. DEFISIFLOBA Blume, Bijdragen 743. — Foil, oppositis (broiler peliolalit) laoceolalii acuminalissimis, basi acntis, exlrorsum acute serrulatis (summls inte-gerrinUt), aaargine reenrit canescenlib., sublus niveo-lomenlosis; racemis ter-minalib. (aolilariit larnltft); pediceHla mullifloris cernuit. 6 — In Java.

t *Species nan tatis notoe.*

60. B. HEPALSN8I8 Gotta, Menwrie dl Torino XXXV. 182. - Ramis subletragonit trrarieaits fmflnait; ML krtfHtr peilolails, ioftriorib. o?ato-oblonfla iobin-togefrimtt aeejlejenlla, aspajrioflkb ejfalla Isnosjvallnr atnjnallt, tlhnbos obtntis> typra laeriBs •nbtntaaabrtfHa, it} jjowaa lennflnolt. 6 — Cretdt In lfepalla. - Qoad lorel Indeaeripu.
61. B. (LAHTANA Unn. Spec plant 875.) 8ALVIFOLIA AiL Hort Kerens, f. 150. - G. Don, General syst of gard. and bot IV. 001. no. 55. — Caule leiragono to-nenloto; foil. oTalo-lanceelallt acolis cordatis crenatis nigosis, infra lomeolo* sis; paicola e racemis Inlerraplia composiu. 6 — Jcq. Hort Schoenbr. I. tt l. 8K — SlipoJae 2 rolondaue. Thyrent tennioalit. Flores fasciculaii. Corolla lonienlosa, tobo rubro, limbo pallidiore, (aoce barbala. Ovariom siellaio-pilotama.
62. B. VIBGATA Thjbrg. Prodr. fl. Capent. I. 3a, Flor. Capens. I. 542. - Foil. M-neari-oblongis oblusis integris; racemis tfrminallbns. 5 — Rabilos Bf***fL Bami Ilifornnt rollisqne albo-lomealosi. Folia 2Vi-l-pollicaria. - Cretdlj Promontorio bonae apti
- *L B. I^COMPTA Unn. toppi IS. - Tlwbrff. I. e. M2. - Foil, fascienlalit ofoH pilotis; racemis lorminallb.; ramis Botnotis rifMit. 6 - Folia sericea intofra mloia. — Cretch In Promoailerlo bonao tpol.
63. B. TBBRATA Lo«r. Fl. Coebinèn. 72. - Spr. ftytt ?egrt. 1.4». - Bamls « « ^ J ML tewatis lancoolalit torrait; pednennllt aillarib. oniOort. 5 - Floret alJJ solharH pednsjevlati. Corollae segmenU otata. fttigma bifldom. Ifedarlnai P) pilotom. Capenla bllocnlaris polysperma. — Crweii in Cocbinchina.
64. B. VOLtBIUO Um. Illusr. gener. I. 201. no. 140* - *pr. I. c. - Caule volar-billi foil. Moearib ncejUt Infegerrimis; eymis aiillanb. frnngioeo-lomenioalt. ~~volar~~ ~~br~~ - Cotollao inbnt brttiaeinins, limbna profuode ^»*dnada». - Crescii in taa ~~all~~ ~~1~~ ~~Barba.~~
65. B. (cOMAJU AmbMa, Flor. Fhmln. L L 140.) CAMPESTRI* Wlprt. •jaaajj i**olo kmjsjt) raaitia rin»4alo; ram«Me lotrafoala; foil. •ub%***uUb. lancotian* •• anpretjast MtasjBnBaa^i>^#Avfsv B. U ^ L M ^ ^ sfl^ria aMMva tftita** basi aMena)^^ tit totegonamst; tomni napllli. ajnjanjaiBirli ptintjanlmio In raeaaoe •or*i«** lot sttbrarybttot 4%ooU«; eoryela •orolU •!!» dnplo bmioria dtanib. aovM'^ enlla dtlloideis; eoroUae Uotatfa obintlaeiniis. 6 - ftaaint iUnairaint ~~peda~~

Folia 4',-pollicana, pollicem lala v. loprena S-S'/s-pollicaria, vii lempollicem laia. Basis foliorum integerrima semipollicaris. Capitulum pedunculatum 't-'A poll, longi. - Crescit in Brasilia in districtu Fluminensi.

ft *Species e genere expeOendae.*

B. GLABRATA Spr. - CEPHALANTHUS SAKANDI.

B. SALICIFOLIA Jacq.

B. SALIGNA Willd.

|-●>>=*●*''<<●

3072. MJXIA *Cmmm.*

(Blh. in Uook. Gompan. bot. Magai. II. 50. — Commers. mis. ei Lam. Illattr. gen. I. t. 71. — Meisn. Gener. pi. vatcul. I. 300. II. 890.)

1. ff. VERTICILLATA (....)T - Blh. I. c. - Arborea glaberrima: Toll, submli-ellialis pcliolalis oblongo-ellipicU integerrimis; paniculii amplii faiiigialis; ealycib. pamculaiis laetib. glabrii; alaminib. brevler exserlis recurris. \$ — Iⁿ Madagascaria crsciu
- i. N. FLOBIBUKDA Bth. I. a. — Arbofta glaberrima: foil. enbvertfcillalls pellolatis oblongo-ellipiicis integerrimis; panieulia amplie fasliglaUs; calyeb. liboloso-campaniUatia locidis, brefsalme denUiU; alaminib. oorollae laelnlii longloribas. ft*— Affins praecedentll, aed oaljx moll* graefflor, florts mlnoree, tifmltr Ion-gloro. Habila niraqna apeoict aoqienti aflalaf ted fotlls tailorings fjabeffrtnli dffert — Cresell In Proaontrio bonae tpejl (Ultannage, Evartkops rifer).
3. N. (BUDDLEIA Willd. Bnuar. pi. hort. Berolln. U0.) flAUONABlh. I. e. - Arborea: foil, peiolaiis oblongo-lanceoUUa lotegerrimis, anblna ramls ealycibq. lonenlosisj paniculis amplU fuligiaais. d — *BuddUia iaUeifoUa* Jacq. Hort Schoenbr. I. 12. t. 50. (nee Vahl). — *Scoparia arborta* Thnbrg. Prodr. II. Capeni. I. 88. — *Callitcarpa pamculala* Lam. Diet I. 503. — *CkUianUmt oleaceut* Burch. mss. « Schuli. Syst f egeiab. Manias. III. W. — In Promonlorio bonae spel.
- 1 N. CORRIGATA Blh. I. c. 60. — Foil, laneolalit, margine crenalo-erispulif, supra lacidis rogoslssimii, tnblui ramis ealyebq. tomenloso-lanalii; panicnlis paneifloris. 6 — Cresell In Promonlorio bonae tpoJ (Willbergen In Cafferland).
4. H. DY6OPHYLLA Blh. I. c. - Divarioato-nmoat: foil. peOolaUa ovaila grosse denUiU ptania, anbim v. niring. ramls ealyebq. donae loamloee-lanaiis; Caa-eienlla floram toils eyoala. 6 — la Pr««onlt«lo *•••• tptl (Ultschaga, Albany).
0. N. LOBULATA Bin. L e. - DifarintU-naota: foil poioUUa ~~ovatis sinuato-~~lobaiis deniaila tuidalala-erisf>la, angina v. nilnajn mmla fjellin>#> ~~tomentoso-~~lanalis; laaeleolia flortun deaalaalnilt gMotit. 6 — Qnttit to PwinHri» b««at •pel (Nlenteweldabergen el Klilplaala rifer).

Tribus IX. VERONICEAE Bth. Scrophul. Indie. 43. -

Endl. I. c. p. 687.

Corolla roiau inftiodibuliformis T. rarius refolariUr bllabUU. 8la-mlna 4 aeqaalia ferUlla T. tacplat 2 potlica, aterlliam radimeillis oallis. Ctprala bllocQlarU, locoikkle bifalfli, TtifU aaaplaalmf JoiU dlstepl-meDtam blfldb, none sepUfrnfe blalfis.

SOY3. mcOPABIA *Urn.*

(Lira. Gener. pi. no. 143. — Helm. Gener. plant, vaaealař. I. 300. U.II& — Q. Don, v General ajat of gard. and bet IT. 0řř)

: |. I. *Calydbus quadri/dis.*

1. 8C. DtLCIS Linn. Spec plaoUr. 106. - Grtnr. Da frnolib. I. tt|. 1. 41 - p_t||§. Fl. Owar. t lift. - Arrablda, Flor. Fluminens. 1.1181 - lamia foliisq. plemmq Urnalim ?erlicillalis otalo - lanceolaus profunde serralis, in peUolom ailennaus O — *St. tmala* Forsk. Descr. Aeg. Arab. 31. - S**oUndu Boerh. Lsgd. Bat U. KB. - *Vtronica America** erect* fruiescft ei ramosa* HeriA. Faradls ill ^•U• - |ero%ca fntUcota ertela duias kex***I*n ca*U Sloan Jtmiir K|

Hist. 1. 165. t. 106. fig. 2. — *Phuieuoides Americanum /lore albo Mrapetalo* Pluk. Aim. 890. t. 215. fig. 1. — *Tupeicava* Piso, Brasil. 246.

?. *procumbent*: Caalibus procambentibus; foliis quaternis; floribus subsessilibus. — *Scoparia procumbent* Jcq. Americ. 18.

y. *arborea*: Foil, lanceolatis alternis inlegerrimis; corymbo supradecomposito iricholomo. — *Scoparia arborea* Linn. Suppl. 125. — Tbnbrg. Prodr. fl. Gap. 29. — Grescit iuter In4icos tolius orbis.

|. 2. *Calycihis quittquefidis*.

2. SG. FLAVA CbauK et Schlectd. Linnaea II. 603. t — Lnk. et Otto, Icon. pi. select horL Berolm. 1.1 60. — Foil, lanceolatis in peliolam allcnuialis dentatis; pedunculis glabris; calycis dentibus aculis, margine pellucidis; corollae laciniis calycem leria pane superaniib., pills corone copiosis dimidias lacinias aequan- Ubns. % — Herbaea glabra: rami s. caales sabradicales caespitosi spilhamaei, pedales elatioresque alriato-angalall, foliis, ramis floribusque verticillatis quaternis, ternis oppositisq. instrncli, internodiis longitudine foliorum longioribusque. Folia inferiora lanceolala in peliolam brerem altenaata, apicem versus dentata, 6 circiter lin. longa, sesquilineam lala, superiora floralia minora sublinearia subinlegerrimaque, omnia com calycibus minatisslme panctalata. Pedunculi aiillares solitarii filiformes nudi uniflori, 0 circiter lineas longi. Calyx ebracteatus profunde 5-fidus, laciniis anguste lanceolalis acatis. Corolla amoene lutea quam ilia *Sc. dulcis* major, diametro irilineari, rotata, laciniis aequalibus late rotundatis; fauce slamlnlfera piloram corona cincla. Capsula OToidea, calycis persistentis clausl magniludine, tardias septicide debiscens. Semina minima scrobiculata brunnea. — *Microcarpaea Montevidentit* Spr. SysL Tegetab. 1. 42. — Crscsil in Brasiliae aeqnlnoUalis proWncia Ciaplalina.

3. SC AltitUA Cham, et 8chtohd.,L c VI. 375. - PolL laejieiatit In peliolam atleBoatisiociso-deiiUIUlobaUaTe; pad—olla glabria; calycis laciniis aculis, margine pellocidit; corolla calycem panllo saperanle pllis brevissimis raris ima basi coronaia. 0 — Specimlna visa dligitalia el spitbamaea, speciminibus uberioribus *Sc. flavae* admodam similia, diversa: caule e radice fibrosa unico, floribus minoribu, corolla minori, corona depauperata pilorum breviorum, seminibus minoribus in capsula baud minori, foliis profundius incisis sublobatis. — Grescil in Mexico ad ripam fluminis Tecolulensis prope Barriles.

1 SG. EBIGAGKA Cham, el Schlectd. I. c. II. 001. | - Frulicosa: foil, linearib. inlegerrimis; pedunculis pubescenlib.; calycis dentibus aculis, margine pellucidis. 6 — Fralei ramosissimoa praeler pedunculos glaber, rami pedales teretes striat ad verticillos defunctos incrassato-cicatrissati. Bamoli erecli foliis oppositit !•* tragoni, beiagooi T. polygon!, foliis tune ternis ?. quaternis. loternodia 3 lineai longa. Folia ad eouiu 0 lin. longa linoarU angoalissima integerrima punctaU firma ereeta, superiora bretiora. Pedancoli aiillares solitarii filiformes uniflori breviler pilot!, 4 lin. longl. Floroa et Crneiuu omnino *Sc. /latar*, »cd color corollae iocertus. — Grescil in Brasilia meridional! (Campo dos Inforcados). >

y SC PLEBEJA Cham, el Schlectd. L c. 005. t — Foil, aublinearib. subdentatifi pedoncalis glabris; calycis dentibus aculis subciliaris. 4 ~ llerba triennit glabra slricta 1-2-pedalis, basi ligneseena, mox in ramos bornotinos ditisa. Ramierectricti purporasceotes heiagoni, ramnlis e quotit nodo lernis trrlinllatis, intef nodiis circiler pollicaribus. Folia verticillata terna sublinearia, apireni verso^T laiora, integerrima ?. apice denlala, ad summum 0 lin. longa, m lineam laKi ^ Mreaia molto minora. Pedoculi axillares solitarii fliliformes 3 lin. lonRi. Floret ei fractal quam In praecedentibus mlhores. Gal)ris lacimae lanceolatac acn- Ue eiiailo trlaenrlae, oenlo armaio margine subciliatae nee membranaceae. Corollae qaarlridae lacioiae ovatae calyce paullo majorea, expansae corollae diameter circiter bilisoarla. Capsula owldea. - Creaeii in Brasilia meridional!.

ft. SC EUPTICA Cbaai. el Schlectd. I. c. VIII. 21. t - Angulis subalatis ramorum. pediuculis, calycib. neno et margine foliorum pilosis; foil, clipticis anlrrortuav

- grosse serralis; corolla calycis laciniis acutas margine pellucidas el apicem versus lenuiler breviler ciliolatas paullo sperante. 2l. — Herba pedalia v. altior. Caulis ramique primarii letragoni, ramulis 5-8-gonis, angull loogiuscale pilosi. Internodia adulta pollicaria v. longiora. Folia subsesailia opposiu lernaque unguicularia, maxima 10 lin. looga, 6 lie- lata, serraluria otrinsecus 3-5. Pedunculi axillares solitarii folia aequantes superantesque pilosi. Calycis quiuqoefidi laciniis acutae pellucido-marginalae, dorso inferno praesertim el ad nenros pilosae. Corollae lobatae quadrigonae laciniis ellipticae obtusae. Corona ad faecem non admodum densa, pilis longiludine filamentorum. — Crescit in Brasilia.
7. SC. PINNATIFIDA Cham, el Schlichtd. 1. c. 22. f — Foil, linearib. pinnatifidis; pedunculis glabris; laciniis calycinis inaequalib. aculiuscolis trinerviis pellucido-marginalis; corolla calycem duplo excedente. % — Fruticulosa more *Sc. jlatae* a qua nee habitu, nec facie aliena, al caulibus firmioribus el crassioribus hexagonis ascendeniibus praepollens, ab omnibus vero differ! foliis pyrelbroidibus. Internodia subsemipollicaria, rarius pollicaria. Folia rami el pedunculi opposita el verticillata lerna quaiernaque. Folia ulplorumum inieraodils breviora carnosula punctata linearia el lineari-pinnatifida, Itciniis panels, rarius ilerum pinnatifidis oblusiusculis. Pedunculi 4-5 lin. longi. Floras, capsulae et semina fere 5c. /favae. Corollae laciniis ellipticae. — Crescit In Brasilia australi.

t *Species non satit nota.*

- a SC. GYPSOPHILOIDES Wiprs. NOT. act aead. Caes. Leopold. Carol. nat curios. XIX. Suppl. I. 304. — Caule procumbente ramosissimo diffusiformi; foil, oppositis linearib. aculis legegerrimis; florib. pedunculatis solitariis axillarib. v. in umbelias axillares pedunculatas paucifloras congestis. % — Folia sesquipollicaria, sesquilineam lala glauca. Pedunculi 8 lin. longi. Habitu refer! *Arenariam* v. *Gypsophilam*. — Crescit in China ad Lin-ling.

tf *Specie* e genere expellendae.*

6C. AT STRAUS Sieb. Hb. fl. NOT. Holl. 184. - TEUCRUM ?

SC. ARBOREA Tbnbrg. — NUXIA SALIGNA.

3074. GEOCDOBDA Cham, et Schumler

(Cham, el Schumler. Linnaea HI. 11. — Meisn. Gener. plant. vaseolar. I. 300. II. U7. — 6. Don, General syst. of gard. and bot IV. 561.)

1. G. CUNEATA Cham, el Schlecht. I. e. t 6t f. — Cades artlev. Jall i m m ta-gelliformes prosirali cubiuius longioresque, ad nodos bine lade radleales, Internodiis ad 3 poll, usque elongatis. Folia hlice brevlora opposita T. lerna qnelerna Te bine inde fasciculata obovala T. rolandata, basi eoeala In peUolum allenoala, petiolis ima basi connatis, lobata, lobis irregulariter inlerdom duplicato-crenatis, in cuneata parie iolegerrima, majora 15 Ho. looga, 7 lin. lala, Janelora minora. Caulis junior, pedunculi, petioli, nodi calycesque pilis articulatis crispatis magis minusve hispidi, folia caelerum glabra. Flores axillares pedunculati e nodis letraphyllis bini, pedunculi folio breviores filiformet unflor. Calyx sublanuginosus profunde 5-6dnt, laciniis anguste lanceolatis acuminatis. Corolla infundibuliformis, limbo (4-5 lin. diametro) amplo sobaequali quadripartito, laciniis rotundatis iniegerrimis. Capsula oblooga calyce dimidio fere brevior acuminata. Semina minuu. — *Btrepstes glechowfuki* 6pr. Syst. Yegeiab. IV. 11.234. — Crescit In Brasiliae meridionalis profinciis Rio Grande do Sol et Montevideo.

3075. SIBTHORPIA Kth.

(Kth. In II. B. Kth. Nov. gen. et spec. pi. II. 300. — Meisn. Gener. plant. vascular. I. 300. II. 218. — G. Don, *Sibthorpia* el *Disandra* Linn. Gener. pi. no. 775. et *gupp* plem. 32. — G. Don, General syst. of gard. and bot IV. 541.)

sectio I. SIBTHORPIA Linn. Gener. pi. no. 175.

Calyx quinquopartitus. Corolla quinquefida. Stamina qualuor. Semina leretia, umbilico basilari.

1. 8. BUBOPAEA Linn. Spec. plantar. 880. - Willd. Spec. plantar. III. 340. 7 -

- Engl. bot l. 640. — Grlor. De fructib. et seminib. pi. 1. 201. t M. - G. Don I. c. 611. fig. 66. — Pilosa repens: foil, longe petiolatis reniformib. 7-0-lobatis; florib. tetrandris snbdidynamis. 2l — Calyx hispida. Corolla pallide lutea, segmenla 3 superiora parparascenlia. Semina plano-convexa v. subaogulaia futca. — *S. prostrata* Salisb. Icon. 11. t 6. — *Alsine spuria pusi* *Ua repent foliit Saxifragiae aureae* Plaken. Phytogr. t 7. fig. 6. — *Ckryptolenium Comubiense* Vein. Bril. t. 6. fig. II. — Crescit locis umbroiiis ad fonies in Lasitania, Uispania, Gallia el in Britannia.
2. S. PICHIXCHENSIS B. B. Klb. Not. gen. el spec, pi. II. 390. t t. 176. - Klb. Gynops. plant, aequinoct II. 100. — Hiapida repent: foil, reniformib. 7-9-lobalif lobis oblofit; fiorib. penUndria. ^ — Habita praecedentis. Flores purport!. Semina minoliseioM. — DfdfoaoVa *cytotoUariaefoUa* Willd. m*s in Roem. et Schnlt Syst vegeiab. VL MO. — Creacit locis aaperrimia in monte ignifomo P1-cblaeha Inter pianitlem Verdeaelra et Cborro de Cantuna.
3. 8. BETUSA H. B. Ktb. I. e. 301. t t 177. — Klb. I. c. - Hiapida repena: foil, renifonnib. molllobis, lobia relosis; florib. penUndria. 2} — Corolla© pnrporeo->iolaceae. Folia qoam ilia *S. Europa*—t, col proiime accedil, duplo triplove majora. — Crescit locis frigidia in Nora-Hispania Jmta Tiangillo.

Beetle O. BOABDBA USJL Sappier 31

Calji 5-8-partitaa. Corolla 5-8-fida. Gumina 5-8. Semina oavicutaria, urnbilico basilari.

4. H. PEBEGBINA Linn. Spec plant. 080. - Ploken. Phjtogr. t. U7. fig. 5. - C Don I. c. fig. 67. — Proitrala pobetcem: foil, renifonnib. crenalit; pedicellia gealnata. % — Folia lenge petiolau ilia *Gl9dkom**\$ referentla. Pedicelli plentmqae geamlnaU, eed Interdem etlam leraetl T. aolltarll. GefelU lava. - *ihsamdf prmtrmtm* Lin. Bjtt ?efek WL -, Cart!*, Bot. Ma«aavJŪ||»W- Orlar. De frnetib. el aemlnb. III. * t. lfe - Cretell la IntaU Jtadekt.
5. S. (DiftANDEA Unau gyat feget. edit leleb, 137.) ATBICANA Linn Spec, plant. 880. — Proatrau pwbeecena: foil, erblenlatia Integrla crenatia; peduncolit toliU-riia. 2} — *CkrjfsopUmi fokit plmtia aquatic* for* IUno pentapelalo* Shaw, Afrlc 140. fig. 140. - Crescit in Africa borcali.

3070. FILOfMMKITICIMJI Am.

(Am. No?, act acad. Caes. Leopold. Carol. XVIII. 3U. - Melsn. Gener. plant ft*~ calar. I. V& II. *77. - Btā. in Hook. Compao. boL Magai. II. 40.)

- I. GL. SPATHILATIM Am. I. r. - Bib. l a - Urrba poailla repent *Umt>\$9*** (aeie: foliis oppoaitis anbiaacicaUlis apatbolaUt, petiolo baal dilauie •€»>?•#* nante; acapia •elttertie uiflerU •bradeaiaa folio peollo loogioribot. Q — aWsr**' ftr— *tpmlkmlmf* He«k. Bel. Miaeell. IL MM fepl. t 4. - Btb. 8cropb«l. IB-dle. 31. - !*»**•• faye—e Bpr. BftL ?eşol. L « L - *Umo\$HU dimmdra* U** Maatiss. pi. «•. - CreeeM la laale arieauil (la FeaiaMla et in plaotie ad ~~be-~~ *berumpo*), el ia *Senegambia*.

3977. UVIMELLA Linn.

Linn. Geaer. aUaL ao. 77* - MeUa. Geaer. plaaur. vascul. I. 306. II. 214 - 6

Dea, Geaeral 8yat of gard. and boi. IV. U&j

- I. L. AQUITICA Uaa. Baec atoaur. ttl. - 8m. Eogl. bot t JM. - ~~Hook. Flay~~ *L—iim. L m.* - Beakār. Hadacā. I. 178, - Otd. Flor. Danlc. t. 60. - ~~Sun~~ "»-HiM. Flar. Bit 30. le. tea. - Btāa. Fl. Gna. «c«r«. JO. ao. «* ~J S* *7—f. E Gam. (eailt I.) ttl - PaelNe acaht alolonifra. folia 1-4-polOPMJJ* ianraelUe=apalliatou inHganlaia •aearaoM; »edeac«li radicals •«^t ^ M LTV brevioree aalBirl; eereU raeelle, laae ttreate; eafame atroceralee. O» > - L mmmm Uadeta. Abet U j l i - *Ptml+*t(U* Hall Fl. Jeaat. »^u T M. l - Waafeafartto *pmimOHŞ* C Baeb. rial. pcl - Mori* Otoa. Hi**^l L ~~10~~ aeei. l. i U fig. |. *SptrfmU perp—U* fahis lwMis* Lo« Pratt- 9*

81. — *Alsine palustris repens, foliis lanceolatis* Pluken. Almalh. 80. l. 74. fig. 4.
 — *Alpine palustris exigua, foliolis lanceolate* Menti. Pag. 2. 17. fig. 0.
f. Foliis sublinearibus. — *Limoteua tenuifolia* Hoffm. * Nutt Joarn. acad. Philad. I. 115. — (Locis exsiccatis).
r. Coulo pollicari Y. bipollicari.
d. Floribus diandris. — *Limoteua diandra* Krok. Fl. Silesiac. II. 1000. t 87. fig. B. — Locis inundatis, per totam Europam borealem et in America boreali.
 2. L. AUSTRALIS R. Dr. Prodr. fl. Nov. Holl. 443. (edit. N. ab Esenb. 990.) — Folia spathulata-linearibus; scapo longioribus; floribus didynamis; floribus diandris. 0? — Crescit locis uliginosis in ora Novae Hollandiae australi et in insula Diemensis.
 t *Species e genere expellenda.*

L. DIANDRA Linn. - GLOSSOSTIGMA SPATHULATUM

3078. AMPHIASTHUM Torr.

(Torr. Aon. Ljc. New York. IV. 83. — Melsn. Gener. plantar, vase. I. 300. II. 219.)
 I. *A. — Torr. I. c. O? - Crescit in America boreali.

3070. WEBBOMBA Unit.

(Linn. Gener. plant no. 25. — Melan. Gener. plant, vular. I. 300. II. 218. — Spr. Syst. veget. I. Ta — Dietr. Sytopi. plant. plerumq. 1. 55. — G. Don, General sjst " of gard. and hot IV. 80L)

Sectio I. DIPLOPHYLLOIDI Lohmmer, Berlin M*fas. Tin. i. 2.
 Calycis diphylli foliola biloba, in fracto compressa. Semina navicularia. — G. Don I. c. 570.

I. V. (DIPLOPHYLLUM Otto mis.) CRISTA GALLI Steven, Transact. or the Linn. Soc. II. 408. t 31. — Cattle ascendente simpliciter v. subdichotomo pubescente; folia subsessilibus cordato-ovatis obtusiusculis serratis, marginibus venisque ciliatis, anprems quam inferiora majoribus; pedunculis axillaribus axillari folium atquantilibus multifloris; calycis diphylli foliola cordatis suborbiculatis serratis, apice profunde emarginato-bilobis corollam duplo excedens. © — Herba stipitosa prostrata pilis patentissimis puberula, procumbens. Folia inferiora opposita, superiora opposita allorata fere ovata, axillaria ultra nervum basi cordata anthesi, pallide viridia. Pediculi v. Wimmer §oUmm — qum? e* panlo longiora. Calyx diphyllus foliola parva tripartita munificenter f. ~~Andreas~~ /biloc, fructu ancuro, ditto eireitor somnolentia, raro Mutua utque biloba elliptico-ovata. Corolla eogenerum minus ovario oculo mloer poUmo ootrufla admodum togata. Capsula calyce pariter ornata JeroUris, tpeo euMrginau, loculis monospermis. Semina nigra rugosa magnitudine Lentis, ditto latero umbilicata. — *Diplophyllum teromcaeforwu* Lehm. Bot. Magai. VII. 4. 1 — *Diplophyllum kirsutum* Karel. et Kinl. Bullet de la soc. bot. natur. de Mosc. XV. 417. — Crescit in sylvis umbrosissimis Caucasus orientalis aopra Kobas*.

2. V. CABDIACABPA %lpn. mss. — Puberula: folia ovato-oblonga, basi attenuata; topalla margino subintegro capsula obovata duplo longioribus; tminibus laevissimis axillaribus otkroleueU. Q — MafoUodJoe of habito precedentis. Folia inferiora crivnoUu, superiora IridonUU, »omni iotgerrima. Sepala ovata cordata, lobis acumulata. Corolla. . . . 1 Somna obovata laetissima, minoramquam io V. Crisla gttUL — *Diplophyllum t*rdioc*rpum* Etrol. et Kiril. Bullet de Mosc. XV. 417. - Crescit in sylviculis uabrosissimis mooum Alau ad (L* Lepsa in Soongaria orientalis).

Sectio II. ROCILIDIMPBRMOH Echk. PI. Germ. t. oicaro. p. 3t&. Calyx quadripartitus, fructifer saepe compressus. Semina concavo-rostrata (Aumoides Koch, Synop. fl. Germ. et Utlv. [rdit I.) 53a — *Ompkalotprv** Be%or Knemer. plant. Vulb. ft. Podol. 85.)

3- V. BILOBA Linn. Uantist. pi. 172. - Willd. Spec. plant. I. 71 f - Ifbb. PKini crille; If. 015. - Bib. fccropul. lodic. 4). - Caule cruceusculo pubescente. folia

subsessilib. oblongi* laoccolaisve inlegcmrais scrralisvc; calycib. quadripartitis coroltam superantib.; capsulis bilobis, lobis stylo longiorib., calyce brevioribus. 0 — Caulis simplicissimus orccius, superne pubescens digitalis. Folia peliolaia ovala acuta glabra, ba»i iniegerrima, floralia allerna scssilia lanccolata. Flores pedunculali cernii solilarii. Pedunculus folio florali brctior. Calym lacioiaie ovalae aculac subacuales, fructu dupio longiores. — Affini« I', *orrenti*, scd calyx aequalis. — ,9. *minima* C. Koch, Linnaea XVII; 888. — Vix unciali* glabrioscula pauciflora rarius\e unidora. — (ID Armeoiaie graminosis). — Crescil in Capadocia inter segeles, in India orientali.

4. V. UDICAILIS Karel. et Kiril. Bolkl. dea nalnr. de Mosc. XV. 415. f - ADOOA glandulosa: caule erecto a basi ad nedlam nado; foil, obtongis, basi attenniU* iniegerrinif glabris, margin* glandnloto-ciliatis; pedunculis aiillarib. soliiarilf, folio brevlorib.; calycU qoadrlpartlii laclniis subioaequalib. obtusiusculis obieore 1- rarioa 3-nenrlla; corollis calyce TEX ofnorib. am ilium sobaeqaoiib.; capsahs profunde bilobit ciliatlit calyce panllo brevioribas. 0 - Plan la pusilla 2-3-pollicaris. Caolis inferne puberottis, aaperne cam pedonculii pilis glanduliferifl longiuscnlis sparse ?eslilos. Folia floralia oblooga, basi atrlnuala, suprrma fere linearia. Laciniae calycia lincari-lanceolaiae obtuaiusculae glanduln\$0-ciliaiae, plfrumque nervo medio obscure percursae. Corolla pallide covrulea. Capaulae frlandufo\$ae stylus persislens, lobis brrior. — Affinis V. *bihbae*, lamcn ditfrsa: foliif integerrimis pfdunculof eicddenlibus, laciniis ral)cinis kubinaqnaliboi obluisiucolis, corolla calycem subaequanle alque pilis rarioribut dupio Iriplote loogioribof. — Crescil in monloaia brrbidis Sooogariae ad ritulutii Paipak prope nonimenlom Ajagua.

- y V. AGUE*m Lino. Spet. plaiUr. 18. - 8m. Eogt feot t MOO - Si no. Dlsch-loda. Flor. Bit tt. (le. ten.) - gt HJL Pt Fraoc »t a ^Jtebb. Fl. Germ, ex cart. 3U. no. MOO - Hchb. Plant crille. III. Bg. 44flL> *Ich, Synttpt. 0. Germ, (edit I.) NO. - Bertol. Flora Hal. I. JOO f - Bib. 8«npkal. lodic. 40. - Podunculis axillarib. toliUriU folium subaeqnantib., fraciiferlareffliis; foil. o»aio-subcordalis serralo-creoalis; capsula sparse glanduloso-pilosa nubrotunda ac«l# eaarginaia, lobis lorgidis ad soloram aobcompres«i«; siaminib. margini inferiori tubi imeriis. Q — <orolla lalea aabliliffr cofruleo-<tiriala, lobo <uperiori dllnie corrulco f. carneo. Folia luleo- r. olivaceo-viridia, niaffis oblongo-ovalia quam »ub^rqarnliunj. Capsulae loculi 4-5-spermi. - V, *pulcheUa* Guts. Flor. Sicul. prodr. I. Ji, Fl. Sicul. I. 5. — *Abim* media* Feba. HMor. |>l. 221. - V. *varicolor* Frirs.? — Crcicil int arris toliui fere Europae, In Atia minore ei in India orientali (Sabaranpur).

- V. DIDYMA Tea. Fl. Reipol. prodr. p. & - Brrol. Fl. Italic. I. 1W. t - Koch I. c. 431. — P*dQ>culi« asillarib. soliuhit folium *ubaequaoilb., fntclifnrii ~~relo-~~ its; foil. a«btolHdo-<ftla» ••bcordttis, profunde serraio-rrcoaiii; capfoU P^ paiesilib. dfnat pnbaeesjU aevie eaMifiMU, lobit globoso-ronvMls; »iamis)IP-argini inferiori lobi inaefltt.0 — Cavlee etftpiloel pronirali, ba«i ramosl, P**~saartt, pedale* *. ulira, pubetcesilee. Folia ornU subcordaio-deltoidta t. •• •peeisia^oa Inidrianiibus anptora o?aia v. oblonga, omnia longioscole pt^**lata magis misjaf r gross* drniala gtabra t. pilosa, laele vireniia. superiors P**''sim allenia. Pedanroli pubrruli uiptorimum folio longiorr«(arqualrs ». brf^{elprf**} Calyris lacioiae quatuor pamm fnaeqoalea, margine rl nius brevier pilofll*^ Corolla coocolor calyci arqoalis, coervlea, faure albida. Hemina 0 - If *o <P**T l««sj|a. - r. poM* Fhet, 5l«tit fl. Roecic. ed«. 1 p. I. - Urb. Pl. fr«U« *JTi * L Wa. fl<. «M. & _ f. ^^^ gB. ED(1). b01. t 7H3. - Flor. Dame, y * Cottla, Fl. Usidio. 11. 1 t - ML rl T«rp. Fl. Parts. I. M. I. «1. - /• ~~egre-~~ ^ Wabl#>f. n guecle. I ||. - IVTM^I f*4U CU»««fryo# Bit. Mooqi. ~~lrv-~~ gul. I. 09. - f. *mitidmU* Bebb. om. (oil*).

,I. Forma islsjoMtlia oiagls difteM el pabtaeoa. Ainu* idfo nilida, ealf> ***mm. corolla « fritlot imauubilef ooUs cons^rvanL - Creae'l is) Hfl* ip u>u fere Earop* (GermanU, Gtllia, luha. Brtianma He).

7. V. OPACA Fries, Novll. fl. Suecl. (edit. 2.) p. 3. - Koch I. c 531. — Rabb. Fl. Ciern. excurs. 305. no. 2487. (excl. synonym.), Plant, critic. III. fig. 441. — Sirm. Deuschl. Flor. III. 58. (ic. acn.) — Pedunculis axillariis. solitariis folium acquanlib., fructiferis reflexis; foil, subrotundo-ovalis subcordalis serrato-crenatis; capsula crispulo-pubescente transverse laliori acute emarginata, lobis turgidis ad marginem compresso-carinatis; slamiuib. fauci inserlis. Q — Corolla cocculca. Ctpfula latiludine sua dimidio brevior fere obreniformis pili* eglandulotit crispalispal tecia, turgida quid em sod id marginem evidenter compressa, hit noils cl insertion? skiminum differl ab antecedentibus duabus. Locub 3-5-spermi. — Crete it in n^ri* et cullis tiernianiac, Ilchcliae el Galliae.
- a T. B'XRAl'Mil Ten. Fl. Napol. I. 7.1.1. - Sirm. Deuschl. Fl. list. 50. (ic. aen.) - Rabb. I. c. 3M. no. 240M Planl. critic. III. 50. I. 200. OR. 430. 431. - Koch I. c. - Berlol. Flor. Italic. I. 103. t el 847. - Engl. bot. Suppl. II. t. 2700. - Pedunculis axillariis. solitariis, fructiferis relleis, superiorib. folia supcranlib.; foil. o\atis subcordatis profunde crenato-serratis; captula transverse laliori teui* detail* rciculala obtuse emar^inata, lobis ad sutunm compressis divaricatis. Q - Caulis c basi ratnosus, ad nodos interdum radicans, taepc ultra pedalis. Folia o\ia aut ovato-oblonga, inferiora oppositt subcordata, reliqat allcraa minora. Pedoncoll folio circiter duplo longiore. Calycis laciniae parum loaequalet ovato-Itncolatae acuminatae uninerviae, batl callosae. Corolla grandit calyce major laclc cocrulea strlata. Semlna cymbiformla darto tuberculata. Herba lota pilis longlt diaphanii articulatl maglt minutve blrauU. — V. fUiformis Birol. Fl. Ancon. I. 6. - DC. Fl. Franc. V. 388. (nee Sm.) — V. Pmica Poir. Encycl. mrlh. VIII. 108. (542.i, cl Morelto, S)nops. Veronic. £1. no. 35. - V. Taururfortii r.mol. Fl. Radon*. I. 30. — V. eymbalai me folia Schm. — F*, agrcstis \ar. Hyzanlma Siblbrp. el Sm. Fl. Grace I. 0. I. *. — V. hotpita M. v\ K. DeuNi hi. Fl. I. Sil. - Veronica flotculii obUmgis pedirclhs intilentibus, (hamardt y»s folio, major Buib. Ceiiur. I. 26. t. 40. fig. 2. — In anis tohus fere Kuropae, Imic inde ranor.
- fe V. HEHERAKFOLIA Linn. Spec plantar. 10. - Sirm. I. c. - Sm. Fnjl. bot. t. 781 - Fl. Dank. L 4 » - f.urlit, Fl. Londin. III. U 5. - Poll, cl Turp. Fl. Pan*. I. 23. t. tt. - Vir. Fl. Hal. fragm. I. 15. L 15. fig. 2. — Rrb. I. C MS. no. 2!M. - Kochj. c. (edll I.) 531. - Berlol. I. e. I. 101. f - Pedunculit aUlarib. aoliuriit folium subaequamib., fruciiferis redotlt; foil, eordau-roloadauU cronaiosubquloqueloblt; captal«j|pboto-qutdrMoIM; eatyelt Ueiallt eordails, rruUfvn erectit. O — Caulit proiWtat caetpltotot, batl rtmetM tplikaaaeot pedalis n ultra. FolU tcmiorbicularia 3-5-loba, lobo lennloali maJoH, typerlora alirrna, IBM mlnori. Petioli canalicutati, apicf dilaiatl. Calyelt srgmenu aeqnalla cordalo-ovaU acula ciliata, caeleroquin glabra. Corolla cal)ce minor, passim coepulea, fauce alba ¶l coi*ruleo-«truta v. tola albida. Captalae loculi ditprmi, nubiode monosperrai. Tola planta hirsuU. — Variat humtlior (V. triloba OpiU. Herb.) •I plnguio V. Lappago 6chraok, Baiench. Flor. I. 218.) foliorum loblt rotundatit. — Veronica folio Uederae Riv. Monopet irregul. I. 09. — Crtaccl per toiam Europam in a grit.
- KL V. CYMBAURIA Bodard, H>>. aur la Ter. C>mb. 3. - Rrb. I. e. 365. no. 9«M. — Kodi I. c. (edit. I.) 532. - Sibtbrp. H Sm. Flor. Graec. I. 7. u 0. — Berlol. I. e. I. 105. f - Pedunculit aiillaHb. sotltarilt, frueUf«*rit redeklt, tapcriorlb. folio >toDgiorib.; foil, nubcordaio-semlobieulatis lobato-rrrnatit; captula clohotoquadcioba; ral)ris laciniis elllpiicls, fraetlfert patentissimis. (') - raulm terra pro^ralUH inrornc ramonui e muhs dependens, *f%quirdali^ Folia infertota cordaia senuorlnrul.iria, »uperiora alterna sacpe ovata nubcuorau, omnia drnuta carnosula. Petioli ranahculaii. Pedunculi trnuri apirr incraitatt. i«rp,u» MM. longiores, fructifori r<*nmai. (\il)ci«. quadripartiti ^r^mrnla aequaha, niut pubeicentia. Corolla raljre major \. minor allu, fauce >indi», drridua. « *|>%_ita longitficule pilona > rarnin glahra. Nrmma dor»o tt!irrrulata Folia infta %*,yr ^b^m u - I. /><immi/<IM<i Gu«%. PI Kirul %u|.| | | no Q plania n.am;r

- *V. cymbalariaefolia* Vahl, En urn. I 81. - Viv Fragm. Flor. Hal. I. 14. t. 10 fig i . v. *hederaefolia* p. Linn Spec, plant. 10 - *Veronica Chta Cymbalariae foho verna, flore albo, umbihco mrescente* Buxb. Centnr. I. 25. t. 30. fig. 2. (mala.) - Crescit in muns velustis in Germania, Italia, Graecia, Gallia, Britannia, in Atlantide alnsque locis.
11. *V. PRAECOX* All Aact. 5. no. 285 1. 1. fig. 1. - Rchb. I c 305. no. 2401. - Hagenb. Fl. Basil, t. 1. - Koch I. c. (edit. 1.) 530. - Berlol. I. c. I. 00. t — Foil inferiorb. cordato-ovatis crenalis oblusis, floralib. lanceolatis, caule ramlsq. multiflons laxc racemosis; pedicellis calycem subaeqaanlib. ascendeniib; capsola subrotundo-obcordala lurgida 0 — Caulis erectus Y. ascendens saepe jam a basi ramosus spitbamaeus. Folia inciso-dentala obtusa succulenta, subtus pleramqae rubentia, supenora alterna, utriueque ad basin parce dentata, cactcrum et praecleque supenora integerrima. Pedunculi interdum in longo caulis traclu folio subposito breviores, etiam fructifen stncti. Calycis segmenta inaequaha oblonga oblusa. Corolla vix calyce major coerulea obsconus slriaia. Capsula pilosa el ciliata calycem non excedens. Tola planta pilis articulajis apice saepe glandulifens hirsula — *V. Romana* Scop. Flor. Carniol. I. 18. — *V. ocyimifoha* Thuill. Fl. Pans I 10. — *V. segetalis* Pers. in Usteri, Annalen der Bolamk XIV. 37. — *V. acmacifoha* Schleich. Catal. 53. — *V. vtsada* Waldst mss — Crescit in Europe media in cullis agnsque hioc inde.
12. *V. TRIPMTLOS* Linn. Spec, plantar. 10. - Sm. Engl. boi. i. 20. — Siblhrp. el Sm Flor Grace. I. 8. I. 10. — Flor. Dame. t. 627. — Curtis, Flor Londin. II I. 5. — Poit. et Turp. Fl. Paris. I. 23. t 25. — Strm. Discblnds Flor lift. 8. (ic. aen.) - Rchb. I. c. 300. no. 2102. - Koch I. c. (edit. I.) 530. - Berlor I. c. 1. 90. f - Foil, digitaio-partitis, imis ovalis intetgris, floralib* lioceolatis; caole ramisq. nullifloris laie racemosis; pedicellis calyce ^{lon}HH|A»J^t4enUb ascendentib; capsula subrotnndo-obcordata torglida. O — Canlli%MrpQbe\$ens, nunc basi, nunc supra ramosos decmbens v. erecius. Folia carnosala, infra saepe rubentia, inflma longias petiolala digilalo-quinqueparlila, lacimis laliusculis oblusis. Racemus terminahs semper abbrevialus, bracteac hi-Iriflidae, sapromae subinde indmsae. Pedicelli bracteis nunc longiores, nunc brouores CJJCIS quadripariui lacimae oblongae oblusac. Corolla puldire coerulea »trni salurationbus nolala Semina in ulroque loculo 10-12 hemisphaerico-cupuhforroia fusco-mgn-caniia. Herba tola tocidula, pilis articulajis apiot glanduligens puberula. — *Alsine parva erccta, foho Alsinet hederaeao* Lobel. toon. 404. — *Veronica Rutae foho* Riv. Monopet irregul. t. 01 — *V. dtgitata* Lam. Fl Franc (edit. 2.) II. 445. (nee alior) — *fi. puttia* Bertol. I. c. 07. — Foil ovatis una alien*e erena notalis, superiorb. subinde digitalis. — *V. Romana* ^11 Fl. Pedem I 07 I. 85. fig. 2. — Crescit in Eoropae agris.
13. *V. SECUNDIFLOBA* C. Koch, tinnaea XVII 268. - Pilosa: foil, peliolatlt oblongis inciso-serratis; racemo longissimo rarifloro tenul secundo, bracieis et calycis segment!* quatuor oblongis acatii; pedicellis capillarib ascendeniib. aal boriiontalib. inplo braceas superantib.; capsula emarginala inclusa. 3. — Swtura *V. pedumeularit* M. Bieb sed semimbus longe ditersj — Crescil in Radscha.
- 14 > *NIGRICANS* C Koch I c — Prostrala v rarius ascend, ns multicaulis foil-omnib petiolatis ovalis crenatis adpresse pilosiig, saepe disiicbis, racemis caolis apicem soperanlib. laxiflorik, pedicellis braceas minutas triplo superantlb.; ^{efp}* lycis segmentis quatuor oblongis acutis capsulas vublurgidas aequantibus ^ *J Habitu, colore mgricante el Ooribus contend cum *V umbrota* M Bieb. aul ^ ~~montana~~ L., sed his speciebut sunl seteina plana. - Cre^cil in Vingrelif*BltioH*
- tto II. %BROXIC4 Hthh. Pl. Verm, eicura. p. »•«. "
- S. 1. Ann***.
15. *V. \ER>A* Linn Spec, plant. 10. - Sinn. DUchln di. Flor. HA. 13. (Ic aen) - Eogl. hot l l » . - Flor. Danle. L VI - Poit el Turp. ?l Paris I. 21. L ». -

- Trallin Flor. v. Oestr. II 1. t. 101. — Rcbb Fl Germ. exc. 360 no. 2493 - koih, Synop*. fl. Germ, (edit 1.) 530. - Dertol. Flor. Italic. I 05. f - Foil, pinnauparlilis, lmis o'valis inlegns, floralib lanceolalis, caule ramisq. mulliflons racemoso-spicatis; pedicellis erclis calyce brevionb.; capsula compressa obcordala, stylo fissuram aequanle O — Caulis teres erecius digitalis, palmaris v. parum ultra, simplex v. supra parum ramosus puberulus. Folia ima petiolala inlegra sessilia, superiora pinnalifida, omnia pilosula. Bractee lineares acuminatae pedicello multum longiores, pedicelli vix I in earn longi, calyce ipso breviores. Caiyeis hirtelli quadriparlili laciniac luacuales lineares acuminatae. Corolla coerulea stnata calyce minor. — *V. Dillentt* Crantz, Auslnac. 352. — *V pinnalifida* Lam Illusir gener. t 22. fig 4 — *V. tucculenta* All. Fl. Pcdemont 1 78. 1.22 fig 4. (ic. mala.) — *V. monlana* Riv. Monop. irregul. t. 06. (nee t. 05.)
- fl. Foliib subinlegns — *V. polygonotdes* Lam. Illustr. gen. I. 47. — *V. Bdlardi* All. Fl. Pcdemont. I. 77. t. 85. fig. 1. — Crescit in arvis totius Europae.
16. *V. DIGITATA* Vahl, Symbol. I. 84. (nee Lam.) - Willd. Spec, plant. I. 75 (excl. •yn.) — Caule apice piloso ramoso; foil, omnib. digilalo-parlilib; florib. sessilib, segmenlis calycis quadnGdi capsulam aequanlibus. O — Folia peliolata, infenora irifida, segmenlis ovatis, segmenlis laleralibus brevionbus anguslionbusque, floralia inferiora quinqueparlila, superiora tripartite, segmenlis lineanbus, capsula obcordala. — Differi a *V. triphyllo* floribas sessilibus foliorumqae lacinlis linearibus, et capsulis obcordaiis, a *V. verna* foil is omnibus paiiilis. — *V. chamaept-thyotdes* Lam. Illuslr. gen. I. 47. — Crescit in Hispama.
17. *V. GRANDIFLORA* D. Don, Ann. or nat hist. VII. 458. f (nee alior) - Annuu erecU glanduloso-pubescens: foil, infenorlb. peliolatis ovatis crenalis, supenorib sessilib. pinnalifidis Inparlilisvo; florib. solilarus axtilanb.; caljns segments hnearib. oblusis; corollae calyce triplo longions lacinns rhombeo-ovatis subunguiculalis. O — Caulis erecius filiformis simplex v. ramosm bipollicans purpurascens glanduloso-pubescens. Cotyledones persi«tenlos peliolatac remformes. Folia inferiora 3-5 lin. longa, utrinque pilis articulatis raroque glanduhgens veslita, superiora sessilia pinnatifida v. Iriparlita, segments lineanbus integrcnmis oblusis, termmali majori sub»palholalo. Flores in aplce caulis axillares solitaru, peduncali glanduloso-pubescentes folit iriplo superanles. Calycis segraenta linearia obtuia, doobus anlerionbus majoribus. Corolla omnium maxima, diameiro semiunciali el ultra, cyajea, laoinlla rhombeo-ovalis, basl anguslau lutea tubunguiculalis, anlica ml^PB* Ovarium subrolundum gUbrum Integrant. — Crescit in Caria ad Maeandrum levlum el prope Mylaaam.
18. *V. GLAUCA* Siblhrp. et Sm. Flor. Graec. 1. 5. t 7. — Procumbens pillosa. foil cordalis profunde scrratis peliolatis; peduoculis caplllarlb.; calycis quadrifidi segmentis denlalis. O — Hcrba ramosissima. Caulis bifariam pilosus. Folia glauco Corolla coerulea albido-margmata, calyce major. — In Graecia prope Albenas.
10. *V. AMOENA* M. Bieb. Fl. Taur Caucas. I. 12. — Caule patulo; foil. o\atis erenatis, floralib. oblongis Inlegemmis; pedunculis solllarils fubracemosis folia superanlib.; lacinns calycims lieoanbus. O — Habitus F. arewwu, sed folia floralia dissimilia caulinis, mluula Integerrima. Corolla magna coerulea, fauce alba — Crescit in agns Ibenac
90. *V. ACINIFOLIA* Linn. Spec, plant. 10. - Poll et Turp. Fl. Paris. I. 82. i. 83. - Sinn. Ducblnds. Fl. Ifl. 58. (ic. aen. pessima.) — Rcbb. Fl. Germ, excurs. 366 no. 9404. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 520. — Foil, ovails subcrenalis, floralib lanceolalis inlcgrnum; caule ramisq. multifloris laxeracemosis; pedircllik patentib. calyce duplo longionb , capsula compressa plamuscula transverse laliori semibifida, lobis orbiculatd, sijlo fissuram aequanle. O — Caulib teres crectus % ascendens, in feme ramosus \ diflusu* \. cliam simplex bipollicans v. spilhammaem. Folia carnosula cuneala obiusa loiter serrala glabra \. pilosula, inferiora minora bre^iler peliolata, rcliqua sessilia Kacemus laxiflorus, pilis patentibus undique hirtus Braclcae lanceolatac obiususcubo, passim pedirrlllo frwciifro

- bretioris inlegernmae \ subdenlatac Pedicelli lennes 2-3 hn longi creclo-pa-
iuli Calju» quadriparlili lacunae subinaequales o^ato-hnccolatao ncuiiusculac
— *leronica minima Cltnopodu mmont folio, glabra Homana* Bore Mus 10 t
0 dt 102. - \aill Dot Paris 201 t 33 fig 3 - V *Homana* All lib Pedcm
1 79 I R5 fig 2*⁹ — V. *acmacifolta* G.Don, General sjst of gard and but I\
578 no 164 — Credit inter segcle» in Gallia, in Germania australi-occidental i
in Italia, (1 in Chili *kt* Hook el Arn. Bot. Beech voj J9)
- 21 \ ARU:>SIS I inn 1 c. 18 - Sm. Engl bol XI. u 734 - Flor Dame 515 -
< uriiis, 11 Londm I t. 4. — Poit. cl Turp. Flor. Pans I 21 t 21 — Sinn. I. c.
— Krhb I c 3403 - Koch I. c 530. - Berlol Fl. Italic I 02. f — Foil cordaio-
odlib crenalis, floralib. supenonb. laoceolalis inlegernnm, caule ramisq nulli-
flons laie racemoso-spicalii; pedicells erectis caljcc brcuorib, capuula com-
pressa obcordalo-bloba, stylo fissuram paullo supcranlc O — Cauli* tere» crec-
tus v agceudeos, simplex v. Inferno ramosus > diffuaug bipollicans — pedalit*
Folia ima roinora ovata petiolata, supenora cordalo-otata sessilia, omoia oppo-
sita oblusequu serrala, raagis minasve pubescnlia Racemus terminahs
uipunnum elongalus laxiflorus Bractcao lanceolalae aculosculac \ oblusao,
hiM angustatac integerrimac > in fen ores ad basin dcnlatac Pedicelli brevis-
sirni (orolla caljce minor cocrulea. — *Atystum Dtoicoruhs* Column Ph)l. ed
INEip 27 ic 28. - V. *acmacifolta* Willd. Enum pi hort Berolm I 41 — 1^
Homana Scunidl Fl Bob em 45 — V *polyanthos* Thuill H Pan* (edit. 2.) 0 —
V *mtcrophylla* kitaib. mss — *Veronica latifolia minor* Rn Monop irregul t 01
— Grescii locis culm el in ams Earopao loiius el in America boreali.
- 22 V. PLLCIELL4 Brnbrdi. mss. ex Rocm. cl Scbull. Sjsl. ^egel I 120. - Pro-
cumbent pilosa. foil petiolalis late cordalis profunde crenaiia, peduncuhs ùli-
rormib. ?ii folio brevlonb.; caljcit Ueinilt imequalibot. O — llabilui omnino
V *Perricae*, ted minor minasqae pUoti, folia magit obloDgt firmiora Corolla
calyce brctior alba, laclnia toperior roaea. — Cretcil....T
- 23 V PEREGRINA Liun. Spec, plant. 90, — Rccb. 0. Germ excur* 360 no 2400.,
Plant critic. 1. 34. I. 30 fig. 74. 75. 70. - Flor. Dame I 407. - Bertol Flor. Hal.
I 01 t — Cham el Schlbld. Linnaca II. 550. ~ Vtilld Herb U9 - Full linoari-
oblongis obtusiii iniegernmis sobseralis^e, florib axill.inl> suhsessilib, capsula
nbcordala compressa glabra; semimb granulali* O — Caulis teres crectu» *im-
plei > jim a hasi ramosus palmans T ^pithamacuf. F^ha opposiu oblonga
obiusa inferne Integra, »upra lcviler argutrqui* »errala, lobinde tola intcgerrima,
radicalia caulinaquc^ima obo^ala in prtolum anguitala, reliqua »e««ilia, iuprema
c t ramea mmra Bracieae obTertf lanceolalae obla«ae inirgerrimae tore mulio
longiores Pedirelli bre^i«fifilii. Caljrm qoadnpartiti lacimac lanreolaiae acu-
nu^cular arqualri Corolla calyre bre^lor alba v. pallidi^time cocrula, fegmrn-
i/% ntatis oblutit tlicUt. Slamma corolla bretiora. Tola planla glabra — I#~
rontra lerrtHrU annum, foHo Polyfofttf, /for* alho Moris. Oxon llulor I. SSI.
»ect 1 t 24 fig 10 — f. Rom*** Lino. Spec pUnU 10 — I *Xalapma* II. B
Kib ^ov grn el »per plant II 390. — Klb Syoop« pi ae«jim«ct II KM — V*
Ckltlmt H It kth. I f 300. - Kth. I e - r̄ *Pentrtana* W iNI II. rb 230 -
} Mar^lmndic* Murr roromrni Ooelling 17U p II I 1 I <<tn>lt*tan*
Hall Flor Carol 01 -- I. *camotula* Lam. Illustr. gen I 47 I *lams* Lam
Fl Fr rdil. I)V.44 — » *palUserns* Oatrr Fl Monlaub .V I rr« il h nc ind^o
In Europa in intnla Daoira \mak, pr««pc \rali»hnam^f Ihmbur^um, Pragam. i^o
Italia hioc inde), io Brasilia mendionili, in Pmniac rudrrati* n murif ad *i~
cum Mlao, in segelibos Mmae , in ruln« regni ^uitrntit propr i hillu , in rcjoo
Merk. 200 (prop« Xalapam, in neioribu« L(quidamban« StjranOuar , a GOU n*
per tolas fot4e?is Boreali-American! lerrttonum dein per rrgione* sylvaticas^o
Amenrjr bortallt a M*-5T lalilodiois boreali
- 24 ^ (t.RtTOCABPA I \ Mrjrr, \riekbn d. r Pflmn am Oucaf 100 - An-
nua pqbrula raolib ranntit diffutif, foil o^atit arutiuftrulit terrain, pedot-
<uU«a%illjanb f>li« longionb r«hnb quadripartiti*. lannn» sublanccolalis» ecUua^o

- aequalib, capsula compressa transversal! late obcordata, sinu reclangulo, lobis lanceolatis, seminibus compressis. O — Crescit In Caucaso.
- 25 V. FILIFORMIS Valil, Enumer. I. 82. — Sm. Transact. of the Linn Soc I 195 — Rchb Plant, critic fig. ~~H4~~ — Caule procumbente villosulo filiformi, foliis rotundato-cordatis crenatis, pedunculis longissimis, fructiferis reflexis; capsula obcordata subturgida, calycis quadridi lacinis inaequalibus. O — Folia sparse pilosa. Lacinae calicinae lanceolatae Corolla magna pallide coerulea. Caules longi procumbentes — } *erontica* or *tent alts*, *folus tiederae terretrii*, magno (lore Buib. Ontur I 25 t 40 fig 1 — Forte cadem ac *V Buxbaumii*? — In Caucaso
- 91 V. REMFORMIS Rafin Journ de bot 1808 I 228 - G Don, General syst or gard and bot IV. 578 no. 172. — Procumbens hispida foliis sessilibus remformibus crenatis MISSIS; floribus subsessilibus; calycis quadridi lacinis ovatis aculeusculi* O — Folia alterna subsessilia. Flores albescens-lacineae Capsula glabra compressa — Crescit locis arenosis ad New Jersey.
27. V. DEPRESSA Kilaib mss. in Schull. Fl. Australiac. (edit. 2.) I. 32. - Rami procumbentibus; foliis ovatis subsessilibus; floribus sessilibus aggregatis O — Specie valde dubia. - Crescit locis siccis in Hungaria.
28. V. REPEINS Clar in DC. Flor. Franc* M-^{TM*} ~ Repena glabra: foliis rotundatis crenatis pedunculorum circiter longitudine. Q — Herba minima Folia subsessilia Calycis aequaliter quadridi lacinae ovate-lanceolatae oblongae. Corolla pallide purpurea calyce duplo longior. Capsula obcordata ciliata calyce longior. Scimna numerosa glabra appanata. — V. (*enella* Vlv. Flor. Cors. — All Fl. Pedem. t. 22. fig 1^o — Crescit In montibus insulae Corsicae.
- 20 V. MAXIMA Stev. Mem. de l'acad imper. de Mosc. II. 173 - M Rieb Fl Taur Cauc III 13 — Foliis ovatis subsessilibus grosse serratis pilosis, racemis lateralibus, calycibus capsulisque ciliatis. O — Herba pilosa. Calyx quadripartitus capsula major. Corolla pallide coerulea vix calyce major Capsula compressa obcordata - Buxb. Ontur I 23 I. ft. — Crescit in montibus Iberiae
- 3a V. SIRIACA Roem et Schult. Syst. veget I 110. - Erecta foliis ovatis serratis, inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus, pedicellis patentibus bracteis imbricatis; capsulis ciliatis. Q - Folia subciliata Pedicelli pilosiusculi quam bracteis duplo quadruplo longiores, bracteis lanceolatis ciliatis. Segmenta calicina aequalia oblonga. Capsula compressa. — V. *p\$dmneuUta* LabUL* Plant Syr decad. V. 8 t 5 fig. % (axel. syn. Buxb. et M. Bleb.) - Creata In Syria prope urbem Damascum et In Monte Dagebelcher.

%, 2* **Perennans.**

k. Axilla **TI-raeamoaaau**

* *Calyce quadripartite,*

31. V. (INEIFOLIA I) Don, Ann. of natur history VII. 457 t — Glanduloso-pubescentis raris antheris, foliis subsessilibus cuneatis basi crenatis; caule suffruticoso profertente, segmentis calycinis oblongis obtusis corolla breviter tubulosa, ovario suborbiculato scabro. 5 — Fruticulus procumbens ramosissimus habitu *V. iaxatUts* Folia opposita brevissime petiolata cuneata coriacea non ciliata, utrinque pubescentia scabra, subtas cosia promissa subcarinata 2-3 lin longae 1V.-2 lin lata. Petioli teretres longi canaliculati basi subconnati Bacemae axillares Kolutani multinervi pedunculati, pedunculus purpurascens glanduloso-pubescentis rostris longior. Bracteis pedicellis capillaribus brevioribus, inferioribus inclusis crenatis foliisque similes, superioribus subsessilibus inaequalibus Ciliis glanduloso-pubescentibus segmenta oblonga obtusa, duobus anterioribus multinerviis Corolla obovata lobis majoribus tubo hirsutissimo lobis, lactinis limbo rotundis integris intima duplo angustior Oculum compressum orbiculare «« rr puberulum iqtetrum. i apsiila • In Irania rupibus ad Anjndrum Outturn
32. V. HOOKERIANA I Prs mss - Iruticosa prostrata ramis brevibus, multicoarctatis decussatis patentibus Ulicibus subsessilibus rotundis brevissime petiolatis iocis-crenatis lobis pedunculis lactinis ramosis superioribus bracteis

- ovatis calycibus glanduloso-birsutis; racemis corymbosis 4-6-floris; segments calycis ovatis; corollae lobo inferiore bifido. 5 — Fruticulus 4-0-pollicans, rami ascendentes breves foliosi. Folia dense quadrifolia, si rami arcle appressi sunt terrae, subsecunda 4-5 lineas longa, 3 lineas lata. Pedunculi erecti cum bracteis pedicellis calycibusque remote glanduloso-pilosi. Pedicelli 2-4 lm. longi, sensim gradatim ID mores. Corolla pallide alba, laevae antica opposita oblongae, inferior (an semper?) bifida, laterales orbiculato-rotundatae multoae latiores. Capsula? — *V. nicea* Hook, fil in W. J. Hook. Icon, plant. t. 640. (nee Lindl.) — Crescit in Nova Zeelandia (in monte Tongando).
33. *V. TAURICA* Willd. Spec. plantar. I. 70. - Lodd. Bot. Cabin. t. 014. - Folia pilosiusculis linearibus indivisis et pinnatifido-denticulatis, racemis lateralibus; pedicellis bractea longioribus calyce quadrifido glabro. 2]. — Caulis videtur ascendens tere pilosiusculus. Folia laevae viridia semiuncialia conferla lineana integra et subcuneiformia, apice tridentata et linearia pinnatifido-dentata. Pedicelli bracteis multo longioribus. Calycis lacinae inaequales. Corolla rosea. — *V. orientalis* A. DC. Enumer. I. 72. — Crescit in Tauna.
34. *V. APIYLLA* Linn. Spec. plantar. 14. — Stn. Dtschlands. Flor. H/t 50. (lc. aen.) - Rchb. Fl. Germ. excurs. 360. no. 9407. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 535. - Derlo. Flor. Italic. I. 68. f - Cham. et Schlegel. Linnaea II 550 - Folia breviter petiolalis obovato-ellipticis crenato-serratis integerrimis, racemo antheri tuberculato subquadrifloro; pedicellis fructiferis erectis capsula obcordata longioribus. 2]. — Caules teretes caespitiosi ramosi, inferne repentes breves. Folia elliptica v. obovata petiolata, in surculis junioribus longe minoribus et subrotunda Racemus in quovis caule v. ramo umcus v. rarissime duo, laterales, folio longior filiformis striculus, apice 2-0-floras. Bractea oblonga integrae obtusae Pedicelli domum bene loquuntur. Galyot sogmeou oblonga obtusa, duobus majoribus. Corolla majore obovata. ToU planU pills sub lenie articulatis bispida palmaris. — In maiore planta pedunculatae scapiformis. — *Veronica alpina jnmil**, *eaue apkyuo* Bocc. Mat. 17.1.1. et 0. — *Veronica parva iaxatuu caulicifo**dis* Segalier. teron. I. 941. I. 3. Bg 2. — Pluken. Aim. 304. t. 114. fig a - *V. grandiform* Willd. Hb. 910. - Lnk. Jabrb. der Guchsknd 1.49 - Grtnr >ov. Comment. Pelopoli 14 I. 18 fig. 1 — 1' *nutheaulu Vert.* Knabir. I II. - I. *depauperate* Waldsl. et kit. Pl. rar. Hungar. I 245 - I. *tubaeauii** Lam. Illustr. gen. I. 171. — P. *KawUsehatika* Linn. Soplem 83. — Crescit in alpinis Europae australes et in Asia boreali.
35. *V. DEPILPERATA* Waldst. et Kitaib. Plant. rar. Hangar III 973. T t 945. " Repent ascendens pilosa: folia, obovatis obtusis suberratis, pedunculis aillaribus. tubracemosis, calycibus quadrifidis, ramis trifidis v. quinquifidis. % — Corollae f. coeruleae segmenta sopeiora enarginata. Capsula obcordato-ovata. — Forte *V. aphylla* ft. Bating. Traosylv. I. 92? (Caules. ttenlib. repentibus; folia, ad apicem rotundalis pilosis subdentatis; scapulis semipollicibus pilosis simpliciter, basi foliosus aere denticulis. in racemum 2-3-florum abeuntibus; pedicellis tubnutantibus. bracteis oblongis obtusiusculis; corollis pallide coeruleis, calycibus miequiter quadripartitis — In rupibus calcareis et ilunganae et Lipuxac *j
36. *V. OFFICINALIS* Linn. Spec. plantar. 14. - Stn. Hticlands Flor. list. 58. 0* aen) Eogl. bot. L 705. - lior. Dame t 248 - Stenik bot t. 150 - C. irU*. Flor. Londm. III. U- Bull. Herb. t. 283. - Poir. ci Turp I-1 Pans I. 1* ..* - Pknck, Icon. pi. medic. I. 7 t li. - Lam. Illust. gen I t. 13 ug. 2. - Bckkbr. Hndbcb U 3. - Hayne, Uinngew I t J. - Rchb. Fl. <*c<rn>#£/ W. SJO. MOB. — Koch, Synops. fl. Grm. ,cdn 1 525 - Bcrtol Flor. Italic. I J £ t - Folia breviter petiolata obovato-ellipticis oblongiusculis, racemis simplicibus. Strobilus deorsum; pedicellis fructiferis recurvis, rapula maagulari-obcordata oblonga tejjarginau bracteis; caulibus hirtulis, basi repentes, apice ascendentes %> — *Caesia patcot* pollicibus longiusculis % »r» quipcdails usq N. Folia opposita, breviter petiolata, basi cuneata apicoque megra acuta v. obtusa, reticulata margine subaequaliter deorsum aal terrata Racemi pauci solitarii

alierm v opposiit laxiflori longeque pedunculau. Dracicae lineares m calyem acquanles. Calycis segmenla oblonga angusta oblusa. Corolla pallide coerulea alms salurauonbus percursa. Tola planla pills villosa ariicalalis sursom curvulis hirsuta esl. — *Veronica* Riv. Itfonopot. irregal. t. 03. — *Veronica mat alpina glabra erecta, foht parum erenah* Bocc. Mus. 17. U 10.

f. puillia: foil, subrotundo - obovalis. — *V. Tournfortii* Schmdt Bobem. centur. I. 12. - Rchb. Plant critic, fig. 1054.1055. - VIII. Dauphin. 11. 0.

y. Foil, obovalis v. obovato-rotundalis glabrimsculis. — *V. AMontii* SchmdL I c. — Rchb I c. VIII fig. 1053. — *V. MufUeriana* Vesl mss. in Roem. el Schull S)sl. \cgel. I. Mantiss. I. 108? — (Foil, ellipticis inlegemmis obtusis pilosis ciliaris breviter peliolalis; caulib. breviter prostratis radicanlib; racemis lateralibus; floribus capsalisque erectis — Uescil in Styna supenon)
d. luxuriant racemis paniculatis. — *V. Spadana* Lejeune, Fl de Spa I. 22

* c. Floribus albij. floribusque plenis inierdum occurrit.

C Folus flavo- v. albo-vanegaiit. — Crescit in praiis Earopae lolius el in America boreali.

37. *V. SBTIGERA* D. Don, Pl. rar. Scot 4. — Pliossima: pills rigidis glanduosis, caulib. ascendentibus; foil, elliptico-lanceolatis serratis subcrenatis; racemis elongatis axillaribus, calycibus quadrilobatis; capsulae abruptae indivisis. 2} - Folia parva Dracicae foliis longiora. Corolla pallidiuscula coerulea. Capsula ovaia compressa glabra. — *V. hirtuta* Hopit. Ft. Gloll. 9 — Lnk.Enumer. pi. horL Berol I 24 ~ Crescit in Scolia in Ayrshire.

38. *V. CAPEensis* Fenzl. Pemptas plant. no. rar. Capons 12. t — Perennis, glanduloso-pubescentis caudicibus filiformibus. bumifusis radicanlib. foil oppositis sessilibus. oblongis el oblongo-lanceolatis serratis, racemis axillaribus alteris subterminalibus, bracteolis quam pedicelli brevioribus linearibus, calycis lacinis subaequalibus linearibus, capsulae loculo obovato, apice inlegemmate glabruscula polysperma, seminibus obovatis biconvexis. — Species ad specimen unicum confecta, quod praebebat praeter sequens notas Cauliculus simplex digulis apiculatis leres, ad nodos radicans, supra in cauliculum polyphyllum erectum cum racemo aequali elongatus. Folia confertissima opposita breviora sessilia uncinata semiunclata, cum caeteris paribus palenim glanduloso-pubescentia, demum subnuda, infima oblonga v. oblongo-elliptica, 3lin. ae minus lala obiuta, reliqua parum minor, margine subaequali. Racemi 2-3 infraaxillares apiculati erecti nemiuclatae ae breviores, fructiferi fere unclatae dense glanduloso-puberuli 3-10-Qori. Bracteolae lineares aculae pedicellis demum dimidio breviores Pedicelli capillares patentes A-2 lin. longi. Calycis lacinae subaequales lineares glanduloso-pubescentes Corolla coerulea (?) roiala, lacinarum rotundarum posita major Siamina 2 corolla subbreviora. Capsula matura calyce duplo major Semina in utroque loculo plurima (immatura) ovalia biconvexa laevia. — Crescit in Promonlono bonae spei.

39. *V. PHEAICA* All Fl. Pcdemonl. I. U fig. 3. - Rchb. Plant critic IX fl. 1051.105i, Fl. Germ, excurs. 367. no. 2300. — Koch, Synops. B. Germ. (edit.) 525 (adnot. ad oo. 7) —*: Repens: foil, obovalis subcoriaceis nullis glabriusculis argute serratis; racemo subsolitano densissimo longe pedunculato, lacinis calycis linearibus acutis; corollae linearis-oblongae; capsulae oblongo-obcordatae acute emarginatae, lobis rotundatis. — Caulis teres prostratus, apice ascendens Folia breviter petiolata, basi cuneata apicem integrum acutiuscula, subinde oblusa. Racemus spicaeformis densus solitarius Pedicellus lineam circiter longi Bracicae lanceolatae calycem aequantes. Corolla violacea duplo grandior quam in f. officinali*. Capsula pilosula Pharmacopoli Pedemoniani hanc praefereunt I officinali, net inmento — I uffinnaht fi Linn Spec plantar 14 - *Veronica rotunda* firmu glabra denotulatu Allion. Spermatophyta t 4 fig 3 — I illtonu bm. Transact of the Linn Soc I 180 — Willd Spermaria I 59 — < resell in alpebus Pedemonum el Pedemontano

- 4a T. AMSORIIYLLA C.Koch, Ltanaca XVII. 287. - Foil omnlb. peilolalis glaberrimis, radicalib. minutis integris oblanceolalis v. obotato-spathulalis, caulims infcnonb. ovato-subrotumlis inciso-serratis, medns ohlongis serratis, ex basi interdum inclsis, supreme angustissime oblongis, margine subrevolutis; racemo (axillan* solitano?) longissimo apbyllo; pedicellis Oliforraib. bractea majorib, flonbus carneis. 2|. — llabitu similis est *V. prostratae*, sed Jam calyce quadrifido recedit. — Crescit ID Armenia occidental!.
41. V. MONTANA Linn. Spec. plantar. 17. — Engl. bolan. t. 700. - Curtis, Flor Londin. HI. t. 4. — Slrm. Dlschlnds. Flor. Hfl. 58. (ic. aen.) — Flor Dame. L1901. — Jcq. Flor. Austnac. II. 6. t. 100. — PoiL el Turp. Flor. Paris. I. 14. I. 10. — Hffm. fl. Germ. (edit. 1.) I 5 t 1. — Bchb. Fl. Germ, excurs. 367. no. 2501. — Koch, S)nop» fl. German (edit. 1.) 90. — Foil longe petiolatis otalis inciso-crenato-serratm, racemls anllarlb.; pedicellis frucliferis palulis, capsula transverse laiori, basi apliceque emarginata complanata glabra, margine crenqfaia ciliata; caulib. basi repenlib. sparsim pilosis. 2I. — Caulis teres debilis procumbens, ad nodos radicans sobpedalis, passim ramosus, apice erectus. Folia in dncrsis planlis magnitudine di versa, oblusa grandidenlata, dentibus subinde inticqualibus, infcnora minora. Racemi axillares soli lam allerni > ranus oppouli pauridon tenucs, folio longiores. Calycis lacinae ovalac aculiu< ciliae otalao m inatqudles Corolla pallide cocrulea, \enis purpura>cenlibus PoduHli lonuissfmi bractea lanceolala panra acatiascula longiores. Tola planta pili* articulatis pubcicens v. hirlclla. — *V. procumbent* BIT. Monop. irregul. t 93. — *Alyssum D%\$-cordts montanum* Column. Ecphras. I. 290. fig. pag. 288. — Crescit in ncmonbus frondosis praesctim in solo calcareo per lotam Europam, sed ranus occurrit
42. V. CUAMAEDB\S Linn. I. c. - Engl. boL t 623. — Curtis I. c M X - Flor. Danle. L 448. — PoiU el Turp. I. c. I. 13. t 0. — Sim. I. c. — Srensk bot. t 230. — Lam. Illustr. gener. I IX fig. I. — Martyn, Flor. mat U 06. — St. Oil Flor Franc, t. 8. — Dayne, Annelgew. IV. t 4. — Loddig. Bot. Cabin, t. 53 — Rchb. I c. no. 2302. — Koch I. c. — Bertol. Fl. Italic. I. 80 | — Foil. sub>c*silih o>alls inciso-serratm; racemis axillarib, pedicellis fruclifens ascondentib, capsula tnangulari-obcordala ciliaia longionb.; caulib. a>ccndentib bifariam pilojiis. ^ — Caulis dcibilis, inferne decumbens et ad nodos radicans, oblique ascrndens, M'mipedalis leres Folia ima minora ^ubroiunda v oata suhstssiha, nliqnA mnlalo-otata sessilia, omnia opposita grossc paxsiraqur Mibini(M|ualier deniaia pub* scenlia, supenora minora. Racemi opposid v allerni pvriunculali longo iraclu flonferi. Bractea lanceolata oblusiu>culat ciliaUr \ toiae poboccnief* (.alyri* lanniae lanceolalac panim inaequales ciliat ac aut pubrnccolei, rin\$#>ni< .ide<t lacinia quinU. Corolla grandis amoene coerulea »irn» >aturailoffibuH, interdum pallescent •. albida. Corolla caduca, in umbra el tempore pluvfo claott* — *ieromem plmUmtU ImhfoHm* fciv. Monop. bregul. 1.04. - Ieroitira minor foW* mi1 rotundioribut Segaler. Veron. I. W. — Moris. Oxon Ilistor I. 320 sect 3. L 23 Tg 12.
- fi. lomttfoha-* Procenor* foil magnU, superiorib. di<tincte peiolalx, cordaH^ basi cqnralis, obto<is — *V. lawmtfoUn* Hayne, MaRai dor naturf Freunda MI. IJ2. — *V. Rudolpktana* Ila>nc I r III — t dtrattrain Tau<rh, Flora 'B Z) |<|. p. 308 -i>' Don. (.rncral %\ of ^rd and hoi || 571 no. II*
- 7 *camo-pubetceiu* pilif raulini< bifariam loni;i<'ribu< I ;>i>#a >i illd. ftpec plantar. I 6H t - *V. pmnahfida* Aurior *lpheala* Pohl, Tmi flor ~~Bohem~~ 15. ffg. | — G Don, drnrral *js| of gjrd and bot. I\ 57i no IUL H ~~370~~ no. io*. I *florida* Schmdi Fl Bohem i rrtru per loum Kuropaol 'o pralii et ad sylfaram margiies, etian in Canada occurrit
- < \ (fUMAEDBTOIDES B4% •(Chanb Flor PHoponn m i l - C^<<^ *>^in rrrprnlr, piles sparsls sabglatinoto. MI. otato-cordah< inrlso - <ubpftt84b^<f rrenatitque. laciniis calyelnis lanceolatit, apice oblutit U \u 4Ifferrc *Hf&^T a V Ck*m*edry Crescil km Peloponncso.

44. V. FROELICUIAINA Rebb. Flor. Germ, excurs. 307. no. 2400. — Ascendens: foil, oval is serratis, race mis oppositis erectis clongati* laxiflori*. 2l. — Isum hjbnda inter *V. oflianalem*, cujus floret el *V. Chamaedryn*, cujus habilu* et folia? — In iisdem eerie alpbis cliam *V. officinalis* reperla c&l. — Crescil in pralis alpims „im Algau“.
45. V. ACUTIFLORA Lapcjr. Abr. P)r. suppl. 7. — Roem. el Schull. S)sl. \egcl. I 112. — Pilosa: foil, lincanb oblusis, infcnob. profunde serraiis pilosis, supc- rionb. Lnccolalis submtegm rugose; racemis clongalis; corollae segments acu- mioati*. ^ — Pedicelli bracieis longiores. Corolla rubra. — >alUc afGnis *V. Chamaedryt* el *V. pilosae*. — Lrcscil ad Tolosarn propc „La fontaine d'amour“ locis umbrosis».
46. V. MICH UAH Lam. Illusr gener. 103. — fiulo subfMulnto \iscido-ullos; foil, semiamplexicaulib. oblongo-lancotalis denticuhili* glibns, racemis spicalis brevib. pedunculate, pedunculis rigidis axillarib, caljcis quidrihdi sivmenlis ovatis aculi*. 2l. — Folia sesquipollicana, 0 lin. lala. Corolla mediocns. — In Onenle crescil.
47. V. IMBROSA M. Dicb. Flor. Tauric. Caucas. I. II. — Flor. Rossic. I. 7. - Foil. Inferior)b. otalis grosse serratis, supenob. oblongis subserratis; raceme late- ralis. paucioons; caulib. iepentib.; calycib. corollam subaoquamibui. ^ — IManta laxe cacsptiosa. Pedicelli clongatl. Corolla speciosa. Folia surculorum slenlium inlcrdum Mibintegerriraa. — Crescil in Taunae sjlvls ad Karassubasar.
48. V. PEDLNCULAUIS M. Bieb. Fl. Casp. 120., Fl. Taur. Caucl. il. - Pubescent foil o^ais profunde duplicalo-serrali*; racemus lxxis; caule dense bi^nalim piloso, pedirellis capillanb. braccas duplo ciccendibus. ^ — Corolla cocrulca — DifTort a } (ham a e dry caule undiqnc MHO^O dcil>iu> bi^criatun piloso, folns ulnnq magi» MHOM> prufuudius denlahs, j odicellis gracililer clongalis el lacmns caljcinis oblusi-. — I *pctlunculuta* \.ilil, Enunier. I. 77. — Iluxb Leiilur I 20 t. 41. fig I. — I? *flaenda* (>auhb. ilaccidib folusq. profundius 0»M» — In Caucaso
- 40i V. MI(R\NTIIA Lnk. el HffimrnpK Fl Portug. I. 240. t t 57. - Mollucr pu- betcenli-cancscens Ml. bubsc>silib. ovalis oblutis grotke crenalin piloiis; ra- cemii axillarib., florib. subaggregaiis. % — Pill pubiccniiiae cunrali. Rraclic iloearei pedicellos excedenies. ScgmcoU calycina 4 lanceolaU acula fubacqua- lia. Corolla porta alba, ad faucem purpuratcenli-annulaia. CapsuU coaprcs»a emargmala, caljcc brevior, nargine ciliaia. - Valde afflois || *Ckmwuudryl*, icd flores oiinorctf totaque pllosiffma. — *V. Tucrium* BroL Flor. Lusilan. 11). — *V. moUu* Zca m«. ex Rocm el bebull. S)§L tegel. I. Hi. — *V. moUnma* llor- lor. — Crescil in Lusitama.
50. V. PLLU! J V H Dr. Pro dr. flor. No\, Holl. 1. 435. (cdil. Nee« ab Eienb. 201.) - Raccroll laienlib laxis; MI o>atis macqualiler inciso-serralit glabnt; caule Ir- nuil>ime pubescentc, peliolis inferiorib. dimidio folio longioribu^ 2^ — Corolla cocrulca. — Crescil in No\ a lllandia.
51. V. BROWMI Rocm. el Schult. Syfl. vegcl. I. 118. — Foil, ©valo-lancoolam glabrlt inaequaliler ncrraisi; caule bifariam pubeicenie, peliolit ioferionb. folio ler brevionbun; racemis laleralib. laxi*. 2l. — *V. arguia* R. Dr. I. I. c. c. — In Nova lllandia crrtcil.
- 5ft. V. DISTANS R. Br. I I. c. c. — Foil o\ain lale ftccralu glabris, pctiolis cilia- Us; caule decumbente bifariim piloso; cor)mbit laleralib. pedunculatis pauct- floris. 3- — Flores roerulei. — Cr<*>cil io No\ a HollandJa.
83. V. M>\AE HOLLAMXAK Poir. Kncycl. mé I h. Mil 520. - Foil ovatu prorundr creoatis pctiolatis, r.Kemis laurahb.; florib. longr |>rdirHlah*, rmlib piibcv(O- nlibus. y. — i alj\ gl IUT Hrartrac oalae. Capsula obrordala com|ircM.i ciUrr bre\ior. — \aM<*> affini-. I < *hnmaedryi* - Cre<>cii in >o^a lllandia.
- M. \. P\RMKIOIU >alil. s\mli .1 Imt III 4 roll Imcari-lanrcolalin ini<ker- rli> alpbriH imuromlis fl|>)ro\im.ilis M^SMII». nu^dis lupnllicinb, raremH i r* r tfsquipollicnrib timltidon*. lu.irtn> mmulis, (orollac t r ments clolosis

- capsulis calycem duplo excedentibus ovalibus. 6 — *V. hortibunda* R. Ur. mss. in Herb. Sm — (rescit in Nova Zelandia.
55. \. MALROCARPI Vahl I t\ — Foil, lanceolalis inlegernmis plants glabns quadripollicarib. cernui; racemis creclis folia irquantib.; braricis minutis; corollae fijo calycora duplo eicedente, segments obiusi*; capsule ovali acutis calico inplo longionbus. t) — Crescit in Nova Zelandia.
- 56) \. MLLARDIERI Vahl, Enumer. plant. I. 70. — Foil, lanceolato-oblongis mlegerrimis subsetsilib pilosis; caulib. numerous pro&tratis filiformibus tillosis; racemis 2-J-pollicanb., braricis flores circiter acuantib.; segments ralciois inneanb. aequalib.; capsulis obcordatis compressis calycom acuanlibus. 2. — r.rescit in fejna.
57. \. SALIRIFOLU Forsl. Prodr. flor. IM. Aunr no 1]. — Endl. Ann. des Wirn. Mus. I. 187. t. 14. — A. Rich. Voyage de TAstrolibc iDcimime Dnision) I. 180 t — Foil, linean-lanceolatis aculissimis palmanb. inlegns; s pic is axillanb. pedunculalis folio tongionb.; calycis corollaeq. lacinus lanceolalis aculis. 6 — Frutei bi-inorg>alis ramosus, rami elongali glabri. Folia opposiia decusata palmana basi **subsessilia** plabra, poiioli \ix ulli bast dilalali amplexicaules. Floro albfdo-coeruleo-centes. Spicae a>llaros rlongalac pedunculatae, folio loiu'iores, rliachis pubrruli l'rdirrlli lrc>i->Mini, baM brartra lanceolala **Miffin** pubrruli. Calyci9 subbilabi id larimac otalo-acutae rilialac. fomlj lubulosa, lubo longitudine ralycis, limbi lacimae lanceolatae acuUio siibpalcnlrs, Lilrralibus sublalionbus, i nil ma rliquin longiore. Antherae subcordalac. Capsula ovali rompresa acuniiraia, oculis pohsperma. Semina plurima subrolunda. — Crescit in lilloribus Novae Hollandiae.
58. V. ANGISTIFOUA A. Rich. I. c. 187. t - Foil, liocanb. aculic Klourm bipollicarib. lolegnt; gpieli axillarib. naliiflorit pedunculaliit, folio longionb.; calycis corollaeque lacioit oblult. ^ — Boffnilex ft-3-pedalit ramotu»; ramis elongatis cinerascocibus glabris. Poll* oppotlta tetalia glaucsceniia, 4 lin. lad. Fl<re< coerulescenles spteali, spicae anllares peduncuUti folio duplo rl ultra **longiores**. (alycis lacimae oblusae ciliae. Corollae tubus m anuuius. lacunnae subinaequale* oblusae. Capnuli. . . . ? — Crescit in ^o\ae /celandiae lillunbus **Bassia** dm Ourans, Pas^e de> Fraiif ais.
59. V. KIIPTIC\ Font. Prodr. flor ins Austral no 10 — \ Rih I r 1^> 7 — Foil rihplirio lanrrnlaie^e inlrgerrimis glabris, racemis br<Mij p.niciflorif comml <m< .) — C. Jules **trif*** rimn<i biore\ tlo* phbn F« In stibprtiulaia oppo<ua drru<<ata palrnha Rlabra plana rnrnia ohusi nbtohMr murrnata inirg<*r-nma, pnllicana. Prtmli bn'VM opprensi plant Racomi lui |tauciflori PrdicelH pclmlorum Inngitudine. Calycin lacimae >ubular Corolla** lubu< ral)CP duplo longior rrectun, lacmns palentibus ovalu, |ateralibu< roajonbu* stamina long* tudin<* corollae. Captola ovala compreita acuminau quadrnalvia bilocularit* Srmina plunroa tabroluoda. — Crescit in Nova Zeelandia.
- 60 V. DK(I sst T1 Ail. lloii. Kfveot. fedil L) I. 90. - < urln. Rot. Mag.u. I *42, — (tlabra: foil prr%islrtib. rllipiiri< inlrgerrimit drru^atK. rarrmi* pauroO' m; cattle fruiien<o j — F>lia nucronai.i rundi carnlaRinro-marginata. **Racem** quam folia brevior<. Rrarlrae ovalar alulae (nroU inrundibuliformi* **cof**-ruka. — *lhb§ MagHlamira* Ju>> in dmcl >j>t <r;riab '21 i rc*nt in **insulis** Falklandici* el in vit Vagrellanir.1
61. V. FORMOSA R Br Pm<lr fl >n Holhn.I I 4M r.li N ab Ktenb ^{V.0)Z} PniUeoM foil p^rennanhb drru<<ali< lanr<*oUii< inirprrrim gUbrrrimiftb ^ arulu; ram 1< bifarlan pilu<iuscoli>; corytebi* anllarib paupiflon*. *> - **Cresc** in in<<la Vao DiemeQ
- (B. \ I UIATA R. Rr. I c. I. 4M. (edit ^ee> ab K*rn b SO - %. Conn, in **lloob**. Rot Mjgai. 1.3451. | . KrrcU: foil, late UnrroUu* longr aruminalif **caulib**. argute inarqualier terratit; racemil atillarib npponti* rlnitffaii: rorollis **pila-**biaus paicoiib, Ubio toptrict* indiviao, infariorr tnpanio, lobo .nedio m **lloob**

- ^j. — *CJUIS bipedalis simplex glabrusculus*, sub lenle bifanam pilosiu»iulu»
 Folia oppoMia J-4-pollicana sessilia laic lanceolala valde ailenuata glabra, supra
 obscure \mdia, infra pallidiora obsolete nervosa. Pedunculi axillares opposih
 folio longiores, floret albi fragranles magni. Bractee subulalac pedicellorum
 circiter longitudine Calycis segmenta lanceolala acuta, geminis pa rum mmoti-
 bus. Corollae rotatae lacimae ovalae — *V. Denrenha* Andr^w*. Dot. Keposil
 t. Wl. — Crescit in Novj lollandia australi cl in insula Diemensi.
- OJ \.C\I\<1>AR lir I c I 4J5 (edit N ab Esenb. 291) — (Hook. Bol. Magaz
 adnot ad t 34G1) — Folia late ovalis subcordalis rugosa inaequaliter serrulo-
 crenatis pectiolatis caulibus Inrsiitis, calycibus pilosis ciliaribus rapsula longioribus,
 race ID is lateralibus. pedunculatis paucifloris stricto, folio inulioiioi longioribus I].
 — fœulis herbaceis Hongatus saepe 5-0-pedalis, in locis graminiosis late rpon[^]
 \. decumbiMⁱ*» Folia opposita grosse serrata, sublu[>] dispersa, Inspidj (A\\
 quadripartitis lapsiis longioribus, lacinus oblongatis oblongiusculis nonosis Capsula
 rotundata compressa emarginata eumbrata polisperma, distichis septemto <OII-
 trano. — Crescit in Novae Zelandiae Insula septentrionali (ad ripas amnium ken-
 Kerl inter grammam)
64. *V. PERFOLIATA* R Br 1. c I. 434. (edit. Neci ab Esenb 300) - Sims, Hot
 Magaz. t. 1090. — Folia ovatis acuminatis, basi connatis integerrimis glaberrimis,
 racematis antheris longe pedunculatis multifloris. ^ — Herba perenni* plarip-
 dalit Folia sesquipollicaria v. bipollicaria, pollinem circiter lala, cordata ovata
 acuminata integerrima, lata basi sessilia aroplexicauli-connata Racemi axillares
 oppositi longe pedunculati, folio ultra quatuor longioribus crurillimis multilobis
 Flores breviter pedicellati Racemae selaccac prdinlli lonmludims Corolla bi-
 labiata corulea, labio superiore rhombico-ovato inligro, inferiore tripartito,
 larmis ovalibus (capsula ovalis acuminata calycem duplo excedens — (resni in
 >o\ a lollandia i
- W. \ I)IFF(s\ Ho >k hi in Hook Iron planar t 01"). — Suffruticosa caulis
 procumbentibus diffusis ramis longatis, foliis per paria rfmoli» palenlib elliptico-
 ovatis acutis serratis subciliatis. gubrit ner\oso-coriacri«, racematis atillanb
 oppositis longissimis (leiuosis; bracteis pami* lineari-tubulatis, prdirellis Hon-
 gatibus) calycibus glanduloso-pubescentibus; capsula orbiculata tegmen calicis
 late elliptica paucilobis eiccedentibus. ^ — Raceoili loogitlmt ••eend«Blet, 6-8-
 pollicares, pedicellis gracillimis fere pollicariis. Corolla corulea v. alba Ha-
 bitu similis *V. protratae*. — Creirit In Nova Zeelandia (Tongariro).
00. *V. MIMTICA* C. A Me[>]or, Venechn. der Pflanz. am Cauc. 105. — Perennans
 tuberosa raiiformis ramis diffusis; foliis, obovato-ovatis obtusis
 crenatis ^ iniegerrimis, rai ciliatis lateralibus paucioribus; pedicellis rapillan-
 bus spatulatis longioribus, ciliatis quadripartitis lacinus oblongo-spatulatis obtusis
 subatqualibus, corollae coruleae brevioribus, rapaulae oblongo-cylindricae lobis hub-
 orbiculatis, stamino filamento, »emimbu» ? <ri'»ril in Cauca»o.
07. *V. LAXA* Rth Scrophul Indie. 45. — Parce pilosa* Ml. lubtesulibus ovalibus >
 ovato-oblongis incisuris pilosis; racematis alternis, caulis quadrilobis,
 capsulis trifloris emarginatis hirtis. ^ — Oescit in India onomali
 ad kidarkonta.
08. *V. DELICIERA* ^all. Catal. 402. ex Bib. I.e. — R. J. I procumbens caule glabro,
 foliis bifanatis lanatis; foliis, feisilibus ovalibus lanceolatis creolatis serratis
 nervosis, racematis allornis pumibus pubescentibus, calycibus quadripartitis, rapoulis im-
 matum rliombeo-dilalatis v. marginalibus. Z. — In Nepalu ad dossain linn, I modi
- 00 \. \H-IISHthlOllt Pmr Inrul mnb Mil ',« - I oil ^,,1.1, Mibcordit,
 ovatis cronalo-iiuisiH nha puberulis, racematis spicatis, latralibus oppo«ih% ^
 — Caulis eroculus pubescens rranlis r<dn obtusa polli(arii 10 Imrat laij ||rar
 f de ovalae \n rahem aequiAntes (il)u« launiao acquirn (ornlla ; nn ,
 ilHde coi-ruhM * all.a i apsub obrord.iii ulabra Vnna mini i tescit *

70. V. *vt:silA>A* Rocrn. el Schult S)st. tegetab. Mantiss. I. 111. Caulib. pilosis MIIOSIS; Toll. pro^e serratis petiolalis, caulims otnli«, ramcalib. oblongis, race-me spicalis elongatis; braceis fihformib. cal)ccs paullo superantib.; stylo stami-nib. era^siore. 2]. — Folia ad basin Integra, plerumque subcordata. Calycis lacimac vubinaequales. — *V. mltutaefolia* Vahl mss. — Crescil....?
71. V. CHUM Lape>r. Pjren. Abreg. Suppl. I. 6. — Foil. sosilib. rugosis eloogatis profunde dcntnti<», racemis lateralib.; calycib. quadripartite, partiliomb. maequa-lihus If — llerba minor qunm *Y. latifolia* cui simillima quidem, *ed diferi jam eal)ncibus quadnfdidis. Folia angusliora acultora, calyces et bractea magis elon-gatae. l'lorc» magm cnerulei. Tola planla pilosa. — *V. lalifoba* /^o *dubia* Lapeyr* I CO. — *V. dubia* Chaix in DC. Fl. Franc no. 23ft).
fi. minor Lapeyr. — Foil, oblusis ad basin subpinnatifidis. — In P)renaeit.
72. V. MAROSTACHIA Vahl, Enumer. plant. 1.71. - Pilo«a, %illo«a: caulib. pro-slrals; foil lineanb. oblongi* cilrorsum profunde serratis incams; racemis axil-larib. longi«»imi« ^ — Caulis filiformis. Folia aeosilia obtusa. Capsola obcor-data compres<a cal)cis longiludine. In planla colla caulis sesqaipedalis et raeoni bipedalcs occurrunt. — Cre*cit in S)Ha.
73. \ IRTICAEI'OI \ Linn Til. Supplem. 83. - Jcq. Flor. AuMriac. I. 37 t. 50. — Rchb. Fl Germ. elcur«. 307. no. 2503. — Koch, S)nopt. 0. Germ. edit. 1) 523. — Rertol. Flor. Italic. I. 81. f - Foil, scsulih. otatis argute Hcrraln, supenonb. longe acuminati*; raeemis aiillanb.; pcdicellis fruclifen* patcnli*«imi*, capsula saborbiculan Iran^ren»e lallon emargioata; caule <pamm piloso t] — Radii re-pew gemmifera. Caulis tere« ereclus, ad summum *e<quipedalin simplex glaber v. pilotiuscolus. Folia opposita sOMilia, aeapo inaequaliter serrala pilo»a, infe-riors minora sobrolonda oblosa, foecestrve ovala aul cordaio-oraia, sensim acu-tiora, topenora ovsto-laoceolata acuminaU subinde cordaia, omnium maxima, sopraa lterum ninora v. angusliora. Racemos interdum etiam termloalis adesU Floret secundi. Braeteae linearet, pedicello breviores. Cal>ci« laciniae ovato-lanceolatae tii aculae. Corolla dilute coerulea t. ro^ea, slriii nalurationbus no-lata. — *Veronica maxima latifolia* *eu *Quercus folio* Mon> Oton llnlor. I. 302. seel. 3. I. 21. fig. 18. — I*, maxïma Seguier. Veron. I. 210. Dalech lli%ior. 1165. fig I — Duxb. Ceninr. II. £J. I. 31. - I. *lahfolia* Scop l'lor C'jrniol edit <) \ W — \ *gateoptifolta* dilib — I*, *nrcaoidet* D. Don. in Loud l'lor BriU 7. — Cre%eil lori% umbrosis in Eurnpa auilrali el in Bnh>nia
- 74 \ PF.TRIK\ *Wl Mem de Caead imper. de ^lote. III. 2W V 310. - Bcbb. Flor Germ elcur«" XI no 2MM. - A«renden« foil lanreolati« glabris arfo^o pauei%«*rrati« aeutK racemif »ubcor)mbo«o->pa<iciflom, eap«ula obeordalo—elliP"" lira. ?} - (auli« 3-5-po||jean«, pilis curtail* teoue pube«ren*. peduncoli fill* former etongaii. Corolla majateola dilute eoeerulea. * *Y. Damngarlrmn* Roem.* * Srhult - Roch. Plant. Banal, fig. 41. — l'. panci/Toro Kit ! - *Y pr<tunrd*nt* Y V Rieh Flor Taor. Caoeat I. 27. - Crttcit In Cauca»i alpibut hcbocbdbagb of Tljfendagh, in alpihus Traosylvanlae et In Banato.
- 7) V. SCCTELI \TA I inn Spec, plant 16. - Engl. bot i 7*J - rurtu, Fl. Loodl* III t. 1 - Flor Dame 9DP. I. IVJI Poll et Turp Flor Pari* I 13. I. 13. — Strm DeuUcbl. Flor HA S* ic. aen > Reh. Fl. Germ el«rur» 397 no. 3308 — korb, Hynops. fl. Germ edit. I V2l R<rtol Flor Italic I 71. - *Foll. s«*silib lanceolato-linearlb arulit, remote antronum iln,tiralati«. racemis axil-laiib.; pedicellis fmrtiferU pilenlittimi* eap«nla rompr««a emarginato-bilob» trosMvorso Utioh. % — Radix repent. Caulu lere» grarili« infernr deejunjtent, ad Bodos rsjajicaas, subpedalu, Mepe ramoot. Folu oppotita te«llla lanceolato-hnraria v. lioeana acomioata tc*I«time denneulala. »ubiode inlegenima. Racemi pedunealatl toliurii, Mrfias allrmi loaort paurlBon Oeiuosi, folio loag ^ ^ pedicelli leooi««i«t, rrucurct r>leH. Braclrotae lmearet *. *lineari-lanceolatu-* pedicello mullum bretlore*. Cal)cis laclmao otalo-lanceolaiae «coUO. *Calyca alba*. roseo-v coeruleo-alfioia. — *Veronica palustris angustifolia* Rivin. *Moq.**

irregul. U 06. - *AnagaUit aquaiiea quarta* Lob. Icon. p. 467. - *V. Carolmana* Poir. Kncycl. mclh. VIII. 520? iGlabra: caule erecto, apice dicholomo; foil, ovalo-oblongis obtusis subinlegernmis, wfenonb. peliolaiis. ^ - Folia carnotula, 6 Hn. longa, 3 lin. lata. Racemi laxi foliosi, bracleae peiolalae pedicelln Ion-giores. Caljcis lacioiae ovaiae. Capsula obcordala. — lo Carolina, locis aquo-
sts crescit.)

a. *glabra*: — Gcssn. Icon. aen. t. 10. fig. 87.

0. *piluta*: Caule, pedunculi* \. caljce quoque margineq. capiularnm villosis. — *Y. Parmulana* Poit et Turp. Fl. Pans. I. 10. I. 14. - Trallin. Fl. Aoilriao. 1. 20 — G. Don, General S>kl. of Rani, and bot IV. 576. no. 147. — Crescil loci* inundalis per loiatn Kuropam, Sibinam el In America boreali.

76. V. TKM'IS I.db Icon. P. Rosa. All. illmlr. 1.217. - Ldb. Fl. Altaic. I. 38. f — Caulc erecto Mririo folnsq. glabris oblongo-lanceolatis aculiuculm scrrolatis; raremis axillanb., ini«»rnirdns opposllis; capsuliselltplico-obotatiit oblusis integrity Q? V — Caulis erectuK striclus 10-polliearit. Inlernodia fulim longiora, in medio raulo ea duplo superaniia. Folia sessilia fere connaU 8-0 hn. longa, 3 rirnirr lin. lala, Infima emarnda reflexa, media obiuie *errulala, luprema acuiiora. Karomi versus apicem caulis anllarcs oppnsiii gracilea 4'/i-pollic*rei v. paullo loogiorfs. Bacemon supremos, altero opposilo rudimeolano, sobtenntialis. Floret in ra-cemo soliiarii, rarissime geminali bracleati pedicellall, pedicellis fliliformibun ux 3 lin. longis. Capsula ellllplioo-obovala glabra, apice rotndau Integra. Semina minuia globosa. — Crescil In Persia boreali.

77. V. ANAGALLIS Linn. Spec. plant 16. — Engl. bol. I. 781. - Curtis, Fl. Londin. II. I. 3. — Flor. Dame. I. OOI - Poll, el Turp. Fl. Pans I. IV I. 12. — St. Ilil. Fl. Franc. 37. t 0. — Stensk bol. L 127. - Il.ijne, Arznez>gom. IV. 1. 1. - Rebb. Fl. Germ, excurs. 307. no. tWOQ — Koch, S>nop<. (I. Germ. (edit. 1 524. — Bertol Flor. Italic. I 70. j — Hlh. Scropbul. Indie. 44. — Foil. »ei>filib. lanceolate <>a-lisq. aculis serrati*, racemis axillanb.; pedicelln fructifens patenliiMmis; cap%ula orbiculari le\iter emarginala. ^ — Caulis crassior quam in V. *Heccabunga* erec-lus v. ascendens Qtiulosus, inferne td nodos rtdicans bipedalu, inlerdum rano-MU. Folia aessilia opposita, inlerdum verticillalo-ternau t. quaierna, ba«i lata, •pice acuU aequi-bipollicaria, 4-0 lin. laUv leviler remote arftuleque aerrau v inlenhun Iniegerrima. Racemi aiillarta aollUrll opposiU pedanculaU, paaaisA folio mulium longiores, longo Iracu omJUori. Bradeae liMarvs pedicello pltrumie breviores. Calycis lacplae lanceoiaiae aal ovaUe ac«U« pantm inaeqaalei. Co-rolia panra pallide coerulei v. roa«a, sliis saiorailoribut pereuma. — *AuagmUit aquitica caule conraro* Caesalp. De plaolis Lib. VIII. Cap. 9K p. 336. — V. tm. *dulata* Wall Caul. 406. - Wall, in Rib. Flor. Indie. I. 147.

§. Foil, bretionb. late ovaio-lanceolalis levistime lerralii inlegnsque. — ~~Ana-~~
galhs aquatica major folio oblongo C. Baub. Pinx. 25i *BeruU major*
Tabern. Icon. 710. iflg. bona). — *Y. lenflia* Schmdl. Centur. Bobcm. I. 14.

r. Caule bunuli subpedali; foil, crebnonb. brevionb. laureolalia. — *AmagaUu*
•fnaiaica minor *folio obhmgo* C. Baub. Pinx. Stt. - A**g*UU *qouettr* mt-*
**or aUera* Taberncm. Icon. 718. (bona).

d. Glabra: caule erecto; foil, lineari-lanceolalit aealis amplexicaulib iniegrik, calycib. corollae aequalib.; capsulit elliplicls oblusis obsolete emanriuau.
Y. anagallotdet Guts. Pl. rar. Sical. 5. 1.3. — Gussone, Flor. Scul. s)aop» |
16 - <;. Hon. General syst. of gard. and bol. \|. 996. no. 151. - V. *AnagatUs*
tar. mm»r Ini Sjfllogf pi. 12.

Creicit in mulis per lotam Kuropam, Sibiriam, Orirnrirn, Indiam orientalem
Chinam, Japuiam rl in \..rii* Amcrrac borealis reffionibu%.

78. \. KKCCAH NG A I um s|,rr planl. 17 Mrm. 11 llmucbl. III J7 ,c am
- Sm. Kngl. bol. \ I. ut» Curl*. Flor. Lnndin. I. i i - Hor. haute i i ||
•T Wood%. tfrdic. but. i. 7. - Poll, et Turp. Flor Pan. I. H I II Pi
Poo. pi. medir I H I U. - bventk bol. \ HI. - Hau»r. Ar/nr,«cm \ \ t g .

Rchb. Flor. Germ, excur*. 368. no. 2507. — Koch, Synops. fl. Germ. edic. 1.) 5*1. — Bib. Scrophul. Indie. 44. — Bertol. Flor. Italic. I. 00.1 - Foil, petiolalis ellipticis oblongis* e oblongis crenato-erratis; racemis axillaris; pedicellis fructifens patentibus; capsula subrotunda turgida leviter emarginata. t. — Caulis teres, latus farctus, in femore procumbens et ad nodos radicans, superne surrectus, saepe ramosus et rubens. Folia opposita elliptica et oblusa minute crenata breviterque petiolata. Racemi laterales pedunculati axillares. solitarii oppositi. Bractae lineares* aut inferiores lanceolatae calicem subaequant. (al) x parvus lacinus pauculus inaequalibus ovalibus v. lanceolatis acutis aut oblongis. Corolla parva coerulea siliqua salutaribus percursa, fauce albida. Capsula lurgida sabrosa lunda vix emarginata. — Tota planta glabra succulenta nitida. — Sum Fcbs. Histor. stirp. 7*21 fig. 725. — *Anagattia aqualia* Dodon. Pemptad Mirp. 503. — *V. punctata* Hamilt in D. Don, Prodr. fl. Nepalensis. 03. — *Beccabunga* Riv. Monop irregul. I. 100.

fl. Foil, oblongo-angustalis oblongis Bertol. Amoeo. Hal. 324. — *V. Beccabunga fl. alpina* Ten. Viaggio in Abruzz. 43. — *Beccabunga alpina sive Veronica glabra alpina aquatica Oleae folio repens* Boer. Mus. 22. t. 0 - *Beccabunga minor* R. I. c.

/ Foil subintegerrimis; floribus roseis et bracteis pedicello longioribus — *Y. hmosa* Lojeune, Rev. fl. Spa 3 — herba recent antiscorbutica in aculariis grata, sicca nullius usus. — Crescit in fossis aquae limpidae* nusquam per totam fere Europam, in dura orientalem et Americam borealem.

* * Calyce quinquepartito.

79. *V. PIRSHII* G. Don, General syst. or gard. and bot. IV. 573. no. 113. - Glabra repens: foil. reniformi-cordatis profunde crenatis; racemis apicalibus lateralibus pedunculatis brevibus oblongis; calycibus inaequalibus quinquepartitis. — Folia longe petiolata. Caules repentes, ad nodos radicans. Pedunculi alterni fororum longitudinalibus. Bracteis oblongis crenatis. Floret magni densi pallide rubei. Filamenta corollae longitudinalibus. — *V. reniformis* Prsh Fl. Americae septentr. I. 10. (nee Raf.) — Crescit in America boreali ad ripas Missouri

80. *V. HIMALENSIS* D. Don, Prodr. fl. Nepalensis. 02. - Rth. Scrophul. Ind.c. 44. - Pubescenti-hirta v. demum glabrata: foil. ellipticis ovatis \ n^a|j-olijnnf;i> iocitocrenatis, junioribus hirsutis; raceme oppositis longo pedunculatis. rachibus inaequaliter quinquepartitis*, cap^ulis ovalibus acutis* calicem* u^eraniil>us t|. - F. *grandiflora* Wall < aU. 401 nee almer — Corolla aurea. - \fmi< dicitur *V. fr#-crio* — Cn %ā in-India orientali (io>>ain Tban .

HI *V. M\FV Lindl Bot Rrgitt , >fw Ser XV. Pl. nitrell 43. (nee Hook.) - Racemus erectus lateralibus multifloris; foil, pinnatifidus glaberrimus, laeviter linearibus digitatis, tepalibus quinque; ovalibus oblongis; corollae basi barbatae laciniis* tribus anfructibus; capsulae obcordatae dU*epilmeoto taliter bilobis contrano. %> — Herba «r%|uipedatis Hgida. Floret pallide albi. - In incula D enenrnm.*

^ *V. PROI>TR\T\ linn Spec, plant, tt. — Sirm. Flor Durhnd* lift v< ir aeo. pettiaia). — Rchb Flor. (term, eicnt. 38K. no. 5MH — K<>rh, s>n>ps fl (ier** 'edit. |.) J©. — Rrrtol Flor. Italic. I. 70 | — F>ll. brr\u<T j.oiulau Imeari* lanrolaliter crenato-rrrati< ba<i «ubinci»i« ubinlrKernns>r, rarrnm atillarib.; prdirr|i< captulam loiter emarginatam »ubacquantil» , raulib %t< n<h pro>traliit flonfert a<crndenlibat. ^ Caulr* rar<pito<i trft<*> a inbu« quaiunr pollr* cibus ad dodrantrn lonV. Folia ublonga oblonga, apirr inir^rrrnn. r<liquo >> giat avbinarqualiter denutj, tnfrnora brv<itr prtioUu, bi%ā aiuu^uij. propo- batin crebre pecioiaU, »superior« ftubinitfvnu Rarrmi in ••immo r<ul< latorale* tolilaril a<llar<« oppottU, ranu* altrrnt aul in caulr minm loofr pedunculi Jti pobttcentr* Brarirae oblongo - linrare* obiu^jr nli<Ur aul birtulae pedunculo aeqaak< laikiorv% v bre%tore< (al>n< Ucinuc lanreolaUf acutiusculae ? . obtum<ruljr nliatac. binutae aul glabrar, quinta omnium minima. Capsula majuscula pallide v micaMua coenilta tcoitque tatarauonbus piCla. Tola >>*

albido-pubescent, pubescenda sursum curvulo. — *Veronica frutescens durtor oblongo Chamaedryos folio*, Palavna Bocc. Mus. 18. t. 10. — *Veronica minor angustifolia ramottor et procumbent* Seguiet. Flor. Veron. I. 237. — *Veronica minor angustifolia* Mom. Oxon. Hist. I. 321. seel. 3. t. 23. fig. 16. — Riv. Monop. irregul. t. 05. — *V. Orttmana* Ten. Appendix. quinla ad Il. Napol. 4 el Lmnaea III. Lilcralurber 07.

a.genwna Rrhh. Fl Germ, excurs. 308. no.2508. — Decumbens: foil, infenorib. otatis, reliquis oblongis lanceolatisq. crenato-^erratis subinlegerrimisq. — *Teucnum quinlum* Plus Hist. 350 — Ri. Monop. irregul. t. 02. fig 2. - Vua non difficile dislinguitur a duabus sequentibus tempore florondi praecoxion, caulihut inulto gracilionibus, basi dun* lignohis jumoribus el sclnlibu» in orbein pnwrati* flonbusque pallidionibus, ludil quoque flonbus albis et carneis, quod in signenlibus non occurrl.

fl. tulurejaefnha Toil el Turp. Fl Paris. 22. I. 22. — Hook. Bot Magaz. t 3083 — Spicis laicalih. caulem proslratum superaniib., foil, inflmis oblongi*. Mlpcrne scrraiiM, infimis subdenliculaliti, aliis llineanbus inleRernmin - < rr*- cit in collibus siccis apnci* per toiam Germaniam, Helvetian) el lialiaro bine inde.

83. V. AL'STRIACA Linn. Spec, plant. 17. — Koch, Synops. 0. Germ. (edit. 1.) 590. — Berlol. Flor. Italian. I. 74. t — Foil. sobpcUolalis lanceolalis crenalo- v. pinnolifido-sorraljs v. atnbila ovalis mullifidi*q.; raemis axillarib ; pedicelli< superiorib. capsulam acute emarginaiam aequantib.; calycis quinquefdi UCIUM II-nearib. oblusi», raulib. omnib. ereclis v. a basi arcuala ascendentibu^ . ^ — Caulis dodrantali!» \ sosquipodalis simplex \. ramo»us Folia ima el sumraa passim subhimplicia, reliquis subbipmnalilidis, lacinps nunn linearib angustivM-mis obtusis aut acutis, nunn oblongi* duplo inplo^c laliorib nbtu<»», larinun infenonbuii temper longmribui ditancalis. Folia supremn subinde» Hiib|erlieil-lalim terna. Raremi laterales lonRi peduneulali solilarn axillares oppomh Brae-leae pedicello lon^iores lineares aut lanceolalae, infenores 2-3-hdae, reliquac simplices. Cal^x 4-5-partitus (!!), laciniis duabus duplo longinnbu*, quinla omnium minima »ubmde deficiente. Corolla grandiuacula pallide coerulea flrnt satoraliarlbus percursa ToU planta eanetceoli-pubeiceni (Berioloni). — *Veronica lemitsnme laclmata* Moris. Oxon. Hislor. I. 321. sect 3. t. 23. flf. 17. - r. *lalfolia* el *V. Teucrium* Rebb. Fl. Germ, cienrt. 308. so. S90* 9910 ex p.

a. deniala Koch I. c. — Foil. lanceolaUs T. laneolaio-llnMrib., plerumq. re* mote crenalo-serralis, quandoque Inteferrimlt. — I' *dental** Schmidt, Ceotur. pi. Bobem I 20. — *V. pro\$(rata t. angustifolia* Brohrdi. mst. ex Rchb. Fl Germ, excurs 308 no. 230R — *V. Schmidlii* Roem. el Schult SJ»L |egelab. I n^i — I *pantculata* ^illd. Spec, plant 1.71 fexcl. *>n. P.ill — *V. Ten-et mm* , *angustifolm* I db Fl. Altaic I 40 - I. *angustifoha* Brnhrdi. m«s. (nee A. Rich) — I *Teucnum* !lo«l. Fl. Autnac I S - |eromca *Teucrn facie* Park. Theatr. 551. (rum ie.) — *Teucnt quarh lerha ipecies* Clas. Ilutor. 340. (cum ie.) — (*hamaedryt tvptna fade Teucrtt pratentit* Lob. Icon I *MI fi. ptinnatt/ida* koch I c. - Foil lanceolatts v lanrrolato-linearib. pinnatifldo-denuiis. — *V. Ausirtaca* Linn. I. c — Jcq. Flor. Austriac. t. 120. fig. 4. — *V. protrata t. Ausirtae** Rchb. I. c — *V. polymorpha* Willd. Knumer. plant hort Berolin. Suppltm. p. 2. — Lnk. Jabrbeb. der Ge«rhtknde. I. 3 43 - *F. lactmtala* Mncli. Method, pi. 21. - *V. pralenstt* a. Oanti, Fl Auilr. 314 (exel <n. Tournef — | *Jacqutm* Roem. el Schult S«ot |cw| | l(X

a. mulhfida Rchb I c - Bot Mapar I 1070 - Foil palmJiliparlilu, parntionibiis angUhtissime luiparibu* inci»< — I *anguihfoha Yi*ch tn/s.* | i^.. *nutfolta* M Bieb Fl laur (auca« I II - I *protrnta* , *mulhfida* Rrhh I.e. - *m in Tniuir of ihr Linn Soc I 101 - I *mulhfida* linn v.,rc ffani. I 17 - learnt map* piln^i. rorolli< rnsn* (f 1f!|t| ad *prriem ^qucentem!) - Jrq Flor \u%tnar 1.130 fi; 1 et jj

t pectinata Rehb. — Foil, inferiorib. peclinato-pinoatifldis, auperlonbus li-
neanbus in(egernmi<. — *V. protrala d. pecltnata* Rehb. I. c. — *V. pecltnata*
Vabl, Enumer. I. 71? (Foil. obloDgis peclinalo-scrnlis; caulib. pro>tralis;
racemis elongalis, basi foliosis. 2), — Buib. Cenlur. I. t. 30. fig. 1. — Caulis
basi fruiicosus ramosus ascendens, ul lota planta, cancscenti-pubescens.
Folia subpetiolaia, basi acula. — Crescit propc Constaniinopnhn).

C. *tnhocarpa*: Capsulis pilosis. — *V. Irichocarpa* Rocm. el Schult. S)sl. veget
Manliw. I. 100. — *V. pilocarpa* Lnk. Eoumer. plant, horl. Brolin. I. 23. —
*V. oriental*** Willd. Enumer. plaot. bort. Berolio. I. 22. tnc ahor.) — Omoef
bae varietalea furmit io termed us confluool el e seminc uoius plaolae enaa-
cunlur. Varietates *fi.* el y. noo raro io uoo caule repcunntur Florcol inter-
cedenle praecoiui el seqnente acriai.

1. *oritntaUt* Linn. Spec plant. 17. — Procumbent pubescent foil, lincon-lan-
reolalis, Inferioribns pectinalo-pinnaliGdis, superionbui iniegri; racemit
aiillaribui elongalis; pedicellis bracea longionbus; flonbut coerulem. — K.
*oriental*** AiL ilort. Kewens. (edit. 1.) I. 2X — Loddig. Hot Cabin, t 410. —
}. *heteropkulla* Salisb. Paradis. Londin. 7. t 4. — (Crcsni in Armenia el In
Iberia.) — *V. Ouehea* Slot, mss.

Crescit in collibus SICCIS apricis Eoropae australi-onenialis (in (ermania el m
HelTetia australi, in Italia el eiam in Ilispauia), in Orienlc, in Armenia, Iberia,
Somchetia etc.

84. V. I 4TIFOLIA Linn. Spec. pi. 18. non Rrhh. Fl. Germ, eicurs. 308. no. ttia) *)
- koch, Synops. fl. Germ. edit. I) U0. - Bertol. Flor. Italian. I. 79. t - Foil,
tettilib. e bail tobeordata ovalis oblonrJM]. Ineito-serratit pinnalifldisq.; race-
mil aiillarib.; pedicellis ereclis captnlam acnle emarginaiam aubaequanlib.;

1) Bane ei prioret biice nolis ciroveMeribi toll Belcbenbachi

L. V. PROSTIATA I. — ftc*. I. e. «08. - *Cqptulae obcordatae lobu apice d<#-
Itmtibu**. — a. taiurejaefolia *Poit. ei IWrp. ft. Pant. I fcl* — *Decumbent foil**
Hm—nhu. — *ft. genuine: Decumbent: foil, inferiorib. oraltt. rrltquts oblonfif*
ImneooUiUq. erenalo-terraitt tnbmUgtrrimuaue. — *Tcurnum Y. Hut. p W>*
fodem erecla: R%t%n. I. 9±fig.% — jr. angustifolia Bmh — Hahor asrmdentl
foil tameeolaht tubterrai iniegerrimtre.* — *V denlala Schmdt — V. sc bld lil*
R S. — 0 peclinala Op. — toll, tufertonb. BtehmiUa - ptmnaftiddt. atiperrorb
*Htheanb tnllegerrmt**. — *t 4u<lnaca I L. - H.lattor atcrndrm foil lamreolaltt*
*tnnto-vi*noltAdt. Jcq iutlrac. I. J&. fig. 4. — | pohmorpha Hdd. —j**
*mullifid i / Rot Magaz t HHO - Jeq. Auttr I. 3S>. fall Foil. p*lmS>~*
partttt, parhtiomib amgutttttime hnearb. tmatu. — | angujtifolia Ftsck.

2. V. TN<RU M Ltmm (edt. *) - *Mehb. I. r. 2300. - (apsulae obovmla-obcorStf*
lat lobit aptc commtceitibus. — *Tcurtum H. lerlia »pene» vlttt. p. 3a? . ~*~**
TrQerium |akl. — V. denlala Sibrad. — a. hynopitoh iteendent: ffU.J^L*
*rtb. inteorrmis ml tmbdmlmh**. — *fl. onenlalis Att - At r em dent * foil, t..•Jf^*
*ImmetolmJt. tmferiorib. p*Him4U>-p%mmatut4U, tupertonb. tmiryernnis. — tjl*
nuifolia Her - trtttior: foll mmmib. kimimri ptmnaftiddt. — t oronalia t^A^
Bol. r<aata I 410 S HoMeana Astndmt: foil, lamreolaltt crenato-serrata*
*m*44%t mttemuaio-acitmtmmlu, 9+rtm* apietm (mieaerrimit t. Cltfalana Asc*
dt: foil, ommib oroto-lametolmh mibmemqumUfr terrotu. — C ^ d'feticalls*
T—ttL Sjllog •d Hor Hatitbon, II. 247. - Decumbent foil, orattt obt*i* lo-*
rilfr mmtmHt tetthl . caul decumbent* rilloto, (tn Apenntmit.)*

X T LATIFOUA I. -- *Hckb I. e »ia - Cmptmlu* orbteuhnt tmarginalea lobb*
mptee connirenHbt. — « drrumbens: fof. hmeart-Imne—latt subitgerrimb
*- V. Taence row. - ** . r«aī<i.l.Oll. - ,1 beteropbilla Hock H. Ban. fig. 4*
- AuttMdemf fml. Immrtolalu crenaHt, tupertonb %ntegerrmtt.
MU.f — r larinufa Murk. — iteendent • MI tmtt lameeolatit tmeito-larinofa
*9*9T*m4* lineiri-lmueeolah* deulsttt. - i |. P#eodorban)«rd7» Jf* Austrig. f*
I• 10t — MI. •r</o>»alo#M. pMiia. erumlo-terrmliM - |. monUna Str. fig. 1.*
- a. mmlna- Poll. tnte tmlib erenmf^termt. C plicata row. Tens fig. 1.*
*"" Mollifef i A. W. f. M. A. H#<-<rr*4MM. - % pilot* .VA«r. iarto alina? — y.*
critpa WjrtMP - ^ beieropb)lla #§». Pmrd I 4 - Foil. inferiorib. subit-*
ptnmmnpma. Imetnt ditnimSo- r*tuudmHt, tupertorb. Itmeanb, incise-pennatifldis:*
sptulm pubetenu. — |. orleoialit Mild. Kmm. | pilorarpa Lnk. — V. ur-
ebotarpa ft < . #. noiuft^a Je Auttr. I. 300 fig. 5 AW. inferiorib. pal-*
*mate-|«nniaf«<, tywmonli. Itaj#<«ImmetolmJt imetf-pt*metelid. — t. m. p. 100*
Jeq. I. e. fig. 3 - PutLAWmb. pmbmmH Imeinitt Hmtmrib. pinnatifldis.*

caulib. omnib. erectis v. c basi arcuata ascendentibus. ^ — *Galearia* erectus undique pubescens simplex dodranalis v. subquipedalis. Folia iroa minora subsessilia, reliqua arculo sessilia, omnia opposita cordato-ovata v. ovato-oblonga obtusa obtuscula. dentata, subinde subincisa v. imo peclinata, supra nudiuscula piloso, infra pubescentia, supremo angustiora. Bractea lanceolata v. lanceolata-linearis oblonga acuta, ciliolata >. hirsuta, pedicello longior v. brevior. Corolla tubulosa corollae salubriori-striata. — K. *Teucrium* Poll, el Turp. Fl. Paris. I. 10. l. 15. — F. *Pseudochamaedrys* Jcq. Fl. Austriac. I. 37. l. 80. — *Veronica major frutescens Chamaedrys turpia latifolia* Weinm. Phyl. t. 1005. 8g. A. — *Veronica major alt era frutescens* Moris. Dion. liblor. I. 319. sect. 3 t 0. fig. 10.

o. *major* Scir. n. l. Flor. Germ. I. 35. - Foliis basi cordata amplexicaulibus*.

f. *minor* Schrad. I. c. — Foliis basi ovalis cl plerumque oblongis. - F. *Teucrium* Vahl, Knumer. I. 78. (ei descript.) - (Sum 1. *Teucrium* Linn. «4 hanr, an a* Tarletatee F. *AmmiHmeme* perllncat, noadum aatl* canafat.) — Crescit in Europa media nee tamen ubique el in Armenia.

85. V. LITETIANA Roem. el Schult. Syst. veget Manllu. I. 100. — Foil, lanceolatis glaberrimis parum densis; racemulis lateralibus longissimis. % — Corolla pallide cerulea. Capsula glabra conpressa. — Forte varietas V. *Tuttrii* caulibus vli pubescentibus, foliis salutaribus vli dicitur nitidis sabinlegris. — f. *niida* Duf. mss. ei Poir. Eocycl. method. V. 407. — Crescit. . . . T

80. V. CRINITA Kilaib. mss. io Schall« Fl: Austriac. (edit. S.) I. 90. - Erecta pubescens: foil, subsessilib. ovato-lanceolatis inaequaliter serratis; racemis axillaribus, folia duplo excedentibus; calycis Ucinii > inaequalibus. ^ — Caulis lomfnosus. Folia inferiora obtusa, superiora acuta, basi apice in(cg*rrima. Ilrarloac pedicel I is longior. (lipsub marginalia compr«\$a. V. *atifolia*, 9. *heterophylla* Rabb. Fl. icrm. e\cur\$. X^ no. SSIot — Crescit in Hungaria.

87. V. PARVIFOLIA Vahl, Enumer. plant. I. 71 - Ascendens pubescens: foil, parvis pinnatis; racemis multifloris; bracteis pedicellos aequantibus. % — Folia omnia, eicepiis superioribus, profunde pinnatifida* Floret ei capiolae quam in F. *oritur* triplo mi no ret. Capsula compressa orbiculata. — Buib. Cenlur. f. I. 41. If. *. — Crescit locis gramlnosis Io Cappadoda ei Amenta.

88. V. ROSEA Dsf. Fl. AUaai. L IX - P«baMsaj; tank AnUlaot tMaadcaU; foil, pinnatifidus breviter petiolatus, Mriaaja* t-a-iajalalit; rotata tloag«''« axillaribus; bracteis pedicellos aequantibus. 6 — Ptdmill etpillartt. Calycis laciniatae inaequales quaternae v. quinae. Corolla rotata magalutidiae Illat V. (atf. *fobae*. — Crescit in Ispania loca subalpina prope Aalequera Juua La pfQt de los Enamorados.

B. *Terminia* • roosaouo.

* *SerpyUifoliae* G. Don, General syl. of gard. and bot. IV. 808.

Hiliculi parvi plerumque alpij erecti vel procumbentes follii parvis, ribus bitribus paucioribus, post aebetia elongatis; habili proprio augis quam cetera characteribus a *Vernonia* \$pitmti\$ difonI.

80. V. BELLIDIODES Lias, goe, plant IV - Krok. Flor. Bilesiac. I. 11 11 - Bbb. Fl. Germ, eieus. 310. no. OMA. — Koca, Oyaops. B. Germ, (edit I.) M0. - Beriol. Flor. Italic. I. M. f - Foil. obovata oblonga, inferioribus majoribus. oonges subrotunda, caulibus oppositis remolis; racemo terminali bracteato paucifloro, pilis ariularibus villosis; capsula obovata leiter emargata. ^ Caules leres simpliter ascendens digitalis pslmart«tc pubescens, ad h«am dmn« fohoiui, reliqua parva filium panbu» duobus %H (ribus mler se remoiit «e»tilos. Folia omnia O|M.\IU % obovata-oblonga cuneata obtusa «r»»tila, superioribus minule crenulata, sulindit tnta inlgrrrima puberula, inferiora majora. Bracteae oblongae «. oMonco-lmrrrolatar oblongae, pedicello l.m., or* t subindeque % oret Cal«n* iju.idHpartili larlniar ovato-oblongae obtusae Corolla saturate

- roerulea, fauce alba. Capsula ex compresso turgida pubescens calyceem excedens. — Hall. Stirp. indigen. Helvet. I. 235. t. 15. fig. 1. — Crescit in alpinis Helvetiae, in Sudetibus et in Pyrenaeis.
00. V. FRUTICIOSA Linn. Spec. plant. 15. - Strm. Deutschl. Fl. Hfl. 56. (ic. aeo.) — Engl. bot. t. 1028. - Wife, in Jcq. Collect. botan. IV. 229. t. 5. - Rchb. Fl. Germ. excurs. 369. no. 2512. — Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 520. — Bertol. Flor. Italic. I. 85. | — Foliis oblongis obtusis subcrenatis, in Oris minoribus; racemo terminali paucifloro glanduloso-pubescente; capsula ovali leviter emarginata. ^ — Caules caespitosi interne radicales, ex iis assurgunt cauliculi annotini stricti simplices, longitudine varii, etiam dodrantes teretes pilosuli. Folia petiolata obtusa subcrenata, superiora aequalia longiora lanceolata aut oblongo-lanceolata obtusiuscula aut acuta, paucim Integerrima, subinde una aliter creata notata, praecipue margine pilosula, sessilia, superiora iterum minoria. Racemus terminalis non brevis pauciflorus, nunc molliflorus elongatus, totius pilis articulatis apice glanduligeris patulis pubescens. Bractae lanceolatae obtusae, pedicello longiores T. breviores. Calycis quadripartiti lacinae lanceolatae acutiusculae v. acutae vix inaequales, lacina minima interdum accedente. Corolla carnea venis roseis percursa. Ovarium sub orbis subrotundum obtusissimum glanduloso-pubescentis. Semina plana peltiformia. — *V. frutescens* Scop. Flor. Cam. (edit. 2.) I. 10. — *Veronica* no. 545. a. Hall. Hist. stirp. indig. Helvet. I. 235. L. 16. — In alpinis Germaniae, Helvetiae, Italiae superioris, Sclaviae et in Pyrenaeis.
01. V. PONAEE Willd. Spec. plant. I. 61. (excl. syn. plerisque) - DC. Flor. Franc. III. 460 — Bertoloni, Flor. Italic. I. 83. t. — Foliis superioribus ovalibus acutis serratis; caule ascendente erecto; racemo simpliciter; pedicellis fructiferis rectis. 2|. — Caulis ascendens T. erectus palmaris pedalis, teres simplex pubescens. Folia inferiora minoria tuberculata tuberculata ereata obtusa, reliqua aequalia ovata. eordato-ovalis acuta serrata, superiora minoria saepe altera, omnia pilosa T. pubescentia. Racemus terminalis simplex, pilis quam plurimis apice glanduliferis pubescens. Bractae oblongae lanceolatae obtusiusculae pedicello breviores v. eae aequales ciliae adnatae pubescentes. Calyx 4-5-partitus, denique quinto minimo, reliquis oblongis obtusis. Capsula compressa subrotunda emarginata pubescens. Pedicelli fructiferi recti. Corolla pulchre roerulea. — ». *Gouan* Moreti, Decad. pi. II. 6. — (*V. pumila* Allion. Fl. Pedem. 270. I. 22. fig. 5. vulgo hue relata eximie pertinet ad *V. alpinam*.) - *V. temperrima* Lam. Flor. Franc. (edit. 2.; 436. — Varietas haec species foliis acutis, trilobis, ramis numerosis axillaribus, foliis latoribus orbibusque longius spicatis. — Crescit in Monte Baldo, in montibus iusulae Corsicae et in Pyrenaeis.
08. V. ARBUSTULOSA Benth. n. s. c. Rchb. Iconor. Of. M. - Flioromifracosa: foliis oblongo-lanceolatis subnatis reticulatis; racemo paucifloro corollae rostrato-striato; capsula ovali calyce longiora. 6 - Creata.? (colitur in borto regio Driftensi).
- «. V. STELLERI Pallas mss. in Willd. Herb. Itt. - Lnk. Jhrbchr. 1.3. 40. - Cnt. et Schkbid. Linoea II. 557. | — Caule simpliciter hirsuto; foliis sessilibus cordatis serratis ereatis obtusis: racemo brevi; bracteis crenatis pedicello brevioribus calyce bracteato. ^ — Radix obliqua horizontalis articulata leres subramosa. Caulis lioquos v. bini, rariis plures ascendentes simplices imi digitales et sphaerocauli. Folia per paria 4-7 decussata opposita sessilia semiamplexicaulia ovata Inlerdum aabeordata, apice acutiuscula, 15 lin. longa. 0 lio. lata, acutius v. serrata alM ?. obsolete serrata ?. Intrigerrima, subradicalia minoria emarginata superiora et inferiora subaequalia, superiora non rariis opposita, inferiora tarpe confertiora. Floret primis laxo corymbosis, dnm rariis, racemosis M-loro. Pedicelli fructiferi calyce quatuor longioribus. Bractae topriori sensim breviores, topriorae lanceolatae inirriginae, pedicello breviores. Calycis quadripartiti lacinae lanceolatae acutiusculae. Corolla corollae ad faucem inaequaliter villata. Capsula elliptico-ellipsoidea calyce subaequali.

- gior turgidula in emarginata. Semina illis *V. alpinae* similia. — Crescit in Kamtschatka, in insulis Kurilis et in Unalaska Aleutarum.
04. *V. GRAINDIS* Fisch, mss. ex Spr. *Neue Entdeckungen*, II. 122. — Folia, cordato-oblonga, obtusa, profunde dentata basi, subpinnatifida nudis; racemis elongatis; capsulis subglobosis glabris. 2. — Caulis plerumque simplex pubescens. Calyx subaequaliter quadrifidus. Corolla alba. Antherae et pistillum carosae. Uabulum valde arcedit ad axillanfloras, sed racemus certo terminalis. — In Sibiria.
05. *V. LANOSA* Blh. *Scrophul. Ind. or.* 45 — Caule basi lignoso; ramis caespitosis subsericatis lanatis; foliis, sessilibus, ovalo-lanceolatis incisio-serratis, supra glabris, tuberoso-pilosis-hirtis, racemis laxiusculis; calycibus inaequaliter quadripartitis, capsulis (immixtis) ovalis aculis. 6 — In India orientali (Kanaour).
06. *V. DALMGAIITEMI* Roem. et Schult. *Syst. Veget.* I. 100 — Ercula glabra foliis inferioribus oppositis sessilibus ovalibus v. ovato-lanceolatis serratis, superioribus alternis simplicibus linearibus lanceolatis; corymbis dichotomis; pedicellis filiformibus erectis patentibus umfloribus; calycis segmentis aequalibus; corolla pallide coerulea calyce duplo excedente. — *V. pelraea* Baumg. *Slirp. Transylv.* I. SL. no. 27. — Crescit in fossuris ropium in Transilvania.
07. *V. DENSIFLORA* Ledeb. *Icon. fl. Ross. All. Illust.* t. 125., *Flor. Altaic.* I. 34. — Racemo terminali confertissimo subcapitato; caule fruticuloso bifurcato piloso; foliis sessilibus ellipticis dense serratis obtusis glabrescentibus, basi ciliatis; bracteis calycibus pilis articulatis biseriatis. 5 — Caules ascendentes 2-5-pollicares, basi subramosi et folia in axillarum praeritorum emarcidibus vestigiis, superne dense foliatis. Folia sessilia elliptica dense serrata, apice subintegerrima, subinde glabrescentia, basi utrumque pubescentia darscula. Racemus (terminalis) densissimus capituliformis vix semipollicaris, defloratus longior. Bracteae lanceolato-lanceolatis pedicello duplo longioribus dense ciliatis coloratis. Calycis quinquepartiti lacinae 4 subaequales, quinta brevissima, omnes margine articulato-pilosae. Corolla magna laevigata coerulea, lacinae quarum majori. — I, *alpina* Sieber in Pall. *Nord. Beyr.* II. — Crescit in montibus alpinis Altaicis (ad Il. Koksun, Algulac, Kurai, Tschujam et in monte Farbagalai).
08. *V. NUMMULARIA* Gouan, *Illustr. I. L. I. Og.* 8. (eius syn.) — Caule pubescente v. glabrescente, foliis, obovato-orbiculatis in petiolum attenuatis aggregate inaequalibus v. obsolete crenatis; racemis brevibus paniculatis dracunculatis segmentis calycibus obtusis ciliatis; caule prostrato fruticuloso, 6 — Foliae abscissae palmarum coenilei. Corollae segmenta inferiora cuneiformia obtusa, reticulata linearia. Folia decussata imbricata. — *V. taxaltit* ft. Willd. *Spec. plant.* I. 68 — *F. shriceiflora* Lapeyr. *Abr. Pyr.* 6. no. 8., *Flor. Pjr.* X. 51. (eius et syn.) — Proxima est praecedenti, sed differat caule glabrescente aul ex loco tenuissime pubescente, nec bifurcato piloso, foliis multo minoribus obovato-orbiculatis in petiolum attenuatis inaequalibus >. obsolete crenatis nec dense serratis, corymbo paucifloro floribusque minoribus. — Crescit in Pyrenaeis.
09. *V. JAVAMICA* Blume, *Bijdragen* 742. — Caule procumbente; foliis subsessilibus oppositis ovatis obtuse serratis pubescentibus; spiels axillaribus terminalibusque; laciniis calycinis obtusis. — Crescit in monte Gede Intulac Javae.
10. *V. M'TANS* Bongard. *Mém. de l'acad. Impér. de St. Pétersbourg.* (VI. Ser.) II. 157. f — Caulibus simplicibus apice nudis; foliis, sessilibus ovalibus serratis acutiusculis corymbis (terminalibus), capsulae subglobosae calycem subaequante. — Caulis pubescens. Folia opposita simplicia pubescentia, in caule quoque circiter quatuor. Bracteae et calycis Mibaequalis segmenta pilosa. Corolla parte coerulea inaequaliter. Capsula ovata margata. — Affinis *V. Sutun*, cui differat ovaribus minoribus caule nudis, capsulae glabrescentibus nec pilosis et corolla imbricata — Crescit in insula Sitihia
101. *V. CAPITATA* Ross in Bth *Scrophul. Indie* 45 — Pilosa caule uropilata, M. sessilibus ovato-rotundatis subdentatis, racemo terminali confertissimo capitulo

articulato-piloso, Mamimb. subcserlis. 2]. — Flores duplo roajores quam in *V. alpina*, capsulas non >idit Bentham. — Crescit in India orientali (in Kanaon).
 102. *V. ALPINA* Linn. Spec. plant. 15. — Strm. Deutchl. Flor. lift. 50. (ic. aen.) — Flor. Dame, t. 10. ct t. 1021. — Engl. bot. I. 4&l. - Curtis,* Flor. Londin. t 208. — Krok. Flor.-Silesiac. I. 24. I. 3. — Koch, Synop». fl. Germ. edit. 1) 520. — Rchb. Fl. Germ, excurs. 360. DO. 2514. - Berlol. Flor. Italic. I. SS. ; - Bib. Scrophular. Ind. or. 4». — Foil, ellipticis crenalis integerrimisq., infimis rainonb. subrotundis; racemo terminali paucifloro hirsuto, pilis patentib. articulatis eglandulosis; cap* sula oblongo-obovata emarginala. 2]. — Caulis digitalis palmaris\c decumbens ascendens tercs simplex, subinde e basi ramosus caespitosus, praesertim superne hirsutus. Folia obtusa v. acuta, modo integerrima, modo parce crenatula denudata am • errata, inferiora minora petiolata, superiora subsessilia glabra v. pilosa, supra binde lode alterna. Flores in corimbo terminali deorsum paucifloro, fructifero in racemo breviter abeunte. Bractee obverse lanceolatae oblongae ciliatae v. hirsutae pedicellom tuperantes ?. aequantes. Calycis quadripartiti lacinae v. x maequalcs forma bractearum. Corolla saturate coerulea. (capsula compresso-lurgida magis minusve birtota bindeque glabra Pili totius planiac longiusculi patuli articuli diaphani. - *Veronica eauli tnnphei foUii comjleslis terminato, folio ototo-aculit dentalit* Alhon. Spccim. 19. t. 3. fig. 3. — *leiotuca* no. MI. Hall. II»(or. slirp. indigeo. Helfet. I. 235. t 15. fig. 2.

a *integerrima* Rchb. I. c. - Poll, elliptic^ obtus^ intrgerrinis. — *V. integrifolia* Willd. Spec. plant. I. 03. — *V. alpina* Ocd. Flor. Dame I. 10. - Krok. Flor. Silesiac. I. oo. 28. I. 3 - Rchb. Pl. Bannat. fig. 45. - Folia m dntata Linn. Flor. Lapponic. I. 0. fig. 4. - Folia obtusa Hall. Hist, tirp mdigen. Helf el. t 15. fig. 2.

ft. *Uropittu* Lebb. U- Foil terralaUa, inferiorlh. subrotundii, ioperiorib. otatit. — r. *r+hmdifoH** Bckrak. Braono Salitb. no. 15. I. 2. - *V. pygmaea* Braane 1. e. no. 13.1. 2. - r. *pumil** All. Fl. Pedcm. I. 7V L 22. fie 5. - *V. Gtbkardiana* Vest?*)

y. *ermat** Bcbb. I. e. - Foil, ovaio-ellipticis crenalis. - Curtm, Fl Londin ,I 208. d. *Wormikioldu* Hook. Bot. Magai. t. »75. - Klatior simplr^ foil, multo majorib. Jorib.; calyce capsulaq. glanduloso-hirsutissimis. - I *Hormthodit* Roen. el Schull. S»»1. frget I 101. - Spr. Sy%l Veget. I. 72 I. *alp mo* var. TII#-*lasehkmsis* Cham, et Schlchid. Linnaca II. 550. - I. *alpm vir?* Flor, Dame. I. 1901.

r. *MerraUfoha* Rch Phnl. Bannal. fig. 40. - Foil, lanrolatis otatitq. ae«Uf serrati*. - *V. ymdifolio* Veil on ex Roem. el Scbull Sytt veftt. I. Mailiss. I. 103. - <. Don I. c. 508. no. 5(1)

C *minor*. PtilosiMiaa tUtoraqe multo bomilior: foil, aliernlt acutii •abllloaibus. - Lapeyr. Abr. Pjren. 4. — CTMCU in gramtootis alpion IOUOJ E«ro-par, India* orietalla (Pter Pnnjal) ot la Coalatcbka.

BOX V. EL PII HAS I IE FOLIA Lak. Jbrbebr. der Gewcbtknde. III 41. - faalib. f-P«Mib. v apice pubesceniib.; foil, lubtetsilib. obloogit tmato-crtnatU glabrii* wctmli paoriQon*. pedicellis elongatit; tegmenlis calynnit o«ati« glabHa. % ~ Herba gracMia. - *V. ikymifolta* *illd. Herb. - In Pcmar nmnttr tibilan).

104. \. THYIIFOLIA Siblhrp. el Srbn. Prodr. fl. (ir I d, Flor tiraer. I t » " Cailib. taffhiliotit diffuti*. foil rlhptici* rrtoluii» pilmi* inirgrii. racevii ter-
 ■laalib. capilaii ? . corynbotit tolitarn*. rahn b arqualib., raptolae emargi-
 ■Mio lobit ditaricalM. ^ Ihbilut I. frmtimosar Urarirae < bo^aiat. Corolla
 oovra, 100 I«b«a albtu. - Cretcii in mtula* Cuindiar moniibut spactulata.

*) t. *VERONICA* Vest man ex Roem. et Schull 3 et veget. I. Mentis. I. 104. Ramis prostratis radicanlib. - ramis glabris, inferiorib petiolatis; ramis hirsutis: inferioribus bracteolarum longis - ramis alpe Schwa-

109. V. PAUCIFLORA Kilaib; mst. ex Lnk. Jbrbchr. III. 41. — Caulib. procumbenlib., apicc puhscenlib.; foil, subsessilib. oblongit serralo-crenalis aculi glabris; raceme paucifloris, pedicellis clongatis; segmeolis calycinis ovalit glabris. ^ — Crescil ID monlibus Carpalborum.
106. V. SAXATIMS Jcq. Obscnal. 1.200. — (Linn. III. Snpplem. 83.) — Sinn. Dtsch-lods. Flor. lift. 58. (ic. aen.) — Engl. bot. t. 1027. — Svensk boL t. 347. — Loddig. BoU Cabin. 1. 704. — Rchb. Fl. Germ, excurs. 300. no. 8513. — Koch, Synops. fl. Germ. (edu. 1.) 5*20 - Derlol. Flor. Italic. 1. 86. f — Foil, obovatis ellipUeitvo subcrenalli, infimis minorib; racemo terminal! paucifloro pilit crispulis eglandalosis pubescnto; rapsuli o\ala, suporne aUenuata vix emarginala. % — Caules caespitiM suffruicosi, passim humiliores quam in *V. fruticulosa* magisque decumbentes apicibus porrectis. Folia omnia brctiora el quidquam laltora, apirc oblusa rotundaia, tsaepius crenala, infenora obovaia, tupenora oblonga. Coryrabus pauciflorus — inlerdum eliam racemut elongalut multiflorut — semper adapergUur pubesceniia brevittima lorfum adpressa el iocunula, pilif sub lenle articulaiis. Corolla »peciosa coerolea, fauce anoulo purpureo picia. Otarium sub antheii ovatum acutum cano-pilosum, pills tglandulosif. Paria foliorum caulinorum remola. — *V. frulirulosa* Fl. Dante, t 348. — Ffroite* taxoHUs J. Baud. Ilislor. III. lib. XXVIII. p. 284. (ic. boot). - *Veronica tertim firuicans* Clut. Hltlor. 347. (ic. bona). — *Veronica alpina* eon fogUa di StrpUU Poo. Mont Bald. 161. (>g. mediocr.) — Morla. Oion. Hisior. II. 318. tecl. 3. t & fig. 5. — Grttell per loUn Eurnpam In alpbui calcareii.
107. V. CRETICA Pall. mtt. ex Lnk. Jbrbchr. III. 41. — Procumbent: foil, lineari-spailuiKiiis scaherrimit; racemis brevib. dentit. ^ — Valde afflois praecedenti forHMjuc ojus >ari(M). — Crescil in intula Candia.
108. \. MACROSTEMON Bnge. mss. in Ldb. le. fl. ROM. Alt illuslr. 1. 127. el Fl Altaic. I. 3J. I — Racemis (erminalib. <illosis, demum elongaiis; caulib. fruiiculosis ramosis; foil, infenonb. subrolundo-ovatU inlegernmis, »upenorib. oblongis serrulaiis pubescpnti-ullosis; capsula pubescentc ubotaia emarginala caljcem • duplo excedente. j — Caulis part Inflma tub lapidibus latent geniculata glabra \. futca, foliorum loco tetiila squamis decuttallt ovalo-ellllllcit oblusis submrmbranaceft, part superior erecu v. ascendens parce tillost ramosa, raaiis decuttallt tterllibut. Folia tetllla pubMCtsU-vllloat, lita a acuUtttcvta, taporiora obtoM, medio serraia, apice subinlet^nima v CI«IIM tl rasM Inferlora Inieroodilt mulio breviora, tuperiora tlllt longiora. Baemna strtdttt ttmiaallt pollicarit Y. tesquipollicarit pedoneulataa, pedunculo Mbapbjtlo. Bractee Inferior?* otato-oblongac, superiores sensim mioores oblonfo-ttnearm, parce albo-villotae. Floret inferiores *uboppositl, tperioret tpartl. Calyct 5-partnl lacinae oblongae, quinia hroi%*ima, omnrs praeterilm margne Ylllotae. Corolla mtgna violacea, filamrnia ea longiora. Pill nmnes eglanutoti amculati. — Creiclt rarior In lapido»is a*pcn» tummarum alpium Aluicarum ad 0. Tschujam.
100. V. SERPYM IKOLJA Linn. Spec, plant. IV - Sinn. Ducblodt. Flor. HfLM. (jr. aen.) — Engl. boi. t 1075. — Flor. Danic. I. 401 — Curlit, Flor. Londin. II. i. ± - Polu et Turp. Fl. Parit. I. 20. I. ». - Krok. Flor. 8llt#lac. I. ». I. 4. fig. A. B. — Ldb. Flor. Altaic. I. 36. — Bin. Scropnvar. lad. or. 4ft. — Bt. ti p<v. p|or. Perov. I 6. — II. B. Kth. NOT. gen. el tpee. pi. II. 380. — Behb. Fl. Gbrm. eteun. 300. no. 2511. — Koch, Kynopt. 0. Germ, (edit I.) MO. — Berlol. Fl. Iulie. I. m f — Poll, ovalit oblongiu* tubcrenailt, infimit minorib tnbrottindit, Horalid •aperiorib. lanreolails integerrimis: caule ramisque mllifloHt latp raermo»t», pedicellu erecus rahcem »ubaequantib.; capsula compressa tubrotundo-obcordaia tran^crM* lai.ore uhcuf rmargmata; *hlo porrrclo. ^ - Caulu iimplfi % bati ramoMIS infernr r<jon%, dnnde a^rcnd«Mi« palmans v. dudranialit gU. her v. pilo*ulus lol*i >ppo«iu oMuta miegrnma v. rrrnaia (rinema glabra • plloiala, infrriora lumora pciolaia, superiora se»«ilia, »upmura iirrtim minorj •atpequr alicrna RjremiM rlongalus p.lotului. Brarieae hncrolaiae oblu»ar

pedicello longiores T. eo breviores. — Calycis quadripartiti lacinae subaequales ovatae obtusae, interdum pubescentes. Corolla albida coerulescens v. pallide coerulescens striis saturatioribus percursa. — Habitu grandiore et firmiore, racemo elongato minusque hireuto, corollae colore et longitudine stylo distinguitur a *F. alpina*. — *Veronica pratensis* Dodon, Pemptad. stirp. p. 41. — *Veronica minor terpyrifolia* Lobel. Icon. 472. — *Veronica erecta sylvestris* Rivin. Monop. irregul. U 03. (loxurians). — *Veronica minima repent* Rivin. I. c. 90. — *V. ruderalis* Vahl, Enumer. plant. I. 00.

f. tenella: Foil, rotundis r. subrotundo-ovalis panis; caule sterili prostrate, florifero erecto. — *V. tenebra* All. Fl. Pedem. I. 73. t. 22. fig. 1. — (Fl. Wetterau. et Schm. Centur. Bobem.) — *Veronica praiensis Nummulariae folio, flore coeruleo* Pluken. Phytogr. U 223. fig. 4.

y. neglecta: Foliis quaternis tertrifloris. — *V. neglecta* Schmidt.

3. *nurmiOariawfolia* Tbolli. — Foliis orbiculatis.

«. *kutnifolia*: Prostrata: caulibus repens; foliis cordato-rotundatis pubescentibus. — *F. humifusa* Dicks, in Transact of the Linn. Soc. II. 288. — (Crescit locis umbrosis lapidosis in Scotia).

C. hirtuta: Tota planta pilis brevissimis dense hirsuta. — Crescit locis graminosis per totam Europam, Sibiriam, Indiam orientalem, in America boreali et in regno Quito prope Santa Fe de Bogota inter segetes et in sylvaticis montibus Quindia.

110. *V. HERNIARIOIDES* Poerr. Cblor. Hispan. 00. — Lapeyr. Pyr. abr. Supplem. 4. — Foil, oblongis glabris integerrimis parvis, inferioribus reflexis; caulibus prostratis diffusis radicanibus; racemo terminali denso ovato. 2|. — Corolla coerulea, tubo albo. — Crescit in Pyrenaeis ad Port de Jacca.

111. *V. FONTANA* Pall, ex Lmk. Eoumer. pi. horl. Berol. I. 108. — Caule repente pubescente; foil, sessilibus. ① falls t. 23. fig. 1. — Folia glabris in bracteis foliaceis pedicello mallo longioribus. ^ — Crescit in Unalaska et Kamtschatka.

112. *V. TENELLA* All. Pedemont. no. 272. t. 22. fig. 1. — Foil, omnibus petiolatis rotundatis rugulosis subcrenatis; caulibus repens. calycibus villosis. % — Folia petiolo longiora. Flores coerulescens v. purpurascentes longe pedicellati. — Pluk. Phylogr. t. 233. fig. 4. — Valde affinis *V. serpyllifoliae*, cujus eae critica varietas foliis longius petiolatis floribusque longius pedicellatis coerulescens, roseis v. purpurascentibus. — Crescit in alpinis Pedemontanis et Pyrenaeis.

113. *V. MICROPHYLLA* Kilaib. mss. in Scholtes, Fl. Ausiriac. (edit. 2.) I. 20. — Foil, ovatis irregulariter crenatis; bracteis fixis pedicellorum longitudine; caulibus ascendens, basi repens. 2|. — inter varietates *V. serpyllifoliae* removenda esse videtur. — Crescit locis arenosis in Hungaria.

114. *V. TELEPHIFOLIA* Toarnef. Corollar. 7. ex Vahl, Enumer. plantar. I. 64. — Glabra: foil, oblongis subintegerrimis T. extrorsum obsolete crenulatis petiolatis semiunguicularibus, sessilibus repens. filiformibus. % — Inter varietates *F. serpyllifoliae* removenda §••• videtur. — Crescit in Armenia.

•• *Spicae*:

Herbae v. suffrutices foliis oppositis verticillatis saepissime lanceolatis ? li' nearibus, floribus in spicas vel racemos saepe longissimos terminales axillaresque ^ congescunt. — Habita plerumque erecto foliisque ut plurimum ad formam lanceolatis traesentibus scilicet florum spica saepius deorsum Jam primo intuita satim different a speciebus omnibus supra enumeratis.

H5. *V. CATARACTAE* Forsk. Prodr. fl. no. 9. — A. Rich. Voyage de l'Asie 18*. f — Racemis terminalibus flexuosis; caulibus suffruticosis; foil, lanceolatis ratis. ^ — Caulis bipedalis suffruticosus simpliciter prostratus ascendens terea la vix ramulos. Folia petiolata opposita bipollicaria, internodiis duplo longioribus, squamis albida glabra, serratis apice callosis. Petioli breves teretibus. Pleae (racemosa) axillaresque palmatae simplices flexuosi. Petioli filiformes pauca pollicares rariotioscall. Calycia quadripartiti lacinae

- lanceolatae acutae, margine glabrae. Corolla Irregularis, tubo brevissimo, limbi quadripartiti laciniis subrotundis, lateralibus majoribus, infima angustiore. Stamina* corolla breviora. Gapsala subinflata subrotundo-compressiuscula, apice emarginato-biloba glabra bilocularis. Semina... t — Crescit in Nova Zeelandia.
116. V. SPECIOSA R. Cunn. mss. ad Hook. Bot. Magaz. adnol. t. 3461. — Hook. Bot. Magaz. l. 4037. — Caule fruticoso erectiusculo v. diffuso; foliis oppositis planis obovatis coriaceis decurrentibus, apiculo calloso obtuso, margine Inlegerrimis coloralis incrassatis; racemis terminalibus brevibus erectis confertifloris; bracteis ovato-lanceolatis pedicello dimidio brevioribus; laciniis calycinis ovalibus aculeis tenuissime ciliatis, dimidium lobi corollae subaequantibus. & — Frutex speciosus 3-4-pedalis, caulibus pluribus robustis ascendentibus et in loco natali valde insignis. Folia 3-4-pollicaria. Flores speciosi cyaneo-violacei facie fere *Lytimachiae atropurpureae*. Stamina exserta pistillum aequantia. Capsula bipartibilis elliptica acuminata glabra, calyce duplo longior. — Crescit in insula Nova Zeelandia septentrionali (ad fl. Ilokianga) et ad oram occidentalem. — Ab indigenis vocatur *Napuka*.
117. V. LIGUSTRIFOLIA R. Cunn. mss. In Hook. l. e. adn. — Caule fruticoso; foliis ovalibus-oblongis v. anguste lanceolatis obtusiusculis inlegerrimis glabris; racemis pedunculatis terminalibus paucigeris foliis subaequantibus; bracteis oblongo-lanceolatis pedicello duplo brevioribus; laciniis calycinis ovato-lanceolatis aemiatentibus longitudine tubi corollae 3} — Frutex gracilis bipedalis. Folia opposita ovalia v. attenuata-lanceolata sessilia. Flores albi spicali-racemosi. Calycis persistentis lacinae aequales. Corollae lacinae aculeis aculeis. — Affinis *V. angustifoliae* A. Rich, quae lamina differit specie gracilibus pedunculatis axillaribus folio duplo et ultra longioribus, laciniis calycinis obtusis lobo corollino duplo brevioribus foliisque linearibus angustis acutis, sublimbus glaucescentibus. — Crescit in insulae Novae Zeelandiae septentrionalis collibus sylvaticis ad ripas fluminis Kaua-Kaua.
118. V. DIOSMIFOLIA R. Cunn. mss. in Hook. l. c. — Knwl. et Wlsc. The Floral Cabin. III. 65. j l. 106. — Caule fruticoso erecto; foliis decussatis petiolatis lanceolatis aculeis inlegerrimis lanceolato-serrulatisve, terrarum simpliciter incisim remotis, supra concavis laevibus, sublimbus ditcoloribus; eorum axillaribus terminatibus multifloris; bracteis ovatis pedicello duplo brevioribus; laciniis calycinis ovalibus obtusis dimidium lobum corollinum aequantibus. 6 — Frutex gracilis virgatus 3-4-pedalis, habitu omnino *Trackymenem* referent. Ramis teretibus erectis foliatis. Folia 9 lineas longa evenia, sublimbus carinata. Floret albi. Capsula elliptica compressa aculea bipartibilis, calyce triplo longior. — Ab incolis *Pirili* appellatur. — Crescit in insula Nova Zeelandia septentrionali (in sylvis ad fontes fluminis Wycaddy, circa calaracias rivi Keri-Keri etc.).
- HO. V. CANA Wall. Catal. 401. ex Bth. Scrophul. Ind. orient. 45. — Basi procumbens: caule piloso v. lanato; foliis petiolatis ovalibus inciso-crenatis, junioribus canaliculatis, demum glabris; racemis paucis terminalibus axillaribus; calycibus. Inaequaliter quadripartite; capsulis laevibus dilatis inlegerrimis. ^ — In Nepalia, Gossain Than et Kanaour crescit
120. V. SPLURIA Linn. Spec. plant. 13. - Koch, Synops. fl. Germ, et Melvel (edit. 1.) 27. — Foliis oppositis lacinis qualiterque oblongo-lanceolatis lanceolatisve aculeis simpliciter v. subduplato-serratis; racemis terminalibus subpaniculatis

THano el duas sequentes, quibus cotinprebenduntur, Veronicae triplicatae Germanicae* aliis limitibus circumscribenda ette creditur L. Belebenbach.

EL?OVAMOSA Pret. Ft or. Ceehic. 2. - Rehb. fl. Germ, exeurt. 370. no. «M6 - ~~ovata~~ instula: foliis inferioribus obtusis; calyce acuto pistillum inaequaliter angustiusculis lobis aequalibus, capsula excedente; racemi fructiferi inaequaliter octo-angulatis. - Glabriuscula autem taepius breviter et motu inaequaliter, <>-ferre non raro atandulpa. Remeum omni imihei Men comotus. Captum orb*-culata emarginata turgida parva.

elongatis laxiascalis; bracleis lineari-lanceolatis pedicellam aequantib. v. eo breviorib.; capsula subroiunda emarginata turgida. % — Variat pedicellis bracleora aequanlibus el duplo Iriplove superanlibus, foliis lanceolatis fereqne cfliplicis,

- a. Vaillanti: *Spithamaea et ultra, foliis superiorib. lineari-oblongis subinlegerrimis, infimis rotunditatit serratis; calyce extus squamuloso-pilosulo.* — Yaill. Paris, bot. t. 33. fig. 4. (optima).
- fi. Barrelieri: — FoU. eUipUco-ipalhalali* ellipticisque crenalis. — V. Barrel it ri Schott mss. in Roem. et SchulU Syst. veget. I. 04. — Veronica mag recta lali-folia, spica coerulea Barrel. Icon. 082. — V. spicala s. nilcns Koch, Synops. jl. Germ. (I. edit.) 528.
- y. nilens: ulabra nitida gradlis: foll omgmotioribus, corolla dtlutius coerulea aeuminala. — Barrel. Icon. 081. — V. niteos Host, Flor. Ausriac. . . . ?
- i. Clusiana: Elatior: foil. Untori-lanceolatis elongatis, omntb. rrenalno- el tub-dupliato-ierrotiM. — Ctus. Hist or. 340. fig. 2. — V. Clusii Srhott ex Roem et Sckmlt. Suet. 0080U L W. — JV. hybrida Schmidt, Flor. Bohem. 8. - V. spicala VaSTFloT: Danic. I. 52T J
- «. Iliaikiana: Foil, caulinis cuneato-lanceolatis serratis, acumine integerrimo. — V. bretifolia Lnk. Enumer. pL hort. Berol. I. 21. — V. brarhyphylla Roem. el Schult. Syst. reget. I. 00. — (Foliis remolius argute serratis. — V. arguta //). Berol. 1829J — Variet. a. et 0. si tola tomenlo magis minusve candido obduela: V. incana Linn. Spec. plant. 14. — Vahl, Enumer. I. 50. — Ldb. Flor. Altaic. I. 32. — Ilffm. Comment. Goelling. XV. 123. I. 0. — V. ranesrens Pall. Itin. II. 522. — [Racemo terminali solitario; foil, lanceolato-oblongis crenatis integerrimis obtusiusculis eaque erecto incano'tomentosis.] — Crescit in coUibus apricis calcareis et arenosis per totam Germaniam (fi. et r. australi) et in Sibiria Allaica (tar. incanaj.
2. V. ORCHIDEA Cmtz. Stirp. Ausriac. II. 333. | - Bot. Magax. I. 2210. - Rock. Bannat. fig. 42. — Rckb. I. c. no. 2517. — Supeme stricta: foil, subcoriaceis^ inferiorib. rotundaHs; calyee sessili acuto molliter puberulo; corolias laeiniisb-ft<*>rt-fl<Nmi<*>Jfr. i - [V. apicau C rialaia kock, Synops. ft. Germ. (edit. |.) 528.1 - FoUU intisoimis V. crialauU >***. Vobor timige Aremp. 14-21. - V. Craolait Schuli. Obomn.botou. If. - V. tibrMa III Bi*T. Flor. four. Cauep*. I. & - V. erassifolia KitoA. ms. es Moem. o7&S&E3t S&TL rsgel. 1.00. — C. Bauk. Hist. pi. III. 382. ie. — Moris. Oxon. Histor. It. soot. X §. n. fig. 2. — V. arguia Moretti, De quibusd. pi. Ital. doe. II. 0. — Firmm: folio plerumque laneotata et ocala, infima eliptico-tpatkulotaj spica ex ovata basi conica compacta, ante anthesin comsal in cuUa tamen laxtor el folia longiora, caulina semper per paria rrmnta, cultmō patentissima v. de/lexo (Ctus.dM. fig. I.): plerumque tola kerba nitida, aurtumno purpurascens. occurrit vero etiam motlifer pubescens et subtomntosa, foliis /neari-lanceolatis, corolla eyanea dilute eoeerulea aut alba, capsula compress* non emarginata. — Crescit in collibus syttaticis calcareis in Austria, Hungario, Transyltania, in Italia superiori et in Sibiria Altaica.
3. V. SPICATA Unn. Spec. plant. 14. - Rckb. I. c. no. 2&M. - llerlol. Ft Italic. I. 02. excl. rar. yf — Ascendens: foil, plurib. arulis; calyee lubaequaii, pitis co*^ colorib. aequaliter puberulo; racemo ante anlkesin comoso, fructiferp compact** bracteis eapsulae orbieulari-emarginatae calyee excedenti adpressis. «L.»
- a. minor: Palmori r. sempedolis. — Veronica spiraea minor /• Bmmh. Pinx. 9u> - Vm%U. Bot. Paris. 200. I. 30. fig. 4. - lomincisUU. Istono dsUo pionle W> I. 73. //f. I. et % — Veronica rrla minima Ctms. His lor. 347. ifig. infero). -r V. Slernbertiana Bntkrdi. mss. in Wildt. Mb. IM. (V. spicaia *. ailraa * « Sfnops. eoHL 1. 518.) - V. apicaia 5m. EnoL boL I. 2.
0. major: Spitkomoeo 9 modoHs: foli. oroto-loneeolalis. saepe racemtspt*nb& — V. spicata Flor. Domic I. «. - V. australlt Sckrad Comment, verim* no. «. lab. 2. fig. 3. — V. looginraetMU fi. polioraulic Ink. Jkrbckr. I.&> V. nupM llortor. — V. laeia Hrtor. — V. menibaefolia Sckott. m Roem. " Sehmk. Sgst. reget. I. 00. (excl. syn. HUM.)
- * * Unfit wunuste nmereo-tomntoso. — V. canr^rent Sckrad. Comment. y* - V. Italicu Host. fFt. Austriae. . . . ?? — V. incana W&M d. Spec. . . . 50? - ft*!*, et sXitoib. Plant. rar. Hungr. III 271. f. dU - V. meall 5 rm ^ Bel. I. 50a - V. neglrrla ItfA. Enumrr. /, 50.
- r. hybrida: >P>M inferioribus lolionbus elipttris; raule mono-polystormi V. spicau Poit. ef Turp. Flor. Pans. I. 10. f. 10. V. btbrtda /inn. Sfn fflml. 14. - EngL bot. I. 073. - Snnrrnl. Aol. Jonm. iftO. f. 3. - Sfn Engl. t. II. fig. I.
- ««» geoMonlioms, rmrms oUhrescns. sed puberulo. Pubescens, sup-porus saepe glanbUos*. roemus n«n ininterruptus. a bast ampks. multe cran-fior «« im V7aquaanda .rf. adtol. no. |JJ, capsuUUduplo unajor, cot'olla di-mte coermtom ami alba elongolm atuo, calyx subcortaceus ocuhus rulus. — Crescit in proHs subalpinis Europae prouerhm mediae et oustrmki.
4. V. CANARIATA Mm. Phytogr. Bl. 23. t. 2. 1. Vahl Enumer. I. 57. - Rckb. T'riiio. - Lucendeus foil brewib. otmSSLontVoloUsq!mumorwai* incan-

longius v. brevius acuminatis, serraturis simplicibus et duplicatis. Follorum apex magis roiausve iniegerrimus est et bractee saepe pedicellos, Dumquam aulem calyces aequant. Variat porro:

«. *Schrad.* Koch I. c. — Foil, lanceolalis brevier acuminatis, serraturis remolis, sed non semper aequalibus, pedicellia plerumque longij. — *V. spuria*

terratit, ealyre inaequali acuto aequaliter puberulo; corolla antice denticulata; racemo frutifero laxo; brae lei ealyci captulam infra exedenti adpressis. jy — Corolla obtusa, calycii tubcoriacei parMtones ovalo-aculae, racemus virgineut adprett comotut, captula minor ac t* praecedente.*

- «. *paludosa* Hchb. I. c. 371. — *Gracilior erectiuscula, corolla carnea.* — *V. paludosa* Lejeune, *Flore de Spa* I. 22. — *V. carnea* llortor.
 - ft. *Grandis: llimilior ascendit: foliit duplicate - incitis glabriutculit; corolla magna alba.* — *V. grandis* Fitch. — *V. grossa* Marl, *liort.* Erlang. 12?
 - r. *crenulata* li/fm. I. r. t. E. fig. 3. — *Bchb.* I. c. — *Habitus praecedentis, molliter pubeteens; foliit terrati* aui bicrenalo-incitit; corolla magna coerulea.* — *V. villosa* Schrad. *Comment.* I. I. fig. 3. — *Cretcit in agro Leodinensi a) H in Sibiria, frequenter in horlis colour,*
 - 5. P. *SPIRIA* Linn. *Spec. plantar.* 13. — *Rchb.* I. c. 371. no. 2533. — *Stricta: foil. 8-&*i« rerticillatit, apice inlegerrimit: pedicellis eatueem tubaegualem bracteatq. post anthesis superanlibus ascendentibus, racemis igitur virgineut nudis. 2). — Captula orbieutaris vix emarginata turgida, ad marginem in raritatem compress*.*
 - a. *paniculata: Calyx in genere minimus, pedicello pluries brevior, corolla aturea.*
 - * *paniculata: Foil. angustilanceolatis, utrinque aequiliter attenuatis serratis glabris aut lomentato - tcabriutculis.* — *V. paniculata* Linn. *Spec. pi.* 18. — *Ledeb. Ft Altaic.* I. 20. — *V. spuria* a. *Schraderi* Koch, *Synops. (edit. 1.)* 527. et supra, quam cf.
 - * *cordata-spuria: Foliis quaternis e basi cordata lanceolatis serratis.*
 - β. *grandiflora: Calyx major, pedicello vix brevior, corolla major dilute coelestina.*
 - * *angustifolia: Foli. linearis-lanceolatis grosse serratis; racemis densiusculis patulit.* — *V. spuria* Lejeune.
 - * *foliosa: Foil, oppositit ternis quaternis otatit r. orato-lanceolatis inaequaliter tubterratit nilidis tubcoriaceis.* — *V. foliosa* Watdt. et *Kit. Plant. rar. llungar.* // 100. I. 102. — *Schrad. Comment.* 1.2.11a. I. — *Syr. Ft. llalens.* 0. I. I. fin. 2. - *V. bretifolia** *M. Bieb. Ft. Taur. Caucas.* // 16. (foliit tubtomentotit. — *V. Iriqueira* Kilaib. — *V. amehytUna* *WiUd. Herb. III. et Enumer. pi. hort. Berol.* I. 17.
 - y. *nilida: Foil, oppositit aut temis lanceolatis incisis.* — *V. nilida* *Fitch. mst. ex Hoem. et Schutt. Sytt. tegetab. t. M.*
 - * *laciniata: Foli. subfascieutatis breviter petiolatis UneoUHs pinnatis, segmentis 4eg*rr*omis inaequalibus. tinsrib. 9. lanceolatis, stjmtutit e*ty-dnit oblomao-oroiis.* - *V. laciniata* *AiU Hort. Kswens.* (940. *IJ* i. 10. ~ *V. aporia* *Junghsms, icon. rnr. f. L. fig. 4.* — *Veroaleatram* *Itcioiaiuai*
 - * *terrala: Foli. inferiorib. basi orato-lanceolatis serratis, sumrmni* subintegerrimit.* — *V. Elabra* *Schrad. Comment, t. I. fig. A.* — *V. npuha* *Spr. FL Halens.* I. 1. — *V. lptofiarhya* *llortor.*
 - * *carnea: Uraetett longioribus, laciniis calycinis mnguslioribus, pauUo magis ac in reliquit inaequalibus; coroliis carneis.* — *V. elegant* *DC. Cat. horU Monsvel. hi), p. IM.* - *Lnk. Enumer. pi. hort. Berol.* I. 21. - *V. carnea* *DC. Mem. de (genere I. IM?* — *Horib. racemoso - tpicatis; foli. oppositit Utneolatit acutit aequatiter terratit. basi breviter eunemius eaueq^ erecto pubetremhh; bractei linenrib. pediceUum aequanlibus. ^ — Cretat.?!* - *V. Incarnju* *0. Don in Loud. Hort. Bhtanic. pag. 6!* - *V. Inill-cira* *Lejeune, Herit.* 4. --
- Cretcit per totam Europam et Sibiriam praesertim Allairam in aprietit tircit.*
- rad. Comment. *? t. I. fig. 2. - Behb. I. c. no. 2V2L - Stncla: f.p.*ili* ternisre elnngalis acutit tertut apicem terratit% terratit% appro-sijitij inuequatib.; enlyrr pott antheitin tubaequnli pedteellum tuperanle tort-pMtiis p or redo bret tutculo); en p tula gtoboto - rumpritta obluta. ^ H «-eJIM omplut tlirtut den tut, ante antheitin dense eomutus. eorolm dtlule eoe-tariniit brenbut Inl%t, captula rir emarginata.*
- «. *perinroha • Clabrtutculn niten%: foil, e basi euneata lunecotato-Itneanb. ffspidalis. m. V. nrr»ir lolia Schoit mse. er Lnk. Enummer. PL hort. Berol.-t. Sarr. L. h. 12. - Ust. Erlang. 12. - V. georgiua // 12. Flor. Austriae. >• Bort. Drua. - Ust. Erlang. 12. - maxima rigidissima: - V. Aoaribmuoi*
- reflexa: Supers eanetens: foil e euneat* basi orato-Imnceotatt. - V. eala* *Schrad. Comment. H I. I. kg. 2.*
- Schrad. Comment. *? t. I. fig. 2. - Behb. I. c. no. 2V2L - Stncla: f.p.*ili* ternisre elnngalis acutit tertut apicem terratit% terratit% appro-sijitij inuequatib.; enlyrr pott antheitin tubaequnli pedteellum tuperanle tort-pMtiis p or redo bret tutculo); en p tula gtoboto - rumpritta obluta. ^ H «-eJIM omplut tlirtut den tut, ante antheitin dense eomutus. eorolm dtlule eoe-tariniit brenbut Inl%t, captula rir emarginata.*
- pubescens: Foli. ovatis, serratis, pubescens, mfd a obtcura foil, ex orata batt / (in-cool. IM* - V. longifolia* *Bmrrtnr. Ft. #/»« r I.*

Schrad Comment I 2 Gg 4 — V *amcthyttna* \t illd Uerb 171, el Enam pi Horl Berol I 17 — V *rubella* Pall mss — Barrel Icon t 801 — Gmelio, HID I 169 t 39 — V *pamculata* Linn Spec pi 18 — Pallas, Itin III. 314 — Ledeb Flor Altaic 1 29 f — *Veronica angustifolia*, *flonbus pantculattt* Amm Ruthen 32 - V *bretxfolta* M Bich Fl Tiur Cauc I 0 III 8? — (Cf Steven, Mem de la Soc des natur de Mosc \ JJ8) — V *leucantha* Helm, Mem. de la Soc des nator de Mosc II 104 t 8 — K *Altaica* Fisch Cat horl Gorcnk 1812 el inde V *capitulata* Poir Suppl Encycl method V 400 — V *nrgata* Lnk Jhrbebr 1-3 p 39 — (Planta pol>morpha, occurril Inpedalis el vix pedalis valde pubescens et glahnuscula, folns terms el, rarius quidem oppo<illis brevionbus el elongalis obtusiusculis et acuminatissimis — Ledeb I. c)

ft *laxiflora* Koch I. c — Foil, lanceolatis longe acuminatis, scrluris approximalis. — V *laxiflora* Lejeune, Revu, de la fl de Spa 4 — I *spuna* Spr Fl Halens Ll fig 1 (serratus simplicibus)

9 cord i folia *Glabra nitida obscura foil ex cor data bast lanceolatis otahsve* — V *macrocarpa Hortor Accedit format Schradenanac, std ylabernma, folia densa acute profundeque tri-quadserrata, calyj. et corolla major, capsula maxtma oialis compressa* — Cresctt in piatis ulignosis Oermantae mediae et australt-orientalis

7 I ARGUTI Schrad Comment no 7 t 2 fig 2. - Rchb I c no 2522. - *frecta foil lanceolaliM arutts aequahter simphtlcrq terrain apice integerrtmis calyce valde tnaequalt pediceUum superanle (elongato), capsula subrotunda emargnata acuato-cartnata 2).* — V *mullicaulis Brnhrat' Horl trford* — V *allernifoha Lejeune I c* — *holta xnfima bast otala out tube or dot a racem amph ante anthen dnse et pate+it-comon, demum longstmt, later ales e bast arrecla ascendet; eoroUa laei* hlaema; cmpiuU ealmets pmrhitomtbu tnferionbus superata ft loDgebraetMia GlahrtsetmM. ymruif foHis kmaolaiu 2-6-poUcanbus* — V *longebraeteau Lnk. Bnumer pL hart Berol 1 20.*
r mtens *Foil ovatu nitids.* — V. nltena Lnk Fnum pi hort llctnt / 20 — \ *Dilida Lnk nut* — V *argalt WtUd Enum pi hort Berol / lo* (resnt in pratts ultgtuosu tyaltctts m Saxonta, Auslna, Hunyana el m agro Leodtnest

8 » MARITIMI Itnn Spec plant 13 — Rchb I c 37» nn 20,21 s/n la foil. 2-3-4->fl/iwi rertinllahs fin nroj canal t cut a hi reflexis, m ajnrtm us/m serratis calyce post anhestn ralde tnaequaU arrecto elomjato jndt ellum bracea brextorem superante, racemis nrgueis ideo commit ^

a *Complicata *rolia bma, terua quatrnare rertiallata hiuan-elngata acut* serrata s<iepe basi lalton subito arunnata | roiiipln All Hlfm Vhytogr. Blaelt W t k fig 4 - \ fle\uo<>a Host mss - k| llunln Morett - d\ V. ricinensn tnfrap TW no |±f*

9 *aurea Tota mtida folia e bast cuneala tanceolato-hneana elongala argule el bast profundus serrata obscure undia - | amrvaSrhohexLmk fnum. pi horl Berol / ££. tadem humihor puberula | maritima Rchb Plant. cntir I fig 75 et Schrad Comment I I et eadern canesrens | acula Mart. Hort rrlang 13*

T *rundrn<ata llabtlu format praecedmhs folus lamen in sieea flaro-tren-tibus | nirdiai* eiusque eoroUts dilute eoeleittms, racrmo drnsittimo calfC* elonguli unr ft ill I us* — V *cuodeotala uortor* — \ r<uio>a Hoi tor — v. 4rniu>a Hnrloi *^

* *rlaiiitr Unmtnm alia nihda foil tiinceolato-lutcnnb IttHjisstms | -Q-po*~ Ifarib, imftnonb rrrtr basi subnrndahs argutr dugh aIn rl profundus StT rah* V elatifir rhrh Slant mire | H *//<| inumrr |>| horl Bero* I IJ | »crnlina llmlor Hirmg Hoi 7r%tn,j 1-il /l M*

ff *lohpfuM roll 0> basi cordnhi lamreolalo-acumntatis anjute r rurT ato- rrruhs — | |nnmU>U> Sshrnd t ommem I 2 H<ir<- pubsrns r guP rne ranetremg | ,l<U Hot! mss et forma curt tdrns | falrala Mart M'f Br (j>f JU — A>M terms | nliarit Hffm fohts quntrms | quaartifolia*

5 *Q<jl>rwM foil oeoto-rt Immreoimlo-oblonats 2-<-/i>||ir<n* . •<|rrrord. tx>*i eordmlu, dmphcalo-srrrats uplmmum rnthdts ad pottrem ifM* roma V te ***** equahler ptrrmlt, md politerm Inmoa lartff* *r,r Vaha V maiitiBa Oed Flor htmtr I 74 - lo>frm,*>t har furma* O<>>JjT,la terea rnc*mo (exei y suh amikem laxtusrmlo roroll 1 tUlnte blncin* **r* in brnuer obeqrdmln lurgtda, tm temtttimam rnrtnam *>* rompress* rrl ~r*4ts rt ad furionm maroimes per lolmm fere turopam disperse m>*

- y. foliosa* Koch I. c. — Foil, elliptico-lanceolalis, plerumque Inaequaliter serratis. — *V. foliata* Waldst. et Kit. Plant, rar. Hungar. II. 100. t. 102. — Spr. Pl. Italens. 6. t. 1. fig. 2. — *V. triquetra* Kitaib. mss. — *V. mVidaEhrh.* Plant, select, no. 4. — *V. Rhuthenica* Fisch. mss. — *V. brevifolia* M. Bieb. Flor. Taur. Cauc. I. 6. — (Specimina superne pubescentia).
- d. subcordata* Koch I. c. — Foil, c basi ovata aut subcordata attenuates. — *V. glabro* Ehrh. Plant, select. 11. — Schrad. Comment. 25. t. 1. fig. 4. — *V. leptostlachya* Honor. — Occurrit hacc variolas foliis simpliciter et duplicato-serratis ut antecedentes. — Crescit in pralis locus fere Europae et in Sibiria.
121. *V. LO\FIFOLIA* Linn. Spec, plantar. 13. — Schrad. Comment, t. 2. fig. 1. — Koch, S>nops. fl. (Jerm. (edit. 1.) 527. — Foil, oppositis terms quaternis ex ovata v. cordatis basi lanceolatis acuminatis, ad apicem usque argute duplicato-serratis; raremibus terminalibus elongatis spicaeformibus densissimis; bracteis linearibus subulatis subulatis; capsula subtrotanda lurgida emarginata. % — Variat foliis latioribus et angustioribus, brevioribus et longioribus, basi profunde cordatis, subcordatis et ovatis, atque, basi praecipue, inciso-serratis. Forma foliis angusto lanceolatis, basi ovatis: *V. mariima* Linn. Spec, plantar. 13. Schrad. Comment, t. I. fig. 1. — *V. elatior* Host. — Flor. Danic. t. 374. — Lf. Phylogr. Illcit. I. E. fig. 2. — *V. complicate* Lf. Phylogr. Blaett. 06. I. E. fig. 4 — *V. grotta* Mart. Flor. Erlang. 12. — *V. acuta* Mart. I. c. — *V. ambigua* Mart. I. c. — *V. rigens* Mart. I. c. — *V. perticifolia* Schott. mss. ex Lnk. Ennmer. pi. bort. Berol. L 21. — *V. media* Schrad. Comment. 23. t. 1. fig. 2. contentum V. longifolia foliis in apicem usque argute duplicato-serratis, differunt tanquam foliorum basi cuneata in potius lalum sensim allenuata. Culla lanlummodo ol>scnala esi. — In prati humidit, ad foveas per lotam Europam et in Siham.*
122. *V. SPICATA* Linn. Spec, plantar. H. — Vaill. lib. Pans. t. M lib 4. — Koch. S>nops. fl. (icim rilit. li. Vit. — Foil, oppositis ovatis lanceolatis serratis, terminalibus ovatis, tuffmrih. obtusis; racemo terminali subulilano elongato spirarfonui densissimo; bracteis lanceolato-subulatis pedicellum nuperantibus; capsula subrotunda marginata lurgida — Flores corulci, rari oarnoi v. albi. \anat: I pulifscntia hrcMstima gtandulo»a, 2) brevissima crispula, 3 longiore »ubs(iulo»a, pilm reclm, 4) calicibus glabris, glabris el ciliatis pilosique atque: b, caule folisque glabris. Porro:
- a. rutgari* Rorh I. c. — Oculi glanduloso-pubescentis: foil. inferforlbu* oblongifolium baccis cuneatis. — *V. tpitala* Auctor. — *V. Clutii* Schott. mnn. ex Roem. et Srhult. S>st vegoi. I. M. — SI pili glandulosi aut radem calice glabro nialo: *V. Hjuamota* Pn>l. Flor. Cerhir. 2. — naec >ariflari solo s>llu>-<tn pinmnsiino >. ruliura mullum aucta refer I F*, *argutam* Moretti, De quibusd. p. li. il <er II. 0. V. *spicata* y. II or I o I. Flor. Italic. 1. 03.
- fl. lahfoha* K-xli I r. (rispulis - \. ^liinlulu^o - pubescentis: foil, inferioribus ovatis terminalibus arcuatis serratis. — *V. htfbritla* Linn. Spec, plant. 14. — I *autitali** Srhrad. C'ommriil. 24 I. 2. fig. 3. — *V. paludosa* Lej. Flor. dr Spa I. II Culhira oritur bare >anetas.
- r. tamnifolia* Kurh I r t. n>puto-pubescentis: folium lanceolatum argutius serratis y *aUrrntf>tia* l.r.j. Flor. do Spa II. 3<fl. — *. *media* I rjpiini*, Hr%4
- *. *mlrnt* korli I. r Tota glabra. folium rAl>ribu»que nialis I. *milms* Hon. Klor. \u<tnar I 7. — I. *SlermberguinaBrnhr*<|| mss. In NilM. Herbar. 101
- . *irtutuid* Korb I. r. — Sculofo-pubescentis |u||% rrrlu rplandulo»i<; rah n-but glabris nialis*. I. *HnrreUcri* Schott m%« in Roem. r| Srhull >>)*. ^'teU I. W Plrrumque Halior e'd quam anterrdent «M f>»a rlliplir.. - oblooga babel, «rd foln% rlliptin* quoque lanroUli»cur orrunl
- C crisUta* Koch I. r IXitior. suprnc pubrrula corolla* larinu* augu»lio-Hbiiia tortuotit — I *mstala* Ilrnhrdi I *orcktdta* I.rulf Au*tnar 4. p

Opil. AffrntJur mirmlui intuprr nd A.mr \. Hrac bin Opi/s. — *V. Jurigtian* n — *V. ku%ldrtik*i O;MIX \. Ilrnningll *Optil* * IMlcrn *tpili*

333. — *V. hybrida* M. Bieb. Flor. Taoric. Caocas. 1.8. — *V. crattifo* Ua Kilaib. ex Roera. el Schult. I. c. 00. — Crescil in apricis siccis per lolam fere Europa m et Sibiriam.

123. *V. CRASSIFOLIA* Wierxb. Flora (B. Z.) XVIII. I. 251. f - Caule assorgeole, basi laevissiroo; foil, coriaceis glabris oblongis oblusis, ex ovata basi cordaliti duplicato-crenalis, ioferiorib. longe petiolalis; racemis densis; calycis laeinia oblusis ciliolalis capsulam obcordatam glabram aequanlibus. 2]. — Caulis erecius rigidus siriclus nunc tolas laevissimus, nuno supra parce pilosus, pedalis Y. sesquipedalis. Folia opposiu valde crassa coriacea, radicalia el caulina inferiora longe petiolala lioguaeformia aul oblonga oblusa ex basi ovala in peliolun decorrenle magi* minusve cordata, olrinque glaberrima, dorso rugulosa, margine inaequaliler crenata, media mioora, suprema ovato-oblonga subsessilia amplexicaulit crenala aol serrala, praesertim margine parce pubescenlia. Racemi lermiales el axillares palmares •. ipilbamaei. Bractee lineari-lanceolatae calycis longiudine. Calycis quadripartil laeiniae lioeari-laoceolalae per paria minores obtosioseolae glaberrimae v. cilialae. Corollae ad faucem dense barbatae cyanae laeiniae lale lanceolalae aculae. Capsula profunde emarginala glaberrima vix calyce longior. — Affinis *V. orchideae* el *spicalae*, ab ulraque differre dicilur: glabrilie el laeritaip omnium parium, praepimis vero texlura lignosa caulis el coriacea crassa eisucca foliorum, foliis inferioribu* peliolo longo canaliculalo subalalo insidenlibus subcordalis, exacle el duplicalo-crenalis capsulisque glaberrimis. — Crescil in lapidosis rupesribasque calcareis monlis Szimcon ad Csiklovan in Banoalu.

124. *T. BACHOFEMI* Heuffel mss. in Flora (B. Z.) XVIII. I. 253. f — Cano-pubescent: foil, opposilis cordalo-oblongis aculis lanceolalaeve inaequaliler el duplicalo-serratis; calycib. sobaeqoalib. capsulam obcordatam glabram sobaeqoantib.; corolla tobolota. ?} — Caotw ti eadcai radtce ploriml, basi parnm Incllnatl, ion erecti pedales •. sesqalpedales It t a s brtrisalme cano-pubesceoles. Folia omnia peiolata (peliolo 'i-l-pollicarl) plana, ottingoe bretUer parceqoe puberula, pollice saepe laliora, IVi-S-pollicaria cordato-oblonga acula, media acuminata, suppreroa lale cordalo-lanceolala f apicem fere usque gro*se duplicalo-serraia, aliquando basi Incisa. Raemi lermiales simplices aul ramosi errecti elongall. Bractee lineares periicello longiores puberulae. Calycis quadripartiii lariniM lincres subacuales corollae lubum ft capsulam subarquanies. Corollae cyanae lubus inflatus, basi inaequalis laciniis lale lanceolalis. Siamina corolla loogiora* Capsula parta obcordau subrolunda, parom compressa glaberrima, calycfB vb aut non excedii. — Affinis *V. longifoliae* forleqoe inter ejut varietales referenda* differre dicilur prafiertim: Yeslito cano-pubescentle, raule humitiore, foliis bioif oppositls longius petiolatit laliohbos brevioribusque, minus profunde el acuW serratis, capsula evideoler emarginala, corollae faoce minus birsuta, lobo lolal# longiore. — Crescil io ropesuibus versos alpen Relyeiii io Traotylvaniae coaWtato llunyadieosi frequoissime ei rarios ad Thernas Uerculis versos alp<f Banoatos.

125. *V. TICINK>SIS* Pollini, Flor. Veronens. III. appdt. 70A - Brrlol. Flor. Halle. I* 61. t - Foil, opposilis vfrlicillatisq. lanceolalo-linearib. acumioatitsimii aequaliMT argulfq. serratis, basi coealis subpelialalis glabris; brarlri* lioeari-selaceis. % -- Caulis bi-iriprdalls ere^lui lerr«, inferne flabrr, tuprrne pubrrulos, ~~intodum~~ porpura<rcn«. Folia vtrltcillalia Irrna, rariu« qualrrna t. oppotila angosta ~~longa~~ acuminaii»»ima(frre utqur a<l rtrlrmm apicrm arqu<liirr argutr vrrrda, ~~certa-~~ luri* remoliu>culis, glabra, bati runrata. Horn in racrmo npicatforml ~~terminall~~ eloogalo aconioalo, sarpe laieralibos plortbos anllaribus acredeoUbas. ~~Bractee~~ pedicrillo looflores. Calyris qoadripartil segnenta Uorrolata ae«U, ~~duobus~~ paullulum loogioribut. Corolla rovrulea. Capsula ovata gUbra. - f. ~~Maoti~~ Vomti, Bibliotb. Iuliaoa III. 380. - Roea. el Srhult. S>s|. tegrt. I. Maollai. 1. •J - *V. maritima* \oc€ el Balb. Flor. Ticio. I. 0. cl JK - Crescil io ~~prati*~~ ~~paludosis~~ ioler flumeo Ticioon el rivon Gravellova.

126. *V. SERRULATA* Pall, in Hb. Willd. ex Lnk. Jhrbchr. I—III. 38. — Caule gracili tomenoso; foil, opposilfs v. ternis vemcillalis petiolatis, inferionb. oblongis, superiorib alternis lanceolalis, basi altenualis serrulalis; braceis infenonb. pedicello loogionb; calycib. pubescenlibus. 2l. — Corolla coerulea v. purpurascens. — Crescit in Sibina.
127. *V. STEPHANIANA* Roem. et Schult Syst. veget. I. 00. — Caule graoili lomenoso, foil opposilis lernisq. yerlicillatis laoceolatis, bati allenuatis, aculis, serratis, tomenlo minulo canescentib.; bracteis pedicello brevioribua. — Valde afflols *V. spunae*, sed tola planla canescens. — *V. molltt* Lnk. Jhrbchr. I-III. 30. (nee Zea). — Crescii in Persia.
128. *V. GLABRA* Ehrh Plant eisicc. uo. 11. — Vahl, Enumer pi 1.358. - Schrad. Com menu t 1 fig. 4. — Foil, opposilis v. terms verlicillalis ovalo-lanceolalis •culls, basi alienualis, apice Inlegerrimis, simpliciler serraiis caulibq. glabns, terratuns remotis subaequalibus. % — Differt a *V. arguta* statura elation folusque longionbus lationbus magisque aequaliter serraiis. Pelioli ciliati. Folia inferiora basi subcordata. Floras coeralei T. purpurasceioies. Variat etiam Ooribus •Ibis. — Forte ad variolates *V. maniiuuu* pertinet — Crescit in Europa austrah
190. *V. RAMOSA* Pall. mss. ex Lnk. Jbrbchr.. I-III. 30. — Caule pnbescenle; foil, ternis verlicillalis oblongo-lanceolalis remote serrulalis, ramealib. opposiUs aggregaiis llinearibus, supremis inlegerrimis. 2l. — Crescit in BlbirU.
130. *V. CARTILAGINEA* Ledeb. Icon. fl. ROM. Alt Illusr. 1210., Flor. Altaic. 1.98. t (adnot) — Caule pubescente; foil, glabris; bracteis inferlorlb. calycem superantib; lacinnis calycinis glabris ciliatis nervosis, ioferionb. oppositis spalbulalis, versus apicem serraiis, supenonb. allerois lineanb. serrulalis. 2l. — Caules plures ex eadem radice l/i-2-pedaleslenuiler puberuli simplices v. ex axillis foliorum infcnorum subpollicares, ex supenorum fasciculos foliorum emillentes. Folia l'/t-2-pollicaria, infciora »palhulata in petiolum allenuata, versus apicem serraia, serraiuns uinnque 2-3 remotis, superiors lineana 2-3 lin. lala remote camlagineo-serrulaia, omnia erecto-incurvata. Racemus solitanus (vel plures) &-6-pollicaris. Bractee linean-setaceae. Pedicelli 2-3 lin. longi pubescentes. Calycis quadriparuti lacimae ovatae subtrinerviae. Corolla coerulea. Capsula....? — In Davuria prope NerUcbinsk crescit
131. *V. RUBICUNDA* Ledeb. I. c 908., et Flor. Alt I. tt. f - nilou-pabcMMs: foil, oppositis In petiolum aueaoaik oblongls laneolatisve serraU; braeials omnib. pedicello longiorlb. oalyeeq. gUnduloeo-pltosls. 3f - AlBnls videtur *V. §9TTMI*tae* Pall, et *V. •UfmUi* DC ab utraque aiua differt: folils semper opposilis, supenoribus subalternis, non peliolaUs, sed ID petiolum ad insertlonem usque marginalum decurrentibus grosse serraUs. — Raceml doo v. tres 6-7-pollicares. Bracieae omnes pedicellis longiores el eum Ills calyclbusqoe gUndulia pedicellatis obteclae. Calycinae lacimae 4 Inaequales oblongo-linear** obtusae, interiores paullo majores. Corolla rosea. FilamenU demum corolla longiora. Stylus post corollae lapsum calyce quadruplo longior. — *V. m MU P^ll.t* — In Davuria crescit
138. *V. CONFUSA* Roem. el Scholt Syst veget L Ofl - Foil, oppositis, inferionb. cordaiis, superiorlb. ovaio-lanceolaiis acumloatis dopllealo- inaequaluerque serraiis cum caule molltter caoesoeaU-pubeseeuUb.; eorolUe segmentis divaricatis acuminalis, capsulis pilosis. 2l. — Folia juniora mollia, adulu rugosa, inferiors peliolata, superiora subsetsilla. SegmenU calycina pilosa cialia Knremus aplcatus pier unique soliiianus. — AfQnis *V. eomphcatoe*. — Crescil ...⁹
133. *V. LONGIFLORA* Roem et Schult Syst |e*t|. I OS. - Foil cordalo-Unceolalii argute tnaequalurr orrralis Rlabriutrusis, corollae tubo calycem duplo eieedeole, caçns lacinm p.mn inaequalibus % — llerba apice pubescent Pelioli cialiali folia runeiformia, supenorum denies rubro-apiculali. Pedicelli et calyces pub. «cenlr< i orollae hlacmae lubus I , linea* longus Lapsula obcordaia pilosa — (rt*<ci(^

134. V. POLYSTACUYA Lnk. Enumer. pi. hort. Berolin. I. 23. - Foil, subsessilib. ovatis acutis serratis pubescentib.; ramis spiciferis aggregatis; florib. subsessilibus. 2l. — Herba pubescens. Folia versus apicem usque serrata, acumine reflexo. Bracteae inferiores flore longiores. Flores parvi pallide coerulei. Racemi in corymbum ramos terminantem dispositi. — *V. corymbota* Hortor. — Crescit . . . ?
135. V. LIXERIANUS Ledeb. Ic. fl. Ross. Alt. illustr. t. 211., Fl. Altaic. I. 27. adnot. t. — Caule piloso; foil, glabriusculis oppositis petiolalis oblongis acuminatis, basi rotundatis, ex base acute simpliciterque serratis, serraturis subaequalibus; bracteis pedicellos subaequantibus; calycibus paleis. 2]. — Caulis videtur elatus (pars superior bipedalis adest) debilis glutulosus undique pilosus pilis subdeflexis, versus apicem ramos aliquot oppositos ex foliorum axillis emittens. Folia petiolata (petiolo quadrilineri) 4-pollicaria v. longiora, latitudine pollicaris et fore sesquipollicari, membranacea, basi rotundata inlegerrima, caeterum ad apicem usque serrata, serraturis apicem versus decrescentibus. Racemi ires, intermediis lenninalis pedunculatos, infra flores folia aliquot minuta gerens 4-3-pollinaris, pedunculo sesquipollicari v. bipollicari, duobus laterales ex axillis supremi foliorum parvis oppositi breviores sed longius pedunculati, antea omnino aphylli, aut basi foliosi. Pedicelli bracteis breviores. Calycis lacinae 4 reflexo-palcatas inaequales. Corolla rostrata. — Crescit prope Irkutiam.
136. V. LIXARIAKFOJJA Pall. ros*. in Willd. Herb. ex Lnk. Jhrbrhr. I-III. 3). - Foil, oppositis linearibus sensim attenuatis longisque aruminalis remote serrulatis; bracteis pedicello longioribus. — Caulis angulatus sparse parvis pilosus. Folia basi apiceque integra medio tanlummodo serrata. Racemus elongatus, rhachis pubescens. Calycis glabri segmentis rariis. Corolla coerulea magna. — *V. ciliata* Fitch. Cat. hort. Gor. ex Lnk. Enum. pi. hort. Berol. I. 10. (nec alior.) — Crescit in Sibiria.
137. V. PINKATA All. Hort. Kevens. (1. edit) I. 10. - liffm. Comment. Goetling. XV. 130. t. 10. - (Laxm. Aet. acad. Petropolit. 177a. 1.20. fig. I.) - Foil, subfasciculatis inferioribus pinnatifidis, superioribus pinnatifidis simplicibus, foliolis v. segmentis filiformibus divaricatis; calycibus quinquepartitis. 4 — Caulis ascendens pubescens, in planta culla plerumque glaber. Folia appropinquata angustis segmentis inaequalibus. Racemus in planta spontanea «oliosus», plures in planu culla. Capsula ovalis. Planta nimis variabilis quoad longitudinem caulis (4-pollicaris et bipedalis obversalis, foliorum latitudinem et pinnationem obovatis colorum. Flores parvis. Calycis coerulei, interdum albi, rarius rosi. — Crescit in apricibus Siberiae frigidissima.
- W. V. LAKTA Karel. et Kiril. Bullet. de l'acad. de natur. de Moic. XV. 414. — Racemus terminalis solitariis aequalibus; foil. fasciculatis sublinearibus terminalibus, basi attenuatis grosse et inaequaliter serratis inermibus, superioribus omnibus inaequaliter; floribus pedicellatis. villis in corolla prominens lib.; laminae complanatae plus quam duplo excedentibus. — Puberula multiradiata *V. pinnular* quam maxime affinis, foil. lanata in millibus primum ab auctoribus viti numquam pinnatis et barba interna corollae. denique «lubo promissa» diuina videtur. Flores laevae coeruleae. Calyx lobis «marginatis» omnino, *pinnular*. Folia magis quam illius «cabra». Crescit in rupestribus luonhuni Auiad ad fl. Mrrbjn in Soongaru.
130. V. M-SSII IKLORA Boffe m. in l.db. Iron. fl. Ross. All. illustr. I. I* - Flor. Auiad. I. 3d. Floribus in «piram terminali «ulicilariis dentatis «cl. «lib.; foil. oblongis, basi canalicatis. in prolium allinatu per uolo - pl. «BtW. lanatis miogerriom obliotrotulit, «supremis lioranb. mierrimili eauleq. pubescentibus. *4 — Tola plania quocumque ollicij nullo - pobweos. ernii implet. Folia subopposita, ioflora «alio - oM» innata in iporum lonfiotne aituau. telermedia oblonga pinnatifida. larloit of ill. irgemmi «obliotrotulu, «uama obloogo-hnranj «ubinit (trmroa acoia. K. fotioma i of moron proleuoi ranorum rudtmeoia v. f. «cicuh folionay

- III ramos clongali. Spica terminal is solitana, accedentibus rutli mentis spicularum axillanum. Bracleae lineares calycem superantes. Corolla coerulea. — Proximo affirm pracedenll el subseqcnli. — Crescit in Sibirla Allaica in locis slenlibus deserli ad flmios Kurai et Tschuja.
140. V. IN'CISA Ail. flort. Kerens, (edit. 1.) 1. 19. — Loddig. Bot Cabint. L 1397. — Foil, subfasciculatis petiolalis lanceolatis pionatifidis, segmentig subinlegns segmentis calycims lanceolatis. 2l. — Caulis pubescens. Racemi numerosi terminates et axillarc*. Folia basi cuncala. Caljx inaequalilcr quinqueQdus. Corolla coerulea \. alba. — Credit in Sibina.
141. V. bIBLACIMVTA G. Don, General syst. of gard. and bot IV. 567. no. 47. — Pubescens foil, opposite \. term* quatermsvc \crticillati» »ubfas(iculatib o\alo-lanceolati>, supra mlidis, profunde duplicalo-dentatis subpinnadfidisq.; calycib. quadripartite* inaoqualibus. — Corolla purpurascenli-coerulea. 2l. — V. *marttma* Linn. Ill>. - < rescil?
142. V. GKMI AVHDES Vahl, Symbol, botanic. I. 1., Enumer. pi. I. 02. - >enlon Jard. de Malmais. t 80. — Sims, Bot Magai. t. 1002. — Sibthrp. rl Sm. Fl. Grace I. 5. t 5. — Foil, radicalib. oblongis crenalis, raulinit ovalo-lanceolali* cartilaginco-marginatis, apicc crenalis, bail angustalis, supremii aculis inlegerrimis; caulib. simplicib. ascendendb.; lacinia corollae luperiori lateralib. minori. 2f — Folia puberula obscure Irinema. Bracleae villotae. Segmenla calycina fnaequalia. FI ores pallide coerulei. — Bulb. Centor. I I. 35. — K. *Buxbaumiana* Pall mss. ei M. Bieb. Fl. Taur. Caucat. I. 9. — In Tauria, Cappadocia el Armenia.
143. V. PAI.I.IIH flornem. flort. Ilafn I. 17. — Foil, lanceolalii oblums subieratif, corollae lacinia superior! lateralib. majori; caule ascendente. ^ — Yalde afTinin praecedenti, ^ed folia multo tenuiora et angustiora internodiorum longiludine ner ilia duplo superanlia. Flores dittanies pallide coerulei. - I *Otympica* Pall ? — Crescit?

f *Species vix notae.*

- 141 V. VITIFOLU Sm. Herb. — Foil, cordalo-rrmfonnibug argute denlalii; cau->«?; flonbut.....? "4 — Cretcil in No>a lollandia.
145. V. KOBLBRI Roem. el Schulu 8)tt vegetab. 1.97. — Caule erecto pubescent*, foil, caulinit Integerrimis oppotiUt v. teraia Tercicilatit, lloralib. aliernit peduculo brevioribut o - V. *norm* Koeler ei Ro«m. Collect. I. 30S. - <<*ru. . . .Y
140. V. ROTINDIFOLIA Ri. el Par. Plor. Perot. I. •. — Vabl, Bnuider plant 1.81. — Pilona caule gracili repente; foil. orbleutaH-reiitformib. crenati* priiolati< tubpellalis; pedunculis peiolo doplo longloribat. ^ — Caallt porpurascem. Folia ad nodos 2-J-na, plerumquo solitaria. Corolla porparaicenll-rotea. Stamina 3, tubi longiludmr (erte non ad *leronteam* attineL — Conferai *lirrpstem* (amgeram Cham el Srhldild - (Keperlor. III. 3H2) — Cre»cil in Peru via.
147. V. BRAf.1i: 11 K Opii, S)llope plant ad Flor. Ratubon. II. 49. - F<4» oppo- IUt altemi%\c Lite lanrrolatis inaequallter gro^e rl argute terraltt, tuperinnb. nargine «or«u« apieem intecrnms cauleq. pubricentib; braceit leliformib. Ion- |iitlmi» "4 ». *hnyfuba* Wblnbrg ? - Creicil?
148. V. LITTORALIS Arrabida, Flor. Flumin. U M. - Caule ttHetutimo oppomr ramoto, full longe peiolalit oppoiitif late ovatia acuminalu Inirgrrrimlt tubundulatit; tpicit terminalib. peduncolalit loDgiutrolit; florib. fubkekftilib, l>raeleil lanceolatit eoa duplo escedeulib.; calycis quinquefdi laciniit Nneari-»ubula- Us, tubo corollino duplo breuonb.; corolla infundibuliformi-lubu|o%a, hnnu* laMeolalis refleii«, rap«ulae orbiculant acuminulatae loculit ut Md^iur n««n««upermin. % — hpecuuen Illimtralum, rilnbent plantar »ummitalrm. ultra p«««U|r Folia fere »ripo||iram. petiitln lupollicari. lamina nrrilr quadnpollirari, pull 2 laU. Bracleae -. poll lon^ic m ramulis mfrtu»ri»u% »t<*nlch Spirae 2 ,-' i.,|| loogae. — Cre-ci(iu llr.isili.i m dihone Hunnnnm
- Ml V. STOIUMKKHV I rhm I innaea III I iteraturb « Raremt» anllanh . un- •ooib. reptantili bir»uti«. pilm dcmuin diMicbi*. full pci lam n.rlu. -« 18118

grouse ferrato-dentalis sabbiraotis; calycib. foliaceis capsula longioribns. *Q* —
Crescit in America boreali.

130. V. FLUMINENSIS Arrabida, Flor. Flamin. t25. — Non est hujus generis nequo
ad *Serophulariarum* ordinem Tidelar pertinere.

ft *Species nomine tantumtnodo cognitae.*

- V. ABROTAMFOLIA Lnk. (An V. PINNATA Ail.?)
- V. ASCENDENS D. Don.
- V. CALLISTACHYA Ledeb.
- V. CANDIDA Lodd.
- V. CIRCAEOIDES G. Don.
- V. DIVERSIFOLIA Mnch.
- V. EXALTATA Mead.
- V. MELANCHOLICA Hort Paris.
- V. MESOTYPYA Lnk.
- V. GENTIAMFOLIA Sweet.
- V. PANNO3ICA Mill.
- V. PINNATIFIDA Willd.
- V. PRAEALTA Hortor.
- V. RIPARIA Seidl.
- V. STRICTA Lodd.
- V. WALDSTEINIANA Schott

t t t *Species e genere expellenda**.

- V. BBUNOHUITA Wall. — CALOBBABDOS BBUNONIASA.
- V. LINDLEYA1U Wall. — P1CROBHUA BUBBOA.
- V. BOTUNDIFOLIA (var.) Bt. at Pav. — HBRPB8TE8 LANIGBBA.
- V. S1BIBICA Uaa. — PAEDEROTA SIBIBICA.
- V. TETBAGONA Book. (Icon, plant t MO) - PODOCARPUS DIEFFENBACHII
Hook. (Icon, plant t 547.)
- V. THYBSIFLOBA Wall. - SCBOPBULARIA CALYUNA.
- V. TIBIFLORA Fisch. et Mey. - PAEDEROTA TUBIFLORA.
- V. VIRGLMCA Linn. - PAEDBBOTA VIBGINICA.

3080. P. tEDEEOT. % Linn.

(Lion. Gener. plaou no. S0. — Meisn. Gener. plant fascal. I. 301 II. 218. — **Bertol.**
Flor. Italic. I. 105. - *Leptmudr** Noit Gener. Aneric 1.7. - G. Don, General **synt**
of fart, and bot IV. **378.**)

Scotte L PAEDEROTA.

Folia oaaaslla. Braetaae sab slagalo lore siagutae.

I. P. BONABOTA Liaa. â>aa. pUat ML - Lia. Illaslr. geaer. I. t 13. If* >. **a-g**
- Jaq. Fl. Aa»uiac. V. * Appoadi. t 31. - gins. Deouchl .Fl. Hft M. (le. **con**)
- Pallia. EJeai. II. Itt. L 1 fig. 1 - Bcbb. FL Gerai. eicon. 371 no. * * 7
Bocb, Sytjoao. i. Germ, [edit l.) 3& - G. Doa, General tytt of gard. *****VI**
IV. MO. ao. 1. ig. tt. - Foil, iafsrriorib. sabrolaadlt, taperiorib. ovailt; braotii⁰
ealyeibq. blrtaiit; eorollae labio topenore iniegfrimo; tUminlb. corolla M*^
fionbat. ^ - Ca«iu larea ereclus oaetplotnt paucipolliearW v. tptitbags⁰¹
simplei ?. bati raosus villosas. Folia laia ariataa srMilla, reliqua **brevis**
P«Uolau sabrolaada, saporlora gradaUai major* otaU, omoia grow* **et subia-**
aeqaaNlar aorrau, aeau ?. ablasa villotola, vaHaal b?aiolae«alaU **rebrtas et**
leoQlas satraia. Bacttaas ttrailaalis timplti Uttuteolof. Bradaaa ^{litcf#*J^}
llaearts lattfftrrimae blrue. Calycis laelaiao aag««iltlmae obiasae, **quinta l-**
viore, hlruo. CorolU eoomloo-rataa, aabtdo palhdUftima tobalosa **blabata,**
lablo saperioro apieo foraicaio aeolo, laferioro 3-4-ldo, laeialis **subaequalibus**
oblongis. Aaiâaraa coaralooa sogiMaiaa. Gaâaala obloaga ammlau **restrata**

calyce brevior. — *Bonarota montana* Illic, *Chamaedryos folio, flore coccinea* Micheli, *Sov. pi. gener. 10. I. 15. fig. I.* — *Veronica petraea sempervirens* Ponar, *ad Chamaedryon vulgarem faUam accedens* J. Baub. *Histor. 111. lib. 2ft. p. 289.* (ie. xjlogr.) — *Veronica petraea* Pon. *Mont. Bald. 179. ic.* (excl. coroll. et capful) — *Paederota (Wulfenia) illosl*, *Flor. Ausriac. I. 10.) chamaedryfolia* Suffr. *FurojuL 105.* — *paederola coerulea* Linn. *fil. Supplcm. 84.* — *Wulfenia Bouonarota* Sm. *Transact. of the Linn. Soc* VI. 06.*

ft. minor Berlol. I. c. — *nacemo compacto.* — *P. Bonarota ft. Willd. Spec. pi. I. 77.* — *p. Bonarota Suffr. Furojul. 10*.* — *P. chamaedryfolia* Roem. et Schult. *SM. Vegel. I. 178.* — *Wulfenia Bouonarota ft. rotundifolia* Vobl, *Enumer. I. 80.* — *Bonarota montana italica, Chamaedryos folio rotundiore et quasi rir-cinmata, spica coerulea habiliore* Micheli, *Not. plant, gener. 10. t. 15. fig. 2.* — *Croni in alpinis Italiae superioris, Furojulii, Canthiac, Tyroli.*

8. P. (WLLFK.MA Sm. *Transact or the Linn. Soc. VI. 00.*) AGEKIA Linn. *Mantiss. plant. II. 171.* — *Sum. Dculschl. Flor. list. 24. (ic. ten.)* — *Rchb. I. c. no. 2*M.* — *Koch I. c.* — *Berlol. I. c. 110. t* — *Foil, terrain, aupertohb. o\alo->lanreolatis longe acuminatis; corollae labio superior* bifido; aUmlnlb. corolla brevionbus. 2t* — *Caules teretis erecti v. ascendentes caespitosi palmaret r. pedales, plerumq. implice*, interdum barii ramosi, tenuiter pubescentet. Folia oppositi (v. nonnumquam verticillata terna aol alierna), ima sessilia miolma subrotundo-ovau, reliqua sensim tajora ovalo-lanceola acuminata ioequaliter arguleque nernnia subsessilia puberula, IVt-2-pollicaria, tuperma aogalliora. Racemus terminalu simplex erectus v. cernuus deorsus, mox laxiusculus. Bractea angustissime linearis obius»»ubulac glabra calyce longiores. Calicis laciniac forma bractearum, quina paullo brevior. Corolla sulphurea, calyce longior, labio superior! fornicato bifido, inferior infido. Folia puberula Antherac fta^n.Kae flatae. (capsula oblonga acuminata rosirata. — *l. luten* Linn. *fil. Suppldu. 84.* — *p. Bonarota* Jcq. *florl. Vindohon. II. W. t. 121.* — *l. urlicaefolia* Bngn. *Fl. Furojul. Use. H.* — *Bonarota ekamaedryfolia* Scopol. *Fl. forniol. (edit. 2. 'I. 23.* — *Wulfenia lutra* Hotl, *Fl. Austr. I. 10.**

ft. Zannickeilii: *Foil, nioreli. o^aiis; caule abbreviato; racemo compacto.* — *P. Zannickeilii* Brigo. *Fate. pi. Furojul. 0.* - *Roem. et Schult. Syn tegeb. I. 178.* — *P. Bonarota ft. Zannickeilii* Pall. *Flor. Veron. I. II.* - *llontrotm montana tiaiic; Ckawf94ryi folio minm* crmmto, spica ImUm, rx momU r<-ratio* Micheli, *Nov. pi. gen. 19.* - *Grteit lo alplbtth Carlmbiae (We^cinrr etciBt'ttlpfn), lo mootlbat Furojulii, el In Tyroli luHd .Ciaia d'a>u*.*

Beetle II. LEFTAIMU.

Folia verticillata v. rannu alierna. Bractea tub tingulo Dore blnae.

• *Foliis certiciuotis.*

- & P. (VERONICA Linn. *Spec. plant. 13.* - *lffm. Comment. Goettmg. XV. III t. 1., Phylogr. Blur. 80. t. 0. fig. I.* - *Thnberg. Flor. Japon. 20?* - LEPTANDRA Nun. *Gener. plaoL Americ. I. 7.* - CALLISTACHYA Raf. *New York med. repo«. V. GO VIRGINICA* Wlpri. *mit.* — *Foil. Inferlorib. quinalim, superiorib. quaternatim «ericillatit ovato-Uoccolatu acuminatit peUolalut. | — Caulu pllit ruft obitu* e>l. Folia taturaie viridia, tuperiora rtrlua teraiaa. Corolla alba. Captula Irtragona quadrivalvt. Semioa rugosa. — Teronicastrum album* Moeb. - *AW/a-chya alba* Raf. *Journ. de pbya. LI I III. 886.* - *Kniphr. Ceotur. X. p. 07.* - *Pluken. Phylogr. t. 70. fig. 2.* - *Creteil ie Virginia (et in Japonia!;*

- C P. (VERONICA Linn. *Spec. plant. 12.* - LEPTANORA Null. I. c. - C4I.LUTACIYA Raf. *New York medir. repo«. V. 60.* SIBIRICA Wlpri. *m<t.* - *Foil ^ - 0 - nit verticillatu lanceolatu tesimalib. acuminatit.* "4 — *Oulif piloton. Folia 2-3 polhçet longa, quam praerredeniulio laliora.* — *Ann. Ruth. 20. I. 4.* — *Irro-nioastrum rubellum* Moeh - *Eustaehya eoruUa* Raf. *Jouro. de pbyt LXWIX* •W. — *Creteil in Da<una.*

*' *Folns allernis.*

- 3 P. VERONICA Fisch. et Mey. mss. — LEPTAbDRV Fisch. et Mey. Ann. sc nat. V. 301.) TUBIFLORI Wlprs. mss. — Glabra crecla. foil, sparsis sublineanb. aculis argute serratis; racemo terminali densidoro; corolla lubulosa caljcem quinqueparlilum pluncs excedenlcm. 2|. — *Leplandra Meyen* G Don, General syst. of gard. and bot. IV. 570. uo. 3. — *Leptandra angittifolia* Lchm Lmnaea XIV. Lileraturb. 1J0. — Planla subglabra laele >indis mullicauli*, cauhbus l'/:-2-pedalibus liucjlo-angulaliM. Folia 3-4-pollicana, 3-4 lin. laia, neno medio albido, >er>us basin iilcgorrma, dcio serrato-denticulala, dentibut dislanlibus, apiculo albido saepe incuno instructis Racemus terminally soliljnu* spiciformis densiflorus 4-G-pollicaris>. Pedicelli Oh formes braclea Imoan, pedicclo duplo longiori buffulli. Cdlyces coloraii, lacinns duabus lufenonbus quain reliquac longioribus* Corolla IDIUS el flamenla brevia dense pilis albidi» tilloaa. — In praii* Dahunae.

t *Species minus nota.*

0. P. HUMILIS Willd. Hb. ex Alb. Dietr. Spec. plant. I.? — Caule simplici bifanam villosa; foil, sessilib. obovalis, apice denlalis; corymbis termmalib. capitatis. ^ — Pollicans dense foliosa. — Grescil in alpibus Allaici«.

ft *Species nonnisi nomine cognitae.*

P. A!SG!STIFOLIA Turczan.

P. VARIEGATA RduSch.

t rf *Species e genere expellendae.*

P. AUIERSTIANA Wall. - WULFEMA AUHERSTIA!HA.

P BO> \E SPEI Linn. — DIASCIA BERGIANA.

P. CHAVAEDRI FOLIA Koen. — MICROCARPAEA CHAMAEDRYFOLU

P. COCHLEARIFOLIA Koen. — PEPLIDIUM UUMIFUSIM.

P. MINiyA Reu. - MICROCARPAEA MU8CO8A.

P. MINIMA Wgbt. - JGSTICIA EIVINOIDBS.

P. MJDICAULIS Urn. - WULFEMA CARINTHUCA.

P. OBLIQUA Alb. Dietr. - LOXOTIS OBLIQUA.

P. RACEMOSA nonll. - IIEMIUERIS MONTANA.

P. WILFEMA Lam. - WULFEMA CARIMIIACA.

3981. CiLORII tDDOH *Bth.*

nil) *c< rophul Ind. or. 44. - Mei»n. Gncr. plant, tascul. I. 307. II. 218.)

- I C \I IK>MCA? Wall falal. 405. BRINOM4>A Bib. I c. - Uerba ereria glabra 'ub»implci IV,*-2-pedajis. Folia oblongo-lanceolala leviier acuiq. serraia, ba»l in petiolum brevem angusiala. Spica sempedalit. Florrs srssilei glomerati. % — (.resell in India onenlali.

3082. H'I'LFE^IA *Jcq.*

- (Jcq. Miscell. II. tl t. 8. flg. 1. — Meisn. Gcoer. plantar, vascular. I. 307. II. 218. - G. Don, General tysl of gard. and bot IV. 580

1. W. CtRIMIIACA Jcq I. c, Icon. pi. rar. I. 1. 2. - Nees ab fSenb jun. Gcoer. pl Germ. X>l. t 3 - Sirm. Deutschl. Fl. lift. 50. (ic. aen) - Runer rt lohentk* Itiner. bot. I 73. I. 1. - Sweet, Brit. Do* gard. II. I. 100. - Mm*, Bot. Mat?*** t 2500. - Bib. Scropbul Indie 40. - Rcbb Fl. Germ, eicun 371 no 2U0. " Koch, Synopf. fl. Germ iedil. I) 532. — Foil, oblongis, ba»i angutlaliis duplicato** creolif, caulims hebelaii>, racemo in scapo soliiiano denso; corollit coerul*⁰ liUcinm, lubo ban »upra gibboio, limbi lacinus rolundalu, Inflma crnata. ^ '* Pmtdtrot* *Wulfenta* Lam. Illustr t. IX flg 2. - *PatHerota nudtrauht* Lao. ~ Cretell In alpibus Cannlbiae (9luf rcr Jtu^^cr Aalfolrc im ©ailt^U bci ^ *XtttUt* Emtcbor cm Michor.

2. W. (PAEDKROTA Wall. Caul. 410., AMIHERSTUM Bih Scropbul. Indie. 40- *~ Foil, oblongit, baal angatuiit duplicalo- | Incuo-crrnatU, corollae lubo reel* Imbi lacinlis omoib. acoUtslmU. 4 - Habitus onmno praecedeniis. ☉U te IUaaoo lodiat orientallt.

3. W. RE-SIFORMIS Dougl. mss. ex Blh. I. c. — Hook. Flor. Dor Am eric. II. 102 f 1.171. (nee 170) — Foil, radicalib longe petiolais remformib. duplicato-crenalis; scapo bracteale laxo racemoso; calycis quadripartiti lacinnis longe ciliaris; corollae lubo recto, lacinnis rotundatis, inflama crenala. 2L — Rhizoma perenne repens, fibras copiosas emillens. Folia radicealia longe petiolata conaceo-membranacea glabra v. pilis deciduis sparsis hirsuta, reniformia v. cordato-reniformia crenala Petiolus digitalis glaber v. deciduo-pilosus. Scapus florifer longitudinalis foliorum, demum fructifer elongatus foliis subduplo longior erectus nudus v. nudiusculus. Flores in racemum laxum dispositi bracteali, bracteis ovatis pedicello brevioribus. Calycis quadripartiti lacinae ovalo-lanceolatae acutae planae adpressae longo ciliae Corolla calyce duplo longior subinfundibuliformi-tubulosa coerulea, limbo subbilabiali, labio superiore integro, inferiore aequaliter lobato. Stamina exserta, fauci hirsutae inserta. Antherae dorsae affixae. Ovarium subglobosum compressum. Stylus lubo corollino brevior, stigmae obtuso. Capsula elliptica nigra membranacea obscure reticulata compressa biloculans, superne ad marginem utrinque dehiscens. Dissepimentum e marginibus valvarum introflexu arete cohaerentibus. O — ^{na} Americae borealis montibus prope fl. Columbia.

f *Species e genere expellendae.*

W. AGERIA Sm. — PAEDEROTA AGERIA.

W. BOUONAROTA Sm. — PAEDEROTA BONAROTA.

W. LUTEA Host. — PAEDEROTA AGERIA.

W. NOTOMANA Wall. (Tenlam. 0. Nepal. 40. adnol) — LOXOTIS NOTOMANA Wlprs

W. OBIQUA Wall (Tenl., II. Nepal. 45. I. 35) - LOXOTIS OBLIQUA.

W. INTERMEDIA Wall. - LOXOTIS INTERMEDIA.

3983. CWMPIL/T/TH/ft *Rtk.*

(Rh. Not plantar spec 4. — Meisn. Gener. plant. fascic. I. 307. II. 218)

1. C. (KBAMUEM Linn. fil. Supplem. pj. 81 - Willd. Spec. pi. I. 52) SALBO-LOIDES Rth I. c. t — Funiculus: foil, carnosus lenticulatus lobatus. glaberrimis; racemii terminalibus. calycibus pubescentibus, lubo recurvo. 5 — Crescit in insula Teneriffa.

3084. OTMWAWDRA *Fdu.*

(Pallasi, Her. HI. 712. L. A. fig. 1. - Meisn. Genet. plant. vascular. I. 307. II. Sid. - Cham, et Schlecht. Linnaea II. 500.)

1. G. LONGIFLORA Karel. et Kirii. Bullet. del natural de Moscou XV. 417. - Glaberrima foil, radicalibus. petiolalis oblongis ovalibus, basi attenuatis crenatis aut integris, lubo corollae calycem duplo aut subtriplo superante, labio inferiore profunde tripartito, siliis. tubo subinclusis, lobis acutis. multilobis brevioribus. 2l. — Calyx lobis fissis, apice integer aut levissime emarginatus, marginibus albo-membranaceis ciliatis. Flores albi. Tubus corollae calycem in lobis duplo, in albis triplo fere superat. Ab omnibus congeneribus siliis subinclusis, lobis multilobis brevioribus alque lubo et lobis corollae re ipsa longioribus dignoscitur. Stylus staminibus brevior inclusus. — Crescit in submontibus alpium Alatau ad 0. Lepsa in Sibiria.

2. G. KUWAITENSIS Royle mss. In Bib. Scrophular. Indie. 47. - Foil, radicalibus ovatis subincisodentatis, basi rotundatis angustatisve, staminibus ad basin labii superius brevissimis, stylo stamina aequante; stigmae lobato. 2L — Affinis ^{ideur} *G. Gmetni* Cham et Schlecht., sed spica florum lenior — Corollae labium inferius quadridum, an constanter? — Crescit in India orientali (Kunth)

3. G. CASHMIRIANA Royle mss. ex Blh. I. c. - Royle, Illustr. of Himal pi 201 t 73. fig. 3. - Foil radicalibus oblongis grosse crenatis integerrimis, lobis longo-ovatis, spica breviter ovata, corollis apice incurvis, siliis lobis superius

subsuperanlib, stylo eo brevior 2l. — Corollae labium in fen us saepius biGdum. — Crescit in Cashmena.

- 4 G GME LIM Cham, el Schld. Linnaea II. 561. f — Foil radicalib subrotundo- aut elongato-ovans, basi param attenuatis obtusiusculis, grosse inaequaliter erenatis, siamimb labio superiore duplo breviorib, stylo illo brevior. 2l. — Radii fere digili minimi crassitie undique longtime fibnllata, ad collum peiolis ann praeleriti emarcidis coronata. Caulis crassos 3-21-pollicans ascendens teres simplicissimus Folia radicalia peliolata, none basi viz attenuata, nunc fere subcordata, semper oblusiuscula, margine simpliciter v. duphciter crenata, baud raro obtuse scrrata Petioli 1-3-pollicares, basi dilalati subvaginantes, caulina (m superiore caulis parte) sessilia opposite aui alterna subrotundo-ovalata aut o*ata, radicalibus acutiora, caelerum illis similia el sensim minora in braceas abeunt ovatas acuminates, quorum snperiores saepe integemmae. Spica terminalis bre-tis densissima 1-2-pollicaris, ranus longior, fere pollicem crassa. Corolla coerulea, labio sopenon rotundato aut integernmo, aut emargiato aut tricrenulato, labio in fen ore 2-3-fido Filamenta brevissima, quani labu soperions margioi adnata Capsula oblongo-ovalata parum acuminata 2-loculans 2-sperma. Semina oblonga parum cunula. — *Veronica folia inferioribus otatu crenatis, supertioribus rotunda* Us mucronatis, caule tpica terminal* Gmel. Fl Sibine III. 210. — *tymnandra or at a* Willd Uagz der Gesellschft naturf Frnde zu Berlin V. 305* t 10. fig 8. - (*illd Herb. 261) - *G. reniformis* Willd I c. 390 t. 10. fig 9. — (Willd Herb. 262.) - *G borealis* Yar. Pall Inn III 712. - *Lagotis glauca* Grtnr. Av. comment. Pelropol. XV. 534. t 18. fig. 2. — *Bartsta Gymnandra* Prsh Flor. Americ. bor II 430? — Crescit in Kamschalka, insula Bannngii, in Lnalalschka Aleotorom, (ad oslia II. Colombian?).
5. G. 8TBILLEBI Cham, ei Sohlchtd. I. c 903. t — Foil, radicalib. oblongis, ulrinque sed infra magis ttiennatis aetis, laaequaliter obtuie serratis; steminib fere longitudinaline labii superioris; stylo illo longiore. 3> — Planta gracilis praecedente multo tenuior. Caulis rectus, rarius paullulum ascendens, saepe digitalis, ad summum pedalis, superne foliosus Folia radicalia pauca (1-3) peliolata, in petiolum longe attenuata oblonga acuta, apice basique plerumque intrgrnna. Petioli basi subvaginantes. Folia caulina superiora sessilia p*euo-oppo»iia alter* naque o^ala acula r subacuminata, abeunt in braceas otata* acuminatas Spica terminalis tenuis gracilis, (longibus praecertim inferioribus doiantibus, omnibus non valde congestis, 1-3-pollicaris MI dimidium pollicem crassa Corollae coeruleae labium superius inlegemmm aut leviter crenulatum, inferius 2-3-partitum Stamina longiudiciora fere labii superioris cujus cum margine e minim* parte sunt concreta. Capsula . . . — *Gymnandra minor* m||d. I. c. 393. I* ^ fig 3. - (Willd herb 258.) - *G. deutata* Willd I. e. 394 I 0 fig 4. - (Willd Herb 200.) - *G franks* Willd. I c. 394. t 0 6g. 5. - (Willd Herb. 250) - *Orthocentrus* var Pall I c. - Crescit in Sibiria Inter Lenam et Oceanum el In frigidissimis rupestribus ad sinum Bl. Ltnrenili
6. G PALIASH Cham et Schld. I. c. 004. — Foil radicalib subrotundo- *ul elongato-ovatis aruliusculis, basi attenuatis obsolete crnain ^laminib labio superioris duplo breviorib, stylo illo longior % — Differt ab anifredentibus: stator* sincla majori, folns aut integemmis aul obsolete tanium n Ictier crenatis, Is bio corollae inferior! consumer bilobo, Ucinns corollae omnibus angustioribus* A G Omehm differ! insuper stylo cuerto, a G Strllrn Mamioibus minoribus. *p G. %mU\$nfoum Willd I r 392. U 0 fig I. <V>illd lib. *H) - G Altaic* Willd. I. f. 399. L 0. fig. 2. - (Willd lib. 236 - is ehngala Willd I. c. 305. t 10* Of*7, - (Willd. Hb. V>I, - G. borealis ei arcto ri alpibus Da>urite Pall I. c I *' Af- I- - BMstttf Gfwtnsndra Lino 61 - Crescit in sumrois alpibus Davuriae ** in plaga arctica tibinae.
- 7 G EIBIA Doogl, mis. In Hook Flor Bor. Aroenc. II 103 M 171 (oec 171) - Foil, radicalib. longe pMiolaUs ovalis subcordatis obiu»i». profunde duplicatO' ~~crassus~~Us, Molinis minoribus, superioribus sessilib. sensim in braceas ovatas abeunt -

lib.; spica gracili densa, tola lanatd-birsula; calycib. ntilis; corollis parvis; stamimb. slyloq. longe exsertis. ^ — Radix e fibris crassiusculis simplicibus dehiscentiibus. Caulis erectus pedalis simplex foliosus, superne praeserlim lomenlosus. Spica elongata bracteata. Bractee flore longiores, inferiores majores lanaiae. Cal>x omnino nullus. Corolla parva subcoriaceo-carnosa rabra(?), extus intusque birsulo-lanaia, lubo brevi, limbo profunde quadripartite, lacinia superiore majore, tubus in Ten on bus minonbus inaequahbus, omnibus ereciiusculis. Stamina 2 longe exserta. Filamenta glabra. Antherac magna. Ovarium o vat am lanatum. Stylus gracilis stamina superans. Stigma obtusum. Gapsula.....? — Credit id npas fl. Golumbiae etc. cl in vallibus „of the Rocky mountains" in America boreali.

3085. PICRORUIZA *Royle*.

(Royle, Illusr. of Himal. pi. 201.1. 71. fig. 2. — Meisn. Gener. pi. >ascul. 1.307. II. 217)
1. P. KURROA *Rojle* I. c. — Blh. Scropbul. Indlc. 47. — Herba subcaulis. Folia radicalia oblonga, basi in petiolum angustata, apice serrato-crenata glabra v. pilis paucis conspersa. Scapi nudi erecti. Flores sessileae dense spicati. — *Veronica? Lindleyana* Wall. Calal. 401. — Crescit in India orientali (in Gossain Than el Kamaon, ad Kidarkonta).

3080. OVBISIA *Cotnmers*.

(Commers. ex Juss. Gener. plant. 100. — Melsn. Gener. plant, vascul. I. 300. II. 217. — Poepp. cl Endl. Nov. gener. ei spec. pi. Gbil. I. 2-)

Sectio I. OURISIA *Oommers*.

Galx bilabiali, labio supenore Indenlalo, infenore bifido. Corollae limbus erectus, tubi medn parum ampiiali cl subcurvali vix sexlam partem aequans.

1. OH. MAGKLLAMCI *Gnnr*. (II. De fruciib. cl scmimb.pl. 111.44 1.185. - Poepp ei Endl. I. c. f l. 4. — Gaule repenie; foil, radicaib. cordalo-ovalis ellipticiioe duplicato-serratis longe petiolais, caulinis remformib. oppositis scmiamplexitilib.; pedunculis axillanb. solitriis elongalis umflons; calycis bilabiali ciliai labio supenon trideniato, inferiore biOdo. 2^ — Herba 3-5-poldcaria decumbens parce ramosa. Caulet bati procombenle petiolis annorum praeleniorum ve»mi, dein sirictiuscali, foliosi, folia (aic dicla) radicalia longe petioloU acutluscula inciso-serrata, serraturis dupliealit, ntrlnque eoncolora glabra. Caulea floriferl folia dimidio superanlea, paribus folloram aemlaopleileaalttai pauca muniti. Pedunculi ex axillia fohorum aubfaatiglall teretet ebraealei, pollicarei v. aenquipollicarcs. Flores pulchre cocciol 0 Ifn longi. Calycis labium auperlus iridentaltutn v. breviter tnOdum, inferioria sexiante brevioris laciniae fere ba»in usque liberae, omncs acuiusculae trlnerves glabrae, ad marginem pilis longis albidit riliatae. Corolla mfundibuliformis calyce plus duplo longior, limbi lacimis subaequalibus obcordatis oblusis ereclis v. vix apice palentibus. Capsula subglobota rosirala did)ma membranacea, ab apice loculicldc bivalvii. Scmlna plurima fusi-formia pallide ruTe^eniia. — *Chelone rutUoides* Lino. 01. 8oppl. pi. 271. — Crescit In Chili ausualis Andibus Anlucensibus.

SeeUo IL DIonOHA Oa?.

Calyx aequaliter quinquepariitus. Corollae lmbut patens, tubi reeli cyllndrici terliam v. dimidiam panem aequans.

2. OU. MACROPUYLLA *Hook*. Icon, plantar, t 545. et 546. - Repent: foil, longe petiolatu oblique onrdaiis crenatis; scapo (petiolisq. hirsulis) diphylo; foil, opostliffe o^atis »err.uH sessilib.; umbella prolifera; in\olucro subociophyllo, foliolis lanceolate sorrads; caljre obliquo corollisq. hirsute. 2L — [Herba 14 pollicet alia, scjipus pedalo,) nrciler polhcci infra apicem diphyllut, folia rbnomaUt repentis pctiolis 3- I- pollicanbus, ha%i mrmbranarea longt* pedolata, dilalata temiamplrxiraulia, lamina 2-2' -pollican, 2-2¼ pollirev lata, cordaU serralorenata. Floro< pedunculali (pedunculi I', poll longi) orioni vrrticillati, >rriicillit nuperpotitK, undo ros diccri* poles prolifero-umbHiaiov Corollae laciniae

lanceolato-lineares acutae pilosae, limbi corollae incisuras fere allingentes. Corolla lacinae obtusae rotundatae, superiores binae breviores, inferiori protrahenda Capsula ovalis glabra, calycis duas teretibus allingens] — Crescit in Novae Zealandiae monte Egmont.

- 3 01 IMEGRIFOLIA R Br Prodr 0. nov Holl. 439 (edit N ab E 295) - Glabra caule repente, Toll subovatis integerrimis; pedunculo terminali subsolitano; calyce profunde quinquefido aequali Q — Crescit in insula van Diemen.
- 4 01 COCCINEA Pers Enchir bot. II 100 — Pöpp et Endl I c 5 f - Folia radicalibus cordato-ovalibus duplicato-crenatis, subtus violaceis hirsuto-pubescentibus, petiolis caule villosis, pediculis paniculatis calyce aequali corolla sexies brevior, pilosis 2. — Herba 15-20-pollicans tota villosa brevibus fuscis magis minusve obtusa duplicato-crenata, supra parce villosa, subtus violacea, juniora ruberius, in nervis tunc villosa, 2-4-pollicana, basi vix quadrante angustiora. Caulis sinuatus simplicissimus, rarius ramosus birtus Folia caulina pauca opposita sessilia ovato-oblonga inciso-serrata v interdum sublobata Pedunculi axillares paniculati solitarii v. gemini bracteati nigrescentes pilosi Flores coccinei 10lm longi Calicis lacinae lanceolatae acutae pilosae, fere basin usque liberae Corolla infundibuliformis, limbi lacinae obcordatae obtusae, superiores duae paulo interioribus, tertiam lobi partem adhaerentem Capsula globosa calyce persistenti tecta apiculata paulo major Seroina compresso-plana — *Diehroma eocmeum* Cal Icon plant I 59 I 22 et Annales des sciences naturelles III. 233. f t 32. — Crescit in Chili australis in montibus Antucoinos locis ambrosu ad Omeo Rucuc.
5. 01 PALLENS Poep. et Endl. I. « t t 5. - Poll, radicalibus cordato-suborbiculatis crenatis glabrescentibus petiolis villosis; caule aepertine, pedunculi paniculatis calycibus aequalibus, corollae regularis tubo dimidio brevioribus glaberrimis 4 — Herba 5-10-pollicaris facie *Primulam*. Folia radicalia longe petiolata (petiolis 2-3-pollicanibus) cordato-orbiculata, 2/3, pollic longa ac fere totidem lata obtusissima concolora, ad nervos venasque rufescenti-villosa, caeterum glaberrima. Caulis scapiformis gracilis, apice saepe nudus, paribus foliorum aliquot spatulorum sessilibus profunde inciso-dentatum insinuatim interdum axillaris uniflorus solitarius in racemum (nec paniculam ut ajuni auriores) brevem dimidiatum Flores 7 lin longi carni v albi Calicis lacinae lineariter-ovatae acutae Corollae infundibuliformis lacinae obtusae patentibus leviter emarginatae Capula paulo minor, ad suturas profunde sulcata loculicida. — In Chili australis in montibus Antucoinos locis rupestribus cum alhis Quillay-Leuwo.
6. 01 UPINA Poep. et Endl I c | I 0 - Poll radicalibus cordato-oblongis duplicato-crenatis, petiolis caule villosis; pedunculis corymbose calycibus aequalibus, corollae regularis tubo dimidio brevioribus glaberrimis — *Hec* quadri-epillicaribus obovatis faele *Primitivum*, fusco-villoso Folia radicalia longe petiolata (petiolis 1-2-pollicanibus) obtusa T. obtusiuscula, interdum fere reniformis pollicana, 9 ho lata, supra obscure viridia nudiuscula parve pilosa, subtus pallidiora, ad nervos villosissima Caulis strictus foliorum raris in densis denotum vix • lio. superaniam paribus aliquot in racemum Pedunculi ei foliorum axillis solitarii genite uniflori in corymbum breviter 4-0-florum collecti Calycis lacinae ovatae aculae glaberrimae Corolla 7-0 lio. longa splendidissime, lacinae longioribus lobi obovatis obtusis patentibus Capsula •• Crithrae Chili australis Andium lumino vertice Pico de Pilgae.
- 7 01 MICTOPHTLU Poep. et Endl I c f u 7 - Suffruticosi tiabra foliis ovalibus sessilibus eoque adscissis bracteatis corollae dimidio brevioribus 4 - Saffra rarisissimae 3-A-pollicariae glaberrimae. Caules diffusi. basi inde foliati, ramis erectis secundis, sterilibus saepe obovatis Folia basi remotiora, superiora 4-000 quadricariae Habitu doliidiam laeam longa, ramulorum nigra, fieri •• Ho •• om Uora magis berbacea, lorifloro coriacea glaberrima lacte viridia, ••

Intein subtilissime granuloso-punctata, hinc inde glandule breviter pedicellatis adpersa. Pedicelli versus apices ramulorum ex axillis folio ram simpliciter Mnetiusculi 2-3 lin longi subcorymboso-racemosi uniflori. Lalycis lacinae late lanceolatae sub lenie subtilissime pubescentes. Corolla fere semipollicans roseo-lilacina, limbi lacinae laeviusculae subtruncatae undulatae. Capsula calyce quadrante brevior globosa didyma styli rudimento superata membracea. Scilicet pluma irregulariter oblonga pallide rufescentia. — Crescit in Chili australi in rupibus basalium fissuris ad Tuvu Lcuwu et in Sierra Veluda in Andibus Antucensibus

- 8 OL POI ^ VNTIA Poepp et Endl I c 4 t — Suffruticosa ramis pubescentibus, foliis, utalibus seorsim per panem remolis inembranatis, pedunculis axillaribus. Solitarii — tarsus umbriliformis clongatus; laminibus. — Suffrutex elegans praecedenti affinis eaque omnibus partibus duplo major, basi ramosissimus «puhamacus puberulus, radix apice in rhizoma crassum lignosum et plumbus caulibus arce intertextis conflatum extensa. Caules plures pollicaris laticisquo spithamaci allern ramosissimi dense caespitiosi foliosi, seniles floriferi conformes intermixti. Folia ovata sessilia decussata, paribus invicem ires tineas distantibus, lineam longa obtusa conatae laeve viridia, tub lente pulverulenta punctata leniter pubescentia. Pedicelli 2-3 in ramulorum apice a xii Hares solitarii uniflori folio iriplo quadroplove longiore filiformes. Calycis lacinae lanceolatae obtusae pubescentia fasciculata glandulosa ornatata. Corollae 10 circiter lineas longae nide coccinae infundibuliformis limbi (inclus flavi) laciniae brevissimae rotundatae vix emarginatae paleniusculae. Capsula. . . . T — Crescit in Chili australi in Andibus locis frigidis.

f *Species non satis nota.*

- 0 OL PYNATA Wall ms. ex Bib. Scrophul. Indie. 47. - Piloso-hispida foliis pinnatis; segments oblongo-cuneatis IUCISIS. — Capsula ut in *Stylhorpta* apice uniloculari dicitur, sed in exemplaribus suppetentibus immatura est siccaione nimis compressa. - *Maxus pinnatus* Wall. Calal. 3015. — traxit in India orientali.

3087. HEUPHBAGIA Wall.

(Wall. Transact of the Linn. Society XIII 611. — Melso. Gener. plantar. vasculari. i. 909. it. an.)

- 1 II. HETEROPHYLLUM Wall. I. c. - Wall. TeoUm. fl. NepMess. Illustr. 17. | I & - Bth. Scrophul. Indie. 48. — Caulis fragillimos pedalis v. bipedalis prostratos, per distantiam irium pollicum v. quatuor radiceans, radice simplicibus pallidis fibrillosis, obsolete quadrangularis, epidermide fuscescente secedente Rami pauci, versus extremitatem rauli tenerrime breves indivisi oppositi acutanguli asperuli a partibus articulatis partibus hinc. Folia bifolia. Caulis ovato-cordata subreniformia plana partem membranacea citius marcescentia, opposita ferre amplexicaulia brevissime petiolata unguicularia ad pollicaria, remote, interdum pollices plures distantia oblata acutiuscule et late dentata, lobis baseos Iniegn rotundatis, utrinque pilosula, sublobis triovis leviterque reliculato-veosa, siccate ferre (neque, superiores et ramea ovata v. suborbiculata pauca bracteaformia, illis ter quaterve minor. Folia alia subulato-acerota biv. trilineariter semiteretia, supra foveata pilosula aeola laeve viridia nitida senilia, undique partem, 20-30 circiter conferta In fasciculos rotatos unguicularum breviter petiolatos patentes axillares et oppositos foliis caulibus > terminali Petioli foliorum majorum ||| 2-3-hnearum supra sulcati partem, lineola elevata lenem caulem > ramura ambirnic Slipulae nullae. Flores partem axillares foliorum * u-rmatis fasciculorum, partem insidentibus breviter villosa ebraclpalo Cihx suboralis partem icns dense villotus profunde quinquepartitus, lacinus partem lineam purpureo-acuii». Corolla rotata calyce duplo major infundibuliformi « glabra, lobis obsolete letragoos. roedio tnlialut d, » partem 5- v. ranu 0-fidut admodum obscure bil-M*iuN i e -

atnatione imbnatus, lacimis oralibus obtosis nunc subrelusis, duabus auperio-
nbus parum lationbus. Faux penria nuda. Stamina 4 acqualia parum supra fau-
cem elevata, roedio lubi mserta, aolhens oratis erect is parum connivenlibus,
ulnnoe longuudinaliier debisceolibu* nudis. Pittillum staminibus parum bre-
vius, ovanum subrotundum lae?e, disco bypopno exiguo annulan flavicame
suffulium bilocularc polysporum, oiulis inserlis placentae, dissepimenlo apice
minute perforate) utrinque adaatae, stylus teres b re vis, stigma leviter incrassatum
simplex acutum. Bacca otalo-globosa magmlodine *Pui*, st>lo persistente coro-
nala, suffulta caljce patentissimo, baud acuta foccinea laois nilida, inscnpla
lineis gracillimis impressis goatuor e tertice crociatim decurrentibus commissu-
ras valvarum mentienlibus, cullro difBcilius io tolidem laltula? parlibilis, nun-
quam sponte dehiscens, membrana exterior lenuissima chartacea, me»ocarpium
spoDgiosum pallidum, bast copiosius, verlice tenuius. Dis»epimcnlum incomple-
tum membranaceum tenoissimum, verlice perforatum, hiatu inverse triangular!,
aetale oltra medium baccae deorsom exlenso. Placentae duae nemilunato-bi-
cornes spongiosae convexae, biatui dissepimemi utrinque adnatae ibique con-
fluenles, medio crassiores, sursam atlenualae nigulosae. Semina minuia pallide
ferruginea otata sessilia punctala mox toluti fundumque baccae utrinque occu-
pantia Integumenlum simplex. Penspermium carnosum aqueo-pallidum tenue,
semini conforme. Embr)o dicolytedooeus Radicula centripcta — An ad *So-
lancearum* castra remofendum? — Crescit frequenti^^ime in montibus >epaliae.

3998. LEITOPHYLLIH *Dumb*, el *Bonpl*.

(Homb. et Bonpl. Plant aeqoin II 09.1.100. — Meisn Gener pi. vatcul. I 306. II 217)
1. L. AMBIGUUM Homb. et Bonpl. I. c. — H. B. lib. Nov. gener. el spec pi. II.
300. — Kami sparsl retroAexl. Folia tlllpllea oblnta, basi acatiuscula, 0-11 lin.
longa. Corolla violacea, palato aorantlaco. 6 — Prope Actopao Mexlcanorum.

'ARAGOACEAE D. Don, Edinbrgh. nrwphilos. journ. XIX. 113.

Calyx 4-5-pbyllas persistens, basi bracteatus. Corolla hjpocratenfor-
mis regularis decidua, limbo quadriparttlo patenti aequali, aestnaliooo
coDvolula. Stamina 4 acqualia, sinubus corollac mserta, filamenla bail
barbata. Antberae bilobae, oculis apice omnino confluentibus. Piotil-
lum I. Ouriuro 'bilocularc. Sljlus filiformis. Stigma capitatum iodi-
visum. Capsula quadrivalvio bUocularis, oculis telraspcrmis. Disiepl-
mentum ulrinqae pltccolifenun, denun liberum. Semioa crecla imbneata
compressa, tnargloe rarmbraoaceo-alata, testa membranacea reticulaia.
Albumen copiosom carnooom. Embryo rectus axlllis inclusus. *CotjMo-
noo* obloogae compressor Badicola teres oblusa, cotyledonibus triple
loDglor, iofero. — Fruliceo Novo-Groooleoses facie cupressino ranoslo-
simi, ramis oppositis. Folia quadrifariam imbricata conacea intcgerriiB**
Flores atillares soliuurii substssiks albi.

Tnbus onruUfn *Ptr\$omahs% Polrmomtaent* ft *B%onon%attt\$* pinter affinis, ab hu
•tiK matt (HkBino mtiviso et ral)rt pol)ph\llo, a IHI^ ruHiae r^'jl<i^ atsdvati de convoluta
dwttonitnr. *PoUmommctu*, impnimv *Dtapenstm** roo*nit (im.lla rvnuUr*. aestivatiooe
coovofiu, atofliiaom loatrtwat, scimoitKis aUlts, atUrueo d>>rr(><t ttujaute vwoiQO indiviso
et c,psuU btlvcalan.

3989. ABAtSOA *Uumb*. *Bonpl*. el *Kth*.

(H. B. Kib. Nov. sjtifr. el spec ptoaM. III IK - Mean Grner. plant. vascular. I.
300. II. 117. - G. D<n, General ijtL of gard and boL I\ S37)
I. A. CUP*K*SINA U. B. Kill I. c 140. f I. »0. a. - G. Don I. c flf. 0> ~ * * !,
•quasmoformib. •valo-4elio«deit arete adpresaia, marglne obtolele lanaii*; ****

- corollae villosa. 5 — Corollae lacinae obovatae calycis quoque segmenta ciliata. Antherae cordatae reniformes. Filamenta bati villosa. — *A. juniperinum* U. B. Kth. I. c. t. 210. b. — Crescit jaxla Santa Fe de Bogota.
8. *A. ABIETINA* H. B. Kth. I. c. 150. f. L. 217. — Ratnia glabra; foil, linearib. patulis obsolete ciliatis; corollae tauce nuda. 6 — Kami 3-4-ni Yercicillali. — Crecil Jaxla Gaola Fe de Bogota.

Tribus X. GERARDIEAE Bth. Scrophul. Indie. 48. — Endl.
Gener. plant p. 690.

Corolla campanulata infundibuliformis v. tubulosa, limbo quinquefido, laciniis rotundatis plants. Stamina quatuor, omnia ascendente fertilia. Antherae biloculares, loculis discretae, saepe acuminatis. Capsula bilocularis localice T. septicide bilocularis, falvis indivisis T. bifidis. Semina nucleo aepiasimo intrinsece teatam laxam reuclatam arilliformem minimo.

3000. ESCOBEDIA Af. et Poo.

(Hi. el Pat. Byal fl. Perot. 150. — Helta. Gener. plant, vaaenl. L. 308. II. 810. — Bth. In Hook. Compan. hot Magax. I. 80B)

- I. *ESC. 8GABRIFOLIA* Ri. et Par. L. c. - H, I. Kth. NOT. geogr. et spec. plant II. 371. 11. 174. — Bib. I. c. - Foil, ovatif oblongum, baal eordaila, deotai U. % — (fierba ultra bipedalis strictissima, alplex v. ranoaa, rami aequali hraati. Folia 3-4-pollicaria acutia, 1/3 poll, lata Y. Intardam Uliora, lanceolata, utrinque acuminata Y. elliptica, basi rotundata, Y. subcordata lemiamplexicaula, fere basin usque crenato-serrata. Flos axillares terminales breviter pedicellati, sub calyce bibracteati, bracteae minutissimae ovales oblongae lioea una vix longiores. Calyx tubuloso-campanulatus aequilicariis. Corollae lobis cylindricis iripollcaris, limbus 2/3 pollicet diametro tenet, lacinae aoborbicallarea undulatae obtusissimae aequales. Antherae aequalia. — *Budnera graminifera* Linn. fil. Sapplem. 287. — *SihU ewrUtii** Arrabida, Flor. Fluminena. 1.1. 119. - *AtmfMm* Ineolia andltner. — Creacit in aeopnotia regni NoYo-Qranaienaia Inifr wbeni Mariqalae «t fodinam BaneUnlnat, injUdlbna PeniYUnia ai in Bnalliae proYncia Mnajnm generallam*
8. *ESC. LINEARIS* Schlehtd Linnata TIL MH - Mk. L. c. - Folt tag* Inaari-baa. 2l - Praecedent maxime affinis 404«akpi» modo M. Iia a«alirllölla, aod fofili linearibus facilia dignota. Planu bipodalit cauMf almpot, tafmt rabbit-pdna, aetate calyescena. Folia 4-5-polliearia, t-4% lineaa lau, denticollit remotit Inatructa, In ficcia fere complieau, inferiora breviora obtusiora, baai S-7-nenra, nenris laterallibus debilioribus, mox eYandit. Calyx 8% pollicea longna, denlibua 4-5 lioeas longia triangulari-acuminata. Tnbua corollae ealyce aetqal-polllice longior, limbi diametro bipollieari. Canlia Ima para et radii pulvere croceo t laanria epidermidia quail progrediente tacta, bine et a*mtn Yernacalom *AMifHm*. — *Bnobiii** Umi» Cham, et Sehlehld. Linnata V. I(E — Creacit in Mexico loda graminoali ad Hacienda de la Laguna.
1. *ESC. STRICTA* Zacc. mat. ex Stead. Nomencl. hot (edit 1) I. 508. - Spedet quantum ego ad indeacriptau — Creacit la Mexico.

3901. PHIHOCAJLTX Poki.

(Pobl. Plant Braallens. I. 03. U 51 — Meian. Gener. plantar, vaacal. I. 308. II. £&. - Bth. in Hook. Compau. boU Magai. L. VB.)

1. *PH. MAJOR* Mart. Nov. gener. et spec. pi. Brästl. III. 8. f. t. 801. - Bth. I. r. - Foil, ovalit v. ovato-oblongit obtusit mucronulatis; bracteolit infra floret «ubuluto-linearibus; filamentis glabris; antheris dorsi barbatis. % - Fructului 4-0-podalii erectui, apice ab ipso bati ramoant glabris teretiuacului Y. obtusit ttragono. Raroi »imile«. Folia alterna aut rantealta tuboppositi imbrata III.

- brevissime peliolata scsquellicaria Y. pollicaria crassiuscula corlacea oblusa rolundala, nervo medio ID mucronulum excurrente, utnque giabra laevigata integemma Flores speciosissimi in racemum icriminalcm densum v. laxiusculam semipedalem v. eliam loogiorem digesli. Bracleae pedunculorum longiludine semipollicares Pedunculi axillares et supraaxillares, supra medium articulati bibracleolali, bracleolis linean-selaceis. Calyx pollicans pulchre mimalus tnbuloso-venlncosus glaber, denlibus inangulari-acummatis. Corolla calyce longior pulchre coccinea subcurvala glabra» limbi lacmia subroluodala aquales, deinde patenti-reflexae, lubus fulvescenti-pubescentis. Filamenta glabra, antherae dorso barbatae Capsula . . . T — Crescit io amoenis campis subalpins in Brasiliae provncia Adamanium.
2. PIL. MINOR Mart I. c. 4. f I 90S. - G. Don, General syst of gard and bol. IV. 502. no. 2. fig. M. — Bib. I. c. — Foil, obovatis aculiusculis, bracleolis infra Oores subulatio-lineanb; filamentis glabns; anlbens dorso barbatis. 2I — Fruliclus 2-4-pedalis, inferne simplex, superne inordinate ramosus. Rami obsolete lelragom, spongioso-corticati longitudinaliter rimosi, cicatrfcibns foliorum delapsorum orbicanbus insigmti. Folia vix brevissime peliolala arete quadnfanam imbricata unguiculana, 4 lioeas laia, obovata acolioicola nee latnen mucronulala coriacea crassa, utnque glabra, subtus pallidiora. Flores inter folia suprema sparsi axillares. Pedunculi pollicares pubescentes medio articulati bibracleolali, braeteoln spalbulato-lanccolalis Ires lineas longis, unam latis. Calyx basi valde inflatus, ore contractus, inde ovatus, unciam longus, glaber, pulcherrime sed dilulus quam in praccdenle mimalus, denies ovalo-lnangulares, supremo majori. Corolla e calyce parum eminent pulcherrime coccinea, limbi hypocraleriformi-palenlia Ueinae of alo-orbicaUroa, exloj gUndulosae, margiue pilosulae. Filameota ban! villoanla, anllee glabra, aalfcarao f labrfosculao. Capsula ad summons uocialis coriacea ovalo-oblonfa ae«U bruwea bivaWis. Semioa plurima oblonga compresso-scobiformia ffatca sesquilioc«m longa, densissime imbricata. — Crescit in altis campis in Brasiliae provincla Adamanium.
- J PH. AURAMUCI'S Pohl, Plantar. Brasil. icon, el descnpl. I 05 | t 53. - Bib. I c. - Rchb. Flor exotic, t. 293. — Foil, obovato-elliptich, bracteolis infra flores oblongo-lanceolahi, filamentis »uperoe anthersq dorso villosis % — Caulisfructificans prdalis ramosus ereclus aphyllus soberosus, rami erecti subdicholomi mermc> fulio»i Fulia ^ensilia crassa coriacea alterna imbricata ovali-cllipicalulcgrmmd oblu^i glabra, supra nitida, subtus lulco-imdia 0-0 lin. longa, 4-0 lin laia Pedunculi sohiani aullares Irrminalesque uniflon ^ad If lin longi) ad medium bibracteali, bractee oblongae aculae. Calyx subincunratus inflatus aurantiacus corolla bretinr, ore anguslalus obliquus el inaequaliier quinquedenlatnft 13 lin longus, 7 lin diamctro lenens. Corolla labulosa incurvata calyce longior, lubo apice InOalo, ore contracto, limbo quinquelobo, laciniis roiundalls, impaH infenore obcordata reliquis majori. SUMina didyoama, supra medium cum aatheris piloto-barbata. Capsula coriacea elllptico-acuu glabra Ian is, ad suturaf impretaa cano-brunna sempollicaris Semina numrro»i»»ima lonRi««iima pa'' leacea ferruginea — Crescit in montmm verticibus loris glarrom pctrosis Inl* Rio Jeqollnboaba el Silio Colombi in protincia Minarum Generalium Brasilia**

f *Specws 0 genere excludenda.*

PIL. RUIXAMTHOIDES Cham. el Seblchtd - MKUHVA **RHINANTHOIDES.**

3002. MELIMII t *Bergtus.*

(Dergius, Flor. Capens. Itt. t X fig. 4. - Me no hener planur vascular. I. W* ''' ttO. — Bib. in Hook. Compan. bot Magai I. 301.)

I. II' UISPIDIM Bib. I. c - Piloto-bispidam* foil, laoeolalis subdenUlif. ^{bas} angastalis, padyaculit aplice bracteaia. * — Tola plaola pilis albls rigidla ^{ble-} pid* (oicpUs corolla el eapaola), pilonim call pormanenles, node tola fil P^l***? - Mparrima, Us lit iripoUalla Ictiior quadrangylarit, tonenic pare* ramosus. rolls

inferlora alterna, superiora subopposita, breviter petiolata lanceolata acuminata, basi longe attenuate, integerrima aut sinuato-denticulata, cum petiolo quadripollicaria, ultra pollicem lata. Folia superiora sensim minor deinde in bracteas abeunt anguste lanceolatas. Flores axillares pedunculati pseudooppositi bibracteati, pedunculi pollicares bispidi, apice bibracteolati, bracteolis lanceolatis patentibus reflexisve. Calyx 9-10 (in. longas, dein auctius ultra pollicaris campanulato-pentagonus 5-fidus, laciniis triangularibus submucronulatis. Corolla glabra fere sesquipollicaris oblique subventricosum-campanulato-infundibuliformis, lobis ovalibus obtusis integerrimis. Capsula subglobosa paullulum compressa, diametro semipollicari. Semina elongato-cuneiformia $1\frac{1}{2}$ lin. longa. — *Lyncea hitpida* Cham, et Schlicht. Linnaea V. 100. f VIII. 24. — Crescit in Mexico in sylvaticis prope Hacienda de la Laguna.

2. M. (PHYSOCALYX Cham, et Schlicht. Linnaea n. 23. t) RHINANTBOIDES Bth. I. c. — Scaberrimum: foliis oblongis subdentalibus, basi vix angustatis; pedunculis calyce brevioribus. medio bractealis. 2. — Bipilbamaeum, bipedale v. elatius, facie et inflorescentia *Rhinantho* baud dissimile: caulis erectus superne ramulosus dense pilosus. Folia pseudo-ovoidia, basi trinerviata, marginibus subsinuatis denis Iriaogulares baud erebri interdum obsolete, caulibus maxima • ubripollicaria, vix semipollicari latitudine, folia superiora sensim minor. Pedunculi axillares solitarii uniflori ('A-y_t poll, long!) medio bibracteali, bracteis lanceolatis parvis. Calyx exilis scaber, inus molliter pubescent, quinquestratus et quinque-dentatus, dentibus triangularibus acuminulato-mucronatis, dorsali paullulum minori, florifer lubuloso-campanulatus semipollicaris, fructifer valde inflatus physaloideus, ad pollicis longitudinem vix excresecens. Corolla limbo calycem superat, tubus breviter curvulus, limbi lacinae subaequales rotundatae obtusae ciliolatae. Capsula a calyce inclusa coque multo minor compressoglobosa, semina minuta oblonga. Calyx purpurascens-nigrescens. Corolla purpurascens. — Crescit in Brasilia.
3. M. SCABRUM Bergius, Flor. Capens. 102. t 3. fig. 4. - Bib. I. c. - Foliis lanceolatis, basi latioribus. dentatis scabris; pedunculis calyce longioribus. medio bracteatis. 4 — *Gerardia Aigrina* Uno. 61. Supplem. 878. — *Nigrina vitcota* Lion. Matiss. plantar. 42. — Crescit in Promontorio bonae spei.
4. M. ZETBEBI Hook. Icon, plantar. L 2U. — Foliis ovata subtrifido-laciniatis scabris; floribus in axillis superioribus. foliorum bibracteatis laciniis calycinis lanceolatis; antherarum loculis longis alme reamrnt; ovario bino gttoboto. % — In Promontorio bonae spei crescit.

3003. EBTEBHAXYA *Mikan.*

(Mikan, Delect. faun. cl (lor. Brasil. US. — Meisn. Gener. plantar, rascul. I. 306. II. 210. — Bih. in Hook. Compan. bot. Magax. I. 203.)

1. E. (VIRGILAUJA Mart. Nov. gener. et spec. pi. Brasil. III. 7. f L 903.) CAMPFSTRIS Spix et Mart. Reise durch Brasilien I. 397. — Bth. I. c. — Foliis lanceolatis • oblongo-lanceolatis mucronulatis, basi contractis nervibus, floralibus pedunculosis soperantibus; racemis simplicibus. 6 — Frutex pluricaulis tri-quadripedalis Irregulariter ramosus. Ramuli obscure tetragonati, ramuli similes oppositi aut alterni, foliorum cicalricibus exasperatis. Folia alternata aut frequenter opposita decussata brevissime petiolata 1-1' A-pollicaria, 3-4 un. lala lanceolata v. lanceolato-oblonga, utrinque attenuate, mucronulata minutissime serrulato-scabra Y. in exsiccatione subcrenulata, nitida opacave glaucescentia. Racemi terminalis simplices v. rarius obdivarum ramorum ramoni. Pedunculi axillares 4-h lin. longi ebrarnti. Calyx campanulato-cyatbiformis (3 lin. longus) dentibus triangularibus roanmiudino variis. Corolla pollicaris v. longior carnea coccinro-mucronulata (versus limbum frequenter; exlu* ICIUIUT lanata. Capsula in calyce distincta persistenter. deinde irregulariter Rs*o o^ata nigrescens; fructu nummulari irregulariter »ubruneo-quadrala. - Crescit in Uramliae rimpU, Inrin »ub»turfo et in arenosis irriguit 'ad praedium Slac. Ilarbarac baud procul a Huuntf

Sapucaby, baud procul a Villa Ricca et oppldo Tejuco) lo protincla Adamanlio
el Minarum Generalium.

2. E. (YIRGULARIA Marl. Nov. gener. el apoc pi. Brasil. III. 0. f L 201) MONTANA Spix et Mart. Reise io Brasil. I. 307. — Bib. I. c. — Foil linearib., olriog. acutis QDinenriis fasciculalis, floralib. calyces soperanlib.; racemis composills; geotalib. exsertis. i — Frutex ex ima basi dhrisus in plures ramos 2-4-pedales ereclos obsolete leiragoDos irregulariler ramulosos, cicalrissalo-asperos. Folia linearia uoguicularia polliraria T. longiora, quam inlernodia doplo longiora, sesquiliocam laia_r opposiia decassata ramisque aiillaribns abortieDlibos fasciculata, sub leole minolissime denticolala caniosola, infra pallidiora. Flores axillares solitarii pedunculali, in racemnoi lermioaJem collect!, pedancoli 3-4 lin. longi ebracieali. Calyx qoam praecedeolis angosllor, dentibus triangulari-aculis, inierdum apice albo-barbalia. Corolla ondalls pnrporea *sobllilissime puberula, ioius paoclis maculisque satorallorlibos nolata, e lobo cylindrico infoodibnllformi-dilalala, laciniiis snbqoadrato-oblongis, antlce rotondallf reflexls, sabllliler ciliatls. Capiula 3 lineas longa. - Gerardia caesarem Chan, et Schlcbl. Linnaea III. 17. f - In moolibas provincise Minarain Generallon In Brasilia.
3. K. (VIRGULARIA Mart. I. e, III. II.) SPLEJIDIDA Mikan I. c. - Btb. I. c - Foil. anguste lanccolalis acutii In petiolnm angstatls; racemo subsimplici paucifollo folioso. 5 — Kami obsolete telragoni, cicalrisati lineisque protninenlibos a clca-Iricibui decurrentibus elegaoter excolptf, janiiores foliosi. Folia pseudoopposita peiolata anguste laoceolala, aobinde breviler cuspidata. Folia adolta (cam petiolo) 1-1% poll, looga, S lin. laU. Pedaculi axillares solitarii opposili oniflori (4-5 lin. longi). Calyx ebracteatna easpanalatoj 5-denUtos. Corolla lubuloio-inrondttHUifoniis emiu, lloabl profiJide qvlaqielobi lacinlae otaue ebtnsius-calae dllaUe. Ptlameau baal aptoeqoe vtllloslaalnia. Corolla ad filamentoniid Insertionesi rillosissiaM, caeterasi glabra, Capevla ovoidea qnadrYaltls. Sesalaa nmmeroaa panra saepe abortifa. — Gwrdi* (Dmrgeria) gttidioidu Cham. et Schlcbltd. Linnaea III. 16. f — In Brasillae aeqnlnoCualis provlncla Babiensi.
4. B. (GEBABDIA) MACIODONTA Ckam. et Schlchtd. Unnaea VIII. 90. t - Bib. I. c. — Foil, laaceolalis, basi angoalalia, apice acotii nucronalis; paocala ternioali pyramidau comosa; ramolis bifloris comosis; pedunculis folia ramalosq. kuperaniib.; denlib. calycinis snbolalo - acaninatls. 5 — (Descriptio et diagosU ex specimine unlco). — Ramos obsolete telragonus eleganter cicatrisalo- retleo-latoa, internodlis inferioribas (i-3 Ho. longis) bretibas, sarsum elongatis (9 Ho-loogtf). Inflorescemiam versas Mia per ramonim abortom tabfasdcolau. Ramos axilis sopra inlorescemiam lateralen eloagalos no?ellos steiilis. Pedacali I*-retes glsbri 0 lineas longi. Calyx obeostfco-eyllndricos, praeler margioem vlllo—snlom glaber qotaqveOntatnt, somlpoWee fix bretlor. Corollae sesqnlpollcarli laeinae eilialae, ttrnqve gUbrao exlmie awHssim^pie aeamlnaue, Anibera* albo-Unaiiae, HasMoU mi — wli-fttsat. CapenU. . . . f - In Brasilia tropic*

t Sptctu § Q***r\$ \$sp\$sn*nda.

1. ALPISTEIS 8pli et Mart. - GBIARDU BâUCOYPIYLLA.

3904. MACRANTHERA Tomy.

(Tomy, Ann. Lye. Hew York IV. 80. L 4. - Meisn. Gener. plant vascul. I. 308. H* 111. - lift, In Hook. Compan. boL Mag«« I. «X)

1. M. (COHRADU Rntt. Joam. acad. Philad. VII. m. t li.) FUCHSIOIDK8 Torr.Jr «. - Bit. I c - HmU 9-4-ftotfaUo nnneniU. Follomm sofnionu IMOOOI|^ taftrionssi linrani dlrita. sUeeaina lonfos nallateralis. Pedoncoli opposiU r- Iraus ?. siâtsiaai Fiona areetl. Corolla polllearis, apice sobincorra, ore abli-qno. StanUaa nojianonHa, 9r - CfeaeU In Americao boroalis elitatibM a nora-lionlMM (Looiaiana).

- «. *M. ULCONTBI Yen. at Sitnd. NonMML. botta. U. 88. - Spedes mIM laaofa^ - CnaeH In Alafceaa.

3995. SEYMEBIA *Pnh.*

(Prsh. Flor. bor. Amerlc. II. 737. — Melsn. Geor. plant, vasclar. I. 306. II. 220. - Btb. in Hook. Compan. bot. Magai. I. 903.)

1. 8. TENUIPOLIA Prsh. I. c. — Bib. I. c. — Tenoissime vl^cido-pubescens: foil. setaceo-pinnatifidis, laciniis indsis; capsulis glabris rostratis. % — Rami graciles. Folia dislanlia parva. Corolla semipollicem circiter diametro habet. Capsula grani *Piperit* magnitudine, rostrata, rostro ipsius longitudine. — *Afielia* (*Gerardia* Pers. Encbirid. botanic. II. 154.) *caaioides* Gmel. Syst. natar. 927. - *Gerardia Afielia* Michx. Flor. Am. bor. II. 90. — Crescit in Carolina, Geosgia, Louisiana etc.
2. 8. PECTIXATA Prsh. Fl. Am. sept. II. 787. - Btb. I. C. 804. - Pubescens: foil. plnnatifidis, laciniis linearib. oblusis,* subincisis; capsulis pubescentibus. obtusis. ^ — Folia magna eorumque lacinae quam praecedentium multo latiores. Capiua major, compressa obtusa emarginata. Corolla.T — Crescit in Louisiana et in Carolina australiori.

t *Specks* < *g\$nm \$xp*U\$ndae*.

8. AURICULATA 6pr. - GERARDIA AUBICULATA.
8. MACROPBYLLA Nutt. - GERARDIA MACROPBYLLA.

3990. fJEBJUUMA *Lkm.*

(Linn. Gener. plant 747. — Heist. Geatr. plant vascul. L. 30B. II. BO. — Bndl. I. c. eicl. sect. e. — Bib. In Book. Comp. bot. Magat. I. 904. axel, actionib. V. et VI.)

SecUo L 0TRT00D0V BUL In Hook. Obaipuu bot. Hafts. I. 204.

Calyx profunde quinquefidus. Corolla flava, tubo saepius brevi incurvo. Antherae mulicac/loculis duobus fertilibus. Species omnes Boreali-Americanae.

1. G.? SERPYLLIFOLIA U. B. Klh. Nov. gener. et spec. plant III. 343. - Bib. I. c. 904. — Procumbens: foil. ovatae oblusae integerrimae; floribus axillaribus solitariis sessilibus; laciniis calycinis integerrimis. 6 — Fructulos undique glabres. Folia circiter 2 lineas longa. Corolla glabra pallide lutea sublaeviformis, tubo calyce triplo ecedente. Umbrae Officinarum glaberrima. — Crescit locis temperatis Novae Hispaniae prope Carolum et la Uttote toeve 8U. Ckriatepkeri.
9. G. PROSTRATA H. B. Klh. t. e. - Bib. t. e. WL - Preteritax ML p4amiUMla, laciniis linearibus. aete meronaOs, tJariefuY. teelalat Betib. axUtaHb. aakeollat rills sessilibus; lacinae ovatae subdentatae; corollae tubuliformis, tubo calyce triplo ecedente. Umbrae Officinarum glaberrima. — Crescit later Pachocam et rontem Veolio In Nova Hispania.
- a G. VIRGATA H. B. Klh. I. c. 344. — Btb. I. c. - BreCU tIrgato-ramosa pubescens: foil. pinnatifidis, laciniis (spatulato-)linearibus obtusis (acuosis) Inlegris (T. inferioribus) incisif; laciniis calycinis oblongis Inlegria denutisq.; corollae (aurantiacae) tubuliformis; antheris ereclis glabris; capsula ovata acuta. 2. — Corollae tubus quam sequentis longior magisque incurvus. Filamentum dense lanatum. — Crescit prope fodnam Yillalpando Inter Guanualo et Santa Roia Mexicanorum.
4. G. (SEYMERIA Nutt. Gener. plant Americ. n. 40.) MACROPBYLLA Blh. I. c. - Pubescens: ML. Inclso-deolatis pinnatifidistis f. Infilms blpnnatittdts, lactnls otato- V. oblongo-lanceolatis, inprent lobIntegenimli; floribus subsessilibus; calycibus hirsutis, laciniis ovatis subdentatis; corollae tubo brevi incurvo, iniis trilobis; staminibus didynamis; antheris pilosis. ^ — Forma et colore corollae antherisque obtusis accedit ad species praecedentes. NaUUII ambras gUkru esie dicit, uprcimina aulem sicca aniherae pilatusculis ostendunt, sed quoad planam circa valde compressa est, difociles erunt antherae dimjuncioni a pills corollinae. Habitu accedit ad *G. grandifloram*. Antherae filamentorum breviorum parum minoris esse videtur. Captula (ex Nutt.) parva teotriosa compr^ssopliculatae snbquadn^abis. - In America? borcalu civiuihui Ohio et Kentucky

Seetio n. OTOPHILLA BUL L e. 205.

Calyx profunde quinquefios. Corolla purpurea campanulas. Stamina didyoama, antheris longiorom ferlilibus, bre?iorom minoribas cassis.

5. G. (SEYMERIA Spr. SysL YegeUb. II. 810.) AURICULATA Michi. Flor. Am. bor. II. 48. — Blh. I. c. — Herba erecta: foil, oblongo-lanceolatis, basi saepios aurlcalato-lobatis; florib. subsessilibus. 2]. — Crescil in civilalibus occidentalibas Uoionis Boreali-Americanae.

Seetio m. PIDIOLARI0DB8 Biñ. L o.

Calyx semiqninquefldas. Corolla flara tubuioto-campanulata. Stamina didy-nama. Antherae subaeqoales, locolis binlf fertillbni, basi calearatis. — Herbae Bo-reali-Americanae foliis laiinteolis Meploa Ineisis. — Corollae lobi saepissime ciliati.

6. G. FLAVA Pnb. Flor. Americ seplentr. 1U423. (nee Linn.) - Blh. I. c. — Pu-betcent: foil. oYato-laneeolallt oblongisve obtosis integerrimis •. sinualo-lobatis; calycis pabescentis laclniis oblongis oblusis, tabo subbrevioribns. 2} — Corolla sesquipollicaris glabra. - Pluken. Phytogr. t 380. 6g. 1. — In America boreali.
7. G. Q'ERCIFOLIA Prsb. I. c. - Bib. I. c - Glaberrima: foil. Inferiorib. amplis b^ppinnatifidis, superiorib. oblongo-lanceolaMi plnnatifidis inlegerrimisve; calycis sabinflati laciniis lanceolalis acatif, tobo brevioribus. % — Corolla major quam praecedentis. — G. /lava Linn. Spec, plant 848. (nee Prsb.) - *Rhinanthus Virgi- uicus* Gronov. Fl. Virgin. 102. — Crescil folgaris in America borcali.
8. G. GRANDIFLORA Blh. I. c.,900. — Pobescens: foil, ovato-laoceolatis aculls, apice serratis, basi pinnatifldis; calycib. pedicello longiorib., laciniis obtusis in- tegerrimis deniatitre; corollif caljee quadrnplu loogioriboa. 2} — Corolla 90 lin. longa. Capsvla corlacea magna apenlata. Intermedia quasi Inter praecedentem et neqoeotem. — Crwell In Mexld proTlnela Tetaoa.
9. G. PEDICULARU Lias. Spec pUftiar. 870. — Bib. I. e. - Glabrlnsclra T. pn- betetvs: foil, ovalo-laneeolatis obtvsls p>innaUfldis, laciniis denutis; calycib. pe- dicello breviorlb., laciniis dentatis; oorollis calyce Iriplu longioribus. ^ - Co- rolla 15 lineaa longa. Capsola coriacea apiculala. — Crescit in America boreal! commanis.
10. G. PECTINATA Torrey mss. ex Bth. I. c— Hirsuta: foil, poclinato-pinnatifidis, lobis subdentatis; calycib. brevissime pedicellalis birsulissimis profunde quioque- fidis, laciniis dentatis; corollif calyce iriplot longioribus. 2I — Corolla omnino praecedentis, a qua differt birsuie densiori, foliis minoribui magisque dltisls pedunculisq. mullo, brcvioribus. — G. *Pedicularia fl. peclimala* Null Gener. pi* Americ. II. 4A. — Crescit in Carolina, Georgia et in .the Rocky mountains*.
11. G. DEMSIFLORA Bib. I. c. - Glabro-bispida: foil, pinnatifidis, lacimis angosta lineanb. aculis rigtdis ciliato-scabns; florib. ttenndis »ptcatis; laciniis calycinii lanceolatii aculissimit; corollae tnbo basi alleoualo, apice dilaUtf; capsulis ob- lusus. 4 - Corolla pollicaris. Filanenta pilota. Antherae sectlonis *Eugerardif* sed acutiores, basi pilosulae. — Crescit In Metici provinda Texana.

feette IT. BOTTAURDU Bth. L e. 206.

Calyx qvinquedenlatof, rarius smiquincoefidos. Corolla purpurca campanulaU T. tuboloso-campanulala, rarius lenlrieoso-tubulosa. Antherae subarquats, locn* lis binis fertilibns niutiri«. — Ilrrbae suffratice^^r AuMro- rl Borrari-Aineraicai, foliis lioearibus v. raiiu« lanceolatis integrrrimis %. inflmis raritsime incUis.

- 9 Csrtlto —+U c*mp*m*Utm r. tuMoio-campomulata nilosa. - Urrba* ~~Urrba~~ Ue*9T9 Amstro - Americani.

12. G. DIGITALIS Bib. I. e. - Glabra: foil, lineanb. lae%iosculi>; florib. ^{sub*ef>}lib.; denilb. calycinia brevib. truncalis mulieis, marginc «illo»iMimi>; corom ample caaauMlaiu villotis, calyce quadroplo qoinloplove longioribus. * - F₁o* ret In spica* terminals Iniempua dispoaiii, folia floralia minima. Calyx *: »«*• Corolla olira pollioaria paltf)lit#i>a. Forte frnliclnls bumilit. - Cre#⁰¹¹ la AaMrtea anairall (MaMonado).

13. *G. RIGIDA* Gillies mss. ei Bib. I. c. — Glabra scabra: full, linearib. acutissimis; florib. racemoso-spicatis; calycib. pedunculo longiorib. Imnctiii, deniib. brevib. aealis; corollis ample inbuioso-campanulais villosis, calycem qualer v. quinqu'ea excedentibus. 2]. — Flores ejusdem magnitudinis at pilosiores quam *G. linarioidut*. — Crescit in Americae australis provincia St Louis.
14. 6. *BRACHYPHYLLA* Cham, et Schleichd. Linnaea HI. 15. t — Bib. 1. c. — G. Don, General syst. of gard. and bol. IV. 557. no. 14. fig. 52. — Frulicoia glabra lacvis: foil, parvis angusle lanceolalis mucronulatis; florib. pedunculais; dentib. caljcinis brevib. acutis, capsula ovoidea brevionbus. 6 — Caules pedales v. cubitales parce irregularilerq. ramosi cicatrisali, cicalricibus icrnis opposilisq, internodiis 2-3-lincanbus, rami hornolini foliosi. Folia subopposita, superior* allerna, internodu* paullo longiora aessilia mucronulala carnosula, 4 lin. longa, lineam lata. Flores in summiialibus axHirfres solilarii pedunculali opposili alicrmque. Pedunculas folio suffulcienlc brevlor nudus, fructifer incrassalus. Caljx campanulais decemnervius. Filamenia bail paree pilosa. Aniberae glabrac. Capsula calyce duplo fere longior loculicide dehiseena. — *Eslerhazya* (*Virgularia* Mart. Nov. gener. et spec. plant. Brasil. HI. 10. t t- 805.) *alpestris* Sptx el Marl. Reise nach Brasil. L 307. — Crescit in Brasilia tropica.
15. *G. (VIRGULARIA* Ri. et Pav. Syst. vegeL flor. Pern*. 161.) *LANCBOLATA* Blh. I. c. 207. — Glabra laevis: foil, oblongo-lloearib. mucronalis, basl angusiat; florib. b re viler pedunealatis; dentib. calyclnis brevib. acutis; corollis ample tubuloso-campanulatis villosis calyce quadruplo longioribui. 2I. — Praecedentll quam maiime affinis forieque ejus various erit habenda. Differt foliis latioribus (praecipue versus apicem) longioribusque. Anlherae et filamenia glaberrima - *Virgulana revaluta* Rz. et Pav. I. c. — In Pennia inler Huariaca el lluanuco.
16. *G. LINARIOIDES* Cham, el Schleichd. Linnaea III. 13. t - Blh. 1. c. - Glabra scabnuscula: foil, luicanb. aculis unineniis; florib. racemosis; ral)cib. pedunculo broionb., dcnlib. o\alo-lruncatis lanceolalise aculis, tubo multo bre\tonb; coroliis ample tubuloso-campanalatis pubeiceniib., caljce quadruplo v. quinluplo longionbus. ^ — llerba cubilalis; caulis ramiquir medullosi tetragoni virga(i; limis decorrentibus a folioram Insertlone notatis, folia ramulique anboppositu. loternodia ad summum sesquipollcaria, sursam multo breviora* Folia aeasllia linearia acuu S/\«-pollcarla» « lin. la u, tuprema minors. Floret p^dancuUii, aiillared solitarii aubracemosl. Calyi 10-striatoa easBftanalatos 3 lin. longa*, fructifer ampliatus. Corolla eitus pubescent, limbo glabrtaetsita dllalo, r lubo breu oblique campanulas, limbi lacinife rolundaue. FilamenU paree VMiom. Capsula 3A lin. laia calycem soperans. Semina minula angulala. — Tota planla sicca mgrescii. — Cre»cii in Brasiliae provinces mendionallbus.
17. *G. GEMS1 4KFOLIA* Cham, el Schleichd. I. c. 15. f - Blh. I. c. - Tola glabra scabrella: full, lanccolalis acutis sublniicmis; florib. racemosis; calycib. pedunculo bretiorib., drnlib. o\ aio-lruncaii lanceolatis\ e aculis, lubo mulio bre^io-rib.; corollis ample tubuloso-campanulalis pubetccnlth., ealyce 4-5-plo Ion-gioribos. % — Caules vlr gati ramis foliisqoc vrllicillalis dense vctstlii, Imni a foliorum insertlone decurrentibas subheiagoni Folia sessflia lanceolata acuta, margine scabernma, internodiis multo longiora, maiima caulina 2/i->pollicaria] 5 lin. Iota, ramealla multo minora, opposillone perturbata sparsa evadunt Ftores apicales solitarii axillares pedunculali. Pedunculi 3-4 lin. longl flore terminali bractcinque binis anlla flonferis inntucli. Calyx brevis quinquedentatui. Corolla praecedentit speciei. Filamenia basi apiceque villosa. Capsula. . . . ? - t m c - cando nigrescit. — In Brasilia meridional!

*' *Corolla tublubuhta fere glabra, — llerbae Aiulro-Americanae.*

- ,18. *G. ANGISTIFOLIA* Marl. Nov. (irncr. el spec. plant. III. II | t. S». - Blh. I. r. — G. Don, (irniT.il «»)i. of gard. and bol. |V. V>7. no. 10. fig. 5J. — Prrennit llabernma caulc crccto mg.iio-tamoso, full ultra pollicanb. anguMe Imeanb

acutis crecto-patulis; pedunculis ebractealis folia subaequantib.; calycis aequali deniibus mucroooculis; corollis calyces quintuple- superanlibni. 2} — Caule* plures cubiales et bipedales obscure tetragon! glabri, linea decorrente ab Insertione foliorum utroque latere notati. Folia opposita sessilia anguste linearia acuta l-l'A-pollicaria, internodia ultra duplo superantia, tix semilineam lata subglaucescentia, eisiccata inflexa. Flores pedunculati axillares, pedunculis sesquipollicares. Calyx campanulatus 2 lin. longus T. longior. Corolla pollicaris membranae violaceo-lilacina, e tubo brevis infundibuliformi ampliata, limbi lacinae suborbiculares tix inaequales. Capsula duriuscule membranacea 2'A-3 lin. longa oblonga nigricans, loculicida (ultra medium) bifida. Semina cuneato-subquadrate nigro-fusca. — In humidis praevalentibus in Brasilia.

10. G. MSPIDULA Mart I. c. IX t t 207. - Bñ. I. c. - Annuæ, patenti-hispida: caule fasciato-ramoso; foliis, ultra pollicaribus linearibus acutis palulis praeerlim margine papillois; pedunculis bibracteatis folia superantibus; calycibus aequalibus deniibus acutis; corollis calyce triplo longioribus. Q — Caulis pedalis aut cobulibus obsolete tetragonis, ad ramificationes parum incrassatus purpureus, parce pilosus. Folia opposita sessilia acuta, infera 9-pollicaria Y. longiora, 1/4 lin. lata, superiora sensim breviora papillose blabidula. Pedunculi axillares oppositi Cliformes, inde latissime racemosi, medio bibracteolati, bracteolis linearibus subalatis aut linearibus lanceolatis. Calyx campanulatus aequalis 2-3 lin. longus, denibus in angularibus acutis. Corolla pallide rosea calyce triplo longior tenniseae laevigata, sursum curtata ampliata, lacinae suborbiculares. Capsula oroides membranacea nigricans, 4 lin. longa y In calyce ampliata sessilia. Semina cuneato-oblonga fuscantia. — Crescit in caespitibus palmaribus in provinciis Piaubiana et Paratensis in Brasilia Meridionali.

sa G. COMMUNIS Cbaai. tt Schluh UL 19. t - Bth. Le. - Glabra laevia: floribus subsessilibus; dentibus calycibus tubo longioribus; corolla tubulato-campanulata denibus calycibus broiler excedente. O — Pedalis bipedalis T. eliam altior. Caulis obsolete tetragonus lineisque dearsenibus sulcatus, striatus, infra nudatus, medio ramis subfastigiatis insiratus. Internodia pollice plerumque breviora. Folia sessilia linearia acuta oculo nudo vix cartilagineo-crenulata ne tamen strabra, caulibus internodiis longiora, bipollicaria, tix linea latiora, ramea et floribus breviora, pseudo-opposita, numquam sparse. Flores axillares subsessile solitarii subspicati, pedunculo lineam longo. Calyx 10-striatus quioquefidus, lacinae angustissimae linearibus, tubo corollae brevioribus. Corolla obliqua tubuloso-infundibuliformis, limbi subbilabii lacinae rotundatae obtusae. Capsula compressa loculicida dehiscent (3 lin. longa, vix 2 lin. lata) subobliqua. Seal** nigrescens dilitica. — Crescit vulgariter per omnem Brasiliam.

** Corolla subcampanulata gastra tel Irriter pubescentis. - Jfrtat Bortdir Awtrietmt,

t Pedunculi calyce breviores, denibus calycibus elongati.

21. 6. DASYSTHA Schiede et Deppe, Linnaea V. 101 - Caule bifariam pubescente; foliis linearibus glabris; dentibus calycibus tubo longioribus; corollis extus pubescentibus, calyce subduplo longioribus. ^ — Ex habitu affinis est (7. purpur***) - Folia glabra, maxima pollicaria, lineam laevia. - In Meici Terra (ria).

& G. BETAOPHYLLA Hart Transect of the Americ. philos. Soc V. 180. - ** 1. c - Glabra: ML radicalibus, UUs iacis, caulibus linearibus v. Uacari-lanceolatis acutis rigidis, margine teabris; floribus subsessilibus; calycibus angulatis, deati lanceolatis-sj<trib. acutis, tubo parum brevioribus; corollis ample campanulatis, eitis f-i-tost pubescentibus, calyce triplo v. quadriplo longioribus. * - Corolla patens 8 lineas f. pollicaria longa. Folia inferiora tripartita v. M... daJaia describuntur. - fi. §r<4/for<; - Arhaotaa, Texas idruatiBond, 2 Confo. WL 201, 0. Celt. 2M)

ft Peduncul ealyce breviores, denies calycis truncatl breves.

23. G. FASCIGDLATA Elliot, BpL.oCS. Carol. elGcorg. II. 115. — Bib. I. e. 208. - Scaberrima: caole rigfdo, snperne ramoso; foil, angusle linearib. a cõt is; pedunculis brevlaaimia; calyclbus iruncatis, denlibus brevibts acalis; corollis amplia campannalia levller pobeseenlib., calyce quinquies longioribus. q. — Forte G. *purpureae* variolas? — Creacil in Carolina ausirali el in Georgia (Jacksonville).
21. G. DOMINGENSIS Spr. Syst. veget. II. 817. — Marl. NOT. gener. ot spec. plant. III. 15. t — Bth. I*^c - ~ Perennis, tenuissime hispidula: caule stricio credo subfasligiato-ramoso; foil, subpollicarib. angusle linearib. acutis crectiusculis, quam pedunculi breves ebracteatl triplo longioribus; denlib. coljcis aequalis acutis; corollis calyces iriplo superantibus. ^ — Caulis cubitalis el bipcdalis, inernc aimplex el foliosus, foliis dense congestls et qaasi fasciculis ob ramutos folii-geros abbrctialos, snperne fasiiglaio-ramosoa obscure leiragonus, sub Icnle passim sublililer blspidulus. Folia ungoicularia tot pollicaria, raro longiora, angusle linearia, dimidiam scilicet lioeam lata, sub Icnle in margine tumido tenuiter scabra pilis albls erectis. Flores In aummitatlbna caulis et ramorum racemos conslituunl laxoa foliosoa. Pedoncolt-clrclier lineam longl ideoque a foliis Ooralibna ler quaterve soperall. Calyces glabrl lineam et quod excedll, alii, campanulas, dentibus breyibus acutis. Corolla porpareo-lilacina(?) goatuor II-neas alia, lubos sursom valde ampllatoa, limbos brevlis subaeqoalls. — G. *purpurea* Bertero maa. — In Inaola 8tl. Domlnlct AnUllarum.
25. G. MARITIMA Rafin. New York med. repoa. II. 301. * Bib. I. c. — Ilumilis glabra carnosaa: foil, linearib. obtusis; racemo terminal!; calycib. breviter pedunculalis iruncalis, denlib. brcitissimis oblusis mulicis; corollis glabris campanulalis, calyce iriplo quadruplove longioribus. 2|. — Herb a 3-4-pollicari», corolla vii octo lincas longa. — G. *crinita* Eddy. - G. *purpurea* fi. *erasrifolia* Pn»b. Fl. Americ. aeptenlr. II. 492. — fi. *grandiflora*: Duplo m.ijor, folia in parte superiore paaca. — Crescit io marilimis prope New Jersey el New York in America boreali.
10. G. PLUKENETHI Elliot, Bot of 8. Carol, et Georg. II. III. - Bib. I. e. 208. - Laevlssima: foil, panris remolis filiformib. subfasciculatia; pedunculis calyre fo-llisq. bretlorib.; calycib. truncalis, deotib. brevib. acutis; eoroUia tonoaime pobescenilb., calyco vis triplo loogioriboa. 2|. - Prope accedit ad 6. *UmufiUsm* r. *kptophyUam*, ted folia nalto graciliora tt p^unomU eonsUoUr bratlaalmi. - In Carolina et Georgia crescit.
27. G. PtRPL'REA Linn. Spec plaolar. 818. — Sims, Bot Magta. t 2MB. - Bib. I. o. — Foil, linearib. acotiuaculla plants, margioe scabris; Oorib. brevlier pedooculalis; calycib. subenerviis, deotib. aculis, tubo dimidio brevioribua; corollis glabris ample campanulas, basi breviter tubulosla. ^ — Plukeo. Phylogr. t 12. fig. 2., Mant I. 384. fig. 1.
a. *parxiflora*: Corolla ||| 7-8-lineari.
fi. *grandiflora*: Corolla pollicari. — Crescit vulgaris in America boreali.
- t t t Pedonculi calyce longiores.
28. G. LONGIFOLIA Nutt. Transact or the Americ. pbiloa. Soc. V. 1«0. - i£>_k. Flor. Bor. Americ. II. 101. — Bib. I c — Foil, anguate linranb., margine se«bri« floralib. flores superaniib^ peduoculia calyce molto loogiorib.; calycib. subenerviis, deolib. laoccolatis acutis tubo vix breviorib.; corollis glabris ample catnpa-nulatis, basi breviter lubulotis. "% — G. *aspera* Dougl. m»s. — Crescil in Ame-rica boreali-occidental* .Arkansas, Red River).
20. G. LIMFOLIA Nutt. Gener. plantar Americ. II. 47. - Bib. I. c. 200. - dule mgalo laevi ramosissimo; ramis aptce florifem; foil, linearib. arutm Uevib. %. scabrelhs, pedunculo longionb.; ral>nb. trunratin campanulatis minutr ~~dentatis~~; corollis amplis campanulati«, faure pubescente, larinn< ommh. rih«iu 3
Caulis 2-3-pedali«. Calji etimie irunrAluf M| quinquedentirulaiut. Folia ~~glabra~~
•• margine scabrella. Oescii e <.ardina boreali ^er»ut Flondam.

30. *G. PEDUNCULARIS* Bth. I. c. — Foil, linearib., margine refoliata cauleq. scaberrimis; racemis paniculatis; calycib. longe pedunculatis aequalibus truncatis, denibus brevissimis acutis; corollis ample campanulatis pubescentibus, margine longe ciliatis calycequo quadruplo longioribus. 2l. — Pedunculi rigid! bipollicares. Capsula globosa calyce longior. — Crescit in Mexico.
31. *G. FILIFOLIA* Null. I. c. 48. — Bib. I. c. - Foil, filiformibus, plerisque allernis subfascicularibus cauleq. scabris (laevibusve?); racemis paniculatis; pedunculis flonferis folio multo longioribus; calycis truncati denibus brevibus aculis; corolla ampla venricosampanulata. 2f — Intermedia inter* *G. peduncularem* et *G. tenuifoliam* r- *teptophyllum*, differ! caulibus gracilibus foliisque filiformibus siepe (nee tamm semper) fasciculatis, floribus majoribus longe pedunculatis. — Crescit in Florida occidentali, in Louisiana et Texas.
92. *G. STRICTIFOLIA* Bth. I. c. — Foil, linearibus rigidis acutissimis cauleq. ramossissimo scabrellis; racemif tubpedunculatis; pedunculis folio longioribus; calycibus truncatis, dentibus setaceis; corollis campanulatis calyce quadruplo excedentibus. ^ — IMaota habitu foliisque nonnunquam similis *G. heterophyllae*, corolla *G. tenuifoliae*, sed major, pedunculi ejusdem circiter longitudinis ac *G. filifoliae*. Antherae valde lanatae ut in *G. tenuifolia*, — Crescit in Texas.
33. *G. TKMIFOLIA* Vahl, Symbol, botanic. III. 79. — Bth. I. c. - Caulis angulatus laevissimus; foil, linearibus, supra magis minusve scabro-pilosulis; racemis paniculatis; pedunculis folio demum sublongioribus; calycibus (runcatis, denibus brevissimis acutis; corollis campanulatis glabriusculis calyce subtriplo longioribus; capsula subglobosa calycem non excedente. 2l. — *G. *recla* Walp. Flor. Carol. 170. (secund. Prsh.)
- a. *humilis*: Laevissimus: foil, maxima vix ultrapollicaribus latiusculis; corolla 5-8 lineas longa.
- fi. maerophylla*: Scabrius data: foil, maximis 5-3-pollicaribus latiusculis; corolla 7-8 lineas longa.
- l. leptophylla*: Scabrella HaU: foil, filiformibus, maximis sex pollicaribus; corolla 0-7 lineas longa. — Speciei varietates forte proprias efficient species, «ed characteres alii non satis firmi. Omnes differunt a *G. pedunculari** corolla glabra tunc ciliata, a *G. selaeae* habitu et capsula breviter denticulata. Omnes in genere* sunt lineae a foliorum intertione decurrentibus et antherarum laevibus alba «illo»a. — Occurrit in America boreali* comitatibus Illinoisi a. Boston, 5. Junij 1811 et Si. LOUK, y. Jacksonville et Lovmiana).
34. *G. SETACEA* Wall. Flor. Carolin. 17a - Bib. I. c. 210. - Rami* gracilibus foliisq. setaceis scabrellis; floribus paucis longe pedunculatis; calycibus denibus brevibus setaceis; capsula ovata calyce ecedente % - Affinis *G. tenuifoliae*, sed certim distinctim es. — *fi. parrifolia*: Foil, ditantibus 3-0 lineis longis; floribus raceosis ^ — Crete it in Pennsylvania, Carolina et St. Louis.
- 3k *G. APIHYLLA* Salt. Cener. p. Amenc. II. 47. - Bth. I. c. - Rami* hirsutissimis filiformibus subnudis scabris; foil, brevibus remotis linearibus v. »mnibus. »quantiatforBib., calycibus pedunculatis inaequalibus, denibus brevibus acutis capsula flobosa calycem ecedentim. ?}
- fi. fictilis*: Rami* irracilliroi* pauciflori; floribus paucis.
- y. *grandiflora*: Rami* rigidis; floribus racemosis majusculis. — Species valde variabilis, sed faecia distincta fulva plerisque ad squamas vultu longas obtusas?. moerontas redactis. Folia inferiora rariim 4-3 lineas longim. »ccvmuC Uwe Hgidi scabra. - Crescit in America boreali! (Carolina »ortim et Florida).

t *Spirits fork* § *gnun txpillenda*.

30. *G. TKMOPUBIFOLIA* Wlprt. Wov. act. acad. caetar. Leopold. Carol. 1811. 1. 309. - Foil, oppositis uncinatis grosse tertiae longioribus; floribus racemosis alaribus pedocellatis; bracteis pedunculo triplo brevioribus.

ovato-lanceolatis inaequalibus; calyce profunde quinquelobato, lobis ovalibus
 aequalibus; capsulis ovato-pyramidalibus, aculis bilocularibus polyspermis. 2. — Folia
 linearia, 3 lineas longa. Pediculi 0 lineas longi; capsulae semipollicares.
 Flores non visi sunt. — Quoad genus dubia. — Crescit in Peruvia.

ft *Species e genere expellendae.*

- G. AFZELIA Michx. - SEYMERIA TENUIFOLM.
 G. BRASILIENSIS Spr. — FRANCISCEA RAMOSISSIMA (Addend.).
 G. GAESAREA Cham. et Schleich. - ESTERHAZYA MONTANA.
 G. CASSIOIDES Pers. - SEYMERIA TENUIFOLIA.
 G. DELPHINIFOLIA Linn. — SOPUBIA DELPHINIFOLIA.
 G. DIGITATA Spr. - CONVULVULUS ?
 G. FILIFORMIS Schum. et Thonn. — SOPUBIA FILIFORMIS.
 G. GLUTINOSA Bnge. — REINHARDIA CINNENSIS.
 G. GLUTINOSA Linn. - PTEROSTIGMA GRANDIFLORUM.
 G. GMDIOIDES Cham. et Schleich. — ESTERHAZYA SPLENDIDA.
 G. HEYNEANA Bib. - SOPUBIA DELPHINIFOLIA *fr.* PARVIFLORA
 G. NIGRINA Linn. — MELASMA SCABRUM.
 G. OROBANCHOIDES Lam. — AULAYA CAPENSIS.
 G. OBTUSIFOLIA Benth. — SOPUBIA OBTUSIFOLIA.
 G. PARVIFLORA Bib. — LEPTORHABDUS BENTHAMIANA.
 G. SCABRA Linn. — SOPUBIA SCABRA.
 G. SCABRA Wall. — SOPUBIA TRIFIDA.
 G. SESSILIFLORA Vahl - GLOSSOSTYLIS CAPENSIS.
 G. SOPUBIA Bib. - SOPUBIA TRIFIDA.
 G. STRICTA Bib. - SOPUBIA STRICTA.
 G. TUBEROSA Linn. - RUELLIA REPENS.
 G. TUBULOSA Linn. - RUAMPICARPA TUBULOSA.

3007. (3807/.) LEPTORHABDUS Schreb.

(Schrenk, Enumer. plant. novar. p. 83. - Endl. Gener. plant. Supplem. II. addend.
 p. 100. tab no. 3807. - (Genus 3007. omnino deest, tubulosaque quoad genus
 quoad ad buac locum perUenit) — Meun. Gener. plant. vateul. II. 306.)

1. L. MICEANTHIA Schrenk I. e. 91 t — Berba annua vix perennis, caule
 teretibus 1-2-pedalicis: caule erecto teretibus teretibus, ad angulos teretibus, simplicibus
 teretibus ramis Y. etiam ramis teretibus; ramis tenuibus. caulis vix teretibus; foliis, impari-
 bus sessilibus., inferioribus tuberculatis, laciniis elongatis linearibus. v. linearibus-lan-
 ceolatis intragerrimis v. denatis, latis elongatis linearibus. integerrimis; caecis
 in caule, ramis ramulorum terminalibus. elongatis interruptis, apice nutantibus.; floribus.
 oppositis, rarius alternis, perianthiis (2-4 lin. longis) filiformibus., foliis floralibus linearibus
 brevioribus subulatis; ramis linearibus; I: lin. longo fructibus paulo amplius, ramentorum
 rotundis campanulis quibusque, lobis linearibus-subulatis tubaequalibus. lobis
 aequantibus.; corolla purpurascens parte (in 3 lin. longa), tubo tenui
 incurvo, longiludicis calicibus, limbo amplius campanulato quinquefidis, lobis
 aequalibus. bifidis; eapula forma et tractura illi *Euphrasia** similis. Q - Creten
 in Sogaria In ripa fluvii Tenieek.
8. L. BENTHAMIANA Wpr. mas. — Caule erecto teretibus; foliis, subpinnatifidis,
 laciniis angustis linearibus.; racemis numerosis virgatis in paniculam amplam
 dispositis; bracteis minimis.; denatis. calicibus brevibus acutis; corollis calicibus
 in dimidio longioribus. Q — Corolla in IV, lin. longa. Capsula ovato-
 oblonga parum compressa. *titardia parviflora* Illh. tot*, in Wall. Catal. w. .
 Scrophular. Imlir. 4 Illh. in luoq. Compan. bol. Magai. II. 210. no. 30
Uanjna pinnatifida Dene m v m Jquem. Vojage bulan. IV. p. 110. — Cr*rit

Genus a St. Endlicher incaute prope Collinsiam collocatum inter Ger-
 niam et Sopubiam locum, ut jam . . .
 scriptis.

in montibus Himalayensibus. — Differt a praecedente foliis subbipinnatifidit, bracteis minimis deolibusque calycinis brevissimis.

3. L. (DARGERIA Dene. ross. in Jacquem. Voyage bot. IV. 116. I L 121.) LIMFOLIA Wlprs. mss. — Caule elalo simplici r. ramoso acute tetragono puberulo; foil, integris linearib. aculis; racemis virgalis ramos terminantib.; bracteis floret aequantib. T. superauib.; laciniis calycinis laeolatit aculis, corollae lubum subaequantib. glabriasculis. Q — Herba allitudie 2-4 doemelr. simplex T. breviter opposite ramosa, erecta srica, undique teauiler (Deo glanduloso-) puberala. Radix exilis. Caulis acute lelragoas (craulie pennae colambinae), sursum attenuatas, basi puberalas, apice glabrescent. Folia opposita (2-3 cenlimetr. longa) internodiis longiora linvaria acuU mneroaalala (tix 3 millimetr. lata), integerrima aessijia, interne conslrta, ualoervla, otrlnque glabriuscula, saepe erecta, sopeflora (floralia) alleraaatla. Bradeae linearea coafonnes, turtum breviores. Flores In bracteit axillarea aoliurii (fix 3-4 millim. long!) brevisime pedicellati, aaepe bracteit breviores. Galycls camptnlati lacioite linear!-lanceolatae acutae moeroulatae, demum acereacenta herbaceae, bine inde pilosae. Corolla calyco longior inrundibnlirormi-tabaloM, tabo tabiaearro, limbo 5-fldo regular!, lobis rotundais alte incisia v. emargioalls, omnlb. patolia glaberrimia. Glamina 4 inter limbi lobom anticum el laierales medio tabo inserta, fancem aequantia subaequantia, anlherae cordatae biloculares. Stylus terminalis fliformis, ovario triplo longior, faucem corollae tix aequans. Stigma leninale depressum papillosum. Orarium ovaium, soperne poberalom, biloculare, loculisbiovulatis. Capjiula compresu ovata leviter emarginata, soperne puberala loculicide bivalvin. Semina bina in qoovif locolo oblonga scroblenJaU nigmcenUa. — Creseit in India boreali (in UrieiU altiaaiSBif sapra Poye el Beci).

3W8. OONJBIA *BamOi*.

- * (Hamilt ma a. es D. !>••, Frodr. fl. Nepal 88. — Helta. Gener. plant fateaL I. 900. II. MI — *Gw*ri4i** sect VL *S*pmHm* Bih. In Hook. Compan. bot Magai. I. 810. - 6. DOB, General syst of gard. and bot IV. WO)

1. S. TBIFIDA Bamilt In D. Don, Prndr. flor. Iff pal. 88. — G. Don I. c. no. I. — Riglda ramosa: foil, pionatisectis, laciniis linearib. scabris; dentib. cal)cims oft* lisi, marKine riliato-menbranaceis lubo mallo brevioribus. ^ — Flores lulei? — *Grrardia Manuka* IUmilt. ms«.) *Sopubia* Bib. in Hook. Compan. bot Maga¹ - ^ 210. - *Gerardia tcabra* Wall. Caul. 388ft. - Bib. Scrophul. lad. 40. (nee Littäv) — Creseit in Ilimalayae taontibos, in Zeylania el in Madagarraria.

2. S. iGERABDIA Bih. in Wall. Caial.3887. et Serophol. Indie. 4a) STRICTA G. Doa I. e. no. 1 - Atpera rifida tobrtaosa: folt laDceolalo-lincarib. bine inda denUlit iocimve; deniib. calyciait Uaeolalit ac«Ut nudis, tabo nolto bretioribot. 4 - Floret oiuiiao S. *Jdpkintifal****. Captela ad ba«in globosa, apice coapret** — Crescit in ladia ontaiaJI (MarUbaa ei PTODM).

- X ft. (tiKBARDIA Uaa. ftpec pUat MB. - Bib. ia Hook. Conpao. bot Magai. I. til. t II.) DELFIHXIIFOLU G. Doa t e, ML DO. 1 - Bamotiuima laevis: foU* piaaaUldU, Uciaus aagosie lioearib.; deaUb. calyeinis lineari-sabulalis tab# loagioribas. ^ ~ Caolet herbacei erecli ramoti qaadraagalares glabrt R**¹ opposiU deaaaaail. Folia seasilia simplicia T. trlpianati8da, srgaitalit •»g«J*¹ⁱ Uaeanbos glabrit. Fedaacall soliUrti brevet, prope apicen brac* eas 2-3 •«buU* Us gerealet. Calyt Ubalooaa suialns qamqae fldus, srgmeau* gracilibat ac«A«t. Cec«IU tale lafaadlbaliforals, fauce laOau, limbo »ubbtUtaio paleate **km*~ •*». Iob4t ebtatke nsbieaadit, labio iaftnore obicoriu* maculate, ftumiaa di«J* Dama, Iltsnau leceuaia pilotala rubrj. Aotberae quatuor, duae ^i¹tot V coalieue, saperiorct lacambeales .localo lertili ereclo, slenli dtceadeoia calc«n lormij, ioierdnas*sed rarlui, stamen qvlalam imperfertum adesi. *i)lu» filiform^ fttigma diUutum Uoaeiaia^ Cepsela bi«alti«t recepucolo semmifero •fj ^ 1 BWIO rabesceale, seailaa iaamm pane o%ato-obloaga (tcrcoir. - B*~ "•mimdiUmm Roitl mss. in Spr. h)O. ^«STH II 775.

- fi. paniflora*: — *Gerardia Ueyneano* Bib. in Wall. Calal. 3801. — Crescit in India orientali.
4. 6. (GERARDIA Linn. Spec plantar. 270.) SCABRA G. Don I. c. no. 4. — Glabra: foil, oblongo-lanceolalis integris v. cnealo-3-5-fidis, margine scabriusculis; denlib. calycinis lanceolalis lobo vii breviorib.; corollis lubuloio-campanulalis, calyce plus triplo longioribus. % — Caolis semipedalis v. pedalis, plerumque simplex. Flores subsessiles fereque aggregati. Corolla pollicaris lacte purpurea. Filamento pilosa. — Crescit in Promontorio bonae spei.
5. S. (GERARDIA Bib. mss. in Hook. Compan. bot Magaz. I. 211.) OBTUSIFOLIA G. Don I. c. no. 5. — Caule apice birsulo; foil, oblongo-lanceolalis integris subdentatisve oblusis scabris glabris; denlib. calycinis late lanceolalis oblusis, lubo demum subinflato fii breviorib.; corollis lubuloso-campanulalis, calyce duplo longioribus. † — Caules simplices pedales. Flores *G. seabrae*, sed calyx major. Filamenta glabriuscula. Antherae loculos steriles longe apicalibus. — Crescit in Madagascaria.
6. 8. (GERARDIA Schbatn. at Bonn. Kongl. Dansk. Vidensk. geltek. Afhandl. IV. 48. f) FILIFORMIS G. Don I. c. no. & - Foil, filiformis scabris; pedunculii oppositis brevibus. Antherae subsolitariis. a^ — Corolla pallide purpurea, ad faucem late campanulata. Antherae bipartitae. Loculis oblongis inaequalibus divergentibus. — Crescit in Guinea (prope Prampene at Ningo).

BAPHIDOPHYLLUM *UochiteU*.

(Ilochstelt No?, gener. plant Afric. 10. — Afelsn. Gener. plant vascol. II. 3W.)

Calyx bibractcolatus campanulatus quinquedentatus, denlibus subaequalibus, intus praesertim ad margines laevis. Corolla infundibuliformis, limbo quinquefidio subbilabiali, lobis rotundatis Yeoia. Stamina quatuor ad basin tubi inserta subaequalia, breviter everta. Antherae biloculares, locula diacrisis, altero majori erecto, iolus hirsutus, fertili, altero minori diacrisis glabro effuso. Ovarium biloculare, placentia diametrali utriusque adnata multiovulata, stylo usque simpliciter longo evertus filiformis, trifida linguaeformi anabacuto, quoadmodum bifido. Capsula ovata elliptica biloculata, loculicide bilobata, valva media aequaliter. Bimla plerumque canescens. Stamina formia, testa ut videtur laxa. — Herbae Natalensis hills terribilis, racemis terminalibus.

1. R. SIMPLEX Ilochst I. c. II. - Pedale bipedale: caula emu agnata suculo simplicissimo papilloso icabro; toll sparsis teralibus aequalibus linearibus. pollicaribus longioribus. margine revoluto fere latis. ligidis (quasi acerosis) fragilibus. erectis aculis glabris, margine unimodo scaberrimo; racemo elongato terminali, pedicellis aliter erectis, basi braeae filiformis fora pedicellum subaequalia iosmclis; calycibus eims glabris bibracteolalis; corolla calyce duplo longiore purpurea; epipetala otalotillipia eoipretaltseala, aplea riosa el stylo apicalia biloculata; seminibus plurimis nullo. ^t ^t - Crescit ad rivus g Mauritaniae in colola Naulensi Africae australioris.
- 1 R. RAMOSUM Ilochst I. c. li. - Bipedale: caula striata ramosa, Jofrof lereii, superne angulosa scabra, nee noa anabulosa; foil, linearibus aculis plants, margine revoluto rigidus scabris fragilibus. pollicaribus, ternis quaternis. iuberectis; simpliciter racemis terminalibus. tuberculis utis; floribus in verticillis irrui quatuorfidis. rarius (rarissime) unifida; pedunculis calicibus brevibus. bracteis rudem superantibus. \. angulosis. foliiformibus. angulosis, linearibus iuberectis. calyce duobus compositis; calicibus raris glabris purpureis. raris, dro-ub. ovalibus, intus lanatis; corolla purpurea raris duplicibus \. duplo longioribus. ! ^ — Crescit in virgula plantae prope San Segal in Abyssinia provincia behiro

399¹/. MACROSTIPHON Hochst.

(Hochst. Nov. gener. pi. Nubic. 5. - Flora [B. Z.] XXVII. 1841. 374. - Endl. Gener. plant. Suppl. II. 161. - Meisn. Gener. plant vascul. II. 308.)

1. M. FISTULOSUS Hochst I. c. — Planta paludosa (annua ut videtur) glaberrima, exsiccata nigra: caule erecto sparsim, dodrantali T. pedali quadrangulari simpliciter v. plerumque superne ramato; foliis oppositis pinnatis, pinnis filiformibus. flulosis verruculosis; pedunculis subaxillaribus. unifloris, folio plus duplo brevioribus, medio bibracteatis; bracteis oppositis filiformibus; calycis patentibus laciniis e basi ovala concava in acumen erectum filiforme productis, corolla 5-6-plo brevioribus; corolla alba vel purpurea lobis rectis venosis. O — Crescit in stagnis pluvialibus exsiccatis ad montem Cordofanum Arasch-Cool.
2. M. BLONGATUS Hochst I. c. 0. — Differat priori, cuius simillimus: pedunculis elongatis folium sobaequantibus, bracteis longioribus. et calyce erecto dimidiata corollam aequante, laciniis e basi linearibus lanceolatis filiformi-acuminatis. Q — Forte priori* varietas. — Crescit in stagnis pluvialibus exsiccatis ad montem Cordofanum Arasch-Cool.

3000. HAUTEYA Hook.

(Hook. Icon. plantar. L 118. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 300. II. 220.)

- I. 11. PIRPIKA Hook. I. c. f - Calyce profunde quinquefolio, lobis lanceolatis, tubi corollae iofloro-venulosis dimidiata aequantibus; corollae limbo planiusculo, ad marginem undulato. 3f — Orefend *Uitmkmg*ms* Becl. msa. - Crescit in Promontorio bonae spei

3000¹/. AVLATA Harvey.

(Hanrey, Genera of South-African plants. — Eadl. Gener. plantar, fascic. I* p. 1485. — Meisn. Gener. plant, vascul. II. 815. 308.)

1. At. (OROBANCHE Thunberg. Fl. Capens. 453.) 8QUAMOSA Hanrey I. e. - Hook. Icon. plantar. L 401. — Floribus apicatis deorsum; corollae limbo concavo integer* rirao. 3 — Caulis 8-3-pedunculatis simpliciter v. ramosi, squamis aurantiarum v. aureis densis* testibus; calyces flavi et aurantiaci; corollae tubus spirantissime luteus, limbus obscure antriacus. — Crescit in Promontorio bonae spei.
- 1 A1. OROBANCHIUM Thunberg. I. c. - ALFECTRA Thunberg. Kov. gen. III. R35.) CAULIPKNSIS Harvey I/c. — Caule simpliciter villosulo solcato-angulato; squamis caulinis sparsis adpressis lanceolatis, saepissime oppositis; floribus axillaribus oppositis. »iii« pedunculatis; calycis inflati laciniis lanceolatis; corolla lobulosa cylindrico* clavata »ensim ampliat. Q — Caulis palmaris v. pedalis. Corolla pulcherrime* crocea. Pedunculi onguiculati. — *Grewia umprobiuhoit* Lam. — (*Pro***** AUctr** D. Dietr. Syaops. plant plenunq. III. 0M. - In Promontorio bonae spei*?)

4000. tLOMAOATVLM Cham, et Schumder.⁹)

{Chum. H. Senecb. Lionaea II. ft - Meisn. Gener. plant, vascul. I. 300. II. 220. — Bib. in Hook. Compan. bot. Magai. I. 211.)

1. GL. AVFSSI9 Bib. aVropbol. Indie. 40. et in Hook. Coropan. bot Magai. I. 211. — Folio, ovalo-lanceolatis lanceolatisve, basi truncatis bracteatis peliolalis* f*⁴ v | Inbreviato-asperis; calycis dentibus latis arutis brunscime riliatis. ^ — *if***Z* *»F**rmmm* ata«f«a» Bib. in Wall. Caul. m - Cr^rit in India orientali! I¹ •••le Taeng Dong prope Avam;
2. GL. ASPKRA Cbani. et Senecb. Linn«ra III. tL t « Bib. in Hook. I. c. 212. — Folio sulcatis. oblongo-lanceolatis, basi truncato-cordatis* caulibus. *bispidis*

*) St. Endlicher, Geogr. tU*¹ r. p. Ail. Ailic generi tribuit *stamina quinque didynamia!*

asperrimis; calycis denlib. lalis aculis bracteisq. hispidis. Q — Caulis erectus subsimplex 1%-3-pedalis; folia pseudo-opposita, rami graciles axillares caule ipso breviores. Folia breviter peliolata oblonga acuminaU acula, basi subtruncalocordata (elongato-triangularia; grosse et inaequaliter serrata, maxima bipollicarLa, V» poll, lala, internodiis plerumque longiora, superiora senaim minora. In caule foliisque supra, infra lanlummodo ad nervos pili albi et luberculo oriundi dimptertis. Flores axillares pedicello semilineari suffulii. Bractee fill forme I hirsulae calyce breviores. Calyx campanulatus medium usque quinquefidus, laciniis triangularibus erectis, fructifer auclus. Corolla 5 lin. longa, et lubo brevi campanulata, limbo oblique imncaio (?) bilabialo (?) labio inferior! porrecto (!). Genitalia inclusa. FilamenU per paria curvalo-convergenlia, anllterae cordalo-renifortnes, rima lacrali dchiscentes. Capsula magnitudinc Pisi, globosa membranacea glabra, calyce aucluso inclusa. Setinae numerosae oblongae conicae tenuis»ima, totam capsulam replentia. — *Serophularia Ftuminensis* Arrabida, Flor. Flumin. VI. I. 87. — In Brasiliae provincia Rio de Jané%o In fossis prope St. Annam.

3. GL. CAPENSIS Blh. Scrophular. Indie. 50. ei in Hook. I. e. — Folia subsessilib. ovalo-cordatis, inferiorib«obtusis, auperiorib. acuminalls cauleq. luberculis minntis seabris laevibq.; denlib. calycis lanceolatis aculissimis bracteisq. subnudis glabra. ©T — *Bhinanikus smker* Thnbrf. Fl. Capens. prodr. 06? — *BarUia scabra* Spr. SysL vegeu II. TOT — *Girmrdim nuiUfiora* Vaöl, Symbol, bouncl. II. 79. — Crescit In Promonlorio bonte spei et In Uadagascaria.

4001. PHTEIROSPERMUM Bnge.

(Bnge. mss. ex Fisch. cl Mey. Indx. semin. horl. Petrop. I. (1835.) p. 35. — Mtiin. Gener. plant, vascul. I. 300. II. 220. - Bib. in Hook. Compan. bot. Magai. I. 212.)

1. PUT. CHINENSE Bnge. ex Fisch. cl Mey. I. c. - Ann. sc. natur. V. 121 - Llnnaea X. Lileraturb. 00. — Blh. I. c. — Herba annua T. blennii habilu, foliis, calyce et capsula baud dissimilis *Pedicularis palutris*, sed corolla fere *Mimuli*, ordide rosea, fauce lineis 9 flatidis noUit. — Crescit in China boreali.

4002. CANTHARUM R. Br.

(R. Br. Prodr. flor. Not. Holland. & - Moftia, Gaer. pUnL vaseul. t 300. II. «X - Bin. SeroplumUr. Indl«. 30.)

1. C. GRANDIFLORA Blh. In Wall. CaUL 988a, Srropbnl. Mle. 50. - Kerta glabra luberculofco-scabra: florib. secundb approximalls amplis; calycib. oblongo-innatis, hinc fissis, inde aculinsimis. Q? — Calyx 0 lin. lonfos, corolla 21 lin. longa. — Crescit in montibus i?j Sillel in India orienUli.
2. C. BRIMOMANA Wall. Catal. 3882. - Bth. I. c. - Brevis hispida: Oorib. remotis; calycib. oblongis hinc fissis (nde arutis; 0t — Cal)x 5-0) lin. longus, corolla 12-14 lin. longa. — Crescit ad Moolmyne in Martabana.
3. C. HISPIDA B. Br. I. c. 43ft. - Wall. Plant AsiaL rarior. I. 30. t I. 4V. - Blh. I. c. — Brevis cano-hispida: florib. remotis; calycib. otalls hinc d*%%, iQJe aculis 2-3-fidisv«. QT — Calyx eirceller 3 lin. longas, corolla 7-8 lin. longa. - C *Nrpalnsi** D. Don, Prodr. fl. Nepal. 88. — *DigiimU** strict* Bxb. Flor. Ind. or. III. 00. — Crescit In tola HindusUnta, Kepalia, Kamaoo et in montibus Prome etc.
4. C. NUMIFUSA Wall. Catal. 3893. - Bib. I. c. - Diffusa hnmills ramo»j«»ima glabra brluscule: florib. dittantib.; calycib. ovatis hinc fissis, inde acuiutculis bifidiM«* O? - Cal)x fix 2 lin. longui, corolla 4 lin. longas. - A«2«moña *Tr**ueb*ric** Spr. S»i. vegeL II. 812! - Crescit in Peninsula Indiae orientalis 'ad Naibpur'.

Tribus IX. *RHINANTHEAE* Bth. Scrophular. Indie. 50. —
Endl. Gener. plant, p. G92.

* Corollae linibus bilabialis, labio superiore concavo, galeato v. lineari integro v. emarginato, inferiore trifido. Stamina quatuor (v. rarius duo) asceodentia, antherae biloculares, loculis discretis parallelis, saepe acuminatis. Capsula localicide bivalvis, valvis medio sepliferis, saepissime integris. Semen testa solida v. laxa arilliformis, nunc in alam expansa.

4003. *OBTHOCABPUS* Nutt.

(Nutt. Gener. plant Americ II. 90. — Meib. Gener. plant, faicul. I. 312. II. 223. —
Bib. Scrophular. Indie, p. 12. in adnotat.)

1. *O. PUSILLUS* Bib. I. e. — Humilis ramosissimus glabriusculus: foil, apice mullifidis, laciniis divaricatis setaceis; dentib. calycinis linearibus. firidibus. corollam tabaequantibus. — Herba fix biponicaris. *Q* — Crescit in California.
2. *O. GRACILIS* Bth. I. c. — Can lib. namerotif subramosissimis, apice pubescentibus; foil, apice mullifidis, laciniis difaricatis linearibus-subulatis; dentibus. calycinis lanceolatis-subulatis acutissimis vix coloratis; corollae (purpurascens?) tubo eiserto pubescente; staminibus. galea brevioribus. *O* — Crescit in California.
3. *O. FLORIBUNDUS* Bth. I. c. — Glabriusculus ramosissimus: foil, apice plonali-6dis, laciniis linearibus. divaricatis; dentibus. calycinis linearibus. viridibus; corollae luleae tubo subexserto glabro; antheris exsertis. *O* — Crescit in California.
4. *O. ERIANTHIS* Bth. I. e. — Basi pubescent, apice lomentosus ramosissimus: foil, apice mullifidis, laciniis lineari-aelaceis difaricatis; calycibus. tomentos, dentibus. laocoolails aetiulaliam firidibus corollae lateae tabo longe eiserto lomentoso; antheris galea brevioribus. *Q* — Crescit in California.
5. *O. TENUIFOLIUS* Bib. I. e. — Piloso-pabeaera: fell. 3-ft-fidit, laciolis linearibus-subulatis; floribus. dense spicatis; foil, floralibus. latissimis incis; dentibus. calycinis brevibus. subulatis. — *BarUia UnuifoUm* Prsh. PL Am. bor. II. 429. — An *Castillej* species? *Q* — Crescit in America boreali-occidentali.
6. *O. DEKSIFLORUS* Bth. I. c. IX — Hook, et Arn. Bot. Beech, toy. 370. — *Gubriusculus* ramosissimus: foil, apice trifidis, laciniis linearibus; spicis densis imbricatis (Rarescentibus); laciniis calycinis lineari-subulatis subcoloratis, corollae pubescentibus tubum aequantibus; staminibus. galea brevioribus. — *CasliUeja* aM*V#* Hook, et Aro. Bot. Beech, toy. IM. *Q* - Crescit in California.
7. *O. TOLMIEI* Hook, et Arn. I. c. 370. — Puberulus: caule stricto saepius a basi ramoso; foil, lineari-acuminatis integris; floribus. breviter spicatis; bracteis difaricatis linearibus; dentibus. calycinis uncinatis tubo membranaeo subdoplo brevioribus. firidibus; corolla lulea glabrit tubo longe exserto, labio superiore apice oncinato, inferius trilobum erectum pressum paulo saperante. *Q* — Crescit in California.
8. *O. PURPIRASCENS* Bib. I. c. - Ramosissimus piloso-hirtus: foil, pinnatis lobatis, laciniis linearibus. difaricatis; spicis densis imbricatis purpurascens laciniis calyceis aequae ac illis bractearum lineari-spathulatis, apice coloratis corollae pubescentibus tubum aequantibus. *O* - Crescit in California.
9. *O. HISPIDIS* Bth. I. c. - Hook. PL Bor. Americ II. IM. - Sobramosius pilosobispidus: foil, e basi laeolala looge subtrifidis, laciniis lineari-subulatis; floribus. dliastibus; bracteis firidibus. corollas sopraotibus; calyceis dentibus. hof<ri>ca-celt firidibus) corollae (flafeteoUs) tabo glabro brevioribus. *Q* - Htec ul »P*cl* omoes praeedeotea, eat teaais eelpedalis f. fix pedalm. species sequentes Umen recedunt tuiara graadiori, ollra pedali, babltoque Inhospermoldeo duro. - Cretei(in Colombia.
10. *O. SIHICTIS* Bib. U- Hook! I c t 171 - Caule duro rufispido; foil. laciniis trifidis; floribus. dentibus. linearibus. looge spicatis; bracteis difaricatis trifidis, laciolis looge UoceoUlii corollas sopraotibus; dentibus. calyceis UoceoUlii

brevissimis tiridib.; corollis (luleis) glabris, tubo longe exserto. O — Ad IL Columbia el Red river in America boreali crescit

11. O. LUTEUS Nutt Gen. pi. 11. N. Am. II. 57. — G. Don, General syst of gard. and bot IV. 616. — Caule simplici; foliis, alternis integris lanceolatis linearibus sessilibus acutis oppositis, cum bracteis calycibus pubescentibus v. sessilibus, margine scabris; bracteis trinerviis divaricatis trifidis; floribus latis glabris axillaribus alternis sessilibus. O — Forte cum praecedente consociandus erit — Crescit in America boreali (Missouri, Fort Mandan).
12. O. BRACTEOSUS Bth. 1. c. — Caule duro pubescente; foliis lanceolatis, apice linearibus trifidis; floribus spicatis; bracteis latis divaricatis trifidis rigidis; denibus calycinis lanceolatis rigidis tiridibus, corollae purpurascens tubo brevioribus. Q — Crescit ad flumen Columbia.
13. O. LITHOSPERMIDES Bib. L. c. — Erectus durus ramosus, basi pubescens, apice hirsutus: foliis irinerviis, inferioribus integris, superioribus 3-5-fidis*, laciniis lanceolatis; spicis densis flavescens. bispicis; denibus calycinis lanceolatis linearibus flavescens. hirsutis, tubo corollae glabrescente brevioribus. Q — Crescit in California.
14. O. CASTILLEJIDES Bin. I. e. - Homilif pilosusculus: foliis oblongis, inferioribus integris, superioribus euntatis trifidis; floribus laxis sessilibus; calycibus tubulosis, denibus bracteis v. trifidis; tubo corollae (porphyrotoetii) tubo brevioribus exserto. Q — Crescit in California, |

4004. CASTILLEJA Mutis.

^y (Halls mss. ei Linn. 01. Supplem. 893. — Meisn. Gener. plant vascular. I. 313. II. 823. — G. Don, General Syst of gard. and bot IV. 014.)

Setto L. IUCASTOLEJA O. DM L. e. §14.

Calyx laeviter altero longior aliter denatis T. lobatus. Antherae diltreue angustae, loculis aequalibus.

1. C. (BARTSIA Lion. Spec. plaar. 839.) PALLIDA Elh. Synops. plant aequinoct n. Ma (adnot ad no. ft) - 8pr. Byst Tegetab. II. fit — TOMSIOM: foliis, radicalibus linearibus alternis integris, superioribus 3-5-fidis*, laciniis lanceolatis; spicis densis flavescens. bispicis; denibus calycinis lanceolatis linearibus flavescens. hirsutis, tubo corollae glabrescente brevioribus. Q — Crescit in California.

fi. Vnatasekentit Chamiss. et Sehlehd. Linnaea U. MI. — Caules simpliciter cubitales teresque cubitales, erassius pennae gallinae. Folia superiora ovalia lanceolata 3-5-nerviis, et limbo parte obsolete, nervis sublimis prominentibus, quam in vulgari magis hirsuta. Bracteis in apice silicae mioas lacerae. — Crescit in tinalascbka insula.

& C. AFPINIB Hook, el Am. bot leech, toy. 154. - Caulis betaceo subsimplici piloso-hirsutus foliis linearibus lanceolatis irinerviis pubescentibus. Ingris t. raro apice denovo-lobatus; floribus inferioribus pedunculatis; calyce florifero tubuloso antice posice. flsso, lobis bifidis, segmentis loeari-lanceolatis aeallt; corolla calycem subaequante. % — Folia floralia BOB dilauit, qua nola difert a *C. lilko-tirmoid*: A & imiegHfotia Linn., cuius ralde affinis, recedit calyce per amhesin tubuloso nee venricosus. — Crescit in California.

a C. TOLUCCENSIS H. B. Kib. NOT. gener. el spec. pi. III. 3D. — Kth. I. c. 00. M. Caulis suffruticosus ramosus procumbens. gtabrit; foliis lanceolatis obusis hirsutis subintegris, superioribus apice trifidis; floribus axillaribus sessilibus; calyce corollam subaequante. 6 - Caules cespitosi; rami quadrangulares densae foliati. Corolla glabra. Caty bifidus, imbit rotundalis. - f. reicil in monibus Mfticaoit Prop* urbem Tolurcae.

4. C. MORANENSIS U. B. Kth. I. c. 328. - Kth. I. c. - Caulib. safflroticosis simplicib. prostratis pubescenti-hispidis; full. lancoolalis aculis hispidis integris, superiorib. trifidis: florib. axillarib. sessilib.; corolla calycem paullo superante. % — Calycis bifidi lobi emarginati. * Crescit locis lempcalis inter Pachuca et Moran Mexicanoram.
5. C. MJBIGENA H. B. Kth. I. c. 330. t 103. — Kth. I. c. — Caule suffruticoso ramoso erecto hispido; foil, linearib., apice trifidis densissime hirtis, lacinia intermedia subtrifida; florib. axillarib. breviter pedunculatis; calyce florifero Yenricoaco corollam aobaeqaante. 5 — Ramf tetragonl. Folia Ooralia rubra. — Crescil in arenosis montis ignivomi Picbinchae Joxia planitiem Verde Cuchu. — C. trifida Willd. Herb. 11700. — C. fisifoKa* Linn. proxima esl.
6. G. FISSIFOLIA Linn. fl. Sapploa*. 900L — Willd. Spec. plant. III. 290. - Sm. Icon. inedil. 40. t 40. — H. B. Kth. I. c. 330. — Kth. I. c. 100. - Caulc suffruticoso ramoso erecto hispido; foil linearib., apice trifidis dentissime hirtis, lacinia intermedia trifida; florib. spicalia pedunculata; calyce tubuloso corolla dimidio brevior. 5 — Folia trinervia pollicarum. Ramulorum rudiemla In axillis foliorum. — Crescil locis frigidis regal Novo-Granatensis Inter Zipaquira el Santa Fe de Bogota.
7. C. LACIMATA Hook. et Arn. Bot Beech. toy. 401 *- Pilis raris rigidis* obcila: caule erecto herbaceo; foil, linearib. trifido-pinnatifidis, laciniis cloogalis biliformib.; florib. axillarib. subsessilib.; calyce corollam subaequantem. ^ — Valde affinis C nubigenae, quae tamen fruticosa, calyce inflato, foliorum laciniis multo latioribus brevioribusque recedit ab hac specie. — In Chili ad Conceptionem.
8. C. ARVENSIS Cham, el Schlegel. Linnaea V. MB. - Caule herbaceo simplici aul ramoso pilato-trifido; ML spatulato-lanceolata v. oblongo-lanceolata obtusis basi acaulis Iriaxtifidis latioribus ambetentibus ioribus spicatis; corollis calycem fixo superantibus. % - AMils P. H**9p<moidL> 4JsUngo*ada follomm forma, capsula lalio majori tobrileoari, samalibna conealis nulla membrana alata, testa reicnialim impresso-punctata laia. — Crescil in Mexico prope Jalapam Inter segetes inter San Andrea et Serro Colorado.
9. C. IMEGRIFOLIA Linn. Supplem. 509. — Sm. Icon. inedil. 30. U 30. - Willd. Spec. plantar. III. 300. — H. B. Kth. I. c. 330. — Caule fruticoso ramoso erecto albidulo-hispido; foil, linearib. inlrigris hispido-pubescentibus; floribus picalibus sessilib.; calyce florifero breviter pedunculato corolla brevior. t]. — Folia Irinenia» 8 lin. longa, 1", lin. lata. v.B)l bidentatus. — Crescil in lempcalis Novae Hispaniae prope Tasao San Angutlin de la Cuesta el fodinam comilis da Rayas.
10. C. LITHOSPERMOIDES n. B. Kth. I. c. 331. L M. - Caule herbaceo subsimplici piloso-hispido; foil, lanceolato-linearibus, apice angustalibus obtusis latioribus Irnuisfime piloso-hispidis: floribus subspicatis sessilib.; corolla calycem vix perantem. ^ - Folia Irinervia 1/2-i->pollicaria, 3 lineas lata, floralia rubra apice longior dilalata. Calyx lalere altero fissos, allero bimodum. Corolla alba. — C. pifiUm Willd. Ilrrb. II7W. - C. HIUj** pdlid** Tilde afflu. - Crescil in Jparatis Novae Hispaniae prope Real del Monle el Moran, el In rrgno (Jail**** prope Ckillo.
11. C. TBMUIFLORA Bib. Plant. Hartvegian. 8L no. 101. - Fruticosa pubescenti-scabra: foil, linearibus laevigatis, basi amplexicaulis dilatatis Integerhmis; calycibus late laevigatis aculis, noprermis apice coloratis; calycibus pubescentibus, dehiscentibus. acutis, corolla leui glabra subdimidio brevioribus. - In Mexico.

oeUo n. EQCIIftIU I<tt. \$3tsjor. pUat AaMrfo. LR

C*lyx SMiajooforaiis bliffo* td emargioatas tel quadnfdus, sfgmeolif ~~scabra~~
UUa. Antherae lincoros, localis taafqoallbtts, oniei cobamates.

U 1. Calyx tpatkatformU blfidu* r. quadn/Uut inclinatu*.

11C LO^GIFLOtU Kai«. Pnglll. plait. iftodlL L I - Caule suffruticoso ~~scabra~~
~~scabra~~ Imprimis btal rtaioao; foil, iaftorib. suboppositis, borUooulitw 49\$**">

- e basi amplectente dilatato-antriculata linearibus acuminatis, superioribus latioribus, omnibus trinerviis; bracteis ovalo-acuminatis trinerviis pallidis, summo apice lateraliis divergent-divaricatis; floribus brevisaimis pedunculatis terminalibus. aubracemois paucis; calycibus lobulatis compressis lobis elongatis bidentatis auranthiatis; corolla longe exserta, labio superioribus attenuate obtusis recto, apice rubello, inferiore minuto 2-3-fido, lobis porrectis obtusis; stylo parum exserto. 2l — Creata in Mexico.
13. C. SCORZONERAEFOLIA D. B. Kth. 1. c. 331. t. 165. — Cattle herbaceo simplicibus (?) piloso-hispido; foliis linearibus, basi dilatatis subamplexicaulibus integris hispidulis, floralibus bracteiformibus coloratis; floribus apicalibus sessilibus; corolla calycem superante. — Canalis angulatus rubicundus. Folia triovata subtripollicaria, 2-3 lineas lata, Ovaria purpurascens. Calyx ulrinque fissus, segmentis emarginato-bidentatis. Corolla plioa. — Sequens? alba? — Crescit in rmpatribus Hispaniae prope Paucaro et Ario.
- 11 C. OCCIDENTALS Torr. Ann. lye New York II. 830. — Caule herbaceo simplicibus piloso; foliis linearibus lanceolatis apice attenuatis puberulis integerrimis acutiusculis; floribus spicatis sessilibus; corolla vix calyce longiore; bracteis erectis trifidis. 2} — Folia acaulescens. Spica simplex oblonga. Bractearum aegmnum Intermedium nonnunquam trifidum. Calyx unilaterally subaana quadridenUto. — Graecis in America boreali (Eokey mounUins).
15. C. (BARTSIA Link Spee. plaitar. 830. — KUCHROMA NatL Gener. pi. Amer. II. W.) COCCINBA Kth maa. a Bio. in Hook. Flor. Bor. Amerie. II. 105. — (Spr. Syst. vegetab. II. 755T) — Plioa: foliis plerique inclatis; calycibus ulrinque fissis, aegmentis latis integris rectis corollam aubaequantibus. T. ea vii brevioribus. ^ — *Pedicularis seu Cristae galii off nit Virginian** Ajugae multifido folio, cpiribus coccineo, flonibus pallidis in tipam congetfis* Pluken. Aim. t. 10i. fig. 5. — /ormUnmm tenui *Coromopi folio* Moris. Oxon. Uistor. III. 305. sect. 11. 1.13. fig. 28. — Crescit in America boreali.
- W. C. HISPIDA Bib. maa. in Hook. Ft. Bor. Amerie. II. 10ft. - Plioa-bispida: foliis plerique inclatis; calycibus ulrinque, praeartem infra Qssis, tegmenibus apice bifidis, laelibus oblongo-linearibus. corolla param brevioribus. 0 — (Cavils annoa decumbens atralatas longi-ptoMM. FoUa oMeaga aplea trii4a . taitfra pint longia vesUu trinenrla, Infarian aaaplM tnagra> Biaetaaa iljlongo-iMHttlnaa mlaJaUe Inleae albaeve, fen semper plsnaHldas, Qaptmlae ek4e<<c>>e pvbaeaeitea, aeminibus cuneatis retleolaUs.] — C. w w n 0oejft nva. In *UtfL Bot.* Befist u 1130. — Crescit in Americae borealia itfloBttSta boreali-oeeldanlalibna (Port Vaneoa?er).
17. C. MACROCARPA Bth. Scrophular. ladle. 13. adnoL — ErecU ramoa: caulo piloso; foliis brevibus ovalo-oblongis integris trinerviis, basi amplexicaulibus, superioribus obtuse trifidis runcatis, floralibus apice latis coloratis; calycibus brevisaimis. I obuse quadrididis bine fissis; corollae tubo inclato, galea breviter exserta. % — C. *laiifolia* Hook. et Am. Beech. voy. 15t el 380. — C. *TohxemtU* Cham, ct Schlichtd. Linnaea II. 570. (aec U. B. Klb.) - Craecil la California.
18. C. FOUOLOSA Book, ot Am. Bol. Boeah. ?oy. 154. — Rivoo-lomfotosa: caule fruticosa ramoa; foliis coccineis, inferioribus linearibus obtusis, superioribus floralibus dilatato-crispatis rariis; floribus sessilibus; calyce florifero n-baloso anlice poallotq. aequaliter flosso, lobis rarter emarginatis; corollae tubo calycem non aequalantibus. ^ — Herba 9-3-pedalla, folia in axilla-fovent ramulot abbreviatis abortitio i. e. folia aubfaaciculata. — Bx habltu non dissimilu c>(C. *Utifoliae*. — Credt In^California.
10. C. (KUCHROMA Null, f.tntr. plant. Americ. II. 55.) GRAKDIFLORA Spr. S>tt tfgtab. II. IV}. — Prrrnnih: full, bractemq. ronorolibus linearibus fimbriatis bu-pldit, lacinnis ilnancadi; rnhcib. quadridid partim obliquis; corolla raljrmia xcededlr, lalm luforion.* sf(imrn(is aruminati). ^ — Corolla puberrula i-3-p<i|-Haarit virescens-alba in eulurem roscum transirnf, lalno vuprnon virescente

Cast, sestiflora Prsb. Fl. Amer. septentr. II. 738? — Crescit in America boreali (fo planitiebus montosisque ad fl. Missouri et Mississippi).

20. C. MIMATA Dougl. mss. in Hook. Flor. Boreal. Americ. II. 101 — Glabra r. apice pilosa: Toll, caulinis integris; calycibus otrinque, praesertim infra, fissis, segmentis apice bifidis, laciniis lanceolatis oblongisve corollae tubum rix aequantibus: — Crescit in America boreali -occidentali! (Blue mountains).
21. C. LUCIBROMA Rafin. Transact of the Americ. Philos. Soc. [New Ser.] V. 180.) PURPUREA G. Don, General syst. or gard. and bot. IV. 015. no. 17. - Folia cucullata trifida r. subcrenata (a little jagged); bracteis raris; calyce corollae coloratis quadrifidis anilateralibus; corollae segmentis acutis. 2. — Caulis tomentosus. Folia tomentosa. Calyces corollaeque speciosissime rubicundo-purpurascens. Calycis segmenta linearia, omnia anilateraliter inclinata corollam subaequantem, corollae labium superius apice trescens. — Affinis *C. grandiflorae*, sed recedit corollae proportione et bracteis. — In America boreali (Arkansas, Red river).

S. 2. *Calyx quadrifidus atque* Hs.

22. C. PARVIFLORA Benth. Mta. de l'Inde. Impr. des scienc. de St. Pétersbourg. (VI. Se.) II. 157. - Caule simplici ascendente, basi squamulis orbatis acutis integris incisive tolo, apice villosa; foliis, sparsis ovato-lanceolatis regulariter incisis, segmentis otrinque ternis oppositis divaricatis, inferioribus lanceolatis acuminatis, superioribus linearibus acutis; floribus ad apices ramorum dense racemosis sessilibus (robis; bracteis foliis conformibus? villosis; calycibus quadrifidis laciniis linearibus; corollae labio superiore trilobato, inferiore tubo; antheris sagittatis laevibus. V — Affinis dicitur *C. turgida* sed praeter characteribus aliis differt Jam floribus duplo minoribus. — Cretae in insula Bithonia.
- U C. (GAIKHOBOA NQN. Joan. aevi Philai. tit. L) ANGIPTIFOLIA G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 6ML. no. 11 — Herba pilosa: foliis, difaricatis trifidis, radicalibus simplicibus, segmentis linearibus obtusis; bracteis trifidis, segmento in medio plerumque iterum inserto; calycibus quadrifidis, segmentis aequantibus. — Caulis plerumque ex eadem radice 3-4-pollicares pilosus. Foliolorum lacinae dirimuntur bifidae, trifidae simpliciaque. Corolla parva in calyce aequali longior. — Crescit in America boreali (in ripis ad ripam fluvii Goddini prope Columbiae fontes).
- Si C. (ALLICBROA Nail I. c. 47.) BRADICRUI G. Don I. c. no. U. - Pilosula, foliis palmatis bifidis, segmentis linearibus; bracteis foliiformibus; calycibus quadrifidis, segmentis aequalibus. — Caulis simplex. Folia pubescentia, e medio dirimuntur trifida, lacinae inferae trilobae. Bractea obovata, lacinae intermedia imbricata trilobae. - Crescit in America boreali (similiter in praecedentibus)

*t SptUs mom rit\$ cogmita**.

- ». C. CORONOPHOLIA Vent ex Spr. Syst. vtgt. II. 7H - Caule erecto; foliis linearibus hispidis ibiegerrimis trilobatis; lobis neamoils lecondii. 4 - Cretae - la Nova Graeco.
- ». C. (BAITGU Prsb, Fl. Amer. Septentr. II. 790.) ACCVINATA Spr. I. c. 71* - Folia linearibus doagatis trinerviis, floralibus oblongis longiMime aequalibus floribus vperaaifbaii deallbaa ealyeit acmii. % - Crescit in insulis Altae.

ft SptUi prortus incognita.

87. X SKRIATA Bortor. - (Sl. 4. N. MacL. boUnic. (edit ^) I. 3N.) - ~~Crescit...~~

*t t t 9p\$d\$si # fMtrt \$xp*U*mfa*

C AMIIGUA Botil et An. - OETHOCARPCJS DKNSIFLOR18.

Ctonns hand satli Boti».
ONCORIYNICIUS *Lehm.*

(*Lehm. In Linnaea VIII. Literalurb. 5. — Meisn. Gener. plant vascul. II. 223.*)

Calyx campanulatas biBdus, laciniis bifldis lateralibus. Corolla tubulosa calyce duplo longior, labio superiore canaliculate, inferlore breviter inflato-plicato trilobo, lobis angustis, labio superior! adpressis. Stamina eiserta. Stylus stamina aequans. Stigma capitatum. Capsula ovata. — Herba biennis subdecumbens: foliis sparsis sessilibus linearibus trifldisque, floralibus pinnatis; floribus spitatis.

1. *O. PINNATIFIDUS *Lehm. I. c. - <? - Crescit in Chili.*

4005. ADFINOSTEGIA *Bth.*

(*Bth. mss. in Lindl. Introduct [edit 4J 449. — Meisn. Gener. plantar, vascular. I. 318. II. 223.]*)

1. U. RIGIDA *Bth. mss. in Lindl. I. e. - V - Cretell in Nova California.*

4000. TBIPHYSABIA *Fisch. et JMey.*

(*Fisch. et Mey. Iodx. temln. hort Petropolit II. 98. — Melan. Gener. plant vaicnl. I. 313. II. «4.*)

1. *TR. VERSICOLOJt *Fisch. et Mey. I. c. f — Ann. •& nalar. V. 301. — Linnaea XL Literalurb. 122. — Bth. In Hook. Compan. hot Magai. II. 10. O — California.*

4007. SCHWALBEA *Linn.*

(*Linn. Gener. plantar. 744. — Meisn. Gener. plant vascul. I 312. II. 222.*)

1. *SCHW. AMERICANA *Linn. Spec. plantar. 844. — Grtnr. De fractib. et semimb. pi. I. 290. I. 99. — Lam. Illustr. gener. t. 520. — % — Euphratia Mariana major, Horibu* tpicatat amplti lubis longiortyu, iummit oris profunde indiii Pluken. Mant 73. t 318. fig. 2? — Crescit in America boreali ad paladom margines hand procnl ab ora marina.*

4008. LAMOUBOCXIA *H. B. Kth.*

(*H. B. Kth. ROT. gener. et apee. plantar. II 339. - Mtisn. Gener. p int fateiUr. L 312. II. 222. - G. Don, General ayst of gard. and bot IT. H3L)*)

|. 1. *Stamina duo tuperfara brmriara stiriHa.*

1. L. VIRGATA *H. B. Kth. I. c. 330. t 167. — Kth. Synop*. plant aeqnlooe II. 103. — Ramis terctiuscolls; calycib. Ibllisq. gUbrii lineari-lanoeolaUs obsolete crenato-scrraiis; laciniis calycinif lanceolatis Integerrimls. %1 — Herba anffrticou ramosa. Folia circiter pollicaria, 2 lin. lata. Corolla carnea. — Prope urbem Quito. & L. SERRATIFOLIA *II. B. kth. I. c 336. t 168. - Kth. I. o. - Ramis tetragonit blfanam pilosis; foil, lineari-lanceolati* iociso-scrrealis calyebq. glabria, laciniis oblongo-lanceolatis integerrimis. 4 - Folia sabiessilia 14-19 lin. longa, 2 1/4 lin. lau. Corolla carnea. — Crescit Juta SanU Fe de Bogou et oaUractam Tequendamae in regno Novo-Granatensi.**

& L. RniNANTHIFOLU *H. B. Kth. I. e. 337.1160. - Kth. L c 104, - Caule ramisq subtetragonit pubescenti-pHosIs; foil. oMeogU acntis, basi rotodatla subampliicaulib. crenato-terratia toooissime hlrta; calyce piloao-hlrto, laciniis e?ato-lanoeolalls aerraUs. ^ — Folia •nbpollcerla. Corolla carnea. - Crscii loeit temperatit Novae Hispanlae prope pagot Magdalenae, Actopan et Santa Rosa de la Sierra.*

1 SYLVATICA *II. B. Kth. I. c. 3J7. - Kth. I. c. - Sobvolubilis: ramis teretib. pilosiusculis; foil, lanceolalo-oblongis acutm, basi angustatis subduplicato-serratis calycibq hirtelliv Ucinnis oblongu acntis serrulalis. % - Folia subsessilia polUuria v. longiora Corolla rosra pilosa. - Pratecdenti simillima - Crscit in Wife prope pagum A)avaca Peruvianorum*

3. *L. CORDATA* Cham, et Schlichtd. *Linnaea* V. 103. - Intermedia inter *L. vitcotam* H. B. Kth. et *L. rhinanthifoliam* H. B. Kth., a priori foliis cordalis sessilib. sub-amplexicaulib. breviorib. latioribq. diversa, ab hac uberiori pube in inflorescentia viscosa, laciniis calycinis inlegerrimis discrepat. Habitus peculiaris, caulis stric-tus virgatus dense foliosus, foliis apicem versus valde decrescentibus nee Jam floriferis. Corolla coccinea. Folia maxima l'A poll, longa, *U poll. lala. — Crescit in Mexico inter Tenestepeque et Quanlolalepam.
6. *L. VISCOSA* H. B. Kth. I. c. 338. — Kth. I. c. — Caule subtetragono; calycib. foliisq. piloso-lomenosis viscosis lanceolatis acominatis serratis; laciniis calyci-nis lanceolatis integerrimis. Q — Folia* pilosa subbipollicaria, 0-7 lineas lata, folia floralia ovalo-lanceolata pollicaria glanduloso-pilosa. Corolla carnea, ex-tus tomentosa. — Habitus *Lobelianm.* — Crescit in littore Mexicano Oceania pa-cifici prope Acapulco.
7. *L. LOKGIFLORA* Bib. *Plant Hartwegian.* 22. no. 188. - Foli, linearib. acatlis in-tegerrimis cauleq. glabris puberulis; calycib. glabris, laciniis linearilanceolatis oblongis integerrimis; corollae labii inferioris laciniis lanceolatis acutiusculis vis-coso-pubescentibus. 2} — Crescit in Mexico. — An recte hujus parograph!?

§. 2. *Stamina quatuor omnia fertilia**

8. *L. XALAPENSIS* H. B. Kth. I. c. 338. — Kth. I. c. — Caule ramisq. teretiusculis hirtellis; foli, lanceolatis acuminatis argute serratis calycibq. glabris; staminib. omnib. fertilib.; laciniis calycinis oblongo-linearib. integerrimis. 2}. — Folia sub-sessilia aequipollicaria, 3 lin. lata. Floret cocclnei extui pilosi. Loculi obovati antherarum mucici. — Forte proprium exhibet genus antheris omnibus molibus fertilibus diversum. — Crescit in declivitate orientali montium Meicanorum prope urbem Xalapam.
0. *L. MULTIFIDA* H. B. Kth. I. c. 338. — Kth. I. c. — Caule rabetragono foliisq. glabriosculis pinnatifidis; staminib. omnib. fertilib.; calycis farinoso-pubescente laciniis lanceolatis inlegerrimis. 2} — Caulis pilosus rubescens. Folia petiolaria 0-12 lin. longa. Corolla coccinea exclus pubescens. Loculi antherarum basi arisuti. — *Sienocklum elegant* Willd. *Herb.* no. 11001. (ex Cham, et Schlichtd. *Linnaea* V. 101.) — Crescit in temperatis Novae Hispaniae Inter Guanajuato et, Santa Rosa de la Sierra.

t *Species non satis nota.*

10. *L. BARTSIOIDES* Hook. *Botanic. Miscell.* II. 231 - Pnbtceos ramosa: foliis linearilanceolatis oblongis crenato-pinnatifidis scabris; bracteae lanceolatis corollae brevioribus; floribus in spicam oblongam congestis. ^T — Habitus omnino *Bartsia viscotae* v. *Banksia cristata* v. *Urtica*, sed calyx cylindricus corollaeque, quae in speciminibus siccis videri, pertinet ad *Umounerim*. — In Peruvia.

4000. CTMBABIA *Metierichm.*

(MeasurerschB. ex Lion. Manilla, pi. 417. — MeUn. *Geogr. plant. vascular.* I. 31. 283. — Seiblbld. ex Nees ab Eseob. *Horae physicae Berolinenses* 109-UOit)

Calyx quadripartitus, denibus interjectis nullis. Corollae lobis oppositis lamina inlegerrima.

1. *C. BORYSTHRMICA* PalUt msa. ex Seiblbld. I. c. 100. t. I. 21. Ig. II. - Plantae fixae tripollicariae, plerumque nuda, tunc tamen dense inretexta caeruleo-alba. Folia linearibus; fere oppositis linearibus subaequalibus floribus ad caulis basi oppositis axillaribus. Flos in 4 lobis. Calyx rarisimè in 4 lobis. Corolla rarisimè in 4 lobis. Antherae 4. — Calyx quadripartitus, denibus interjectis nullis. Corollae lobis oppositis lamina inlegerrima. — *Urtica* v. *Urtica*, sed calyx cylindricus corollaeque, quae in speciminibus siccis videri, pertinet ad *Umounerim*.

labiam inferius sublobam, parum exlorsum flexum, palatum gibbum, intus flavissimum, faux aperla. Stylus parum exsertus. Capsula.....? — Crescit in calcareis ad Kamenaja-balka prope oppidulum BerisUf et ad pluvialem rimum Burguni inter fluvios Boryslhenem et Hypanim.

Seotlo II. EUCIMBA Endlioh. 1. o.

Calyx quinquefidus, denlibus interjeclis minoribus. Corollae labiam superius bipartilum, marginibus reflex is.

2. G. DAVURICA Lion. 1. c. — Lam. Encycl. méh. II. 233. t. 53a (non bona). — Grtnr. De fructib. et seminib. plant I. t 53. — Schleichd. 1. c. 106. f t. 21. fig. 1. — Planta semipedalis, plerumque minor, tota villis dense inlerlextis adpres- aia incana: caulib. plurib. reclis terelib. parum ramosis foliosis; foil, oppositis aeasilib. lanceolatis acuminatia; florib. axillarib. in medio caule subsessilib., sat magnis. 2l — Calyx campanulatus parum ventricosus membranaceus 10-12-co- slalus, ad medium in laciniis 5 valde acuminataj Assus, inter quas reperiuntur alternatim dimidio breviores subulalo-lineares, rariua tdiunt laciniis 0 majorea et lotidem minores. Bractea ad basin calyca gemloae lanceolaiac acutae tubo parum longiores. Corolla calyce fere triplo major, extua minus villosa ringens Bubbilabiata, tubus superue venricosaa, labium soperius fornicatum bipartilum, laenlls rotundatis reflexis, Ubli inferioris tripartiti laciniis rotundatae oblosae, media majori, omnibus deflexis, palatum gibbum, faax aperla, tola corolla pul- bre Data, Intus rubescenti-gutlata. Capsula ovata bilocularis bivahis parum sulcata. Semina irregulariter angulata laevia tubusca. — *Cymbaria Daurica pumila incana*, *Linariae folio mogno*, *lore luteo gutlato* Amm. Rulben. 35. t. 1. Og. 2. — Crescit in apricis monosis berbidis siccioribus glareosisque Davuriae.

4010. ODOYTITEB Uall.

(Haller, Uelvel. 301. - Mcisn. Gener. plant, vasoul. 1. 313. II. 223. — G. Don, Ge- neral byst. of gard. and boU IV. Oil.)

Beetlo L UCRAITHEA Wlpn. msa* — Tubus eorollinos calyce brevior.

1. 0. VEHNA Rchb. Flor. Germ, excars. 330. no. 9440. - Foil, o ba»l Utiori alte- nnaUt laneooUio-linearib. remote aerraUa; braetela oblosgo-lanceolatis flore longiorib.; eorollii aoperaelo margtoo* 4oste pubeaceotlb., lablo anporioo com- presso truncato-obtaao, laclnlla telMorii oblongU obtasia; aallierffa aplct rillo connexis. 0 — Corolla dilute purport*. — *Bupkfmiim tmm* Bellardl In Appndi. II. Pedemoni. 33. — *Bupkratia [BarUia* Huds. mu. ex tyr. Syst vafd. II. 773.) *Odonlilet* Linn. Spec, plant. H4L — Cnrtils, Flor. Lnndin. 1.1 44. — Flor. Danic. t 025. — SchLbr. Bot Hndbch. t. 100. — Martin, Flor. RosL t 48. — 8m. Engl. bot. t. 1415. — Rivin. Monopel Irregul. t. HQ fig. 2. — *Craiaegonum Eupkrati*** Gor. W. cmac. 01-03. — *Kuphratia [OdonUU* Pert. Synops. II. 150. — Ldb. FL Altaic. I. 424.) *rubra* Rib. (ubi?) - *Odoniites tulgari** Stev. M'm. de l'acad. im- p^r. do Mo»cou VI. 4. — Crescit in ami el agris Buropae fere loiiua et in Si- biria Aluica.
- & O. (BART8IA Bertol. Amoenlt. Hal. 33. - EDPHRASIA Urn. Fl. Franc, (edit, ij 39a - Koch, Synopt. fl. Gersn. [edit. 1.] 547.) SBROTINA Rchb. Fl. Germ, cxron. 350. no. M90. — Foil. lancoolaUa aeominatii, baaia venna aubattenuatis remo- tiuscule arrratisi braetela obloogo-laoceolatia flore brevlorib.; corollis superllcle margioeq. dense pabetcentlb.; labio superior! compresso truncato-obiuto, lacl- aiis ioferioria oblongis oblusis; anlberls apice villo connfiis. Q - *Euphratia OdenHtet* fi. Linn. Spec, plantar. 84i. — Crescit in montosii siccis Germamae cl Buropae ausraliorif.
- i O. 'KIPHHASIA Linn. Spec, plantar. Mi - Jcq. Flor. Auttriac. t. 308.) LITKA ftebb. Flor (ierra. etcur*. a*0. no. 2151. — Foil, lanccolato-linearib. obsolete re- moleq. scrraiii, Nupenonb. linoanb inteccmrois. ommb. ciulccj. iuperne ealy- •Ibq. pube»renlib., pillM adprMi* rmpulU oglandulofic; corolla barbato-nliaia; *abo superior compresso truncato-obluso; staminibus corollam supfraniibu»!

- antheris glabris liberis. 0 — *Euphrasia pratensis lutea* C. Baoh. Pinx. 834. — Morris. Oxon. Histor. III. 432. sect. 11. t 24. fig. 16. — *Euphrasia lutea tnontana a>gustifolia major allera* Column. Ecphras. I. 204. t 903. — *Euphrasia Coris* CrnU. Anstriac. stirp. 296. — *Odonlites /lore luteo* Riv. Monop. irregul. t 01. — *Euphrasia linifolia* Lam. Encycl. method. Supplem. 305?? — Habitu referi *Odonktem rubram*, sed differi floribus luteis, corollae labio superiori barbalo emargnato, caale foliisque hispidis, capsala villosa calycem non adaequante, calyce pubescentie. — Grescii in aridis monlosis Earopae praeierlim austral is.
4. O. GRANATENSIS Boiss. Elench. plant Nov. Hispan. 154. el Voyage bot. dans le midi de l'Esp. 1273. t t134. — Annoa: caale hamili erecto ramoso patule hfrsuto subviscoso; foil, lanceolalis, basl apiceq. allenaalis pubescentib. viscidulisq. bracieis flores sobaeqaanlib.; calyoe gianduloso-bispido corolla duplo brevior; corollis glaberrimia parporeis laleraliler compressis, labio superiori cucullato trancalo, inferioris labli lobis parvis rotundalis; anlberis villo conoexis brevissime acominalis; capsula ovalo-compressa submarginala birsula calyce brevlore. O — Caolis ereclus 3-5-pollicaris, jam a basl ramis palolls oppositis instructus, pilis crispulo-lanalis albidis villosos. Folia sessilia lanceolala acuta, basi aite nuata, atrinque puberulo-viscida, caalina circiler polticaria, ramea anguliflora breviora. Spicae terminates anlalerale abbreviate subincurvae 8-10-florae. Bractee viscido-puberulae lanceolato-lineares, calyce longiores, corollam sabaeqaanles. Calyci* birsuti viscosi lacinae acalae, corolla dimidio breviores. Corolla glabra purpurea incurva brevis, ea *O. serotinae* el *O. verna* minor, laleraliler compressa. Labiam saperias galealam oblasum, Informs trilobum paallo brevius, lobis parvis aeqaalibas rolandalis. Anlberae inclusae, apice villo con nexae, basi mucrone brevisaimo inalraciae. Stylus papillosna perststens, sUgma eapltatnaa. Capsala lobla ealyeinls paallo brejior ovata, eoapressa obtain a argtnaia, per median paries vatraaai aatoo profaado p w m t, apice birtella. Senlna cylio*1ea loBgHadlaaHtar crobre alrialo-aileala. — Grescit in Hispania in damosis regionis alpinae Sierra Nevada In monle inter valles rivi Monachil et Barranco de San Joan.
5. O. (EUPHRASIA Linn. Spec. plant 842. var. a. [excl. var. fi.]) LIMFOLIA G. DOD, General syst. of gard. and bot. IV. 011. no. 3. (excl. synonym.) — Foil, linearib. integerrimis; calycib. glabris capsulisq. calyce longiorib. pilosis; florib. luteis. 0 — Crescit in Gallia et in Italia.
6. O. (EUPHRASIA Pers. Enchirid. bot. II. 130.) TEMIFOLIA G. Don I. c no. 4. — Foil, lineari-selaceis inlegerrimis caducis; calycib. tubulosis (quam praecedentis duplo fere longioribus); hradeis ereclis: staminib. corolla breviorib.; anlberis circumcirca barbalo-cilialia. 0 — *Euphrasia HmifoUa* Column. Euphrat* II. 08. t 00. — Brou Flor. LosiUnic. 1.185. (nee Linn.) — In Losiunia.
7. O. (EUPHRASIA Linn. Manil. pint. 80. - Oonan, Illusr. 37. — Lam. Illusr. t. 518. fig. 3.) VISCOSA Rchb. Ft Gens, excors. 300. no. 9498. — Foil, lanceolalo-linearib. obsolete remoleq. serralis, soperiorib. linearib. integerrimis, bis cauleq* soperne calycibq. pubescentib., pllis glanduliferls palenlib.; corolla margin⁰ glabra, labio superiore compresso iruncato-obluso; staminib. corolla breviorib* antheris apice villo connexis. 0 — Flores pallide flavi. Corolla glabra slalim ab a Minibus dislingoitor. Folia laliora quam in *O. lutea*. — *Euphrasia linifolia* ? • Linn. Spec. plantar. 842. — *Pedicularis annua lutea tenuifoUa tiseosa pomu* rtdoUns* Garid. Alt 351. t. 78.
- fi> mwtralis* Boiss. Voyage bot dans le midi de l'Esp. 1270. — Brtvius glanduloso-tiscota: foil, breviorib. lenaiorib^ floralib. flores non aequanlib.; florib* capsQllsq. minorib., rorollis exlus glanduloso-pilosis. — Crescil in Uispaal** Gallia, GaUoprovincia et in Vallesia.
8. O. (LASIOPRBA Prsl. Ft SicnL L p. XXXIV. - ELPBRASIA Gossone, Llnnae* II. 014.) BOCCONI Wpra. mss. - Ganle anffrnUcoso; roll, lanceolalo-linearib* iaferiorib. rtlronam scabHs, saperiorib. margine laevib.) calycib. glabris; **N***

- labii inferioris corollioi subrotundis, in termed I o cmarginato. 2]. — Bocc. Mtis. I. 108. — [*Euphrasiam squarrotam* Slzm., quac ad *O. purpuream* perlinere mox monslrabimus, ill. Reichenbach hue pertinere affirm a I.] — In Sicilia rrescii.
0. 0. (EUPHRASIA Low. Fl. Gallic. 11.367.) CORSICA G. Don, General syst. of gnrd. and bot IV. 611. no. 6. — Caule ad basic proslrato ramoso; Toll, linearib. inlcgerrimis; florib. axillarib. subspicalis; calycib. corollam luteam aequantibus. O — Grescit in montibus insulae Corsicae.
10. 0. (EUPHRASIA Dsfont. Flor. Allant. II. 36.) PURPUREA G. Don I. c. no. 7. — Boiss. Voyage bot. dans le midi de l'Esp. 472. no. 1271. — Foil, linearib. integerimris glabris; racemis secundis; slaminib. corollam aequantib.; capsulis oblongis viscosis. Q — Caulis obscure purpurascens strialellus obsolete tclragonus, rami tcretcs paniculali. Calyx qainquedenlatus. Corolla violacea magnitudine <). *riscosae*, segmentis labii inferioris rotundatis, plerumque denticulatis. Anlherae glabrac. — *Euphrasia squarrosa* Slzm. lib. — *Pedicuiarit annua paluttrit foliit Kali Valenlina* Tourncf. Herb. — Crescit in Hispania aastrali (in provincia Malacilana, in rcgione mediterranea australioH occidental!, in regno Granalensi el Valentino) cl in Africa boreali.
11. O. (EUPURASIA Boreaa, Aon. des scienc. oatur. VI. 254. t) JAUBERTIARA D. Dietr. Synops. plantar, pleramq. III. 544. no. 10. — Foil, linear!-acaminat is bractelsq. tubintegris; dentib. calycis brevib. lanccolalis obtofiasculit; corolla sobaeqnali, lobio superlore arcuato, Infer!ore erecto, lobis iniegris; staminib. styloqknonexscetus; anlheris ovatis, sublns leviter barbali. Q — *Euphratia lutea* Dubois, Flor. Orl. 311. — Crescit in calcarels Galliae meridionalis.
12. O. (EUPHRASIA Brot. Flor. Lusitanic. I. 185.) ASPERA Boiss. Voyage bot. dans le midi de l'Esp. p. 473. (adnot.) — Caule tereli glabro; foil, ovalis obtuse serratis scabris rugoso-linealis; florib. spicalis. O — *Euphrasia atperrima* Lnk. — *La-iioopera atpera* Hffmosgg. — Crescil in Lusitania.
- SeoUo U. MACRANTIEA Boiss. Voyage bot dans le midi de l'Esp. p. 471.
Tubus corollinus calyce longior.
13. O. (EUPHRASIA Vahl, Symbol. boU HI. 7a — Caran. Icon. I. 45. t. 02.) LONGIFLORA B. Webb, Iter. Hispan. 94. — 6. Don I. c. 612. no. 8. — Viieido-pubctens: foil, linearib. inlegenimit; corollae lobo filiformi calycem triplo loperanie. 0 — Folia obtasa, ramealia Imbricaia. Corollae lablum tuperiot Indrlrlsum, Inferioris laciniae rotandatae. Caulis purpurasceos. Rami quadrangalares. Floren axillares spicati lutei. Scmina longiludinaliter striata. Aniberae loculi basf aristali. — Forte novum efficiul genus. — *Euphratia vermicutalo folio UUpantie* Barrel. Icon. 1204. — Boiss. Voyage bot dans le midi de l'Esp. 471. no. 1260. — Crescit in declivibus aridis et dumosis regionis monlanae et alpinae Sierra Tejada, circa Granadam, in collibus supra la Subla et in vallibus supra San Geronimo asceodendo ad cacumen calcareum Dornajo dictum (in Hispania).

4011. EUPIIBASIA Linn.

- (Linn. Gener. plant. 741. [excl. spec. pl.] — Moisan. Gener. plant. vascul. I. 313. II 223. — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 609.)
1. E. OFFICINALIS Linn. Spec. plant. 841. *) — Koch, Syaops. flor. Germ. (edit. 1.) 536. — Foll. ovatis, utrinq. subquiquedentatis; dentib. inferiorib. approximat-

*) *E. OFFICtNAUS* Linn. I. r. - *Strntk bot.* 1.287. (exct.fr.) - Hayne, *Arzneigr.* iX. I. H. — *Kchb. Fl. (ierm.* 358. no. 2444. — *Rigida pyramidata: corollae ralará ulrina, acute bidcntnlm, labii Inbit laferalib. breviorib.; captula oblonga rólundata in murrnm aruminala; foil, nitidit in ticco plicatosulcatit lineatit. Q*

a. pnrvilla: Corolla cnlyce rir senfuilongior.

→ nr.nnlillor;i: Corolla ealyce duplum lonyior. Caulit rclfcjcn pubescent, taepe eanetcens. folia obscure riridia nlnra ovala out cur data, manit r. trntut argute terrain. Caly.r glabcr, corollae lubum afqunnt; corolla flacin'a, i/n-lafo luteo, galea profumdt concaiu; stylus ideo mayit <ic in aliis de/c'rut.

rib, foliorum superiorum acuminatis brevius longiusque mucronatis; labio corollae superiore bilobo, lobis patentibus 2-3-dentatis, inferiore triodo, lacinus profunde emarginatis. O

a. *pratensis* Koch I. c. — Glanduloso-pilosa. pilis paucis, densis foliorum lupulorum mucronatis. Floret plerumque majores lobis, macula ciliosa ad basin labii inferens, lobis sex violaceis in labio superiore et novem in labio inferiore natis. — *E. officinalis* var. *pratensis* Fries, Novil. 0. Suecic. II. 190 — *E. pratensis* Rehb. Flor. Germ. eicors. 390 no. 2446. *) — *E. Roskoviana* Hayne, Arzneigew. IX. L 7.

f. *neglecta* Eoch I. c — Pilosa: pilis patentibus glandulosis, folia superiora sicca In Tarditate subsequente profundius serrata, dentibus cuspidatis. — (Wimm. et Grabowsk. Flor. Siles. II. 218. — Specimina valde pilosa *E. fumosa* fl. *peumala* Lehb. Fl. Germ. eicora. 330. — (In subalpinis procul.)

y. *nemorosa* Koch I. e. — Pilis densis adpressis pubescent, folia superflora praevalde serrata, densas aspidalis, lobis corollae saepe plerumque coeruleum et quandoque lobis hoc coeruleus. — (Pen. Enchirid. II. 140.) - *E. officinalis* Hayne, Arzneigew. IX. U.S. — *B. stricta* Host, Flor. Ausnae. II. 183. — Locis siccioribus frequens.

* *alpestris* Koch I. c — Forma foliorum vel in far. a., pubescens vel in var. jr. — Haec variola*, occurrit: 1. floribus majoribus ejusdem coloris ac variegatis a : — *h. officinalis* fl. *alpestris* Wimm. et Grabowsk. Fl. Siles. II. 218. — 2. Floribus majoribus coeruleis. — 3. Floribus minoribus* variatis *nemorosae* *E. newiorota* Rehb. Fl. Germ. eicors. 358. no. M4S.***) — 4. Dentibus foliorum obliquis; lobis miotis. — *E. micromita* Rehb. I. e. no. 9441 (***)

t. *hatior* Bib. Seropan. Indie, or. At. — Pubescens simpliciter. ramosa: oculo allio. — *B. d'opim* Bib. la Wall. Caul. 3888. — *B. timpa* D. Don, Prodr. fl. Wepal. 9ft. — Cretil In tola Raropa, In Sibira et In India orientali,

ffumitor ramosior conditio: var. curia Fines — Crescit per Mam Europam in siccis apricis.

^ *F. PRATEXIS* Schultze ex Rehb I. e - Laxa tubulata corolla* gaU* uim/ intrenata, lobis tubaeque Ubu*, rapula obcordato-oblonga mucronata* bretwnno emarginatae immerto, foliis pubescentibus, in agro plantis opaeu. O

a. *minima* Jacq. — foliis oralis paucis serratis, lora fere lora Im4to. — Eopbras* minima lula Bocca Mus I 00 Eatlem ramosa wimjor B. alpina I*+ Illustr I 518 /to. 2. - E. of Gcoialis A7. Dante I QSI. - Strm Ft. Dlsehto#* Hfl J. (te. aen.).

f. *lilifolia* Fott. e*rdait> Inamfmi*rU. arsvU serraHs. — Bophrana alba olav cinarum C Bamk. H Moru. Oxam. Bstcr. See\$. II. L 94. fa I. - KupbrasU B|x%% Monopel irregul 1.90 f\$. I. - B. ofldnalis Sckkkrlindb I. ID capr sua non exserim.) — B. Botkowiama If«fa#, Artnetgnr IX I 7 (P. rana non MWior. Tola puttstns, summm4 giamdmiosa. ealveu lanmae laiteres as B of Brinalis CoroUa major atfa, potato htUo. labu lob* laterales Inbme. hnta imhma mrdtom aegmans. Vortoi rartus corolla hlascemlc. — I rescu t> praiis Germantae ad alpes alHssimas usque* ascendunt.

*] *B. NEMOROSA* Pers Emektrid. II. 140. - Rehb I. e. »o 9441 - Laxa subfastigata corolla* aenea ulr%na bterena4a, lobis lob*s imbaeqMahb; eopsmla imbaeq-oblongo, simpoma Ofmslaia truncaio, mucrone brensstmo aptenUua, foil. »o sicco rucalis O

<. leo«ina. foll otahs ssrrahs. - E. of Brinalis Bull Herb I. 233.

0. Mdlau SOL — Fall, tnonouion-eordotts argmU tncuo-serrots - Cretil <***** Germantas omUraUoru.

25 HKfttTBA Behb I c <t.9441 - TensUa mhda eorollas (minimas) galas %irina. obim* trUrmaio. loM loots laUraUb abormoiu. copsuUoblo erans emargioatmrom excedsmU; foil UmeoloHs pomnerehahs, More /ructuque %F*P O - B. of Seioallt tor. slrtcurtewwbbhrgtF GGIMob *, tor gracilis rucalis — Grmto Sjmm ***** rontamuUbbhrgt* rucalis, P. rana pnciatimi, corollis alba, palato luteo, lobis lob* Uroltkms InlmooMs, lora in- lina abbreviata. — In sylvis ericetibus

varietas laiflora rotundifolia {*E. latifolia* Prsh. Flor. Am septentr II 430
occurrit ID America boreal!.*)

2. ξ . MINIMA Schleich. apud DC Flor Franc. HI 473. — Koch, Synops 0. Germ
(edil. 1.) 546. — Foil, ovalis, otnoq. sabquinqueden Uilis, dentib. snpenorum
brefiter mucronaiis; labio corollae aupenore bilobo, lobnlia connWenlibua biden-
tata, Infertore tnfido, lacinifa profunde emarginalis. O — Humllii ramotissima.

*) *Ab hae longe ahenam harum specierum expononem dedxt* H. F. 9 <yer> Wille-
mets (*Euphrasta officinalis* el especies totsxnes *Erica tagans* el
multiflora, *Observations de botanique. Extratli det Memotres*
de la SocHt royale det sciences, lettrei et arts de Nancy, (1833-34.)
- Nanry, 18J5 8co. pp. 10.;

- I *E OFFICINIALIS* — S. WiUem. Le.9. — BraHeis watts glanduloso-pubes-
centhb, grosse serrahs, dentib setaceu; foil, tubstmpctb, dentib oblusis
A. grandiflora — Linn. Flor. Stedc. 218. — DC. ft Franc, III. 472. *fxH*
syn Hull) - K. officinalia a grandiflora Wattr. *Schedul. crUte* 321 — B. of-
ficialis a vulgaris Spenn. *Flor. Fnburg. II. 302.* — B. officinalia a praleiois
Frits, Notxt. flor. Stedc. MS. — B. Botko?iaoa Fay**, *Arsnetgew. IX. I. 7*
- *Spr. SysL vegetab. II. 777.* - E. pratensis A laifolia *Hchb Flor. Germ*
excurs. 390 — *Fchs. Oislor. M0. (ic. J — Bit. Monop. irregul. I. 132.*
B. Intermedia: - B. ofUcloalU *fi. minor Unn. Ft. Stick. 212?* — B. officl-
nallel. neglecu *Koeh, Dtshtmd: Flor. IV. 319.*

C partiflora-

a. anlmla: — B. pralenala a. minima *Rchb. U t. 390. (fxH. su)J*
fi. imbricaia — E. ofQcioalis a. ImbrletU *Koch I. c. 390. (excl syn. Lap)*

2. *E. HEMOROSA* Pers. — 5. Willem. I. c. 7. — *Bracteis sybglabru eglanduloHs,*
taepiu ntidis argute serratu, dentibus longe setacets, foUorum dcnltbus pro*
vanetahbus tarns.

» A. grandiflora' *Glabra dentibusfohorum obtusu.* — E. officinal!* *fi grandi-*
flora Hchb FI. Germ, trcurs. 358. - E. officinalU d. alpestrii *Koch, DUchlns*
Flora IV. 340 - (E. alpina *Linn.??J*

B. Intermedia *Subglabra dentibus foliorum setaeis.*

a. vulgaris — E. ontrinallt *fi. ayfresirla Pers. Enchir II. 140* - B. officinali»
Thuil FI. Parts. 301 - B. officinalia^, nemorou *Pers. I r.* - K officl-
ttfte >, partiflora *WaUr. I. c.* — B. officinaUt *fi. monUna Frim L e.* - B

officinalis
Hustr. t

* BraeuU calydfcnaq— plicata.

fi alpestrla: - B. ofBcnalla #. alptnflt *M—k i <.f*

y. imbricaia.

C. parviflora- *Subglabra: dentibusMiorum obsusii.*

a. gracilis *Glabra substmpUx longe jUiformis strict*.* — B. officinalit B. mon-
tana y gracili« *Fries I. c.* — B. mlcrantha *Behb.<. t.* — B. offleioalia b. al-
pestns *hoch I c*

,i minima *Sublabra, samut p|los|u\$ruLa subsimpUx ererta.* — B. ofBelnalit
lam thrl //. 4UI - K officinalia d. fid. - E. officinalia *. minima *Duby*
— *BarUia humilii Lapeyr. Abr. Pyr. 344.*

Y imbnraia *Glabra bracteu tmbricatu.* — B. minima * *ImbrlcaU Pen. I c*
— *Baruia imbricaia lapeyr. (. c.*

E. ALPINA Um. — S. WUem. I. c. II. - BraHei* *emgusU lanceolatu glabru*
paralMe setacto-demtaHs, baH cmneaUe, foUorum dsmtibus subobiusu.

A. graodiflora: — B. officinalia b. VOL — B. alpina *Lam. I. c.fatL Ma. tt*
synon. UoppeJ — B. alpina r- grandiflora *Gaud.* — B. ofBcnalia *fi. alpina*
Duby. — B. ofacnalia *LoiseL*

B. intermedia

a. ftalisbargeniifl- — *Folus utnnaue bi- seu IrtdtmJalu.* — B. *Salisburgenis*
Fnk m Roem Archtr fur Boll 43 - B. officinalia *fi alpina car Soyrr-*
HiUrm. ohm) - K Alpina *Gaud* - ξ . officinalu *fi. Saliburt*
liaune. \alt\$b t I /In I * *ensis Mh.* -

i tririxpiiJala *fohtt ufnnqu* umdmtalu angusltonbus.* - E. *tricuspidata*

, hnn *Sprc plantar MI* ^v *Huh Almath I ft? /I*. 5*

i. p. parviflora

a. laia -K minima T *ldpruou»n Soyrr- WiUem ohm*
fi imbncau

- foliis et pubescencia similis *E. officinalis* var. *nemorotae*. Flores miduli, labium superius coeruleum, inferius tolura flavum, praeierea aulem ultramque lineis piclum ut in aniecedente specie. — *E. pratensis* a. Rchb. Flor. Germ, excurs. 350. — In pralis alpium Germaniae et Helvetiae crescit.
3. *E. SALISBURGENSIS* Fnk. in Hoppe, Bot. Taschenbch. 1704. p. 100. — Koch |. c. — Rchb. I. c. 350. no. 2447. — Braune, Slzbrgr. Flor. II. t. 1. fig. 1. — Foil. lanceolatis oblongisve, basi caeatis, utrinq. bi-tridentalis, denlib. aequidistantib., foliorum superiorum calycisq. cuspidato-aristatis; labio corollae superiore bilobo, lobis bi-tridentatis, inferiore trifido, laciniis profunde emarginalis. 0 — *Lamarckii* planta ejusdem nominis hamillima est et flores fert magnos coeruleos, tamen hujus varietas esse videtur. — Gracilif, rami filiformes soblignosi fragiles ascendentes, folia durioscula pectinalo-dentata; corolla alba, palato flavo, galea picrumque lilascente, rarlas tola corolla. — *Euphrasia tenuissime ditsecto folio on-gusto* Boca Mas. t 60. — Crescit in alpiibus et subalpinis pralis in Germaoia, Helvetia et in Italia superiore.
4. *E. TRICUSPIDATA* Linn. Spec. planUr. 841. — Koch I c — Rchb. I. c. no. 2448. — Foil, linearib., apice atrinq. anidentatis, denlib. foliorum etiam superiorum calycisq. aculis mnticis; labio corollae superiore bilobo, lobis bi-tridentatis, inferiore trifido, laciniis profunde emarginalis. 0 — Folia angusta linearia 0 lin. longa, semilineam lata, a basi usque ad ires longiludinis paries edentula, deinde denibus geminis brevibus non mucronatis ins (me la. Flores ui in *E. officinali*. — *Euphrasia angustis ei iricuspidatis foliis, floribus sx albo purpureis* Pluken. Aim. 142., Phytogr. L 177. fig. 1 — Zannich. Hist. 110. L 76. — In monte Baldo.
5. *E. TATARICA* Fisch. mss. in Spr. Syst. ?egeU II. 777. — Ledeb. Icon. flor. Boss. Altaic, I 435., Flor. AlUic. II. 423. f - SobgUnduloio-Yillosa: foil, sessilib. lale ovatis serratis; florib. •lilltrib. aollariU; carjclb. glaadoso-pubescentib.; corollae laeiots emarginatis; eapsullt eaJeom saperaotibus. 0 — Affinis *E. officinalis**, differ! tamen caele sobpedall sobslmpllel glanduloso-fillosulo, pilis nonnullis articalatis, foliis inferioribus brevissime peliolatis, superioribus exacle scssilibus, mullo lalioribus, summis fere cordatis serratis quidem, serraturis vero paucioribus, lalioribus brevionibusque oblusioribus, ulrinque sublus dentiusque glanduloso-pubescentibus, calycibus glanduloso-pilosi*; capsula matura brevifloribus. — Crescit in apricis ad fl. l'ba, Kerlyk et T»cbar)sch.)
6. *E. CIXEATA* ForsL Prodrum. no. 2M. - A. Richard, Voyage de l'Astrolabe (Bo-Unique, II. 101. f — Caale ramoso lereli scabro; foil, obtusis subcuneatis* bino illinc uni- T. bidentatis rrasiusculis; florib. spicatis» lermioalibus. Q? — raalli panicalalo-ramosus. Folia opposita parvula crassiuncula, basi angustata tabpetiolaia, apice oblusa, obsolete I-2-dentata la la. Calyi lubulosos compr<sus subam*'' plialus quadrilobus. Corollae labium superius subfalcalum biGdum, inferiore trifido, lobis subaequalibus, apice obloso truncatis. Stamina inrlu*a. Capsula oblonga compressa calycem duplo superaos oblusa biloculatis poljsprroa. st mlna otoidra, basi apiceque ciruneula cello lot a acuta lerminata. — Crescit i0 IS'o?ae Zeelandiae rupibus Baritlmls (Bale Tologa) obi Hal* vulgo nunrupaiur.
7. *E. ALPINA* R. Br. Prodr. fl. Mov. Hollaad. 430. (edit. X ab Eseob. 802.) - Co~rollae laciniis omnib. emarginatis; calyclb. subsessilib. pubrscentib., capsula p<* ram brtviorib.; foil, conealis 3-5-crenatis glibrit, ramorum fertiliu di<tanliD*» sterilium decussatis. 0 - *E. Diewunica* Spr. Sysi. vrgriab. II. 777. no. tt- " .. Insvla Van Dienens Land ertscit
8. *E. TBTRAGONA* R. Br. I. I. e. c. - Corollae larimi* mfrnorib. emarginaliis; «•' lycib. Riabris obtdis subsestilib. capsolat arquannb; full, nubotalib. 3-5-deO* Ulis oblutis gUbrU; raule leiragono. -^ - lo No»tc llolldmliar ora ausirali-

0. E. COLL IN A R. Br. I. I. c. c. — Gorollae laciniis omnib. emarginatis; calycib. glabris capsula fere dimidio breviorib.; spica mulliflora, parib. (florum) inferiorib. distantib.; foil, lineari-cuneatis obtuse tridentalis glabris. Q — Crescit in insula Van Diemens Land.
10. E. STRIATA R. Br. I. 1. c. c. — Corollae laciniis striatis retails; calycib. acutiusculis glabris; spica subovata; florib. omnib. imbricatis; bracleis foliisq. subpalmato-5-lobis glabris; caulib. adscendenlibus. Q " — Crescit la insula Van Diemens Land.
11. E. PALUDOSA R. Br. I. I. c. c. — Gorollae laciniis snbintegr; calycib. acutiusculis; spicae multiflorae parib. inferiorib. disinctis; foil, linearib. acutiusculis paucidentalis glabris, rameis distantibus. O — Grescit in Nova Hollandia (New South Wales prope Port Jackson). *
12. E. SPKCIOSA R. Br. I. c. 437. - (edit. N. ab Esenb. 203.). - Corollae laciniis rclusis, inferiorum intermedia emarginata; calycib. acutiusculis pubescenlib.; foil, decusvatis ovalis crenalo-incisis cauleque ereeto scabris. 0 — Crescit in Nova Hollandia (in New South Wales prope Port Jackson).
13. E. SCABRA R. Br. I. I. c. c. — Glanduloso-pubescent scabra: corollae pubescentis laciniis integris; calycib. acatis; foil, lanceolatis dentato-incisis. 0 — In insula Van Diemens Land et in Novae Hollandiae ora anstrall crescit.
14. E. ARGUTA R. Br. I. I. o. c — Pubescens: corollae laciniis integris; calycib. bractisq. selaceo-acunlioatif; foil. lanceolatis pinnatifido-ineisia scabiis; caulo erecto. O — Crescit In Nova Hollandia (In New South Wales prope Port Jackson).
15. E. SANTOLINAEFOLIA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 333. t. 106. - Kth. Synops. plant, acquinocl. 11. 102. — Piloso-glandulosa viscosa: canleramoso tereli erecto; foil, linearib. obtusis crenalis; filamenlis pubescentib.; antheris, stjlo capsulisq. glabris. 2}. — Folia 4-5 lineas longa. Corollae labium supcnut concavura emarginalum. Foliorum crenaturae revolutae. Capsula oblonga obtu*a sobcompressa. — Credit in planitir Novo - Granajensi inter Suacha et Santa Fe de Bogota.
10. B. STRICTA H. B. Kth. I. c. 333. - Kth. I. c. - lliipida)a: caule subsfmplici snbtetragooo stricio; foil, linear! - lanceolatis oblosioscutis crenatis; filamentis antherisq. glabris; stylo capsulisq. pilloais. 2} - Folia 7-8 llaeas longa. Corolla lutea puberula. Capsula obtota comprotu. - PraecedentU martin* affinis. - Crescit locis temperatis et fhgidis prope villa* QoJUo QoJloislom et ID declivitate montis Anlisanac.
17. E. MELAMPYROIDES H. B. Kth. 1. C 334. - Kth. I. c - Caule paniculato teretiusculo rcfloxo-bispido; foil, llocarfb., tpice obtuie denutis bispidis; calycib. piloso-glanduloiis; filamentis glabris; antheris atylo capsulisq. pilosin. 2} — Folia 7-8 lineas longa. Corolla lulca. Capsula oblonga compressa. — Crescit loci* temp'ratis regni Quilen<>is in planilte Cachabambae Juxu PinUc in radicibus montis Anlitanac.
18. E. Mt'TICA H. B. Kth. I. c - Kth. I. c. 103. - Caule pauciculato tereli foln^q. bispidis linear!-lanceolalif grosse serrato-crenalis; calycib. hispdis; corolla stylo Olamentisq. piloaia; antheris glabris mulicis; capsulis hlrsutis. % - Folia pollicaria. Corolla coeruloa. — Crescit loots sicels Peruviae inter Lucarqur el A>avacam.
10. E. GRANDIFLORA Hochst. mss. In Seubert, Fior. Atoric. 30. no. 280. t 8. Og. 2. — Caule fruticuloso ramono pubescenle; foil, sesslib. f basi Iruncata avato-subrotuntlis, margini* redcto crenato-dentatis coriaceo-rigidis glabris, praesrrtim subius roicubio-rutfulosn; florib. in caulis rl ramorum apice rongrslo-spicati> roroll.1 cahçcm triplo tuipcranle. Z} — Corolla Hperiosa purpurascenn. labn infonoriH Ir lulu lacunae lair marpn.ilac, lamina ^ericro-birlella faucrque corollae macula nã\CNConiibuH \arirgaia In prncrupio humido ad latu^ occt-dentalo n> n|s i^unonn IUMIUP |*|? . V(>rarum

20. E. HOLLIANA Lowe, Transact. or the Cambridge Philos. Soc. IV. 20. t — Laciniiis calycinis foliisq. lanceolato-oblongis oblusis, inferiorib. grosse denatis, suumis subinlegris; corolla lulea calycem duplo excedent; staminib. corollam subaequantib.; caule ramoso. O? — Corollae conspicuae sal magna labio interim trilobum, lobis rotundis obtusissimis denticulatis, superius simplex. Folia et habitus quodammodo *Odontitis vulgaris*. — Ob aetheras distinctissime aristatas vera *Euphrasiae* species, etiam toto habitu, caule ramoso etc. a *BarUia tifeota* differt. — *BarUia viscosa* var. Bnki. Ub. — In sylvis insulae Madeirae-

t Specie* vix notae.

21. E. (LASIOPERA Pral. Flor. Sieol. 1. p. XXXIV.) RIGIDIFOLIA Bivona in Spr. fcyat. vegetab. II. 775. — Caule bast Irifido stictico; foil, linearib. obtusiusculi, subtos convulsi erecta calycibq. srigillosis, saperiorib. remotis; florib. spicatis aliernif; corollia calycem excedentibus. Q? — Forte ad *Odomilem* pertinet. — Crescit in Sicilia.

21 E. GLUTINOSA M. Bleb. Flor. Taar. Caucas. II. 70. - Glanduloso-pilosa viscosa: foil, linearib. carnosis integerrima; lorib. tobracemosis; corolla calycem »uperant. Q? — Planula taepae digilo minor, tota pilis apice glanduliferis viscosa. Florrs *£. luteae* minores, calyce ultra dimidium quadrifido, laciniiis linearibus corolla lulea, lubo calyce paullo longiore, labio superiori brevi, inferiore plao Irinbo, lobis subaequalibus. — *Pedicularu ohematu annua Psyllii folio, flore luteo* Tournef. Cor. 0. — In Taariae sammo moole Ttcbaturdag.

ZL E. ASPERA Willd. Hb. ei Spr. Sytt tegeUb. II. 775. - Foil, linearib. ctllioihixpidis; florib. allarnit teatilib.; tobo corollae soperne Inflalo, calycem iriplo superanto. O - Craeil In Guinea.

M. B. KAUFORMS Willd. BnomoraL pi. aon. Btrollin. 63ft. (adnot) - Spr. I. c - Herbaea ttrioia niaplda: foil, linoari-lancoolaUs Integerrimft tubcarnosis abbreviaali. O - Crescit in Hispania.

tf Sptde* e genere expellendae.

- E. ASPERA Brotert - ODONTITES ASPERA.
- E. ASPKRRIMA Lnk. - ODONTITES ASPERA.
- E. BOO'OM Guss. - ODOMITES BOCCOM.
- E. CORIS Crali. - ODONTITES LUTEA.
- E. (I)ROMA>DiaA>A Spr. - Sopi'bia DELPHIMIFOLIA
- E. CORSICA Lowe - ODONTITES CORSICA.
- P. JAI'BERTIANA Boroao - ODONTITBS JACBRRRIA.^A.
- E. LAEVIS Galor - ODOMTITES LITBA.
- E. LANCKOLATA Gaud. - ODO.1TITBS LUTBA.
- K. LATIFOLIA Linn. - BARTSIA PI'RPI'RKA.
- E. LIXIFOLIA Brolero - ODONTITBS TB^1'IFOUA.
- B. UMFOLIA Lam. - ODONTITES VISCOSA.
- B. LONGIFLORA Vabl - ODONTITBS LONGIFLORA.
- K. LtTEA D<boi> - ODONTITES JAI'BCRTIAKA.
- K. LI'TBA Linn. - ODONTITBS LITBA.
- E. ODONTITBS Linn. - ODONTITES VERSA.
- K. PI'BPiREA DtfonL - ODONTITBS PI R PL RE A.
- B. BURBA Rf*. - ODONTITES VERNA.
- B. SBRQTINA Urn. - ODO.NTITEH SKROTOV
- B. SPIRAUS Pow. - OOONTITBS TBNIIFOLH-
- B. SQ'ARROSA Scfnier. - ODONTITES PCRPT RKi
- B. TENI'IFQLIA Pm. - ODONTITRS TKNtIFOLU
- B. VERMA Boll. - ODONTITBS VERNA.
- B. VtSCOIA Um. ^ ODONTITES VISCOSA.
- K. VIRQATA Lnk - ODONTITIS TBNI'IFOLIA.

PABEXTUCELLIA *Viviani.*

(Vivioni, Flor. Lybic 32. t. 21. ~~III~~ 2. — Meisn. Gener. plaolar. vascular. I. 31*2 II. 223. — G. Don, General syst. of gard. and bol. IV. 027.)

Calyx tubulosus inflatus membranaceus quinqueadontataa, deolibus lineari-lanceolatis inaequalibus glanduloso-pilosis. Corollae taboo gracilis, limbis bilabiatus, labio superior! ovato concavo galeato, inferior! lineari, versus faucem piloso canaliculato, apice trilobo. Stamina quatuor subaequalia basi labii superioris inscrla; antherae globosae didymae conniventcs. Stigma crassum Iruncalum. Capsula subbilocularis bivalvis, valvis introfleis dissepimentum incompletum efficientibus. Semina in placentis pariculis pendula, breviter funiculata. — Herba L)ica annua pilosa: foliis oppositis sessilibus 5-?-nerviis, radicalibus ovatis aculis profunde serratis, superioribus floralibusque otalo-lanceolatis denatis acutis, supremis tricuspudatis. Floras purpurei. — Hoc genus proprius ad Rhinanthum quam ad Eud^rasiam accedere videtur.

1. P. FLORIBUNDA Viviani I. c. ex G. Don I. c — Floret aollUrll aittlares, spicali vel racemioi, pedicelli brevlaalmi. O — Creaall Io Lybiae mootibos mar (limit.

4012. SIPHONOSTEGIA *Bth.*

(Bib. Scrophul. Indie 51. — Meien. Gener. plant vatrul. I. 313. II. 223. — Hook, el Aro. Bot. Beech, voy. 203. t. 44. — Bnge. in Bullet. scienliQque de l'acad. irapér. de St. Ptrsbrg. VII. 278. — Kndlich. Gener. plantar. Supplem. II. pag. 61. [charact. emendatus.) — *Prismatanthu** Hook, et Arn. ms*. — tVarovia Bnge. mss.)

I. S. CIINENSIS Blh. I. c. - Hook, et A*m I. c. — Herba erecta: ramu %airfai< lenuissimc pubescentib.; foil, inferiorib. oppotilit, Huperiorib. alternis pinnaii-6dit, laciniis incitis acutii lanceolatit; florib. »par»it »ubdi»taniil. >ub»cs»ilibM in tpicaa iniempiai racemotve terninalci digeilit. O? ^J? — *Pritmatamthus bartrtoid*** Hook, el Aro. nut. - Creicil io China ad urbca Macao.

4013. BABIWUft *tMm.*

(Lino. Gener. planiar. 130. — Melao. Graar. plaoL ?aae<l. I. 313. II. 20. - G. Doiñ, Georeal syaL of gard. aod bol. IV. 612.)

Sectlo I. BABTMUA *EmiL* «eatr. »lamt ». t?4.

Semina majuscula, dorso convexo alls aenlt-octooit intracia.

I. B. (STAKCIKLINA Crnii. Slirp. Ausriac. 2M.) AtPINA Linn. Spec. plant 839. - Sm. Knitl. bot. t. 301. — S>en*k bol. t. 573. - Scbkbr. BoL llandcb. I. i. 169. — Sum. Fl. DUchlndf. lift. 17. (ic. aen.) — Hook. Fl. Loodio. t 87. — Rchb. V|. Germ, eieurt. 361. no. 2156. — Koch, Syoopa. fl. Germ, (edit I.) 345. — Foil. <p>poftiiu otati* fubamplexieaulib. obioae aerralit; antheris piloala; cap<uli> pilohu caljfre longioriboa. ^ — Spiihanaea ereeia, Oorei apieen vertot axillare&(corolla calycc plus dnplo looglor violaceo-llveoa. — *BmpkrmHm rubra H'estMorlamdiae, Mis brevibus oUusi** Raj. Angl. IV. 318. — P^dtvutmrís ge%*t mtmtamum Oed. Flor. Danlr. t 43. — *Clinopodium alpHutm* Poo. Mont Bald. 3U. — *CUnopodium alpinum kirmlmm* C. Baub. Pinx. 285. — Ploken. Ph)lo|T. I. 163. fl|. 5. - Crckcit in alpbaa toiiu» fere Kuropae el in Labrador.

8. B. SPICATA Per*. Knchir. II. HO. - Ramond in Bullet det sc. natur. oo. XI. II. 141. Og 4. - Foil. oppoMii* o\ato-cordatii obtuse denialii, aopcriorib. lancco-laiit remoius ilcnialis; flonb. irobncio-spicalii; pcicia ramotic; ^Umioib. ga-•caoi ae<uanlib.; anthem piloiis; capsulis cal>ce longioribut pilotit. O — Spic<longata. Brarieae <uam cal>cei bre<iore». Florc» lutn? - *U. fayoiimf* Lapew *'^ Greacii in Pyrenaeif

Sectlo II. TRIXAGO Steven, Mem. de la soclete d'hist. nat. de Mote. ¶1. 3.

Semma minima laeviuscula.

3. B. PERUVUNA WIprs. Nov. act acad. Gaes. Leopold Carol, nalur curios. XIX. Supplem. I. 400. — Caul* erecto ramoso glanduloso-lomentoso, foil, sessilib lineanb. oblusissimis crenalo-denUtis; flonb. in foliorum a\illi» solitarus subsessilib spicaiis; corollis calyce viz longionbus. O — Uerba pedalis erccta ramosn, rami axillares oppositi. Folia 6-0 lineas longa, 2-3 linear lala sessiha cum caule glanduloso-lomenlosa, exsiccalione nigra. Calyx carupanulatus a equal Herquadnfidus, lacions lineanbus obtusis, cum tubo 8-0 lineas longis Corolla calyce vix longior brunnea. — Crescit in Peravia (Laguna di Tihcaca el circa Tissalomam).
4. B. (TRIXAGO Slev. Monogr. Pedicul. 4.) PURPI'REA Dub), Dot. Gallic. 3H. - Caule aubsimplici v. e ban ramoso; foil, ovalis denlato-palmatis; spicis basi interruptis folions; calycib. villosis, segmenlis lanceolalis oblrns, anibens glabriusculis; semimb. trigoms reciis. O — Herba 2-6-pollicaris pubescens, basi subramosa, corolla tubulosa alba, limbo kermeaino brevi, palalo crocco. — Auphratta pralentts latifolia Ilaltea C Banofrini. 234. — Won*. Oxon Histor. HI. 430 seel II. I. 21. fig 8 — Euphratia lertia latifolia pralensit Colurom Krpliras. 200 t 1302 fig. 2. — Euphrasta [Trtxago Rcb. Flor. Germ, excur* 300 no. 2453. — Bartsta Sm. Flor. Graec. VI. 60. I. 586. — Euphragta Gnsch Spicileg. 0or. Rumel. II. 14.) latifolta Linn. Spec, plantar. 841. — Euphrasta purpurea minor Magn. Monspel. 05. t. 04. — Barrel. Icon. 276. fig. 3. - Sabb. Hon. Roman. 3. 1.7. — Crescit in collibus incultis Ulnae, Monspelii, Italiae et Africae borealis.
5. B. (LASIOPERA Lnk. el Hffmuffg. Flor. Portug. U 61. - TRIXAGO Rcb. I. c. no. MM.) VISCO8A Lias. Spec. flanUr. 830. - 8m. Engl. bot t. 1045. — Lightf. Flor. Seolic ttl. L l i - Hoek. Flor. Londn. L 161. — G. Don, General syst of gard. and bot 612. fig. 80. — Villota, superne vitcoia: foil, lanceolatis ocuminatis groaae serratfn, superiorib. (braeteei) alternia lloeari-lanceolals neucie MT-ralis; flonb. distantib. axillanb.; atamimb. galea brevionb.; anlhms pilosis; segmentis caljcims lineari-lanceolatis acutis. O — Cauhs tres <impk*. £grOU lulea Capsula pilosa calyce mullo brevior Tola planla viscosa — Euphrasi* lutea palutnt Pluk. Aim. 142. I. 27. fig. 5. — Euphratta lutca lattfoba palutirU Moris Oxon Ilislor. III. 432. — Aleclorolophot Ilalica luteo-pallida Barrel. Icon, rar 209. I 065. — Rhtnanthm tiscotut Sm. Fl. Bnl 018.
- # btrolor Rcb; I c. — Pubescens caule stmplici v. parum ramoso; foil, opposite lancfolalo-lineanb. serralis; flonb. dense spirant; bractfis o^atia * > ovato-rotundalis; calyrib. lanatis, segmenlis ovalis obtusis; rorollis albidii? galra rosea; antheris pilosis: capsulis villosis calyce brevionbu* — tlartii* btcolor DC. Icon. pi. rar. Gall. L 10. - Duby, Bot Gallic. 3M. - Cre<ci loci* uligmosis por toiam Europam auslralem (cUam in Britannia) el in Brasilia⁰ provlncia Montevideosi.
6. B rBELLARBIA All. PedenonL SML - RHINAMTHUS Lion. Spec, plant. M0. - TRIXAGO Linn. Spec pUnL (edit 1) 602. - Sm. Flor. Graec t 585. - VillosopQbeseeoj: eaule simplicissimo; foil, opposiu* lanrrolalis oblose serralis, br**~ leis late ovatia, supremis inlegerrinit; flonb. dense spicatts; calycib. lan<u< ••* lose minuieq. doajialis; anthem pilosis; corollae labil inferioris lacinia media oblosa, lateralib. aoioon; capsola villosa ralycem ar<|ianlr. J - faults go*ij" drangularis laaalita. Corolla crocea, foliorum denirn rlongati. Ttxago allid urrmtto foUU Barrel. Icon. 714. fig. 2. - Unoptra rhtmamhma Lnk el HHTmashg Fl. Portof. U 9 8 .
- fl. rrrricolor Rcb. I c. - Corolla alba, galra rotra. folinrum drniib breve-nbus. — Brrttm (Kk*mm*tku* Df. Flor Allanl II tl rrrticolor Pers. K cbiHd.lt 151.— Trtxago Apula umteamtu Column K< |>hr IH I IU) I. ¹⁹] Moris. Oioo Uittor. III. 4i7 *rcl II ID I O M - 9>edtc*lan* rrrt*fot *Pira Coiira Insllt 172. Barrel Iron 666 Unoptra th*****

venicolor Lnk. et Hoffmngg. I. c. — Crescit in maritimis regionibus Mediterranearum, in Palaestina.

7. B. MAXIMA Pers. Enchirid. II. 151. — Ganle ramoso; foliis inferioribus oppositis, superioribus alternis oblongis obtuse et grosse dentatis; corolla e labio in fenestra superiore excedente, segmentis labii inferioris aequalibus obtusis. Q — Pubescens. Flores lutei in spicis terminalibus diglossis. — *Rhinanthus verricolor* Lam. Diction. II. 02. — *Pedicularis Cretica maxima amplioribus foliis et floribus* Tourn. Cor. 9. — Crescit in insula Candia.
- a B. (TRIXAGO Griseb. Spicileg. fl. Rummel. II. 12 t) CARNEA Griseb. mss. — Caulis glanduloso hispido; foliis oblongo-linearibus remote obtuseque serratis; spicae bracteis superioribus ovato-subulatis integerrimis calycibus glanduloso-pilosis; calycis interioribus dentibus connatis brevibus obtusatis; corollae roseo-albae labiis longitudine subaequalibus; stigmatibus crassis. — Herba 1-3-pedalis interne ramosa. Spica fructifera saepe semipedalis. Capsula ovoidea calycem aequans breviter rostrata. — *Aleclorolophus* Trixago* M. Bieberst. (nec alior.) — Crescit in Macedonia et in Thracia.
9. B. (TRIXAGO Rehb. Flora [B.Z.] 1330.131.) SCORDIFOLIA Steud. Nomencl. bot. (edit. 2.) I. 189. — Palenti-ramosa: foliis ovato-oblongis obtuse serratis glabris. O — Crescit in insula Madera.

f *Species e genere expectandae.*

- B. ACUMINATA - GASTILBEJA ACUMINATA.
 B. CAPENSIS Spr. — POLYCARENA CAPENSIS?
 B. COCCINEA Arrabida, Flor. Flum. VI. u. 12. — ? T
 B. COCCINEA Linn. - CASTILLEJA COCCINEA.
 B. GALLICA Poir. = GYMNANDRA INTEGRIFOLIA.
 B. GRANDIFLORA Spr. - CASTILLEJA GRANDIFLORA
 B. HUMILIS Lapour. - ETPIRASIA MINIMA.
 B. IMBRICATA Lapour. — ETPIRASIA OFFICINALIS (var).
 B. ODONTITES Buds. - ODONTITES VERA.
 B. PALLIDA Linn. - CASTILLEJA PALLIDA.
 B. SCABRA Spr. - GLOSSOSTYLIS CAPENSIS.
 B. SEROTINA Huds. — ODONTITES VERA.
 B. SEROTINA Bertol. — ODONTITES SBROTINA.
 B. TENUIFOLIA Prsb. — ORTHOCARPUS TBNUIFOLIUS.
 B. TRIFIDA Spr. - BUNGEA TRIFIDA.

4014. BUNCUEA C. B. M&S.

(C. A. Meyer, Venecho. d. Pflanzl. am Caucas. 106. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 313. II. 221)

1. B. (BARTSIA Spr. Syst. vegetab. II. 773.) TRIFIDA C. A. Mey. I. c. 109. - Corolla luca, exclusa villosula. Calyx pubescens inflatus. Q — *Rhinanthus trifidus* Vahl, Symbol. bot. 1.44. — *Pedicularis orientalis turpina, folio trifido, flore magno flare Meenle* Tournef. Cor. 9. — Buib. Centur. 1.5. t. ft. — Oeteil in Canesibus montibus Talisch prope Swant (altitudine 6-800 pedum).

4015. PEDICULARIS Tournef.

(Tournef. Intitulat. rei herb. I. 77. — Meisn. Gener. plant. I. 312. II. 22X — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 019.)

Beetle I. PEDICULARIS Behb. Her. Cera. exew. MI.

Labium corollae inferius deflexum.

- §. 1. *Verticillatae* Steven, Monogr. Pedicular. 20. — *Cyclophyllum* Bnge. mss.

' *Rostratae*: — *Haifa rostrata*.

1. P. CHAMISSONIS Sloven. Monogr. Prdiru. 30. J. I. 4. Hg. 1. - Caulis nodosus siliquis; foliis in quibusdam omnibus. dandr qualrriam fronsillali* profuodo pinnatis.

- fidjs, laciois lanceolate opposing inOmis pinnaliOdis, supenonb. serraiis; verticillis fl on fens in apicc caulis 5-6 superpositis, flonb in singulo subsems sessilib , corollae galea nncinata. O — *Plania speciosa*, tola glabernma, annua (vel bien-nis?*) . Folia quandoque omma verticillata, lacinus superiorum integernmis, eilima eloogata. Bractee quaiernae foliis similes at ramoses Corolla *flava*, sicca obscure violacea, lubus calyce duplo longior, galea in rostrum acutum de-flexum v subrectum producua, omoioo edeotula, labium infer!us trilobum, lobo medio minore. Filamenla duo pilosa. Capsula calyce sesquilongior, valde obli-qua, mucrooe longo. Semioa angulata membraoaceo-stnata. — *P. kamoia* M> Bieberst. Hb. — *P. Romanxofllt* Cham, ex Spr. Sysi. veget II 773. — Irescil in Sibinae alpibos Gorgonensibus frequent et in insula Unalashka.
2. P MYRIOPHYLLA Pall. Itin. III. 331. 440. 737. U 8. fig. 1. A - Steven I c 21. - Bnge. Mém. de l'acad Impér. de Si. Plrsbrg. des div. sav. 11. 567. — Foil radi-calib fere longitndine caulis bipinnatifidis, pinnts distantib. inaequalib., majorib plnnatiflldis, foil, caulims quaternatim terlicillaiis pinnaiifidis; florum •erticillis in spicam terminalem biuncialem aggregalis; bracleis etiam sommis lacimalU, calyce glabro, subtus ad medium fissio, galeae roslro uncinato, apice emarginalo. 2f — Calyris denies breves, saepe serrulati, sammo minore. Filamenla longiora barbellata, antberae otatae, basi sagilitaiae. Sligma plerumque cxsertum incre-s*alum. Capsula calyce mullo major obliqoa acuminata Corolla *flava*
\$. purpurea Bnge. I. c — Flonbus porascentibus. — *P. rupestru* Turcz. mss. — Crescil ill rupibus apncis ad Jeniseam, in paludibus alpinis Davuriae ad 0. Kirkun el in alpibus Aliaicis.
3. P. ABROTANIFOLIA M. Biebertt. mat. in Steven I. c tt. t t 5. 0g I. - Ledeb. Icon. flor. Rota. Altaic illoalr. t 278. — Ledeb. Flor. AUic. II. 496. f — Bnge. I. c 567.' — Foil, plaoaiifidis qoatenulia verlicitlaUs, lacioili linearib. pinnaiifidis, extimia minorib. qnandoq. deajlicoUUa; calycib. membranaceii birsutls quInqnedenUlis, deotib. bracteiaq. clliato-binutit subinlegemmis, galeae rectae rostro subnullo; tpica dema; caole ipsa basi ramoio, caetenim simplici </ et O — Caulis spithamaeua ad angulot pubescens Spica terminalis uncialis dense hirsuta. Bractee latae. Calyi ovatus inflatus, ore angustatus. Corollae tubus quam plerumque congenerum longior, calycem duplo eicedens Corolla ad unam tertiam bilabiata, galea rctangule contexta in rostrum obtusum brevissimum de-sinens, labium inferius trilobum palenlisumum, longiludine corollae. FilamenU glabra Sligma ex#ertum incre»satum. Capsula otala obliqua vix mocronalii calyce paullo longior - *P. verhetUato*, 9 Willd Spec plant III. 214.
fi glabreseau Ledeb Fl. Altaic. II. 490. — Praecocior procenor calycib bract-mq. glabretceDlib.; spica basi inlerrupla — Crescil In Sibiria olienore, ID apricis nonlosis ad IL Kerlyk et Kan in Tacbarysch influentes, ad fl. Tschujam
- 4 P OTERRI'PTA Slepban mss. ei Willd. Spec, plant. III. 214. - Steven I. c. 23. t I 6. - Ledeb. Icon flor. ROM. Altaic. I. 434, - Ledeb. Flor Altaic II 42) t — Caule simplici, Toll piooatifidis, laciniis lanceolatis inclso-scrrolK, spira in* termpta; galeae hemispbaericae rostro subnullo, calyce quinqurfido, (acinus bracteiaq. serraiis glabnusculi*. % — Caules solitarii v. pturrs e radire muliicipili Vt-1-pedales el altiores quadrifariam pilosi Folia infenora 4-5-polhcaria, suprema bipollicana, circumscnplione oblongo-lancrolala, utnnque attenuate glabra, lacioiae albo-cartilagineo-marglnaiae mucronatae. Spica e vtrlicilli* ^-eVfloris, inferioribas v. omnibus remoliusculis Brartrae ovatae aerraiac gU* brliacslae qsateraa. Calyi 10-eotlalos, tabaequaluer acuteque quinqurdentatus, denUboa stbdeoticulat*. Corolla alba <u flavicans Gaka ommno rdntula hemuphaerkca. Labii inferiona ciistatl lacioiae abbreviatat obiusae. Filament* duo barbau. - Creacit baud procal a fodina Soloiuscbentkoi in rollibus ad n-volum Reaowka.
- [^] F. SUBROBTRATA C A. Meyer, Venewho. der Pflotn. am Caucas. 109. - P_{er}~
 •»»U: caale timpllelaalM; foil. eaoJmu qattenia plooaufldia, Ucioiia abbrevUU

- obtusis, floribus dense glaucis; calycibus glaberrimis semiquinquefidis, corollae (purpureae) nongentis galea brevissima rotundata. % — Folia *P. verticillata*, corollae *P. aduncae*. — Crescit in montibus Caucasiacis.
6. *P. CRASSIROSTRIS* Bunge. Ballet, scientif. de l'acad. impe. des sc. de St. Petersburg VIII. 248 no II. — Caule simplici; foliis quaternatis verticillatis pinnatisectis, segmentis abbreviatis inciso-serratis, verticillis inferioribus remotis, summis spicatis; bracteis superioribus ambigua obovatis subpalmatifidis, basi inaequalibus, superne dentatis, calyce campanulato quinquefidio, laciniis elongatis inaequalibus spalhulatis denticulatis, corollae tubo calycem excedente incurvo; galea conveia sensim attenuata in rostrum incurvum crassum conicum truncato-obtusum, labii inferioris laciniis lateralibus oblongis obtusis, media obovato-orbiculari multo minori, filamentis glaberrimis; capsula . . . 2l — Flores videntur purpurascens — *P. rufra* Guldens*. Her. 1. 427??? — Crescit in montibus prope Tschukmen Imeriali, provinciae Transcaucasicae.
7. *P. GRACILIS* Wall. Catal. 413. ex Bth. Scrophul. Indie 38. — Elata paniculato-ramosa caule bifurcata piloso; foliis pinnatifidis, laciniis oblongis obtusis serrulatis incisive; floribus dialantibus; calycibus binae floris, dentibus brevibus integerrimis; galea rostro tenui recto. 2l — Variat foliis magis minusve incisive. — *P. verticillata* Wall. Catal. 414. — *P. Bismaliana* Wall. Catal. 422. — Crescit in Nepalla, Gossain Than et Kamaon, Mmaoree.
8. *P. PECTINATA* Wall. Catal. 420. — Bth. I. c. — Erecta elata subsimplex glabra foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis acutis serratis pinnatifidis; spica laxigula; calycis dentibus brevibus integerrimis; galeae rostro longo, apice contorto. % — Crescit in Kamaon, ad Ihoor, Pyr Pundjal et versus Cashemenam.
9. *P. PYRAMIDATA* (Ko)te mss in Bth I c — Lindl Bot Regist. (New Ser) XIV PI (cell IV) — Galea elata subsimplex caule quadrifariam piloso, foliis pinnatifidis, laciniis oblongo-lanceolatis obtusis serratis crenatis subpinnatifidis, spica densa v basi interrupta; calycibus hirsutis, dentibus brevibus acutis integerrimis, rostro lineari contorto galeam ipsam duplo superante. 2l. — Crescit in Himalaya versus Cashemere.
10. *P. TRINEROSTRIS* Bib. I c. — Erecta elata subsimplex: caule quadrifariam piloso; foliis pinnatifidis, laciniis obovato-oblongis obtusis crenatis; apice densa imbricata; calycibus hirsutis, dentibus brevibus integerrimis; rostro apice teasli contorto, galeam ipsam vix excedente. q. — Crescit ad Pyr Pandjat.
11. *P. PORRECTA* Wall. Catal. 423. ex Bth. I. c. — Homolita ascendens subsimplex caule bifurcata piloso; foliis pinnatifidis, laciniis oblongis obtusis serratis; spica pauciflora imbricata; calycibus glabris, dentibus brevibus integerrimis, galeae rostro longo tenui incurvo subcontorto. % — In Kamaon ad Sbalma et versus Cashemere crescit.
12. *P. BREWSTERI* D. Don, Prodr fl. Nepalens W. - Bib. I. c. 53. - Caule suberecto humili simpliciter, apice cano-villoso, foliis ovatis villosis pinnatifidis, laciniis brevibus inciso-dentatis; spica densiuscula; calycibus hirsutis, dentibus brevibus cristatis, galeae rostro tenui longo recto % — *P. lanigera* Wall. Catal. 410 — Crescit ad Gossain Than.
- * *Eroilrei*. — Galea eriostris.
13. *P. MOLLIS* Wall. Catal. 416 — Bth. Scrophul. Indie. XL — Caule erecto elato ramoso, apice hirsuto, foliis hirsutis simpliciter v. bis pinnatifidis, laciniis oblongo-lanceolatis inciso-serratis, apice interruptis tenuibus; dentibus brevibus oblongis cristatis, galea recta edentata erosil. ^ — Corolla lenis vix 4 lineas longa. - Crescit ad Gossain Than.
14. *P. ERICA* Linn Sp. plantar 840 - Jrq Flor Australiar I 206. Sinn. Dlsrhlm Flor III 20 (ic acn Rhb fl Germ occurs J01. no 2457 — Koch, Synops n Germ vdl I) 544 no JO - Dili Scrophular Indie VI Steven, Monogr Pedicular 24 — roll quillcrnain %orlicillai* profunde pinnati

fldis, pmmis ovalo-oblongis oblusis inaequalitor denlalis; braceis floribq. >erlicillads- galea sabrecia oblu»a edenlula glabra; calyce mflato hirsuto, apice flsso, denlib. bre|i*9inm. 2|. — Flores pcdunculo brevi^imo cauli adprsrso suffulli Cal)i »ubglobosus| inflatus membranaceus trlialis, magu minute tur«utus, ore angustalus. Corolla rosea \. alba plcromque honionlaliler dcprc«>si, ad medium bilabiata, labium mfenus atnplum Inlobum. Stamina mox omma corollam aequanlia, moi duo breviora, filamenlis loogiorum superne barbait*. Anlhcrac basi fissae. Sligma exscrtum. Capsula acuminaU subrecla, calyce paullo longior. — *P. caetptom* B. Webb, Her Ilispamense 94. — 'cf. Boiss. Voyage boi. dans le midi de l'E«p p. 474. no. 1378. — Specimina parvola false pro distincia specie descripta)

a. minof birsala* calycia dentiboj iolegerrimis; capsula calycem pa rum excedenle.

fi. hirtotior: calycli dentibos *erratis; capsola calycem duplo eicedente; corolla minore. — (Hall, Ilclvet. (edit. I.] no. 033. U 17. flg. 1., [edit. 2.) no. 318. I. 0. flg. I.)

r. major, glabriascnla: calyce doplo majore fobdentato; capsula pa rum brevtiore. — />. *Stevemt* Bnge. mss. In Ledeb. Flor. Altaic. II. 427. — (Bnge. Mem. des div. sat. de SL Ptr*brg. II. 567.) — *P. eaUota* Adams mss. — *P. dulams* Willd. Herb. — Crescit in locis graminosis homidis alpium Europae occiden- Uhs el Sibmae et in India oriental! (Kanaour), [y- in paludosis Davuriae).

15. *P. SPICATA* Pallas, Ilin. III. appndi. no. 100. t 8. flg. 2. - Willd. Spec, plank III. 90S. — Steven I. c. 23. t — Foil, qoaternatim (inlerdom eliam quinatim) ?erlicillatit plnnatifldb (noo repandls at ail Willd. I. c), aommis saepe Iniegerrimit; spica dratlsflsju hmbriatai calyeU lobls rotuodatis, rarios obsolete denutis; eorolta ealycem triplo fcrv. wwiertf, ad u i a uitlam bilablau, labio a«pe- riore dimldlo brerlore reeto tobeylledrieo obcsjalulmo, Inferiore ampllalo trilobo. O T. potlos ^t? — Ramnll breves ei aiillls taperioribna. Calyi brevjs bir»uius, supra let ins, svblus altlos, viz tamen id anam tertiam fissns. Lorolla purpurea plerumque horitontaliter deflexa. Stamina longitudine corollae, anihcru in ipM galea posilis, filamentis duobas barbalis. Sligma simplex inclusum Capsula calyce param longior obliqoa mucronala. — In alpium Dabunac paludibus.

10. *P. AMOEY4* Adams m«s. ei Sle?en I. c. 23. f L 7. — Bnge Hem. de* di?. sav. de St Plrsbrg II. XI./ — Caule simphcissimo; foil qualcrnaiim Terticillalis pin* natifldis, lacinin ardie serrato-inctsis; florum verticilli» remotis; florib. subset- silib qualernis, calycisoiatu sabinflati lacinns linearib , snmma brevisnima oraUj corollae calycem quadruplo superaoms, galea recta obtusissima, labio superior! sobaequahlfr trifldo refleio. % - Caolii simplidssiBas 37i-7-pollicaris. Foil* radicalia fere qMdrupollicaria loagios peliolau, omnla lolo ambiuu lanceolaio- hoearia, |4-pollic«ria, 8-3 liaeas UU. Bractcae qoalaniae calycis tubnm ad- aeqnaotes lanceolaue frosse aeolaqve desiuee. Corolla purpurea, 9 lin. longa, ad QMa tertiam btlabiata, galea bretler quam lablom inferum subaequaluer tri- Uum, lacimae suborbicularw, iatermedla paallo minor. Galea recta obiutiMiroa, asjlberaa basi sagillalas Inclodetis. Si>los extertos. Filamenla omma glabrs. Capsula vli obllqva. ToU planla giabra v. fix ad angulos pubescent T. arc- Mra M. Biehem. lib. - fi. •Ibtfora - Crescit in Kamsbika et in insulis Ka- rtilis («ar fi. In moiUtms AIUicit

17. *P. CACCASICA* M. BlebersL Flor Taur. Caocasic. II no 1194. Sieven I. «
* t t i - CaaJlb. e rbf lasjaie rraso muliicipile pluribus errctis; foil qoater- Mtlsi venleillaUs ptaaaUldlt, laciniis obtu»isserraio-drnaiii», florib dense •pi- ca lit (tenicille MSBO aeapiaa sjugis minusve remoto »ub«r«tilib . eal)ci* quin* qaefldi laeiaais lasjceolaito aetle dealalls, saperton dimidio breviori. corolla calyeem dajsOo eucedrnte, galea redilmea obtoslaaima ecollaia labium inenus) »ub»p»ot r Uilobim sabaequasue. 4 - Bbltoaa crassam lignctcens molUeeps »ub»p»ot castes cjviaqeepollicare* simplicisaisBos %ii ad angulos pubescent**

Folia lanceolato-linearla Ms praecedentis simillima, laciniis tamen obtosis. Folia superiora sensim in bracieolas abeuni lanceolatas scutas grosse inaequaliterque pinnatiGdo-dcnlalas v. denlalas. Corolla 10 circiter lin. longa, ultra lerliam unam bilabiata, labio inferiore reOexo, laciniis suborbicularibus, intermedia minori ad basio angustaia. Galea subcucullaU stamina penilus includens; sl)lo subexerlo. Filamenla glabra. Capsula calyce parum longior obliqua mocronala. — P. *Pertica* Willd. Herb. — Crescil in summis Caucasi apicibus Kasbeck el Schbagdaggel in Persiae borcalis alpbis Samamisisis.

]. 2. *Sparsifoliae* Rchb. *Flor. German, excurs.* 301.

* *Roitratac: Galea roslrata.*

t Slphonanthao Blh. Scrophul. Indic. 53.

Corolla ringens, lubo long© exserto, galea Talcala roslrata, rostro proboscoideo conioorto vel uncinalo.

18. P. SIPHONANTHIA D. Don, Prodr. flor. Nepal. 05. - Bib. Scrophul. Indie. W. — Humilis caespilosa glabriuscula: (oil. elongalis pinnaiiscllis, segmenlis brevib. oblongis serratis; spiels bretlb.; ealycib. hlrsulis bine flssls bifidisve crisUTis; tobo corollae calycam quadropio soperate, galeae rostro lioeaii - proboscoideo cootorto emargioato. 2} — Cresell in Nepalit (Gossalo Than).

10. P. DOOKERIANA Wall. Caul. 421. ex Blh. I. e. - Ascendent sobramofa glabriuscula: Toll, pinnatisectls plnnatiOdlrsre, laciniis obloogis v. ovalis deolalis v. pinoalifidis; calycib. hirsutis bine fl«sis blfdisve crlsuiis; tobo corollae calycem subtriplo excedente, roslro proboscoideo-contorto emargioato. ^ — Corolla rubro-purpurca v. alba. — Crescil in Kamaoo, ad Simla el in Cashemeria.

». P. MKGALAMIA D. Don, Prodr. flor. Nepalens. 04. - Blh. I. c. - Ertrta glabra v. apicc hirsua: foil, pinnalifidis, laciniis oblongis ovatisvc ptnqaiifldif trr-ratis; spicis ilemtim rlongalis inlerruplls; calycib. quioquidcnlalis cristalis; lubo corollae calyrrm duplo excedente, roslro proboscoideo - conioorto trifldo. ^ — In Kamaoo el Gossain Than ad Choor, in Mussooree et Cashemeria.

U. P. BLEPHAKTHOIDES Bib I. c. - ErecU pobetee«s: foil, pioaatifldit, lacinii* ovato-oblongis pinoatifldis denutis; spiels eloogatU densls; calycib. quiaqoe-deDlalls cristatis, bine flsais; tubo e*rollloo Mlyetm dlaidio eteedesjlt, roslro proboscoideo aiceodeote, aptoe laevrto tmarfiaalo. % — Crosdl la India orie«-lali (ad Pyr Pundjal).

22. P. RHII>A>THOIDES Scbrenk, BnomertL plantar. no?ar. 91 f — Glabra: eaole ilmplicisMino; foil, (caulinis alterols) plnnalifldis, pionls sobrotondo-oYaUt inciso-dentati<i; calycis pilosi dentib. 4 (oliaceis dentatis, quieto sobulato; corollae tubo calycom fere duplo superante; galeae roslro linear! proboscoidro cootorto. •pice truncato. ^ — Specks pulchra, babitu ad P. *Jatquini* accedem. Caulet ex eadem radici* saepe plures 3-0-pollicares, plemmqoe assorgentes, ratios erecti. Pinnae vix basi decorrentet. Flores in racemom brevem dessom coogcui purporei. Calyx parce pilosus, bracleae foliaceae sed minore*. Tobui corollae anguius calyce doplo circiter looglor, labium ioferius ampllssimom 4', lin. loogum, 8 lin. latum trtfdam, lobis rolaodatis, interoiedio mioorf. Filamenu duo superior! hlrsota. Stylos loogitodine rosiri. Capsoia doogaia oblooga* — |Q Soongaria in alpbis AlaUu ad fl. Baskao crescil.

21 P. TUBIFLORA Fitch, ran. ex Slevco, Monogr. Pedicul. 30, f — Glabra: roll, oblongi* pinnatifldit, laciniis rolundalis crenails; florib. axillarib. ptdicellatis, dein in mpicarn bre%coi compactatn digettis; calycls puberuli ad unam tertian bilohi laciniis inciKo-drntilit, accrdenle nonnuoquam tertia minorc; corollar tubo longummo triunnalü, galra in rottrum tenuif<imum cirnnaiom producta, labto itiftnorc amplo mlobo; ulaminib. omnib. barbat*. '4 FiUnroia tobi •pici inec ba»i) in»rrta. Folia floralia petiolo lato ciliatu tuffulta. Anthrrar ota-••, basi emarginatar. Stinma rapiutum inclutum. /*. /<nyl/fora Rdlpb nca

de l'acad Impériale de St. Ptsbrg IV (1811) 315 l a - Crescit in muscosis rupium ad lacum Baikal

24 P PUNCTATA Dene mss In Jacquem Voyage IV 111 T t 122. - Elala caule lereii glabro, foil pinnat6dis, lacinnis ovatis obtusis inaequaliter serratis incisive, bracteis folis conformibus inferne lae pilosis, calycibus binae flsiss membranaceis, denique saepius terms, lateralibus lobulatis, postico integro brevissimo, galeae rostro tenui compresso annulatim incunro, lobis labii inferens rotundatis ciliolatis albo-punctatis. 2]. — Herba circiter pedalis e rhizomate pluncipiis, simplex »nticia glabra Caules bast Tientes, supenu* sordide purpurascens, pilis brevibus flexuosis obsili. Folia inferora alleraa approxmata longe petiolata, circumscnpione oblongo-lanceolata pinnaligda, lacinus (non stride oppo»ilis ovalis obtuui irregulariter aeimlaia inoisive, abtus reliculato-venosis pallidionibus, caulma eoformia brevius petiolata. Bractea foliaceae pmaifidae in petioloa membraoaceum, bast arachnoideo-villosum angustatae. Floris purpurei albo-punctati racemosi, singali axillares breviter pcdicellati. Calyx tubulosus membranaceus irregulariter, antice fissus lobus, lacimis lateralibus foliaceis lobulatis, intermedia iniegra Corolla ealycem duplo aoperaos, galea in rostrum longissimum spiraliter incurvum atenuata glabriuseola, labii inferens maximi reflexi laeimae subaequales, lateralibus orbiculari-reniformibus, intermedia inenle minon apice emarginata suborbicular, omnibus ciliolatis albido-punctatis Stamina brena faucem DOO attingentia, glameoU villosa, antherae obotatae glaberrimae. htylus corollae rostro inclusus, stigma capitalum papillosum Lapsulo pergamacea obliqua mueroota ovalo - cornea compressa, calyce persistente dimidio loogior obsolete venosa glaberrima. — Crescit la Indiae oneouli-borealis locis bumldif circa Gomboar.

& P. LABELLATA Joquem. mu. a Done. L c, 118. f V IH - Ascendeo* homlin snbsinplex caule tereti glabro; foil. oMonglt pinnalilobalis, lacioia approximalit locloso^denlatis, deotib. mucroiuUUs; racemo paocifloro subcapitato, cal)cib araebooideo-pilof, laciniis Uterllb. herbaceis lobulatis, ponticj brenon incigra lanceolaU, galea in rostrum tenoe Incunrum compres^um longum abeunte. y. — Derba 4-0-pollicaiis simplex v ex eadem radice bicep< glabra Caulii teres purpureo-tinctus glaber T. loterdum bifariam pilo«un Folia inflma circunxriplione oblonga, allerna, bipollicaha, vix srmipoHirm lata pionati-lobulata, lobis oratis irregulariter semilatis, baud raro margmr callow*, in peliolum membranaceign margine pllosum aoguilata, subtus pallidiora subtili**!*⁹ reticulato - venota Floret racemoso- captlati breviter pediretlati roiei, lacioi* inirrnedia pallidiora. Bractea foliaceae, margioe arachnoideo-pilonae faljs bioc fls«u< 5-lobos, lobis ovalis argole serratis, postico brevlorl lanreolalo inie* gro, onnr< glaberraiil, tubo arachnoideo. Corollae tobas gracilU ralyeen duplo exceden«. galea km roatniai gradle longIMIMBI ioconosn producu, labii Inferio* ris reBexi lariolae laiarakt roandalo-rettiroaies, Intermedia duplo angvstiori aoborbiolari, ialegria, palalls rt4lc«lalo-vea)oals glaberrinis Stanma 4 inter llabfr laciajian aajlicaii H lateraloa inserta ioelvt, llassenta pilosa. aniharar basi Mgiutae, stylus a roslro ioehuos, ttigma discoidean papillosum <)>inum oblique otoldeom Capfola ? — < rr%rit in Indiae boreali- orientalis humidis ab Yurpo ad Lanulcbe, Gbalang-Ghauil allitudine 1*1)0 pedunt

25 P KI KPHAs Bois« Piagoos plantar novar \ HI - Pumila glaberrima *»> partis, aabitu late liaearib pinnati* pmoi* mimmit rnnfrtiii »ubimbrati« ova- Ua aol oMotgis obUtis ere»ato-deaiali«. margine ralrarrit raultb nanit a*ceodta)Ub, aplcoS-4-florft. pedieelds lon* inferiors ralyrrm aequannb «uperao- Ubatve, topenonua) brvtiortb . brartei* panit pinnaii*rru« raljr«"» «ubaao^ia« lib. caljcis glabH labo eyllajdrteo, MDOTOO contincio frri- ad medium u'4 uo, deauib. liaeanb, apice Mbdilatalfc caleareq rrenoUn* inarqualib . »• f"10ri aiolUai brevion corolla* tube lesml ealyee longiorl, apire «alde incur* o ja MsbMB) bNB) aaphato corollae flabrae rotae labio aopenori in rotnioi M** •km anoja«ato loogiMiaioai eirriajMliisn coovoUlua eitremiUie lmean truncatum

oblique murronulalum producto, labio inferiori latis»inio ad medium uaque tn-
lobo, lobis subaequalib. rotundalo-subrelusis; filamentis glabns. % — Planula
1-2-pollicans, folia radicalia cum petiolo vix pollirana, 8-3 hoeas laia, calyx
4A lin. longus. Labium in fen us 3ft lin. longum, 6 lin. laium. — Crescil 10 Per-
siae borealis alpibus Elamout

ft Proboscoideae.

Corolla nngens, tubo ||| excerto, galea falcata in rostrum rectum v. surreclum
nee rontortum clongata — *Hyncholopha* Bnge. mss.

27. P. CAIOOSA Wall. Catal 418. ol Plant \si.itic. ranor II 44. t I. 1M - Bth
Scrophular. Indie. 54 - Freda pulie!>cpn<i foil oblongls obtuse crenatK, basi
angustatis, inforionb. petiolatis; spins paunflom, demum elongatis interrupts;
calycib. bine flssis oblique 2-U-fldis subcmntalis; corolln rectis; galeae rostro
tenui recto, labio inferiore laiissimo. ^ — llabilu *P. retupmatae* affinis, *ad co-
rolla distinctissima. — *Rktnanthu* bifidus* D. Don, Prodr. II Nepal. W. — Crescil
in Nepalia (ad Cboor el Mossooree).
28. P. FURFL'RACEA Wall. Caul. 418. - Bth. Scrophular. Indie. 54. - Ascendens
•nramosa: foil, petiolatis ovatis, inferiorHb. amplit semlpioaatifldis, lobis ovalis
inclso-dentatis plnnalifidisve, superiorib. panrls lociso-denuilf v. subpianaUfidU;
cal)cib. bine flssis, Inde brevlsslme 8-3-denUlls; galeae roslro laaal recio emar-
glnaio, labio inferiori latisslmo. % — Craseli ID Nepalia ad Gosaaln Than.
80. P. WALMCIII Bnge. mss. — Ilumilis: foil. lanc«*olatis pinnatifidit, laciniit
o>alo-lanceolalis serrulatit; racemo paucidoro; cal)cib. apico quinquedentalis
criataiiH, mrollae palea rlungata falcata, rostro recto. ^ — Corolla magis aperU
quam in /. *ruitrata*, folia angustiora minu^que dissecata, capt>ula rectior longior,
cacierura hmr sinnlis forleque cjus \anetates. — *P. asplcmfoUa* Wall Calal. 410.
ex Bih Scrophul Indir VI nee Fldrkc^ — Crrscit in India onrnllali kamaon).
30. P. ORMTIIomn.NCIHS Bth m«« ex Hook Flor. Boreal. Atncric II. 108 -
Poll, ad baon raulis apprximatK pinnatiaeclis, sfgrenils profunde pinoali6dii,
laciniit tncuo-ilcnlalis, ral)nb o^aio-ioOalii brrviter quinqnefldis, lacinili In-
tegrts subdentatiMf corolla© lubo caljeem MI superante, labio inferiore patente,
galea ralcaio-ro»irata, rostro tenui recto ^ - *A P. rostrts*, eui alflnit eat, dif-
feri fulus miffit duicctis, calycia forma el corolla mm ore. Herba fix seoiipe-
dalii dense foltosa. — Creicit is America boreal!-occideoull.
- ** P. JACIU'IM Korh, DcuUrbl. Flor. IV. 383. f - Koch. Synopt. II Germ. (rdiU
!) 54L - Taulib asrendenlib; foil, profunde bipinoatifldfs, pinnulu dentatU,
corolUe IIIIMO nupriori subilo in roilmm elungatum lineare Irunraium cmanfi-
naiQoi angusiato, filamrntu Inngiorib. apice »par»im pilosls; caljrc oMongoc-
<npanulato glabro t ner%is margineq pubescente, laciniis sopernr fohareti in-
*qtialiifr crenatit, apire recunralis, cal>cis tubo tnplu bretioHbtt. % — Floras
yotel. Caulis imea decurrente e pabe bwritslaa formata noUUu. — *P. r«#fr<lc*
'*!• Flor. AuMriae. u fltt. - Mrm. Dcuucbl. Flor. Hit *U (le. •••.) — Crescil in
tlpibus AuAiriant, Tyroleotibos ti Bavaricit.
- 31 J*- HOSIBATA linn Sper. plant S4*.-) - *Urn. Ill«atr. I. 317. fig. 1* - <gitt.
•onogr. Pedirul 37 f exrt. syo. FlOrte\ ^ Koch, Synopi. fl. Germ, (edit I.) ML
- Rchb. Fl Germ Pirar« 361. no. 9190L - Caaailb. profInUi ascendentib.; foil.
Profunde pmnailOdii, pinouU duplfraio-deoUtlf; corotUe Ubio superior* subilo
In rostrum eloogatum hnrarc truncaium abeute, filametHls longloh. supra n e -

*) *P. RUSTRATA* Linn Gay, *Ann de natur (l. Ser.) XVI 215* — Multicaulis
caulis digitalis prostratis paucifloris petiolisq glabris v pubescentib. foli.
pinnatifidis, laciniis inciso-dentatis, floralib deciduis, pedicellis gracilib. infe-
riorib elongatis petalis, calyce oblongo-campulato, basi auriculato, tubo gla-
bro v pubescente, corollae tubo intus glaberrimo, filamentis inferioribus laxe
barbatis.

dium barbalis, calyce lobuloso, basin rersus altcualo, ubiq. breviter villosa, lacimis superne foliaccis inaequaliter crenatis, apice nncinalis, lubo calycis triplo brevionbus. 2]. — Caulis linea decurrenle villosa-pubescente notatus. Corolla rosea. — Crescit in alpbis Germaniac, Helveiae, lialiao el in Pyrenaeis.

- J3 P ASPLEMFOIA Florke mss.#) in Willd. Spec plantar. III 208. - Koch I. c. MI. — Rccb. Flor. Germ. eicurs. 361. no. 2460. — *Sinn* Dcuischl Flor. lift. SO ic aen) — Caule erecto; foil, profaode pinnatifidis, foliolis duplicato-dentatis; corollae labio hupenore subito in rostrum clongatum lineare truncatum emargioatuo angastato; filamentis glabrls; calyce oblongo-campanulas lanalo-VIII040, lacimia tuperne foliacen crenalis, apice uncinatis lubo taljcis triplo brevioribu*. 2]. — Corolla rosea. Slnclior ac humilior quam *P. rostrala*, superoe sublananaia, folia mullo minus ineisa. — *P. rostrala* daud.? el Hall.* Icon, llehel. t 8. fig. IT — Crescil In locis madidia alpium in Tjroli, Cannlhia, Siyna (auf ben 3in<Ttfclal*cn \m €a(\$burqifa)cn, auf ben ftu<fcr unb £eiliqcnblut<r *Zaun*, ber \$ajter)e, Olam^mk *Qlo&ntv*, in Iprel auf ben ©refyen bei \$(cur(ing im Ober<3nn* tjalc, *30)(ctmt bei ?ient.)

- M. P. CEMSIA Gaud Flor. Uelvet IV. 132. - Gay, Aon. sr. nat. (I Ser., XXVI. 215. — Im-Incaulis: caolib. spiihamaeit ascendenlib. petiolisq lanaiis, foil, bipinnatifidis, lacinulis lerrato-denticulalif; florib. sobsessilib.; calyce rampanulalo, ba»i roluodalo, tubo dense lanato; corollae tubo inlus ad filamenlorum oriRinem' pilis brevib. spars is villo^ulo, filamentis infenonb. glabraii<. ^ — *P. tuberosa* Tar *rubn/lora* Ave^Lallem. Planl. rar. Hal. boreal. 10. — *P. gyroflexa* Kccb. Fl Germ, eicurs. 302. (eicl. synonym.) — Crescil In alpiom Pedemontantrum llonl Cenis, de la Musa, in vallibus Lange el AoiU.

35. P. P^RB!UCA Gay U f - Siaipln *. Irieaollt: caulib. apiihamaeis allioribq. aseodeulib. gtabris saalUloris; UIL MplBMUidla, Ueinulls inciso-denUUs, floraiib. pertltieotib., peiioils margIM fadtq. lanalis, caoliBis in lieeam lanatam deeorreatlb.; florib. lobsestilib.; calyce campanulalo, basl rolundalo, lubo glaberrimo nigro-venoso; corollae lubo lotos ad filamenlorom insertionem longe deoseque barbato, pilis creeds; filanentis Infenonb. dense barbalis. tj, — la alpbis Pyrenaeis crescit.

- JO. P P()HTK>SCIIU(ill Sauter apd. Rccb. Flor. Germ eicurs. JOI. no. 9138. «* Plant, crilir. V. Bg. 587. - kccb, 8)oop< 0. Germ. (rdil. I MI - Caule erect* dense folialo, foil. Dinnalifdis, pioois doplicato-denlalis, corollae labio soperiore in rotirum breve conirum apice Irnocatom seosim abeunie, flamenlis loogiorib* supra medium barbalis; cal)ce lubuloto-campaoulalo glahro, ncms margmeq. pubmrrnir, lacioiis superoe inarqualiler crealis, apice recurvatis, lubo calydf bre%ionbus % — Corolla <* persico porpurea. — *P. gemin*jlora* Porleoscbl. *•• — <.re<cit io tMyriae alpium altis<imarum granmcarum locis bomidis. — (^B Cber. eirpemarfa ia bet Dcffaarr WHO. ««f boo ^cfeaf^rat 7400 gni b<^»

37. P. FARCJCfLATA IHIarti (Appodi. allera ad Fl. Pedemonl. ioedll.) »•«. '• Willd. Spec. pUolir. III. fja - Rccb. Fl. Germ eieon. 3DI. OO M03. - *~>dh I. € — Catle birtulo foil piooatfldis; corollae labio foprHore Io rostrum breve cooicnai, apice imnraiom seosim abeuale; flameolis longionb. supra medmai barbato-villosu; calyce eampaoulalo, ollra medium qoioquefldo, deose P^{ub}tf ceole, lacioiis follaceis piooaiifldn droialisq reclis, bractets soperiorib. iriBdii* •egmrolls ploaalifdia. * - Plenimque lou plaola pubrtreos, corollae tubus ealycem fere doplo toperal, corolla ro»eo-per»ira ui lamtonltm. - <lherb ^i^{ld}* ll<7.) - p. fir*fi, jr* Willd. Berb. 11*10. et »pee. plaoiar III ~~212~~ — A^ - Lat-

*) P. ASPUMS, i>U4 H>rt#. - Om, Amm. it nsimr I S*r » XXU 315
 inemmiu galle dimimlik TtUp» pmmatimais Hirulu* immanita foil foil P^^
 tom<M *mnsodmUtu. P**eUu iminonk Imbuemhs palant '•. ^t
 r c*»P—*i*to Ur* Ummio: eorollm* I mho tmlitt *•, iUmenlorom on
 Ie, pOu erttris k^niomimlikms: fUmmrmh\$ infertontms glmkrmiu.

- lem. De plantis quibusd. Hal. boreal. 15. j — *P. tuberosa* All. (nee Lion) - *P. asparagoides* Lapeyr. — In alpinis Helveticis, Pedemontanis, et Italiae superius crescit. — (cf. p. 425. no. 76. r-)
38. BARRELIERI Rchb. Flor. Germ. excurs. 302. no. 2405. — Koch I. c. - Erccia. foil, profunde bipinnatifidis, pinnulis dentalis; corollae labio superiore subito in rostrum elongatum lineare truncatum emarginatum angustato; Diametris longioribus superne barbato-villosis; calyce angustie campanulato ad medium quinquefidio glabro, laciniis margine puberulis lanceolatis acuminatis inaequalibus reclis; bracteis baccatis. pinnulo-3-5-lobis, laciniis lateralibus integerrimis. 2l — Spica multo longior et interne laxior quam in *P. tuberosa*. Flores flavo-rosei. — *P. ascendens* Gaud. Flor. Helv. 145. (nee Schleich.) - *P. tuberosa* Pollini?? — *Aleclorolophus* m on tan a flore albo Barrel. Icon. 1. 400. — Crescit in alpinis calcareis Helveticis (auf dem 3cQt bei Aalfaren gnüften ten. (Santnen 20allig und SBern, fiber Gbatauten auf dem 9W. (Srey und Sarev).
30. *P. TIBEROSA* Linn. Spec. plantar. M7. - Steven, Monogr. Pedicular. 38. t - Rchb. I. c. 302. no. 2400. - Koch I. e. - Strm. Fl. Duchlnds. 30. (ic. aen.) - Ascendent- foil, profunde bipinnatifidis, pinnulis dentalis; corollae labio superiore multo in rostrum elongatum lineare truncatum emarginatum angustato; filamentis longioribus superne barbato-villosis; calyce campanulato id medium quinquefidio, laciniis foliaceis inciso-dentatis rectis; bracteis superioribus trifidis, laciniis inciso-dentatis. ^ - *P. incana* Jcq. praeter colorem florum flavam aegre distinguenda. Caulis superne ad angulos pubescens Flores brevissime pedicellati. Sigma capitulum exsertum. — *P. ascendens* Ilpe. et Strnberg. Dokichfl. der Rgnsbgr. bot. Gesellsch. I. II. 122. — *P. gyrofolia* ? Vill. Fl. Delphin. II. 497. — Omen malum, nam librae radice hirsuta qualem nee tam tuberosa appellanda Hunt. — In alpinis Germaniae, Helvetiae et Italiae frequentior.
40. *P. GYKOFLEXA* Vill. Flor. Delphin. II 427. (excl. >r. ft.) t. 0. (nee Rchb.) - Steven I. c. 40. | — Caule hirtulo; foil pinnatifidus. laciniis bipinnatifidis, laciniis niveo-lanatis demum serratis; galea acuminata in rostrum deflexum recurvum, apice bifidum producta. ^ — Talis pedicellata innata cristata, laciniis quatuor foliaceis, lobata multo inaequalibus. Cornuae galea fere *P. metro-rubensis* Atlas MoU duo v. etiam omnia magis minute barbata. — Hall. Icon. Helvet. t. IX. - Crete in alpinis Delphoalae.
41. *P. INCARNATA* Jeq. Flor. Austr. II. M. i. 1401 (nee LUn.) - girm. Meelis Mt. Flor. Hfl. 8. (ic. aen.) — Lebb. I. e. 301. BO. Mil. — ftoet) I. e. — O. Doe, General syst. of gard. and bot. IV. OKL. BO. 4* a*. M. — 8lt?eaj I. c. 30. f - Ganlib. ascendens. erectis; foil bipinnatifidus temilatisq.; corollae labio superiore in rostrum elongatum lineare truncatum emarginatum angustato; filamentis glabris; calyce inbuloso-campanulato lanato quinquefidio, laciniis lanceolato-tubulatis integerrimis rimis reclis, longioribus lobum suum subaequantibus, bracteis superioribus tethedis iolegemmis. ^ — Folia et pinnulae lanceolatae acutae. Rostrum corollae labium inferius multo excedit. Sigma capitulum saepe exsertum. Corolla rosea, labio superiore albe saturatum. — All. Pedemont. no. 14ft. t. X fig. 2. — Crescit in alpinis calcareis Koropae occidentalis-australis (in Hungaria, Cariniliis, Trau>y> tania, Helvetia et in Italia superiore).
42. *P. ATRORLBEMS* Schleich. nss. apd. Gaud. Flor. Helv. IV. 130. - Rchb. Fl. Germ. excurs. 301. no. 9402. — Koch I. c. 542. — Steven I. c. 30. t. IX - MunUI, Denkschriften der allgem. Schweizer Gesellsch. für die Naturwissenschaften III Die Pflanzl. von Graubünden 101. f. L. 0. - Caule erecto simpliciter, foil profunde pinnatifidus, laciniis locis serratis semilatisq.; corollae labio superiore breviter truncato, rotto truncato tubulato; filamentis longioribus superne pilosis, calyce campanulato unguiculato, laciniis lanceolatis acuminatis »erru-|*U%, bracteis »upenonibus lanceolato-linearibus laceratis, apice fimbriatis. ^ — Spiculae densae flores saturate purpureae. Folia maxima 5-6-pollinaria. filamentis licet laevibus, amhilu elliptico-biobovato, bracteis lanceolatis, fere raris ut vix pinnatifidis - inriosa. laciniis lanceolatae arulae. inferiores tubulosis. %u|irruio« conuales Spica

compacta biuncialis*, bracteis ciliaribus tripartitis, supremis integris. Capsula ovata obliqua mucronata calycis paulo superans. — *Pennina* Gaud. I. c. — Crescit in monte Pennino haud procul ab hospitio.

43. *P. TEICRIIFOLIA* M. BiebersL mss. ex Steven, Monogr. Periculis. 31. t. 10. fig. 1. — Caespitosa: caulibus plurimis simplicissimis (dodrantalibus); foliis lanceolatis duplicato-crenatis, aequalibus. tomentosus oblongus; floribus in capitulum terminate collectis; calycibus oblique bifidis, laciniis lanceolatis integris; tubo corollae calycem duplo excedente; galea in rostrum longura semicirculari producta, labio inferiore paulo longiore trilobo, laciniis rotundatis, intermedia lateralibus triplo minore; filamentis glabris; stylo exserto. 2]. — Crescit in secunda Insula Kurilensi.
44. *P. RESIPINATA* Linn. Spec. plant. 840. - Gmelin. Fl. Sibiric. III. 201. no. 10. I 44. — Steven I. c. 31. f. — Caulis angulatus pubescenter, saepe axillari-ramosus; foliis subsessilibus lanceolatis crenatis glaberrimis; doribus dense spicatis; bracteis superioribus ovalibus acuminatis serrulatis; calyce pubescente oblique truncato, subtus ultra medium obliquum, supra bifido, lobis oblique acuminatis; corollae tubo calycem duplo excedente, superne ampullata; galea convexa in rostrum breve acuminatum bifidum producta, labio inferiori amplo rotundato breviter trilobo; filamentis longioribus barbatis. ^ — Folia basi haud raro cordata, cartilagineo-dentata, plerumque glabra v. rarius subulmifera. Flores in foliis superioribus axillares in spicam densam abeunt, purpurei, carni v. albi varietate lorti ad medium bilabiali. Corollae labii inferioris lacina media rotundata, laterales ovatae. Antherae sagittatae. Stigma subexsertum. Capsula eaque dimidio longior oblique mucronata. — Frequens in frigidis umbrosis per totam Sibiriam occurrit.
45. *P. BRACANTSTACUYS* Ledeb. toea. Ior. Roae. Altaic, illustr. L. III. - Ledeb. Flor. Altaic II. 4V. f. — Caulis erectus amplius pubescenter; foliis, protunde pinnatifidis, laciniis lanceolato-linearibus acute serratis glabris; floribus breviter spicatis; bracteis inferioribus ovato-lanceolatis acuminatis fuscis serratis hirtellis, supremis subtrifidis; calycibus hirtellis quinquepartitis; corollae galea rosstrata arcuato-inflexa ad marginem ciliata, labium inferius aequante eoque inclusa. 4 — r. aulit loner ad summum pedali, simple. Spica 10-15-flora. CXXX campanulata ad nos bipidulus, dentem aculi »errarii. (iorullae ochroleucac tubus) calyce vU longior, launum labii inferioris media ariiucula cannata, margine villota. Filamentum longiora barbata. Muli par »uprmi rum Migmaic exerta. — Oresril ran»ima in summa »alpi Altaica Aitulacensi inter fl. kaiiija ft Tschuja JaceoW in tubalpins prope de»ertum ruraicum. Bnge. Mem. »Us »av. rtrang. da St. Plr»brg. II. m.)
40. *P. PROBOSCOIDBA* Sibir. I. c. 31 | - Ledeb. Flor. Altaic. II. 430. - Foliis pinnatifidis, laciniis lanuolatis inbrifalibus acutis, arisute incifto-iratis, laciniis sermlatis albo-earilagiato-fjargiB-laiis; spica longi»ima densa; bracteis oblongis albo-aarfinatis; calyce campanulato bilabiali quinquepartito; corolla ovata acuminata, oiangine villosa. ^ — Pnmo inlunu sinillima P. *»<+*** *»'» tod loribn* nuimr ditersa. Folia breviora rotundiora. Bracteis inirgfrri^ nae pallida, narginr nllosa. Calyx ore tillosus pallidus. nenis latit nndibo* percurta, §4 anan irrtiam bilabialut, deniibut inie»rrmmii. Corolla magnitudin' P. tmrta«l## In*, tobu« calyce paulo longior, labium superius forma o»ni«⁰ stagularf ovatum, ila at aargo inferior ad medium u»que nllotu« non ui in ^ liquis concern*, sod conveitit til, labium infrius dimidio fere brevius ^{miT*}... vllotoai Irilobom, lobo mt-dio iiplo majorr. Filamenta duo toperiora ^{»f'f'f'} &!*»» etseruim. - Gmelin. Flor. Sibir. III. « I. 4J. - Oeteii *» Sibiria Allaiea *t m Davoria.
- P. USCIUTA Orphan In Willd. Spec. plant. III. i 11 - Steven I. c. 34. t. *»[»] - Ledeb. Fl. Altaic. II. 431. - ToU glabra: eanle ererlo stmplici; foliis ^{p,0,11,11,11} p ^{»»»»} i ^{»»»»} Uciaiit lanceolatu terralo-deotaiit. summit mnflueniib.; ***** ^{leae} ^{leae} ^{leae} infont leiiori; calyc. b. glabris rampanolaiia quinque^enulis; M

rostrum acuminatum labium Inferius duplo excedente. Of — Herba 2-3-pedalis. Folia breviter petiolata v. caulina sessilia, ambitu lanceolato-lineariter longe acuminata, 4-0-pollicaria, pollicem lata, fere rhachin uique laciniato-pinnatifida, lacinae lanceolatae aculae duplicato-serrulato-dentatae. Bractee lineariter dentatae lobum corollinum aequantes. Spica infra laevior, supra densa 9-pollicaris. Calycis aequaliter quinque-dentati dentes integerrimi. Tubus corollae luteae calyce sesquialongior, galea semicirculari, apice porrecta, in rostrum acuminatum truncatum producta. Filamenta duo barbaea, quam galca una tertia breviora. Antherae basi sagittatae, stigma capitulum exsertum. Labium corollae inferum rotundatum trilobum, lobo intermedio lateralibus quadruplo minori suborbiculati. Capsula calyce duplo longior ovata oblique acuminata mucronata. — *P. altissima* Tall. Hb. III. 207. 317. 319. - *P. incarnata* Linn. Spec. plantar. 847. (c&c. syn. All. el color, flor.) — Crescit in subalpinis Altaicis.

48. *P. LAPPOMCA* Linn. Spec. plantar. 847. - Oed. Flor. Daime L i - Linn. Fl. Lapponic. 2^o I. 4. fig. 1. — Steven I. c. 35. t — Caule erecto simplicissimo superne pubescente; foliis semipinnatifidiis (i. e. rhachi laciniis aequante) in petiolo brevem cuncta laciniis brevissimis crenulato-dentatis; floribus in pyramidam laevem collectis breviterque pedicellatis; calyce ovato brevissimo 2-3-5-dentato, sublimis fissis; corollae galea annectata. Q — Herba 10-13-pollicaris glabra, apice pubescens. Folia radicalia longius petiolata 3-4-pollicaria bipinnatifida, lacinae dentatae, caulina altera vix ultra setulosa brevissime petiolata, ambitu lineariter-acuminata, rhachi latissima lacinarum longitudine, laciniis tunc saepe confluentibus. Spica laevior 8-10-flora; floret breviter pedicellati bracteati, bracteis foliis omnino conformibus sensim brevioribus. f. a. i. ovali membranaceo ultero quinquelobato, ore valde obliquo, subtus ad medium fissis. Corolla bilabata, galeae gibbae rostrum tamen minusve delirium, apice truncatum. Filamenta omnia glabra. Stigma extertum vix incrassatum. Capsula calyce parum longior obliqua mucronata ovata. — Crescit in Lapponia, Groenlandia, Eamirhatka, ad ostia Lenaee in alpibus faucibus.

49. *P. COMPACTA* Sirphos in Willd. Spec. plantar. III. SIO. - Steven I. c. 36. t L II. fig. I. — Ledeb. Flor. Altaic. II. 431. - - ErccU strictissime simplicissima: foliis bipinnatifidis, laciniis crenulato-teretibus, superioribus saepe confluentibus; floribus densissime spicatis; calyce membranaceo inflatis acaule 5-dentato; galea rostrata glabra, labium in fere aequante, rostro reuagittato deieto. % — Caulis saepe pedalis et ultra, superae pubescentis. Folia laeviora longiora, superiora brevius petiolata minus minora. Florum spatiae interdum vix pollkaret, baud raro 5-(V-pollicin-). Specimini longe spicata folia etiam habent multo laeviora. Bractee breves latae, saepe pubescentes, inflatae foliaceae. Calyx glaberrimus ovatus innatus, 5-nerviatus, subtus AJRUS quinque-dentatus, dente uno alterove saepius deficienti. Corolla praeter rostrum calyce vix duplo longior lutea. ad unam teretiam bilabata, galci angulo aculo adunca, rostro terrain inspiciente attenuato trilobato v. brevissime eiuarginalo. Laciniae inferiorit trilobae laciniis intermediis lateralibus multo minor orbicularit. Filamenta duo (in iocis omnia) barbaea. Stigma exsertum. Capsula calycem excedens ovata, apice aculo recunato-uncinatum. — Crescit in Soongaria (ad montem Tarabaga), in berbendis editioribus Altaicis ad fl. Tscharysch, Koksan et Kalunja.

** *Errotret*: — Galea non rostrata, (ntrata).

| *Faucidenci* Steven, Monogr. Pedicul. 27.

Corollae labio superior? udiuqu? infra medium dentato. ... *Pharyngodon* Ungt*.

50. *P. rfttJOKTA* Dili. m%*. in luuk. H<r. Boreal. Amerif. II. |(R .. Freria gU glabra: foliis pinnatifidis, M<IUMUIS lineariter. inrii>o-%i>rr4li>; »jiri< laiiu*ruh cal) cib. campanulativ |icnni Miprrnu |>.u\ a, lateralibus uirun| IMM IJU, ro...
•pice lineariter. inlrgn>; rorullde lulio i-ahrem arquaule; galraf airualar
•oetri in labium inform* Uii>>inium dt*rur%o. ainn- \. \ mm-iiu. "4

- crassum lignosum caules plunmo* 10-12-pollicares emitten*. — Creacil in America boreali ad Oumen Columbian*.
51. *P. SIRRECTA* Blh. mss. 10 Hook. I. c. 107. - Erect a glabra: foil, pinnatisectis, segments lanceoUlo- hneanb. subcarlilagineo-serralis; spicis clongaiis nullifloris; calycib. lubulo»i» quioquedenlatis, dcote supenore minore, laterjlib. alius crenalii; eorollae galea formcala (alycem subduplo superanlc, 10 rostrum subulum surreclum cal)ccm plus triplo superanlem deiinenle. 2|. — Corolla duplo major quam ID *P. Groenlandica*. — ID America boreali-occidentali inienon.
52. *P. GROEMJtNDICA* Reli. Fl. Scan, (edit 1.) 117. — Flor. Dame 1.1100. - Steven I. c. 31. t — Radiee fatriculaia; eanle tmplici; foil, profunde pinnatifiditf, aegmenlis lanceolatis acuminalis terratit; caljcib. glabns brevissime quinquedenutis; eorollae clausa, galea nempe labio infenore incumbenle, rotlro subulalo fursum arcnato palenle (lobla lalerallb. galeam ampJeelenlibus?*T); filamenlis glabns, anlberis obtuais; atigmale sub»implici iocluso. 2|. — Corolla rubra. — *P. (netnatmfi. GroenUndica* Retz, Observ. IV. 27. t 1. — In Groeolaodia.
53. *P. RACEVOSA* Dougl. m«s. ex Blh. in Hook. I. c. 108. - Ascendens glabra: foil, peiitolalis lanceolatis duplicalo-serralis; racemis elongalis lans, cal)cib. bine fissis brctissime bifidis membranaceis oblotis; galeae arcoatae rostro subulalo deflexo suberecto, labio infenore lalissimo. 2|. — Saepe occurrint racemi axillares foliosi. — Credit in Columbia.
54. *P. PALISTRIS* Linn. Spec. plant. 815. - Sm. Engl. boU L 300. — Rivin Monop. irregul. I. tt. fig. 1. — Petiv. Brit. L 30. fig. 3. — Schkhr. Bot Hndbch. U 171. - Grtnr. De fructib. el semimb. I. I. A3. fig. A, — llayne, Anneigew. VIII. L 33. — Steven I. c. 3X f — Bcbb. Flor. Germ, excort. 303. no. M7& - Koch, Synops. fl* Germ. (edIL 1.) 5tt. — Caole erecto a baai ramoao; foil, pionaltfidis, pinnis oblongis subpinnalidia lobvlalla, lobnlia cronaUs; eorollae labio superiore subfalcalo brevissime roslralo truneato, angylis in denlicolnm sobulaium proiracilt; calyce bilobo, lobis inciso-dentallf critpis. ^ vel cf — Rami foliaque infenora aaepe oppoola. Folia adulliora margine carlilagineo ciocla. Calyx junior cyliodricos tubulosus, dein subglobosoi evadit ore vane laceralo, mox sublu« ad mediom fitsut, lacinns quinqe subarqualibus terralis, mox vere bilabialus, labIU inlerdum bifidit, plerumque glabcr cst, noooumquam vage pubescent. CorolU purpurea v alba. FilamenU duo barbala. Migma capitatum plerumque inclos«0* (aptula talde obliqua reflexo-macrooala.
- & *latteaulu* — €aule slnclo non raro ultra pedali, florib roseis. — *P. lacvicaulis* Lang. N)lloge pi. ad Flor. RaUsb. I. 187.
- T. mtmor* Caul.b. plonmis lenuib., foliia minorib., flonb rarionb. mioorib.: calycib. ad nenoa practertim vermcoso-poncutis; gaka tub apice obaolei' denUculala. - *P. ifmifoU** Idama Herb. - (Cmdl in bibiria Aliaica.)
- 9 miUform*: Corollia albia. - Creacil in praUa palndoais per lolam Europaa el Sibiriam, nee noo in 2lew Foondiand.
- U. *P. VU&SOWIACA* ftleven, Moogr. Pedicular. f7. t t. 9 fig. I. - Hook, **Flor.** tor. Americ II. 107. - Tola gieberrima: caule taepe aimplici, taepe **medium** •«!»• ramnosu; foil, lineanb. pinnaiidit, laclmia erenulaio-incitit; **Herib.** axillarib. brevHer pedicellalia; calyce oblique qamqoedenuio, tublat ad **medium** Sato; galea reeUlinea obUiaiaaaima, infra medium ntrinque unidenuia, labit **inf-**riorlt irilobi lacinllt rolondalit, Intermedia mlnori. ^ O - llerba annoa v. **bi-**•atia babilo *P. pmkutru*, cojnt eUam folia, »ed minut dhita, aogutiiora. **Flores** aillUrM, neqve toperiorea in tpicem aggrrgati, brnrner pedlcellaii, **foliis vel** kraeUla miMo brevlorea. Denlet calyrmi taepe drntaii, cal)cet lp«l **domum** subglobeao-iniaii. Corolla magniiodme formaqur (rre *P. flamm**'* ad **tertiam** partem bilabiau, labio toperiore airo^rpareo. galea obtututima coovexa. ****>*** inreriona Irilobi lanniae roiondaiae, Intermedia rrliquit mioori. Filameota ooo **P*rt*** PIOM- Geniulla inclata. Captala roiodau valde obliqua, caljee *****~** **aradi** foegior, meeron« redo *P wtmrrodemits* R ir. m«« in Rirbarda. **Appads**

84. — G. Doo, General syst of gard. and bot IV. 022. no. 30. — *P. paluttru* Hook, el Arn. Bol. Beech, roy. 128. — Grescit in Davuria prope Dorooioitk el in America boreali (Saskalctaawan, Hudson's Bay ei in ora boreali-occidentali).
80. P. ADUNGA M. Bieberst mss. ex Steven I. c. 20. t t. 5. fig. 2. — Tola glaber-rima: caule siriclo ramoso; ramis subfasftgiatis; foil, profande plnnalifidis, laci-niis utrinq. 2-3-dentlalis; florib. in splcas terminates 5-0-floras aggregatls; brae-leis linearib. denticulalis; calycib. ovalis, supra ad medium, Infra ad nnam ler-tiam fissis, laciniis ovalis, apice deniculalis; corollis profunde bllablatit; galea falcata breviler roslrala truncaia, infra medium ulrinq. unidentala, labll Inferloris Irilobi laciniis subaequalib.; filamenlis duobui apice cilialis. O? — Planla semi-pedalis. Folia 2-1-polllcaria, lacinae vix duas llneas longae. Flores conloril, iia ui galea saepe calycis flssorae inferiori inenmbal. Corolla purpnrea. Capsula longitudine calycis valde obliqua mncronala. — *P. paluttru* tar. Willd. 6pec. planlar. III. 908. — Grescil in Sibirla el in KamUchalka.

tt Bicuspidalae Steven I. c. 41.

Corollae labio superiore bail edenlulo, gtlea brevl, apice bidenUU. - *Lophdo** Boge. mis.

57. P. ANGI'STIFOLIA Bib. Plant Harlweg. 22. no. 100. * Bracta ramoaa: foil, an-gusle linearib. Integris, margioe minute cartilagineo-aeiruiaUs} spicia deasis paocfloris; ealyce glabro irnncalio, potlice minute trldenlalo, aniice slceo mem-branaceo; galea fornclala obluua, aniice blcuspidatai eapsula lanceolata aculis-sima, supra debiscenle, calycem sublriplo superanle. 3} — Crescil In Mexico.

38. P. AEQUINOCTIALI9 II. B. Klb. NOT. gener. el spec. planlar II. 332. - Steven I. c. 41. t (* 3. fig. 1. — Foil, lanceolalis crfnalo-piooaliOdit, laciniis oblusissimis emarginatis dentalis; florib. in spicam densam lerminalem congeslis; bracieit ovato-rhombeis cmargioalis; calycib. ovalis inflalii, supra ad medium, infra fere basin usque flssis, laciniis aculis inlegerrimis; corollae lubo calycem Iriplo su-peranle; galea obiusissima fornicaia, aniice bicuspidala. 4 — Hcrba fere semi-pedalis, caulis ascendens leres pilosna. Folia polliccm longa, 2 lineas lala in peilolum lalum decurrenla, margioe pllosa. Calyx brtvlaslaia pedicellalas pilo-asbllobut, laciniis aequalibvi acolia laieralibat. Ubium oorollae looge pro-iracium, tub! eorollni longiuidloa, galaa foraicaU obuueialM ac<u bic<apl4au. Labium loferiut iriente brevioa anbaaq<alliar Uiloboai, Ueiaais rotoadaais obm-sis. Stylus valde inflexns, parta loflect aabparallala aioadaulo, euarUu, aligma capitalo-bilobum. — Grescil In umbrosis aionUom MexicaBanun.

90. P. CANADENSIS linn. Manilss. planUr. 00. - Swaal, Brit flow. gard. I. t 07. - Steven I. c. 41. t - (Willd. Spec, planlar. III. ill.) — Caole shnpliei; spica tubfoliosa; corollae galea sclaceo-bidenlala; calycib. deortam Irnncalis. ^ — Caolis erecius spiibamaeus simplex superne pubesceat. Folia alterna pinnaiiOda incisa crenau obtusa laevia. Spica lerminalis setsilis ovala folio»a, braceis ca-lyce paullo longioribu». Calyces pnbtocenles oblique daoraom irucati. Corolla ocbroleuca v. ocbroleuca galcaque pulchra purpurea tubCaleaia fix roslrala, ted apice fere tnincaia, aargine aupariora vii deala nunifaslo, lateflore auiem uuioq. dente setaceo mulio magis eloogalo quam in *P. fykalic**. Labiom inferiaa Ui-Qum oblnsum. — *P. Mmrimma* 9U, Pluken. Phylogr. t 437. Ig. X — Hano cam praecedenia consociandam ease contendit Buage.

<9 Spica elongaia. - *P. gladi**! Michx. Flor. Bor. Americ II. l& - Grescil in America saplealrionali.

- 0U P. KIPIRASIOIDKS Sirpban nil, in Willd. Spec, plantar. III. 2M. — Steven I. c. H. I - Ommno simple* \. ratnosa: ramit infrriorih. saepf oppotitii; foil, inferiorib. pinnaiifidn, pinnit oblongi* subpionaiifidis lobulalit, lobulit crnratit superiorib. trn»ira inlo<riK racmi% Ian* lernunalib.; ral)nb r>lindnro-iubu-losis (fruciflfrns rampanulalit tridfniiait; corolla profundr bilabiaia. gjlra ron-'xa bitirnlau. ilrntib. ^ul.uUt.*, Ijbm mfrriorr paullo lirrno ro inlo>o.

Herba saepe pedalis, superne pubescens. Folia inferiora omoioo *P. palutrit*, superiora seosim iotegra. Corolla magniludiDe *P. palutrit*, flava, fulva, purpureo-puDdata v. omnino purpurea. Capsula calyce plus quam duplo longior lanceolata oblique acuminata fere ut *P. vertidllatae*. — *P. heterophylla* Palriu. mss. in Hb. DC. — *P. corymbota* Pall. mss. — *P. ramota* Wormskiold rass. in Hb. DC. — *P. Labradorica* Linn. Pl. syst edit Houttuyn VIII. 30. t 57. C - Crescit in montium Uralensium parte orientali, ad sinum Obicum, ad Lenam, trans Baikalem, in Kamlschatka et in insulis usque ad Kaljak, in insula Cbamissonis et in Labradoria.

61. *P. NASUTA* M. Bieberst mss. in Ste?en 1. c. 43. t t. 15. fig. 1. — Scapo glaberrimo: foil, radicalib. longe petiolatif, ambitu ovalib., profunde bipinnaliGdis, laciniis lanceolatis profunde pinnalifldis, lacinulis linearib. subserralis cartilagineo-marginatis; spiea terminal! ovala densa; bracleis foliaceis, supremis ovalis calycem aequanlib.; calyce pubescente orato, ad unam teriiam quinqueOdo, deniib. linearib. integerrimis subaequalib.; corollae ad medium bilabialae galea parum arcuata acute bidentata, labii ioferioris laciniis rotundatis oblusissimis subaequalib.; filamentis glabris. O — Uerba semipedalis v. alior simplex. Folia radicalia 3-4-pollicaria, petiolo 2-2%-pollicari, rhachi plana. Bracac hirsutae. Corolla magnitudine *P. palutrit* purpurea. Stigma parum incrassatum excrtum. — Facies omnino seqnentis. — Crescit in insulis archipelagi Kamtechatkici, Silcba.
02. *P. SLDETICA* Willd. Spec. plantar. HI. 200. - Steven I. c. 44. | t 15. fig. 2. - Rchb. Plant critic. IV. fig. 574., Flor. German, eicurs. 302. no. 2MB. — Koch, Synops. 0. Germ, (edit 1.) 542. — Foil, semipinnatifidis, laciniis lanceolatis acutis lobulato-denlatis serralatis; caule simplici; corollae labio superiore falcato brevissfme rostrato trnncato, angulis in dentem triangulari-subulatum protractis; calyce qulnqnefido, angalis paberalia, deolib. lanceolatis indhrisis serralatis. 9} — Herba 4-5-pollicaris sob spiea pnbeftcens Folia longe petiolata, fere omnia radicalia tripollicarla (petiolo blpollcart, lamina polllcart), illis *P. Lapponiae* band dlssimilia. Calycis dentea integenrlmi •. tenuissime serrulati, quinto plerumque brevior lanceolalo. Corollae incarnato-purpurascntis galca talde convexa, saepe ultra antberas in rostello brevissimura produrla, apice crenulaU* Filamenta omnia glabra. Stigma subcapitatum brevissime subcxsertum r. inclusum. Capsula ovala oblique rostellata. - *P. eomota* Matlusrhka, Enumer. 160. — *P. incarnata* R'rok. Flor. Silesiac. II. 378. — *P. flammed* Krok. I. c. 377. — *P. r#-cvitita* Krok. I. c. 379. — Crescit io locis irroratis et ad fonles in Sudelis (att SBcge ten brr ^am^c(« nad) bcr SBiffenfauff, am flcincn XtiQt. am 9iantc fecer ©Jel|d* gxuU, am gtcjtn &AU u. f. to.) et in America boreali. (Bear lake to the arclif sea coast)
6. *wMtrodonia* Karet el Kiril. Bullet de l'acad. des natural, de Mote. XV. 419. — Deolib. galeae doplo longioiibos. — In lapidotis alpiom Alatao.
- r. lamata*: Calyce deosius lanato, deniib. baud serrulalis; corolla oblatiore •* minus arcuata. — *P. Mroatea* Adams Hb. — In Sibiria.
- t. bicolor*: Corolla fla?a, galea porpurea. — *P. Sletenii* Adams lib. — Crescit prope oppidulum Sbigaosk ad Leoam.
63. *P. SYLVATICA* Linn. Spec. plantar. M5. - Sm. Kngl. hot. I. 400. - Flor. **Danic.** t 225. - Schkbr. Hndbch. t 171. (Oos.) - Strm. Flor. Discblndi. Ilfl. 13. (ic **aeu.**) - Hayne, Anneigew. VIII. I. 34. - Svenik bot t. 358. - Petiv. Bnt I. 30. W>*: - Bchb. Flor. Germ, escurs. 382. no. 2467. - Korh, Snop«. fl. Germ. { ^ (1:) } Mi. — Sleteo I. e. 45. t - B. Webb, Her. Ilinpan. «4. - Caule priroario erecto a baai torifero, secundariis prostratis; foil, pinnaiifldm, pinnis ovalib. nubpio*** liSdo-lobaUUt, lobulis S-3-deoUtif; calyce quinqudrntalo, drnlib. superne k< liaceis denUlisq.; corollae labio tupenore subfalraio brr<d>>ime ro>iralu liunc<<> angulis in deniem Iriangvlari-subulalum protracnv ^ n / - Caulis vis <llr< palmam altus evadil, saepe soliuos. Galea couvr&a. Filamenta duo apice barbata. Stigma parum iocratsalum ioclusum v. bretissime riserlum. Capsula c>† lyct iBdaM o<>au obliqoa mucronaU. Semioa part a ovala laeviac. (Corolla rosoa-

- *Pedicularit minor* Riv. Monopet. irregul. 1. 02. fig. 2. — *Alectorolophus terliut* Clus. Hist. II. 211. fig. 1. — *Pediadart Lutitanica* Lnk. et Hffmnsgg. Fl. Portug. I. t. 61. — Crescit in tolius Europae el Sibiriae pralis lurfosis.
04. P. FLAVA Pallas, Iliner. III. appndx. no. 07. t. R. fig. 1. ex Willd. Spec. plant. III. 208. f — Steven 1. c. 45. — Bnge. M6m des div. sav. de l'acad. imperial, de St. Plrsbrg. II. 300. — Caule simplicissimo; foil, succulentis profande pinnalifidis, segmentis dislanlib. lanceolalis acutis remote grosse dentatis; spica subfoliosa; calycib. inaequaliter quinquedentalis, denlib. lanceolatis serratis; corollae flavao galea oblusa, labio infenori trifido; filamentis duobus barbali; slymate exserto capitato. 2]. — *P sulphured* Pall. Ilin. III. 230. 321. — Crescit in Sibina.
05. P. SOONGARICA Schrenk, Enumerat. plantar, novar. II. 25. — Rngc. Bullet, de la classc phjs.-malh. de l'acad. impc'riale de St. Plrsbrg. I. 381. — Glabriuscula: caule simplin credo; foil, sparsis, radicalib. pinnaliseclis, segmentis lanceolatis pinnaiifidi», lobis denliculalis aculiasirais, caulinis profunde pinnalipartitis, caeterum similib.; spica densa, florente abbreviata; bracteis infimis foliaceis, superiorib. lineanb., apicc denticulalis; calycis campanalali herbacei parce hirsuti denlib. quinque lanceolalis acuminalls integris; corollae (pollicarit) galea recta, apice inflexo-gibba auberostri abniple bidenlala labium inferina ecflialum superante; filamentis duobus parce pilositi; eapaula.? 2 — Flores Tidentur flatl. — Crescit in montfbus Dschabyk in Soongarla.
00. P. PIYSOCALYX Bnge. I. c. 382. — Caule smplici erecto; foil, aparsia, radicalib. oblongo-lauccolatis pinnatipartilis v. pinnalitectis, aegmenlis ovato-lanceolatis pinnaiiparims v. Ossis, lobis carlilagineo-mucronalo-denliculalis glabris, caulinis minus profunde partilis, caeterum similib.; spica pauci- v. multiflora laxiuscula \. densa glabriuscula hirsutave; bracteis foliaceis lanceolalis subpinnalifidi^ denticulate; calycis foliaci ecoslati, demum inOali quinquedcnlali denlib. 4 denticulate, poslico inlegcrrimo; corollae rectae galea incuna brenter rostrala, apicc in denies 2 triangulare* acutata, labii eciliali lacinias rolundaUi paullo superante; filamenlis duobus pilosls; capsula late ovata aequali acuminala a calyce inclusa. % — *P. flat a* Ledeb. Flor. Altaic. II. 433. (excl. syn.) - Ledeb. loon. flor. Roas Altaic, t. 430. - *P. /Una fi. AUaUa* el r. corna Bnge. Mem. des dlv. sav. de St. Plrsbrg. II. M0. 570. - *P. cornea* Pall. Hb. - Plorts intense flavl concolores. - Crescit in monloaia graminosls ad fl. Irtyseb, Ural et Wolfeu.
07. P. COMOSA Linn. Spec. planur. 847. - ftebb. Pl. Germ, eieore. 303. no. 947a — Koch, S>nops. fl. Germ. (ediL 1.) 542. — Steven I. e. 4fw f 114. — Caule erecto simplici; foil, pinnatifldis, pinnia oblongfs acuminalis plnnailfldlt, laeinlla muero-nato-serrate*; calyce qmnquedentato, angulia puberulis, dentib. bretissimis ovalis oblusis, laltludme »ua bre\ionb., labio corollae superiore falcalo, breviler rostrato truncaio, angulis in dentem triangulari-subulaium protractis. % — All. Pedemont. 220. t. 4. fig. I. — Sle\ Icon. Mosq. t. 5. - All. Spec 50. t. II. fig. 1. — *P. tuberoio* Pall. Ilin. II. 38. - *P bulbosa* Pall. Inn. II. 87. — *P. imbrieta* Pall. Herb. — *Alectorolophu* alpinus primus* Clus. Ilti. 210. — Crescil In Europa mendionali ct in Sibina. — Corolla ochroleuca r. citrina
- W. P. SIBTIORPII Boiss. plant, nor. oriental, dlagnos. IV. 83. f — Radice fnds cyltndncit, apice attenuali« con<unte; vaglnis coll I oblongia acutiuscuUs brevlb.; caule simplici punclalo, lana crispa alba obsilo parce folloso; foil, glabrioaeulis, ambitu lanceolatis pinnatlfldis, pinnis pinnatiperlitis, lobulis acutis saepe compresso-mucronails; spica densa crmpo-lanaia, primum ovala, dein cylindnca; brarteis calyce bre>ionb., inflmis bifidts, laciniis laleralib. lineanb., media Iriangnlari mullo majorl, oranib. inloffrisj, reliquii lanceolalis aculis inlegemmis; ral)cc campanulalo-inflaio mrmbranareo 3-nervi, secus nervos papillis empit lanalo, denlib. 5 tngulanb. inlrgnis aculiu^culis, longiludini suae aequilais; corollae fla\ae cahre plus duplu longiorii lubo subincunro, labio lupmori galeato breviter ro>iraln, apire in drutes 2 a basi triangular! brr\itfr srlirpo-niu-cronalos producto, labio infcnon bre\ion glabernmo; fil. mentis duobui pilosis,

capsula compressa obloogo-subcorrata, a basi lation usque ad apicem aculum angusiata calycem paullo eiredeote % — *P. flat a* Fl Graec. - Crescil IQ rupeslnbus summis Olympi Bilbyni ei in dumosis Cadmi supra Philadelphiam.

- 60 P. ACMODOMA Boiss. I. c. 84. - Caule glabro elalo foliono simplici, foil, radicalib. el caolmis peliolalis, ambitu lanceolatis pinnalipariiiiis, pnnis numerosis oblongis pinnaiisectis, lobis triangulari-ovalis obtusis subcrrnulali» ralcarco-marginads, spica eloogala, basi laia foliosa glabra; braceis Infimls hnearib , <uporne calcareo-creoulatK, calyces soperantib., caeteris lanceolalis aetuis Iniegns cahcis loogiludine; calycis glabri cyliodriei, inter nerros laloa merobranacei deuiib. bremslme ciliah* Inangulanb., longilodind aae aequilatis, mucrone duro calcareo apicolatis, corolla lulea calycem aoblrplo excedente, lubo arcualo, labio superior falealo breviter roelralo, aplee in denies 2 a basi inangulan breviiier *cia-ceo-mucronaloe prodaclo, labio inferiori breviori glabro trilobo denticulato, filamentia daoboa aoperne lanalis. 2} — Uerba pedalis, folia cum pciolo semipedalia, pinnae 0-7 lin. longae, spica flonfera 5-pollleans. — Crescil in Cappadocia ad Euphratem el in Persia© monle Savalan.

- 7a P. YEH*TA Schbangm mss. ei Bnge. Bollet.de la Classe ph)s.-malh. de l'acad. imp^r de SL Plrsbrg. I. 380. — Caulib. simplicib. erectis, foil spams, radicalib. elongatis lanceolalis pinnaiisectis, segment!* lanceolatis pinnatipartitis, lobii cartilagineo-denticulatis glabrlusculis, caulims decrescentib , supreme peclinatopariitit; apica lanuscula glabra birsutave; braceis basi cuncatis irregulantet 3-a-fldis, lobo medio prodaclo, apice serrolalo; caljcis campanulato-r>liodriel membranacei glabri hlsalive denlib. S aequae latls ac longls acutia integerrimit; corollae galea faleau brttMar r«alraU, aplet In denies doos trlangulares acotalii labion lofadoa •cUiauui dapto a«pt#ania; llaattoUs doobaa pilosis; capsola oblique otau In aplicean rearvo-petfeeMun aeamlnaic, calycem duplo eieedeote-^ — P c—le— var. 8lev. Monogr. Ptdic. 114, fig. B. — *P. proerm* Adams mss. *P. ppmwtUsim* Pall. mss. — *P. iw*ri—U* Pall. Bb. — *P. sabma* Turcian rasf — *P. eowuu** varr. 1. t. C 9- Bnge. Mem. det div. sat. de St. Pirtbrg II 570. - *P acktlUmefoh** Torcian. mat. — Creaeil In bamidis subsahi^ ad fl. T>chujan.

- 71 P GRAECA Bilge. Bollet de la Classe phys -matb. de I arad impcriale de Si* Ptr*brf. I. J70. — Caule erecto simplici tillo*ulo. prtiole latiuculo tilloto; fell ambi(u o^aii*, bipinnaliseclis, lobis laoceoLMis aruminaiM acue drnlalis glabrft raulims paucis ^upitib., spira capilata densa villo«a. brarteis foliiformib. !•*• brrviiifrq peliolatis pinnatipartnis denticulalis; cal)cis o^ato-campanolali vllefi drntih ovalo-lanceolalis intrgerrimis subdenl culatisvr, Niiiiudine sua duplo loft* gionb , rorollae %»\f locarta suberostri, sob apice Inmrato-bidrntaU, labii i** ferioris lacmils lateralib. semiorblcolalis subdeoticolalis laiatadfnp galeae; fl!i** mentis doobas pobescenlibu< } - Planla florens tit tripollrrarin, folils bretibo* latis braceisque ab aflmbus facile dlstlUgoenda. Plores ri sicco purpurett «*' lycea villosissimi. - Crescil in alUsaimls monlibos Velncbi in Graecia.

- 71 P. FI*6A Tortsan. mss ei Bage. I. c 377 - Ciole simplici erecto, basi ood* •enailmvilleaalo; MLaparaia, radicalib longe petiolalis ovaio-oblongis pinnaU* •ecus, aefmesjiit ovalU profuide pinoatiparutis, lobi* iocUo-drnuis cartilagiB<.* mocoMlis gtabria, sobforalib similib.; spira pauroora. braceis DifPmflM calycis ciliodrid, ad Dervoa birtelli dealib 5 inaogulanb. aetuis iolf gerriob aeqM leagte ae UIU; corolla* galea falcaU bretiler rottrata, apice in dcoles d«oa brtfM aeulaia, UMi laciniaa reniformes dilaiatat IniegerHmat #upcrapi. fillamemUa omajib. fUBriueolia i capanU . . • - ! » . rmhims r- **?*•** **lj Alm des dit. m. de SL PtrtWg. II. 371. - Crescil in alpibut Baikaleosibus - footes fl. W|drittka. - (Florea S-S-ttl porpurei)

73. p. TAXACBTIFOLU Aiassa, M*m. nal. aer«L Mo»q V. 10*. - Bage. B^{ttlk>} la Qaaae pkyt.-maU. U Taead. Imper. de M. Pirmbrg. I J77. - Ceole »¹¹⁰l¹¹te¹¹ •rtcte, e teal pobecearte; fell tpartis, raaiiralib petiolalis obloBgo-lasceoia¹¹

- pinn.ihseclis, segments pinnanfidis pinnaiipatiu«»\e, lobis inlegn* v. paucidentnii» oblusiusculiN glabns caulini* similib. ucutrq dentalia; spica florcnle capitata drns.i multiflora nlbo-lonugmosa, bracicis lineanb. intogerrimis; calycis campanuldo-oblongi lanugino*i deniib 5 lancvolatis Inlegcrnmis, corollae galea incuna brcvissimr rostnla, sub apicc in denies duos aculata, labn lacinnns lateralib. oblongis denticulalit, galca dinndia anguslionb ; filamenlis omnib. subglabris. capsula oblique ovala recuno-mucronaia, calyce inclusa. 21 — *P. laeta* Sle\ lib. — *P. incarnata* Pall. lib. — I¹ *romota* ft. Sir* Monogr. Pedicular. 47 t. 14 fig 1) - *P. rubens* ft. *detei torum* Buge Mom de* di\ sav. do M. ptrsbrg 11.571. — Floret purpurri, >anant pure albi — (.re^nt in gr.imino»ib a\ Wolgam el l'ral ner non in borcalionbu* Sihime.
- 74 P I.EU<)I)O\ r.nseb Spinleg. flor. Rumel II. 17 t — Radirc fasciculatn, fibrillih inrravsatis, caule ereeto simplici мюоко, superne sparsifolio, foil pinnatisorlis, siiblus pilosis, »egmenlii distanlib. pinnaiibdis ^rrralisq , lacinu* lanreolatis deniibq murrionalo-aruiiu, apicc »artilagineo-albulis, spira lauusrula, ral>re rampanulain quinquedentalo tpartim piloto, dentib. lanceolalis acuminaim oblusiuscuhs, nine denlifens, corollae ocbroleucae galea e collo angutlalo in-Dexo-cuna(a brenier roilrata, juxta apicem iruncatum denle Iriangalari-tubulalo ulrinq. aucia, filameolis superne cilialo-pilotn; aolberae appendicolit iriaogu* larib. oblu»iu»culiit. ^ — Caulis spKbamaeus crastlutculus niqjicaot, inferne pill* mollibus albulis adtperaot. Folia radicalia ambiiu obloogo-linearia v. lanceolau, caulina breiora simpllciora, bracieanlia linearia dcnllculaia, tuprema fere inlfgerma. Spica sosquipollicaris continua. Capsula. . . . * — Crescit in regionr alpina Skardi, in pralis montis Kofeelitra.
75. P. IM(iI>OSI lingo Lmnara \ \ I.lInrlurb 122 — R.nhrc fasciculala caule simpliri somipodali glabnu<rulo >. piloso, f«ll. radiralib lanrmlalis pinnadparlilit, pmniH pinnaliserii*, larinnns aruliu>culi< glabri^, npira Toliona, brartrM foliaceiH pinnaiipariitih rahro longiorib . r.il)re Tolinreo pilo<o \ Mllo^o inarquallier qutnquedentalo, deniib innso-furraht; corollae (purpurear drnlib galrao in rostrum bre^e rrassiunculum produclin; t)lo tubeserio, cap^ula eal)rem plat daplo eicedente ^ . Folia radicalia td 3 pollices longa. - *P. rubtm* Bnge in Udeb. Fl. Alutic. II. 43V (nee Sicph.) - Lcdeb. Ir. fl. Rots. Aliatr. illu»ir t 411 — Crescit in Sibiriae Aluicae paladoait td fl. Tie-harden el Inul.
70. P. RIBENS Stepban mst. in Willd. Spec plaaUr. III. 210. f - Caule tinpllcii. foil. pinnaURdis tenuintime dUitia; tpica folioaa; calyce lobnloto roberrimo gUbro quinquedentato, deniib. binia longiorib. apice taepiat blfldia; corollae (purpureae) labio superfnvi rmarginalo creoulalo, aub aplee ulrinq. fetaeoo-dcniaio. 24 — *Caulis* orrrius oriopnllirans. Folia radicalia quadripollicaria.
- 24 *Alata tea* Karri rl Kinl Rullei. de Mosc. X>. 410. — Spica brevi rylindrira densa villoMHMma, poiioln villosis»tois foln^que multo minus romposihs
- T. Europnra* Ingr I r >72 "" — // *fasneuhla* llellardi mis. apd Hilld Spec, plant III. iH rf p 410 no 37 In Sibina media rt in P)rrnaeis
77. P. IMSVMAI V> srbrenk, Udllrt. dr la da«HC physic.-mathem de I arad des sr dr M Ptr>brR II no. II. no 37) p. 10V Radicit flbru rlongalii r>-llndrarris, caule simpliriinmo aubglabro; foil, glabris pinnaiisertis, segmrntis angu«iis incisib pinnatiQdis^e, lobit bretib aculit; foil, eaulinia »imilib »parm, spira drn»a. brarieis (m«*tjii»i linearib. subinteaicrrimit; calynb »uhin0«ii« di»n»r lanaiin, dentib M lineanb subintegerrtmist ajalea gibba erottri in denies »ubulato» elongalos demnente, labium inferlna glabemmum eiredenle, filamentis 2 •ubpilosis ^ — *Kd P nbtntm, uhgtnotam* el *lastotiaehyam* proiime accedit
- Trr^ril In praim grimino«m ad I) lurhim
- 7^ I» 4(IIIIIKAKrOIU Mrphan m»< inUilld Kper plantar III 2IQ . I r det. Icon llor Ro^ \ll illuMr L440 I erirb Flor. Altair II 414 * *lc\ nnon Rnge Mrm »k * »al tin dr I act A imp«*r dr si |Mr>brg II VW — < %q\ fcm, plici ped.ili ranr%rrnlr f* 11 M (« m% pintiatiMn.. pinm% diktantili |.M,fun(U P I n n U t e . l a t u u s s i n n « u - d « n U h % I m r a n b . n n e r a t r r n t i - p u b r r u l i t

glabrescentib, spica nuda elongata densa; bracteis linear-lanceolalis cano-pubescentib. inciso-dentatis, calycem subacquantib.; calyce foliaceo cylindraceo acute quinquedentato canescente; filaments duobus barbatis; capsula ovato-lanceolata, calycem duplo excedente. ^ — Corolla palhede flaticans el albida. — Crescit in rupeslnbus SICCIS ad Oumma Tscharjsch, Kurbcbum et Tuchujam.

79. P. FRIDERICI ALGISTI Tommasini, Linnaca XIII. 74. | L i - Foil, pinnatifidis, pinnis oblongis pinnatifidis, lacinus mucronato-serratis; calyce o>ideo arachnoideo-villoso quinquedentato, dentib. lanceolatis acutis, lahtudine sua loogiorib.; corollae labio supenore falcato breviter rostrato iruncolo, angulis in denlem triangulan-subulatum protractis; filameolit duobus *' pilo»uh» 'ex icone), antheris sagittalis; stylo breviter exserto; capsula otalo-lanceolaia calycem excedente. 2|. — Rbixoma simplex v. rarias pluniceps lignosum, peiolorum rudimentii coronatum. Caalii limplicisimus 3-10-pollicaris parum inclinatus, mferne glaber, superne parce YIIOSUS, tillis caducis. Folia radicalia peliolo 1-2-pollicari supra canaliculato parce ulloso suffulta, ambiiu oblongo-lanceolata, peliolorum circiter longitudine, pinnae pinnatifidae, lacimae planae n.'icul.lio-icno<>ae, serratae, folia caeteroquin subconacea, caulina brewu* peioloiaia, radiralibu* minorata at similia, floralia brevis&ime peiolata minutque composna Spica densa • compacta baud raro 4-6-pollicaris. Calyx bremsime pedicellatu* ad basin subinflato-rotundatus, subconaceus fusco->irens, lacimae aequalis 5 lanceolatae acutae. Corollae roseae ^nec ocbroleucaej galea Talrala anlice roiundata, apice acute bidentata, labn duplo breUons trilobis lacimae latrralc* seinirordatae crenulatae. Stylus eisertus, stigma parum incrassatum bilobum. — I^l, muctda C Koch mss. — *P. rotea* Ten. — *P. fasnculala* Pollini (nee Bell.) — *P. rostrat** Gun. (nee L.)l — Crttcit IO berbldia Jugls montis Suvnik in protncia littorali Austriaca.

- 8a P. LA8IOSTACHT8 Ledeb. Icon. Bor. BOM. Alt illatlr. t. 440, Flor. Altaie. II. 431 t — Caul© bumill smplici pubesente; foil, plnnatifldis, lacinns densis II-nearib. pinoatifldis; splea fuliosa densa bretl; bracteis hneari-lancenlatis, basi Integerrimis, medio pinnaltseclis, apice serrulatis, cal)cc longionb Ila\oscrtilanalis; calyce membraoaceo Infundibuliformi acute quinquedentato drnop lanaio; rorolla caljcera v:x duplo excedente; slamimb. ommoo glabrii 4 — Radii fasciculata. Cauh« quadnpollicans v. bre>ior. — Crescit in udi« summae alpiss • n. Tsrhujam contra ostium flumims Tscbegan jarnniis

- 91 P DOLICHORH/A Scbrenk, Enum. plant not. II W. - Dngr Bullet, de U classe pbyn.-matb.'de l'acad impériaIs de M. Plrsbrg. I. 170. - Caule flmpli^ erecto superne tilloso; foil, spams, radicalib. longr pehulatis plnnaliseclii, segmentm lanceolatis piBoalipartiti« lobis cartilagineo-mucronato-serratis, caulioii sursom decrtcenlib. sesstlib, spira laxiosrula glabrata, bractei* triOdis, acip* media produrta lineari aerrulaia_t lalerahb. dentiformib.; ralycis campanulati membranati i quinqestriaii dentib. qoiouque abbreviatis acutis iolrgerrimit; corollae galea unrioata in rostrum cooicum eloogala, apice in denies duos Sibô-laloa partitum prodoeta, UbiJ lacisjiU dilalatis, lateralib. intus mediaq. basi cllialia, galea brevionb.. flamealis doobos pilosis; capsula . . . ' - Crescil^B mooubus Dacbabyc̄ Soooganae.

- Hi. P. ALTAICA Stepban mss. apd. Sle?eo_t Mooogr. Pedic 4K. t. 14. 6g A. - L⁺ deb. Icoo. flor. Bossic. Altaic, illustr. I. 4H_t Flor Allair II 430 t - r₁*u₁* stricto simplici subcascete, superne atropurpureo-mamlato; foil. radicaU^û* piBMiaociis, lacioUs ovatis oblosiasculi* grosse rrrnaio-terr)ii«(raulinis inciso-plaaatiidia, lobis serrvlaUs, supremis horanb rrrnato, tpica nuda la«a mulii* rarias paoci-)flora; braciets oblosgo-lanreoUti* p«lmatuctis »erratis, C₁*I₁*C₁* fohaceum eylla)drac#«a obsoltl* qaiouqedeoutum caoetrentm maculatum subaequantibas; galeat dealib. bretissimis; Olameoits duobu* barbati*. stylo vn exs*rtio; capsula ovata calyces svperaole. % - <aalis 1-2-pedah* Folia radlci^û 4->-pollicaha_t desavsi aer«de»tibas p«iioht 10-pollicana v. luogiora. Co1¹ a¹ a¹ fla«a - R f*mo4*9 tar. 8M«es) I. e. - Crtcaci la summis alpihus Alulcif

Koksuu, Abai mendionalem et Tschuja, in monlibus allioribus ad fl. Tigerack et in monle Sinaja Sopka.

83. *P. ARCTICA* R. Br. mss. in Frank I. Journ. appndx. 742. ex G. Don, General syst. or gard. and bol. IV. 025. no. 61. — Caule simplici lanalo; foil, ptnnalifldli, lobia subovalis denlato-incisis, aduluorib. globris, petiolis caulinorum dilalatis; calycib. lanatis quinquefidis; galea oblu^a iruncala bidenUU; flamenlis longiorib. pilosis. 2l. — Corolla purpurea glabra — Affinis dicitur *P. Sudeticae*. — In insula Mehille crescit. — Gf. squenlem.

t || Edeniulac Sloen I. c. 40. — Carollao labio superior! omnino edenlulo, galea brevi. - *Anodon* Bnge. ross.

- &4 *P. L* (si) OKFFM Fisch. mss in Steven I c. 40. | t. 0. fig. 2. - Hook. Flor Boreal Americ II 100 — Foil, bipmnafldm, radicalib. copiosis, caulinorum rbarlu dibiiata, spica densa lanala; calyce quinquefido corolla quadruple* brevior; galea nbtusa (runcala (nonnunquam sub apice denial 2l. — Accedit ad *P. irtrolorrm* el *hirsutam*, sed ab utraque differit corolla eliam hac duplo majore. Caulis palmans, superne dense lanalus quandoque bati omnino glabror, toperne hirsuiuv Folia radicalia bipfnatiOda, laciniis magis miousve incisis, rbacbi angutta, peiolo bail dilatato, caulina mlnora plnnaii6da, rbacbl laliore. Spica dimidiuoi caudem occupat, denaiaaima foltosa, bracleae supremae llineares inlrgerrimae. Calycis densissime lanaif lacinae 5 llineares subaeqnales. Corolla calyce 4-5-pio major, galea obiosa v. rarias sab apice bldenlala. Filamenla duo loa, duo apice lanium ciliata. Sligma capitatum exsertum. Capsula lala, admodum obliqua, calyce longior. — *P. arctica* R. Br in Parry* First Voyage Appdi p. 270 — *P. pur/ut ascent* Cham, in Spr. Syst. >egel II 7*1. — Num foric cad cm ac species priernlens ' *V hirtuta* Richards. Appndx. 25.

fi. clattat Foil paunorib, spica clongala laltoro, galea majorv

y. lanalu spica maxima clontfaia, foil, bipinnalifldis, segmentis anguMic - *lanala* Hook et Arn. Bol Beech, toy. 128. - *P. atopfcurotdn* Adams mis Crctrii in regiombus arlici* Asiae el Amerlcae (circa otlia l.cnae, Kamiacbalka, McInlle in«_T Koliebou's Sound, Rocky moouUios).

85. *P. HIRSUTA* Linn. Spec planur. 848. - Flor. Danic. t. 110ft. — 8levea I. c. 51 | - Laoaia: folioto erecto implici; foil. plnaaUadit, rbacbl la peUolan foliaceum dilatata; spira foliota; calyce qulaqveido klrraioi eorollae ealyce dapio longions galea ohiusixtima. 2). — Folia caalloa aaepe laoeolaU aaplexicaalia, apicem tenu» laniummodo pinnulis nonnollis aacu. Calyeia bretiier qaloquofidi lacinae subacuales, saepe denialae aul incisae. Corolla calycem iriplo auperans, ad unam tertiam bilabiata, galea convexa. Filameoia omnia glabra. Stylus inrlunus. Corolla dilute ramea. — *P. artrra* Adams mis. — Lino. Flor. Lapponic. 245. i. 4 Gf J. — in Lappoma Tornensi el ad ostia Lenae nee non in insults Americao arctirae.

M. *P. FLAMMKA* Linn Spec, plant. 840. - Steven I. c 51. - Linn. Flor. Lapon 845. i. 4. fig 2. - Humilis foil, praecipue radcalib. plnotlifldis, pinntt o^atit retrorsum imbricalis denial!*; calyce quinquefido (glabro); spica breti, eorollae galea obtasissima rotunda, labli inferioris laciniia lioaaiibot. 2^ — Calyx subtus alius ficus quod praesertim ex fniciifero intelligitur. Filamenla omaia glabra Stigma inclusan. Variat corolla lota Bava el galea purpureo-futca, labio iaferiore tuboque Oavis. — Crescit in Laponla, Groenlandli, Labrador.

87. *P. ROSRA* Wolff in Jcq. Collectan II. 57. — Jcq. Icon, pi rar. t 115. — Sirm. Deuuchl. Flor Ila 20 (ic acn. — Rcb. Flor. Germ, excort. 302. DO. 2400. - Koch, S>nop* fl. Germanic 'edit M 543. - Steven I. c. 54. | — Foil, pinnatifidus, pinnis angule lanreolati* arute »erratii», florib <picati»; bracteis pinaattfido-deiitatiH, ral>re jiaullo Inntfmrili, ^upermnb ftubinlegemmii, calyce lubuloso-campanulato lanato ArmiquitnqueUdo, deniib. aequalib lanreolalo->ubuUti« *CUI, corollau labio ouprnore rerlo sulifalciuio edenlulo nh(u%o tlat.ro ^ -

Scapus nudus* pauciflorus»e flonbus 5-0 terroinalibus onus. Corolla calyce duplo longior rosea, labio supenon saturation. Filamcnla duo barbata. Antherae nlllosae Stigma capilalum e\scrlium. Cap»ula caljoe »e*quilongior oblique mucronata — *Pedtc. hirsula* All. Fl Pedcm. t. 3 fig.],, t 11. fitf 1 — Crescit in alpbibus Europae mediae el in Nbm.

88. P. CADMKA Boiss. Diagno* plant, not oriental. IV. 82. — Humid* raespitosa* radice cjlmduca \cricali tenui parce rauiosa, vagini* colli oblongis oblu>i\ bre- vi»»imi», foil peliolali», ambilu lanceolalis gtabrescentib. pinnalm, ptnnii pams otalo-oblongi», ileruo! pnnati»ecti<i, lobulis bretusimis ditaricali!* deilals; caulib. folia m »uperantib , parce foltoslt, lana crispa rarocenle clongata Inr- sulis; spica densa ovata ararhnoideo-lanala; bracei* o\ato-rhombeis calyces aequantib. >. subsuperantib., basi cuneata inlcgns, infenorib. pectinato-mri»i», supenonb. apice lanlummodo 3-5-fidis, lacinns obsolete dcnlirulali* mlegmtc; calycis looge lanali tubo campanilalo subinllato, lacinns lubo (nplo fire ltrevio- rib. lanceolatis acutiusculi» rerli», una allemc bre^iorib , corolla rosea gltbra calyce duplo longion, tubo subcurvato, labio superior! rrrlo late lincan, apica rotundato prorsus edenlulo, labio inferiori galeae aequilongo trilobo, lobis ro- tundali» »ubac<ualib.,t intermedio basMalde anguslato, filameniis glabns, capsula compre»»a exlrorsum falcato-subrecurTa acuta lanceolata. ff — Planla 2-3-polli- ranv (.ajulula den^a 0-10 lin longa V. rolla H hn. Innga, calyx fere 4 lin. longus. - (.rescii in summitale Cadmi occidentals supra (ibejra.

80. P. OLYMPIC* Boiss |. c. 8J. - Uumilm radice lenui trrtirali, vaginis colli laoeolatu elongatu acutiusculis, foil, glabm peliolalis paucis, ambitu Imearib. pinoatit, piODit brevib. ovalo-Inangolarib. rolondatit calrareo-creoulali«v folii parte luperiori UDlun deolaU; eaole glabro folia radicalia tubduplo r&cedcole parce follow, tplea otaiia 4tAia; bracteit oblongit oblutiuculu calyces subsu* peraalib., inflnlis bail lobatia, caeterit obloogo-lanceolaUs obtuie 3-A-dentalit, calydb. hirsalJt; calycif breviler campaoulati denlib. tubaequahb. triangulan- lanceolalis aculit iotegrii, lubo Iriplo breviorib ; corollac ro*cae ^ glabrae caljce duplo loDgiorii tubo abbrevialo, labio soprrion recto late lineari, apicr roiundalo prortus edenlulo, inferiori brevion Inlobo, lobi» nubarqualib rolundalin, fila- mentK glabm Zf — Caules 2-4-pollicares *»pira fore pulln an», cal)\ 3 lio., corolla 5 lin , labium Mipcrius 2 lin. Ionium, Imoam latum, mfenun minu». — Affitm praecedenti el /' remeolon <.rescil in pralii bunmlis regioni» alpiot* infrnor^ Olympi Djlh)m

«. P. ORTHOTIIT (.ri.rb Spinkg flor RumH II l> , Radice dr»rfndeote; caule rreclitculo »implici parce pilifero nubaplullo, foil. pinnati»rcii»t brae* trantib. oppo%iu«, §unmi« infjri*, imorum frgrornlm ovalo -oblongis obtu^ oblutrq. •erraiopinnatifldii glabnt; »pica abbrenata. caljce lanalo campaouUI⁰ quioquedtolalo, deolib. laoeolalit obtu»lu»culit; rorollae rubrae galra recl! ob- Uisa edentula croilrt; fllaneolif lopernc parer pilotm, aoihrrav **appodiftH*** Irtangolanb. acatiu»coli« ^ — fthuona fae»pilotun ramo%um, caulet **plures** 3-^pollicaret emillrnt *P rot** Frivald«k m%.* - Crricii in rrgione **alpina** Skanli aoslralit el Rbodopct, in berboti« nooti« PeriMcn

01 P. VESIGOLOft Wabkobrg. Flor Helvetic. II* - Ro)lr, Illutr. of Ilimal. Pj* »l U 7a Og. 1. - Bcbb. Plant, critic. I. fig. 31 - Rrhh. Flor liern etcurf. 36* ao. 2471 - Koeb, gyiopt. fl. (ifrn. mill. I U3 - str%rn I c. W. r - ^{Foib} pioftaUdit, plaait ovalib. doplicalo-creoati»f tuprnunb deor%um imbricatit; braceU obloagU pin»aUMo-Cfeou«, »uperionb •ubinirgrrrimit calmer p*ⁱⁱ⁰ longiohb.; calyre tob«le*o - eaapanulalo rum brarin* «illo»quedntato. denlib. tMtqoahb. lanceolaiU. apice rvcu%ati« »ubrrenali». rorollae Ubio **supere- riore** recto •bfalcalo, aptre edeatolo pbiu»o gUbro ^ \anal magoitudmtf * dlgliall ad tpiUuataea*. Galeae ap«t Mepe brnruinr rrllynut, temper *o ^ .'' !«• fonsaot. Corolla ciirina, macola pumrea » aimpurplea »ub apice **superioris** Untnta duo barl aia *P. flam mum* Wolff. In Jrq (.olltci. bol |

70. ncc Linn.) - Hall. Icon, Helv. t. 8. 8g. 3 — Fl. Dame. 1.30. — Crescit in alpibus Europaeis, in regionibus Baikalensibus, in jugo Hiraalayerm ad Sbolma et versus Caslieroenam (Bth. Scrophul. Indie. 54.), in Kamlschalka, in Lappoma et in insulis Amoenae arcticae.
fl. jUinfoha Foliorum lacinus baud retrorsum imbricatis; calyce minori. — *Utriculo* Adams mss — (Ad Lenim crej>cil;
02. P. ZEYLAMCA lth Scrophul. Indic. 54 — Krecla siroplei: foil, oblongs ubtutus carililaginci* duplicato-crenatis*, sublus furfuracco-pube>cenlib.; racemo cloiKalo laio; cañnb. hmc II>M>; inde subquinquedentatis* crenatis; galea recalcata, anlice suhangulata. 2L — Crescit in insula Zrjlania.
- 03 P. ATROPIBPIBKA Nordm. Vorhmlige Diagnosen 3. - Foil, allernis, rorolljclabio supenon basi edentulo, galeae ohlu>ifr>imac .ipicc edentulac ro>ro nullo, braciei> Imcanb longionb. calyce den>i>simc lanalo quinquedentato, dentib. tub. 3-j-)|o brcMonb. inaequalib., Toll. pinnalisceli*, segmentit pinnalipitrim*, lacinn> anguole st>rralis. ^ — In montibus Adshara et Acbalnk.
04. P. ROMO<< I mn. Manliss. plant. 80. — Jcq Flor. Au<lnac 1.110. - Hall Hoiatirp. Helv. I. 0 III I - Kchb. Flor. Germ. e<cnr<. 3W. no 2473. — Koch, Synop* flor. Germ. edit. I. 642. — Steten I. c. 95. f — <aule vubnudo v fohoso; foil, bracteivq. infrnrib. pinnalidm, laciniis proTunde pinnatidif, lacnulia lineari-lanreolatis inriso- murrionalo- ferratis: bractea superiorib. lanceolali plnoalindo-<crriaitf; calyce rampanulato integro, angulis >illoso 5-dentato, dentib. tubo multo breMonb, e basj triangular! arumtnali^, postenore longiore, corollae labio supenore subrecto obuso edentulo hir<uto; filamentis omnib. apice dense barb. balk. ^ Plauta soimipedalis \. pedali< Bractea Mipremae tntrrdum >ienli>< Corolla purpurea /. *Sumtma* Pullini. - Galea glabra. — Oe^cit in locis glareosis > Hubilpnis prr Kuropain mediam ad Pulla*am usque, nee ultra proteiul
05. p. U|in Kill Craff, Flora H 7. XMI. I. 42. - Koch, Synops dor t.crman (edit. I >)> Full brarii'isq inferiorib. pinnatidm, Ufinim profunde pinnalidm, larinulift lineari-lanreolati^ inaequaliter mucronato-<errati<. brarteu superiorib. lanceolati* pinnatiHdo-i>rnatis; calyce rampanulato senibifido *ub>patbaeo, aollice villoso 3-5-dentato, dentib. bre%i>sinu tnaogularib., posteriore paulo majore; corollae labio subrecto obluto edentulo glabHotculo; flUneolia longionh apice dense barbais. ^ - Planu S-4-pedalis. Floret aulpburel. - Crvicit in alpebus Vorhinensibu* Caroioli*(atf Ht 3am<ir ml 3* n u bit jf|t atktim <rf<nWn.)
00. P. nELI rITA i.mn. Spec, plantar. M0. - Jcq. Flor. Aosiatic, t 8W. - form. Flor. IMtrhndi. list. 30 <ir. aen. — Rcb. Flor. Germ, eicart. 301 no. 0471. - Koch, Synops II. Germ. edit. 1) 543. — Sieten I. c. 54. t — Foil, profunde pinnatidm imuncatis, ptnnuli* lanceolate pinnatifido-dent aim deniculataiq., superiorib. basi lain confluentib; florib. <piratis; bracteis lanceolatis indinsii triflidisq. flore brrMonb, infrnrib. pinnatifidu elongata; calyce rampanulato glabro tcmquinquedentato, dentib. lanceolatis inaequalib. arulm. corollae labio supenore >ubrecto obuso edentulo glabro ^ — Herba procera 1-3-pedals. Cal)t glaber coloratus. Corolla ferrugineo-purpurea. — IVdimlana *alpinm foUU airrrnu p,m~*afu, flortbus ex airorubrnhbus* *< spirits* *demsam eomp#<IM* Hall. HrUrl 041 I. 10 hg. <. — I*, *obsolete* Crnti. Slirp. Auslnae. 310. - Crescit in alptbut Hungariar, Au>thae, T)roli, Pedetnonui, HeUeliae et luliae supenons.
97. p. KLATA Willd Spec, plantar. III. 210. — Steven I. c. 53. t t II. Og. 2
 p. Clause siroplici, foil profunde pinnatifidis, pinnis lincart-lanceolatis crenatis, >ptca laia stbfoliosa; cal)cis o>aii giabn dentib. quinque brru*Minii, eornllae galra oblusa, apice obsolete dfiata 4 (aulis simplicituniui 1'i-2-pedalu erectus Folia allerna prorunde pnnailida, pinnis di>lantibuit linean - lanceolali oblu>rrrnaliH, rreni* miiuhssimo niurronulali* Spica srnnpedalu %ub(o)io>a elungata Onliut infrrioribus di>ianlibuo, ouprnonhu* run(crti< rolia floralia infrriori ctlyce duplo lonisiora. >umma cihrom arquaniu inpaiaia rrrnulaia V*||| iutilosus glaber inarqu.iliirr (uini)icdrn(aiu< (nro)lae purpur<r tubus calyce

- iriplo fere longior. Labii inferioris tripartiti crenulato-dentati lacinae laterales oblusae, intermedia longior mucronata. Filamenta duo longiora barbata. Capsula calyce duplo longior mucronata parum obliqua. — *P. punicea* Poll. mss. — (Gmel. JI. Sibiric. 111. 211. no. 22.) — Crescit in Sibiria ad Obum et circa Krasnojarek ad Kalscham, circa Smjof.
98. *P. ORIZADAE* Cham, et Schlecht. Linnæa V. 103. | - Caulis credo simplici; foliis, pectinato-pinnatifidis, laciniis lobato-pinnatifidis glabris; calyce quinque-dentato, dentibus lobulatis; galea brevissime rostrata iruncata. 2) — Caulis 6-18-pollicaris. Folia radicalia 3-4-pollicaria, 4-5 lin. loba copiosa, caulina pauca nullo minora sessilia, pinnis inferioribus majoribus, sensim in bracteis abeunt. Calyx 5 lineas circiter longus, corolla purpurea, tota 1/2 pollices longa, labio inferiori trifido, lobis rotundatis inlegerrimis, galea fornicata antrorsum paululum producta in rotulam brevissimam truncalium interdum leviter bidentatum. Capsula elliptica acuta compressa, 10 circiter lineas longa. Semina magna ovalia. — In Mexici monte Oriaba crescit.
99. *P. BRACTEOSA* Bib. mss. in Hook. Flor. Bor. Americ II. 110. - F. erecta elata: foliis, pinnatisclis, segmentis lanceolatis, inferioribus distantibus pinnatifidis, laciniis serratis; spica elongata densa; bracteis membranaceis ovalis aruminatis; calycibus quinquefidis pilosis; corollae galea obtusa sobincurva, anlice arua v. vix obsolete bidentata. 21 — Herba bipedalis et aliorum, folia 6-pollinaria v. longiora, pinnae quadripollicares. — *P. elata* Prsh. Flor. Americ. teplenr. II. 425? nee Willd.) — Crescit locis umbrosis in America boreali (Rocky mountains¹).
- IOa *P. DENSIFLORA* Bib. mss. in Hook. I. c. (adn.) - Erecta elata: foliis, amplis profundis pinnatisclis, segmentis ovali-oblongis pinnatifidis, laciniis oblongis incavo-dentatis; spica densa molliora; calyce inaequaliter quinque-dentato; corollae galea reu oblonga, antic^o biante, labio trinito. ^ — In No^{va} California creseiu
101. *P. WILHEMSIANA* Steven I. c. *. f. t. 10. - M. Bieberst Flor. Taurin. Caucas. 111. 412. — Rhizomale crasso; canale erecto simpliciter vage pubescente, sarpe ad spicam usque nudo; foliis, radicalibus longe petiolatis bipinnatisclis*, pinnis distantibus sessilibus late ovalibus pinnatifidis, laciniis dentatis, raulinis angustioribus demum confluentibus; spira densissima; bracteis foliariis, declivibus deflexis, superius serratis. comaeformibus; calyce densissimo lanato ovato quinquefidio, dentibus linearibus elongatis; corollae galea oblonga imbricata. *4 - Folia inferiora fere semipollicaria. Filamenta radicalia fere *Spiraeae filipennular* faris. Corolla magnitudine *Spiraeae ochroleurae*, calyce vix duplo longior. Filamenta omnia barbata. Stigma exsertum. Capsula longitudine calycis oblique acuminata breviter mucronata. — *P. wilhemiana* Gorenk. — Crescit in monte Beshtau et circa Karlsnam in Caucaso.
108. *P. CONDEXSATA* M. Bieberst I. c. II. 71. no. 11. - Strvnr I. c. 57. t. 17. - Canale simpliciter; foliis, bipinnatifidis, laciniis lanceolatis inaequaliter deolatis, *M** amb spica aggregatis, sensim minores in bracteis abeuntibus; spica densa elongata pyramidata; calyce valde lanato luboloso 5-dentato, dentibus triangulatis breviter integerrimis subarqualibus; corollae galea oblonga imbricata. *4 - Folia inferiora fere semipollicaria, uncias 3 loba, illis *P. foliosae* simillima. rhachis inaequaliter semipollicaria. Filamenta omnia barbata. duo drnsiu*. - Valde affinis (forteque baud saUs distinctu) *P. foliosae*. - Oescit in alpinu Caucasu orientali Iberia et Hyreanar.
- MB. *P. TILFTRIS* Linn. Spec. plant. Ur. H46. - Sieten I. c. 57. t. 10. Bg. i. - Linn. Flor. Aluic, II. 43* - Canale erecto simpliciter tag^o birtuto; foliis, inferioribus. »» Uolom ailevnalis, snptrilobis. SMailibus. Imeare-lanreolatis* Irtilr pinnatifidis. laciniis oblongis duplicato-serratis-dentatis; »» pira imbricata infra laxiuscule bracteis superius ovatis acuminatis argo »» vrain-drni »» calyce ovaio-cjno draco hirvuto qatequedcnuio, dentibus inaequalibus. Uncro Uuit intefhs; corolla anasa leniam bilabiatu. labio superior ad marginem ulloso. »» P

cdenlula raucronulala, in fen on inlobo, hlaroenlis gl<ibns, Migraale mcluso, cap-
sula ovala parum obliqua vix caljcem excedente. 2† (nee O). — Caulis pedalis
foliosus. Folia infcnora 2'A -3-pollicana, superiora sensim breviora, bracleae
landem %-pollicarcs, 9 lineas latae, leviiier pinnatifidae. Corolla scsqmpollicaris
luteo. — *P macrocarpot* Pall. ms*. — Crescil in alpibus Davunae, Altai, karal-
schalkae el trans Lcnam.

101. P. ACAtLIS Wulff. in Scopol. Fl. Carniol (edit. 2) 1. 430. L 31. — Slevn I. c
58. - Jcq Collect I L 11. - Rchb Flor Germ excurs 363. no. 2474 — Koch,
S)iiops (lor derm (edit 1) 54J — Foil, pinnaiifidn, pinnn ovatis pinnaiifidn-
mucronalo-dcnlatis, pedunculis radicaib solilams uniflons folio multo
brcMonh , cal>ce scmiquinquéfido, dcntih supernc foliaceis inciso-dcnlalis , co-
tollae labio supenore falcato rotundato-obtu<o cdentulo, margine MIOSO ^
Corolla alba in rolorum rarnem \ergen» — Crescit in farmoliae alpibus el in
lialia supenore (in alpibus >iceolini<O

Sectio II. PR080PIA Bchb. Flor. Germ, excurs. 363.

Lorollae labio in fen ore inflexo fauccm rlaudente.

105. P.* A>ANA Hall Catal 1007. — Btb. Scrophul. Indie. 5S. - Diffuia hireuta
foil, opposilis pinnatifidis, lacimit brevib. lanceolaiis subincitif; calyeib. quin-
quepartitis, laciniis llinearib. intgerrimia; corollae labns tubaeqaalib. t galea reeu
obtu^a, labio infenore brevsiime trilobo. % — Vix bujus generis. — Captulae
decant. — fre«cit prope Avam vertas moniem Taong-Dong
- 100 P. GR(M)IFLORA Fischer, Mém. nat. cur. Mosq III 60. — Steven, Mnoogr
Pedicular 17 f t 2 — Laule tvsqipedali, suprrne ramoso, foil, radicaib „spi-
thamae >) laic lanceolatis pinnaliltidii, pinms bipinnalifidiu, lac>nuli> lanceolaiis
carlilagmco-dentalis, caulinin senMin minorib conMnulibus, florib in caule ra-
mi>q longr vpirahs »ub>e>>ilib remote, braclm magnis lannnlis, lanniis \arir
inci<o-domain, calycis quinquepartiti deutib. lalis ovatis acutis inlegris, corollae
galea aubfakata acummaia, margine ciliala, labn arrecii subaequaliter trilobi la-
CIONIS o^atu obiusiti 2|. — Tola glabernma. Caulis tetquipedahs. Folu radicalia
0 poll, looga, 3 poll, lala, modo *Artemttutrum* tenuimme inclsa. Filameola basi
deoeae villota, superoe glabra. Captula calyce brevlor globota treviiier mucronaU
— Creteit in Davuria.
- 107 P. SCEPTRI'V CAROLINLM Linn. Spec pUnUr. MS. - Unn. Flor. Upponlc
I. 4. fig 4. - Strnsk boi. i. SOS — Slrm. Flor. DUehlnda. Hft. 30. (ic aen)
Flor Dame t 20. - Rudb. Itin. M 1 . - Rehb. Flor. Germ, eteurt. 383. no
2479 - Koch, S)nopt flor. Germ. (edit. I.) 544. — Slevn I. c. 17. f ~ Foil, ptn-
natifldiv pinni* o^ato-oblongit oblutit dupllcato-crenallt, brarteu ovalit indi-
visis, rahco glabro (juimjuedenlalo, denlib. oblongit obtusit acute fnaequaliter
crenatis, corollae tubo tupcrne'campanulalo, faucc labns coonntib. clau>a_f
labio supenore falcato obiuo • dentulo %. — Tola glabernma, taepe hutnillima
sabaniflora pauci pollicarit ^ 2-4-pedalit ramota. Folia taepe ultra netnipedalia
2-3pollire« lila, ad rbachin fere unque lacimaia Rracteae vagfnanlei oiaiae,
eahre parum longioren, MI serrulatae, Infcnores tiepe foliaceae spira long<
inierruptia torolla ipeciota sulpburea, margine labii inferiorit sanguinro -
Cretrit a finu BoUoico utque ad Uavuriam. (In Pomerania anterion prope Gry-
pbiam, in cnilale Megapolilana, prope Regimontlm, in alpibua Saliiburgen»ibui
el M)nacl<_t in RoMia Kuropaea gradum 5i* laiit boreal meridiem temiB nun
tranvgrrditur
- 10* P LAM.KOIA.Tt Mlcu Flor \m bor II K - Mc\en I r IH * - Hook
I-lor Bor Amenc II 107 < mlr rrrrto folioto, foil oppo>iii> lanre<lati> du-
'li(alo-mri>o-rrrna(is (lorib dnist« npicatu, corollae clautar cal)ce trlplolon-
ffi'iriH |jbn> ftubacqualib , pale a •ttihrottrala ^ . — (AUMH simplex v n aallu
f<lorum bretiirr ramo^u* "lerc*, «uprn<* glabrr, infra linen duabu« villosu
Polu omtua oppo<ii.i, in poimluni aiicnuala, nuprnora vr>M)a lanrrolala du-
pllecaio-inmo-rrcnjia, »^UP" parce pilo%a infra nl*br< spine vr. quunciale

lions dense imbrican alierni. Bractee ovaiae rrenalap, supremae steriles. Calyx subglobosus glaberrimus oblique bilobus, lobis rotundalis rrenulatis. Corolla data, ad medium bilabiala, labiis subaequalibus, galca incuna subrostrata glabra, labii inferioris lariniae breves subaequales. Filamenla glabra subaequalia. Slihma inclusum. Capsula calyce sesquolongior valde obliqua mu'rone reflexio. — *P. Virginica* Poir. Kncycl. meih. V. 126. — *P. pa Hi da* Null. Gener. pi. Americ. II. 50. — *P. terotina* Mubleobrg. Calal. — Crescil in Canada.

109. *P. CAPITATA* Adams, Mem. nat. cur. Mosq. V. 100. - Sle\en I. c. 19. | I. 3. fig. i — Hook. I. c. 106. — Subpubescens: caule brevi subaph)||o; foil, pinnalifidis, pinnis inciso-pinnalifidis; florib. paucif capitalis; corollae caljrem quadruplo excedentis claaac labio Inferior* duplo breiore, galca obiuta ; >i)o eiserto. 2^? — Radii tennis inler *Sphagna* detcndens. Caulit uncialis > palmaris, superoe ancepi pobescens. Folia longiludine caulis, radicalia paura, raulinura plernmque aoum, ambilu lanceolali, supra glabra, sublus puhrrula. Flores 3-5 in rapitulum lermioale colleoli magnitudine *P. Scripli Carolini* fla>i. Bractee foliaceae villosulae. Cal)\ pubescens campanulatum, ad medium quinquefidus laciniis dentatis oblongi«, suprema integerrima. Corollae lubn> wx e cal)ce emersuv, labium superius duplo longiu* incurvum, galra apice bre^iler obscursqf bidentata. Slihma subrapilatum «arpe Mibe»erlum. CapsuLi obliqua murronaia. r.ihccm aequarn >. eo paullo l>ro^ior. — *P. MrUnii* R. Br. in Idrhard*. Appndi-7iX — Hook. Appndt. to Parr)'i «emnd Vo)agr 402. I.I. — /* rrrliciUata Irtb. Fl. Amer. sep1fDlr. II- 120. nor alior. — *P. Stelleriana* Pall. nun. Creiril circa o«na Lrnae, In Kamtabalka, Fnalaicbka ft In Amrnrac arciiuae insulin.

110. *P. STRIATA* Pallas, IUn. III. m 737. no. 08. L R. Og. 4- ~- Willd. Spec. plan* lar. III. W. — Steven I. c 90L f — dale erecto tlmplcissimo, «ur|o ri eaded radice pluribus; (oil. profunde plnntlifidla, laciniis linranb. aculiusruh* argul« •errulatii, Qorib. spicalit; bractei linearib. •ubinlegrnmiH ra^rm guporaniib; ralyce subventricoso bilabialo, superiore^tridentalo, infrion bipardio; ronllae fla^ao sanguineo-Tenosae galea oblutissima, sub apico bidrniaia , labio inferiori oblique torto. ^ — Caulis pedalis. Filamenla duo longiora barbaUi. Capsul« longiudine cal)cii acuminata compratsiuscula carlilaginea, rrliqui« durior (\$!**- I. (. t I. tit 2- — Crescil in apncis etcel»i< Da«unae circa Kjarbiam t| Jo^{ffi} *allrm 1 nilungui.

I *Species'addenda el supra pag. 112. uo. |(i-i imrrnula.*

111. 16a. *P. MDICAIMS* C. koch. Lmnaea X\11. 2H0. - Piloo rhiiorate «ab- lerraneo plurirauli; caule simpliri; MI. omb. pinnalifidi*. pinm« pinnalifidi* incU's, aul radicaib. congrtlit, aat qualerriatim verticillai* «pirjm o%aiam con- geilatn involacranlib.; ealyce ei dorlo ronvetiutrulo, ftegmrii* Unceoi* inlrgm aul denlalis corollae lobom adaequantib., labn* aequilongis, supen* feelUino, inferior) breti sed lullVino; Alamentis superiorib. pinnis .%> ~ C—tmricm tiailis folii* cauliois el llamenlU glabertinis baud aegre di>li>^ufOd P. mmemm etian similis, labio superior* aniice cunalo n filamriis glabn><^ ttrtieitUu contra quacumbabitantime con^oil. canbreinoOdo et apice f*9 * dentibus bretiboa discrrpal Crescil in Somrbeiiac iraciu Banbakl.

t > *Species promtt incognttae.*

- CHKILA5ITHIPOLU Srhrenk.
- KXALTATA D. t>on.
- MRXICA^A /qce.
- ORTIIOSTACMYH Uriseb.
- PKDICKIXATA Rnge. (P. m—mim Bogrd
- PSVLLIIFOLU Poir.
- PLATVRHY5ir.IIA Hrbronk.
- VIOLAHCRS§ fkhrrnk.

t i t *7^{ieflff e} O[^]nerc expelltnitae.

- V ACAIII* Arrabida I r I 107 inec ^ulff
- P <OMOb4 Arrabida I c. t 100 (ncc olior)
- P S<hPTRIM MARIAMtl Arrabida Hor Muimn VI I KM
- P SESSILIS Arrabida I c t 105

40K) HIIIIV%\TIIIIH M Bteberst

(M DicbetM Hor Tauric (aucasic II 63 — MiMI dencr plant vascular I 312 II 223. — *klephas* (* Don, donrral s>M of ganl and bot l> 010 — *Nhynchoenri/i* (jn>eb spirile (* (lor It urn el II 12)

I MI OKI! NTH Is linn spor plantar MO — < orollac labio superior? suluihtn inruno nl>r< quadnfido, lacinia sub rostro corolhe o\ala, latrilib ntriifju< refit&is, quirli n en obtusa O — *H*phas atientalu (tore magno pmbosndr m-curta* Tournrf < oroll 48 , Itin II 200 t 200 — *Elrphas tncurta* !• Don i\$oneral M<t of Rard ind bol l\ 010 no 1 — Creicil In Oricnlc

2. Rll (IlinM IIO< o m s (<nscb I c) KLEPHAS Linn I c - (orollac labio %u-
 perioro subulato recto, raljce tnflido, lacioiis duabus rrfleiU, trrlia latiori crccia
 plicaia acua Q — *Mepkat Campoctorenstum* Column Ecphras I 180 I 188.
Euphratta lutea flortbut EUpanUt cmpui cum probotade rtfemttbus Mont
 Oxon UiftL III 432. *ecU 11. t 94. fiff 14. — *hlepkas italca /lore magno, probot-
 nde turrecla* Tourocf Coroll 48. — *Etephas one*(alii M Bifber>l* Flor Taur
 Caucasic II 00 — *Hephat rrcla* G Don I c no 2. - *Rhynchoenryt Hephat*
 Griaeb I c — *Rhmanthm onrn(ahs* Frn lib

fi parwflora llorib minoribu< — *Hephns ortentals flare parto probotniit*
turtecla Tourmf < oroll 4M — < re>cil in umbrosu Hunuliac et Italiar

, *Species e genere excludcndae*

- Rll ALK(TOROLOHII s Pall «- Al hCTOROI OPIII s HIRsLTI!»
- Rll. AIPIMJb Bmgrtnr - Al KITOROLOPIIIS AIPIMs
- RH. ALPIMS Urn - DARTS IA ALPINA
- RB. ANGtbTIFOI IL» Gmel - ALRCTOROLOPIIIS AKGOSTIPOLII »
- Rll BIPIDUh - PKDK LLARI8 COMOSA.
- Rll (\PKNhlh Thnbrg * POLICARKNA CAPKNSI8.
- Rll C KrTK | s Dirtr - BART8IA TRIXAGO.
- Rll (RISTA (.UN a linn — ALECTOROLOPBIS PARVIFLORUS
- Rll fRIsT\ (.41 11 fl I inn - Al El TOROLOPIH 8 (.RANDIFLORI H
- Rll (HIM \ (.K\ 11 7 I inn - Al KC.TOROLOPIII 1 IIRSI TI H
- Rll (UIMA 4. U 11 Pall « Al h< TORdLOPIII S b>AH> frl ORI s
- Rll MOIUUINDIsD Dnir - PARI NTI CKL1 IA H ORIRI MIA
- Rll IIIHsITIS lam - \l I I TOilOI OPIII h IIRM TI h
- Rll IM)K I S 1 inn - (.OMOsPhRMt M KLOX.ATI M
- Rll MAJOR r.brh - Al R(TOROLOPIH S OR%MMFLORIH
- Rll UWIUIH lam - DARTMA \ISM)ba
- Rll MVXIMIS Willd - B\RTSIA TRIXAGO
- Rll MOOR Kbrh - ALECTOROLOPHUg PAR\IFH>RI s
- Rll PIKIIER hrbumn - ALEI/TOROLOPIII s \l PIM s
- Rll s(ARRRTbnbrg - GLOHHOVm IS CAP|-Ns|s
- Rll SPM ATI s Poir - BARTsI \ s|>|C ATA
- Rll TRIHdt s |*U\ >- R\ \(\,I 1 IIIIDA
- Kll TIUWdd^illd - II\Ufs|\ TRI\(\,O
- Kll M-RsKOIOK lam II\HIM\ M K\|M|
- Rll MI |OS| S Prr- \11 MOROIInPIU H ||||S| ri »
- Nil MM <M s sm **BARTSIA VISCOSA**

1017. IMOCTOROLOPIH *//«//.

Hall, Helvci. 314. - Mcisn. Genor. plant, vascul. I. M2 II. 2-23. *Rhinanihi* spec. Linn. — Koch, S>nops. fl. Germ, [edit. I.) >4

1. A. PARVIFLORI'S Wallrth. Schedul. critic. 34«. - Kchb. Plant, critic. VIII. Og. 074. — Foil oblongo-lanceolalis; braceis concolomb., su|>cnont>. incisoserratis, dcnlib. acuoinatis; labus corollae porrecti*, tubo recto, denle in utroq. latere labu bupcrions breviier o\alo, aeque longo ac lato. 0 — Dens labn .superioriN nunc albidus, nunc tiolaccus. Flores dimidio mmores ac in subsequent, braceae saepe brunneo colore suffuiae. — *Rhinanthus [Altrtorohphus Itrlib. Fl. Germ, eicurs. 308. no. 2440.) mimcr Bbrb. Beitr. VI. 144. — Koch, Sjnops. flor. Germ. (edit. 1) M4. - Rkinanlktu Crista galli Poll. Palalin. II. 175. - Hhtnanthus Critla galli a. LIBO. Spec, plant. 840. — S*cn>k bot. t. MS.*

§. *fallax* Wimm. fl Grsbowsk. Flor. Silesiac. II. 213. — Altior- caule lincoln nigris adsprrso.

T. angustifolius Rehb. Plant, critic. VIII. fig. 073. - Foil, dimidio aiiRuslionbu*. - *fhinanthu* minor* ,?. *alpinus* Gaud. Flor. Ilehct. IV. 107? — Crescit in an is et pratis toliu* Europae.

- t A. (HAMUFLORIŠ Wallrih. I. c. 316. - Foil, oblongo-lanceolatif; brnctfis de i'olonb. pallidiH, superioriub. mciso-srrnti^ dentib. »ubulati« cu«pidati»; labii* corollae pnrrerlo. tubo subcunalo, dente ID ulroque hterc labn superiorii o^alo; cañce glabro %. subpubtcente; srminum alis dimidio <cmnr lalionbus-O — Dent labn corollae nolacut. — *Hkinamikus 1 Aleclorolopkus* Rehb. Plant critic VIII. Of. 073.) *miajor* Ebrb. Beilrge. VI. 144. — Rehb. Flor. Grm. ricurf. aw. no. 9441. - Koch I. c. - *Mkim&mlMi Crista galU fi. Lino. Spec, plant. 840. - Flor. Danlc. t 081. — Sveitk bot t 348. flf. I. — Crescil ID prails Eoropae.*

3. A. (RHINANTH'S Lam. Flor. Frene. II. 391} HIRSDTI'S All. Podemont. I. M. - Rehb. Plant, critic VIII. t 000. (eicl. temiotb.), Flor. (.^rm. ricun. W. no. 2442. (ei p.) — Bracteis decolorib. pallidit, taperiorib. innso-serrate, dentib. subulalis cutpidalii; labiii corollae porrectis, tubo tubcunato, dente in utroque later* labii superiorif otalo; caljcc THIOSO; nemioum ali« »rmine ipso inplo angutlio* rib.; foil obloogo-lanceolatif. 0 — Planta »arpe «c»quiprdjlis > luprdalit. — *Khtnanlhut UtmuJus* Scopol. Fl Carmol. I. tYi *Alfdorohphus* Pollicb, PalalIB-II 177. — K'xh I. c. — *Rktmanlkui Mimulus* Scopol Klor. Carmol (edit. 11 751- — *tlrrlorolophus* 41. Birbr>l. Flor. Tauric. !!aura«. II ũ< t'nsta galU T' LinB* Spec, plant. £40. — <• Don. General »>t. of icaril. and bot. || 6)*. flic- 00?) '~ *Rktnamlhms rtllouis* Pen. Knchind. II. HI. - t'rtsla *guilt mat Bauh. HiMor. III* 430. — Aierlorolopkus grimdt/lorvs* ,9. *pubms* Vtallrlb. hrbedul. rnlic. I. 31> '~ Creacil la Earopa auitrali rl 10 Caucato.

4. A. 'RIIXA^THIt'S Gael. Fl. BadeDt. II. * - korh I. c. HS. ANGI>TIFOLIUS Wlprt. mta. — Foil, e bat) laoccolau longe aitenuat; bractfit drcolonb. p<di\$, tttptorib. lori»o-><raU», deolib. •abalaiit loon* anttalu. labio coron<v ••petiore a>ceodroie, infeiore palesle, deole ID ulroque lairrr labu »uperioni obloDgo.O — Prarler dfotea labli aopenoiit tiolacrom macula violarea ad b** •10 labil IMertorit. Corolla dinidio mioor et tubu* dimidio aoRutiior qua⁰ •• A. p*rrifior: - Rh. Cnsta g*lh fi Lion. Spec, plaol. H40, r> **v***hfoh*s ^ .ud# Fl. Helv. IV I08L — Crt>cit in «ubalpiou Germaoiae rl Ilehriiae.

- ». A. (HMAXTHti *Bmtnmr* Surp. Trao.)U II. IM Koch I. c Gri.^b. Spi- «>•§• •• ftmri. II II) ALPIMS Wlprv m% Foll.oblooiro-lanreolaii*. brac- Int docolorib. palli4U ouro-•iriiielli. puonaiitq . tuprnacibo-prratis, dranb. ••b«lalo-c«tpid«lu; labio corollae tuprnore atr<*ndenie, iofenorf pa- leoie, deate la airoqiM lairrr labli MI pert or.* obloogo Folia el b "fiese A. fr*+/**. Borta A •mgushfoUi ,Labiarn corollar infenut maculu pluribus co«mleb nolalQM. - *Rtkmmmtkms pmirker* fkhonmcl, Plaot etticc Silet* ' in »ubalpiat, Baropae M>irali-orir«ulit et la Ruaelia cretcit

4018. UELAMPYBUM *Tournef.*

Tournef. Insil. rei herb. 78. - Mcisn. Gener. planl. \ascul. I 312. II. :&j. - Itclih Flor. Germ. excurs. 357. — Koch, Sjnops. fl. Germ. [cdil. l.J 539 - G. Don, General s)»l. of gard. and bot. IV 020.)

1. *M. SAXOSUM* Bmgrtnr ex Rchb. I c. no. 2433. — Florib. secundis axillanb. remolis; Toll, linean-amplexicaulib.; corollu calycem acquanlibiib. O — Caljx ||-ridi-flarus rubro-punctatus, corolla hians, galea nnea, margine replicata den*^e barbata, "labium e niveo flavum striis tribus longiludinalibus laeie purpneis percursum — Crescil in monlibus Transjhaniae.
2. *M. riUST\TIM* Linn. Spec. planl. M2. - Flor. Danic. 1. 1101. — Sm. Engl. bot I. 41. - Ilivin. Monop. irregul. 1. 81. fig. 1. — Rchb I. c. no. 2437. - Koch I. e - Spicis quailrangulanb dense imbricate; bracteis cordate sursum complicate recunati* pcclinalo-dcnlalis. O — Flores albidii, antice pallidi flan, labio mfe-fenore ttU*llino, t purpurei labio infenore mlus 0a\o. — Croat in sjhi> pn lotam fere Kuropam el Sibiriam rarior.
3. *M. UOKNsE* Linn. I c. - Engl. bot. L 53. - Flor. Dame l. Oil - Hook. Flui Londm. t. 03. - Sabb Hort. Roman. 0. I. 8. - Rivin. I. c. t HO - Rchb. I. c. no. 24\$*. — Koch I. c. — Spicis laxis aequalib.; braclen ovalts lanccolalo-acuminaiis ftubulato-dcnlalis, sublui bifariam punctalii; calycib. pubescenti-scabm tnbum corollae sobaequanlib., deotib. e basi ovala elongain selaceo-acuminalis. O - Corolla purpurea, medlo annulo albo el macula Oava ad baun labil Inferior i«, bractee purpureae. — *Tntieum Vaccinium* Dodon. Pemptad slirp. MI fig. 2. — Lobel. Icon. I. i. 37. — Moris. Oion. Iliitor. seel. II. L 23. fig. I. - If *argyrocomum* Fisch. — Crescit In agris tolius Kuropac.
- 1 *M. BARBATIM* WaldM. ft KiUib. Plant, rar. llungar I. RQ I. H6 - Rchb I. c. 2430. — Koch I. c. Spicitt laxm arqtialib; bractem o^ati< lancrolato-acuminali* subulato-dcntatiH, infr.i impunctatin, caljeib. hir^ulm, tubo corollino tnplo hr<<~ Tionb , dentib otads .K ununatin. O Bractee luleo - iiridet, raro purpurar corolla flat a — Inu-r ^r^oiei Kuropae aotlralioris 'Dalmatiar, llunganac etc
5. *M. NEVOROSI'M* I inn I c. 843. — Flor. Danic. t 301. Srhkhr. But. lndbch t 110. - STensk boi. I. 423 — Sinn. DUEblnds. Flor lift. 20 ic. aen.) - Rchb I. c. BO. 2436. — Koch I c. 540. — Spiels tatiuicolis second!*; braceles saperiorib. profaode cordaiis denuisj calyeib. hirtuUt, eoronam dlmlldlaai aabatqnanlib., denlib. subulatlt palenUbaa. O — Bractta* aiureae. Corolla a<roa< mbo ferugrteo. - *M \$yfraicum* Rivln. Monop. Irroffvl. t 81. fig. 1 - Barrel. Icon L 760. fig 2. *M. rtolaeum* Lam. Fl. Franc - Creacli In ayWla el oesnoribus Europae fed non ubique .
- & *M. PRVTK>>K* Linn I c H43. - Engl. boL i. III - Schkhr. I. e. - Grtnr Do fructib. el nenunib I t. M fig 1. — Svensk bot t 07. — Best I. Hort Ky>t t ISa fig. 2. - Rchb I c no 24i>. - Koch I. c. - Spicis latis secundis; braeleu lanceolate, supmonb. ba<i utnnq uni-bidenlalis; calycib. glabris corolla triplo brevionb.; florib. horuonuliter patentibus. Q - Varial floribns albls, superne Batis alque loim flavif. - Morif Oion Ilittor. sect II. t 81 fig. 3. — Be>>l Eysl. aetUv. 12. I. 2. fig 2. — *Mdampyrmm rmlgatmm* Pert. Encblr. II. IM - Crescil in praiu turfotis enceUaqoo per lolam Buropam.
7. *M. SYLVATICI'M* Lion. L c - Bogl. bot t 804. - Flor. Danic. t 145. - Hook Flor Londm. t. 170. - Rchb. I. c no. 2434. — Koch I. c - Hook. Flor. Bor Amerle. 11.105. — SplcU laiit aeevndis; bractoi* lancoolalis inlegeninit; caljnb glabrlt corollam aequaniib.; florib. erectis. O — Florts dimidio quam anteceden-Us nlnoros aurei, errrti, fructu« autem nntanles. — If *olprstr** pen I. c jf *bneart* Lam IMcton l\ 23. *M. Ammeamum* Michi Fl Am. boreal. II lft Crescil in *)hi* el praiu »ubalpioif per loUm Kuropam el America* borealem | spenei nomine (*antum cognttae*.
- M. IATIKOLIIM* Uublcnhrq 4.aul n Null (,rt,rr |>l Amcnc || > IF,MI!
- d lacum l>cla<<arc in \menca borcali
- * *M. (URPATIUM* ^rhult KoiU *M hnhnlum* * rl Kit

40P.I. TOZZIA *Micheli*.

.Miclicli, >ov. gener. plant. I. 16. — Meisn. Goner, plant, vascular. I. 313. II. 223.

G. Don, General syst. of gard. and boi. IV. 035.)

I. T. ALPINA Linn. Spec. plantar. &R — Lam- Illuslr. gener. I. 522. — Jcq. Flor. Austriac. II. t. Ito. — SebLuhr, Bot. llandbch. t. 165. — Stirro. DtschlmK. Flor. lift. JO 'ic aeni — G. Don I. c. 636. fig. 63 - Rehb. Flor. German, eicurs. 337. no. '2432. — Koch, Sjnops. flor. German, (edit. I.) 530. — llerba perennis spiihamaea et altior succosa lonfe ramosa: foliis sessilibus otatis pauci-crenato-ser-ralis; florib. in raceroos bre>es braciaaios tenninales collect!*; corolla (lava, hbio rubro-punctalo. % — *Tozzia alpina lutea*, *Alsinet folio*, *radice tqumala* Mirbeli, No\ gener. pi. 20. L 16. - *Eupkratia lutea alsinefolia*, *nulice tqumata* C. Bauh. Pini. 234. — *Denlaria buguloidet*, *r ad ire globota tqumulit myontoidits*, *alpina* Meoti. Pugill. 1. 9. fig. 3. el 4 — *Orobanche bugtossoides*, *radice rotunda*, *squa-muiis myontoideii*, *alpina* Moris. Oxon. Hislor. III. seel. 12. I. 16. fig. antepnultim.) — *Anonyma t. Gregorii*, *radice Denariariae* Column. Ecphras. II. H. I. 50. - In summis alpibu^ T)rolensibus, HelTelicii, Pedemonlanit, Salisburgen^ibus, in Sudeti<, in alpibu* Italiae ^iiperiom et in Pyrenaeis rrencil.

Genera dubia.4020. CSOMAIU *Bs. et Ait.*

;Hi. el Pav. S]ml. Dor. Perut. KB. - Meisn. Gener. plant, vascul. II. 214.)

I. G. 'GOMARIA Spr. Synt vegeUb. II. TSX) RACEMOSA Ri. ei Pat. I. c. - G-Don, General iytU of gard. aod bot IV. 618. — FolL obloDgo-laocooUiis, apic< deolicoUUs; flohbas rtceanosit. 6 — Gretck in PenitU.

4021. AAWCFIBBI.% *Rs. et Pav.*

tRi. el Pa?. Prodr. Oor. Perot. 5. I. & — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 307. II. 218.)

I. S. OVATA Ri. el Pav. I. c, Flor. Perot. I. 7. t I. 8. larn. Illustr. pouc. 1.004. - Foil, ovails acomioatlf, petiolis setnicylindricis. ^ — llrrba orgali<. Caulis erectus lelragoous tix divisus glaber. Folia oppo^ita petinlaia paienlia ovali arummata intrgrrrima, supra tenon nitida, pube>rrniia. Pctiuli connali. **spico** lerminalK. Flore* in lerlirillos aggrrgaii »r>ilr*. Vrrtirilli multiflori **involuerati**. Imolurn diph>lli folmla otala acula rnncata, apire r<n<«ia, punirca **persistentia**. Bracleae lol quol florr< oblongae, tenter emarginaur pumcear, flore< dislingueo* les. Cal)i fere lubulo<u<, infroe angatUtu< qumqurpartilu* purpureus. **OMI** * lolea. Filameota ad apirem birsula. — CrMcit in Prru^iae lorn* umbrotis.

40*22. L l f l E % TCJI *Lagaica*.

.Lagasca mss. in Spr. Hyti. tefetab. II. flSO. H 773. - Meisn. Gener. planlar. **788** colar. II. tl4.;

I. L ROTtTIDIFOMA Ugaaca et 8pr. I. e, 77\ - Suffrolei glanduloso- viseos<<< graveoleas: foil, decossatis reajiforaibos creoaatu; »pint anllahbos peduorulai'' sohUriis. 5 - *Omrinn*. . . . ? Metal, Dissert. 'Paris. »A». H*o. e ic. - Cretnl * Btspania awirall.

4023. DICEBOM *t^ur*.

(Locrtftro, Flor. T^cbincbitt. HO. - Mrito. lirnrr. plant vascular. II. **214**)

f. I. *Corolla subcompatwbUm*, *linfo quadrilotxj tubaequaU*.

I. D. O>riinr.HI!IB5iSIS L—t. I. e. - Foil, lerim icriicillaiis ovalo-lanffolaU> serratii caraoais sUbHs; pe4us><<hs sohUriis atillanb. uoifloris villosls; ><<^rIDJ pallide %iolaccis; eorellae caaipamilaUe s#g<<raUs obeordaiis, uoa rvliajai* <<*' tori % - Radii r*#as - Crr^rit loci* ultRiantU in **Cochinchina**.

- fc. 2. *Corollae limbo bilabiali, labio superiore emarginato, inferiore trifido.*
2. I. LATIFOJJI S Blume, Bijdr. icon 7V2. — Foil, oppositis subsessilib. ellipticis
obtusis, basi cuneatis obtuse dentatis scabrellis; racemis (terminalibus elongatis;
caule subnuplici. 2(?) — Crescit in montosis humidis in insula Java.
3. D. MONTANTS Blume I. c. — Foil, oppositis ovalibus obtuse dentatis, ulrinq. rum
Crescit in insula Java ac monte Salak.
4. I. GIAMH'UFEHI'S D'lumo I. r. — Pubescentibus: full, oppositis sessilib. ovatis
(terminalibus crenulatis; ramis terminalibus glanduloso-pilosis. 2? — Crescit in insula
Java prope Interiori el BaUMani.
5. I. CAF.SPITOSRS Blume I. c. 7W. — Pubescentibus: full. Heterophyllis oppositis
crenulatis; pedunculatis unifloris, plerumque solitariis eilranillaribus. Vanai
talarum et pilosis. — Crescit in insulae Javae locis graminosis.

4023. *OIIAMBI Manuel Blanco.*

- Man. D'lumo, Flora de Filipinas 510. — Endlich. Genr. plantar. Suppl. I p. 1405
— Meisn. Geogr. plant. v. 2. p. 200. et 307.)
- I. C. D'IIOTOMV Blanco I. c. f. — Herba graveolens: ramis dichotomis; foil, op-
positis ellipticis acuminatis integris glabris; floribus terminalibus gttulosis
— Crescit in insula Philippinis.

4021/., *TAL. Manuel Blanco.*

- (Man. Blanco, Flora de Filipinas 484. — Endlich. Geogr. plantar. Supplement. I. p.
1405. — Meisn. Geogr. plant. v. 2. p. 200. et 307.)
- I. T. OPOIATA Blanco I. r. 4H5. — Herba: foil. oppositis lanreolatis obovatis
nerviatis, vubus rotatis pubescentibus, petiolis raris; (In insula lolilarum et
libu) — Crescit in insula Philippina.

4021. *O'DBOK SUBdl. et Zuccar.*

- iSiebold. et Zuccar. Abhandl. der Mus. Akad. (1. Klatte) III. II. Abtbl.
TV. I. 3. Eg. I. — Eod. Gener. plant. Supplement. III. 79.)
1. C.? Siebold. et Zuccar. I. c. — Crescit in Japoo. (Libri el Uteai aoi)

4024/., *P^A'atIVal Dm*.*

- (Dm. in Ilamili Prodr. II. Ind. occl. 40. — Rsdlich. G. Mr. plant. Sipplet. II. p.
22 adnot. — Meisn. Geogr. plant. v. 2. p. 200. et 307.)
- I. P. KROM(OII)KS I. c. — Canale bonifidivale ramoio; rami tub-
lomatiosi. rami oppositi inaequaliter dentati, basi tuberosi. In
pactianis. In axillaribus litariis sessilibus. O? — In insula Ilitpanio

Genera nondum descripta.

1. ADEJVOMTOHJI *Blum**

(Blume. Flora IB. Z. | Mil p. 69a)

2. PALVftTRITKIA *Hen.*

M. C. Keli. Obien. bot. pugill. (IOJ p. IS. — Idem ar Ckarnoitomn Bih
boi. m. 1H I f. *' dicitur. Rhb. NamnrL no. 4543

I. EIRDILOIMim (.nff,

Uwillllll in Vadrj* Journ. α %c no 13 p MI

Graera aflala.

4024. R%MO\DI% *L. C. Rich.*

(L. C. Rich, in Pers. Eochir. I. 216. — Meisn. Gener. plant, vascular. I. 308. II. 212 — Ad *Cyrtandreat* pertinere dicitur.)

I. R. PYRE\AICA L. C. Rich I. c. — Derba perennis folia radiralia peholata ovata inciso-crenata rogosa brunneo-birsuta: acapus palmans cor)inboso-2—1-floru<>, corolla magmtudine fere *Solani tuberori* lilacina, fauce alba flato-roaculata, antherac florae. ^ — *Auricula Urn Myeoni* Dalecb. Ill si or. 837. — *Corttua foitū otattt testthbus* Linn, Hort Clifort. 90. — Trew, Ebret. 20. I. 57. - *lerbascum* [*Chatxta* Lapeyr. Abr. Pyreu. Suppl. 37. — *Ramondia* Rcbb Flor. Germ, ficurs-388. no. 2020.) *Mycomi* Lion. Spec, plantar. 255. — Mill. Icon. t. 277. — Curl. Bol. Mag. t. 230. — *Myconia borrogmea* Lapeyr. Abr. Pyren. in — *Ramondta scapi-gera* Jeaum. St. Nil. Hiilor. pi. fa mi I. I. 290. — Crescil locis umbrosis in alpi buf Pedemonlania el Pjrenaicis.

4025. HABEBLE1 *Frivaldsky.*

(Frivaldny, AcL soc. Hangar. II. 240. L I. — Griieb. Spicileg. nor Ramel. II. H — Meisn. Gener. plant faical. I. 30R II. 212.)

I II. RHODOPE>'SIS Frivaldsky I. c - Flora (B. I., 1835. p. 331. - Lmnaea XM-Lileraturb. 21. — Endl. kooogr. gener. L 00. — Griieb. I. c. — Perrnnit: acapo onbellifero; foil, imit rotolatis •palbulato-laneeolatls coriaceit tlrigoso-birtulii •errato-crenatit ditcolorib.; pedicellit 2-5 opposite bibracleolatit; corolla cyanea. ^ — Capaola OTato-oblonga brftMa, Talvit none bifldis, aemimboa indeflniiii* Ovariaan ftboa«BB tiylo toboa eorollae aobaeqnante qvadrnplo brerius; lUmioa arcoau. — Gretell la Efedope bocMll prope Kalopblr, BOD procol ab arbe Car-tota (la Buaelta).

4020. OBOLABIA *Linn.*

(Linn. Gener. plantar, no. 778. — Meian. Gener. plantar, rascular. I. 313. II 223. — G. Don, General sytt of gard. and bot. IV 035.)

I O. VIRGIMCA Lino Spec plantar. 881. - llerba 3-4-polhcari§: radice tenni ramosa; foil, craitit virdtib. carno»uhi, infra sarpe purpurascntib.; Oortb. »•*'' •tlib. geninit T. tfrnalm, Tcrtu* apicem caugt corrulrternti - albi« v pallide roq« befrfotibut, bractea foliacea nuffullit 4 — *Orobonrk**)irg*mta*a, radic* f*r*t~ totdt, tummo eauit foltu tubrolmmdtt Mont. Oton lli<tor III MM «ect 12. I. l& flg 23. - Pluken. Aim. 271, Pb)lo|r|. I. 200 Og 0 - Crrtcit in America bore*'' no Pentylfania, in tieinia Pbiladelpbiae raro, prope We»t Cottier el freqoenier in tylvit ombroaia ad laeoni Brie).

t *SpmUs wiiki fumins Ionium nota.*

O. CAROLIMIANA Waller.

ADDITAMENTIM.

3874. VERBASCUM Jinn.

a r. p. 1*71

D.MS.O I S 2. fi. |p 131 |

101. (1^a \ SMW4KFOIIM Boiss Diagno*. plant no\ orient 1\ to - IVr-
enne raopiloHiim, lolum lomrnio denso florroto nun dctrhili trMium albo-
cinrrasr<*ns caudicib mduralu \c>ligus folioram rmarridorum testili*, full
radicalib cblonKo-lanceolali* in peliolum longum attenuate acutnuculif ncnoio-
reiiculatiH, miuuir el ob(u>c crenalit; caulib. erectia tirgalia umplicib. au(par-
citsime raino*i*, interne foliotia, MI. caulioia lanceolalia, bati magia minuive
decurrenlib., nonb. aubaeailib. per 1-3 io aplcam laiam diapoaltia, baai t-3-
braciealis; brarica eilrema iriaogulari acunioala caljce dlmidio breviorv; caly-
CII pannosiiiimi laciDtia UnceoUIf aculit; corolla ctua batl lanaU calyce
plu» dupio longiori inlenae lulra; IllamrnU omnib. bre\ib. aequahb. villo auran-
liaco drnttiMiroo uitque ad apicem barbain; anibens omb.Senifortnibui. 2].
Folia cum peliolo 3-5-pollicann, supernc 8-12 linean lata, caulina minora, limbo
saopo secus pollicib longitudinem decurrone, fte»im anRunUto. (.aulc* 1-\f>qui-
petl.ilrs, sjurai" : -1 -podalos rriar. glomerulii florum ', -1 pullicem rrmoli<,
ral)n« Unniao tri» linrai long.ic, Pore* 0-8 lineai diametro lali. — Otftcu in
collibub »irci» Canae circa \cmdjc el Gbeira

Dimio II |. 1. |. a. (p. 133.)

10SL 00a.) V. CYLINDRUCARPIII tiri»eb. Spidleg. flor. Banal. 11.45. t - < auk
ligoe«€ol« i«reilv demum airo glaberrimo gtaiinoao; foil. Into obloagis aiauaa
undolalu, aupra glaucla glabrait, tobiut iomenlo lc««i caa«a«*ftUb., *«p*ri«rib.
mirgrii ovato-oblongU aetallb.; paoleolae aapUa ramla eredo-paleoUb. raaM->
*|s, pedicHlit calyce iriplo longloHb. j calycla Mgaeslis Uac«olaUa, dt««a gta-
bemmi« gluiinotim, corolla flava capaulaq. cyll)dHc« tttieque obtoaa Uiplo bre-
tiorib ; anihriH reniforroib., flameolia albldo-lanalla. % — Panirulae pedalu
rim I rmutMMruli, fatnculi 5-8-flori, pedirelli ereciiQicull. — CretcU in intula
TattoK, in arena liiorra propr Panajia vertut Kailro.


100. 30b \. Ol\vri< I M Boi»» Ddiagoo» plantar, notar orient IV. M. ~ Totum
looienio adpr«»o ninli in parir nuppriori plantae tubfloccoso caoo-lomenlotooi
caul* term taldr Halo rra««i»«imo, tuprre ranovo; rania eloogaliitimU. ~~folia~~
radicalib. caulnUq inQmu magoit laocrolatia v. oblongo-laoceolallt acuiu. ~~baai~~
atlenualu ftubu»Milib. aut rotundatit aettilib , caulinia aaperiorib. lanrrulain
~~scutift.~~ ba»i »ubauneulaiU; glomenilia Boruas nuliifloria tecut ranot ~~spiras lant-~~
~~scular~~ ba»i »ubint»mipiaa formaatlb., bracea liaiari eia aequilooga ~~scutilla~~.
pedunculia tomentoia calyce plot dvplo loogiorib.; calycU tomeatoal lacioiit
bretiler lanreolaio-lioearib.; corolla calyre teiluplo majori lutra, ba»i tiolaceo-
maculaia, hlamentiis rubrii, omb* anlberat reofortn«« (ereoub , duobut majortti
oaque ad medium, carieru lota longiludine albo-barbali«. captula oblonga, u_n-
dem gUbrctrnnc, caljce dupio Inngiorr ^ — Caulet 3-5-pedalei Folia lofrriora
taepr vr»fuiprdjia. (-1 pollirr* laia, tnfiua lanceolata, cartera otato-Uoreoiaia
caulina »rnm diminula lanreoljta. apirr attenuata Spirae »arpi» bipedalr«*
Glomrruli 10-M-Qun I'rdirrlli 4'» linrn, rahr«« ferr 2 liorj* |,ngi « 'Holla
•• l./lorrofi paullo ma)«ir. diaiintro pulhcarl (.ap»ula lrr» lma% luoga - hi
OBAt regionr inlcrmrda Ohmpi in pr*ti» rtr%on(

KM JOc V 4SPERMIM Bois* I c 57 - Tolum induraenlo brevissimo squimulis sicialtis constante a»pro obsitum cintreum caule elalo subangulalo, b»i folioso, supernc ramo»i«simo, ramis >irgalis slnclis folio ridiralih ovato-oblongis peliolalis, ulrinq allenualis aculis inlegris, caulmis sissilib otalis, basl aunculali», sublus rclculalo-nervosis, sumrois orbiculalis \alde aunculalis s»ubplicalis retusis, breviter mucrooalis, florib per 3-5 vccus raraos in spicas laxas di»posili» brevissime biellato-squamulosis, pedicello caljce paullo longion suffultis, caljcis parvi lacinns oblongis aculis, corolla flava eiuu* puhcmlento-lo menella calyce 4-5-plo longiore, filamentis subaequahb lota longiludme albo-barbalis, anlhens omnium reniformibus 2^? — Caulis J-4-pedah* supernc ramosissimus, rami fere pedales graciles Folia radicalia cum pciolo 8-10 pollice* longa, 2-2A pollices lala, caulioa supenora fere orbiculaii oblu»c rl lair aunculaio-cordala, locus nervum medium limbi coniraciionc plicaia, murroiulo 2-J lineas loogo lermioaia Pedunculi 2 lineas, caljx linram lonpi corolh 7-0 linearum diamelro V *cheiranthifolio* afflne, »cd dislinclim folns ndirihbus lalionbus o^alo-oblongis peliolali^ nee usque ad bisin alttnuulis, fonm foliorum caulnorum, r»Ucis hcinnns laiiionbus bre\ionbusque, indumenta tolius planlae non pannoso sed bre\issimo adpre»so »ubsquamulo»o — C rescil in c lhbu» calidim regions monlanae parcius, inter ^enidje el Ohejra, in \illibu» Mesogis circa Demend

31 ° > GAH(a)\>iriM Tin - >Mprs I c 135 no 30 - *fi hettiophyllum* Gnsch Spicileg flor Rum el II 40 — Caule lereli ascendenie pedah (loccoso-ioraenloso, flocco axeon sccedenle, foil imis ronfertis ellipticis v ellipiuro-oblonms, utnng acuiusculis peiiolum subduplo superanlib crenalalis, caulim^ enmic dirresrenlib , pleritq breviler obloogo-laoceolalis tessilib , ombb supra VIIIOMS virenlib sublut eioereo-tomenlotU; raremo •impllcl, bati Inlerrupio, floriK fascieutaiis pedicello loDgiorib, ealycen tii aequantib., braclea taperaiis, caljcin segmeniiq laneolalif aculit, anlvena binis ovalib , filamenlo glabro quadruplo bre\ionb(filamenlif 3 breviorib albtto-lanatit. — Ten Fl Napol I 210 flg 1 — (u>cil in Scardo, in subalpioit monlis Kobelilza

? - [p 130 |

Iffi 41i)\ IEIOSTACII\O> Grisch Spinleg flor Rumd II 4J | - Perenoe raule infra racemum simplici <*lrlo lereli nudmsrulo, mf« rnc liocoso, fuperne Rlabernmo full imis ba«i subcordiln o\alo-ol>lonps | <IMIO MIKO duplo lon^iorib , duphralo-crenaliH, supra glabralis <ubiu% disri lunb MIOSI«, caulinis \alde rrmoiH o\alo-lanceolals, raremo in fern t* subrumposiio fi^cit uloruni dis-laniium pidirelms inaequalib glaberrimi«, cal>ri« ^rpmrnhs lanctohii^ *reulius-* rulis con Ha lulea Iriplo breviorib , tnthcru rcmformib fihinrniis purpurro' lanalis, capsula * ^ - (auhs 3-4-pedalis sinriissun n fcha ima |»i''rJ 4-8-polhcaria, 2-J/i poll lala, racemui ban iemel di\Hu»» prdalis, fasciculi »I* lerni 7-3-1-flon, pedicellit leoutbus — Crescil in 4lbama borcali inler p^f* rl Drnnik

100 42a) | L\DIIM Bout DiagDOT planl nov orient l> 02. Birnne, *totum* induniroto valde flocco»o el deleruli (in pane inferiori planla tandem *evanido* insirurtum eaule folioio flato lereli(tuperne simplici > pamculato-ramo*0* foil ombb leouitfimis oblute aul acutiuncul rrenau»t radicalib araph* otaio, oblongis obtu»iu»culit tectilib , u«que ad basin altenualis. raulims inferioriD paullo infra bann consinciit, ban lala aunrulain, «uperionb oblongi* •c o'la v acumioaUt, bati laliorib cordalo-aunculali* Qonb pedirello raljce br«- %ort toffollit In glomrrulot 3-5-florot tecu» rtm in »pira« ln « in^rrup-las disposiut. flocculo deoto griteo facile •rcedenii «rsiiii« brarleis *lanceo-* lanceolalis aculit glomerolot aeqaanlib , ealjee ad b»Mn usque in lannia* *lan-* ceolatat acuUt Eaao, corolla 0ava, b«»i nolareo- mteuUia, <xiu< ^labriu»culu. caljee Uiplo major!, Olamenli* lana imen»e tiolnea in duobim |oigi«ril» au^  tvanida intruciis, anihent ombb renifurniib r«>>«ula ouii rah_re P*ul

brevion -/ — Caulis 2-4 pedalis, folia mfenora pedalia, parte supenon 4-5 poll, lala, caulina mfenora paullo supra basin laic auiculalam slrangulata, suprcma o\|a aut sacpius oblonga, basi \ix aitcnuaiia, calyces 5 linear longi; corolla diametro polhcaris; capsula pi*o fere dimidio minor. — Crescit in collibus Lydiae a regione calida prope Smyrnam usque ad regionem monlaoam supcnorem v. gr. in vallibus Tmoli ad Dozdagh.

107. (42b) V. BITHYMIUM Boiss. I. c. 63 — Caule clato glabrescente tereii folioso, superne paniculato-ramosissimo; foln* infimis tenens amplis oblongis oblusis, inferne aUcnualis scssilib. aul subsessilib., caulims multo minorib sessilib. cordaio-aunculatis ovalis, apice in mucronera lanccolalum acium niagis minus abrupto aunculatis, infenorib denial)*, supcnob. obtuse cl crebre crenulalis, omnib pagina supenon glabrescnlib., inferior! tomenlo brewssimo pilorum slel-latorum canccentib., ramis elongalis tcretib.; florib. per 5-7 secus ratnos <pics laxiuscula» formantib., pedicellig calyce 2-3-plo longionb suffultis, bracti!* Inncolatis acuiis pedicelli paullo broionb.; calyces parvi lomenlelli lacinus oblongo-laneeolaiis oblusis; corolla exius tomenlella calyce Irtplo majore lulca, Qlamonii* >illo \iolacco in majorib. duobut tub apice deflclenle barbali, antberis omnib remformib.; capsulis ovato-rolundis tomenlellis ralyce duplo longioribos 2p — Caulis 2-4-pedalis; folia inferiora pedalia fere tempedem lala, basi longe angustala \\\ pcliolala aul sessilia, folia caulina media •ubbipollicana tesquipedcm lala, longe el iubabrupte acuminata; pedicelli 3-4 lneas, calyx lineam cl paullo amplioa lotogus, corolla panra 5-6 tineas lala, capsula piso dimidio minor. — Crescit in regione inferior! Olympi Bilbyni in sylvaticis.

108. (42c) V. AUENOPIORL'M Boiss. I. c. 04. — Bienne ruins radicalib. indumonlo pilis stellalks con*.lanh» flavescenle scabnusclo bre\i obduclis lanccolalis acutis, in pcliolum longe atrnuatis, obsolete crenulalis, sublu» rcticulatim prominenti-nenoMs, caule orcto simplici aul ad basin spicae parcc ramoso, Coins caulims inliorescenliaq copiose glandulo»o-\i^cidis lanccolato-lincanb. lineanbusve ^es*ilib., basi suballenuatis ocuiis, margine sublus subrevolulis, florib. solilarns, pedicello palulo-arcualo calyce iriplo longiori suffulus; bractea lineari apice §e-Ucea In florib. mediis spicae, pedicello subdimidio breviori; calycis lacinus li-netri-Uneeolalis acuiis; corolla Oava, basi violaceo-maculaUv calyce 4-5-plo major!; flameotls subaequallb. fere tola loogiiudne lonfe b<rtellt, duonim Infer lorum villo ommno violaceo, Irium alloran villo Inferae vlolaeo, tub anbera albedo, anlliens omnib remformib.; orarlo lomenloso. <f — Ptanta l-i-pedalli; folia radicalia cum pctiolo 4-5-pollicaria, rix pollicem lata, sublos nenrosissima, caulina 1-2-pollicaria Spica 0-8 pollices longa. Pedicelli 7-0 tineas, calyx 2% lineas longus, corolla nuguiudine V. *Daltanae*, — Crescit in Caria.

r- - fP- 1» I

100. (53a) > < IIKIUNTHII <I H M Hois>. Diagnos. plantar, novar. onenlal. IV. 56 — Birono, tuium indumento bre\i a^perulo pilis stellahs constante pannotum gritfurn caule credo elalo hubangulalo, superne rarooKUtimo; ramis Mriciis foil radicalib. lanccolalu acuiusculis magis minus\e elongalis, in peliulum longe aticnuaiiii, caulims Resmlib oblongit, basi subauriculato-cordalis, superne aite-nuaio-acuminatis, omnib. inlegerrlmis; florib. seens ramos per 3-5 in fa^nculos subli»iantes duposilis parvis, alteris subsessilib., alleris pedirello lomenloso ca-l>ci acquali aul longiore suffullis; bracteolis mimmis Iriangularib. acutis; cal]cis parvi tumeiiUMi lacinus lanceolalis arulis, corolla lutea cal]ce quadruplo majori, exius lomeniella, flamenlit* MIO flaveffrenli barbali, duobus paullo longionb apice nu<diH, anlliens omnium nMufurmibu*. / — PUNta 2-3-pedalit Folia mfpriora §-* |M>|U<*> longa, \-ll linear lala Kami flonfen nrgali semipedalet longiore%i|ue, llores t| (.ih(c ft re magmiudine rorum V /IOCCOH — Crescit in pri-ll* ri'giom* alpiiiae in < adino <ru nlali •upra (4u|os>am el in Tm<>o feuperium

HO. 5Jb > 1UWUOIHMI lloiss I c MI - Iienne full omnib radu lhb
ambitu oblungu-hiiceuldli rutuualo-pimuliHOili'*. supra el praesclitu sublus

id domeoio cn«pulo pilis stellatis constante (omnino canescentibus, segmentis in utroque lateri costae mediae 7-12 sessilibus. oppositis alteriusve ovalibus obliquis, obtuse 1-3-lobatis-sinuatis, saepe crenatis, inferioribus versus basin folii dellexis, sensim abbreviate diminutisque inter se remotioribus, superioribus magis densatis, saepe secus costam decurrentibus. basi auricularibus, Miprcmi* in terminate vane lobulorum obtusum conduntibus, petiolis costisque lanatis, caule tereti nudo clavo glabro, paulo supra basin ramosissimo, ramis tenuibus. virgulis elongatis striatis, folium is caulibus ter squamam viridem ovatum acutum ad basin ramorum reducis; pedicellis per 2-3 secus ramos dispositis, spiculis laevibus formantibus, supremis solitariis, omnibus gracilibus. puberulis strictis, calyce l' A-2-plo longioribus, bracteola ovata acuta in perspicua suffraginis; calycis pericarpium carnosum glabri lacini linearis-spathulati* obliqui pellocido-punctatis, corollae lobae fugacissimae calyce fere decuplo majoribus lobis rotundatis inaequalibus, filamentis fere aequilongis, omnibus fere ad apicem usque tubo ovario e pilis apice incrassatis consistente bartans, antheris omnium reformatibus; capsula primum tomentosa, dein glabrescent ovata calyce sesquialongiore obliquiscula. </ - Folia radicalia ea *Ltoniodonht* aul *Glaum lulet* referenda, saepe semipedalia vel longiora, pollicibus 1-2 lata, segmenta praesertim infera reflexa, omnia obliquis* >ane vel irregulariter lobata repando-dentataque. Caules 2-3-pedales, rami floriferi saepe pedales, fructiferi cloogati, pedicelli 2-3 lineas, calyx vix lineam longus. Corolla diametro 5-9 lineata. (capsula sesquialongiora aul paulo amplius longa, magnitudine illis *CoriandH* la/ici. — I *partiflorum* Lam. Encycl. — I *drumtu folio argenteo* Tournef. — 1° collibus calidis Lydiae circa Smyraam crescit

111 (33c) V. NAPIFOLIUM Boiss. I. c. (MK - Bieoee. foliis radicalibus rosulatis petiolatis, (omeolo deaso • pilis stellatis constanti magis novissime obscuris rotularibus sierillan ~~ptBBOtCB~~ argiv^* pttloUUU lyraUs, segnealis laterallibus. 1-3-Jugis oblongis otatis roaidatiste partis aarlealatforsibus., lermloall naxlmo ovalo obuuo» omnibus. lategris aol obsoleillisMsM ereatils, folio radicali uno alierove sacpr ad sefpnealam lermnale oblongum redocio, caulinit sessilibus. aul sub^es^ilib oblongis aol elliptico-lanceolatis acotatis, basi ailenotatis, caule glabrescente subaogulato ramosissimo; ramis striatis virgulis elongatis tenuibus ; folium floralibus. ad squarroat lanceolatam acutam minimam reducis, pedicellis per 2-3 sreis ranos in <pica» laevibus dispositis, sapremis solitariis, omnibus gracilibus. puberulis striatis calyce subduplo longioribus., bractea bracteola minima ovata acutiuscula suffraginis; calycis parti carnosuli birtelli lacinus oblongo-spathulati% nbtu«i«i»imi« pellocidopuocialis; corollae lobae calyce decuplo majores lorn ohoTato-roiundalis sobioaeqaalibus , filamentis subaequilongis, omnibus >|||o flavido r pili« apice JocrSS-tatit coostante in doobis majoribus. apicem non atungrntr barhaii« antherii omoiom reiformibus ; capsula primom lomentella, dein glabrescente breviter ovata ealyceaa plodlo eteedenle oblasa. <f — Foliorum radicalium segmentum terminali saepe basi COB9MOI««. Caulis 1-t-pedalet, rami floriferi •/, - pedales, calyx praecedens »ed laciaiae tridntibus •palbologiae, corolla prarredentis, capsula >a«llo major i liatas ft paulo amplius longa, »equilongiora Uta. lodomea-turn rottlarui steriliom deasimlmom paoposom argyrcum, foliorum eioriora* H eolmoram mioos dennim cinerascens. — (re«cit in colhbu* »icci« Cariae ia* lenorit circa Gbeyra.

119. (&d I V. 8M\lt^AKIM Boiss I. c. 01 Bienae foliis radicalibus panno ~~dense~~ argyroo pilis stellatis constanti magis novissime obscuris rotularibus sierillan ~~ptBBOtCB~~ argiv^* pttloUUU lyraUs, segnealis laterallibus. 1-9-Jugis partis aorieolatiformibus ovatis roiuundatistv v aliquando ~~ovoidis~~, lermiajall maximae avale v. rotoodalo »iaoaio-drnaiio v rrpando. raro* ~~integro~~, basi roivadaio *. irMcato, foliis ad basin caulit paucis bracteis petiolatis oja ~~is~~ iodivisU, ram+tltb. laajctolaiis staslib. partit. caule glaberrim. terti ~~****f~~ c«sjte raajoaai ramis virgulis mafis mioott« elongatis. pedicellum glabrescentem* s*liuriit v. biato ste«s t*mm% io spiculis laxissimas dispositis, calyce »obaequiloof«f ~~htuA—k~~ minima laactolau ac«u tofujus; calycis pericarpium carnosum

laciniis linearib. acutifuscolis pellucido-punctatis; corollae luteae calyce seiluplo majoris lobis rotundatis subinaequalib.; filamentis Tillo flavido pilorum apice in-crassatorum (in longiorib. superne saepe evanescente) barbatis, antherif omnium reniformib.; capsula primuro tomentella, dein glabrescente oblongo-cylindrica oblusa calyce duplo longiori. «/ — Foliorum radicalium lobi lateralet 3-5 lineas longi, lennalis diameter 1-2-pollicaris. Caules 1-2-pedales, calyi cii praecedentiam paullo longior fere sesquilineam longus, corolla diametro 9 linearam. Capsula 2/3-3 lineas longa, vix linca allior. — Crescit in declivibus diffusis montium Coraci* ad occasum Smyrnae.

113. (We.) V. PINARDI Boiss. l. c. 02. — Bienne: foil, omnib. inlegcrrimis, inducmento pannoso (pilis stellatis consiante) nanis, radicalib. obverse oblongo-lanrcollalifi in peliolum longum atcnualis, ioflmis oblusis, carter!* acutiusculis; caule erecto lercti, inftTnc cano, dense folioso, soperne glabreicentc ramosivissimo; rami* leuuib. clongatis tirgalis; foliis caulinit seutilib. oblongo-ellipicis cani* acutim-culis, ramealib. minimis triangularib. acalis; pedicellis lenuinsimit glabrescentib., calyee paullo longiorib., per l-3secus ramos In spieas laxas disposals, bast bracleola minima ovaia acuta suffultis; calycis panrl glabri carnosnli laciniis linearib. •culiusrulis pellucido-poncialis; corollae calyce decoplo majoris luteae lobis obovati* subinaequalib.; flamenUs villo flavescenie pilorum apice incrassatorum barballs, longiorib. duobus parte lertia superior! nudis, anlberis omnium realtor-nib^ capiula.....? <f — Folia inferiora fere *OnosmaUs* cum petiolo 5-6 pollices longa, superne 1-2 poll, lau, cano-argyrea, nenris eleganter promineniibus; caules 1-3-pedaled, basi Mills minoribus sessilibos coplosis Tesllll. InOorescencia et calyces praccdcnun, corolla major 10-12 lineas diametro lau. - In Caria.

a. - ip. iao.1

114. (Ma.??) V. KOTSCIIYI Dois«. ct llobenack. Dlag nos. plaular. norar. orient. IV. 50. — Toium iulumenlo brevi adpresso cinereo obduclum: foliis radieali- *»«....., caulinis inferionb. obovatis oblusis in peliolum bretem allenuali«t *u- perlorib. oblongit setsilib., basi rotundalis, apice magis miou»ve acuminaiis, omnib. crebre el minute crcnails, crenis aliquaodo (ere obtotetis; caule supra folia ci- irema parce ramoso, rarius simplici; Borib. brevissinie pedunculatit per 3-4 secut ramot la apleas laias disposiUs, baal bracttatis, brae4ea nicriorl iriangulari acominau ealjee mulio brevlom «alyela adpresst clsxruoMtis Uotella ovaio- iriangularib. acutis; corolla flava etlus loaMfttoaa, ealyte Mblrlplo sajtvI. . . . *? - Caules bipedaleN, folia in6ma can petiolo 8-1-podletti, Mtqulpollcem ft ampliu< lati, ratMera fere cjusdem magnitudlols tod toatlta. spleae7-10-poll- icare*. corolla 10 poll.;!??) lata. A praecedeail follis caulUis auperioribus non deurrentibu» di^diirtiHHimum: V. *timpUci* Lablll. quod eandem tpeclcm ac V. *ckrycrium* Srhr.nl. e>*e lidrtur el V. *Syriico* Schrad. magis affloe, sed ab eis eaule ramoto. f«»i» maj.>r»hus brarteis floralibus calyce multo brevloribua, indo- mento tenui»«imo ner pannoio diMinrtum esl. — Crescit In S)ria prope Aleppum.

tt P. 130.1

- Hi (Ma.) V. XANTIIloriIOKMCEIM Grtsch. Spicileg. flor. lumel. II. 12. ~ p_{er}- one: caule simplin subabylo sriclo, apice glanduloso-piloso; foil, trais rotu- latit petiolati*. e bam tubcordaU otalo-oblongis oblsis nagosis pilosis, grosse crenatii sinuatitq.; racemi pedicellia solilarifa braetoasn minulam mulloies »u- perantib. arcuato-patentib.; calycis segmealis oblongis obluniusculis corolla Oata triploauperaiis; capsula otato-globosa apice rotundata duplo breOonb.; orollae sefaeolis o«alo-rbombeic tubo quadruplo bretionb.; anthens sub filamentorum *, lana purpurca occuMahv ;; - Buib. Centur. l. t. 21. - *. *ballariouirs* Whlnbrg. B»s. — Crr»cil in re^iune raldj Thraciac et in omni Cbersoneso.

Disto II. V 2. [p. 110.)

- U(fltla.; V. Al.\.vsiro|,| M llo%% |)iacn.%. plant, noiar. orient. IV. M. - per ~~esse~~, ranpiiuum. ba«i tulTriuu^renw, t«tum pubr a<pre»m»tma pilorum stella- ~~torum~~ canum raulib. crecii* pumlift »mij|iri|> aut parcr raiuu»i»; full ~~radialib~~

numerosis, caulinis pauciorib., omnib. anguste obovalo-lanceolalis lanceolatisve, basi longae attenuatae integerrimis obtusis carnosulis, facie superiori subcanaliculatis; pedicellis carnis binis solitariisve in spicas laxas dispositis calyce sesquialongiorib., basi bracteola lineari oblusa vix perspicua suffultis; calycis canis parvi laciniis lanceolato-linearibus obliquis; corolla (lava? exclusis pilis siella-tis canescente, calyce quadruplo majori; filamento duobus paulo longioribus glabris, caeteris parce barbatis, antheris omnium reniformibus. 21 — Caudices crassi vesligiis petiolorum vetustorum lecti, caules vix semipedales, folia 1/2-2-pollicaria, superne 2-2 1/2 lineas lata, basi multo angustiora, caulina pollicaria, petioli 2-3 lineas, calycis sesquilineam longi, corolla parva 5-6 lineas diametro lata. — Crescit in Armenia.

117. (65a.) V. CRENATIFOLIUM Boiss. I. c. 51. — Uiennc: caule puberulo credo simplici aut parce ramoso folioso (ereli; Toll, sublus et inflorescentia indumento tomentoso flavescenti-griseo pilorum stellatarum vesligiis, superne glaberrimis, radicalibus et caulinis inferioribus breviter petiolatis ovatis acutis, caulinis caeteris sessilibus ovalibus, basi rotundatis v. rarius subcordatis, superne breviter attenuato-acuminatis, omnibus acutiuscule v. obtuse crenato-dentatis; floribus sessilibus in spicas cylindricas elongatas compactas valde lomentosas dispositis, bracteis triangulari-ovatis acuminatis calyces aequantibus stipulatis; calyce ad basin fere in lacinias lanceolatas acutissimas fissis; corolla exclusa tomentosa crassiuscula calyce triplo majori; filamentis rubris, tribus minoribus basi nudis, superne villosa aurantiaco floccosis, antheris reniformibus, duobus majoribus superne unilobulatis parce et breviter barbatis caeterum glabris, antheris oblongis; capsula globosa tomento denso delersili veslita calycis longitudine. — Caulis 1-3-pedalis. Folia inferiora 3-4 pollices longa, 1/2-1/3 pollicaria, petiolo pollicari suffulta, caulina sensim breviora minora in bracteis 3-4 haec lobis albescentibus. Spicae visquipedales. Calyces 4-6 lineas longi, corolla 8-9 lineas longa. Capsula pisco aequalis aut paulo majora acutiuscula. Species facie *F. pumilio* v. *momium* Schrad. referenda tamen ab eis diuocissima folia caulibus decurrentibus, infimis ovatis petiolatis, omnibus profundiuscule crenatis. — Crescit in locis desertis hircanici planities (Zittun) Rancliae inter Kuslendje et Tierna ad mare Daubii silarum.

118. 10a.) V. CILYSORRHACOS Boiss. I. c. 54. — Lienne, lolum induratum paucifloro, pilis stellatis adpressis ronslanle, riuum: caule erario pumilio a ball ramoso-paniculato; ramis abbreviatis crassiusculis; foliis radicalibus oblongo-lanceolatis, in partibus longe attenuate acutis, caulibus scintinatis ditinutis sessilibus, olivaceo. attenuatis oblongis; floribus ovatis «ru» nmo in spica, latusculas dispositis, pedicello subpalulo rance non longioribus; bracteis «ati» breviter acuminatis pedicellis longioribus; calycis triplici panno «Uli» triadularibus; corolla calyce triplo majori, exclusa lomentella intrinse flavo; filamentis laevibus barbatis, duobus longioribus apice obtusis, antheris omnium reniformibus. — Caudex 1-2-pedales, lenticulatus fohoti. Rami a basi numero 3-4-pollitares. Folia com petiolo 3-5-pollitaria 10-15 lineas lata, radicalia 3 lineas el auro longiora, corolla distinctissima. Pulcherrima et distinctissima. Species biduae mien aereo panato iatim digno crndji. — Crescit in summis praesidiis Caeni ovalibus supra Colottan.

Ditum ||. % I

119. 19a.) V. BOYBYCIFERUM Roiu. Diagnet. pUnUr. noor. onrnul IV. 32. — Tolas toaienlo niteo dcothiimo nolh «imn, in pjrre inferrinn pliolae andem detctili, obdant: caule lrrrti rra to r bio, u lrrnr r mo n. infrroe folios; foil, radicalibus. pttJolalis magnit ovaln-oblun «i» <> l. ium, ba i attenuatis, caulibus setthb. ottut arotio m|U, b «ti mmoJati* i ranu obolissime emarginatis, omoib. iolegmi» U; floribus. pet. 1-5 is ilomrrulo* rro «i. u* rulo* Uitpo. i. u. spicas el «sigiat lasia fottypioa «ra df «u» ia > lon «% i ma aim glomrmloH- ocul- tanto veallua rt idto ryli drac «a» eo «f» «cU» q. lormaniib.; bracteis o «a» acutis calycibus aequantibus: calyx lrrinu* o «aio-inanituljiib. aruii*; corolla CU co

quadruplo majori, basi extus lanata lulea, lob is ohoyalo-subretusis; itaminum 2 infertorum longioruin anlhens oblongis longiudinaliter adnatis, flilameolit upila-teialiiier a basi ad apicem barbtili*, tnum breviorum omnino barbalorum anlhens reniformib , villo lulcscentle calycis longitudinc. — Planta 3-4-pedalis, folia radicalia saepe pedalia, pcdem dimidium lala, oblusa, breviler petiolala, cnulina numcrosa approximata minora. Rami florifen numerosi saepe sesquipedale» pedalesve lana copiosis»sima mollissiaia nilca ui planlac pars superior tola omnino occultait. f.aljces ires tineas longi, corolla pollicem laia Capaula piti magnitudine — Crccsil in collibus ad basin Oljmpi »itis et in ipsa regione infenon Ohmpi circa Broussam

120 i70b) V. GLOMERATIM BOISS I. c 52. — Bienne, lotum mdtimcnlo denso brch asperulo o pffl» stcllalis Mibstipilalis constlanlr tcsilium, gnsco-fultcscens caule >alde elalo suhangulalo, in feme folioso, superne pamculalim ramosissimo. ramis elongaiis subflvxuosis; folns radicalib. magms oblongo-lanceolalis, basi atieiniais sub«»e»silib., npice acuiis acuminalisve, caulims sesoilib sensim diminutis oblongis otaiisq acuminalis, sopenorib. cordalo-subaunrulalig, omnib •ubincgns, fl«»nb subsessilib. per 3-5 ID glomerulos valde iomenlosos brae-lealos inicnripte spicalos dispositis, bractea exlcnon irianguUri acuminala calycib. brcMore, caljrc valdc tomentoso usque ad basin in laciolas lanceolatas crassas acuias fisso, corollae luleae lubo cylindrico brevi, limbo exios lomenloso calyce Iriplo major!, lobis obovalis aubmaequalib.; fllamentia tix ioaequalib., omnib. u«que ad apieem villo flaveacente barbatla, anlberlt omniam reniormlb. barbato-papillosis J — Planla 4-6-pcdalis, folia Inferiora pedalia el ultra, 3-4 pollicea lala, caulina nmernsa 2-3 poll, longa 1-2 lala, rami saepe pedalei >. ictqulpedalen, cal)x scmipollicans, corolla diamelro sosquipollican, tubo 2 lineai fere longo. Pulrhra spocioH indumento den no ospero glomcrulisq; florum di«-siiiiH disiinriissunn — Oescil in rollibus lolius regioms ralidae circa Smjmam el MagncMam, in insula /ac>nlho et in Macedonia.

121. (70c) > M»hKM)II>LM Boi«. I. c. 53. - Biennf, lotum indumento laxo a»pro-rolu griesco in pane superiori planlac undem secedenle obduclum caule erecto elaiissimo subangulalo, in feme valde folioso, nuperne ratnoto-paoculato, foil radicalib. oblongo-lanccolaiis, basi longe in petiolum aileoualit, eaulims inflroi* sessilib. laneeolaiis, pane Inferiori auenualis» bail eordalo-sabaorieiiUai, caulims superiorib. oblongis cordalls anleaUUs aenminalls, omnib. (prtealye laf«-rionh crenulaio-denUculaUs vlrldescent!-griMls; rftMit abbrtviatis; fllorib. 2-3 sevsilib in Klomcrulus tomcnlosos bracteafoa basi Unlam Intemptc* tpicaios, superm subcompacta^, breven di^positis; bracteis ovatis actmInatff calyces aequaniib , cahto toiuento<o profunde in lacinias taneoolatat acutas Gsso; eorollae malima<* luieie ralur soxtuplo majnns rxlus lomentellae lobis obovalis inaequa-lib , lilamrniis m m.iequ.ilib , oronib usque ad apieem >illo flavescentle bar-batis, anilien% nmmb renifnrnnb papilloso-asperis. rf — Planla 5->6>pedals Folia inllma H-|0-pollirana breuler petiolala l'i-2 pollices lata, quae sequuntur fere longiora mfern riiam %ubron»lricla, srd basi aurlculaia, suprema ovaio-ob-longa mullo minor* Spirae subsemipedales subcompaciat, basi subinierrupue Calyt ro l' gtomrratt dimidio minor 4 linets fere longus. Corolla diatneiro tarpc bipolhrari. — In pratis umbrosis regioois alpioae Ttoli circa pngutn Boidagh.

81. ^aV. IMU'I.ATtm Lam. - Wlprs. I. e. 145. DO. 81. — , * **fgr%fohum (irueb Spicilrg flor. Rumel II. 48. — Foil, imls slnnalls (Qurrnu Roboru foliu baud disaimllibus) calvcicentib., siipenorib. snbintegril repando-undulatis otaio-ob-longis sesvilib ; »pica interrupts »implici longissima Ilanc formam mam e^e Toutnrforln planlim in liien« mnnuit (etah In Macedonia, prop? halonichi versus montem kohl ut in pascuis siccis crescit

Species n< n sain not a.

122. V. TRICOPHYLLUM Gussob Spicil^ n_{or} n_{ump} | H_m ; p_{crrnno} r#1ulr
 •••••rescente. infra pJincuUm Minplci uudiutruulo Unii *< mum alto clabrato.

foil, imis conferiis profunde pinnatifida oblongo-lanceolata* breviter petiotatis, uinoq. eandem tomentosis, tomento persistente, lobis oblongo-rotundatis subtincerrimis undulatis; paniculae ramis ascendens simplicibus, demum rigidis; pedicellis subsolitarum stricis calycem subaequantibus; calycis cernentis lanceolatis acutis demum virentibus, capsula ovoideo-oblonga duplo brevioribus. eique adpressis; corolla ... ? 4 — Caulis pedalis stricis, folia ima 2-J-pollicana, 8-10 linearia, caulina simplicia paucis minoribus sessilibus, floribus subulata. Paniculae rami demum subsimpliciter. — *V. tptnoso* L. (cf. p. 144. no 7&) affinis videtur. — Crescit in rupibus Macedoniarum australium, in collibus prope Salonicum.

3878/. JAMTHE Grueb.

(GrUeb. Spicilag. flor. Bamcl. II. 4a)

Caly quinquepartita subaequalis. Corolla rotunda, limbo quinquepartito subaequali, segmentis binis superioribus oblongis, fascia lanuginosa in interioribus, lobis inferioribus subrotundis glabris. Stamina antherifera 2 inferne filosa distincta, antheris oblongis filis adnatis unilocularibus. Rima debiscentibus, lobis superioribus barba purpurea aucta, quinti rudimentum nullum. Ovarium . . . ?, stylo declivis in stigma iucrasculum ascendens sigulato abeunte. Capsula . . . T

I 'J. BIGILIFOLIA Guss. I c. - *Verlucum bufuUefohum* LID - Cf. pag. 141 DO. 04. — *verbascum Osbeckii* var. *ByotUtrnm* Una.

3870. CELSIA Linn.

(Cf. p. 147.)

ISSHSL PBOMFTaUPtOi BO.

(nayaivaVa Qriatlv Spldleg- Bor. tomel. II. 40.)

Baafra D. A M T M Bit. {pag-148.)

tl. (7a.) C LUOLUE Bolsa. Diagona. plaaL not. orient. IV. 05. t - Bail suffruticosa, tota pubescente glandulosa (aliqua pilis patulis longioribus. cr)%(allmit magis majoribus copiosis InUnniit) tonenella: caulibus erectis aut basi aiceo-deolibus teretibus fragilibus foliis, parte Oorifera simplicibus aut ramigeris, foliis polymorpha, inferius pellolatis lyrato-pinnatifidis* 2-4-JHRI*, »egmenlii lae« ceolato-oblongis leuilibus, aequalibus eilenon tubderarrentibus, laferioibus. M-P* mtimif, terminali basi cuneato-oblongo acuto, alio multo majore, omnibus grotto el obliquo* denlatis, denlibus »aepe creolatis, inlerrmdnt «e%o%ib, ad fcgmeolo* oblongum acuminatum aut canaliculatum, aut duabus hinc lineis ferrugineis fluitantibus redactis, topemittit dimittit induit tobrhombn« bati cuoeali* 'o* legH«, toperne acute denliculatis auenalo-acuminatis, «piri» lerrnialibus inolU-Bom; pedicellis breviter glandulatis patentibus v. defletit calyce 4-S-pio longioribus, bati bractea Uoeolala v. lineari-lanceolata, apice aequali - »eiacra eii 3-4-plobrevioretilipatia; calycem lobis rotundatis, bati tobangutlatit. •u«i«i«- anaoribus. tou long undine, longioribus. panlo Infra antheram ntque pills nif 14? •pie* InrraiMUf barbata, antWHt oamim nedifltit loculit condumibus; cap««If roimndla ealyce panlo longioribus. brevitime glandulato ^ - Taulea Vi.*-P** dale«. Folia ra Scr*pk*li*e referentia majora «• -polhcaria, tefmenlif l*1^ raliobis -0 linearia, terminali te«quipo|liceni lon«u. topenora tub »piri« *1* oblongo-lanceolata 4-0 linearia longa. hpleae 3-5 pollire«longae, pedifili 0- lineae, bracteat ad fipicae baal 4 linearia longae »ed dein dtminuUe, in 'P|« pa?U Mpcrtorl minlnMe. Corolla diaaaleo 7-0 hnrarum. Captola piao dim. die •Inortt. - Crvacti in Sttoi. mptoni ad rollr* cirra Gbeira (ariae, AprodU* veterua.

t 5jptci«# ad 94Chones non referenda.

&C SrjWAAOWUHA C Koch, Unnara Wil. m. - Full radicalibus oblongis grotto acuto. ttmtia bcottoalnM psbetcroub.; peduncula floretcentibus. hrior-tallbtae. /J — Croadt la Amoia traas Araieo

Addalur pag. 130.:

38?U/i- STAtBOPHBAGMA *Fisch. el Mey.*

(Fiscb. ot Mcy. Indi. scmin. borl. Pclrop. IX. 00. — Endl. Gen. pi. Suppl. III. p. 78.)
 I. ST. NATOLICUM *Fisch. el Mcy. I. c. t* — Planla habitu *Verbaici* lloribusq. f>J-
tiae, 2-3-pedalis, basi lomentosa, apice glabra ramosa; folia tomcnto stellatn
 cinerea, tilts *Verbatei longifolii* similia lanceolato-oblonga acuta inlegerrima,
 inferiora in peliolum attenuata, supciora stsstlia oon decurrenlia, 4-5-polltca-
 Ha, pollicem lata, superiõrs rainora. Infloresrenlia basi ramosa el praeler brae-
 lras parvulas otatns ophjlln, glanduloso-pilosa. Flores suaveolcntes sulphurci,
 in (undo purpurco-maculali. ^? — Crescit in Natolia.

333. NCBOPHILABIA *Tournef.*

icr. p. IM.)

8eeUo II. 8CORODOMA fi. Dra. - (pag. I to.] % . I.

85. (10a.) SCR. AKSTIVAMS (iriseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 36 | - Prrrnns.
 caule hcrbarco oblusangulo foliisq. villosulis epnnetatis, baai aablruncalii oh-
 longo-subrotundif obiutif inaeqaaliler diiplicaio-aerralit, serrataiii najuseulis
 pateniib., lcrsus peliolum deeretceolib., peUolis apice dilalalis oppotillii, infeho-
 rib. folium subarquanlib.; cymU aiillarib. pedonculalis aabtrfloria folio brevior-
 rib. piloto-glandulosis; calycis segncUus obloogis oblusit son marffaaUs pilotit;
 genialib. corollam sup«rne purporMeeolen tobaequanlib.; appeodcala •obro-
 tonda minula; eapsula....T % — lo tteardo ioler KalkaodHe el Kobelilia.
85. (lit.) SCR. SMVRNAKA Boi««. Diagooi. planL nov. oriental. IV. 60. - Birnnis,
 pills albit paiuli* crinpulis ma^is minusve hfspidula, prarlerea tuprrne rubro-
 glandulosa: foliin oblongis ovaaisvc aruli^, inflmiii mrrriatis, omnib. profunde in-
 cisis, Inbj< inangulanbuii acute denlalis; panicuh trrtinali elongat-! nudt, pe-
 duoculis Mibp.iuli» abbrevaiis 1-2 Iricholomif brartra in inflmii oblongi argute
 denUia in caelrns lincari inlegra aul basi denliculaia eis brevion ^uffulin, pr-
 dlcelli* ralyri subaequalibus; braeais pedicellonim minimis subulalls; eal)ris
 glabri lacintit ovalis marglne membranaccis; corollae porpurcae glabriu»rulae
 lablo saperlori provecliori sabquadrtto, appendice lrassverte doogaU teoiirllip-
 tlta, eaptttla bretiur ovau calyco subduplo loogiore. </ — Plaau t-3-ptdalit,
 folia 3-4 pollleea longa, t laia, iB0or«tc««Ua s«q«e«Ua, a *M 4Uhn folht
 prnfunde locitl»?, pills rubro- nee Blgn>-glatid«l#tla, p«d«ae«llt phnrMorlt, brae-
 tei?» inferioribus denlalis, corollae color* ti lablo avpavtori afOToeU«H, appeodfcls
 forma. - Cmca in pralis ad rivoloa moaliom Lydtae, MõSM tvpra ioaraabai
 propc Sm>nam.

f. 2. |pag. 107.)

87. (21a; SCR. TMOI.KA BOIM. Diagnos. plant, nov. oriental. IV. 66. — BitooU,
 tola inferoe pilit patulis albis rn»puli« lursuta, superoe pilis brevlorb. ttifro-
 |Uodulo»i« rrebre ob«ila, %i»nda: caule obsolete quadraogulo; follis peliolo limbo
 brevlori suffultis o^ato-InanguUrib. acutiusculia, infariorib. bati trunraii, «u-
 periorib. sarpe basi bremsimr subcuoealis, omnib. acute tobaloplicato-rrrnaitis;
 panicula irrminali elongaU nuda; pedooculis Uicbolomls braclea linrari trirboto-
 niiam subarquaoii suffullia; pedicella catycl aubaaqoalib.; raljcu glabri larinns
 ovatis angusie membranoeis; corollae glabraa firiditKcnti-Oa^idar **abbreviatae**,
 labio superior! inferiorem vii superanla, lobls oblutissimis; rudimeoio **quanti**
 siamloit parr6 rolundato-reoiformi; eapsula breviler o\iU cal>ci dupln longion.
 </ — Planla l-i-pedalis, inferne pills ararbnoidrm magis minu^r bir*uu
 suprrne nicrn>i:l.indulo»a. Folia ra *Mtliuat* rcfrrrentia 1%-i pollicrc longa. 1-|
 lata. Panirula laio ^uraia rlongaia, brartrac omnm lmrarn tntgrar, toQmir
 aolae florn »ubaiquanU-%, rarlorac pedunruli rommunu inrboiomiai \n'apquaa-
 Ut, brarlroljr .id prdirrllloruni b>P%in sr^ near brexitHtnr. s>r *gUt*dmio\$,ir W* ^
 Nphmis affinit, bace d.ffrrl indumento lirrt.^imo, folu* inlimift ronlaiik, ummbui
 tbtuaitu crnnati*. brartnt infrnonbus vblongi» denials; pedicelli» **lungioribus**.

calycis lacinii latin* mrnibrancis, corolla rubescente. Crescit in pratls pin-
guibus repionis montanae, Tiuliit aU Bo/dagh.

*. 21 bJ SCR. SCARIOsa Boiss. I. c. 67. — Perennis, inferno glnherrima: caulib.
terciib. erect is; foil. pcli>ldlis infcnorib. ambilu o\alis bipinnntisccis, cosis
pnroarijs basi nuda dilalata secus pctiolutn decurrentibus, segmenti« oblongo-
lanceolalis obtuse el irregularilrr dcnialis, basi conflueniib., superionb. broiler
petiolahs pinnalisectis, segmcolis laeolalis anguslis, obiusis obiuse »nci>o-iien-
lati»; panicula valde elongata nuda; peduncuhs slnclis pluries dichotoiuis basi
braclea eis mullo brenori oblonga, io ioflmit dentala, in superionb. inlcgra late
albo-membranacea suffullis, poilicellis calycis longiludine broiM>ime glanduloso-
hirtis, bracteolis oblongis otalivse lalitime scanosis; caçi> glabcrnmi laeinns
ovalit landem longitadinaliler nenrotii, membrana alba ei* laliore aui .iequilaia
marginalia; corollae brevis parpurascntis labio supenori parura pnnario, in lo-
bos subrolondos diviao, appendice snbrolunda; capsula o\ata lungo attenualo-
acuminala calyce daplo longiore. ^ — Caules se»qui-inpcd.ile». Folia bre\iier
peliolata, limbo abbreviate 2-3 pollires longo, S lalo, cosiae primanae 2-'J-Jugae
basi nuda dilalalae el secus coslam mediam decurrenies, .sepmenta pmnaia aut
bipinnata lanceolata, lobi basi eiterna inter se confluentTM. Panicula »a<pe pe-
dals sricla. Peduoculi muKiOori. Corolla ea *Ser. nodosae* paullo minor, margo
»canosu«_T bracteolarum el caçeis lineam el amplius latus. Species calycibui la-
lissime marginalin di>lioclif>ima. — Crescit in Syria prope Alep el Anlab.

80. (21c.) SCR. TAVCIETEA Boiss. I. r. 08. — Perenni>_t tola secu» caule* pedunculos
folia praecipueque secus nenos pilia glandulonit brenb. lomeniella tiscidult:
rhuonale ligoao; caulib. berbacea fragillium fuliosis tereiiu>culis; foil, peliolo
ea snbaequaale tat brevloii saffolUa IriMgolari-ovaUs, basi subcordaiis imnca-
tisivse parre et Imgolarller ioeito-lobalia aot ladhrlsla, semper argute deotalis
acuiis; panicla lerailBtJi abbrevtoU nodai pedunculis semel bis«e dicbotomis,
cooi fore io dicbotomla, braeua ovala obloogave acula iniegernma, ba>i
aUenaala suáTaltis; brecleolis liearib. integris brevissimi*; pedicrlhs raçceoi
>n aequanlib.; calycis glabri laciniis rolondis late membranar«M% glanduloso-
puncclalis; corollar glabrae vlrenceoti-flavidae labio rfupenon brr\i>Nimo_t lobit
rolundaiis, appendicc reniformi Iran>ve>e laiiiori; capsula plobosa muica raljt#
»ubiluplo longion. ^> — Caul ex numero>i ' — 1-pedalrs. Foha basi irunraia aut
subcordjla »aepe in peliolum bre%o>ime allcnuiaia, ad lerliam partem laturidialis
incma duplicalim et argute «errala_t suprnora Kimphciicr denlata, majorum lumbus
l',i pollices longuŝ, pollicrm aut amphu« latut, bracleae J-4 linea« longae, IV«
latae. Floret magniludinis eoram *Sar. tjlamulosae*. -- Cre>cil in fl>>>un» rupertum
Ta)i(eti infer i or is circa Mislra.

Qa (21 d., bCR. DEPAIPERATA Boiss. I. r. - Perennis cae»pito>a. tola nub lencs
crebre et miotoi>time glandulosa: 'glamiulit raulis tr>»ihb nt ramomm inOores-
renliae el foliorum bretUsiaie slipiaai* caulib. aomeroiit berharm rrai>iuscolft>
basi atrendeniib. *irf alls, ioferne oppositc el siriele ramo%it folio>i« quadrang*p
Ha; foil, brvviler pHiolalis, ambitu oblongis pinnatifldi«. «rgmrnlis 3-7 iofiwW
molio asinonb. disliBClit, svperiorib. in terminate acutum inrisum conflaenUaH
otnoib. acute Ucmiatu; MI. topremit minuii* »r«<ihb., segments angu>iis*¹⁰
crivpulls argatr drniiculalls; pameula nuda lata depauperala e pedoncolis «l^{erfl-}
I -J-floru Infertonb. Ionftionb. coo*lanle; brarlei* lanreolaio-hneanb. Obio*
obtoletc drniicolatit «H tnlegm peduoculi* mullo lire%ionb., bracle oli» luncarib-
p*4icellU «it caljcem arqoamib.; caljcit gtabri lacioiU roiuudi* ancu*te sibJ^
siarvlBaiif; corollae glabr«> virftcenU-luleae Ubio tuperton purpuratrenii p>*
prowUor*, lobi« roiantatit. appeodire reniformi lr«OMer>r ljiic>ri. cap>ula r>J
lundala mueronau »utJrpr>>a ealyre fere doplo luBgion. '4 <a>iTM numero
1-2-prd4lrt. basi et itrrom ad baiiB tafloretreniac ramo>i. rami elong*¹ⁱ fo-
lioti. Foha pro planlae magnlladlnr pun, majora cum peii.il« %< ses vi-
poUearia snagia siiBMte ba<l pinnstinda artute drniiruUia. »uperiora multo
dimlo«U angustaU crispulo - denticvUia Pan.cuU propirr |.<<Juncul<>> alternos

remotos (in fenonibus exceptis) umnoros depauperata. Flores magnitudinis eorum AY *nodoiae* — Crescit in glareosis et rupestribus regionibus alpinae montium L) - diae et Canoe frequenter (Mesogis supra Trades, Tmolus supra Philadelphiam et Sardes, Cadmus).

01. (21 e.) SCR. OLYMPICA Boiss. I. c. 60. — Perennis, in fere glabra rhizomata soffruiscentem; caulibus numerosis ascendentibus, basi foliosis subimplicibus. herbaeae mgnantibus; foliis, intense >indib. petiolatis pinnato-lyratif, segmentis 3-5 oblongis aculis argute dentato-incis, inferior! uno alterutroque basi liberis aut piciolulalis, cactens basi confluentibus; panicula nuda laxa simplici e pedunculis abbreviate, in fenonibus. 2-3-florum, caetens unifloris conslanle, glandulis brevissimis stipitatis conspersa; bracteis minimis, in fenonibus. oblongo-lanceolata deniiculaii*, caelmselaceis; calicibus glabris lacinis rotundis transverse sublatis v membrana scanosa rufescenti denticulata eis lallon marginalia imbricatis, corollae flatidar calyce >ix duplo longioris labio superior! purpureo production, lobis rotundatis appropinque remiformi; capsula rotunda mucronata calyce imbricatis longioribus — Caules pedales caespitosi numerosi; folia nigricantia-vindia flarnda ea (*hryanthrum frMleseutu** magtuiudiae et forma referentia; panicula saepe *c-mtpedali* pauciflora; flores eis praecedentium paulo minores. — Crescit in caelic rupium regionis alpinae superior!* Olympi Bilbyni t d origoem vallis Kirkbounar.

OS. (41 a.) SCR. PINARDI Boiss. I. e. TO. - Perennis, parce et minus glandulosa: rhizomate hgnoso; caulibus numerosis fragilibus. obsolete quadranguliferis. lenoibus simplicibus. ? ramosis; foliis. • bilobatis v. pinnatis-lyratis; segmentis irregulariter et magis minusve obtuse denatis-1 net iis, basi confluentibus; panicula nuda gracili laxiflora; pedunculis elongatis pluries dichotomis lenoibus bractea oblonga aut in nuperioribus lineari denticulata v. Integra suffulh*; bracteis srtireis; pedicellis calycis 2-4-plo longioribus; calicibus lacinis rotundis albis-marginatis, corollae purpureae labio nuperon abbreviato, lobis rotundatis, appendicibus panam oblongo-clavaia obtusis, filamentis glandulosis exsertis, capsula globo-a »ultratosobdtd»ma breviter mucronulata calyce duplo longiore. 2f — Planu magnitudine et forma foliorum multum varians, sed a .V. r<wi«, (*Hvertam** et *l*n*tata*, quibus affinitate esl, forma appendicibus oblongis nee trantverte rrimiformi, pedunculatis Cracillibus. elongatis captulaeque forma distioctissima. Caules % - Mtej<|y*dalef, folia pellolau 1-sesquipolliciaHa ?. plinniaia, tegfitaUt peiioitUUU •Maago-Unceolatis inciso-pinnatis v. Meptos lyrtu, lobis abbreviatis tarle Ineiti v. etiam oblonga lohata, pedunculi saepe po Hi cares v. tetquls>o||earf« greielet paoviclam •bbretialam formant; florae eis *Se. larinal*** paalio mloores. dpsalae pUum saepe arquant, <<*d aliquando dimidio minores evidenter didymae. Forsan melius propter •tamina einrrta prope X. *Moppet* et *emnam* colloenda. — Cr^scit in rupetribus* Canae

01 (48a) SCR. <.A>Ks(T.NS Bongni et < \ Mey. Veneichn. drr Pflin am Saisaog-Noor 51 | 1 II - Puberulus (arinoso-incana. caulibus. erertiusculum obtuse leiragom ramotn, foliis oblongis in petiolula allenualis iaequaliter berratis, serratis recuno-falratit, lhr>ro tenninali aphylo, cymis lairralibus pedunculatis dirhotome glandulosis; pedicellis ralyee bretloribus.. »<p<lit oliinngi* obm»i», margine aognstissimo searoso einelis; sunlnib ei»ern« »tamine »trnli oblongo: capsula ovata aruU ralyee. ^ — Proxima *Srr rupettn*, %*d dinVrt rannite foliorum, terraiorit recurvalo-falcatis, floribus* minoribus»v »epalis anguste sjjargin»ii«, «b afBni *Ser. tan r gat a* disingailar foju« inranu tnditi»n, stamine Oerili aogufflo oblongo. - C'retil ad nulos Baiarka ci karbat»rha in Altai

M 'SCR FIIFIFIIA <M - Cf pag 171 1 m.ROR ilou. |>,ifBo. pUul na% oriental \ ~»Q Hore* raptularqur dimidm mmorc», cauln ramo»iorr» Crtr ie»quipnla|r« Radii birnrm fulla inflma o^ata ubi%a lobata |.r»olata caetera subsessilia 2-3-pinnatisecta, superiorum segmenta tenuissima denticulata Pedunculi aburtu »rnr| lanluni Oirhtntnn Jlore* •ecu* frdunruli r*m<» subsessiles Capsula pito dimulio minor I re% m m roldbiu t rru tubalpimt Mesogis

t *Specie* non satis notae.*

91 SCR. LRPIDOTA Boiss. Diagnos. plant, nov. orient. IV. 71. — Perennis, basi suffrucaesopilosa, tola squamis adpressis rotundalis concaviusculis, margine stellatim ciliatis can*; Toll, carnosulis oblongo-spahulaha longtime in petiulum atenuaiis, radicalib. inlegns aul obsolete 3-5-dentatis, apice obiusissimis Iruncaliste, caulims paucis Irifidis, lobii oblongis oblusis brevib., terrainali saepe iridenlalo, raulib. terelib., basi parcissime follows, superne nudis humiib., pamaculae brevi»simae indumenlo parcion subdeter»ili; pedunculis tnfloris, bracia hneari canaliculala brevi basi suffullis; bracteolis minimis; pedicellis caljre paullo longionb.; cal)cis parce squamulosi el glanduloto-piloni lacinns rolundalis raembrana sranosa dfniculata cis paullo angustion cinclis; corolla.... ; rapcula roluoda breviler macronala glabra calyce paullo longion. Zt — Species indumeolo lepidoto caoo pilot *Hippokapt, EUagn** aul *Alyuorum* referenic ab omnibus disliociissitna. Caolis cum panicula miO polltctet longus, folia cum petiolo sesquipollicana superne I',-2 lineas lala carnotula, apice subtruncaia obsoletissime indentaia, aliquando cum duobos dentibus laieralibui, «aepe inlegra, caulina profunde trifida lacions obloogis. Pedunculi lemipollicares, pedicelli Ires lineas longit capsulae magnitudims earom *Sc. camnae* aul paullo majoref — Cre\$ci in Armenia.

03 SCR MAR(il>ATA DOIHS. I. c. 72. - Perennis glabemma: caulib. nuffrutescolib ascendenlib Irrrilib. luridis, basi folio»is; foil. inQmi« breviler peliolalis p*rvisit ovato-subrolundis supenonb. obloogis aculiuculi*, omnib carnosis glabernmi« pooclulalis crenatis, erf ni< ruluodali regolanb. margme albo calloso cioclii, anllis gemnas folionim paullo minoran edeoib.; panicula glabra laia nuda; pedunculis palolU rigidit subspioeacenUb. dkcboionit aut abortu simplicib.; brcteis brarieolisq. minimia linearib.; pedicellia calfce breviorib. aaepe suboollii; cal)n« glabri lacnlis rolandit •DgailA albo-margioails capaula panra roioda dinidio brevioribus. ^ — Caolet batl toáTinleteoles pronUali 9-|2.polllcarei, folia ioferiora vu 8-3 lineas looga lalaque peliolo limbo brevion suffulla, superiors 4-3 lieas longa, i-3 lala, ulnnq. aeatata, omnia carnosia, marginc albo creuceo cremruo insignia Inflorenrenlia *Srr. eantmae* el afflimum, cap»ula minima. Coroll.i . . * Cresnl in Persiae monle KUind.

On s(R (,| IMXLIKKRA Clarke, T m.l 600. - Raceium lerminali composilo; *MI Hijjiror«Jjlo»ci«ali4 lala drntalu punriali«*, bavi inaci|cialib , peiiohs glaoduloto* pube«renlibus ^ — Afflms *Scr apprmUtulalae*, a qua differ I folu* basi *Sc0i9* denlalis eialialK rl'prrrforalo-punclalis oec appendiculjli«, (lonbus breuoribo* laiiioribn%. — Cre%ril in Tbracia liiiorah ad Ponium

333. A%fiELO\lt iumb. et Bon pi.

'CJ pag 17*

I. A. (.OKMGER4 Hook, iot Magj t JKIA. - Il.rtulola' foil, lanceolalis ^{entalis,} ba»m «ersu« lalionb. lolegerrimU, superiorib. mlnorib. brariearformib: ^{pedun-} eulia solilams granlib. pilotU; labil inferions srgmenlo iniermrdo long* cof* •••» eorva apire bidenlalo. O ~ *dmgthmm nh*4** liardn. Herb. fl. BrasiU ••• 07I. — Crete11 m Bntiha.

340. LI\%BI% Vent.

i.r. PM i-w

Scotte I. CIUIOUimCM DC !p<g I** I

117 v6a) L. ftVDITO^PCR«% ftoitt Dlagoos. plant nov. orient l| 71 - ^{Anno,} l»U •lbo.|o»9»IHla «i»udul4 r«q|ib erecli* puroih* timplinb aul bast P. ^{parce} ramo*i%. foil «e»iilib 'Moagi* lme«nbu»«e oblu»i», Oorib *nb*»%ibb ^{J1*U>Jf.} ba»i f.lio r«l)ren •«b«rquanle svffullis; f«l)jn« bsn lan^ cn%»ula ^{riogata h.} p«di larinut Unceolalo >|ior«rib. oblusis rorolUm arquaulib.. rorollae ^{violaceo} ottoa ptlotltucwUo labio superiori oon reJeio, palalo MI promiorole, ^{calcare} if subtecuno corolla plot quadmplo brttlort. capsulae globutae ^{cajce mule}

brevions brevissime tometellae stylo apiculatae loculis aequalibus; semibus genericis compositis truncatis, profunde longitudinaliter sticatis, sulcis* transverse foveolatis. O — Planta propter praesentiam calcans pum quidem, sed mafoli 2 lineas et ultra longi, capsulaeque non obliquae, sed rotundae loculos aequali ab *Antirrhinis* remota et inter *linaria* prope *L. minorum* et *Ittalem* collocanda. — *Antirrhinum rydilotpertnum* Fisch. et Mey. (cf. 824 no. 10. cum *Hynonjia*). — Crescit in Georgia, Caucasia et circa Aleppo.

Sectio II. CYMBALARIA Chav. [cf. pag. 190.]

118. 12a.) *L. MICROCALYX* Doiss. *Diagnos. plantar. novae orient. IV. 72.* — Tenemma: caulibus prostratis raespitosis intricatis repentibus, lana longa rispa alba obvilis; foliorum limbo glabrescens breviter ciliatulo rotundato trilobato, ramis subquinquelobis, lobis rotundatis obtusis; foliis, inflorescentiis saepe rotundis integris; $\text{r} < \text{unruli}$ folia $\text{u} < \text{peranlib.}$, superne glabris; calicis glabris minutis hinc utraque obtusis; corollae glaberrimae pallide violaceae labio superiore ad medium bifido lobis sinatis, inferius lobis tribus aequalibus. ubirunniis , pilaio aurantiaco profunde bilobo, calice recto corolla dimidio brevior. T - Kuli teoerna 4-7 lineas laeva; pedunculi pollicaris; calycis lacinae tria lineae quartam partem longae; corolla cum calice ex Hneai longa. — In fissuris rupium in faucibus $\text{Ta} > \text{geii}$ prope *Mimra* crescit

Sectio III. UICIASTHUM Ohaf. [cf. pag. 190.]

110. (4Qa.) *L. MACEDOMCA* Gritsch. *Spicileg. Oor. Rumel. II. 10. t* - Anoa, inferne lignescens glabra: caule fruticose, inferne subfimbriato; foliis, omnibus sparsis glabrescentibus, basi latiuscula venis ovato-lanceolatis breviter acuminatis; racemo lanifero inferne nunquam composito, bracteis deflexis pedicello limbo duplo brevioribus: ramis glabris integris abbreviatis ovalibus aruminatis aculeatis rotundis tubo multo brevioribus; ramiola. . . . ; corolla flat a (f' longa) calice apice florum arcuante; seminibus. . . . ? J - In Macedonia occidionali crescit.

111. (Ma.) *L. KIRDICA* Boiss. et Hohenack. *Magno. plant. not. orient. IV. 71* - Perennans, glaberrima glaberrima; caule hirsuto foliis tripliciter acutis, foliis acuminatis. U - laevolatit rigidit hirsuta, basi attenuata acuta Ua ntrthi ; racemis elongatis multifloris liliatis; floribus pedicello eaeque brevioribus AIM ; bracteolae linearibus pedicellum aequantibus; calycis lobis ovatis lobis U acutis albo-marginalibus; corollae pallide rosae glabrae palato concolori alborum, raris in rano cornu arcuante; eaputa globosa calycei fere pariter; seminibus disoidibus inaequalibus foveolatis. — Caulis aequalis bipedalis, superne ramosissimi, rami virides lenes. folia bipolitea, 3-4 lineas laeva, rotunda M rulgaria dimidiata mini , 5-6 lineas cum calice longae. — Crescit in declivibus raris montibus Gara *Kirdi* taniae.

112. (10a.) *L. COMOLOR* rb Spicileg. flnr. Romel. 11 i. - Perennans glabra *Borifera* nudi caulis caulibus arcuatis gracilibus simplicibus; foliis, lineariibus tttrtnq. attenuatis $\text{p} < \text{r} > \text{i}$ imivp vrrlicillatis ; racemo laevi parifloro; $\text{hr} > \text{c}$ - teis pedicellum cubantibus; calicis lobis gUbr segmentis oblongo-ovatis UocroUlu ub - tasiatulis, corollae tubo p u duplo brevioribus, capsula foveolata superpartem, corolla ftava 4-5'' longa calice deicentem tpce obtoiu culum u rrante , semibus otatis triquetris eialatis rugatis. % — *Antirrhinum tuptum* Fl. Graer. i % (eid. yn.)

S. nrpms : caule inferne $\text{rpi} > \text{ni}$ calice tonno romllam tubarquanip. rah - clt segnentis oblonki nbtuM — Crescit in Macedonia et Thracia.

359. % \ T I R R | | | | \ | Ju\$.

U | -as *il

A. RYDITOSPERMUM Fisch. et Mey. el * c f , ^ 2il no KM ~ IIN UI R || f f pa iVI > ||
SPERMATA ROIM f. pa iVI > ||

Addatur pag. 230.:

3S90'v GABTBOMBIA D. Don.

(D. Don in Sweet's Brit flow. gard. II. 75. adnot. — Endl. Gener. plant. Suppl. II. p. 00. — Meisn. Gener. plant vascul. II. 215.)

I. G. (SCROPHULARIA Moc. et Sesiè mss. - LOPHOSPERMUM D. Don, Transact. or the Linn. Soc. XV. 340. — Cnarannes, Monogr. des Antirrhin. 70. - Wlprs. Repert bot. syst. III. 230. no. 3. j) PHYSALOIDES G. Don, General sjsi. of tfard. and bot. IV. 3ML — Crescit in Meico.

3004. FBASCIftCEA PohL

(Cf. pag. S37.)

4. *FR. ACUMINATA Pobl. — Cf. p. 23a - *Betleria Bomodora* Arrabida, Flor. Flumin. VI. t 8a

BESLERIA INODORA Arrabida, Flor. Flumin. VI. t 81. e«e videtur FR.OCIS-CEAE ipeciet.

3000/,. TETBA\EMA Blh.

(Cf. pag. 251.)

I. 'T. MEXICAM'M Bth. - Wlprs. I. c. — Hook. Bot. Magai. tab. 4070.

3031. MAE1* Lour.

(Cf. p. 272.)

'II. PIMIUIO ft. Br. - Wlpra. I. c. DO. 4. - Endl. Iconogr. geogr. t. 102.

Addatur pag. 277.:

3My,. •EMCHAESA Bth.

(Blh. Plant Hartwaf. 78. — ftadl. G*a*r. plant. gappeni. II. p. 01. — Malaa. Ganor. plant Taaal. II. 388.)

1. H. FBUTICOSA Bib. I. e. DO. 548. — Frnlei 2-3-pedalis viscoso-Tillosus: ramulit anbteretib. berbacaia; foil, oppoaila 3-5-pollicarib. oblongo-laoceolalis do* plicalo-dentalis, ba»i cordalo-ampleiicaoli conoids, penmoemis; cjrois anHarrib. pednoculatis J-7-floris, folio breviorib-; braceis oblongis aculis pedicellai oon aequantib.; calycis senipollicaris lacimin lanccolaiis, superiorib. loagioriba curollis sesquipollicanb. mimuloideis , quantum t| sicra videri polesl). 6 — ^* Meico (Qaeialleungo/ crescit

303s. MOBttAtIA R. Br.

U. p. 278.

*M PIBE6CE>8 *. Br. - Wlprt. I. c. no. 2. - Eadl. Icoogr- f*»«« I-¹⁰³ -

3M0. BrCHWCBA Linn.

(Cf. p. 301.)

'1. CBTICABFOLU ft. Br. - Wlprs, I c. no. 1 - Endl. Iconogr. geogr. t78.

Addatur pag. 3XL:

3073/,. «O«PHO«lTI4iMA Turezan.

(Torciaa. Flora (B. Z.I XXVII. 120.;

Calyi quadripartitoa aequalit. Corolla rotata, fauce parce pilosa. **limbe** quadripartito aequali. Summia 4 loclaaa, fauci inttrU, aolherao **bilocu-** larea oblongac moUcac, localis parallelis. Captula (iroroatura) **oblonga** bitaUia bilocularis, ovola nuroero^a aepto afllta. Stylus ainp|fi **biliformis**. •Ugma clafaio-capiuiui.

I. *G. SCOPABIOIDB9 Tnrtaaa. MM. la Dregf, Coll. plant. Capent. no. **6884. ex** ^ **era** (B. I. i X i m I2D, - O? %I - Croacil in PromontoHo bonat ape*

3979. VEBONICA Linn.

(Cr. pag. 335.)

Seotio U. OOOUDIOSPERMUM Hehb. [cf. pag. 335.]

151. (3a.) V. CAMPYLOPODA Boiss. Diagnos. plant, not. orient. IV. 80. - Annuā, parce el breviter birtella: caule parce folioso erecto paullo aopra basin opposite T. dicbotome ramoio; foil, radicalib. nullis, caulins oblongo-lanceolatis obtusius-calls, infimis basi obsolete denticolaiis, superne integris, caeieris inlegerrimis; racemis terminalib. laii mullifloris elongatis; bracteis elliptico-linearib. acutissimis pedicellos subaequantib.; pedicellis capillarib. calyce duplo longiorib., breviter birtellis incunro-palulis, eitremilate snbinfractis; calycis parce glandulosi laciniis aoguslc lanceolatis acuminatis; corolla calycem vii aequantc; capsula calyce paullo breviori parce glandulosa, usqf ad basin biloba, lobis obovalis, apice rotundato-subangulosis; stylo flssura dimidio breviori; seminib. oblongU cjmiformib. valdc rugulosi. O — PlanU 4-6-pollicaris, folia majora 5-7 line** longa. — V. *bilobae* afflois ab ea bene disUneU foliis angustioribus bracicis »e-palisque, valde angustatis sublinearibas nee ovatis, pedicellis apice infraclo-recurve ncc rectis et inprimis seminibus dimidio minoribus profunde rugulo»i* nee lacviusculis. — V, *biloba* Pl. Arab, union. Ila. No. 118. non Vahl. — Creteit in Arabia pciraea, Syria ad Aleppum, Assyria ad Messul et In Persia boreali.
5. *V. DinYMA Ten. — Wlprs. I. e. 335. no. 5. — P. Jtaftn* Mortal, Flora der ScbueiU S7I. no. S3.
152. (5a.) V. AICIEBI Boiss. I. c. — Perennls? minima caesplota, lou pills crispulis hirsuta: caulib. Oliformib. fragillimis Intrieatls flemosis bretlb. foliosis; foil, minlms bretiirr petioiatis, infimis otato-rotundatis profundf crenatis, crenis rotundalis, floralib. infrtorib. subiessilib., basi caneatis 2-3-dfntalis, summis oblongo-spaihulatis inlrgriti; flurib. lolilariin aiillarib.; prdicellis capillarib. brartea trlplo. cal)cp quinluplo longiorib. eximif flexuosis; calycis larinlis valde lomrnlellis oblongii obtuiis integris, duobui minorib.; corolla rocniita? ciljrr duplo longiori; capsola calycem superante to into tell a ompressa subrotundato-obror* data, lobls rotundatis; stylo emarginatara mnltto longiori fletuoso; semlnth. obloogU eymlbformib. laevibus. % - PlanU m e fragmenUs suspicaH potetl perenols lotrieau raoit *SikU»rpim*§, caoles t-3>poUiear«s fr«g«Umlf Mia talaa petlolo 3 lloeaj loogo a»Jtaluv 1V.-9 lineaa longa ItUajM, s«t*rt*r« smiMra Integra, pedicell lenaisslml seueei Mxooet v«rit ituni, 4 lit- et ampliut longi, calces et capsulae ela V. m§r§His dimidio minor*. — Crttcl la alpihut Demawend Persiae borelis.

8e«Uo DL fEBOHOA Bfjfc». (el. pag. 33ft.)

f. I. *Annuae.*

- U3. (10a.) V. CIAMAEPITYS <iri>fb Spirileg. flor. Bumel. II. SI - Diffuse at-eendfos pilosula: foil. pinoaliftrrto-&-3-parUtiſ laelniis linearib. obtusls, vrrtut baain attenuaiiii; brartris tuprriohb. none integrU, none Iofeme appendirulatii conformlb.; florib. subsrssilib. albdls bractea superatis; eaptnta obverse deltoidea trnncata cbartacea; stylo elongato moi evanido. O — In Tbracla merdionali.
- 151 (10 b.) V. Pt'MILA Clarke, Travel* II. Ui. 950. - Viscoso-pubescent suberecu aimplei v. patole ramlgera: foil, rbomboo-ovallf rbombeisq. profunde lobetis, lobis inferiorib. snbdentaUa; pedooeoJis patttil* eloagatis; corollis coeruleis, segmeatis ovatia. O — Crescit In Ilaemo.
155. *dm**) V. MACBOPODA Boiss. Diagn. pi. nov. orient. IV. 70. - Annuā: raulib pnmllls glabris, basi parce ramoiiii; foil, rosulatit et ad cauliam dicbotomiam oblongo-spatbulaiiii, ban aiienualis sessilib. obtosis, obtuse drmicolatit brm»ftiine albo-hirtrillif: rarrtnit lermioahb. latiMimit; pedicellit palrntib. rapillarib. glabris, ral)cc inluplo longiorib, ba»i braclrola lin<*an<«paibuUta obiu»a rahm longiudioe luffulUf; tepalu parre el brenlrr fUodulo*o-h.rthlu oblong,% obtusiss. ••rolla albida *. rarnra* caljcr paullulum longiori; rñi%ouU ciUrrm arquante

compressa planiuscula, transverse latiori, vii ad lerliara part em usque biloba, lobis rolundalis, stylo tandem evanido Gssura paullo longiori; seminibus planis subreniformibus. Q — Folia *Androtacet maximae* 4-5 lio. longa, tres lala. Caules 4-5-pollicares fere a basi floriferi. Pcdicelli sex lineas longi. Flores magnitudine eorum *V. acinifoliae*, a qua braceis minulissimis, pedicellis capillaribus duplo longioribus, capsula calyem non superante, seminibus subrciiformibus nee ovalis egregie dignoscitur. — Crescit in Persia.

§. 2. *Perennes.*

A. *Axillari racemotae.* • *Calyce quadripartite.*

156. (32a.) *V. DABNEYI* Hochstelt. mss. in Senbert, Flor. Azoric. 30. t. 8. fig. 1. — Fruticulosa: foil, sobcoriaceo-rigid it oblongo-lanceolatis, margine subreflexo argute serratis glabris; racemft aiillarib. multifloris brevissime hirlello-pubescentib.; calyce quadrlpartito glabro; capsula petiolum (pedunculum!!!!) aequanie obcordata pubescente, venulis prominulis. 6 — Crescit in rupibus insulae Fayal Aiorarum.
157. (30a.) *V. MICROCARPA* Boiss. Diagnos. plant nor. orient. IV. 76. — Tota breviter lomenella: rhizomate suffrutescente; caalib. pumilis adscendentib. foliosis; foil, breviter peiolatis ovato-rolundis oblusis obtuse pectinatis (?); racemis axillarib. plurib. longe pedunculatis, floriferis globosis densis, fructiferis elongalis; braceis oblongis linearibusve acutis integris pedicello broviorib.; calycis laciniis 4 oblongis obtusiusculis inaequalib.; corolla albida? calyce vix sesquilongiori; capsula lomenella panra calyco paullo breriori vii compressa acute emarginata stylo emarginata duplo longiori superala. 2l. — Crescit in Persia propc Bayazid et in provincia Aderbidjan.
158. (36b.) *V. TYMPIRESTEA* Boiss. et Spmn. ex Boiss. I. c. 77. — Tota brevissime lomenella: caulib. abbreviatis herbacels proslralis; foil, tesslib. obloogospaihulatis, basi aUenuatis obtuals, saperne obtolellsaime el aculiuscule denticulatis; racemis a&iUarib. sollUurils; bractels ovalis acutis pedicellum subaequantib.; calycis pedicello paullo brevioris lacioiis 4 subloaequalib., oblongis oblusis inlegerrimis; corolla coerulea calyce duplo longiori; ovario tomentello stylo Ion-gissimo superalo. 2|. — Crescit in regiooe alpina summa Tymbresli Actoliae.
150. (36c.) *V. PAEDEROTAE* Boiss. I. c. 78. — Perfnnis: caulib. herbaccis nuriif, repenlib. raespilosis fragillimis; foil, breviter pcliolaliscarnosulis pubcrulis ovalif oblusis, basi subtrancatis rolundato-crenalis v. integris; racemis florum 1-2 F^{'''} teralib. aul caulis abortu subtenninalib., pedunculo folia superante suffullis ro* lundaio-capilalis valde papilloso-hirsulis; bracteis linearib. pedicellos aequanlib*; pedicellis calyce breviorib.; calycis valde papilloso ad basin usque parlilt lacinii* elongatis, lineari-spaibulatis oblusis subaequalib.; corolla tubulo^a elongata gl*~bra ad medium usque in lobos oblongos aculiusculos fissa, calyce paullo longiori; staminib. summo lubo iosertis; slylo exserto, stigmatc capilalo; capsula puberula calyce triplo breviori compresso-plana obcordata, lobls rolundatis subdivarcatit* stylo longissimo svperala. 3l. — Caules blpollicares nudi repentes, folia suprema petiolo 3-4 lineas longo saffulu, 3-4 lineas longa, tres lala. Calycis lacinae ire* lineas, corolla fere 4 lineas loogae, capsulae parvac lincam longae, I^{1/}, lalae. Habitus omnino *Linariae erasrifoliae* Cavan. Species in genere ob corollas tuba* losas paullulum anomala et hoc characlere ad *Paederotat* accedens, sed ab ei* capsula non ovata, sed valde compressa biloba eis *V. orientalis* el afflnium simillima, racemisqae axillaribus abhorrens. — Crescit in monlibus Elanoul P<*rsiae borealis.
- lóU (41 a.) *V. CARIK>SIS* Boiss. I. c. - Parcissimr rl breviiier puberula: caulib. bCfbaccis proslralis repenlib. folionis, basi nuda fibrillosi<; foil, breviter peliolaU*» breviiier ovalis, bati subcuoeatii oblusjs, regulariler utrinq. 4-5 crcnin profuadif rolundalis iostnielis, a]labriuscalis; racemis axillarib. subsolilariis; braclris oblonK^spatbulatit oblois, iofimis denticolalia, caeteris integris; pedicellis caly«^e sesquilongiorib. braceam aequantib.; calycis fflanduloso - birauti lacioiis qaaiuor

lanceolatis, obtusiusculis inaequalib, majon basi saepe 1-2-dcnliculala, corolla cocrulea calyce duplo longion, capsula brevissime tomenlella compressa suborbiculan, apice iruncala subretusa stylo brevi apiculata. % — Caules repenles basi ramosi, flonfen 3-pollicares, fruciflen saepe pedales. Folia circiter tres lineas tonga, 2/i lata, breviter peliolata sabconacea obtuse crenato-lobala ea *Teucrtt Chamaedryot* referenda, sed breviora el mullo minora Raceml erecii, florifen semipollicares, dein elongati magmtudine eorum *V prottrala* aul fere majores Capsul 1 lineam 1 U lata — Crescil in arcnosis regioms montanae alpium Anatoliac (Cadmus supra Gheyra, in via inter Gheyra el Denisleh, Tmolo et Bozdagh)

101 77a) V SCARDIGA Gnseb. Spicilcg flor Rumel II. 31 t - Glabra gracills erecta foil peliolatis ovalis, supra basin integernmam serratis aculiusculis, racem oppositis hxiflons, bracteis pedicello arcuato tenui multo broionb, corollis pallide coeruleis, capsula compressa orbiculalo-elliptica, apice subinlegra calycem aequante 2}. — Crescit In Albania boreali.

B *Termtnalt-racemosae.* * *Serpylltfoha.*

102. (104a) \ (4ESPITOSA Boiss Diagn plant nov. orient IV. 70 — Caespitosa perennis caulib humifusis superne dense foliosla foil. llnearl-tyaihulalis integris, subtus revolutis, basi subconnatis oblusis, tuperiorib. praecpoe Una crispa parce ve<ititis, flonb 1-4 lerminalib. e caespite TIX exiertis, pedaneulia ealycem subaequantib, braclea oblongo-linearl eos aequanti auffullis; caljcis longe crispolanati lacinns oblongo-llinearib. oblinsiuaealis inaequalib; corollae magnae roseac calyce duplo longions lobis ovalis, capsula calycem aequante glabra compressa obcordata, transverse latiori, lobis rotundalis ^ — Caules 1-3-pollicares, folia crassiuscula 4 lin longa, lineam ferc lata, Cores magnitudims eorum *V Teucrtt*, capsula lineam longa, scsquilineam lata. — Grescit in regione nivali Cadmi occidentalib supra dhejra, Olympique Bithym

16).(1(Ha)> LRINOIDES Boiss I c 78 - Parce cl brcmsime hirtella caulib herbaceis minutis, basi prostratis radicanib. caespitosis, dein ereclis >aldc foliosis, Toll ses>ilib carnosulib o\atis oblu>is, crenalo-dcnlicuUis, tupremis integns, flonb 3-5 lerminalib approximate glanduloso-bispidis, pedicellis calyce subbrevforib, braclea ovato-oblonga eis aequali suffullis, calycels Uoimis subaequalib oblongo-spatbulaiis oblusfs, corolla oeralea calyce doplo longloro. 3} — Caules pane foliota vix sesquipollioares, folia S-4 lineas looga, crebre erennlaia, racemi subcapiiaii 3-5-Don, floren magailudinls eorum *K nummutoria**. — In cacumine Parna>si crescit

Addatur pag 368

3)79/, TETRitLACirM *Turczan*

(Turc/an Flora [B Z)\X\II 120)

Calyi profunde quinquepartitus, lacuuib basi subcordalis macqualibus. Corolla h)pocratenfurmis bubarquahter quadnlida, laciniis obtusis. Stamina 4 aequalia, faun inserta imlusa, anthers globosis muticib biloculanbus. Stilus niiformis inclubus stigma cla\atum papillosum (apMila globoso-compressa chartacca biloculan* scphcide bnahis, >al>is biparlitis. Blssepimentum libcrum placentifcrum compressum, fo\eo hb 10, oitoscariatim per pana disposihs notatum. Scmina in fo\eo hb iinlulanlia irrc-S^iarlter tctragono-prismatica otra, sulrls profunde longitudinahbus 4^{ru} gisque trans\cr<ahbus rlganier ribculpata.

^h *T. IEROMiAkFORMK Turnnn mss in Blanche!, Coll pi no 28MI » Ilora (B- Z) XX\ II I JO V ' (*TLscti* in Bahiae paludibus d llhabira

3052 **WULFENIA** Jcq.

(f P«R no)

4 W ORIENTALIS HO.M Ilagno^ plant nov orient M 75 - f.labfir.nn Toll *carthagineo-coriaceis* oblonico-ppalhulalif, in pftiolum brf^cm ntlcnunhs q)lusc

crenalo-lobalis, creois ileram obsolete crenulalis obtusissimis; scapo nudo folia superante; florib.....; spica fructifera laxa; bracteis oblongo-lanceolatjs acotis; pedicelhs birtellis bracteam superanlib., calyce sabdoplo longionb.; colycis glabri laciniis anguste lanceolalo-lieoanb.; capsula oblonga calycis longiludine. % — Folia cam petiolo 8-9 poll, longa, 2 poll. lala. Spica fructifera 4-5-pollicans, pedicelli 4-5 lieoas longi. Foliorom forma *W. Carinliacac* valde affirm, sed in bac folia teneriora minus cartilaginea, subtus ad nenrum medium lonato-hirlella, pedicelli calyce mullo breviores, alia discrimina in planta florenle quam non vidi quaerenda sunll! — Crescit in rupibus ad Seleuciam*

3084. GYHWVDBA *Pali*

(Cf. pag. 371.)

G. ARMENA Boiss. Diagnoi. plant, nor. orient IV. 75. — Glaberrima: foil, omnib. radicalib. inlegerrlmis cartilagineis ellipticis, otrinq. attenuatis oblusiusculis, in peliolum brevem complanatum subcanaliculatam abeuntib.; scapo nudo folls brevior; spica ovata; bracteis oblongis acutiusculis corollam aequautib.; calyce spaihaceo usque ad basin flsso, ad tertiam partem usque in denies triangulares glabros obtasiusculos diviso, corolla plus dimidlo breviori; corollac labusaequ-longis, superior! integro cucullato rotundato, inferiori in 3 lobos uvato-rolundos profunde fisso; antberis filameolo els duplo longiori suffultis. 2|. — Folia cam petiolo 1¹/₂, pollices longa, 4-5 lin. lata, scapos can spica scsquipollicaris, calyi l'A lincai, corolla fere 4 lineas longa. Collom radice fibris stipaiuro. Species ab omnibos nolis cbaracteribus datis bene distinct*, propter patriam valde occideoulem in genera *Sibirico* ei *Awuriam** noUibilit. — Crescil in montibus Armenia* circa Bneroam.

0. G. STOLOianiA C locb, Uwiaea XXVII. SML - Foil, radicalib. peUolatis oblongis remote desrtatis; spiels plvrib. radieaJlb. breriter pedaocolatii folia sob-aequantib., partim steillb.; slolonlb. decombeniib. foliis sqoamaeformib. oblusis obsiis. 4 — Crescil in Iraetabns Somcbeliae Bambaki el Schuragel.

4010. ODONTITE9 *Hall.*

(Cf. pag. 307.)

14. (1a.) C. AUChERi Boiss. Diagnos. pi. DOT. or. IV. 74. — Annu, tola pilis ad-pressis scabns brerib. namerosis e tuberculo orlis aspera: caulib. parce oppoail* ramosis, retrorsnm asperis; foil, lineanb. fleiuosis arutiusculis; florib. In tsilH* tuperionb. opposilis, pedicello calyce tnplo broiori suffultis late ipicatis; foil floralib. calyces aequanlib. soperanlibusve; calycis asperi campaoulaU denUb. lanceolatis lobum aequantib.; corollae nibrae labo non etterto, limbi birteUi panl labiis aeqaileogis, sopetioii rotundato, infenoris lobis sobreiusls; antberis iaieiail omb. glabris sabroUndis amticis; capsula compretsa oblonga apiee WM&** calycem aeqaale. 0 - CaolU lorlfer 3-d pollices longns, fructifer fere p#dali<> folia 5-8 lineas longa, lineam dimidiam |aUt calyces i lineas longi, corolla aa O. ~~cornae~~ minor. Ab omnibos speciebus nibrifloris generis indumento aspero >>•• ~~theris~~qsje glabris et motlcis disllaela. — Crescil in Olympo Armeniae.
15. (3a.) O. a t a S I U C. Kocli, Linnaea XVII. 9B0. - Caule simpliciter ~~***~~ spicalo, pilis crispuhs obleelo; foil, cadacissimis; calyce obloogo 9-coslalo ~~sub-~~ glabro, dealib. laocoelalis; captola sobaequali; corolla eitus Tii puberula; ~~***~~ mloib. Inclasis; ailberii atUce villosis; semiaib. oblongis albo-coaUtut- O^T " Ab O. *Uu%* reedll antbtrit villotis, ab afBoi *O. tfmtfoli** recedil mloori ramo- ~~***~~ (!!) follis miaoj cadoeis, laleraodiis distaoioribos, calycibos ~~1000~~ i ~~7~~ 0 0 ~~ti~~ MUi(M) ftitotit, daaUbvj •bloaia el corolla hirsola. - Crescit in ~~Armenia~~ ~~—~~ tpeciee liacUdtsjier *imthpu*.

Ordo CUT. OROBANCHEAE L. C. Rich.

[L. C. Pich. in Pers. Enchirid. II. 130. — Endlich. Gener. plantar. p. 726. — Meisn. Gen. plantar. vascular. T. 314 II. 224. — OROBANCHES genera AIA^KHTH auctore Fr. 0 a. Wnllroth (Francof. ad Moen 1825. 8vo i — G. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 627. (ex parte.];

4182. EPIPHEJL8 Nutt.

(Null. Geogr. plaut. Americ. II. 6a - Meito. Geogr. plant. vtsul. I. 314. 11. 225. - look. Flor. Bor. Americ. II. 03.)

1. B. AMERICANA Nutt 1. c. — Hook. I. o. — Endlich. Iconograph. gener. L 80. — Rarii carnosa *Juglandit* magnitudie, undique fibrillata, perennii. Scapus ex ipa radice ramosissimus torulatus nodosus angulatus apophyllus, demum lignescens, rami simplices t. divisi e squama ovalo-oblonga prodehant angulose glaberrimi, superne pedicellique pubescentissimi adaperal, sordidiflori distaliter, finetirerf eloDgali sesquipedales, inflorescentiam ramose-fligatam constituent**. Braeiae toliuriae aquamis conformea, leni in minorei brevissimae oblongae enervis fuaecacinea glabrae, margine parce bibrillo. Calyx monophyllus urceolatus breviter 5-dentatus. Flores polygami brevissime pedicellati alleni aolilalii flavi, superiores masculi ringentes quadrifidi in labium inferius planum divisi, inferiores foeminei omnes fertiles* obsolete 4-fidos mentientes* apice cito arcte conniventis fere conferruminati et capsulae, donec *ne* debiliant, calyptrae mamillariae, aplice clausae insinuatissimae eoque stigma coarctatae. Capsula obovata, basi a calyce cincla 1-oculari polyperma. - *Orobanchae eae ramose, floribus distantibus* Clayt. to Groov. Virgin. ! «. — *Orobanchae wUmor Virgin**** tigmotior* JMT Mmm etmUm (loribus minuHs onmU Moris. Oic*. Hlalor. Seet VL 1.16. Og. a. *V***muk* (JlyteMdU Wallrth. Qeae. Orob. *uun\$<4 m) Hrmimim* UML 8p«e. plsmur. ML - *Uptmmium* t at *Ammi** mM*V. IMIB. IBM. - GM«dl parasitica In *F*gor%om* radicebus In Vlrgetia. *^ \ „• , . . .

4183. PHEUPABA 4 Dtfmi.)*

(Dfont Flor. Allan!. II. 60. — Meian. Genet. plant vateal. tM4.11.ttl. - O.Doo, General syit of gard. and hot IV. 081.)

feotto L TRIOHTOB10M Wallreth, fiener. Ortn. *Staeutuj* pnf. M. - 0. A. May. M I. In Ledeb. Her. Altaie. II. 4M.

Calyci 4-5-fidui, lobis elongatis inaequalibus aevminalla. Aninerte auperficie glabrae, locolla tilloso-dehiscens. Capsula alyll deidoi baai coronata.

1. PH. LAMUGINOSA C A. Mey. mat. in Ldb. Icon. Dor. Ret*. AIUlc illustr. L 317. et Pier. Alule. II. em f — C A. Meyer, Vrtchoa. der Plain, am Caucas. 101. — Albo-lanaU: aqoemls floralib. evaio-lanceolala calycem necdenlib^ calycia lobis lanceolala eubaeqaallb.; corollae fauce aubloJaU^ labio aapereiore paullo longiore» lobla labil lofarlorft aobeeqnalib. oUlpllolt obiusis eabdeniiculaaiiei Hammentis aniberiaq. glabrit) aiyo Rlanduloao, aligmale bilobo. % — Scapus simpliciaimus 4-10-pohiearis. — Species Intermedia quasi inter *Ph. Eoeruiemm* et *canoiam*, ab illa differt lanugine alba, squamis floralibus calyce longioribus in apice scapi subcomosis, labio corollae superiore paullo brevioris, lobis obsoletius denticulatis, ab hac dignoscitur corolla in fauce multo minus ampliata, intoa

*) *Barleae* If mat nee binde %tt ail SI. Endticker ft rum e* Mitner. si forU iccipif* tperies nomnuUas minus *olaa*.

- hirtella non lineis 2 villosis exarala, antheris dehiscentibus glabria neo margine lanuginosis. — *Orobanche caule simplicissimo, supra florifero* Gmelin. Flor. Sibiric. III. 214. no. 28. I. 40. fig. 1. — *Orobanche caesia* Rchb. Plant. critic t. 008. — Creacit in herbidia Allaicis ad fl. Talitza et Calunja prope Barnaul. (Cf p. 401. no. 14.)
2. *H. MACRANTHA C. Koch, Linnaea XVII. 200. - Scapo glabro squamis patentib. obsito; bracteia orato-oblongis calycem quadrifidum aequanlib., corolla recta tubulosa pubescentia triplo breviorib., labio superiori bilobo, intus glabro, inferiori aequaliter trilobo, intus praecipue inter lacinias laterales et mediana piloso; staminib. corollae basi insertis, *ii dimidiam partem superantib., antheris margine pilosis; stylo bicapitulo (UI) glabro. — Crescit in Armenia. — Specie male descripta!
3. PH. (OROHANGHB VII, Delphin. II. 400. - Rchb. Plant. critic VII. t. 028. - Engl. bot t 423. — Rchb. Fl. Germ, excurs. 350. no. 9428. — Koch, Synops. flor. Germ, [edit 1.] 538. — Alb. Dietr. Flor. Boraasic III. t 150.) COEBULEA C. A. Meyer, Vnchns. der Pflanz. am Caucas. 101 — G. Don I. c. 032. no. 3. fig. 02. — Scapo simplici; calyce monosepalo calycem dentato, denub. lanceolatis acutis; corolla tubulosa antrorsum contracta, tubo medio angustato, laciniis labiorum acutis plantis; antheris glabris T. basi paulo pubescentibus. 3} — Scapus simplicissimus reclusus subcarnosus glabrosus, squamis remotis orato-oblongis fuscis insurrectis pedalis et altior porpurascens. Spica oblonga 15-30-flora speciosa. Bracteae ternae, exterior ovalo-oblonga aequiformis, interiores lineares calycem aequantes. Corolla tubulosa, basi aequantior, fauce amplius lobata coerulea, laciniis (%) aequales ovalo-oblongae acutiusculae tri- v. triplicarviae. Stamina glabra Stylis aequans glandulosus, stigma capitulo affixum. — *Orobancha* /fore ototo at/en Matt* Otta* Janar. anu 12. L 10. fig. 2. — *Orobancha* «••• atari* Qua. Halt?. I. fl. — CW% (a) — raw PallTt — O. p. r. i. r. a Jcq. Flor. Aostriac t 9MI — O. *pmrpwrmetm* Gmel. 8yaL 954. — *O. lawis* Lam. Fl. Franc II. 337. — Sebibr. Hdbch. 901 L 170. — Crescit in Koropae mediae et australis agris parasitice in radicibus *Cannabae sativae*, *Melianarum*, *Solani* *littorati*, *Ztae Maydu*, *Viriae* et *Chrysanthemum eumopifolii*.
- fl. Millefolii* Rchb. Plant. critic. VIII. fig. 1055. et 1050. - Humilior: corolla molliori pubescentia ciliata opaca lavandulacea aut coerulea, lobis tubuloso-rhombris cumminatis, calyce breviori. - Crescit in radicibus *Aekolmi* *Millefolii* pluribus locis per Germaniam dispersis.
- r. *cihwii* Griaeb. Bpicleg. flor. Rnmel. II. 59. - Coalescens simplex: calycis 5-(4)-fidus; corollae violaceae supra faucem contractae tubo sensim arcuato-paleari, limbo lobis ovatis acutis deinde glanduloso-ciliatis; antherarum raris marginae lanato-ciliatis; stigmae pallide amethystino. — Crescit in radicebus. . . . T la peiasola Bajloa Ores,
4. PH. (OROBANCHE Pert. Eacalrid. II. 181. - Tmir. Act nat car. Berolla. 1882. It 154 1.1 Ig. ia - Willfta. Gaer. Orob. *itmmutvi* O. t - KOPSU *Demort.*) LOHGIFLORA C. A. Hey. Vneas* der Plata, an Cauc. 104. - fteapo *limp-* eiateala parat raiottq. aqaaioto; bracteis ovatis calycem aequanlib.) *calycis* artealati daaUb. faoqaalib. laearlb^ corollae labo pomelo subiafuadballfofaV^ flacado ia limbaai pat#alimiatitai tiaapiiato, labiis otoua reiraieisi tuari**1 baal laleraa blndllt; aalbfrta fillotia. ^ - Scapus spibaaMea at alira **." [4]alalaealaa blrtalaa. Sqaaue rraiaue bretet, braieat otatae earjraai aw- ~~sequentes~~, laiertorta adicHla acaftal eta«no afftae liaares aeaiaaaua earf** ~~tebam sequaiaa~~. Calyi BBoaabyllaa po»Uce sina*io-deltas, fore arfflay dtaie« « Haaarat atqaalat. OraHa praewr batta pro captala circaKlatiaBa^ ratuaduai aabiafaadibaWfonai-iabaloM laceida, ia limbum pairntistlaiaai ~~aa^liau~~, titas laiaaajat braatlaacala pallide cotraletrcas. lanoiae Ubloraai ~~pro-~~ ^{AKUV A^{alM}} »*rBtft«qae birtaU. Aatberae matiaue albaies brctiler ~~mucronatis~~ ~~rum vite dehiscentis~~. — la agro Asiracbaaic# ~~provenit~~.

5. *PH. RUFESCENS* Griseb. Spicileg. Dor. Rumel. II. 50. f — Rufescens ramosa: calyce quadrifido, laciniis lanceolato-acuminatis; corollae homochroae parum cordatae; lobis calycis lubum sabaquanlea, bracteolae lineares. Calyx ad medium fere 4-fidus, laciniis inaequalibus, binae flavae. Corolla rufescens v. subinde violacea semipollicaris, limbo brevi glanduloso-ciliolato. Filamina suprabasilaria glabra. Stigma bilamellatum cerinum. — Crescit in radicibus *Pianiginit Lagopodos* in Thraciae litore.
6. *PR.* (*OROBANCHE Viviani*, Plant Aegypt. decad. 22.) *PEDUNCULATA* Wipw. mss. — Caule a basi diviso flexuoso angulato aequantissimo; floribus laxe racemosis; pedunculis bracteis suppositis duplo operantibus; bracteis calycinis duabus lineari-seicatis; corolla calycem monophyllum quadrifidum quadruplo superante; filamentis gemineque applanatis glabris. — Crataei deaertis Kabiridis.
7. *PH.* (*OROBANCHE* Linn. Spec. plant 868. — Thunberg. Prodr. flor. Capens. 07. — Rehb. Plant. crilic VII. fig. 033. 094. — Ball. Herb. L. 800. — Bagl. bot. L. 181. — Wallröh. Gener. Orob. *baextt*[^] 63. t — ... tier. Germ. exew. Mb. no. 2130. — Koch, Synops. 0. Germ. [edil. 1.] M0. — Alb. Dietr. flor. Bortsele. IT. t. 80.) *RAMOSA* C. A. Meyer, Verzeichn. der Pflanz. am Cap. 10C. — Scapo ramoso parce squamoso; floribus alternis in spicam acutata laxe dilapallia; calycis monophylli subrecolati quadrifidi dentibus ovatis acumioatis aequalibus; corollae infundibuliformi-lubulosae labio superiore ascendente, inferioris lobis aequalibus oblongis rotundatis; filamentis puberulis styloque tenuiter glanduloso incloais; stigmate recto. Q — Scapus interdum a basi, frequentius tamen e media parte ramo basi rarissimoque simplex, inferne sensim humidolus glaber, superne hirsutifloriflorescens, digitalis Y. pedalis, ramuli conformes hirsutiores, loienmedio breviores. Spicae virgatae. Bractea exterior otala aenuvteala fuaca, calycem subaquant, interiora lineata aequalia. Calyx tenalier mottbranacena violata P<Mto mlMtf'donia oblongo-lanceolata aequali capax, ptaolar potii-cnni afaioram anbaeqalao. Corolla praeterea baal« pio tapstla tlrossa Moadaai roiaudaum lobtllota, aenslai la Ca«am ampilau nArlatta, tofomo ia?aooo»a, aplao cyaneo-purpurascens v. coerulea, laMm aopartaa M M n aagl BlaaaYo rotundatum integrum, inferiora aobaequalliar ttttdnm, ad palaiui ia?taootU blrtnta. Stamina basi hirtella. Stylus glabrulose. SufBa albdm capHatonL Capsula otalo-subrotunda. — *Orobanchae ItrUm* polydioiia Ona. Hist. 1.271. - Moris. Oxon. Hist. III. 902. sect. 12. L. 10. Bg. 8. - Cbabr. Stirp. 207. 6g. 3. - Gueiurd, Mem. 1746. L. 0. - *Orobanchae intrrupla* Pen. Bnehlrid. II. 181. - (ex Cham, el Schleich. Linnaea III. 130.) — Ad radices GMM*»«6# per loUm Baropam el Sibiriam ei in Promonorio bonae spei in agris humldlvtealls eresell
- & *PH.* (*OROBANCHE* Dene. Ann. sc. nator. [2.8er.] IV. 201.) *DBLILBI* Wipr. mts. — Simplex •• aequali ramosa: ramulis angulatis pubescentibus; squamis eanlioi laneolatis aeaila semipollicaribus, floralibus brevioribus; apleto ramulis lerninaoiibus laxifloris; floribus seaaillibus; calycis eupuiformis denibus lanceolato-seuoeia, corolla polleari extrorsum puberula, tsoce dilata, interiorum pubescentibus; sUminibus. Infra medium inbinaerila; filamentis glabris; stylo glabro, fandi aequali. Q — Planu fosca 8-12-pollicaris, floret aiurel duple majores quam *Ph. ramo\$ae*. Calyx subcampanulato-copuliformis, flores sessiles. — *Orobanchae ramot** Delile Flor. do PEG) pie (nee Linn.) - Crescit parasitice in radicibus *Cucurbitum Jlvlo-nil et Broitiarum* in horlin prope urbem Cahiram in Aegypto.
8. *PU.* (*OROBANCHE* Borkhausen in Rocm. Meues Magai. ao. 1704. p. 6. — Rehb. Fl. Germ. excurs. 380. no. 21«., Plant. critic. VII. fig. Ott. 030. 031. — Koch I. c. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. IX. 1. 570.) *ARENARIA* Wipr. «. ms% - Srapo simpli

calyce monoepalo quinquedentato, denlib. subulalis; corolla tubulosa subrecta, tubo medio angustato, fauce subinflata, laciniis labiorum obtusis, margine reflexis; antberarum aotora lanato-pilosa. % — Scapus basi leviter incrassatus erectus simplicissimus dorsalis T. pedalis birsalis albus diuive coerulescens, deum fuscus. Squamae ovatae. Spica comoia spilbamaea 15-30-flora. Bractea ternae, exterior ovato-oblonga, laeralia lineares aculae breviores. Calyx plerumque 4-, rarius 3- T. 5-6dus, dentes lineares aculi aequales praeter quinum breviores, corollae strictranas superantes. Corolla infra basin pro capsula circumcludenda rotunda diluorem et ei slatioibus constrictam, allenuaia subinrundibuliformis, in fancem palentem ampliata dilute coerulescens, dcmum rubigiosa birtella, labium auperias profunde emarginalum parceque crenulatum, ioferioris lobi ovato-rotandi aabaoqales oblosi, inlos ad limbum birtelli, ad palatum longitodimher albo-tillioal. Antherae cum villo sluposo dehiscentes. Stigma bifidum aoranllacum. Capsule ovata. — *Orckit aborlira* Lejss. — *Orobach* Jaefc Bbrb. msa. — *Orobanchae* [Pk dypaea G. Don l. c) *comos* Wallrh. Scbedal crilie. l. 314. el Gener. Orob. *Stant'ij* 59. f — Crescii ad radices *6 tinislai tinetoriae* el *ArtemiH e*mp\$stri\$* in Gallia el Geroiania.

10. PH. (OROBAXCHE Alb. Dielr. Flor. Borassle. III. t 151. t, Flor. Harrhic. 338.) ROB 1ST A Alb. Dielr. mss. — Villotola: seep A rasso ramosissimo; vpicis denifloris; brarleis lernis calycis lonirjldne; ralycls quinquifidi lannia quinta minima; corollae tubulosae labio superiori bilobo, lobulis rillois, lalni Inferions reflexi laciniis aequalib. tix crenulalii; filamenlii ghhcrrimis, anlberla villosa cinctii; stylo gUberrimo, stigmale bilobuloto atramineo. 4 - Scapoa bipedalia v. alUor slrtetlulmoa e baal (pollieem fere diametro lenenie) ramosu* linde TI- I rets glab«r» tofrt tpeae ptret ?m«Mt. Bejmflim ovaies obiusae pollicares, semlpeNeefli lalee, ••••film tftlapes aenmlnaUe. Spicae O-poliirares vet longiorea. BraeteM temte teeeelalt-ltoeare*, laiermedia longion. Cnijrls la-eJajot (esepta postica) Unearl-laneeolatae acomInaiiitimar. Corolla pollicarla, Inbvt lajeorvM, ad faneem loins bre?iter villosus. Stigma pallidissitnc lulpburenal globoloso-bilobam. — Habitus *Pk. rimotte*, flores *Ph. eoerulw*, ab utraque fff* lura insignis. — Cresfil la radicebos *Arttmiria* camprtrU* in collibus ~~arenos~~ aprtrif (hrf ^aamqartcaMif lister 9rtl>am).

11. PH. OROBA>CIIR Bib. Flor. Indie. III. 27/ I.NDICA G. Don l. c. 63*. ••• 4 — Ramo^a pilo%a: <rapo ad ramificatinnes lanlummodo squama inlruetei ~~calyce~~ subunilaterali .^-fi<W; «pira dea«a elavata; mrollar tubulotae labio ~~superiore~~ bilobo, Infrriori triMibo; antberis lanalis bifidit, oculit ralaralis; •lamente ~~gla-~~ brit; ttigmate bilobo. 3> - Prope accedit ad *Pk. romotam* sed recedit ~~erg~~ ^ duplo majonbu* (eoerukit). - Crescit In India oncteli el Nepalla In raaiabBf

12. PH. OBOBAJOIF. Fr. W. Scbolli, Flora [B. I.] XXVI. W. « ^ f f 2 K D M. - Calyre monotepalo qolftquedeatelo, denlib. e lala ba»i laneaalBW ••••* eorolla falyeem ihpla eicedeate tobiJosa •nbboHiooiallier pateote aabarcoai , tat* sepra o?ahom eoareuio, loae aajpliao, faoee ample, laelalis lablomv OTS* tit, laMI Mptri»rts approilmails, Ubli laferforis dlsienlib ; siaminlb. »••• "T dioai MM latertla giabHt, ^f - Fiaau pnlrblma porpareo-eotf*! " ^ " TT. ~~modo~~ *Pk. (t)reà«Ma>* *Simlm* H Pk. (Orobanchae) Sekmtaii tomfT*—*. " w radicebus *P99rmUm\$ bitnmt**— ad Tripoliim creseil.

13. PH. PILCHEUA C A. Mayer la Eirbtld. Plant aof. Caspic Cneaf. H* t ~~l. 12~~ - Alba-laaau: aejwaila aaaBorallb. ovalis aealis ealycesa sabaeaj«aalIK» ~~labio~~ talyeia Haeart-tafcatallJe a«baae»allb.; aoraHaa favre aobialaia, lablis ^{9aB} ~~gla-~~ loagts. l' bit lebil laftrlefe enberbkalaila dealletilalis atqoallb ; *~~***~~ ~~gr~~ ~~3-4~~ brft, aaiaerlt aiyloej. pMaan; aUfajala bilobo. %1 - Scapil ¹ ^ ^ ~~deno~~ pollicaret, baal —m IsjaraaeaU, aaa ita aajMmls, ealyelhns H ~~deno~~ albo-Uaeil. ~~eejas~~ *Ma f * U* ataila aavlla ditUMibat obtMi. Flerea ~~8-10~~ ~~spicall~~ Braelee (erajae?) Ua#are« M M ! U (M ealyeam fere aejaaaiea. Cay ~~7~~ U. -- Mi laetelee Ne)eeH-eai«Uie« e«baeq«alaa. C^olla aalataie tie4aeec-c*tr«l»c«¹¹

- 10 lin. longa subineurva, e bail cylindrica in faorem tensim ampliata, exius dense albo-lanata, inlus parce pilosa, lacnulis otrlunque labli fimbrialo-dentatis. Filamenia glabra. Anlberae margine lanalae. Stylos albo-pllosua. Stigma eublbobom flavum obliquum. - Crescft in radicibus.....TJn Imerelia.
14. PH. (OROBANCHE Rchb. Plant, critic. VII. fig. 036. — Buxb. Ceotor. 111. I. 1. fig. 51) CAESIA Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 50. — Coeraleacens simplei: calyce quadriQdo, laciniis subalati; corollae violaceae tapra fndom arete consirictae lubo erecto-palente, versus apicem arcuato, limbi lobls ovato-fubrolundis v. o>alo-oblongis oblusis; anihemis glabm; sligmate pallide amethbystino transverse nulcato. q - In radicibus *Erodii cicutarii* in pascuis montis Tschalai-Septprope Enos el in insula Chalkt crescit.
15. PH. (OROBANCHE Viviani, Flora Lybic. M. L 15. fig. 2.j COMPACTA G. Don I.e.632. oo.0. — Scapo simplici fquamoso-imbricato, a basi ipsa florifero; spica ovaia muhiflora, tqumis Ooralib. floret dlnidios aequantib.; calycib. quadnfidis aegmentis ovatis obtusis, Inierdum truocatis, corolla iriplo breviohb.; corolla incumra versus faucem lofandibQtiforol-aaipllaia, laclois labii superioris o>aiu aeatia, Inferiorls rotondatla ondolatlt sobaequalib.t atanlaib. tobun corollium aoqoantib. glabrls, aolherla pllosa; stiganate capiUlo-tnucato. % — Crescit in radlcibua.....T In magna Syrt*
16. PH. (OROBANCHE Nutt. Gentr. pi. Amarle. II. tt. — Hook. Flor. ior. *Ammie* II. 02.) LVDOVICIANA Wpra. n>M. - P<b<MtnU-glia4ttloaa: catJa brtvl almplici v. subramoso; spica olongala densiflora; calyoa InaeqoalUtr profunde quioquefldo bibrncieio, laciois lioearib.; corollae Inlus ailutq. pubescenlit tubo elongalo rurvalo, labiis subaequalib., superiori biOdo, inferiore trifldo, I obit acutiusculus; blanuinb. inclutis. ^ — Calyx saepe sexfidus observatur, labium corollae Huporufl naepe integrum. — Crescit in America boreali (New Caledonia, Saakatcha<ju, Rocky mountains).
- feotlt U. 0I8TAICO Uk. el iffmiafaV " «• rtrtif. I. Sit. t IS.
- Calyx semlquioquefldus, lobis aequalibna obtnala. Anlberae undiqoe lanatae. Gapanla atylo peralaleate demon longitudinalalltor aeeajdenit umlnau. Scapua slm-
pIU^? ? <Wt ~ (B*****TM* Wallrib. Gener. Ortb. *tmnm** f. *. ted. IT.)
17. *VtftMk* C.A. Mejet^TtneJeba.* \$k Hnja. *Of Cm***. [M. * i*s;j>1HM: acjvamlt foraiA. taneoolaUs obtutia, ealjee lenflefft.rei^fW, lasl lattela Mq#-riorl (? posteriori) linear!, loierlorl (? aaUlori) apalkatforml q—eWf tata, dentib. obtuala; corollae (violaceae) rectloteolae tibuloto^eampannUUe laelnlis patentib. sobaequalib. semlorblculails; llamenila baal barbatia, aalberla aplee eonnectilvo producto mucroolatis; atylo gtaberrimo, itlgmate indlfUo. % — In radlcibnt.....? in Caucaso crescit
18. PH. FLAVA C. A. Me)<r I. c. - Glaberrima: tqumis Uneari-lanoaoUtU, florallb. corolla multo longiorib.; calycia tubnloal lobls rotuadatis; earollae flavae teenrtae inbulao - campanulatae lobis pateotib anbaequallb. ovalAa; filamentii bail pvbeacentib., antheria apice connectlvo producto mncroanlatls) stylo glaber-rimo, aUgnute aubretnao. ^ — Crescit in radicibna.....T in Caucaso.
- It PH. aULsU C A, Meyer In Ledeb. leon. flor. Rotate. Alula. Illnatr. t IM. -. Ledeb. Flor. AUie. II. «U. f - Soblaaata: aqoaais floralib. ovato-tanceoUili calyce longiorib.; braeUla anblnearib.; carycis ladolis aemiorbleulaila aequalib. ; eoroHae rectinsculae tobuloso-campanulatae loblt aabaoqnalib. Mmiorbieulatis patentib.; filameniis basi barbatis; antherii mnticis; stylo glabro; stigmatate emarginato. % - Planla ei observatiombus non paratitica semipedalis v. p<d<i7 Scapus erectus crassiiie digiti minoru, basin venos tuberoso-Inrrastalut squamae florale» c bam dilatala ovaio-lanceolatae obtoaiusculae, dorio albo-tanatae calyce fere mqulonglores, corolla duplo brr\ tores. Bractrae hneares v. aogu<ir oblongae Hhplicaeve obiutae, calycem aequames, lanuginoMe lanatu-nliatar Calyrts tcniiquinqueadi lacinae scmiorbiculaiae obtu<issimae marginr >cario>ar

alba lanugine ciliatae. Corolla odorem *Violarum* spargens speciosa 1-1' A poll, longa, eilus glaberrima, tubo albido, limbo amoene violaceo, labio superiore paullo brevior biOdo, Inferiore IriOdo, lobis sobaequalibus palcnlibus rotundalia crenulatis ciliolalis. Filamenta basi dense lanala, antherae dense albo-lanuginosae., inaequaliter bimucronalae. Sligma leviter bilobum fuscenscens. Capsula magna ovata. — *Anblatum Totaricum* Fiscb. mss. — Crescil in locis argilloso-salsis deserti Soongarico-Kirghisici irans O. Kurtschum.

2a PH. Tr'BULOSA Schenk, Plant, spec. Aeg. Arab. 23. f — Scapo caroso sulcato uni-tripedali; sqamis late lanceolalis oblois; bracteis ternis lanceolatis elongalis; calycis laciniis oblongis obtusis; corollae Inbo curvato calyce duplo longiori • filamentis pilis sparsis obellia; stlgmale corollam superante. q. — Scapus pollicis crassitie cylindrieos aolaaiaa aqnamalos. Bractea lernae, doabus lateralibus fere dnplo brevioribus, media maxima calycem superante, omnibus lanceolatis aeotie canoala, margine laceris. Corollae tobos calyce duplo longior areoaiio-iofandlbnlfbnrls, lacinae labil aoperloris el inferioris laterales rotundatae, intermedia paullo breviori actinscna. Filamenta exseru sparse pilosa. Aniberae cordato-sagillatae mnticae villosa-lanuginosae. Stigma bilobum glabram. — Crescil in radicibus.T Inter Sues el Tor in Arabia pelraea.

21. PH. (CYSTANCHE Lnk. et Hffmnsagg. Flor. Poring. I. 310. t 03.) LITE A Dsfonl. Fl. AllanL II. 00. f I MO. — Scapo simplicissimo soicato caroso; bracteis ternis subaequalib., exteriorib. oralo-oblongis, Inieriorib. ooinerviis; corolla e basi angostata arena to-tubolosa in fancem ampliala quinquefida speciosa, lobis ovato-rotundaiis aeqnalib. palentib.; sUmlnb. glaberrimis, antberis maxlmis obsolete mncronalis; sligmale eapitalo emarginato. % — Scapus glaberrimas (ot lota planta) lotcseens. Bractea lernae, exterior semlamplexJeanlls ovaio-oblonga, corolla doplo ftrevftar, neqt* «aoa4er, Interferes ovalae vnlneirlae con formes, calyce brevier**. CaJfata denies ft e*oie»-i«lamiaU cfelael aequales, corollae lubo mnllo bretlore*. Cawlla medloia—a arasjala-Infrnlosa, Interne sensim angu»tata, sopen* amplleta, lacinae ovaio-rolondataa aequales palenies. SUMina valida glaberrima, aniberae lanalo-villosaa. Sligma crassom emarginalnm cernoom. — *Orobanck* HmHori** Forsk. Aeg. Arab. IIS. — Wallrlh. Gener. Orob. 3ta*M9* 70. f — Crescit in Barbaria, Arabia et in Aegypto.

22. PH. (OROBANCHB Wallrlh. Gener. Orob. *Stackt-jij 10.* — CYSTANCHE Lnk. * Hffmnsagg. Flor. Porlog. I. 80.) VIOLACEA Dsfool Flor. AtlanL II. 00. L 144. — Srapo simplici carnevo; bracteis ternatis; calycib. qoioqoeartitis; corollit ~~cyllidricis~~ arcoatis. ^ - Squamae laeolatae obiu^ae nmcrosae sparsae, sploa ~~enica~~, corollae violaceae limbns irregnlaris, lobi rotundaii, sligma crassom b l k f r ^ plicae fancis lolae. — 'Atftwov Tbeopbr. Bislur. VIII. 8. - *OrqbmK\$ Phay* f a#« Willd. Spec plaoUr. III. 398. — Crescil in deserto Barbariae.

23. PH. (OBOBARCHI WiUd. §>#€ pi UL 3M. [eicl. syo, Forsk. VaU at ~~Dahut.~~]) TI5CTORU Wlprt. mat. - Scapo atenllclsslmo, sqamis ~~semiamplianob.~~ oblongis erosio-crenolatis mtalto; âvaeieâi lernls, exteriorib. conformlb. oblongis bravlatib.; calyee campannalo Inaeqoalilar obtnseq. qolnqoeOdo; coftIU • ~~Q*^~~, Mblnlba^lbtJlforml venricosa InlaU qnlaqoeftda, labiorom lobis aaf*»»^ r # ^ mndatla seeMI lacymbMtibos. % - Scapns basi leviter iocrassaUaf ~~carosus~~ esquipedalls. Fleram splca avala lf-It-lora. Bradcae lernae, ~~interiores duplo~~ angostiores breviores oMosae. Calyx ad medium qulaqorfdos, ~~dentes ovali ob-~~tasi, corolla molto brevlatla. Corolla a basi angotuu ~~subinfundibulliformi in-~~ ~~lato-tubulosa lula mcaaa S-Wla, labio superiori profunda bildo, inferiori or-~~ q««lller irUobo. - *l*f»p««i Lntilmmif f*r* Imtoo Tooraef. Corolt 4 1., - ~~Oro-~~ *•«»# (Uikr— Uaa. Spt«. pUnL 844. (excl. tar. fi.) ~~Pkt ypara Wrti~~ Gener. Orob. ~~«><a*Mtvi~~ » • - *CtmtH* la Usliaaia.

M. PH. tOftOBANCHB Kdgvrlb. to ftoek. t—n. of boi. II. ~~ms.~~ CALOTROPIDIS Wlprs.msa. - Sflea eonrenitara; scapo gUbro spongioto, tucci ~~aqueose alao;~~ bracua lemia naiflorU, Infriore majwe, âitce acominau, dem«n. ~~«»~~ alib. cenic, calycem fuptranit caraasa porparascenie. svpra tolva, dnabus wTMalib.

clipticis canaliculate, laierib. versus basin pilis carno»is ciliais glabris, calyce breviorib.; calyce quinquefldo, segreantla obtusis glabris; corolla ringenie, lubo calyce subduplo longiore curvato, limbo bilabialo, labio soperiori biOdo minore suberccto, segmentis rolundis emarginatis purpureis, inferiorc paiulo irifido, segmenlis rotundis emarginatis purporascentib., inlas flatls, fauce tallcculis duabu* luleis iostrucia; siaminib. 4 didynamis, inferiorib. longlorib. glaberrimis, juniorib. in anlberium lineare antheras superans productia qaod poslea marcescens ad antberam affiogilur, anlheris bilobis cordalis, pilis albis praeaeiriim ad basin marginesque saccarum hirtis, juniorib. bisce pilis arcle coalilfs post imprrgnaionem discedcnlib.; pollinc ovali; pislillo glaberrimo ad basin ovarii disco luieo circumdalo, ovario conico uniloculari placenia 4; slylo siaminib. longiore medio angoslaio curvalo, glandaloso slgmale apice clavaio. 2IT — Crescil in radicibus *Calotropidit UamiUonii* In „the Sich Stales".

85. PH. (OROBANCHE Cham, et Scblebtd. Linnaea 111. 134. f) CALIFORMCA G. Don, General syst. of gard. and boL IV. 038. no. 3. — Viscido-pubescens: scapo simplici; florib. corymbosia; calycib. bradealis campanulaais regulariler quinquefldia; corolla recu lobolooa riogente, Ubio snpero piano, apice bilobo, Infero Iriaecto, lacioils dissilla linearib. a e«Us; staminlb. ecalcaralis, aniberis sagitiaais rima Tillosis; silgmato orbicular! peluto. ^T — Tola brovilor •laeido-glandolosopobescens. Scapua trfpollccaria, sqnamao lanoaolaue icatae. Plorna podoaaulat, peduncull praeter sqaamam filetonieni braelala daaboa linear! -lanoeolatis Instructos Calyi dimidiam eorollaai aeqnaaa, laeinLM linearoa, btll dllauiae. Corolla pollice longlor tnbnoM, lablom anperios planom Teillironna biloban, lobis acolinscolis. Stamina non eiseria. — CrescIt In vicinia porlua 6U. Francisci In California.

80. PH. ARMENA C. Koch, Linnaea XVII. »1. - Simplicissima, inferne glabra, squamis carnosis coloralis otto-acuiis oblecla, supernc cum bractei oralanccolmis el bractcolis lincari-lanccolalis albo-lanaginoso: rilyce bracleis duplo, corolla triplobre^iore, lobis ovalo-aculis inaequaiib.; corolla recta sobaequiloba, Intna annulo lato albo-piloio notata ei quo stamina avadunl; aeninib. nudis. 4 - Species intafOeianler daacripta. — Crescil In planiUe ad Araiea aiu.

• Species non recte notae

81.fH.? SCIACAITLU lib. SeropbnL Indie, Wk — Ga^la brotlaalsiu iriim amamalna. P*dwc*ll t« eaole 3-5 sqanria brtflorit Mllsjri. Cnlfi 0-7 Ite. lon» gua tnbnoana, bul param Inflatus, aplesj terafriirilar 4-ft-aMlaisja. Corolla 8-9%-pollcarls, inbna basl tenui* e caiyee bratlir tuaftia, tfeln la laoesn amplam dllauina, llmbna brevlier el late snbllablatfa ajaloqaoMst. Stamina 4 glabra. Antberae glabrae, locnlls calcaraila. SUGma eapluiumT Capania. . . . ? - Crescil In Peninsula Indiae orientalls.

8B. PH. (OROBANCHB Pf». Encbir. II. 181.) AEGTPTUCA Wpra. mss. - M.JUeanlia: florib. longe pedonculaiis; calydb. qolnqooflds; Uamonlla glabria, anthorla aploa barbatis. % — Crescil in Aegypto.

ft *SpeeUi a gener* 9xpelbnda\$.*

PH. AB01BVIATA Blend. - ABGINBTIA ABBRBVIATA.

PH. IIPLO'sU Bpr. - ANOPLANTHCJ8 UNIPLORDB.

PH. BIEBBKBTEllin Fhcb. - ANOPLANTHUS BIEBER8TB1MI.

PH. COCCINBA Pert. - ANOPLANTHUB BIB1BB8TEINII.

PH. FASCICCUTA Spr. - ANOPLAKTHOB FASCICCLATUS.

PH. FOLIATA Lamb. - ANOPLANTHU9 BIBBER8TEINII.

PH. INDHU Spr. - AKGI^ETIA I>TH(U).

PH. TOURNEFORTII Dsr. - ANOPLA.MUtg TOIRNKFORTII.

t t t *Species prorsus incognita*.*

^PH. CARNOSA C. A. Mey.

•PH. (OKOBANCIK Mulet) SCHI LTZII Wlprs.

'PH. [OROBANCHE Spennt) SICUU Wlprs.

4184. CONOPHOL19 Wllrth.

(Wllrth. Gener. Orob. *tiaoxyji*) 78. - Meisn. Gener. plant, vascul. I. 314. II. 825.)
 1. C. (OROBANCHE Linn. Sopl. 88. - Willd. Spec. plant. III. 351.) AMERICANA
 Wllrth. L e t - Scapas simplicissimam teres coloratus succulentus spithamaeus,
 tolas undique squamis ovato-oblongis acuminatis enerviis adpressis sessilibus
 flavescentibus, demum squamam slobilorum abietiformum instar rigentibus im-
 bricatus. Spira oblonga acuminata bracteis cooperta, partem scapi squamosam
 subaequant. Bractee ternae, exterior exaele squamaeformis, sursum sensim mi-
 nor, interiores calyci adpressae lineares acuminatae, calycem subaequant. Flo-
 res subsessiles lobi coocolors fere cum reliquis partibus. 2j. — Crescit in Ca-
 rolina ad arboram fruticumque radices.

4185. OBOBANCHE Linn.

(Linn. Gener. plant, no. 770. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 314. II. 225. — Wllrth.
 Gener. plant. Orobanches *AIKZEYII* eicl. sect. 2. 3. 4. — G. Don, General sysL of
 gard. and boL IV. 028.)

§. 1. *Sepalis discretis v. in anterior* part* basi concretise posterior* Uberis.*

1. 0. CRIENTA Berlol. Plant. Hal. rarior. decad. 111.36 - Koch, Synops. n. Germ,
 (edit. 1.) 533. - Rclib. Fl. Germ, excurs. 354. no. 2413., Plant, critic. VIII. Fig. 800.
 — Sepalis plurinerviis subaequaliter bifidis tubum corollae superantib.; corolla
 campanulata, anlice basi strumoso-veolricosa, dorso arcuata, labiis inaequaliter
 denticulatis glanduloso-fimbriatis, superiori galeato inlegro v. euarginato, lobis
 patentib., laciniis labii inferioria subaequalib.; staminib. basi corollae insertis
 dense pilosis, soperne styloq. glanduloso-pubescentib.; disco stigmalis holosericeo
 elevato-marginato. 3} — Corolla campanulata ampla v. basi anlice strumoso-
 gibba, lobis saeque, siamini* lanam basi corollae insert*, stigma luteum margine
 fusco-purpureo cinctum et tota pilis copiosis brevibus glanduliferis tecta atque
 odore suaveolente dignoscitur. — *O. gracili** 8m. Transact, of the Linn. Soc. IV.
 171 — Rchb. Plant, critic. VIII. fig. 898. 800. — <). *caryophyllata* Vitjan. Ann.
 bot. I. 175. — *O. tularis* Gaud. Fl. Helv. IV. 170. <). *caryophyllacra* Schult,
 Beir. rur. Knnlss. der deutsch. Orob. 8. — Occit parasitice in radicibus *Loli*
corniculati et *itippocrrpidis* comitat in locis granmMS in Germanii aoslralv,
 Hehcijj el in Italia^

/? *leioslemon* Griseb. Spicileg. flor. Rumd II V> - Rufr<cens, basi subteqot"
 li<: bracteis corollae cruciatis tubum ^ul>ar>uaatib.; sepalis nertonis **subulatis**
 bifiditv; corollae tubo ad basin antire vnririoso, dorso arcuato, limbo pa-
 lente fUndolopo-cilitto; staminib. imae corollae insertis gUberimis, **auo**
 ima basi pilosis. — *O. osm<ieta* Griseb. Rise II. loU — Crescit parasitic* in
 radiribus *Thymi StrppUi* in ref ione sououoa Macedooiar.

*. U. VERSICOLOR F. W. Schollt, Flora (B. / XXVII. 120. - - Sepalis bi- v. ob-
 aolele plorioeniis, e basi oiaU lanceolato->ub<lalis inaequaliter bifidis **tubum**
 corollae superantib.; corolla labuloso-rampantolata a medin tubi leoslm **amplata**,
 faoce amplimlsm, dorso recta, labiis denirulails. superiori integro; **staminib.**
 infra medium tubi insertis a ba%a ultra medium lanuginoso-pilosis; stig<ili< **disco**
 laevi. 4 - Habitus *O. rrmemlme*, srd floret nullo minore<, corolla basi toboloM'
 Me venricosa, pallide flatescens et supra ovarium atrosanguinea. - **resc f * I**
 raoHlee in radtcibus *Ckrytmikemi eoronopifoiii* prope Maupham el **Corinil. n-**
 in Graeela.

1 O. SPRI^XRRi r. W. ftcbnIU I. c. 13a - ^rpah* pluHoenl.t e b*i< ¹¹jjlf!j
 anbrotonda laetolalo-acoainaUs mdm>i< <. b.Od.f, margioe denUto-
 corollae tobum vii aeqaaoUb.; corolla a ba>i amplissima campaouUI*
 basl stramoto-tMtricoM, dorso rurtiaa. labns loaequalurr deoicual" R'^{ndu}
 loso-flmbriatis, toperiori infertorr nullo majori recto subemarginato. >^{ni%} in

- vivo?) paucilib., lacinia media labii inferioris lateralib. majori; btaminib. ad basin corollae inserlis, a basi villosis, superne glabris slyloq. glanduloso-pubescentilib.; bracieis brunneis sparsim villosopilosis. % — Habitus *O. cruenta*, corolla inlu's sanguinea. — Grescii parasilice in radicibus *Citti* cujusdam ad *Melissam* prope urbem *Naupliam* in *Graecia*.
4. *O. BREVIFLORA* F. W. Schullz I. c. — Sepalis 3-5-nerviis e basi ovata lanceolato-subulalis integris, (ubum corollae acquantib. v. superanlib.; corolla a basi amplissima campanulata, antice basi strumoso-ventricosa, dorso cunrala, labiis inaequaliter denticulatis glanduloso-fimbrialis, superior! subemarginalo, lacinia media labii inferioris lateralib. paullo longiore; staminib. basi corollae inserlis glabriusculis, basi villosis. 2]. — Species dubia ex habitu affinis *O. cruetdae*. Stigma, stylus et stamina exserta. — Crescit in *Gracciac* provincia *AUica*.
5. *O. RAPUM* Thuill. Flor. Paris, (edit. 2.) 317. - Alb. Dielr. Flor. Dorussic. IV. t 249. — Ilchb. Plant, critic. VII. Qg. 023., Flor. Germ. excurs. 355. no. 2426. — Koch I. c. - Moulins, Annales dps sc natur. (2. Scr.) III. 00. f — Sepalis plurnerviis subaequaliter bifidis inlegrisve lubom corollae subaequantib.; corolla campanulata antice basi strumoso-ventricosa, dorso arcuala, labiis undulatis obsolete denticulatis (haud fimbrialis), superiori galeato emarginalo, lobis patentib., labii inferioris lobo intermedio lateralib. duplo majori; starafmb. basi corollae inserlis, inferno glaberrimis, apice slyloq. glanduloso-pubescentiib., disco stigmatis bolosericeo immarginato. 3. — Corolla ampla campanulata *O. cruenta*, sicca lusco-fusca, antheris defloratis albis, staminibus in feme glaberrimis a labiis non fimbrialis (conferas tamen iconem et descriptionem Alb. Dielr.) cognoscitur. — *O. major* DC. Fl. Franc. III. 488. (an etiam Linn. Spec. plant.??) - Rchb. Plant, critic. MI. fig. 000. et Fl. Germ, exrurs. 3M. no. 2417. - Engl. bot t 421. — Curtis, Flor. Londin. II. 11*28. — Crescit parasilice in r.ubicibus *Genitive litoriac* et *tcopariae* in *Germama australiori*, in *Hehetia*, (Italia et Italia).
6. *O. ULICIS* Moulins, Ann. des sc. nat. 111. 71. t — Scapo graciliori elrto, basi mediocriter incrassato sphaerico; squamis baseos paucis majusculis laxiusculis, reliquis paucis elongatis acutissimis; tplica brevi laxe 20-40-flora; sepalis integra, rarius bidentatis bilobisve; corolla magna Irigona ventricoso-dipretsa, exclusa lutea, faace dilauta tangelneo-rabra; staminibus paullo supra corollae basin affixis, basi pilosis, duobus poiticis albis laetis; alignaie maximo Intense luteo. 3r — Planta saepe 18-ao-pollicaris, color* universall inter cilrinum et rubrosanguineum ludens, odore *Berhrndt* fugacisslmo. — Crescit parasilice in radicibus *Ulicis nani* in *Gallia* (prope *Lanquais*).
7. *O. PROCERA* Koch, Dtschnils. Flor. IV. 438., Synopn. 0. Germ, (edit 1.) 534. - Sepalis plunnemis laic ovalis subaequaliter bifidig integnsq., tubo corollino breviorib.; corolla campanulata, anuvv basi strumoso-ventricosa, dorso curtail, labiis inaequaliter denticulatis, nmgine subglandulosis, superiore galeato emarginalo, lobo intermedio labii inferioris paullo majorc; staminibus basi corollae inserlis glabris, ima basi parce pilosis, apice stylloq. subglandulosis. ^ -. Crescit parasilice in radicibus *Cirtii ardentit* prope *Manhetnium*.
8. *O. PRUINOSA* Lapeyr. Suppl. 87. - Rchb. Plant critic. VIII. fig. Oil. - Koch, Synops. fl. Germ. (edit. 1.) 534. - (Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. W) -. Hrpalis quinquenerviis bifidis, laciniis subaequalib. angustis nubilalulubum corollae aequanlib.; corolla campanulata, dorso subcurvata, labiis ciliatis undulato-plicatis Crispin oblique denticulatis non ciliatis colorato-venosis. «superiore bilobo lobis labii inferioris* rotundatis. imoimedio duplo majori; staminibus supra basin corollae inserlis, inferno villosis. «apicem» stylloq. glandulosus. O - Corolla manna praecedentium sed lenius substanti. n', emrta papjraroa. luhu« magnu pliratoconspis insrudata inisqur rorrulnn pulchre picta. f. *grandiflora* Dor) et

- Cbaub Flor. Pcloponn. D83. t i- i3''* *; — < resell parasilice in radicibus *ttctae Fabae* in Europa onentali-australi.
- 9 O AW STISLPAIA F. W. Schulli, Flora [B. Z. XXVII. ID. - Sepalis uni- T. obsolete quadnenns indivisis bifidisq., e basi suborala angustissime subulalit, tubo corollae broiorib curoq. aequaolib.; corolla campanulata, dorso subcorvata, fauce ampliata, labus eipaosis undulato-plicatis obtuse el obsolete denticulate, supenon subbilobo, lobis labil lofenons rotundatis, inlermedio duplo majon, slaminib. supra basin corollae inserlis, inferne villosis. 2I. — Habitus *O. prunosae*. — Crescil parasilice in radicibus *Orobi dtgitalt* in Hjmello monle Graeciae.
10. O. SCABIOSAE Koch, Dlsclods. Flora IV. 440_M Synops. fl. Germ. (edit. I 534 — Sepalis plurinenrns ovall* in aplcem subulalum attenuate, corollae lubum superantib., T. bifidis, lacimis parallel is; corolla campanulata, dorso arcuala, citu* labioq. sopenore tolas piloso-scabris, pilis spams brevib. glanduhgens, tuber* colo tiolaceo nigrove iosidenlib., labiis loaequalib acute denlatis, margine crispis, supenore paullo sursum conralo bilobo, lobis palenlib., lacinus labn inferioris aequalib.; slamioib. prope basio corollae ioserlis, inferne sparsim pilosis, apice styloq. subglabris. ^ - Similis *O. Eptthymo*, differt autem caule crassiore altiore, luberculis nigris piligens corollae, lobis labn ioferionbus aequalibus 0-lamenlisqae apice glabns conniveolibus oec arcualo-desceodentibus — *O. cornicolor* Duby, BoU (IJIIC. 3S0?^ — Crescil parasilice io radicibus (*katrophyll** *tylwtnt*, *Mentkae arxensis* *H Scabtosae columbana** (bet 9tr6>tclflaiten umb «cfer im &tm\$rtiQ< £atcrn) et ID Galloprovmcia.
- II 0. 6PECIOSA DC. Fl. Fraoc. III 100. - Alb. Dielr. Flor. Borossic. III. I. 140. (Flor. Marcble. 30.) — Sepalls plorioenrns, sobilo lo acunto sabolaiaam cootrsc-lis labam eorollae aequaolib.; corolla eanpaoolaU lo nodio dorso rootloooola, soperoe aolrortun conrolo, oslot labioqoo toporiorl, lotus glaodoloAO-pllosIs, pills luberculo obraceo iosideotib., labiis loaoqoalib. acute deoliculatis, margine crispa(is, soperiore apice paollo sursum eurrato bilobo, lobis patentib , lacintis labii inferiorfa sobaeqoalib.; stamioib. prope basin corollae mierlm, interne spar* sim pilosis, superne glabris; stylo soperne glaoduloso-piloso ^, — o potfi'oY-flora Wimra el Grabowsky, Flor. Silesiac. II 233 t — Koch, 8)nops Q. Gerol-(edit. I W4 — Oescit parasilice in radicibut (*trtit arrmsu* in Silesia, prope Fraokofurtum ad Viadrum el in GJIIO — Scapus et lores cerino-Qavcsceottft sqfuamae luride brunneae.
- 1*» O COMIENSATX MorM, Stirp Sard, clencl _pp A - Rchb. PlanU critic. VII. fig. mi - Ghseb. Spicilfg. Qor Rumel. II V) supenif ?|llosa sqoals brte* lei»q totilanit laoceolalo-acunioalis rorollam rubro-roseaoi etcedeolib.; caijw* bipartiti lacioiis sobbiOdis; corollae labio tuprriore subbilobo; splca eogula eyliodnra coatparla, stylo glabro. sligmalr purpureo. ttamioib. basi plloolusa- In % - Crescil parasilice io radicibus *GrmuU** *Coniem** io fUrdiola ei la red-eibos *Cmmpmmto** *pfrnftlii* io peiotola llajioo-orot io RooaHia.
- IX O. LEICAFTHA Gnseb. dpicileg. lor. Runrl II. 5? -- Palleseestf paw*** oasi sobaeqoalis brarleia corollae alboe lobum sobarqoanlib ; sepalli *Z •ils sobolalla blldiste; forollae lobo palrole recliouseulo. lisobo paieaioi ^{9U} *minu* soprabasitarib. glabris; sligaale violaceo. * - Habitus leouior, spica a ^{bbreviate,} corolla sesaipollican*. stanioa ad basio ioserliooift laoa lolea bretiaalaia ^{lo i} *trucia,* caHemm flaberrima alba, aoberae broooeae teooiter biarisUUf, ***** ^{bigio-} *ccum* derlioaium. - *O. olfo* (iMepbanV Rchb. PlaoL critic. VII.) ^{(see}

*O. <?tXr>ino*A Bory H Ckmnk I. t Pritli r i^Qmtpfdatis, pills sub-
riseidu httpdm Monk, den—tmemtu. eomUts mmjonb Imbmloiti, tubi latitudi-
guad
latis
Nay* »»»fSSMMffl; fi&miJki bmm pU»*u. sftyto fioiuro. ***** ^{cordate.} ©
- *triacd m Pll»p»mi\$49.**

- Buxb., *M. Biebers*L). — Crescit in castanelis umbrosis prope Karats in Humehao peninsula Ilajion Oros.
14. *O. BARTLINGII* Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 57. (adnoi.) - Ochracea, basi subaequalis: bracteis corollae pallidissime rubrae tubum subaequantib.; sepalis uninerviis subulalis, corollae tubo erecto-palenle ad apicem arcoalo-declivem ojqae reciusculo, limbo porrecio; siammib. suprababilanb., interne aparsim piloila; aiigmaie saturate flavo. ^ — Caulis pedalis palhde ochraceus, tqumis ochraceo-luteis. Spica elongata. Bractcae 0-8 lin. longae subulaUe 3-5-nemae. Sepala Integra, dorso cannata rubescenli-pallida glanduloso-fimbriata. Corolla 8-10 lin. longa e basi aequaliter in tubum subcylindncum ampliaia, labio uiroque bonionalilcr porrcelo, superiori bilobo, infenons lobis aequalibus subrotundis denticulalo-ciliatib. Stamina superne glabra, antherae brunneae tenuiic raucronae. Stigma ci styli apice uncinale pendulum biglobosum immarginatum glabrum laeve t. minutissime papillosum colore cbromatis plumbi. — Creicit parasilice in *Libanolde montana* (in lntcr-^tfttn bci ftUentorf).
15. *C. CRASSISTYLA* P. W. Schultl, Flora (B. Z.) XXVII. 131. - Srpalis obsolete plurinerviis e basi ovata lanceolaio-subolalis Indlvlsis v. dente bremsimo bifldis, tubum corollae aequaolib.; corolla campanulas, dorso arcuaia, eitus glanduloso-pilosa, labiis Inaequalib. denticolalis, lobo iolermedio labil inferlont lateralib. longiore; siamluib. prope basin corollae Inserts, interne sparslm pilosis, apice styloq. glanduloso-pilosis; stylo crasso. % — Species dubla kabitu *O. Epithymi*. — *O. comosa* Spranner mat. — Crescill parasilice in radlcibus *Cisti* cujusdam in Graecia.
10. *O. PUNCTATA* P. W. SchulU I. c. - Sepalis uni- t. obsolete plurinertiii, ei ovata basi lanceolato-subulalis indiviais t. bifldis, margine Qmbnato-glandulosit, corollae tubum aequantib.; corolla campanulata, dorso arcuala, eitus tuberculis airo-violaceis punctata pihsq. glandulosa el venis tiolaceo-purpureis longiludinaliter picta, labiis inaequaliter tlenticolatit, lobo intermedlo labii inferiors lateralib. longiore; stamioib. prope basin corollae inserts, interne squamis P«IOM», apice stjloq. glanduloso-pilosis. ^ — kiabiuis *O. Epilkywu*, cujus forte vaneias — Creicil parasiiice in *Oslo* quodam in Graecia.
17. *O. BPITHTIIM* DC. Flor. Franc. III. 100. - Rcb. Plant criUc VII. flg. 887. 88B. 880. - loch, Sfnops. fl. Germ. (edit 1.) U. - Alb. Dietr. Flor. Bonusic IV. L iftl. — tepalis plorlottTIU ItaeoUUa Mb«Ulo-««anilMUa Mbo oootUe longiorib. iodiviili r. denie divtrletto bifldis; eroUt eaapanolau, dono letter arcuau, eiua labloq. soperlore into glandoioso-pllosU, pills luberculo minutissimo insidentib., labiis inaequallb. acale denUUs, atrflat crispaUs, raperiore apice paullo sursum curvalo bilobo, lobis patentib., lobo intermedlo labil inferioris laleralib. duplo longiore, tlaminib. prope baiin corollae inserts, interne sparsim pilosis, apice sljloq. glanduloso-plloiii; disco stigmalis velutlno margine elevalo destillulo. ^ — Planla plcrumque 5-0-pollIcaris, vl\ a sordide lutescens, saepe colore purpurco suffusa. Stigma obscure purpureum, antherae fuicae nee albae. — *O. rubra* Sm. Bngl. bot I. 1786. — Hook. Flor. Londin. L 105? - Wallrolh, %taer. Orob. *daextuj* 43. |?! - Rcb. Plant, crilic. VII. flg.885. - *O. ipartiflor** mirth. Schedul. crilic. 300. — *O. paradoxa* Koch msa. * *O. nuda* Koch mss. — *O. mm§or* Wolt out. - *BpUkymum* MaranL Method. 175. IWIInh. Gener Orob. *Staaxtui* 48. ti-
- p. rubiffinaa*: glandulis pallide rubiginosis adsperta: corolla longior angusiior obscure fusco-porpnrea, labio superior! protracto subtmncato, lobuils deflc-iis_f antherae flavae, stigma aurantiacum. — *O. rubigmosa* Alb Diftr. Flor Borussic. 111. L 252., Flor. Marchic. 331. - Crescill para»ihci» in radicibus *Tkymi SirpjlU* in encetis campisque incultis per loUm Gennamaa, Galliam. Helvetiam el Bntaniam.
18. *O. LYUCA* F. W. SchulU, Flora (B. Z.) XX\ II. 1». - Sepalis plurinmm o»»i_{fc} bifldis, dentib. lanceolatn-Hubulalis lubum rorollae atquantib lungioribq., rarn-time dente allero tfpali umus trunrato. rorolla lubuloio-campanulas', dorwi

curvata, fauce amphala, labus inaequaliter acuteq dentatis, supenoro bilobo, *iamimb. sub medio lobi insertts, a basi ad medium subvillosis. % — Habiius (. rubentts et O h pithy mi. — Crescil ad Lycos in Altica.

19. 0 APICILAT4' Wllrh. Gener. Orob. dcaaxsuj 30. t - (Gn*eb. Spicileg. flor Rumcl. II. 58. adno(.) — Rchb. Plant, crilic. VII. fig. 878?? — Ochracea, palmans, basi subaequahs: bractoi* corollae homochroae (ubum subaequanlib.; scpalis 1-2-nemis subulatis hifi(Jf*»<; corollae tubo erecto-palenle, dorso arcuato, limbo patente; stamimb. suprabasilanb., inferne sparsim pilosis; stigmatate saturate fla\o. 2|. — Caulis pallide ocracem, squamae fuscescenles. Spica brem, bractcis semipollicanbus ovalo-lancecolatis 3-5-nenriis. Sepala 3-4 ho. longa biflda, dorso con>exa binema diaphana glandnloaa. Corolla 0-8 lie longa pallide ocrarea nee rubescens, e basi aequaliter In lobum dorso arcualum dilatata, apice JCCITIS, labio superior! bilobo reflexo bre?l, infenoris lobis palentibus, medio laieralet laliindine duplo auperante. — Crescit parasilice in radicibus Peiargomtt gravto-lenhs in olllf hortoram (in Tbunngia) el in radicibus Ltbanohdts monta*** (in Untcr'^effen Ni flUcntcr?.)

20. O. DIAPHANA F. W. Schnlli Flora (B. 2.) XXVII. 13a - Scpalis irinenriis dla-phanis lanceulatis indi? ISIS, corollae tubum vii aeqnantib.; corolla tubuloio-cam-panulata, dor>o m currala, labus inaeqnaliler denliculatis, superior! paullo sur-sum cunalo, slamimb. supra basin corollae insertis, basi subvillosis. 4 — Habitus O. Gain, cujus forte varieUs. — Crescil in Garcia (in Pbtiotidi\

21. 0. GALII Duby, Bol. Gallic. I. 310.** - Rchb. Plant, critic. MI. fig. 8QMK. - Alb. Dielr. Flor. BoniMic. III. I. 145. - Koch, Synops. 0. Germ. <cdil I.) 53& -

*) Eadrm \$\$\$ dicihtr * O. Hederae, quum confwrtu i*ff pig- 478. no. 40.

“) Ad krnnc perHm€9 vidmktr Ifu—S**. fma» pro rarietaibus kobto:

I. O. ADENOSTEMON Rekb. PUm. critic. VII, ig. 8M. Ft. Germ. crcurs 2SI. no. 2414. — Robust* Uslacto-ockracea, *upt* e tola glanduloMa corolla nmphata, labti %nfriori9 UcimU pintis roiumdatu; \$cpatis bifdis lantcc' eoharrmtib.; #y/yfuanwrntya, aUmdwifrit; \$gmat* dirancato-hgloboio. Z^ — Irani pa- ra* %t%* %* radtnbus Gain Molloginis tel Trritra;

1 O hRU'SM 41b Inclr. Flor. Horuitt MI / 417. Flor. Marchtc. 332. t — dlandulosa Hfunmts ltncan-ta*ecntatt\$. tinea brert dmsa bractctt qu*m flo**9 brertonb, tepalw bifditi, loctmns macqualtb neuhs, mmUa lubuloso tubroca, labts rrm/d/ii, rtificrton tubtrunrato emtrgtmaln, lobulit demum r/r^sis, in- fertnru palemhs (armiu oblotyts rolymdalts. media major*, filamemtu infrrns rilloM, iuprrmc glanduloitt. fly/o glandulngo, gUgmate obrerte remformi lala- niio. ^ - Itamla 0-8-po/lrarw paUd* nlpkmrea. glamdmu ^ r ^ V^oia. Sptra 1-3-poUicans, bralear Uweolaio-ltmraes Floret piUd* "up... a sub- nibtrumdt tempouicam — (ret hi parasthee IN radtetbus Galii veri (bel dem

3. <>. MAIMASTHA Alt. ThHr. Flor. Bowc. 17/. I >>>. Flor. *...£& *U- lilamdmlota iqwmitt tmfertonb tmbrolmndtt. tubilo oemmimsltt, **P*/%yZttm* uean-lomeeolofit: tp%em Hongalm; brmeint floret txeedcmhb, tepaio ^ 9b maximo nformt qmidnfido, ItcHnis mcimmmHs. 9xt*r%or%b. mmjorb; orbi loci- fmrrmln. Imbiu errmulstu. ttpTttt wmmrpmaln porreHo, *mfenons trijubi loci- mm m0dtm major*. /Ummmtis m(wm\$ ntiottt, tmptnc gUmdmlons; *fyo glandu- <*%, \$Hfmmi9 diemneito- inglobmloso pmrprmo > - PI an I a hip* dale pallide f*f rubro-eJh ma, g. bc h u m r us o h n , basi tuberotoamcrmasata. Spies ultra semipedalis remoliflora. Sepala antic rcalita. corolla ultra pollicaris calde incruca flocculenti-ferruginea Flores Dianthum redolent. — (Cresci pa- rasilice in radicibus lalli (bel dem Terce Menge chaweit des Stabichens Rauca la det Wart f^raiWaftira^

4. a TOUOIATA Rekb. MM/, enhe Mil fa II* - Alb. to*'- M. or. Boruata. I*- f. 410. Mar Mmrekie JO. t Glamdmfata iqmamu tmf*Tt<rtm. er orali basi !••#• armmt*.,!, **\$ca domgmla. braeirtt mrollam fere aeqttamhb. - aks an- tie* e+aiths *m pktfmm eoUmrJorne amadr+dmn. lactmmt f j b r n o r e a r b . intermedHt abbrenaiu. evroU* iwbrmrtala. labttt rremnlaht. ***?J2zil £&*** rmargtmmla, imfrimr* trilobo. Innmttt tmbaeqmabh . filamrmlit *»J« L - Si- t*perme gUmdmi—u. tlplo glamdmloso. itlgmat* btglobmloto P*P****UZ semper mUhma pra*e+4rmH. ted kfrrlfloriums mtmorib** reehonbms bractem ^ ^ l-g%*ribu* emifetsmma I m s tmUnmeihu abbretmttt »blusytm^ ai Juch * < g fctsmma Imrtmus tmUnmeihu abbretmttt Gidtiqut ai Juch * < 9mrms9li€9 randerobus Cialli bl\ lent terfe t*ct4C rvniretl rel ttx Wart f J ^

- Sepalis plunnerviis subaequaliter biOdis, lubum corollae dimidium aequanlib , anticc coniugis connallsq.; corolla e ba»i sensim ampliata campanulala, dor»o curvala, labus maequaliler dcnliculalis, superior! galealo, lalerib. porreclit (noo paienlibus), labu infenons lacinnis ovalis subaequalib. porrectis, lubo dimidio brevionb.; siamimb. supra basin corollae interns dense piloiii, superne slyloq glanduloso-pilosis; disco sligroalis velulino margine elcvalo destiluto. % — Sligma obscure purpureum. — *O. caryophyllaea* Sin. Transact of Ibe Lino. 800. IV 100. - C A. Meyer in Ldb. Flor. Altaic. II. 452 t - Wllrth. Gener. Orob. *ttaxtijj*' 35. f (excl. sijn. plunb.) - *O. vulgati* DC. Fl. Franc. 111. 480. - *O. ttiponhna* F W. Schullz, Ilcitr. iur Knln»s. der deulsch. Orob. 7. — *O. caryophyUacea* Rchb Fl. Germ, excurs. MJ. no. 2412., Plant, critic. > II. flg A00 WI. *O. throbttgena* Rchb. Plant, critic. *MI. OR. 005. 005.*, Flor. Germ excurs. AW no *4». - *O. laxiflora* Rchb. I. c no. 2421., Plant, critic. *MI. tig W 000 010.* Alb. Dielr. Flor. Borussic. IV. I. 253. f - *O. major* Polhch, Fl Palalin. II. 200 - *O. tubiflora* Alb. Dielr. Flor. Borussic. III. I. 147. — *O. muttla* Dumort Florul Belgc. 33. [diagnosis pessima!!!] — Crescil parnitice in radicibus (*ialu trn 01 MoUugmt* per totam Germaniam, Bnlanniam, Gallian, llehetiam el in Rumclia.
22. *O. GLABRATA* C. A. Meyer in Eicbwld. Plant nov. Casp. Caucas. 10. t t. 17. — Furfuracca: squamis snbQorahb. lioearib. florem aequantib.; sepal is indivisis lineari-lanceolatis; corollae sabeamanulalae reetloscolae labio Inferlore paullo breviorc, lobis oblnsls denlicuUUt, Intennedlo lonfiore; BUmeniis basi gltber-rimis, apice styloq. subglandolosis; stigmata emarginato. ^ — Scapus qulnque-pollicans. Corolla (sicca) sordide et obscure rufa faucem versus paullo ampliata semipollicans. — Accedit ad *O. Gahi* formas minores paucifloras, satis tamen differl stamimbus ba^i glabris nee Inrsulis laciniaque media labii infenoris longion. — CrchCl in ktfehctia.
23. *O. AVELIANAK* Pfund, Flora (B. Z) XXVI. 183 t - Sepal. piunnemis subaequaliier biiidis, margine antico dente unico instructs contiguus v. coalitis, lubum corollae dimidlum subaequanlib., laciniis laoceolaiis acutti; corolla tubuloso-campanulala antrorsum curvala, labiis oblyse v. obsolete denliculalis uln-doloso-cllialis, superior! oblyssime emarfioalo, lobis duobus tcuiis palentib dlvteo, Inferiori inaequaliter trilobo; fllameoiii supra basin corolla* laserltt, inlerne pilorum deosorum serie munlUs slyloq. superne glaodoioto-plloolt; MIgaaic laevi. ^ - Seaput S-IO-polllearia pallldo BMIIUM glandalMM. fqnaaMO taa-ceolae longe acumlnaue fuseao. - Crated parasitic* In radlclbot CsryM >*^ - *lanae* in Bohemia (tel *Vraq* in cinem fB&Ib»>ni .tent ttont").
- d4. *O. RUBENS* Wllrth. Gener. Orob. *dtaxtrf* 40. f — Koch, Syoops. fl. Germ (edil. 1.) 535. — Sepali» plunnerviis late ovalis subutato-acumlnalls, anticc poniceq. denle inilruclis v. maequaliler bifidis, lubum corollae tubaequanlib., antice
-
5. *O. GILYA* Alb Dielr. Flor. Ilorutsic. *MI I. 430.*, Flor. Morckit. 330. t - Gton-dulota. \$quami\$ tnfenonb. tmbnraht oblongis^ \$pica dongtit* infirme lasa, braeUis forum tongtiudne; sepols anttce coaUtu in pkfUum eoUmrtform* quadriMium, lactmU acuti*, fxtortorb. tublongtortb.: corollm tubcurtatu, labus eremuafli, «*p<rtort galeato emargtnalo, tnferton` trilobo, Ucinim media parum lonqiori; fiameniit tnfem* tiUotu, tupems glanduiosis; tlylo glanduioio, -H%Q-maU dtpartcato-bialobuloso purpurto. % — Plant* pidaU* color* rrr<cro~JUT°o ban vtx tnerattafa. Flores magmUudina] *O. Kraasei ted magu mmrraff.* - CresatporanhceInradiHbu* Galii (btl Urn Derfc ©crfle effntottt U4 fetatibene
0. *O. CITHINA* Alb ihehr. Flor. Horustie. VII. t 441 , fFor March*, 3M t Gton-duloia tqumii tnfertonb. paucu oblongtM, tpiea denstusculn aniee romu.h braeleit floret esredenhb . tepaht anhre enaltht tn phiflUm coUanf, rme auadrifidum, lannut aruht, extenorth. Inrujtonb , corolla currata, labtu tubcrenulinh superior* (jalratn emaryinaln, infer writ Inlobt porrech lanmtis tuba* QUA hi*, filamenttt inftrnc itllntit. tupeme glanduhtit, tlylo glanduloso, tUgmale oir pureo tncrattalo bifido % 4 pracredenlibut differl color* pathdr rilnno rapt, quum florum, el tltgmale minuhstmc bifido — (retcti parastlice tn ra-dicibus Gain (bb» tern Teife ^cr^t cbnxtux te* 2Attd>(nf 9hucn in ter IWjtf * ran

coniugis v. coalilis; corolla e basi canrala lubulo»o - campanulata, dorso recta, apice galeata declivi, labns inaequaliter denlatis, supenore bilobo, l^oD|g ptieo-
tib., labu infenons ovatis nubaequahb., laleralib. pateolib.; siamimb. 10 curva*
lura corollae toserlis a basi ad medium dense pilosis; stigmatis disco Yelutino
margine elevato desliluto. 2]. — Corolla 0-10 lio. longa lubulesa, lubo supra batin
coospicue currato, dorso recto v. subimpresso, labio superiori insigmter galeato
et canralo apiceque paullo tursum canralo haec species slatim dignoscitur.
Stigma cenno-flavum. — *O. elatior* Koch el Zii. Cat pl.Palat. 12. — Rchb. PlanU
critic. VII. fig. 001. 002. — *O. elatior* Sullon, Transact of the Linn. Soc. IV. t. 17.
— Engl. bot. t. M8. — Rchb. Fl. Germ, eicurs. 354. no. 2118. - Alb. Dielr. Flor.
Bonus. III. t 148., Flor. Marchic. 33a — *O. Bueckti* Alb. Dietr. Flor. Borussic. III.
1.145., Flor. Marchic. 3?»?) — *O. lutea* Baumg. — *O. Medtcagmu* F. W. SchulU,
Ann. d. Rgnsbrgr. GtlUebft V. 90S. - Crescit parasilice in radicibus *Medieagtnis*
*falcata** el *tmivms* per Germaniam et Galham.

25. *O. GRAZDISEPALA* F. W. Schulli, Flora (B. Z.) XXVII. 128. - Sepalis plnri-
nerviis ellipticis, apice tiideotatis corollam aequantib. v. superanlib., dentib.
subulatis, sopenori infenorib. duplo f. quariruplo longiore; corolla lubulosa sub-
campanulata subarcuata, lacinils denticulate; suminib. infra medium tobi insertis,
a basi ad medium parce pilosis. ^T - PlanU magna bipedahs el alior, flores
magmtudine flornm *O. minorit*, habitus vero *O. rubeniu* v. *O Centaur tat*. — lo
Graecia ad Naopliam crescit

20. *O. S'VBVERTICILLATA* F. W. SchalU I. c. - Sepalis obsolete quinquenervlif
ovatis inaequaliter bifldis r. indivlals tobum corollae aequantib.; corolla tubu-
loto-campanalaU arcuau, Ubilt Inaeqoliter deDlicolatis, superiore vli bilobo;
•uaialb. is earralm eorolUe Intertlt, a basi ad medium subvlllosit. % — Ha-
bitus *O. ruimUt*, sed lores paaHo mlnoret. — Crescit 'parasiUce la radieibas
rim— «sjat4aai prope Tkabaa to Graeala.

27. *O. LILACINA* P. W. ScholU I. e. NO — Sepalis obsolete 1-3-nemis, e basi
• otala sobllo subulatis inditisis ?. deole brerl aoclis tubum corollae aequanUb.
•. superanlib.; corolla lubnloso-campanulata, dorso leviter arcuata, labns obfo-
lele denticulatis, lobis rotundato-truneaiis subaequahb.; slamimb. sub medio
tubi insertis, interne pilosis. ^ . — Habitus *O. nbentts*, sed minor. — CrescU !•
Grarriae protincia Attica.

A *O. LORICATA* Behb. Fl. Germ, eicun. 3tt. no 2123. eicl. synonym.) - Koch.
Synopt. fl. German, (edit. I 50L - [Alb. Dirlr. Flor. Borussic. IX. t. MOIJ -
Sfpalu 3-5-nenrns bipolaritis tubum corollae aequantib, corolla tubulpso-
panulata dorso recta, apice anlrorsum curvala, labns obtuse denliculatis, —P^"
rfore btlobo, lobis patentib.; staminib. sub medio tmbi iniertls glabHs, batl P * ^
pilosit; siignalib. disco. . . . ? > - Srpala angusU profunde dlvlta* C<roiw>
aequantia •. soperantia, corolla 7-8 lineaa looga, a basi ad labinm iaflaritJ a H⁰
rocu, in dorso labit soporiorlt unlom paullo curtau, labinm bllobnB ^ * V
susains parre pilosa, alle supra fnem lertiae partis lubi in<erta. — ^| --- fior
BcUtlca. Pl. eisicc - *O. Artmisiin eampntru* Gaud. Fl. HelveU IV. 4» ~ (O
mmjtr Ball. R<rb, u35T, - Crosell parasitico In radicibus *Arttmisias compositis*

i *O. BIETKU* Alt. th*r. I. I e. e. - Srpa floaro \$*?***d*H; *Huomis* %££
nor*, ex or mi* »«* immcnUtU. npertonb. UtufoUo-hm^mnk.. \$£<* <^f-
fU: torn** \o>,tmd*n* Imhj evroUtni, \$*palu \$mmEqmfiltr ^ . ^ ^ I V # S *
lahs Smlf; coroUm i*lui*s*. Utou dm
emarginato, labmkt rttolmht. *mfrton\$ Jifi'Tt Unm»u rotundans,
longiori; flama mlu. «ylo fl<iro. \$Ugm*U decaricato-biplobuloso flaco.
? - Tota fuce-tirns r. murpJrmshms. Spl* 6*-foU*c*ru lara. Bractae
lanccolato-linearcs mult. Stylis apice
coru malier piloso cu vireocan - purpurru p*re***. Convallariae
purpurascens, stigma corino-florum. — Flores ipmrgu
majalis. — Crescit parasitico in radicibus *Medica* giDis falcolat p ope Franko-
furtum ad Viadrum.

in monlosis mcollii (auf ben fleftert&ergen *et 9lf#er«leben unfc bet franrenbauten in **unnngen, au«* im ttanton SBaUu).

- SO. O (ALLICA Græmer, Flora (B. Z.) XXII. 376. - Sepalis indmsis corolla dimidio minorib.; corolla lubuiosa, lubo ad medium curvalo coarctato, dein aubc>hndrico, lacinut labli infenons iribns subaequalib. oboratis flmbnalis saepeq. mucronalis, lablo superior! reluso tenuilerq. deniculalo; slaminib. glabns infra medium tubi insertis, ovario sligmateq. glabris, corollis praesertim Inlui intense coeruleis. ^ — Crescil parasilice in radicibus^rfemmoeGaf/icaeioGalliaausirali.
- 30 O. PILRIDIS F W Schulli mss in Koch, Dlschlnds. Flor IV. 453., Synops. fl. Germ (edit 1] 530 — Sepalis uni-bincrviiis integris v. antice dente auctis tubum corolloc superanlib; corolla lubuloso - campanulala, dorso recla, apice antrorsum cunata, labiis obtuse deniculatis, superior! inlegro, margme laterali paiulo; slamini b fere in medio lubi inserlis, a basi ultra medium dense pilosis, superne verruculoso - scabrellis; stigmatis disco sublaevi granulis minutissimih obtusissimis dense oblecto. O — bligma sordide violaceum. Simillima *O loncaiae*, sed caulia superoe el bractee mulio magis tillosae, sepala uninema, ranua denie aucia el lunc trinervia, coroUa superoe paullo magis aolrorsum curvaia, Ubium supenua tolegrum, aUmina a baai supra medium dense plooa el supra verreaulosa. Quam *O. /Una* pilosior etl, sepala corolla* lubum *aptranl, corolla dorso mulio minus curtaia esl el labium superlua Inlegrum, taieribos tit atetalit, nullo modo refraciis, filamenta longiora, apice mollo miaus earaU aunt, stigma ultra filamenlorum cunraturam pro mi net sordide tiolaceum nee cerino - flavum, laliui et in disco subliliiier granulalum non cicalrisatum. Ab *O. lueorum* differ! corolla recta, antico Ionium paullo cunrala, labiis obtuse crenulalis, labio superiore inlegro, inscriione slaminum alliore el sligmale subliliiier granulato — Crescil parasiUce in radicibus *ihcndtt hteraaidu* in Germama.
31. O. STIGMATODES dimmer, Flora T. Schlesien WQ. - bepalis subaequaliter bifldis, lacinn*. rectis lanceolalis, apice cootiguis v. coactis enenus, lubo corollino paullo brvionb, corolla lubuloso-campanulala, dorso arcuata, libio supe< rlori obsolete irilobo, lobis reclis, laciniis labll ioferioris subaequalib. oblongotaiis, omnib. margine eroso-dentis; slamini b. suprabasilarib., infra villosopubesceailb., aopra glandulosls arcualim deleiis; stylo pare* ftaadtllfero. y. - Stigma e lablo superior! eisertum, prlmum eertno-flavra, Uioe atreaai bole-aericeom capluto-blobom. Scapos 1-1/-,-ptdalls. Splea M<ilpc4alto dtotltora 90-30-flores exhlbena. Sepala aaepe anUee la pbjilom eollarlforme quadHfidom coalita. - Crescit parasilice In radclclbus *CmOmvr*—* *ScmH***— Is) agrla Slleslae (*Ui* ben <8^«flrubtn bci Sirftyl in Cbrf6>ltlcm).
32. O. FLAVA Marlins mss. apd.*F. W. Schulu, Beilrttge iar Kntnu. d. deuueben Orobancben 0. — Koch, Sjnops. fl. Germ, (edit 1) 530 — Sepalis unlnerviia v. obsolete trinemis integns v. anice denle aoclis lubum dimidium aeqoaniib.; corolla tubuloso-campanulala, dorso curtaU, labiis deotriculaUs, superior! bilobo, lobia reflexis retrorsum accumbeniib.; suminlb. fere In medlo lob! Insertis, a bail ultra medium dense pilous; stylo glabro, sligmatis disco Terraeoao-cicairitalo. % * Valde ioslgois esl lobis labii superioris refraciis el poalice sibi con-Uguls. ToU cerino- v. dilute flava, corolla 7 lioeaa looga, sUmina longiora apirr manubrii inalar valde arcuau el descendenia, sligma cerloo-Oavum. — Cre>cu parasiice in radicibua *TuMHIagimit* nfo#o« (auf bet 3far>tlucn bci 9RAaa)fn).
33. O. LICORUM Alex. Braun mss. apd. Sculli, Aonaleo der Gwchsknde. V 501 — Koch I. c 537. - Sepalis binemis inaequaliler bifldis, lubum corollae aequao-lib; corolla lubuloso-campanulala, dorso curtaia, labiis subliliiier glandulosociliais obsolete denticulatis, supenore bilobo, lobis paientib; sUmioib. prope basin corollae insertis a basi supra medium dense pilosts, sl)lo glabro, siigm<ut disco lae>i veluimo. ^ — Insigmter differl a praecedente colore flavo-rubenie corolla ampliore, nctu mulio majore, lobis pairnlibus non rcfraclin, filamfniu longionbui apice mulio minus cunatis, st)lo ultra slaminum cunaiuram emerso

el ihgmatc majore fu«co-rubro profundius bilobo, \eluhno nee •erracoso-cica-
insato. — *O loncala* Rchb. Plant, critic. VII. fig. 018. — An eiam Alb. Diclr.
Flor. Borussic. IX. 1. 580.??? — Crescil parasilice in radicibus *Berberidi** i *ulgans*
(*bitbt* Hot int (Englitoru *C*zrttn* gu SHunfyn umb in ben bairrf\$rn 91(rm bci ^artcn*
firó)cn fceotatyttt.

O. Rubi Alex. Braun mss. apd. Koch, Dlschlnds. Flora IV. 4i8. (nee Vauch.) —
Florib. paullo majorib. el amplionbua. — *O. Rubi* Duby, BoU Gallic. 330. —
Oescil parasiice in radicibus *Rubi catsu*

U O. ARCIATA F. W Schulli, Flora (B. Z.) XXVII. 120. - Sepalii obsolete 2-3-
ncrih e basi o>aU lanccolatis inlegris v denle dnancalo tenuissimo bifidis,
tubum corollae aequanlib.; corolla lubulosa arcuala hnri;onlalih»rpatcnlc el penei
sursura cunala, tubo aupra ovarlom vix coarclalo el fauce ampliaia, laeinui den-
ticulaiit roiundatit, labio superior! infcriori mullo majon. siamimb. supra bafin
corollae laiertla el ultra medium ulloso-pilosis. ^ — Specie^ pan a pilis albidit
sparsim lanufinota, floribu* xerampelim» brevionboi quam *O. mtnoru* ioitrocta.
— Creacit in Graeciae provinca Altira.

35. *O. kL'GFJ* Schmiti el Rfgel, Flora Donnenc. 100. - Sepalls corollae tubom
aequanlib. e basi otaio-oblonga biOdis Innemis, larioiis >ubaequahb. iubulalo-
acuminalis, corolla tubulosa tuperne letiier anlrorsum cunaia, extui laevi, dorto
glandulo^o-pubesrenle, labio lupenon emargmalo eroso-deniiculalo demom
erecto, inferiors inlobi licinm laterahb. e bail ovato-subrolunda acummalis
obsolete triGdin cuspidalii acule denlalis, media majon acute denliculata, §aepil-
IIme nenro mrdio excurreole cutpidaU; tlamimb. aupra basin in»erli« fparfe
pilosolii; stylo Rlabro, tlfimaU cenoo-flavo. % — Plania pedalis v. icaquipedalu
elegantar earneo-purporea fttBdaloto-pubetcens nilda. Bracleae flonbuf Ion-
fiore* pallide parpvtMMiltt. Splca elo«faU apicem venua dentiBora aubco-
moM. Corolla 6-8 Ho, looga dorto laete parporateem, anlice pallida, teoia lo-
tentlas eoloralif perenrta. — Creaeil paratllice in radicibus *Trifolii medii* (6ci
ICM Serf* f iR| ii *Ut Wakt* ten ©enn bl|cr afriii qrfvntcn

•35. *O. PARVILOBA* P. W. Schulli, Flora (B. Z.) XXVII. I*. - Sepalis obsolete
3-6-nenriif • basi otala tanceolalo-subulailA bifidis, ramsime indivisit corolla*
lubum «upfranlib.; corolla tobulota «ubarcuata, lacinns partis obsolete deotien-
|i|s, niamimb infra medium lubi imrrtl* «par<>im «il|oso-pi|nm<i. ZI — HabW
<> *Salnar* Plania prarsertim in inflorr«cenlia pili« albidit* subnllosa, ewleata
gn»eo - ochrolriya Orscil in Garcia ad .>aupham.

37 *O. SALMIK* F W Schulz. Annaln der G«cb«kode. V Jft. - Koch, 9j*f-
0 (irzman. (edii. I > 537. — Nepali* uninenut inaequaliler bifidu lubum corollaa
suprraolib.; corolla lobuloflo-tampaoolau, dorto curvala, labiis denUculatii ••••
eillatis, supfHori bilobo, lobif porrvclit; »iamiiflb. supra basin corolla* ~~nd~~ * j-i *
basi Qhra medivai deaae pilot is, topernv pilit glaoduhreris parce adsptoM; ~~u-je-~~
mans disco telmiao. ^ - MiffM iaiMto rertoo-loieum Simillma 0. ^ ^ .j j
a qua difrrt sepalis semper M inert I is, labiis copiosr dronculaiis, lobla WD^
svperton semper porrecto oooqoam patenubos tugmairque cerioo - ~~ovi~~ */Z
Croacil parasiice io radicibus S«ieio# *gluhmo\$ae* in subalpinis (in ten ^ ^ j^
^Irm, ler fltamui U\ (Wro>tr#^aHs an» m Un PairrfttM liltt ~~justifm~~ ~~u-je-~~
umb m •taiHite

V « *TAROTAE* Moolms. Aon. tc. oat III. *IK* | - Scapo gracill. ~~leviter striato,~~
bati oooaal til increaaaato; squanit baseos pauci«, laiU elongatis ~~aculis, reliquis~~
Porw4t pa«ciaf aoffuslis, apice refleiiis. spict deosa latate, br«l, dlmidio« §. P ^
P«m aj«ajq«am aeqoaote; sepalit aempr profuode biidis; corolla parta, ci ~~od-~~
draeoa, graeih, l>c«na, tUmitib. looge supra corollae basin •Hut, •••• *\$n ~~ara~~ J
~~stigmato~~ tioUcto. *IJ* - Plaou 10-tt-pollicarts rubro - tiolacea. - Crw«i P

since in radictbvs i>««rt *Cmrrtm** km Galha (prope Laoquai*'. — — — Uc
• *O. MIXOK* »«i|Ma Trooaact. of tb# Lion. hoc. IV. *I7H* - Hebb. *Wi* i * «IM*
?II. If. 0H, 017. 079. ML. n. Ctrm. etcan XX no. M07. - I*''' - 8 y n ^ ^ .
Germ. (tdit. I.) m. - Mpalis plurioenns. • basi otaia aabilo ao|<> le >uDUIBI

~~lilacina~~; lacinnis subulalis tubum corollae aequanlib. v. longiorib, corolla tubulosa arcuala, lablis oblyse denticulalis venonis undulatla, superior*, bilobo porrecio, lobis labii (inferiona subrolundis subacqualib; Maminib. sub medio tubi inseriis glabna, inferne pilis sparse obsilis. Q — Stigma purpureum v. lilacinum Similis *O. amethytteae*, differ I lamem bracteis e basi ovaia lanceolalis, tubum > eliam corollam aequantibus, corolla aequilaia quidem, sed brevior tubulosa aensim cortala, nee subito in genu flexa, labile rolundatla obtuse denticulatis staminibusque minus alle inserts — *O. artetwts* Dumort Florul Belgic. prodr 33* (diagnosis pessima — (rescit pnra»itice in radicibus *Trtfoln praiensts* {bti ®enn, in ben Gantcncn ©aabt unfc 2ihlU«, fc n?tc bet Ruime in 3ftacn).

- 4a O IIKDERAK \auch Monogr. Orob. 56 I. 8. - Schmil/ el Rend, Flora Bonnens. 101 - (Moulin*, Ann. des sc natur III M j) - Scapo gracili *aldo stnalo, basi in spbaeram uurassalo; t>quants bateo* hiis imbnalu, rliqui* Uxis lanceolalis aculis, spica loogissima dense mullillora, sepaiis magis minute biGdu, saepus inlcgerrimis, corolla part a cylindracea gracitt incuna, fauce coarctiaia, lalerib comprasissima; alamlnlb longe supra tubi basin afflxis, bam parce pilosis (pilis deciduis), poslicis ab ioviccm remoltsalmla, stigmatcluleo. ^ — Planta 0-21-pollicaris e luteo vlolascens. Odor letissime mellitun. Stamina pottica aaepe aboritva. — *O barbaia* Polr. el Rcb. Plant crille. VII. fig. 881.884., Rcb. Fl Germ excurs. 353. no. 2406. — Creacll In radldboj HadarM Aaiieft In Europa auslrahorl.
41. O. AMETIHSTEA Thoill. Fl. Paris. II. 317. - Rcb. Plant crille VII. fig. 020 021. — Rchb Fl Germ, excurs. 355. no 2425. — Koch, Syoops. 0. Germ, (edit I) 538. — Sepaiis 3-6-n em is e basi ovaia subilo angustala aubulato-altenualis bifldisve, lacinnis angustis subulalis corollam aequantib, corolla lubulosa, bam subito in genu flexa ct anlrorsum cunala, deinde recliuocula, labiia loacqualiter acute denticulatis undulato-crispis ramoso-^enosis, supenore galealo porrecto emarginato \ *ubquadrnlobo_p lobis lateralib. labii inferiors tubbilobii, intermedio duplo majore 2-J-fldo; stamimb. corollae corvalurae inserlia glabrit, in feme sparse pilosis 3]. — Caulis \iolacea v. purpureus, florea albidu v. dorso leviiier Ulacini ?. lolll Illacini veniaque purpureis picU. SUGma (naera t. nbro-roscum — *O. Brynfii* Duby, Rot Gallic L 3Sa — *O. riatorfi*. MiaroflittM WUrlk Goner. Orob. *diacxtoii* 61. — Croteli partlllet In radicibus *Br\$as\$M*,ç—Vaslrft to B«-ropa *ccidentall-analraU.
42. O. HISPAMCA Boiss Voyage bol .dant It mldl 4o|VtptfM no. H8L — CaoJe aimplici parce puberulo, spica denta; florib. feraetta nnlea otalo-Irianfulari aeuu nigricante glabre¢e parallele solcaio-srlrlau aufalUa; ealyeb ilaepall gti-bnusculti sepaiis muliincnn* subblcarinallt, ad lerllam partem bifldla, lobis aculis bracleam aequantib, corolla dimidlo breviorib.; corolla pane glabresceote, coerulea incuna, supra o%anum coarctiaia, llmbl tlx ampliaU lobis rolandatts aubinlegns, aniberi* paullo infra corollam dimidiam interlia glaberrimis. % — Graeii in arenosis Hupaniae*ausiralla.
43. O. PRAGRANS Eoch, DUcblnds. Flor. IV 463., el Syoops. I. German (edit I 938. — Grlseb. Spicileg. (lor. Rumel. II. 58. — Sepaiis Inlefrif ?. Inaequaliter In-fldis; corolla basi tubulosa, soperoe aensim ampllala, dorso curtata; alaminib. |p medio tubi inserlia e baai arcuato-patenii asceodenlib., Inferne pilosis, auperne glabri*. sacculis antherarum breviter lenuiisimeq. mucronalis. ^T — Planta etiam exsiccata fragrans. - *O. coerulea* Frit. Hb. — Crescii in Austria inferior el in Macedonia
- 44 O CIRVIFLORA \mant, Plantar Aegypt decad 22. no » I. 1 fig. p _ Furfureo-birsuta. scapo squamoso, spica compacta multiflora, bracteis ovatii aculis corolla duplo bre\ionb, cahce bipartito, laciniis bifldis, lacinia altrra lineari-oblysa, allera anlica otala, corollae tubo (candido) ineunato r)lmdraceo labio supenore bilobo, lacinnis subroiundo- ovati* crenulatis, inferion» tnpinm aubaequalib similib. ommb crenulais coeruleis. genuine »ummib rorollaq

- glaberrimis 4 — Filamentum breviter medio tubo inserta. Corolla fere retriangulae curvata. — Crescit parasitice in radicibus *Lithospermum dactyloides* in Aegypto.
45. O. FERRUGINEA C. Koch, Linnaea XVII. 201. — Simplex, superne pedicellis ferrugineis obtecta: squamis raris minutis; bracteis ovalo-lanceolatis; sepalis lanceolatis corolla amplius minoribus. miosqu. deoticulalis; labio corollae superior! galeato truncato, inferioris lacini subaequalibus; laminae. et pistillo glaberrimis. ^? — Species non sufficienter descripta! — Crescit in planitie ad Araxen sita.
46. O. COERULESCENS Steud. mss. in Willd. Spec. plantar. III. 340. — Rebb. Plant. critic. VII. fig. 925. — Fl. Germ., excurs. 390. no. 2127. — Alb. Dietr. Flor. Borussic. VIII. 1511. — Koch, Synop. fl. Germ. (edit. 1838). — Sepalis induratis bifidisque tubo corollae longioribus; corolla tubulosa, tubo curvato, in femore ovato, supra ovarium coarctato, laciniis labii inferioris concavis; staminibus supra medium lobi interni, basi parce pilosis. ~4 — Flores e minoribus caeruleis. Spica lanatovillosa in specimenibus exsiccatis quasi mucore obducta. — Crescit parasitice in radicibus *Artemisia campestris* ad ripam Danubii (fretum Cernaburg) et in planitie trans Araxen sita.
47. O. COLORATA C. Koch, Linnaea XII. 201. — Rubro-brunnea glaberrima. squamis aequalibus ovalo-lanceolatis, superius flores excedentibus, crassiusculis; sepalis ovalo-lanceolatis ex basi subconnatis (antice? aut potius?); corollae ramosae labio superior! galeato bilobo, excluso piloso, inferius trilobo, palato intructo(?); filamentis glabris ex basi porrigentibus. t? ; stylo bicapitato! glabro. % — Species insufficienter descripta. — Crescit in Armenia.
48. O. AMMOPHILA C. A. Meyer in Ledeb. Flor. Altaic. II. 4M. t, Icon. flor. Ross. Altaic. illus. t. 310. — Albo-lanata: squamis floralibus ovalo-lanceolatis florem aequantibus; pedicellis lobis lanceolatis subaequalibus tubo corollae cylindrico inaequaliter; laminae ovatae antherae; filamentis styloque binatis, stigmatibus subbipartitis; laminae palati unguiculatae. % — Differt ab *O. caerulea* sepalis minus profunde fimbriatis tubo corollae brevioribus, corollis amoene saturatque caeruleis, filamentis styloque semper biseriatis et loco natali arenoso. — Habitat in deserto Kirghisico.
49. O. BORKHANS Turn. Cal. Baik. Dan. no. 177. in Bullet. de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou \ no. IV. p. 722. — Albo-lanata: squamis floralibus ovalo-lanceolatis; sepalis bitidis, lobis lanceolatis subaequalibus tubo corollae cylindrico antherae; laminae ovatae antherae; filamentis styloque binatis, stigmatibus subbipartitis; laminae palati unguiculatae. % — Differt ab *O. caerulea* sepalis minus profunde fimbriatis tubo corollae brevioribus, corollis amoene saturatque caeruleis, filamentis styloque semper biseriatis et loco natali arenoso. — Habitat in deserto Kirghisico.
- 3a O. VABIEGATA Willd. Gtner. Orobanch. *itaot.* 4a ! — Rhiz. Pl. ^{L 0 r 11 k >} MI Of. «JL OOi - Flor. Germ., eicon. 3M. no. 410. — »capo basi l^{viler 1111*} craulo; squamis bracteis ovalo-oblongis furfuraceo-hirtulis ^ J J j • ffBMSiis calycis ovato-lanceolatis laciniis 11 or ares aequales dit*»U; **coro-** inflato-teatrico, extus glanduloso-atropica diluente, Intus purpuraceo, **labio** • upenore rostrato reflexo subintegro, inferius infido rnp, lobo ^{1 0 r} medio productiore; tuannibus basi interna styloque biseriatis; stigmatibus **obcordatis** subdorso. ^ — Heaps pedalis purpuratrens. Spica 15-»-flora oblonga. **bracteis** corollas tobaequant. Sepala ^{lii*} Qlu«ima. Corolla dilute flavescens, lobis **sub-** r«U Mrparascitis, labiis tuperiM rUartoM, mar«ine repllatum, ^ ^ " p; **la-** nolt saedia smjor phcato-gibbosa, lateraliter rostrata. — *O. fortis* DU » . Franc. V. 301? (nee DsM - *O. C*H** Dnby. Bot. Gallie 340. — Crescit P * * » **ice** in radicibus *Syrinchium* in Sicilia *| Germann australi (let 3»*t **ref**). **obl n**
- M. O. RETICULATA Willd. | , f . t t | — Scapo lobaequali, ^{u|uw*} • ^ ITMCJU: fit nranilo; bracteis oblongo-lanceolatis corollam aequantibus. Wwnlo-wnura **lln** r«lycia diphylli Mpalia Unc«oUlo-lanceolatis simplicibus. corolla brevis; corv

- inflaio-lubulosa glandulosa, labio superior^ emarginalo venis taluralionb. dae-
daleis nutritio, inferioris lobis rotundalis aequalib.; slaminib. slyloq. gtabriuculis;
sUgmale sphaerico diviso. Oj - *O. foetida* Lapeyr. Abr. Pyr. 1. 358? - *O. efatior*
FIUgge mss. — Crescii in agro Tolotono.
52. *O. BRACTEATA* Vivian. Annali di Storia nat. IV. 235. — Calycib. biparlitis, la-
ciniis lanceolatis acuminato-seiaceis, corollam subaequantib.; braciae aolica
laDceolato-acumiaala florem superantc; corollae labio superiors indiviso ovaio-
roiundalo undulalo, inferiore trilobo, lobifl subaequalib. ovato-subrotundiscrenaio-
undulais; slaminib. slyloq. exsclis glabris. — Habital in Corsica.
53. *O. FOETIDA* Dsf. Flor. AllanU II. 59. I. 144. - Lnk. el Ilffmnsngg. Flor. Portug.
I. 316. f t. 02. — Willd. Spec. plantar. III. 348. - Willrth. Gener. Orob. -*haaxeui*
44* t — Scapo scosim in basin Inlumescenle; bracteis lanceolatis acuminatis co-
rollas superantib. »quamisq. remolts con form ib. hirsuto - furfuraccis, scgmenlis
calychnig (sepalis) ovato-lanceolatis in denies lineari-subulatos divisis; corolla
indato-lubulosa nervosa (alro-purpurea), labio superlorc profunde emarginalo,
inferioris lacinia intermedia rotundata porrecu laleralibq. subtrilidis denticulato-
crispis; slaminib. glaberrimis; sligmale bilobo coonivenie. "A- — Sea pus sesqui-
pedalis, spica spilbamaea speciosa 50-70-flora. — *O. bmrkata* Broter. Fl. Lusitan
I. 183. — *O. futca* Lam. Encycl. melb. IV. 031. — *O. major* Lngndrff. mss. -
Orobanch major lore cuculMo foeHd4s\$imo* Tournef. Herb. — Crescii in areno-
sis mariimls Barbariae, Lusitaniae el Hispaniae.
- M. *O. SORDIDA* C. A. Meyer mss. in Ledeb. Icon. flor. Boss. AIL illoslr. I. 380. -
Ledeb. Flor. Altaic II. 455. t — Pubescens: squamis floralib. oblongo-lanceolatis
flore duplo breviorib.; sepalis liberis bifidius, lobis lanceolatis subaequalib.; co-
rollae cylindricae incurvae labiis subaequilongis, lobis labii inferioris oblongia
acutiusculis integerrimis planis, intermedio sablongiorc; flamenlis slyloq. sub-
hirsDtis; sligmate bilobo. % — Valde affinis sequenti, sed omnino distincta. Dif-
fert enim pilis albis brevibus densis in tola planlae luperflcir, squamis floralibu<
longioribus flore duplo (non iriplo) brevioribns, corolla sordide flavescente ?. di-
laliaaime subfusca (non amoene saluraieque coeruleo-violacea), lobis labii infe-
rioris Inlegerrimis v. deniculis obsolelis perpaucia insruclis (BOO crebre aperte<
dtaltaitails). — Crescii rariasima in locis ropesribos monliasi Arctul la deseito
Sooafarico-Klrgbbico orlealall BOB prowl a Ueo Saiaan-Noor.
55. *O. AMOBNA* C. A. Meyer maa. In Ldb. Iooo. lor. IMI. Alt Illotr. % 90S. -
Ldb. flor. Altaic. II. 457. t — Glabrioicola: sqnamis floralib. ovato-laoeoolaUs
flore Iriplo breviorib.; sepalis liberis bifidis, lobis lloMrl-ltBOOoUUtoboequalib.;
corollae cylindricae incurvae labiis aeqoilongia, lobis Ublt loferioris obtoaioseolls
denticulatis, intermedio sublongiore; flamenllt baal birtoUotcullst apice styfoq
subglandulosis; stigraaie bilobo. % — Scapos semipedalis. Corolla amoene sa-
turate violacco-coerulca, ntus glandulis ptocis adiperta, inlut glaberrima tu-
bulosa, letter incurva, fauce modice ampliala. — Ab 0. oranarta M. B., qoaeum
Ubio corollae supenore bifido convenit valde diffen squamis floralibus aogu>t|o-
ribus loogioribus, sepalis bifidis, lobis elongalis non brtMtfimo bideniatis corolla
denlque quadruplo majore minus incurva. — Crescii in locis ruposiribui monuum
Arkaul la deseito 6oongarico-Kirgbisico orienuil non procul a Ucu Saisan-Noor
36. *O. ARBNARIA* M. Biebersu Flor. Tauric Caueas. II. 83. - GlabrloseoU: aqoa-
mis lanceolatis; spica pauelflora, squamis floralib. corolla breviorib. srpalisq
gtabriuculis; sepalis bifidis; laciniis corollae acutiusculis; suminlb. glabrm. 'L
- Corollae coerulcae labtum superius bifidum. - *Orobanchr Vreüca prorrtoŕ*
non ramota, caule tenui, (lore parvo tubcoerulto Tournef. Cor. 10. — *O. Cum*
Willrh. (gener. *Orobanch. dtaatin*; '58. — Rrhh. Plant. critic. VII. L 001. fl< ^{ana}
— Cre^cit in Podolia, Ue<inrabia, Tauria ot Caucasia loci* arroo»ii. ⁹⁰⁰
57. *O. ALBA* Stephan in Willd. Spec. plantar. III. 350. - |C. Kueb, Ijnnaea ||||
>1!J - Scapo ruho-villiiho, »quam^ laiufuUli* romoli« mumto, hrad<is ovato-
acuUs lubo breuiirib.; cal>ci» dtpb)lli sepalis obloiiinu acuiii*, rurolUi* tubulosa.

labio superiori obcordato, inferioris laciniis subaequalibus. rotundalis denticulatis, »ugmale bilobo crasso. ^ — Scapus tempedalis glanduloso-rufescenti-pilosus. Spica 1-3-pollicaris. Corolla speciosa alba cum purpura subeunte glandulosa. — *Orobanche major* *Ihyrso florum speciosus* Buxb. Centur. III. t. 2. (nec III. 2. t. 1. fig. 2.) — Crescit in Caucasi graminosis ubertim.

§. 2. *Sepalis in parte posteriore basin versus concretise antice liberis.*

38. 0. MEDIA Dsf. Flor. Atlant. 11.90. — Scapo simplici pilato triato firmo; squamis adpres>is ovalis v. ovato-lanceolatis; Oorib. deme spicalif; bracteis ovalii coocavis calycem aquaotib.; sepalis posiice coalitis bifldis, laciniis aogaste acutis; corolla curvata calycem duplo saperante, labio superiore bilobo, inferiore trifido, lobis rotundalis sabaeqoalib.; siaminib. inclusis. 3* — Corolla pallide flavescens. — Crescit locis arenosis in Barbaria.
30. O. CEHNCA Linn. Spec plant 882. — Willrb. Geogr. Orob. *Statxj*) 73. - Caule simplicissimo; corollis recunralis; bracteis ovalis corolla broiorib.; scapo nodiuscolo. q. — *Orobanche caucie simplici, corolla incur c a bracteis deltoideis longiore* LoefO. liin. 152. - Ei aactoritate Cl. V. A. Meyer species haec brctlstime el valde insufficienter descripla hoc relata eil. — Crescit parasilice in radicibus *Artemisiae campestris* in aridls flispaniae.
- 60 O. BICOLOR C. A. Mejer m«. in Ldb. Icon. 0. Ross. Alt illuslr. t. 300. - Ldb. Flor. Altaic. II. 458. f — Furfuracea: squamis floralib. ovatis acolii, flore subduplo longiorib.; sepalis bifldis T. indivisit, laciniis lanceolalis subaequalib.; corollie cylindricae iocurvae labio superiore soblongiore bilobo, lobis labii inferioris panria seniorbicolalis deoUcolaiis sobaeqoalib^ filamentis basi paberalis, apic« styloq. glabris; stigmaie eaMrginalo. I — Scipna 4-8-pollicaris. Sepala rarlus indivlst, potllot eallu, demon trrefolartter n pu. Corolla valde Ineonra, fere emUnBfJarlf alblda ?. dllaUtlma TloUeea, limbo saturate tiolaceo. - O. *cfmua* Pall. mat. * Crescit In deterto Soongoro - Klrghisico occidentali ad ripam riToli Tschoganka fenos radlcem montis Tschlngistau.
01. O. CASTESCEN6 Boge. Mem. dea div. sav. de St. Ptrsbrg. II. 124. - Albo-laoaU: sqaamis floralib. ovatis acuminalis florem excedenlib.; *opahs poslicr basi con* naim, altero bifido, altero Irifldo, lobis linearib. ioarqualib. corollh* cylindrical inrurvae labiis aequalib., superiore lalo bilobo, inter lobos rrvoluto» bidenUW, lobi« labii inferior!* rotundatM denticulali«; filarocnlii f»l)loque glabris, sligni*^ bilobo. 2f — Florr» intense cocruclo-tiolarei. T>pum novi fjenrri* prtab*** tidrtur, ab *Orobamekù* calycis sepalis allcro biG«do, altrro Irifldo, et labio corolla* »superiore mier lubos bidenlalo diverii. — Oe^ril in Cbinae borealis «onto**» Lun-Zyan-ssy
- f *Species non satis notae.*
- tt. O. RIGES Uitel. Flor. Gallic. 3M. ei G. Don. General sy»t. of gard. and bou IV. fltK. no. 4, - ftcapo Rlabro; sqaamis rigidis lancvolatit imbricate P^{obet}, ~1* Ub.; flortb. late tpiratis; sljlo aUminibq. glabris; lació.i. labii corolliol iofcrcloni •cvMascalis; sligmati« bifldi lobis dtslantibos. ^? - rrr«m in Corsica. — "P*" cics e dlagnosi data ommno non rteognoscenda '«ed cf. infra no. OS).
- M. O. SAMGLIHB Prsl. Delic. Pragent. 170. - Pub"vent scapo Mmpliel. ***£ BOM; sqaamia floralib. flore* sabaeqoanlib.; spicu drusis; corollae lacinlii quahb. obtosis deoiicolatis; sUmknib. glabemmis. ^ — Crescit in *Setia**
- 01 O. PUTYSTIGMA Rcnb. Plant critic VII. p. 11. Flor. Germ. **excurs. 333. no. 10m** - 0Ugm«lis lobis deplano-socnriformlb. roropliratit; stylo apice g **landati-** gero; filamenUs glabris; antberis in tertJre atqur flt*ura brr»» ullo **scrotib;** corolla breti ampliala. % - 9eap«s r«bo%iat atropurpurrut. bractea **sparaeo** remotae. spica «Vn«i««ima, floret amph e trttareo purpureo»»triall g»a **adulesi.**
- Oeteii in Germaia au»irali (traffKrg in f^l^ir^if^cn . *%k |
- 0* o. MDIFLOBU Willrfn. sche'lul. critic I. «a, Gener. Orobafb ***im**tu r - ,** Rcnb. Plant, crrlir. %ll. Of *mi. *H* 010. - Scapo ««bacqo* •; sqoamw w **-ac-**

teisq. ovalis parce birsoUosenllf; segmentis calycinis ovalo-oblongis IU demo lineares subaequales bifldis; corolla veniricoso-subcampanulata inclinala glaberrima, labio superiore rolundato emarginalo crenulalo, inferioris lobis laieralib. snbrhombeis, Iniermedlo ovalo porrecio breviorib.; siaminib. slyloq. glaberrimis, sligmale emarginalo infleio. % - *O. rigens* Lohsel. Fl. Gallic. II. 384? - *O. minor* Flor. Danic t 1210? — Grescil parasilice in radicibus *Pruni tpinotac* (bci Saaffenne)*

60. *O. CRINITA* Vlfiani, Flor. Corsic. 11. - Scapo ad basin sqoamis Iloearib. elongats obsilo, squamis floralib. linearib. acuminalis, extus pilosis, flore longiorib.; corollis quadriOdis incurvis subcylindricis, lobis rolundalis crenalo-ciliallis; 11la-menlis capsulisq. glaberrimis; sligmale bilobo recurro. ty - Spica elongata compact!., apice comosa. Corollae fulvae. - Grescil in Corsica prope San Bonifacio
 •7. *O. CRENATA* Forsk. Aeg. Arab. 113. - Caule simplici villosio; corolla qulnque-loba deniiculaio-crenala, stamina includenle. % — Crescit in Acgjplo.
 08. *O. PDRPUREA* Linn. Sopplem. m — Caule simplici ramosoq; corollis quadrifldis; staminibns calcaratis. — Crescil in Promonlorlo bonae spei.

ft *Spades e gtnere expellmdae.*

- O. ABORTIVA* Leyst. ~ PHBLIPABA ARBNARU.
O. ACAULIS Rib. - AEGINBTIA ACAULIS.
O. ABGINETIA Linn. - AEGINBTIA INDICA.
O. ALECTRA D. Dielr. - AULAYA CAPBN8I8.
O. AMERICANA Linn. - CONOPHOLIS AMERICANA.
O. ARENARIA Brkhsn. - PHELIPAEA ARBNARIA.
O. BIFLORA Null. - A3OPLANTHIUS LMFLOBCS.
O. BRASILIENSIS Arrabida, Fl. Flumin. VI. I. 03. - BESLERIA...
O. CAESIA M. Bieb. » PHELIPAEA CAESIA.
O. CALIFORNIA Cham, PI Scblchld. - PHELIPAEA CALIFORMCA
O. CALOTROPIDIS Edgw. - PHELIPAEA CALOTROPIDIS.
O. CAPKNSIS Thnrbg. - ALLAY A CAPEN6H.
O. GARNOSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. U 01. — BBSLBRIA. . . . ?
O. CBRNUA Arrabida I. e. L 71. — t?
O. CERNUA Pall. - PUBLIPABA COBRULBA.
O. COCCINBA M. Bleb. * ANOPLANTHUS COGCOIBU8.
O. COERULEA VIII. - PHBUPABA COBRULBA.
O. COMOSA Hook. - ANOPLAIFTHUS COMO8C8.
O. COMOSA Willrh. - PHBLIPABA ARBNARIA.
O. COMPACTA Viv. - PHBLIPABA COMPACIA.
O. CRENATA Arrabida, Fl. Flumin. VI. t. 6X - ?!
O. DELILEI Dene. - PUELIPAEA DELILEI.
O. FASCICATA Null. » ANOPLANTHUS FASCICDLATIS.
O. FISSA Arrabida, Fl. Flumin. VI. L 00. - UYPOCYRTA. . . . %
O. FLUMINENSIS 19 Arrabida I. c. L 63. - BBSLBRIA. . . . ?
O. FORNIX Arrabida, Fl. Flumin. VI. I. 75. - HYPOCYRTA. . . . *
O. FRAASII F. W. Scbulli. — PHBLIPAEA FRAASII.
O. GLABRA Hook. - BOSCIINIAKU GLABRA.
O. HIRTA Arrabida, Fl. Flumin. VI. L 70. - UESNBRIA ALUGOPHVLU
O. INMCA Rxb. - PHELIPAEA INDICA.
O. INDICA Spr. - STB 1(1 A OROBANCHOIDFH.
O. INTERRIPTA Peru. - PIIKLIPAEA RAMOSA.
O. LAKVIS Khrh. - PIIKLIPAKA ARENARIA.
O. LAKVIS Lam. - PIIKLIPAEA COERLLEA.
*O. LO*GIFLORA* PIT*. - PIIKLIPAEA LONGIFLOUA
O. LLDOWICIANA - PIIKLIPAEA LIDOWICIAM
O. MELANCHOLICA Arrabida, Fl. Flumin. VI. I 77 - im><M.\R1,|\
 <> MONAMTHLOS Arrahida I. r. i. 60. - UYPOCYRTA , •

- O. MONTANA Rudb. - CLANDESTINA RECTIFLORA.
 O. PEDINCILATA Arrabida, Fl. Fluroin. VI. L 73. - V
 O. PEDLNCLLATA Rib. - AEGINETIA PEDUNCULATA.
 O. PEDINCILATA Viv. - PHELIPAEA PEDUNCULATA.
 O. PERIANTHOMEGA Arrabida, Fl. Flunnn. VI. t 08. - BYPOCYRTA
 O. PHELIPAEA Wilrtb. - PHELIPAEA TIMCTORIA.
 O. PHELIPAEA Willd. - PDELIPAEA VIOLACBA.
 O. PCRPI'RASCENS Gmel. - PHELIPAEA COERULEA.
 O. PL'RPIREA Jcq. - PHELIPAEA COERULEA.
 O. RACEMOSA Arrabida, Fl. Flarin. VI. I. 18. - RYDITOPHYLLUM PRASI-NATĪM.
 O. RAMOSA Lion. - PHELIPABA RAMOSA.
 O. ROBL'STA Alb. Dletr. - PHELIPAEA ROB 1ST A.
 O. ROBSICA Cham, el Schicbtd. — BOSCHNIAKIA GLABRA
 O. SBCUNDA Clot. - PHELIPAEA COERULEA.
 O. SERPENS trrabida, Fl. Flaroln. VI. I. 07. - HYPOCYRTA
 O. SICĪLA Spenn. - PHELIPAEA SICCLA.
 O. SCHĪLTZII Mutel. - PHELIPABA SCHILTZII.
 O. SĪ'AVOSA Tbnbrg. - AILAYA SQĪ'AMOSA.
 O. SPICATA Arrabida, Fl. Flomlo. VI. t 7a - GESPCERU ALLAGOPHILL4
 O. TLX'TORIA Fortk. - PHELIPAEA LUTBA.
 O. TLNCTORIA Willd. - PHBLIPAEA TUICTORIA.
 O. TIBBROSA Arrabida, Fl. Plnaiio. VI. L KL — ?T
 O. TIREROSA Hook. - BOMIHNIAKU HOOUR1.
 O. TUBULOftA Arrabida, Wl Fl uU. VL L m - tt
 O. IMBRLATA Ambida L C k m. - tt
 O. UNIFLORA LIM. - A19OPLAITHCJ8 OHIFLORD8.
 O. WTBNBAGEHSW Bkt - HARVBYA HJ1PI7RBA.
 O. VENTRICO8A Arrabida, Fl. Fiomift. VL t 74. - TT
 O VERTIGLLATA Arrabida I. c L 04. - TT
 O. VIOLACEA Wilrlb. - PHBLIPAEA VIOLACBA.
 O. VIRGIXUNA Lion. - EPIPHEJIS AMERICAMS.

4180. BOftrn\llbil% f. A. Meyer.

C A. V<7fr nif. ei Bogrd. Mom. do l'acad. imp*r. dr Sl. Plrtbrg |N. S*r.| U
 19. - Mrun. Geor. planL vaicul. I. 311 II. 221)

I. B. OROBASCIIIE Hook. Fl. Bor. Amer. II. 91. I. 107. GLABRA C. A. Meyer ~~ms.~~
 ei Board. I. c. - Glabtrrina: eaulr iqaanalo, basi Incraataio rellcalaio; ~~equa-~~
 ail cordali* aeOU* (tkclute) litrmc ratcitorarit; calyce cjalblfonoī ~~ird~~^{***TM}
 corollae tobo loflato, lablo avpenoh floogalo Integra, iofenorr ~~o b r A * A J J ! ^~~
 •urr in l o bo. % - Tnbw pollic« Mtp« cra»»lor diffonna folidof. ~~fl...~~
 (BHuU* <***\$*??) llgotit latldH, caolm not tingnlua. ~~moz p tres profert.~~
 Bcap«a caulU«<» tiinplirit%iBVJ craaiaalaint 0-:iO-li-pollrah«, ~~squams basi~~
~~obulna~~ tftaaiaalmc Imbrfealia, tarara dUtilit tpar»i». Squama* ovaiae ~~oDis~~^{oDis} T«
 ae«ajUaau«_t Infiiiore* tablude ~~bt viore~~ oniniou lar«r»_t *upcri«ret (bwclntnj
 pllit albit eritpaila eiliaur, rajce longiorw, coroll* ~~brectiorr~~— ~~Spica~~ ~~4«nalaainw~~
 diaetro polliari, ba»l paollulom rvasala majurrm r«ulu occupant ~~partem imo~~
 ftw Joiegmm. Floret telra »qoa»a. brettilnr pedlcHlai.. calyee ~~ebrectate.~~
 circiioTUatat loagi. Calyt mbo rorolUe bre*i««r monopb)llo», plh» ~~«|»«crie-~~
 pai^cIIUUif, tnbInMaio* ». loarqoallrr q«ioqardrniaiu«. drnle qnl»¹⁰ ~~po~~
 minlnjo. lalcrahbat aMjorlbna, lalerdnai Intnraniibu*. Corolla lubolota ~~inw~~
 glabra, ptht albU cttlpalia clllala. Tnbnt brvtu. labium ioperio* ~~Jj|~~^{10tl,cr}
 p«rrectuai bttqñaj « taij>loi lnYfaun. Infrum oi.o.reum tubiruna ~~caM~~
~~lribum.~~ Suslna 4 didyaama aindto mbo Inavria ntrru, ~~Wlo»»UPA~~
 ^•ra. FllaBMInbaaidilnuuanbflaadnlofta.rarleniai glabra Anib«ra0 ~~«-su~~[^]
 bli«~~colares~~ araikM. Bifhu In Ubman tofenun Jēo>i«t. »Ugm« arqnaie- ^f

*ubobliqua leniformis. - *OrObmuke caule Simplici9timo uUra dimidium florifero* Gmel. Flor. Sibiric. III. 210. t 40. fig. 2. - *Orobanche Roaica* Cham, et Schleichd. Linnæa III. 132. t - *SteUara lathraeoidet* Fiach. mss. - Crescll In inaula Cbamiasonts, adLenamet in Kamuchaika. - Kamlschadalis contra Haemopiysin eal remedlum. . w i t .

2. B. BOOKEBI Wlpra. maa. - Glabemma: scapo squamato, baal tuberoao; *quamM ovatla acaminatia (siccitale) iolense fuscis opacis, tubere reiicalato areolia toberculiforraib. pentagons; spica densa; florib. unibraclcalis; calyc© eyathlformi obliquo tridemalo; corolla tubulosa bilabiaia, febiis ereclis, superior© otato inlegro, ioferiore trilobo brevior, lobis ovali-oblongia obtusls erectis. ^ - ParaiUca in radicibus. . . . ? Scapns erectus aimplei digiulis et ultra, squamosos, baai in tuber reticulaium incrassalum aquamia laiiu»culis fusco-nigrescentibus leetam abiens. Flores in apieam elongatam congest! erecli paullulum curvati. Stamina inclusa. Filament baal barbala. Anlberae ovalae erortae apiculataf, facie anteriori debiscentee, rimla longitndinalibua auperne Junclis. Germen oiali-aobrotundum. Stylus supra cunraiuu. Stigma subqoadrilobum. — *Orobanchf tubtrosa* Hook. Flor. Boreal. Amerie. II. 02. L 108. — Greacil in Amehcae borealis ora occidentali.

4187. CLAWDB9TINA *Tourn\$.*

(Tourner. InaUl. MI herb. 052. — Melai. Gener. plait vaeol. I. 314. II. m*>)

- I. CL. RECTIFLORA Lam. Illualr. gener. t UI. fig. 1. - Candlee kynogaeo rasnono aquamato i scapla brerlssimis; florib. ei ailllla squamarum solilarlia longe peduncnotis strictis magna coeruleia. *Q* — *Chndettina fore tubcotnUeo* Tournef. Instit rei herb. 032. — *Lathraea Clandestine* Linn. Spec. plant. 843. — *Orobanchke montana* Rudb. Klys. II. 233. fig. 11 - *Denlaria aphyllt* Kay, Uintor. 1230. - Moris. (Hon. Ilistor. III. 303. sect. 12. I 10. fig. 15. - Crescil in lom urabroti* parasiticc in radicibus arborum in Europa ausuali (in Gallia, Hiapama ft Italia*.

41bH. LATHBAE/I Linn.

(Lion. Gener. pi. no. 743. feicl. sp.] - Meisn. Genet, plant vaacnl. I. 314. II. 225.)

1. L. SQUAMARIA Linn. 8pee. plant. 544. - Grtnr. De frncUb. el neminib. I. 241 t tt. - 8m. Bngl. bou t 80. - Flor. Danlc 1130. - gcbkkr. Bot Hodb«k. t 70. - Alb. Dittr. Flor. Bonaale, IL t IU. - Bvenak b H t U i - Bebb. PL Qtrm. e&enra. 357. no. 9131. - Koch, SysM#e. fl. Gem. (eJH. I.) em - Bkiiuoma c r m m ramoalaaimum, aquamia bravlbaa enraosl 4 M M Imbftoatâa albMla vajftllque obaitnm; scapi plurea aemlpedalea ettjat albdl, aquamla aparalt aibidU carnoaia insiructi; Oorea in racemum nlllateralem Inclinaium eoltoetl, brtrtler pedifrlati biseriati, sqnamis bracteantlboa dorao peduncotl commral blaerletls eraaala carnoaia rubescentibus; calyi albido-rvbescens; corolla ealyce anbdupto longior albida, lacimis pillide purpuraacenslibna. % — *CUmtUsliut penduUfiora* Lam. — Blackw. Herb. t. 430. - *Squamaria Orobantke* Scopol. Flor. Carnlol. 700, - Blvio. Monop. irregul. I. 80. fig. 2. — *Amblatum* Dodon. PempUd 551 fig. 1." - Creaelt paraaliice in radicibus arborum froticumque frondosorum (praeaeiriim Coryff leaitesMt; per toiam fero Europam et In Himalayae moniiboa.

ft. irecla C. Koch, Linnæa XVII. 901. — Erecta (nee eerooa) oeraleacena: braetela ovatis; calyce piloso Inflato; corolla tubuloat euerta, labio superior! galealo, inferior! erecio anbtrilobo; aumlnib. euertia, anheria albo-villo^t-florib. denaioib. boritontalib. nee cernnia. ^ - Cretcll in Somcheitae ^{ylvia} carpineis. — Specie differre videlur.

1~ *Species e yenere expellenda\$.*

- L. ANBLATIM Linn. - ANOPLAMIU'S TOTBNBFORTII.
L. (XANDESTINA Linn. - CLANDESTINA RECTIFLORA,
L. PIIKLYIMEA Forsk. - PIIKLIPAEA RAMOSA,
L. PIIELYPAEA Linn. - PHELIPAEA LI TEA,
L. PIIKLYPAEA *fi.* Linn. - ANOPUNTHIUS COCCL>ELS,
L. QUINQIEFIDA For>k. - PUELIPAEA LtTEA.

41s<J t\OPLiVnUft Endl.

tEndl mil. ti Iconogr. geogr. L 72. - fttfseiso. Geogr. plant, vascular. I. 314. II. fcg
— *Anoplion* Willrh. Geogr. Orobanch. *dtat^j^* [*Orobomchet* secl 3. — oec Zoolog)
— *Anoplion* G. Don, General *)»(of gird, and bol. IV. 631)

8*etla I. EUAJOPLOI UdL feNr. pUnt p. 727

Corollae lubos longus iocunrus, limbos paleoa. Scapoi brevis T. obfolotos, peducaloi eloogalof gracilea uqifloros, baid aquama vagtaaloi promeot.

I A. ITIFLORUS Eodl. Iconogr. goar. 1751 — Peducvlis uoiflorif loogittimlt gracillimii biriellia, bail squamis ?agtaaeformib. monitlf, icapon radicalet obaolelom loDge auperantib.; corolla labajoaa loeunra. labto Miprriore bifido, lacioif It-bias i«r«r1as irifldam aeqantib. eiioa margioeq. ciliati», siamimb. stjloq. glabrii; Migmalo eapiuio euargtoato. 3) - Habiloa *Pmimtta**. bcaput radicalii wjoaail paucissint. it ovaiis crassiuscolis acuUs temiamplexicaoli - decorreoibus mooltoit «e%quiuncialia glabemmus tsub«implei pallide rofceiceos. «quamae tiortgerae obnuae leouiter pubeotes. Peduoculi quadripollicarea umOon. Calyi campaoollaiui quioquefldof ebracealeus. deniea ovalo-actumioali birsoU. Corolla lobalota •Dnini longiiodioaliter siriaia birsou pallidr coeruleacea tobbilabaiim quioquefida. lacimae Otaio-obloogae oblosae aequales leooiler ciliaiae Antbcreae glabrae. (apsula ovala. - *Dt%Ur%ar tern Anbltto eordi a films, /fore poU%dt cotruleo* Grooof. \irgioic. 70. — *Gtnltana mtnor turra, for* nmphct ampto di^Mro palhd4 /Ur«ct*40* Plukeo. Mat tt. L 34ft. fig. I. - *Orobomckr u**fior** Lion. Spec. planur. 8M. - *Orokmdu (Pk*Up— ftpr. 6jtt «egeub. II. 619.) bifiora* Null. Geogr. plan. Aatric IL MI - Book. Flor. loreal. Americ II. 93. *Anophn Infiorum* G. D M U M N . ! * CttMII la Virfiaia. Canada ei New Foodland.

S. A. COMOTOS WlPfi. MM — rlliiMOM: caole bretl denaltalmr fascicolaUm raaMao; roMto iqaa—alat calyet ajatejaepartilo ebraeteaio, lacinui laoceolatii acomiaaiis (**esabolatisolaM aoetor^ eorollae lubo longe eurrtto curviiio. Ubiis eloogalif reeonia. aopariori obloogo bifido, inferior; infido, lacinns lioeaH-obloogit, apue bidentalis; aolberis pilotia. 4 — Plaoia qudnpollicans corjai* b«so-rauoia, caolis sefquoipollicarif. deotitsime aquamaius, squamae pTalo-ae** miniaiae brevet. Peduoculi pollicaret «|qama lioeari, raljns bji.in ubaUiof#*ia supra medium ^agioalim Inclu»i. (al)i fere batio u»que quioquefidua ~~breu l^~~ ~~pinaculus~~ Corolla calyce ultra doplo loogior, pollicant, lubo parum ~~incurve,~~ ~~labrum~~ iippenoa breviler biUium, hciniae labii infenont arqualet, ad ~~labiorum~~ ~~incisuram~~ usque secUe, apue bretiier biftdae paientim rerurtae. SijluJ ~~apice~~ fere renaogalo ladiMloa glaber. siigma brondibuliforme capiialom. Cap ~~caula~~ o%cia glabra. - *Oroimtk* tomosm* Hook. Fl. lor. Amt/ie. II. «. L 160. - ** rip it 6 Columbian crtttdt

1 A. PASCJCI'LATt «» Wlprt. m)t. - Pnlvtmlealo-pobetceBt• raole breti ~~fascicu-~~ laUm roaioao; ramoh* »eu peduoemlis audit uoiflorU, nIjrr quioquefido ~~ebreo-~~ loou, kdia tHaagvlinb. at«tl«; cotollar lubo longe eurrio curraio, labilt «» ~~ectis~~ coeavia brovib. obtotia. taperlore bifido, tnfriorr infldo. IanniU IniegtiJ ~~lib-~~ •eaut glaa^alo^f, aai^etit Rlabrit ^ - Plania i .-4-3-pollicarif. «» ~~pas~~ •iajplet sqoamotaa. aqvamae ovalae obiasae, flohferae acuiiosmlae. ~~ed^VZ^s~~ soiliir.1 obroeioaU poJtlicaret et atillit tqiamarum 4-6 ulnmarom. Calyx ~~www~~ caMlliatMl->aaja«a«la«u., breviter quioqurj.num. Corolla calyce ~~g" i^ of~~ ••••of i«a«loM iacofto, laeiaiao mba 4-S-ir% l»r^»ior**f. ~~tupenoret~~ ~~lipae~~ ai^ ^ coahue, em ubo »tloeo-a#>o«roal*«. »iylaa glaber, sub apice defleiw. ~~it. Sr~~ capluio-lalHattallbnBe * *OivUmtm** (Fk+p*** Spr Sy.i. ^ ' ^ / « ga /atetasiafa Rail. Geaet plaaL Aawric IL M. - Book Plor. lor. Aatom. ~~bo-~~ t ITPi - *AmspUm f—ticmUtum* O. Doa I. «. «3J. ao X - Crttst: i la Aaien^ "all (tatkaicâaoaa, ColaaBMa).

4. A. COCCINEUS Wlprs. ma*. - Pinguis glaberrimus: aepo squeals semiamplexicauli-vaginantibus. remota multo in pedunculum uniflorum lerninaleni prolenso; calyce monophyllo ebraciatato Irregulariter quinquealato; corolla Inlatocentri-cosa quinquefida, lobis aequalibus ovato-rotundatis. % — *Pk\$tip*ea* {*Anoplon* 6. Don, General syst of gard. and bot IV. 833.) *Towmtforiii* Dof. Aon. moa. d'nlatur. X. 898. t SI. — *Pkelypaea* {*Anoplon* C. A. Mey. Veneichn. der PiauL am Caac. 104.) *Biebenieinii* Flsch. mi a. - *PktUpae** (OrofcNsato M. Bieb. Pl. Gaip. 58., Flor. Taar Caocas. III. 418., Pl. rar. Ross. II. t 00.) eases*— Pert. Eocbir. II. 181. - Wallrfn. Gener. Orob. *dtantui* 66. f - *Lalhraea* Jft#ftjM*« fi. Linn. 6pec. plant. 844. — *Pketypae* orientalis**, (*Lore coccineo* Tournef. Coroll. 47. t 419. - *Lalhraea Phdipaea* GULDENST. llin. 1. 422. - [*Phelipae* foliata* Lamb. Transact of the Linn. Soc. X. 200.17. - Spr. S)sl. vegetab. II. 818:t!J - *Aegi%mm cocceinea* Joss. ms«. — *Oroboncht PhelipMa* M. Biebertt. Fl. Gasp. Appndx. 170. — Crescit in Armenia, in Tanra, Caucasian in Sibiria tfrnus mare Ca«picum. — Planum Toarnefortlanam a BieberaieJnlana speciedifferre v«J« dubilamus almul cum Q. Wallrolb.

iMttt O. sJDUTUI In41. L e, TB8CUL

Gofollae tabus breffa venireosus, limbus blabiatus. tea»«a tqnamis niajes-calis amplexicaulibna faginatna In pedimoulom aalItorani 4tttaoaa.

3. A. (AMBLATUff G. Don, General ayst of gart. and bot IT. W.) TOUWIFOI-Til Wlprs. msa. — Gorollae lablla Indiftola. *? — *Uthra*— *Am%htmm* Linn. Spec plant 844. — *Anblaium wrUnimle*, /fete *pmpura»ctnt*§ Tournef. Coroll. 48. t 481. — [*Phelipaea foliata* Lamb.tTT — Cf. speclem praecedentem!] — fttlrpa a nenlne post Teprnefertlum visa, talde dnbla! — Grescit in Oriente.

4100. AEGINETM Linn.

(Unn. Spec, plant [edit 1.] 032. - Mei»n. Gener. plant vascular. L 314. II. 224. - G. Don, General syst of gard. and bot IV. 031)

- I. AS. INDIGA lib. Plant of the coast of Command. I. 03. t 91. - Bib. Seropbnl. Udte. ftl - Seapo eiongato anbaimplici nudo; oorolbe limbo brericer quadrt-H±% - (Walk CetaJ. W) .- Q r f » s u | f A***** *Urn*. Spoe, plaaur. 883. - WM - Cte iik Itmte, Begl FakfroV. XL fl. 141. -> Cewin ewaan nej>pora, ealyi aveaatna. — la ~~lump. stryian (Lagaria, SIDA, CACARA, TANG SONG, TIToy, Dbeyra DItaa, EMaA qin w Wi m & L~~
2. AB. (OROBANCBB ti^ . Hort leJtg^nl *ft. it Fl. MM. tit *Wkf fBDUNCUUTA* Wall. PUnt Asiatic, rartor. ltt. It. t t» «^ — Glabrnt ee*f* atmf Uo) aquaails panels atlenuatis carnosls lostruelo, squamit floralkb. liiangnlartfc. ; eeJyeo spa* ibaceo monophyllo interiore lalere 6sso; eorollae tobo Inlntn eaifoem aeqnanlni limbo quinquepartito subaequall, segmenUi reolfomilb. denUenlalls; llasnaejils glabris; siigmate magno cordato-peluto. ^ — Pedunenli untlorl onapum aeejana* tea. Flores maiimi. Gorollae Cubus luteus, limbo obeeuro violnoeo. Calyi tiquore viseoso repletus est Siamioa inclusa. Gaptula ovata. — Crealt perasiltce la raddelbus *Andropogi wuncaU* et *Bambusarum* complurluni In Bongbalia.
3. AE. ABBBKVIATA Uamilt ms». in Wall. Catal. 3001 - Bin, I. e. — Wlprs. Nov. Act aead. Caet. Leop. Carol, nat curios. XIX. Supplem. I. 400. — Canto brotissimo ramoso (v. simplicl) sqaamato; eorollae aaspUe Hmbo bilabftato, lablo inferlore ample trilobo. % — Crescit in Peninsula tedtae orlenUlla ot In Manilla.
4. AE. (OROBANCHE Rib. Flor. Indic. 111. 20. ei Plant of Ibe coast of Corumand, t 293.) ACAILIS Wlprs. mis. -- Acaulis: florib. in capitula trrognlaria radica sessilia congettH; calycib roonophyllis spalbacels unilateraliter Oast v. irregular nler bifldis; eorollae lacmiis crenatis; antberis slmplicib., duabua Inlerlorlb. glandula magoa recurva c\ali auctis; stigmatate peltato. Q - Braciae trlangelares, pedicellum unum v. plures includentes. Corolla rttus purpurea. inius Oava — Grescit parasilice in radicibuk *China tug*r-ca*e* '?) in borto boUnico CaU cuUeon.

t *Species e genere expeUendae.*

AE. CAPITATA Grab. « LIPOSTOMA CAPITATLM.
 AE. COCCINEA Juss. — ANOPLANTHI'S COCCINELS.
 AE. LONGIFLORA Car. — BOIVARDIA LONGIFLORA.
 AR. MCLIFLORA Car. - BOLTARDIA GAVANILLESIL

4191. 0TOB.%\CHE *Thnbrg.*

(Tbnbrg. ei Linn. Mantiss. plant. 203. — Meisn. Gener. plant vasenl. I. 314. II. 2H
 — G. Don, General syst. of gard. and boL IV. 835.)

I. n. SANGITIBA Linn. I. c. — Sjst ?egel 574. - Endlleb. Iconogr. gener. t tt-
 - Toti planta sanguinea: spka Tillota; (lores porpurci. V — Petit. Gaa. I. SI*
 Ig. 4. — H. eocetawi Llaa. mas.? — Crcicit parasilice in radicibns.? In Pr*~
 monlorio bonae spel.

Cleaaa d•*!«••

4192, EPÍa1111ZA\T11tH *Blume.*

blumc, fatal. horL Bujtenior^r. ex Flora [B. ZJ 1<25. p. 103, - Meisn. (Jtner.,
 Her pubenlj;„Jn>ar#tttcul ar. |. 314. M# 234.)

1. E. CVLIMR(VA Blune I. c. [M. - Spicit drnsit cjilindricis; germine obloajo:
 *|>|o CM<SO minimo. 4? — Cre^cii in imala Java,
 2. E. ELONGATA Blume I. e. - Spicis laxii elongatla; fermine globoso; st)lo sim-
 plici. ^? — Oescit in iuuJa Ja^a.
- X E. LINEARIS Blume I. c. — Spicit minimis teaiiasimls; germioe globoso; ~~st)lo~~
 selaceo. ^T — Cretcil in insuJa Java.

Genera affilia.

410Vi- PUOLIBMA AufC

(Nntk nwa. In W. I. BOOB. l<t<. planian U 68B.)

Calyx protada aaipartias. laciniit linear!-subspathulalis. Corolla mo-
 nopelala Infoodibaltfonttis, limbo gobregalari srilobo, lobis rotuiulaiiii
 plieatls, aeatlvatioae Irobrktiis. Stamina 0 nupra medium tub! inserU
 inclusa ani^frialia aeqoalla, cum lobis corollae alterDantia. FilameotA
 brevia. Anili<^rae obloogo-otatae oblusae baloculare\$, oculis prope ~~mon~~ ^f
 ncru longiuidioaliter debi>cotibu>. Ovarium superum aubgloboau, ~~u~~
 cirrumftTentiam multiloculare, oculis uiiii-otulatis, oulis ad ~~ang~~ uJ
 iolernum rirea.aiia rra^ais^imum affliis. Stylus elongalus ~~CT*^~~??
 incluHiis. Stigma dilalalum, crntro depreaao, marglne lobato-deotw*
 ifurius imnalurua ban at us>? loculia tcmioibaHquc ut in otario. ^JJ^K
 ei angulo iuteriori peoiletitia. —> flerba aacculfnta colorata ~~l para~~
 in arcoosis Califoniiae proTenin^ facie *Orobomchts* apbylla, acapo ~~simplic~~
 aqataoao! floribua partis dco>i>!*ima apicaiaa ul tidetur ebraceieaua,
 I. PH. ARE.VUICif Won. mat. In Hook. I. c. - Planla »*pu>* polliew alia b ~~ablit~~
 €Mr9tmne**m?. *Hitip*—mm rrfrrrnt. Scapu* ereetat tlmcki ~~dense et sub*~~
 aaakai tqnaaaalaa, tqamae r h^ . arqqiUu tliiptiro-oblotiM' obiotae adaw*aaar^
 VUnm aplaa bit+INctrf. poll.crm rra<<a otalu mu In flora Caljfli ~~l<c<B ia#~~
 44Tii-tibaptinfulalaa aruiia>cuUe. nurf 4>* dor*<>(ur pilo<rr, oroiiao ~~*mm^~~£
 mm brtvit<<a. Gafella mfundib<difortni - lubulota . ore leviirr ~~constit~~, ~~uun~~
 MIMI laaltlat taiasdaue obl<aa<< nndnlalo-rrvntae aeqaalaj ~~potente~~. ~~File-~~
 • w u aa)ia<ffar<ai togittdiatt. 8i)l<<> Minim *wjuat - Uttett ~~locis arumalis~~
 »• ^lifonia (Moammj *i \$t. Dieajo).

41W,. LBM^Ot *Uaue ti Lesarza.*

Llawe H Utana, Kov. t^H. «*tle. dr%rnpi. I. 7. - Mn.n. gmrr. plw- ~~f-sec~~
 I. «i II. IH. - C>r*Ut>rk,amm B. B. Kth. Ho». |rn n ^prf P^li/JS |S|.)
 1 HObli. - Ilk. 8j>o^ pl. inpla. ir. <7. - Endl. tirorr. pi. p. ¹³*J1!1, |i,
 I. *L. BUDBKH>ROIDES IU<e fi Ltarta I. r. - CWtfopaffaiiai ~~^^~~
 B. Kit 1.1. e. r. - Crvtni paraeilca In radidbva.? la M^air<

Ordo CLV. LABIATAE Ju\$*.

(Endl. Gener pUul p. 807. — Meisn. Gener. plpt vasqui. I 282 IL 190 — Lablatarum genera el epeoles: or, a description of the genera and species of plants of the order Lablatae; with tholr general history, characters, affinities and geographical distribution by *Ueorge "Bimthmm*, Lsq. F L . S - London. 6vo 1832—183G J

Tribus I. *OCYMOIDEAE* Btli. Labiat p. I T - Endl. Gcner plant p. 608. — Meisn. Gcner. plant, rascal. I. 282.

Stamina deaUnata. Corolla avbbllablata, lobls qualnor anperlerlorlbaa plants aubaeqaattraa blolm tapremia coalitla, IBIMMI rtarilMln fātnmqieie dlfforml piano Y. saeplaa concato cynbaeforml v. aacctto. Ailkarae tfe-floratae saepissime patellaeformes."

Subtribua I. *MOSCUOSMEAE* Endl. I. c.

Corollac laoiniae subaequllongic, inflma angustior declinala anbplana. — *Tropicae amphigcac.*

3509. *OCIMIM* Linn.

Linn. Gcner. plaot. no. 131. - Meito. Gener. pUaL vaealar. I. \$OL 11. IW. - BU LablaL I. ct 707.)

Scilla L. Botanic Garden, 1788. L. c. G.
 Tjrnantflta tyvariora b a Tii...
 teillerl, padleellt raSaila, fitlpe...
 1. O. CANUM S!ma, Bot M a o la...
 erecio pube\$eent<; foir. paUotalli...
 lat cioeicntib., petiolit dllallf; neaffila ttmpffclb.; ea||ij...
 fraetiferit reflexis cauli adprettlt^batl tnpra fibbla <ft...
 orbiculalo conca^u brerisiime aemnlDalo, alls batln eatfelf BOB atllBgeaub.,
 denlib. lateralib.o\alii acutlt, laflmlt aetaceu; ftiamaut avpefiorib. baal app<a-
 dicalalU. ^ - AfOnc O. BatiUeo, ted flortbat dapio nlnoribot M kabHo difUaelaa
 Caollf pcdalii vcl ultra, ramoini, pilit brevibu^ rffleila aaeplM faadealaila eaao-
 pobaeaeot, ad axillat pilis nonnullit lontU all>ni> clliaina. Folia, ovata Y. ovaio-
 i^Monfa, l-<< pollicet Ionia, inieferrima v. FubdenUU, Bm...
 ~ rarla looglt albin saepins clliaia, sapra ad n<<^vot Unuiatltao pubttcaftUa, subiut
 fiabra pnnruta Racemi nunerosi tlricti, 6-polloarM r. ottra, teriidllaatria nu-
 merotlt, fruciiferis vii samplolleeat dltUnUsMa. Folia loralla obknga, p<UoUu
 ealycei tk taperamia, clliau. Catyocet aU padaaculi parce eillaU, orbiruUio-
 depress! vix tesquilineam laii. (jenlialia corolla Kara duplo longiora. — O imeri-
 eanum Lion. Amocn. acad. IV. 276. — (Id. Spec, plant 633., BOB Jaec.) -- (t album
 Roxb. el aliorum, non Linn. — O. itamimtum Bimi, Bot Mag. t Mat., in u-uu
 — O. incane\$etetu Mart Reise nach Braiil. II. 787. — [Bib. I. c. 13. BO. tt) —
 O. kisptdulum Schum. el Tlionn. Kon^l. Dansk. Videmk. SHsk. Afbaadl. IT: |0
 — HabiUl in Asia calidiore, in Madagatcana, in Indite one nulls pfnintula', ,,
 IBSQII Zfylandia, In provincit Silbel Benabaliae, in *c<<no Uurmanico ad |asl.i
 mew, IL (Ibina el in intuitu Marianu.

2. 0. *BASICUM* Linn. Spec. plant 833. — Bth. I. e. 4. t — Caule herbaceo erecto T. adscendente; foil, petiolatis ovatis T. oblongis, basi angustatis aobden Uti glabris, petiolis ciliatis; racemis simplicibus; calycibus pedicello longioribus, fructiferis reflexis inflato-campanulatis ciliatis, basi supra gibbis, dente supremo oTato concavo brevissime acuminato, alis basin calycis non attingentibus, dentibus lateralibus ovalibus acutis, infimis setaceo-acuminatis; filamentis superioribus appendiculatis. Q — Species dia culta sub diversis coeli lemperiebus, ande quam maxime variabilis. Caulis herbaceus, saepius ramosissimas, erectus T. In var. a. et 0. basi diffusos et adscendens, pedalis Tel ultra, basi glabris Tel pilis brevibus reflexis pubescens. Folia ovalia, obtusiuscula TO! frequentius acuminata, basi saepius (in speciminibus syhstribus) valde angustata, subter paniculata, irregulariter dentata Tel raro iniegerrima; florilla parva bractaeformia, petiolata, oTatu, acuminata, ciliata, calyces paulo frequentius Ja, saepe colorata. Racemi saepius 8-10-pedicellares, BBBO to Tar. 9. Tix 2 poll, longa, in Tar. A. pedales, simplices Tel in Tarr. ?, *, f. Tarle ramosi. Verlicillari in Gmi saepius pollicem fere distantes; sobrani (in Tar. 7. et t'omnes) approximati. Corolla calyce subduplo longior, tubo incluso, fance sobinflata, in Tar. s. major; labium superius late quadrifidum, inferius integrum dilatatum, lobis saepe crenatis nodulato-crispis T. in Tarietatibus cultis fimbriatis. Stamina saepius exserta. Filamentum superiora breviter appendiculata. Stylos basi Inerassatos. Achaenia laevia.

a. *piloium* Bib. I. c. — Caule ramosissimo adscendente; foliis parvis oblongis finjegerrimis, petiolis terlicillastrisque pilosissimis; racemis elongatis; corollis saepius glabris. — *Basiticum indicum* Ramph. Herb. Amb. V. 263. t 02. fig. 1. — *Ocimum minimum* Barm. Fl. Ind. 120. (non Linn.) — *O. Basilicum* Burm. I. e. - *O. hUpidum* Lam. Diet I. 384. - *O. fdoiium* Willd. Boom, plant hort BoroL — ftoib. Hort Be* 41 — *O. affHajw*. Horaem. Hort Hate.

fi. *wmimum* 01k |> i/ — Habitu fere TarloUlls &, sed erectius minus pilosum: foU Bajofik m M i . subdecaiafet ootolla saeplos Tillols. — *Soladi* 7Vr-1MB RhodOv Hort Malab. X. 173. t 87. — *Basilieum citratum* Rumph. Uerb. Amb. V. 208. t OX fig. 1. — *O. BasiKcum* Linn. Spec. plant 833. — *O. lan&olatium* Schom. et Thonn. Kongl. Dansk. Vidensk. Selsk. Alhandl. IV. 42T * *O. anisatum* Hortul.

y. *glabratum* Bth. I. c. — Caule erecto; petiolis calycibusque parce ciliatis; foil. Tix denatis; racemis elongatis simplicibus. — 0. *iniegerrimum* Willd. Spec. plant III. lot - *O. caryophyllUtum* Roxb. Hort Beog. 4 1 - 0 . *lanctdatum* Schom. et Thonn. Koogl. Daosk. Videosk. Selsk. Alhandl. IV. 42. - Bih. Labiat p. 0. t

*. *majui* Bth. I. c. - Foil. oTatis calycibusque magnis; racemis elongatis simplicibus. — *O. MB/BJ* BortnJ.

c *album* Bth. I c - Foil, late OTAUl ortstioseoilf doBULis; racemis abbreviatilatis densis Tix ciliatis eaatcoatih.; corollis glabris T. Tillolia. — *O. album* UBB* HaBlitt. plant 8 1 - 0 . *laxum* Herb. VahJ an Schontb. - *O. Amtricmm** Iteq. Hort. VIndob. IIL t 81

C 4tfbm# Blh. L c 1 - Foil. bolUUs Crispin T. varie laciolalo-dOBUUii corollif uoplBS Tillotis; racemo vario, - *O. bullaium* Lam. Diet I. 384. — *O. urlicifoKmm* HortoL (000 Both.) - *O. fimbrialum* Hortul. - *O. pelletum* UortaL — *O. eocffeBIBSi* Hort Paris. - *O. tcultUmnoulu crtspum* Barm.

%> *****tnnm* HB. Le. - Iroeuum glabratan petiolis calycibusque ciliatis; w c y •BBTtrUto rabrumo. - *O. Ban-Huh* Roih, NOT. spec. plant. 833. — *Pinirmm* MtmUwi Bpftag. Syst Togetab. II. 601.

*. *rurpmf* \$<m\$ Blh. k c - KTOMBB gUbrum airo-parparMeoBt: pHioUfJf^ hycibq. Hi oiUaUt; roomo esobgaio •Bhraaoao. - *O. mtdmm hVIL* ... — *O. nigrum* TBOBIB.

1. *dyroforus* BIB.LO. - Erectum glabratum: p¹-tis cal cih. viz ciliatis; raceme thypoides-ramoso. ... Merr.

Comm, Gotling. VIII. 47. L 1 - Jaog. Horl. Vindob. 111. L K - Habitat in India orientali calidiore Indigenam, in horiia per omnem terraram orbem saepissime culiom; nunc eliam sponie in America centrali.

3. 0. FORSKOELEI Bth. I. e. 0. t — Caule herbaceo pubescente; foliis breviter petiolatis ovatis, basi rotundatis subintegerrimis glabrescentibus, petiolis nervisque ciliatis; racemis simplicibus; calycibus fructiferis pedicello longioribus. Inflata campanulatis reflexis, basi supra gibbis ciliatis, denle supremo orbiculato concavo, alis ad medium calycis attingentibus, lateralibus ovatis viz acuminatis, infimis lanceolatis telaceis Q — O, eano el *Basilico* affine, sed ab utroque foliis breviter petiolatis basi rotundatis crassiusculis differt. Folia canescentia, supra glabra, sublus ad nervot hirsutula, margine fix crenata. Petioli dense ciliati. Verticillaris remoli. Flores O. *BatUici*, sed stamina longius exserta. - 0. *gratitiffnum* Forsk. Flor. Aeg. Arab. 110. (non Linn.) — Habitat In Arabia felici.
4. 0. MINIMUM Linn. Spec plant 833. - Bib. I. e. t - CanJe herbaceo erecto teoissime pubescente; foliis longe petiolatis ovalibus integerrimis glabris, petiolis nudis, ocreis subconformibus; racemis simplicibus brevibus; verticillis laxis; calycibus pedicello subbrevioribus, fructiferis reflexis, denle Mpreno orbiculato, inferioribus brevibus aentia; filamenta papillaribus. baal appendicula. V — Canlis erectus, ramosissimus, semipedalis ant Til pedalis* Folia aomeroea, ?ix sjajora quam In *Thymo SerpyUo*, floralia longe petiolata, inferiora eavlnla TII mlnora, supreme panra el acuilora, fere omnia verilettlasroa aipennlla. VerUellasri pauai laxi, Yii sexflori. Calycis dens supremos oblongissimos, alia ad medium mbi decorrenibus, denies inferiores late ovali. Corolla fere 0. *BaiiHei a. piloti*. — 0. *talinum* Molina, Nal. hist. Chll. 891. — Habitat In Cbill prope Valparaiso, an indigenum?, in Ze)lania?
5. 0. SELL01 Biò. I. c. f — Glaberrimum: caule herbaceo erecto subsimplici; foliis petiolatis late ovalibus acutis, grosse serratis, basi subcuneatis, floralibus sessilibus calyce brevioribus deciduis; racemo simplici; calycibus. Includit pedicello longioribus ovalibus reflexis subnervis glaberrimis, dente supremo otalo obtuso concato, alls medium calycia alUngenibus, inferioribus. OTatis, UUrallb. bretluime, InBnls teft aeuco-aiucroiatli. ^ - CanUj fufcifj peremal ramoMs, ramis subsimpli- elMa 1-t-pedallbos glaberrimis. TWI M b m nio antnala, kttl oaMnaji v. rolndaia In peUolom longe aBgoMIj^MHfec vtofepe glabft, IIII<t ftrct glandnosa, floralia brteuae forValatitjriWpMh, latt otala, BBtefferiaM, ealyet breviora. Racemus elongtlos fr^pinMM- Yertifllfaatri IMMU atffleri. Calyces membranaceo nervoal, (ante Inlli'atna. Corolla albida? ealjeesi vli excedens, lobi 4 superiores brevissimos, oblongissimos, tfttaat longior o?ald-ioUudal«a planus. Sumina ci»erla. Filamentum i taperiora baal denle obtnao brerl appendiculata. Slyli lobi breves dllaauto-compress I. Acbaenia ovalo-romndala subcompressa. Habitus fere *OrtkotipkowU itr—Unci*. — HabiUl la Aaeria meridionali, In Brasilia el In Nota HiapanUu
0. 0. VIIIIDB Willd. Bnum. pi. bort. Berolia. M. - Bib. L e. 7. t - Canle fniitatto ramoso pubescentlet foil, petiolatis ovaio-oblongis acaulis crenatis, basi Mtanmia gUbris v. ad ooslas pubescentibus, floralibus bradeaeformibus. ovaUs tea- laatit dedduis, racemia raawals; calycibus pedicello aabaaqaallb., Israelaria nu- iaatib. denle superiore ovaio-aeaaUaalo eoaeavo breviter decarrentle, laiaralib. abalajis, infima elongalis sabconnaUa; corodia ealyeem vlx soperandb.; aUminib. anxsertia; filamentum superkrilb. buH appaadlealaUa. 6 - Frutex tripedalis erectus, basi nudus, ramis letragonis pilosis, angulis rotundalis glaberrimis. Folia oblusa crenata glabriuscula, nervis pilosis, subtus reticulato glandulotopunctata. Racemi terminates ramosi pubescentlet, 3-4-pollicarei. VerUcillatui 6-flori. Calyces pilosiusculi glanduloso-punctui. Corolla parva caiyem vix «K. oedeoi. Sumina breviter eiserla. Acbaenia rugosa. Valde afQoe O. grclOtiNu. a qao differt praecipue futora minore creiore el calycis forma. - 0. rWA/To- Roth, Cat. bol. 44. fet fjudem Nov. pi. »pre. *19.) - o. *ktplodo** Bf«>

- Fl. Ow. el Beu. II. 50. I. 04. ipes&imej. — *O. febrifug**m Liudl. Dol. Reg. t. 753. - Habitat in Africa occidental! tropica, in regno Benin ft In Sierra Leone.
7. *O. GRATISSIMUM* Linn. Spec. plant 832. — Bth. I. c. 7. t - G. Don, General sysL of gard. and bot. IV. 671. fig. 74. — Caulo frulicoso Klubriusculo: foil, pcliolatis ovatis aculis crenatis v. grosse denlalis, basi anguslalis glabris v. secu? (o.stas puhescenlib., floralib. bracieaeformib. lanceolalis acuniinalis, basi baslalis; Mceiui* simplicib. v. basi subramosis puhescenlib.; calycib. pedicellalis, fructi* feris nulantib., denle supremo ovalo-oblongo breviler decurrenc, inferiorib. Lrexissimis; corollis calycem vix superanlib.; tlaminlb. vxscrtis; filamenlis superiorib. basi appendieulatis. 6 — Bami elongali, obtuse lelragoni, angulis glabris, tulcis saepe tenuiler puhescentibse. Folia longe petiolata, umpliora quam in *O. Basilico* el afGnibus, floraJia pedicello breviora reflexa v. decidua. Raccmi graciles mulliflori, foliis saepe breviores, axi puhescenle. Pedicelli breves calycesquo puheseenlet. In hortls saepe colilur. - *Catiu Tirtata* Rbeedc, Hort. Malab. X. 171. I. 86. — *O. Zrylanicum* Burm. Thes. Zeyl. 174. el t. 80. fig. 1. [quoad folia.] — *O. fruit scent* Mill. DicL no. 0. — *O. peliolare* Lam. Di. I. I. 385. — *O. gratisimum* Jarq. Icon. pi. rar. III. t. 405. — Habitat in India orientali, in peninsula, in Benghdia ad Monghyr el Natbpur, in insula Penang.
- a. *O. SLAVE* Willd. Enum. pi. bort. Berlin. 620. — Bth. I. c. 7. f et 707. - Caule frulicoso villosio; foil, petiolalis ovato-oblongis acuminalis crenatis, basi angusUIU rugosis villosis, floralib. bracieaeformib. ovatis acuminatis; racemis subpauciculalis; terlicillaslris 0-floris; calycib. pedicellalis, fructilVri* nutantib., denlo tupremo otalo breviler decurrenle, lateralib. iruncalis inflmisq. broiler selaceomurrionalis; corollis calyce majorib.; filamentis superiorib. basi appendiculalis. 5 — Frulex crectus ramosus, ramis obtuse lelragonis villosis v. angulis demuni glabratis. Folia craaaiuacula, molliler rublginoto-vtilosa, juuiora subius laoala, 2-4-pollicarie, grot** crenaja, baai longe angusUU, superiora mlnora. Kacemi lermiMlft ramosl, folttt nrnllo lengiores. Folia floralia reflexa v. decidua. VeHicillaslri sexflori laii approtimall. Calyx floriqer puhescens, fructifer subglaber membranaceus. Corolla major quam in *O. graiUsimo*. Stamina exseria. — *O. urticaefolium* Roth. Cat. bot. 52. (ex ejosdem Nov. spec. plant. 270.) — *O. graUsimum* Lam. Diet. I. 386. (non Linn.) — *O. Zeylanicum* Desf. Hort. Par. (cd. 2.) 75. - *O. villotMM* Wfinm. in Sjlkg. pi. Kalis!). I. 121. 'non Roxb.) — *O. hofo\$\$riceum* Breil. — HabiUt in Madagascaria el in Itra^iliar pro\incia Maragnaniensi in rudcrali* el ad''acdes prope calaraclam fluminis Itapicuru.
0. *O. BOJERI* Bill. I. c. 8. t — Caule frulicoso tomentosio; foil, petiolalis ovalis crenatis, basi rolundatis v. cordati* rugosis tomentosio, floralib. ovatis acuminalis; racemis simplicib.; verticillaMris sob-10-floris; calycib. nutanlib., denle supremo ovalo breviler decurrenle, inferiorib. brevissimis; corollis calyce duplo longiorib.; slaminiib. euertis; filamenlis soperiorib. basi appendieulatis. b — *O. eorJifolium* Bojer in Loud, Ilorl. Brit. 910? — Habitat In Madagascaria.
10. *O. FILAMEXTOSUM* Forsk. Fl. Aeg. Arab. 108. - Blh. I. c. 8. | - Caule fruUcoso ramoso cano-lonento»o; foil, breviler peliolalis ovalo-oblongis, utriq. angusaiis, acute serralis teouissime pnbescentib.; racemis simplicib.; calycfc pedicello loogiorib., fructiferis reflex is, dente supremo breviter decurrenle, W^| ralis. Iruncalis, infimis breviler mncronatis; corollis calyce *ul»-4-plo lonflornV* geotalib^ longe exsertis; filamenlis superiorib. basi appendimlalis. ;> — Rami obtute lelragoni, tomeolo brevissimo canescenle*. Folia crastiuscula »ubcaraota» basi ioUgerrima, in pftiolum brevem villosum ba<i subdilaiatum angu«tata, floralia braeieaeformia colorala acuminala, ante antho«in comou, per anibesin decidua. Racesil tisaplice« laxiosculi breves. Verlicillattri 0-flort. Cal>cei puhescenies nee eillall, deotes laterales laii truncalii, infimi in cal)ce florigero miouii, calyx fradiler non visas. Corolla alba sobiafundibuliformis, limbi lobi 4 saepioree tubreiexo-paUUi, infimu pianos paleos. Stamina corolla duplo longiora. - *O. Ahpuimcwm* Hort Paris. - *O. grmmdi/Urum* L'Ueril. Slirp. 80. I. 43. - In Africa orieotali tropica, in Abyssinia, in Arabia fdiel prope montem Mflban.

11. *O. SERPYLLIFOLIUM* Forsk. Fl. Aeg. Arab, 110. - Blh. I. «. 0. el707. — Caule fruiicoso; ramis cancscentib.; foil, oblongo-cunealis lulegerrimis cano-lomenloris, basi angustalis; racemis simplicib. paucifloris; verticillasris laic sexfloris; calycib. declinalis cancscentib., denle supremo ovato obluso breviter decurrente, lateralib. ovatis aculls, infimis lanceolatis acuminatis; corollis calyce subduplo longiorib.; staminib. longe exsertis. — Frulex humilis, ramosus, coriice griseo laxo. Folia fere *Thymi vulgaris* parva, ineana, saepe margine convoluta, fasciculate Racemus brevis, verticillasri pauci 6-flori. Flores *O. adscendntis*. Corollac labium superius patens, irtcrius declinatum, ovalum, concavum. Stamina corolla duplo longiora. — *O. Burcheluanum* Btli. Gen. el spec. Labial. 8. f — Creseii in Arabia felici, in raonle Chadra cl in Promonlorio bonae spci.
12. *O. ADSCENDENS* Willd. Spec. planiar. III. 166. - Blh. I. c. 9. t - Caule herbaceo prosiralto; ramis pubescenlib.; foil, petiolalis ovato-oblongis oblusis subdemalis, basi angustalis pubescenlib., floralib. bracteacformib. deciduis; racemis simplicib.; calycib. fructifera nulanlib., tno srrialo, denle supremo ovalo decurrente, alis medium calycis allngenub., lateralib. iruncalis, margine membrinaceo-cilialu, inflmis brevissime atiaeeo-acuminatis; corollis calyce duplo longiorib.; staminib. longe exsertis; fUamentis superiorib. basi appendiculis. 2f — Caule* e basi crasso perenni berbaeel, protlraii, divaricaii, tortuoso-ramosi, 0-0-poll icares, ramis apice saeplus eaneseentibus. Fold rlx majora quant In *O. minimo*, forma fere *O. lancti*, subtus saeplus oano-lomenlosa. Calyx tnetter *O. gratissimi*, basi profunde sulcalus et transverse rugosus, superne membranacco-dilalalus nilidus, dento supremo marginibus revololis, 2 inflmis breviter setaceis, laicralibus minulissimis, fauce intus nuda. Corolla calycem >ix ocedens; f^onilalia triplo longiora. Filamcnla superiora basi appendiculo cuneifnrmili-inialo aucla. \$i>lu« apice subulalo-bifidus. Acbaenia subrolundo-compn^sa, lac>in. — (). *Indicum* llulli. >ov. pi. sp. 27-J. — *Plectranthut Indicui* Spr. Syst. vegetiab. II. 091. — *O. aialalum* Roxb. Hort. Beng. 45. — Habitat in India thenlali, in lolius pcninsulac aridis sabulosis.
13. *O. OBOVATUM* E. Meyer, Comment, pi. Afr. auslr. fasc. II. 220. — Herbaceum? ramis pobescenlib. sublncais; foil, late ovalib. obovallsve, Juniorib. canescenhb.. floralib. bracleaeformib. derifaii; rttffemls paucifloris; calycib. ioeaois pott anthesin nulanlib., dente tupremo ovalo dtett%<nle, lateralib. trutt<atls, BMrgioe cilialo-villosissimis, inflmw brtflsftina iöUe«o«aoumioatls; corollis ealyce duplo longiorib.; staminib. longa exsartfl, supirlorib. bill appandJcalatis* ^? - In Promonlorio bonae spel eresil. • ^ • .

f *Species sectionis primae non tath nofuf.*

14. *O. (L'INEENSE* Schum. cl Thonn. Kongl. Dansk. Vidensk. Selsk. Afbandl. IV. 38. | - Bdi. 1. c. 10. t — Foil, ovalis, ulrinq. attenualis serrafis, Hublus pilosis punctais pigosis; racemis terminalib. ramosis; calycib. glabhs; bracteis dfUoid<*in acuiuinalis drciduis; ramis hirsulis. % — Radix simplex vel subramosa. Cauli< suffruticosus, bi-quadrpedalis, ramosus: ramis herbacif is, quadraogolaribu*, quodrisulcatis, pilosis. Folia opposita, ovaU, acuminata, basi acuta, obluse serrata, sabhlrsuta, venis prlmarils supra villosis, sublas pilosis (pnnctif excavalis). Petiolus rofdiocris, pilosus, supra sulco villosiore exaratus. Spica venicillata: verticill ^cxnori, pedicell olrinque in peduneulo terni. Bracleae deltold^ae aiiguli^ acuminalis caducae v. deciduae, ante anthesin decussatae. Periambum Ore longiludine corollac, b.isi gibbum, sensim ampllalum, bilabialum: labium stiperius lalius orbinilatam cum acumine, exlus concavum, adscendens: labium inferius triliilun). denle inlermedio emarginalo deflexo. Corollae lubus patens longiuiince.ihrk. Limbi labium alierum sursum spectans, lalius, semiquadri^fidum. obtusum. aequale; labium alkrum deorHum speclans, an>riiMiu<T longm*. inirgerrimuin, iolacpo-inaciilaliim. Filamonia filiformta, declinaia, laleri inlimo luli adnala, c.il)cc duplo loiiRiora ; Lileralia interiin'rius parum brc\or,i, prmpi* bi^om e&teerentia proeesMim siibulaluiu. iecur\um, villn<uin. AtHherar rriifnnnr.. roin-

- pressae. Germen quadripartitum, mioimam. Stylos filifonols, aumlotbas parum loogior, declioatos, versus apicem parum refractos. Sligma bifidum: laciois subaequalibos, acotis. Calyx labiia conni?entibos clausus. Semina qualoor, sobroluada, panra. — [School. I. c] — Cretcit io Africa occideoiali, io sylvis Acerae.
15. O. ARISTATUM Blame, Bijdragen 833. — Bib. I. c. 10. - Foil, ovalis obiosis repaodo-creoulalis, basi atteoaalis iolegerrimis, margioe el io veois infra puberulis; ramolis telragoois el raceno subsimplici obverse pubesceoiib.; veriicillis remotis seilloris; bracleis ovalis aeomioalis ciliali* sessilib.; calyois lablo ioferiori quadrideolalo, deolib. iolermediit loagUar arftUti. 2l. — Habilat Io Java circa Balaviam io gramioosi*.
10. O. BRACHIATUM Blume 1. c. 8A — Bib. I. c - Foil, laoceolalo-ovalis, olriog. acolioscolis, sopra basio remote serrolalls, margine el io costls Infra puberulis; nunis fastigiaUs tetragools obverse hispidolis; racemis simplicib.; veriicillis dislioclls seifloris; braeteis ovalis peliolalif com calyce pobesceole ciliatis; calycis labio ioferiore quadrideotato, deolib. iolermedlis param loogioribus. 2|. — Habiaal io Java io locis siccis circa BaUviaoL

Beetle n. mBd<flMUH Bti L e. U.

Filameou sopertora basi fascicolo pllroa appeodlcolau. Raceml laii gracles. Vertidllastrl seillori. Pedlcelli paleotts, ealyciboa nolaolibos.

17. O. CAR3OSUM Lnk. el Olio msf. ex Bib. I. c II. f - Caole herbaceo sobglabro; foil, peliolalis ovalis acolioscolis grouse serralis glabriuscolis subcaroois, floralib. bracleaeformlb. decldois; racemis simplieib. multifloris; verticillaslril O-floris; calycib. campaoolalis oioaolib. glabris, faoce lolas nuda, denlls sopreml margioib. reBeilt, brevUer dtowmotib., laienlifc. trooeaUs, iofimit seiaceo-mocrooails) eortllit <o||— vix excedeollb.; flaoMolls superiorlb. basi fascicolo pHoram appaqiltoiimi.^ — IolwseeoUa a *mtU_t at folds el cbaraetarlbos telii looge dUftrtM. CaoAs ajnelot, ranosos, gtaber vel apicem versos leooisttaM poeeceoa. Folia basi lolefenioia, eoeau ?. rotundata, crassioscola, subcarooM, tobtot oervota, glaodolosa; loralla sessllia ovala acumioaia. Racemi 6.8-pollicares, vtrticillastril oomerotl Calyces ovalo-campaoulaii, fraciferi pedicello loogiores membraoacei oervosl colorsli, deole sopremo ovalo oblusol, lateralibos b re viler mocrooalis, ioflmis supremum subapqoaolibos. Corolla parva porporasceos, lobi 4 superiores erecli oblosi, iofimu< planus obiu<an< superior!* bos paollo loogior.^ Siamioa 2 ioferiora corolla soblongiora, flameoiiis ioiegerimis, 9 superiores molio breviora, flameoiiis basi pilorum fasciculo speedleolaiis. Corolla ioler slamiu sopeHora pilosa. Aoiberae localis parallelis sob* cooflootiboa. Achaeoia oblooga subHqoeira oigra laevia. Gyoobaseos glaodola loferior ovario brtvior. Stjll lobi subaeqoales, sobolali. - LuwmiUera c*m— Spr. Syst veftub. I?. Cor. potter. «3? - Habiut Io Brasilia meridioali et i« Nova Hispaoiat
14. O. 8ANCTII Lioo. Maot. pi >. - Bib. L C II. f - Caulib. pilosifj foil, petj*- Utlal ovalib. oblosia deoutis piibssoeollfcs Mrvia petiolisq. pilosls, floralib. brtelioioforoiid, tossilib. p#4ieello brevterib.} racemis gradlib. simplicib. v. basi ram*- >>»; eaJyciaw ooiletllo breviorib. ooUotib. glabrioscolis, ioios fauce oo*li, •••••• sopremo thovato cocave breviler decarreoie; aorollis calycrm u% soporoBtM flameotis soperiorib. basi pilorum fascicolo a#Ho^ol<<h>>- O •* culu |~~ BUrps io*lodi< volgtfis, tt dodum colla, Idoo villotiaie tUloraqoe valde i9n* > •Mis. ToU plaou sfttpios porportacit, io borUs Europaeis berbakra, io !•••••• •***U'oofoanoi auot, vel S4tplot, totto Boxborgbio, suflroucosa, *Bodort*_K.I^0i!! P<rva< looft poUouta. Baemi tali, 3-t-polltaam. Verticillasin o-flori. Flor^ parti. Corotta pail|4t porptaiceos, Stamioa brtvltter exsena. - B* pillou--- HrmU ImBob< Bert: Amb. T . E I B L i - O. UgUmimm Perennatle! Bono. Toot. Zeyl. U i L f l l t l. (food flom.) - O. Ztylsmicum •* <^1^m etc. •^m. Toos. Ie|L IH I. fib. t 8. - O. /rvltMSM Bono. Pl. lod. lot. - O. ino- **r*m Bono. Pl. UL tm - O. OMOMAOTNO Lloo. MaoL pi. A - H***nhus

- monaehorum* Spr. Syst. Vegetab. II. 000. - *O. tenuiflorum* Lam. Willd et Auct (non Linn⁹) - *LumnUirra tenuitora* Spr. Syst. II. 687. - *O. tomtntonm* Lam. Diet. 1. 387. - *O. rillosum* Roxb. Hort. Beng. 44.? (non Weinm.) - *O. hirtuium* Benin, in Wall. Plant. Asiat. rar. II. 14. — Habitat in India orientalis siccis aridis, in omni India circa templa, in peninsula frequentissime, in Benghalia, in Zeylama, in Java, in insula Timor.
10. *O. TEMIFLORIM* Linn. Spec. plantar. 833. (excl. syn.) - Bth. I. c. 12. t - Caulib. herbaccis(°) adscendentib. ramosis pilosis; foil, longe petiolatis oblongis obliuscusculis crenatis, basi subangustialis pubescentib.; racemis flirormib., basi subramosis; >crlicillaslns pauciflons remotis; Toll, floralib. late ovalis sessilib.; calycib. breviiier pedicellatis subnuiantib. glabriusculis, inlus fauce nuda, dente supremo ovato obluso, basi bretiler decurrente, inrcrionb. abbreviate; corolla calyce subbmiore. O? - Ab *O. tancto* non differi nisi racemis bmionbus lenulssimis, Mns florallbus lalioribus, floribus mimmis sub&ccsibuv An *O. tanctt* specimen hortense floribus semiabortivis? — Habitat in India orientali, in Malabar.
20. *O. GRACILE* Bth. I. c. 12. t — Caulib. adscendentib. pilous, superne paniculatis; foil, breviiier petiolalis oblongo-ovatis obtusis crenatis, basi angustialis pubescentib., superiorib. lanceolatis snbaoslib., floralib. bracieaeformib. sessilib., pedicello multoties breviorib.; racemis numerosis simplicib.; calyeb* frnotiferis pedicello longiorib. declioalis, fauce intus villosa, dente supremo ovato obtuso breviiier decurrenle; corolla calyce subbreuiore; flamenUs soperiorib. basi pllorum fasciculo appenjlculatis. O* — Affine *O. lofiefi*, sed foliis angustioribus, floribus mmoribus, et calycis fauce intus tillosa dislineUssimum. Racemi filiformes, cubpamculah. Folia floralia minula. Calyces glabriusculi, nerm hispiduli*, dentibu* infenoribu* lanceolato-sclarni, 2 infimis superiorem aequantibus, 2 lateralibu* bmionbus,. Corollae lobi 4 superiores lati, breves, inferior oblongus, concavus, »ubdentatus. Slyli lobus inferior complanatus. Acbaooia oblonga, pallida, laevia. — Ilabilat in Africa tropica orientali, in insula Zangnebar.
91. *O. TENELLUM* Bth. I. c. 12. - Glabrum. caule pusillo ropenle; foil, petiolatis ovato-rotundaUs arenatis; racemis laxis simplicib.; vertlellaatrla sosiorls; calyolb. longe petteellatis deellnaUa glabris, dente supremo ovato itHTInim, vix decorrente, fauce Intus nuda.; og^nUa vlxealyoeni eicoojamtlb.; giniUHb.ountUi; filamenit soperlorib. basi pHóao-TppenienUUa. O — ateta pejoHU repens, habitu *Salciae teneUa* \$ smllls. Raml itetiles rajiantoa, aaOpa'pnbsnanHDi, florigeri adscendentes, 4-5-polleares, gUberrlnl. Folia faro linaWnttlpnilalaWas, tettora, glabra \c! pilis raris hlspidula, floralia minulisajaatw FtofOi •lnnl, longe pedicellait, 2-3 lin. longi. Corolla *O. MQHCU*. Acbaenia oblo<|a_v laevia. — Habitat in Madagascana.
22. *O. OBTLMFOLIUM* E. Mey. Comment. pi. Afric. austr. last. II. 227. - Caulib. villosis; foil, petiolalis ovalib. obtusis, supra hispidulis, subtus pubesceniib., floralib. bracieaeformib. sessilib. pedicellum subaequantib.; racemis gracilib.; calj-olb. pedicello longiorib. oblongis nutantib., inlus lanoo noda, deoto supremo obovato eoneavo vli decurrente; eorollis calyce dlnNdlo longiorib.; siamimb inclusis, flamenUs soperiorib. basi vix pubescenilbns. *? - Crescit la Promonlorio bonae spel.
23. *O. CITRIODORUM* Vicinoi, Semln. rar. hort. Palav 1RI0. rolled, ex Linnan XV. Lileraturb. IOL - Caule suffruticoso pubescente, foil, peitolalis o>slo-|anceolais obliuscusculis repando-dentatis glabriusculis, floralib. confonmb. arum inirgris breulcr ppiolalK ciliatis; racemi simpheis verticillaftrm 0-floris dutamtb pcdunculi"* ereclu ral>cibq. nulantib. rxtus et fauce villosu, dente supremo or-biculalo lc\iler dirurrentr, laterahb late o^atis apiculatis, infilmu UnreoUi, subulalis; corolli* calyce majorib. flamonlis •uprrionb. supra ba>m infr*n,s ~~toiquo~~ appendice pemcilliformi mumlK % Crescit in >ubia,

Sectio III. GIMHOCMOM Bth. 1. o. 12.

Filamenla omnia nuda. Verlicillasri 6-flori, vol rarius 10-flori. Pedicelli ca-
lyce breviores.

24. 0. MICRANTHEM Willd. Enum. pi. hort. fierolin. 630. - Bib. I. c. 12. f et 70S.
— Canle herbaceo erecto ramoso subglabro; Toll, pctiolatis ovatis acutis serralis,
basi roluodalis cuoealisve subglabris, floralib. bractcaformib. deciduis; calyce
fructifero deflexo oblongo, deote supremo oblaso concavo decurrente, alis pedi-
cellum allingeniib., 4 inferiorib. ovalo-lanceolalis, 2 lateralib. brevissime, infi-
mis loDgius acumioalis; corolla inclosa; filamentis edenlulis 2]. — Caulis fere
pedalis, obtuse tetragonus, tenuiter pubescens, demum glabratus. Folia glabra
vel tenuissime pubescens, sublus glandulosa, floralia sessilia late ovala, acula,
vericillastrum aequantia. Flores parvi. Calyx fructifer valde acutus, pedicello
longior, ovato-oblongus, membranaceus, nervosus glaber, vel ad nervos tenuiter
pubescens. Corolla calyce brevior. Stamina ioclosa, filamentis omnibus inie-
gerrimis. Achacnia ovalo-sublriquetra, nigra. — *O. frutescens* Sieb. PL. exsicc. —
O. Americanum quorund. Don Linn. — *O. pubescent* Mill. Diet. — *O. montanum*
Hook. Bot. Magaz. 1. 2000. — Crescit in America acquinoctiali, in Jamaica, in
insulis Caribaeis, in Nova Hispania, in provincia Caracas, in Guiana el Cayenna,
in Brasilia ad Maranhao, Rio Janeiro el in insula Slae. Catbarinae.
25. 0. CAMPECHIAMM Mill. Diet. no. 5. - Bib. I. c. 13. - Caulc erecto villosu
v. demum glabralo; foil, petiolatis ovatis v. ovato-lanccolatis acutis subserralis,
basi coeatis angustalisve, sublus canescentib., petiolis nervisq. hirsutis, floralib.
bracteaformib. lalis decidais; calyce fructifero deOexo oblongo hispido, dente
supremo obloio concavo decorrente, alis pedicellum altingentib., 4 inferiorib.
ovatis, lateralib. breffssine, in8mis longius arialalis; corolla breviter excrta;
Blameulia tdtatolia. 9}f — AfBe* O. micraniAo, §ed diversum caule, praeaelrlm
ad Mfef, fottorwaqM nervis poilolisque btrsullt, el foliis minohbus sublus ca-
DetMalibot ftl etio^tomentosii. — Crescit io America centrali ad Campcachy,
in NOT* Hiaptla.
20. 0. OVATUM Bib. I. c. 13. t - Caulib. ereclis subramosis; foil, subscsilib. late
ovatis subdenlalis, basi rotundalis glabriusculis v. hispidulis, floralib. bractea-
formib. decidua^ race mis abbrevialis; calyce fructifero ovalo inialo defle&o,
denle supremo ovalo-oblonno oblusu concavo, fere ad basin calycis dccurreoie,
inferiorib. laic ov^tis breviier Holacro-acuminali<i; corolla calycem vixexcedente;
filamentis edenlnlis. ^ — Caules e basi pcrenni? plures, erecli, subramosl, §•"
mipedales pedalesve, villosi. Folia obtusiuscula, inlegerrima v. utrinque 1-2-
dentaia, basi rolundala, rigida, sspra pilis raris hispidula, margine ft sublus ad
nenroa ciliala, loralit bracteaformia, sestilia, lale ovaia acula intrgerrima,
calyce florifero asblonglon, frueiifero breviora. Racemi 1-2-pollirarrst, verti-
cillasiri approxlmatl 0-flori. Calyx fructifer pedicello longior, glaber vel pili*
brevibus cilialus denlibas infimis subcoonalis lupremum aequantibus, laleralibus
brevioribus. Corullae lobl ovati oblusi. Stamina breviter rxscrta. Antherae
ovaio-reniformes. Stylos aplce breviter nubnlato-bifidus. Achacnia pallida, sub*
globost. - Creseii in Brasilia meridional!.
27. 0. NUMCAULR Biñ. I. c. 14. f - Caule simplici nudo; Toll, ad basin caoli*
approximatis vix peiolatis ovato-roluodalis pilosulis; racemis elongalis; ca-
lyce ovalo deflexo, denle supremo ultra medium calyris decurrente, inferiorib*
teiaceo-acumioatit; corolla calyce duplo longiore; lilamenlis edeutulis. 6*~"
Caules e baai crassa lignosa plures, adscodeolrs simplicissimi nudi ^{ercClif}
acute tetrafoli, glabri v. tuperne pabescentes, semipedales pedalesve. Folw
omnia Mibradicalia oblu«a rroala, ba»i rotundala v. parum angustaia crassa ^
^ubcjroosa, supra aparse, sublus ad nervos pilo»ula, sub>lu» pallida flandol#ta,
nuralia bracieaefornila, calyee brevtora decidua. Rarrmn* 4-0-pollicaris, ver-
"eiiUMri remoU 6-lori. Calyret pedicello »ublongiores; fruciiferi non •««<;
Corona campoolala, Isjbii 4 »uperioribu« late ovatis subpalentibus, inferiori

- ovato oblongo declinato piano crenulato Stamina exserta, superiora breviter subdilatata, at integerrima Antherae ovalo-remiformes Stylus longe exsertus, apice breviter subulato-bifidus Achaema non visa — Crescit in Brasilia meridionali
- 28 O RIGIDUM Blh I c 14 f - Ramis erectis smetis pubescentibus, Tolle sessilibus amplexicaulis lanceolatis aculis inaequalibus, basi rotundatis rigidis ciliatis, floralibus bracteis formibus. ciliatis, racemis laxis, verticillatis hirsutis, calycis fauce talus nuda, dense supremo breviter decurrente, corolla vix calycem excedens, tsaminibus densulatis — Suffrutex videtur humilis rigidus sinctus Rami compresso-tetralitri Rom, axillis pilosis, sulcis pubescentibus, angulis glaberrimis Folia subconcaeva crenosa, ad nervos pilis longis albidis ciliata, caeterum glabra, utrinque glandulosa, floralia sessilia, pedunculo quadruplo breviora Racemi 3-4-pollicares pauciflori, rachis pedicellis calycibusque glanduloso-pubescentibus Calyces omnes deflexi, pedicellum aquaevoles purpurascens nervosi, dens supremus laevis aculeus planus, laterales angustiores ovati acui, superiorem aequant, paulo longiore lanceolati subulato-acuminati Corollae labium superius lobum, lobo medio late ovato emarginato, inferius duplo longius dilatatum concavum Achaema rotundato-compressa subindata — Crescit in Africa tropica circa Angolam
- 20 O TERETICAULE Poir DicU Suppl. I 903 — Bib I c 14. f - Caule suffruticoso villosulo, foliis breviter petiolatis oblongis irregulariter terra lit, basi longe angustatis, utrinque pubescentibus, floralibus conformibus. floralibus longioribus, supremis persistentibus, calycibus declinatis tubulosis hispidis, dense supremo breviter decurrente, corolla vix calyce longioribus, inclusit filamentis densulatis — Suffrutex diffusus \ divaricatus, ramis liberis lomento canaliculatis Folia obtusiusculis irregulariter serratis v crenatis, utrinque pubescentibus, floralibus conformibus, intrinsecus densulatis, supra persistentibus flores longe superantibus Verticillatis remotis 0-floris Pedicellis 2-3 lin longis Calyces declinati, demum reflexi, basi hispidi, 10-nervi, densibus membranaceis, supremo ovalo margioibus revolutis, inferioribus inflexis acutissimis, lateralibus lanceolatis, influit tubulatis, fauce inclusis nuda Corollae lobus superior 4-lobus, influit paulo longior angustior Gemmae luteae. Filamentum superius nuda. Stylus obtusiusculus breviter bifidus - O. *Tkonningii* Sebum Kongl Danica Vidensk. ScJtk. Afhaedl IV 30 — Crescit in Africa tropica, in Guinea et in Senegambia
- 30 O BRACTEOSUM Bib. I. e. t — Hook Icon plant (.455, - Caule herbario erecto piloso-bipedo; foliis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis acutatis remote terratis, basi angustatis, supra glaberrimis, tobtat hirsutis, floralibus bracteis formibus, racemis duplo triplo longioribus. canaliculatis; calycibus proflicis reflexis omnis subinflatis, dense supremo ovato breviter decurrente, margine rotatis, lateralibus ovatis breviter mucronatis, influit longe sobulatis, staminibus breviter ciliatis, filamentis densulatis — Herbalis, -pedalis, parum ramosa, raris obulso letragomis Folia 1-2-pollicana, tubulata pallida Inflorescentia O *Vanttet*, at folia floralia multo longiora petiolata, laevia ovalo-cuneata inaequaliter taepiunt colorata, glabra v pubescentia, demum decidua. Calycet fructiferi at in O *Bastlto* ad axin arete adpressi, tunc breviter hispidi nee ciliati, densibus superioribus forma fere O *grattstmi* forollae labium superius truncatum, breviter quadridentatum, inferius paulo longius dilatatum concavum. Achaema orbiculata subcompressa laevia — Crescit in Africa occidentali tropica, in arvis Lambar Senegambiae
- 31 O ? DIFFUSUM Beauh in *Ann Plant Asiatic rar* II 14. el LabiaUr gen et bpic 15 I — Caulis suffruticosus diffusus villosus, foliis petiolatis crenatis, basi rotundatis-tuneatis lomentosis-lobatis, raceme gracilibus paucifloris, corollae raris. Ijcc MX duplo longioribus, lobo recto, fauce subaequali, olamibus corollae brevioribus, humentibus densulatis — Suffrutex humilis raris, (mtubus partibus pubescentia submota) folia MI n-IU lima* lon^j 0-8 ii • forma fere O *sancti* »cd ad bism n^j^ runnia floralis minutissima Kacim

2-3 poll longi \eriicillastri pauci, »aeplus 2-4-flon, ranus O-florl, sub&ecundi Lahx pubetens, intus fauce pih* clau:»a, fl mgr caiupanuljiu*, tlente sapreroo orbiculalo piano, iuferionbuj» minulis, fructifer nulant oblongus slnatus, dente supremo ad»cendentc, margmibus revolutis, mferioribus lanceolalo-subulalis porreclis. Corolla 2 v 2/« lineas longa glabra, lobo supremo laliore mtegro, 2 laterahbas mfimoqac >u concavo otatis. Glamioa brevissima mclua, filaments Integra. Shlus inclusu«, apice obtusus, demum bifidus. Achaema oblonga, oculo armalo minuli»sime punctala. — An *Orthotphotus* species? — Crescil in India onenidli, in andissimis rapeslnbus peninsulae circa Tanjorc Tondiman et Tcnnyelly, ad Palamcoltah

32. ◊• MEUBRAISACEIM Bib. Labial, gen. et spec H - (aulo ercclo villo»o. foil broiler peiolatis ovalis obtasis crenatis, basi rolaodalis rugose tillo»is, floialib. infimis conformib., inferiorib. bractcafonnib. lanceolatis membranaceis villosis, racemis simplicib; verticillastns sub-10-flons, caçcib oblongis pubesceniib, dente supremo orbiculalo m decurrenle, infenorb. lancrolalo-tubulati», siamioib. corolla brenorib, filamentis edentulii. ^ — Caulis In»rhaceos \idetur. Folia pallida, minute glandulosa, Ooralia sessilia. Racemi 4-6-pollicaren. Calci» deos suprcmu* membranacei flavescens acutus, ranus truncalus v. bre»i»sime denliculalu>>, mfimi lairrahbus paullo longiore< Corolla calycem >ix superans, labium supcnu> Infidum, lobo medio lalo orbiculato emarginalo, infenus breve orbiculalum concatum integemmum Si>lus brenler biQdus, lobis subcomplanalis. — Crescit ID Africa tropica ad Guipungo Angolae.

t *Specie* quoad genus vet tectioem dubtae.*

33. O. AFICARON Low. PL Catto. 370. - Bth. I. c. 16. - Foil, lanceolalis integeninlt pttotto; tftoto ivmlMilb. terciillaUs interruptis. O - Caulis annuus pedaf m i M Ulrafsj—a filoasa, ram it paucis adtcendeniibus. Folia ovato-liiMtlltl lrtlljlllBlt plOM oppotllt petlolau. Flos albus mioulus resupinaius, fpieta f«tMUitft treetis longls terminalibus, verticillis interruptis birsuiis Tola plaaU •«•? • 9kL — Crescit in Africac onentalis arenarns
- 9i O. ZATAIHBIIDI Bth. I.« 10 - Foil carnosus cuncato-oblongis, ulrinq. subquadndenlais villosu schsilibu« > (aulis frulicosus diffunui pedalis brachialu* Rami tereles >IIIOHI conhrti braihiati articulati, arliculis unguem longii* Folia opposita sessilia, «ennp||u« m rrmota subpollicana crassa, bisi Ailenuaia Integra, supenus plnnque 4-denlata, .ipici< dente obtu<o, villotula, supra cana, subtus puoctift fernigineis atper«a, inm^ pulposa Pedunculi anllarrn icrni ual* flori breves flifonnes. Flores non %BI \aldc fragran< Dicunl edule f«««* Simii* quoque gratooi. — Porsk. PL Aeg. Arab 110 - O. *ZalarhemU*, 3 Forsk. I c - Crescil in Arabia Mlei, la mootibos mrdn* inter Dorebat Taavs
- H O VAALAB Fortk. PL Atf. Arab III - Bib. I. c 10 - Caulr tetragyno brachiatn, radirib. Olaneolosis, fruciU pilo»o ʒT — Tanlae fragrantiae »unl radices at incola« »olr«nl affneaodo communicare odorem ip»ii odorifem Mn»rbo, Xi-bfto de. tl soaveolenlia baec gr»unt necum to captula, ul semper gratum spire*¹ o^aram. — Crctcil lo Arabia felici c regiombus moolo*is oricntcm versus affortur vtotU Mi el fakib.
- » O. UACftOSTACBU M Poir OICI Soppl 1.301 Bth I c 10 - (aule •«'• frulicofOf foil, ovalo-tublanrrolatit oblusis subdentalU subglabris. »pica dens* lemIMIL^ - Caulesdori glabri ranotissmi, rani piloti. Folia m priiulaia parva br«vlo,«valia v ovali-oblonga tubcaroosa viridia, ulnoqur fr«* gl'bra obtusa. viidoolau. i>ic«e trnninalr*, I poll el ultra longae r)lindnra« ol»m»ic, flonbus deotu, CAjvcibus pilit brevibu* bir«ulit. In India oneuuli. ad Pondicbery-
37. O. MSOOSTM Roil. >o» »p€C. pUntar *74 - Bib I r 17 f - V»scqa««, # **Pilosissimum** foil. obotAio-tubrolondit gro*«r et oblu*r %rrratn, tublM reticu-. 4 **late - rugosa**, riMM simplin. braciei* ov«u» prliolalit. ral)cU Ublo lofenori **quadridentato**, deaiib. laiermedut lonaionbus %' - ToU planta primo inluH" •

fuscus v. griseo tomentosa v. delur, at pilis capitalis densissime obsessa cu Caulis credens palmans et longior, basi sublignosus, crassitie filii emporelici tenoions Folia peliolata obovato-subrotunda, grosse el obtuse serrata, basi in petiolum plerumque paullo breviora ailenata, subtus praesertim pilis densissimis capi-fjatis quasi tomentosa, et reticulo vcnarum emmentiore rugulosa magmiudine *Ongam Majoranae*. Racemus in caule ramisque terminali simplex laxis elongatus. Verticilli remoti, in fenores plerumque 4-, superiores 6-flori Bractee ad quoniam verticillum duae oppositae ovalae integerrimae, pedunculo triplo breviores Prunculi setacei, longitudine calicis Mmplices uniflori. Calyx nervosus, venoso-veinulae bilabialis I abium superiorum otalum, apice subangulosum, post florescenciam demum colore sanguineo suffusum, inferius 4-dentatum, dentibus hneari-subulatis, 2 intermediis dimidio longioribus labium superius* supereminentibus Corolla sanguinea bilabialis. Labium superiorum rotundum inc-gemmum, inferius trilobum, lobis subaequalibus, Inrrmedio paullo latiore Stamina didjama inclusa. Filamenta purpurea, fauci corollae infixa et in tubum decurrentia edentula. Antherae reniformes flavidae. — An *Orlthonphoms* species* — *O. menthotdet* Ilcyne mss. — *Plectra*ihu\$ tucofus* Spr. 8yft vegeUb. II. 000 — Crescit in India onenlali.

38. *O. AGUTUV* Thnberg. Fl. Japon. M8. — Btb. I c. 17. - Racemis filiformibus; foliis ovatis acuminatis serratis, bracteis birtis. 2. T — Caulis tetragonus erectus glaber lacinis. Folia peliolata ovala acuminata terrena, inferne integra glabra, ramosa pallida venosa, 2 poll. lata, tripollicarta. Petiolus folio paullo brevior in carina subius hirtus. Racemi filiformes diguales el ultra. Bractee ovatae acutae hit-pidae — Oescit in Japonia.
30. *O. C. niSPIM* Thnberg I c - Blh I c 17. — Racemis terminalibus; foliis ovatis serratis. conspicuis, caulis inspidi — ('aulis leiragonus erectus MIOIUS ramis Rami dicusali, cauli similes. Folia peliolata ovala acuminata icrrala, inferne integra glabra purpura»cnlia enspata pollicana. Petiolus longitudine folii, laxus villosus. Racemi terminaliter laxi digitales et spiihamei. Bractee oblongae acuminatae lae«es glabrae. Calyx bispidi. Decoeto hujus tingunt Japonenses radices *Mapkani*, *Rapat*, el fructus varios color** ^iurac rubro. — *Suo t. f. Pw-purm*, *wdgo Mturauahki t. \$.* nobOis Kaempf Amoen. exotic Cue, V. p. 181 ei Thnberg. — Creteil In Japonia circa Nagasaki culia.
40. *O. RIGOSUM* Thnberg. 1. e. MO. - Bib. I c. 17. - taemU temlnallb; ML ovatis acutis serratis, tabiut rogotit. > - Caulis iettaftWM folcaUt, teDuitslnie tomenosus, bipedalU et ultra. Rami oppositi, caulis almllet painll. Folia ovala acuminata serrata, subius rugosa et pallida, supeHortbv* teatttm aiinoribaa. Ftorum racemi lormalis contracti. — Crescit In Japonia.
41. *O. SCADRIM* Thnberg nr»s in Transact, of the Linn. Sot. II. 338. — Blh I c 17. — Racemis simplinb erectis; foliis ovatis snbtut punctatis. 2. T — Caulis erectus paniculatiH loiragonus, uti tola planla piloso-icabndus pedalls el ultra. Folia oblonga acuta serrata, subius minutis pon» punriata. Racemi lerminalia simplices, floribus oppositis, digitales. Bractee floret ditiingoeniet teuceae. — *Ocimum punelatum* Thnberg. Fl Jap. 240. — Creteil In Japonia.
42. *O. INFLEXUM* Thnberg Fl. Jap. 210 - Btb. I c. 18. - Panicula lerminali racemosa; caule ramisque flexuoso. ^? — Caulis hrrbaceus el rami Demote*-erecti apice inflexi, tenuissime lomenlotl tetragoni pedalet. Folia ovaU acuta terrata lenuissime ncabra unguiculana. Panicula racemosa coarctata. tsut pulvent hujus pro suffimi^iis idolorum. — Crescit in Japonia.
43. *O. \IRCALLUM* Thnberg I c 250 - Bib I c - Narmic terticillaiit virgatu foil oblongis mTratis V - <-auli» trlragonuk, profundf suleaUt, tenuittimr ^lomccilosu-i flc\»o'.i>-rn«clus ramosus Rami cauli »inuk*«, infriore* remotioref Iliperiorci urgali Folia olivaceo-oblunnga *crrala, trnui*Mmc lumento»a |i_0|h' Caria et ultra Ratemi Qorum in raiuis trrminalo%, rx wrticilli% %finori* f< quentibus digiUles crecli - (JI-KII in Japonia propr Nagasaki

ft *Species non descripta.*

O. CINEREIM Br. in App. in Sail Aby*s.

ft t *Species e genere expellendae.*

- O. ACROCEPIALIM Blume. = ACROCEPIALIS BLUMEI
 O. ASPERIM Roih. » COLEI'S BARBATIS.
 O. CAPITATIM Roth. - ACROCEPIALIS CAPITATUM.
 O. CAPITELLATIM Linn. - ACROCEPHAMIS CAPITATUM.
 O. COETSA Spr. - PLECTRANTHIS COETSA.
 (). DENSIKLOLIM Rolb. - PLECTRANTHIS DENSIFLORIS
 O. DIMIDIATIM Sebum. « MOSCHOSMA DIMIDIATIM.
 (). FASTIGIATIM Rolb. — SALVIA PLEBEJA.
 O. GRANDIFLORUM Blume. - OITBOSIPHON STAMINEL.
 (). GRATISSIMUM Fonk. - PLECTRANTHIS OVATIS.
 O. HADIE3SE Forak. - PLECTRANTHIS MADAGASCARIENSIS.
 O. MADAGASCARIENSE Perv - PLECTRANTHIS MADAGASCARIENSIS
 O. MAYPLRE>SE Roth. « PLECTRANTHIS CORDIFOLIS.
 O. MEMHOIDES Linn. - GEMOSPORUM PROSTRATUM,
 O. MOLLE Ait. » PLECTRANTHIS CORDIFOLIS.
 <(). MONADELPHIM Rolb. » COLEI'S HEYMEL.
 O. VOMOSTACHYTIM Beaux. - PLECTRANTHIS PALISOTI.
 O. PAMCDLATIM Pen. - COLEI'S PERSOOMI.
 O. POLYCLADOM Lnk. - MOSCHOSMA OCYMOIDES.
 O. POLYSTACHYON Linn. « MOSCHOSMA POLYSTACHYTIM.
 O. PIOSTEATUM Linn. — GRNIOSPORUM PROSTRATUM,
 O. PUNCTATUM Liu. — PLECTRANTHIS PUNCTATIS.
 O. IACEMOSCIM THt. — PLECTRANTHIS THIXBERGII.
 O. PALVIOIMS Modi. — PLECTRANTHIS PALISOTI.
 O. SGDTICXAMIOIDES Lion — COLEI'S SCUTELLARIOIDES.
 O. SUPPINICOSUM Sebum. in Thonn. - ORTHOSIPHON GLABRATUM
 O. SYLIATICUM Sebum. - GEMOSPORUM PALISOTI.
 O. TEMIFLORUM Barm. - MOSCHOSMA POLYSTACHYTIM.
 O. TERMFOLILIM Sprng. - PLECTRANTHIS TERMFOLIS.
 O. THONMNGU Schum. - ORTHOSIPHON GLABRATUM.
 O. THYMIFLORIM Roth. - ORTHOSIPHON GUBRATIS.
 O. TRISTE Holt. - ORTHOSIPHON RIBICINOSUM.
 O. VEHTICILUTIM Lion. - PLECTRANTHIS THIXBERGII.
 O. ZATAKHKXDIM Portk. - COLEI'S ZATARHEMEL

3670. «E%IOMPOBIM Wall.

Wall. D M. in Bib. Labial, flraer. fl. p. f. lft - Meitn. Gener. plant. %afcular. I
 m. ii. IOL)

laetia I. 6OH0SPtIOM ItiLe. tO.

CaljCif drnte* doo inflmi liberi.

- I. MADAOASCARIBSSE Blk. L f. ». t - r. aole »uffrulo«o procumbent ranoa O
 foil. peilalaUi ovalit obloilo«coli« erenain, ban rotundau t. ronlatu rugoajj
 ulHoq. THIOSVIU, floralib. brartrarformib. ovati« arutit, bati albidi*. j — **Caulis**
procumbens, oblate Irirjgono* glabrr, raroit junionbu» brvvi««iroye **rafo-**
pubescentibus. Folia peiolali tubpnllirana otata obtu«iutruia rrrnaia, **bas**
retundata, inferiora tubconlala, juniora runeala, uinnqur %illo»ula **rirosala**.
suprema M loraha bati albida. Boralia par%a brartejeformia o«aia aruta **sessilia**.
 Vertlelllatlri 4iaiiarii 10-0ori rfcenoti, rarcrou i-4 poll, lone*. A*IJJcei **sub-**
 ••••Ilet, *Uritmi* rampannlaid. corolla dinidio brnn.>re«. frurnferi »ub«reeli **tu-**
 kuloti flabri ttriai, Iraot%ertim m«o.t, denhbot brv%ibu«. %upertore U»« **ovato**
 patoau BOB d*eorr*at«, 4 tarerionbut laio-laoeeolalu ereeif. Corolla **tubus**
 ba*I t« «aitt ftuee eaaipanvlaia. lobit pauUbut. 4 •openoribot of am. inferior^e

- declinalo linean-cunealo subconcavo Genitaha extern Uliama linean-oblonga, sub lente rugosula nigra - Crescit in Madagascar^ in monle Tanonaman proinciatic Emirncnsn.
2. *G. bTROBILITERUM* ^ all. Plant Asiat. rarior II. 18. - Blh. I. c t - Hook, fcon plantar, t 462. — Caulis credo ramoso, foil, subsessilib. ovalo-oblongi, uiring angustalis dentalis aspens, supra hispidulis, subtus glabrusculis, >eriacillastns multifloris in apice ramorum <picaln, infimis subremois; foil, florab. otati* acuminatis, floras superanlib, calycib subsessilib, rurliferii ereclii striatus tululusis, basi transude rugosis, ore membranaceo irregulariter 5-dentato \$ - (auli> basi fruticosus, ramis elongatis erectis. 1-olus caulium 2-3-pollicana, basi in pvtiolum brevissimum ailenuata, supenora minora el floralia bam saepius alba ilacemi spiciformes, 3-4-pollicares; verticillas in approximati \ infra parum distantes. Uij* saepius subbilabialis, fructifer lincas 3 longu< labis supenons deule medio ovato obtuso, lateralibus minutis, labio inferiore breuore bidnuto. Corolla >>i calyce longior, labium superius late 4-dentatum, inferius subbreviter anguste lanceolatum. Gemula corolla in brevi »a *Plectranthra colorata* D. Don, Prodr. D. >ep. 110. — Crescit in India orientali, in montibus Nepoliae el Silhet.
3. *G. PARVIFLORUM* Benth. In Wall. Plant Asiat. rar. II 1 & el UbiaU gener. et spec. 20 f — Caule erecto ramoio; foil. oblongo-lanceolatis a cullis, lris angustis serratis strigoso-hispidulis; racemo elongato laio multifloro; calycibus pedicellatis, fructiferis declinatis, basi transverse rugosis, ore bilabiale, labio sapenore indentato, dente medio majore ovato, in fenore inlegerrimo inflexo, calyce claudente. ^.* — Caulis pedalis srsquipedalisve inferne glaber, superne pilis raris adpressis turgidulus, ceterum ad axillas foliorum turgidulus el floralium fasciculis pilorum nudis Folia in pvtiolis breviter attenuata, irregulariter acute dentata, basi cuneata integerrima, supra el ad nervos strigoso-hispidula, floralia ovata acuminata, lris subbreviura, supra glaberrima, tubus hispidula Racemi 3-4-pollinaria, verticillas lans stibremotis 13-20-denti Pedicellae calyce longiores erectae graciles glabrae i ihrei ppr anhel sin mioti bipidi, fructiferi tii tineas 2 longi, basi bipiduli, labium membranaceum glabrum Corolla parva, summitas eiserilis. - Crescit in India orientali la sosjUbat Silhet.
4. *G. ELOSOGATUM* Bib. LabiaU gen. ei spec 21 | - C<ul< bail proslrsU raoMtq. elongatiff sub^ectis pnbosceolibus; Ml. brenter peirolaUs oblongo-UactouUs ae<-ns terrain*, basi attenuatis hispidulis; verticillas lris m<U0<ris spropriimstli tpicans, calycibus breviter pedicellatis, fructiferis subdilatatis ovatis, basi striatis irregulariter rugosis, ore conirario, dente superioris atatio membranaceo ovato, 4 inferionb. minoribus aculis ^ — llibilu *G. protiraio* afOoe, differt cullibus <longalU minus foliosis, angulis vn callosis pubescentibus, racemis densibus. Pedicellae brevis sinu Fuha floralia late ovata, basi albida acuta. Calyx magis calycis *G. pmtim*, sed ore lris dilatatus, dente supremo ovalo obtuso, 2 lateralibus distinctis anguste lanceolatis aculis, 2 inferis subcoarctatis. — AAinan. thus *Imdua* Burm H Ind 131. l. 30 fig. I. — Crescit in Zeylone saoiubun
3. *G. GRACILE* Blh. I. c. | — Glaberrimum. caulibus protractis ramosissimis, (oil. oblongo-linearibus subserratis, basi longe angustatis; verticillas lris multioribus racemosis, inferionb. remois; pedicellis cespitatis calyce subduplo longioribus, calycibus tubulosis, basi striatis irregulariter rugosis, ore membranaceo acute quinque-dentato subbilabiato ^ — AfBoe *G. protracto*, sed pmo intulo glabrum el foliis angustioribus distinguendum. In Orescentia *G. protracto*, sed laior Calyx paulo cetero direlli duplo longiores Urollae mmoUe, gemmibus breviter exsertis A (*B rhngato* caulibus prostratis el racemis longis differt — Crescit in India orientali, ad litora mans prope (olombo 7eylanae el in Coromandru
- 1 *G. PROTRACTUM* Benth. In Wall. Plant Asiat. rar. II 1 H ri Labial, gener. et spec. 21 | el 708 - Caule prostrato nudo, full priuutis oblongo-lanceolatis, inferionb. subtotalis, supreme lanceolatis lineari-basis, basi <0-nastat, verticillas lris multi-locis spicatis. mfrionb. subremutis ralcibus jrdi

cellalis, Truclifens dcilmalis, basi snatis trans>er>e subrugosis, oremembranacco irregulariter bihiato, labio supenorc Indcnlato, denlc mrdio major©, ID fen on credo bidenlaio. ^ — Caulis prostratas ramosissimub hi*pidus, angulis subcallo&is glabcrnmis. Folia pana, semipollicem ad pollicem longa, lineas 3-4 lala, acule et remote serrata. Racemi 2-4 pollices loogi spicaeformes. Verticillasin 10-90-flon, inferiores remoliusculi, supremi approximali Folia floralia ovata acuminata sessilia, ba«i albida submembranacea. Pedicelli caljre longiorcs gracilcs erecti v subincum Calyces parvi, fructiferi YU l'A lin longi, ba»i siriati hi»piduli, luperoc conlracli, ore dilalato membranacco. Corolla minuta, cal>ce >ix duplo longior, tubo brevissimo ineloto. Stamina breviicr exseria — *Katumba Rbecdc*, Ilort. Mai. X.. 183. U 92? — *Men (ha Zeylamca etc*, Burm. Then Zf)l 158. l.-70. fig. 2. — *Tkywnu tmdieus* Burm. Fl. Ind. 129. - *Ocymum mtn-tkotdes* Barm. Fl. lad. 199. — Linn. ManL plant M. — *Ocymum prottralum* Linn. Manliif plant M8. — *Lummtstra protrata* spr 8) si. Tcgel II 087 — *Mentha (EUhoUzia* Pers. Eocbir. II 114. *ocymotdet* Lam. Diet. IV. 103. - Crscil in India onentali, in maniimii Coromandeliac ct Zeylamae.

- 7 G. TIIMIFOLIUM Bib. I c. 21. | - Caule herbaceo, basi procumbente pubc<cente; foil, tessilib. ovalis obtusis crenaiif, floralib subconformib. minorlb., tupremis braceisq. albido-cartilaginein; %ertkiUa>»irik dislinhb, calycib. tubsessilib. irregulariter bilabialis, labio tupenore o^aio mtegro T. ba>i ulrinq. dentalo, infenore integro v. bidenlaio. 4* — Cauls IMSI procumbente* elongaii* apaperné adacendeolet ramoti lenues. Folia u\ ultra somipollicem longa, ba»i rolaodalo-cooeaia, inpra bupidula, tubtus ad nerto cloaioi villoiuU, caeteroai flabriaacoU, floralia taproma braceiaeformia miaou. Racemi gracilcs interrupii* Verticillatirl flobotl, IOOjiUoro qoam ID G. *prostrate*, at floret pauciorrs arena* aetsilea. Galji mafalladIM ealfcia G. *prostrate* frociifer magii aucius, dentibot obtoalarlbM* Corolla ealyeoa brovilor eieedent. Stamina breviicr rxierta. — Habitat to Vadafatcaria, lo provlndae Fmiraeosis montibuf.

Soetia II. PUT08T0HA BUL L O. 22.

Denies ciljcini in labia duo subintegra coalili.

8. ït PALISOTI Bib. I. c. 22. 7 - i aulc credo pubesrrnlc; foil. petiolatK ovalii. ban rotundaio-conratif, (Inrjhb >eriirillajro \\\ longiorib.; racrmo graeili caljci* labiU mcmbanacei* sulnnirris * — Caulu hrbaccus tubtimplex, parfa pabc«ceof, ranw junioribui «ИИОИИ Folia *Moichotmabs paly\$iachy%* obloM crenaia glabriotcola, pilu ram hmpidula T pubctcncia, floral 11 bralcacforoil* acominala. Racmat timplet 3-4-pnllicarit. Venicillattri lan mib-IO-floH* Pedieelli teoof, % Ho. loofl. Ploret parti. Calyi o^alut, fniclifer deelioaW btblabatus, labile mombraoacei* oblotit ioiefrit deole »oprioro ovalo eloofoalO, ba»i ooo drcqrreoa, laleraliboa iruncalit, toflmia coalitit¹, »upenore pat*o»» iofenore caljcem eladente v. demum patent*, faoce lotos nuda Corullae tub«* cal)ctm m tuperaoa, faot ſubaequali», labiom tupertu* 4-fldum, inffhu* dcclibatun eoacavom, bail aofotlalum, toperiori «U longiut. (acoitalia glabra, COrollam aoqaolia. PllameaU libera edrniula. 8l)lo» bwitcr bifidat,?). - ^{8p}*J* *tlmxxh JffcoJMaj** villotiora 1001 quam *lakl***: - *PialoHoma African*** FL de Beoof. Fl. O». el Beo. II. 01 I 91. ffl. t - *Ocymum syhahcum* Schooi' TboM. Koagl. Daoak. Viden%k SeUk. Afaodl. IV. 44. - llabitai in Africa ^{uo} pica, to rtfoo Beam, ad Mier«ood» Creek lo Congo, in i)hu ad Aquapm*

3671. MEAO\% *Blum**.

Blunt, BUdragtB 83L - MeiM. Gener. plant. «a»cul. I. ffi II. 101 - *»»• **Labiat.** feaer et spec, ii.)

3. M PALUSTftft Blome, BiidrageaCT. Btb I c. - llerba ioodora, folliU °Tajo-oblogi. deautit rofoela pllotioteolit. Ooribot dente terticillaio-tp^{111*}. «ll~¹¹¹» **caiorc** ^{caiorc} **caiorc** bradoatia, podleoUia Caaccolatia. V - In Javat palodotia circa Buii

3572. ACBOCEPIIALtS *Dth.*

(Blh. Labial, gener. el spec. 23. - MIMMI. Gener. plani. %ascul I. 282. II. 101.)

1. A. CAPITATUS Blh. in Wall. Plant. Asial. rarior. II. 18. cl Labial, gener. el spec. JJ. + _ Hook Icon, plant. I. 550. t — Caule procumbente foliisq. ov.ilis subglabris, calycis labio inferiore 4-dentato. 2|. — Cnulis lenuis, basi ramosissimu*, ramis adsc'endcnlibus glabns v utnnque linca pilosa notais». Folia peliolala oblongo-ovata, romoie scrrata, basi an^lala intrgf mma glabra, floralia sub capitulo 2-4 o\ala subsessiha capitulo longiora, in capitulo minutissima Capitula ovaia, terminalia *. aiillana, pcdunculata |. sessilia, c ^oriicillastris 6-flons densissime imbricalis composita. Caljx per anlliestn m linearis, fructifer tubulosus, fero semtpoUicarnscanosusglahcr, labio superiore conwio, inferioris dontibus subulatis ciliatis. Corolla cal)com aequans. Stamina inclusa — *l>runella Indtea* Burm. Fl. Ind. 130. — *O capiteUatum* Linn. Mant. plant. 276. — *O captatum* Roib, V». plant, spec. 270. — *Lumntliera raptlala* Spr. Sy«l. \cgclab II 0X7. — In India orientali, in peninsula circa Tratancor* el Courtallum, ad Monger el Goalpara, iu Nepaho, in regno Burmanico ad monlem Taong Dong, in Java, in China.
2. A. BLUMEI Bib. Labial geoe. el spec. 23. — Caule diffuso telragono; foil, lineari-laoceolaus grosae serratis; florlb. dense capitalis terminalib:, bracteit ovatis nervosis cinctis. % — An ab *O. capita to* distincium? — *Oqfnum aereocephaium* Dluoe, Bijdragen 834. — Ilabiui In Javae gramiDotis humidis circa Ronpieu.
3. A. VILLOSL'S Bth. I. c. — Caule erecio fbllltq. piloso-hlrfatla; calycis labio inferiore iniegemma. ^ — Caulis ereciu< pedalin ramosut lelragonus sriatut, pilm articulatis, saope glandulosus villnsus. Folia petinata elliplico-oblonga t first a, ba«i angustaia, pilis caulims conformihus hiMuta, «ubtus glandulo^a, lioralia 2 v. 4 sub rapitulo, raulims conformu in|n|urrantia, in capitulo mrambranarea lalo o\ala sinu.ilm flores subaoquantia Brarlac minutinsimae. Capitula globosa, terminalia * in dichotomia ramrum ftuiprioruro subnositilia, verlicillastris 0-flont dense imbricalis. Caltx mbucanosiu, labium supromum subenerve inlegerrlum convexum »ubglabrui(infenus iniegrnraum indrtum 4-nervium, apice peninlaiuin. Cotolla vii eiserU. Stamina labium infonus aequantia. Stjh lobut inferior superiorem basi Involvoos. - Cre»cii in Mad«gascaHa.

3673. HOSCnOAMJI *Rchb.*

(Rcbb. Conspect 171. — Meisn. Geoe. plant taseul. I. IBS. II. 101. — Bib. Ublal. gener. et spec. M. el 108.)

1. M. POLYSTVCIHTM Blh. In Wall. Plant Astti. rarior. II. 11 - Bib. Labial, gener. el spec. 24 et 708. — Caule acule lelragooo, angulis laevlb. v. vii asperis; vfrticilla«trift 6-10-nons laxi« appronmaais. Q — Herba gractlls 1-2-pedalis ramosa, ramis glabriH v. pilis brevlbus raris hispidula. Folia longe peliolala o^ata aculiuscula crnnata, basi rolundata v. cunraia, glabra v. supra leouissime pub**ccnlia, subtus pallidiora. Racemi numcrosi graciles 2-4-pollicares. Verticillaitri saepius aeiflon. Calyces hispiduli, vix bilabiali, deolo supremo ovalo olmiMu*oulo, laieralibus ovatis acuminalis, inflmm setacriv Corolla minuta, palhdo purpurascens. — *Orynum tenuiflorum* Burm Flor Ind. 120. (non Linn.) • *Orymvm polyslachyon* Linn. Mant. plant. 907. - Murr. Cnmm. G6llng. nov. III. 71. t 3. — *Lumntzera polystachya* Jacq. Eclog. II. — *Plertranihut* para/Tom* R. Br. Prodr. II. Nov. Holland 500* — *Meetranthu* mirranthu* Spr. Sysi. %rg«ot II OBI?? |n Indiae orientals hunudm, in peninsula, ad Arcoi in proucia Circanense in m-suia Maurido, in rrgno Rurmanico ad Rangoon et Prome el in proviocia^Taln% in Ja|a jutta Rata^iam et in inoula Timor.
2. M U s|R UK Iih I.C.7W. - Caule aruic tetraganno, angulis laevib.; foil. ovati« t. <nato-lano*olatis pnbescentib; \crtm ill.i«ins late 0-10-flori* ditlannb, »^|o •pice bifldo O - ^»* «' ne ||t a prarrrdciito diffrrt f«h« pub»mrrriiibu%, ra«r-n»s longionbus latioribui, ciljei* drntiliu% inferioriliun aügiü%iinritiu» et ,hi, profundiut h»»o — *ilecimnthut motchalut* H llr Prodr (I >>> ||,|| vi, {llth*

- I r. VS | - *Lummlzrra moschata* Spr. S)st. \rgcOb. II. 6⁷. — In Xova Hollands (ropira rrrsnl)
3. M DIMIDIATIM Blh. I. c. 24. — Caule acute Iclrafcono, angulo laetib.; racrmit fl<ni>atis, \rtinlljstris sub-10-flons glomcraii* rcmotiusculit o* ~ *M. polystuchy* \alde affline di fieri, fuliis majoribu*, raccim* longionbus 8-10—polhcan—bus, lion bus nuuoribu*, terlicilla>lri<> sarpius Q— II<H distanlihuv — *On/mum ditmduUum* Schum. et Thonn. Kongl. Dansk. Scslk. \ideu>k. Afhamll. \|. 41 - Habitat in Africa trnpica, in (.ongo el in Guinea.
4. M. OMMOIDIis Uih. in Wall. IManl Atiat. rarindr. II. 13. et Labial, genrr. el spec. *Ii*. — Cnule leira^ono, anguli4 aspens; irrllirillaMris 6-flori< latin. (o)? — HJHJUH *M polyslaehyt*, sed folia acutius <erra(a, ^tipra hi<pidula, ^ublus <nno§-eeniia; cañce< paullo majores glabriu<ciih(frurlifen Aürti palenie^ diHimcliu> bilabiali, labio supenore Iridentato, dentibus o\ahs, mrdio lalmre, infenore bidentalo, denlibos laneelalis aculis. — *Lummtzera orymoules* J.IK| Kilop II. ~ *Orymum polycladon* Ink. Knum. plant, bort. Brol. II. 110. — Habitat in India onenlali in proiinria Silbel.

f *Species quoad genus dubia.*

L(MMTZKH\ f AF.sU Spr. S^t «egelab. \. cur poMor. £f). - llami< glahnut-CUMH terelibu^; folu^ o^alis dontalo-rmiatK; peilunculis «ub<<erticillati<< ba<i bracifalK. >pecie< >H^nic descrijMa, ^eru>imillior non no^a, et ideo »u r<-linenda. — Cre>cii_____*

7¹ *Spenes e genet e exrhidendae.*

- L. f PITATA Spr. - ACROCEPIULI s i:\IMr\TLS.
 L. r.AR>OSi Spr. - OCVVIW r,AR>Os(M<
 L. DESSIFLORA Spr. - PLECTRA>THC'S RIT.OSIS?
 L. FASTIGIATA Spr. — SAL VIA PLRBFJA.
 L. MOSr.HATA Spr. — PL.F.CTRANTHIS >IOS< II\TI s
 L. PROSTRATA Spr. — GKMOSPORI M PHOsTltAM ||
 L. RIBICLNDA Spr. - ORTHIOM'IION HI IIII MU s
 L. SAL\IIDI:-S Spr. — PLKr.tltAM IK s III.\M.I.
 L. TKMIFLORi Spr. ~ iU.\M\ || s ^ n i M
 I. MIUi\TA Spr. < ORTHosllMION \\\Ri,\US.

3.174. ORTHIO<illMIO\ lith.

(Bib. in Dot. Reg. \|. ad rale, no I U) - Mn%u. (.rner. plant. va<rul I. \$**.* ^
 101 — Bib I abut, grner. el »per. tS)

1. O. R| PICT>DtS Btb. in Wall IManl Anal, rarior. II. II et I ibut. ^ner. f>
 •pee. » I - Hook. Icon, plantar. L 4*0. - Caulib. cae%puo>u, ba>i folio-
 •it ram><i%. foil. oblongo_r>vjii> grotte denial!*, bati angu%iatU, inflmi* P^
 lio|aii<, ftupermb. »e<>illb.; corollae tubn redo, fauce »ubarquati cal>ce da-
 plo longiorr. «iaminib. corollaro ar<uaniibu*. 3- — Radii era<>a, flbn* I*~
 teralibut taepf* tubroait. Caule* rum raceroo peddle* v ultra, ad<<cendenl<<
 leiragont, piht artitolalU «i>eoti» roagu m>nu>t< «i||n<i, v. in «ar. Y. f^{frt}
 glabrl, bad folio<i ramo<i(apiece «ubnudi Folfl <-l-po||iraria **cras<io>***
 rula, tublm pallida trnota m>ouii%>imr gUnduloto-puoetaia, fl<>ralia **brac-**
 Ifaefornua mnoU ovala aruninata Racenut 0-9-pollican<, **verticillat-iris**
 demuoi fere polhcem ditUntibut »ei(orit. Calyre* frocliferi pedicello **lon-**
 goret, obloogt ouiantet, pamm Inrunft, 3 Imeaa Inngi, d*nle tupreroo **Q%BI** ^
 aapra foQca<o(coloraio Corolla alba t. dilute purpura<<een<, knc<j< 6 ?.
 •pecinioibot (lapaleo>iba> fert » longa - *Hertramtkn rvbimmda* V. l><n. P'<<ldr.
 •• Nepal, lift. *Lmmmttiern r*btrum<i<i vpr. S)»l <rgeub IV rur. potl* **J*

< m*U*s*twnu Rib. I r. — Foliis uinn<|u< nollu>>iroe IIIOM* - **Plectranthos**
 mulbstmms Wall. <•••.

A r*m*ij*ms Blh I e. — Folu* brr<iirr l<>inrolu>>-pube>e>nnbu>. — **Plectran-**
thus tuherotmi Ro&b. MM. - *Ortmmm Imbrrotum* Rib in Herb. Banks

- T. rigidus* Bth. l. c. — Foliis glabrusculis v. brevissimis lomentatis. — *Onnum rufifolium* Lamour. mss. — Habitat in India orientali, a. in Sapaia el Kamoun, 0. in munibus Orixae, ad Segain regno Burmameo, r. ad Athpur el Monghjr.
2. O. YIRGMTS Bib. In Wall. l. c. of Labial, gener. el spec. 28. t — Caulibus basi cespitosus; ramis creclis inctis; foliis, oblongo-lanceolatis subdentatis, basi angustatis, v. infimis breviter petiolatis; corollis calyce duplo longioribus, tubo rectiusculo, fauce subaequali; slantibus. corollam subaequantibus. 2l. — Ab (*) rubicundo* differat: caulibus* Halioribus, foliis angustioribus, racemo brevioribus paucifloro, verticillatis remotioribus, corollis* minoribus, tubo >u recto. Caulet Mnrii, pinnis foliosis, uli lota planla glabrisculis. Calyce colorati. — *Plectranthia uryata* I. Don, Prodr. fl. Nep. 110. — *Lummitzera ttrigata* Spr. 8)si. legeL IV. cur. post, ill — In India orientali, ad Gorakpur el in montibus Morang.
3. O. MSCOSIH Iih. in Wall. l. c. el Labial, gener. el spec. 27. — Caulis basi fruticoso erecto ramoso; foliis petiolatis ovatis crenatis* rordatis vifcoso-pubescens glanduloso-punctatis, petiolis anthesis pilosis, corollis tubo recto calyce duplo longiore, fauce subaequali; flammis corollam subaequantibus. q. — Inflorescentia *O. amoena* aed habitu el foliorum forma dneriui. Kami, p*lioli el nervi foliorum pilis longis albidis viosis saepius bispidi. — Habitus in India orientali, ID montibus Dindygul.
4. O. TOMENTOSUS Bib. I. l. c. c. — Caulis suffruticosus; ramis adscendentibus lomentoso-pubescentibus; foliis, petiolatis ovatis, basi cuneatis rotundatis v. subcordatis cretibus, breviter lomentoso-pubescentibus, petiolo anthesis nudis, rncemis clungantibus; corollis calyce triplo longioribus, tubo subinruno, fauce subampliata. staminibus corolla brevioribus. — Medius inlr O. turoium n *glabrum*, .dfinis ciam nonnunquam *Onno dt/fuMo*, a quo corolla triplo quadruplo* mijorv el -ll<> distinetus. Folia fr* *O. glabrum*, sed majora rra<<flora el sacpnis lomonosa, qianim otiam in »preminibus» nonnullis fr* plahra, 4il sniper drnsi>Mme ulnque Rlamluloso-punctata. lacrimis 0 pollicos r| ultra laxiutruhi >rriritUntri terundi subscilion. Calyce oblongi, fructifera i Im. longi. Corolla 9 lin. longa, r* *O. rubicund**. — *Octmum lr*te* Roth, Not plant spec 270! — *PUetronthut Irish** Spr. bjr>L vegetal. II. 000. - Habitus in India orientali ad Palaveram prop© Maderatpatam.
5. O. PALLIDUS Royle mtt. ex Bib. In Hook. BoL Mlaccell. III. 370. - Bib Labial gener. el spec. 708. f — Glaber v. lefuulaalne pobtierai: caule tacendenie; foliis, petiolatis ovatis oblate et grotto tubincito-dentatis, basi Imegmimit cunraii el in petiolum decurrentibus; corollae panrae tubo calycem subaequante, fauce subaequali, slantibus. corolla brouonbut. ^ - Afflort 0. *lontutoto*, habitu *Onnum ateendrn**, foliis *Onnum cornoium* quodammodo referat el per antbetin floret primo inluilu *tmnts aUniore*> quam *OrtHotphit* videulur, ted bujut generu rtt. Herba humilis, IMM ramosa, florifera taepe vis bipollicarit, fructifera »emipetalis. parum altior. Kami acute tetragon!. Folia crattiutcula %, - I - p o |. licaria el longiora pallide \india. Spicae subtimpliret brevet. Floret magmtudine *Ocimi d%ffu\$%*. Corollae labium inferius tupriori longius contra>um i'.§|| fructifer elongatus, pedunculo recuno ei arquali, deOetut tubulotut tubinrunut glaber, drnte tuprrmo ovalo conca\o-replicato breviter decurrente, lateralibus brevibus latit acutis, inflmis tubulatis. - Cretclt In India orientali id ripat H Jumna, in artnotm Djamn regni Cathemerlani el In anit Potun.
- a O. GLABIUTIS Bib. in Wall. Plant. Atiat. rar. II. 14 el Labial, gner el spec. 2S * el 700. - Caulibus adscendentibus ramotus glabrus. foliis longe petiolatis; 0<al: acutis dentalis basi rotundatis v. tubordium glabrusculis; forollis tubincum* tubo raepe duplo longiore, fauce Mil.i.'q.nli. Mmmmb rnrnlla WreMonbu» ^> - Herbs perennans basi rann%a. r.uin« aiUrendriiibis * erecii* <I.,n» \ i,,li% minuli*«inn» ftrabriiHculis, ftaepiis purpura^rriibus Folia ^ubpolhcana % m * lerdum l'.-2-pollicana, gros>e el aruir errata, baM m pet.olum parum dr' currentia, supra taepe purpura%ieiiiiia »uliu» pallia, jutnora altnda |> r-

tioli inferiores folio longiores. Racemus 2-5-pollicaris gracilis. Verticillastri seuipollicem distantes. Flores duplo nun ores quam in *O. rubieundo*. Calices alro-purpurci glabni, denic supremo o\alo roiuudalo, margimhus subrevolulis. Corolla pana gracilis glabra atro-purpurascens. — *Ocimum thymiflorum* tyolh, Nov. plant, spec. 209? — *Plectranthut thymi/lorut* Spr S)sl. wgcl.lib. II 000. — *Ocimum Thonningii* Schum. Kongl. Dan>W. Vidensk. Selsk. Afbandl. IV. 43. — *Ocimum tufruticosum* Sebum I. c. — Habitat in India onenlali, in pvnmtulj, in insula Zejlama, in Arabia et in Madaga>caria.

7. O. INCLHMS Bib. in Wall. I. c. 13. el Labial, gener. et spec. 28. - Mannd et Henslow, The Botanist IV. L 173. | — Caule basi procumhenle ad*cendcne; foil, pcliolatis oblongis crenalif, otrinq. anguslalis, lenuissime pubescentib.; \erlicillaslns subsecundia; corollts villosis incums, cal)ce tnplo Inngmb., fauce •ubaequali;* n laminib. corollam subaequantibus. ^ — Folia 2-Vpolhcaria, infc-nora longe peliolata, utrinque ad nervos petioli caule<que pubeseentia. Raecemi elongati laxi. Calces *O. rubieundi* v. *O. tirgali*. Corollae 9 lin longac, tubo longe exserto, sacpiuitalde incurvo, labiis patcniibus ut in *Starhyde* v. *IMoimc*: — Habitat in India onenlali in monlibus provinciae Silbel contiguus.
8. O. Sf^PICER Dth. I. I. c. c. - Caulib. e basi cra«sa repente radicante ererllf iimplicib. seapiformib.; foil, ad basin caulis approiimalis prtiolatis ovaio-oblongi< grosne dentatis, basi angu<tati« glabriu«cuh«; racemis elongati«; rorollis ca- h«e subtriplo longionb., lubo recto, fauce amplissima; stamimb. vn coroll* longioribu*. 2^ — Radix cras»a perenn« sublignosa. Caule< cum racrmo 1-9~ pedales glabriosetili. Folia fere omnia radicalia, limbo 3-4 poll, longo, 1 Vt-2 poll, lalo. Corolla coerulea, 7-0 lin. longa, faoce talde ioflaia campanulata; labium superias-brcvlssinoai 4-deoUtun, inferivt dooga^{loin} conea^um. (ienitalia bre- viler exaeru. — Utblat la ladia orlMUll In Napalia.
9. O. STAMITEL'S Bib. In Wall. I. c. el UblaL gener. et «prc. 29.)* - Taule her- baceo erecto sobramoso; foil, peliolatis o^aiis acuminate gro%»e drntatis, basi cuneatia rolndalit v. supreme subcordali*; racemis lam, corollhs calyce inplo longionb, lubo subrecto, labio sopenore dilatato; gemialib. longis^ime et^eriii* ^T — Herba 2-3-pedalm glabnu>cula |. Irnui««ime tomeniot*pube>r<*ns. !•''' lllore%centi.i el eaħx omnino generic. Flon*« canduli pulcherriml, fere *Clrrod\$*~ dn* r.orolla H.Q-lineari«(tubo graeih , blnum ««ipenus dilalalun quadndenUW** infenu* Imeare c^nahculatum. (irmulia c.ipill.iri*.i, corolla fere tnplo longiorf* llabiiu planta flnngera *I lerodfndrmm*, fructifera *On mum* refer!. — Variat floribo* albidic el lilacims. — *Oaumum grandt/lontm* Blume, Bijdragen K&. (non L'U^nLJ — llabiiat in India orientali, in nionte Taong Dong dielo Avae el in MariabanUt in moniibns Korojivari, In Java ad nvulot locis umbrosis, in insula Kikobaf •* d Offak in insola Waigiou Molureamm.
10. <). CAPITATC* Blh. Labial, gener. ei »pec.0. f - Caule herbaeco erecto ^{sub-} ramoso; foil petiolalis ovaii* acuminalU grosse denlalit, ba<i aoguttaii*; r ^{aco-} »ls spicifbrmib. abbreviatis densia paoeiflons: corollhs caljce plus duplo)onfi~ rib.; gtaiulib. lo^igissime expert is. 4 — IUules adteendeoies, pedalei H •!••• pilis bretlbas nits bifarian pabeteenLM. Folia i-4-pollicana acua, irr«ff«k<^<^ler erenata, crenolts aorrooati*. ba<i longe ang««ua, supra pilis rans brevibol ^{ibi bit*} piduU, caeleniaft glabra. Verticilla«m texOon pauci, in »piean oblongaa •••* quipollicareni toogUslae peduaculatam approximali. Folia Ooralia infrriora, ba» dilauu tobaapltxieanlia. longutino aconioala, calces aequaolia. •opre»^{i e*T} moMdilauu colorata glabra »ubciliau. r.al)ces aobsessiles semipollicarei > ^{labri} tubulofiti, denle supremo matiao dilauio veqo.o margimbu* reOexis tli ^{decur-} remibQt, 4 Inferioribot b«s» eonnaiu. apice seiaceis. r.orolla fere *O. *laminet,* —d labii Miptfi«rit laciniae angusiore^ labium inferius lieeah-cuoalum ^{cana-} H^{ca}U^{tem} Ceniulia corolla plus duplo longiura. - llabiUl in America uopica.

Subtribus II. PLECTRANTHEAE Endl. Gener. plant, p. G09.

Corollae lacinia inlima elongata concava. — *Tropicae gerontogae*.

3575. PLECTHANTHUS Benth.

(Herit. Stirp. I. 85. - Meisn. Gener. plant, vascular. I. 282. II. 101. - Dth. Labial.

gener, cl. p. 20. et 700)

Sectio I. GERANTHUS Benth. 1. e. 32.

Calyx fructifer declinatus dente supremo ovali, 4 inferioribus lanceolatis. Corolla basi supra calcarata. Fruticosa. Flores paniculati.

1. PL. FORTICOSUS L'Herit. Stirp. I. ». 1. 41. - Bill. I c. 32. - Caule fruticoso; ramis pubescentibus; foliis, petiolis late ovatis Mibrord. Hi. duplicato-dentatis gtabriusculis, floralibus bracteis formibus; racemis laevibus pamrularibus; (irilla lri laxe sexfloris; calicibus campanulatis, dente supremo ovali arculo non vurrente, inferioribus lanceolato-subulatis, fimbriis longioribus, basi connatis; corollae tubo basi supra calcarato. 6 — Fructus elegans 3-4-pedalis, caule, petioli nensisque foliorum pilis adpressis rufis pubescentibus v. villosis. Folia juniora supra pilis imbricatis bispidula, demum glabra, 4-pollicaria et ultra, latitudine longitudinis aequantibus, grosse et obtuse duplicato-serrata, basi longe cordata truncata v. ad petiolum breviter cucullata, floralia subinterrima, pedicellulis multo breviora. Pauciflorus parce ramulosus. Pedicellus teretis longus. Corolla caerulea elegans, calicari ad basin tubi extra calicem exserto, tubo deflexo talyce duplo longiore, labio superiore reflexo palea maxima late rotundata breviter quadrifido, inferius breviter contra deflexo. — *Germane a urticaefolia* Lam. Diet. II. 0*2. — Habitat in Promontorio bonae spei, in insulis quibusdam copiose prope Kabinia rixit et alibi.

S. PL. S.W. Urtica (K. Me). Comm. pi. A. Inc. ausir. I. 227. ~ Taule suffruticoso pruribundo; foliis peltatis hubrolundis rhomboidibus, basi truncatis recurvis denatis; ramis laevibus mucronatis; trichotomis laevibus 3-4-flores; ramulis cimpantibus, dente supremo ovato acuto, inferioribus lanceolato-subulatis; corollae tubo basi supra obtuse calcarato. ^ — Basi gtabriusculi. Folia subpollinosa, dentibus v. lobis 7-11 notatis, glabra v. supra bispidula, floralia inflata »bronnifolia, aperiens antheras deciduas. Corollae tubus circumferenter teretis, 3V, imbricatus, labiosa aperiens taumina amplum tamaribatom, imbricatus vti brevis oblongus concavus. — Crocus in Promontorio bonae spei.

3. PL. CILIATIS E. Mey. I. e. - Ramis teretibus; foliis ovatis dentatis, basi inaequaliter cuneatis, obovatis bracteis formibus racemis racemosis; verticillatis laxe sexfloris; calicibus campanulatis, dente supremo ovali acutissimo vix decurrente, inferioribus lanceolato-subulatis, fimbriis longioribus, basi connatis; corollae tubo amplo, basi supra obtuse calcarato. ^ — Habitus, in Promontorio bonae spei calyx PL (rutkoti, M. rami villosiores et corolla praecedens. — Crescit in Promontorio bonae spei.

StoUo U. GLEODES Benth. L. e.

Calyx fructifer declinatus, dente supremo ovali, inferioribus angustioribus subaequalibus v. longioribus, basi connatis. Corolla basi supra gibba recurva calcarata, declinata v. deflexa. Herbae fruticosa. Flores racemosi v. subpauciflori.

4. PL. VESTITUS Benth. I. e. - Caule fruticoso; ramis dense nigris villosis; foliis peltatis ovatis longioribus obtusiusculis crenulatis, basi cuneatis (nervis rimis rugatis, supra funco-pubescentibus, subtus rufo-iridis; racemis imbricatis. Irritilla minus laxa M. d. carens dente supremo ovali acuto non decurrens, imbricatis subulatis; corollae tubo aequali recto, supra subgibbo. 5 - Rami irragouii. Folia floralia pauciflora decidua. Yrlicilla minus pauci laxae rymaeformis pedunculo ramoso ulnque 3 lina. longis ramis brevibus, pedicellulis longis derlin. HK. < alx PL. fructu pubescentibus Corolla 5 lina. longa, Ubi in Intibus, »superiore 4-fido, inferius introrsum, »bu omnibus »ultraqualis. Madagascana crecit.

- 5 PL. CA>ESCENS Blh. I. c. 33. f — Ramis breviter cano-tomentosis; foil, petiolis cordato-ovalis aculis crenatis, supra rufo-omenloti* rugosulis, subtus canescentib. lenimsime pubescenlib., supremis lanceolalis, florahb. bracteaeformib; racem simplicib. terminalib. folia superanlib.; verticilla>tri<> laxis seldom; campanulalis, denle supremo ovalo aculo noo decurrenle, infenonb. subulalis lufimis longiorib, basi connalis; corollae tubo inflato, supra m gibbo. 2l - f auli* videtur herbaccus, saepe inflato-nodosus. Folia subconacca, 2-J-pollicana, ba>i saepius cordala >. supenora rolundaia, supra rugoso-aspca, subtus <ilde nervosa, floralia ptdicellis vu brevlora refleia tes<ilia spathulata acuminata subdenlata, nec ciliala. Raceroas 2-4-pollicans laxus. Pedirelli quatur fore lineas longi. Corollã paullo brevior quam PL longiflon, lubo inflato long© eiserto, extra cal}cem supra subgibbo el decuno, labium supenus reflrxo-paten*, lato-rotundatum, breviter quadnfidum, inferm* paullo longius concatum C)robi-forme. Stamina libera. Stylus apicc subulato-biOduS. — Habitat in Madagascana.
6. PL. LOGIFLORt'S Blh. I. c. f — Caulesubsimpliciei den«e tomentos; foll. longe petiolatis ample cordato-ovatis aculis grosse crenatis rugulosis, utriq. pubescentib, doralib bracteaeformib; racemo simplici folns brevior; verticillistris laxi< sex lion-* approximate; calycib. campanulalis, denle supremo late rotundato non decurrenle, infenonb. subulatis, infimis longiorib; corollae lubo recto supra gihbo. 4. — faults herbaceus adscendens. Folia basi late et profunde cordala, crenatuns saepiu* serratis, »upenora multo minora, floralia subsessilia late ovata integernma aruta ciliala. Racemas 8—4-pollicarM. verticillastri laii, pedunrulo coromum subnullo, pedicellif folia floralia superaniibus, 4 lin. lonffS defleiiit Klanduloso-pubesceniibas. Calyi declioalus pubescen*. Corolla fere pollicarii, labiis palenlibus, supetiorU lobia qnaluor rolundaiis, infenore porrei to integro ovalo. Siamlaa lablo loferiore br<viora. Sljll lobi subulati. — llabitat In Madagatcaria.
- 7 PL. PtitCTATUS Liltril. Slirp. 97. L «L — Bib. I. e. 33 f - Caule herbareo erecto crasso piloso-bispido, foil, breviler peiiolatit o^atis oblusis crnatM, basi rolundalis, supra el soblus ad nenros bispidfs; raremis fimplicib. v. basi ramocis, >erticilla>tris 6-10-Ooris, supreme approximate, cal)rib. bispidis derlmalis, fruttifens membranaceo-iullali», dente «upremo otato aruto non derurrenle, io-Ononb ei suhaecjualib lanceolate, corolla cal>re duplo longiore, tubo basi iq* fra gibbo, ad medium defraclo, faure arquali, labio %upenore bretissimo, Inferiors inruno porrecto concato ^ — (auhn cra»»us 2-pedals, saepe punctatui. Pili raulu el foliorum articulali, >aepe glaodulifert. Folia *ub-2-pollicaria, bati late rotundata v nuhcordata cra«»iusrula rugu|o»a, »ubtu< glandulosa, supenora settilia, Horalia inBma cauhs sobronformia al multo minora, verticillasiro* Y,x eicedenlia, superiora bracleaeformia nembranacea late ovata acominala ciliala, suprrma subromosa. Raeemi den»i bispidi, basi inierrupti. PedicHli calyee brevior*. Corolla magoiludine PL parrifori, dilutivime coerolfa, diseo labii 00* perions lineis purpareis oolato, labio infenore apirem versus iniensius punetalõ. Acbaenia ioflato-rotunilata subcomprensa pallida laeviu<rula. — Onmmm puneit-*m Lino. Mast. pi. 2?i. - Gdfopns macmiosa Lam. Dirt II 001. Gtrm*** maeulos* Lam Did. II. 001. - Germmma pumelata Poir. Diet. II. 70. - CreiCil in Abyssinia.
- 81 PL LE*CHIEf A'LTII Bib I c 34. t - Caule erecto subcarnoso glabriOJCfilOí foil, looge peitolalU oblongu acomioaUs oblu»e srrraii*. ha*i roiundalo-cooealli tettgerrimis glabns, florahb. decidoit, racemo »impliri. vertinlla*tris laiii mulifloris; pednocolit otnnq subcaniosis, irrrgulariler ramotit, ralycis fruenfrt d^nie supremo ovalo breviler decurrenle, infenonb decimal^ ovato-acumlnali<> lateralib soprtmam aequantib., InBmis longtorib, ba>i cum lateralib. ultra medium isjvieem eons)ati>; eorollia calyce quadraplo loogiorib, lubo elongalo, batl tobgibbo, ad mediam defracio, faace dlllauta. I - Species PL eordifoho el maeulos aflnis Specimina deflorata habitu Colrmm m*tn>fd>9*m aeoiulanlur.

faulis herbaceus ') glaber v. sub lenie tenuissime pubescens, bina inde subulberculo» u« Folia 4-0-pollicana flaccida, subtus minutissime glandulosa. Yertinillasae aequales. Calyx florum parvus campanulatus, fructifer valde acutus glaberrimus membranaceus, ejus *PI cordifolia* raagnitudine. Corollae labium superius lobatum v. brevissime tridentatum, inferius ei subaequaliter lobatum oblongum concavum v. subplanum. Stamina libera, ad basin labii inferius inseria. Stylus breviter bifidus. — Habitat in Java.

9. PL. ROTALIS Spr SyM. vegetab II 600 - Dth I c. 33 el 700. - Caule basi procumbente radicante, ramis erectis crassis glabris, foliis petiolatis ovato-rotundatis ohluscis crenatis, basi rotundatis v. cuneatis in petiolum abdercurrentibus glaberrimis erases nosis, floralibus bractaeformibus, racemosis simplicibus, loricatis laxiusculis multifloris approximate, calycis campanulati dente supremo laevi oblongo acuto vix decurrente, lateralibus immixtis, inferius ovatis connatis, brevissime acummatibus; corollis calyce immixto longioribus declinatis, tubo supra lobis, fauce vix inflata % — Kami inaii, itaepit glabri, rarius leniter pubescentes. Tota plarea alba nigrescit, el glandulis minims nigri obaesa est. Folia ovata minua. Pedicelli breves simpliciter pubescentes. Corollae labium superius brevissime quadrelatum, inferius elongatum porrectum. benialia corolla brevis. — *Kurka* Rheedee, Hort. Malabar. IX. 40 I. 85* — *Kept (a Madagascariensis)* Lam. Did. I. 715* — *Germane* rotundifolia* Poir. Diet. II 703. — *Coleuif rugosa* Bib. ID Wall. Plant. Asiat. rar. II. 15. - Uabial in insula Maurio el In Coromandelia

10 PL. TRRMTIS Simi, Dot. Magai. t 2400. — Bib I. c. 31. f - Caule orcio, ramis tenuibus rano-iomentosis, foliis longe petiolatis ovatis acutis grosse serratis, basi imbricatis angustatis subcarnosis, supra tenuescens pubescentibus, subtiliter crenatis, florum bractaeformibus, racemosis simpliciter, loricatis laevibus multifloris approximalibus, ramis campanulatis, dente supremo laevi Mino non distans, inferioribus ovatis acutis brevissimis, corollis calyce immixto longioribus decemlobis tubo supra lobis, fauce vix inflata 4 — Radix fibrosa, tubercula oblonga laevia. Caulis herbaceus Habitus *iH. rotundifolia*. a quo differt pubescentia leni, foliis aenloribus el basi nagis anfractis, saepius a constantibus Itnaiian verticillatis calycis forma. Folia ovata flabra inlegerrima Uaesjotau, laeviter acummatibus. Podietli bracteati. Calyx pubescentia. Corolla glandulis olivaceis, labio superiore breviter lobato, inferiora elongata pomelo. Quodlibet corolla breviora. — Habitat in Madagascaria.

11. PL. OVATUS Blh I. c. 700. — Tenuiter pubescens: caule herbaceo erecto; foliis breviter petiolatis acuminatis creberrimis, basi rotundatis, supra scabris, oralibus bractaeformibus; raremibus laevibus panrolaeformibus; verticillatis aequalibus subdecemfloris; calycibus fructiferis nutantibus. ovalis tuncunris stantibus reticulatis leniter pubescentibus, dente supremo ovato acuto, inferioribus laevibus acutis 3, — A *PUdrantki* el tectone *Coltotiles* dimtus fotiofum forma eaeierum habito quodammodo *Pi cordifolia* referu Racemus *PL aiulralis* Flores *Pi fructifer*, sed corolla supra brevis glabra nee calcarata. — *Ocimum gratissimum* Forsk. Fl. Aej. Arab 110 (oec Linn) — Crescit in montibus Arabiae felices.

11 PL. FORTIDUS Blh. I. c 35 - Caule rasso villono; foliis breviter petiolatis lam ovalis crenatis, basi truncatis cordatis crassis rugosissimis villotissimis, floralibus deciduis. racemosis densis subramosis, verticillatis multilobis, ramulibus molliter villosis dente supremo ovato-lanceolato acuto, inferius lobis seuceis, corollis calyce immixto longioribus, tubo enerto ad medium deflexo fauce vix inflata ^ - Tota planula rufescentia Caulis obtuse tetragonus, breviter pilosus Folia fere rhomboida v. deltoidea, utrinque densissime villosa Rarissime picaeformis, parum rimosi 2-J-polhrare* Folia floralia laevia cordata aru- Ainau, supra glabra, sublus densissime villosa, llores* MipranMa, per anihcMn dm dua Corolla */' rordifoliae* — *Onnum foetidum* L. r. Banks n. l. - ||j|, , q

^ iQ Nova llandia tnnci ad Fndr. l. our» River

13. PL. CORDIFOLIIS D. Don, Prodr. fl. Nepal. 116. - Bth. I. c. 3) et 700. - Tenue pubescens: caule herbaceo erecto, basi inflato-carnoso; foliis petiolatis late ovatis crenatis, basi late cordatis, floralibus bracteaeformibus ovato-cuneatis; racemis laxis paniculatis; verticillatis secundis paucifloris; calycibus fructiferis nullis. ovatis, dente supremo ovato acuminato non decurrente, inflexis. lanceolatis acuminatis; corollis calyce vix duplo longioribus, tubo basi infra subgibbo, ad medium deflexo, fauce dilatata. % — Radix tuberosa. Caulis basi crassus camosus, bina inde inflatus 2-3-pedalis ramosus. Folia 2-3-pollinaria subramosa glandulosa, glabrescens v. pubescentia breviter pubescentia, floralia pedicello breviora. Racemi 4-6-pollicares, basi ramosi, in apice caulis laxi paniculati. Verticillati 2-0-flori, pedicello communi utrinque subnullo, pedicellis 4-8 lineari longis. Calyces per anthesin multissimi, fructiferi 4-5-lobi longe submembranacei, denticulati 3-5-lobi lateralibus parum longiores, basi subconnatis. Corollae labium superius ascendens brevissime quadridentatum, inferius longius latum concavum. Genitalia corolla breviora. Acbaenia inflato-globosa pallida laevia. — *Perim Tolosri* Rheede, Hort. Malabar. X. 161. t. 84. - *Orpnum Maypuretui* Rotb. Nov. plantar. spec. 271. - *PL Maypurensis* Spr. Syst. vegetab. II. 001. - *PL secundum* Koeh. Hort. Ben*. 45. — *Pi. incanus* Lnk. Enum. plant. hort. Berlin. I. 190. *PL mollit* Spr. 8) st. vegetab. II. 600. — [Bib. I. e. 35.] — *Ocimum molle* Ail. Hort. Kew. (edit. 1.; II. 022. — *PL diraricatu** Weib. in Syll. pi. toe. Hatisb. I. 68. — Habitat in Indiae orientalis montosis, in peninsula, in Nepalia.
14. PL. STIBINCIS (s. Bentb. in Wall. Plant. Asial. rarior. II. 16. et Labial. gener. el spec. 36. — Glabrescens: caule herbaceo erecto vix carnoso; foliis petiolatis late ovatis ovatis ovatis, basi cordatis, lateralibus bracteaeformibus ovatis; racemis laxis subpaniculatis; verticillatis multistromatis; calycibus fructiferis subnullis. ovalis, dente supremo ovato bracteaeformibus, lateralibus ovato-lanceolatis acuminatis; corollis calyce quadruplo longioribus, tubo basi infra subgibbo ad medium deflexo, fauce dilatata. 5) — *PL eordtfo* Uo v. de Bolt. Differi statura minor, caule vix carnoso, foliis profunde crenatis subincis, corollis longioribus angustioribus, calycis dente supremo latiore obtuso subdecurrente, inflexis vix uterque longioribus. — Habitat in India orientali, in peninsulae umbrosae prope Courtallum et Dindigal, in Zeylaniam.
15. PL. STIBINCIS R. Br. Prodr. flor. Nov. Holland. 506. - Bib. I. c. - Caule cano-pubescente; foliis petiolatis ovatis ovatis, basi cuneatis crassis rugosis tomentoso-villosis, lateralibus minutis deciduis; racemis densis mollifloris elongatis paniculatis; verticillatis multifloris approximate; calycibus declinatis fructiferis incurvis, dente supremo ovato obtuso non decurrente, inflexis. lanceolatis acutis; corollis calyce subduplo longioribus. % " Racemi spiciformes elongati densi stricci. Verticillati ultra 90-100-flori. Florae minutae, breviter pedicellatae. — Habitat in Nova Hollandia tropica.
16. PL. ZKVLAMC16 Bib. I. c. - Caule basi procumbente adscendente crasso pubescente; foliis petiolatis ovato-rotundatis ovatis pubescentibus, floralibus ovalo-rotundatis ovatis ante anthesin bifariam imbricatis; racemis elongatis, basi subramosis; verticillatis lanuginis subnullis-floris; calycibus declinatis, tubo supreme ovato aequo, breviter decurrense, inflexis. lanceolatis arum; corollis calyce quadruplo longioribus, tubo basi infra gibbo, ad medium deflexo, labio superiore quadrilobato, inferiore ascendente porrecto concavo. ^ - *AMM** *PL austr* Uo JJJJJJ statura foliosa majoribus, foliis ovatis majusculis imbricatis, et corollis foribus et bifurcatis. Calyx fructifer non visus. - Habitat in Zeylaniam.
17. PL. AUSTRIUS R. Br. Prodr. fl. Nov. Holland. M6. - Bib. I. c. - Caule herbaceo erecto pubescente; foliis petiolatis late ovalibus ovatis, ovatis, rotundatis rugosis pubescentibus floralibus ovato-rotundatis deciduis ***** elongatis ovatis verticillatis laxiusculis »un-IO-floris«: calycibus decussatis, antheris inferioribus siccis lobis lobis, dente supremo ovato vix uterque evrtilate, inferioribus lobis lobis sciaceo-acuminatis rotundatis calyce »ubtriplo longioribus, tubo basi tubgibbo declinato, labio superiore palente, inferiore porrecto ^

- concaro. 2]. — Caulis 2-3-pedalis erectus subramosus crassus, pilis subrellois pubescens. Folia crasia rugulosa 1-1 1/2-pollicana, basi iruncaia v. subcordata, in petiolium subdecurrentia. Racemi semipedales. Verlicillasri semipollicem ditanies. Pedicelli inaequales, 1-2-linearès, calyce fructifero subbreuiore. Corolla pallide purpurea. — *Pi. austraiu* Lindl. BoU Reg. 1.1098. — Habitat iti IS ova Uollandia circa portum Jackson.
18. PL. PARVIFLORUS Willd. Hort. Berol. 1. t. 65. [non Br.] — Bib. I. c. 37. et 700 — Caulis suffruticoso credo ramoso lomenoso-villoso obtuse tetragono; foil, petiolatis late ovalis obtusis crenatis, basi rotundatis. Verlicillasri rugosis, utrinque villosis, subtus albidis, Ooralib. ovato-rotundatis deciduis, racemis elongatis simplicibus; verlicillasri lanusculis sub-10-Oons, calycibus. decimals, fructifens incurvis striatis, donec supremo ovalo acuminato, MI decurrente, inferius lanceolatis selaceo-acuminatis, corollis calyce subnullo longioribus, tubo basi aurgibbo declinato. — Valde affinis *Pi. australi* Differt btalura humilior, caule suffrutico, foliisque villosioribus, foliis flonibusque minoribus — *Pi. patavil/orut* Uenkel, Adumbr. plantar. . . . f — *Pt. paniculatus* Jcq. Fragment 02 1 01. — *Germane* parctflora* Polr. Diet II. 761? — *Pi. grateotens* H. Br. Prodr. (I. ROY. Boll. 506. — In Nova Uollandia tropic*, in montibus circa portum Jackson 1 to Inaulii Sandwicensibus crescit
10. PL. THUMIKRGII Bth. I. c. 37. — Caule procumbente glabro; foil, petiolatis rotundatis obtusissime crenatis carosis glaberrimis; racemis longis simplicibus, verlicillasri laic 4-0-Oons; Toll, floralibus. acutis, pedicello brevioribus; calycibus. fructifens declinatis striatis, vix incurvis, dente supremo ovato aculo decurrente, Inferius lanceolatis setaceo-acuminatis, corollis calyce quinuplo longioribus, tubo decuno, Inbino inferius elongato incurvo. 2]. — *PI Madagasranensi* affinis, differt caule foliisque glaberrimis carosis. (Corolla ea *PI australis* longior et lenior. Racemu* gracili). Pedicelli filiformes - *Orythum rrrrntllatum* Linn Suppl 270. — *Ocymum racemotum* Thunb. Prodr. 0. Cap W — Habitat ad Caput bonae spei.
90. PL. MADAGASCARIBNSIS Bib. 1. c. 37. et 700. - Caule herbaceo procumbente filloso; ramis ascendens; foil, petiolatis rotundatis obtusis locis-crenatis. Folia ovata; taenula elongata simplicibus; verlicillasri laevigatis sub-10-floris, foil, floralibus. membranaceis ovatis. Corollae subtriplo longioribus, tubo basi aurgibbo, ad medium deflexo. — Folia *PI. Thunbergii*, sed plura omnia pilis longis albidis villosissima. Corollae *PL parviflorae*. — *Ocymum Aurieu* Forsk. mss. in Herb Banks. — *Ocymum Madagaseartense* Pers. Enclir. II. 135. — *Pt. thuosus* Sieb Fl Mauril. eis. no. 152. — *Onnum Hadtrnt* Forsk. Flor. Aeg. Arab. MQ — *fructifens Fonkodii* Vahl, 85 mb. bot I 44 (nee Willd.) — Habitat in Madagascar*, In insula Mauritio, in Oriente (Arabia relief?).
81. PL. HUTD8 Bib. I. c. 38. — Caule procumbente hispido; foil, petiolatis ovatis obtusis crenatis, basi cuneatis rugosissimis hispidis, floralibus. minutis; racemu elongatis aobsimplicibus; farticillasri laevigatis 0-10-floris; calycibus. declinatis, fructifens incurvis striatis, dente supremo ovato aculo, inferioribus lanceolatis setaceo-acuminatis; corollis calyce quadruplo longioribus, tubo basi subgibbo, ad medium deflexo 2]. — Affinis *Pi. Madagascarietui*, sed differt praecipue minoribus ovatis nec rotundis, rugosioribus et hispidioribus. Corollae fere duplo majores abrupte deflexae, fauce inflata. Labium superius 4-dentatum, inferius dilatatum concavum. Genitalia exserta. Caulis breviter pubescentibus elongatis prostratis, ramis ascendens. An * *Pt. Madagascar*nut r** ? *PL. Siebkui* Herb Banks mss — Ad Caput bonae spei
- ti PL. SIEBKUI Herb Banks mss. c. 710 — caule herbaceo procumbente pubescente, foil breviter hispido; petiolatis ovalis obtusis, basi cuneatis rugosissimis hispidis, floralibus. minutis; racemu elongatis aobsimplicibus; farticillasri laevigatis 0-10-floris; calycibus. declinatis, fructifens incurvis striatis, dente supremo ovato aculo, inferioribus lanceolatis setaceo-acuminatis; corollis calyce quadruplo longioribus, tubo basi subgibbo, ad medium deflexo 2]. — Affinis *Pi. Madagascarietui*, sed differt praecipue minoribus ovatis nec rotundis, rugosioribus et hispidioribus. Corollae fere duplo majores abrupte deflexae, fauce inflata. Labium superius 4-dentatum, inferius dilatatum concavum. Genitalia exserta. Caulis breviter pubescentibus elongatis prostratis, ramis ascendens. An * *Pt. Madagascar*nut r** ?

- crassiusculis pubescenlib., floralib. subnullis; racemis laxis simplicib.; verticillasiris scxfloris; calycib. pubescentib., fructiferis declinalis pedicello subbreviorib. incurvis striatis, denle supremo rotundalo aculiusculo tix docurrente, inferiorib. lateralib. lanceolalis, inGmis »elaceis; corollis calyce duplo longioribui. 2}. — Radix apice incrassaia. Species sequenti el praecedentibus affinis, svd habitu ct characleribus inter eas media. Corollae lacioia iofima eloogata concaia. — In Ncna Hollandia Iropica crescil.
23. PL. FORSTERI Bib. I. c. 38. — Caule herbaceo erecto(?) glahriusculo; foil, pe-liolatis otalis oblusiusculis, basi cunealis remote crenatis ghbriusculis, floralib. minuiissirais subnullis; racemis laxis simplicib.; Terlicillasris laxc 6-10-floris; raljcib. glabris, fructifcris declioatit pedicello breviorib., denle supremo ovalo ncuto vix decurrente, lateralib. lanceolalis acutis, inGmis setaccis; corollis minutis, calyce florifero vix duplo longioribus. 2f. — Planla tenkra grarilis pedalif el Ultra, fere glabra. Folia 0-18 lio. longa, petiolo glabro folii longiludincm ae-quate, glabra v. tenuissimc pubescenlia teoera nee carosa. Racomus gracilis. fere *Pi. Thunbergii*, sed longior. Corolla vii 2 lie. longa. Cal)x fructifer fere *Pl. parti/lori*, scd brevior. — Habitat in Novis llebridibus in insula Tanna.
24. PL. MOSCIATIS R. Br. Prodr. Oor. Nov. Holland. MO. - Bib. 1. c. 38. — Spicis secundis; foliis rbombeo-lanceolalis crenaii* calycibusque pubescenlibus, corollae labii superioris lacinia media emarginata, labio infmore piano. — Ad *Moschosma* genus pertinere videtur. — (Bib. I. c. 710.) — *Lumnitzera moichal** Spr. Sy»l. vegetal. II G*7. - Habitat in Nova Uollaodia tropica.
25. PL. COLORATIS £. Mey. Comment, plant. Afric. auslr. I. 228. - Caule pubescente; foil, amplis ovalis crenatis, baai inaequaliltr angustalis bispidulis, floralib. bracleaefomib.; racemis simpllelb. panieolaUsve; verticillatris laxc hcxfloris; calycib. campatnUUs, 4«ttle aopr«mo lat« rotundalo, inferiorhb. lanceolato»ubu« latis, iofimis lonftorib.; e«roUa« labo aeqoall loagIMInno lenui. ^ — AfDnis *PL longid9to*. Calyi glaber coloralut. Corolla for* pollicaria, limbo panro. — Habitat in Promonlorio bonae spei.
26. PL. PETIOLARIS E. Mey. I. c. — Caule crasso caroso pubescente; foil, longe petiolatis amplis subrotundalis, grosse dentatis, basi cordatis glabriusculis, floralib. bracleaefomib. rbomboideis; race mo simplici; verticillasris laxc 6-floris; calycis dente supremo ovalo acuminato, infonionb. lanceolato—ovatis; corollis rahce multoties loit^ionb., lubo rxtra rahrem defracto superne dilatalo. %> — Af-firm *Pi. rordifolio* et *subineiso*, differ! racemi* elongatis simplicibus el eorollii miulto majoribu«. - Habitat In Promonlorio bonae spei.
27. PL. TOMKMOSIS E. Mey. I. c. 220. - Caule suffrulirosso ereclotomenloiofil-losa; full, peiolatis amplis late otatis oblusis grosse crenalis, bati rotundalUi utnnq. tomrntoto - villotis, floralib. braeleaefonnib. rbomboideis decidais; race-mi« paniculato-ramofia; veiticillasirU late Mib-10-floris; calycis denle supremo ovalo, Infenorib. lanrcolalo-snbulalis; corolht ealjce 4-^plo looflorib.* ^{ln} b °* f medium drfraclo, sopeme dilatalo. 2} - Afflnis *Pi. *ustr*li* et *parrtfioro*, diflW* racemis paniculatin, floHbus najoribus folusqoe magif tomenlotis. — HablIM »• Promonlorio bonae spei.

f#«tie m. irrni«CTUZ iu L e. 39.

<.al)t fructifer declinalns bilabialui, labiis sobinteferrfmis subaequalibot. Co-
rolla basi supra gibba nee calrarala drfracia. Herba. Florrt racemosi.

- »• PL? PALI9OTI Bib. I. e. » - Caule berbareo erecto pubetcente; foil ^{ovatis}
obmsis cr«oaiis_v^Asi rolandalis v. cordalis, nrrnu ulrinq. pubescenlib., florall*
bracleaefomib.;veeinq siaplici; verticillatirit srflons rrmotij calycib. fructif-
frns bilabialis, Ubiia tubiolrgis membraoaceu subaequalib.; corolli* ^{calyce sub-}
duplo longioribtt. % - Caalis COBI racemo circnrr pcdalis. Folia ^{ro-} ^{lla} ^{occi-}
M«, ovaio-laaeootou, acua, re0e«a, nliala, cloraia. pr.hrcllis ^{abbreviata.}
IUeoai«a3-4-poll)c«fia. Pedirelli pubrcenlet, calyce sublonsmrr*. Cay. ^{lx pubes-}
«e», tfenle ssprtsno late ovalo brcvuer decarrente, labium supenus lurnan »

lateralibus minuti»simis intra basin supremi, infimis in labium interim obiusum brevissime bianstalium connatis. Gorollae fere *Pl> parn/lori*, sed in specimimbus Palisoiams vaido irapcrfeclae el nondum aperUe sunt. Achaenia laevia. — *Ocy-mum monostachyum* Pal. de Beauv. Fl. Ow. el Ben. II. 00. t. 05. f. 1. - Ilabilai in Africa iropica. ^

Seotlo IV. MEUSSOIDES Bib. L o. 89.

Calyx fruclircr dedinalus bilabiatus, labio superiore tndcnlalo, inferiore bidcn-talo. Corolla basi supra calcarala. Herba. Cjmae axillares pauciflorae.

90. PL. MELISSOIDES Blh. I. c. 30. t - Caulc herbacco, angulis aspens; foil, pctiolatis laic oialis, basi cuneatis glabnusculis aspen*, floralib. conformib ; \erli-cillastris axillanb. laxis remolis; pedunculis ulrmq. Infldis; caljcib. campanulas glabris, labio supenoro tndentato, inferiore bidcnlalo, dcnlib. ombb onus acutis; corollis dfraciis, supra oblyse calcaraltt. % — Caulis \idclur procumbens %. adscendens, rami dongali aculo tetragonl, anguli pilis minutis rclfcus scabri, fades glabrae. Folia parva, ovato-rbomboidea, acuta, crenala, supra el bubius ad nervos pilis mlnuils scabra. Floras vii folia superanles. Pcdunculi fructifen 1-3 lin. longi, pedicell doplo longiores. Calyi membranaceus, labium »upmus reconro-paleos, supra concavam. Corollae tubas calyce duplo longior, supra in catear breve ioflatus, ad faucem contraclus: Itbla fere at In *PL futicoto*, sub-aeqaalia, superlus patens brevfter 4-dentatum, inferius ovalum acolum fntcggerium deflexum. Stamina lIben, labio Inferiore paullo brevlora. Stylus broiler fubulaio-biQdus. Achaenia tubglobosa, lacviuscula. — Habitat in India oncnlali in provincia Silbct.

Sectio V. ISODOR Schrad. mst. ex Btta. L o. 40.

Cal>x fruclifor dedinalus, dcnlibut omnibus acqualibus * in labia 2, supenu< tridentalium, infcnur* biilcnlalium, drjccilis. Corolla bavi supra Ribba nec calraraia, dedinala >. defracla. llvrbac suffruuiccs\c. Flores pamculaii \ rarius raccmoM

30. PL. LANCEOLATI'S Bojer msit. ex Bib. I. c. 40. | — Caulc credo trnuirr |>u-bescente; foil, oblongo-lanctolatis rigidis pubescentib., basi in petiolum brocm angusuiisi raemo simplici; veriiddlastrls laxis muliiflorkt calycib. campanulas Mfualtb., frueiirerls Inflais IncurvU, ore contracto, dentib. aequalib. brevib. obtu-sls eonoWentlb.) eorollU Mlyee quloluplo loaglorib., mbo basi infra sobgtbbo, medio refracttw ^t — Caolls harbaeeuat tatragomva. Palia obmaloacala, Irregu-laritar serrau, nenrosa, vt trioqa dense glandalaaa, ioralia parva, braetaaeformia, bail dilatau, subulato-acumlaau. VerUallaatri lailv pedoncolo communi brcti, ramis elongails, pedicelils brevissimis. Calycef floriferi parvi, decllnati, glandule rubric dense obsiit, fructiferi valde aucti. Corollae lubus tenuis, fauce hubacquali, labio snpenore breviicr 4-dcnlato, Inferiore elongato porrecto con-ravo oblongo integrrimo. Filamrnia usque ad faucem adnaU, dein libera, labio inferiore brevlora. Stylus subintegcr. Achaenia orbiculata compressa paltida laevia. — Habitat In Madaga^caria, in monle Antoungoun provindae Bmirncmh.

31. PL. SPICATUS R. Mey. Comment plant Afric. anstr. 830. — Caule frecio trnuiter pobescente; foil, parvls late ovatis, basi runcalis subcaraosis glabnusculis; racemls elongatis simplidb. ramosisve; verticillastris lailuscolis multifloris, ral)-db. campanulatis subaequalib., fructiferis elongatis eireinnatis; corollit'calyce 4-5-plo longionb., tubo medio defraeto. 2^ — Ex floribui *Pi. lanceolate* afQnis sed foliorum forma diversissima. — Cresdt in Promontorio bonae spei.

32. PL. OBLONGIFOLIUS Wall. Plant Asiatic, rarlor. II. 16. - Btb. I. c. - Caule herbareo ad%ccnden(e ramoso glabro; foil, peliolatis oblongis dentatis, utrinq. an-giKiatK, supra bi«piduli«f sublus glabris, flnralib. brartcisq. minuiisi'mis subnul-ln; pnmculiH taxis ramn^is mulnnnnn; rnl>cib. derlinaiit \ix bilahiatis obiii^i* ft-dentalit, per anlhcsin o>alu slnalis, fruclifcris lagenaeformib , ban inflate ore contrarlo; corollis calyce Iriplo lonpionb ; slamimb. corolla brttionbus ^* — Caulis 3-4-pcdalisf non carnosus, fere ommno glaber Folia ciira petiolum

4-0 poll, longa, 2 poll, lata, valde acaminaia el basi looge allenuata, sublus glandulosa. Racemi secundi, paniculalo-ramosi, cymae laxae, pedunculo communi scnipollicari, ramis gracilibus ulrinqae 3-4-floris. Cal>x glaber srrialus, glandulis rubris oblecius, per anlhesin minulus, fractifer basi valde inflatos submembranacens nervosus, 3 lineas longus. Corolla lineas 3 looga, lubo suhinQato supra vix gibbo. — Habitat in India oriental!, in Nepalia.

33. PL. SCROPUULARIOIDES Wall. I. c. - Bth. I. e. t — Hook. Icon, plantar, t. 404. — Caule herbaeço erecto ramoso subglabro; foil, longe paliolalis late ovatis crenali*, basi rotondalis inaequaliler cordatia v. aubcunealis, floralib. bracleisq. minutis; paniculis laxis; calycib. fructiferla declinatis profunde bilabiatis ioflatis, labio superiore adscendente tridentato, in tori ore concavo porrecto, breviler bidentalo, dentib. omnib. obtaala; corollis inflalis, supra gtbis, calyce aubriplio longiorib.; ataminib. enertis. 2|. — Caulis 3-4-pedalis ramosissimus subcarnosus, angulia pubescolibus. Folia palmaria subcarnosa, basi saepius inaeqoaliter cordata, none rotundala v. ailenoala, sopra hispidula, subius glabra glandulosa, nervis elevatis carnosis pubescentibus. Pelioli inferiorum semipedales v. ultra, superiorum breviores, none brevisaimi.' Cymae lasae, pedunculo communi semipollicari, ramis 1-2-pollicaribus, pedicellis 4-5-linearibus racemos paniculiformes basi ramosos formanles. Calycea tenuissime pabescentes, submembranacei, nervosi. Corolla fere *Scrophularia** ex albo-rosea, inodora, uti tola plaota. Labiam tuperias adscendens quadrifidum, lobia crenulais, inferius angustius longius inlegrom. Filamenta libera, basi villosa. — Habitat in India oriental), ad ripas torrentium In Nepalia el Kamaon.

- JW. P. WIGITII Bth. I. c. 41. et 710. — Caule herbaeço erecto ramoto; foil, petiolatis late ovatis v. rolondalis acaminatis, baai cordatis, olrinq. glabrii v. pubescentib., floralib. Inferiorib. conformib., aopremis braeteiaq. membraoaceis rotundalo-spalhalalls, ptdoajcolo podioeUlaq. bratorib.; paoicolis rãmoaUaimis moltilflorlti ealf ctb. froeUfaHa dtellMifta. •Mongto tocar? la atrlatia gUbris, oro oblique bltablato, denilb. rabteaajoillb. ofullf: corollit Inflatis deellnatla, supra gibbis, tubo cilyce dimldio longlorei alamlnb. ezaertis. ^ — Habitus *Pi, striati*. Corolla *Pt. serophulaHoidis*, at mullo minor. Folia sesqaipollicaria v. vix bipollicaria, saepius longe acuminata, margine obtuse serrata, rigidi, nervosa. Panlicula et caljces *PL itriati*, at folia floralia el bracteeae majora laiinra. Corollae tubus laiitudine loiiigiludinem Tore aequaiH, labio superiore adscendente quadrifido, inferjorf angustinre longiore concavo. Filamenla libera glabra. Stylus bremsime bifidus. Acharnia oblonga laevia. — Habitat in India orieolatl, in paala* «ulae montoMi circa Madura et Tenively.

05. PL. MtiRESCCESS Bth. I. c. 710. - Canle herbaeço erecto ramoso; foil, peliolatlt late ovalis, basi cordatis rolndalis v. aogu>lalis; paniculit raccmisfe nulliOoris; calycib. fructiferis declinalis otalis locum* MnalU, profunde bilabiatis, labio superiore truocato breviler trldentalo, inferiore bifido, deotib. ovalis; corollia declinatis, supra vix gibbia, lubo ealyce dolo longiore; slamib. exserila. 3* ~Jj^{ll} P(. *Wighlii* variat hinotie et foliorum forma; ab hoe differt praeartin .. ^ ~J^{ll} forma. Bacemi interdum subsmplices, at, cymis ramosis, paioirolaelormea. — *Pt. Wifkitt* \$. Bth. I. c. 41. - Creicil in moolibns insular Zeylaniae.
36. PL. STBIATL'g Benih. in Wall. Plant AsiaL rarior. II. 17. et Labial, genet. ^{et} spec. 41. f - Caule herbaeço erecto ramoso snbglabro; foil, subsesailib. ^{ovalis} acumioatis creotalis, basi cuncalis rigidis, supra hispidis, lubtus glabrla; ~~panicu-~~lla laxia ramosissimis mvlflori«; calycib. declinatis oblongit subbilabiaUa* ~~den-~~tib. obluie vix lajaeqaahb., froctiferis inenrvis ttrialis glabris glandulosis; coroi-laetobo dettltato, bati svpra subgibbo, ad medmm recto; »lamimb. brevltter ei[~]•ertis. % - CaoUt «.3-pedalit, glaber v. teaaisime fano-pubeseww. ^{Folia} 9 poll, loaira, aaaqalpollie«m Uu, aoperiora et floralia gradatim minora, ^{g^oprema} «U braeat alMta. Baeoml vix a#modl, paBimlato-ramosUsimi, ^{elTM laxae,} P«4«ac«lo cosisiQiii taepe pollicaH v. ultra, ramia iracilibot elongaii** ^{Calyx} fhicUfr noa loflaUis, ted valdo Jo con us, basi declioatot, ore adtcefldeote pro*

- funde striatus. Corolla 3-linearis, calyce quadruplo longior, lobus elongatus lenis, labium superius breve ascendens exclus glandulosum, inferius ovatum concavum. Summa breviter, stylus longe exsertus. Achaenia ruguloso-punctata. — Habitat in India orientali, in montibus Silhet in Nepalia, Mussoore, Dheyra-Dhoon.
37. PL. HISPIDUS Benlh. I. I. c. c. — Caule herbaceo erecto ramoso pubescente; foliis subsessilib. ovalis acuminatis densis, basi cuneatis rigidis, supra hispida, subius pubescentibus. dense glandulosi; paniculis laxis ramosissimis rouliifloris; calycibus declinatis oblongis obtuse 5-dentalis, fructiferis bilabiatis vix incurvis hispidissimis; corollae tubo declinato, basi supra subgloboso, ad medium recto. 2l. — Sutura et habitus omnino *PL striati*, a quo differt pubescencia et praesertim calycibus basi subinflatis minus incurvis bilabiatis, pilis articulatis densissime obtectis. Stamina vix exserta. — Habitat in India orientali, in montibus Silhet.
38. P. GERARDIAMS Benlh. in Wall. Plant Asiat. rar. II. 17. et Labial, gener. et spec. 43. — Caule herbaceo erecto subramoso subglabro; foliis ovalis acuminatis tenuibus, supra hispidulis, subtus glabris parce glandulosi, inferioribus peliolatis, basi angustatis, superioribus subsessilib., basi cordatis, floralibus pedunculo brevioribus, supremis bracteisque mollioribus; racemis paniculaeformibus vix ramosis; cymis laevibus gracilib. mollifloris; calycibus declinatis oblongis bilabialis, densibus obtusis, fructiferis incurvis striatis glabris vix glandulosi; corollae tubo declinato, basi supra subgloboso, ad medium erecto. % — Affinis *PL striato*, differat alatura minore, foliis herbaceis majoribus, racemo subsimplici, rachis pubescente. — *Bguepu* lophanioides* D. Don, Prodr. 0. Nep. 110. — Habitat in India orientali in montibus Nepaliae et Kamaon.
30. PL. COETSA D. Don, Prodr. 0. Nep. 117. — Bth. 1. c. 42. t — Caule herbaceo erecto ramoso cano-pubescente; foliis peliolatis ovalis, utrinque angustatis, medio crenatis, supra hispidulis, subius pubescentibus; paniculis ramosissimis mullifloris; calycibus declinatis oblongis bilabiatis, dentibus ovalis aculeis subaequalibus, fructiferis incurvis striatis cano-pubescentibus, vix glandulosi; corollae tubo basi supra gibbo, ad medium deflexo. % — Caulis 2-3-pedalis*. Folia saepe bipollicaria, longe acumata, rugulosa, supra viridia, subtus saepe canescentia minute glandulosa, florula inferiora conformia, superiora alba. Paucula ampla ad usum canescens. Baccae panicleae secundae rariore, eysae graeviae laxae molliorae, flosculi communi a-4-11. rari, rariora in formibus. Bracteae multinervae. Corolla calyce triplo longior, obcordata, lobis profundis patentibus; siliqua 4-dentata, in medio toto cono porrecto. Siliqua corolla breviora. Stylus exsertus. Filamentum 3-4 lineis. — *Scuellararia Japouica* Barm. Flor. Ind. ISO. [ex p.] — *Oeywrm Co^Um* Spr. 8. sysL. vegeL IV. Cur. 223. — Habitat in India orientali in montibus Nepaliae, Kanaon, et ad Taong Dong regni Burmanici, in montibus versus Cambemiam, la Peninsula in Japonia et Java.
40. PL. MBNTHOIDES Benlh. I. I. c. c. — Caule herbaceo erecto ramoso cano-pubescente; foliis peliolatis ovalis, utrinque angustatis grosse densis, utrinque pubescentibus; paniculis laxis paucifloris; calycibus fructiferis declinatis oblongis incurvis (?) eane-pubescentibus, dentibus acutis, supremo latiore; corollis basi supra subglobosis, lobo vix deflexo, fauce inflata; antheris subbilocularibus. ^ — Habitu *Pi. CoeUa* affinis, sed racemis paucifloris, corollis vix deflexis antherisque subbilocularibus distinctis. Summa corolla breviora. — Habitat in India orientali in peninsula australiore.
41. PL. MACRAEI Bib. Labial gener. et spec 42. | - Caule herbaceo ramoso rufo-villoso; foliis peliolatis subsessilib. ovalis aculeis subdentatis, basi rotundatis, utriusque molliter pubescentibus, floralibus conformibus; paniculis ramosis mutuo-orif; calycibus declinatis oblongis subbilabialibus, dentibus subaequalibus ovalis, fructiferis incurvis infertilib. villosis; corollis calyce triplo longioribus, tubo basi supra gibbo, ad medium deflexo; antheris bilocularibus. ^ - Tota planta pubescentia rufa molliter villosa. Habitus *PL CoeUa* sed humilior, caulibus praeruptis. Folia mollia none integerrima, mine utrinque irregulariter 2-3-dentata. Paniculae m. nu., ra-

mosa et flores deosiores quam in *PL Coetta*. Cymae laxae axillares oppositae, pedunculo communi villosa 3-4 lineas longo, pedicellis gracilibus. Filaneota libera. Labium inferius corollae elongatum, staminibus longius. Calyx fructifer major quam in *Pi. Coetsa*. — *PL rugotut fi. tomentotut* Benth. in Wall. Pl. Aiat. rarior. II. 17. — Labial in Indiae orientalis peninsulae montibus Madurensibus et in Zeylania.

42. PL. RIGOSUS Wall. Plant. Asial. rar. II. 17. — Bib. I. c. 43. t - Caule fruticoso erecto: ramis incanis; foliis, petiolaribus ovalibus obtusis crenulatis, basi rotundatis. supra pubescentibus rugosis, subtus cano-lomentosis reticulato-nervosis; paniculis ramosis multifloris; calycibus deellnatis oblongis vix bilabialis, dentibus lanceolatis acutis subaequalibus, fructiferis subincunris Uriadi pubescentibus; corollae tubo basi supra gibbo, ad medium deflexo — Fructus 4-6-petalis ramosissimus, cortice laevi griseo, rami lragoni dense pubescentes. Folia vix uncinata, saepe semilanceolata, eacte ovalia, more *Salviae officinalis* rugosula, subtus in speciminibus culibus pallida, in specimen candidissima, floralia inferiora conformia, superiora pedunculo breviora. Cymae utrinque lob-3-florae, inferioribus foliis breviores, pedunculo communi 3-4-linearibus, ramis bracteis pedicellis 3-4-linearibus. Bracteae miculae. Flores fere *PL CoeUat*, at corolla minor, alba v. pallidissime coerulescens. Calyx fructifer paulo major. Stamina corolla breviora. — *Ocimum densiflorum* Rib. Nov. plant spec. 575?) — *!•»•»-nilzera denti/fora* Spr. *Syl. Tfigiab.* II. 07. — *itodom pieclranlkoides* Schrader. — Habitat in India orientali ad Cooor, in Sirmore.
41. PL. REPENS Wall. I. c. — Bib. L e t — Caule basi repente radicante adicendente subsimplici hirsuto; foliis, petiolaribus ovato-rotundatis obtusis grossis crenatis bati rotundatis v. cordatis, olivaceo. bracteis; racemo laevi subsimplici; ramis pedunculatis; calycibus deellnatis oblongis tabularibus glabris, dentibus lanceolatis acutis; corollae tubo deellnato, basi supra gibbo, ad medium recto. — Planta baccata, — pedicellis pediculis, ei omni parte pilis longis articulatis vettis. Folia ad basin cavata approximata, infima longe petiolata, superiores subsessile, floralia inferiora conformia, superiores bracteaeque innata. Rami nudus, simplex, v. basi ramosus. Cymae inferiores distantes laevi, pedunculo communi semipollicari, ramis pedicellisque gracilibus elongatis clabris; superiore approximatae brevioris densiore, subserratae. Florei magnitudine *H. ilriati*, at corolla supra gibbior. Stamina corolla breviora. — Habitat in India orientali, in montibus Malabar.
41. PL. MONTANA Brntb. in Wall. I. c. et Labial, geo et spec. 44. - Caule herbaceo ramoso, nuprime ramis tomentosis; foliis, hirsutis petiolaribus ovalibus cordatis rugosis densis; ramis ramosis pyramidato-paniculatis lororotatis; verticillatis subserratis densis multioculis; calycibus fructiferis declinatis incurvis lobaequalibus obtuse 5-dentatis. 4 — Uerba videlicet pedalis basi glaber, crassa. Folia inferiora desant, apertiora paniculata opposita, densa rufo-lomentosa. Panicula fere *PI* lenifolia*, \$*4 minor. Calyx 5-lobus, incurvus, nee laciniosus, erectus. — Corolla non visa. — Habitat in India, orieoiall la peniotula circa Noodjdroog.

SMUTTL fTHMttIUM BU. L o. 44.

Talyi fructifer tritellus, lobatus, aequaliter 5-dentatus. Corolla basi 5-petalis Ribba, arc ralararia, deflexa. Herba. Floret pyramidato-paniculata.

43. PL. TERMFOLII* D. Don, Prodr. I. Hep. 117. - Bib. I. f. t - Hook. Icon. plantar. t. 4. M. — Tomentosus: caule terete sobramoso; foliis. lacinialibus ?articulatis subsessilibus. Uvae/lalo-oblongae araminalis smilif, basi euotatif rugosis; paniculis ramosis deatU pyramidatis multifloris; calycibus fructiferis cyndricis erectis

*) OCTMVM DKSSSFLOaCM ML L f. f - Fotii \$*brohm*Jo-orstji grasso et •MM* terra Us, kmsi fm fHimmm p*rum mUemmois, tuyr* ictbrwralis, subius ci- rrore - lomentosis: panicula terminali ramosissima, rubeo foliosa: bracteis linearibus minutis; emyctibus subaequalibus quatuordecim.

slrtalit aequaliter 5-dentalifl. 2]. — Caules slricii, 2-3-pedales, hexangulares, undique dense rufo-villosi v. tomentosi. Folia 3-5 pollices longa, pollicem laia, supra elevato-rugosa villosula, sublus venosa, pilis ftellalis rufo- v. incano-iomeniosa, floralia conformia minora, suprema minuia. Racemus rarius subsimplex, saepius rami numeroti stricli paniculam densam elongaUm pyramidalam formanii. Verlicillasri densi, secundi, nulliflori, cymis lernalim vcriicillalis v. saepius una aborlienie opposilis, pedunculo communi 2-linear!, ramis lin. 4-5 longis, pedicellis bretissimis. Bracleae linearcs, minulae. Calyces densissime \illosi, denies ovali oblusi. Corolla cxlus villosissima, lubo supra gibbo, ad medium defraclo, labio supcrioro patenle 4-dentalo, inferiore ovato concavo. Stamina corollam. aequanlia. - *Ocymum ternifolium* Spr. 8ysi. vegetal. IV. Cur. posler. 224. - Habital In India oriental! ad viarum margines in sylvit el in bumidis moniosis Nepaliae, Kamaon, Silbel, Oude, et regni Burraanici.

40. PL. CALYCIUMS E. Mey. Comment, plant. Afric. auslr. I. 230. - Tomenloso-pubescent: caule erecto; foil, ternallm verlicillalts lubsessilib. otato-oblongis, basi cuneatis rugosis; paolenlla denila pyramidatis multifloris; calycib. fructif^m otalo-tubulosis ereclla 10-nervils, dentlb. aequalb. aeotli. % — *Pi. temifolio* similla, differl umen follia latlorlbns ai calyebus rrucliferis 3-4 lin. loogis subloftalia veooiit. Habitus, InOoreseentia, calyces floriferi el corollaa omnioo *PI. temifotii*. — Cretil in Promentorio bonae apel.

Saetlofil AMinTITODEfl Bih. L e. 48.

Caly frue lifer erectus, campanutalui, aequaliler 5-dentatua. Corolla bail supra gibba, nee calcarua, dfracU. Floret laxo paniculat.

47. PL. AMETIYSTOIDES Bib. I. e. f — Caule erccllo ramoso pubescent; foil. o\aior-r<iundaiis crenaiis, basi longe angustalis iniegerrimii; florib. late paniculaisj cal)cib. fruciiferij* credit campanulalis glaberrimis aeqaahlfr5-deniaii<i. ^ — Caulis berbaceus (?) ereclus, telragonus, pilis brevibus ob^ersis pubesrem*. Folia parva, dislantia, petiolo cunealo-dilalato, tenoissime pubescentia eglanulosa. Racemi clongatf, paniculaio-ramosl. Folia floralia inferiors caulinis conformla, suprema minuu sessilia, Verticillasrl lakissimi, cymlt utrlnque elongatis n u e oamlbiu regulariter dicboiomis, Inferloribus nuaie ramU caulisiis eoBformt-bos. Braetae ovaiae, Intmaa fotlaoaaa, auprtaiM BinaUa. Calfi JwşOawOtf coeruUa\$ campanulaio^a^flobotat, denUbot krwlbut lau •falla amula. Corolla calyca qoadroplo longlor t*Mintarla, tobttt baal t<pra gIMtaa, 4<dIMiaa, •Ion-galus, reetat, labiua saperios brere qaadridwk«UUBi, tafarIM lalo-rotaadaum Integerrlmum. SUMioa corollam aequanUa. — HablUl Is Cblia.

48. PL. DUBII'S Vabl msn. ex Bib. I. c. 711. — Caule erecto ramoto pabeteenie; full. oTtlis crenalis, basi cuneallt angustalitte rugosis; florib. laxa paniculatls; calycib. fruciiferis credit campanolatis cano-pubescentiib. aequaliter quisquedeoialla. % — A *PI. amethystoide* differl foliis aogustioribus rugosis, subios venoaiialBli laoolter pubescentibus calycibasque canescentibat. — In Japonia.

49. W- 1NPLSXU8 Vabl m«s. ex Bib. I. c. — Glaber: Caule credo tubsimpliici; foil, otalia aculit grotte dentails, batl longe angustatit; racemo lato paacilloro; calycib. fructiferit erectlt campanulas glabrit aequalller qulaqtiedenuiis. ^ — A /*. *amethyttoids* differl foliis aogustioribus el racemo simplici pavcifloro, ted exemplar barbarll *Vahiani* tix Jam floridum etU — OetmMFI it/ltxum Tbobrg. Flor Japon. 349? — Crescil in Japonia.

t *Species quoad gtnu* dubia**.

50. PL. (OCYMUM Rh. Nov. plant, spec. 271 - 1fMMZERA Spr. Ryu * w i n <R7.) SALVIOIDBS Bm. I. c. 43. \ - Folti. ^aio-oblongis crenulatu, bail in <<liolum dccarreniibuft iniegerrimis, ulrinque pilosis cilialis, caule inferoe p,|< tersis incano, superne rum ral)cibus pilis rapiiatis sub\iscozo; rarrmo Irrmt-nallsimpliri; braciein iubrniundu-o\ali< subpeliolaiit; raljn» lalm inJer.oni »U-periorit?) Uidcniali, di-ule inlermnlio niimmo. ^.? - y.\ inflvreTrniia ri coill- **.

- forma vjdelar *OcimU* affinis, sed calyrc longe diversus. An *Moschotmatis* •. *Pennellae* species? — Crescil in India oriental!
51. PL. ?; JAVAMCI'S Bib. I. c 45. — Paniculis virgatis foliosis pediceilis sobumbellatis; Toll. otato-oblongis grosse denlalis, utnnq. pubescenlibu«. 3- — Calyi tubulosus quinquedentatus, deotibas sobaeqaalibu*. Corollae labium inferius longius concavum subintegerrimum, superios fornicalam semiquadrifidum. Stamina diihnama declinata, labio inferioro inclaia. Aolberae globosae uniloculares nudac. Stigma semibifidum. — An poliui *Gmiospori* species? Cerlc ab *EUhoUxia* valde dncrsus. — *FAtkoUia Jatamca* Blume, Bijdragen 885. — Habitat in Java in paludibas monlaois.
52. PL. NLDIFLORIS Willd. Spec, plaptar. III. 168. — Bib. I. c. 40. f - Neclarlo gibboso; paocala racemosa nuda; foil, cordalis rugosis superinnh. ampleiicaullbas. 2} — Sob nomine *Ocimi Chinenrit* in boriis occurrit. Caulu brevis vis semipedalis, quadrangularis, credos pobescens. Folia inferior a petiolata, 2-3-unciaha cordata acominata, gro^e denUta, rngota glabra, subtus ad \rna« pubescentia. Pelioli unciales a basi folii decresreotet, luperne alati. Folia soperiora minora, cordata dentata ruRosa ampleiicaulia. Panicula tcrmmalis, pedalls el ultra, ei teriicillis confertis composita qui e qoatoor racemit secundis brevibus unnalibuH formaniur. Bracirae ad quemlibet vrrticillom binae parvae cordaUe mtegemmae, sessiles. Cañi bilabiatai, labiom superios Inlobum obtusum, U-bi'im inform* bipartilum, hciniin lineaH-tubulitii. Corolla parr a, claoM, P>-be>renn, tubo rrfracto soperne gibboso. — An *Cotei* species? — *Gtrmanea nudiflora* Poir. Diet II. 763. - Uabitai In Cbloa?
- 51 PL. (DEMTIDIA Lour. Plor. Cocbinch. 309.) NA5EINENSIS Spr. Sjst ^rgcUb. II. 091. — Bih, I. c 40. — Caotla herbacraa, tnauus, 1-pedal is, erectus, duriuscalus, leuagoous, rt@laa, a)«rportat, glabar, ramls brachiatis. Folia reniformia, coDcava, limbo reOe&o flmbriato glabra, foaeo-p«rpor«a, oppotila, peliolis longis. Floa albo-mber, spicis prisnaticis, quadragonii aiillaribas. . . . Periaotbium bl-labiatun 5-fidum, nitidum pilosum 5-oerviom, erectum, laciolls 3 superioribus oblusis denticolalis, S ioferioribus sobulatis longioribus. Corolla ringens pilosa, labio superiore 4-fido, laciniis subacqualibus rolundalis erechs, labio inferiora Riajore inteKfrimo inrurvo refleio. Filamenia did)nama, faun in»istenlia, omiia corolla brciiora. Antberae bilobae sianles, lobis ad basin dnaricati*. German 4-fidum. Sl)lus bre<is, arquaahs stamimbq*. Stigma arutum, bifldum. . . . Semma 4, subrolunda. . . . — Planta atpertz elegant, colore el odore *Mltiitt CV#licae* similis, folns »pia«, cal)ce, el corolla differens. — \ rrosimililer ad *A*ii9~ektlim* tel ad *AeoUamtMmm* referendus. - Habitat in Cbina Maokini, iode Caalooem delala ob pulcbntudioem sludiose colitor.

ft *Sp*ci*i 9 gentre \$xclud*nda**.

PL. AMBOI>K^8I8 Spr. - COLEIS AROMATIFXS?

PL. ABOMATICIS Ro»b. - COLBIS AEOMATIC18.

PL. AftPKR Spr. - COLEI'S BARBATLS.

PL. BAAtBATtS Andr. - COLBLS BABBATL'S.

PL. BARBBLIEBI Spr. - OCTMtM BASILICtM.

PL. BICOLOB Blame. - COLEIS BICOLOR.

PL. rAMIKI79 Bolb. - COLEIS' 8PI CAT I'S.

PL. aRKOSCS to. - AMSOCHILLS CARNOSIM.

PL. COLORATUB DOB - GE^IOSPORUIf STROBILIFEBI'M.

PL. COMOSUB Simt. - COLEL'S BAM ATI'S.

PL. CRASSIFOLIItS Vabl. - COLBtft ZATARIE.^DI

PL. CRA&SIFOLIUS HortaL - COLEL'S AROMATICL'S, el AMSOCHILL'S

NOSUM.

PL. DtBIDB ftp*. - A3ISOCBILCS CABMOSI'M.

PL. FOR»KORLEI WNM. - GOLEUS BABBATIS.

PL. GALEATI7S Vaal. - COLBI'S GALEATt'S.

CAR-

- PL. INDICES Spr. - OCIMUM INDICUM.
 PL. INGRATUS Blume. - COLRUS INGRATI'S.
 PL. LACINIATUS Blume. - COLEUS LACINIATI'S.
 PL. MACROPBYLLUS Blume. - COLEUS MACROMIYLLI'S.
 PL. MONACHORUM Spr. - OCIMUM SANCTUM.
 PL. MONADELPHUS Roxb. - COLEUS BARBATUS.
 PL. RUBICUNDUS Don. - ORTBOSIPIION RUBICUNDUS.
 PL. SCUTELLARIOIDES Blume. - COLEUS BLI'MEIL.
 PL. SCYTELLARIOIDES R. Br. - COLEUS SCUTELLARIOIDES.
 PL. STROBIMFERUS Roxb. - AMSOCHILI'S CARKOSI'M.
 PL. THYMIFLORUS Spr. - ORTHOSIPHON filABRATTI'S.
 PL. TRISTIS Spr. - ORTHOSIPIOK TOMENTOSI'S.
 PL. TUBEROSUS Blume. - COLEUS TIBEROSI'S.
 PL. VIRGATIS Don. - ORTHOSIPHON VIRGATI'S.
 PL. VISCOSUS Spr. - OCIMUM VISCOSI'M.

9570. COLELA Lour.

(Lour. Flor. Cochinch. 450. — Meiaa. Gener. plant, vascular. I. tfs. II. 101. Bth
 Labial gea. el apee. 47. el 711.)

MotiiL OAHIMUB BU. 1. c, 49.

Yerilcillaairi 0-10-Borl. Calyx frttetifer reflexua, Inlaa faooa villoaa. ^x

- I. C SPICATUS Benth. In Wall. Plant Aalat rarlor. II. 14. el LablaUr. geaer. ei
 apee. 40. — Caule bail proeambenle; ramit adacendeniib. patenilm plloaia; foil,
 peiolaiis obovairi, basi angualalia carnoila, floralib. membranaeela coocavii,
 flores superantib., do mum deriduU; splclf limplicib. flonfalia dentil; verticil-
 latlris a-IO-floris approiimalii; calycib. fructiferii delieeis biipidii, fauce inlut
 villosa, denle supremo rolundalo nubdecurrenle, hiferionb. lanreolalu aculit
 aubaequalib.; corollae tubo defracllo, labio Inferlore ilipilalo cymbiformi. [^] -
 Caulei basi ramosi rrasiiusculi, obluse lelragonl, rami I - !/* -pedalea. Folia
 1-S-pollitaria iniegerrima v. tersus apices parce erenala, ulnnque pubeicentia
 rara lenuiaalma lubeaajeaeenUt. Spica 4-S-pollitaria el altra, vertleillasuis on-
 •Utaq dtuit el arete approximaUa. Folia loralia UIUtma aeau dllaU. oaeie-
 raai gUbra, Juoiora ad apleeai apkae aowiaa. Maj per infbaalei daoldia flani-
 talia el corolla a kmrhmH, aod nUnora. AebaomU rotmdia eimpraaa sign toe-
 . viasima. - PUCfranUms m+m lotfe, ROT. plaamr. afoe.m - BabHal la Mle
 orientall, In peninsolae anoniibna DndygnL "
- S. C BARBATUS Benth. 1. I. e. e. el 711. — dale baal Irmiooao aaeaaaeia lo-
 menioso-hlspido; foil peiolalaila ovalla creaalla, baal angaaUUa, mollller toejea-
 tosis, Juniorib. slrigoio-hispidis, Borallb. membranaeela tale ovalis acumioaUs
 in apice racemorum comotis, per aotbesin deeldaia; racemls aimpleib.; verticil-
 laalria aexfloria ditumib.; calycib. fructirerla dellexis biapllda, fence inlus villoia,
 deate aupremo ovato aubdecurreote, inferiorib. Uaceolalla aeatia aabaeqaahb.;
 aartJlae tabo defracto, labio inferior* stipluto maxlmo cymb&foraii. % — Caoles
 ramosi S-3-aedalea, pills arilcmtalla rigidla aaperl v. losaealeao-blaplldl. Folia
 (. atrlnque caeaeaeatia crassoscala laccllda, aaeplaa tomentoea, aae pili rigidis
 adpreaala obieeu, floralla In raemo Juaiore ealycea aaperealla adpreaaa. Racoaiot
 alrictua aemlpedalla v. demnm podalla at longktr. Calyces deloratl at in OHmrs
 deflexi el ad axln arete adpreaal. Pedleelli brevea simplices aallvri. CaKx
 pills albdlla dense obtedaa, labiom superiaa membraoaceom ovatam acutom.
 Corolla albo-coerulea. Tubus basi aubgibbaa, extra caljem'ad angulum rectum
 defraclus, faux inflata. Labinm auperiaa breve patens, brevissime et oblate qua-
 dridenlalm, infertas magnum porrecium compressom cymbiforme, gealialia ia-
 veiuideos. Slilus aplee bretiter subulato-bifldus. Achaeia laeviMima. — PUr-
 Irmuikus ForskdUi Willd. Spec plantar. III. 100. - BoL Magat. L ttJO. -
 Girmnso Fortkdtii Poir. Diet. II. 764. - PUHramlkus kirlmius Andr. BoL Ren
 . t. aH, — Pr*cira*lh*s comotu* Bot. Ma^ai t. «III. ~ Orimmm asperum Ruth,
 III. «

- >ov. plantar, spec. 268. - *Meclranlhut asper* Spr. Sjsl. vegetab. II. 600. - *Pler-tranthut monadelphut* Roxb. Ilorl. Beng. 45. — Habitat in India oriental!, in mon-
 losis australibus peninsulae, in Dintlygul, ad Nundydroog in Mysore, in Banga-
 lore, in montosis Nepaliae cl Karaaon, in Madagascalia, in Arabiae felicis
 montibus altioribus ladicnsibus alibique.
3. C. HEYINEI Bth. Labial, gener. el spec. 50. — Caule berbaceo adscendenie sim-
 plici; foil, ovatis grosse serralis pubescentib.; racemo lerminali simplici; braciis
 o\ato-lanccolalis reflexis; Glamentis edentulif, baai connatis. ^ — Caulis ereclus
 simplex letragonus pubescens palmaris el pedalis. Folia remoia obtusa, sublus
 pallidiora venosa, media ultra sesquiunciam looga onciamque lala, inferiora el
 superiora minora. Flores «erlicillali, verticillis distioctis seroiunciam a se invi-
 cem remolis sexfloris. Bracleae ad quetntis verlicillam 2 planae, longitudine
 circiler pedicellorum, pnbescentes. Pedicelli filiformes pubescentes, vix ultra
 sesquilineam long! simplices uniflori. Calyx lubulosus sriatus, pedicello suo du-
 plo loogior bilabialis pubescens. Labium superius subrolundo-ovatum mucro-
 nalum, tenuissime crenulalum integrum cilialum, veois elevalis eleganlissirae
 strialis reticulatum. Labium informs quadrifidum, laelnaie aelaceac sraabrae, 2
 intermediac paullo longiores lateralibus. Corolla rlngeof. Tubus c>lindraceut,
 caljce dimidio fere longior. Labium superius trifidum, inferius longius ovalum
 roncavum crenulatum Inlegrum. Stamina decllnala, labio inferiori incumbeolia.
 — *Pifctranthus monadelphus* Hejne msf. — *Oeimum monadelphum* Rotb. Nov.
 plantar, npec. 207. — Habitat in India oriental!.
- 4 C. ZATARHENDI Bib. I. c. 50. - Foil, caraosis rigidis late o>itisi acutis crenalis
 villois, basi (runcatis. 4*. — Caules surgentes femperTireotes quadragono-tereles,
 telit nolliboa farcti. Folia brachiata. PeUolst (/« poll.) patent tiUo»u», subius
 terea pianos, aopra com ciDallcolo. Laalaa aomMM, late otaia, fere subrtunda,
 (IV. poll.) pataaa, ?mte moMtM MtalatA; tMb topcrae eanla anguMis, infra lati«
 elalia deauio-eramla, oblaiM bfjtl mneaHau Peduoeli terminates tpithanaei
 vertleillall. Bracteae ad vtrlleilloa alrlnqne toliuriae nembranaeeae oYato-laa-
 reolatae dellexae. Pedicelli teni, utrinque ID alngulo verilirillo unillori, ncmplol-
 licare*, saperiores priut Ooentes ideo longius exrescunl. Flores resupinali. Calis
 labiu infortote 'supcriore!) lalo ravo subrotundn, ruperiore finfenore? broiore
 quadripartite, lariniis lineari-lanccolalis. Corolla ringens. TUHN albic.in* rora-
 prrn^uo, basi suUiui gibbus. medio refraru«i ad angulum rectum, apice latior,
 k'jpr.i plmtn, infra genirulum rarinalu« supra. labium supenus infonut?> vlo-
 lareom rymbiforme mmpresium oblu«um integrum, infrnu soperiut?) eredsal
 album nblosum, *i| quadhrntatum. Filanenla 4, did)nama. infrmra labio lot**
 giora, »uperiora adbuclongiora, omnia a bati ad mrdium ronndata in tubum fl****
 tun firca pittillum. Slania breviora. lubn annrxa. Nrriarium, glandula iofrt
 germina versus basin Itabi crassa ovali* rrecta tiridis. (icnoia 4 parra globosa.
 sijlu* fillifnrmis ruber, loogitudioe slamioum. Stigma duplex aeutum. — *Oei-*
mum a. Zatarhendi Fortk. Fl. Aeg. Arab. IOU — *Pteetrm*tk*t cr*s\$if*U*s Vahl.*
 Symb. I. 44. - (*itrmnem rrasmfolim* Poir. Dtel. II. 704. -- Habiu in Arabia.

8tcU« U. AB01AIU Btb. I. e. \$1.

Vertieillaalri dentl subglobosi muliiOori. Calyx fruenfer ni declioatut, f«
 inlus nuda.

- 5- C ARO«ATICI9 Beolb. la Wall. Plant. Atial. rarior. II. 15. el Labial. *gr. el*
 •pec. 51. H 711. -- Caote ba«i fruliroco . rjimt lomeoiofto-pubrtrrnlib. v *bispidia:*
 foil. pttioUitt late ovaUs rreoatu. ba«i roiundalit ronratU%e crj%»i»im». *ultraq.*
 blspidla t. cano-villosit, floralib. ealjrean nt aequanlib.; rarrmi* timplklb.; *ver-*
 tieillatrlrt rffeolte globotU mulnQorit; eal)rib. ftubereriit lotnrnioti*que* *latu*
 nuda, denie topremo onto- oblongo menbraQarro son drurrmic, *Inferiorib.*
 br«iorib. Mlaceia snbaequallbus. ^ — Caulr* rraMI rarno»»- «a»ctloait *bag*
 •obtig»esi. Kami l-lv,-pedale«t aaeplnt bmiler bitpidi. Folia C *grauosima*
 i-t-polltearta, In v|«9 craMistima «ihdia «aacnloM rugosa. tificiate *albicaulis,*
 Pd« br»%b«» 4«M« Qbin.1, dor alia pana arvainaia, per anlb*«l« *refert.*

Verticillasri 20-30-flori et ultra. Calyces breviter pedicellali parvi albo-lomenloii. fructiferi vix aucti. Corollae tubus calyce subduplo longior, ad medium defrac-
lug, faux inflata, labium superius brevis quadridentatum, inferius tubo aequali,
exlus pubescens, parum dilatatum cymbiforme. Geophila breviter exserta. Aeba-
nia subrotunda compressa brunnea laevissima lucida. — *Hectranthus aromaticus*
Roxb. Hon. Beng. 45. — *C. Amboinicus* Lour. Fl. Cochinchin. 372. — *Marrubium*
album Amboinicum Rumph, Herb. Amb. V. 205. t. 102. fig. 3? — *Plectranthus*
Amboinensis Spr. Syst. vegci. II. 600? — *Plectranthi cratiffolius* Hortnl. — *C.*
aromaticus Lindl. Bot. Keg. t. 1520. — *Colei erastifolius* Bib. in Wall. Plant.
Asiat. rarior. II. 15. el Labial, gen el spec. 52. no. 0. — Habitat in India orien-
tal! ad Palma (an indigenus?) in hortis Indicis frequentissimus, sed raro (lord.

SeoUo HI. SOLEH08TEM01I Btñ. 1. o. 62.

Verticillasri laxi multiflori. Calyx fructifer declivatus, fauce inclusus nudus.

1. I. *Calyx denis lateral** abbreviati, truncati, ab infimis confertus
connatis liberi.*
6. C. BOJERI Blh. I. c. 52. — Caulis humilis pubescens; folia, petiolalis ovali* oblonga
renalis, basi rotundata f. subcordata, supra et subter nervis bipinnatis, flo-
ralibus multinerviis; racemis elongatis axillaribus; verticillis laxis sub-10-floris,
pedunculo communi ramisque breviter imbricatis; calycibus pubescentibus declivatis, denis
supremo ovalo obtuso vis decurrente, lateralibus abbreviatis rotundatis, inferius
elongatis acutis, ultra medium obovatis; corollae fauce vix inflata. — Caulis
herbaceus subsimplex rufo-pubescenti. villosus. Folia minora quam *C.*
scutellarioides, ovata nee acuminata bullato-subrugosa purpureo-maculata sub-
tus glandulosa. Racemus elongatus. Verticillasri el flores *C. scutellarioides*, sed
pedicelli longiore* cretiores. Corolla minor glabra, tubo calyce duplo longiore,
labio inferiore hinc, tubo aequali. Stamina breviter exserta, ultra medium con-
data. — *Plectranthi maculatus* Bojer mss. — *Mitella maculata* Chap. mss. — In
Middagascana ad Bionia-mena provinciae Emiroensis habitans.
7. C. KCUTELLARIOIDES Benlb. in Wall. Pl. Austral. rarior. II. 10. el Labial.
gener. ei spec. 53. f. — Glabrescens: caule basi frutescente; folia, petiolalis obovata
breviter acuminata deorsum, basi rotundata glabra v. laxe tomentosa, oralibus
demum daedulis, verticillis breviter imbricatis racemis elongatis axillaribus
verveillasriae ita multum; pedicello MMSI aequali, pedicello
ramosa brevis aequalis; calycibus declivatis, basi rotundatis, fauce
inclusis nudis, denis supremo ovalo aequali v. deorsum albidis. ovata ob-
tusissimis, inferius longioribus. acutis, ultra medio eosae usque corollae
cuneatae vix ampliatae. — Rami glabri v. tomentosi pubescentes, obtuse
triangulati. Folia 1A - 2 - pollicaria, anguste ovala, subtus valde nervosa, saepe
sobrepurpurascentia, floralia laevia membranacea acuminata. Racemi pedales
el ultra. Verticillasri in quibus pollicem, supremi semipollicem distantes
10-lf-flori. Calyces multivalvi, fructiferi aucti glabriusculi. Corolla calyce
florigero fere quatuor longior, basi infra gibba, labio superiore pallido
ovalo breviter quadridentato, inferiore coerulesco duplo longiore
coarctato incurvo, basi angustato. Achaenia ovata orbiculata
compressa laevia. — *Majana aurata* Humph, Herb. Amb. \.
900. t. 108. fig. 3. (sed inflorescentia in icona deest el ideo dubia). — *Orimum*
scutellarioides Linn. Spec. plantar. KM — BoL Magai. L 1446. — *Plectranthi*
scutellarioides R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 305. — Habitat in Archipelago Indico,
in insula Amboina el Bourou, in Nova Hollandia Irpica fit in insula Mauntio.
8. C. ACUMINATUS Benth. in Linnaea VI. 81. el Labial, gener. el spec U. | C.,
superne pilosus; folia, petiolalis ovali longe aruminali incisiva
rotundata. cuneatis, ultra puberulis, petioli* rufo-ciliati*, floralibus
subrotundatis. denis simplicibus; verticillis laxis multifloris; pedicello
rotundato; calycibus declivatis fructiferis multifloris. last Mnau. LHM r
denis supremo ovalo obtuso vis decurrente, inferius elongatis, inferius
rotundatis, inferius multifloris. fauce inclusis nudis.

- felit rugoHis villoti*. Racemus canescil Calyx fracifer oervosus incunus, dentr
 §upremo glabro. Corolla omnino ul in caeleris speciebua bujoi lecilooit. Sta-
 mioa cxserta, Glamenlis ullra medium coonalis. - *Ocimum paniculatum* Per*.
 Enchir. II. 135. - Habital in Madagascar*.
14. C. MULTIFLORUS Bib. I. c. 55. — Caule aicendente •illoao pubescenie; foil
 longe petiolalis ovalo-oblongis aculis crenalo-serralis, basi cuneatis v. angusia-
 tit, molliier pubscenlib., floralib. deciduis; racemls elongatis aimplicib.; terli-
 eillasri* qnadfariam cymaeformib., pedunculo communi utrinq. subnullo, ra-
 miselongalis, pedicellis calyce breviorib.; calycib. glanduloso-pubesceollb., deole
 mpremo orbiculalo bretiler decurrenie, taleralib. obtusissimis duplo bretiorib.,
 inflmis lanceolalis Hongalis, ultra medium connalis; corollae lubo lenui, fauce
 subinflata, labio inferiore maximo lalistimo conca*o. ^ - llabilu C. *acuminate*
 afflois, sed ditersus foliis tli acuminalis, inQorescenlia, calyce el corolla. fauli<
 berbacru* Tideiur. Folia lublui mioule glandulosa, peliolis rufo-villoiin. Calyx
 fraciifcr incurtus •trialui, deole supremo subplao. Corollae labium infenui in
Coleit bujus seciionis maximum. Filameola ad mediom conoala. Acbaenia pana
 orbiculaia compreflca nigra laetla luclda. ~ Babiial io insula Manilla.
15. C. (PLECTRAMHL8 Blaae, Bijdrageo 835.) MACftOPUYLLUS Bib. I. c. U. -
 Calieis blrsuil labio inferiore uifido, laclaU iaterm«dla loaglore semibiflida; fila-
 Beolit bail BOMdelphis; verUeillasirit dUUoclia; ptdieellls ramosls; löll, subro-
 lando-ovails a^Us ioteqaaliler oblate terraila, baal vli aUeoaiia lsUegoniaiU»
 ulrinque pubervlis ^? — Aeedll ad *PL tngrotum*; folia Infra parporascenlla. — In
 insulae Javae bumidis aylvaiicla mooloala babllaL
- |«. C (PLECTRANTIUS Blame I. c. 837,) MCOLOR Bib. I. «. 51 - Calycii
 birsuli labio loferiore Irlfldo, laclnia intermedia longiore semibiflida; filamentii
 basi monadelphis; verlicillis dislinclis, pedicellis ramoso-bifldis; foil, (disparib.)
 ovatis acuminatis crenalis, basi rotundaiis v. inaequaliier attenuatis el integerrimi*,
 ulrinque pubcrulm. ^ — Folia infra purpar.iceolia. AfOnis *PI. macrophylo*. Vanai
 foliis minoribus utrinque acuminatis, rarius ad basin rotundaiis, coslis infra
 porpurascentibus. - Habitat in insula Ja*a ad pedem montis Haleck.
17. C. SECUNDFLORUS Bib. I. c. 55. - Teouiter pobeteens: foil, pctiolalis o%ati«
 aeemiaoUs groate eroMlia, basi roundaiia v. eordaUa rngoeU anbeernods, flo-
 relft. doeldalas raenila etooftilt siejplletlM ftttlclltoalria eymaetemlb, seemodU;
 peduooulo eennunl oirtaej. eUavillo, rasmla elangaMst etlyeik peMells bUpldi*.
 denie supremo obloogo aovto «e« daceitOfcte, toteteflb. abbftrtailt oveila a««-
 loieolis liberis, ioflaXs eloogaUa ae«Ua, ten ad tpleeai oonaUst ee«oUae ranee
 anbdlaiiala. ^4 - AfBoii C. *vrmdifbU*; « quo dlItft ItfBoreMemita. Ca«ttt errec-
 tns ramosus, obtuse tetragonui pabeteens. Fella gtabHusc«la, ad MHOS lennier
 pubescentia, floralia minutissima. Raeeml mnliflori panieoUeformH aerndi.
 Cymae numerosae approxmatae laue, raml pedunculonim In quoqne vettieil-
 lasro 2-4, pedicellis calyce brevioribus, florlbm In qnoqne ramo IO-law Corollae
 inbna calyce florigero duplo longior, basi snbtus gibbns. Labium tnperlna breve
 obtatM quadrifldum patens, loferios eloogatum concavum. Fllamenu ultra
 medleni aonadelpba. - Uabiut In iosula Timor.
- :ia C BLUMEI Bib. I. c M. - Calycii blrsoli labio fnferiore Uifldo, latioia mtrr-
 media longiore semibiflida; flUmeoUi bail mooadelpbls; verticillasrls disUnciis-
 pedicellis racemosis aecnndls; foil, ovalis aenninalit groaae obtuse aerralis, bail
 acutis el iniegerrimls, ulrinq. puberulis. * — Folia supra maculii atropurpurtn
 picia. - *Pteclranthut icuitUtrioidit* Blame, Bijdragen OT. (non R. Br.) - |n hom.
 Javanit cotitur.
10. C. (PLKCTRAMTHLS Blume, Bijdragen 9B.) LACIMATf 8 Bib. I. c. - CaUcu
 birsuli labio inferiore trifido, laclnia Intermedia temibtfida longiore; flianienu
 basi monadelphm: \etttnlla»tri< ditlincii»; pedirellis subramoMt «rrundis; foil
 ovati» aruminatu larimaiiK aut inriso-tfrratis, ban acutu el iolgrrrTimit, utrinq
 puberulis. % -- An tariela* praecedentu* Folia tupra maruli» purpura»fentilHn
 pieta. — In borti« Ja\ania* roliiur.

20. C. (PLECTRANTHUS Vahl, Symb. I. 43. - Blume, Bijdragen 836?) GALEATUS Blh. I. c. — \ectario gibboso; pedicellis ramosis; foil, cordalo-ovatis acuminatis serratis. 2]. — Caulis villosus sulcatus. Folia petiolala, late ovata villosa, praeserlim sublus in venis. Pedunculus terminalis, pedicelli oppositi ramosi. Braciceae nullae. Corolla pubescens, labio inferiore galeato. Acccdil ad *Ocimum scutellarioidem*, cui folia ovalo-lanceolata, flores minores, braciceae cordatae el peduncoli ulrinquo gemini. — [Calycis birsuli labio inferiore trifido, lacinia intermedia longiore semibifida; filamenlia basi mooadelpbis; verlicilli* distinctis; pedicellis ramosis; foil, ovalis acominalis, baai rotandalis subcordatisva ezserte acuc serralis, ulrinq. poberolis. 2]. — Afflnif *PI. mocrophylo* el *PI. ingrato*. — Blame, Bijdragen 856.] ~ *Germmu** *galeata* Poir. Diet. II. 763. — Habitat in Java in humidis umbratia montania.

§. 2. *Calycis denies lateral** acuti, supremum subaequant, infimi longiores, basi cum lateralibus, ultra medium te invicem connali.*

21. C. MACROSTACHVS Bth. I. c. 57. - Gaole pubeicente; foil, petiolatia ovatis acuminatis crenato-serralis, baai rotundatii, aapra el sublus ad nervos hfspidulis, floralib. deciduis; racemis eloogatis sabsimplicib.; verticillastris remolis laxis, pedunculo communi utrinq.(?), ramis pedicellisq. calyce fructifero breviorib.; calycib. glabris, fructiferis membranaceis, Inlaa fauce nuda, dente supremo otalo aculo, marginib. revolutis, inferiorib. lanceolalia acutis, 2 lateralib. supremum aequanlib., 2 infimis longiorib., baai cam laleralib., nllra medium invicem connatis; corollae labo tenui, fauce dilalata, labio inferiore elongalo lato concavo. ⤵ — Caulis herbaceos erectas ramosus purpurascens. Folia sublus minute glandulosa, floralia bracteaeformia late ovata concava membranacea ciliala. Verticillaairi 10-15-flori. Folia el inflorescenlia fere *C imgrait*. Calyx el corolla *C MaiabmHel* — Habllal la Ja?a.

22. C OVATUO Blh. I. «. — CaaJe fUBrtaacalo, aopenie flaeoao-pubescentei foil. peUelalla ovails, vis leariatti, grotM crewUs, baai rotandatis •. cordatis, supra blspldulls, sublas glabrit, floralib. decidais; racemis subramosis; verticil— lastris laxis, pedoncno communi ramisq. sobnollis; calycib. glabris membranaceis, fructiferis inflalii, dente supremo ovato, marginib. subrc\olu(is, inferiorib. aculis, 2 infimis basi cam lateralib. ullra medium se invicem connalis; corollae tubo tonui, fauce dilalala, labio inferiore rlongato lato concavo. 2j. — Folia minora quam pracedentis, minus acuminala, basi saepius cordata, floralia vix ciliala, ante anthesin decidua. Caulis tenuissime canescens, rhachis racemi pills brevibus purpurascens viscosis pubescens. Racemus basi utrinque rano aucus. Verlicillasth semipollicem remoli 6-10-dori. Corolla *C. Malabarici*, • quo differ! foliis minoribus ovatis nee late ovatis cal)cibus magis inOatis, racemo minus ramoso. - An *C. Maiabariei* varieUs? — Habitat in Indiae orientulii peninsula, In Coromandelia.

XL C. MALABARICTS Beoh. in Wall. PUnl. Atiat rarior. II. 10. el Labial. gt» •*, spec. 57. — Tenuiter pubescens: foil, pellolatis amplit, latissime ovalis, bMvHaY, acuminatii crenatis, basi rotuodalo-Irancais, Ooralib. deciduis; racemis la** ramosis; •erticillaslris sob-10-floris laxis; pedunculo communi uirlnq. sabow)+», ramis abbrevlatis; calycib. fructiferis deflexis glabri*. basi subinflab, intoa fan** nuda, drnte supremo ovato acuiioscolo, marginib. revolutis, inferiorib. Isoeop-latis acutis, 2 laleralib. sapremum aequanlib., 2 inBmis duplo longiorib., ad ba»>* tmm laleralib. ultra medium invicem connalis; corollae tubo lenui txserto, faoeo ampllaU, labio inferior* Hongalo porrtcio. % - Caulis herbaceus ereclua, r*m¹ divaricatI fere glabri. Folia inferiora loogisiime pctiolaia, 3-4 poll, el «iv¹ longa et tolidem lau¹ supra glabriuscula, sublus ad nenros pubescentia, i•«raw¹ minota, ante anibesin decidoa. Racemi 4-«-pollicarr«, basi in ramos 2-4 «vial. Caly floriger mioalut, fructifer valde aelos. CorolU circiler 7 ^{liw**y?m7} Oculi a breviev etserla. Acbarala subrolunda rompressa laevia. - Pkrtr ^{aw} ~~the Male to %% HhU~~ In Indiae ortmi.li* prninsula, ad Travancorr.

- 24 C INFI ATIJ& IIIh Labial gen el spec 58 f — bljber foil peliolatii aiupli* ovatij, acummalis dentaus, ba<i longe anguslalis integernmis, floralib deciduis, raceims subramosis, verticillaslms irregulariter cymaeformib , pedunculo communi utnq subnullo, ramis alternis v. omnib. elongalis, pedicellis abbrevialis, caljeib fructirens nulanlib glabns inflatis, inlus fauce nuda, denlc supremo ovato-lanceolato acuminato plauo, infenonb. lanceolalis acutis, 2 laicralib. supremum acqu inhb , 2 infimis vix longiorib., basi cum laleralib, ultra medium iovicem connm>, corollae lubo elongalo, fauce subaequali, labio infenore superiore vix longiore ^ - Affinis C 31alabanco, scd charactenbus datis diMinc-tissimus Cauli* crassus subcarnosus Folia infenora scmipedalia v cum peliolo fere pedalia, floralia laic ovaia membranacea acuminau, anlc antbesin comosa, per anihc»in decidua Rami peduncolorum saepc pollicares, basi incrassaii, pedicelh caljce fructifero mulio breviores. Corollae 10 lin \ ultra longae, lubo subincuno |i| defraclo. Achaema magna rolundala compressa Ucviuscula. — Crescil in insula Zcylanla.
25. C MACRAE! Blh. I c - Pubescent: foil, longe peliolalis ovalis acuminali-, basi rolundaiis v cuucaii», floralib. deoiduis; racemis paniculalo-ramosis, verticillaslris quadrfanam cymosis; pedunculo communi ulrinq. suboulllo, ramis valde elongaiis, pedicella brevissimUs calyeib. fructiferis nnianlib. glabris, basi subinflails, Inlus fauce nuda, denlc supremo ovato acuUusoulo, marginib. revolutis, uiferlorib. lanceolalis aculls, 2 laicralib. supremum aequantib., 2 Inflmis duplo longiorib, basi cum laleralib. ultra medium invicem connalis, corollae tubo exscrllo, fauce amplissima, labio infenore elongalo porrecio. 2|. — Caules el praeserlim ax» el rami paniculae pilis breMbus rufescenlibus subviscosispubesccnles. Folia 2-J-pollicaria, supra el &ublus ad nervos icnuitcr pubescentia. Paniculae el peduncolorum rami brucuali Calyces secus ramos bubsc»iles scundi, foima omnino C Malabanct, a quo diflerl haec bpecic* folus multo minonbu!> angubiionbu^ el iiflorescynin Gcmalia vix exseria Aibaema tubrotunda compr»»a mgra laoia — Crcacil in Ze)lama
- S. 3. *Calycu denies 4 mfenores subasquales, bast Itten v. %%%JC connatt.*
90. C GLABRATUS Bib. I. c. - Caule subcarnoso giabro; foil, peliolalis ovalo-rotondalla aerraio-crenails craatla rigidls glabris, floralib. mlouUs deciduis; racemo lerninall pubesente ilmpllcl paocalaeformt; veriiclltasUls late cymaeformib.; pedunculo communi ulrinq. ramis pedleeUUq. elongalis; calyeib. fructiferis glabratis elongaila, denlc supremo ovato supra concafo, Inferlorib. lanceolalis acutis subaequalib., basi viz connaUs; corollae fa«ee ampliaia. % — Caul is basi ad^cendentc crassus tumidus vix 9-pollicarlt. Folia poll I car i a, subtus ngide nervosa Racemu*) > pamcula icnuis n^ullflorut. Rhachil, pedunculi, calyces flongen el corollae pubicentcs Calyx fructifer glabralui, basi subinflatus, fauco subcontracla clongala intus nuda< denlc supremo oblusu, supra cocavo laevislmo sublncido Acbacnia pallida laevla. — In Indiae on entails peninsula circa Madura habitat
97. C. WIGHTII Bib I. c. — Caule pubescente; foil, peliolalis ovatis crenalin, basi rolundaiis v. subcordaiis crassis rugosis, ulrinq. bispidis, floralib deciduis, racemo lerninall slmplici pamculaeformi; verticillaslris laxc cymaeformib, pedunculo communi utrinq. ramisq elongalis; ralycib. pedicello sublonglorlb., fructiferis declinaiis pubescentib , denlc supremo ovato subplano, infenonb lanccolalis acutis subaequalib, basi vix connalis, corollae fauce ampliaia, labio inferiore quam supenus subquadruplo longiore % - HabiUl in Indiae oricnlal^ peninsula, in montibu« >icghi'rr> dictis
- IB. C PAMCLIATIs nenth in Wall Plant A>ial ranor II 10 el I abut genor el sj>cc 5l) — < aule bail procumbenlc pube»icentc, foil peliolalis lm» o>ati» miscisodentals, bail rotund His \ cuneatis crasM* carno*t» Inspidis floralib deciduis, ncimo lerninall simplici pamculaeformi, ^crttcilUstriH Uu (Mnaifurnub peduoculo communi ulrinq ramis pedicellisq elongalis, ral)cib fruchUns

dechnatis pube&cenlib., fauce inlui nuda, dente supremo ovalo piano, inferiorib. lanceolaio-subalalii subaequalib., basi fix connalis; corollae fauce ampliata, labio infenore quam supenut m duplo longiore. ty — A C. H'ightii differ! foliili lalio-nbus cratsionbus carnosus magls iocisis el ban Mepe cuoeaiis v. angusiatis nee cordaii*, racemo lauore, calycif lobis Jnffrioribus aogoffionbus el corollae labio inferiore brevior. — Uabilai jo India oriental! in moniibus Dindjgul peninsulae.

t Species quoad sectionem dubia.

20. C. PLECTRANTHUS Blame, Bijdragen 83ft.) TtJBBROSLS Bib. Labial geer. el %pec 59 — Calycif birsuti labio inferiore Irildo, lacinia intermedia longiore semibi6da; filamenis basi monadelpfcis; terlicillastris disiinciis, pedicelln unifloris; foil, ovalit creatif, baai canealii iniegernmis ulnnq. scabrellis. V — (Hew* ttrrestru' eosttusis ftampfa, Berb*Amb. V. 372. U 132. 6g. P - Io botlii Java-nieJt eolllur.

+t Species e genere excludcmla.

C. RI'GOSUS Benlb. - PLECTRANTHUS ROTUNDIFOLIUS.

3577. AtilftOTHILIN Wall.

Wall. PlanL Afial. rarior. II. 18. - Meian. Gener. plant. >i>cul I. 981 II. 191* - Bib. Labial gener. el spec >.)

I A IARSOSI'UM Wall. Plant. AsiaL rarior. II. 18. - Bib. I. c. ML - Caule ereelo; foil, petiolatis otato-roiuodaiKt obtu^is rrenalis, baai cord a I it eraui« nrooalat ulnnq. lomeoio^o-villosis; npicis longe peduoevlaUa; foil. Oorallb. o*aii» oblu->it; ealycis labio mferiort Iruocalo Iniaferrinio, aoperiore ovalo acolo membra-naceo, margiM eillalo. % — Canlia berbaeew blpedalla ramosui leiragoous tillo-... Buptfttt *abasdaa. Spieao Icaajt p«d«a«alaU« vli pa^culaUe, frociiferae 1-4 pollic«f !•«(••) aeailpolHeani msaae, rfotorMav eyliadrieat. Calyoet frucllferi taai aatMaiall, or* oalraoto, lamviMr nife-iometUMJ, labio aoptlroo aailmo glabro daitio. Corollao ealyoe daplo longioret, labio Inferiore elongato eontavo ntamna tieedenle. - MI* Kwrkm Bheede, Hon. Malabar. X. 170. t. 00, - £a-romdulm rtmofi Linn. Amoeo. acad. X. M. L 3. - Pitclranthus canosus Sm. in Ree« Cycl v. t7. - PiecH*dht siroWiferui Rotb. Horl. Beng 45. - ilectran- thus dub%u\$ Spr. 8y»U vegetab. II. 001. - Ptteiramku* cramfohus llortul.

f purpurascens Hpicia glabriuscoli* purpuraacrnbus.

y. ylabrum Bth. f r 711. - Amitorktius glabrum Schrad. lodi. «em. hort. Goeitidg. 1833 p. I. — Habitat in India onentali, in rudrralis e murU aniiquis penin-sulae a proTincia Circarenti, ad eitremilalem autiralem, in moniibus Avat ftd Taong Dong.

2. A. PAUIDM Wall. I. e. - Bib. I. c. «d - Caule ervclo. foil peliolali* obloo-(0-eJltpiicU ertoaiif, olrinq. angsstails membrao«rei« v. «u carnosu» glabriuacolls; spiels panieflialis; fall, ioralib. laocoolato-afumioails; ealycis labio Inff-riore oblique trunrulo brevissime 4-denlalo, suprnore lanceolalo aeulo pool ajilbetin alemisto. % — Matora A. tmoH. Folia 3-0 pollires longa, 1-3 PHfoo» laia aeoaianau, groaae rreoau, supra vlt kltpldola, subtu» fere flflabra. Spic« poaiaaaailciM, late pameulalao, lemiore quani in A. emntoto. Calyres frwetiftri-basi sublniatit, superno incurvi, ore obliquo, labio tuperiore parvo *c*Uk*Jf^A

omni pane ferrugioto-lonienioai Corolla fere A. cmrmosi, ai lonnior. — HabMt* in India oriental!, ad M*niem Taong Dong diclom in regno Burmaoico.

AT POLYGtTACHTUII Btsjllh. in Wall. I. e. 10. rt Ubiat gen. el spec. * - <*** tMit rtOMeo; foil. anbsMtilib. otat«-obloofit acmminaUs serrallJs, baai eanotm <M«aM p«b«e««ub.t ••Mot ntnesis; spicis paocitlatis; cal)db. snpernao-ennis, or* obllqno S-deuuto, doste aajprtmo vis loaglore. % - gullir-i iLw V^f c. Caulia tbujN iHrnfoava, bmitainM loneototos. Folia * rano-antia n>nWoentia, a«Majt Mn tea. minute glandulosa, rafe-tomen- rlditaurala. Spic s* t-3.p«||iearta, aeanlp^lktai crassae. Calycet dentibus 5 totl, k*a i«aii, a>iracti olongui in««rvl, ore obMqne flsso, br^fib i b^u n i t t a l a subinumbribus - CH

*ed ob habitum el calyces *A. pallidi* offline*, ad *Anisockilum* baec specie* rclata 0*1
— Habital in India orientali, in uliginosis Nepaliae prope Hetoundab.

4. *A. DYSOPHYLLOIDES* Benth. I. I. r. r. - .Caule basi procumbente; ramis adicendentib. sericeo-ulosis; foil, subscsilib. oblongo-lanoeolalis obtusis Sntegerrimis, basi angu*Utis; spicis anllarib. terminalibq. subpcdunculalis; calycis labio inferiore minulo truncalo, superiore parvo aculo deflexo. q. — llabilun fere *Dysophyllae rugotae*. Ki omni parte pilis moUibus rufescenlibus sericeis dense vestitom. Folia pollirem v. sesquipollicem longa, 4-6 lineas laia, floralia ovata acula. Spicae florentes regulariter c>lindricae, rrrassitie calami scriplorii, fructiferae irregulariter tumidae, 1-8 pollices longae. Calyces fructiferi ba*i mmidi, •uperne incurvl, ore contracto, labio superiore brevi aculo roncavo inrumbcnic. Corolla brevior quam in praecedcnlibus, lobis latioribus. Stamina e&scria. - Habitat in India orienull, In moalibu* peniaaulae IHidgherry dictis.

.3578. AEOLACTHIS Mart.

(Man. Amoenlut bou Monaeaa. 4. — Helta. Gener. plant, vascular. I. 283. II- 121-
- Bih. Labial, gener. el apec. 01.)

- I. AE. (OROLLANTHIS B. Mey. Comm. plant AfHe. aualr. I. 00.) SLAMS Mart Amoeait bou Monacena. 4. fl %. — Bih. I. c. f — ladli aaaaa. Caulis erectus apltbamaeua el pedalia, obsolete lelragoana braehialo-rameeae. Kami all caulis pills tcouiaalmla pubeteeaaiea. Folia anbaeaailla obovau laieiarrima •. alae lade obsolete dentleulata, baal angusUU crassloscula, dilute vlridda glabra, olraque facie punclia impressis notala, floralia inflma parva aubcenformia, superior a braeiaeaeformia. Cymae v. rarai floriferi aiillares el terminates erecti, plerumque triOdi, ad divisiones bracteis v. Mils floralibus partis caulinis cooformibus instructi. Cymarum rami v. racemi paries florigerae tandem incrassatae et delapsu bractearom v. foliomtn floralium ciratrisatie. Flores pulhri, secus ramon cymac distirhi secundi, brevissime pedicellati. Bractcae (v. folia floralia) pro quavis (lore 2, parum concavae cihatae ovatae, inferior emarginato - bidentata pubescens. Calyi bractea inferiore brevior pubescen*. Corolla lilacina tenuissime pubescens, labio superiore slrils violaeis picio. Acbaenia cal<<* paallo emplato oreque eoaaveale clause, ted tandem ima baal tieceaccatc n elreaauelaaio iovolua, dorao ooaeva, laiaa blfaelalla. Oder Uliaa plaaUe suav. - Hablut In Promoaietto kaaaa apel, la ladle eritatalit la aetlla ~~Chloro-~~sium ad Santa Grua la BraalHa qalllar.

:)57K/., mrPOTBBOMIA *Sehnmk.*

.Schrank, Sylloge plantar, novar. a aocleuie Batiab. edIUr. I.<.)

Calyi quinquOdus, dentibus subalilis. Corolla bilabial* riogens, labio superiore trilobo, lobis eiterioribus tculis, lotermedio galealo, labio tnferlore biparlilo.

- I. B. UNDATA Schrank I. c. - > - Stamina quasi aub Ihronl ombella reconduntur. nnde nomen. — Habitat in Brasilia. — Genua nlal verbla supra reddlit prorsu<<
4 Incognium.

3570. PYC3O9TACHT* *Hook.*

(Hook. Biollc. flor. II. i. 90S. — Meiin. Gener. plant vtcul. I. M. II. 101. - Bio. tablet gener. el spec. 01.)

- I. P. COEBULEA Hook. I. c. - Bin. I. c. - Caulis herbaceus ereetua ramosui g|j-ber letragonus. Folia icsillia oblongo-lieoearia t. lanceolaU acuta remote serrau. basi angusuu glabra, subtus glandulota , floralia bractaealormia calyce breviora! Spica dcosa tenninalit, 1-i-pollicaria. Calyces frurtiferi setsilet gluboao-campatulati glabri Mriali, ore iruncato, dentibus teretibus subulali* ngidii »ubspiuosis, tubo longioribus, appendicibus intermedti» ad faurem ralfi% i*amt obiu<4% membranaceift. Torolla cormlea, raUrem flnnfrum dimidin «uprr.in«. uU|,r.i

tubo ciserto, bast infra gibbo, medio defracto, fauce parum dilatata, labio superiori palPDlc breri iruncato breviter 4-dentato, inferiore dilalalo orbiculato conca\o acuminato. Siamina declioala, labium infVriu* acquanlia. Filamenla basi dilalaia subconnata, usque ad faucem corollae adnata. Sijlus subinlegcr. Achae-< nia subroiunda polhcJa lacvia. ^ — Crescil in Madagascaria.

3570/, . BECU'M LindL

Lindl. Bot. Reçigt. (New Ser.) XV. Planl. miteell. 44. — Eodl. Goner. planUr. Sup-
plera- III. pag. 77. — Meito. Gener. plant, tascular- II. 300
I. *B. BICOLOR Lindl. I. c. - 6 — Cretcil in Ab)»sinia.

Subtribua III. HYPTIDEAE Endl. Gener. plant p. GIO.

Corollae laeinla inOma substipitata, transverse subcallosa, deinde sac-
cola, per anthesin abrupte dejecta. — *Fieraeque Americana**.

3V*U. flISCOLOSTEMO* h. .Very.

(R. Meç. Comment, plant. Afric auttr. I. 830. - Nairn. Gener. plant. tatul. I. *3.
II. 101.)

I. S. ROTI NDIFOUrS E. Mey I. c. 231. - Poll, obovalo - sobrotundii paucideo-
Uii»; r.i.'uus pamculalis; calycib. nobincurrii flabrioscnlit coloralli; corolla*
tubo calycr du>lo longiore. ^ - Rani et folia Jnilora tenuiter caoo-tomentota.
Folia lemipollicaria. Ricerol denfl IragylarilOT raaioti r. dichotomi. Calyeet
oppotiti breTiMime pediecllati, fraellferl S Ha. lonai, deotibat nunc bretibui ob-
tatit, nooe ioferioribas r. oaraiboi tobalalo-acaoiinalit. Corolla pollicarii, labi>
4 lin. loDgif. — Crecit in Promontorio bonae spei.

t. i. MAMtLOSt \$ F. Mey. I. c. — Foil, obotalis obtosi< inlcRrrrini; raceml*
tails raaMalt; caljnb. rcriis TI^COSO-MIOM*; corollae tubo calycen plut daplo
eteedtau. ^ - Folia tit 3 lin. longa, Jumora uli rami lenuiler cjoon-lontalofa.
Rami netftl ff—M. VtrticillaiUi Mtpiai qaadhOori. Corolla 10 lio. longa,
libnf tii 9 Ho. longla. - Cmeil to PromontoHo bonae »pei.

1. «i. DENSIFLORLS E. Hey. |.e. - FoU otatit aeuU» ioleKrrrimi*; racemis denill
spicaeformib.; cajjeib. rectis Titcoto-villoait; eorollae lubo cal)ce plus duplo
longiore. o — Folia et rami cano-pube»ceatia. Folioroa forma el inOoretcenUa
a pracedenie %atit diffcre videtur. — Cretcil in Promonlorlo bonae »pei.

4 S. PARVIFLOItS K. Mrj. I. c. - Molliter VIIIOMIS: MI. oblonffif otaliit* api««
•erratit; racenit limplicib.; «erticilla>lh« biflont remolit; calyeib. reclif titcofQ-
tiiiotu; corollae tobo tii eaarto. \$ — ft. Corollae mbo tobeiterto. — Creecll »
Promonlorio bonae tpel.

9581. FELTODOM WM.

(Pokl, Plaat Brasil. icon. I. fl - Meita. Gener. plant. Tatcular. I. W. II* ** . "
Bib. Labial gener. el spec. 62.)

I. P. POMLLtS Pobl, Plant. Braril. Icon. I. 67. f i . U - Bib. I. c. t - CaoJe b<<-^
m>li Mbtlaipliei; foil, tewilib. ellipUcit erenatif glabnt. ad oenrof pilotit; brae^
ten bati rotndatit cuneatu^e pilo>U, floret »obtuprrantibu«. % — GaoU* . *r*
baceae tableret pro€mbu% v. in etemplahbas nanit tuberectuf, ooo« 'k* \$
ML toagut, IOM eloagatat procombent, apicibui a<rrndentiboi. F o | J V i a
tte<a>|<rlDot M n i t m te mipolhceai looga, 10 saioribof i-3-pollicaria o-tua,
aiargiaa •advlau-ereoau, bati roundau *. cuoeau tobeoriacea, iupr* bullata
glabra, tobtnt eicepua •enlf rtievJatia pilo>io>culi« ralde 9TM*****^ us glo-
bra load*. Caplmlam bMifaibaaricrai, pollicem nrciter diamelro, pedun-
colo fere •eaH>t4<j| pitotloicvlu Brae4<ae eMeriorr* tt-8, capitolooi' sequan-
•t<t Ute o<aua obtaiaiaiaie Inlifaniaaa f. tii creotae, ba>i ro tundatae
ruee «u * v. fpa ** Ungt aa)g>*iaiaa Iriaanaa, Jaioivrtt laiaac*****^ . l r i n q e 6

pllosae, interiores nrioulae setaceae. Calyx fructifer valde auclua, denlibus laiiidine tubi bre>ioribus, pella parva ciliata. Corolla alba. Tubus cxlus glaber, denies caiycino* parum excedens. Labium inferius superiore duplo longius, lobo medio lateralibus subaequali, exlus barbalo. Acliaonia inflata, aqua immersa non pulposa. - Habilat in Brasilia, in pascuis siccis circa Traliiras el Nailvidade provinciae Goyaz, in pascuis emails prope Villa Boa ejusdem provinciae el in Brasilia mcridionali.

2. P. LONGIPES Si. Hil. ms§. ex Bih. I. c. 63. - Canle brevi procumbente subsimplici glabro v. pubescenle; foil, scssilib. elliptici* crenalis glabris v. ad nenroi pilotis; bracicis bail rotundatt* cuneaisve glabris pilosisve, Oorib. subbreuionbot. 3l. - Ab exemplaribus majoribus *P. putitti* non differl nisi pedunculo duplo longiore (fere sesquipedali), bracieis brevioribus el calycibus corollisque airo-purpureis ncc albo-Oavescenllbos. — HabilUl In Brasilia ad rivulos prope Santa Borja io Missionibus Uniguajenaibus et in campis prope Curiliba pro\inciae Sancti Pauli.
3. P. BADICANS Pobl I. c. tt. f t 55. - Bib. I. e. - Caule repcnle ramoso raUicanle villuto; foil, peliolaiit otaiis obloslaseullt crenauS, baii roiandails subcordaiisve, nupra el toblos ad nenros bitpidulis; braeieia erenalis, basl cordali*. % — Caolet elongaii telragODl, prawerUm In parie toperiore all padaneall pllit rufeteniibns villoai. Folia l-&-pollicaria plaoa t. fix rugota* aupra pill* apanit inagis minaiTe hisplda, anblat ad nerrot blspidala, eaetervm gtabra. margioe dliala, peiiolo 'A-l-pollicari subulato. Ioflorescenila el floret P. *puttM*, sed brae-leae exteriores parum loogiores, margine freqoeulius crenatae, el basl cordalaa nee cuncaUe. Corolla alba. — Habilat in Brasilia in monlosis graminosis ad Villa Rica (nunc Cldad* de Ouro Prelo) provinciae Minas Gera^s, in sylvin ad presidium S. Juao Bapiisto, in sylvis primaevis provinciarum Rio Janeiro el Minas Gera^s.
4. P. TOJWKNTOSIS Pohl I. c. 09. | I. 56. - Dili. I. c. | - Caule ramoso villoio: foil, ovalib. crcnalit, basi rolundalo-cuneaii% c\ in peiiolum deruir<*ntib. pilo>i>, sublos tomeniosis; bracieis eileriorib. cordaio-auHculalu crtnalit villosif. 4 - Canlia berbacaoi, procuabant v. adaeendent sable^ragonus, 9-pedtlit H ultra, pHls breuibot mflt vltlotva. Folia amUuteoia rvgoaa, t<fra sOtpWa, infra rufo- • pallido-ooiofaota, baal rolandaU oi la p#tlol<ai towm nkilMra aogustau. Pedoneall flral 3-5-po4lioar<t vUoal. CapitaU domun plus polite dlametro. Bracieae exlorloraa 6-8, calyoaa ttheadofitei, otaUo obusae crcaiaiae rogoxae, ulrinque villoMe, basl profunde oordalae, aarioolis obmtls. Calyi praecedeniium, sed denies crassiores, appendlco naxlmo. Corolla sordlde Oatopurpurca, lubo superne inflalo, labii Inferioris lobo medio laieralibos dimidio brevi ore oblongn, exlus longe barbalo. — HabilUl In Brasilia In pascuU siccis circa Fazenda de Alma* in via de Paracalu do Principe ad Bio San Antonio, prope San Joao del Rey provinciae Mlnas Gerats et prope Piraogars, Taubale et Pladanonbongaba provinciae Sancti Paull.

3082. MABATPIANTHES Hart

(Mart. nsa. in Bib. Labial, gener. et spec. 61 - Meisn. Gener. plant tascul. I. 283. II. 101.)

- I. M. IIVPTOIDES Mart mss. ex Bih. U f - Herba procumbens, ramomm et pedunculorum lont;itudine, foliorum forma et villositaie omnium partium marnopere varians. Cauli*s nunc vix 2-pollicares, saepius ultra pedalen, uti iota Mania glabri pubscenicis tomenlo»i v. longe pilosi. Folia Infehora magia minufe i,e-tiolaia, superiora sub>cs»ilia roiundala ovata ovalo-lanceolau, lanceolau * i b l longa, acuu v. oblusiutcuta, serraU v. rrrnaia, bati angutlaia, cumala t roiuo" daia, rarius subcordata, nunc lenuia »ub<labra< sarpius rugulota, |iube>e'miia T tomenlosa, inlerdum rugo>is»ima, bispida *. rufo-iomeoioM, floralia conlurmia Verticillaiiri lubsecundl. Florum rjpitul* den^a fl-fo-flora »f>%>la t ,, ,, ,, ,,

minuste pedunculata. Bracieae lanceolato-lineares v. subulioiae, ealycem aequaoio. Calycis villosi denies laeolali acnli, fructiferis ereclis, patenlibus v. reQexis. Corolla coerulea v. purpura<cens, caljccm vix excedens. 0 — *Hinopodium Ckamaedrys* Vahl, Symb. botanic. III. 77. — *ttypti* thamaedryt* Willd. Spec. plantar. III. 83. - Poil. Ann. Mug. Par. VII. 488. L «7. fig. 4. (male!) - *Uyptit pseudo-ckamaedryt* Poii. I. c 400. I 31. 6g. 1. — *Uyptu in/atala* Spr. Sjsl. tegetab. II. 731. — *ttyptis lurid** Spr. I. c. — Habitat in Americae aequinoctialis culiia, ruderatif, campis, arenoif maritimia etc. frequent in Mexico, in insula Porto Rico t't Trimialis, in Cayenna, in Brasiliae provinces Para, Babia, Rio Janeiro el Minan Gera?s.

>»/. **BHAPHIODON** *Schauer.*

(Schauer, Flora [B. Z.] XXVIII. 345.)

Capitula long* pedancalata conferte multiflora, bracteis numerosis subolatis InfolQcrtta. Flores sessiles ebracteati. Calyi turbinatus, floriferi tabus brerls aequalis interne nudus, limbis ei aciculis aubulatis 5 loogioribus et 5 pluribusve brerioribus Illisque alternis conTfclus, fructiferi tubus aoctus, membranaceus, sob limbo ID alam horizootalem collaris ad instar productas, limbis subimmatatas. Corolla calycra eicedens; tubus leviter cunatus interne flaber, faoi subioflata, limbi subbilabiati lablam superius bilidom paleos, ioferiug trilobam, lobis lateralibus linearibus patentibus, medio obloogo, basi contracta saccato, sub antbesi dejecto. Stamina 4 declinata edentula villosola, antbrae subcordato-reniformeSt loculis apice «ubconfloetibus. Stylos aplca redancus; stigma terminate sabtnincataa. Loboraai geralaia pl«raaa<|ae ooo nisi onicas perfectibills, rfliqnls lo iyioaajoro breri mdiaMatariU, Hie aobadoltus pericarpio menbraoaceo atric«lirornls oborains compressns laetls, gemtnulam bastflum aMtropam fbfena. Prodat....t — Herba Brasiliensis.

I. U. (ZAPAHIA Neea ab Esenb. et Mart NOT. act. aead. Caetar. Leop. Carol, oat. enroa. XI. 71. t I ».) ECHIMS Srahoer I. e. MO. - Canlei berbacei flifonne* proconbelef folHqoe plloao-villoiola. Folia looge peliolala aicndcntla ovata v. ovato-obloQKa, baii rotaodata irancata v. tobcordata breviter acumioata grouse rt inaequaliter serralo-dentatj retirulalo-veooia, tublus pallida. Pedunculi fliflor.*^ mes folia tuperanlef, tuperoe bracteu alternis Mibulallt reOexinque muniii. Capitula globowi *Cffnst* mole, deolibut calycn pilif articulati» hirsutis ancaltitqua involucri rtgidi« undiqur borreoibaf ecbioala. Corolla lilacino-corrulca, limbo calycif fere dupio longior, lacioia iofima glabra, reliquii pili* nonnullis articulatit dor»o ad apicem barbua. ^ — Varial foliorom nagnitadioe, folu«que IVi-9-pollicahbai M fit toaiipollicaiibat r«p«ritur. - Cretcit ln Brasilia tropica, in protiocia Mioas Geraia.

S5H.1. UTPTIfI *Jeq.*

Jeq. Colkft botanic. I. 101. - Metal. Geor. plaot medlar. I. «U II IW. - **•

LabiaUr. ftatr. et upee. 64.^v

••flit L fTBHA IU. L •. H.

Pioroa aasailcs. Vertidllaatrl aaliiflorl lobirlobofti in ipiram droaan v. ^{race*} ^{fruc*} BQID tBterrapim ailapaiti. Bracieae oomero»ae adpreuae «ubolaUt. U1) i Ufer •obmeajbrauctaja aplice reconrot, deotibo* aabulaUa. (Uolit »op«rac den«-dates. Folia loralia aila«U.

!• at VUCUTA tisth. I. e. f - llerbacea: ramia eloogati* •inrti* »ob«odia; ^{fol.} MrtU fssMUs Mbteaallb. ovaio-obtosajlf rafoaia vtlloti*: veHinllastra »nti-^{nti-} •oHt km atHcasi km na lemIMlem eoagetUt; braetta panit tabolalU; ^{calycis} ^{pubescen} i Ubalotl Bmtifri *ntmni* or* obliqao nembraoaceo '...w, ^{dentib.} ^{subulatu} glabrla tabo Mbaequallbta. > - Caalea * baii Mgoou plorm ^{berbacei} ^{eracti}, I-ft-toaWos, jlabH t. ad baalaj pvbctmt** t^ragonl taleaU. ^{roila pou-} ^{riaci} BM, tit 4-4 ||»ea* |oa)fa. t inierdooi lalaia ovaU tubpollieaHa, ^{ol} ^{nie ru-} ^{roci} Mlam k ep da, loralla minuia brarirarron»ia ^{Kira dase, .f| v: p o} ^{illicario,}

deniibus calycinis relleio-crinia. Calyces sessiles membranacei striati, fructiferi 3-4 lin. longi, donlibus subulalo - setaceis, 2-3 tin. longis. Corolla briⁱ* alba, labio sup.nore punrlis purpureis notalo. Filamema bine pubesceolia. Acnaenia oblongu subcompressa pallida laevia. - Uabiial in Brasilia ad Ponle d'Erva, ad rivulos prope pagum Coracao de Jesus in provincia Minas GeraeV

- 1 B. INTERRUPTA PoM, Ic. inod. ox Bth. 1. e. f - Hcrbacea elaiia viscido-pubes-
cena: foil, peiolaiit oblongo-clliplicis eroso-denuiis rogois, ulrinq. viridib. pube-
centib.; vcriicilla»tris nullifloris in racemum inerruptum lerminalem subra-
motum disposiis; braceis lineari-subulais aculis, calycem aequanb.; calyci.
pubesceulis lubulosi (fnicUfcri recurvi) ore obliquo membranacco, denlib. subula-
tis labum subaequanlibus. % - Caulcs 8-3-pcdalcs niricli >ubsimplices, ba>t
foliosi, medio subnudi, tuperoe floriferi lubpaniculalo-ramoM. Folia mfvnora
longiuscul pciolau, lVi-4-pollcaria, media minuu »ub»rssilia, Qoralia M»b-
nulla. Bractcae numeroae adpreasae. Racemus ouoc simpln pedali* «i ultra,
•unc brevior ranosui. Veitieillatiri deosi globoti, infimi pollicem reraoi, su-
preml in «picam approximalL Calyi ChicUfar tlongatua tUiiau* vubmrbrana-
ceus viscido-pubescent, denlai glabriuaeull aeoiimmi inaeqnales, demum Mcl-
laio-divaricaii. Corolla calyce brtvior, eitus PIUHMCM#M fiaveseens, labio supe-
rior* purpureo-maculalo. Sumiaun inferiorum flanoau glibra, superioruu
bine pube»ceniia. Achaenia oblonga anbeonprMta pallida laevU. — Habiui
in Brasilia ad 8anu Crot proviociae Goyai, In pasouis prope Paiaada do Fraa-
olsco Jose do Maios provineiao oceideolalis Minas Gera#s.

3. II. PLATAMFOLIA Mart mat. ei Bib. I. c. f - lerbacea perennis: eaule bast
repente radicante; ramis adscendenlib., basi floccoso-laoalis, superne denudalit;
foil- bretiicr pctiolalis Inle ovatis duplicalo-crenalis el anxulalo-lobaiU, ba>i
tubcordalis, supra pubesceniib., sublus lomento albo lanalis; >rrtirilla<insdi*n«e
mulunoris plobois rcmntis, in racemum lorminalcm dUpotili^; brarlici* «ubula-
lis adprcsHjs calycem lioriferum aequanlib ; r.il>cit pubesrrnliK fruiiiftri rtrurM
membranacei ore obliquo, dentib. subulatis. ^ — Caulen bail pereones hublig-
nosl, eilremiiate ramiquo adsrendenles v. rrecU S-pedalet tetragoni. lo-
lla tare *Popuii albi*, S-polliearla,* ragosluseula, sublos praetetiim in tern* uii
ptiloll brovoa ei ramoram para Inferior Una alba aaoill loaaata f taUa, aaatrlora
remota panra subsesaUU, loralla miouia. ?0TUt4Uaanl paaol, rta>o4i> fn<l
liferi fere polleom dlamelro. Braetaao par aaiatota adpiaataa, po#t aaibeala
refleiae lanatac. Calyx Boriftr albo - toaaalataa, IraeUfar saaiabraaaaeas pnbes-
cens, basi smbinflatus adscendens, aplca param raaarfai, laiaa glabcr, denUbua
inbum fero aequantibus pnrpurascenlibnt pabaacaailbaa, eperlortbus loalfloribna.
Corolla deolibu> ralycinis subbrevior alba, laeloiis aaparloribaa laaco-aaaealalis,
InBma subrosoa. Kilamenta glabra. Achaenia otoidco-compresftiutcola aiidia
olivacea. — Habitat in Brasilia in camp Is ad Joaieiro protiociae Bableaalt.

Section. 6PICARU Bth. L e, 19.

Floras aetsiles. Verticillamri multinori in spicam densam v. fix bani interrupt
Urn disposiU. Bracieae numerosae adprestae lioeari-sabalaue. Calyx frucufrr
reeiua, denlibua subulatis. llerbac foliosae.

4. II. SPICIGERA Lam. Diet III. ltt. - Bib. I. c. 78. t - Herbacea: canlo elaiio
erecio ramoso glabriunculo, aogulis asperis; foil, peiolalis ovaUs acnminais t<r>
rail*, Dfl*ci cwicaiis pubescenlib. v. glabriusculis, soblos pallidis, floralib. brae-
icacformib.; \rriicillasiris muliiOoris in spicas densas lernlnalfs approximate
bracteis lincanb. calyces aequantib.; calyeii pubesceolis rceii ore arquali, dm-
lib. lanceolalo-subulais striclis rigidin. Q? ~ Caulis l-O-pedalii crassua oblate
tetragonus, glabcr v. lenuiter pub^ccrm, angulis aculeis minutis aspraUs. Folia
longiusculc prlMilia. lamina l7r-2-pollican*, apice acuminata et acula martior
duplicato»errata(*upra «arpiu% leuuirr pube>crn». tublui trnota, /rnu pi|^
bravibus pubescenlibuv Spicai* in apiribu< caulu et ramulorum ryhndnrar, nr-
rller pollicom loncao, 1 lin r<cl^, lP \>riicilla»m inferior™ %apr •ubiinfti

- Folia floralia uli bracleae lineares acuae inlegorrimae, pilis brevibai dlisto-
puboscentes, calyce panllo longiorei. Caljces scssiles faucc intus nuda, dentibus
tillosis tubo subaequalibai. Corolla pana alba, m dentibiis caljcinis longior.
— *Nepela maxima* etc. Sloane, Hist. Jam. I. ITJ. I. 108. fig. 1. — *Xepeta foUi\$ ter-
ratis* Plum. Ic. 102. — *Byptis Madagatearieniis* Bojer ms*. an Sued, Ilorl. Bot
fed. 2.) MM? - Habitat in America et Africa tropica, in insulis Antillis, in Brasilia
el in Peravia, in Senegambia Africae tropicae, in Madagascana elm iniula Manilla.
5. II. LOPHAMHA Mart mil. ex Btb. / c — Herbacea: caule humili ereclo ramofu
glabruscolo, angulit tix aiperit; foil, petiolatis obiongis obtusis crenato-serralls,
basi angustatis, ulrinq. glabrinsculls, mbtai pallidis, floralib. bracleaefonnlb.;
verticillastrii 6-10-floris in ipieat terminal** interraptai sabapproximatis; brao-
ten lintanb. calyce subbrevlorib.; calycit pnbescentis recti ore acquali tronealo,
deoiib. tabnlaUs tlrictlt rigldif. Q? — Ab afflni *H. tpidgera* differ! caule semi-
pedali T. TII pedali bail ramoiistltno, foliit partis oblois et «picis interraptii
calycibotqoe majoribot. - Habitat in Brasilia, In herbidis paicuis in Serro Frio
provinciae Minat GeraCt.
6. II. STRICTA Benth. I. e. 7D. t — Oerbacea: caule ereclo icabro-pubeicente;
foil, breriicr petiolatis oblongo-lanctolatii obtusis grotie terratit, bail aniputa-
lis, supra nllsalit, subtoi eano-tomentotls; raeeno tnbramofo; verUcillatru
muliioons, snpremts interrapte fpicatis, inferiorib. in apicolat brevet di«potiUs;
bracleis tubulatis ealjee breviorib.; caljcit glabrinacnli tubulosi recii orcaeqoall
trancato, dentib. sabnlatit. 2} — Badii (? canlit pars inferior?) nodota. Caalii
i-3-pedalis, tubtlnplei, parce foliotas te4ragonos, angnli pilit breviuimis rigldis
seabridl, iaeiaa gUfcft* ?. ptlla rarla pabaaealaa. Folia Inferior* iy,-2'/.-polli-
caria, topra nfftaa, ailia bratlbua rigUla tilloaa at acaba, sabius tomenio al-
bido d#a#a lanaia, ••!!•!
•aeana aloBltaiM, ta part* aayarif et vartlallaatria gtoboiit appronnatis
eofositiM, la part* InftHore ei tpoalla ejlindrlels rraiotii, basi InternipUs
1-1%-polliearibus. Ca'jds faai intas nda, deotea tab© breviores. Achaenia
oblonga obtosa laerla. Species inter *SpU*rimw*y Apodote* et PohfiUtmiam* quas
media. — Habitat in Brasilia meridionali. •

Section II. APODOTIS Btfe. L c. T.

Florrs sessilei. Verticillastri e capitnlis binis icsiilibm *rd «aepe dislinclii
compositi, axillares, remoti T. rartus in raccmum terminalem intcrruptum dispo-
titi. Bracleae subulaUe t. lanceolatae. Ca)\ fruclifer rectus, douhbus svbnialis
v. laneoolato-sabulatis ngidolis. llerbae nudicaoles t. foliosae.

I H. UDICAULIS Benth. I. c | - Herbacea: caulib. simplicib. rrtis *ubnndl*
sericeo-lanatis; fell, snbradlealib. ottlib. obtnsis crenatis rugosis hispidsi ra-
cemo simplici; ?erUdllastrls gtobosis multifloris, soprrmsapproximstis; braeta»
sabalaUs floret aegeanUb.; calycls pabesceatls Mbulosi dentib. abbrtiaUs ac««
Us. ^ — Canles e basi crassa lignose mfo-laoiu panel, 8-3-pedaies at aWtf
simplkisslmi. Folia onnia ad basin approximate, S-O-polliraria, basi angulata,
anpra pills longis rigldls dense bispida, snbtos nervosa, nertis bUptdls. Nodi
soperlorea apbylli. Verticillasrl semipollicem diametro tenenles, moliiflori Inft-
Hore« pollieeai ft ntra distantes, snpeHores In spicam tcrminalfm •PP^{roll} # 1 ^ ^
Folia floralia bracteis eonformia. Calyces foscesceoles, irmuro glabratl, ier-
lams nda. Corolla panra, eitns tit pobesceos, tabo caljrrm subacquanie, ser-
We p«rp«rea, gumiaa glabra v. snperioram fllamenu intus pub«rrntia (bt Nil-).
Aekaeia e?aU-oMea«a palliea Uevla. - Habitat In Brasilia in campii et ad
vlas ptope Vllta ee Casn>anba preflselae Mnas Geraes, ad Macaeon in rra
Imiba pmtaefae Cojai.

I B. SBBJOU Bib. I. e. - Caelib. aabelaplicib. serieeo-laoatis, topenM •ttbjpA [.
••s; Mt iiiimIHb. etatis obinsls sablBlegefriaiis crassis nervoala, nriag*
— laaaiia; eaphallt a]l«basis dense snalUioris, bretiter peduenlaUs rat
braatela esbalatls eepIt«l«ni ««q«ianiib.; ealyeis tvbeleai sericee-lamu
dentib.

subolatis, deroum subpaienlibus. "4 - Caules e basi perfnni plures herbacci crecli, 2-pedalcs uh loU planta Una laia alba subsencca dense Teslili. Folia versus medium cauli* approximala, 2-pollicana, >n crenaia, basi rolundato-cnneala, in caulis parlc supcr.ore pauca pana remoia, floralia pedunculo bre-tiora. VerlicilUbtn 5-6remoi, raccmum tenninalcm formantos Capilula «u-premasubscssilia, infcnora brevier pedunculala, omnia semiglobosa, demum globosa. lemipolliccm diamelro. Bracieac cl cal)ces apicc nigresciet. Corolla *ix cabcem eiccdens Gcmllalia cxscla. Achaenia malura non tisa, Junlora re-ticulalo-rugosa videnlur. - Species inlc // . htrtuam el #/. nudtcaukm ?. B. pU-UknifoUam qua»i media. - UabiUl in Brasilia meridional!

». H. ONCINATA Bib. I. c. 8a - Ramn nifo-lomenlosis; foil, subsesslib. o*aio-oblongit •crraio-crenalU, baai rolundalo-cuncatis, supra kcabnusculis hispidulis, snblQi ad nenos rufo-lomentotU; eapitulia globo»is dense muluaorio axillanb. sessilib.; bralcis UoceolaUs capKolam aequanlib., apice subulalis bamaiis, ca-lycis campanulalii deniib. rigldli subulalo -aristaiU bamatis. % — Folia frro B. ktrtulal, noralia omnia eonforala* Capital! els U. kirtuiae majora, brarirm dentibusque caljcinis reTolato-hamotls Uppacea* Galjcia (aui iolus rufo-lanata. Corolla denubus calyclnls rabbNTlor. — Habitat la Pom*la.

ia H. HIRSUTA D. B. Ktb. Not. gen. «t ap«e. pL 1L 318.11 ML - Bth. I. c. - Bamli rufo-blrsuUs; foil. teMillb. T. bnrltar peUolaUi oblonft-tviili, ba«4 «•-neatis angosUtlt eroto-oreaaUt nigotit tlUosUt eapltulls MttUib. globotla 4MM mulliflorii; bracleii ItneeoUU caljetm aequantib.; calyela blipidi dentlb. Ian-ceolalo -subulalis rigidis, demum tnbpatullt; aebaealis rogost. ^ — Baml le-tragoni, uli folia pills rufit articulaUs dense birtntl. Folia floralia tuperiora cau-linis mullo minora. Capilula sessllia T. brevissime pedunculala, tcmcellasins raccmum inlcrruplum formanuib. Denies calycini lubo dimidio breliorrs. Co-rolla bro\iUT e*orla, cilus bispida. Gemllalia bre%iler ciserta. Achaenia reii-eulaio-rugo^a mgra. — Uabilal in America meridiaoali, in ^o>ae Andalu»iao locis andis apncis monlis Tuminquiri, in campis berbidis prope ban Joao del Hey el ad >ilia Bica protincia Uinas GeraCi.

iMtttl?. PutfOnS BU. L t» M.

Plonui oapitnla asillaria podmealaU globota 4m— MHiáWt. BrtcttM ao-merosao adprettae ovatat. Calym fructifer batl laflalat tioagiln, «r« lamrto, denubus brevibua ovatla laaoqaalibat.

11. n. ODOHATA Bth. I. e. 81. - aullb. ffTatlatt•H«aatttti» MI. àmiter pe-tiolans oblongo-elliptlcia crenatis, batl rotaadatla, tapra teaàrlt, aabiaa toawo-tosis; capuulis globosis dense maliiflora raaioalialBio-paalcalaUt; calycU villoti fraciifcn vlonpaii incuni ore obliquo, brevier quinquedenUlo. % - Fruiei ba-bitu tiuddhjac. Folia 2-4 pollices longa, supra loberoulU partis crebris exas-peraia, floralia minuu. Pamcula ampla ramosiuima, ramis gracilibus tomeosit. Capitula flonfera \ix 2 tin. diamelro, floribns dense ImbricaUs, la quoqoe rapl-talo ultra trigiou. Calyces tomenloso-hispidi, frucUferi elongail gracles, dentibut bretlbos ovalis acutis Corolla© bretiler euerUe. Aehaeia oblongo-lmcana laefla. — llabiui in Perulia.

12. U. UUGI>OSA bL Ilil. mss. ex Bib. I. c - llerbacea patilla glabra: foil wui-hb. lancolaiit acuii< serratis, basi cordalo-amplexieaullb.; pedunculit axlllarib simplicib , capiulis partis globosis deaals; braclels ovatis capiulom subaequan-lib.; cal)cis frucufcri basi ioflali ore obliquo contracto, dentib. brevbslmii ioar-qualibui. ^ - Kx omni pane glaberrima, habilu Gfholam rferen*. (aul't subsimplex, adscendens, 3-0-pollicaris. Folia semipollicaria * \n polliraria basi subdilaiala membranarea, ulnnque vlridia. Pcdunculi inferiorvs folio bre-viores, Gliforme*. Upiiula fruciifera vu 2/i Im diamelro, H-iy-flora Corolla^ minulac. Achaenia pana oblonga gtabra lacvia pallida Khrn palhd f n urpu-raie«nies, lobo inHmo inlenkiore. Odor gmii - UabiUl in Bra»ilia in UH gino-ili syUaiici» prope Itagui pronnae Sancii Pauli

13. n. LACIMATA Bib. in Hook. Jooxo. of bol. II. 40. t - Erecta poberula: foil, pinnatiseciis, laciniis linearib. inclso-denlatis; capitulis axillarib. pedunculalls semiglobosis dense nulliOoris; braceis ovalis; calycib. apice incurvis, ore obliquo acute el inaequaliier deolato. Q — Caalis ereclus semipedalis Ievier cano-pobescens. Folia pollicaria, inlerdom bipinnalisecla, supra glabriuscula, sublns cano-puberula. Peduoculi folio longiores lenues rigidi. Capilulum 4 lio. dia-roelro habet Bracieae calycem aequaotes acolioacolae ciliaiae; calyx fruciifer membranaceas, basi subinflaloi, supra medium parom contractus el incunrus, ore valde obliquo, deolibus S infimia minimis, omnibus subulato-acuminalis. Corolla lineam longa, apice eitoa plooa. Aehaeola oblonga. — In Guiana Britannia.

Beetle ?. OTBTA Mb. U b U t gener. et tpeo. 6L

Florum capilola axillaria pedoncalala globosa dense muliiflora. Bracieae nn-merosae adpresae subulatae. Calyx fraclifer elongaius, apice rccunras, dentibos subalatl.

14. H. RECCRVATA Poit. Aoo. mus. Par. VII. 407. t «. OR. 2. - Bib. I. c. - Caole herbaceo sobereclo villosio; foil, b re viler peliolalii ovalis crenaii*, basi rotuodaUf cordatisve rugosis villosis, sopremis pan is sobsessilib.; eapiiuli* globosis dense muliilioris longe peduoculatis; recepUcalo nado; bracteis subulatis calyces aequandb.; calycis tubulosi villosi fniclifrii recorvi ore Iraocalo, deniib. aobulatii* ^ . - Caules e basi prrenni erecliusculi ramosi 4-0-pedales, angulis acallf It'' tragonis subasperis, basi pilis longis paleoiibui, tuperne pilis bretioribus sob-adpressn villosi. Folia vii pollicaria, floralia panra remola. Peduncuh pollicav—ret el ultra, pobesceoles. Capilola froclifera vii 5 Ha. diamelro. Denies calyciol parom laaeqoales porporajcralet. Corolla parva f labra pallide Oavescens. Achae- nla panra obloag* laevia. — *H. microtppkmU* Bert. naa.

fi. k(r\$mtUr: Camlet ei Mta deaalos bt'reou.

y. grmdifoH*: Folia daplo an/ora leaoiora, magit vltreoUa. - Habitat in Ame-rica aeqalBoetiali, In Nova Htepanla, In Inaola 8u Marlhae, lo Cayenna, ad Demerara, la Brasilia.

Ib. II. PALIDOSA 8L Hil. msa. ex Bib. I. c. 8L - Herbacea molliter subsericeo- ullosa: foil, breviier peliolalis ovalis acuti* serralis, bani rolundalo-cunealis ru- gosisF mnlitcr villosis, sobtos ranescentib.; capituli* globose tlense multifloriO; pedunrulit capiiplo 2-3-plo longionb.; braceis nubulalis adpresnis cal)ce< sub^ aequantib.; receplarulo nu«do; calycis tubuloi pube<cenli« frurtifcn recunri ore subdilaialo, deolib. laoceolalo-sobulali«. ^ - A // . rtrurrala differ! praecip** folus nigosis nolliler villotis, basi polius cuoeatis quam cordatis, ao retera ap*2 cics disiiana? Floret albi. * Uabilai io Brasilia, m paludibu* maniiimii *'' Poou da FroU proviaciae ftpiriloa Saacii.

W. H. MICROPHYLLA Pobl, le. ioed. et Bib. I. c. - Herbacea cano - pobeceea*: foil, breviier peliolallt ovalis emails, basi aagottatis nigosis subrano-pobof^ ceoiib.; capliolis globotis deate aiolliOons; prdoncuht capitulo ^{iu3"p1ofi Jf?T} giohb.; rrcfplacolo nado; bnclrU tobolaiii adim»i% calyces soba ^{bea>ili^} ••lycla labalosi lonenlosi fmetlferi rrcurvi ore »ubdilato, dealib. ^{1. ancoelato-} subolatb. % - Ab aflai *U. rtfmnaia* diftVrt: caorsernlia. foliu multo ^{microribus} brmm peliolalis et saepios fubcooriformiba*, prdunculi« brevionbua, ^{ei pitulis} minonbus nomereioriboj. Corolla carnea. Filamenia clibra. Achaeala ^{minon} oblooga pallida laeria. - Habital in Brasilia ad Villa Paracalu do PHnrip ^{c et ad} •an ioao *M Bey* provincial* Minat Geratt, in pa«cois bomidi» n lucis in ^{undato} prone Tanbale provinciae SancU Panll.

17 II. DIVABICATA Pobl, le. ined. et Bib. I. c. - llrrbacea dlvaricaia: ^{ramis} adterndeollb. virgatit cano-pnbeoeonUb.; foil, lieari - Uoccolaus remolij. ^{apice} serraiit, basi longe anfnutlft, tnpfa vridib.. toblnt eane«ceoiib.; eapllw ^{J^} boalt dense moltnoHs podoorolalit: bracteis tnbolaiis adprealt calfOH ^{sub-} ••^••nilb.; rerrpuento tobnodo; calycis loboloti pobetcenlis ore 4o—''> ^{3-3-pedales} ••••qno, deniib. tobnlnlla. ^ - Cjule* basi ranioslssnil follois. raml

- paruro MIDOOI, obtu*« letragntt Aucatt, tenulicr cano-puhescctntes. Folia mfo-
riora 1-2-pollicnria vcnosa, nunc utrinque viridia, saepius subtus canescentia,
superiora pirva sevolia remola. Gopilola el Oores fere II. *mirrophyllae*, scd
calycvs minus recuni. Corolla pallide purpurascens. - Habitat in Brasilia ad
Brijao pnmnciac Goyai, ad rivulos in campis prope Tacaramby inter Minns Nova*.
18. H. LAVA>DLLACKA Pohl, Ic. incid. ci Bib. I. c. - llerbacca albo-tomcnlosa
erecla: ramis virgath; foil, linearib., apice denticulatis, basi angustalis, utrinq.
cano-tomentosis; capimlis globosis dense mullifloris longe pednnculalii; bractei*
sabulalii adpressis, caljces subaequantib.; receptarulo nudo; calycis lubulooi
pnbescemis ore demum obliquo, denltb. subulatis. ^ - Arthnis // *divaricatae*,
ted habitu ereclo, superfine cana el foliis longioribus anguslioribm disiincia vl-
detur. - Habitat In Brasilia prope Fazenda dc Gamcleira protinriac Gojaz.
10. H. CAPRARIAEFOLIA Pohl, Ic Ined. ei Bib. I. c. 83. - Suffrulososa ba*i ra-
mosa: ramis clatis apicc sobnudls, breeder pubescentib.; foil, panis ra^nculatis
sobsenilib. laoccolalo-coneaUs acolis denUtl, basi angustalis viridlb., brevis-
sime pubesceniib.; capltollt longe pednncalatl pan Is globosis dense multifloris;
braclels subulatis capilulum aeqaanlib.; receptaeulo nudo; calycib. fruciiferit*
elongatis recur*is, dentlb. sobnlatls nolllier pnbeaeenllb., tnbo brevioribus. ^ —
Habllal In Brasilia ad Serra do Chrysalt el In monte Clarvo provlnclae Goyat.
- SO. H. DESERTORUM Pohl, Ic. Ined. ei Bth. I. c. — Ramis rufo-loanontosU crec-
tlls; foil, petiolatis oval I b. obnlala erenatia, bail angututls eraaala ragosl, vtrinq.
molliter rublglnoso-villosls; capltulls looge pedunculaila globosis dense multl-
floris; rceptaculo nudo; bracteis eapltulum aequantib. linearib. rufo-tillos»is;
calycib. fructiferis elongalis recnrvis, denlib. linearib. molliter rufo-villosis. ^ —
Habitat in Brasilia in pascuis descrtorum ad Rio Parah>buna provinciae Mi-
nns Geraos.
21. II. BIENNESEENS Pohl, Ic. ined. ex Bth. I. c. - Frulicosa? ramis brevitr rufo-
tomentosis; foil, petiolatis ovalo-oblongis obtusis crenalis, basi anguMato-rotun-
datis rugosis, supra scabridis, subtus rufo-lomentosis; capitulis longe prdunrulatt*
globosis dense multifloris; receptaculo nudo; bracteis subulati« rjpitulum Mib-
aequantib.; calycib. fructiferis elongalia recurvis, dentlb. tubalalis nolhrr villo-
ala tubo brevioribaa. ^T - Hablui In Brasilia ad Bngeobo dot Bola provln-
clae Goyai.
- S. II. REFLBXA Si HIL nts. «i Bih. I. e. t - HerbacM erada d#oM raft-villo-
sissima: roll, subsestlllb. ovaUs aeotlt arfile Inaeqvaller deaUUs, baal angas-
tato-cunpaiis, uirioq. molliter villosisslmls; eapluUs longa pedraevUUA globotla
dense multllorls; bracteis subulalls calyces aeqaatib.; nceptacvlo rabnudo;
calycib. fructiferis elongatis recurvis, dentlb. subalatis nolliler vflotlMials, tubo
brevioribus. ^ — Caulcs complures dari 1-i-pedalet, parum ramosi, uii folia
et pedunculi pilis mollibus rufis subsericelt dense vesllli, simplices v. gaperne
corymboso-ramosi. Folia numerosa, S-S'/i-polllcaria, aaepe teraaUoi ventcJIIaia,
Ooralia conformia minora. Pedunculi in aiillis foliorum superioroai 8-3-polli-
caret. Capitula rruclifera 8-10 lin. diametro. Bractcae refleliae. Calyeet mem-
branacel tarbinato-tubulosi, ore recurvo trancalo, denllbus refletls. CorolU
purpnreo-violacea pubescens. Btanloa pubescentla. Odor foeUdus. — HablUl
in Bratilia In casnpls herbldis prope Araia provlnclae Mints Gtrats.
- S3. B. CABDIOPHYLLA Pohl, Ic. ined. ei Bth. I. c. 84. - Caolib. ereciU <trtdU
lanato-hirsutiKNimis; foil, testlllb. tmpleiicaulib. late cordirormib. acutls sub-
tenratit, molliter sericeo-lanatis; capimllt pcduncuUis globotlt, dense mulli-
floris; bractei.i subulttlls molililer villosls, capilulum aequantib.; rec#p#truln oudo .
ralycib. fructiferis olongatis recurvo-defleliis, dentib. subultlit molliier \illotls .
y. — Caulcs complures, 1-1'A-pedalet, simplices v. parce ramosi. Folit vit
tempollrarit erecta repicala, neno medio cauli adpresto, flnuhus reflet it n
Ideo cauk« quasi 4-alali, rugosa, tubtus >enots. Pedunruli %rcu% nukm paurt
IVi-S-pollicares, saepium 3-« ad apircm glomerati ||| pol|irare«. Ct|utult fmr-
Ufera tempolllicrm diametro. Bracteat* ct florr* II ri+txme. Corolla **conspicua**

Achacnia oblonga subcompre»sa laevia. — Habitat in Brasilia ad Rio I'ruhu, Ouro-fine e(Sania Loria provinciae Goyai el ad Paracatu, in campis planiiee elevatae Chapada dictao in pane occidenUli provinciac Minas Grrai's.

SecUo VI. CTABOOEPHALUS Pohl mss. ex Bib. 1. o. 84.

Florum capiula eliam Juniora globosa dense multiflora. Unclear numerate adpressae capiulum acquanles subulalac mollrs villosac. Rreceptaculum nudum TCI broiler pubescens. Calyi fractifer membranaceus lurbinalo-tubulo* uH rrrtus vel subincunrus basi glabr, denlibus subulalif tubo tubacqualibu* roctia molliier rillosissimis. Corolla vit denies calyclnos toperans. — llerbac vel suffruices pie—rumque duri. Capiula versus apices ramornm pauca cocrulescentia, plerumqu* longe pedonculala.

M. II. LA>ATA Pohl, Ic ined. ei Bib. I. c. — Soffrulicosa: ramis lanato-lnr%uii«siinfs; foil, crbris sessilib. ovalis aculuscolis crenalis, basi cordalo- amprticaulib utrinq. lanato-hirsntis, mbtus nenroso-rugosissimis; capiuli* pedunrualis Rio* botis dense multifloris; receptaculo nubnudo; bractit ^ubulati* rapitul«im ae-quantlib.; calycib. fubrtcti^, denlib. subulalis nolli«imp hnaio-Mllo-Ui, Kibo subaequalibus. ^ - Habitat In Brasilia ad Ag«i Gente el Trahirat provinciic Go\az.

%j. II. ADRRESSA St. Hil. msj. ei Bth. I. c. - Caulib. ereelis strictis nubtimplicib. pubescenlib.; foil. sr»»jjib. rrectis ovalo-lanceolalis aculis crenalo-<praii«, ba#i roiuodads ^ubcordalo-ampleiicaulib. rigidii nenrosis glabri* t. lomcnio»is; capH tulis glo»is dense roulliflorit longe pednncnlalis; receplaculo nodo; hractels sobulatis capiulum aequaolib.; calycib. rtctis, denlib. lubulalls molliier Mllo»i* lubo sobaeqaalibns. % - Bablloa for* B. §mrdiopk^0, sed lenuior. Cjuk* 1-3-pttUles, basi dta«4all. Polia 3-5 lla. losga, cauli adpressa, plana. bj«i vif eordala, sitblas vaM« tatusj, stnitoria aevtls v. oblois, Inferiora glabriu«cuh, sapressa eaad-losjsesjCoM •. rariat rafstcaatlt. Capllola frvciifera vit semipolli* can diaBMlro. Plores &. coraVopAft/fls*, s«d calyces rtell videoiur. — llabiiat i> Brasilia In campii prope Torqoitla In pane mcridionall protiociae Goyai.

W. H. BIGIDA Pohl, Ic ined. ei Bib. I. c. 83. — Suffrulicosa: ramis pobescntil>* ereriis; UA\ se»»ilib. ofalis aculusculis serratu-crrnalis, basi cordato-ampleii-raulib. rugofiii, supra brevisiime, sublus rufo-pubesenlib.; capitulis longe pe-dunrualis» globosis dense mullifloris; receplaculo subnudo; bracin* subulatis capilulam subae^uantib.; calycib. tubrfeli*, drnub. subulads molli»Mto<* villosis. lubo suloequalibus. ^ — A II. nertosa differ I Miis angusiionbu« minus canes* rroubuf, capitulis minonbus el slalura lenuiorr rigidiore. — Uabilat in BrasiH* inter CaJumbis el Barrros provinciae alioas Gerae*.

97. II. PBAGILIFOLIA St Hil. mss. et Blh. I. e. - Suffruico»a: ram.* ered* pubesrenlib.; loll. se%»ilib. ovaio-rolun4aiis oblusis crvnahs, basi rordalo-a*'' plenraohb. ruffidis, supra sobglbris, demam landit, sablus rrticulalo - venosis* Sims sabglabrit; capilalis pedoneul«li« globosi* dense mullidons; rrept W' nudo; bracin« sobulalls eapilulum a<*«iMnib.; ralycib. rerti*. denlib. subulatis ••lljifr villosis, iMbo stbaeq«alibu«. ^ - Rami duri ba«i fere glabri cor-lice flansa, soperoe pobc«ee«lrv Folia semipollicana dura %arr« fraali** odore grtti, sablos gUBra, ssbresinosa. Capnna semipollirem dianeiro. &' rolU. pjllide purporeae. A If. SMtM« differ! praecipue glabriu«*. - Rabi^ in Bratiha in arraaiU qarliotis prop* Peaba pro«inriac Minat Grra«*.

< .H. !L&VOLA Pobl, le. ued. et Bib. I. e. - Soffrnticosa: ramis %iiloso-bispil«»j toil.aetallb. •«ato-roiMdaiU oblasU erenaii*. basi cordaio- ampleticaulib. n. globosis, anava ftebesctnib., sablo eano-lomroiotis: eapiulit longe pedunruW globosis tftsJM sjtlltiWis; wetstteciU«bn«4o; braceis sabulalis capiulo** qoaoiib.; ealyftb. sabt^iis, tartib. salmUIU •MMitMisac tillosis Uibo ^b***qU T l»b«s. % - Habtlai m Braalla laier Ballta ti Bio 4« Praia pro?iaciae aUnas <»****; a CANDIDA Pabl, kw iaed. *s Bib. I. e. - ftufrviirosa: raiiis albo-uat ^ * ^ MI. s#t*Mib. •tatia •btjstiawralis er»nau«, basi c o r d a m p l e t i c a u l i b . r 1 f 0 # A

apra canescenlib, sublus albo-iomenlosis; capilulu pedunculalit globose <den*«
mulliori*, recepuculo subuudo, bracteis subulaUs capilulum aequaalib.; caljcb
tubreciis, deniib subulati* mollisMmc villosa lubo aubaeqoalibaa. ^ - Uabiui
in Brasilia in cr Ilio Jcquitonbonha el Barreroa prounciae Minas Geraes

30. D. MOI LISSIMA Benib I c - buffruticosa. ramis elongalis lillosis; foil ses-
ailib. ovaio-roiundatis acutiusculis crenalis, basi cordalo - amplexicaulib ncr-
•oao-rugosn, umnq mollisume >illosis, pedunculia folio longiorib.; capilulis
globosis den<c mulliOoris, bractu hubufolis capilulum aequaulib.; receptaculo
nudo; calycib. subreclis, dentib. subulalls mollller \illo*is, lubo sublongioribus.
* - Caules e ba»i lignosa crectl, 4-5-pcdalcs. Kami pauci subsimplices, obtuse
teiragoni, pilt» maequalibui mollibui nifls glandulosi* fcubroscm MIOSI Folia
S-10 lin. longa, ralde rugoia, Juniora iubiencca, omma molhler Mllo»a, regula-
riter creoulaia. Peduncali folio ouoc parum nunc Iriple longiorrt Capilula
•tolacea, fruciifera 0 lin. diametro. Bractfcte uli denlca coljcini »ubulatae el mol-
liler mfo-villosae. Corollae deoliboj calyelnU »ubbrtviorr», obhcure cocrulco-
violaceac. — Habiut In Brasilia In aepiboi ei eullif ad Coogonbik de Sabara,
prope pagum la Concepcao proviaciae Mlau Gerata.
31. n. ARGLTA Pobl, Ic. ined. ei Bib. I. c. 80. — Saffrvtlcoa? elaU: rania deone
rafo-Yllo»ls; foil, peilolatia lalo otaiia rounldailavt arfuu dealaiia eraaala rugu
ala, ntrinq. dense villoala; capiialla looge pedaacolalla globoalt, d«mt« aiolUOoht,
receptaculo nudo; bracteia aobolalla eapitulun aeqaaailb.; calycib. sabmlla,
deniib. tubulaiia mollaalme tilloala, lubo aabaequallbua. % * Speciea folllt don-
usiuroe MIOSIS majorlbuaqua quan la afaalbaa diillociaiaia. — Dabitat la Bra-
silia in pascuis de»erloram ad Rio Parabybuna provinciac Minaa Gfrate
32. II KLGOSI Benth. I. c. - Caule frulicoso, ramif pubeicentl-tillo»is; foil brc-
>iter pctiolaii> otaio-rolundaia aculis, argule »crrato-rrfnaii§t, ba»i roluodam
> rordihs rugoj»ib, ulnnq broviler rufo-tillon«; capilulit longe pedunrulaiii
dense globuMs inulddoriH, braceif iubulalii capilulum fubarqnantib, ral)cit>
aubrectiH, deniib subulalii* raolluer \illofis, tubo fublongioribui Zf Caulit
ereciut, a-pcdalm Folia 0-9 lin. longa, tacpe ternatim veninllala rra»»a dura
Pedunculi 1'/,-4-pollicarea. - UabiUI in Brasilia in terra daa Caraacai proOn-
cia« Mlnat Geraet.
- 33 H CUNEATA Pobl, le. ioed. u Bib. I. e. - SafntlcoaT raaila aracUa laawn-
toso-pabeiecnUb.; foil, braflur ptUolaUa obovailt tola ortaatl, baal aafaatatia
ngidis, supra acabrluacalla, aablna rtUealaUa rat»»»»aâ«aaaat1b. | caallalla flobos-
sia longe pedunculalla; reepuoiilo nudo; braciala aâaaUlla eapttulaaa aeqaan-
lib.; cal)cib. reccus, deniib. subulaUs moltiler villoaia, labaaia aabaaqaaaiibaa. %
— Habitat in Brasilia in campla desertofum ad Bio Parabybuea protlaflaa MI*
nas Gerald
34. H. LIPPIOUKS Pobl, Ic. mcd. ei Bib. I. c. - Fraticoa? raaiU rufo-toaienio-
aia; foil breutor peiolaiis ovaais crenatis, baai rolundaiii, apra pabaartaib.,
sublus reticulate rufo-iomrniocfii rigid is; eapiiulia looge pcdaaaalallt globosts
dtase mulliOorm, rercplaculo nudo, bracteia subulaUs eapllalun aeqoanlib.; ca-
lydb. aubreciis, deniib. «ubulalii«, molli»tiaie %illoaia lubun subaequaniibus 6?
— Affliis // . ngidat, habilus II nertotae, aed folia conslaatar petiolaiaf, basi
otala, nee curdaio-anplencanlia. — UabiUI la Braallia ad Cbapado do Sacra
ban Marcos ad Cabesseira Ribeirao Balalba provtncUe Goyai.
35. II sr. UdIMK)LU Mart. naa. ei Bib. I. c 87. — Frutlcosa ranis subfaseiculatii
ngidi» glabnuscule nodosia; roll, panls subtaaaailib. linearib. aculis argute »fr.
ratis, ba»i angustalm rigidis glabria laevib.; capitulla longe pedunculaiis giobo»u
dense mulunons receplaculo nudo; bractels lubulalis capiitolun aeqaaniib, ca-
l>nb lubreciis, deniib subulaUs mollib. villoaia, tnbo subaeqoaltbos. 6 — Habilus
bi capilula // rugotae, »ed foliorum forma disdnciissima. - Habitat in Brasilia in
camp is ad Scrra de San Antonio premnciae Minas Geraes.
30. R. PEDt. VtLARIs Benth I c Pubescent full remolis sessilib lanceolaUa
^ blast serrali*, bi»i roiundaiis »ubcon«cei» »u*ra glabris nuidit, tubiu* nerrvbio

ami 8 •

8M||> TIL UIOSrUBUA Mb. 1. e. »⁸.

Florum capitula semiglobosa denio MHUMI. Brtlew nunieroae dpte. Mc lanceolatae v. lineares, capituli fructiferi patentes nec tericeo-tomentosae vel lanatae. Receptaculum villosi

campanu

brevibus

durae.

Capiiula plerumque bwiler pedunculata, tertut aplcet ramorum ^{plurimae} pauca mol- liter sericeo-tomentota vel lanato-villotissima.

* HT LKUCOCEPBALA Mart m>t. « Bib. I. c. ». ~ « ^ ^, basi J t S⁻ bent: ramitadtendenllb., toperne Incaoo-pubcentib., batiglabratlt, Cöl tub-Msslllb. lanceolatit obtoM eerrallt, bati anguiUlit rogotit, lubtui ncano-U>inentortt; eapiiulit longe pednuculatia partit tobglobotit dente mulUflorii albo-Unaiii; reepucolo lanato; bractala eapltnina aeqaanllb.; dcnlib. calycinlt tubalalit moi-lisslme villotif. 4 - Caalla bati craatat, raml numeroti protrati dein adRcendooiei, ad ailllaa uU fotlonui aoparioniai pagtaa Inferior el capitola Una alba vettil, Inter nodot plenunqoe glabrati v. apicee pubeteenia. Folia iemlpolllearia ad pollicaria. P<d«Moll ft-3 polL longi. Calycit deout tobo catnpa-nolalo aequalit. Corolla pirui exterta rotea. Odor pla«uo toatittinie aromalcot. — Hablut In Brasillae eaapit artnoala prop< io«i«4ro •€•• lumen San Praneiteo el In pasenla tleelt aopUmtqoo ad MtJtm ti ll — pwfIMIM Bablentla.

43. n. PASSERINA Matt mat. ex Bth. I. e. - Prntioota dWarleaU: ramia ttHeeo-tomentotii; foil, anbaetallb. panla oboTato-oblongft oblotlt IntegerHmtf md«-latit, bati angutiatt eYeolit, vtrinq. aerleeo-tomentotli; eapltnllt parrla tenlglobosis dente mulUOorii, breviter pedoncuUlit; reeptaculo tiHoto; braeteii Unccolaiii oblusis tericeo-tomentotii eaplalum tubaeqaantib.; calycit eampanulaii scricco-villosiJilmi dentib. tbhretitlit lanceolatlt. 6 — AfBoU If. SHto, ted foliit ovaiis undulallt dlttinctittinia. — Habitat in Brasilia In Serra de Pic-dade, in rupibot cataractae Cunnauby Inra regionen adananliam provinciar Minat Geratt.

44. H. 8BLLOI Benth. I. e. - Canle ImUeoao proeombenle; ranilt Mriceo-toBentotla; ffoLL tMtllob. iinearib. obtult laUferrimit pUaU, bad aafttalaiU vtaiu cano-tonmtoato; eapltaHt parrit MBlglobt«lt deMt miMHA* bmtMr pc4«A-colaUt; rwepucalo miotoj braettU lineoolatH wrteeo-I—ltrtfU atplHIm tnbaequantib.; ealyeit umpanilaU atfleM-vfllofl dtadb. tbbtrrtiHi taetotatit. (> - Fruticulot divaricatnt. Baal nunerotl bmea owolliawll wlejwv. Folia erebra, tix Remipolltearia, tonento Mbttllcdd brtrialnio ntrtoqM ctMttMta. Capiiula pauca, vertut aplcet ranoran dliopotlu, 4-5 llnou dlasetro. Pednacnti 9-3-lineares. Corollae glabrae tubas ctljeaei breriter toptrat — Hablut In Bratilia mcrdionali.

44. H. ANGU6TIFOLIA Pohl, Ic. Ined. ei Blh. I c - Caoie ArviloM Mberdo; tamla tericeo-tomentotit; foil, tabtettlllb. liotrlob. aentlt, aploe denuit, ban tateferrimtt longe angututit tenotit, alrinq. terleeo-tomenlotit) pedoncolit CJ-pltalo temigloboto dente multifloro longlorlb.; reeptaculo villoto; bracteit lanceolatit tericeo-lonentotlt, capitlan aequaotib.; calycit caapanolaU tericeo-villoti dentib. abbreviaUt nollltllmit lanceolatlt. 6 — AfBnit B. SHhi el qittl media Inter hano et B. vHuHmmm. FniUoolat vldety erectot. Fotit I',-«',- pollicaria, floralia eapltnlnn laperanUa. - BablUI In Brasilia id Bern d*Onrada provinciae Goyai.

«. H. SAXATILIS St Hil. ntt. ei Bth. I. c. 00. - SttffraUoota: ramit tericeo-io-menlotis; foil, tubsettllib. oblongo-lanceolaUt acotit, apice denuUt, baal Inlegerrimit angattalis venosl, ulriq. tubtericeo-tomeniotit; pedanevllit capiulo temigloboso dense multiOoro longiorib.; rtctptacaJo tilloto; bracteis lanceolau^•erleeo-tomentotit capiulum tnbaequanUb.; calycit campanalaU acncev-linau deartib. abbreviatu lanrroUii* % - Rani ditaricau l-<-prdalr», ut. fwl,

tomento brevis tuberculato - candidi. Folia bipinnaria rigida, tenax tuberculato valde prostratis. Pediculi folia laciniosi breviores. Capitula serripulchra diametro. Receptaculum et calyces dense tomentoso-lanati. Dentes calycini breves recurvo-patentes. Corolla lobis calycem cedens, alba, apice pubescentibus. Filamenta glabra. Affinis *U. angustifoliae*, sed foliorum forma abunde distincta. — Habitat in Brasilia in monte arido prope Alecrim inler Kio Sao Bartholomeo et Garapa provinciae Goyai.

47. II. HILARII Bib. I. c. — Herbacea? dura, tenuis Una longa laciniosa: folia subserripulchra ovalia-oblonga lobis crenatis, basi lobalis crassius rigidis; capitulis semiglobosis dense multifloris, breviter pedunculatis; receptaculo villosissimo; bracteis orato-lanceolatis capitulum subaequantibus; calycibus lanatis trilobis denatis abbreviatis aequalibus. — Caulis complures erecti, fere simpliciter laciniosi-pedales, densi, quibus planta pilis longis albis sericeis adpressis late compressis. Folia laciniosa-pilicarpa, ramosa talia reticulata-venosa, floralia capitulosa laciniosa sperantia, superiora breviora. Capitula plana versus apicem curvata, demum (era pollicem diametro habent) Pediculi plerumque capitulum longiore. Bractea foliaceae acutae v. eiteriores oblongae. Lana receptaculi et calycis partis superioris densissima. Calycis lobis basi glaber striatis. Corolla alba. Stamina glabra. Anthera ovata compressa breviter laevia. — Habitat in Brasilia in monte petroso Morro de Tuao dicto in parte meridionali provinciae Goyai.

48. II. HILARII Pohl, Ir. ined. ei Bth. I. c. — Herbacea, tenuis subserripulchra telutina: folia, obtusa-lanceolata lobis crenatis, basi in petiolum longe angustatis; capitulis semiglobosis dense multifloris, breviter pedunculatis; receptaculo villosissimo; bracteis ovatis lanceolatis capitulum subaequantibus; calycibus villosissimis basi subaequantibus. — Caulis complures erecti, fere simpliciter laciniosi-pedales, densi, quibus planta pilis longis albis sericeis adpressis late compressis. Folia laciniosa-pilicarpa, ramosa talia reticulata-venosa, floralia capitulosa laciniosa sperantia, superiora breviora. Capitula plana versus apicem curvata, demum (era pollicem diametro habent) Pediculi plerumque capitulum longiore. Bractea foliaceae acutae v. eiteriores oblongae. Lana receptaculi et calycis partis superioris densissima. Calycis lobis basi glaber striatis. Corolla alba. Stamina glabra. Anthera ovata compressa breviter laevia. — Habitat in Brasilia in monte petroso Villa Boa et Cartao, in sabalosis in Serra dos Pyreneos provinciae Goyai et in monte ariferis prope urbem Pararalu provinciae Mioanae Gera's.

49. II. ORIOLAE Pohl, Ic. ined. fi Bib. I. c. 91. — Suffruticosa procumbens acutis pubescentibus: folia, oblonga-ovalia lobis crenatis, basi in petiolum breviter angustatis; capitulis semiglobosis dense multifloris breviter pedunculatis; receptaculo villosissimo; bracteis lanceolatis-lanceolatis capitulum subaequantibus; calycibus villosissimis denatis subaequantibus. — Caulis complures erecti, fere simpliciter laciniosi-pedales, densi, quibus planta pilis longis albis sericeis adpressis late compressis. Folia laciniosa-pilicarpa, ramosa talia reticulata-venosa, floralia capitulosa laciniosa sperantia, superiora breviora. Capitula plana versus apicem curvata, demum (era pollicem diametro habent) Pediculi plerumque capitulum longiore. Bractea foliaceae acutae v. eiteriores oblongae. Lana receptaculi et calycis partis superioris densissima. Calycis lobis basi glaber striatis. Corolla alba. Stamina glabra. Anthera ovata compressa breviter laevia. — Habitat in Brasilia in monte petroso Villa Boa et Cartao, in sabalosis in Serra dos Pyreneos provinciae Goyai et in monte ariferis prope urbem Pararalu provinciae Mioanae Gera's.

50. H. DICTYODEA Pohl, Ic. ined. ei Bth. I. c. — Bairns rigidi, tomentosa pilis subserripulchra lobis, eaeo-villosis; folia, breviter pedunculata ovalia-oblonga lobis crenatis, basi in petiolum breviter angustatis; capitulis semiglobosis dense multifloris breviter pedunculatis; receptaculo villosissimo; bracteis lanceolatis-lanceolatis capitulum subaequantibus; calycibus villosissimis denatis subaequantibus. — Caulis complures erecti, fere simpliciter laciniosi-pedales, densi, quibus planta pilis longis albis sericeis adpressis late compressis. Folia laciniosa-pilicarpa, ramosa talia reticulata-venosa, floralia capitulosa laciniosa sperantia, superiora breviora. Capitula plana versus apicem curvata, demum (era pollicem diametro habent) Pediculi plerumque capitulum longiore. Bractea foliaceae acutae v. eiteriores oblongae. Lana receptaculi et calycis partis superioris densissima. Calycis lobis basi glaber striatis. Corolla alba. Stamina glabra. Anthera ovata compressa breviter laevia. — Habitat in Brasilia in monte petroso Villa Boa et Cartao, in sabalosis in Serra dos Pyreneos provinciae Goyai et in monte ariferis prope urbem Pararalu provinciae Mioanae Gera's.

M. H. ADAMAE Pohl, Ic. ined. ei Bth. I. c. — Suffruticosa procumbens acutis pubescentibus: folia, oblonga-ovalia lobis crenatis, basi in petiolum breviter angustatis; capitulis semiglobosis dense multifloris breviter pedunculatis; receptaculo villosissimo; bracteis lanceolatis-lanceolatis capitulum subaequantibus; calycibus villosissimis denatis subaequantibus. — Caulis complures erecti, fere simpliciter laciniosi-pedales, densi, quibus planta pilis longis albis sericeis adpressis late compressis. Folia laciniosa-pilicarpa, ramosa talia reticulata-venosa, floralia capitulosa laciniosa sperantia, superiora breviora. Capitula plana versus apicem curvata, demum (era pollicem diametro habent) Pediculi plerumque capitulum longiore. Bractea foliaceae acutae v. eiteriores oblongae. Lana receptaculi et calycis partis superioris densissima. Calycis lobis basi glaber striatis. Corolla alba. Stamina glabra. Anthera ovata compressa breviter laevia. — Habitat in Brasilia in monte petroso Villa Boa et Cartao, in sabalosis in Serra dos Pyreneos provinciae Goyai et in monte ariferis prope urbem Pararalu provinciae Mioanae Gera's.

- B. ttulinae*. - Habitat »l rip." rWoli Corrego NOYO in region* (dintnum |<rn-
vinciae Mina ~ '9
49. H. *COMVUTLHL* m". ex Bth. I. c. - Herbacea: raulib. procrabeniib.
ramosis iillo.it; foil, parvi< numerous se<*i!ib. ovatis obluais crenal.s ban, cor-
datis rugotis pubescenlib.; capiulismigloboti. den.c multifforii; podunrulis
ttpMrto.abloalorib.;!ractlsta^ lato-linearib. recurvis, capitulum aequan-
lib.; recepuculo lanaio; calycib. villoM^imis, denlib. subulalis abbreviatis. *4 -
Herba humili* procumbens, nunc in scnipedalis, ramosissima, raml. none fere
pedalibai lubtimplicibus. Folia plerumque 3-4-linearia, rarus semipollicaria,
talde rogoaa el saepe nifescenlia, Ooralia peduacalo breirlora. Capiiula rraetirea
Ixaaulpollicarfa, rafescaia. Bracicae numerosae, apice w w i e . . uirtii
eoemlea. Siamioa baal pubtacanUa. A II. *crf**a* differt itatura humili, Mm
et capitulis minoribua, dentiboa cal|Cinla bractfiique brconbu* .ci habiiu.
- Habitat in Brasilia ID pasctla noftlit Serra da Canaitra dicti prouciac Mi-
oat Gera<i.
53. H. ALPESTRIS St Hit. mw. a Bib. I. c tt. - Herbacea: caulib. ad<eend<Mihb.
T. ereclis, parce ramoala ruffo-villoala; foll^BOBaaroala acMilib. ovio-oblonni*
obioala crenaiii, batl eordato - amplexleaalb. reietla ruajoala · TelaUoo-pube>-
eeaUb.; capliuU aemlgloala deoae nralUBoria; pedwealla eapiuUuai aubae-
qoantib.; bractei UnctoUlo-lloearib. eapitolom aeqsaaHlb.; reeplatile lanato;
calycit villoalaalnl deolib. mbolalia abbrevialis. % — Oaulboa partibas awjor
eit quam *H. coeruU** ei *graUolatfoUm*. Caulea elongatl tlrail. Caplmla majora
el longius peduDCulaU. Folia In ipeclminlbaa auppeUnliboa bojaa ipeciel eon-
ianler reflexa funt, ID *B. graUolatfolia* erecu, lo If. *coerulem* pateolia. AD om-
nes cjudem specie! polymorphae tarleiales? — Habitat ID Brasilia lo humidis
herbosis camporum elaliorum prope Serra da Caoasira pro%inciã Mioai ticrati.
54. II. GRATIOLAKFOLIA Si, Mil. tnt*. ex Bib. I. c - Uerbacca: caulib. rreclii*,
basi ramoiis; ramis virgalis rufo-villosis; foil, partis nutneroffi* kestilib. o>*ti>
oblusis crenalis, basi cordalif rugosis rufo-pubesceaUb.; capilulis sroiigloboiis
deoae BaliiOoris; peduaeulis capilalum aequaolib.; recrptaeulo lanaio; brarteis
laoceoltlo-linearib. capliulo lubloogiorib., apice reeunis; rteepiaeulo laaalo;
eatyelb. villoststimis, deotib. subolalis, tabum aubaeqaaBtlbaa. * — A *H. eo<m-
Ua*, eoi autura, foliia et eaplialla slaiUts eet, diftrt tablu el braettis deatibaa-
qoe ealyeiala loaglorlbaa. Captiala peaei, la eorja^M lemtoalet appmlaMta.
- Hablut la canpia la plaalUe eletau eeldeauH prwrteelae Blua Geralt.
55. II. GOYAZENSIS St Hit. met. ex Bth. I. e. - Herbacea ¥. tafMeosa (T), ad-
acendeos v. erecla: ramis pills loDgis dease villoala; fall. teaalHb. evaU-elllpUfU
oblusU rrenati*, basi cordatii rugosis Tillosis; eaplialla temlgloalt dease multi-
florli; pedunculis capilulo brevlorib.; bractela llaearlb. reetia caplmlnai ac-
quaolib.; rerrpiarulo lanaio; calycib. villosaalaili, dentib. subulatis abbreviatit.
9† — Herba basi dura v. suffruiei circlter pedalia parce ramoaaa. Folia "«-l-pol-
lllearia dura cras>a_T wide rugosa, elegaalereaulala, crenataris aadalatis. Ca-
pliala fere dupio majora quam in *II. eotruUa*, floribaa laoa nifefceae dense im-
neftla. Corolla aiurca pubescens. Stamina gUbra. Differt a If. *eotrulra* r|
aflalbus foliorum forma el habiiu, a *II. er*Mtm* braetela matlds et deoiibus n-
lycinls abbreviaii. — Habitat lo Brasilia In campia prope Laage in regioae meri-
dionatl prouciac Goyai.
90. II. OVATA Pohl, Ic. Ined. ex Bib. I. e. — Caale berhaeco erecto rigido tilloso;
foil, sessilib. ovalis oblusis crtnalls, taal cordatis retievlaio-rugosissiniis, ulrinu;
tomeoloso-pubfsceniib.; capitulis semigtobosii dense multiQorii brttitrprduñ-
rulatit; rerrplaculo \iloso; bractei bail Uaceolatls calycisq. >illo>ull dea-
iib. IOIRC subUliH glabriusculis. ^ - A t f . <r<t<f* differ! foliis laioribus dfinil
bu>que rahcinis el bracteis gtaboribui longins lobulaiis. — IUbidi to Brasilia
Inter Allegres el Tnnidada prouciac Minas <ierafs.
- »7. H. CRENATA Pohl, Ic. inedil. ei Bth. I. c, W. - Herbacea: raule rwio rigido
villoao; foil. tfMilib. oblongo-ovalii obiu*n crenatis, ba>i mtundsh* , uinnq

Illos rcticnlato-rugosfe; caplnlls aemiglobosis den6o matllflorls; receptacalo lanato; bracteis basi lanceolatis, aplice longe sabulatis, calyces naperantlb.; calycis dense villosi dentib. sobalalit tillosis, to bo rix longioribus. 2]. — Specie* taldc variabilis, altitudine uepias circiler pcdali, tola pills longls patentibos et lomenlo rabigiooio magls mlnnsve obsessa. Capitalajuniora dense et mollisslme tomenlosa, adaltiora glabrora. Folia crebra, saepius valde reticulato-rugosa, crenatnris aequalibos, margine molctls. A *H. coemiea* ct affinibos bracleis longe sobulatis conslanter distingoiar. — Habitu to Brailliae protinciis Goyax, Babla, Minas Gerats et Matto grosso.

38. D. TUB5ERAEOFOLIA Mart mss. ei Btb. l. c - Snffrnticosa: ramls pabescen- tib.; foil, sabiesiilib. obloago-laoceolatls oblntig subcrenalis, basi roloadato cordatiffu, ulriog. pills adresss noIlter Tillosis, subtos pallidia; eaplInlis #0- talgloboais donao mallllorls, brerltcr pedonclatia; recpctaculo lanato; bractda lanceolate-laearb. capitolum aeqaolib.; calyela apice Tillosiimi dentib. au- bolatia tobo brofioribaa. ^ - Habitob fere *fmulat dysentrricae*. Folia mollia rogoaa, sabloa tomentoaa, aonipollicaria v. tii pollicaria. Capitula In apicl- bas ramoram aobeorymboaa, rracUfera aempollicem diametro. Braotoao aplice reenrae, demum refleiae. Calyx laoa alba Tfloiiissimos. Corolla vii ealyce lon- gior alba, labio soperiore porporeo-Bolato. Stanioa glabra. Species Inter A *cramtam* et *telutinam* media. - Habuit In Brasilia, In campis sierllibus calidit in Serro Frio prope Barbados provlnrtte Minas Gorala.

». H. A6TEBO1D&S St. Bit. niaa. a Bib. L c - CaoJlb. oreeUs almpliclb. villoalfi foLL aoatilib. orodla laaceoUUa obuiaa oreoaUa, but cordalli, nargine revolatl ragoais fiUods; eapUaila pia>WfwlaHa gtoboals ateM wUtiOoria; braetels lan- coolaio-asjMalia ojateteni •lajpiuftj ifupfmla laaalo; caJyefa apico TIIIO- aiaaiml doaUb. wbnlaHa, labo laa^aittiav % — Caoioa oosftplnrM aobpedalet. Babltat *Athnm*, aootloaJa Cofrtaf—, Folia faro *M\$^\$oUM*» ajNilat. CaptoJa B. traaaUg, aad ^ataciaao el demos ealjdal nlaaa raearrl. - Hablui la Brasilia.

BfeUafm. 000a71ALOSBU.Le.t4.

Florum capitnla ovoidea deaaa paociflora. Bractee numerosae adprcs<ac o\la- lae. Calyi luboloao-campanalalos rectos, dentibas subulatis mollissimc villosli tubo longioribas. — Saffraticea froJcesve, capiulils pedunculatis ad apices ramoroai paoculaus.

00. H. HALIMF FOLIA Mart nss. ei Bib. l. & M. - Saffrailcoia? ramls ascendea- lib. eaais; foil, sabsesailib. ovalib. oblnsis inleffrrinis, baal rotaadalils, mrija> caais; epilalia pedaacalaUs o?aUs caals, dease ploriSorls; rocoplacalo pat*; bractots otalis obtaiaaaails ctpltalaai sabaeqaaaiib.; calyds labaloal jsfff; aabalalis faollUalse rlllotla. % - Folioraai Coma at colorloilae plaouoaaajao *Atriplici* ffflJfa* Basal aabalaiplicoa, deaao folloal, vert as aploos lprirofl. «- daaeali folia bmiMr aagoraalat. CapliaU circiier 4 lla. longa, SA linoat.laia. Braotooo auaa laaaiaa, aurflao aabclhaue, lalaa aliidae. Calyi aplice »o"i«V- sjMS), baai tUbriascalas aisaifatanaimis. Corolla breviter et*eria. Acnaeolia oT0*o% doa laovk aMlda. - Bablui la Brasilia la campis aliis petrosis ad Villa do do Coat** prortaeiae Baãioaajs.

•I. & CBASSIFOUA Bart. am. et Bib. L c. - Saffraticou: ramls dease lot ^{de-} Wto-liUpidls; foB. eretjris aasallib. rolaadaUs obtasisslails, basi cordaio- ^{de-} MoleaaJI^ amargiM rtvolalls, alriaej. UftaUaalaiia; oapltalis brevlier' ^{pedun-} laiiisoaio-s>aMto4sjMtoS-IO«ltfla; rtetpucalo aado; braciela ^{lanceolatis} rapllalaai aoajaaattk alaplslHalaiii Jaatfc. oalyclals aabalalis •llloslsalaiis, ^{tubo} subaeqaalibas. % - PlaaU bataila, baal divarteata raçota. Baal aotof ^{den-} loa, _arco rasjalart. Folia Ttt soailpoltioada eraasa, pllia ^{biopidis} doaaaslamo o'aoHa, Batalla para. CapHala dlaaotro t-3 Ha. aoea* raçiea ^{brevis} 4laa«olla, Cofoflaa aiattiaae, oalas pabrseam, - Bablui la BrasftM »• ^{petrosis} ad Vina #o Bio do Coatas laiarloria aroftatIM Baãtasla.

02. H. LACUNOSA Pohl, Ic. ined. ei Bib. I. c. — Fralicoia. ramia molliler vitlosis; foil, subsessilib. oxalii oblusissimis, tii crenitii, basi cordalis rugosls, sublua rafesceulib. v. cancscenlib. lomenoso-pubeacenlib.; cipitulii pedunculalis ovalie dense pauciOorif; receplaculo nudo; braceif otalis adpressis, deolib. calyciola dimidio breviorib.; calycis villosi denlib. lubulatla molliier villoiii tubo longioribus. 6 - Rami erccii, superne subpaniculall. Folia circlier pollicaria sessilia ampleiicaulia r. bremsimc peiolata, led verosimiliier ipeciea non dlversae sunl Polla Ooralia gradalim minora arcie lefiilia. Raceml lecundi. Capilula numerose, 4-10-flore, fructifera 2-3 lio. longa, pedunculo 3-4-lineari. Corolla vli deolea ealyclnot excedcns. - HabiUl in Brasilia, ad Santa Ingraia, Villa Rica el alibi provlociae Minaa Geratt.

Seetlo DL TtldOfPIAHUA Bth. L e. »5.

Florum capliula globosa denae molUflora. Bradeae oumfrofae adpressae sn-balaiaie, capituli fructiferi In peduecutom reflexoe. Receptiaculum nudum. Calyx eempaoulatui rectos, deaUbtu Illfomlbaa molliier plomotis, lubo mulioiiet lon-floriboft. Corolla dcnllbaa ealyelalt brtvior. — SafruUeea frmieeive plrramque IOOHMMMI, capliulla numerotla |*m& poalMimUUt ampl< pattleolalla> pleramque coe-raltMmtibot.

<X 0. CRINITA Benib. 1. c. — Cattle frttleotOf rmlt eaM-to>e<Utit(MI. aab-seaallb. oblongo-ltBMoUUt acoUua<d<a Intefatiimla tvbterratlm, btll trnna-Ulis cano-iomenioala aubragotla, B<rtilb. pedmealo brerlorlb.i eaplmla giobotlt dense muliifloris; brfelefs llinearlb. anbalaUfto capllalo brevloiiib.: receplaculo nudo; oalyeit villoil denlib. flifformlb. molliier plmnotlt, tobo nulioiiet longioribus. 6 — Caulis 2-2'A-pedalis, bail lignosat. Rami divaricaii, superne adscendenies. Folia opposita ?. lernailm veiiicillaia, media pollicaria, supenora minora, floralia conformia, ommla lomenlo brtvissimo cano |. pallide rurc<cenie molliter eanescentia, subtus valde venoia, margine integerritna T. versos apicem dentibut paucis olmnque noiaia. Capltula In aplco ramorum aubpanirulaia, deniibua calychnia longissimis criniu. Bracieao caoo - pubescenlet, exienorcs sublanrrolaiaio. Calycoa campanutaii, lobo brorlaalmo, deoliboa 3 lln. elulira longis. Corollao denUboa oalyciola brovloroa, pallllo roaoo-olboo.

fi. P^ekmU: PolLmlaorib. mtfla looaeouala; eapHoUt oomorosla. - Boblui In Brasilia ad PaootHu nroflnolM Ooyoo tt ad Bofloto Yotbo oi Bio Joqol-llnbonba provlnoloo Mlnũ Gorole.

64. B. SPIRAEABPOLU Mart. moo. ex Hk. t e. f — Fratloot: mmlo OBM-IO-meiosis; foil, broviior poilolaito omnoolo-oblonfla obo?oia?o obinolt ojuoronolalia crenalia, bail caneaia, mbtof otno-lomonioola rlgtdulis; ponloola omplo; oopllolis breviter peduncualia globoala donto molUlorla; braeteia aobnloii capilulom sobaequantib.; receptcolo nudo; calycis villosi denlib. Ilifornib. molliier - plnmosis, lubo mulioiies longloribua. & * Baml loiragonl aopo nil folio irrw •oilml foriieillaii. Folia semipollfcarlo oi pollicario, caulina loferloro loio okovolo, aoperiora ol jamealia anguslioro, omnio supra rogoloao subeaei-oonllot onblua vonoao rano-pubescenlia v. tomooloto, florolia pedunculo 3-5-IU noori T. rarioii subpollicari broviora. Copllnlo versus apiooa ramolorom racemoo, racemia ample ibyraoideo-paocualia, fradiroro eircilor 0 lin. diameiro. Colyi oompanulalos, lacioiis domom fere 4 lin. loogis, molliier letoosis plumotU, corollam subsuperamibnt, Species inter E. crimtlmm el B. wudu/toram media — Habiiai in Brasilia in cample doeerlMorro Prio od Burned Jeqoiilnbonba provl. JI ciae Minas Gera*s.

W, H. MARTIUSI Bib. I. c. f - Fruticoia: ramis lenuiier lomenlosis; foil. p<|o. lads otalo-oblongis oblusis crenalis, bati rotuudaio-cunealit, supra rugulotit pubescrntib., sublus incano-tomenlosis; capilulis globosis dense mulufluris p>-duncualift paniculalis; braceis subulais capiulo tubbrevionb.; rerrpiarulo nudo'; oalycib. fruciferis clongalis, lubo inflato, denub. Olifortnib. mollurr pl<.m<>,' l<bo loogionbus. 5 - Frulei bomanae allitudims el ultra. Corolla alba dcoubut

calycinis subbrerior, limbo gracillimo sarstun campanalalo dilalalo. Ab *B. eriophylla* differi: ramis brevissime lomentosis nee dense Unalis, foliis tenoibus acutioribus, supra pubesceniibus nee villosol-analis, subtut magis incanis ei illig nois. — Habiui in Brasilit in sylvis Caiogas inier SanU Anna el Santo Antonio das Qnemadas provinciae Babieosis.

00. H. ERIOPHYLLA Pphl, Ic. ined. ex Bth.l. eQQ. — Fruticosa? ramis albo- Y. subrufo-lanatis; foil, subsessilib. oyalib. oblusis crenaiis, basi roiundalis, supra Tillosis tomentosive, sablus cano-lomeolosis ?. floccoso-lanalis; capitalis dense globosis multifloris pedancalatis panieulatia; braceis lineari-subulMis, capitulo subbreviorib.; receptaculo suboado; dentib. calycinis fliformib. moililer plumosis, tubo longioribus. M — Caules lignosi complures erecli ramosi, ramis basi foliosis, panicula demon fere pedali. Folia ramealia bipollicaria, floralia minora, omnia crassa rigida, crenataris regularibas andalatis, otrinqac tomtnto denso, toptr info, soblus pallido r. albido veslita. Paniculae rami Untto-villosissimi. Capitula 0-10 lin. diametro, in Yivo mi corollae aneibyslinea, siccitate coerulescentia.

fi. coriifolia: Minus tomenlosa. — Habitat in Brasilia ad Megaponte el SanU Lucia provociarom Goyai et Minas Gerafa.

07. II. BRACHYPHYLLA MarL mss. ei Bib. I. c. — Froticosa: foil, pttiolalis late ovalis oblusis crenaiis, basi rolandalis rugotis, atrinq. bre^iler subrufo-toroentosis; capitulis globosis dense multifloris pedunculatis paniculati*; braceis *nbulatis capitulo sobbreviorib.; receptaculo nudo; calycib. fruciiferis clongatff, tabo inflalo, dentib. Bliformib. molliler plamosiii, tabo loogioribus. — Afflnis A *eriophyllt*, sed foliis brevioribus lalioribas disiincU. — Habitat In Brasilia In campis ad Serro Frio provincla Mioas Gerait.

OB H. MULTIFLOBA Fobl, le. Ined. ei Bik. I. e. - FrfjUeott: ramis eano-tonentoala; foil, brevisslme ftttJoUtlis ovato-rotoDdatls, argiito crenaiis, sobtus albotomeniosla coriacela rlftdii; panlcuU ampllssima; eapllulis breviter peduncniatft globosis dense mullifloris; bracteis subolalis capilulum subaeqoamib.; receptaculo nudo; calycis villosi deotib. flifonnib. molliler plumosis, tubo multoicis longioribus. 6 — Ab // *Marliusi* diffirt ali // *brachyphyUa* ab // *enophylla*, foliis laioribus, ba<i rotundatis. — Habitat in Brasilia inier Rio Jequitinbonhi rt Calumbis prounciar Minas Gera?s, in »)lvis Caiingas provinciae Babiensis interiorif*

Swlio X. ZAI7II0PI0U Mart. aai. ex BUL L C. 97.

Florum capiula globosa dense multiflora. Bractee numerosae Adprvstae id*¹¹ bulatar. Calji lurbinatio-campanulatus, fructifer nenbranaceus, nrdio inflatos, or* contraclus, drniibus subolalis rigidis crectis T. paleotibut. Corollae lubus calfOt* acquans ?. sobloogior. — Uerbae procunbenlet f. difaricalar, capilulis loaft P*¹¹ diinrulalis. ^

00. H. SIDBRITIS MarL ass. ei Bib. I. c 97. f - llerbacea procuSfibeos: rt«U adsceadentib. pilosissinist foil. iaOaiis peliolalis, raaicalib. labsesslib. otaUi •calia argute sen a Us, basi rotuadaiis cordatisve ngidis, uuina> viridib. P^oi*T; bitpidis; capiulit paocis pedoacalatis globostt dense mulliOoris; briclei* lineari-sabulaiis capiialua aeqoantib.; recepUcofo nudo; calycia bispidi fructiferi tubo ajfdio mflalo sobcalloso-aoaulalo, ore contracto, dentib. 5-10 inaeqaalib. sub-UUs rigidis divaricaiis. > - Mtrba pallid* virtus, toU pilit rigidulis petanllbaa aagit sBiaotva obtessa. Caslts l*-pe4ale* tetragon!. Folia pollicaria. FHasicsjli ataqalalhcarta, raro ©ppotU. Corolla nolacea, calyca duplo longior. Calyca fructiferi priso latsjltsj fracUbos Sf*ios*4 edmwtnn** slsallet sunt, et ob denies ealyciaot aaeat 10 bate species a Martiaso at gtaus propria* habetur, Md soediaatibaa aV. Mm* H Ifmmri* a JfrpJMttf eymmoetph^Ut H aricharptiar et) — atfaraa^a aal. - Mabiui ia Brasilia in locis bi««# inundatis inter Japera H Capa* at circa praotlia prop* talgado Is daatrio provinciae Minas Gerafa.

70. *H. LODATA* St. Hil. mss. ex Bib. I. c. t — Herbacea procumbens, piloso-pubescentis: Toll. peliolalis lale ovalis acullis linualo-lobalii crenalii, bail cordalis, ulrinq. viridib.; capilulis longe pedunculaiii globosis dense mulliflorU; braceii •ubulaiii capitulum subaequanlib.; recepiaculo nudo; calycib. breviter hispidis, fructiferis inflalo-laKcniformib., ore contracto redo truncato, denlib. 5-0 subaeqoalib. subulatis rigidis pubescenlib., lubo brevioribus. 3]. — Caulci elongali, ad nodoa inferiores sacpe radicantes, pilis brevibus subviscosis pubescentes, angulii oblusis. Folia fere *Allhaeae hirsutae*, Ooralia sessiiora peduoculo mullo breviora. Bractea 2 eitcriores a capitulo saepius parum dislanles, omnia uli denies caly-clni pilis brcubus subglandulosis hispido-pubescentes, ct apice inlerdum bamulosa. Capitula florifera 4-5 lin. diameiro, frudifera duplo majora. Calyces fruciiferi membranacei, prope basin valde Inflali, superne elongali, fauce inlus snbvillosa, dentibus saepe sex erecto-patenltbus. Acbaenia oblonga nigra, sub lenle tenuiier rugulosa. Corolla coerulea. Odor foelidus. — llabilal in Brasilia in pascuis prope San Joie provinciae Sancti Pauli.

71. *H. LAGENARIA* St. Hil. mis. ex Bib. I. c. 08. - llerbacea: ramis ascendentib. glabriusculis; foil. peliolaUs ovalis aeuminalis aculit duplicato-dentali», ba*i rolundalis viridib. pubescenlib.) capilulis pedunculalls paniculalis subglobosis dense muliiOoris; receptacolo nudo; braeteis subulalis eapilulum subaequaniib.; calycii fruciiferl glabri lubo Inflalo lageoiforml, ore Irancale subobliqno, denlib. •ubulatis glabris, lubo brevloribus. 2} — Folia *H. tpicim** v. *B. wmkwrn**. Capitula *H. lobatae*, sed ninora. Calyces plerumque 5-denUllr exteriores ore obllquo, fructifcri yalde Inflatl, aed mlnores quam in *H. lobata*. Bractea denlesque calycini apice saepe bamulosl. — Habitat in Brasilia.

Sectlo XI. CEPALOPTIS Bth. 1. e. 98.

Florum capitula scmiglobosa v. dfroum globoita dense multidora. Bractrae numerosac adpressae ovatae lanceolalac linear?* v. rarius subulaiac. Uecfpiaculum glabrum v. rarius vil|o«um. Calyx campanulatus v. lubulosus rfcclus jflaber pubesceos y. villosa-hispidui nec lanatus, denlibus subulalis v. baii lancrolalis, rarius brevissimis oblusis. Corolla calycem breviter superans. — Uerbae suffruiccs\c, capitulit aiillaribus pedunculatis v. subsessilibus.

]. *I. Gnidia9folia*§ Bth. I. e. — Folia parva (ntegrirtma, baH cordata, margin* rceofvla. Capitula fructifita globo\$sa villosa. BraeUa* ova-fa* v. tonceofafa*.

72. *H. IMBRICATA* Pobl, Ic. loed. ex Bib. I. c. 08. f - Ramis eredia v. adsc^o-denlib. virgalis pilosis; foil. sessMlb. ereciia, cauil adpressls laibricaila toneoola* lla acutis iDicgerrirais, margine revolulis cillatis, baal dilaUlo-cordatia, aihog. glabris; capilulis dense globosis muliifloris; peduncolis folio aubreviorib.; braeteis ovatis aculis rigidit, capitulo sublongiorib.; calycis casnpanutaii bupidi (ba«i glabri) denlib. subulatis villosis, demum subpatentibus. 2]. — Herba perennls, basi •ablignoa procumbens. Kami circiler pedalea lubtimplicet, ul io *Gmidit* foltis •reclis adpressis oranino obiecli. Capitula 1-3 versus apices r«moratn, rarinkime opposiu, fraciifera bracieis reflexis globosa, semipollicem diametro. Recrpuculum glabrum. Pedunculus crassus, 2-4 lin. longus pilosissimos. Bractea margine pilosae. Calyx basi valde aitenuaius glaber membraoaceus, dentibus lobom fere aequantibus purporascenlibus. Corolla vix denies calycinis superaot, eitus pubescent, lubo cilrino compressiasculo, lisabi laciniis 2 superioribus roseis laterahbus lla\esceniibus, inBma roaea. Acbaeioa oblonga pallida laevia - Ma^l bital io Brasilia, inter Aldega Carelao do Pedro terceiro et Crixas p^oro^ciae Gojai, in campis ad Riabao el prope Pe do Morro deserti Serro Fho prottnaiac Minas Gcrats.

73. *H. DITASSOIDKS* Mart. mil. ex Bib. I. c. 00. - Kuffrulicosa: ramis t.llotit-foil. SMSilib. parvis crebris patemib. ovatis oblu<i>>imis inteffermmis, margine revolulis, basi cordala ampleiicaulib., supra bullatis glaliernmu, »iitnu< un in pl_?lls villosis; capitulis dense globons muliilluris bmi>ime pedunrulat; bracin

lanceolatis villosis, calycis basi glabrusculi elongali dentib subulatis villosissimi — mis 2}. — Habilus ommno *Penaeae* v, lesleMarlio, *Dittutae* Folia Jim longa. Capiiula demum polhcem diametro, plcrumque solitana subterminalia Receptaculum pilosissimum Corolla *U imbricatae* — Habiial in Brasilia, in adscensu Serra de Itacubé in Serro Frio proviociae Minas Gerafs

§ 2 *Latandulaccae* Bth. l. c. 00. — *Folta ban angustata integer-tma, aptce subdentata. LapUula frucUfera globosa villosa. Bractee lanceolatae v. Uneares.*

74 II LINARIOIDES Pohl, Ic ined ex Bth I. c 00 — Suffrulico<a ramu ereclis sirtctin elatis subcanescenlib, foil tesslib lincarib subinlegemmis, basi angustaiis lenuissime cano-pubescentib.; capiiulis subglobosis dense multiiflons longe pedunculalis, bractea lanceolalis albo-tomentosis, extenorib rapilulum subsuperanlib, receptaculo subnado, calycis villosi denlib subulati* creciis molliter viUomslms, tobam sabaequaiitibus % — Affinis *U strctunmae*, a qua non differl nisi capiiulis majonbus villosionibus, bracieis lalionbus el deniibus calycmis longionbus, a // *denttfolta* foliis brevionbas el deniibus calycmis subulalis dis-tinrta esl — Habitat in Brasilia, ad Coromba provlnciae Goyat, in cimpis Serro I-no proinciue Minas GeraSs et prope Aldea dAllo dos Boys inter Minas Novas.

75 II STRIFTISSIMA Pohl, Iron ined e\ Bib I c. — Suffrulicosa nmis erectis Alnclis elans, broiler adpresse pube^centib, foil sessilib lincarib subinlegem-m»s, basi angustaiis tenaissime cano-pubescentib, capitulis subRloboM* dense mulliflons longe pedunculalis, bracieis lineanb, eilerionb capilulum sub.icquanlib, receplaculo nudo, calycis tubuloso-campanulati >illosi denlib subulatis crectis, lubo dfniidio brenonbas. % — Habitat in Brasilia ID summiate monlium (bapada do Serro San Marcos dicta ad Cabesseira do Ribeirao Batalba provmciae Goyax.

76 U DBN6IFOLIA Pohl, Ic lee*, ti Bth. I. C 100. — Soffroticosa ramis creciis breviiier adpretae pabcteralib.; foil. a«Millb. oblongis iniegerrimis v. apke denticulatis, basi anguslails vtaosla glabnascolls v. ieouisiime tomenoso-pube!>-reniib, capilolls globosls dense mullifloris longe pedunculate, braclei* lanceolatis, extenorib capitulo longiorib obtusis, receptaculo nudo, cihris tubuloso-CAMPnnulail ^illo<i dentib subulali^ erectis tubo multo brcMonbuk I|. Habitus // *Imnnouhs*, a jjua folns lalionbus differ! — Habitat in Bn*ilia, id san Marcos pro>inrne dotaz, in rampn prope Sahara protmciae Minj* dcra«s

77 II UHOMItfHHIA Pohl, Ic ined ex Blh I c - (aule prorumbenie pubetrcnie foil »es»ilib o«alib, apice denlalis, basi rotundaio-runratiH, ulnnq. gUbnusruui^ capitulis lonye pedunculatis subglobosis dense multiflom, bracteis lanceolaim obusis capitulum aequanlib, rereptaculo nudo, calycis lubulosi vil-lo<i denlib subulalis erectis, lubo dimidio brevioribu^ 2|. — Habitat in **Drasilia**, ad Engenho prope Sao Seba»tiao proviociae (loyai

§). *Pedunculotae* Blh l. c, 100. — *Capituta hngr plunnilata se-mighbnsa. Bractee subulatai. Calyces giabn \ pubaccntedervf bus subulals*

7* II TETRM.OM Pnhl, Ic ioed ei Blh I c - (lule rrrrlo glabriusculo, angulis aculis pube^centib, foil breviiier |»rh>lali« o*»lib ohiusi« rrrnati«> basi angustatK rugo»is, supra «cabridi<, sublu* ruhifinn*o-|»iib<*«rrtitib prdunCUH. elongatis, infenonb ramo»is capilulis »ubglo0o»is drn<r mulliorM bract*** ubuUtu cahrr« aequanlih calyris lubulono-rampanulalii «ub«illo»i drnlib F*** ee<laio-iubolalii» ngidit glabnu«culis ^ - I aub« Haiu« ngidu^ cra«u<, ang<» talde prooiineotibu* Folia caolina remnta, forroa rt muftmiuduir 1/ confer** floraha parva laneoolala Peduncull Inferioret 4-5- pollirarri v rami caulW •pin- rapuula 9-0 gerenies, superiors vix pollicare« Denir* calynni bre%e« — lhabitai in Bra*ilia, ad Rngenbo dot Boy* provmciae (>o)<i

70 H Mtl TIBRACTEATA Bemb I r 100 el 7li llerbarea, glabra v **superno** pubetctns, nodis pilosis foil broiler petiolalia ovatls aruninalis serratis, **basi**

rolundalis v. in peliolum allenualo-decurrentib. villosissimis rugosis; pedunculis tomentos, capitulo semigloboso dense multiifloro longiorib.; bracleis numerosissimis linearib. subradialib., capitulo sublongiorib.; calycis glabriuculi denlib. abbrevialis lanceolato-linearib. rigidis. % — Affinis *H. lantanaefoliae*, a qua differit foliis peliolalis et bracleis omnibus lineari-subulalis. Folia 1 — 1'A — pollicaria. Calyces fructiferi valde clongali, basi inflati. — Habitat in Brasilia, in provincia Bahiensi ineriore, ad Rio Janeiro, ad vias prope Pedras provinciae Rio Janeiro et in aqualicis orientalibus et in sylvis caeduis ad Ilajuru provinciae Minas Geraes.

- §. 4. *Latibracteatae* Bth. I. c. 101. — *Capitula semiglobosa. Bracteae late ovatae. Calyces glabri v. pubescentes, dentibus subulatis.*
80. II. PETIOLAHIS Pohl, Ic. ined. ex Blh. I. c. 101. - Herbacea caecula: Caule glabrusculo, angulis scabro-hispidis; Toll, longe peliolalis late ovalis aculis duplicalo-serratis glabris v. supra scabro-hispidis; capilulis longe pedunculalis subglobosis, dense multiifloris; bracleis ovalis aculis venosum ciliaris subglabris, eapilulum aequantiibus.; calycis glabruscoli denlib. lanceolato-subulalis rigidis, lubum aequantiibus. — Habitat in Brasilia ad Aldega Maria provinciae Goyai.
81. U. LANTANAEPOLIA Poll Ann. mo*. Par. VII. 406. L 20. fig. I. - Blh. I. c. f - Herbacea villosa: foil, subsessilib. ovalis oblongisve serraio-crenalis, basi angustalis rugosis, subius tomeolosis; eapilulis globosis dense multifloris longe pedunculalis; bracleis ovalis aenmioafis, eileriorib. lalissimis, calyce sublongiorib.; recepiaculo villosa; calycis basi pubescens denlib. lanceolato-subulatis aculis rigidis subspinosis. Q — Caulis basi repens radicans. Rami adscendentes, magis minusve pubescentes, apice saepe dense lotnenlo canescenle villosi. Folia 1-1', - pollicaria, aculiuscula, supra pubescenlia v. hispida, subius tomento canescenlo v. rufescente dense villosa. Pedunculi 2-3-pollicares. Bractea exleriorcs Idlac adpressae concavae, rxius lomenlosae, intus pubescentes. Calycis denies partim inaequales, drimum saepe subpatentes, lubus fructifer parum aculus. Faux iniu« annulo pilorum brevium munila. Corolla calyce vix longior alba, labio superior© maculis purpureis lcvier punctaio. Genllalia breviter exserta. — Habitat In America aequinoctiali, In aridis Montis Cocollar Novae Aodalusiae, in Panama, NOVA Hispania, insulis Trinltaeis et Porto Rico, in Brasilia in berbidis ad Rio Teffo provinciae Rio Negro, teens flnviam Amaionum alitque lools.
82. II. ATRORUBENS Poll I. e. 480. f L 87. fig. 3. - Blh. I. e, - Caule reptante, basi radicante; ramis adscendeoib. piloso-pubescentib.; foil, peliolalis ovalis crenalis, basi rotundalo-cunealis, supra hispidulis, subius pallida glabrit pillosisve; capilulis pedunculalis globosis dense multifloris; bracleis late ovatis membranaceis venosis capitulo vix breviorib.; calycis membranacei tubulosi truncati denlib. subulalis stricis. ^ — Undique pills longis albidis palentibus v. vcrsm apicem caulis adprssi> magis minusve hirsula. Caules basi purpurascenles, rami elongali. Folia pollicaria, subius pallida. Capitula fructifera semipollicem diametro, pedunculis pollinaribus cl ultra. Bractea exteriores obusae, interiores aubulalo-acuminatae, uii pedunculi et interdum calyces rubescenles. Cil>cis faux inter denies margine ciliaria. Corolla alba, lubo compresso superne dilatato, laciniis 2 suprvmi* punctis minulis roseis irroratis, laieralibus rrflexis. Infima oblonga pallide fusca, exlus pubescente. Filamenta interne pubescentia. Antherae (lavo-fuscae. — I/, *procumbent* Schleichd. Linnaea V. 101. — Habitat in Americae aequinoctialis umbrosis et locis olim cullis in Mexico ad Hacienda do la Mnguna, in insulis Maninica, Sancii Dominic!, Trinilaiis, Sancii Vincenlii, in Ca)cnna; in sylvis ad Para, Maranbao, Bahia.
- §. 5. *Marrubiastrae* Bth. I. c. 102—*Capitula demum globota. Bracteae lineares. Calyces campanulati, basi membranacei glabri, iuperne saepius villosi, dentibus lanceolato-subulatis. Folia magis minunc sinuatn.*
83. H. MOLLIS Pohl, Ic ined. vx lith. I. c. f - Hrbarea rufo-tilln*a: foil, breviter peliolalis ovalis obliuis irregulariter serraio-crenatis, basi rotundalis cuneatis

lit fubcordalisve, utriusq. pilis rugis adpressis molliter villosis; pedoculis villosis capitulo subgloboso dense multioribus aequalibus; bracteis lanceolatis-linearibus. oblongis capitulum aequantibus; receptaculo piloso; calycis campanulati ore villosissimo, dentibus lauceolatis-tubulosis, tubo brevioribus. ^ — Caule circiter bipedales, parum ramosi, uti folia et capitula pilis articulatis rostellibus rufescentibus dense velut. Folia 1-1 1/2-pollicaria mollia rugosa, subtus venosa, margine non simpliciter crenata, saepius subsinuata, crenaturis acutiusculis, floralia in ore. Capitula pauca, ad apices caulium lobisideo-paniculata, sub anthesi haemisphaerica, fructifera globosa. Pili receptaculi caulinis similes, Calyx membraceus, basi attenuatus glaber, superne villosissimus, dentibus brevibus aculis erectis. — Habitat in Brasilia ad Santa Cruci ad Joao Dias et inter Capao et Alfres Milicbar provinciae Minas Geraes.

84. H. MARECIBASTRA Pohl, Ic. ined. ex Bth. l. c. 102. — Herbacifera: caule erecto rufopubescente; foliis, breviter petiolatis late ovalibus irregulariter denatis subsinuatis, basi rotundatis-cordatis, utrinque villonibus; pedunculis tilingis capitulo tubuloso dense multioribus longioribus; bracteis oblongo-linearibus acutis capitulo longioribus; calycis membranacei flabrisculi dentibus subulatis villosis, tubo longioribus. — Affirmo // *angutotae* et *Simula**, sed petiolis brevibus, foliis villosis minoribus. — Habitat in Brasilia ad Ouro Preto provinciae (Joao Dias) verum in Ilohabamba Peninsularum.

85. H. AXGLOSA Schott m. 9. ei Blh. l. c. 102. — Herbacea: caule erecto superne multifloro; foliis, petiolatis ovalibus acutis subulatis linearibus v. irregulariter flabrisculis lobatis, basi rotundatis-truncatis, topa sparse, subulatis ad nervos villosis v. deorsum glabris; pedunculis villosis capitulo subgloboso dense multifloro bracteis laevibus v. oblongo-linearibus. — Habitat in Brasilia ad Ouro Preto provinciae (Joao Dias) verum in Ilohabamba Peninsularum.

86. H. SIMPLI I'DM. Ir. inrd. Blh. l. c. 101. — Herbacifera: caule rufopubescente; foliis, petiolatis linearibus acutis tubulosis villosis; pedunculis glabris capitulum multiflorum aequantibus; bracteis lanceolatis-linearibus. — Habitat in Brasilia ad Santa Cruci provinciae Minas Geraes, ad rivulum (Joao Dias) verum in Ilohabamba Peninsularum.

§ 0. *Otuimaf Blh. l. r. HM. — CapUula tirmum globota. Bracteis lanceolatis. Calycis lobulati v. campanulati, pott anthesi saepius 9-bracteis, dentibus tubulatis glabris.*

87. H. LAPPACRA Brnh. l. e. 1011 et 711. — Herbacifera: ramis glabris; petiolis linearibus; lobis lanceolatis-linearibus acutis; pedunculis tubulosis; calycis lobulatis linearibus acutis; lobis lanceolatis-linearibus acutis; lobis lanceolatis-linearibus acutis; lobis lanceolatis-linearibus acutis.

U. *bracteis rigidis subulatis-linearibus. — J. hirsuta: Capitulis plerisque axillaribus.*

breviter pedunculatis. [^] — Caulis erectus, angulis u e -
 pius pubescentibus, in faciebus demum glabratis. Folia 1-3-pollicana, utrinque
 angustata, serratis acutius valde inaequalibus, Junior* cano-xillosa, omnium ve-
 nae subteralde prominentes. Capitula pauca, in apice ramorum glomerata,
 ••••• pana 2-3-jugis eulem remota Braciaceae hupidulae. Calyces breviter pubes-
 centes, dondibus glaberrimi* Corolla calycem \ueiccdens alba, labio superior*
 purpurascens. Goniata tuberculata - Habitat in Brasilia in provincia Enire
 Rios, in partu humidu a San Jose provinciae Rio Grande id Sania Borja
 Missioni Fruruayen Mn.

88. H. IMOLLICKATA Bih. I. r. 10J. t. - Herbacea erecta glabra v. leniuiler pu-
 bescent; foil, setislib. elhpiiris lanceolate aculis sfrrials, ba«i cordatis; pe-
 dunculus capitulo temigloboso den*e mulufloro lonRionb.; bra«li*ii laic lancr-
 lam aruiis rapiulolum longe saperaniib.; receptaculo nudo, cal)cib. rampaQualalit
 pubescenitib, denitib. subulalit lubum aequanlibui. [^] - Species .iffinit // capi-
 latat, radtatiae elr, ted foil It el bract nt diaUncliaaina. tolia n. irrida, 3-^ -> ol-
 licaHa, saepe ternaiim veriicillau, alrinque |abra v. juniora pubescenitii Ca-
 pilula ad apicem caulis longiuteole pedoncvlala, frucefera circiirr pollirrm
 dlameiro. Uraciae foliaceae, bati dilaUiae, 8-10 lift, loogae. Calyces fere //
 loppaceae. — Habitat in Mexico ad Saliepee.
80. H. LAPPIL-ACKA Marl. mis. at Bth. I. c. 101. - Rerbacea adactadtoa glabra
 v. pubescent foil, pciioitttts obloo|o-ovalit acutls aerralia, bail euntaUa v. an-
 gustatis, pedunculis capitulo semi|oboso denie multifloro longiorib. i bracteit
 lanceolatis v. hnearib. rapiulolum aequantib.; calycis fruceferi eanpaDulall den-
 lib. subulatis rigidin glabrum tubo longionbus. % — Folia fere // eapitatae, sed
 minus meita Cnpilula II. lappaceae. A // brettpede differl prdunculit tnplo
 lon^ionbus. — ILililat in Bramlia in k)haticis udm umbrotis prope (auaraniin-
 guilu proMMfino Sanrli P. iuli el ad viam publicam Paulinam pro«inriac Rio Janeiro.
- W. RAMOSv >uM, |c incid ex Bth. I. c. - Krerta glabra. foil, prtioilatit oblong.»-
 ovatis inc«i%o»erraii» v. irregulariter tinuato-dentalu, bail inu*gmttnt« cuneatt
 v. angustatii, pedunculit capiuulo dense nulliQoro l<ngionb.; bracleit lanceulaIn-
 lincanb. obiusis capitulum nuperanlib ; caljcla lubuloto - campanulati drntili.
 lanceolato-subulatis ngidis, tubo brevionbus. 2l. — HabiUl in Brasilia ad Faieada
 Allegres provinciae Minas Geraet.
01. II. INAUOBNA Bib. I. e. - Herbacea ereeu glabra: foil, fubseeellb. lale otails
 oblusiusculis crenalis, basl cuneatio-aoguaUILT; captialis pa«cit longe p+ffaacu-
 lalis globosis dense multiflois; bracieU lanceolaUs obiusis capUulnai aequanUb.;
 recrpuculo nudo; cal>cib. glabris lubulosis, deniib. lanceolato-sobulalU tubo
 brevionbus.^. - A // captitataidiffer!glabnlie, foliis mafissetlililubulalioribus, el
 denlibus rah rims basi lanreolatis. Plaota inelegant, babilu CompoMiarum l>r-
 bmmu alfinuiin. - Hlaliat in Brasilia in camp it ad Rio Doce.
02. II. CAPITA TA Jarq Icon plant ranor. I. I. 144. - Bth. I. c. "f - Herbacea erecla
 glabruscula, foil, pettolaiis ohlongo-otaltis inciso-terralis, basi intefemnm
 euneatis v. angufttatit, uinnq. glabris • pilit raris bitpidulis; pedunculit capitulo
 gtoboso dente nullifloro longmnb ; bracieis otalo-lanceolalis v. lioearib capiuulo
 fruceifero breviorib ; receptaculo nudo, calycis fruceferi elongali tubulo»i trun-
 cad deniib subulatis slnelis lubo demum bretionbus. [^] — Herba 8-3-pedalu
 •aepisfrime glabra. Caules obtuse letragom. Folia inferior* saepe ultra 3 poll!
 longa. Peduncult 2-3-pollicares. Capilula fructifera valde aucia, pollirem dia!
 welro. Bracieac caljerm aequantes v. paullo superantet, ted in capitulu frur-
 lifero in pedunculum reflciae, a cal)cibus ^alde auctm fere occulUue sum (a.
 lyses fere consumer glabn membranacei, deniibui tubo demum tnplo bretionbut.
 Arhaema uii in tpccKbut afflmbut oblong* obtu»a subcompretta mgrea laena
Sidenhi clc. Sloan. Nat hiM. Jam I 174 I. 100 fig 2 - <1%*opadmm ~~rugosum~~
 Linn. *»pec plant. 822. — (hnpodmm *raptlalum* Km Prodr fl Ind occid ~~m~~ —
 U»pU\$ eapitata Poil. Inn mu» Par. \ II 464 I 27 f 1 - Habitat m Amr.ra
 aequinocitali, in Mctico in dumctis apncit ad Hacienda dc la Llaguna, ad Panama ,

in insula Jamaica, et alibi in India occidentali), occumli eiam in insula Manilla venximihiter ei America allia

03 II BREVIPE* PoiL Ann. mus. Par. \ II. 405. — Bih. I. c. 105. - Caule ban glabriusculo, fuperne pube«cenle, foil, peiolalu ovalo-oblongis lanceolalisve acotis trregulanier terrain, basi angutlalat, supra hispidulii, *ublus >. ranus ulnoq. glabnuşculis, peduocalu capiuulo globoto deo»e multifloro brctionb. v >u loo* giorib. bracteis lanceolalo-lineanb. aculif capiuulam fubsupcranhb, ealjcu po~ bvtcenlit Iruncati denlib. ereciit lobulalis fitncut, lubo ftublongtonbut % — Caulit ereclot ictragonut tulcalos, aoguli pilis adpresti* pubesrentet demuBi glabrali. Folia bt-lripolhcara, nonrl paginae inferiorit »aepe bi<pidi Pedoooli tempolliearet. Capilala nagniludine *Cerast.* Bradeae nuroeroftiuimae, 10-lenore* tubulalae caljctque pilit brevibas paiulis rihato-piibe<rentes Corolla* •it calyce loogioaret. - *U. giotoferm* P. W. Me)er, Primit flor E»»rqu J07 •t') - * acute Beolh. in Liooaea VI ftL

0. glabnor: Deolib. caljcinn rigidionb oblu»ionbu< — *II radtaia* II. B. fclb* Nov. geo. el tp. pi. II. 318. — Cretcil per loiam fere Americam aequinoclitlem et in Manilla.

01 II Gaidichaini Benlb. in liooaea VI 77. el Labial gen el »pec. 100. - llerbjrea suberecta glabra v. lenuittime pubesfens foil peiolalais o%am» acalil irreculanier rerrato - rrenati« tubincitisve, ba«i rolundah« euneatin v nupremii anguslan», tupra hi%piduli»i sublut glabnutculit. prdunculis npiulo globoto dense multifloro tubbrevionb.; braeleit laoceolatii capiuulum »ubaequantib : ca* Ijcit tubembraoacei tubuloti denlib. Imeanb. crecii< lubo mulioiie« bre«ionbui« ^ — Habitat el folia If. capitate*, ted moor. Capilula eiam fructifera u& ultra 5 lin. dianetro. Denies coljeloi brttloret, bosl approiinai et latiore*. — HabiUt in Bratilia la h«rt>Mlo od Rio Jaotiro.

«S. R. LAMCEOLATA Poir. Diet. Soppl IIL 114. - Blh. I. c. — Glabnutcala: foil. pHolaiit obloogo-laacoololis Itoeaiibutve, alriog. aogmtaiii remote »erraiti bati integerrioiit; pedooolit capiuulo globoto dooae noltiQoro brovionb.; bracteit eiiorib. obloogo-lanceolalit oblotiotcolit, capiuulo Inngmnb.; raUn« glabnu«-ruli fructifen eloogali Iruncali dentib »ubulati« «tnr(i«, lubo broionbun 4 — lhbilu% // *lanctirfohat*, ird ab bac et a // *radtata* differ! (iraeripur < jlm) (rue* lif.ro mrmbranuceo, a*» trunratn, dentibus subulaii« mmimo ftpmo«i%, a // *brt-nyrdt* glabrilie el foln« longionbut frequenter 4-''>-polln anbm. a // *eaptl**** fojn%ani;uviioribii«el rjpiluli«dimidiominonbu«. « // *Uaud%fkau* foln« eloogali* el d«*ntibu« eal)rioi« «ubolali« rredit — Habitat in Brjolia ad Maranbao.

« II IOXJFOLIA Pobl, le. ined ei Bib I c CJUIC erecto pubetceote. *Ml* priiolati* oblongo-lanreolatift acanioatit irregulartr d.nuu*. ba«i angUftUliif tupra elabn«, »ublat «illotoli«. peduocolu rapilulo drnte muliilinro longiorib. brarin% hntjnb rapiialua toperaolib ; ealjri* iubulo»o-rjmanulaii de»*iD. tubuliti« lullii longionhu* % — Specie* m a *H lacusln* ditlinria tideiof. — HabiUi in Bra«ilia ad Rio Trabirat rt in Herra San l-eln prminriae Gojai. . .

•7 H LAM hlfefOLIt fccbuio ettbono kongl |lan<l |»|en*k HrUk Afbandl h.* * — Rik L c t - Oule berbaceo pobetceote. foil brenirr peiolan« o l»»»» * *'' reoi«iig actltmtcali* gro%«e terrolit, ba%i angu*utit intrcrrrimM hispidulit. pa-dunrulu npiulo globoto dent* nullifloro brr>ionb. brarin% Ijnrrrolalit ^{oDl} v s rapiiulum %>ibaquanub. raljnt o»ati %ubinOati denub laiur>lain»ubuU»» ri-gidift errriiv % l^ali* batl prorombeot adtreoilrn*. iibiu»e tpirj«onu», ^{u0} [^J; pubtectftt. Folia ', -3 poll looga, tupra irauuer hi»pidula %ubcu« punciol«>>> nemt bUpidit, toraha conormia Pedaoruli rrmoti hi%pidn-%illo>l R ⁿ e»e pubete^ntM, calyre lonfero looitore*, rrucciiferum iubar«|uanie« t*al>cet ^:ll - pube%rrntex, ore arqtali. *Utter* inlui oada, dealiba* bati lanerolalit erteⁱ rtiⁱ e. di« tubuUo-BacronatM, t«b« froclifro brmonbu* Corolla ral)COOt *!• e»e

*1) *Floribus capitatis*, ptJmmrmio mt*m>d4o muUohri brmort; hrmel'' loner oia-
las calycem fructiferum mfr*U%***, f*i*is ©f«Mw, MirtofiM mcum»*utis.

dent. - Habitat in Africa aequinoctialt vtroi hnl llller ex America allata in paludibus Gambiae prope Albuda.

- tt. H. LACUSTRIS SL. lil. mi*, ei Bib. I. c. 107. - Glabra: foil. poiio lalls obtongo-lanceolatif Y. inflmis otalia acuminalii irregulariler lerralo-crenalis, basi aogustatis, mring. glabris; pedunculis capitulo gioboso dense multifloro longtorib.; bracteis lanceolaii« oblusis capiiulum aubaequanlib.; calycis fruciiferi membra-ace* labulosi deolib linearib. tubo brctiorib.. aupremo lallori. * - Habitus H. Ismttotofar, «?d pedunculi loogiores (circiler pollicares), el ab omnibus affini bai differ! dentibus calyciois, quorum superiores longion* suol, el Ideo baeo tpecles «d sccliouem IHmgioiu approiimalur. — Habital in Brasilia in aquatlcif prope Lorona, Pendamoohongaba o4c. protinciae Sancti Pauli in humidii props lacum da« Concbat provneiao Rio Grande do Sul.
- »• H. IOMALOPHYLLA Pobl, lo. iaed. ex Bla. I. c. - Bamif rufo-birsulii; foil, breviiar petulaiia oblongU v. obloafo-lanceoiaUi obtuni, ba»i runfaii* aniu-ftlavisvo creoailli rtgotit villoaiat eapilolla brvtvtaimo pedoorulalif »rmigkbn»i< dense muliifloris; bracteia lanceolatis ealycem aeqnantib.; ealyaa lomenio<i fructifcri elongatl baii I nil all deniib. brovlaaimla lanceolaUt aeatis. % — AfBom II. hirtuH, aed calyclbua el inflortaeonlia ad base MCltonem referenda. Caulet numeroal, 1-IVi-pedalet. Capiiula per anhetin bemltpluerica, deproase, frucufera ealycibua valde elongaUa ffarf) globoaa. Corolla* albao, pnrpwtwfnwoiaiaii. Acbaenia aub lenle puocuio-ragoaa. — HablUi in Brasilia in oaapta tlajvalla proTincise Minaa Gera*s vnlgarii, ad Villa Eftea ejuadem provineiae.
-]. 7. *Brachyodontet' Btk* f. c. 107. — *CapUula \$emiglobo\$a, demnm tix globosa. Bractcae ovatae v. lanceolatae. Catycu campanula^, dentibus abbreviate watt's obtusis.*

100. II. OBTYSIFLORA Presl mss. ei Bib. I. c. — Suffrulicosa?: ramt* adpretsa pubckrenub.; foil. poiioUl it o\alit v. oblongo-lanceolalia oblu»iu»rulu enenatis, basi angukialis, ulring. bispidulis v. drmm glabralia; pedunrulis capitulo sub-•iloboso dense muliQoro bre«iorib.; bracieia ovalia srlialis rapiiutum aequaolib.; caljcit campanulali deniib. abbreviativ ovalia oblusis. % — p||| ramorua jumnim ei foliorum paginae inferioria rufeseuil Folia ioferiora ovaU el basi in poiioium longa angualata, auprema angusio lancooUu. Floruai eapktia 4-5 Im. diameiro, Junlora deprtaaa, deaum fero globosa. Caljoot pttbeseontta. CorolUo vix ealycem eieedenua. — HablUl la Poruvla In MaaHe U«an«eo,
101. II. PARKERI Bib. I. c. 108. - Caulo superae pobotoente; foil Mtalllb. oblongo-ellipiici« v. oblongo-lieoarib. aculls ffrosae aerratla, baal ang«aUUa nertoia glabriusculis; pedunrulis folio longiorib.; eaplmlia globosis dense multifloris; braciicii lanrcolalo-linrarib. obtusis capitulo aublongionb.; ealyrf< glabn rampanulali dentil), ovalis abbrwiatis obluiaa tubpatenlibua. 2} — Cauhs hrrbicrui, basi glabr, suprrne uti prdonmli adpretge pubescent. Folia pollirrn looga, 3-4 lineas laia. Pcduncoli 1-2 poll, longi. Acbaenia triqvetra Uuncau laetia. — Habitat in America meridional! ad Demrrara.

\$.8. *Xylodontes Bik. I. c. 108. — Capitula temiglobosa. Bractcae lanceolatae t. lintartt, apice subulatae v. acutiiima*. Calyces comptmulati, dentibus basi lanceolalis subulalis rigidis glabrii, plerumqui *ub\$pinosU.*

102. II. RAHIATA Willd. Spec. plantar. III. 84. - Poil. Ann. Mus. Paris. VII. 460. t 27. fig. 2. - Bib. I. c. - Glabra berbacea. foil, prliolalis ovato-lancrolsin acuminalis crenaii«v, basi cuncalis v. angustali*; rapNulis gtnboits dfntr mulifloris peduncubiik, bracieis obtongo-lanceolalio obtusis capitulo longiorib.; calyris campanulali drntib. lanceolalo-subulatis arutis rigidis tubipinotis. %. — Canles 1-2-pedales erecti ramosi, acuir irtragom. Folia 1-3-polltcarta. utringoo aarpiu« angusiaia srd obiuaia rl oblu«r irrregulariirr crriu. cimnta utrmque glabra, prliolo subdilataio. Capitula remotr »ubracrmoia liraru-av glabra* n«-merosar, .-Uciorf* lafpr apicc drniicuUaa. Cs»i fruciifrr parom rtungaiat,

deotibas tabo brevioribot. Arfinii *B. anguslifoliae* el *U. eapitalae*, a priore gla-
britie, foliis etc. differt, a posteriore calyce non troncato et deniibus basi lanceo-
lalis nee iibulatis. — *Gimopodium rugotum* Lion. Spec, plant. 822 (ei Carolina).
— Dill. Bort. Elib. I. 88. t 75. f. 80. — Habitu in Americae borealis regione me-
ridionali, in Carolina, in Alabama, Novo Aureliano et Louisiana et ad Hacienda
de la Llagna.

103. II. RLBIGNOSA Bentb. I. c. — Saffroticoia: ramia diTaricalis rubiginoso-lo-
mentosus; foil, breviter petiolata oralo-oblongis obtusissimis serrato-crenalis,
basi enneatis; capilulis temigloboais denae multifloris brevissime pedunculatis;
bracteis eiteriorib. late ovalis capilolan aobsuperantib.; calyris villosi denlibi-
suberectis lanceolato-aubalalia ligidis. 2]. — Suffructi 2-2'/i-pfdalii. Ran-
elongaii brachiati ramoai sublereles, tomenlo bravi rubiginosi. Folia 1', poll'
longa, 0-0 lin. lata, aapra tenniler pubeacenia, sublus lomentosa, uinque rugosa,
nil lou planu rabiginota. Pedunculi m peliolo longiores. Caly* rampanulaiuif
dentibae tobtplneteenlibut tubo brevioribus. Corolla alba, punciis purpureis no-
Uta. Ovarii lobi a pice pilosi. RecepUculum tillosum. — Habitat in Brasilia \$d
Caretao provinciae Goyai in campii inter flum. San Francisco el Rio dai Velbai
ci in Serro Frio provinciae Minas Gerafs el in aummilale moniis Uorro do Hondo
Velbe inter Minas .Novas.

1M. II. LITESCENS Pohl, Ic. ined. ei Bib. I. c. 100. - llerbacea procumbens? ru-
biginoso-villosa: foil, breviter petiolatif o?alit obtntls frrraio-crcnaliti, bail cn-
Deatif, aopra icabridif, subloi nifo-pabeiceniib.; capiluht temiglobosii denie-
multifloris brevissime pedunculatis; bracleis ovalo-lanceolalif capiulum subie-
uperantib.; calycit glabriufcoli deolib. aubereelia lanceolalo-subulalis rigidi* tu-
bam subaequanlibot. % — Aflalt *H. rwarffrsiof* % aed vii cum ea conjungenda
erii, major tat, ca«lia daaa» rafo-tHloaaa, folia majora laliora, aopra srabra, raro
tilloaa, capilola aujora aaagiaqot aeaallia, plemrnoe glabiora, bractee nume-
roaioara, lailorea, deotet ealycinl losfiorea. — Uabilai in Brasilia ad Megaponle
prorioeiac Goyai la campis ad Villa da Campanba et alibi prorincia Minas Gc-
raes et in eampla aiccia ad Santo Aalonio das Quemadai provinciae Bahivnsis.

105. II. AFFIMS Blh. I. e. — Erccta? rufo-lomentosa: foil, brviiicr pciola(i« ova-
lis oblu«iu\$culi«, basi anguslali« rugosis; capilulis trmiglobnsis drn^r mullifloritf
<di]ti*riorib. subpaniculatis; prdunculis copilulo subbreviorib.; brarlrir ovalia
anii^ cafiilulum subarqoaniib.; calycis rampanulaio-villo*i dfnlih. lanceolato-
subulatis rigidis, apirr glabratis. % — AfGm« // *rubigimotae*, >rd differt caulo
errcliore, foliu aculmnbu, rugo«ionbu, tomrnto drn«iorr rufo-villosi»- Pedao-
culi peiolo demum duplo tnplove longioret. ~ Habitat in Prruvia.

106. II. KF.RR'IGNOSA Pohl. Ic. ined. ei Blh. I. c. - Ad%cendrn dense niblgl;
no%o-tomrnin%j: foil, b ret Her petiolatis rolundalis obiusiMimm crenalis, sa«
irunrjt., -.l.rordaUsre crassissinia rugosif, sopra hi»pidi». subtus tomenlois;
capnuh« trmiglobosis drnte noluOoris. tnfcriohb. pedunrularis, suprrmU soo-
aessihb.; braeieis etlononb. ovalif acaiis. raljce brcnorib.; ralyr.s villoii, uea-
Jb. «abeTeclis la«ceojalo-sobolalis ngidis. 4 - ." *rubif**—* «nim.. soi rau-
!»• ertMio., t.bdior. lota magis loa**nio«a, prarTrtlm folia late ovala r rotunday,
rratsissiaia ot drn«« wbigioota. Capiiola pauca, soprema tarpr •tt* "P*V\|
fructifrra tmipolhrsd diamrtro. Pedanculi ioBroi »rmip«ll'^m longi. ***
•omerotir, «dpr««ae, on caljcti fmngiuro-v.llotae. lialynt drnIM_101 o nre-
viores. Acbaema stjgra oblonga. aplice lenler hinpida. - llabiiai «n Brasm.
Bio Pillocaa protioeiae Gojat.

107. H. LIT.IOA Pohl. Ic. lodd. « Bill. I. e. - Frulicota glabra : foil. ••bJ«J upra
o«jhb. ara(i««colit. «it deolaiu, basi ••eato-rolondaiu. coriareis r**
Incidit. %ubivt vroosis. toralib. capitolvsn aeqooub.; rapiloh* o*o1del**
aaiiglobosis 4ens« moluloHt; bfocleu laajerolatis ngiJt* capnluua
oolfeis villosi d«aitb. taoolalo-s«b«Uii« rifidis glabnoscalis. 6 "
Brasilia ad ttrra Chryataia provinciao Goyat.

108. H. PROTEOIDES Su Hil. mss. ei Blh. I. c 110. - Frulicosa? erecU rigida: ramis brevier rufo-loinenlosis; foil, brevissime peUolalis late ovalis oblois crenatif, basi rolundalo-subcordalis corisceis rigidis, supra lucidis, sabtus ad yenas pubesceniib; capiiulis paucis subcorymbosis pedunculalis semigiobosts, dense moltiflom; bracie.s lanceolalis, apice dent.bq. c.lycinis subulalis rigidis glabr.s lucidis, 6 - Folia I-IV,-pollicana. Pedunculi vii pollicares. Capitula pollkem dlametro habenl, purpurasceniia. Corollae vii denies calycinos excedeoies, eitus villosissimae. — llabiial in Brasilia.
109. H. CORDATA Pohl, Ic. Ined. ei Bib. I. c. - Herbacea rufo-villosa: foil, sob sessilib. ov.io-rotund an s obtusissims crenalis, basl rotundato-subcordalls rufoils, supra scabro-hispidis, sublus ad nenros rufo-villosis; capilulu pedunculalls sftniglobosis dense moll Moris; bracieis lanceolalis integernmis capilulum aequantib.; calycis glabrioscvli denlib. lanceolalo-subulalis suberectis ngtdis, tubum subaequanlibus. If* — UablUi In Brasilia ad Arrayul Trabiras provm-ciae Goyai.
110. H. REMOTA Pobl, Ic. Ined. ei Bib. 1. e. lia — Herbacea elaiia broiler rufo-villosa: roll, brevier pellolatls lato ovaia obtosissimis crenalis, basi roiundaio-caneatis rogosis, supra scabrldls, sublus ad nenros rofo-villosis; capilulis peduncu-lalis semiglobosis dense muliflorls sobprolifeHs; bracieis ovalis ialegenireis aculis capilulum aequanllb.; oalyels basi tillosl denlib. laneolalo-eabulaile svb-erpcils rigidis glabrsl, tubum subaequanlibus. ^ — *B. cordmim** valde aflsils el forsán mcra varieus, sed folia omnla peiolala et angosliora, ol planu tola gla-brlor elatior. — Uabitai In Brasilia ad Paracala in Senra Santa Isabel pro%inciae Mioas Graes.
111. H. VIIXOSA Pobl, Ic. ined. ex Blh. 1. c. — Herbacea? dense mfo-Yilloia: foil. ses»ilib. rolundaiis obiusissimis crenalis, basi roiundalo-rordalis cra^«issimi« ru-gosis, supra scabro-hispidis, sublus rofo-villosis; capilulis semiglobosis den^o mulufloris pedunculalis; braclris etlrrriorib. lale ovalis foliaceis drntaiis, cal>cem superanlib.; calycis villosi denlib. freclis rigidis glabriuscolis etljrr sublonRio-ribus. H — Caulis bipedalis, uli pedunculi erassos rigidos n tillis pairniilms ruffs dense obtetsus. Bracieae dense inibricauo, etlerioros villosissimae. con-suner danUculaiao. - fl. rHUmUU Pohl, Ic inod. lloa diitrl alal ca«l« bumillore, rolils nagls roUculaio^rofosis, tl capiulU ma|orib«a. — BaBIUI In Brasilia ad Olbo d'Agos provtoclao Goyai ei /I. ad Padroello provtaelao lIteaa Gtraf s.
- VL H. ORBICULATA Pobl, Ic load.« Blh. I. e. III. - BtrbaoeaT rafo-villosa: foil, icssilib. rolundaiis obiuslsslsls, basl roiaodato-oordaUs rasjoala, sopra seabro-bispidis, sublus pubescenlib.; capilulis sessilib. snbflobosl dense aulliOorit. bracieis ovaio-lanccolaiis inlegerrinis capilulum aequanlib.; calyeis glabrioscotl denlib. lanceolato-^ubuUiK erclis rigidis lubo longioribus. 2l — Habiui io Bra-silia in summiiaic monlium Cbapado do Senra San Marcos diclorum provia-ciar Goyai.
113. II. MGRKSCENS Pohl, Ic. ined. ei Bib. I. c - Herbaceea, procombens? ni-grescens pubescens: foil, sessilib. ovalis obiusis crenalis, basi cordatis, uinnq. scabris, sublus lacunoso-rugosl, ad nervos pubescenlib. | capilulis paucis br-rvissime pedunculalis semiglobosis dense% muliinnris; bracieis tilerionb. ovails obiusis rugosis capiuo breviorib., iolerionb. lanceolalis oblnsis, capilulo loo-glorib.; calycis villosi deoiib. subereclis lanceolaio-subulalis rigidis. % — Habi-tat in Brasilia inler Rio Corumba el Rio San Marcos provinciae Goyat.
114. H. COMPLICATA SL HF I mss. ei Bib. I. c - FruUcoss: ramis longe sfriffo-pilosis; foil, rrebris s<>ssilib. lale rolundaiis obiusis nubcrenatis, bask rordaiol amplexicaulib. complicau* rigidis, supra tcbriusculis, sublus Uc'unoio-veootu'; capiuuliH paucis »ub<cssilib. seiniglobosis dense mulufloris; bracej* laorrolaiii aculis capilulum aequanlib.; cal)en basi pilosi denlib. lancroUin-tubulaht ns:i-dis, demum *ubrecurvo-palcnlibus. ^ ~ llabiiu* II. rotundtfohnt. »ed Mi,* ^Z aUctissima. Rami el bam foliorum Una longa nencea *. subtecania oblectu.

Folia caelerum rufa glabra Y. subtas brcfissime pabesceniia, 4-5 tin. longa, subimbricaia. Capilula pauca, secus ramo* axillana. — Ilabilai in Brasilia in campis prope Sabarà provinciae Minas Geraès.

115. II. ROTU>DlfrOLIA Bib. I. c. — Caule fruticoso tomenloso-villoso; foil, petiolatis ovalo-rotundalis erenalis, basi rolundalis rugosissimis rigidis seabris, ulnnq. subvillosis, capitulis semigloboais dense nulliQons pcdunculaiis, sopremis fasiigialis; braceis lineanb. calyce longionb.; calycis basi villosissimi denub. lanceolalo-subulalis rigidis, demum subrecurvo-paleifiibus. 6 — Fruiculus 1-2'/i-pedalis ramosissimus, dense foliosus, ram is sinatis tomenlosis. Folia saepe ternaum quaiernaimve verlicillata, tempollicana v. vix pollicana, subtus nems talde prominentibas, basi rolundala, petiolo 2-3 lin. longo. lapituli ad apices ramorum disposilt, vix piao majora. Corolla vix calyce longior. — Habitat in Brasilia in rapibua ad San Joao del Rey provinciae Goyax, in regione meridionali provinciae Minas Geraès el prope monlem Morro d'Andaio dictum inter Minas Novas. *

- 116 II MONTICOLA Mart mss ex Bib. I. e. — Fruticosa ramis rubiginoso-viHots, foil, parvis petiolatis ovatis obiusis crenatu, basi cuneails conaceis, »upra scabnusculis, subtus reticulalis rufo-pubesceotib., peduncuhs folium subacqaantib ngidi), capitulis semiglobosis dense multiiflons, braceis lanceolatis rigidis capitulum aequantib., cal)cis tubulosi ba»i ullosi denlib. abbrmalis hnccolali* ngidi* 5 — Frutex 5-6-pedalis ramosissimas, ramis supenonbus (rcquenlius cor)mbose-fastigialis, habitu *II. rolundifoltae* Folia plcrumque semipullicana, petiolo 2-lineari. Capitula fructifera semtpollicem diamelro, mfcriora remoia, supenora versus apices ramormm numerosa, subpamculaia Denies calycini bujus sectionis brevissimi lah, demnm aobrecarvi Corolla carnea pubescens Ovani lobi glabri. — Habitat in Brasilia in arenosis nontosis inter Villa Rica ft Santo Antonio de CAM BUUK«v Villa Rica provinciae Minas Geraes el Serra Negra •d llmltee provinciaroai Mioas Q«ra«a et Rio de Janeiro

- 117 H. TRICBPHALA 8L Bil. mss. ei Btb. I. c IIS. — Suffhthitica ramis virgali< villosis; foil, petiolatis ovaio-elllpticis obtusis crenaix, basi cunralo-roiundaiis coriacels, supra scabris, saptus nifo-pubesccniib, pedunculx folium arquaniib.; rapiiulis tfemiglobosis dense mulunons, bracteis lanrcolalis riKidi< capiulun anjuanlib, cal)uu tubulosi ulloti denlib lanreolals rigidis glabri*, lubo parun brr>ioribu« "4 -r (.baractenbus 1/ *monhcolae* affinM, urd caulibu< Hongalk 2'i-3 -prdalibu* parum ramom*. foln* majonbuv lonjrionbui, cl drniibuf ralycinit longionbus di»liocla esl. — Ilabilai in Brasilia ad Serra da Caraca provinciae Mina» dPracs

- IIS II MIMKKTA Pobl, Ic. ined ex Biñ. I. c. — Frrria Haia rubiginoso-tomeato«a foil petiolatit ovato-tllipticis obtotit erenalis. ba«i cunfati* rugosis, ^{sapt} »ctbrtt_t tublut mbigino»o-loaientofis, capnult pfdunrulaii« magms ^{emiglobos} s» d«*»r multiOoris, bracteis ovalis iniegerrinii fohacn* villo«l«, ^{capitulum} aub«uperanlib, calyris villoai denlib lanrfolaio-tobulaii* ngidit »ubpaie«lib* glabrit, lubo tublungiohbot ^ — Suffrulet 4-prdali« rt alior Folia numeroMt 3-4-pollicana, ba«i longe angotlala ei poiiu* otilongo- qaam ovaio-efhptiC* Capitola dtnura frre pollicem diamvlo, paaca, vrr«u« apirr« ramorum tubcoryav" boia Braeita? cra««iu»tulai», MIU« rufae. l>rollai« «illo«i««imar, alfaf, •P'«e TO%9»* — Habitat in Brasilia ad Ponlffritf pronneiae Go^ai, in campi* ad ^{aquat} prope Formigao el fontrnd« provioriae Mina« («rrsf«

- »• H ALI'TMFA Pohl, If inH fi Bid. I r - llrrbacea fr*rla v ^{adscendens} b«Milla villota foil •ub»eMlhb ovalib. oblotit rrenaiit. ha%a runratis ^{rugosis} supra scabro-Bitpidis, subins villotis. rapiluht longe prdoncolaiis maf»U ^{•e} B3i«pbarrici«, drote maluaons. braceis rapiiulum •operaolib lancrol*^{•^} **V riunh biiorib villosit. CJlyci* villoti deolib lanrrolaio-tubulatic ^{rt:igi§ f^ij} lubum wbaequaaiibvt. ^ - llecba vit »e»ipedalis. habiia *Miod**'* [•] biui ^{M.} Folia bi»*llicarta, t^rtwa saep« val4« approaltiata H qoati verticilUWt ^{Capitula} ta 'tola proata«oi.b«« kiaf ida. P«4uc«li r«>dt, folia i«b»op«raoie^

pollccm diametro habenU Corolla carnea. — HabiUt la Brasilia ad Arrayul Tra-
biras proviociae Goyax, IQ campis deserti Serro Frio el prope Uberara provinciae
Miaas Geraes.

180. II. FERRUGINEA Bib. I. c. 113. — Erecla rufo-tomenlosa: Toll, subsessilib.
oblongis serrato-crenalis, basi cuneatis rugosis; eapilulis globosis dense multi-
floris subpaniculatis, pedunculis capitulo longioribus; bracteis ovalis aculis capi-
tuluro subaequalibus; calycis campanulati denlib. lanceolato-subulatis rigidis. %
— Caulis erecius erases rigidus, obtuse tetragonus. Folia 2-3-pollicaria, supra
breviter rufo-pubescentia, subtus tomento denso ferrugineo villosa. Pedunculi
pollicares v. paulo longiores, versus apices ramorum numerosi. Capitula fere
H. lappaceae, sed bracteeae laeviores, dense villosae. - Habital in Nova Hispania.

HI. H. XANTHIOCEPHALA Marl. tuss. ex Bib. I. c. - Herbacea? erecla v. adscen-
dens glaberrima: foliis breviter petiolatis ovalis crenatis, basi rotundato-cuneatis
conatis, utrinque glaberrimis, supra nitidis; pedunculis rigidis compressis folio
longioribus; eapilulis semiglobosis dense multilocis; bracteis ovalo-lanceolatis
rigidis, eximie cuneatis subserratis; calycis basi lanatis denlib. lanceolato-subu-
latis rigidis glabris. 2l. — Species [ex aequalitate unice distinctissima videtur
C. (seequipollicaria) nitida el pedunculis versus apicem compressis subula-
tis. Capitula magnitudine H. tonferta* ei ferrugi*—*. Calyx basi pilis longis
compressis mollibus lanatus. — Habitat in Brasilia in campis regionis adamanum
provinciae Minas Geraes.

12L II. ANOMALA Bib. I. c. — Ramis lomentoso-pubescentibus; foliis ovatis
obtusis crenatis, basi rotundatis euneatisve rugosis, subtus lomentosis; eapilulis
semiglobosis dense multifloris, breviter pedunculatis in apice ramorum subpani-
culatis, bracteis ovalis aculis calyces subaequalibus; calycis campanulati denlib.
basi ovalis rigide subulato-angulatis. 2l. — In specimenibus supradictis folia
ramalia saepe alterna, raro fleuosa. Caulis erecius videtur, plunpedaliter, ob-
tuse tetragonus. Folia lesquipollicaria, supra lenissime pubescentia, subtus
tomentosa, ovata parva, supra minima. Capitula magnitudine Elephantopus
cabrt. Bracteeae tomentosae, nervis rigidis notatae. Calyces villosi corolla vix
breviter. Genitalia subaequalia. — Habital in Brasilia meridionali.

10. H. CAESPITOSA 8L Hit. mss. ei Bib. J. c. - Caulis b. numerosis erectis rufo-
pilosus; foliis sessilib. ovalis obtusiusculis grosse el inaequaliter serratis, basi ro-
tundatis v. angustatis, tonalibus subaequalibus oertosis glabris eapilulis semi-
globosis dense multilobis longe pedunculatis; bracteis laevibus capitulum su-
perantibus; calycis campanulati villosi denlib. basi ovalis rigide subulato-angulatis.
% — Caules complures subsimplices subpedales tetragonales, pilis longis
patentibus rufis v. purpurascensibus dense vestiti. Folia pollicaria v. magna
obovata glabra v. pilis raris villosa, denlibus remotis paucis inaequalibus.
Capitula pauca, ad apices ramorum subcorymbosa, pedunculis erectis rigidis.
Bracteeae pubescentes nervosae rigidae. Corollae dentibus calycibus breviores
carneae. — Habitat in Brasilia, in dumetis el pascuis eiaratis provinciae Sancti
Pauli.

BecUo HI. POLTDS8MU Bth. L. c. 114.

Florum capitula sessilia subsessilia v. raris longiuscule pedunculata numerosa
in racemos paniculato-ramosos v. raris simplices disposita densa, nunc multiora
depressa v. irregulariter subglobosa, nunc ovoidea pauciora. Bracteeae numero-
se adpressae ovatae lanceolatae v. raris lineares. Calyx fructifer nunc in lobum cy-
lindricum, apice truncatum auctus, denlibus seuceis kirtis %. raris obolm-
nunc (in ipecibus nonnullis eapilulis ovoideis) lobuloso-campanulatus, denlibus
anccolatus aculis. Corollae lobus saepe cuneatus. — Uerbae suffruticosae plif-
rumque multiflorae

1M. II. \KsTITA Blh. I. c. III — Caule fruticoso, ramis floccoso-tomentosis, foliis
petiolatis rotundatis obtusis v. vix acuminatis raris crenatis, basi truncatis cor-
oatis rugosis, utrinque villosis, eapilulis compressis, verticillatis approximatis

racemosis; racemis pauculalul; bracteis adpressis* ovatis Unceouliro oblutis, calicem aequantibus, calycis fructifera inflato-lubulone glabrati ore truncato, dentibus obsolete, fauce lobis nuda. \$ — Fructus plunpedalis Rami obtuse tetragonales, lomento floccato rufo-albido testiti. Folia 2-3-pollicaria, saepius laeviora quam longa, late duphcalo-crenata eratta, subtui nervosa, utrinque tomentis rufescente subvelutino vettita. Pannicula femipedalis et ultra Folia flora haec parva, tupe-nora bracteaeformia, oti bracteaefloret taepe tuperantia < alycet per antbeim brevet campanulas, eilut lomenloti, florigen elongati, bractien tuperantet, *ub-glabri, irrostersim rugosi, ban tubinflaii, ad ot coniracu, dentibus brevissimis oblutis v. subnullis Corolla coerulea glabra, tubo m eiterlo, lobis lubo aequalibus Geitalia eiserta. Acaecia elongata tubcompressa glabra laevia — Ab inchois Brauliac dicitur *Errm dt Santa Anna, Erva do Pape rt Berbena* et vul-Derana babelur. — Habitat in Bratilia, ad Allegret in Serro Krio pronnciae Mi* •at Gera«a, in provincit Sancti Pauli, in miMiombut inter Kio Ibicuby et SanU Borja et prope San Joao del Bey et alibi io Bratilia inlenore

lii H DLPLICATO-DE^TATA Pohl, Ic. med. ei Bib I c - Frutiro«a ramii tubtomenlotis, foil petiolatit ovatit oblongatit eroto-erenali», ban rotuodatit cunfatii>e, supra srabns, tublut cano-lomenlotit, capitubs sesvilib . verticill*** tn< .lppronmaais ra«ciculato>raremotit, racenit paniculatu, brartem adpre>ti> lanreolaiis oblu«i» rra«\$is tomentotit, cal)cet »ub«uprrantib., ralyri« fructife^ infiaio-tubulosi %illo^i ore Iruocato, drntib brevib inaequalib ob«oleti«ve 5 " Folia arudnra quam in // *restla*, ban minime cnrdata el oilnui lomento^a, p*~mrula minor %implicior Fasciculi io ractmis naglt approtimati — *ft rtreteeni* Pobl, Ic. inrd — Habitat in Bratilia ad Trabitrat protineiae Goyat, ad Bio Jequitmbonba d alibi to provincia Mtnat Gerae*.

1» II ALTBAKAEFOLIA Pobl, Ic latd. ei Bib. I. c. 113. — FraUcota ramit Ooc-ee«o-iom«ilotia; foil, pttlolatla lat« ovalia oblaiaacalla eroto-erenatii, batl trvnealo-cordata nngott, otrioq. tomentotit; eapitulia tertilib; tertiellatuit approtimata fateieulato-racemotit; racenit panicolatit; braclelt adpret«t« lan-eeolatit crattit tonentotit calicem tuperatib; ealyrit fructiferi inflato-lubulotit glabrati ore nbtotele v. irrregulariler deniato, fauce intu* nuda ^ Affinis // r«#-utae rt *duphralo-dentatae* Bracteaefloret conttanler lanreolaiar Folia utrinquo brr«iirr C4no-iomrnlo«a, nee villota ul in // *resfita*, nrc ba*i roiundatn-cunraia rl %upn «irrnlu ul in // *duplicate-dentata* 4o oranrj rju«drm %prcivi ^arie-tatr« v lr«lr Pnhlio trrar %prnrj* — Habitat in Brasilia ad Fairnda Vieyra * in pa«rui« h'linidi* prope Um dat Vorte« provinnciar Vmat Grrat*«

Ul II B4RB4TA srhrank in Drnkrtrhrft bol (,r>rl»rhfl Rcgrrn»b II At — Bib. I c — Mule frutiroto. raro* loneoto>i«. foil priolaii« lair ovaii« acuminati* innso-drolaiit, bati truocatit rrattii rugotic, ulrinq niollis»ime nllotit, r^J^i* lulit tertilib., vertinlattHt lant approitnalif tubraeemom. racenit panlCtiW* tM. bracieit otaiit acmu calyces aeqoatib . calyci% tomrnto»i canpaottlali ore truocalo. drnlib »ubul»IU Mrecti* to bo arquahba* :- - Habitus // t0sl%0, *** tomeajlajaB OM>IIIU«, IO pagina infertore foliorum albidun tubtenceum C.»it^{ee} •ortferi ooMiajo diver«i, **4 rraelifcn noo viti - Habitat io Brasilia

I*. H. OBVALLATA hprenq n«t ft Bib I. c - i aule fruticoto; rain* lonenio-tis, foil brvtiler priolaht ovatit acuiatrolit etoto-crenah*. ban r runc * ll jr ^ i dalit rratsis mgo«i»nmi«, uinnq loneolom rapituli* »e««ilib . terttellW ditnoclit fatcieoUto-rarrnotis, racenit panniculatis br>ctri« numero»i« o. l. K lanevolaiit acau« adpre«m caljc» doplo inplote longionb . calyci* ***^ ^ tmt)cal«, 4tAiiib ftubulalit »Inclis, lubo «ubacqualibu% %% - Afflms // r#fl ^{ee} bmrkmUs A prton dfferl calyc« H foliorun forma, a If *barbmlm tohit* •cttIDI, J.. ti« ft lofloretetMia Floraoi fatcicaji IS-90-flon H ulira. bracieit ^ ^ ^ laa ^ ni« rugotit toaAMtoait MOt* tenipollicartbus obdueti Bacenuh ^ r * * 0 pollicare*. Paoicala anpU «ald« raawa. Caljcet tuperne dilaiiah. C. r. M. la ~ p. e. i ««tc«t)t, t«d# br^iUr titerto Arkwia . . . ? - la Brasilia prope A«eg* •4 Bio J«s«U*o4j«t>»a protinciat (iojaa ~~habitat~~.

ISO. H. CARPLMFOMA Bib. I. c. — Caule fralicoio; ramis rufo-villosis; foil, sessilib. ovaio-rotundatis oblusis acuminatisve deniatis, bail cordalii coriaceis, supra glabriusculis, subtus venoso-rugosis lomentosis, demum glabralis; capUults •ess.lib.; verlicillasris approximatis disiinclis fasciculalo-racemosis; racemis paniculatis; bracteis adpressis ovato-lanceolatis acuminatis, calyces superanlib.; calycis fructiferi lubulosi glabri ore truncato ciliato, dentib. fubulalis sriclis lubo aubaequalibus. 6 - Fruiri 3-5-pedalis, habilu praecedentum. Kami duri eras*!, obiue leiragoni, lomento brevi el pilift longioribus laxis vestili. Folia pollicaria T. vix wtquipollicaria, supra rugulo*a saepe lucida, subtu* tenosissima, Jubiora lomenio laio albido tesiila, aduiora glabrata. Panicla parce ramosa. Racemi 2-3-pollicares crassi. Bracieae subviolascenles, exlciores longo acuminatae. Corolla coerulea, eitus pobesceni, calyce subtriplo longior. Achaema oblonga, apico abrupt* acuminata glabra laetia. Odor forlis aromaiiru*.

fi. pilosa: Folia glabra; caul« rtmisq. paieolim pilosis. — Habitat in Brasilia, in caropis el collibui alecit provinciae Minai tierae* vulgaris, intrr Minas Novas, in proviocia Goyai, ad Cochabamba Pervvianorum?

130. II. AQUATICA Pohl, Ic. Ined. ei Bib. I. c 116. — Fratkota: ramii patrnlim pilosis; foil, subsessilib. ovalo-oblongli obloaiotcullt dettlalia, basl cordalis coriaceis, supra glabriuculis, subius venoso-rngosls leviur lomtsilosis, denum glabralis; capiulis sessilib.; verUeltlatrIt approiimatis disUnciit fatcieulaio-racemosis; race mis subpaniculais; bractelt adpreaia ovalo-laneeolaUa subolalo-acuminais, calyces superanlib.; caiyels frucUrerl tubulosl ore truncato ciliato, deniib. subulalis ioaequalib. itrectis. 6 — A 17. *earpinifolia* differ! foliis angns-lioribus subpeliolalis, caule palcnlim piloso, bracleii longioribus. — Ilabilal in Brasilia ad Rio da Praia provinciac Minas Gerafi.

131. II. ARIOA Si. Iiil. mss. ei Blh. I. c. t — Ramis rreclit \irgalit palcnlim ptlo-sis; foil, scssilib. ovalo-lanceolalis aculis serralis, basi roiundalo-cordatin glabris, supra scabris, floralib. late cordiformib.; capiulis seissilib.; vrrticilla\tris aequalib. inlerrupte racemosis; racemis simplicib. v. subpaniculais; bractris otalis oblusiusculis coloralis caljcem subaequanlib.; calycis lubulosi drnlib. hncar&b. inaequalib. tubo brevioribus. ^? — Caules 8-3-pedalei, parun ramo»l. Racemus plerunque simples, capiulis Wi dlsUocUs. VerUclllaairi semipollicem dinianea. Folia floralia veriicillasiruB tl& auptraaUa. Bracieae gtabiiuucuUe glandulosae, utl calycaa aordldt nibrao, tjsitriorta raHns vircMaotaa follacae. Receptiaculum glabrum. Calyx fnieHfer elongates membraaaeeo-figidos Ytootoa glabr v. ore brevisslme ciliatus, denes superiors dimldio iobo loogiores, inferiores saepius pa rum breviores. Corolla pailide purpurea, calyce parum longior. Genitalia excrta. Stamina inferiora bine pilosa. Achaenia otoideo-compressa laevia. — Affinisi // *riolareae*, sed foliis minus scabris, magis cordalis, verticillasris minime socundis dilTere videtur. — HabiUt In Brasilia, in paludibus exsiccalis in deserlis mcrdionalibus provinciae Goyai.

134. U. VIOLACEA Pohl, Ic. ined. ex Blh. I. c. - Ramis ereclis tirgalis, apice villosis, demure glabralis; foil, subsessilib. ovalo-tomenlosis ovalisve acutia duplicalo-serralis, basi roiundalis v. inflmis cordalis, ulrinq. scaberrinis viridib. coriacci*; capiulis subseasilib.; verlicillasris secundis ioterrupte racenoais; racemis abbretialis simplicib. v. subpaniculais; bracteis adprestis ovalis aculiuirulii membranaceis coloralis, calyces subxoperanlib.; calycis lubuloti glabhuictli denlib. subulalis. 2f — Ilabilal in Brasilia ad Trabiras provincial Goyat.

133. II. GLOMKRATA Marl, ex Schrank in Sjll. plant, soc. Ratiib. II. W. ~ inh. I. c. 117. - Ramis lenuiter pubescenlib.; foil, breviter pciolali* »e«»ijl,utve ovalo-oblongis lanceolalisve acuiiuKCulis strati<, basi rotundatii, oiring. pubn-centib.; capiulis subsessilib. ovoideo-globokis paucifloris; vrrticilla«tri« intrrrupie racfmosj*; racemi» elongali* snbpaniculalis; bracteis ovaii» aculis ral)rcs duplo superanlib.; caljcis lubuloti glabriusculi denlib. lanceolate arutit tubo tubtriplo brevionbus. ^.? - Caulis berbaccus? adseendens, obtute teUagonu*, »scpiua

parparascem. Folia vlx pollicaria subrugosa, floralia inferiora conformia, superiora gradatim minora, suprema bracteaeformia. Verticillastri inferiores fere pollicem remoti. Race mi elongali term males, saepe ultra pedales, lateralibus dimidio brevioribus. Capitula aaepe 3-4 in eodem verticillasiro, 6-20-flora. Bractee plerumque coloratae, margine ciliae, dense imbricatae. Calycis faux inlus nota. Corolla vix calycem excedens, extus pubescens. Achaema oblonga laevia nitida. — *U. oppositi/lora* Schrank io Denkichr. der Rgnsbrg. bot. Gesellchaf II. 52. — Habitat in Brasilia ad Para, td Congo Santa Rita provinciae Goyaz, ad Baritisaes in deserlo el ad Allegres provinciae Minas Gerats.

134. B. PAUCIFLORA Pohl, Ic. ined. ex Bth. 1. c. - Herbacea pubescens- foil, petiolatis ovatis obtosiusculis serratis, basi rotundatis cordatis, supra molliter hirsutis, subtus glabrusculis aabcanescentib.; capitulis ovoideo-globosis paucifloris pedunculata racemosis; racemis elongatis laxis; bracteis late ovatis membranaceis sabcoloratis, calyce longiorib.; calycis tubulosi membranacci glabrusculi dentib. lanceolatis aculis, tubo duplo brevioribm. 2} — Folia fere // *pec-Unatae*. Capitula *H glomeratae*, sed minora pauciflora pedunculata. — Habitat in Brasilia ad Megaponle, Santa Crut et Corallino provinciae Gojaz.

135. H. FOLIOSA St. Hil. mss. ex Bth. I. c. — Frolicosa? ramis adscendentib. rufo-villosis; Toll, breviter petiolatis late ovatis obtusis crenatis, basi rotundatis cordatis, utrinq. vmdib. mucido-pubescentib. villosis; capitulis ovoideis paucifloris, breviter pedunculatis late racemosis; racemis subsecundis foliosis subpaniculatis; bracteis ovato-lanceolatis vmdib. calyces superantib, calycis tubulosi dentib. lanceolatis erectis aculis. % — Caules 1-2-pedales, nil racemi dense foliosi. Folia inferiora 1-9-pollicaria, floralia capitulum aequantia. Racemi pauciflori. Capitula *H. petr*—9, sed viridia. Bractee aobmembranaceae venosae, exiua viscido-pabete—t—, calycis emnino obiegMtea. Achaema oblonga laevia nitida. — [Ubital io Brasilia.

130. H. PETRAEA St Hil. mss. ex Bth. I. c. * Fruticosa: ramis erectis tomentosis; foH. petiolatis ovatis obtusis crenatis, basi cuneatis rugosn, utrinq. molliter tubrufo-tomentosis; capitulis ovoideis paucifloris breviter pedunculatis in race mam brevem densum approximatis; bracteis ovato-lanceolatis aculis coloratu, calycem superantib; calycis tubulosi glabrusculi dentib. lanceolatis erectis. t> — Fruticulus gracilis, basi denudatus. Racemus 1-2-pollicaris subsecundus. Bractee ft calyces rubicundae glandulosae. Achaema oblonga laevia pallida. — Habitat in Brasilia, in petrosis prope Taioba in deserto occidentali provincial Minas Gerats.

117 H. SIBROTANDA Pohl, Ic. ined ex Bth I c. 1H. - Fruticosa- ramis erectis virgatis tenoiter pubescentib.; foil, parvis sessilib ovali-rotundis obtusis crenatis* basi late rotundatis rigidis coriaceis venosis, utrinq. vmdib. scabrusculis, floralibus, rufis: capitula ovoideis paucifloris racemosis; racemis subsimplicibus; bracteis coloratis lanceolatis acutiusculis eiliatis, calycem superantib.; calycis fructu iobuloai ore inaequali ciliato, vultu dentato. 6 Habitat in Brasilia, ad Ponlefette provinciae Goyai.

138. H. LYTHROIDES Pohl, Ic. ined. ex Bth. I. c. - Fruticosa- ramis erectis virgatis pubescentibus; foil, parvis sessilib. ovalibus obtusis crenatis, basi late rotundatis rigidis coriaceis venosis, utrinq. vmdib. scabrusculis subrotundis pubescentibus. capitulis ovoideis paucifloris racemosis; racemis simplicibus; bracteis lanceolatis acutiusculis coloratis pubescentibus, calycem superantibus. calycis tubuloso-campaulali ore inaequali, denis. subulalis? — Habitat in Brasilia, ad Faienda Agua Fria provinciae Goyai.

130 II PARVIFOLIA Pohl, Ic. ined. ex Bth. I. c. - Fruticosa- ramis erectis virgatis tenoiter pubescentibus; foil, parvis sessilib. ovalibus obtusis crenatis, basi late rotundatis rigidis coriaceis venosis, utrinq. vmdib. scabrusculis subrotundis pubescentibus. capitulis ovoideis paucifloris racemosis; racemis simplicibus; bracteis lanceolatis acutiusculis coloratis pubescentibus, calycem superantibus. calycis tubuloso-campaulali ore inaequali, denis. subulalis? — Habitat in Brasilia, ad Faienda Agua Fria provinciae Goyai.

- caulis fructiferi lobulosis ore truncato ciliato, vix denudato. 6 — A. f. *tubrotunda* differit foliis angustioribus in petiolum brevem angustatis, bracteae longioribus, capitulis paucifloris — Habitat in Brasilia, ad Megapontis provinciae Goyax.
140. II. RIBH, l. h. > DA Pohl, Ic. med. ex Bñ. I. c. f — Ramis glaberrimis, angustis scabris, foliis petiolatis lanceolatis, bracteae acuminatae duplicatae-serratae, basi cuneato-rotundatis, supra scabris, subulso leviter ad nervos lomentos; capitulis ovoideis paucifloris bracteae pedunculatae racemosis; racemum paniculato-racemosum, bracteis lanceolatis coloratis, calyce duplo longioribus, calycis lobulosis ore truncato, denudatis. selacteis »Inclusum lobum bubaequantibus. 6 - Tota planta saepe purpurascit. Caules 1',-2'-. pedales erecti. Folia 1',-2'-pollicina forma fere // *sptcatae*, cui haec species habili affinis, sed capitulis subaequalibus elbracteis lanceolatis distinctissima. Racemi parvi ramosi graciles. »erlicillalis secundis. Folia floralia tamen bracteis conformia. Bractae exclusae glabrae v. »ubcentes, margine subulso Calycis fructiferi tubus demum bracteis »ubaequantibus, denudatis brevioribus. — In Brasilia, ad Barra do Rio dan elhas, in campis prope Villa Rica, prope San Joao del Rey provinciae Minas Geraes.
141. II. MURICATA Scholl mis. ex Bib. I. e. 110. — Herbacea?: caule glaberrimo, angustis scabris, foliis, petiolatis lanceolatis acuminatis duplicata-serratis, basi cuneato-rotundatis, supra scaberrimis, subulso subglabris; capitulis depresso-subglobosis paucifloris subsessilibus. »erlicillalis secundis, supremis appressis, infimis remotis; bracteis lanceolatis acutis adpressis calyces superantibus. villositas, calycis fructiferi lobulosis pubescentibus ore truncato, denudatis. tetactis inclusis lobum bubaequantibus. 2'.? — Caules plunpedales erecti v. adscendentes. Folia // *rii-cundae*, sed magis acuminata, floralia minora. Bractae membranaceae, saepe coloratae. Denudatis calycis lobum bubaequantibus. — Habitat in Brasilia, ad Rio Janeiro et ad Rio Abaile provinciae Minas Geraes.
142. II. INODOIU Schrank in §ll pi. soc. Ritisb. II. 50. - Bib. I. c. - Herbacea caule credo glabro v. bifloro pubescente, angustis lobulosis, foliis, petiolatis lanceolatis acutis »acqualiter serratis, basi lanceolatis cuneatis »ro(undatis) »e lenibus, utrinque glabris, subulso pallidis, capitulis depresso-subglobosis paucifloris subsessilibus; verticillatis secundis, supremis approximatis, infimis remotis, bracteis ovalo-lanceolatis adpressis, calycem aequantibus. pubescentibus; calycis fructiferi lobulosis pubescentibus ore truncato, denudatis. selactis atriculis, lobum bubaequantibus brevioribus. ^ - Herba plaripedalis, pallide villosa. Uabitu fere *Pogostemon plectranthoidis*. Caulis angustis acutis, sed in apicibus suppeditatis nunquam exapicalis. Folia saepe duplicata-serrata ?. lubaogularia, basi iniegerrima Petiolum limbo 2-3-pollicinarum fere aequalis. Racemi subsimplices terminalis et in axillis foliorum caulium. Capitula 0-10-flora et ultra, supra subulso plana Corolla alba, lobum breviter exserta. — Affinis *il. muricatae*, sed diversus caule lacti, folio lenibus glabris et bracteis angustioribus. An mera varietas ex cultura orla? — Habitat in Brasilia humidis.
143. H. SYMLARLM Si lil. mss. ex Bih. I. c. — Ramis lomentoso-pubescentibus; foliis, petiolatis lanceolatis acutis duplicata-erratis subulso, basi rotundatis, utrinque viridibus rugosis villosis v. lomentoso-pubescentibus; capitulis ovoideis paucifloris subsessilibus racemosis; racemum paniculatis; bracteis ovalo-lanceolatis villosis, calycem subsuperantibus, calycis lobulosis pubescentibus ore truncato, denudatis. selactis inclusis tubo brevioribus. 2'.? — Affinis // *canucenti*, sed viridior, capitula majora magis »ilia et praesertim bracteis numerosiores majores calces oronino oblectantibus faules 2',-3'-pedales, basi subulso in parte superiore uli folia jumora »ix canescentes. Bractae foliaceae »irides v. apice subcoloratae. — Habitat in silvis caeduis provinciae Minas Geraes.
144. H. P. n. TA. II. B. klh. ov gener. et spec. pi. II. 321 - Bih. I. c. - Ramis piloso-pubescentibus, angustis asperis, foliis, petiolatis lanceolatis acutis duplicata-serratis incisuris, basi rotundatis, supra subulso »renibus, »ubulso cano-to. »edulis, capitulis ovoideis paucifloris »ubsessilibus »ccundis, »erlicillalis racemosis.

mosis; racemi* laxe paniculatis; bracteis ovatis aculis calicem flonferum sub-
superantib., fructifero brevionb, calycis pubescentis dentib. selaceis Mnclis, tubo
brevionbus. ^ — Caules herbacei erecti, rami Iclragoni Folia floralia brac-
teacformia. Axis paniculae et pedunculi villosa-lanata Bracteae paucae adpressae
coloratae, margine ciliatae. Calicis fructiferi membranacei elongati. (Urologia
calyce duplo longior.

fi longiflora calycibus demum bracteis subduplo longioribus. — Habitat in
Mexico, in temperatis inter Pazcuaro et Arrio, in dumis prope Jalapam fl. in
locis Savannah diuisis insalae Trinitatis vulgans.

145. H. CAESALPINIA II. B. Kth I. c. 321. - Bib. I. c. 120 et 715 - Ramis (omen-
toso-pubescentibus, foliis petiolatis orbiculatis aculis diplicatis serratis sub-
incisive, basi rotundatis, in petiolum angustatis, subultra v. unguis cano-omen-
tosis, capillatis ovoideis paucifloris subsessilib. subcuneatis racemosis, racemis
paniculatis; bracteis ovalibus aculis calicem flonferum aequantibus, fructifero bre-
vioribus, calycis villosi post anthesin elongati ore truncato, trifloro. selaceis sin-
clis, tubo multo brevioribus. I. — Caules herbacei crasse tomentosi, nungulae vix as-
perae Folia aequius crassa nervosa, supra molliter pubescentia, rarius glaberrima,
«tubus dense cano-tomentosa, floralia pinnata, suprema bractearum
Racemi numerosi pedunculati, 2-4 pollices longi verticillati inflorescentiae «capitulum
remota, «pennae approximatae. Fasciculi 5-7-ovarii, pedunculo communi
brevissimo. Bracteae adpressae paucae aculae tamen v. in capitulo fructifero
apice coloratae, margine ciliatae Calyx fructifer talis caliculus erectus «in-
dentibus suberectis lilioidem lobi in aequantibus. Corolla glabra, tubo caly-
cem parum excedente. (membrana breviter exserta. Acanthia oblonga lacina. —
Teuocum rumboldii Willd. ex Loud. Hort. Brit. 835. — Habitat in America
tropica, Juxta urban Caracas al in Nova Hispania.

fl. arvensis Bib. I. c. 712. — Folia, vix canescentibus. — 17. *arvensis* Poepp. ins*.

— Habitat in Chili.

140. H. MIMOSA A. NT. HA. Pobl. Ic. ined. ex Bib. I. c. - Ramis breviter pubescentibus,
antheris laevibus; foliis petiolatis ovalibus aculis irregulariter serratis, basi
rotundatis subinaequalibus, supra pubescentibus, subtus pallidius cano-lanatis*.
capitulis paucifloris racemosis, pedunculo capitulum aequantibus; racemi
virescentibus Hongair* paniculatis, bracteis ovatis lanceolatis acuminatis, calicem sub-
superantibus, calycis pubescentis ore truncato, dentibus «clavatis «(nclis) tubo sub-
brevioribus 4* — Aflinn // *polystachya*, «radix minor, minutissima, capite
tubo multo minore, racemi gracilioribus* — Habitat in Brasilia, ad villa Bo. pro-
vinciam (F)ax

147. II. HYPICATA Pohl Ann. Mus. Nat. Hist. VI. 474. I. S. * fig. 2. Bib. I. c. - Ramis glabris
breviter pubescentibus, angulis aruleato-scapulis. foliis petiolatis orbiculatis
serratis crenatis, basi rotundatis cuneatis utrinque jilabris «ruli» v. suprae pones-
centibus. capitulis sphericis ovatis laxe racemosis* pedunculatis capitulum aequantibus
qualibus, racemis paniculatis, bracteis ovatis «bractea», calicem fructiferi
dimidio brevioribus. calicem glabri*. fructiferi elongati, «in-
dentibus «clavatis mho multo brevioribus* r » spricet » aldf * * * J
f. aulit herbaceas errantibus. bumanar aliludim. rario M, antheris oblongis el
«r» brevibus «faciis bus glabris v. breviter pubescentibus» Folia
pollicina herbacea, imparia «pinnata», «tubus pallida venosa, rarius «bractearum
eentia. topinoria pinnata, floralia pedunculata breviter pubescentia Pruduntia
pinnata sobaequas glabra. in vanae bractearum «in-
ranus 2-3-floris Bracteae saepe late ovatae membranaceae, nunc «aetae
neciformes v. laetolalae glabrae v. maritimae eiliae* I al) «
brevioribus canaliculatis, fructiferi bracteas duplo excedentes, 2-2 v. «
Racemi Mnalis, fauce intus nuda. dentibus Uliludine lobi brevioribus
«ar» a tuba «tubo albu» calicem sulcatis longior, bractea
superans. Limbi lacinae superna nuda obscurioribus noxiae.

corollam aequanlia Achienia parva mgra sublucida - *Nepeta mulabtlis* Rich in |c| Soc Hist >H Par ⁹ — Habitat in America aequinoctiali, 10 insults Sanct. Doromici cl Martin.ca, in ISova Hispama in locis calidis, in npa flamion Mngdalenae prope Honda 'Novo-Granatensium, in Layenna, in nemorosis Esse- quchonensium, in (.u.ani, in Brasiln in sylvis caeduis, etiam in insults Manams el Manilla \croj,imiliier ex America allata

148 II ROsm\T\ Sil/m mss. cxBUi I c 121 - Ramis glabns, anguhsaculealo- scabns, foil pciiohtin o\ali* aculi* inaoqualiier sirralo-crenatis, basi rotundalo- cuneatis glabns, capital.* bail globose laie racemosu ptdunculuU capilulo fruc- llficro subbretonb bractis ovato-niembnnacus glabns, cahec fructifero J-4- plo brevior.b , calycib glabns, fructifcm basi indalis longe rostralm, ore truncalo, dooiib brcvissimm selaceis slnrlis O - ^{^^^ creclus} 4-5-pedalis ramo- SSSIDI^S tolia glabra lenuia, parco dentata, bail inlegernma, floriha inlima capiulum eicedenlia, luperiora pedunculo broiora, suprcma mmuli llacemi subhimpltccs, fero pedales Verlicillasln ioBmi pollicem, tuperiore^ MI J»imi- polliccm dislantes second! Peduncall 3-4 lineas longi Capilula 0-10-flora

- Cal>ces fruciifcn 5 linoas longi nembraoaeci slriali, basi inflau, apice longe al- teouaio-cylindrici Achaenia panra oblooga nigrt lae>ia sublucida. — llabital in Brasiliae umbrosls prope Bahlam.

140 n TENUIFLORA Bib I e - Ramis biforiam pubeseentlb, angulis laevib; foil pciiolaiis ovaus acolis inaequaliler serralis, bast rolundalo-cuneatis glabrlt, rapilulis ovoideis paucfloris laie racemosls, peduncults capilulo fructifero dupio longionb , racemis pamculatis, bractcis ovain membranaceii caljce fructifero dimidio brcMonb caljcib glabris, fructifens elongaiis, basi inflalis, ore truncato, deniib sclaceis strictis tubo mullo brevionbus O — Afflnis // *spicatat*, sed caulibus laeMbus bifarnm el allcrnalim pubescentibu>, glabrilic foliorum el bractcarum cl pedunculis ilongalis gracilibus di^lincla c>t — In Brasilia

150 II L\P\>SA Pohl, Ic ined ei ISih I c 142. - Glabnacula, ramorum anguhs aubaspens full petiolalis ovain acummatis inaequaliler ierralu, bam runealu, supra sparse, subius ad nervos hispidulis, capilulif otoideis paucfloris late racemosis, pedanculis capilulo fructifero breviorib, racemis divancalo-pamcu- latli, bracieis ovaiia aeulls nembraoaecis cilialia; calycib. gUbruscatis, rhacife- rls vlx braciea longioribus, or« Irunealo, deoiib. seuceis slricUs lobo dimidio broionbus OT - A B *ipicata* differt praecipoe etlydbut brevioribus, denubus longioribus, bracieis acaiionbus, eaplullis majoribui, etc. — HabiUl In Brasilia.

151 II DLBIV Pohl, Ic. med ex Bin. I c - Pubescens- ramorum angulis laevib; foil brc\itir pciiolaiis oalis acutis duplicalo-crenatis, basi cueatis, supra sea- bro-hispidulis, Mibtus ad ner>os pubescenllb rugosis, capilalis ovoideis pauci- floris racemosis pidunculis broMssimis, racemis subramosis, bracieis lanceolatis acummatis, caljce fructifero longionb pabescntib cilialis, denlib calycmis solaces strictis, lubo dimidio longionbu« 0+ — Afflnii II *expansae*, sed minus ramosa illosior, bnctiac longiores angustiores — Habiut in Brasilia, ad Rio Abaile provinciae Minas Gcra^s

132. II RII\TIDEA Bih Plant Harmeg 21 no 170 - Frulicosa (*) ramis glandu- dulo-pubescenlib , foil breviler pciiolaiis oblongo-lanceolalis serraiis rigldis, supra scabernmis, subius puberulu, floralib parvis iubo\<in acuiissimls, rapi- lulis paucflom densis subsessilib in racemum terminalcm Inerruptum subra- mosum disposuu, bracieis paucis oblongo-lineanb subuliic\er ral>ce plerumq breMonb, cihcib pubescinlib subvi»cosifc, fructifens auclis obliquit ngidis, dentib lanceolato-subulalis subspmescentib, corolla caljceparum longiore hrr- MUT pubr>cente *S — Specie* disiinclissimi habilu quodammodo // *rubtundam* reftrI, iiidr *Polydesmiam* it *Jlinthtdium* media — llabital in Mexico

Seetlo XIII. MESPHERIA Bth. 1. e. 122.

Florum capitula laxiuscula pauciflora. Bractee nuoc minulac m ullae, nuno lubulalae laxae, calycera subaequant. Calyx in eapilulo sessilis, fructifer oblique campanulatus, ore truncato, dentibus subulalis sinclis et faoce inlus villis clauca v. pilorum fasciculis 5 inter denies di«po«ilis magi* nunusve ciliaia. Corollae lubus inclusus v. broiler exserlus. — Herbae r. rarius suffruices plerumque pilosae, capiulis pedunculalis, inferionbu* T. ranus omnibu* in axillis foliorum caulmis conformium solitams v. fasciculam, soperionbut saepius in paniculam laxam disposilis.

1W. H. PLECTRAMHOIDES Bib. I. c. - Caule herbaceo ererlo pilis longis patentibus. birsulo, angulis laevibus; foliis brevissimis petiolatis late ovatis v. rotundatis obtusis creato-serratis, basi rotundatis r. subcordatis pilosis, capitulis paucifloris laxe racemosis pedunculatis; racemum laxis paniculis. bracteis lanceolatis acutis calyce brevioribus; calycibus floriferis campanulatis villosis, dentibus subulalis tubum aequantibus. O? ^.? — Caule* sarpius purpurascet Miuet Kami, petioli (brevissimi) el nervi foliorum pilis IOORIS albidis palendibus «arpius vesicii Folia in polhcaria, vupenora minora, floralia minima conformia, suprema immuta. P«-» nicula laxa. Pedunculi capitulo longior duplo longiores. Bractee laxiusculae, calyce longior subbreviores. Flores parvi. Corolla colore duplo longior. Stamina exserta. >pecimina fructifera baud suppeunt. — Species II. *sptcatae* ad Ut inter *Polydetmtam* et *Metophaenam* quasi media, habitu *IHeelranlho Coetsoe* noo di»imili*. — Habitat in Brasilia meridionali.

IVi H. PL MI LA Pobl, Ic. ioad. ex Bth. I. c. - Herbacea bumih erecta: caule patentibus piloso; foliis brevissimis petiolatis late ovatis rotundatis ferrato-crenatis basi rotundatis. aabcordatis firdibus. plioist eapitulum laxe pauciflorum pedunculatis raeaoala; bracteis laxis aubulatis, calyce brevioribus; calycibus letisilibus, fructiferis oblique campanulatis ON imoato, dentibus iubuUim, fauce intus villosa. ^.? — *B. eommuni* talde afQoit, ted minor pilotior el folia laliora. — Habitai in Brasilia, ad Serra de CbrysUia protincia Gojaz.

ISS. H. COMUTFIS St. Iiil. mtt. ex Bib I. c. 123. - Herbaria humiln jflabra f. magis mmu5>e TIHOM: foliis breviter petiolatis rotundatis n'aiiH oblongis crenatis, basi runcatis angulatisve, capitulum laxum pauciflorum pedunculatis racemosis, bracteis IJII« «ubulatis, calycibus ««siliH nlln* fructiferis oblique campanulatis ore truncato, dentibus subulalis, fauce inclusis lanala ^ — Herba semipedalis v. vis pedalis, basi saepe sabrepens, superne procumbens* ad^cendens v. erecta paucifloro-ramosa, nunc omnino flabra, saepius magis minus^e ^illosa Folia /i-l~ polhraria, utrinque viridia, rrenalunt obiusi« v aruh« nunc omnino glabra, nunc rugosa, utnqnc nolliler villosa. Racemi J-3-polliaris Pedunculi 3-0-lineares, 3-^-Ooh. Calyces flonfen pam caropanul. ui, fructiferi parum auell, lioeam longi, bine g.bbo.i el Ideo pedicellu« lairrali« r*adil. Corolla coerulea, eilus Rlabnoscula, lubus breviter extertus, lirof.u* profunde lobatus. lobo InDmo. apice subulalo-acuminato Filamenta pilosa Arlnrn.a ofoideo-subglobosa nigra laeyia. Valde vanabilis etl quoad latitudinem foliorum el tilloiiiaiem. - /'• /'f' TM' Pobl, le. lord. - Habitu in Braulia, in rampis Hc^alJ. praeruptis el ruderaus monioa protmriae Minas Gerat« coaimunis

IM II FRITICOSA Salim m»s. ex Bib I.e. - Ramis durancalis, Junionibus. tom^J. lous. foliis breviter petiolatis* o>alt obtusis crenatis, basi cuneatis rugosis j sobolis pallidis; pedunculatis solnarns axillaribus foliis longioribus. capiulis laxe paucifloris tabflobotis. bracteis laxis sabulatis; calycibus fructiferis basi supra gibbis elobgatis incurvis. ore oblongo truncato villosa, dentibus subulatis paucifloris but 6 - Fructus 4-e-pedalis, ramis oblique letragomis hgnosis •ulr*J'J' ramall numerosis brevibus aodosis looietoso-pubescentibus. Folia vn 4-0 llo floJ aapra ballau-nigom, te«oitsiaAa pubescentia, subolis tenosa subobovatis* oss, onim ralia cosiformia. Capitula v. fasciculi Oorum paoca, versus apices ramulorum •estilia 10-li-lora. Bractee calyce panim bimorea nodes. Calyce* •«»• les,

forma fere // *suaveolentu*, sed tenuiores incum et ore magis obliquo. Tubu* extus pubescens. Taux margine iilosa. Denies longitudine laiitudioem lubi aequanies, inier se subacuales v. tnbus longionibus, demum stellato-paieniet Corolla coerulea, m pubocens, tubo denies calycmos subaequanle. Gemlalia corolla bm.ora Achacnia oblonga obtusa subcompressa laetiuscula. - Theae loco umrpaiur, pracserlm in refr.geratione. - Habitat in Brasilia Iropica, in colhbus aridis circa Bahiam, In tjlwī <al.ngas ad Maracas provinciae Bahiensis el in campis in Serro Fno protvinciae Mma« Gera?».s.

157. II AIEMSSOIDKS II B. Kid. Nov gen. el spec, pi 11. 320. - Blh. I. c. - Suffrutico>a ramis rufo-villoiis; foil, bretitcr petiolatis otatis acuiis serrato-crenatis, basi rotundam, supra VIIIOSH, subius dense cano-loraenlosis, peduncuht brevissimis axillarib. aubbinatis; capilulis roulliflons laxiusculis secundis. bracteis minuiis seiaceis; calycib. pubescentib, fructifens o)ati* slncim, fauce inlus ullosa, denlib. brevisaimis seiaceis villons ^ - huffrutcx ramoHissimiH 4-0-pedalis aromalicus. Folia floralia caulinis conforraia. Pedunculi in a\illn •aepissime binari, rarins soliUrii. Corolla alba, exlerne pubescens. Arhaema oblongo-Inquelra laeivissima. — Habilai in America aequioocuali, in locis aU» amoenis prope pagum El Tablon el ripam flaminia Juanambo ia regoo No^o-Granalensi.

198. H. PILOSA Bib. 1. c. 114. t — Suffrnllocota: ramis pllontls; roll, peiolaili ovalis aculls leviter aerruUla, baal cordatis subcanesceniib.; pedonculis folio sublongionb., capilulis 0-10-0ori« sobgtobosis; bracieis mlnuils selaeela; eaiyeib. fructifens valde auctis ovato-tubulons aequalib. Iruncalia pilosisslmia» denlib. setaccis, tubi ladludine brevionbuM. 2l. — Rami glabri v pllis longis patenlibus ad angulos obscsni. Folia pollicana fiaccida, leviler el regulanler crenulata v serrulata Pedunculi in -XIIIIS infcnoribus saepe 2-3-nati \ fasciculi i jrtne globoiio-capitaiar, flonTerae magniludine Pm, fruciiferjc Or an Ilraclae minulissimae Cal)r^k bux intus Tillohissima. — Ab *H. polyanthn* differt foliorum forma, caule sufTrulicoso minus pamculato, peduncutis brevionbu*, caljcibu* frucufcris raajortbus (minonbus vero quam calyces *H. anaveofmJtf*, pilis longts patenlibus densusime obsessis. — Uabilal In Peru via.

ISO. H. SCAVBOLENS Polu Ann. mas. Par. VII. 471. t ». if. 1 - Blh. I. c. - Caule herbaceo erecto piloso; foil. peUolails lau ovaUa alnaalo-Mrrallf, l>fenonb. basi cordatis, soperlorib. rotoodalis eon«aUaYt pubosenUb. villosls lomentosisve; pedunculii captulo paueiOoro subbretlorib. In axlllla toliurlla 1-3-naiis>e racemosis; racemis panicularis; bracieis mloutls teUeelti calycib. fractions oblique campanulais stnata, ore subaequali Irvneato villoao, dentib uubulatis rigidly ereciis O — Herba erecu flrma ramosa S-O-pedalif. Caulis obtuse telragonus, pilis lungin patenlibus albidis magis minuive hirsuius, caeicrum glabr v ad axillae el »uperne tnmenlosua. Folia 1-2-pollicaria, laiiludine longitudinalincm fere aequanha, margine scrraia v. crenata et taeptut tlnuata \ innsa, Inferora fere temper cordata, supenora frequentius rotundata, cuneata v Interdum longe anguhtata, omnia nunc tenuia (praecipue In speciminibus rulit*, ||| pubesceniia v lomenlosa, saepiu* crassiuscula rugosula, supra pubesceniia v. villosa, subius dense lomenlosa. Verticillasrl secundi, inferiores renoli anlbre», supenores nunc In racemum laxum elongaium, nunc In paniculam densissimam mullifloram disposal. Pedunculi saepe (ramulis subaborllentibu«; in axiUo quoque quasi fasciculati, nunc brevmimi, saepius calyrem aequante^, ranu« eo longiores. Calyces in quoque pedunculo 2-4 sesoles biriuli, fructifrn >tldr oucti, 4-5 lin. longi subdeclinali, supra subplani, profunde 10-ntnati phcati, ore bmilor ciliato, donlibut subaequalibus tubo ditnidio brenonbus Corolla r«r-rulea, tubo denies cal)cinos aequanu*. Achaema oblonga lae^ia - *MmthnMlrum maximum* Sloane, Nat Hist. Jam. I 171 I 102. fig 1 - *UnoipKaertum kirtutum* P. Bromne, Ilitt Jam 257 I 18 (ig J - *UaUoia folit curdatt* Mm If | |w flg. I - *Halloia tuairolens* l|m> Spec. 815. - Jacq Hurt \im] ||| 24 i |>

Bystropogon suaveolens L'Her' Sert Angl 10 — *Hyptis Plumtert* Poit Ann mus Paris MI 473 - *IlypUt ebracteata* R fir in Ait Hort kew (ed 2) III J9I — *Bysteropogon graieolens* Blume, Bijdragen 824^{9*}) — Habitat in America nequinoitali vulgaris, in Mexico ad Hacienda de la Llaguna, in insulis Jamaica, Porto Rico, Brasiliae provincia Goyaz et Minas Gëracs, in Peruvia, etiam in Asia tropica verosi mi liter ex America allala, in insults Philippine, Manilla, Molluca, in India onentali circa Maderaspatam et ID Jara.

1G0 II GRA\EOLENS Salzm ex Blh I c 125. — Caule herbaceo erecto pilosiusculo, angulis laevib, foil petiotalis ovalis acutis sinuato-serratis, basi cordalis rugosis, ulnng viscoso-pubescentib, pedunculis axillanb fasciculo paucifloro plunes longiorib , supenonb irregularitersubpamculatis, braceis minutis calj-tib fructiferis parvis oblique campanulas, vix slnais, ore subaequali truncalo, dentib brevissfmis subulatis rigidis eclis O — Hcrba 4-0-pedahs, // tuaveolentt affinis, sed pedunculis elongaiis filiformibus elcaljcibus fere Inplo minoribus distmcta Tola planta viscidula et pilis brevibus palenlibus villosa nee tomenlosa Peduncufi ramulorum abortione in axillis 2-3 glomerati fill formes pollicares, apicc fasciculum 4-6-flora m ferentes Calyces sessile*, fructiften vix 2 lin longi pilhdi, nenis vix prommentibus Corolla coerulea Achacma *H tuaxeolentis*, sed multo minora Odor gravis aromaticus — Habitat in Brasilia, in ma nil mis prope Babia, ad Rio Janeiro

101 II IUBROS4 Salzm ex Blh 1 c — Caule herbaceo erecto villosa, angulis scabns, axillis subnudis, foil petiotalis late otatis acuiis irregularanb serratis el incisio-lobatis, basi rotundatis cordaisvc, supra pilosiusculis, subius pallidis pubescentib Y demum glabraiis, pedunculis axillanb fliformib subfasciculolis, capitulo laxo 3-10-fioro mallotiei longiorib; braoleis minatis tetaceis, calycjb fruclifens parvlf pobetceatib. oblique ctmpaonlalif, ore aequali truncalo villosa, deolib breviuimii lubulalis atriellt O^ — Ab afflni // vucida differt pilis minime viscosis, caule ad angulot scabro-murfcato, foliis subius subcanescentibus, denlib acutioriboi Corolla lilacino - coerulea — *üypht graveolens* Srhraok in S)ll pi soc Ratisb II 30***)) — Habitat in Biasilia, in umhrosis prope Dahla, in nemonbus provmciarum Sancti Pauli, Rio Janeiro it Mm a* birats \ulgatis>ima>

1C2 II POMOTIU Poit in 4nn mus Par >ll 470 - Blh I c 120 | - Caule herbarco credo pubesrend-tilloso, axillis piloMssimiN foil pt imlalis o^atis aculiusculife irregulariter crenalo-serrate basi rotundatis conlatisvc, supra piloso* »cabns, subtus albo-tomenlosis pamculs ampla pedunrulis filiformib capitulo la|r 5-20-floro mullolicis longiorib brarlois nnnuiis «tiaccn, cal>cib frucliferis oblique campanulatis pubescentib , ore arquah iruncalo MIOSO, donlib bretissimis yubulatis slnclm % — llerba odorau««ima 4-<J-prdaln, superne pamculatoramo%»9iQia Pelioli piloso-hi<pidi Folia I - 2-pollicana, simphter senrata v ftiam margine tinuata, floralia minora, nuprtma minula Panclula laxissima, ramis elongatis tenuibus Pfdunculi clon^al. 5-10- * S)-J0-flon (apitulum froclifenim globo<um maffoiludme leratt i al)x circiler i Imcas longui, lauca villu albit rla%a (orolla minula pulnsipnt uolaree Achacma o\ata laevia - *Byttropogon ttdarfoUum* I Hint >>eri tngl !>• - Habitat in Pennii, >>>

*1 B)STU(POC.O) GRMOIfys IUume. tt)j,hajrn. <2> moao pflontusorio foil main twfctebn b fubcnlnht duphrato-srrruianw... pubarnUib .capitulis prmneultU axUanb lobtartu. caiynb pilogu drwi-
Ernlag
** // (Hi\K>tt\ls Schrank I e - Flonb anllanb tmmnahq. ramulorum tutsUttarm rttmulo lupmorb foha decusaanhb caule aculct... t>ro % Hamt inferior et legem vulgar tm tequantur, rl ex «... orlMAInr, ted tupertoret plermmqu* rum folnt trueem rerlam }... la-nrmpe MU*I, bmnqu* cum folio mm basi but amgulot rrelo* formant... pratter r n « raid* pubttetmttt, glabra pumeiala taiucu denies subulata

- temperalis monilium Quilcensium el Peruvianorum juxta Quilo, Loxa el Gon/an.ima.
163. II. LILACISA Cham el Schlectd. Linnaea V. 101. — Bib. I. c. — Molliler pubescens: foil, pcliolaiis ovalis ellipticisve aculis duplicato-serratis, basi cuncalis angustatisve, supra pubescenlib., sublus canescenli-lomcnlosis; capilulis Lixe paucidons axillanb. opposilis pedunculalis parvis; braceis laxis setaceis, caljrc MX breMonb.; caljrcii villosi ovali stnali denlib. acuminato-subulalis, demum patentihus. ^ — AfOnis *H. polyanthae*, sed folns el calycibus disimcia. Cauls erecti 2-3-pcdales. Cjmae 5-7-florae, pedunculis fill formibus pubescenlibus vix pollicem longis. Caljx urceolalus hirsulus, magnitudme calycis // *polyantheae*, sed minus iruncalus, dentibus bnsi cilatali* cillialis, fauce intus subullosa. Corolla (hlacina ex Cham, el Schlectd.) pubcrula, caljrcm bre\iler supcrans. — Halmal in America cenlrah, in dumelis propc Jalapam Mexicanorum el in I\o\|a Hispama.
104. I|. tRTICOIDES II. D. Klh. Nov. gen. el spec. pi. II. 320. - Blh. I. c. - Caule herbacco credo icnuilcr pubescenle, angulis subaspens; full, pcliolaiis oxaiis acuns scrralis, basi cunealis, supra hispidulis, sublus pubescenlib.; capiuli* la\c pauciflons longe pedunculalis, in racemos secundos pamculalos dispobilis; brnr-leis minulis seiaceis; calycib. pubescenlib., fruciifens oblique campanulalis, ore aequoli truncalo villosu, deolib. subulalis slriclis, lubo subbreuionbus. 0 — Rami Iclragoni. Folia supra el sublus ad nenroa scabriuscula, 8-3 pollices looga. Corolla minua. Achaema oblonga, oculo armalo rugulosa. Media iuier II. *polyaniham* el // *pectinalam*. — Ilabiiial in America acuinocliiali, in lemperali» in radicibus montis Macullepec propo Jalapam Mexicanorum.
- 1W. II. RACE MI) LOS A Marl. ms<. ex Blh. I. c. f — Caule herbacco ercelo lenuiirr rufo-pubescente, angulis lacMb.; foil, pcliolaiis o>atis aculis tluplicato-sorrahs, ba» rolundalis el in pcliolum decurrenlib., supra MIOSULH, sublun rufo-iomcn> IOSLI>; cyrois rapitaiis paucilloris breMSMmc pedunculalis, in racemos t>ubsorundos aiillarcs oVposilis; braceis minulii selaceis; cal>cib. rufo-lomcniosis, frur-liferis oblique campanulalis ore aequali Iruncalo villosu, denlib. bubulahi hinciis, lubo brevioribus. 2). — Ilabiius *H. polyttaehyae*, sed braceis calycibusque dislinctissima. Ab *U. uricotde* differl fascieulis fere sessilibus. A reliquis bujun scciionis racemis axillanbus peduoculalls deosis rufescenUboi ad apfcam caulis subpamculaiis recedit AfOnis quoque II. *peclinaia**, ted cymis elism fructiferis capitatis nec clongalis el racemis caule folioramque pagina inferior* rabigiooso-lomcnlosis abunde differ!. Herb a esl 2-2'/t-peda1ls. Corolla albo-violacea rx St. Hit., rosco-alba purpurco-maculala sec. Marlius. — Habilal io Brasilia, in pascuis clo\iti> in Scrra do Papagaio el ad Villa Rica provinciae Minas Geraricl in <)\|is cacduis micr Minas rt Rio do Janeiro.

i Species sectionis hujus turn satis nota.

166. II. LAMIIFOLM »cinm. in Sjllogc plant, soc. Raiub. I. 226. — Blh. I. c. 127. — Caule ramoso tolragono pilo>o radicante; foil, subcordalo-otaiis acummaiM crenalo-dcnlalis piloso-scabns pcliolaiis, sublus albicanlib.; capilulum aiillanb pedunculalis inicrnodio breviorib.; imolucns seiaceis capitulum aequantibus. 4* — Caulis 4-6-pedalis dccumbens radicans, acute Iclragonus, ad angulos praecipue pilosus, in planitiebus sub Icnlc 2-3-stnalis. Folia subcordalo-ovata acutnaia, supra >india, sublus albicania, praccipue ad ncnos piloso-scabra 1-2 uncias longa, %-1 lata, in peliolum desinencia. Pctiolus 4-5 hn. longus lilicrnodia 2-5 uncias lonp.i acqualia. Pedunruli axillares oppomu 1-2¹.: -unnale« teretcs. Capiuli magmludine *Pin major*M. Imolucrum lincan-sciarpum pili« crebns ad marginem obsesum. Calyx bre\is lubulo-us 5-deniatus, de*ntiliu< acuminalis acqualibug. Corolla par\|a albida, marulisi mmuii^imis t'lolams > ferrugincis picia. Faux inliaia. I abium supenus bilobum, informs tnlohum lobo mirrmcdio sarralo, cxius piloso, marKinibu« onimbu» reflexi* Affini* // *polynnhat*. — An II. *umbrnta* } — Ilabiiial in Drisilu

Seetio XIV. PECTINARIA Bth. 1. c. 127.

Cjmae per anthesin subcapitalae, post anthesin elongatae unilaterales peclinatae. Bractee laxae selaceae. Calyx subsessilis, fructifer lubulosus iruncalus, denibus seiaceis striculis, fauce intus villis clausa.

IG7. II. PECTINATA Poit. Ann. mus. Paris. VII. 474. - Bth. I. c. 127. - Glabra v. tenuiter pubescens: foliis, pinnatis ovalis crenato-serratis, basi rotundatis, subtus paludis; cymis multifloris laxiusculis paniculato-racemosis, demum elongatis multinis peclinatis; bracteis laxis seiaceis, calyce lobbrevionibus; calycis lubulosi canescentis ore iruncato, fauce intus villosa, dentibus setacis strictis, tubo brevionibus. 2]. — Caulis basi durus sublignosus. Rami erecti 2-3-pedales*, angustis lacibus, saepius pubescentibus. Folia forma et magnitudine variabilia, nunc triplicaria laevia ovata oblusa, nunc 2-3-pollicaria acuminata acuta, crenatis oblongis v. rarius acutis, utraque glabra v. pagina superiore pilis brevissimis raris hirsutulae et subtus tenaciter cano-lomentosa. Racemi secundi, apice dense conchali, basi interrupti simpliciter v. frequenter paniculato-ramosi. Cymae utraque 5-30-florae, juniores capitatae, bracteis denibusque calycinis subulatis crinitae, fructiferae ut in *Borragineti* incurvo-peclinatae. Corolla parva, paludis purpureo-rosea v. flava, labiis purpureo-maculatis*. Achania parva oblonga nigra laevia. — *Mentha perilloides* Linn. SysU (ed. 13.) 445? non Aucl. — *JS'cprta peclinata* Linn. Spec. plant. 700. — *Bystropogon peclinatum* L'Herit. Scrt. Angl. 10. — *Mepeta aristata* Rich. Act. soc. hist. nat. Par. 110. — *Liolera Pertiea* Spr. in Transact. of the Linn. soc. VI. 157. t. 4. — *Ilyplis Persiea* Poit. Ann. mus. Paris. VII. 471. — *BaUola disticha* Rodsch. Obs. 35. [ex Mejer, Flor. Essrq. 208. non Linn.] — *BaUola tuaveolens* Rodsch. Bald. Diar. fasc. 2^a p. 70. [ex Mejer I. c. non Linn.] — *Ilyplis nepeloides* Fisch. ex Schrank in Denkschr. der Bol. Gesellsch. Regensb. II. 3%. — *Ilyplis racemosa* Zuccagni in Act Acad. Taun. . . . ? — *Bystropogon eoaetmum* Scham. et Thonn. Kongl. Dansk. Vidensk. Selak. Afbandl. IV. 34. — Dabial in Americae aequinocialis aridis cretacea et arcuosa vulgata*, etiam in Africae nec non Asiae regione iropica spontanea, sed non indigena, tu insulae Cuba, Jamaica, Porto Rico, Caribaeis, in Mexico validior, Panama, Peruvia, insula Trinitalis, ad Essequibo, Demerara, in Brasilia in Africa occidentali iropica, Madagascaria, ad Maderaspalam et in insulis Mananis.

Seetio XV. MITHIDIUM Bth. 1. c. 128.

Flores in terlicillatris axillaribus plurimae multiflorae simpliciter v. breviter pedicellatae. Bractee minulae minutae v. laxae selaceae. Calyx campanulatus aequalis, fauce intus nuda. Corolla vix calycem excedens. — Herbac apice saepe subpaniculatae.

16A II. PILEG 10IDES Pohl, 1c. Inrd. ex Bth. I. c. 1*. - Herbacea. basi procumbens: ramis adscendentibus. adpresse pubescentibus; foliis, breviter pinnatis lanceolatis acutis serratis, basi angustatis rugosis utroque, floralibus conformibus multinibus; verticillis omnibus dimidiatis globosis, dentibus multifloris; bracteis subulatis calyce brevionibus; calycis lubulosi membranae basi villis denibus lanceolato-aubulatis erectis brevibus. V - Specie* inter *Mimim* et *Apodoten* media, an ad hanc sectionem referenda? Achaea laevia. - Habitat in Brasilia ad Yndia do Pari provinciae Mint* Grafs.

III. II. ALBIDA H. B. Kih. >or. gen. el apoc. plant. II. 310. - Bib. I. c. - Flores eosa Oocoides, foliis, ovatis obtusis r. supremis subulato-acuminatis erentibus, basi rotundato-cuneatis rugosis; verticillis laxiusculis globosis dimidiatis racemosis subpaniculatis; bracteis brevibus seuceis*; calyce fructifero globoso denibus lanceolatis, dentibus mollissimis seiaceis*. tubo subaequalibus. et folia lana alba anoblocota dense fetida. Folia superiora rotunda, floralia tubulato-acuminata, verticillis longiora. Corolla vix calycem excedens. Achaea sobinflata ovali-rotunda compressa. Calyx lana alba de omnino immertl. - Habitat in Mexico, in regione temperata mollium Juncus Cntco in coavalle Saclis Jacob* et prope orbero Valladolid.

170. II. PUBESCENS Blh. I. c. 129. — Suffruticosa tomentoso-pubescentis: foliis subsessilibus oblongis acutiusculis serratis, basi rotundatis subrugosis, sublimbus pallidis; verticillastris parvis globosis multifloris remolis; racemis paniculatis; bracteis brevibus setaceis; calycis campanulati villosi denibus rigidis subulatis, tubum aequantibus, demum stellato-palenibus. 2l. — Rami obtuso letragoni, pilis brevibus dense pubescentes. Folia sesquipollicaria, supra adpresse pubescentia, subtus densius tomentosa, superiora subcanescentia. Panicula semipedalis tomentosa. Verticillastris magnitudine Pitt. Calyces subsessiles albo-villosi, denes glabriusculi subspinosi. Corollae denibus calycinis paulo longioribus. — Habitat in Nora Hispania.
171. II. MOENIA!U Bth. I. c. — Suffruticosa? pubescens: foliis breviter petiolatis cordato-ovalibus duplicato-serratis rugosis; verticillastris globosis multifloris distinctis racemosis; racemis paniculatis; bracteis brevibus sclaccis; calycis campanulati villosi denibus rigidis subulatis glabris stellato-palentibus, lubo duplo longioribus. 2l. — Pubescentia subrubiginosa. Folia 1-1 1/2-pollicaria, exacte cordifera, sublimbus pallida, utrinque leviter pubescentia, Ooralia caulinis conformia sed minor, superiora verticillastro breviora. Panicula praecedens. Verticillastris 10-15-floris, denibus calycinis subspinosis ebinatis. Corolla denibus calycinis dimidio brevior. — Habitat in Nora Hispania.
172. II. SPINULOSA Dlb. I. c. t - Suffruticosa tenuiter pubescens: foliis petiolatis ovatis acuminatis serrulato-crenatis, basi cordatis; verticillastris globosis multifloris distinctis racemosis; racemis paniculatis; bracteis brevibus sclaccis; calycis ovali pubescentibus denibus rigidis subulatis glabris stellato-palenibus, lubo brevioribus. 2k — Caules et folia lenissime rufo-pubescentia v. demum glabrata. Folia 1 1/2—2—pollinaria, leniter crenulata v. serrulata, basi laevicordata vix rugosa et subcoriacea, floralia verticillastro breviora. Verticillastris majores quam in // cordifolia, denibus ralyrinis rlinm per anthesin stellato-palenibus spinosis rrhinatis, sed denes duplo breviores et iubus calycis major quam in // cordifolia. — Habitat in Nova Hispania.
173. II. STELLATA Dlh. I. c. — Herbacea: ramis rubiginoso-villosis; foliis breviter petiolatis ovatis serrato-crenatis, basi rotundatis rugosis villosis; racemulis paniculatis; verticillastris* dense globosis; bracteis parvis teiaccis calycis ovali villosi denibus subulatis tiellaio-palenibus. % - Caules erecti ramoti 4-5 pedales. Folia utrinque villota, floralia inferiora conformia, superiora minus liracleacormia. Panicula ampla, fere pedalis lerminalit rubiginosa. Verticillastris disiiucii subremnii numerosi. Calyces parvi, fauce inlos parum villosa, denibus Kuharquilibus sulircurvis. Corolla pubescens, calycis vlx Inngior, lobis lubaequalibus, infimo >irum saccato. — Habitat in Meico ad Cuernavaca et Toluco.
174. II. SCOPARIA P<il. Ann. mus. Par. VII. 475. t 31. fig. 8. - Blh. I. c. - Fruticosa: ramis ^labris, in^ulis .imlcais; foliis brevissime petiolatis linearibus oblongis inlrgorrimis sulxieniculatisve jdb>hri<; verticillastris laxis remolis 2-10-floris* calycis glabriusculi denibus ovalibus creclis nbiu<is. 4 — Kruticulus ramo>u<, ramorum anguli hinc inde aculeis brevibus relle&is aucii. Peltoli brevissimi articulati. Folia basi parum angustata inlegerrima v. hinc inde denliculata uninrvia minutissime glandulosa, margine saepe revolula et ad aillas fasciculata, floralia conformia. Flores minuti, mine solitarii, saepius 6-10 in verticillastro laxo dispositi. Calyx florigris ovaio-rampanulatus glaber v. lenissime pubescens, denibus lubi lalitudine dimidio brevioribus, fructifer declinalis subgloboMis faux inlus nuda. Corolla glabra, vix calycem excedens, lobis 4 superioribus stibaequalibus oblongis* nhusis, infimo sacralo. Ternitalia inclusa declinata. Arhaenia law nvala eompresso-iriqnelra. — *Satureja Americana* Poir. >iel. IV. 571 — *Salurrja rondaca* Juss. ex Poir. I. c. - Habitat in Americae aequinorialis, in tu. lis Porto Rico et Saudi Dommei.

UV II. VKRTICILLATA Jacq. Icon. r.u. I. I. 113. - Rih. I. c. I*), ft 712. - ||(MIR
Icon, plantar. I. 4^ . t - Suffruticosa: n n m eiectis pulie>rrnii|i. v. pilo%mk. MI'
III.

brevier peiolalis lanceolalis acutis serratis, basi rotundato-angulata lenuissimè pubescentibus. verticillatis Idiusculi* plunflons distinctly racemosi, ralcis otati glabri dentibus erectis obovato-lanceolatis — (IUS erectus pedalis et ultra, angulis laetibus Pelioli basi exclus glandula semiannulla nolaii el subarliculati. Limbus 1-2-pollicans pennemus Folia flora In caulinn conformata, *cd minorâ Hores immutâ, brevitè pedicellati, saepe penduli (aljces sinaii (orollae albidâ, vix calicem excedentes Gmlalia breviter exserta Achama oblonga glabra laena — *Mentha hyptiformis** I am Diet IV NO — *Starhyt patent* SwrU. L&OT pi gen eL spec 88 — Habitat in America aequinoctiali, in Bleuo ad viam prope Papatla el in insula Sancti Dominici

170 n F4*riCILAT4 Bth. I c 130 f - Herbacea glabra r (enuiter pubescens. foliis peiolalis otatis acutis serratis rugulosis, utrinque xndib, racemis elongatis paniculatis, verticillatis lam plunflons, bracteis minutis seiacen, calicibus fractifens aucti glabri dentibus ovatis acule, tubo mullohe* bractinibus ^ - < aulis erectas I 'i-3-pedatis, apice paniculato-rarâoms, innuiter pubescens, obtusum tetragonum, angulis laevibus Folia nunc glabra, mine timentque puberula, subtus glanduloso-punctata, floribus infima conformia, sapentia minora scissis, suprema minuta binctiformia in gemma lanceolata verticillatis nunc reguheruer globois 10-40-floris, nunc depauperati 2-3-floris foliosi prohen < «'y res flonfon otain-campanulati, fructifens valde aucti aequales imdes 10-nervi venoM, superno ampliati subplicati, fauce mtus nuda, dentibus erectis v patentibus Lorolh minuta purpuratâeni Acbaenia oblonga minuta Affirm // rfr-tetiltat, differt foliis lalionbat rugosis, calycibus fructifens aroplatis etc ** *HypUs undulata* Schraok in Deokichr. der Bol Ge>elltcb Regensb II 51* — *H*P~pothroma umdaia* Schrank in 8jll. pi. toe Ratib. I. 83'' - Habitat in Brasilia ad tiam circa habita Uooet et in locis humidis provinciae Rio Janeiro vulgans, circa Joao Gomei el In rapibot In Serra San Joae provinciae Minae Gera^s.

177. H. FASTIGIATA Bib. I c. — Herbacea adscendens Toll petiolalis otatis acutis duplicato-ternatis, basi rotundatis, supra verticillatis villosis subtus cino-pubescentibus, racemis fastigialo-paniculatis, verticillatis laxi paucifloris bracteis minutis elaceM, calicibus fructifens aucti glabri dentibus obovatis anitâ, lubn multo-lirâ breioribus ^ — A // *fasnuculata* differit illositilr el pinirula coarctata drn<mrc >rrliciTia^trii num<rosis laimribus plrurumque i-C-floris — In Brasilia* 17* II rHUX \ H \ si III mss ei Bid I r 131 lrrbarca raule adscendente rufo-lomento*, foliis petiolatis K utah* arulis ^errat >crnâliH, basi rugosis, supra <illn<i4, 4ubtu< rufo-lomento^i*. Mrerun r|ingiti* pinirulati4, *rriicill*ln>!*.*. phinHori* brartei* minuh* »rtacri< rahru lamti fructifens aucti dentibus ovali* acuti* tubo multotiet bractinibus ^ • - A // *fasnuculaia*, cui babbu afflnii, character. b. m. daim abunde differit - Habitat in Brasilia ad rivolum Simeon Pereir* pro incur Minae Geraet

170 II IEUKTOftttf Mart n<t fi Bth I c - Fruco. a Ml peiolali pmiif otatit oblat tuberculo., basi rotundatis »ubconace.* glabriusculis. »upra lucidif, tobtut pallidif rliculatU *eriicilla*trn2-e-floris serundit axillanb. calicibus fructifens loboloti glabri dentibus obovato-lanceolatis > - Bami ^firil^a iomrnto<o-pqbe<crnir> Folia raalina 6-9 linear longij Ooralia .libro|u,1 2-1-l.nrjrn, »aprenu pn.ll» mijora, atilli< plrriimque »irribu< Bracleae .ub-nollar IJIM fnicuf.r |inn< Inngut. 10-nervi* rt Iran^rr*iro^reticulatus. Torolla calycem bmnrr tuprran* Habitat in Brasilia in rampi* deserti inter ^llnai Nova* rt Rio de H<n Frann%oro protinnae Minae Oerar* . me0-

170 II IF.HiriLOHA Bih I e - i aole r lato ramoto lenuissime frumgmeo< .i. U i toio Ml breviter peiolaliit oblongo-Hilipucit aculif. basi funfJl, . . *Jfioflif rugotif, tobtat cano-iomentotia. terHcilla>ln< paonflont »ub>eco>>J# fr||Chfe-raernotit, raceoiit pameulâit. bracteis mlnuâ. calicibus campanulatis»

) if pmg ãil kmjns oprris

rls vesiculososo-milalis membranaceis venosis, ore contracto, dentib. brevib seta-
ccis *H** y. y — Species distinctissima. Folia *Buddletae talvtaefoliae*, 4-6 poll,
longa 1-1 $\frac{1}{2}$. laia, floralia parva, suprema cricillanro subbreviora. Calyces flo-
rigen'pam rugofei tomenton, rrucciifen />< magmludine globosi reicculalo-ve-
HOHL — Habitat in Amencac meridionalis provincia Guayaquil.

181. U CALIUU Marl ms>. ex Blh. I. c. - Frulicosa: ramis pubescentib ; foil, bre-
viiier peiolalii rotundali* oblimxinm subcrenatis rugose, sublus canesceniib ;
florahb. minuiis, cjm sessilib. laxi* in racemo denso *ubramoso approximate;
calyc.b. pedicellalis lubulos.s, ore aequali Iruncalo, denl.b. subulalis slncells lubo
bremnbus 5 - Kami dnancali. Folia m scmpollicana, sublus *enac iralde
prominent marginc saepius roolulac, in parle cauli* »upcrwre remola Ilace-
mus J-5-polhcam, basi ramonn, flonbus numerosm parm. >erlicillastn
10-13-Oon, pedunculo communi rammque cjmarum bre%issimih, pedicdhs raljce
longionbus. Bractae brevissimae. Taljccn frurlifen ux aucii Hesquilmram
longi. Corolla m calyco longior. Special inter *Mnthidium* el *Pechnanam* me-
dia — llabitai in Brasilia ID Serrt de Sao Anlonio in deserlo Serro Fno proun-
ciae Minas Geraas

SeoUo XTL BODDLHOIDBS Bth. L e. 181.

Cymae pedunculatae subcapitatae mulUQorae nutnerotae pimcaUUe. Bractea
minutiae Calyces subsessiles lubulosi campanolati, dentibus abbrevitlis, fauce-
inuis uuda. Corollae lubus exserius extus tomentosus. — Frutices elall, facie Buddlelaran.

- 182 II MKMBRANACEA Benib. I. c. 131. — Frulicosa rufo-lomentosa: foil, petio-
lalis oblongo-ellipticm, basi rotundalo-cuneaiis, suprt aspernmis, subtus rufo-
tomtnlosis; fascicultr* florum pedunculais laxi< numerosis muliiflorih late pon-
iculatis, bmrteis mmuds; calyrib bre\iler pedicellulis nrreolatis rufo-tomentom,
dentib nequalib brMnsimis obluos ^ — Frutex 7-H-podalis Kami obluni* lo-
Ira^'oni sulcati, tomento rufo furfurnceo \estiti Folia 4-Vpolliran.i, bre\iti>r
acuminata, marginc lenuiler crenato-serrala; flnralla inflma conformia, »uprnora
pan a cuneiformia, suprema minuta uti bractae linean-setarea Pamrula l<c
ramosa. Pedunculi 3-^Unearen, 10-13-flori. Pedirelli caljcc bre\iore\ (a>x
flonger ovato-iubulosus, ft Im. longus, denlibus brevisimis oblusis, frurulrr
conformis, vix elongalus. Corolla 4 lin. longa. Tubus exserios aequalis subin-
rurvus, exius pubescens. Llmbi lobl 9 supreal ovaU paienlet, 9 laieralet br»<et
ercen, inflmus dejecius acuminalus saccaius. Achaenla conpreasa, ala membra-
nacea Ulissima cincla. — Habitat in Brasilia ad Chapeo d'Uvat el Barbacena
pro>innac Minas GcraSs, in sylvis caeduii prope San Bartholomeo inier Mi-
nan >o\as

- 183 II 1AFIMAK Nth I. c - Frulicosa tomenlosa: foil, peliolalis oblongo-lan-
ccolatis, basi cordatis, supra rugo%is luctdis glabris, sublus cano-lomeniosis, fas-
cicuhis florum pedunrulatii laxis muliiflons paniculalis; bracteis minuiis seiacns,
caljcib brMter pedicellatis elongahs lubuloso-campanulalis aequaliier 5-denta-
Us tomenlosis; corollis caljrc subduplo longionbus. \$ — Frulei facie *Buddlna**
Folia 4 poll, el ultra longa Pedunculi 3-4-pollicares, 4-fldi, ramis 2-3-choto-
mis. Flores ad apices ramorum paniculato-glomerati numerosi, breviiier prdi-
cellaii. Calyces bast longe altenuati, 2-5 lin. longi, albo-iomenlosi, apice pur-
purascenles, denlibus bretibus lanceolalis. Corolla exius lomeniona, lubo leoui
exserto, lobis supenonbus ovalis oblutis, inflmo oblongo aculo c>mbiformi
Stamina corollam aequaniia. Stylus eiserttn brenier bilobus, stigmatibu< pl^mi
obtu>is aequalibus. Acbaema oblonga oblu>a plana aplera - llabitai in Peruna

Sectio XVn. UMBELLARIA Bth. I. e 133.

Cjraae pedunculatae umbellaeorraes plunflorae. Bractae minuUe teiarear
Caljce-i pedicellati lubulosi, dentibus lanceolatis seticei>%e, fauce intus nuda < ,
rollae tubus inclusus > exserius

184. II RIIABDOC.UW Mart ms< ex Bth I r ||| - Fruhcosa ran,, i<nieni.io-
pube^centib , foil, bmiter petiolati» »ulrolundi» argute terrain, ban cordati.

rugosis, utnq molliter pube:»reniib., floralib. confonnib ; cymis nxillanb. umbellaeformib. rigidis paucidon^; caljicib. pedicellate* lubulosis rigidis aequalib. pube»cnilib., denlib. &ubulalis slnciis tubum acquanlib.; corolla denies ralycinos aequanle. 6 — Species fohorum forma, infloreucenia et calyce distinctiSMtna. Folia (MMincana crassiuscula, sublus venosa, ulrinque pube brevi molli >estila Cyraae vix folio longiores, pedunculo communi 3-4-lincan. Brarieae minutae. Pedicelli 2-3-11nearer. Caljx IO-nemu ngidus, exlu» molhier pubescent, inius glabernmus. Staminum filamenta glabra. Achaema ovoidoa laetia. — Habitat in Brasilia in graruinosis ad Rio Janeiro el in monlibus ad Tijuca.

185 II. 10MEMOS4 Poil. Ann. mus. Par. VII. 400. - Blh I. c. — Suffru(iro<a' raris floccoso-iomcnlosis; foil. breviter pctiolais ovato-oblongic nbibus rrmiais, ba»i rotundalis rugous, ulrinq. lomenlobis, cjmis axillanb umbollaeformib podunculatib nulliQons; bracteis mmutis setacei», cal>cib pedirelKitis lubuloso-camptnaUliti elooRalis albo-lanatis, denlib. aequalib acummlis ^ — Himi 1',-2-pedales ramosi, lomenlo albido v. fla^e»cente IIoccoho demum deciduo >c-silii. Folia 1-1 1/2 poll. longa, sublus venosa et densius (omentosa. Ptdunculi «o-mipollicares, 6-10-flon, pedicelli 2-3 lin. longi, den«c albo-lannli. Cal>res 4 ho. longi, lana alba pra»erlira basi vestm, denies lanceolaio-acummati Corolla exserla, exlu» pubescens. — Habital in Mexico prope Aclopan regioms calidissimae juxla Acapulco.

SecUo XVm. SU60IABRHEI Mart mss. ex BUL 1. o. 133.

Cjroac f^pul.incler dicholomae rouliiflorae racemnsae v. rarius difformes, in pfl-
mculam elongaiam coarctatam disposilae. Bracieae selaceae. Caljx subsensilii
tubuloso-campanulatQs incurrus, ore obliquo, deolibus lanceolatis acutis v. rariu*
obtusif, fauce lotus node. Corolla coerulea, lobo plerumque brevier ex»erto. Fi-
lamcna Yillotiitima. Frvliet v. ranat herbae elalae, plerumque magu minute
albo-lomentoi, habitu Aoisomellf.

ISO. II. LEICOPUYLLA Pohl, Ic. ined ex Bib. I. c. EM. t — Ramis basi plnbni,
superne •ubfloccAso-tomenloms; foil, brevier pelmlalis o\ato-oblon^M obiu«if
cronuKitis, basi rolundatK, supra nilidis srabriu^rulis, sublus all)o-ionitMilo«i«:
r\mis prdunrulili4 dichotomic densis mullinoris, bridns sclireis, rahre triple
hrcMorib , calrnb suliscessilib. lubuloxo- rampinuhliH MOIUMIK mrurus albo-
lanalit, deniib lanreolaiin acuin ,S It inn obtiiM^ trira^oni, lomenlo brevi*
simo subfannoso canescenie^, demuro drnud.ni F«lia 1-J-polhraria subcona-
rea, sublus reliculati, lomento bro>i>Mmo randido tcsiiia, floralia infrriora con-
formia scd par\ a, suprema mmuta. \erlinllasiri nunnr omnos rrmoiu racemoili
rx c)mi« rrgulanier dicholorox formnii, ranu« ad apices ramorum panirulanj
dentam formanles r)narum ramis irrrsulariirr rlongaiis. t.alyx "• «««*»*, ht^
minor, fructifer parum auclus, tram^rse rriirulalu«. mius flaber. ore obllqoo.
(orulla rubra, rilu* ullota, lubu< jirr%onrr rtMilus. Filamrnia bretiler piloia.
Acbaeia rompr»««. margme tubulaia Il.lib.iai in Brasilia a Rio Jrqu.l.nhonlia
utque ad Barrrrrof, in IUBIDO monio liambe cl in campi* «J l>l>^lo » »^crr^
Frio provinciae Ninas (irra?*

W H UIRIFOIU M Nil HIM rx Blh I f. - Frumro%a ramis rrrrli* tomen-
iflli«. foil pctiolaii* olilnnir»-lanreoliiiB aculi» rrrmiUliN basi runralis utriq.
iindib glabru, T. auprrnn* sublu« lotncnclln fjmi* prduirulali* dirbol®
Mentis nuluOorit, brarlru «Hareif pami, ral)nb »uli%e«lib lubulo J? «««»
pannatit iocurtts albo-lanaii*, denlib lanreolais arum ^ - llalulu* U leuco^
p*y««#, ted race«u« Uxor, »eriicilla»in remoiu, el (lore* minorcs P^ctor
Folia longe duema, plerumqui* J-pollicana. K auli* 3-«-prdal» ligno»uj ut bi||fc
parum ramo»u« Corolla pallide coerulea. - Habitat in Bra>ilia in art***II P^rope
Penba mlrr Minai >ovas ^

181 U. SCABRA Bth I e. - FrvlicoM: ramu lomrnlosi*. foil bre*IW petiolatis
ovatis rllipiicifte, ba»i roludalo-rordahs rugo»is, supra »caberritn'f • sublus v.

floralib utnnq albo-tomento*is; cjtnis pedunculads numcrosis munitions raremoj,o-pamculaiis, bracieis nnnulis selaceis; caljci b. brevier pedicellalis luhuloio-cimpanulaii!. elongate albo-lomentosis, denlib. aequalib. lanceolatis acuiis. 6 — Frulex bumanac altitudinis, basi crassilie 1-2 poll, cortice pallido nmoso, ramis ereclo-pnieniibus obtuse iclragonis sublerclibus breviler floroso-ioiucnions, diMiiimi ghhratii Folia caulina mfima subrolunda, supenora elliplica J-4-pollicaru ba>i MX cordata, mnhus clause, suprema minora, bam rolundata, floraha mfrnora par>a subrolunda, caeterum cauluus lubconformia, suprenia minula braiit'ieformia. I'amrula parum rainosa clongata densiflora albo-tonien-105»i. IVduncuh CJLICC breiores_f b-12-nuri. Diacicac mmulae. Caljci* 4 lin longi, forma *lnts<meht* OUI/I, bdsi allenuali, parum incuni, fauce mlu> nud.i, ore obliquo, doiiiiibu* lon^iludme laliludincm lubi aoquaniibus Corollac exlu* piibpMniCH, pallido lilacino-coeruleoac, lacinus mpenonbus basi albi^ lilacino-Mnaiis. lubus raljce |i| Inngior incunu* Limbi lobi j>upiTiocrs kubpateniei. I.Urr.tlos erecii, inflmus ncuminalus, bom ulnnque dente nolalus, callo iran-xirio albido Tilaiucnia basi pilota. Slylui broissimo bifldus. Acliiciua compressi, ala membranacca MI latiludinem dimidiam aequanlo cincia. Ilabilus *Gompho-Mlemmalit*. — Habitat in Brasilia in descensu Serra de Santo Anlonio inlerTabuhiro Cobcrios in Serro Frio provinciae Uinas Gcnfti, ad margines fjUarum ad Alto dost Dois inler Minas Novas in provincla Rio Janeiro?

180 II. CANA Pohl, Ic. ined. ei Blh. I. c. 135. — Ramis subfloccoso-lomtnloils di->.incatis; Toll, breviler petiolatis ovali-rolundalis oblusisftimis emarginali!»e mucronulaii!» vix crenulatis, basi rolundatis, supra lomentoso-srabris, sublus n superionl). uinnq cano-tomeniosis; c)tn|\$ pedunculalis dicbotomis laxu> paunfloris, braclPis selaceis minulii>, caljci b. pedicellalis lubuloso-campanulaiis IM-cums albo-lanaiK, dentil). lanceolali\$ acuiis ,S — Folia mfertra 4-pollinna el ulira Torolla profunde lobnla, rahec duplo lon^ior, cl\lus pubrbccns, tubo ci-Ijcom aoquanu*. A // *trabta* diffVri foliis_cauliniH rolundioribus, ajnee «MII irpi nans, pamrula litmrr, corullis majonbus etc. — Ilabiial in Brasilia ad Ililo \baiio provinciae Mina» Gera«S

100 II. SORDIDA Pohl, Ic. ined. ex Blh. I. c. - Ramis subOocco-so-tomento^s Toll, breviler peiolalis ovali-rotundatis obtusissimis mucronalis, vix creoiis, basi rolundatis cordatisve, ulrinq. lomenlosia, soblus albeiceollb.; cynis pedunmlali!, (lidiolorois deosis muliinoris; bracieis seUceia; calycib. tubsessilib. lubuloso-rampantulaiis elongaiis incurvis albo-lanatis, ore obliquo, dentib. lanceolate acuiis ') — Aflmis // *eanae*, sed (lores densiores, calyces longiores. — Habitat in Brasilia ad Ilarbaccna, Oliveira el Villa Rica proviociac Minas Gera«s.

101. II. ALTISSIM4 Si Ilil mss ex Blh. I. c. — Frulicosa elala: ramis subnorrnsn-tomenlosis, foil penohii^ oblnnps oblusiusrulis tenuibsime crenulalu, ba^i rolundaiis rugosis, utnnq rano-lomentosis; racemo amplo: cjmi pedunculatit dicholomis laxiusculis muliinori!>, bracieis selaceis; calycib. subsessilib. lubuloso-campanulaiis incums mcoso-pubescenlib., ore obliquo, denlih. lanceolate acutls. 5 — Arbuscula circiler 15-pedalis, torluoso-ramosissima. Folia 1-1 • - pollicana crassiu>cula. Racemus fere pedalis, simplex v. basi ramis 2 oppom insilrucius. Cal)ces nigrescentes, 2-5 lin. longi, dentibus 3 superionbus majonbus subpalenlibus. Corolla purpureo-coerulea iocuna, tubo bre\iler exserto. Filament! villosa. Achaema >alde compressa. - Habitat in Brasilia in campi* **prope** pagum Meiaponie el alibi in parle meridionali pronnciae Gojai.

192 II IATIFOIUMart m« ex Blh. I. c. - Frulicosa ramis molliter trlui.nn_puboscenub, foil ppimlaiih late o\alis obtusis crenatis, basi roiundatts subrom-phralik cramssimis rigidm, supra \elutino-, tuibliiH alb«-tomenio*,s i.ii,i,,ia coactata deiifcidon subsrcond.1, fiorih irregulanier r\mo«iH. S.,.,.,n,,1(1M ,, tarns scssilib, bracicis lanceolali* deciduis, raljci* nn.panulali albo->,||OM, ^

incum denlib. brevib. obliuscusculis. 6*) — Rami crassi dun, obtuse letragoni, pili* brCMBus adpressis v. subpatentibus, in parte supenore caulis albescentibus dense vesili. Petioli semipollicares. Folia 3-4 poll, longa, 2-3 lala, superlora angusiiora. Paucula 6-10-pollicans, nunc lhyrsoidea, nunc ramis infenonbus ditaricalis elongatis. Verlicillastn mlerdiim fere normalilcr cymaeformes, pedunculo communi ulrinque brevi, ramis elongatis subbifidis v irregularianer ramosis. Flores secus ramos alterni. Bractee all folia floralia submembranaceae, calycem fere aequanles. Calyx flonger dense albo-lomentosus subincurvu*, vix 2 lin. longus, fructifer parum auclus campanulalus aequalis pubescens, inlus glaber. Corollae exlus pubescentes, calyce plus duplo longiores, tubo caljcem acquante, limbo profunde lobalo. Filamenta villosa. Achaema compressa, margine subalata. — Habitat in Brasilia in deserlo ad Serra de Santo Antonio in Serro Fno provinciae Minas GeraCs.

193 H? SALVIAEFOLIA Pohl, Ic. ined. ex Bth. I. c. 136. - Frulicosa ramis molter adpresse pubescenlib; roll petiolalis oblongo-elliplicis oblusis crenaiis, basi rolundahs rugo<is, molliter utrinq. \illosis, sublus albescentib; pamcula coarrtata racemiformi secunda, axl pubescente; flonb. solilams approximate subsessilib, caljcb. tubulosis incurve albo-villosis, ore obliquo, dentib abbrevialis obtu&issimi* truncatis 5 — Caulcs elali. Folia 3-pollicana. Pamcula sesquipedalis angusla, rami in fen ores irregulariler elongali, compline* fasciculati, iupenore* irregularanler cymaeformes, supremi in verlicillasrum contracli Calyx denle nuprenio caelens majore, sed non bilabiatus* ut in *Eriope*. Corolla fere *hrtopes*, exlus pubescens, calyce fere duplo longior, tubo breviter exserto. Filamenta basi dense lanata. Achaema ovoidea laevia, necc ompressa. — species inter *Hypentam*, *Siagonarrhen*, et *Eriope** quasi intermedia. — Habitat in Brasilia ad Calumbis in provincia Minas Gerafis.

Seotlo m. HTPDOA Mart. Bit. ex BUL 1. e. 136.

Flores subsolitarn subsessiles T. saepius pedicellati, di*posili secus ramos paniculae nunc laxissimac divancalae, nunc coarctalae racemiformis, ramis cjmaeformibu*) v spicaeformibu«. Bractee sub calyce bmae nnuuiaae, ranus scetaeae h u e, cal>cem subacquanlc* Caljx tubuloso-campanulalus ar<|uali> \ ranut in<iir>iis, fructifor nuclus, dentibu* lanccolaiis acutis ^ ranus oblusis (orollac l u L I U S inhuHU S \ longe exsortus, plrrumque coconeiis. Filamrnla tilloscMma. — llorbae su<Trulices>c basi plorumque lomenlosac pilo^ao foln^ subconaccis, superne panirulatac j>ubnudaae glabernmae glaucae.

WI II DKNsl-LOR I Pohl, !c mod ex nth I t 1 n - i aulc clalo, >asi vix piluso, foil peliolatis o^alo-lanceolatis aruliusculo crrnatis, bi>i rotundali- * <rassii> »upra »cabnusculis, subtus rvticulalo-rugosiv lomenlo<o>pube<ronlib, panicul* racemiformi coarctata Klabemma glauca, ramis %pirarformib, flonb «ub<<essilib* den<<e approximalis, calycis tubulosi incum dentib lanreoljtis arutis; corolla* tubo in^cluso. ^ Folia 1-2-pollicaru Cal)ce<i membraoaroi subulabri. Corol* lae glabrae — Habitat in Brasilia ad (arelao, Kngenho hanlo Antonio el Trabiras provinciae Goyax

103 II BRACHIH4CH\S Pohl, Ic ined ex Bib I c | - Caulr basi piloso-bii" pld< foil parvi* 4uh*c<iilih nv.iti<< obtu<i<< erenalx, basi rordalit rugo<is to* mentelh<< villnsi<%e, floralib bracingq minute o>ati<< Kpiarel%*r arum, panic*^{1*} coarrtata glabernma ghura, ranrn spirarformib, flonb HulMesHilib appro*^{1181*} >*, caljcis pabrtcentii lubuloti incum reUulali denlib brenb obiu>>_t corol^{1*} tubo ?ix exicrto. ^ — Caulis erectui, 3-pcdali>_t parum ramo*u>, teres, super⁰⁰

Ilute affintt oerurrtl in kerb Martamn ex inlenore pm\ ttnae ***** Gera's
Spenet nor a pamtruta rlonngta. eomllts pants rl ralynhut a rut US* mi
fjhrnhM\$,ma, scd folta ia specimmibut nppdenlibus deSunl et idio
dentatis
describi

- in parte glauca bine inde In vesicuias ovoideas ca\as inflatus. Folia semipollicaria, simiha folus // *crenatae*, sed broiora. Pamculae rami pmani valde elongati, apice spicas breves laxiusculas irregulares ferenles flores fere in verticillastros 0-10-flores approximati. Pedicelli cal)ce breviores glabernmi. Caljx flonrer molliler pubescens, 2-2'A-lineans, fructifer fere duplo longior glabnusculus ngidus membranaceus, inlus fere glaber, denlibus laiiludine lubi brevionbus. Corolla pallida >iolacea, cxlus pubescens, lobis brevibus. Filamenla \illosa. 81}11 lobi breves obtusi Achaema ovoidco-Inquelra laevia, apice iruncaia, angults acutis — llabiial in Brasilia in \ia a Rio Cnxas ad Rio Maranhao provnciae Gojaz ad Tejora prope urbem Paracalu provmctiae Minas Geraes.
106. II. MEIOCIIIIDhS St. lil. mss. ex Blh I.e. — Caulc basi piloso; Toll poiio-lalis o\alo-oblongis lanceolalisve aculiusculis serralo-crenalis, basi rolundalo-crenatis crass is rugosis, supra pubescenlib., sublus cano-lomenlosis, llornlib bracteisq parvis lanceolato-subulalis, pamcula coarctata racemiformi giabornma glauca, florib. subsessilib. approximate; caljcis puhscenlis lubuloso-campinulali denlib lanceolalo-subulalis aculis, corollao#£ibo vix exserlo. 2l — Caulcs erecii plunpedales. llabilus // *brachystachyds*, al pamcula simplicior el %çsciculae minores. Folia fere *It. Salzmanni*, sed crassiora. Rami pamculae brevissimi, supenoros in \erlicillastros condensali. Caljccs, denies el bractee long© acuminau. — llabiial in Brasilia.
107. H. BLAINCIETI Bth. 1. c. 712. t — Caule basi piloso (?); foil, peliolalis oblongo-ellipticis oblusis crenalis conaceis, ulnnq. glabns; pamcula laxa ramosa glabemma glauca; florib. versus apices ramorum approximalis; bracteis minuiis subulalis, Cdljcb. lubuloso-campanulalis incums, ore obliquo, denlib lalis aruminalii, fruenrens valde auctis*; corollac tubo MX exserlo ^ — llabilus// *prunosae* sed folu* differt Folia tnpollicana el ullra, pcliolo Tore pollican llnnius inter folia glaucescit Pamrula minus ramosa el flores numerosior*, minus approximati quam in // *prunosa*. Caljx flonfer pubescens, fructifer glabtTrimus parum reticulalun. — Grescil in Brasilia prope Babiam.
108. H. PRUINOSA Pohl, lc ined. ex Blh. I. c. 137. - Caule elato; ramis basi piloso-hispidissimis el rubiginoso-lomenlosii; foil. scMilib. rolundalis obuifitis erenails, basi oordaiis crassls, supra scabrls, sublus Ucanoso-rugoslstiiDls; pamcula ramosisslma gUb<rrima glauca; florib. pedloellalis, terras apices ramoram approximalis, bracteis minutis suboialls; calycib. inboioilt Inconrls, ore obliquo, denlib lanceolalis acuminalls, fruciiferis auctis venosis transverse rugosis; corollac tubo vix exserlo. 2l — Acbaenia ovoideo-compressa laevft spiers. Corolla eitus pubescens — Habitat in Brasilia, in Serra San Felix provinciae Gojaz.
100. II SniPJCX S(. Mil mss ex Blh I c 138. - Caule elato, basi lomenosio-MIIOO, full subsessilib o\aiis oblusis crenalit, basi rolundalis »ubcordatis\c crassis rugosis, ulnnq. tomeniosis \ supra >illosn; pamcula laxa ramosissima glabra subglauca, poduncuhs dhformib uiflori^; bracteis minutis seiaceis, calycib. campanulais bubreciis, dondb. abbreviatis aculis; corollae tubo nuhinculoso. 6? — Folia pollicana // *melochnotds*, sed fere sesulia. Affimm // *Salzmanni*, sed caulis erectior simplicior, tomentosus nee pilosus, pamcola ramosior, rami breviores el lota minus glauca. — llabiial in Brasilia inter saxa in Serra Dourada in parte meridional! provinciae Goyax.
200. H. SALZMANM Blh. I. c t - Hook. Icon, plantar t 403. - Fruticosa ratm« (folialis) palcentim pilosis, foil peliolalis ovaiis obtusis eroso-crenatis rugous pubescentib , sublun pallid^; pamcula laxUsima subnuda glabemma plaura, rimis elongaiis, pedunculis niiformib 1-3-lions; caljcib campanulais ^enosu, denlib. acqualib. arum, corollae tubo vix excerto ^ - Frulex ramo^Mimu< irlpedalis (exclusis pamculis, quac 1-2-pedale<), basi prnstralun v rrrrii«. rami divanrali Rami sub pamrula folio<i, pihs lonpn pateniibus >II|OM pamcula m ramoft clonpalo< lonios subrnmosn* di\i«a, basi lunr md« vaopi» \onincenso-iu_mida Folia floralia ad basin prdunrulorum Imearia glibrrnma I-J Im |nn„

Pedunculi remoti subsecundi, inferiores subindori. Bractea sub pedicellis brevis minulae setaceae fal) x flonger lineam longus, fructifer 2-lmcnns infk-mi mrmbranaccus 10-nemus glaberrimus. Corolla pallide coerulea, calice duplo longior glabra. Tuhus breviter eisertus 1 imbi iobi 4 Mipmores subpatentes oblongo tubo aequales, 2 supremi slrns purpureis nolali, infimus vaecatus Aeliaenia o>ato-compressa obtusissima lactia. — *fl tomentosa* foliis ulrinque lomen-IOMS, subtus albis — Habitat in Brasilia tropici, in sa\o>i< nmnlosh it campi* alh\ ad \ilia do Illo das Conta* cl Cailcie el ad flumon Sin FIMCIMCO protinnac Iahiensis, in pascuis prope Dora Jardin protinnac Almas Geraos

201 II CALOPIHLLA SL fill mss. ex Dili. I. c. — Elata ramis superno paniculate glaberrimis vix glaucis, foil, petiolatis amplis otalis acunnnatis sinuato-lobatis crenatis, basi profunde cordatis, supra scabm, subtus dense nlbo-lanalo; pamcula laxissima, ramis Cliformib.; peduculis brevissimis umfluns, brarief minutis setaceis; calycib. fructiferis valde auclis glabra rocmbranarcis subglauus, oblique campanulas, ore broissime 5-dentato, corollae lubo ui einrrio. .S — fauhs 3-pedali\$, vesicula amplis hinc inde inflam, omnino glaberrimus, sed pars inferior deest. Folia 4-0-pollicana, supra vmdia, iubrrrulis cle>ati\$ scabra Toroirao pro specie hujus seclioms rainiraae, at caljces fruriiferi 3-d hn longi — Ihibilal in Urasilia, in monle Morro d'Andaia dicio inter Minas ^o^a<

202 II MTIFOIU Pohl, Ic. incid ex Blh I. c. — Ramis basi pilo^o-hi^pi.lis, superne paniculatis glaberrimis glaucis; full, petiolatis late o^atis acunnnatis irrckdlinter crenatis cl ^inuato-lobatis, basi profunde conlalu, supra scibn^, subtus albo-canentibus, pamcula late divaricata; pedunculis filiformibus unifloris, cd-1) iib. glabnt Dembraoaceit, fructiferis valde auclis oblique campanulatis, ore breiMsime 5-dentato; corollae lubo longe exterto i — Caulm claim, baM fruii— Cfxu* Folia floralia mi bractea mlnata tubulosa. Corolla coccinea. Acliaema ovoidea. — Habitat in Brasilia ad Santa Cruz provinciae Goyai.

203 II CRISPATA Pohl, Ic. lord, ex Dlb. I. c. 130. — Caule elato, basi vit piloso, foil, petiolatis oblongis, tnarginc undulato-crenatis, basi rotundatis rrrnssissimis ri^idx, supra hirsutis, subtus molliter villosissimis, suprnob hn(<>ohto-jinoanh, (loralib br.iclcisq partis lanccolalis, pamcula roarrtna glabfrnma plmrn, ¶<>rib SITU ramoc brttes podunculalis sohtariin oppositis, rahnb tubtiloso- < iui| uiuLiliH molliirr UIOHIN, donlih lite hmrohtis > // mlynnat ifhms stil i Inrarii nxi* dilis <listiurli\Mnn (orolhi* MII MP, rihrc< ilnplo longiore^.

Habitat in Brasilia in >ma Dournh pro^mnir <*>!/

201 II Hill IM\ Mart ross r\ Bih I r (vjlr rial., bisi pubescent? el pili< rarts riliato, full pehohl n o<<ito-lanreolads oblnngiste irn ^ulanler ik<^ilali<> basi roiuuifl >ik< <ubcordati>te rra<<i<, supra ^illo<is, %ubtus inmeniosn-pubrscenlib pamcula latissima subnuda itlabemma planei r-inm prdunrulisq. subunf* flcirM r\finsa(i<, bractef tobulatis, rahcib fruriifris doniraiis mbmflatK, denlib lanroblis arulis 6 — r.auh< e ba*i pennm irrius, Inim.inic nltiudio'' Folia 2-1-pullirana, subtus rane<renti-lnmrnlo%j, infima bmmra }rdun<^uli iofenoret sarpe raossi Inflort l,al)t flonfer // ralynnnt, at pn<i anhrstu valdo elonxatqr. Corolla rorcinea fere II lan/lorar. »ed paullo brrtior — Ilabi^I in Brasilia, ia campit subalpim< petrous in i(Urrn%u montis Sincora pro*in- ciae fiabirnsif, io rampi* pelraeis prope Reira de Tras o% Monies, in P*rt6 occidentali provinciae Minas <<rrae< el in sjhis raeduis arenosis prope pag>^m Penha inter Minat ?iotas

2» II PAMC'LATA Bib I r - Ramis basi Y.IIOMS. foil brt^onrr petiolali* o^<^* tis oblusis crenatis, basi rotundait rra<<i< rugosis, utnng den>e (omrnlo>o-<n* losis. pamcola laxissima tabnnda glaberrinia glaura, ramis elongatis. pedonulit fidformibus umflont, ral>rc pubetreole subbrenonbus .^ - I ruiet bat* ¶<>^#y* folios** ferrugineo-tomeotoios rt palentim <illo>u<. tuperne ample paniculatae llaberrimot glauco, »ed rarios inflato-turoidu%. i A\>| fruriifer 5 lineai lonj] canpaoulatus membranaevi venosus, txtus glaber, inius albo-^illo<H, denlib<>

lanceolatis atqalibus aculissimis Corolla coccinea, exlus pubescens. Tubus taljce duplo longior Limbi lobi multo breviores. M)lus longe exsertus. Achaemia cotnprc^a o\alo-rolundata aptera — Habitat in Brasilia mcndionali.

900 II. L\iriOR\ Marl mss ex Blh I c — Ilanm ban \illosis foil pcholaris roiundais obluM* crenatis, bast rotundalis cras&i* rugosis, ulrinq tomrniosopubescenlib, sublus rclicularis albesnenlib, pamcula laxissima subnuda Rlaber-rima glauca bracei* pann o^atis, mm is elonRaii*, pedunruhs filiformib uniflons, caljce pube«ceiic plum duplo longionb, corollac tubo caljce duplo longiore of — Habitus II *pantculatac*, *cd folia muho minora (0-0 Imcis longa), longius petiolala el minus villom Panicula ramo*ior, pedunculu duplo longmnbu*. Folia lloralia minuta, scd laliora quam in // *pantculata* Uradpnc o\atae minutae C'alx \isroso-pubescensi parum incunu»v fructifer foro glalier, intin laxe lanalut, dentibus o\ati« acuiiUHCulii Corolla <prrio«a roccinea, r\lus pubeMenn, ultra polliccm longa, tubo longe pxnerto, supra <ub\onlrroso, fiuie subcunlrada, limbi lobis suprnoribns late oblnngis OIUMS - Iihibit.il in Uiasilia, in campis monlosis ad \ilia Rica el alibi prtninciae Minas drrac^

207 II. CALYCINA Pobl, Ic. ined. ex Blh. I. c 140 - Caule clalo, bam MI pilo^o, Toll peliolali* obloogo-elliplicis obluais creoaU, basi rolundatit crasaisikimi*, ulrinq. tomentoto-villoiif, superiorib. angutliorib.; paocula laxiima subnuda glaberrima glauca; ramia pedunculUq. uoidoria elongalit; braceit cordato-amplexicaulib, calycib. fructifcris elongalo-campanulalls glabrls, deniib lanceolatis acutts 6'. — Calyx fructifer 7-8 lin longut. Corolla ultra pollicam glabra rorcinea Achaema late compressa. Species pulchemma, bracteis rt folns florihl»u« **distinctissimj.** — llabital in Brasilia ad bcrra do Chr»»(ais el Trahirjs pro\inciai' **Goyaz**

20A II >I<R\TIU St Iiil m<s ex Blh. 1 c — faule clato, baM paicniim pi-|o!>o, full priolali*. inferiorib malib, suprnorib ob>li»n^o< Iipin i> Ijnrn I iliste scrralo-rronutis, baM runeali» conaceu, ulrinq \iridib. »ub»rabriH glabra \ |»-itentim piluM», pamcula laxa tubnuda glaberrima »ubglaura f rami^ r^<niis.iio, pedunculu calyre paulu longionb.; braceu panh o^ato-lanreulaiu, ral.uib fruciiferi* elongaiit, drniib. laaceolatit aculit, corollit calyce tubquadruplo Ion-glonbut. 6 — Inter // *eaiyeinam* el *lonftfloram* media. A priori differ! foln* glabris v. aaltem pilo»ia, pedaoeulis brevioribus el braetit minonbut aoguMio-ribus, ab // *longflora* folu* longionbun, braceit ovalo-lanceolatt etc. Caulis 2-4-pedalis simplex \. parum ramotus, hioe inda loflatua. Calyces el roroltae nunc glabri mine \illosi (orolla fere •etquipollicarlii. — Uabiial in Brasilia, in terns aunfrns prope prfgum Paracalu provinciae .Minat tieract «ulgatn»ima

200 II IOM.IF1.OIU IN.hl, Ir ined ex Bib I c. - Itamis basi pilosis. foil pc-liolatis o^ato-oblonms \ rolundaU^ <<busi* rronatis, bati rotundalif rra«>», MJ-pra scabriH, <ubius ri*irul.iio-ru,;<>si*» rufo-pube^centib, pamcula Uii%ima MIInuda glaberrima glauca, ramis elongilK, pedunculu Qliformib elongatit umlloris; braceis partis lubulaliA, calyub. campanulutu, fructiferif aurtu itibunbrinareiti reticulatis, dentil), lanceulalis acutis i> — Cal)X inlu« ^illois%imuH, niui pubescent, demum glabratus. Corolla extua villosa, tubo cal)ce triplo Imigiure Achaema ovoideo-compressa. — Uabiial in Brasilia, in campis a Barbaceua usque ad Paiacatu provinciae Goyai.

210 II RETICILATA Mart msi ex Blh I. c. HI. t - Caulib ban pubetcrn.b •ubpilosis, foil petiolatis o\atis oblongis lancrn|aiis>e duphcato-serrate, bas| cuncaiis rotundatis^e cunaceis, mpra glahris tubscabns, subtus reiculato-%< no-sissimiH, ad tenas tomenlosn-pubrscrntib, pamcula lamsima subnuda glaber-rima glauca, ramis pedunrulnq unillorii elongalis, brarieis nubulnu. ca h, ^ fructifens campanuhus v deniib lanceolatis acuiiu»culis. ^ . < aulit |'-2 - - - - 4alit erectui, interne «ublelragnum, superne teres. raro inflaius I ..,1 fornia lalde variant, nunc late otaia, MI sroqinpollicaru n |, .m b lun]a,3 hIJI 4

oblongo-lanceolata, basi cuneata 2-4-pollirana Pedunculi omnes uniflori filiformes, calyce 2-4-plo longiores. Calyx fructifer 4-5 lin. longus, inius dense tillosus. Corolla // *cocctneae* y. parum brevior. Stylus exsertus, apice brevissime bifidus, stipitalibus crassiusculis. Anthera obovato-compressa. — Libellula in Brasilia, in rampis inter Rio do Rile et Rio Grande in \ u ad S. Joan del Rio prouincia Minas Gerat's, in campo borbordis circa riuem urbem et prope Cirandai riuem protmcaie.

till. II GLAUCI Si. Hii mss. ei B(h. I. c. — Caule elato, IMM *wx* piloso; full, p-holiii* o\alis, marline undulato-crenatis, basi cuneati > crasM* (onareis, utnq. > in Jib, supra *rabn» subglabris, sublu* reliculatis laxis Mine lomrnrllis, pani i ula man mi, donb. *cru« ramos elongatos sinctos bre\ucr pedicellis, bra< leis pnrMs lanrolalis; cal)Cib. campanulalis suliplabris, donlib Ink' lanreol. iis ob- IUMS, corollae tubo longe esserlo. ^ — Media inter // *rntpalam* et // *rticulata*. A priori differ I glabrie foliorum et rah cum et ramis particular elongatis, A // *reticulata* folis majonbus rraisionbus, cal>cibus breMus prdirellati* mlus fere Rlabns, dentibus oblusn. — Habitat in DraMlia, in pascuis prope habitalionem Caiambu in caropn Gera» pro\innae Saneu Pauli.

t *Species e genere excludetulae.*

ii mtuiFnins Wnd ~ .M\>YNA\TIKS IHPTOIDES.

II (il \M)UOs\ Meb. . S\LMA OCCIDKNTI IS.

II INFI \T\ Spr - MARMPIAMIIES inPTOIDES.

II. I L RII> \ Spr. - MARSYPUMIIES HYPTOIDES.

II. PsMnO-CIUMVEDRYS Poil - MARSYPUMIIES IIYPTOIDES.

II. STACHYOIDES Lnk. — ELSBOLTZIA INCISA.

tt *Species tix notae.*

II. CIA^ISSOHIS Bib. Llnnaea VI. 570.

H. MEMHODORA Scbrank in Sjll. pi. sor. Ratisb. II. 30.

H. NEPALENSIS Lebm. Sem. hort. Lamb. 1^».

II. ODUMFOLIA R. Br. in App. lo Sail's Ab)ss.

II Pn|||.U>A J.irq.

II M\K\TIROSMA Spr.

.1)^4. KRIOPL *Uumb. et Vonpl.*

Humb ft Donpl mss ei Dili I ab ai gonrr. el <prc Mi — Menn Gener. plant.

\3*cu\ | N.1 N 10|

I F. ini'EMOIDE* Marl HIM ei Dili I. r. 142 7 - Fruirn«a raule ba*i piloto, ~~supern~~ gbhernmo ulauro, foil, brenier peliulaii« otjii* oblungi^ve aculi*, bafi ~~rotundatis~~ runralitte roriareM, «ublu« alhi%. panirula ampla rimo«. 0 — Frolet r%\ %r\pedji4 Rami terelc«, ba<t prte*rrhm ad nndn« ut in *Hyperiit* pllii lonji* patrnlibu« sordide albic hir«uti, «up»rne uli pameula fflabernmi, ror« glauo indiiii Folia 3-3-pn||irana rra<«a, *«rpiun anile «errulala. nune tn erenulala, Junmra «upra inmrnlo breti molh pillnlo «Huiina, denium glabrata *ut> lurid*, mfra valde reiiurata albo-tomenio«a. Pamrula pedali* el ultra, rainit infrriohbot ramo«i« Pedunruh lomenloti, >it rah re brenore*. Braealea miott-Mr «riarp«f V.M|| flonfr lurbinoiu*. niu« ulln^u*. denlibu* omnibuc |anr*o* lali* aruiMftimit, fruhfr clabrata«, drnihn* ul in inln gnrrre bilabialim aufli»- Corolla pallide cneruleo - r«»»ra, «lrn« roe^ileit in parle *uperiorr, ealje d«P>° loifinr, lubo dilaialo ewrtn, fiius |ul>r«<rnv habitat in Dra^ilia, lo al^{if} cimpit ad Rio da ConUt pro«ineiae Dabien«i<

2. K MOMK.OU Mart DIM. *I Bib. I c 141 - .suffruicoia rauk ba>l canotomrnio%, mprne Klabro roeruleteenie. full bretier peimlaii* ~~ovato-sa~~ *~~tundis~~ rnnarm, »upra glabnt laridit »abriu«ruli«, «ublun ~~resescentib~~, ~~margine~~ ~~relatis~~; pameula ramo%a ^ Soffrulrt ihpedali*. Rimi dun irriief f. tl*_»» tetrage Qi, tuprrne to_m*_0lo denudjlt el nnro-roerule*rrnie». al %n fU^{cl}. Fo^{cl} ~~reticulata~~ ~~vix~~ ollra lemipollicriD looga paieun«, mar? M« le%mr drniaia. tubltti

- et cano-lomentosa. Panicula semipedalis, ramis plerumque simplicibus, juniores ul pedunculi et calycis florigeni lomentosi. Corolla pallide coerulea, exclus pubescens, lobo dilatato breviter exserto, limbo amplo. — Habitat in Brasilia, in campis iupalpesinibus ad hincora provinciae Bahierms.
3. E. OBTI *»\TI Bib I c — Suffrutescens caule lomentoso-pubescente, fois sessilibus olib. oblui* subterminalibus conaccis, supra subrugosis, sublimbus Inmenin-Sis, ramis natis, racemis ramosis 2l. — 4b *E. polyphylla*, distincta cum foliis obtusis lumbis majoribus sessilibus et magis lomentosis, ramis brevibus ramosis olib. — Libali in Brasilia, in campis alposinibus prope Baluensts
4. E. POI\PII\III Marl niss ex Bib I c — Suffruticosa caule lomentoso-pubescente, fois brevibus poliolalibus olib. IjirtMilahsu* .lulis *« rralis ton. mis sup. i lundis, nubis Hiiliomcniums, mirnmo ciliali, racemi elonjii> hiisimpluibus 2l. — Suffruticosa Immilis, basi alde ramosis cl druse Miosis Bum cliam Miperne lomrnoM, nee clauri. Folia MI semipollirari.i, aepe r(in)li< in, basi rotundata, ramis uli pelioli pilis lon^ts palrnibus natis, t>pr< ; IUI laoM.l, sublimbus lenuier lomentosa. Racemi oennprdalOH, fimplires Huron pm-cdenium. — Habitu in Dramlia, in campis subalpsinibus ad Bio da (uni <> <I Cajcf provmciae Bahiensis.
5. E. CRASSIFOMA Marl. mss. ei Bib. I. c — Fruticosa: ramis pubescentibus, full sessilibus subimbricatis laevibus acutis serratis crassis roriacris, utrinque glabris, nervis nudis. ramis simplicibus 6 — Fruktulus 1-2-pedalis rertus, habitu h)ol</i>hyllac Mnulis, sed folia lata sessilia densissima suberecta densissima <fere inibri(i.e. infra tenosi> sima et minima (omenl(i.e. Girollao ul in [>n<(c-deniibus dilute i ilaceae, eius pubescentes, lobo m exserto dilat< Ililniit in Brasilia in Serra (Ji> Ij^es el Smorra proMneiac Habiens «
6. E. P\HMI'OIH Marl m<> ei Bth I e MI — Suffruticosa ramis (om< n< >> pubescentibus, full ulisrv^ilib. oalm acutu compluralis, utrinque MTMIII) m< lhi< r tomentosu, margine medi*, ramis< numerosi« »ubramo»i> ^ . Suffrutescens ramis iisminut. Folia >ix 3 hn. lonica, in spreiroimbiis siren omnia romplirata \ r< n-volult, uii rtml, phunculi et calycis loncto br<?l subirelullo pohetrmtia Torolla *E. erastifoliae*. - Habitu in Brasilia, In gjMt Caljoga* <! Siocora pruvineiae Bahiensis.
7. K. MDIFLOBA Humb. et Bonpl. mis. ex Bib. I. c. — Suffruticosa: ramis birtutissimis, Toll bre\nor peiolahs oblongis acutiusculis calloto-serratis, basi unguentis glabris tonareis n<><Ms, margine kubnlii<; racemis simplicibus 2l. — Suffruticosa ere< h< l'<li set>(inpollitaria i urola iolaceae, fauce ampliala, ramis purpureis nuda Iluuii Im lerin^iales. \erlirilla>ln inlerJum quadnflori I'rdicelli (ilifonim's ^ 1ln. l'n; i^lahn Toroll i uhel* quadruplo longior iolaira, lobo iix riMTlo, func ani>li.ti. sriK purpureis nolata, lobo infimo apice biculiler bidenlari - II ibiial in \mema aequinoctiali ad Ma)pure in Guiana.
8. E. CRASSIPES Bib I c — Suffruticosa ramis erectis simplicibus pubescentibus; fois «ubHCK»lib. o>nln obiikin rrenalibus. lancrolalis aculu srrraii* ^ l>lib< useulis; racemis elongatis simplicibus. ^ — Caulis eban crassa lignosa plures erecti semipedales pedali. Folia nunc semipollirana, plerumque otava supenora lanlum lanceolata, nunc Jn >or. fi.) omnia lanceolata pollirana ei ujri. in ulraquo pauca rem<ia itubaspera, plerumqutio tflabra \ pihg rarx uuiti.nio mumla njjidula ramis lomentoHO-pubescentia. Racemus 4-H-lobulatus « Mrniu» Corollae lobus inferior basi ulnuque denatus, apice bicornu% -- ^ acutifolia — Habitu in Brasilia, in pasnis «Iran» prope partem van Jose in parte medietatis pro<iii(i.e. J(>.II, in pro<ui(ia Hiu «dr Jjnnro.
- K TI I i:ilOIII s M 11,1 mss ,iB1b I e - ||.rl.at.a • pr..ru_m|,i,< Mn ,, bam painilim pilose, supenu- piibr<roniib fois brenh r prii< hits % 111s e i,1w- •ioirulu subterminalis Klil>n< *nb(iliais rir<*nn< Honm s sut.s mpi, \ XI% ;

f uiles herbacei elongali an complurc* c basi lignosa', lomenlo bretig>imo pubescentes el in parte inferiore uti margines foliorum plerumque pihs longis palenlibus ciliali Folia fere *E nudtcauhs*, sed plerumque mmora, wx ultra semipollmana. Internodia folio longiora Peliolu* 1-2 lin longus Racemus *t nudtcauLs* Corolla coerulea — Habitat in Brasilia, in s\\is caedim exaralit prope 1 ucnda de Jose (aelano de Mello el in plamlic inter Alto dos Bois el \ilia do l-juido inter \linas Novas

10 E (OMPLK AT4 Mart ras< ex Bth I c. — Frulicosa ramis elongate lomenlosi* patentimq subpilosus foil petiolatif late otati» OMIUM* cri'tiatis, ba*i rolundalis rugo>is, ulrinq villosis, sublus lubincams, ricemn simplicib albo-lomentosis o — Frutex orgyalis, saepiu* incanus Rami elongali sublexuoo, race mi 1-J-pauciflon terminalet. Folia distanm semipollicana, molhter nllosa, Jumora fubius molliler albo-villosa, saepe complirati (nrolla pana coeruleo>iolacea — Habitat In Brasilia, in alta plamtie Chapada do Paran pronunciae Minas Gerafs et in sylvis CatmRan et campis ad Sinrora pro^incia Bahienois

11 E FOETIDA Si Ilil ross ex Bib I c 141 - Frutirosa rarois dnanratit, ba<i pateniim pilosis, superne lomenloso-pube<cenlib, foil petiolain o%ab>> ocului-rulu serrato-crenatis Klabrii<<culm conarei<, racemis paniculalo-ramosis \$ — Irutfx ereclus 2-3-pedali< Folia 1',-3-pollicaru, saepe romplicated, juniorn ad \i\\w pubescentia, tetjsliora glabrata, supra lucida, saepe glulino<a Pantcula elnn^ita laxa, ramis talde diTanratm. Corolla purpurascen< Odor foelidu* — ILibital in Brasilia, in denerto occidental! provinciae Minas Gera<*> el in pascuis etaratis prope paffuro Corumba in regione meridionali provinciae Cio>ai

12 E ALPESTRIS Mart. mss. ei Bib I c — Frulicosa rarois peiioh*q palenlim pilo^issinis, foil petiolaUa ovalib. oblusls creoaals, basi rotundao-cunealis rugo<isf ulrinq til|pais, aubtus tli eao<fcentlh.; raceois panlcuUio-ramosis. 6 — Affinis *E complied***, §94 soperflelc blrtotlort, tolilt angusllonbus et praeseriim Ooribut in pamcalam pedalen el ultra nee In racemum simplirem dispositi* dislincla. Ab £. *macrotaekym* differt foil Is brevibas oblusis — *fi ? glabrtor* — Habitat in Brasilia, in summo monte Itambe, *fi.* in campis editis ad Lages provmciae Balnen<>i4

1) h M\I(OsTAFinA Mart m<< ex Blh I c. - Hook Iron planlir t 401 | — I ruhrosa ramrtt puhesrenub villo<i<c. foil pHmhtis o\atn-ljncoolatis artiis <I mit ii Hi-, ban roiundatM subcnrditise ru^osK, ulriruj MIOMS pimrula amph rjmnsi ^ — rrulei elilu*. villo<itate \JMO \anabili< Folia I - 1-pollicana et I n^iora, subtus saepe pallid ura v Mibcanrscntia Pmutla <aepe <rsquipedjls it ultra Floro secundi i orolla corruloo-purpurca, extu< pube<cens, lobo mfimo bre<i><ime hirornuto In <ar \$ caule< rufn-inmenlosi et pilis pa* lentibu< drn<e bir%uli folia >ublus rufo-villosa el magi< rugo^a — *P nllota* — Habitat in Brasilia, ad San Joao del Rey Mariana el alibi protinriae Minas Genet, in areno<i< in Serra Negra ad hmiles pronnciae Rio Janeiro el ripas Ouami* Itacurambi Pequeflo inlrr Minas !So<<<

Subtribui IV. L(VAM)!JLEAE Endl. denrr. plant, p. Gil.

Corolla bilabial!, labio snperinri* bilobo, infriore tnlobo. **Siamine** rorullar tubo Inelu>a. — Ocnun meditraneum.

3.W> Lt1%\DIL% *Imn.*

(Linn. Gener plaot no. 711 - Meikn Grner pUnt vatcul. I 2U II 101- " Bib*

Labial gener el spec IVI

toll* L ST01CIA8 Bth. 1. e. 147.

Foln noralu 3-5-flora to spiean dentam imbnrata. »Qperiora slenha comof* Calycis den< »uprenus d.Utalo-appeodiculatus. — Arbusculae folna inieftm"11s < pinnalo-ilenutis

1. L. STOLCIAS Linn Spec plant MO. - Bib I c | - Foil oMon<no-linearib 'niegermm, margin* revolutis, ulnuq cano-loneolons, spins dcosif camosis.

loripillasiris 0-10-(loris; cal>nb. ovatis incams; tubo roroilae breviorc vS—
Fruticulus 2-3-pedalis ramosusimus cretus, ramis subleretibus, janionbus cann-
lomenlosis, saepiu« abbreviate dense foliosis. Folia sessiha subsemipollicana,
juniora brevtora, in axilla subrasciculala, omnia sublus >enosa. Spica broiler
pedunculaia terminalii 1-1'-pollicaru. Folia floralia den*c imbneata rhombco-
cordata acummnta opposita \ in var *ft* qualprnatim \erlicillala V5-flora tomen-
toso-pubpscerilifl, siiperiora siprilia romo«a dilaiata oblongo-cuneiformta color.iU
Cnl>x otato-iubulosuft lomenlnsu\ dcnlibu< breuhti* obdmusculK, 4 inferioribus
sub.icqu ihbu«, supremo in appndirpm nbcorddlum dilalalo fnrolla alro-purpurpa,
lubo broiler exserto Arbaema cuatn-triangtilaria — *Slocchat purpurea* Tourn
In>iu 8)l I W - *Stoechat offianarum* Mill. Did no. 1. — /. *Sioechat* Sibh.
et Sm Flor Grace \ I t 540.

0. *macrottachya* (linn Hist. I at 110 — Spicn crassionbus 8-jtonis. coma *pe-
nosa. folns laiionbus. — *I pteudo-tloechat* Kdib e\ lloll in Bol 7eim(C
H29 11.001 — ll.ibil.il in Europae mediterrancac el Africa? borealc* collibus
HCCIH peirosn arenosisque.

8. L. PEDLNrXLATA Ca\ Praecl 70. - Blh. I. c. - Foil, lanceolalu inleRern-
mi<, margine revolulm, utriq. cano-tomentofif; tpicii dentit comn^it; tertinl-
lantriB 6-10-norli; ralycib. elongalii pubesceollb., luburo corollae aequanlibui. i>
— Differ! a *L. Sloechade* Imprimi apica erattiore brevtore el laiioie atque longe
pedunrutaia, ralyce cylmdraceo nee ovalo, lubum corollae vii aeqaaoie nee bre-
\iorp, p(habilu. Odor debihor quam *L. Stoechadts* (De GinR.). An re\rra upcde
distinda⁴ — *I. Stoechat*,⁹ Linn. Spec planl. 800. — *Sloecha* pedunculata* Mill
Dul no 2 — Habiiial in Hispania, in I UMLama ad npat Tam in oruelis hcd ra-
rior, fnMjuMilior inlcr Lamego et \I^PU el in insula Madera.
3. L. VIRIDIS Ail llrnl. KPW 11. ^ - Blh I P. IIX - Toll oblonco-lmearib
Intpggerriini<f margine ro\oluli\, utriq. \indib MIOM», «pici% la\iusculi« »ubro-
m>n; >eriicillaklrn (J-IO-flon». ral>cib lubulo»m fubtilloii*, lubum rorolbe
aequanlibus ^ — A *L Stotrkade* differl praeipuc folnt %illo»i« uii »pira PI poma
viridlbut, »pica laiioie el cal>pe longint appendirulaio. — *Siotekas rirtdit* Raj
llltt I. 514. - *Latandula tiridis* L'llerit. bert. Angl. 10. t SI. - lloaTm. el Lnk.
Flor. Portug. I. M. U. - *L Masioni* Cela. et Gtng. IlitL Uv. 137. - Habitat in
Lutitania ad Serra de ItonchiquA tl loUr CatirooiftrU el Meriou ei in isttlla
Madera.
4. L Di:>T\TA Linn Spec, planl. 800. - Bib. I.e. f - Poll. obloDfo-lioranb. Ian-
ceolahs^e obtu«e pinnato-dentalis pubetceolib., toblut caelt, anargine rpvolutit,
spicis laxis subcomoKi», cal)cib. oblongn pubetcentib., lubum corollae tubae-
quanlibu^ *A- — SuTruifX tesquipedalm, ba>i ramosut, ram it adtcendenlibui tr-
Iragonu tomenlo<o-pubpHpentibu»v bail folioni«, extremiiale pedunculo elongalo
Dudo terminals. Folia 1 — l'A — pollicaria, margine regularanter rrenaia T obiu^p
pinnaiiflda, ba>i anguiktaia, »upra \iridia glabnuipula, fubtoi caoo-pubeppnha
Spica 1-2-polhcariH, ba>i iniprrupla >eriinllauln 5-10-flori. Folia Ooralia rhom-
boidea acuminata, bast euneata membranacea %illoio-tomfnlo«a, nuprrma MPMIU
colorala nubcomota. r.alycet brevtier pedicellaii oblongo-cylindracci, frurnfri
parum elongail, ban subinflati, deniibui 4 Inferionbut aequalibui abbreviaii
acuii«(supremo In appendicem lalif>inum membranacpnm obcordaium dilataio
Corolla /. *Stoechadts* Achaenla ovoideo-triquetra pallida lar>ia. — /. *hrtrro-
phylla* fPoir. Did. Snppl II 308) vanelalei duaa horlennec ^erotimiliier li\l,r d .,
mrliidit, qtiarura allpra forte ei I. *demlata* el f. *tera*, alters ex I, *drnlata* ci /
Spira oria e*! - TT Ging. lli<i I a\ 142 > - *Slofthas dentata* Mill |),rl oo, I -
Ldenlala i urln. Rot Mi«at I ¥10. - Habitat in Kuropap el AfriPap region^ mp-
dilprraneae occidentals andi<, in HiKpania a rpgno \a|pntinoad \ndalutia_m rt in
iruuli* Bakancis in reuno >apn\it.mo ad dargann. in ^ir.ln, »n IfIMjh 7, Mn1|1i
Archipelagi Graeci, at >n tponlanea, in regno Alger.cn.i rt in nmilj Madera

Sfctlo II. SPICA Bth. 1. o. 148.

Folia floralia 3-5-flora in spicara laxam appropinquata, superiora calyce breviora fertilia. Calycis dens supremus dilatato-appendiculatus*. — Arbusculae ramis superne nudis, folus inlegerrimis.

5. L. VERA DC. Flor. Franc. Suppl. V. 308. - Dlh. I. c. | - Foil, ohlonpo-lmcanb. <inceolati>e integerrimis, junionb. canis, margine reoluti, «pim interruptis; verticillatis 0-10-floris; foil, floralibus rhomboidibus* aruminatis membranaceis, omnibus fertilibus, supremis calyce brevioribus; bracteis subnullis, > - Fruticulus 1-2-pedalis, basi ramosissimus, ramis erectis lenticulis subtomentosis* basi foliis, buperne <unnudis. Folia Juniora saepe in axillis* fasciculata broia, margine reoluta et ulnne albo-tomentosa, tetra-lobata plamora imdiora I-I'/r-pollicana v. clivata longiora. Verticilla* triflori remoti, supremi in spicam interruptam nunquam compositam approximati. Folia floralia contanter dilatato-membranacea venota acuminata glaberrima et fere ciliata, sed forma variabilia, in Omalis praenertim in A. longius acuminata et calicem subsuperanda, superiora concava calyce breviora. Calyx breviter pedicellatus tomentosus caeruleo-virescens, dentibus brevissimis, supremo in appendice breviter producto. Corolla calyce duplo longior, exclusis pedicellis. Achaenia parva oblonga brunnea lenticulata — Species in horto >acipiente culla. — £. *angustifolia* Moench, Moih. 3*9. r1 Aurt. <eu - *L. Spica a.* Linn. Spec. plant. 800. - *L. Spica* Lois. Fl. Gall. II JW. - *L. turgida a.* Lam. Fl. Fr. II. 401. - I. *officinale* Chan in <ill. Fl. Dauph. II. iU. 3M — Habitat in Europae et Africa* regionibus mediterraneae collibus sic-rilibus et declivibus, in Gallia meridionali ab Occidua inferiore et Gailoprovincia usque ad Lugdunum, in Euria, plagis maris praecipue, Liguria occidentalis, Corsica, Helvetia, in Calabria, la A. Uale.

fi. IYrtinaria; Folia floralibus inferioribus longioribus; calycis appendice etidentiore. — *L. Pyrenaica* DC. Flor. Franc. V. 308. — Crtscil in Pyrtoacis oneotalibus et in Calonia, Arragoia.

0. L. LANATA Boiss. Eleo. plant. nov. Hisp. 155. et Voyage bot. dans le midi de l'E'p. 2M. I. L. 135. — Bam suffruticosa: foil, oblongo-lanceolatis latis oblongis integerrimis, basi longe angustatis, margine subreolutis, omnibus dense tomentosis* canis; <scipi> <alid elongatis stellatis* imbricatis>, «pim Hon. iiii <nlitit'rtitit> >rtinlalis 0-S-floris*, foil floralibus lincolalis > lincanb, omnibus fertilibus, supremis r. l. subreterioribus. bracteis* minutis srUneiH, calyce inpleto hirsutis* <ifrib. <rahe ocloner^io brevis* denhecililo, ad m* r>os et ad roar — K* m ^lelidiim lanaio, corolla hirsutissima. "4 — Cre>cil in Iitpamae australis areo<i<

7. L. M'ha DC. Flor. Franc. \ .107 - Bib I. c. 110. - Foil oblongo-lanceolatis* >ub<paiculatis> inlrgerrimis, basi longe angustatis, margine subreolutis, utrinque cernit. spines subinterruptis; verticilla<ns C-IO-floris>, foil floralibus lanceolatis* linranh, nimb. fertilibus, supremis calyce brevioribus. bracteis* linc.iri-fubulatis*. calyce brevioribus. ^ AfOnis *L. rente*. Differi habitu humilioribus, colore fib. diore, foliis ad basin ramulorum magis congestis. >ica drn^iore et brevis, lorum Ooralium forma et bractearum praenentia - /. *Spira*, 9 I inn Spec, planlar. 800. - *L. turgans* ^ . Lam. Flor. Franc. II 4ai - *L. lafohn* till. r' Dauph. II. 351 ~ Habitat in Europae et Africae regionibus mediterraneae aridissimis, W Hi* pinus in<ulic> Balearibus*. Gallia meridionalis, Iuliae re<n> ^capo Mano, SiciH* Graeciae tgro Lacoico, in agro Tunetano et Aik'Tim

imilt m. PmOtTOSIAB flia<. lift Uf. 151. - BUL 1. c. 14t.

Folia Ooralia uniflora opposita, in typicam latam disposita, superiora nonne Calyx 13-nervis aabbiUbiatua, labio superiore 3-dentato, denio medio lauw appendiculato, inferiore bidentato. - Uerbat perenne v. basi subliguato-dentata v. ineiao - multifida.

6. L. ROTTMIFOLIA Bib. I. e. 130. - Foil. p.H.M. il, Ute ovale locio-dentata*. basi roiaod<lu, ainq. glabrit. spicis elongatis granlib; flonb. solitariis* <PP 9"

- sut**s. 6 — Specie* Mns tons margine tanlum inci»o-dentatis nee divisus dudnc-tissima. Iahiiu el spica *L. abrotanotdit*. Kami lenuiier pubescentcs v. glabri \inde*. Folia 1-1'/i p»H. longa, plerumque ulna polliccm lala, deniibns oblusti cr.isMusruli!*. Denies caljn¹ lanceolaii uculi. — Habitat in insula bancli ISiculat Capun >mdis Afnae occidentals.
- L. 1M>>AI A Lmn. fil. Dis^s. Lav. M. — Blh. I. c. t — Bre\iss»ime incano-lomen-losa: foil. Mmplinter v. bis pinnalipArtitis pinnatifidisxe, lobts inlegernmis ob-lusissimis lloralib. otatis acutiisculisi; »picas elongatu granlib. sublerms incann; flonb. soliiarnt oppo>ili«. 3- — Ilcrba perenms v. basi MifVulicosa, tola tomento brCMssimo subsenceo incana. Caules lia«i ramosi folioM, apicc in pedunculum 1-1':-pedalem telmgonum nudum abcunie*. Folia nunc simpheiter pinnaiipar-tita, saepius tcro *cgment.i pmfunde 2-J-lobala |. pinnalifida, loln» omnibus inU'gerrmn\ margine stibtooluiiH, utriiique cams, cacicrum gl.libnv Spicae pl«>-rumque ire* leiranoieue J-J- polluares laxae. Folia floraha rahrc sublongmri CaKces {lubscsMlp* o\,iio-oblongi denlibus brC^i^nimi^, ^uperionbu* lale o\ili», 2 inferiorbut ttn»;uNh< lanceolate*. Corolla purpurea, lubu caKce subduplo |<n-giore — 1. *pmnala* Jarq. Icon, plant, ranor. II. I. I. 100. — Bol. Ma.; t 401.
- fi pubetcrn. I. formota* Diftr. Lekic. >aihr. 4. el Link. Enum. Hurt. Be-rol. I. 10J. ex Ging. Hist. La\ 150. — Habitat in in»ulis Cananeonbui, in rupibus mnnrni-i insulae Maderae el in Teneriffa.
10. L. ABIOTAM>I)KS Lam. DicL III. 429. - Blh. I. c. - Viridis pilotfuacula: foil bipinuaiiNCeds, lobis inlegns obluiiusculin, lloralib. o>ato-lanceolalu acu-linsimis; spins elongatis gracilib. ramosis; norib. tolilanis oppo>itis. ^ — Ab affini /. *ptnnata* diffVri supt*rficie Yindi nrc cana, caule bnsi pubesrente, folns magH diHscdis, oegmoniiN angusiorlbui, spicn plerum<|ue 5 lonpribu* l.ninri-busque el fold* florahbus acuiionbus. — /. *(anancnut* Mill Pici no 4. - /. *rlrgant* Desf ||nrl Par 71 — Mirb. Ann rnuv d'lnst tut \V 1.5 fig. 5 - II i-buai In in«uli« Canariennibui
- ILL MILTIFIDI linn Spec, plantar. 8U0. - Blh. I. e. - \irtdn pilo>a caulib. foliosis, full, hipmnaiitidi*. lobis »ubcuneati< aculii, floralih. cordalo- dilalali< acumtnalit \IOMK, concern tubarquantib.; »pica den«iu»cula; caljceb inmenio-•U. % — gpeciea \anabili» et afflnit *L. abrotamotdt*, a qua contanter differt api-cn brevioribut plerumque •implieibut, foliit flor<libut lalii exlut villotU el ca-hc.l.us %alde lomentotis. Caulis ba.l plenangu« vlliotat flongalu* foliomv INDunculi dimidio brrvioret quam In *L phmmta* el *mkrotmtoid**. — Habiiat in Kurop.ie el Afnae mediterraneac regiombui autro-occidentlalibuB, in penin>ulai* Iliopanxac legione Boriica el circa Murciam, in Lusilaoia Translagana, In Ca-ladria, in COMMUM IIIIIIIH regm Tuneiam et Algenensis.
12. L. I>IBKs< LNN Dme. Ann. M\ naiur. m\ pag. 240. - Blh. I. c. 711 - Ilir-sula: caulib. %inci%, foil |>innaiiserli», segmentis hne<rib. inlegrin »ublnnm|r< floralib. membranaceit cihert subarquantib.; ipicit fracihb.; flonb. ftohlartit opposiitiin. % - ^ua>t media mivr / mufti/Mam el *toronoptfoUam* et huic pr.ie-seWm vilde aflinis e<t. diffTel hir>uiie, caulibus magia fohatis, ipicii densionbui foliitque floralibu* majoribui. - (.re»cil in de«erlo Mnairo.
13. L. CORO>OPIF()LIA Poir. Diet. XI. W. - Bth. I c 151. t ft 713. - Giabra caulib. »ubnudu »tnti»; foil, pinnaiiterlii, segmenlis lineanb. inlegns, floralib. brevi»>tnis o\ails acutitaimit: spins gracillinis; flonb. solitarus oppotiiia re-molis. ^ — Caules floriferi plurimi ramoai gracilet, foliit plerumque deMiuih Folia in ramis sienlibus 1-2-pollicaria tubcarnta biipidula, segments anpisir lineanbuu Spica 1-2-polliearis umplex t. subramo_ka, floram pjbui denium valde remoiit* Cahi lubulosus tubcinereut aut rulieolu«, dentibut acuin bff>i-bu< MibaequahbiM. I orolla coerule^cen*. tubo calyrr duplo long.ore, lmbi lobit fere aequalibuN paienlibus. Achaema otata fu^ca lae\ia. - / *multifido* Burm PL Ind. t < lig I nmrjiisd ihid IJt nrr | mn /. *tneta* ||<| y\ A,gM,, I. »ti:ii. li^ 1. - llalnial in \lr.ca onrnuili ri ^M orndrniili. m A««HI, prope \at (Je I I tMicmruI in d«\rrii« sUrr PI in "P"1513

Sectio IV. CHAETOSTACBYS BUL in Wall. Plant Asiatic, rarlor. II. 19. et Labial gener. et spe*. 151.

Folia floralia unifl ra allerna, in «pi<a laxiuscula ramosa dxpoMla, suptnora non comosa (aljx U-nem», subaequaliter 5-dcnialu» — Herba perenm» Folia mciso- muliifida

14 L BIRMWWM Dih I c HI t — TenuiUr puhcscons rauhb. follows, MI bi-pinn ilisedi*, si'gmenlis linianb inlepperrimM, Hor.ilih membranaceiv, basi dilalaili> loupe M lacco-aruminatis, «picn deimu»culi», florib soliiams alierno appronraiiis ^ — (aulis tidelur berbaceu* erectus lelrigonu<*, ad nodos contracclin, tenuiter tomenlo»o-pubesrens Folia ses<iha, lacinnn obiusis, marline rcvolutis, sublus lomenlexo-pubescentibus ^pira icrmmalis, sarpus ramo»a Folia floralia caljcem superanlia Cal)i se^ilis strulus canescrn-*, deniibiM aculis, fruitiTer turgidus. Corolla lentils, caljcem r\ced<*ns I imbus >iditur subaequaliter 5-fldus Disrus ovarn infra glandulifer Arhaima aqua imrnona, eiius ul in iuyphdibus el Salnu fcelalinosa — *L muliifida* Durm H Ind 126. (ner ejusd. ic ibid I JS fig I nee I inn ; - *Bysteropogon btpinnatus* Rolb, >ov pi. >P^c. 22* - *Chaeloilarhyt mullifida* Blh in ^ all plant 4siat ranor II. I*. — Habiit in India orientali tero»imiliicr in peninsula

7 *Species e genere excludenda.*

I f\R>OMLinn dl - \MM)< HILLS CARNOSES

Tribus II. 31L\THIOIDEAE Btb. Labial, pen. et spec. 132." — Endl. Gener. plant p. 012. — Meisn. Gener. plant, ta*-cular. I. 283.

Corolla ftubcaropanulata •. infuodibuliformis, tubo calyce broiore |. m longlore, limbo 4-o-fldo, lobit tubacqualibus. Staroiua di>tanlia recta v. divergenlia, ncc per paria approilmala.

Subtribim I. POGOSTEMEAE Endl I r.

Anlhrrie terinualrs ronnuentim uniloculare>. Stamina subrialmila. -- Gerontoz; ar >ublropicac.

156. POGOSTEMON Dsf

D^f(nl Mrm rau< d h %l ml II I>l — \lti<n d.nrr plant rascul I 2S3 II 101. — Blh labial grner el «prrr HI

1. I. *Pamculatae. Racrtm pamculato-ramust.*

I P PAMHIUIUBih in ^all. Plant. k%f\ ranor I V el Labnl Gener el »prrr IVJ | - (aule ereelo, pilit erech* pube«rrnie, f«ll inaequahh ovailt »«-n»o->rrrali#, ba»i anizu«iati». vefiicillatin« gl>ln»*i* trrundi* rrrnn n» rareniq*** rarrnit lerminahb, brariei« lale o>ati» mrmbranarnt, ral>rr« «uprrranlib ^ a-lyrit membranarei pube«renii« deotib lanrrrolaii* filameniit barbatu ^ — Cau-lic barbreat i-O-prdalit, rjrois pamruljiit pilM adpre^tit erertit %inKoti* "I~I<MI« Folia lenu a flarnda, nupra el «ublu* pilit adpr«>ic raulini* »imihb** ob«e>ta, nargine profunde inmn-denuia, loin* o^aiit duplicalo->erraili, io qunqae pan unun peliolaiun J poll el ultra Ionium, alierum tubfe«>il« duplo quadruplo«e bre«iu«t floralia coofortDia el pariier inarqualu. «ed mulm roinorf, nptvma brarieaefonlla Raeemi lati a«illare« allerui in axilla foln majoria orMU inOdI folio %u loajiore* >ertinlla%lri omnr* ditlincti, infroi »eroipolliceBi r«-moli, mpremi magit appronnau Brartrae rahrr«qur membranaceae, leou iter pabe«eente« nliatae Corolla lnum*ioia, al omnino bujut genen* tid«t«r F, 11 Until* n,rrru. nrديو barbala - *Mmmum pndnm* Bheede, Hurl M<lib X, 120 • *y - tUKolif pmcylalm *il*i hpec plantar III. MI - *ttyisop^ ensHI*** Lam Did III IJJ - Uabiial in India orfeniali, in hanidit llalabariae, inTa%oy

2. P. PLECMAISRHODES Dsf. Ann. mus. Par. II. 1M. t. 0. — Hook. Dot. Magaz. U 3238. — Bin. I. c 153. el 713. — Cano-pubesccns: raule credo; foil. o\aiis, basi cuncalis t rolundalis duphcalo-serraiis, flnbn subsecundis glomerato-spicaig; spins otaio-cjlindncis peduncularu pamculalis; braceis laic o\alis slnalii glanduloso-punctalis, caljces superantib.; caljcis membranacci hirsuli glanduloso-punctalii denlib. lala lanceolate acuiis; flamacnli» barbativ ^ — i aiiles herbacci 2-3-pedales Kami obfusc letragom, jumores molliler cano-YIOM. Folia raulma ;»-3-pollicana, »upcnora mtnora, floralia mrcnora conformia, suprema braciaeformia. Pamcula densa multiflora Vorlicillastri floribm 'JO-50 et ulira secundu dense gloincrahs compositi el spicula* densas 1-1¹.-pollicarea formantrs liracicac apicc roloralae, molliler villosae imbnratac Oljces obco-mco-iubulosi, apuc coloraii. deniialu corolla duplo longmra. Acbaema otatn-Iriquelra nigra laois*ima lucida. — *Origanum Henyhalrnse* Burm Flor Ind \IH. I. 38 fit; J posina — *ASmtha sreunda* lloxb llrnl BenR 14 — *Hrnsra pyramirlala* Wendl i ollrrl. pi II 20 I 84. — llabilal in ludii« onctiMlis Iunndis, in llndutiama, >< palia et Kamaon, >cr*u» Dejra Dboon, ad porium kbecrcc, in Ja\la ad pcilm iticutliH (icdc.
- 3 P. MI LOSI s liih I c 15J - \illocum caule ^ubereclo; foil o»uln, ban rnlundatis *d polmlum anguslalisi crenatis, flonb. subsecundu glomrrrato-spiralis, (piculis cylindrins »ubse««lib. pamculitit; braclen n^aiin Miriam pubetcrnhb., calyces aequaniib. rahcn \illon denlib. laoeolalit acuii; filaincniit barbaim. % — CauliH ercnus *. adftconden*, pilit ereclo-paleniiibus %illo%au«. Folia rra««a, dense el molliler villo«a_f folns P- *pUetranthodu* dimidio v. in\ar ,9 duplo majora, minii* profunde el obiuie denlaia. Pamcula dcn»ior anicuMior racciniformis. Bracicac paullo bre^ioren, uii cal>rc* \illoHiorcs. (orolla minor. *fi. macrophyllu** — llabilal in India onenlali, ad silh«<
4. P. PAHHFLOHIs Blh in ^all I c)l el labial gt ncr d M^{kr} 1^ — (11|t° asrendenc, lenuiler pubcorente, foil KlalnunruliH <.\3lo-<t!)t>iiniH, basi anH-Mis-lalis duplicalo-creualiH, flonb. xub»ccundis glomcraln-ftpivali*, hpiruh« MIK«*S-silib. racemosis, rarrmit anllarib. Irrnnnalibq., brar(ei) u|a|is »(naii«> pubesceniib. Ooreg luparaniib.; calydis villoxi membranacei dendb. aoKu»ic lanrrulaiu, fHam«oiit barbatit. ^ — Caulit bail procumbent aterndcn«, demun glabraiut Folia flaccida 3-4-pollcarla, breviier ptiolau. Paaicula racemiformi. gracilior qu.im in l> *pleeiranthoid*: VertAllaalrf, calyce* et Boras duplo minore*. Folia lioidalra braciaeformia, floret auparaniU. — lo Indlaa orieoUlir provincia Silbel.
5. P (1 \BLK Bib. I. I. c. c - Glaberrimom: caale credo; foil. o%««u», ban go-Ruslitt cnMiatis, \crucillaMris subaequalib. globotit siucatit; spicii paniculate; bradcis otalis cal)cr Inplo brr\ionb.; caljdis glabn dentib. oxato-lanreolan»| filamenlis barbali. ^ — llabitut ferc P. *pttctranthoidti*, setl vx oroiu pane gl«J brum, f>lia mnjora, longc petiolaia, minu« dfntaia, bant Innge anguMala. \crd-cillatlrri »ubdisiinrii, in spirulrt J-0-pollicanbus appronmau talycm forma et corolla /* *pantflorae*, sed flore» mulio numero»iore« et bracicrae triplo brr^io-ret. — *Penlla polystachya* D. Don, Prodr. 0. Mep. 115. — llabilal in India unco* tali, in Nepalia.
6. P. TLBEKUI.OSI .s Bib I. I. c. c - Pili» brctib iicllatis ci tuborrulo orl.s pubescem. caule credo, foil, otalii, baci aiigunlatis duplic.il««-Mtralit, utrinq. tuberculono-rugosif, xcriicillaMrit aequalib. globoM* rrmoiis m<*moftitf|raccmnia pamculaiif; hraciei* mmuii»; calydia luberculosi dentib subulaii*. (ilaaiinn« t, u_balih ^ — Affine /' *ylabro*, a quo diffvrl praenerlun luberculi% |«-JM •, Inllll peiolala, floraha »c><iha lineana acula, verticillasiro ^ubbreMora Hurt* ,ub-je»«>ilrs, fore /> *ylalitt* — llabilal in India onenlali, in >rpiln
7. P Ilr.\M.\Ms Bin. I. I. c. c - I auk asrendrntp pulieMi m. MI KH|,riul-culis o\alis, basi angiiMalit irregulariler rreiniH, winilhM. s HMT Mri||Ij s ,,, lerrupte Hpiciio, spins paniuhiis, brnicis <* ids sub, |I(r>>,s , |y, s MJ, (l'' quaniib , r.il>n» pulM«rentis diMitib o\,ni*. Il.iiij«-nli« bulnii^ | ' \ , , , | ~ dcnllbuH diffcil uriuillaMri* ftre nmoibu» di>UiuU>. I (,JM r«(ni,i /> ,y,luhl^

ulrinque saepius tenuissime pubescentia. Panicula laxa patens. Verlicillastris juniorcs secundi, demum subaeuales, saepe 30-50-flori. Corolla *P. partiflori*. — *Cottam* Rheede, Hort. Malab. X. 153. t. 77. — *Origanum Indicum* Roth, Nor. spec. pi. 1205?

/? Coins subincisis, dentibus calycinis anpustioribus. — Habitat in India orientali, in peninsula, in Java, in uligmosis Ceyloac ad Callura,/? in Zeylania interiore.

§.2. *Racemosi. Racemi simplices subspicati.*

8. P. VESTITTS Bib. in Wall. Plant. Asiat. rarior. I. 31. et Labiat. gener. et spec. 155. — Tomenoso-lanatum: caule ascendente; foliis ovalis crenatis, basi subcordatis rugosis, molliter tomentosis, floralibus superioribus calycibus breviter; racemis simplicibus; verticillas tribus secundis approximatis; bracteis linearibus subulatis; calycibus villosis demum lanceolatis; filamentis barbatis. 2. — Caulis e basi lignosa ascendens, uti folia tomento denso rufo-albido lanuati. Racemus densus*, 2-3-pollinaris. Folia floralia, bractea calycis *P. rotundati*, sed villosiora. — Habitat in peninsula Indiae orientalis.
9. P. ROTI MUTTS Bth. I. I. c. c. — Villosum: caule ascendente; foliis rotundatis duplicato-crenatis, basi truncatis v. cordatis, (floralibus superioribus calycibus breviter; raceme simplicibus; verticillas tribus aequalibus subremotis; bracteis linearibus subulatis; calycibus trilobis lanceolatis; filamentis barbatis. ^ — Caule basi procumbent cum raris ascendentibus vix pedalis pubescenti-MIOSUS. Folia pauca 2-pollinaria, molliter villosa rupea. Racemus 2-4-pollinarius, e verticillas 5-10 distinctis late multifloris compositus. Foliorum (floralium parvum canaliculatis conformis, superiora lanceolata bracteaformia. Bractea exteriora calycibus paulo breviora, interiora minutae. Calyx 3-4-linearis. Corolla parva. — In Indiae orientalis peninsula habitat.
10. P. MOLLIS Bth. I. e. 153. — Molliter tomentosum-villosum: caule ascendente; foliis late ovatis crenatis, basi rotundato-cuneatis, floralibus calycibus sublongioribus; racemis simplicibus; verticillas tribus aequalibus, inferioribus renatis, supremis approximate; bracteis linearibus subulatis; calycibus villosis dentibus lanceolatis-jubulatis; filamentis barbatis. 2. — A *P. rotundato* differt caule ramosiore, foliis numerosis duplo minoribus, basi cuneatis nec cordatis, racemibus longioribus, verticillas tribus duplo minoribus demum lanceolatis lineari-linearibus, into antheris distinctis subduplo longiora. — Habitat in India orientali, in peninsulae montibus Madagascariensis.
11. P. HIRSA (Th. s. Illh. I. c. - PIK adpressus* hirsutum- caule ascendente; foliis petiolatis ovalis acuminatis serratis, basi rotundatis, floralibus superioribus calycibus breviter, racemibus simplicibus; verticillas tribus aequalibus; bracteis linearibus subulatis; calycibus hirsutis dentibus lanceolatis-arutis; filamentis breviter exsertis barbatis. 2. — Habitat in vanetatum graciliorum *Mnlhar aifuticar*. Caulis* foliis* rhachis, bractea calycis* pilis adpressis* ^ ad axilla* subpalenibus hirsutis. Folia tetustiora et caulibus basi subglabrata. Racemus* 2-3-pollinarius*. Verticillas 10-15-floris laxiusculis. Corollae partae. Stamina trilobis* corollae longiora* Filamentum* apicem* purpureo* dense barbata. — In Zeylania.
12. P. ni PF.STRIS Illh. I. e. IW - (ihbrum- caule raris; rami* acris* lib. full, petiolibus lanceolatis* H* drinalis, bast angulatis*, floris. lib. bracteis. niulii. raris simplicibus. »Tiicillj* rennli* |Miiciflon*. cal)Ci* K labri dmiib. o*ati* abrr* i3tiH; libmrtu barbata. ^ - (aul's rlonjjali lenue*, d nodoi tarpr radiranlen, uli tola plani* librrnmi. F*ha basi longr in peti* ansustata, limbo 1-|-'.-pnlliran. Han-mi i-i-|iollirarr%. \erlir. ll. isln late pau- Cillori. Cahci-% parti, r.or.illar minul.ic. Filament* rxlra corullam f*o calycis loribus loitKiludnr. mrdio dcn%c barbata — Habitat in /ejljniae rupe*tnbu» edit Circa Wra F.l.l.a.
13. P. SPKCIOSI S Rih. in Wall. Plant. Asiat. rarior. I. 31. et Labial. Ufner* n* ato- WO - Piloio-bi»pidum: caule crasso; foliis late ovatis basi cordatis duplici

- crenatis; race mis simplicib.; verlicillaslns teretib. laxis approximate; bracteis minutis, calycis glabnusculi tubulosi denlib. subulatis, filameniiis nudis. 2|. — | *P Wighttt* differt folus majonbus lationbus, basi cordate cl praesertim spica den; a crass a et corollis gemtalibusque longius exscrtis, sicclilate mgns lucidis. Antherac flavescenles. — Habitat in India oncnlali, in pemn»ulac montibus Madurensibus.
14. P. WIGHTII Dih Labiat etc. 1 c. — Piloso-hispidum: caule erecto?, foil, pctiolatis o\atis acutis duplicato-denlatis incisistc, basi rotundalo-cuncalis, racemis simplicib, >erlicillastris acqualib approximatis v. mfimis remoiis; bracteis linean-subulalis, calycis glabn denlib. lanceolato-setaceis hispidis; filamentis nudis ^ - Caulis, folia, bracteac, rhachis el denies caljcmi pilis longis albis paienlibus hispidi, caeterum glabn. Folia fere *Iamxi* v. *Galcoptuht* 1-1'/.-pollicana Kacemi 3-4-pollicares densi v. basi inlcrrupti Floras numerosi. Caljx fruclifer 2¹ Im longus glaber membranaceus, apicc breviier denlalul ol hispidus Coiolla minula Filaments glabra v. tenuiter pubescent ia, caljcis tubo subaecjuaia — Habitat in India onenlali, in peninsulae monlibus Madurniibus.
- 15 P WNTIIOIDKS Blume, Bijdragen 825. - Blh I c. - Caule herbareo, folus otahs, ulnnque aculiusculis, supra basin duplicato-denlatis pubescentibus, spica UTminali clongata siraplici, verlicillis approximatis; slamimbus nudis. — Crescit in sjlvvis umbrosis insulac Javac in monte Gede.

3587. **DYftOPHYLLA** Blume.

(Blurae, Bijdragen 820 — Meisn. Gener plant va»cul. I. 283. II. 192. — Dtl. Labiat. gen. rt spec. 156)

S. 1. Oppositifoliae. Folia opposita.

- 1 D. STRIGOSA Dili in Wall Plant Asia! ranor. I. 30. cl Labial, gener et spec. 157 f — *Pil»* adprcMs stngosij, pubescpn» CIUP erecto, foil opposite subsessilib lanceolalo-o\atis grosic herratis, norahb lanceolatis, flonb broionb, spins crassis lixuisculis, nljcis otali bir»uli denlib. subulatis precis ^ . — Cauli* Hpsquippdalis vi ulira, obtuse tPtagonus. Folia senquipollirana acut.uscula, bam roiundata rugo»a luspida. Spicac fcub.nlcrruplac, J-4 pollice« longar, **Ki ^ i r V** " 11 1 1 1 6. BraCIMC PafVaC subulalac, CalS^{ci} » ^ » » " longior« quam **Series inter *Dysophyllan*** forOlli major ••WrwgBlirit, itaiDinibus **longior bus. referenda? —**
Habitat in India orientali
- 2 V HIOSIROIDESBih.1 I c c -Serleeo-io«nenloM:cMlc,creclo;folI.op. posit.s hri'iiter pel.olal.s, floralib. ovalis minutis, <p.c.t densi, cilj.c.t tomen- IOI dumb bretiviimis rectis ^ - Plants hum.l.s, ex omni pane lomento molli **subseri**reocaiiPMens. Caiilis semipedalis \ m pcdalis erectus ramosus, obm<o **tetragonu»** Folia plcrumqup pollitana crassitucula mollia >cn»o-rugos'a obtusiuscula, margin? irregutoriler subcrenats, basi in petiolum bre\cm snguststiT Spicae crasMtip pennat* ansennae, nunc vix pollirarcs, naepc \ero tenuiores 4-5J polhcars Corolla minula — *Mentha myqturotdcs* Holh, ^ v. spec, pi 257 — Habitat in peninsula Indiae onentalu
3. D AUHILLIAKIA Illume, BOdragen 820 - Dlh. I. c 158 - P1II, molhb n.i.,]s birsuta cauhb prorumbeniib , foil opposiian subsessilib. o\alo-oblongn Vro **is** serratis Horal-b <\ato- lancpolatls, florps subacquanlib , npitii drntiiMuis' c **so** LICIS UIOM denlib o\slis, post antiPMn connenlibus. Z|. — ||a|,m «PICI, **T** praesertim pilis crebrn paivniibtis *D rrunatae* allnis, spd caul.bus ramo'u rl **et** et folus diHtinclissima lolia plerumqup liirsuiis>ima, ranu% p.l.s S(M U **hervog** paginac inrcnom et Innc indp in pagma supenori sparse ***#,,,,,,**
Humph Herb Amb M 41 U 10 |,K 2 - *Blrntha f.xtula* Burn. \ **Z'd T | £**
- ITIi/Ad *aunculana* I ,nn VanH.n plim.ir S| - ||a|Mti i In |nda **orientali**
cal.d..., el .1. n»uls Anlupplag. Ind... fuss.s ,| ud,, in prmnMih in/rilan **in**
in Uengalo on. ntali, in msulis Pmang it jd laong hong pro. 0 ^ »,, ,n **in**
in JUolucus tt in Amboma **In Javo,**

§. 2. *Yertictilatae. Folia terticillata.*

- 4 D CRIFIATA Bth in Wall Plant Anat rarior I 30 cl Labiat gener el spec. 158 el 71) — Pilis mollib patulis hirsuta caulib elongate procumbentib simpliciuculis foil qualernis, rarius quintis * scni», lanceolate oblu»i» inlcgernnm, mirgme rctoluii*, Poralib lanctolatis, flores subacquanlib spicis densis, verticiUastro infimo dishncto, calyci* villosi denlib obtuMUsculus subercciii 2J. Rami procumbentcs \idtnlur nee ut in sequentibu» basi fluitantc* Sunt plc-rumqut simphcps 1-2-ptdales et longiorcs flagelli formes, ad nodos fngilcs, et at in 1) *auriculana* ex omni parte pilis patentibus mollitr MIOM Foln ad basin caulid crebra in partc supenore loternodns breviora, circiier pnlicem longa. Spica *D aurtculanae* — *Mentha quadnfoha* D Don, Prodr fl >cp 113 [non Roib] — Habitat in India oneolali, in Ncpiha
- 5 D QIADRIFROLIA Bib I c — Tomentoso -villosa caule ercclo, foil quaternis eiliptico-linearib integernmis v remote serratis, utrinq angustati», floralib li-nearib verlicillanlro bre>ionb <picis elongalis, ba<i subinterruptis, cal)Cif ovatt dentib anguslc lanceolaiis acutis ereclis % — llerba aqualica, caulibus basi fluiiantibus ghbnusculis, ram is emersis 1-2-pedalibus, uti folia et spicae pi-lis ^recio-apprcssis simplicibas rigiduhs magis minus^c constanlcr >clutmo-tom«ntosi«» tomrnto in >ar a et 0 drnsusimo, in >ar r tenuiorr Foln eras-^iu»cula I / -3-pollicaria roollia acua <ub«erraia in var r bre*i>n angusiiora rigidmra Spirir 1-6-pollicares. — *Mmiko fuadnfotta* Rmb Hort Deng 44 (non Dbo) - (*kotrka teneea* Opii et Corda, Flora R 7 1810 I 35 — Habitat in India onentali, in aquis slaguanibus prope CalcuKam, in monte Circar, ad Vizagapatan
fi veluitna foil nervous, bati in petiolom angustalk. — Ad Taloy orae Tc-nasterim habitat.
X pube\$scens foil. aBgvtte Hnearibot. — ID nonllbua Pundua
- 6 D >ERTICILLATA Bib in Wall I. e et Labiat gen el spec 150 t — Glabra caule erecto T ascendeotr, ramia foliitq 0-10-verlirillaiis foil elongil)-lmea-rib, ulrinq angusialis, spins densistimis, caljcis fruclifen dentib o>aiis >tp||ato-paluli» ^ — llerba aqualica, basi fluilans radiran» Rami flonfen rrccti pedales s« Mjinpiduali««e ccasM sulraii, ramuli numcm»i trrliallaii \-o>ia 2-3 pollires } n^a JCUU plerumque argute et nmote ncrata, omnia glabernma Spicae >» pollirare^ d« nMt^ime imbricalae i iljcc^ fruclifcn MI auch ved denlibui tub-r(rur\o-|>jt» nlibus siclljii (« rolla minuia purpum Arhienu lae^ia — Jfrti/A4 *ilcllala lour r1* (o<lunch J6l *Mrmha rrrlinllata* Hoib llorl Beog 44.— Ujbiial in India ononlah, in Bengalia, ad ^ilhel, in (orhinrbina
- 7 1) i RA!>NI< 411 Is Bñ. I I r e -Glabra caule atrendrnte ramotn foil *qn**~lernm num <juini» \ teoii lanreolato-lieoarib, ba»i dilaiiis »ubinirgerrl»"» floralib laorruiali*, Ooren taperaolib, spirit elungatis , raUn* pube^reuUS den-*lib obtiMiu'iulit Hubrrectia ^ — Speciet inter *D pumttam* r\ *O irrhnIM*** media A priori differ I »talura elation {pedal i et ultra brarteis lanceolatis* • potienort cal>ri» fruriifrii dentibus ererlis, ab olraqae foln» ba<i dilatatis» *p^c^* dupio triplove lonxiunbui cra^tionbut el flonbus majonbu* Folia bipollitaria ei ultra fepira (ructikra, taepe 4 poll tonga — HabiUt in India unenuli* • hilbri l>l in Brogalia
- ad PIVILA Bib I I r r - Glabra caule atrrndenle ramoso foil quiter«>>> iofenonb tubtrmi rllipdco-Imranb , otrioq angu«lali« re mole nerraii*. llorali• otail», calycn nllc<i rampanulaii frurlifen, toflaii drniib obiu^iu»euli« subere** !•» ^ — Herba aquatica ei omoi parte, caljeibut eirrp^n* glabernma ^{Caa}lls b«>i npem v Oulaot radirant Kami flftrigrri •ubrerrli »emipedak« v ^{P*f}lls longiorrt folia Infima »ub»eoa aogutla polltraHa el »it deniaia tuperiort qu«" Uma laiiora ei kmr mde argme terraia Rami ut folia tertiolall *PJ^f-f R «P«e« rauht el ramrum >ll polhruet den«p«<imae falyt fruclifer ^ji ^{alo»»a»»} »u», ted laiusime campanuUlut, dentibua lautculit ereciit * »ubconoiteoMbu»

Corolla purpurea, calyce florifero vix duplo longior, dentibus apice emarginato. *Acbaenia minula* subrotundo-compressa lacvia. — *Mentha pumila* Graham in Edinb. New Phil. Journ. 1828- 303. — *Mentha verlici* Uata D. Don, Prodr. fl. Nep. 114. — Hook, in Bot. Mag. t. 2007. (non Roxb.) — In India orientali, in Napalla.

0. D. STELLATA Bih. I. I. c. c. — Glabra v. superne pubescent: caule repente; lamisereciis simpliciuaculis; foli. 0-8-nis verticillatis angustis linearibus, imernodia obaequantilib. Inlegerrimis, floralibus bubulatis; calycis villosi ovarii denub. ereclis aculiuiculis. 2l. — Herba humilis pusilla, facie *Galii vert.* Caules basi repentes radicanes. Rami ascendentes v. crecii 3-0-pollicares, basi glabri, tub spica pubescentes. Folia crebra, inferiora glabra, suprema sub spica pubescentia, 2-3 >. MI 4 Im. longa lineana acuta, margine inlegerrimo subretoluta, basi subdilaiala, floralia calycem subaequantia. Spica densa 1-3-pollicans villosa. Calyx fructifert parum elongatus. Corolla parva purpurea, dente supremo emarginato. — *Mentha stellata* Lamilt. mss. (non Loureirn). — *Mentha qua term folia* Rolb, Nov. spec. 230? — Ubiat in India orientali, in Malabarica et in Mysore.

Subtribus II. ELSUOLTZIAEAE End). I. c. p. 612.

Antherac versatiles, loculis divaricatis, demum confluentibus. Stamina interdum subsacculata. — Gerontogae subtropicae.

3588. ELBHOLTSIA WUId.

(Willd. Spec, plantar. 111. 20. — Meisn. Gener. plant, vaicul. I. 283. II. 102. — Bib. Labial, gen. et spec 100. et 713.)

Seetlo I. APHANOCHILDS Bth. In Wall. Plant Aalat. rar. I. 26.

Spicac saepius laiae paniculatae aequales \. subsecundae, folis floralibus lanceolatis >. »bulbali», nunc >cro dense imbricatae aequales, foliis floralibus ovalibus v. lanceolatis. Antherarum loculi divergentes \. divaricati, demum confluentibus.

1. B. FLAVA Blh. Labial, grn. et spec. 101. t - Suffruticosa rrcia' foil, piciolati ampin lale ovalis acuminatis nervosis, floralibus bractaeformibus ovato-lanceolatis acuminatis, calyces subaequantilib.; apicis latiusculis axillaribus terminalibus: corollae calyce aobduplo longioribus. % — Suffrutex 2-pedalis, omnibus partibus pubescentia molli canaliculata obvilis. Folia palmata, basi rotundata v. cuneata, supra glabrescens, subtus pubescentia rufescentia. Spicae plerumque axillares > r> hinc 2-3-pollicares, demum for* elongatae multinerviatae crassae denudatae, in paniculam terminalem elongam subapproximatae. Folia floralia (in spica) lale ovalia acuminata. Verticillatae multiflorae laevissimae. Bractae subulatae. Calyx oblongus, demum lanceolatus acutis. Corolla obovata, tubo subincurvo, limbi lobo supremo obliquo retuso. Achaenia ovalia lacvia. * - *Aphanochilus flavus* Blh. In Wall. I. c. 2H t 34. — Habitat in Napalia, in montibus altissimis ad Sheopore et versus (ios^ain Than, ad Kidarkonla.
2. B. LBPTOSTACIYA Blh. Labial, gen. et spec. 713. — Dene, la Jacquem. Voyage IV. Boumque ltf. t ^ 132. — Suffruticosa erecta: foil, subsessilib. ovatis, uinnq angustatis, floralibus bractaeformibus membraceis oblongis calyces aequantibus; spiribus gracilib. elongatis ininterruptis; floribus minutis; corollae calyce tubduplo longioribus. *4 - Affinis *K. polytaehyae* panlerque acrius nibeat, diffri folis duuidio brevis et flonbus. Verticillatae omnes dislincti parvi densi 10-20-flori. Spicae caescentes 2-4-pollicares. — Crescit in Caabemria.
- a E. POLYSTACHYA Blh. I. c. 101. — Suffruticosa erecta: ramus pubescentibus; foliis piciolatis oblongis, uinnq angustatis nervosis, floralibus bractaeformibus multilobis, spinis lanceolatis paniculata, corollae calyce subduplo longioribus. % - Ab *K. flat a* differit pubescentia brevissima subulata, folium dimidio angustioribus, basi longe angustaliter inlegerrimis, in parte superiore regulariter renulatis, spicis terminalibus faugulibus lonuonibus laxioribus, (inhibentibus multibus majoribus) crassiuscula i-1-pollicaria, 1-IV, poll. lala. - *Penlla fruttum* I)) , , , > r , m l r

- fl ftecp 115 — *Aphanochluta polystachyuta* Bth in Wall I. c 28. t 33 — Habitat IO >apalia, in monlibus alti>simis ad Sheopore el Chandagham in Mossooree
- 4 E STAIMOM Bth I c — Suffruticosa crecta rarais glabris, foil, petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis serrato-crenalis, basi longe aigulalats, ulrinq glabermm, floralib braeteaeformib minutim, spicis elongate tanocenlib subpaniculate, verticillaslns Iniiusculis secundi*, corolla cdl>cc incano subduplo longionbus y. — Ab *E polystachya* differt rami>glabermnis, foln& angu>lionbus, ulrinque longiu* angu>lali», spicis longionbus (semipedahbus) canescenltbus. Cahre* elongati, dentibu* acutiusculis Stamina longe Liberia — Habitat in China, inter l'ekin el Jehul.
- 5 E BLAMM Biñ 1 c 102. — Herbaria canescens MI oblongn, utnq angulatis, Ooralib lanceolalo-subulalis, verticillastris laxi* secundis spins paniculate, corollis calycem vn eicedentibus 2 — faults cretus 1-2-pod<iln ramosus, obtuse tetragonus Foliorum forma eadem ac in *t potytlarhya*, sod nullo mi— nora (>n bipollicana; et lenuora, margine remote scrrala nee rrcnata, subtus canesceniia Spicae numerosae paniculate J-6-polli(ares secundae Folia florilia infenora lanceolala, caetera subulala, uli bractie nljcc breviora verticillasln rirnter JO-flon dimidiali Flores mmutl, brcultr pedicellali (al>x post anthesin auclu> membranaceus o^atus, dentibus «obulati< end is for »lla albidu Odor lolius phnlac aromaticus debilis — *Mmlha blnmla* Wall mss — *Penlla elat** A Don, l'rodr (1 >ep 115 - *iphannchilus blandus* Bth in Wall. 1 r 20 — lti>t Migai t 1001 — Habitat in India oriental), in montibu* Napaliac, Silhil et A>ae et in roontc lloreb Arabiae.
- 0 E D>CISA Bth I e — Herbaria glabruscula foil poiolalis rhomboideo-OTatls incmo-serratis, >erticilla>tris aequalib Uns, spicis panirulatis, corollis ||| calycna eicedeoiibnt. ^ — Afflois *E. bUmdme*, sed bumilior Folia 1—1'A poitices longa el saepe ultra potllcem ltu, profunde iociso-ereolata Petiolus limbo sacpius longior Spicae numerosae gracilen aeqoales inerruptae, vix l'/i lin crassae, fructiferac densae, 4 lin crassae Folia floralia caljccs nuperantta et tnlcrdum dii>»> longiora Flores *E. blanda*, sed caljx fructifer magis auclu< o\ilo-elongiius, brc^iler %-denlatus membranaceus, lenui<simc pubesrens (orolla miouU nll-idi — *Mcn(ha innta rl M fortens* Wall ms< — *Vtniha blanda* I)(PI rar. In rl i,en l| t * *Prnlla Irploitarhya* I) .|)on Pmdr II >i|» in - *llypM tinchy mlrt* I ink, rnum plant hurt Berolin II 100 — 1/ *ha nor htius foiltms* Blh< in W ill IMint AMal rar I J9 — *Iphanochilus paniculatus* Bib in Wall I* € JO — In India oriental), in Dr>ra Dhoon, in >apalid oi ad Tiong Dong A>ae.
- 7 fc PUFrs(h>SBlh I c - lrrbarra caule tomento*o-pube*crnte foil bre-%>r pctiohiit o^o-oblon||i< acuti< crenalo-<rrati<, ba<i wtgc>>rrimi<, «upra glabnu<ruli<, «btu< tenuiter tompnto<i<, >rrhcillastn* arqualib drn<i< corollii VII caljcfm rterdrntibut ^ — I auli< rrrriu% ramosus, obtusr trtrjig>nuf Foil* supra glabra * nrulo armato trnuiMime pubrscentia, »ubius tmuiir tomrntoft glanduloto-punrtata, floralia ^erticillastros superantia brartrarformia lanceolal* •cuia tntegerma \crlirUla>tri spicati infri<irr< dnimrii, drnsc mulliflori. hpirae gracilft 4-5-pollirarci >illo>>r, an hi>pidn flongrrie 1-4 lin , fruciiferi* H-0 lin diamvlo Br^rtiaf lancrolatar, ral)r<ro au|uinir< i ahre> *ub>e>sil<»> >>t anhrtin aurti <illo>i, brr^itir et aequaliler quinquentati stamioa t <^1-•eria 2 corolla breviora Habitat in Java
8. Is, MOIISSILLA Bih I c l&l lrrbarra torn* nio<o-tilln<a foil breuiter pe- liolatis ovalo-oblongi< aculu crenalit, ba>i rotunUati% * angu*iatu< verticillastris a<<<ualib drom, c<rolli> |n cal>crm nciduiUbu* ^ I *ul% nectu* ramosof foliosu* I-olia guprft ad Dervo* pub>rrolia »btut uli priioli lowento mol* r*Wa floralia brarlfaeformia cal)cr brrviora Spica drn*a i-J-pul>f*rl>. 3-9 lin dumriru inollurr %>%a - Bracle<e linrar*. calypr brrtiore* Calyces o*H palhdi villosi, ore obliquo drnlibu< abbrctiali* aruti> »ubpungenlibu> »u~ premo longiore Corolla et IUmmi t /*<toce*i/M. — Habitat iu Java.

0. E. INTEGRI-FOLIA Bib. I. c. 714. — Herbacea pubescens: foliis breviter petiolatis oblongo-linearibus inaequaliter obtusis integerrimis, floralibus bracteiformibus ovatis, floribus breviter, verticillatis interrupte spicatis. — Habitu *E. pubescenti* et *E. mollis* affinis, alio foliis distinctioribus. Spica lenis 2-3-jugis. Verticillastri inferiores distantes. Flores in verticillastro 0-10 sessiles. Calyces pubescentes, etiam fructiferi campanulati, dentibus breviter ovalis. Corolla parva. — Crescit in China.
10. E. PILOSA Bib. I. c. 103. — Herbacea piloso-hispida: foliis petiolatis ovalis v. ovalo-lanceolatis, floralibus bracteiformibus subulatis imbricatis, flores superantibus. Verticillastri dense imbricatis; spicis hispidis paniculatis? — Herba procumbens. Caules circiter pedales teretibus. Folia pollicana oblusa crenata, basi cuneata et in petioliis decurrentia rugulosa, utrinque hispidula, floralia infima conformis, superiora subulata. Spirae sesquipollicares, in apice cauli et in ramorum axillaribus villosae. Bracteae calyce sublongiores, uti dentes calycum subulatae. Corolla immixta. — *Aphanocklutea pilosa* Benl. in Wall. I. c. 103 — Habitat in India orientali in Java.
11. E. ERIOSTAIIA Bib. I. c. — Herbacea pubescens: foliis breviter petiolatis ovalo-lanceolatis, floralibus bracteiformibus ovalis, ovibus brevibus; verticillatis dense imbricatis, spicis tomentosis paniculatis. — Habitus fere *E. strobiliferae*. Caules erecti, pedales et ultra ramosi, obtuse tetragonales, facibus pubescentibus. Folia 1-2-jugis obtusiuscula, serrato-crenata, basi rotundata ovata, supra villosula, subtus pallida subtomentosa, floralia inferiora saepe subconformia, superiora late ovata obtusa imbricata, calyces subaequanda. Spirae plerumque pollicares ramosae molliter lanato-tomentosi. Corolla calycem paulo superans laeva. — *Aphanorhiza crassifolia* Bib. in Wall. I. c. 29 — Habitat in India orientali in Java.
12. T. 1) L. s. 1) I. c. 714 — Dracaena in Java. Vojager IV Boissier 127 1) H. — Herbaria puberula foliis petiolatis oblongo-linearibus, floralibus bracteiformibus ovalo-rotundatis floribus breviter, verticillatis distinctis imbricatis, terminalibus tomentosis villosis, racemosis. — *E. moslarhytha* valde affinis, «radice multinervi villata, folia aequalia longiora, spicae demum lanatae. Calyces fructiferi duplo majores. Corolla purpurascens. Arbaenia tenuiter pubescentia. — Crescit in India oritur in provincia, in gurgulis ad Ovelia RICI et Yonnedch-Seursing.
13. E. PISILLA Bib. I. c. — Minima subsimplex subflabra: caule filiformi; foliis ovalis inaequalibus, floribus paucis subcapitatis. Q? — Herba erecta 1-2-pedalis. Folia ovata ramosa parva 1-2 distantia, floralia parva 1-8 appressata, caulibus subconformia. Flores minimi oppositi subsessiles. Calyx pubescent. Corolla r. (c) Milne lutea. Siamia inclusa, duo superiora minima v. abortiva. Antherae orbiculares — Crescit in Cambomea herbis trans Kioubrory.

BecUo II. CYCLOSTEGIA Bth. la Bot. Bot. Ad t. U82. ad Mt

Spica denique imbricata Folia floralia connata membranacea «ovata imbricata» fimbriata marginata eilialia Antherae ovalae, loculis confluentibus.

14. E. STROBILIFERA Imb. Labial gener. et Rpec 103. — Herbacea. foliis petiolatis ovatis floralibus connatis cuneatis membranaceis tenens, marginata riliata spicis imbricatis terminalibus stipularum — Herba erecta, semiteretis pedalis. Folia ovata basi parum angustata. Spicae cylindricae, 1-2-jugis verticillatis 0-10-jugis. Flores foliis floralibus humiliter Bracteae minulae. Odor praequam gratus aromatis. *ichstryta strobilifera* Rib. in Bot. I. r. 30 (eius syn. Kumpb. et lurrum — Habitat in India orientali in provinciis Yipaliac et ad Gossain Iban Emodi, ad kidarkonia

feetto HL. ELSHOLTZIA Willd. 1. o.

Spicae uli folia floralia late ovata secundac. Aniherae lineares, loculis divaricaiis.
15. E. CRIST AT A Willd. Spec, planlar. III. 20. — I'steri, Magaz. II. 5. t. 1. - Bot.
IHagaz. I. 2560. — Bth. I. c. 104. — Herbacea glabriuscula: foil, peiolalis ovatis
oblongisve, utrinq. angustalis, floralib. lale ovalis aculis ciliais sccondis; verli-
cillasins approximalis secundis; spicis paniculalis. Q — llerba 1-1'/_-pedalis
erecta ramosa, fere glabra. Folia 1-2-pollicaria. Spicae terminates, 2-3-polli-
cares. Veriicillastri rauliiflori approiimali. Folia floralia viridia membranacea,
fiores superania. Calyces cilialo—birsuti. Bracieae minulae lineares. Corollae
minuiaae, pallide purpurascetes. — *Mentha ovata* Cav. Ic. rar. IV. 36. (300. fig. 1.
— *Mentha Patrini* Lepech. in Nov. act. Peirop. I. 336. I. 8. — *Ilysiopu* ocymifo-*
lius Lam. Dici. III. 187. — *Hyttopot bracealtu* Gmel. C. P. ex Sieud. Nora. boL
206. — llabiiai in Asia fere omni el eiiam in Europae culiis tcrosimililer ex Asia
allaia in vallibus Eraodi, versus Cashmere, in Sibiria circa lacum Baical el in
Iraciibus Dabunae el circa Nertchinsk, in jugo Aliaico, in Suecia.

Species e genere excludendae.

E. JAVANICA Blume - PLECTRANTHIS JAVAMCI'S.

E. OPPOSITIFOLIA Poir. — COLEBROOKIA OPPOSITIFOLIA.

E. OCYMOIDES Pers. « GEMOSPORUM PROSTRATUM.

E. P.A.MCI'LATA Willd. - POGOSTEMON PAMICULATUM.

3580. TETBADEKIA Bth.

(Bth. in Lindl. BoL Regisl. ad I. 1300. adnol. — Meiin. gener. plant, vascol. I. 283.
II. 102. — Bib. Labial, gener. el spec. 154.)

1. T. (MENTHA Hells. el Bojer mst) FRLTICOSA Bib. I. I. c. c. 105. t - Frutex
ram is vii letragonla MOO- T. subrnfo-loinentosis. Folia peliolala, ovata v. ©b-
longa crenaia, baal rotaodaia MOIU ragota, supra vlridda, ionenloio-pubescen-
lia, soblus caoo*lomealota. Vwilelllaslri 6-10-flori apicali. Spiculae numerosae
subpollirarea peducolaLatf, rac€Boao-panlealalae, panicula raraostissiraa densa.
Flures minuli sessiles. Folia Ooralia sub ramls paniculac caulims subconformia,
at minora, sub spiculis mullo minora, suprema sub verticillastn> hraclfaoformii,
lak* o\oia, ante anlhcsin imbhrala, calyces aequanii.i, per anthesin dendua.
Hr.iriear minulié, subnullac. Caltccs minuti, onus rann-toinciiosii. Corolla ca-
l>ct'm duplo suprrans. Siamina exserla. Glnndulae o^arn rubrae, ovaria triplo
supcraules. Achacnia malura non %i&a — Crocit in Madagascaria.

Sublribus HL. MKMHKAE Endl. I. r. p. 012.

•nlberae biloculares, loculis parallels.

3500. COLEBROOKI.% Sm.

(Smilh, Eiot. Bol. II. I. 111. - Mcisn. grnrr. plant. \a>cul. I. ^1 II. 102. - Bib.
Labial, gener. el spec. IW.)

1. C. OPPOSITIFOLIA Smith I. c. * Bib. I. c. | - Ramm, fnlms »ptri«q. opposilis.
6 — Rami den«e lomentoso-lanali »ubruffl. Folia prtioUla, 4-6-|>»llirana ei
longiora, ohlongo-elliptica, uinnque anguniaia, marline rrenubia nr^<»/a, xupri
molliier pubescencia, subtus tomentosa v. lanata pallida, inaeoa v. rufescentia.
Ooralia ultima tubconformia, at minora angu«iiora, <uprema brarloaoformia, anto
anthesin imbrfcata. Spiculae l-J-polhrarr* totmrnit>*ae pnlunrulatar pjmculatat*
Vfrticillasirorum rjmac ditimetac capKuUeformrt denoe »o^ih, bracu*» basl
Connalit involocrtiae. Floret parvi 4'al)ci« lubut bmitMniu*, tlrnir* >ubulaUf
maluraiioor rlongati, Hcganter plumo»i, »arpc purpurascvnu-s. (orolla iubulos<t
medio comraria, limbi lobi otati brmt%imi MJIM ri<i*nu«. Arharnia obl«»M
Subiriquetra, apice villosa. — *Elsholtzia oppositifolia* Poir. Dict. Suppl. V. 663.
— Habiui in India oneo»ali in monlibut ><j><dur rl kaiuaun, in Uejra Ubood.

2. *C. TERNIFOLIA* Roxb. PI. Corom. HI. 40. t 245. — Dlh. I. c. — Ram is, folns spicisnuc ternalim verticillalis. £> - A praecedenc MX differt. Folia plerumque roagis lomenosa el breuius petiolala, cl spiculac densiores videntur. - Habitat in India oriental! in monlibus Carnaticis.

351)1. PEIULLA *Lin.*

(Linn. Gener. plant, no. 578. — Meisn. Gener. plant, vascular. I. 283. II. 192. — Bib. Labiat. gen. el spec 106.)

1. *P. OCYMOIDES* Linn. I. c. — Rib. I. c. — Caulis herbaceous creclus 1-3-pedalis cras&us firraus, obtuse tetragonus, sulcalus pilosus. Folin longiuscule petiolata, 2-4-pollicana, ovaia acuminata, grosse serrata, basi cuneata v. in petiololum angustata, ulnque viridia tenuia subrugosa, ad venas pilosa. Racemi folio breviores. Flores numerosi. Calyces per anihesin minuti, fructiferi taldecauli, breviter pedicellati pilosi. Denies labii superioris bre\cs lali, inferioris longiores, anguste lanceolati, omnes acuti. Corolla rotunda albida. Achaemia pallida. 2p — *Ocimum frutescens* Linn. Spec. plant. 832. — *Melitia maxima* Arduin. Spec. II. 28. t. 13. — *Bentha peruloides* Lam. Diet. IV. 112. (non Linn.) — Habitat in India orientali in montibus Kamaon, Nepaliae, Silbet el Avac.

t *Species e genere excludendae.*

- P. ELATA* Don. - *ELSHOLTZIA BLAKDA*.
V. FRUTIGOSA Don = *ELSHOLTZIA POLYSTAGHYA*.
P. LEPTOSTACHYA Don. — *ELSHOLTZIA INCISA*.
P. POLYSTACHYA Don. — *POGOSTEMON GLARER*.

351)2. ISAVTIU'S *Michx.*

(Michx. Flor. Dorcal. Americ. II. 3. — Meisn. Gener. plant, vascular. I. 283. II. 102. — Rib. Labial, gener, et spec. 100.)

1. *I. COERULEA*'S Michx. I. c. 4. 130. - Rib. I. c. 107. | - Herba annua, semipedalis pedalisve erecta ramosa subrescida, ramis pubescentibus pilosis. Folia breviter petiolata oblongo-ovata, utrinque angustata, margine integerrima. Nervis trinerviis, utrinque trinerviis, glabra v. saepe pubescentia r. pilosa, floralia conformia, gradatim minora. Pedunculi teretres, foliis breviores unilobati, sub calyce saepius bibracteati. Calyx elothaeola *AwMkytea** *coeruleae*. Corolla *Menhae*, pallide coerulea. — *Trickostemum brackiata* Lion. Spec. plant. 834. — Habitat in America borealis cretaceo in Pennsylvania, Marylandia el Virginia, Carolina el Kentucky, at copiosior trans montem, ad Sain Louis.

353)3. PBEALIA *Opilz.*

(Opilz, Flora [B. ZI H24. I. 322 - Meisn. Gener. plant, vascular. I. 323. II. 102. — Rib. Labiat. gener. et spec. 107.)

1. *P. FERVINA* Frosen. in Syll. pi. voc. Raldb. II. 213. — Blh. I. c. j - Herba prostrata dura glabra. Folia sessilia, linearia v. linearilanceolata oblusa integrissima, ulnque undia punctata, ad axilla* subfasciculata, floralia conformia, suprema sterilia. Verticilla tri- multiflori densi distantes, folio florali subremorato, 0-8 lin dimetro. Racemac ovalac v. ovalo-lanceolatus, flores Kuhacquantales foliareas, basi in unolucroni pumatifidum connatis. Calycos glabri rarim apice lincati, rictibus ovalis folmrois, raargine intriore rihilis, sub apice <ors< arisMtis Corolla raire d'ipio Inn^ior, pallido purpiarasrens, lacinnis CMCF* JM-lo<ulis Slamuin bio\i(or oxserta. Stylus sMnibus !>ro\ior x. stil>KM\ualif> Achaemia pallida *Ventha etuna* Linn ^pec plant.ir WJ. - *Ventha purtata* Murrh Molb *Pulftimm ennum* Mill Dul n I *Fulrgwm anyushfulmw* Riv Mon irr I 21. fig. 2 — *Preslva yobuiflva* Opil; in It<i /_n i i-9j | ^i *Pretha nlhflna* Opit/ in I c lalnl.il in r.iirnp.io mrdnc ri iisir.jinn% nli ginosis et in fo\$N udit in I uoiama, llisp.ini.i, (Lilln iustat)

3504. MEVTHJt Linn.

Linn. Gener. plantar, no. 291. — Meisn. Gener. plantar, vascular. I. 283. II. 193. — Hth. Labial, gener. cl spec. 168. et 714.)

1. *M. LAYAXDI'LACEA* Willd. Enum. plant, hori. Berolin. fi09. - Blh. I. c. 170. | et 714. — Ganescons: Toll, sessilib. lanccolato-linearib. subintegerrimK, ulrinq. rano-tomentosis; spirn densa; calycib. albo-lomcstosis. 2 — Caulis erectus Mibratnosu*, tomcnto bre|i candiduc Folia l'/i-2-pollicana, plcrumqtie integer* rima, rarius hinc inde dcnlala, basi subcordala, saepius decuna, neno raedio tahdo, utrinque cano-tomcnlosa, floralia subulala \ertinllasros subacquantia. Spir.ie «ubsolitariac cjlmdraceac, ante anlhcsin comcac, demum basi mierruptae. Vorticillastri mulliflori, infiroi distincti. Bractcac tubulatac. Caçces pedicellique rann-tomentosi. Species foliorum forma distinrtissima, scd nondum spontanea \isa. — *M. lavandulaefolia* Pers. Enchirid. II. 110.? — Habitat in Ilispania In humidis montis Sinaï et in Promonlorio bonae spei.
2. *M. INCANA* Willd. I. c. - Blh. I. c. 170. f - Caule humili paniculalo; roll, sub-sessihb. otato-cordalis subdentalis, utrinq. cano-tomontosis; spiels numerosis .ibbrcnalis; caljcih. tilloso-lomcnlosis. ^ — Caulcs adscendentes vix semipeda-le*, pubescentia brevi cano-tomcnlosi. Folia pana, late ovata obtu<a, margine mtc^orrma v. hinc inde dcntala, basi cordata subampleiicaulia, utrinque sed praesertim in pagina inferiore cano-toraentosa, floralia ioflma subconformia, vcr-ticillasiros paullo snperantia, superiora laoceolata acuta, floribun breviora. Spicac m polhcacres numcrosac paniculatae, basi foliosac, Junioros densac, demom b>> liores. Vcticillastri 8-0ori, approximali *. demum subremoti. Pcdicelli braelca subulala subbret lores calycesque tonenlofo-vlllosi. Caljcis denies lubo bre-vi ores. Corolla caljee doplo longior, eitos pubescens. — *M. tpicala* Fortk. mss. — Jt. *Crrtica* Hortolr—Jt *Piriiea* Hortol. — Habitat in Graecia, PersiaT Arabia?
3. *M. TOHENTOSA* d'Unrille Mem. toe. Linn. Par. I. 333. [non Borkh.] - Bib. I. c. t — Canle erecto v. adscendente elato; foil, sessilib. lanceolalis v. otato-lancco-latis irregulariter serralis subreflexis plicalis undulato-crinpis, ulrinq. albo-lo-mentosis; spicin elongatis cylindraceis, basi ioterruptis subpamculatis; calycib. tnmiMitoso-pubcsrentibus. ^ — Caulcs 2-3-pedales, plcrumqiiio erecti, rarius bnsi pmrumbm*!> rl ad<rendenie<i telragoni, lomcnloso-puboscntes, apice pamco-lilo-r.unosi. Folia oblusiuscula, bail rolundjla v cnrdali, molha el ulnnque, praesertim in pagina infcriore molliter cano-tomentosa, floralia bracteaefor-nna, infiTiara lanceolato-Imearia, superiora subulata, >erlicillasiro vix longiora. Spicae plurimae, U-4-pollicares el longiores graciles, per anlhcsin inlerruptiae, fruciiferae \ix condentalac. >erlicillaMri dislmcn, flonbus numerosii parvis. Bractcae subulatae, exieriore* caljce sublongiores. Cal>ces breviler pedicellati, eampanulalo-globosi. Corolla exlus leouissime pubescens. Siaroina rertilia ei-sena, <terilia inclusa. 8i)lus exsertus. Specie* *M. tylvrtri crispae* (*M. * " 2111a "* tae Willd.; afflni«, srd habilu, fohis angu*tioribus oblusiusculn el spicis dupio tiiplo%e longioribu* in specimimbusi lam sponianeic quam culiis constanter di-tincta videiur. *M. catesrent* Sieb. Pl. exs., non Roth.) - »/. *trthca* llorlul. — Habitai in regiooe mediterranea oriental, in Creta, Syria, in (iraecia ad footes •n<ulae Sryrae et in Persia ad Teheran.
- i *M. SALICINA* Burch. Cat. geogr. pi. Afr. Au>lr. 1372. - Blh. I. c. - Cancsrens. caule ererilo; foil, pcliolalx lanreolaio-linearib. submlegerrimK, supra glabnus-culis, subtus incams; spicis rylmdnci*. "4 - Kicmplana in herbano Burchlian^o jam deOoraia, sed foliis angustis a *M. iloylrana* di>lincti«siroa, ab omnibus »> Nenthis tpicalU folns peiioilaii* differt. Folia magniludme et forma folii* *. Jf ^ ramlulaeae simiha, sed »upra fere glabra, *ublus lenuiier albo-lomenloaa- — JY. *Capnuu* Thunb. Prodr. 0. Cap. W? - Habitat ad (apul Bonae Spei.
4. *M. BO\LF.A>A* Blh. in Wall. Plani. Asiatic, rar. I ». el Labial, gen. cl isp^{ec.} "I. I - Tola albo-lomenlo<a foil, peiioialalis ovaio-oblongis inaequahier serr^{a-} us: spicis elongaiis gracilib., basi interruptis. ^ - Hlibilu Jf. #y/r<n^{mount} tsi-

mac afGni», sed candldior el foliis peliolati bpici&que elongalh interrupts di-
sclinclissima taulis creclus ramosus, 1-2-pedalis, Una Candida dense lomenlosu*
Folia oblusc serrala, basi rolundalo-cuneala, supra pallida lenuiler lomenioso-
pubescenlia, sublus mollissirae albo-lomenlosa, floralia lineana candidistima,
Flonbus broiora Verlicllablñ di>lincli numerosi pam globosi, lufcnores re-
moli, supcnores in spicam gracilem clongala approximali Flores minuii Mibsis-
siles' Bractcae subulaiac Caljx campanulalus, dense albo-lomenlosu», dcnlibu*
latis obtusis Corolla parva albida* Stamina ferlilñ corollam subaequantia —
Habitat m India onentali in Dheyrā Dhoon cl in Iliinalayac jugo ad Simlah*

- 6 *M S\L>LSTRIS Linn. Spec plant 804 —Bib 1. c 171 t el 715 —Caulc ercclo,
foil sub>c>>ilib ovalo-lanccolalis oblongi>ie, supra pubescentib > lomenlosis,
sablus albo-lomenlosis, spicis densis v basi inlcrruptis conico-cjlindracus,
taljub MllobO-toraenlosis — Species ID Europa vulgans cl magnopere tariabi-
hs A 9/ rotundtfoha folns loogioribus acuhonbus el canescenlu a V tomen-
iota foliis lalionbus plerumque planis cl spicis brevioribus, a if mcana caule
(exceplis laniis inftnonbu^ autumnalibusve nonnullis) crecto dislinguitur Cauh*
bubsimplex > ramosus, 1-2-pcdalis, nunc brevissime cano-lomentobut, j>aeplu!>
pih-, lanali* subrccllexis tomentoso-villosus Foha sessilia v In ramis inrenonbus
autumnalibusve broiler pcholala, acula v raro oblusiuscula, marline magis mi-
nus\c serrala, basi rolundala > subcordalo-amplexicaulia, supra pubescenlia v
tomenlosa v inlcrdum demum »ubglabrata, »ublus conslanler magi* minusve albo-
lomenlosa v lanata, flonlia bractcaeformia, uli bractcae subulaia, verlicilla>iris
flonfens bre\iora, anu anthesm subc&erla Spicao plerumque sebquipollitdn s
densac obtusae, in \ari(Utibui nonnullis ha>i inlcrruplac Caljcc» et pidirelli
dense tomentoso-ullosi Corolli purpurasren*: o\lus sacpissime pube^ccni
Stamina ferlilñ exseria sclrili i mcusa Habitus uli forma foliorum in \ innta-
tilins a, fly r, tl o ti liui est, sul difTirunl \illosil H* In Mr ', qu IO ftrMti
proles horUiiM!> t «ipitu s)\isin di\ersi orU csl, folia I iliora oblusiori IK In
Inter M tyhestrem el 9/ »ulandtfuham il rugo>iora sunl , lam dnm pi(!inai m—
fen on s laxior esl, spirit que minus confertae >ar C eni cjudim for rim, H>ILL>
magis interrupu» gaudens, sed dubito an »ynon)nu Tcnorn reclc hu< cititilur,
plurimas enim tpecict divertas iub hoc nomine a Tenorio ipso missal in berbiri-
lo vldl Var. i) esl forma quasi monslrosa In hortlt orla, el \arleutfbut crtspts
dictis caelcrum tpecierum limills — In horto Gftllnffcpfl nub nomine Jf pyn-
mtdahs planta cohur, qua© videtur Jf tyvettrit varlcUi, ted differt foil I • laiio-
nbus glabnonbus el spicis clongaiis gracllibus Interruplis, verticilUilnt pirns
pauciflons*

- a mollmtma foil utrinq molliler albo-lomenlosis — 31 molh\$stma Borkli
— II mcana Sok Herb ox Sm in Rees Cycl 2J — if caneteent Koib, Lalal
bot III 40 - V (hattpeMU Mill Did no 10*
*fi. eandtcans foil ulring brevisimo cano-lomenlosis —M candicnnt Crant/
Slirp Au>ir JO — U tyhestrtt candtcant Rchb. Plant crilic \ 2* t OSj
— Jf palitda Vo ab kscnb — if sylicstnr albtida Rchb Plant triln \
28 I 08J*
*r glabrata foil supn plobriu>fuli>f sublun pubcftcrnlib submnuu — f/ /,
tani Ten H >i|> App > 1^ e\ ejusd 5)11 (1 Nap 281 — 9f / aetutadhan •
Opu ex Tin S\ll n ^ip 2<d*
*J tultjant foil supra P>IKNC(ntib Mibrugeo^is biibliis molliler albo-totix nio.
Ms 9f candicans Mill Did — Vf ti/o#ā Sole, Minlh Ilrit t I <t 2
V tyhrllnta Sm Inns Sni I inn I ond \ 179 Fn^l llol | (>^i (mil |
9/ ijmtssurw » illd Spt r pi ml ir III V) M mtiara W did I < 70
9/ Im/folta In N H \n^l 121 9l lomctosa Horkh J/ hyhila
Schkeli PI <|* nut I n 55* 9/ nfirmf ha Opi/ in Hot /tit |*| ||
32 V sutnis ll« (Tm ** <| Mil in HIM (x l I) nun (<i^ || If, .
beckian f dpi/ in Hoi /ul 1^1 II 52V J/ /<<IJ/ M<<UI« dp/ ui I •
— Jf oblohfi j O|uz in I L »*

e. netnorota: Toll, orato-oblongis, supra viridib. pubescenlib., subtus laxcalbotomcentosis. — Jf. *nemorota* Willd. I. c. 75. — 31. *tyhalru* Sole, Menth. Brit. I. 3. — Ocd. Fl. Dan. t. 4*4. — Jf. *sylcestris* 3. Sm. Engl. Fl. III. 73. - *Al. sylteslris nemorosa* Rcb. Plant, critic. X. 28. t. 084. — Jf. *rotundifolia* Sole, Blentb. Brit. I. 4.? [non Linn.] - Jf. *niliaca* Jacq. Hort. Yind. III. 40. U 87. [non Vahl] — Jf. *terotina* Ten. Fl. Nap. t. 150. ex ejusd. Syll. fl. Nap. 281. — Jf. *hirla* Beck. Fl. Franc. 220. ex Freicn. Syll. pi. soc. Ralisb. II. 220. cl verosim. Willd. — Jf. *dumelorum* Schulk ex Reichb. Fl. Germ. exc. 310. — Jf. *gralüüma* Wigg. Prim. 0. IlolsaL 43. ex Rolb, Tcnl. fl. Germ. II. pars II. 0. — Jf. *tapida* Tausch? ex Rciobb. Fl. Germ. exc. 310. - Jf. *lialleri* Gtucl. Fl. Bad. 2. 504? ei Rciobb. Fl. Germ. exc. 310.

C. Caule divaricalo-ramoso; spieis gracilib. interrupts; verlicillaslris pauelfloris dislinclis. — Jf. *urlieaefolia* Ten. Fl. Nap. t. 157. ex ejusd. Syll. fl. Nap. 283.? — Jf. *origanoidc** Ten. Fl. Nap. prodr. App. V. 10. ex ejusd. Syll. fl. Nap. 2M.

r. crisper: foil, undulalo-crispis profundo dcnlalis subruo^s sublus molliler albo-lomcnlosis. — Jf. *undulata* Willd. Enum. GOS — Nees ab Esenb. PI. mcd. ic. — Rcb. Plant, critic. X. 27. I. 030. — Jf. *telutina* Lcjeunc? - M. </u-cisiüma Dumorl. Flurul. Del p. 48? — Jf. *critpa* Ten. Fl. Nap. II. 20. — Riv. t. 50. - Jf. *serolina?* Ten. S)ll. fl. Nap. 281. - Jf. *foliota* Opiz c| Fresen. Syll. pi. soc. Ralisb. II. 220. — Jf. *iomeniosa* Iloppc et llrnnscli ex Ilmbh. Fl. Germ. exc. 310. — Jf. *hybrida* Schleich. ex Kcirlib. Fl. (icrm. exc. 310. — Jf. *Lamarckii* Ten. Fl. Nap. prodr. App. V. 10. et S)ll. fl. Nap. ^2 excl. syn. Schrad. et seq. — Jf. *emarginala* Rcb. Plant, critic. X. 27. I. 070. — Habitat

in Europa fere lota el in Asia borcali nee non inmlis Canaricnilbus ad fosvas el in udis vulgarit; « Ufi In Graecia, Dalaatia, In Uitpania, in iotulls Canarlenlibat, eliam in Angla el Germanla, obi raree tidentur; d. in insulis BrUannicis, in Suecia meridionali, Danla, Germanla omnl, Lailania, Galha, Hifpania, In Italia eliam meridionali, In Sicilia, Graecia, Bulgaria, in Rossia Europaea, In Taurin, in promonlorio Caucasico el monlibus Beschtau, in jugo Allaico, in Sibiria ad regionem .supriorem fluminis lrl\<rh, in insula Tcnriffa, ad Caput bonae spei, r in Calalonia, in Italia et for*an in (ieroiania.

7. M ROTI MIFOLIA Linn. Spec, plantar. 825. - Dili. I. c. 17J. | - Caule crccio; full. M'iMlib. o\ato-r<>lund.ilis creualii rugosi*, supra pub>rrnli"lnrti\$, sublus laxc albo-lanaii»; spicii donMi conico-r>jindri(i>: raljnb. hirlis. ^ — Cauli* crrrtus »ubramo»u», l-2-pedali«, apico rijujM pauris ptiüiculus, pilis mollibus lanatit ^rstilus. Folia pliTumque o\atu-r<itumlali, i.inus elliptira oblusa, crenituns oblu>i« |. ranus acumiuaait, basi r>'(untiato-rorilita, cunsianler rugo»a, lana paginac inferiors multo laxiurc quam in Jf. *lyllestri*. Spicae Jf. *Syl€€Str%\$*, scd \indcs nrc ranc^cenlef, el tarpus lasi interruptac. Prdicelh glabriuacoll v. him. Cal)r< hirli. Corolla albida. Slamina ferlilia r\srta, sicriha inclusa. — Jf. *rolundifohti* Mn. Kngl. But. I. 440 - Jf. *macroshuha* í tn. Fl. Nap. II. » I. öd. - *)|L fl. Nap. ;M - J/. *ncglrcla* Ten. Fl. Nap- » .#TM. 11'>7. fi; I. ex S)ll. fl. Nap. ^i jam ab aurl. ipso hue rclaUi. M. *fragrant* Vrv*|t Vvl Prag. 7H ex Gu»s. Prodr. fl. Sir II M. - Jf. *ru.jma* I.am. II* Fr. 11 120. R>lh. Caial. hoU II. tñ. r\ Fr<en. S)ll. 11. *or. Ralisb II. i)0 - .I/, *tuaievlens* Erb. Rntr. 7. •«• ex Fretrn. Syll. pi. soc. Rjli>b. II. iJO. - llabilat in Europai* ferr lului*. Africa mediterranco cl Sibinae rudrali%, ad %a« cl fu*sa* HI iii">l'- Bnlannicii, <<ermania omni, Galha, Ii«pama, IUMiama, in in*ulj MaJrra, Tangrr, liaha ^{ctiam} meridionali, Sicilia, Graecia, etiam HI lim-nca burcali inlerdum ex horli* a ^{ufuga} occurnt.

a M. VIRIDIS L. IQD. I. c. HOL. et Btb. I. c. 173 r\71*. | llaulr crccio; foil. ^{subses-} ilib. ovaio-Uoctolali* inart|ujjiti*r M*rraiu raulcq. glabn«, floralib. ^{omnib.} bractearromib., «erticilU»tro sublongiorib. cal)cibq. hirlis* gUbris^e; *p|c|s^ ^ Imdracei laxit; «erlicilla»lri» approximate t. mfimif ». omuib. di»UUibu»« 4 —

Stalura, habitus et forma foliorum ut in *Jf. tylosesri*, sed caule foliisque glaberrimis consumer distinguitur. Spicae plerumque hirsuta, nec cano-pubescentes interdum omnino glabrae. Exemplaria Doreali-Americana ab Europaeis nunquam distincta videntur. - *Jf. viridis* Sole, Menlh. Brit. t. 5. - Née* v. Escnb. Pl. mod. ic. — Sm. Engl. Dot. U SW24 — Fl. Dan. I. 1876. — *Jf. verticillata* Feuill. Pl. Chil. 4. I. 99. — *Jf. spicata* CranU, Stirp. Austr. 328. — *Jf. ocimifolia* Opiz mss. — *M. brevicauda* Lcbm. Sem. bot. Hamb. 1828. — *Jf. balsamea* Reichb. Fl. Geim. exc. 300.? [non Willd.] — *Jf. laevigata* Willd. Enum. plant. bot. Berol. 600. — *Jf. mhaca* Vahl, Symb. III. 75. — *Jf. Pudina* UamiU. — Bib. in Wall. Pl. At. rar. 1. 20. — *M. icnui* Michx. Fl. Bor. Amer. Ul. 2.

fl. angustifolia Loj. — *Jf. tenuifolia* Opiz ex Reichb. Fl. Germ. exc. 300. — *Jf. Lejeune* Opiz ex Reichb. I. c. — *Jf. Mutchin* Rehb. Plant. critic. X. 27. t. 031.

y. crisp a: *31. entpala* Schrad. Cat. Hort. G. H. L. — Willd. Enum. 008. — *31. hercynica* Rolil. Deub. Fl. — *31. crisp a* Roth, Tent. fl. Germ. I. 2K et II par* 2. 7' [ex specim. hort. non Linn. — *Jf. cordifolia* Opiz ex Fr. in Sill pl. soc. R. allsb. II. SJ2. — *Jf. horrefuta* Opiz ex Fresen. 227. — In hibernia in Europa temperata ruderalis, in Anglia, in Scotia, in Gallia r. inor, scilicet in Alsatia, Fraecofurti, ad Treviso, in Bulgaria, etiam in insula Madera, ad Caput Bonae spei et in America boreali et meridionali, tamen ibi spontanea videtur.

0. *31. PHATE.* SIS borealis, Menlh. Brit. t. 17. — Bth. I. c. 174. t. — Folia, tuberculosa. ovato-lanceolata oblonga et serrata caule erecto glabris v. lenissime pubescentibus, floralibus subconformibus. minoribus, superioribus late lanceolatis, teretibus tubulosis, duplici longioribus, et illarum omnibus remotis globosis; pedicellis glabris, calicibus campylatis denatis. hirsuta. — Species inler *Mentha* et *UfoUa* rhizocillastris remota foliosi, micrometallata foliis sessilibus distincta, caeterum quasi media et inler *31. tinctoria* et *Jf. anensem rubram*. (caulis erectus firmus ubi inermis, parum ramosus, ramis erectis bracteatis) Mjgalus, purpureo-ruber, glaber v. pilosus brevissimi pilis pubescent. Folia caulina fere *31. tinctoria*, firma, saturate viridia v. rubra, supra plabra, subtus pallidiora, breviter pilosis, Oracula gradatim minora angustiora, tamen bati proportione maiora. Rhizocillastri denti globosi. Bractee lanceolato-subulatae. Calyx florifer tubuloso-campanulatus, fructifer tubuloso-campanulatus, aunc fere glaber, dentibus obsolete hirsuta, nunc dense pilis erectis strigosis hirsutus. Corolla purpurascens, exclusa plabra pubescens. Stamina etiam fertilia inclusa. Stylus exsertus. — *31. rubra* Hud*. Angl. ex Fries. Nov. fl. Suec. led. 2J 170. non Sm. — *Jf. genthis* Sole, Meib. linc. t. 15. — Sm. Engl. Bot. t. 440. — *M. gracilis* R. Sm. Trans. Sue Linn. I. oml. V. 10.

fl. ensata *M. densata* Willd. Spec. plant. III. 80. — *Jf. ciliata* Opiz? ex Frenc. in Sill. pl. Rati. II. 240. — Habitat in Europa septentrionali, in Anglia ad fossa et in quibusdam locis et vix spontanea, in cultis Succiac quasi sponte.

la. *M. SUA.* IS GUSH Plant. rarior. 387. f. t. 66 — Dth. I. c. 715 et 175. t. — Mollior pubescens v. villosa: folia, petiolatis ovatis acutis serratis, basi rotundatis, tubus pallidis. incanae, floralibus parvis lanceolatis v. inermis caulibus subconformibus; rhizocillastris distinctis, infimis remotis, tunc mitis calicibus spicati. 2f. — Affirm *Jf. ptenlae*, a qua differit in superficie molliter villosa et Cois subtus magis minutis canoscentibus. Caulibus basi saepe procumbentibus, rami ad centum annos rarius crocatus, pilis mollibus lanatis subrectis praesertim in parte superiore. Miosu forma et inagmtidine foliorum *Jf. in-antar*, rari nulli, superius rari nulli, sicutus tomentosus et villosus, Porulium jarium rari nulli strobiliformis, Mjriura p. ma. lanceolato-subulata, Mriullastro: subcilicirupia elongata in hibernia in insula nriquiri pedunculata, superioribus subglobosis, minoribus et minoribus in insula, Mriurum triplicem imitari vult subulata, uti pedicellis in insula. Corolla rubra, Mriurum accumibus kuppelati-

bus eliam ferlilu constanter inclusa. Stylus exserlus. — 31. *pubetJen** Willd. Enum. plant borl. Berol. 006? — Rechb. Plant critic. X. 27 t. 078. - *M. glomerulala* Jan. — V. *duaneata* Lag.⁹ - *M. batsamra* Willd. I c * - *M. hirta* Willd. I. c. ex deacr. in Link. Enum. II. 10*. — If. *Lantju* ticiger, Pharra. Bot. 1232. — Habitat in Euro pa niendionali, in tiallia mcndionali prope Avcnionem, in Italia, in Siciha.

11. M. PIPEKITA Linn. Spec, plantar. 805. - Bih. I. c 175. f - Foil peliolatis ovalo-oblongi* acutis serratis, basi rotundalo-crcnolis raulcq. glabm, spici!» laxis oblusis brevib., basi interruptis; pedicellis calycibq basi glabns, denlib hispidis. 2I. — Caulis basi procumbens adscendens ramo^us, subrubens gljhcrrnmus >. pilis ranssimis palenlibus ciliatus. Pciioi s»irpii» ciluli. Folia ovato-oblonga v. sublanceolala, basi rolundata, saturate vmdia, in \ar.a. ulringtir «laberrima v. raro ad nenrot sublus ciliaia, in >ar. ,?. ad ncnos pctioloiquc hirsuia Floralium par infimum caulmis subconformc, superior*! pana, lancrolato-subulala, floribus breviora. Verticillastri pauci laxi, superiors in spicam breveni oblongam obtu»am rubescentem approximate infirai rcruoii, cjmis utnnq breuter pedunculatis. Bracteac subulalae, cxtcnores caljccra aequanlo* iVdicelli glabernmi. Caljccs lubulo»i purpurascenlen, dentibus subulatis crectis. (!<rollae glabrae. Stamina etiam fertiha conslanter inclusa. — *M.ptprrtla* vrs ab hsonb Pl. med ic. — Sm. Engl. Bot. X. 087 — if. *ptpmta officinalit* Solo, Month. Brit t. 7. - if *ptpenta vulgant* Sole, IiB [sed >ix CJUMI. Mcnili Brit t ^) 31 *tjlabrala* \ahl, Symb. III. 73. — *H. Kahtnna* Forsk Fl \o£ Ar. — 1/ *balsamea* *illd. Enum. pi. bort. Berol. €08.?

ft.⁷ *subkirsula* foil, subtui ad nertos pciiolisqut' lursuiis. — *M hirtula* J Sm berb. — *M. ptpenta syhestru* Sole, Menlh. Brit, t 24. - If. *htrla* Willd. I r 60S.? -- if. *Ptmmm* Kees •. Esenb. ex deter, in Reichb. Fl. (ierm. «^c. JUO — Habitat lo Europa seplentriootli sponiane* et in Europa ~~br~~ loi.i. Aogypto, Asia media, India, America boreal! et mrndionali culu vi c\ horm aufuga quasi spontanea; *fl.* in Anglia ad lacum Milham, in conitjtju Norfolk prope Bath.

12 M. CITR\TA Ehrh Beitr. \ II. 150. - Bih I. c. 173 'l - Foil pctioladi «<«lib». basi Lite roiundatiH »ubcorilalii^r raulrq RI.ibrii \ priiolu ciliaiis. \oriuilljHiri< paucis in capilulum oblongum appronmah^, \ inlnno h\<> rrmotn, pnticellis i.ih(ilx| glabm ^ — 1/ *nujneans* Mill Did n II V <>l<>ta(>i Sole. Mentb. Brit t 9 Enk'l Bot. I IOI'I. — if *a<hpr* a* Mormli *M* ill pl.n.t J/> <l W illd. >p<*.c. pl.int. III IV — ll. ibit. il m Anglia in a>ju<ms rumiUiui (bi'Hlnn , in (~~ju~~ bna septentrionah rt prope Bedford \n «<*< ^poiUni'j'

13 M A^f KIUK Linn Spec, plant. 8UA - Bih I r 170 , rt 715 i auk pilis rrfinis hir<uto, foil petiolali* o«ali« %rrrati«, basi roiundaii* «ub<ordati«*, utnnq biftpidulit v >illo%i», floralib inborn subennfornub , %uprim% bracteos* formib , «ertirilla<tn* paurit, omnib | t-1 »uprrionb RloboHM- « <,t,lonco-C* piiait, »upremu lerminali, inflnm tarpr rrmotit. rahnb mhultm* prdicHMs^* villotis 4 — Sprcirs ^ulgatittiima et %alde %jrubili%, %al mll<rr%irna * folns Constanter di<linrla «nlriur. faults »jrpiu« rrcrtu« raiu<>Miv ma^is ninnusto «illosu«, ad aogulos saltrn nunquam ghbr IOI14 %rmprr prii<,lji4, supra pilis spar«i« magi* minu%e hi<pidula, ranut Mib^hbrj, »ubiu» «III<M *ri halditoto, nunc cono-tom<«nto%a \rrin IIIJ*UI nuja*culi gl.»lu| %u, j I. rum<juc ? - ^ in ejptitulum glooftum « »pirjro >*<«m ublni^jin 1 «r r| on, sto - esjndroca» *pproimali, rtlremut trnniuiuli%. inUmi » plur mi mf IMIIM rrm>h ~~cauib~~ ulrmque br<«iirr prdunculaiM >««lu fl>ril.j ii.f.ri.n caulnis subconformis, iuprrriu brartrarformij, trrlnilj<iro br««<<.rj IV.L...II calyceque hispidi

*. Med/ - **/* U pipriUm r l M JUUJIM am. t t <i'iu > jm < w / i . tinti « . . * * * * / * .
 fca
 utru* ur kyrt a «ortensio Specimina vtr »/ .N/anr.t m inJum tiod . ? - *n
 dota. uca sarpe colitur

Bracteo linean-subulalae. Denies calycim subulati. Corollae in exemplan-
 bus masculis v. hermaphrodite m.ijusculac, slaminibus exsertis, in foemineis
 sen cisiralK plcrumque minores, slammibus inclusis, anthrrarum loculis cas-
 sis. — Var. a. quac praesclim in umbrosis occurril, nonnisi superGcie gla-
 bnon, folns plcrumque majonbus el flonbus paucioribus saepe minonbus a
 vulgniiHsima \ar. ,5. distinguilur, a *M. citrata* differt caulis angulis semper re-
 flexo-impidis el slammibus (dum frlilia sunl) exsertis. Vary, est forma hor-
 len<is. Var. 9 quasi media esl inter var. fl. et *M. artetuem salivam*. — Jf. *pai*
lustns Mill Did. no 11. - Jf. *aqualica* Sole, Menlh. Brit. t. 10. II. 1 Jf *hirsute*
 Sm. Transact Soc. Linn. Lond. V. 103. - Engl. Dot. 1. 447. - Jf. *pedunculata*
 Pers. Sjn. II. 119. - Poir. Diet. Suppl. III. 003. - 31. *acutt s err at a* (Op)17 0x Fresen
 in Syll. pi. soc. Katisb. 11.226. - Jf. *nigrescent* Weihe ex eod. I. c. - Jf. *bugutae*
foha Wnlie ex eod. I. c. - Jf. *braehiala* Weihe ex eod. I. c. - Jf. *anla* Weihe
 ex eo. I. c. - Jf. *onganoides* LeJ. Fl. Spa. - Jf. *pubescent* Willd. Enum. m *
a. ncmnrosa- Fries. Nov. Fl. Succ. [cd. 2.] 183. - Bth. I. c. - Jf. *pubescent* Willd. Enum. m *
colorumq. pil» brenb. reflexis, foliorum spartig raris, calycum bre^ib i>a-
 tent.b.; ^criicillasins paucis, omnib. globoso-capitaiii v. infimo remoio -
 Jf. *nrata* Rchb. Plant, critic. X. 80. U 077. - Jf. *capita** *Opii* - 7 *Z e r*
media Host, Fl. Auslr. II. 141. (specimina pa rum villosiora) — Jf *>umur. &
 Host I. c. (Jf. *inlermediae* simillima.)

ft. *hirsula*: Willd. Enum 010., xlosior: vcrlicillasrii ul in var. a , sed pi era ma
 majoribus. - *M. hirsuta* Linn. Mant. 81. - Hook. Fl. Lond' V. t. 168. Jf
 Jf. *dub,a* V.H. Fl. Delph. II. m. - Jf. *riparia* Schreb. - Jf. *Weiheana* Onii
 - Jf. *nepetoides* Lej. Fl. Spa. - Jf. *dumetorum* Schult. - *Origanum tii/*
gare Fl Dan. t. 64.

T. ensa fil, cnspalo-pl.cat.s laccro-dcnlal.* , bro>u< pet.olat.s; innorc*
 rent.a praccdenl.um. - *V. crista* Linn. Spec. pi. HU - >cen ab K<cnb PI
 med. ic.

J. subspirata villosa: criteillostris loripis supfl i» »ob.,,c.l... nfwonb.
 remotis; foll. floralib. fere omnib. rtulim. conform.bu.. - jf. * , , , , , t Sm
 Engl. Fl. 111. 70. - *M.* . 77. - *M. peludosa* Sole,
 Menth. Brit. t. 22. - *J.* . t. 6. [male.] - *M. ritalis* Sole
 - *M. ballotaefolia* Opiz. - *M. pyramidalis* Ten. Fl.
 Napol. II. 33. t. 33. - *M. jassaa* Plant. critic. X. 28. t. 970. -
 Habitat in Europa et A.,, Sibirie. <ulg.UMin. ,B aquesis ad fossas etc. et
 in o

H. M. ARIRV.IS L.nn. Spec pl.nl. 80S. - Bib. I. c. 178. el 715. - Cal. a allata.
 turn pilot.0 Miloso ». Klal.rluncalo; foil, petiolitii otali* obloncUve bi.i retror-
 din* runraii» ». anRU>|*li9, dorilib. omnib. conforrolb. Oorei tñpenñlib iudr»
 mik iubtlrñlib; >criinll.i<drIH onmh. Rlobonit multiOorii remolli; bract'cit lan
 ceolalo-<ubulali«, caljrom lubuloiom eampanutatunte iubaequamlibut a,
 Specie ultra omnes pol)morpba; tarlal rnim: caule tinplici ». main mintt.JI
 ramoao, ranu. rrrcto, narpius Jnarir.io procumbenle T. diffuio, nune bumih <.:
 Mmipedah, nune ramit HonRatu 2-3-pedal.bu«, ranut in var. r. RMnu.rull'
 in omb... .In. p,|, . m . g |, , , , , <» Yl|lo,o-hl.pldo. Variat porro bin. , , , , ,
 la« irunr... , OWM-OUOMM. >. <uperi.ribua oblonc«ll.pl.c., It, !, . , , , ,
 quam .n Jf. *ranaden*,, nune rugo,, , , , , , mif, v. in tar. r. el C «Ubrl. «lr-
 mmbraMrri*. omn.bu< priolot., , . »UPrrosf ies,||libu., »whf,|UMr1, m«B
 Hlb.M« (at m,n<n,u, <am .n .» . , , , , </.<; , . p.n.,, den., , , I*! ! , ? ,
 rul.i.s «p,,us phnia, majorom partm occpant.bu., nune pauci, rrw
 m.lalcn. r.in.on.ni, turn IWil.ut ulisc«s,|,bu, s. pr,|,r*lh« Vre-

panulatis v subeylin
 lis, superioribus
 uli » . * . . . f «»»» . • «' < " -lfinun. »ubl.ilabial|k ^ anal demur ,7 i. T ub-
 em

>arpus mclusis (fcrilibu* v. KtenlibusV A If *nquattca* const.inter distincla est mule indclerminalo, *crticillastn» omnibus distinclis nec «uprcmis capitate \ «picati<, folns floralibus omnibus caulirm conformibus \crlcillasiros mullo superanlibus nee supremn bractcaeformibus \erlicilla*»tro breunnbus V 1/ (*anadentt* folns laiiionbus plerumque rugosionbus el pilorum direction?, nempc caulinis reflexis, folioruro paginae superiorly adprcssis, infcnom patentibu*, pedicellorum rflexis, caljcinis ereclo-patenlibus. — *M.talua* Lmn. I c sto — Jf. *genliht* Lmn. I. c.

a *tahca* calycib. subcylmdricis pedicellisq. hirsuiis, Toll, magi* minustc >||-losis. — *JU. gentht* Rebb. Plant, critic. X SO. t 974 — *M ru alts* <soW Month. Brit t 20 — Jf. *saita* Sm. Trans. Soc. Linn Lond \. J99 — HURI Hot I 448. — jf. *htrsuia* £ *terhallala* Sm Enpl Fl III 70 - 1/ *aquahra* HI *sattva* Fre»cn. in Sjll. pi soc. Hali^b II. W. — *M aqunhm* II *rrrtctltala* Fries, Nov. 0. Suec (cd. 2.) 183. - *M. rrrtnllata* Mill Put n 17 el Aucl plur. — *M. aeuUfolia* Sm. Trans. Soc. Linn. I ond V J03 - Kngl Boi t. 2415 (folia angusliora) — if. *palustns* Moench, Mcih planlar. OHO r\ Fne«. I r. — Jf. *pilota* Spr. Pl. mm. cogn. pug. II. 00 ex Fries I c. — *U <tufna* Srlrcb. non Vill. — 3i. *crnala* Becker, Fl Franc SSI — Jf. *nlloia* decker, I r £2! — 1/, *ongamfoha* Host, Fl. Auclr. II. Hi — Jf. *tortuosa* Host | c — V *maculata* llosl |. c. — Jf. *srohna* llosl I. c. — If *nemnrsa* llosi | c. 144 — If *longtfolta* llo<l I c — Jf. *lattfoUa* Host I c)*> - 1/ *data* llosl I c. — Jf. *earnwhea* Host I. c. 140. (folia tillnsmra <ub(us allmla sublanaia) — *M. rmduta* llosl I. c. 147. — //i. *oiahfolia* Op./ - Jf. *Sperkmoitnan** Opu - Jf. *cveruUa* Upu. — Jf. *phcaia* Opu ex Rcichb Fl Germ <»r J07. — Jf. *arguia* Oplt ei Reichb. I. C. — Jf. *Holktt* Nec« ab I-Nrnb v\ Hnrhb. I.c — Jf. *obtusai** Opli ei Reichb. I. c. — If. *mehuarfnnta* I <J e\ Heichb. I. * fi. calycib. subcylldricis tillosls; pedicellif glabn>, foil tillosissiuio — Jf *§a~lira* Sm. Herb.

r calynb. subcylmdncis villosis; pedicellis glabix, caule fnlusq fftabrlu*eiili*» — V. *genhlts* a, 0. Sm Tran«. Sor. I inn I ond \ 3W «(ompl nonnulla.) — 3I *atfuatira suartfoha* Fne«, >o> fl suc< cA 2. 1*4 1/ *tahr** Beck. Fl Fnnr 2il - ¥ *nummutarto* Scbreb II I rl If //n /mm (Inicl — V *mtula* [f?)*i, Fl Au<lr If 143 - Jf. *rubra nct/m>tinra* l<hb Plant, critic \ 2b I 07f — If *montana* ||o>t I. c 14^ *M tyh ultra* ||n>i I r 140. — If *rufNiir/d/fi* Op.i m ll>t 7eit k*J4 II 31* •

* m&rit cahcib oJindnri«, prdirelli* cailir folii%q ^Ijbri* rub* ntibus — Jf. *rubra* sm Iran* s_or. I inn Lond \ 2ft — hn*1 Bot t 1411

r rw/y.in# Bib I. c 179 rt 710. - <a1)nb rjmpjmihtU iillosi*. **pedicellis** glabrK. caule foliitq. «illotit - Jf *nrrmsts* s<i|r, Mrntb Brit I li- *** Tran« Soc Lian Lond V.ilX - KORI Boi t 2110 rt aucl |>lur Jf <^r#> Its Sole, Menth Brit L 14. - Sm Kogl II III *I l.nd Bnt l. ^ ^ J T Jf ym/i/i* Mill Diet. DO. li. el aurl plur Germ V *iustrta a* Jacq. *» Ao.ir. V 14 t 4T0 - All Fl. Pcdem I M I 7) fis 2 Jf />•'«'• WII J J Ana. boi 7) Jf *palustru* Mocob, Melh 3W. r\ P<nr hut >uppl- I** M£ - Jf *mtUuaeUa* ||o>l< Fl Autlr II 141 - If «M<I><<«/«m llo<<< ^T 1*0 - Jf *Hmekyotd.** llo>| I c - Jf *multiflora* ||o%l I r 147 - Jf f**mt* Mia Ho%t |. c - Jf *eanmktaca* Until r 140 - Jf *H*t nrir.i/d* II©*1 l. c. IMI If runaw II. M I c If >i uj/ra/i ||o<i I r IM If *lare* **Host** •• «• Jf *parrftorm* l|o>t | c lii - If /<oiyM>r|iAa llo%l I c **Host** /WJ<iej. Fl spa. n |'tr%rn to s>ll pi Raiub II 34i If >««<iM1* *>1 J. <tFr>rQ| c - Jf ri/f><u Urrk II Franr V >r .cM<Ar<J Tbuill. P>» **SW** . Jf *mtrrmnla* Nrri ab I*rnh r> nrhb II Itertn r>c ^ f *DalmaUe** Tausrb in hjll pi »oc Hañ%b II 3W - Jf *grnhif* ; Jj **Host** reusti ,I Herb, ftm Jf *arre%*i\$, mgrrght* rl nr n/i# llrrb hole - J **Host** *mttfoha* Hott, Fl Autlr II 144« - It *oefmotdes* llo>i I. c !**• - * r **Host** ••lo Host I e IX) - Jf afrftjtj Hebb PIJOL crMic I « • *'

arvensis lanceolata Rchb. 1. c. t. 07W. - *M. arvensis paHetaHatfoUa* Rchb. 1. c. 1 «70 - *M. arvensis agrettii* Rchb. I. c. U 071. - *Jf. arvtmii plicata* Rchb. 1. c. t. 072. - *M. acutifolia* Rchb. I. c. 25. t. 073.

T calycibus campanulas villosis; pedicellis giabns; caule fotnsq. glabrmseu-
lis. - *M. genhl** Sm. Trans. Soc. Linn. Lond. V. 206. - Engl. Bot. t. 2118.
— *Jf. gractltt* Sole, Menth. Brit. 1.10. — *V. gracilit a.* Sra. Trans. Soc. Linn.
Lond. V. 210. — *M. saliva* Sole, Menth. Brit. I. 21. — *M. variegata* Sole I. e.
10 - *M. pulehella* Host, Fl. Auplr. II. 148. - *If. Aiulnaca* Host I. c. 150. (neo
Jacq.) — *M. grata* Host I. c. 152. — *V. alrotirent* Host I. c. — *Jf. retinosa*
Opilz* — *Jf. parviflora* Schulz ex Rchb. Fl. Germ. exc. 307.

« *glabra'* calycib. campanulas; pedicellis caule folnsq. glahcrnmis. — *Jf.*
glabra Sole mcs. — *Jf. praecox* Sole, Menth. Bnl t. 13. — *V. rubia* Herb.
Smith - *if. gnhlu* ^{H081}; Fl. Austr. II. 141. ét auct. plur. Germ).

0. *crupa* Toll, undulalo-crispis lacero-dentatis; calycib. folnsq. vanu - *Jf.*
tatwa ISecs ab Es»cnb. Pl. raed. ic. — *Jf. critpa* auct. plur — Habitat in
Europa cl A«a media ct boreali volgaiisima, in regione mediterranea rarior,
in SJIMS umbrosis, ad fossas, in ndis uliginosis aqualicisque, prope Gcor-
gopului Caucasi, prope thermas ConslaoUnomonUnas, in AlUico jugo, in
vallo Cashemenano.

15. *M. CANADE^SIS* Linn. Spec. plant. 800. — Blh. I. c. 181. el 710. — Prottrala T.
ascendens, glabruscula v. dense palentim pilosa: foil, peliolatis oblongo-ellip-
ticu, utnnq. longe anpustatis, Doralib. conformib., supremis lanceolato-lineanb.
Rubstenlib, >crk«cillasiri!> ommb globoKis multillorit remold, brartei» lancoo-
laio-subulatis, caljccm tubuloso-campanulalum Mibacquantibus "4 — Afflnn
vaHetalibus angu»tifolii!» *M. anenat*, soil folnt constanti'r anKM«dinrihu<, 1>JM
longe oii|{ustalis, habitu laxiore, cl pihs dum n^tant omnibus patcniibus multi-
bus di(Tirt Species parum \ariat nisi pilis in *ar a. prac^ertnn ad rauk»s ct
calyces numerosiH densis, in >ar ,9. raris »ubnulli» — Habitat in Amcricae bo-
real is monlibua el ad rnulon ct amnes \ulgan>, in Chinae proMocta Kianang
a. rtUota: — *Jf. (amadentu* Auct.

fi. glabrata: — *jf. borşalu* Michx. Fl. Dor. Am. II. 2. — Vii son varietal prae-
cedenlisT

10 *M. LAPPONICA* Wahlenb. Fl. Upp. 161. t W. - Bib. I e. Ifl. f - Caule re-
tro r*um ^cabro; foil peiolatia oblongit umlli, baal angttiUtis glabrii, floralib.
ronforonn, verticillastn» ommb. remotit paelfloris; pedkellis glabrit; calycib.
a«pen« Jenlib obtusn. 2|. — Valde afflnia etl *Jf. Canadtnti gUbraia**, et vis
nisi ^eriicillastns paucifloris ealycibusque panrli denilbui obtutloribus dlistincta.
Tola planta plibra ct pallida, odore satis suav fere *MeHitat*. — Habitat in rip is
lubhumiuV .irrnoms fluui Kemensin Laponiae el in Kamlsrhatka.

17 *M. I \>(KOI \TA* Bth. 1. c. | — Caule pills adpreisi* refleis pube^eente; foil.
lanceolatiH acutis herratis, b.isi in petiolum angustatis, supra asperatis, subtui
glabrii, floralib. ommb conformib , supremis vertiritlastro doplo longiorib, trr-
ticillastns ommb. rcrolls multifloris; calycib tubuloni< adresse vllo^n, drntib
aculls. "4 - Cauh* erecius subramo«uft letragoout. Folia crassiuscula, supra pilti
ninulis asperata, subtus glabernma glandulota t. ad nertos pilis ram ciliata,
iofenora 2-3-pollicana, supenora gradalim minora, suprema vix pollicana. » r -
ticillasln in parto raulis suprriore globo»i lanusculi. Bractee aubulaur, ~~exte-~~
rioren liores subaequanes. Pedicelli pilis reOens obsiti. Calyces adpr»»c Mllast,
Denies cal)cim lanceolato-subulati. (orollae lobu« superior longtor, ~~exte-~~
eoarginatu%, dennhus acuiiu»culis AtTinx If *Canadnut*, ltd habitu, caule erecto
et piln adpr«»M» distmrla. — Habitat in Zeylama.

18. *M. II%III III*t.\ Fitch mcs n Iltl I r — Caule triTlo subsimplici, MI bre-
tiier petinlatis otalo-lanrfoljli* plabrrnrnx (loralib conformib, >riitcil|utn<
Paum remolH Uie globoMs, caljcb tubulo^is ghbrunruli*, <L nub t.launv "4
— Cauha w'ctu* sub^mplrt tetr.iKnnus, pili« r«flrn« br< xsmnio jub< *a n* |,a
bretier petiolata o>ato-lanccolata ubtusa inirgermma » bre\is»imc tt nruote
III.

serrala, utrinque glabra, floralia conformia. Verlicillastris 1-2 globosis laii. Bracteae subulalae minuiissimae. Pedicelli breviter rclrorsum pubescentes. Calyces glabnusculi pubescentes stnali 10-nerves, inlus oudi, dcubus obiusis. 2 infonibus paullo lahonbus. Corollae tubus inlus tillosu*, hmbus quadnfdus, lobo sopenore emargwato. Species calycifeus lubulosus, dentibus oblusis ab omnibus Europaeis dislincla. — *Lepeehinia clinopodhfolia* Willd Ilort. Brol. sub no. 21. — *ilormtnum cltnopodiifoha* Pers. Enchind. II. 133. — Habitat in Dahuna.

10. M. MOLLIS Bib. I. c. 182. — Caule ramosisimo (olubilit*) piloso-lanato; full, petiolatis ovalo-subrotundis aculis subserratis, supra pubesrrntib., subtus albo-lomenlosis, floralib. conformib.; verlicillastm omnib. rcmolis globosis muliifloris; caljcb. albo-pilosis, fauce inlas villosa. q. / ^? — Rami supernc albidii. Folia lubpollicaria. Verticillasri 20-30-flon. Denies caljcemi subulati. Corolla cal)ce vix longior pubescent alba, limbo rubro-maculato. Siamma inclusa. Silyuf extertui. Achaenia ovoidea laetia fusca nilida. — *Bystcmpngon molle* II. B. Klb. Nov. gen. el spec. pi. Amer. II. 317. — Habitat in America aequinocnali frequentissimc in alia plamlie montium prope Quito, Riobamba, Nuc»o el Cuenea Peruvia, in Columbia prope Santa Fc de Bogota.

20. VI. PLIKGII M Linn. Spec. plantar. 807. — Bib. I. c. — Caulc ramosximo prosirato; foil. prtioaliiN otatu; verlicillastrit omnib. remotis globosis muliifloris, r.i-ljnb. tmpidi* bilabiali*. inios fauce villosis. % — Cauki el folia in *.ir. communi glabri v. irnuitcr pubescentes, in var. *fi.* pilis mollibui Kublinnh4 drn«o villosi. Folia floralia Kuprema sessilia, saepios rrfleia, vertiri||a<tro broiora >. paullo longiora, omma parva, ID var. a. nenroia, in *fi.* rugo»a. — *Puirgtum vulgare* M&U Diet. no. 1. — *PuUgium *r<tum* Mill. Did. no. 2. - *Puhgium lahfohum* Baub. Pinx. 222. — *M. ixigua* Linn. Spec plant. 805. - 8m. Ic Joed, t 3K. - *U. M*~gium* Sole, Menlb. I. 23. — Neet ab Esenb. PI. Med. ic. - Sm. Bngl. Boi. I. 1020. — JT. *HmpUx* Host, FI. Aair. II. 14S.

fi. caalib. foliitq. dense villosis. — *M. lomenlota* Sm. in Rees Cyci. — If. /o-menielta lloffm el Lnk. FI. Port. I. 73. — If *Gibrallanea* Willd. Knm. OIL *M. pulegioides* Rchb. — *Pultgium tnmmtflum* Prcsl, FI Sic. XXXVI — Ha'' biUI in Kumpae fere toiius fossil humidi^ uli^innsiHquo, prope I enkoran IB Cinraoo, nijm circi Valparaiso in America mrmlinn.ili, ,9 in I UMLania, HI** pann, dallia mrditerranra prope Mon*prluim, in Suilia rariu», regno Napo* litano, Alpcn.i, Tauna meridional), TenrnfTi

21. M RKV>I IKM IKb I r. — PUMIJ rrrprns Rlabrmma rami« filifnrmib. ascen* drntib . foil. pelinlali« nrbiculatis. ^rrhlla^lriH l.nr paMnHons, cal)cih ploboso; campanulali« glabernmi* subbiUbialK, intu< fauce HIIOMH % Oaules bas diffu«i r«mo»i«timi repente*. Rami %K 2~pollirarr%. Folia loniro prtioalaia, liimbo orbiculalo vit 2 lin. diamelro lubinlrRrrrimo. Florw in qunqui* \ o r r l l e ^ 2-0, pedicrlln cal)ce longionbus. r.orolla n odor *Mmlhur l*ultg**%* a qaa ba-bitw, sed nullo modo florum characleribu« differ I. — *Ihymut parrtftarms* R«d* ** *AudtherUa* Bib. in BoL Reg. ad calc. no. 109*. — llahitai in Corsica.

t *Sptciis dubiae* v. non satis iwtat.

22. M. (;RAVEO|E>S Pre>l, FI. Sicul. XXXVI. - Bib I c. Kl. - Sp,cis **panicu-** lalis c)hndricis; flonbut »e*nlibuv ral)cibu« pubr^crnlibiM, braciin **lineari-se-** taen* cal)rc doplo longionbui; caulr credo rjarn^o tnmrn(o*n, full is cor **da** oblongu mucronaiis remote %rrr*U* pube«rrniibu«, «ubiu« cinerro-iomentos **ta. 2**

— AB ad Jf. *pyromtHol+m* referenda llabiial in Sinlia.

O. M ANGLSTIFOLU Ho>t, Fior Au%ar II. IV - Bih. I c. - Florum ^{vertic} approtimati<; folu« lineari-lancrolaii* plant bmuitt, pcdirrlln bi»p>>*», ^{lam'} mb corolla brevioribot. ^ - Cauht ereriuu bumili* purpura#cen», ^{la} asperatu«(timplei v. ramotui. Folia anga«la, »upra medium deniicol-la» P ^{id} •rtisji tubtot birftuta. Bracleae lanceolalae acuae ctliaciae. Pedicelli ^{urt} Cain raapanolatut birtot: cal)ci« dmirt acutinsculi Corolla pun» ^{scen} euerne pilota, laeiola superior emargiaata, favt pilis obsiia. Siamioa co ^{rol}

breviora. — Habitat in Austria, in agro Vindobonensi prope Weidlingau Purkersdorf locis humidis syWaticif.

24. M. M' MIDICA Poir. Diet Suppl. HI. 002. — Blh. I. c. — Fols lanceolatii sub-serralis glabris nervosis, sublus puoclati; caule erecto ramosissimo; verlicilhs pedunculatis subcorymbosis. 2]. — Caules erecli glabri »ulcaii, Tore a bam ramosi, ramis palulis. Folia petiolata lanceolata acula, magis minusve deniculata, ulnnque glabra, pollicem longa, 3-4 hn. lata, sublus nervis prominentibus et tenuiter punctata, supenora et floralia breviora angusiora. Flores rubencenles. Verlicilli axillarc*, opposite pedumulali Pcdunculus ulnnque glaber brevissimus, corjmbulura globouum ferens, pedicellis uniflons. Calyx fere glaber, profunde striaius, dcnlibus 5 aculis. Corolla pilosula, caljcc pa rum longior Stamina exseria. — An *Mt cromertae* species⁹ — In Africa boreali, ad oras Barbarae prope ruina* urbis antiquae Tabarcae.
25. M. JA\ VMCA Blumc, Bijdragen 826. - Blh. I. c. — Flonbus capilalu, fols lanceolatis medio ad apicem difclanlcr serratit, ulnnque puberulis, raule obverse birsulo, hlammbus ex»erlis. 2]. — Maxime accedil ad *M aeultfoham* — An *M lanceolata* v Jf artrmii var.T — Habitat in Javae locis humidis circa Buiemorg el in uliginous prope Tugu.

ft *Specie* e genere excludendae.*

- M. AFRICULARIA Linn - DYSOPHYLLA AURICULABU.
M. AthTRALIS Br. - MICROMERIA AUSTRALIS.
M. BLANDA Wall. — KLSHOLTZIA BLANDA.
M. BLANDA DC. - KLSHOLTZIA INCISA.
M. CA^ARIENSIS Lam..- B\STROPOGON ORIGAMFOLIUH.
M. CAMRIKINSIS Linn. — BYSTROPOGON CAINARIENSE.
M CKR\l>ALmn - IMtKSLIA CKIWINA.
M (OlimiJ()S4 Lam — BlsTKOPohON C4>ARIK>SE
M DIKMKMC\ Spreng - WICKOMERIA GRU.LIS
M. FOETIDA Burm - D\M>PIIYLLA AtRK LURIA.
M. FKtTICOSA Roxb. - KLSHOLTZIA v. P()iOSTEMO!1....?
M. GRACILIS Br. — MICROMERIA GRAULIS.
M. HYPTIFORMIS Lam. - IIYPTIS VKRTICILLATA.
M. MYOSnoiDEh Roik. - DYSOPHYLLA MYOSUROIDES.
M <(YMOIDES Lam. — GENIOSPORUM PROSTRATUM.
M (>ATA Ca>. — ELSHOLTZIA CRISTATA.
M I'ATRIM Pall - ELSHOLTZIA CRISTATA.
M PERU LOIDI-S Lam. - PERILLA OCYMOIDES/
M PERILIOIDE^ Linn. - IIYPTIS PECTIN AT AT
M PIL\lt)s% linn - BYsTROPOGON PLUMOSUM.
M. PI Mil A Grali - DYSOPHYLLA FUMILA.
M. PUM.TATA Mornch - PRF.SLIA f.KRYINA.
M. Mi ADRItoI IA Roxb. - D\SOPHYLLA QI'ADRIFOLIA.
M. QIADRIFOLIA Don - DYSOPHYLLA CRUCIATA.
M QtATERMFOIIA Rolh. — IttSOPHYLLA STELLATA.
M SAURKIOIDKS Br. — MI! ROMERIA SATDREIODES
M SM'.UMM Roxb. - POGOSTEMON PLECTRA!STHOIDES.
M STELIAT4 lour - DISOPHYLLA \ERTICILLATA.
M \ERTK III KTA Don - DYsOPH\LLA PIMILA.
M \KRTHIII \T\ Roxb - DYSOPHYLLA VKRTICILLATA.
M ZEYI \M(A llurm - GKMOSPORUM PROSTRAUM.

3595. *LYCOPUM* Linn.

(Linn. Gener plant no 15 Mci*n dcii fr plant \a%cul. I 2HJ. || 192. — Btb
I abial gciicr rl spec im j

1. L. \RGIM('IS linn Sprr plantar » Blh I r I ft* f _ Gl«bnu%rula
caule bail »lononifro, full oblori{«o-clliphci», uinnq angu»latii rrmuir drnuu»,

calycib. 4-dentatis, dentib. ovatis obtusis; slarainum sterilium radimentis nullis. 2l. — Radix saepe (uberosa reptans. Caules basi saepius siolones replanies fill— formes emillcnes erecliusculi simplices v. ramosi pedales v. ultra. Folia breviter peiolata 1-2-pollicana, denlibus brctibus, basi integerrima, ulrinquo glabra, sublus saepe purpurascenlla. Verlicillastris parvi. Bracleae bretissimae. Calyx campanulatus, denlibus 4, v. rarius quinto minore adjeclo, lalis obtusiusculis, tubo brevionbus. Corolla calyce paullo longior, tubo intus ad inscriionem siaminum >illoso. Slamina 2 fertilia breviler exserla, sienlium vestigium nullum. Achacnia denies calycinos aequanlia, apice glandulosa.

ft. paueiflorui: — *L. uni/lorus* Michx. Fl. Bor. Am. I. 14. — *L. pumilut* Yabl. Enum. I. 211. — Habitat in America boreali, in bumidis a Nova Anglia, in Carolina, prope Saint Louis el ad (lumen Saskalchawan, prope Cumberland House Fort, *ft.* ad lacns S. Joannis el Misllassins.

2. L. MACROPIIYLLIS Bib. 1. c. — Caule erecto firmo obsuse telragono; foil, pe-liolaiis amphs ovalis longe acuminalis, grosse sinuato-dentalis, basi angasalalis glabns; wrlicillasris nulliOoris; calycib. irregularier 4-5-dentalis, denlib. ovatis obtusis; Marainum rudimentis nullis?; acbaemis cahrem aequanlibus. 2l. — Affirm *L. Yirgintco*, el quasi inlermedius inter hunc el *L. obtusifolium*. Caul is in .specimnc unico suppelente ultra pedalis crassus, obtuse leiraponus sulralus el tenuiicr pube;»ri*ns. Folia 3-4-pollicaria, fere tesquipollicem laia, denlibus utnnque 3-4 profundis lalis nolala, ulrinque glabra. Veriicillasin densis»iroi, al breves. Bracleae brevissimae. Calyi *L. Virgin id*, srd di>nle quinlo frequeniius adjecio differt Achaenia majora qoam In *L. Ytrgmico*, apice glandulosa, calycem aequanlia. — JL *VirgMcus ft. quercifolius* Pursb, Fl. Amer. sept 1. 10? — iiabiui in America boreali occlidental, ad frelum Juan De Fuca.
3. L. OBTUBIFOLID8 Miebi. « Vabl, Bourn. I. 2J2. — Bib. I. c. - Caule erecto firmo subaimplici; foil, tetsllib. obloogo-ellipticia profunde serrails, basi rolundato-aogoslaUs; veriicillastris nulliOoris; calycib. Irregulariler5-denlaii»; achae-mis calyce vii brevionb.; siaminum rudimentis subnullis. ^ — llabiiu *L. Virginico* alfinis, sed caulis firmtor, ad axillae subnodo^u* 1-2-prd.ili«». Folu arciius sexilia, minu« angustata_T denlibus brr^ibiM aruds \. ohtUMusrulii, utroqur lalere notjij, ulrinque glabra. \clrlirillaMn dcn*»i. Flores majorrs quam in /. *Virginieo*. frartcie lauccolato-orutac, exirriores |i| caUcem arqu.mirs. Tal^cis denies sn^M^Himo ^, uno nnnore, lanceolalo-.iruti, lubo prr nmilM'sm lonpiorf*, posl anlhcin brr|i|rrs. ^^H.i donhbus cahrimis vuldongior Si.imina frllilia sub* mru%a, Me^^^WU^PRila nulla v. brr|i%Mm.i* Arharma magn.i, apire valde Klandulota^^^H>it*1 in America borrali orridrniali, in planiiiobu< sreus Bed Hiver, ad iflHBatkalrbawan propr Carllon House Fort el ad friium lludsonii*
4. L. KIROPAF.I'S Lino. Spec. plantar. 30. - Bib. I. c. 180. 'eicl. tar y., - &^{olo}~ nib. nullis. raule erecto ramoto; foil, priiolam o«aio-oblnnvi« mnuaiio-dcoacaii* v. pinnatiGdis; vrrlicilla»lri« mulliflons; cal)cib. aruir quinquodenuiiii; ilaminuqi sierilium rudimrni« nullis; acbaemis lubo ral)nt »ubbrmuribu». ^ — £. u¹¹⁰ 1-3-pedalis, non utolomfer, arule lelragonus, fjUbr >. pubr>rfii». Folia (1^{u0}*. d nagmtudioem el denies valde vjnabilia, sarpius drnlibus acuiit profundis no1*¹⁰ el ad basin subpinaalifida, lobis v. drnlibun lanrcolali* aruh«, >uMui P¹⁰*. i¹⁰ nervosa nervis elevahs, ulrinque glabcrnma v. in %*r. *ft.* pubr«rrnlia. \<*>llcT^ Usri densissiml. Bracleae lioran-lanfolaiac « subulalae, riirnores sarpe ca* lycibas loogloret, Calyris tubus slnaius comcut, denies acqualc* . * ° e o l o l ^ aubuUU hgidi aculissimi, lubo longiorc*. Corollac drnle* r«l)Cinos . e c , i l l f o l . albidae, dtnnbos oblusis subaequahbu*. lubo intu« ad in*rriionrm »iamin« villoto. Slamiaa 2 eiserta fertilia, •irrihun %r>iggiam nullum Arharma lae« i a •flaoduloM, lubo calycis breviora v. vix arquaha. - *L aquaUcus* Mo«n«k; ** i b . Z L F ^ M l r s i ' U m . Fl. Fr II. 4X1 rjuid. Illu%ir. gen. I. Ill. - L- r«^«^{ri}#J^v*T \$ Bncfjirtd. ! . > ! - £ . *Emropaeus* Sm. Rngl. But. L life - Fl. D«n. ^ 1 (W , ~ ^ * n s k . Bot L 2 & - C«ru Fl. Lond. III. i ?

fi. pubescent: differ I caullbus oblusionbus foliisque valde nervosis, ulnque pubesceniibus el dentibus calycinis parum longionbus. — Habitat in Europae tollus el Abiae borealis humidis aquosis.

5. L. RLBELLUS Moench, Suppl. 440. ex Wenderoth In Syll. pi. novar. soc. Rallsb. I. 88. — Bñ. I. c. — Siolomb. reptantib.; caule ercclusculo humili pubescentc; foil, peiolatis ovalis, basi anguslalis, profunde denlalis pubescenlib.; calycib. 5-deniaiis, denlib. lanceolalis aculis; slaminum itenlium rudimentis nullis. 2l — A L. *Europaeo* differt stolombus longissimis foliosis, caule humili vix semipedali. — Habitat in America borcali, in \irgima.
6. L. SIMJ4TLS Elliot, Bot. S. Carol, et Georg. I. 187. - Blh. I. c. 187. f — Caule ercclo acue tetragono glabnusclo; foil, peiolatis oblongo-lanceolalis, ulrinq. angustatis, mfimis pinnalifldis, medns hinualo-dcnlalis, supremis lineanb. subintegerrimis, \erticillaslns mulliflom; caljcb. quinquedenlalis aculis, slaminum glenlium rudimcniis capilalis; achacnus tubo calyns bretionbus 2l. — Stolonei nullae⁹ Caulis erclus 1-2-pedahs, saepim lenuor quam in L. *Europaeo* glaber, acute iciragonus. Folia maxime varlabilia, infenora fere semper basi pinnaisechia, apicc minus profunde denUla, media linuato-deniala, longe in peliolum angusitfla, dentibus segmenlisve laeceolatis llinearibuave, superior! et interdum fere omma anguste lanceolala Integerrima v. remote dentala, basi in peiololum broem angustata, omnia glabarrima. Verticillasrl, calyces, eorollae et stamina L. *ejcaltati*, a quo differt sUlura mullo minore, foliorum superiorum forma el acbacnus tobo calycls brevioribus. — L *Europatus* Pursh, Pl. Amer sepi. I. 10. — L *bracteatus* MUhlenb. ex Lnk. Jahrb. I. 3. p. M. — I. *Amercanut* Mtthlenb. ex Barton, Fl. Pbilad. 1. 10.
- a. dutectui'* Foil plcrumq. pinnatifldis. — I. *exaltatus* Elliot, Bot. S. Carol, cl Georg (non Linn) — /., *heterophyliut* RaOn Mod Fl. II. 28.
- fi. culgans* Toll plerumq. sinualis — /.. *ttuatus* Elliot, Bot S. Carol, fl Georg 1. IK7 - I *iulgans* \u\ Gen. IN Amer pi. I. 15.
- y. anguihofus* foil, plerumq. lineanb. Hubinlegerrimit. — L. *angushfohut* Nuiu Gen. N. Amer. pi. I. 15. - L. *longtfohus* RaBn. Med. Fl. II. 2H - I. *Pimntyktatucus* MUhlenb. ex Rafn. I. e.t — L. *pmucifionu* RaOn. I. c • - Babliat in Amerlcae borealia aquosU valgarit, a lumiae eUskatebavan ad Canadam, ad freium Juan de Fuca, • Canada ad Virgiaiaa, la civiuu Ohio ct ad Louisville, In civltaibofr autirallbot, var. a. praeaipot la regione boreali, *fi* in media, *r* in ausrallore.
7. I. ALSTR\IJS R Br Prodr. fl. Nov. Doll. 900. - Bib* I. c. 710. - Caule erecto glabcmmo v pilis paucis hispido; foil, subsesslib. oblongoMajiceotaiit, utrinq. angusia is argu e dtatK supra v utloq l b i i. leitflaw. b dentatK, supra v. utloq. glabirrimis lucitflaw. tubtus pubeircniih . >rcli(ill.is!ris mulliflons, ral)cib. quinquedentatis bracteisq. aculissimu, stammum sienlium rudimentis capilalis; achaemis tubo calycis brevloribus. ^ — Ah I. *Furopaeo* ilifTeri praeler habitum slaminum sterilium praesentia. Vatdo affims e>t I *stnuato*, a quo differt habitu, fohii subsessilibos cl calycibus braeteUque aculionbuH — L. *Europaeut r- argulus* Blh. Labial, gener fl »pr 1H0. — /. *lundus* Turrz. mss. — (resell in Asia oneniall (Sibiria et China) el in >o>a Hollandia (Port Jackson et in >an Diemens Land).
8. L. EXALTITI'S Linn. 01 Suppl. 87. - Bth. I. c. 187. - Caule erecto ramoio Halo; full priiolatts ovalo-oblongis pinnalilldis; vfrticillastris muhiflorls, calj-cib acute quinquedt*nlaii», Maminum slenlium rudimentis capitatu, arliaeniif denies caljiinos Mibaequantibus. ^ — Caulis saepe 4-pedalis fl ultra, amir triragunun glabor > pubcucen* Folia magmtudine variabilia, at constantr profnadr pmanilida % pmanlisrecla, Rogmcniis lanceolatis acutis t. oblutis inlgrrrriiniH di-nUHH \ rarius piniuhlidm, sublus neno>a, basi in pHinlum anguMtu, ulnque glabernma \ in \ar ,I piibi^rnnia \erlicill.iMri drn<it%imt, at nn-nore» quam in/ *turopafu* Ira<tcie lain cij]ato-,mil>ul ilae ngidar, r'tti riorn cal)cem »ubsu>eranU'H. Ulji campanulalu*, dmlil.uk atqualibus iantroUi_

•ubulalis acotis rigidis, lubo subbrevioribus. Corolla minor quam in *L. Europaeo*, tubo intus subglabro. Stamina 2 fertilia subcxserla, 2 sterili rudimenta subulaia capital*, corolla breviora. Achaenia laevia, apice subglandulosa, dentibus calycinis paullo breviora. — *L. pinnati/idu** Pall. Fl. Ross. II. t. 1. — *L. exaltatus* Sibth. et Sm. Fl. Graec. I. 0. I. 12. (an Sabbal. Ilorl. Rom. 3. t. 64?) — Habitat in Europae orientalis et Asiae mediae humidii.

| *Species e genere excludenda.*

L. DIANTHERA HamilL - MELISSA? NEPALENSIS.

Subtribui IV. MERIANDREAE Endl. I. c. p. 613.

Antherarum loculi disjuncti, connectivo liliformi.

3500. MERIAXDB.t *Bth.*

(Bib. In Bot Reg. XV. ad calc. no. 1282. — Meisn. Gener. plant, tascul. I. 283. II. 102. — Blh. Labial, gener. et spec, 18*.;

1. M. STROBILIFERA Bib. in Wall. Planl. Asial. rarior. I. 29 et Labial. I. c - Ramis denso floccoso-lomentosis; verticillastri spicalis, inferius subremolis; foliis floribus bracteiformibus ovato-lanceolatis, quadrifariam spicalis. ») — Fructus 2-3-pedunculati et ultra. Folia breviter petiolata oblongo-lanceolata 2-4-pollicaria oblusa crenulata, basi faasialo-nagillata rugosissima, supra villosula, subius laxe lanata, florum sessilia integerrima, verticillastro parum Inngmra. Spicac versus apicem caulis plures 2-4-pollicari densae v. basi aubinlerrupiac aifualcs. Verticillasiri 10-30-flori densi. Bractae minulae. Flores magmudine florum *EU-holUia* blandtu*. Calyces basi aenuali aubincum, e&tus dense lanati, fructiferi aucti dense imbricati, labio superiore integro, inferiore bifido, dimidio breviora. Suniaa 9 tli natru. Achaenia parva oblonga. — Odor lotius planlae fortu iogralus. — Habitat In India orientali, In montibus proviociae Sirmore, in Jago Himalayensi ad 8yen e4 infra Simlah.
2. M. BMMGHALENSIS Blh. in Wall. I. c et Labial gener. et spec. 180. et 710. — Caule glabriusculo; ramis canescentibus; verticillasis remotis ramoso-pamculatis. 5 — Fructus divaricatus, basi crassitie bractae humani, corlicis rimo>o. Folia fere *Salviae officinalis*** 2-3-pollicaria petiolata oblongo-lanceolata oblusa crenulata, basi Iruncata. rotundata, supra elevata, subius reticulato-rugosa, utrinque rancsrnna v. supra tmdia, florum parva sessilia, suprema verticillasiro breviora. Rami plurimi srmipedales. Verticillasiri In multilobis globosis, per anthesin «cmipollirem, fructiferi fere pollirrm diametro. Iraricjt* minulae. Calycis pndirelldsjnolliirr villosi In subrecti, labns lonKMulinr «ubarfpjalibus, supere brfn^Mq^BidenUlo, denlibut uli lobi libu infcnon« Unrrrolalis aculis* Flores magmltrwR florum *Thymi Serpylli* v. *tulgans*. Mamma enrria 2, rariu 3 v 4. sili lobi dilalarii aroli. Foliorum sapor et odor forliorr* quam in *Slcia offiemah* Odor altulu valde camphoralu. — *Salva Abytumra* H. Ir. **Appd.** lo Sail. Aby»s. - *Salt*â Bmghaiensis* Roib. Fl. Ind. I. 146 - *Salva dianthera* Roib. Nov. spec. plant. I*. — Habitat In India onenUli, in Brnghalia et Coro* Bandtlla? lo borlis lodicis sacputime colitur, ubi pro *Salt ta offianaU* uiuur.

Tribus III. *MONARDEAE* Bth. Labiat. gener. et spec. 190. —
Endl. Gener. plant, p. 613. — Meisn. Gener. pi. vascul. I. 283.

Corolla bilabiata. Stamina fertilia 2 (inferiora) adscendenlia. Antherae lineares, nunc loculis contiguis oppositis confluentibus connatae, nunc dimidiatae liberae v. postice connatae, connectivo linear! in filamentum articulato, apice loculum fertilem ferente, postice truncato v. saepius producto filiformi clavato v. loculum a Herum nunc difformem casuum nunc ferilem ferente.

Subtribus I. SALVIEAE Endl. l. c. p. 614.
Connexum filiforme cum filamentum articulatum.

3507. till A LI Linn.

(Linn. Gener. plantar. 39. — Meisn. Gener. plantar, vascular. I. 281 II. 102. — Bib. Labiales gener. et spec. 100.)

Secus I. BUSPHAOB BUL In Book. Bot Malo. III 371.

Calyx campanulatus, labio superiore tridentato, inferiore hupido, dentibus omnibus aculis, maioralione vix aculis. Corollae lobus amplus subexsertus, lobus pilosus annulatus. Labium superius crecum, inferioris lobi laterales reflexo-patentes, medio lobo pmarginato-bifido, laciniis aubreoaxis. Connectiva postice porrecta, loculum difformem cassum v. rarius subpolliniferum ferentia, extremitate subconnexa. — Herbae v. saepius suffrutices regionis mediterraneae, foliis integris v. pinnatisectis.

1. *S. CRETICA* Linn Spec, plant. 33. - Bth. I. c. 306. — Fruticosa: caule alio-lanato; ramis floriferis (omnino-pubescentibus, foliis integris petiolaribus oblongo-linearibus, basi angustatis rugosis, inferioribus subulosis albo-lanatis, floralibus sessilibus, supremis dorsalis, racemis subramosis, teretibus nullifloris; calycibus membranaceo-coloratis multilobis, profunde (superiore) bilobis, inferiore bifido, dentibus omnibus subulosis-aruminatis; rostrum calycis duplo longioribus, tubo amplo exserto, intus annulato, labiis erectis, superiore recto, inferioris lobis lateralibus reflexis; connectivis postice subabortivis v. breviter porrectis, loculum cassum ferentibus. 6 — Valde affinis *S. officinalis*, cujus varietatem esse huadent *EUUng* et *WWduovius*. gmeliniana culla onchia quoad flores monisruosa differt. Calycis profunde irregulariter bilobis. Corollae lobi aequaliter bilobis. Stamina varlabilla, postice saepe omnino abortiva. Siliqua et ovaria saepe dupplicata v. multiplicata. Caeterum a *S. officinali* differt foliis multilobis per longum petiolatis. — *S. tenuifolia* Riv. Monop. Irregul. 50. t. 1W - *S. officinalis angustifolia* Lnk. T — 5. *Crelia* Scrb. Ww. act. nat. eur. 470. l. 3. l. t. PI rar horl. Gpnev. IV. 0. t. 3. — Crescit in Creta
2. *S. ILLIACENSIS* Vahl, Rnum. pi. I. 222. - Bth. I. c. - Fruticosa alio-lanata. Tolle in petiolaribus oblongo-lanceolatis, basi angustatis rugosis, omnibus vix aculis, floralibus sessilibus, supremis deciduis; racemis gracilibus subramosis; calycibus tubuloso-campanulatis, apice membranaceo-coloratis striatis pubescentibus, bilabialibus, dentibus omnibus subulosis-acuminatis; corollae calyce duplo triplo longioribus, tubo amplo petiolaribus, intus annulato, labiis erectis, superiore recto, inferioris lobis lateralibus reflexis, connectivis postice porrectis, utrinque antheriferis, posterioribus, cassis connatis. — A *S. officinali* et speciebus affinitatibus differt canescens, foliis angustis per ut in *S. Cretea*, sed brevioribus, racemis grandibus, multilobis, laciniis lanceolatis paucifloris et calycibus minoribus bilabialibus. An *S. fischeri* siirps s) in *S. Illianorum* Lag. Gen. et spec. nov. diagn. I. 4. *S. lenuwr* Lpsf v) Roem. et Si hull. Ksi pgpiab. I 200 — *S. rufinervis* Ilorlul. PI norm. Pi SI hull I c. *S. officinalis*, *xar* *Hispanic* Ron. \< j. ^ r boi dans I* midi do I'ISp 1207 T - labiis in Hispania, in montibus circa bigonia, abunde in collibus andis mediocre altitudinis

3. *S. OFFICIALIS* Linn. Spec. plantar 34 — Dih I c | — Caule fruticoso albo-lanato, ramis flonfens torucnoso-pube«rcntib , Toll mtogris peliolam oblongis, ba»i anguslalis rolundalistic rugosts, infciorib sublus albo-lanali», floralib sessilib ovatis acuminatis, ba«i membranaccis slnalis, ractmi* «ubsimplicib , \erticillas»tris mullinons di«tinctis, caljeib rampanulalii mrmbranaceo-coloralif slnaiib pubescenlib , labio MI pen ore Indenlato, in fen ore biGdo, denlib omnib. subulalo-acuminatis, corolla calyce duplo (riplotc longionb , (ubo amplo exserlo, intus annulalo, labus erectis, superlore recto, inferiors lobis httrralib reflens, connectms postice porreclis, ulrinq. anlbenfon**, IOCUH posteriori!) rassii connalis. \$ — Fructi humilis divancalus Rami en»cii, baM foliosi, flonfen pedales sesquipedalesve. Folia 1-1%-pollicana obiusiutrula rrrnulata, supiora ranu> glabnuscua, bati aaepiot an(rutiala, inGma ran us au^ustita rotundata v. aubcordala, floralia Infima berbacea, calyces tubaequania, »uprema mcembranacea coloraU panra tubdecidua. Verticilla^tn paun J0-90-(lon dcnsi, podicellis •ubramotit, inlerionbat elongalis. Caljx 4-S-hncari4 H-nervis, drntibun omnibus acute lanceolaiis, tenuiter pubescens, ba»i submrmbranaceun «matu«, apke coloratus Corolla extun lenuiter pubetcens, labio <upenore ^ubformcato rotundalo subcmargmato non coiDprea«o, ioferions lobo medio roloffalo divanralo bifido Maminum <upenorum rudimenla minolifsima, infciorum connaiua ad inserlionem filamentorum Integra T parum gibba, poslico aob lorulo tncrawata, lilamenia medio connectm in^erla, appeodice breui rolundalo Mjlus plabcr, BubaequalMer apice bifidui. >anat corollii purpureia coeruleii « albn, majonbus mmoribuiYe. — *S. thspatuc** etc. Beal. Hort. B)»t aest ordo 8 fol I fig 10 2* — 5. *ptiUos** Uffmotfg. Nachtr. I. W? — 5. *ckromahra* llffhin*gg. Narhir 9 — 5 *gmifior** Tea. FL Nap. *pndt.* App. V. X — Habitat in Europae auitralif aiccii in litftsJa, GtlIU mediiarraam, Pedemonio, regno Napoliuno, regno Lonibardo-VeocilMo, hi Ittria tt DalaaUa.
4. 8. *HOTUTDIFOLIA* TUianl, liloftrat dl ale. piante etr. p. 0. t t 1 — Cano-loneniofa: caule frvllcoso adscendente, foil, ellipiico-iubrotundis rugnsis rrrnulatatis obtoafa, bail inbcordatin, supenonb. oblongis, braclns cordalo-Mibrniumlis se^silib. cu^pidatK, picudo-^erticillorum di«linium (jnih inftnorib poiJuiuculali< multiOori^, caljnb. 3-<entatn birsulin, corolh dujtdo bn^mnb , denlib. lanrt O,IIIH aculi, sopremo rotundalo mucronulalo miniino j — (.ro>di in monto Ida Dilb)mae
- 5 *S. CRASMFOIA* Dcsf Arbr ft arbn<* I HI non Sm - mh If 3)0 - Caol0 frulico«n albo-lanatu. rami% flunfrri* lomenoso -pultCHCt niib . full prtliatit ovalif obIUM*. bi«i »ubcordali» eroffo-rrriiiai* rullu»i% pubr«n nlib , ramorum tlrrilium undulalo^rri«pii, ulrinq. albo-lanahi, floralib infm»i> berbarei%, »upre-Bit membranacea decidua. racemit uinplirib , %ertirilla»tris muliiflon* tiff«n— lib raljcib campanulaii* •obnembranacen coloratia »tnaii» pube«rrniib , labio aupenore Irldrntalo, inferior© bifido, drntib omnib Unreolaiiii a«iiii*. corollii cajjee «is duplo longiorib , lobo amplo »ubei»crto, intu* annulalo, labn» rroclift aoperiore rtclo, infrnon* lobi* laleralib. reOetu. connective potticc porreclit olriiq aafcerifem, Uruli» poMenonb. ca««it conn tt« *S* — sprno» tiubia, «c-roftimililer .V. o/Jkctmalt4 varielat ei cullura orta, »rd difVrre tidedm folim majoribut lationbut, ba»i tubcordalu eroto-rrcnaii» rt ramorum »irnlum. ut in *S. pomtfrra*, undolato-cntpit el calycibu» majonbuk %illo%mrribu» A .S *gtandf*°** •latora bumili el foliorum forma dialinguilur llalniat in Durupa au«irali?
- «. 8. *GRANDirLQRA* Ritliag, 8aU no 1 - Bib I c - Caulr fruiirono albo-l«-Mlo, rinli tortfefU UaiHilof-pube%crniib foil iniegr^ pcioUn* o|»u* «««** In, bail late roiendaUt ? cordalit mgA«« pube«rcniib , infli« nubt«« **lanalis**, •oralib ft'rbacns r. ••prtalt ba»t membranarrn, o(tti« acuiU race«l^B **sub-**almpcib . vrnclliatrlria ft-IO-lortt dUilnrn*. ral>nb rampan*ilaMem' ^ana-ccia Mloralla atrtalU bUptdu, labio superior* trtdettiato. mferiore bifido, **vntib**. onnib.acaUi, corollis calyca doplo triplow loagiorib., lubo amplo euerto, **ntas**

annulato, labiis erectis, superiore redo, inferiori lobis lateralibus reflexis; connectis positis porrectis, utrinque onihens, oculis posterioribus. cassis connatis. h — Affinis *S. offinnah*, al differt cauliculi clatiori 2-pedali >. ultra, foliis (ramorum floralium) nullo majonibus '3-3 poll, longis, 1/-2 poll, latis), basi late rotundatis v. subcordatis minus rugosis, supra v. indubus, sublus incanescens, utrinque pubescentibus nee lanatis, raecmis densibus, flonibus saepius majoribus*, calicibus magis hirtis. Folia ramorum sterilibus et primordialis ramorum floriferorum minoribus cl saepe lanata, sed basi semper laliora quam in *S. ofret* aff.* — *S. major* etc. Besl. flor. K&A. acsl. ordo 8. fol. 1. fig. II. — *S. officinalis* Pall. Ind. laur. ex Habl. laur. 174 M&C. Ricb. (non Linn.) - *S. tommlnsa* Mill. Diet no. 2. — *S. grandiflora* Jacq. hi. Itl. fasc. IV. 55. t. 30.

fi. minor: statura iunior, folia minor et magis incana, at semper basi late rotundata \. cordata. — Habitat in montosis Taume occidentalis et meridionalis locis apud saxones in Oriente.

7. *S. C. >ri!>A* Hih. 1. c. 210. - Gule frutesco, basi sublanato; ramis nonnatis lomeno < pubescentibus; Toll, petiolalis, plerisque pinnatis erectis rugosis, subtus albo-lanatis, segmentis eiretino maximo oblongo lanceolato, basi nungw>lalo, lateralibus utrinque 1-2 oblongo-lanceolatis, basi rotundatis, floralibus bracteis formibus deciduis; racemis elongatis; verticillis nullis remotis; calycibus campanulatis submembranaceis coloratis trilocularibus pubescentibus, labio superiore tridentato, inferiori bifido, dentibus omnibus subulato-acuminatis; corollae calyce duplo inplexo longioribus, tubo amplo emerto, labiis erectis, superiore recto, inferioribus lobis lateribus reflexis; connectivis postice porrectis, utrinque antheriferis, oculis posterioribus. cassis rotunda. ^ — In hortis Gallicis saepe occurrit sub nomine *S. trilobae*, *S. interruptae* \. *S. officinalis* foliis pinnatis et si *S. Crexca*, *graniflora* et *nassifolia* cum *S. officinalis* jungantur, haec etiam pro mera \aetate ejusdem speciei habendi rati, M&J distincta tamen raecis elalioribus, raecis fere pedalis t. ultra, \er(iell. lris numerosis*, Mn) nullo majonibus pinnatis, legroenio extremo duplo longiore et in parte laliora quam folia *S. offinnahs* it apice angustatis acuity nee obtusiusculis. A *S. triloba* et *incurva* abunde differt calycibus tenuiter pubescentibus nee \itcotis, basi et characteribus alia topa novis. An *S. auricularia* Mill.? - *S. munia* Schumler, Obert. bot 10? (non Thunb.) — Habitat in Europa australi.
8. *S. AUCURRI* Dih. Ann «c. nai. (* 8er.) VI. 37. - Caule basi frutesco folio lomentoso pubescente; roll, integris petiolatis oblongis rugosis, supra pallidis glabris; subius albo-tomentosis, petiolis nodatis lomeno, floralibus subnullis; pameula nuda denudata glabra; terlocularibus S-4-0 oribus; calycibus tubulosis campanulatis subaequaliter 5-dentatis viscoso-pubescentibus. 6 — In Cilicia.
9. *S. Ct.M* KLADKIM Boiss. Klensch. plant. no. Hispanic, no. IVJ, Voyage bot dan* le nudi de I Ksp. 4^o. no. 1200. {• I. 130. — Caule frutesco folio obovato; Toll, oblongis petiolatis, utrinque tomentosis rugosis pallide virentibus; scapis nudis erectis glabris; paniculae talde elongatae rami < \iseidulis glabris oppositis abbre\iatu inchoatis, pedicellis simplicibus. aul dichotomis, ad rosetam partem articulis et bibracteis; calycibus campanulatis post antherin bilabiatas acute eomalo lubaequaliter quinque-dentatis glandulosis \lscosis; rurollae caere triplo longioribus extus glandulosis bibracteis labio ^upenori lateraliter compresso, apice bifido, lobis rotundatis inflexis in lobis, lobis lateralibus o>atu reflexis, in medio majoribus emarginatis, connectivis positis porrectis bracteis, loculum nupolniferum gerentibus. § - CJUCH 1-2-pedale > obtuse 4-angulare. Srahi termaleit S-i-p, dale, paulo >upra basin runosi nudi Pamulie rami firmiter pollicem tenent, in Pediculus medialis unilobus, lateralis 1-2-florus. Calyx pilis cernuis albis glabris qui iure clinalis, duobus post antherin mduritu reur<i>. Corollae labium ^upenus flavo-album in \enoso- -inatura, Ubi inferius inien^r tiolaceum, ad faucis ingressum mirvli aln.li \iohre<i> iurtaia n<>inum, loin iniermedn dni-ione* oblusae subquadraia In lli* >. inij mrdM. inli in i I\H, < ei ad marginem xncarum ad mliees monlis Sn<rra do la >ir\, > v,,(ri \ uii<M r,

I' N im W H C m Monibr el \urli Ann ^ nmlur 2 Sor || 37 - Caulc ba<i
 fruii* >>> pubosPiMilo foil mlecjn* pcliohlis n|>oni;N rugnsih, supra glahri<, sub-
 i i> jiinn nb rano-tf)inoniosis, potmlit nliihs, llonlil> minilissimis subnullis
 piniruh nudi dinnnli i;hbri plauca >(Tlieilla>tris 2-1-floris, Horib longe
 ped trlhlis, caħrib liliulnso-rampanulalis >i<,coso-pulu>scenlil>, labio siipenore
 Mibinteir.ro \$ — (resni in < ippadoeia

II s IMIODA I inn III Mippl W — Illh I c 210 f — Caulp frulieoso ramnq
 alho-1.milis foil peiolalis otatis oblu<is rugosis erassn, suhius albo- Innate*,
 bosi rordais auneulati* v. spgmenlis distinctis pam< o\ain-roiunditi« 1-2 ad-
 lectus florahb. membranarcis deciduis, raceme ahlireiatis oihpamculiis visco-
 sis, \erlieilla<tns 0-10-florin distinct!*, eiljnb tubulnsn-eampanulaiiH <triste
 villosis viscosiH, labio superior© tndenlato, in Ten ore bilido, denlib. omnib o>ali>
 acutusculti, corolli* eal)ce subliplo longiorib , tubo amplo piM>rtm, labio supe-
 nore rrrlo, infenore subpalcnle, |nbi< rcflicus, conneclnis posiiee porrpctis
 uiring anberifpris, oculis poMenonb cassis appro\imaiis hberis .> Praeier
 fohorum formam Pi habilum a S. *offinnah* «pmper dislmclissima pst ealyeibu*
 niullo minonbus raecmiqap axe viscoso-nlloto, racemis abbre\iaii< panieulati*
 Mr | KIHS <aepiut di>ancalo-ramo!ius, uti folia lana den<a alba ve<tilu>. Fola
 1-1 -pnlliram, saepe Integra, nunc sefjmenln duobii* pam< lalprahbuj saepe
 MV i lermmal diMinclis aurirulala, lloralia membranaea dense *ll<>^a *decidua*
 < IVM>>) Imeas longi, dpniibu* bre%ibus e\lu> dense VIIIUSK, glandulo<o-ti>co<i
 |iurpurairen(e< (orolla rubro-tlolaeea, pitus glabra, tubo medio inlus pilo<o-
 innulalo S)|u< piserlus glaber, breviter bifldus - S. *qutmqrfoUa W*> Monop
 nn^ul t 131. - S. *Qunculata* Mill. Did. no 3.* - S *fruhcota* Mill Pirl no *

S *nyplea* l.am. Illootr. gener. I. ML — S. *baceifrra* Kill Salv. 4. — * *marm-
 hioutes* Vabl, Koom. I. 223. — 5. *Clusii* Jaeq. llorl. Schoenbr. II J7 I, 195.? —
 S *subtriloba* Scbranfc is Syll. pi. toe. Ratiib. II. W? t - S. *trtiobo* 8m. el Siblh
 Fl. Graee. I IX I. 17. — Habitat in regionis medileiraneae el onentalis Poniicae
 eoliibus mceit apricis etc, in Sicilla, in Calabria oripnlali, in in<ulis Arehipelagi
 ri in omni Graeeia fre<juen<, in in<ulis MPIOs el Nun<, in Syria el ad Maen

12 s l>rKKRll>T\ sphou%b Dpob Marok 7 t I - Illh I e 211 \ - faule fru-
 in <o nmi> MM nso-ullovts, foil pelmlaliH irreeihrlitT pmmliserhs rugosis,
 M (ui T>MI >-tinn>nlosi%, se^mento exlremo mixini) lidTiliumf] *paribus 1-2*
 • \ it >-nllil iuuit, I M r lundilis, M j>ii< nlis ah<> nnnimis rilundilis inlerjccll¹¹*
 II rill* mi mbnn-tri < deeuic rn i m> simpln i * rlliril iHm<> subsptflori* r~
 in I* eihrb Inliul<>so-i lmpinuhtis slrnlis \III<>S<>_MS4 <>is, labio nupprior*
 Ir luliin, inf<ri re Infill', denlib omnib aenli* n r<>llis nhre duplo tnplo^{fl}
 l'ii<ci>ril) , lull i i |srrtn amplialo, hbio *uprn<>re ririn, iuf*riort* manmo, loDit
 rrfit-xi*, medio |jii<<imn, eonnerlms posiire porreeii*. tilnnq anbenferK. *~
 eul% posiermrib ra<<i> tubcnnnali*. .^ I iule< 1-4-pi'dale<, inferne glabraf.
 pih* apire glandulifens tillo<i Folia eum pelmlo 4-6-po||ieana *. <|^f

supernc
 constanter puinalispeta, •pgrnenlit najnnbu< fnuformiluis (renuhlit, **extremu**
 saepe I- 1-pn||iari, laleraha fere duplo minora, inlermeilia minimi 1-1-1**nearia**)-
MaajIUI l-i-peil.ili% > ertirillattn Inferore* -aapp 2-J pn||nr< disiante. **Folia**
 flnralla oTain-aeummala membranaepa dpridua, ejljee duplo breuora llradM
 niinuiap, (jhre< po>t antbptin rampanulalii, labio miperiore reeunro-pal¹¹le,
 hrnle* brtrt* Corolla >pecioM enerule^epnli-albida, labium <uperiu> rlliu* ^ n-
 brtciMM si)|u< etieiiuf glaber, Brettier bifldu< In hrti< saepe **occurrit** -
 nomine S *ptmmolae* v .S *ragarfna**, «ed ab ulraque di<linrli *> ..**irrupia**
 J<<'q Fragn 01 I 90* - S<<eel. Rnl flow gard II I bO Habitat m **Africa**
 boreah, |B prnvtiit auttralionbu< rrgni Maroeram

1T *» Itl>fiF.>S siblh PI hm. Hnr l.raee I 14 I M illh I f <*. - **Ramis**
 %i<rosii- ^illoii%at (o|| priiolatU irppffulanter pmnaii%prti>. trgmrniii **inarguilib**.
 otalo-oblongu, ba<i roiundalit, uirtng tillotit, lubtu* *u ranp>ce<^t> > **Arvalib**
 tnpmbrarureu denuit, raremo timplin, «prtcillatin< »ttb>cifl<n> U^f§ re **U**
calveib nulanlib iubuU><o-raropanulaif tlnalit tilloio-^itrofi*, labio vuprn **or**

brcvilcr indenUlo, inferiors bifldo, dcnlib omb aculiusculis, corulll* i llyca
 tnplo quadruples longionb , tubo cxscrto ampliato rccuno-ad»ccndculc, lrucc
 amplisMiua, labio bupenore crccto »ubfakalo, infenore maximo, lobi* reflcxi*.
 incdio latit&ituo, connectivis poslitc porretlis, utnnq anilierfcarii, loculc poMc-
 rionb cassis »ubconnatis .) — Caules 1-2-pcdalcs, ba»i glabrati Pcliolli lon^i
 uliali Folia fere S *interrupted*, a qua corollis tñaximis rrcuno-adsicmcutibus
 dii*lincli»Mina — Habitat in braeuau deilmbus pclro»is monlium non infrequent
 II s PINNATI 1 inn Spec plantar J9 Bill I i — < aulo bcrbaceo credo pi-
 loso, foil pinnaliscdis, se^menlis J- 4-jugis pcliolulalis ovalis inci»o-crcu.iii<>
 niKulosis MIOMS TcUcniim Mtnplub , \crlcillasiri** Hubsciflom remoljs, foil II i-
 ralib bradm q inimbraiiauit otalis atutnmalis, CAIJCC bmionb diudui». <i
 lji11) urnolalis ininciit piloso-l.m.ilis, labio superior? Induililo, inferior* IM-
 (ido, denlii) omn b briM^Mmis aiutis, corollis caljce tnplo I niKiorib tub •
 longe oxMcrlc, siuptrnc sub impliato, labio supenorc recto, inferiors lol»i> I ih i i
 lib dellexis, medio iiaximo, connclm» pohlice porrcditi, ulrinq .UIIK n!« n
 loiulis polenoril) cassis ipproxonatu libcn> ^ - lota pilin longi<> albidin li
 uaia it broiler \iMO»o-villo»a i aulcs 1-2-pcdalc*, ba»i folio>i hulia miii* i i
 quam in S *interrupta*, al beifinenia nunero»iora, *% inaequalia > negun nil-
 raimmis rotundatis paucis mterjecus. Calyces pedicellali, lalitudine longiudim in
 subacquantes. Corolla© pulcbrao ullrapollicares purpureae. — Species (olu» pm
 naiis S *tenuptae* afflni«_f cal)ce S. *nubicolae*. — Habitat in Ruropa aainlrah
 pracseriim oncuiali, in lli»pania, in arvis pascuis Sinyrnae, in Orioule el in Araln i

13 S CAEH PITOSA Montbr cl Audi. Ann. sc natur. (S Ser) \ I . V - < aulo basi
 frulicoso rainoHismo, ram is atUcendenlib. brevib dense foliobin, foil pinmn-
 i»eclil», b(*i;nicilli<i J- I- J U R O oblong dcnlatis, ulrinq. lomcnloso-pubcsrenlii»
 \illo^isq peimlis nhii>» Inrsul^e, foil floralib inlcuru o>alis coloratin, cihiei
 aeqiianiib ucemis bioib dtntsis, (al)Cib rampaulalis coloralis ^i%<»*••-vil
 lo»is, labio ^upenore mleKro % nniule lrldeulalo ^ Lrcbiit in (i|»»atj»« 11

10 S. SUFIITM Os\ Monlb. ct Auch. I. C. JO - Itanui ad%rend«utib glabcnmis
 tubglaucis, foil distaniib pmnaiscclis, petiolit ciliato-hirlU, ngmrniu J-7 ** s-
 silib. oblongis denlaii«_t terminali maiimo, ulrinq pubetcentlib , foil, floralib
 ovato-acuminaiU subincmis, calyce brevionb.; verticillaslns remold »-*-flori».
 calycib campanulais hirtis, labio superiore brevissime 3-deoUlo. 3]? - Cre»m
 in Tauro

17 s PHIIKR1 Monib el Audi I c. 40. - lamit gUberrimlt subglauru, f.>||
 distaniib pmnaliscclis, peliohs longe clliatas, scgnemib.3-S late ovatis duplicaio-
 crenalh, lermimli inatimo, ba«i subcordalo, juniorib. plo»is rugo»U_t demum
 Khbr.illi neinhr ma«us, (loralib olaiis acuminatU calyce subaequalib , \crh(il
 lastrii J-0-lioris distmiib , (.il)ub pedtccllall* amplis campanulatm hirlii, lal,
 superiore broiler indenlalo, dcutib omb ncutimimi* 2|. • — Creint in lauro

IS. S IMAH>U \ . ilil, l'.nuin. I 24) (non Cav an Dthng Sah n l' l' l - ltd,
 I. c — Ctuilc lurbaieo credo pilono, full pñinati>cclm, seKmentis 2-1-JM^IN s. t,
 n«ssilib olaiiH irriialm rugo^i% Mllois, raccim* kimphrib , urliclluins j i
 flons reiiioiii, foil doralib nicmbramrims olati» acuminalis nix« l,, , > , , |
 deciduis, caljuh rjinpanul ili«» pilodo-laiiim, Ubio nupenorr indt m it,, , u,(.
 riore bidtMilato, dcnlib omb olat s ICIIIIH, cnrollit cil>re \ix dup|<, |,u»K,M,ri|,
 lubo cahceni aegu inli*. hbm Mipirion* rrcIn, inrcnoiii |olu% laleral.l, ,|, d. xj
 Coniii'ClivH potiuu* p<irr«Mms, iirm | .mheriferis, loruli^ posUTi«iribu<. « I,K * j,
 bi*n->* ^ Il ibilus s *junnat* , i qu i llonlu> diflclrl, a S *mm f i*, |, j u
 laulc on do d l>r K h is tlisliiK 11 «si Ilalnlii m Urn nle

ID S IUU<< \IMIII\ sin h«u phmir l "i t 'i - litl, | , < , u|, . I, , , , , , , ,
 CUIIIIMIU r IIIIH i Kit ml mil' | «il.» MHIII \ || pñmUis, (s %~\ j«rfis % , .
 incnli« pttioluhlis obi m^is ii nil | IHmIMJI * suj i i \ ||, , si. ml t t is , ml | u
 bc»rculib , llurilib wulo - IUM K l in> iu\ t , (s « \<• m , i , , mii |
 abbreviati %crlitilli«lri- J J-!IOII> l^iuuhs ch., 1, c iui| intil.!.« € | " , \}

labio superiore 3-dentato, In fen ore bidentato, denlib. omnib. ovalb acute; corollis> calyce subduplo longiorib., tubo calycis aequante amplo, mius annulato [*] labio 5-lobato recto, inferioris lobis lateralib. deficientibus, medio margine bidentato. — *buffrutex* (^o humilis, vix palmaris, basi rario*us, ramis pilis albidis pubescentibus. Pili ciliaii Folia cum segmento ultimo J poll longa, Memento icmipollicari, lateralibus anastomosis. Calyx amplus, fore S *offminalis* Corolla purpurea (. Calyce & cl braceae purpurascens — >anat Mils lanceolati*, ultimam saepe confluentibus. — JS. *ontaliti* Mill. Diet, no 8' Habitat in (jeruana, Oncle el in Persia.

2a S. BHM. rKITA Ru*s. Nat. hist. Alcp I Blh. I. c 2LJ - faule herbaceo crecto pubescente; foil. pinnatis>clis, se^menli* 2-J-jugi< sossilib. oblongis aculK crenato-serratis, basi angustatis*, ulnq. lomenuloso-Milom^, flornlib. Ijussimi* o>ali> acuminatis integerrimis persistentibus, (lores ampU'itentibus, calyce longioribus; racemis simplicibus; verticillatis sub-10-lobis reinuui^, calycibus sessilib. campanulatis, basi membranaceis, labns MIOSIS, superiore tndentato, inferiore 4-dentato, denlib. omnib. lanceolatis; corollis c.ihro duplo longioribus, tubo amplo incl'iso. ^ — Caulis pedalis se>quipedalis. Fol. a 2-4-pollicana, segmentulo ultimo majore, floralia fere S. *telarcae*, basi membranaceo-albida. verticillatis deim. Corolla purpurata>ccens. — Labial in Sjna prope Aleppo.

21 S S (\BI(S4t:F<)[U lam. Journ. In>t. nal. no II 44. 1.27 - faille lichacra, rarus diffaMH pilom>lanhs; Toll pinnatis<ectis>, srijmentis mibjrmialis inter>bi>ectis v. pimidi>ectis oblongis v. linvanb. aculK mioprrnmiN, raceme simplicibus, %ericttla>lns 0-10-flon< distinctis, (oil l'oralibus. prr<i%(cnlib. lanceolatis o^atis v. ovato-rolundatis acuminatis; calyxnb. ample campanulatis ^inalis villo->m, labio superiore brevissime Iridentato, inferiore biudo, doniib. ovalibus aculis; corollis calyce duplo longioribus., Inbo amplo breviter esserlo, labio >superiore reolo biOdo, inferiore amplo, tubo rotundatis deOeiis, medio lalo emarginato, conoelivis poflice porrectis dilataiis, ulnoq. anhenfca*, loculis postrioribus. cassis connatis. ^ — Caules diffusi, I-I'j-pedales, basi palenim pilosi v. lanah, superiore subglabris, saepe purpurea>cenle<. Folia nuicrosa, nunc fere ulabra, f>acpiu> raiu^cnlia U pilosa, se>mcnU J-3-jugn, >aopniH gemmata >. Iernata, at (ipposiia, vi inde ijtiaM \crhcillJla Hacemus 4-0-pollMarin > ultra Fuha floriln irifWi'iri o\ato-larKcolill, ril\u% supirantibus, Mipenon lalmr.i brcuora. (il\re> fruc h< n 7-S Inn i> IOIL;I, linui r podnillih in<li, uinlitt r |>i|o>pu->brecentes, dentibus abbreviatis. (or''the puldine allml u\ tubo inlui pilo<o->annulato. Stylus breviter exsertus \aruil f<>ns s u po an^u\ii<> Himis glabriO-nbu%, \rricjllasris num < nimbus G-flnrIH, ntmr 10- lit n% |. ultra, \arial ell ana uia^niludiiic v\ forma fuliurum fluralium .s ptnfolm Tall Ind laur —S Ta~rtca llabl. Ph<. Ilc^rhr Taur. dt)J. - .S. *Scabiota* Vvrt. Knchind I JO S. !/•-bliztama ^illd. in Scrad. Journ. Bol I >9 I. i. - Jarq 1 il Hit I P. 1- & ~ Bol. M*z I \4& - S *rulnerannrfoha* Hilld. spir p'inl ir I 149 - llabital In repone Pontua in clmt Tauriac circa At hmrrhr *l lljiliiln<arji, circa >'' rastubaiar frqrn^, rt in Armenia.

stetit n. imarosPaUCE BUL IQ look. Bot. MUC. HI. 373.

Caly cijnpanulatu*, Ublo tupen>rc 2-3-Iido, mfrriorr bifido, lobis omnibus >ubari>alibus<, po>i anibrMn membranaroo-diLlnln ^r^ <%K i • r>llai' lu bus am- plu<, IIUM pi|o>o-annulatu< labium ku|onu* Mibfalnuun ii)nipr<<<um< inferior lobis Utralt> pjicnlrs (.onnrrliva p<>sin c p<>m<ii, |. < u'itn di(T<>nrm cas* u fercoia, nircmilatr >ubrnnr%j tniiri* > nmiH Inline orpiu* inc<n<<< llabitu* F.utphactum, prae<rtim %prrrf> Mrdiiirrin*n* <t i anjnen>i. -C n > durior* sum el magit liRnoiar

< h M>kIAHA Horn, cl schult s^i M.ml I |>J Iih I al>i<l. <... .. spec. til - llerbarea* rjmlt adrrmlrniib lomriito<i< foil pnnaluecllit se.j<entis ^.^-Jugi> ...ihb oblongo-lanreolaiic obiu<iu<ruli< rrmati*. batl apgu<lati< ru got!*, tupra p<btc<ntib , >ubiu> nollitr <illo>i<. Ooralib late otalit oblu>>

legns, calyces subaequantib., racemis simplicib., verticillaslns multiflorfs, caly-
cib breviter pedicellalis mollirr villosis, tabus membrunaceo-dilatalis venosis
subcoloratis, superiore lato sinualo, in fen ore bifido, lobis ovalo-rolundalis, co-
rollis calyce duplo longionb., lubo amplo subexscro, labio superiore redo, in-
feriors lobis lain lalcrab. rellexis, connecciivis poslice porrecciis ulrinq anlheri-
feri*, oculis posicnonb. connalis 2I, — Kami 2-3-pedales, pallide virencs >
subcanescens et molliler >illos>i Folia fere *S. incarnatae*, sed anguslora, seg-
mento cftiimo circiier 2-pollicari, summa in petiolulum decnrrenlia, omnia supra
pallide urentia, aubtus canescenlia llacmus pedalis, molliier ullo^us. Brac-
teao panne, oblon^ac \ 1-2 exteriorc* foliis floralibus conforms. Calyx 7-8 hn
longus, basi sirialu* submembranaceus, sed vircni v apicc pallide purpurascens
Corolla coerulea, labio superiore exlus piloso, magmludine corollac \$ *tcawhtac-*
foliac, rui hacc species habilu affini\ sed calyx *lymtnosphaaum* — *S. ptilantha*
Link, Knum plant horl. Urolin. I 10 — llabilal ID Oricne.

83. S. AU/TAUOSV \ ahl, Kuum. I. 227. — Bib. I. c. - Caule sulTrulicoso a«l-
ncendenle piloso, Toll infunonb. pinnallsectis, svgmentis 1-2-jugU supfnunxi
integns oblongis obiusis rugoslsimts, ulrinq. villosis, mbtus canescenllb, flora-
lib, infconb conormib., superlonb. membranacels, calycem subaequantib ; ra-
cemis simplicib , >crtilcillastns sub-10-Ooris, calycib. ample campaoalaispiloso-
bitpidis, labn» membraDaceo-dilatalis venoils coloratis, superiore inlegro, infefiuro
bifido. % — Affinis *S. Moluccellae*, sed folns pinnatu ei calycibus bispidis di-
versa Calyx fructifer maximus. Corolla glabra. — Habitat in Oriente.

24. S. INDKAMiLI DC mss ex Rib I. c. 717. — Canescens foil, pinnatitocds,
segmentiit J-4-Jun^ oblongis obUMs* interRerrimis, ulrinq. lenuiler pubescenlib,
floralib par^i> decidui^, u^rticillaMns 0-10-flons, cal>cib maximis glabns mem-
branacoo-\enosis coloralis, labio superiore lato sinualo, in fen ore bifido, lobii
o\o\o-rutundjii!», corollis \i\ ixscrlls I> — Species pulcherna folun dinime-
li&siina, (lures *S. ucctabulnsae* \erlicillosln »tip<*norcs subftlcU^ Folumini
segnieiiia inferora polhcana, uliiroum mojus, omnia pallida cra»iuscula pam>-
\enia nee rugo»a — drool in Persia.

25 8. POMIFERA Linn. Spec plantar. 34. - Dtb. I. c. 215. f - Sibth. el Rm Flor
Graec. I. 12. t. 15. - Whlnbrg. bis XXI. 1005. - Caule fruticoso; rtnli c*no-
lomentosis, foil petiolatit otalo-oblongU obluais, bail rolondsiis v. •ufctordatli,
margine crenulatis undulato-crisplt rugosis eaols, floralib. calyca brviorib.,
oupremiH bracteUq. membranacelt deciduis; racemis subramosis; verticillaitru
sub^einons dishnctis, cal)Cib. ample campanulalis, baal ^ubetcentlb. aubalriatfs,
labns membranacco-dilaitatis veooils coloratis, superiore latissimo sobinttger-
nmo \ stnualo, infenore bilobo, lobis obovato-rolundatis oblusit mucronulatis,
corollis ciljre duplo longionb , lubo amplo subexierto, labio superiore sobrecio,
inferiori-i lobis dellexm, medio latissimo; conneclivis poslice porreclis, ulrinq.
anlbenfens, loculi-. posienonb. dilTormibus subconmtis 6 — Frulex 2-3-pedalis,
basi rubescens Folia '2-J-pollicaria, in speciminibus sponuoels vix semipolli-
ccm, in culm fere pollicem lata, ulnnque albido-lomentosa. Racemi bretes,
saepius rami» utrinque 2-3-, terticillasirit glomeratlf saepius 3-4-flons Folia
floralia late o\ata acutiuscula. Calyces subsessiles, frue Uteri semipollicares n
ultra, lailwme rampanulati Corolla coeruleo-violacea, fere tcuquipolliraris, ex-
lus plibra \ tonuiter pubcHcens Tubus supra ovarium contracijs, intus pitoso-
annulatuH, «uprnc nniplinsimus 1 nbia rmgenlia, nupmuk H-0 lin longtim laiuni
BubrompresMim, rectum \ sulifilc iium, informs lalissimuru, lubis rotund m%
Stamina -trnln brt\n liliformii v, apiro cla^uia, ferhhum niamenti ad nndiunt
corollne him supenorii attin^c IIII, (imnecinis brenbus medio afluu si>|u» ui
itNcrllus jrliiber, aput* bn\iltr bilid i» IMinla \u odora \ arotnaiira M*I
galloc rjuji potiui mum nk* *, mdc sio Joanti in de»m<i pro c*ia in%«l\i%»M»
crrdunlur S cntpa limn Mon»p irr l |l, s ft ugtfn a | u| saU t,, %
— llabil.it in Orivntff, in Uilu ivllibas npncis it aHpcns, iti <,ravua vulgaris
in Palaestina tl Syria

- 20 S CALIUM Siblb. el Sm. Flor. Graec. I. IX t 10. - Bth. I. c - Caule frulicoio; ramiji creclis cano-lomenloMs; foil, pcliolalis o>ali* obtusN, bi>t cuneati* rotunddi» l subcordali* crcnulali* »ubplam» rutfosis cams, floralib. caluv brcttionb., supreruis bracteisq. inenihranaceis dcciduis; raceme abbreviate stibraiuo»o; verlicillaslms 2-G-flons rcmolis; cal)cib. ample campaniil.iii>, 1>.l>l sinalis pubescentib., labns mcmbanaceo-dilalalis venosis, supenore lalissimo mte^ro sinualo v. brcttissimc 3-mucronalo, inferiore bilobo, lobis obotalo-cuneatis, torollis caljce duplo longionb., tubo amplo Vl cx»erto, labio supenore ret in, in-fenoris lobis deflcus, medio lalissimo; connectivis postice porrertx, iiring antherifens, locuhn poslerionb. difformib. <ubconnatis. j - \alde affmis > />«-miferae, a qua differ l foliis brevionbos lalionbus plants, caljcbus- uunoribus ba*i magis snalis el villosioribus, labns minut dilalalis, corollm saepMi» majoribus. An revera dislincla? — S. peregrtna fiauvolit Ressoner cd. >chnucdel I U 12. flg. 100. ei Boem. el Scult. — Habitat in Graecia in innle Iljmetlo prope Athenas, In monle Poros el in collibus apncis et maritime nisulac Somi ad urbem Valbi.
21. S. Eini'TAMIIA Monlb. el Auch. Ann. sc. nat. (£ Svr > \l 40. — Suffrutiros. i humihs. foil, longe pcliolalis ovatis oblongisc, basi subcordalis rugosis, junionb albo-toroentosis, floralib. otalis acuminalis caljce dimtdio broionb , tctrcil-lastris l-10-noris, parum dutanlib.; cjljcb. subsessilib., ba«i »lriatis, labns amplis membranaceo-dilalalis venosis, supenore inlegro v. obscure tnlobo, in-feriore dimidio minore bilobo. ^ — Crescil in Cappadocia.
28. 8. EUPIRATICA Bib. et Monibr. el Aoeh I. c. — Fruicosa ramoHisiima foil-peliofilis ovalo-oblongit, basl •nbcordaUi v. nlrinq. segmenio parvo auric*, crenalis nigoaiatmla lomea)lof#-lanaiii villositve, floralib. ovais acuminahs, cal)co plemmq. bretiorib^ raemis a(caa)dia; venicillasins t-4-flons; ealycib. sessilib. amplis campanulalia, labils membranaeeo-dilalalis tubaequalib., supremo inlegro, apiee rtconro, inferiore bilobo. ^ — llabklai in Cappadocia.
29. S. ML'LTICAL' LIS Vahl, Enum. I. 22S. - Bib. I. c. - Tomentosa: roll, subror-dato-oblongi« obtu»i«>imls erenatis; ealycib. birds; bracteis lanceolalis, raule berbareo. ^ — Caulc* plurcs erecli scmpcdalc<, IMM foliosi, uti l«»li plauM lomrnlono-incanl, superne inter ^ertieillos pilosi K«»In pcliolta sennpdlicana, «eno«o-subriiK^A Petioli folio lonRu>re« inrani pilot *rtn illastri distanics 0—flon. Brarleae rahce bretiore*. Cal)\ frurlifer c.imjianuhus ma^ous membra-nareus ^eno^us, l.ieiniK rotundatK. — K\ descriptionr \jIde afhnis est V rfl/jf-nmie, a qua differ re tidclur caule berbaceo humid, folns Crfuluni iniiioribu^ ** floralibu* lanceolalis. — Habitat in Orente.
- JU S HIOI.LCC.KI.I.AK Bib I. c. 210. - llaule berbaceo ererto pubcscnlf. ^U longe petiolalit o«alis oblutis crenalis, basi rordati* ruRo»i%innii«, uinnq P^u* betcrnlib., Juniorib. canrscrolib, floralib. cal)re bre«ionb . %uprrnn< bractcsijl membranacris deciduis; racrmit elongahs «implirib . «<*rtirilla«tri« rrmotisO-ly-florls; caljcb. »ub»estilib. campanuUt*, ba«i »tnaii% pubesn utib , fracllW^* ampUttnm, labii* mcmbanacco-dilalalu, %uprn<re niinuto ftubtndriitalo, infe-riore bilobo, lubit oblum«imi». ^ — A S. catyctma differ! Mil* ru^>n>rib<i* vix tomenlotU, ban cordatu, cl praecipue racrniM «loni;ali« palmanbiM * f«*rC Pe dlibut, ^erticillatrls densis rcmollt. CJUII% bant prrmi* r«"H'iis Hami crce li pedales el ultra Cahcc* matimi f«< J/ *« (/ / * * / < * * ! / (••rulnc .. * An S. mmlirmui? >cd bacc et di'Mnptiui r tula l< tit Ul<>M uu.nia - llabH^t in *)ria prope Aleppo.
- Jl. S. AIREA Lion. Sprc. pUniar A - BU» I c tlurli*. H»i M.IUJ/ .. liz. Caule fruiirofto, ramu cano-lomento«i«. full i« imljii« «%jiii-subr«'i»M^i# «h- lusis inU'iivrTiniis •inuah«c r«ri4rri% iniam*, lloulib *i««ilib %iilV»{# per»i*^ tenulj.. racemu abbre«iali« A'tbrjm.»%i», fenicilij«iri« billons appro *11n*11*1 ta ^ tyell». ample campanula** «illo»i», Ubn* mcmbanJM«o-diUl4li« «cn<"" tur° \A vuptrJore subniccerrimv lati rviuudato inknoir emargisAp * btl'd" iou

- otaio-rntundali*; corollis ea)co tnplo longiorib., lubo raljccm \lx superntc, labio superior* maximo subfalcalo-compresso, Infcnore brevioro patenc, lobn rniindaii* subrellexii; connectms police abbrevialis subdeflexi< dilalatis, anllierne lorulnm minimum cassum ferentibus. \$ — Frtitcx plunpedalis, tolog albido-tomenosu* Folia semipolltcaria v. YIX pollicana rigidula, mollilcr albido-tomonio^a Racemi riensi 2-4-pollicares, verlicillaslns vix distinctly, axi, folns lloralibus, cil)cibus(jiic hispido—villosis. Folia floralia calyce tnplo quadrupleo breuorn (nhcos (lonfen semipollicares, fructiferi gaepe ultra pollicares, lobis mnumis glubrali* reticulato->cnosn. Corolla pulcherrima aurca, lubo amphalo, basi lontrado, iniu* pilo>o-annulalo, labii I n fen on s lobo medio cmarginalo Gcnilalia labium superius corollae subaequanlia. Filamenla dilatata abbreviate. - .V *Afnrana* ctr Commcl Hort Amsl. II 183. t. 02. — *S. cohrala* Linn Syst 71⁹ (non > nhl In Arnca australi ad Capul bonao >pci etc. cl ad unuro Alfioa.
- 32 *» (.VIUPKNsIS r. Mo). Comment, pi. Afnc. amir. I. 2J2 - SulTrulico^a foil prholaiis laii* otatis oroso-dentalm, basi truncalit RiibcordaliKtc rugoniR ramiM| \i>cos»o-pubescentib, UTticillastm racemoili bifloris secundiR; rahcib ampk* campanulatis VIIIHK, labiio mrmbranaceo-dilatati venom colorant, luprrinn recuno subtruncalo brevissime tridcnlalo, Inferior! bifldo, dfnlib. ommb acuti<f corollit caljcc duplo longiorib., lablo tuperlori falcalo conpreuo. ^ — Afflun *S. roiundfottae*. — Habitat In Promonlorio bonae ipel.
- 33 S. IIA8TAEFOMA E. Hoy. I. c. S33. - Frulleoia: ranis tenoier vlteoio-pqbesrrentib; foil, pctiolatis o?ato - oblong It dentatlt, bail taepiua baitato-aaricalan* cravvis subconaccin, Juniorib. vis canetcentlib.; racemlt brevib. ranoit; Yerllnlla»tris bifloris; calycib ample campanulatis villosit, labiis membranacro-dilatati< >enoMs coloralis, suprrion sinuato, infenon bilobo, corollis caljer tubduplo majonb, labio iipenori subfalcalo-compresso inferiori brenon patente. * — Kami dnancati nm rancscntct. Corolla fere .V (*itrerstfohac* srd tubus brevior - Iblni.it in Promonlorio bonac spei
- US nniJ.r\MK M» I c ±U - Frunco«a ramis albidis, bati foliom. foil brrMssime petioiatit ol»lonpis, profunde incifo-dentatii pinnaliOduq ronarem rigidis venosit, *ubtus albif, Qoralib. deciding; raceoim panirulaio-ramosi«, w-rlicilUitrii biflorii; calycib. campanulatis pilis longUtimplt oblecUi, labiis demum membmnacoif, tuperiorl breriier UidenUio, Inferlori bifldo, denUb. omnlb. acutn; cnrollit calyce subduplo lonflorlbns. 6 — HabiUI In Promonlorio bonae spei.
35. S ALBiCAULTS Bib. mts. In B. Mey. Coountnl. pi. AfHc. anstr. I. 01. - Fni-liro«a ramis albidis, ba<l foliotis; foil, brevltr potlolaUs obovaio-rotundaUs ob-InnffKte rrenans ronaceis rigidis tenosis, sublus albidis, floralib. bracteaefonnib. parMs acu'issimiH, racemis panicolato-ramosis; verticillasrls bifloris; calycib! rampanuhiis pili* longi«Himii obtectis, labiis demum tmembranaceif, superior! brr\iier tndentato, inferiori bifldo, dentib. omnib. acutis; corollis calyce lubduplo longionbus 5 — ,9. Ramis basi foliisq. inferioribut bispidis. — Crescit in Promonlorio bonac upei
30. S. AFRICAN \ Linn Spec, plantar. 38. - Bth. I. c. 210. t - Taule frut.rotn, apice paniculato, ramis cancjccnlib.; foil subsessilib. ovatls oblongm obo^atis cuneaiivve acutis integerrimis v. stnualo-dcnlalts, basi •nguitatis, supra glibnui-CUMH, subtus albidm corlaceis ngidis, floralib. bracteisq laic ovatls subperuttcntib, racemis subramo^is, terticillAttris 8-0-floris disUntib.; cal)eib. campanutatis hi<pnlh-villosii»imi!»), labin demum membranacco-dilalalis, kupenoro snbintegro late rotundato, inknore bifido, lobis otaiis aculis; corollis caljcc duplo longiorib, lubo caljrem m suprrante amplialo, supra basin ronlracio, inlut piloto annulate labio supenorc nubrocio, inferiore patente, lobis subreQcm, conneciuu poshre abbre\iaiiis porreciis dilataii», aniberae loeulum castum ferentibus. 6 — namosi^ima, ba>i purpurascens, ramis rane«centibus. Folia forma vanabiba nunc spatbulata obluna, »aepiu< otali * oblonga aeuta, fere «cmpe, murmulor aruminata, rarm* denlata, duplo mm< ra quam in *S aurca*, *upra »aepiui nridia, ftubiu* (oottanter albida Calycr* duplo m norci quam in s ^{^i} *aurca*, ba

>illosis<imf, lobis lobii inferiors aruhs, post nntthesin VII elongali, at saepius apirr Inlissime membranacci Corollac 7-8 hn longac, labus subacqualibus, tto-laceie. Tubus intus piloso-annulalus. Genitalia rxscrln. — *S. Africana* Com-mélin, Horl. Amsl II. 181. t 01 — Mill. Ic. t 225. fig. 1. - *S. cohrala* Vahl, Enum. I. 230. — *V. tmegrrtma* Mill. Ic. t. 22). fig. 2. — *S. barb at a* Lam. Illutir. I. 72. — Habitat ad Caput bonae spei.

37. *S. CRISPI'LA* E. Mey. I. c. — Frulicosa: ram is \\x pubscenlib. paniculi(i!); foil, parvis pcliolatis obovato-subrotundis eroso-denialis undulato-crispis, Juniorib v. omnib. incanis, florahb. sc>silib. rolundalis, cal)ce m bro\\iunb, racemis vix ramosis; verlicillasris 2-C-flons; cahcib campanula^ pubescenlib. t. bretiler MIOSIH, labus demum membranaceo-dilalaai*, suprrion bretiler tmlentato, inferiori bifido, denlib. omnib. obtusis; corolli* caijce duplo longionb, Libio supenon VII incano, inferiori amplo palente. 5 — Habitat in Promotuono bonae ipei.

3*. *S. PAMCULATA* Linn. Mant. 25. et 511. — Bth. I. c. 207 — Caule frulicofu; ramis scabns glabnusculis; foil, peliolalis oboiatis acuix suhdenttllis conacris, uinnq. Mridib, subtus scabru, floralib. otalis membranacns deciduU; raccnus panicul.iio-ramosi^; \\crticillasrif 2-Ooris disinctis; raljcib. rampanulatis S(a-bri>, libn< demum membranaceis subdilalalis, superiore inlegro miundato, infioriore bifido, lobis o\\ali> acummatis; corollx ralyrc tubinplo lonRmnl), tubo rahccm acquanlc, labio supenore subreco, raedio breviorie palonie, loins roiuu dHis tubrefleis, conneclois poslice abbrevialis porrcelis dil.-ii<li<, anilirrae l<> rulum rasiu ferenlibui. > — Folia senipolhcaria, ba^i nn^ustala, ipin* >orraii. glabra v. nenrii villonU, majora quam in *S. Africana* el uinnqnr undm ^ra-briucula. Calyeef 5. Aftietm^t, ted glabriutculi, fruclifcn minus dilalaai ('<<-rotla 5. AfHfna paoHo major* forma polloi 5. aureae, >ed duplo minor purpu-reo-Tlolacea. Tobaf lotai ploao-BBBiiUloi. (ienlialla eiserta. — *S. ehamae-laemgnea* Berg. Cap. I. & — *S. minor* etc. Breyn. Cenl. I. 100. U 85. - Habitat ad Cap at bonae Spei.

39 ** *DE.MATA* Ait. Hort Kew. I. 37. — Blh. I. c. — Caulr fruhroso glabro, foil, hneanb. fasciculalis remole dentali* glabnusculi> florahb. brirtriMj n\\aii> ca-\\ce multo broMorib persisenlib.; raceme simplirib nl>brr>iiii>, \\rriirill.i>(rif 'J-O-fionn, cal) cib. ample campanulalK pube>rcnlib, IMM Hinaii<, hbus ilomurn mrmbranacei> dilalati* rrlirulaln-ner<o>is suprrion* sinnalo sub-j-deilalo, in* frriore bifido, drnlib. o<oli< oblu>iusculi>, rorollin rj >rr >ubdu*Io |ongionb.> lubo rah com aequanlf, labio superiors subrciio, infrriorr n arquali palentc_v Jobis rolundalif >ubrrfleis; connecm> police abbrouii* thlaiaia, anlberae lo< culum n^u o fcrentbm o — frulet bumili>, ramit trtngoois orpius glabrii >enipfdalibut Folia ramorum jumorum in anllit fatciculala, tongiora <ii polll-caria, nunc angutie lioeana idlegeriaa, tarpiut bine inde drnlaia, inierdujs laneolaia profunde denlala eonacea dura, tn meant, floralia i!-3-hnearia_v vii braceia majora, nopreoa pabeteentia. Raemi 1-2-pollirarr%, *criicilla>lrii •pprotimatift at Ui>tiortit. Calycet forma el magmtudme .V ifneamae, at bre-viMiaae (at in *S pa^tmtata*> ieabro-pubetcenlr* Corolla .S ifnrama^{m10}£[j purpvreo-%iolarea* lubu amplialo inlut ter>u> medium pilo>o-annulJio. ^{11b1} infcnorii lobo mrdio emargiialo-bifiJo. (unnertnj <ablu% tub in^rlione brg> >iirr drntata M)lut breuter riteilut - *S rujtda* Tbnm> Prodr fl Cap. !• •* — Habitat ad Caput bonae >pci

40. •• KI\\EA Tbutbrg. frodr. 0 Lap W F>ll UnreoUIK inie<ernmi> ^{albe-} tomentont. rams divaricali>. %? laulu rrrriu* 3-prdali* Hami rl ra ^{muli} deutsati lelragoni so kali, tnfcnrn <Ubn, >iiprine iomenm<i F<ha "pon ^ po- liolaia aruU, pa rum rogosa convoluia mvra patula. iniernodn* brruora ^{polu-aria.} Alillae ramnlis fulfent oiuiUf. Prtioli <agmanlr>, irnum in folium ^{dilatati} breves. Floret oppottu t tobpsntculaii m apieibu< ramulorum. Calj*ff ^{hirt} ^{CoqM} < purpureae, ealye* doplo longiores himiln *S amrra** el ^{chamaecristagrac.}

sed dislinriitur facile folns lanceolalis mveis — *S hmccotala* Lam III gen 1
72 sec. Vahl. — Habitat ad Capul bonae spei.

- 41 *? CANARIE>SIS Linn. Spec planiar. 38. — Blh. I. c. 218. — Caule fruticoso
albo-lanalo; foil, pctiolalis lanceolatis haslalo-lriangulanbu* rugosis subglabns,
noralib. o\ato-lanceolalis calyces superanlib. membranaceis coloralis; racem
ramosis; teriicillasins subsexnons approximate dislincln; caljctb. incurvo-cam-
pantilatis, labus membranacco-dilalalis, supenore sinuato-sublrirobo, infernore
bifido, lacinus oblusis mucronalis; corollis calyce plus duplo longionb., lubo
incluio ampliato, labns bubaequalib. subreclis*, supenore subfalcalo, inferiornt
lobis lateralilcr deflexis, connectms pollice subdilaialis, antherae loculura cas-
sum ferenlibus. o — Frulcx org)ali<, m *horus* sacpte cultus, folus baslads el
raule dense lanalo di>lmcii<>simu». Folia floralia el calces membranaceo-co-
lor.Hi. Corollae purpura>cenles. — *Sclarea tomento\$*a Mill. Diet. no. 13. — *Schra-
dena haslula* Moench. Mclb. — Habitat IO inbuilt Cantnensibus, cliam IO Sicilia
sponte al non indigena.

Seetlo III. DRTHOSPIAOE Bth. In Hook. Bot Misc. III 373.

Calyx lubulosus v. campanulatus, labio superior© tubintegro iruncalo t. bre-
Tissime trideniaio. Corollae tobus cxferlui, inlas piloto-annultlot, labium iupe-
nus falcato - compressum, Inferior!! lobl laleralet ptenlet. Conoecliva potliee
porreca, loculum difformem cassum ferenlla, extremitale sobconnexa. — Herbae
Europaeae *. Asialieae, vlrides gubgluiiooMC, foil Is plerumqoe aoplit batUlo-
eordalK, corollis flavis v. rariut coeniku.

- 42 S (iITIM)SA linn. Sper. plantar 37. — Dlh Ubiat. gener. et spec 21ft. —
Ciule herbareo eri*ro glulinoso piloso; foil pcliolatis o\iio-oblongis acuminads
denlalis, bnsi cordalo-sagittalis, floralib. o^alis acunnnalH, caljce bro\ionb;
racemH simj>licil>, \prhnlbslns disLiniib. laxi< 0-lloris, caljceb lubulosis, labio
ffupenore truncaio m< gro subreccuno, in fen ore longiore, dcnlib otati* aruli<;
corollis caljce iriplo lonpi<nb, lubo einerlo aequali, tndis pilnsiusculo, fauro
ampliaia, limbo bnnte, labio hupenore falcato compr<sof infriori< lobi> lair-
rilibus oblongis rflexis, medio late rotondato; connerinit po%re libens ap-
proximate porrectis, antherae loculum rutun fereoiibui. ^ — Herba elaiia di-
•rlcaio-rtmofo, ex omol pane glatlnom. Folia inferiora anpla, »aep< 7-8-
pollicaria, superiora mlnora, breviut poliolaU, batl acoaiQato-aagilMta, ad pe-
tiolum eordaia \. late emarglnata, ulHoqae glabra t. glutlDO«o-pubetc«iilla.
Flor< snepe besquipollicares, paliide flat 1. Stamina lupriora tlx abortlenUa, al
pana abbreziata, anihens sagltiaerormibut subcattls. — *Coins JorU* Besl. Hort
K>si nest ordo Mil fol 4 fig I. — *SHartm gtmot** Mill. Diet no. II.—
llalnt.II in Kuropae et Asiac mediae sylvis urobroslique, In Iitpanla, Gallia me-
ridionali, llrhelia, Italia, dcrmaDia meridional!, Rosila meridional!, Tauria, Pro-
montono (nucasico el in monte Beschtau.

43. S. MBK OLA \% all. ms<. ex Bth. in Wall. Plant. A%lat rar. 1.6*. - Sweet, Brit,
flow. gard. II t. 144 — Bib Labial gener. el spec. 210. — Caule barbaro ererio
villosa, full peiolatis ovato-lanceolalis creualin, utrinq. pubetcentib, inffriorib
basl ha<tato-cordatisf sopenonb. batl rotandalis v. angn<tatis, supremis flora-
libq. seisilib. ovatis arutia integerrimis; racemis svbramosis, %erticillaslrit latit
pauciflons remotis, ralyceb campanulatis TIHOSIS, labio supenore integro dm-
tibq Ubn infernons acuii* rorollis ealycc soblriplo longionb, lubo etserto ae-
quali inlus piloso-onnulalo, f.mre ampliaia, labio supenore subfalrato, inferioris
lobi< lateralib. refleis, comialib. longe ei<ertis; eonnectnm postiee porrertu,
airinque anlhonfons, lorulis po*>leriorib ca<si< eonnexit. ^ — .V *gtulmotQ** afB-
ni<, sed dneroa folns anKustioribu< minnribu<, floralibun mnjonbu*, raohnifl su-
premis hiibcoiiformiba^, c*hfis lobis Mibaequnhbui, rorolli* minonbui, UIHO
supenore m falc.it>>, ppnilalibui lonpuHimi* rl pubevrrnin tula mbhinpidji ner
glutno<a - Habitat in Indiac onenlalis moniibuit Kamauirn<itMi< rl Srunaghu-
rensibus el in talle Cashmenano el ad kidarkonui

41 S II[\s Ro>|_0 ms*. ex Dth. in Hook. not. Mi>c. III. 371 rt Labi.it. pen. el <I"C. 210. - [Kojle, Illiistr. or Himal. pi. 30J. t 73. fig. 2. - Linill. Dot. Kegist. (NCH Scr) XI\ . t 39 1 — Caule herbacco erecto MIOSO; foil, longe pcholaris laio oiati*, ha si tale rnnlalo-saptlatK, floralib. otatii .iriimmalis, raljcc breuorib; racemis subaruosi*; \erlicillastri* sexflons; caljcis campntiulati Mriati rolorali plulinoM labio supenore mlegro Iruncalo, inferiore longiore, denlib otalis acu-(is; corollis cahec inplo longionb., tubo exserlo, fauce unpliata, limbo luanlf* hibio siipenore falcalo compre<>\$o, lofcnore lato palonc, connectnis posiiro porrechs, utnnque anlhmfens, IOCUJ* poslerionbus cassis *ubcouncils ^ — Specie* pulcra, affirm V. *glutnotae*, sod raremis brctioribns romoMs donntfloris el rahnbuH rampanulalM cocrule^cenlibuH abunde dislmcl.i. Corolla species* rorrulra. Stamina brrvaer, tlylus longe oi<crius. r.onnclna poshee brctia. — 11il• 1lat in \alle Cashmeriaoo.

A| S. f.4VPAMLAT% Wall. ms<. ci Rib. In Wall. Plant. Uiat rar I 07. el Labial. <eo. el spec. 220. — Caiile herbareo ascendenle hirMito, foil longe peiolali* nrophs OTatis acutu inciso-crcnaln, ba^i cordate, utrinq hispulnlit, fluralib- <M> acutiH, c.iljce brevionb.; raremis »ubramo»i<; wTlinll.iHtris subsoiflon* remotis, raljcib broiler pedirellalu ample rampanulalK iruncalK >illo*is Ubio superiore breMssimo mibintegro dentibq. labii inferiors Lite o^atin aculi*; ro- rollis r.iljre dimnllo loii^iorib, tubo ampliata inclu^o, labio supenore falcalo, infmorr brr<iH<iimo; connertmg poslice porrecti< liberu apprnmmatis anlberaO lorulum ra>9iim ferenlibun. ^ — Herba l-i-pedaIn. Folia 4-0 poll, longa c(loiidem lata. Ricemi breves Ian tubpamculali pauciflori- Tal)x maginVudinc S. *ptmnae*. Corollae imperfeclo examinalae, »ed teile Wallicbio Mruiles ilhs *• *nubicolae* nont. Tabus intat certe piloflo-innulalus. — Hlabilat io India orientali, in monltbut Gottaln Tbao.

. SMTto I?. IOUDnni BUL li IMIL UL MUC. III. 373.

Calyx tubulofui, labio superi ore iruncalo iubirideniaio. Corollae lubm sob fauce amplialus v. TenInco\$us inlus ejaonulalus, labium -upenus rectum eonca- vum >. falcalum compres<um, inferiors lobi laterale< oblongi crecli sublnrti, me- dous p.ilem rotundatiiH. Connerlna po^tire defleia, abrupto dilal.ila, nlrcmitalt ollo^a ronnecta ~ llerb.io regioni* mrdilerrant^ao.

Io H \IRIDIs Imn spec plantar. M. — Bib. libi.il »:en el spec 2J0 — Taule In rbirot) irei to MID^O, foil petiolali<> o\ali- obluu^iH, Insi roium>lali< oblu^I* rreitutii XHOHK, superinnb otaln -rordali<, (IDTJIII) lalissimi* aculu per^i<*> lib, cahrr sublontiorib, «uprenii< eradatim ninonb. raci mi< -implicit*, vertla<ln< di<t.mlib. »ub>e\flun%. cahnb lubulo>i* tilln*)*, fructiferio demum arCt6 reflnu plicjlo-!iiriaii<, labio »upenore Iruncalo brtMiirr tndenlalo, infer ion< dentib hncrolalii aculit; corollit cal)cc |n Irriia parc longiorib, lubo »ubiB- rlu<o, lab o tuprnore inrunro coccaro, inferiors |ubi< lalrralib. oblongi* ercoll'f rnnrrrtiM* po^ticer drfleti* triangulari-dilatalit, rtlremilati* callo>a conneiU* ^ — Herba nurr M| 2-3-polliparm, §arpe, prae<ertim in |*r I, pedali< v. *tmtra*. (.aoh* ercllus, parce ramo<u<v pili< paleotibu< \illo>ut. Folia l-i-pollicarle, •aeplus etaele ovaha nbtum>ima, reiculariter rrenaia, superiora ba<i laiiora sub- rordata, Qoratia Uiiittime cordala acaminaia rihata, omnia «illo%a tindia ^lyces frurifem taepe ol in *Octmo Bastiteo* arclr rrflm ngidi, profunde *ukali, stris acute prominemibat Ciliait*. Flore* pani albidi % in *ar ,9 %iulacei. *'bas corollae intut nudu<. tub faufe ampliata* (.eniialn inclii^a t onnerina tdt ~ lola. - S. *irumtmUi* ^illd. Knun plant, hort llerol I 31 S *Sprimmni*' ><°P< l>el Int. III. 31. |. W. - jacq 01 Fel I ii i 15 - Rehb Planl. criiif. *..*T t M2. non Willd.) - 5. *ttridas* J*cq |c. nr I 1 I 4. |U(Fl AH. I. >>#or- - Siblbrp el 8m. Fl. fir I. IS I 19, Rrhh. Planl. cniic |l sH I. tfl. — #or- mimum ttnde lloenrb Mciñ 3H.

0. *Oor%kus* no/4ir#M. - Habitat in F.europae, Afnrae cl A>iae regioni* m**ol* et taocae loci* ticcis, Mtotis, arfillosia eic, in Barbariae cojlbut cirtt Tun -

(um cl Tanger, In Hispania Italiae ams Uncelln&ibus, Genuao, Lucanlac cl Apuliao pralis argillosis, In Paliualia, in Graccid ad Capul Drepanum, Epidauro, Cararaania cl insiula Cypro, Tauria, Promonlono Caucasico pracscrum occidentali cl in monlibus TalUcb.

47. S. IIORMINUM Linn. Spec, plantar. 34. — Dili. I. c. 221. — Caulo berbacco credo villosu; Toll, pcliolali* ovali-oblongis, basi rolundalis v. cuncali* obtuse crenalis villotiN, siipenolib. o\alis cordjlis, flurahb. latissinus aculis per>islenlib, caljcc sublotigiorib., supreme mnnbranacco-dilJlalis culoralis como>i>; raccmi* bimplicib, \erlicillaslns disianlib. sub-Q-flonsi; caljcib. lubulosis pubesconlib., rrucliforis reflexi* plicaloblnatis, labio supenore truncalo brexitrr 3-dcnlalo, inferiors dentib lanccolads aculis>; corolla ealjce dimidio longiunb, (ubo induso, labio supenore incuno concato, infmori* lobis laleralib. crrelis, comu'ilm* po>lirc <lrllc>i> in.inKuUri-dnUalu, fUrcmilale callosa conrxis ^| - llonmnum cohmtum Moench Melh. 370. — Hormtnum tain um Mill Dul no 3. — S. colorata Iliore, <lit. Land. 17. - S. Hormthum Siblhrp. cl Sin. II <ir I. 15. t. '20. — llabilnt In Europac, Africac cl Asiatic regione Medilerranco-PonlKa ad marines aprorum, in dumclis etc., In Barbona, In Italic aRro Nicaccn^i, Apulia cl Puccia, In Dalmalia, In Gracclae arvit baud rara, ad Poros, in Sjna circa Aleppo, in Tauria circa Karaubasar.

48. S. FOISKOKLKI Linn. Hani. 95. — Bib. I. c. 221. — Caulo berbaceo IU^DVU-coso-\illosu; foil. Inflm* pcliolalit ample ovali* rtpando-crenalii, bail aurirulads lobali!>>c \illosis, caulinit paucis tubscisilib f floralib. late otalii acunnna(i> persiMcnlib, cal)ce mullo brevionb.; raccmii clongalis subsimplicib ; xTticill.is-Ins 2-0-dons di>tatttib; caljcib. tubuloMs, lahio Mipcnure (runcato niinulo I-dcnlalo, inWioris drntili. lanccolaiiH jrulis; corollis r.iljrc duplo lon^iorib, tulto t'i*rho ampli i(o, LIHO siipiTion^ Mibrcerio emarifin.il<>IMU<lo, r<>niH^i(tim> M^>KO dclii'iin IIMTIS rerun o<cl I Lit .it I \ xrtremitato .ippro\nnaii\ . I\ . i IUIS SI^IUIK - daliH, basi MIOMIS, supiriM* Mibnuilun, ranus ulnn<ui< \ul> rarotno 1-2 I nli.i m-Qma 3—1-pollirjn.i, bail Mibcurilala iM ^arpiiii auricul.ilo-lotiaia, kiiprri<ifa iiiiulto niinora, floralia |i| 3-4-linoana |iruii.i nllosa. H.KCIII aiis pif% pa(riiii|ni< vifcoiig vilhisuK. VeriicillaMn domum pollirem \. ulu.i rtmH, >apliu< 2-11-ti, rarlug 4-0-non. Pedicelli demum folia floraha >uprr.inir* < .ihx 4-5 lin lungus apice nappc coluralus nmii 3 labil tuprrriorii «alMlioribu<, |i*ra><<-pubr>rnu Mibrcrciu*. Corolla violarca, forma frrc tospkanum Annulu. in lulum nullut fraux uiu* pube^cen,. lab.um infcriui tancKaium, Mm nird,< ddrv. unirrinalo-b.hcJo. <-onnochna poihrcc lublu. oblu< denuu .S ti/B.I- I^i*W II APR \rab <>2 - .S f ortkbln Bui. Mag 1. W ^,||,J ||<r_i Brml \ 5) Siblhrp. (| s,,, | |o_r iUate I. 10. I. <. - Uabilal in Mci*nlc. in >)*• a utubro> U!)mpi, Billi)nuc ii urea pa_k'um Bd^rad prupr l.<u,um,nopu|,n

49. S. MILT. I. 0.11111/1 1h1,7IF 11j um or I^nl. (Inn b<r. 50 ciBth. I. c 717. - Caule herbaceo ercrio pilusu. roll pnioljii* pumaii>ruu, immraui 3-7 |i*iioUi> ovalis Crenall*» ulUill o n><Jon \ bihdo, fluralib liralruradurmib . racrn* >im|jili-cl. Verticilla*ITU nmluOoru Lui>, cal)nb. raoipaoulaiu, labio >u|rti<n- jmi* in eg. Inferiore lte^U>^' bidenUlo, rurullar raljer tuMnplu |unitium> IUM> lre-viter es Comp^CHo* IOU% *rlr,ur al, n^iJ^o. lalnu ringrtib. Hongait, >uprriore talcatu rolundalu^! llif<tnorc I^11^ ^ ^ . l>bi> lalrraUb. oblongit errrlu-palpmib . medio 4 - n f^ liiybrialo, ronnrctim pokitrr U< Qciu tubdilaiaft, riUrmilalr r<nnr^iv speciescaj^ cis^*****' >>p<^i<n iiu<^fo pi rorullac lubo inlui annulaiu AH lclitv - P>de cl |>^ luiHuf* rerpdiu, runnfim* pu^iua dtflrnt tubdilaUlu nec antheru a 1> r^*m^llhaer >>fk^M k^%an UMui Mriiom* propriac i>|>u* llabial in t.bi

Sectio V. AETHIOPIS Bth. In Hook. Bot. Misc. III 373.

Calyx campanulatus v. *iubulosus*, labio superiore tridentato, dentibus erectis, medio saepe minimo. Corollae lobus sub fere amplius \. \enricoMM, intus eiannulatus, labium superius falcatum compressum, inferioris lobi laterales oblongi auberekti sublorti, medius palens rotundatus, plerumque conratus emarginatus crenulatus*. Connexiva postice deflexa, abrupte dilatata, c(\r«-miiatr callns.i ron-ocxa. — Herbac regions Mediterraneo-Ponirne cl montium Asiaticae mediae. Folia rtpars inferior cauh* saepe albo-lanata. Folia floralia piTMSlrniia cricia, >crii-eillaMros aniplctenda, v. rarius pedunculo vix longiora. Panicula dnancaio-ramoso, rarasinie subsimplex.

50. S. IMHC4 Linn. Spec. plantar. 37. — Bin. Labial, pener. cl spec 222. — **Oule** herbaceo erecto pilosiusculo j foil, pcliokili^ ovaiis oblonitise aculM **subdentatis**, basi late cordatis glabris, floralib. o\ato-cordatis n*lle\i-; racemum <implinb.; verticillasrlt 0-floris rfmoli<; calycib. sessilib. campanulatiH, posi anihr^in io-flaiit, labiit Irunralis, superiore Indentato, dentib. brfMNMini- .ippn>ximaii<, in* feriore brtviler bidentato; corullii calyce Iriplo longiorb., lul>o>ii cinrrto, fuce amphala, labio superiore lu.uimo falcato compresso<<ot infriore bre^iore paenic, lobis rotundatx, lateralib. rellexn; geolalib. ex«erlis; ronnerinis postice deflex* •ub^JilalalK, cxiremilalc rail »^a conne\i.<. 2I — Caulis claiiM angulatiK plabor v. pilis glutinosus MIUNUS. Folia infima 3-5-pullir.ina_t ainfu^lc ouu, superiora laliora, suprema »c»»ilia_t (loralia calyce broiora. Il.ircmut «r»(uiprddli) cl ultra, terlicillatlns paucis remoh>>inii<. Calyx magnitudine *V. pinnatae*, fructifer membranaceo-venosus viscoso-pubesceos inflatus, ul in *Lyckuide apetala*. Corollae pulcherrimae Oatae purpureo-naculatae, inagnitudine *S. ar^rmleat*. — *Srlarf** *fmdtco* Mill. Diet no. 0. — *Smitia Hdica* Jacq. Uorl. Vindob. I. 33. I. 78. — Bol. Mag. t. 3BX — UabiUI In India> terosinililer lo monliboi Periiiae v. Arabiac.

51. S. COMMUTATA Bib. I. e. — Ctole herbaceo rrecio plloso-hinpldn; foil, pe-liolatli ovalit obtusis eroio-crenatU, batl cordatis cra««ls lubprculoHo-ruRo^js-simis, olring. tiridib. bUpidis, flnralib. pedunculo m lonRiorib.; rarrmn <|cu>o npicaeforro; c<il)cib. caropanulalis bi<*>idi<MmiH, him* patrnhb., supriorr bre-eder Indentato, dendb. errelis; cornllis cal)rc M)duj>> lon^ionb., lalno superior* filralo cinipri'Noo, infermriH lobit lalrr.ilib o|,oni; <> rrrrijN, r<>nnrrti>*> po<(irc define alirnprr <fill.IIIH_v r>rrmilalc coririx.N If — Ii>ln raulina nu-nicr<>iora cl nnnra *unl quant in carirri^ Imjus vrrimnis, \i\ M>M|ui>ollir.iH<*> **Rocemus** in *prrr, m ne l.mn.n'.mo pulliran^, ri \<riMill.iNlr^ 3 druir .ip>ri>n^ **maus constant.** *V. ihnnimtra* Linn. Spec phnl. X't ncm *^ari/ nec Aurl j — \$' *Synnca* llrrii. (tōnan non l.mn. — llabilal in lialu *,% in Sjria*

5*. H. HYRI \<U Lino. Spec. plantar. 30. — Blh. I. c. *til* — i'aulr herbacco **St** briosculo, soprae pauculato Innicnoso-pube<crnlr; MI. prdolali* n%alis ob-luffit eroto-crrnalit •. inciso-dcnUhs, bati cordali<, uiring. %indib. **rugosissimis** pab<tcenlib.. Qoraltb. lal< ovatu coac<<it pertuicnub., caljrr dimidio **breviorib;** racemU pamcuUiit; «rrlieilla>lril ditianiib. i-6-flon>; ralytib. campanulatii *^ nmlotU, labio superior* indralato, lafrnote bifido, droiib. omnib. %ubjc<|aiH^* UncroUIU tealit; forollis rtl)ce diandio lonnionb, lubo mrluto >rnlnro>o, 1^ bio «u pert ore •ubblcilo, inferior^ loln< lairrljlib otl.nu'h rrrrii<. connecti- pn>hrr dcAVti abrople dilalali<_t rtrirmuir rj||.o rnnrn*. "4 AfBni **S.** •dormU*, »rd Uliis «indibu<. firma frre foliorum s *pnUrnsn* diffrrl ^ole JV. fete 3. *Tmfiumm**, sed asulio moor iciririlor Folu fl.-rjha ri caljrr* duplo ^{ir1} plot* minors_t «o||Mer lomeniutl *nee* hi<pidi, mm.n.r »pmo<i (nrulla alba-llabilal In Ortcait tl PaU^iint, in hjru prop* Akp|.o n in prnu.

Sfc ft. niiOKATA Willd Raum. plant. bori. Hrrrol 41 - Bib. I. c | *C.BUU* .••£ fr<licosu< b<<i albo-lanato, tnpennr pamruUiu gUbro. foil priioUiM o%ak< •• ^ ^MlaiU •cuminaiis, irregularlrr cr*nMo-dmun<. ba*i rordaiis rugotU, ***** >l>o-to>cat>fti>, sopchonb t#>>Uib. (Ooralib pedicollo broionb. pcr>isie>w^.

- racemji pamculalls laxis; reticillastris remotis billons, calycib. campanula* strialis pubescenli-hirlis, labio supcnoro otalo palcnlc, denlib. brevissimis subconnnenlib, infcnons denlib. lonccolnls aruminalis>, corollis cnljeo subtriplo longionb, lubo caljcem acquanlc >cnlncoso, labio supcnorc falcato compresso, in Tenons lobis lalcralib. oblongi* creclis; connccclms poslico rhomboideo-dilalals cxlremiate callosi connexis \mathbb{Z} — Caulis basi pennnis v. siiflutico*»ii«> ramo»us Kami basi a»ccndentes, superne creed tetragoni, angulis oblusis callous, basi lana alba laxa oblecli, superne glabn v. icnimsime pubescentes Folia canlini inlima longe pcliolata, limbo iripollican, 1-17: poll. Iain, margine crosodcnUla, utrinquic lana alba omnino oblcccta, media «c»silia latiora cordaio-amploxiraulia, cacicrum conformia, superiora hub patmula mullo minora cl floralia minima cordato - o>ald acuminata inlcgcrnma palcnlia pubctcnlia, suprrma membranacca Pamcula pedalis v. ultra ramosisbima. > crticillasln fere pollicit'ndisiane* Corolla alba, labu infcnoris lobo medio fla\escente, pumlis piun* tiolacm piclo. Mjlu* cxscrclus, lobi* brcvibus acqualibus subulati* — *S atgentea* florlul. non Linn. — *S albula* Jacq. Obscrv. 10 no. 7J. — *S odoruta* J i < | fil. Kcl. fasc. II 20. t 10. — llabilal prope Bagdad ID Persia.
- 54 *S. r.4M)II)lsMMA* Vahl, Eoumc. plantar. I. 278 - Bib. I. c. 234. - Caule hrrbareo credo albo-lomenoso; foil, peliolatis ovalis obtuilt slouato-dentatis, bnsi cordais crassin riiffoiis lomcnlo albo ulrinq. demltslme lanalit, doralib. lads acummaii concavU perslsieniib, caljce tubbreviorlb.; racemls ramosit; Yerucillastris C-10-norls, supremi abortienllb.; calycib. campanulalii vllloiii, labio supcnorc Indentuto, ineriore bifldo; corollit calyce dupio longlorib., tubo ralycem aoquanlc, fauco \entncosa, labio superior© falcato rotnpres*n, infcnons lobis laieralib. oblongis erectis; connecti\is poslice rhomboideo-dilalati« deflciiH, cxlremiate Cdlosa connexis ^ — *A .V. argenlea* diMinrtxoma Mm minonbu* crasMs, potius dense lomcnlosis quam lanali« Corolla alba, labio lla>iranic, mapiiludine .S. *Sclarrae*. >alde aMinis *S. odoratar*, differl MIIH obhiHionbus crasMonbus, floralibus caljrem <ubaequantibui, \crdcillaMris 0-10-floni» rl p.iniculis minus ramosis. — *S. crautfolt** Sibtbrp. cl Sin. Flor. Grace I. 10 t. 20 — llabilal in Armenia, in insula f.)pro ranssimc.
45. 6. *SCLARKA* Lion. Spec. planUr. 3B. - Bib. I. c. - Caul* berbaceo credo «il-loto; foil, peiolalii ample otalis eroao-creotlU, bati cordatis rugenit iocaaU, tupremis ampleiicaulib., Doralib. laiittiml. aeaaiaalla coccaWi MembranacHs coloroi.s, floret supcramib. pertlieDlib^ raetmit panculaiiii; ferUcillatris ditlaniib «ubse*nom. calycib. campaonlalit alrialit pabctceoll-bitpldit, labio »upmore tndcnlalo, Inrciigre biHdo, denlib. lubtplqoto-actuninatis; corollit rahre dupio lonciorib, lubo incluso sub fouce venlicoto, labio superior© falcato romprtsou, mfi-rions lobis lalcralib. obloogis creclis; connectivit poitico dilatms dcllexiN, rviremilale callosa connaiis. 2|.! — Caulis creclut S-3-pedali« crassus visrosui, pilis sranosis villosus. Folia maxima, »acpc 8-9 poll. Ionja, 4-5 lata, in opontancis roffo»i<sima villosa, in cullis glabriora, caulnorum pans »upremi basi anguslala, floralia praesertim superiora membranacca, ba»i albula apice rosea comosa. Calyces *S. argenleae*, bruvinslme pedicellati, basi albidit pills brcvibus aspen VI»CO»I. Corolla albido-coerulea. Tubus medio conirartu/ inlus denie apicc pemcillalo appendiculalui. Connecclva ad lalus interim dmic brevi aueta. Sl>lui cx«ertus, sub lenlc brevissime pubescent. ~ *Sclarta tuiga* r%* Uill. Did. no. 1 *Salna btactcata* Sims, Bot. MaR. I.]»». - s *Sims, am* noem. el Schull S>st Add II el Mant. I 210. — BoL Reg. t. 1003. -" *S. Sclarea* 6ibibrp el Sm. Flor Urarr I 18 t «. >- llabatal ad via. vt InMrcis Europae meridionaliH cl regionjn Poniirae, in balha mendionali, Pedenionio ,|uii_a % , tiMilnonali, rrisno >>pol.lino, Smlia, Ulna d Dalmatia, in insula <oi ArqIT, lattt t.raiu, inter oppida Sfiu«nu,licrli cl Uubad Uiih)mac, in Taun.ie inonioVa, derlmbuH CLUUI iniir llakirhi^arai n scbatlnpolim, in cnonlibus ljl>»_rh
- 50 *S SPINOM* 1.»« M.nl 511 Bib I c - Uule herbarco gUnl|<|UMI_|ll|l|u foil, pcliolaiis ample otalis iniuo-crcnam. bas, rulundai.s rugo»is pubi-iccniiib

supcriorb be>Mlib cordato-araplexicaulib., floralib lali>slmis acuroinalis conca|i* pr^islenlib, calyces subsupcranlib., ratemis paniculate, UTiicillastm distanlib. 0-10-flons, calycib lubulosi» cylindricis slnahs, labio suponore Jdenlalo, infenore biGdo, dentib. omnib. creili* spinuMs; corollh calyce \ix diindio longiorib, tubo incluso sub fauce >enlncoso, labio supenore falcalo compresso, lufenoris lobis lateralib. oblongis erecti*; connectms poMicc dcfUxi* membranacco-dilalatis, exircmilatc calloj»a connciis. ^ - llorba 1-2-pedalH, saepius pilis patuli* apicc glandulosis ex omni parte hispidi, rarius glabra Hami tetragoni, angulis oblusis callosis glabratis. Folia inforiora 1-5-pollicana, bretilcr peliolata glabriuaculd, floralia calyce flonfero longiora, fructiforo subbreteriora, \iridia >. basi albo-membranacca, margino ciliala. < alr**> SCSMIOS, po*1 anihesin elongali, saepe ultra pollicarc*, ore parum dilatato, e&tus nunc plaborrimi lucidi, saepius pilis longis glanduliTens ciliali Denies labu supermnn subacquales, lanccolato-sobolati subspinosi, jnfenons profundiores. Corolla alba, eilusglabra. Gemlialia labium supenus corollac subaequaniia. (.onnectna edentula. — *Uormtnum tuateolent* Mornch, Mclb — *JHarum ic<jiji>tiacum* >e>Img Fl. Aegypt. 75. ic. 70. — *S Abyssmtca* Linn. fil. Suppl. 88 *S icji/ptiaca* I inn. Man! 20. — *S. \$p\no\$a* Jacq. Ic. rar. 1. 2. I. 7. - Habitat in Aegjpio, in *)^{ria} prope ileppo.

57 S 1»\I.4KJ>TI>4 Blh. Labial, gener. el spec. 713. — Caulc herbaceo glanduloso-piloso, Toll, pctiolatis oblongis subpinnati»ecliH v pinnatifidis rugosii MIO^IS, lobx eroso-dentalis obtusissimis, floralib. bracteaformib latissimi« acuminalii concam persistentib., calyce brevionb.; racemis pamculatis; %erticillaHtriH dis* tanlib. subseilloris, calycib. tubulosis slnalis, labio supenore broiler indentato, dcnlib. omnib. ereclis subspinosi; corollis calyce subduplo loogionbus % — Habitus, loflorescenua el flores *S. spino\$a*%, differl foliorum forma. — *S. bimaica* Delile mat. — Habitat In anrla Palaeslina.

58. S. TINGITANA Bill. Salf. 30. — Bib. I. c. 935. - Caulo herbaceo glanduloso-piloso; foil, peliolalis ample ovalis ineiso-crenalis, basi subcordatis rugosmsimis VIIIOSK, supenorib. amplexicaulib., floralib latissimm acuminalis concerns prr-M>lentib. calyce subbrevionb.; racemis pamculalis; ^erlicillasris disianhb 0-IQ-flons, calycib. campanulalK plicato-striatin ln^pido-ciliatis, Libio Mipriore ~~subtridentate~~, doate medio obsolelo, lateralib et I.KIHHS Libn uifonoris roclU ~~subspinosi~~, corollo calyce duplo longiorib, tubo (j|\(cm .iiquind' sub f.mce u*ntncoso, libio superior^ falcalo rompresso, infermro lobis Ijieralib nblongii erectif, connectivis po^lice deflens membranaceo -dilatalis, e\lrennia(c rallo<a conne&is ^ — Anim« *V. iptnotQt*, a qua differt folui laimnbus, basi cordatis rugoftionbus et praecipue calycibus ample campanulalis net r)lindri<i> el corollis majonbus, lubo ampliore medio contrarlo nee lrnui, apicc tanium veuincoso. Iota planta pilis longis palentibus et brenbus glandulo»iH tnsvida et odorem gratrm spiral. — *S. foeltd** Lam lllyMr. gen I 0U - .s *coarelatu* >abl, BnuID plant I 277 - Habitat in Afncac bo real ** agro Tunetano.

»• 8. PRAKCOX Vabl, Enum. I 474. - Bib. I c ~~IKO~~ - Foil, oiaio-oblongit •«»• t repaadis laevib. tubpilosU; braceis cordalis venosis acuminalit, longitudine ca* lycis. ^ — bimilis praecedenti. Caulis herbaceu* ereclus pilo»u« Folia I wf riora petiolala Iripollicarta, ovalo-oblonga, basi atenuata, obsolete dentaia obtu**» venis raris pilota, superiora sculia ovata acuta murrinata, inaequaliter dental** aubrepana, caeterum infenonbus nimilia Prdunruh v\ anlli« superioribus « termmalibns oli pedicelli villo»o-«i«eo»i \ertinlli romt.n, 4-0-fl«»n Br<rif ~~se~~ trnoiae, in evspidem atenuatae Calyi biljbn(u« mliul«»u« nrno%u«, U ~~h:um~~ »uperui« ovatum longius, iofrnus bibdum, dmiibu* ru%pulali« mno«ui> ^oruHa magnitudine *S Setmrtme*, galea «illu«ula lnirjns »i)lo el LIHO inferiore ~~brevior~~, labium infrnut ronratum. Aolberae proprndruu% Iljluial in Mnca ~~boreali~~ OU tt. AKfillOFIN linn. hpec. plaour JO Uili I c £U - i.aulo lii-rbaf« ~~erectio~~ albo-Unalo, foil infimi« prliulali*, ba«i anicu«un« raulini* «ordalo-a>P^{ri,1} lib., omalb inciaQ-denUtis ru<vtis>imif, utring dense albo-Unati». floral^ ~~la-~~

tissimis acuminatis persistentibus concavis, calyces aequantibus. lanatis; racemis paniculatis, verticillatis G-10-flores distinctis; calycibus campanulatis conatis lanaix, labio superiore J-dentato, in fenestris ore bifido, dentibus omnibus subulato-spinosis pinnatis, corollis calyce duplo longioribus, tubo incluso sub faucibus tenncoso, labio superiore falcato compresso, inferioris lobis lateralibus oblongis crecibus, connatis postice deflexis abrupte dilatatis, extremitate callosa connata. 2l — llerba nunc \ix semipedalis, saepius pedalis v ultra, apice paniculata, ex omni parte hinc longa densa m\ci \estiva. Folia minora crassiora quam in affinis, Mipmora uti floridia et densa calycini acutissima subspinosa, basi membranacea. Calyce plicato-sinuato, tubo membranaceo, ore patente Corolla albida, labio superiore pubescente, saepe rubescente, tubo medio contractus dense broi obtuso pinnulato inlus appendiculatus. Connata edentula Stylus exsertus — *Aethnops* [les] florl [l]s II ord MM fol 3 fig 1 — *Sclarea Aethwptt* Mill Diet no 2 — *Sclana lanata* Mocnb, Melh 374 — *Salua Aethwptt* Jacq Fl Auslr II. 7 t 211 — llatit in Kuropae, Afrae et Asiaticis regionibus Mediterraneo-Ponicis anis et campis aridis argillosis et in locis siccis stentibus in ftabana, lispima¹* dallia incendiaria Pedemonte, in Austria, Hungaria, Dalmatia, Illjria, Podolia, Graccia et Sjria, ad ruinas veteris Chersonesi, in Tauria, promontorio Caucaico, in montibus Taliis et prope castellum Grosnaja.

01. S. COMPIKSSA \ahl, Enum. I. 275. — Bib. I. c. — Caule herbaceo erecto villosa, foliis infimis pinnatis, basi rotundatis, superioribus cordato-amplexicaulis, omnibus ovalibus crosodentatis rugosis, utrinque sublanatis*, floralibus latissimis obtusis persistentibus. concavis coloratis ciliatis, calyces aequantibus; racemis paniculatis, verticillatis 0-10-flores, supremis abortivis, calycibus campanulatis membranaceis coloratis pubescentibus, labio superiore 3-dentato, dente intermedio minimo, inferiore bifido, dentibus oblongis, corollis calyce dimidio longioribus, labio superiore falcato compresso, inferioris lobis lateralibus oblongis, connatis postice abrupte dilatali extremitate callosa connata. — \ffims S. *iethwpuh* Differ I praecipue foliis (lateralibus dentibusque ciliatis obtusis muticis et verticillatis hupremis abortivis. — S. *compressa* \cnl. florl (cl). I 50 — Habitat in Oncis?
02. 8. ARGKNIKA Linn. Spec. plantar. 38. - Bib. I. c. SIS. | - (Knwls. et W»ur The Floral Cabinet III. W. f. t. 112.) - Caule herbaceo erecto *illow> foliis, rtdicalibus pinnatis caulinisque inferioribus aessilibus ample otatus, basi cuoallt sinuato-lobatis crosis lanatis -rugosis, flortibus latissimis acuminatis concavis persistentibus pinnatis, calyces aequantibus; racemis paniculatis verUcllUtris 0-10-flores rcmoiss, supremis abortivis, calycibus campanulatis flrtatis villosis, labio superiore 3-dentato, inferiore bifido, dentibus omnibus subspinosis; corollis calyce subduplo longioribus, tubo incluso, faucibus venncosis, labio superiore maximo falcato contproso, inf* rions lobis lateralibus oblongis crecibus, connectivis postice abrupte dilatatibus, extremitate callosa connatis. y. — Affinis N. *ipinota** et S. *Tn^ttanar*. Folia radice et caulina mfima 0-6 poll longa, 4-0 lala, saepius profunde incisa, lobis crosodentatis, rugosis \enis albis, utrinque lana laxa >esiva, superiora multa minora, floralia omnino S. *Tmgitanae*. Panicula ampla, ferd parco ramosa, racemis longis apice abortivis. Calycibus »cssile% 8-0 Im longi, fructibus patentissimis, basi submembranacei ngidi sriaii, denubus Ubu superioribus ||i maequalibus. Corolla »pcciosa roseo-alba, magnitudine X *pratrirm* paulo superans Tubum medio contractus, inlus dentibus 2 ^ubconnatis appendiculatis* tonneclna poMicc (supra dilalationem) fcaapiut ed»nlula, rirm* dense minuo »ubulato nolala, appendicula supra broiler oblonga bidrtiala — *Sclarca aryenea* Mill Did no n - *Salua Arlhtnptt* Jrol 11 | u» | H non I inn - S. *patula* Desf 11 All I 41 S. *AUandra* Pers Knrhind I « - s *rtnuhiUmma* «u«s Prodr n Sicul I 10 - Hoffm rt I ink I kir Pott | 151 t 11) (non tahl S. *pyramtdalit* IVligna, Inst bot 2 54* < > *argentea* Jacq florl Sihurnbr I 4 t 0 '- Sibth u Km Hur firaec I 3» i 27 ¹¹²⁻ bitai in Kuropae et Afrae rckionibus mediterraneis ar\i« inrulu* in ¹¹²⁻ florl 311

lusilania hinc inde In Transtapana, Ilispaniao protinria Alpartensi et circa Matantum frequenti>Mma, in Sicilia, regno ftapolilano, Dalmalia, monte Parnas»o tiraeciae cl in Crcla

03 ^ 1ERBASUFOLIA N. Dicb. Fl. Taur. Cauc. III. 91 - Blh I c 227 - Cnuie herbaceo credo viscoso->illo«>o, foil infimis pctiolatis ample otahs, basi corda-ii^ sinuato-lobatis crosis crossin rugO9i«simN, supra tix lanatx, subtus nncis tomentoso-lanalu, floralib lalissimis acuminatis concatis persisienhb \illosis, caljce* subaequanlib., racemit subpamculalis; verticillasris 2-0-floris approximate distinctly summis ibortivis; calycib. campanulatis <lnaiis mcoso-tillosis, labio supenore Iridentalo, ID fen ore bifido, denlib oranib acutis w| spmo»is; corollis calyce duplo longionb, lobo incluso, fauce >ontnrosa, labio superior* maiimo falcato compresso, inferior!! lobis lateralib. oblongis ercclis, conneriivi* poslice deflens abrapte dilalatis bicornulM, eitremitale callna connahi ^ — S argenteae maxine afOnis, differ! stalura humiliore, folnsba^i rordiii«, nee anffustatit, lana bretiore lomcnlosa, pamcnlis roinui ramosae cl >crlicilljstrH mag* approximate. Corolla paullo minor. Conneciiva poshec supra dilalaiionem subulalo-denlata, appendicula supra bicornula. - S canduhmma M Dieb Fl. Taunc. Caucas. I. 21 (non Vabl.) — HabiUl in regiois Caucanicae sienlibus, in colhbus Ibcnac Cauca<ique onenlalis fl ad lorrenles Samur cl Jarharibasch tliiions Cubensu, in lapidosis SICCIS alliorom montium Tatflsrh prope Tillim ft « Persiae pro<incia Aiarbaidjan.

61 S. BR()lhM»ETI Blh. I. c. — Caule berbacco frecto »ubvi«co»o->illo<o, foil, pftiolaiis ample o^alis oblutii sinoalo-crenalis ban! cordatU cra\$4i« rugn»i»sini, supra tindib. subglabria, aubloa niveo-lomeolosis, venls visco<o-pubfHcen-nb.f Ooralib. ovalo-IMC«ol«llt acominaiis coneavis thridib. hispidit prrsisicniib, calyce sublongioiib.; racrnia paioealatii; verticillatris subsfiOorU diimciis, calycib. campanolails blspldu, labila paiealib, auperlore 3-deniaio, deoiiib, ovatit acnls, nedlo abbrevlalo; corollis calyee vli duplo longlorib., lubo loelao, labio auperlore falcato compreaao, Inferlorla lobia latcralib. oblongis eredis, connfdivis poslice deflexis abrupte dtlalalis, exirfmilale rallo«a connrxis ^ — spfcics diilinctissiroa, afflnis S verbasafolae, scd foln* amplionbiM supra lana fl«*stiiiti« pamcula dfnsiore ramosiore <illonssima, folns flnraliluio an^ustionbai* llonhuH minonboi, fl aliis nolis dilTert — In Tcncnfla' \ in \fnra boreali.

G> s >(M)|(CR)FTUM Hall m%% ci Blh in Hall Plant As nr I 07 el Bib-I abial gen el <prc 2fc*. - Caule herbaceo crerto, basi lanato, %u)n rno THIOSO->>sro*o, foil infimi^ longe pcliolalis ample o|au<* ero»o-crenati», ba<u angustaUl rugo%i«, %upra tillosis, sublus albo-lanatis, floralib laii»finm acuminatis cooca-%i per<i>lrniib cal)cea afquantib., racrmis pamculjti*. %ericilla*lrn rtmow •ub»e|auri> calycib. campanulalis slrialis a>pfro-villn»i«, labio superiore 3-den-Ulo, in fen ore bifido, deoUb omoib. subulalo-mucronalu, corollis cal>ce tripl° lonKionb, lubo longe eisfrlo, sub fauce anplialo, labio superiore subfak*^ compress, inferiorit lobis laieralib. obloogis eredif, conneciim police abrupt dilaiiis, f nr?milaie callosa coooriis. ^ — Afflnis S argemtrae, differl folii !•••• peliolatla minus iaci»i*_v supra vii lanaiis, sublus lana subfloccota den»U*ioi* ve<•litis, calyeibos minonbut, corollis lougioribui, lubo lenui etterin, inlusa*W ed- dieulalo Corolla violacca? cilus pubfscen* - Habitat in A>iae mediae v. Indit orientJIM regione Iliasalayana in Luddak, in olle Ca^bmenana ft in Kan*0** fl Kidarkania

<< * IA>ATA Rotb. Flor Ind I 147.- Biñ I c - C aule herbaceo caespitose, bati lanalo, MI oblongo-Uncfoljii« obiu»is inlegri* minute rrenolali*, basi longe aaguftials mgosiMia •, supra laie, *ubiu« den<i>»iroe oneo-lanali*. f ratib. lat>%imi» acuminatis coa)ca<is penisifnub cal)ce« acqoaniib f raremit •ubalm- plicib «illoso-<ite<ais; verticilla*lrn remoiis »ub-<flori«, calycib ca»panulatis foJ labi« superiore truncate bretiier trldeauio, Inferiore bifldo, deollb *cutis, t b i o r>lli» caljcc duplo loog.orib, labo bretiler eiterto sub fauce amp>>«10» l i r i o »>>pvrtor« falcato coapreaao, iafenertf lobis lateralib obloogif eredis; coance

- cdcnluln poslice deflexm abrupte dilalalis, cxlremilale callosa connalis. ^ - < aules c ba»i lignosa plures erecli, basi ramosi foliosi, dense nneo-lanaii, superne flonfen simpliccs, pilis palcnlibus el pubescenlia vmcosa icstili, I-2-pedals. Toha 3-4 poll, el ullra longa, \ix 8-0 lin. laia, nunc intcgemma, saepiui minute crenulaia v. sinuata. Verlicillasln demum 2-3 poll, dislantes. Mores niaRniudme *S. Aclhtoptdti*, calyces el braceae conformes, sed >illos». Corolla eiis pubc-cens, lubo basi altenualo intus gubvilloso el versus medium minuie bidentalo Stylus cxserlus. — 5 *integnfolta* llardw. In Asiat. Res. VI. 310. — *S. cana* Wall Cat no 2145. — *Slenarrhena lanata* D. Don, Prodr. fl. Nepal. 111. — *Salua lanata* Wall IM. As. rar II II I 110 - Habiat in Asiae mediae Jugo Himalaji-nM, in alpbibus summis Ramaoncn<ibu<, Sirraorensibus el Gur*alen<ibu>, in monic elc\alo prope Advance inter Hurdmar el Srinaghur, in Musnoorce el in toto jupo >ulgam.
- 67 *S. CANhsU-^S C A Me>er*, trzchnss d Pflnin. am Caucas. 80 - Blh I. f 718 — laulc herbaceo, basi albo-lanato, foil, lanceolalo-oblongu inlcgrik > sinualo-|nbatl», ba»i longe anguMatis rugosis, supra laie, sublun den<e albo-lanatis, fluralib. latissimis acumtnatis conca\is perstitentib., caljce subbreuonb. racemis ramosis villosa-viscosis; veiiicillastris remotis; calycib. tubuloto-campulalais, labio supenorl iruncato breviler denltlo, ioferiorit dentib. laneeolatis •cuminatis; corollis calyce subtriplo longlorib., tubo breviter euerto, labio »uperlori Kubfalcalo. *Q* — Valde afflnii 5. *pMomdti*, difftri habitu eUUori leniiorl, racemis ramosis flonbusque minoribus paucioribm. — Creicil In rupectrtbai promoniorii Caucasicl versus fluvium Aoticetam el prope acidalam Nartiana.
- OS s STAMINHA Montbr. el Aubc Aon sc. nat. (S. 6ér.) VI. 41. — Caule herbareo credo laxo glutmoso-tillono, basi sublanalo; foil, inflmn petiolalis oalii, basi rotundatis cordatis\c, supenorib amplexicaub. minorib, otnnib eroso-dentati% ruKosissimi^, utriq laic sublanalis, floralib. latusimis oblusis persiMfntib, ca-Ijre MibbrtMionb, rncenus parre ramoKu, verticilla^lns dense 0-IO-floris, ra-Ijcib campanulalis hispidis, labio Huperiore 3-dentato, Inferiore bifido, dentili omnib erectis acutis, corollis cal)cc subduplo longtonb., gentalib risertif ^ — Crccsil in Cappadocia.
00. 8. PIILOMOIDKH Asso, Orjclogr. Arraş; ISA. I. 4. - Roen. Scriplor. pi. lli»p el Lusli. 10.1.1. fig I. - Bib. I. c tftt. - BoU«. Voyage hot. dm le nidi de l'F.t-pagne. p. 483. no. 1301. — Ca«le herbaceo eaesploto, bttl albo^Mftlo; foil, oblongo-lmearlb. lanceolailsve acuii InlegHt v. tatalt staaato-lobstW, ba»l longe angustatis rugosissumls, uirlnq. albo-lanaUs, lortllb. UUtimlt oonnilMIU ron-cavis persistentib, calyce longlorib.; racemls fnbilnpllelb. viHoto-viiC4»tiit verticillastns remotn, calycib. campanulallt, labio luperlore lnoc«lo brevii 3-dentaio, inferioris dentib lanrolatit acuminaiis; corollis calyce tublriplo longiorib., tubo exserto sub fauce >enincoso, labio supenore falcalo compresso, inferior it lobis luterlib oblongis erertm, connectivis poslice delicti* tubdilalalis, cxlremilale callosa connexis ^ — Statura *S. latutiae*. Caulei bail Una laxa, apicr pilis longis pateniibun el pubcsreniia viscosa vesllli. Vfiiicillatrl 2-3 poldres remoll. Folia floralia sublanata (.al)ces pilis longis paleniibus hirsuti, h*u membranacei Corolla extus subglabra, lubo basi lenui inlus nudo Connertna poslice edeutula, fnterdum subanthenrera St)lus exserloi. — 5. *MonlbrtUi* Bib. Anna! des sc natur. (2 Ser) >l 42.) - Habitat in Hispania, copiotc in nonlibus Arragoucsibuk circa Sigucnia, in iiioutibus Uoeticit el in h)ia?
- *, S WMMinil ttllh inn sr nat I V, 1/ M -SuffruUcma' rnuhb erectis bast alb j-nnrifri, «/n nm i. » I/»»«I* Ml Itinrcctlahs.tmfimu in pet.alum an(tu)l tnhl, *uptn nib mt tnto-am/ly i r,iulib, nmtnb rrrmulakt r rfmute e(c ul' rtr, /nrriffi/ /«-s/» nntatM, i uy< tittttns mpra lmr IU/VUI rfcni ht /nrriffi/ /«-s/» nntatM, i uy< tittttns mpra lmr IU/VUI rfcni ht
- lals>tmts nnt is c mans igniifm/i., ru/j/*.* sufmuntih. subtus alba-tan.Mto "I i bulil/"" Sup'ullimur/r, r'it "V i l rahjnh *r "T Edfi cell stu omnib binth acuhssnmi metis cut«Ils taturc duvlo lvnmt tibus ' it' /, tal m .Syiiu

70 S GLR11 OPIUM I I inn. Sjicc. plarilit J) - Dili. I. c. 220. f - {kn*K el Wstsc. The Moral (.alm.ol I. 0. t. I. 5.] — (\ii.k bub.iri'o, basi albo-lanato, Toll, infom rib profunde pmnalihdis, lobis lincarili obtusn smuato-subpinnnhlidi* riuoM!>Miiijis, ulnnq. late lanalis, superiorib submU'K'ns, llnrahb. laiissimi* acu-idiuliN ronca\is per>i>lcnlib., c.iħcc lon^ion!), racemis paniculate, \ctricillnsiris sub-G-floii* di>tantib, suprcrms oborlicnlib; caħnb. tampariulati*, labio »npe-nurc indrnLHo, inferiore bifido, dcnlb omnib laurrolaiis Hfiacci* subspinosi!*; ioro|i> cihcc duplo longionb, lubo incluso \cnlricoM), Libio superior? falralo* coiDprt'Nso, in for ions lobi* latrralib. oblongis creccis, ronm>itm> posiuē defleii* abrupt*¹ dilatilis, cilrciDilatc calloia conr&t\$. I|. — (.aulin pars inrcior ct folia Luii |j|a uiiwa, rarrmus, bracleac el caljccs f>ilis |on^i> .ilbii sraiiiosi^ patonli-bus \oiiti Folia inferior* 7-8-polhcaria, fere ad rnniani pinnatilida \ bipinna-iifida, cosla alala lobUqoe fere omnibus laliludmc subar<|u.ilibm, folia llorali* Mndm icnuia, mioime ruposa glulinosa. (lal)res b.isi niiMiil.raii.icn (nrulla lu-leo-albida, tubus intu« nudus. Conneclna »ub insrrliono supra * drnlata. — *Sclarea ecratophylla* Mill. Dir. no. 8. — *Satna ejraipcrata* I at *Anal nenc* nal. III. 11J. I. 17. cl Icon 0. 3*. I. 5W. — Habtl.it in Orunic in S}na propc Al<TP> propc Ariinatbcam, in Pcma el in Mauritania svd dubia ciu*.

t *Species hujut icctionis dubite v. tnceitae svdts.*

71 ** (.HWr.OIKNs \ahl, Knun. I 27J. - Dili. I. c i>. - l'oll, cordaii* rugotis crenatis, in for i or ib fubxuulis; npiri> lainnti^ lursutisMin s, brarhis rtird.i(io > — Rami oblyse lotraRunl «illo>i>>inn. Kola pi'iiulala bipollic.uis, surMiin scosim nunora, infcnora cordaio-oblonga, »uprnora cordaia ubtu>a, in.nMju.iiiiT cre-nai.i, oinnque rugota villoft, praetertim »ublu« Incana. hpira *spthamaca*, in-frne tiDplicier rainoM. Vertlellasiri approtiroaif, pilis »ordide albis hirsutissim iriflori. Bractcae aUeoalae, eal|ce brevior*, supra glabrac. Ca|) \ *subsesvite* eampaoulaiaa Irideoialttt, deolt superior* otalo. Corollae galea linca-f<lcaia pilota, »iylo brevlor. — Habitat la Aegjpio.

II. S. VABIA Vabl I. c — Bib. I. c — Poll, cordatit Inacqualiler crenais rugoris, MI!IU> cauleq. locaoo-toroenlotii. ^ — Folia petiolala, inpolliraria \ parum iii.ijora, cordaia oraia oblusa, ulrioque ruffo«a, supra oruloann.iii) \ill<>sula p c-liuli sosquipoll carrs. Prdunruli lernnn.nl<^>i irrm. \ rriinlli srxibin I luos >ci-*.i|j s llru trav rordatar acuminaUr, liMi^iliidmc ra>>is (.iħris uii pnJuiculi 11 br.u h'jr iirraui, dcnlbiiK subulal ». (<> lla par\ a, cal} <e parum Imi^ior. *** II ib lal in Armenia.

Sectlo VI. PLETHIOSPHACE BUL io Hook. Bot Misc. III. 373.

Tj|) \ I>|I>JS, labio »upri<>rr supra rnnrato |sulurii*> (ilrni.bus inb>u> lro>*>*** *conu.ventibus*, infenu* b.flduro, drntibu* aruii*. < orolljr |u|m| «ub faure ••* *phatus v ventricosus*, lniu» nanaulalu%, labiutn nuprriu^ r.ica\nni |. fir ato- iumprrs%um, infenvri« lobi lalerlr* oblongi subrrrdi »ubiorii, moiliu> P'aleos rotundJtus, plrrumque conratu* enar|(inalu> rrrnulatu* (.uiinrcii«a poiiice de ^ Octa, abrupt? dilaUia, ritremilalr rallo>a cuiiuaM - lrrrbar Kuroparac, Afrif*⁰ el Boreali-I%iaicae, fulut tarpiot ero>o-dri<iati> |. inn>i<_t racem *cleogatis* •imphcibut % virisato-pahifulalif.

73 h BtCOLOR Df>f. in Fourtr. Journ dc drrou% V,9l - Bib. Labial U^{FB}J*¹ tper in. - Curttv, Bol. ***% I I7H |ic%foui I lor. AH I 24. I & ^ Jcq. Hon. Siboenbr. 1.4.1.7. Pailon, Vagai.tir < r lml IX pag <l. (cul, tab. •i>o. a me aoo ti>a) — Caulc hrrbairo errtto »iibrjiiio<o pub<***crnli-^>*c⁴f0. *fol. indmns* peliulaii* ample O<JU< m<^>« -drni4ii< pinnaiildi* v *palmato-loba- tis, modus* petiolalia ovalo-laoirvUii* a< UIUHUU* incito-drntata, superiorib. »r%<lib. Uftceolalu, oramb. baal rordaii* gluiiuo<u-pubr>reilib. flur.ato- lanrcolaiit aemioatit refletit; rarrni • »ubrai>o<i* rb n;aii<. >rrlrlll*§1^> |i- •on* diftiinriii, cal)cib. pedierllo bretiuub rainpjnuliili »iriaii> gluiiia °\crioN> Hi>, labio taperiore o<aln-rolundalo(drnlb roinitrnlb »ubul*¹ < > deatib. laocrolatit »ubuUo-acuinioali>, corulla cal)ce inplo lool^{lorID}, tubo

cal>cem aequante superno amphalo, labio snenore falcalo compresso, inferiori lobu laierahb. oblonpis ereclis; gemtalib. longe exserlis; connectis police rhomboidco-dilalialis deflexis, extremilale calloga connexis. 2L — Species pnl-cheruroa ac disiincilsilma, affinis *S. Autriacae*. Caulit 2-3-pedaln, parcc ramoHus crassus telragonus, angulis callosis. Folia radicalia saepius palinato-pm-natifida, mine subintegra, cauiina anguMiora rugosa, supra glabnuscua >. piln <panns pluhnosis obsiia, sublui in nemi glulinoso-pilosis. Racemus l'A-2-podilis multifloriis. Pedicelli 4-0 linear longi. Draclejc subnullae. Caljx 4-5-Imeans, pilis» apicc glulinoMi hispulus, labu» palcnlibus, donlibun sclacco-acu-nimalis (ornlla *S Aushiaear*, amplior, labio supenore copiulco-tiokucco punch* nureis, inTeriore camlido, lubus s.iibac(lualis, ||| \cntnrosus, inlus nulcus I il>u nifL'nori> lubus mrdius late o\alus conca\us emarginalus — *S crauifolm i i*]. Horl Malr descr 15 - Jacq Fragn 47 I 00 - llabit.il in Unca boroali in ruiloratiH urbi* Tnigidi« antiquje, propc Salics, Tlemscn, Tanger

74 *S ALGKUIKNSIS* De*f. Fl All I. 2J. I. 3. - Blh. I. c. 231. t - Foil iifrnorib o>ahs crenalis in peliolutn dccurrentib.; cal)db. dentaio-fipinovi« nuUnilius, bracicis rflexa. I). — Caulif ereclun hirsulus leiragonut, angutti obtUMS Iljnn longe virgali erecll. Folia glabra, inkriora ovaio-oblonga crenata oblusa, 2-^r> cerium, lata, 8-10 longa, ID peiolom breuem decorreolia, media et tupenora pauca setsiha lanccolata acula, saepe integerrma. Vertiellttlrl S-4-O-florl dis-imcii. Flores pfdicellaii, ante cl poit floresceniario nutaoiea. Braclcaae ovatae acutac relloxjo faljx hirsulus\$lrriaHM5-donlalui, dcnlibut apicc getarro-ipinoM4, tnbun lupiTi(ribu» brevioribus. Corolla coerulea, magniludinc *S. pratensis* 11-buim suponus ulloMim falcatum compresNiim, infonus tlobum, lobo lutfrmnlio majure contaxo tihmrnii anuita, Irnnsversim pediroalto brcM aflixu Su!<n exoorliis Semini fusta siibroiiliinh, caljrc terti \llinis *S bicohm* DifT.rl Ciuuk¹ birMito, folns o\ato-oiiloi^'is rrcmtis nor cr«Hi» aul »mu Ho-(rcmlis libii.il in Nfru i }or« ill propc Mnane \IK*TUC.

75. *S. LAIKOI* IA \ahl, Kniiiii I 271 ~ ldtl I. c. - Foil remote d«»n(ils glabn*. infenorib. ublongit, bati atlcnualis, superiorib. cotdalit; prdunruli% olongaiis % - Cuiti* herbaceut erectat parcc pilosut purpurareot, tuperne In ram«« llori-foroi divUut. Folia radicalia peiololala, tuperlora itttilla, ft-3-pollraria, obm-nisnima, batl aitenuata acuiutcnia, veaofto-vltloM, lupresa aalaora vtaota, pilig rans<imi« ob«o|eti» adtperea. Pedanaall aaptnic larul vllofl Mhvtocotl. Vcr-ucilla^in rmoil quadriOori. Pedicelll brevlwnl. BraeUae eordae acmlnatan villosae, iiiiu< glabrae, calyce dimldlo brevlortt. Calycet eanpanulalii tritU \illosi bilabiali. Kabium tuperiui adscendent ovalaro aculun, ioferiut bindum, dentibiii si'tarcis Corolla calycc mulio major, galea folcala, apice oculo arnialo MIIS nonnullts ailspvr>a, bljlo brevior. Filamenla propcndcblla. — llabiiiai in TPKHO linpilino.

70. *S. INAMOKNA* \ahl, rnum I 200. - Bth. I. c. S3S. | — Caule bfrbaceo credo ramoso glulinoso-Innpido, Toll peiololalu ample o\aiit inciio-deniarii, ba»i ror-datit bifpidi*, supreme lanccohto-lmeanb, floralib. otalif acummati^ rrllex^ racemi* clongatis iuibramoti*, \erticilla»tris 0-floHi diiUniib; caljcib prdirrilo brevlonb ample campanulalis slnalti hmpidif, labio t«p«nore o%alo, denhb »u-bulatu mbconnnentib., infenon* dentib. lanccolato-tubuULit, ommb brnnb ngidis. corulln calyre duplo longionb f tubo calycem arquante \it ampliato, la-bio suponore Tilmio compreno, infonoriH lobn laieralib. oblongu rrrrti% \ r m mialib \i\ rxsrrlis. COMMON U\I« poMicr drflexn dilatadi. eUremilate rall<j4', Z. nans ^ — i ntali^ CMHLL. tin pctioli, foliorum neni, bractcaae n cahrrn ^ M.H. ipni' uhncuu.S rrrquHMiniH rrr r^n« I*»jii palmir.a ru.l.a. tar.« fore lunnrrm infii i at ill i. Ins, drnllil.us nnjonbu* %ubjngulala, ulmmir rrrr rrrr rrrr rrrr rrrr rrrr. jiri««*irliui Mibluu trabrrlll vm% % il. j, « prominrtibiiH, rimorum llorirfrnriim hnrrroluii., rrrr.r.um p.r.uioilrm, MIJ,ui ta floralia sohHha, lnni dil.li.ila. ptioli nifcricriini longi VtAmu ili 1-t.vl, rrr r r r gati prdicrlli ullu»o-\i»ri)«i 0-tt lm \u|u. (.,u\ | in t rrrr, j% fl j, j. l. l. r

doancatis, deniibus ia spinulam navam subpungcnlem abeuntibus. Corolla magnitudme 5 *Sclareae*, extus pubescens. Achaenia oblon^o-subglobosa laevia. — Habitat in Ui[^]pama.

77 S. LELCAMHERA Visiam, Lionaca XIV. Lileralb. 1J7. — Caule suffrulicoso tetraquetro, foil, peliolalis otali* subcordalite serrate rugosis, floralib lanceolato-cuspidatis calyce subbreviorib. deciduis; racemib teraunalib. pedunculaiis simplicib, verlicillaslrís 9-10-flons; calycib lubulosis pedicello triplo longiorib, labio supenore brevissime tndenlato, denlib. connttenlib coalitiste, infcnons biGdi lanceolate; corollis calyce duplo longiorib, tubo exserto sublus tenlncoso, labus subaequalib., supenore formcato irunralo-emarginato, inferiors lob is lateralib. ovalis plams gubpalulis, medlo majore rolundalo emarginalo, siammum connectivis in feme dilaiaiiis, extremitale ralloa connexis, anlhens st)loq bjrvalo exserlis, lobif sligmallici inaequalib. subulahs 2|. — Hlabit.it 7

7*. S. AUSTRIACA Linn. Syst. veg GO — Blh. 1 e t — Caule hrrbaceo erecto subnudo pubescente; foil, radicalib. peliolalis laic ovalis inU^grrii ero^o-dentatis, basi cordalis roludalis v. cunealis rugosis, supra glabris, subtus pubescentib, caulims paucis sessilib, floralib. ovatis acuminatis cilialis, calycem subaequuntib, racem subramosis; verticillastns subsexfloris, infenonb. distantib, suprcmis approximate; calycib. sub>essilib. campanula* pilosis>imis, labio supenore rntundato, dentib brevi>simis conmentib, inferioru denlib o\alis acuiis, corollis calyce mplo longiorib, lubo subeiserto, raedio conlrado, huca \entncosa intus subnuda, labio supenore falcato coropresso, Inferlo[^]I[^] lobi< lateralib. oblongis erectu, gemlalib. looge exserlis; conuerlms postice abrupte dilaiatis deflexis, extremluie calloia cooexit. 2|. — (aulis 2-3-pedalin subkimpkx cras[^]us, obtuse letragonui, pills rabviieosU pubetens. Folia radnalia J-4 poll, longa el vix anguftflora, terraje appreiM, nenrls iiepe rubeicenlibun, caulinorum paria 1-2 sessilla, S-pollicaria ovala acuta, floralia ovalo-rordaia, 5 linens longa Braealeae pedlcellam subaequantcs, otato-lanceolatae. Pedlcttus 1-2 Im. longus. Calyx 4-5 lio. longus, pilin longis mollibus villosisslmus. Denies labu mferions br(e> ovali, superiores brevissime setacei, medio minimo. Corolla orhrolour.i, o\ius piloso-glulmosa, roagailudine fere *S. pratensis*. — *Sclatra dnlant* Mtuli [^]lelb. — Sa/tia distant Pobj ex Sleud !Somenrl bot rdil I 725 - *S Sriarra* t rantx. Mirp Austr 2J0 non lino) — *S iustnara* J.<c| II \us(r II [^]t 112 — But. Itn; I t 1019 — Habitat in Kuropac onontiliN herbidi*; n.l niir;incN agroruni etc in Austria infrnore, Hungana, Trans)hama_f Molditia, inti r lanaioi ct Anli<etam, circa Elizabethgrad, frequenn in Taunae monlibiK

70 i> LIVDATA C A Ue>cr_v Rnumer plantar rasp <aura* 80 - Hib. I c. 71< — Caule herbaceo erecto subnudo pubrsrenir, foil, radirahb prtmhif** laic o**~ us inlegns eroto-dentatis, basi cordalis rugo>iMimi<_t utnnq \indib subhirtulis. cauliois paucis settilib., floralib. ovatis acuminalis, raljec breviorib, raremts ramosis, verleiHasina 2-fl-flons diflantib.; raljcib. tubsrs%ilib late campanulalif bmpidulit, labii superior!* rotundali deolib brevi>fimi< connivenlib, >ⁿ*~ noris dentib acutis, corollis calyce sublnplo longiorib., tubo subriserto, Ub|^o tuprriore falcato compresso, iofenoris lobit lateralib. oblongii ererth. ~~gen^otaliu'~~ fxsertis, coDDeciivis poMice deflexis dilalai*, extremitate ralloa ronnrxi*. 2 - Ab affioi *S Auitnmca* differ! folits brevionbuc magi* rugtuis, raceroi* ~~pu^oci^ofloris~~ calycibusque latins campaoalatis vix birlis - 4.re>cil in (.aucaso, locis ~~lapidosis~~ mooiiam Talysrb prope pagum MIant.

W. 8. CEftATOPUYLLOIDKb Lion Manl 20 - Blh I. c 232 - C>u|e ~~herbaceo~~ adsceodesle? villoso; foil, oblongi* inci<o-pinnanrid.<, lobii oblongo-~~lanccolatus~~ inciso-deolatii rugosissmis glabrm, suprnorib *ub<r%o%ilib, floralib o%aii* ~~scu-~~ lis. calyce dimidio brevionb. racenis elongatis mibramo*i<. tprticilla>ri< ^{rem0}~ tis 8-6-Oons, calycib pedlclUlia canpanulati* h.>pid.>. labio >uperiore orn> colalo recurvo-paieate, deolib. miniait coomveniib. inferiori* drniib. lanctoiau •wila; eorollta calycc duplo loogiortb., tubo bre>iter ri<rrio sub f<<<*e [^] ntn-coao, labio superiore subfalcalo comprcMo, inferioris lobis lateralib. oblongi*

ereclis • connectivis poslice deflexis rhomboideo-dilataiſ, exiremiale callosa connex'is. 2]. — Rami divaricali adscendentes, pubescencia brevi el pilis longis subreflexis villosi. Folia *S. clandestinae*, sed aucciora, sacpius glabriuscula, rarius longe pilosa. Racemi in cullis ullrapedales, verlicillasri longe remoli. Calyx *S. pratensis*, al minor, vix viscosus. Corolla *S. pratensis* minor, *S. verbenaecae* major, forma *S. prat emit*, lubus inlus nudus. Stylus brevier exserlus, lobo superiore brevissimo. — *Salvia etc.* Arduini, Spec. II. 12. t. 2. — *S. ceralophylla* Ten. Syll. fl. Nap. 21. (non Linn.) - Habiiat in regione mediiterranea ausraliore, in collibus aridis Calabrac, in Sicilia australi, in Aegypto.

81. *S. PRATENSIS* Linn. Spec. planlar. 35. - Blh. I. c. 233. t - C»^{^e} herbacco crecto subsimplici pubescente; foil, radicalib. peliolalis oblongo-ovalis oblusis crenatis incisivc, basi cordatis bullalo-rugosissimis, supra glabris, pcliolis nervisq. sublus pubescenlib., caulinis paucis sessilib., supremis lanceolatis acuminaiis, floralib. cordaio-ovalis, calyce breviorib. subreflexis; racemis viscosis subsimplicib.; verlicillastris sexfloris distanlib.; calycib. subsessilib. catnpanulalis viscoso-villosis, labio superiore ovalo-rolundalo, denlib. brevissimis coonvenlib.; corollis calyce tripio longiorib., tubo subventricoio calycem aequanlc, labio superiore falcalo oompresso, inferioris lobis laleralib. oblongis ereclis; genilalib. exserlis; connectivis poslice rhomboideo-dilalalls deflexis, exlremilale callosa connexis. 2]. — Species statura el pubescencia variabflis, at floribvs maguls coerulecis rarissitne rubentibus aut albis, racemo simpliei Y. ulrinque ramis paucis instrucio, foliis vix incisio cordalis rugosisslmis etc. recognoscuda. Radix inierdum an consunler? Inherosa. Folia sirpe, praeserlim in varielaiibus australioribus, mngis ininusvc sanguineo-maculata. — *Sclarea pratensis* Mill. Did. no. 4. — *Sclarea lubernsa* Mill. Did. no. 12? — *Salvia pratensis* Sm. Engl. Dot. t. 153. — *S. atjrestis* Linn. Amorn. Arad. III. 399? — *S. hoemalodes* Linn. Spec. planlar. 35. - S\ *liarrelieri* Ten. Fl. Nap. I. 0. t. 2. — Scbrank, flort. Monac. I. I. 5. — *S. Tenorei* Spr. Syst. veglab. I. 05. — Swecl, Brit. flow. gard. I. t. 20. — *S. rubicunda* Wenderolh mss. — *S. riryata* Savi, Dot. Elrusc. II. 4. — *S. rariyata* Waldsi. el Kit. ex Willd. Enum. plant, bort. Bcrolio. I. 30. — *S. tricolor* floriul. Habitat In Europac mediae el autiralis berbidls pralis sleds, ad vias etc. vulgari* In Anglia, Galla, HUPanla, LnsiUnla, Germanla, lulla, Graeela, Rossia merldlonali, etiam in promontorlo Caucasleo el propt TIOlm. la Baropa boreall Mil. in floris Scoiicis, Suecicl«v, PelropollUnls etc. destderatur.

82. *S. DLMETOUUM* Andrx. In Bess. Enum. pi. Voibyn. 3. el 40. - Btb. I. c. 234. — Caulc herbacco credo subsimplici pubescente; foil, radlealib. et Infnlis peiiolotis ovatis duplicalo-crenalis, basi profunde crenalis rugosis, ulrinq. glabrii r. huhtus ad IUTVOS el petiolos pubescenlib., caulinis paucis sessilib., laiisslme ronlalo-ovalis acutis, floralib. rolundalo-cordails, calyce breviorib., demum reflexi*; racemis ^ubstimplicib. viscosis; verticillasirii sexfloris remolix; calycib. subsessilib. campanulatis strialis viscoso-villosis, labio superiore ovalo-roiundalo, deolib. brevissimis connvenlib.; corollis calyce subtriplo longiorib., luho ventricoto calycem aequanle, labio superiore falcalo compresso, inferioris luhin laleralib. oblongis ereclis; genilalib. subinclusis; connectivis postice rhomboideo-dilalaliis deflexis, exlremilale callosa connexis. ^ - AS. *prainui* differt foliis minohbus minus rugosis inlegrioribus, inferiorlbut longius peliolalis, caulinti lalioribus, verlicillasri* remolioribus, floribus dimidio miooribus, a *S. tirgaia* Malura humiliore el racemo subsimplici, a *S. campestris* fxemplaribus minoribun veriicilla^lri'i r«'molis visrosin, a *S. nudicauli* el *S. buUata* fuliii. - *S. anrniit* Linn. Amni'ii. ocad. 111. 3W. (sec. Li-deb. Fl. Alt. I. 24. »cd vix ex desrr.) - ||«'- Itital in Asia media, in jugo Allairo, in prali* ad (lumen Tscharysch, in deseno Kirglusiro ad (lumen Nura, in |A||Q (iashnieriana.

83. *S. LI'SITAMCA* Jarq. fil. Krlog. I. 57. I. 3rt. (e\rl. *>n. Valil rl Poir?) • - ||i|, I. c. - Cauk liebnceo credo ||iilo«o-viivoso; foil, radialib. |iriiolalii'. r ^{auliniv} paucis amplexraulib., omnib. IrianRulari-ovalis, DOM iruncalis subordalu ^{aculiv}

inciso-dentata rugosissima, supra glabris, subtus villosis, floralibus ovatis acuminatis calyces aequantibus; ramis ramosis; verticillis sexfloris distantibus: calycibus subsessilibus campanulatis striatis hispidis subvenosis, labio superiore into rotunda!, dentibus brevissimis conniventibus; corollis calyce duplo longioribus, labio incluso venuloso, labio superiore falcato compresso, inferioris lobis lateralibus oblongis erectis; connectivis postico rhomboido-dilatatis dodecaxi, extrorsum miliale callosa connatis. 2]. — *Salvia Lusitania* Mill. Diet. no. 3? — Habitat in peninsula Hispanica?

84. S. VIRGATA Ait Hort. Kew. (ed. 1.) I. 30. - Bib. I. c. - Caulis herbaceo credo ramoso pubescenti-villoso; foliis, radicalibus petiolaribus ovatis, basi cordatis, caulinis inferioribus breviter petiolaribus amplis ovalo-oblongis, basi rotundatis, cordatis, superioribus arctius sessilibus rotundatis, supremis cordato-amplexicaulibus acuminatis, omnibus eroso-crenatis rugosis, supra glabriusculis, subtus ad nervos pubescentibus. v. hispidis, floralibus ovato-acuminatis subreflexis, calyce brevioribus; racemis ramosis elongatis; verticillis sexfloris distantibus; calycibus breviter pedicellatis campanulatis striatis villosis-viscosis, labio superiore lato rotundato recurvo-palente, dentibus minimis conniventibus; corollis calyce duplo longioribus, labio incluso subventricoso, labio superiore falcato compresso, inferioris lobis lateralibus oblongis erectis; connectivis postice rhomboido-dilatatis deltoideis, extremitate callosa connatis. ^ - A.S. *pratensis* differt pinniculi maxima (2-4-pedali), ramis elongatis paucifloris, foliis amplis et floribus multo minoribus; a 5. *Sibthorpii* (cujus varietates hortensae faepe buic similes) sialura elatior, verticillis rempita, calycibus et foliis floralibus viscosis vix coloratis et floribus majoribus. Specimina silvestria Talde hispida. - *S. virgata* Jarq. Hort. Vindob. I. 14. L. 37. — 5. *Tiberina* Maori mst. — 5. *Garganica* Ten. Indx. semin. hort. Nap. 18V — 5. *emduea* Horn. Hort. Hafn. I. 30? — 5. *amplexicauli** Lam. Illotr. geogr. I. 0? — 5. infra Spr. Syst. tegel. IV. Cur. poster. 17. — 5. *Caucasicum* Schreb. In Syll. pi. soc. Rallsb. II. 98t — 5. *affinis* Spr. — Steud. Nomencl. bot. (edit. I.) 725? — 5. *Bauhini*, *Barrelieri*, *quercifolia*, *Taurica*, *Turina* etc. Hortul. — Habitat in Italia, Romae, in praesens (Jargani).
85. S. VISCOSA Jacq. Misc. II. 32i, Icon. rar. I. 2. I. 5. - Dili. I. f. 11. * - «caule in herbis erecto «isoso-pubescentibus; foliis petiolaribus laevibus ovatis crenatis subsinuatis, basi cordatis rugosis, utrinque villosulis viscosis, superioribus sessilibus, floralibus rotundatis, calyce duplo brevioribus; ramis elongatis ramosis; verticillis multifloris subobovatis; calycibus campanulatis viscoso-villosis, labio superiore nervoso-rotundo subrecurvo-palente, dentibus minimis conniventibus; corollis calyce triplo longioribus, labio emerto, sub fauce venuloso, labio superioris falcato compresso, inferioris lobis lateralibus oblongis erectis; connectivis postice deflexis rhomboido-dilatatis, extrorsum miliale callosa connatis. "4 — Kt omni pane viscoso-pubescentis. Caulis elatus 3-pedalis t. ultra, superne pariter foliosus paniculatus. Kolia radialis A poll, longa, 4-5 lata, raulina inferiora 3-4 poll, longa, f. > ala* supralora multo minora lala sub«esilia, omnia irregulariter crenulata v. sinuata, nec incisa. Halice* subsettites 2-3 lin. longi. fructiferi 4 lin., ampk campanulati. Ubio superiore supra talde Concato. Torolla 8-9 lin. longa coerulea, «J. is slabra. Stylus fisertus, lobo superioris brevioris. Affinis V. *virginata*, ed/01, is liis itelegantibus et micollate differt. — Habitat in Europa australi, in Hispania? in Italia, ad Calabram et Serra prope Kdr.
86. S. RIGOSA Thobrg. Prodr. D. Tapr. 07. - Bib. I. c. - Caulis berberis anaeendeote tillotstimo; foliis petiolaribus ovatis * oblongo-linearibus obtusis, dentatis, basi cordatis bollato-rugosis «imi«. utrinque pubescentibus, floralibus oblongo-ovalis acutis, calyce abbrevioribus; ramis «ubramosis; verticillis multifloris; calycibus campanulatis glabris «illo%U »trialis«. labio * uperio orbiculato recurvo, dtollibus minime connatis; ramis calyce duplo longioribus, Itbo calycem aequante sub fauce teotnco»o(Ubio «uprioris »teclo, Inrrr bis lateralibus ovalis ortella; connectivis postice deflexis abrupte dilatatis. extrorsum miliale callosa connatis. * - A S. *diseruali* diitincta est foliorum forma, raiyriu

ninioribus ample campanula^{^*} nee ovaio-lubulosis el corollis (ut in ca albidis) fore duplo maioribus, flonbus *S. pralenstt*, tamen paullo minoribus. — Habitat In Promonlono bonac spci.

87. *S. DISKMA* Linn. Spec, plantar. 30. — Dlh. I. c. 236. — Caulc herbaceo, basi proiumbentc, ranns adscendenlib. glulinoso-villosis; Toll, inrcrionb. peliolati*, supenonb. subsessilib., omb. oblongo-lanceolalis erosis, basi rotundahs > cordatis, utriq. gluiinoso-tillosis, floralib. laic ovalis aculis, calycem subacquatib; racemis bubromosis, \eriicilla>In> 0-10-florU remolis; caljicib. ovaio-lubulosis gluimoso-villobis sinalis, labio siipiorc orbiculalo recurvo, denlib. minute louimenlib, inferiors denlib. lanceolalis aculit»; corollis* caljccm broiler superioraniib, tubo caljctm acunnlc, sub faucc >enlnoso, labio supenore redo, inferiuris lobis laleralil). exalts crocus, medio rolundato emarpmato-palcnlc, connrcnis posicc dollexis abrupte dilalatis, exlrcrailalc callosa approximate \. toinccxis I|. — Aflims *S. xcrbenacae*, longtfoltac el *S. clandestnae* \aric(aiil>u> niijorilHis, diffTerl Mlusiat omnium parlium, ciain foliorum paguic Miprioris, cnule basi protunibeitc, folns angu>lionbus cras>ionbus eroM>, nrc cruias ui in *S. inbenaca* nee incisio ul ID *S. elandestma*, calycibus tnajoribu», coroll n* tubo araplion, tabus brMoribus eic. Corolla albida. — *Mormntum ducrmw* Moench, Itteth. — Habitat ad Capul bonae ipci.
88. *S. SIUTHOIIPII* Sm. el Sibih. Flor. Graec. 1.17. t.22. — fith. I. e. - Caulc herbacco credo, supcrno tubpamculalo villosio; foil, radicalib. pellolalls amplis, iu-pvnorib. icssilib., omb. o>alia grotse duplicalo-ercnalis sublnclitU, supra glabria ruRosis, subtus \lloslsf flomllb. roluodalu acuminalis subcoloralls, caljic brcMunb, raceme clongaiis brachialls ramosis subcanescentlib.; verticilla^trisi uumeroM!> distinctii 0-10-florm; caljicib. lubuloso-campanulalis molliter \illo>id, labio supenore orbiculaio recur>o, dentib. minimis connenlib, infenuru dcnub lanceol U> aiutisbimib, corollis raljcc \ix duplo longionb., lubo exsrrlo »ub fauro \euincoMj, Ijbio supcriure subfalcalo tfubcompre>so, inforions l>ik* latcrnhh oMon^o-liiuant. >subcreclii, connects\% police defleii^ abrupte dilalati», cxinmuatc callosa ronnel!>. ^ — *S. sylintn* el *S. nrgatae* valdc a01 nin a priori diffTct caule minus folioso villoiiurc, foliis amplionbus (Infcnoribus 0-0 pull, longis, 3-4 lam), racemis eloogaiis virgatis; aS.virfol* terticUlaslril mag.> approilmalii numerosioribus, calycibus paullo majoribu ti foliit floralibut sacpiu* membraoacea coloraUs. In bortltt elauor tl ramoslor ttttdK ti i<U# *S. virgata** sirail.or. - *s. tamputri** M. Bleb. Flor. Taur. Cwcat. L ». « UL tt. - ftebb Plant, critic. VI. tl. 1. 920. - 8. *hypmUom* Ante. ««. ei B«M. Bourn, pi. Podol* 3. - *S. mollts* Jacq. 01. Eel. I. 56. L 37? - *S. mpUwifuUs*, *BarrtUtn*, (*auca-stca*, *Taunca*, *vtrgata* etc. llorlul. — Dabital in Buropae medilertrneaa orientals el in regions Poniicac campis graminosis ad vias, In GraccUe monte Parnan>o, in Pvloponneso el in Zncjntho, In Insula Scjro, in Podolia auslraili, in »)l\i> UulKariac prope Sisopolin, prope Ineadam el Sm}ruam, in Tauria montosa orrientali, cirta hoba>(opolin.
89. *s. SYLIKbTHIS* Linn. Spcr. planUr. 34. - Dtb. I. c. 237. f - Caulc herbaceo erecto, supcrnr pamculalo, foil, infvriorib. peliolatis, luperiorib. sessilib, omb. oblongo-lanceolalis crenatu, basi roiundalis v. sacpius cordalis PUKOHII iu,ra glabris, subius pallidionb. pubescenlib. Y. canescenlib., Ooralib. orbiculatls acuminuiis coloratis, cal)ceff subacquanib, ante anhesiu fmbrcalis, pon amhesin feubrelli>xts; roc cm is cloiiKaiis subramotis, \erUclllaslria 6-10-florfi dUlinrii* caljicib. o\ato-lubulosis labio supenore orbiculaio recurvo broimrne Indentaio* corollis cal)ce duplo loiiKionb, tubo cal)cem subacquanle, sub faucc an.,I.a. % labio supcriore subrrrio, inferiors lobis lalralib. oblongis ereclis conn'it''' cdi-ntuhs posiare abrupte dilalalm, citrcnllaic callona connui. ^ - s>*''V* elM statura rt nllosiatic ^anabiliti, di>iincti>sima liabitu. Caulis nunn' fcc'-' dal.s, nunc ir.pedalis n ultra, opicc ramis bractnati* panirulalu*. leira *onus flā'' ber pub>cen< \ HIIOMII Folia narpius pan a vu t-polhraria, inirrdun ^'' 3-4-pol.icirucl ultra, iifcriura wrp.us puiolala et tnlma baM pjrum vcto angustata,

superiors sessilia, saepius cordato-amplexicaulum, omnia rugosa magis* ruinosius
 xillosa et *ubius canescentia, marpne simplintr Y. duplicato-crenata nee mcio,
 apice sacpiu> acutiuscula. Verticillastri inferiori* sacpni* semipollicin ditan-
 ies, supremi raagis approximati Calyces 3 iin. longi ttnati, nunc glabnutculi,
 saepius m.igis minuste \illosi, apice colorali. Corollae purpmeo-Molaceae. Tu-
 hus sub fauce pa rum venlnosu*, mlus nudu». Libium supenu** concauim. St)-
 lu« breviter exserlus. — *Sclarea Syriaca* Mill. Diet. no 5. — *Sclarea nemorota*
 Mill. Diet. no. 6. — *Sclarea tylistrit* Mill. Diet. no. 7. — *Sclarea punctata* Murrh.
 Mclb. — *Salvia nemorosa* Linn. Spec. plantar. 35. - *Iteichh* Plant. critic. \ I. 10.
 I. 320. - *S. sykitru* Jacq. Fl. Austr. III. 7. t. 212. - *Beichb.* I c. >1. 20. t. 527.
 — *V. deserla* Schangin in Ledeb. Cal. borl. Dorp 1824 p 0. — *Ilpichh.* I. r. >!
 21 t 528. - *S. Valentino* Vahl, Enum. pi. I. 2W. - *V. data* Host, H. Amir I S4.
 (an Ten. S)ll. fl. IS a p. 18?) — 5. *amplexicaula* Lam. Illustr. gener. I. 08? — *S.*
alpestris, aspmla, Taurina etc, florul. — Habitat in Kuropac onentalis el me-
 ndionalis el Asia© mediae campis herbidd, in Graecia, in Hos^ia australi, Tre-
 quent a Taona el i^ucaso usque ad Zmeiov el fliniuni Iri)»cb el irans Ilium,
 eliam In Persia.

90 S. PE.>DILA Vahl, Enumer. plant. I. 2^1. — Bñ. I c. 238. | — Caule herharm
 crecto >iloso; foil. inOmis pcliolatis, tupremis »r<iilib, oromb. oblonRo-lan-
 ccolalis obfjsis duplicato-crenatis, basi tubordatis rugu»is pubescenlib, (loia-
 lib. orbiculalu acuroinalis, calyce duplo bri*%iorib. persistentib. r>'flexis; rareraï*
 subramo\$î5, apice subnutanlib.; ^frticillafina (J-10-floris di>tincli»; ralycib. tu-
 bulosis pubckreniib., labio superiors orbicalalo palenle bre\issimc 3-dcnlalo,
 corolhs calyce duplo longiorib.; lubo lobexserto, tub fauce veolncoso, labio su-
 penore palenle anbfalcato, idferioria lobia laieralib. oblongia ererlis; connectiv^
 aupra denUlis, poalice deOeiia abrnple dilautia, eilremilalo calloaa connexis. "Ar
 — A 5. *mmimmJ** dlftlett oaole folioto, follia aogiuioribut breuiua peiolam, ra-
 eemis panels eloDgalis lails, floriboa dopio majoribos, lobo corolla« bast atie-
 noaio, aupra medium Ineanro, anbtos venirieoao el folils Ooralibaa dimidlam
 cal)cem aequanlibus; a 5. *tylistri* raemis TIK ramosis nuianlibus, Coins flora-
 libun minonbus, floribtia majoribua. — *S. Cren|entceM*%\$* Be<*. Enum. plant. Volli.
 40. — *S. belonicarfolim* Eill. Salv. 49. — Habitat in Europa orienlah, in Transjl-
 \ania rt in Podolia.

91 s. M TA>S Linn. Spec plantar. 39. — Dili I c. f — Caule herbaceo pubescentie
 subnud», full subradicalib. longe pNiolalis o*alo- oblongis duplirAto-crcnali**,
 h>v< subordati* rugoot, floraiib. roinutis orbiculilil, ratomin nbbromtn longe
 pcdunrulatis paniculalK, per antbc<in nulanlib, «eriicilla%tri4 sub-0-flon* ap-
 pronmaiK, cjljnb. rrflexii pubocentib., labio «uperiore o>alo rulundalo, supra
 concavo brr>i><ime Iridentalo; corolhs calyce duplo longiorib, tubo aequah ra-
 lycem aequante, labio superiore recto patenle, inferiors lobm lateralib obloogia
 erecti*; cooneclms poslire deflens dilatali», eulrrmiiale callo*a conneiK. 4 •
 Cauhs 3-3-pfdali* subsimplrx leUagonna, aoguli albidu rall»M, ^upcriu* angusK*
 panicalaloi. Folia panel, Infima com peliolo 7-9 polhres longa, obtu«a irre-
 RaUnter crenala, supra glabnuseuU, »ublos molliirr pube*reuaa % lomenioaa,
 superiors paucissima, longe rënoia, ad ramificalione* pauculae mmaia, lance o | ?
 lato-lioraria, floraha pedirellis breiiora >illo»a H ace mi npiraeformie», 1-1/«
 pnlhccm longi. Calyi tkt 2 ho. longu« sirialu*. i orolla tiolarra, 4-5 Im. loiil<-
 Labium supertoi infer lore longiu», rilus lenuiier pubrcnncn Tubu* iniusomli®
 nudut. Stamina corolla breiiora. Connrcuva edrniula Mylu* brrrtier rî*JJJ!f
 aub Itnio trnuiaalme pubeteros, apice «ubulato-bilidu». - *S. beionuaefoha* & .
 lio«. Rtlf. 49. - *S. kastalM* Ellling, Sah 48 - s' pmMa Bes* Fl<r C<ain C.
 (oaa ViMj. - 5. N<|«M WaldsL el kit PL. rar Iluncar I 6J I 02. - BPI.
 L ii». - *S. acuiifokm* Urn. Illvai. gen. I. (KL - Habitat in Kuropa in
 Fodolia el tialieia, Hoogaria etTraaayhaau. Be»»arabia fepirniriooali, »• f* m p i s
 taslit <d Tanaim el Borysibenem el abund« in eoldbus apr.c.t Tauriae, p r o e
 Odttsan, in moanboa Taljsrb prope pagum hoirs.

- 02 S SCLAREOIDES Brot. Ptayogr. Lusit. 3. t. 2. ct Flor. Lusit I. 17. - Bib. I c. 710 — Caule herbaceo erecto aobsimplici piloso; Toll, radicalib. pelloalla oblongo-ovain oblongis crenatis subincisive, basi cordatis bullato-rugosissimis, supra glabris, pectiolis nervi* q. subulis pilosis, caulis paucis sessilib., supremis lanceolatis acuminais, floralib. cordato-ovalis, calyce brevioribus subreflexis, ramis viscosis subsimplicibus; calycibus subsessilib. campanulas viscoso-villosas, in basi superiore ovato-rotundato, denique brevissimis connatis; corollis calyce duplo longioribus, tubo subveninoso calycem aequante, labio superiore falcato compresso, inferioribus lobis lateralibus oblongis erectis, gemmalibus vix exsertis; connatis postice rhomboideo-dilatatis deflexis, exsertis ralloso connatis. 2L — A *S. pralensis* non differit nisi floribus minoribus. Habitus 5. *elandestinar*, sed foliis distincta, a *S. Stblhorptt* differit racemis brevioribus viscosis paucis et foliis minoribus. — *S. bullata* Schousboe mss. ex Vahl, Enum. plant I 203. — Dili 1 c 2J9 — *S. Lusitanica* Poir. Diet VI. 000? (non Jacq.) — *S. elongata* Spr. Pugill plant, rain. cogn. I. 43. — ubi in Europae mediterraneae regionibus australibus, in Lusitania et in Italia cum *S. pratensis*, *S. clandestina* ab auctore confusa?
- 03 S. BAETICA Bolss. Elenh. plant, novar. Hisp. no. 157. et Voyage bot dans le midi de l'Etp. 485. no. 1303. f — Caule simpliciter ramuloso glanduloso-blanco; foliis omnibus radicalibus pectiolatis oblongis oppositis crenatis, nervis spartibus birtellibus; bracteis triangularibus calyce brevioribus reflexis verticillatis 4-4-lobis diotantibus; calycibus subsessilibus bilabellibus viscoso-tillosis tubo superiori breviter tridentatis, denique connatis, inferioribus lobis bidentatis; corollae rubro-fuscae calyce duplo longioribus labio superiore valde porrecto falcato compresso, inferius nullo brevioribus lobis oblongis; connatis postice rhomboideo-dilatatis deflexis, exsertis ralloso connatis. — Folia radicalia 3-4-pollicana, 1/2 poll. et amplius lata, caulina nulla aut pauca lancolata sessilia. — Habitat in umbratis regionibus calidis, in Hispania australi (in regno Granatensi, in regione Daetica prope Gadec).
04. 8. MDICALLIS Vahl, Eooner. plant. I. 9B0. - Bib. I. e. 830. - Caule herbaceo erecto subnudo incano-tilloso; foliis, tubradicalibus pectiolatis oblongo-tinartibus lanceolatis acutis ovato-dentatis, basi lobatis bullato-mugosistibus, supra glabris, subtus caetentibus. Antheris, Boralibus. Oculis, calyce brevioribus subreflexis persistentibus; ramentis albidis. ramentis verticillatis setulosis distantibus, calycibus sessilibus. catenulae viscosae filiculis, labio superiore ovato-rotundato, dentibus brevissimis connatis, inferioribus lobis, corollis calyce nullo longioribus, labio superiore falcato compresso, inferioribus lobis lateralibus oblongis erectis. — Valde affinis *S. onchitis*. Differit foliis antheris ramentibus ovato-dentatis. — *S. merjamit* Forsk. Flor. Aeg. Arab. 10 - *S. Aabytmca* Linn. 11. Suppl. 88? — Habitat in Arabia.
- 05 S. VEBBENACA Linn. Spec, plantar. 35. - Bib. I. c. - Caule herbaceo erecto pubescente v. villosa; foliis, ovatis oblongis ovatis rugosis glabris, inferioribus longe pectiolatis, basi angustatis, superioribus latioribus sessilibus, basi cordatis, floralibus ovato-rotundatis acuminatis villosis persistentibus, calyce subreflexo, post anthesin reflexis; racemis elongatis simpliciter subramosis; verticillatis remotis 5-natis; calycibus ovatis birsatis, labio superiore orbiculato recurvo-paenante, denique mimis connatis; corollis calyce dimidio longioribus, tubo calycem aequante, tubo veninoso, labio superiore falcato recurvo, inferioribus lobis lateralibus oblongis erectis; connatis postice rhomboideo-dilatatis deflexis abrupte dilatatis, exsertis ralloso connatis. — Caulis 2-podalicus vel ulira, minutus villosus, ramentibus ramentibus. Folia sarpius 1-4-pollicana, 1-2 poll. lata, lobis ramentibus ad medium aitim-gentilibus. Racemi axis floralibus natis ramentibus empressis villosis (Mugosistibus) ramentibus, lobis antheris natis, nervis uli Tolia floralibus col. ramentibus (tallibus, ramentibus) ramentibus, ramentibus albidis, magnitudinis corollae S. ramentibus.

est *S. dandeslinac*, quacum forsnn conjongenda. — *Horminum verbenaceum* Mill. Did. no. 1. — *S. Spielmanni* Willd. Enum. pi. borl. Dcrol. 38. — *S. Spietmanniana* M. Hieb. Fl. Taur. Cauc. I. 21. — 5. *illyrica* Schull. Obs. Hot. 8. — *N. micrantha* Desf. Cat. hort. Par.? (non Vahl.). — *S. verbenaca* Curt. Fl. Lund. III. ic. — *S. horminoidc** Pourr. Act. Tolos. III. 327. — *S. liyzanlina, hcterophylla etc.* Ilorlul. /?. *oblongifolia*: foil, oblongis crenaii*, vix incis. — *S. oblongata* Vahl, Enum. plant. I. 250. — *S. belonicaefolia* Lam. Must. gen. I. 70. (non Kill) ?? *incita*: Toll, late ovalis incis, lobis ovalis acutis .ipproiimalis. — Habitat in Europa septentrionali cl media, in Rossia Europacn, ad sepcs cirra Uy-zantium, in Caucaso cl Tauria, fl. in hortis culla, y. in Kuropa media el aus-Iraliori, ad Tolosam in Gallia?

00. *S. CLAMDESTINA* Linn. Spec. plaolar. 30. (non ejusd. berb.). - Dlh. I. r. 2J0. cl 710. — Caulc herbaceo erecto pubescente v. villosa; Toll ovato-oMongis inciso-denlatis pinnalifldisve rugosis glabris, inferiorib. pctiolatis, bnsi anguslalis Iruocalis • subcordalis, floralib. ovalo-rolundalis acuminatis villosis persistenlib., calyce subbreYiorib., post nthesin rcediis persistenlib.; racemis nimplicib. f. subramosis; verlicillaslril inferiorib. remotis, suprcmis approiimaiis suhsex-floris; cañrib. ovalis binulis, labio superiore orbiculato, dentib. minimi* conuiventib.; corollis calyce duplo longiorib., labio supriore subfolcato concavo, inferioris lobis laleralib. oblongis erectis; connectivi* postice deflectis, ahrupto dil.italis, extremilalc callosa approiimalis v. cnnneiin. % — *Sclarea decidu** Mocnch, Mclb. — *S. terbtaca* Vahl, Eoumer. plant. I. 2U. — Rchb. IMml. cri-lir. VI. 17. I. 531 - *S. rerbrnaroide** BroU Fl. Lu»it. I. 17. - *S. potymorphn* llffm. el Link. Flor. Porlog. I. MO. L 10. - Rchb. I. c. 18. t <4. fig. 710. - >• *acutala* Link el BroL Phyl Laall — 5. *toUina* Lowe, PriraiU flor. iladerens. 19. — *S. obtutaU* Llok et BroL I. c — 5. *p*rvilora* Link ex BroL I. c. (non Vahl) — 5. *cia*de*%oid*§* Llok, Jabrb. III. 100. - *S. pratea** Savl, Fl. Pis. I. tt. - 5. *pallidiflor** Si. An. Pl. Agen. la — 5. *vartabiH** tar. Lois. Fl. Gall. (ed. 8.) I. 10. — 5. *oblongata* Bebb. I. c. 10. L 382. non Vahl. — 5. *micrantha* De»r. Cat. hort. Par. (ex Rchb. I. e. non Vahl). — 5. *Yivianiü* Spr. in Sicb. Pl. Apul. el Calabr. r| Rchb. I. C.

09. *mullifüia*: foil, profunde inciso-pinnlifidii, lobis ovato-oMnngis. — *S. mullifitta* Siblbrp. et Sm. Flor. Grace. I. 17. (. 21. - Krhb. I. r. IS. L V24 fig. 720. — *llnrminum ele.* Barr. Ic. rar. 24. I. 2IX). — *S. cUindntina* Vahl, Knuraer. Pl.inl. I. 2M. - Rchb. Planl. crilic. VI. K I. 51)* - *S. Inn mat a* Willd. Knuffl. hori. Berol. Snppl. 2. - *S. erosa* Desf. Cal. horl. Par. (x - l>oir. Did. SuppK V. 40. I - *N. eeralophyllotdrs* Willd. Enum. horl. Rrrol. I. 207. n Rchb. L C - *S. erratophylla* C. A. Mcy. Ven. dcr Pfl. am Caur. OEP (non Linn.) - llabliat in Europae aoslralis el Africa*? boreali* apricin, ad »ia« clc, in Lusitania, llmpaovia, Gallia aastrali, in Italia omni, Sicilio, Sardim.i n Isiria, Palmalia, ad Byranlium, Smyrnas, in Syria prope Aleppo, in moniibus Taly»cb propo pagum Snanl cl circa pagoi versus man* Ci<piura.

07. *S. ALGOSISSIMA* Zuccariai, Abbaodl. d. MONrh. Akad. d. Wi«rn«fh. (Mallj-Pby». Klatie, III. 244. t l. 7. - Caule herbarco hinuio; foil, pctiolaiis P^{lnna} seciis, >egmeQiis lieoanb. oblois crenaii« bullaio-Yugosi*mmi4 lomrniosft-nlr^{to} inaequalib., Ooralib. minimi ses»ilib. o^alo-roitindali*; verilirilla»tri« 0-10-Oon di«taniib.; calycib. obovalis lanaio-pi|n«i«, labio nuprriori obo«aio n>tundalo re* eunro - pairnie, dentib. parti* connitrnnn.; conncrii»o po»tice defleio irunca^{to} ^ — Habitat io Palarttioa prope llirr>*olyrna*.

V. *S. COSTROVERSA* Teo. 8)11. B. >ap. IH. - Rih. I. c. 241. cl 719. - <*>> n^ barco pabescenie f. tilloio; foil, nblongi* memo -pinnatifldi*, lobis ol>|ol^f l|f lincariib. oblusisslnis iociso-crenaii« bullalo - rugo%iMiroi« manc,he .h re ^ a i o - f oiring. pilosulis. ioferiorib. peliolaii*. «uprriorib. U-MIID. , nor»ll^jjcillaf roiuudjti* acaminalis villosis, calyce tit bre^ionb.; rarrmi* ramosis; »e^e tis pili^ «n» 5-io.floris, inferiorib. remolis, suprrmtt appronmati*; calyf*b. ©ta dentib. l>»g«>timU hirtuio-lanalis, labio suprrtorr orbiculaio recurto-paicnie,

rainimis connivenlib.; corollis calyce breviorib. v. dimidio longiorib.; connecimis poshec dellexis abrupte dilatatis, extremitate callosa approximalis v. connexis. 2l. — *S. claudettinae* habitu simillima, at saepius humilior ramostor. Folia magis inciJa, lobd fero ad coslara ailingentibus oblusissimis el ut in *S. ceraluphylla* bullato-rugosissimiis, ulrinque pilis longis raris sparsis el ad nervos puboccn-tia brevi veslitis. Hacemi pilis longissimis albis villosissimi nee viscosi. Caljces subsessilcs, posl antlicsin dcflexi, forma *S. verbenacae*. Corollae in specimimbus hjlveslnbus plcrumquo in fundo calycis minulissimae inaperlae, at genilalia per-fecta includenlcs. Otani lobi maximi. Achaenia malura pallida lacvia subinflaia. — *S. lanigera* Poir. Diet. Suppl. V. 48. (exempt, majora horlcnbia). — *S. claudct-Una* Linn. Herb. (non cjusd. Spec. 30.) — Siblhrp. el Sm. Flor. (iraec. I. fl. t. 21. — Habitat in redone mediterranca ausraliori in Hispania, Calabria, insula C)-pro, S)na prope Aleppo, in Africac dc»erto Magnac Sjrlcos, in Acittplo H ad Capul bonac spci.

£. *grandiflora* Dth. 1. c 710. — Corollis calyce plus duplo longionbus. - In maniimis prope Jaffa habital.

00. *S. DKSEUTI* Dene. Annal. des sc. natur. (9. Sér.) 1834. II. 948. - Dlh. I. c. 710. — Suffruticosa tncana: ramis dlvarlcatis pubescantib.; foil, partis paucis oblon-gis petiolaiis crenatis bullalo-mgols, nargina raflatlt caoo-pubescent ib., flo-ralib. parvis, supremis minimis; vertloiliaslrls 2-6-Doris dlstantib.; calyclb. otato-campanulaiis pilis longisiimit birsulls, labio superiore tridentato, inforiore bideniato, denlib. omnib. subaequalib. v. superiore minore. % — Calyces fere *V. controvenae*, ted denies labii superioris vix connivent — Habitat in deserto Sinaico. — Species ob (lores deficientes dubia.

100. *S. M'IUV AK*. Horl. Kew. (ed. 1) 1. 42? - Bib. I. c. 242. - Caulc herbaceo crocio MIONO ramoscente; full, infenonb. longe >ciolalis, superionb. K'SMIU. v. cordalo-amplrxicauhb., omnib. oblongo-o\alis lanccolatis^c oblusic« %. acu-minaiis, irregulantor crenalis orosiwe, basi cordatis rui;osis!>imiK, supra irinnirr pubesceniib., subiu< cano-lom«'nlom< sublanatis; racemis \illomft>inus drnsi< ramosis; tcrlicilla*iris sexflons approximat; calycib. ovatis nolhssime hirsulo-lanatis, labio superiore orbiculalo recurvo-patenta, daatib. minimis conni^eniib; corollis calyca subduplo longiorib.; labio superiara falcalo anbeoapretaa, Infr-rrioris lobls U ten lib. oblongU erecUs; cannaeUvta poiUea deleiit abrupte di-latatis, exiremiate callosa approimatla v. eoonetlf. % — Habllas 5. *vrhimaca**. Folia fere *S. tyvettru*. Raceno ei floribus *S. 9*m\$M\$r—\$* affinit, aed caulis elaiior el racemus ramoslor denslor. — Bablut In Abyssinia at In Nubia.

| *Species sectionis hujm dubia** t. *4nc9rta\$ s\$dit.*

101. *S. BAHKKLU*.Hl Killing, SAW. 40. ex Vahl, Enum. plant. 1. 200. (non Ten.) — Dlh. I. c. 24J. - Foil, ha^ialo-ianecolails Inaequaliter serralisi caule folioao credo. V - Caulis creclus bicubitalis. Folia petiolata baslato-gcplemtobat.i, lobo medio producio lanccolalo, acuta hirsuta. Bracieaa panrae ovatae ciliaiAo acutae. Veriicilli sexflori. Caljx >illosus 5-denUtUf. — An *S. bicolor*? — Habitat la Uispania.

102. 8. *PARVIFLORA* Vabl, Enum. plant. 1.908. - Ltibili. lean, plant S)r. rar. dcr. IV. 13. t. 7. — Dlb. I. c. «3. - Foil, cordaio-atatis crenatis rugosis; raremit terminalih. rompoiilis; braceis cordate calyce brctioribus. % — (Uulis erertut aesquipcillalis subincanus. Folia cordato-oblonga venosa rugosa tirdl - cinrrn»-crniia cronaiia, kiibus \illosula, supmora Kessiba. Veriicilli flortbus subpr<jlI cellali«2-0-flori, braceis otalm acuiis \\\ calycis longitudine. Calyx lornmioMu »ubincanu», dimidio corolla broviur. Corolla Kubtomenlosa flavescens, labio MI-penore rt'ciiisculo subemari(in.ito, Inrcriore tnlobo, lobo medio suborbicuUia* b'lamina Libio supenore incluta, pedicello fllamrniorum brevi, fl)lort%rrio. s_o ' . mina 4, bma umcumvc abornna. Alias ul in c«nR«-neribu«. K* ir.,i_M. |.ii.,n,r dien affim* udclur *S. sylvicln*, vx h|ir(imtno Tournefiirtiano in hrrbmu ll.n.u'' siano senalo v| MC nminalo *S. rrbtname* >ar r^d In lwtl ir,, \sii

«• * »! . in in r i . inn i nl* fl mo d« t %\ 71'

Simillima videitur *S. JVuftiae*, sed calycibus lomenosis subincanis discrepal. — Habitat 10 Onenie, in Sjna juxta Damascus in monte Dgebcl Cher dicto.

Sectio VII. MCBOSPHACE Bth. ID Hook. Bot. Misc. III. 374.

Calyx ovalis, labio superiore inegro. Corolla minima, tubo incluso inu< rx-annulato, labiis brevissimis, superiore erecto, inferioris lobis lalcralibus pateniibus. (onnecliva postice deflexa Imcaria, longitudinahier connatn Sjli lobus inferior rnmplanato-dilatatus rolndalus — Herbae procumbentc* Amencanae.

HH S OCCIDENTALS Swarti, Fl Ind. occid. I 23. - Bib I abi.it gener et spec.

244 I — Herbacea diffusa T. procumbent, glabra \ pubcuens foil pedolatis late ovatis acotis serratis, basi rolundatis cuneatisve glabns v hi*pidulis, flonlib. pedicello vix longiorib. sessilib. ovato-laoceolalis acutis persistentib, racemif elongatis, basi subramosis; Yerticllastris 2-6-floris remotis, flonb minutis, calycib lubulosia glandaloao—villosis, labio superiore inegro denlibq labu Infe—rioris obtoals, corolla calyce dimidio longiorib, labio superiore erecto, inferior© subpatente ei longiore, conneclivis postice oblusis loogitudfnaliter connatis, slyli glabri lobis complanatis rotundalo-dilalalis. ^ — *Verbena minima Chamaedryot foho* Sloane, Jam. I. 172. t 101. — 5. *procumbent* Rz. el Pav Flor Peruv el Ibil J. 27. I. 39. fig. a. — 5. *radicans* Poir. Dice. II. 621. — *Hyptf* glandulosa* Sieb. Fl. Mart. exs. no.' 151. — Habitat in omms Amencanae aequinocialiM rudcratis campeslnbus etc.

104. S. MISELLA H. B. Kib Nov gen. et spec, plant. Amer. II 200 - Dih I c 245.

— Caule herbaceo piloso; foil, subrolondo-rhomboidcis acuiis, basi htibcunciis crenatis glabns; verticillagris subseiOons remolis, calycib piloso-glandulo-8is. 2]. — Caulis semipedalis, inlerdum pedalis ramobus diffusus, ramis ascenden-ubus teiragoms, pilis minutis reflexo-palolis conspersis Folia brevissime pe-UolaU 2-4-linearia. Spicae filiformef verticillalae. Flores pedicellati, pedicello hirtia. Bractee tnbroiiiDdo-ovaUe aeominatae htrtae deciduae, calyce breviores Calyx campamilauis tliiaioa bllablauis, labio superiore aoulo integro, infertore bifldo, lacinilt acuminato-aobolatlt. Corolla calyce duplo longior \iolacea — Vix differl a praecedote. — Habitat lo Novae Hispamac locis calidis inter por-lum Acapulco et La Venla del Exido.

Sectio VHF. CALOSPHACE Bth/in Hook. Bot. Misc. III. 374.

Calyx o>alus tubulobiis v. carapanulatus, labio superiore inirgro v breviter tridnciaio. Corollae tubus ex&ertus v. inclnsus, mtus exannulatus, sed interdon prope basin denlibus 2 auctus. labium supenus rectum concatum integrum v< saepias breviler emargioatum, infenons lobi palenics Connects a postice defleia Imearia longiludinaliter connala. Styli lobus inferior subuliin« — Hrrbne j>uffrutire« v. fruticea Amencanae habitu polymorphae, sed a caelens sectiombuf facile distinguendae. Folia IDtegrilerrala crenata v ranus integprnma

f. I. *Micranthae Bth. Labtat. gener. it spec. IM5.* — *Corolla vix 3-hnearii, calyce dimidio v. ranus subduplo longior. Tubus inclusus. Labtum tnfenus superiore erecto subduplo longius. — Herbae corolu* coeruleis inconspiatis.*

105. S. OBSCI'BA Bth. I. c. - Herbacea diffusa Toll pctiolatis ovails aculif serratis, basi aogoitalo-cuneatlf glabrl* v supra hi*pidi», uinnq \iridib, floraliP* persistentib. sessilib. ovalis acuminatis, calyce brevionb., racemis elongaii* ilin^ plicib.; verticillastris 9-6-floris rrmotis, Horib mmulM, calyoib. tubulosif *aD* ftlaoduloso-Tillosis, fructifen* aucti*, labio supremo inegro donhbq. labii j< eii< rioria breviler aobulalo-acuninatis, corolla calyre dimidio longiorib, l< biq superior* erecto, iofeHore tubpaifnli* duplo longiore, connreims posilcejJ?''* fl/ oblnsis loogiladioaliter coonatis, slyli lobis subulatis aculis ^ - ^ o. ;, v mqc ttmiUima, ted calycis (obi luboUo-acuminati el sl)U lobi aculi suboiaw roiuodaio-conplanati — HablUI in Jamaica.

8 BIPARIA II B. Kit. Nov. geo. et spec, plant II. JO - Bib I . f 47 ^ 720
; Cault herbaceo erecto ramoao pubescentc, full u?olo-oblooglt **d.J --- lotis

- serratis, utrinq. piloso-pubescentib.; verticillasins nulliflons parom remotis; calycis pilo&o-glandulosi labio apenore Incuspidato. 2\T — Herba canescens odoratissima. Caulis strictus paniculato-ramosus ramique leiragoni pubescentes. Folia opposita, brevilis petiolata ovalo-oblonga acula iuncordata serrata, utrumque praem subulso piloso-pubescentia pollicana. Petiolus 2 ho. longi pubescentes. Spicae terminatae 3-4-pollicares verticillatae, verticillis nulliflons parum remotis. Bractae subrotundo-ovatae acutae, pedicellis pilosu vix longiores. Calyx subcampanulatus bilabialis sinuatus piloso-glandulosus, labio superiore tricuspidato, in fenestra bifido, lacinus acuminato-subulatis. Corolla corollata, calyce parum longior — Habitat in regione temperata, in parte fluminis Chulucanas inter pagum Guancabamba Peruvianorum et Paramo de Guaraani.
107. S. TENELLA Swartz, Prodr. fl. Ind. occid. I. 45. - Dth. I. c. 240. - Caule herbaceo prostrato procumbente, ramis ascendente pubescentibus, foliis petiolatis late ovatis rotundatis obtusis crenatis, basi cordatis, supra adpresse pubescentibus, habitus glabris, floralibus lanceolatis minutis persistentibus; racemis brevibus, verticillatis subsexfloris; floribus minutis; calycibus tubulosis glanduloso-villosis, labio supremo integro denatis. Labii inferioris brevissimè obtusiusculis; corolla calyce breviter superante, labio superiore abbreviato truncato, inferiori patente bifido; connectivis posice longitudinaliter connatis; stylis lobis subulatis. Q — Species omnium minima, vix 3-pollicaris, facie fere *Veronica* cretensis. — Jamaica.
108. S. MICRANTHA Vahl, Enum. plant. I. 835. - Bib. I. c. f - Ceterum herbaceo erecto glabro v. pubescente; foliis petiolatis late ovatis irregulariter crenatis subsensibus, basi truncatis v. cordatis glaberrimis, floralibus lanceolatis pedicello brevibus; racemis simplicibus; verticillatis 6-10-floris; floribus minutis; calycibus lobulosis glanduloso-villosis, labio supremo integerrimo denatis. Labii inferioris obtuse, corolla calyce dimidio longiore, labio superiore abbreviato truncato, inferiore patente, lobo medio ovalo-rotundo lobis geminis, connectivis posice incurvo-clavatis longitudinaliter connatis; stylis lobis subulatis. O * ~ ^ *bullata* OrU Dec IX. 100 - Jacq. Hort. Schoenbr. IV. 41. t. 481. - *S. serotina* Vahl, Enum. plant. I. 222 (non Linn.) — 5. folio cordato-ovato etc, Ard. Spec. 1. 10. l. 2. — Habitat in America aequinoctiali, in Mexico et in insula Cuba.
109. S. SEROTINA Linn. Manlii. plant. 25. - Bib. I. e. — Caule herbaceo pubescente v. villosa; foliis petiolatis ovatis obtusis crenatis, basi truncatis tuberculatis rugosis, supra villosis, habitus molliter pubescentibus lanceolatis, pedicello brevibus; racemis simplicibus; verticillatis 6-10-floris; floribus minutis; calycibus lobulosis rotundatis villosis, labio supremo subintegerrimo denatis. Labii inferioris acutiusculis; corolla calyce breviter superante, labio superiore abbreviato truncato, in fenestra patente, lobo medio ovato acuto; connectivis posice incurvo-clavatis longitudinaliter connatis; stylis lobis subulatis. rf — Affluens *S. micrantha*, sed minor. Hacemus laxo ramulorum villorum. Folia villosa angustiora, subregulata crenata, nec erio-cristata. Flores minores. Calycis dentes acutiusculi. Corolla minor, sordida alba. Calyx fructifer brevior et lator. Stamina et stylus omnino ut in *S. serotina*, cetera a quibusdam variis habentur, led distincta videtur. Stylus apice subulato-bifidus. - 5. *dominea* Vahl, Enum. plant. I. 222. - Swartz, Observ. 18. I. 1. fig. 1. (non Linn.) - *S. serotina* Jacq. Ic. rar. 1. 1. l. 3. — Habitat in America aequinoctiali, in insulis Bahama Trinidad, Santa Cruz, Jamaica. *
110. S. UMBELLIS Bth. I. c. 247. - Caule herbaceo erecto ramulorum patentium piloso, foliis petiolatis late ovatis acutiusculis crenatis, basi rotundatis cordatisve, utrimque videntibus. Minus pubescentibus, dorsalibus superioribus membraceis laevibus deciduis, raceme simplicibus, verticillatis 2-4-floris laxis remotis; floribus minutis non ad axillas foliorum caulinarum, calycibus tubulosis campanulatis villosis labio superiore integro denatis. Labii inferioris [latin inferioris] acutiusculis, fructiferis valde aurtm / - Habitus et folia *S. serotinae*, a qua differt verticillatis plerumque billon, infimibus anlinibus fructiferis ul in *S. rhomboides* » *lanceolata* [aldis subulatis]. — Habitat in Mexico.

- III S INCONSPICUA Blh. I. o. — Caule procumbente' villosa; foil, brevissime petiolariis ovato-lanceolatis obtusis crenatis, basi cordate rugosis, subtus rufotomentosis, floralibus deciduis; racemis subramosis, verticilla«Iris 4-0-Doru. IJXIS; flonb. parvis, calycibus lobulosis sordidulis subglanduloso-villosis, labio superiore lulegro deolibq labii inferioris obtusis. %* — Hacc species \nlcr *Alicratitha** distinctissima videtur foil is valde rugosis, subtus tomentosis Caules elongati ramosi. Folia l-l'/i-pollicana, superiora sessilia. Racemi subpamculati. Calyces S *serohnae*, sed rigidiores, dentibus obtusioribus. — Habitat in Mexico.
112. S PALEAEFOLIA H. B. Kth. Nov. gen. et spec pi. II. 303. t 157 - Dih I. c. 200 720 722. — Caule soffrulosus erecto ramis pilosis, Toll, cordato-sagittatis, apice rotundatis crenatis, ulrinq. birlis, subtus canescentibus; spicis pamculatis; verticillastris bifloris oonferlis; calycibus piloso-glandulosis. 2l. — Kami tetragoni quadrisulcati pilosi. Folia opposita petiolata, profunde rordato-sagittata, apice rotunda la creata reticulato-venosa membranacea, supra viridia bipollicana, inferne 90 lin. lata. Petioli sesquipollicares pilosi. Flores magnitudme norm *Thymi Serpylli*, pedicellis piloso-glandulosis. Calyx campanulatus bilabiatus sinuatus, labio superiore obtusiusculo, inferiore bifido lacinus acuminatis Corolla cocculca, tubo calycem paulo superante, labio superiore oblongo obtuso galeato, superno pubescente, labio inferiore duplo longiore inflexo piano lobis rotundatis, inter* media multo latiore emarginato-biloba lobis rotundatis. Stamina et Mjulus exserti. — Habitat in Andibus Novo-Granatiensium inter urbem Popayan et pagum Palace.
- 113 S. TILIAEFOLIA Vahl, Symb. III. 7. - Jacq. Hort Schoenbr. HI 2 t 214 - Bib. I. c. 218. f — Caule herbaceo erecto glabro v. tenuiter pubescente, foil, late ovalis crenatis, basi truncatis v. subcordatis molliter rugulosis, ulrinq. pilis raris pubescentibus., floralibus membraceis lanceolatis deciduis, racemis axillariis; verticillatris lastis approximatim 0-10-floris; calycibus tubulosis in nervis ciliatis, labio superior* inflexo deulibq. lobis inferioribus ovato-lanceolatis acutis; corollis vix calycem excedentibus 2l.* — 5. *fimbriata* H. B. Kth. Nov. gener. et spec. Amer. III. 290 t 140 — Habitat in America aequinoctiali, in convalli Caracasana et in Andibus Novae Hispaniae juxta urbem Pazcuare.
- Hi s FLEXIOM Pr^l mss. ex Blh I c — Gule dilTuso lortuoso plibro, foil. petiolariis ovatis aculis serrato-crenatis, basi rotundato-cuneatis glabris, floralibus membraceis lanceolatis deciduis; racemis implicibus, verticillatis 6-10-floris; floribus minutis, calycibus tubulosis glabris v. nervis ciliatis, labio superiore integro denique labii inferioris aculivulvis; corollis vix calycem excedentibus 2l.* — *S. tihaeifoliae* affinis, sed caules diffusi tortuosi glabri folia glabra > ad rostrum et nervos minute ciliata, basi nee truncata nee cordata Itacmi 2-0-pollicareu. Calyx minor quam in *S. tiliarfoha*, nervis breviter bispido-nerviis — In Mexico*
- 1». S. LAMEOLATA Willd. En urn. pi. hort. Berol I J7 - Blh I c. - Caule herbaceo ascendente ramoso glabro; Petioliis lanceolato-hincaribus obtusiusculis v. acuminatis, basi angustatis pubescentibus, junioribus incanis, floralibus lanceolato-tubulosis calyce brevioribus; racemis simplicibus, verticillatis subbifloris omnibus remotis; calycibus lobulosis sordidulis glabra, habio nuperrime integro dentibusque labii inferioris lanceolatis acutis; corollis calycem breviter superantibus, tubo incluto ventricoso, labio superiore redo, inferiore longiore, lobis rotundatis, connectivis posice deflexis linearibus longitudinaliter connatis. Mjulus broiler bifariam barbaio. % — Caules neciter pedales glabri v. ad extremum ramorum tenuiter cano-pubescentes, ramis saepe racemos excedentibus Folia r/i-«-P⁰¹¹¹¹¹ licana, saepius oblongo-linearia, nunc apice longius angustata, medio obtuse serrata, in var. *fl.* angustiora et glabriora verticillatis fere pollicem remollibus v. rariis 2-4-Dori. Calyces breviter pedicellatis tripartitis, fructibus We aocu, basi inflatis. Corolla coerulesca, (cum calyce, v. 4-lmari*. - ^s f_~ ft*** Uorn Bnom. pi. hort. Hafn. I. M. - *S. lancearfoha* Poir. DicL Suppl * «•

— *S. lanceolata* Jacq. fl. Eel. I. 13. t. 13. — *S. atpidophylla* Roem. et Schult. Syst. Mant. I. 200. — *S. trtehotUtnmotdet* Pursh, Fl. Am. sept. I. 10. — Habiat
 <* In America septentrional!, in Mexico, in convallt Goanaxuatensi Novae Hispa-
 ** mae el ad Missouri (lumen).

* 110 S LEPTOPHYLLA Blh. I. c. 240. — Gaale herbaceo adscendenle ramoso gla-
 bro; foil subsessilib. angusie lineanb aculis inlegemmls glabris, florallb deci-
 duis; racemis simplicib.; verlicillastris remolis subbiflons; calycib. tubnloMS
 sinalis glabns, labio supenore ihlegro denlibq. labu infcnons acoiis; corollis
 calyco subduplo longiorib., lubo incluso, labio supenore erecto, infenore paicnto
 duplo longiore, lobis rolundalis, connectivis postice deflcxis lineanb. longitudi-
 naliler connaiis, stylo breviter bifanam barbato. %* — Valde affirm *S lanceola-
 tae*, a qua differt folns anguslionbus glaberrimis el floribus majonbu<; a *S. an-
 gustifolia* caule glabro el floribus tnullo minonbus. — la Mexico ad Chrislo.

I. 2. *Brachyantkae* Bth. I. c. 240. — *Folia floraha bracteaeformm
 decidua. Calyces glabri villosi v. cano-tomentosi nee dense tomentoso-
 lanati. Corolla 4-linearit v. longior. Tubus inclusus v. vix calyce plus
 dimidw longior. Labium inferius superiore plerumque longius planum,
 lobts rotundatis, medio maximo. Floret eoeerulei v. rarius albidu v. pal-
 Ude carnei nee coednei nee flavidL*

A. *Anguitifolia** Bth. I. <1

Folia lineana T. lanceolata, basi angostata v. cuneala, pteramqne petiotala.

117 S AISGUSTIFOLIA Cav. Icon plant. IV. 0. t. 317. - Bth. 1 c. - Gaulib. her-
 baceis erects gljbris v. palenlim pilosis; Toll, subsessilib ohlongo-line.inb ,
 ulnnq angu<tatis integernmis serralisve glabris, florahb. bracteaformi!) linenri-
 hnrcolatis docidui*, racemis elongatis simplicib ; verlicillastns ommb dislandb
 2-0-lions, calycib tubulosis sinalis hispidis, labio supenore mtegro dcniiib(|
 labu mfonoris o\atis acutis; corollis calyce duplo longiorib., tubo calycem ac-
 quanle venlncoso, labio superiore exlus pubescente, inferlore duplo longiore,
 lobis rotundatis, medio maximo emarglnato bifldo; connectivis postice deflcxiv
 lonRiiudlnallier connaiis; stylo bifarlam barbalo. % — Caules complures 1-1¹/₂,
 pedalei Tirgail inbramotl, batl folioli, obloso tetragool stHatl, ex onni parto v.
 aaliem ad nodos pllis loogls albidit paleoiiibus ellitll.' Folia •/•-polllearlt, ex-
 acte hnearia v. basi paran aogoauu oblota ?. aeuU Itttegerrima ¥. hioc' indo
 serratuns remotls qp u u, floralla calyce duplo trlplove brtrloro. Raemut ft-Q-
 pollicans. Venicillasirl fere pollicem remoil. Calyx taepo oortileiceos, pili
 , albidis creclis v palulis hispidus. Corolla aiarea, raagnliudlne fere *S. Grahami*
 Connectiva poslice dcniaia hnearia. Stylus vix exsurtus, lobo superiore subulalo
 longissimo - 6 replant Jacq. Hort. Schoeobr. 111. 38. t 310. - *S. etrgata* On
 Dec J. - *S. anqutUfolia* Bol. Reg. t. 1M4. - Habiat In Mexico, in locis aUjJ
 prope Toloniico el drande el spluncam Danlae, io mootosts prope Tlalpuxahua.

118. 8. PALLIDA Blh I. c. 250. — Caule herbaceo procumbente glabro; ramis ad-
 scendentib canescenlib.; foil peliolatis ovato-lanceolatis ?. lineanb. acuminain"
 basi angustatis, Juoionb. cano-tomenlosis, demum glabrallf, floralib. basi ovati<
 longe^ lineari-acuminatis deciduis; racemis simplicib. elongatis; verticillaMris
 remolis subsexflons, calycib. <uboet.silib. tubulosii alrialii eano-tomeoiosis, labio
 supenore inlegro denlibq. labu infcnons oralis aculis; corollis calyce subduplo
 longiorib, exlus pubesceniiib., lubo venlncoso calycem aequaole, labio supriire
 erectto, inermre duplo longiore, lobis rotundatis; connectivis postice lineari di
 latati* deflexis longitudmaliter connatis, sl>lo sublus brevissime pubesrenle %
 - Habitus fire *S lanceolatae*, sod caulii magis procumbent elongatus, ramit
 ranruriiibtm Folia aculiora Karemi fero *S terratae*. Flores mapn.iu.l.,,,,
Stachydn annuae - *S canescen* Dili m Herb Mills Reg Berol DIM fnonHr(rr)
 -[Lindl Bol Kcgisl. (New her) MI t 30 1 - Habitat in Brasilia mendiufinl'
 ad Buenos A^rcs

110. S. A2LREA Lam. Diar. bist. nat. I. 409. — Dth. I. c. 250. el 720. — Canle her-
baceo erecto glabro; foil, petiolalis oblongo-lanceolatis v. lmeaib. oblusiuscuhs,
basi longe angustatis subserratis alrinq. viridib. glabns, floralib. lanceolato-li-
nearib. deciduis; racemis simplicib. elongatis; verticillas lns dislanlib. subset
lions; calycib. subsessilib. tubulosis atrialis glabriusculis, labio superiore intcgro
deniibq. labii inferioris lali* aculicutculis; corollis calyce plus duplo longiorib,
cilus pubesceolib., tubo ventricosocalyce dimidio longiore, labio supcnoro
erecto, in tori ore dnplo longiorc, lobis rotundatis; conneciivis posticc deflexis lon-
gitudinaliter coadatis; stylo biranam barbato. 2j. — Herba plunpedalis, vindis
v. coerulescens. Folia 2-3-pollicaria rigidula, saepe iniegernma T. dcoibus
paucis bine inde notata, superiora aogoste linearia, floraha m decidua calyce
breviora. Verticillastri subseeoodi. Calyi vmdis v. coerulescens, glabr v. le-
ouisalme cano-pubeacens, 3 IID. loogus. Corolla semipollicans, exlus pubesceos
eerulea. 8tyll lobna superior iofiore duplo longior. — 5. *acuminata* Pers. En-
cbirid, I. SI — 5. *acuminatissima* VenL IlorL Cels. 50. L 50. — S. *angustifolia*
Michi. PL bor. Am. I. 13. (oon Cav.) — 5. *Haia* Poir. DicL VI. 025. — 5. *Mexi-*
cana WalL Fl. Carol. 05. (non Linn.) — S. *axurea* Dot. Mag. I. 1728 — S. *longi-*
folia NuiL Transact, of lbe Amenc. pbilos. MI. II. 185. - Habitat in Amcncao
sepiniionalis civitatibus ausralioriboa in Carolina, Alabama, Georgia superiore,
Florida orientali, ad Jacksonville in Noto Aurehano.
120. S. PITIHERI Torrej mss. ei Bib. I. c 251. — Caule herbaceo erccio totncn-
loso-pubescente; foil, peliolalia oblongo-tanceoUtis v. lneanb. acutis subserrn-
tia, baai longe angustata, ulrinq. molliter lomenosis, floralib. lanceolato-lmcanb.
deciduis raeunia simplieib. elongaus; fertieillutris dialaniib. 6-15-flori»; caly-
cib. subsessilib. tsbulosis alriatia villotla, labio superiore iolegro deniibq. labu
inferioris latla eblaala; eorollit ealyce plot duplo loogforib., exlus pubescentib.,
tubo venricoao ealyee eUaidto longiore, labio superiore erecto, Inferiore duplo
longiore, lobla roUpdaUai eonatMitla poatice deflexis linearib. loogiodinallier
connatla; stylo bartU'lo. ^—Habitus 5. *asur\$as*, sed tola pubescentia molli ^ub-
caescentie lodoia, Cores numerosiores, el calyces majorc%, drniibus obusionibus.
— Habitat in America septentrionali ad Red River.
121. S. LAEVIS Bib. I. c. — Caule herbaceo erecto glabro; foil, pctmlatis oblnngo-
lanceolalis, ulrinq. longe angustalis reeroole scrratis glabrx, (loralib. membraoa-
ccia late rotundaii^ cilialis oblusis deciduis; racemo simplici longe pedunculato;
verticillas lns 0-10-floris, infenonb. remolis, supreme approximate; Calycib. pe-
dicellalis campanulalis cilialis, labio superiore subintrgro deniibq. labu inferioris
lanceolalis cu^pidatis; corollis calyce triplo longiorib, tubo subetserio venlri-
coso, labio superiore glabro erecto, inferiore subinplo longiore, lobn rotundali*;
conoertivis poslife deflexis late linearib. Inngiuiinalner ronnaii<; »i)lo longe
barbalo 2r — Affiois 5. *uigimotMt*, sed differl rarem x Mraplicibus lertirillastrit
remoi« paorfloris, calycibns eilialis, corollis majoribut glabri*. el aln< noil*, •
5. *iaektoide* differl venkilUalris distinctis glabcritni«, ralyibus rampanulaiU
•ee lobsloaia, bati pilosis, apice glabris nee inrano-villosis el glabrilie caulia el
follows*. — Habiaal In Mexico, prope Tlalpuiabua.
- lfl- 8. 8CBIXQSA Bib. Plant, Hartveg. «. no. lffO. -- Aonua * caule bumili erecto
scabro-pvberalo; full, peulalis lanceolalis obiu«iu«ruli« gro«e »ubinci»o-den-
laii«, basi aoguaUis scabro-puberulit; racemo «implin lermmali glanduloso-
pubescentie; vertieillaslria subsexdori* remold, lirann* o»aim rm%»iroe decidul
ealycib. birtis profoode bilabial**, lab... laic oum, tupehorr iniegro, i n r a r e
•revlitr bMdoi eorollae Ubo cal)cem parum exrclenie. O " , s* taeri q" o--" J
modo afBois, sed abunde differl. Cal)rrr* coerulr*rentrs. Corollae coeruleac.
Cretcil in Metleo.
10. 8. ILKil^oSA Bib. I. e, - Canle herbaceo erecto glabro v. nillo " ; » » ^
UoUtia obloBgo-lanceolails aevUa aorraUa, bati angustatis glabru v P^A**
•orallb. eaeabraftaeia late ovatis acamioatis deciduis; rarrmi* deosit long labio
dunealait sabraaiosls; verticilUsiris multiOuns; calycib. campanula*1*.

- superiore subinlegro deolibq labu inferiors acuminalls, corollia calyce duplo loDgionb, lubo subincluso venlncoso, labio superiore cxlus pubescent* redo, infenore duplo longiore, lobis rotundatis, connedivis poslice deflexfs late lioea-nb longiludioaliler connatis, sljlo supra breviter barbato 2|. — *fi rufeseens*: ""caule foliorumq pagina infenore rufo-pubescentie. — Habitat in Brasilia ad rivulos San Jose, Toropasso etc. provmciae Rio Grande el in ulignosis prop© Eslancia do Salto Missionom Uruguaiensium, ad Buenos Ayres, *fi.* in sylvis cae- duis ad viam a Mines ad Rio de Janeiro.
- 124 S LAVAISDULOIDES H B Klh. Nov gen. et sp plant Amer. II. 231. - Bib. 1. c. 952 ♀ — Caule herbaceo, ramis ereclls cano-pubescentib.; foil brevissime pelio- latis oblongo-lanccolatis aculis, basi cuneatis crenatis cano-pubescentiij>, subins albidis, floralib ovatis longe subulalo-acuminalis deciduis, spicis simplicib, ver- licillaslms approximate aequalib. subdecemflon*, calycib lubuloso-campanulais cano-pube»cenlib., labio superiore inlegro dentibq labn infenons ovatis brevi- ter mucronalis, corollis calyce dimidio longiorib, lubo incluso subsequali, labio •upenore recto, Infenore duplo longiore, lobis roluudatis, medio lalo emargmalo; connectivis poslice lineanb. deflexis longiludioaliler connatis; stylo incluso bre- tiler barbato. ♀ — Caules e basi ramosa plures vlrpati, pube brevissima v. pilis brevibus red ex is oanescenles. Folia l'/t-ft-polllicaria rugulosa, aepms lomeoto brevi supra eanesentla, subtus albida, nuaó utrlnque pills adprttsls pobeteotia. Spieae ft-3-polliearea, looga pedimculaiiae, juniorea apice folils OoraÜbus COBAQ- sae. Verticillasin omoes approsimali •• laflmo renoto. Calyi stHatus, basi ca- nescens, apice saepius eerule^cens Corolla palllde eeerolaa panra. — *S, Hum- boldttana* Roem. et Schuit. Syst. ManL I. 183. — & *Utandulaefolta* Spreng Syst. \cgci 1. 58 (non \ah1) — llabiial in Nova Uispanla, in regione temperata prope irbcm Pazcuaro in litore lacus.
- 125 S STACIHOIDES II B kll I c 287 t 138. - Bib I. c 252. et 720 - Caule herbaceo subsimplici folutq pubesceniib concolorib lanccolalm acuiit crenato- serralis, spica oblonga longe pedunculala, \verticillaktms approximalis muliilloris; caljcib cano-MIU!»IS ^ — llerba erecia 3-pedalis. Caulis telragonus subra- mo»u*, pilis reflex is pubescens. Folia opposlla, breviter peliolala lanceolaia, ere- nato - serrata, basi angusiala, viridia pllisqne brevlbns raria consperta, 2-3-pol- licarU. Pettolua 4-5-pollicarli caoalicalatos pubtteaM. Spiea sesquipollkarit termnalns, longa peduocnlau verticillaU soliuria, InUrdusa d«aa atlllarta ap- proximalae. Bractee oblongae, acumlato-aubiilatM pnbajaetatoa. Calyt t«bo- losns Mnatus mcanus villoao-blrtus, labio aoporloro iDtogro aovlo, Inferiore bl- fido, lacmns acuminatis. Corollae coeruleao. — Vli a 5. •UmgtUm dlfferro dlcliar. — Habitat in montibus frlgldla Meilcanis props loa loam el Saata Rosa do la Sierra
- 120 S KI O\G\TA || B Kll I c. 287. t 130. - Bib. I. e. 2M. — Caule herbaceo ercclo »ul>timpliili cauo-puhescenie; foil, breviter petiolatis obloogi* acutiuscu- lis, ba»i anguhioiis crenalo-borratis glabnusculis v. sublu» pubesceniib, floralib. ovato-lanceulais hirj»uul>, calycem aequantib.; ipicis obloogls longe prduncula- Us, verlicillaslms mulnfloriH arete approximalis; calyeib tubulosis striatis pilosm, labio superiore inlegro infenorisq. dentib. acutis; corollis calyce duplo longionb , tubo vix exserio >enlncoj»o, labio superiore recto, Inferiore subinplo loogior*! lobis rotundatis, medio lato emarginato; connectivls postice linearib deflexia longitudioalilier conuexis, stylo barbato. % — Caules complures subsimplices, 1-2-pedoles, basi fotiosi, superne subnudi Folia sesquipullicaria, supra ira- bnubcula, kubtuj. glabrav. ad nenon pubescentia Spiraer/: -2-pollirare<, dense villosae. Caljce» subcolorati Corolln \iotacca, >ix 4 lincas longa, atus jmbrs- cens — .S *lielontca* Rocm cl Si hull K)si ^egelab. Manl. I HA — s *simplex* Spring S\sl \cnuab 1 W - Habitat m >o\ a Ilispama, in drclnilate monium •t)cci(Ienlalium intrr Anu el Aguasarcu
187. S CORKt(iir\ >ahl, Eiiura I t'>2 - Blh I c — <aule frulico«o, ranm rufo-tomcnlo>i>, foil pcliolalo oblongu-lanceolatii obtu>is crtintis ba^ rutuu-

dais ragosissimis, supra glabnasculis, subtus rafo-lanalis, floralib. deciduis; >erlicillasins »ub-6-floris d.slantib, calycib campanulatis subglabris coloratis, labio supenore integro denlibq labu mfenoris oblusis, corollis calyce parum longiorib, tubo subincluso, labio supenore recto, infenore longiore. connecmii pollice linearib deflexis, longitudinaliter connalis 5 — Rami el foliorum pagina inferior lana rufa densissima veslili. Folia bipollicana approximala. Caljccs coerulescenes. Corolla coerulea birta. — Uabilal in Peruvia.

B. *Ovattfoliae* Bib. I. c. 2M.

Folia petiolala ovato-rotundata ovata ?. ovalo-lanceolata, basi rotundata truncata T. cuneata, rarius subsessilia, bail euneata.

128 S ASSIRGENS H. B Kib. Nov. gen. et spec plant. II. 203 - Bib I c 2*4. t — Caale herbaceo «ubramoso aicendene pubescente; foil, otalo-ellipiicis, oinnq. aculis crenato-serratit glabnusculis; verticillasn* moliiflons, infenonb distanlib; calycib. lericco-bfrsutis. ^ . v O* — Herba 10-12-pollicam laulis ascendens aubramotus, tenunsime pubescent lelragonus Folia opposila, breviter peilolaia utnnqne giabnacula, rems sublua pubescenllbos, bipollicana Spica terminalis, longe pedunculaia verticillaia tripollicans. Pedunculus 4-pollicaria. Flores magmudine riorum *Stachydis annuae*. Calyx campanulas bilabialus, labio supenoro orato obtuto brevi<<imp mucronato, labio infenore bifido, lacimis obtusis mucronaii!» Corolla pallide nolacea* (carnea ei Bonpl), tubo tuperne ventneoso compresso calycom subaequanle, labio inperiore galeato conca^o pubf^cenio, inferiore mplo longiore trifido, laclnia Intermedia maxima biloba, lobis rotundatu Stamina inclosa — Habitat prope Paicaaro Mcikanornm.

1» S. HELIAPCTHEMIFOLIA Biñ. I. c. 04. t - Caule herbaceo erecto (*\ ramis Tirgatit pabeteentib^ foil, brevlume peUolatit obloogii acutis nubserraiis, ba»i angosiatif rugulo»lt glabrit •. alrinq pubetcentib., floralib. mlnuUiimimis, racemis slmpllcib.; vertleillaatria 0-90-florlt aecondia remoiU T. jnpremli approximatif; ealyeib. tabaloaia ad nenroa pubeseenilb., labio superiore inlegro denlibq labii inferlorit acutis; corollis ealyce subduplo longiorib, lubo acquali incluso, labio supenore erecto, exlus pubescente, in fen ore duplo longiore, lobis rotundatis, medio man mo bifido, connects is poMice linearib deflexis lonnHudmaliier connatK, stylo bar»alo ^ — Caule* basi ramosi, ramis sub»injplicibu» 1-1 '»—pedalibus, acute leltraconi, pallide virides, pili* bre\ibus reflens pubescentei. Folia inlernodus br« Mora, 't—1' -pollicana, subtus pallida v rarius concoloria. Rarrmi 2-0-pollirarrs >erlinlla<tn infimi sarpr longe remoh, <uprcmi approxirnaii, »3()IUH »ub-10-Don Corollae coerukae v in tar ,9 albae Afflnis 5. *latamduhult*, a qua differ I folus dimidio brevionbus, racemo inlrrrup(or el floribus ircundis majonbus — t flonb. albi« minionbus — Uabilal in Menco propo Tlalpuiahua fl prope San Martin.

130 S SIDKHITIDIS Pre»l msg. « Bib I c. 251 - Caule frulicono, rarois crectls albo-iomrnlo«i«< foil brevier peliolalis ovahb obluuu^culi* srrraio - crenalli. bail cuneaiK rugulotn, snpra viridib., tublu* albo-tomenlo«i». racemis brevib; vtnieillaslms hubtexflont. ealyeib. Inbulo»is villosis, labio nupenorr inlegro denlibq Ubii infenons aculit 5 — Specimen manrum, »ed tprneu etidenier dl-atinctiaaima. 5. *tptcala** afflnif, ted calyn* labio <upfnore integro diffcrl Corolla non vita — Habitat in Peruvia ad lluanuro

131 S CHAMAEDR^OIDKS Cat Iron plant II 77 I 197 Sims. Bot. Mag. I. W. — Bib. I. c - Caule »uffrutico»o prorumbencie rami* rano-lomrniosis, foil P^o tiolatit ottlo-obloogii oblutif rrrnulalM, ba«i ancu<tau« T rotundails rugos, •ubtot eano-tomenlosis, floralib lair otatis arummaln. caljro majorib dec- duis rartmlt timplkib. vertirilUtrif .ub-O-AVin, rahnb lubuloiis siriaijj i- o- menintli, |.|,|o tuperioro lolegro denlibq hbn Jnfenori* brevier cuspi labio corollii ciljce duplo longiorib, extos glabnv, mbo vit ct^erio TfnrlcA, i- i- j- f- •aperiore redo, Infenore duplo longiore. lob., rotundain, laierallb »»/»-ato. | medio maximo bifido; conneciivis pottice deflexit linearib, »iylo supra Dam

- 21 — Omni parte canescens. Folia rugosa, fere *Salviae officinalis*, sed multoties minor. Racemi elongati* Verticillasri ante anthesin folus floralibus imbricatis oblecti fructiferi ultra pollicem remota. Calyces breviter pedicellati canescentes, labio superiore saepe purpurascens. Corolla coerulea, labio in fenore latissimo subplano. Genitalia corollam aequantia. Connectiva sub insertione supra dentata. — *S. chamaedryfolia* Andr. BoU Rep. t. 410. — *S. chamaedryt* Willd. Hort. Berol. I. 20. 1-20. — Habitat in Mexico.
- 132 *S. THYMOIDES* Bth. I. c. — Caule suffruticoso ramosissimo canescente; foliis minimis subsessilibus ovalibus obtusis integerrimis canescentibus, margine subrevolutis, floralibus ovatis acuminatis deciduis; racemis brevibus paucifloris; verticillasris distinctis laxe 2-4-linis; calycibus ovato-lubulosis sinuatis glanduloso-pubescentibus, labio superiore integro denub. labio inferioris obtusiusculis; corollae calyce duplo longioris, tubo venoso calycem aequante, labio superiore recto, in tenore duplo longiore, lobis rotundatis, medio emarginato; connectivis postico lineari. Ovaria longitudinaliter connatis; stylo breviter barbato. — Plumulis ramosissima canescens, facie *Thymi* v. *Gardoquiae*. Folia vix 2-linea longa plana. Saepius margine revoluta, rigida, magis minusve cano-lomentosa. Racemi 1-2-pollicares, verticillasri 2-4-, saepius biflori. Calyx 3-4-linea longus. Corolla coerulea. — Habitat in Nova Hispania et in Mexico.
133. 8. *GLECHOMAEFOLIA* H. B. Kth. NOT. fen. et spec. plant. II. 200. f. t. 141. — Bih. I. c. 230. t. — Caulibus herbaceis subsimplicibus, saepe pilosis; foliis ovato-triangularibus obtusis, basi subcuneatis crenatis glabrisculis, junioribus pilosis; verticillasris subquinquefloris remotis; calycibus bibris labio superiore incuspidato. — Caules complures subsimplices 1-2-pollicares procumbentes apice ascendentes subclavati, inferne glabri. Folia opposita petiolata, adula glabra, pilis minutis adpressis raris conspersa, praesertim juniora in venis, 0-0.5 lin. longa. Petioli 4-5 lin. longi, margine ciliati. Spicae 3-4-pollicares pedunculatae verticillatae. Flores paulo minores quam in *S. prunellae*. Bracteae axillares acuminatae ciliatae, longitudine dorso, caducae. Calyx campanulatus striatus bilabialis pilosus, labio inferiore biparvo, laciniis cuspidatis. Corolla coerulea, tubo breviter ventricosus compressus, calyce paulo brevioris, tubo superiore galeato emarginato pubescente, labio inferiore triplo longiore lobis subconvexis, lobis lateralibus abbreviatis rotundatis reflexis, intermedio multo majori marginato bilobo. 8-10-nerve et stylus labium superius vix supertransversum. — Habitat in Nova Hispania, in urbe Guanajuato et pagum Sanciae Iosae.
134. *S. NANA* H. B. Kth. I. c. 210. — Bth. I. c. — Herbae acaulis: foliis ovatis obtusis, basi angustatis crenatis, supra hirsutis, subtus lanatis; spicis pedunculatis; verticillasris subquadrifloris; calycibus glandulosis lobis labio superiore tridentatis. — Folia radicalia subsessilia subcuneata rugoso-venosa pollicariae longiora. Spicae radicales semipollicares, verticillasris approximatis. Pedunculi 3-4-pollicares tetragonales, pilis patentibus glanduliferis obsiti. Calyx campanulatus striatus, labio superiore ovali-tridentato, dentibus subulatis, inferioribus bifidis, laciniis subulatis. — Habitat in Nova Hispania, in locis siccis prope fodinam Valentianae in continenti Guanajuatensi.
135. *S. PRINELLOIDES* H. B. Kth. I. c. 280? — Bth. I. c. — Caulibus herbaceis subsimplicibus erectis piloso-pubescentibus; foliis petiolatis ovato-oblongis obtusis emarginatis, basi angustatis ulrinque glabrisculis, floralibus ovatis acuminatis deciduis; raceme simplicibus longe pedunculatis; verticillasris remotis tubifloris, supremis approximatis 5-6-floris; calycibus campanulatis lobis 5-entibus, labio superiore breviter tridentato, inferioribus denub lanceolatis acutis. corollae calyce subtriplo longioris, exsertis pubescentibus, tubo fallo atque venoso, labio superiore recto, inferiore subtriplo longiore, lobis bis rotundatis medio lobo emarginato, connectivis postico lineari. Ovaria longitudinaliter connata; stylo barbato. — Caule complure basi foliosae rami erecti 1-1.5-pedales tetragoni. Folia nunc omnino glabra, magis

minusve praeserlira ad nenros hirsnta. Calyces coerulescentes. Corollae coeruleae. Folia fere *Prunellae vulgaris**. Racemus et flores 5. *laevis*, sed majores. — Habitabilis in Nova Hispania et in copulosis montibus ignivomi Jorullo Mexicanorum.

136. *S. ARENARIA* Si. III. mss. ex Bib. 1. c. 257. - Fruticosa: ramis glabris; foliis petiolaribus oblongis lanceolatisve acuminatis serrato-crenatis, basi cuneatis angustatisve, utrinque viridibus glabris, floralibus ovalibus acuminatis deciduis; racemifloris simplicibus; verticillatis 4-6-floris secundis; calycibus tubuloso-campulatis striatis glabris laevibus, labio superiore integro dentibus labii inferioris ovalibus amminatis; corollis calyce subduplo longioribus, exius glabriusculis, tubo subexserto ventricoso, labio superiore recto, inferiore subrevoluto, lobis rotundatis; connatis postice deflexis linearibus longiudinaliter connatis; stylo bifariam barbato. 5 - Pedicellae 4-pedalis ramosissimas. Folia 2-3-pollicaria. - Habitabilis in Brasilia, in areosis Serra Negra ad Ilmiles provinciarum Illinas Gerats et Rio de Janeiro.
137. *S. SERRATA* Bib. I. c. - Caule herbaceo erecto subsimplici glabriusculo; foliis petiolaribus ovatis oblongis lanceolatisve acutis grosse irregulariter serratis, basi cuneatis rotundatisve glabris, floralibus lanceolato-lineariibus, calyce brevioribus reflexis v. deciduis; racemo elongato simpliciter; verticillatis omnibus remolis 6-10-floris; calycibus pedicellatis lubulosis urticatis pubescentibus, labio superiore integro dentibus labii inferioris acutiusculis; corollis calyce subtriplo longioribus, exius pubescentibus, tubo subexserto ventricoso, labio superiore erecto integro, inferiore duplo longiore, lobis rotundatis, medio margine emarginato; connatis postice obtuse deatis deflexis dilatato-linearibus longiudinaliter connatis; stylo barbato. 5 - Habitus 5. *niigino**, sed loorescencia et oribus diversa. Folia latiora, profertim serrata, Racemus 4-6-pollicares. Verticillati semipollicem ditumes tubulose. Calyx 4-flores. Corollae coeruleae, fere pollicares. Stylus vix exsertus, lobo apertore bifurcatis daplo superante, subtus losge barbatus. Acbaeola oblongo-tiuetra laevis. — Habitat in Brasilia meridionali, ad rivulum de las Viboras in Republica Argentina.
138. *S. IRI'GI'AYENSIS* St nil. mss. ex Bib. I. c. - Caule herbaceo erecto glabriusculo; foliis petiolaribus ovato-lanceolatis oblongisve acutis serrato-crenatis, basi rotundato-cuneatis glabriusculis, utrinque viridibus v. sublaevibus pallidis, floralibus ovalibus amminatis deciduis; racemifloris simplicibus elongatis; verticillatis remotis 6-10-floris; calycibus subsessilibus lubulosis striatis rano-villois, labio superiore integro dentibus labii inferioris ovatis acutis; corollis calyce subduplo longioribus, tubo ventricoso calycem superante, labio superiore erecto, inferiore duplo longiore, lobis rotundatis; connatis postice deflexis linearibus longiudinaliter connatis; stylo sublus barbato. 5 - Valde affinis *S. pallidat*, sed raule erecta, folia lallora minus acuminata et floret numeroioris. An ejus >ariru%r — Habitat in Brasilia, ad ripas flumini truguay in campo San Joio provinciae Rio Grande do Sul.
130. *S. IRTICAEFOIDA* Lion. Spec. plant 31. - Bib. I. c. 2M. | - Caule herbaceo erecto pilis sabgladulosis villosis; foliis breviter petiolaribus ovalibus rboniboideis acutiusculis, basi rotundato-mucronatis, ad petiolum cuneatis glabriusculis, floralibus ovatis deciduis; verticillatis multifloris remolis; calycibus breviter pedicellatis campanulatis villosis, labio superiore integro dentibus labii inferioris late ovalibus acutiusculis; corollis calyce subduplo longioribus, tubo subexserto ventricoso, labio superiore erecto, inferiore duplo longiore, lobis rotundatis, medio margine emarginato; connatis postice lineariter dilitatis; stylo bifariam barbato. 5 - Habitus 5. *niigino**, sed loorescencia et oribus diversa. Folia latiora, profertim serrata, Racemus 4-6-pollicares. Verticillati semipollicem ditumes tubulose. Calyx 4-flores. Corollae coeruleae, fere pollicares. Stylus vix exsertus, lobo apertore bifurcatis daplo superante, subtus losge barbatus. Acbaeola oblongo-tiuetra laevis. — Habitat in Brasilia meridionali, ad rivulum de las Viboras in Republica Argentina.

- inciusa. Stylus breviter exsertus, lobis subulatis, superiore duplo longiore.-- Habitat In America septentrionali, In remotis occidentaliibus Virginiae et Carolinae In Carolina septentrionali et in Georgia.
140. 8. GRACILIS Bth. I. c. — Caule herbaceo(?) erecto glabro; roll, longe petiolalis ovatis acuminatis, basi rotundatis serratis, atrinque piloso-pubescentibus., floralibus. ovalis acuminatis coloratis deciduis; racemis simplicibus.; verticillastris laevibus sex-decemfloris, infimis remotis, supremis approximatis; calycibus breviter pedicellatis campanulatis striatis coloratis glabris, labio supremo inlegro inferiorisque denub. setaceo-acuminatis; corollis calyce duplo longioribus., tubo calycem aequante ventricosus, labio superiore recto, inferiore duplo longiore, lobis rotundatis, medio lato emarginato; connatis postice linearibus. deflexis, longitudinaliter connatis; stylo barbato. 2. — Caulis (v. ramus?) simplex purpurascens. Folia flaccida sesquipedalia, supra pilis brevibus adpressis, subius longioribus pubescentia. Racemus 2-3-pedicularis glaber rubescens. Flores parvi numerosi corollae, magnitudine *S. carneas*, a qua differunt praecipue foliis angustioribus acuminatis, basi rotundatis nee cordatis, racemo glabro et stylo barbato. — Habitat in Nova Hispania.
141. 8. LBPTOSTACBYS Bib. I. c. — Caule herbaceo erecto ramoso eano-pubescente; floralibus. longe petiolatis ovato-rotundatis acutis, basi truncatis, utrinque viridibus. tenuissime pubescentibus., floralibus. ovalis subulato-acuminatis deciduis; racemis simplicibus. elongatis; verticillastris demum ovatis remotis ambisexfloris; calycibus ovato-lubulosis striatis Inanis, labio superiore inlegro inferiorisque denub. acuminatis; corollis calyce duplo longioribus., tubo calycem aequante subventricosus, labio superiore recto, inferioris lobis rotundatis, medio lato emarginato; connatis postice linearibus. deflexis longitudinaliter connatis; stylo glabro. 2. — Folia *S. tiliaefoliae*, petiolo 1/2-2-pediculari et ultra, superflora arcuata simplicia. Racemus demum ultra pedalis, verticillastris inferioribus* pedicellatis, supremis semipollinatis remotis. Calyces *S. lacanduioidis*. Corollae coeruleae, duplo majores quara in *S. lavanduloide*. — Habitat in Nova Hispania.
142. S. MBMBRANACEA Bib. I. c. 3M. et 790. - Caule herbaceo(?) erecto glabro; roll, longe petiolalis amplis late ovatis acutis erenatis, basi rotundatis v. truncatis floralibus. deciduis; racemis elongatis simplicibus.; verticillastris remotis laxis subdecemfloris calycibus. pedicellatis asuaallk. eaaas>eneUUa glaWto, labio superiore inlegro denub. labii inferioris ovatis acutis; corollis calyce duplo longioribus., tubo calycem aequante ventricosus, labio superiore recto, inferiore duplo longiore, lobis late rotundatis, medio lato emarginato; connatis postice elongato-linearibus. deflexis longitudinaliter connatis; stylo barbato. ^ — Herb a videtur S-3-pedalis, ex omni parte glaberrima. Folia 3-0-pedicularia tenuia membranacea, soblus saepe purpurascens. Racemus rere pedalis, verticillastris regulariter distantibus aequalibus laxis. Calyces aequaliter leviter purpurascens. Corollae coeruleae, magnitudine circiter *S. tmgusUfoUae*.
fi. acuminata: Toll, utrinque longe angustatis; corollis brevioribus.
fi. viUo9ula: Folia minoribus., calycibus. Junioribus. villosa. — Habitat in Mexico, *fi.* in Guayaquil.
141. 8. RHOMBIFOLIA Rx. et Pav. Fl. Peru?, et Cbil. I. 96. 136. Bg. b. ^ Bid. I. c. 250. — Caule herbaceo erecto ramoso pubescente; roll, petiolalis late ovatis rhombicis, basisubcordatis pubescentibus., floralibus. ovato-lanceolatis deciduis; racemis simplicibus. paucifloris; verticillastris sub-6-0oribus remotis; calycibus. ovalis pubescentibus., labio superiore inlegro denub. labii inferioris ovatis acutis; corollis calyce dimidio longioribus., tubo calycem aequante ventricosus, labio superiore recto, inferioris duplo longiore, lobis rotundatis, medio emarginato; connatis postice linearibus. subdilatatis deflexis longitudinaliter connatis; stylo glabro. Q — *S. folioia* Bth. in Bot. Reg. I. 1429. — *S. pilota* Vahl, Numer. plant. I. 940.
fi. glabrior: calycibus. tenuioribus. glabri*. - Habitat in Peruvia, in foliis areolaribus notis Loroas de Atiquipa et non dictis in Camanae provincia et copio allis Cbancay, prope Limam, in Peruvia meridionali, in Mchico, prope

144. S. HERBAGEA Bib. I. c. 720. — Caule herbaceo erecto subramoso villosio; foil, longe petiolatis late ovalis rhombeisve, basi subcordatis pubescentibus, floralibus ovalibus deciduis; racemis simplicibus; verticillatis tubulosis distinctis; calycibus ovalibus lobulosis demum herbaceis, labio superiore deorsum labio inferioris ovato-dilatatis; corollis calyce dimidio longioribus, tubo incluso Q* — *S. rhombifolia** affinis, differt caule calycibusque hiraulioribus et praesertim calycibus longioribus tiridibus, labio herbaceo-dilatatis VII acuminatis. — Habitat in Mexico ad Lebuaniepec in diUooe Oaiaca.
145. S. TAFALLAE Bth. I. c. 280. f — Canie herbaceo erecto ramoso tillnso; foil, petiolatis ovatis* creatis, basi rotundatis v. cuneatis hi'pidulis, floralibus ovatis acutis, demum deciduis; racemis simplicibus; verticillatis 0-10-floris remolibus; calycibus ovatis oenrons illons, labio superiore integro dentibus. labii inferioris ovata acotis; corollis calyce dimidio longioribus., tubo meumo ventricoso, labio superiore recto, In fen ore duplo longiore, lobis rotundatis, medio emarginato; connectivis poslice hnearibus. subdilatis deflexis longitudinaliter connatis, stylo glabro. 0 — Rami erecti substmplice* parce foliosi. Folia inferior* longe petiolata, hmbus panrus, vji pollicans, superiora minora remotiora magis sessilia, floraha ralyre diroidio breviora. Racemi 4-0-polhcarrs. Verticillata Mn aequales, inferioris pollicem T. sesquipollicem remoli. Calyces 3-4-lineares, labio superiore paullo incurvato. Corolla 5. *rkombifolia*: Affinis *S. milt*, at caule herbt-Cfo annuo, villositate et aliis notis diverta, affinis quoque *S. no/acea*#, sed in bac corolla calyce Iriplo longior. — Habitat ad Tarmam Peroviae.
- 140 S. IOLACEA Rt. et Par. Fl. Pernv. et Chil. I. 95. L 43. fig. b. - Bth. I. c. - Foil, ovatis ereoatis; floribus spicatis; verticillatis setosis; labio corollae deoedeole O — PlanU bipedalis hirsuta. Rami faaciculati fibrosa. Caulis erecius ramosus tetragonus. Rami oovalmllea. Folia ovata acuta ereoata ragosa obtusa. Spicae lemloales brevia ereciae. Flores breviter pedicellati, bracteis oppositis ovatis concatis stipati. Corolla coeruleo-tiolacea, calyce triplo longior, labio inferiore lato, galea longiore dependente. — Habitat in Tarmac provinciae Peruvianae praeruptis calidis.
- 14? S. GLODILIFERA Car. Anal. di cienc. nat II 3. - Bib. I c. - Foil ovalis small* villotis, ramis, bunctis calycibus. pilosis-glandulosis O* %* — Lni-triprdji«, allrre ramo»a, pilis ngidi* glanUulifrx Folia petiolata, pollicem longa, 5 tin laia, ulnque villosa verticillatis sridon, bracteis acutis* brevibus Calycium lacinae oblonga calyce m duplo longior violareo-purpurea, utroque superiore breviora, inferiore tripartito, lacina intermedia multo major. Stamina 6 — Habitat in Chimboraz.
148. S. *RILKSHASKII* Bib. I c. 951 | - Caule herbaceo Si erecto glabro v pubescenti, foil breviter petiolatis ovalibus obtusis renatis (basi rotundatis *). cordatis glabris v. tubulosis pubescentibus., floralibus deciduis, racemis simplicibus. verticillatis subsifloris remollis subsecundis, ramulis tubulosis-caropao atriaUa pubescentibus, labio superiore integro dentibus labio inferioris ovatis* cordatis. corollis calyce Iriplo longioribus, tubo meumo troiriroto, labio superiore recto, inferiore triplo longiore, lobis rotundatis. medio matimo emarginato; connectivis postice lineatis. deflexis longiusculis ronniiu. »iulo glabro Caulis pedalis, basi denudatus, medio foliatus glaberrimus apice tenuissime pubescentibus. Folia 1-17,-pollicaria tiridia »rno»a glaberrima. rmoic renata, »prema »te Inicerrima. Verticillata Mn iofr.orr* ultra pollicem remoli. sacpi« O-i ranu» 2-4- t S-IO-Bori Calyces oblongi »tilr« I^rollar roerukae «ubn» c. lae. cum labio inferiori 7-8-linearibus Albnii .S. *»urrata«, in qua »foit* »ora acutiora, sublae albo-lomeata, calycet majoribus, corollae »rkom^ »a 5 *rkcw&folm* foliis, Inlortrentia et corollis diunctis»ima. - »ft. Hook. Bou Misc. - Habitat in Peruna in iall« Ca»M* P^oP^e OUrij ad Haamantanga

149. 8. GALEATA Ri. el Pav. Flor. Peruv. el Chil. 1. 2T. t 42. fig. a. - Bib. I. c. t — Foil, ovalib. serratis; calycis labio superiore galealo; corollae labio superiore convoluto. 6 - Caulis 3-pedalisramosissimus brachialus, Interne subteres nudus. Rami brachiall lelragonl, posl exsjccalionem femiginei. Folia subsessilia deflexa, ovalia ovataque serrala venosissima rugosa aspera, leviler pubescenlia. Spicae terminates lernaee creclae, intermedia longlor. Flores verlicillati, breviter pedicellali. Verlicillaslri 6-10-llori palenles, bracteolia 8 ovalis opposilis caducis ilipali. Calyx ringens, superne dilatatus venlricosug, labio inferlore concavo bifido inflexo, superiore concavo, galea majori. Corolla albo-violacea, calyce duplo longior, labio inferiore inflido, lacimis ovalis, superiore aogusialo, mferne convoluio, superne palulo, stamina stylumque involveote. — Habitat in circuilu MuBa Peruviae locn aridis.
150. S. MITIS Ri. el Pav. I. c. 27. - Bib. L e t — Foil, ovatis aculi* serralis tomentosis, spins terminalib., intermedia longiore apbylla; verlicillaslris munitions. 2l. — Plania bipedalx. Caulis ereclus ratnosus brachiatus lelragonus sulcaius. Rami consimiles, toiler pubescenies milissiml. Folia petiolala otala acula scrrata rugosa venosissima tomentosa, subtus Incana. Spicae terminates, intermedia longior apbylla. Flores verticillali secundi pedicellali. Verticilltslri 0-12-flori. Bracteae opposilae ovaies acuminalae pubescenies cadueae. Calyces bilabial! 1-2-nenres pubescenies subcampaoulall, soperne llvldl, labio superior* lotegro acuto brevior parum Incurvo, inferior* bifido aculo. Corolla albo-coerulea, calyce paulo longior, extus pubeseene. Stamina looglludiae corollae. Stylus superne villosus. Stigmata exserta. Semina trtgonavenoia fulva. — Habitat in praeruplis calidis Canlae provinclae Peruvlanae ad Obrajillo vlcum.
151. S. INCRVATA Rt. el Pav. I. c. 24. t. 42. fig. b. - Bib. I. c. 902. - Cauter herbaceo ereclo tenuiler cano-lomentoio; foil, peliolatis ovalis acuti serratis, basi rotundaiis v. cordalis, subtus mollissime albo-lomenlotis, florahb. doidux; raceme siroplicib.; >rticillastris 4-0-floris remotis; calycib. tubuloio-campanulatis pubescenlib., labio superiore inlegro denlibq. labii Inferiors ovalis aruminatis; corollis calyce duplo longionb., lubo locluso veolricoso, labio suppriore recto, Inferiore longiore, lobis rotundaiis; cooneclivis poslice linearib. deflent, longitudinaliier connalis; slylo glabro. * - Herba bipedalis. Folia blpollicaria, ad medium caulis approximaU doflaxa. Carjds fruoiiftrl labla incarva. Corolla purpureo-coerulea. — Habitat In Ptraviao etrcvltto Mala.
152. S. UISPAMCA Lion. Spec. plant. 37. — Bol Reg. 19M1 — Bib. I. e. f — Caule herbaceo erecto pubescente; foil, pollolalia ovatis aevlls CMAaio-tarraila, basi angusialis v. cuneatis glabris, Ooralib. ovatis acumloaiis etllallt aiibparslsieniib.; racemis densis ramosis; verticillaslris muUIOorls approximatei calycib. inflato-tubulosiH molliter pubescenlib., labio superiore inlegro denlibq. labil Inferioris acuti»; corolla caljcera MI excedeollb., lubo venlricosu, labio superiore erecio inlegro, infenore longiore, lobls lateralib. oblongis reOexii; cooneclivis po»nre lineari-dilalians deflexis longitudmaliter connalis; slylo barbato. O — Folia longe peiioiaia, limbo 2-3-pollicari, floralia calyce breviora, longe acomioata. Racrim y. spicae plures subramosi 2-4-pollicares densi albo-vlresceoles. Verlicillaslri saepius iub-10-Oon. Calyces subsessiles, basi inflati albidii, apice pallide virides/ molliter pubescenies, 4-5-lineares. Corollae exlus glabrae, pallide coeruleae lubus catycem aequans, supra basin el ad faucem valde conlraclus. Labia bre- >ia, infenore vn longiore. Genilalia corollam acquanlia. — S.felragona Mornrh Melh. pi. 373. - S. prtmmalica Cav. Descr. 14. - Habitat in America aequinon.al/ in regno ^uilcnse prope Chillo, in montibus insulae Jamaicae, in Meuco (fii*_{ra} _{tn} America borcali prope Now York, el ex America vctrotimtliter allala, in Europa australi sponie, in Ilnpania, in Pedemontio, Liguria el in Olivetis tneliae.
153. S. ANf-IUTA lth. I. c. 721. - Caule herbaceo erecto >i pubrsfrnie (>|| peliolati» laic otali* acuminalis scrratu, basi rotundaio-cum-ain tmuitrr >ul% centib., subius vix cauescenlib., floral.b. ovaiis acummaiis di-cidui»- , racemls

mQltifloriselongatisramosis; verticillastris laxissecundis; calycib. loboloso-c/im-paDolalis vix pubescenlib., labio supenore integro denlibq. labu inferions aculis; corollis calycem breviter superanlib., labio supenore redo pubescente, inferior© longiore, lobis rolundatis, coDDeciivis postice lioeanb deflexis longiludinaliler connatis, stjlo barbaio. % — Habitus fere 5. *polyttaehyae* Caulis anguli crassi glabn acuti, facie pubescentes. Folia fere 5 *polyttaehyae* sed glabnora, ba*i saepias cuneala. Bacemi longiores laxiores. Calyces fere glabn, saepius colorati angulaii. Corolla dimidio minor. — In Caracas.

1M S POL1ST4CHYA Ort Dec. 53. - Cav. Icon. planL I. 17. t. 27. (male). - Blh. I c. 202. t — Caale herbaceo ereclo caoo-pubescente, foil, petiolaiis ovaiis acumioatis serralis, basi rotandaiis v. cordalis, supra rugulosis pubescenlib., subtus nenrosis cano-pubescentib. r. tomeotosis, floralib. ovaiis acuminatis deciduii; racemis deosis ramosis; Tertlellastris mulnfloris approximalis sub<ecundi>, calycib. lubuloso-campanulatis pabescenlib. v. tomentoso-villocis, labio supcHore Iniegro denlibq. labll Inferioris acutis; corolln ealyce duplo longionb, lubo in-claso venircoso, labio tupenore recto pubescente, Infcriore sublongiore, lobis rotundalis, connectivis potlice hnearib. deOaxis longitudinaliter connatis, stylo supra barbaio Q? - Caules 1-2-pedales lelragom sulcau, glabriuculi v saepius pubescentes. Folia 2-3-pollicaria, sublus saepius tomentoso-pubescentia ranescentia. Spicae 2-3-pollicares pluret sunramosae, in panicuiam <cmipeda-lem densam contracUm dispositae. Flores parti, saepc 15-90 in quoque verticillasro Corollae coeruleae. Variat pubescencia foliorum et spicarum nunc teoui, saepius magis miousve tomenloaa, calyclus rarius hlipido-villoi*, vcrl-cillasiris omnibus approximalis T. lolnsis) reaiotls. — In bortis occurrit etiam sub nomine 5. *tpiemtm*, 5. *ir#y»Wc«*, & *mrfmiticm*, 5. *tHrfona* etc. — *S eaesia* H. B. Klh. No?. §*. I »p. pi ASJMT. II. Sft. — 5. *Hm—HfoU** Lag. Gen et sp. nov.S. — Habitat hi Mtslt* *fiof* Us loans ot Puerto de Varieotos, In montibus GaaBaiuaUfljslbuua c4 ad Illora laeaa PaievarauU, la declrrtate oeddenull mon-tlam Hexteasjonim prope Tlalpaxabaa.

155. S. DBMSIFLORA Bib. I. e. 721. — Caole herbaceo ereclo vix pub<rentc, f<>> petiolatis ovatia obluais creoatis, bail rolundato-truocatin subcordatis>e ru^osis-simis, utrinq pubescenlib tindlb. Y. vix subtus cane<cenlib, floralib docidms, racemis sulximplirib. splcaeformib, verticillastris multiflnns approximaix, calycib tubuloMs Hubgtabns, labio supenore integro dcAtibq labn infenuno ovatis obtusi%, corolli* ealyce dimidio longionb, gentalib exscrtis, connccim» poslics linearib d<fleIM longitodinaliler connatis, stylo glabro "4 — Specie* *S polytl*-chyae* el .S *heerht* afBnis, sed ab ulraque disiincti»sima, a priori foliorum forma, a posteriori pubescentia, ab utraque inflore*centia, catycls forma, eorollit P*^1 el gemulibus loage extertis recedil. — Crescil in insula Dominica

1M. S KRF.RIII Blh. U t t - Caule fruticoso? ereclo pubc>renic, foil pellola-t\% ovati* obtutis crenatit, basi rolondato-tmocalls rordaUsve ruKosi<>iniis, ^D~ tu* cano-tomentosis, floralib ovtils deciduis: racemii den»is pamculato-ramo*i*. verticillasiris mullifloris approximalis, calycib tubulojo-campanulaift P^1 0 " biriis, labio avperlore lolefro denlibq labil Inferiorls acutU, corollis rat)cc dupio longlorlb, t<bo IBICUSO troIncoso, labio lupenore rerio pubeicmh, infr"O^re longiore, lobis rolodatis, connecti^ls potlice linearib deOex.s longiuidinain^er connaiis, stylo gUbro ? supra barbaio. 5 - Afflni* s *potyMaekyae*, *ed wi^lis minnnbus obtutls rtgotltaimls el bati magis cordatu, racemi* brc%oi<rlbuua <<en-alorlbas ei calyclboj kirtis oec caoo-lomen(o>if ditlincia nt Ihibial in V^ico prope Tlalpuxabua.

C *Cordtfohae* Ob I c. 251

Folia poliulala, ba»i magit minute c cordata

W7. S SEHUTRATA Xoccar. in AWBocall. Baier Uad J. r ^ IM - I «^ ~ TM us «b-
 - Uule froiicoao, ramis tomeoloao-pubetcenub. foil JCHIC>UJU o - ovai ^
 tuais cresjaUs, bati cotdalis rugoiissimls, sublut albo-lomcnloti»» u<>^*lw-

- parvisdeciduis; racemis siroplicib.; verticillasris 4-8-floris dittanlib.; caiycib. pedicellatis lubulosis slnalis glanduloso-villosis, labio superiore inlegro denlibq. labii inferioris obtusis; corollis calyce duplo longiorib., exlus lenuller pubescenlib. lubo brevier exserlo ventricoso, labio soperiore redo, Inriore subbreiore; con'neclivis posiice deflexis linearib., longiludinaliler connalis; Mylo sublus barbalo. *i>* — Affinis 5. *Scorodoniae*, sed diversa calycibus duplo majonbus, pcdicellis elongalis (3-4-linearibus) el corollac labio inferiore brevior colore inlen-sjore. — Habiiial in Mexico.
158. S. FRUTICULOSA Blh. I. c. 721. — Gaule fruticoso humill ramosissimo; rarais albo-lomenlosis; foil, pelioblis ovalis obtusis crenulalis, basi roiundalo-lruncalis subcordalisvc rugobissimi*, supra vix pubescenlib., sublus albo-iomenioms, floralib. ovalis acuminalis dcciduis; racemis simplicib.; \erlinllaslrn subsexfloris distanlib, caljcib. subsessilib. lubuloso-campanulalis albo-lomenlosn, labio supenore mlegro denlibq. labii inferjoris obtusis iruncalis; corollis cañce subtriplo longionb, lubo breuler exserlo, labio superiore redo, inferiore duplo longiore, lobis rotundalis; siftlo brevier bar|alo. \$ — Affinii 5. *Scorodoniae* el *bretfflorae*, sed ab utraque habitu dislinctissima. Fruliculus vix 4-6-pollican*. Folia semi-pollicaria. — Crescil in Mexico circa Oaxaca.
150. S. SCORODONIA Poir. DiL Suppl V. 40. - Blh. I. c. 8511 - Caule fmiticoio; ramls eano-iomeniosis; foil, pellolails ovalis obloogisve obtusis crennlaiis, btsi roiundalo-cordalis rugosissimls, supra pubesceniib., sublus palllds v. albo-tomentosls, floralib. ovalis acuminalis deciduis; racemis simplicib.; verlicillasris 6-20-nons dislaniib.; calycib. subsessilib. tnbuloso-campanulalis striatis glanduloso-villosis, labio superiore inlegro dentibq. labii Inferioris obtusiusculi^, rorollis* cal>cc duplo longiorib., exlus tenuiter pubescenub., lubo broiler exserto >enlnoso, labio superiore redo, infenore duplo longiore, lohis rotundaiit; ron-necllM!> posiice deflexis linearib. longiludinaliler connalis; sl>lo glabro. j — Kami rit;idi palrnlos, nunc lomcnlo cano undique pube>cenle», aclale »arpc glabrali purpura^ccnics. Folia 1-2-pollicaria, juniors v. omm« sublus cano-iomento*a. Raccmi 2-4-pollicares, soliiaril v. subpaniculali, verticillasris MI »rmipollicerm di^ianiibui. Pedicelli vix lloeam loogl. Calyces i-3-lineares vlscoti. Corollao coeruleae, basi albidae, fere 5. *mar(\$Hm—> at panlto mlnoret. Labiam iup*rius brevier euarglnauun, loferloris lobus ntdlos maxlmos emarglnaius. - *S. mdissodora* Lag. Nov. gen. el sp. pi. s. - 5. *ktrim* Searaak in S)ll. pi. soe. Ba-li>b. II. 00.?) - HabUu In Mexico.
100. S. AMARISSIMA Ort. Dec. 4. - Bib. I. e. - BoL Baglit L 347. - Caule herbaceo erccto raroaso patenlim piloso-hlspido; foil, peliolalls ovalis cordaiit erenans rugosis glabnuscusis, sublus canescenlib., Ooralib. ovalis acutnioatift drciduis; racemis simplicib. densilloris; verlicillasris dislinclis subreotit nub-10-floris; ral)cib. lubuloso-campanulalls slrlaiis villosis, labio »upmore inlegro denlibq. inferiors aculiusculis; corollis calyce lubtriplo longionb., lubo raljcem aequanic ventricoso, labio superiore rcclo glabriusculo, Inferiore subtriplo longiore, lobis rotundalis; conneciivis posiice deflexis llneari-dilaiait loll-giludinaliicr connalis; slylo supra barbalo. % — Caules S-pedales, pih> lqgit patenlibus saepe glandulosis hispldi. Peioli pollicares. Folia iciquipollirana neni* pubescentibus, caeterum glabra, supra rugosa viridia, sublus palhda v! cancbccnlia. Rnccmi 3-0-pollicares. Flores 5. *lachnortach^dit* \. *S. prturtntit*. Calyce* piloso-hispidi Corollae coeruleae. Conneciiva supra ad Int>enioncm denials. si)li lobus superior inferiore duplo longior. — *V. nrctnnala* (av. Icon, plantar. IV 0. t. 3I<. — *S amara* Jicq. Hort. Schoenbr. III. i. 255. - s *nepetoidei* II D Klh. >o>. pen. el spec. pi. II. slo. f I. 150. - In Meico prop* llalpuhahua, in locis alpine No>ac Ili^pamac inier Temascailo el Ouanatualo

*) *hyutiroa*, *ulutinnta* foil, *lanrcotatt* *rynout* *tnarquahler* *errnalu* *rrcnti* *unndu-*
lato-rf/lexit. *rallynb.* *comvt cuts,* *curuUat* labio inVriore ronr.it i, , v' - An huc
 an ad S. semialraiam referenda *

- 161 S. CCSPIDATA Rz. el Par. Flor. Perur. et Cbit. I. 23. t. 40. fig. 6. - Bib. 1. c. 205. — Suffrulicou: ramis pubescenlib.; foil, peliolalis ovatis oblusiuscalis erenatis, basi cordatis nigosis, sublus pallidis pubescentib., floralib. otatis acuminalis dcciduis, racemis elongatis subsimplicib; verticillaslrissubsexoons dislanlib.; calycib lubuloso-campanulais •tllosis, labio superiore breviter tncuspidato, denlib labii lofenoris ovatis cuspidatis; corollis calyce sublnplo longionb, tobo breviter exserto venlncoso, labio sapenore redo, infenore duplo longiorc, lobif rotundatis; connectivis poslice deflens linearl-dilalalis, longitudinalner connatis, stylo glabro • b re viler pabeicenle. ^ — Suffralex orgjalis. Folia pollicant subduphcato-crenala. Flores fere S. *Scorodontae* T. *amaruttmæ* Corolla coerulea. — Habitat in Peravia in colliboa circa Purroeboca et Lbeuchm.
102. S. CARDIOPHYLLA Bib. I. c. 721. — Herbacea* v suffrulicosa' ramis pubescenlib.; foil peliolatia ovalis crenatis, basi profunde cordaiis HJROSH, utnq. molliier villosis, floralib. deciduis, racemia elongalis iimplinb, verticilla<tns subsexflorts diaUnlib.; calycib lubuloso-campanulalis tenuiier pubescentib, labio superiore integro denlibq labii inferforfs ovrlfis aculiasculis, corollis cal)cc duplo longionb T tobo subincluso venlricoso, labio sopenori brevi recto, inferior© sublnplo longiore, lobis rotundatis; connectivii poalice df(lexi< lineanb, longitudinaliter connatis, al)lo glabro. 2). - Habitus 5. *nuptatae*, a qua differ! folus molliter villosis el calycibus majonbus subcoloralis, dentibua mulicis, labio superiore inlegro. — Creacil in Americae meridionalia eitralropicae Banda onentali.
103. S. GILLRSII Btb. I c. 2GI. - Caule fralicoao; ramia cano-tomenlosis, foil, petiolatia ovalif v ovalo-laoeeolatit obtasloscalls crenato-dentatis, bail truncatocordaiis nigoaia, supra gUbriaseolla, sablaa cano-lomentoaia, floralib. o>atis acatis deidals; racemis sinptietb.; fertlelllasUis remotls 2-0-Boris; calycib. •obsesallib. campanilatla eaao-p<bes<entib., labio superior* integro inferionsq. denlib. ovatis obtusis maeronaUs recrvt; eorollt calyee sobdoplo longlorlb., extos pabescentib., labio superiore redo, Inferlore dnplo longiore, tobis rotundatis; connectiTis postice lineari-dilaUisdefleils, longitudinalatier connate, shlo brevissime pubescenle. 6 — Ilumilis, basi glabrata, rami cano-lomenlosi el glandulis coccincK cnn^persi Folia 1-1'/t-pollicarla, »ublus nenosa albida, »aepeduplicato-crrndta acutiuscula. Racemi 2-6-pollicarr< pauciflon Cahers 2-3 lin. longi, sacpniN colnratl, labm demum talde recur>o-patrnlibu5 (orolla cocrulea ft tyre s *urharfohae*, <æd minor Odor fraRrini*simus — Habitat in Cbifi copiose in pracrupus Andium prope Mendoza el I »palrta el in monlc Cerro de las Achiras dicto.
- 1M S RACFMOSA Rz el Pav Fl Peruv et Cbil I. 21 - Bth I c. 2fJ | - Foil, cordatis aculis sublaocrohtit serralis; racrmis terminahb rompositis, bractels ovatis acuminalis ^ - Planta birsota. Caulis ereclus ramo»u<, infrne nudus suhteres Rami bracbiati letragoni. Folia looge peiolala cordata acuta sublancoelaia serraia, saepius colore purpareo litido macalala Raccmi terminal?*, P^{lu}~nmis spicis compositi Flores %rrtcilt<ti, breviiier pedunculati, anir rlicationem obiecti bracuis ovalis acuminalis coloralis caducis. Corolla obscure coerulea. — Habitat ID forsons el raderati* Iluanuci Peniviae.
- 161 8. CARKRA H. B. Ktb Wot gen el spec pi II 300 I 151 - Bth I c 200., t - Uule frulicoso rasooso ereclo glabro, foil. »ubroiundr»-o»ati« acuti* cordaus crenao-serraiis birtis; verticilla»tris multiflons, tnferrionb parum rrrroois. calj<ib Mrtis. § - Caotls erectus ramo<us ramique icirarconi glalm, genicull P»° . Follt opposiU, longe petioUta, ulriq birta, i-i poll long*. <<-20 !... lai . Petioll sesqalpollicares canalicafaii, iniernr pilo»i sp,rje trrniinal* * rrlleci latao plo. tripollicarri, verticillis mulliflons approximate, infrnonbut parum remoli*» * res magnitudine floris JT<u#<# *offlanais* Braricac ol>lon<>c acuroioatae. cal-co breviorei caJucae. Caljt tubulosos bilablatu* »ir.atu* hirtus, apice ^{co}orali^ labio sspereiore ovalo-acominalo, ioferiore bifido, lacinn* acuminalis. Coro carnea, ubo sapenie panim venlncoso caljcem superanie, I<W° supc rioro

concaTo obtuso villosa-pubescente, Inferiore paullo longiore patentim reflexo
 Irigdo, lacina intermedia emarginata-biloba, lobis subrotundis. Stamina generis,
 galeam parum superantia. Siliqua eiserlino glabrum. - Habitat in Andlboa Quin-
 doensium in regno Novo-Granatensi.

166. S. PROCURRENS Bib. I. c. 266. — Caulibus. basi repentibus. radican-
 tibus; ramis ascendentibus. glabris villosisve; foliis, petiolatis subrotundis
 ovatis, basi cordatis crenatis glabris villosisve, floralibus. late ovatis aculiscu-
 deciduis; racemis simplicibus. longe pedunculatis; Verticillas 6-10-floris remolis;
 calycibus breviter pedicellatis campanulatis hispidis, labio lupenon integro r.
 brevissime tridentato denique lobis inferens acutis; corollis glabris calyce sub-
 duplo longioribus, tubo calycem aequante venuloso, labio superiore recto, infe-
 riore duplo longiore, lobis rotundis, connectivis postice deflexis linearibus
 longitudinaliter connatis, stylo subglabro ♂ — Caules elongati ramosi glabri
 • pilis paucis saepe glandulosis hispidi viscosi, Juncos saepius pilis adpressis
 pubescentes. Folia distantia, inferiora subrotunda, fere *Nepelae Glechomae*, su-
 periora subovalia rugulosa venosa glabra T. utrinque villosa. Racemi *S. ovalifol-*
hae, at minus nigri. Verticillas infimi 2 poll., supremi vix semipollicem re-
 moti. Calyx *S. lachnostachydu*, at minus hispidus. Corolla coerulea *S. ovalifoliae*.
 Connective ad insertionem supra donum. Stylos subglaber ?. brevissime barba-
 lus, lobo superiore elongato subulato, Inferiore abbreviato acuto. — Habitat in
 America meridionali, in pasena humidis et sylvis profluvii Rio Grande do Sul,
 in sylvis humidis ad Porana et ad fossas prope Buenos Aires.

167. S. PROPINQUA Bth. I. c. 267. — Caulibus basi repentibus; ramis adscenden-
 tibus elongatis villosis, foliis, petiolatis ovatis-obtusis crenatis, basi cordatis, utrinque
 villosis, floralibus deciduis, racemis simplicibus; verticillas subcylindricis remolis;
 calycibus pedicello subaequalibus tubulosis sinuatis rufo-villosis, labio superiore in-
 tegro denique lobis inferioris ovatis aculis; corollis calyce duplo longioribus, tubo
 calycem aequante venuloso, labio superiore recto, inferiore duplo longiore, lobis
 rotundis emarginalis, connectivis postice deflexis linearibus dilatatis, longi-
 tudinaliter connatis, stylo glabro. ^ — Afferunt 5 *procurrentis*, a qua differunt
 caulibus firmioribus foliisque magis villosis, foliis breviter petiolatis et praecipue
 floribus majoribus calycebusque longioribus pedicellatis, utriusque nee campanulatis,
 rufo-villosis nee pilis hispidis. — Habitat in Brasilia meridionali.

D. *S. procurrens* BU. t. e. H. 7.

Folia sessilia T. subsessilia, basi rotunda. — Spodopomones Brasilienses nigrae

168. S. OVALIFOLIA St. Hil. mss. ex Bth. I. c. — Caulibus basi repentibus, ramis
 ascendentibus glabris villosisve; foliis, breviter petiolatis ovatis-obtusis
 crenatis, basi rotundis glabris subcordatis, floralibus. ovatis-lanceolatis, calyce
 breviter deciduis, racemis simplicibus; verticillas 6-10-floris remolis; calycibus
 tubulosis sinuatis pubescentibus, labio superiore integro denique lobis inferioris
 ovatis aculis, corollis calyce duplo longioribus, tubo calycem aequante ventricoso,
 labio superiore recto, Inferiore duplo longiore, lobis rotundis, medio latissimo
 emarginato; connectivis postice supra denique deflexis linearibus dilatatis, lon-
 gitudinaliter connatis, stylo breviter barbato. 4 — Caules basi nigrescentes
 ramis ascendentes, parce foliosi, sub racemo subnudi, pedicelli aequipedalesve.
 Folia polycaria v. ultra, exaeque ovalia. Racemus longe pedunculatus, verticil-
 las fere pollicem remolis - 5. *repent* Bib. in Herb. Mus. Beg. Berol. mss

fi n. Uosa foliis profundius serrato-crenatis, basi latioribus. — Habitat in Bra-
 silia in pascuis Missionum Uruguayensium vulgaris et in campis herbidis
 prope Fazenda do Capitaõ Pedro provinciae Minas Geraes, *fi* prope Salto
 Graude fluminis Uruguay in provincia Rio Grande do Sul

160 S. LACINIOSA T. in S. Bib. I. c. - Caulibus basi radicante, ramis adscenden-
 tibus simplicibus. villosis et paucis pilosis, foliis subsessilibus ovalibus-oblongis obtusis

regulariier crenolatis, basi rotundatis v. subcordatis rugosis, sublut rafo-tomentosis, floralib. cordato-ovatis oblusiusculis, calyce subbretonb subpersistentib.; racemi» denais, teriicillaslns subremous sub-10-flons, ralycib. campanulas pilo»o-hi»pidis, labio supenore inlegro deniibq labu infenons acutiusculit; corollis caljcc subduplo longionb., In bo calycetn subaequanle ventricoso, labio supenore recio, in fen ore duplo longiore, lobis rotundatis; connectims postice deOexis lanceolalo-dilalalis, longiitudinaliler connalis, stylo bifanam barbato. 3» — Caules 1 't-2-pedales, m ramon rafo-tomentosi v. villosi el pilis longis albidis patenlibos magis minusve hiapidi. Folia pollicana, elf Ranter crcnulaia rugosa subconacea, supra leouiiier pubes cenua, sublun subsenceo-iomenlosa ve« nosa, Qoralia >ix in verticillatfro froclifero decidua. Racemus 3-5-poll icaris. teriicillastri infimi vn semi poll Jcem remoti, supremi appronmaii, saepius 10-flori. Calyces breves campaoolali, bracleae el axis racemt pilis longis paulis dense bispidi. Corolla eoeerulea 5. *ovalifolttte*, ai paullo minor. — tlabuai in Brasilia* in campis prope Regialro de Cuniiba^el in pascuis prope Faicnda da Foruleia provinciae Sancti Pauli.

170 * S VISCIDA Si. III mss. ex Bib. l.e.206. — Suffrulicosa vi-co«a ramis glanduloso-hirtis, foil sessilib \ infenonb pcliolalis ovaio-lanrtolalis acutiusculi» serralo-crenalis, basi cordatu, olnnq vmdib. mnlilib. bnpidn, racemis elongalis »ub»implicib , verlicillaslns suMexfloris sob«eeiindi«, caljnb. tubuloso-campanulalis villosis viscosis, labio superiore iolegro deniibq labn inferions ovais acuiis, corollj« calyee duplo longiorib., lubo aobexserlo teniricoso, labio aupenore recto, inferior* duplo loofiore, lobii rotundatis, oonnectivis posiice deflexis lmeari-dilaUis, losgilodioaliler connalis; stylo supra barbato. 2» — Suffrutex 3-4-pedlit, ball aaepe deeanbeaa, rani berbacei divaricati. Racemi •enipedalet numerosi. VarUciUaalri aeanlpollieaiii •. deaun pollicen renaoii, plerunque secandi. Garalia eotrnlaa. — Habllat in Brasilia, In aylvis Carrascos dicua, in terra Negra ad IIB IIM_ atoviaelaraai Mloas GeraM «i Rio de Janeiro.

171 S CORDATA Bib I. c. — Caule berbaceo ereclo elato tilloso, Toll brcviiir petiolalis ovato-oblongis acuiis crenatis cordalis rugosti, supra pubosrenlib , sublus mollitcr albo-lomento«i<t floralib o\atis acuiis *) dculuis, racenns simplicib , vrrticilla>Iris dislanlib. rounnris. cal)nb tubuloso-campjnulahs sinatis pubc^rcDtib , labio supenore inlegro deniibq labn uifrrions acuiis, rorollis caljre triple longionb , lubo brenier exsrrlo ^enlnro^o, labio supenorc redo pa* bc»cenlr, infcnore duplo longiore, jobi% rotundajais, mrdio lali%»imo rroarginalo; connerliTi« postice supra dentatis deflexis lanreolaio-dilaiatis obiusi<, loogiludinaliifr approximatis sobconnatis; stjlo glabro % — (.aules flrmi 3-4-pedal** aubtinplicei, nolliler «illo»l Folia ampla 3-4-pollicana, molliter rugosa, subtu« lana alba subsericea lonentnso-tillosa \enicilla»in saepe ultra 30-flori, ferr pollirero renotl, racesao semipedali Corolla coerulea ultra polhcorii Styb lobu« superior longissime tabulates, inferior quadruplo bre«iur acuius — Ifabi-UI in Brasilia mendionali.

171 8. NBRVO8A Bib. I. c. - Caule berbaceo (*) ereclo subsimplici rufo-lotoeniofo tl pilia loogis pateolib. bispido, (oil. sessilib ovato-lanc^olati« aruiis crcoato-aerralis, basi roUadaUs subcordatis conaceis, supra ru«osi< gUBns. sublus a*r-vosis tenuisaiiat ruCo-tosaealoPis, floralib. otatis acuminatis drciduis, racflB^o eloogalo, verticillaatrls crebris 0-10-flons. ral)cib o»jio-iubulo»n tinatis pa-bMceabb,, labio superiore inter© deoubq labu infenons late otali* obiusif j brvfkter aeoaaiQatis; corollli ealyce duplo longionb , ciuu« tomento«is, l«bo e»-•«rto superae aaipialo, labio lopehore redo, inferior* brenore, lobis ^{uler*M D,} rotundatis reflexis; connociitit odrauluis, postire lioeanb. dortexi* conoalli; •«J•^o barbato ^ - Caolot (t. ra«l?) aaibsiopicet «-3-pedale«, baM denadal*. ^{folia} •• m«dio caolit «tSBoroaa troeiijscc«la Hglda l-*pollieana; superiora »^{re*o r} J*J«ora aoisjiittata. ftaeoma ultra pedal It, tenieillatrit tji iraiipoIH¹ ••••• Mboar Caljeetpedleo1laU3lib.loBgl. Corolla 0-«-jioearis coeralwceos? fiumin^o

- loeiosa Stylus corollam aequans, lobis sobulalis, superlore longlore. — Habitat in Brasilia mendionali
173. S RIGIDA Bib. I c. 200. t — Caulib herbaceis erectis villosis r. glabrioaeilu; foil, sessilib lanceolatis v Hneanb., bati cordalis, margine erenulafs glabris subconaoeis rigidis, floralib. minulis linearib. declidnis; racemis simplicib., verticillasris 0-10-flons remotis, calycib. tubolosis ttraiis villosis, labio superioris integro dentibq labii infenons ovalis aeulis; corollis ealyce subduplo longiorib, mbo oalycem acquante venlncoso, labio snpenore recto, infenore duplo longiore, lobis rolundalis, conneclms postice deflens linean-dilaialis, longiludinaliter connatis, stylo sublus breviter barbato. 2|. — Species quoad laliludinem foliorum Tilde vanal, sed pnmo intuiiu ab afflnt *S nervoia* differl racemo paucifloro vix umquam semipedali el folns angustionbus. — Habitu in Brasilia, in locis a unfens camporum ad ^ilia Rica, in pascuis prope pagum Piumhy, in parle mendionali provinciae Blinas Gerafits el in campis prope Santa Borja inler Missiones L'ruguyacnes el prope Rio Jacuby provinciae Rio Grande do Sul
- 174 S ROSMARINOIDES Si lil. mis. ex Blh. I c. — Caule tuffruticoso, ramis erectis virgalis lomenloso-villosis; foil, tessilib. linearib. v linean-lanceolatit acuminais creoaais, basl subcordaUs rigldii, supra glabriuaculis, toblus canomeniosis, Ooralib. ovalis acuminais deciduis; racemis elongatis aimplicib, vericillastris aubsexOoris dlsUnlib.; calyeib. lubulosis vUtaso-villosis, labio sup en ore inlegro deniibq. labll Inferioris aeulis; eorollis oalyce aoblrlplo longiorib., lubo breviter exserto, labio superlore ereelo, ioferlore aubiriplo longlore, lobis rolundatis, cooneclivis postice deflexis lieari-dilaUlls, loogitudiMlller connatis; stylo bifanam pubesceolc. 2|. — Planla inodora bipedalis, basi hgnosa Folia in parle Inferiore ramorum crebra subblpollicana, margine saepius revoluta Racemus fere pedolis Corolla coerulea, lieeis albis nolala — Habitat in Brasilia, in campis Missionum Urugua)ensium prope el Salto grande flumims truguay
- §. 3. *Axilhflorae Blh. I e. 270.* — *Folia floraha caultmt conformta. Floret ax Mares. Corollae (ubu\$ calyct aequala v. vix dimtdw tongior. — SuffnUcet v. fruticuh humtles, floribu\$ coervleictntibus.*
- 175 S AILLARI8 Moc. et Sess. mss. ei Blh. I. e. — Suffrulicosa homilii foil obiongo-llnearlb aeotls Integerrlmls, basl angtttsUtis scabrt-hlrtils, toraliS). conform I b, verticillasris axillarlb. S-6-floris; ealycib. smbsewlllb. labiUtlit slrteUs pubescentib, labio superlore tridentalo, Inferiore blB4o, itnUb. OMID aeulis subuloto-acuminais ^ — Specimen unicorn In fcerbario LmbertlMO servaium habitu *Thymo* > *Satureja** simile est. Folia 3-4 llm. tonga. Calyces folils subaequalcs - forollae desunl. — Habitat In Nova Hlspanla.
- 176 S CINE1FOIIV Blh I c - Suffrutleosa homllls: ramis deenmbenlib. tillotis, foil sessilib o\ato-cuncatis sobdentatls, basl angustails, ulrinq. vIHdib., floralib. ronformib, verticillasris axillarlb. paucifloris; calycib. tubulosis villosls, labio supenore brevier tncuspidato, Infer I ore bifldo, lobis acuminais; corollis ealyce plus duplo longiorib, lubo exserlo aequali, labio superlore bretl erecto, infrriore iriplo longiore, lobis rolundatis; eonneclivls postice deflexis dllautis submcras-aatis, longiludinallter connatis; stylo glabro. 1|. — Caules e basl crassa lignona lorluosa plures, \\x semipedales flexuosl Folia 3-4 lineal longa, dente uno al-lerove ulrlnque nouu, InQma el suprema sublnlegerrima Florts magoitudioc florum *Calamnthae Nepeiae* — Habitat In Mexico prope Cbapollepec?
- 177 S CALAMIMIAEFOLIA \ahl, Enum pi. I 233. — Bib. I. c - Caule frulicoto ramis canescenub, foil petiolatis late ovalis obtosis crenatis, bast rordaii/ utrinq tenuicr lomenlosii, floralib con form ib; venicillaslms axillarib remotis subieflori« calycib pedicellatis tubuloso-campanulais glabnusculis, labio »u- periore integro uifenorisq dentib ovatis aeulis, corollis cal)ce lubduplo lonjrinl rib, cxius pubescentib, labio supenore credo, infenore duplo longion* lobis rolundatis, conneclms poslice dilatalis dedexis, longitudinahier ronnaii/ §1 u.0 superne barbato 5 - R«mi tenues subpurpurascotcs Folia ||| unguiculaña

otrinque mollia, margioe ulnnae crems 2-4. Corolla coerulea. Genitalia breviter ciserta. — Habilai 10 iDiula Sancti Domioici.

178. S. BALLOTAEFLORA Bth. I. c. — Frulicosa humilis* foil, peliolatis orolotoodatis obtusis crenalis, basl troocalis cordaiisfe, supra glabnusculis, soblof albo-tomentosis, floralib. conformlb. T. supremis bracleaeformib.; Yeriicillasiris paucn anllanb. 2-0-floris distantib., r. 8-3 supenonb. in racemutn brevem approximatii; cal/cib. pedicellalis tubuloso-campanulalis, basi attenuate, labio supenori integro denlibq. labii inferiorif o?alis pott anibesin dilalahs; corollif calyce tubduplo longionb., lobo ineloso, labio tupenore erecto, infenore duplo longiore, lobis rotuodalit; connectivls poslice dcflexis dilataiis, longitudinalfter conoaiis, slylo bifanam barbalo. 6 — Fraiicalos ramosissimus. Folia vis temlpollicana, Jumora nublos oil calyces tomenlo aabfanoaceo alba. — Habilai in Menco prope Tollman.

§. 4. *Mtmbranactae Blh. I. e, 271.* — *Folia floraha bracUaeformia dilatato-potentia membranacea. Coroliae tabus inclusus v. vix calyce longior.* — *Herbae v. suffrulicu, jtoribus coerulucentibus.*

170 S. BtPLELROIDES Pr>l mu. ei Blh. I. c. - Herb area glabnoscula • roll, peliolaiis ovalif aculis crenalo-serralit, but aogofUtts cuneatlsTe, ulrinq. viridlb.; ramis in aiillis abbrevialis, peduocolit longis fasciculalis; tarticillastro in qnoque peduncolo aolilano lerminali nollifloro; foil, floralib. calyces eicedenlib. persislenUb. late roiundalis, basi sabeordalis, apice breffier acuroinalia neni-branaceis veosit glabru; calycib. afjaallib. soeabranaceis, labio sopenore iniegro denlibq. labii ioferioria otatia aetHioaeolU; eorollis calyee tii longiorib; connectims poalict dofleila, loMtMdlMliar coaoaiia. ^T O? — Species ioflorefcenlia disiincUsalsaa. Fodoac<H 3-5-polllear<<. FolU floralia 3% lift, longa, 5 lin. lau. Florea nltoli. — Gmell In Mexico.

180. 8. LASIOCEPHALA Hook. §4 An. Bot Beech. toy. 301. - Herbacea, pobet-cenii-biru: foil, pellolalia otalo-eordatla acolis grotse aerralis, basi oblusis; peduncalia longiasimls filifomib.; ferlicillaatris globoso-gloneraiu remolissimis paucis; bracleis cordalis acalis membranaceis relirnlalis, vcriicillasro subbretionb, calycib. dense albo-tomeotosis. ^ — Habilai in n>j?no Menco

l<l >s VQcN>| Bib I c. 871. - Caule bfrbacro ^) procumbent?, raml asceadrniib brcviter pubescenlib.; foil, peiolads o^aiin acuminaiis serraio-crenatia, ba*i runealis f trunralis glabnusculis, floralib. manmis orbicularib acamioatif membranacris venosis patenlib.; racemis simplicib., %rrticilla>lrir rrmolis (kl⁰-flon<. calyrib sabsessilib. ovalo-lubulosis canescrnlib, labio supiore lottf*⁰ denlibq labii ioferions acalis cilialis; eorollis cal)ce duplo longiorib., tobq >o-ducto vcnincoso, labio soperiore redo iolcgro, infenore duplo longiore>. IODIS roiundalis, nedlo lato eaargioalo; conneeuvis poilice linearib. defleiiit. ¹⁰⁰* tudmallier connalis. stylo giabro. 3} - Folia forma 5. po^Hack^f, sed uirmqoe viridia glabra v. tenoiMime pvbesceolia, floralia fere pollicem lala, ad >enas ietftler pllosa. Calyces el floret 5. fcpfo#f<d>y*#. Coroliae coeroleac Ranc >p>clesa miseniol Hocino el ftesse sob nomine 5. br>cltaeflora*; sed hoc noise. muundttsi erat ob aotiqoiorem S. briUmUm Bust. - Alflni* S. ^ f ^ ^ J sed foliis floralibos majonbus viridioribos el magis acomloatit, floribot bus el inflortaceolia diauoclissiaa. — Dabital In Not* Iitpama.

•• &. *Bracfata\$ Blh. I. c. 271.* - *Folia floraha bracUaeformia* ^{per-} ^{ibus} ^{oribus} •^<mfrio ktrbacHi loff rotundata, flora amplecUntta. Corolla* n inclusut v. calyct vU dimidio longior. — *Uerba\$ fruticiiv*, n cotruUtctntibut.*

l* 8. UIBSITA Jacej. Bort SeHotAbr. 111. I. L D i • Bib. I. c. «7<...f "remo f ^{Cau} ^{remo} ^{u-e} •^> aseostdenu rasio#o pobeMonlo; foil, peliolatia oblongi* •c'°"• serralia, fcaai tagiuuiis villoais, floralib. aeasilib. Uu rolandaUi acoBioaui, iv •

- clliatis persislenlib, Yerticillasram superanlib.; racemis limplielb.; •erlieillailrfs
inbsexflons, demum distanlib.; calycib. sessilib. tnbuloso-campanulais subiofla-
tis itnalif pubesceniib. v. hispidis, lablo saperiore Inlegro dentibq. labu inferioris
ovalis aculis; corollis calycem brevier superantib., lubo incluso venlncoso, labio
sopenore credo, inferiore duplo longiore, lobis rolandalis; connectivis poslice
deflexis lineari-dilatalis, longilodinaliler connalis; stylo sublus barbato. 2|. —
Occurrit etiam in bortis sub nomine 5. *praeecis* el *telragonae*. — *S. phlomo-*
ides Car. Icon, plantar. IV. 10. t. 330. (non Asso). — *S. ciliata* Poir.T Diet VI.
588. — *S. braeteata* Poir. I. c. 022. — 5. *tideritidii* Vabl, Enumer. plant. I. 250.
— 5. *cryplanlhot* Schult. Obs. 12. — *S. nepetaefolia* Poir. Diet. Suppl. V. 48. —
Habitat in Mexico.
183. 6. CLINOPODIOIDES H. B. Kill. Nov. gen. et spec. II. 204. t t. 145. - Biñ. I.
c. t — foule herbacoe erecto superne albo-lanato; foil, ovatis obtusiusculis, basi
rotundalis crenalis, subtus pubesceniib.; verlicillastris mullidons dxlanlib ;
bracleis magms subrolundo-cordaiis persistentib.; calycis albo-birli labio infe-
riore brevior reflexo. ty? — Caulis herbaceus erectus lelragonus pilosus, su-
perne albo-lanatus. Folia oppoila peiolala, basi roiundaia aul subcordata
orenau, utrinque pilis spartla adprestia praesertim in veols obsila, 2-pollicana
el loogiora. Floras variicillato-splettl, verticillaslris subglobosis mulilOoris
dlsuniibus braeteatis. Floras 10 lln. longl. Braeteat sobrotuado-ovatae obtusae
pilosae persisientes, calyces superantes. Calyx laboloso-campanolaius bllablatoa
albo-hirtus, labio superiors ovalo-acomlnalo, Inferiore dimidio brevior bldo,
lacinus acuminaiis reflexs. Corolla pallide coerulea, tubo calyce longfore, IU-
perne amplialo glabro, labio superiors galealo oblusio pubescente, inferiore triplo
longiore Inn do con\exo saturate coeruleo, laciniis lateralibus abbreviatii, inter-
media dilaiata biloba, lobis rolundatis. Stamina labium superius subaequantia.
— Habitat in INo\ali»pama inter urbera Pazcuaro el Apuaiarco.
184. S. SPECIOSA Prbl. mil. ex Blh. I. c. — Fruicosa: ramis superne albo-villo-
sis; foil, peiolaiis ovalis aculis serralis, basi rolundatis Iruncaliisve rugous, su-
pra pubesceniib., subius albo-vitlosis tomsotosisve, floralib. bracteaformib. late
OTalis acumioaia, calyces longlorib. prsrslstnUb. bsrbaesta sabeoloratis; racemo
dense imbrlcaio; terticillaatrls approximaUs fr-IO-floris; calycib. aafnlis lubaJo-
sis, lablo superiors srstoUbq. Isbll IsjCsrloris ofaUs acaUs; esr<UU salves
sobdoplo longionb., labo calysoi aequasUi sjnsniulib. loofs tutctls; soDMcUfia
poslice linearib. deflexis, loogliudioalUer csmalls. 6 — AllaJs 5. *Ptmutmsi*
sed cbaraclenbus dalis disllncilssima. VsrUsllistri sobssenadi. Calyss7 7-« lin!
longi, basi him, apice utl folia floralia st eoroUst atropurpleU — Hablut in
Peruvia circa urbem Huanuco et In monlaais Ticinls.
185. S. MATHEWSII Bth. I. c. 722. t - Herbacea: ramis sapsras villoslsaimis; foil.
ampin peiolaiis ovalis, basi profunde oordalii flaccidis, utriq. tirldlb. glabrit
v. nervis vix hirmiiis, floralib. bracteaformib. lale oralis membranacei colora-
Ui, calyces aequantib. subpersistentib.; racemo elongalo laxo; •ertlcillaitrii 0-
10-Doris; calycib. pedicellatis magns tubulosis, labio supsiori Inlegro dcntibq.
labil inferons ovaUs aculis; corollis calyce vix duplo longlorib., tubo cahcem
aequanle, lablo superior! brevl; genllalib. longe exserUs; connectivis posticc li-
nearib. deflexis, longiludmaliler connalis. % - Florei 5. *tpenotot*, folia fere *S.*
macrophyUae el forsan radius inter *Longifloras coeruleat* enumerator. Folia in-
fenora 6-8-pollicaria, floralia oblusiuscula. Bacemus elongatus ultra pedalis
Pedicelli calycem acquanles bin»uli. - In Peruvia ad Purrobuca el Obrajillo
180. S. PARQUERENSIS Moc.no el Scss6 mss. ex Bib. I. c. 273. - r.aule herbacoe
credo, superne albo-lanato; foil, longe peiolaiis ampin otatis acutis ban ro-
tundads \. cunealis, in peiololum alatum decurrenlib, utrinq. pubttrennb' floralib''
•ess.I,b rotund.iii< OBIUMS persikentib flores amplectentib; racemit Mniilnb'
verticillaMr.s dense gloxms muhifloriN appro&imainduiinclis, rahn h lubulo^n %
campanulatis albo-birli^ labio lupenore o.ato acum.nalo »niékro, mftetiorr

dimidio brevior, laciniis acuminalibus reflexis; corollis calyce subtriplo longioribus, tubo exserto, superne ampliato, labio superiore recto, inferiore triplo longiore, lobis rotundatis, medio maximo emarginato; connectivo postice linearibus, deflexo, longitudinaliter connatis; stylo pabescente. — Descriptionem et iconem *S. eltnopodioidu* Kaolhii omnino refert, praeferat folia, quae amphora et basi in petiolum late alatum decorrenlia. Racemus densior. Corolla coerulea pollicari. — Crescit in Nora Hispania.

187. *S. MACROSTACDYA* H. B. Kth. NOT. geo. et spec pi. II. 206. - nth. 1. c. - Caule fruticoso erecto hirsuto; foliis, petiolatis subrotundo-obovatis aculeis, basi profunde cordatis, auriculis rotundatis imbricatis, utrinque pubescentibus, floralibus late ovatis villosis peraxillariis, calycem aequantibus; spicis densis crassis; verticillastris multifloris arcuatis approximatis; calycibus sessilibus tubulosis villosis, labio superiore tubo integro dentibusque lobis inferioribus acutis; corollis calycem excedentibus. 6 - Organi et altior, rami tetragonales hirsuti, nodi nodosissimi. Folia 2-3-pollinaria, irregulariter crenata. Spica 0-1-pollinaria, diametro ultrapollicari. Corollae in specimine Tafallia in calyce exsertae coeruleae sunt, labio superiore fornicato leviter emarginato piloso, inferiore tripartito, lamina intermedia emarginata. - Habitat in Peruvia prope Guayaquil in alia planitie Andium Quiteniam Jaita Quito, Llacuoga et Cuencabamba.

{ 0. *Friantiae Bth.* l. c. 273. — *Folia floralia bractaeformia decidua. Calycei dense tomentoso-lanati. Corollae tubus calyce vix dimidio longior. — Herba frutescens, floribus* albidis flavescens Ubus v. rarissimis.*

188. *S. LEUCOCKPHALA* H. B. Kth. No?. geo. et spec pi. II. 303.11.130. - Bib. I. c f - Caule fruticoso erecto hirsuto; foliis, ovatis obtusiusculis cordatis creberrime serratis, fimbriatis lobis ovatis verticillatis Bolifloris arete confertis; calycibus eadmodum lanatis lomeiosis. 5 — Prutex erectus teretis ramosus inodorus. Rami tetragonales canaliculati. Folia opposita pellucida, apice angustata crassiuscula reticulato-venosa, bipollinaria. Petioli 4-5 lin. longi canaliculati. Bractae icriminales ovatae verticillatae 2-3-pollinariae. Bractae ovatae acutae, supra densius pubescentes, subtus albo-tomentosae, rariore breviores. Calyx tubulosus bilabiatus albo-tomentosus sublanatus, labio superiore ovato aculeo, inferiore bifido, lacinus acutis. Corolla violacea, tubo calycem aequante, labio superiore linear-oblongo emarginato interne pubescente labio inferiore paulo longiore, superne inflexo palato piano, lamina intermedia tubulata iolegra. Stamina septem etstrata. Stylus exterus pubescentis. Stigma bipartitum, laciniis aequalibus. - Habitat in Peruvia, prope pagum Alausi Quito.

189. *S. BREVIPLORA* Mof. ft Stt. nts. fx Bib. I. c 871 - Caule fruticoso; ramis tetragonibus canaliculatis; foliis breviter petiolatis ovatis acutis rerenulatis, basi rotundatis. »subcordatis«, supra molliter canaliculatis pubescentibus, tubus albo-tomentosus, lobis ovatis acuminatis calyces aequantibus, subtus dense albo-tomentosis; racemosis apicatis deorsum tuberosis; verticillatis tubulosis approximatis seuis; calycibus vubsemitibus tubulosis campanulatis albo-tomentosis labio superiore integro inferiusque dentibus abbreviatis obtusis. corollis calycem subduplo longioribus, etiam tomentosis, labio tubulosis. grnatis. fubexsertis c«B8«U«U postice linearibus, deflexis, longitudinaliter connatis. Mylo glabro. Polla fere USJIMM# vix pollinaria. Racemi 1-2-pollinariae. nunc so Warli. plures panleolae Calyces imbricati, 4 lin. longi, basi attenuati inconi. labium sopenos sablocurvum, breviter emarginatum, inferius longius rotundatis. medio maximo bifido. »t«caffio.» «idetur S. »t«nini et »t«tua partibus fere disidio Minor, folia niout cordata nomenium »t« oalyetia tenuius. — Bablall in Nova Hispania et in Meticu.

190. g. COLLINA II. B. Klh. Nov. gen. et spec. pi. II. 288. f - Bib. I. c. 283. t 720. el 722. - Fruticulosa: ramis foliisque subulso albo-lomentosis, supra pubescentibus. lanceolato-oblongis obtusiusculis, basi acutis crenatis; spica longe pedunculata; verticillatis multifloris approximatis; calycibus albo-lomentosis. 6 - Erecta ramosa odoratissima, rami leiragoni albo-lomentosi, inferiores saepe decumbentes. Folia opposita, breviter petiolata lanceolato-oblonga obtusiuscula, basi acuta crenata, supra viridia pubescentia, subulso albo-lomentosa pollicaria. Spicae terminales pedunculatae verticillatae, verticillatis inferioribus dislanlibus. Bractea lanceolata lomentosa caduca. Calyx campanulatus lobis bilabialis! albo-lomentosus, labio superiore ovato integro acuto, inferiore bipartito, laciniis acuminatis. Corollae deciduae coeruleae, labio inferiore albo-maculato. — Habitat in cohibus siccis montium Quilensium prope Riobamba Nuevo.
101. S. SPICATA Róm. et Schull. Syst. vegetab. Maol. I. W2. - Bth. I. c. U4. f 720. el 722. — Fruticosa. ramis glabris, junioribus cano-pubescentibus; foliis lanceolato-oblongis, apicem versus obsolete crenatis, supra pubescentibus, obtusum albo-lomentosis; verticillatis multifloris approximatis; calycibus albo-lomentosis labio superiore iridato. 6 — Frutex Iripedalis et aliorum, ramis tetragoosis glabris, junioribus cano-pubescentibus* Folia opposita, brevissime petiolata ovata oblonga acuta iniegerrima, apicem versus crenata, supra viridia pubescentia, subulso albo-lomentosa subpeltata. Spicae terminales axillariae pedunculatae verticillatae. Floret 4 in longis. Bractea ovata acuminata albo-lomentosa, apice coalescentes caduca. Calyx campanulatus lobis bilabialis, labio superiore obtuso tridentato, inferiore obtuso bidentato, dentibus omnibus acutis. Corolla coerulea, tubo calycem aequante, labio superiore galeato concavo emarginato pubescente, inferiore duplo longiore tritido, lobis rotundatis, intermedio duplo latiore emarginato-bilobo. — *S. pulchella* II. B. Klh. Nov. gen. et spec. pi. II. 288. t. 140. (non DC.) — *S. Humboldtiana* D. Dietr. Gaertn. Lex. VII. 418. - *S. Humboldtii* Spr. Syst. veget. I. 04. — 5. *taligna* Willd. Herb. ex Link, Schw. et Alb. Dielr. Spec. pi. I. 306. — Habitat in Nova Hispania.
102. S. FARINACEA Bio. 1. c 274. — Caule herbaceo erecto glabriusculo » foliis petiolatis ovato-oblongis lanceolatisve obtusiusculis irregulariter serratis crenatis, basi longe angustatis glabriusculis, utrinque v. tubus canescentibus, floralibus parvis deciduis; rachis elongato simpliciter; verticillatis multifloris subsessilibus v. superstitibus appressatis; calycibus albo-lomentosis, labio superiore integro lobis obtusis; corollis calyce duplo longioribus, estis glabris lobis longioribus, lobis rotundatis; connectivis postice deorsum linearibus, longitudinaliter connatis; stylo barbato. HT — Folia fere 5. *uliginosa* v. *S. serratae*, sed ab nraque calycibus dense lomentoso-lanatis distinctissima. — Crescit in Mexico, in provincia Texas Inter Rio Guadalupe et Rio Colorado.
103. S. REVOLUTA Róm. et Pav. Flor. Peruv. et Cbl. I. 28. t 41. fig. b. - Bib. I. e. — Caule fruticoso erecto albo-lomentoso; foliis breviter petiolatis lanceolatisve obtusiusculis crenatis, margine revolutis rugosis, utrinque albo-lomentosis, floralibus inferioribus conformibus, superioribus ovalis acuminatis deciduis; racemis simplicibus; verticillatis subsexfloris remotis secundis; calycibus lobulosis dense floccoso-lomentosis, labio superiore integro denique lobis inferioribus acutis; corollis calyce duplo longioribus tomentosis, tubo exserto venuloso, lobis subaequalibus, superiore credo, inferioribus lobis rotundatis; connectivis postice linearibus de flexis, longitudinaliter connatis; stylo birtulo. 6 ~ Frutex 2-3-pedalis erectus ramosis simus, ex omni parte albo-lomentosus. Folia sesquipedalia, petiolata bracteata. Racemi semipedales. Corolla albo-violacea. — Habitat in Peruvia, in praeruptis provinciis Cuzco.
104. S. LEUCANHA Cav. Icon. plant. I. 10. t. 24. - Dili. I. c. 27V - Caule fruticoso; ramis subulso albo-lanatis; foliis breviter petiolatis lanceolato-linearibus.

aculu minute crenatis, bast rotundalis, supra rugosis pnbescantib., subius albo-lanatis, Ooralib. ovalia acommalif deciduis, racemo elongato, verticillastris multiflons, infimis remolit; calycib. subsessilib. ovatis dense lanalis, labio superiore integro denlibq labii io tenons oTalis aealis; corollis calyce duplo longionb., eitos albo-lanalis, tubo exserto amplialo sabvenlncoso, labiis abbreviate, sa-penore erecto inlegro, infenons lobis lateralib. rotundalis, medlo integro erecto concavo, connectms poslice linean-dilalatis deOexis connalis; stylo barbaio. 5 — Ramf elongati, lana demum cadaca. Folia mollia 2-6-pollicana Raceml saepios purpurascetes, densissime lanati 0-10-pollicares. Verticillastris infenores pollicem remoti Flores 10-12 lineas longl. Corollae albidae, sob fauce parum contractae. — Habitat in Mexico.

10*. S VELUTINA Bth. I. e. — Caule frolicoso?; ram it dense foliosis telullno-lanalis, foil subsesslib. oblongo-laoeolalis obtusis creotalis, basi angustatif rugosis, sublaa velollno-laoatis, floralib. lanceolalis deciduis, racemo laxiusculo; verticillastrU sub-6-floris; calycib. tubulosis strialis floccoso-iomentosis, labio superiore inlegro denlibq labii Inferioris ovalis acuus, corollis calyce ditnidio longionb., exlas albo-lanatis, tubo amplialo, tabus subaequahb, superiore recto, infenons lobis laterahb. ovalis, medio inlegro; connectiTis edentulis postice deflexis connain, stylo glabro — Afflois 5. *confertiflorat*, sed characlenbus dalls disinctissima. Racemi 4-0-pollicaret. Floret atbidi Pedicelli 2-3 lineas, calyces 4-3 longi — Habitat in Brasilia meridional!

106. 8 ERIOCALYX Bertero in Roen. el SchiilC. SysL tegeu AddiL 2. ad Manl. I 216. - Bib. I. c. — Caule frulieoso; ramis dl?arlcatis caoo-pabesceniib, foil oblongo-lanceolalia acoaiioalia aerraUa, baal eoneatis, supra pabescantib., subius dense cano-lomeoiotla, floralib. ovalia acaalnalls decidais; racemif abbrevlatis aimpheib.; •eriuellUatria t-IO-florla approilsjMllai calyoib. campanalatis dense lanata, labio saepiore Inlefro denlibq. labii iBferioris ovalia oblois; corollis caly-O«B breTiler soperatlb., exlas lanaiis, labo loelaa, lablia abbrevkatis, superiore recto inferiorisq. lobo medio Integro; consiectivla postice breviter produclis linean-dilaUlis deOexis, longiludinaliter connalia; stylo barbaio 5 — Rami divaricaii • procumbentes nodosi, acute tetragooi, jumores cano-tomentosi, aetaie glabrati Folia ad summitates approximata 3-4-pollicana crassiuscula, molllier rugosa, supra midla, sobtus cana venosa. Racemi 2-3-pollicares ^ erlicillaalri distiocii, at approximali CIJCCS subses<iles 3-lineares ovalo-campanolaJ, I*A* aaeplus rubescenie. Corollae 5. *confertt/lorae*, a qua differ! foliorum forma, racemis abbreviatis el cal)cibus najonbus. — Habitat in Jamaica.

107 S COtfERTIFLORA Póol, Pl. Bras, ic II. 134. t 100 - Bib. I. c 276. - [Liodl Bot Regisu (New Sery XII. t 201 - Caole fruticoso? , ramis mfo-tomeolosis, foil, petiolatia ovalo-oblongis aculiuculis crenatis, basi cuneatls, in pe^ tiolum subdecorreotib., sopra rogosl adpresse pobetceolib, subius dense ruio-tomenlosis, floralib. Ofalis looge acumioaUs reflexis v. deciduis, racemis elon-tatis. verticillaalris crebria maliifloris; calycib. ovalo-lubulosis tomeninso-lanaiijif Ubio saepiore Integro denlibq. labii inferioris oratis acolis, corollis calyce di-•Idlo loogtortb., exlas aareo-laoalla, labo exserto veolriooso, labns abbrfTi^{alis} superiore redo inferiorisq lobo medio iolegro, connectiiva poslice brefiltf ^{pro-} duciis dilaUUa deflexis, longitudinahter coonatis, stjlo glabro 5? - ^ " i ^{firmi} obtose tetragon! soleati. Folia 3-4 poll longa, »esquipollicem lata. ^{macromi} •lira pedales bracteis looge acumioatit apice como* i terticillaalri ^{nainar0, i} •••wi, sesoipollicem t. loferiores fere polhrem di»lanles Calyees robesc^o 4 111. longl. Corollae panae, iotui robellae, exto« flatidac r rubellae, I^10* ^{aurca} testie. - |D Brasilia prop* Rio Janeiro, ad herra d E»Irella el Padre conrj-^{ll b.}

Mfl. 8. USUVTHA Bib. I. e. - Fniiirosa ramis denie lanatn. ^{folli# 01 .# j j j l mis} ovali-oblongis obiosla creotalis, basi rolondaiit v rordaiu, **9T* ^{J. ce bre-} fcUpidlt, »ablat molliMime «lbo-Uoali». Ooralib otaUc acumlMti*. c« j. ^{oris;} flortb. ócidals; raceois eloogatis aimplicib, verticillaalns dUUOlib. muiuu

calycib. lubulosis denae lanalia, Ublo auperlore Inlegro infertoriaq. denlib. ovalis acutis; corollia calyce dimidio longiorib., tubo fix exaerlo ventricoeo, extoa pubescente, labiis aobaeqaalib.; connectivia poalice linearib. deflexis, longitudinaliter connata; stylo glabro. 6 — Folia el babilua fere *S. Scorodoniata*, al folia majora rugoaiora et anbiua mollisaima albo-tomenosa. Bacemi 0-8-pollicarea, aaeptua rubeacenta t. flaveacenta. Inflorescentia et floribus 5. *ericalyci* tffinis, aed folia distinctissima. — Habitat in Mexico.

§. 7. *Longiflorae* Bth. I. e. 270. — *Corolla* tubus calyce 2-5-pfo longior, Labium inferius Superior\$ plerumque brevius v. rarius longius.* — *Herbae, suffrutices frutesce, corollis albidis, flavescuntibus, aurantiacis, coerulescentibus, coccineis v. purpureis*.*

A. *Albida** Blh. I. c.

Corollae albae.

1M. S. TOMENTELLA Pobl, Plant Braa. ic II. 138. t U 1M. - Blh. I. c. - Caule herbaceo? erecto rufo-lomentoso; foliis sessilib. ovalo-oblonga obtusis erianthis, basi angustata rugosa, supra hispidula, subtus tomentoso-pubescentibus., floralibus deciduis; racemo elongato; terminalibus 6-10*floris remotis; calycibus lubulosis atriata tomentosa-pubescentibus., Ublo superiore Integro dentibus. Inflorescentia acuta; corollia calyce duplo longioribus., tubo albo-lanalia, tubo exteriori aequali ampliato, labiis abbreviatis, superiore recto, inferiore proflexo, lobis lateralibus rotundatis reflexis, medio erecto integro concato; connectivum poalae abducatum deflexis connatis; stylo breviter barbato. % — Galearia (T. rami?) anbalpicea 8* 3-pedalea. Folia pauca remota 2-3-pollicaria. Verticillata inferiora 2-3 pedicellatae distant. Calyces aequalia 0-8-linearia, fructiferi subcampanulati. Corollae 15 lineas longae albae, lana alba demissima veslilae. Connativa postice brevia. Filamenta supra insertionem longe lineari-producta. Stylus corollam aequans, lobis subulatis subaequalibus. — Ab incolis *Selca* dicitur. — Species Inter *Eriantha* et *Tubifloras* quasi media. — Habitat in Brasilia, in campis herbida provinciae Goyax circa Melopolim et provinciae Minas Geraes frequent.

B. *Aurantiaca* Bib. I. e. 917.

Corollae aurantiacae v. luteae.

900. 8. LUTEA H. B. lib. NOT. gener. el. pt. II. « 1. 1. 1 * . - Bth. I. e. 177. - Caule fruticoso erecto ramuloso; foliis oblongis obtusis obovatis supra glabris, subtus albo-tomentosa; Terminalibus multifloris, inferioribus deciduis; bracteis ovatis acutis, calyce brevioribus. eadibus; calycibus fuscis pilosis labio superiore iridenato. 6 — Caulis erectus ramosus, rami tetragoni pilosi acrii. Folia opposita petiolata oblonga acuta ant. obtusa cordata, supra nigrescentia, 1-1 1/2-pollicaria. Pedicelli semipollicares. Spicae aenipetales terminales verticillatae. Flores 0-10 lin. longi. Bractea bracteae, calyce breviores. Calyx subcampanulatus bilabiatus atriatus, lobis aequalibus acuminatis mucronatis, inferioribus bifidis laciniis acuminatis anbalatis. Corolla lutea glanduloso-pilosa, tubo ventricoso calyce triplo supero, Ublo superiore oblongo galeato concavo obtuso, labio inferiore tripartito trilobo, lobis rotundatis, in medio latiore. Summa inclusa. Stylus exsertus barbatus. - Habitat in Peruvia in locis subfrigidis inter urbem Loxa et noxiem Saraguro regni Quilensis

» 1? S. PUNCTATA Ri. el Pav. Fl. Per. et Chl. I. 87. t. 30. fig. b. - Bth. I. c. 277. Caule acaule glanduloso-pubescente; foliis petiolatis ovalibus acutis serratis, basi rotundatis integerrimis connatis venosis, supra v. c. subius concoloribus. pubescentibus glabris, floralibus. ovatis aruminalibus deciduis; ramiis nunc ph. b.; v. or. c. 1-10-floris remotis; calycibus campanulatis hirsutis. Ublo superiore integro obtuso v. brevissime indurato, inferioribus dentibus oam arulu corollis ciliatis triplo longioribus. pubescentibus, tubo exteriori subulato, labiis,

- subaequalib., superiore erecto, inferioris lobis rotundis; connatis posice linearibus. deflexis, longitudinaliter connatis; stylo barbato. 2} — Planta foetidatulpino odore, ferruginea (R. et P.). Cauli 2-3-pedalis, obsolete tetragonos, ramis braehiatis purpurascens. Folia fixa pollicaria, longius petiolata quam in icone citata, ovalia glanduloso-tisocosa. Racemi aemipedales. Corolla alba, saepe lulescens A ?iolaceo-alba, magniflora 5. *lamifoliae*. — Species forsitan inter *Brachyanthas* numeranda. — Habitat in Peruvia in collibus altis Huanuco.
202. S. PAVOMI Bib. I. c. 278. — Cattle fructu bifariam pubescente; ramis superne glanduloso-rillosis; foli. petiolo aequali obtusis inaequalibus, basi cuneatis glabris, floralibus aequalibus acuminatis deciduis; racemis simplicibus; verticillatis multifloris* disalobis.; calycibus campanulatis glandulosis, labio superiore integro dentibus. labii inferioris late obtusis aequalibus; corollis extus pubescentibus. calyce subquadriplo longioribus, tubo longe exserto, medio inflato, labiis abbreviatis erectis; connatis posice linearibus. deflexis, longitudinaliter connatis; alylo aequali barbato. fc — AfBois *S. punelatae*, sed diversa foliis megerrimis oblonga, calycebat utlonbui, corollis longioribus, inaequalibus. Corollae flantes ?identar, labii inferioris lobis erectis brevissimis, medio integro. — In Peruvia.
203. S. INTEGRIFOLIA Hi. et Par. Flor. Per. et Chil. I. 95. I. 35. fig. b. - Bib. I. e. — Caule ramoso glabro; foli. petiolatis inaequalibus, basi cuneatis glabris viscoso subcarnosis, floralibus lanceolatis acuminatis; racemis abbreviatis simplicibus.; reticulatis anbaefloris distantibus.; calycibus lobulosis glabris, labio superioris integro dentibus. labii inferioris obtusis aequalibus; corollis calyce triplo longioribus. pubescentibus, tubo exserto subaequali, labio superiore erecto, inferioris lobis rotundis anbertis, medio integerrimo; connectivis posice linearibus. deflexis, longitudinaliter connatis stylo glabro. 6 — Caulis bipedalis ramulosis, ramis totis v. l. Folia vix semipollicaria, obtusa T. acuta. Fiora lina pollicaria. Calyx vix quadruplus. Corolla crocea-hiata. Quidam exsiccata. — Vernaele *Socotmeco* aec. Patoa. Sic eiam plures aliae *S. himalaicae* speleae nonnatae a Paronlo In barbaro Latnbertiano. — Habitat In Peruvia ad Caxatambo provinciam Juxta aquas inferas Cbeorbin et inter ropes.
- 901 S. OPPOSITIFLORA Ri. et Pat. I. c. 96. t. 43. fig. a. - Bih. I. c. - Caule suffruticoso, basi procumbente; ramis fructibus leniter pubescentibus; foli. petiolatis ovalibus, basi rotundis v. cordatis rugosis pubescentibus, floralibus deciduis; raceme simplicibus.; verticillatis bifloris secundis; calycibus lobulosis atria* lit, labio superiore integro dentibus. labii inferioris obtusis aequalibus; corollis calyce quadruplo longioribus, extus pubescentibus, tubo longe nullo, labiis subaequalibus. Inferioris lobis suberectis inaequalibus rotundis; connectivis posice linearibus. deflexis, longitudinaliter connatis; stylo glabro (*). ^ - Suffrutici, gratissimo odore praeditus (R. et P.), 1-9-pedalia. Folia tunc pollicaria, nunc tunc pollicana, aobius trina, let Her crinalata. Racemot l-pollicarum. Corolla 5. *tubiflora** paullo minor, rotunda. - 5. *grati** Vahl, Enum. pi. I. 944. - Labiati in Peruvia In locis aliis aridis et ventosis Tarmae oppidum.
204. i. »TRICTIFLORA Hook. Bot. Miae. II. 134. - Bib. I. c. 910. - Caulis suffruticoso; ramis breviter tomentosis pubescentibus; foli. petiolatis ovalibus aequalibus ere-naio-ierratis, basi cordatis crassiusculis subcarnosis glabrisculis, floralibus oblongis arotis membranaceis deciduis; racemis elongatis. verticillatis bifloris aequalibus j calycibus lobulosis atrialibus pubescentibus., labio superiore integro dentibus. labii inferioris lobis obtusis aequalibus; corollis calyce ultra duplo longioribus. tubo elongato in corvo, ostas umeosio, labiis subaequalibus. ^ & paienub , «superioris rtulo <Dir^ fo, Inferioris lobis latibus brevissimis»; genibus eivrtu; connectivis posice linearibus., longitudinaliter connatis. stylo glabro. > - Fruis orbiculatis. 1 V, - pollicaria, pallidiuscula euraosula. Juniora leniter pubescentia. Jtrapedale*. Folia lorata H calyce striatis pubescentibus glumari, >»»»»» >n l'c,, •• laibrica. Tertius Maath pott anlbtln polheim dittanis. Corollae aere. - ceciduae, aequalis pollicarum. A S. f-K/for.. tar. ft. differet foliis glabrisculis

carnosus minus cordatus, eaele giabriori; a 5. *glumaeae* YII direr** Tidetor, nisi patria et foliis minus oordatis. — Habitat in PeruYla Inter Yago et Obrajltlo vallis Canta.

200. 8. TUBIFLORA Sm. Icon. 90. t. 96. — Bth. I. e. t — Caule inffrullcoso erecto Yilloso; foil, peliolalis ovatis obtusia crenalo-serratis, bail eordalls, supra pubescenlib. Y. villosis, sublus albo-lanalis v. inferiorib. glabralis, floralib. ovalo-Uoceolatis aculis membranaceis deciduis; racemis simplicib.; Yerlicillasirla bifloris secundis; calycib. lubulosis srialis lanatis v. villosis, labio superior* inlegro deniübq. labii inferioris lanceolatis aculis; corollis calyce irplo longiorlb., lubo elongato incurvo, exlus lomenioso, labiis subaequalib. subereclis, superiore integro, inferioris lobis parvis rolundalis credit, medio concavo; genilalib. subexserlis; conncciivis poslice lioearib. deflexis, iongiludinaliier connalis; stylo glabro. 2l. — Caulis bipedalis creclus, basi ramosus, obtuse telragonus sriaius, in var. a. densissime el mollissime, in tar. *fi.* brevjier Yillosus. Folia mollia, sublus albo-lauaia. Racemi in ulraque varietal* recti Y. apice subnutantes. Folia floralia el calyces glumacel, taepiut tonento candido tubsericeo vesiiii. Corolla aureo-cocinea sesquipollicaris. *Yur.fi.* non di fieri niai foliis inferioribus glabratis el caule racemoque mlnos YUIOSU. Folia jonia sntos consumer lomeniota. — 5. *biflora* Roll el Pav. Pl. Per. et Cbil. I. 94. t 38. fig. a.

fi. glabrata: foil, inferiorib. eoncolorib. snbglabri*. — & «rei#» Ri. et Par. Fl. Per. el Cbil. I. 23. t 30. fig. a. — Habitat In Pennrla In montibas arenosis Huanuco in proviocla Cbancay, In arenosis PeruYlae meridional is, *fi.* in montibus arenosis Yulgo Lomas in Camanae provincla ad oppidum Atiquipa.

C. *Coecinea** Bib. I. e. 980.

Corollae coccineae v. purpureae.

907. S. LEOMFROIDES Glox. Obs. bot 15. 1.9. - Lam. 11l. t.90. Og 3. - Bid. 1. r. 280. — Caulc frulicoso; ramii glabrlusculis; foil, peliolalis ovali* v. rbomboidfh oblusis subcrennlis, basi iruncalis subcordalls, supra glabrlusculis, sublus vrnois canescemib., floralib. conformlb.; YerUcllastris aobseifloris; florib. foliis subaequalib.; pedicellis peilolo brevlorlb.; calycib. toboloso-eaoipanolalis glabris, labio superior* inlegro loblaq. labll Inferioria late otaila acuUsi corolla calyce aubduplo longiore, lubo veMrieoeo, labiis s«baeq«allb^ soptriore oreoto latefro, exius pubescenie, Infarlorla lobls laurallb. oMoa^la tetalt, SMdle rotandelo deReio; stamlnlb. inclusis; eonectlvif edoulallt, poetlee ialaili obtnals, loajfl* tndinaliier connalis; siylo eiseito barbalo, leMa snS^Utl. 6 — Praltet orgyalls, rami sulcaii nodosi glabri Y. tenolter cano-toMontMI. Folia In aplolbus ramorum saepe approxiroata, inferioris aaepe snbrotunda, snprenu OYato-oblonga, rarios integrrima, saepius alnuau Y. crenoltu. Vertleillatri In axillis follorom cauliorum nfc racemosi. Calyces ampll Yirides glaberrini. Corolla cocclnea, 0iyll lobus superior ailcnuato - sobulamt, Inferlore panlo longior. — 5. *formota* L'ller. Slirp. I. 41. I. 91. — Mirb. In Ann. Mot. Par. XV. L15. ig. 0. - TraiUn. Tabul. I. 308. - Curt. Bot Mag. t 370. - *Jungia forwios** Moench. - 5. *nedota* Rs. «t Pav. Fl. Per. el Chit. I. 9). t. 41. flg. a. - 5. *pyrifol** Dombey ex Cav. — Habitat in locis temperatis regni Quilensls prope pagum Chillo et Icnubams in arenosis argillaceis peirosisque fluanuco.

906. B. PLUMOSA Ri. el Pav. Fl. Per. et Cbil. 1.90. f 137. fig. a. - Bth. 1. e. - Foil tubcordatis aculis crenalis; pedonculis 4-5 axlllarlb. seioOorls; stylo plnnoio }
— Plants subiomoniosa, lomenio ferrugineo. Caulis orgyalii ercetus ramotui }
Rami leneri lanuRinosi leiragoni bracbiaii. Folia pciloiata subcordala acula ere }
nala Yenosissima rugOM, sublus leviier lanuginosa. Flores axillarei vertkilUU }
prduunilalii. Pedunculi 3-4, frequenlius 5, ttreies uniOori, petiolit longiores }
bracleoli* lolidcm subulalis aliquando ovalis Miffulli. Calyi biQdo« nervoiöi tu }
bulosus, inlus »caber. Corolla purpurea, riiu^ hiritula, cal>re d-plo longior l/ }
biia aequalibuH, superiore rmarginalo, infmore (rifi<lo. s'hl_a« Innuto - purpu- }
rascens. - Ex iconc el de*cripi,one non a S. leonuroidf dnTtri n.*i foliis subtu

leviler laoginosis al corollaa lobo snblus non veotncoso. — Habitat io Peruvia in Tarmae proviociae praeraptis ad Huaisa-huassi vicum.

900 6 BALAUSTINA Pohl, Pl. Brat. icon. II. 133. L 180. - Bib. I. c. - Suffniticosa erecU pilot*: foil, petiolatif oblongis aeotls serratis, basi angustatis, ulrioq fi-nd ib. piloiu, floralib. coofonotb.; verticillailns aullarib. remoin sexflors; caly-cib. lubutoiis pilous, labio aapenore inlegro denlibq. labu infenoris ovatis acu-tis, eorollit calyce iriplo loogiorib., tobo longe exserto, labio tuperiore recto, infenore pateote breTiore, lobif ovalis » cooocetivis posiice deOexis lioean-dila-tatu, longiludinaliter eoDoatis; stylo barbato. 2]. — Caulei tnpedales, rani ru-bescenti-broocci. Folia 2-2'/t-pollicaria, floraha fix mioora. Bractee lanceo-latae, vix pedicello longiores. Calyces breviter pedicellati, luperne ampliati. Co-rolla 2 poll, longa coccioea, labN iofcrons lobo medio inlegro laleraliboi panun UUore. Stamina corolla breviora. Stylos paullo longior — Habitat in Brasilia io dumetis et iotcr fratices ad margioes viarom prope Eogenho da Varge profio-ciae Rio da laoeiro.

810 S. ASPERIFOLIA Bth. I. c. SSI. - Cattle soffrotieoso fredo brevisslme pubes-cente, foil tessilib. obloogis creaalis, basi aogustatis, mpra tuberculosis asper-nraii, subtui glabnuscus, floralib. ofalis acumioatii membraoaceis ciliatis de-cidui»; racemn eloogatis, verticillastris labiexflorU sobsecundii, infimis remotis; calj-cib. tubulosis pubesceotib., labio soperiore iotrgro deotibq. labii inferiorls ovatis aculis, corollis calyce 3-plo loogiorib. pobesceolib, tubo elnngato luperne ampliato, labio superiore ereclo, ioferiore dimidio brevioro, lobis lateralib ob-loogis daflexia, medio iotegro; cooocUvis edeotolit, postice deflexis lineanb. acoils, loogliodloaliter eoooot(S) stylo axaorio plomoto. % — Caulei eloogati, m-perne soboodl. Folia 3-1-poPlearia eoriacta subplieau, supra tobarculis spartif asparrloia. laceml saoilpodalea pedalaara. Tertldllastris loferlores 2-3 poll, di-siaoiies. Calyces 4-MIneortt. Corotlao sosqniipoUJcuret coccioeae, lubo soparoe sed lofra fauceoi ampliato, faoce fit ootraeta. A S. *tcabrida* differt foliis latio-nbui, flonbus ounerosloribos et coroilae lobo OMgis inflaio. — Habitat in Bra-silia in Serra dai Caldes in partf nendiooali provmciac Gojai et in pascua SIC-CIS prope Padre Aoaslano el ad pagun Congonhai da herra proinciae Mi-oai Geraes

211. S bCABRIDA Pohl, Pl. Bras icon. II. 140 t. IW - Dib I c - Caule soffro* ticoso ereclo bre«iMine pubesceote; foil subsessilib. oblongo-lanceolalis obto-sit crmaais, bati aogustato-rotuodatis, supra luberculis anperriroit, lublus f l f bnusculis, floralib ovatis acuminatis decidois, racemis smplicib. elongalls; ver-tiaillasins paucifloris; calj-cib. tobolosis pubesceohb., labio soperiore loitfro deotibq. labu ioferioris ovalis acolis; cerollis calyce triplo loogiorib. P^{uh**?}r tib, tuho eloogato vii aapliato, labio soperiore ereclo, ioferiore brevioro, iODIS oblongis, medio lolegro; eooocUvis postice deflexis lioearib., loogitu<li^{halier} eooootit, stylo plomoso. % - A S. *msptnfoh** differt folds angustioribus, verti-ailloairia plerussqoe 2-4-fioHs, el corollae tubo nioui ampliato Color corona pttlekre rober. - Habitat lo Brasilia io pascui* gramnotit ad 6ania Locia pro-vioclae Geyax H circa Barbaceoa el Begislo Velbo io campii ad CoocendaJ «" sertis provloeia Mioas Gera#s.

212. S. PCB8ICIFOLIA ftL Nil nts. ei Bib. I. c. - Frotif osa ramis soprmo villo- »U; fell, aobsetsllib. ebloogo-laoceolatis acumioatU »ubterratis, bati ° £ iolalis, ••to aeobrioaeolis, soblos cocolorib subglabnt. floralib. bracteaeroroi^{va-} il« aconlMila tfeeidols; racenis sioiplicib.. vcrieillaum lubnexflorU * » flx. ntab.; caljeib loboloto-eaapeBoletis, extut laoa looga purpurea tctiint, lib* 3-]e- rtore iolegre deotibq breviais, labu ioferent ota *A' p. fiore dilyce plus doplo loogiorib. vlllotit, lubo tuperne ampliato, labW^{dic} f J- •••••, Inftriore dioitdio breviere, lobo medio inlegro. connrrtWis » ••••• errl InUif »« f - R⁴, loaguudlnalier roooalis; »l)lo plumoso 6 - Fmlti 9^{TMCD} rum 5-7-pedall^s. Folia 2-3-pollicana lublos ad veoas levller rufo-iiH^{0 n n w w c}

glabra. Axis racemi et calyces pilis scartosis purpureis arilcalais dense Yestlli. Calyces fere pollicem longi, fructiferi coriacei, apice param ampllall. Corolla coccinea, ulira 2 poll, longa Stylus breYiter eisertus, lobo saperlore longlore. — Habitat ID Brasilia in sylvis pnmiliYis prope pagmn Rio Vermelho in parto orientali provinciae Minas Gerae*s. ^

213. 8. MARIANA Mart. mss. ex Btb. 1. c 282. — Fraticosa ramis tomentoso-villosis; foil, breviter petiolatis oblongo-lanceolatis, alnnq. longe angasulis, supra laeYiusculis, subius molliter pubescentib. palldis, floralib. bracteaeformib. ovatis acummatis decluis, racerois simplicib.; verticillasru subsexnons dislantib.; calycib. lubuloso-campanulatis, extus lana adpressa subsencca rufo-alba dense Teslitis, labio supenore Inlegro denlibq. brevissimis, labil inferions ovaus acotis, corollis calyce duplo longionb. Yillosis, tobo longe exscro, labio supenore erccto, in fen ore dimidio brevior, lobo medlo subintegro; connectims postice lineanb. deflexis, longitudinaliter connatis, stylo barbato. 6 — A *S. perttafoUa* diffen folus angustionbus snblus subtomentosis et lana calycis. Corollae eliam breiores vn ultra sesquipollicem longte. — HabiUt in Brasilia in homidis sylvaticis proTinciae Minas Gerae* ad Mariana, EefUlo Velbo el Rancho da Viuva prope San Joao del Rey.

214. 8. HILARII Btb. I. c. — Fraticosa: ramis glabris; foil. peiioLaUs oblongo-T. ovato-lanceolais acominatia subserratls, basl angntUto-euneaUs, ulrinq. vridib. laevlusculis glabris, floralib. linearib. tubdeeldols; raemls slnpltcib. abbreviate, Yeiiicillastris panels 2-4-floris approxlmatis; calycib. tubuloso-campanulatis, extus lana brevi corrugalis, labio superiore Inlegro dentibq. brevissimis, labii infenons ovatis oblusculis, corollis calyce dnplo longiorib. lanatis, tubo longe exserto, labio superiore erccto, inferiore dimidio brevior, lobomediobsubintegro; connectivis postice lineanb. deQexis, longitudinaliter connatis, stylo barbato 5 — Folia fere 5 *pernnfoUae*, sed latiora, longius petiolata. Racemi vix folia ramealia superantes, verticilUstri plermque 2 v 3, 2-4-flori. Flores magnitudine florum 5. *pernctfoUae* v. parum minores, el Una calycis el corollae diversi — Habitat in Brasilia.

21ft. ft. SALICIFOLIA Foht, PL Brat. Icon. II. MQ. U 101 - Btb. I. e. - FraUeoaa ramis glabris pubescentib. •. rufo-filloalt; foil, brtvlltr p^ioloUs obtaig*-|taeolatis subcrenato-serraila, mrlmq. angusuls gUbrk t* anfta alspldnlls, snbui tenniter rufo-tomentosis, floralib. ovaUs acntis deeldnls; raoMsls elongaUs; verticillastrls sob-0-floris; calycib. Ubuloso-campanulatis glabris v. pubescentib., labio superiore integro dentibq. bretitslms, labii Inferiorit a colls i corollis calyce plus duplo longionb, lubo longe exserto, labio superiore erecto, loferiore dioiidio brevior, lobo intermedio subioUgro; connectivis posiice linearib. defleilt, longitudinaliter connatis, stylo barbato. q. — *S. p*r\$ictfoli*4* affinis, sed calycibus glabris pubescentibusve el foliis minus sessilibus longioribus sat disiincta Yidetur - 5 *arguta* Btb. in Herb. Reg. Berol. mss. — Habllat In Brasilia inter frutices circa Quelot provinciae Minas Geratfs, td rivulum Monliqueira in parto orientali ejusdem provinciae

210. 8. HAEIHKE! Bib. I. c 283. — Fruticosa?: ramis cano-lomentosis, apice vU-coso-villosis; foil, breviter peliolatis ovali-oblongis v. oblongo->ltnceolatis acuiis serratis, basi rotundatis rugosis, subtus albo-lomentosis, flortlib. brtcteteformib. lanceolatis deciduis, racemis elongatis simplicib. Y. Yerlicillastris infeiorib. irregulariter cymos»s subramosis, calycib. lubuloso-campanolatis viscoso-Yillosis labio tpenore integro denlibq. labii inferioris obiutiusculis, corollis calyce snb~Iriplo longiorib., eitus mcoao-villosis, lubo longe exserto, labio superiore recto'' inferiore eo breYiore, gemialib. exueriis, connectivis posiice linearib. dtfluis'' longitudinaliter mnnatis, st)lo glabro. \$ - Species distinctissima et forma fo|lo ' rant <i inflorescentia Veriicillasin secundi, supenorev texflori > intirdum 8 in'' flori Itxlusculi, infenorom cjmao elongiiae ^ racmuv ba^i ramo. ui ^ corolla

- 15-16 lio. longa coccinea, tubo tenui, apice vix ampliato. Stylus apice tenuissimus, lobis ioaequalibus. — Ilabilal in Peruvia.
217. S. HIRTA U. B. Klh. Nov. gen. el spec. plant. II. 200. - Bin. I. c. 200. t el 721. — Caule fruticoso erecto bifariam piloso; foil, ovato-oblongis acuminatis crenato-serratis, sublus incano-pubescentib.; spicis paniculatis; verticillastris remolis paucioris; bractei ovalis acuminatis hirsutis, calyce breviorib. deciduis; calycib. subglanduloso-pilosis. 5 — Frutex erectus ramiosus, rami tetragoni glabri lineis duabus oppositis pilosis instructi. Folia opposita petiolata, supra viridia et tenuissime pubescentia, sublus Incano-pubescentia bipollicaria. Petiolus subpollicaris canaliculatus, interne pilosus. Pedunculi pedicellique hirsuti pilis glanduliferis viscidis. Bractea subrotundo-ovatae acuminato-cuspidatae hirsulae, calyce breviores deciduae. Calyx tubuloso-campanulatus bilabialis serialis birtus, pilis glanduliferis, labio superiore acuminato, inferiore bifido, laciniis acuminato-mucronatis. Corolla purpurea, calyce triplo longior, superne hirsuta. Stamina longe exserta. 5. *glanduliferae* Cav. affinis — Habital in Andibus Peruvianorum prope pagum Ayavaca el villam Lucarque.
218. S. RUBESCENS H. B. Klh. Nov. gen. el spec. plant. II. 301. 1. 154. - Bih. I. c. 292. 723. 724. — Caule fruticoso erecto canescente glabro; foil, ovalis angustilobis cordatis crenatis, sublus tenacissime corno-tomentosis; spicis paniculatis; verticillastris 4-6-floris distantibus; calycib. densissime piloso-glandulosis. 5 — Rami obtuse tetragoni. Folia opposita longe petiolata 4-pollicaria, supra tenuissime pubescentia. Petioli 2-3-pollicares glabri. Paniculae terminales, pilis densissimis purpureis patentibus obsitae. Calyx tubulosus bilabialis purpureus piloso-glandulosus, labio superiore ovato acuto, inferiore bifido, laciniis acuminatis. Corolla amplexicaulis purpurea, calyce duplo longior, glabra. — Habitat in temperatis partibus Quitoensis.
219. S. CALBANA H. B. Klh. I. c. «T. - Bib. 1.1. 1. c. e. c. - Caule fruticoso erecto ramuloso piloso-glandulosis; foil, ovato-oblongis obtusis cordatis crenatis coriaceis, supra rugosis pilosis, subtus incano-lomentosis; verticillastris bifloris distantibus; bracteis ovato-oblongis calyce hiis brevioribus deciduis. — Rami tetragoni purpurei. Folia (*Betonicae*) opposita petiolata, irregulariter crenata coriacea 1-2-pollicifera. Petioli 8-12 lin. longi glandulosi et pilosi. Spicae terminales 3-4-pollicares. Bractea ovato-oblongae pilosae glandulosae, calyce breviores deciduae. Calyx tubulosus bilabialis serialis birtus, labio superiore acuminato, inferiore bifido, laciniis acuminatis. Corolla purpurea, calyce duplo longior, pubescentia Stamina exserta. Specimina florifera baud suppelunt. — Habital in Andibus Peruvianorum.
220. S. TORTUOSA H. B. Klh. I. c. 222. 1.142. - Bib. I. c. 953. f - Caule fruticoso erecto foliis sublascescentibus tomentosis ovato-oblongis acuminatis, basi «c» gustatis serratis; spicis secundis; verticillastris subsextifloris appressis; calycibus villosis-lomentosis; corollis elongatis, labio superiore galeato inflexo superante. 6 — Ex icone supra citata simillima videtur 5. *curritorae*, sed ex descriptione Konigiaa diversa videtur praeter pairiam, foliis majoribus fuscis cretibus longius petiolatis, floribus minoribus longius pedicellatis, denubus calycini »ubulato-acuminatis. — ilabilal in Andibus Quinduenibus Novae Ginnatae.
- W. § CLRMFLORA Bib. I. c. *M. | - Fruicosa: ramulosa tomentosa ovato-oblonga pubescentibus foil, petiolatis ovato-oblongis acuminatis crenato-serratis, basi rotundatis v. •B*U*^*^ Us, supra pubescentibus, sublus molliter cano-tomentosis, (localibus acuminatis ovato-oblongis; floribus secundis incurvo-subreflexis, >cruciatim 0-10-floris; c*»i* ib, subsessilib. labiis pubescentibus, labio superiore densibus labi inferioris acuminatis; corollis c*]C« subquadrifloris, citus pubescentibus, labio superiore ampliato, labio superiore tercio, inferiore brevioris, lobis inferioribus denubus, medio rotundatis; sUnibus inclusis; connatis ovatis P. — Habitat in Mexico prope Tlalpuabua.

222. *S. NEOVIDENSIS* Bib. 1. c — Frulicoid?: ramis tenuiter pubescentib.; foil, peliolalis ovatis acuminatis serrato-crenalis, basi rotundalis mollib., supra pubescentib., sublus pallide v. cano-tomentosis, superiorib. sessilib., floralib. lanceolalo-subulatis calyce longiorib., demum deciduis; racemis elongalis simplicib.; verticillasris lais remotis secundis 2-6-doris; calycib. tubuloso-campanutalis pubesceniib., labio superiore integro dentibq. labii inferioris orais aculis; corollia calyce 4-3-plo longiorib. subglabris, tubo basi tenui, apice valde ampliato, labio superiore recto, inferiore brevissimo; genitalib. exsertis; connectivis postice linearib. deflexis, longitudinaliter connatis; stylo glabro. £ — AfOnis *S. curviflorae*, sed diversa ramis elongalis virgatis, foliis parvis latioribus, racemis elongalis, foliis floralibus longioribus subperstentibus nec ante anthesin deciduis, calycibus minoribus, corollis gracilioribus et staminibus exsertis. Corollae coccineae, 14-15 lin. longae. Stylus et filamenta lenissima. — Habitat in Brasilia prope Rio de Janeiro.
223. *S. FRUTICETORUM* Bib. I. c. — Herbacea erecta elata glabruscula: foil, peliolalis ovatis acuminatis serratis, basi cunealis, utrinq. viridib. glabris v. tenuissimè pubesceniib., floralib. deciduis; racemis elongalis simplicib.; verticillasris subsexfloris distantib.; calycib. tubulosis striatis pubesceniib., labio superiore inegro deniq. labii inferioris ovatis obtusis; corollis calyce subtriplo longiorib., exius villosis, labio superiore recto, inferiore brevissimo: summis corolla breviorib.; connectivis postice linearib. deflexis, longitudinaliter connatis; stylo pubescente. % — Caules 4-pedalea. Folia 3-pollicaria. Calyces virides herbacei v. submembranacei nec colorati. Corolla intense rubra, forma fere *S. Xeoviden-ſu*, sed exius dense villosa, pitibus subflavescentibus. AfOnis 5. *omstinae*, sed foliis minoribus, calycibus glabris et praesertim corollarum forma et villositate distincta. — Habitat in Brasilia inter frutices in Arrayal.
224. *S. ALTISSIMA* Pohl, Plant. Brasil. icon. II. 136. 1.102. - Bib. I. c. 285. - Suffruticosa: ramis erectis clavis glabrusculis; foil, peliolalis ovalo-oblongis aculis serratis, basi angustato-cunealis, supra glabris, sublus lenissime pubescentib., floralib. ovatis acuminatis deciduis; racemis elongalis simplicib.; verticillasris multioris distantib.; calycib. tubulosis villosis, labio superiore integro deniq. labii inferioris ovatis aculis; corollis calyce plus duplo longiorib. glabris, tubo longe exserto, labiis subaequalib.; connectivis postice linearib. deflexis, longitudinaliter connatis; stylo piloso. % — Caulis ultra seipodum, veram apertam utriusque foliorum et calyces pilis glandulosis villosus, caotum planum fere glabra. Folia 4-5-pollicaria. Corolla poro rubra, 14 Un. longa, tubo vix ampliato, labio inferiore trifido, lobis rotundatis. — Habitat in Brasilia litoraliter ad Arrayal Santa Rita provinciae Goyac.
225. *S. MOSCHATA* U. B. Kth. NOT. gen. et spec. plant. II. 203. t 143. - Blh. I. c. — Caulis fruticosus erectus glabrus; foil, ovatis acutis, basi cunealis serratis glabris; verticillasris 5-d-floris distantibus; calycib. glabris aut pilosis; corollis elongatis*, galea angustata recta. 5 — Organi, moschum redolens, ramosa, rami quadrangulares stricti. Folia opposita peliolata, venis subtus pilosis, 2-pollicaria. Petiolus subpollicaris glabrusculus. Spicae terminatae pedunculatae verticillatae 3-pollicares. Flores 15-16 lin. longi. Calyx tubulosus striatus, Junior fuscus ciliatus, lobis bilabialis, labio superiore ovato-acuminato, inferiore bipartito, laciniis acuminatis. Corolla purpurea, calyce triplo longior, externe bispinosa, tubo superne ampliato calyce duplo longiore, labio superiore elongato recto linearis-canaliculato emarginato, inferiore 2-3-lobato brevioris trilobo subconcano, lobis rotundatis, intermedio abbreviato retuso. Stylus labio superiore longior, supra villosus. — Habitat in regione alta prope Almaguer Novo-Granatensium.
226. *S. HIRTELLA* Vahl, Enum. pi. I. 249. - Bth. I. c. - Caulis herbaceus adscendens viscoso-villosus; foil, peliolalis ovalo-oblongis aculis crenatis, basi rotundato-cunealis, utrinq. viridib. subglabris, floralib. ovatis aculis deciduis; racemis elongalis simplicib.; verticillasris subsexfloris remotis; calycib. tubulosis hir-tissimis, labio superiore inegro deniq. labii inferioris ovatis <brevi>; curollis

calyce plus duplo longioribus, extus villosis, tubo longe exserto, labiis subaequalibus, genitilibus longe exsertis, connatis postice linearibus deflexis, longitudinaliter connatis %* — Caules praesertim in parte superiore uli calyces pilis longis glandulifens hirsuti Folia plerumque glabra v ad venas pubescentia. Corolla coccinea pollicans, (obo superne parum dilatato Labia lata, Informis breviter trigona, in parte patens — Dabilal in Penitia

827 S SECLINDA Blh I c 2R3 et 723. — Caule herbaceo erecto glabro, ramis pubescentibus, foliis petiolatis oblongis, atrinque angustatis aculis serratis, supra hispidulis, subtus glabris, floralibus ovalibus acuminatis deciduis, verticillis subsexfloris secundis; calycibus tubulosis serialibus pubescentibus, labio superiore integro dentibus labii in Tenons acutis, corolla calyce dimidio longiore, extus pubescente, tubo breviter exserto sobaequali • ad faucem vix contracto, labiis abbreviate labaequalibus, superiore erecto, inferiorum lobis lateralibus oblongis, rostrum integro; genitilibus inclusis; connectivis edentulo postice deOexu linearibus, longitudinaliter connatis; stylo glabro. % — Afoois *S. lamnifoliae*, *ed distincta foliorum forma, racemis secundis et flonibus cocci natis, a 5. cum/fora differ! folia longioribus, subtus glabris et flonibus multo brevioribus. Rami Juniores pilis reflexis pubescentes. Folia 2-3 poll, longa, 0-12 ho. lala, utrinque acuta Racemi 4-0-pollicares. Corollae coccinae, vix semipollicares. — Habitat in Brasilia meridionali

228 S CIUTABth I c.W. t - Caule herbaceo, ramis elongatis glabris \ angustis petiolis ciliatis, foliis petiolatis ovalibus aculis crenato-serratis, basi rotundatis v subcordatis glabris, floralibus ovalibus acuminatis ciliatis. detnum deciduum, Tertiaris sub-10-floris; calycibus tubulosis serialibus pubescentibus, labio superiore integro dentibus labii inferiora aculis, corollis extus pubescentibus, calyce duplo iriplove longioribus, tubo aepone ampliato, labiis subaequalibus; connectivis pullet deflexis linearibus, longitudinaliter connatis, stylo glabro exserto. % — Aflalt *S. Immhoffii*, el foUdrum forma, corollis coccineis etc dist. % UneUMIBie. Venelllealra tit aewidto el Clillf e 5. nevmd* el ctm^ora differu — Habiut in dometts Papaottae Meileeaoniuv.

220 9 BLEGANS Vahl, Bourn plank I. 239. — Bib. I. c — Caule herbaceo erecto glabro T sparse piloso, foliis petiolatis ovatis acuminatis serratis, basi rotundatis • angustatis, supra hispidulis, subtus glabris, floralibus ovatis arumioatis deciduis, verticillis remotis subsexfloris, calycibus breviter pedicellatis campanulatis glandulosis villosis, labio superiore subinlongo brevissime 1-J-ariato, inferiore breder 2-dentato 2-artialo, corolla exclus pubescente, calyce sob-2-plo longiore, tubo leni subocuno, labiis subaequalibus oblongis, staminibus sob-exsertis connectivis postice longe lineari deflexis, longitudinaliter connatis »l)lo exserto barbato. ^ - *S. tmrmmmta* CMW Aol di cienne nal II 112. - H. B. kth >or gen et spec. plaoU Aner II. 283. I. 144. - *S. mtcroeaiiu* Poir. Diet ^11 614 — Habitat in Mexico prope Tlalpuexabua el prope Guanaxualo

230 b MEMIENS Pohl, PlaoL Braiil. icon. II. 137 t 101 - Bib I c 77 - Herbacea erecta caule basi glabro, apice paleoioo piloso, foliis petiolatis ovatis acuminatis terrain, basi rotundatis, utrinque tinctis glabris, floralibus partim deciduis, racemis simplicibus elongatis, verticillis remotis paucifloris. calycibus iobalao-eejpenuatis, basi vmdibus villosis*, apice membranaceis coloratis, labio superiore integro dentibus labii inferioribus ovatis subulalo-acuminatis, ^ Vitis cahre 4-3-plo longioribus, tubo longe exserto, labiis subaequalibus. ••••• gtmalibus inclusis, connectivis postice linearibus deflexis*. longitudinaliter connatis t4ylo glabro 2} - Herba subumplex setquipedalis, loba glabra, exceptis rbaehlqve racemi, qui pilis albis paucis den«e *illo«i sunl Calyi floreo*|l loogui, fructifer elongatos, apice membranaceus glaberrimus corcineus Coro* P chre coccinea, fere glabra, 19-ti ho |<nt*, tubo in parte superiore partim dilatato Labia erteia, Inferiora breviter inflata - HabiUI in BrasiliU •• — d'Esirilla H circa Pateoda d« Padre Lorrta provinriar Rio de Janeiro.

« • iPLENDE^IS Sello mst. In Roa el Schull Manl II. 1» - T. ar - Bot Megut t e. 87. - Bcbb llort boL I. L 31 - tolla In Mem. Acaa. -

- XXXI. 331. t. 17. — Caule fruticoso; ramis glabris; foil, petiolalia ovalis acuminata crenato-serrata, basi cuneata rotundata v. subcordata, utrinque glabris, floralibus ovatis acuminatis colorata decidua; verticillatis bicoloribus; calycibus campanulatis membranaceis coloratis glabris. T. nervis plicatis villosis, labio superiore inaequali dentibus labii inferioris late ovatis acutis; corollis exclusis glabris, calyce subtriplo longioribus, tubo exserto aequali, labio superiore erecto, inferiore abbreviato; laminae subsexlobis; connectivis postice deflexis linearibus. obliquis, longitudinaliter approximalis Y. subconnatis; stylo tenuissime glabro. 6 — Species pulcherrima, in boris nunc vulgarissima, foliis floralibus, calycibus corollisque coccineis distinctissima. Calyx fructifer ample campanulatus, fere pollicaris, glaber v. villosus. Corolla 2-2 1/2 pollicaris glabra, tubo parum ampliato, labium superius erectum oblongum, inferioris lobi laterales oblongi reflexi, radius integer suberectus. Connectiva edentula. — *S. Bratiliensis* Spr. Syst. veget. 1. 56. - *S. colorant* Horlul. — Habitat in Brasilia, in sylvis ad Guaxindiba prope Rio de Janeiro.
832. *S. INVOLUCRATA* Car. Icon, plant II. 114. 1.105. — Bib. I. c. f — Bot. Reg i it i. 1205. — Bot. Magai. t 8872. — Caule fruticoso; ramis elongatis glabris; foil, petiolalia ovalis acuminata, medio crenato-serrata, basi rotundata-cuneata glabris, floralibus bracteiformibus sessilibus late ovatis acuminatis coloratis, ante anthesin imbricatis, per anthesin decidua; verticillatis aubsexboria approximalis; calycibus tubuloso-campanulatis atratis, labio superiore integra dentibus abbreviatis, labii inferioris ovatis seiaeo-acuminatis; corollis calyce 3-5-plo longioribus, tubo Yenicoso glabro, labiis abbreviatis subaequalibus, supremo erecto YINOSO genitalibus inclusis; connectivis postice deflexis linearibus subdilatatis, longitudinaliter approximalis; stylo barbato. § — *S. laevigata* H. B. Klb. Nov. gen. et spec, plant. II. 205. t. 147. — Habitat in Mexico prope urbem Mexici, ad Tlalpuexabua.
233. *S. SESSEI* Bib. I. c. 288. — Caule fruticoso; ramis glabriusculis; foil, petiolatis ovato-oblongis acuminatis, basi rotundatis cuneatis v. angulatis, utrinque glabris Y. subtus pubescentibus, floralibus minoribus, supremis minutis deciduis; verticillatis paucifloris paniculatis; calycibus inflato-campanulatis membranaceis coloratis glabris, labio tubo peri ore integro dentibus labii inferioris ovato - rotundatis; corolla calyce subtriplo longiore, tubo longe quarto aequali, labio superiore erecto integro, toferloris lobis lateralibus. Mosgla rotunda, stylo parvo rotundato; connectivis postice linearibus. 4-plex, 10-lobis, 10-lobis, 10-lobis; stylo glabro. % — Folia 8-3-pollicaria aoboriaca. Falca brevis laia. Calyces fructiferi maxime cocclni. Corolla fere bipollicaris eoeioea pubescentis. Styli lobus superior longissimus. — *S. colgetmflat** Hoë. et Seta. mas. — Habitat in Nova Uispania.
234. *S. PUBESCENS* Bib. I. c. 723. — Caule fruticoso; ramis tomentoso-pubescentibus; foil, petiolalia ovalis obtusiuscula, basi rotundata rugosa, supra pubescentibus, sublus molliter cano-villosis, floralibus minoribus, supremis minutis deciduis; verticillatis paucifloris subpaniculatis; calycibus subsessilibus inflato-tubulosis aubicurvatis, apice coloratis, labio superiore inaequali inferioris dentibus late ovatis obliquis; corolla calycem duplo superante, exclusis pubescentibus, tubo longe exserto subaequali, labiis subaequalibus, inferioribus lobis lateralibus oblongis reflexis, medio rotundato; connectivis postice linearibus deflexis, longitudinaliter conatis; stylo breviter barbato. 6 — Affinis praecedenti *S. Reglae*, habitus prioris, aqua differt in foliorum forma et pubescentia molli lilius plantae. Calyces minus inflati et pubescentes vix membranacei. — Crescit in Mexico (Oaxaca).
235. 8. *AGGLUTINANS* Lag. Gen. et spec. nov. p. 2. no. 12. — Bib. I. c. 288. - F. II cordatis ovalo-lanceolatis acutis serratis, subtus candidantibus; corollis pubescentibus. calyce inflato quadriplo longioribus; caule hirsuto villosis. y* .. poij, yu f* ~ praecipue d praesertim Juniora villosa-viscosa. Verticillatis subinflatis bracteis Bractae o^alae acuminatae concavae, calyce brevioribus, deciduas. Corolla coc-

cinea fulgentissiraa. Stylus saperne compressas ibidemque utrinque barbalus. Sigma glabrum, galea longius. Calycibus 5. Sestet affinis videtur, sed foliis distinctissima. — Habitat in Nora Hispania.

230. S. REGLA Cav. Icon, plant. V. 33. 1433. - Bib. I. c. 288. - [Lindl. Bot. Regist (New Ser.) XIV. t. 14.] — Caule fruticoso; ramis glabris v. sub aiillis breviter pubescentib.; foil, peiolatis rotundatis oblusis sinuato-crenalis, basi late subcordalis coriaceis rugosis, supra bispidualis, subtus nervosis pubescentib., floralib. subconformib.; verticillastris terminalib. paucioris; calycib. subsessilib. lubulosis colorati*, labio snperiore inlegro denlibq. labii Inferioris late ovatis acutiusculis, corolla calyce duplo loogiore, exlua pubescentle, tubo venricoso, labio superiora erecto, inferior© vix loogiore, lobia lateralib. obloogis rcOexis, medio rolundalo inlegro deflexo; connecti Tla potlica edenlalis, breviiter productis deflexis oblusif, longitudinaliter coonalis; stylo glabro exstrto, apice subulalo biOdo. 5 — Kami purpurascetes. Folia sesquipollicaria, supra pallida, pilis bre\issimis asp era, •obtas nervosisslma rufescenlia, teouiter pubesceolia. Flores 3-6, in apicibus ramnlorum brevinm congesli, foliis calycem subexcedeotibus intermixtl. Calyces Kubsessiles, ample tobulosi, 8-9-lineares, molliter pubescentes, demum glabrati nervosi venosi, apice coccinef, basl virescenlet. Corolla coccinea, brevissime pubescens, connertivo postice brevlore quam io afBnibus. — *S. dittoidea* Pers. Encbind. I. 25. — Habitat ad Vilalpando Mexicanoram, in fundo de Hcglc.

237. S. GRAHAMI Bth. in Bot BeglsL t 1370. at Labial, gener. et spec. 280. — Caulc fruticoso; ramis glabris v. lenuissltne bifariam pubescentib.; foil, peliolalis oialib. obtusis, basi rolundatis ?. cunealis, medio irregulariler crenatis subglabris, floralib. ovatis acuminalis ciliatii deciduis; racemis elongalis; verticillasiris bifloris; calycib. tobulosis strialia, nenris pobaseanlib., labio sopariore inlegro denlibq. labll Inferior!* acoilai corollta ealyce daplo longiorib., extos glabris, tubo longe eisarlo taalricoao, tabla sQparlora araeto lalagro, lafaiiora dnplo longlara, lobo medio lallaalmo emargloalo; cftsaaetiYit potliea deflexis linearib., longiia-dinaltter connalis; stylo breviter barbato. 6 — Valda afflnis 5. *microphyllae*, at differt caule elaiion (2-3-pedali), ramis bifariam pubascentlibuii, folu* ID aj on bus Don rugosis vn nervosis glabnuscusis, raremis elongati« (uhra pcdalibus, calycib» sjrpiuH rolcralis, flonbus paullo raajohbus. — Habitat in Mexico, in mootibus prope Tlalpuxabu.i, prope urbem Mexico.

23*. S. MICROPHYLLA II. B. Kih. >ov. gen. el ftpec. pi. II. 2SM - Bib. I. c t - Caule fruiico<o; ramis lenuiter pube«cenlib.; foil. petin|aii» o*aii» obtus'is minulla regulantrr crrnaiM, bati rolandalis rugosis pubescentib., llrralib. o^atis acuml-natis ciliaiis deciduis; racemis brevib.; varlicillailris biflorii; calyrib. lubulosis striatif, nervis pubasceolib., labio superiora lotegro deotibq. labii inferioris acuminahs; corollis calyca daplo longiorib., eilus glabris, taba veninroso calycem sooperante, fauce cocontracta, labio aupariora recto, Inferior* duplo longiore, lobis rotuudalis, medio latissimo; conaedlvvis postice deflexis haaarib. longitndinaincr conaatU; stylo breviter barbato. 5 — Habitat in locis alpinia Novae Hispaoiaa prope Saaeia Iota, Moran, Pacbucan et ad Vilalpando.

219. S. GLCtFACBA II. B. Kth. I. c. W. - Bth. I. c. 27«. el 7«L - Caule sulfruU-coto erecto ramisq. pube»rrnhb.; foil ovatit oblu<i« cordatit «ubintegerrimji corurpi* glabnuscusis; verticillastris biflorit distaniib.; brarteis oblongis acollt ciliatit glumaceis, calycem tubaequanlib; calyrib. glabriutrulu ^ - Caulii el raim obtaaa tatragoni. Poha peiolata trmipolliraria et longiora, margme pilis rar^{is} ob«iu. l^atioli 3-4 Up. loogi, UtnulMime pubesrentes. Spicae Hongalaa vertl* cilUue. Braciraa oppaaitaa sinatae glabrerrmie ciliaiae. <:al)i tubulosa ^{bila-} bialun ttriatut, labils pilot«-<ilialU, supenore aenminalo, I oler I ore biflda !. ^{statio} acuaiiaaiis. - Habitat is lemparaus No«ae HUpaniae.

•«• •• BUBROTDNDA »L Ril. m«s. et Bib. I. e. tt» - nerbaeca erecti ramosa, gUbra: fall, patlolais lata ovaUs subrotundis ablustuiculis creato-serralis, Das

rotundalo-lruncatis, utrinq. viridib. glabris; racemis elongatis smptlcib.; verticillastris laxis 2-0-floris; calycib. pedicellalis lubuloso-campanulalis pnbescentib., apice coloralis; corollis calyce plus duplo longlorib., iubo eiserlo ampliato, labio superior© recto, ininteriore patenle, lobo medio Jatlssimo; genilalib. exserils; connectivis postice linearib. deOexis. longiludlnailler connalis; stylo glabro. % — AfDnis *S. cöcgmeae* sed glabrilie et foliorum forma diversa. Corollae tabus in parle superiöre amplior el labium inferius brevins. — Crescit in Brasilia.

241. *S. COCCINEA* Linn. Mant. 88. — Murr. Comm. Golt. 1778. 86. 11. — Bib. I. c. — Caule herbaceo erecto cano-pubescente; foil, peliolalis ovalis aculis crenaiin, basi cordatis, supra pubescenlib., subtus cano-lomenlosis, floralib. ovalis acuminatis deciduis; racemis simplicib.; verlicillaslrís 0-10-floris remolis; calycib. lubuloso-campanulalis striatis pubescentib., labio superiore iotegro denlibq. labii inferioris aculis; corollis glabris calyce duplo longtorib., iubo exterior, superne ampliato, labio superiore abbreviate erecto integro, inferiore sublnplo iongiore, lobis rotundalis, medio lalisslmo emarginato. % — Caulis 1-2-pcdalis ramosus incanus, raro pilis paivlis basi hispidus. Folia 1-8-pollicaria, sublus mollissima, floralia calyce breviora. Calyx saepe pnrprnascens. Corolla coccinea. Specimina Indica nullo modo ab Americanis different. — *BorwUnum coccituum* Moench. — 5. *rotea* Vahl, Eoomer. plant. L S44. — 8. *glaucae* Pohl, Pl. Braa. Icon. II. 136. L itt. — Habitat In America aequinoctiall, In Florida orientull, In Georgia meridional!, In Jamaica, In pascals camporum Inter gramina In via ad Rio Claro provinciae Goyai, in iniula Cuba et In India oriental! ad r!pu Gangis et circa Maderaspaiam e borlis disseminata.
242. 8. *EXCELSA* Bib. mss. in Bot Reg. [New Ser.] XIV. pi. misc. 185. — Caule herbaceo elalo pubescente; foil, peliolalis ovatis acuminatis serrato-crenati*, basi rotundalo-cuneaiis membranaceis, supra glabriusculie, sublus pallidis puberulis; racemo elongato; verlicillaslrís bifloris; foil. Doralib. bracleaeformib., caljces subaequanlib. deciduis; calycis lubulosi viridis labio superiore integro; corollae coccineae villosae iubo caljcc plus duplo iongiore snbincurvo, superne ampliato, labile subaequilongia. q. — Florea in racemos nudos 4-9-pollicares digesii. - In Guatemala cresciu
913. 8. *UNRATA* Bib. I. c. 7M. - Ramis blfariam pnbtacmyks foit B«UoUUa«vtlis obtuua crenalis, batl tranecalls, *trinq. viridib. tenalter p«b«t«t«Uub.v. onllb. late ovalis decidois; racemis aimplldb.; vcttiellaMria 4-4-florit; carydb. tubuloso-campanulatis viridib. pobeseentib., labio snperieft intefro dratibq. labil inferioris ovalis vix acuminatis; corollis eaJyee dsplo lftngtorib., tobo exserto ventricoso, fauce coniracta, labio superiore extna villosa erecto, Inferioris lobis laicralib. oblongis rellexis, medio rotundato deOeio; steminib. inclusii; eonnectivis postice deflexis oblongo-linearib. longlndinaliter connalis; stylo plumono. i — Folia fere *S. Grahami*. Corolla fere *S. fklgMU*, al minor. Folia Ooralla ante anibesin imbricate pubescenlia breviuime eiliala, latiora qoam In *S. glutmacta*, a qua diffen eliam pubescenlia, foliis crenatis son corlaceis et verticillastris aeplus sexOoris. — Crescil in Mexico.
- M4. 8. *P8BUDOCOCCINEA* Jacq. Coll. II. 302. - Ic. plant rar. 22. L 200. - Bin I. c. 200. - Bot Magai. t. 2»4. — Caule herbaceo erecto pills longis patentib. bipido; MI. peliolalis ovatis aculis crenatis, basi rotundalis v. subcordatis, supra pubescenlib., subtus tomenlo cano pubescenlib., lloralib. ovatis acuminatis deciduis; racemis simplicib.; verticillaslrís 6-10-Doris remolis; caljcb. lubulosi strialis pubesceniib., labio superiore integro dentibq. labil infenons aculis corollis extus lenuiier pubescentib., calyce duplo longiorib., tubo exserio aeanal labio superiore credo, infenore duplo iongiore, lobis rotundalis, medio latistimo emarginato; connectivis posiice denexis lineanb., longiudinalner connalis. »t)lo exserio glabro. ^ - A 5. *coccinea* differ! caule elation (4-prdali v. ultra, loniro pilosoneccano-toroenloso, folus majonbus ba>i sarpuis rotundahn nec cordatu florallbus roajonbus, corollae labio supenore paullo iongiore. Connect. ^

insertione bretiter denlata. — Habitat ID America aequinoctiali, in Nova Andalusia in declmfate montis Tuminquum, in Nova Hispania et in Caraccas.

245. S. TIBIFORMIS KIUScb. in Olto et Dietr. Allgem. Garlcnzgt. IX. 114 - Lnk. Kliucfa. el Olto, Icon, plant rar. bort Berolio. II. 70. t t. 28. — Caule suffruticoso erecto petiolisq. pubescent! -villosis; foil, membranaceis deficits suborbiculari-OTatis, basi cordatis, supra glabris rugosis conveiiusculii, margine crenato-serralis cilialis, subtus in nertis breviler pilosis, superiorib. breviler, inferiorib. longe petiolatis, floralib. decidnis ovato-acumioatis, subtus pilous; racem simplicib.; Tercillastris 10-12-florls; calycib. longis tubulosis striatif piloso-glandulosis, labio superioris integro dentibq. labii inferioris setosis; corollis puniceis, calyce laiea longlorib., extus villosis, labiis subapqualib., superiore recto emargiato, Inferioris lobis rotondalis minutissime deniiculails, lateral ib. abbreviatis deflexla, medio oblongo palente; gemlilib. longe eisertis; slylii versos apieen pllosis, lobis stigmatis valde inaequilongis 3} - In Meico. SMS S. STOLONIFERA Bib. PI. Hartweg.505. — Herbacea stolomfera: caole erecto, basi ramoso folioso birsuto, soperne nudo; foil, loogiuscule peUolaUs lale cordiformib. r. sobdeltoideia obtosis crenatis rugosis, utrinq. birsutis, subtus densius tillosit subcanescenUb., floralib. braceacformib. parvis deciduis; racemo flongato terminali simplici; tertiillastris renotis 2-0-floris; cal)ce tubuloso-campanulato pubescente, labio superiore iotegro dentibq. inferions UUs obtusiuJCUU; corollae tubo elongato mcunro, medio inflalo, sub faucecontracllo, labuf subaequiloogis. ^ — llabiUl in Meico.

- M7. 8. PBOEMICEA H. B. ktb. NOT. gesar. el spec, plant II. 302. t 1M. - Bib* Labial genet, tt spec 201. t — Canla fraticoso credo ranisq. muricato-bispidii; foil, ovaila aeotia aabooHaUa aarnlla flabrisj vartieillaalris multifloris distantib.; calyeib. blapldo-glaaj4«loala; galaa abbrtflala; sUninib. longe eisertis. 6 — Q^{o1} dripodalia ramoaa, raaal latragoal q«adr)t«catl. Folia opposlu petiolata, nerto aaedio pilosioacola, sobias gtabarrlma ataqalpolllearia graveolentia. Pell oil 6-1 lin. longl canaliculati, Interne pllosl. Spieaa terminates subpedales verticillat* Pedunculas commons el rbachls pnrparascentes piloso-glandulo«l. BracteJ ovato^oblongae acalae, pilis articulatis glandulifens nliatac, pedicrlllo pilot* longiores. C«l)X lubulosns bilabiatus striatus hispido-Klarnhiloiun, labio sopeiore aruto, infenore bifldo, lanmis acuninatii. Oomlla «angumca(exierne p»** brrrula, lubo calycem duplo superante, labio superiore abbreviato obtuto, inferiore tnfiJo patrnlf, lacinn intermedia man ma tmarginata biloba, lobis rotunda*!*** Stulus stamina supprans filiformis glaber. Stigma bifidum, lacinus aculis In*~ qualibus. Fructus in fundo ralycis. Aebaema 4 oblonga obtusa, obsolete trig⁰⁰* etterne convfiiuscula, interne aogaslala glabra futca. Media videtar <.*.*' -1 pte*doeocr*t*m el 5. puleMlam. - Habitat ad radices monlium Colopaii * ft Coraion inter Malalo et Tambillo la regno Qoitensl.

- MA. 8 PtLCHELU DC C«t bort Moosp. 141 - Bib. I. c. 201. el 7*4. - Loj, Uort Ripol. 123. t i l - Caole fratleoso; ramit pubeseetib.; foil. peiioUUS o Us, aplice angotUlls oblosioaealls emails, basi lais cordatis mrmbraoaceis gilotls Mbglabris, floralib. membranacpi* ovaiit acummatis decidait; simpleib.; faHicillaslri* snb-IO-floris; calycib lubulosis striatis ernnb., labio sopmore inlegro dentibq labn infenoris otaus aculis; caljre duplo lripl«ve longiorib , eilus glabrit, tubo looge etserto ioins bideauu, labiis subaequalib., superiore recto iptrgro, infrions ItvaMb. abbrevialia obloogis daflnis, mtdio lair roiundalo breviler eoaaactltii poslica supra sabolala-droUtift deOens liocar.b , loogiludtoal natis; stylo sopra bretitstue barbaio :> - Af6o.» S fulgtmU, a quai d» lenio- lenoianboi sobglabris, caule glabriore, corolli* bre«ionbu» glabris, UDI lenio- ria lobia lalaralibaa miooribai, mrdio majore, stjlo supra «ix barbaio* — JMStectyJ Ug. <- Habitat U Maaico. * »). OUGOSTACBYA Gasparioi, Oaamaaione 5. f - Caole «^oaa; ramis foliaq. subpubernlist foil, cordalis brevitr acominaus cr

saperiorib. subsessilib.; ricemopaacifloro; corollae galea glabruşcula, genilialium longitudine. 5 - Affinis *S. pulcheUae* DC. — Habitu in America australi. — Species insufficienter descripta.

290. *S. FULGENS* Cav. Icon, plant. I. 15. t. 23. — Bib. I. c. SOL — Sweet, Brit flow, gard. (New Ser.) I i. 50. — Bol. Regist U 1350. — Caule fruticoso; ramis pilosobirsulis; foliis petiolatis ovatis aculis crenato-serratis, basi cordatis, supra pubescentibus, abtus albo-lomentosis v. lanatis, floralibus sessilibus ovatis acuminatis deciduis; verticillastris 8-floris; calycibus pedicello longioribus lobuloso-campulularibus pubescentibus, labio superiore integro denique labio inferiori ovatis breviter et obtuse acuminatis; corollis calyce duplo longioribus, tubo ezserto venricoso, basi intus bidentato, fauce contracta, labio superiore extus villosa credo integro, inferioribus lobis lateralibus oblongis reflexis, medio rotundato integro deflexo, staminibus inclusis; connectivis postice subulato-dentatis deflexis linearibus longitudinaliter connatis; stylo plumoso viz ezserto. 6 — Fructus 2-3-pedalis Y. ultra, rami numerosi nunc fere glabri, saepius pilis densis patulis birsuti. Folia magnitudine et hirsutie variabilia, nunc viz pollicana, supra bispidulosa, subtus subdensa alba vestita, in speciminibus calicibus saepe 3-pollicana, utraque viz pubescentia, omnia mollia sabnigosa, floralia calyce sablongiora, basi ovato-dilatata, acumine longo obluso, integerrime pubescentibus, saepius colorata, ante anthesin decidua. Racemos sessilibus pedalisve, verticillatis ultra pollicem disutibus. Calyces breviter pedicellati 6-8-lineares lobis 10-nerveis. Corolla speciosa coccinea 5-pollicaris. Stylos dense bifariam barbati, labio superiore lobis parvis spatulatis. — 8. *cardioides* H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. Americ. II. 301. t. 151. — Crete in montibus Mezlanis, prope Tlapuzahua et prope Lerma.
251. *S. AYAVACENSIS* H. B. Kth. Nov. gen. et spec. p. 11.206. - Bth. I. c. - Caule fruticoso erecto raroisq. flavo-hirsulis; foliis ovatis aculis cordatis crenatis, subtus pilosis, verticillastris sub-8-floris distantibus; calycibus elongatis pilosis-Rutinosis. 6 — Fructus 6-pedalis, rami tetragonis flavo-birsulis. Folia opposita petiolata, irregulariter crenata, supra pilis parvis appressis obtusa, subtus pilosa, a- /t poll. longa. Petioli 4 ho. longi flavo-binutissimi. Spicae semipedales terminalia aequaliter verticillatae, 6-8-floris, rami pedicellati bifido-folia. Calyx 8-lobus longus tubulatus lobis pilosis-undulatis. Labio superioris acumine obtusato, inferioris bifido, Ueinis tunc v. Mto-c. b. la. Ua c. J-rolia purpurea? - Habitu in temperata F. t. M. inter Ayavatam et ripam terminis Cuco.
258. *S. RECTIFLORA* Vis. Linnæa XIV. Linn. 13B. - Caule suffruticoso letraquetro villosa; foliis cordatis serratis, subtus petiolatis villosis; bracteis ovato-rhomboidibus cuspidatis, calyce duplo brevioribus deciduis; racemis terminalibus pedunculatis simplicibus villosis-villosis; verticillastris multifloris; calycibus compresso-clavatis nervosis pedicello superantibus, labio superiore inflexo inferioris bifido denique lanceolato-subulatis; corollis calyce duplo longioribus rectis, tubo subclavato, labiis subaequalibus, superiore cochleariformi, inferioris lobo medio transverse elliptico erecto, lateralibus marginatis revolutis; geometris labium superius duplo superantibus; connectivis postice deflexis linearibus approximatis connatisve; styli lobis inaequalibus subulatis. 2l. — Uabulat. . . . ?
253. 8. *ACUMINATA* Ri. et Pav. Fl. Per. et Cbl. I. M. t. 37. Bg. b. - Bib. I. c. 203. - Caule suffruticoso erecto villosa; foliis petiolatis ovatis acuminatis crenato-serratis, basi cordatis rugosis, supra bispidulis, subtus concoloribus, ad nunc pubescentibus, floralibus calycibus subaequalibus ovato-oblongis obtusis membranis clivatis deciduis, racemis simplicibus; verticillastris subsextifloris remolentibus calycibus pedicellatis tubulosis striatis pubescentibus, labio superiore integro denique labio inferioris lanceolato subincurvis, corollis calyce duplo longioribus tubo ezserto submucoso, labiis subaequalibus, superiore integro, inferioribus lobis, medio rotundatis, medio integro, connectivis postice deflexis linearibus, longitudinaliter

connalis. % — Caulis orgyalis tetragonus sulcatus, pilis arlicnlalis palentibus villosus. Folia looge petiolala, ample cordala, floralia glumacea incarnata. Racemi lonri laxi Dauciflori. Pedicelli cahcem subaeauantes. Calvx fern nollic«
~~fra, lobis laxi Dauciflori. Pedicelli calcem subaeauantes. Calvx fern nollic«~~
 Pillao el Cantae.

2M. S. LONGIFLORA Rz. et Pav. I. c. 83. U 10. fig a. - Bib. I. c. - Caulc frulicoso erecto villosu mcoso; foil, peliolalis ovalis acuminatis serralis, basi cordatis pubescenli-hirsutis, sablus albo-lomenlotfis, florahb. o\atis acuiis coloralis deciduis; racemo simplici; verlicillaslns pauciflons dislanlib.; calycib. ovaiis inflalif coloralis, labio aupenore tolegro deolibq. labn inferiors ovatis acuiis; corollis longissimis calyce quintuplo loogiorib., eilus birsulis, lubo amplo longe exserlo, labus subacqualib., superiore erecto, iofenons lobis rolundalis; conneclivis postice lineanb. deflexls, loogilodioallter conmln, stylo glabro. 5 — Frutex triorgyalis ramosissimus, ramls Yillosis et glanduloso-pubesceDlibu^ . Folia ampla, longe cordiformla. Raceml eloogati nulaotes. Corolla 5-polhcan> speciosa la-nae otinae colore. — Habitat IO Peruvla in pracrupii* profundis Tarmac ad Huicbay praedium.

D. *Cotru**a\$Bib. I. c. 803.

Corollae coeruleae r. coeruleo-violaccae.

255. S. RLMICIFOLIA H. B. Klb. NOT. gener. et spec, plant II. 305. - Bib. I. e. t — Caule frulicoso erecto ramisq. pubescent!-birtls; foil, oblongis basialis obio-siu<culis crenatis, sublui Incanis et tomentoso-lanatis, pamculis terroinalib.; tertictllastris bifloris parom renotit; calycib. piloso-glandulosm. 6 — Frutex 4-4-pedalis erectus ramosas, rami tetragon! pobescenti-biiii. Folia oppouia petiolaU sagiitato-bastatt obtnsioseala retienlato-venosa, supra rugosa pihisque con-persa, tublus lomestoto-tonau ft Incaaa. 4-pollicana, basi SVi poll. lau. Pe-Uoli 1-1%-pollieaiw, iBcaao-UaaU. Panlealae longe peduneulaUe quadripolli-earot patMtet, spiels vertleillatta. Poduneull raniquo paniculae glanduloso-pubescentef. Calyx easopanujaUis bllabiatoa atriatu piloso-glaodulosus, labio supenore oblongo acnto, inferior* bifldo, laciniis acatiutculu. Corolla ignota. — Species inter *BraehyanUuu exLomgifloras* media. — llabilat juxla urbem Quito el in radicibus montis Javirac.

250 S. PETIOLAKIS H. B. Klb. I. c 301. - Bth. I. c. SM el 724 - Caule herbaceo fnMo ramoso tenuissime pubescentle; foil, longissime peiolaiis dflloideis eor-daio-haslaliis oblusiusculis, irrfgulanier crenaio-serraiis hiriis, vrrticillasiris bl-fions dislanlib, calycis piloso-glaodulosi labio supenore mdcnlaio. ^ — Herb* crecla sesquipedalis ramosa. Caulis ramique telragoni, irnuistine pubetcenl^i* Folia oppo»ita nubtripollicana, ulrioque, prafsertim »ubiu* in venis pilis tenoibus sparsis albicanlibos appretsis birla, reticulalo-venusa mcrobranacea iripolileariit basi 3 poll. lala. Pelioli 4-6-pollicares canaliculali birii. bpicae longe pedoo-culaiae ifnmales, saopios leroae Yerticillatae. Bracieae oblongae pube»centes. Calx canpanolatus bilabialoa srialna piloso-glandulosus, labio supenore tri-deouto, infenore bi8do, laciniis acuminalis. Corolla coerulea pnbescent* — ?* — \$%UmU\$ el w**eropyU*4 a(6ois. — Uabitat in America aequinoctiali in I**i^o calidis in Hpa fluvii llagdalenae.

237. S. VITIFOLU Bib. I. c. 794. - Caole herbareo errclo villosu; foil. peUoUU⁰ lale delioideis angolalo-lobaus, basi inincaiiis v. lair saguiaio - cordalis ^{et***} utrinq. villost-birtatis viridib. v. sublu* rufesrrnhb., floralib. ovato-lanceol«
^{Ug.} acnmiaaUs dtciduis; racemis elongalis ramotis, veriinllaiiris 2-0-Dons ^{****} calycib. pedicelUis otalo-campanulalis t.llom, labio supnre »^{ubut} i ^{lato} defiii»>|. Ubu inferioris acumioaiis. corollu cal)ce 3-4-pl<> lonajiorib, ^{tubo - ro-} ?Hfr riterio veatneoso, limbo hiaotc, labio nupenoro falcalo, infenort ^{longior,} lobis rotundaiis: stylo glabro. * - llabitut A pffiotom. \$*g*U*j** * ^{macro-} ^{itolaris.}
 p*Hfa esed foliorum praecipue forma dmincussima csu r lores iSP*

Corolla cocrulea, tabus supra ovarium contractus, dein prope faucem valde \cn-ncosus Conncliva posiice oblongo-dilatata longiludmaliler connala, exiremitale libera. — Crescit in Mexico ad rooniem San Felipe prope Oaxaca.

258 S. SAGITTATA Rr. cl Pav Flor. Per. I. 23. I 35 flg a. — Blh. I. c. 204 t — Caule herbaceo erecto villosa, Toll peliolatis tnangularlb. sagiltaiis aculis circnato-scratis rugosissimis molliler villosis, floralib ovalis acummaiis dcdiduis, racemis clongalis ramo»is, verticillaslns remotis 2-0-flons; caljcb. pediccllaiis ovalis villo«is, labio supenore late ovatn obluso v Indenlalo, infenore bifido dentib aculiusculis, corollis calyce quadruplo longionb , tubo exscro sublu» submfalalo, labio supenore recto integro, infenore vix mnjore, lobo medio emarginaio, connectivis pollice linearib. dcflexis, longiludmaliler connatis, stylo glabro. % — faulis orgjahs creclus, in feme ramosissimus, rami brachian tetragonl sulcaii MIOSI et Rhnduloso-pubescentes, saepe erecti, alioquin procumbentes radicanses Fohn IOIRC peliolata dellexa, 2-3-pollicana, aunculis a(uiis duerRentibus Raccmi saepe pedales, paniculam brachiatam parce ramo»am formantes. Vericillasln pauci, saepius 2-4- rartus 6-Oori. Calyces purpureo-Molacc, labio superiore conca>o nee recurvo Corolla obscure coerulea, extus pubescent labio inrenore propendente, lobis rolandatli. - Vulgo *Salvia Heal* locolae *Satvtae of fictnalu* loco hano apeeiem aubstitaaol - Hablui la Peratla eopioM in horiui versaris et roderatls Tarmae, Uaarooberl el Hoanuei, In moot*-Qalndia Novo-I Granatensium et ad Obrajillo.

250 S. MACROPHYLLA Bib. I. c. 785. - Caole herbaceo erecto plloso-hlspido • foil longe peirolaus aroplis ovatis cordalis, superiorib. baslatls subnigosls, ulrinu vi-ndib h.sp.d.s, floralib. ovalis deciduis; racemis elongahs ramosis >lsros.s ver- t.c.laslr.s remoti, 2-4-flons, caljc.b pediccllalis campanulas,, demum olonRaiis V.IIOJLS, labio supenore brevissime tridentato, infer.ore bifido, dennb ombb. oval.s acut.s, corolhs cal,c subquadruplo longionb , tubo exserto ampl.alo I ,b,0 supenore credo, inferior* m long.ore, lobis rotundalis; connectn.s POMICC h- neanb. dcflexis longuudmaliler connatis; sl)lo glabro. ^ - A S sagXtata dft>rt sutara elai.or, foln. mulio ro.joribo. lailoribus, baseo. aurlcull, roiund.ti, c<r-

SSSSS multo minus rugosis et magis bispidis
Corolla coerulea. Genitalia exserta. —
as Samianum.

100 6. SCDELLARIOIDES H. B. K.h. Nor. gen. et spec. plant. II. 303. t. 138 — Blh I c SM t - Uerb.ce. .d.c<,d.n.: racis piloso-pubescentib. v. glabruacu- II.; foil. pe.,ol.U. ov.,,deltoid... ~*MU crenato-serratis, b si hMFi. ur.nq hPrel., floralib. ovalib. deciduis; w < | . . b . t . a . p . l . e T b £ \$ £ TerticilUMm drolandub ubbOori; c.ljclb. cmp.nul.tl. *l.co.o->lllo.l. !lh.< supenoro brewlcr indenl.lo, ioferiore blOdo, deoUb. tnoib. aeoUc corollii. ea- lyce inplo lonnionb , lubo longe euerto Yeolnco.o, labio inperlore recto, infe- nore .ublongiore. lobo medio em.rgia.lo; genil.lib. longe euerti.; conn*cl.*I^ postlce Imeirib deBem, lonRiludm.liler eonn.li. % - C.ule. bad proeumben- U. tideolor, r.m, ped.le.. In p.rle .uperiore .bnudl. Foil. .e.qu.p.,||ir.ri r LULudioe longnud.nem sul>.<|u.nlia. C.l)ce< bre>e», pill, glutino.u d.» .7.* III. <te.ll. polhcr., cocrule., ex.u. |,,<er pttb..c.< T>bJTZ r l'. T O.tus, *ub f.uce p.rum con.r.c.u. Ublm .up.riu. .ublnl egrum, infel iris le.. na calycis et labii inferioris corollae fere vertus. — Habitat in America aequinoctiali 7 regno Quitensi prope Chillo, in humidis arenosis terrae frigidae prope Santa .di Bogota

SOI S P*Ti.\s (a* Iron pi > Vx 4M - mi, I c 20^ + - IMAund iheBuUmni III i 100 t- l.n.II n.l K,g,s. Vw stfr) \ H , < , 1U n n > Mainline of Uotanx M p I cum ic aen | (i , | c horhir.)

bispidis, floralib lanceolato-linearib, verticillast utrinq
rib

maximis; calycib. campanulatis villosis, labio superiore brevissime tricuspidato, inferiore bifido, denlib. acummalis; corolla calyce subtriplo longiore, fauce ampliala, labio superiore subreclio integro, inferioris lobis lateralib. oblongis reflexis, medio rotundato acuminato; lamimb. longe exsertis, conneciivis poslice deflexis edcnlulis dilatatis, longiludinahler connalis, slylo longissimo glabro 2}. — Caules 1-2-pedales simpliciusculi, pilis patenlibus albis articulais in parte superiore caulis j»ubglandulosis villosi. Folia infenora peliolala, basi laic hastalocordaia, supenora subsessilia, omnia aculiuscula, breviter crenalo-serrala, supra rugoso-hispida, subius pallidiora, bispida v. in specimimbus nonuullis pilis albis rigidis densissime villosa, floralia sessilia inlegernma aculiuscula glanduloso-pilosa, infenora lanceolala, suprema lineana, fere pollicana. Pedicelli calyce breviores. Calyx campanulalus, 8-9-lineans, vix nervosus, profunde bilabialus, pilis brevibus mollibus pubescens. Corolla coerulea, ultra 2 poll, longa, exlus breviter pubescens, lobo crasso, faoce ampliala, labiis Inanlibus subercctis, superiore longiore, Inferioris lobo medio dependente late otalo acuminato Stamina corollam fere pollice, stylus sesquipollice excedentes. — *S. grandiflora* Nee (ex Cav. I. c.) — 5. *ipeclabilti* H. B. Kth I. c. JW. — Habitat in monlibus Mexicanorum prope Tlalpuabua ad Vilalpando prope Guanaxualo, San Rosa cl in umbrosis prope Real del Monte.

262. *S. LONGISTILA* Bib. I. c. f — Caule herbaceo? erecto tomentoso-villoso; foil, peliolais laic ovatis acummalis crenalis, basi ample cordali* rugo&is, ulnng. molliler pubescenli-villosis, supenorib. sessilib, floralib o\aii» longe acummalis Cihalis deciduis, supremis subcomosis; verlicillastns 6-10-fions, caljcb clongalo-iubulosifi, basi snalis molliler pubescenlib., labio superiore iniegro denlibqbrevissimis labn inferioris longe setaceo-acummalis; corolla caljcc vix duplo longiore, tubo aequali, labio superiore ereelo, inferiore breviora, lobis ovalis, lalenlib. reflexis, medio blfidis geolulib. exjerlis; connectivlt poslice deflexis longitlmo prodaetls obUuls, loogHadlnallier connalis; slylo glabro, lobo superiore longissimo subnlalo. 2} — Caules crass! sobcarnosi, lana subcanscente brevi villosi. Folia saepius basi inaequaliler cordata, infenora ampla, supenora mullo minora, floralia ante anthesin imbncato-comosa, molliler pubesrenlia striam acumine longo-subulato mold. Calyx fere pollicans, pedicello Mibacqualis, labi* o n h acuta, infenus m flssum, molliler 2-an»latum, supenus 1-arisiatum. Corolla coerulea subincurva, lobo cal>ccm broiler «upcranlc, superne paruro am* plialo. Labium infenus brevissimum patens, supenus subduplo longius, exio< glabrum >. tenuier pubescens. Connectsa cdenlula, poslice lineana, fere *< basin lubi altingenia. — Ilabiial In regno Mexicano prope Zincpecuario.

283. *S. AMETHY6TINA* Smith, Icon. Ined. II. 27. I. 27. - Blh. I c 296. - Frullcof*: ramis albo-villosis; foll.° peliolalis ovalis aculis, basi profunde cordam, aunculo rotundatis rugosis, supra pnbescentib., subius cano- v albo-iomentosis, floralib. lanceolatis decidun, racemis elongalis simpheib. veriicillatiris laxe srxfloris re* molis, calycib tubuloso-campanulalis, exlus VIIIOSK, labio supenore mlf/° deoiiibq. labii inferioris ovalis acuiis, corollis calyce subduplo longiorib., 1°^ exserto ventneoso, labns subaequalib, inferioris lobis lateralib. oblongis refleij medio tubiniegro, gemlialib inclusis; connecinis poslice dclfc&* lincanb., 1°^ giludinaliler connatis, sl)lo barbalo i> — Folia longniiculr pcholala, S-3/« P° * longa, crenato-serrata. Racemi semipedales Pedicelli raljccm *Ubae<11. a' J J. Calyces *S. Mexteanae*, %. parum %alidioreg Corollac forma corollarum * P''^ gimti* v. *Mfjncanae*, cocrulcae polhcares FOIIIH *S fuhjenh* affmi», floribu, c' *Mfj-trinae* — s. t must a II. B Kth >ov gencr el «pre |> II 3M .. *?''^ molts in icone) — Habitat in America arquinocluli, in %mlibu« C)uindlue? inter {juebrada de Toche el la beja, in >ow OranaU cl in bumidi* » errae i n st- dae prope Santa Fé di Bogou. U

284. *S. KARWINHkl* Bib. I. c. 725. — Caule frulicoso ?\ ramis rufo, lanflilis, peliolaiit ovatis acuminatis crcoalis, basi rotundalu, supra rugulosi* a*1'et J 1,)

sublas rufo-lanatis, floralib. decidais; verticillastris multifloris; calycib. amplis tubulosis glanduloso-villosis, labio superiore iniegro denlibq. brevissimis, labii inferioris longe acuminatis; corollis calyce duplo longiorib., tubo amplo exserto, labio superiore erecto, infenore vix longiore, lobis ovatis; genitalib. corollam aequantib.; connectivis poslice deflexis longitudinaliter connatis; stylo glabro. 2. — Affinis quodammodo *S. longittylae* et *S. amethystinae* sed characteribus datis differt. Ex habitu *S. Haenckei* similior, sed corolla coerulea atque nolis jam differet. — Crescit in Mexico.

205. *S. CYANEA* Bih. 1. c. 296. — Caule fruticoso; ramis tetragonis cano-pubescentibus; foliis, petiolatis ovalis acuminatis serrato-crenatis, basi cordatis, utrinque pubescentibus, floralibus ovalis acuminatis membranaceis deciduis; racemis simplicibus; verticillas longis laxe 0-10-floris subsecundis; calycibus tubulosis rufo-villosis, labio superiore brevissime tricuspidato, inferioris denique lanceolatis acutis; corollae calyce subduplo longioribus, tubo exserto, superne ventricoso, labiis subaequalibus, superiore recto, inferioris lobis lateralibus oblongis reflexis, medio rotundato; connectivis postice linearibus deflexis, longitudinaliter connatis; stylo barbato. 6 — Affinis *S. amethystinae*, sed differet foliis magis acuminatis et praesertim calycibus tenuioribus rufo-villosis, labio superiore rotundato. Corolla pubescent, magnitudine *S. amethystinae*, sed tenuior. — Habitat in Nova Hispania.
260. 8. *MEXICANA* Linn. Spec. plantar. 37. — Cav. Icon, plant. I. 10. t. 20. — Bth. L c f — Caule fruticoso erecto tomentoso; foliis, petiolatis ovalis oblongis, utrinque angustatis serrato-serratis tomentoso-pubescentibus, floralibus ovalis acutis deciduis, pedicello vix longioribus; verticillas longis 0-20-floris; calycibus elongato-tubulosis, nervis ciliaribus, labio superiore iniegro denique labii inferioris ovalis acutis mucicis; corolla calyce duplo longiore, tubo ad medium inflato, sub faucibus contracto, lobis subaequalibus, superiore recto breviter pubescente, inferioris lobis lateralibus oblongis reflexis, medio minore rotundato emarginato dedeco; connectivis postice deflexis obtusis, longitudinaliter connatis; stylo barbato, lobis subulatis, superiore longiore. 6 — Rami oblique tetragoni sulcati, lomento breviter denso vestiti. Petioli 1-1 1/2-pollicares. Folia 2-3-pollicaria nervosa acuminata, breviter serrata, supra pubescentia, in nervis tonentia, sublimen demum junioribus, praesertim in var. *fi.* subulatis, basi in var. a. euneata v. longe angustata, in var. *fi.* aequaliter latera minus rotundata, alio MNIU, floraliter sessilia, late ovata villota, breviter acuminata per adthesiam decidua. Bacula saepe pedales, verticillas longis approximatim 10-90-floris. Pedicelli 4-0-10-aequaliter villosi. Calyces 8-10-lineares v. fere pollicares, in var. *fi.* antherae nigrescentes glabris, nervis ciliaribus. Corolla coerulea, lobo oblongo supra basin contracto, minus bidentali. Connectiva edentula. — *Jungia aUtima* Murb. Moih. pi. * *Selarea Mexicana* Dill. Hort. Elth. 330. t. SM. fig. 3. — *S. meliuaefolia* Deaf. Cat. Hort. Par.

fi. major: foliis junioribus densius vel longius lomentosis. — *S. papilionacea* Cav. I. c. IV. 0. u. 310. - *S. mtdifolia* Ort. Deo. 0. — Habitat prope Patcuaro Mexicani locis temperatis, prope orbem Mexico.

907. 8. *GLABRATA* H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pi. II. 200. — Bih. I. c. 207. — Fruticosa? glabra: foliis, petiolatis ovatis acuminatis serrato-crenatis, basi cordatis, utrinque viridibus glabris, floralibus parvis deciduis; racemis elongatis simplicibus; verticillastris longis 6-10-floris; calycibus longe pedicellatis tubulosis campanulatis glabris, labio superiore iniegro denique labii inferioris subulato-acuminatis; corollae calyce plus duplo longioribus, tubo longe exserto venuloso, lobis subbrevialibus, superiore recto villosis, infenore longiore, lobo medio latissimo; stylo barbato 6* * ^ — Specimen Karwinianum herbaceum videtur, et folia majora (2-4-pollicaria). Corolla violacea pollicaris. Tubus medio venicosus, ad faucem parum contractus. Calycis praeaequaliter bilabialis indeg. Stamina inclusa. Stylus breviter exsertus. — Habitat in Mexico, in montibus (comparati) Novae Hispaniae inter coenobium (ianpense et) illatum Coccolliar.

- 268 s CONCOLOR I arobert rass ex Bib 1 c — Caule fruhcoso (*) ramis glabris; foil pcliolatis otalis acuminate serraiis, basi truncais glabris, florahb deciduis, racemis clongaiis simplicib, \erlicillastris rcmhhs multiflons, cal>cib longe pedicclaiis tubulosis stnalis villosis, labio supcnore integro dentibq labn infenoris ovahs acuilis, corollis calyce duplo longlonb, cilus pubesceniib, lubo tenui eiserto, superno ventncoso, labns subaequalib, supenore recto inlegro, infer ions lobis lateralib oblongis reflexis, medio inlegro, connerlms posiice lineanb. deflexis, longitudmahler connexu, stylo glabro \$• — A S *amelhyshna* differt fo- Ins glabris concolonbus, basi truncais nee cordalis, flonbus longius pediccellalis Calyx coerulescens villosus, pill saepe glandulifen Corolla coerulea Folia juniora inierdum lenuiter pubescenlia. — Habitat in Mexico
- 200 S COERULEA Bib I c 206 t — Caule herbaccho' erecto, ramis glabris v patenlim pilosis, foil petiolatis ovalis longe acumioatis, basi truncais rolundatis v. subcordatis glabris, florahb deciduis, verticillastris 2-6-flons »ubsecundis, calycib. lubulosls, labio supenore integro dentibq brevissinns labn infenons obtusiusculis, corollis calyce sublnplo longionb, tubo exsercto sup erne amplialo, labns subaequalib, supenore eilus pubescenle erccto, mforioris lobls lateralib obloogis reflexis, raddio inlegro, connectsis posticc minute dentatis deflexis hnearib longitudinaliter connatls, stylo glabro 2|. — Rami nuoc glabri * tenuis <imc bifanam pubescentes, nunc pilis longis albis paieniibui apice satpe glandulifons bi<pidi Folia supra saepius pilis brevissimis raris hupidula, subtus glabra T ad ncvros tenuiter pubfscencia, infenora saepe 4 poll longa, basi V/t lala, apice longe anguslata Bacemi 4-&-pollieares, verticillasin pauci Calyces breviter pedieellali, elongato-tobolosi, 10 lin longi, tirides v subcoerulescenle* tmail unolsslme pabeaentes, lablls ovalis. Corolla coerulea, sesqui- aut 4-pollicans. Stanina lablon •aperlia aeqnantla. Stylos Yii euertas, lobis tenuibus, supremo doplo longiore. — Habitat in Brasilia meridional!.
- 270 8 TGBIFEBA Car. Icon, plaolar. I. SB. t SO. - Bth I c 06. — [Lindl Botanic Regist (new Ser) IIV t 44) — Caule herbaccho glabnucculo, foil petiolatis laic ovalis serrato-crenatis, basi rotundato-truncatis v subcunoahs glabnusculis v subius rano-pubf«cenlib, florahb deciduis, racnm simplinb MTiicilhsstns subsrvdoris <ecundi<, caljcib subsessilib lubulo^is slmtis ghbruiHCulit, labio su(•n >re inlegro infcnorisq denlib ovati» icummalis corollis caljrc J-4-plo longiorib, e\lus glabris > pubescenlib, tubo longe etserlo acquah sulnncunro, labns abbrevialis, supermre erccto inlegro, infrnore breuore, lobis roiundalis deflexis in medio inlrgro connertms poMirc bre\iler produclis defletis lineanb subdilatais, longitudmahler connalis, sl)ln barbalo ^ — taulis bipedalls el ultra, erecius v adtcendens, acute telragonus purpurateens, glaber •• angolu brevier pubfscenlib Folia fere S *Mexicanae*, sed tenulora, baul saepias parum inaequaha Racemi semipedales, wticilla*iri saepius 4-3-flori, Infenores poll.cfin, »upenores semipolhcen dislaioies (orollae violaceae, li-15 In I«n-gae, tobo VII amplialo. Gemtalia brevier e»*crtta - S *longilora* Willd S»>cc pi I 141. - Habitat in Mexico
- 271 S GI'ABAITICA M Nil ro»s ei Bib I c - Frut.co«a ramn patnlim pilous, foil peiolaiis ovalis aculis serrali*. b»i truncaio-rordaiii rugosisMmn Wfpidis, fubiut lubcao-lomenlosn racemin plunb simplicib ^erudin \rticiiw-aUit paaciflorislaftlsapproiioalis calyeib labuln«is glabnujculiH, labio «upenor latofro dtiibq Ubii Infenons o%*U\$ acolis, corollis f>l)re sublnplo ^{lon}»¹⁰ib, lubo long* cstrto, labn» Hongain aeqoallb. »Umimb corolla brnrnorib ^{con}nectivin posiice linear*b drflevu, longiudiniliiier eonnaii* M)lo -ubius barn ^{ato}6 - Hprrim pulcra Folia l-l /,-pollirana « orullae 15-10 hnras ^{lo}»^a*^f ⁱ - leose coeruleae (at)ret taepiut glabri, inierdum pill* glandulo»is ⁱ•ⁱ•ⁱ ^{id} - Babiui in Brasilia inter frolices prope Sanlo Anjo, inter Mi<tio«s ^VTM* ^{ua}•^{en}ats volgaris

272. S LAMIIFOLIA Jacq Hort. Schoenbr. III. 37. t. 318. — Bth. I. c. 290. t — Caule fruiicoso⁹ credo subglabro; foil, peliolalis ovalis acuminalis serrate-crenatis, basi rotundalis v. cuneatis glabrin, floralib membranaceis ovalo-lanceolatis deciduis; racemis elongatis, verlicillasris 0-10-floris; calycib. subsessilib. lubulosis, labio supenoro integro dentibq. labu inferions acotis; corolla calyce tix duplo longiore, tubo subaequali, labio snpenore erecto extus villosus, infriore brevior, lobis lolerolib oblongis reflexis, roedio rotundato integro; slaminib corollam acquanlib, connectivis poslice dellexis edenlulu oblusis, longitudinalncr tonnitis, stylo barbato 2|. — Kami obtuse telragoni, jnmores taepe tenuicr pubescentes. Folia sacpe 3-4-pollicana, glabra v. rarius supra tenuissime pubescenda, subtus ncrvosa glabemma, floralia calycem subaequanlia acuniinata, per anlbesm rcfixa v decidua. Calyces subscssiles 8-sinali, denlibus ovato-lanceolaiis acutiusculis. Corolla coerulea, tubo aequali breviler ciscrto, labium supenu* lana albo- coerulea villosus, in fen us paullo breviler MI patens. Stamina corollam aequantia Stylus vix exserlus, lobis subulatis — *S Boottana* Jacq HI Eel I 00 t 47. — *S. Bootti* Tratt Ob*, bot fasc. II. 50. t. 02. — *S hye-maht* Boose ex Jacq I c. — 5. *cyan*** Fiich. Cat hort Goreok. 21. — *S thymtflora* Willd Enum Suppl 2. — *S. amoma* Sims, Bot Mag. t 1204 — Bof. ftepos. t 440. - *S. vtolacea* D. Donn. Hort. Cant ed. 4. - 5. *UUfolta* And Tr. Soc Arts and Man XXV. 210. — *S. oi*r#a, eoeruUa* etc Hortul. — HabiUl in insula St Yincenlii.

273 s AFFIMS (ham et Schlecht Lmnaea V. 00. — Bib. I. e. — Caule fruticoio, ramis glabn», foil pctiolain ovalis acuminalis aerrato-crenatis, basi rolqndatis glabns \ tenuissime pubescenlib, floralib ovalis membranaceis deciduis; racemis elongatis subsimplicib multiflons, lerticillastris subappronmads 5-10-flons serundis, cal)Cib pcdicellatis angu«ile tubulosin tenuissime pubescenlib, labio supenore inlegro infenorisq denlib longe subulato-acuminalis, corollis caljre subinplo longiorib, lubo exscrto aequali tenui, labns subacqualib, gemlalib exsertis, connecimt posiice linearib denexis, longitudmaliter connatis, stylo Rlabro. 6 — Flores palhde violacei. — Habitat in Mexico prope Jalapam, in Cordillera de Gucbilapa.

274. B. PURPUBBA Car. icon, plant IL S8.1100. - Bib. I. c - Jaq. Hort Schoenbr III. 2. t 253. - Caule borbaeco ereeto fiabriaseolo; foil. poUoUUs otatia aean^ natis serraitis, basi rotuodatit T. eordaUs gUbrja ?. taa<ts*ha> etBO-pabtMnilb Horalib parvis ovalis acumlnatia decldoia} raecomls doaala raamoals; vortleHlastHs* muliifloris approximatis seeondia; caljclb. tabuloalt albo- T. parporeo-lanatis, labio supenore integro dentibq. labil Inferior!* aabalato-aiacroaaUa; eorollli caljce ^ubtnplo longiorib, tubo exserlo ineunro, labio superior* recto pubescenic, mrcnre aoquah, lobis rotundalis; connectivls poslJce linearib. deflexis, longitudinaliter subconnatis, stylo utrinque barbato. % — Habitus 5. potyffarhyae, sed differt caule glabnorc, calycibua aecundis dense lanalis, corollis duplo longioribus tubulosls, tubo m >enlnco. — HabiUt in Mexico.

Species htyus techontt incertae sedis v. dubia.*

873. 8. CUPIRAEOFIIA II B Kib No\ gener. el spec. pi. II. 288. - Bib I. c 300. f — Caule hrrbaceo bifonam piloso, Toll, ovalo-elliplicis oblusiusculu, basi acutis crenatis glabris, margine hirtis, verlicillasris biOoris valde renolis, calycib. ghbriH cilMfik ''4 — Caulis sc«quipedalis ramosus, rami tetragoni purpuVascenies glabn tolia opposita pciolaia, basi acua el integernma, utrinque glabra, marginu piliH albidis bre>ibus obiila, 6-9 lin longa. Peioli 4-0 hn longi glabn* margine mcmbraiaei Spicae termiuales 4-pollicares verticillatae Pedunculi pilis piirtibiiH apire glanilulifens ub&iti Pedicelli albo-hirti Bractee o\«tolanct»l HIP, longe acuminaiae glabrae, margioc ciliatae caducae, caljcem subl acquant^ (al)cin tubulosi suliiilo-striati bilabiali, labio supenore o\alo inlruro acuto nlnlo, inrrnure bilido, latmun aculm cilialis iorollae ' — ||*h|/ at in sylvis Penniac.

270. S. RUFGLA H. B. Kth. 1. c. 801. — Bib. 1. c. f — Canle saffruticoso erecto rufo-tomentoso; foil, oratis acominatis, basi angustalis argute serralis, sublus rufo-pubescentib.; verticillastris subaexfloris distanlib.; calycib. pilosiasculis. 2]. — Caulis ramosus tripedalis, rami tetragoni rufo-tomenlosi. Folia peliolala, basi apiceque integerrima, reticulato-venota, supra pilis parvis conspersa, 2-3-pollicaria. Petioli 4-5 lin. longi canalicalali rufo-tomenlosi. Spicae terminales aut axillares solitariae 3-4-pollicares verticillatae, verticillastris 6-10-floris. Bractae ovatae acuminato-subulatae pubescentes ciliaeae. Calyx bilabialis, labio superiore inlegro acuto, inferiore bifido. Corolla purpurascens, labio superiore pubescente. Genitalia inelosa. — Habitat in Andibus subfngidis (juindiensibn) prope los Gallegos in regno Noro-Granatensi.
277. S. TOLIMENSIS H. B. Kth. I. e. 202. - Bib. I. c. f - Caule fruticoso erecto rufo-pubescente; foil. ovato-lanceolatis, utrinq. acotis inaequaliter crenalo-serratis, sublus dense pubescentib.; verticillastris subsexfloris distanlib.; calycib. birtls.6 — Caulis tripedalis ei altior, rami tetragoni dense rufo-pubescentes. Folia opposite peliolala, reticulato-venosa, supra glabriuscula, pilis mioniissimis conspersa, 2-3-pollicaria. Petiolos labsemipollirans canaliculatus rufo-pubescentis. Spicae terminales et axillares 3-4-poll. ica res verticillatae. Bractae ovatae acutae serrulatae, subtus pubescentes. Calyx bilabialis tairlus, labio superiore ovalo inlegro aculo, inferiore bifido. Corollae labio superiore recto externe pubescente. Stamina inclusa. Praecedenti similis foliorum forma, laminae satis distincta. — Habitat in monte Quindia inter Ibagaae et Tolimac mtrni.
- m. S. DISCOLOB H. B. Kth. I. C 9011 MI - Bth. I. e. 301. t - Caule fruticoso erecto ctDo-tonMBI«M; rajria jontorib. glsUnoeit; foil, ovato-lanceolatis acotiasella, kati roUuadatl Intogttrhmt, topra glabrto, subtus mveo-tomenlosis; verticillastris saboctoioria itotantlb.; braceis caducis; canb. .ilbo-iomeotofis. & — Fructi grareoleos glilinosus, omnibus partibus albe amarus, s-3-pe allf. Caulis ramosus, rami tetragoni pulverulenlo-iomrntnsi incani, juoiores virides et glutinosi. Folia opposita peliolata subcoriacea bipolhraria. Petioli fubsenipollicarei albo-toroentoai. Spicae terminales Terlicillaiaio H-O-pollicarrs. Calyx campanulatus striatus albo-lomentosus bilabialis, labio superiore ovalo aculo, inferiore bidentalato, dentibus aculis. Corolla calyce duplo longior, nitido-uolacea, labio superiore recto obtuso, inferiore infenore trtpariio, lacinia inierroedia majore triloba. Stamina inclusa. Stylus paulo exsertus. Corolla. . . . I — S. Bonpiandiana Dielr. et Gaern. Lfiic. Kichtr. VII. 403. - Habitat in montibus obumbrans Andium Pruruarum in convalli amoena fluit Gaancabanbae.
270. S. ACCTIFOLIA Bt. et Par. Hor. Per. el Ctail. I. »4. t 38. fig. h^u^A^A^J - Foil, cordalia acotis oblose serralis; spicis verticillatis. 5 — Caulis erectus oblose letragooos ranosut. Rami oppositi erecti tometo tetragoni solrall. Folia peliolala aeaM, aliquando duplicato-serratis appoimatli, aopra mgow, olriaque tonienio»a teno»i«ima. al« Ytticillaiae. Verticillastris 6-lt-floris .ppro»imaa. Flores eolaU Mcvtjdi. Bractae oppositae ovalo-lanfrohtac arutae carinatae tomentoMe. Calyx tometotof, lotos wabrr bilabiatus aequali*. labio integro, inferiore bifido. Corolla purpurea, calyce duplo longior. Mamrollae longilodine. Stigma bifidum villosum exsertum. Vernacule Socconc* Bablut copioM in Cheocblo Perutiae pratia el bumidit.
270. S. PAUCIFLOBA O. B. Kib. I. c. 301 - Bib. I. c. - Caulis saffruticoso erecto ramis birtls; foil, ovalit oblatis cordaliter renatU, »ubtu« tenuimemntosis; verticillastris b»ioht distantib.; calycib. pedalis et altior ramoia, rami utragoni quadranguli porpuruli. Petioli oppositi rassiasevla reUcolato-vtoota mgulota, supra vindla poltiarta et longiora. Petioli aobpolleare« albo-iomrntnsi. bipollicam verticillaue. Bractae oblongae, calyce brevioribus caducae.

tubulosus bilabiatus striatus pubescent, labio superiore aculo, inferloris bigdi lacimae acuminatae. Corolla purpurea, lablo soperiore hirsulo. Stamina el pislillum exserla. — Habiiial in calidis Novae Hispaniae.

Seotlo IX. BOHHOSPHAGE BtlL Lablat gener. et speo. 302.

Folia floralia el braceae imbricariae spinosae. Calyx ovalug, labio superiore iridentalo, inferiore brevior bifido, denlibus omnibus splnosis. Corollae lubus intus piloso-annulatus, labium supenus rectum emarginato-biOdum, inferioris lobi laicrales parvi, medio maximo lacero-fimbriato. Connecllva medio affix a remola, posiicc subporrccia, loculum subconformem pollinifenim ferenlia. — Herba Californica. Flores in verlicillasiris densissimis mullifloris braceis Buffullis glomeraii. SSL S. CARDUACEA Dib. I. c. t — Caule herbaceo erecto subsimplici albo-lanalo; foil, pciiolalis oblongis pinnalifldis, sublus laxe lanalis, lobis ovalis sinualo-dentatis, denlib. spmoso-acuminalis, floralib. bralcisq. imbricalis spinosissimis; verticilla»iris remotis dense muliilioris; calyclb. InQalia lanalis, labio superiore elongate mdeniaio, inferiore bifido, deolib. omnib. spinosis; corollae lubo subinduso, labii inferioris lobo medio fimbrialo; eonneclivis poslice liberis, aolberae loculum aubcassum ferentibus. ⚔ — Species dislinclissima, babilu *Morinae Ponica* v. *Cardui*. Caulia 1-8-pedalis, all foliorum paglna Inferior el calyces lana longa laia alba veslilus. Folia Inferiora *C&rdtU tnni/tori*, floralU ei braceae omnino *Morinat Pertica*: Vertleillasri denslssiml* demum 8 >«IL diamelro. Calyces demum fere pollicem loogi. Denies labil soperioris païenUssimi, infenorih broiores crecli. Corollae tubus denies calychnos sobaequoans, annulo interno obliquo'piloso. Labia lemipollicaria sabaequalla, basi angos(aU_t superius bubplanum semibifidum, lobis oblongis oblusis, inferioris lobi laterales breves oblongif mfunuK clongatus dilaiatus, elegancr el profunde lacerus, omnibus basi annusiahs, apice dilalatis. Geniialia subexserla. Connecii^a cum filamento subcontinua, antice adscendrnria, antherao loculum ferlilem adnalum fcrentu, poslice filiformia, loculo minore subcasso, uli superior croceo. St)lus filiformis, apice aequaluer biQdus. Acbaenia lala iriquelra. — DabiUl in California.

BeotloX. PT0IO8P1A0I BtlL I e. S^o1

Folia floralia el braceae ImbrleiUe molleae. Calyi OTabtt, Ublo superior© irldenuio, inferior* bifldo, dooilbw omilboa anbolaUs. CorolUo tabu tatas piloso-annulauis_t lablom aoperiot roeua# Inffnriorio lobot moiiM loteftr ¥. omarginaius. Conneci.vt medio afflia, posllM remoU porroeta, U—torn •adconromem polliniferum ferentia. - Herba California, Flores la TtnMltaMrit nralUfloris donssime glomeraii.

882. S. COLt' MB4R1AE Bib. I. c. | — Herbacea erecu parnm ramosa: foil, profunde pinnatifidi* rugosis glabriuculls, lobis oblongo-lieoarib. oblasls eroio-dentais incisil\e, cxiimo vix latiore, floralib. braceaeformib.; verticillasris solitariis binisvc dense mullifloris hemispnaericis; braceis laic ovalis membranaceis acuminaiis imbncali»; calycis ovali pubescentis lablo superiore elongalo concavo breviler mdentalo, inferiore brevior bifldo; corollae lubo fnciuso, labii inferioris lobo medio crenulato; conneclivis poslice liberis subporrectis aniherae loculum cassum ferentibus. ^ — Habitus fere *Seabiotae Columbaria**. Caulli semipedalis v. \lx pedalis pubescens, sub verlicillasro nudus. Folia in pane ioferiore caulis fere *S. clandestinae*. Verlicillastru a folils caulinis longc remoU, 8-10 Im. diamelro, rapituliformes cocrulfscenlc!». Braceae numerosae latisslmae. Corolla caljcc parura longior, magniludine corollae 5. *IS'tlotiac*. — In California.

t *Species dubia*.

283. S. LKOMA Ulb. I. c. 30J. — Ilcrba pedalis ramosa pubescent: caule leiragonoranns brachnan>. Folia cordala crenala ru^osa puborenlia peliolata. Floret clfgauler rubri, per >erlicillaHiroj» 5-0-floro» pedunrulalo< dispomti ft brari ovalo-acumiiialii sehjulibusque Instructi. Taljx siriatus bilaln.nus, tatxo ⁿⁿsupere-nore Uuucalo tndculalo adscendente, infcnure bidcnUlu dcuubus ⁿⁿacutissimig

longioribus. Corolla riagens, lubo brevissimo, fauce sensira ampliata striata sub-
 tngona, nclu subrotunda, labio inferiore triGdo, lacinia inlcrmedia majore emar-
 ginata, superiore crecio carinalo emarginalo bre\iore. Stamina 2 fauci corollae
 ad latus labii infenoris inserta, superne ftircata, anthers 4 oblongis, qua rum
 singula in qualibel dnmooe Glameoli. Ovanum superum tctragonum, sljlo fli-
 formi corolla longiore, slgmate trifido, lacinia inferiore majore. Scmina 4 ob-
 longa. — *Leonia talvifolia* Llaw. el Lex. Nov. teg. descr. H. 6. — Uabital in Me-
 xico in praesidio de Sancta Rosa ad CbigDaguam.

Secti© H. ISTBB08PHA0B Bth. In Hook. Bot Misc. III. 347.

Folia floralia decidua. Calyx tubulosus, labio superiore truncato tridcnlalo.
 Corollae tubas inlus piloso-annulatus, labium supenus brc\e rectum, inferioris
 lobi laterales parvi lubpalentes. Connecliva medio afOxa, pollice remota porrecta,
 loculum fubcooformem polliniferum ferenlia. — Herbae Mediferranean Afncanae,
 Asialicae et Boreali-Americanae, floribus racemosis, verticilla>tris laxis paucifloris,
 calycibus aæepe coloratis.

284. S. NILOTICA Vabl, Ennm. pi. I. 258. - Bib. Labial, gen et spec. 303. t - Murr.

Comment. Cölling. 1778. p. 08. t. 2. — Jacq. Hon. Schoenbrunn. III. 48. t. 02. —
 Caule herbaceo erecto rillofo; foil, infenorib. petiolatis ovatis crcnalis erosis v.
 lyratis, basi subangustatis, supenorib. late cordiformib. lubsessilib., omnib. ulrinq.
 tiridib. rugosis villosis, floralib. ovalo-lanceolalis aculissimis caljce subbrcxionb-
 racemii abbreviatis ramosis; terticillasrif 0-10-floris dMinctis; caljceb. o*ato-
 campanulalif pobeicenlib., labio toperiore truncalo, deniib acutissimis diver-
 gentib., ioferiona dentib. laoeolalis aculissimis; corollis caljce dimidio longio-
 rib., iabo fubaeqaali, ioloa oudo, labio auperiore redo, infenori* patentis lobi*
 tubreOexia, ai«4io enurgioalo; eonnectiivig poatice liberis porrectis aniberae lo-
 eulpm easaaai fowajHlnn. ^ — CaolU 8-3-pedal it t acue ieiragonus, pilis iub-
 vltcoait magt miottste vHl«t«t. Folia In Tar. a. S-3-polllicaria, inferior! otalla,
 •opreaia lale orala, bail Iruaeala v. cordaia, omnla breviter crenata; in var. ,9.
 majora aublnieia, baai inelto-plnnalifida. Racemi juniorp* dcn»i, domum laxi
 paniculalo-ramofi. Folia floralia denlesque cal)nm coerulrsrrnlos nculissirai,
 denie medio labii.superioris snepe minimo. Corollae pllido rotTulonc. — *Uor-
 tnmum napifolium* Mill. Diet. no. 4* — *Ilortninum* *>iMirum Moench.Mccli.pl.—
S. applanata Willd Ertum. bort. Bcrol. Suppl. 3 — *S. intermedia* SrlmU. Ob» bot-
 0. — *X. naptfoha* Auct. plur. ct llorlul. (non J.inj .S (by>nntca Jacq. Icon.
 rar. I. i L 0. non Linn, herb an Linn. fil. Suppl sp — .V. .\ubia Murr. Comm-
 dull. 1770 00. I. 3. - Habitat in Afgyplu.

2U4. S. SYLVICOLA Burch. Cal. (Jeogr. no. MW. ~ Bth. I c 304. - Caule herbaceo
 adtcendente villoio; foil, bretilcr peliolalis lair o\aln aruti* dentaiii, bail cor-
 daiis lublobatis. utriq. villo<it, floralib. ovalit aruromaiK ralyce brevlorib; ,ra-
 Cfrni* timphcib.; verticUlattris aecandit laxit 0-flon« di«taniib.; caljcnb. wju-
 loso-campanulati* >illou», labio tuperiore truncalo iriilrntato, loferiore bildo,
 deoiib. lancrolatK, omnib. ietaceo-acaminaiiv corolla rahre duplo longiorit).,
 tubo tooui n^rio, Ubio tupenore redo emarKinaii, infonoro lonpiore paten e,
 lobo medio tnarginato; conneclivii potlire libfn% anihrrae lorulum alierunj ••-
 rrrtibut. % - fauki elongali i-pedalc« n ultra. *ub%iroplicrH iriragnni TIW»
 F«|ia fere *S. Klohcaf*, »cd omma safpiuH priinlaia el bam loin* uirmque 1-
 iniitrucla ttlotiora el tubtot •ubrane«rrniu. Raremut flornn* 3,,<*''P°llig*rl eJ
 fmcitifer olongaius. %crtirilli«trn ultra |ntllicm dulaniihu*. %n». P«dic
 calyces deote molluer tillon. Folia Onralia cal)cc, brarlrar pedicello bre*
 rorolla fere *S. aurt***, »cd diaidm minor. - Habitat ad < apui bona* »P«-
 fcb S TEMIFOIU Burch. I. c. W1. Bib I. c. ft.auk ln-rbacro "rC10, Past
 ranoio «i||o»n. roll longe pnioUiit o««to-rouiniljii« obiu»i* droUll i *JbOMlib.
 JIMre, ba»i •uiirurdali* tranmin t. tubha>laii% lubalit^r, utnm|. V1'loisf, cil||-H|ris
 Mdicello aubbrtiorib otalo-lancrnlatu aruti«. racomi* impli«'»b» *er l
 lobiecundit 2-0-florit remoiitj t4l)cib. pedicclUm tubuloi* coloratu* M'atiss

pubescentibus., labio superiore ovato subtruncato, dentibus lanceolatis acutissimis; corollis calyce subduplo longioribus., tubo exserto aequali, labio superiore erecto brevissimo, inferiore triplo longiore, lobis rotundatis ptenlib., medio emarginato; connectivis posice liberis antherae loculum cauum ferenlibas. 2f — Herba pusilla, basi foliosa et ramosa, cum racemo semipedalis v. vix pedalis. Peiulus lamina foliorum saepius longior. Lamina semipollicaris v. vix pollicarii, nunc fere *Saxifragae rotundifoliae*, nunc ul in *S. sylvicola* sublyrau. Racemus laxus. Verticillasiri semipollicem v. demum pollicem remoti. Pedicellus 2-3 lin. longus. Calyx nulans 4-5-hneoris lubulosus, sed apice parum amplialus, dentibus selaceo-acurainaiis. Corolla coerulea. Genitalia exserta. — Ex descriptione Thunbergiana affinis est *S. obtusulae*. Sed in hac caulis fere glaber et folia supra glabra, sublus in vents pilosa. Plant* nostra tola pilis mollibus subviscosis villosa. — Habitat ad Caput bonae spei.

887. *S. AURITA* Thunb. Prodr. fl. Cap. 06. — Bib. I. c. 305. - Caule herbaceo erecto villosus; Toll, peliolalis lyrato-pinnatifidis v. pinnatisectis, segmentis eroso-dentatis, sublus venosis cauo-pubescentibus., floralibus. minulis ovalis aculis; racemis simplicibus.; verticillastris 6-10-floribus dittantibus. secundis; calycibus sessilibus. lubulosis elongatis coloratis tirlalU pubescentibus., labio superiore truncato, dentibus. seiaceis erectis, inferioris dentibus. lanceolatis •euUsslmis; corollis calyce ploa duplo longioribus., tubo tenus longe exserto aequali, labio mperlore erteto brevissimo, inferiore triplo longiore, lobis rotundatis is deOexo-paieollibus., medio emarginato; connectivis posice liberis antherae loculum cassum ferenlibus. S† — Folia fere *S. scabrae*, sed majora. Caulis subsimplex erectus v. aacendem. Calyces longe cylindrici semipollicares, apice purpureo-coerulei. Corollae magnitudinis et forma *S. lyratae*, sed leniores. — Habitat ad Caput bonae spei.

288. *S. SCABITA* Thunb. I. c. 07. — Bib. I. c. — Caule herbaceo erecto paniculato-ramoso; foil. lyrato-pinnatifidis rugosis scabris, margine eroso-crispis, sublus venosis canoceniibus., floralibus. minulis ovalo-lanceolatis; racemis elongatis »ubramosis; verticilla»in» 5-floris distantibus.; calycibus campanulatis pubescentibus., labio superiore truncato, dentibus. seiaceis erectis, inferioris dentibus. lanceolatis acutis; corollis calyce duplo longioribus., tubo aequali inlus anonlalo. Itbio supenoro erecto, Inferlorla lobla reflexo-pateolib^ Medio emargato; MostaUvit pottice liberis antherae loculum cauum ferealibua. % — Cauli rifidn enaber pibeioeai bipedalis. Folia profaadius IOOJM q«am In *S. nNMtMlo*, lobe tiUejo BMUmo, omnibus rigidis rugoso-crispl. Racesil fere pe4al«s, ftrUellUUi numerosi 6-non v. ultra. Corollae *S. runcinatae* §, ted paulo majores. An revert tb ilia distincta? — Habitat ad Caput bonae spei.

280. *S. MARGINATA* R. Mey. Comment pi. Afric. austr. I. 830. — Caule herbaceo aihcendciite tfl.ibro ramoso; foil, peliolalis ovalibus. oblusis slnoato-dentibus sobincisive, v. inferioribus. lyralis, margine ad nervos peiolisq. ctialibus, faciebus glabris; racemis simplicibus. ramosisq.; verticillasinis C-floris secundis; calycibus. pedicellatU lubulobo-campanulatis subcoloratis subscabris, labio Kuponon late truncato, denibus. subulatis, inferioris dentibus. late lanceolatis subulato-acuminatis; corollis leniter pubescentibus., calyce subduplo longioribus. — Uabil in Promonlorio bonae spei.

200. *S. RUNCINATA* Linn. Mant. 80. - Bth. I. c - Jcq. Hurt Schoeabr. I. 5. i. g. — Caule herbaceo erecto paniculato-ramoso; foil. runcinato-pinnatifidis rugosis supra hitpidtili*, lobis inciso-crenatis, terminali majore, floralibus. minutis ovalo-lanceolatis acutis; racemis nubramosis paucifloris; verticillasinis 2-6-floris remotis; calycibus. ovalibus pubescentibus., labio superiore truncato, denibus. minutis scu-CCIH errclit), inferioris denibus. lanceolatis acutis; corollis rale re duplo longioribus., tubo subaequali inlus annulato, inlio superior* exserto, mforion* lobis reflexo-patenlib., medio emarginato, connectivis pntirr librm fcul»|Mtrrt'rli» antherae loculum cassum ferenlibus. ^ — Herba liunnlii, narpus nmoM^mja cano-pubescentis. Folia pollicana, pnmordiaha l^rala, lobo terminali obotato ubtusiusculo,

siouato-dental*, postenora praeiertim supenora, ut in vanetatibus nonnullis 5. *clauetimat* pinnatifida, omnia tapra pilis adpretait hitpidula, sublof glabnora, nertu pubescenubos, m rogota aculiutrua, floraha vix lineam looga. Racemi 3-5-pollicaret, verticillastri m 3-6 tubaecundi. Calyces b rev Her pedicellali, haeat 2-3 longi ovato-campanolati, nerm 5 primaru* validionbut, tu- pra plaa v. inter Denrot inbconcavi, denies labii fupenoris reroof erecti v. di- vergenlei nee conntventes. Corolla coerulea. Annulus inira lubum pilotof. Gemtalia breviter exseria. — 5. *iroia* Dwf. CaL hort Par. 08. — Poir. Diet SnppL V. 10. f — Habitat ad Capul bonae tpei.

501 5. RAPHANIFOLIA B. Hey. Consent, pl. Afnc. aoslr. I 237. - Caule herba- ceo erecto villoto, foLL inferiorib. peliolalii lyralo-pinnatiBdis, lobo olnmo ovato- oblongo, taepiui auHenlato-batlato, caetent ovalit, foil tupenorib leisilib. bati battalia, oanib. obtntis eroio-dentatit nigosii pubetcentlib., racemif ra- otit; verllcllatrit • nb-10-flont; calycib. brevititime pedicellaiit ovatis villotit, labio foperiori troocao b rener tridentalo, ioferiori biflido, deoiib ommb acniis; corollit calyce duplo longioribnt. 2} - Habitat in Promontorio bonae tpei.

202. S. STE>OPH\LLA Burch. Cat Geogr. no. 1881 - Bib. l.c.305.- Herbacea erecia glabnuscua Toll petiolain oblongo-lanceolatis v lineanb runcioalo- subpinoalifidis rugosis, floralib minutis OYato-lanceolatit aculif, racemis sub- ramox*. \eriicilla>lrn tub-O-florif renotit; calyeib. ovatif glabrn, labio iupe- riore truncato bre%isnme tridentato, inferiorit dentib. lanceolatis acuiusculif, onnib. nuicif, corollit calyce daplo longiorib., tnbo mbaequali vix exierto, io- ittt annnlato, labiit brevib. tobaeqoalib^ connectivit pottice liberit tobporrecm antherat localnm eat torn ftrentibnt. % — Aflinia 5. *runcuuUae*, ted glabritie, canlo tiatiorn mlnoa ranoto, follii elongaUt angytutia, racenlt gracllibut et denliboa ealyelnlt brtttoribvt dlffert — Habitat ad Caput bonae tpei.

203. ft. aCPBNft Bnrch. I. * no. 9630. - Blh. I e, - Berbaecia giaberrima caule baii repenle folioto; rania floriferin adtceodtoUb. tobnodit, foil, tubradicalib. pelio- latit elongatit rvncinato-pinnalifidit, vix ragotit, Doralib ovalo-laoceolalu acan- talyce bretionb., racemo tubtimplicl; verticillatrit subsecundis tubteiflorit renolit, cal)Cib ovalit, labio lupenore truncato Indeulalo, infenont dentib. Ijnceolalis, omnib «riaceo-acuminalit. ^ — Folia fere S *stenophyUae*, ted cha- ractenbut dali* abunde dolinguitur. Corollae aperiae non %itaet ted ex alabattro videotur corollit 5. *stenophylat* paullo majoret. — Habnai ad Caput bonae tpei.

W. S. L\BATA Linn. Spec plant 33 - Bib I. c - Caule btrbaeco erecto tob- timphei piloto, foil, radicalb lyrailt eroio-deniattit, ulrinq bi>pidulit, caolioU pancit oblongo-lanceolatit, bati longe angutuuit, 8oralib. oblongo-llnnnrlb. ca- lyce tubbrctiorib. racenit nbntimplicib (veriicillatUit 6-6orlt laxlf^{TM**mm'}. calycib lobuloto-campaoulait nntanlib pilotit, labii toperiont deoiib Drevio dituntib, infenont denub. lancoolaUt acutit. corollit calyce tubtrplo long.onb., Uibo longe ewerio, tupeme ampliato, labio tuperiore brevi recto, infenore irj- plo l««gitm, lobit rolondalit paienlib . medio lautumero arginalo, ""·<*" "" potlice liberit porrcctlt antberat loclnn catiooro ferenlibut ^ - Radix CTMJ* perennit, Canlit 6-0 poll * in callit tetqrtpedero v ultra allut Folia «·t«·.· na paiala S.a.p«lllicaria tinualo-obotau f Mepmt lyrala, peiolo tubulato, ca«« itna Mtpina 8 t. 1 Racemut linplex * parce ranotut Calycet pedicellall, ^{lln} ···It paWnUbot cihati eoloraii Corolla porpneo-tiolacea, lin ·-|0 ^* ^{lmm} >«O6«, Uibnt ad fauces valde ampliatiut, labinn tupenut bremtimum » ^{lln} naionit MC fomicaium <%yl lobui inferior longittimnt, broiler ^{eliertJ? v!l} (N1-1 hum miri-nUns B*f*im* /b/.o Dill llort Eltb. 210 L 175 fig «· ~ZZ~i - Vtrfmatm I inn. bpec. plani KB. - Horntmmm tyrmtum Mill. ^{D*EL} f C.P. Omium l^rmlm Sehrank in S,ll pl toe, Ralitb II 57. - Habitat in ^{f 1*·r} I J. ^·IrtoMli, prope Pbiladelphian, m Virginia, in Carolina et Georgia ireq^{uentu} time, «i |« Rof 0 ^{Aurliano}

215. S. SUBSESSILIS E. Mey. Comment, pi. Afric. austr. 1.237. — Herbaeae: caulib. basi repentib., floriferis ereclii simplicib. birtif, foil, subsessilib. oblonglg obovatisve obiusis eroso-dentatis, basi angulatis, vli lobalis rugosls, sparse blspldis, floralib. late ovalis acuminalis, calyce breviorib.; racemo simplici; Terticillatris 6-floris; calycib. campanulalis declinalis pilosls, Ublo superior! subtruncalo tridentato, Inferior! bifido, denlib. omnib. subulalo-acollssimis: corollis glabriuscolis calyce duplo longiorib., tubo amplo. 2l. — ID Promontorio bonae spei.
296. S. OBOVATA Elliott, Bot. S. Carol, el Georg. I. 33. — Bib. I. c. 301. — Ceole herbaceo credo pilosiusculo; foil, late obovatis Inlegris sinualis glabriuscolls, basi longe angustalis, floralib. ovalis calyce subbreviorib.; racemis subsimplicib.; verticillastris 6-floris deusis remotis; calycib. tubuloso-caropanulalis nulantib. pilosis, labio superiore truncalo, denlib. minimi* dislanlib., inferioris denlib. lanceolaiis aculis; corollis calyce subtriplo longiorib., tubo longe eiserlo, superne ampliato, labio superiore brevi recto, Inferiore triplo longiore patente; connectivis postice liberis porrectis anlberae toculum castum ferenlibus. — Affinis 5. *lyratae* el vix foliis omnibus late obovatis iotegrli crassioribus glabrioribus, calycibns brevi at pedicellalis et denUbus plerumque brevioribus et minus aculis differt — Habitat In America septenlionall, la Georgia id flumeo Oakmulgee, ad Novam Aarelianom.
207. 8. ACAULIB Vahl, Enumer. plant. I. 257. — Btk L e. — Caole herbaceo orocto sobsimplici pilose; foil, obovatis iBlegrts slnuatlt, otrinq. blspldolls* bail longe angusialis, floralib. ovatis calyce sabbrevlorlb.; racemis subsimplicib.; verticillasiris sexfloris remotis; calycfb. tubuloso-campanalats nntantib. pilosis, labio superiore truncalo, denlib. minimis dislanlib., inferioris denlib. lanceolaiis acutis; corollis calyce plus duplo longiorib., tubo lenui longe eiserto, superne ampliato, labio superiore brevi redo, inferiore longiore patente; connectivis posiice liberis porrectis anthvrae loculum cassum ferentibus. ^ — A S. *obovala* differt corollis minoribus lenuioribus et foliis angustioibas. — 5. oeymoidet Roxb. mss. io Wall. Plant. Asiai. rar. I. OS. - Habitat in India oriental!?
906. S. JAPONICA Thunb. Fl. Up. 22. t. A. 2, Bib. I. c. f - Caole herbaceo erecio ramoso glabro; folL potlolaUa pinnaUsedk, segmestls ovaUs MmiaaUa, basi angusutls inciso-dentals v. plMaUMIa glabrU, florallb. laaotolaila eatyo* breviorlb.; raemia snbsimplleib^ vertlellUstria fbtaiBqrU 4lslaeUt; ealyefb. tubuloso-campanulatis glabria atrlatia, labio superioro taUgro ovato obtoto, Info* rioris dentib. aculis; corollis calyce doplo longiorib., tube vli eiserto aoqoall, intus piloso annulato, labio soperiore recto, loforiore patMU, lobla rolandatls, medio emarginato; genilalib. exsertis; connect I vis postice liberis porreclis antheriferis. O - Herbs glabra elegantisslma. Caulis obtuse tetragonus tnleauis. Folia 3-4-pollicaria v. ultra, superiors slmpliciler, inferiora bipinnallsecla. Petloll ciliati. Segmenta saepius petiolulata, 2-3-Juga v. pane eitlma sessili terminali in peiolulum angusiata, omnia profunde deniata, ulrinque glabra v. subtot ad nervos tenuiter pubescentia, floralia parva decidua. Racenl 4-5-pollicarei multiflori, basi saepe subramosi. Yerticillaslri snbsecondi, Inferlorea aemplollicem diitantes. Flores magnitudine floris S. *terticillatae*, ied calyi brevior. Corolla coerulea(?)f extus subglabra. Stylas glaber, apice breviter et subaequaliter bifldas. — Habitat in Japonia.
290. S. CHINENSIS Bth. I. c. 725. - Caule herbaceo erecto pobesrenle; foil, petiolatis inlegris v. infilmis trisecils late ovatis oblusis crenatis, basi Iruncalis cordatisve, supra pilosis, sublus glabris, floralib. parvis bracleaeformib.; racemis nubsimplicib.: calycib. tubuloso-campanula^ Mriatis glabrin hispidutisve; corulli* calyce subduplo longiorib., tubo \ix exsrto, labio fuperiori incurvo, Inferiore palentc. O* — Herbs subfascirulalim ramo^a. Folia kubpolliraria, pili paginae superioris longi hparsi, inferionicu »eKm<*nta laieralia intermrdio parum minor* sessilia v. peiolulaila. Racemi semipedale*. VerlicillaMn di>tantes »ub\$rf(l.r)i!

Florès fere *S. Japonicae*. Calyct colorali labium supenus inlegrum rotundatum. Corolla eitus pubesceos. — Habitat in Chioa prope Kia-nang.

t *Species hujus sectionis non satis notae.*

300. *S. TRMNGULARIS* Thunb. Prodr. II. Cap. 06. - Dlb. I. c. 308. - Viltoio-hii-pida. foil. tnaogulanb. dentatis; ramis patulit. 2l. — Caulis herbaceus erectat, omnibus partibus pilis albis birsotus, bipedalis. Rami et ramuli oppooti divarican fleiuoso-erecn. Folia opposita peiolata eordala triangulari-spathulata palenlia, VII pollicaria. Peioli loogilodine folli. Florum Tercillastri remotl pedunculati. Pedunculi reOeii. Calyces angnlali ariMatt, corolla paullo brenores. Diunguitur facile a *S. auria* petiolit absque auriculis et caule ramoso. — Habitat ad Caput bonae tpei.
- XI. *S. OBTESATA* Thonb. I. e, 97. - Btb. I. c. - Villoia* foil, ovatis incisls crenatis; ramia Oeioosis. % — Caulii herbaceui, parum villosus debili erectmscolus simplei v. ramosas, pedalis. Rami opposiU, caoli iimilef fleiuoso-erectl. Folia oppoiu peiolala obluta mcisa el raro svbbastala, supra glabra, sublus in venis pilosa, margine ciliala, vu pollicaria. Petioli ciliati, lonftiludine folil. Florea tertiailaio-oppositi bini peduoculati. Pedoocui erecli, delioraii reBeil. Calyces angustati »cabn ariMali, corolla doplo breviores. — Habitat ad Caput bonae «pei.
902. *S. CLAYTON!* Elliott, Bot 8. Carol, el Ceorg. I. 33. — Mb. I. c - Foil, rordato-ovalis smuatis deoiatis rugotis; calfcis deotib. labii supenons conmventibus. % — Radii crassa, fere tuberosa pertnoii. Caulis berkaceas erectus, fere pedalis. Folia ovata el eordala laoeolaia pisaatlflida, aegaesi&s deDUiks, ragona, ad veas el margme pobetceatia. V«rU«illatiri t-flori. Folia floralia cordatovau aconIMU 4caH«la pvbttfIMtU. Ctlji Mb«ampaBQlaid bilabiatu, in tenif el margiae blapMag. Lablsm e^porto tri^MUFm, dentibos ronmveniibus, inferias loogiM blMvai, sagsifMs oovsaiaaUs nucronatit. Conneciivum utrinque ••iborlfanlsjk Astborae for* olgra*. — *AS. lyrat** rerte difhnciiMinia deoiitaa calycisis it io *PUHospksrcts* coon if ealibos, sed ab bar «eeione eooaeellfls utrtoque aoiberiferis Ios>g0 dirersa. — *Species valdf* dubia, an rite descripiat* — In Carolina meridionsli, in pa«cuis aridis arenosis circa Beaufort abonde

StcUo HL BOTIOSFIACE^th. it BMk. Bet Mlie. II! 314.

Folia floralia et brarieae minulae. Calyt ovatus, labio «superiore intfgro v bre>i«ime tridrniao, denlibus connrntibus, infrnore bifido. Corolla minima, tubo inclu^o, Idbio »upnre recto, in fen ore sobpaiente. Connecliva mrdio afRia, postier rmoia porrecta, loculun subconformem fereniia.

TO ft. PLKBFJA R Br. Prodr. 0 Not Moll. SOI - Bib. I abiat gen et tpec 300. t « m. - Cattle herbaceo erecio ranoto pubeirente. foil peiolatit oblongif rugnif. «ertieillatir1s lails aubsetBoris raeno»i«; raremi« fa*ilgiato-paiilw«^{litJ} caljciib. campannlalis, Ubio »«peri ore tniegerrimo drotibq labii inferior!* obtu»». corollia ealyee «ii longmrib. labio superiore recto fornicatn; connerliy" postiee adtcendentib liberis, anlberae loelum ra««um ferrntibus. 4 * C*ul!* bl-lrtpt4a!lt brarbialo-ramoaiit. oblase leiragonu*. pili* hrni»»irol«^{reOe*ii} rano-p«beaet«s. Folia 9-3-pol'''r"ia arala rrrnata. ba«i anguMata rogo«ar^{it} nmirr pube«re«iia, Boralia lanceolala acala, tertirill.i>iro brctiora Racfml!^{ti} ramo%i>imi Paaicula den«e faMigiaU Flores minuii Cahi pedicellains dfr^{ji} natut ovalo-raapaMlaiat pabescrns 13-nertm Corolla brr^iirr ri«erta, l«^{bio} superior brtvi recto tobfornicalo emargnaio, Inferior? »ubpatenir, lobo •^o longiare ofMrgftaiao SUsBisa sopnora nulla. Inferiora rorolla brr%iora, con^{nec-} tvis liberl* aoiice localvm fertile* ovaio-oblongum mrd.o artium Irrtmi^{ibu} po»ure sub lomlo ca%»o incrattaiu. ad inwrtionrm flameniorum^{rdrnlull^} lu« corolla brrvior, brrviMlnif bildu* Arbirma o%alo-rotuod«la^{la*1^jcrfl} badla. - s *brarkimis* Roib Hon. Bench 4 rt Fl Ind I I* - 5^{t/-}7⁷raiiii-•«>b. Hon. Bens* V - *Octmm fa\$g*mimm* Rolb. N»» |l »P*r. *77⁷⁷ *mizera fustigata* Spr. »,i ,rgrt II 0-7 - .V *manifera* Buge. B««» er. plant.

Cbin. 30. — Habitat In Asia tropica at Australasia, io hnmldis Indiae orientalis, io Nepalia, Oude, Hindustania et Silhet, In Deyra Dhoon et ad ripai flumioia Janna >u!garis, In provincia Tokeen Juxta Nyan-ke-nyen Chinae et in Nova Hollandia tropica.

304. 8. PUMILA Bth. I. c. 726. - Dene, in Jacquem. Voyage IV. 18B. t t. 133. — Caule humili erecto caespiloso, pili longis rigidis barbato; foil, ad basin caulii approximate oblongis T. linearib., basi angustatis rugosissimis, utrinq. viridib, floralib. minutis; racemis subramosis; verticillatis remotis &-6-00ris, supremis terilib.; calycis otati pilosi labio superiore brevissime tridentato, dentibus conniventibus, inferiore biOdo, dentibus late laeocelatis acutissimis; corollis vix calycem excedentibus; connectivis posice ascendentibus. liberis loculum cassum ferentibus. % — Valde affinis S. *Aegyptiacae*, differ! caulibus erectis vix ramosis. Caules vix 3-4-pollicares. — Habitat in Cacheria.
305. S. AEGYPTIACA Linn. Spec. plant. 33. - Bth. I. c. 300. t et 798. - Jcq. Hort. Vindobon. II. 40. I. 108. — Gaule proeumbente humilis ramosissimo cano-pubescente; foil, canaliculis parvis reuotis sessilib. lanceolatis-linearibus acutis dentatis v. infimis oblongis, basi in pedicellum angustatis, lobis multo; racemis elongatis anbracteis; verticillatis reuotis tubulosis; calycibus ovali pubescentibus labio superioribus brevissime tridentatis, dentibus conniventibus, inferioribus bimembris. Unceolatis subulatis-acuminatis; corollis vix calycem exsertis lobis peltatis ascendentibus. liberis loculum cassum ferentibus. % — Planis setosis v. vix o-pollicaris, basi sun lignosa. Rami et folia pubescentia tenuiter canescentes. Folia vix semipollicaria, superiora minora. Verticilli asini pauci, ultra pedicellum distantes. Flores vix ultra lineam longi. Calyces fructiferi parum aucti villosi, labio superiore ut in *Heliosphacei* orbiculato, supra concavo, dentibus minus conniventibus. Corolla et stamina S. *plebejae*. Stylus breviter exsertus glaber, lobis subulatis. — *Mitella perennis* Forst. Flor. Aegypt. Arab. 108. - *Aymia kirlut* Viv. Fl. Lib. spec. 30. u 14. Off. 1. - *Thymus Syrticus* Spr. Syst. veget. II. 607. - Habitat in Africae ora septentrionali et occidentali, in Aegypt, Lybia, insulae Fortunatis, Caesariensibus et Capis Viridia.

leetteZUL OTiaeiPIAOI BU. tm Ink. l et ato. IBLtM.

Calyx ovato-tubulosus, labio aequaliore integro margine, Werief* MM*. Corollae tubus brevis amplius, lobis annatis, lobis feffvia, asijetna, ataalai, inltons lobi patentes. Connectiva postice remota deiesat ttfsttar «esna» FIUttao erecto, cum connectivo subcontinua. — An genus proprium

306. S. SAXICOLA Rth. in Wall. Plant. Aasiat rar. I. «. el LabitL gen. el apee. 810. t - Caule caespitoso, basi ramoso; ramis floriferis erectis anbracteis glabris foil radicalibus infimisq. rotundatis cordatis crenatis glabris, eaulibus paucissimis ovalilanceolatis incise-dentatis, floralibus minutis ovatis; racemifloris subramosis verticillatis lobis laxis distinctis v. supremis spicatis; calycibus inbaloaeo-easpanulatis nutantibus glabris, labio superiore ovato integro recurvo-pateole, inferioris dentibus lanceolatis acutissimis; corollis calycem vix superantibus, tubo incluso ampliato, in lobis piloso anulato, lobis abbreviatis, superiore erecto, inferioris lobis reflexo-patentibus; antheris fertilib. omnino adnatis; connectivis postice abbreviatis subulatis delcis liberis. % — Caules e basi crassa radicante plures semi- ad sesquipedales simplices v. sub racemo ramorum pari unico, basi glabri, axis racemi molliter villosus. Folia radicalia, petiolo 3-3-pollicari orbicularia v. rotundato-ovata, 1-1/2-pollicana, eubus palhada. Bacemus ante antheras ipifatu, demum elongatus. Verticilli infimi longe remoti, supremi approximati, omnes iuncti cuncti laxi irriteriales. Cahi flonger m 2 lin longus, fructifer 3-4 pollic., nervis 5 alidus, labio superioris subplano. Corolla plana coerulea. Stylus breviter exsertus. - Habitat in India orientali, in Nepalia.

Bootlo XIV. nmSPIACB Btb. In Hook. Bot Mia*, m. 874.

Calyi tubulosus, labio su peri ore Iruocalo tridentalo, infenore biGdo. Corollae tubus inius piloso-annulalus, labium superias eredo-patens fornicatum, mferiorif lobi patentee Connecliva poslice remota, brevissime producta defleia acaia. Filamenta recta, cum connectiro sobcondnua. — Herbae regions Medierraneo-Ponticae, habita Htterotpkaciufn, An geoa proprium?

307. S. VERTICILLATA Linn. Spec, plant 37. - Bib. Labial, gener. el spec. 311. t

— Caule herbaceo ertclo piloso-hispido; foil, basi cordalis lyratis, lobo supremo manmo ovato-rotundalo integra •. sinnalo-crenatis utrinq. bispidis r. lanalia; racemis ramosis; ?ertictlaslr 90-40-florii remotiss calycib. lubulosis tilloil«, labio soperiore irancao trideotalo, inferiore bifido, deniib. omnib. selaceo-acominalia; corollU caljce aobduplo loogiorib., tubo incluto, labio supcnore recto forolcalo; oonneclifis postlce brevissime produciit drfleis atlenuatis; filamentia rectis eonoecilvo subeonlinois. ^ — Caulia S-3-pedalit letragonus, pilis bretiboi alblt bitpidui. Folia ampla, irregnlartier crenaia v. mnuala, rrenaloris ranui acuiis, aupra el aobloa ad nenros bitptdula, in var. r Junior* tobiuf denae laoaU, floraha defleia bracteaefonnia aetailia late oraia acaminaia ciliaia nembranaaea, calyce breviora. Raceml taepe pedalea ?. ultra, bail ramos ulrinque 1-2 emitlenies. Vemcillaslrf globoai, pleromqve 90-30-flori. Pedicelli cal)ce tobbrevioref. Cal>i tiriaiuuf, ba«i pilit palenlibna dense bispidoa, apice glabnu<culas, aaepe coloratof. Denies labif superiorls ovati acQtiMifni paienlej, infenorii lanceolali erecli. Corolla ealyce dimidio longior, t«bo til eiserio, eilus pLbescens, labio superior* s*epe deflno, inferioria lo6i abbretiaU, medio roiandaio. Siamioom soperioniai nritaMatt a)«lto, lalartora eorollam aubaeqoantia, oculis feriilbas saedio •Ails, MtMcIJvft Umartk. — Bvmimmm 9*rtiHU*4um Mill. Did. no. 3.

p. w»m»: Wm atriAajM SMUMOT ItMlta. - S. moWs Dooo, Hort. Cant edit IflOi (Boil U9q.)

T. pmUidm: foliis rabhUtgtMTtailt ccsloqve pallldo villosia. - Habitat in Eoropa aosirall et in Asiae raftone Modlterranoo-Pontica.

308. S. NA PI FOLIA iacq. Hon. Vindob. 11.71.1. IU. - Bin. I. c. - Caul* herbaceo

erecto piloso-btftpido; foil, loferlorib. lyratis, lobo ultimo maximo folnsq. sape-riorib. ovato-oblongis sinoalo-crenatis, basi roiundaiin conlali^c, ulrinque villosulu, racemis vu ramo«is; terlicilla«In< 0-12-flon< rrmoiic; calycib tubulosif tillo«i«t labio superior* tmnealo mdenialo, infrriorr bifido, dentib. omnib. seia-reo-aromioalis; corotlis ealyce dimidio longionb . lubo inrluso, labio superiore redo fomiralo; connectivis poslice brevissime produdis defletis atlenuaU; fil*bn •eons rrcctis com connectivo subconlmou. ^ ~ \ u ac ne m • 5.00 rrtte illate differ! verticillaalHa plemmque 10- nee 90-floris el flonbot fere dupio majoribus. Folia nl ln 5. r*rtie(UmU none iolegra, none lyrato - pinnaiiflda, lob« extimo maiimo, laleralib«J»in peliolo anricalaefonribos, sed plenimque ovaio-obio ng a polios qoam OMIO - roloadaU el obloslora. - S. rerhnlmlm tar. dTnr. m eab, foe. Llan. Par. |. Mf - Hobittl la Oriente in rruiceia limyrnae el in ania w-

381. t. BUMBLLII Bib. I. c 31*. - Caole herbaceo * eredo pobesceole; foil. ¥£ liolaila •bloagtf acolit sianalo-deouia eras»it mgotis, airing. *lbo«Uoill*! oil, rahb. otatit acusaloiU calyce brttionb.; terucillatirls laiemuliiflons rem: ^ calycib. lobalotis, labio auperioro traoeato indrnuiio. loferioro bifido. centi omnib. acaalMUs; eorollis calyeo dimidio longionb., lobo incloso, labie supetororoclo; eonnectivit poslico breviasime produciit »ubulani; filanenu^s rectis eoaaoetivo aabcoatmais. * - Flow omnino S. rerbnUi**, »c* mioores. Folia fcro 5. poan/#rM. ftMcitt diilioctissima. - Habitat in fcyria prope Alcpp°

t Spteits itctionit dubia.

MO. S. AMTIBBHHHFIUOHU Debnbrdt Caial. plantar, Inoti. ^ malcloten 97. † — Cabo ltrragono a«bb#rbaceo ramoao; foil pettAlaiu dp|l0ldf0«oVt, !!Biis irifloris ••lpp«-cathale inranit; racemi irrninali< %erticillU d»«W» denIU appoillu; bracieU lalo otaus ciliatis acummais decldois; caljcis tri

cylindrici glanduloso-pilosi dentib. mucronulalis; corolla (roiea) venricosa, bail el apice angustata, labio inferior© irilobo, laieralib. patentf b., medio emarginato, fobiuf barbalo, galea villosoglandulosa itecaU stamina occulunie; allgmate plumoio. 2} - Crescit.?

ft *Species omnino ignotae.*

- 8. BENTHAMIANA Gardn. Sert. plant, t 10.
- 8. BVZANTINA Juss. ex Sleud. Nomencl. bot. 725.
- 6. HALLERI Fisch. ex Steud. I. c. 726.
- S. LINARIOIDES Paxton, Magaz. of bot VII. 77. (c. ic. aen.)
- 8. MONTANA Gardn. I. c. t. 20. adnot.
- 8. RIVULARIS Gardn. I. c. t. 90.
- S. ROSTRATA Schmidt, N. Abbandl. Bthm. Gel. der Win. I. 11.

t t t *Speciet e genere excludendae.*

- S. BENGHALENSIS Ro&b. - MERIANDRA BENGHALENSIS.
- S. DIANTHERA Roth. - MERIANDRA BENGHALENSIS.

3508. AVDIBERTIA Blh.

(Bib. In Bot. Reg. XVII. t 1400. — Melan. G<ser. plant vascular. L 2Bt II. 102. - Bib. Labial gener. et spec 318.)

1. AU. G&UNDIFLORA Blh. Labial, ftn. at.apt*. 312. t - CaitetUlo villosio; foil, oblongo-ellipiicla sinoato-ereaatii, bail eordaila rofosls; vertleJIIaelrls deasls multifloris; bracteia late ovatls calyclbq. amplla menbraiiaceli eoloraila villosls; siaminib. longe exsertis. %> — Canlea 8-3-pedalat ereeil erassl fubsianplicM, pilli simplicibus glandulouls villosi. Folia Inferiora petiolata 3-4-pollicearia, topa viridia sabvillosa, snbtua laxe lomeolofo-villoaa pallida v. caneicentia, t auferiora sessilia minora angusiiora, floralia late ovata amplexicaulia, calyces vix auferantia, pars suprema sarpe stcnlis. Verticillattri demum 2 pollicet diametro. Braetoae cal)cem aequantes numeroiae imbricatae acuae t. mucronulatae purpuraceniei villotae, margine cilialae. Calycii labium tuperiui amplum obtuiii>imum, Inferius dimidio brexiui, profunde fiitam, lobli lanceolalia a call*. Corolla fere setqulpollicarif, tubo longe exierto sablncurvo, aplice paran dilatato, labia pateoUa brevla, superiu emarginaton bl4ajM, Infrterioria lobl lateralea oblongl, •ledioa late roiaodaioa. Suminoaa avperioraM wilMMti br<tle eUvlforaiaa, ioferiora fertilla looge eiaena, ad aiedloaa atllwriiU. C<aaa«Uva tab afttaaUiftoae non producta, aplice antheram unllloelafjtft llaaraai fftAUa. tiylsa aumioa aequana, lobia aubaequallbai. Achaenta c—prtaaQ -trig—tra, — BablUt k) California septentrional.
2. AU. UEMILIS Bib. I. c. 313. t - Suffrulkom: foil, id basla camlla approiimalit petiolalis oblongo-lanceolatis obtaiit crenulalli, bul longe angaauii ragooii caneicenlib., floralib. bracteiq. lanceolatit acalii viUoili; geniulib. eianrlla. ^,— Habitu varietates roinores *Salviae officinais* refert Caulet icnipedalea, baal folioii et incani, superne villoii. Folia lo6ma l-l'/i-pollicarla, petlolo fere polllicari, nore *Salvia* officituUi** rugota, In medio caule rtaoU panra, in parte §uperiore tub verticillaatria braceaeformla. Veiieillaalrl 3-« remoUv In racemum flmpliceD diapotlti, aemipollicem dlanetro, dentl nnlUOorl. Calyces post anthesin inflali, profunde bilabiati, labio superiore breviatline tridenuto, dentibas acutissimis, inferlore dimidio brevlore, denlibos lanceolatis actilis. Corollae tabus vix exserlus, labium superius breve bifidnm, inforiuq dnplo triplove longius. Stamina breviter cxseria. Si)lus molto longior, lobo soperiore brevisiimo. — in California hpplenrionali habitat
3. AU. STACIIYOIDES Bib. I. c. t - Suffruticosa: ramis rigidis folioiii; foil, breviter peiolaiis oblongo-lanceolalis obtusis erenulalii, basi anguatatis rugous subius canscentib., floralib. bracteisq. o^atis acuminatis; genitalib. corolla sub-brevioribus. ^ — Afflnii praecedanii, sed abunde diversa. Rami pedalfs dun tomenloso-pubescentes, superne uti braceae el calyces ilscosi. Folia 2*3-pollictria, pctiolu brevibus basi dilalalo-subamplexicaulibus, ul in *Au. kumltt*

floralibus) calyce brevioribus. Calyx porpurascens. Corollae lobus breviter exsertus. Corolla alba v. pallide coeroleo-purpurascens. — *A. latifolium* Mill. Diet no. S. — Habitat in Europae et Africae regionia mediterraneae collibus alicia et montibus, in Barbaria, Lusitania, Hispania, Gallia meridionali, insulis Balearicis, Italia a Pedemontio usque ad regnum Neapolitanum et Sicilianum, in Tyrolia meridionali et Isiria, in insula Graecia rariua, in Melo, Zacyntho nec non in Boeotia et in Oriente.

3000. *NONAVLDA* Linn.

(Linn. Gener. plant, no. 37. — Meisn. Gener. plant, vascular. I. 884. II. 193. — Bth. Labiat. gener. et spec. 315.)

Sectio L EUMOSABDA Bth. 1. o. 126.

Gentiana longe euerata.

1. *M. DIDYMA* Linn. Spec. plant. 32. - Bib. I. & 315. et 798. t — Bot. Mag. t. 540.

hiapidulis v. rariua glabralia, floralibus, silibus, bracteis, exterioribus, oblongo-lanceolatis, basi longe angustata col. oralibus; calycibus. theonibus atrialibus coloratia glabris, fauce aubnoda; corollia glaberrima. % -> Caules erecti fistulosi, circiter bipedales, aente tetragonali, angustia seep* praeaeritibus aub axillis pills raria ctilialibus Bonnonquam aaperla. Folia 2-3-pollucea, aploae aepiua In aemaen longam angustata, irregulariter aerrata, aerratibus obtaala T. mneronalatit, lapra pills sparsa adsperea, subtoa nenria prominolii magis mnotre petiolitque ellatia, Inter nervos uli In pagina superiore pilia adspersa, floralia seaalla angustiora, verticillastro saepius longiora, basi colorata, caelenim canlinis imilla. Verticillatrali aolitarii v. saepius binj, !/« v. 2 poll, dislanlea magni globoai. Bracteeae coccineae, eiteriores oblongo-lanceolatae, basi longe angustatae, foliis floralibus fere dimidio breviores. Calyces semipolluces, exius glaberrimi coccinei alriat, parum incurvi, ore sobobliquo, dentibus lanceolato-aubulatia latiladnem calycis vii aequantibus, demum anbatellato-patentibus, fauce nuda v. pills panels Instructa. Corolla coccinea speciosa, cum calyce ultra seaquopolluarit, tubo basi tenui, superne ampliato, calyce duplo longiore, Intma pubescentia esasnaUto, tabula aobaoquallb. Y. Inferiore parum longiore. Gentiana losgs taasrU. SUSIUMSJI aspsriaraam veatglum nullum v. brevlaalmm aušmatws. M— ssajau stamina dtdjaiania tisa, quamtis saepe occurrere dleuntur. Styll loM tajbalail* Mparlsr bKtUslaius, Inferior triplo longior. - *M. fishdo\$* tar. Curt. Bot. Magat. L 14 T - if. eocff. *nea* Michx. Fl. bor. Amer. 1. 10. — *M. purpur*— Lasu Diet IV. 280. - *M. at&f-miana* Pursh, Fl. Amer. sept. 1.17.11. (male). - at. *purpuric*—s Wander. Indi. semin. hort. Marb. 182S. — *M. Otw*goen\$* Bart Prodr. 0. Penaylvan. I. 34T — Dabltat in America septentrionali, In Canada et Pennsylvania, ad rhulos excobiorum montium Carolinae septentrionalis*

S. *M. FISTULOSA* Lion. I. c. 32. — Rcb. Fl. exotic. II. 20.1172. — Bth. I. c. 310. t 720. t — Foil* peiolatis ovato-lanceolatis, basi rotundato-tobcordatii, utrinque glabra pubescentibus. hlspldisve, floralibus, sessilibus, bracteis, exterioribus, subcoloratis; calycibus. subincurvis vix coloratia, fauce intus htspldis; corollis glabris tillosisve. % — Species gsutura, tillositate, magnitudinis el colore florum ei bractearum forma maxim© variabilis, a *Jf. didymia* constanter distincta auinra elailori, calycibus bracteisque minus coloratia, corollia minoribus magia minusve pubescentibus el praeserim calycis fauce, Intus pills hisplda et saepiaa clausa. Caules 2-5-pedates glabri ciliati Y. pubescentes, Intus fistulosi v. faretii. Folia nunc ovata, nunc angustae oblonga, at saepius ovato-lanceolau glabra bispida v. pubescentia viridia v. canescentia. Bracteeae exteriores mi folia floralia nunc late ovatae, basi cordatae, nunc lanceolatae, basi rotundatae v. oblongae, tides v. pallide roseae v. purpurascenle*. Corollae saepius pallide roseae v. purpureaentea, rarius iniense violaceae v. purporcae, nec uoquam coccineae. —

M. allophylta Michx. Fl. bor. Am. I. 10. — *M. elinopodia* Linn. Spec. plant. 32. — *M. purpurea* Pursb, Fl. Amer. sept. I. 17. (non Lam.) — if. *oblongata* Ail. Hort Kew. (ed. 2.) I. 51. — *M. rugosa* Ait. I. c. - *M. glabra* Lam. Did. IV. 256. - *M. hngifolia* Lam. I. c. 255. — *M. altiaina* Willd. Enum. plant. hort Berol. 33. — Rchb. Fl. exotic. II. 27. t 170. — *M. affinis* Lnk. Enum. plant, hort. Berol. I. 0. — Rchb. I. c. 31. t. 182. — *M. undulata* Tauscb in Rchb. I. c. 31. 1.181. - *M. mtidia* Willd. I. e. 32. — Sweet, Brit flow. gard. 1. t 08. — *M. violacea* Desf. Cat. hort Par. 06. — if. *variant* Bart Prodr. flor. Pensylv. 1.30. — *M. intotucrata* Wender. Ind. sem. hort Marb. 1828. — if. *eommutata* Wender. I. c. — *M. lilacina* Wender. I. c. — if. *hybrida* Wender. I. c. — if. *barbaia* Wender. I. c. — if. *coerulta*, *crūtata*, *dubia* etc. Hortol.

fl. mollit Linn. Spec. plantar. 32. — Foil, molliter pubescenlib.; corollae labio soperiore densius barbato. — if. *moliit* Linn. Amoen. acad. Jll. 390. — Rchb. Flor. exotic II. 98.1171. — if. *mtnfkaefoHa* Grab, in Edinb. Ne* phil. Journ. XXI. 347. — Bo*. Magax. t 2858. — Habitat in Americae borealis monlosis, dometis etc vulgaris, in regione occidental! tecus Oumina Saskaichawan et Red River dicla, in Canada, Pennsylvania, Virginia, Carolina, Novo Aureliano et ad Saint Loots, ad Missouri, etiam in Mexici provincia Texas, in dumetis prope Jalapam, tar. *fl. saepios* in reglonibus borealibus.

3. *M. BR.4DBURIA.Y4* Beck in Sillim. Amer. Jonrn. or scien. X. 200. — Bib. I. c. 317. I pt 73). — Foil, subsessilib. ovato-lanceolatis, basl rotundatis, sublus canescentl-tomenlois, oirioq. pilosii, floralib. bracteisq. exteriorib. basi rotundatis subcordatis coloratis; calyeib. glabriascalis atriatls, saperne contracts, fauce birsuta, denllb. subulatis aristaUs; eorollia calyce vlx dolo longiorib., extus glabriusculis, lablo soperiore traotsslmo, tpleo borballo. % — Caolis clrciter 3-pedalis glaber •. aofnlls otlatla. Folio *M. /UNiloto*, sed aobsossllla pllis loogit mollibos adsperta ot cilloU. VorHoilUtrrl tolllaril, mofoltadioo if. /UfWo#a«. Bractea loco laaoololio, basl soboordouo, oil calyces parpuraecenies. Calyces lofonie loflatl, superao contract!, ore villoslsslmo, dooliboj latitadioe tubl dimidio v. sob-daplo longioribos, demon sllelalo*pateotibos. Corollae pallidac, vix calyce duplo longiores, labio Inferior* ponctis porporeis noiato. — if. *fbtulosa* Hook. Bot Magaz. t. 3310. (etcI. lynn.) — Habitat in America borcali, in locis incullis prope Saint Louis, secus flumina Missouri et Obio.

4. *M. RtSSELLIANA* Null. Trav. in Arkans. territ Ml. - Sims, Bot. Magai. t 2513. - Hook. Eiol. 0. II. I 130. — Sweet, Brit. flow. gard. II. I. 106. - Bib. I. c. t — Glabriuscula: foil, subsessilib. lanceolatis, basi rolundalis subcordalis, floralib. bracteisq. exieriorib. sessilib. coloratis, basi long* anguMalis muticis; calyeib. glabriutculii, faoce subnoda, denlib. subaequalib. lancrolatis abbreviatls rigMsi corollis glabris, tubo looge oxserto, labio lofehore punctato. ^ — Caulet eloogaU glabri v. *gd* aogulos leooitsime ciliaii. Folia bipollicaria, vix semipollicen laU, remote deolau glabrioscola v. margioe ciliaU, sublus nitida, floralia oli bractea exterioros saepe porporasceotia. Bractea paucae laiae, vix calycibus loogiores basl oagusUae, apico acoUe oec arisUUe. VerlicllaMri solliarii v. pauci, ol W if. pwiefolo parti. Calyces inferne parum inflali glaberriml, superne contract!, on obllqoo, dootibus demom sllelalo-paloslibos glandulonis. Corolla gracillima, tooo trnui, Ubiii eloogatls, iofeiore elfgaoter puoctato. Grnitalia exserU. Aotbera, cobaerentes, vlx biloculares. — BabiUt io America septcninonali, io Arkansa, ioler Rocky aououias.

*ooiio O. CBILYOTil \$UH. tz BtlL L O. 720.

SUaalM labio superior! corollae breviora v. acqualia. - (*Cory***** ~~Nuu~~

Traniact. Amer. philos. ftoc V. 185.)

o. *M. PI^CTATA* Lioo. Spec, plaos. S. - Andr. Bot Rep. t. <6. - »<<• • ~~Juste~~ ^{L. 87}
Blau I. c. 31ft. - Teooitor poboMoas: foil, peiiolalit lanceolatis, basi ay
~~subulatis~~. braeteitq. eiteriorib. sestillb., bati aubcolorau* »^{uUeli}. C*^ubrcviaiiis
~~subul.~~, IAQCO brovtor barbau, deoUb. subaequalib. laocoolaUs ao

rigidis; corollis glabris, tubo vix exserto, labio inferiori punctato. % — Caules adscendentes ramosi pedales pubescentes, oblique tetragoni. Folia 2-pollicaria angustata, parce dentata v. subintegra. Verticillastri in parte superiore caulibus pauci remoti, minores quam in praecedentibus, omnes foliis floralibus breviores. Calyces basi parum inflati. Corollae tubo vix exsertus. Genitalia labium superius aequantia. — *M. lutea* Michx. Fl. Bor. Amer. I. 10. — Habitat in America boreali a Virginia et New Jersey usque ad Floridam, Carolinam, Alabama et Novum Aurelianum.

6. *M. ARISTATA* Null. Trav. in Arkans. Terr. It.? — Blh. I. c. — [Hook. Bot. Beechey. t. 3825.] — Canescens: foliis, oblongo-lanceolatis, basi angustatis, floralibus bracteisque exterioribus sessilibus subcoloratis, apice longe subulato-aristatis; calycibus striatis pubescentibus, fauce barbata, densibus subaequilongis longe subulatis, apice penicillatis; corollae tubo densius calycinis vix excedente. % — Habitus et statura *M. punctatae*. Folia argute et remote serrata, etiam caulina apice uli serrulatae saepe subulato-aristata. Bractee numerosissimae, anteriores ciliales, saepe purpurascens v. flavescens, supra subtomentosae, margine ciliales, apice longe subulato-aristatae. Corollae magnitudinis *M. punctatae*, sed labium superius latius, inferius imbricatum. Stamina labio superiori breviora. Densius calycini subulato-aristati, vix ultra modum tubo excedente*. — *M. titridora* Cervantes Lag. NOT. gen. et spec. plant. S. — Habitat in America septentrionali, in Arkansas, in Mexici provincia Texas ad Bejtr et EJo de Uthitad ei in Novam Hispaniam.

f. *Specie* dubiae v. non tatis notae.*

7. *M. SCABRA* Beck in Sillim. Amer. Journ. of Scien. X. 96k — Bth. I. c. — Perennis: caulis obtusangulus glabriusculus tripedalis ramosus; folia 2-2 1/2-pollicaria ovato-lanceolata subcordata serrata, margine revoluta scabra crassa punctata, breviter petiolata subvillosa; bractee ovato-lanceolatae; florum capitula magna terminalia subclava; calyx semipollicaris hirsutus, fauce dense barbata, densius breviter subaequale, corolla hirsuta, pallide purpurea, labium superius reectum, summis subaequale. — An *M. Ufulcaae* var.? — Habitat in America boreali in sylvestribus ad Mississippi propa St. Louis.
8. *M. GRACILIS* Pursh, Fl. Amer. sept. I. 17. — Blh. I. C. 310. — Glaberrima: capitulis parvis nudiusculis laevibus. Urinaria hirta exsertis. Ciliales; calycibus pubescentibus ovatis; corolla breviter hirsuta. Itaque uterque floris; fere linearis-lanceolatis acuminatis serratis flabris. % * An *Blephiliae* species? — Habitat in America septentrionali, in montibus Carolinae meridionalis et Virginiae.
9. *M. VILLOSA* Martens, Notice sur quelques BOUILLONNES. esp. des plant. 2. — Caulis pilosus obtusangulus; foliis, sessilibus ovalibus acutis, remote serratis villosis, dense ciliatis, sublimbus pallidis; involucro porporeo villosis; florum capitulis; corolla pallidis rubro-punctatis, labio superiori barbato; calyce colorato glabro, ad faucem barbato. 3]. - In America borealis provincia St. Louis.

ff. *Species e genere excludendae.*

M. CILIATA Linn. - *BLEPHILIA CILIATA*.

M. CILIATA Pursh. - *BLEPHILIA URSUTA*.

M. HIRSUTA Pursh. — *BLEPHILIA HIRSUTA*.

M. ZEYLANICA Burm. - *NISOMBLIS OVATA*.

M. PRATENSIS, *M. RIGIDA* et *M. VIRGATA* Baffo. Med. Fl. II. 37. ex descriptione non recognoscendae et ideo excludendae.

3601. BLEPHILIA Rafin.

(Rafin. Journ. physiq. LXXXIX. 08. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 284. II. 101 — Blh. Labial, gen. et spec. 310.)

1. *B. CILIATA* Rafin. Journ. physiq. LXXXIX. 08. - Bth. I. c. | — Foliis ovatis, basi angustatis, sublimbus canaliculatis, floralibus inferius.

conformib., supremis bracteisq. exteriorib. ovatis acutis coloralii, caljces aequanlibus. 2l — Caules erecii, acute tetragoni pubescentes, angulia retrorsum birsutls. Folia 2-pollicana glabnuscua T. teouissime tomentosa et subtus ad nenroa pi* loso-bispida. Verlicillastn globosi remoti, omaes disiincii. Bractee ovatae rigidae nenrosae ciliatae, apice rubescentes acutissimae, interferes aoguslioref* Floras vix semipollicares. Calyx extus binutus. Corolla extua villosa, labiam aupenus infenore brevius. Geniialia parum longiora. — *Monarda ctUaia* Lion. Spec, plant 33. (nee Micbt.) — Habitat in America boreali, in Pennsylvania?, in Virginia, Carolina?, ad Missouri, prope St. Louis.

2. B. HIBSUTA Bth. I. c. M - Foil, petiolatis ovatis, basi rotundalo-cordatift utrinq. birsulis, floralib. inferiorib. coofonnib., suprcmis bracteisq. linean-subolatis, calyce bretiorib.; ealycib. pobescentib. recums. ^ — llabitu ramosior el laxior quam *B. ciliat**. Caulea tetragoni birsuii. Veriicillasin numcrosiores minores, sopremi approximate Calyx minor magis binutus. Corolla magis cxserU subglabra. — *Monarda kirsuta* Pursb, Fl. Amer. sept. I. 10. — *Monarda cUiaf* Micbx. Fl. bor. Amer. 1. 16. (non Lino.) — Habitat in America septentrionsli, in mootosis Virginiae, ad lacom Michigan et flomen Missouri, prope St Louis.

3002. ZIZYPHOR.% *Linn.*

(Linn. Gener. plantar, no. 36. — Meisn. Gener. plant, tascul. I. SSI. IL 102. - Bth. * Labiat. geoer. el spec 390.)

l. I. *Perennes suffruticosai.*

1. Z. CLIJOPODIODBS M. Bieb. Flor. Taur. Cauca. I. 17. - Bth. I. c. 330. t - C. Kocb, Unoaea XVII. 801 - SuffruUcosa: foil, ovatis obloogis lanccolatisv* floralib. subeofaraib. ?. aagosUorlfc. Uuia; vrtlcillastris in capitulum subro luodam termMale apprilouila; ealyelb. caoo-pubeseoiib. v. pills paacis ciliads. 3f — Habile flfaW *S&rpjOt* varieuiom mtjorom. Bami dffasi semipedalM ?. TII pe4alea, saept porporaactAttJ, uti folia oi calyces tomtato trevissimo caoetcentet. Folia Inima plenimqoe late ovau, superiors angosta oblonga v. Io tar. /I. omola ovaia, fix ooqnam aemipollicana, ba*1 in peliolum brevem aoguslata oenroaa ponciata. Verticillaslri paun 6-IO-flon, in capiulum lanusculum subglobosum approxlmati. Folia lioralia caljcom aequantia v. ?is longion, saepiu< ango%la, ranu< praesprtim in rxemjilanbus cullm o\oia. Brae tear mmutis<imae subnullae. Pfdirelli fere lineam, raljcn I/2 hn. Inngi. Den- Ws ral>cini breves aculi, po<t anlhenn ronmtenlr*. Corolla (rum labns) calyce subduplo longior rocrulco-purpurra. Labu infrmri<> lobi Ulrrales rolundatif mrdius longior emarginalus. Stamina bre<ilcr ex>eria v. miordum corolla breviora,

a. *camtefms*: foil, pleramq. anguUis integris, calynb mimroe pilosi*. — THAI** *capilaia* Linn. Spec plant. 3a * *Tkymu* pumetalms* Willd Pb)togr I. 8-w Borm. I ScbolL Syst. veget. I. Mft. - *Tkymus Imridus* Kbrb. Briir. VII. W ex Roem. el Scbolt L c - I. *dnopodtotdes* a. *rumtla* et *fi. atmoidn* Budolpn in Mees. Acad. sciaoL Pelropol. II. 311 - Z. *lemmtor* F*lk, Topofr. I. 00. ** Bodolpb I. c. - Z. *Mmsnmi* Adas apud Web rt Mobr Bf.tr. ex Rudolph I. * 0. *wudia*: foil, plerumq. otatls; ealycib. pilosiu<ruli<< - Z. *ehmopodioidi** B<< dolpa la Mem. Acad. tcieoL Pnrop. II 311 i II <*irl. tar a ri/>. - Z. ><*>~ p*U*fa giirn, BoL Magat. I 006. fmalr) - I *mrdta* link, Knutn pi. BOH. Berol. I. 17. — Habitat Io grammosis montou Anse mrdiae, m ^{ArBe} T* T Ibencae moala Alioar el io Caucaso frequent, prope T.flin, in rupe>triD mooUs Bescbbarmak et io litlore areaoto marit Catpiei prope ^{lrrrbed} J«ffo AHako frtqaotUsimt, Io Sibiriae regiooe Iseiensi el in de>erto *boo* I tried prop* Irtim.

- 1 Z. GIDDEUHEIMBBI C locb, Llooea XVII SOI - Foil Inferiorib. •^•>>J sapenorib. major!b. •ubrotoodis aut ovaiis, Ooralib matimi< ^{oT-to} J2J p1- ••U<, omoib. Inlcg<>rrlals(marglae rrvoluts magi* mmu>*e pilosis: ••V<_sul(f >Uau*«ir» calyclao miaonb, draiib. cal)ri< Unceolalo - acumloatij cap •obsto<•. ^ . 3*rpjUmm *Armtncum* Good. Ub. - Craacil Io Armania.

3. *Z. SERPTILLACBA* M. BiebersL Flor. Taor. Cauc I. 17. — Bot Mag. t 006 Tt - [G. Koch I. cJ — Rod. Mem. acad. sc. Pelrop. II. 315.112. — Poll, oblongia acotitis canesceniib. glaberrmls, marline et nenro dortall paginae inferioria acabrla; florib. breviter pedaooculalia faiciculum spicamve efficienllb.; calyce tenaiter pubescenle, deolibus aubulalia. q. — Crescit in Ostia et Cartalinla.
4. *Z. DASTANTHA* M. Bieb. I. c. 18. - Bth. I. c. 321. - Suffruticoit: foil. ovaiis obtongisve, florahb. conformib. tails; verlicillaslris In capilulom oblongnm approximalis v. inferioribus disinctis; calycibus bispldo-pilosisslms. ty — A Z. cW-nopodioxde differt folns lationbus, Oorum capilulis longioribua et calycibus piloso-bispidissimis. Denies calycini ellam parum longiore. Corollae pleramque brevwrce el stamina rartus exsclra. — *Z. Putehkini* Adam in Web. et llohr, Gat. 1. 42. ex Room el ScbulL Syst. — Sims, Bot. Mag. t 1001 (male.) - Ilabital in Cauca»i Iberici subalpiois el in montibui Talysch.
5. *Z. CANESCENS* Bib. I. c. - Poll, ovaiis, utrinq. molliler cano-pubescenlib., floralib. conformib.; venicillastris In capitalom terminate approximalis; calycib. mollner pubescenlibas. 3† — Uabilu *Z. Hispa*ica* afflois, led soffruticota tide-tur. Flonbui capitatii *Z. cUnopodioidi* approximate, at folia floralla latoria, calyces mloores. Ab otraqae folls, ranis calyethoqae mollter cano-pubescenlibas diftingaiur. — Habitat In Syria at In Aegypto.

§. 2. *Jlerbaeae annual.*

0. *Z. HISPAMICA* Linn. Spec, plant. 31. - Bfn. L e. 3M. - Aonoa: foil, sobtauillb. ovaiis oblongisve, (loralib. rhomboidels calyce longlorlb.; vertleillatrla distinctis axillanb. approximalis 6-10-florif; ealycib. sessilibos. Q — Herba 2-4-pollicaris dura, basi ramosa, ramis ad^cendenlibus rigidis villosis. Folia inferiora angustiora, floralia subplicola rigida nervosa. Verticillaslri parum distanles, ramorum pariem majorem orrupanli"i. Caljces subsessilen, broiler bispidi, ba«i subinflali, apicc attenuaii, deniibu^ connivenlibus. Corollae vix calycem excedeolcs* — Ilabiiat in Ilispama.
7. *Z. ACUTIFOLIA* Monibr. el Aucher, Ann. se. nat YL 44. — Poll, ovaiis acutlslsmls, basi aogusuiit pubescenlib., floralib. coaformlb.; Tarcillastris disunctis atlllarib. subesfloris; calycib. brtvltter pedicallatia pubetcaallb., aploe ailasiaaUa. O - Afflms praecedenu el aequenu, ab Ilia diftrt floriboa pasUaaMatto, ab h** calycibus vix pilosls, aplice alongatla magia ailaaaalls, ab olntjM follia aafvstloribus anRusiissimU, a *Z. femiforf* praocipM neadlt miisjdlua MJonua. — Prapa Aleppo cresci.
- 8 *Z. ACINOIDES* Linn. I. c. - Bth. 1. a. - Annoa: fall, breviler petlolatlf late ovaiis, lloralil). conformib. calyce longiorib.; venicillsslris paaala dlstloctla axillarib. laxiH (i-10-non^, caljcib. pedicellatia. O — AfAois *Z. BUpmUt*—. Caalet longior« laxiorcs. Flores majores. Galycas piloso-hispidl. — Habitat in Hispaoia.
0. *Z. CAPITATA* Linn I. c. - Rdlph. Mem. acad. scient Petrop. IL 308. L 10. - Sbibrp. et Sm. Flor Graec. I. 10. I. 13. - Bib. I. c. - Foil, lanceolalis, basi angustails, floralib laiissimu rbombeo-ovalii acamlnatis; vertlecltlasiris In capimium aobglobosuiD terminale approximalis; calycib. piloto-hlspldls.Q — Herba 3-5-pollicaris divancato-ramona, ramis pubescenlibus. Folia caulina *Z. tenuioru* floralia lahssima ciliaia, veni5 validis sublus lineata, calyces excedeolla. Capliula densa terminalia. Calyces 7 *tenuioris*. Corollae parum looglores, lubo lenul exserio, limbo brevi. Siamina corollae subaeqvalia. — Habitat in regionn tneduorrancae el Rossiae australi* agris, campis et collibus, In cullis in Atlanic Hupama, Italia meridional!, monie Crucis insulae Cjprl, Ariueola, Caucaso' Tauna, monhbus Soongancis.
- ia *Z. TKM'IOR* linn. I r. - Bth. I. c. — Foil lanceolalis, basi angustalis, floralib, subronformib., irrlinllaHins ombb. diMinctis axillanb; caljrib hispidu.pi. losissimi»; coroll» e caljec breviler exicrim Q - Ran procumben», nrtim numerotis ereclis semipedalibus, pihs reOe&is pubckceniibu*. Folia polhcaria et

longiora acuta integerrima r. hinc inde denliculata, margine et nervo medio, praeserim supenora ciliata r. rarus omnia nuda, caelcrum glabruscula pallida, floralia calyce longiora. Verlicillasri laxi 6-15-flon, saepius per parlem majorem caus disposili. Pedicelli 1-2 lin. longi complanati. Calyces 3-4-lineares, extus pilis longis palentibus, inlos fauce parce villosa, denlibus comveniibus. Stamina inclusa. — *Z. spicata* Cerv. An. cienc. Matr. IV. 250. — *Z. terpyllaea* Ten. Syll. flor. Nap. 16' (oon Bieb.) — Habitat in regioms mediterraneae el Rossiae ausiralis collibus incnllis, in Hispania, Allante, Apulia, in locis SICCIS montium Talysch prope pagum Swant et in monie Arkaul jugi Allaici.

11. *Z. BRAISTII* G. Koch, Linnaea XVII. 2M. — Foil, obloogis acutis cauleq. pilosis (nee minute pubescenlib.) conformib., capitulis subglobosis, calycib. minute pilous aut pobescenlib., dentib. lanceolalo-acuminatis. 5 - In Kurdistama.

I *Species dubia.*

12. *Z. JAVANICA* Blume, Bijdragen 822. — Btb. I. c. — Florib. capitalo-spicatis terminthb.; bracteis subulatif ciliatif; ealycib. tillosis; foil, peiolais ovaiis, exlorsum grosse serratis, ntrinq. caulibq. prostralis pubescentibuf. O — Corollae labium supenus refleium integrant, in fen us tnlobum. Stamina 2, nx excrta. Antherae sagiliatae. Stigma ioaequale bifidum. — Habitat in Ja>a, in cacumine monlis ignivomi Tjenmai proviocite Cberibon.

ft *Species e genere excludendae.*

- Z. BRACKOLATA* Roem. et Scholt. — MICROMERIA BRACTEOLATA.
Z. GLABELLA Roem. et Scholt — MICROMBRIA GLABELLA.
Z. BISPIDA Steud. - HEDEOMA HISPIDUM.
Z. MARIANA Roes, et Scholt — GUN ILA MARIANA.
Z. PDLBGIOIDB8 Datt — BBDEOMA PULBGIOIDBS.
Z. PCJNGENS Ledeb. — NEPETA PDSILLA.
Z. SILIQUOSA Loor. — JDSTICIA OBSCDRA Vahi.
Z. TAUFICA M. B. - FLADBRMANNIA TAURICA.
Z. TII\MOID&S Roem. elSchull - THIYMUS SERPMLIM \ar (C(\ I U THY-MOWEh Herb. Linn.) el MICROMERIA FILIFORMih vCIML\ 1HUIOIDES Herb. Gouan).

3002/1. FLADEBM4WII *Bnge.*

(Bnge. Bullet, de l'Acad. des sc de Moscou >l no. 11. et 11 - Meisn. Gener. plant. ra*cul. II. 306)

1. *F. (ZIZYPHORA* M. Bieb. Fl. Tanr. Caucas. IV. 250. - Bih Lalnat gener. «' »pec 323.) TAURICA Bnge. I. c. - Foil, lanceolatif, ba<i anRusUHv floralib sa^* conformib., verticillamrin omnib. dblinctis anllanb . calycib hnpido-piloil**j~ mis, corollit calyce doplo looffioribof. ^ — *Thymbra sptcata* Pall. Indi* '* *° Tauriae montuns, in Pen la et Arabia crr>ciu

f *Species incognita.*

- 1 *F PARVIFLORA Traouell Bullet de l'Acad. de S1 Pirsbrg VII no. 3. - &~ *typhora temmor* Karel. el Kiril. nee Lion.??

Tribus IV. *SATUREINEAE* Bth. Labiatar. gener. et spec. 324. — Endl. Gener. plant, p. 616. — Meisn. Gener. plant vascul. I. p. 284.

Calyx quinquedentatus aequalis v. bilabiatus, labio superiore 3-dentato, inferiore bifido. Corollae tubus intus exannulatus, calyce v. bracteis imbricatis brevior v. vii longior, limbus subbilabiatus, labio superiore piano integro v. cmarginato bifido, inferiore patente trifido, lobis plants subacqualibus v. medio vii latiore. Stamina distantia recta divergentia v. vix ascendentia aequalia v. superiora breviora v. abortiva.

Subtribus I. *IIORMINEAE* Endl. Gener. plantar, p. GIG.

Connective parva. Stamina fertilia quatuor.

3003. *HOBMINVBI* Blh.

(Bth. Labial gener. et spec. 787. — Meisn. Geogr. plant. Taicul. I. 284- II. 103.)

1. *H. PYRENAICUM* Lion. Spec. plant. 831. - Sweet, Brit. flow. gard. III. U 252. - Bth. I. c. 727. — Herba peregrina. Folia fere omnia radicalia peliolata ovata obtusa profunde crenata, basi truncata et tuberculata v. truncata et tuberculata. T. ad nervos hispidula. Caulis floriferus erectus simpliciter semipedunculatus, foliorum paribus 1-2 basi instructis, infra medium oriferis. Verticillatae subsexflori secundae. Folia floralia bracteaeformia, etymologia breviora. Calyx breviter pedicellatus nutans, nervis subredecim elevatis strigatis, apice aequaliter colorati glabri v. ad nervos hispiduli, lobis patentibus, dentibus acutissimis. Corolla purpureo-violacea 0-10 lin. longa. — *Melia pyrenaica* Jacq. Hort. Vindob. II. t. 183. — Habitat in alpidibus Salisburgensibus, Pyrenaeis et Vallesiae.

Subtribus II. *OUIGANEAE* Endl. Gener. plant, p. GIG.

Calyx 10-13-nerviis. Stamina quatuor fertilia.

3004. *BYSTBOPOGON* Burtt.

(Herb. Sert. Angl. 10. - Meisn. Gener. plant, Yttenl. L 2M. II. 103. — Bth. Labial gener. et spec. 3M. et 117.)

Beetle L. *BTSTIONMOI* Blh. L. o. til.

Calyx 10-nerviis campanulatus. Floret laxe cymosus.

1. *B. ERIANTHUS* Blh. I. c. 727. f. - Folia serrata, supra viridia glabra, sublevis vix tomentosa; cymis pedunculatis corymbosis, dentibus calycinis ovatis. fructus — Sequens ei habitu limulii, sed foliis acutis serratis et floribus differens. Corollae 3 lin. longae, tubo basi tenui, extra calycem inflato, lacinae parvae laevae, aequales erectae, inferiores palenles, faux et tubi pars superior intus lineis pilorum teretibus dentibus — losa. Stamina inclusa subacqualia, omnino *Bystropogonis*. — Habitat in insula Juan Fernandez.
2. *B. PUNCTATUS* Ue*r. Serl. Angl. 20. t. 23. - Blh. I. e. 325. f. — Folia crenata, utrinque viridibus glabris v. sublevis vix tomentosa; cymis pedunculatis corymbosis, dentibus calycinis ovatis. fructus — Frutex tripedunculatus. Ramis glabris Y. tenuissime tuberculatis. Folia 1-1/2-pollicaria peliolata ovata obtusa, basi truncata, tubo rotunda, tubo glabra, subtus venis prominentibus et tomento tenuissimo tepe pallida. Cymae axillares corymbosae, longe pedunculatae, ramis primariis et interdum secundariis elongatae, apice capitula 5-10-linea ferentet, flores in quaque dichotomiasoluarum pedicellati. Bractae breves subulatae. Calyces hispidi, dentibus brevibus acutis. Corolla exiliter leniter pubescens. — Habitat in insula Madera.
3. *B. CANARIENSIS* Ilr-r. I. c. 20. - Bth. I. c. - Ramis serratis; Toll, crenatis Yillosis glabris, utrinque viridibus; cymis axillaribus pedunculatis corymbosis, dentibus calycinis nubilatis lobo brevioribus. 6 - Kami lionfm valde hispidi. Folia minora quam in praecedente, Doralia Cymae subulatae. Cymae inferiores

capiellatae ut in *B. punctate*, superiores fere a basi dichotomae, dense floriferae, flonbus omnibus pedicellatis tix capilellatis. Rami uli calyces hirsutissimi. Denies calycini tubo longiores, corollas aequantes. Valde affinis *B. punctato*, a quo differit lillosilate el denlibus calycinis lenuionbus. — *Meniha Canariensis* Linn. Spec. plantar. 807. — *Heliotropium Canariense* etc. Comm. flor. AmsL II* 180. t. 65. — Habitat in insulis Canariensibus.

4. *B. PLUMOSUS* Hér. I. c. 20. t 22. — Bth. I. c. — Foil, serrato-crenatis, supra tenoissime, snblus albido-tomentosis; cymis axillanb. densis; dentib. calycinis tubulatis. 6 — Habitus *B. Canariensu*. Folia fere *B. organifotii*, at saepiui dentata. Rami floriferi tillosi. Folia floralia cymis breviora. Cymae dicholomao densae sessiles, floribos numerosisslmis. — Crescil in insulis Canariensibus.
5. *B. ORIGANIFOLIUS* Hér. I. e. 90. — Biñ. I. c. — Foil, subniegernmis, subtu albo-tomentosis; cymis pedunculatis panicolato-racetnosis; deniib. calycinif snbulaiis. 6 — lanl florlferi tomentelli. Folia floralia superiors flonbus mullo breviora. Raemus nunc pedalis latus, nunc brevior subrorymbiformis. Cymae peduneulalae, panim ramosae, ramis irregulariter 2-3-chotomis, apice capiuiiferis, inferiores abeunt in ramos breves el c)mas parvas forum. Flores *B. Canariensis*. Calyces el pedicelli minus bispidi. — *Meniha plumosa* Linn. Mant. 273. — Habitat in insulis Canariensibus.

Sectio U. MHTI08TA0IT8 Bffc. L a. 325.

Calyx 13-nenrius tubulosus. Verticillasri dense spicali.

- & *B. 6PICATUS* Bth. I. c 3M. t - Foil, rabserrati*, ulring. vindib. glabns; verlicillastris dtnsis spicalis; denUb. calyciois ovatis. 5 - Ram* glabernmi. Folia petiolata 1-1%-polliearia ovata aculioMula, remote el leviler serrata, ba<i rotundata, floralia malto miaora, vtotoqae eano-tomeotosa. Verticillastri 6-10-flori, ID aalealM breves aMiraqat Y. ssbglobosas lermiales dense aggregati* Caljees villosaiail. Corotiae vlt daatfbas ealyelnis longiores, all geniulia omnlno *Bjttropogimii*. Staam qoiotoai fertile saepe occurrit. — Habitat in Peruvia, ad Porroeboca.
7. *B. TOMENTO8C8* Bib. I. e. f — Foil: subcrenatis, supra viridib. hkpidulis, demum glabratis, sobtus tomentoso-lanatis; verticillastris densis fubspicatis; dentib. caljciois subilatis. 6 — Rami divancaii, jumores villosi. Folia caulina petiolata 1-2-pollicana, nunc ovata oblusa, nuoc o>alo-lanceolaia acua, bail rotundata rugulosa, lana subtus den<a alba • rufescente instruria, floralia gradatin minora, sopra calyces m superantia, ulnque molliter villosa. Verticillastri multiOri, infenores subdistincti, supenores in spiculas oblongas foliosas appro* umati. Calyces tillosissimi. Corolla *B. tpioti*. - Habitat in Peru via.
- a *B. CANUS* Bib. I. c. - Foil, ovalo-lanccolatis subdentaii<, ulring. canesceotlb.; Yerticillastris laferlorib. disUnctls, supenonb. subspicaiit; dentib. calycinis sobulatis. 5 - Froiei ramls tillosis teooibus. Folia pollicaria petiolsta acaU, basl conealo-rotondau, floralia parta. Verticillastri multiflori laxiu>culi. Florei ml•ores ae in praecedentibus. — Habitat In Perutla.

f *Species dubia*.

- * *B. DERTATUS* Polr. DieL Soppl. I. 755. - Bib. I. r. - Foil, otalis birsulls serrauS; verticillasuis florom bispidis. 6 - Vcrosimiliter *Uyptidu* species. - Peruvia habitat

tt *Species § genere expeUendae*.

- B. BIPINIUTCS* Both - UVA ^ DIU Bt'RIIA.NM.
B. COAtCTATtS Scbam. - HYPTIH PP.CTI3ATA.
B. GsUVBOLRRS Blume - fIYPTIS SI A>EOLKN8.
B. MARIFOLIUS Juts. - MICROIHKRIA MARIFOLIA.
B. MOLLIS H. B. lib. - METMA HOLMS.
B. PKCTINATIS L' Her. - BYPTIS PKCTI^IATA.
B. ftIDAKFOLUS L Her. - HYPTIH POLYAMHOS.
B. buAVKOLE. ^9 L'Uer. - UYPTIS SI^AVEOLKNS.

3005. PYC\ANTIEMEM Michx.

(Michx. Flor. Bor. Amer. II. 7 - Meisn. Gener. plant. vascul I. 284. II. 193. - Bib. Labial, gener. cl spec. 326.)

Sectio I. TULLIA Bth. 1. o. 327.

Calix ovulo-tubulosus, subbilabiatus, dentibus saepius subulato-aristatus. Licillastri pauci ampli, saepe laxi, cymis ramosissimis-mullifloris. Bractea exterior foliacea, interiores subulatae. Folia petiolata.

1. P. INC VMM Michx. n. Bor. Amer. II. 7. - Bib. I. c. 327 f - Folia breviter petiolata, ovalo-oblonga aculis remote serratis, basi rotundata puberula, subula albo-lomentosa, verticillatis mulliflora densis cymis; bracteis linearibus v. eximio lanceolatis. demum calycinis aculis subanisatis subaequalibus. - Caulis cretus ramosus ultrapedalis cano-pubescent. Folia toquippollicana, utrumque pubescentia et subula tomento brevi subfloccoso candida, supra imbricata % superiora raris, floralia conformia at minora, longius petiolata et basi magis angustata. Verticillastri ad apicem ramorum 2-3, diametro 1-1% pollicis, pedunculi ulrinque dichotomi taxuicall. Floret numerosissimi. Bractea exterior lineari-spathulatae petiolatae, interiores lineari-subulatae, omnes incanae, subulato-aristatae, apice sellis mollibus saepius barbatae, calyce subulogiores. — *Clinopodium incanum* Lino. Spec. plant. 889. — Dill. Hort. Blth. I. 87. I. 74. — *Origanum incanum* Wall Fl. Car. 103? — Habitu in America boreali in trivis et fructibus!) a Canada et Novo Eboraco ad Carolinam et Alabama.
2. P. I OOMISII Null Journ. acad. nat. sc. Philad. VII. 100. - Blh. I. c. 728. | — rionibus cymosis multibracteatis, bracteis lanceolatis acuminatis incanae, folia petiolata ONJIS subserratis acutius breviter, superne glabra; dentibus cymis abbreviatis acuminatis, apice trilobis, floribus marulatis. — Affine *incanum*, at folia distinctius em foliis brevibus glabris, blatura humilior, lumen conopseus maculatis. (mae plerumque terminalis magnae. Bractea ranceolatis, extensor uti folia petiolata, ceterae densae angustae lanceolatae < j | x tubulosus, dentibus brevibus sed acutis, fasciculis pilorum brevi terminate (orolla alba v. pallide rosea rubro-maculata, lacinae oblongae. Species polychroma, odore *Pulegii*. — Cresoll in Georgia.
3. P. TULLIA Bib. I. c. 398, t - Folia pello oblonga aculeis subserratis, basi angustata, utrinque pubescentibus, subtus pallida; verticillatis multilobis cymosis; bracteis linearibus, exterioribus oblonga aculeis calycibus bilobis, denub. aculis subaristatis; corollis imbricatis glabra. 3} — Caulis erectus ramosus ulripedatus pubescens. Folia 2-pollicaria et ultra, leniter pubescentia, supra viridia, subulata pallida. tuberculentia, floralia conformia. Verticillastri in apice ramorum 2-3, diameter 1/2 — 2 pollicis, laxi, pedunculi ulrinque elongati dichotomi. Floret numerosissimi. Bractea exterior lineari-oblonga, ulrinque longe angustata, interiores linearibus-subulatae, omnes antilatae, apice setis longis mollibus barbatae. — *Tulla pycnanthemoides* Leavenworth in billim. Amer. Journ. of science XX. 343 1.5. - *fi. timberbe* Bth. I. c. 728. - Habitat in America boreali, in Tennessee orientali, in civitatibus septentrionalibus.
4. P. AIUSTATUM Michx. Fl. Bor. Amer. II. 8. 1. 33. — Blh. I. c. 328 f — Folia breviter petiolata oblonga aculis subserratis, basi rotundata, ulrinque glabra v. lomentosa, verticillatis mollidoris densis; bracteis acutiusculis, extimis oblongis, intimis subulatis; ralis dentibus aequalibus acutis subaristatis, corolla mm pubescentibus % — Herba pedalis rigida, parum ramosa glaberrima, pallide viridula. m. ar. ? subcanescens, tenuissime lomentosa. Folia 1, -2-pollicaria rigida canosa, inferiora saepius serrata, superiora integerrima micillaria pauci, 5-9 lineam diametro, flonibus jmbessilibus. Calices tubulosi. M. r. d. tubulatio bractisque rigidis. Corolla calycis lonior. Stamina r. i. b. r. M. ter exserta, labia breviora. — *V. intentalum* Pursh, 11. Atur. M. J. 4 | y — *Origanum clinopodium* V. Car. ex Pursh I. c.

constanter integerrimis, omnibus vmdibus. Cauhs saepe purpurascens. Folia nunc glaberrima, nunc villosa. Calyces et bracteae polius villosae quam tomentosae. Corollae omnino *P. muhct*, saepius punctatae, interdum impunctatae; var. 0. non nisi folis angustioribus differre videtur, nec ul species propria habenda.

a. latifolium • *Brachystetnum lerttillatum* Michx. Fl. Bor. Am. II. 6 I. 31. — *Thymus lerttillatus* Poir Did. VII. 653. - *Pycnanthemum terchillatum* Per!.. Enchmd II 128.

0. angustifolium *IS'ejtcta Vtrgimca* Willd. Spec. plant. 111. 56. — *Brachyslemum* *tr(jimcum* Jklichx. Fl Bor. Amcr. II. 6? - *l>ycnanthemum Vtrgmeum* Pers. Sjn II. 128. — *Jirarhytticum lanceolatum* Willd. Enum II 623. — *Thymus lanceolatus* Poir Did. Suppl. V. 305. - Ilabital in America boreali, \u montibus Pennsylvanicae usque ad Carolinam superiorem, ad Boston in montibus petrosu.

10. *P. LIMFOLIUM* Pursh, Fl. Aroc. sept. II. 400. - Blh I. c. 310 - *Gibberum* caule superne paniculato; foliis sessilib. linearibus integerrimis rigidis, \criuallalris densis numerosis terminalibus subglabris; bracteis linearibus acutis rigidis. dentibus colycini lanceolato-subulatis brevibus acutis rigidis; corollae ad faucem inius villosae. — Habitus fere *P. mutici*. Caulis denitilme foliosus glaberrimus. Folia sublinearia, margine subrevoluta, anguste linearia. Ciliatolae praecedentium, sed calyces et bracteae fere glabrae. Dentes calycium alae bractearum apice subcallosi acuti rigidi. Corollae lobus oblongus integrus. Stamina et tubo breviter exserta. Stylus subaequaliter bifidus. Achaenia oblonga minutissima, punctulato-nigra v. fere laevia — *Thymus Virginicus* Linn. Syll. teget. 453. — *Brachylemum* *intifolium* Willd Enum pi. 623. — *Koeberlinia capitata* Muhl. Melh. pi 408. - *Pycnanthemum tenuifolium* Schrad in Sieud Nora bot. 660* (ed. 1) — *Origanum firxuosum* \S ill H (ar. 10) ex Pursh. — Habitat in America boreali in MCCIS et praelis montosis a Nova Anglia ad Carolinam, in Georgia ad Novum Auracianum, ad Saml Louis

11. *P. MDLUM* >ult Gen pi Amcr. II. 34. - Bth. I. c. 331. - *Glabrum* pallide virens* caule subsimplici stricto; foliis sessilib. ovato-oblongis obtusis intragemminibus basi rotundatis; verticillatis laxiter corymbosis paniculatis glabris; bracteis ovatis linearibus, lateribus breviter sinuatis; corollis intus pubescentibus. — Caulis 1-3-pedunculatus teretis et alpinellus quomodo in caeteris speciebus. Folia erecta, margine aubrevolata? lili polticularia, superflora minus a remota. Corymbus densus. Bractearum eiteriorum laxae, ealyces aequales glabrae acutae, nec antatae. Calyces tubulosi basi glabri, dentibus brevibus pubescentibus. Corolla pubescens. Stamina et tubo einserta, limbo breviflora. — Ilabital in America boreali in montosis Carolinae et Georgiae.

f *Species e genere excludendae.*

P. MONABPKLLA Michx. - *MONAIDELLA CAROLINIANA*-

P. MOMAMM Michx. - *MOABDELLA MONTANA*.

3000. *MOARDELLA* Bth.

(Bib. Labial gener et spec. 331 — Mchsn. gener. pi. vascul. I. 2& ||.]o;)

1. *M. MONTANA* Blh I.e. - Caule erecto; foliis sessilib. ovato-lanceolatis acutis serratis, basi rotundatis; verticillatis dense globosis magis, bracteis eiterioribus laevibus acutis, calycibus tubulosis subaequaliter dentatis. — Folia »es%o]i]a et verticillatis magnis *Monardae* — In America borealis atque montibus (arolmao
2. *M. CAROLINA*>A Blh I c a& - Ilirtella* foliis abrupte pinnatis, nuberulato-obovatis serratis, capitulo bracteis ommibus coloratis inuicibus, bracteis ciliatis, calycibus in Mimilalis barbilibus % - Ilalnim *Monardae fistulosae* S|,K-malis laciniis allera brevissima - I'aulis 2-3-pedalis Folia, pinnatis ulirapolliranibus obtusissimis, lili alae auminata, profunde serrata Bractearum rali>re dupli |,,nJ giorces Corolla pallida, pallide rubra Spencs dubn /> JfonatiM/a Pursh)n Herb. Lamb. *Monardae fistulosae* kiuillima est, sed corollae denticulatae, sic eam in

- iconc Michaimam — *Pycnanthemum Monardella* Mirhi Fl Bor Am II 8. t. 31.
— Habitat in \meruac borealis alli» monlibu* Larolmcsibu* et in monte Saluda.
- 3 M ODORVIMS MWA Dlh. I c. f - Caule procumbente, foil subaessilib oblongo-lanceolalis, ulnnq. angustalis intcgemmis cams, terlicillaaln* dense globosis matins »olilaru», bracteis ettcnonb. late ovatis oblusi»&imis coloraiis, caljicib. tubuloMs elongate subacqualicr dentalis. ^ — Caulis humilis ramosiis, basi purpiirjMcns cl tenuisbime cano-lomcnlosus Folia subsessilia, pan a |i| >empol— luana obtu»a, margine subretolula, basi anguslala, subtiii ncnosa, utniKjue brrM»Mme cano-tomenlo«a, floralia braclei* subconformia > erhcillasri sohtani terminalci, florifen diarnelro fere bipollican Bracu*ae membranaccac >cnom«, m« liner tillosae, caljicibus aquales, intenorc* par\ac More* nuroero-»is\$inil. <,j\|ir» ui in *Wonanhs* lubulosi, denlibus bre>ibu> o«ali» ob(usiu)<< ulis, aptce >IIOM, sed Tauce mias tobnuda. Corollae roseac (*\ tubus broiler cxserlus apice parum dilalaiut. — Dabilal in America borcali-orrnrntali in pcirosi* ad flu men Columbia el in rupibus alpestribus in monlibus .White Mountains" dictis.
- 4 M 1>DI'L\TA Bib I. c. — Caule ba^prorumbenle, ramis adscendentib., foil, oblongo-lineanb obtusii, marRine undulato-rnspin, ba»i in pcliolura bre(cm aiuustati», utnnq >iridib glabns, tertirillaoiri* den^o globoiK magnis solitinis; LrnUh exlenorib late ovatis aruti< mrmbranacei^ mulinn, «al)Cib tubuloMS tl tu\JiH suba»Mjualiter drnlatis mutins. 4 — Rami 4-12-pollirarp* pur|>urasriiiU", glabri \ Ionuiter pube<cenli s Folia crassiunrula, uninema, ad axilla* sjepe fj^ciculala, V.-1-pollicana. Capitula el Oores if *odotahssimar*, at brae-teae clabnorea acuiiores. Calyces baal membranacei, apice >illosi — Habitat in California tepteatnonali.
- 5 M DOIGIJKSII Bth. I. c. — Caolt baai procumbente; foil peiolalm lanceolalisi liiifanb, ulrnq. anfiuUlla Tirldib. pabaacentib.; verticillatris dense globonis nafois soliiariis; braclels eiUHorib. ovaio-laneaolaiis, caljces fuperaniib. nn-stato-acomlnalls; calyclb. ovalo-tobotosls laflatia tillo<i4, dentib subaeqaalibus aristatis "4 — Herba pubescena semlpedali«, dlvaricato-ramoia, rami purpur^centes l-tiha plliraria subplana. Capitula polhrem diamoiro Brarieae exlc-riores I»M membranarcae, |cn|t valde prommenlibus, .ipire \imlrs uti denies calyces Mib>'jiii*n>lf s I inniae rnrnllinae et grnit.iln broiora (juani in *M odo-tahssima* cl *undulata* — Habitat in California M'>tenlrn>nili

%()?. tlltRUI* *Umh.*

(Moch \k<lb«(l | lint suppl rx Bth I abut K«n«r el «pcc 333 — Mciso. gener plant tabular I ^4 II IU

I A nirTAVMH Bib I c. ,* - Foil. »ub«et»ilib , ulnnq raroiq dense la^{o t i U} ^
SuITruiet procumbens pedalis, ranm ad«rendeniibu«(uti f«lia, lana alblda an^{sta}
Ourm«a mduiis Folia seuilia v brr^iirr pPtmUta, 0- 10-lmeana, lalf or
obiuti inlegernma. ba»l roiundala rratsa mullia, »iibtu« prnnmenia, npr>i<pn>
mioenlibut, Ooralia parta gUbr.ora. hpirae bretiler pedunculaiae, pollirare«
paroi loagiore« Brarieae 3-4-lineare*. laie imbricatae sessHes fuborbiroia^
tnlegerrlmae glabemmae membranareae, exiermre* tenuitcr 5-nemae, apice
lorai.r |oro||# fc<|Carala Mamma looge ei%erla - *Oti.jamum Ihtam*^{nut}
I inn sprr plant MI - Bol. Mag I. 9PA - *Amaracus lomrnlytus* Mocncli
Steud Nom bol I. 60 — Habitat in Creloe rupibu« nee alibi

* A. TOLRM>:F>RTII Blh I r | Foil «et«ihb orbirulati*. ba*i jiuibcordalis r^A
»'»q glabemmi« rilialioe % -- Praetr glabritiem diffrrl ab 4 ^{thclam*} b^{omt}
bitu, folut minoribu« laliludimr longitudinem %ubaequaniibu«, *eni» *» p r 0
n.niilMM. M,in« deo<|nnbu«, brarteU lalionbut, gemlalibu« parum ^{br*%l*ri} ^D ^{fI}
Habitu *Hhn itola* roiemt* Caulet r ba»i rra«*a lij:no%3 numro*i •^{pp} ^A ^{es} ^{DI} ^{um}
arnnprii4ir« HpiruUe paurae ohlongae »ub»e««ile« »ubnuianle« Ca»jc^u
>nfenut diUinrte bidenuium, denlibut oblu«i« o*%l.» I or<lta sub ^{»»»} ^{ce} ^{calcar}
brtti obluo aucla bumma ei»eria - *Origanum Tnyrmeforh** AH- Hort hew.

(ed 1.) II. 311 — Siblh. ol Sm. Flor Grace VI 56. t. 500. — *O. ealearalum* Jus§. ex Sleud Norn bol 572 — Habilal in Arclnpelagi Gracci insula Amorgos in rupibui prope ditae Virgini* counobium et in Oncntc.

3. A. LORDIFOLIIB Monlbr et Auch Ann sc nmlur. (2 Sé>) VI. 43. — Foil, sessilib. cordiformib ramisq glabernnm, caljcis labio superior! orbiculalo brevier tridcnialo, infenore nnnorc biddo 2|. — Species inter *Atnaracoi* el *Organa* fere media, *cd pnonbus affimor liabilu, caljns labio supenore multo niajore m deninto ol fauce intus nudi \b A *Iuurnefoi* hi differl folns aculu, raran elongaim, racemo siib%ini|lic i la\ion, corollis minortbu* et calyce, ab *Organo Styleo* foliorum foimi, rums subsimplicihu*, racemo niullifloro, caljce el corolla. — Ircscil ID insula (>pro

.%08. ORIGAMM Linn.

(Linn. Gencr plant no 720 — Mciin gener. plant ir vascular I 2&4 II 103. — Dili Labial gener. el tpec J34

- 1.0 SIP\LEIM Lino. Spec plant. 823 — Siblh. el Sm Flor. Grace M 57 t 070 — Bth I c m f — Caule decumbent*, aplice paniculato-ramoso, roll breviler peliolailt integernmls, luferiorib. tubrolundlf hfspido-lanalis, supcrlonb. ovails glaberrlmu glaucis; spieolli obloogli tollUrlil lernlfve OQUolib.; brarieis laxit ovam eolorails; calycit gUberriml deoUb. 3 tuperionb. loogloribat. % — D«si procumbens, rami sterilei brevet adtcendenlei villotiitlmi, folid rotundionbus erases, uirmque lanalls, floriferl pedtles tesquipedaltfve, dnaricnto-ramosi glabri, folns remotis partit paucit tubenerviit acaliuiculit, bam rotundatis Folia (loralia parva Dracicae duplo majores ovalae rocmbnanarcao oblusae, rubvnto!> ut in *imarans*, laxiusculae, dimidio minores quam in 4 *Ith-lamno* C.il>\ SCNMIIS, br.irir.i dimidio minor, lubuloso-ratnpanulalus phber nuMnbrtinauiiH, duitibus nbtusis,) supcnonbuH pa rum lqngionbus, 2 infrnonbus mlus MIOXX (.oroll.ic lubus aequali!, r.ihcem acquann I imbun bn< iri Kubbrc\ior (n>mtili.i ci^crla Stjlus subaequalilcr biOdus 0 *hyndum* Mill Diel.no 12. - Habitat in Orientc el Gracna, in monte bipjlo Phr)Kiac inter bmjrnarn el Dursam, prope Aleppo, in monle Delphi.

- 2 O. COMPACTUM Bth. I. c. f - Bo lit. Voyage boL dans U midi d« TEip. 1306. t 1* 147. - llumile tubiimplei: foil. sobMaslltb. otaUi obluiU vii ittraUa; apicis dense capuatis cylindncis; braetela elongaUi UoceolaUi aetiUt cotoratii, ea-l)cc duplo longionbui 2|. - Caulet e baal auffrnlleoaa panel aenlpHalei, erecti Y. ad^cendcnies simplices Folia minora el rigidlora quam In O mlyan. bpiculae 0-12 fere polhcarcs sub«c*silcii, in capllulom terminal^ oblongum appropiimalne. Bractea paullo mnjores quam in O. *mlgari* el omnes acutaf. < 11\ x extus glaber, dcnlibus intun b.irbalis, supenoribui parum longioribus. — O *yian-dulosum* Salzm PI exs inon l)c>f) — In Africa Mediterranea prope Tanger

- 3 O. VLLGARK Linn I. c. 821. - Blh. I. c 335. f — Hook. Fl. Lond. III r tab. — Ereclum villosum foil, peiolalis late ovalis oblusts tubierralit, ban Into rotundalis, ulrinq. vindib.; spiculis oblongii cylindncisve glomeratu ronmbosn-paniculalit; braeis ovatis oblutis coloraiin, caljce dimidio ad duplo lonmon. bun % — Planta habitu \alde \anabilii, ounc vix tempedahs, saepiik |-2-p r. dali< Caulo* complure* erccii, parum ratnotl, magii minus\c hirtuti, M f p a rubi-nlei. Folia 6-0-linoana, margine denlibus obscuris noiata, nrr%ia* tubtug promencnlibiis, magii minus\c villosa, rarissime tubglabra spiculae in rot>rub>o teruunali, ad apice> ramulorum cl in atillis foliorum fuperiorum faKrmil|a|10 nunc bme* obloiigao, nunc in \ar *fl* \aldc clongalae (usque ad I p>|| |,MiaarI teir-vonae Braciear quadnfanam imbncalac laxae, al raljcei ubti gr_ntr» nii^ bnmceae, fere srnper glalirae rubenle« Taljx glabor, drnubu* awiuaahlm** Corolla exsrn purpurascrns ^ rarius alba Stamina si(pi|u< , v, , , r h t j M i m h \ar , I n » n diffrrl nisi vpnuhs <long.itis \ar > b.ilntu <U\trsi ,M, scl| ' ' ' borlensis \idc-lur, nee unqu.un i &eni|ljrij ^hi^tna Msa \jr : forsnn spccuob

- propria est, at *O. vulgari* valde affinis. — *O. stoloniferum* Bess. — *O. orientate* Mill. Diet. no. 5.
- fi. prumaticum*: spicis frocliferis elongatis prismalici*. — *O. Heraeleoticum* Rcb. Fl. Germ. exc. 313. (non Lion.) — *O. Creticum* Linn. Spec. plant. 823. — *O. maerostachyum* Link, Handb. 468. — *O. megtutachyum* Link, Enum. pi. hort. Berol. II. 114. — *O. hirtum* Link I. c? — *O. latifolium* Mill. Diet. no. 3.
- y. hutnile*: viz semipedale glabrusculum, foliis angustionibus el spiculis parvis numerosis corymbosis. — *O. hutnile* Poir. Diet. Supplem. IV. 180. — Mill. Diet. no. 4.
3. *virent*: bracteis vii coloratis saepius pubescentibus. — IlloOr. et Link, Flor. Portug. I. 110. t. 9. — *O. oblongaium* Link, Enum. plant, hort. Berol. II. 114? — *O. thymiflorum* (*O. vulgare* *fi.*) Rcb. Fl. Germ, excurs. 313. — Ilabnat in Europa, in Africa mediterranea el io Asia media, ad >iai et sepes in syhis ruderaltis monlosisque in Scotia, Anglia, Suecia, Ilossia Europaea, Dania, Germania, Gallia, Italia, Dispania, Lusitania, Africa boreall usque ad insulas Canarieoses, in insults mediterraoeis, in Onenie et regione Tauro-Caucasica usque ad mare Caspicam, in Rosm Asiatica usque ad Jugum AKAicum el Pi re Punjal ad limites vallis Casbmenani, etiam in America scpicinonali
4. *O. NORMALE* D. Don, Prodr. fl. Nepal. 113. — Bib. I. c. — A«cendens nlllo»um: foil, pctiolatis ovatis oblusiusculis, basi cunealo-rotundalis, ulnnq. Mndib; spiculis parvis oblongis glomeratis corymboso-paniculatu; bracteis lanceolalu acutis calycem breviiier superanlibus. ^ — Caules 1-2-pedales ascedentes >illosi, apice panicolaio-ramosi. Folia longius peliolata quam in *O. vulgari* et ba*i cuneata, caeciram subconformia, utrinque villosula. Spiculae breves ovatae v. rarius elogaue lanceolatae acutae nomerosae, ad apices ramorum fasciculaio-corynboMe. Bractee aabpateotet viridea pubescentes. Calyx *O. vulgari*. Corolla minor. Stamioa (an consUolerT) IDCIMUM. — Habitat io Indue orientals montibus Himalayeoslboa, In Nepalia, Kamaon el Slrmore.
5. *O. HERACLEOTICUM* Lion. Spec. plant 823. — Btb. I. c. 336. t — Erectiu<culum glabrum r. villosum, glaodulosom: foil, breviter petiolatn oalis oblusin inigerimi4, ba»i Lite rolaodatis; panicula elongata; spiculis oblnngis elnngatis^e glomerahs, bracteis ovatis aculis tiridib. pubescentib. calycem aequantibus. ^ — Species talde ^anabilis, sed eoostanter recogno<cenda bracten |n colyce Ion-gionbiM, spiculis laxis el Ooribus pams. Caule* plerumque 1-2-pedales, rnagK minute >illo«i, nunc vero io var. *fi.*) m 3-4-polhcare« el fere glabrl. Koli* palhde nrrntia glabra v. pube^reotia, nervx saepe hi«pidulis. Spiculae numero-nae pedunculate, nunc pauciflorae oblongae, nunc •r«quipollicares. Bractee lair imbricatae, naepe deciduae, rarissime glabrae, taepius pubeseeniei. *Flort* n mlgan* dimidto mioores. Calyx aequah«, dentibu* oblutiusculis. Corolla alba. sumina plerumque exserta, inlerdum corolla subbrevis. — <>- *gtandutotum* D^f Flor All 11.27. - *O. Smyrnatum* 8m. Flor. Graec. VI. 37. L57I. (non Linn.¹ — *O. Creticum* Sieb. Pl. em. el aucl. plur. (noo Lioo.)
- fi. kumtU*: - *O. pomflorum* d'Unr. Eoum. pi. Arcbip. in Meim. Soc. Linn. P»^r-327. Habitat in regione mediterranea autrali, io Atlante prope Ma«car, io Tilabha, ad Tergesium, io montibus Graeciae baud rarum, in Archipelag⁰ (irirco, Creta, circa Smyrnam, Byiaolium el Odnsm.
- *O. LAXIFLORUM* Royle io Hook. Bol. Miic III. 376. - Bih I. c. - Caole pro-cumbvoie «illo»o; foil, brenter petiolah* late otati* oblu«is submlegerrimis, D«₁ roiuodatit, Qlrinq. viridib. pubescentib.; brarleit aruiis calyce sublongionb. v. ridib. flonbq laxissime spicalit. 4 - Folia *O. tmlgant*, %ad caule prof um De^ el prar«rrtim «pins lam oec imbriraii* ditlincta. Flores minores el J-IB fl^ |ia in *O. HerarUotro*, infenores tolilani di«lanle« Brartee v. potioa W^{ia}. |jffJ|rf<f uii rauhna %mdia el pubrteentia, patula ner imbnaia Spirulae vlx 'Di |U| | plvrmar ad apirrm rauli« incbolomo-paniculatnv — Ilalutal In 'ndra orie ||U| |
- ^ Nagkaoda in montibus Uimalayensibus.

7. 0. MAJORICUM Cnmbess. Enum. pi. Balcar 124. - Dth. I. c. — Caule laxo tomentoso, foil ellipticis pubescenlib., nonb. fasciculalis, calyce bilabiato; corolla bilabiala, labio supenore emarginato, infenore infido. 2|. — Canlis herbaceus bipedalis el ultra, teres ramosus, lomenlo laxo vestilus, folia infenora 8-10 lin. longa, 5-6 lin lala peliolala, petiolo 4-5 lin longo, supenora mullo breviora sessilm, omma ovato-elliptica, ulnnq, praesertim sublus, pilis brevissirais albidis scabnuscua Flores ad apices ramorum spicali, spicift brevissimis conglobate, sinpulac basi intructae bracica folns superioribus omnino conformi florem lubacquante - An *Thymus Rtchardi* Per*.? — Habilai la aridis insulae Baieancae Majons prope Incam

i Species duhiaie.

8. 0 PiftCTATUM Poir. Diet Suppl. IV. 180. - Bib. I. c 337. - Foil, ovato-lanceolatis punctatis glabns, capilulis Jphacncn subpubescentib , bracteis aculis calyce longionbus. 2|. — Caules erecli glabn Yam on iclragoni Folia subscribe acurainata iniegrnma, pallide vireolia nenoia, pollicem el ultra longa, puntiu parvis niKrescenlibui consperta, in var. *fi.* aogaffiora lanceolaia. Pedunculi bractes. Spiculae globotae, pin magniudlne. Bractea laoeolaue aogutue acuisimae tubpubeiccotei, calyce param loogiorei. Corolla albida, — An *O. Vera-cUolict* apcimina Jumora?

fi Folus ingustioribus lanceolalia. — Habitat....T

9. 0. VESTITUM Clarke, Trav. II. 451. - Bib. I. c. - Foil, mbcordalo-ovatii pe-uolatis iniegrnrois, ulnnq. lomenloiii mollisslmis; ipicis lubrolundo-omln pedunculatis compactis tomentosis aublernii; caole luffruicoso. 2f — IManla ramosa lomeniobo-incana. Folia nervoia, 5 lin. longa, sacpius redexa spicabo brocs, >aldc tomenlosnc, basi con>tipa(ae subternac. Calji bilabialus obo^alu^ fauce Unugmosus Corolla gracilis Rlanduloso-punclala. bi)lus oxj>crius. Stigmata reflexa — An *Majorana crautfolta*? - Habitat in Palacstina prope Cana.

10. *O. SALMFOLILM Roth ex Steud Nom. bot. 572.

+t *Species e genere excludeftdae.*

0. ABGYPTIACUM Auct. - MAJORANA CBASSIFOLIA.
 0. ABGYPTIACUM Lion. - PIIDU dabia, tiDOoymia lo Spec pi. 883. alia ad AMARACUM TOURNEFORTII, alia ad MAJOIANAM NBBVO8AM rttmoda.
 0 BENGHALKNSE Burm. — POGO8TBMON PLBCTBANTHO1DBS.
 0. CALCARATUM Juss - AMARACUS TOUBNBFOBTII.
 0. CILIATLM Willd - Planta dubia veroilmlltter ex ordlne excludeoda.
 0. CLIfitOPODIOMRS Wall. - PYCNANTHBMUM ARISTATUM.
 0 DICTAMMJS Linn « AMARACUS DICTAMNUS.
 0. FLEXIOSIM VNull. - PICNANTMEMUM LIMFOLIUM.
 O. INCANUM \Nalt. - PYCNANTMEMUM I>CANUM.
 0. I>DICLM Rolb. - POGOSTEMON PLECTRANTUOIOES.
 0 MAJORANA Lion - MAJORANA U0RTENSIS.
 0 MAJORANOIDKS Willd. - MAJORANA I10RTENSIS.
 0 MARU Sm. cl Auct. - MAJORANA MICROPIHYLLA.
 0. MARU Linn - MAJORANA CRASSIFOMA.
 O. MICROPIHULt'M Gieb - MAJORANA MICROPIHYLLA.
 0. ONITES Linn - MAJORANA ONITRS.
 0 PAIIDLM Pers - MAJORANA OMTES.
 O SM\RNAKLM Linn - MAJORANA OMTES.
 0. SYRIACI M I inn - MAJORANA NKR\OSA
 0 TOIRNKFORTII Ail - 4M\RAUS TOI R>EFORTII.
 0. ^ALLICIIAMW Uih - MAJORANA IIORTENSIS.

3009. MAJOR 4 M Much.

(Mnch Method plant. 406 — Meisn. Gencr plantar, tabular. I 284 11.193. — Dtb. Labialar gener. cl spec. 338)

1. M MICROPUYLLA Bib. I. c. — Suffruiicosa procumbens ramis tenuib. glabrusculis paniculatis; foil, pams remote pcholihs late o\alu> oblusis, basi rotundatis, ulring. albo-tomenlosi*; spiculi* subglobosis ad apices ramorum paucis subcorymbosis. 2l. — Divancalo-ramo^a, ramis purpurascntibu* lacvibus nli-fornnbus. Folia triplo rainora quam in *M horlenti*, cjclerum conformia, uinn-que cano-lomenlosa. Spiculae globo<ac paucac, in conmbos pnr<os> laxos ad apices ramorum di>posilae. Bractee caçcesque tomcnioso-ulloaae, apice dense ciliatae Corolla *M. hortensu*. — *Onganum Maru* Sibihp cl Sm I lor Grace. >I 50 I. 57J. — Bot Mag. i. 2605. — *Onganum tncrophyllum* Sieb. Pi Cret exa. — Ilabuai in Creiae monlibu* Sphacioticis
2. M HORTENSIS Mnch Meth pi. 406. — Blh 1 c — Hamis glbnbusculis racemoso-paniculati»; foil, petiolatis oblongo-otalis obtusis inlrgcrrimi*, utrmq rano-tomentoMs, spiculis oblongis in ramulis glomeratis sessilibus 2|. el O — < aules m borlis noslris saepe annui, in fngidarus v in locis nalahbus perenncs, basi suffruticosi Rami dun pedals sesquipedalesve tetragoni pubescentcs, parum ramosl. Folia semipollicana. Spiculae 3-5, subsessiles ad apices caulis et ramulorum axillanum, oblongac tomenloso-villosae. Bractee cl caljres romplanaiaa, arcie imbricatae. Corollae parvae purpurascntes v albac. — \ariolns* in horns boU-mci!> occurnt huic babitu simillima, at diver>a caljubus ul in *Ongams* 5-citniatis, sed complanati^ el bractels imbricati^ ul in *Majomna*, \ero>imililer bjbrida bor>ensil!>. - *Onganum ileraeleoticum* Hurl. — *Origanum annifoUum* Wallrlb. — *Onganum Majorana* Lino. Spec, plant. 824. — *Origanum majoranonles* Nil Id-Spec pi. III. 137. - *Ori^mmm WaUduanum* Bin^ in Nail. Plant. Atiat. rar I. 31. — *Mmj&rana* croat* U%tk. IUib. pi. 400? - *Origanum Outlet* Lam. Did. IV. 008. ei DC Fl. Fr. III. Mfl. (non Linn.) — Habitat in Africa mediterranea el Asia media, in collibus ineoltia prope Mascar, in alpibus k.imaonciMbu> Indiae orion-tahs_T in horto frequentissime culla et talde >amlnh>
- 3 M (IMSSIIOM1 Bib I c 3J0 — Ramis to men tell is racomoso-paniculatis; foil-
sessilib o\ato-tllip(ici> crasMs molliter lomentosis spiruhs oblnn^is in ramuh*
glomeratis rrsilibui 2|. Q^ — Habitus 3l h >rlcntu, a qua diffort Mm ^e^ililbul
muj. ribus rrasM>, ulnnque uli cal>cr> cl braricae tltmse tomenloso-lanalii- ""
Onganum llaru Linn Spec pi ^i> non alior » — *Origanum icgyphacum* Au&
non I inn Habitat in Ononle, in Palae>iina d in (rria
- 4 M >KH\OSA Bib. I c - Krecia raniM painitim pilonin paniculate; foil. 300-
^ I b late otati< fubiotegemmit, ba>i rolundjio-irunralift v infrnorib. «ubcar-
d tits, ulring. villosi*; ipiculit oblongi» pirth in ramulin glomerallf iessillbu**
~4 — ПИИИИИ If hortetuu, at paairula magx di\ancata el ramosa Caulif ere<^us
pedalm lolu «emipollicaria v inferiora lubpollirana, b.m <ubrordata, loW>.
M. Omlu Spirulae nutnerotac mmorr< rl di>tinrtiuo< quam in V. kort****^
Calyces rt brat irae *M Omlu*. i orollae parum majorr*, staminibus ex*rtti>- ^
Origanum Synfum I inn spec plantar. Hil^ O *Indicum lalarhemh* i^P
^i>l PI Aeg 31. ic 31 - Habitat in Arabiar prnin<ula Guinea cl in Arg>P<^^
3 M OMTr.s Bib I r t I aule errrio »ub*im|ilin hir^uio. Ml »c*«nk< oy-
«ub<err4dt %illotuli< lomento*i>tc, »piculi< p.ir<i< o\«uln% numern>i< dens
rymbotit ^ - (aulc< erceli prdafc<. %iroplic% » rarissime su ra^bm*^
l<onqia jiatrntibut biuuti Folia trmipnllicina, bi*i *sepissime cordata enosa
subrugosa, nunc ad venas Unlum pdbr<renlia, nunc utrmqur tomentoso-villosa.
Spiculae nuni^roti%<iniae, in eorjmbum lrrrminalem frrr pUn<im, 2-3 poll. dia-
mciro •Ji<po>iUc oblongae, 3-6 Im longae %ill.i*i^imar <dyres et bracteo
quadrifjnam imbriraii Corolla *M kurlensu* > p mlln iinj<or On\$*m \$myr-
l »nn spec pt »14 - Hiblhrp cl hm Fl Itrarr \ I o I <2 - on^!!!r cd <e>
%a*um Lion Spec plaot tti. - *Onganum pallulum* Dc>f Cat borl i^ <

305. — Habitat in regione mediterranea orientali, in Dalmalia, in Graecia australi insulisque circumjacenlibus, in collibus pelrosis Aslypalaeae, Leri, Sami etc, in Creta, Smyrna et Troade.
6. M. TURBINATA Vogel, Beiträge etc. 11. — Rarais lenuilerlomentosis, foil, petiolatis ovalib. obiusis inlegns, uinnq. cincrclo-lomenlosis; spicis ternis terminalib. quadrangularib. ovalib., lateralib. pedunculatis; calyce turbinato, labio supenore fere eraarginato, inferiorc brevissimo obtuse denlato. % — Habitat ?
7. II. OREJA Vogel I. c. 12. — Ramis tenuiler pilosis; foil, petiolalis ovalis subserralis, ulnnq. lenuiler pubescenlib.; spicis elongalis in ramorum apice ternis pedunculais; calyce supra profunde tridentalo, anlice fisso. 2l. — Crescil ?
8. M. NEGLECTA Vogel I. c. 19. f — Magis minusve pilosa: foil, superiorib. subsessilib. ovalis subserralis; spicis aggregalis; bracteis inlus calycibq. saepc glandulosis, deniib. caljcinis bre*issimis. 2l. — *Origanum Onitet* Willd. Urb. no. 10078. — Crescil in insula Greta.

3010. THYMUS Linn.

(Linn. Gener. plantar. 727. eicl. spec. plur. — Meiin. Gener. plantar, vascular. I. 884. II. 103. — Blh. Labiaiar. gener. et spec. 340.)

Seetto L MASTICHIA BUL L e. 84L

- Denies calycini omnes subulall. — Beello geeri *Byttropogoni* valde affinis.
1. Tn. MASTICHINA Linn. Spec. plant 887. — Blh. 1. c. t — Bolts. Voyage bot. dans le midi de l'Esp. 487. no. 1308. t — Diffusus ramosas pallide vireas v. canescens: foil, petiolalis ovalis oblonglsve obiusis, basl angustalis nudis plants, supenorib. floralibq. latiorib.; calycib. villosis, denlib. omnlb. subulatis plumosis, tubo longionbus. 2l. — Suffrutex polius diffusus v. ascendens quam pmcumhcns. Folia 2-5-lineana, margine saepc Innc inde denliculo notata, juniora utnnque canoscentia. Verlicillnsin pauci, omnes v. supenores in capitula globnsa terminalia approximali. Bracioac minutac. Pedicelli brexcs. Caljces fruciifcn nutantes, labio supenore lato piano, denies basi lanceolali, in selasriRidas uh lanniae labii infenom produci el dense tnotiilerque ciliali, ila ul capilulum molliter plumosum videatur. Corolla albida, plerumque dentibus calycims brevlor, ranus longtor. — *Th. diatut* Mnch. ex Sleud. Norn. boi. 835. (edit 1.) — *IVaortoa-num* Clus. Hlsl. pltot. 35X Ic f.
- fi. micranthut* Bolts. I. e. — Magit protratat, caplinU minors, dlaaelro *PUI*, calycis multo minoris o>nlet tubum aequanlet aol eom vis superanlet. — *Th. tomen(o\$ut* Willd.? — *Th. marifolius* Ponrr. — *Th. Alwiormdux* Léon Duf. mts. — Habitat in Hispaniae, Lusllanae el Barbarlae prope Mascar el Tlemsen Incullis el arcnosis.
2. Til. TOMENTOSUS Willd. Enumer. pi. hort. Berol. II. 090? - Btb. I. c. - Diffusus ramosus canescens: foil, vii petiolalis ovatis obloogisve obtutii, baii angustalis nudis planin, Junionb. cano-lomenlosf*, floralib. lale ovalis subimbricatis; calycib. villosissimis, dentib. omnib. subulalis plunosis tubo broionbu*. % — A *Th. Mastichina* sails dislinctus videtur calycibus el inflorenrenia. Cnpi- lula parva numerosa subglobosa. — *Th. marifolius* Pourr. el Willd. I. c. — *Th. ehngatui* Link, Enum. pi. II. 118. — llablal In Uispania in Algarbia.
- SecUo U. 8BBPILLUM BtlL L e. 342.
- Denies caljcioi superiores lanceolali. Folia Ooralia caulinis nubconcolora.
- J. TH. HIRTLS Willd. Enumer. plant, hort. Berol. 023. - Boi»s. Voyage bot. dans le midi de l'Esp. 488. no. 1JII. f I- 128. — Tolas magis minutte adpr»w hiriun: caulib. suffruicosis procumbeniib. aui saepius erecus; foil, ad oxilh* fa»cicul«hi magis minusve r«oluii«» lanceolalis aul saepius lineanb.; «ericiillakin» in rapi- luU icrminalia densa rotunda aul oblonga, ranus basi inlerrupta agRlomrraii< bracteis ovalis arutm, m.irgine re\o|ulis llorosque suprraiilib; caUcn Milt«cauilib; albo-ctliati parlc mferiori *aldr Inrsula, labio »upi*riori ad mcduim iridrnna lo, dentibus lanceolalis acuiis, labio infenori avquali bidvntatu, drntibu% »ubuUt^

- a. *legitimus* Boiss. 1. c. — Caules procumbentes. Folia fere eglandulosa, inferiora linear-lanceolata subrevoluta. Capitula oblongo-cylindrica, basi interrupta, et terlicillaribus approximatis constantia. Corolla rosea. — *Th. Willde-
noicii* Boiss. Elench. pi. nov. U^l*pan. no. 158. — *Thymum saxatile ex monte
Calpe* Tourn. Herb.
3. *intermedius* Boiss. 1. c. — Folia valde revoluta glandulosa, corolla alba, caules humiles procumbentes, capitula cylindrica subinterrupta.
- y. *capitatus* Boiss. 1. c. — Caules erecti magis lignosi, folia valde glandulosa cum comolula, omnia linearia. Capitula subrotunda densissima. Corolla alba. — *Th. diffusus* Boiss. lib. et mss. n. Seg. u.
- d. *erianthus* Boiss. 1. c. p. 480. — Caules erecti et capitula globosa densa, sed flores paulo minores calycibus birsuissimis. — Crescit in rupestribus regionibus calidae et subalpinae Hispaniae australis et in regno Murcico et Granalensi.
4. *Til. LUSITANICUS* Boiss. 1. c. p. 489. f. I. 130. fig. A. — Suffruticosus caespitosus: caulibus erectis simplicibus foliosis (3-5 pollices longis), parte inferiori glabrescentibus, superiori breviter pubescentibus; folia fascicularia acicularibus rigidis acutis, valde revolutis glanduloso-punctatis, basi longe albo-ciliatis, caeliculorum glabris nervis, sub lente brevissime scabridis; capitulis densis rotatis, rostratis nudi-
ci» *Aiellanae*; bracteis magnis calycibus superantibus ovatis, parte superiori aliena-
lis acutis, facie exteriori albo-pilosis; calycibus breviter him labio superiore la-
tis» & imo brevis hinc tendens laeo, dentibus acutis, inferioribus ad basin usque in dies
nervosis; corolla alba. ^ — *Th. rillotii* Gulhenik. — Crescit in Lusitania.
5. *TH. CAHNOSI'S* Boiss. 1. c. p. 400. t. t. 130 fig. B. - Suffruticosus: caulibus basi procumbentibus, deinde erectis, pubescentia alba brevissima pruinosis; folia minimis fasciculatis valde revolutis carnosius subtetralibus oblongis obtusius glanduloso-punctatis glabrescentibus; capitulis densis rotatis; bracteis ovalibus calycibus superantibus, margine valde revolutis, eilote raris nervosis binellis, inus crebre glanduloso-punctatis; calycibus hinc labio superiori vix ad medium usque iridatis, dentibus acutis, margine revolutis, intermedio saepe brevioribus, inferioribus ad basin usque in dies scabridis; corolla alba. ^ — (Crescit circa Olymponem in Lusitania.
6. *TH. YLIDARIS* Linn. Spec. plant. 825. - Bth. 1. c. 342. (cxrl. s)non. t - Boiss. 1. r. no. 1909 - Krcrtin \. basi procumbens cano-pubescentibus: folia sessilibus linearibus lanceolatis acutis, margine rotatis, 3d axillas fascicularibus, floralibus linearibus oblongis; terlicillaribus laevibus subdissectis; calycibus labio superiori dentibus linearibus, inferioribus laciniis subulatis ciliatis*. x> — Fruticulus semipendulis ramosissimus, lomento >. pubescentia brevi cano. Folia 3-4 linearibus scruis ramosis distantibus, at in axillis ramulorum aborlimentibus fasciculis. \< rterillasiri supremi v. omnes in capitulum terminate laeo approximatis, interduo 2-4 inferiores laxo 90-flori remoti. Bractea minulae. Flores Th, Srrpylnt * > arpiu < minore v. Stamina nunc et > erla nunc inclusa et tunc tunc aborliva, corollae minoris. — *Th. glonduioius* Lag. mss. - Habitat in Europa autro-occidentalis sicut in Andalusia, in Lusitania, Hispania, Gallia australi, tunc in Australia, illa a Prdmontio ad regnum Napolitanum, in (irarcia monlosis.
7. *TH. TFMIFOLIIS* Will. Diet. no. a. - Boiss. 1. c. no. 1110 | t. 137. - Bih^J-c. 7^ . Krectus v. basi procumbens: ramis pubescentibus; MI sessilibus linearibus subulatis amplexibus margine revolutis, ad axillas fascicularibus glandulosis toralibus lanceolatis oblongis, terlicillaribus dimantibus. calycibus laciniis superioribus ovatis, inferioribus laciniis subulatis. j A TH ruhjart differt praecipuo tenuioribus ttridibus glabris v. MI subtus lenit rano-pubescentibus.
- a. *granus* Boiss. 1. c. fig. A. - Caulis simplicissimus. \ rrtinllasiri oinnes sile < numrrouores, minus flonbundi. t^ rftl
fi. *florthumdu* BOISS. 1. e. 8*. B. — Yerticillata mformis »aep« >. | o o g | or. • ulTulii, omnes majoribus mulliflori. Flores subrotati. Calyx P^a^ I o def#
Corolla major magisque eiterata. — In Hispania australi prope u*

8. TU. DIFFUSUS Salim. Pl. exs. ex Bih. 1. c. 342. — Procumbens: ramis flonferis ascendentib. cano-pubescentib.; foil, sessilib. linearib. >. lanceolalo-linearib., ad axillas fasciculais, margine revolutis nudis, uinnq. cano-tomenlosn, florahb. conformib.; vcriicillasins in capitula oblonga approximate; calycis labu superioris dentib. lanccolalis aculis, mfcnoris lacinns longe subulalis. 2|. — Habitus *Th. angustifolu.* Folia *Th. vulgaru.* An hujus vanctas? — *Th. adseendetii* Bernh.? ex Rchb. Fl Germ. exc. 313.
- .3. *pubescent* B. Webb, Her Hispan. p. 21. — Habitat in llispaniae monle Gibralianco.
9. TH. DECUSSATI S Blh. I c. — Ercllus: caulib. ramosissimis pubccentib.; foil, sessilib. o\atis. obtusis, marine revolutis lcnuitcr tomentosus, ramorum stentium decuman*, iloralib. conormib.; terlicilla»riH pauciflons capitellalis; culjris labu superions dentib. bre\ib. o\alis, infenons lacinns subulalis ciliali*. ;j. — Fruticulus ramosissiraus, ramis vetenbus subspinescentibu*. Folia 1-J-lincana, ramorum fertiliun parum remoia, iierillium decussailm approximala, nec in axillis fasciculala. Verticillastru ad apices ramoram paud 2-4-flori. Caljces »ubsc»»iles pubescenies. Denies labii tuperioris brevissimi oblusl. Corolla parva. — Cre>cit In Arabiae deserlo Sinaioo.
10. TH. BOVEI Bib. I. c — Brectos: ramis rigldls slrlcils villostis; foil, breviter peiolalls ovalis oblusis planiuseullis, margine peliollsq. snbciliaiis, Ooralib. conformtb. adressis; verlicillasiris paucifloria spicalis; calycis labio anperiore maximo bri'Micr Indentalo, inferiors laciniis subulalis cilialis. 5 — Fruticulus basi ramosissimus ercllus 0-9-pollicans. Folia fere *Th. Piprrellae.* Verticillasiri subexdon, infciores parum dmianles, supenores in Hpicam pollicarem drnsam approximati Caljces j>uhsessiles MIOMJII crecii adpr>>si >. maiun subnutaiile*>. Corolla *Th. Scrpylh.* — Habitat in dscrlo inter Suez rl (ia/a.
11. TH. PIPKRKLLA Linn. S>sl. 4'>l fnon All.) - Blh. 1 c. 34). - SuffTrulico«us procumbens: ramis adscndeniib ngidis pubceniib., foil peliolalis late o\atu obtusii, basi Iruncato-subordalis non cilialis crassis ngidis ^rnosis glandiilnsis, floraiib. conformib.; calycib. glabriusculia, labil superiors deuiib. brevib. o atis lorerioria ladnfls lubul.Ut cilialis. % — Afflols IX *SerpyUo.* DittiDfollnr ramis ngidis minus diffusis, foliis cratslor^us, baal roiondaUs, lofeHorlbus aobcordatis. Verlicillasiri laxi subsexOorl, versos apcea ramoram 3-4 approximate Calyces majores quara in *Th. Serpyllo.* Corolla calycem paollo exoedeos. Stamina Includa. — *Th. graveolent* Sibih. el Sm. Flor. Graee. VI. 01. t 576. non M. Bieb. - Habitat in regione modilerranea australiore in collibus Incultis Barbanae, in llispaniac raontanis prope BuRol in rcgno Valentino ei monle Paroasso.
12. TH. nERBABARONA Lois. Flor. Gall. 300. t. 0 - Blh. I. c. 343. el 720. - Procumbens glaber: ramis flonfens breviier ad»rendentib.; foil, breviier peliolails ovaio-lanceolalis aculis, basi rolundatis subciliatis, floralib. subconformibus; caljcis labu superiora dentib. brevib. lanceolaiis, infenons laciniis subulalis ciltaii* ^ . — Vix ac no vix quidem a *Th. Scrpyllo* dislincius folio rum forma el habilu laxiore. — *Th. affinit* Sieb. Pl. exsicc. — *Th. lueidut* Guss. Prodr. fl. Sicul. Suppl. 189? — Habitat in Corsica.
13. TH. SERPYLLUM Linn. Spec, plantar. 825. - Honk. Flor. Lond. III. c. iron. — Sm. Engl. Bol. t. 1514. — Blh. I. c. f — Suffruticosus p̄rocumbent r, inns flonfens bre\iler adscndentib.; foil, breviter petiolaiis o\alis, basi anRiistai,» cuneaiis rotundali<le venoiu, margine petlolisq magis mmus\p nliaiis floralib. subconformib, coljcis labu superiors dentib brpub lanrrolalo-ò\ah< infononi lacinns Mibulnlis cilialis ^ — Caulr* bæ%â lignum ramo^ifgimi, Monò usque ad pedem el ultra Hongjii, rami nonferi plvrumqup \i< I-2-pnllirârcs, ranus, praeserlim in \ar ft, 4-0-pollicaros, sao>iu> glabri, nunnr ,,r0 pubescenies \ ^MIOM Folia 2-4 lineas longa obiu*j \ r-in^im<* afijjnu-cula, basi saepissime anguslala el nlus ulnnqur 2-0 dnnaia, in »ar ,9 lanium

basi rotundata, at in hac majora obtusissima nee cordata, glabra v. villosa, floralia minora cl breviora, caeterum conformia v. racissime parum laliora. Verlicillasln 6—12-flon, plerumque pauci in capitulum terminate oblongum approximat, nunc numcrosi, infcnores v. interdum omnes remoli. Pedicelli erecii, basi bractea minuta aucli. Calyces fructiferi nulantes oiati, lubo campanulato 13-stnato, labio supenore late ovato piano subreflexo, apice broviter tndentato, infenore ex lacinns 2 subulatis cilialis constanle. Faux intus pilis numerosis clausa. Corolla calyccm breviter supcrans v. praesertim in floribu* focmineis dentibus caljcinis brevior, purpurea ranas alba, extus glabriu<cula. Stamina nunc exserla, nunc inclusa, et tune saepius aborlita. Stilus saepissime ex<ortus. — *Th. exterent* et *Th. includent* Ebrh. Arbr. 158.

a. *vulgarit*: foliis minoribus, venis valde prominentibus*. — *Th. tyvestrit* Schreb. et ex Reichb. Flor. Germ, excurs. 313. — *Th. ngtdut* Reichb. — *Th. humifutut* Bernh. ex Reichb. I. c. 312. — *Th. ntrtodurut* Schreb. ex Link, Enum. pi. hort. Berol. II. 115. (exempl. elongala pamfiora) — *Th. tubcilralut* Schreb. ex Reichb. Fl. Germ, excurs. 313. — *Th. etlraiat* Dumort. Florul. Belg. 47. - *Th. lanuginotut* Schkuhr, llandb. II. t. IG4 (exempl. ullosa) - *Th. colhnut* M. Bieb. Fl. Taur. Caucas. III. 401 (exempl. folns anpustionbus.) — *Th. effutut* Host, Fl. Auslr. II. 137. — *Th. proeerut* Opi/. - *Th. Kollmunzerianut* Opiz. — *Th. Sudelicut* Opiz ex Reichb. Fl. Germ, etnirs. *Sll.* — *Th. trrrratut* Opiz ex Reichb. I. c — *Th. laevigalut* Vahl, Mmb. bot. II 65. (Folia cunealo-oblonga nee lineana.) — *Th. arenanut* llernh ex Reichb. I. r. 312. — *Th. melittoidet* Fi>ch. ex Herb. plur. — *Th. decumbent* Bernh. ex Reichb. I. c. 313. - *Th. glabratut* Schull. ex Reichb. I. c. an Link? - *Th. deflexut* Lej. ex Reichb. I. c. 312. — *Th. glaber* Mill. Diet. no. 6.

fi. *moniamut*: foliis majoribus mioos rlgidis. — *Th. montanut* WaldsL el Kit* Plant rar. Bung. 1. 72. L 71. — TIL *ekamatdryt* Fries, Nov. flor. Suec. (ed. 1.) 35. (ed. 2.) 107. — *Th. puUgioidet* Reichb. Fl. Germ, excurs. 313. — Linn. Spec. pi. (ed. I.) 502. (exempl. erecuora ngidiora.) — *Cuntla thymoulet* Linn. Spec. pi. 31. — *lledema thymoidet* Pers. Enchir. II. 111. — *Ziztphoia thymoidet* Hoem. cl •tichult. S)*t. icgol. I. 209 — *Th. nummulanu** Br>b Fl. Taur* (vnr. II .W. — Bot. M<ig. t. 2666. exempl folns m.ijonbus Ijtiorihus.) — *Th. Pseudnserpyllum* Reichb. — *Th. majoranaefohus* |>c*f Cat. horl. Par. 74. — l'oir Dirt Suppl. V. 100. - *Th. oiaturViM.* Din n 7 - Habitat in Europa toli o(Asia scpienlrionali, a in sirris aprrlis, ,i. m monl.ims prae<erliro au-siralioribu* m Scotia, Anglia, Surru, l.ippoma, D.IMALJ, Germama, **Gallia**, HiHp.inia, li.iha, Graeciac monlibui, HOSMI Kuropaca usque ad Petropolim* in roffionr Tauro-Caucanci el O<pica, in jugo Altairo el llimala)ao ad Sioi' lah et T.hoor.

14. TH HKTKROTRICIIItS Gmeb. Spinlrg. flor Rumel. II. 116. | - Ranis as-cendeniib puberulu; foil, linean-lanceolatm oblusiusculi< dulanlib.. in a|iH* fatrirulaiM, plani< glabru, infra medium ciliatis; brarteis ronformib; c<hci> P<loti Ubio luprrion ad medium Iriflido eju<q lacinin lanreolalo-acuminaiis seto<o-eiitiit, corolla pallide violacra. 5 — Oescil in monte Atho.
15. TH A>GtSTIFOLII S Pen. Enchmd. II. 110 - Blh I. c 344. el 720 - B. **Webb**, lirr Hispanic. 21 |t|e| tanei; — \$u(Truliro>ut procumbent rami* llorifen^bre-<Her ad%rendeniib glabn< v. pube<cenub, foil, bretiler petiolaiis oblo<no-ll- D<<<nb, ba>i angu*lati< %eno<is, margme peiol^q nliaii*. floralib >ubconfor<mb> calynb plvromq glabn<, Ubu *uprrion< dfiihb bretib lanreolalo-o>aus, nfe Horn l'aciniit <ubul<ti< ciliatit. 4 - A *Th Serpyllo* non differl nisi fol>>> * n g u n. Htionbui An rorra %anria<^9 Varial raulr folnsqur sarpius glaberrim*. ''^ n g nunquam pubr<crnlibu< villoti>que. — *Th anrulans* Wald*1 el Kit- P< II. 157 i. 147 *Th eaetp<thhut* Link el lloffm Fl Porl I t 1*1 — •'• t. byt Lot.< i || - *Th repent* link n lloffro Fl Porl * *Th odoratit**'*** M. roj r [FItaur CJUC III 40) rtrmpl rrliaia)- *Th tptnulntut* Ten. Fl • **2'? ^pl >. - *Th. mteant* Lowe, Primit. flor Uadcrent. 10 — *Thymbra c%lt*i** Ten. H. • -

- prodr. Suppl II 09. ex ejusd Syll n. Neap. 260. (non Linn) — *Thymus nervosus* Gay PI exs. un Uin — *Th. Zygis* Linn. Spec. pi. 026. et Aucl. plur. - *Th. vanabitt* Link et Hoffm Fl Port I 1.17. - *Th. ahatui* Lam Fl. Fr. II. 392. - I*. *albidus* Opiz in Dot 7eil 1824 II. 526' - *Th. inodorus* LeJ ex Dumort. Florul. Belg 47 — Habitat in Europa praesertim australiori et in Asia media, in collibus incultis MCCS andis et ad vias in Lusitania, Hispania, Gallia australi, Germania australi, Italia, Graeciae montibus, circa Byzantium et in monte Bougourlou, in regione Tauro-Caucasica et Allacica, etiam in insulis Madera et Azoncis
- fi* NKY \DITNSIS Bois* >ojage bol. dans le midi de l'Esp. 490. no 1313 - Suffruticosus* procumbens, rami floriferi ascendentes bibrachiales glabrescentes, folia inferna imbricata convoluta, floralia longiora obovata superantia lanceolata, omnia hirtella crebre punctato-glandulosa, basin >ersus< ciliata, caputula rotunda, calycis exclusi glabri, inclusi lanati densius lanati superioribus lanceolatis glabri, inferioribus subulatis ciliatis. Corolla rosea glabra. — *Th. scryphaloides* Bory, Fl. Sierra Nevada. no. 154. et Ann. gener. 111. 18. — Bih. Labiat gen. ci spec 729. — Bolss. Elench no. 150. — In Hispania australiori
10. TH. PANNONICUS All. Fl. Ped. 1.20. — Bib. I. c 345. — Suffruticosus procumbens ramis floriferis ascendens villosis; foliis breviter pellucidis linearibus T. in Tenore b. oblongis, basi angustatis venosis, marginibus peliolatis ciliatis, floralibus subconformibus, calycibus villosis, lobis superioribus denatis brevibus lanceolato-ovatis, inferioribus lacinis subulatis ciliatis 2. — A *Th. angustifolia* tunc differt ramis Pannonicis longioribus cretioribus villosis et foliis duplo longioribus — *Th. Marchalianus* Willd Spec plant III 141 — *Th. glabrescens* non Linn. et Link, Fl Port I 110 t 15* - *Th. Zygis* Pall Nov act Pelop X 313 (non Linn) - *Th. ascendens* Bernh • in Link, Knum pi hort Borol II 115* — *Th. odoratus* Mill Diet n 8 et Aurt plur — *Th. iustnacus* Bernh cl ex Reichh Fl Germ exc 312 — *Th. pithgerus* Opiz ex Reichh Fl dorm exc 313 — Habitat in montibus Europae australioris et Asiae mediae in Alpibus Pannonicis, Germania australi, Hungaria, Podolia, regione Tauro-Caucasica, Caspica et Allacica.
17. TH. COMPTUS Fnv Flora XIX. 420. - Fruticosa: caulis pluribus ascendens albo-pubescentibus, foliis lineari-subulatis recurvis vili pangenibus dilatis, verticillatis densis subglobosis albo-tilliosis, supremis approximatis; calycis denatis subaequalibus subulatis pecunia-ciliatis corolla parva purpurea minoribus, bracteis lanceolatis, basi dilatis nervosis. ty — [Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II 118] — Oescil in Kumelia
18. TH. ZYGIOIDES Griseb Spicileg flor Rumel. II 118 f — Truncus radicans, ramis scissis erectis pilosis, foliis spathulatis linearibus, basi longe attenuatis ciliatis subsessilibus glabris plants, imis brevioribus imbricatis; bracteis difformibus ovalo-lanceolatis ovalibus obtusis; verticillatis capitatis; calycis pubescentibus labio superiori breviter indentato, denatis ovalo-triangularibus acutis, inferioribus segmentis quadruplo brevioribus, his pectinato-ciliatis, corolla alba breviter exserta — Crescit in campis et pascuis Thraciae calidae.
19. TH. SIBTHURPI Bih I c — Caule basi procumbente ramoso, ramis erectis glabris, foliis subsessilibus oblongo-linearibus glabris nervosis, obovatis conformibus, lobis numerosis pennis subspicatis, calycibus villosis, lobis superioribus denatis lanceolatis acutissimis, inferioribus lacinis subulatis 2. - Suffrutex aemipeda. Folia 6-0 lineas longa, laeviora quam in *Th. Marchaliano* glabra nigra, nec ut in *Th. lanceolato* molliter >illo>a Verticillatis 2-0-non in spirula* laxas pollinibus approximatis Folia floralia ||| calyce longiora < calyce* subvirescentes < corolla MX nullo modo excedens Stamina raris — *Th. lanceolatus* Sibth et Sm Prodr II dract I 411 non Denf) — In Graecia montibus
20. TH. LAMCOI Alls Desf 11 t II M) t 12* non Sm - Bih I r - suffruticosus erectus molliter >illo>u> foliis subsessilibus ovatis lanceolatis obtusis,

basi rotundato-cuneatis venosis molliter pubescenlib., floralib. conformib.; racemis densis secundis; calycis villosi nulanlis denlib. labii superioris otalis acutis. 6 — Fraiculus 0-8-pollicaris erectus, basi ramosissimus. Folia fere pollicaria. Spica 2-3-pollicaris teres secunda. Calycis labii infenoris lacimac subulalae, supenoris dentes ovati nee sabulali, ut vult Dcsf. — llabitai in Africa borcali in Allanie prope Tlemsen.

SI. Til. LIMEARIS Bib. in Wall. Plant. Asiatic, rar. I. 31. et Labial, gener. et spec 340. — Procumbens: ramis floriferis breviler adscendentib; Toll broiler peliolatis oblongo-linearib., basi angustalis tenosis, margine petiolisq. ciliatis floralib. ovatis, basi rotundalis subimbricalis; calycib. glbnuscus, labn supenoris dentib. brevib. lanceolalo-ovalis, inferioris laciniis subulais ciliaiis. C. — A *Th. Pan'' noniei* varictalibus glabriorfbug nonnisi babilu laxiore el folns floralibus differl. An ejus Yarielas? v. cam *Th. Uerbabarona, angustifolio, Pannonico* e(*Stbthorpii* ad *TIL SerpyUum* referendus? — Habitat in India onentali in regi<nis flimalajensis moniibus Kamaonensibus.

22 TH. BRACTEOSI'S Visiani mas. ei Bth. Labiat. gener. cl spec. 340. - Visiani, Flor. Dalmatic. I. I. 20. (absq. descriplione. — Procumbens: ramis floriferis adscendenhb.; roll, peliolatis oblongis, basi angustalis planis veno<is, marine petiolisq. superiorum ciliatis, floralib. sessilib. late rotundato-cordalis imbncaits ciliatu; calycib. ullosis, labii superioris denlib. bretib. otalo-lanceolalu, inferioris lacimis fubulalis ciliaiis. ^ — Habitus el folia caulina *Th. linearis*, a quo folns floralibus dislinclissimus esl, a *Th. striato* foliorum forma rt liabitu laxiore differt. An ejus var? — Habitat in Dalmatia.

83. TU. STHIATUS Vahl, Sjrob. bot. I. 18? - Bth. I. c. - Procumbens: ramis floriferis adtceudeollb. pobetcenlib.; roll, labaestlllb. lineanb. ngidit, basi angastatii glabrls ciliatis, floralib. Utc eordalo-ovatii strialis calycibq. pubescentib. in capilulum oblongom arcle approximalis subimbricalis. 5 — llabiiut *Th. angutUfolii*, ai folia longiora rigidiora et inflorescentia ditinclissima. Folia floralia nuida \p-nos.i, margioe ciliata. — *Th. Zygit* Sibtb. el Sm. Fl. Gr. VI. 60. t. 574. 'non Linn.) — Habitat in Europa australiore, Gibrallanar, in repno Napolitano, (iraecia.

34. TH IfRS' TIS M. Bieb Fl. Taur. Cauc. II. 50. ft III 4W? - Ilih. I. c. - Pro-niiuhons ramis florifen* adtcendenhb rano-puhsrenlib.; foil. »e%<lib. liearib.» ad atillas subf.iHCiculi<t, margine plani< nhalis, ulrrrj. rano-timenlosis, flora* lib lilionl). flonbq. in rapitulum oblonpum arcle appronmatis. ^ — Habitus I^{7*} lit/fust, anguMttfnlu, itnah rl tiUott, a duobu< pnonbu< dilfcit foil is floralibo* laiiionbut, a *Th. strtato* villonlale, at a *Th tilloso* Mm floralibus iniogerrioiis rano-pubr<rentibus. — *Th. vulgari* Sibih. rl Sm. Fl. Graec. prodr. I. 41ft f¹⁰⁰ Linn) — Habitat in Graecnae monlosis el in Tauna.

45 TH \II.I.OSIS Linn. Sper. plant 8i7. -- Sibtbrp. el Sm. Fl<r. Graec. VI. ©. I. 578 - Bth. I. c. 347. - Suffrulosos procumbent: rami> broib. birsullotc** lis; foil, oblongo-linranb. plamusculis, margine nliatis, floralib. oblongo-1*0, ceolatit, apicr »rrrati< ralyribq. coioraiis. vrrlicillatris pauriflons appronmal ia. 5 - Habitus *Tkymt amguslifolii*, a quo differ I fnim majrin ciliati* et praeserti cal>ribui dupio majnnbu< folntque Ooralibut, ul in *Thymbra tpicata* coloralif it. apicr <jfpi<ftime drntibu< 2-3 arulit noiatit. Vfriicilla<in laii nff imbricJ tti. Corollae \n raljcein eicfdentrt Habitat in ArchtpHagi Garri irnulil.

96. TU. CAPITELLATI'S Iloffm. el link, Flor Port I i. 12. - Bib I. e. - P r a l i A sut caoesceos- foil laocrolatit oblunt, margmr rc>olutit, tubiut cano-lo» ^ ton*, floralib. tubimbricalis late o%ali< c*!>rr* tuprranlib.: »ertinlla<IHi ^ flont in rapiuila globota tprminalia aggr(jii<- % - Sprnet iolloryv ^ ditliortutima Habilut el folia caulisa frrr *Th vulgari* Horum C«P»^{da} deo. SBorotiMima, fcrr <>rtga*t M*ru. nagmtudinr p%ia «:(l)ret part* Se»^s U** j.-Dja Ubus bretibus patrmibu<. Corolla HI raljre longior. - Habitat in ttti s trans Tagua prope Lisboam, to Algarbia.

27. TH. ISTMIDICIS Dcsf. Fl. All. II. 29?*) - Blh. I. c.-Ereclus v. basi procura-
bens: ramis cano-pubescentib.; Toll, sessilib. oblongo-linearib. spaibulatisve
parvis fasciculatis plantis glabris subciliaris, floralib. imbricanlib., basi latissimis;
verticillasiris in capilulum parvum globosum arcle approximalis; calycib. villosis,
labii superioris deniib. lanceolatis aculis, inferioris laciniis subulalis. 6 — Habi-
tus *Th. vulgaris* a quo differt foliis brevioribus glabris, plaois v. complicatis,
nec margine revolutis, et praesertim inflorescentia. Capilula vii piso majora
hirsuta. Folia floralia exteriora basi latissima (lores amplectentia, in apicem
oblongum obtusum producta, interiora calycibus subbreviora. — Habitat in Uis-
pania, in Barbaria prope La Calle.
28. TH. PUNCTATIS Visiani, Illustrat. di ale piante 7. "M- 2. »' I. - Pumilus
fruticulosus creclus glanduloso-punctatus: cauliculis cano-pubescentib.; foil,
ovalo-oblongis bracteisque laevibus ovalis subrhombicis nervosis oblongis plantis gla-
briusculis, basi ciliaris subsessilib.; florib. spicalo-capitalis terminalibus; calycis
bilabialis glabriusculi dentibus longe ciliaris bracteis corollamque subaequantibus, su-
perioribus lanceolatis, inferioribus subulalis, fauce villosis; sUminibus inclusis. } —
Circa Angoram ad Mare nigrum.
20. TH. CUERLERIOIDES Vitiani I. c. 8. f — Pumilus caespitosus: cauliculis suf-
fruticulosus effusus gracilib; foil fasciculatis linearibus oblongis pubescentibus, mar-
gine revolutis ciliaris, basi planis sessilib., floralibus.....; floribus tubis spicalo-capitalis;
calycibus pubescentibus, fauce villosis, deorsum adscendentibus acumine ciliaris,
superioribus lanceolatis, inferioribus linearibus. % — In monte Ida in Bithynia.
30. TH. HISPAMGUS Poir. Diet. VII. 040. — Blh. I. c. — Fruticulosus subereclus:
foil, linearibus ciliaris; floribus capitatis subvillosis. \$ — *Th. JVumidico* valde affinis
et forsitan ejusdem variolae. Distinguitur foliis margine ciliaris, capitulis florum
minoribus subglabris v. parce villosis, bracteis minus dilatatis. Caulis duri lit-
nosi, basi pariter procumbentes sursum, 5-6-pollicares, rami numerosi lenes
subletragoni, apice pubescentes. Folia sessilia anguste linearia intermedia,
y|x acuta nervosa punctata, 4 lin. longa, 6 lin. lata, margine ciliata, ad axillas
fasciculata, internodiis longiora. Calyces tubulosi striati, nervis purpurascen-
tibus, capsula clavis contersa, denibus fere subaequantibus ciliaris, fauce villosis. Co-
rolla) Myce longior purpurascens. SUMIO corolla sublongiora. — Habitat la-
tissima et ad littora Africae septentrionalia.
31. TH. CAPTATUS Hoffm. et Link, Fl. Port. I. III - Bib. t c 348. t - Basi
procumbens ramonissimus: ramis erectis canescentibus, aloribus subsplnescentibus
foil, sessilib. linearibus oblongisve planis, floralibus. Inbracteis ovatis cillaU* vlrudibus.
calyces oblongis. 5 — Fruticulus elegans dorog semipedalis v. In bortis sub-
pedalis. Folia 3-4-linearia, alia minora ad axillas fasciculata, glabriuscula, saepe
complicata, nec margine revoluta. Florum capilula terminalia globosa, v. saepius
oblonga. Verticillastris 0-floris, arete imbricati. Calyces folio florali breviores erecti
adpressi glabri, v. angulis breviter scabro-hispidi. Labii superioris dentes bre-
vissimi, inferioris lacinae subulatae ciliatae. Corolla e capitulo inserta, fauce
dilatata, labiis paleiformibus. Stamina exserta distantia divergentia. — *Satureja ca-
pitalis* Linn. Spec. plant. 708. — Sibth. et Sm. Fl. Graec. VI. 30. t 544. - *Thymu*
Credcut* Brot. Phyt. Lus. 27. t 12. — I*. *Harinotei* Ten. Fl. Nap. prodr. 35. «i
ejusd. Syll. fl. Neap. 290. — Habitat in regionis mediterraneae siccis aridis saxo-
sisque, in Barbaria, prope Tanger, in Lusitaniam, Hispaniam, Siciliam, regno Neapolitano,
Archipelago Graeco et Graecia copiose, Syria et Palaestina, prope Smyrnam.

*) *Fruticulosus erectus: foil, linearibus, capitulis glabris, tubis nerrotis; Torisfe rant-
tatis; bracteis ovato-lanceolatis ciliatis; raluribus hirsutis. S - FruleJ1-dfrimJ-ir-
ramotus. Kami gnm'lrt rrtcti, tuyrne pubetrenlrl. Folia inlegerrima h*7arid
patnria, tubit tirrota et punrtata glabra, 2 millim. rix lata. FatdcuU axilla
ret. Floret conferh, terminates in capilulum oblongum ditposti. Hrartee otato
lanecolatae aculae nervntae ciliatae, lutujitudine (lorum. Calyx ttltntut trtiauT
h-dentlalu*, drntibut tetarnt. Corolla part a rotra. Affinit Th. /wi< Iinn h,7
frt folit glaberrimit nec ciliatit, bracteit bati latiorit.*

32. TU. GRANATEXISIS Doiss. Eleoeh. plant. no. Hispan. no. 160. et Voyage bol. dans le midi de l'Esp 491. no. 1315. t. 140 — Suffrulosus prostratus ramulis Donfens erectis lomenosis, foil, subfascicularis raiouii* glabris, vix ad basin subciliatis ovalo-aul oblongo-spathulatis glanduloso-puncialis, floralibus multo majoribus. nervosis ovatis, apice ailenutis obiusculis, margine dense ciliatis coloralis, capitulis subrotundis; calyce excluso glabro, dentibus 5 alde ciliatis*, labio inferiori profundius diviso; corolla rosea, excluso hirta, calyce plus duplo longiore. £ — Crescit in Hispania australi, in regno Granalensi.

See Uo III PSUDOTHIMBRA Bth. L. c. 348.

Folia floralia magoa membranacea colorata

33 TH CEPHALOTIS Linn. Spec. plant. 826. — Bth I c ! — Erectus ramosus cano-pubescentibus foil, sessilibus linearibus, margine molutis pams fascicularibus, floralibus maximis ovatis aculis submembranaceis coloralis imbricatis ciliatis obtentibus. £ — Habitus et folia *Thymi vulgaris*, at inflorescentia distinctissima. Folia floralia semipollicaria sessilia, basi rotundata, margine ciliata purpurascens. Capitula subglobosa, magnitudine *Cran.* Corollae excluso pubescentibus, tubo exserto bractea subaequante, limbo brevi. Stamina corollam subaequantia divergentia. — Habitat in Hispania et in Lusitania.

34 TH BROSSELOETIA Boiss. Voyage bol. dans le midi de l'Esp. 402 ! t. 141. - Suffrulosus caulibus glabris erectis foliosis; foil brevis pedicellatis ovato-lanceolatis obtusiusculis punctato-pellucidis, capitulis magnis ovalibus; bracteis imbricatis ovalibus, apice acutiusculis coloratis, margine breviter ciliatis, caeterum glabris; calycis corolla triplo brevioris labio superius apice brevissime tridecosto, inferiori in dentes setacros dimisso; corolla pubescente rosea 5-10. *citifolia* Blh. (ex p.) — Crescit circa Mogador in regno Maroccano.

35 TH LONGICOROLLIS Bolst. t. c. 409. no. 1318. f. t. 142. - Suffrulosus ramis crecibus brevibus cano-pubescentibus: foil, sessilibus linearibus, margine revolutis glanduloso-punctatis, floralibus late ovatis, apice attenuatis acutiusculis imbricatis glabrescentibus. subcoloralis, calyce profunde bilabiali, tubo glabro, inferiori lanato, labio superiori brevissime 3-dentato, inferiori in lacinae duas stipulatis ciliatis usque ad basin dimisso, corolla purpurea hirta rariore duplo superante, e bracteis longe exserta, tubo calycis labio superiori brevissimo bifido, inferiora trilobata, lobis subaequalibus, lobis antheris rariore — (rescit in Hispania meridionali in regione montana iberica).

36 TH MIMBICUS (L.) Benth. Elench. plant. no. Hispan. no. 102. et Voyage bol. dans le midi de l'Esp. 403 no. 1117 t. t. U. - Multiflorus ramosus erectus foil lanceolatis linearibus subsessilibus, marginibus revolutis, bracteis caespitoso-pubescentibus glanduloso-punctatis, floralibus matit glabris tenuiter membranaceis ciliatis albicanibus ciliatis aruicatis, interioribus angustatis lanceolatis propter angustiam bractearum nuperum vix ciliatis, excluso junioribus ciliatis, in tubo pilosum, bilabiale, labio superiori breviter tridentato, inferiore profuso in lacinas etaceas ciliatis dimisso; corolla alba glabra hirta, calyce triplo longiore, e bracteis exserta; filamento et taminibus longe meritis. - Crescit in rupibus Sierra de Bado in Hispania australi.

37 TH RILIA Benth. I. c. MK. - Fruticulatus ramulis puberulis
 «i», foil oblongo-lanceolatis linearibus obtusiusculis punctatis. **villo-**
 imbricatis, floralibus sessilibus ovatis aruicatis tubulosis nervosis **rigida**
 Us ciliatis imbricatis, calyce oblongo-angustatis - Frustrum rariore **Flora**
 erectos 3-decimetr Bami Juniores pubescentes Unigine **rigida**
 aut vix tetragonis, nunc simplicibus. nunc ramis imbricatis Folia linearia **Flora**
 pairia «e»ilia, margine unque pilis albidis nuda. pom conspersa **Flora**
 denque capitatis terminate, capitulis ovalo-cylindricis obtusiusculis **Flora**
 Bractea magna ovata aculea ciliata, tubulosa nuda, rariore **Flora**
 «e» aabcompre bilabiale, drinibus riluatis, inferioribus **Flora**
 Uctia. Corolla violacea. Tubus rectus, calyce duplo longior. Labium

integrum oblongum subplanum, inflexum lobum, lobis subrotundis integris. Stamina 4 didynamia, corolla vix longiora. Antherae minulae. Stigmata acuta. — *Thymra citala* Desl. Flor Atlant. II. 10. t. 122. — Habitat in Africa boreali, in collibus a meridie et incillis prope Mascar, prope Galla et in insulis Cananensibus.

f *Species non satis notae.*

- 3a TH. PULCHELLUS C. A. Mejer, Enum. pi. Cauc. Casp. 87. — Dill. I. c. 340 — Caulis basi fruticulosus cretus, ad angulos pubescentibus; Tolla glaberrimis plantis oblongis * sublinearibus oblongis, imis ellipticis; verticillasis spicatis approximatissimis, densis calycibus lacinis superius subaequalibus subulatis; laminae externae. 5 — Habitat in regione Caucasio-Caspica, in collibus gypsaceis ad fl. Anticetam.
39. TH. RICHMIDI Pers. Enchirid. II. 110. - Bib. I. c. - Flonb. capitatis, bracteis obovatis calycibus rigidis. Tolla laevis ovalis, sublongiora nervosis § — An *Onganum majoncum* Lamb? — Habitat in insulis Balcensis.
40. TH. MULTIFLORIS Pers. I. c. 131. - Bib. I. c. - Flonb. axillaribus pedunculatis, pedunculis multifloris; calycibus oblongis, densis acutis; foliis ovatis glaberrimis, vena subtus praeinervis. 3. — Folia sublongiora. — Habitat+
41. TH. HIRSUTISSIMUS Poir. Dict. VII. 690. — Bib. I. c. f — Folia ovato-lanceolata sessilibus bracteis capitatis subverticillatis; bracteis ellipticis hirsutis. Oculi — Caulis erectus humilis lignosus glaberrimus teretis ramis latis. Rami erecti breviter subsessilibus. Folia parva, superius longiora lanceolata, in petiolo breviter angulata acuta inaequaliter firmata punctata, pilis rigidis albis conspersa, internodiis longiora. Flores ad apicem ramorum breviter spicati, bracteis lanceolatis flores subaequantibus ciliatis v. margine pilis numerosis rigidis albidis bispatis. Corolla purpurea, calyce sublongior. Calyx lobulosis, ore apertus, dentibus 5 subulatis acuminatis subsinuatis subaequalibus, lacinis ciliatis. — An *Micromena*, »/ *neritoides* affinis? — *Thymra hirsuta* Pers. I. c. 114 — Habitat in Onocleis
42. TH. LEBICUS Huffm. et Link, Flor. Portug. 1.1.11. - Poir. Dict. Suppl. \ 105. — Bib. I. c. 150 — Flonb. verticillatis capitatis terminalibus axillaribus; Tolla lanceolata, sublongiora albidis, densis calycibus subaequalibus subulatis. 2. — An *Iferromeria Graeca*? - Habitat in Lusitania.
43. TH. MEGAPOTAMICUS Spr. Syst. veget. IV. Cur. post 9M. - Bib. I. c. - Caulis erecto herbaceo; foliis linearibus convolutis asperis pubescentibus; pedicellis confertis folia superantibus. 2. — An *Urdiotma multiflora*? — Habitat in America meridionali ad Rio Grande.
44. TH. LONGICAULIS Presl, Flor. Sicul. XXXVII. - Bth. I. c. - Caulis longissimis repens puberulis; foliis lanceolatis-oblongis obtusis glaberrimis ovatis; capitulis globosis, bracteis oblongis obtusis, longiludine calycis pubescentibus; densis calycibus ciliatis subulatis, antheris exsertis. ^ — Habitat in Sicilia.
45. TH. BOVARIESIS Tenore ex Ann. des. sc. natur. XIII. 381. (Nouv. Scr.) — Suffrutescens hispidulus caulis cretus; foliis linearibus punctatis glandulosis inaequaliter nervosis; flonb. verticillatis; verticillasis sepalis; corollis calyce inclusis. 2. — Habitat in Boaria.
- 46 TH. BREVI-FOLICIS Wahlenberg. Isis XXI. 1001. - Verticillasis sexfloris, racemosis basi gibbosis pubescentibus, corolla dimidio brevioribus; foliis cuneiformibus subrotundis integerrimis albido-lanceolatis, pedunculo brevibus. 2. — Habitat in Sina.
47. TH. CORIACEUS Vogel, Beitr. zur Kenntniss etc. 23. - Capitulis elongatis acutis, bracteis maxima late ovatis acuminatis distinctis dense glandulosis, nervosis subciliatis, foliis caulibus ellipticis v. ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis 2/3 — Crescit in Asia minore.

f *Species nonnulli nomine coguntur.*

TH. AEGYPTIACUS Brnne

TH. C4MPH()RA11s Huffm. et Link.

TH. INTEGER Griseb.

i t t *Species e generc excludendae.*

- TH ACINOIDES Ten. = MELISSA PAT4VIY4.
 Til. ACI>OS Linn. - MELISSA ACIM)S.
 TIL ALPIMS Linn. — MELISSA ALPINA.
 TIL ATHOMCI'S Bernh. - MELISSA JHEPETA
 TIL B4IIRELIERI Spr. — MICROMERIA MAIUFOLI4.
 TIL BIFLORLS Don. - MICROMERIA BIFLOR4.
 Til IIRAINEMS Iloppe. - MELISSA NEPET4
 TIL UROW>EI Snarli. - MICROMERIA BROWNKI.
 TIL CALAMIMHA Scop. - MELISSA CAUMIMIH.
 TIL CALAUINTHOIDE* Rabb. - MELISS4 <AI 4MINTHA.
 TIL CANESCENS Dumorl. — MELISSA ACI)S.
 TIL CAMS Siev. - MELISSA GHA\KOLKYS.
 TH. CAROLINIAMS Michx. - MELISSA C4ROLIM4N4.
 TH. CIAMISSO.MS Bib. « MICROIHERI4 DOt (iLASSU
 TIL CORSICLS Pers. - MELISSA MU.ROPini.L4.
 TIL CHETK.LM DC - MICROMERIA MARI't'Oit.
 111. CHOITICLS Pen. - MICROUERI4 PIPERELLA.
 TH DF:nill> Bnge - MELISMA DKBII IS.
 TH DIFFLMN Horlul. - MELLshA >EPETA.
 TH I>OK.L\HI Bib. « MICROMERU DOI'CiLASII.
 TH EHICAEFOLIL* Rolh. - MICROMERU \ARI4.
 TH. E\H.LI> MD. - MELIV4 (iK4\KOlI >v
 TIL FILIFORMLS Ail. - MK.ROVERIA HIKOKMIS.
 TH. FILIFORMIS Sieb. - MICROMERIA NKKX)SA.
 Til. FRUTICLOSUS Bert. - MICROMERIA APPROXIMATA.
 TH. GLANDULOSL'S ***. - MBLISSA GLANDI'LOSA.
 TH. GRAKDIPLOB17S Scop. - MELISSA CRAMUFI ORA.
 TH. GRANDIFLORIS Sinn. - MELISSA (.AROIIM|\>
 TH (;RAVEOLE>S Bieb. - MELLsM (.RWF011Ns
 TH IETERpPIIULI S P>ir. - \IKi.lss4 A< INOs
 TH IIRTINRU^ . \IK.HOMKHU (HV!.(V
 TH IIRriHSirb ^ \IEIIssA IKMII 4
 TH IIIH1ls\it.- SU.\U 4K<.\Prur\
 TH IMHKK ITIS For^k. - MM.ROHMCI4 FORsROIKI
 TH I U ^ h Nui - MKLIsM IM 4M
 TIL IM)H.I > Burm. - (.KMOspoRI || PR(>sri(\TI H.
 TH |\O|)ORU Drtf. - MILROUHRM INo|)nR|
 TIL LAM.KOLATI^ Puir - P>C^4\TIIKHI M I 4NCEOUTIM.
 TIL LI UDI M Ebrb. - ZI/1PHORA (I IVipolHOIDE*
 TH M4RI.INATI> Sn. - MK.ROUERI4 PIPKRKLLA.
 TH MARIMMIIH ^ild - MICROMkRIA MARIFOLIA
 TIL MASTICHIM Mblb. rl Ho - MK.ROMERU NtH>OSA.
 TH MU.RAMHI s Brot - MICROVKRI4 (.HAFJA
 TH VICROp|IUI.lt Jlr* - MICROMERIA MM ROPHYLL4.
 TH V<^TAM s <.r<nlt - MELISHA 4I PIM
 TH ^IOS(ATKLLIH Pall - MEIISM I VI AMINTUA.
 TM. SFPKTA Hrop - MKIHH4 >K>'KTA
 T<. KKPF.TOIDKSI Dun - NKPKT4 RI UKRU bi
 TH MtBlbCMsH B kib - MM RotfKHII M **BUENA**.
 TH ORMaMKu Its lion - MM IHHA I <>MM 4I I Iv
 TH PARMFIORIH RrM - ^IMTIU Rt-VtltM
 TH PAra\IMsjjr q - Mkl IssA PAT 4\I> %
 TO. PIPERKLL4 4II - MM.ROMhRU PIPKRKI I 4

TH PIPERMITS Don. «= MELISSA LONGICAPLIS.
 TH PUNCTATUS Willd. - ZIZIPHORA CLIMPODIOIDES.
 TH PIRPI RASCEINS Po.r. - MELISSA PURPIRASCEKS.
 TH REPELS Don. => MELISSA IEPENS.
 TH ROTUNDIFOLIUS Poir. - MELISSA ROTUNDIFOLIA.
 TH SERRATIS Poir. «= PYCNAISTHEMUM MLTMUM.
 TH SLOEOLENS Sillih. cl Sm. - MELISSA PATAVINA.
 TH SLBF. ORIMTIS >isi.ini. = MICROMERIA SLBCORDATA.
 TH SMIMIHS Spr - MICROMERIA PtLEGIUM.
 TH SM.\ATI«:iS Benin. - MELISSA CLINOPODIUM.
 TH SMITHIS Spr. — SALVIA AEGYPTIACA.
 TH TENERIFTAE LnW. - MICROMERIA MICROPHYLLA.
 TH TENKRIFTAE Pcrs. - MICROMERIA TERIFFAE.
 TH TEREIMHINACEUS Willd - MICROMERIA TERIFFAE.
 TH TRAGOKIGAMJM Linn. - SATLREJA THYMBRA.
 TH IMBROSLS Spr. - MELISSA CALAMINTIA.
 TH VEROMCAEFOLII'S Spr. - MELISSA VEROKICABFOLIA.
 TH VERTICILLATLS Poir. — PYCNACTBBMUM LANCEOLATUM.
 TH VILLOSISIMUS Tauach. — MELISSA ALPINA.
 TH VIRGATUS Ten. — MICROMERIA GRABCA. •
 TH VIRGINICUS Linn. - PYCNANTHEMUM LINIFOLIUM.
 TH XALAPENSIS H. B. Klb. - MICROMERIA XALAPENSIS.

3011. KITTREJA Linn.

(Linn. Gener. plant. no. 707. — Mcisn. Gencr. plant. >ahcul. I. 3M. II. 103. — Bih. Labial, gener. cl spec. 351.)

Sectio I. SATDREJA Bib. 1. o. 362.

Yerlicillasin pauciflon. Bracicae panae v. nullae.

1. S. HORTE>SIS Linn Spec, plant. 705. — Bin. L e t — Erecla pubeiern*: trr-licillaalris subsecundis rcmuuis v. aupremis subspicatis. Q - Herba ramo»i«-alOM aempedalu v. parum alilor, aaepe purpuratcent. Rani pills brevibus riRi-dla reOeils pubescentes, vix tetragonl. Folia oblongo-llnearla araU iDiegemma, basi In petiolum brevem anguiiaia, sparse ei brtTler pabescoila l-acrvla plaoa T. slccitate margme Involuia, Ooralla conformla. Verticillastri late snbtfflorf. Pedunculi communes in venicillasiris infer ion bos lineares, In anperioribus »ub-dum. Bracicae breves Imcares v. omuino abortivae. Pedleelll brevissimi. Calyns denies ad medium lubi attingenles rigidi subaeqaales, uli nenrl calycia breviter Bcabro-hispuli. Fau iulus ommno nuda. Corolla denies caiycinos vii eicdrns, exlus sparse pubescens. Gcmiaha lobis corolla* brevlora. Achaema ovoideo* inquelra laevmsrula. — *S. nminro* Burm. Fl. Ind. ISA. (non Linn.) — Habitat in Europa auitrali, in Ilispama, Gallia ausirati, lialia ei ei Buropa verosimilaer al-lau in America boreali, lodiae oneotalis peninsula el in Promoolorio bonae *pei.
8. S. RUPESTRIS Wulf. in Jarq. Coll II. 190. el Icon. pi. rar. t. 4W. - Bib. 1. c. | — Suffruiicosa: ramis adscendenlib.; foil, peiolalis ovalis oblusis glabris v. §ub-canescentib.; racemn densis mullifloris subsecundis; calycis drntib. brevib. acu-liosculis. 2). — llabitu inter *Saturtjas* el *Mehttat* (*CalaminihasJ* media. Caultt basi lignosi. Rami herbacei l-l'/t-pedales, dense foliosi ramulosi, apice subra-Descentes. Folia 3-4-lmcaria subintegerritna, basi anguslaia, in etcmplanbus cullis majora, hinc inde rrcnalo-denials, floraha inOma confurmia, tuprnura parva, flonbus hroiora. \ etticillastn mulunon bubr)mo»i, in »piram tru rarrnum densum 1-3-pollifarcem approiiman, pedicelli hro^Mmi. Bracicae minuiac. Cal)rrs vix lineam longi erecii arquale* suhrampaulali, faure miui Klabrnnma Corolla lubo breviterciscrlo, ral>re duplo mplotr loiigior alba. libn% hianlibui St.mnna breviter e»>erta, vn di>lanlia. -- *S thymtfoha* Scop Fl Cam rdit '2 \ ^9* *CaiamiiUAa rupestnt* Ho»l, Fl Au»tr II. 131. - *Mdnta alha* W.iUKi ri kit IM

- rar. Hungar. HI. 227. 1.905. — *Xepeta Croatica* Spr. Sy«?i \eget. 11.727. — *yep eta pumtla* Spr. Cent. spec. mm. cogn. 20. — Habitata in Europae auslro-onenialis moniibus SICIS et locis aspens, in Carmolia, Hungana, Croatia, Cannlhia, blna et Dalmalia.
3. S. MONTANA Linn. Spec, plant. 704. — Sbthrp. et Sm. Flor. Grace. M 35. t. 543. — Dlh. I. c. 353. f — SufTrulicosa glabra v. lenuiler srabro-pubc»ccns foil, ohlongo-lineanb. aculis v. infcnob. spalhulatis cuncalistic oblusis; \erlicillaslrts plurifions laxis »ecundis, in spiram v. racemum approximate. 2l — Caulcs basi lignosi diffusi ramosissimi. Rami crecli v. adscendenle> jsonupedales pedalesvc, nunc ommno glabri, saepius pilis brevissimis subreflexi* pubcsrenles. Folia infenora el ramorum sclnlium laliora, nunc obovata, margme ciliaia, snpenora uti floralia angustiora, saepius nota, omnia uninema xndia rigidula glabra v. pilis raris brevibus vii pubetcentia. Verlicillastri mferiores saepius remoiusculi laxissimi, cymis ulrinque pedunculalis 3-5-floris, caljnbus prdicellatis, braceis lineanbus foliaceis, supenores dcnsiorecs multiflori, mag is approximati, interdum omnes in spicam densam umlateralem appronnali. Corolla extus glabra >. pubescens, caljce duplo longior alba v. purpurascens. — *S. trtfida* Mneh. Mclh. pi. 3*0. — *S. iubtpicata* Vis. Spec. pi. Dalm. II. I. 4. — Ten. App ad Ind. scm. horL Neap. 1827. — *S. illyriea* Host, Fl. Au*lr. II. IJ3. - *S. raririgata* Hosl I. c. 134. — *S. cuneifolia* Tei. Fl. Nap. I. 151. fig. 2. — 5. *obovata* Lng ex Spr. S)*t. veg. II. 720. — *S. hyssoptfntia* Bert. Ann. di Slor. nal. 1820. fasc III. 400. — *Micromeria monlana* Rrhb. Fl. Germ. exc. 311. — *Micromeria pygmaea* Rchb. I. c. — *Saturfja pygmaea* Sieb. pi. exs. ex Rchb. I. c. — *Jirrnmrria variegaia* Rchb. Fl* Germ. exc. 890. — Habitata in regionis mediterraneae Ions andis apncii monlosisque, in nonllboi Pyrenaeif prope Bagneres de Luchon, in Hispania, Lusitania, Africa boreali, Gallia el Geroaola mediterranea el tecus Rhodanum el Rhenum? uaque ad Belgian, Io Italia a Pedemonlio osqae ad regnum Neapolitanunf in Isiria quoque, Dalmalia el Graecia.
4. S. VIRGATA Vitiml, Flor. Dalmatic. I. t. 18. fig. 1 - Bib. I. c. - Suffralicosa scabro-bispida: foil, oblongo-lineanb.aculis; rerlicillasins plunloriH subaequalib. remotiusculis, in racemum longum virgatum disposals 2l — A *V. montana* non differ I nisi inflorf<centia el hmulie. Cal)n< drnlrv riiam pa rum breviores r l dorc> mm ores. Kacrmus nonnumqiiam ultra prd.ilis. — *S. <picata* Vis. ei PI-r\N Imon iiii Wurtrmb. — *Jfirromeria sptcata* Itchb. Fl (term. r\c. 311. — *S-fasneulata* Tau>ch in S>II. pi. soc. Ralisb. II. W — Habitat la apncis Daloataie.
- 5 S SPOOSA Linn. Spec, plant. 704. - Biñ. I c. - Sibthrp. el Sm. Flor. Grace. VI. 3G I. 545 - Gn»eb. fepinleg. flor. Rumrl. II. 121. - Suffruticosa rrecta lortuoforamoia ramis lomenlosis spine«reniib ; foil oblongn acutis glabris; vertirilla»iris paucis pauciflons. 6 — Frulirulut »rmipedalis ramosi««imu9, raoi* trr\ibut fere omnibus In spinal abeunlibus. Folia *S. montanar* l.rcuora laliora, in ramis slenlibus minuta. Florei *S. monlanae* minoro, rarirrum conforrof* -'' *S. approximate* Fnvaldsk. Flora (B. Z) XIX. 438. - Habitat in Archipelago Graeco et in Creta.
6. S. HYDORA Salim. PL Tang exs. fi Blh. I c. 354. t - Suffrutifort d ^ ** glabnu4cola-ramis adtcendrntib ; foil. lmeari-«patbulalis ohtu»i< margme cin>~ti», «upenonb. flores exredentib ; florfn, panm sub«es«ihb.. drnlib calcin< obtusiu«cuhs. ^ — Specie* disiinciissima llabitu« fere *Thymt angustifolh* ~~excm~~ plahooi najorum. Ramt durl ienui«9ime scabro-pubrvcrnlri. Ramuli *brt*i* ~~ssimi~~ numerosi, apiee folils dense obterti. Polia semipolhrana. prartr ««... .arj|. .r naks glabra. floret paucUtimi, Inter folia se%»ile*. l'al)ces glabri camp«> ul^ 10-nervii, dentibus S brevibas nulieis el saepius oblusis. Faux inios nota. — Habitat prope Tanger.
7. «. aUTIFA F.*rh el Meyer, Ann. sc. nat. V. 300. - PubeffeotI-*.»...; ritt" ^ ereeil. raaoiUsiais, bail froiculosis. ramlt %irgati«; foil, oblongit ittb" neari , eJ O«»it anliahb. paucifloris; braeieolis liaearib. caljce nulio bretiorib.; caij

bilabiati lobis sublinearibus, muticis, inferioribus binis longioribus. 6 — Habital ID monilibu* andi* Taljsch.

8. *S. PACII* IMI LA V Koch, *Linnaea* XVII. 205. - Frutescens divaricato-ramosissima caulibus summiis ramisque pilis conspersis; foliis glaberrimis crassis, dense glanduloso-punctatis angustis oblongis obtusis; venticillis lris distinctis; cymulis subsessilibus 2-jugis; demum calycibus lanceolatis acutis aequalibus, corollae labio superiore marginato-bifido, inferioris lacina media majore; nuculis oblongis gneseo-nigris, hilo colorato. 6 - *S. mutica* Fisch. et Mey. calycis demum obtusis ciliis ramis virgatis, 5. *intermedia* C. A. Mey. aulem foliis obovatis subcrenatis differt. — In Ciscaucasia et ad Tanaim ID terra Cosacorum.

Sectio II. *THAGORIGANUM* BtL L o. 354.

Verticillatis dense globosis multioribus remolibus, bracteis suffultis. Calyx lubum corollae subaequans.

9. *S. TINIBRA* Linn. Spec. plant 704. — Sibthorp. et Sm. Flor. Graec. VI 33.1541. — Iliis. I. c. | — Suffruticosa diffusa scabro-pilosa: foliis, oblongo-linearibus v. inferioribus obovatis cuneatis acutis; verticillis lris multifloris demum subglobosis, omnibus remolibus. 6 — Kami lignosi 1-8-pedalia divaricata ramulosis. Folia acutiora breviora et parva latiora quatuor in *S. monUma*, caeteram confertim scaberrima. Venticillis demum fere pollicem diametro 20-40-floris. Bractea ovali-lanceolatae aculae adpressae, calycem tequantem, alii calyces pilis paucis hispidae. Calycis dentes subaequales lanceolato-nubulati. Faux intus nuda. Corolla *S. montanae* minor. — *Thymum Tragoriganum* Linn. Manl. S4. — *Satureja Tragoriganum* Tausch in Sibth. Pl. soc. Ratisb. II. 248. — Crescit in regione mediterranea asiatico-orientali, in montosis aspens Graeciae australis et Archipelagi frequentissima, in Asia et Palaestina montibus.

Sectio III. *PYCHOTBYMUS* BtL L o.

Verticillatis in capitulo oblongum aggregatis, bracteis suffultis. Calyx minus

10. *8.T. RIGIDA* Benth in Herb. Bnks ms. ex Bib. I. c. — Suffruticosa procumbens: ramis adscendentibus, oppositis pilosis; foliis ovato-linearibus, marginibus revolutis; verticillis lris in capitulo oblongum terminale aggregatis; bracteis imbricatis villosissimis; calyce brevissimo membranaceo. — Rami 4-d-polliferae subsimplices numerosi, basi puberuli, apice piloso-hispidi. Folia ovata glabra, nunc, praesertim superiora hispida, 3-4 lineas longae. Capitulum 1-2-pollicare, pilis mollibus albis hirsutum. Bracteae subcoloratae lanceolatae obtusae. Calyx bracteis imbricatis brevior, profunde quinquefidus. Corollae tubi bracteas aequans. Limbus potius *Pycnanthemum* quam *Satureja*, cui vero generi huius haec plima simillima est, nec ullo nodo cum *Pycnanthemum* conjungenda. — Habital in America boreali, in Florida orientali.

t *Specks dubia*§.

11. *S. CAMPANELLA* Rhenb. *Naturgeschichte*. Reiche 13. - Bib. I. c. TO. - Suffruticosa: ramis pubescentibus; foliis, ovato-lanceolata acutis inaequaliter bipinnatis subsessilibus; florum cymulis folio parvis longioribus bracteatis; calycibus brevibus campanulatis, profunde quinquefidis. 2l. — Habita proximo accedit ad *S. rupestris* Wulf. — Habital in Africa boreali prope Casertam.
12. *S. OLLA* Ehrenberg I. c. — Bih. I. c. 799 — Suffruticosa: ramis teliculis, foliis angustis linearibus et lanceolato-linearibus acutis sessilibus-hispidis, florum omnium foliis longioribus bracteatis; calyce brevibus campanulatis profunde quinquefidis. — Habitu propius accedit ad *S. Thymum*, cujus flores et folia majora sunt. — Habitat in Africa boreali prope Casertam.
13. *S. INTERMEDIA* V A Meyer, Enum. pi. Taur.-Casp. 01 - Bih. I. c. 3W — Undique pubescentibus ciliis conspersis caulibus diffusis ramosis, fruticulis foliis, obovatis-oblongis obtusis subcrenatis, cymulis antheris paucifloris

- bracleis sublinearibus, calyce subbretioribus; calycibus bilabialis, lobis lineari-lanceolatis mucis. — Folia *S. Thymbrae*, calces fere *S. montanae*. — Habitat in Caucaso, in locis lapideis prope pagum S*ant.
14. *S. SE>SIL!FLOIDA* Presl, Flnr. Sicul. I. 30. - Bib. I. c. 355. - Florum fasciculis sessilibus, in spicam oblongam foliosam dispofilis; calycibus ore ciliatis denibus ovatis erecto-patentibus; tubo corollae calycem duplo superante, foliis linear-lanceolatis acutis ciliatis punctatis, subtuticibus; caule basi fruticoso; ramis diffusis vel lutino-pubescentibus — Habitat in Sicilia.
15. *S. HIRSI'ITA* Presl, Del. Prag. 79. — Bin. I. c. - PrdunruK axillaribus brevisimis 1-3-floris; bracteis calyci aequilongis; foliis ovatis lanceolatis hirtellius; caulibus simplicibus hirtellius pilis erecto-patentibus. — Folia auctori ad *S. filliformis* Desf. (*Micromeriam microphyllam*) refertur, a fl. GUH<OIPP Prodr. II. Virul. II* 115.) politur ad *Micromeriam Julianom*. Cuius characteribus dicitur specie MI recognoscenda esse — Habitat in Sicilia.
16. *S. PARVIFLORA* Preil, Fl. Sicul. I. 35. - Bib. I. c. - Florum fauribus «i» lib. IriOoris in spicam foliosam dispersis; bracteis numerois sociatis dentibus calycis erectis, tubo corollae longitudine calycis; foliis ovatis lanceolatis internodiis duplo longioribus basi fruticulosius villosis. — Habitat in Sicilia.
17. *S. ANGISTIFOLU* Presl I. c. - Bth. I. c. - Florum fasciculis foliis brevioribus denibus calycis erecto-patentibus; tubo corollae calycem paullo excedente; foliis oblongo-lanceolatis caule suffruticosis patulo pubescentibus. — In Sicilia.
18. *S. LONGIFLORA* Presl I. c. - Bib. I. c. - Flnrura fasciculis foliis arque longioribus denibus calycis patentibus; tubo corollae calycem duplo excedente; foliis ovatis lanceolatis, basi canescentibus; caule suffruticosis diffusis. — Habitat in Sicilia.

tt *Spirits* nominibus ngnitar.

*S. *SCABRA* Pretl, fl. Sicul. I. 30. - *Thymus scaber* Presl, Del. Pnf* 4*

Sicilia habita

•S. *OLOBIFERA* Desf.

f f t *Species e genrrt rxcludrtulae.*

- S. AUKRICANA* Fftr. - *IVPTIS* si. OPARI.
- S. APPHOXIMATA* B.v .. *MICRONTERIA! APPROXIMATA.*
- S. IWKSTK&S* (UM. - *Vir. RnVKRU CANESCENS.*
- S. (APITAN Lino. - TMUHS r,riT\TI?)*.
- s. (OMIOKI ju<<< - inpris SCOPARU.*
- S. (OX'KMi Horn - Mh.ROMKRIA (RAKfa.*
- S. r()>SK>TI>A Ten. - MICRONTERIA GRAECA.*
- S. FASCIA'UTA* Raflo. - *MICROMERIA APPROXIMATA.*
- S. FILIFURMIS* Deaf. - *MICROMERIA MICROPHYLLA.*
- S. FILIFORMIS* Ten. - *MICROMERIA >KRU)t>A.*
- S. GRAECA* Lion. - *WICROMERIA GRAECA.*
- áV MCAMA* Sprrng. - *MICROMERIA OROVATA.*
- R. IKODORA* Host. - *MICROMERIA PARVIFLORA.*
- * *JITUA!IA* Linn. - *MICROMERIA JLIAMA.*
- S. IANATA* Liok. - *MICROMERIA IANATA.*
- S. MICRANTHA* Hoffm. et Link - *MICROMERIA GRAECA.*
- 8. MICROPHYLU GUM. - MICROMERIA MICROPHYLLA.*
- ft. NERVOSA* Desf. - *MICROMERIA NERVOSA.*
- B. Oliganoides* Linn - *MICROMERIA Oliganoides.*
- 8 OVATA* R. Br. - *MICROMERIA OVATA.*
- ft. PARVIFLORA* VU. - *MICROMERIA PARVIFLORA.*
- ft. PI'ETA* R. Br. - *MICROMERIA PI'ETA.*
- ft. PI'OVATA* Loaa. — *MICROMERIA OBOVATA.*
- ft. PI'ETATA* R < M. — *NKPETA RELIOTBOPIIFOLIA.*
- ft* TKH&AUFFAK* Link. - *MILROMERIA MICROPHYLLA.*

- S. TEM'IFOLI^{It} Ten. =- MICROMERIA GRAECA.
 S. TEMIS Link. - MICROMERIA TENUIS.
 S. IARIA Berth, et Wrbb. - MICROMERIA VARIA.
 S. VIMINKA Linn. - MICROMERIA OROVATA.
 S. VIRGLMA*A Linn. - P(CXA>THIEMUM ML'TICUM.

Subtribua II. HYSSOPEAE Endl. Gener. plantar, p. 617.
 Calyx quindecimnctis. Stamina quatuor fertilia.

3tU2. HYNHOPtW Linn.

(Linn. Gener. plantar, no. 700. - Mci>n. (iencr. plantar, \ascular. I. 284. II. 103. —
 Bih. Labiatar. gencr. el spec. 356.)

1. II. OFFICINALIS Linn. Spec. plant. 700. - Bib. I. c. j - Tola pianla sarpiuf Klabi'rma, in var. r> vero pilif brevibu* rigidis *illo«a. Caulis ba*i liffi«iM diffusus ramosusimus. Rami elongali vjrgali 1-2-pedales. Folia HCSMM, taepiuk oblongo-lineana v. lanceolata, In var. a. elllplica, in var. y. anguMiora oblu*a inPRernma plana v. marglne tubrevotua, bail parum angutlala, utnnque \iridia, tubius uninervia craailutcula. YerHellaalrl 6-13-Qort tecundl, la apicam lerminal-lem approiimail v. inferioret remoil. Folia loralla eauliola ooDformia al ninora. Bracleae exteriores lanceolaio-llnearea acoUe, calyet vli br«vloreaf Inl«rior«t minutae. Corolla coeruleo-purpurea, rarlot alba. Aebaenla ovoldea irlqoeira compressa lacviuscula. Yar. d. durlor e*1 el tola cano-villoia, al vli ipeciet propna, a. cst var. hortentiii.

a. latifoliut: — II. Furheri llortul. — // . atopecuroidet Filch, (llortul.) — //.

officinal is ft. decustatu* I'crs. Enrhirid. II 114. — // . myrtifoliut)?s{. Hurt. Par.

fi. vulgarit: — II. offinnalit Jarq. Fl. An%t. I. 502. — II. ruber lleruli.

∴ anguilfoliui: — II anguMhfvlnis Hiob. Fl. Tour. Cauc. II. .K III. 3^9. — // . orirntahi Ad.im. \Nill«l. Knum. pl. hort. Hero). II. 000. — // . Caucasteus Spr in Sloud. V>m hot. Ur

d. eanetcms DC Fl. Fr. Suppl. .100. — Habitat in Europa auMrall rt Ana media, In UUpania, (iallia australi, Italia, (ercoanla auatrali, ranor in licrminia me-dla, In Belgio, in Ro»»ia mrridional, in Taurla el Caocatia, ID Jugo Altaico, X. praesertim in reglone Atiatica, t. circa Avfnionea.

t Specie* e genere ejetludmda*.

n. AMSATLS Null. - LOPIANTIII S AMSATUS.

II. BRACKTATUS (imcl. ,, ELSHOIT/IA CRISTATA.

II. CRISTATI'S Lam. - IMMfOSTKMON PLECTRANTNOIDB8.

II. DISCOLOR De»f. ^ LO|''|A>TIUS AMSATLS.

II. LOPIA1STHOIDES Don. -* PLECTRANTIUS GKRARDIANUS.

II. L()PIA>THIIS Linn. — LOPIAMTUS CHINEMESIS.

II. NEPETOIDES Lino. — LOPHANTIUS NEPRTOIDB8.

n. OCYMIFOLIUS Lam. — BL8ROLTZIA CRISTATA.

II. RESUPINATU8 Moench. - LOPHANTIUS CHINEHSI8.

0.8CROPUULARIABFOLIUS Willd. -LOPUANTHL8 SCROPIULARIAEFOLIIS.

Subtribus III. CUNILEAE Endlich. Gener. plant, p. 013.

Stamina duo inferior* fertilia.

3013. C'OLLINftONIt Linn.

(Linn. Gener. plantar, no. 17. — Mnsn. Goner, plantar, vascular. I. 2K4 II. |0X _
 Bth. Labiatar. gener. el spec. 357j

1. C. CANADENSIS Linn. Spec. plant. 30. el Hurt Cliff. 14. 1. y - Bf_n. |. r. ;i_w *
 — CaulP glnhriusculo; foil, late o>atih arummatik, ba»i rolundaiii »utic«irdaii«V
 ranu< rune.iliH nlabn%; pamruli cloiiKala lau multidora; (onb di.indri. Zi
 CaulU bcrbaccus erclui ramo»us 1-1'A-prdalulael|i» compre*vi-u.u_aKI||U%,

- saepius glaber, rarius lenuiler pubescens. Folia ampla, bretiler peliolata, saepius longe acumioala serrato-crenala ncnosa, ulrmque glabra, subius minute et sparsim glandulosa, supcnora el floralia infcnora scssilm mmora. Pnmcula 5-10-pollicans laia, parce ramosa. Dracieae pedicello multoies> brctiore* sclareo-acuiuinale, basi dilalalae. Calyx frudifer pedicellum aequans subpliber. Corolla flava subcampaoulala, caljce florifero quadruplo longior. Stamina 1, lonjje eisoiia ditdncata, slenlia oulla. — *C. decussalo* Mncb. Meih. pi 379. — (| *ovahs* Pursh, Fl. Amcr. scpl. I. 21. — *C. cuneata* Wcnder. Schrift. Nat. (Jcs. Marb.? — Habitat io America seplentrionali, io sylvis umbrosif rupeslnbu* a Canada .id Carnluiiin.
2. *C. TLBEROSA* Michx. Fl. Bor. Amer. I. 17. - Bth. I. c. f — Foil, feubrhombo-ovalib. aculis, basi cuneaiis; panicula eloogala laia ramosi<*sima multiflora; florib. diandris. 2} — Caalia in feme lereiusculus pedalis ramo»us. Folia 1'^-pollicana, caulioa teaaiha oppoiila cordata. Pamculae rami rlongaii Dracirae panrae subolalae. Calycis denies seiacei tubo lonRiorc^ . Florrs multo quam m *C. Canadensi* nioreea, a qua differ I foliorum forma el flonbus nnonbu«. — ^* *ierolima* Wall. Fl. Car. 03. et Pursb, Fl. Amer. sept. I. 21. - Habitat in America seplentrionali, in umbroiis bumidunque flvarum (.arolar.
3. *C. SCABRIUSCULA* Ail. Flor 1. Lew. (ed. 2; I. 00. - Bib. I.e. - Caulc procura-bente glabnuscule; foil, peiolalis oralu* acutit dentatu, ba%a rotundati\$> »upra glabns v. pilosiusculis, sublua glabris; racemis simplinb. axillanb. terroicalib><l; flonb. diandns. ^ — Caulii videtur procumbent v. adtccndent, folia mullo DI-nora quam io caelent tpeciebot, ?n bipollicaria. Racemi pubetcentes 2-3-pollicaret, flonbus oppotilia brevier pedicellalit, *C. Canadmu's* duplo mmoribut. Corollae rabro-lavae. — *C. seabrm* Pert. Bocbind I. 29. - *C. praecox* WalU Fl. Carol. 64. — BabiUl la Carolloa ft Florida, ad Jacksonville Io LoaUiaoa.
4. *C. PUNCTATA* EllioU, lot of 8. Carol. and Georg. I. 30. - Bib. I. c W. f - Foil. otalo-laacoolaUs iraaioaUt, basi acutit, subius pubetceuiib. poDOUUtq; panicula eompoalla. 4 — Radii toberota. Caolls berbaceu« ererlut, 4-0-pedalis tcaber pobetceos, apice ramosu*. Folia magna drnlaia scabra, supra pubescenlia, subius sublomenlosa acula, iotrddum ulnnque aruminaia, par supremum ovatum tubsessile. Floret paniculalo-raremosi. Prdunruli, cal\X, corolla, el foliorum pagina inferior punciis rrtmo»is consprrna. r;il\N> labuim superius trifiJum, in fen us longius bifidum, lacinnis oinnibus arulis Corolla flsvefceos, rttus pubc»ren«v, inlus pilosa, lacinii^ s»uprriorbu« o«a(i< stibarqualibus, loferfrc long lore fimbalo. — llabilal in Carolinai* «o|o pingui frequent.
5. f. | *KRTICILLATA* Baldw. in Kliioll I. c. - Bib. I. c. ! - Caule basi glabro oudo, tuperne tiscoso-pubesceote; foil, late o\au* acuminati«(basi rotundaio-cueoalit, parib. binis approiimalit pteudo-%ert>rillalit; raccmo laio tubtinipHci; florib.'lelraodris. 3} - jlerba pfdalis tubtimplrtr ererla. Folia ampla. bati magn aoguslaia quan In *C Cmmudfmh*, ulrinque pili* broibu« rant hi«pidula e| nargioe ciliala. Raetnuf ti«co»o-pubrteens semipedalit nudut. Veriieillasln iaflai subsetOorl, tupreml biOorl. Corolla ealyre triplo lonftmr, eviim P^{ubef} eeos, Ubio Inferiore bretiter flmbnato. Anoulus inlernut ad orium Mamioom •qoamosta. - llabilal Io Georgia.
0. *C. AM8ATA* Purtb, R. Amer. »epL I. 21. - Bib. I. r. t - Curti*. Bol. Mag ^{sa.} L 1210. - Foil, late ovalis subdenUlit, bail rolundjlo-trunrati* ruRosis, ^{n9Vf} is ftobius eauleq. pub#«ceolib.† paoirula deota; flonb. inrandn* ^{m4} — Caulls ere⁶. loa sobrasAosos, obiuse leiragooos rufetceot, pih« brrtibu« pairnubos ^{*ub vlc} ^ ••• P«b«tc«aa. Folia breviora quam io *C (amadensi, MI* arunioaia. P>^{rC*} Uta, valde rugosa, supra glabra *. ad tfna* pubrtrentia. tubiut nrrtosa, ^{corolla} infima rauliois conformU, auprema brarierarformia. Brartrae pana* ^{m*J} ^{dfOitt} eeae otaiac acominatae, bast ampltikaultft, prdirHlit breuorrt. P>o*^o ^{fa} 4-6-pollicarit. Calyt floriger *C. (mumdnuit* Corolla magniludioe corol ^{es} ^{extus} •^•wii, »ed labil lorerioris lobos media* «n lanniaiu*. pallide lui » glabra. - Habitat io Asserica seploolrioall in nooiibus Georgiae.

3014. CIXILA Linn.

(Linn. Gener. plant no J5 - Meisn. Gener. plant, vascular. I. 2A5. II. 103. - Blh. Labial, gener. el spec. 300.)

1. C. MAIUANA Linn Spec plant 30. - S^{cel}, Bnl. flo^{*}. gard. III. t. 243. - Blh. I. c 300 | - Ilcrbacea foil, subsessiiib. ovalia scrralit, basi cordaiis, lnralib. tabconformib , mfer.or.b. flores superantib.; C)mit pedunculalis laxe rorjmboms. % - Bami bmos glabn, ad nodos pubescentes. Folia plcrumqnc polhcina obtusimcula nertosa, ulrinque glabra. Verlicillatfri pauci. Cjmac ulnnque dirholomae, ramis gracilibus glabns. Bracteac parvac subulalac Caljcr* m ultra lincatn longi slriati, fauce inlus villonsuma, dentibus brcubus lanceolalis ocuiis. Corolla calyce subduplo longior, inlus pubescens. Stamina long** enerla. — *Zisypchora Mariana* Boem el Schul Syst. %egeiab. I. 208 - *Saturrja onganouies* Linn. Spec pi. (ed. 1.) 508. — llabilal in America borcali a Canada ad Urolmam in nionlom siccit.
2. C. INCISA Blh. 1. c. 301. t — Frollcota: foil, peliolatit o^ato-rhomboidi'is ^ro^sc inriso-terralii, bail lolegerrint cuoeallt, Dorallb. conformib. flores kiipcraniib , cymis pan is pedunculalis subcapliailf. 6 — FruUi ranoaisalmus, den«c foliosut., ramis leouier pubeaceolibut, vii leiragoola. Polla aeuu, 6-8 Ifo. longa, 4-0 lata, glabra, utrinque dense glanduloM. Vertlelluilrl late nalUttorl. Cymarum pc-dunculi petiolos acquanies, pedicelii brevlalml. Braeitae partae seuceae. Calyx lubulonus, basi angustatus glandulosus slritlms, deDlibat aeqaallbus Ian-ceolalis subfoliaceis ereclis, fauce Inlui vlx villosa. Corolla Intus pubescens, tubo cal)ccm nubaequanle. Stamina breviier exserla. AnCherae connecto cras^o, loruhb subdi\ancalis. Sljli lobus superior brcMssimus, inferior elon^atu* re-cunus complanatus, marginc ct apicc sligmatifer. — In Brasilia mmdioiuli.
3. C. ANGUSIFOLU Illi I c . j - Fruticosa glabra foil. brc\iter peimlaiis rllip-lico-lincanb. intoi;orrimis orrraliite, floraiib. conformib. flore< »uprrautib , *<r-ticillastrift laxis piurill(»ri%, floril* mlnutis > — Frulrx drn^e foliosuik, rami cli-bri vix tetraioni Folia circiter pullicrm longa, nunc inlegernma, nunc apirrm •enus grotsc nerrata, bail nnguitala iniegernma, ulnnque glabra, minute gl.in-dnloao-punciaia, supra viridia, sublut pallida. Verticillailri late pluriOori, pt-daoetilo communi pedicellisque saepius brevtstlmif. Bracleae tainuiiMimao ovalae. Flores minon. Calyx ovatat slrialus, aequaliler 5-denUttit, tenuissime glandulosus, intus fauce nubvillosus. Corolla Intus pubescens, lobo caiycem »ub-aequame. Gemtalia brevitcr eiserta. Antberarum locull connectivo crasrn iub-paralleli. Styli lobus superior tit Inferior! brerlor, Inferior subcomplanaiui, tpcco stigmalifer. - Habitat in Brasilia meridional!.
4. C D-CANA Btli. I c. | -Fruirosa: foil, b re viler peliolails ovalo-oblongii obo-vaii»e obtu«i» iniegerrimis, ulrioq. cano-lomentosis, floraiib. conformib. floret tupcranlib.; verlicillatirit 3-6-florit. 6 - lUbilui *Wcrom*ri*e oboratoe*. Bami elongail virgail dente foliotl caoo-lomenlosi. Folia 3-0 lmeas longa, bati angutiaia, ulrinque pillt tllellalis cano-lomenlosa, minute glandulo»a. \rrtml-latul folio a-p-plote brevlorat. Bracleae miouue aelaeac. (al)x bre\itr pr-dlecllalus, tnagniiudlne calycis C. *Mari^umt*, ovauit, brevtier obtuse 5-denttiut, extus lenui»»tme glandulotus el cano-lomeniotut, inlus fauce vtllitsiisimui. Co-rollera e&lus pubescent, lubo brevtier exseio, Inlut pubescent, labus intus gla-bernmis. Gemtalia vix exserta. Aniherarum loculi di\crget tubdn.inraii. blyli lobl subaequales. Achaema oblonga sublriquelra, sub lenlc trnui^ime ru-gulota. — Habitat in Brasilia meridional!.
5. C. LEIXAMila Bib. I. c. | — Ilcrbacea, glabra: foil brevistime peliolatit otato-oblongis intrisemmis, ban rolundalis; r)mi» \ix peUunculaiu Unukrulis mulu-fions. ^ - Uule* e radice plures crecli rauiosi obtu»e telrjgom Rlabrrnmi. Folia t-& tin. longa tcnosa glabra, sublus oculo armato obnenata pundis mmutii da-vit resmosi* consperia. \erliciUattn Ian, lufenuret remoi, hupreun **aprruizmati**,

- IG-20-flon. Pcdicelli et cal>ce< pubescentes. Bracteeae linear!-lanceolatae, pedicellis parum longiore*. Corolla alba, exclus pilo!>a. — Habitat in Mexico.
6. C. POLYANTHA Bth. I. c. 301 — Ilerbacca: caule erecto pubescens, Toll, breviter petiolato «ali» sub«erratis, basi rotundata; verticillatis laxi> multinerviis in racemum longum dispositis. 2]. — Caulis ulirapcdales, praesertim ad nodos pubescentes. Folia pollice longiora, utrinque tenuiter pubescentia, subtus pallida. Verticillatis laxissimis, inferiores 40-50-flon. C)marutn rami divancalodichotomi. Calycis saepius nutantes pubescentes, demum acutis. Bracteeae linearis-sclaceae minutae. Corolla alba, magnitudine corollae C *JManantu* Stamina longe exserta. — Habitat in Mexico.
7. C. LYTIIRIFOLIA Dh. in Lindl. Bot. Reg. XV. ad calc. t. 12⁹ et 1 abiatar. gener. et spec. 363. — Ilerbacea: caule erecto pubescente, foliis oblongo-lanceolatis serratis; verticillatis densis rufifloris «patis, inferioribus dolmen*, ralicibus villosissimis. — Caulis ultra pedalis ramosus, cum foliis tomenio breviter pubescens. Folia r/i-2-pollicana acuta, basi angustata rugosa, vix pubescentia, superiora minora, floribus vix excedentia, utrinque parva. Spiracul. 2-pollicares. Bracteeae hirsutae, calycis aequantibus adpressae. — Corollae C. *Hananae*. — Habitat in Mexico prope Kcal del Nlonie.
- P I' *>TMCTA Bib. I. c. | - Ilerbacea caule erecto multinerviis linearibus obtusis intus. Nervis nitidus, verticillatis densis multinerviis, in spicam terminali basi Bubintrrulam apprimens. — Habitat in *hetlhtae*. Caulis 1-2-pedalis in *ubra-OKMUI*, acute quadrangularis, angulis callosis, glaberrimus. Folia parva, 1-1/2-pollicana, 1-nerviis, margine tuberculata pallida glaberrima glandulosa, floralibus rimosa, taprena acuta bracteeaeformis, calyce breviora, margine ciliata. Bracteeae lanceolatae-aobolatae. Spica 1-2-pollicaris. Calyx ovalis imbricatus 13-13-Denia glandulatus, imbricatus 4-aeaiama, dentibus imbricatis acutis marfioe ciliatis. Corolla omnino *CuuiUi* alba, lobis inferioribus porpureo-punctatis lobis glabris, superiore emarginato. Stylus lobis inferioribus planis acutis apice fimbriatus. — Habitat in Brasilia in paludibus prope Ilicao de Sanelon et in Mixiombus Urnguaribus.
- 0 i ^PK'\T\ Bth. I. c. t Ilerbacea, procumbens rimis villosis, foliis breviter petiolatis obovatis, lobis obtusis crenatis, immixtis verticillatis. — Habitat in *to(ragonu^t* pilis hirsutis subhirsutis villosis. Folia villosa supra adpressis pilis, glandulosa, ad nervos pile longius nliatj triticilla «fri inflmi subhirsutis, superioribus in *inca* 1-1/2-pollicana dillopo «iti Folia floribus in *Oma* caulibus conformibus floribus «upcraniis, superioribus *MI* * lia lanceolata acuta, calycibus brevioribus Bracteeae linearis Atriatar, calyce brevioribus. Floret magnitudine C. *Marianae* - In Brasilia meridionali
- 10L C. MK.MIIOIDKS Bib. I. c. 363. t - Ilerbacea procumbens raris tiliis; foliis ovatis uobis oblatis «u crenatis, basi rotundata, verticillatis dense multiobis disjunctis % supremis apprimatis. % - Bami elongati «ub«imphe*» pilis paucis «illosis. Folia seipollicaria, supra rugulosa, teoukrr pubescentia. utrinque glandulosa, subtus ad nervos prominentes ciliata. Verticillatis *P<^C* iubgloboi Folia floralibus caulibus conformibus, superioribus sessilibus. Bracteeae late ovatae membranaceae ciliatae — Habitat in Brasilia meridionali.
- II. C. GAUOIDBS fiih I. c. I - Suffruticosa procumbens foliis parvis laevibus oblatis inermis. Verticillatis nullofloris drosis *I* *picam* Hongatam basi subinermis apprimatis. — Bami elongati **rgall.* *f B* [^ «irni* pubescentes. Folia numerosissima. 2-3 nervis longa subsessilibus *ri* *cc* ^ duphraia, supra subtus imbricatis pubescentibus, subultra glabra fl. *dolos* ^ Vericillatis disjunctis. Folia floralibus caulibus conformibus, superioribus *IB*nOirxf* *lyce* » «*Bequealia*. B r t e i w conformibus, paulo brevioribus. Calyx ciliatus *u* *bus* *pubescens*, lobis Uuce villota, denubus laevibus breviter *U 111*

Corolla pallide coccinea, exclus pubescens, calyce duplo longior, faucibus dilatala inlus villosa, labium superius planum, \lx emarginalum, inferioris lobi angustiore subaequilis inlegrnmi, v. medio parum longiore submarginale impunctato. Genitalia exserta Antherirura loculi parallel. Sili lobi tuberelet, supernore paulo brevior Acbaema malura non *isa. Odor forlis aromaticus *Menthae Pulegtt* - Habitat in Brasilia, in campu provinciae Mmas GeraJt cl paludibus provinciae Sanciai Pauli jb urbe Castro ad Curiliba vulgaris.

12. C. FASCICLLATA Bih. I c. f - Suffrutescens procumbens: ramis piloso-hispidis, foil sub«c»ilib fascicularis oblongis obtusis inlegrrimu, margin* molulis, ulrinq. hispidis, vcrimllastris densis munitis, in capitulo oioidea lermmalia aggrega. 3. — Kami piloso-bi»pidi iciragoni Folia 3-5 lncas longa, in axillis fasciculata. Florum caputulum /i-1 pollicem longum, >rclicillasro vaepius allero a capitulo disiinco. Folia floralia cauliois conformia. Bractae ramosae, inlenores hncarc srialae ciliae. Calyx ovalut pube*cens, inlus fauce \illoo, dentibus subaequalibus credit, bail laecolalit tubulalit ciliae. Corolla exclus pubescent, miut \illo»a, lubo brevlier eiterlo, fauce tubdilaiaia, labium »upcus planum, >ix emargioalam, infer!us patent, lobit lateralibus lotegcrrimit, medio longiore tubcmargioalo. Genitalia extcrU. — In Brasilia meridionalia.
13. C. MICROCEPIALA Bib. I. e. 304. f — Herbtct* procumbeot: rtmit vix pubeteeiib.; Toll, pciolaiit obloogit obovlltte obUtlit loieftrrfmlt Y. tubtlnotto-terralis, basi angustiait glabrit plants; verticillatrlt nalUBorlt deotit, capitulo pana globosa subierminalia formaniibut Q — Caulit ramotlttimut, raral iciragoni, sub lcnte icnuissime pubc»cenes. Folia disUnlit parva, juniora in axillit suhfahCiculna, in nervo medio marginibusque sublus prominulis glabruscula, sublus glandulo!»a Flores in \erticillastro denso termmalia capiluiifonui > nonnulli saepe in terciinllasiro aliero a terminalli cmolo dispoMli. Fuha fluraha caulims conformia, rapitulum suprrantia. Bractae o\atac arutac membranaeae, caljre saopiui bretinrci CJLIX oalus »tnalus, rxtus glabrusculus, lulus fauce villosissima, denlibui laic lanrrolalis aculis, tubo broionbui. Corollac albae tubus MI exserius, fauc dilatala inlus villosa, limbut >i\ bilabialus, labium tupcriut planum, late oiatum, bre\i%»ime fmarginalum, labii Infrriort lobi paulo angustiore, tupra punrus 2-4 purpurnt notali, Itlcract iniegerrimi, mediut submarginatut. - llabiiat io America meridionalia, In Brasilia mehdiooali, in republica Argentina et in Pcrufia.

f *Species ignota.*

14. *C. VERTICILLATA Mocnch ex Steud. No mend, bot (cdiL I.) 800. - Zuyj>»«ra rtrlinUala htcud. I. c.

ft *Species § genere excludendae**

- C. DLCIANAM Sprcog. — HEDEOMA ^EPALEMSIS.
 C. CAPITATA Linn. — ZIZYPHORA CLINOPODIOIDES.
 C. COCCINEA Hook. — GARDOQUIA HOOKBRI.
 C. PRUTICOSA Willd. — WBSTBIKGIA ROSMARIMPORIII.
 € GLABKLLA Michx. — MICROMERIA G LABEL LA.
 . C. UISPIDA Sprvng. — BEDEOMA II ISP ID A.
 C. LYRATA Schraok. — SALVIA LYRATA.
 C. NEPALENSIS Don. — UEDBOMA NPALEN8I9.
 C. PULEGIOIDES Linn. - HEDEOMA PULBGIOIDES.
 C. TIYMOIDES Gou. - MICROMERIA FILIFORMIS.
 C. TUYMOIDES Linn. - TIYML'S SERPYLLUM.

Tribus V. *MEUSSIXEAE* Bth. Lahiat. gener. ct spec. 365.
— Endl. Gener. plant, p. 618. — Meisn. Goner, plant. >ascul.
I. 285.

Calyx 13- rarius 10-neniis quinqueedotatus bilabialis, labio superiore Iridentato, inferiore biOdo, rarius acqualis. Corollae tubus risertus v. rarius inclusus, inlus eiannulatus, limbus bilabiatus, labio superiore recto inlegro v. emarginato-bifido subplano v. raris«ime palcato, inferiore patente, lobis planis subaequalibus v. medio sarpius laliure inlegro Y. emarginato. Stamina adscendentia didtina, superioribus broioribus, interdum abortieotibus.

3015. HEDEOUA Pen.

{Pen. Enchir. II. 134. - Meisn. Gener. plant, va*cul. I. 2*5. II. 103. - Dih. Labi at gener. el (pec. 3W. et IX.)}

SaeUo I. M08U Bth. 1. c. 366.

Calji otaius, labio superiore palcne subplano broiler indrntaio. Herbae fo-
lls tjfntatis.

1. II. MIPALENSIN Bib. L e t - Caule herbaceo ererto raro«o glabnusclo; foil, peiolaii* ovatif, ulrinq. aognaUlia aerralts planii glabnu«culi«, flonlib. partii; vertieillatint biflori* fecuodii late racenoait. % — r.auli» 1-3-pe-
dalis, angalta acullt atbatperia, caeiemn glaber. Folia aemipollicaria v. vii
pollicaria, aopra vridia aobrogosa, aobtoa palldtora tenota. Bacemi numero^i
anllarea, baal folioiL TaitiellUatri dmuaj aeanpollken dialante*. Bractaea mi-
notae iubnolla«. Nona panrl. Calyc«a brelrier pedkellaii decliaati, poal aaibe-
stn tobioflaU, labil inferioria lacniae lanceolaUe obioaae, toperioribot longl^rei.
Faux iolut p lit breviboa villoaa. Corolla calyccm m aequana. — *Cumta Nepa-
Unsis* D. Don, Prodr. fl. Nepal. 107. — *Lycopu* dianthera* Boib. Fl. Ind I. 145. —
Melissa Srpalmii Dlh. in Wall. Plant. AsiaL rar. I 00. — *Most a ocymmdrs* Ha-
mili msv ~ *Cunila liuchanani* Spr. Sy*1. \egel. 1.51. Ilalniia in Indiae orico-
ttlis jüüio Ilimal.ijensi, in Ncpjlia, Dfjra I)boon el Cathmeria.
- J. II PI I KiilOIDKS Prr«. I. c. — Blh. L e t - ^«ule herbaceo rrerio ranofa
)«l)f«ronU', foil prholalis ovali«, ulrinq anpu%uii< %uhsfrraii< plami pubeteen-
tj|>, florulib ronformib , mtirillatirif anllanb irtflorM. rnn>lli« ral)rem aequan*
lil>U4. "4 — Herba granlif tenipedalif, fanr *Melissa* Annot.* Folia semipollicaria
el ulira, lenera, nunc integemma, aaeptum terraiunt pauf rrmoi« hinc inde
nutala. Prdicelll 1-2 tin. longi. Brarirae ad basin pedirellorum oblongo-lfnea-
rrs, pedicello breflorct. Calyi 2 lin. loogu* •inalut, deoi(*« labu nupcrioHi bre-
vet ovali aruli««iiDi, Ubium lofrriot doplo bretioi, lannn« »ubulati« ciliati*.
Corolla vu caljce longior, eiioi pobetcent, labium »upenu« conravum brevier
•margioaiom, infenont lobi iDiegernii tubarquale*. — *Meltssa pulegoidi** Linn.
Spec. pUat vedu. 11 303 - *Cmmila puhgtotdet* Lino. Spec pi. 30. - *H*yP^k•^{ra}*
pultgoidn fecoiB. el Srball 8)it tegel I. 900.
I *Mfxitamm* foil. tub»e«»ilib., ulrinq rolundaiii. - Ilaliiiai in Americae bo-
reali« arvit »kcu nontomque a Canada ad Carolinam u«qur, 9 in Mei^co.
J. H. PIPBBITA Bib. I c. 730. t - <«««d< herbaceo pubr»cenie. foil. ••batMiljw
ovaiia obloala tobrrenalM, ba«i roiundatit glabnutruli«, floral.b •ubconformib.;
vertlnllaairit atillaHb. tabtetOont. corollia ralyrem •ub»uppranlibui. % "J. RⁱI?
erern bre»e« »ob»ioplirrt Folia «n •emipolltrjma. uinnque %ird»a, flori i«
Binora angutliora, tuprema raljret tit aequanlia Brarlrar nblongae ^J!*^J
la) trrucillatiri* tupremli tubnullae. r.aljrrt pubr«rrnr«, frrr *H'M**** *H I
*k*Us*. duplo najoret qaam in praecedentir Prdirrlli ferc hoeaea lo»f» «-«-''
«omplaaaU. Corolla purpuraicent? - *Cumila ptpenta* Mo{. el Se*. 10
N«« Ul.p.o.a babiut

Sectlo II. HEDEOMA Bth. 1. o. 367.

Calyx tubulosus lobis denibus omnibus* subulalis. Suffructus folis integerrimis.

- 1 II. CIIIIESII Bib I c I — Caule suffructuoso glabro, foliis subsessilibus. Inflorescentiis
 oblongis in irregularibus basi angustatis glabris; verticillatis bifloris, corollis caly-
 cem glabrum ut superanlibus* % - Suffructus 2-6-pollicans Folia (*Thymus tu-*
gartsj) linearia, basi in pediculis bracteatis angustata, punctata rugosa glandulosa
 aubfasciculata Pediculi folia linearia subaequalia. Calyx declivis tubulosus,
 pedunculum aequans, glabrum 13-15-nerviis, basi subtus gibbosis, sub faucibus villosis,
 parum contractis bilabiatis, labio superiore 3-dentato, dentibus linearibus-subul-
 latis recurvis, inferioribus* bifidis, lacinis subulosis incumens ciliaris, labio inferiori
 sublongioribus Corolla violacea calyce vix longior, faucibus \ll inflata, labio su-
 periore bracteatis emarginato, lobo medio labii inferioris integerrimo. Odor
Thymus Ab arboribus #/. *Mutiflora* differunt verticillatis bifloris, glabris omnium
 partium, corolla minori etc. — Habitat in America meridionali ad Cerro de Aclinas
 prope Mendocino.
- 5 II POLIGALAEFOLIA Bib. I. c. f — Caule basi suffructuoso ramosissimo, foliis
 crebris sessilibus ovatis obtusis integerrimis, basi angustatis coriaceis glabris, flori-
 bus ad apices ramorum approximatis; corollis calyce glabro dimidio longioribus.
 q. — Caulis nunc rosissimus, basi procombeo ligo subulosis, aculeis tetragonis. Folia vix 3
 lineas longa uninervis subulalis, creberrime punctata. Floretis pediculis, folia Boralia su-
 per iunctis pediculis in tenores 3 lineas longis, apertoret brevioribus, omnes supra ba-
 sin bracteis 2 subulalis auctis Calyx 3 lineas longis tubulosus, profunde striatus,
 dentibus lanceolato-subulalis, bimis nervis longioribus angustioribus ciliaribus. an-
 nulus tubi inclusosissimus Corolla extus tenuiter pubescens, ralis in di-
 midio longior, lobus inferioris erectus, labium superius erectum craeginaio-bifidum,
 inferioris lobi subaequales rotundati integerrimi — In Brasilia meridionali
- 6 II. MULTIFLORA Bib I e t — caule suffructuoso, basi ramosissimo, ramis pu-
 bescentibus, foliis subsessilibus linearibus integerrimis, marginibus revolutis punctato-
 scabris brevissimis verticillatis atillatis. S-0-floris; corollis raro
 biplo subduplo longioribus % — Ubitua fere *Micromurus Graecae*. (caules
 terpedales, basi lignosis ramosissimi, rami terpedenae, per lorum fere longi-
 tudinem florigeni. Folia 3-4 lineas longis acuta, creberrime eicavaio-pooquia uni-
 nervia. Pediculi in antheris quaque 1-3 nervis, 8-3 lineas longis. Bracteis ad
 basin cujusque pediculi 2, foliis conformes, aed pedicello dimidio breviores. Ca-
 lices 2-3 lineas longis, profunde striatus, ocellis elevatis breviter biplo, dentibus
 subulatis nervis, inferioribus duplo longioribus incumens ciliaris. Corolla eius
 dense pubescens, ralis subduplo longior, tubus erectus, labium superius bre-
 viter emarginatum, inferioribus lobis inermis Integer. — Habitat in Brasilia
 meridionali
- 7 II. DIMONDI Bib. I. e. 36. f - Caule suffructuoso ramosissimo; ramis pu-
 bescentibus, foliis pediculis oblongo-linearibus. Inegerrimis; verticillatis 0-10-flori-
 ris; corollis calycem biplo vix superantibus. 4* — Caulis basi lignosus ut
 detur, 4-6-pollicaris. Folia semipollicaria acuta v. oblonga, pubescentia brevi, uti
 ramus aspera, in pediculis basi angustata, ad axillas non fasciculata, ocellis cal-
 ces tubaequans Verticillatis inermis tepede IO-Borl. Calyx pampis, profunde
 U-linearibus* subbilabiatus, dentibus omnibus subulatis, faucibus intus villosa (orol-
 lae minutae — A// *GUhsn* differunt verticillatis multifloris el calibus luspis*,
 a #/. *mutiflora* corollis minutis, a *U hwpta* calicibus minus biplo* M) bi-
 labiatis, braiis hubnullis el alis noils. — Habitat in America boreali, ad Monterey
 provinciae Texas Mexicanorum
- a II HISPID K Pursh, Flor Amer sept II 4M - Bib I c - Annu recta nmu
 aubhilokis, foliis sessilibus linearibus obtusis integerrimis, linearibus conformibus (We!
 tuperanlib, verticillatis subulatis, bracteis* lanreolatis-subulatis

aequantib.; calycib. ciliaio-hispidis profunde bilabialis; corollis calycera vii excedentibus. O — Herba 2-4-pollicans ramoso»ima, dense fohosa, rami pilts bretibus reflexis pubescentes. Folia senipollicana umnervia \mdia. \crlicil-lastn numcrosi, supenores appronnali. Folia flonbus duplo longiora. Calyces basi gibbi, deniibus anstalis. — *Cuniia hitpida* Spr S)*1 tegetab I. 54 — *Zizyphora hitpida* Roem. et Schult. Syst. vegetal. Manl. I. 179 — *lfdeoma htrla* Null. Gen. pi .Y Am. I. 10. — Uabilal io America boreali ad Missouri, ad Mississipi el in Rocky mounlams.

t *Specie* e genere expcllenda.*

II. ARKA>SA!VA Null. - MICROMERIA ARKANSANA.

II BRACTEOLATA !Null. -* MICROMERIA BRACKOLATA.

II. GLABRA Pers. - MICROMERIA GLABELLA.

II. THYMOIDES Pen. - THYMCS SERPYLLI&t v. MICROUKIUA FIMFORMIS.

3010. MICBOMBIA *Bth.*

(Blh. Labial gener. et spec. 371. el 730. - Meiso. Gener. plant, rascular. I. 285 II. 103)

Sectlo I. USPEBOTITÄUS *Bth.* 1. e. 371.

Flores in pedicellis aiillanbus, uirmque 1-3cal)ce longionbu* sohurn, pe»lun- culo commum nullo v. rarius elongato. — Herbae Amencanac foln> naepe rrrnaii*.

1. M. GMBELU Bib I. c. | - Glabra: raule berbaceo ereclo pumllio; foil. «e»i- lib. oblongo-lieoanb. obians lolegerridis: verticillailns »ub»eiflon«; pedicellis elongam oudis; cal) cib. tubbilabialis, deotib. onoib. tubulais, fauce inlu» vil- lota. O? - Berba puaila km oaiol p&rf glaberrima, aaepe purpurasceos, et basl saepiut •lolosjlfera. F*It o Isj flotoaibn peiioiaia otaia, In cauliboa obloogo- hnearia tempollicaria. BraeUM folilt eoBformea, pedicello vts brevlorat. Pedi- celli el calycw 3-lieoaret. Calye«a U-DtrtlI profoode alriail, deniiboa osMibua laoceolaio-aobnUlis, 8 lnB»It protaodloa fltafa. Pans ?illo*laalnia. Corolla ca- lyce duplo longior glabra, labion aoperrui inlegruro, labit infenons lobi sub- aequales, medio inlrgro. Stamina mferiora sub labio «uprnore a«rendeniia(suprnora brevissima, tubo inclu»a. Antbrrarum loruli dnergrnlr<< Stylus apice Mibjo.ualirr* bifidus. — *Cumla globella* Mirhi Kl. Bor Amrr I IP — Jf«- *ijlabu»Null. Gen pi. Y Am. I. 16? — *Zizyphora tjlabeUa* Room el Scholt*

Syst |kj;«lib I JUD. — Uabilal in America bnrrjli, in lanada, prope >o«um Ebo- raium, in rup(*»iribu^ %æx< (lunos bi. Lawrence, Ohio, Trnr^srr el MitsissipK

2. M. HIKDEOVA Nult. Trao*act. of the Aronc. ph.I Soc V. 1^6} ARKANSANA Bib. I. c. 730. - Caule ramo«o; foil. lineari-lancrolaU* anilce *rrralif, superlorib. iniegrnmis; terlinllamni sobquadrillorit; prdicrllit ad banin bibracieolalls; flonb. letraadns. V - AfBnU U *glakrae.* odore *PuUgi»* Tola plania gl'bra glandulota 4-6 pollices alia. Pedicelh ealycem cyliodrareum aequanirs Drnies calyrim teUeel. Corolla subrampaoulaU coerulea, palalo albo. - Cretcit ⁱⁿ AneHcat tepieotnooalis terra Arkantana.

3. M. (HEDEOMA Null. Geo. pi N Am add. - ZIZYPHORA Roem el SrbuU- ^{Syst.} *Wb. MaBt I. 179.) BRACTEOLATA Bib. I. c. - Pubtsrraa- caule si ^{mplicl} lenui. foil. hoeari-lanreolalN, otrtnq acutis iotegerrimis. pedirelh* ^{>el*eeo.} brarieolalii 3-5-0ons; ralyre obloogo aequali; corolla miouta. O? — flablUll ^o Amenra boreali, in Carolina.

1 M. hTOLO.MFEBA Bib I. c - Caule brrbaceo protiralo radiranie I^{1*5} ^f Jjj setailib. ovato-rolttodati* oblus»» »ubcrrnali», ba»i tubordali% glabris; ? ^{dic} *g elongant nuditi calyns deniib o*aio-laoreolaii«, fauce miu» %illota. % — * *Xalapnti* differ! raollbus subflrnioribua aruie leiragomt ft Coins l«l^orib*^f JjjJ[^] silibu«(nrc peiolo limbun aequame dooitit. Raroi el folia *Grtholmm* rt» ⁱⁿ Habiat in Nmrj Nispaaia.

* M. BftOWXEL Bib I. e 371. - CauU berbaceo pro.lrato glabro; ^{Coll. P^{ellOli*}} atoroU ^o obtais saberroatis glabris, pedirellis eloogatis ^{****} Cjij ^{ca}

- denlib. ovaio-lanreolalis, fauce inlus villosa. 2l. - Caulcs ba»i saepius rpenles radicanles, rami filiformes, apico ascendenles, uti tola planla glabernmi. Folia vix 3-4 linear longa ci lala, ba*i iruncaia v. subcordaia, >i\ \enosa, ulnnque viridia, floralia m.nora conformia. Verlicillasiri biflori disianles. Braclcac *ubnullae. PedicHh hliormes. Flores magniludme Jf. jUiformu. Denies caljunl Uti subaculi. Corollar lubus broiler exserlus. - *Thymut Brownei* S*arlz, Prodr. fl. Ind. occ. 80. - llabii ai in America calidiore in Florida, Jamaica, ad Sania F6 de Bogota, in Brasilia.
6. M. XALAPENSIS Bih. I. c. - Caulc herbaceo proslralo piloso; foil, subsest.l.b. ovalis subcrenalis nhalu; pedicelli» elongalis nudis>; cal>cn denlib o\alo-lanceolatu, fauce inlus villosa. ^ - Ab affni praecedenie diffcrl folns subMS*ilibus ovalis nec rotundu, caulibuKque pills longis albidis hmuii*, a *M. ttolontfera* foliis angu<»ioril>us pilo»if. — *Thymut Xalapenris* H. B. Klh. No\ gen. el sp pi. Amer. III. 310. - llabii ai in Meuro, in declmlaie monlium soh orienti ob>crsorum inier tillom Pilela el orbem Xalapt, In humidis prope Xalapam.
7. M. C'NMNGIAMI Bib. I. c. 73a — Canle herbaceo proslralo lenuiler pubescenic; foil peiolalis rolandalii tubinlegerriml} pedicellis elongalit nudic*; calycib. birtuils, denlib. ovalo-lanceoUla_v fauce inlos noda. ^ — Jlabilui ommno Jf. *Brotrnei*. Rami tobflrmloret, folia ejusdem magniadinU vlt anqoan ob<o-leie crenata. Coljx magniludine if. *Douglasii* el pari modo poll amheslq ovato-globosus. Denies Inlus villosi, ted faux noda. Corollae tobut Incluaaa, nagniludine ei forma If *laturejoidit* el *au\$ralit*. — Creteii In Novae Zeelandiae iniula scpieninonali ad oram occidentalem prope flumen Manqamaka Hoklanga.
8. M. D(r<iL\SII Dlh. I. c. 372. | — Caule herbaceo pro»lrato; foil, peliolain oalo-rolundalis obtusis crenaiis, bnsi rolundnlo-truncatu, ulnnq Klabris, pedunculis elonpIK, basi \. nicdio bralcalis; caljc* denlib. subulali*, faun* intus nuda. ^- - Kami longissimi proslralo-rpenles letragoni, lenuiler pub<»rnrirH. Folia infenora polhcana, rimoalia MMiupollicana, lailudine loigiiiidiirin MIII-aequaniia, marRino «iibri*|o|uia ner^o«a tcabra sublun pallida, peioln pube^rrnie 2-4 lin. longo. PedicHli circiier \ linea» longi, bralcit S bretibui »ububii* aucil glabri. Calyx »inaiu* Kubglaber, deniibus aequahbai, fructifer baii inflalu* otalo-globosut, dentibnt tuberecln, corolla dimtdio brevior. Corolla 4 lin. Unga purpurea, extut pubetreni, labio superiore emargioalo, inferlorlf lobo medio io-tegro. Tubus ei faux inlus glabra. Siamint 2 superior* lobo aublnclusa, 2 inre* riora adscendeniia, labium superius subaequaniia. Antherantm loenli divergenles. Stylus subexscriiM, lobo infenore complanalo obluto, topertortm brefiorem basi invo|enic. Arhaenia subglobosa nilida laevia. — *Thymus Douglmtii* Bib. Lmnaea M 80 - *Thymtu Chamis\$o*i\$* Bib. Llnnaea VI. W. — Habiiai in America borrah-occidental! ad flumen Columbia el in California lepienlrionali.

SecUo IL PIPKBBLU Bth. UbUt genar. it tpee. SIS.

Flores sul^essiles v. In eapilula sessilia pedunculaUque glomtraii. PedirHli lubnull v. caljcc brevlora^ . VerttcillasIH axillares v. aubspieail — Suffrullcei \. rarlina berbae. Folia iniegerrima venosa, aaepe dura, floralia eaulinis tubconformia.

* *G9ron(og\$at*.

0. M. JULIANA Bib. I. c. f — Pubescent suffraUcoia: ramis ereciit iiriciis; foil, bessilib., inflmis ovalis, supremis lanceolato-llnearib., omnib. obiusis integrri-rimis, margine revoleus; florum fasciculi! densia brevlier pedunculaiis; bracicis calycem tetsiiem subaequaniib.; denlib. calycinis subulali» rigidis, laiiitudim lubi vix aequalib., fauce inlus nuda. ^ — Caule* basi lignosi procumbenie^ ramo»is-simi, rami pubei»cenieh, v. in var. *fl.* hirsuli dun, pedales el ullra, parum ramulosi. Folia fore omma o\ala, suprema el floralia angusliora, \erlicilla»lroi %\% auperanlia. Pedunculi ulnnque brousimi 0-10-llori el ullra. Florum fi sciculi cum pedunculo m 2hn. longi densissmi. Caljce* riguli Mririi, brarin< dense suffulli glabnusculti, denlibus bmissimis subaequalibus. Corullae **minutissimae**

vix calyces superantes, labium superius brevius emarginatum. Stamina ad faucera corollae inserta, superiora brevissima, inferiora longiora ascendunt, sed corolla breviora, antherae per paria approximate, inculis linearibus demum ditancalis. Stylus corollae multo brevior, lobo superiore pariter brevior, inferiore subcomplanato. Achania oblonga laevia. — *Satureja Juliana* Linn. Spec. plant. 703. — Sibth. et Sm. Fl. Graec. VI. 32. t. 540. — Ten. Fl. Graec. t. 151. fig. 3. — *Sabhalia corymbota* Moench, Melh. pi. 380.

fi. hirsuta. *Satureja Juliana* var. *caneterns* Gu* s. Prodr. fl. Sic II. 114. — *Satureja hirtula* Presl, Del. Prag. 70? — Habitat in regionibus mediterraneae eolibus siccis saxosisque in Sicilia, regno Neapolitano, Dalmatia, Peloponneso nec non Croatia et Zarynbo copiose, insulae Corcyrae et Lerinae, *fi.* in Sicilia, Dalmatia.

10. M. GRABCA Bib. U f - Pobeseem: ramis erectis v. ascendentibus; foliis ellipticis, inferioribus orbatis ovatis, superioribus lanceolatis-linearibus, omnibus integerrimis, margine revolutis; florum fasciculi axillares teretibus; Tracheis plerumque calyce dimidio brevioribus; deolib. calicini nubilosis, latitudinis lobi longioribus, fauce iotos ullosa. *4 — Stirps variabilis. Caulis basi lignosi procumbentes ramosissimi, rami ascendentes «. orricil, glabri, sarpus magis minute pubescentes, pedales et ultra, pariter ramis, laxiore quam in praecedente. Folia inferiora, superiora breviora, utrinque 2-10-flori. Bracteae paucae setaeae, plerumque calyce nullas breviores v. exterioras 2-3 concernere aequales. — *Satureja Gram* Lies. Sptc. plant. 704. — Sibth. et Sm. Fl. Graec. VI. W. I. 542. — Ten. Pl. Nap. t. 151. f. t. — *Thymus mieranikus* Brot. (Pb) t. Lus-30. L IX - *Stunja mitram* Om Bofto. ei L Jok, Flor. Port 1.142. — *Tkywnu* Air-Iu4 KOM. Hal. Mat. Alt? IL ML

fi. longiflora Guss. Prodr. I. Sic II. 117. — Corolla calyce duplo longioribus. — *Satureja comstmanii* T.M. Fl. Nap. III. I. 151. fig. 0.

y. densiflora: florum racemulis densis, brevibus pedunculatis; calycis fauce inclusis minus villota. — *Satureja lemifolia* Ten. Fl. Graec. I. 151. C. 4. — *Juncromeria unguifolia* Reichb. Flor. Germ. excus. 310. — *Salvia hirta* Hoffm. Fl. Austr. II. 14? — *Thymus rirgalut* Ten. Fl. Nap. U Iw. (fig. 3. ex ejusdem.) — *Satureja congesta* Horn. Hort. Hafn. rx Sprng. Syst. teglab. I. 710. — Habitat in Europae regionibus mediterraneis cullibus «ICCK» «axo» «i» «q» in locis umbratis, Corsica, Italia agro Tarentino et Neapolitano, in Sicilia, Peloponneso Graeco et insulae Corcyrae, in insularum Cuiusdam Sarol rupibus rari et in Syriae montibus.

II. *st.* (SATIREJA Vitae, Flora (B. I.) IMO. I. Ergning «bl. ia - Flor. Dalmat. t. I. 0g. I.) PARVIFLORA Rrb. Fl. Gem. excus. HM - Rth. I. c. 711. - *st.* g labra: ramis fob credit; foliis, setulosis, omnibus linearibus. inirrigatis, margine revolutis; pedocellulis foliis aequantibus. late fobtrioribus; bracteis minutis; calycibus tobalatis, superioribus lalioribus, fauce iotos villota. — *st.* differt foliis multo angustioribus glabris, floribus Ingr. pedicellulis *st.* calycibus doabot forma et longioribus inaequantibus. — *st.* Flor. Atriat II. 131 tow Sl#.) - Creta in Dalmatiae extremo confinio pro Albani in montibus Patrolibus.

H. M. CRISTATA Griw. Splcleg. flor. Rumel. II. 122. - Suffruticosa: foliis ellipticis, inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis-linearibus, omnibus integerrimis, margine revolutis; florum fasciculi axillares teretibus; Tracheis plerumque calyce dimidio brevioribus; deolib. calicini nubilosis, latitudinis lobi longioribus, fauce iotos ullosa. *4 — Stirps variabilis. Caulis basi lignosi procumbentes ramosissimi, rami ascendentes «. orricil, glabri, sarpus magis minute pubescentes, pedales et ultra, pariter ramis, laxiore quam in praecedente. Folia inferiora, superiora breviora, utrinque 2-10-flori. Bracteae paucae setaeae, plerumque calyce nullas breviores v. exterioras 2-3 concernere aequales. — *st.* Flor. Atriat II. 131 tow Sl#.) - Creta in Dalmatiae extremo confinio pro Albani in montibus Patrolibus.

13. *M. TENUIS* Blh. 1. c. 731. — Suffrenlicosa procurobens: ramis adiceodenilib. floecoso-lanalis; foil, sessilib. linearib. aculis inlegerrimis, margin© revolulis lanaiis; •erlinllaslns 2-0-flons; calycib. sessilib., deolib. tubulaus ngidis, lubi latitudine longionbus. ^ — Rami floriferi 3-4-pollicares, derue folios! el floriferi, uii folia el calyces lana brevi laxa subflocofa canescenles. Flores plerumque in aiillis •oliiaru, folii* floralibus subbreuiores. Bractea subulalae, calyre breuiores. Calyces lenues. Corollae denies caljclnoi vis eicedentes. — *Satureja tenuit* Link In L. v. Buch, Bes»chr. der Canar. Ins. 143. — Habiat in in»ularum Cananen-sium monlibus.
14. *M. LA*ATA* Blh. I. c. 731. (nee 374.) — Suffrulicosa proenrobens: ramis ascendenlib. floccoso-lanalis; (oil. sessilib. linearib. obtusis inlenernmn, margin? rc-YolniiH, Innatis; terlicillaslrís 0-10-(loris; cymil pedunculalis; caljcb. i»e*silib., deniib. hrc\itsimis mollib. tomentosís. 2|. — Affinit *Mgtenu*(el inter bane el if. *van am* qu >M media. Folia breuiora el oblusiora quam *M. tenuit*. Inflori'•-centia *M. rartae*, a qua differl superfcie tola lomenlo v. lana bre*i Candida foliisque crasoionbus. — Crescil in montibus insularum Cananen»ium.
15. *M. VARIA* Bth. 1. c. 374. t el 731. — Suffrulicosa procumbeos pubescens •. tilloua: foil, sessilib., ioferiorib. ovalis, superiorib. laeoelalis, ad atillas sobfatciculatit, otnnib. obtuafs, marsjine revolalia, soblos sobeoescolib.; florib. mloails In fasciculo sensili v. pedunealalo sessilib.: braeis minoils; calycib. lubulosls pobesceniib. folio florali breuorib., fauce ioius villosa. % — Caoles ramosissiral lignosi procumbenies, rami procambeolet, adsendenles •. erecli, cano-iomenintii pubesrenies, ranus glabri, dense foliosi. Folit olrfnque tomenio brevimdmo canesceniia v. ranus pubesceniia v. glabra, inferiors pauca ovaia, media r| *u-periora lanrcolaio-lineana, floralia confonnia, calyces saepismme »uper.intia. Fasciculi florum utnnquoS-IO-nori, saepius sessiles, pedunrulo nunr 1-3-lincari. Pedicelli breuiHsimi. Calyces recli, lenuissime pubescenies, m 1/, lin Inn^i, saepe purpurascenlov Corollae vu calycem excedenies. — *Satureja tana* Hmh. el Webb mts. — *Thymus encaefolius* Rolb, Cal. II. M. ei Willd. Knutn. pt hurt. Berol. Oil. — *Thymus inodorut* Bib. fn Linnaet VI. 77. (noo Desf.) - *Saurrja thymoidtt* Lowe, Primli. Dor. Mader. 10. * Babiui ia insulU Ctaarienslbut \ul-gaUaalma, la Madert, Ttoerlfft el Porto *Umto* t4 In latnU ia»cU Nloolol.
10. *M. APPROXIMATA* Bchb. Ft Gem. Me, 60* - Bit Ublat nier. oi spec. 375. — Suffrulicosa procumbeos pvboseou T. rffHoMt foil. sesalUb. Itaceolails, superiorib. linearib. subfascicotalls, omnlb. obtntlMCtllt, Bttorfloo sobrovolutis; florib. breuiar pedicellais; bractels pedicellam aeqnanlib.; calycib. lobulotls pubescennb., fauce mius villosa. 0|. — *M. earfa** valde affloit, differt floribus subduplo mnjonbuH (magmiudine II. *Graeea*§) el follis longloribus, caeterum vllio-siiaic el habiiu ud <perie< praecedeos variaL Calyt 2-S¹/, lio. longus, uli folia el ram i >a>pe lnsutuj*. Corolla calyce dimidio loogior. — *Salureja fatciculata* Ha flu. Préc. des Dcrouv JO. — *Satureja approximate* Biv. Manip. V. 13. - *Thymus fruticatotut* Ben. Amoen. Hal. 101. — Habiat la Europao medUerraneae au»ira-lioris collibus siccis, in Sicilia, regno NeapoliUno et Albania.
- 17* *M. IMODORA* Bib. I. c - Suffrulicosa: ramis pubeieenlib.; foil, sessilib. numerosissimis fasciculaiss parvis lanceolaIU obtusis, margioe re\olults canosceolib. ellialis; verlicillaslrís pauciflori*; florib. In fasciculis foliorum sabsostflib.; bracteis minuiis; calycib. lubulosls glabnusculls, fauce iolus villosa. ^ — Fruicx ramosismmus ereciun, fere pedalis. Folia minima pcrennantia rigidula ariformia. Corolla purpurca caljcc longior, magmiudine *Thymi Serpyth*. Labium »u-perius iolegrum oblukum, infenons lobi subacquaales rotundali Glandulae oullao aul rarisMmat*. — Ab afflmbus *M. taria* el Jf. *fatciculata* differl raule erecnore, folu» minonbus, numeroM>simi« an|(u»iioriliUH. — *Thymus inodorvt* |)c>f. Kl At-lanl. II. 30 I- 1-9 — Habitat in Al^eriae collibus andm el loruliu.
19. *M. DENSIFLOHA* Blh. I. c. - Suffrulirola diffuta ft Libra ram.» al>lirma(i%. foil, approximatis keskilib. lonceolaio-linearib. aculu, marK'inc r«\<>lutis fl<_r<<lib. III. <j]

- calycem aequantib.; verticillastris sub-10-floris, in spicam ovatam dense approximalis; calycib. sessilib. tubulosis glabrusculis, fauce intus tillosa, dentib. lanceolato-subulatis ereclis, lalitudinem lubi vix aequanlibus. 2]. — Habitus fere *Thymi SerpyUi* vaneiatis *angustifoliac*. Folia 2-3 lin. longa, supra tiridia sublucida, sublus pallida aubcanescenlia. Calyces 2 lin. longi siriati, saepius purpurascetes subbilabiali, dentibus 3 soperionbus vix lationbus. Brarteae parvae subulalac. Corolla calyce parom longior, extus fere glabra. Anihcrarum loculi demum divancaii. Sljls subaequaliter bifldus. — In insulis Cananensibus.
10. M. FORBESII Bib. I. c. 370. — Pubescens aufrulicosa procumbens: ramis ascendentib; foil, subsessilib. oval is obtusis, basi rotundalis plarm>. marginesub-revolutis, utnq. pubescentib., flora lib. flores subsuperantib.; terticillasiri* densis pauciflons; calycib. subsessilib. ovalo-cylindrtcis, dentib. bretib. «ctacei* corolla breviorib., fauce Inlus.villosa. 2t — A Jf. *Trntriffae* differt pubrsceniia, ramis validionbus, foliis majoribus oonerosis, calycibus brevionbus sub>c*silibus, a Jf. *nerro\$sa* calycibus ninos pilosis, denlibus multo bretionbus, a Jf. *microphylla* calycibus subsessilibus el babulu validiore. An Jf. *rartae* varielas? a qua differt foliis omnibus ovalit. — In insola Sancti ISicolai Capilis Viridis Africae.
- SO M. SATIRKJA (Suss. Pl. rar. 228. I. 41) CAN ESCKNS Bib. I. c. - Villosocane<cens: caule gracili; foil, inferiorfb. ovatis, supenonb. lanceolalo- linearib. acutis; pedunculis axillanb. 2-7-flons solitariis binisq. subsecundi*; bracteolis bretib. pollicllo aequilongis; ealycib. pilis patulis villo>is<inm. 3- — Hacc cum descnpiione Jf. *G rat cat* fere io omnibus convenit, dnntaxat caule* supernc non pilis brevibus adprestitis sad palaniibos tillosl, faux calycis pema non villis elaosca, corotlae quanvis gracilea taneo ealyee fere duplo loogiores. — Habitat in Sicillaa collibus arietta ealcarais at la eollibus nantinis Japygiae.
81. M. NBRVO8A Bib. I. e. — Pobaeaeaaa soffruticosa: ranis ascendaollb.; foil, sessilib. onuib. ovatis atolls loaiferrinis plaois v. margine vix revolalls; ?erticillastns molUfloris, a<parl#rib. approilmatis; flaron fasciculis laxis vix aedunculalis; bracteis brerlsalnis; ealyelb. pilosisslmis, deniib. seiaceis palenllb , fauce imos subvillosa. % — Rani 4-5-pollicares simplice*. Folia omnia o>aia, inferiora laliora, basi subordala, nervis sublus sarpe piln bretibus luipidis, supermra angustiorj, basi rotundala v. parum angusuta, florr* snpranlia el saepa mnlhier villosa. Flores ninores quan in Jf. *Gratca*. Cahrr* pif% longis albidis pa(endbu« dense suffulli. Corolla vu CM)CC longior, laltium <uprnu< brevasime emargmatum. Anlberarum loculi oblongi dnjunch, demum di<ancati. Achaenia oblonga laevia. - *Satnrtja ntrrota* Desf. Fl. AllanL II. 0 (. 121. fig. 2. — *Salurrrja fUiformu* Ten. Prodr. el Mann. >lag. bol. I. 290. ex Ton. Syll. fl. Neap, tffe - *Tkymus /Utformtt* b'ieb. Pl. CreU eis. (non Linn.) - *Thymus Mastickin** Sn. Prodr. Flor. Grace, (oon Linn.) - Habitat in regionis nediterrancac eollibus siccis aridis el ftssaris nipiom, in Allaole, Sicilia meridional!, rrgni .Vapolitani nariiiims, Josolis Archipelagi Graeci at prope Leplin nagnam lybiae.
- fi. M. MICROPHYLLA Bib. I. e. 371. t - ftuffrwlicoa glabriuscula pubescens v. ?ill<*o-eanescent ranis flhfalrb.; foil, partis ovais obloogisve obtusis p'>^ v. aarftfte aobrevolulis. flomn fatciculis peduoculati* lans paucifloris; ^{brt}ete pedleallos a<baaqaolib.; ealyelb. ovalis glabnoseulis v. brenier villosis, f*co finius sobfillosa. ^ - Slirpt oil Jf. *Grmtcm* qoad pubescenlian el caolif <i>'' tudioem variabilis, v. onuibos pambus glabra el late virrns v. calyce ^{uni>mp} '' betcaaa v. uodiqot villosocoesens. Caolet flilifornes graciles ^{hr***f'w^} D+ias t-4*pollicarts, In «. ascendeniet v. erecii, Brniores vi Vi-I-P.'>'' •Ils variaUubot |fi>. Folia semper part a, l-« lin. longa, V.-l Ha. ^{Ueta} *Wet* in omnibus tariauuboa ooifomia, sobios nertosa, nargioibos ravolota, tireolia el glabra la «., pallidiora la *fi.* canesci-olia in J., el eicapia Mr. <t in-fanora saepius >orftorasc<oila. Pcdooocoli bracieae 'folio floral!) sob, ^{joctae sub-} aaajoalet t. pan>< ticadaoies l^ -lori, 1-tV. ho. loogi. PediaalMU <emilitea- m. BraaiaoU4 ibraetaaa) lloaaes >tucaaa, calycis basin sabalM***>'. ^{ref.} *Corollae* ^{ref.} *Purpurascetoi* P<baaaaaiaa parraa, calycis dealaa aobeieadcalM .. ^{oca} foU>to -

- a. *glabrtuteula* laele virens pusilla, fere omnino glabra. — *Salureja m<crophylla a.* Guss. Prodr fl. Sic. II. 120. - *Thymus Teneriffae* Dortul. non Peri. — *Satureja Teneriffae* Link, Eoum. pi. horl. Berol. II. 101.
- fl. *viUota-* (Innior, saepe purpurascens v. canescens, caulibus calycitjusque villosif. — *Satureja m<crophylla fl. r-* *• Gust. Prodr. fl. Sic. II. 120. 121 — *Thymut m<crophyllus* d'Urv Enum. pi. Arch, in Mem. Soc. Linn. Par 327 — *Salureja fUtformtt* Deaf. Flor. Allant. II. 8. I. 121. fig 1? - Ilabilat in regfone mediterranea au&lraliore, in fissuns rupium Atlantis, in collibus aridis Siciliae, regm ISeapoliiani et insulae Mediae.
23. M. OVATA Bih I. c. — Suffruticosa procumbent: rarois ascendenlib. villosis; foil sessilib ovatis oblusiusculis, basi subcordalu, margine rooluhs, utnq pubescenlib, floralib pedunculo brevlonb. v. suprcnts longiorib, (lorum fasciculis pedunculais laxis, dcnlb calyctnis brevib. selaceis, fauce inius wlloua ^ - M. *Forbesu el m<crophyllae* afQau, t priori differi ramis lenuoribus, flortbus minoribus, fosciculis pedicellais, a M. *mtcropkylla* tali is basi lalionbus, margine talde revoluiis, noralibus anguslioribus; an M. *micropkylla* \$ tar.? — *Satureja ovata* R Br. in App. lo Salt Aby>t. — UablUi ID Abjsainla.
94. M. FILIFORMIS Bib. I. e. 378. — SoffrtUcoia diffusa glabra: rtmli fillform.b., foil, tnbieiiiiilib. ovaiia, inferlorib. cordailf, loperiorlb. batl rotondait, omaib. obiusiusculis iniegerrimls planli; •ertlcillasirls tabblflorlt; pedleello airlnq. calyem subacquante, bail minute braciealo; ealyelb. tobaloil declinatli v. nutaniib, dcnlb. subulais corolla lubbreviorib., fauce loiut tubvillota. ^ — *it. mterophyUae* habiuu affinu, sed raml lenuiores el folia magis remota Caljcet M *Tenertffae*, sed saepius solilaru longiusculi pedicellali Folia sacpiu purpurascenlia Cal)ce>fcere 2 lin. longi glabnusruli, denies selacei erecii Anihcrarum loculi divergencles Si) I us subaequahler bifidu*. — *Thymu* fUtformtt* Ail Horl. Kew. II. JI3 — *l>tperrllafiliformt9Vrcs*, Fl. Sic I 35. — fum/a (*hymotdes* (iouan. llerb. — Habitat in regione mediierranea, in insults Baleancis ad rupes el murrot, vulgaussima el in Ilispama.
- 25 M. PUNCTATA Bth. I. c. — Suffrullcoia: ramii tlongalit lenoib. lenuutim« pabetMBtlb; foil, subessillb., ioferlorib. ovailt acullt, aoperiorib. obloogit obtuillf, basi angusaiis, margloe vli ravolallt, sopremis Sorts tubaequaAUB^ loniaifasciculis breviter pedunculais; bracieis nloolta; ealyelb. MMllk. svbgtabrls panrlt ovatis cylindricis, dentlb. brevib tetacels, faeeelotas VIIIOM. % — Habila M. *Graecae*, characteribus, glabritie el floribus M. *Timrigms* afBnis; • priori differi caule folnsque viridibus subglabris et floribus minoribus, t Jst. *Tenertffae* foliorum forma el calycibus. Raml aemipedalet. Folia ditiaolia. Pedoeuli pierumque 3-0-11 ori, superlores brevissimi. — *Salureja punHata* R. Br. In App. to Sail Ab)ss - Habitat in Abyssinia.
95. M TE>KRIFFAE Bib. I. c - Suffruticosa diffusi glabrluseola: ramis rigidia lenuib, superne pubescentib.; foil, sessilib. ovatis aculis rigidis glabris plants, inferionb. latiorib. subpiicatis, supenonb. sublanceolttia Cores subaequannb.; florom fasciculis densis breviter pedunculatis; bracieis brevissimis; caljcib. sessilib. pubeteniib. cylindncis, deniib. selaceis corollam subaequantib., fauce intus villosa 2|. - A Jf. *micropkyUa* differi ramis elongatis lignosis, foliis acuUoribus rigidioribus longionbus, doribus subsessilibus, cal)Cibus elongatis lenuoribus. Corollae romuiae. — *Thymus Tenertffae* Poir. DicL Suppl. VII OW — *Thymus terebtnthnaceu** Willd. Enum. pi bori. Berol. 024. - ID losula Tenenffa
27. M. BIPLORA Bih I. c. — Suffruiicosa ramosissima caespitosa ramis atendentib pubescemib v. pilosis, full, sestilib ovahs aruiis plants v. margine »ubre)olutis rigidit* glabns, bast subcordaltt, suprnorib liore bre\tonb, >erticiUa»-tris laie paucinoru, bracieis pedtcellum »ulnrquanttb.. ciljcib pedtrrlUui subtecundis tcnuiler pubetrenltb v piloiulis, fauce intuit MIOM ''4 < aulr« basi dense ramosissimi, rami vix 3-4-pollicares, dense folio»i Folia rigida

vn 2-3 lineas longa, superiora minora, basi saepe parum angu-
tala. Pedonruli caljcc subbreve*. utrmque taepius 2-3-flon. Draciac
minulae. Pedicelli bre*e.« Flores Jt. Graecae v pautlo minores. Caljces
profunde Mnali. Corolla caljce dimidio longior, labium supenos
vu eroarpnaium. Summa superiora corolla bretiora, inrenora
brcviiier eiseria. Aniherarum loruli oblonjo-liiiearef, deroum
divancaii Slyli lobl aubaequales. Vu. nisi babiiu el foln%
majoribus ngidionbus a Jf *Tenen/fae* differL - *Thymus biflorus*
Hamili. in l). Don, Prodr. 0. Nep. 112. - Ilabiiial ID Iodiae
orienulu moolibus, in >epalia vi kamaon, Mu»-sooree,
Mielghern.

28. M. SIBCORDATA Visiani m«s. ei Bib. l. c. 370. f - Suffruico«a:
ram is bre-ib. subereous subsimplicib. pubescentib.; foil, sessilib.
plant* lair otaiis obiiuis. basi laie irunraio-cordalis, floralib.
anguitiorib.; fasciculi* florum terundis pedunculaiit pauciOoris;
calyrib. rylindncis pubesceniib., deniib. aubulaiia, fauce Iniut
Doda; corollis euertit. ^ - Caules t basi fuhl, kno., a plurci
crerii v. basi procuiDbeoi«3-3.polUcarei. Folia crrbra laiiora el
miou< r.R.da quam in praecedeniibuf, tublut 3-7-venia,
supra el tubioi ad venas pube<ceoiia. Floret folia »uperanles,
3-3 late ad apirem pedunculi 3-4-hnean» dinpoiin. Braricae
breve* lanceoliiae. Calyces breviler pedirellali forma el
magnuudioe *M. Graerae*, denlibu« inferinribus parum longionbu*
el profuodiut 0»»i»(fauce iniuii den»e villo%a. Corollae
lubus denies cal>cono» aequaot. Speciea foliorum Turma ditlinc-
li«sima. - *Tkymut tvbeordaius* Vitiaoi, Flor. DalmaL I. l. 10. -
In Dalmalla.
80. M. PIPF.RELU Bib. l. c. - SuffniUcoM: ranis adsrendenlib.
pubr^renlib.: foil, tetsilib. laie ovaiaa oblais, basi roindalia
v/ tobcordaiis, ulrinq. Rlabrm, supremis obloBglis pan Is;
floraa faaeicolis latla peduoculalit seeundis pauciQoris;
braritis panrla oblosfla: ealyelb. tabsetsllib. Inbulosis
pubesceniib., dentib. subalatit, 3 sapertorb. paieatlb., ItiiM
ialss ouda. % — Kami berbacei 4-6-pollicares. Folia infertora
sabriionda «i saepe andalau, madia 3-4 tin. looga. Verlicillasiri
remolio#full Peduocull fere fbHorom florallum longiudine,
oliinque 3-3-flori Bracicae laiiores qo«m in eaeirns speciebut.
Calji HnnKaius ul io *M dewi/lora*, »aepe parpura«ren«(denies
hneari-subulalii, supenorcs palenrs infiTiorr ererii, raelrrum
nubaequ.ijp«. Corolla lenuner pubc*crnv — *Thymvt Ptprre/la*
All Fl Prd. l. 21 I M fitC: I 'male. - WaldM. rl Kn IM. rar.
Unpir II 100 l. IV) non Lmn, — *Tkymut marginalia* Sm in
DukvIM ewicc.no. 71 - *Tkymus Croalieui* Pen Knrhind II. IJ0 -
(*alamtnlha Cmatica* Host, Fl. Au«tr II IK — In Kumpae au»
irahoris m»niibu« Pedem«iniam« rl Croaieis.
30. M FORSKUII.FI Bib I r. - Caul-b derumbennb. imbriralit;
foil, ovalo-aco-li». flonb atillar b. tuliarn« se«»ihbut ^ -
l!al)t »Inaiu«(faure % fill* rlausu, nnn bilabidiu*. ted
3-denlaiu«, tub labio •upertore nma inter larimas profunda.
Flore* rubii. Cauli* eiifuat fruiiculo«us. — *Tkymus tmbneatus*
Fonik. Fl A*t Arab I(K — Habiiu in de«eno Arabico.
31. M. BINAICA Bib. l. c. KO - Suffruhro«a ramis elongaiit
ncidi« sub«implicib.; loll. \$tibs*»»il b ooi» pUni* v. margin*.
re»oluh», »uprinnb. florr* »uperan<ib.; florum fa»eiruli«
U»r%»(«n peduurulalt*. ral)rib. »ub»r^alilib i^ati«, drnlib
brttib. setacea; eorolhs mmuii« > - ||.»bilut fere Jf.
Graerae. a qua umen di»unc« t»»ima esi Mll«, vrrriin|ia«
iru den»i% rl ral)ribu« mmimi» ovaii«. Kami I-IV f pedalis.
uii fulia pjllide «irrnlr«. Folia rmoia, 1 Im longa. neno
roedio promiocnit, laieralibu* plrrumque e%amd « VrrriirillaMn
I*»l>-flun. otnne* remoU-Flort« t« gturre mimmi C«l)rr«
%it linram loogi. »arpr roloraii — Ilabiiial in Arabia
Initr rwpe* de-erh Hlnairi
32. II SPHMIKliA •: K»rb. Ltnnara \VI| »^ - Fruie«ren«
virgal«-ramo»a: ralyonliq •oil* pMtr«reiiiib. f.li
punciali* nllilajiiieuUIn-lineanb.. ••P^{rcnif} conformib
apprrntimal •. %rrn. IU»in« H-IJ-flori. f..l.» *equanlib,
tp*fiu ^n Itndrirario r-fl, %r pMll<<im rrii. irunl..
branrlt mmun*. r-l>re rampanulalo bilab«a_{tt},
|«bio »uprn,in quadrjio. lrrMier indenui.i, inferior*
bidrnialo; nurull» •ubruiu«Uo-e«ii.,rr.o«..Mi, c n, M - mgn*.
blo ronrolore. % - •• Had*fha.

** *Australasiae.*

33. M. SATUREIODES Bib. I. c. 380. — Glabra: caulib. erectit ramosit; foil, tubtetsilib. tubelhpticis lanceoltisve oblufft planis: verlicillatlna laxit 8-10-flori*; calycib. lenuittime pubetcenub. cylindricia, deniib. abbreviate lanceolatif, fauce Intut villosa; corollis calycem vix excedentibut. % — Caulet tenuet, bati radicanter, rami ererti 4-5-pollicaret, saepe purpurascenlet, angulit vix tcabrellis. Folia 5-6 Im. longa uninervia v. veins lateralibut uinnque 1-2 vix contpicuit. Pedunculi vix lineam longi. Calyces breviter pedicellaii, in quoque fatciculo 3-5, superne parum dilatati. Bractee vix pedicellum aequanle*. Stamina incluta. — *Mentha saturejoidet* R. Br. Prodr. 11. Nov. Holland. 305! — Labiial ad lacum George Novae llollandiac cl ad Port um Jack*on.

34. M. AUSTKAMS Bm. I. c. — Flonb. verlicillalis; slaroinib. exterlis; corolla© labio suprnore bilobo; calycib. lomenlosif, deniib. ban intut obsolete barbait; foil, lanceolate; caulis adtcndenlit angulit marginalia tcabris. ^ — *Mentha ausralit* R. Br. I. c. 505. - Habitat in Australasia ad Porlum Jack»on et in in»ula Van Dieroen.

35. M. GRACILIS Bm. I. c. — Glabra v. lenniter pubetcent, ptllide vireot: caulib. credit; roll, breviter petiolalia ovatlt v. tuperiorib. ovaio-lanceolalit obtutit planit; verllclllatirit tubtexdorit; calycib. pnbetceoUb. eyllodrieo-tibeampanulaiit, dentib. lanceolalit acullt tubi laliudne breviorlb., fauee iQlnaaada; corollit calycem vix excedentibut. * - A M. \$aiur*jo(d* differ* follit praeteriim bati latioribus, pubesceniia et calycibut najoribut magiaque Mttillbut, faure Intut nuda. Folia nublus venosa, utrinque pube«ceotia brevittima, praetertiro in pane caulit supenore canescentia. Stamina exserta v. Incluta. Habitu a Jf. *talurejoide* non disjungenda, al tlaminibut eerie dittantibut rectit nee adtrendrnribus a *Alicromeriis* recedil. — *Menlka graeilil* R. Br. I. c. 305? *) (non Sm). — *Mentha Dtemenica* Spr. SytL vegetab. II. 7M. - Cretell ID Autlralatia, intuit Van Diemen.

*** *Americana**.

35. M. OBOVATA Bib. I. c. 381. f - Caule froUcoao divaricato ramotin.mo; foil. obovatU obiatlt IniegerrlaiU. bati aogu.iaUt, aarfioe nvoUUt rmco»it, uir.nu. canetceeniib.; florib. aubteMlllbaa. 6 - FrulUmlo. e i i t ^ . t m ^ f / e r . c i u f r a m l d . v . r . e a u e l o n g . l l a b b r e t U U f i r . f o l p u b t a ^ . ^ P o l U ^ t a M - l p o . U c I r i . t u p r a r u g o s a a . p e r a . a o b i o . c . o o - u « t . i o t . , I . t * * e l . t o | b t * e « U l a t l r d l o r a t u b p l a n a , v i x r u g o t a . F l o r e t p a u c i , f o l i l s b r ^ l o r M , b r e ^ l t a l a i e p u d l c t l l a l l . B r a c t e a e m i n u t i s s i m a e t u b u l a l a e . C a l y x e x i u t c a i M C o a a , p r o f t i a d t a i H a t n a , r r u e i f e r v i x i n d a t u t , d e n t i b u t n u b p a t e n i i b u t t c u l i t l a o c e o l a i i t t e u e e i t v e , 9 i n f e r i o H b u t v i x b n o r i b u s . C o r o l l a c a l) c e t u b d u p l o l o n g i o r , S V . - l i n e a r i t r e c i a , f a u c e t l i d i l a i a t a e x t u s p u b e n r e n * . l a b i u m k u p e n u t b r e v e r e c t u m b i Q d u m , l o b i t o b t a t i t r o t o n d a t i t ' i n f e r i o n s l o b i r o t o n d a t i a b h r e v i a t l , m e d i o l a i o r e l o i e g r o , l o b u t i n t u t a d f a u c c n i v i l l o t u t . - *Satureja viminea* Linn. Amoen. acad. V. 900. — *Smtmrtja inrana* Spr S)tt. vegetab. II. 719. - *Zygi* aromatiea* Dftvx. in Hanilt Prodr. n. Ind orrid 46. - *Xemopoma obotalum* Willd. el Colla, Hort Rip. 147. L t t . - *Mteniha rim' nea* etc P. Br. Flor. Jam. 25S. - Habiat in Jamaica.

37. M. BOM VI AN A Dlh. I. c. 731. - Glabra v. tenuittime pabetrnt foil tub. ^ tihb. oblongu obium obo%aitve integernmit plaoit; veriicillatrit peaciflon." col)cib. tub^e^ilib., dentib. brevib. obiutia ereciit, fauce inim nuda :L - M' obovatae alfimm, *ed folns multo minonbut numerotit plani* caUrill, uMIUe |, r vionbut diHincia Folia utrmque »ub%mdia. O.rolla minor quam in 'if I' vata, %k caljcc dimidio longior. - Labii.ii m repubhea Boluiana.

Holland 305 — Florib verticillatis mentosus, laciniarum marginibus punctatis; caulis recto. 4 T r ^ f m J l * foil lanceolatis
Otnth ptlis infirm burbatu. r mU, ir l, btn lupexturr nn«T, ...
f* p-70, u, iublus punctan.; caule recto. 4 T r ^ f m J l * foil lanceolatis

- 38 M >LBIGE>A Bib I c 381 — Procumbent ramo»issiraa bispida foil parrls
 peliolalis lale ovaiis oblusis inlegernmis, terliciltasin* biflorn, calycib subsea-
 silib, deniib subaequalib aculis, fauce intu» >illosa 5 — Habiius fere *Thym*
Serpyllh Gaules basi perennes sublignosi, rami pubescentes, »upt*rne hi*pidl.
 Folia vix ultra lineam longa plana, ulnnque hi'pida, floralia conformia, calycM
 subaequaniia Calyces molliter bispidi 13-sinali, denlibus breubus rictis Corolla
 calyce subduplo longior, extus pubescent — *Thymus nubtgenu** II B Klb NOT.
 gen el spec pi II. 316. — Habitat in Peru via m loci* aipernmis monlium igno-
 vomorum Puracé el Rucu-Picbincha
- 30 II (JILLIESII Bib I c.) - Procumbent teuissime pube«ccnn foil tessilib.
 oblong's obiutis iniegernmif, verticillastris subbiflons, calycib «ub«etsihb, den-
 lib rigidis subrevolutit, fauce inlua tubvillota. 2l — Caulis suffrulosus pro-
 cumbeos *), rami acute letragoni, icnulaaime pubescentcs Folia parti, bail
 rotundaia aubplana, ulnnque leoulsslme pube«ceniia, subtus dense glandulosa,
 3-4 lin. looga, 1-2 lala, floralia conformia verlicillastris biflon r. Inferiors ra-
 nus sub-*0ori, folio doplo breviora Bracieae parrae setaceae. Calyx subset-
 sili» ovalus sinalus pubescent glaodulotot, iniui ad faucero parce villotiM, dentet
 brr^es subaequales seiacei patenles rigidi Corolla vu calyce longior, inlus ex-
 lusqf glabernma, labio supenon brevissime emarajinalu suberecto, infenorif
 lobi arquales oblusi patenles integemni. — CrescII in America mendionali prope
 Mendoiam

Scotio Ul. raODMBUIA Itt.Lo.SII

VerticilUtiroroa eyasae etongatae pedoneolaue tabdicbotomae. Folia saep*
 dentau. — Herbae Bvropaeaa. — Flaaiae fortan ad *MtUssmm* refereodae.

40. M. POLBGIUII Bib. L e 9ft\ t — Herbacea adscendena pubescent - foil, petio-
 latis ovatia denialit, *mlrlng.* virdtib^ raemis coarcutlt tecoodls; cymlt aabdi-
 ebotomit paociflorit; ealyeit deatlb. *elatfell'fobaaqualib., fauce inlua villota %
 — Caules erect! sobtimplicet, pills brevissimis refleis cano-pubescentes Folia
 inflma subrotunda oblusa, vu denials, supenora acuta el acute denlala, bati ro-
 lundaia, omnia rago<a, pili< brevibui bi«pidula Raccmi V\ «rmi|tedales. Cymae
 pnlnnrulalje Bracieae pedicellis subbreviora^ (alje* if *drareae* cylindrici
 %imh rr«Tti, dennbus laliluilmr lubi lt»ngioribu< Corolla cal)re ^ubdoplo bo-
 ili >, forma *Salurejae* — *Melstn l'u|ryium* Roibel, Del pi rar Banal 63. C tt»
 firf H. *Calamimlka ongamtfoha* ||o»i, Fl Au^lr II l* - *Meluta tubnudS*
 ^ald^ el kit Plant rar llungar III *ftl • (*alammlha tubmuda* llosl, Fl-
 Au/dr II 110* - *Tkymus iubmudms* «pr sy«t vrgrub II 008 - Habitat in Ba-
 natu ad rupM ibermarum Uercolis, in agro Fiumensi
- 41 M MARIFOLU Bib I c | - Incana adscendens foil ovaiis obloogisve ob-
 iu«u %ubiniegerrijjift, supra caneacenlib, aubius albidis, raemis lasts multiflorif;
 calynt drniib oblusil aubaequalib, fauce inlus %illosa. corollis calyce subdoplo
 longionbus % - Rami divancali l-S-pedales, uti folia el calyces tomento
 leaul cam Folia tit 3-4 lin longa. nunc Intrgrrrima, nunc leviter *|OU*1*
 v dealata Blana paocivema Racemi rlnngaii Cymae laiae pedunculalae di-
 rbnioma* Folia floralia inferiors pedunculo Inngiora, superiora bre»lori«
 Branae miouiae falyre« ovaio-iubuloti rrrcti »iriaii, faucis villi* denies sae*
 siut soperaanlos Corolla ralyce rlut duplo longior Habitus fere *d i ierum
aetioaja CmimmtlUf, *rd e*lyi omn.no mcromrna* *Mrhss* fruticosa* Linn.
 Spec, plantar MI - *Mfhsss (rtbra* lam Din II 79 el auci plur (P0 Linn.)
 - (*alamtmikm CrtUcm* Lam Fl Fr III WV - *IS*p*I* tYHu** Pleir 'y) 5leua*
 Wom lboi 5il|| (ttfll. ||) - *Thfmmt • rmrus* D«. Fl Fr III JW looo_0r t||i|7
Thymut Barrthiri Spr RyM %ofKel«b II OCA - *Mrhsim martfoha* Peri. B**"
 II lJ1 *Septlm mmrtfohm i at* Iroo plant rar %l U I 370 - ^f 1 ^ ?
 plant bert. Berol II 004. — *Aspeta serpyllifolia* M. Bieb. Fl. Taur. Cauc II 40.

— Cent. pi. Rosi. I. t. 88. — Rchb. Plant, critic HI. 10. U 210. — *Nepeta partifolia* Horlul — Habitat in Europae el Asiae mediterraneae nee noo Tauriae nccia saiosis creiaceis, in Lusitama, Hispama, Syria prope Nazareth el ad moniem Libanon, Tauria, in (Ions Siriliams Ilalicisque non occurrl, in Pedemonlio el Gallia australi cialur, sed dubia civis.

1 *Species e genere excludendae.*

- III. MONTANA Rchb - SATIUREJA MONTANA.
 M PYGMAEA Rchb. - SATIHEJA MONTANA.
 M SPICATA Rchb. — SATUREJA VIRGATA.
 M. YARIEGATA Rchb. « SATUREJA MONTANA.

3017. MEM**I Bth.

(Bth. Labial, gener. el spec. 383. el 732. — Mcisn. Gener plantar vascular I. 285. II. 101.)

Sectio I. CALAMITHA Mnoh. Method, plant 408. - Bth. 1. o. 386.

Racemi Ian şubs«cundi. \ erticillaslrorn c)mae utrinque pedunrulaiac dicholomae. Bracieae minulae. Calyx subleres slriaius, basi m gibbui, faucc intus villosa.

1. MT INGANA Bih I. c. 308. - Herbacea T. basi suffrolicota procumbent- rarois adscendentib. cano-lomenlotia; foil. peilolaUt partis orbienlailt sabiotogemmis, ulnnq. cano-tomentosis; racemls subseoundis; vertictllaairis paaciOorls; cyans MX dicholomis, calycib breviter bllabialls, fauce iotas villosa; eorolhs ral)ce m duplo longionbus % - Species inter *Meiutam* el *Mierowufrtam* fere media Folia 3-lineana, utrmque lomenlo molli, uli rami et calyces cana Vcriicillasin >upc-riorei comlensali, mfenores lauores Bractcae minutae. — *Thymut tnanus* Sib- thrp el Sm Flor. Grace \ I 02 I. 577. - *Annot tncanus* GriM-b. S>,CII«K n. Rumel II 1J2 - *Jtehua (retca* Rus« Nat hist Alep (non Linn ; - Habitat in regione moditerranea oncnlali, in Archipelagi Graeci imulis frequens et ad Athenas, in Syria quoque propo Aleppo
2. M. CRETICA Linn. Spec plant. 828 - Bth I. c - llerbacea humilis, basi pro-eanbena ramis adscendentib. piloso-hispidis; foil. ptioUUa pams subroiundi. obtois aubintegerrimis, uiring. molliervi ~~bulu imls; racemls subseoundis; cyans villosa; corollis villosa; corollis villosa; corollis villosa~~ liisque villosissimis nee tomeolo tenui caols. Cynaraoi Inftrtonia peduoecu^ commums 2 lin longus, superiorun brevlor ?. Dallas. - *Tkmmu hirus* Sieb Pi exsicc (non alior) — Habitat in Greta.
3. M TIHMIFOIIA Bih I. c. 380. el 732. -.Caule berbaceo adaeendeoia cano-pa-be^cenie, foil peiolatis ovatis oblais, m creolis, bail cuoeaUs rotuodatise subcanesceniib , racemo laio secundo; cyan* dichotomis; florib. parti«; calyrib brevissime bilabialis, dentib. aculis; corollis calyce sabdoplo longioribui ^.« _ Qaasl media videlur mlcr *Mttromcnam marifottam* el *MtUssam Seprtam*. Folia y|% semipollicana, nunc inlegernma, saepius obscure crenata, tubtuN venoia dense glanduloso-punctaia, supra lomenlo lenuissimo tiibcaoescenua Harm - us minus diffusus quam in Jf. *iSepeta* Floret param minorea. Calyces tenuiores VII bilabiati, denlibus omnibus bre^bus selaceo-ansULis, iribas superioribus patentibus, bims infcrionbus ereclis Fauil villis elaasa. Corolla Htbriu - cula, pall.de purpurascens Fauil dilatata, labium supenua emarRinaturn Infer.ul n lens, lobo medio m emarginato. - *Calamntho thymifolia* || qsls Vi »., r r 8." W -. *Satureja thymifolia* Scop Fl Cam I. 4W. (p. 118) Ht. sel 4. moi. miler id *rejam r t* f d 1p *T h* Salurejan rupetrcm referenda l - *Thymut ortgantfobus* Vis.ani Flora IB 7 1830 1. 51 - llabiit in Carnioliae ruprninbtIH mun.que tei - us Jienais.
4. M GLA>DULOSA Bth. I c MZ | (aue herb.reo. \ m n J # Z \ full pr-llolalis lair o.al.n acul.usculs grosse ^errals, Lasi roiundaiu »ub«labri, race- mit laxi^mis pauciflons sccondis, cymis dicholonm, caljr.b bilabiatis; dentib

aculu, corollis calyre panro vu longionbus ^ — Raroi patentcs Mndcs tcnues, pili* brevi»simis subpubescentes, m letragom. Folia •;-1-pollicarm, longiuscule peliolata, serraluris paucis profundis, lenuia, ulnnqnc tindia, subiu* paucinema, floralia gradatim minora. Cymae laxc duhoioma. Briclenp panae lineares Flores minuti. Calyces vmdes |n pube»rrnlc», dente> latin suponoril laii, breviter anstali patentcs, infenons «ubulati ereili Faux mius MIIS clausa. Corolla alba v. pallide purpuraseoi. — *Thymut glandulusus* Req in Ann. sc. oal V 380 — Habitat ID Corsica.

5. M NEPETA Linn. Spec. plantar. 828. — Bth. I. c 3*7. ct 732. - Caule herbaceo; ramis procumbeniib. adscendentib. suberectisv« villo»is, Toll, pciiolatis laic ova-Us obtusis crenatis, basi rolundalis, utnoq. villosis, sublus pallidi*. racemo elongato IJIO multiOoro secundo; cynit dicboiomit; calycib. bretiter bilabiatis, dentib subulatis, corollis calyce dimidio v. Wi doplo loogionbus. 2I — Caulis dedecambeos T. adscodens. Rami eloogati sublelragom, denne villosi Folia semipollicaria Y. m polhcana rugosa, supra intense viridia, subtu« saepe incana, floralia minora, suprema minuta. Racemi elongati. Flores numerom. Bracieae minutae oblongae. Calyces secus raroos cymarum breviter pedicellati ovali stnati vinde» >. purpurascotes. Dentes supenores breves o^ali aculi, inferiorrs subulad long ores v. rarius orones subaequales. Barba fauns deniibun >upcrionbus nunc brevior, nunr (in eodem ipecimme) subaequahs. Corolla allnda \. pallide purpura*ccns, punrlis inlensionbus oolati. Aolberinim connrrinum cras<uiP_f loculi distinrti divergentes. — *Thymus SepHa* So. Fl. Brit. II 642. — Engl. bok t I4M - Hook. Pl. Load. I. con Icoo. - *Calamintha pamflora* Lam Fl. Fr. U* 300. - *Calawunlh* triekofrm** Moeoch. Melb. plaui. 400. - *Thymus diftstu* Hortul. — *Thymms Brmm\$mm\$* Boppe. — *C*i*mi*lkm rotumdtfoita* Host, Fl. Au>tr. II. 131. - *Caismtmk** •Mff<ai Host I. e. - *Cmtmmimtha Nepes* UonIm el Link, Fl. Port - *VlmwUmtkm* 'c—mini Pratl, Pl. Sical. I. 87? - JMtoa *obustfolia* Pert. Eocblrid. II. ML - Bth. L «. W.

fi. Aik&miem: baalllor gUbrlor: foliis tiridloribot. — *Tkymv** *Athonieus* Bernb. ct Reichb. Fl. Germ, cieart. 388. sab. no. 8&H — *Calamtntha Atfmntca* Kcirlib. I. c. — *Mehism aetkeot* Hortul. — llabilat in Europa prae<rrtiin au-tralion in aims, rudentis, ad vias etc , in Anglia, Kallia mrndminali, id I ugdunun, in !u>ilania, Ilmpania, in Italia a Prdrmontio ad row'num >oj|Kilitanum, io Mru, (jraeria, Archipelagi in>uhs el in Tjuria mendionali.

6. JI (AUUIMHA Lino. Spec. plant 827. - Bib I. c. W el 7)2. - Caolebrrrbiceo. ramis adureodentib. villosis, foil petiolalis late o«ati« obiUMU«ruhs serralocrenati», basi roiundatis tmocatisve, utrinq. vindlb tillo»i«, racrmo lato secundo; C)BJII laiiMlnis sabdicboiomis paacifloris; calycib. distincie bilabutis, dentib. subulaiis, inferiorib. elogatis; rorollis calyce'plus duplo |ongionbu» *4 — <«^u let ere chores H SnBiorrtt qoam io M. *Nepeta*, folia majora »arpr «e«quipolhearia, flores ptotiorea, calyi fere duplo major, profundius bilabiai». Corollae purporascenles. Var. *fi.* fillosior el folia minora, sed ob magnitudmem florum el calycam fornam hoc oec ad If. *Neprtam* referenda. - *Thymus (alamtnlha* hcop. Pl. Care. (ed. 1} oo. 73X — So. Eogl. Bot. 1.1878. - *Calamtntha mtmtana* a. Lam. Fl. Pr. II. 388. - *CaUmimtko offittrnahs* Moeoch. V<ili plant. 400. - (*aiamtmtks mmikaefoha* Hosl, Pl. Auslr II. 129. - *Tkymus umbrotui* spreng i ml »p. n¹⁰ cogoil. 41. - *Ciismrntk** *umbrosm* Rebb Fl. Germ. e\curs JA** fir1. s)O. pi¹¹.) - Hrliafai *initrm**** Baoog ! ci Reichb I. e. - *Meiuta umbrota* Aucl. Oerm. ••o Btob. - *MHium folio f* Op.i mss - *Tkymu** *VoirMeUa* Pollmi, Fl. >*ro¹⁹.

A ritfMSMim; H^mrns tmlmmimlkode\$ Reichb Fl Luili. Mad eia. - W^bilat io Europat mtldiat ei aaUualis n Atiaa mediae collibu«, a)hi« **apertis etc.** In Angha, Gallia. GrmaoU aard.j el aatlah. l^isilama. Ili»P««^» ei In J •moi Graecia « prop* Bytaotium, io Armenia el Iberia, *, in UiiP«^{01A} ei tolls £aotfieosibtis.

Beetle IL 0AL0MELW8A Bth. 1. o. 3S8.

Verticillastri multiOori subaequales condentatl. Bracleae ovalae •. oblongae. Calycls faui iniuis villosa.

7. M. CAROLINIANA Bib. 1. c. — HerbaeaT glabra: foil, pellolalit ovalis obtoils -anbrenatis, basi angustalls; verticillasris sobaequalib. nulliOoria conden\$atis; caiycia fauce inlus villosa; corollis calyce daplo longioribui. % — Rami Ooriferl elODgail vlr gali, glabri v. lenuissime pubescentes. Folia glaberrima, semlpollicaria v. vix pollicaria plana, nervo medio sublus prominulo, floralia calycea superaniia. Pedunculi communes utrlnque breves, 3-10-flori. Bracleae foliis subconformes, exicriores calycibus loogiores, inleriores gradatim rain ores el angusliortfs. Calyx 2-3 lin. longus gbberrimus, profundo slriatus. Corolla fere pollicaris glabra. Stamina sub labio superiore laxe adscendcniia. Syll lobi subaequales subulali. — *Thymu* Carolinianu** Michx. Fl. Bor. Amer. II. 0. — *Catamintha Caroliniana* Sweet, Horl. Brit 400. — *Thymut grandifloru** Sim«, Bot. Mag. t. 007. — *Calamintha grandiflora* Pursb, Fl. Amer. sept. II. 414. — Habitat in America boreali In Carolina, Georgia, ad Covnglon in Louisiana.

SeotieHL AGH08 Mnek. Mitkti. pUat 407. - Bib. L e. 3*0.

Yerliellastri sub-σ-flori, padleallla erecUs bravlboa rigldie. Braeua* mlnuee T. nullae. Calyx bail lofrt glbboi aableraa, profande alrlaloo, Isaea iata* tilloaa.

8. M. ACINOS Bib. I. c. f — Herbaea auberaau pobeteens ?. villoea: fall, ovatla subserralls, floralib. con form I b. floras superanttb.; vertlelllastHt 6-floria; ealycib. sabsessilib., lablis brevlb.; corollis vix calycem excedeatibus. O — Caules circiler scmpedales ramosi, saepe bast procumbenles, raml subpurpurascenles magis minusve villosi. Folia oblusiuscula, basi angustata, soperiora anguidiora acuiiora, omnia utrinque vlrldla mollia, subtus venosa. Vertictllastrl distanien. Bractee minulae v. nullae. Pedicelli erecli rigid! complanati, lneam longi. Calyces 3-4-1 incarc profunde 13-slriatl bipidi, labium superius Ilium, denlibus 3 subulatis, divaricatis, laciniae labii inferioris labium soperius aeqnanien. T. orollae purpureo-coeruleae, labium superius ai lacioia media labii loferioris inlegra. Aniberaram locvli subdlvarieaU. Slyll lobas lafariar eomplaBattu. Acbae •la laa^a. - TayaMM Amm- Umm. IIM. plast. am. — •§«%. it U»d. I. Ic. - 8n. Kngl. Bot. u 411. - *Aetn4\$ ifcywrfarf Mjaaab, Mataw-at. dn. ^ dtku\$ •«!- garis* Pen. Enchlrd. II. 131. — *n\$mm\$ Ksrijiljlslais. Pllf» INat. lappt TIL HL* — *Tkymut canucmu* Domott. •Fl«rol. laaf|. 41. —; CWaaaaia* *mmmd** Lam. Fl. Fr. 11.304. * . »- ,, %:*,>w

fi. viUotui: *Acinot vMoius* Pan. Bnehlrd. IL 1»t — BabiUI la Boropae arvis vulgaris, in Scotia, Anglla, Suecla, Uslltaaia, Iialla ai Oraeeia, atlam In regione Caucasico-Casplca.

0. M. PATAVINA Bth. 1. c. - Derbaea adscadent pubescent: fall, petiolatle ova* tis acuti* vix serratis venosis subglabris, floralib. eonfomlb. calyce loogiorib.; calycis labiis lubo breviorib.; corollis calyee vix daplo longioribus. O — Major H durior quam Jf. *Aci%o\$_t* floribm daplo majoribus, gtabrior ai errriior quam JT. *alpino*, cui afflnor ai distlneu. - *Thymus Patatimnt* Jaeg. Obs. Bot IV 7. t 87. - *Acinot Paftina* Para. Bnchlrd. II. 131. — Calaaifafaa Patovma Ho»L Fl. Austr. II. 133. — *Mdista majoranaefolia* Mill. Diet no. 7. - *Thywas 9—no* lens Sm. Prodr. fl. Graee. I. 420. - *Thymut adnoidts* Ten. Prodr. fl. Nap. OJ

0. *acuminata* Frivaldsky, Flora [B. Z.] 183S. I. 33L - Foliis Iancw>lato-Hlipticis utrinque acuminalis aculissimis. — HabiUl in Buropa aastrali, in Iliipania, Gallia mediterranea, Iulia ab agro Veronensi el PedemonUo ad rfgnum Neapolitanuro, in monte Parnasso.

10. M. MICROPHYLLA Bib. I. c. 300. - Suffruticosa putilla diffuia subglabra: foil peliolalis subroiundis integerrimis, floralib. conformib.; venicillastrtt 4-0-flurii-ealycib. subsessilib., labiis tubo mullo breviorib.; corollii calyce fere duplo loogioribus. ^.? - PlanU parvt ramosissima, ramit brevibus, junioribus pi|u»u

Folia *MX* 2-lincana rigida tcnoca, saepius glabemraa, inlerduro pilosa. Verlicillinin in ramis Don fen* 1-2 Flores Jf *Patannae*, at calyces longiores lcnuions — *Thymut torticut* Pers Encbmd. II 131 In Corsicac ruonlibu»

11 M AIPIYA Bih I. c. 300 el 712 f — Perenim diffusa pubescens v nlllo*a foil, pptiolalis »ubrolundis otalisve >ix serralis, floralib calyces subaequaniib , vcrlicillastris 4-6-flon«, calycib. subiessilib, labus tubo brctiorib , corolhs calyce plus duplo longionbus 2|. — Caalis ban ramosissimus subligno*u* Ranu florifm idscendenles, saepim villosi semipedales. Folia minora rl pirn 'nque latiora quam in Jf *Acmnt* et *Patavtna*, sopenora intrrdum angustiora (aljces purpuritrrnicf, magmludine Jf *Patannae*. Corolla major purpurascens, faucc valde dihlota, labium Mipenu< el inferioris lobns mcdius brc^isiime c marginal-). Antherarum loruli dnergenlcs, dcmum dnri^atl. Silyi lobu< inferior complaoaluf.

Thymut ilpmus Lioo. Spec, plant 890. - Bol *Mag*. I 2151 - *Annot Alpinu** luenrb, .llelb pi. 407. — *Annot dt/fusut* Bflnnfngb. Fl Monasl ei BoU Zeil 1 K1 I. 333? — *Thymut montanmt* Cranlz, Stlrp. Auilr 27« - *Thymut v%Uot%t%-mut* Tatisch lo Syll.'pl soc Ralish. II. 248? — *Thymut numulUnaefohus* Loisel. mm in DC Herb. — Habitat in Europae anstralions moolaoii anbrotisque. In (tillia, lispama, Gcrmana, Italia

9 *elatior* dnseb Spicileg flor Rumel II I^i. — Cauhbut fillo*o-pubescentibu4icgforibu<, folus subroiundi», a medio argute serralis srrniiins paucin ronmtentiba*, corolla calycem duplo nuperantf. — *Annot mtundtfohut* FrialdsWy nm. In reginoe nupalpina Bhodopet borealx

12 M (.R\>EOLE>^ Bm. I. e. 3PX - Herbacea erecta \illo<a foil prtialalis ~~o~~tiH subseiraiif, floralib. conformlb. floret tperandb , veriicillaslris 6-flor«; calycib. tttbtMlllb^ Ublit locurvit t«b«n aeqoatl., corollii ralyce vit ~~dimedio~~ longioribtt. Q — Htrta fit blpollcarls, tlaiplei r. ramoia. Folia *M Patavmaf*, at llllotiora. Plom majortt qiiaa la *M. Arinot*, mlnoret qoam In Jf. *Paian*a*. el calyeii forma dlaUaCUtaloiL — *T%ywmf fravolfus* M. Bleb PI Taur Caoc II 60, Pl. rar. Pott. ie. I. I 3R. — *Aeinps frmttolent* Link, Knun. pi bort. Ber«I II. 117 — *Thymut em**t* Stet. apud fffoffm. lo Corom. toe pb>< med Mosq I *W* ei M Bieb — *Thymut extguut* Sibib ft Sm Flor dr.ire \ I bl I ')!*> I.o-rollae in icove mmore* quam in ctemplanbu*) — *innot ennus* Hnrbb Flor. drrm eirurt. 337. — Habitat in Kumpa .n^tro-orimUili rl in \iia Caucasca, pmpp Vapolin, in iDtulaei^pri monlibu*, in Tran«)harna, Tauru el Iberia media, in monlibus Talyich

r *Spencs non tads notae.*

13 V PI RPI RtHfRfS Bib. I. r. 301. faule ramo»o dnancalo tomentoso; ML nvaiis ftubserraiis, summit coogelit >oloral»» , vertirilla»ins l-£-fl»n» fubap* proimatlt. 4 — Folia prattertlm ad veoat rubro-nolarea I omlla roajutcoia rubra - Media later Jf. *AHmo§* el *alpmam* tidelur - \eromroillier *M aipi**e* Mri«a« - *AHmct pmrpmrmstms* Pert tocblrid II 13. - *Thymut purpuroscf*** Poir Diet. Suppl. VII. 6M. - Habitat in Hicpaolia

14. II BOTI NDIFOLIA Bib. I. c - Poll, orbiculatis mucmniati*. %am» »ubius promlatanb, eaule procombeole, apiee calyeibq ?illo»u ^ - E* eirmpUnbus s boc somite is borlit bolairia rullis, oon differre videiur a Jf. *Pal*«**«* ~*T *nog ro1wn4tfWu§* Pert I. c. - *Thymu* rohindtfolut* poir I r - *Thymut* ~~notae~~ *toidet* Bernh. ei Beicbb Fl. Germ fie 3*7 - Uabilal in Hitpania io Hu ~~ngaria.~~

•Milt If. GUMPtMini UBB. OtBtr. pUBL M. It*. - Bt*. L e. Sit ~~sub-~~ VertieUaalri molUflori ?. late paunflori aequalet, pedunculo common*. ~~sub-~~ •olio, po4ietUto flUCormbul arc complanatis Brarlrae mbtllalae, nun© • ~~sub-~~ ann calycem aoqoaate*. Calji basi infra gibbut t subaequalis, fanre latua ~~sub-~~ T parum tillota.

^ M DKBILIS Bib I e. f - Barbarea a«»tlla debilis glabra. foil. ~~pedicellis ovatis~~ ••Haala^ •obtorraais. floralib. miaorib . vertieillatiris ptuciflorit. ~~pedicellis elon-~~ gaUa fltlformlb braetett miaalJt. ealjeit faace iotas nuda ^ * ~~Herba vix J-4-~~

pollicaris, in omni pane glaberrima. Caulis ascendens subsimplicis. Folia rotunda-pollicaria', basi in petiolum semipollicarem longe angustata lenia, floralia inferiora conformia, superiora parva. Verticillas tri distantcs 4-6-, rarius sub-10-flori. Cymamra pedunculus communis saepius nullus, rarius in verticillas tri inferioribus 1-2-linearis. Calyx declinalis, 2-3-linearis, basi non gibbus. Corolla — *Thymus debilis* Ledeb. Icon. (or. Ross. Alt. illustr. t438. — Habitat in Sibiriae jugo Altaico in umbrosis prope fortalium Alexandrowsk et in deserto Soobgoro-Kirghisico circa montem Kent.

10. M. ARUNDASA Roiss. Vnjage bot. dans le midi de l'Esp. 408. no. 1328. t I. 145. - Perennis, tota pilis mollibus. caulibus villosa: caulibus herbaceis prostratis; foliis, petiolaribus ovatis acutis, basi rotundatis*, bracteis remotis, dentatis; verticillas tri aequalibus globosis; bracteis subulatis calyce brevioribus; calycis subincurvis dentatis inferioribus paulo longioribus. 2l. — Caulis plurimi repentes simpliciales longis pilis patulis hirsutis. Folia breviter petiolata rotundata-ovalia acuta, utrinque crenatis 2-3 acutis dentata, utrinque, praesertim subulosa, floralia minora ovalia lanceolata. Verticillas tri 1-2 sessile*, 8-14-flori globosi. Bracteis subulatae plumoso-ciliatae tubum calycinum subaequant. Calyx patule bicuspidatus. Corolla biterminalis pallide rosea. — Crescit in Hispaniae australiori regione montana Sierra de la Nieve pagana Ifuatejam.
17. M. CMBROS, AM. Bleb. Fl. Taor. Caoc. II. 03. (nec allor.) - Bib. I. c. 302. t - Herbacea diffusa pubescens. villosa: foliis, petiolaribus ovatis acutis, basi rotundatis; verticillas tri aequalibus globosis multifloris bracteis mollioribus v. crenatis subulatis, calyce dimidio brevioribus. 4 — Caulis elongati numerosi procumbentes, basi repentes, parum ramosi, 1-3-pedunculati rami tetragonali, versus apices pilis raris villosi, basi glabrati v. angulis villosi. Folia quam 9/10 Clinopodii minora, utrinque et minus runosa, vix pollicaria, supra sparse, subtus ad nervas hirsuta, floralia media inferiora raulinis conformia, superiora angustata. Verticillas tri 20-40-flori, inferiores remoti, superiora interdum in spiram laevem v. raris multo densa appropinquati. Pedunculus communis utrinque nubsulatus v. pedicellatis brevior. Bracteis paucae subulatae ciliatae, nunc brevissimae tubulatae, nunc pedicellos aequant. Y. parum superantes. Pedicelli tannati hirsuti, calyce breviores. Calyx declinatus, imbricatus, basi infra glaberrima, oeris ciliatis, aplee tubulato. Ubi pauca, aequalia. Inferiora laevia tubulata, superiora aequalia. Corolla ealiam vis diluendo longior purpurascens. Summa superior! saepe siliqua. — *Thymus repens* f. Rib. In Wall. Pl. As. rar. 1.00. - Habitat in Arabiae Babilonica, in Iberia sylvibus sub arboribus circa Ananor et Dosehet, in montibus Taiyab frequent, in jugo Himalaensi vulgaris, in montibus peninsularum Indiae.
16. M. HKPKNS Iih. Labiat. gener. et spec. 303. — Herbacea diffusa, basi radicans pubescens. villosa: M. petiolaribus ovalibus obtusis serrato-crenatis, basi rotundatis; verticillas tri aequalibus globosis multifloris bracteis subulatis numerosis calycem aequantibus. % — Habitus *M. umbrotae*. Rami longiores. Verticillas tri densiores hirsutiores. Bracteis numerosae, longe ciliatae, at in *M. dinopodio* calycem aequantes. — *Olinopodium repens* a. Rib. In Wall. Pl. As. rar. I. 00. - *Thymus repens* I. Don, Prodr. fl. Nep. 113. - Labiatum in Asia media, in India orientalis montibus Nepalesibus.
10. M. ORIFAMKOLIA Bth. I. c. 302. f - Capitulis verticillatis; bracteis linearibus hirsutis bispidis; Toll, ovalibus integerrimis hirsutis. ^ — Plants «esquidalis caulibus* ascendentibus ramosis laciniosis bispidis. Folia subpetiolata ovata integerrima, utrinque pilis adpressis hirsuta, unguicularia. Capitulum floribus verticillatis bispidis inferiora ramulum acumulantia, longius pedunculata. Bracteis capitulis subulatis linearibus lanceolatis bispidis, Mi calyce lonamprolongati elongatis hirsutis 5-dentatis subulatis dentibus inferentibus paulo brevioribus. Corolla pilosula, lobis superiore breviter hirsutis, inferioribus integerrimis, inferentibus lobis, lobo medio contra. Mi acutis-ilo, i, i, i, i,

longitudinis calycis* — An non potius *Micromenae* species⁹ — *Clinopodium on-*
gantfoUum Labill. Ic. pi Sjr rar IV 14 t 9 — liliabil in monte Libano
 20 M CLINOPODIUM Bib I c — lherbacea erecta nullo foio petiolalis oralis
 obliuus subcrenatis, basi rotundatis; verticillatis aequalibus globose raulufloris;
 bracteis subulalis numerosis calycem aequantibus ^ — Calyx 1-2-pedales, pa-
 rum ramosi Folia 1-2-pollicaria, saepius ulnne villosa, rarus supra sub-
 glabra, subtus pallida v. subcanescentia, margine nunc intrgerma, nunc obscure
 v irregulariter serrato-crenata, Ooralia minora magis sessilia > verticillatis
 distantes, pollicem diametro et interdum majora. Calyces 3-4 lin longi uti brac-
 leae pilosissimi Corolla Jf *Calamtnlhae* calyce duplo longior — (*Itnopodium*
tulgare Linn Spec plant 821. — Son. Engl. Bot. t 1401. — *Ctmopodium Aegyp-*
tiacum Lam Diet II. 20 — *Omopodium alropurpureum* el *tanraium* Hortul.
 — *Ctmopodium plumotum* Sieb ID Bot Zeit. 1822. I 242' — *Thymus tyteaticus*
 Berob. e& bieu. Norn, bot 208. (edit 1) — Habitat in Europae omoia et Asiae
 mediae sylvis apertis ad sepes et vias, a Scotia et Suecia ad Hispamam, Siciliam,
 Gracciam et Cretam, io regione Caucasio-Caspica, eiam in America leptenrio-
 nali terosimiliter ei Europa allala

SecUoV. HEUPITUUM Bth. 1. c, 393.

terticillatis paucifloris laeviculis secundi. Bracteae paucae, saepius* otalae.
 Calicis basi in gibbus patens, labio sopenore glaberrimo, faucibus intus nudis. Pili
 raris villosa. Corolla alba r. flavescens, tubo recurvo adscendens.

21. M. OFFICINALIS Lion. Spec plant 827. - Bth. I c. 303. f - lherbacea erecta
 ramota foio, late ovatis crenatis, basi truncatis cordatisve, Ooralibus subcon-
 rimb.; verticillatis aequalibus. Calyx 1-2-pedales, rarus supra sub-
 glabra, subtus pallida v. subcanescentia, margine nunc intrgerma, nunc obscure
 v irregulariter serrato-crenata, Ooralia minora magis sessilia > verticillatis
 distantes, pollicem diametro et interdum majora. Calyces 3-4 lin longi uti brac-
 leae pilosissimi Corolla Jf *Calamtnlhae* calyce duplo longior — (*Itnopodium*
tulgare Linn Spec plant 821. — Son. Engl. Bot. t 1401. — *Ctmopodium Aegyp-*
tiacum Lam Diet II. 20 — *Omopodium alropurpureum* el *tanraium* Hortul.
 — *Ctmopodium plumotum* Sieb ID Bot Zeit. 1822. I 242' — *Thymus tyteaticus*
 Berob. e& bieu. Norn, bot 208. (edit 1) — Habitat in Europae omoia et Asiae
 mediae sylvis apertis ad sepes et vias, a Scotia et Suecia ad Hispamam, Siciliam,
 Gracciam et Cretam, io regione Caucasio-Caspica, eiam in America leptenrio-
 nali terosimiliter ei Europa allala

M. tilioio - *M. Romano* Mill. Diet oo. 2. - *M. krsuta* Balb - ^ *rordifotta*
 Pert. Eochmd II. 112. - *M. Uvrtem* Hortul - Jf *ailunma* Siblbrp ft ^m.
 Flor. Graec >l 63 t 570, - (Io monle Libano)

22 M niRSLTA Blume, Bijdrageo 830. - Bib. I c 304 - Capitulibus
 aequalibus; foio, ovato-oblongis oblate serratis calycibus hirsutis V - Anloit jr
 o/7feco«Ji - nabiUl Io Java, Io cacumioe noolis ignitomi Tjerimai proviucia
 Cjeriboo.

23. M. PARVIFLORA Bib. io Wall. Plant Asia! rarior I. to el Labiat geor. «
 spec 301 - Herbacea erecta toglabra foio otatis f otato - laeolaus acojw
 subirratis, basi roiuodalU coealstf, Ooralibus coformlb . lertidllasrlra . * * *
 rib latis secund it. bracteis paucis partis oblongo-hoeb , corollis " * *
 longioribus % - Cbaraeleribua ~jf. ofiffi* afBnis, sed babi w <fl reril, Tota
 pl»U satpe purporaeras tflabra, pills paacis eiceplis ad « . » » |oi au. lit al.
 • mat roUomm ?. calyevm. Folia fit pollicana. Iofloretceolia Jf. e, r, r, r, r, r

Bracteae saepius minutae. Calyces minus dilatati, labio superiore minore quam in *M. officinalis**. Corolla vix exserta alba? — *Geniopsis axillaris* Bib. in Wall. Plant. Asiat. rar. II. 18. — *Scutellaria Japonica* Burm. Fl. Ind. I. 130. — In India orientali, in montibus Nepaliae et Kamaon et Deyra Dhoon habitat.

84. *M. FLAVA* Bth. I. I. c. c. — Herbaria erecta subglabra: folia, ovalia v. ovalo-lanceolatis aculis serrato-crenatis, basi rotundatis, floralibus confertis; verticillatis axillaribus. laxis secundis; bracteis paucis oblongo-linearibus; corollis calyce subtriplo longioribus. 2l. — Habitus et folia *M. parviflorae*. Calyces apice colorati 4-5 lin. longi, labiis patentibus, superiore subplano, dentibus late lanceolatis aculis, inferioris lacinae lanceolatae aculae, labium superius aequales. Corolla 9-10-linearis flava incurvo-ascendens, fauce valde dilatata. Stamina omnia fertilia. Antherarum loculi divaricati. — In India orientali, in montibus Nepaliae.

Sectio VI. MACROMELISSA Bth. Lablat. gener. et spec. 394.

Verticillatis laxissimis, saepius paucifloris, cymis subumbelliformibus, pedunculis elongatis vix dichotomis. Calycibus fauce palmaribus, intus subnuda, lobis profundis palmaribus. Corolla elongata purpurascens, lobis dilatata. Stamina apice lobdislantia.

85. *M. GRANDIFLORA* Linn. Spec. plant. 827. — Bib. I. c. — Herbaria subsericea, parce villosa: folia, petiolatis ovalia teulit grotte dentatis, basi rotundatis cuneatis, obovatis, virdibus; racemo laxo paucifloro cymis pedunculatis vix dichotomis paucifloris; calycibus fauce intus subnuda; corollis amplis calyce plus duplo longioribus. 3l. — Caules basi ramosi decumbentes, ramis pediculis suberectis glabri Y. pilis raris villosi. Folia saepe 8-3-pollicaria, nunc glabra, saepius pilis sparsis utrinque hispidula, floralia inferiora conformia, superiora multo minoribus angustiora. Verticillatis paucis subsecundis. Pedunculus communis nunc 3-4-linearis, nunc fere pollicaris, rami subnulli, pedicelli inaequales, longiores calycibus aequalibus. Bracteae parvae lineares aculae. Calyx 4-5-linearis lobulatus, fauce parum ampliata intus nuda v. pilis paucis ciliata, lobis palmaribus, lobis oblongo-lanceolata subulatis. Corolla 1-1/2-pollicaris purpurascens, fauce albe inflata, labium superius breve emarginatum, inferioris lobus medius latus emarginatus. Stamina laxa approximata. Antherarum loculi subparalleli. — *Calamintha grandiflora* Moench, Melb. plant. 408. — *Thymus grandiflorus* Scop. Fl. Cam. ~ DC. Fl. FT. III. 508. — Habitu in Boropt* alyu ombrotu, la BioabM Pyrtaicis, Cebennarum et Loierc, ID Alpibus redentibus, H<l?tUelt OcrsMsJe4aqo<v. In Olympo Biibynco, monte Albo, Uconlola nonilbw t4 la Tavta circa Baldar.

85. *M. MACROSTEMMA* Moench, el Bess. nsa. t% Bth.Uc.aOi. - FratricoM: ramis divaricatis, Junioribus villosis; folia, petiolatis ovalia oblongisve acula, basi rotundata-cuneatis levissime serratis, supra virdibus, subul pallidis, utrinque glabrisculis hispidulisve; verticillatis laxis subsecundis paucifloris; pedunculis pedicellatis elongatis; calycibus glabris, labio superiori patentibus, fauce intus subnuda. 5 — Rami elongati suberecti. Folia distans semipollicaria Y. vix pollicaria, floralia conformia, cymis sublongiora. Cymae plerumque 8-3-florae. Bracteae parvae oblongae. Calyx 5 lin. longus, labiis patentissimis. Corolla lenulskim pubescens, calyce subquadroplo longior, lobis dilatata. Labia lubaequalia, superius erecium oblongum breviter emarginatum, inferius patens, lobis rotundatis medio emarginato? Stamina subexterta. Antherae subdistantes. — Habitat in Nova Hispania.

SecUo VU. HBTBB0HBLTB80I BUL I. e. 305.

Verticillatis irregulares paucifloris subsecundis, in ramos foliolos saepe abeuntes. Bracteae subfoliaceae. Calyx elongatus, basi non gibbus, lobis bilabiatis, dentibus sclaccis reclusis, fauce intus subnuda. Corolla elongata purpurea, lobis subreclusis.

27. *M. LONGICAPILLIS* Wall. mis. ex Bth. I. c. f - Suffrutescens • ratim Hongntm decumbentibus pubescentibus; folia, ovalo-oblonga obtusis subdentatis, basi rotundatis angustatisve subvillosis, floralibus conformibus; verticillatis paucifloris irregularibus secundis; calycibus elongatis subdentatis, dentibus lanceolato-lobulatis, fere

mtus subnuda. 2]. — Caules debiles 2-3-pedales, basi lignosi, rami juniores molli-
 IUT viliosi, summilalibus purpunscentibus* 1 oia |i| semipollicem longa, nunc
 integemma, saepiis utnque crenis 1-2 notata. \erlicillastn \ersu» apices ram-
 orum approtiniati, irregulariter 2-6-flori, folns floralibus bracieiste foluccis
 (<i|)ce brHonbus inermixli. Calyces 5-6 lin. longi, saepe subbilabian, labia
 MI palentia. Faux inlus fere nuda t. rarius pilis albis Mibclausa Corolla >io-
 lacea, calyce m duplo longior. Stamina supcnora plerumque aborlita Species
 inter Mrhssam et Uedeoma media, an genus proprmm ' — *Thymus pipertut* D
 Don, Prodr fl >epal. 112. — *Thymus onganifolius* D. Don I. c. — *Clmopodium*
Itmytcaule Bth in Wall. Plant Asiat. rar. I. 60. — Habitat in India oriental!, in
 INcpaliac montibus.

f *Species dubiae.*

- 2fc M RIGOSA Lour. Flor. Cochinch. 36ft. — Bth. Labiat gener. el spec. 300. -
 Race am confeiis axillanb. lerminalibq., foil, rugosissimin subrotundis acuminatis.
 O — Caulis sesquipedalis tetragonus erectus ramo»i»«imus Folia rugosissima
 subrolunda acumfnata serrata opposita petiolata Flores albo-rubn. Planta tola,
 lorollis exreplis, colore obscure vindi praedila — Habitat IO Cochinchina.
- 29 M >EROMCAEFOLIA Pers. Eochind. II. 138. - Btb. I. c. - Foil, late otalit
 trratih petiolalis, caule ramoso diffuso; pedunmlia tlongatis ramosis. % —
 <auli> >illo<U!>. Folia subglabra. Calyx glaber. Corolla inlus purpurascens, ma-
 (iilis alhido-uolacen vanegata. *Yeromcam arrtnsem* refer!. — *Thymus rrroni-*
laefohus Spr. Nym >egelab. II 608. — Habitat in Bahama
- JU. M IX)DORA llasskarl, TOdichnfl roor natuarltjke Gesrhiedems X 127 - Foil
 peiolatis ovads acotn dentata Uxiaacohi; verlicillasins multifloris interrupte
 spicaia; bracele actaeda flabriMeolli; calycls limbo aliaio. O^ ^,* - llerba
 npiibunata tBotfort taMla *Tkqwd Swp\$ML* — Cretdt in intula Ja>a.

tt *Cli*opodia auctorym duhicu*

- 30 CL. ASIATICUM Lour. Flor. Coeblnchin. 374. - Bib. I. c. 300. - Foil, oblong,*
 nenrotia rugoflt, aubtat tomeniotla; uplca teHicillala lerminal. 2). — Caulii 2',
 pedes longoa erecius leiragonus quadritulcalus simplex >illo»u«. Folia otato-
 oblonga obiu<a| e>iter serrata mullinema, sublus tomentosa opposiia I Io* \io-
 LICOUH, %\nca terminals oblonga composila, \erlicillasin inlerrmpu, nnolucra
 KII(J hir^uia (alvx bil.ibiatu< inteperrinuM inaequ.ili« PIOMSMIMIS (.urolla la-
 bio Miprriore ronca^o aequaliter infiJo, infenore refrarlo integernmo longiore.
 i erie r genere el fonan ex ordine exrludendum Si re*»ri ad *Inbialas*, ve-
 roMmilitr J<I *Amtsorhilum* referendum — Habitat in (orhinehina
- Jl CI III VII K Mill Did. no. 4. - Bib. I. c. - llumile ramosuro foil, rugosionb..
 capuuli« explaoali« V - Habitat in Carolina.
- J2 11. CtIOLIMAM'M Mill. Did. no. 3 Bib I c - Caule ereclo noo ramofq.
 foil <ublq» villosis; Tertlcillasiris paucionb ; braceis calyce longionbus 4
 llabilal in Car lina.

ttt *Species e yenere excludendat,*

MELISSA AIB\ Wald>t. et Kil. -* MMROMKRU RUPESTRIS

M. CRETICA Un. - MICROMKRU MARIFOLU

M. FRITICOSA Lino. - VICROMERU «\RIFO||\

M. MYRIFOLIA Pert. - MICROMKRU MIRIFULIA

M. MAXIMA Ard. - PEKILLA oi |UO||>f s.

M. NEPALE>SIS Bib. - IIF.I>KOH\ NKPU I.NHIS

M. PMBMIS Por»k. - »% nil AtK.M'TIM \.

M. PLLRGIODES l.lnn. - HEI>E"Mt PI I K<i|OIDr>

M. PI LEGIIM Rocb. ** MICROMKRU PI I.K<;il M

M. PIRE>%I< A Jarq - HORMIM M PIRKNAK I «

M. hi BMI D\ m<<J<d el kit. - MICHOMERIA PI I Kitl M

M. SVL\K>TRI» Un. — MELITTIH MEUMiOPIH 111 M

CLINOPodium CAHTATIM \$w - HYV1H CAPITTA

- CL. CIAMAEDRYS Vahl. - MARSYPIANTHUS HYPTOIDES.
CL. FRUTICOSIM Forsk. - PHLOMIS MOLUCCOIDES.
CL. INCANUM Linn. - PYCNANTHEMUM INCANUM.
CL. MARTINICENSE Jacq. - LEUCAS MARTINICENSIS.
CL. RIGOSUM Lino. — HYPTIS RADIATA et GLOBIFERA.

3018. GIRDOQUIA Rz. et Pav.

(Rz. et Pav. Prodr. flor. Peruv. et Chil. 148. — Mcisn. Gener. plant, vascul. I. 285. II. 103. — Bfn. Labial, gncr. et spec. 307)

1. G. BETOMCOIDES Lindl. Bol. Regisl. (New Ser.) XI. plant, misc. 86. no. 150. - Caulis siccus leviter pubescens acutangulo; folia, petiolis ovatis serratis glabris, utrinque. Mridib., basi apicque. integris, floralibus sessilib. inlcrermis; nms donsis pedunculatae, basi foliatis; calycis glabriusculi denlib. hretib. aniiis; corolla arcuata dupl. longior, labio inferiore denliculato. 5 — Crescit in Mucuo.
2. G. MEXICAISA Blh. Plant. HartweR. p. 50. no. 377. — Fruticosa: ramis glabris; folia, petiolis ovatis aculiculis, basi rotundatis, margine remote serrulatis inlegerrimisq., utrinque. glabris, gubus pallidis; verlicillasrii irregulariter cymosus laxis paucifloris; calycibus fridibus glabris, denlib. aculis; corolla pubescens calycem quinuplo eecedente. 6 — *G. multiflora** et *btonieoidi* affinis. Folia vix unquam semipollicaria, saepe 4-5 lineas longa, petiolo 3-4-lineari. — Crescit prope Regla Mexicanorum.
3. G. RILITIFLORA Rz. et Pav. Syst. TegeL flor. Peruv. et Chil. 140. et Flor. Peruv. et Chil. inedit. IV. t. 40). fig. a. — Maund et Henslow, The Botanical I. L. 0. | - Hook. Bot. Magaz. t. 3772. - Paxton, Magaz. or botany VI. 223. (c. ic. aen.) — Blh. I. i. 308. — Fruticosa subglabra: Toll. petiolis ovatis oblunib. subrotundatis, basi rotundatis, subtus pallidis, floralibus conformibus.); verlicillasris inlcrermis subsocundis; cymis pedunculatis in dichotomia; calycis glabriusculi denlib. aculis, fauce inus nuda, corollis calyce inlo longioribus. — Caulis basi nudus, ramis pedales, vix folia et calycem laborrimus. tumens tenuissimo pubescentibus. Folia pollicaria, obscure dentata. Cymae folio breviores. Pedunculi et pedicelli filiformes. Calyx tubiobcurvum, apice coloratum. Corolla bilabialis, per antheras evidenter bilabialis. Corolla olivacea pulchre coccinea. T. purpurea, fauce diluata. Summa aequaliter. — JMS «ovitiflora» Cav. Icon, plant. rar. VI. M. u. Alt. (male). - Babui in Chill arva in eaipis provinciae Conceptionis.
4. G. RUGOSA Bib. I. c. 300. - Fruticosa villosa: folia, petiolo ovato-rhomboidem serrato-dentatis*, basi rotundatis eoraceli rugatis, utrinque. tiltotum, sublimi vix canoscentibus; verlicillasris laxit nullifloris; calycibus villosis denlib. anbulis ciliatis, fauce inus subnuda; corollis calyce duplo longioribus. 5 — Prulex ramosissimus, ramis nudis letragonis, juniores rufo-villosi. Folia 1-1.5-pollicaria, Ute rhomboidea reticulata (o-nosa floralia minora, aliam tuperantia. Cymae breviter pedunculatae. Bractee oblongae villosae, calyce breviores. Pedicelli breves. Calces 1 lin. longi tenues virides villosissimi, denlib. fimbriatis. Corolla villosa, labio superiore erecto, breviter emarginato, inferiore tubiformi lobis oblongis inter se gubaequalibus oblit integerrimis. Stamina didynamia, antheris sub labio superiore per panam approximate. — Speciei aequo jure ad *Mfittam*, *Mirromertam* v. *Gardoquiam* referenda. - Labialis in Peruna.
5. G. EILIPTICA R/ et Pav. Syst. veget. fl. Penn. et Chil. HO. et Flor. Peruv. et Chil. inedit. IV. i. 405. fig. b. — Blh. I. c. t. — Fruticosa creta. ramis ulaliribus, folia, petiolis ovatis aruliculis serrato-cronatis, basi rotundatis cunra-Usve, utrinque. iridibus glabris subciliatis, floralibus minibus, verticillatis 5-floris; ramis iridibus pilosis, denlib. arulm, fauce inus nuda, corollis caecis subquadratis lonibus*. — Rami letragoni. Folia pollicaria subbruffosa. Fluorilla a rufumia. verlicillasris denlisculi secundi, pedunculis infundibuliformibus. Bractee exlimores foliaceae oblongae alar. (al)rcs Mriaii, h, M, s, l, periere breviter dentata, ut patet. Corolla fere hesquipollicaria p...

coccinea, lobis abbreviate. Stamina exserta subdistantia. - *Stachyt speciosa* Hook. Bot. Misc II. 215. — Habitat in Peruvia montibus versus Cheuchin et Sayan vicis inter Pacron et Obrajillo Vallis Cantac.

- 0 G. THYUOIDES U. B. Kth. Bot. ren. et spec. plant. II. 314. t - Bib. L. c. - Folia ovalis acutius subcordatis, rostrata revoluta subserrata, supra glabrescentibus, subtus cano-pubescentibus; floribus verticillatis. 5 — Fructus ramulorum ramulis tetragonis pubescentibus. Folia breviter petiolata teretia, 3 lin. longa, 2 lin. lata. Petiolus pubescentibus. Floret verticillati pedunculati semipollicares, verticillatis nullis duntaxat, internodia 5-6 lin. longa. Calyx tubulosus 10-lobatus 3-dentatus pubescens, dentibus inaequalibus acuminalibus subulatis. Corolla lobis triplo longior flava pubescentibus, tubo infero pubescente, fauce longissima, inferne barbata, limbo bilabiali porpureo-maculato, labio superiore emarginato, inferiore trifido, lacinis obliquis. Stamina 4 distantia subinclinata filamentis glabra. Stylus eiserius. - Habitat in America meridionali, in Andibus Quilensibus?
- 7 G. KLEGANS H. B. Kth. I. c. 315 | — Bib. I. c. 400. — Folia subrotundo-ovata obtuse serrata, supra pubescentibus, tubus albo-lomentosus; pedunculis axillaribus subinfloris. § - Fructus aromaticus 3-4-pedalis, rami tetragoni pubescentibus, juveniores albo-lomentosi. Folia petiolata, basin versus integerrime conarata reticulato-nervosa, 6 lin. longa, 8 lin. lata. Petioli 1/2 lin. longi lomentosi. Flores breviter pedicellati. Calyx tubulosus 10-lobatus 5-dentatus tomentosus, dentibus acuminatis, 3 «superioribus minoribus. Corolla rubra, eili pubescentibus, fauce (lava incarnata - maculata. Stamina 4 distantia subinclinata inter Molalo et Pansache in declivitate montis Igoivomi Cotopaxi regni Quitensis.
- a G. PILCHELLA H. B. Kth. L. e. t - Bib. I. e. - Folia ovata subrotundo-ovata obtusiuscula, basi cuneata, margine serrata, supra pubescentibus, subtus albido-lomentosis, pedunculis axillaribus subinfloris. 6 - Fructus 3-4-pedalis ramosissimus, ramuli tetragoni pubescentibus erecti. Folia petiolata coriacea veuosa, 8-9 lin. longa, 0-7 lin. lata. Petioli 1/2 lin. longi tomentosius Flores longe pedicellati, pedicellis 2-3 lin. longis, teretibus tomentosis. Calyx 4-lobatus (pollicaris tubulosus 10-sulcatus 5-dentatus in tomentosis pubescentibus, dentibus acuminatis-subulatis, 2 inferioribus brevioribus — Habitat in America meridionali, in locis calidis inter Casate et Contumasy Pruruae.
- 0 (. TOVKA-TOSA II B. Kth. I. c. 311. | - Bib. I. c. Folia subrotundo-ovata aruiuscula, basi tuberculata, margine serrata et levis «errata», supra pubescentibus, subtus albido-lomentosis, pedunculis axillaribus subinfloris. 5 - Fructus aromaticus ramosissimus 3-pedalis, rami tuberculosi, ramuli tetragoni pubescentibus Folia petiolata coriacea venosa, vix semipollicaria, 5 lin. lata Petioli lineam longi tomentosi Flores pedicellati, 8-10 lin. longi. Pedicelli lineam longi lomentosi. Calyx tubulosus 10-sulcatus 5-dentatus albido-tomentosus. dentibus aruminatis, 3 superioribus minoribus. Corolla calyce triplo longior inrarnata, etiam pubescentibus, tubo brevis, fauce longissima, inferne barbata, limbo bilabiali, labio superiore emarginato, inferiore trifido, lacinis obliquis. Mamma 4 distantia inelata Antherae strobiliformes Stylus eiserius glaber. Achacna Inangula haec laevigata - (*i. grammatiflora**) valde affinis Habitat in America meridionali, in arenosis alveis plantis! (^nitensis juiia Lactungia, Hanbato et Riobamba) ueto
10. G. GRA-DIFLOBA H. B. Kth. I. c. f - Bib. I. c. - Folia subrotundo-ovata obtusiuscula, basi cuneata, apicem minus denudatis supra tentissime pubescentibus, fructus Incano-toaeuotis, floribus axillaribus sohlariis, breviter pedunculatis. Fructus 3-pedalis, ramulorum ramulis sableres glabriusculi. ramuli pubescentibus folia petiolata miculata triplo longiora semipollicaria. 4 lin. longa. Petioli 1-1/2 lin. longi mucoso-lomentosi. Calyx triplo longior 10-sulcatus 5-dentatus acuminatis subaequalibus. Corolla lobis triplo longiora, limbo bilabiali, labio superiore emarginato, inferiore trifido, lacinis obliquis. Mamma 4 distantia inelata Antherae strobiliformes Stylus eiserius glaber. Achacna Inangula haec laevigata - (*i. grammatiflora**) valde affinis Habitat in America meridionali, in arenosis alveis plantis! (^nitensis juiia Lactungia, Hanbato et Riobamba) ueto

- dislanlia subexserta. Filamenta glabra. Antherae incumbentet arcualae. Stylus glaber exsertus. Acbaema trigona oblusa Hi sea laevia. *G. incanae* simillima videtur. — Ex hac descriptione non nisi foil is apice serralis a *G. incana* difflert — llabiat in America meridional!, in convalli temperala fluminis Cbambo Inter monlem ignlvomem Tunguragua el pagum Penipe.
11. G. BREVIFOLU Dili. I- c. 401 — Frulicosa incana* foil, brevissime pctiolatis sabrotundo-ovaiib obiusis, margine |i| re\oluli*», supra pubescentib., subtus cano-tomenlosi», floralib. conformib. caljces acquanlib.; \erliciUasiris 2-6-flon& t>e-cundis, caljciib. subcoloralib, dentib. lanccolatis aculis, fauce inlus nuda; corollis calyccm brc\iter superanlibu*. 6 — Habitus *G. tncanac*, folia breviora latiora, supra \india oblusa > breussime mucronulaia, cal)ci* denies angur>liores cl acutiores Ab omnibus affhmbus corollis >ix caljcera exccdenlibu* dislincla el >ix a *Ht cromttus* separanda cst - Crc>cil in Perutia
12. G. I>CIM R/ et Pav. S)bt nor. Peruv. cl Chil 150 cl Flor. Peru*, cl <Inkiis IV (inedil j t. 493. fig. 4. — Dth I. c. — Fruticosa incana foil brc|i>»iaic peholatis otatis obtusis inlegcrnmis planif, supra pallidis, sublus cano-lomciions floralib. conformib. calyces aequanlib.; terlicillaslns 2-0-0oris; calycib. incanis, ore obliquo, denlib. brevib. aculia, fauce Inlus nuda. 5 — Folia *DHianlhemt earn* semipollicana iniegerrima, floralia conformia calyces superanllt. Bractcae parvae, llineares obiusae. Calyces subsessiles Incunri, Interdam subblUBittl. Corolla ultra pollicans pubescens flava? Gemlialia lubeiserta. — llabitai lo Pemvia, in pracrptis ad Cheuctun vicum.
- 13 G. HOOKERI Blh I c t - Paiton, Magaz of bot. III. 243. (cum ic. acn) - Lindl. Bot Regi>i 1.1747 — Fruticosa⁴ glaberrima foil oboialis subintcgerrimm, basi in pedolum brc\om angusltis, ulnnq \iridib., pedunculu 2-J-flon* , raljcis glabn ^bbilabini hbio supenore broiler Indenlalo credo, fauce inlus |||||% clausa „S — Rami \irgali lenues glabn Folia semipollirana 1-J-ncnia glanduloso-punctata remotiuscula Pedunculi nunc bre\« uniflori, nunc in ramuloi breves foliaccos subinforov abuncles Pedicelli brc\cs. Cal)ci> labii tupcnori< denies brevisnimi, labium infenus bifldum, lobis ovatis. Corolla corcinca glandaloto-pabescens, labiis profunde fltsis, brevller lobails. Sumioa tubeiserta dlflanlla. Aniberaram locull parallcl. Stylos eisertus. Calyce • caetrrls ape-ciebus parum dlversa, sed loOoreseentla, corolla el siamlaa omnlno *GariofuUe*. - *Cunila eoreinea* Null, ex Hook. Exotic, fl. III. t. 163. — *Metis** eoeimea* Spr. Syst. vegeu II. 224. — llabilal in Florida.
- 14 (i SEHICE\ Prebl mss ex Bib. I. c. 402. t — Suffruticosa procombens scriceolumenlona foil sessilib. linearib. inlegemmii, margine revolulils, ulrinq. senceo-lanalis floralib. braclei^q. coiiformib. minorib.; flonb. axillanb. lolitariit; calycib nencis, denlib. breub. subaequalib., fauce inlus nuda. 2j — Rami, folia cal>cesque lomcnio albo sericco induti. Ramuli flonferi breves adscendentet uti folia ternatim verticillali. Folia 3-5 lm. longa, floralia conformia. Brartcar conformes v. bretiorei. Caljces subsessiles, folio aquales, vii Incum. Denies breves reel I Corolla 10-11 lm. longa coccinea pubesceos. Stamina infcnora exserta, laxc adscendenlia, supenora tncclusa? v. aborlhaV— HtbiUl In Perutia, in valibus Cordillcrarum.
15. G AIU.KMEV II. B. Ktb. No\ gen. el spec, plant. II. 313. | Bib I. c - Argenleo-sencea. foil oblongo-lanceolalit oblusis, margine revolulu mieecrn-mis. flnnb. axillanb solitarus 6 — Frulex ramosissimus, rami densusime conferti tciragom ar<enleo-8encei. Folia subsessiha, nerto medio subtus \ahlc prommenle, uirinqe argenlco-sencca, 4-J lm. longa. Flores brc\ucr pedunculali nfmipollicarck Calji campanulas-lubulosus 10-sulcatus J-den(aiui bilabiatui, extu< albo-sen ecu*, dcniiibus aculis subaoqualibus, fauce nuda Corolla rait re* Iriplo longior coccinea, cxlus pubescens lubuloso-inrundibulilormis, tuho lirVj interne glabro, faoce longissima, Imra lonpuudmali pilosa infrnc barbata, lmbi

bilabiale labio superiore subroiuudu emargmalo, infonore Inlobo, lobis rotundaiiv Stamina I duhnama disMnlia mclusa, umcum fertile, reliquon scnlia. An— thorac rcmformcs, unica maxima, Inbus minulissimiv Shlu» lonne e\serlus glaber. An >cre bujus generis ob stamina 3 aborlinili.i' — llabit.it in Am men rucndionali, in alia planilie And mm Perutianorum juUa urbem Mmpampa, in radicibus montis mclallifen Gualgajoc.

16 (i. DISCOLOR II. D. Ktli. I. c. 311 j - Dlh. I. c. - Toll oblongs ..riitis t'''' cunrato inlegornmis, supra pubcruli*, subtus sericco-pubc-ceniib. el inranis. b — rrulo\ raiosiissimiiH, rann oppoMli iclragoni, ramuli ranrsrrnli -pubescenles, rortioe solubili. Folia broiler peliulata venosa, \ems subpjr.iIMis. neno subtus prominulo, ntembranaci'a, supra \india, 4-8 lin longa, 1' -I lin. Iain. IMinli 1-1 . lin. longi cano- pubrscentos. Flores ad apicrm ramulorum axillaros solitarn, bre>i(er pedunculati, 0-7 lin. longi. Pedunculi (.lpillarci, i<Mi'iissiinc puberuli, l'/j lin. longi, basi brarteati. llrarlrae folio simillima«\ snl muiores, ralycrm baud aequanles. (lal)\ MIOSO-pilo<us lubulosus IO-IE*TM^ fauro |>il^ altxs rlausa, limbo bilabiale, labio tupenore In-, infrnore bilulo, lacinus lanrroljii^ aculis, 2 mfrnonbuv paullo brctionbus, apire arunnnalo -subulatis lomlh lubulos.i, caUce J-4-plou* lonpior, Mipmic amplKil.i. cxlornr piibe*ren< purpiinM, liniln quinqurlnlo subbil.ibi.ilo, larinii* rotundatis, fuirr nuda. Manini I (hd)uama Mibdistaiiia inrlu<.i. 1-ilimonta glabra. Anthorac rcmiformo*. Habitat in America meridionali in drch\ilate nionti« billa do (.irarat.

17. (. <|ILIF:SH (inñ. in Kdmb. phil. Journ. 1831. Srpt. 177 - Lmdl. Hot. **Regist.** I. Mi — Dtb. I. c. 4ttL t — Soffrolicosa: ramis dninrati* pubrsn nlib.; foil oblonKo-linearib. cancalitte oblnitit iolegerrimin, ba*ii aiiKuMatn, ulnuq. >indib. plam«\ floralth. conformib. bracleUq. calyce •ubbrc%mnb.; irrttallasirn patirK nulliflorU latloicullt IrreRularib.; calycib. elongalii rrerlm, drnlib. lanrrolaionubulaia tabaeqaalib., faoce toius nuda. 2} — Caulet bail lignosi dnaricad ^ prorumbenlet. Rani primarii in racrmom longum terminalem abcunirs, wrtinnlanlri magni den^l multiflon dUlincti. Kami laterales den^c foliost, \rrilirilla>iri numrosi pnuriflori irrrpul.irc^ subsreumh F«lia J-6-lin<>ana umnrr^ia, (Inralia «iti brartrac o\Trn>rrs conformn, at caljcc bn^iora. (>l>»i'» 'j-b lin. loi,(ji Hsiriai n*rii \ |i\ incurs, droiibu^ nunn diNiule bil.ibi.iii^, sirpuis ommbiif rrrli*. n.fi*rioribis profundms (SMS Corolla jiiibrNrons firnura. M\li lulu nub.T.tjui!.^ *Iniriloquta 1 nhum* Illh. in (look, rl Aru Hut. Ilcccb. |o). S£. — Habitat in Mnli prope \.ilparaiso.

18. i; ono\ \TA R/. cl Va\ S%L flor. b>ru\ ct l.lnlrn«. 13a et Fl>r. Peru*. IV. (uirdit I 404 lic- a. - Bih. I. r. 40L |> — Fruliosa rarui* ranc>renlib.; foil oboolo-oblongi*. lia>i angu%lati«, nurgim* rr%nluii inlogcrnmi#, »upra lac^lusculi%, »ubtu« pallidit paurcheniis ulrmq. glabn*; %erlicilla*iri* »ubbinoris sc-rundi*. cal)nb glabnusculu. dmlib. brc%ib. obiuais, fJ«c mtus \illosa. > Frulei 3-|irdili«. raroi dnancali. Folia J-4 tin. longa. basi luigi* in prioluin br<ti>Minuu aogustaia, ^rmt paucit pinnaii* «upra inroo«picm«. U^ralia ronform»a. Calycet »ub>r>>ilc« %. broiler prdirrlali, 4 Im. longi »lnaii, '* »'»; lcn\ tomentelli, ore parum obliquo. deniibu% »uprnnonbu« |t| longionbu*. l.»rolw caljcc tubiriplo loogiOr, «tu* Mlo>i«>iina, »laniaibu» longc cuscrli*. - HabiU in PeruMjr praerupit* ad (.heurhin neom.

It. C. GUBRATA II. B Klb >o^ pro rl «pcc. pi. II. 311 I - »«'° I. r. - **amb** pabetceniib.; foil hnrrolaio-oblongi*. ulrmq arulM, margme rr^oluii*. **ccm** %wu% letter tmaut glabris tupra nuidit, nublut glandulo%u-p<nrlulali*; **florib.** aullanb. «olitiru« j - Frulet ram>%nimu», rami »ubirirag«>iii. **e con-** fern folios. |,|14 broiler pviolata %mna roccmra *rmlp«U««'ar^ . * **late** Ptiid . lin Inngi, Irnui«>ime pubr>renr«. |*|orr« br%ürr prduocua **ti** **lata** **licore**. Calyiiubulutut IO>»lratu« glabrr ulaodulo>o-punciulau». **Pce** **rolla** **tata** bilabtatot, deotibut aruminaii*, J %<iprnnonbui paullo loogio **rli)U>**,

calyce duplo longior, exlerne pubescens, lubo interne scricco, fauce pilosula, limbo bilabiato, labio supenore emargmalo, infenore tnlobo, lobis oblusis. Stamina 4 didjnma distanlia inclusa. Filamcnla glabra Antherao subreniformes. Shlus* glaber exsertus Scquenli proxuna — Habitat In America meridionali prope Quito*

20. G 1AMIOLIA II D. Kth 1 c 312 | - Dlh. I. c. - Ramis cano-villosis, foil lincanb. lanccolalis aul oblongis oblusis, basi angustalis inlegernmis glabns, sublu!> punciuhtis, flonbus axillanbus solilanis. \$ — Frutex ramosissimun, rami jumores siibelragom, dcnsissimc foliosi Folia pctiolala approximala tonosa, ncno subtus prominente, conacca glabra, 4-5 lin. longa, V -2 lin. lala Pclioli breves, basi incrass-ah, infra medium articulali glabri. Flores brevitcr peduncu- lati pollicires et lon^iorcs, pedicellis MI lineam longis pubescenlibus Cal)\ lu- bulosiis bil ibutus sin.ilus glaber, vix 3 lin. supcrans, fjuce pilis clausa, labio "Upcnore J-, m& riorc 2-fido, lacinns acunnnills subacqualibu« Corolla rubra* extus bulll («i-pubescens, fauce Ictiler pilo»iubcula Stilus oi stamina exsorta — Habitat in \menca mondionali, in locis aspens obnubilis Andium >o\o-dra- natensium in detliMtate Parami dc Saroguru Juxta pagum Ofia

21 G. STItlATI Rz. el Pav. Syst. flor. Peruv 148. el Flor. Peru*, et Cnl (in- edii.) IV. t. 404. flg. b. — Bth. I. c. 404. f — R<mis villosol-anatls; foil, pan is ovatlt inlegernmis planis v. complicate, utrinq. glaberrimis strialis v. dorso ciliaals; >erticillastris bifloris secundis; calycib. gUbrls, deolib. brevib. obtu- <>is, fauce" intuH \illosula. 6 — Frutex 3-pcdalis ramosissimos, dense foliosus Folia sessilia, 2 lin. longa, basi rotundata v. subcordata riglda, venis paralMis ulnquo conspicuis, lfonora acuta, superiora obtusa, floralia conformia. Pcdun- culi bro\issimi Cal}\ parum mcunus, rigide stnalug, denies suhacqualci \ bupenoros M\ lon^iores (orolla ooccino⁹, caljco tri>lo longior, extus pubescens stimuli ixirouc bro\itor <xserta — Habitat in Peruuac collibus andis in lar- II) It (I IIII IIIUI p_{ro}MIK HS

22 G MKHOPimiVII II Kth I c 111 t — IUh I c - Foil oat.s obtus.s cordalii ro>oluli> mlegi rriiui glabrU, marginc neruoq medio cilialu, flonb axillarlb soliiianis. 5 — Frulex suatcolens 2-8-pedaUn ramokissinuii, ram is don- sisiitne cooferlli, Jumoribus pubescenii-pilosls Folia breviler petlolata, rotrginc ^brcnoluta \cnosa globra nitida, vix lieeam looga. Peiloll pllotl. Flores spar»i pcdunculati <ubpollicare«. Peduncull vU llineam longl pubescent*. Catys tu- bulosus 10-^ulralus scabrellut, limbo 5-dcnlato bilabiato, denUbut acutis ci- lintis, 3 supcnoribiis paullo brevioribus, fauce ealycis nuda. Corolla cal)cequin- tu>lo longior tubuloso-infundibuliformis rubra, extus Irnulsslme pubescent, tubo bn\i, inlus s(ri(oo, fjuce longitissima compronsa in inferiorc lati*re linea longilu- iliii iji pdos i-bubala, limbo bilabialo, labio supenore crrelo omorginato, lacinun rotuiiKitis, labio inferiorc tnddo, lacinns rolundatis patent!-reflcn, intermedia Mibonurgmata Stamina 4 didjnma distanlia, MI cibcrta Filamenta glabra Antliorao reuiformcs biloculares, oculis ulnque eitrcmilate connecims transvor^c affix>s oppo»itis Sljlus exsertus glabor Stigma bifidum. — Habitat in \nrxrxj mondionali, in Andibus Paslocnsibus in Ions fngidi* prope Rio Dlanco inur pa- go Guacbural ol Tulcan.

1) (> JIMIsOM Dili I f - Fruhcocjia procumbons glabra full, minimi* late ON itn obtusis integornnis plains \ conduplicalis, utnnq Mridib glabrii, |cui~ (illistns subbilloris, caljtib glabrii, donlib bre\ib. obtUMs, fauce intiis nu< i Z). — I LHM ul in ii *icioluta* m lineana, at forma di\orsi»»ima cnbn MSSIH con HI i, supra laon, subtus elegantcr nmosa (ahcos subsiolitiru KMMrnnn pnifun.lo illi in, ikiitibiiii lalis ubtusi»<imis, ^uprioribus patditibiu (ir<»ll i mm r ic in *U ruulula* rubro-carnca, oitus puboscois Stamina omnn fi ^{tu}l_{1,3} 11 il it l in IVrinii ad Paramo de Antisina

im G RI\OIII\ IU ot l'i> Sjsi u ir Poru\ a I Lil IIJ n I lor P_ot_uv_o U Unl l> uudil I m H' b litl, | i 105 , v_u(TriJtlCovl ir_o(t_u)_o

ramis pubescentib.; foil, minimis subrolundis obtusi»simis integerrimis, basi cordali», margine revolulis, supra glabris vmdib., subtus albo-tomentosis; verticillatis subbifloris; calycibus tomentosis, denatis latis abbreviatis, fauce inclusis subnuda. *i*) — Rami elongati ramosissimi. Folia numerosa »sessili«, in lineam longa bullata, subtus valde revoluta, floralia et bracteae conferrae. Floret saepius aii I lares solitani, nonne lero tres in eodem pedunculo (brevissimo. Calyx 2/3 lin. longus cano-tomentosus subreclus. Faux intus pili* raris barbata. Corolla coccinea 10-11-linearis pubescens, parum incunata, basi allenuata. Stamina omnia fertilia, laxa ascendente subdissecta. — In Peruvia collibus et in saxorum fissuris versus Ihuassabuassi, Pano et Huariaca ticoi, in Cordillera Peruviae.

f *Species omnino dubiae.*

23. G. CAPITATA Spr. Syst. veget. Cur. p. 223. — Bth I. c. 403. - Capitulum ovatis longe pedunculatis; bracteis calycibus spinosis; foil, faucicularibus linearibus longis, margine revolutis integerrimis cauleque ramoso bispidis. *y* — Habitat ad Rio Grande do Sul.
20. G. SPICATA Spr. I. e. - Bib. I. c. — Spicis terminalibus villosis foil, subfascicularibus sparsis subintegerrimis asperis. 6 - Habitat ad Rio Grande do Sul.

ft *Species e genere excludendae.*

- G. OBOVATA Spr. - FRANCISCA RAMOSISSIMA
G. (RIGAMIDES) Rchb. - VERBENACEA LANTANAE AFFINIS.

3019. tILECIOK Spr.

Spr. 8) si. vegetab. IV. Cor. potter. 227. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 205. II. IM. — Bib. Lablatar. gener. et spec. 401)

1. GL. SPATHULATA Bib. I. e. 406. f - Foil, petiolatis sabrolondo-spathulatis subcrenatis erassis, otriisque obovatis tomentosis; calycis denatis brevibus, inferloribus longioribus; corollae labio superioris erecto subgaleato. % — Suffrutici basi procambeos, rami ascendentes tomentoso-pubescentes. Folia breviter petiolata spatulata T. subrotunda-rhomboides, apice crenata, basi cuneata integerrima, in petiolum decurrentia, subulosa venosa, floralia conformia, florum breviora. verticillata subbiflora, bracteae minutae. Calyx subobovatus obovatus stantibus lomentosus, fauce inclusis villosis. Corolla extus pubescens, labium inferius patentius, lobis patentibus integerrimis subaequalibus. — Habitat in Brasilia, in passu prope Anjo Missionum Uruguayense et prope Santa Maria provinciae Rio Grande do Sul vulgari.
2. c; i. THYMUM Spr. Syst. vegetab. Cur. post. W. - Bth. I. e. 407. t - Foil, petiolatis obovatis subcrenatis, attingens subvirescentibus subglabris; calycibus denatis brevibus subaequalibus; corollae labio superioris maximo galeato. *i*) — (ruet ramis subtetragonis caulis pubescentibus. Folia petiolata late ovata subrotunda obtusa v. emarginata, integerrima v. irregulata »inualo-crenata, basi runnata aegrotata integerrima, in petiolum decurrens supra vmdia, subtus paludosa veosa glauca, utrinque glabra, floralia conformia, verticillata 2-flora. Bracteae minutae laeviores. Calyx folio multo brevior subobovatus ovatus siliatus sub-15-nerviis, leniter pubescens, fauce inclusis villosissimis, denatis abbreviatis villosis. Corolla calyce duplo longior, extus pubescens, fauce inclusis villosis, labium inferius maximum fornicalo-galeatum, inferius lobis distinctis integerrimis, lobis lateralibus latioribus, labio superioris lobis distinctis integerrimis. - Habitat in Brasilia meridionali
3. GL. SKBFTUIFOLIA 81. Ilil. mss. ei Bib. I. e. - Foil, partis petiolatis ovatis obtusis integerrimis. otriisque viridibus glabris; calycibus denatis tubulosis, lobis longioribus lobis aequalibus: corollae labio aperiens magno falcato. *b* — ••Th lignoti elongati prostrati glabri ?. tlx ad apicem trunco •• lia. longa, forma riympalli, aveta glaudoloto-puocata, P*li f, ucc < soprtma vix caetctua; floralia conformia, saepius parum majora,

- ezcedentia. \crlicillastrl biflon. Bracleae minutac. Calyces sessites lomenclli, denlibus» c basi lonceolalo subulalo-anstatis, parum inacqualibus. Faux mlus dense villosa Corolla carnea, magmludine *Gl thymotds*, sed galea minus inenmbens - An *Gl martfoltae* vanelas? — Habitat in Brasilia inter saia a Santa Theresa ad Rocha provincioe Cisplalinae commums
4. GL. MARIFOLIA Bth. I. c. + — Foil, breviier peliolalis o\atis inlegernmts v ||x crenulalis, utrinq pallidis lenuis»imc lomentosis, calycis denlib setaceis subacqnalib. lubum subaequantib, corollae labio supenore erecto subgaleato. 4 — Suffrutex procumbens, basi radicans, rami cano-tomenlosi. Folia broissime peliolata, nunc laic nunc oblongo-ovala oblusa intrgerma v subcrenaia, basi rolundata v saepiu* angustala, juniora cano-pubesccnlia, adulia glabnuscua, ulrmque glanduloso, sublus venosa, floralia conformia \crticillastn 2- \ ranus plunfion Bracleae minulae Calyx sessilis oialus cano-pubesccns slnatus, mlus fauce villosissima, denlibus subulatis nudi*, tubo subbreioribus (orolla magmiudine (*A Thymoidit*, exlus pubescens, labiura supenus crectum rornicatum, vix cmnrgmatura, infcrius patens, lobis inlegernmis, lateralibus lationbus — In Brasilia meridional! habitat.
5. GL. CANESIENS St Hil. mis. ex Bib. I. c. f — Foil, subsessilib. subrotundi« •abcrenalis, utrinq. canesceniib.; calycis denlib. setaceis subaeqaalib. tubum subaequaoub.; corollae labio superiore erecto sobgaleaio. 5 — Soffrulufr/i-i'/t-pedalis, basi radicans, rami elongali virgali cano-tomenlosi. Folia sessilia, brevissime peiolata, late rotndau oblusiuscola crennlata, basi rolundata v subcordala, ranus angustala, sublus renosa, olrinque magii minusye cano-tomenlosa, floralia conformia. Verticillastri 2-6-flon. Bracleae minulae Calyx cl corolla omnino *Gl. manfoltae*, cujus forsan vanetas esl Corolla carnea > fla>esrenn punciis purpurcis picla An \anetales plures v species dislinclac conjunctio, an omnes *Gl martfoltae* \anclalcs⁹ — *Gl. candidum* Bib. in llrrb rop Brrol msn — Habitat in Brasilia, in pascuis prope Serra dc San \aticr Minsionum Uruguayen>ium, in arcn>i> inter palmas prope Garapuru, >illano\ a pronnciac Sanctae (.alhannac el inter >axa montis Cerro Aspro provincial Cisplalinae
6. GL. ORIGAMFOLIA Bth I. c 40ft. t - Caule hinulo, foil, sessilib late o^atis sobroiundisve creoaais, basi cordalis, nlrloq vlrldib. lomeDloto-pobesceniib villosiste; calycis denUb. subulatis, Inferiorib. tubo loDgiorib.; corollit d<«oies calycinos vix exoedeoUb., labio sop«rior« galealo. % * gufrutox proeotth<ot, rami elongali, pilii pateollbus dense Blrtnli. Folia obtuslusoula sabplicata, saepius reflexa, sublus nenrosa, utrinque pilis mollibus villosa, glaodulis sub tomento numcrosis, floralia conformia, floribus subbreiora. Verticillasirl 0-10-flori. Braetcae minutae Calyx subsessillis ovalus villosus, dentibas subulotm hirsute lubo longionbus, fauce mlus villosa. Corolla alba v. flavescens, \ix denies cal^rinos excedens, raelerum *Gl tpathulatat*. Acbaenia ovalo-subtriquetrA lactiuscula — Habitat in Brasilia, in monlibus Juruoca el prope Villa Rica provmcia Minas Gerars
7. GL. SQUARROSA Bib. I. c. t — Foil, subsessilib ovalis, basi rotundatis «ubror-daiisve rigidis complicalis, glabris ciliatisve; calycis denlib. subulatis, inferiorib lubo aequalib, corollae labio superiore galealo. ty — Suffrutex bam procumbvn*, ramis adscendentibus r. ereclis, nunc glabris v. brevhsime pubesrentibus, nunn den«e villosis Folia saepius recurva 3-4-hnearia acuta inlegernma, margine >ix rc^olula rigida nervosa glabra v. ad nenros pilis longis simplicibus ciliaU, utrinque glandulosa, floralia conformia floribus bre\iora. Verticlllasin sub-6-n««n Calyx ovalus rigidus slnalus, cxlus ad nervos pubescent, mlus fauce \il!.,sN,nn, dentibus lanccolalo-subulalls rigidis ciliads, tubo longionbus, inrerionbuH naepc longc produclionbus Corolla alba v. pallide coerulescens, exlus \illosa, labpim supenus ereclum formcalum emarginalum, denies cahnnos fxerdeos/inrrrm« breuus lobin subaequalibus inlegerrimio - llabilat in Bras.ha, in pa>rui< |,,i-midis prope i arrancas pro\incia Minas dcraes el in nmpis (.era. s pnmnn H Sancu Pauli vulgari*

^ df CIII\1\ Bib I c f — Caulc piloso, foil o\ iŕ* oblongisvc intcgemmis, IMM angu>tah*, ulrinq imdib <ihalis, raljci* dcntib sulmlatit tubo longionb , corollae labio »upenorc galeato. ^ — Suffrutex⁹ ba>i procumbent, rami erecli pub>ccn(c<i et pilli* longis albido ciliali. Folia semipolliiana, mferiora brc-\i*»iime peiolata, supenora et (loralia subscessiha longiora ellipteo-lanccolaia, omnia oblusa inlcgrnna \. hinc inde dcnlc umco allcrote »crrala, ulrinque gla-b>ra, mirgine pilo longi» albidis ciliala ncnosa glandulo>a, floralia floie* duplo siiper.iutia. > erlicillastn dcn«e sub-G-flon. Braclcac minut u\ Caŕcc> exlus b>r>uti o\ati, intus faucc tillosi»«ima, denlibus linca-subulalis, lubum sub-~~jequantihs~~ ciliatis, ^ubaequalibus. Corolla denlibus longior, e|i|n Millosa, la-hium supfriui ereclum fornicatum, profundcemarginalum, in fen us ci subacqualf, lobiH roiundalu, mrdio emarginalo? Stamina et stilus *Gl tquairotae* — Habitat in Brasilia, in protincia Rio Janeiro?

V (JI. 1U>KNS Bib. I. c. 400. t — Foil, petiolatis o\alis inleggerimiH, ulrinq sub-canescenlib., floralib. pan is, denlib eal)rim< lancoolalis, tubo broiorib , corollis caljee triplo longionb., labio supenore elonpato falralo. 2I MjŕTruir\ ereclus, rami cano-lomentosi, babilus *Hehantkemt hahmtfoht*. Folia *Unpin it Ualml*, pedohla n(a ob(u«a intogernma, ba<i anguslata l-n-cnia, ulnnqur brcM^ime nno-fonuMitovi glandulo«a; floralia pana oblonga, caljee bre\iora \crlicil— li^iri IJ\I b-IO-don, pedunculo conimuni utnqt* pedicollis longion Bractcae oldouKo-lmeares raljee breviores. C*)dX tubuln«u> xtrialiH, exlun lomentofO-|niln»srcns, intus faic(Mil|o>i>4inia, dentibus o*ali* aculin, tubo riplo brenonbut. I orolla <>tus pubnrenn, caljee Iriplo longior nngem, labinni suprii< clongatum falratum cniarginatom, inferius brniot paleni, lobi* rotundatin. — Ilabilil in Brasilia meridional!.

10. (iL. M\RTOIDBS Si. Hil. M I. ex Blh. I. c. - Ramlt %illosit; foil ovats crc-naiiii, basl angastallf, airlnq. flrldlb. T. tabloi subcanescenlib. subavpenn, ca-UCM tubuloti denlib. Unceolallt acnlis, tubo bretiorib.; corollae labio nuperiore errrto fornicato. 2} — Frulei 3-4-pedalit ramosittlmus, rami virgah, dense folio<i. Folia semipollicaria oblusa, basi in peliolum brevem anguslata nglda \eno*.i, pubescentia brcti scabrella, floralia conformia, raljres ncquanlia Y. M\ briMiora >(rlcilh<lri 2-6-flon, %er«u« apircs ramorum paun, lave appro&i-m Hi subsiTundi (i!)r(s bre>iter pedirrlali, 1-4 lin Inngi Mndes stri.ih, drnief > I l.y n k s v infrnrcH profuniliM fi<>si, biM Ijiirolali, apuo arislali. laliludini «u>i lpquitrH FJUI IIIUH dniHC ullosa Corolla roerulea, r.ii)Ci* ilimidio Ion-^n r, i linn |nibr«ren« Ialna suhacqualia, HUpenu emargiiiatum |i| inrurvum. O I. r loiius planUi* furlin *Mrmhar t*uletjn*. - Specie* mrollae labio nuperiore ~~minus~~ conri^o An/Aiar affiriM, babilu eliam inler <*l<chott vi *Knthiam rubi*-cream* qna<i media - Habitat in Brasilia, in loci* allis in Srrra do Tapa^aio pro-~~vinctae~~ Mmas Gerafs communs

3020. It KIT 111% Blh.

(Bib Labial gener ft *pfc. 40a el 73*. - Me %an <rner plant *ascul I W " I W)

Swtio I. EBJOTHMU8 Bill. 1. c. 410.

Frule* rami« dioncail% folio>i* «jmar a&illare« prdunculalao pauciflor^{ac} CJI)O« fam ~~IIIW%~~ %ll%a i orollar labiuo suprii* bifldum — An genu« proprii^{..} I k HI III K.]. \ Blh I c I Fruliroo r,m Wulio%ic f<ln<|. *ubjrlabn-; O^ prdunmljii« pauciflon« umbellulifurinib , m »lhier pilo*is%iroi». ral)Cib ~~cat~~ drouth, Uuce inlus nuda ^ - Irulei habitu *Hub%aeenrum* R!«« div^{cat} jgj acule lelraŕoni, aogulit pul>r*rrnlibu*, inler flore* molliler pilo%i. ~~caele~~ U m * bn Foht ftrnipollicana »ub>r%ilu o«au ubiu*a inu-Rernma, ba^i roi^{undata v.} cnlita, ulnoque (bbemma, %ubi« unmrria pallidi glanduloso-punctata, mar-~~gine~~ %ubrriŕijula. lofloresceniia nunc anllarM. rann« ad apicm ~~escurantibus~~ <l Mm flnralibus eaulinit orunibut con form il>u«, nunc lernnnal^{collig floratibus} ~~supremis~~ multo minonbu« \rriirilld%iri in ijuoque ramo i-J- ~~clucul~~ ^ com-^{0-Ooram} ~~munis~~ urini|ue 3-5 + ~~meas~~, apice ombdlulam v. v mam I'C*«» J..

ferens. Pedicelli 3-5-linearcs Cal)x4-lineans, brMcMcr dentalus, uli pedunculu*, bracicac pedicelliquc, pilis» longis patenlibus mollibus cocrulco-rubns dense ob-
 »essus» fructifer MI acutu*, mlus fauce pilorum annulo clausa. Caljcis denies
 laic la'nceolati aculi recti, corollac tubus broiler exscrlus, labium bupenus
 bifidum, inferius vix longius tnfidum, lobis omnibus planis oblongis obtusis sub-
 acqualibus. Stamina exscrla. Anlberarum connecclivum crassum, loculi dnari-
 cati. — In Brasilia, in monlosib ad >ilia Rica el alibi provinciae Minas Geraes

Sectio II. KEITHIA Bth. 1. c.

Rami herbacci clongali procunibcnle* foliosi. \crlicillastn axillares paucifiori
 Caljcis faux mlus nuda Corollac labium supenus \ix emarginalum

2. K. SCUTELLAIUOIDES Bib 1 c. — Procumbens ramis elongate foliosis gidbru
 t. angulis cihahs, foil glabris, \crlicillaslns axillarib , flonb subsrvulib , co-
 rolla caljcc MI duplo longionbus. ^ — Caulcs berbam procumbent s, mini
 subsimplicc* clongali aculi iclragom, angulij brc\iHşirnc ob\crse uliaais, rinun
 dense pilosis Folia sessilia lanceolata obluso, margine bnmsimc crenaii, basi
 cordala glabra rigida nitida, nervo medio sublus prorainulo, 0-0 lin l<ngi, Ho-
 ralia conformia >crlicillasin axillares, sacpius 0-llon. Flores kecundi M^MIOS
 Braclcae hnearcs glabrae, calyce dimidio breviores. Oljx glabr v. nenin ci-
 liaiit, deolibus lincaribus aculls TireTisiime cilulis, superlonbus parum longio-
 nbus. Corolla cxlus pubescens purpurea semipollicaris, lubo exserlo, superac
 parum dilaialo, labium supenus breviler emargmalum erectum, inferius longius,
 lobis rolundatis, medio emargiualo. — Ilabilal in Brasilia, in bummo monic
 liambe, in paludosis prope Siiio deserti occidcnlalis proinciace Minas Gerar*
 cl prope S \auer provinciae Missionum.

J K. PILOSV Bib 1 c. 411 t — Procumucns ramis elnngatis foln»si>, foil nl>-
 cibq pilosis, \erticiUabtris axillarib, flonb. subsessilib , rniollis cal<c |A||*
 duplo loii^ionbus t| — Hilulus cl folia omnino A. <ruM/<irtot</>i, M<Δ tiuli S <l
 folia ptlis longis .illndis spirsis obs>>a 1 lores Kubsolilaru, f* re duplo nnj TI^
 Caljx major il magis obliquus quam in A. *Meutcllanoide*, pilosu*, deniibus 1 in —
 ccolatis. Corolla alro-purpurca, 0-10 lin. longa, rxlus pubeseens, lubo lonjn- < v-
 serlo mcurvo, fauce dilalala.' — Uabilal in Brasilia in pascuis humldis ad Moron-
 gara el prope Castro in campis Geraes provinciae Saacli Paall.

4. K. CILIATA Bih. I. c. 734. f — BreeU: foil, narflne ealycbq. basl pills lonfis
 ngidis ciliaais; vertlcillaslrrii sobracemosis; Oorib. seislllb.; corollis caljcc dimi-
 dio longionbus. ^ — llerba lemlpedallt parum ramosa, ram I tcnuiier tomen-
 tobo-pubebcentcs. Folia sessilia Vi-1-polllicarla, lanceolata obiusa inlegemma,
 basi rolundala, crassiuscula glabra, basl margine pilis albis longis clliala, »upe-
 rion nnnora, floralia infenora subconformia, suprema caljcc breviora. \erll-
 cillasln sexflon distanc* Bractcac lineares v. subulatac caljcem aequantes Cal-
 ^ccs J-4 lin IOIRI crccu, basi gibbi dense hispido-ciliali, tupcrne lenuo<< glabn
 hubpurpurascntes, ore huboequali coniracla 5-dcnlato, fauce mlus \illosa, den-
 libus angu&lc lanceolalis acutih. Corollac labium supenus calycem breviiier »u-
 perans, informs longius inHdum, lobis oblongo-rolundatis, medio majon rciuso
 — Crccsil in proMncia Mexicana Texas.

Sectio III. EHABDOOATILOM Bth. 1. o. 41L

Suffrulliecs v. herbae, ram is creciis \irgalis, bam foliosis v. fere omnino nudis
 Vcrlicillasin in spicas terminates approximali. Caljx acute denlalus, fauce inius
 »illosissim3.

5. K. \ILLOSA Bih I c | - Caule subercrto ramoso, cano-\illoso, foil M ^,i,b
 oblongo-lmeanb oblukis, margine revolutm, utrinq MIOSIS, raremu *iirili.rmib
 deiMsi subramosis, \crlicillaslrrii O-n<i> approximah, llonb beimlib romllu
 cal>ce imo-ullosa subduplo longinribus '4 - i <ules lurbacci M M'mpi ,|ref|p%
 telragoni, pilin subreflexis dense \illo>i, basi rinKMssinn ILIKISI, %up<am sii'-
 nudi. Folia semipollicana inugrrnnia, lloralia acun caljro mulio ITM, ,,r, H,
 ccml 2-J-pollicarc» dcossissimi Uljcc* nubirilinvaes ij-uinu sub>inan run

villosiirai, donlibus brevibus acuhssnm subrcums glabns subaequahbus. Corolla exlus villo»issima, lubo eiserlo, fauce ui dilalata, labium superius emar-Kinaium, inferim planum, lobo miermedio laliore integro Stamina 3, vix ex-seria aniharum loculis divancalis lineanbus, »upenorum >o>ligium nollom. Mjlus ex»crtus, lobo mfenore complanalo supenorem >ix bmiorcra basi sob-amplectente. — llabilat In Brasilia meridional).

C k LWAMRLOIDES Bib. I. c t — Caule erecto ramoso sencco -tomenloso; foil sessilib oblongo-lineanb. acutis, margine subretolulx, ulrinq. senccis, rarenns spicaeformib. densus, basi interrupts; verticillasris multiiflons, flonb. sei-Mlib, corolla caljce sericeo dimidio longionbus. ^ — Ab afflni A* *cillosa* differ! pubescentia bre*i sencea adpressa, foliis ulrinque angustatis longionbus subplants et corolla brevionbus. — Uabital in Brasilia in campis prope Congonbas do (ampo provinciac Minas Gera^s el in bumidis prope Fazenda de Carapicuva pronnciae Sancii Pauli.

7 K. GRACILIS Bib. I. c. 412. t — Caule herbaceo, ramis erectis telragoms subnudis subglabris; racemo terminali; verticillaMns remoi* 2-0-florin, caljcn dontibus acuti* ^ — Caules sub<implices juncei, 1-1/-,-pedales iclragoni, glabn « facibus (cnui»Mmc pubescnlibus Folia perpauca, plerumque vn 2-J ho. longi floralia uti brarii'u* |i| lineaem longa glabra Caljro <ubsc>>>iks > brcuier pedicellati, 3-4 lin. lougi tubulo^i MIOSI, denes brevitr an>iaii Corolla pur* pur., enq, caljce dimidio longior pubescens Stamina inrlu^a — llabilat *o Brasilia in campio h« rbidu pronnae Minas Cieraf*, prope Oarapatoi provinciae >anrti Pauli el prope Rio Pardo provinciae Rio Grande do Sul.

8. k. I)EMI)\TA Bib. I e t — Caule herbaceo, ramis erectis telragoms subarticulali« ^ubnodis glabris; racemo brevi lemnali denso; flonb. pedicellaiis; corollis cal)ce pabetcente ultra daplo longloribui. ^ — Caules e basi dura erecti, bipedales et ulira, subsinpllcet crassl tetragon! fociebus tulcatls. Folia perpauca tessilia, saepe fere abortlva, rarlot 0-8 llo. longa linearia obtusa iniegrnma glabra. superflora at floralia I-8 llo. looga acuta. Racemus oblongus laiui subrainoMis 2-pollicaris. Bractea 1 lin., pedicelli 2 lin longi. Calyi 4 lin. longos profunde strialus alrovirens, breviter et parce pubescens, dentibu* brnibus late lanrcolads aculis »ubacqualibu«, ore inlus villosisiino (orolla nlu* sericco->illo%a, alba >. sulpburoa, tubus longe eisertu^, nupprno >ix dilalatus Mamma 2 w| r\Ncrta, aniharum loculi^ dnancatis linraribu«, supriorum ve>ligian nullum M>lus brvitr t<isrrtu«, lobis kubaequalibun, infenore laliore superio* r«m ba%a lubamplertrolr Achaeoia oioidrj lacua. Habitat in Brasilia lo campii de^erti« SICCL» provinciae Minas iieraf*.

iMtia I?. STMIOCTUX Btk L e. 412.

Herba ranii erectii trlidis sobnudis. \ verticillasri pauciflun disiincti »ubra-irnton <.«l)i obtuse denlalus, faoce intus nuda.

• k I (UA |>EA Bib I. c. - (^ule herbaceo. ramis crectu telragonn nubarticulatis subnudi* glabris. verticillasms paucis paociflons. versus apicetn caulit ^{sub} raceaosu. Zt Rani el folia omoioo A' *demuHaltt*. \ verticilla>tn sacpius ^{bi-} flori. flores breviiier pedirellali. Bracteat parvae. lorolla cornea ^{utrapolli-} cans, ealyce tobuiplo longior. Stamina eiserta — Habitat in Bratiln. in ^{summo} tonie llambc el in paludosis in frerra da Ibilipoca provinciae Uma« Geraes

.1121. TH1MBB % % Lmn.

(Linn. Gen pUnl. no. 704. - Mnsn Gener planur. vatcuUr I *tt. II M- " *th

Labiatar gener el spec. 4IJ. ^*

1 Til SPICATA Liaa. Spec, planur 7W - Sibtp el sm Flor Graec 11 V ^l * - Hib I c. | - Rufnite* dams rtgidus procombeof. ramw ad.crocentibus ^{arva} Mipedalibus padalibuvi>. tit pub<sresiUbus. Folia ramorum sieriliom P. ^{ada} Mbdecussata oblasa, feniliusa Cert polllicaria linearia acuta rigid* unioervia pi ^{ada} * ^{omp} ca ciliau. \ ertieillasri moliilort. in spicasa 1-6-pollicarem ^{nuBC} * " £ ^{interruptam} ap>rotisBaU. PoUa loralla tl braciaaa lata laowolata acua colar*

ciliala, com floribot in veriicilastro arcie Imbricata, calyces obtgeniia. Calyces sessiles erecti adpressi, glabri v. nervis cilialis, labium superius planum, demibus brevibus lanceolatis, inferioris laciniis sabulalis cilialis. Corollae eiserue tabus braciae subaequans. — *Th. verticillata* Linn. I. c. 700. (var. horleosis, monslrosai) — *Th. ambigua* Clarke, Trav. IV. 830. — Habitu In regione mediterranea Orientali, In ericelis, collibus siccis etc Acbaiae, Melos, Sami, Cypri, Creta, Asiae minoris, Smyrnae, Palaestinae.

t *Species e genere excludenda.*

TH. CAPITATA Griseb. (Spicileg. flor. Rumel. II. 127.) - THYMUS CAPITATUS-

3022. DICEBANDBA *Bth.*

(Blh. in BoL Reg. XV. ad calc. no. 1300. — Meisn. Gener. plantar, vascular. I. 883. II 104. - Blh. Labiatur. gener. el spec. 413.)

1. D. LINEARIUS *Bth.* in I. I. c. c. — Habitus *Byttopii officinalis* variclatum angustifoliarum. Caules crecii virgati pubescentes. Folia sessilia anguste linearia 1-1.5-pollicaria integerrima glabra, ad axillas subfasciculae. Verticillastri sub-6-florti ad apices ramorum approximate Braeae minutulae setaceae. Pedicelli breves. Calyces 4 lin. longi erecti glabri, basi flridis, apice membranacei albidii. Corolla calyce duplo longior, tenuiter pubescens. — *Orauthera umbrifolia* Elliot, Bot. 8. Carol, et Georg. II. 03. — Habitu In America boreali In Carolina Inter flumina Flint et Chalahouehle.

3023. POCKMITOE *Blh.*

(Blh. Labiat gener. et spec. 414. — Meisn. Gener. pi. vascular. I. 285. II. 104.)

1. P. DOUGLASSII *Bth.* I. c. f — Folia, floralibus bracteisq. obovatis; tiaminibus. corolla brevioribus; denibus calycinis inferioribus tubo plus duplo longioribus. 2} — Caules crecii pedales, parum ramosi glaberrimi. Folia petiolata, 1-1.5-pollicaria oblongo-obtusata integerrima, basi longe angustata, nervisque viridia glabra, superioribus et floralibus (caulibus conformia) rarius binae inde dentatae. Spica oblonga, 2-3-pollicaris. Braeae lineares aculae subfoliaceae, uti folia superiora et denibus calycinis virides et glabrae, sed pilis longis albidis rigidis margine ciliatae. Denibus calycinis inferioribus tubo triplo longiores. Corolla prorepascens? fauce inuis pilosa. — Habitu In California septentrionali
2. P. MONTICOLA *Blh.* I. e. — Folia, floralibus bracteisq. obovatis; tiaminibus. exsertis. — Differt praeterquam a *P. Douglasii* eadem floralibus nervisque, spicis minoribus numerosis et floralibus majoribus. Dentes calycis inferioribus tubo duplo longiores. — In California septentrionali.
3. P. PARVIFLORA *Blh.* I. c. - Folia, floralibus floret superanlib.; subminibus. corolla brevioribus; denibus calycinis inferioribus tubo longioribus. 9. *Affinis *P. A. lasii*, sed spica vix pollicaris, folia angustiora petiolata, et floret dimidio minore. — Habitat in California septentrionali.

Tribus VI. SCUTELLARINEAE *Bth.* Labiatar. gener. et spec. 410. — Endl. Gener. plant pag. 416. — Meisn. Gener. plant vascul. I. 285.

Unly bilabiatum, labio superiore truncato integro v. subtridentato. Corolla tubo exserto ascendente, intus annulato v. nodo, lobis labio superiore truncato. Summa 4 sub labio superiore adscendeolia dimidia inferioribus longioribus.

3024. PRUNELLA linn.

(Linn. Gener. plant, no. 127 — Hb. Gener. plant, vascul. I. 285. II. 104. Labiat. gener. et spec. 410.)

1. P. UYSSOPIFOLIA Lam. Flor. Franc. II. 300. - Rchb. Plsnt critic. III. 42. 141. - Bib. I. c. 410. t - Folia, setislib. oblongo-linearibus lanceolatis c. integerrimis

strigoso-hispidis, n̄cis labii cupenons dentib lateralib lancolatig. % — Cau-
les ad>ceridentes, sennpedule* \. |ix podales, uli folia rigidiores quam in IV
i uhjan el pilis n̄pidis cilialo-hispidi. Folia constanter integerrima el scssilia,
infonora bisi in peliolum bremsimum anguslala, media el supenora bast ro-
lundalo-subampleiicaulia, floralia ft spicae IV.rutyflm (.al)\ /V *yrandiflorae*,
donhbiis laieralibus labii superiorly inlermedio saepius aequalihu*, rarius longio-
nbus Corolla IV *tulgart* major, Pr, *grandiflota* minor purpurascen*, ranus
ilba Species a IV. *rulgan* rerte dislincia. — *llrunetla* (*anadentts* Mill. Diet,
no 2* — llabitai in Europac mediterraeac sicm apcriis, in Ilispama, Gallia
ausrah el Pcdemonlio.

2. PR. GR(M)IFLORA Mocncb, Meib. pi. 414. - Blh I r. 417. t - Foil, peliolall*
o\aiis mtegcmmiis denaliste, cslycis labn superioris dendb laieralib laoeo—
lain, rorollia amplis calyce plua duplo longionbus. ^ >it, nisi floram mi-
gniludme, a IV. *ruigtn* differt, el forsan fjus variolas llorhi «acpius\$ elalior
rsl, BUDC fere glabra nunc villota. Folia saepius, praee>eriim basi denlala, nunc
«ubhaslata, inlerdum Inlegernma. Corolla ultra pollicann, >iolacra > purpurea.
I j) Cis labn superiorly denies laterales nunc inlerroedio sublongiore<t naepe vero
bre%ioero laliores sublrunali. — IV. *tpraoso* Wonder Schrifl >al. ties Marb.T
— IV. *hastacfoUa* Brol Fl Lus. I. 181. — Habitat in Europa fere omm cum IV.
tulijan in «}ln» loci»que umbro»ioribu«.

J TR HIGARI* linn Spec plantar. 837. - Bib. L e t — Foil peimlalis oraUt
oblongi«%e inlegns denials \. inciso-pinnaliGdis, ralycis labii supenori< denlib.
truncaik anstatis submuticis|e t. rarius sublanceolalis; corollh cal)ce dimidio
«. vii duplo longioribui. ^ — Caulea berbacei, a basi raroosi, rami bas< de<
cumbeotes, rarios repiaatat, florifari adaeandeoiet, nune vn 2-3-pollicaref, nunn
(in unbroslt) aeaqoipedaJta. Ptaata s u e onoiiao glabra, taepus pilit albi ngi-
dia aparala magU misont kiaplada, praeaesilm ad rauonam parten tuperlorem rl
nenros foilornm, noae la T<r. «. ofliai parte vlllotiaaiaa. Folia caoliao (taepio
pan supremo) coostantr pellolata, forma valde variabilia, Infroa el ramorum
sierihuro fere semper eliam in var.r. el C integra el otala, omnia uinnque \i-
ndia % subloi pallida rugo^a, T. rarius laena subrarun^a Par stipremum cauli-
norum <es«ile et basi saepe subdlatatum forma floralibiH .ippro\iniaiau^ floralia
imbnral.1 s^ilia orbiculala, mfima %arpe \un\$e arunmiala, raeirra brevier ari-
siau, marline magi< minus>e nliala, ranu« in «ar > mida mnrnibraoaceo-rcli-
rul.iiij, superfcie <ubglabra >ctrtici!lasn 0-llori, in »pira nblonga v. cjliodnca
imbnrali. Bractrae nullae (.al)ce« %esv\lr* « brevier pedirrlali, basi all p'-
dicelli saepius bitpidi, apice purpuratrenies, labn supenoHs denies nunc irun-
cati ferr etanidi, saepius breves anstulali, laterales nbeordali o«ati v. rariu*
Unrrolaii, in eadem splca saepe ^anabiles. Cnrollae Molaceae purpucascente*
albar v rariot canieae. Galea flabra v. pilosa

a *ktsptds*: caole folMsqoe (sobinlegfis) «illoso-bispidi«simis. - Pr. *t*P^{tia}
Bib in Wall. Pl. As rar. I. 06. - IV. *kinmia* Wend Schr. >!. Ges. Marb.? ~
Pr. Air/a Bernb.?

9. *«ifTM. foliis inteirris ovalit oblongiste, glabns r sparse bispidif — **!
ifrU «. Linn. SpfC. «7. - Hook. Pl. Loud. III. If. - *Brumella offif!*
Cranli, SWrp. Aaslr. «7«l *PrumtUa *nl*rmcd>a* Brol. Flor I n»n I. 1&. <..j
Beichb) - IV. *UhfoUm* Doon, Hori. Canlabr. - IV. *replams liumort* Floro
Bdg. 44. - Pr. *Burnt*** DumorL Horol. Belg U *Brumelia tot* ^{horU}
P. BaaiLL Moaofr. l«? - Br. fVmu,r««jicfl ^illd Knun. pi ^{horl. Berol.}
631. eieaiDl. Utifolla. - *Prmmeli** (*rohmm**a Mill. Diet no. 5. - ^{Brumelia}
•equmoHimks & B. Kin. Wot gen. el spee. planl. II. 3*3- I 1W. - ^{Prumelia}
omta Pert. Rncbirid. II. 137.

•||Mi0a -
• *lomfmf* Mils Inlegns oblongo-laoeolaiis, (labrii v pare_TU^r
PrumiUm Hon\$ mim Doogl. mia. - *BruntU** P>Mt#y/TM««« wllld n "V^{horU}
»f*L «l .(etempl anguslifolia; - *Brmmc(fm Austretotte** Mafic »P^{ua} r*

- mill. Monogr. 103. L 7. fig. A. B. - *Prunella angustifolia* Wender. Schr. Nat. Ges. Marb. T
- i. *parri/lora*: foliis subinlegris ovalit sparse hispidis; corollia vix calycetn excedenlibus. - *Brunella parviflora* Poir. DiCL Suppl. I. 711.
- c. *pinnatifida*: foliis caulinis omnibus f. plurimi* incisfs pinnaliOdisvc; rorollis purpureis. - *Prunella longifolia* Pers. Enchirid. II. 137. — Rchb. Plant, critic. VI. 81. t. 588. — TV. *pinnatifida* Pers. I. c. — *Pr. ineisa* Link, Enum. pi. horl. Berol. II. 1*2? — IV. *dissecta* Wender. Sclir. Nat Gcs. Marb.? — IV. *rulgarit pinnatifida* Kciclib. Plant, critic III. 30. t. 230.
- C. *laciniata*: foliis caulinis inciso-pinnalifldis v. infimis intcgris; corollis albis. — *Prunella laciniata* Linn. Spec. pi. 837. — Rchb. Plant, critic. III. 38. l. 218. - *Brunella tulfurea* Mill. Diet. no. 5? — *Prunella alba* Pall. - M. Hieb. Fl. Taur. Cauc. II. 07. - *Irunella rerbenaefoliit* Vaill. Bot. Par. I. 5. fig. 1. - Habitat fere in toto orbe terrarum, in Europa omni ad vias cl *»pes in «)lvi* apertis, pralis siccis etc. vulgalissima, in Africa boreali prope La Calle, in Asiae regione Aliaica, Tauro-Caucasica, Caspica, Cashmeriana, Himnla>ensi et in montibus peninsulae Indicae, in Japonia vulgaris, in Australiae terra Van Diemensi, el ad portum Jackson, io America boreali VQlgtfrt a Canada el ora boreali-occidentali, obi vulgalissima, usque ad uontea regionis aequioctalii; c praecipue in montibus Indicia, Io Europa austral! rarion fi. la Europa el Asia vulgalissima, io America aequinocilali et Australia, In America boreali rarior; r- in America boreali vnigarls, In Buropa ti Asia rarior; &. io Europa praesertim raditcrranca occidentall, In boreali rarior; t. in Europa ausrali; C. in Europa frequens, in America boreali occurrlt raro.

t *Species e genere excludendae.*

PR. INTKHMEDIA Kciclib. - CLEOMA LISITAMCA.

PR. INDICA llurm. « ACROCKPIIALUS CAPITATtS [cum *Acanthacta* quariain in licherario Burmanniano sub hoc noroinr miscitur]

3025. CLEO\I,% *Unn.*

(Lioo. Gener. plant no. 730. — Meiso. Geor. plant vascular. I. SB& II. KM — Bih. Labiat gener. el spec. 410.)

1. CL LUSITANICA Linn. Spec. planUr. 837. - Bib. L e t - Habitat *PnmllU** *rulgarit* var. *Udmiata*: CaulU bftl ramotus, raml sempedales •. vfi pedales hispidi. Folia seasilla oblongo-lanceolau v. lloearla obtosa, profnnde denuu v. *emipinnatifida, basl angoslau rugosa, alrlnqve vlrdta subblspla, lloralla minora acua, apice utl lacioiae longe arlstaU hlspla. Verticllatrl 0-flori, in spica laxa approximate Bracleae nullae. Pedicelli breves erectl, axl adpressi rigidi complanali. V.a\i brcus amplus, nervis 10 promioeolibus, Inter nrvos membranocous, <'itti* hispidus, inlus maiuraliooe pills margioalibus densin subclausus, denies lahiu Hupcnoris brcviler, lacinae inferiors longe arislaii. Corolla forma el magnitudine fere *Seuteltariae galtriculatae*, coerulea aul violacca, extiu pubescens, calyce subtriplo longior. Q — *Prunella intermedia* Bcbb. Plant, critic. IV. t 90S. [non Brotl - Crescil in Ilispania, in Arragoiae campis nlcrlil»imi», LusiUnia, In Barbariae arvis propo Mayane.

3020. H C't TELLABI Linn.

iLinn. (iciicr. plantar, no. 734. — Mcisn. Gener. plant vascul. I. 285. II. 1M. — Bth. Labiat. gener. el spec. 410. cl 733.)

Seotio L LUPULINARU Arth. HamUt Monogr. 1L - BUL U b U t gener. et spec. 428

Folia floralia sacpius membraoacea. Flores tetragono-spicati v. lubraremofcl vix hri'iindi.

- I. SC. ORIENTALIS Linn. Spec, plant 834. - SiMhrp. el Sm. Flor. Grace VI. 64 t 580. - Rchb. Plain, crilic. I. 10. t. 8. fig. 17. • • Bill. I. c. | - Caule prononilM-ni. foil. pmoLitiH oxatis inciso-ilenlalis pinnatilldmc, Kubtu< incani«. flor. iliji nrm. branacci» inlrgemmi» su bbrbricatus; spicis tetragonis oblongis. 4 — Caulis ba.

ramosissimi radicanter repentes, rami ascendentes, obtuse tetragon!, tenoiter cano-tomentosi. Folia 8-10 lin. longa oblusa, basi cuneato-truncata, margine profunde regulariter dentata subpinnatifida, supra viridia, tenuissime pubescentia, subtus lomento tenui Candida. Racemus tpaniciformis 2-3-pollicaris terminalis simplex. Folia Ooralia sessilia, late ovala acuminata interprima, uti rhachis magis mioussve pubescentia. Corolla flava, 12-15 lin. longa, eitis tenuiter pubescentes. - 5c *Sietertii* Bunge in Ledeb. Flor. Alt. II. 304. - Ledeb. Ic fl. Roaa. AIL illustr. t. 121 - Sc. *Caucasica* Arth. Hamilt. Mon. 14.

fi. pinnatifida Linn. — Refab. Plant critic. 1. 10. t. 8. fig. 16. - Foliis minoribus profunde pinnatifidis. — Crescit in Europae austro-orientalis et Asiae mediae nivalibus et montibus praeterquam calcareis, in Croatia calidioribus non procul a Senia, in Oljmo Bilhynia, in Orlente, Syria prope Aleppo, Persiae provinciae Aiarbaidjan, Armenia eirea Tiflis, Tantra et Caucaus, frequent in Jugo Alto et in Jngi Bataalyeatie nonlibi Kanaourenbut, a. praeterquam in montibus Asiaticis, *fi.* in calidioribus mediterraneis.

2. SC. PROSTRATA Jacquem. msi. ei Bth. I. c 73X - Caule prostrato; foliis, petiolatis late ovatis tuberculato-crenatis, nervis viridibus. mollioribus pubescentibus, floralibus integerrimis tuberculato-crenatis imbricatis; ipsoque letragonis oblongis. 2^o? — Habitus et foliorum forma *Sc. grandiflorae*; floret *Sc. orientalis*, ab utraque tamen differunt foliis utrinque tridibus. Corollae lobis, labio superiore praecipue trilobato, magnitudine *Sc. orientalis*. — Crescit in montibus Indiae orientalis aegyptiacae tetrionalis circa Pangoi, Rarang et Coopeona.
- 1 SC. GRANDIFLORA Sims, Bot Mag. L. ctt. - Bib. I. c ttt t - Canale procombente; foliis petiolatis ovatis tuberculato-crenatis, nervis viridibus. mollioribus pubescentibus, floralibus integerrimis tuberculato-crenatis imbricatis; ipsoque letragonis oblongis. 2^o? — Habitus et foliorum forma *Sc. grandiflorae*; floret *Sc. orientalis*, ab utraque tamen differunt foliis utrinque tridibus. Corollae lobis, labio superiore praecipue trilobato, magnitudine *Sc. orientalis*. — Crescit in montibus Indiae orientalis aegyptiacae tetrionalis circa Pangoi, Rarang et Coopeona.
4. SC. PKCTIVATA Montbr. et Aub. Ann. tc. ual (1 Ser. j VI. 44. - Sul-Tnitieota: ramulis adscendentibus. iacano-lomentosis lanatis; foliis, petiolatis laevibus, basi cordatis incifo-deotalis f. pectinalis-pinnatifidis, ulnis villotis - tomentosis ineanit. tabulis albo-lanatis, floralibus ovalibus iolegerrimis imbricatis, nivalibus lanatis; apice oblongo letragonis. - Caules et folia ferruginea. - Spica fere 5c e Wiala Ma, at magis tomentosa. Corolla magna porphyrea. - Habitat prope Trebuada.
- V? SC FRUTICOSA Detf. Cal. bait Par. 63?*) - Bib. I. c. - Caule **fruticoso**; ramulis adscendentibus. iacano-lomentosis lanatis; foliis breviter petiolatis **ovatis** aaralia lacino-crenatis iacano-toamentosis, floralibus ovatis integerrimis racemosis. - Caules basi **abligati**, alaribus adscendentibus aaraliis, in parte tapehore albo-lanatis. fere *Sc. orioaife*, aapra ragota, aabta raadldtama. Rarri elooga U. Folia floralia eaeuia, ealyce fii loagiora. Calycet tuberculato-crenatis cao-illot. **Uae** CoroUae aMgailadiat *Sc. orioaife* tabo flaro, labiis eornitae. **Species** ditlaeUMlaM, atal *Sc. orioaife* afflalt; an hoc referenda t. **inter** *Sc. chymarrifera* ataa 5c. Uir n n amaodaada? - flabliat In Syria prope **Aleppo** **Perla**.
- 6? SC. PIMATIFIDA Artff. Baaiill. Moagr. W L 11 | . 1 - Bib. I. c. - Folia **oblonga**; foliis ovalibus obovatis, aallalibus alioque pinnatifidis, lobis oblongis.

*) *Folia cordatis rugosis tomentosis-lanatis; emmit fruticoso. - Pedalis. Flores spicati. Corolla flavescens?, tubo longissimo truncato.*

- sis; florib. in spica laie imbricalis; braeieis ovalis denUiis snbfollaeels. \mathfrak{F} — Differl a *Sc. orieuiarii* floribns paullo majoribus, braeieis pinnatifldis et foliis profunde incisus ulrinque lanalis. — In Oriente Inter Kermancha et Amadan.
7. SG. ALPINA Linn. Spec, plant. 831 - All. Flor. Pedem. 142. t. 25. fig. 3. — Waldsl. et Kitaib. Plant rar. Hungar. II. 140. t 137. — Sweet, Brit flow. gard. I. t 00. — Bot. Regisl. t. 1460. — Blh. 1. c. 425. f et 733. — Caule procarobente; foil, sabaessllib. v. breviler petiolalis ovalis serrato-crenalis concolorib., floralib. membranacels imbricatis; spiels telragonis oblongis. \mathfrak{F} — Habitas *Sc. orientalis*. Rami acute telragoni pilosi v. pubescentes virides. Folia magnitudine folioram *Sc. orientalis*, lamem peliolus brevis v. nullus, limbus basi rolundatus ?. cordatos aculiusculus, leviter serralo-creuatus, olinque viridis pubescens v. pilosns. Folia floralia ut In *Sc. orientalis** colorata pilosa. Flores *Sc orientalis*. Corotlae 12-15-lineares, nunc oranino purpureae, nunc tubo T. labio Inferiore flavo, nunc in var. *fi.* omnino flavae. Variat eliam haec species caule foliisque magis minusve pilosis, foliis floralibus magis minusve ooloratis, foliis laioribus anguslioribusvc, sed variacionibus divrrso modo in diversis conjunctis non ut species distinguendis. — Se. *AUaiea* Fisch. Cat. hort Qor. 30. — Sweet, Brit flow. gard. I. t 45. — *Sc. varitgaia* Spr. fil. Tentamen. — *ScuUUaria* He. Gmel. Ft Sib. 111. 890. no. 58. t 48. — *Sc. eompresta* Arth. Hamilt Moagr. 90. — Bib. I. o. 444.
- fi.* floribus Oat is. - *Sc tapuJfea* Llan. - WiUd. Spec pi. III. ITS. - flehml, le. t 73. — Bot Reglst t 1403. — *Sc wna* Bettor, Prim. fl. OaL p. II. BO. 43. — Habitat in Buropae et Aslitt mediae moatiboj, In Pyrenaeis edIUorlbos, In Alpibus HeWeticis, In Iulia superiore, Calabria, Croatia, Gallcia, In Siberia omni temperata et in Alpibus Altaicls frequenUssima.

SeoUoIL HBTSRAITHS8IABth.Le.4M.

Folia floralia parva herbacea. Flores racemosi secundi, omnes T. saltern superiores sparsi nee oppositi.

8. SC. LONGIFOLIA Bib. In Lindl. Bot Regist adnot ad t 1483. el Labiatar. gener. el spec 485. — Glabra: caule erecto; foil, petiolatis ovato-lanceolatis acumlnaUs remote dentatis, basi roiundato-cuneaUs, floralib. Unearth. mlnuUs deiduis; raeemls elongatla anhramoals; florib. seenndis tfarsis; eorollii caljce glabro oetuplo longlorihaa. * — Raaal oilra podalot oroetl. Folia iriBollicarit, utrinque glaherrima el laerla, tvhlst parom tonooa, marflne groaae ilsaiais. Raceml ires semipedales. CoroHao eoeinoae pnhoioonloi, poUioe looflores, hasl longe attenuaue, apleo parum dilautae, lahlls hrerlbas orootto, superiore longiore. — Habiut In Nota Hlspania.
9. SC. MULTIFLORA Blh. I. I. e. e. 480. — Caule oreto lanllar pnbotoffiite; foil, petiolalis ovatis acuminalls obtuse slnaato-denutis, bul rotnndato-tineaUs, floralib. lanceolalo-linearlb. calyce subloogiorib. { raeemis elongaUs simplldb.; florib. secundis sparsis; corollis calyce tilloso quintoplo longloribua. 2} - Canles subramosl, tomento 4enui pubeseentos. Folia Se. *longifoU*— laiora, floralia persiitentia. Spica semipedalls. Flores anne alterni, saoplna plaros glomerati. Corolla pnrpareaT 10-11 lin. longa Ineurra Tillosa, tubo basi attenualo, apice dilauto. Genlulia corollam aoquantia. — Habitat in Nora Hlspania.
10. SC. ATRIPLICIFOLU Blh. I. I. c. o. - Tenuiler cano-pubtscfnt: foil. peUolatis late ovatis oblusiusculis subinlegerrimis repandisfe, basi truncalis subcordatis subcaroosis, floralib. ovatis acuminalls, calyce sublonglorih.; raeemis rlongali» vimplicib.; florib. secundis sparsis; corollis calyce subseilnpllo longioribun. ^ - Eiemplar unicum in herbario Lambertiano ei spica cum foliorum pari umco consul, sed dislincliissimum, afflne praecedentibus. Flores inferiores oppoiIU superiores pseudo-veriicillali. Folia floralia docidua. Corolla Kubpollicaris ferè recla, npic dilalala subglabra. — Habitat in Perinia.
11. SC. SPLKNDEMS Klusch. mss. in Lnk. Kliscb. cl Olio, Icon. pi. rar. taorl but. Berolin. I. 31. t t 13. - Paxion, Magazine or bot. X. 00. (c. ic. am) - Annals do Flore el Pomonc II. (Scr.8.) no. 1 Novb. IW. p. 52. | (cum lab. acu) - tau

- lib. adscendcnlib. raraosis pubescenlib.; foil, longe petiolatis late cordato-ovatis, broviter aralis rugulosis, deflexis laele viridib. grosse dentatis, ulrinq. rillosopub>scenlib., floralib. parvis subovalis, ulrinq. altenualis scrullalis o •iridi-vio- laceis gKinduloso-puberulis dcciduis; racemit elongatis sunplicib. calyctbq. Holacois, glanduloso-puberulis; florib. sparsis; corolli* snlurale cinnabarinis puberuli*, calyce 6-luplo loogiorib.; antheris glabris, basi glandulis candidis sessilibus ornatis; achacni* minulittime echinulali*. ^ — llabilal in Meico.
- H. SC. COCCINEA II. B. Kth. Nov. geoe. et spec. pi. II. 325. t - Blh. I. c. - Foil. oblongis, ulrinq. obluis iotegcrrimit glabris, sublus violaceo-purpureis; Hptcis lerminalibu». ^ — Caulit ereclus ramoii ramique tclragoni, lenimsime pubet- cenlen. Folia peliolata venota, nenro medio rni»qoe sublus promineniibui ei pubenih«, supra viridia rigidola, tabbipollicaria. Pelioli 0-7 lin. longi ranali- culali, trnuisiime pabe»ceotet. Spicae sesquipollirarcH. Floret sparni pedircllali, 7-0 Ho. longi. PedicelH pubetcentes, basi bradeati. Braclcae lanrcolatae oblo- sae pubeicenlei, pedicellot tubaequanlrs. Cal)i Irnuissime pubcHcen*. Corolla coccinea glabriucula. Achaenia 4 in fundo cal)cis porM>icrUis ^Ide aucti el claini. - Habitat in America meridional!, in regno Novo-Ciranalrnsi?
13. SC. IXCARNATA Vent. Chooi dei pi. 30. I. 30. - Blh. I. r. - Foil, cordatis den- (atis, subtus tomentojsis; ipiris tenninalib. iecundi«; braclci* linoan-lancccolaUi; • florib. incarnalis. ^ - Caulet erecti bipedalet pnbescenlet ramoni rinerei. Folia peliolata ovaia cordiformia, 1-3 poll, looga, I¹/₂, lala denlaia, tupra pubcfcenUa, intense viridia, in var. 9. dimidio minora. Floret pulchre rubri. Bractea P«- dieellum aequanlet. Calyx lobolotat comprettat, exlut villoiu tabinlegeV^ «quam t eoorata pott tBlbotio valde eloogaU. Corolla paboaceot, calyce textuplo longior, labo batl aUoomlo. Limbaa paioas, fi. wimor: iDillt laseoololo-evatl. — Habitat In America meridional! prop* Gaala Fé dl Bogota.
- II SC TVBIFLOBA Bib. ta Liadt Bot Baglat. adoot ad t. 1103. el Lablalar. gen. et tpee. 4S7. — Canllb. adtceodentib. ranooit pubetcentlb.; foil, peiolalit ovatii obtottit groste creoaait, batl rotundalit, «upra binpidulin, subtus mnllhier pubeceniiib.; floralib. ovalit ante antbesin imbricain; ncomin Himplirib ; florib. necundi* «par«i«; eornlli« calyce fubiftloplo longionxiH. ~4 Ilrrba imiltirau- li« rami irrric« mnllliirr pub«ccenlov Pctioli pol|iraro«. Folia pnlhrrm longtf ' lala. iiiiüM lcnui««im(t mollüiTi|up pubcnrenti.i, floraha ni.iju»rula. Coroll* |io|lirari«, lubo trnui. - Habitat in lla«iha meridionali.
- 15 SC. ILIGINOSA SI. Iil. DM. ei Blh. I. c. ; Cauhb. adtrendrnlib. «. rrcrIK rjmo«ii pubetrenlib.; foil, peiolalit o«ati« grntfte rrenatit, ban roiumlali* »ub- rordaitve, ulrinq. glabriatculU, Boralib. pan it la|i»; racemi* ün>li«*ib ; OoriU* «ubtrundit tpanit; corollit calyce quinluplo longionbut. 3- - C.JUO* hrrbacei •rmipedalet pedalette, parum ramoti, rami lereiet. Folia plrrumque dupio majora quaro in Se. *Imbiflor**. nooc glabra, nuoc pilit ran* in pagina tuperior bitpidola, floralia oblonga, calyce lubbrttlora, bati in priiolum angutiaia, riarn Joalora lata glabra. Calyt (melifer oblongut, appendirula magna. Corolla * is teoilpolllearit coerulea. palalo albo, faoe lenui. - llabilal m Brasilia, In »)" uliginotit In Vargem dot llorreiet, in pro«incia meridional* Sanrii Paul*.
- 1«. SC BRK\IHnHA Bib. I. I. c. e. - Glabra: raulr ererlo; foil, peliolalii ovaUt acaminalit ohium tiouato-denlaait. ba«i ruiundalo-ininraii*, floralib. inC** loto liaohb. calyce tyblongionb.; racemit elongatit timplicib. lati«: I w l k t J e u n d | r i B tpartlti corolUt ralyce glabr« tubUiplo longionbu*. * . Inirr Se. * " 1 0 w el «tyiac#«ai fert media. Caulit olira psd«lit. Folia I¹/₂, -i-p.illiraria J J T A » r a w Irnma glabernma v. pillt rarUtiont topra HUpidala. ComlUe glabrae cru- le«cenlet, 4-3 It«. loogae, limbo paleole. - HalnUl In Peru%ia.
- " *C PI BPIBASCKKg S«n. Fl. lad. occid. II. 1013. Bib. I r. f u b - I ^ f i l - o b . •w«loImmili leaailer pobetcrnle v. glabnutrulo; foil, peiolaiit ••••• supri tntlt aiatalo-creaaut, ba»i laln»ine truncatit *. aabcoroa .

hispidulis, sublus v. otrinq glabns, floralib. minuin dcciduis; racemo laxo; dorib srcundis sparsis v. infmonb. opposilis; calycib pedicello brevionb., fruclifens magnis gUbnusculis Q* — Herba tenuis flaccida semipedalis ramosa. Folia inflma parva late rolundala, media sesquipollicana, obluse sublnangulana, suprema minora angualiora, omma supra pilis raris hispidula, caelcrum glabernma. Racemas nunc sesquipollicans, ex florum panbus 3 v. 4 sacpius constans, micrdam 2-4-pollicans, flonbus 15-30, basi ramo uno altorote sacpius auctus. Folia floralla minutissima lincana, per anthesin decidua v inflma ranus caulims subconformia persi*tcnlia Calyx glaber, fruclifer minus auclus quam in adnibus. Corollae scraipolhcars tenucs, galca anguslala, lobis latcrahbut cam aequantibus, mfraro longiore con\exo cmarginalo sinuato — *Sc. Felubert* INes et Mart, in t|o|. act acad. nat cur XI 77. — Habitat In America acqumoctiali, in Brasilia dislnctu Insulanorum provinciae Bahiensis, in Indiae occidentalis insults tuadclupa, Sancti Vinrentn cl in Carracas.

18 SC. AGKhSTIS Si Ifil mns. ex Bth. I. c. 428. — Caule nuberclo tcnuitrr pubr&ccnlc, Toll, petiolalis ovalo-subrolundls oblusis sinuato-crenalis, basi cordatis, supra tiispidulis, sublus glabriusculis, floralib. minuhs kubnullu; racemis brevib. simplicib., florib. vix secundis ipartlt. QT — Herb* bail ramoaistima vix 4-0-pollicaris. Kami, pelloll el nenrl follonun tomenio ienuitslmo canetcentef. Folia Vi-1-pollicaria, utrinque tiridia, pagloa aaperlore pilla longlt ipartlt hlaplda. Racemus 1-2-pollicaris. Calyx fructifer valde aclus membraoacea. Corolla coernlea, circiter 4 lincai longa. Ab affloe *Se. purpuratcmU* dlffert eorolla ml-nonbus, folus hi<ptdis, caulibus oi racemo brevioribus etc* — Habitat in Brasilia, ad San Miguel da Jequilinbonba protinciae Bahiensis.

19. SC. DISCOLOR Colubr mss. in Wall PI As. rar I 60 | - Bth. I c — Caule basi radicanli* folioso adscendentc, supernc bubuudo, foil, peliolatm o>atis obtusis crenaiiH, basi rolundato-cuncaiH, mteriorib. rurdalis, floralib. minutm, race mis clongiiio, basi subramosis; florib. bccundis spar««. ^ Caulei» cum racemo 1-1 -prdaleç, basi foliogi, supernc sacpiun ttubnudi Folia r/: -2-polhcana, sacpius ad basin caulis approximata, ranus secus caulem clongatum di»poslta, inQina ei inlerdum omma cordata, superlofi rarius basi cuoeata ?. aogu»iaU, utrinque tenulMime pobetceolia, subtus nenrosa, saepiai purpnratetnlla. Racemua subnudus aemlpollcacia T. ultra, Oorea numcroil bretitet pedleellatl. Calyx floriger parvus pubeacens, squama tlx lablm topoiif excedentc, nmeUer membranaceus. Corolla eiuis vix pubeteenf teoali, elrdier 8 llnett longs. Aolberac broiler barbalae. Glandula ovarli parva. Aehaenia loberculoto-blip Ida. — 5c. *huhca* I). Don, Pro dr. 1L Nep. 100. (non Lino.) — Habttal In India orientall, In rooniibus >opnliac el Silhet.

lectio HL. STACHYMACRIS Arth. HaaUt Monogr. 17. - BUL L c 4M.

Fuliafloralia herbacca par>a, caulina difformia. Flores racemosi secundi oppositi

20. SC. I>DIC\ Linn. Spec plant. 833. — Blh. I. c. f Caule basi procumbente; ramis adscudentib. villosis; foil, parris petiolalis rotondalis crenatis, basi cordans, ulrlnq. molIHcr pubescentib., floralib. minulia; racemo subsimplici doriho, florib. oppositis secundis; oalycib flonfens pubescenlib. pedicello brcMonb ', corollae labio Inferior© latissimo ^ — Rami semipedales v. |t| pcdales letragoni pilis palcnlibus villosi Folia vix semipollicana, forma fere *tilfchoma** *hederareat* Racemus drnsior quam in *Se. nolacea* 3-4-pollicaris. Squama cahcis rruclifert \alde aucta membranacca Corolla glabnuscala, 0-7 lineas longa, tuprrnc ampliata Anlherac slammum siipcnorum \ix barbalae. — Habitat in (tuna i.rope Macao, in Japnma, in Ja\ a ad ncpcs circa Tugu pro\inciacc Buiieniorg

21. SC JAPOMI \ Morren oi Dene. Ann. sc nalur (2 MT; 1834 II 3n » p11|a|| Magaunc of botany X 123 (c ic acn i - Blh I c 7JJ Caule boM prostrato*, ramis as>cond» ntib quadnfariam puberculis, foil o\atis oblu-n gro^r crnan*, basi rolundatu glabn* peliolaiis, floralib. gradatim luinonb . llorib ol.po<iii« Ustlal)Cib. ptlosulis, corollis pubescenhb. cocrulci^ ^ - Crescu in Japoma

22. SC. COLEBROOKIANA Wall. Pl. As. rar. I. 67. - Bib. I. c. 480. - Caule creclo ramoso lenuier pubescente; foil, peliolalis otalo-rotundalis obinsis crenalis, infimis basi cordalis, superiorib. delloideis, basi rotundalo-lruncalis, omnib. ulrinq. lenuiter pubescenlib., floralib. minolis; racemo simplici laio; florib. opposilis secundis; calycib. florigerii pedicello bretiorib. pubescenlib., fraciferis auctis glabratis; eorollae labio inferiore laisaimo. 2} — Affinis *Se. violaceae*, led caule firmiore ramosiore et foliorum forma diversa. Folia fix pollicaria crassioscola mollia, ulrinque tenoier ei brevissime pobescenlia, ncc hispidula. — Habitai in lodiae orientalis peninsula.
23. SC VIOLACEA Heyne mil. in Wall. L c 00. - Bib. I. c. t - Caule erecto f. adicendenle pubescente; foil, peiolalis cordalo-ovalis crenalis, supra hispidolls, subius pubescenlib. glabriste, floralib. aessilib. ovalis pedicello bretlorib.; racemo laio subsimplici; florib. opposilis secundis. % — Herba semipedalis T. fere pedalia subramosa biapida pubescens T. rariui glabriuscula, babilu *Se. purpuratemtt* valde affinia, sed foliia racemiique dislincla. Folia saepiua eiacie cordirormla T. parum elongaU. rarius suptriora basi rotundata, 1-1%-pollicaria, ulrinque viridia tenuia, sopra pllia brevibus sparsis magls minusve hispidula, subius praesenim ad nenroa pubescenlia T. biapida, rarius fere giabra. Racemua 4-5-pollicaris gracilis laius, rarius basi ramls 1-2 auclus. Folia Ooralia pedicello pkrumque dimidio breviora T. lofima parum longiora. Calyi floriger pubescena, fruciifer valde auclus. Corolla semploricaris, lablo infer(ore longiitudine fere lobi laiissimo conteio. Genilalla labio superior* Includa. Achacoia valde lubercoloM« ai non hlsplda. — Sc *Hdicm* Soib. Hort Bengb. 49. (non Linn.)
- O. kitpidtor*: - *Se. Wighiama* Bib. in Wall. PL As. rar. I. 67. - *Sc. nodulo** Art*. Hamllt Monogr. 20.? — Habitat la Indiae orientalis peninsula el in ZeylanU.
21. 8C. OBLOFFGA Bib. In *UtfL* *ot Bogttt adnot ad t lajx «t UblaUr. goner, el spec. 4». — Caule adaeéndonle pnboaconlo; foil, petiolalis oblongo-ellipticis aeaiiuscolls, aplco subserratus, bul rotnndatis Integerrimia glabrlusculis, floralib. otatis minutis; rocomo laxo simplliculculo; florib. oppositis secundis; calycib. pedicellum aequanlib., fructiferis maximis glabriusculis; eorollae labio in Toi ore* laiissimo. ^ — *Sc. riotaecae* maxime affinis quoad Maluram, inflorescentiam el dorrs, scd distincta foliis, quae vix pollicem longa et lineas 4-5 lala, obloogoclipiica nee late ovaia, apice fix serrata nee crenata, basi rotundata nee cordata. Caulis basi subprocambens videtur. — Habitat in Zylania.
25. SC INCRVA Wall. PlanL AslaL rar. I. 07. - Btb. I. c. 430. - Caule adscendente ramoso pubescente; foil, subseasilib. oblongo-ellipticis aculis remote serratis glabrioscnlla, floralib. minois; racemis lermnalib. simpllicib.; florib. "oppositis secuodis; pedicellts eaJjco triplo loagiorib.; corollarum lubo gracili incurto, labiis profnade Basis, superiore amplo cnenllato, inferiore breviora. ^ — Species dlaUncelssima, sed specimen unicorn la borbario Wallichiano Imperfectom. - ¹⁰ India orieoull ad Taong Dong monlem Afoatem babiut
20. SC GIOSSA Wall. I. c. - Bib. I. c. - Caule basi procumbent©; ramis adscendeniib. tillosU; foil. peUolaUs ovalli aeominalis crenatus, basi roiuodato-truoca*⁺ tis glabriusculis, floralib. peUolaUs, fnflmls caolinls sobconformib., supremis ^{ti} calyeom excedenUb.; racemis laxis simplicib.; florib. oppositis secundis; ^{corollis} leswibas. ^ - Caalea basi snbligaosl, raml obtoie leiragoni, pillis ^{brevib.} adpretsla pnboaeentoa. Folia l-l'A-polUearia, snpra el subius ad nenros ilenuii pubetetsUa, acatlaaenla. Racemi brtfea laxl. Corolla Olin. longa, 'ix P ^u D ^u ^ ^u T; tobo tennl, faeoo fix 4llaUU, Ubiis oblongts erectia, inperlore galeato, ^{lowa} teralibos mlnaUs, infortoro eonvoio. — Habitat in Indiae orienUlis monuaw *mm*-maonemiboi, in moaliboa Syen ad gimlab.
- «. iC GOUHNAB All. Flor. Pe4om. I. 4a t 84. fig. 2. - Sweet. Brit. flow. fard. «• «• *. - Bta. I c f - Caale trtdo ramoto pobfMeate; foil, ptiltMo otaua

- crenalis, basi late cordatis truncatisve vix rmgosls tenuiier pubescentib., Ooralib. ovatis calyce fructifero breviorib.; racemo elongato laxo subramoso piloso; florib. oppositis secundis; pedicellis calyce fructifero maximo piloso breviorib.; corollis calyce sextuplo longioribus. 2|. — Gaulis 2-3-pedalis, acute telragonus, pilig brevibus sursum tendeniibus pubescens. Folia inferiora lalitudine longiludincm fere aequantia, 2-pollicaria, basi profunde et late cordata lenuia, subtas nervosa. otrinque tenuiier pubescentia, superiora saepe angustiora aculiora et basi iruncala, in petiolulum subdecurrentia. Racemi semipedales et ultra simplices v. utrinque ramo aucli, pilis longis palentibus subglandulosis hispidi. Folia floralia ovala v. ovato-lanceolata acuminata, basi angustata inlcgerrima berbacca pilosa subviscosa, calyce saepius ditnidio brevioro, inferiora rarius ei aequalia. Pedicelli ctiaara calyce florifero breviorcs. Calyces fructiferi maximi pilosi. Corolla (alro-purpurea) fere pollicaris, cxlus Icviiier pubescens, tubo basi angustato, fauce dilatata. Achacnia tuberculoso-hispida. — *Sc. peregrina* Sibth. et Sm. Flor. Grace. VI. 00. t. 382. (non Linn.) — *Sc. allissima* A lib. Ilamill. Ilonogr. 18. — *Can id a racemota* Moench, Moth, plant 414? — *Sc. paUida* Guss. Fl. Sic. prodr. II. 137? (non Bieb.) — Habitat in Europae australioris agrit sylvallcis, ad Vincennes prope Parisios, an spontanea?, In Sicilia septentrional!; in Italia a Pedemontio ad regnum Ifeapolitanum, In insola Cypro et ad Byiantinm, In Hungaria rarissime, in Bannatu et Dalmalia.
28. SC. TOURNBORTH Bib. in Lndl. Bot. Regist. adnol. ad L 1403. et Labiatar. gener. et spec. 431. — Glaberrima: caule erecto ramoso; foil, petiolatis ovatis v. ovalo-lanceolatis grosse crenatis, infimis basi late subcordatis, superiorib. rotundato-lruncatis, floralib. ovalo-lanceolatis, calyce fructifero subbreviorib.; racemo elongato laxo glabro; florib. oppositis secundis; calycib. pedicello longiorib., fructiferis maximis glabris; corollis calyce sextuplo longioribus. ^ — *Sc. commutatae* maiirac affinis, differl foliis rarius cordatis et corollis duplo majoribus glabris. — Habitat in Persia, ad mare Caspicum prope Lenkoran.
20. SC. COMMLTATA Guss. Prodr. flor. Sicul. II. 130. - Bib. I. c. 431. f - Caule erecto ramoso glabriutculo; foil, petiolalii ovatis v. ovalo-lanceolatis crenatis, basi late oordaUi vlx rugoals glabris, floralib. ovaUs ealyoe fructifero aabbreviorib.; racemo elongate laxo snbramoso glabro; florib. oppoiltte acundis) oalycib. pedicello longlorib., frueiiferts mailmU glabriaj corollit calico quadraplo longioribus. 2|. — *Sc. Column*** afflnla sed dlstlnctu glabrillo ot oorollia duplo fere minoribus. — *Sc. peregrina* Waldst. et Kit. Plant rar. Bungar. II. 154. 1125. (non Linn.) — *Sc. aUi\$*ima* Linn. Spec plantar. 630T — Habitat in Europae ausfro-orientalis et Asiae mediae herbis nemorosis, ID Hungaxia, Dalmalia, Tauria et orani Caucaso vulgaris.
- ja SC. PEREGRINA Linn. Spec, plant. 830. — Bib. I. e. - Caule'procumbente; ramis elongatis glabris v. apice pubescentib.; foil, petiolatis ovatis obtusls crenatis, basi rotundaio-trunutis glabris, floralib. bracciaeformib. petiolatis ovato-oblongis, utrinq. acutis Integerrimls pubesceniib.; racemis elongatis laxis; florib. subsetftilib. oppositis secundis; calycib. maximis pilosulis; corollis exlus pubescentibus. 2|. — Caules et folia saepius glabri alropurpurascens v. rubicundi. Folia subtus paUida. Racemi longissimi lenucs, verticillastrl fere pollicem disantes. J'olia floralia vix calycem fructiferum superantia, inflma glabra, suprma Rubvillosa. Calyces suprmi pilosi. Corolla violacea, vix 5 lineas longa. — *Sc. rubicunda* Ilorncm. HorU Ilafn. ex Spr. SysL vcgelab. II. 70S. — Habitat in Tauria <t in Sicilia.
31. SC. ALBIDA Linn. Manliss. pi. 248. — Artb. Hamilt. Monogr. 21. 11. _ gibvhrp et Sm. Flor. Grace. VI. 05. t. 581. - Bib. I. c. 432. - Ramis divaricaiii pubtsccnlib.; Toll, petiolalii late ovalis oblusis crenatis, basi rolundaio-irunratis v. infimif cordalis icnuiler pubrsccnlib., floralib. prtioiais ovalo-oblongis, utnnq. aciitis integerrimis pilosis, calyces superamib.; racemis clongalu laiiis] fl_{or}, b. •ubsessilib. oppositis secundis; calycib. pilosissimis; corollis» eitui \illoiij ^ -

Rami clongati crassi tetragoni pubescenles. Folia scsquipollirarla, grosse crenala, basi sacpius subinaequalier rolundata, inferiora interdum glabriuscula, superiora villosula. Racemi sacpc ultra pedales, rhachi Yilloa. Folia floralia cum peiolo V.-1-pollicaria. Corollae scmpollicares, sordide albac. — *Sc. Cretica* Mill. Diet. et Ilortul. — *Sc. nigrescent* Spr. Syst Yfgelab. II. 702?) — *Sc. pallida* M. Bieb. Flor. Taur. Cauc. II. 65. (non Guss.) — llabital in Europac auslro-onentalis et Asiae mediae syhis montosis, in Oljmpo Bilbyno et ad B)zanlium, in Creta, in monte Libano, prope Heliopolin, in Tauria mendionali el in Sibma ad Tomum fluMum.

32. SC IIIRTA Sibtbrp. et Sm. I. c. 00. t 583. - Bth. I. c. - Ilirsutissima: foil, petiolatis ovalis obtusis crenalis, ba«i rolundato-truncaih cordalisc, ulnnq. hirsutis *M* rugosis, floralib. petiolatis oblongis caljcem tubaequanlib.; raccmio laxii; florib. subsessilib. oppositis secundis; ealycib. fruciifens inflate pilo»issimif; corollit exlus Tilloait. 2f — Caules in pedales ramosi. Folia minora quam io *Sc. peregrina*, obtusiora quam in *Sc. saltiaefolia*, nec ul in bac rugosa. Corolla fore *Sc. Columnnae*. Caljx fruclifer valde auclus squama magna. - *Sc. decumbent* Sieb. ex Spr. SysL vegetab. II. 70S. - *Sc. utriculata* Labill. Icon, plant. Sjr rar. 1>. 11. t. 0. — Habitat in Crela et in Libano.

33. SC. SALVIAEFOLIA Bib. I.e.431 - Caalib. adscendentib. bispidis; foil, pello-laiis ovalis, basi subcordalis rugosisslmis hispidfs, floralib. braciaeformib. P^* liolaiis oblongis rugosin, calyces subaequantib.; racemis laxis; florib. opposite secundis; ealycib. tillosis. %> — Species distlntissima, caules numerosi duri adscendntes, ?ix semipedales. Folia fere *Teuerii Scorodonii*, more *Saiviarum* rugosiasisia, loferiora longe, saperiora brevitor ptliolata. Racemus brevis paucifloros. Calyces pedleollum sabaeqaoales, aqoama magoa. Corolla pubetC4Bf> nagnitndine S#. *pTfrim*— ?. paollo major. — Babiiai in Graecla.

M. SC. VERSICOLOR NaiL Gen. pi. N. Am. IL 38. — Bib. I. c. f — Caule ereclo ramoso pubescente; foil, petlolalis late otatls crenatis, basi profunde cordatis, uinnq. pubescentib. rugosis, floralib. sessilib. late ovatis inlegerrimis, calyce sublongiorib.; racemo simplici r. subramoso elongato mullifloro; florib. oppositif subnpcondis; caljcb. hirsutis. % — Tola plania pilis fin racemo >iscidi>) pubesrens. Caules elan, acute tetragoni. Folia »ubtus nenosissima, \ix 2-pollicaria, priiolo ullra pollican, utrinque pubetcnlia, (sec. Nultal> J-4-|inlicana fere glabra Raccmuf 3-5-pollicans. Folia floralia subimbnrala acula iBlegernma nerv%a hrrbarea. Cal)X ample campanulatus, squama labium supenus non exec* denle. Corolla extus pubescens, tubo eloogato lenui, fauce dilaiata coerulea, labio infer i ore albo. Aniberae tix barbatae *K Sc. Colummat* abunde divert a Coin*! racemit et babilo. - *Se. eordifolia* MQblenb. Cat. - *fi. brodeaia* • foliis floralibus majonbus »obc6loratis. — Habitat In America borcali, in plamiicbns et §)I^{vis} aperds in Ohio et Arkansas, ad Lexington protinaciae Kentucky, ad Novnm Aurelianum, >?. ad Rio Bratos provmciae Texas Mexicaooruro.

». SC CANKSCKNS Null. I. e. - Btb. I. c - Caole elalo ramoso pubescente i foil-petiolatis of atis v. otato-lanceolalis aetis crenatis, basi angusialis rotondatii ^ inflmis cordatls, ulriq. pubescrnlib., sublus incanis, floralib. oblongis caly*^e nuperanlib.; racens laxis paniculalis canesfrnlib.; florib. oppositis secundis; ealycib. cano-ionentosis; corollis exlus pubescentibus. O? — Ilrrbt • rfcw plu-ripedalis, rami obtuse lelragoni, pubeseenlia mold cane*cenies. Folia 2-3-pollicaria, supra magis virldia, soblus pallide canc>centia. Pameula ampl< >riata multiflora. <Uees breviter pedicellati. Corolla.- corruleae ft-9 hn. loogae, .. bo ban parum atlenuato, fauce subdilauta, galea elongata Incurta, lobis lalerit, buo brevibos ovatis, iaBmo laUasioio cooteio galea breitore. - *Se. serrai** »P* S-J's'.

 ---> calyces villosissimos superanlib.; foU. cordato-ovalis crenatis, subtus ramiq. canescentibus. secundis; bracteis subsessilib.

vegetab II. 703. el aucL plur. (oon Andr.) - 5c *pubtcent* Mttblenb. Cat? — *Sc incana* Spr. in Steud. Norn. boU 757? (edit 1) - Uabitat in America boreali, in Canada, in sylvis aperlis ad Ohio, prope Lexington in Kentucky el in Louisiana supenore.

36. SG. SERRATA Andrews, Dot. Rep. I. 494. — Bib. I. c. t — Caule elato ramoso glabro; foil, peiolalis ovalis aculiusculis crenalo-serralis, basi cunealis inlegerimis/ulnoq. glabnusculis, floralib. oblongo-lanceolotis, suprftnis pedicello >ix longlonb., racemis laxis subsimplicib, flonb. oppositis secundis; calycib stri-goso-pubescentib.; corollis amplis, cxtus pubescenlibus. 2l. — Herba crecta pluripcdalis, rarai oblusc telragoni glabernmi v. superne tenuissime pubescenles Folia ulnnqvc vmdia, supra subpurpurascenlia, sublus pallidiora at mimme canescenlia, in pelioluni subdcurrentia. Racemus pauciflorus, axi glabro | tenuiter pubescenlc nec canescenlc. Folia floralia glabra, calyces inlerdutm fere glabn Corolla cocculca ultra pollicans, lubo amplo, superne dilatato Galea incuna, lobi laterales late o>ati abbroiali, labium ovatum con\cxum galea longius - In America borcali, prope Fredcrikslown habitat.
37. SC SAXATILIS Riddel, Supplem. Calal. Ohio pi. [1830] p. 14. ex Hook Lond Journ. of bot I 221. — Pilosiuscula v. subglabra. caule ascendente; foil peiolalis membranaccis cordalo-ovalls grosse creoaUs, tuperiorib. cordalo-oblongu obtusis, floralib. ovalo-oblongis breviter peiolalis Integerrimis pedicellos picrumq. superanlib.; racemis laxis; florib. oppositis subtecondis; corolla breviiier bllabiala, galea recluscula. ^ — A Sc. *terrala* diversa tarn floribus quam folis, ad *vtolaceam* accedere videtur. Corolla semlpollicaris, labio inferior© tubo superne amplissitno trlplo brevior, galea fix iucurva. Achaenia valde tuberculosa — In civiialc Americae borealis Ohio.
- 36 SC PILOSI *MicUx*. Flor. Dor. Amer II 11. — Bin. I. c. 434. t - Caule credo simpliciusculo pubcs»cenle, foil, remolis breviter peiolalis o\ali» oblusc crenatit, basi infimis rotundalis, supenorib. cuneatis v. anguslalis, utrinq pubc»cenlib t pilosi*, floralib. obotalo-lanccolalis calycem subaequanlib, racem lans subramosis pamculalis, Oonb. oppositis secundis; calycib. >illouls, corollis onus tenuiter pubescenlib., fauce subdilalata. ^ — Caules elon^all acute tetragon! parce follosi. Folia circiler sesquipollicaria, pollicem lala, utrinque tenuiier pubescentU v. supra el sublus ad oenros piloso-hlspida, palllde viridia subconcoloria, obtuse el remote crenala, Infima parva rotondau. Rac«mus v. pankula broMs pauciflora. Pedlcelll eajyeo longiores. gquama calycis brevis. Corollae cocruleac 8-9 lin. longae, vlx pubescenles. Faux dilalala, at minus qaam In *Sc tntegrtfoha* Galea magna erecta, lobl laterales ea paullo breviores ovatl, labium lalissimum contexum patens. Flores aulumnales vix consplcui sunt, at ferhln — 5c *Carohntana* Walt. Fl. Carol. 103. — *Sc elttptca* Müblenb. Cat ?
ft. tenuiter pubescens nee pilosa — *Sc. otabfoha* Peri. Enchirid. II 130? - llabilal in America borcali, in ambrosis sytvalicl* in Pennsylvania, ad WCRI-Chester, In Virginia, Carolina, Georgia el Novo Aurelltno, *fl.* ad Princeton in New Jersey
30. SC. YILLOSA Elliot, DoL N. Car. el Georg II. 00. - Bib. I. o. - Caule crrrlo ramoso villosu, foil majusculis lanceolatis, utrinq. aculis grosse dentalis, suluus villosis, supra subbispidis, racemis pamculatis conferliflons. ^ — llabilal in America borcali, in Georgia inter fluua Oakmulgu el Flint
- 40 SC IMEGRIFOLIA Linn Spec, plant. 830. - Bin. I. c. 433. | - Caule creclo simpliciu&culo pubescenlc, foil remolis breviter petiolais oblongo-lanreolatin v linearib oblusis itilegerrimis v infenonb. denlatis glibnut»culis, fluralib calycem superanlib, racemis laxis subramoiis, flonb oppositis secundi*, calycib pubescenlib, corollis glabnusculis, tubo superne fauceq ample dilalala — Habitue *fcrcSc ptlotac*, sed folns el floribus disinctissima Folia inbma fc«(*pius* pana o\ala oblusissima denlatn, sublux purpurascenlia, supmora l-l¹/-poiira^ na oblusiuscula, pallidc \india » in Ions SICCI purpurascenlia, nunr pi ,i,rji

saeplus tenuissime pubescentia, integemma v. rarsissime in orloque margine denle
ono allerove nolala. Inflorescentia 5c. *pilotae*. Corolla ampla palchre coerulea,
labium in fen us maculo inlensiore notalum, forma fere *Phytotlegiae*, 8-0 lin. longa.
Tubus basi lanlum anguslalus, superne cum fauce valde dilatalus. Galea incurta,
lobi laterales dimidio breviores crecli ovali. Labium ompkssimum conveium
patens emarginatum. Antherae longe barbatae. — *Se. polymorpha* Arth. Hamill.
Monogr. 3\$. — *f>c. hyuopifoUa* Linn. Spec plant. 836. — *Se. Carolmiana* Lam.
Diet. > II. 706, Illustr. L 515. fig. 3. — *Se. otdifolia* Pers. Encbmd. II. 130?

fi. ktpida: Caulib. hispidis; corollis villosis. — Habitat in America boreali in
SICCIS el humidis, a Pennsylvania el INovo Eboraco ad Carolmam, Georgiam,
Nor am Aurelianum el prope West-Cbesler, *fi.* in &ovo Aureliano.

41.T SC. LCNEARIS Bib. in Wall. Plant. Asiat rar. I. 00. el Labial gener. el spec.
435. f — Caule procumbente; foil, inbessilib. oblongo-lincanb. oblusis subin-
legerrimis, margine subrevololls, soblus canescenlib., floralib. ovalis concavis,
calyce sublongiorib.; racemis simplicib. densis; florib. oppositis subsecundis; ca-
lycib. pilosis; corollis glabriusculis. % — Canles e basi crassa sublignosa nume-
rosi, basi procumbentes adscendenles piloso-pubescentes, >ix semipedales. Folia
6-0 lin. longa, 2 lin. lala, supra glabriuscula, inferiora interdum paullo lauora el
margine utrinque dentibus 1-2 obscure notaia, floralia berbacca late ovata ob-
tusa inlegemma concava laia pilosa, calyces superantia. Racemi . spicae de-
mum 2-3-polhcarcs. Flores fere *Se. alpina**. Corolla ochroleuca fere pollicaris,
lubo basi allenuato, fauce dilatau, labiis lalis purpurascenlibus. Gemlalla sub-
eiseru. Antherae breviter barbatae. Achaeia lomenlosa. Habitus inter *Lup**-
hmaria el *Stmckywucri*des *amgusOfogas* medius. — Habitat in Indiae oriental**
monlibos Eamaonensibnt.

«. ? SC VIBICIDULA Boge. Bansa. plant Cbln. bor. M. - Bib. I. c f - Caolib.
decasnbtaub.1 foil. tatsJIib. lnearl-oblongls oblnslt Iniegerrimis plants, olrinq.
Tiridib. tlteidolls, lorallb. otatls ooneatU, etlyoe tvblonglorib.; calycib. pllostis;
corollis glabrinsenlls. % — Habitat *Se. Un—rit*, enl talde affhnt, sed folils pla-
nis nirinque viridibnt flseldnllt ei parnm lailorlbos diversa. Racemi?,
fiores lis *Se. Untaru* fere eonformes Tidentur. Corolla ocbroleuca. An cum *>.
hmeari ad *Lupukmariai* amandanda? — Habitat in Cbina boreali, in glareosis
inter Jui-lin el Zsimin-i.

43 Sf MACR4>TII4 Fiscb. ei Rebb. Plant critic. V. 52. t 488. - Bín. I. c. 436. | -
Caulc basi procumbente adscendente glabnuscuro; foil scssilib lanceolatis ob-
tu^is integernmis, basi rotundatis subglabris ciliatis, floralib. cal>cc longiorib ,
racemis simplicib.; florib. opposilis secundis; calycib. pilosis, corollis amplis
eitus pubescenlib., tubo superne dilatalo. ^ — Species pulchra rt characleribus
datis distinctlssima. Caulis saepe parpnrascens, angulls linra pilosa <aepius ci-
liati«, caeterum glaber. Folia supra alrovindia glabra . pilis raris brevibu* ob-
aessa, subtos pallldiora glaberrima, floralia inferiora caulims conformia, superiora
braciaeformia. Racemi plnrimi, floribus Internodio longionbus. Corolla polli-
cans coerulea, tubo superne Talde dilatalo, galea incunra, lobis laleralibus dl©>»-
dio brttlonbus, labio lalo conveio subpalente galeam aequante. Antherae bre-
titer barbtue. - *SntUUana* He. Gmel. FL Sib. III. 2*. no. 50. - *Se. yrandt-*
fiora Adams, ate. Boge. (non Sins.) — Habitat in Asia onmiali, in Dahuria, in
nonlosis KerUebiae el Argonensium frequens, in China borrali, non rara In mon-
tosis Zim-wey-schan el alibi, nee non in ipso muro magno inter Peking el Jehol.

•t«CI» I?. mnUCOLARIA ArtiL laiBilt Mtofr. 3L - BUu 1. o. 4M.

Folia florali berbacea caulim< conformia T. gradatim minora. Flores opposm
seondi aiillares v. sopremi subracemosi

44. SC. HETEROPHYLU Montlir. el Aoeh. Ann. sc nat. VI 45 - Taule decom-
boole, basi ramotissimo. ram it tomentellis; foil inferionb peliolalis ova
~~rugosissimis~~, medns oblongis longe prtiolatis rugosulif. tupriorib. »or* libq.

aesslib. obloogo-linearib. ublntegerrimis, omnlb. utroq. palldls vlrldib. subcanescenlib.; florib. aillarib. oppositis secundis, suprcmts approximalls. % - Kami purpurascenies. Folia parva. Corolla flava raagniludino 5c. *galericulotoe*. — Habitat in Syria.

45. SC. ANGUSTIFOLIA Pursb, Fl. Amer. sept. II. 412. - Blh. Labial, gen. cl spec. 436. (excl. syn.) — Glabriuscula: caule erecto simpliciusculo; foil, infimis petiolatis ovalis denlatis, snperiorib. subsessiiib. oblongo-linearib. inlegerrimis, omnib. bail rotandaio-cunealis, floralib. conformib., gupremis sterilib.; florib. axillarib. oppositis seeundis; calycib. pedicello brevioribus. QT — Herba vix semipedalis, in omni parle glabra v. tenuissitne pubescens. Flores pauci folia vix supcrantes. Calycis squama labium supcrius breviter excedens. Corolla 8 lin. longa, labiis subacqualibus, lobis laleralibus brevissimis, fauce param dilalata. — Habitat in America boreali-occidental! secus flumina Kooskoosky et Columbia ab ortu ad arccm Vancouver.
46. SC. CORDIFOLIA Fisch. Indx. semin. hort Pelrop. 1.02. - Treviran. in Nov. act. acad. nat cur. XIII. 185. — Bib. I. c. t — Glabrt: caule ramoso; foil, breviter petiolatis oblongo-lanceolalis obtnsis integerrimit v. remote serraUs, basi rolundatis v. cunealis, floralib. conform!b. gradatim minorib.; florib. axillarib. oppolitis secundis. Q1 — Species media Inter *Se. angutUfoUam* ei *gakriculalam*. Caulia videtur erectus T. adscendens. Statura minor quam In *Se. gaUriculat**. Canles e basi ramosa erecti, vix semlpedales, pleromqno glabri. Folia glabrt latiora quam in *Se. anguttifolia*, aogusllora quam In *Se. gaUriemUUa*, serraturis paucis oblusis remotis plerumque noUta el baal rotondalo-cuneau nee eordala. Calyces glabri purpurascenies, squama brevi obtusa. Corolla 5c. *anguttifoliae* v. eliam parum longior. Var. *p.* babilu simillima el vix characteribus supra nolalis dislinguitur. — *Cattida etc.* Amman. Slirp. Ruth. 43. LM. — *ScaieUaria etc.* Gmel. Fl. Sib. III. 220. no. 51. U 47! - 5c. *Adamtii* Spr. Syst. vegetalab. II. 701? - Arth. Damill. Monogr. ». t. 2. fig. 3.

fi. Adamtii: foliis minus denlatis, floralib. minorib.; florib. subracemosis. — Habitat in Rossia onenlali ad lacum Baikal, in jugo AlUico, Daburia, ad Sc-lengany el in KamUcbalka.

47. SC. GALSRICULATA Linn. Spee. planUr. 635. — 8m. Bogl. hot THIL U 523. - Book. nor. Londln. II. c. le. - Blh. I. c 431. f ti 138. - Caule ramoso 4l?arl-cato; foil, brevssime peilolaUt ottlo-UnetoUiU acaUs, bail rotundato-eordaili, floralib. conformib.; florib. axilltrib. opposllls seeandls brevistlme pedieelUtls. q. — PlanU quoad slaturam el pubescenliam variabilis, ted foliorum forma el floribus facile distinguenda. Calyx breviler pedicellalus, saepios pnberteeni, squama labio superiore brevior. Corolla 7-8 lin. longa coernlea, lubo tuperne faucequo dilalalis. Galca labio subbrevior, lobi laierales breves erecti ovaii. Achaenia luberculoso-rugosa. In var. *r.* corolla vix ultra 6 lin. longa el ml lota planla glaberrima. — *Cattida yalericulala* Moench, Melb. plant 411 — *Sc. epilobitfolia* Arlh. Hamill. Monogr. 32.

a. *pubescent:* caule, foliorum pagina inferiore, calycib. corollisq. pubescenlibug.

fi. vulgarit: caule folisque glabris, corollis pubescenlibus.

y. *glaberrima:* corollis minorib.; caule folisque glabris. - Habitat in humidt Europae, Asiae el Americae borealis, in Lapponia, Scotia, Anglia, Gillia, Hispania; seplentrionali, Germania, Italia a Pedemonlio ad Calahriam, at in ausralioribus regionis mediterraneae rarior esl, nee in flora Sicilians noc Graeca occurrit, in Rossia a Pelropoli el in Caucaso ad jugum Altairum el Dahuriam, in omni superiore Jcnisci regione usque ad Irculiam cl ultra nee in Jugo Himalayensi?, in America ab ora borcali-occidrniali ad Canadam el Novum Eboracum, a. in America vulgatiore occurm, rliam in JURO Altaien m vix in Europa, *p.* esl Europaca et Asialica, at rarius in America, y. in Amr-rica borcali-occideDlali.

- 48 SC. HASTIFOLIA Lino. L C. - Bib. 1. o. 437. - Caule adscendente simpliciusculo glabro, Toll breviter pchollis o>ato-lanceolatis oblusis, margine inlegerrimis, bast truncate haslaio-subloftatis, Ooralib. conformib giadatim minorib., flonb opposilis secundi* frubracemosis, calycib pube>ccllib, corollis elongatis, fauce dilalata, galea labio infcnore brevior. 2} — A 5c. *galenculata* differ, foliu bail baslahs, corollis parutn loogionbus, ID racemo (crminali magis approximate — *Cautda hoittfoha* Scop. Flor. Carn I. 430. — Uabital in Europae el Aiiiae occideDlalis humidis ranor, in Galliae region© Andegatensi et Aureliana, in Scania, ID Austria el Germania, prope Uudam el ad kumam rivum.
- 49 SG RIULARIS Wall. Plaot. AsiaL rar. 11 00. — Dlh. I C.4J8. t - Glaberrima: caule basi procumbente; ramis adscendeolib. simpliciusculis, foil inflmis peliolalis ovato-rotundalis mediiq. ovaio-lanceolatis oblusis crenalis, basi dilatalis cordalis, supenonb. floralibq. minorib., basi aoguslalis, flonb opposilis sccondif labracemosis; calycib. corollisq. glabria. 2|. — Caolea basi radicanles, semipedalea pedalesve. Folia ranorum slenliom vix semipollicaria subbrotooda, cauhoa iofenora pollicaria, aupenora gradalim minora, floralia suprema caljcem broiler excedoia. Corolla 4 lio longa, fauce parum dilatata. Galca brevis, lobi lalcales eam subaequaotes ovali erecti, labium In forms paullo longius, lalum contexam cmarginaium subpalens. In spedmimbus Chinensibus cacicrum o o - Dino conformibus folia fere omnia basi roiundaia T. angusiata, ranus cordala. — *Sc. peregrina* Roxb. Hort Bengb. 43. tnon Linn.) — *Sc barbata* D. Don. Prodr. fl Nepal 100. - 5c. *squamuiosa* Arth. UamilL Monogr. 3>. - Ilabital in A*i«« mediae rnalis, in Indue oneoUlis TiUibut Kepalenstbui, in Cbinae provinciif To-keen ei Kia-oong.
- sa SC RIMICIFOLU B. B. lib. No?, gesu e4 spec plant. II. 324. - Bib I. c. 43B. el 139. — GUBotrtsM: ea«lo koaill dllfeao roatoao; foil. Inlfmif peUolalis laie OTaila, boal kasUlo-eordalla, aiediia loneeoUtla tcutli. basi basUUU. iupremi* floralibq. aobsesailib. laneoolatla •. IlaaArib., basi rotondaila aogotuUsve; florib. ninulla opposilis secaodia. ^ — Berba poilla semlpedalls t. rarint sobpodalis: basi ramoaisaima radicaos, rani acala letragoni. Folia ramorum slerillun saepe *Rumtci* acttoitUae formam aemalanlia. caulina infenora semipollicaria, superlora vix 3 lin. longa. Flores fere 5c. •unorw. Pedicelli hneas 2, caljccn 1 longi. Corolla (*Sc. m%*oru*) exloi lenuissime pubescens |i| 3 lin longa Faux |ix dilalala Galea panra. lobi lalcales breves, labium infenus paullo longius; laiumi cmarginaium patens. Squama calwcis brevis. GeniUha subexserta — *Sc rae*-mota* Pert. Knchind II. 130. — Ilabital in America praesertim meridional!, ad Hacienda de la Llaguna Mexicanorum, Sanla Fe di Bogola. Montevideo: Rio Pardo provinciaio Brasilienaia Rio Grande do Sul. ad Mendotam el Valparaiso.
31. SC MINOR Linn. Spec. pi. 833. - 8m Engl bol. t »i - HooW. Fl Lood. lj: fe - Bib I c. 4J0. - Hnmilis glabra: foil, breviter peiolalis, Infros laie ovaus mediisq ovalo-laneolaUs, basi cordalis subbasUlls, supremis floralibq. !•«-ctolatis, basi rolandalia, omo#b. obloais, florib- pants asillanb. opposiU* »^* cndU; corollis aabglabria, fauce vix dilaUU. ^ - Folia *Sc galericul****** ''' autora molioiies minor. Tola planla vix 4-*.polltcaris Folia omnia ellam o... ralia poUoUla, inferiora aeepios breviter hatialo-lobata el bine inde labdcnU^ caeierom iaiegemma, inflma subrolunda parva, media 0-0 lin longa. ^{lupcr, d} el floralia vix 4 lin. Pedicelli caljceru aequanles Squama calyns brevii ^{ma} Corolla 3 lin looga. basi vii recuna, galea parva, lobi lalcale* ei ^{1 0 1 ? o q} I ^ labiam loogius subpalens eroargmalum GrmUlia subexterta — *Sc. errey*. Toreian. mat. - Habiial In Kuropae el Atiae mediae parutlnbus, In ^{Anglia} Gallia praesertim occidenUli. Iitpania occideniali, Lusilama, in Germania P ^{rae}sertim sepientrionali. io Siberia prope IrkuUk.
- <. SC IIAVAJKNSIt. Jacq Oba. II A. t tt - Bib L e t - F°» ^{us} cor ^ ^ M crooalit, florib. axillarib, lablo corollae ulroq irifido O - P ^{l j o 1 j U e e} L f | S Proc«aib«aieie^EU kerbaea. Folia obiota glabnufcola peUolaU oppo>>«*

scmipollicaria. Pedunculi nñflorl solitaril axllares. Flores Inodorl, fere pollicares cocrulei, characlere congenerum, sed calycis bilabiali lacinae subrotandae integerrimae el fere aequales, corollaeq. labium informs semilrifidum et paullo longius, sDperioris lacinae subrotundae, media emarginala ac latior, lateralibus integerrimis. - Crescit Havanao in rupestribus marilimis.

53. SG. MICROPHYLLA Moç. et Sessé mss. ex Bib. in Lindl. Bot. Regist. adnot. ad t. 1499. et Labialar. gener. el spec. 430. — Pubescens: caule diffuso humili ramoso; foil, petiolalis, inferiorib. rotundalis sinualo-crenalis, superiorib. ovatis, supremis subintegerrimis, ulrinq. angustatis; florib. parvis aiillarib. opposilis secundis; pedicellis calyce longioribus. 2|. — Valde affinis 5c. *humili*, at villosa. Folia superiora basi rotundata, inferiora tantum laic cordata. Kami lenues palenlim pubescentes. Corolla magnitudine *Sc. minorú*. Calyx basi pubescens, squama post anlbesin maxima membranacea glabra. — In Not a Iispania.
54. SC. III MILIS R. Br. Prodr. Dor. Nov. noil. 507. - Blh. I. c. 430. | - Strigosopubescens: caule humili; foil, b rev Her petiolatis, Infimls rotundalis inciso-rrcnatis, superiorib. ovalis rotundalo-dilalalls subhaslalo-lobalis, omnib. basi cordatis, floralib. supremis calycem vix excedentib.; florib. parvis axillarib. oppositi* secundis. ^ — Stalura 5c. *minorit* el *parvulae*, ted parnm ramosa. Caulls an* guli, foliorum pagina superior et nervl paginae Inferloris pilis brevibus strigoit pubescentes. Folia vix 3-4-linearia, Inferiora lalltudine longitodinem excedentia, obtusissime crenata, superlora basi aurculis rotundatis sobcrenaUs nastata, versus apicem integerrima. Flores 5c. *minorit* eliam brevloret. Calyces glaberrimi, squama labio superiore paullo longiore. Corolla calyce duplo longior subrecla, tubo supernc fauccque valde dilalalis. Galea brevissima, lobi laterales lali, labium duplo lonpius, convexum intgrum? Genitalia breviter exserta. Anthrac generis. — Habitat in Australia ad Portum Jackson <¶ in terra Van Dicmen>i.
55. SC. PARYLLA Michx. Fl. Bor. Am. I. 12. - Hook. ExoL fl. II. t. 106. - Blh. I. c. 440. f — Caule huraili divancato-ramoso pubescente; foil, infimis brcmlef peiolalif ovalo-rotundatis, mediis, superiorib. floralibq. sessilib. ovatis v. o\atolanceolalls, omnib. obtusii Integerrimis v. raristae denUtis, basi subcordatis; florib. parvU axillarib. opposUs tecundis; corollis subgUbHs, fauce vix dilataia, ealyce vix duplo longioribus. QT - Herba vix 4-S-pollicaria sobdecumbeof ramosa, rami acute tetragonl, dense foliosl magis minuiva pubescenlet. Folia parva, media vix ultra semipolliceni longa, superiora gradaUa mlaora aogusliora, inflma breviora latiora, Inrerlora nonnunquam bine indo subdentata, superiora el floralia constanler integerrima, omnia nenrosa pubescencia v. glabriiicula, pallide viridia v. purpurascencia. Calyces breviter pedicellati pubescentes, squama labium superius excedente. Corolla forma corollae *Sc. minorit* et vix longior. Genitalia subcxserla. Achaeia tuberculoso-rugosa. — *Sc. ambigua* Null. Gen. pi. Americ. II. 37. — Habitat in America boreali, ad ripas fluvlorum et in humidis In Canada, Virginia et ad Missouri vulgaris videtur, occurit eliam in regione Illinoensi, ad Lexington In Kentucky el ad Bio Braios provinciae Texas Mexicanorum.
50. SC. RESINOSA Torrey, Pl. Rock. Mount 83S. - Bth. I. c f - Minute glanduloso-pubescens: caule humili erecto ramosissimo; foil, vix petiolatis late ovatis oblusis integerrimis, basi rotundatis, floralib. confonnib.; florib. axillarib. opposilis secundis; corollis villosis, calyce plus quadruplo longioribus. Q? - llabitu *Sc. parvulae* afOnis, sed rigidior ramosior. Folia vix 4-5 lin. longa, basi iubcuneato-rotundata nee cordata, ulrinque \iridia, subtas nervosa, oculo nudo glabra videntur, sed sub lente pubescencia resinoso-glandulosa, utrinque uti rami irrorata, superiora minora vix angusliora. Calyx glanduloso-pubescen« berbaccus, squama maxima. Corolla magnitudine *Sc. gahriculatae* coerulra, drnic villosa, ba-i attenuata. - Habitat in America boreali, ad flutnen Canadian mirr Rocky Mountains.

57. SG. ANTIRRHINOIDES Bib. ID Lindl. Bot. Regist adool ad t. 1403. et Labiatar. gener. et spec. 440. — Gaule diffuso ramoso glabro; Toll breviter petiolalis otalis oblongis inlegemmis, basi angustatis crassiusculis glabris Y. tenuissime pubescentib., floralib. conformib., supremis slenlib.; flonb. axillarib. oppositis secundis; caljicib. pedicello brevionbus. O² ^² — Habitus *Antirrhini tempervirens*. Rami laetes, acute tetragoni glabri v. oculo armato leniter pubescentes. Folia semipollicana, foil is *Antirrhini tempervirens* simillima. Flores omnino 5c. *angustifoliae*. — Habitat ID America boreali, prope arcem Vancouver ad ripas flumiois Columbiae.
58. SC NERVOSA Pun»b, Fl. Amer. sept II. 413. - Bib. I. c 411. f - Caule simpliciusculo glabro; foil, infimis petiolalis rotundatis, medus sessilib. lale'otalis denlato-crenalis, basi cordalis, floralib. iupremis ovalo-lanceolalis integemmis, omnib. glabns v. supra hispidulis, margine scabns; flonb. parvis axillarib. oppositi secundis; corollis'glabriusculis calyce duplo triplove longionbus. O* — Herba tenera, laete viridis, caule acute tetragono subalato Foliorum pana 2 infima ut in *Sc. parvula* purpurascens parva, media 10-12 lin. longa, vix angustiora membranacea nerosa obtusa, crenatuns paucis remotis nolata, (loralia infima conforraia, supenora gradatim minora angustiora Inlegnora, at calyces duplo triplove superantia. Calyces glabri, floriferi pedicello breviores, fructiferi aldr aucti, nquama latissima membranacea labium superius superante. Corollae parum majores quam in *Sc. parruta* et minor?, coeruleae, eilu* tenuiter pubescentes, tabo superne parum dilalalo. Galea parta concava, lobi laterales rotundati patentes, cum infimo emargiato labium inferius convexum patens formantet. Stamina longiora subexserU. Acbaenia toberuloso-rugosa. — *Sc. teuerii-folia* 8a. In Hew, CycU XXXII. BO. U. — *Sc. parviflora* RaBn. Itin. ex Arlh. Hamllt Honoir. 37. — *St. grmctii** IfalL Gen. II. 37. — HabiUI in America borealis dumotls ad ripas fluminnni Bcbayiklll, Susqoebanoa, Miisourl et Ohio.
59. SC. DRUMMONDII Bin. L e. f — Canllb. adseendcnlib. subramosis villosis; foil, petiolatis ovatis oblongis erenatis, basi cuneatis, floralib. Integriorib. mloorlib., omnib. utrinq. villosis; florib. parvis axillarib. oppositis secundis; corollis villosis calyce vix triple longionbus.^ — Rami semipedales tetragoni. Folia semipollicaria, infima ovata, petiolo pollicart, supenora subsessilia, suprema elliptica subinlegerrima, oronia Oores subsuperantia. Corollae 3-4 lin longae coeruleae. Habitus *Sc. parrutiae*, sed villositate et folis erenatis distinctissima Afflnis *Sc. moUha* a qua differ! folus basi cunealis nee cordatis et floralibus supreme majoribus. — Habitat in America boreali, ad Rio Braios provmciae Texas Hexicanorum.
60. SI. MOLLIS R Br. Prodr. flor. Nov. Uoll. 507. - Btb I. c. t - Caule simpliciusculo pubescente; foil, petiolatis ovato-rotundatis obtusis grosse creolalis, bail late cordatis, suprnorib. florallbq. ovato-lanceolatis acutis, omnib. utrinq. molliirr villosis; florib. oppositis secundis axillarib. v. supremis subracemosis; corollis qoam ealyi pedicello brevior duplo loogioribus. I — Caules pedales et ultra, parum ramosi, angulis acutis pubescentibus. Folia inflma longe, superiores breviter petiolata, floralia omnia erenaU calyces excedentia, Junior! dense villosa* vetosiora pilis supra sparsis et sublos secus nervos obsessa. Pedicelli, calycei et corollae villosa. Corollae 3-4-linearea videntur. - Habitat in Nova Hollandia.
61. S. TIBBROSA Bib. I. c - Caule humili siroplici erecto villosa; foil, petiolalis ovatis oblongis erenatis, basi rotundato-truncatis, floralib. oblongis omnib. utrinq. villosis; florib. axillarib. oppositis secundis, corollis villosis calyce plus quadroplo longionbus % - < aules e radice oblonga luberosa ^{imPll, fei, 1, 0,} luarii, via 1-3-pollicares. Folia 4-5 lin longt, floralia gradalim minora ^{P orll, J, n} brenora, at calyces excedentia, omnia crenata v rarius inlegerrima ^{l, or 0, n, *} magnitudine *Sc. valtric* % * m *, lubo lenul. - Habitat in California septentrionali Mi.
- «. 8(., COERTLKA Mof. el Sesse mss. ex Btb in Lindl. Bol. lef«»J- ^T ad u 1403. el UbiaUr. fener. el spec. 44J. - Caule simpliciusculo ^{P ad 0, 1, 1, 1, 1,} foil breviter petiolalis ovalo - rbonboideis obtusis erenatis, basi rotunda us, ^{ll, 1,} rallb. sebeonformib. angustioribus, supremis lanceolalis sobintefenimlis, omm».

supra pubescentib.; florib. opposilis secundis axillarib. \. supremis subracemosis; corollis calyce subsessili septuplo longioribus. % — Caulis semipedales pedalesve ascendentes tetragoni, interdum subulati. Folia infima parva subrotunda, media pollicaria, floralia gradatim minora ei inferiora, suprema calyce duplo longiora integerrima v. dente uno aiterove nolala. Pedicelli calyce breviores. Corolla 8-10 lin. longa, exclus pubescens, tubo lenui, superne vix dilatata. Galea brevis. lobis laterales lani subpaucules, infimus galea subduplo longior latus convexus emarginatus, dente parvo in emarginalura inclusus. Squama calycis demum labium superius superans.

f. Foliis utrinque pubescentibus. — Habitat in Mexico prope Tlalpujahua.

63. 6G. MOÇIMANA Blh. Labial, gener. et spec. 442. — Ramis ascendentes?, basi villosis; Toll, petiolalis ovalis subsinuato-crenalis, utrinque viridibus, supra hispulis, subul subglabris, floralibus infimis conformibus, supremis parvis oblongis; floribus opposilis secundis; corollis calyce pedunculato sexuplo longioribus. 2l. — Rami basi subliguosi videntur, apice glabrescunt. Folia pollicaria. Corollae speciosae coccineae? sesquipollicares incurvae glabrescunt, tubo superne vix dilatata, limbo credo, lobis lateralibus cum supremo labium superius formantibus, infimus vix emarginatus, tubo superior* brevior. — In Nova Hispania.
64. SC. MALVAEFOLIA H. B. Kih. Nov. gen. et spec. pi. II. §5. - Blh. I. c. - Folia subrotundo-ovalis obtusis fere serrato-crenalis, supra pilosis adpressis conspersis, subul glabris; floribus axillaribus subsplatis. 9} — Caulis ramosus erectus tetragonus, tenuissime pubescens. Folia petiolata reticulato-venosa, 8-10 lin. longa, 7 lin. lata. Petioli 4-5 lin. longi, tenuissime pubescentes. Flores oppositi pedunculati, 4-5 lin. longi. Pedunculi lineam vix longi pubescentes, medio bracteis duabus minutis subulatis instructi. Calyx lenius pubescens. Corolla coerulea? labio superiore exclus pubescente. Stamina 4 didynamia, in limbo superiore latentia. Filamenta glabra. Antherae pubescentes. Stylus glaber, longitudine aequum. Stigma acutum. Achania 4 minima, in fundo calycis peritrochae tenis clausi, subglobosa fusca. — Haec species cum binis sequentibus forsitan ad *Perilomiam* referenda crit — Habitat in America meridionali, in locis montosis alsi Juxta rodinam Saucue Annae in provincia Mtriquitensi, in regno Novae Granatae.
65. 8C. CIMANENSIS H. B. Kih. I. c. f - *Bib.* I. * — Folia ovata subrotunda obtusa, basi rotunda, utrinque pilosis, vix pubescentibus, subtus canescentibus; floribus axillaribus lobulatis. 6 — Rami ligulati tetragoni laeves glabri, angulis inerassant. Folia petiolata reticulato-venosa, nervo venisque tubulis prominentibus, membranacea, subtus canescentia, 8-12 lin. longa, 7-8 lin. lata. Petioli 3-5 lin. longi canaliculati piloso-pubescentes. Flores oppositi pedunculati semipollicares. Pedicelli 1-1 1/2 lin. longi pubescentes. Calyx campanulatus, dorso gibbosus pubescens, labiis aequalibus inaequalibus. Corolla exclus pubescens, calyce quinuplo longior. Fructus in fundo calycis bipartitus et clausus. Achania 4 oblonga convexo-trigona laevia glabra. — Habitat in America meridionali, in locis siccis prope Cumana et Bordonas.
66. SC. VOLUBILIS U. B. Kih. I. c. f - *Bib.* I. c. - Volubilis: folia elliptica, utrinque rotundata crenata, supra pubescenti-pilosis, subtus molliter pilosiusculis, interdum incanis; floribus axillaribus solitariis. 6% — Rami quadrangulares medulla alba referti laeves dense et molliter pilosi. Folia opposita petiolata, basi acuta membranacea, 14-10 lin. longa, 0 lin. lata. Petioli 4-5 lin. longi canaliculati, dense pilosi. Flores oppositi, breviter pedunculati, 7-8 linearum longi. Calyx brevis campanulatus bilabialis piloso-pubescentibus, labiis aequalibus rotundatis integris. Corolla generis? exclus hirta-pubescentibus rubra. Stamina 4 didynamia exserta. Filamenta superne puberula. Antherae bilobatae Mibdidynamae, loculo altero in lamina longioribus minore ambo abortivo? Ovaria quatuor diu communia imposita glabra. Stylus glaber erectus. Stigma bifidum? Fructus in fundo calycis bipartitus clausus. Achania 4 oblonga convexo-trigona Ufvia

fusca glabra, immatura. Flores . . . ? — Habital in America meridional!, in syMi opacisjuxta Loxa el Gonzanama Novo-GranaieDsium.

SeoUo 7. MASGHALOSTACHIS Bth. 1. o. 443.

Folia floralia herbacea, inQma caulinis conformia, superiora parva bracteaeformia. Flores oppositi secundi, plerumque io racemis aiillaribus lermiDalibuaqua disposili.

- 07 SC. REPEXS Hamilt in D. Don, Prodr. fl. Nep. lia - Btb. I. c. t - Cano-pubesccns, superoe viscosa: ramis icandentib.; foil, petiolatis ovatis crenalis, bail rotundalis subcordalis, sopremis acutis, bail subcunealis, floralib. ovalis oblnsis calces sobsuperanlib.; racemis numerosis axillarib. (erminalibq. abbreviaais laais; florib. opposilis secandis. 2|.w — Ctoles longiisimi ramosi subleiragoni, lomento cano pubescentes. Folia sesqolpollicarfa rugulosa, supra viridia pubescentia, sublus cano-tomentosa. Racemi 2-4-pollicares, saepe ramosi, in apice caulit dense panicalati, secus ramos subremoli fleiuosi cantscentes visroso-pubescentes. Calyces subsessiles parti. Corollae 7-8 lin. longae, basi valde attenuatae* fauce inflata, lablls subaequalibus, superior* elongalo falcaio galealo, lobis laieralibus ad basin galeae brevibm obtusissimis, labio inferiore valde conveio paienle. Achaenia tuberculoso-rugosi glabra. - *Sc. cana* Wall. Pl. As. rar. 1. 67. - *Sc. WaUUKian** Artb. Hamill Monogr. 9L t 8. Ig. I. - Habiui In Indite orientalis montibus Nepalensibus kamaooensJbus el Avensibui.
08. SC. SCANDEKS D. Don, Prodr. fl. Nep. 110. - Bib. I. c 444. f - Caule stao-dente; ramis glabris acuiissime telragonis; foil, brevicer peliolaiis ovato-laneeo-laiis acumioalis crenalis, basi rolos4alo-c«rdaiis glabris, floralib. late ovallt acominaUs til calye«a raptrtsiilbw; rn—la) aiillarib. lenlnallbq. pobesceniib.; florib. oppMills s—ndtsji %w — Maal ftefert IMTM, Mepa glaicesceniies, angnlis acvltt Millosis. !..* 1-tW—yWlcata, tttplot (tabejrrisM, rarias soprt pllis rails hltpidata, «CMIB« Itsjfb) iugsttlaia. UTSBIBAU. Baoanl flaxnosl, rbaalil, ea-lyelbMf eoroUls bnataiaf s aaprsjaila pubaaeeoiibas. Corolla faro polNcaris, basi panim auaaaata, faaea dlaliala, falea%a4dø faleaia acou, lobis laiaralibus ovalis eractls galaa dlmlidio brarloribus, lobo nedio rolaodalo patenla sublongioribus. — *Sc. ongmos** Blh. in Wall. Pl. As. rar. I. 67. — *Sc. eeUidifoh'a* Artb. Ha mi It Monogr. 27. — Crescil in Indiae orientalis montibus Kamaonensibus at Kepalensibus.
60. SC. LATKRIFLORA Linn. Spec, plant. 835. - Bib. I. c. | - Glabra: caula ereaift ramo»o; foil, peliolatis ovalo-lanceolatis acuminalis, basi rotuodatis, floralib. so-penorib. calycem vii tupraoifb.; racemis aiillarib. lermiahbq.; florib. opposUll secundis. ^ — Caulis pedalia ramosiuiaius, rami tetragooi, uti tola planu gli" bemmi. Folia I-8-polllcafia, snoeriorsa gradalim mioora. Racemi lalfftle* graciles oumero»i. folls floralibns partis, termiales alongaii, foliis floral**0* ioflmis caallois conformibos. Flores pedicollali oarti. Calyi glabar campaaualalas, frociifer elaosas, squamo bravi obtosa. Cõrolla coenilea, tii 3 IUL I^{BS*} - *twid* taUnform* Mnch. Hath. - Crescil in America boretli, ad 'cease et marginas aqoarum a 2Vovo Eboraco, ad oram boreali-occideoulem at a ~~Canada~~, *d Garolisam el Notum Aoraliaoom.

t *Speeds e get*er\$ expellendae.*

SC. CRKTICA Linn. - TEL'CBII'M ARDM.M.

SC JAPOMCA Barm. - PLECTRANTHtS MESTHOIDES com **MELISSA**
PARVIFLOBA:

3027. PEBILOMI.% 17. B. Eth.

(H. B. Kib. Nov. gaoer. « spec. »l- An^ric. II. J*. - Maisn. Genar. pl««- f i j f B . .

I. «ã. II. IH - Bib. Ubiat geoar. at ipac. 444.)

I. P. SCITELLARIOIDES B. B. Kib. No?, gan. el spec, plant. II. 3B7. t t 187, —
Bib. I. e. - GUBra: foil. paliaUlia atatia, basi roluodaiis to***0* ~~partis~~
IM ramoraai lortNbq. partis; racaais graailib.; florib. sacoadlt; ~~corollis calyce~~

- glabro fix Iriplo longloribas. 6 *1 — Caules glabri, acute tetragonl subalali. Folia sesqnipollicaria, apice breviler acuminala, grosse crcnala, subtus venose, superiors uli floralla acula, vix 2-3 lin. longa, basi anguslata. Panicula fere *Euphrasiae Odontitis* ramis gracilibus aimplicibus 3-4-pollicaribus. Flores op* posili, versus apices ramorom approximate viz majores quam flores *Scutellariae minoris*. Calyz supra gibbus v. brevissime squamalus, omnino glaber. Corolla coeinea? exlus rufo-villosa *P. ocymoides* minor, caeterum ei conformis. Achaenia acula luberculosa, anguste quadrialala, alis denticulatis. — Habitat in Peruvia.
9. P. OCYMOIDES II. D. Kih. I. c. 328. f - Bib. I. c. — Glabra v. vix pubescent: foil, peliolalis ovaiis crenalis, basi rotund a lo - truncalis, floralib. conformib. gradatim minorib.; racemis elongalis; corollis calyce pubescenle quadruplo quinluplove longionbus. 5 — Caules basi subrecti ramosi, rami clongali dharicati, acute (elragoni v. subalali glabri v. apice el ad nodos loiter pubescenles. Folia 's-l'A-pollicaria, in forma typica aculiora el supra sublusque ad nenos hi>pi—dula, in *xar.fi.* glabra, in ulraque varielale utrinque viridia. Racemi sub>implices lerminalis 'A-1-pcdales. Verlicillaslri omnes disiantes. Folto noralia inferiors caulinii conformia el Oores superanlia, suprema parva. Bracleae parvae Jincan-subulalae, interdom nullae. Calyx nutans, bravller pedicellatus. Corolla coccinea, 7-8 lib. longa recunro-adscendens, extus villotlulma. — Oeacii in Peruvia, in locia sleds prope Alausl Qaitenslum, prope Obrajlllo el ad Cueau de Porrocbuca.
3. P. PRUTICOSA Schiede ei Deppe In Linnaea V. 10ft. — Blh. I. c 4H - Eanl lereiiuscnli, Juniores cum petiolis el nenrls folioram la Inferlori pagina tenaissime • adpresse pubescentes. Folia ovata ellipiicave acuminaU, grosse inaequaliler serrata subintegerrimaque membranacea glabretcenlia discolora, pilis subtus el in margine sparsis, lamina in aliis speciminibus 4-pollicari, in aliis pollicori, peliolo tertiam circiler laminae partem longus. Racemi pauci-(3-0-)flori oppositiflori pcdunculati, lerminalis axillaretque oppositi. Pedunculus proprius ic^quilinularis. Calyx Rlabriusculus, 2 lin. circiler longus. Corolla speclosa coccinea, longe tubulosa, 15 circiler lin. longa, ?alde arcaala, limbo valde obliquo. Genital I a consplcua, doraalls Inrerioiis lubl pars exlus tenuistime pubescens. Fructus non visas. — In Mexico, in dumeiis Jalapae el 8erre Colorado.
4. P. TOMBNTOSA Bib. I. c - Pell, ovatlt, supra puboaeentib^ sublos albo-io-meniosis; corollis calyce vlllose-laaato subuiple lonfiorlbua. 6.— Babtuis *P. ocymoidit*, sed ramla folloram pagina Infarter* tjelyellMaqne ttititt tfaoso al-bido vestitis diversa. Floret ptr m mlnoree. GMlle batl 4<re*,*>ji llraetna? — Habitat in Mexico.
- t *Specie* omnifao dubia.*
- y P. DUBIA Spr. 8ysl. vegetal. II. 104. - Foil, ovato-oblongis acutis terralis; calyciboi fruciibusque pubescenlibas. 6 — Crescil in Brasilia.

Tribus VII. *PROSTANTHEREAE* Bth. Labiat. gener. et spec. 447. — Endl. Gener. plant, pag. 621. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. pag. 28G.

Calyx campaulalus, nunc bilabiatus, labiis planis integris v. inferiore bidentato bigdovc, mine aequaliter 5-dentatus, faux intus nuda. Corolla tubo brevi amplo, fauce campanalata, limbo bilabiato, labiis subplanis, superiore emarginato v. bigdo, inferiore triGdo. Stamina 4 didynama, corolla breviora, inferioribus nunc longioribus, nunc abortivis. Acbaenia coriacea reliculalo-nigosa, stylo subpersistente.

3028. *CHILODIA* R. Br.

(R. Br. Prodr. fl. Nov. folland. 507. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 286. II. 104. — Bib. Labiat. gener. et spec. 447.)

1. CII. SCUTELLARIOIDES R. Br. I. c. - Bth. I. c. | - Frutex ramis, glabris v. leniiter pubescenlibus. Folia perennantia sessilia, vix semipollicaria linearia v. sublaBceolata acula inlegerrima, margine subrevolula, ulrinque viridia glabra lacvia v. juniora subtus leniissime pubescenlia, floralia conformia florcs superiorin4ia. Pedicelli axillares uniflori, sub calyce bibracteali, bracleis parvis subulaliis. Calyx \iridis glaber, basi srialus, labiis membranaceis patenlibus vix venosis, inferiore margine leniissime cilialo. Corolla calycem breviiier excedens coerulea glabra. — *Proslantkera empetrifob'a* Sieb. Fl. Nov. Holl. exs. no. 187. — In Nova Hollandia ad portum Jackson, ibidem rarior propo fluvium Nepean.

3020. *CBYPIIIA* it. Dr.

(R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 909. — Veito. Geogr. plant, vascul. I. 280. II. 104. - Bib. Labial, gener. et spec. 448.)

1. CR. SERPTILLIFOLIA R. Br. I. c — Bib. I. e. — Foil, oblongo-linearib. plaoini-rulis calycibq. glabris, fructiferis pedoncalo fix longiorib.; ramulis glabriusculis, pube leniissima appressa vestitis. 6 — In Nova Hollandia ad bram meridionalcm.
2. CR. MICROPHYLLA R. Br. I. c. - Blh. I. c. — Foil, ovalib. convexis minutissimis fasciculalis calycibq. puboscentib., fructiferis pedunculo aliquolies longiorib.; ramulis pube palenii-curvala vestitis. 6 — Praecedenti nimis affinis et forsan rjus vaneias. — Habitat in Nova Hollandia ad oram roeridionalem.

3030. *PRO*TA\TIERI* Labill.

Labill. Fl. Nov. noil. II. 1* - Meisn. Gener. plant. va*cul. I. 2*0. II. 104. - Bib. Labiat. gener. et spec. 448.)

1. PR. IASANTHOS Labill. Fl. Nov. Holl. II. 18.1.157. - Blh. I. c. 450. t - Aodrwl. Hot. Rrpon. t. 641. - Bot. Begist X. 141 - Bot. Magai. t. 24M. - Frulicosa: foil, ohlongo-lanceolatis denlalo-serralis glabris; raremis paniculatis; corollit olring. hirsuiis; anihararum calcari longiore loculum. superanie, breviorc loculo aequilonffo adnalo. t) — Frulei orgyalis, rami glabriusruli. Folia prrenoantia, breviiier peliolala 2-3-polliraria, irregularitrr acule denliculala, ulrinque viridifl, floralia ramorom paoculae subconformia minnra, sub floribu;* minuta subnulla. Raccini breves, in paniculam oblongam 4-0-pollicarem approim.iti. Florcfl oppo>iUt hrrrtiter pedunculati. Bracleae in apice pdunculi nubulatac, ralyci adpressae e euro subapquanles. Cal)x leniier pubescens, fruciifrr aperius, labia subaequa* lia. Corolla ampla, exlus denvr >illo<a. Antherae omnes conformes, loculi paralleli, exterior submollicus, inferior lilamrnto lorulum aequanlc calcaratus. — 1° AuHiralia ad pnrntum Jackson ri in terra Van Dirmciifti habitat.
2. PR. COKRI'LKA R. Br. Prodr. 0. !Nov. Hull. 5(H. - Blh. I. c. - Frulicosa: roll, lanceolalu dentato-nerralis glabrit; raremi< tubpanirulalii^ parum di\i>is; corolli*xtui imberbib.; anihararum calcari. subaequalib. adnaiif loculum vix soperan- UbiM. 5 - Habitus *Pr. lasianlki*. Fola pkrumque angusliora. Racem* infrria- r^t •xilUrts folio plerunque brenores tupriorci in panicula brevi laxa dispo>lll>

- Calyces breviter pedicellati. Corolla glabra, magnitudine fere $\frac{1}{2}$ latianihi. — In Nova Hollandia ad portum Jackson, in umbrosis ad flumen Wollondelly.
3. PR. INCISA R. Br. I. c. — Bth. I. c. f — Ramulis glabriusculis; foil, ovato-oblongis, basi angustalis dentalis incisive glabris, utrinque glandulosis; racemis paucifloris; calycis labio inferiore quam superius angustiore et duplo longiore, calcaribus aequalibus adnatis, loculo brevioribus. 5 — Ramuli tenues virides, saepe alii angustissimi marginales. Folia $\frac{1}{2}$ -pollicaria, sublus pallida, floralia infima parva subconformia, suprema nulla v. decidua. Verticillastri 3-6, ad apices ramulorum biflori. Pedicelli filiformes. Dracae lenuissimae. Calycis labium inferius breve orbiculatum, superius oblongum obtusum. Corolla calyce duplo longior, fere glabra. Racemi graciliores quam in *Pr. Sieberi*. — Habitat in Nova Hollandia ad portum Jackson.
4. PR. SIEDERI Bih. I. c. 451. f - Ramulis glabriusculis; foil, ovalo-oblongis incisodentalibus, basi longe angustalis glabris; racemis laxis paucifloris; calycis labiis aequalibus; antherarum calcaribus aequalibus adnatis, loculo brevioribus. 5 — Fructus sexpedalis. Ramuli elongati rigiduli tenues virides, saepius alii 4 angustissimi marginales. Folia palentia, longe petiolata, limbo fere pollicaria, ulrinque glandulis subsexsertis induta, sublus pallidiora, floralia minora, suprema minuta. Verticillastri 3-4, ad apicem ramulorum biflori. Pedicelli aliformes. Bractae lenuissimae laxae. Calyces glabri, basi attenuati vix seriali, labiis orbicularibus membranaceis, inferiore vix angustiore, nee longiore. Corolla aperta non visa. Valde affinis *Pr. incitae*, sed calycebus diversa. — *Pr. incua* Sieb. Fl. Nov. Holl. exs. no. 180. (non Br.) — Habitat in Nova Hollandia, in umbrosis ad latus montis Illawarra et alibi secus oram a portu Jackson versus meridiem.
5. PR. PRUMELLOIDES R. Br. I. c. 506. - Bih. I. c. f - Foil, crassis ovalis integris v. grosse dentalibus glabris, floralibus bractaeformibus deciduis; racemis terminalibus subpaniculatis; corollis extus hirsutis; antherarum calcaribus longiore locutura bis superantibus. 6 — Rami virides tetragoni glandulosi, angulis hinc inde denticulatis. Folia petiolata pollicaria et ultra, oblusa v. acutiuscula, basi rotundata v. cordata, ulrinque praesertim juniora densissime glandulis obsessa, corolla parva membranacea oblusa ciliata, ante anthesin saepe decidua. Racemi ramii utrinque 1-2 aut 3-4-pollicares. Florea opposita, fere IV. latianihi. Pedicelli erecti, tubam calycis aequantes. Calyces demum nudi glandulosi, basi profunde siriati, labiis membranaceis, superioribus turgidis, inferioribus brevioribus, saepe retuso v. emarginato. Corolla calyce duplo longior, exclusivum. — Habitat in Nova Hollandia ad portum Jackson, frequens in collibus totius ad Duvium.
6. PR. OVALIFOLIA R. Br. I. c. 509. — Bib. L e t — Ramulis lenuiter pubescentibus; foil, ovalibus glabris integris passimque paucirenalis; racemis abbreviatis terminalibus axillaribusque; calycibus glabris glandulosis; antherarum calcaribus aequalibus. loculo aequilongis adnatis. 2. — Rami tetragoni pubescentes. Folia breviter petiolata, 4-6 lin. longa oblongissima, basi subangustula crassiuscula subconformia, floralia plerumque conformia minora. Racemuli vix pollicem longi subramoti, dense pauciflori. Pedunculi breves. Pedicelli calyce breviores. Bractae minutae, calyci adpressae. Calyces basi profunde siriati, labiis vix membranaceis crassiusculis nervosis latis, inferiore sublongiore. — Habitat in Nova Hollandia ad oram orientalem in aequalibus et in interiore boreali-occidentali.
7. PR. ATRIPLICIFOLIA A. Cunningh. mss. ex Bib. I. c. f - Ramulis lomentosis, foil, ovalo-oblongis inaequalibus glabris; racemis laxis terminalibus; calycibus glabris; antherarum calcaribus aequalibus, loculo aequilongis adnatis. 6 - Fructus densus odoratissimus, rami vix tetragoni cano-tomentosi. Folia breviter petiolata 4-6 lin. longa, angustiora quam in *Pr. ovalifolia*, crassiuscula, has, antherarum obscure inaequalia, floralia parva bractaeformia. infima rami subconformia. Racemi 1-2-pollicares graciliores pauciflori. Pedunculi calyce MI breviores. Calyces glandulosi, labiis hirsutis latis, inferiore parum longiore. Corolla inaequalis. *Pr. ovalifolia* affinis, aequalis in Nova Hollandia interiore, in collibus andis Merilbin ad Humum Larblan

8. PR. COTINFOLIA A. Cunningh. mss. ex Bth. I. c. 452. t - Ramis tomenlosis; foil, orbicularis crassiusculis glabris iniegerrimis, apicc retusis emarginaUste; racemis elongalis; calycis labiis iotegerritnis. 6 — *Pr. rotundifoliae* valde affinis, a qua differt ram is magis lomeotosis, foliis (in speciminibus suppelenlibus) nunquam creotalis, basi polios rotuodatis quam cunealis el apice saepe profunde emarginalis, racemis termioalibos 2-3-pollicaribus el flohbus dislanlibus. Calycis labium inferius superiore dimidio angaslius el parum longius. Corollae . . . f — HabiLai in Nova Hollandia interiore, io sterilibos rupesiribus occidentalibus vallis Wellingloo.
0. PR. RETUSA R. Br. I. c. 500. - Bib. I. c. — Foil, orbicularis crenalis glabris, ulriog. glandulosis; florib. axillarib.; calycis labio inferiore relaso; calcari Iobum vix superanie. 5 — An revert a JV\ *rotundifolia* dislincla? — llabilal io terra Van Diemensi.
- ia PR. ROTUNDIFOLIA R. Br. I. c? - Bib. I. c. f - Ramulis lomeolosia; foil, orbfealatif spaibulalisve crassiusculis glabris iolegris creotalisve; florib. subracemosis; calycis glabri labiis iniegerrimis; anlberarum calcari. aequalib. loculo breviorib. adnatis. 5 — Folia vix 3-4-1 i ntaria, apice oblosissima pauci-crenata, basi cuneala el in peliolum brevem anguslala subaveoia v. aobios 1-nervia. Racemi breves terminates sobsecundi sinplices v. composili. Calyces pedicellali declinali, basi striati glabri, labio superiore laliore, inferiore vix longiore inlegerrimo. Corolla ampla, calyce plos duplo longtor, exlus glabriuscula, lobis labii inferiorif maximis. Sumioa vix e faace exseita. Calcaria omnino adoala el vix obvia. — Crescil in terra Van Diemensi.
- II. PR. NIVEA A. Cuning, mss. ex Bib. I. c f - Glaberrima: foil, linearib. iniegerrtiAia, marftne rtvolalis laevib.; raeats laxis lerminalib.; calycib. glabris, labio soporiore Mitaa, iflorUr* diaaidlo brevlor* elllalo; aniberarom calcari aJlero loealam kit sapcraaUe, âlls** tomlo brevi*r< adoalo. 6 — Fralex elegans iripedalls, rami vlrfaU rassjotiaslml raMllqae glaberriml laeves uretos v. sab axillis compressi. Folia acteilla %-1-pollicaria erassiasoula, marginibus revolalis subierçelia, floralia subeofoonaia. Racemi numerosi pauciflori. Verlicillastri axillares biflori disiaoles sobsecoodi. Pedicelli teoues. Bracleae minoiissimae suboullae. Calycis lubus lineam longus, profunde slrialus, labium * superius 3 lio. diamelro, orbicolalum membraoaceum reticulato-venosum, margine nuduro, inferius adpressum calycem claudens, vix sesquilineam lalum. Corolla nivea calyce doplo longior, exlus pubesceos. — llabilal io Novae lloilandlae it* leriohs moolibus saxosis slerilibas.
- II PR. BAXTERI A. Cunnioqb. mst. ex Bib. L e t — Ramis albo-ioroenIOiii; full, linearib. iolegerrimis, margine revolulis laevib. glabris; florib. *ubaxJllaiib^ calycis sericeo-tomenlofti labio saperiore maxian, inferiore brevior* 6 'w' Ramuli oumerosi ligoosi rigid! lerelrs, uli calyces pills albis sericeis •dJ^Jf^ obicci. Folia senipollicaria sabpaoculaU enervia, margine revolau m*!* **~ Ian, basi alternaaia. Floret ad aiillas foliorum floralium caulioii coDiomiia^m brevncr pedunculaii, ranis ftoriferis apice foliosis. Calyx forma *Pr-niceae*, at labU eraaaiaora, venis'sob loneolo reooditis. Corolla non visa. — llabilal in Nova Hollaodia ad Kiog Georges Sound.
13. PR. LINEARIS R. Br. I. c. MQ. - Bib. I. c. 433. f - Glaberrima: foil. ^{n1*} inlegerrimis glabria laevib., margite sobrecorvis; racemis terroioailb.; calyd ⁶ glabris lenuissime cilialis; anlberarum calcari loogiore loealam bis ⁶ - Frelti elaittt gUberrimot, rami virgaii letragool. Folia sabpollicaria ^{subse-} silla obtasa aainervia, toblus pallida, floralia breviora, suprema minuU. ^{Verti-} cillasrl biflori rtSAoll, in rac<ais laxis iernnalibus disposiil. Bractee ^{lineares} bretes. Calyces brevitor pedoocoUtf, basi slriaU glabri, labiis ovalia ^{Co-} laceis subaequalibas bracteiwjae aaeptos lenoiler cilialis, ioitrdum ^{n1^} roUa calyce paullo loigior, ntaa pobeaeos, faace inlus pilots. Styll >><< ^{Jacu-} "ttatfaU, stigmaia eraaaioacala. - Habiui ID Nova Uollaodia ad pftftani •on, !• mptairiboa ad Spriogwood el alibi.

14. PR. DENTICULATA R. Br. I. c. — Bib. L e t — Ramulig tenoiter pnbescenti-
scabrU; foil, linearib. integris glabris, fablas glandulosis, supra Juxla margloem
recurvum tuberculoso-denticularis; calycib. ciliaris pilosulis; antherarqm cal-
cari longlore loculum subsuperanie. fc — Fnilex babilu fere *Wettringiae*. Kami
subleretes, pubescencia tenui viscosa? induli. Folia seisilia rigida acuta lucida,
pilis brevibus paucis rigidis e luberculo ortis hinc inde in pagina saperiore quasi
denliculata, floralia brevioro, basi membranaceo-dilalata. Flores breviter pedi-
cellati, in racerais laxis secundis terminalibus disposiui. Calycis labia inleger-
rima, inferior! minori. Corolla calyce vix duplo longior. — Dabital in Nova
Hollandia ad portum Jackson, in monlibus prope Balhursl Tersus occidentem.
15. PR. CRYPTANDROIDES A. Cunningb. mss. ex Bib. L e t — Glabra: foil. Ian-
ceolalls v. linearib. oblusis integerrimis T. denlicularis, ad axillas fascicularis,
floralib. conformib.; florib. paucis axillarib.; calycis glabri labio superiore tri-
denlalo; antherarum calcari longiore, loculum bis superante. 5 — Frulex bumilis
glandulosus subviscosus glaber v. pilis brevissimis raris conspersus. Folia m
2-3-linearia, plerumque inlegerrima T. in ramis, praeserlim sterilibus, ulrinque
denliculis 2-3 brevissimis oblusis nolala. Flores secus ramos axillares subscisi-
les, axillae superiorea steriles. Bractaeae foliaceae, calycem subaequantes.
Calycis alriaii labium superius recurvo-palens obluae iridenulum, denie medio
laieralibus majore, labium inferius integerrimum, superiore aogutliua inflexum.
Corolla calyce plus duplo longior. — Hablut in Nova Hollaodla, In ropibnt ad
fluvium Hunler.
16. PR. ASPALATHOIDES A. Cunningh. mil. ex Bib. L e t — Ramli pobescentib.;
foil, parvis linearib. integerrimis, margine revolulis glabriusculis fascicularis, flo-
ralib. conformib.; florib. paucis axillarib.; calycis glabri subsessilis labiis sub-
aequalib. inlegerrimis. \$ — Fruliculus humilis decumbens, ramuli pilis brevibus
gluinosus pubescens. Folia 1-2 lin. longa, ad axillas confcrU sublerelia, Ju-
niora pilis brevissimis raris conspersa. Calyces 3-4 lin. longi subsessils, basi
subbracteis, labiis membranaceis subcoloratis. Corolla coccinea, exlm fere glabra,
calyce plus duplo longior. — Habitat in Nova Hollandia inliore, in collibus arli-
dis sterilibus ad fluvium Lachlan.
17. PR. CALEYI Bib. 1. c. 494. — Ramis pnbescentib.; foil, parvis ovato-ellipticis
obtusis, margine fetotnili, ad axillas fatcicoUUs, vix pnbescentib., floralib. con-
formib.; florib. pauca axillarib.; calycis pubescentia labiis subaequalib. Integerrim-
is; antherarum calcari longlore loculum superante. \$ — Aflnlt Pr. «jpe-
lthoidi, sed characteribus dails dlatneu. Folia 1-3-linearia, eottTexa. Pedunculo
calyce longior. Corolla calycem vli excedas. — Habitat In Nova Hollandia.
18. PR. MICROPHYLLA A. Cunningh. mat. ex Bth. L e t — Ramit glabriusculis;
foil, parvis crassis oblongis oblusis integerrimis patenti-recurvis glabris, floralib!
conformib.; florib. paucis axillarib.; calycis pubescentia labiis subaequalib. Inte-
gerrimis; antherarum calcari longiore loculum vix superante. £ — Fru-
ticulus bumilis ramosissimus, ramuli abbreviati. Folia numerota vix lineam longa
eraiaa subavenia, floralia et bractaeae conformia. Calyces 2Vi-3-lineares, pubes-
centia brevi adpressa canescentes, basi vix striati. Corolla coccinea? calyce
duplo longior, exins pubescens. Antherae polios mucronatae quam calcaratae
videntur (calcaribus nempe loculo omnino adnatis, apice non penicillatis). — In
Nova Hollandia Interiore in deserto prope fluvium Lachlan habitat
10. PR. SAXICOLA R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 509?*) - Bth. L e t - Foil, lineari
oblongis integerrimis crassis, juniorib. pilosulis, floralib. conformib. flores supe-
rantib.; florib. axillarib.; calycib. apice birsutii; antherarum calcari longiore lo-
culum bis superante. & - Frutex gracilii, rami virgati ut folia pilis brevissimis
adpressis oculo nudo vix conspicuis conspersi. Folia sessilia J-6-linearia obtusa

*) *Follianea* H'oblonis, otalibq. inlegerrimis pilosulis; raeemo foliato
v ealyetb. tonulu, lahu inlegerrimu subaequalib.; calcari toblm b's paucifloro:
eauce difiuo, bast tufruticoto. * TM*mm wi# superante.

crassa subavenia, floralia canlinis aequilonga. Flores secus apices ramorum axillarcs, vix racemum formanles. Pedicelli breves tenucs. Bracleae Hneares adpressae. Calyx junior apice dense hirsulus, demum glabralus. Corolla calyce duplo longior, extus pubescens. — Habitat in Nova Hollandia, in rupibus prope Batbursi ad occidentem montium Coeruleorum el prope portum Jackson.

20. PR. MARIFOLIA R. Br. I. c. - Bib. I. c. f — Ramis birsutis; Toll, ovato- v. elliptico-lanceolalis inlcgerrimis, margine revolutis, ulrinq. hispidis; florib. axillarib. subracemosis; calycib. hirsulis, labiis subaequalib., infriore reluso; antherarum calcarib. loculum paullo superante. 6? 2f? — Rami virgali parum ramosi, l-l'/i-pedales. Folia distanlia subsessilia 2-4 lin. longa, pilis albidis rigidis oti calyces el ramorum pars superior bispida, Ooralia calyces subaequantia. Flores versus apices ramorum pauci. Calyces apice coerulescentes. Corollae calyce parum longiores. —# Habitat in Nova Hollandia ad portum Jackson el in montibus Coeruleis.
21. PR. THYMIFOLIA A. Cunningh. mss. ex Bib. I. c. 455. | - Ramulis lenuissime pubescentib.; foil, ovalo-subrotundis pauci-crenalis, margine recurvis glabris; florib. breviter racemosis; calycis subglabri labiis iolegerrimis; antherarum calcarib. aequalib. loculo breviorib. adnatis. 6? — Rami divaricali vix lelragoni, juniores pubescentia brevissima glaodulosa tenui caoescentes, laxe foliosi. Folia broiler petiolata, vix 1-2-linearia, glabra v. infra ad nervum pilis paucis brevibus ciliata, floralia minuta decidua. Flores ad apices ramulorum 4-8, in racemum brevissimum approximati. Pedicelli breves. Calyx *Pr. violaceae*, sed glaber v. pilis brevissimis paucis ad strias ciliatus. Corolla alba glabra, calycem breviter superans. Affinis *Pr. violactae* *rBt.fi.* el forsan ejus varietas, sed giabriiie, foliis miooribus et floribus albi* distincu videtur. — IV. *relusa* Sieb. Flor. No\ Holl. exs. (aon H. Br.) — UablUI In Nova HoUandla ad Sprlogwood prope portum Jackson.
22. PR. VIOLACEA R. Br. Prodr. flor. Nov. Holl. 509. - Bot. Registr. 1.1072. - Bib. I. c. f — Foil, subrotundis crenalis, margine revolutis, ulrinq. ramisq. pubescentihirtis; racemis paucifloris densis; calycib. pabescenti-birlis, labiis integerrimis, inferiore duplo 4ongiore angusliore integerrimo; antherarum calcarib. aequalib. loculo subbrevioribus. 5 — Rami divaricati lelragoni, uli calyces el foliorum P< gina inferior pilis rigidis glandulisqut* inlcrcmiilis vestiti. Folia 3-4-1 inea ha, supra <ubbullata et luberculato-rugosa, pilis e tuberculis ortis, sublu* pallidiora nev* u)v.i, floralia parva, suprema minuta. Verlicillasri 3-4, ad apices ramulorum in racemos breves approximati. Pedicelli breves. Bracleae minuiac adpressae. Ca< l)i fructifer vix 2 lin. longus, labio ioflore incurvo-concavo ad.occndenie, oa- l)ccm subrlaodenle et ideo, eui superiori longius, vix eum excedit. Corolla <•* l>re »ubduplo longlor, lobo medio lato rotundalo vix emarginato. Var. *fi*> Inl*** mrdia mter bane et praecedentem.
- i. glabrior*: foliis minoribus. - Uabiut in Nova Hollandia ad portum Jack***
*, in siccis ad Sprigwood prope portum Jackson ad ascensom monliomCoeruleorum et in ipsis monUbus Coeruleis.
23. PR. INCANA A. Cunningb. mss. et Bib. I. c. - Foil, ovalis oblusls crenatus bullato-njonis, alrinq. ramulisq. villosobispidn; racemis brevissimis ^{de o>1*} antherarum calcarib. aequalib. loculo breviorib. adnatis. 6 — Frulex 5-6^pW* ^{de o>1*} divaricatio-ramoftos, rami Jooiores oti folia et calyces pilis albis patentibna >•* bwcolo oriii deosisaiae villosi. Folia semipollicaria, brrvissime peliolaU ^{de o>1*} cocoloria, supra bullaU, margine reflia et nervis subtut wide prominenu. ^{de o>1*} Glaodulae paginae inferiont exsertae subpedicellariae. Folia Ooralia minora, m ^{de o>1*} lerdum sobcolorau. Floret pauci, in racemos irriminales sobcapiuios •PP ^{de o>1*} maii. Bractee subolaUo adpretsae. Calyces sobsesstles, labio inferior* vUM ^{de o>1*} dactiore. Corolla purpurea calycem breviter superans, exlus ^ix P ^{de o>1*} Habui in Movae Hollandiae monlibus Coeruleis, in rupibus ad juncUontv ^{de o>1*} tlomsn Nenean et Wamgumba.

24. PR. RUGOSA A. Conniogh. mss. ex Bth. 1. c. 456. t — Foil, ovato-rolundalis crenalis bullato-rogoſis, ulriog. ramisq. villoſo—hiſpidis; florib. paucis axillarib.; calycis biſpidi labio ſuperiore ſublridentato, Inferiore eraarginato; aniherram calcarib. loculo brevloribus. 2l. — Habitus et folia fere *Pr. ciolaceae*, ſed inflo-reſcentia el calyce diſlincliſſima. Corollae magnitudine corollarum *Pr. violaceae*, exluſ glabriuſculae. Calycis labium ſuperius breve lalum, denlibus (v. crenis) brevbis latis obluſis, labium inferius longius anguſtius. — Habitat in Nova Hol-landia, in monloſis pracruiſ ad fluvium Hunter.
25. PR. RIIMBEA R. Br. Prodr. II. Nov. Holl. 500. - Blh. 1. c. - Foil, rhorabeo-orbiculatis inlegerrimis, adullis ſupra nilidis, ſubtuſ gianduloſis; ramulis caly-cibq. pubeſcentib.; florib. axillarib.; antberarum calcarib. loculo brevioribus. 5 — Rami divnricaii vix lelragoni parce ptioſi. Folia ſubſeſſilia, ſupra bullalo-convexa, ſubiuſ uninervia, 2-4 lin. longa, floralia conformia. Flores aiillarcs oppoſiti. Calces breviler pedunculaii hiſpidi, labiis inlegerrimis abbreviate, ſuperiore laiore. Corolla vix calyccm exceden*. — Habitat in Nova Hollandia ad porium Jackson.

t *Species e genere excludendae.*

PR. EMPETRIFOLIA Sieb. — CHILODIA SCCJTBLARIOIDBS.

PR. LINEARIS Sieb. — WESTRINGIA LONGIFOLIA.

3031. HEMIANDRA B. Br.

(R. Br. Prodr. fl. Nor. Holl. 502. — Meisn. Gener. plant vascular. I. 288. II. 104. — Blh. Labial, gener. ei ſpec. 450.)

1. II. PUNGENS R. Br. I. e. — Bib. I. c. t — Snffrulex decumbens rigidus, denſe folioſus, rami duri glabri v. baſi pubeſcentes. Folia ſeſſilia oppoſita lanceolaia aculiſſima pungenlia inlegerrima glabra rigida, ſubiuſ 1-3-nervia, floralia con-formia caljces ſupcranlia. Flores in axillis ſolitarii. Pedunculi calyce brevjnes, .apice bracias 2 lanceolatas calyccm ſubaequanes ferenles. Calyces glabri, iabns ſubaequalibus, ſuperiore mucronalo-pungenle, inferioris lotuſ aculi». Corolla calyce duplo longior, extuſ glabra alba purpurco-lincla v. punrtaia. Odor plan-Ue ſicca nulluſ, nee ut in *ProilatUheri** aromaUcuſ. — Habitat In Novae Hol-landlae ora meridijiaU el Io oolibuſ prope Swan rifer. ^
2. H. EUARGINATA Lindl. Bot Reg. (New 8<r.) XIV. Pl. affc. ft. 72. no. IM. - Caole erecto; ramſ patalia patenUm pabeſeMtil.); foil. ligeAri^/bloDfU compilerſ pungentib. trinerviis, ſeeuſ nervot marglnemq. plló»ls; calyWb. ••bfttitlllb. v||-loſiſ, laciniis ſubacqualib. pungenllb.; eorolUe laelnlli ſoperiorib. rotundatiſ fmarginaiiſ. q. - Corolla albida carneo-punetulau. A *B. bimifoli** differ! ſeg-mentis caljcinis aequalibus el a *H. hirsuia* foliorum forma laciniisq. calycinm pungenlibuſ. — Creſcil in Nova Hollandia.
3. 0. RUPESTRIS HUGel mss. ex Blh. Equm. plant Httgel. 285. - Archiv drr K. K. Oeſlerr. Garienbergſſſcbft. I. 2. t *• *• — Caule erecto pateotim piloſo; foil, lato lanceolatiſ complicaliſ incuniſ, ſubtuſ ſub-5-nerviis laxe piloaliſ; calycib. Mib-ſeſſiib., baſi piloiſ, laciniis longe acuminatiſ eubaequilongſ pungenlibuſ. :j. — Creſcſt in Nova Hollandia.
4. H. BREVIFOLIA Blh. I. c. 280. — Caule proſtrato pubeſcente; foil, lanceolatiſ v. linearlb. complicaliſ, ſubtuſ 3-5-nerviis pubeſcentib.; calycib. hiſpidU, laciniis broiler acuminaliſ pungenlib., ſuperiore dimidio longiore. ^ - In No\ a lloſlamlia.
5. II. HIRSLTA Blh. I. c. '280. - Caule proſtrato (?) hiruſo; foil, oblongo-linrarib., baſi longe angtiſlatiſ plantſ v. vix complicaliſ, ſubiuſ 3-neniis hiipidiſ; rnhnb! hiſpidiſ, fruciiferiſ ampliſ, labiis laliſ brevb. aequilongſ acutiſ ſubmiiiriſ; co-rollo pubeſcentlc. 2l. — Creſcil in Nova Hollandia.
0. H. LINEARIS Blh. I. e. 288. - Glaberrima: caule proſtrato; foil, lineanh , haſi longe anguiatiſ complicatiſ, ſubtuſ 1-3-nerviis; calyciſ ampliſ laciniis latit ionte acuminalii ſubaequilongſ pungentib., pedicelliſ calyce parom hrtvtnrftut. ^ - Crfſeit in Nova Hollandia.

7. II. GLABRA Bib. l.*c. 287. — Tota glaberrima: caule prostrato; foil. Unceolalis v. linearib. complicalis, subtas 3-5-nerviis; calycis laciniis breviter acuminatis pungeolib., superiore dimidio longiore; pedicellis calyce vix brevioribus. 2} — Crescit in Nova Hollandia.

3G32. HEMIGEKIA Jt. Br.

(R. Br. Prodr. flor. Nov. Holland. 502. — Meisn. Gener. plant vascul. I. 286. II. 194. — Bib. Labial, gener. el spec. 457.)

1. II. PURPUREA R. Br. I. c. — Bib. I. c. j - Foil, (ernis; corollis calyce brevioribus. 5 — Fruticulus gracilis, rami virgati foliosi glabri. Folia sessilia semipollicaria el longiora linearia acula tubierelia glabra, floralia conformia. Flores pauci axillares pedunculati, folio breviores. Bractee lineares, ca)ce breviores. Calyx glaber, lacioiis aogatlit aculls. Corolla coeruleo-purpurea, exlus glabriuscula, labio inferiore sopra villosblo. — Jn Nova Hollands ad portum Jackson.
8. H. SIEBERI Bñ. L c. — Foil, quaternis; corollis calyces superaniibus. 6 — Frutex rigidior el major quam *U. purpurea*. Folia crassiora laliora obtusiora, saepius mucronnlata. Calyces majores, elsi corolla breviores, laciniis lanceolaiis. Corollae labium inferius dense villosum. — *U. purpurea* Sieb. Flor. Nov. Holl. oxs. no. 101. — Habitat in Nova Hollandia ad portum Jackson.
3. II. SERICEA Bib. in HUGel, Enum. planl. nov. 800. — Foil, opposilis v. paribus .approxiroalis subqu:neniis, juniorib. ramisq. sericeo-villosis; Oorib. sessilib.; corollis calyces superaniibus. % — Crescil in Nova Uollandia.
4. II? LONGIFOLIA Bib. I. c. 291. - Glabriuscula: foil, opposilis clongalo-linearib., margine revolulis, subtus albidis; pedicellis calyce longiorib., medio bibracieolaii*. ^? — Creacit in Nova Hollandia.

303%. ATEMMDWUK Lindl.

(Lindl. Swan rlv. hot p. XI. — Mtlsn. Gener. planu vascul. II. 380. — Bndl. Gener. plant Soppl. I p. 1400)

1. A. INCANA Lindl. I. c. no. 189. L5. fig. a. — Foil, oblongis incanis sericeis; florib. axillarib. Mliariis. 2(?) — In Nova Hollandia ad Jbe Swan river Colony".
2. A. POLYSTACHYA Lindl. I. c. no. 190. - Foil, oblongo-lanreolalis lomenlofis, subtus venosis; spicis axillarib. imbricalis; filamenlis basi villosis. 4? — Crescit in Nova Hollandia prope .ibe Swan river Colony".

HO:): WESTRISGIA A Br.

(R. Br. Prodr. flor. Nov. Holland. MI. — Meisn. Gener. planl. vascul. I. 9M. H- 1** — Bñ. Labial, gener. el spec. 457.)

- I. W. ROSMARINIFORWS Sin. Tract*. 277. L 3. - Andrws. Bol. Bepoi. t Mi - Bih. I. c. 458. f — Foil, quaiernis lanceolaiis, margine revolulis, supra glabrlo>culis, subius argenleis, Ooralib. calyce subdoplo longiorib.; calycis argeniel dentib. lubo dimidio brevioribus. 5 — Fralex I-2-pedalis el ultra, rani ^i^*r^i^ caii teiragoni, juniorcs pilis adpressis .argenlci. Folia fere pollicarla fatfIH* perennantia rigid* palentia acutiuscula inlegerrima, basi parum anguslala, Juoiora sopra piiit adpreftsic cinerascentia, demum glabrata nilida, subius ull calyces pilis adpressis cinereo-argenira, nervo medio prominente, caelerum aveoit. Flor<« in axilli* >olitarii, oti folia qualernalim veriicillaii, \crlirillaslri pauci ad ^ P | 0 * ramorum appro&imati. Bractee lineari-subulatae, calyce breiores. Calycev subsessilea, dentibus arutiusculis, margine revolulis, maiuratione subinflati* Co~ rollae exlos adpresse villn«ae, inlu* pilis rans barbatae. I imbi labii i0 Pf^i0 ris lobl laiosculi troncaii, inferioris angusliores nubaequales. Stamina f,r^11 Jf^*^Lambda certa, at laciniis corollims breviora. Filamenia pilis paucis villosa. — W. fruiicota Willd. Spec. plant. I. IS. - Habitat in Nova Hollandia, frequent m <oi: libus arenosis maritimis ad portum Jackson, Bolany Bay el versus m e r i ^ ^ ? \
- t. W. DAMPIERI R. Sr. Prodr. fl. No?. Boll. 3D I. - Bib. I. c - Book, it* magas. l. 33m - roll, quattrnli liaeaHb., margino rtvolmla, sopra glabriusculis, subtus

cinereis, floralib. calyce duplo longiorib.; calycis argenlei denlib. lubo dimidio brevioribus. 6 — Vix a *W. rosmariniformi* distinguilur foliis crebrioribus parum angusioribus longioribusque, sublus minus argenleis. An ejus mera varietas? — Habitat in Nova Hollandia ad portum Jackson, in collibus arenosis ad oras King George's Sound.

3. *W. BREVIFOLIA* Bib. I. c. 450. — Foil, qualernis elliptico-lanceolalis, margine revolulis, supra nitidis, subtus argenleis, (loralib. calyce subbreviorib.; calycis argenlei denlib. lubo dimidio brevioribus. 6 — Affinis *W. rosmariniformi*, at diversa foliis mullo minoribus, glabrioribus el floribus minoribus. — Habitat in terra Van Diemensi.
4. *W. RIGIDA* R. Dr. I. c. — Oth. I. c. — Full, ternis lineari-lanceolalis, margine revolulis, adullis supra glabris, sublus calycibq. cinereis, denlib. lubo dimidio brevioribus. ^ — *W. Dampieri* valde affluis, differl foliis ternis nee qualernis brevioribus, saepius breviter mucronalis subpungenlibus el florum verticillastris plerumque minus approximatis. Denies calycini breves subdivaricali. Folia floralia calycibus longiora. Folia internodum mulica. — Habitat in Novae Hollandiae ora meridional!, frequens in rupibus aridis maritimis in aulac Rollnest ad ositum fluminis Cygooram orae meridionalia.
- & *W. CINEREA* R. Br. I. c. - Bib. L e t - Hook. Bot. Magai. t 3107. - Foil, ternis linearilanceolalis divtricatia mucronatis pungenlib., margine revolulis, utrinq. calycibq. cinereis, denlib. calycis brevissimis. 6 — Fruticulus ramosissimus humilis divaricalus. Folia forma foliorum *W. Dampieri*, sed supra, praesertim juniora, tomento leni cinerea, subtus candidiora tomentosa, floralia conformia, calycibus subduplo longiora. Flores sessiles cum foliis lematis verticillati, verticillastri distantes. Bractee minulae adpressae. Corollae labium superius villosum pallide purpurascens, inferius albidum, utrumque purpureopunctatum. — Habitat in Nova Hollandia ad oram meridionalem, ad King George's Sound in ora austro-occidentali el in insulae Dick Insigne ora occidentali.
5. *W. ANGUSTIFOLIA* R. Br. I. c. - Bib. I. c. — Foil, ternis linearibus, palonibus, margine revolulis, adullis supra scabriusculis, sublus calycibq. cinereis, dentibus lubo dimidio brevioribus. 6 — Habitat in terra Van Diemensi.
7. *W. EREMICOLA* A. Cunningham. ex Bib. I. c. — Foil, ternis linearibus, marginibus revolulis, sublus cinereis; calycibus sericeo-pubescentibus (tubo anlongioribus. 6 — Rarior divaricatis foliis. Folia aequifolia quam in caeteris speciebus, vix semipollicaria, margine valde revoluta, floralia calycibus longiora. Folia ad apices ramorum approximate denies calycibus lanceolato-subulatis. Corollae minores quam in sequente. Labellum superiorit vix inferiorit latitiores, labii inferioris lacinia media bifida. — *W. longifolia* Lindl. Bot. Keg. t 1481. — Habitat in Nova Hollandia Interloire, in desertis prope (lumen Lachlan et in rupibus prope Bathurst, ad flumen Macquarie et in vallibus Lushington et Glen Finlass.
8. *W. LONGIFOLIA* R. Br. I. c. 301. - Blh. I. c. 400. f - Full, ternis linearibus, margine recurvula, utrinq. calycibus viridibus; denlib. calycinis longitudine tubi. ^ ^ nam elongatis hexagoni ramosi foliis, angulia asperis. Folia internodiis longiora, plerumque pollicaria, breviter setaceo-acuminauta, margine parum revoluta, supra arabrella, juniora sublus pilosula, floralia conformia calyces longe superantia. Verticillastri 2-3 in apicibus ramorum. Calyx breviter pedicellatus, dentibus lanceolalis acutissimis. Bractee pilosae, calyce dimidio breviores. — *ProHanihera linearis* Sieb. Plant. Nov. Holl. exs. (non R. Br.) - Habitat in Nova Uollandia ad portum Jackson etc., ibidem ad ripas rivulorum.
9. *W. GLAURA* R. Br. I. c. - Bib. I. c. - Foil, ternis linearilanceolalis planis, utrinq. calycibus glabris. <> - Anterior praecedenti, at foliis laevioribus plane primo intuitu distincta. Folia fere pollicaria, apice rotundata mucronata bis, in pedicellum brevem angustula, utrinque uli tola plama glaberrima umbrata, orala

conforraia. Verlicillasri flornm pauci dislanies. Flores subsessilea folio mullo breviores. Denies calycini lubo pa rum breviores. Corolla....? — Habilal in Kova Ilollandia Iropica.

10. W. RIBIAEFOLIA R. Rr. 1. c. - Bib. I. c. f - Foil, qualernis elliplcia pladisculis glaberrimis nitidis; calycib. glabriusculis, denlib. lubo sublongioribus. 6 — A W. *rotmariniformi* differ! glabrilie, denlibus calycinis aculioribus el foliis brevioribus lalioribus, margine vix revolutis. Rami juniores pilis adpressis pubescentes. Verlicillasri 6-8-flori, secui ramos disposili, aiillis superioribus sierilibus. E cl. Brown folia elliplico-lanceolala, lamen potius ovata quam lanceolalaia sunt, an eadem species? — Habilal in lerra Van Diemensi.

3034. MICROCORYA R. Br.

(R. Br. Prodr. 0. Nov. Holl. 50i — Meisn. Gener. plant vascular I. 286. II. 104 — Bib. Labial, gener. el spec. 46a) %

1. M. VIRGATA R. Br. I. c? - Bib. I. c. 461. f — Foil, oblongo-linearib. obtosis calycibq. glabns; bracleis caducis; corollis eitus hirsulis. 6 — Rami elongali >irgati, parum ramo»i glabri, juniores iriangolali, demum subtereies. Folia internodia subaequanlia, circiter 3 lin. longa, saepe ad unum lalus falcaia iniegerrima, basi angusiala crassiuscula avenia v. sublus nninervia, margine subrevoluia, flonha conformia, flores breviler superanlia. Flores in aiillis fohornm floralium soliiarii el cum iis lernalim verlicillali, secus ramos disposili, folia ^suprema saepe slerilia. Bracleae mioutae deciduae. Pedicelli bretitsimi. Calyces (lonTeri lineam, fructiferi seaqailineam longi, obscure 10-13-nervli, deolibuf ovalis obiudiuacolia, iolmo parum longiore. Corollae labiom superius denlibus ealycinis aabbrevina, lobis brevlasiuala laUs acoUotcoois, eilus hirsolis, inferior!* lobi obtongl obtoil paunia aubaeqnalea, labio anperiore iriplo longiores, fere glabrl. Sumina aabinelnaa. Stjlina aiaminlboa brevior glaber, lobis brevissima. Acbaenia ovoldea, apice villoaa. — laMlal in Novae Hollaodiae ora meridionall, in uliginoais ad King George's Sonnd.
2. M. BARBATA R. Br. I. c — Bib. I. C — Foil, linearib. oblusis glabris; calycib. corollisq. eilofhirsulis; bracteis caducis. 6 — Habitus omnino 3l. *virgatae*, a qua differt cal)cibus dense villosis. Rami glaberrimi. Folia rliam glaberrima Ion-giora quam in If. *tirgata*, basi anguslala. — Habilal in No^ae Ilollandiae ora mendionali, ad King George's Sound.
3. M. RPI REA R. Br. I. c. - Bib. I. c. - Foil, ovali-oblongis, margine reenrvilt ulnnq. pube rara brevisslma conspersis, sublus punclalis; ramulis tchceis; calycib. cineraiceniib.; bracleis aelaceis persislentibus. 5 - Habilal in Novae Hoi-laodiae ora nendionali.

3034/.,. PEEOVAKIA *Kanlin.*

(Karelin, Ballet de l'aead. df nalor. d. Mosq. IMI. p. 1A. L I. - Eodl. Gen. ~~plant~~ Soppem. III. p. 77.)

- I. 'P. ABROTAMOIDES Karelin I. c. - > - Creacil In Turcomannia media, !• lonUbnj Balkaneosibot.

Tribus VIII. *NEPETEAE* Bth. Labiat gener. et spec. 462. —
Eadl. Gener. plant, p. 622. — Meisn. Gener. plant, vascular.
I. 286.

Calyx aequialis v. obliquus subbilabiatusve, dentibus superioribus majoribus. Corolla inclusa v. eiserta, fauce plerumque inflata, labio superiore subfornicato, inferiore patente. Stamina 4 didynama, superioribus longioribus, adscendenlia v. divergentia.

3035. *LOPIAXTIHS* Bth.

(Blh. in Lindl. Bol. Resist, adnot. ad lab. 1282. et Labiat. gener. et spec. 402. et 733.
— Meisn. Gener. plant, vascul. I. 286. 11. 194.)

SecUo I. *OUASTAIBRA* Bth. L L e. o.

Verticillasri in spicam terminalem aggregati. Stamina superiores declinala, inferiora adscendenlia. Folia Integra.

1. *L. URTICAEFOLIUS* Bib. 1. 1. c. e. f. - Glaber: Ml. cordalo-ovaUa cr en alii, ulrinq. viridib.; aplca denala oblongls; laelnHi calyeinli IJneari-subalatJs; geoiulib. longa eiaenli · 2]. — Gaolla elalua Mape 3-4-padalia erauns ranoaoa letragonus. Folia pelloiaia, basi laia, aploe obtoaa •. soperlora acntluseula, floralia aaaalla otata acuta, sub ipica eaullals snbconformla, la splea floras aeqoaotla Integerrima, at omnia viridia v. vii metnbranaceo-colorata. Braleaa paocae laneolato-lineares, calyce subbreiores membranaceae ooloratae. Verticillastru multiflori densi, in spica crassa 2-4-pollicarl imbricali. Calyces semipollicares incurvi glabri membranacei, apice coloraii, ore obliquo, denlibus superioribus longioribus. Corolla purpurascens, breviic eiserta. — Habitat in America boreali-occidrniali ad flumina Lewis et Clark frequens.
2. *L. RUGOSIS* Fisch. et Mey. Indi. lemin. bort. PelropoliL 1855. p. 30. - Dili. Labial gener. et spec. 733. f — Subglaber: foil, rugosiscordalo-otalit cauMalo-acnmtnaiia aerrato-daBUila, otrinf. eoncolorib.; spiels denais obloogU; lobis ealielBlt Uno#olaUl>acaUQjeiUis; sUmlnlb. eorotU alylôq. moHo loBgoribns. y. - fluigura *L. urticifolia*, sed folia audalo-aeamlBaUa ai lo & ealyvlBla bravlbyJ aenllascolls nee longiitlme aeqmhuOa. ab fta PbtiaitTdlauBOU, a t~ »ropkuariaefolio follorum rorma, florlbos ma)affibBa 'at alflo eoralla ?ii losglore, ataminibus brevlore differ!. Caula 9-4-padalla atrletaa. Folia *UrHc** dioicae*. , Floras coeralci. Herba odore at sapore JflmOa* pipvrUf slaiUla. — In bort is ' Chlnensium colitur.
3. *L. ANISATUS* Blh. in Lindl. BoU Reglft i. 1282. et Ubiat gener. et spec. 483. t — Glaber: foil, ovatis •. ovato-lancaolatis aculis creoaUs, supra viridib., subius albtqt spicis cyindricis, basi Interrnptls; laciniis calyciois laaceolaiis acotis; ge-BltaHb. eisertis. % — Caulis bi-tripedalis leiragonus ramosus erectos glaber. Folia 1%-2-pollicarla, supra glabra, subtus (tomento oculo nudo inconspicuo) alba, floralia minora, inferiora conformia, superlora calycibos breviora subinlegerrima. Sploa pleramqae 3-polllcarls, ioterdum lamlpadalis densa, verticillastris paucis densissimis subdistinciis. Bractee paocae panrae linear! - laoceolaiaae. Flores dimidio minores quam in *L wrHcaefolio*. Calyt vii 3-lineari*, aplice coloratus, ore tii obliquo. Corolla incurva. Stamina 1. *urticaefolii*. — *Byaopus anisalus* >uu. Gen. pi. N. Amer. II. 27. - *Uyaopui discolor* Desf. Cat. hort. Par. 'fd 3 } 07 . . *Staekyt Foeniculum* Pursh, Fl. Amer. sept. II. 407. - *Hyaoput Foenitulum* Sor. Cenl. pi. min. cogn. 24. - Habitat In America boreall, in dumelis ad flumln. Missouri, Saskalchawan, Columbia el Red River.
4. *L. SCROPHYLARIAEFOLII'S* Blh. I. 1. c. c. - Caule pube.centf; foil 0 <i.. acutis serralo-crenalis, ulrinq. viridib., supra glabris, subius pubMteni.h' fcn,F . . . cjlindricii, ban interruptis; denlib. cal)cims lanceolatis acutis. ^ - Utbuu' 1

anitati, a quo differt foliis latioribus subtus pubescentibus nee albis et floribus parum majoribus. A *L. nepetoide* differt foliis subtus pubescentibus, floribus majonbus el praesertim calycibus apice coloralis acute denlatis. — *iyytopus scrophulariaefolius* Willd. Spec. plant. HL. 48. — *iystoput eatariaefoliut* Hort Par. — Habitat in America septentrionali, in nmbrosis bumidis a Pennsylvania ad Virginiaro rarior, ad West Chester.

5. *L. NEPETOIDES* Bib. I. I. c. c. — Glaber: Toll, ovalis aculiusculis serrato-crenatis, uiring. viridib. glabris Y. subtos vfi pubescentib.; spicis cylindricis, basi Interrupts; dentib. calycinis ovatis obtnsiusculis. — Caulis 2-3-pedalis ereclui ramosus glaber letragonns. Folia r/i-8-pollicaria, basi rolundata Y. subcordata, subius oculo nndo glabra, sub lente pobescentia. Racemus 3-0-pollicaris densus viridis, verticillasri mulliflori, inferioribus disinctis, superioribus subconflueniibus. Bractee paucae o?atae virides. Calyces tubuloso-campanulati vH—dee, citus lotosqoe glabrl, dentibus breribus obtnsis •. ill acntis, superioribus peram majoribas. Corolla ?li denies calycios eicedens, staminibus broiler eisertlt. Stylos saepios corolla brevior, fnierdum vero eisertos. Arhaenia apice tillosa. — *Byuopus nepetoides* Lion. Spec pi. 706. - Jcq. Hort. Vind. I. 88. I-00. - Habitat in America boreal!, In ambrosia a Pennsylvania ad Virginian, ad Mississippi prope Saint Loois, prope West Chester.

Beetle n. *RISUPDUBIA* Bth. Ub Ut genet, el ipee. 464.

Cymae aiillares pedoncolatae laiae pauciflorae. Florea sobresupinali. Stamina inferiora subrecta, snperiora adscendentia.

6. *L. CINNEMESIS* Bib. in Lindl. BoL RegUL adoot ad lab. 1M. el Labial gen. et spec, 464. f — A>ll* ovalia oblongisre erenaUa, floralib. subconfonnib.; cymis aiillarib. pinloneoUUs laile M«0Morte; lorib. sobreanpinaUs. % - Planu sub* tiscoaa. Gaalea 1-I^W-pedalea erectl rasBoaJ, raml lelragoni glabrl v. tenuiter pobeefltea. Folia breviter petlolaU poUiearia`obtoaa, basi rotundala truncaU v. tli cordate, Mrlnqoe vltMla flabra T. vii pobeaoentla, floralla plerameje «ymas aequantia ?. sopraema ailnora. Pedoaeoll sobsecondl, apice rymam onllatealedk 3-A-floram ferenles. Bractee breves aobolatae. Flores lorseion pedicelli et caljci* partfs inferioris plerumque resupinati. Corolla coeruka. — *Ilytoput Lophanthus* Linn. Spec. pi. 706. - Jarq. Hort Vind. II. 85. U 182. - *Uyuapui resupinatui* Moench. — *Nepeta lophantha* Fisch. — Habitat in Sibiria circa Pesav koia prope Xcrtscha, in deserto Kirghisorum et in China srplentrionali.

* 3030. *H'EPETil* Bth.

(Bih. Labial gen. el spec. 464. el 734. - Meisn. Gener. plant taicul. I. 896. II. 104.)

Beetlt L *BOBIIIPBTA* Btfe.Le.46B.

Verticillastri cooferti, sopreml in spicam terminates sublolerruptam *appresi-* mali, cymis omnibus seasilibne. Brarleae variae. Calys tnbulosos rectua f. *scopias* incurvns, ore aequali v. obliquo. Stamina snbeiserla, laie adscendeotia. *olla dis-*serta t. lobaia.

- I. *N. BOTBYOIDES* Ail. Hort Kew. II. 887. - Rib. I. r. - Adscendeos *humilis* ramotlsalma pubescens: foil, petiolalia profunde subbipinnatiOdis, *fe gmentis* obloogo-laaceolatis v. linearib. obtnsis integenimis v. subpinnatifldis, *coralib.* lineari-sobnlatls) spirit cylindricis, basi vii intemplis; raremis slmplleife *spi-* ciformib.; bractela dentibq. calycinis acuiis. Q - lltrba in semiprdaliif* *Folia* saeplos bipinoaUda, superiors simplicieier pnnaliflda, floralia miouia. *Spicaf* deajaa 8-3-po||lcaris. Bradeae minulae. Calyi membranaceus P^{11*6****}, ore *ore* obllqoo. Corolla Bafetcens tillota. Stamina corolla tubrirnnora. - *N. multi-* *fida* Linn. Suppl. 873. - X a i m Pall, in Aft Pelrop. 1770. II. 863. t li *N.* *biptnnata* Cat. |c. rtr. L 36. t 40. - Habitat in Slbina orientall, in refl©o« *Al-* Uica ad Onvios Eotnoja et Tschaja ct in deterto Soonjcoro-KirRbiMCo.

- 1 *N. TKXffOLIA* Bib. L c. - Canle prorombeote glabro t. tenoiMlm« *PT* eesMe; foil, potlolatls piMatlsecUa, stgmentis oblongo-linearib. acnlla adbserrii ..., *ab?* baii asgiauus, atrinq. |labr1«sc«lls, luperiorib. florallbq. iotfgrii; •!»" r« *cll1<*

basi subinerrupta; corollis minutis calyces breviter superantibus. 2]. — A JV. *lavandulacea* differt foliis spicisque gracilibus et floribus minutis. — Habitat in China inier Pekin et Jehol.

3. N. LAVANDULACEA Linn. fil. Suppl. 272. — Bib. I. c f — Adscendens pubescent: foil, peliolatis, basi profunde pinnaliddis, segmentis oblongis ovatisve obtusis floralibus. ovalis acuminatis; spicis cylindricis, basi Interruptis; denlib. calycinis brevissimis ovalis; corollis calyce subduplo longioribus. q. — Caules simpliciter 1-1' A-pedales, pilis paucis longiusculis, praesertim basi pubescentes. Folia nunc omnia in scraenla 5-7 dissecla, nunc inciso-pinnatifida v. subintegra. Segmenta forma variabilia, terminate majus incisum, caeterum integerrima, nunc viridia glabra v. ad venas subtus pilosa. Folia floralia sessilia, Ullskime ovata integerrima, calyces subaequantia. Calyx subcampanulatus, 1/3-2 lin. Longus, apice villosus coeruleo, ore vix obliquo, denlibus subaequalibus. Corolla coerulea incurva, limbi lacinae 4 superiores subaequales, infimus duplo major integerrimus v. vix emarginatus. Stamina omnia basi adscendentia, antheris exsertis disjunctis, loculis divergentibus. — JV. *mullifida* Linn. Spec. pi. 700. — Rchb. Plant. critic. VI. 22. t. 530. — *Lophanthes mullifida* Bin. in Bol. Begisl. adnot. ad t. 1282. — *If. lobata* Rudolph ei Stand. Nom. bok 552. — *Sausturia pinnatifida* Moench, Meth. pi. 388. — *Utandu Ufo Uis ov*Hs rta.* Gnel. Fl. Sib. III. 24*. t. 55. — Habitat in Sibiria orientali, in regionibus Altaicae occidentalis locis montosis apricit frequent at in Dahuria.

*

SaattoD. PTOIORFITA BUL L e. a t.

Verticillasteri conferti, superius omnes in ipseam terminalem aggregati, cymis omnibus sessilibus. Bracteae altere exteriores imbricatae, calyces aequantes. Calyx tubulosus rectus v. incurvus, ore aequali v. obliquo.

4. N. LINEARIS Royle mss. ex Blh. In Hook. Bot. Misc. III. 377. — Bth. Labial, gener. et spec. 460. — Caulibus adscendentibus glabrescentibus; foil, sessilibus linearibus acutiusculis integerrimis, basi angustatis, utrinque viridibus glabris; spica ovata pauciflora; bracteis lanceolato-subulatis; calycis elongati dentibus lanceolatis lubo brevioribus. 2]. — Caules humiles basi procumbentes, plerumque glabri. Folia 1-2-pollicaria, floralia aequalia antherifera, et multo breviora. Spicae breves subsimpliciter. Calyx et bracteis glabris, dan ubi villosa. Corollae lobis le-
viter antheris. — Habitat in India orientali Boatibna Himalaytaabna, U Sabatboa ei versus vallem Cashmarlamun*.

5. If. CONNATA Royle ex Bth. In Hook. Bot. HIM. in SIS. at Lablat U- Caule erecto villosus; ML sessilibus lanceolatis acutiusculis, basi cordato-amplexifolius. subconnatis, utrinque viridibus glabris; splea oblonga denu T. bail subobovata; bracteis lanceolato-subulatis ellipticis, calyce aequantibus; dentibus calycinis subulatis tubo longioribus. q. — Species pinnatifida. Caules simpliciter, pilis mollibus albis villosi, folia 2-3-pollicaria, subulata venis, basi dilatata at saepius magis minusve connatis. Spica 2-3-pollicaris erasta pinnatifida. Folia floralia ovata-lanceolata, longe subulata-acuminata. Bractea plerumque subulata; 7-8 lin. longae. Corollae incurvae, dentes calycinoe breviter excedentet. * Habitat in valla Cashmeriana.

6. N. NIVOSA Royle ex Bib. 1.1. c. c. — Glabra: caula humili erecto ranoio* foil, brevissime petiolatis lanceolatis acutiusculis, basi rotundatis, utriusque viridibus; spica oblonga densa; bracteis exterioribus ovatis acutiusculis calyce longioribus; denlibus calycinis longe subulatis lubo-subaequalibus. — Habitat in India orientali semipedalis v. vix pedalis, basi ramosa foliolata, rami erecti uli folia glabra? Folia 1-2-pollicaria, subulata venis prominentibus. Spica 4-pollicaris, sed bractea multo majores membranaceae venosae, longe ciliae. Calyx pariter ore subaequali. Corolla incurva, calyce duplo longior. — Habitat in valle Cashmeriana.

7. N. ERIOSTACHYS Blh. Labial gener. et spec. 731. — Caule erecto subsimpliciter pubescente; foil, subsessilibus ovalibus obtusis raris, basi rotundatis-subcordatis, supra viridibus glabris, subulata incanis; spica oblonga densa; bracteis oblongis

linearib. subulatisq. calyces aequoalib.; deotib. calycinis subulatis tubo sublongiorib. bractei*q. villosissimis. % — Spica fere *N. connatae* et *N. nervosae*, at foliis distinctissima. Herba 1-1'/t-pedalis. Folia 1-1'/i-pollicaria, floralia late ovata, inflma crenata, superiora bracteaeformia inlegerrima acuta. — Graecis In Cashemerieae vallibus Paspae et Pabér io berborum editioribus et ad sylvam margines.

8. *N. CAMPESTRIS* Bib. I. c. 731. — Pobetceos r. glabrioscula: caulibus ascendentibus subsimplicibus; foliis, subsestrilibus lanceolatis acutis serratis, basi rotundatis, utrinque viridibus; spica elongata, basi subinterrupta; bracteis exterioribus lanceolata acutiusculis ciliatis, calyces sobaequalibus; denique calycinis subulatis tubo subaequalibus. 2} — Afqois foliorum forma *JV. mervotae*, floribus *N. spicatae*, Ram! e basi perenni plures 1-r/t-pedales, omnia folia non pubescentia brevi omnino obtecti, DUDC fere glabri. Spicae et bractea omnino *N. tipicalae*. - Ubiat frequens in Cashemerieae campestribus.

0. *N. ELATA* Royle ei Bib. In Hook. Bot. Misc. III. 378. et Labial, gener. et spec. 400. f — Caule erecto glabro; foliis petiolo oblongo-ovali* v. obovato-lanceolato crenatis, basi late cordatis, utrinque viridibus glabris; spica oblongo-cylindrica subinterrupta, bracteis lanceolato-subulatis calyce sobrevioribus, calycis glabrisculi deolibus sabulatis tubum aequantibus. — Herba 2-3-pedalis, fere omnia glaberrima v. raras densibus calycibus breviter pubescentibus, petiolis foliisque obovatis subciliatis. Caulis acute tetragonus, parum ramosus. Folia 2-3-pollicaria, forma fere *N. naerantkot*, inferiora oblanceolata, superiora acutiuscula. Spicae ad apices ramorum 1-1'-pollicares lenues. Veruillas pauca subdistant. Folia floralia ovalo-lanceolato-bracteaeformia, nisi bractea armis venosa. Grolia inewtae, ealfoa dopu lofflorea, tubo eiaerto. — Habitat in India orientali BSMatata IninfajmHwi rflimlan in valle Caahmeriano.

II. *SPICATA* Bin. In WnIL Plantae rarior. I. 61 «l Lablau 47a t - BreCU glabriuscula: foliis, petiolis oblanceolatis, basi cordatis, utrinque viridibus racemo simpliciter abbreviato denso; bracteis oblongis v. lanceolato-linearibus acutiusculis, calycem aequantibus; deolibus calycinis longe subulatis tubo aequalibus % — Herba elata, parum nmog*. Caulis acute tetragonus, angulatus pubescentibus, caeterum glaber. Folia 1-1'/i-pollicaria, inferiora longiuscule* superiora breviter petiolata remota, floralia late ovata sessilia bracteaeformia aruissima serrolata. Spica sesquipedalis densa. Calyces sessiles iocunri, Offi aubaequah. Corolla iocurta, calyce duplo longior. Achaenia laeviMima. — £#-t<miea taecifata D. Don, Prodr. fl. Nep. 110. - Habitat in India orientali, in montibus Himalayensibus provinciae Kamaon et Buddrialb, in valle Caahmeriano ad Simlab.

II. *FL. RAPHAIVORHIZA* Bin. Ubiat gener. et spec. 731 - Caule ascendente, basi pubescente anthero; tell. petiolatis ovalibus oblanceolatis crenatis, basi truncatis bispidatis, utrinque viridibus; spica brevis densa, basi subinterrupta; bracteis lanceolatis, calycibus aequantibus; deolibus calycinis longe subulatis tubo aequalibus % — Herba elata, parum nmog*. Caulis acute tetragonus, angulatus pubescentibus, caeterum glaber. Folia 1-1'/i-pollicaria, inferiora longiuscule* superiora breviter petiolata remota, floralia late ovata sessilia bracteaeformia aruissima serrolata. Spica sesquipedalis densa. Calyces sessiles iocunri, Offi aubaequah. Corolla iocurta, calyce duplo longior. Achaenia laeviMima. — £#-t<miea taecifata D. Don, Prodr. fl. Nep. 110. - Habitat in India orientali, in montibus Himalayensibus provinciae Kamaon et Buddrialb, in valle Caahmeriano ad Simlab.

II. *R. DISCOLOR* Rf jle mas. ex Bib. In Hook. Bot. Misc. III. 378. f. 47a - Caule ascendente, basi villosa; foliis, petiolatis ovatis crenatis, basi truncatis bispidatis, utrinque viridibus; spica brevis densa, basi subinterrupta; bracteis oblongo-linearibus acutiusculis calycem aequantibus; calycibus flabrisculis deolibus antheralis tubum aequantibus. - Radix craft* jj- ***** Fnlla fere *JV. &«****, al mioora. Rami auperne elongati Spica bmlor el craaiaior quam in India, verticillata non altero longior - Habitat in berbffif Catbeaeriff.

II. *R. DISCOLOR* Rf jle mas. ex Bib. In Hook. Bot. Misc. III. 378. f. 47a - Caule ascendente, basi villosa; foliis, petiolatis ovatis crenatis, basi truncatis bispidatis, utrinque viridibus; spica brevis densa, basi subinterrupta; bracteis oblongo-linearibus acutiusculis calycem aequantibus; calycibus flabrisculis deolibus antheralis tubum aequantibus. - Radix craft* jj- ***** Fnlla fere *JV. &«****, al mioora. Rami auperne elongati Spica bmlor el craaiaior quam in India, verticillata non altero longior - Habitat in berbffif Catbeaeriff.

13. *N. MOLLIS* Blh. I. c. 734. — Caule adscendente villosa; foia, breviter petiolaris ovalis obtusis subrenatis, utrinque molliter mucosis, sublimbus subcanescentibus, superioribus pappis remotis, spica tenui subinterrupta; bracteis, oblongo-linearibus acutissimis calyces aequantibus; calycis tenuiter pubescentibus denatis tubo multo brevioribus. 2. — Affinis *JV. dtscolor*, sed characterebus datus differens. > cruciatum — lasna vix sexflora, fere omnes distincti, eisi approximate Corolla pallide rosea, labio In fere ore purpureo-punctato. — Ilabial in valle Cashmenano.
14. *N. ELLIPTICA* Rojlc mss. ex Blh. in Hook BOLMHC. III 378 et Labial, gen et spec. 470 f — Caule cretulo subvillosa, foia, scssilib. ovato-ellipticis obtusis angustis dentalis, basi cordatis, utrinque viridibus glabris, spica basi interrupta, foia (loralibus bracteisque ovalo-linearibus acutissimis ciliatis, calyce sublongioribus, denatis calycinis subulatis tubo subaequantibus. 2) — Species foliis elegantibus et rogoribus dentatis, primo intuitu distinctissima. Caulis 1-2-pedalis parvo ramosus, pilis mollibus albis villosus. demum glaberrimus. Folia circiter pollicana, apud I non rotundata, superiora minora acute acuminata, dorsalia infima subconformia, superiora bracteiformia. Spica tenuis r/t-2-pollicans. Calyx et corolla J> *spicata* Var. 0. nonnulli corollas minoribus differt. — *N. polystachya* Blh. in Hook Dot. Misc. III 378.
- fi. parviflora.* — Habitat in Indiae orientali monibus Himalayensibus a Cashmeria ad montes Syen, *fi.* ad Smlah.
15. *N. GRATA* Bth. I. c. 73*. — Caule erecto ramoso tenuissimè pubescente; foia, subsessilib. ovatis obtusis crenatis, basi rotundata subcordatis rugosis, utrinque pubescentibus. v. supra glabriusculis, sublimbus aubcanescentibus; spica ovalo-oblonga crassa, basi interrupta; calycis ore valde obliquo stibbilabiali; corollae calyce vix duplo longioribus. 2. — *JV. supmae* simillima et vix differens «uprificio potius molliora v. glaberrima quam *Milosa*, caule cretulo elatiore (nulla pedali oia rotundata parum minoribus. Vericillata pauci multiflora. Odor grains *Salt* *ac nifinnaht* — (rescit in Cashmeria lapidosis.
16. *N. SIPIW* Slo> Mem soc. nal. cur Mosq III 20). - Blh I c IV> et 471 | — Humilis adscondens pubescent foia *subsessilib. ovalis crenatis, basi rotundata rugosis, utrinque viridibus villosis; apica ovata secunda; bracteis oblongo-linearibus calyce aequantibus; calycis ore valde obliquo aubbilabiali; corollae calyce plus duplo longioribus. 2. — Caule ramoso Miosus, ramis lempedalibus, taperae subnudis. Folia vi-1-pollentia, superiora parva remote, florea liforma subcordata, supreme bracteiformia. Vericillata peoel, ODD<I In tplee ?U pollicari approximati T. uno diaunte. Calyx magnos tridit membrineat striatus pubescens, denatis superioribus multo majoribus, In labio superiore basi subrenatis. Corolla cocerulea; fere pollicaris aobglabra, fere valde ampliata — *JV. fsta* Blh. I. c 471. (nee C. A. Mey.) | — Crescit In Caucao orientali, in lapidosis ad lorenlem Chodjal et in alpinis Tafandhag.
17. *N. GHANATENSIS* Boiss. Elench. plant nov. Hisp. no. 163. el Vov. bot. dans lo midi de l'Esp. AOa no. 1334. t I- 144. — Tola glutinosissima. caulibus simplicibus quadrangulis erectis; foia, subsessilib. late ovalis obtuse crenatis, basi cordatis puberulis viscosis; racemo spiciformi elongato, verticillatis distantibus; bracteis linearibus acutis calyces subaequantibus; calycis glaberrimis dentibus lanceolatis. 2. corollae albae tubo calycem multo superante, labio inferiore rotundato, ad medium valde strangulate, faucem versus uolaceo-punctato. ^ - Caules 3-5-pedales, supra parce ramosi. Folia scssilia v. rarus breviter petiolata itutuosu, puberula. Inflorescentia pedalis v. longior, >ericillatastris poll 1-2 distantibus superioribus approximatis. Corolla alba hirtella viscida. — *IS multibractea*, Lnk. et Hoffmannsgg. Flor. Portug I. u 5? (nec Dsf) - Crescit in regione mouini superiorum in Sierra Nevada lxpamac meridionalis
18. *N. yilT!BR4rrEAT%IM* FI Atlan II 11 t 121 - Bth labial genrr d spec 471 I — Erecla pubescent foia broiler petiolatis ovalo-oblongis rrrniii* basi cordatis, utrinque viridibus. rrrmo npiriformi drn< simplicis, IMM *u|nM<r-ruplo, bracteis linearibus subulatis coloratis caecis arqinnibus mrolhr lul ,|M|

tes calycinis acquantc % — Caules elati subsimplices, obtuse letragoni, tennilcr pubcscentcs Folia inferiors 1-2-pollicana oblusa, basi profunde cordata, ulrin-
quc adprc»e villo^i, supenora longe remota minora ses»ilia acuta, floraha in-
tcgernma, suprema bracleaeformia. Spica oblonga, basi plus pollice diamelro,
purpurascens, verlicillaslms dense muluOons, inOmo dislanle Bracteae nume-
rate acuti»siroae pubescentes. Calyx villosus elongatus, dentibus lanceolalo-
subulatis. Corolla JS *retteulatae* — Habital in Atlanle prope Tlem»en.

10 IN \AILLAM11 Bib. I c. f — Erecla glabnuscua Toll peliotatis lale otatis
obiuMt, basi cordalis, supenorib subsessilib, utrinq vmdib, racemo simplici
tuterrupte spiciformi, verlicillastn* pauciflons, bracleis extcnorib oblongis obtu-
siu»culis adpressis slriatis subcoloratis calycibq pubescentib, corollac lubo bre-
viicr exserto 2]. — Caules pedales, acute tetragoni, ad angulos lenuiier pubei-
centes Folia pollicaria, lale nee profunde crenala, sublus ad venas pnmariat
subpubeseenlia, caeieram uli pagioa superior glabra, supenora scssilia, floralit
lale otata Iniegernma, m calyce longiora Spica elongata, tix semipollicem
diamelro. Bracleae intenos laoeolatae Denies calycim lanreolato-linearcs,
%upenores angusliores. Corolla glabra incurva, calyce subduplo longior. — l»
Oritnte habitat.

20 \ \PLLKI Lena mss ex Gussone, Prodr. II Sicul II ML - Bth I c 735 el
472 t — Erecla subglabra foil sessilib. ovalo-lanceolatis rrenati*. basi cordatis,
uinni(xndib, racemo spiciferai denso siroplici, bracleis oblongo-lanceolatis
subcoloralis caljcem »ubaequaniib, dcnlib calyrim lanceolalis, lubo loogiorib;
eorollae lubo longe exserio 2J. — Cauhs dura* simplex v. ran us subramosus
peilaht glaber v. lenuii»ime pubescens. Folia minora el breviora quam in AT
tubtros; mJnus rugosa ei glabra Y. Una parcissima in parte supenore raulis
induu Spica tesmla S-3-pollicaxis, rariaa elongala. Veriicillastri infenores
disiincii, toperioret aablalrieall. Folia floralia otaia, baai roiundau, caeterum
bracleis eoofornia. Bracleae Imbrlcalae, calyces lorlfero* obtegentes, fruciiferis
breviorft acutlsalnae coloralae striatae pobeacentes. — A *imberosa* Desf. Fl At-
lant II. 10. (non Linn.) icf. no. SS.) — *N. rosim* Slim. mss. ex Bth I c. 471 —
Habitat in Africa boreali §d Tanger.

21 > TIBEROSA linn Spec plant 798 - Rcbb Plant critic \ 231 4)9 - Bib.
I c 472 el 73) t — Cauk credo umplici <ublanato, full mlimi> peliolatis, su-
penonb «e«sihb otalo-lanreolalis crenahs, baM dilaliali^ c Ttlalis, ulrinq viri-
dib v subtiM «ublanali< ni(joM<, racemo spiciformi drnso omplici elongalo;
bradeis late ovalis rriculatis colorali^, ralycrs arquaniib eorollae lubo deotes
ralycinis aequanle % — Radix fasrirulato-tubero«a (aulit cra»«us 1-J-pedaliSt
lam la)a mbtiicosa magis minusve binulut Folia rrrbra suberecta, inferior
pauca peiioUta, rrltqua sessiha 9-3-pollirana, supenora breviora et laliora,
suprema tubrolorau et gradalim in floraha bracleaeformia abeunlit, CinM^{0*}
omma rugosa pubetrenlia, sublus saepe lana laia caoesceotia. 8pie«^{B 0 * o . is}
bipollicant, tarpe fere pedalis Verticillaslri taepioa omoes dislincli, al w^{*d e}
approumaii, drn«e muliiliori, 3-4 poll ices diamelro. Bracleae namerofM !...
ovaiae aeuiiae integfrnmae, basi cordatao nembranaceae reticulato-tenoaae
pubesecsilea, pleramque roloralae el ealyres etccdentcs, inter duel tiresceoU*
caljce sobbrtviore. i orolla coerulca. - .V *tanol** Jarq Obs. boL III. 81* U J³
- % *rrheumtm* De*f. H Atlant II II I 1*4 - Rcbb. PlanL cnlic. V. ** t. - d
- .> ciototfl BroL - A *temkra* Tau»r» io BoL Zeil 18J1 I «W - *. *fabosa*
Moris, ftlirp. SaN. eleorb ei Linoara \ I itcraturb ». - Bib Labial. *gener. et*
•pec. 448. - Habitat i« llbpania autrali, LuMiana, in Atlanle prope *Tiemson*
rl in Sicilia.

2i. N ACKROSA B Webb, lter HJ.panirn.f » | - C aule glabrescenie erocio r«-
moso fttrielo quadnsolcalo, foil, otatis cordaiit irrgulanler crenatis. rie*** r«-
•©•o elongalo caodalo, braclei* plunniU laneeolatif aut hnearib nen»»is me
liier elllalia In eaacroMai ailenoatis, ealycet sobarqaanlib, calycib. eofl*|⁰ net-
IOS* 4esiukw oloaigaUa eiliailt aroU«iimis. eorollae lubo calycesn eicedente. +

- *N. tuberosa* Desf. Flor. Allanu II. 10. (excl. aynon) Cf. no. 80. - Crescit in Hispama meridional! el in agns Algeriensi ei Tunelano.
23. *N. DENSIFLORA* Karel. et Kml. Bullet, de Hose. 1W2 IV. 725. - Puberula: canle erecto; foil, ovalo-lanceolalls in petiolum allenuatis obtusiuscuhs, inaeqaaliler crenalis; veriicillasins in spicam densam rarius inierruptam ad apiccm canlis congestis; braceis lineon-oblongis calycibq. alias aequalib. molliter pilofa_y ore obliquo; corollae velutinae labio infenore obsolete crenulato. ♂ — ID alpbas ISarymensibus in Soongana crescit.
81. *N. SCORDOTIS* Linn. Spec plant. 706. — Viviani, Fl. Lybic. specim. t. 0. fig. 2. — Bib. I. c. 47J. f et 735. — Adscendens lomcnloso-lanala. foil, petiolatis ovalo-rotundatis obtusis, basi cordalib, utnnq. villoso-lanalis rugosis; raccmo simplici subspiciformi, >erticillnslns di&linctis dense mulliflons, braceis o\alisaculi» adpressis calycibq. Milloso-lanalis. 2|. — Herba pedalis, in exemplanbus }>jhestribu» ex omni parte lana densa subcanescente villosissima, in culus basi subglabnta, superne villosistma. Folia vix pollicana crassiuscula, floralia sessilia, \rriinl-laslro vix longiora, caclera caulims subconformia. \erlicillasln in raccmo 3-0-pollican parum distaoles, demom fere pollirem diametro. Cal)ces o\aii, fruciiferi inflatt, dentibus lubaequalibua laoeolalo-subulalis. Corolla glabra, tubo tenol Incurvo breviter exaerlo, faoxe dUaUla. Achaema ovato-triqueira laevia — *N. tomentota* Sieb. Pl. exa.
- fi. tirtidis*: basi aubglabrata, superne ?illotissima: foliia ulrinqae viridibus. — *N. hir\$uta* Linn. Spec plant. 709. non allorum. — JV. *Scordolu* Linn. I c. — *N. procumbent* Mill. Din. no. 10. — Habitat In Creta, 0. in Sieilia, al dubia civis, verosimiliter planlac Crclensis tariela* borlensis.
- 25 *N. CIRCI»AT* Willd Enum. plant, hort Berol 002. — Blh. I c. 473 - Spira terminali o\aa, foil o\alis cordatis crenalis petiolali* ^ — Caulcs simplicict crocli Inpollic.iros folia petiolala Iripollicana ouU, profunde cordala crcaia Spica o>ala sohiana lerininalis. Bracloac o\alac aculac. — In Cappadocia
- 96 *N. GMTINOhV* Blh 1 c 735. — Cautc erecto ramoso glutinono-pubrfricnir, full, scssilib. ovati> lanccolatis\eci>o-dentatis, utnnq. virldib. \SCO»IK trnui»-sime pubescenub; raccmo simplici; veriicillatirts disianiib. v. supreuis lubspieatis; braeis llinearib. acoUsslmls, exteriorib. calyct paroin brevlorlb.; ealjcib elongatls striatls, dentib. brevib. acails i eorolUe labo longe exseiio. % — Caulis 1-r/t-pedalis strictus. Fella supra subbullaU %*V«-potliearla, ntrtla subium valde prommpntibus. Inflorescentla fere *N. ii*Uc*§* ?. *N. dtttmmH\$*% sed cymae eliam inflmie plerumque sessiles. Calyces vlseoso-pubescentes. Corolla violacea. — Habitat in Indiac orientalls Jugo Himala)ensl Inter Poyè el Rici.
- SeoUo UL STEGIOHEPETA Bth. 1. e. 474.
- Cymae in verticillastris multifloris condensatae, in fen ores saepe pedunculaUe, superiores mbspicaiaae. Racemi simplices v. rarius ramosi. Bracuae calycem subaeqaaotes v. auperantes. Calyx nuno elongatus incurvus, ore obliquo, dentibuh laneolalis subulatisve, supenonbuu majonbui, ounc fere rectus, dentibus subaequalibus. Corolla tubo vix v. breviler exsertn, fauce inflaU.
87. *N. SIBTHORPII* Blh. I. c. t — Adscendens v. erectU, basi ramosa tomenioia v lanata: foil, petiolalla ovatis oblusis crcoatis cordalis rugosis molluer cano-iomentoMS lanalisve; vertinllastris densia mulltfloris, inferlonb. distanlib, »uperiorib. m spicam oblongani rondensatis; braceia ovalis oblongiste oubulato-aristatN calyces aequaniib; calycis ovati dentibus subaequalib an»iali», tubo aequilongis, corollis ralycc vix duplo longionbus % - Caule* basi dun di,rambenles sublignosi raiuosi, rami nunc erecti 1-2-pedales, nunc ad»rendrnir» m pedaled ramosi tetragom cano-tomenloM Spicae ad apices ramoruoi di-n%ac l-l'/.-pollirares, >erli(illantn paun, sub t.}|ca diotinrii rolia broiler |M-U«-lala V.-l-pol^{liana}»^{morp} *Natrubu* rugosa et naepius lana laia utrinque induta floralia se^silia CJ)CC« acquaiiiaa, caelcruuj cjulimt conformia Bractear

membranaceae. Calyx ut in *M. Itahca* fero aequalis, at denies profundias flssi. Species inter *Oxynepetas*, *Stegtonepetas* el *Pyenonepetat* media. — JV *halxca* Sibihrp. el Sm. Flor Grace. VI. t. 548. (non Linn.) — Habitat in montibus circa Alhenas, prope Zara in Dalmalia.

28. D. ITALICA Linn. Spec. plant 708. - Jcq. Hort. Vindobon. II. 51. t. 118. — Rcbp Plant, critic. V. 50. 1. 481 — Btb. 1. c. 474. t et 736. — Erecta elata, tenuiter cano-pubescentis- foil, petiolalis ovalis crenalis cordatis, ulnqque tenuiter canescentibus; racemis subsimplicibus.* bracteis linearibus lanceolatisve rigidis calyce sublongioribus; calycis elongati subincam ore vix obliquo, denibus lanceolatis acuto, superioribus submajoribus., corollis calyce in duplo longioribus. 2. — Caules 2-3-pedales rigidi, parum ramosi. Folia vix pollicana oblusa v. aculiuscula, basi late cordata, interdum subhaslata, leviter rugosa, floralia infima conformia, suprema bracteaeformia. Verticillatis in omnes disiliuclis, in fenestris dislanles, superiores approximati, omnes densi multiflori, cymae sessiles v. breviter pedunculatae. Bractee numerosae 1-3-nerviae, margine saepe submembranaceae, tenuiter pubescentes, nunc lanceolatae calyce subbreviares, nuoc lineares rigidae, calyces superantes. Corolla purpurascens. — JY. *teucrtoides* Lam. Diet. Suppl. I. 711. — X *marrubotides* Willd. Enum. plant, hort. Berol. II. 003. — JY. *tmbneata* Lag ex Spreng. Syst. vegetab. II. 729. — JV. *Orttntalu* Mill. Did. no.0. - !S\ *Calammtha* Tausch in Bot. Zeit. 1831. I. 210? — N. *macrostachya* Jcq. Plant, exsicc — *Catana eaneteetu* Moench, Meib. plant. 388. — Crescit in Uispama, in Italia, sed in floribus lialicis etiam Neapolitan* et Siciliana dcesl.

29. N. DISTAHS Royle mss. ex Bib. in Hook. Bot. Wise III. 379. et Labial, gener. et spec. 475. — Erecta elata: caule basi villosa; foil, petiolalis ovalo-lanceolatis obtusis crenatis, basi profunde cordatis rugosis, subtus triosis; verticillatis densis, inferioribus remotis, inpremis approximalis; bracteis linearibus lanceolatis calyceo tubaequantibus.; calycis elongati in parte ore obliquo, denibus superioribus lanceolatis inferioribus omnibus, seuceo-acomioalii; corollis calyce in duplo longioribus. ^ — AfBnis JV. *italic***, differet racemo simplici depauperato, foliis inferioribus fere rugosis, sablas dense villosis et dentibus calycis omnibus apice scissis. Folia superiora pauca remota minora. — Habitat in India orientalis montibus Himalayensibus ad Mussooree et Sjen.

30. N. CRIMTA Montbr. et Auch. Ann. sc. nat. (2. SIT.) M. 46. - Erecta caule tomentoso pubescente, foil breviter petiolatis obtusis crenatis, basi cordatis, utrinque molliter pubescentibus., verticillatis densis paucafloris, inferioribus remotis, superioribus approximate; bracteis calyceo aequantibus denibus calycis longe foveolatis; corolla tubo dentibus calycis vix longiore. 2. — Habitat in Tauro.

JJ. IS. CILIARI & Btb. in Wall. Plaut. Asiat. rarior. I. 04. et Labial I. c. t - Brit. Ueano-pubescentis- foil, petiolatis late ovalis obtusis crenatis, basi cordatis, sabint v. utrinque cano-iomenosis, racemis subsimplicibus; bracteis ovatis v. late lanceolatis, eitenoribus calycem subaequantibus; calycis elongati pubescentis incurti ore obliquo, dentibus lanceolatis subulatis subpatentibus, corollis calyce subduplo longioribus. ^ — Habitus et inflorescentia A. *ruiUraitt*, a qua differt foliis ramisque caescentibus, Ooralibus ovalis membranaceis, ante anthesin subbriatis et praeterlim bractearum forma. Racemus fere semper simplex et cymis subsessilibus. Folia caulina superiora paucis remota in exemplaribus Roylei dii, majora et cum Ooralibus infimis caeteris conformia in speciminibus cullis* Nepalla. — Crescit in India orientalibus, in Nepallu, etiam bemenam.

31. N. RUDERAMS Lamill. mts ex Bin. I. I. c. c. - Subrecta, tenuiter pubescentis. foil petiolalis ovatis obtusis crenatis, basi cordatis, utrinque pubescentibus. subturridibus, racemis subsimplicibus secundis; cymis densis inferioribus plunclutibus; bracteis subulatis, extenoribus calyceo aequantibus.; calycis ovatis pubescentibus ore obliquo, dentibus subulatis, superioribus longioribus; corollis calyce dimidio longioribus. 2. • Calyx inferioribus ramosis, obtuse letragonus, pubescentia breviter

- subcanescens Folia gesqnipollicaria, utnque molliter pubescntla neo lomen-
tosa_f basi lalo el profunde cordaia. Cymae subglobosae mulliflorae Pedunculi
in fen ores pollicares, supenores brevissiml, verlicillaslns supenonbus in race mo
denso umlaterali approximalis Calyces membranacei, vix 2 lin longi, moliiter
pubescenies Corollae parvae purpurascetes. Specimina Hurduarensia diversa
videnlur, foliis minonbus, cymis laxionbus. — *Glechoma erecta* Roxb Fl. Ind
HI. 7. — *Thymus ncpetoides* D. Don, Prodr fl Nep 113. — *Glechoma Htndottana*
Rolh, Nov pi spec 258' — *Glechoma Indicum* Spr Syst vegetab II 727 —
Habitat in India oriental!, ad radices montium I Sepalenstum, in Nepalia, llurd-
war el Rajemahl, in Ilinduslama
- 33 N GLOMERATA Monlbr et Aucher, Ann se nat (2. S6r) VI 46 - Adscendens
pubescens foil breviier petiolatis ovalo-rolundis crenalis, basi cordalis, infenonb.
subaunculalo-lobalis, supenonb sessilib remolis, verlicillaslns densis remote,
bralcis calyce dimidio brevionb , calycis otali pubescnlns ore obliquo, denlib.
lanceolatis acutis, corollis calyce sublnplo longionbus 2l. — In Cappadocia
- 34 N CLI>OPODIOIDES Royle mss. ex Bib. in nook Bot Misc HI 370 el I a-
biai gener. el spec. 47ft. — Adscendens, tenuilcr pubescens foil peliolatis oatis
oblusis crenalis, basi late subcordatis, nlrinq. vmdib. lenuilcr pubescenlib, ra-
cemis subsimplicib; verlicillaaria laxiosculis muluflores aubsecundis; bracieis
aubalalia calyce subbreviorib; calycis tobulosi pubescenlia ore obllqoo, denlib.
superionb lanceolatis, infenorlb. subulalis; corollis calycem vix excedentibns %
— AfGnis *N ruderah*, differt praecipue calycibas minorlboa tenulonbus el corollis
minimis vix calycem excedenlibus Flores *Chnopodto repenti* non dissimiles,
sed caractres ommno *Nepetae* — Habitat in India, ad npas flumims Jumna
- 35 N iriCOPH\LL\ Blh I c 470 — Adscendens v suberecta ramib cano-to-
mentosis, foil peliolatis o>atis rolundalisve crenatis, bisi truncalis v conlalis,
supra Mndib rugous, sublus albo-toroentosis, racemis subsimplicib secundis,
cjmis subscsilib densis mulliflons, bracieis hubulalis caljce subbroionb ca-
lycis lubulosi cano-pubescnlns ore obliquo, denlib lanccolalo-subulatia, supe-
nonb longiorib , corollis calyce dimidio longionbui 2^ — Ab affini *N ruderali*
differt praecipue foliis panria rngosia sublus albb. * Habitat in India oriental!
ad Mussooree.
30. N. FLOCCOSA Blh. I. e. 730. f - BreCU diTirioito-ramota, Una alba floccosa
vealita: foil, peiolais subrotundia, baal eordatla; raemls laxlaalmia anbramosisi
cymls capiluliformib paucia mulUflors longe pedunculalls; bractels linear!-an*
bulatia calyces acquaniibus 4 — Afflns *N. jruderali*. Radix crassa Peioli
limbo longiores, inferiorum limbua 3 poll, longus et latua aublobato-crenatua
crassus subcarnosus, utnque dense lanalus. Folia ramealia tnullo mioora, flora-
lialia minima Cymac paucae distantes. Flores iV *rudralu* Corolla panra vix
calyce longior — Grescit in Indiae septentrional la lapidosis aaxoiaique inter
Nako et Cbango.

Sectlo IV. OATARU Btb. L o. 476.

Cymae In verticlllaslrns multifloris plerumque condensaUe, inferiores peduncu-
latae. Racemi simplices v. panicolati. Raclearae calyce breviores, plerumque bre-
visslmae. Calyx elongalus incurvus, ore obliquo, rarius subrecto, deniibus lanceo-
latis, supenonbus plerumque majonbus. Corolla tubo breviter exserlo, fauce inflaia

37. N GR4CIL1FLORA Blh in Wall Plant Asiat ranor. I. 05 el Labial Rcner it
spec 470 - Adscendens glabra v tenuiter pubescens foil peliolatis o\aii* Ian-
ceolatisve obtusis crenalis, basi cordalts, ulnnq tenuilcr pubescenlib subiu''
gubcanescentib , racemis ramosis, cymis laxissimis dichotomic, pedunculi's uinn''*
ramisq clongalis niiformib , bracteis subulalis caljce breMonb cal\ci« o*ato''
tubulosi ore obliquo denlib vubuhlU, supenorib longiorib , torolli* caUce >it
duplo longionbuH ^ - CIUIP* 1-2-pedals, bas, rim.si, ram. lenuiss.m,
Folia pauci, longe peliolala, \ix pollicina, lenuia MI rupoM liar, mi ultn >c
dales laxissimi secuodi Omarum rami cloganler incurv Bracuac <ataccat''

- 1-2 v. rarios infenores (cymae ramorum), fere 3 lin. longae. Calyces pedicellati, 2A lm longi. Corollae parvae coeruleae. Species gracillima, inter *Catartat* el *Stegionepetas* media. — In India onenlali, in provincia Ilurd*ar, Deyra Dhoon.
- 3d. N MICRAMILA Bunge mss. in Ledeb. Flor. All. II. 401. — Ledeb Icon. Dor. Ross. Altaic, illustr. t. 412. — Bib. I. c. t — Adscendens bumilis pubewns v. glabra: foil, petiolalis oraiis oblusis crenatis, basi rotundalis, utrinq. pallidis; racemis lam ramosis; braceis pedicello >n longionb; calycis tubulosi mcurvi pubescentis ore obliquo, dentib. lanceolalis, supenonb. submajonb.; corollis cal)cem vix excedenlibus. 2l. — Satura A. *micrattfhae*, sed Coins longe peliolahs, cjmis longe pedunculatis paociflons, babilu graciliore, superficie glabnorc, fle—nbusque mmonbus sal distincta Tidetur. — Habiaal in Sibmac jugo Allaico, in montibus Arkaul el Dolenlara.
- JO. IS. CATARIA Linn. Spec. plant 700. — Blh. I. c. 477. — Erccia data cano-pubeseem: foil, pellolatis ovalis aculis, profunde crenatis, basi cordalis, supra viridib., sobtas cano-tomentosis; racemis sobramosis, >erticilla*»tn\$ den*is nullifloris; braceis pedicello vix longionb.; caljcis ovali pubescentis subincum ore obliquo, denlib. e basi lanceolau subulalis subpatenlib., supenonb. longionb.; corollis calyce dimidio longionbus. 2l. — Caules 2-3-pedaies, tenuiter piibescences v tomcnloso-canescenles. Folia sesquipollicana rugoba, (loralia infima subconformia, suprema panra bracteaeformia. Verticillastri subglobosi, superiores approximate infenores remoli. Cymae infenores breviter pedunculatae. Calyces molliter pubescentes, breriores quam in praecedentibus. Corollae albidae. — *Calalaria tulgans* Moench, Melb. plant 387. — A. *vulgari** Lam. Fl. Fr. II. 308. — A. *eitriodor** Becker, Fl. Francof. 2ia - A. minor Mill. Diet no. 2. - A. *Amc-riemmm* Raevsch nua. «x Stead. Norm* bot Stt? (edit 1)
- fi. ctmdtdm:* folllt frnelso=erenalis, rapra pallidis, snbtna eandidia. — Habitat in Enropa fere tola, praetertlai anatrallorl, et Asia media ad mnros el sepes in nideratis, in reglone Tanro-Cancaalea el Catpica, In Sibiria; occurrit etiam in America septentrionall, terotimiliter ex Enropa allata.
40. N. NEPETELLA Linn. I. c. 707. - All. Flor. Pedem. I. 37 t 2 fig 1 - Rccb. Plant critic. III. W. t. 261. — Bth. I c. — Erecta pubesrens * r.ino-iomento>a: foil, breviter peiolatis lanceolalis crenatM, basi rotundalis cordali^ve, ulrinq. rano-pubescentib. tomentoniste; racemis mulufloris subsimphcib , braceis pedicello MX longionb, cal)cis tubulo>i incum ore obliquo, denlib. lanceolalis superionb. majonb , corollis cal)ce dupio longionbu* ^ — Specie%r praeserliw in horin, valde vanabilis. Caules in tar. a. saepe 3-4-pedalcs, tcrncillafirl ul in A *Cutana* magm densi nulliflori, in racemo longo di>positi, in tar. *fi*» ""**" mus bumtlis «ix 2-3-pollicaris. Folia in omnibus vanciaiibus conformia, eaulin pollicana, ramealia minora, nunc ulrinque molliter cano-tomentosa, nunc, P<^ ftctrim in var ,9., subtmidia, tenuiter pube*ccotiaf In omnibus \arielatlbs f<igo- Corolla saepius dupio major quam in A. Ca/<rt< albida purpuratcens f* c
- «. *tmnjor* racemo elongato muliifloro, flonbus albidis Y. purpurascenlibit*
*CHmna !ScpeUU** Moroch, Melb. planL 3BR. - A. *amelkyhna* Uesf. - r.oi
 Diet. Suppl. III 200. - A *panicuUia* Mill. Diet. no. 4.
- JS kumtlu:* racemo breti denso, floribns albidis v. purpura<cenUbus. ~ *N. lan- etolmia* Lam. Did I 710. - Bf hb. Plant, rrilic. ^ I 2a I W0. - A# **<ioyobis Vañl, Symbol. bol. I 41. - A. *yrareolems* | ill Fl Helpb II JBO. - *N. Arre- fo*«B#M Urn. Did I 703
- 7- *Intmmm;* foliit rngosioribut rano-lomentn«i». - A %*ea*a Ait llort >> ^ ^ SW5 - Habuit in Europa auttrali, prar*ertim in monnbus. in Ilispania» ^ ^ loprovincta, HcUetia au»usli el Italia a Pedrnmliu et LiKuria *o ***
 .NeapoliUnum, a. in nmbrosis monlosi», *fi* in siccionbu* raldioribqa* Ad-
 41* N. C\AA&A Stev. in Mem. soe. nal cur Motq. III 2tt Bib. I. e. 4W. ' is par-

vis ovatis oblongisve crenatis rugosis, utrinq. cano-tomentosis; racemula numeros brevib. secundis; bracteolis brevissimis; calycis lobulosis incurvis cano-lomentosis dent. b. sublanceolatis, superonb. longiorib.; corollis calyce vix longiorib., tubo incluso. 2]. — Caules ut in *JV. Ucranica* incholeto-paniculati, sed rami racemulis brevibus unilateralibus nee corymbulis terminali. Tota planta, praesertim calyces, lomentis molli inaequali. Folia ut in *Marrubii* nonnullis v. *Slachyde Palaestina* rugosa et inaequali. Cymae pauciflorae laxiusculae. Racemuli polycarpi numerosissimi. Calyces 3-4 lin. longi, valde incurvi, dentibus malicis mollissimis. Corolla parva cyanea v. albida? — *JY. tucana* M. Bieb. Fl. Taur. Cauc. II. 40. et III. 302. - Rrb. Plant. critic IV. 4. L 305. - *A. acinifera* Spr. Pug. pi. I. 41. et Sjst. veget. II. 727. — *JS. mollissima* Tausch In Bol. Zeilng 1831. I. 210? — Habitat in Caucaso orientali, in glareosis ad torrentem Chodjal, ad torrentem Terek et in locis lapideis montosis prope acidulam Narxana.

42. N. MEYERI Bth. I. c. — Humilis ascendens: ramis tenuissime pubescentibus; foliis petiolatis ovatis obtusis crenatis, basi cordatis, utrinq. subvittatis, sublus pubescentibus; racemis subsimplicibus multinerviis; bracteolis calyce multo brevioribus; calycis elongatis incurvis pubescentibus ore obliquo, dentibus lanceolatis, superonb. longioribus; corollis calyce vix dimidio longioribus, tubo incluso. 2]. — Inter *JY. Mustim* et *Catanam* media, dentes lemipedales. Folia caulina polycarpi, floralia inflata subconformia, supra minora. Verticillati numerosi densi multiflori viz secundi, cymae inferiores breviter pedunculatae. Calyx *JV. Mussini*, tamen breviter pubescens nee lanatus. Corolla *JV. Catariata*, a qua differit solum humilis, foliis obtusioribus sublus vix pubescentibus et dentibus calycinis lanceolatis. — *N. nucanthea* C. A. Meyer, Enum. pi. Cane Casp. 02. (non Bunge.) — Habitat in Caucaso, in locis siccis lapideis montium Talysch prope pagum SwanU

43. IS AGHKSTIS Lnx. TSouv. Nol. 25") - Bib. I. c. 470. - Erecta glaberrima Tota pediculis ovato-lanceolatis inciseo-dentatis, basi subcordatis nervoso-rugosis, utrinq. multinerviis; racemo elongato subsimplici, bracteolis pedicello tunc longioribus, calycis elongatis incurvis ore obliquo, dentibus lanceolatis, superonb. majoribus corollis calyce vix duplo longioribus, tubo breviter exserto. 2]. — Caulis bipedalis, parum ramosus, basi foliosus viscosus. Folia caulina polycarpi subincomposita, caetera glabra, floralia multinerviis. Verticillati secundi cymae 5-7-florae, breviter pedunculatae deaeae. Calyces 3-4 lin. longi vix duplo longioribus, tubo lanosissimo viscoso villosi. Corolla albida pallida majore quam *ID If, Cicutu*. -. Habitat in Corsicae arvis, in monte d'Oro.

44. N. AZUREA R. Br in App. to Sail's Abyss, ex Bib. I. c. — Erecta: foliis sessilibus ovalibus v. ovato-oblongis crenatis, basi subcordatis rugosis, sublus canescentibus; racemis simplicibus; cymis subsessilibus; verticillatis densis, superioribus subsplacatis; bracteolis minutis; calycis subovalibus incurvis pubescentibus ore obliquo, dentibus lanceolatis acutis, superioribus longioribus; corollis calyce duplo longioribus. y, ~ Exemplaria SalUana pedalia, caule tenuiter lomentoso. Folia supra viridia, inferius pubescentia, Juniora utrinque canescentia, floralia inflata subconformia, superflora linearia bracteiformia. Cymae utrinque 10-12-florae, dense dicotylomae! Calyces 2 lin. longi striati coerulescentes. Corolla coerulescens, tubo breviter exserto, basi aliena. — Habitat in Abyssinia.

45. N. RACEMOSA Lam. Diet. 1.711. - Bib. I. c. 480. - Rrb. Plant. critic. VI. 10. t. 585? - Erecta pubescens: foliis peltatis ovalibus obtusis crenatis, basi cordatis supra tinctis rugosis, subtus canescentibus; racemis laxis subsimplicibus, multinerviis subsessilibus v. inferonb. pedunculatis paucifloris; bracteolis calyce multo brevioribus; calycis elongatis incurvis molliter lanatis ore obliquo, dentibus lanceolatis tubulosis longioribus, corollis calyce duplo longioribus, tubo breviter exserto. 2]. - I

•)MPETA iCrtSTISLou I r --Foil cinnalo-oblongu rrcnnht ghbru rvn...
~~auxiliaris axillaris~~ r*cem* < ** dtgittis, braelen hnearth calyce ulloin d%Z7to

- A JV *Muttinx* differt caule erecto, an ejus varietas⁹ An huc referenda synonyma plura hortensia sub JV. *Muttxm* enumerata? — Habitat in Oriente.
46. IN MISSINI Henkel, Adumbr. plant 15. - Rchb. I c. 20. t 587. - Blh. I c. f — Diffusa ramis ascendens cano-pubescentibus; foliis, petiolatis ovalibus obtusis crenatis, basi cordatis, supra videntibus rugosis, subtus canescentibus, racemis (axis simplicibus secundis, cymis subsessilibus paucifloris; bracteis calyce multo brevioribus, calycis elongati incurvi molliter lanali ore obliquo, dentibus lanceolatis, tubum longioribus, corollis calyce duplo longioribus, tubo breviter exserto. 2l. — Folia in exemplaribus culis fere JV *coloratae*, in sylvestribus multo minoribus rugosioribus et subtus magis incana. Cymae saepius utrinque 3-7-florae, interdum multiflorae Calyx magitudine calycis JV. *coloratae*, at densius minus aculei ei semper magis minusve lana brevi molli alba v. coerulescente indutus Corolla JV *coloratae* paulo minor, pallide coerulescens. — JV. *longiflora* Sims, Bot. Mag. I. 023⁹ (male) non Vent — JV. *talvtaefoha* Pers Enchir. II 115. — JV. *eyamotrieha* Tausch in Bot. Zeit 1831. I. 218* — JV. *argentea*, *diffusa*, *incana*, *lamtfoha*, *leucrotodei violacea*, Will denote tana etc. Hortul. — Habitat in regione Caucasico-Caspica, in Iberiae collibus stentibus lapidosis.
- 47 > GRANDIFLORA M. Bieb. Fl. Taor. Caucas II. 42. - Rchb Plant, critic III 68. t 279 — Blh. I c f — Erecta glabruscula foliis, breviter petiolatis ovalibus obtusis crenatis, basi cordatis, supra videntibus, sublus pallidis > canescentibus; racemis basi subramosis; cymis pedunculatis multifloris; bracteis calyce multo brevioribus; calycis elongati incurvi glabrusculi ore obliquo, dentibus lanceolatis acutis, superioribus longioribus; corollis calyce duplo longioribus, tubo breviter exserto. 2l. — Caules plunpedales ramosi, nunc glabri, saepius versus apicem lenius pubescentes. Folia caulina oblusa, subtus, praesertim juniora, lomentio tenui saepe canescentia, rarius concoloria. Racemi plurimi sulframosi, semipedalei pedalem. Pedunculi cymarum inferiorum pollicares, superiorum 3-4-11-nearum. Cymae laxae. Floret, praesertim in racemis mediis, numerosi. Bractee subulatae, exteriorae saepe calyce dimidiatas fere attingentes, interiores minutae. Corolla coerulesca. — JV. *mekstaefolia* Pers. Enchirid. II. 115 — JV. *lamufolm* Hoffm. Hort Mosq. t Bieb. — JV *colorata* Willd Enum. plant hort Berol II 002 — JV *argentea*, *grandu*, *incano*, *leucrotodes*, *violacea* etc Hortul — Habitat in (a) casu totius graminosis montibus sjhalicis et in insula Melos
- 48 Y DETOMCAKFOVIA C. A Mejer, Enum. pi Cauc. Casp. 02. - Bth I c. 481. — Erecta subsimplex villosa-tomentosa foliis infimis petiolatis, <superioribus sessilibus ovato-lanceolatis crenatis, basi cordatis, utrinque videntibus mollioribus pubescentibus, racemis brevibus simplicibus, Yerticillas omnibus densis, bracteis calyce multo brevioribus; calycis elongati villosi ore obliquo dilatato, dentibus lanceolatis subaequalibus; corollis calyce duplo longioribus, tubo exserto basi alienato. 2l. — A JV *grandiflora* differ! canaliculis parvis superiorem, foliis, calycibus corollisque pubescentia mollis lomentosis fit racemo breviter subspiciformi. — Habitat in Caucasii montium alliorum Talysch graminosis.
40. N. SALICIFOLIA Royle mss. ex Blh. In nook. Bot Muc. III. 370 et Labial. I. c. — Erecta cano-tomentosa foliis petiolatis ovalibus v. ovato-lanceolatis obtusis crenatis, basi rugosis, utrinque mollioribus lomentosis, supra canescentibus, subius albis: racemis laxis subsimplicibus; cymis pedunculatis elongatis multifloris, tractibus brevissimis, calycibus oblongis erectis subrectis pubescentibus, ore obliquo, dentibus lanceolatis, superioribus longioribus, corollis calyce plus duplo longioribus. Caulis caeco-tomentosus Racemus videntibus pubescens lomentosa v. pollicaria. Herpetiolaria, floralia parva oblongo-cuneata verticilla in ramulis. Cymae utrinque 12-90-florae, pedunculo communis circiter tripollicares, breviores quam in JV *grandiflora* Corolla lenis fr-7 lio longa - lilioides in talibus. Talysch.
30. N MELISSAEFOLIA Urn Diet. I 111. (non M Birb) - In Ann nw. J. X. 301 t 81 - Bib I c t - Erecta pubescent foliis petiolatis ovalibus obtusis crenatis, basi cordatis, utrinque videntibus villosis, superioribus mollioribus, inferioribus canescentibus, racemis

laxis subsimplicib.; bracteis calyce breviorib.; calycis elongati incurvi pubescen-
lis oro obliquo, denlib. lanceolalis, superiorib. majorib.; corollis calyce vix duplo
longioribus. 2). *JV. grandiflorae* affinis. Caules circiter pedales, pilis subglan-
dulosis pubescentes. Folia inferiora longe petiolata, limbo vix pollicari, basi
pro fim de cordalo, ulrinque pilis subadpressis villosis, floralia lanceolata acuta.
Verlicillasr'orum inGmorum cymae longe pedunculatae. Bracieae exieriores lan-
ceolaio-Uncares calycem subaequantles, superiores minuiaae. Calyx *JV. grandiflorae*
subcoloratus pubescens, mini me canescens. Corolla multo minor quam in
JV. grandiflora. An ad *Macronepetat* referenda? - Habitat in Arcbipclagi Graeci
collibus aridis, in Creta et Melos.

Sectio V. MACRONEPETA Bth. I. o. 482.

Cymae pedunculaloc paucinorae. Racemi terminates laxissimi subramosi. Folia
floralia superiora v. omnia bracleaeformia. Calyx elongatus, ore obliquo, denlibus
lanceolalis ovalisve, superioribus sublalioribus. Corollae longe exscrae lubus lenius
exsenus, faux inflata.

51. N. MACRANTHA Fisch. Hort. Gorcnk. ex Bth. I. c. 482. f - Erccia raraosa sub-
glabra: Toll, breviter peliolalis ovalo-lanceolalis serralo-crenalis, basi truncalis
subcordatisve, utrinq. viridib.; racemif elongalit laxiusculis; bracteis minutis; ca-
lycis elongati subincurvi ore obliquo, dentib. lanceolatis, superiorib. majorib.;
corollis calyce plus triplo longiorib., tubo longo exserto, basi attenuato. 2} —
Caules 2-3-pedales glabri v. superne tenuiter pubescentes. Folia 8-4-pollicaria,
ulrinque viridia, superiora minora subsessilia, floralia inflata subconformia, su-
prema porva bracleaeformia inlegerrima lanceolata. Racemi pulchri second!
simplices. Cymae breviter pedunculatae 3-7-florae. Corolla speciosa coerulea
1'« v. fero 17: pollicaris. — *Dracocephalum Sibiricum* Linn. Spec. plant. 830. —
Pall. Fl. Ross. III. t. 13. — Bol. Mag. U 2185. — *Moldatica elata* Mocnch, Melh.
pi. 410. — *JNoldavica Sibirica* Mocnch ex Sleud. Nom. bol. 285. (edit 1.) — *Dra-
cocephalum etc.* Gmcl. Fl. Sib. III. 244. I. 51. — Habitat in jugo Altaico frequens.
52. N. GOVANIANA IHh. I. c. — Krecla raniosa, tenuiter pubescens: foil, broiler
peliolalis amplis ohlongo-ellipticis crenalis, basi rotundalis; racemis elongatis
laxis subramosis; bracteis minutis; calycis elongati subincurvi ore obliquo, den-
lib. lanceolatis, superiorib. majorib.; corollis calyce quariruplo longiorib., tubo
tenuissimo longe exserto. 9} — Valde affinis *JV. macr—Uk***, a qua vli differt foliis
obtusioribus, basi rarius truncatis, racemis subramosis, cymis InferiOribMlongius
pedunculatis et corollis tenuloribus, proportione calycis longioribdf. -* Orieeo«-
phatum Govanianum Wall. Plant. Asiat. rar. II. 05. — Habitat in Indiae orientalis
montibus Himalayensibus, in Casbmerla, Kf darkonta, Kanaour, Sirmore et Kamaon.
53. N. ERECTA Bth. I. c. — Caule erecto pubescente; Toll, peliolalis ovalo-lanceo-
lalis obtusis crenalis rugosis, basi cordatis, sublus subcanescenlib.; racemis elongatis
laxiusculis; bracteis minutis; calycis elongati subincurvi ore obliquo, den-
tib. superiorib. latiorib.; corollis calyce plus duplo longiorib., tubo longe exserto,
basi attenuato. 2* — Affinis *JV. maeranthae*, differt foliis rugosis, subtus canes-
centibus et floribus paucis minoribus. An cum *JV. Goviana JV. wiacranthae* va-
rietas? — *Dracocephalum erectum* Royle mss. ex Bth. in nook. Bot. Mite. 111.
380. — Habitat in Indiae orientalis montibus Kanaourensibus.
54. N. 9LABRA Blh. I. c. 483. — Adscendens glaberrima: foil, peliolalis ovalis acu-
tis, basi cuneatis, inferiorib. serratis, superiorib. inlegerrimis, utrinq. viridib.;
bracteis ovalis laxis calyce breviorib.; racemis laxissimis paucifloris subparticu-
lato-ramosis; calycis elongati incurvi glabri ore obliquo, denlib. lanceolatis, su-
periorib. majorib.; corollis calyce plus duplo longiorib., tubo tenuissimo longe
exserto. % — A A\ *longiflora* differt *Rlabritic* et racemis *Kracilihu** f>immi>>.ii. »^,
mosis, ab omnibus setjuenlibus foliorum forma. — Habitat in Oriente.
55. N. FISSA C. A. Meyer, Enum. pi. Cauc. Casp. 33. - Bth. I. c. 737. — Suberecla
glaberrima: foil, peliolalis ovalo-rotundatis, basi late subcordatis incinio-cernaim,
ulrinq. viridib.; racemis laxissimis paucifloris subramosis; calycis elongati incurvi

- sabglabri ore obliquo, dentib. oblongis, superiorib. sublteriorib.; corollis calyce triplo longiorib., tubo leuissimo longe exserto. ^ — Caules 2-3-pedales, basi subdecurabeoles, superne subnudi. Folia pauca, inferiora longe petiolata viz pollicana, superiora parva subsessilia, floralia minuta oblongo-lanceolata, omnia crassiuscula, subtus venosa. Cymae remotae, in fens ores longissime, superiores breviter pedunculatae, omnes 3-5-florae v. rarius subdichotomae v. in racemos abeuntes. Bracteae calyce multo breviores subcoloratae laevae. Corolla coerulea 10-12 lin. longa. — *N. laxa* Bib. I. c. 483. — *N. longiflora* C. A. Meyer, Enum. pi. Cauc. Casp. 02? — Habitat in Caucaso, in locis lapidosis siccis montium Talysch?
50. *N. LONGIFLORA* Vent Hort Cels. 06. t 66. - Bib. I. c. 483. t — Adscendens subcanescens: foliis breviter petiolatis, superioribus sessilibus, omnibus ovalis crenatis, basi cordatis rugosis, utrinque pallidifloris; racemis elongatis paucifloris; bractei pedicellum vix aequantibus; calycis elongati subincum pubescentis ore obliquo, dentibus lanceolatis, superioribus latioribus; corollis calyce subtriplo longioribus, tubo teoiofimo longe exserto. ty — Caules basi decumbentes foliosi ramosi, superne nudum, alii foliorum pagina utrinque tomento leuissimo subcanescentes. Folia pollicaria, ramealia rariora, caulina superiora remota parva sessilia, floralia minuta bracteaformia. Verlicillastri pauci remoti. Cymae utrinque pedunculatae 3-5-florae Calyx saepe coerulescens, caeterum uti corolla omnino *X. septemcrinalae*. — Habitat in Persia inter Teheran et Ispahan.
57. *N. BREVIFOLIA* C. A. Meyer, Enum. pi. Cauc. Casp. 03. - Blh. I. c. - Decumbens pubescens: foliis longe petiolatis subrotundis crenatis, late cordatis, subtus v. utrinque subcano-pubescentibus; racemis paucifloris laevibus; bracteis calyce brevioribus; calycis elongati incurvi pubescentis ore obliquo, dentibus lanceolatis, superioribus latioribus; corollis calyce plus duplo longioribus, tubo leni longe exserto. 2} — Habitu *N. longiflorae* affinis, sed humilior, nec saepius superne nuda. Folia inferiora vis semipolliceni longiora, et parum latiora petiolo pollicari, superiora et floralia inferiora conforius magis sessilia, superiora subsessilia bracteaformia. Cymae inferiora longa pedunculatae, superiora breviter pedunculatae 3-5-florae. Bracteae lanceolatae aculae, eilerloret inlerdom calyces aequantes. Calyces sessile*, fere 4 lin. longi, pilis paucis hispidis pubescentes, apice colorati, ore obliquo subbilabiali. Corolla coerulea incurva, 8-10 lin. longa, forma omnino *N. longiflorae*. — *A. hngt/lora* Fisch ex Herbolul. — Habitat in alpinis Caucasicis orientalibus Tiflida.
58. *N. CRINIPA* Willd. Sper. plant. III. 50 - Blh. I. c. 470. et 737. - Erecta pubescens: foliis petiolatis ovatis obtusis inciso-crenatis, basi cordatis, utrinque cano-pubescentibus; racemo subterminali; bracteis pedicello multo longioribus, calycis elongati incurvi villosi ore obliquo, dentibus lanceolatis, superioribus latioribus; corollis calyce duplo longioribus, tubo breviter exserto leni. ^ - Affinis *N. tartariae*, sed diversa est: utraque minor, foliis utrinque canis et corollis fere duplo longioribus, a *N. Muutni* differit: racemis vlt secundis, calycibus villosis nec lanatis et cymis subsessilibus. — Habitat in Oriente.
90. *N. SEPTICRINALIS* (RENATA) Eberh. on, et Blh. I. c. 481 f - Brevis fabrifera villosa foliis inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus, omnibus rotundatis oblongis, basi cordatis, utrinque vinctis; racemo elongato paucifloro, bracteis pedicello longioribus; calycis elongati incurvi ore obliquo, dentibus lanceolatis, superioribus latioribus; corollis calyce plus duplo longioribus, tubo leuissimo longe exserto. % - Caules pedales, basi foliosi. Folia *N. Glyceria*. at inferiora, caulinae et calyces pubescentia viscosa leui indola, floralia in bractea caollnatae conforius, superiora minuta inaequalia. Verticillastri valde remoti. Cymae inferiora longiora, superiora breviter pedunculatae 3-7-florae Bracteae plerumque breviter pedunculatae. Corolla J- lin. longa coerulea griseis. - Habitat in Africa aegyptiaca, in Aegypto in insula Sialco.
91. *N. TETRACRINALIS* Willd. Boon. pUnt. hort. Berol. 60S. - Blh. I. e. - Cymae pubescentibus. % - Folia longissime petiolata non serrata, tubo obovato utrinque

dentibus 4-0 grossis instructa., pubescentia, semipollicaria. Racemus e cymis paucifloris dissilis compositus. — Habitat in Armenia.

61. N. LAMIFOLIA Willd. I. c. — Bth. I. c. — Cymis pedunculatis nullifloris; corollae tubo filiformi curvato; foil, ovatis cordatis obtusis peliolalis serratis pubescens. % — Planta facie *Lamii amplexicaulis* tola pubescens. Folia peliolata 4-linearia. Caules 4-5-pollicares adscendentes. Cymae axillares pedunculatae nulliflorae. Flores in apice caulis verticillato-capitali. Corollae tubus longissimus filiformis curvatus, superne dilatatus. — Habitat in Armenia.

Seotio VI. GLECHOMA Linn. Gener. plant no. 743. — Bth. I. o. 484.

Verticillaris axillares pauciflori, foliis corollis caulinis conformibus. Calyces tubulosi subincurvi, ore obliquo, dentibus lanceolatis aristatis, superioribus productioribus. Corollae exsertae tubo extra calycem dilatato. — Uerbae prostratae v. repentes.

02. N. GLECHOMA Blh. I. c. 485. f — Procumbens: foil, peliolalis rotundalis emarginatis, basi cordatis, utrinque viridibus, floralibus conformibus; verticillatis axillaribus paucifloris; bracteis pedicellum vix aequantibus; calycis elongati subincurvi villosi ore obliquo, dentibus lanceolato-subulatis, superioribus majoribus; corollis calyce triplo longioribus. % — Caules elongati prostrati, basi radicales, rami floriferi adscendentes, magis minusve villosi. Folia circiter pollicaria, suprema minora, at conformia. Verticillaris omnia distantes. Floret folio plerumque breviores. Pedicelli breves. Calyces 3-4 lin. longi, fructiferi reflexi. Corollae coeruleae 0-7 lin. longae v. in var. r- vix lin. Antherarum loculi divergentes, nee omnino divaricati et idcirco antherae cruciatae dicuntur, quae porro in pluribus aliis speciebus occurrunt. Var. *fi. hirsutior* est, var. 7. omnibus partibus minor et glabrior. — *Glechoma hederacea* Linn. Spec. plant. 807. — Hook. Fl. Load. II. ic. — *Chamoedema hederaceum* Moench, Mch. pi. 303. — *Chamoeclema vulgare* Vail. Dot. Paris, t. 0. fig. 4. 5. 0. — *Calamintha hederacea* Scop. Flor. Cam. no. 730. — *Glechoma micrantha* Bonmgh. ex Rchb. Fl. Germ, excurs. 310.

fi. hirsuta: - *Glechoma hirtuta* Waldst. et Kit. Pl. rar. Hung. II. 194. t. 110. -

Glechoma magna Merat, Fl. Par. 225.

T. parviflora: — *Glechoma heliophylla* Opl. ex Rchb. Fl. Gem. excurs. 310 — *Glechoma inUrmtida* Schrader. — Habitat in Europa omni et Asia boreali ad sepes et fossas, in silvestribus et in rod. et in us, occurrunt in Europa meridionali, et verosimiliter ex Europa allaUu 1 : °* .

03. N. MVALIS Blh. I. c. 737. f - Radice repente; caule hamili; foil, levibus rotundatis rugosis, utrinque viridibus, floralibus conformibus; verticillatis axillaribus; bracteis pedicellum vix aequantibus; calycis elongati subincurvi pubescentis ore obliquo, dentibus lanceolatis; corollis tubo torto resupinatis; saminibus superioribus exsertis. % — Caules basi ramosi, floriferi simplices suberecti 4-0-pollicares. Corolla dilute coerulea, more *Lophanthus chinensis* resupinala. — *Glechoma nitalti* Jacquem. mss. — Crescit in Indiae septentrionali-orientali montium glareosis altissimis creta Ytrpo.
04. N. TBIBETICA Bth. I. e. — Caule diffuso humili ramosissimo; foil, breviter petiolatis rotundatis, basi urinato-cuneatis subcoriaceis pubescenti-subulatis, floralibus conformibus; verticillatis axillaribus; bracteis pedicello longioribus; calycis elongati subincurvi dentibus lanceolatis subulatisve; corollis rectis, fauce dilatatis; genitalibus corolla brevioribus. - A praecedente differit corollis majoribus, calycibus bracteisque mollioribus villosis. - *Glechoma tibetica* Jacquem. mss. ~ In Indiae orientali-septentrionali schistosis aridis Juxta Koo-khio-ghang el Lari.
05. N. LONGIBRACTEATA Blh. I. c. f - Caule diffuso humili ramosissimo- foil petiolatis ovalo-rotundatis, basi truncato-cuneatis molliter villosis, floralibus subconformibus; verticillatis densis ad apices ramorum congestis; bracteis linearibus corollas aequantibus; calycis tubulosi subaequalis dentibus tubo subaequalibus corollis rectis, fauce parum dilatata; bracteis corolla brevioribus. - Ramis porpurascens tomentelli. Folia inferiora saepe squamiformia, superiora

semipollicaria longiuscule petiolata, floralia angostiora acutiora, suprema bracteaeforraia Bractea et calyces villosissimi. Corolla azurca. — Crescit in India onenlali-seplentrionalis montibus, ID arenosis mobilibus Rang-rang-gtaan-li.

Seetlo VU. ORIHOMEPETA Btb. L e. 485.

Florum cynnae densae, breviter pedunculatae. Verticillatae distantibus racemosis. Racemi simpliciter v. saepius paniculato-ramosi. Calyces ovalo-lubulosi subrecti, dentibus sobaequalibus subulatis rigidis, nee pungentibus. Corollae exseriat. — Herbae elatae, foliis subsessilibus.

60. N. LATIFOLIA DC Flor. Franc. III 528. — Bib. I c. — Ererla elata pubescentibus: foliis sessilibus ovatis obtusis crenatis, basi subcordatis, utrinque v. in nervis, racemo elongato multifloro; bracteis lanceolato-subulatis, calyce brevioribus; calycis ovali pubescentis ore dentibus. Smell. tabaequalibus; corollis calyce duplo longioribus. 2l. — JV. *nudae* afflois, fed certe distincta. Pubescentia, praesertim in exemplaribus sylvestribus, saepe viscosa. Folia fert* duplo majora magisiora el proportionem laliora quam in *N. nuda*. Racemi longi densi, parum ramosi. Cymae dichotomae. Bractea interdum calycibus subaequales. Calyces fructiferi 3 ho. longi, uti bractea saepe coeruleascentes. Corolla coerulea, exserta pubescentibus. — A" *grandiflora* Lapeyr. Hist. abr. pi. Pyr. 320. — *N. coerulea* Ait Hort kewens. II. 285 — Habitat in Europa anstro-occidentali, in Illopania et in Pyrenaea versus orientem specialibus.

67. N. MJPA Linn. Spec. plant 707. — Btb. I. r. 486 f - Ererla elata glaberrima: foliis sessilibus. T. m. petiolatis oblongis emarginatis, basi subcordatis utrinque v. in nervis; racemis multifloris paniculatis, bracteis pedicello magis longioribus; calycibus fructiferis ovali pubescentibus ore dentibus strictis subaequalibus; corollis calyce dimidio v. duplo longioribus. 3* — Caules 9-4-pedales, obtuse leiragooi Klabri • tenuissimo pubescentibus. Folia 1%-8-pollicaria subnigrescentibus, subtus reticulato-venosa, saepe glabra v. subglabra l'culaaisM pobaeewtla, loralla Infima coDformia ajradatim mi' nora, superiora bracteaeformata lloamrlt acuu totogerrima, vii pedunculo longiora, ramea interdum breviter petiolata. Panicula saepe terquipedalis, rami ronn-pedalis. Cymae multiflorae, pedunculi inferiores fere 2-6 lin, superiorum vis gemineam longi, rami et pedicelli nunc brevissimi, nunc longissimi. Illicae vis calycis tertiam partem aequantes subulatae rigidae Calyces flonffn lenues lubulosi, fructiferi inflati o^ah 2 lin longi pubescentibus Corolla alba T coeruleascentibus 4-0 lin longa, tubus inclusus, faux arapla, huiusmodi cupens brr^e erectum concavum, inferius lobi laterales palentes subreflexi inlegerrimi, infimus mus emarginaluH rrenatus concavus*.

a. *grandiflora* corollis saepius purpurascensibus v. coeruleis. — JV. *Pannomca* Jacq. Flor. Austr. II. 18. I 1». — *Y *paniculata* CranU, Slirp. Austr. 370 - A *italaeo* | ill Fl Delpb II. 367 - *Calana nuda* ffoeneb, Metb. P. 3BA. — *Catmra nolaeae* Moench ei hteud. >om. bot. AU. (ediU I.) ^
fl parr %fl or a corollis saepius albis. — X *Pammomca* Lino. Spec plant 7077 — A *nuda* Jacq. Fl. Austr. I. 17. t 24. - N *Iscamca* M. Bleb. Fl. Taar. CaOC II. 41. - A *alba* De%af fl Steud. Nom bot 5H. edit. I) - <ataria pa**?j! Iota Hoencfa ri Slrud Norm bot. 5U (edit. I - Habitat in Kuropae australis praesertim orientalis el Anae Sibiricae apricis caedois graminosis sylvaticis que praesertim monosis.

Stetto ?UL OXICPSTA Bth L e. a t.

Florta diaUncli v. ad apice* ramorum glomerati rotundato-paniculati. Calyces lubulosi subrecti, dentibus subaequalibus tubulosis tubungentibus Corollae dentibus calycinos aequantes f. ||| superant* Illicae bumiks Folia piffumque peiilaia

< X PARVIFLORA U Bieb. Fl Taur Cauc II 41 - Bib I f - subrectis paniculata villota foliis ovatis v. ovalo-lanceolatis (obtusis) serratis. Calycibus rotundatis cordatis, utrinque rigidis. Rami lant inbotone panicis* bractea liataribus calycem aequantibus; calycibus otato-tubulatis pubescentibus <

aequali, dentibus linearibus rigidis corollam superantibus. 2l. - Caulis pedalis, rami divaricati tetragoni, basi pilis palenibus villosi, sub floribus lenius pubescentes. Folia inferiora 1-1' A-pollicana, grosse serrato-crenata rugosa, supra tenuiter pubescentia v. fere glabra, subtus laxe villosa, superiora gradatim magis sessilia integriora minora angustiora et acutiora glabriora, suprema bracteiformia, uti bractee calyces subaequantia linearia acutissima inlegemma umnervia, vix pubescentia. Flores 3-5 ad apices ramulorum paniculae subsessiles. Calyces 3 lm. longi erecti, profunde sinuati. Denies lubum subaequantibus aculis Mmi subpungentes. Corollae minutae coeruleae*, exclus pubescentes — Habitat in Taunae et Caucasi etiam Iberiae campis coUibusque SICCIS, prope Cberson, Odessa et in montibus Talyscb

60. IS UCRANICA Linn Spec plant 797 - Blh I. c 487. f - Erecta paniculata subglabra. foliis caulibus subsessilib. oblongo-lanceolatis obtusis »ubdentatis«, basi rotundato-cuneatis, utrinque v. mdib, cymis laxis tnehotome paniculatis, bracteis linearibus; calycis elongati bispidi ore subaequali, dentibus lanceolato-lanceolatis acutis corollam subaequantibus. % — Habitat *N parviflorae* bimilt*, sed disimela caule folisque glabris v. tomento tenuissimo subcanescentibus, foliis leniibus nec rugosis et calycibus fere duplo longioribus, saepius hiipidolis. Tota planta siepe in parte superiore purpurascit. Corollae coenileae tubas tenula inclusas, faux incurva, limbo labium superius subreclum, inferiores lobi laterales inlegerrimi, vix palentes, denies calyctibus aequales, lobus medius duplo major orbiculatus concavus crenatus. — *Teuertum Stbiticum* Linn. Spec, plant 788 — *JV Stbinca* M Bieb. Fl Taar. Caac. II 41. — Habitat in Sibiria circa Orenburg, in deserto Soongoro-Kirghisico, ad Irlim in Jugo Altaico.

70 N HELIOTROPICIFOLIA Lam Diet I. 711 - Bth. I. c. — Erecta paniculata ctenescens foliis brevissimis petiolatis oblongis subintegerrimis, basi anapmalis, utrinque canescentibus, cymis taxibus tnehotome paniculatis, bracteis linearibus, calycis elongati bispidi ore subaequali, dentibus lanceolato-linearibus acutis corollam subaequantibus tj. — *N Ucranicae* simillima, sed in differ I foliis subintegerrimis, basi angustatis et ramis, foliis calycibusque pubescentia t. l. omni t. brevis canescentibus. — *Saiureja tritico* Rasa. Nat Hist Alep. — Habitat in Orientis, in Syria prope Aleppo.

71. N. PUNGENS Blh. I. c. — Erecta glaberrima: foliis petiolatis ovatis acutis basi angustatis subcarnosis, utrinque abaequantibus. bracteis foliaceis subsplens calyce longioribus; calycis elongati ore subaequali, deo. linearibus rigidis, corollis calycem tix superantibus. % — Caulis erectus herbaceus basi ramosus, vix pubescens semipedalis. Folia (*Chenopodii*) aeole dentata, basi attenuata, in petiolum decurrens carnosula glabra subcanescentia, petiolo basi dilatata, floralia conformia minora. Venicillis discretis (30-flori et ultra), multifloris remoli, supremi approximati splcati. Bractee nervosae acutissimae nigidae. — Habitat in Persia inter Bagdad et Kerraanba.

72. N. PUSILLA Bib. I. c 488. t - Pumila erecta, lenius pubescent foliis paucis patris ova acute serratis, floralibus. auperia bracteis lanceolato-linearibus acutis pungentibus; floribus. cymoso-capita t. subcorymbosis, calycibus tubulosis pabeteentibus denis sabaequalibus acutissimis, corollam superantibus 2l. — Caulis filiformis subsimplicis 3-4-pollicares, apice ramis paucis corymbosis. Folia 3-4-linearia subglabra, utrumque viridia, serratis hinc inde anstulatis, floralia multifida conformia, inlcnora v. bractee inlegemma basi angustata, at sensu, calycis acquantia. Gjm. 3-5 irregulares densae capituliformes pauciflorae (!-lycea sessites, 3 lm longi, basi subinflati. Corolla minuta lenius, at otnmo *Nepetorum* hujus sectionis. Stamina eerie didynama, infronora breviora - /o *typhora pungent* Bnkc mss in I edeb Fl All I O - Lcdi-b Icon (I Ru) - All illustr t 121 - Habitat in Allaico monti Arkaul

t *Spenes dubiae*.

73. N. JAPOMCAVA Willd Spec plant III 52 - Blh I c { - Horum n. a. i. i. (U. a. axillaribus, foliis pedunculatis ovatis terrain tomentosis ^ - < * , ! , , herbaceus

- inferoe teretiusculug decumbens nudas, superne obtuse telragonas erectus tomentosus iadivisus spilhamaeus v. paallo ultra. Folia opposita peliolaia ovala acula serrata, utrinque lomeotosa, led sublus magis albida palenlia semipollicaria, superiora sensim minora. Petioli tomentosi, lineam longi. Flores paniculali. Paniculae in supremis foliorum axillis opposilae trifidae fastigialae. Pedunculus lineam longus, pedicelli axillares. Stamina flore duplo longiora. — *A. incana* Thnrg. Fl. Jap. 244. — Habital io Japooiae summis montibus magDae Kosido.
74. N. MACRURA Ledeb. ex Spr. SysL vegetab. II. 729. - Bib. I. c. - Cyanis multifloris palentib., paiculatis subapbyllis; calycib. incanis slriatis; foil, subcordalo-triangularib., looge peliolalia serratis canescentib., summis inlegerrimis. 2j — In Flora Altaica deesl. — Habital in Sibiria.
75. N. NEPALENSIS Spr. I. c 730. — Bib. I. c. 489. — Spicis composilis subsecnndis; calycib. incaois; foil, laoceolalls medio serratis petiolatis subreflexis, ulriq. altenualia iniegerrinis. % — Habital in Nepalia.
70. *N. CANESCENS Raeaach ex Steud. Norn. bot. 452. - An *Uyptit caneseent*?
77. *N. PATAVINA Fisch. ex Sleud. I. c. — An *Melissa Patacina*?
78. 'N. PAUCIFLORA Spr. ex Steud. I. c. — In tyslemaie Sprengelii omissa.
79. *N. SIDAEOFOLIA Raeusch ex Stead. I. c. 553. - An *Byptit polyantha*?
80. *N. SUAVEOLENS Roemer ex Sleud. I. c - An *Hyptis luaveolens*?

ft *Species e genere excludendae.*

- N. AMBOIMCA Linn. - ANISOMELES OVATA.
 N. ARISTATA Rich. - HYPTIS PECTIN AT A.
 N. CRETICA Dielr. - MICROMERIA MARIFOLIA.
 N. CROATICA Spr. - SATURBJA RUPESTRIS.
 fi. DISTICHA Blume. - ANISOMELES OVATA.
 N. INDICA Bam. - LEUCAS DECDMBENS.
 N. INDICA Linn, — ANISOMELES OVATA.
 N. LOPHANTHA Flaeku — LOPHANTBU8 CHINENSIS.
 N. MADAGASCARIENSIS L I D. — PLEGTRANTHUS ROTUNDIFOLIUS?
 N. MALABARICA Linn. - ANISOMELES MALARARICA.
 N. MARIFOLIA Cav. - MICROMERIA MARIFOLIA.
 N. MITABILIS Rich. - HYPTIS SPICATA.
 N. PECTLV4TA Linn. - HYPTIS PECTINATA.
 >*. PERSICA Poit « HYPTIS PECTINATA.
 N. PINNATIFIDA Fitch. - DRACOCEPUALIM BOTRYOIDES.
 N SCORDITIS Viv. - BALLOTAE SP.
 N. SERPYLLIFOLIA M. Bieb. - MICROMERIA MARIFOLIA.
 N. YERSICOLOR Trev. - CRANIOTOME VERSICOLOR.
 N. VIRGLMCA Linn. - PYCNANTHEMIM LANCEOLATUM.
 GLECHOMA GRANDIFLORA DC. - STACUYS CORSICA.

3037. MABMORITIf t *Bth.*

(Bib. in Hook. Bot. MifC. III. 317. - Meiin. Gfner. plant, vaaeul I. 285. II. 1H T
 Bib. Labial, genrr. el spec. 489)

- I. M. ROTtNDIFOLIA Royle ex Bth. in Hook. Bot. MifC III. 377. el Labial. 490. t
 — Caulis baii cratius ramotui. Rani barbarei procurobentei tenipedalef su*
 ainplicei tomentoto-tillo»i, apice dente folmsi. Folia frre *Lamii mptis icoultis*
 raniformia, omoia peliolaia rugosa crenaia el utrinquf, praesertin ad p^{ina} ?
 ioferiorein, lomeoto albo lanuiculo lanala. Yrriinllaslri paaciflori teenndi_f <
 aiillii foliorum •operiom m ditpotiti el plerumqoe petiolit bretioret. Breia**
 lanceolaue calyce aabbreviorea. Caljce* tomemoio - pubeicentet, denies tubo
 aequalet aculi, ted non ipinotl. PlanU habitu *Lantum ampUxicaii** 9if 80-
 daniDodo N*ptl*_m *Guckotmim* rtferl. cbaraclenbat *Oracocepka* *maU*
 *114. 2 - Habiui in India oriental) in nonlibui profiociae Kanaour.

3637/., CIAMAESPACOS Schrenk.

(Schrenk, Enumer. plant, nov. 27. - Endl. Gener. plant. Supplem II. Addend p. 105 - Meisn. Gener. plant, vascul. II. 360)

1. CIL. ILICIFOLIUS Schrenk 1 c 28. - Herba pusilla glabruscula foil, peliolalis oblongis v. ovalo-oblongis aculis, flonb in foliorom axillis solilarus subsetsilib., bracieis brevib selaceis fultis; calycis [*Lamtorum*] denlib. anbaequahb. setaceo-acominaiis inermib, fauce villosa, sed nunquam clausa, corollae(violaceae') tubo elongato fill form i longe exserlo, labio supenon longion, labu inferioris brevions lobis suborbiculatis, slamimb. tubo longionb, limbo brevionb., antbens alro-violaceis, carp id us nigncantib. elongalis tngonis, dorso rotundatis, vertice alis tribus angustis apice confluentib cristato O — Ad lacum Balcbasch in Soongana

3038. DRACOCEPIHALUM Linn,

(Linn Gener. pi. no. 720. — Meisn Gener plant vascul. I. 286. II. 194 - Blh Labiat gener. el spec. 400. et 738.)

Sectio I. KEIMODBA00I BUL L O. 402.

Caules procumbentes ramosissfmi. Folia suborbiculaia inciao-crenata v. tub-palmato-pinnaiifida. Flores oapiuto- v. oblongo-tpicali. Antherae glabrae.

1. DR. PALMATUM Siepb. in Willd. Spec plant III. 151. — Bib. I. c. f — Caule procumbente villosa; foil, peliolalis ovalo-rotundatis palmato-pinnalifldls, ulrinq. viridib. villosis, verticillaitris capitato-ipleatia; bracieis partla enneatia setaceo-dentlaiis, calycis dente supremo lato truncato; corollis calyce subtriplo longionb., labio supenore elongalo incurvo. 2]. — Kami floriferi adscendenlen 2-3-pollicares, uii folia molliler villosi. Folia 3-4 lineas longa et lala, peliolo semipollican, supra rugosa, subtus nenrosa, lobis ad medium foln altingenlibus oblongis obtusis iniegemmis, sinubus acutis, floralia magis se^silia anguslora, obtuse dcnlata, ai vindia el rugosa, nee membranacca. Ycrlicillasn pauci 2-6-Don approximaii Bractcae calyce raullo brviores subpalmato-dentatae membranaccae villosae Corolla speciosa purpurascens, fere glabra — Habitat in Sibma oriental! prope Ishiginsk.
2. DR. BOTRYOIDES Siev. in Mem. Soe. nat cur. Mosq HI 906. - Bth. I. c — Caule procumbent* villoao; foil, peiolalis ovaio-rolandtlis palmalo-plnnaliQdis, uiriaq. aubtrldlb. villoala; veriicillasirls captuto-?. oblongo-splealla; braeteia cuneatis incisib; calycis denie supremo o?ato teolo; corollis caiyee dlmidio longiorib., labio auperlore bretl recto. % — A *Dr. patmuto* differ! folila param majonbus, verticillasiris 6-10-florls, denslos tpcalia, braeteia calycem subaequaniibus, calycis dente supremo mlnut dilatato et praesertlm corollis exiua villosis, galea labio infer!ore dlmidio brevior. — *Nepeta pinnatiffida* Flsch. CaL bort Gorenk. 1812. 22. — Habitat In Caucaso oriental!, tub alpe Tysendagh in ripa glareosa torrentis Chodjal, in alplbui Tufandagh inler fragmenta schist!.
3. DR. DISCOLOR Bunge msa. ex Bib. I. c. f — Caule procumbente ramoso; roll, petiolatm ovatif profunde pinnatifldia, lacimis margine revolutis, supra viridib. gUbruaoulli, subtoa alba; •erlicillastria oblongo-apicatis; bracieis exienorib cuneatis seuceo-deouils; calycis dente supremo lato truncato arlstaio, corollis caiyee duplo longioribus. 4 — Canles prostrati radicaies, rami flonfen adscendentes 2-4-poll I cares, tenuiter pubescentes Y. canescentes. Folia 3-4 ||n. longa, regularlter, ut in *Scutellanoe orientalis* var. *ft*, profunde pionatiflda •. subpalmata, supra rugulosa, sublus lomenlo lenuisimo alba, laciniis linearibus opposlls 3-4-jugis inlegernmis Y. inferionbus bifldis, sinubus obtusis, floralia inflma conformia, sapenora bracleaeformia. Spica 1-1'/t-pollicans densa Y. baal laxa subinierrupta. Bracleae exleriores sessiles semipollicaret, calyces excedentes membranaceae subcoloralae ciliatae, apice pinnalim 3*5-dentatae, intenores subinlegrae lanceolalae, omnes artslalae Verlicillasn subsexflon Corolla coerulea — Or *ortganotdet* Ledeb. Fl Ail II 383 fnon Steph) — Habitat In Sibnac jugo Allaico, in subsalsis aspens montium calcareorum el nclusosorum ad fl Tschbyarysch \ersus oslium fl. Kerlk el Kan

4. OR PI>NATUU Lino Spec, plant 839 - Lcdeb. Ic pi. fl. Ross. Alt. illuslr. t 445 — Bib I c 493 f — Caule procumbente ramoso, foil pciiolatis ovalo-rolundalis subpalmalo-pinnalifldis, ulnq vmdib subvillosu*, \erlicillastris capilato-spicalis, bracleis exlenonb. cuncalis inci>o-denlali*, caljcis dente supremo o\alo an«lato, corolla calyce dimidio longiore bratleas subacquanie. 2l. — Caulis proslralus ramo»issimus, rami Don fen brete* adscendenles pubescente». Folia longe petiolala, 3-4 lin longa el lala, ba»i subcordala, lacinnis oblusis ad medium limbi vix ailingentibus, supra rugosa, sublus paucinema, margine subrevoluia, floralia infima sessilia oblonga oblusiu»cula, suprema bracteis conformia Spica densa sesquipollicans ovala Dracleae 6-8 lin longae, exlenores Do res supcrantes membranaceae cilialae, apice acuis&ime J-5-fidae — *Dr pinnahfidum* Lam Diet II. 310 — Habitat In Sibina, in lapidosis aspens alpintis Altaicis ad fl Tschuja, ranor In monle Tarbagatai descrti Soongoro-kirgblad el in insula Olchon ad lacum Baical.
- 5 DR ORIGANOIDE9 Slep. in Willd Spec plant III 151. - Bib L e t - Caule procombente, ramis Mllosls, foil peliolais ovato-roiundalis mciso-crcnalis, utrinq viridib pubescenlib, veriicillaslns capiialo-spicalis, bracleis maximis lalp runealis inciso-denlatis, calycis denlib. omnib. lanceolatis membranaceis, supremo vn latiore, rorollis calyces vix eicedenlibus. 2l — Folia laiora el minus mcisa quam in *Dr pinnato*, Ooralia maxima, infima bi>i membranacca, apice foliacea cuneala, suprema bracieis conformia Spica globosa, fere se^quipollicem diametro Bracieae numeroiae, 8-0 lin. longae membranaceae purpureae THIO-sae dentibus lanceolatis oraliive anslali», inlenores angustn res. Calyces membranarn, bracieis bret tores. Corollae corrulcae brarleas subaequanles, raclrum lonbus *Dr. pinnatt* conformes. — Ilabilal in Sibma, in summis alpibus AUaicis d 0. Tschuja.

ItettoIL 0AUDaU00IBULLe.4M.

Caules baal ertaal. Raal lorlferl ereeU paucfollail. Folia sobradlcalla, longe peliolaia crenaia. Vertlellastris capiUo- t. oblongo-spical. Anlberae glabrae.

- 0 DR IUBERBE Bunge mss. ex Bib. I. c. f — Subglabrum caule credo bumih; foil radicalib longe, caulmis paucis broiler puolalis, omnib remformib. profundo crrnalis, utrinq \indib, verlicilla^lris capilalo-spicalis, bracieis coealii inriM» K'<^>n, cal)Ci» denlib superiorib oblongis, corollis caljce duplo longio" n)U» "4 — (aules ba^i caespilosi, foliorum emarndorum rudimenlis obiecli* Kami florifen erecli semipedale» glabn v tenuier pubescenlen Foliorum radiealiioiB pedoli 3-pollicares, limbo vix pollican, utnnque glabnu^culo, caulinorm parU umci mulio roinora, floralia »es»ilia subcolorala Bracieae <emipollicaret cel©; raiae, margine inirrdum subpubescentes, cal)cc« subaequanles. Calyces eoloraU glabnusruh submcunri, deotibus loperionbus parum lalioribus longioribusqo** Corolla coerulea pollicam, tubo apice dilalalo, basi parum allenualo, l*b'» subaequalia. — Ilabilal in Sibinae summis alpibus Allaicis ad II. Tschuja.
- 7 DR (.RODIFLORIM Lion. Spec plant 630 - Bib I. c. f - Bol. M»\$''< 1000 — Caule erecto, superne piloso, foil radicalib. longe penolais oblong le oblusis crenaiis, basi cordalis, caulmis paucis brctucr peliolaim ovalis, offbi' b uinnq Tindib subglabris, Ooralib orbiculais pilosis, supremis bracteis r'fifH^ ^erucilla»iris oblongo-spicalu, bractri* maunm orbiculato-cuocalii toCloo-doa Uln, calycis denlib supenonb. oblongis, corollis amplis cal)ce iriplo longior-boa. ^ — Caules e basi crassi perenni foliorum emarndorum rudimenlis nigris ottecia eomplores erecli, nunc 3-4-pollicares nunc pedalrt, »uperaf s«b axille el ad anguloi pilo.i, bati Rlabrali Folia radicalia *StackyJu llttoimef*, 1-3-pollicana, caalioa paaca peliohi brevibus dilaUH« cihaiis »ubconnahs, suPeriala sesulia rotundaia, Ooralia bracteis subconformia Hpica i-3-pullicaris, verticil-lasiro inflnin sarpius distineio. Bracieae fere polhraret, inienores suKustiores, »a«is minusve coloraue Corolla coerulea fere bipollicans — UifC f spe-clet et *Or. imktrto* a *NtpH** non nisi bracieis d.lferuou - *Dr. AUatense* -aim.

- in Nov. comm. Pelrop. XV. NO. t. 20. fig. 5. - Refab. Icon, plant, cult, et colend. L t. 06. — In Sibiria frequens, in Jogo Altaico ubique in alpinis et ubalpinis.
8. DR. SPECIOSUM Bth. in Wall. Plant. Asiat. rarior. II. 63. et Labial, gener. el spec. 404. — Caulis erecto pubescente; foliis radicalibus longe petiolatis late cordiformibus, caulinis paucis breviter petiolatis, omnibus rugosis, obovatis viridibus, subtus pubescentibus, floralibus orbiculatis subbracteiformibus; verticillatis oblongo-spicalibus; bracteis orbiculatis inciso-crenatis, calyce multo brevioribus; calycis dente supremo ovalo; corollis calyce subduplo longioribus. — Radix fasciculata, fibris incrassatis. Caulis simpliciter 1-1 $\frac{1}{2}$ -pedales, sub floribus molliter villosi. Petioli foliorum radicalium 3-5-pollicares, limbo vix pollicem longo, fere 2 poll, lato, supra glabrescens, sublus ad venas pubescens. Foliorum caulinarum paria 2-3 inferiora radicalibus conformia, at minora, breviter petiolata, superiora sessilia ovala, floralia omnia orbiculata, infima calyces superantia, superiora breviora. Verticillatae 2-4 densae subsecundae, infima saepe distinctae. Bracteae 3 lin. longae. Calyces simplices 6-lineares amplius incurvi, dente supremo ovalo, lateralibus oblongis, inferioribus lanceolatis. Corolla exclusivè villosissima purpurea? — Habitat in Indiae orientalis jugo Himalayensi, in Gossain Than.
- d DR. FRAGILE Turcian. mss. ex Bth. I. c. 405. t — Caulibus decumbentibus aristatis pilosiusculis; foliis petiolatis oblongis obtusius obsear crenatis, basi rotundatis, obovatis viridibus pilosis glabrescentibus, floralibus bracteisque sessilibus ellipticis integerrimis mucronatis membranaceis pilosis; verticillatis oblongo-spicalibus calyces aequantibus; calycis dente supremo maximo orato; corollis calyce subduplo longioribus. — Caulis crassus procumbens fuscus, rami pedales, ad nodos articulationis fragiles tetragonae, saepius, praesertim in parte superiore, pills reflexis induti. Folia 1-1 $\frac{1}{2}$ -pollicaria, leviter late crenata et fere glabra, interdum (ramorum scirpium?) angustiora integerrima pilosa. Spicae 2-3-pollicares, verticillatae infimo subdistinctae. Bracteae maximae, pallide virentes, lenissime reticulato-venosae, margine et ad venas pilis longis ciliatae. Calyces 6-8 lin. longi, basi purpurascens striati hispiduli, apice pallidi membranacei, dente supremo caeteris subtriplo latiore. Corolla flavescens incurva, exclusivè pubescent, tubo breviter exserto, basi attenuata, fauce dilatata, labiis subaequalibus. — Speciet-calycis et habet *Dracocephala*, eul bracteis integerrimis ab hoc genere recedit — Cretum in Dauria ad lacum Ilosonpl.
- ia DR. LAMIFOLIUM Desf. Ana. mot. Par. 3. L A — Bth. 1. e. - PoU. ovatis obtusius crenatis; floralibus terminalibus; corollae labio topiore bifido, laciniis deaeulis. — Caulis simpliciter tetragonae 6-19-pollicares caeteris. Folia petiolata, uti caulibus pilis brevissimis cooperta. Floret ad tunc caulium caput. Calyx dilatatus, laciniis 5 profundis aculis rectis subaequalibus. Corolla tsagna rosea 4-5-pollicaris, tubo recto villosa, a basi ad apicem dilatata, fauce inflata, labium superius elongatum concavum, laciniis 2 obtusius oblique truncatis, Irregulariter dentatis, labium inferius trifidum, lobis lateralibus brevissimis, Inferiore profunde emarginato bifido crenato porpureo - maculato. — An *Nepetae* »peies? — Dabitur foeret fissuris rupium.
- Seetit in. CRIPTODRACOI Bib. L d. 49ft.
- ^tules erecti ramis foliosi. Verticillatae ciliato-spicati. Antherae glabrae.
11. DR. PARVIFLORUM Null. Gen. pi. N. Am. II. 35. - Bth. I. c. - Caule erecto ramoso pubescente; foliis petiolatis lanceolatis inciso-crenatis serratisve, obovatis viridibus, subtus pubescentibus; verticillatis capillato-spicalibus; bracteis ovato-cuneatis irregulariter dentatis; calycis dente supremo late ovalo; corollis calycem excedentibus. — Caulis herbaceus pedales v. vix semipedales. Folia *Dr. Moldavicae*, at glandulosa, subtus pubescentia. Spicae globosae v. oblongae densae ad apices caulium et ramorum. Folia floralia exteriora caulibus subconformia sessilia nuda, scirpium brenner anstatis, interiora bracteis subconformiter, Bracteae uti calyces vides venosae glabrae v. ciliatae, aristae brevibus r-ruin tuncpungentibus. Corollae parva coerulescens, eilui pubescent. - Hic, iat m

America septentrionali ad lumen Missouri prope arcem Mandan, ad Red River ei prope arcem Cumberland House ad flumen Saskatchewan.

Seotlo IV. MOLDAVICA Bth. 1. o. 406.

Caules erecti v. ascendentes foliosi. Verticillasiri distantes subracemosi. Antherae glabrae.

12. DR. STAMINEUM Karelin et Kirilow, Ballet, de la soc. impér. des naturalist, de MOSCOQ XV. 423. t — Perenne pubescens muUicaule: caulib. ascendenlib. ramosis; foil, cordato-orbicularis v. reniformib. obtuse inciso-crenatis; bracteis parvis cuneato-oblongis integris 2-3-dentatisve, denlib. aristalis calycibq. bilabialis villosulo-lanatis, labio superiore late trilobato, inferiore bipartito, lobo medio labii inferioris corollae vix emarginato; geophilis longe eiteris. 2|. — Habitu Dr. *imberbii*, at minor foliisque minoribus fructu. Bractee absque arisia calyce triplo breviores ovatae mollicae aut aristatae T. ad latera denubua 1-2 arilatifoliae. Corolla Intense aerea. — Ambigit inter *Kaimodraconet*, *Kaidrakona* ei *Moldavicum*. — In glareosis summorum alpium Alatau ad fl. Sarcban.
13. DR. MOLDAVICA Linn. Spec. plant. 830. — Bib. I. c. f — C^{uic} <^recto ramoso; Toll, petiolatis lanceolatis inciso-crenatis, floralibus angustioribus, basi aristato-serratis; verticillastris distinctis longe racemosis; bracteis lanceolatis aristato-serratis; calyce bilabiato, labio superiore late serratifido, inferiore bipartito; corollis calyce plus duplo longioribus. ^ — Herba I-PA-pedalis glabra v. lenissime pubescens. Folia pollicaria, inferiora late lanceolata obtusa, grosse crenata, basi subincisa, crenatis et lobis omnibus mucosis, superiora et floralia angustiora, apice obtusa et obtuse serrata, basi angustiora, ferruginea longe aristatis, omnia utrinque vtriusque glandulosa. Verticillastri fl-10-flori, racemosa semipedalea T. pedalem formaitea. Bractee foliis floralibus dimidio breviores ei lit antheris, — 4 a 400, aplee emittunt omnes aristati*. Corolla eoenileia ?. alba, faecies nuda. — *Moldavica* Moench, Meth. plant. 4ia — Crescit in Sibiri orifera, etiam in India orientali, America meridionali etc. e borbis dispersum.
14. DR. HETEROPHYLLUM Bth. I. c. 738. - Caulibus ascendenlib.; roll, petiolatis oblongis crenatis, infimis rotundatis subreniformibus, basi cordatis, superioribus oblongis, floralibus basi angustatis basi cuneatis. oblongis aristato-dentatis; calyce bilabiato, labio superiore late semilobato, inferiore bipartito; racemo subspicato. 2|. — A l>r. *Moldavica* differt statura humiliori, raris subsimplinibus, spica densa et foliorum forma. Folia flammula supra rugosa, subulosa nervosa, superiora saepe pubescentia, caulina nunquam aristata. Flores Dr. *Moldavicae*, sed parum majores. Torolla puberula. ~ Habitat in India orientali-septentrionalis montibus Kookhio-ghang.
13. DR. FOETIDUM Bunge msi. in Ledeb. Fl. Alt. !!. 380. - Bib. I. c. 490. - Caule buroio dtvaricato ramosissimo; foil, petiolatis ovalo-oblongis obtusis crenatis, floralibus angustioribus, basi aristato-serratis; verticillastris distinctis breviter racemosis; bracteis oblongis aristato-serratis; calyce bilabiato, labio superiore late serratifido, inferiore bipartito corollis calyce plus duplo longioribus. ^ — Valde affinis Dr. *Moldavicae* et fortan ejus varietas. Differt statura vix 2-3-pollicarum foliisque brevibus longe petiolatis. Rami et calyces pubescentes. - Babul Sibihae collibus arenosis M4 latas deitram deserti edili juvula 0. Tschuja titens-
14. DR. IMBERBII Karelin et Kirilov, Ballet, de la soc. impér. des naturalist, de MOCOA IV. 423. - Pubescens: caule erecto ramoso; foil, petiolatis oblongis, cordatis, basi aristato-serratis; verticillastris distinctis longe racemosis; bracteis oblongis aristato-serratis; calyce bilabiato, labio superiore late semilobato, inferiore bipartito; corollis calyce paulo longioribus, labio galeam duplo longioribus. O - Peacock post anthesin dilata. Corolla teuis alba. — Crescit in arcibus Soogan ad lacoa Inderlanaem et inter montes Arganah et fl. Lepiam.

17. DR. ROYLEANUM Wall. mss. ex Blh. in Wall. Plant. Asial. rarior. I. 61 et Labiat. gener. et spec. 407. t — Caule erecto stricto; foliis, petiolalis ovatis crenatis, floralibus angustioribus, superioribus basi aristato-serratis; verticillastris distinctis inerrupte spiralis; bracteis oblongis aristato-dentalibus; calyce vix bilabiato, dentibus superioribus talioribus; corollis calycem vix excedentibus. 2|. — Caulis semipedalis v. in cultis ultra pedalis, basi glabratus, apice pubescens. Folia distanlia, ^ultrioque viridia, basi glabriuscula, inferiora cuneata, superiora angustifolia, floralia calycibus sublongiora. Verticillastri 6-flori, in racemo v. spica interrupta longastrialia terminali dispositi, inferiores distantes, superiores approximate at omnes distiocli. Pedunculi breves erecti rigidi complanati. Bractee petiolalae, calyces aequantes virides, aristis longis divaricatis. Calyces 3 lin. longi striati, tenuissime pubescentes, dentibus convolutis clausi. Corolla tenuissima flavescens? — Habitat in Indiae orientalis provincia Kunawur.
18. DR. PKRKGRIMJM Linn. Spec. plantar. 820. - Bot. Magag. t. 1064. - Bib. I. c. 408. t - Documbens: ramis adscendentibus glabriusculis; foliis, glaberrimis breviter petiolalis lanceolatis, plerumque paucidenatis, dentibus aristatis, (fioribus v. interdum fere omnibus integrimis; verticillastris distinctis paucifloris secundis breviter racemosis; bracteis oblongis laevibus aristatis subdepressis; calyce bilabiato, labio superior* late tridentato, infundibulo anguste bifido; corollis amplexibus calyce sobtriplo longioribus. % — Caules basi laxi ramosi prostrati, raris teonea tetragoni rigidi aemipedales v. vix pedales. Folia plerumque pollicaria, dense omnibus dentata, ratios omnia inaequalia, floralia plerumque calyces aequantia v. aequalia dimidio breviora, omnibus obtusiuscula, nervis minusve mucronata paucivenia. Bractee calyce multo breviores, nunc minutae ovatae oblongae v. lineares integerrimae v. paucidenatae. Verticillastri pauci, non distantes nunc approximati. Pedunculus communis pedicellos subaequans et cum iis rigidus subcomplanatus. Corolla 15-18 lin. longa purpurascens v. coerulea. — *Ruytchiana verticillata* Mill. Diet. no. 3? — Habitat in Sibiria fere omni, in apricis montium Allai'orum frequens.
10. DR. THYMIFLORUM Linn. I. c. 831. - Bot. I. c. t - Caule erecto?; foliis, breviter petiolalis ovalo-lanceolatis lanceolatisve crenatis, floralibus angustioribus. in (fioribus) verticillastris distinctis multifloris longe racemosis; bracteis ovato-rotundatis suboblongis; calycis dente supremo late ovato, inferioribus laevibus; corollis vix calycem excedentibus. - Caules 1-1 1/2-pedales, parvis ramosi, tenuiter pubescens. Folia caulium parva, vix 6-8 lin. longa, floralia tofiora fere duplo longiora, flores longe sperantia, gradum breviora, omnibus viridibus vis pubescentibus. Verticillastri plerumque 10-15-flori. Bractee foliaceae, calyces aequantes v. breviores, rarissime denatae. Pedunculi breves erecti teretibus. Corolla lenissima purpurascens. — *Zorwia pumilior** I. Joach. Mel. plant. 411. Habitat in Europa Orientali, Upsaliae, Mosquae, in Podolia australi*
- » DR. MULTICAULB Montbr. et Anchor. Ann. sc. nat. VI. (8. Sér.) 37. - Ramuli basi fruticosa numerosi nudi; foliis, breviter petiolatis lanceolatis (omnibus. Clavatis, junioribus cano-pubescentibus, floralibus conformibus; verticillastris paucifloris aequalibus racemosis; bracteis lanceolatis integerrimis assistentibus; calyce bilabiato, labio superiore late tridentato, inferiore bifido; corollis ^nervis pubescentibus calyce plus duplo longioribus. 6 — Habitat in Armenia.
91. DR. NUTANS Linn. Spec. plant 831. * Bib. I. C. 400. — BoL Begin. U 841. - Caule erecto; foliis, petiolatis ovatis crenatis, floralibus oblongo-lanceolatis integrioribus; verticillastris distinctis multifloris longe racemosis; bracteis ovatis oblongisve subintegerrimis; calycis dente supremo late ovato, inferioribus lanceolatis; corollis calyce plus duplo longioribus. H> — Habitus folia, et calyces *Dr. thymiflori*, differunt corollis fere 8 lin. longis, tubo breviter exserto tenui, fauce amplissima. — *Zomia nulant* Moench, Melh. plant. 411.
ft. alpinum Karel. et Kiril. Bulletin de Mosc. XV. 424. — Hircania: caulibus. «ubdiffusis; foliis, minutis; bracteis saepe crenatis; floribus parvis. — Habitat in Sibiria fere omni, in apricis montium Allai'orum frequens.

- £2. DR. FRCTICULOSUH Slepb. in Willd. Spec. plant. III. 152. - Bth. 1. c. - Suffruticosum glabrum: foil, subsessilib. ellipticis mucronalis integerrimis T. superiorib. floralibq. aristato-dentalis; verticillasris paucifloris, supcriorib. subspicatis; bracteis ovalis aristalo-dentalis; calycis dentib. omnib. lanceolatis, supremo latiore; corollis calyce vix duplo longioribus. % — Rami vix 4-pollicares subtragoni ramosi glabri. Folia 4 lin. longa T. vix semipollicaria, basi rotundata, inferiora breviter petiolata et plerumque integerrima, superiora scssilia, basi denlibus 1-2 insiructa, omnia apice mucronata. Flores in apice caulis breviter gubspicati. Bractee forma foliorum, sed basin versus denlibus utrinque 3-4 apice aristalis instructae. Calyx coloratus arislatus. Corolla *Dr. integrifolii* a quo calycibus, foliis, etc. diversum. — Habitat in Sibiria circa Kiachla.
83. DR. INTEGRIFOLIUM Bunge msi. in Ledeb. Fl. All. II. 387. - Bib. I. c. f — Suffruticosum glabrum: ramis aubereclis; foil, subsessilib. lanceolatis oblongis integerrimis, floralib. bracteaeformib.; verticillasris racemosis secundis; bracteis of alia aristalo-deotatis; calycis dente supremo late ovato, inferiorib. lanceolatis; corollis calyce subduplo longioribus. % - Uabilus *Dr. nutans* sed foliis dislocatissimis. Caules basi lignosi ramosi subpedales. Folia pollicaria. utrinque v. 1-2, ad axillas subfasciculata, floralia infima subconformia, basi denlibus paucis aristatis instructis, superiora omnino bracteis conformia. Racemi 3-4-pollicares. Verticillastri omnes distincti, infimi distantes, plerumque sub-10-flori laxi. Pedunculi vel pedicelli lineam longi subteretes. Bractee exteriores ralyrem subaequantes, interiores breviores, dentibus longe aristatis. Calyx purpurascens, 4-5 lin. longus striatus inconrus, dente supremo inferioribus triplo latiore. Corolla *Dr. nutans*. — Habitat in Jugo Andico in praeruptis montium Kurtachum prope Baly et in rupetribus prope riuam Abukit, in Babria.
- M. DR. SPIHS8CE118 Wndrlh. Index m l n. h. Marburg. 1841. p. 5. - Pedunculis opposita eorinboao-trilit; bracteis obtusis imbricatis; calycibus coloratis inaequalibus denis septem; foil, pedicellata oblongis incano-dentatis, dentibus longe simplicibus. ^f — Graecia. . . . f

8<ottff. liTflOnAIA Bth. L a. 499.

Caules erecti foetidi. Verticillastri abinterrupte spicati. Antherae villosae.

25. DR. ARGINENSE Fisch. mis. e\ Link, £num. bot. Berol. II. 118. - Bib. I. c. - Rchb. Ic. 0or. cul el colend. 1.1.1. — Swzel, Bril. flow. gard. I. I. 47. - Glabrum: caule credo; foil lineari-lanceolatis integerrimis glabris; verticillastri subspicatis; bracteis cuneato-ellipticis aculis; calyce glaberrimo bilabiato, lobis superioribus late fimbriatis, inferioribus anguste bipartitis; corollis amplius calyce triplo longioribus. ^ — Afria *Dr. Huychianat*, differ! praecipue calycibus glabris et floribus majoribus. Rami sesquipedales subsimplices. Folia subsessilia, 2-3 poll. longa, margine fixa revoluta, Juniora in axillis fasciculata. Verticillastri pauci, 2-3-flori. Bractee calyce breviores, basi longe angustatae, margine bracteis ciliolatae. Calyx 8 lin. longus imbricatus, lobis profundis aculis. Corolla terna pubescens coerulea speciosa, ultra sesquipollicaris, fauce amplius. - Uabital in Dahria.
- « DR. AUCIAXA Lion. Spec. plant. A30. - Bib. I. c. 900. f - Caulibus erectis caulis pubeotibus; foliis linearibus lanceolatis integerrimis glabris; verticillastri subspicatis; bracteis ovato-lanceolatis integerrimis; calycis pubescentibus triplo longioribus, inferioribus anguste bipartitis; corollis calyce plus duplo longioribus. Kasul a basi ramorum plures pedales subsimplices. Folia linearibus pollicaria, angustata, margine revoluta, Juniora in axillis fasciculata. Verticillastri pauci approximati aobteflori. Bractee parvae, superiores minutae. Calyx triplo longus, pedicello brevi leviter, basi alius canaliculatus. Corolla purpurea tripollicaris, fauce ampla, lobis superioribus longius excedentibus. - *Dr. f. Mart.* F. Mart. ei glabris. ptoat. boL 9B1 (edit 1., ~ Jaiyftiaim 'P<***~' la Bwopat ft Aaiae Rosticae mootoia, in Nor^egia collibus IP'''

Guldbransiandiae, In Gatioprovincia, Delphinalu et HeWetia, In Franconla, Bornssia et Galicia, in Rossi a circa Rezan, in Caucaso et monle Beschtau, in jugo Altaico frequens.

27. DR. AUSTRIACUM Linn. 1. c. 820. — Jcq. Icon. pi. rar. I. t 112. — Bth. I. c. f — Caulib. ereclis pilosulis; Toll. 3-5-fidis v. ramealib. subintegerrimis, laciniis linearib., margine revolutis; verticillasris subinlerrapte spicalis; bracteis 3-7-fidis arislalis; calycis denle supremo ovato, inferiorib. lanceolalis; corollis calyce subriplo longioribus. 2l. — Habitus *Dr. Ruytehianaey*, sed foliis dirisis et margine revolutis disinctissimum. Folia ramorum sterilium rarius Integra. Verticillasri 6-10-Oori, omnes saepius distincti. Folia floralia et bractee hispida. Calyces crassi, 8*9 lin. longi, denle supremo lalralibus duplo, infitnis triplo laflore. Corolla speciosa, ultra sesquipollicahs. — *Zornia partita* Moench mss. ei Sleud. Norn. bot. 283. (edit. 1.) — *Ruytehiana laciniata* Mill. Diet. no. 2. — Habitat in Europae et Asiae Rossicae montosis, in Pyrenaeis, in alpebus Delphinalus et Helveliae, in Germania australi, Galicia, Transsylvania, Podolia, Caucaso et in monle Beschtau.

f *Species dubiae.*

28. DR. ODORATISSIMUM Polr. Diet Suppl. II. Ml. — Bib. 801. t - Florib. tplcallf'bractei anguste lanceolatis ci Halls, Bore longiorib.; foil, ovato-oblongis integerrimis. %1 OT — Viz 4-5 poll, allom. Caulis teretes. Kami diTarleaU elneresabrubescentes, angulis pubescenlibni. Folia medioerller pellolaU panra ovalo-oblonga inlegerrima, ulrinque angustiora, 4-5 lin. longa, toperloro angustiora lanceolata sublongiora. Flores sessiles, approximati in spica brevi terminali, subimbricali. Bractee angustae lanceolalae acutissimae 7 lin. longae, margine ciliatae, floribus sublongiores. Calyx tenuis lubulosus btrialus, strns subciliaris, denlibus 5 reclis* broissimis. Corolla albida subpurpurascens, exlus pilosula, lubo leni calyce vix longiore, fauco amplissima. — Habitat in Crimea.
20. DR. COCHINCHINENSE Lour. Fl. Cochinch. 371. - Dtb. I. c. - Florib. spicatis; bracteis subrotundis acutis»; foil, ovato-lanceolatis integerrimis. 0? — Caulis herbaceus 10-pollicaris cretus telragonas sulcatus tillosus. Folia ovato-lanceolala Integerrima villosa, pauca, opposita. Floret violaceo ipcail terminates; braellef'proundit acutis mnlUfloris. Corolla fauce InOaU, lablo saptriore ooneavo. FflaenU didynama piloia. 6iigma acutam biBdam, laeiniis Inaequalibtu mutuo loflexis. Semina 4. — Habitu In Cochinchina.

ijpf'

I t *Species e genere excludendae.*

- DR. CANARIENSIS Linn. — CEDRONELLA CANARIENSIS.
 DR. CANESCENS L. — LALLEMANTIA CANESCENS.
 DR. CHAMAEDRYOIDES Balb. — SPHACELE CAMPANULATA.
 DR. CORDATUM NoU. - CEDRONELLA CORDATA.
 DB. DBNTICULATA WAIL — PHTSOSTEGIA VIRGINIANA.
 DR. ERECTUM Ruff*. — NEPETA RRBCTA.
 DB. GQVANIANOa Wall. — NEPETA GO VAN UNA.
 JML IBBRICUM M. B. — LALLEMANTIA IBBRICA.
 DB. INTERMEDIUM NatL - PHTSOSTEGIA VIRGINIANA.
 DB. LAHCIFOLIUM Moench. — PHTSOSTEGIA VIRGINIANA.
 DB. MEXICANUM H. B. Kib. — CEDRONELLA MEXICANA.
 DR. OCYMIFOLIUM Mill. - LALLEMANTIA PELTATA.
 DB. PELTATUM Linn. - LALLEMANTIA PELTATA.
 DB. BIBIRICUM Linn. — NEPETA MACRANTHA.
 DR. SPECIOSUM Sweet. — PHTSOSTEGIA VIRGINIANA.
 DR. VARIEGATUM Vent. - PHTSOSTEGIA VIRGINIANA.
 DR. VIRGINIANUM Linn. - PHTSOSTEGIA VIRGINIANA

3G38/., LALLEMAVTIA *Fisch. et Mey.*

(Fisch. et Mey. Indx. semin. horl. Pelropolil. VI. 53. — Endl. gener. plant. Suppl. I. p. 1400. — Meisn. geogr. plant. vascul. II. 366.)

1. L. (DRACOCEPHALUM Linn. Spec. plant. 831. - Sweet, Brit. Flow. gard. I. L 38. — Bib. Labial, geo. et spec. 407. t — ZORNIA Moch. Method, plant. 411.) CANESCENS Fisch. et Mey. I. c. ex Linnaea XIV. Literaib. 151. — Caule subereclo ramoso leouissime cano-lomenloso; foil, peliolalis, infimis ovalis oblongisvc sub* inciso-crenalis, floralib. lanceolalis subiniegrimis, omnib. lomento lenni subcanesceniib.; Tercillastris dislinclls looge racemosis subsexfloris; bracieif ovalo-cuneatis aristaio-dentatit; calycis incanl deole supremo ovato, infimlf laoceolatis; corollis calyce duplo longionbns. % — Caulis pedalis, obtuse telrtgonus. Folia ioflna in peliolium longe angastata, superiora uti floralia sesslli** basi breviter angnslata, omnla obtasa, inferiora vc noso-rugosa, superiora cras-iuseQla paociveoia, omoia calyces excedeotia. Bractea ralyce dimidio breviores petiolaUe, baal angvstatae, tenuiter pobesceotes, nervis elevelis in aristas rigidas eicurremibos. Pedocoll breves erecti rigid! complaoaU. Corolla coerulea. — Habitat io Oriente, io Syria prope Aleppo.
2. L. IBERICA Fisch. et Mey. I. I. c. c - Caule decumbenle?; Toll. peUotatis ovalo-oblongis, basi longe anguslatis subdentalis, floralib. lanceolalis subIntegerrimis, omnib. glabris; Tercillastris distinctis longe racemosis subsexOoris; bracteis lineari-cuneatis, apice aristato-dentatis; calycis glabriusculi dente wpremo ovalo, inferiorib. laoceolatis; corollis calycem vlx exccdentibm. 2L — Corolla rotrolea lenoia. - *Dratoeephaium Ibericum* M. Biebrst. Flor. Taor. Cauc II. 64. - Bib. I. c f - Creacll io Iberia.
3. L. PBLTATA riach. 61 Mey. L I. e. e. — Gaole ereclo; foil, peiolalis ovali* oblosla ertttaUa, lorallb. OM««C«-UBC«OUUS lotegriorib.; Tercillastris distinctis Bohfloria losge racesBoalai brMUia otMeolaUt ariauto-deouii; talycis denie •opraio o?«lo, Uuralib. oblatigta, laflasjo Ua««olalo; eorolla eatyeeu vix excedeolibos. 1 - Caolea rabalaipplleM oltra peiUtoa, glabri ?. tenuissnie tonentosl. Folia seaqnipolUcaria, basi coneau teouia, atrioque tirdia gtabra, floralia gradalim angostiore, omnia Oores superantia. Verticillasri plerumqne 10-12-flori. Bractea peliolalae latissimae, calyce b ret lores, nervis eleralis reticulatae tirdet glabrae. Pedunculi breves rigidi erecti complanati. Corolla papa coeruleaywib* KUBra. - *Dracoc'ephaium pelialum* Linn. I. c. — Blh. I. c. | - *Dracoc'ep M** ocyimifoiium* Mill. Diet. oo. 4. - *Zoruia peltato* Mnch. Method, pi. 411. - *Crocit* in Urienle.

3039. CEDBOTfELLA *Bth.*

(Bib. Labial, gener. el spec. 901. — Meisn. gener. plant. vascular. I. 9M. II. 104.)

- I. C. CORDATA Blh. l. c. j t t t - Herbacet stolonifera: foil.eordalo-ovalis creoc«-Us; Tercillastris paeifloria aecondis lo spicam T. racemam brevem atproxim^ ^? - Caules basi repenlef radicaoles, rani floriferi erecii senlpedalet fMU* pllces Tillosi. Folia 1-1%-pollIcaria, forma fere *Umii* obsjta rago»a pabescenu^ v. glabriascula, floralia calyct brtvloru petiolau, basi retvodata. inferiora ^ j T nalata, saperiora iotegetTima. Cymae breviter pedunralaue, I-3-florae. C r semipollIcaria aapltis vlridls, vlx pubescent srlralus, ore obliquo, deollb. no lato lanceolalis acalls, anperioriboa longioribas. Corolla pallide eorrulea *speciosa*, fere aesqilpolllearis, tubas basi tenols, intat pube«rro«. faut AO>plifl? > p t j la- ^••i Mpetivt laium concavum, apice bilobum, lobis rotundaUy 1* , oris lobi laitralca otaiio-rotndati, medius lalus sobplanos, supra pilosut *emarginatus*. SUMina lablo t«s*riore brvviora. Aoiberae parrae. - *Drmcoeepkd** cordatum* Now. Gen. pi. n. Aaier. II. 31 - Uab'lal in America sepicnuionall *d Sumen* Ohio Infra *Blh. borgk* *AmmttrtUi*
- 1 C MBXMIKA Blku L c f - BltU: foil, ovalo-lanceolalis, bani rordaUs o« *maulis*. ««fUeilUairia molUfleris In raemani v. tpicam iniermptam lerriem --F^{fo}!! IftUlii *? - aitrilia fl-0»p«4alis, gUBra v. teauter pubesceos. FoUa breviter 9*¹⁰¹

r/s-2-pollicaria, longe acorninala ncula, grosse dentata, sublus glandulosa. Verticillasri laxi 90-40-Oori. Cymanim Inferioram pedunculi communes saepe semf-pollicares; cymae superfores subsessiles. Pedicelli breves erecli. Calyx lenais, fere glaber, dentibus acutissimifl. Corolla purpurascens, calyce triplo longior, tobo lentil incurvo, fauce vix dilatata, limbi lobis brevibus. Genitalia exserta. — *Draeocephalum Mexieanum* H. B. Kth. Nov. gen. et sp. Amer. II. 322. 1.160. — Habitat in Mexico inter segeles el in pratis regionis alsae prope Valladolid, Patcuara el Chalco, prope Talpuxabua.

3. C. TRIPUYLLA Mnch. Melb. pi. 411. - Bib. I. c t - Fralicosa elata: foil, pinna-tim triscctis, segmenlis oblongo-lanceolalis; verlicillasris laxis in spicam oblongam lerelem aggregalis. 6 — Gaulis 2-3-pedalis, raml floriferi berbacei tetragon! glabriusculi, ad nodos pilosi. Foliorum peliolus /t-1-pollicaris, segmenta lateralia subsessilia pollicaria, basi obliqua, lerminala peliolulalum sesquipollicare, basi rolndatum, omnia apice anguslala, margine crenaia, ulrinque viridia, glabriuscula v. saepius, praeserlim in pagina inferiore, pubescenlia. Verticillasri 10-12-flori. Calyx ample lubulosns, 6 lin. longos, 13-15-srrialas pubescens, denlibus e basi lanceolala subulalo-aoaminatis aequalibaa. Corolla albida, calyce vix duplo longior, fauce param dilalaia. — *Dracocfhalwm Camorieme* Linn. — *CtdroneUa Ca*arim*i4* Comm. Hori. Amst II. 81. U 41. — Babltal in America et forun In Canariis. H

Tribus IX. *STACHYDEAE BUL Labiat* gener. et spec. 50b. — Endl. Gener. plant p. 623. — Meisn. Gener. plant vascular. I. 286.

Calyx irregulariter venosus v. 5-10-nervius aequalis, obliquus v. rarius subbilabiatus 3-10-denlatus. Corollae tubus inclusus ?. eisertus, intds saepe annulatus, limbus bilabiatus, labio superiore galeato v. piano integro v. omargioato, iofiore varie trifido. Stamina 4 adscendentta didynama, superiors breviora, omnia fertilia v. inferiorum antherae rarissime caesae v. dimidiaUe. Acbaenia sicca.

I. Subtribus I. MELITTEAE Endl. Gener. plant p. 633.

Calyx post antheain inflatna bi- v. quadrilobus. Corolla longe eiaerta.

3040. MELITTK *Linn.*

(Lion. Gener. plant, no. 731. — Meitn. Gener. plant vascol. I. 08. II. 105. — BUL Labial, gener. et spec. 903.)

1. M. NELISSOPHYLLUM Lino. Spec, plantar. KB. - Jaeg. Flor. Aotlr. I. t ». - Engl. bot. t 577. - Eelehb. Plant critic III. 41. t «U. - Bin. I. c f - W. Ebcl, Zwölf Tage ant Montenegro II. 40. t I. fig. 3. a-b. - Caales berbacei crccil aubalmullea 1-IVi-pedalea uuagoni, magla mlnoafe pilis patenll-reflexia birtol* Volte brevltter peUolaU iy_a-a-polllearia o?au crenata, batl eordala •• auprena rolndata ragota rillota, nlrinque flridte, floralla conformia Teoprenia anguatiera, omnia floret excedenlia. TorlielUulri fobiexOori axil* laref. Bracieae aabnllae. Pedicelli calyce eobbrevlref. Calyx aemipollicaria viridia glaber v. magla minnfTe villotna, labio v. lobo supremo in eodem exemplari saepe inlegro el emarglnalo t. tnblridenUto. Corolla I'A-pollicarit rubra v. roseo-aiba, lubo a basi amplo, exlms glabra, lablnm snperins saepius patens el inlegnm, rarius emarginalum, inferlos subdnplo longius, lobis laieralibus o(aio-sabrotundls, medio maximo late rolundato integro. Stamina e tubo breviter exlerta, limbo brctiora. Filamenta dilatata, margine pilosa, basi cum corolla conouenlia, nee appendiculalim producta. Varial foliis eliam floralibus profunde cordatis v. superionbui etiam caulmis basi rotundolis, coroills nunc Yix polliraribus, saepius 15- v. inlerdum 16-17-linoanbui albidis rubris v. variogalis, hiraoiie loiius planlae et caljcii lobo supremo inlegro v. 2-3-denlalo, lolcrdum fere

bifido, sed nee ID species nee in varietales distinctas dividenda videtur. — *M. grandiflora* Sra. Fl. Bril. II. 644. - Engl. bot. t. 636. - Hook. Fl. Lond. II. ic. - Rchb. I. c. t. 212. — *M. albida* Guss. Prodr. fl. Sic. II. 140. — *Melissa sylvestris* Lam. Fl. Fr. II. 401. — Habitat in Europae ambrosia, in Anglia, Gallia, Germania, Lusitania, Hispania, Sicilia, Italia, Graecia.

t *Species e genere excludenda.*

M. CAROLINIANA Spr. - MACBRIDEA PULCHELLA,
M. JAPONICA Thunb. - SCROPHULARINEA QUAEDEAM?

3641. *PHYSOTEGIA Bth.*

(Bth. Labial, gener. el spec. 504. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 896. II. ltt.)

1. PH. VIRGINIANA Blh. I. c. 901 f et 738. - Calycib. acute quinque-dentat. q — Herba 2-3-pedalis, saepit omnino glabra, rarius pubescentia tenuissima in parte superiore indurata. Caules param ramosi tetragonae laeves. Folia sessilia, plerumque lanceolata, interdum oblongo-ovalia v. obovalia, saepe acuta, irregulariter et acute serrata, basi angustata, atrinque viridia laevia crassiuscula, nervo medio subtus prominulo, caeteram subavenia, floralia inflata subconformia, caetera omnia bracteaformia, calycibus breviora ovalia lanceolata v. linearia acuta sessilia nigerrima. Racemus terminalis simplex? subpaniculato-ramosus 1/2-1-pedalis fere oppositi approximati v. distincti subsessiles v. breviter pedicellati. Corolla bilobata, lobis ovatis, lobis superioribus purpurea speciosa, 10-11 lineas longa v. interdum ultra pollicaris. — *Physotegia imbricate* Hook. Bot. Magai. 1.3386. — *Draeocephalum Virginianum* Linn. Spec. pi. OB. — Bot. Mag. U 467. — *Draeocephalum intermedium* Noll. Traata* of the American Philoa. Boe. V. 187. — *Draeocephalum lancifolium* Uo—tbl Umh. plaat 4W. — *Draeocephalum vniemtm* Vent Hort Cela. t. 44. — *Draeocephalum imbricatum* Alt Hort Kew. II. 317. — Bot Mag. t S14. — *Draeocephalum ifcitmm* Swoei, Brit. low. gart. I. t 03. — *Draeocephalum okotatum* Elliot, Bot of B. Cart*. aas* Qoorg. II. 8ft. — *PraHum purpurmtm* Walt Pl. Carol. 166. — *Pratium coccineum* Walt I. e. — Habitu in Americae borealis montanis a Canada, humidisque Virginiae et Carolinae ad Novum Aurelianum et provincialis Texas Heicaorum et ad fl. Colombiae orae boreali-occidentalis.

- 1 PH. TRINCATA Blh. I. c. 305. f - Calycib. truncatis obscure 3-5-lobis, lobis ovatis, lobis superioribus denudatis. — Herba erecta subsimplex 1-1 1/2-pedalis, caule pubescente. Folia et inflorescentia Ph. Virginiana, Folia floralia basi late ovalia, calycet aequantia. Calyx magnitudine Ph. Virginiana, sed late campanulatus apice venosus membranaceus, margine sublucido-denticulatus, lobis plenis obocurrit latissimis mucronatis. Corolla param brevior quam in Ph. Virginiae labio superiore breviter bifido. — Habitat in America boreali, in provincia Texa Mexicanorum.

3642. • ACBBIDEA Elliott.

(Elliott, Bot of S. Carol, and Georg. II. 86. — Meisn. Gener. plant vascul. I. II. 106. — Bth. Labial gener. et spec SOS)

1. M. PULCHRELLA Elliott I. c. - Bth. I. c. f - Caulis herbaceus erectus obtuse tetragonae lucidus glaber. Folia petiolata oblongo-elliptica obscure serrata? siccata, basi rotundata v. cuneata tenuia, vix veuosa, glaberrima v. supra pilis raris conspersa, Oculi sessilia ovalia, calycet aequantia. Verticillastri 1-2 ad apices caulium. Bractea nullae. Calyces sepaliculi glabri membranacei vides, corolla bilobata, lobis ovatis, lobis superioribus integeribus. Corolla sesquipedalis glabra, tubo basi angustato, toperne plam dilato. Pilae villosae. Antherae valvulae margine breviter ciliatae, intus antherae pilosae. — *Thymbrm* Pl. Carol. 102. — *Melissa Carolinae* Spr. Syst. vegetab. II. 700. — *Pratium in-* ^»a* Msi Walt Ft Carol. MS. - Habitat in America boreali, in Carolinae montibus prope Augustam.

3043. SYMLNDBA Nutt.

(Null. Gener. pi. N. Am. II. 20. — Meisn. feener. plant vascul. 1.286. II. 104. — Bib. Labial, gener. el spec. 500

1. S. GRANDIFLORA Null. 1. c. — Bib. I. c. f — Habilus fere *Lamii*. Caulis sub-simples pedalis, pilis longis sparsis hispidulus. Folia pauca, inferior* longe petiolata laie ovata subacuminata crenata, basi cordata lenuia, ulrinque viridia, pilis raris bispidula, floralia sessilla, inferiora caulinis subconformia, superiora ovata lanceolata inlegcrrima, suprema calycibus vix longiora. Verticillasri pauci distantes biflori. Bracleae subnullae. Calyces sessiles, e sepalis 4 connalis constanies, 2 laleralia majora, nervis laleralibus superioribus disiinciis, inferioribus cum nervis suprcmis scpalorura inferiorum confluenlibug, 2 inferiora parum minora, nervis laleralibus inferioribus snbdislinclis, sepalum quinlum MI-premum omnino a basi calycis aborlivum. Corolla speciosa albo-flavescens, fere sesquipollicari?, tubo basi tenui, dein valde dilalalo in fauccm amplissimam, extus glabra. Filamenla, praeserlim in parte superiore, longe barbata. — *Lamium hitpidulum* Michx. Fl. Bor. Am. II. 4. — Habitat in America borealf, in Kentucky, in sylvis Tennessee, in umbrosis ad Ohio prope Cincinnati.

Subtrlbua II. LAMIEAE Endl. Gener. plantar, p. 624.

Calyx quinquedentatus, limbo hand dlatato. Corolla aubplana Y. fornicata. Stamina e tubo exserta.

3044. WIEDEMANNIA *Fuck et Mey.*

(Fisch. et Mey. Indx. semin. horL PelropoliL IV. 92. — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 287. II. 105.)

1. W. ORIENTALIS Fisch. et Mey. I. c. el Linnaea XII. Lilcraturb. 175. - Herba annua habilu omnino referens *Lamium purpureum*, foliis petiolatis o\aiit acutiusculis dontatis, superioribus scssilibus, basi cunealis; floribus sordide purpureis in verticillasris capiiatis dislantibus posilis. — Habitat in Asia minore.

3045. LAMIUM *Lmn.*

(Linn, Gener. plant 710. - Meisn. Gener. plant, vtienl. I. 287. II. 105. - Bib. La-
^
blat gener. el apeo. 507. el 738.)

Seetlo I. OBYALA Una. laaer. plaat.

Corollae tubui rectos, inlus transverse annulalos, fanx amplissfma, gtlea ovata. Anlberae glabrae.

1. L. ORVALA Linn. Spec, plant. 808. - Bot Magai. t 171 - Blh. I. c. 908. - Foil, amplis laie ovalis, basi truncatis cordatisve rugosis snbvlllosls; corollae tubo recto exserto, inlus piloso-annulalo, faace amplissima, galea ovata Integra, lobis laleralibus brevissimis mullcit; anlheris glabrls. ^ - Folia laliora, majora quam in *L. Garganieo*, pilis brevibus villosa ?. fere glabra. Caulis fere glaber. Folia floralia Oores looge taperaniia. VerUcllattri iob-10-Sorl. Bracleae paucae II-neares breves. Calyx eoloralus, fere glaber. Corolla rubra v. purpurascens, 15 lla. v. fere sesqaipolleem longa. Galea extus pubesceos, margioe ciliaia. — *L. Ptmmonicum* Scop. Fl. Cam. L 27. — *OrvtUa lowtioide*\$ DC. Fl. Fr. 5JQ.
. fi. Foliis inciao-deoutit. — *Orvala Garganiem* Linn. I. e. III. 807. — Cresci in Italia, Pannonla et io Istrla, in Pedemonlio, in Foro Julil, prope Nannelem in Gallia.

SeoUe 0. UUU0P8IB Dwiort. FlemL Belf. 45.

Corollae lubus recius, intus nudus v. transversim plloso-annulaius, faux am-
pllssima. Anlberae extus birsutae.

2. L. MULTIFIDI'M Linn. 1. c. 800. - Bib. 1. c. 500. et 738. - Foil, superiorib. in-
ciso-lobalis, ulrinq. glabris; corollae lubo recto exserto, inlus annulaio(?)t galra
oblonga, fauce amplissima, lobis lateralib. brevissimis mulicis, anlheris glalmg.
q. — Caulis crectus semipedalit v. vix pedalis pubescens. Folia infenori ovata

in.

ioi

obtusissima, apice inlegemma, medio crenata, basi cunola, saperlora l'A-pollicaria obiusa, profunde el obtuse lobala, floralia acutiora angusliora, floribus subbreviora, omnia incisa. Bractee breves ovatae aculae. >erticillasri nulliflon dittanies Calyces series, adpresse tillosi. Corollac pollicares v. parum longiores. Galea ba»i talde angustala, cxtus lanala. Labium subMipilatum bifidum? — Uabilal ia Onente.

3. L. REMFORME Mootbr. el Aucher, Ann. sc naL (2. Sér.) VI 47. - Glabrum- Toll, longe peliolalis reniformib. inciso-crenalis, ban laie subcordalis, verticillasris 2-0-Oons; calycib glabris, denlib. lanceolalis aculis, corollis calyce quadruplo longionb., lubo redo v. ba»i viz recunro adscendenlc, inlus nudo, galea ovaU pubescenti, apice bifida, fauce amplissima, lobis lalerahb. denle brevi apicalalit, anthens birsulis. 4 — Habitat prope Trebuondam.
4. L. RFIOMBOIDEIM Bib. I. c. fI00. - Humile simplei foil rhomboideis rugoslf, utnnq ealyebq. velulioo-lanatis; rorollis amplis calyce inplo longionb., lubo recto into* nudo, faoce ampla, galea lata, lobis lateralib. otatis integns, auberis hirsulis. 2p — Caolis bumilis vu seroipedalis simplex adscendens lomentosovillosus. Folia caulma parva pauca, Ooralia numerosa petiolaia rhomboidea, io-firaa subintegemma, supenora profunde crenata, omnia obtu»i*«ima, basi coneala rugosa, utnoque lanato->illosa. Verticillakln oubbiflon Dractee subalalac, molliler lanalae, calycem aquaotei. Calyx semipollicaris, molliter villosos, dentibus lanccolato-lineanbus. Corolla fere scsquipolhcaris, extos pubesceos, magDiludie corollae L. Oarganta. Labia longitudine subarqualia, lobi laterales obloogi, paollo majores quan in caeiens IAMIM. Acbaema immatura subearnosa tideioir. — *Eriantherm rkowtboidf* Bib. in ilook. Bot Misc. III J80. - Creselt In lodlat ortlalalit proviicia Kaoaoar.
5. L. GAIGANICCM Lino. I. e, «ft. - 8B. EXOUC bot I. C 4*. - Btb. I. c. - Foil cordalis ragosis, otrlnq. snolllter vMotla; calycib. villosis; corollis calyce quadmplo looglorib., tabo recto, iotas oado, fauce anpliaslnia, galta lata, lobis lalerlib. aogolatis v. deote brerlssiao appepiculatis; anlbens birsutis. % — Caulis adsceodeos pedalis uti folia el calyces pills longis albldis dense et molliler villosus. Folia forma fere L. *ruigatt*, plerumque parum mmora, floralia flonbus plorumque breviora. Verticillasin IO-20-flon densi. Bractee bre^ifsimat. Calyces sessilcs, parum obliqui, denlibus tubo brevioribus lanreolalis acumlMlis, >n apice subulatis. Corolla 15 lin. longa rubra, ritu» Hllona, intas glaberriiB** loborum lalerallum dens oblu»u«(rarius bifidu», labium basi conlraclum, latissi** obcorditum subbifldum. Aotberae bir«utis»imae. — L *Mtckrhanum* Taoich <° Bot. Zeil. 1831 I. *tlM* — Habitat in Europa mediterranea, in Pedemontlo, ° (jargano manic ad castnim Aogeli, in Graeciae moote Hymetto, in Lacooiae ** Cret«p mootibas, turn in Olympi Bitbyni summitate.
- 0 L LO>GIFLORUI Teo. Fl. Neap, prodr. 34. - Bib. I. c 510. - Caule glabri^oculo, foil cordalis subrogosis glabns subvillosisve, verticillastris multiOorii ^{ca-}lycib. glabralis, corollis calyce subqaadniple longionb., lubo redo inlus nn ^{do,} fauce amphs«ima, galea lata, lobis lateralib. aogulatis v. denle bremsimo ^{A ppen-}dicolatis; aotbens birsulis. ^ - A t *Gorgameo* vu ac ne vix glabrilie ^{difort.} - L *litigahm* DC Fl. Fr. III. MI. - L *Ptdimontanum* Rcbb. Fl. ^{Germ. are.} 325^f; - Habitat in Europae aostralis nootosis, in Pyrenaets, ^{Galloprovincias}Bkooie Ventoso, Pedemontio et Apenoinis supenonbus, in regno ^{Nespolitano, in}Blellia et Graacia.
7. L. GLECBOIOIDES Sin. in Rees, Cyclop. XX. ex Btb. I. c. 7» - ^{b. riansen-}lorn- foil, panit |₀Bge petiolatis cordatis erenatis v. superiorib. subincisls; ^{ver-}ticillastris 0-10-loris; calycib. (labriasealis, denlib. brevib. aculis, eorollH «°

! ESSfi? #5Wfr "1" *® /'•'•' rordttu tneuo-terrahi acummaM ^{calycibus-} ^(marimar)
 ruSzL* ***** *••• brtt%oriku\$ Unrtolatu cUtui. corolla

- lyce subquintuplo longioribus, tubo recto, intus nudo, fauce amplissima, galea oblonga, lobis lateralibus angulatis, dente brevi appendiculatis, antheris birsuis. % — A I *longiflora* differet foliis parvis dentibusque calycibus brevibus latis, nee elongatis subulatis, a *L. veronicaefolia* foliorum forma, verticillatis multifloris calycibusque proportione corollae brevioribus breviterque dentatis. — In Onenle.
8. *L. VERONICAEFOLIUM* Bih I c. f — Glabrum- foil parvis longe petiolatis rentformibus inciso-crenatis v. digilalo-lobatis, basi laesubcordalis, verticillatis bifloris, calycibus glabris, dentibus lanceolatis acutis, corollis calyce quadruplo longioribus, tubo recto v. basi recurvo ascendente, intus nudo, galea ovata basi angustata, fauce amplissima, lobis lateralibus dente brevi appendiculatis, antheris bibrulis 2l — Foliis infrenibus *L. amplexicaulis*, corolla *L. longiflora* affinis Herba humilis, caulibus ascendentibus 4-6-pollicibus. Folia fere *Veronica hederaceae*, petiolo 0-12-lineam, limbo v. 4-lineam, utrinque glabra v. pilis raris nissim pubescentia, crenalibus profundis paucis, floralia conformia, uti caulina longe petiolata Corolla breviter pollicans, fauce amplissima, labio superiore late ovato acutiusculo villato Antherae pilis longis numerosis hispidae. — Graecia
9. *L. STIBIATUM* Sibbrp. et Sm. Flor. Graec. VI 46. t 537. — Foliis ovatis profunde crenatis, basi laesubcordalis, supremis approximate floras operantibus v. his vix brevioribus, corollis calyce glabro triplo longioribus, lobo recto tenui, fauce dilatata, galea longissima, apice bifida, lobis lateralibus angulatis, dente brevi obtuso appendiculatis, antheris birsuis % — Habitus fere *L. vulgaris*, sed folia leniora minora et basi minus cordata, floralium petiolis calyce breviores. Corolla sesquipollicaris, labio superiore 7-8 lin longo obtuso-lineariter, eitis villosa Stamina vix ad dimidium labii superioris allingentia. Affine *L. bilbo*, aliter foliorum forma, calycibus rectioribus longioribus, corollis majoribus — Habitat In Graeciae cl Arclupchi dracci ruderalibus copiose
10. *L. HIFIDIM* Cr IM rar infsc I 22 t 7 - Ten Flor Nempoln t IV) ffr 2 - Blh I c 511 f — Foliis ovatis, superioribus aruminalis, omnibus inciso-lobatis crenatis-dentatis, supremis appropinquatis flores superantibus v. utrobique, corollae tubo recto intus nudo, fauce dilatata, galea elongata apice duaricalo-bifida, lobis lateralibus dente brevi appendiculatis; antheris birsuis. %> — Habitus *L. purpurea* Folia petiolata, inflata profunde crenata, superiores pollicaria, apice obtusiuscula, late et profunde crenata, basi triangulariter inclusa, margo viridia v. supra albo-lineata, magis minusve villosa. Verticillatis multifloris, inferius remon, supremi subcapitati Bractae paucae, subulatae v. nullae. Calyx pubescens ovatus, apice incurvus, ore albe obliquo, dentibus lanceolatis acutis, apice subulatis, tubo brevioribus v. vix longioribus Corolla alba, plerumque dimidio longior quam in *L. purpureo*. Var. fl. oon differt nisi corollis, ut in *Lafatu* plunum occurrit, abortu brevissimis.
- fl. clandestinum* corollis minutis. — *L. erythanthum* Guss. Prodr. fl Sic. II Q7 - Reichb Plant critic VIII. 3. 1.107. — Habitat in regione mediterranea, in Corsica, Sicilia et in regno Neapolitano.
11. *L. AMPLEXICAULE* Linn. Spec. plant 800. - Rchb. Plant, critic. III 21 t 224 6g. 373. — Hook. Flor. Londin. II. (ic.) — Kngl. botan. I. 770. — Blh I. c 511 f et 738. — Foliis orbiculatis, caulibus petiolatis, floralibus amplexicaulis, omnibus subinciso-crenatis; corollae tubo recto tenui, intus nudo, fauce dilatata, galea oblonga integra, lobis lateralibus mucicis, antheris hirsutis. O — Herba decumbens, basi ramulosa, rami semipedales v. vix pedales, apice ascendentes glaberrimi. Folia caulina pauca, longe petiolata, vix semipollicana, forma *Veronica hederaceae* utrinque glaberrima v. bispida, floralia latissima calces amplexicaulis et ea superantia, subtus in venis elevatis bispida, supra plerumque villosa verticillatis multifloris, omnes distincte inferiores ramuli, supremi fere approximati Bractae subnullae. Ulicis scissiles ramulaliter obliquo. internodiis lanceolato-angulatis lubum subaequantibus v. longioribus, nix liter villosis Corolla purpurea puberula, tubo longe exserto micrat in ih

paucis hirsulae. — *I. palmatum* Sin. in Rees's Cyclop. XX. — *Galeobdolon amplexicaule* Moench, Melh. pi. 393. — *Pollichia amplexicaulis* Willd. Fl. Berol. 198.

O. clandestinum Reicbb. I. c. VIII. 3. t. 706. — Corollis abortu minulis. — Habitat in Europae, Africae borealis, et Asiae mediae necnon Americae borealis ruderatis.

12. L. RECTUM A. Schenk, Plant, spec. Aeg. Arab. 19. f — Foil, inferiorib. orbiculalis, reliquis ovatis, omnib. cordatis obtusis crenulalis rugosis pilosis; florib. folia dupio superantib.; corollae tubo recto cylindrico tenui, calyce triplo longiore inlus nudo, fauce arapla, galea lineari-oblonga erecta, apice bifida, lobis lateralib. dente brevi appendiculalis; antheris exlus hirsulis. 2). — Herba semipedalis, basi decambens simplex. Folia inferiora parva longe petiolata, omnia basi cordata. Bractae lineari-lanceolatae acalae ciliatae calyce breviores. Verticillasri 10-12-flori, inferiores distantes, superiores approximati. Corolla purpurea. — Affine *L. striato*, sed foliis floralibus flore dupio brevioribus et staminibus labium superius subaequantibus satis differre videtur. — Crescit in cedreto montis Libani.

13. L. INTERMEDIUM Fries, NOT. 0. Suec. [ed. 1.] 105. fed 2.] 192. - Btb. I. c.512. — Rebb. Plant, critic. III. 22. t 224. fig. 372. el VIII. 9. t. 721. - Foil, orbiculalis, caulinis petiolatis, floralib. amplexicaulib., omnib. subinciso-crenatis; calycis denlib. subulalis lubo longiorib.; corollae tubo recto tenui inlus nudo, fauce dilatata, galea oblonga integra, lobis lateralib. dente brevi appendiculatis; antheris hirsulis. Q — Habitu foliisque *L. amplexicauli* simillimum, et vix diversum dentibus calycinis elongatis et corollae lobis lateralibus dente brevi lanceolato acuto appendiculatis. Caeterum *L. amplexicauli* multo affinius quam *L. purpureo*. — *L. mohucium* Fries, NOT. fl. Suec. 78. ei Reichb. I. c. — Habitat in Scania et Gerauola septentrional!

14. L. PURPUBUM Linn. Spec plant 800. — Bngl. bot t 100 — Hook. Flor. Lond. II. (ic.) - Flor. Danie. L 523. - Bib. t e. 519. t et 730. - Foil. Inferiorib. orbiculatis, floralib. ovatis, omnib. crenatis, supremis approximalis flores superantib.; corollae tubo recto tenui, basi intus piloso-annulato, fauce dilatata, galea oblonga integra, lobis lateralib. dente brevi lineari appendiculatis; antheris hirsulis. 0 — Herba basi decumbens, superne ascendens foliosa, apicibus saepe purpurascens, foliis parvis dislanlibus longe petiolatis. Caules semipedales v. rarius vix pedales. Folia omnia rugosa, utrinque villosa. Verticillasri nulliflori, ad apices caulis dense approximati subcapitali v. infimus remotus. Folia floralia e capitulo eminentia, caulinis conformia, at gradatim minora. Calyces petiolo breviores v. vix eam superantes. Corolla plerumque semipollicaris rubra, rarius alba. Galea extus villosa. Antherae pilis paucis hirsutae. — *L. nudum* Moench, Melb. plant. 303. — *L. ocimifolium* Sm. in Rees's Cyclopaed. XX.

fl. motle Ait. Hort. Kew. II. 207. — Foliis minus rugosis obscurioribus paucicrenatis. — Habitat in Europae omnis necnon Aniae ruderatis.

15. L. INCISUM Willd. Spec, plant III. 80. - Engl. bot t 1933. - Rebb. Pl. critic. III. 21. I. US. fig. 370. 371. - Btb. I. c. 511 - Koch, Synops. flor. Gen* (edit. I.) p. 564. - Foil, inferiorib. orbiculalis, floralib. late ovatis, omnib. incidentatis lobalis, supremis approximalis, flores superantib.; corollae tubo recto basi intus piloso-annulato, fauce dilatata, galea oblonga integra, lobis lateralibus dente brevi lineari appendiculatis; antheris hirsulis. Q — Inclusi. Floret *L. purpurei*. Fortan bujura varietas, at constanter diversum. Variat t-purpureum corollae nunc brevioris, nunc longe eiserit, verticillasri nunc omnibus approximalis, nunc inferioribus longe remotis. - *L. dusthamm* Vill. Flor. Delph. I. 551. - *L. dusthamm* With. Brit. Pl. 527. - *L. urens* Weihe ex Reichb. Fl. Germ. etc. 81. - *L. wiphaltum* Weihe ex Reichb. i. c. - *L. Cofsfeldia* Weihe ei Reich. I. c. - Habitat in Europae praesertim inonalls aris lo Scotia, Aoglia, Suecia, Gallia, Germania.

Seotio m. LAMOTYPUS Domort. Floral. Belg. 45.

Gorollae tubus iotas transversim annulatus, sub annulo conraclus, supra anulum dilatatus subventricosus subrecurvo-porrectus, faux parum dilalata. Antherae extus hirsutae.

10. *L. GRINITUM* Montbr. et Aucher, Ann. sc. nat. (2. Se>.) VI. 48. — Foil, ovalis cordatis rugosis villosis; dentib. calycinis subnatis plnmosis corollae tubo Ion-giorib.; corollae tubo intus piloso-annulato recurvo-adscedente, fauce subdilatata, galea oblonga, lobis laleralib. dente brevi sabulato appendiculatis; antheris birsulis. % — Habitat in Cappadocia.
17. *L. MOSCHATUM* Mill. Diet. no. 4. - Blh. 1. c. 513. t - Foil, ovatis cordatis glabrusculis; dentib. calycinis longe lanceolato-subulalis; corollae tubo amplo brevi, intus piloso-annulato subrecurvo-porrecto, fauce amplissima, galea tubo longiore, lobis laleralib. breviter obtuse acuminatis vix appendiculatis; antheris birsutis. 2|. — Habitus *I. vulgati*, sed corolla distinctissimus. In exemplar! unico suppetente, caulis et calyces glaberrimi sunt, folia pilis brevibus sparsis hirtella. Folia floralia flores superant Gorollae albae? tubus dentibus calycinis brevior glaber, galea extus apice dense villosa, basi longe angustata, lobi laterales potius angulati quam appendiculati, lobus infimus maximus stipitatus. — *I. calycinum* d'Urv. M6m. soc. Linn. Par. 323.?) — Habitat in region* mediterranea orientali, in Archlpeiagl Graeci insuls, Epldauro, Samo et Bmjrae.
18. *L. GUNDELSHEIMERI* G. Koch, Linnaea XVII. 907. - Gaale stricto erecto pills horizontalib. aut reversis obsito; foil, petiolatis adpresse pilosis ovato-acuminatis serratis longe petiolatis; verticillastris nullifloris, supremis folia excedentib.; calyce campanulato-lubuloso, dentib. cilialis subulalis, inferiorilongiori; corollae tubo subrecurvo ampliato, ad basin annulato, labio superiori subtruncato, inferioris diraidio brevioris lacinia media biqda, laleralib. 2-3-dentatis; (llamenlis ex parte connatis, antheris villosissimis. 2|. — Uerba tripedalis. — Crescit in Armenia el Cappadocia.
10. *L. PETIOLATUM* Royle mss. ex Bib. in Hook. Bot. Misc. HI. 381. - Blh. Labial, gener. et spec. 513. f — Foil, ovalo-lanceolalis acuminatis, basi vix cordatis; dentib. calycinis longe suffulais; corollae tubo amplo, Intus piloso-annulato recurvo-porrecto, fauce vix dilaUU, galea elongaU, lobis laleralib. nullis v. breviter seuceo-appendiculatis, labio brevissimo; antheris hirsutis. % — AfBne *L. vulgati* sed foliis et corolla divertim. Habitat £. *fUwuort*, a quo differt antheris hirsutis etc. Herba tenerior quam *L. vulgatum*. Caules pills reflexo-patentibus hirsuti. Folia inferiora longe petiolata, floralia sessilia, omnia basi saepius rotundata v. truncata v. inflma cordata, superiora longe acuminata, grosse subduplicato-serrata, utrinque viridia hispida. Bractee linear!-subulatae, calycis tubum subaequant. Verticillastri plerumque nulliflori. Denies calycini molliter hispidi, tubum corollae aequantes. Corolla alba, tubo ventricosus, superne el basi contracto, fauce obliqua plerumque nuda, interdum dentibus utrinque 1-2 insracta. Galea extus villosa. Labium galea dimidio brevius. Antherae pilis paucis hirsulae. — Habitat in Indiae orientalis Jugo Himalayensi vulgare, in Kamaon.
80. *L. PARIETARIAEFOLIUM* Blh. 1. c. 739. - Foil. Inferiorib. ovatis, superiorib. ovalo-lanceolatis acutis, basi truncatis, rarissime cordatis; dentib. calycinis longe subulalis; corollae tubo amplo inlus piloso-annulato subrecurvo-porrecto, fauce subdilatata, galea oblonga, lobis laleralib. dente subulato appendiculatis; antheris hirsutis. 2|. — A sequente differ I foliis etiam inflmis rarissime cordatis, 'supremis

*) *Caule tuberecto ramato glaberrimo fistuloso foil, cordati rugosis tanalis DM. bteentib., summit citam subpetiolatit; calycib. lanib. retrulalut /ori subaequantib.; dentib. calycitit longissimit arcuatit subulatis tix ciliatit; florib. rorh. rtiis ieuilib.; rerticiUatru numerous; inferne remolis. — Flores albidit. Corolla ex-*

mullo angustioribus saepius idtegerimis et corollis minoribus. — *Lamium Parietariae fade* Moris. Blas. 278. — *Lamium molle* Ait. florU Kewens. II. 297? (ex p.) — In horto bolaoico Parisiensi colitur.

21. L. VLLGATUM Bth. I. c. 514. | ei 730. — Foil, ovatis cordatis v. basi Iruncalis rugosie, plerumq. villosis; deotib. calyciois longe subulatis glabris v. villosulig; corollae tubo amplo, iotus piloso-annulato recurvo-porrecto, fauce subdilaiata, galea oblonga, lobis laieralib. denle longo subulato appendiculatis; anlhens hirsutis. 2|. — Planta villosilate foliorum, deolibus, numero et colore florum valde vanabilis, at constaoter oorollae forma recognoscenda. Caules plerumque basi decumbentes ramosi, ramis simplicibns adscendenlibus, plerumque subpedalibus. Folia inflma parva, aaepe rix semipollicaria, longe petiolata, media 1-3-pollicana, apice oblusa, acula v. longe acuminate, margine crenata, dupljcato-denlata v. subincisa, basi late cordaU, sinubus profundis obtusis, v. rarius tantum truncala, ulrinque viridia T. in utraque varielale supra mogis minusve albo-lineala T. macolata, magis mlnusve rogosa et villosa, floralia conformia v. basi minus cordala, apice longius acuminate, brevius petiolata, saepius Oores excedenlia, interdum vero iis subbreviora. Bractee minutae. Flores in verticillasro 10-20, nee in speciminibus albifloris crebriores quam in purpureis. Caljces nunc fere glabri, saepius praesertim dentibus ciliato—hirsutis. Corollae vix cum galea pollicans.

a. *rubrum*: *L. maeuMum* Linn. Spec. plant. 800. — Reichb. Plant, critic. HI* 12. t. 215. - Siblb. et Sm. Fl. Gr. VI. 46. t. 556. - Sm. Eng. Bot t. 2590. - *L. rugotum* Ait Hort. Kew. II. 296. — Reichb. 1 c. 14. t 217. (nee alior.) — *L. rubrum* Wallr. Sched. criL 300. — *L. mutabite* Dumort. Floral. Belg. 45.? — *L. hirtuum* Lam. Diet. III. 410. — *L. ttoniferum* Lap. Abr. Pyr. 333. — *I~grandiflorum* Pourr. Act acad. Tolos. 111. 3*2. — *L. laevigatum* Linn. I. c 808. — Iolekb. I. e. 14. L 816. (non allor.) - *L. meliuaeifolium* Mill. Diet. no. 5?

fi. *album*: *L. album* Lion. I o. 809. — Hook. Fl. Lond. II. lo. — Sm. Engl. Bot. t. 768. — *L. capUatum* Sm. In Rees, Cyclop. XX. — *L. nirtum* Hortul. — *L. foliosum* Cntxliy Stirp. Austr. 258. — Habitat in Europae, Africac borcalii, et Asiae mediae arvis ruderalis umbrosis monlams etc. a Scotia, Succia et Pelropoli ad Lusilaniam, Ilispamam, Sicilian), regnum >capoliianum cl Graecam u«>qc, in Barbana, regione Tauro-Caucasica, Caspica cl Aliaica.

22. L. TOMEMOSI' M Willd. Spec. plant. III. 00. - Bth. I. c. 514. - Foil, ovatis cordali* rugosis %illosis»imis; dentib. cal)cinis subulatis plumoso-nliaix; corollae lubo amplo, intus piloso-annulato recurvo-porrecto, fauce subdilaiaia, galaa oblonga, lobis lateralib. denle longo subalalo appendiculatis; anlbfm hirvuiii. 2F* — Vix ac ne vix a *L. vutgato* differt foliis minoribus villosionbus et denlibu^ calycinis villotissimis. Verosimiliter *L. tulgali* vanelas. — *L. Columnae* Ten. Inds-semin. bort. Neap. 1827. — Habitat in Europa ausiro-orientali et Asia media, in Italia au»Irali, in Armenia, in regione Tauro-Caucasica et Caspica >ulgare. •

Soetlo ni. 6ALB0BD0L0I ladMB, nor. Anglic. 258.

Corollae tubus inlus oblique annulatos, sub annulo coniractus, supra annalun dilatalus subventricosus subrecurvo-porreclui, faux parum dilatata, galea oblong** basi longa angustata. Antherae glabrae.

23. L. PIBESCE^S Sibtbrp. mss. ex Blh. I. c.515. - Foil. o\aii», ba%ā truncalii •• ^ cordatisve, supenorib. acuminati«, ommb. rugoşis villo»i»; corollae (rubro-P^ar^ poreao) lobo basi contracto, inlu< oblique aonulaio, superne vrninroso-4iDpli**^ Aubrecanro-porrecto, fa ace »ubdilata? galea clongaiia Integra, lobis lateralib. «> ^ gufafis, angulo motico Y. bre%āler setaceo-appendiculato; anibens glabris. 4 ^ Vix ac ne vix a *L. fiexuoto* differt corollU dimidio mignonbus >illosioriboa P«''' pureo-rubris et foliis vtlosioribut. Denies calycim ut in /.. *flexuoto* ^{10D^1^1} ^ t villosiute variaol Bracieao plerumque latiores sum. — *L. rugosum* Sibtn^ c Sm. Flor. Grace. VI. 45. I. 5J5. - In Sicilia, regoo Ncapolitano et in Graccia ••

- 24 L FLEXUOSUM Ten. Fl. Nap. 11. 19 t. 58, Syll. 287 - Bth I e. t — Rchb Plant, critic. VIII. 3. t. 700. — Foil, ovatis acumioais, basi iruncatis subcordatisve glabrusculis v vix villosis; corollae (albae) tubo basi contracio, inlus oblique annulate, superne ventncoso-ampliato subrecurso-porrecto, fauce subdilalala, galea elongala mlegra, lobis laieralibus angulalis, angulo mulico v. seiaceo-appendiculalo, antbens glabns. 2|. — Gaules basi procumbentes, saepe radicanies, rami adscendentes v erecli subsimphces, saepius debiles subpedalas, pilin reflexis magis minusve villosi Folia omnia petiolala, infenora mioora oblusiora, supenora saepius acuminala, omoia grosse subduplicalo-dentlala, vmdia v. linea alba noiala, nunc fere glabra, nunc pilis paucis hispidula, Qoralia saepe subincisa Veriicilla&ln 0-20-flon Bracleae lanceolatae v. lineares, tubum calycis saepe aequanies — *L. Petittnum* Gay ined. — Habitat in regione mediiterranea, in Galliae agro Ruscinonensi, Sicilia, regno fteapolitano et in Barbana
- 2» L GALEOBDOLON Cranz, Stirp Auslr. 268. — Bib I c. 516 f -r Foil ovalis acuminaiis, basi truncatis subcordaliive glabrusculis pilosisve, corollae (luieae) lubo basi contracio, superne subvenricoso ampliato subrecurso porrecto, inlus oblique annulalo, fauce subdilalala, galea elongala Integra, lobis laleralib oblongis muticis y brevissime appendiculatis labio tix brevioribus. ty — Herba erecia, pedalis v sesquipedalis, saepius fere glabra, inlerdam, praeserlim in folis infenonbus cauleque pills longis indula. Verllcillatiri namerotiorat quam in caeteris speciebus, 6-15-flori. Folia floralla superiora lanceolala, basi in petiolum angusiata subinciso-dentlala. Bracleae lanceolalaUe calycis tubo broiores. Denies calyclm breves, e basi lanceolala subulali, tubum corollae aequanies. Corolla 8-0 lin longa, galea tubo aequilonga glabruscula, margine ciliata, lobo infimo basi angustalo — *Galeoptu Galeobdolon* Linn. Spec pi 810 — *Pollichia Galeobdolon* Roth, Fl Germ I 254 — *Leonurut Galeobdolon* Scop Fl Cam no 705 — *Galeobdolon luleum* Huds Fl Angl 258 — Elook Fl Lond I! ic - Sm Engl Bot t 787. — *Cardiaca sylvatica* Lam Fl Fr II J84. — *Pollichta tulgans* et *montana* Pers Ann bot 14 JO — *Galeobdolon tulgare* Pers. Enchind II 132. — Habitat in Europae, et praeserlim septentrionalis, umbrosis, sylvaiicis, sepibus etc in Scotia, Anglia, prope Peiropolim, in Gallia, Hiipaaia, Italia, Germania.

t *Sped** duMcM.*

80. L. HIRTOM Poir. Diet. Bnpl. 900. - Bth. I. e. — FoU. OTato-cordatls pabescenti-hirsuiif subincanls; caule calycibq. hirsailaalmls; corolla parra tobglabra. % — Flores *L. albx* sed multo ml cores, fere glabrl. Gaalla hrlrls *l~ hirnUi*, sed corolla alba et calyces hirsmisslmi. Folia moll la *L. moUii*, sed diilincu crenatuns obiusis subregulanbus, canescentia pubescentia, margine pills albis numeros ciliata, infenora longe petiolata. Yerticillastri paufiflorl. Calyces breves villosissimi, dentibus 5 brevibus. Corolla alba parva erecia glaberrima v oculo armato versus medium galeae viltosnla. — In borto Parmensi cultum
- <7. L. MICRAMHUM Weinm in Syll pi. soc Ratisb. I. 68. — Bib. I c — Foil oppositls, infenonb. peliolalls, superiorb. sessilib. cordalo-ovatis obtusis scrrallis; verticillastri sexflons. O — Caulis telragonus pedalis et cum omnibus planue parlibus pilosus, pills patenlibus reflexisve. Calyx A-partitus, denies aequales cillatl, seta terminal!. Corolla parva, denies calycis fere adaequans incarnaia, labium supenus formcatum integrum, inferius emargioalum Involulum edeniulum. Pnmo inluito I. *purpureum* refert, sed pilotitate et corolla parva praecipue differU — An *L. purpureum* v forsan *Siachyt arvensu?* — Habitat in Brasilia

t *Species e genere excludenda.*

L. HISPIDULUM Michi — SYNANDRA GRANDIFLORA

3040. LAGOCNIDLITS Bnge.

(Bnge. mss. ex Blh. Labial, gener. et spec. 640. — Meisn. Gener. plant. vascular. I. 887 II. 105. — Fisch. et Mey. mss. in Schrenk, Enum. plant. novar 28. adnot. — *Moluccellae* spec. Pall. — *Yrneloffia* Belanger, Voyage auz lodes ontales tab. aen. fasciculi 4li.)

§. 1. *Spinosi Fisch. et Mey. I. e.* — *Spinæ v. bracteæ spinosæ in foliorum (praesertim inferiorum sterilium) axillis. Carpidia apice glandulosa.*

1. L. DIACANTHOPHYLLUS Blh. I. e. 041. t - Fisch. et Mey. I. c. t - Spims birlis, caule pubesceole; foil, cuneiformib. trifidis incis, lobis acuiis mucronalis; calycis bine birti denlib. oblongis acaminatis mucronalis, lubo longionb.; galea bifida. 2| — Caules albidi pube lenai vesliti et inlerdum ad gemcula birti. Folia Tindia glabnuscula, lobis saepissime acalis mucroneque armalis, in folns infimis apice rolunjlalis et mucrone apicalalis. Calyces lalere ezlerion birti, caeterum gUbr, fruclferi maxim!, lubo 0 lie. longo, denlibus margine ciliaiis in mucronem acaminatis, 5-7 lio. longis, interdum calyces sunt paullo minores. Corolla magna, dilute rosea, galea bifida, lobis bilobis. Filamenia (ut in omnibus speciebus) villo cohaerentia. — *MoluceUa dtacanthophyUa* Pall. Nov. act. acad. Peiropolit X. 380 t. 11. (icon rudis) — *MoluceUa Marrubtastrum* Slephan, Mém. de la soc. impc>. des natur. de Mosc. II. t. 4. (excl. desenpt. et pair) — *M. grandilora* Slephan mss. in Willd. Sptc. plantar. HI. 131? — Crescil In Soonganæ monte Sarbagalai.
2. L. LEIACANTHUS Fisch. et Mey. M*m. de l'acad. imp6r. des sc. de St. Plrsbrg. (VI. Sè>.) II. 940. et in Schrenk, Eoomer. plant notar. 29. | — Spims glabris; caule pubescente; foil, cuneiformib. Irifidis incis, lobis obtusis mucronalis; calycis glabri deolib. oblongis obloaia macronatis, tubo paullo brevlorlb.; galea biOda T. Indhrlsa. 9|. — Folia corlaeaa glaberrlma et nonnisl margine setulis minulls rarls aeabra. Bplaae el braeteaa aplnosaa patentei glabrae. Calyces glabri, fructiferl minores quam praecedens, tubas 4% tin. longus, denies M'/t llm. longl v. vix paallo longiores. Corolla calyce triplo longior, primo dilulissime rosea, dein colore satoratiore insigms, galea apice saepissime biGda, lobis bidenlatis, inlerdum indmsa apiceque obsolete denlala. — Differ I a praecedente caule, spinis caljcibusque non hirlis, foliorum lobis denlibusque calycims apice rolundatif mucronaliH nee non caljcis tubo denlibus eerie longiore. — Crescit A Soongarla versus lacum Saisang-Noor.
3. L. MACRACAMIIIS Fisch. et Mey. I c. 30. | - Spims glabris; caule pubescenta; foil cuneiformib. trifldis, inferionb. incis, lobis acuiis spinosis; calycis puberuli denlib oblongis acutis mucronalis tubum subaequantibus; galea indivisa. *A ~ Fruticulus gracilis, spinis eloogatis 0-0 lin. longis flavidis glabris •. vfi puberulis fere usque ad basin annulus, coriice nWeo tenuissime pubescentle teclus. Folf* pubescent! -scabra cuoeata triflda, foliorum inferiorum lobis laleralibus biM**> Iobo medio indenlato, omnibus acutis mucroneque elongalo albido armalis, lolw summa non raro indivisa lanceolata tnBda T. Integerrima splnoso-mucronaU* Calycis flonfen tubus 4 lin. longus, denies acuii aique mucronali, longitudiot tubum aequant T. illo TIX breviores, linea paullo latiores. Corolla rosea, ^ ' ^ sesqoilongior, galea piloaisima indivisa, apice iruncaU saepeque crenis quatoor obsoleteis nouu. O?aria apice glandulosa. — Proximus *L. tmngm*, a quo folioro lobis mucrooe elongato spinosis satis differre videtur. — In Persia propeTebera
4. L. (TKMBLOFFU Belanger I. c. fig. A.) IXSIGMS Fi»cb. et Mey I c 33T- * j, * Dosaa. caole glabro; fell, cuneiformib tripartitis incis, lobis sublmearib. • < 0 ^ muilcis; calycis gUbertmi denlib. oblongis mucronulalis, longiludiae lubi; ••••• indivisa. % - [Caolea e rhiaoaale erasso ligaoso plurimi simplicissimi • f ^ dales v. param alUores gUbr, e baal apieem asque spinosi, spinæ ^VT tMlraoi axillis per paiaa gemloaUe, folio Ipso pa mm longiores, folia IBref pro •ajora aeaalla triada, lobia laialalibut apice bifldis, Intermedio profuode W*^Q>

- laciniis late sublinearibus aculis mucicis, folia superiora simpliciter trilobata v. supra tridentata. Flores axillares sessiles solitarii. Calycis dentes oblongi, tres superiores parum productiores, omnes mucronati, lobo corollino multo longiores. Corolla tubulosa profunde bilobata, lobo parum infra labia pilorum annulo incilio, labium superius (galea) obtusissime emarginatum piloso-ciliatum, labium inferius subreflexo-complicatum irregulariter, dentibus lateralibus brevibus aculis, lobo intermedio longe producto suborbiculato profundo emarginato. Filamenta quatuor didynama in vaginam membranaceam infra fissam longitudinaliter coalita?? An Iberae per paria approximate glabrae? Stylus exsertus apice bifidus. Caetera omnia ignota! — Crescit in India orientali-septentrionali?
5. *L. HISPIDUS* Fisch. et Mey. 1. c. 33. — Spinus: caule berto; Toll, cuneiformibus tripartitis, laciniis incisibus linearibus rotatis; calycis pilosi dentibus*, linearibus mucronatis, lobo longioribus; galca indivisa. 2l. — [Caulis ramosus hispidus-pilosus?, spinae axillares geminae longae rigidae. Folia anguste linearia trifida v. pinatifida v. interdum subbipinnatisecta, laciniis linearibus angustis mucronatis. Flores in apice ramorum sessiles verticillato-congesti. Calycis lacinae subaequales lineares mucronatae, lobo ipso piloso-berto duplo triplo longiores. Caetera omnia mihi prorsus ignota sunt] — *Yrmeolofla hispida* Belanger 1. c. fig. B. — Crescit in India orientali-septentrionali??
- §.2. *Inermes* Fisch. et Mey. 1, c. 30. — *Spinae in foliorum axillis nullae. Carpidia eglandulosa.*
6. *L. LACINIFOLIUS* Bnge. mss. ex Bib. Labial, gener. et spec. 041. f — Fisch. et Mey. 1. c. 31. — Caule pubescente; foliis, cuneiformibus spinoso-dentalibus; calycis glabriusculi dentibus sublinearibus acutis spinosis, longitudine lobis; galca bifida. 2l. — Suffruticulus humilis rigidus. Caulis sub axillis villosulus, ceterum glaber. Folia crebra semipollicaria rigida coriacea glabra laevia viridia, dentibus ovalibus brevissime spinoscenti-mucronatis, floralia conformia. Verticillastri axillares pauciflori. Calyx vix 3 lin. longus glaber locvis, dentibus subaequalibus. Corolla 0-7 lin. longa, lobus inclusus, lobus oblique annulatus, galca ovalis bifida, lobus pilosus, lobus inferioris lobus laterales breves oblongi aucti, medio profunde bifido. — In Mongoliae australis lapideis subalibus crescit.
7. *U. PLATYCALYX* Fisch. et Mey. Supplem. ad Indie, semina. hort. bot Petropoli IX. 13. — Bracteae spinosae lobulatae; caule pubescente; foliis trifido-multifidiis, lobis sublinearibus spinoso-mucronatis; calycibus glabriusculis, limbo diluio membranaceo angulato-quinquelobo, lobis mucronatis. % — Species calycibus amplis illis *MolucceUae laevit* similibus in genere distinctissima. — Crescit in fSoongaria?) vallibus montium Chantau, locis aridis.
8. *L. ACUTILOBUS* Fisch. et Mey. mss. in Schrenk, Enumer. plant, novar. 31. f — Glaberrimus: foliis, cuneiformibus 3-5-fidis incisibus acute spinoso-dentalibus; calycis dentibus triangularibus spinosis, lobo triplo quadruplo minoribus; galca bifida y. indivisa. % — Caulis glaberrimus albus. Folia magis minusve divisa, semper acute dentata, dentibus spinosis. Flores bracteis subulatis spinosis patentibus fulli. Calycis lobus circiter 0 lin. longus, dentes triangulares praeter spinam fere 1/2 lin. longi atque lolidem lani. Corolla calyce duplo circiter longior, galea bifida v. indivisa. - *MolucetUa aeuliloba* Ledeb. mss. in Eichwald, Planl. nov. v. minus cognit. II. 39. t. 35. - Crescit in littore orientali maris Caspici in collibus siccis.
9. *L. PUNGENS* Schrenk, Bulletin de la classe physico-mathématique de l'Académie de St. Pétersbourg. 11. no. 11. (no. 37.) p. 105. - Inermis: caulo bracteisq. hirtis; foliis, cuneiformibus quinquelobis dentalibus, lobis dentibusq. acuminatis spinosis; calycis glabriusculi dentibus ovato-lanceolatis spinosis, tubo duplo brevioribus; galea bifida. ^ — *I. Bungei* f. *minor* Schrenk, Enumer. plant, kctar. 32. — Fisch. Mey. et Lallemand. Ind. semin. hort. Petropoli IX. no. 112J. — Herba 2-4-pollicaris, vix allior. Calyces et bractae interdum pilis elongatis raris adspersi, saepissime glabri. - Crescit in collibus aridis Soongariae ad 0. Karakin-Sir et Dschilanischick-basch.

10 L BUNGEI Dlh Lablat gncr et spec 041 t - Fich cl Mey mss. in Schrenk, Enumeral plant novar 31 (excl var /9) — Caulc pubescente, foil cnneiformib. 3-5-fidis mcisis, lobis obiusis mucronulalis, bracteis calycibq glabris, denlib. caljcims ovato-lanceolalis spinosis, lubo duplo breviorib , galca bifida. 2l — Caulis basi lignosus ascendens pedalis obtuse letragonus lacvis glaber Folia pollicana, basi cuneala, Iobi» latis, apicc brevier spinescenti-mucronolis v mn-ttcis, rigida, utnnque glabra laevia vmdia, minuiissirac punctala, floralia subconformia, magis sessilia mm usque mcisa Verlicillastn axillares remoli Bractecac subulalae rigidae subspinescentes virescentes glabrac, calycibus bmiors. Calyces semipollicares, forma fere *Lamxx longt/lon*, at ngidi glabri \irides v basi albidu, ore obliquo, dentibus lanceolatis, supenonbus majonbus Corolla fere sesquipollicans pallide rosea, extus glabra, tubus lenuis, inlus brevier oblique annulalus, fauce non in data, galea elongata subplana, apicc biGda, basi anguslata, labium in fen us fere *Leonurt lanati*, lobis lalcralibus crecli* aculis fereque ul in *Lamiu* in denies mutatis, medio dclfxo profunde bifido Anthcrarum loculi bivalves, valvolis pilis albis dense flmbnalis Achacnia oblonga acute tnquelra truncala — *Moluccella grandt flora* Bnge mss in Ldb Flor Altaic II. 418 (excl <yn) - Ldb Icon flor Ross Altaic illusr 1406. — Crscit in rupestnbus Soon-ganac ad fluvium Irlim et ad lacom Saisang-Noor

11 L HIIRTIS Fisch et Mey. I c. £ — Caule birto, foil cunoifornub 3- v 5-fldis partitive mcisis, lobis obiusis submucronulalis, bracteis calycibq hirsutissimis, denlib calycims ovato-lanceolalis spinosis, tubo »uo duplo brctiorib , galea bifida 2|. — Anteccedenli valde affims, sed jam hirsutic di>cr>u* — Ircsol in Soon-gariae montibus ad lacum Saisang-INoor jacentibus

3047. LEOMRIN *Linn.*

(*Linn. Gener. plant* no 722. — *Meisn. Gener. plant, vascul* I. 266 II 104 — *Dlh Labiat gener. el spec.* 517.)

Seetlo I. OAHDAOA Moeaoh, Met*, plant 401. - Bth. L o. 518.

Corollae tubus inlus oblique annuiatus, supra annulum subventneous. Labium suprnus subplanum, basi anguslalum, informs paicnltesimum, lobo medio inlcgro.

1 I PIBFSCENS Dlh in V^all Plant Asiat rar I 03 el Iabnl gincr eMpec 5]g _ Tenuissime pube>rens foil omnib oalis acuminitis submciso-dentatis; corollis n)re sublnplo longionh , lubo annuhlo, gilei subplana, labio palenie, lobo medio inle^ro tf — A taiUns spenebiis rendil foliis polius dentatis qua no lobatis, at infima non suppelunl \criicillastn 20-30-lion, omnes romoti Petioli fohorium floralium flonbus longioren Limbu* 2-4-pollicans, ulrinque trnuissime pusboscens v fere glaber, denies profundi aculi dentati. Bractrae subulatac, cal>rem aequante«, glabrae Cal)ces glabri, tubi nervi vix conspicui dente<*qoe glabri (orolla major quaro in / *Cardtara* — HabiUl in Indiac oncnlalis montibus kamaonensibu<_r Cboor et Kanaourensibus.

2. L. ROMFiMs Bth I I c r. — faule crecto tenuiter tomenlo^o, foil oftM acuminaiis mfi>o-serrati« v 3-5-lobaliH, supra ^IIIOSIH <ubtu< cano-tomeotosii* calycib cano-tomrnloM< ^ — faults raraosut, ad ixillas pilo>u«» Folia magi* incif* quam in / *Marrubiattro* et *pubnemtr*, angutlmra rt inlegrion quam in t~ *C^{ar}~ d%aca* trrticillaMn multiflon, infenorrs remoli, superiors approximali spicath. Bracieae tubulalae glabrae, faljre< aequanle< Drnien caljcini «ubula(i rig idl sobpatentei — Specimen unicum in herbano Anglo-Indico sen alum mancum ^{est,} corollae non vitae el ideo spene* mrcrla, for^in / *pubescrnlu* \arietll. — ^{Ba-} bitat in Indiae oncentahs monle fhoor

1 L (ARDIAfa linn Spec plant *17 - Kngl bol t V6 - Bib labiat gen- et spec 510 f - Pubescent foil eaulini* infenorib palmaiifidi«, «uperiorib. • vatis lobatis, floralib oblongit lubtrifldn, ba»i longe anguMati*. lobi« omnitt* • vatis lanceolatisve, calycib glabns tillosisve. corollae tubo annulalo, galea »oi* lane, l«kbio paleote, lobo medio inlcgro. 4 — Caulis 2-4-pedalis, basi ramoiof ereci »

rami tetragoni rigidi foliosi, pilis brevibus reflexis magis minusve pubescentes. Folia caulina infima circumscriptione fere orbicularia, superiora acuminata, basi subrotundo-truncata, floralia gradatim angustiora inaequalia, supremis subnervigeris petiolo flores superante, omnia pubescentia villosa v. raris glabra, supra subrugosa, subius palmatis J-9-nervi, nervis venisque secundariis reliculis prominentibus. Lobi foliorum caulinarum ovalo-lanceolati, grosse dentati, floralium subnervigeri. Verrucillata 0-15-flori, omnes distantes, racemum 1-1½-pedalem formantes. Dracae subulatae glabrae. Calyces rigidi sessiles, dentibus palenibus et basi lanceolata acutissimis pungentibus. Corolla exclus villosissima. Galca basi subtripilata oblonga. — *L. Illyricum* Hortul. — *Cardiaca tulgart* Moench, Melh. plant 401. — *Cardiaca Inlobata* Lam. Dor. Franc II. 88

0. villosus foliis rugosioribus caule villosa, calycibus subvillosis — *L. ulosus* Desf. Cat. hort. Par. 73. — *L. condeuata** Ilornem. Hort. Hb. Th. — *L. lacruerui* Lindl. Hort. Trans. VI. 296. — *L. eanescent* Dumort. Florul. Belgic 40 — *L. neglectum** Schrank in Syll. pi. soc. Ratisb. II. 01.

y. crispum foliis margine undulato-crispatis lacero-dentatis — *L. crispum* Murr. Comm. hort. Goiling. 8. t. 4 — *Cardiaca crispata* Moench, Melh. plant 401 — Sabb. Hort. Rom. III. t. 43. — Habitat in Europae totius et Asiae mediae dumetis, rudetis etc., a Scotia, Suecia et Petropoli ad Hispaniam, Sicilian, Italiam, Thessaliam et Byzantium uique, in regione Tauro-Caucasica et Caucasico-Gaspica, frequens prope Theodosiam.

4. *L. GLAUDESCENS* Bunge mss. in Ledeb. Flor. Alt. II. 400. — Ledeb. Icon. flor. Ross. Alt. illustr. 1.170. — Superne pubescentia glaucescenti canescenti foliis caulium palmato-partitis incisis, lobis oblongo-lanceolatis, floralibus subtriangularibus, lacinus foliorum lanceolatis hinc subnervigeris; calycibus cano-pubescentibus; corollae tubo annulato, calca subplana, labio patente, lobo medio integro — Habitus fere *L. Sibirica*, flores *L. Cardiaca*. Folia ampla, profunde incisa, floralia multo angustiora et profundius incisa quam in *L. ardiaca* Glaucescentia proinde in uisum recognoscitur. — In jugis Alai occidentali frequens.

5. *L. TATARICUS* Linn. Spec. plantar. 818. — Hb. Plant. critic. IV. 31 t. 338. — Bth I. c. — Glaber v. apice pubescent: foliis, caulibus palmato-partitis incisis, floralibus subtriangularibus, lobis omnibus foliisque supremis lanceolato-linearibus v. linearibus, glabris villosisque; corollae tubo annulato, calca subplana, labio patente, lobo medio integro. 2]. — Affinis *L. glaucescenti*, sed gracilior, tallura humilior] folia tenuius incisa, flores minores. An species omnes hujus sectionis (excepto forsitan *L. pubetente*) unus species variolatus* — *L. Auaieum* Spr. Syst. veget. II. 738 — Habitat in Talana, Sibiria circa Koljwan, in rupibus regionum Alaicarum orientalium frequens.

Sectio II. *CHAITRUS* Moench, Method. plant. 401. - Bth. I. o. 620.

Corollae lobis rectis, inclusis nudis. Labium superius subforficatum, inferius erecliusculum, lobis subaequalibus*, medio subintegro. Stamina tubo vix longiora, antherarum loculis divergentibus. Flores minuti.

0. *L. MARRIBIASTRIUM* Linn. Spec. plant 817 — Jacq. Flor. Austrac. V. 3. t. 105 — Bth I. c. t. — Ramis elongatis pubescentibus, foliis oblongo-obovatis submarginatis, utrinque angustatis, calycibus glabris, corollis dentibus brevibus, tubo tubo nudo, labio superiore subforficato, in fenestra crebra lobis ferebdcquibus, slantibus tubo longioribus — Rami ascendentes 1-2-pedales, obtuse tetragoni, saepe pubescentia brevissima canescens. Folia petiolata 1-2-pedalia, supra glaberrima, subius pallida, raris villosa, lomentoso-pubescentia, floralia subconformia, gradatim immora angustiora, omnia rariora superius densa. Bractae multae, densae multae, numerosi distantibus Bractae numerosae subulatae, calyces aequales (quibus Jim longi, duntaxat spinosissimi) corollae parvae albae. Klappsteinia — (hatfum, / > -nuroides) H. Birol 201 - thailum Jurtubatum Lhrh - (u) daco

Marrubiatrum Schreb. — Habitat in Europae praesertim orientalis et Asiae Rossicae dumclis rudertis, in Gallia circa Etampes, Nannctem et in Anrernia, in Germania praecipue australiori, in Pedemontio, Hungaria, in regione Caucasico-Caspica, Rossia Europaea australi, in Sibiria et jugo Allaico, etiam in America septentrionali verosimiliter ex seminibus Europaeis.

Sectio III. PAIZERU Moench, Meth. plant 402. - Bth. 1. o.

Corollae tubus rectus, intus nudus. Labium superius fornicatum, inferius erectiusculum v. lobo medio lanatum palente obcordato v. bifido. Stamina e tubo eiserla.

7. L. SIBIRICIS Linn. I. c. 818. — Rchb. Plant, critic. IV. 30. t. 337. — Sm. Exot. bot. II. 67. t. 94. — Sweet, Brit. flow. gard. III. t. SOL — Bib. I. c. f — *Ereclus clausus* glaber v. lenuissime pubescens; foliis pinnatis v. palmatis parvifidis subincisis, floralibus supremis subintegerrimis; calycibus glabris v. tenuiter lomentosis; corollae tubo intus nudo, galea fornicata, labio erectiusculo, lobo medio patente. — Caulis 2-3 pedales ramosi, rami obtuse tetragoni, tomentum brevissimo adpresso saepe canescentes, demum glabris viride*. Folia omnia longe petiolata, inferiora laciniosa subrotunda incisa, lobis latis tunc ultra medium limbi attingentibus, caulina plerumque tripartita, laciniis oblongo-linearibus parvis incisis. Medio caulium tripartita, floralia inferiora conformia, lupulina oblongo-linearia integerrima, flores multo superantia, omnia prope viridia subglabra, sublim pallidiora, juniora pubescentia. Verticillastri densi multiflori, inferiores remoti, supremi saepius approximate in racemo saepe ultra pedali dispositi. Bractearum numerosae calyces subaequantur subulatae, apice subsperescentes glabrae v. pilosulae. — *L. Talari cut* Burm. Fl. Ind. 127. (nee alior.) — *L. occidentalis* Urtul. — *L. heterophyllus* Sweet, Brit. flow. gard. II. I. 107. — *L. alsioides* Bunge mss. — *Panzeria mullifida** Moench, Melh. plant Suppl. 137. — *Panzeria tripartita* Moench, Meih. plant 401? - *Statys Jremisi* — Loor. Flor. Cochinch. 308. - Habitat in Asia, Africa et America calidiora. In Indiae orientalis provincia Deyra Dhoon, Bengala et Sikkim, In Cochinchina et China prope Canton, In China borealis et Daburia, in Japonia, Java et in insula Timor, In Senegambia Africae occidentalis, in Indiae occidentalis insulis frequens in Jamaica, Cuba, Demerara, in insulis Sancti Thomae, Trinitatis etc., in Brasilia circa Rio Janeiro et in insula Sanctae Theresiae.

8. L. LASATI'S Spr. Syst. vegetab. II. 738. - Rchb. Plant, critic. VIII. 13. I. 735. - Bill. I. c. 521. — Caulis humilis albo-lanatus; foliis palmatis parvifidis v. palmatis parvifidis, iridis sublim cano-villosis lanatis; calycibus albo-lanatis; corollae elongatae tubo intus nudo, galea fornicata, labio erectiusculo, lobo medio patente. — Caulis et basi crassa perenni sublignosa erecti duri simplicis v. rarius ramosi, vix pedales tetragoni. Folia petioli, calyces, bractearum, corollarum labium superius et inferius foliorum pagina inferior, lana alba demum subfloccosa vestita. Folia omnia petiolata, laciniis nunc angustis, frons ad basin limbi attingentibus, nunc laciniis ad medium lantum alligentibus, apice sinuatis, ralia conformia minora. Verticillastri densi multiflori approximati. Bractearum subulatae spinosae. calyce breviores. — *Ballota lanata* Linn. Spec. plant. & J* *Panzeria lanata* Pr. Knchirid. II. 1*6. — *Panzeria tomentosa* Moench, Meih. plant. 401 - Habitat in Sibiriae siccis sterilibus inter Montes Kan et Jcbagao, fluviis katunja et Tschuja, prope Simeon et in Daburia.

} Speciei non satis notae.

9. L. JAVASICUS Blume, Bijdragen H. - Bth. I. c. HI - Folia ovato-oblonga inaequaliter densatis; calycibus trigono-puberrimis, dentibus raris acuminatis palentibus; labio corollae superioris concaeco emarginato, laciniis intermediis laciniis inferioribus rotundato-crenulatis, lateribus acutiusculis. — Habitat in Javae occidentali umbrosa montana.

10. L. OBLONGIFOLIUS Blume I. c. - Bth. I. c. - Folia oblongis acuminatis aequaliter densatis; calycibus pilosis; dentibus calicibus tubulatis;

intermedia corollae labil inferior* rotundato-crenulata, lateralib. acnulis. 2l. - Uabitat in Java ad ripas fluvii TJapus in montosis Salak.

- 11 L. GAPITATUS Fresen. ex Linnaea XV. Lillerb. 91. — Rarais oranib capitulo nec coma foliomm terminatis; verlicillastris tribus tantam v. quatuor instructis, quorum infimus 1' />-2-plures pollices a proximo superiori dislat. 3j. — llabitat in America boreali.

ft *Species e genere excludendae.*

I AFRICANUS Mill. = LEONOTIS LEONURUS.

L. ERIOSTACHYS Turcz. = MAR RUB I DM ERIOSTAGIYS.

L. GALEOBDELON Willd = LAMIUM GALEOBDELON.

L. GLOBOSUS Moench « LEONOTIS NEPETAEFOLIA

L. CRANDIFLORUS Moench. = LEONOTIS LEONURUS

I IMMCUS Linn = LEUGAS LINIFOLIA

L. MARHUBIASTRUM Burm. LEUGAS ZEYLANICA.

L. NEPETAEFOLIS Mill. - LEONOTIS NEPETAEFOLIA

L. PARVIFLORUS Moench. - LEUGAS ASPERA?

L. SUPINUS Willd. » MARRUBIUM INGISUM

3048. GALEOPSIS Linn.

(Linn. Gener. plant, no. 171. — Melsn. Gener. plant vascul. I. 987. II. 199. — Bib Labiat. gener. et spec. 522.)

1. G. OCHROLEUGA Lam. Did. II. 000. - Rchb. Plant, critic. I. 40. t. 46 - Bib. I. c. 523. — Gaule pubescent; foil, oblongis v. oblongo-lanceolatis, ulrinq. multiter villosis; calycib. glanduloso-villosis. O ~ Caulu basi decumbens divancaloramosus. Rami, folia et calyces pilis mollibus apice saepe glandulosis teslila Folia latiora crassiora molliora quam in *G. Ladano*, venis sublus prominens, supra depressi* Verticillasn numerosiores 10-30-flon. Galjces parum longioris, deniibus brctibus mspmosi*. Corolla ultra pollicans ochroleuca, lubo longo tenui. — *G. villosa* Sm Fl Brit. II. 029. — Engl. Bot. t. 2333 — *G. grandiflora* Gmel Syst 905. - *G. protrata* Vill. Fl. Dclph. II. 388 - *G. dubia* I rcr« - *Tetraht hngflorum* Moench, Mch. pi. 301. — *G. tegetum* Rchb. ex Sleod Non bot. 351. (edit. 1.) — Creicil in Enropa media, In Anglia, Gallia, et German ia, in Gallia media perfrequens, in floris Iullels, Graeeii ei Caaeatioif non occurrit
- S. G. LADANUM Linn Spec. plant 810. — Bngl. bot. L 884. - Canle gtatro T pubescentc, foil oblongo-lanceolata, ulrinq. brerlter tomentoio-pubescentib, calycib. adpresse pubescentib. pilis eglandulosis. O — Caolli erectui divancatoramosus, circiter pedalis, rami glabrl v. pubescentes, saepe purpuraiceni. Folia 1-r/i-pollicaria dislantia petiolata, in locis siccls angostiora inlcgriora, In umbrosis humidis^e oblonga, remote serrato-crenata nervosa glabra v pubescentio, floralia subconformia rainora, calyces excedentia. Verlicilla<(ri 1-J, ad apices ramorum glomerati 0-10-flon, uno alterove paucifloro, saepe remoto Bracleac paucae lineares v. lanceolalae aculissimao subpungvntes, cal)cem acquanles. - *G. eanescens* Schult. Obs. 108⁹ (Ode Rchb Fl. Germ. exc. J») - *anguilfolta* Ebrb - *Tetraht Ladanum* Moench, Melb. pi. 394.
- fl. pant flora* — *G. pant flora* Lam. Did II 600. — *G. tntermdta* \ill Fl Dclph II. 387 t. 9. - Rchb Plant critic. I 40. t 46. - *G. lahfoha* Hoffm Fl. Germ. IV. 8
- Y sptnosa* caljci* dcniiibus longioribus spinosis — *G. anguxhfoUa* Hoffm I c. — Grescit in Europa omni, a Scotia, Suecla ct Potropoli ad Hispaniain, Italiaro, Ro^siam ausiralem cl Cauca^um
3. G. TETRUIT Linn Spec plani 810 - Ilih I c 524 | - (aule pilis rigidis sacpius birlo, sub axilla lumido, full ON His c.iljci b glabris birfulu>e O — Gaulis creclus 1-J-pedalis telragonus, |a\ t rainous Hami sub gomculig parum inilali in sicclale s>acpiu\$ coniracii; maRi* minusve, pracju'riim in parle superiors saepius pubescentia broi aefpresso-reflex a cl pilis hngl> ngidi^ paicuubus ?

subreflexis induti, nonnullis etiam apice glandulo*is interdum interjeclis, nunc pubescentia, nunc pilis patentibus fere omnino deGcientibus. Folia 1-3-pollicaria acuminata, basi rotundata, supra pilis sparsis brevibus hispidula, venis subtus adpresse pubescentibus v. pilis nonnullis longis ciliaris. Bracteae lanceolatae-subulatae, calycem subaequant. Verticillas 6-30-flori distincti v. supremi approximali. Calyces ovato-campanulati sessiles 10-nervi, nervis 5 eminentioribus, basi fere glabri, ore truncato ciliato, nervo transversali prominente. Dentes e basi sublanceolata subulato-spinosi subpatentes, tubo saepius longiores. Corolla nunc denlibus calycinis brevior, nunc calyce quadruple* longior purpurascens flavescens v. coloribus binis maculata, tabus amplior quam in *G. Ladano* et *ochroleuco*. Labium superius saepius brevissime denticulatum, nonnunquam integrum. Achaenia magna subrotundo-compressa, tenuissime subreticulata. — *TetrahU nodotum* Moench, Meih. pi. 305.

a. *partilora*: corollis calyce 1-3-plo longioribus. — *G. Tetrahil* Hook. Fl. Lond. V. t. 101. — Rchb. Plant, critic. IX. 28. I 877. — Sm. Engl. bot. t. 207. — *G. bifida* Banning, ex Lej. et Court Fl. Belg. 211. — Rchb. Fl. Germ. exc. 323. — *G. aeuminata* Rchb. I. c.

0. *pubescent*: caulibus vix hirtis. — *G. pubescent* Besser, Prim. fl. Gal. II. 27. — Rchb. Plant, critic. I. ML »t 41 t. AI «t AA — fl. Waller inn Knhlchtri. F. B. & L. > o Y I I P ¹ An L Crilir , M _ pl AI _ * AI AI M _ — ** Waller inn Snhlchtil

y. *grandiflora*: corollis calyce 3-4-plo longioribus. — *G. tetricolor* Curt. Fl. Lond. II. ic. — Rchb. Plant, critic. I. 47. t. 57. — Sm. Engl. bot. L 660. — *G. cannabina* Willd. Spec. pi. HI. 303. — *G. tetricolor* Mill. Diet. no. 3. — Habitat in Europa tota et Asia media ad vias, in dumetis, sylvis etc., occurrit etiam in America boreali.

t Species e genere expeUendae.

- G. FCSCA Moench. — STACTHS ALPHA.
- G. GALEOBDELON Linn. — LAMIUM GALBOBDELON.
- G. HIRSLTA All. = STACTHS HIRTA.
- G. HIRSLTA Mill. = STACTHS HIRTA?
- G. HIRSLTA Thunb. = STACTHS HIRTA?
- G. MACI LOSA Lam. « PLECTRANTHUS PICTATUS.
- G. ORIENTALIS Mill. = STACTHS SPINOSA.

3640. AMSOMELEH R. Br.

(R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 503. — Meisn. Gener. plant, vascular. I. 2*7. II. 103. — Bib. Labiat. gener. et spec. 701.)

1. A. MOSCIATA R. Br. I. c. 503. — Mb. I. c. 702. — Full, hiliplim caulij. cinereo-pubescentibus; verticillas 6-30-floris; calycibus cinereo-viridibus, glandule manifestis. 3* — Habitat in Nova Hollandia tropica.
2. A. LNODORA R. Br. I. c. — Bth. I. c. — Foil, rliipliri* glabriusculis, sulcu* punctatis; verticillas 6-30-floris; calycibus viridibus, glandulis manifestis. — Habitat in Nova Hollandia tropica.
3. A. HEYNKANA Bih. in Wall. Plant. Asiae rarior. I. 50. et Labiat. 702. — Glabris v. lenissimo pubescentibus: foil, romolis oblongo-lanceolatis, basi an^usculis, floribus cymis longe pedunculatis secundis paucifloris; denlibus calycinis lanceolatis acutis. — Rumi rlongali irruos, acute telapum. Folia minora v. (rnuora quani ¹ fteicrts spenbus, baM apicimjuc .in5u%iaia %t'rrat'-rrrnaU_v uirique pallid >iridia, nervis saepius tenuissimis pubescentibus, floralia rnuora, »upn*ma minul*« Pedunculi iorehorc* ultra pollicares. nupcn«reH brr«iurr«. Cymae ad apices p* dunculorum anilaterales O-IO-llorai*. BractiMr p.ir\jc subulolae. Calyces erecti 4 lin. longi sub^eskiles, forma fere A. ovalat, §r,] icnuiorci subKlabri. — Habitat in lodiae onenlalis penintula? in iosulac Salcttc montium c&celsiorum syl^{vis} nabrotit ad Tempi* KcoerR.

- 4 A. SALVIAEFOUA R. Br. I. c. 603?*) - Bth. I c - Villosa foil, oblongo-ellipticis lanceolatisve; verticillastns densis plundoris; denlib calycmis brevib. laic lanceolalis acutis. 2]. — Valde affims A. *intermedta* cl A. *ovatae moUwtxmae*, differt statura minore, ramis lenuionbus, calycibus minonbus, denlibus tubo quadruplo brevionbus — In Nova Hollandia tropica, ad Port Essington et prope Capang in insula Timor, ad flumen Brisbane habitat.
- 5 A OVATA R Br in Ait Hort Kew. (ed 2) II. 364. - Blh. 1 c f - Jcq. fil Eclog. pi. I t 86 — Hook Bot. Miscell II. 353 t 19. — Hirsuta, rarius subglabra Toll, ovatis acuminatis rolundahsve, ba&i rotundatis v truncato-subcordalis, verlicillastns mulliflons densis, dentib calycmis lanceolatis acutis 2],⁹ O⁹ — Caules erecti 2-3-pcdales ramosi, acute telragom, pilis rcfiexis, praesemm ad angulos villosi. Folia mfenora longiuscula, supenora brevius pciiolala, forma valde vanabilia, nunc fere rotunda oblusissima, late crenala, saepius ovala, magis minus* o acuminata, omnia molliter rugosa, ulnnque viridia et magis minusve villosa, suprema minora, floraha bracteaeformia v. infima cauhnis subconformia \crllicillastns saepius ultra 10-flon, interdum 30-40-flon sccondi v s>ubacuales, infenores distantes, supremi inlcrmpc spicali. Bracteaeparvae oblongo lanceolalae v. subulalae. Calyx 3-5 tin. longus erectos lubulosus hirsulus, dentibus vix tertiam partem longitudinis occupaniibus Corolla purpurascens, labio inlensiore, tabus calycem aequans, Intas transverse annulalai, lablom informs supra pilosum. Filamenta pilosa Odor *Stocky dts tyvalicae*. — A. *dtsttcha* Heyne in Roth, Nov pi sp 254 — *Nepeta Ambotntca* Lion. Suppl. 273. — *BaUola disttcha* Linn Mant. 81 — *Ajuga dtsttcha* Roxb. Fl. Ind. HI. 2. — *Nepeta dtsttcha* Blurac, Bijdragen 823. — *Marrubtum Indtcm* Burm. Fl. Ind 127 et Tbes. Zeyl. t 71 — *Monarda Zeylamca* Burm Fl. Ind 12. — *Ballota Maurttuma* Per* — *Tsjadaen Rhecdc*, Hort Malab X 175. t. 88.
- fl molhsstma* villosior, folus magis acuminatis, floralibus infcrionbus o\alis flores superanlibus — A *moUtnma* Wall. Cat. herb Ind no 2030 — *Nepeta Indica* Linn Spec plant 709 — Habitat in Asiae calidioru. rudcralis praesclim humidis, ad vias, in India onenlali ferc omni vulgans, in insults ZcyUnia, Uaunlio, in regno Burmanoico, China, insulis Ja\ai, Timor.
6. A. CANDICANS Bth. In Wall. Plant. AsltL rarior. I. 90. el Labial. 703. — Canescenli-pubescens foil, ovalo-oblongis lanceolaliive, bail angutialli. venicillastns mullifloris laxiusculis, denlib. calyelni laeolalls aealla. O^ — llabilat A *Malabaritae* Folia parum laliora, utrinque nit caoles el calyces pnbescentia brevissima candicanlia Cymae ut In A. *Malabaricae* saepe elongaUc. Flores minus numerosi Calyx elongalus, dentibus 4. *ovatae*, — Habitat in regno Burmannico ad npas flumims Ira^addi prope Yenanghuen.
7. A INTERMEDIA ^ght. mss ex Blh. 1. c — Tomenloso-pubescens v subvillosa. foil ovalo-lanccQlalis, basi cuncatis, verlicillastris mulliflons densis >. rymis amplis, demum clongalis, bracteis subulatis, calycis hirsuti dentib basi lanceolalis, apice subulatis mollissimis O? ** Exemplana perpauca habilu et characteribus inter A. *ovata* et *Malabarxcam* quasi media, huic tamen propinquiora, differunt folns lalionbus, superficie minus tomentosa et dentibus caljcinis Utioribus. An A *Malabancae* vanetas? v forsam inter hanc et A *mat am h)bnda*? — Habitat in Indiae onenlalis peninsulae monlibus Madurcnubus et ad Peradenia insulae 7eylaniac.
8. A MALABARICA R. Br in Bot Mag t 2071 - Hook Journ of bot I 225 t 127 — Blh 1 c 701 f — Tomonloso-villosa foil oblongo-lanccolaliis, basi angustatis, verticillastns mulliflons densis v c)nm amplis demum tlongahs, foil floralib, bracteis denlibq cnljcinib «ubulatis mollissimis 2].» — Caulis er^ctus, basi fruticosus) 2-5-pcdalis, rami numerosi oblusi telragom, nunc tomento

*) *Incano-tomentota* foil lanceolatu, supra molUb Ian\b, tublus rugous, \er-ttcillastns mulliflons, calycr glandults tomento sepulUs, 2].

brevi canescentes, saepios lana densa obtecti. Folia breviter petiolata 2-4-pollicana obtusa, in parte superiore serrato-crenata, basi integerrima, in pagina inferiore (uti rami) lomentosa v. lanata, superiore brevius tomentosa v. molliter pubescente, floralia saepias bracteaeformia. Verticillastri amplii parum distantes, in racemo simplici semipedali dispositi. Cymae fructiferae saepe laxae dichotomae 20-50-florae. Bracteae calyces fere aequantes. Calyces subsessiles erecti, molliter pilosissimi v. lanati. Corolla *A. ovalae* rosea v. purpurascens, fauce intus pilosa. Filamenta pilosa. Odor *Stachydis sylvaticae*. — *Nepeta Malabanka* Linn. Mant. 560. — *Ajuga fruticosa* Roxb. Fl. Ind. HI. 1. — *Stachys Mauritianae* Sieb. Fl. Maur. exs. — Habitat in Asiae calidioris praelis humidis ad rivulos, etc., in Indiae orientalis peninsula, in regno Burmannico, in insulis Mauritio, Penang et in Java.

3G50. KTACHYS *Bth.*

(Bib. Labial gener. et spec. 525. et 730. — Meisn. Gener. pi. vascul. I. 287. II. 105.)

Bectio I. ALOPECUROS *Bth.* Labiat gen. et spec. 531.

Herba perennis villosa v. lanata. Verticillastri fasciculato-muliflori, in spicam subinterruptam approximate. Bracteae extenses calycem subaequant. Corollae hirsutae, tubo incluso. Antherarum loculi paralleli.

1. ST. ALOPECIROS *Bib.* I. c. f — Ascendens villosa: foliis, petiolatis late ovatis obtusis crenatis, basi late cordatis, floralibus multifloris sessilibus subconformibus latioribus, supremis bracteisque late ovatis acutis calycem subaequantibus; verticillastri 9 multiflori in spicam crassam oblongam v. cylindricam basi subinterruptam approximatis; corollis calyce ample campanulato dimidio longioribus. 2l. — Caules complures, 1-1 1/2-pedales, vel folia pilis mollibus villosi. Folia rugosa, floralia infima verticillastros subamplectantia. Spica pollicem diametro, 1-4 pollices longit. Verticillastri 20-30-flori. Calyx semipollicaris, fructifer in quatuor campanulatae membranaceae venosae, apice VIIIOSQJ, dentibus lanceolato-sabalis acutissimis subsplendens. Corolla octaroleuca, extus pubescent, tubo vix exserto multo oblique annulato, labio superiore emarginato, inferiore parum longiore patente, lobis uleralibus ovalis. Stamina didynama. Antherarum loculi paralleli. — *Sideritis Alopeuros* Scop. Fl. Cam. (ed. 2.) no. 711. t. 28. — *Betonica Hopeuro** I inn. Spec. plant. 811. — Jacq. Fl. Austr. I. 50. t. 78. — Reichb. Plant. critic. > III. 4. t. 710. — *Betonica lutea* Mill. Diet. no. 7. — Habitat in Europae mediae et australis montibus, in Pyrenaeis, Cebennis, Alpibus Hebelicis, Saehsburgensibus et Austriacis, in montibus Galloprovinciae, Piedemontii et Italiae usque ad regnum Neapolitanum, in monte Parnasso.

See Uo II. BETONICA *Bth.* I. o. 632.

Herbae perennes, pilosae pubescentes v. tomentosae. Verticillastri fasciculato-multiflori, in spicam subinterruptam approximati. Bracteae saepe ceteriore* calycem aequantes. Corollae purpurascens, rarius* obovatae, tubo saepius exserto. Antherarum loculi subparalleli.

2. ST. DECAFLORA *Bib.* I. c. f — Perennis erecta hirsuta: foliis, petiolatis ovato-oblongis obtusis crenatis, basi cordatis, floralibus in gemis cordato-ovatis breviter petiolatis, superioribus bracteaeformibus. bracteisque ovalo-lanceolatis mucronatis calycem aequantibus; verticillastri in spicam densam oblongam approximatis infimo remoto, corollis calyce duplo longioribus. — Caules erecti, 1/2-pedale subsimplices crassi, uti folia pilis mollibus magis minus villosi. Folia 2-3 pollicet longa 1-1 1/2, lala rugosa, floralia infima constanter ovata et 9-11* Spica densa crassa 1 1/2-2 poll., longa, pollicem diametro. Calyx campanulatus basi glaber, apice magis minus hirsutus, dentibus spinosis, superioribus parum majoribus. Corolla exclus villosa, tubo incuno, intus reticulata, sed lineis pilorum longitudinaliter pubescente, labia patentia subaequalia. — *Hottonia Monarda** *ri* Gou. Illutl. 36. — *Betonica Kirtuta* Linn. Maul. Mft. — Reichb. Planl. critic. VIII. ft. i. 7U. — *Biltna Damea* Mill. Diet. no. *. — *Aelomea mcana* Ait-

- Hort. Kew. II. 203. — Bot. Mag. t. 2125. — Reichb. I. c. 5. t. 713. — *Betonica macrostachys* Wender. in Bot. Zeit. 1820.1.353? — *Betonica rubicunda* Wender. Ind. semin. hort. Marb. — Habitat in Europae australioris subalpinis, in Hispania, Pyrenaeis, alpibus Helveticis, Appenninis, regno Neapolitano, Hungaria et in Caucaso.
3. ST. BETONICA Bth. I. c. 532. t. cl. 739. — Herbacea erecta pilosula: foliis longe petiolatis ovalo-oblongis obtusis crenatis, basi cordatis, superioribus remotis floralibusque infimis sessilibus oblongo-lanceolatis acutis denatis, supremis linearibus inlegerrimis calycem aequantibus; verticillis nullifloris, omnibus in spicam oblongam subinterruptam approximatis v. infimo distincto; bracteis ovalis racemosis calycem aequantibus; corollis calyce duplo longioribus. — *X St. detusiflora* differat caule leniore, petiolis longioribus, foliis remotis dimidio minoribus, superioribus floralibusque constanter anguste lanceolatis, spica saepius depauperata, vix semipollicem diametro, subinterrupta. Caeterum statura et hirsutie valde variabilis. Calyx et corolla omnino *St. densiflorae*. Var. *fi.* spica elongata et crassiore, et habitu *St. densiflorae* proxima, sed folia superiora lanceolata nec ovata. — *Betonica officinalis* Linn. Spec. plant. 810. — Hook. Fl. Lond. II. ic. — Sm. Engl. Bot. t. 1142. — Fl. Dan. U 728. — Reichb. Plant. critic. VIII. 4. t. 710. — *Betonica hirta* Leyss. — Reichb. I. c. 4. i. 711. — *Betonica legitima* Link, Handb. 476. — *Betonica stricta* Ait. Hort. Kew. 11.200. — Reichb. I.O.5.L 712. — *Betonica alpina* Mill. Diet. no. 3. — *Betonica fohota* Presl. Fl. Steal. I. XXXVIII*) — *Betonica affinis* Wender. in Bot. Zeit. 1820. I. 353. — *Betonica terotina* Host, Fl. Austr. II.? — *Betonica divulsa* Ten. Syllog. fl. Neopol. App. 014? *fi. major*: — Habitat in Europae totius et Asiae Rossicae pascuis sylvalicis.
4. ST. (BETONICA) Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 130. f) SCARDICA Griseb. Reise durch Rumelien II. 180. et 203. — Caule stricto piloso; foliis cordato-lanceolatis grosse crenatis discoloribus, subultra canescentibus, inferioribus petiolatis; bracteis imis conformibus; verticillis nullifloris spicalibus, imis remotis; bracteis ovalo-lanceolatis calycem aequantibus; corolla incarnata pubescente, tubo exserto, galea integra stamina excedente. 2l. — Caulis 1'A-3-pedalis simplex obsolete leucogonus virens molliter pilosus. Folia 4-2 poll., longa, 14-10 lin. lata, superiora minor*, supra basi rotundata sessilia. Spica basi interrupta. — Crescit in Sardo et Berilsco.
5. ST. LONGIFOLIA Bth. I. c. 533. t. — Perennis erecta villosa: foliis petiolatis oblongo-lanceolatis obtusis crenatis, basi profunde cordatis, floralibus infimis conformibus sessilibus, supremis bracteaeformibus bracteisque ovalo-lanceolatis acuminatis calyce brevioribus; verticillis nullifloris, infimis remotis, supremis in spicam cylindricam approximatis; corollis calyce tubuloso duplo longioribus. 2l. — Caulis elalis crassis dense villosis. Folia 4-0 pollices longa, semipollicem v. vix pollicem lata, basi parum latiora, et auriculis subrotundis crenatis profunde hauiacordata rugosa, venis valde prominentibus. Spica laxiuscula, basi interrupta, semipedalis. Calyces semipollicem longi, pubescentia brevi villosi, ore truncato ciliato, nervis 5 prominentibus, dentibus subulatis rigidis strictis. Corolla rubro-purpurea, exclus glabra, tubus subrectus, intus exannulatus. Faux subaequalis. Labia patenter subaequalia. — *Betonica orientalis* Linn. Spec. plant. 811. — Habitat in Caucaso.
6. ST. GRANDIFLORA Bth. I. c. + — Perennis erecta villosa: foliis petiolatis late ovalibus obtusis crenatis, basi late cordatis, floralibus sessilibus amplexicantibus subconformibus, gradatim minoribus, supremis subbracteaeformibus; verticillis nullifloris distinctis, infimis remotis; bracteis ovalo-lanceolatis acutis, calyce longioribus; corollis calyce tubuloso-campanulato triplo longioribus, fauce dilatata. 2f. — Caulis complures pedales, pilis subreflexis villosis. Folia inferiora longe petiolata, omnia rugosa, utrinque villosa, floralia verticillis amplexicantibus. Verli-

*) *Spica interrupta basi foliata; bractei calyceque hirsute; corolla pubescente galea emarginata**

- cillastri 10-20-flon pauci, omnes distincti, infimi remoli, supremi parum distincti. Bracteae ciliatae saepe foliis floralibus subconformes, interiores angustiores. Calyx 6-7 lin longus, basi glaber, apice purpurascens villosus, dentes subulali rigidi subspinosi. Corolla pulchra violacea, 12-14 lin. lobis glabra, tubo minus emarginato, extra calycem parum incurvo, superne in faucem amplam dilatato. Labia patentia. Stamina subdidynamia. Antherarum loculi demum divaricati. — *Betomca grandiflora* Willd. Spec. pi. HI 00 — Bot. Mag. t. 700 — Reichb. Plant. critic. VIII 0 t. 715 — *Betomca orientalis* Thuill. Fl. Par. 203 — Habitat in Sibiria ad fluvium Terek in Caucaso.
- 7 ST. DISCOLORE Bib. I. c. — Perennis ascendens villosa foliis plicatis oblongo-lanceolatis obtusis profunde crenatis, supra rugosis hirsutis, subulis albo-lanceolatis, floralibus in gemmis conformibus sessilibus, supremis bracteisque lanceolatis calycem aequantibus, verticillastris multifloris subdistinctis paucis, corollis calyce lubuloso campanulato plus duplo longioribus, faucibus dilatatis. — Planta elegantissima, magnitudine et floribus *B. grandiflorae*. Caulis pedalis, obtuse quadrangulus albo-villosus, superne lomentosus. Folia aequaliter grosse crenata, quoad Tormentum proxima ad *B. hirsutae* folia accedentia, supra venteria, subtus tomento nivo mollissimo vestita, radicalia et caulina infera longe petiolata, basi inequaliter cordata, floralia summa in petiolum angustata. Bracteae villis incumbentibus mollibus albis sublanatae. Calyx lanuginoso-villosus, dentibus lanceolatis acutis inaequalibus. Corolla magna villosa, tubo canaliculato paulo longiore, galea lata rotundata integra, labio galea paulo longiore trilobo, lacina intermedia lala emarginata. — *Betonia mvea* Stev. in Mém. soc. nat. cur. Mosq. III 266 — Habitat in Caucasi orientali lapidosis, a flore rosae circa thermas Dschibul, et Quercubro circa pagum Cibinalug.

Sectio III. BHI08TACHT8 BtL 1. o. 634.

- Herbae biennes • perennes, molliter villotae. Terminalis. Verticillas multi-florae. Bracteae taliter emarginatae aequantur, vix eo dimidio breviores.
- 8 ST. MONTBRETII Bib. Ann. t. nat. (2. Sér.) VI 48 — herbacea erecta, molliter villosula foliis ovatis vel ovalo-lanceolatis crenatis, utrinque videntibus. MIOSIS, Dorahb. basi dilatatis lanceolato-acuminatis (lores superanlibus, verticillas dense multifloras distinctas, bracteis lanceolatis subulalibus calyces aequantibus, calycibus lubulosis rufis MIOSIS denique rigidis lanceolato-subulalibus hirsutis, inaequalibus. — Habitat in Olmpo.
- 10 M. HLUACCLA All. Fl. Ped. I 31 t. 84 fig. I. — Herbacea erecta, pilis longissimis lanata foliis plicatis oblongis obtusis crenatis, basi subcordatis, floralibus latissime ovatis in gemmis, basi late cordatis, calyces subsuperanlibus, verticillastris multifloris distinctis, bracteis ovalibus oblongis, exterioribus calyces aequantibus, calycibus lanatis dentibus ovaliter acutis subspinosi. — Laevis et basi crassa perennans plures erectae, vix pedales subumbriles folia raulina 2-5 pollices longa, vix ultra pollicem lala, basi saepe aequaliter cordata. Racemus simplex semipedalis. Bracteae extiores acutae, medio dilatatae, basi angustatae. (a) *SI Germameae*, sed saepius minus lanata. Corolla calyce subduplo longior, forma *SI Germameae* purpurea t. in var. *fi*, quae omnibus alius characteribus aucta a simillima, lutea. — *Stidentia hractea* Lol. Ecphr. I t. 131 t. K. — *Stachys intermedia* Ten. Fl. Neap. prodr. XXVI — *SI b*rbala* Lapej. Hist. abr. pi. Pyr. J36 — *SI phlomoides* Willd. Enum. plant. hort. Berol. suppl. 41.
- fi. lulea* floribus luleis — *SI obliqua* Waldst. et Kit. Ic. pi. Hung. rar. II M. t. 131. — *St. trrhco* Forsk. Fl. (non Linn.) — *SI ortenlatis* Vahl. i. mb. II 61. — Sibth. n. Sm. Hor. Graec. M. 48 t. MO. — Habitat in Europa mediterranea siccis incultis, in Italia, Peninsula orientali, Sicilia centrali prope Rhodum et in montibus Imere, in Balloprovincia, Pedemonte, Romania, regno Neapolitano, Sicilia, *fi* in Croatia, Dalmatia et prope B. 344. 300.

10. ST. MOLLISSIMA WHid. Hort. Bcrol. 60. t. 60. - Blh. 1. c. f — Humilis orecla, molliter villosa: foil, petiolatis late ovatis crenatis, basi cordalis rugosis, ulrinq. subviridib. villosissimis; verlicillasris multifloris; braceis linearib. calycem aequanlib.; calycis campanulali villosi denlib. aculis subspinosi; corollis exlus pubescenlib., calyce dimidio longioribus. <f! — Uerba vix semipedalis. Folia fere *St. alpinae*, at minora, floralia calyces breviter superantia. Calyces 5-6 lin. longi, ample campanulali, dentibus omnibus fere aequalibus lanceolalis. Species slatura et calycibus dislinclissima. — Habitat in insula Corfu cl in Hispania.
11. ST.? PUMILA Russell, Nat. Hist. Alcp. II. 255. L 10. - Bib. 1. c. 535. t - Perennis v. suffruticosa humilis: foil, subradicalib. peliolatis ovalis oblusis, basi cordalis rugosis, ulrinq. cano-tomentosis; verlicillastris paucis nullifloris; braceis exteriorib. calyces subaequanlib.; calycib. glabriusculis, denlib. lanceolalo-subulalis, tubo subaequalibus. ^ — Caules e basi dura sublignosa brevissimi. Folia radicalia fere *Salviae pontiferae*. Rami floriferi 2-4-pollicares, verlicillasros 2-4 fercules. Folia floralia rotundata rugosa, calyces aequantia. Verlicillasri 15-20-oori. Bractea oblongo-lineares. Calyces lubuloso-campanulali. Corollae.....? An revera hujus generis? — Habitat in Syria prope Aleppo.
12. ST. RUPESTRIS Monlbr. et Acher, Ann. ao. naL (2. Sér.) VI. 40. — Saffratcofa bumilis viscosa: ramispilosis; foil, ad basin ramorum approximatim peliolatis late ovalis obtusis crenatis, basi cordalis rugosis, utrinq. viridib. villosis; verlicillasris 6-10-floris; braceis linearib. calyce param breviorib.; calycis lubuloso-campanulali subincurvi denlib. acutissimis in labiis 2 Irregulariter dispositis; corollis vix pubescenlib. calyce dimidio longioribus. 2]. — In Tauro.
13. ST. SWAINSONI Blh. I. c. t — Herbacea? perennis piloso-lanata, basi procumbens ramosissima: foil, petiolatis ovalis oblusis crenatis, basi rotundalis rugosis mollissimis; verlicillasris 2-10-floris; braceis calyce dimidio breviorib., rarius minoribus; calycib. campanulalis molliter villosis, denlib. lanceolalis acutissimis subspinosi; corollis calyce duplo longioribus. % — Species quoad affinitates dubia, et inter *Zietenias*, *Siachyolypos* et *trinslaehydes* fere media. Caules vix semipedales, rami, pelioti et folia pilis longis albidis subserratis mollissime vestita. Folia lempollitaria v. parum longiora. Raceml ramorum primariorum 3-4-pollicaret densl; vericillasri tab-10-flori, bractea ca. Jyds dimidium fere aequantes. In ramulis lateral (but el nonnunquam In omoibua ferticillatir bil ori, braceis subnullis. Calyces subseaslet 4-5-Unaes, dentibus iabum eorollae subaequanlibus. Corollae extai param villotae, labio inferiore superior! duplo longiore. Annulus tubi subobliquas. — *Prarium hinulum* Poir. Diet V. 011. — *Pratium minus* Vahl lib. — Habitat in Graccia ad montem Parnassum et in Ithaca.
14. ST. ZUCCAUNII Blh. I. c. — Herbacea? perennis, pilis adpressis sericco-lanata: ramis elongatis oreclis subramosis; foil, paucis linearib. integerrimis; verlicillasris bifloris; braceis calyce breviorib.; calycib. tubuloso-campanulalis, denlib. spinosis tubum corollae superantibus. 2]. — Rami 2-3-pedales subnudi, nli folia, calyces el corollae pilis albis sericeis longis adpressis lanaii. Folia vix pollicaria mollia acutiuscula, floralia parva sessilia lanceolata. Racemus simplex pauciflorus. Bractea lanceolata, calyce breviores. Calyces sessiles, 5 lin. longi. — Habitat in Graecia ad Acrocorinthum.
15. ST. LANATA Jacq. Ic. pi. rar. 1.11. 1.107. — Bib. I. c. t — Densissime sericco-lanata: foil, oblongo-ellipticis, ulrinq. angustatis, vix crenatis rugosis, floralibus minoribus, supremis vericillasro brevioribus; vericillasris multifloris, supremis in spicam approximalis; braceis linearib. lanceolalis calycem subaequanlib.; calycis subincurvi denlib. vix inaequalibus. aculis mucicis, inclusis lanalis, tubo incluso. ^ — Caules pedales v. rarius sesquipedales, uli folia el calyces lana densi^simi-veslili. Folia crassissima mollissima, minute crenulata. Vericillasri plus JO-flori. Calyces *St. Germanicae* sod densius lanaii, denlibus lalioribus palmatis. Corolla minor quam in *SI. (Jamaica)*. — *Eriostomum lanatum* Hoffm. >jcbl.

- I. GO — Habital in Taanae camp is apricis copiose el in locis herbldis siccis sub-alpinis tolius Caucasi, eliam in monle Beschlau.
16. ST. ITALIGA Mill. Diet. no. 3. — Bib. I. c. 536. — Herbacea erecla cano-lomenlosa: foil, subsessilib v. breviler peliolatis oblongo-lanceolatis angustis obtusis crenulalis, basi anguslalis v. ranus subcordalis rugosis, molliter albo-tomentosis, floralib. ovalo-lanceolatis inlegernmis, veriicillastro &ublongionb.; verticillaslns malliflons dislinctis, supremis approximalis; braceis I mean-lanceolatis calycem aequantib.; calycib. subincums, denlib. acutis spinosis, intus densissime lanalis; corollhs exlus lanatis, lubo inclasso. </• — A *St. Germantca* differt slatara humiliore, folus angustis, basi ranssime cordalis, more *Salvtae* rugosis el potius lomentosis qaam lanalis. Racemi tenuiores. — *St talvtaefoha* Ten Fl. Nap. II. 23. 1. 53. — *Eriostomum talviaefohum* Presl, Fl. Sic I. XXXVII *fl. pungent.* bumilior, folia paaciora, verticillastn pauci ad apices caulis subspicali. — *St. pungent* Ross. Nat. hist Alep. — *St salvtaefolta* Hochst el Stead. Pl. Dalm. exs. — *Stdenttt hirtula* Sieb Pl. Cret. exs. — Habilat in Earopa mediterranea, in Italia ad Paestum el in Eiruria, prope Parmam, 0 ad Zara Dalmaliae el in Syria prope Aleppo.
- 17 ST. GERMANICA Linn. Sp. pi. 812. - Jcq. Flor. Aasriac. IV 10 t 319 — Sm. Engl. bot. t. 820. — Bot. Regisl. 11280 - Flor. Dame t. 684. — Rchb. Plant critic. X. 18. t. 050 — Bth. I. c. f — Herbacea elata, lana alba laxa vestila foil, caulims petiolalis ovalis T. ovato-lanceolatis obtusis, basi plensq cordatis crenalis, floralib. infenorib. sessilib. sabamplexicauhb. crenatis, sapremis lanceolatis acalis inlegerrfmis, vemcillasro soblongionb., ombb albo-lanatis; verticillastris mltifloris distineis racemosis, sapremis approximate, bracteis linean-lanceolatis calycem aeqoanlib ; calycib. subincanris, dentib acatis subspinosis, Inlat Unalis, sapremis majorib.; corollis exlus laoalis, lubo incluso. <f — Species quoad villosJuiem el mftgniladiaem floram valde •arlabills. Caolei, pelioli, foliorum pagioa Inferior el praetertlm ealyoes el braeteae lana alba laxt molls—sima nunc subsericea Teslili. Caulet erecil firm! 1-4-pedales. Folia basi saepissime cordaia, sopra molliter rugosa hirta v. saepius lanata, sublus consumer lanala crassa mollia, floralia angustiora, mfenora verlicillastro subduplo Ion-giora, supenora gradalim minora, suprcma vix caljces excedentia > crticillaslri 15-20-flon el ultra, inferiorcs remoli, supremi approximate racemum simphecem formantes Braeteae lineares, extenores calyces aequanles. Calyces oblique campanulati lanali, dentibus inaeqaalibos ovatis acutissimis spinosis Corolla roseo-purpurea v. albida, magnllodine variant, saepius calyce subduplo longior, exlus dense lanala, nunc vix calycem aeqaans el pubescens. Tubus dentibus calycims brevior, inlos oblique annolaius. Labia patentia, supenus integemfflum, infenus parom longias, saepius maculalum, lobis laleralibus panris oblongis. Achaema o?alo-tnquetra subcompressa mgra laevia. — *Enottomum Germanteum* Hoffa el Link. Fl Port. — *St. tomentosa* Gat. Fl. Mont. 107 — st *Crettca* Linn Spec, pi 812? — Sibth. el Sm. Flor. Grace. VI 47 t 558. — *St tpn-tablis* Cboisy in DC. Pl rar horL Gen I 27. — *St dasyantha* Rafin Prcc. def decouv. 30. — *St btennts* Roll ex Reichb Plant critic X. 17 t 040 — *St polystachya* Ten. Fl. >op II 23. t 51 — *Enottomum polys tacky urn* Presl, Fl Sicol* I X\XV|| — *Enottomum Luttamcum* Uoffm. el Link. — *St Lutitamca* Stead* Nom bot 806 (edit 1) — *St Pannomca* Lang Pl exs — *St. argentea* Tausch in Bol. Zeil 1831 I 217 - *St. alba* Mill Diet n o T - *St HeterophyUa* Moench « toad Nom bot 806 (edit 1) — *SI ctnerea, elongata, excelta, tntermedt** onenUUt, Sibtnca, terbatrtfoha* etc llorlul — *St aeuttfoha* Bory el Cbaubard, Expedition scienliffique de Morn (Bol) 168 el Flore du Peloponn 022. t *fi tubalptna* Griseb Spicileg flor. Rumel II 137 - Caule villosu, foil, supra menlib, calycis denlib aequallb, tubo coloralo vix lanalo; corolla parp<" ructnte. - *St ttneea* GriMb. Reise dareh Rumelien II 180. — Habitat IB Earopte, Asiae mediae el Africae borealis siccis aridis Upidosls.

18. 6T. FLOGGOSA Blh. I. 0. 7». — Herbacea: caule elato, lana densa floccosa resiiito; foil, caulinis petiolalis ovato-lanceolalis oblusis crenalis, basi cordalis, supra molliler villosis, sublus dense albo-lanalis floccosis, floralib. infimis crenulatis, superiorib. lanceolalis inlegerrimis pungentib., calyce subbreviorib.; verlicillaslris mullifloris dislinclis racemosis, supremis approximalis; braceis lanceolmis calycem aequanlib.; calycis subincurvi dentib. aculis pungentib., inlus aublanalis, supremis majorib.; corollae lubo incluso. <? — A SI. *Gertnaniea* el *lanata* differl praecipue foliis basi profunde cordalis el lana caulis el foliorum paginae inferioris densa floccosa nee longa sericea. — Crescil in Indiae orientali-borealis monlibus, in pralis prope Hispaur.
19. ST. ALPINA Linn. Spec plant. 812. — Lapyr. Fl. Pyren. 1.14. I. 8. — Blh. 1. c. 537. f — Herbacea elata: caule erecto piloso sublanalo; foil, peliolalis ovalis serralo-crenalis, basi cordalis, ulrinq. viridib. villosis, floralib. angustiorib., gradalim minorib. aculis serralis; verlicillaslris omnib. remolis mullifloris; braceis linearib. calycem subaequanlib.; calycis pilosull denlib. lanceolato-ovalis aculis spinosis; corollis eklus lanalis calyce subduplo longioribus. (/? — Planla, praeserlim in horlis, valde variabflis, aed consumer a *St. Germanica* foliis ulrinque viridibus, verlicillaslris plerumque paueioribus remolioribus el racemo mullo minus laoalo dislinguenda. Gaales el pelioli nune pilis longis mollibus vetill, nunc breviler tanlum el laxe villosi. Folia ulrinque villosa, sed vfridia lenula, vix rugosa, nunc oblusa, saeplua aculinscula. Raceml aaepe purporaacenes. Verticillslri 15-20-florl. Calyces late campanolati, mullo minus lanatl quam in *St. Germanica*. Gorolla 51. *Germanicae*, obscure purpurea v. rubro-fusca. — *Eriostomum alpinum* Hoffm. el Link. Fl. Port.
ft. intermedia: major, foil, rugosiorib. sublus inlerdum sublanalis. — *St. intermedia* Ait. Hort. Kew. II. 201. — *St. Cretica* Linn. Spec. pi. 812. — *St. ortentalit* Linn. 1. c. 813. — *St. Sibirica* Link, Enum. hort. pi. Berol. II. 100. — Sw. Brit. fl. gard. I. 1. 100. — *St. urlicaefolia* Tausch in Bot. Zeit. 1831. I. 216. - *St. curviflora* Tausch I. c. — *St. futca* Moench? — Habitat in Europae urnbrosis praeserlim montosis, in Pyrenaeis, Gallia cenlrals, alpbibus Helveticis, in monlibus Italiae soperioris el Lucaniae, in Germanfa, *fl.* in Caucaso el Sibiria.
20. ST. SERICEA Wall. Pl. Aa. rar. I. 04. - Blh. I. o. - Herbtcea «UU: caule erecto pilosissimo; foil, petiolalis ovalis T. ovato-oblongit oblosiuoolU erenatus, basi cordatis, ulrinq. villosis, supra viridib., sublus pallidit v. Incanii, Junlorib. sericeo-lanalis; verlicillaslris omnib. dslantib. 10-15-florls; braceis linearib. calycem subaequanlib.; calycis lanati dentib. ovalo-lanceolalis acutisslmis spinosis. ty? — Vix a SI. *alpina* dislinguenda, villosior tamen, Bores in vericillaslris pauciorcs. Racemi elongati mulliflorl, pilis longis laxe lanati. Folia rugulosa, sublus in cxemplaribus sylvestribui albo-lanala, in cullis virenlia. Calyces obliqui, nee vere bilabiati. — *St. Penica* Gmel. Jan. ex C. A. Meyer, Enum. pi. Cauc. Casp. 04. — Habitat in Asiae centralis monlibus, in Caucasi monlium alliorum Talysch sylvis, In montibus Ghilan Persiae, in monlibus Nepaliae el Kamaon, in Musaooree el Ioto Jogo Hlmalayensi frequens.
21. ST. SETIFERA C. A. Meyer, Enum. pi. Cauc. Casp. 04. — Blh. I. c. 538. - Uerbacea data: caule erecto piloso sublanalo; foil, breviler peliolalis oblongii v. oblongo-lanceolatis, basi rolundalis, floralib. gradalim minorib., omnib. ulrinq. viridib. rugosis, molliter villosis, apice arislato-mucronalis; verlicillaslris mullifloris dislanlib.; braceis lanceolalis arislulis; calycis villosi dentib. lanceolalis acutis spinosis; corollis exlus pubescenlib., calyces parum excedentibus. % — Affinis *St. tericeae*, sed foliis subsessilibus angustis arislatis el corollis glabrioribus satis dislincla videtur. — Habitat in Caucasi monlium Talysch locis subbumidis prope pagum Swanl.
22. ST. VESITTA Bth. I. c. f - Uerbacca erecta, molliler albo-villosa: foil, subsessilib. ovato-lanceolalis oblusis crenulalis, basi cordalis crassis rugosis, sublus

dense albo-lanalis, Ooralib. lanceolalis acutis reflexis, supremis calyces vix excedentibus, verticillatis sub-10-floris, omnibus distantibus, bracteis linearibus calyce dimidio brevioribus, calycis villosi densibus lanceolatis aculis subsimplicibus; corollis exclus pubescentibus, calyce subduplo longioribus ty* — AfGimSf *oblongifoliae*, a qua differt foel is crassis lanalis et bracteis sallem in verticillatis superioribus calycis dimidium aequantibus. Gaulis erecti subsimplices, pedales v. demum fere sesquipedales. Folia 1-1¹/_s-pollicaria, supra subvincta rugosissima, subtus lana alba densissima, sed multo breviora quam in 51. *Germantca* \cslita Racemi elongati sincti Calyx fere 4 hn longus. Corollae tubus vix exsertus, inclus prope basin oblique annulatus, labia patentia, inferius superiore dimidio longius — Habitat in Indiae orientalis montibus Nepalensibus.

23. ST MELISSAEFOLIA Bib. I. c — Herbacea ramis divaricatis, pilis obversis mollibus pubescentibus; foel, petiolatis late ovalis obtusis crenatis rugosis, utrinque viridibus. glabrescentibus v. pubescentibus, floralibus superioribus calyce brevioribus; verticillatis tub-10-floris remoliusculis v. superioribus approximatis, bracteis linearibus calyce dimidio brevioribus, calycibus ovalo-campanulatis pubescentibus, dentibus acutis non spinosis, corollis exclus pubescentibus, calyce duplo longioribus 3}. — Affinis *SI splendent*, sed glabrior, et flores pauciores duplo minoribus Folia remota, 1¹/₂ — 2 poll longa, pollice latiora tenuia Racemi subramosi Calyces fructiferi vix 3 lin. longi, late campanulati, dentibus lato lanceolatis ovatisve patentibus Corolla purpurascens, tubo tenui incurvo, inclus unnnulato, labia patentia. — Habitat in Indiae orientalis montibus Nepalensibus. „

24 ST. SPLENDENS Wall. PL. As. rar. I. 64. - Bib 1 c - Herbacea elata canle erecto piloso, foel, petiolatis ovalis serrato-crenatis, basi cordatis rugosis villosis, utrinque viridibus, floralibus conformibus sessilibus gradatim minoribus, verticillatis sub-10-floris remotis; bracteis linearibus calyce brevioribus; calycis pubescentibus dentibus obtusiusculis malleis Inaequalibus; corollis calyce plus duplo longioribus, tubo exserto incurvo. 9} — *SL alpina* § atnU, ted minus villosa, floret In verticillatis pauciores. Bractea breviflora. Calycis pubescentia brevi nee pilis longis villosis, densibus minime spinosis et corollae tubus calyce subdimidio longior — Habitat in Indiae orientalis montibus Gossain Than, in montibus Mussooree et in toto Jugo Himalayensi frequens.

SecUo IV. CALOSTACHIS Bth. 1. o. 639.

Herbae perennes glabrae v. villosae, caulibus saepe ad angulos obverse pilosis aculeatis. Verticillatis subsexfloris. Bractea minulae. Dentes calicis acutissimi v. subsimpliciter. Corollae coccineae v. purpureae, tubo longe exserto. Antherarum loculi divergentes v. divaricati.

25 ST COCCINEA Jacq. Hort Schoenbr. III. 18 t. 2M. - Bot Magai. (006. - Andrus BoU RepositU t. 310. — Blh I. c. f — Herbacea erecta, molliter villosa: foel petiolatis ovalo-lanceolatis obtusiusculis crenatis, basi cordatis, racemum elongatis, verticillatis sexfloris, omnibus distantibus, bracteis subnullis, corollis pubescentibus calyce subduplo longioribus, tubo longe exserto — Rami obtuse tetragoni, pilis brevibus villosi. Folia 2-pollicaria, basi pollicem lata, inflorescentia longe petiolata, obtuse crenata rugosa, utrinque villosa, floribus »cs»ilia, infloribus con form la, crenatis submucronatis, superioribus calyce vix longioribus oblonga, apice spinoso-mucronata. Calyces subsessiles 3-4 lin longi pubescentes virides, densibus lanceolatis spinoso-acuminatis. Corolla pulchre coccinea, pollicem longior tubo incurvo calyce duplo longiore, prope basin inclus pilis transversis annulata. — Habitat in Mexico.

96. ST CILIATA Dougl mss ex Bib I. c. f - Herbacea erecta subglabra caulium angulum obverse ciliatum, foel petiolatis obtusiusculis acuminatis crenatis, basi cordatis glabris v supra pilis raris hispidulis, verticillatis sexfloris, superioribus appropinquatis, bracteis subnullis; corollis glabrescentibus calicis con duplo longioribus, tubo longe exserto. — Caulis 3-4-pedalis parum ramosus

angulis acutis, pilis brevibus rigidis obversis saepius angulatus, caeteram glaberrimus. Pili pilis longis ciliati. Folia 2-3-pollicaria vix rugosa, sabulosa venosissima, nunc glaberrima, floralia minora, suprema calyce subbreviora ovaia roembranacea ciliata. Verticillas inferioris remoti, supremi subapproximali. Calyx vix 2 lin. longus campanulatus glaber, dentibus ovalis subspinoso-acuminatis. Corolla glabriuscula purpurea, fere pollicem longa, tubo perianthii incurvo v. subrecto calyce triplo longiore, prope basin intus piloso-annulato, labium superius subrectum tenuiter pubescens, inferius plus duplo longius palens. Antherarum loculi ante anthesin parvali, demum subdivaricati. — Habitat in America boreali-occidentali ad ripas fluminis Columbiae.

27. ST. THUNBERGH Dth. I. c. 540. t - Herbacea erecta?: caulis angulis obverse aculeatis; Toll. pili ovatis acuminatis crenatis, basi cordatis rugosis coriaceis, nervis subulatis aculeatis, utrinque glabris v. pilis longis bispidis; verticillas sexfloris distantibus; bracteis subnullis; corollis calyce glaberrimo plus duplo longioribus, tubo longe exserto. 2]. — Planta in speciminibus nonnullis procumbens videtur, in aliis erecta, caeterum *St. borraginoidi* similis. Caules ut in Italia, nervi pedicellae foliorum tuberculoso-aculeati. Folia ram pagina superior nunc pilis sparsis hispida, nunc, ut in Italia, aculeis exceptis, glaberrima laevis. Folia siccatae supra bullata nigricantia, subtus elevato-reliculata, saepe rufescentia. Calyces pedicellati, fere semipollicares laeves, dentibus tubo aequilongis aculis, vix pubescentibus. Corolla *St. ciliatae* glabra robra. — *Galeopsis hispida* Thunb. Prodr. fl. Capens. — Habitat in Africa australi ad Promontorium bonae spei.
28. ST. DORRAGINOIDES Cham. et Schlecht. Linnaea V. 100. — Blh. I. c. t — Herbacea erecta: caulis angulis obverse aculeatis; foliis, pili ovatis ovalis aculis crenatis, basi cordatis, utrinque viridibus piloso-hirsulis et subulatis ad nervos aculeatis; verticillas sexfloris distantibus; bracteis subnullis; calycibus pubescentibus pilosis; corollis calyce subquadriplo longioribus, tubo longe exserto. % — Habitus *St. ciliatae*. Caulis 3-pedalis, parum ramosus tetragonus, ad angulos pilis reflexis asperrimus, quorum basis conica aculeiformis demum persistit, facies glabra v. pilis paucissimis brevibus pubescens. Folia 1-2-pollicaria rugosa, pilis sparsis paginae superioris longia numerosis, inferioris paucis, subtus reticulato-nervosa, nervis fere omnibus pilis eantheris similibus aculeatis. Calyces et corollae forma et magnitudine *St. coceinae*. Antherarum loculi divergentes. — Habitat in Mexico, in umbrosis montis Maculiepe et versos San Andrea.
29. ST. CHAMISSONIS Bth. In Linnaea VI. 80. et LabiaUr. gener. et spec. 540. — Herbacea erecta: caulis angulis obverse ciliatis; foliis, pili ovatis ovalis obtusis crenatis, basi cordatis, utrinque velutino-lanatis; verticillas sexfloris distantibus; bracteis subnullis; corollis exclusis villosis calyce triplo longioribus, tubo longe exserto. ^ - Afonia *St. ciliatae*, sed diverse foliis corollisque villosissimis et calycibus longioribus bispido-pilosissimis. — Habitat in California.
30. ST. RIEDERI Chamisso in Linnaea VI. 570. t — Bth. Labial, gen. et spec. 540. — • Habitus gracilescens plantae in sylvis opacis et humidis crescentibus. Caulis 2¹/₂, pedes altus, simplicissimus fistulosus, ad angulos pilis subulatis retrorsis albis munus, internodiis inferioribus 2-2¹/₂-pollicaribus, medii caulis 4-5-pollicaribus, summis inflorescentiae decrescentibus, unico ornatus pseudo-verticillastro sexfloro, superioribus nodo unifloro, summis foliorum paribus 2 approximalis serialibus. Folia membranacea internodiis breviora, inferiora breviter sed distincte pedicellata angusta, ex ovaia basi oblonga, jam emarcida, superiora laliora simul et breviora evadunt, breviter pedicellata, ex ovaia basi lanceolata, floralia ovalo-subcordata, cum pedicellari pane in « poll, longa, ³/₄ poll, lala, summa decrescentia, omnia acuta, margine scabro obsolete depresso serrata, serraturis obtusis, basi et in petiolo pilis similibus caulinis ciliata, in superiore pagina omnino glabra, subulatis in nervo icui et venis obliquis similium pilorum rudimentis vix conspicuis instructa. Flores semipollicares sessiles. Calyces pilis descriptis horridi, dentes angustius oblongo-triangularis, nervo radio crasso excurrente subpinnatis. Corolla

rubra' calyce ter longior, bis eum superans, labium superius integram pilosum." — Habitat in Kamtschaka

- 31 ? ST. HIRSLTA H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 306. - Blh. I. c. 541. — Caule adscendente hispido; foil, petiolatis ovalo-oblongis aculis cordatis, ntrinque hirsutis; verticillastris subsexflons; galea emarginata. 2|. — Herba subsexpollicaris. Gaulis subramosus lelragonus. Folia crenata reticulalo-venosa subpollicana, petioli semipollicares hispidi. Flores pedunculali Terlicillati, 0 lin. longi, verticillaslns subsexflons distanlibus. Calyx tubulosus quinqueGdus 10-slrrialus pilosus, (acinus acuminato-subulalis. Corolla cocci nea*, exlus pubescens, tubus cylindraceus, calyce duplo longior, limb us bilabialus, labium superius ovato-concavum, in fen us tnfidum, lacima intermedia major subcrenulala. — Habitat in Mexico, in locis alsis montinm Inter Actopan et Totonico.

Seetlo V. STACHYOTYPUS BUL 1. o. S4I.

Herbte annoae Y. perennes piloso-bispidae v. glabratae, rarius lanatae Verticillastri plerumque subsexflon, rarius 2-4- v. 10-15-flon. Bractee minutae. Calyces saepius subspinescentes. Corollae purpurascenles rubrae v. roseo-albae, nee obroleuca, tubo incluso v. breviter exserlo.

§. I. *Genuinae Bth. I. c.* — *Caules ereeti elati, angulis saepius pilis longis patentibus obversisve ciliatis, rarius glabri. Folia ovato- v. oblongo-lanceolata, rarius ample ovata. Yerticxllastris Q-lQ-flori. Corollae majusculae, tubo nonnunquam exserto.*

32. ST. MEXICANA Bib. I. c. 541. — Herbacea erecla elala caule pilis rigidis hirsulo; foil, amplis petiolalis ovato-oblongis crenalis, basi cordatis, utrinque hispida, floralib. sessilib. flores excedentib.; verticillaslrals 6-8-floris distantib.; calycis campanalati bltpldi dentib. UoceolaUf acolii sobipinosia; corolla glabnuaculis calyce doplo longlorib., Inbo exierto. 9)t Ot — Afflois *Si. sytoaticat*, fed folia brevius petiolata angallora longlora. Corollae* majores, tabo ampliore, labium superius emarginalnm. — Habitat in Nora Hispania.
33. ST. SYLVATICA Linn. Spec. plant 811. - Engl bot. t. 410. - Bth. 1 `c - Herbacea erecla bispida foil, longe petiolatis ovatis acuminalis scrralis, ban cordatis, floralib. bracleaeformib. vix calyce longionb, verticillastris sub-6-8-floris distanlib, calycis campanulali bispidi denlib. lanceolalis acutis subspmosis ditancalis; corollis glabnusculis calyce duplo longionb, lubo exserto. O — Herba pluripedalis ramosa. Kami tetragon!, uti petioli pilis longis patenlibus hispidi. Folia ampla, grosse el acute denlata tindia, utnnque pilis longis sparsis hispida, floralium par infimum fubconforme, suprema parra Verticillastn saepissime 0-1 rarius 8-flori Bracleae minulae. Calyx 3 lin. longos. Corolla purpurea, 0 lin. longa, tubo Incnro, calyce dimidio longiore, labia patentia, superius integrum, informs duplo longius albo-macnlatum, lobo medio breviter emarginalo. Anoulof inlernus prope basin tubi breviler pilosus. Achacma ovoidco-Inquelra lacvia. — *St Canortensu* Jacq. Icon, plant rar. 1. 11. 1.108. — Habitat in Europae et Aslae mediae umbrosis.
34. ST PALUSTRIS Linn. I. c. - Engl. bot t 1675. - Hook Flor Londin II. (i*) — Bib I. c. 542. f — Herbacea erecla caule pubescente, angulis pateniim v subrelrorsum pilosis, foil, subsessihb. oblongo- v ovaio-lanceolalis serrato-crfnatis, basi rolundatis cordalisve rugosis hispidis v infenonb glabratis; verticillas-tns ft- v. sub-10-floris distmclis, supremis subapproximaiis, cal)cib campanalalis blapidis, denlib lanceolalis aculis subspinosis, corollis cal>ce duplo lon* gionbus. % — Magmtudine varians, nunc vix sesquipedalis, saepius 8-3-pedali* et ultra. Caulei superne semper pubescentes, inferne inlerdum glabrati. P*ⁿⁱ angalorum paienles, rarius reflex!, YIX rigidi. Folia 2-3- • Inlerdum 4-6-poHi-eala, Utltodioe rariabila, obtusioacala, ntrinque pubeacentia •. hispida, inferiors nonnunquam flabrau et vii ragoaa, BortIU infima oaollnia conformity at minor*.

superiora calycevix longiora ovala acuta subinlegerrima. Racemus 4-8-pollicaris simplex, conlanter villosus. Verticillasri infimi rcmoli, supremi subcontigui. Bractae minuiac. Calyces irregulariter sub-10-nervii, denlibus divaricalis. Corolla purpurascens, lubus calycem subaequans, intus annulo obliquo pilorum brevium nolalus, labium superius ereclum truncalum, exlus glabrum v. pilis paucis villosum, inferius majus, lobo medio maximo rotundalo. Achaenia obovoidea laeviuscula. Variat alliludine, foliis lalioribus anguslioribusve, spica densa v. laxa elongata, hirsutie, denlibus calycinis ovatis lanceolatisve. — *St. segelum* Hagen. et ex Rechb. Fl. Germ, excurs. 310. — *St. affinit* Bnge. Enum. pi. Chin. bor. *p. anguslifolia*: floribus minoribus, calycibus submulicis.

y. hybrida: foliis longius peliolalis, corollis subcxserlis. — *St. ambigua* Sm. Engl. bot. I. 2080. — Reichb. Plant, critic. III. 20. — In Europae omnis et in Asiae et Americae borealis humidis, umbrosis, paludibus et ad ripas fluviorura.

35. ST. BAIKALENSIS Fisch. mss. ex Bib. I. c. 543 t - Herbacea caecula: caulo retrorsum hispido; foil, subsessilib. oblongo-linearib. aculiusculis serratis, basi rotundalis hispidis, floralib. calyce vix longiorib.; verticillasris sexfloris, infimis remolis, supremis in spicam densam oblongam approximatis; calycis campanulali hispidi denlib. lanceolalis aculissimis subspinosis; corollis calyce duplo longioribus. 2l. — Caulis erecius subsimplex 1-1'A-pedalis, faciebus glaberrimis, angulif aculis, uti petioli pilis longis obversis clliatls. Folia bipollicaria aogiula subrugosa, ulriouque, praeserlim in pagina superior* pilis longis subadpressis hispida, floralia sub spica conformia, in ipsa spica panra acua. Spica 1-1'/i-pollicaris, dense hispida, verticillastro inflmo stfeptui axllari a spica remolo. Calyces hispidissimi. Corolla *St. palustris*, a qua haec species diflert slalura bumiliore, foliis mullo anguslioribus et spica brevi tenui. — *St. anguttifolia* Pall. Herb. — Ilabilal in Dauria et in Sibiria orientali.

30. ST. ASPERA Michx. Fl. Bor. Amer. II. 5?*) - Blh. I. c. f - Herbacea caecula: caule retrorsum hispido, rarius nudo; foil, breviter peliolalis ovalo-oblongis v. ovalo - lanceolalis aculis serratis, basi rotundalis glabris v. supra pilis sparsis hispidulis, floralib. lanceolalis aculis, calyce longiorib.; verticillasris 6-10-floris disianlib.; calycis lubuloso-campanulali glabri ciliali denlib. lanceolalis aculis subspinosis divaricalis; corollis calyce subduplo longioribus. 2l. — Herba erecia 9-3-pedalls, 4iabiuu *Si, palustri* proiima. Caulea acute tetragon!, faciebus glaberrimis, angulis peliolls nervicque primarik foliorum pills longis rigidis obversis hispidis. Folia 3-4-pollicaria, sesqupollicem lala, uirique viridia laevia, pilis supra sparsis et raris, caelerom glaberrima, floralia gradatim minora, suprema longe ciliala. Racemus semipedalis simplex. Verticillasri laxiusculi, omnes dislincli. Bractae minulissimae. Calyces sessiles, irregulariter venosl, denlibus et interdum lubi nervis primariis cilialift, caelerom glaberrimi. Denies longitudine lubum aequantes. Corolla violacca glabra. Annulus internus pilosus. — *St. arventis* Wall. Fl. Carol. 102. (non Linn.) — *St. hispida* Pursh. Fl. Amer. sepl. II. 407.

fi. glabrata: caulis angulis subnudis v. oniniuo glabris. — *St. asp era* Null. Gen. pi. N. Am. II. 30? — Ilabilal in Americae borealis pascuis, ad ripas fluviorum, a Canada ad Carolinam, *fi.* in Carolina et in Chinae provincia Tokeen.

37. ST. HYSSOPIFOLIA Michx. I. c. 4? **) — Blh. I. c. — Herbacea ascendens glaberrima v. caulib. retrorsum pilosis; foil, subsessilib. oblongo-lanceolalis aculiusculis subserratis, basi parum anguslalis, floralib. aculissimis calyce sublongiorib.; verticillastris subsexfloris dislinclis in racemum brevem approximatis; calycis lale campanulali glaberrimi denlib. lanceolalis aculissimis subspinosis dhraricalis; corollis glabris calyce 2-3-plo longioribus. 2l. — Caulis basi pro-

*) *Caulib. erectis refrortum hispid it si mis; foil, subpcfiolatis lanceolatis argute terraliti; tpicac verticillastris subsexfloris; calycibus rigide spinescentibus.*

•) *Glabriutcula gracilit erecta: foil, scssilib. lineari-lanceolatis, rariter subdentatit; verticiUuithi spicae subquadriiflorit.*

- cumbentes, rami adscendentes 1-1'A-pedales glabri laevesque, exceptis angulis el axillis magis minusve pilis longis reflexis hispida. Folia 1-2-pollicaria glaberrima venosa, nunc sessilia, nunc breviter petiolata. Racemi breves simplices pauciflori Bractea minutae Calycis lobus 1'A lin longus, dens tubo aequales. Corolla violacea, (abax breviter exsertas, annulus internus pilosus incompletus v. evanescens, labium superior erectum, basi angustatum, lobo aequale, inferius partial longius patens, lobis lateralibus ovatis, medio rotundato breviter emarginato. — *St. tenuifolia* Willd. Spec. pl. III. 100? — *St. palutru* Wall. Fl. Carol. 102. (non Linn) — Habitat in America borealis praevalis humidis, prope Saint Louis et in Carolina.
38. ST. CHINENSIS Bunge mss. ex Bib. I. e. 544. f — Herbacea erecta caulis glaberrimus caulis angulis obverse pilosis; folia subsessilibus oblongo-lanceolatis subserratis, supra hispidis, subtus glabris, verticillatis paucissexfloris; bracteis minutis, calycis elongati campanulati pilosi densibus lanceolatis acutissimis subsymptosis; corollae calyce vix duplo longioribus. — Ab affinis 51 *palutru*, *asperm* et *hyssopifolia* folia longis et calycibus magis prope intuitu differt. Tota planta viridis et exceptis pilis quibusdam longis ad angulos caulis et nervos calycis el aliis brevibus sparsis in pagina superiore foliorum, loba glabra laevis. Folia distantia, 3-4 poll., longa, 4-5 lin. lala, basi rotundata, apice obtusiusculo, floralia breviora lanceolata acutiora. Calyces sessilibus, 5 lin longi colorati, densibus profundis et basi lanceolata acutissimis. Corolla rubra, labium inferius densius calycinos breviter excedens, excluso pilorum, superior duplo longius, lobo medio emarginato, tubus inclusus transverse annulatus. — Habitat in China boreali.
- §. 2. *Rude rales* Bth. I. e. 544. — *Herbae taepxus perennes erectae v. adscendentes, rami procumbentes hirsutae villosae v. lanatae, rarius glabrae. Verticillatis 0-, rariis sub-0-flori. Corollae majusculae (cum labio inferiori semipollicares, tubo temper incluso.*
- 39 ST. ALBIGACILIS Llod. Bot. Its. i. 1588. — Bth. I. c. t — Herbacea erecta, basi albo-lanata, superne subvillosa-pubescentis: folia in omni parte lanceolatis, basi rotundato-cuneatis angustatisve, floralibus calyce brevioribus, verticillatis 0-floribus remotis, calycibus ovato-campanulatis viscido-pubescentibus, densibus lanceolatis acutis subsymptosis, corollae glabris. calyce duplo longioribus. — Species prope intuitu distinctissima ob caulium partem inferiorem. ubi folia inferiora, lana densissima alba occosa vestita, racemi pubescentia vix saepissime viscosi. Caules erecti ramosi 2-3-pedales, obtuse tetragoni. Folia remota 1-3-pollicaria Racemus elongatus subramosus Calyces leviter 10-nervi venosi Corolla violacea glabra, tubo breviter exserto, supra anulum internum pilosum obliquum incurvo dilatato. Labium superior breve dilatatum subpatens, inferius subduplo longius patens, lobo medio maximo. Achaemia magna ovalis-triquetra subcompressa nigra laevis. — Crescit in Andibus Chlenti.
- 40 ST. OBLONGIFOLIA Bth. in Wall. Plant. Asiat. rarior. I M et Labial. 545. t — Herbacea erecta v. ascendens, pubescens v. villosa folia breviter petiolatis oblongo-lanceolatis acutiusculis serratis, basi subcordatis villosis, floralibus calyce longioribus; verticillatis subsexfloris distantibus; calycis tubuloso-campanulati pubescentibus densibus lanceolatis acutissimis vix spinulosis, corollae calyce dioidio longioribus. 2j. — Caules elan, basi subglabri, racemi molliter pubescentes Folia 1-2-pollicaria, sublus dense villosa v. sublanata Racemi elongati Bractea minuae. Dens calycini angustatis modis. Corolla violacea, lobo incluso subincurvo, labium breviter exsertis, excluso leniter pubescentibus, inferius ore depresso longiore - Crescit in India orientali, in montibus Silhet
41. ST. AJLGIDES Bib. in Linnaea I 80 et Labial. I. c. - Herbacea erecta birsutiutima folia petiolatis oblongis obtusis crenatis, basi rotundatis cuneatisve nifotus, Oculis conformibus, verticillatis paucissexfloris-Doris remotis, calycibus ovato-campanulatis hispida, deorsum ovalis acuta subapertis corolla glabris calyce

- doplo longioribus. 9} — Herba nunc 3-4-pollicaris subsimplei, nunc basi ramosa 8-10-pollicaris. Folia crassa 1-2-pollicaria, uli tola planta pilis longis rigidis hirsutissima. Calyces magnitudine *St. Macraei*, sessiles crassi, dense hirsutissimi. Corolla 5/. *Macraei*. — Habitat in California.
42. ST. SIDERITOIDES Gill. mss. ex Bib. I. c. 740. — Herbacea ascendens sericeopilosa: foil, oblongo-lanceolalis serratis, basi longe angustalis rugosis molliier sericeo - villosis, floralib. ovalo-lanceolalis, supremis calyce breviorib.; verlicillasris sexfloris remolte; calycib. campanulalis hispidis, dentib. lanceolalis acutis subspinosis; corollis pilosulis, calyce vii duplo longioribus. 2l — Uabiu *St. arenariae* simillima, sed corollae tubus intus exannulatus, forsan *St. grandidentatae* varietas, sed villositate, calycib. longiorib. el slatura faumili dislingoilur. — In Andibus circa Mendozam in America meridionali crescit.
43. ST. GRANDIDENTATA Lindl. Bot Reg. t. 1080. - Bib. I. c. 545. - Herbacea erecta piloso-pubescentis, superne hispida: foil, petiolatis oblongo-lanceolalis grosse dentalis, omnib. basi rotundalo-cunealis angustalisve, floralib. supremis calyce breviorib.; verlicillasris 0-floris remolis; calycib. ovalo-campanulalis hispidis, denlib. lanceolalis acutis subspinosis; corollis glabris calyce duplo longioribus. % — Caules erecti, nno vix pedales, saepius 2-3-pedales. Foliorum forma el inflorescentia *St. albieaulis*, a qua differt caule viridi pubescente v. piloso, foliis hispidis v. glabriusculis nee lanalis el racemo pilis longis numerosis hispido. — Crescit In Chili ad Valparaiso.
44. ST. MACRAEI Blh. in Linnaea VI. 78. et Labial 545. — Herbacea erecta v. ascendens piloso - hispida: foil, petiolatis ovalis v. ovalo-lanceolalis obtusis, inferiorib. basi cordatis, supremis rotundalo-cunealis, floralib. sessilib., supremis calyce breviorib.; verlicillasris 0-floris remotis; calycib. ovalo-campanulalis hispidis, dentib. lanceolalis acutis subspinosis; corollis glabris calyce duplo longioribus. % — *St. grandidentatae-Munz*, sed humilior el minus crecchia, pilis numerosioribus rigidioribus. Folia inferiora longe petiolata, limbo 1-1 1/2-pollicari, 1/3-1-pollicem lato, basi magis minusve cordato, auriculis rotundatis. Racemus *St. grandidentatae*. Calyx 3 lin. longus, corolla violacea (cum labio inferiore) 6-7 lin. longa. Varietalis foliis acutis v. apice rotundatis el hirsutis. — *St. Chamissonis* Hook, et Arn. Bot Beech, voy. 155b (non Blh.) — Crescit in America occidentali, in Chili ad Valparaiso el In California.
- 45 ST. GRANDIFOLIA E. Mey. Comment pi. Afrle. austr. I. 230. — Caule herbaceo ascendente ramoso piloso; foil, petiolatis ovalis obtusis crenatis, basi late cordatis, ulrinq. molliier villosis, sublus canescentib., floralib. sessilib. calycem aequantiib. v. superantib.; verlicillasris 0-floris remotis; calycib. campanulalis hispidis, denlib. lanceolatis acutissimis spinosis; corollis pubescentib., calyce dimidio v. vix duplo longioribus. H> — Habitat in Promontorio bonae spei.
40. ST. SESSILIFOLIA E. Mey. 1. c. — Herbacea ascendens, tola molliier albo-villoia: foil, inferiorib. breviter petiolatis, superiorib. sessilib. ovalis obtusis crenatis, basi subcordatis, floralib. supremis calyce vix breviorib.; verlicillasris sub-0-floris; calycib. molliier villosissimis, denlib. longe subulalo-acuminatis subspinosis; corollis calyce vix duplo longioribus. % — In Promontorio bonae spei habitat
47. ST. BRIDGESII Bth. Labial. 540. — Herbacea erecta, tola molliier albo-villosa v. lanata: foil, petiolatis ovalis obtusis crenatis, basi subcordatis rugosis, floralib. sessilib., supremis calyce subbreviorib.; verlicillasris sexfloris remolis; calycib. ovalo-campanulalis mollissime villosis, denlib. mucicis; corollis calyce duplo longioribus. > — Affinis *St. Macraei* sed folia niinora crassiora, uli tola planta lana molli canescentia, nec pilis rigidulis villosa. — In Chili meridionali.
48. ST. GILLIESII Bib. I. c. 740. — Herbacea ascendens villosa: foil, petiolatis obtusis crenatis, basi cordatis, infimis rotundatis glabriusculis, superiorib. obtusis pubescentib., floralib. ovalis inlegerrimis, calyce breviorib. villosis; racemo villosissimo; verlicillasris sexfloris dentalibus; calycib. ovalo-campanulalis hispidis, dentibus. ovalo-lanceolalis acutis subspinosis; corollis glabris calyce duplo

- longiorib, tubo exserto 2l. — Media inter *St 3facraei* et *cirtnnatam*, a pnore differ! caulibus brevibus ngidis, folns latis et corollis majonbus, a poslenore caule folusque minus hispidis, folus minus crenalis el corollac tubo exserlo — Habitat in Andibus Cbilensibus prope Mendozam
49. ST CIRCmATA L'Her. Stirp. I 51. t 26. - Bth I c 546 - Herbacea procumbens bispida: ram is flonfens crectis, foil, pctiolalis rotundalis obtusis crenatis, basi late cordatis, floralib minorib , supremis ovalis mlgerrimis, caljce subbreuionb; verlicillaslns sexflons dislinchs, inGmis remotis, calycis campanulali hispidi dentib ovalis acutis subspinosis; corollis pubesceniib. calyce vix duplo longionbus. 2l. — Rami slenles procumbenles subrepnles, llonfcn ascendentes, pilis palenlibus dense bispidi. Folia rugosa, omnia utnnque bispida, floralia gradalim minora, suprema bracteaeformio, ante anihesin decussatim imbncata. Braclcae minutae. Caljx 4-lmearis. Corolla 7-8-lineans, pallide purpurascens v. albida. Annulus inlerous bretlter pilosus — *Si veluhna* Willd. Enum. pi borl. Berol. Suppl. 41. — *St. lalifoha* Ait. Hort. Kew. II 303 — Habitat in Uispama australi et Africa boreali, Gibrallanae, in montibus plumbeis Tuneti mque rupium fissuns Atlantis.
50. ST NEPETAEFOLIA Desf Cat. bort Par. 58. - Btb. I c - Herbacea adscendens canescens foil, petiolatis ovalis obtusis crenalis, basi cordaiis rugosis, verticillastns distantib 6-flons, calycib. lubulosis canescenlib, denhb lanceolatis acutis subspinosis, corollis pubescentib. calyce dimidio longionbus 2} — Caules, folia et caljces tomenta bre\i canescenlia Folia semipollicana v \ix pollicana, fere *Nepelae Mutint*. Caljces incum, 3 lin longi Corollae purpurascenles, tubus calycem aequans incurvus, exlus tomentoso-pube&cens, inlus exannulatus, labia brevia, supenus emarginatum. Species habitu a genere rcedil, scd caracteres ommno *Stachydis*. — Habitat in Uispama?
51. ST. ARABICA Hornein. HorU Hafn. 554. — Btb. I. c. - Ilrbacea erecta di\an-cato-ramosa: ramli glabrlt r. ptUnllm pilotit; foil. peiioUUt ovato-ltnceoUti acutiuscnlit serrtto-erentUt, bail rolnadallt euneaitve glabrlt T. pubeicenlib, floralib. sessilib. ovatlt acotlt, bait cordatlt; Tertlcillastris sexfloris rcmolis, calycib maximis campanulas pilosis, dentib. o\atis acuiis subspinosis, corollis pubescenlib calyce dimidio longionbus 2l. — Species caljcibus maximis 0-8 lineas longis dislinclissima. Caulis pars inferior glaber Rarcmi el folia llunlia piloso-pubescentes \ hivpidi Dracteac ininulac Corolla \iolacoa , tubus subrectus caljce bretior, annulus internus sube\amdus, labiura supenus subplauum emarginalum, inferiors lobi crenulali, medius emaignalus Achaema maxima lacvia — Habitat in Arabia *
- 52 ST BILLATA Bth I. c 547. t — Herbacea erecta villosa foil, breviter petiolaliH late ovatis grosse crenatis bullalo-rugosissimis, subtus subcanescenlib., ulnnq hispido-tillosis, floralib calyce breuionb ; verlicillaslns sexflons, calycis turbinalo-campanulati hispidi dentib ovatis acuiis ^ubpungentib , corollis cal)ce subduplo longionbus 3> — Caules firmi tetragon!, pilis ngidis dense Mllosi Folit]\1/2-2-pollirarin, pctiolo vix 3-4-linean, superiors minora sub*e>siliA, lloralia sessiha roiundata rugosa bracteaeformia v infiraa majora, caulims conformia. Racemus terminalx semipedahs, laterale« bre^iores \erticillastris approximat* <ahre« sessilcs3lin longi rl totidem laii, bast allcnuali, denies breves lali Corollj pubesrens, tubo incurvo calycem aequanle, inlus prope basin trans>er<ioa annulalo, labio supenore integro, infenore eo \ix duplo longiore — *St coca**** Hook et Arn. Dot of Beech toy 150 (non Jacq — Habitat in California
- 53 ST. BRACIIATA Doj mss ex Dili l e t - Herbacea procumbent tenuiter tomentoto-pubesrens foil sp>silib oblongo-lanceolalis obtusiu4culi< denials, basi roluodatis rugosi>, terlicillastris subsexdons remotn, caljns o\ilo-campanulali pubescentis dentib ovalii aculKsimis subspinosm, corollm panis, cxius pubescentib , calyce subduplo longionbm ^ — Cauks procumbenles dun subligDOTi, rami fere pedales obiusi, pilis brevittimis fubglanduloti rufctccenti-lomentoii. Folia 1-1\1/2-pollicaru, groitc dcolata, floralia gradaiim minora, omnia

calyce longiora. Bractee minulae. Corolla fere *St. Grahami*, vix plus 3 lin. longa, tubo denies calycinus aequante, parum incurvo, intus prope bosin pilis brevissimis subannulato, labiura superius breve, exclus pubescens inlegrum, inferius plus duplo longius, lobis ovalis, medio lateralibus duplo majore, margine crenulato. Species habitu inter *Oliganthas* el *Ruderales* media, corollis *Agrestibus* affinis. — Habitat in Madagascaria.

517 ST. CANDIDA Dth. I. c. f — Herbaea? procumbens?, tota albo-lanata: foil, subsessilib. oblongo-lanceolalis grosse denialis crenalisve, basi angustalis, floralib. calyce subbreviorib.; verticillasris scxfloris remolis; calycib. ovato-campanulalis lanalis, dentib. lanceolalis acuiissimis subspinosis; corollis exclus lanalis calyce dimidio longioribus. 2]. — Species distinctissima, tota lana densa sordide alba vestita. Rami obtuse tetragoni, ad nodos fere articulati. Folia pauca parva $\frac{1}{8}$ pollicem v. vix pollicem longa crassa rugulosa, raolliter lanata, denlibus paucis grossis nolata v. crassa, floralia oblusa inlegrissima. Bractee minulae. Corollae labium inferius vix superiore longius. — In Oriente el in Macedonia.

95. ST. HUMIFUSA Burch. Cat. Geogr. 3794. — Bth. I. c. f — Herbaea procumbens glabra: foil, subsessilib. oblongo-lanceolalis, basi cordalis; verticillasris subsexfloris; calycib. glabris, denlib. subspinosis; corollis calyce duplo longioribus. 2]. — Species distinctissima, habitu (exemplaria majora) *St. Aethiopicae* affinis. Caules el rami laeves angulosi. Folia aculloscula subpollicaria, margine late crenulata, floralia infima conformia, superiora inlegrissima vix calyces aequantia. Flores *St. Aethiopicae*. — Habitat in Africa australi extraiopica.

50. ST. NIGRICANS E. Mey. Comment. plant. Afric. austr. I. 238. — Caule herbaceo erecto, pilis longis hispido; foil, sessilib. oblongo-lanceolalis oblusis crenatis, basi subcordato-amplexicaulib., floralib. aculis calyce breviorib.; verticillasris subsexfloris remolis; calycis campanulati bispidi (dentil), lanceolalis subulato-aculissimis subspinosis; corollis leviter pilosis calyce 2-3-plo longioribus. 2]. — Habitat in Promonlorio bonae spci.

§.3. *Oliganthae* Blh. L. c. 542. — *Herbae annuae rarius perennes debiles, basi procumbentes. Verticillastri 2-4-, rarius sub-0-(lori.*

57. ST. AETHIOPIGA Linn. ManL pi. 88. - Jaq. Obierr. bot IV. 2. L 77. - Bib. I. c 548. f - Herbaea villosa procumbens: foil. petiolaribus rigidis ovalis-delloideis crenatis, basi profunde et late cordatis, floralibus. basi angustalis, calyce subbreviorib.; verticillasris 2-4-floris racemosis; calycib. campanulatis bispidis, denlib. aculibus aculis subspinosis; corollis calyce duplo longioribus. % — Kami elongati raraosi, pilis rigidis subpalenibus magis minusve bispidi. Folia inferiora scmpollicaria, superiora mioora, omnia supra pilis sparsis dense hispida, sublus venosa, venis hispida, rarius subglabrata, floralia ovato-lanceolata pan a subinlegrissima. Calyces 2 lin. long! subsessiles, profunde quinquedentati, exclus villosi v. pubescentes, inclus glabri. Corolla calyce subtriplo longior, exclus fero glabra, tubus breviter exsertus subincurvus, inclus annulatus, labia palenia, inferius superiore plus duplo longius, lobis lateralibus ovalis, medio maximo rotundato emarginato. Plania hirsuta el magnitudine florum valde variabilis. — Habitat in Africa australi ad Promonlorium bonae spei.

58. ST. SUBSESSILIS Burch. Cat. Geogr. no. 4320. - Blh. I. c. - Herbaea decumbens: caule glabriusculo; foil, subsessilib. ovalis subintegerrimis profundo cordatis, margine nervisq. piloso-hispidis, floralibus. glabriusculis, calyce brevioribus; verticillasris bifloris racemosis; calycib. campanulatis hispida, denlib. aculibus lanceolalis acuiissimis subspinosis; corollae glabriusculae tubo breviter exserto. 2]. — Kami teneri elongati, parum ramosi. Folia vix ultra 2 lin. longa, superiora pauca, floralia calyce dimidio breviora sessilia, basi rotundata. Haec basi subramosi. Verticillastri parum distantes. Calyces fructiferi globoso-campanulati 2 lin. longi, usque ad medium fissi. Corolla calyce duplo longior, labium superius ovalum, inferius subduplo longius, lobo medio maximo.

- Achaenia ovoideo-subtriquetra nigra, sab leote tenuiter rugulosa. — Habitat in Africa australi, ad Capul bonae Spei, ad sinam Algoa.
50. ST. LYALLII Bib. I. c. — Herbacea diffusa hispida: Toll, petiolalis parvis orbiculalis, basi rotundatis cordatisve rrgosis, floralib. conformib.; verticillastris bifloris; calycib. campaoalatis, ore obliquo, denlib. lanceolatis acutis, sapremis loogiorib.; corollis calyce dimidio longioribus. © — Herba pusilla, habila *Veronica agreslis*, lota pilis brevibus hispida. Folia vix 4 lin. longa, totidem lata crenata, olrloqae hispida. Calyces secundi snbreflexi, ore valde obliquo, denle supremo maximo. Corolla roseo-alba, forma corollae *St. Cortieae*, sed mullolies minor. Achaenia subglobosa laevia. — Habitat in Madagascaria.
00. ST. ROTUNDIFOLIA Moç. el Sessé mss. ex Bib. I. c. — Herbacea adscendens: foil, petiolatis ovato-rotundatis crenatis, basi cordalis, floralib. conformib.; verticillastris axillarib. bifloria; calycib. campanulatis pilosissimis, dentib. subaequalib. lanceolatis acutis vix spinescentib.; corollis calyce triplo longiorib., tabo breviter exserto, lablo Inferiore maximo. Q — Afflnis 51. *Cortieae*. Herba lenera. Caalis basi procumbens ascendens semipedalis subsimplex, pilis loogis mollibus villosus. Folia remola, longe petiolata, fere *St. arvensis*, sed basi latiora, profundius cordata, suprema parom minora. Calyces subsessilcs, demum nutantes, petiolo saepius breviores. Corolla fere 51. *Corsicae*, at major. — Habitat in Nova Hispania.
01. ST. CORSICA Pen. Enchlid. II. 30. - Rchb. Plant critic. VII. 84. t. 040. - Bth. I. c. M0. f — Herbacea procumbens pilosa: foil, petiolatis ovatis oblusissimis late crenatis, basi rotundatis subcordatisve, floralib. minorib., supremis calyce breviorib.; verticillastris 8-4-floris remotis; calycib. campanulalis hispidis, dentib. snbaequalib. lanceolatis acutis subspinescentib.; corollis calyce plus duplo longiorib., tabo breviter exserto, labio inferiore maximo. O — Habitu *St. arvensis* •Imilit, fad maglt diffusa. Folia semipollicaria, crenaturis ntrinque 2-3 latissimis aouu, saprana mallo mlnta, omala petiolau tenant vlridia, pilis longis sparsis hispida, flomlla superiors parva totaferrlma. Vettletlastris taepMime biflori, rarias subquadri-flori. CalyeesVedlcellali natantes aobsecondi, magnitudine calycum *St. jtrvensis*, sed basi magis attenuati, dentibus acutioribus, maturatione patentibus. Corolla extus pubescens, 7-8 lincas longa roseo-alba, 'ubo parum incurvo dentibus calycinis parum longiore, labio superiore tubo aequali emnrginato patente, inferiore duplo longiore late ovato, lobo medio rotundato vix emarginato, lateralibus parvis ovatis. Annulus inlernus horizontalis pilosus. Filamenia basi breviter pilosa. Anlherarom loculi divaricati. Achaenia ovato-triquetra subcompressa nigrescentia, macnlis pallidis conspersa. — *Gtechom* grandiflora* DC. Fl. Fr. III. 538.. — Habitat in Europae regione mediteTranea, in arvis Corsicae el in Sardinia.
02. ST. MARRUBIFOLIA Viviani, Flor. Conic app. 8. - Bth. I. c. 740. - SuberecU pilosa: foil, petiolatis late ovatis obtosis crenatis, basi late cordalis, floralib. supremis sessilib. calyce breviorib.; verticillastris sexfloris? calycib. tubuloso-catn-panulalis pilosis, dentib. lanceolalis acolis, sopremis majorib.; corollis calyc* duplo longiorib., tubo incluso calycem aequante, labiis subaequalibus. Q — Habitus *Si. arvensis*, sed calycibus latius campanulatis obliquis cl corollis plurie* majoribus abunde diversa. — 51. *arvensis r> purpurea* Poir. Diction. VII. 373. ~ 5/. *Poirelii* Tenore, Sylog. fl. Neap. App. 538. — Crescit in Barbaria, Corsica ct in regno Neapolitano ad Posilippo.
03. ST. SERRULATA Burch. CaL Geogr. no. 5IU. - Bib. I. c. 540. - Uerbacea decumbent pilosa: foil, petiolatis late ovatis acutiusculis, basi late cordatis, floralib, sapremis sessilib. calyce breviorib.; verticillastris subquadriDoris; calycib* tubuloso-campanulalis hispidis, dentib. subaequalib. lanceolatis aculi* subspinosis; corollis calyce subduplo longionbus. O - Ab afOni *SI. arcensi* differt prae' cipe corollis duplo majoribus. Folia latiora, apice acutiora. Flores pauciore* - 8L *artemis*, y. *purpurea* Poir. Diet VII. 373T - Habitat in Africa aostrali **extrtropicalia**.

§. 4. *Agrestes Bth. U e. 540.* — *Berbae annuae debiles. VertidUastri* 0-, *rarius* 0-5-flori. *Corollae parvae calyces breves parum superantes.*

01 ST. ERIANTHA Bth. I. c. — Herbacea prostrata subrepens: foliis, petiolatis ovato-oblongis obtusis crenatis, basi truncatis rotundatisve villosis, Oculis superioribus sessilibus calyce vix longioribus; verticillatis sexlocis; calycibus campanulatis molliter rufo-villosis, dentibus brevibus aculeis mucicis; corollis calycem parum excedentibus. Q — Affinis *St. arventi*. Folia fere *St. Grahami*, ab utraque affinisque distincta habitu calycibusque. Folia 0-0 lino longa, sublimbrifera, supra uti calyces molliter villosa. Corolla *St. arvensis*. — Habitat in Mexico.

ft. ST. ARVENSIS Linn. Spec. plant 814. - Sm. Engl. bot. t. 11M. - Hook. Flor. Londin. II. ic. - Flor. Danic. t. 587. — Rchb. Plant. critic. X. 24. t. 007. - Bth. I. c. 550. t — Decumbens pilosa: foliis, petiolatis ovatis obtusis crenatis, basi cordatis, floralibus angustioribus, supremis basi conatis sessilibus calyce subbrevioribus; verticillatis 4-6-floris distantibus; calycibus tubulosis campanulatis hispidis, dentibus subaequalibus lanceolatis acutis fixis spinosis; corollis calycem vix excedentibus, tubo incluso, labiis abbreviatis. O — Herba tenera, in siccis aridis suberecta, vix 8-3-pollicaris, in callis* bimedioribusque decumbens elongata ramosa, 1-8-pedali. Caulis et petioli pilis longis paucis bispiculis. Folia 1-1-pollicaria, infera subrotunda, canaliculata basi profunde cordata, ntrinque pilis longis sparsis magis minusve hispida, floralibus superioribus cuneiformibus, apice acutiuscule crenatis, basi integerrima. Calyces 3 lin. longi, saepius declinati et parum incurvi, magis minusve pilosi, irregulariter 10-nerviis profunde 5-dentati, dentibus mollibus acutissimis mucicis v. spinula brevissima aculis, fructiferi basi subinflati. Corolla exclusa pilosula, tubus calycis brevior, annulus internus prope basin tubi, labia subaequalia dentes calycinos parum excedentia. Achaenia obovoideo-triangularia nigra, sub lente punctato-rugosa. — *Glechotna Marrubiatrum* Vill. Fl. Dauph. II. 371. — *Cardiaca arventis* Lam. Fl. Fr. II. 383. — *Trixago anensis* Hoffm. et Lnk. Fl. Port — *Trixago cordifolia* Murb. Metb. pi. 308. — *Trixago colorata* Presl, Fl. Sicul. I. XXXVII. — *Siachyt Brasiliensis* Hortul. — Habitat in Europa, Africa borealis et Asiae mediae? arvis et in America tropica et seminibus Europaem verotimiliter alla.

60. ST. AGRARIA Cham, et Schlecht. Linnaea V. 100. — Bth. I. c — Bubereculosa: foliis, petiolatis ovalibus obtusis crenatis, basi cordatis, floralibus angustioribus, omnibus calyce longioribus; verticillatis subsexfloris distantibus; calycibus campanulatis pubescentibus, dentibus subaequalibus acutissimis subsplens; corollis calycem vix excedentibus. O — Affinis *St. arventi*, sed distincta. Caulis erectiores. Calyces minus res, magis spinescentes, breviter ciliati, omnes foliis floralibus breviores. Flores dimidio minores quam in *St. arventi*, omnium hujus generis minimi. Corollae pallide violaceae. — Habitat in Mexico prope Jalapam, in provincia Texana ad Rio Braxos.

07. ST. TRUNCATA Kunze in Herb. Pfl. mss. ex Bth. I. c. f — Erecta pubescens: foliis, petiolatis ovatis obtusis crenatis, basi rotundatis, Oculis acutis, basi cuneatis verticillatis longioribus; verticillatis 4-6-floris distantibus; calycibus late campanulatis, dentibus aequalibus late ovatis acutissimis subspinosis, tubo multo brevioribus; corollis calycem vix excedentibus, tubo incluso, labiis brevissimis. Q — Habitu quodammodo *St. arcentem* refert, sed erectior et minus pilosa, et floralibus distinctissima. Foliorum inferiorum petiolus semipollicaris subaequalis, laciniae ejusdem longitudinis, floralia subsessilia, gradatim angustiora et acutiora. Verticillatis inferis longe remotis, supremis magis approximatis. Bractee minutissimae. Pedicelli vix semilineam longi. Calyces 2 lin. longi, totidem lati virides, leniter pubescentes, 10-nerviis. Corolla rubella glabra. Labium superius dentibus calycinis brevius, inferius parum exsertum. Achaenia obovoideo-triangularia nigra laeviuscula. — Habitat in Chili prope Valparaiso.

68. ST. PERUVIANA Dombey mss. ex Bib. I. c. 551. - Decumbens: ramis pilosis; Toll, peliolatis ovato-rolundatis oblusis crenalis, basi cordatis glabris pilosisve, floralib. sessilib. calyces superanlib.; verticillastris sub-6-floris distanlib.; calycib. late campanulalis hispidis, denlib. tubo breviorib. latis aculis subspinosis; corollis calycem vix superanlib., labio superiore brevissimo, inferiore triplo longiore. O — Stalura major quam in 5/. *arventi*. Folia latiora glabriora, floralia majora. Calyx amplior. Corolla fere duplo longior, tubo incluso, labio superiore denlibus calycinis subbreiore. — Habitat in Peruviae uliginosis prope Limam.
69. ST. KEERLII Bth. I. c. — Erecla villosa: foil, peliolalis ovalis crenalis, basi cordalis pilosis, superiorib. obloogis, floralib. cunealis angustis reflexis, calycib. vix longiorib.; racemis elongatis; verticillastris sexfloris; calycib. fructiferis campanulatis patentib., denlib. aculis spinescentib., tubo subbreiofib.; corollis calyce duplo longiorib., labio superiore brevj, inferiore Iriplo longiore. O — Habitus *St. Grahami*, sed pilosior, verticillastris sexflori, el flores majores. Racemus elongatus gracilis hispidus. Verticillastris numerosi. Caljces breviter pedicellati, floriferi tubulosi, fructiferi globoso- v. depresso-campanulati. Folia floralia superiora pilosa paucis longis rigidis ciliata. — In Mexico prope Talpuxabua.
70. ST. GRAHAMI Bib. I. c. — Procumbens? piloso-pubescens: foil, peliolalis ovalis-oblongis oblusis crenalis, basi subcordalis hispidulis v. demum glabralis; verticillastris 10-15-floris remolis; calycib. globoso-campanulalis glabriusculis, denlib. ovalis aculis subspinosis; corollis parvis glabris calyce subduplo longioribus. 2j? — Species verticillastris multifloris in hac sectione disiinctissima. Racemus elongatus simplex. Verticillastris inferiores longe remoli, supremi magis approximali. Bractee minutissimae. Calyces breviter pedicellati, tubus linearis longus, vix venosus. Corolla vix 3 lin. longa, fere *St. arvensis*, labium inferius superiore duplo longius. Stamina labium superius subaequantia. Achaenia ovoides nigra laevia. — Habitat in Mexico prope Talpuxabua.
71. ST. DRUMMONDII Blh. I. c. — Erecta pilosa-hispida: foil, petiolalis ovalis-obtusis, basi late cordatis rotundatis, floralib. lanceolatis, superiorib. qotm calyces subbreiorib.; verticillastris sexfloris; calycib. campanulalis, denlib. linearibus lanceolatis-subulatis, tubum aequoalib.; corollis calyce duplo longiorib., labio superiore brevi, inferiore Iriplo longiore. O — Herba subbipedalis, hinc exemplarium majorum *St. agrariae*, folia et hirsuties *St. arvensis*, sed stalura erectior, ab utraque calycibus campanulalis semi-5-fidis et corollis (cum labio inferiore) 4-5 lin. longis, extus villosioribus distanti fieri. — Habitat in Mexici provincia Texas ad Rio Brazos.
72. ST. BOGOTENSIS H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pi. II. 309. f - Blh. I. c. 533. — Caule erecto piloso; foil, peliolalis ovalis, apice rotundalis obsolete cordalis crenalis, utrinque molliter pilosis, subtus subcanescentibus; verticillastris 4-0-floris, galea integra. O? — Folia reticulato-venosa membranacea pollicaria, 0 lin. lata* Petioli 4-5 lin. longi pilosi. Flores verticillato-spicati pedunculati, magnitudine florum *Balhtae vulgaris*, verticillastris fructiferis parum remoli. Calyx turbinato-campanulatus 5-fidus pilosis, laciniis ovalo-oblongis acute mucronatis subaequalibus, 2 superioribus approximalis. Corolla violacea?, tubo calycem vix superante, fovea ampliatam compressiuscula, labio superiore galeato, apice rotundato et integro, extus pubescente, labio inferiore trifido piano superius longiludine paulo superante, laciniis lateralibus oblique oblongis oblusis, intermedia multo major subrotunda integra. A 5/. *Drummondii* differre videtur foliis villosioribus sublus canescentibus et calycis forma. — In America aequinoctiali juxta Santa Fe de Bogota.
73. ST. DEBILIS H. B. Kth. I. c. t - Blh. I. c. - Caule erecto? puberulo; foil, peliolalis ovalis oblusis profunde cordalis crenalis glabriusculis, tenuis margineque hirsutis; verticillastris sub-10-floris, galea bifida. Q? - Caules debiles ramique quadrangulares laeves puberuli. Folia reticulato-venosa membranacea glabriuscula, sublus pallidiora, in venis et margine hirsuta, 10-11 lin. longa, 7 lm. lata* Petioli 3 lin. longi caudicibus pubescentibus. Flores verticillato-tipicis pedunculatis, multifloris *BaUotae vulgaris*, verticillastris fructiferis remotis. Calyx

larbínato-campTñulalūs frTatua pilosolas, laciniis lanceolatis aristalo-subula-
Us subaequalibaa. Corolla pallde violacea, tobo calyem paollo superaole, galea
recia biCda, eitoa pubescenle, labio inferiore Iriplo longiore infido piano palenle,
laciniis rolundalis, intermedia duplo laliore emarginata, palalo purpureo-macu-
lato. — Habitat In America aequinociali, in monlibus temperatis regni Quiiensif
inter Cachapamba el Chillo.

PIT. BILLOPTICA H. B. Kth. I. c. 308. t - Bib. 1. c. — Caule ereelo foliisq. hlr-
sulis peliolalis ellipiicis, apice rolundalis, cordalis crenatla; ertfclllaslrís sexflo-
ris; galea integra. Q — Herba subpedalis. Caulis simplex letragonns birsulus.
Folia reliculalo-venosa, ulrinque hirsuU, semipollicaria, 4 lln. el pánllo jatlora.
Petioll 4 lin. longi pilosi. Flores subsessiles. Calyx tubaloso-campanolatm 5-
fidus siriaius hirsulus, laciniis ovalis acuminalo-mucronalis, S inferioribus mino-
ribus approximais. Corolla rosea, exlus pubescens, lubo calyem duplo supe-
rante, limbo bilabiato, labfo auperiore integro subconcavo, inferiore trifldo, laci-
niis laleralibus redexis, intermedia majore, basl maculi* purpureis nolata. — Ua-
Diial in America aequinociali, in alia planltie Qoilenai juxla Turubamba et Chillo.

Seotio YI. OLIVIA Bib. L. e. 513.

Herbae annae r. perennet flabrae pubeteentes T. pllotae, see lanate* Folia
ovata. Verticflaalrl anbaexflori. Bracteaqjntnuta. Calycea aaeptof t<>aplñ4eeeci-
tes, nonntunquam blabiati. Corollae oebrotaeae.

75. ST. HIRTA Linn. Spec, plant. 81& — XII. Flor. Pedem. t 31. L 2. fig. 3. — Bth.
I. c. f — Erecta v. adscendens ramosa pllofo-hlrta: foil, petlolaiii late ovalis
crenatis, basi late trnncato-cordalis, floralib. aessilib., basi rolundalo-cuneatis,
sopremis ovalis aculis integerrimis; verlicillaslrís sesfloris distanlib. v. supremis
approximais; calycib. campanulatis pilosis, denlib. lanceolato-subulatis acuiissim-
is spinescenlib.; corollis exlus pubesceolib., calyce vix dimidio longiorib., lubo
, incluso, labio superiore emarginato-bifido. 0 — Herba semipedalis v. vix peda-
lis, pilts longis mollibus patentibus hirla, praesertim caules, peioll, calycea ^l>
folia floralia; Folia l-l'A-pollicaria, in loeif tleeit rngulosa, pills uuinque spar-
sis, Inferlora obtnaa mnlica, anperiora splnaUbreriter mueronata, floralia suprema
eajiea brerfóra i,Jo*giora. Baoemi HH^NMA^f<#Dillaiiri Infiml vix pol-
ficem remoil. FoNa^lloraUa.^uepe n t o . ; BM^HW^ttai|mm. Caljces 3-4
Ho. longl, denies aeqnaleã T. wýnrn&p&mfSmWm, fMñjft ; Inmlii-
res, corollae tubum plernmqe soperäitet. ^Qgl|ffi^ ^ Ocy-
mattrum Gon. HorL Monsp. 878. — GaleopifcfiHuia tlnn. Spec, plant. (ediL 1.)
580. — Tetrahitum hirtum Hoffm. et Lnk. Flor. Portug. — Staehys divaricate Viv.
Fl. Cors. App. 2. - SI. imeripta Bcbh. Icon. boL exot I. 88. L 40 - GaUoptis
Bitpanica Mill, ex Sieud. Nom. boU 351. (edh. 1.) — Habitat ID Europae austro-
occidentalis et in Africae borealls slccis rupeslribus marillmis el in insnlis Ma-
t dera el Teneriffa.

fa ST. PLUatOSA Griseb. Spicleg. flor. Bnmel. II. 130, f — Caule ereelo longe
pjloso; foil. elllptico-lanceolaUs serratis anbiessilib., inreriorib. basi attenua^is;
vcjBelllaatrii anbd<eemfloriss calyeis dentib. lanceolalo-aeominalis arislalis; co-
«o1)a« uibo Inelnsa, galea Integra, extos pobescenle. Q — Proximo affiois Sk
kfrtae pube hablttoque conformii, sed differre videlur follia ovalli erenaiis, bast
rotuodatis truncatisque, verticllastrfs paucifloris, calyeis denlibus brevlas arista-
lis el galea bifida. — Crescit in Macedonia boreall inter Komanova el Slrazin.

77. ST. ANNUA Linn. Spec, plank 813. — Jacq. Flor. Auslriac. IV. 31. t. 360. — Bib.
I. e.551. t — Erecta glabrinscula v. superne pubescens: foil, peliolalis ovalis ob-
lusiusculif crenalis, basi rolundalis cuneališve, floralib. lanceolatis calyce lon-
giorib. aculis subintegerrimis; verlicillaslrís subsexfloris dislinclfs, sapremis ap-
proximais; calycib. lubuloso-campanulalis villosis sublncurvis, denlib. lanceolalis
aeulissimis subspinosis; corollis pubescentib., caljce subduplo longioribus. Q —
Herba semipedalis v. vix pedalis divaricalo-ramosa, caulis inferne glabralus y.

parce pubescens, rache mi rhachis pubescens. Folia caulina glabra sesquipollicaria, 8-10 lin. lata, (loralia inferiora glabra, 1/2 poll, longa, sed vir 3-4 lin. laia, suprema multo minora pubescens. Verticillastri infimi reraoti, supremi in spicam appropinquati. Bractea minutissima. Calyx 4 lin. longi. Annulus internus omnino nullus. Achaenia laevis. — *Betonica annua* Linn. Spec. plant, (edit. 1.) 573. — *Stachyt nervota* Gal Fl. Mont. 107. — *St. Betonica* CranU, Slirp. Au»in 265. — Habitat in Europae arvis cullis et ad vias.

78. ST. PUBESCENT Ten. Fl. Neap, prodr. 34. - Bib. I. c. (excl. syn. Vis.) - Ad-J scendens, basi glabruscula, superne pubescens: Toll, petiolatis ovalis obtusifrenalis, basi cuneatis, floralibus ovalis calyce longioribus acutiusculis subintegerimis; verticillastri subsexfloris distantibus; calycibus tubuloso-carpanulatis villosis subincurvis, demum lanceolatis acutissimis subspinosis; corollis pubescentibus, calyce duplo longioribus. 3} — Ab affini 51. *annua* differit caulibus longioribus, basi procumbentibus perennantibus, verticillastri distantibus rogis villosis et foliis floralibus latioribus brevioribus. Calyx pilis mollibus albis villosus, dentes tubum corollae aequales. Corolla extus tenuiter pubescens. Annulus intra tubum incompletus transversalis, brevissime pilosus. A *St. maritima* differit caulibus elongatis decumbentibus, verticillastri distantibus et foliis minus rugosis. — *St. decumbent* Willd. Enum. hort. Berol. Suppl. 41? — *St. Ualbis* Lnk. Enum. pi. II. 110. — Habitat in Europae mediterraneae arvis siccis, in Hispania, Lucania et Dalmatia.

79. ST. FRAGILIS Visiani, Flora Dalmatica I. t. 16. Fig. 1. - Rchb. Fl. Germ. c. 310? — Glabruscula: caule erecto ramoso fragili; foliis oblongo-lanceolatis obtusifrenis inferioribus subcrenatis latioribus, superioribus linearibus integris; spicis terminalibus solitariis lernisve aggregatis; verticillastri conliguis 6-7-floris; bracteis ovatis cordatis acuminatis bracteolatis. Calyx tubuloso-carpanulatis villosis subincurvis, demum lanceolatis acutissimis subspinosis; corollis pubescentibus calyce duplo longioribus. 3} — Ab affini 51. *annua* differit caulibus longioribus, basi procumbentibus perennantibus, verticillastri distantibus rogis villosis et foliis floralibus latioribus brevioribus. Calyx pilis mollibus albis villosus, dentes tubum corollae aequales. Corolla extus tenuiter pubescens. Annulus intra tubum incompletus transversalis, brevissime pilosus. A *St. maritima* differit caulibus elongatis decumbentibus, verticillastri distantibus et foliis minus rugosis. — *St. decumbent* Willd. Enum. hort. Berol. Suppl. 41? — *St. Ualbis* Lnk. Enum. pi. II. 110. — Habitat in Europae mediterraneae arvis siccis, in Hispania, Lucania et Dalmatia.

80. ST. MARITIMA Lion. MaoÜ 8k. - i*q. Hort. Vindob. I.». L70. — Rchb. Plant. critic. V. 51. t. 484. — Bib. L e t - Tomenoso-hirsuta ascendens: foliis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis obtusifrenis, basi angustatis subrugosis, floralibus sessilibus ovatis obtusis, supremis calyce subaequalibus; verticillastri subsexfloris, infimis distantibus, superioribus in spicam approximatis; calycibus tubuloso-carpanulatis villosis, demum lanceolatis acutissimis subspinosis; corollis pubescentibus calyce duplo longioribus. 3} — Caules numerosi scirpedales v. vix pedales, pilis brevibus patentibus hirsuti. Folia circiter pollicaria, saepius rosgosa et tomentosa. Spicae breviter densae, pilis numerosis albicantes. Verticillastri inferiores semipollicem distantes, supremi in spicam brevem oblongam approximatis, saepius sexfloris, demum 2-4-floris. Bractea subnulla. Calyx 3 lin. longi dense tomentosus, demum obtusifrenis acutissimis subspinosis. Corolla oblonga, labium inferius porporeis basi notatum. Annulus intra tubum incompletus, conspicuus, labii inferioris lobi laterales medio lobis minoribus. Achaemia obovato-triquetra laevis. — *St. hetoniae foia* Per*. Encic. Hd. II. W* (non Desf.) — Habitat in regionis mediterraneae arenosis maritimis, in Orientibus Culbide prope arcem Sonkoum, etiam ad littora Oceani prope La Rochelle. *

81. ST. SPIMLOSA Sibthorp et Sm. Prodr. flor. Graec. I. 410. - Bib. I. c. 555. f — Ramorum angulis hispidis; foliis petiolatis late ovatis, inferioribus basi cordatis sessilibus ovalo-lanceolatis; verticillastri 0-10-floris disliotis; bracteis minutis; calycibus ample campanulatis, demum lanceolatis acutissimis subspinosis aequalibus; lobis corollae lobaequantibus; corollae labio inferiore magis tubo. Q? - Caulibus erectis v. adscendens, basi pedalis, arcte Ictragonus, angulis pilis patentibus foveatis rigidis magis nosis ciliatis, caeterum glaber. Folia inferiora longipetiolata, limbo 1-9-pollicari creata, ntrinque vincta, sparse pilosa, superiora breviter petiolata et truncata v. euneata, floralia plerumque calyce breviori. Calyx magis tubuloso-carpanulatis villosis subincurvis, demum lanceolatis acutissimis subspinosis; corollis pubescentibus calyce duplo longioribus. 3} — Ab affini 51. *annua* differit caulibus longioribus, basi procumbentibus perennantibus, verticillastri distantibus rogis villosis et foliis floralibus latioribus brevioribus. Calyx pilis mollibus albis villosus, dentes tubum corollae aequales. Corolla extus tenuiter pubescens. Annulus intra tubum incompletus transversalis, brevissime pilosus. A *St. maritima* differit caulibus elongatis decumbentibus, verticillastri distantibus et foliis minus rugosis. — *St. decumbent* Willd. Enum. hort. Berol. Suppl. 41? — *St. Ualbis* Lnk. Enum. pi. II. 110. — Habitat in Europae mediterraneae arvis siccis, in Hispania, Lucania et Dalmatia.

Corolla fere *St menthaefolae*, tubus parom longior, inlus* oblique annulatus, labium superius erectum oblongum integrum, lobo medio latissimo — *Galeopstt onentalu* Mill. — Habitat in regione mediterranea orientali, in Dalmatia et Iiria, in Crcla, Corfu, circa Byzantium frequens et in lillore Asialico

82. ST. VISCOSA Monbr el Auch Ann sc. nat (2. Sér) VI 40 — Herbacea perennans decumbens viscoso-pubescentis foliis late ovatis grosse crenatis, basi cordatis, utrinque videntibus, verticillatis 4-10-flores distans subsecundi*, bracteis minutis, calycibus campanulatis, denique lanceolatis acutissimis, lobum corollae superanlib, corollae labio in fenore maximo. 2} — Crescit in convalle Euphratis superius

83. ST. MEISTHAEFOLIA Yisiam in Bol Zeil 1829 I Ergnrngbbl 14 el Flora Dalmatica 1 t 17 — Bib I c t — Herbacea adscendens*, ercCU hirsuta foliis breviter petiolatis* oblongo-ovalis serratis, basi rotundatis* subcordatis, floralibus & sessilibus acutis calyces 10-12-flores superanlib, verticillatis 0-10-flores superioribus approximatis, calycibus ample campanulatis bilabialibus, dentibus latis acutissimis submuticis, corollae labio inferiore maximo 3} — Rami tetragoni, angulis obtusis subcallois, pilis palmaribus reflexive hirsutis Folia 2-3-pollicana, sicca nigra, utrinque glauca, superiora subamplexicaulia. Verticillata inferiora distans, superiores Ja spicam 3-4-pollicarem approximatis. Calyces semipollicares virides hirsuti, lobis obtusis, labio superiore nunc semilobato, nunc breviter lobato, inferioro bifido Corolla oblonga, labio superiore pubescente obtuso lobato, inferioro plus duplo longiore, lobis lateralibus oblongis, medio rotundato emarginato Annulus lobis obliquus. — 51 *grandiflora* Host, Fl. Auslr. II 100 — In Dalmatia prope Ascnvium habitat

Sectio VII. CHAMAESIDERITIS Rohb. Tl. Germ, excnrs 318. - Bth. 1. c. 656.

Herbae perennes glabrae v pilosae, nee Janalae Folia oblata lanceolata v hirsuta verticillata 2-10-flores Bracteis minutis Calces aequali subsymmetricas Corollae orbiculatae v purpureae

81. ST. PATULA Griseb. Spicileg 0 Rumel. II 142 t — Caule suffrutescente credo diffuse ramoso villosulo-lanato, foliis oblongo-linearibus acutiusculis sessilibus micropetiolatis v apice serratis bracteis mucronatis teretibus 0-10-flores axillaribus calycibus campanulatis lobis ovatis pubescentibus Uaboparum aequat. — Crescit in Mierioate biresjli

84. ST. SUBCRENATA Vis. In Bot Zeil 18U. I, ErgaxogsbL IS. el Flora Dalmatica 1.110. 6g 2 — Bib I o. — Herbacea adscendens piloso-pubescentis: foliis subsessilibus oblongo-lanceolatis lobis crenatis, basi angustatis inlegemmis, floralibus ovalo-lanceolatis acutis, superioribus calyce brevioribus, verticillatis dense 0-10-flores distans, calycibus lobuloso-campanulatis pilosis, denique ovalis acutissimis subspinosis subaequalibus; corollis glabris calycis lobis duplo longioribus 2* — Afflois *St rectae*, differ! superficie parce piloso-pubescente, foliis angustioribus integrioribus non rugosis el calycibus majoribus Corollae tubus inlas oblique annulatus. — *SL recla fi* Bert Amoen Ital. 318. — Uabitat in Dalmatia montanae colibus, in alpinis Apuaeis prope i Fanli Scritli, Rascello el Fornole.

80. ST. RECTA Linn Manl 82 - Jcq Flor. Ausriac. IV. 31. L 350. - Blh I c f — Herbacea erecta v adscendens piloso-biloba foliis breviter petiolatis oblongo-ovatis lanceolatisve obtusis crenatis, basi rotundatis angustatisve rugosis hirsutis floralibus sessilibus acutis, superioribus calyce brevioribus; verticillatis sub-10-flores distans, calycibus ovalo-campanulatis bibratis, denique ovalis acutissimis subspinosis aequalibus, corolla glabra calyce duplo longioribus — Herba saepius adscendens v suberecta, nunc procumbens v ciam omnino erecta Folia 1-1-pollicina, hirsuta el hirsutis vanabilia, rarus fere glabra Racemi clonales verticillati omnes distans Dracae nunulissimae Lalycis subsessilibus 2 3 Im. longi Corolla calyce duplo longior orbiculata, fauce purpurea, lobis

- denies calycinus subaequans. Annulus internus obliquus, pill* brevibus subsquamosis. Labii inferioris lobus medius breviter emarginatus. Achaenia obovoideotriquetra laeviuscula. — *Sideritis hirtuta* Gou. Fl. Monsp. 85. — *Betonica hirta* Gou. Hort. Monsp. 276. — *Betonica decumbens* Moench, Melh. plant. 300. — *Tetrahit herbariorum* Ger. Fl. Gallopr. 272. — *Stachyt betonia* Cranz, Stirp. Auslr. 204. — *St. bufonia* Thuill. Fl. Par. 1.205. — *St. procumbens* Lam. Flor. Franc 11. 385. — *St. Sideritis* Vill. Flor. Dauph. II. 375.;- *St. tyvetrit* Forsk. Flor. Const. XXVIII. — *St. annua* Sm. Prodr. flor. Graec. 1.410. — *St. glutinosa* Sm. I. c. 400. — *St. decumbens* Rchb. Flor. Germ. exzcor. 318? (viz Willd.) — Habitat in Europae praesertim australioris siles ad vias, in Tauria, Caucaso, in montibus Beschtai et Talysch, agro Byzantino, Asia minore et in insula Creta.
87. ST. SUBNUDA Vonlbr. et Aucher, Ann. sc. nat. (2. Sér.) VI 5a — Herbaea pubescens v. glabriuscula: caulibus erectis virgatis ramosis; foliis parvis remotis petiolatis, caulibus oblongis subrenatis, floralibus calyce brevioribus; verticillatis 2-0-floris remotis; bracteis minutis subnullis; calycibus breviter campanulatis, deorsum lanceolatis subspinosis erectis subaequalibus; corollis leviter pubescentibus, tubo denique calycinus parum excedente. 2]. — Rami juncei tetragoni vides Folia caulina viz 3-4 lin. longa v. perpaucula subpollicaria, radicalia et inferiora late ovata 3-4 lin. longa. Corolla ochroleuca. — Ad ripas Euphratis crescit.
88. ST. PAUCIFLORA Visiani, Illustr. di ale. piante 10.112. fig. 2. - Herbaea lanuginoso-canescens: caule erecto ramoso; foliis oblongis oblatis crenatis rugosis, inferioribus basi subcordatis petiolatis, superioribus floralibus ovato-oblongis sessilibus; verticillatis 4-0-floris; bracteis oblongo-linearibus integris calyce dimidio brevioribus; calycis nervosis basi dentatis lanceolatis spinosis, corollae tubo subaequalibus; galea ovali acuta iolegra, eztra lanala. 3] — Circa Lepanto.
80. ST. PAROLUILL Visiani I. c. f. t. 4. - Herbaea: caule erecto ramoso gracili, pilis rostratis scabro; foliis ovato-lanceolatis sessilibus serratis adpresse stiigosis acutis, basi truncatis; floralibus calyce dimidio brevioribus; calycibus campanulatis, tubo denique calycinus parum excedente. 2]. — Habitat in Twade.
00. ST. LEICOGLOSSA Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 14a — Caule herbaceo erecto diffuso ramoso pilosulo; foliis linearilanceolatis subsessilibus, inferioribus serratis, superioribus integerrimis; verticillatis sezfloris, superioribus approximatis; calycis campanulatis scabrelli dentatis arqualibus subulato-aristatis lubnibus quaniibus; corollae albae ad faucem purpureo-lineatae tubo incluso annulato, galea dorso puberula. ^ — Proxima *St. arenariae*, quae corolla purpurea cenio; eilus pilosa, annulo pilorum obsoleto, calycis tubo denique duplo superante at foliis lalioribus, plerisque integerrimis differ!. — Crescit in peninsula Uagioq. ^ oros et in monte Albos.
01. ST. AREKARIA Vahl, Symb. bot. II. 04. - BoL Magai. 1.1090. - Dsf. Flor. At. j. lant. II. 21. I. 126? - Bth. I. c. 457. f — Herbaea decumbens canescens pubescent: foliis subsessilibus oblongo-linearibus lanceolatisve acutis subserratis, longe aigqstatis inlegerrimis, floralibus minoribus, supremis calyce brevioribus; lirilla Mrs Iszo 0-10-floris remotis; calycibus lubuloso-campanulatis pilosis, lib. lanceolatis acutissimis subspinosis, supremo parum majore; corollis pubescentibus, calycis tubo duplo longioribus. ^ — Rami elongati tetragoni, losfls atolubus subreclis magis minoribusve canescentes. Folia 1-1 * - poll* caria. B* Hia, atrtaqM pilis longis mollibus adpressis canescens, iafirma latoria, ralia iatstffiora aiora, saprema ojinula ovato-lanceolata inlegerrima acuU#- J sima. Racosii lasi adseedentes, fere podalet. Verticillantri laiusculi, ... plus sezflori, sjosMMnquaaa veto 8-10-flori. Bractee vii pedicello longiores §* f, Uceae. Corollae piciprascentis, aalos pilosae. - Si. Iberica M. Bieb. Fl. T. J. Caw. IL 41. - Rtichh. Flor. etoUc I. 43. t. 3ft. - *St. protrata* Lag. Cal. bo. j. ••it. - *MLcordtfoU** WilM. Koum. pL hort Btjrpfe a 010. - 51. p*P*r'' f oir, r

- Diet. Suppl. V. 227. — *St. rubra* DODD, Hort. Cant. - *St. congittta* -d*(7rville, Mém. soc. Linn, de Paris 324. — Bth. I. c. 557. — *St. canetcens* Bory et Chaub. Flore du Peloponn. 010. t t. 10? — Habitat in regione australiore mediterranea et Ponlica, in regno Tunelano ad urbem Raf el prope Biserle, in Sicilia, regno Ifeapolitano, in incullis circa Trapeium communis, in Iberiae apricis asperis.
- ft. Su RAMOSISSIMA Monlbr. et Aucher, ADD. SC nau (2. Sér.) VI. 50. — Humilis divaricato-ramosissima, molliter cano-villosa: foil, oblongis obtusis, basi angulalis inlegerrimis v. inferiorib. peliolalis subdenialis, floralib. conformib., flores Lsuperanlib.; verticillasris subsexfloris distinctfy; calycib. lubulosis molliter villosis, denlib. 5-10 subulatis recurvis spinosis corollam aabaequantibua. Q — Uerba 4-0-po)licarls, rami jam a basi floriferl. Corolla purpurascens. — Crescit in t- Cappadocia orientali.
03. ST. SATUHEJOIDES Montbr. et Aoch. I. c. 51. — Homilis ramosa, glaberrima T. apice pubescens: roll, oblongis linearib., basi angulalis inlegerrimis paucidentalise, floralib. conformib., supremis flore breviorib.; verticillasris 2-0 floris dislanlib.; calycib. lubulosis glabriusculis, denlib. subulatis aculissimis subspinosis, demum recurvis; corollis extus leTiter pubescenlib., lubo b re tiler ezserlo. 0 — Corolla porpurea. — Habitat in Syria.
- 01 ST. ANGUSTIFOLIA M. Bleb. Pl. Tanr. Cane. IL 51. — Sweet, Brit, flow. gard. II. 1.180. - Bth. I. c M6. t - Herbacea glabra: ramla vlrqatls dIAiaU; fall, linearib. Integerrimis serratis Y. Inferiorib. pinnatifidia; racels tlongaHt; verticillastris remotis bifloris; calycib. tobnloso-campanvteUt glabris, dentlb. subaequalib. acutissimis subspinosis; corollis aitus pobeaeentib., tabo breriter etserto. 2|. — Rami elongaii ploripedales tenerl glaberrtmi ?Irides. Folia Inferiora bine Inde laciniis linearibus pinnatiflda, omnia perangusta acuta, floralia superiora calyce breviora. Racemi ultra pedales subsimplices. Verticillasri infenorcs ultra pollicom remoti. Calyces breviler pedicellali, fructiferi 3 lin. longi, 10-nervii, inter nervos subavenii. Corolla purpurascens, glabra v. tenuiter pubeticns. — *St. tenuifolia* Pall, in Link, Enum. pi. hort. Berol. II. 100. — Rcb. Flor. exotic. I. 80. (.28. (non Willd.) - *St. recta* D'Urv. Enum. pi. Archip.T (non Linn.) — HibiUt in % Tauriae meridionalls petrosis sylvaticii circa pagam Temirdschi et prope Cberson.
- ..*k " fle«4teTHIL AMBUU Mb. t e. AM.
Suffrailcet fralle^Te to st n M, mMs;g)abraU_t^M« pUoat> rartldtlaatri g-ft-rarius sub-10-flori. Bractee pirta« v.paaca*. Gn%w too>emtoa* t. lamaU_f 4 M - tlbos mollibus mutlcis. ^t - «,<^*.'3 *
- to. ST. HTSSOPOIDES Burch. Cat geogr. no. 1053. — Bth. I. c — Suffruticosa? glaberrima: foil, linearib. inlegerrimis, florallb. supremis oblongis ealycem aequanlib.; verticillasris bifloris; calycls lubuloso-campaoolatl glabrl T. letissime * lomentosi denlib. brevib. aculis mutiels; corollis calyce duplo longioribus. Q — Bami telragoni laeves. Folia pollicaria, basi longe angusUU obtusiuscula, ulrin'que viridia uninervia, floralia gradalim laliora et breviora. Calyces Juniores interdum tomento tenuissimo conspersl. Corollae extos sericeae. — Habitat in Africa austral! extratropica.
00. 0T. MACILENTA E. Mey. Comment, pi. Afric. anatr. I. M0. - Perennis v. suff-ImUcosat. ramls adacendentib. glabris, basi follosia; foil, linearib. oblongitve Inlegerrimis v. apice denticulatis, basi longe angulalis, ntrinq. glabrit, florallb. inpremis calyce breviorib.; verticillasris 6-floris remolis; calycis subcanescentis denlib. breviter aeuceo-mucronatis; corollis calyca subduplo longioribus. 2I — Crescit in Promo ntorio bonae spei.
07. ST. COERULEA Burch. I. e. no. 1775. - Bth. I. c. - Suffruticosa?: rami* elongalif laxe subtomentosis; roll, linearib. oblongisve integerrimis v. apice subdenticulalis, basi longe angusiatls, ulrinq. glabns v. vlx tomenlosis, Qoralib. superiorib. calyce broionb.; verticillastris billonis; calycis cano-lomentosi denlib. late lanccolatis mulicis; corollis calyce subduplo longioribus. 2I .- Rami teiragoni, apico saepe glabrati. Folia 2-4-polticana subfiridia v. lomcnio teu.7

- praeserlim In pagina inferiore conspersa. Flores pauci remoti. Corolla exlus sericea. — Habitat in Africa ausrali extratropica.
98. ST. SPATHULATA Burch. Cat. geogr. no. 1738. ex Blh. 1. c. 550. — Suffniiicosa lota cano-lomenlosa: foil, linear! -spalbulalis inlegerrimis, floralib. saperiorib. calycem vix superanlib.; verticillaslris bifloris; bracteis parvis; calycis tubuloso-campanolati denlib. late lanceolatis tabom corollae aequantibus. % — *St. lineari* valde affinis, differt foliis latioribus basi longe angustalis, floribus subracemosis, foliis floralibus superioribus parvis, et corollis calyces parum superanlibus, tubo incluso. — Habitat in Africa aostrali extralropica.
99. ST. LINEARIS Burch. I. c no. 8717. — Btb. I. c. — Suffruticosa, tola cano-tomenlosa: foil, sessilib. linearib. inlegerrimis, floralib. flores superantib.; verticillastris subbifloris; bracteis minotls; calycis lubuloso-campannlati denlib. lanceolatis aculis maticis, tubo corollae brevioribus. 2|. — Kami obtuse tclragoni, lomeoto subfloccoso dense Testiti. Folia pollicaria angusta, ulrinque Candida. Flores paaci. Axillae superiores sleriles. Calyces breviter pedunculaii. Corollae calyce tabdoplo longiores, extus sericeae. — Habitat in Africa australi extralropica.
100. ST. ROSMARINIFOLIA Btb. K e f — Suffruticosa cano-lomentosa: foil, subsessilib. oblongo-linearib. integerrimis, basi rolundatis, utrinq. lomenlosis, sublus albis; verticillastris tub-O-floris dislantib.; bracteis subulalis calyce breviorib.; calycib. campanulatis cano-lomenlosis, denlib. lanceolalo-subulalis aculis muticis; corollis denies calycinis vix excedenlib., exlus lomeniosis. 2|.? 5? — Fruliculus bumilis, rami lereles tomento brevi omnino vestili. Folia polius *Rotmarini* v. *Lavondulae* quam *Hyuopi*, circiler pollicaria aculiuscula, supra viridia, tenuiler lomenlosa, non rugosa, subtus venosa, tomenlo densiore Candida, floralia calyces superantia. Verlicillastris panel versus apices ramorum, supremi approxisaaM. Bracleae S-3 calycis lobum fere aequaates, caeterae minotae. GorolUsilabU Mbaenalla MlenIU» raperlos wbiotegerrimum, infrjorb lobi lateralet pafvl. - 8L jghiji^tffi Vthl Htrb. nou Mlchx. - *SidtriH** paWd* Thunb. Prodr. fl. Cap. 99? — flabllat ad Capot bonae spelf
101. ST. RUGOSA Ait Hort. Kew. II. 303. - Btb. I. c. - Jcq. Icon. pi. rar. 111. 7. I. 493. — Suffruticosa cano-lomenlosa: foil, subscsilib. oblongo-linearib. lanceolatisvc, basi longe angoslatis inlegerrimis rugosis, utrinq. tomentosis; verliciltosiris 5-10-floris distanlib.; bracteis subulalis, exleriorib. calyres subaequantib.; calycib. campanulatis cano-tomentosis, dentib. lanceolalo-subulalis acnlli muticis; corollis calyce tubduplo longioribns. Q — Afflnis *Si. rugotae* et *S\$. r^{fi}-tnarinifotiae*, a priori differt foliis anguslioribus, calycibus tomentosis nee lanatis, dentibus loogioribus, a 51. *ro\$marimifolia* foliis rngosis, basi longe angusiaU* subpetiolatis et corollis majoribus. A *SL jugali* differt calycibus sessilibus corollisqae minoribus. — HabiUl in Africa ausrali ad Capul bonae spel.
102. ST. DRtGEAHA B. Mey. Comment pi. Afric. auslr. I. 940. — Suffruticosa floecoso-lomentosa: foil, oblongo-linearib. ipalhulalltve, apice subdenUlis rugosl*, crassis, ulrinq. floccoso-lomenloslf, floralib. inferiorib. conformib., supremli calycem subaequanlib.; verticillaslris plerlsq. bifloris; bracicis parvis; calyftf' tubuloso-campanulalis, denlib. laoccolalis aculis lubo ejus MX breviorib.; corqV Us denies calycinis breviler excedeolib. r tubo incluso. i|> — Habitat iProm ^ torio bonae spei.
103. ST. DEMICULATA Burch. Cat. geogr. no. MOO - Bth I. c. 500. - Suffra^u cosa: ramis cano-lomentosis; foil, peiilolatis obo>atis oblongisve obtu^in creoaU* undulato-crispis rugosissimis, subtus subfloccoso-lomcniotit; verticillastris bl-' fluris; bracteis pants subulalis; calycib. lubuloto-rampanulaiis la\ e toro^nioslit denlib. ovato-Uiceolatis acuUs muticis; corollis cal)co vix duplo longioribus. ^J - Rami et folia fere *MorruHi tuiifns*. Folia Vi-Vi-pollicana, floralia calyC|D» subdaplo longiora. Calyces brtviier ptdicelUli. Corollae cilus icriccac - Bi* blui la Africa australi wuralropica.

104. ST. CUNEATA Banks mss. ex Bth. I. c. — Suffruticosa tomentoso-lanata: foil, petiolalis obovato-cuneatis subrotundalis obtusis crenalis undulato-crifspis rugosissimis, utrinq. subfloccoso-tomentosis; verticillaslrīs billōis; bracteis panrts subulalis; ealycib. campanulalis dense tomentosis, deolib. ovato-lanceolalis aculiusculis mulicis; corollis calyces breviler superanlibus. ty — Rami el folia fere *Marrubii Alyisi*. Folia vix semipollicaria, floralia calyces saperanlia. Flores ad apices ramorum approximali decussati. Calyces 3-4 lin. longi. Corollae parvae, extus sericeae. — Habitat in Africa ausrali in Promonlorio bonae spei.
105. ST. PAUCIFLORA Bib. I. c. f — Suffrulicosa floccoso-lanata: roll, subsessilib. oblongo-lanceolalis obtusis integerrimis, basi angustalis rugosis; verlicillaslrīs bifloris (rarissifne sub-4-floris) distantib.; ealycib. lubuloso-campanulalis floecoso-iomenlosis, denlib. lanceolatis aculis muticis; corollis calycem breviler superanlibus. 6 — Caules 1-1'A-pedales ramosi. Rami, folia et calyces conslanter dense tomento albo v. flavescenle lanatl. Folia inferiora 1-1'A-pollicaria, superiora breviora, floralia plerumque calycibus breviora. Verticillaslrī in exeraplaribus sylvestribus conslanter biflori. Calyces subsessiles. Bracieae minulae. Corolla parva, exius sericea. — *St. orientals* Forsk. Fl. Aeg. LXVIII. (non Linn.) — 51. *Palaestina* Vabl, Symbol. boL II. 01 (non Linn.) — Habitat In Syria prope monlem Sinai.
100. ST. NIVEA Labill. le. pi. Syr. III. 5. L 3. - Btb. I. c. t - Snffrutlcoša tomenloso-lanata: foil, subsessilib. oblongil obtosls Integerrimis, basi angastatls crassls; verticillaslrīs 9-4-floris panois distantib.; ealycib. tnboloso-campanulatls niveis, denlib. ovalis obtosls mulicis; corollis calyce dimidio tongiorib., exius pubcsenlibus. 2|. — Rami erecti subslmplices semipedales pedalesve, uli folia et calyces tomento albo denso subfloccoso lanaii. Folia r/*-pollicaria, venis paucis subius nolala, floralia calyce longiora. Verlicillaslrī in axillis foliorum superiorum 2-3. Bracieae minulissimae. Calyces 4-5 lin. longi, dentibus crassis mollibus brevibus. Corollae lubus denies calycinos acquans. Labia subaequalia palentia, superius subintegrrimum, inferioris lobi laterales parvi. — Habitat in Syriae aridis prope Damascus.
107. ST. BURCHELLU Bth. I. c. 501. f — Suffrulicosa floecoso-tomentosa: foil, subsesellib. oblongls v. oblongo-lanceolaUs aerraio-erenatis, basi angustaiis rugosis; Yerticillastlrē 0-10-florls oisUnetlaj bracteU aslnoUsslsoUi ellyela lobaloso-campanalatl dentib. lanceolalia obtoaia mvtlela jtaieaUb., aoperlorlb. majorib.; corollis calyce subbrevloribna. % — Boflrotim laeljJ JEsrmMI pfgrtmi. Rami sublereies, tomento floccoso mollller Ineanl. Folia lennlter floecoso-lomeniosa, Inferiora 2-3-pollicaria, valde rogosa, subtus dense reticulaU subviridia, floralia r eaulinis conformia at minora candidlora, flores tamen daplo Iriplove supers nil a. Verticillaslrī laxiusculi. Denies calychnf breves. Corolla parva, labio soperiore ..Inlegerrimo, inferiore majore palente, lobo medio late rotundato nndnlaio. — *Phiomū micrantha* Burch. Cat. Geogr. no. 1072. — *Sideritis rugota* Thonb. Prodr. fl. Cap. 05. — Habitat in Africa austral! extralropica, in Promontorio bonae spesf.
108. ST. ABGYPTIACA Pers. Enchirid. II. 184. — Bib. I. o. — Incana:" florib. spicalift foil, ovatls rugosis; bracteis late ovatis acominatis; calyce campanulas Jaevl. a*. — A *Si. Palaettina* calyce omnino laevi differt Spica densa. — Habitat In Aegypto.
100. ST. PALAESTINA Linn. Spec, plant 1074. - Btb. I. c - Snffrutlcosa canescens tomentosa: foil, sessllib. oblongo-lanceolalis obtnsis v. arlstato-mncronalis iniegerrimis, basi parum angustalis amplexicanlib. rugosis; verticillaslrīs subsexfloris, demum remotis v. supremis approximatls; ealycib. tubuloso-campanulalis canotomenlosis, denlib. oblusis muticis; corollis calyce vix duplo longionbus. 3l. — Bami sublereies albo-lomentosi. Folia 1-2-pollicaria, supra pallide viridia v. cancsconlia bullato-rugosa, subius caodidiora, \cnis clcvatis rogosa, ulrinqur uli calyces pubescentia brevissima lomonlosa, in exrmpplaribus s)lvestribus saepe inucrone rigido arislala, floralia breviera, suprema ovaia, omnm calycos superantia. Racemi juniores densi, demum elongali. Bracieae minuUe. Calyces

- sessiles, 3-4 lin. longi herbacei, nervis fix prominentibus. Corolla alba?, extas sericeo-pubescentibus. — *St. lanata* Moench, Melh. pi. 397. (non Jacq.) — Habitat in Paleslinae montibus inter Gazam et Hierosolymas.
110. ST. NUTANS Bib. 1. c — Suffructicosa pubescens: foil, sessilib. ovatis oblongis crenatis, basi angustatis rugosis, supra villosis, aubus albo-lanalis; verticillasris 2-6-floris; calycib. pedicellari* densissime albo-lanalis, fructiferis reflexis, dentib. laeolatis oblongis mucicis; corollis calycem breviter superantibus, exius pubescentibus. — A sequente differ! foliis latioribus, supra viridibus, pilis longis villosulis nec albo-lanalis et praesertim calycibus nulanibus profundius densatis. — Habitat in Africa australi in Promontorio bonae spei.
111. ST. LAMARCKII Bib. I. c 508. — Suffructicosa lomenoso-lanata: foil, subsessilib. oblongis oblongis crenatis, basi angustatis rotundatis crassis rugosissimis; verticillasris* subsexangulis distantibus; calycib. lobulosis densissime oblongatis, dentibus ovatis obtusis mucicis; corollis calycem breviter superantibus, exclus albo-tomentosis. — Habitus *Marrubii*. Rami laterales, juniores lana alba vix floccosa vestiti, demum subglabrati. Folia 5-12 lin. longa bullata-rugosissima, lana brevi molli utrinque vestita. Calyces 4-5 lin. longi. Corolla calycem breviter excedens flava?, labio superiore integerrimo, inferiore paulo majore palente, lobo medio late rotundato undulato. — *St. rugosa* Lam. III. I. 500. fig. 3. (non Ait.) — *Sideritis decumbens* Thunberg. Prodr. fl. Cap. 05. — Habitat in Africa australi ad Caput bonae spei.
112. ST. JUGALIS Burch. CaU geogr. no.1233. — Bib. 1. c. f — Suffructicosa subfloccosa-tomentosa: foil. subsessilib. oblongo-lanceolatis, apice subcrenatis rugosis; verticillasris 0-floris distantibus; calycis lanalis dentibus late lanceolatis acutis mucicis; corollis calyce duplo longioribus. — Rami pedales pauciflori, tomento albo-obscuri. Folia 1-1 1/2-pollicaria, basi integerrima at angustata, tomento supra antherifera, tubulosa floccosa, floralibus gradatim minoribus, supremis calycibus longioribus. — Bracteae; p*mk Malaeae. Calyceae Jireviter pedicellatis, 3-4 lin. longi, trilaterales aequaliter undulatae, tomento denso floccoso. subvelutino. Corolla exius sericeo - Villot a. — Habitat in Africa australi extratropica.
113. ST. INFLATA Bib. I. c. — Suffructicosa: ramis albo-tomentosis; foil, subsessilib., oblongis oblongis integerrimis subrugosis, sublongis albo-tomentosis; verticillasris subsexangulis distantibus; bracteis linearibus brevibus; calycis sessilibus inflato-campulatis albo-tomentosis dentibus ovatis oblongis mucicis; corollis calyce dimidio longioribus. — Rami elongati subfloccoso-tomentosi. Folia tix pollicaria supra pallide viridia, fere glabra, subtus paucivenia, subobtusolobata, obovata, calyce breviora. Calyces floriferi 0-7 lin. longi, obscure 10-nervi, dentibus brevibus, fructiferi Corollae exclus leniter sericeae. Species calycibus multis distinctissima. — In Africa septentrionali? verosimiliter in Aegypto.
114. ST. INTEGRIFOLIA Vahl mss. ei Bib. I. c — Suffructicosa: ramis lomenoso-lanatis; foil, subsessilib. oblongis oblongis integerrimis v. apice paucicrenatis basi angustatis viridibus; verticillasris 0-10-floris distinctis; bracteis linearibus calyce brevioribus; calycibus ovato-lobulosis aequalibus dense lanatis dentibus linearibus oblongis mucicis; corollis calyce dimidio longioribus. — Rami teretes. Folia semipollicaria vix rugosa, juniora lana sublaevi conspersa, adulta fere glabra. Corolla longiora, lomeno densiore. Verticillasris densi. Calyceae pilis aureis tertietis densissime lanatis. Corollae labium superius extus pubescentibus, inferius majus patens, lobo medio late rotundato undulato. Stylis lobis aequalibus. — *Sideritis integrifolia* Linn. Hani. 83. - *Phlomis portifolia* Burch. Cat. geogr. no. 1232. - *Sideritis plumosa* Thunberg. Prodr. Fl. Cap. W. - Ubi in Africa australi ad Caput bonae spei.
115. ST. FLORIBUKDA Montbr. et Aub. Ann. se. nal. (« S*r.) VI. 51. - Suffructicosa humilis eanescens: foil, ad basin ramorum approximatis longe petiolatis ovatis basi cordatis rufois, utriusque caulo-lomentosis, floralibus sessilibus. Oculi *Sideritis floribunda* Montbr. et Aub. Ann. se. nal. VI. 51. - Suffructicosa humilis eanescens: foil, ad basin ramorum approximatis longe petiolatis ovatis basi cordatis rufois, utriusque caulo-lomentosis, floralibus sessilibus. Oculi

lomentoso-pubescentib., denlib. lanceolatis mollib. muticis tubo subdimidio brevioribus. 2]. — Habitat prope Antiochiam.

Seotio IX. ZIETENA Bth. I. e. 563.

Suffrutescens pilis mollibus albis lanatis v. glabrali. Bracteae parvae v. paucae. Verticillastri 2-6-florati. Calycis lanati v. glabri, denlibus subulalis, saepissime spinosis.

110. ST. IVA Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 143. t — Lana densa tomentoso-Candida: foliis, oblongo-lanceolatis oblatis, basi attenuatis subsessilib. subnervi gerrimis; verticillastri 2-4-floris; calycis campanulati lanati denlib. lanceolati-acuminatis, apice aristatis, tubo duplo brevioribus; corollae ochroleucae limbo exserto, extus sparsim villosa. 2]. — Planta palmaris ramosa foliosa candidissima floccoso-lanata. Folia 8-12''' longa, 2-4''' lata rugulosa. — Habitat in Macedonia - occidentali inter Perlepe et Trojai-chan.

117. ST. LAVANDULAEFOLIA Vahl Symb. bot. I. 42. - Blh. I. c. f — Suffruticosa pilosa: foliis, caulinis petiolatis oblongo-lanceolatis integerrimis, utrinque angustatis, floralibus sessilib. ovato-lanceolatis; verticillastri 2-0-floris; calycis denlib. linearibus muticis, tubo longioribus, corolla amplexantibus. 3] — Humilis procumbens, rami cretici, steriles breves foliosos, floralibus semipedales, utriusque pedicellus, folia floralia et calycis pilis longissimis mollibus patentibus obsessis. Folia obtusoscula mollia, pilis longis adpressis subcanescentibus, lineis subparallelis venosis, ramorum sterilibus basi in petiolum longe angustata, pedicellis basi connatis amplexantibus, floralibus basi cordato-amplexicaulis. Bracteae subnullae. — *Zielenia orientalis*** Gled. Act. Berol. 1700.3. — *Sideritis calycantha* M. Bieb. VI Taur. Cauc. III. 303. — Rchb. Plant. critic. I. 17. t 15. — Habitat in Asiae Caesariensis locis lapidosis siccis, prope Tiflim, Angoram et in montibus allionibus Talysch.

118. ST. MUCRONATA Sieb. mss. ex Blh. I. c. t — Suffruticosa ramosissima, pilis longis laxis lanatis: foliis, petiolatis oblongis crunatis rugosis; verticillastri 2-4-floris; calycibus campanulatis, denlib. longis subspinosis corollam superantibus. 2]. — Rami inferi semipedales divaricato-tricholomi nigri duri, utriusque folia et calycis pilis laxis longis mollibus albis lanatis. Folia pollicaria, floralia sessilia, superiora calycibus breviora. Verticillastri distincti, plerumque biflori. Bracteae parvae oblongo-ovatae. — Habitat in Creta.

119. ST. SPINOSA Linn. gytt veget III 58. — Bth. I. c — Suffruticosa, pilis adpressis sericeo-lanatis ramosissima: ramis teretibus pilosis. Folia linearibus integerrimis verticillastri bifloris; calycibus campanulatis, denlib. calycibus. Campanula usque ad lobos lanceolatis spinosis, tubo corollae aequantibus. — A fcl. *glutinosa* differt raris, foliis calycibusque sericeo-lanatis, ramis saepissime spinosis magis ramosis et corollis parvis majoribus. — Habitat in Creta.

190. ST. GLUTINOSA Linn. Spec. plant 813. - Bth. I. c. 504. f — Glabra ramosissima: foliis, oblongo-linearibus acutis subnerviis, basi angustatis; verticillastri bifloris; calycibus campanulatis glabris, denlib. aequantibus. Ovula acutissimis subspinosis; corollis extus aereo-pubescentibus, tubo denique calycibus subaequantibus. 6 — Fruticulus humilis, rami acute tetragonali divaricato-ramosissimi, ramuli saepe spinosi. Folia caulina pollicaria, inferiora in petiolum brevem angustata. pilis raris interdum conspersa, caeterum omnia glabra, superiora sessilia, gradatim minora, superiora minora ovalia acutissima. Floret in axillis brevissime pedicellatis, solitarii v. 2 oppositi, axillis supremis sterilibus. Bracteae pedicello longiores, sed vix tertiam partem calycis attingentes. Corolla fere alba — Habitat in Europa mediterranea, in collibus Corsicae et in Creta.

121. ST. FRUTICULOSA M. Bieb. Fl. Taur. Cauc. II. 51. - Suffruticosa, basi divaricato-ramosissima: ramis pilosis; foliis, sessilib. oblongo-lanceolatis v. linearibus subdentulatis, utrinque viridibus glabris, floralibus conformibus; verticillastri bifloris; calycis denlib. lanceolatis acutissimis subspinosis, tubo subbrevioribus; corollis calyce subduplo longioribus. — Folia linearibus pollicaria, fruticulus brevibus remolis. Corolla pallide purpurea, magis magis *St. rectae*, calyce subduplo

longior, galea emarginata v. breviter bifida, labium inferius aequans. An revera hujus generis? — In Gaocasi orientalis et Iberiac lapidosis montibus.

f *Species non satis notae.*

122. ST. BETOMCAEFOLIA Desf. Cor. pi. Tourn. in Ann. Mns. Par. X. 304. t t 25.
— Dih. I. c. — Villosa: foliis cordatis crenatis; verticillatis subsexfloris; calycibus muticis. O — Caulis villosus tetragonus erectus ramosus bipedalis. Folia cordata rugosa crenata, obtusa in Betonieae officina ut aimilia peliolata. Verticillastri distincti 2-6-flori, folia floralia ovata adnata calyce longiora. Calyx campanulatus villosus pentagonus, dentibus brevibus ovatis obtusis mucosis. Corolla magna alba, lobus calyce longior, lobum aperiens elongatum integrum, inferius trifidum, lobis lateralibus brevibus obtusis, medio multo majore rotundato inegro-flavescente. — AD *SL ipnulosus?* — Habitat in Creta.
123. ST. SCORDIODES Poir. Diet VII. 373. f - Bib. I. c. - Gaule suffruticoso; foliis lanceolatis-linearibus subnervis, floralibus incano-spinosis; dentibus calycinatis reclinatis. % — Kami numero divaricati tetragoni rigidi villosi, praesertim in parte aperiens. Folia dentibus paucis latis irregularibus notata, v. interdum apice sabincata obtusissima, basi in peliolum angustata, utrinque glabra, ocrea sessilia subamplexicaulia lala glabra majuscula, irregulariter margine inciso-spinosa. Flores ante folium fere reconditi. Verticillastri interrupti terminati 0-9-flori. Bractea nullae. Calyx tubulosus striatus subviridis villosus, dentibus 5 aequalibus reclinatis subspinosis. Corolla flavescente, calyce parum longior, lobum aperiens rectum subplanum emarginatum, inferius brevius latius, lobis 3 rotundatis inaequalibus subcrenatis. — Videtur ex descriptione *Sideritis* species. — Habitat in Africa septentrionali?
124. ST. OLYMPIC! Poir. Diet Suppl. V. OS. t - Blh. I. c. fl* - Villosa: caule simpliciter tetragono; foliis ellipticis argute serratis, longioribus ellipticis, canaliculatis distantibus, apice recurvis fateallibus eplea dense lanuginosa. % — AfBols 51. *niveae*. Caulis pedalis leucoglaucus. Foliole pollicares, utrinque obtusa villosa, supra albo-subviridia, subtus lanuginosa. Folia inferiora f. stolonum caespitosa magis lanuginosa, margine crasso lomentoso eleganter cincta. Verticillastri densi. Calyces tomentosi, dentibus ovalibus inaequalibus spinosis, inferioribus angustioribus. Corolla albo-flavescente, exclusa villosa mediocris, tubo vix calyceni aequante, labio superiore integro concavo, inferioris lobis integris, medio majore. — Habitat in monte Olimpo.
125. ST. TOURNEFORTH Poir. I. e. «7. t - Bib. I. c - Foliis cordatis subcrenatis obtusis, petioli basi connatis; verticillatis multifloris; corolla magis brevius villosa, tubo longior calycis; caule tomentoso. ^ — Species polychroma floribus magnis roseis. Caules ramosi bipedales, tomento albo vestiti. Folia basi profunde cordata venose rugosa albo-viridia, tenuiter crenulata, 9-3 pollicibus, longa, pollicem et ultra late, petioli basi dilatato-connati. Verticillastri sessiles dentibus foliis 2 ovatis sessilibus euctis. Calyx albo-tomentosus dilatatus, dentibus purpureis spinosis. Corolla tubo 0 lin. longus albidus, lobis roseis, superius semipollicem rectum obtusum, apice subemarginatum, extus trilobum, inferius aequilongum, lobis lateralibus parvis, medio 6 lin. lato obtuso subemarginato. — *SL Cretica latifolia* Tournef. Inslitol. rei herb. 185., Itin. I. 33. t I. - Habitat in insula Crete prope Canam.
126. ST. PILOSA Null. Jour. acad. Philad. VII. 48. - Bib. I. c. 741. - Villosa: foliis subsessilibus oblongo-ovalibus acutis ferratis; calycibus pilosissimis, elongatis; verticillatis subsexfloris. % - Humilis robusta. Folia basi mollia. Floret majusculi purpureae. — Crescit in America boreali ad Rocas montium.
127. ST. VIRGATA Bory de Saint-Vincent, Kipedit acieatif. de Morée (Bot) 169. t Hel Flor. do Peloponn. MI. f 118. - Villosa-eericea canescens: caulibus remissis; calycibus virgatis; foliis ellipticis; foliis ellipticis; foliis ellipticis; foliis ellipticis. — Habitat in Peloponnese.

rameallb. linearib. bracleaformib.; florib. solilariis oppositis subsessilib.; denlib. calycinis spinescens, labo quadruplo brevioribus. q. — Tola planla sericeo-canescens, 2-3-pedalis. Corolla alba villosa-sericea, galca recta, apice emarginata. — Creseit (n Argollda).

128. ST. CANESCENS Bory et Chaub. ExpediU etc. 167. f 1.18. fig. 1. el Fl. du Peloponn. 910. f1 If. — Tomenoso-canescens: caulib. erecliuscolis; foil, ovaio-lanaeolia crenalis acatis petiolatis; •erlicillastris sexfloris spicalim approximatis; denlib. calycinis spinescens, labom aequanlib.; galea hirsula. % — Caules viz pedales ramosi. — *Si, congest** d'Urville, Ennmer. plant 518? — Crescil in Graecia.

120. ST. CANDIDA Bory el Chaub. Expedit I. c. t 10. el Flor. da Peloponn. 017. t t. 20. — Tomentoso-incana: caulib. ereclinscalis ramosis vix dodrantalib.; foil, petiolatis ovalo-subrolandis crenatis, inferiorib. basi cordalis; verlicillastris sexfloris spicatum approximatis; denlib. calyciois lanceolalo-subulalis subspinescens, tabum corollae aequantib., demum palentibus. 2|. - *Marrubium vduinum* Siblhrp. el Sm. Prodr. I. Graec. 1372? — Cresdt In Messenia.

ft Species omnino Hubiae.

130. ST. DECUMBENS Pen. Encbrld. II. 143. - Bin. I. c. fitt. - Verticillastris multiflora approximata; braotela filiformis; foil, cordata denutli; caule decumbente villosa. 2|T - Corolla flava, 51. *dreinaiae* habita fimlif, Md folia alpiciter cordata el a braclea sub folia floralibus dilaeta. Canlla ramoana. — An* *St. mollissima?* — Habitat. T .

131. ST. VENOSA Pers. I. c. - Bin. I. c. — Foil. inferioribus spatulatis obtusis renalis petiolatis rubro-venosis, canilnis subrhomboidis; canle villosissimo; calyco laevi 2f! - Habitat. ?

132. ST. BETAEFOLIA Pers. I. c. 124. — Bib. I. c. — Foil, petiolatis cordalis inciso-renalis; spica compacta villosa. 2|? — Habitat. T

133. ST. BARBIGERA Viv. Fl. Cors. app. II. 4. - Bib. I. c. 566. t - Hirsula: caule ascendente; foil, cordatis ellipticis crenulatis, floralibus oralo-aculis calyces aequanlib.; bracteis ovaio-linearibus; verlicillastris 0-10-floris; calycibus regularibus. •tplanis; corolla exina lanau, labli inferioris laelna media obovata acuta lateralibus linearibus-oblongis duple longiore. %I — A 51. *tmiUntk**, eojna referi babulum, dfferl folia floralibus In bao Jlnaarl-UMCtlaia calyce dnplo lonfloribus, calycis dentibus lanceolalo-aemlnaUs, Mollae taelna meoia onnoalo-oboTau •wiarginaia. A *Si. Jferodea* habita el oaljee jprtelpae In nae lablato recedit — Jubliat In Corsica.

134. ST. MARRUBIIFOLU VIT. I. c. — Bib. 1. c. - Pills paleolibnis hrla: caule brachialo; foil, cordalis subrolando-ovalis crenatis, floralibus ovalis ellipticis, •pice spinosis; verlicillastris 6-floris; corollae (pnrpnae) labli inferioris lobli lateralibus abbrevialis, medio lobo galeaque emarginalis. ^ — In Corsica.

135. ST. VALENTINA Lag. Nov. gen. et spec. 18. - Blh. I. c. — Foil, oblongo-lanceolatis sabcordatis birtis; verlicillastris 6-7-floris, summls sterilibus. % — Habiat In Hispaniae collibus Engaerae oppidi In provincla Valentina.

130. ST. STENOPHYLLA Sprang. SysU vegetal. II. 734. - Bib. 1. c. - Suffruticota brsaliascola: ramis virgatis; foil, linearibus trinenriis, Inflmis sablanceolatis, ntrinque unidentatis; verlicillastris foliatis; calycibus pangenlibus. Of? — Habiat In Hispania australi.

137. ST. GLAUDESCENS Mussin ex Spreng. I. e. 730. — Caule erecto villosa; Toll cordatis acuminatis serratis, ultrinque biraatis; •erlicillastris apbyllis «plcais»; |acinis calycis divaricatis pungenlibus. %I — Habitat in Caucaso.

138. #ST. BIFLORA Hook. Bot. of Beech. Voy. 155.

t t + *Species e genere excludendae.*

ST. ARTEMISIAE Lour. = LEOMKLS SIBIRICUS.

ST. DECEUDENTATA Forst. = LEI CAS DECEMDENTAIA

ST. FOENICULUI Pursh. « LOPHANTHUS ANISATUS.

ST. MAURITIANA Pers. = ANISOMELES OVATA.

ST. PATENS Swartz. - HYPTIS VERTICILLATA.

ST. SALVIAE Lindl. - SPHACELE LINDLEYI.

ST. SPECIOSA Hook. - GARDOQUIA ELLIPTIGA.

ft ft *Betonica excludenda.*

B. LAEYIGATA Don. - NEPETA SPICATA.

3051. SPHACELE *Bth.*

(Bib. in Liodl. BoL RegisC ad U 1280. adnoL el Labiat gen. el apec. 567. — Meiso. Gener. plant, vaacul. I. 287. II. 106.)

1. SPH. SALVIAEFOLIA *Bth.* Labial, gener. et spec 367. f - Fruticosa: foil, oblongo-lanceolatis, basi rotundatis, supra nigoso-bollalis, subtus ramisq. canescentib.; Terlicillaatria plarifloris secundis, in racemis termioalib. aobramoalt piciformib. eongealia; eorollia calyce subbrevioribus. 6 — Rami lelragoni, pulvere ecneaeente conapersi et eiaaperali. Folia peliolala, oyato-lanceolata aut lanccolalo-oblonga oblnsitiscula, basi aabrolandata, margine crenulala, relicn-lalo-venosa, venis nervoque medio sablas prominentibus, scabriuscula el nigro-viridia, subtus relicuiata, 2-4 poll, looga, floralia bracleaeformia, calyces subaequantia ovala acuminata integerrima rogulost. Racemi lerminales sublerni densi, inlmedius duplo longior 2-3-pollicaris. Floras breviter pedicellati. Verlicillastrl 6-10-flori approximali. Bractea minulisslmae. Pedicelli el rbachis pubescentes. Calyi hispidulos, laciniis lanceolalo-sobalalis subacqualibus paiulis foliisque floralibus coeruleacensibus. Stylos glaber exsertus. Corolla albedo - cocrulescens calycem aubaequana, limbo brevissimo. — *Sidritis talviaefolia* II. B. Kth. NOT. g«u el spec Amer. II. 307. — Habitat in America aequinoctiali el in Columbia.
- S. SPH. 10LLAT4,94k I. c, SOB - Fralleosa: ramulls follsq. snblns cano-iomentosls, soprafMMirt^eA^i^Pflb tUonajIs oMosdf eorMIe eraavlatia; apldl congealis densis; florlb. obejaMt; braettlt ofalla, aplee bldenuUs; dentib. calycinis acominato-aubulatis. % — Ramoslaalma graveoleos, rami tetragon! gla²bri. Folia peliolata, margine reflexa, reticulalo-venosa, supra viridia, bipollicaria. Peioli semipollicares incano-lomenlosi. Spicae coroplures, in apice ramorum fasciculatim congestae sessiles cylindracaee sesquipollicares. Flores densi, breviter pedicellati, bractea communi auffulli. Bractea ovatae, apice bidentaiae, margine iolegerrimae reticulato-venosae pilosae, floribus longiores. Corolla[^] alba. — *SiderMs buUata* H. B. Klh. I. c. 300. - Habitat in America aequinoctiall/ in Andibus Novo-Granatensiom inter Paslo el Teindala.
3. SPH. PANICULATA Bib.I.e.- Suffrulicosa: ramiabirto-lomenlosis; foil, oblongis MgilUlo-cordalis acnlls crenato-dentais, supra rugoso-bullalis glabris, subWlenuiler Incano-pubescentib.; spiels paniculalis; florin, verticillaits; bracteis oralil dentibq. calyciols acnlls. % — Soffrului 3-4-pedalis graveolens, rami tetragool birto-tomeotosi. Folia reliculaio-veoost Iripollicaria el longiora, 16 lin. laU* Pelioll aubsemipollicares ineano-lomentofl. Panicula terminalis sessilis, sub-5-t pollicaris, ramis patulis tetragonis incano-lomentoais. Floret breviter pedicellalif verlicillastris sub-6-floris approximalis. Bracleae ovalae aculae iniegfrimaO reticulato-venosae hispidulae, flonbua duplo breviores. — *SiderUu panicuiti**. H. B. Klh. I. e. 307. t — Habitat In America aequinoctiali, in lempcratimont ^ul; Quilensium Juxla Tarqui.
4. SPH. CALYCINA *Bth.* L e t — Suffruticosa?: ramis molliter villosis; Toll, petio⁻latia ovaio-oblongis, basi rolondalis subrugosis villosis; racemis subsimplicib* aecundis; venicillastris bifloris remotis; calycib. amplis ^illosiaaimis; coroll' amplia calyces breviter aoperanlibos. 2f? — Rami herbaei? vix tetragoni. Folia 8-3-pollickaria, molliora el minus villosa quam in caeleria speciebus, margin* irregulariler denUU, floralit Inflma subeenormia, suprema parva bracteaeforml* ItaeoUu SfwIUa iniegerrima, calyce breviora. Racemi aemipedaes. Calyx fere

- pollicaris, ample campanulatus, denibus subaequalibus lalia. acuiig. Corolla al-bida? breviter exserta, limbi lobi superiores brevissimi, infimus duplo longior, lale rotundatus. — Habitat in California.
5. SPH. TOMENTOSA Bth. I. c. 500. — Suffrutescens prostrata: ramis ascendentibus. tomentosus-villosus; foliis, parvis oblongis, basi rotundato-subdilatatis rugosis, utrinque tomentosus; racemis laevibus scandentibus; verticillatis bifloris; corollis vix calyces excedentibus. 2. — Suffrutescens humilis divaricato-prostrata. Folia fere *Sph. subhastatae* semipollicaria, irregulariter et profunde crenata, valde rugosa, floralia subconformia, suprema sessilia* Calyces declinati, minores quam in *St. campanulata*. Corolla parum inflata pallida. — Habitat in Peruvia ad Cheachin.
- fl. SPH. CAMPANULATA Bth. in Lindl. Bot. Reg. adnol. ad I 1880. el Labial. 560. t — Frutescens: ramis divaricatis; foliis, parvis oblongo-lanceolatis, basi angustatis, *in praesentia bullato-rugosis viridibus, subtus cano-tomentosis; racemis laevibus secundis; verticillatis bifloris; corollis amplius calyce subduplo longioribus. § — Frutex * 8-3-pedalis, rami juniores tomentoso-pubescentes. Folia breviter petiolata semipollicaria v. vix pollicaria oblata, floralia subconformia, suprema parva integriora et minus rugosa. Calyces semipollicares, fructiferi ample campanulati reticulato-venosi, exlas tenuiter pubescentes. Corolla pallide coerulescens, faucibus amplius limbo, limbi lobi laevi erenolati. Summa corollam subaequantia. Stylus abaxialis. — *Rotmarinut Chilense* Molina, Hist. nat. Chl. 13? — *Dracoetaphalum chamaedryoides* Balb. Miscell. SO. - *Algae Lagum* Fentl. Pl. Chl. III. t. 1. — *Phytoxyt acidissima* Molina ex Spreng. Syst. vegetab. II. 710. — Habitat in Chili prope Valparaiso et la Concepcionem.
7. SPH. SUBHASTATA Bth. 1.1. c. c. — Frutescens: ramis tomentosus; foliis, oblongo-lanceolatis, basi truncato-subhastatis, supra viridibus bullato-rugosis, subtus albo-lomenosis; racemis laevibus simplicibus; verticillatis plurifloris; corollis calyce subduplo longioribus. 6 — Inter *Sph. campanulata* et *Sph. Lindleyi* media. Rami elongati divaricati lomenlosi. Folia vix pollicaria oblata crenulata, floralia minus bracteiformia integerrima acuta, minus rugosa. Verticillatis 4-6-floris, vix secundi. Flores pedicellati subnervi. Calyces subcolorati, denibus linearilobulatis aequalibus. Corolla coerulesca. Summa subaequantia. — Habitat in Chili prope Valparaiso.
8. SPH. LINDLEYI Bth. In Lindl. I. o. el Labial. Wpt f — Bot. Magac I, 229. — Frutescens: ramis floccoso-lanatis; foliis, ovatis, basi cordatis bullato-rugosis, subtus albo-lanatis; racemis simplicibus densis; verticillatis plurifloris; corollis calyce duplo longioribus. 6 — Frutex 3-4-pedalis. Rami erecti letragoni, juniorum lana alba dense vestiti, vetustiores glaberrimi. Folia 1/2-3-pollicaria, v. In exemplaribus cullis etiam majora, basi late et profunde cordata, auriculis rotundatis, floralia bracteiformia, calycibus subbreviora ovata acuminata sessilia integerrima. Calyces fructiferi 8-9 lin. longi rigidi lomenoso-villosi. Corolla purpureo-violacea ultra pollicaris, exclus pubescens, limbo majore quam in caeteris, subbilabiato, labio superiore erecto, inferiore subpatente. — *Stocky* Saltiae* Lindl. Bot. Reg. u 1290. — Habitat in Chili prope Valparaiso vulgaris.
9. SPH. LAMIIFOLIA Bth. Labial. 570. - Frutescens: ramis rufo-tomentosis; foliis, breviter petiolatis ovatis, basi cordatis villosis; rugosis subconcoloribus; racemis laevibus subramosis; verticillatis plurifloris; corollis longe exsertis. 5 — Rami dense rufo-lomenlosi. Folia obtusa crenata, subtus glandulosa, floralia sessilia laevi rotundaia, suprema acuminata glabra, pedicellis longiora. Verticillatis 4-6-floris. Pedunculi 3-lineares. Calyx fere *Sahiae* subbilabiatus campanulatus, dentibus selaceo-acuminatis. Corolla coccinea? sesquipollicaris, fere *Slachydii coccineae*, lobis brevibus. Stamina corollam aequantia. — Habitat in Pennia.
10. SPU. SPECIOSA St. Hill. r. ex Dill. I. c. - Frutescens: ramis rufo-tomentosis; foliis, petiolatis ovalo- v. oblongo-lanceolatis, basi late truncato-subcordatis, supra

bullalo-rngosissimis, gublas sublanalis, demum glabralis; racemig laxis pantculo-ramosis; verticillastris biQoris; corollis longe exsertis. 5 — Frutex 3-5-pcdalis, rami letragoni, juniores tomento denso subfloccoso vestili. Folia 3«0-pollicaria, subtas laconoso-rugosissima, jaoiora basi truncate, adulla subsagntalocordata, omnia margine daplicaio-crenulata, floralia panra braceaeformna acuminata sobintegerrima. Panicola subramosisuma, ramis rigidis pauciflons viscoso-pubescentibus. Pedicelli 2-4-lineares. Calyces floriferi 4-5, fructiferi 8-10 lin. longi, ample campanolali, dentibus æqnilongls, sed In labia 2 subdeJeciis, inrenonbas incunris, soperioribas recty, omnibus lanceolalis subulatio-acuminatis. Corolla rubro-tiolacea ultra pollioaris, tubo amplo, limbo brevisaimo. — Habiui in Brasilia, In ambrosia rapestribas in Serra do Papagaio provinciae Minaa Gene's.

3052. CCniWIA Colla.

(Colla, Memorie di Torino XXIVIII. 130. t 47. - Meisn. Gener. planUr. tucular. I. 287. 11. NO)

1. C. BRIANTHA Colla I. c. — Foil, serratis, sapra firfdib. glabris, anblus vlx tomentosis; cymis pedaneulatis corymbosis, denlib. calycinia ©rails; corollis calyce plus duplo longiorib., extna villosis. 5 — *Bysiropogini punctalo* ex habitu siml-hs, sed (bins acutis terratit el floribus differ!. Corollae 3 lin. longae, tubo basi tenui, extra calycem inflalo, laciniae panrae latae, supenores crectae, inferiores patentet, faux et tubi para superior intus lineis pilorum verticalibus dense villost* Stamina inclusa subaequalia, omnino *By\$tropoginit*. — *Bystropogon erianihut* Bih. LabiaL gener. el spec. 087. el Wiprt. Repert. bot. syst III.#087. no. 1. (ubi deleaior.) — in insula Joan Ferntndex btbiUL

3W0. UUPBCniOA WQUL

(Willd. Hon. B«fo» I gL - Mfjta. fiea^r. plant, voeoi L «. II. 190. - Bib. U-M d. ftMT. C4 tt«IV 41A)

1. L. SPICATA Willd. Hoit. Berol. I. fj. V tl. - Bot Regtat t Ittl. - Bth. I. c. f — Caule rrecllo; verticillastiis in splcam terminalem congestis; calycib. fruciiferis clansis. % — Caules l-l'/i-pedales tetragoni, pilis brevibus paucis pubescnteei! Folia subsessilia 2-0-pollicana o?ala oblusa crenulata, basi cuncala rugosa P«H-bescenlia, ulnoque viridia, floralia tub spica subcooformia raioora sessilia, m spica braceaeformia, calyces tubaequantia. Bracteac subnullac. Spica oblong% v. snbgloboaa l-l'/i-pollicans. Calyces pnbescentes, fructiferi valde inOati ei F**% bus incumbentibns denubnsqne longe anstalis inleiiexlis claosi. Corolla paff*/ flavescens. — *UorwUmmm canteens* Orleg. Dec. 03. — *Ilrici* pyrawtidatm* Ja*f» ei Steod. Non. boi. 413. (edit I.) - Uabiut in Mexico, in nmbrosif monU«* prope Ario el ftanU BOM de It Sierra, prope Xalapam.

% L. PROCUMBBFIS Bth. U | - Caule procumbeute; vertidtlaslriss secundia remotif; calyeib. fructlferis paientibut. q. — Bami berbacei mbsimplices rillosi tetragon i. Folia peliolaia, inferior! ovau, superiors oblonga, omnia obtusa crenamq batl Mbeordata, Soralia Infima sobcooformia seMilia, supenora parta b«te**** fonnla. Braetee minuee. Verticillasin paoei 0-10-0ori Calyces bretitrr dicellati declinati subnutantes pubeteenles, fructifen ample campanula!, deo ubns brevius anstalis quam in *L. fpico/o*. Corolla quam *L. tytcatu* parum longi^r* In Mexico babiut

t *Spteits e genre exctudmda**

L. CUNOPODIIFOLIA Willd. - MEMUA DAUBICA

Subtribus III- MARRUBIEAE End!. Gener. plant, p. '627.

Stamina corollae tubo inclusa.

3054. CRANIOTOME *Reichb.*

(Reichb. Flora exot. I. 39. t 54. - Meisn. Gener. plant vascul. I. 887. II. 196. - Blh. Labial, gener. el speo 701.)

1. C. VERSICOLOR *Reichb.* I. c. — Blh. I. c. — Herba erecta plaripedalis ramosa, rami graciles, patenlim pilosi. Folia pellolala ovata acamiaaia crenata, basi cordata, olinque piloso-hispida, Ooralia infima caulinis conformia, saperiora minora, sopra minala braceaeformia. Cymae laxae multiflorae pedunculatae racemosae, racemis gracilibus paniculalis. Flores minull numerosi, eleganter colore albo roseo el purpureo variegali. Braceae minulae. Calyces pubescentes, denlibus connivenlibus. Gorollae tabus calyce circiler daplo longior reclus erectus gracilis albus, limbus tubo brevior roseus Y. purpureus. — *Nepeta verticolor* *Treviran.* in Nov. act. acad. nat. cur. XIII. 183. - *Anisomeles Nepalensis* *Spreng.* *Byst veget.* II. 700. - *Ajuga furcala* *Lnk.* Enum. pi. hort Berol. 11. 99. — *Habi-Ul* in India orient!, in Nepalla, Kamaon el Silbel el in calldis regionis Thonna.

3055. SIDfiBITIS *Linn.*

(Linn. Gener. plant, no. 712. — Melan. Gener. plant Yascul. L 988L II. 190. — Bib. Labiat gener. et ipee. 570. el 741.)

SectloL MARBDBIASIRUM *Mieb.* Method. pL SiL - Btā. L a. W3.

Frulices molliter lanali, saepe nivel. Folia floralla herbacea inlegerrima Y. crenata, infima caulinis subconformia at mollo minora, auprema minuta.

1. S. MASSONIANA *Blh.* I. c. — Frulicosa, lana adpressa densa Candida: foil, oblongis, basi subcordatis cransis, subluft v. ulrinq. niveo-lanalis; racemis paniculalis; verlicillasris paucifloris. 6 — *AfBnis S. Creticae*, sed folia angustiora >ix crenata, in pagina superiore minus lanata. Yerlicillasri irregulariter 4-10-flori, iolcrrupio racemosi, racemis ditaricato-ramosis. Folia Doralia minora. Braectae evidcnliores. Calyces lana densissima obtecli. — In insula Madera.
- ft. 6. CANDIGANS *Ail.* Hort Kew. II. 880. - Bib. I. c f - FraUcosa, lana adpressa 'denſa candldat foil. oTalla subcreoatls, bail truneatU eordatlt eraaaU, airioq. ^dpresae lanaila, snbiai nlfels; racemis slmpUcUM vetUelllaatrIt paodfloris. 6 - Frotex habitu S. *Cmtarimrts*, ud loloa tana ilfta taiaa taptota obiMUw, nervi foliorum omnlno sub ea reeondltl. Potla l«l-potllearta obtarttalma, in*. gulariter v. obscure crenata, floralla Inflow subeonformla, superiora pana oblongo-lanceolala, calyces param excedenlla, ai omnla pellolala craaaa at niveo-lanata. Verticillasrl plerumque 10-florl, Inferlores distantes, snperloret approximati. Bractcac parvae seiaceae, sub lana recondiiae. Calyces tubteasllet subrcflcii, fere *Stachydit* sectionls *Ambkia*e crassl, nenrls sub tana recoodiilt, dentibus brcvibus oblusis. Corollae YIX calycem excedentes. — 5. *Cretica* *Linn.* *Spec. plant.* 801. — Habitat in insula Teneriffa, nee feroslmliler In Creu.
3. 8. MACROSTACDYS *Polr.* Diet Soppl. II. 381. - Blh. I. c f - FraUeosa, Una •dpresa densa Candida: foil, ovalis, basi tubcordatis, supra Intense vmdib, tubius candidissimis; verUcillasris muliiOoris, In splca crassa densissima imbri-cails. 6 — Species pulchra. Gaules lignosi crassi ramosi. Folia peiioala eordala erassa rugosa, supra fere glabra, aublus tomeolosa, margine erenau, Inferiora ampla subrolundala, superiora ovata obtusa, supra pubescenlla. Spicae recur rigidae crassissimae densae, 8-3-pollicares sobramosae. Flores sessiles et ita condensati ul verticillasri nonnisl foliis floralibus e spica eminentibus dibtm-guanlur. Calyces sub lana densa reeondili breves campanula*!, denlibus parvis acutiusculis S. *Canarientu.* Corolla calycem param excedens. — Habitat in insolifi Cananensibus.
4. 6. CANARIKNSIS *Linn.* *Spec. plant.* 801. - Jcq. Uorl. Vindobon. 1.18. t 30. - Blh. I. c. - Frulicosa villosio-lanata: foil, ovatis crcnalis, basi cordatis CMMIS ragoſis, subtus venosiu, ulrinq. veluuuo-lanalis; racemis simplicib.; verticilasiris

multiOoris disiinclis. 6 — Frutex plaripcdalis, rami crassi, oblate tetragon!, uti petioli lana densa subfloccosa albo-flavescente veslili. Folia 2-4-pollicaria, lana paginae superioris densa velutina, inferioris subfloccosa flavescente, superiora minora, floralia inflma subconformia flores rxcedenlia, superiora bracleaeformia calycibus breviora. Verlicillasri subglobosi, 20-30-flori densi, omnes distinct!, inferiores dislanles. Bracleae numcrosae subulaue, calycem aequantes. Calyces >irides villosi tubulosi, parum incurvi, denlibus saperioribus parum majoribus, omnibus aculis, apice rigidis ai non pungenlibus. Corollae flavescentes, tix denies calycinis excedentes, lubus^xannulatus, lablum superius breve lalum erectum plenum emarginato-bifidum, inferius parum longius patens. Stamina superiora brevissima, antheris bilocularibus, Inferlora duplo longiora (at tubo inclusa), antheris dimidiatis. Stylus in exemplarlrbua borlensibus saepe 4-5-fldus evadit, ovario 8-10-parllto. — *Marrubiaitrum lomentosum* Mocnch, Meth. plant. 3Pt — Habitat in insulis Teneriffa el Madera.

Settlê U. EMPEDOCLEA Hafn. ez Bth. 1. e. 674.

Suffrulices v. herbae perennes, basi lanali. Folia floralia Integerrima, flores sessiles ampleclentia.

5. S. SYRIACA Linn. Spec. plant. 801. — Rchb. Flor. exotic. I. 42. t. 57. — Siblbrp. ol Sui. Flor. Graec. VI. 41. L 550. — Bory et Chaubard, Flor. du Peloponn. 803. t I. 21. — Bib. I. c. f — Suffrulicosa albo-lanata: foil, crassis oblongo-lanceolatis, basi angustalialis, inGmis crenulalis, floralib. late cordatis inlegorrimis, calyces aequantib. calycibq. lana densa albida omnino oblectis. 5 — Planla tola lana densa albida interdum »ubsericea (minime flurcosa) oblclla. Caulcs basi lignosi ramosi dense folios!. Rami crecti v. ascendenies, circiler pdalcs, Mns disianilbos. Folia inlegerrima v. minute crenulaia, nenris sub laoa reconditls, floralit saeplw obuua caJyclbus snbbrevlora, rarioa breviler aoumlnau calyces subsuperantla, ai OOB SUIICT Una dfaaa oblteia. Terliollastrl O-IO-flori dUuntes. Calycis denies vlx sploosl aeqtfilM. Corolla oaljce tlx duplo longlor flava, eitûs sericeo-vllloia, tubos lotus obscure annulatus, labium superios bifldum. Sia—minum inferiorum anlberae biloculares, at superioribus m in ores, an sterile^? — Habitat in insulae Crctac monlibus el in Palacstina.
0. S. TALRICA N. Dirb. Fl. Taur. Cauc. II. 43. - Rcbb/ Plant, critic. IV. 01.1.384. - M. Bicherst. Cent. pi. rar. Ross. I. 1.39. — Bib. L e t — Suffrulicosa albo-lanata: foil, crassis oblongo-lanceolalis spatbulatisve, basi angustatis, infimis crenulali% ulring. dense albo-lanalis, floralib. lalissime cordalis acuminalis iniegerrimlf. venoso-rtticulatis laxc lanalis subviridib.; denlib. calycinis lanceolalis matiois* ½ — Valde affinii 5. *Syriacae*, el forsane ejus mera varietas, al differre videiur la^{ca} partis Inferioris brevlore candidiore el magi* adpressa, verlicillasri* praesertim superioribus approxinatis • folits floralibus majoribus longius acuminalis rigidis, uti calyces tomenlo lenul laxc pubescentibus nee dense lanalls el drnlibus calycini lalioribus. Corolla brevlor, labiis lalioribus. — *S. Syriaca* Pall. lod. Tauf. (oon Linn.) — 5. *ineana* Habl. Taur. 148. (non Linn.) — Habitat in apricis BIOB-tibusque calcareis Tauriae frequcos.
7. S. SCARDICA Griseb. Spicileg. flor. Rumel. II. 144. | - Suffrulicosa albo-lanaiaiai foil, oblongo-lanceolatis, basi angustalis; bracieis late cordato-subroiundit ^{coi*}pidalis virenlib. reticulato-venosis flores soperantib.; Terticillastris approximate calyct corollam flavam superante, denlib. lanreolato-acuminatis mulicis. % ''% 'Simillsjia 5. *Tauriae*, sed corolla a cal)ce inclusa el bractcis maximis differ** - * Crescu la Seardo.
8. S. SICL'U Ucria ex Guss. Prodr. n. Sicul. II. «5. - Bih. I. c. 575. - Suffrulicosa albo-lanata: foil, crassis obloogo-spalbulalis, basi angustalain, infenonb. ~~crena-~~ latis, ulring. lanatis, floralib. lalissime cordatis acuminalis inlegorrimis ~~venoso-~~ roUeulaUs laxo laotalis viridlb., calyces sobduplo tuperanlib.; denlib. ~~calycis~~ ^{vix} laAeoolatf-sobalaiis aeaiiasiaais subspinesceolibus. ^ - Haeo eUam species

- a *S. Syrtaca* distinguitur. Altior est et minus lanata. Folia longiora tenuiora, lana laxa subsessile. Verticillas in calyce majores. Folia floralia majora et tenuiora quam in *S. Taurica*, molliter villosa v. laxissime sublanata. — *S. Drullta* Ten Fl Neap II 16. — *Empedoclea montana* Raf Carall 78. — *S. decumbent* Moench, Melb plant 390². — *Isaucularia Ueuterx* Fabric⁹. — Habitat in Europa australi, in Hispania, Sicilia, Italia australi.
9. *S. LIBANOTICA* Labill Ic pi. Sjr rar IV 13 t t 8 - Bih 1 c - Suffruticosa, ramis simplicissimis glabris, foliis obovato-oblongis serratis lomenosis, verticillas distantibus, bracteis ovalis acuminatis nervoso-reticulatis 2l. — Caulis ramis ex plantae basi cernit simplicissimi recti glabris, pedales et ultra folia inferiora obovato-oblonga, in petiolum subdilatatum attenuata nudo-reticulata serrata, superiora lanceolata sessilia, adultiora multo minus cactens toraculosa. Verticillas inter se 1/2-pollicem et ultra distantes, 4-8-lin., bractea ciliata longitudine subpilosae. Calyx supra praesertim pilosus, lacinus 5 subaequalibus mucronatis. Corolla sulphurea, extus magis quam intus pilosa, labium inferius lacina media integerrima, tubus calycis longitudine. — In monte Libano.
10. *S. SIPYLEA* Boiss Diagnos plant nov orient V 32 | — Tota indumento densissimo brevi griseo pannosa caulibus erectis simplicibus v. ramosis, ramis elongatis striatis cauli subaequilongis; foliis oblongo-lanceolatis integerrimis, inflexis in petiolum brevissimae attenuatis obtusis, cactens sessilibus, basi rotundatis obtusiusculis, mucrone brevissimo obtuso callosa terminatis, verticillas parvis subglobosis compactis, omnibus distinctis ad apicem ramorum approximatis, foliis floralibus cernit integerrimis late ovalo-rotundatis, calyce subbreviter abrupte breviter acuminatis, calycis cernit glandulosi breviter tubulosi denibus villosis connatis breviter triangularibus mucicis, corollae parvae flatae exclusae calyce plus duplo longioribus tubo exserto % — Caulis pedales sesquipedales v. stricti, folia inferiora bipollicana, 6-8 lin. lata, verticillas parvi ad ramorum partem superiorem 7-10 mler sc 2-6 lin. distantes, (lores illis *S. Itbanohcae* fere minores, cui babilu affinis est. A *S. Synaca* distat indumento magis adpresso nec molliens, caule elato ramoso, verticillas numerosis, ciliatis denibus omnino mucicis et corollae tubo longioribus exserto. — Crescit in arenosis calcareis Sipylli circa Magnesium.
11. *S. PULLULANS* Venl. Hort. Celt. t OS. — Bib. I. e. f. - Suffruticosae caule basi sublanata, superne raris pubeacenie divaricata-ramosa; ML. ovalo-lanceolatis semi-amplexicaulibus rigidis veno-reticulatis, utrinque v. raris pubescentibus. r. lana laxissima canescentibus, floralibus late cordatis acuminatis Korea daplo iuperantibus | calycis viridis denibus subulatis iposis. % — Caulis rigidi duri, obtuse tetragoni. Folia caulina 2-3-pollicana, superiora et floralia 1-1/2-pollicana, basi dilatata cordata, omnia acuta, inferiora apice paucidentata, floralia saepius integerrima. Verticillas distantes, 6-10-lin. Calyces erecti subsessiles rigidi pubescentes, fauce inclusae dense pilosa, denibus brevibus. Corolla exclusae villosa. Stamina inferiorum antherae biloculares, loculis parvis subparallelis cassis superiorum antherae biloculares, loculis oblongo-linearibus divaricatis. — Habitat in Syria montibus prope Hierosolyma et Tzareh.
12. *S. DLRA* Bib 1 c 576. — Suffruticosa caule albo lanato, foliis sessilibus semi-amplexicaulibus lanceolatis acutis integerrimis rigidis, utrinque cano-tillo sublanatis, floralibus late cordatis calyces aequantibus integerrimis acuminatis, calycis mollioribus villosis denibus brevibus mucicis. 2l. — Habitu *S. Synacae* affinis, sed formae diversa, tota planta minus lanata et verticillas numerosiores remolliores. Folia 1-2-pollicaria crassa subpungentia. Racemi longi simplices verticillas subaequalibus. Folia floralia valde concava calyces amplectentia, acuminata paulo superante, caeterum breviora. — Habitat
13. *S. PERFOLIATA* Linn Spec plant 802 - Bih I c — Suffruticosa, basi villosa lanata caule piloso rigido, foliis semiamplexicaulibus ovato-oblongis lanceolatis utrinque submarginatis molliter mucosis subacuminatis, floralibus late cordatis acuminatis reticulatis, utrinque viridibus (lores duplo Miporanibus, calycibus viridis

- pilosi dentib lanccolato-subulatis acutissimis vlx splnosis. 2|. — Rami e basi subhgnosa erecli, 1-1'A-pedales, pauci divancali Folia 1¹/_j-2-pollicaria integer-
rima v paucidentata, basi saepe conoata, floralia palentia aculissima, basi cym-
biformia, valde dilatata. Verticil las tn omnes disliocti subdislanles, 6-15-flori.
Cdlycc* sessiles erecli tubulosi. Corolla flava, denies calycinis >ix excedens. —
Hlabiat in Europa australi, in Hispama, Sicilia el in Onenle.
- 14 S DISTANS Willd Spec, plant. HI. 06. — Bin. I. c. — Suffrulicosa incana: foil.
lanccolaiis inlegernmis aculis; florib. verlicillalo-spicalts, verlicillaslms distan-
tib; braceis cordatis acuminalis mucronalis nervoso-reliculalis. 2|. — Accedit ad
S *Taurtcam*, sed differ I folns aculis minus lomenlosis integemmis, caule lan-
tum tilloso, verlicillaslms remolis»imis, braceis fere glabris mucronalis, corollae
lubo calyce longiore, lacinia intermedia tabu Infenons oblusa nee emargmaU.
Folia radicalia incognita, caeleram tidelur habitu a S. *Taurtca* diversissima. —
Habitat in Oriente.
15. S. RUGOSA Poir Diet. Suppl II. 383. - Bib. I. c. - Suffrulicosa: fell, ovato-
lanceolatis cbstasis rugosis subdenialis incano-lomenlosis; verlicillaslris dislanlib.;
braceis integri* calycibq acuminalis, apice lomentoso-pilosis; ramis slnclis. 3>
— Caules graciles, 8-10-pollicares dun glabri, rami pauci rigidi glabn Folia
dxlanlia sessilia pollicana el ultra, dentibus obscuris, nenris prommenlibus, Ju-
niora tomenlo albo, in velustionbus evanido, indula. Bracleac (folia floralia *) la-
tae concavae. Calyces braceis longiores, dentibus reel is spinosis. — S. *rhyhdt**
Spreng Syst vegetab V. 044. — Habitat in Syria.
- 16 S AEGYPTIACA Pers. Encbmd. II. 117. - Bib. I. c. - Foil ovalis serratis In-
cams, Tenis aublus prominulis; caule lereti albo-tomentoso; verlicillaslms folio
subjeclis. % — Caulis allus. — Habitat in Aegyplo.

SecUoIH. EU8IDSRTI8 Bth. L o. 6 n.

StfflhiUeM villoil v. pills mollibns loblanall, rarios glabrali. Folia floralia
bractaeformla a«Mili«v, Utlaalne oordau, floras amplectaoitia veooio-reUeulaia,
margine spinoso-denuu. GaJyela dosua aeqoales aplnosi. Corolla denies ealycl-
nos parum excedens.

- 17 S. GRANDIFLORA Salim. mss. ex Bib. I. c. 577. f — Suffrulicosa raule laxe
lanato, foil oblongis oblusis crenalis, basi longe angustalis molliler villosis, (lo-
ralib. latisMmi* flores excedentib molliler villosis, apice obtuse acummatis, bail
margine subspinoso-denticulatis; verticillaitri» dis>ianlibus ^ — Habitus fere
S *Stculae* el folns florahbas vix spinoso-denlalis, inter *Empedoclcas* el *Eund**-
rUtdes media. Caules 1-1%-pedales, pilis longis mollibus laxis lanau. FolU
uinnque firidia Verticillastn densi 10-15-flori. Calyx eloogaio-campanulalaf*
molliler villosus, denlibai laoccolatis breviter spinulosis. Corolla magnitudUO
fere *Stachyot recta**, pallide lutea, tubas intus annulatus. Suminum infer! or am
anlberae feriiles, locnlis aobprrallelis, supeioram loculi divaricati — Habitat In
collibui Tingitania.
- ia S O\ATA Cav. Ic pi. rar. I. 36. t 48. - Bib. I. c. f — Suffrulicosa^f *viridis*
glabra t. subvillosa: foil. obloDgo-ovatit oblusis subsemlis, floralib ~~latissimis~~
florete excedeohb glabris v margine villosis pauciveoiit denlalo-spinosif;
verticillasiris approximalis spicatit. 3^? &* — Caules vix pedales telragoni sa[^]*
scabri, pilis paucis in parte topenore villosuli. Folia ftoferiora longe petiolaU#
I-1'/t-pollicana, petiolo basi eaulem bretiter amplectente, radicalia numero**
in caespitiem eongesta, caulims breviora alque latoria, supenora s«saillora **g^o~
stiora, OBBia paucivenia glabra el lucida, v. pilis paocis villosula, floralia ioBB«
ovaio-UBeeolaia, suptriora laliora quam longa, forma el proporuone ol in *Bm*~
pedoclns, aed margioe deolibiu in spina produclis nouu Spica densa lelragoof
tnuncialia. Vertleillatrlr aoxflon. Floras awailles Calyx tubulo»o-campanulaUi»
vindu, pilit paocU villo_{SM}(desrtiboa UoceoUio-iubtiUUi puagonlibus, .~~rac~~ f e n
bo x villoaa CorolU lolao-albicans, lablon Mperios iotegnim, iofenoris ~~lacinia~~
~~med~~ia sobraiaoda eranau. * Babiui in Hlpaola, in Biscaya

19. *S. SPINOSA* Lam. Diet II 100. — Bib. I. c. t - Suffrulkosa, molliier villosa, basi ramosa subviridis: foil, oblongo-lanceolalis mucronalis, margine aerralia subspinoso, floralib. lalis acuminalis flores excedenlib., margine denlalo-spinosis, omnib. sericeo-villosis; Terlicillasris approximatis apicalia. 3 — Rami rigidi erecli sricli subsimplices, pilis mollibus ereclo-palenlibus villosi. Folia inferiora basi in peiololum brevem anguslala, saepe obluse crenata, exiremiiale el crenalutaris nonnollis arislulis pungenlibus mucronatis, superiora longiora sessiliora, apinulis vaaidioribus, floralia sessilia, ovala v. ovalo-lanceolala acuminata, apice el denlibos longe spinescentibus, omnia rigida, subtus venosa, ulrinque pilis mollibus subsericeis veslita, juniora saepe canescentia. Flores fere *S. ovatae*. — *S. errata* Lag. Nov. gen. el sp. plant 18. — Dabital in Bispania el in Barbaria.
20. *S. ILICIFOLIA* Willd. Enum. pi. hort Berol. 606. - Bth. I. c. 578. t - Suffruticosa glabriuscula: foil, oblongo-lanceolalis, margine spinoso-serratis subincisis, floralib. lalis acuminalis flores excedenlib., margine denlalo-tpinobis, omnib. glabriusculis; verlicillasris omnibus remolia. % — Rami erecli sricli pedales el ultra, vix telragoni, fere glabri. Folia 1-2-pollicaria, inferiora petiolala, superiora sessilia amplexicaulia, supra subbuilala, sublus venosa, alrinque viridia glabra v. pilia paucia hirta, aplce denllbuaqae in apinam abeunlibus, floralia longe acuminata, basi denUU. Veriicillasri mullflorl densi, saepiua I'/i-i poll, dialantes. Calyces ovall sessiles, exlus et ad oa pilis longis molliier vllasi, denies subulalo-spinosi. Gorollae panrae. — Habital in Oriente at in Hispania?
21. *S. SCORDIODES* Linn. Spec. pi. 803. — Bth. I. e. 578. t — Suffruticosa: ramis decumbenlib. adscendenlib. v. subereclis laxe villosis v. rarias glabralis; foil, ovalis oblongis v. oblongo-linearib., basi anguslalis inciso-denlalis mulicis v. rarius subintegerrimis piloso-lanatis glabralisve, floralib. lalissimis calyces aequanlib. v. vix longiorib., margine spinoso-denlalis; verlicillasris villosulis, rarius glabralis, interruple v. dense spicalis. 2I. — Caules basi caespitoso-ramosi, rami in herbis montanis basi decumbenles, saepe elongati, in siccis aridis erecli scmi-pedales glabri, pubescentes v. in parte superioro villosi. Folia nunc glabra, ulrinque viridia, nunc pilis longis adpressis magis minusve canescentia, saepius sessilia v. breviur petiolau tempollicaria v. vix pollicaria venosa, saepe rugosa, deniibus paucia Irregularibus obtuala muliois v. rarlus mucronala. Spicae 1-3-pollicares. Verticillaalri saeplaa disUneU a<d approximail, rariu* omnea imbricati v. inreiores aubdisunlea. Folia floralia Inflaa, p?<<rUm lo exemplaribus
 ^ cullis, caulinis subconformia, caeiera omala vix acomlnau orbioulau amplexicaulia flavescenti-viridia relicolalo-venoa, laxe villotula, margine deniibus in spinam longam abeunlibus. Bracleae subnullae. Calycea aubcampanulalii villosi, dentibus spinescentibus lubum subaequanlibus. Corolla flaveacens, labio superiore pallidiore v. albo, denies calycinis parum excedens, tubus exannulaiun, ad inseriionem slaminum villosus, limbus exlus glaber. Antberae slaminum ioferiorum dimidiaiae.
- a. *grandiflora*: ramis snberelia rigidis; foil, obloogis viridib. villosis inciso-denutis; verlicillasris magni* subinlernpte spicaUs. — 5. *tubspinosa* Cav. 1c. pi. rar. 111. 5. t 200. — 5. *tpino\$*a Bth. Cat pi. Pyr. 121. (non Lam.)
- fi. *commutu*: ramis erecliusculis v. adscendenlib.; foil, obovalo-oblongis inciso-denlalis villosis, junlorib. caneacemib.; verlicillaalris spioosissimis inierrupte spicalis.
- y. *elongala*: ramis elongalis adscendenlib. v. ereclis; foil, oblongis v. oblongo-lanceolalis inciso-denlalis glabriusculis viridib.; verlicillasris ininterrupte v. rarius dense spicatis. — *S. hyttopifolia* Auct plur. — *S. foetida* Poir. Did Suppl. II. 382.-5. *hirta* Rolb, Catal. I. 67. - *S. hirleUa* Brot Fl. Lusit I! 161? — *S. fruticuloia* Pourr. Act acad. Tolos. 111. 328.
- i. *alpina*: — Knwls. el Wslscl. The Floral Cabel I. 65. f I. 31. - Ramis brevib. decumbfnlib.; foil, oblongo-ovatis paucidentalibus cano-villosis v. demum glabralis; terlicillasris dense v. bubinterrupte spicalis. — 5. *alpina* Vill. M

- Delph. II. 373. — *S. Pyrenaica* Poir. Did. Suppl. II. 383. - *S. crenata* Lapeyr. Hist. Abr. pi. Pyr. 331.
5. *glabrata*: ramis adscendentib.; Toll, oblongo-ovatis paucidentalis integerrimisve glabriusculis; verticillastris dense v. subinerrupte spicalis. — *S. hyisopifolia* Auct. plur.
- C- *angustifolia*: Toll, oblongo-linearib. glabriusculis. — *S. hyuopifo* Ua Lino. Spec, plant. 803.
- r. *incana* Isth. pi. Cat. Pyr. 121. — Foil, oblongo-linearib. cano-villosis. — *S. Pyrenaica* Endress, Pl. exs. In. ilin. Würlerob. — Habitat in Kuropa mediterranea occidental[^] in Uispania, Gallia mediterranea, Pedomontio, Helvetia australi, Sicilia, a. in rupesribus Pyrenacarum oricnlaliura prope Bagnols el in Hispania; /9. in siccis aridis Galliae mediterraneae et Hispaniae; r> i'' horlis communis, in Hispaniae montosis sylvestris? d. et e. in Pyrenacis edilioribus et alpbis Pedemontanls; C* et y. in Pyrenacis oricntalibus.
22. S. LEUCANTHA Cav. Ic. pi. rar. IV. 2. t. 301. - Bth. Labial, gen. et spec. 570. — Suffruicosa: ramis erectis strictis lomentosis; foil, linearib. subdentalis glabriusculis, ad axillas fasciculatis; spicis interruptis gracilib. glabriusculis; Toll, floralib. lalissimis calycem aequantib., margine spinoso-dentatis. 2]. — A .V. *scordifoliae* varietalibus angustifoliis differl foliis multo minoribus fere glabris, ad axillis fasciculatis et slatura minore graciliore. — Habitat in Hispaniae regno Valentino, in locis aridis calcareis in Urchillo moote alibique circa Orcolim.
23. S. PINGENS Bth. I. c — Sufrulicosa: ramis erectis strictis pubescentib.; foil, linearib. aculissimis pungeotib. inlegerrimis glabris; spicis densis tetragonis; foil, floralib. lalissimis calyces subduplo superantib., margine longe spinosodeutis. ^ — Spica fere *S. lerratat*, habitu ad descriptioem *S. fortentis* accedit, sed foliis oralibus diveraa. Folia pollicaria, Inferiora interdum vix pungentia. - Habitu lo Hitpaovia prope Valeociam.
24. S. ARBORESCENS Saltm. Blh., 1. C-BOIM. Voyage bot. dans le midi de l'Espagne KM7. f 1. 146. — FraUeovia: ramis erectis subbifariam lanuginosis; foil, oblongo lanceolatis inciso-dentatis glabris, floralib. lalissimis calyces aequantib. reticulato-venosis sublanalis, margine subspinoso-dentatis; verticillastris niulifloris hirsutis distinctis approximatis subpicilis. vS — Frulex 5-pedals, rjmi iuniores acute Icragoni. Folia subscilla ix pullicaria, basi angustata, us apicem acute dentata laeviuscula, siccitate nigrescentia. Spicac terminale*. 3-0-pollicares, pallide virides et villosae. Verticillastris O-JU-flori globosis. Hnrlcae orbiculatae reticulato-venosae. Calyces campanulato-dentati lali, uli denies foliorum floralium breviter mucronati vix tp.oost. Corolla pallide lutca. — Habitat in Hispaniae monte Gibrallarico.
- IS. S. CAVIMLESII Lag. Nov. pi. gen. et tp. 18. - Bth. I. c. W - Subinrana: foil, lanceolatis dentato-terralis; spica elongata; verticillastris distinctis; bracteae cordato-orbicularis spinoso-dentatis. ^ — Caulis lomentosus et hirsutus. Folia subtus parvipuc tomentosa, magis minusve incana. Corolla flat a. -- s. *scardoidet* Cav. Ic. pi. rar. IV. 2. U 303. non Linn. sec. Laga<ca: -- Hirsutus in Hispaniae locis* monochloris Valentini circa Matrilum et in velere Ca^irllj.
- ». S. II IRS' ITA Linn. Spec. pi. 803. - Cav. I. c. I. I. 301. - Bid. I. c. Suffruticosa: ramis decumbentibus piloso-hinutissimis; foil, oblongis ovatis incisodentatis, basi angustatis hirsutis, floralibus lalissimis ramis arquantibus marginem subspinato-dentatis; verticillastris globosis hirsutis omnibus remotis. ^ — Foliorum forma fere *S. trordiniit* ? communis, a qua differl habitu et hirsutie. Verticillastris arpiu« ulira-10-flun, plu* pollicis di<tanto«. Folij floralia ix spinosa. Flore« *S. arboriscenti*. - V. *scardioitn*, *ar. *lamala* rl /ato-folia Bth. Cat. p. p., r. |i|. . s. *lomenlo* \$a Pourr. An. ac<J. Tolov III- 321. — *S. Uippanica* Mill. Did. no. 7. - Habitat in Kuropa mediterranea oricnrali in Uitpaovia, Catalonia, Arragonia, Gallia (arboorea), Occitania, C. i. P. ed. U. e.

27. *S. CIAMAEDRVFOLIA* Cav. Ic. pi rar. 4. I I. 301. - Blh. I. c. - Suffrulososa ramis ascendentibus. ullosulis; foil oblongi* cuncaiisve inciso-dentatis, basi angustalis iubitilosis, norolib. laisbimib calyces acquanlib., margine subspinoso-dentatib, \crticillailris gldbnusculis villosulisve, omb. remods. 3|. — A *S. Airtuta* VII nisi glabritio differt. Verlicillastri sacpius mi no res. Folia floralia majora, in verticillastro fructifero rarus reflexa — Habitat in Hispama, in regno Valentino inter Bocayrenl et Danercs.
28. *S. VIRGATA* Desfonl. Flor. Allant. II 15 t. 125 — Bib. 1. c. — Suffrulososa ramis ascendenhb. v. subereclis sfricus toraenoso-pubescentib.; Toll, oblongo-linearib integernmis v. rarus paucidentalib, basi angustalis, floralib. latis!>iniis calyces acquanlib., margine spinoso-dentatis; verlicillasins villosulis, omb diilantibuv 2I — Affim* *S. scordiotdt C anguttfohae* el *S. tncanae* A priori differt foliis fere semper sessilibus angustionibus, rarus dentali* el \erlicillastn-, remois, a *S. tncana* caulibus minus tomentosi*, folus ocutionbus, flora - Itbus ul in *S. Mcordtotdc* calyces aequanlibus v. supcranlibus, marine dentibusque calycims spinosis. — 5. *tncana* Cat an. Icon, plant, rar. 11. 00 t 180 *S angustifoha* Lam. Diet. II. 108. — 5. *Unearifolta* Lag. Nov. gen. cl sp pi. 18' — Habitat in lli>pama mediterranea el in arenotii prope Mascar Africa© borealis.
29. *S. TRAGORIGANUM* Lag. NOT. gen. ei tp. pi. 18. — Bib. I. c 381. — Suffrull-cosa: ramis adscendentib. v. subereclis lomeoloso-lanalis; foil, oblongo-linearib. oblusis integernmis, basi angustalis sublanalis, floralib. lalissimis calyces acquanlib. spinoso-dentatis; verlicillastri villosulis ininterrupte spicatis. 2I, — A *S. tcordtoule JJ. tncana* differt caulibus basi albo-lanalis el folus longionbus plants constanler inlegerrimis, a 5. *vtrgala* verticillaslris approximatis, a *S. tnrana* foili> flonlibus majonbus calycibusque magis spinosis, calycibus gl. libn» >illo—sulisve nec albo-lanali!>. — *S. tuffruUcota* Mill. Diet. no. 4? — Habitat in llii-pamac rpgm* Murcia el Valentia et in Greta.
30. *S. IMIA>A* Linn. Spec plant, 802. — Blh. I. c — Suffrulloha ramis albo-Uinatib tomentosi^c, foil oblongo-hncanb. oblusis inlegprimis, ulrinq pracsertim Junionb. albo-lanatis, floralib. lalissimis subpalmatifidis, calyce broiorib subspinosis; vertfcillaslris disUnlib.; calycib. albo-lanatis. ^ - Uabilus fere *Urandulae Spicae*. Lana foliorum Juniorum et ramorum partis inferioris densa nna Folia V:-IV,-pollcacia sessilia, basi vlx angustula, superior! renou parva, floralia constanter calycibus breviora vU splnosa, VerllellUflrl subse&flori. Corolla lutca. — Habitat in Hispania.
31. *S. SERIT^EA* Pers. Encbmd. If. 118. — Blh. I. c. 741. (el 582.) - Suffrulososa albo-lanaia foil, oblongo-linearib. spaibulalisvo oblusis integernmis, ulrinq. dense albo-lanalis, floralib subpalmatifidis calyce brevionb. subspinosis; verlicillasirib distantib., calycib. albo-lanatis. 2|. - Affinis *S. tncanae* sed lana multo densior et folia floralia breuora vix denlaia. — Crescit in llihpama
32. *S. GLAUCA* Cavan. Icon, plant, rar. 11. 08 1. 185. - Blh. I. c 742. (el 581.) - Suffrulososa glabra glauce>cens. foil, oblongo-linearib. oblusis integerrimn, dorolib. latis obtusis integernmis v. subdentatis, calyce subbreuionb.; verlicilljsiri* dfstantib, calycib. glabernmis glaucis, denlib. oblusis. ^ — Specie* ex liabilu *S. ineanae* afGnis sed pracler glabrilicm el glaucescentiam distinctisbima esl ralycibus folnsque lloralibus oblusis, mimce spinosis Bracteac saepe adsunt caljcc dimidio breviores. — Crescit in lliispamac montibus Orcellitam^
33. *S. FOETENS* Lag ISO\ gen. et sp. plant. 18. - Blh. 1 c. 581 - Suffrulososa foil, hnearib glabns aculi>, spicis dvnsis; calycib. rructeicontib fauce barbais 2|. — Suffruicx sesqmulnans caulis ramique virgaii junciforrms glabn |>o-duncuii >illosi Spicae cylmdncac, I^/ -5 poll, longae, \cricillasins 12-24 v| ultra, dense imbricalis Bracleao o>aiao subcordalac, profunde inci>o-^rranr, dcnibus subul.ito-ariMali!>_r urlicillailro brmori's. (alycis denies hiibulaio-analali, faux pilii lonni> dense barb.iUi < orolla longuudmo CJIUIS, alba - llabii.it ^n lliispamae regno (jranalcnm et prope >^.<r oppidum

34. *S. LASMNTBA* Pers. Enchirid. II. 117. — Bib. I. c. - Foil, ovalis, dentib. spinulosis; verticillaslr̄is villosissimis. 2J.? — *S. Hispanica foetidissima, flore purpurea* cenle et coma caneseenie Toorn. Insl. rei berb. 102. — In Hispania.
35. *S. GRISPATA* Willd. Enum. pi. bort. Berol. 006. (in not.) — Bib. I. c. 382. - Hirsute: foil, obloogo-cuneatis denlalis undulalis, sabtus lomenlosis; braceis orbfcularis spinoso-dentatis; verlicillaslr̄is diatanlibus. 2J.? — Folia admodam parva andulata. — Habitat ad Gibrallariam.

Sectio IV. HB8I0DIA Bth. 1. o. 582.

Herbae annuae virides, pilis mollibus sublanatae. Folia floralia caulinis subconformia at minora subdentata, dentibua moticia. Calyces dentibus nunc omnibus subaequalibus, tribus superloribus bast snbconaeiis obscure bilabiati, nunc denie supremo maiimo, inferioribus omnibus mullo angustioribus aequalibus. Corolla dentibus ealycinis plcruaquo brevior.

38. *B. LAI9ATA LIBB.* Spot, pi. 804. - Bib. 1. c t — Molliier piloso-lanala: Toll. ovatis, basl rotundatis, floralib. ovalis crenulaUs; calycis molliter lanati subviridis subbilabiati deotib. Ianceolato-subulalis acuminalo-subspinosis, supremo infimis duplo majore. Q — Herbae semipedalei T. viz pcdales, habitn fere *Stahyos annuae*. Caules erecti sobramosi, uti folia et praesertim calyces pilis Ion*gis mollibus fessliti. Folia 1-1'A-pollicaria, atrinque viridia, peliolo saepius dilauto, floralia subconformia gradaiim minora sessiliora inlegriora acuiiora et densius lanala, omnia flores eicedenlia. Verticlllastri sexflori, omnes dislanies. Calyces breviler pedicellati subreflexi, magniludioe *S. Romanae*, at denies angustiores, minus iaaequales. Corollae denle ealycis supremo breviores, basi Havesccntea, labiis apke nigrieantibus. Filameola pilosa. — *S. elegant MUTT.* NOV. COM. Gfttl. 1778. U i - 5 . *nigrietms* Pen. Eoehirid. 11. 117. - *Marrubiaslr̄um eUgom* Motfich, Meth. 'pU 301. — BaMui in regioM mediterranea orientali, in agro Cartonsl# la arris lasolaa Lerl freqoaDs, to Greu el prope Smyrnam.
37. *S. PURPUREA* H. P. Talbot ana. at BUK I. e. 742. — Holliter villosissima viridis: foil, oblongo-ovatis, floralib. inferlorth. conformlb. dentatis, sopremis ovaio-lanceolatis aculis subinlegerrimis; calycis pilosi denlib. aristato-mucmnaiis, supremo matirao ovalo, inferiorib. lancoolato-subulatis; corollae purpurascens galea oblonga. Q — | *S. Romano* difièri caule, foliis calycibusque pilis mollibus longis dense obsilis el praesertim corotlis purpureis nee flavescentibus, galea longiore mullo angustiore. — *Sideritis Cretica maxima Ocimi Valentini fact** Tourn. Hb. — Crescit in insulif Corfo et Zante.
38. *S. ROMANA* Linn. Spec. plant. 802. — Cavan. Icon, plant rar. II. 60. L 187. - Siblbrp. et Sm. Flor. Graec VI. 43. L M2. - Bib. I. c. 582. t - Molliter piloso-aublanala viridis: foil, oblongo-ovalis, floralib. ovalo-lanceolalis denlalis; calyci* glabriaacnli denlib. arislato-mucronalis, supremo maiimo ovalo, inferiorib. Ian*ceolato-sobulatia. %' — Caules basi ramosi erecii v. adscendenies, vii seroipedales, uli folia et calyces pilis longis mollibus albidis vestiti, fere a basi Dorlferi* Folia inflma petiolaia obiusa crenata, bani angusiala, floralia sessiliora acutlorat omnia flores ezcedenlia rogosa, utrinque viridia. Verticillastri sexflori distaote** Bractae sabnullae. Calyces subsessiles ovato-tubolosi, basi subgibbi rigid! 10* nervii virides, dens supremus dilalalus inferioribus inter se aequalibus quadrapi* lalior, omnes arista subolata pungentes, faui intus villis clausa. Corolla flavet* cena. — *S. tpalhulata* Lam. Fl. Fr. II. 377. - *Burgsdorffia rigida* Moench, M^{etb}* plaat. 302. — *Burgtdorffia Roman** Uoffm. et Lnk. Fl. Porl. - Habitat in regionls medtierraeae coltis el rudcratis frequens, in Hispania, Gallia mediiterraneif in Italia a Pedemonlio ad regnum Neapolitanum, in Sicilia, in Barbaria prope M Calle, in insulis Meliu et Leri, in Graecia ct insulis Arcbipelagi, in Syria proP^e Aleppo.
- 3*. & APPROXIMATA Gaspaiini |n Guss. Prodr. fl. Sicul. Suppl. 101. - Bib. I. c. 742. — Ebracteata, deaae villosoblrsuu: foil, oblongls crenaio-denUlis io P^etolalaa atlaaaus, floralib. eaJycca aaaaaUb.; •arUdllaaria a basl **approximatis**

in spicam elongatam; dentib. calycinis spinosis pungentib., supremo orato. 2I?
— Habitus *S. Romanae*, sed rami pauci erecti v. nulli, verticillastri confertissimi, plurimum ab ipsa caulis basi in spicam 2-0-pollicarem dispositi, dentes calycinis spinula brevi terminali. — In pascuis maritimis Siciliae prope Seeiara.

- 4a *S. MONTANA* Linn. Spec. plant. 802. - Jacq Flor. Austr. V. 16. t 434. — Bib. I. c. 583. — Ascendens: caule laxo piloso-lanato; foliis, oblongo-lanceolatis, basi angustatis, floralibus aristatis subdentatis; calycis viridis glabriusculi subbilabiali dentibus omnibus ovalis aristato-mucronatis, demum palenlibus. O — Habitus fere *S. Romanae*, sed elatior, verticillastri numerosioribus et dentibus calycinis omnibus subaequalibus distinctissima. Dentes 3 superiores minus profunde fissi quam inferiores. Gorollae labium superius integrum subconcauum. — *Hesiodia bicolor* Moench, Melh. plant. 302. - *Uetiodia montana* Dumort. Florui. Belgic. 44. — Habitat in Europae australis, praesertim orientalis et Asiae mediae arvis, in Hispania, Galliae australis montosis, Italia, Sicilia, Dalmatia, Syria prope Aleppo, in Tauria, Caucaso et in Tschingislan deserti Soongarico-Kirghisici.
41. *S. REMOTA* D'Urv. in Hém. Soc. Linn. Par. 382. — Bth. I. c. — Ramis elongatis divaricatis subvillosis lanatisve; foliis oblongo-lanceolatis, basi angustatis, floralibus obtusis mucronatis; calycis viridis glabriusculi subbilabiali dentibus omnibus ovalis mucronatis, demum palenlibus. O — *monUmos* valde affinis, sed distincta videtur habitu validiore et praesertim calycis lobis alba nec pilis longis pubescentibus vestitis. Foras *S. monUma* mera varietas. — *S. lanata* Hochst. et Steud. Plant. exsicc. (non Linn.) — *S. moniama* Sibthorp. et Sm. Flor. Graec. VI. 42. U 551. (non Linn.) - Habitat in Archipelago Graeci insulae Sarcos collibus, in collinis et montosis Smyrnae et in siccis pelosisque Graeciae.

t *Species non satis notae.*

42. *S. BOSEA* Desf. in Ann. mus. Par. X. 302. t I- 24. - Bib. I. c. 504. - Villosa: foliis ovato-oblongis obtusis sessilibus crenatis; floralibus geminis axillaribus; calycibus muticis. 2I — Tota planta lomenlo tenui adpresso canescens, habitu et foliis *Teucrio Scordio* similis. Caulis erectus ramosus tetragonus 8-12-pollicaris. Folia parum distantia, 0-10 lin. longa, 4-5 lata. Flores subsessile. Calyx dilatatus, bractea 2 lanceolatae, dentes 5 ovati aequales mutici. Corolla pallide rosea, tubus calycem aequans, labium superius fornicatum obtusum integrum, inferius obtuse trilobum, lacina intermedia apice dilata, lateralibus avulso latior. Stamina intra tubum inclusa. — Habitat in Aegypto.
43. *S. TOMENTOSA* Ucria msn. ex Guss. Prodr. flor. Sicul. Suppl. 102. — Bib. I. c. 742. — Foliis ovato-lanceolatis dentatis incanis; floralibus verticillato-spicalit; tipicis foliosis. 2I? — Crescit in Sicilia.

ft *Species dubiae.*

44. *S. CILIATA* Thuob. Flor. Japon. 245. — Blh. I. c. 584. — Herbacea: foliis ovalis serratis; bracteis ciliatis. 3IT — Caulis herbaceus tetragonus erectus, vix tola planus villosus, pedalis et ultra, ramulosus. Folia petiolata ovata acuta serrata, aubus pallida, supra punctis impressis adspersa, vix pollicaria. Petiolus folio paulo brevior. Florum spicae terminales lanceolatae erectae digilales. Bractea suborbiculatae acuminate nervosae ciliatae imbricatae. — Habitat in Japooia.
43. **S. PARVIFOLIA* Lam. Illuslr. gener. plant I. 505. fig. 2.
46. **S. PROSTRATA* Zucc. ex Steud. Norn. bot. 770. (edit 1.)
47. **S. TEUCRIIFOLIA* Juss. ex Sleud. I. c.

t t t *Species e genere excludendae. '*

- S. ALOPECUROS* Scop. «- *STACHYS ALOPECUROS*.
S. BULLATA H. B. Kth. - *SPHACELE BULLATA*.
S. CALYGANTUA Bieb. - *STACHYS LAVANDULAEFOLIA*.
S. DECUMBENS Thunb. - *STACHYS LAMARCKU*.
• *S. UERACLEA* Col. -> *STACHYS HERAEA*.
S. URSUTA Gou. » *STACHYS RECTA*.

- S niRSUTA Sieb = STACnYS ITALICA
 S. OCMASTRUM Gou = STACIIYS DIRTA.
 , S PALLIDA Thunb — STACIIYS ROSMARINIFOLIA
 S PAINICLLATA II B. Kih. = SPDACELE PAMCLLATA.
 S PLUMOSA Thunb. = STACIHS IISTEGRIFOLIA.
 S RIGOSA Thunb = STACDYS BLRGHELLII
 S. SALVIAEFOLIA II B. Kih. - SPUACELE SVLVIAEFOLIA

3657. M/tRRIBIIM Linn.

(Linn Gcner. plant, no. 721. — Meisn. Gener. plant, vascular. 1. 287. II. 100. — Bib. Labial, gencr. cl spec. 585. el 742.)

Seotio L LA60P8I8 Bnge. mss. ex Bth. 1. e. 586.

Galycis dentes quinque. Corollae tubus exannulatus, labium superius integrum. Folia rotundata palmatifida.

1. M. INCISULF Bib. I c. 586. — Folia rotundatis subpalmato-lobatis incisae, ulnq. subviridibus; bracteis selaccis; calycibus glabris vix tomentosis, dentibus 5 selaccis, corollae labio superiore oblongo integro. 2}. — Caulis ascendentes 3-6-pollicares, obtuse tetragoni, tenuiter pubescentes. Folia circumscriptione orbiculata, profunde incisa, lobis obtusis latiusculis, utrinque Mridia v. subtus pallida, tenuissime pubescentia. Verlicillata 6-10-flora. Calyces et bractae fere Leonuri Marrubium Corolla exclusa villosula albida, calyce dimidio longior Species cononurus affinis, sed gemmata et achaema oranina Blarrubis. — Leonurus tupa-nut Willd Spec, plant III. 116. — Habitat in Sibira orientali, Dahuria et in China prope Peking.
2. H. ERIOSTACHYUM Bib. I e t - Folia rotundatis palmato-lobatis incisae, ulnq. viridibus; bracteis rigidis subulatis; calycibus dense lanatis dentibus 5 subulatis spinetibus; corollae labio superiore abbreviate integro. 3} — Caulis ascendentes semipedales, aevte tetragoni, anperne Una longa laza v. bati glabra. Folia caulina pauca longe petiolata, limbo laxe pollicari crassiusculo, utrinque tenuiter pubescente, subtus nervoso, fere ad basin 5-7-partito, lobis incisae, lanatis lobis obtusis, floralia miora minus incisa angustiora magis pubescentia, at omnia Mndia, floret exsertentia. Verlicillata 6-10-flora, infima distincta, superiores in spicam densam lana longa alba laxa obtusam approximata Bractae subulatae rigidae subspicatae. Calyces ample lobulati, dentes rui erecti v. per anthesin patentes parum longiores Corolla if. lanata — Leonurus enostachyus Turczan. m. — Lagotis undulata Bunge mss. — Habitat in Asia Sibira ad fines Mongoliae.
3. M. LANATLV Bib. I. c. 587 f - Folia rotundatis inciso-lobatis, ulnq. albo-lanatis, bracteis setaceis, calycibus densissime lanatis, deolib. 5 subulatis subpinnatis, corollae labio superiore abbreviate integro. — Caulis o basi eras perenni numerosi decumbentes, apice ascendentes albo-lanati Folia forma M. eriostachyos at minus profunde incisa rugosiora et utrinque lana brevis laxa alba oblecta Verlicillata 6-10-flora, infima distincta, superiores in spicam densam lanatam approximata Bractae uli dentes calycini subulatae, apice subspicatae Cornellae vix e tubo calycis exsertae nigro-fuscae, exclusa villosa, lobis inferioris lacunae uli labium superius integerrimum. Annulus intra lobum nullus Stamina vix breviter lima, inferiora duplo longiora, alba breviora Antherarum loruli divergentes Stylus lamibus superius longior, inferioribus brevior, lobis breviter obtusis aequales Achaema oblonga, basi angustata, apice obtusa nec truncata — Leonurus Marrubium Steph in Mem. soc. nal. Mosc. II 8 - I edeb Icon. pl. flor. Ross. Alt. illustr. I 150 - Lagotis tneana Bunge mss. - Habitat in Alpibus Altaicis, in apricis lapidosis ad Tschum fluvium
4. M. FLAMM Wlprs. m. - Folia cordatis 3-5-partitis rauleq. albo-villois Inflorescentia caealis 3-5-floris, Verlicillata subspicata lanugmosa, lobis inferioribus corollae lobo medio piano emarginato. 2} - Planta homilifera 8-5-pollicaris

If. *lanato* quam maxime affine, tamen minus villosum, foliis profuodius incis, segmenlis cunealis paucidentalis, corollis flavis el labii inferioris lacinia media marginibus non inflexa atque emarginala differt. - *Lagopsis flava* Karel. el Kiril. Bullet, de Moscou XV. 425. — Crescit in glareosis summorum alpium AlaUu ad fontes fluvii Sarchan.

Seotio II. MARRUBIUM Bth. 1. o. 587.

Calycis dentes 5-10. Corollae lobus subannulatus, labium superius emarginatum v. bifidum. Folia rotundata v. ovala crenata v. rarius incisa.

5. M. VAILLANTH Cosson el Germain, Annales des sc nat. (2. Sér.) XX. 203. t. 15. — Caulibus erectis ramosis; ramis erectis albo-lanatis; foliis rugosis, basi cunealis, sensim in petiolum longum attenuatis, apice palmato-incis, lobis integris v. grosse dentalis inaequalibus, supra subviridibus, sublus albo-lanatis, inferioribus 5-7-lobatis, floralibus 3-5-lobatis, glomerulos longe superantibus; pluraerulis (verticillatis) axillaribus nullifloris; bracteis subulalis calycem subaequantibus; calyce villosulo-lanato, laciniis 10-15 el ultra subulatis, apice glabris uncinatis; corollae tubo subannulato, labio superiore bifido, lobis magis minusve divergentibus, labio inferiore obscure trilobo, lobo medio latiore emarginato, lateralibus saepe inaequalibus v. evanidis. 2]. — *Marrubium folio palmato v. digitato* Vaill. Herb. — Crescit rarissime in Gallia (Elr6cby prope Elampes).
6. M. ALYSSON Linn. Spec. plant. 815. — Bib. I. c. t — Foliis subrotundatis, basi cunealis inciso-crenatis lobatisve, utrinque mollissime albo-villosis; bracteis subnullis; calycibus lanatis, dentibus 5 rigidis patentibus; corollae labio superiore brevi emarginato-bifido. 2]. — Caules crassi semipedales v. vix pedales, basi raris adscendentibus, lana densa adpressa indurati. Folia omnia basi cuneiformia integer rimata, apice obtuse el profunde crenata v. lobata, venis sublus >alve clavalis subplicata, utrinque pilis mollissimis albidis subscriccis vesiculis, floralia omnia coniformia, floribus duplo el ultra longiora. Verticillastri secus ramos fere a basi distincti, omnes distantes, saepius 10-15—flori. Bracteae subnullae. Calyces sessiles rigidi tubulosi, excluso scricco-lanati, fauce inclusis lana clausa, dentes lanceolati pungentes duri stellato-paleates. Corolla minula, limbus dentibus calycinis brevifloris labia tubaequalla, superius emarginato-bifida. — *M. pliealum* Forsk. Fl. Aegypt Arab. 313. — Habitat in regione mediterranea, in Italia, Sardinia, Apulia el prope Alexandrian).
7. M. PERSICUM C. A. Meyer, Enom. pi. Caes. Casp. 05. - Bib. I. e. — Pollinis orbiculatis crenatis, utrinque nereo-lanatis; bracteis subnullis; calycibus lanatis, dentibus 5 rigidis patentibus; corollae labio superiore oblongo, apice bifido. 2]. — Habitus, folia el inflorescentia fere *M. vulgaris*, sed ex omni parte lana candidissima vesiculosa. Flores fere *M. Alytti*, at in verticillastro numerosiores. Calyx minor, densius lanatus. Corolla parum major. — Habitat in Persiae Caspicae locis sicclis lapidosis montium Talysch prope pagum Swant.
8. M. COERULESCENS Desf. Cat. hort. Par. (edit. 3.) 305. - Bib. I. c. 588. — Caule elato albo-lanato; foliis ovalis, apice crenatis vix rugosis, supra viridibus, sublus cinescentibus; bracteis exterioribus calyce brevioribus; calycibus albo-lanatis, dentibus 5 subulalis reclinatis patentibus; corollae galea oblonga, apice bifida. ^ — Caule 2-3-pedales erecti. Folia forma *M. Astracanicis*, sed juniora sublus albo-iomentosa v. lanata, adula fere glabra parum rugosa. Flores minores laxiores. Calyces fructiferi fere *M. Alyai*. — Habitat in Persia.
9. M. CATARIAEFOLIUM Desr. in Lam. Diet III. 717. — Bl. 1. c. — Caule cano-tomentoso; foliis ovatis crenatis subrugosis pubescentibus, sublus canescentibus; bracteis exterioribus calyce brevioribus; calycibus cano-iomentosis, dentibus 5 brevibus rigidis patentissimis recurvis; corollae galea oblonga, apice bifida. ^ — *M. Attracanicis* affinis, sed erectius ramosius cano-loraentosa, nee lanatum, nee villosum. Verticillastri numerosiores minores. Flores minores el folia diversa. Corollae auctae. — Habitat in Cappadocia.

10. *M. ASTRACANICUM* Jacq. Icon, plant. rar. I. 11. t. 109. - Bin. I. c. f - Rchb. Plant, critic. III. 61 1 270. — Caule laxo villosulo sublano; fol. ovalis, apice ere-nans bullato-rugosis; ulnq. villosis vindib. \ix subtus canescentib.; bracteis exteriorib. calyce brevionb.; calycib. pubescentib., denlib. 5 brevib. acutis reclis T. subrecurvis; corollae galea oblonga, apice bifida. ty — Habita inter *M. candidum* et *M. leuroidem* media. Caulis pars inferior et foliorum inferiorum pagina inferior pilis longis mollissimis teslita. Folia multo rugosiora quam in *M. leuroidem*, basi rotundata integerrima, apice grosse 6-12-crenata. Verticillastri dense multiflori. Calyces apice molliter villosi. Corolla rubra v. alba. — Habitat in Oriente, in montium aliorum Talysch campis, in Cashmeta, nec circa Astracan.
11. *M. KOTSCHYI* Boiss. Diagnos. plant, nov. oriental. V. 33. — Inferne lana grisea densissima; stylus, superne brevius cespitosus-lanatus, demum glabrescens caulibus ascendentibus subsimplicibus; foliis, surculorum lenium petiolo lanato suffultis sericeis ovato-oblongis crenulatis, caulibus petiolaribus breviter glandulosis ovatis oblongis cuneatis obtuse dentatis, floralibus oblongis in petiolum allenuatis verticillastros superantibus; verticillastri pluriflori densi; bracteis subulatis recurvis lobum calycinum aequantibus; calycis glanduloso-glandulosis dentatis. tetragonalibus spumosis aequantibus. reclis, lobo quadruplo brevioribus, corollae tomentellae calyce duplo longioribus lobo subinserto, labio superiori ad tertiam partem bilobo, inferius longioribus lobo medio majoribus rotundato-obovatis % — Caulis sesquipedales graciles. A *M. Astracanicum* differunt dentibus calycibus tubo quadruplo brevioribus nec tubum diraidiunaequantibus subpaulis. — Crescit in monte Gara Kurdistanae.
12. *M. ROTUNDIFOLIUM* Boiss. I. c. t — Caulibus albo-glandulosis, basi ascendentibus erectis simplicissimis, foliis, utrinque induratis denso pannoso griseo vestitis, facie superiori elegantius reticulata, inferius petiolaribus, caulibus sessilibus v. subsessilibus, obovatis. abortivis, basi rotundatis, margine rotundato-crenatis, toralibus verticillastri duplo longioribus; verticillastri 4-5-nis valde remotis pluriflori densi; bracteis sobolatis calycem dimittente aequidistantibus, calycis breviter tomentosi denlib. villo occultans subulatis spumosis reclis inaequalibus tubo quadruplo brevioribus, corollae pallide violaceae glandulosis ca-lyce subduplo longioribus lobo incluso, labio superiori ad tertiam partem usque bifido, lobis rotundatis, inferioribus brevioribus, lobis acutis, intermedio paulo laevioribus — Caulis pedalis «sesquipedales, folia diametro pollicari v. sesquipedales. verticillastri 2-3 poll. distantes. — Crescit in pratis alpibus montis orientalis supra Philadelphiam.
13. *M. LITESCENS* Boiss. I. c. 34. — Totum indumento flavo denso longo adpresso multo flavescens, praeterea secus caules et petiolos lana alba longa floccosa, demum evanescente obsilium caulibus ascendentibus caespitosis, superne oppositis ramosis; foliis inferius petiolaribus ovato-rotundis, superioribus ovalo-cuneatis breviter petiolatis v. sessilibus floralibus ciliolatis paulo aequantibus, omnibus obsolete denticulatis, superne longe exsertis senecioideis nensos-pictis subtut brevius pilosis rugoso-reticulatis, verticillastri paniculatis ad apicem ramorum et caulium in racemos magis minus denso foliis mixtos approximatis bracteis subulatis paucis, ciliolatis lobum calycinum aequantibus, calycis cribratis birsuibus denlib. e basi lanceolata subulatis spumosis recitatis, lobo quadruplo brevioribus, corollae tomentellae calyce sesquialongioribus labio superiori breviter ultra tertiam partem bilobo, inferioribus aequilongis lobis lateralibus oblongis, medio longioribus ovatis-reclis *Q* I luf i>cedente, superne oppositis ramis abbreviatis, pedalis, foliis mixta 0-12-lineata, 6-8 lan. laia, superiora basi valde Caneata, verticillastri 10-12-11 on, rarus distante* — Crescit in pratis alpibus montis supra Philadelphiam
14. *M. CBASSIDE* Bolts. I. c. 3. t - Totum indumento demum adpressis; caulibus reclinatis simplicibus. foliis radicalibus petiolatis ovatis, basi

- breviter cuneatis, ulriq. canis reliculato-venosis crenulalis, caulinis floralibq. oblongis, basi valde allenualis subsessilib. v. sessilib. profundius dentalis, his deflexis verlicillasros mullifloros densos globosos remotos superanlib.; bractea subulalis calyce breviorib.; calyce tomenoso sulcato radialim decemdenlalo, denlib. patulis subrecurvis rigidis subulalis, lubum dimidium subaequanlib. alternis paullo breviorib., fauce albo-plumosa; corolla tomenella parva calyce subbreviori, labio superiori paullo longiori ad medium usque bilobo, inferioris trilobi lobis ovalis, inlermedio vix aliis longiori latiorique. 2l. — Caules l'A-2-pedales, folia radicalia 8-0 lin , caulina pollicem v. amplius longa, verlicillastris 8-3 poll, remoli. — Crescit in Kurdistaniae monte Gara.
19. M. GLOBOSUM Monibr. et Auch. Ann. sc. nal. (2. Ser.) VI. 53. - Ramis elongatis villosotomenosis, basi lanalis; Ml. obovalis cuncalis subrolundisvc, ulriq. velulino-villosis v. ioflmis lanalis; verlicillastris globosfs mullifloris; calycib. velulino-villosissirais, denlib. brevissimis subulalis rigidis subpatcnlib.; corollae galea oblonga, apice bifida. 2l. — Habilus cl color 3l. *relutini*, sed folia saepius aoguslora, (lores multo minores el denies calycis subglobosi inlus lana flacescente omnino recondili. Corolla albida? — In Asia minori.
10. M. LEOINUROIDES Desr. in Lam. Diet. III. 715. - Blh. I. c. 588. t - Rebb. Plant critic 111.84.1.290. — Caule sublaoalo; foil, ovalis subrolundalisve grosse incisocrenalis molliier pubescentib., sublus v. utriq. canescenlib.; bractei exleriorib. calyce vix breviorib.; calycib. albo-lanalis, denlib. 5 subulatis recurvo-patentib.; corollae galea oblonga, apice bifida. 3p — Caules e basi ramosa erecli v. adscendentes subsimplices, plerumque vix pedales crassi Iclragoni, saepius breviiier albo-lanali. Folia inferiora subrolunda, superiora ovola, floralia suprema ovato-lanceolata, omnia crenaluris lalis profundis oblusissirais inaequalibus nolata, molliier rugosa. Verlicillastris magnitudinc If. *vulgarit*. Denies calycini brctes. Corollae purpurascntes. — 3/. *Astracanicum* M. Bieb. Fl. Taur. Cauc. II. 52? et auct. plur. — *M. affxne* Hornem. Horl. Ilafn. 550? — Habilal in Caucasi promontorio el in regione subalpina frequens el propc Aslracan.
17. M. PLIMOSLM C. A. Meyer, En urn. plant. Cauc. Casp. 00. - Dili. I. c. 580. f - Foil, roluodalig Inciso-lobalin, utriq. molliier villosis subcanescenlib.; calycib. molliier villoslglslmis, dcoitb. 5 bracleitq. subulatis plumosis; corollae galea oblonga, apice blfida. % — Caules adscedentes lelragooi, tomeolo brevi conspersi v. pilis laxis pubescentle*. Folia fere Jf. *lanali*, lobis breribus obtosis Integerrimis, medio saepius majore, floralia conformla, flores excedentia. Vertirillastris fere pollicem diametro distantes multiflori. Bracleae ralycem aequantes. Denies calycini tubo parum breviores, demum sletlalo-palentes. Corolla vix denibus calycinis longior, labium superius oblongo-lanceolalum, inferioris lacinae late* rales lanccolaiae, intermedia lalissima emarginala. — Habilal in Caucasi regione alpina oriental!
18. M. VELUTINUM Siblhrp. et Sm. Flor. Grace. VI. 40. t. 561. - Dili. I. c. f - Ramis elongalis tomenosis, basi lanalis; foil, orbicularis rrenalis, basi subcuneaiis, utriq. relulino-villosis; verlicillastris amplis mullifloris; calycib. (omentoso-pobescentib., denlib. 5 bractisq. subulalis rigidis reclis v. demum patcmib.; corollae galea oblonga bifida. % — Affine *M. candidiaimo*, a quo differl praecipue colore totius plantae et/forma foliorum. Caules sesquipedales, lana in pane inferiore laxissiraa albida vesliti, superne obtuse lelragonl, torocnto brevi flavescenle. Folia tix pollicaria, lalitudine longitudinem aequanle, crassa rugojta mollia, inferiora peliolata, floralia subsessilia. Inflorescentia et flores fere *M candidistimi*, at corollae denibus calycinis breviores. — *Starhyt Candida* Bory el Chaub. Flor. du Peloponn. 710. t t. 20? (cf. pag. 843. no. 130.) - Habitat in monle Parnasso.
19. M. SUPIMM Linn. Spec. plantar. 816. - Blh. I. c. 742. — Ramis albo-lanalis; foil, ovalo-rotundalis molliter villosis subviridib. \. sublus albo-lanalis crnatis bullalo-rugosissimis; verlicillastris muUidoris; calycib. tillosis, denlib. 5-10 subolatis rigidis reclis crclis v. demum paicnlib.; corollae galea oblonga, ip:ce

- biGda. 2 — Species inter *M. candidistimum* et *vulgare* media. Flores prioris cum foliis posterioris. An hybrida hortensis? — Crescit. . . . ?
20. *M. CANDIDISSIMUM* Linn. I. c. — Bth. I. c. 580. f (exclus. syn. Linn.) — Kami's elongalis subramosis albo-lanatis; foil, ovalis crenatis mollissime cano-villosis v. albo-lanatis; verticillaslrīs maximis multiOoris; calycib. albo-villosis lanatisre, denlib. saepissime 5 subulalis rigidis palenlib.; corollae galea oblonga, apice bifida. % — Caules crassi, basi procumbentes, apice ascendentes parum ramosi 1-2-pedales. Folia circiter pollicaria, lana in pagina superiore sericea, in inferiore densiore, iulerdum subfloccosa, adulta rarius viridia pubescens. Verticillastri remoti ampli 20-50-flori. Bractee subulatae rigidae, pleraeque calyces aequantes. Calyx saepe ultra 4 lin. longus, dentibus longis saepius inaequalibus, demum stellato-patcnlibus rectis Y. viz recurvis, in exemplaribus sylvestribus constanter 5-dentalus, in cultis rarius 6-10-dentalus. Corolla albida, dentibus calycinis parum longior. — *St. peregrinum* Rchb. Plant. critic. IV. 10. t 312. (non Linn.) - *M. catariaefolium* Rchb. I. c. 10. 1.313. (non Desr.) — *M. setaceum* Desr. in Lam. Diet 111. 717? — *M. incanum* Desr. I. c. 710. — *M. uncinatum* Hornem. Hort. Hafn. 908? — *M. flexuosum* Moench, Melb. plant 300? — *M. odoratum* Pourr. ex Sleud. Norn. bot. 510. (edit. 1.) — Habitat in Europa australi, in Hispania, Gallia australi?, Italia, Dalmatia, Isrla, Carintia et in Persiae Caspicae montibus Talyscb.
21. *M. SERICEUM* Boiss. Elench. plant nov. Hisp. no. 105. et Voyage bot. dans le midi de l'Esp. 506. no. 1355. f 1.148. — Tolum adpresse argenteum: caulib. elongalis ascendentib.; foil, inferiorib. basi cordatis, omnib. orbicularib. rotundato-crenalis rugoso-plicatis; verticillaslrīs remolis; bracteis subulalis; calycis hispissimi denlib. selaceis subaequalib. reclis; corollae violaceae galea oblonga bifida, labii inferioris lobo intermedio rotundo non plicato. 2} — Caules plures basi prostrati, dein erecti 1-3-pedales quadrangulares infra densissime tomentosi. Folia viridula adpresse sericeo-lomeolosa Verticillaslrīs 5-0 villosissimi multiflori valde remoti in ipctm saepe pedalem approximate Corolla pallide violacea, exclus adpresse birta. — *Marrubium Hispanicum sericeum incanum Alysso Clusii congener, flos purpurascens* Tournef. Herb. — Crescit in pinguibus regionis montanae superioris et alpinae Sierra Nevada in Hispania australi.
22. *M. PEREGRINUM* Linn. Spec. plant. 815. - Jcq. Flor. Austriac. t. 100. - Bib. I. c. 590. t - Humile ditancato-ramosum: foil, oblongis cano-iomenosis; verticillaslrīs paucifloris; calycib. tomentosus, denlib. 5 lanceolato-subulalis erectis v. TIX patentib.; corollae galea oblonga bifida. 2}. — Caules viridales paniculato-ramosi, obtuse tetragoni, uli foliorum pagina supra et calyces tomento brevi canescentes, nec linali, nec tillosi. Folia breviter petiolata 'A-1'/i-pollicaria, basi inaequaliter cuneata, in medio et apice serratis v. crenatis lobis noiaUf floralia con forma minore, at omnia flores excedentia. Verticillaslrīs in axillis foliorum superiorum dispositi, saepius 4-0-flori, rarius 10-flori. Bractee subulatae mucosae lomenosae, exteriores calyce dimidio breviores. Calyces sessile* 10-nervi, apice truncati, dentibus et basi sublanolata subulalis inaequalibus, sinibus rarissime hinc inde in dentem sextum v. septimum minimum producti* Corollae albae dentes calycinis breviter excedentes. In exemplaribus borealibus sialura interdum sesquipedalis, foliis majoribus apice subincisis. "" If. *Creticum* Mill. Did. no. 3. - Rchb. Plant. critic. III. 74. I 2*8. - *M. poueiflorum* Wallr. Schedul. critic. 295. - if *angustifolium* Moench ex Sleud. No» bou 510. (edit. I. - Habitat in Europa praesertim austro-orientali et Asiae mediae aprict, in Germania prope Ilalam, in Austria, Transylvania et Moravia* 10 Graecia et insulis Archipelagi, in agro Byzantino, inter Smyrnam et Bursam «* in regione Tauro-Caucasica.
- «. *M. PA»OMCLM* Clus. ex Rchb. Flor. Germ. excurs. 385. - Bih. I. c. I - ••* ■is ditarkalis subramosis; foil. ovalis oblongisve cano-iomenosis T. molliter ▼"losit. ttnlib. ooinlb. flores duplo superoilib.) TerUcillaslrīs multiDoris, onob-

- dislantib.; calycib. cano-tomentosis, denlib. 6-10 subulalis demum paientib.; corollae galea oblonga, apice bifida. 2]. — Species Jf. *peregrino* a ffin is et eliam ad *M. vulgar e* quodammodo accedens. Tomenlum *M. peregrini* v. vix densius. Folia laiora quam in Jf. *peregrino*, angustiora et aculiora quam in Jf. *vulgari*. Verticillasiri secus ramos dislanles plerumque 12-15-flori. Bracteae calycem aequanles. Calyces Jf. *peregrini*, sed denies 6-10 longiores acuiiores et saepius demum patentes subrecurvi. Corolla Jf. *peregrini*. — Jf. *paniculatum* Desr. in Lam. Diet. III. 716? - Rchb. Plant, crilic. III. 86. t. 300. — Jf. *peregrinum* Spreng. Fl. Hal. 1. 6. (non Linn.) — Jf. *remolum* Kit. in SchulL Oesterr. Fl. II. 161. — Jf. *rubrum* Roth, Nov. plant, spec. 250? — Ilabilal in Germania prope Halam, in Ilungaria, Moravia, Austria ct Transylvania.
24. M. RADIATUM Delile mss. ex Bth. 1. c. 501. - Ramis divaricalis subramosis cano-lomenlosis; Toll, ovatis oblongisve cano-tomenlosis v. molliter villosis, floralib. supremis calyces vii superanlib.; verticillastris multifloris laxiusculis, supremis approximatis; calycib. parvis lomenlosis, denlib. 6-10 clongalis subulalis reclis stellalo-palenlib. subspinescentibus. % — AfDne Jf. *Pannonico*, sed foliis eaicybusque miooribus et cbaracteribus supra nolalis salis distincium. — Habitat in regione mediterranea?
85. M. CUNEATUM[†] Rass. Nat. hist. Alep. II. 251 — Btb. I. c - Caule bail albo-lanalo, apice pubescente; foil, ovato-cunealls rugosissimls, supra virfdlb., subtus canescentib., florallb. parvis vix calyces excedenlib.; calycib. parvis lomenloif, denlib. 10 brevib. subrecurvo-patentib. mutiols. % — Canles eirciter pedales tenuiores quam in caeleris speciebus, parce ramosi. Folia 'A-l-pollicaria angustiora quam in sequente, superiora multo minora. Verticillastris numerosi, infiorescmoli, superiores approximali. Calyces vix 2 lin. longi. Corollae parvae albidae? — Habitat in Syria prope Aleppo.
26. M. YULGARE Linn. Spec. plant. 816. — Bib. I. c. — Ramis albo-lanalis; foil, ovatis rotundalisve molliter villosis subviridib. v. sublus albo-lanalis crenalis; verticillastris munitiois; calycib. villosol-analis, denlib. 10 subulalis recurvo-patentib.; corollae galea oblonga, apice bifida. 2). — Cades basl ramosi erecti adscendentes v. rarlus decombentes crassi duri I's-S-pedalei, Una densa alba In parte caulls superior* adpretsa, In Inferior* laxa obteeti. Folia saaplus fere orbicularia v. rbomboidea, bail nonnunqnam eordata, mtrgine duplicato- v. ioaequalier crenata, saepe undulato-erlapa, tuperfioto ragoslMlma, nune ntrinqna viridia, nunc supra velntlno- v. serlceo-villosa, inbtms magU minmve albo-lanata, in *yar.fi.* utrinque lana longa alba densisslma obtecu, Ooralia conformia minora, sed omnia verlicillastris excedentia, basi magis mlnusve peliolata. Verticillastris dislantes, dense 20-50-florl. Bracteae lineari-subulatae lanalae, calyces aequanles, apice saepius acumine brevi subrecurvo glabro terminalae. Calyces lessiles, nunc breviter pubescentes, nuno dense albo-lanati, denlibus saepissime apice hamalis, rarius reclis. Corollae parvae albae. — Jf. *hamoium* H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. 1L 310. — Jf. *Germanicum* Schrank ex Steud. Nom. bot. 510. (edit. 1.)
- fi. lanalum*: Tolils densius albo-lanalis. — Jf. *Apulum* Ten. Fl. Neap. t. 154. — Habitat in Europae omnis et Asiae mediae ruderatls, ad vias etc. et ex Ruropa allata in America septentrional! et australi.
- f *Species non satis notae.*
27. M. CIRCINNATUM Desr. in Lam. DicL III. 717. - Blh. I. c. 502. - Foil, circinnatis exquisite crenalis rugosissimis; denlib. calycinis subulalis ereclis villosis. ^ — Caules telragoni lomenlosi. Folia orbicularia, regutariler crenata crassa, tomento raolli lucido vestila, fere sesquipollicem lata, petiolis brevibus canaliculatis. Dracleae seiaceae villosae, caljces subaequantas. Flores albi tideniur-son tiles numerosi. Calyx tubulosus lomenlosus. Corollae lubuscal}cis tubum paullo superans, labium superius profundo bifldum. - Habitat in Oricnlc?

28. *M. PARVIFLORUM* Fisch. et Mey. Indz. semin. hort. Petropoliu 1835.33. — Blh. I. c. 743. — Perenne: foil, pobeseenlib. rugosis ovato-oblongis crenalis, subtos caaleq. erecto ramoso (basi) albo-tomenlosis; bracteia selaceis calycem aequanlib.; denlib. calycinis denis setaceis mocronalii rectis patenlissimis, tubo subbreviorih.; corolla calycem fix superante. ty — A *M. peregrino* L. dignoscitur indumento non sericeo et denlibus calycinis semper 10 corolla fere longioribus. Corolla alba, galea bifida, lobis connivenlibos oblusis. — *M. peregrinum* G. A. Mey. Enum. pi. Caspic. Caucas. no. 820. — Crescil In monlibos Talysch.
29. *H. PROPINQUUM* Fisch. et Mey. 1. c. — Perenne villosocanescens: caule ramoso subereclo; foil, ragosis petiolatis grosse orenatis, inferiorib. suborbicolalis, mediis obovalis, summis cuneatis; bracteis aetaceis calyce subbreviorib.; dentib. calycinis villosis selaceis macronaUf palenlissimis reclis, Inbo duplo breviorib.; tubo corollae cisrcto, galea breyi. 3 — *M. leonuroidi* afBne, sed caulis ramosior villosissimus, folia cinerea rugosa, summa non oblonga sed dislincie cuneala, flores mulio mfnoras violacei, calycis lubus brevior, apice baud conslriclus, galea abbreclata. A Jf. *plumoso* negleclis aliis nolis jam primo adspeclu digooscilur corollae lubo exserlo. — Crescit in moniibus Talysch.

ft *Species omnino ignotae.*

M. CINERASCENS Fisch.

M. UNDULATUM Sieb.

t t t *Species e genere excludendae.*

- M. ACETABULOSUM* Linn. - *BALLOTA ACETABULOSA*.
M. AFRICANUM Linn. - *BALLOTA AFRICANA*.
M. CINEREUM Desr. - *BALLOTA HIRSUTA*.
M. CRISPUM Desr. - *BALLOTA HIRSUTA*.
M. CRISPUM Linn. - *BALLOTA AFRICANA*.
M. HIRSUTUM Willd. - *BALLOTA HIRSUTA*.
M. HISPANICUM LIAO. — *BALLOTA HISPANICA*.
M. HUMILE Desr. — *BALLOTA RUGOSA*.
M. INDICUM Bona. - *ANISOMELES OVATA*.
M. MICROPBYLLUM Desr. - *BALLOTA MICROPUYLLA*.
M. MOLLISSIMUM Don. - *LELUS LANATA*.
M. MGRUM CranU. -> *BALLOTA NIGRA*.
M. ORIEMALE Spr. - *BALLOTA ORIENTALS*.
M. PSEUDODICTAMNIS Linn. - *BALLOTA PSELDODICTAMNIS*.
M. RUGOSEM Desr. - *BALLOTA RUGOSA*.
M. RUGOSEM Rusa. - *BALLOTA SAXATILIS*.
M. RUPESTRE Bivon. - *BALLOTA HISPANICA*.
M. SAXATILE Rafn. - *BALLOTA HISPANICA*.
M. SCROPHULARIAEFOLIUM Lag. - *BALLOTA MSPAMCA*.
M. THOUXI Schulu - *BALLOTA AFRICANA*.
M. FWDILATUM Fresen. - *BALLOTA UNDLATA*.

Subtribus IV. *BALLOTEAE* Endl. Gener. plant, pag, 221.

Calycis limbos dilatatus T. sei-decemdenlalus, nunc ore truocato inter denies submembranaceo v. latissime membranaceo-campanulatus. Corollae labium superius saepe compresso-galcatum. Stamina e corollae lubo esserta.

305S. *BALLOTA* Linn.

iLinn. Gener. plant no. 720. - Meisn. Gener. plant vascular. I. 208. II. lift. - ^{B1b,}

Labiata gener. el spec. 302. cl 743.)

Seetio I. *BERUGERU BUL* 1. #. 594.

BraeUaa oblongae v. aubulalac molles. Calycis limbos e-90-deoutua r. crenato-
 1.1. *AFRICANA* Blh. U f - Him U: foil, orbiculalla irrvRulariier creatia, supra
 •• ttlrinq. Tiridlb.; ealycis limbo palcttie orbicvlato dilaUlo, deoUb. subvii

- brevijer selaceis; corollae galea ovaU; slaminib. vix e tubo exsertis. 0|. - Caulei erecii pedales tetragon!, pllis patentibus hirsuli. Folia longiuscule peliolala, limbo pollicari, creualoris oblusis v. rarius acutis, ulrinque pubescenlia hirsata v. subtus sublanata, floralia conformia, petiolo (lores saepius superante. Verticillastri globosi multiOori dislanles. Bracleae subulalae, calycem aequoantes. Calyces 4 lio. longi, pubescenles v. hirsuli, tubo 10-angulato plicato, limbo late campanulalo v. subrolalo, dentibus 5 majoribos longius acuminatis, 5 v. inlerdum circiter 10 minoribus muticis v. brevius acuminatis. Corolla fere glabra, dentibus calycinis parum longior, labium superius breve lalum erectum inlegrum v. bre- viter einarginalum, inferioris laciniae laterales ovatae obtusae, media late rotun- daio-cuneata emarginala. — *Marrubium Africanum* Linn. Spec. plant. 810. — *Pteudodictamnui emarginatut* Moench ex Steud. Norm, bot 003. (edit. 1.) — *Marrubium erispum* Linn. I. c. 074. — *Marrubium Thouini* Schuli. ex Syll. pi. soc. Ratisb. II. 23. — Habitat in Arrica ausrali ad Caput bonae spei.
- 2- B. PSEUDODICTAMNUS Dtb. I. c. | - Albo-lanata: foil, orbiculatis integerrimis v. obscure crenalis crassis lanalis; calycis limbo patenle dilatato lanato 5-10-crenaio. 6 — Frulex bipedalis, rami elongati, uli folia et calyces lana densa floccosa obtecti. Folia vix pollicaria, basi late cordala, breviter petiolata, floralia conformia, Korea excedenlia. Verticillastri dense multiflori dittanles. Bracteae oblongo-spathulalae obtusae, exteriores tubum calycis aequaotes. Calycis limbus demum fere 5 lin. diametro, venis sub lana omnino recondllis. Faux villis clause. Corolla alba rabro-macnlata, lubo in tut transversalm plloso-annu- lato, labio superiore elongato incurvo subforntcato, extus villosu, in parte supe- riore inlus pilis longis barbato, apice bifldo, inferlore patente saperiori aequi- longo, laciniis laleralibus brevibus, intermedia dupto longiori bifida, lobis oblongis obtusis. — *Marrubium Pseudodietamnui* Linn. Spec. pi. 817. — Siblh. et Sm. Flor. Graec. VI. 50. t. 502. — *Beringeria Pteudodietamnui* Necker ex Link, Handb. 478. — Habitat in Greta.
3. B. UNDULATA Bib. I. c. 505. | et 743. — Hirsuta: foil, orbiculatis crenatis, utrinq. villositt rugoso-crispis; calycis limbo patenle orbiculalo tubo subbreuiore crasso tomenioso-villoso, margine undulato-crispo 10-90-crenalo, crenaluris mulicis. % — Rami, folia el calyces pilis patentibus ploribas glanduliferif hirsata nee lanau. Folia caulina vix pollicem diametro, floralia inlora, superiora calyoibus breviora. Verticillastri multQorl, at minus densl qnam In B. *PfudodicCwm**. Bracteae breves lineari-spatbulatae. Calyces demum semlpolllicares. Tubos lotus glaber, nervis elevatis laevis, extus tasl vix ttrlalus, aplee nil basil limbi profunde 10-siriatus subplicatus, faux villis clause. Limbus demum 4-5 lin. diameiro, uti folia crassus rugosus, margine nndulalo-crispus. Corollae lubus Inlas annulalns, galea oblonga, latior quam in B. *Pteudodictatnno*, apice vix emarginata, labll Inferioris laciniae lalerales ovatae, intermedia lalissima emarginata. — *Marrubium undulatum* Fresen. Mus. Senkenberg. 1. 02. — In Arabiae deserlo Sinaico.
4. B. ACETABULOSA Bib. I. c. 505. — Hirsuta v. sublanata: foil, orbiculatis crenalis, supra villosis, subtus albo-lanatis; calycis limbo patente lubo longiore mem- branaceo reticulato sublanalo, margine sub-20-crenalo, crenaluris muticis. 0|. -, Caulis bipedalis, basi perennis, rami pilis longis laxls blrsuti v. sublanati. Fo- lia saepe l'A-2 pollices diametro, supra rugosa, pilis longis hirsuta viridia, lana jnblus floccosa, floralia suprema vix calyces excedentia. Verlicillastri fructiferi fere sesquipollicem diameiro. Bracteae exieroren petiolatae oblongo-spathulatae, tubum calycis aequanies, interiores subulalae. Calyces basi albo-villosi v. lanati. Limbus demum 0-10 lin. diametro, circumscriptione quinquangulalus, crenaluris lalis brevibus obtusis v. aculiusculis. Corollae galea vix emarginata, labii infe- rioris laciniae laliores quam in B. *Pteudodictamno*, angusliores quam in B. *un- dulata*. — *Marrubium acetabulotum* Linn. Spec. plant. 817. — *Marrubium Pttu- dodiclamnui* Sleud. et Hochst. Pi. exs. un. ilin. (non Linn.) — *Beringeria ateta- bulosa* Necker ex Lnk. Handb. 478. — *Marrubium sufruticosum* Mill. Did. no. 0. — Habitat in Graeciae insulis frequens ci in Orienle prope Smyrnam.

- 5 B ALCHERI Boiss Diagnos pi nov. oriental. V. 39. — Tola pilis paluhs, oliis glaudulosis lolermnlis hispida Tell, brevier peliolalis suborbicularis, basi truncatis ovatis/e circumcirca dentalo-crenalis, crenis rolundalis, verticillastris nulliflons, folusea aequaniib. suffullis, braciéis lieanb. tubum calycinum aequantib.; calycis tomentosi lubo costato, limbo patenle tubum dimidium aequanle subse-dicimdentalo, dentib. (riangulan-lanceolalis aculis allernalim minorib , corollae hispidae limbo a calyce incluso. 2< — In Persiae auslralis monte Perezend
- 0 B MOLLISSIMA Bib. 1. c. 505. t — Caule albo-lanato; foil, late ovalis obliis, ulnnq. canescenlib. v. albidis, supra velutinis, sublus subfloccoso-lanalis; calycis limbo palenle tubum subaequanle villosotomenloso, margine breviter 10-dentato, dentib. lalis acutis vix mucronulalis. ^ — Lana caulis brevis velutina v ranus floceosa. Folia angustiora quam longa, regulanler crenala, ulnnque mollissima, infenora sesquipollicana, suprema el ramealia minora, at omnia calyces excedentia. Verticillastri densi multiflon. Bractee numcrosae spalhulatae acutae. Calycis limbus demom 4-5-pollicans plicalorugosus tomentosus. Corolla B. *Pteudodtetamni* albida. — An *B. htrtutae* vanelas* — *Marrubtum tcephulartac-fohum, ctnereum* etc. Horlul. — *Marrubtum Htspantcum* Linn. Herb, (m Spec. 810 non Auct. recent.) — Habitat in Hispama'
- 7 B IIRSIT4 Bth I.e. - Hirsula v. sublanata* Toll orbicularis crenalis, supra hirsutis, utnnq vmdib. v. sublus albo-lanalis, calycis limbo palenle lubum subaequanle hirsulo, margine broiler 10-denlaio, denlib. lalis aculis v mucronulalis. 2I — Habitus el folia *B. acelabulosae*, a qua differl calycis limbo mm ore birsutiore, 10- nee 20-denlato, minus membranaceo. In var *fi.* caulis pilis numerosis pateniibus hispidus et denies calycun acutiores Bracicae in utraque varielale extenores spalhulatae, inlenore» subulatae A *B. Ihspanca* differt folns orbiculatia ei calycis forma. — *Marrubium htrsutum* Willd. Spec, plant III. 113' - *MarruMmm crispum* Desr. In Lam. Diet 111. 710?
- fi. hispida:* vlrldior blmlor. — *Mmrrubium cUurnm* Desr. in Lam. Diet. III. 710? — In Africa boreal! prope Magador et CarlhagnemT, *fi.* in Hispania.
8. B MICROPHYLLA Bth. I. c. 506. — Tomentosa- foil subcordato-ovalis maxima crenuladf; caljce infundibuliformi; bracteis ^pathulalis acutis. ^ — Taules telragoni subflexuosi Folia subsessilia mollia crassa, tcnuissime ct repulanier rrmulala, 7-8 lin longa, circiler 4 lata. Verlicillastn e flonbus numerosis sessilibus consumes, bracteis numerosis spatbulatis calyci aequilongis inlcrmixtif* Calyces fractiferi renosi subvillosi, limbus semipatens, deniibus 10 aculis, quorum 5 mm ores. — *Marrubium mierophyllum* Desr. in Lam. Diet III 720 — Habitat in Oriente.
0. B. RUGOSA Bth. I. c. — dole pobescente sublanato; foil, ovalis oblusn crenatis ragoiis, atrinq. cano-tomenloso; Tercillastris pauciflons, cal)ci« *Umbo* brevi sobpatente, dentib. dens brerib. mucronulalis. % — Caules humiles, to-rn en lo broi induti. Folia fix semipollicaria, sublus saepe albo-lanata. Verticillastri 4,-6- ranus sub-10-0ori. Bractee breves lineares. Cal)ces forma *B-liupantcae*, sed cano-tomentosi nee blrtl, profunde striali. Corolla *B acet*~bulosae*, sed glabnor. — *Marrubium ruyosum* Desf Cat hort Par. (ed 3.) ^ — *Marrubtum humtle* Desf. I. c* — HabiUt in Onenle*
10. B OBLI^IA Bth. I. c. — Caule cano-pubescente, foil, ovatis crenaii* ru^{gosis}, supra canescenlib., sublus albo-lanalis, verticillaslns paucifloris, calycis ^{limbo} brevi inaequaliier dilatalo, dentib. dens mucronatis. ^ — Omnes paries B. *'' *xahht* duplo majores Cal)ces 4-5 lin. longi, limbo saepius uno lalere lanltt* producto el dilauto. — *Marrubtum rugotum* tar. Russ. Herb. - Habitat in »T* riae montibus inter Aleppo et Anliochiam
11. B. SAXATILIS Sieb. mis ex Bfo. I. c. - Hirsula: roll, ovalis orbiculative ^{cro-} aUa ertaais rugosis, uUinq. birtis viridlb. v. sublos albidis; verticillastris ^{pau-} elOoria; calycia limbo brevi inbpatente, dentib. dens mucronatis. 3- - ^{caulis}

basi lignosus videtur Rami divancati Y. procumbentes, pills longis mollibus villosi v. sublanali. Folia inferora pollicana, floralia vix semipollicana Verticillas ut in *B rugosa* pauciflor. Bractae minutae Calyces hirsuti profunde striati Affinis *B rugotae*, a qua differt hirsutie et corollis minoribus — *Marrubium rugotum* Russ Nat. hist Alep. II. 255. — Habitat in Syria prope Aleppo, in Palaestina prope Hierosolimam

12. B. RUSSELLIANA Bth 1 c 507 — Caule vix pubescente, foliis ovatis obtusis in toto genere rugosis, supra videntibus, subtus albidis, verticillas paucifloras, calycis limbo breviter subpalmatis, dentibus 0-10 acutis v. breviter mucronatis 2. — Affinis *B saxatidis*, sed folium omnibus inaequalibus et ramulis minimis hirsutis distincta Folia media semipollicana, basi cordata, supra pubescentia. — Habitat in Syria prope Aleppo.

13. B. HISPANA K Bth I. c — Herba foliis ovato-cordatis, superioribus saepius acutis v. omnibus obtusis, nervis rotundatis, utrinque hirsutis videntibus v. subtus canescentibus, calycis limbo breviter subpalmatis, dentibus densis selaceo-mucronatis 2. — Caulis erecti bipedales et ultra, pilis mollibus palmatis hirsutis. Folia saepius bipollicana, exacte cordiformia crenata rugosa mollia, floralia minora, at flores excedentia. Verticillas 20-50-liniam densi. Bractae lineares v. exlenores subpalmatae, utriusque calycis videntibus hirsutissimae. Limbus calycis vix laciniae parti lobi aequalis Corolla *B. acetabulatae* — *Marrubium Ottipanteum* Linn. Spec plant. 816 — *Marrubium rupetrum* Biv. Unip. II. t 1. — *Marrubium trophulariaefolium* Lag — *Pseudoclamnum acutum* Moench, Melh. plant 300 — *Marrubium taxable* Rafin. — In Hispania, Sicilia, Italia australis et Dalmatia.

Sectio II. BALLOTA Bth. L c. 507.

Bractae imbricat-subulatae molles. Calycis limbus 5-dentatus.

14. B. ISIGRA Linn Spec plant 814 - Rchb. Plant critic VIII 30 I 773 - Bth. I c t — Hirsuta > glabrata' foliis ovatis, basi truncatis, utrinque videntibus magis minusve hirsutis, calycis limbo subrecto, dentibus 5 basi dilatatis, apice subulato-mucronatis 2. — Herba erecta, 2-3-pedalis caulis, folia et calyces > media, nunc fere glabra, saepius pubescentia, nervis hirsuta. Folia inferora latiora obtusajubrotunda, superiora acutiora, floralia omnia flores excedentia. Verticillas multiflori laxiusculi, cymis praeterquam in inferioribus breviter pedunculatae Bractae linearis-subulatae, calyceae aequantes Y. US breviflora. Calyces 4 lin longi, tubo staminate, limbo forma valde variabilis, nunc patente diametro 5-6-nervulato, angulis brevissime mucronatis, none vix aucto, dentibus 5 et basi lanceolato-subulatis vix palmatis. Corollae tubas intus brevissime piloso-annulatus labibus videntibus quam in praecedentibus, superiore obtuso integro v. eroarginato - *B alba* Linn | c 814. — *B. foetida* Lam. Fl. Fr. II 381 — Reichb. I c. 30 I 775 — *B vulgaris* Lnk. — *B. boreale* Schweigg. ex Reichb I c 30 t. 770. — *B ruderalis* Spr Fl Hal 101. — *B. septem* Paulel in Pers Enchind II. 125. — II *rubra* Schrad — *Marrubium nigrum* Cranli, Stirp. Auslr. 272. — Habitat in Europae totius ruderalis frequens, in Tauria et Caucaso.

15. B. URTICAEFOLIA Ortm. ex Reichb. Plant, critic VIII. 30 t 774. — Gracilis. foliis ovatis argute et profunde serratis, calycis dentibus erectis lineari-selacens tubum aequanubus 2. — Ternis quadripedalis et ultra, reliquis (*B nigra* longior tenuior videntibus, vix aut minus pubescens. Folia circuli exaele *Urticae urens*, primordialia tantum cordata. — Habitat in Bohemiae et Saxoniae ruderalis et ad muros.

Sectio III. ACANTHOPRASIUM Bth. L 0 508.

Bractae subulatae rigidae spinaeformes. Calycis limbus 5-10-dentatus.

Id. B. PERSICA Bth I c t — Foliis cuneiformibus dentatis; bracteis spinaciformibus; calycis limbo membranaceo dilatato breviter 5-10-dentato 5 — Frutex similis *M frutescens*, ramulis simplicibus erectis glaberrimis albicantibus Spinio 5-12 ad singula gemmulae inaequales simplicibus imbricatis, basi saepe cobacrenatis

- Folia cunciformla, basi Integernma, apfce Rerrata, serraturls spinnlosis tomen-
tosis>, quae in *M. frulecnenle* mulicae. Calyx regulans 5-fidus, lacinnis obo-
valis scanosis oblusis cum tribus mucronibus, quae in fructu ovalo-acuminalae.
Corolla plamuscula glabra — *Motuccella Peraca* Burm. Fl. Ind. 128. t 38. Gg. 2.
— Habitat in Persia
- 17 B LI MB ATA Bib. I c. 743. t — Canescens foil oblongis inlcgernrais, basi
cunealis, braceis spinaeformib, calycis limbo inaequaliter membranacco-dila-
tato subdecemdcnlato. 6 — Bipedahs erecta ramosissima, rami jumores villosuli,
demum glabrati Folia '/j-1-pollicana uninervia, utnnque cancscentia, suprema
MX calyces supcranlia, basi laliora. Verlicillasln axillares diblanles sexflon —
Crescii in Indiae orientalis seplentnonalis montibus, in glareosis lapidosis edi-
tionbus juxta Pindaden khan.
18. B. SPI>OSA Link, Handb. 475. — Bth. I. c f — Foil, otalis integemmis v. m-
ci&o-dentatis, utrinq. vindib.; verticillastris paunflons; bracteis spinaeformib.
reclis, calycib. hirlis, limbo subrecllo, denlib 5-10 c basi dilalata subulalis sub-
spinosis; corollae galea hirsulissima. 5 — Fruticulus pcdalis crectus ramosus,
rami vix lelragom, pilis brevibu> mollibus \illosi. Folia peliolata, vix pollicana,
caul mn infcnora integernma oblusa, sapenora acutiora, denlibus utnnque 1-2
profundis inslruca, floralia conformia, suprema minora acutiora at (lores supe-
Mnlia, onima utnnque villosa concolana Verlicillasln subsexflon distanies.
Bracteac paucae, caljce parum breviores palenles glabrac lactes, in ramis ad-
ultis pcrsistenles. Calyces brevier pedicellali, 4-5 lin. longi stnaii villosi, den-
tibus 5 e basi ovata subulatis subspinosis 1-5, alus minionbus subconformibus e
sinubus orig. Corollae lubus Intus annulatus, galea brois formcaia Integra,
extus pilosissima, labium mfcarius galeae subaequilongum, lobis oblongis, medio
laiiore emarginato. Species braceis *Moluccella*§, corolla *Leucadt* affinis. Calyx
et geniuiia omnino *Ballotae*. — *MolucctUa fivUetcen** Lino. Spec plant. 821 —
*BertngeN** *firut§seen§* fteichb. Fl. Germ. <xc. 385. — Htbiuu m montibus Pede-
monlu el GalloproTioeia.
- 19 B. I\TEGRIFOL!A Bib. 1. c. 809. t — Frolicosa pubescens foil oralis inte-
gemrais v. ranus pauncrenalis, utrinq. vindib., brarteis Hpmneformib reflexo-
palentib ;talycis limbo dilatato subpatentc 5-dentato corolljcc palca glabnusrula.
''4 - Habitus *B spmosae*, a qua diffieri ramis loneionbus, folns sacpius integer-
nmis, spmis \alidionbus bre\ionbus sacpius recurvis, calycibu*i longionbuf,
limbo ampliore constanler 5-dentalo Corollae ex icone Florae draecae albae,
ImeH purpureis stnatae, vix calyces excedentes, labium superiut oblongum inie-
grum cxius pubescens, infenoris lobus medius emarginatus — *Moluecella fruM-*
eeent Sibth el 6m. Flor. Graec >l 55 1.508. — Habitat in in»ula Cypro
- 80 B FORSKAHLEI Bth 1. c. — Involucris palmalo-filiformlmb , foil ovati< serralis*
Q — Floret albi, labium superius birsuturo, praesertim margine, at mii<* apice
emarginalum, dorso elevalo-slnaium. Erucae saepe flndunt arrodendo labii in''
Tenons lobum medium — *Phlowus alba* Forsk. Fl. Aegypt Arab. 107 | — Habi-
tat in Arabia felici

t *Species dubiae.*

- 21 B ORIENTALIS Presl, Drl Prag W. - Bth I c. 500 - Caule ratnoso villosi;
full cordalo-subrolundis dentatin rugous, sublus inrano-tomeniosis, bracteis
lincanb, calycis ngidi dentib IOspinosis, galea corollae formcata creoulaU. 4
— *Mtarntbtum orientate* Spreng. — Habitat in Asia minore
23. B. PILOSA Lour Fl < ochinch 3M - Bth. I r - Foil ovatis crenatis 10*
mentoslt; verticillaslns pilosis, calycib 10-dentalis ^ — fjuhs prrennis, 4-P*~
dalit erectus debilis tetragonun >inaius pilosus ramosus Folia ovata acuta ere**
nala tomentosa Flos albus bilabiatus, verticillastris axillanbui pilosis Call*
tobulosus recurvoi 10-tnalas, limbo 10-deniato denlibnt aculit reflexis Corolla*
labiam superius integrum foniicatoD, ioferiat patent Uifidum - Veroilnnl^{iar}
*L«M*k. #tf*cies* - Babllai in Coebmbint

23. *B. DISCOLOR Desf. ei Steud. Norn. bot. 09. (edit. 1.)

21 *B. PARVIFOLIA Desf. ex Steud. I. c.

tf *Species e genere excludendae.*

B. CINEREA Don. — ROYLEA ELEGANS.

B. DISTICHA Linn. = ANISOMELES OVATA.

B. DISTICHA Rodsch. — IIYPTIS PEGTINATA.

B. LANATA Linn. = LEONURUS LANATUS.

B. MAURITIANA Pers. — AMSOMELES OVATA.

B. SUAVEOLENS Linn. — IIYPTIS SUAVEOLENS.

B. SUAVEOLENS Rodsch. = IIYPTIS PEGTINATA.

3059. LASIOCORYS *Bth.*

(*Bth.* Labialar. gener. et spec. 000. — Meisn. Gener. pi. vascul. I. 288. II. 100.)

1. L. CAPENSIS Bib. I. c. j — Foil, subintegerrimis; verticillastris 2-4-floris; denlib. calycinis tubo dimidio brevioribus. 4 — Frulex divaricato-raraosus, rami Juniores ictragoni, brevissime candido-lomenlosi, adulti tereles, >ix canescentes glabrati. Folia in ramulis subrasiculala subsessilia oblonga v. cuneiformi a oblusa v. mucronulala inlegerrima, basi angustata, tomento lenuissimo subsericeo canesceola T. demum glabrata, vix 3-4 lin. longa, floralia conformia. Verticillasri saepius biflori. Bractee nuno brevissimae subnullae, nunc calycis quartam partem aequantes selaceae rigidae recurvae, lolerdum subspinescentes. Calyces subsessiles, tomento lenui subsericei, denlibus obluais v. mucrone broi terminatis. Corolla albida? Styli Ucioia superior saepias brevissima. — Habitat ad Gapul bonae spei.

2. L. ABYSSIMCA Blh. I. c. f — Foil, apice denlalis; verticillasris 6-10-florin; dentil, calycinis subulalo-acuminalis, lubum subacquanlibus. 5 — Habitus /, *integrifoliae*, rami tenuiter pubescenles. Folia longiora quara in *L. integrifolia* viridiora, apice saepius denlibus paucis instructa. Bractee panee subulalae rigidiusculae. Verticillasri irregulariter 0-10-flori. Gahces 10-nervii, vix lomentosi, dentibus aoliasimis lobo fere aequalibus. Styli lacinia superior inferlore dimidio brevior. — *Lmc*— *q*twd*Umta* Br. App. to Salt. Abyss. — Habitu in Abyssinia.

3000. BOYLEA *Watt.*

(Wall. Plant. Asiatic, rarior. I. 57. — Meisn. Gener. plant. Tascol I. 888. II. 100 — Bib. Labial, gener. et spec. 001.)

1. R. ELEGANS Wall. I. c. 57. t I* 74. — Blh. I. c. t — Frulex ramosissimus erectui, 3-5-pedalis. Rami palenies paniculati, obsolete quadrangulares, tomento cinereo brevi denso vestiti. Folia copiosa peliolala ovata acua, leviter subcordata, grosse el obtuse serrata, 1-1/2-pollicaria, ulrinque parce pilosula, supra >iridia, sublus. incana, floralia conformia, gradalim minora, at omnia calyces excedentia. Verticillasrl laxae 6-10-flori, cymis breviter pedunculalis, pedicellis brevissimis, Bractee parvae subulalae. Calyces lomenloso-pubescenles, demum 7-8 hn longi cano-pubescenlea, lubo cylindrico 10-striato, limbo lubum aequante. Corollae ex albo dilutissime roseae. — *Phlomis calycina* Roxb. Fl. Ind. III. u. — *Ballota cinerea* Don, Prodr. (I. Nep. 111. — Habitat in Indiac orientalis montibus Sirmorensibus el in Deyra Dhoon, Inter Hurdwar el Srinaghur, in monlibus 8) en el Jounsar in jugo Himalayensi.

3001. OTOSTEGIA *Bth.*

(*Bth.* Labial, gener. et spec. 001. — Meisn. Gener. plant, vascular. I. 288. II. 100.)

1. O. MICROPHYLLA Boiss. Diagnos. plant, nov. oriental. V. 39. — Caulib. fruticosus rami^q. \clunni^; spinis axillanb. palulis albidis lomenlcllis accrosis; foil pam» ovalo-cuneans in ^cliolum bre\om atenuatis, superne br\isMiiR> 5-7-dentalis, denlib. oblusis spinula teraiiuaiM, ulrinq. rugoj»u>bimis \cluiiiu» rano-

- gnseis; Oorib. in axillis supremis glomeratis verticillatis, spinis eos paullo superantibus, basi suffullis; calycis tubo velutino 10-costato, limbo membranaceo dilato reticulato-venoso parce hirsuto bilabiali, labio superiore oblongo, basi attenuato, apice spinuloso, tubo longitudinali, inferiori multo amplius ovato rugoso-phacato sublobato, circumcirca nervis excurrentibus spinuloso, corollae labii superioris calycem superantis galea albo-hirsutissima 5 — Spinac semipollicares, folia cum petiolo 4-6 lin. longa, 2-3 lata. — Crescit in Persia australi.
2. *O. AUCHERI* Boiss.) c. 40. f — Caulibus fruticosis ramisque elongatis quadrangularibus, sub lente parvissime birtellis glabrisve; spinis axillaribus patulis lenibus glabrisculis; foliis paucis facile deciduis parvis sessilibus ovalibus oblongisve spinuloso-mucronatis integerrimis carnosulis hirtellis; floribus in axillis superioribus verticillatim dispositis, spinis basi suffultis, calycis glabri tubo conico viridi conato sternali, limbo bilabiali, labio superiore viridi ovato-lingulari obtusiusculo mucronulato calyce diraidio breviori, labio inferiori valde membranaceo-dilatato albo reticulato-venoso lobato, lobis lateralibus ovatis mucronatis, labio superiore aequalibus, intermedio tubum aequante subquadrato, transverse latio piano integro v. obsolete lobato, corollae labium superius calycis vix superantis galea albo-hirsuta bidensata. 5 — Spinac axillares: 4 lin. longae, folia 5-7 lin. longa, 3 lin. lata — Crescit in Persia australi.
3. *O. IMEGRIFOLIA* Bid. I. c. 100. f — Foliis oblongis integerrimis, utrinque subsensco-tomentosis; calycis labio superiore ovali integro. 6 — Rami obtuse tetragoni sulcati subsensco-pubescentes. Folia basi angustata, apice oblusa, utrinque ut in *Alphaca UaUmo* canescentia, juniora ramis aborlientibus in axillis fasciculata, spinis duabus subulalis reclinatis palentibus glabris in axilla quaque ad basin ramuli. Verticillas in parte aerea in racemum terminali dispositas, foliis floralibus caulibus conformibus. Bractee lanceolatae rigidae integerrime subpaleaceae pubescentes, apice spiosae, calycis lobum aequantes. Calyx *O. scartosae*, sed paulo major, limbo villosiore. — *Motocedra imigrifolia* R. Br. App. to Salt Abyss. — nati in Abyssinia.
4. *O. SCARIOSA* Bl. et R. — Foliis ovatis dentalibus rugosis, utrinque videntibus, calycis labio superiore ovato integro. 6 — Frutrix habitu fere *Royleae*. Rami tetragoni, tomentosis breviter pubescentibus. Folia breviter petiolata, vix pollicana, basi rotundato-cuneata, supra glabra v. tenuissime pubescenda, subtus tenuiter tomentosa concolona v. juniora canescentia verticillatis paucis unilifloris, cymis brevissime pedunculatis. Bractee lineares, tubo calycis parum breviores, canescentibus pubescentes. Calycis lobus striatus MIOSUS, 4-5 lin. longus, labium superius vix 1/2 lin. longum, in fenestra tubo aequilongum late ovalum, margine integerrimum subcrenatum. Corollae galea labio calycis paulo longior — *Molucella tcanota* R. Br. App. to Salt Abyss. — *Ginopodium fruitcosum* Forsk. Fl. Aegypti Arab. 107. — *Phlomis moluceotides* Vahl, Symb. I. 42. V. 14 — Habitat in Arabia felici et in Abyssinia.
5. *O. REPANDA* Bth. I. c. — Foliis ovatis dentalibus rugosis, subtus cano-tomentosis. Calycis labio superiore breviter triangulari. 6 — Affinis *O. scanotae*, differt ramis foliisque villosis, fulvis sublimbus dense cano-tomentosis, calycibus villosis et labii superioris forma. — *Molucella repanda* R. Br. App. to Salt Abyss. — Unilateralis in Abyssinia.

3002. *LEITZIA* R. Br.

(R. Br. Prodr. Dor. Nov. Boll. 501. — Meisner. d. m. cr. plant. Austral. I. 288. II. 106. — Bl. Labiat. gener. et spec. 002. cl. 744)

Saette I. BIMISTOMA Ehrenb. mss. ex Bth. in Wall. PL. As. rar. I. eo.

Calyx lobulosus, ore obliquo, laterale inferius productum, supra unilobum. Bractee numero aequales, calycem aequantes.

1. *L. IMICHA* R. Br. Prodr. Dor. Nov. Boll. 501. — Bth. Labiat. gener. et spec. 605. t. 1. — Herbacea. caule folisque subtus dense sericeo-tomentosis. Bractee multae unilobae villosae, ore obliquo, infra productum,

supra flsso, dentib. 3 Inferiorib. brevib. setaceis, superiorib. evanidis. 2f — Can-
les humiles subsimplices, pilis brevibus mollibus subsericis vestiti. Folia bre-
viter petiolata late ovata acutiuscula, grosse serrato-crenata, basi rotundata mollia
rugosa, supra viridia villosa, subtus pilis albidis sericis vestita, floralia conformia,
flores excedentia, suprema ex apice verticillasiri supremi eminentia. Verticillasiri
pauci distantes, ultra pollicem di a metro. Bractee numerosae, lineares
v. subulatae acutae villosae. Calyces floriferi bracteis breviores, fructiferi longe
producti, fere pollicares, 10-nervi, valde obliqui, supra profunde fissi. Corolla
calycem breviter excedens, densissime albo-villosa. — *Phlomis Indica* Lion. Spec.
plant. 820. — Habitat in insulis Madagascar et Johanna.

2. L. URTICAEFOLIA R. Br. I. c. — Bib. I. c. + - Herbacae, lenissime canes-
centii-lomentosa: verticillasiris multifloris globosis; calycib. villosis membra-
naceis, ore obliquo, infra producta, supra fissis, denlib. 8-10 brevissimis selaccis.
^ — Habitus et inflorescentia *L. indicae*. Caules semipedales v. vix pedales,
basi decumbentes ascendentes, parum ramosi, lomento leni canescentes. Folia
petiolata late ovata, grosse serrato-crenata, basi rotundata-cuneata lenia, ulrin-
que tomento lenissimo subcanescentia, demum glabrata, floralia conformia, flo-
res excedentia, suprema sterilia. Verticillasiri vix pollicem diametro, globosi
densi distantes. Bractee lanceolato-lineares acutae ciliae numerosae adpres-
sae, calyces aequantes. Calyces forma *L. Indicae*, sed minores, denlibus longius
mucronulatis. Corollae albae, tubo leni, intus omnino nudo. Galea brevis in-
tegra, labio duplo longior, lobi laterales ovales obtusi, medius maximus sub-
glipitalis marginalis bifidus, lacinae latae obtusae. — *Phlomis urticaefolia* Vahl,
Symbol. bot. III. 70. — *Leucas affinis* R. Br. in App. to Salt Abyss. — *Hemistoma*
ovatum Ehrenb. mss. — Habitat in Indiae orientalis peninsula, ad Lohargong in
Bundelkund et ad ripas fluminis Jumna, in Abyssinia et in Arabia.

Sectio II. LOXOSTOMA Bth. Labiat gener. et spec. 806.

Calyx tubulosus, ore obliquo, latere inferiore magis producto. Verticillasiri pau-
ciflori. Bractee minulae.

3. L. GLADHATA R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 504. f - Herbacae glabra: verticilla-
siri* 2-4-floris secundis; calycib. glabri*, ore obliquo, infra producto. supra vix
fisso, denlib. 10 subnullis. 2} — Tota planta saepe purpurascens. Caules elongati
decumbentes, parce foliosi tobramosi, an gulis aentli subasperis, caetemm uli
tota planta glabri. Folia petiolata ovata v. oblonga paniculata, utrinque viridia
paucivenia, floralia conformia. Verticillasiri axillares, 2-4-floris subsequendi. Ca-
lyces sessiles, 3-4-lineares, basi attenuati 10-striati glabri, apice purpurascens.
Corolla purpurascens? Annulus internus incompletus transversalis callosus, la-
bium superius oblongum emarginatum, inferius patens, lobo medio late emarginato.
— *Phlomis glabrata* Vahl, Symb. bot. I. 42. — Habitat in Africa austro-
orientali ad sinum Delagoa, in Arabia felici.

Sectio III. PHYSOLEUCAS Bth. I. o. 744.

Calyx inflatus, ore contracto aequali. Verticillasiri 0-10-flori. Bractee minulae.

4. L. INFLATA Bib. I. c. 744. — Fruticosa: foil, sessilib. orbiculatis, basi subcor-
datis, ulrinq. birsulis viridib., floralib. conformib.; verticillasiris 0-10-floris sub-
spicalis; bracteis minulis; calycib. ovalo-inflatis striatis, dentib. densis brevib.
ereclis, fauce intus subnuda. 5 — Crescit in deserto Arabiae.

Sectio IV. ORIHOLEUCAS Bth. in Wall. PL As. rar. I. 61. et Labiat. 606.

Verticillasiri laxiusculi, saepe pauciflori. Bractee minulae v. paucae selaccae
rarissime calyces subaequant. Calyx tubulosus v. subcampanulatus striatus ore
aequali v. vix obliquo, fauce subnuda, denlibus 10 creclis subulatis v. brevissi-
mis selaceis.

5. L. CHINENSIS R. Dr. I. c. — Bth. I. c. f - Suetulicosa: ramis sericco-tomen-
tosis; foil, late ovali urosse dentalis TUROMS villosis, subtus albidis; verticilla-
siris paucifloris; bracteis minulis; calycib. tomentosis infundibuliformib., limbo

aequali demum dilatato acute 10-dentato. % — Habitus *L. montanae*, *lanatae* etc. Rami divancati v. procumbentes, apice ascendentes tetragoni, pilis reflexis adpressis vestiti. Folia breviter petiolata viz pollicana, basi rotundato-truncata, floralia conformia, omnia mollissime villosa, supra viridia. Verticillas in ante anthesin 6-10-flon, sed flores plerique abortiunt et 2 v. 3 tantum malurescunt. Calyces fructiferi semipollicares reQexi, tomento pallido villosi, forma *BaUoiae tulgaru*, sed characteres corollae et genitalium omnino *Leucadts* — *Phlomu Chtnensts* Retz. Obs 11. 10 — Habitat in China et in Indiae orientalis peninsula

- 6 L. MOMAM Spr SysL veget. II. 742 — Bth. I. c. 007 f — Perennis v. suffruticosa ramis senceo-lomentosis; foliis ovalis serrato-crenatis rugosis, supra v. indub pubescentibus, subtus albo-lanatis, verticillas in multifloris, bracteis minutis, calycibus senceo-lanatis, ore aequali, dentibus brevissimis seiacis erectis. % — Rami et basi perenni sobliguosa ascendentes v. divancati, tomento albo uti foliorum pagina inferior et calyces dense vestiti. Folia pollicana, basi rotundato-truncata v. late cordata crassa mollia, floralia conformia. > verticillas in 15-20-flori distantes. Calyces 3 lin longi!, basi attenuati, apice 10-stnati. Corolla alba, tubus inlus transversim annulatus, galea densissime albo-villosa, labium galea duplo longius. — *Phlomu montana* Roth, INov plant spec 203 — Habitat in Indiae orientalis peninsula prope Maderaspatam.
- 7 L. OVATA Blh in Wall. PlanL Asiat. rar. I. 01. et Labial 607 — Perennans v. suffruticosa ramis senceo-tomentosis; foliis ovatis obscure crenatis rugosis, supra v. indub pubescentibus, subtus albo-lanatis, > verticillas in multifloris, bracteis minutis, calycibus pubescentibus, ore aequali, dentibus brevissimis seiacis erectis. % — Affinis *L. montanae* differt ramis elongate (bipedalibus et ultra), foliis majoribus obtusissimis, margine viz late crenatis v. subintegerrimis, floralibus superne minoribus et calycibus subviridibus pubescentibus nee senceo-lanatis — Habitu in regno Bomaaiuco ad ripas fluvii Irawaddi.
8. L. LANATA Blh. I. 1. e. — tomentosa v. laevigata: ramis albo-lanatis; foliis ovalis subcrenatis crassis rugosis, ntrinque mollissime albo-lanatis; verticillas in multifloris, bracteis minutis v. paucis seiacis, calycibus albo-lanatis, ore aequali truncato, dentibus brevissimis seiacis erectis ^ — Affinis / *montanae*, differt ~~lanata~~ tomentosa planae densa candida subsensu, foliis angustioribus minus profunde crenatis (orollac albac⁹ — *JUarrubium mollissimum* D Don, Prodr fl Nepal 112 — Habitat in Indiae orientalis vallibus provinciarum Kamaon, Sir mo re et Dehra Dhoon
- 9 I. MOLLISSIMA Wall Plant. Asiat. rar. I OS. et Bib Labial 007 - Perennis r. suffruticosa* ramis tetragonis adpresse tomentoso-villosis, foliis ovatis crenatis rugosis molliter villosis, subtus pallidis v. canescentibus; verticillas in multifloris, bracteis minutis, calycibus pubescentibus, ore aequali, dentibus brevissimis seiacis erectis 2l. — Habitus fere *L. montanae*, sed saepius elatior ramosior. Folia ^ emul pollicana v. viz pollicaria, inferiora oblusa, superiora aruta, basi rotundato-truncata > late cordata, breviter petiolata, floralia conformia \ verticillas in numerosi distantes 10-30-flon. Calyces *L. ocafae*, 3 lin longi, basi attenuati pubescentes striati sulcatis. Corolla alba⁹ v. saepius purpurea < rca >, lobo intus transversim annulato — Habitat in Indiae orientalis partibus > palensibus, in jugo Punduanum et in China.
10. L. HAULTOMA Blh in Wall. Plant Asml rar I (hi. et I abut GO) - Perennis ramis adpresse tomentoso-villosis, foliis ovatis serrato-crenatis rugosis molliter villosis, subtus canescentibus > rufescentibus, verticillas in paucifloris bracteis minutis, calycibus pubescentibus *ubincnis, ore obliquo, dentibus brevissimis setaceis erectis ^ — Foran / *molhuimac* tanctak, at differ re xdelur foliis majonibus acutiusculis, verticillas in paucifloris et calycibus longioribus subinacris - Habitat in India orientali ad Ilonghyr.
- U- L. TEBES Bib. I. I. c. c. — Perennis v. suffruticosa ramis lomentosis teretibus, foliis ovatis luberculatis, supra viridibus pubescentibus, subtus canescentibus. ^ x

- rugosis; verticillastris 6-10-floris; bracteis minutis; calycib. pubescentib., ore aequali, dentib. brevissimis setaceis erectis. 2l. — AfGnis *L. mollitxmae*, a qua differt ramis loretibus, folis minibus rugosis et flonibus in verticillastro paucionibus minibus. — Habitat in India orientali, in regno Burmannico ad ripas Irawaddi.
12. *L. STRIGOSA* Blh. I. I. c. c. — Herbacea: ramis tetragonis adpresse pubescentibus; foliis oblongo-lanceolatis vix serratis, supra vmdib. sngoso-hirtis, sublus rufo-canescens adpresse lomenosis; verticillastis paucifloris, bracteis minutis, calycib. pubescentibus, ore aequali, dentib. brevissimis. 2p O* — Rami elongati ascendentes, superne pauciflori. Folia sessilia, inferiora pollicana, superiora parva remota. Verticillastri remoli 2-0-flori, rami sub-10-flori. Flores / *ptlotae* — Habitat in India orientali prope Prome.
13. *L. ANGULARIS* Blh. I. I. c. c. — Herbacea procumbens* ramis acute tetragonis, angulis ciliatis subulatis; Toll breviter petiolatis ovatis crenatis rugosis, unguis sngoso-hispidis, verticillastis paucifloris; bracteis minutis, calycibus tubuloso-campanulatis villosis, ore aequali, dentibus seUceis. 2l. — Ab affinis *L. tngota* et *L. ptlota* differt folio mm forma et praesertim calycibus ut IU *L. nepetaefolia* subcampanulatis. — Habitat in Zeylama.
14. *L. PILOSA* Blh. in Wall. Plant AsiaL rar. I. 62. et Labial. 000. t — Perennis erecta ramis piloso-pubescentibus; foliis ovalis serrato-crenatis, utrinque vridib. pilosis v. sublus canescentibus-pubescentibus; verticillastis plurifloris; bracteis minutis, calycibus pubescentibus, ore aequali, dentibus brevissimis setaceis erectis 2l. — Caulis in var. a. erectus sesquipedalis, acute tetragonus vmdes, uti folia et calyces pilis rigidulis conspersi, in var. *fi pilis* brevibus adpressis tomentosi. Folia breviter petiolata, basi late cordata v. rotundata, saepius acuta, superiora angustiora, inferiora vix calyces excedentia. Verticillastri 2-20-flori. Flores fere *L. molhstxmae*, sed calyces parum longiores, dentibus nonnullis interdum subulatis elongatis. Corolla alba v. pallida purpurascens — *Phlomis pxtota* Nib. Flor. Ind. III 12'
- fi pubescent* Blh. I. I. c. c. — Folia sublus canescentibus-pubescentibus. — Habitat in India orientali, a. In Benghalo et ad ripas Irawaddi, *fi.* in Deyra Dhoun et Rajemahl.
15. *L. DECEMDENTATA* Sm. In Reel Cycl. ex Bth.!. 0. 000. — Annotata pubeaent: foliis ovatis crenatis tenuiter lomenosis utrinque viridibus. T. ubi de sae netentibus; verticillastis multifloris, inferioribus. T. omnibus. petiolo brevioribus; bracteis minutis; calycibus pubescentibus. stialis, ore aequali, dentibus brevibus. setaceis. 0? — Haec etiam species *L. mollitxmae* affinis est, sed constanter annua videtur. Folia tenuiora minus tomentosa et facile distinguenda petiolis floralium inferiorum semipollicanibus floret fere duplo excedentibus. — *Staehys decemdentata* Forst Prodr. no. 520 — *Phlomis decemdentata* Willd. Spec. pi III 124. — *Icucac tuckyotdet* Spr. Syst. tegt II 743. — Habitat in Asia orientali et in insulis* oceani Pacifici, in insulis Timor, Otaheiti, Corallinis et Maiden.
10. *L. FLACCIDA* R. Br. Prodr. flor. Nov. Holl 505 — Bib. I. c — Annuum glaberrimum: foliis ovatis crenatis membranaceis, utrinque viridibus glaberrimis, verticillastis multifloris petiolo brevioribus, bracteis minutis, calycibus glaberrimis, ore aequali, dentibus setaceis O — A. I. *decemdentata* vix ac ne vix glaberrima et foliis tenuioribus obtusioribus differt. — *Phlomis Moluccana* Roxb Fl. Ind. III 1] — *Leucas meUssacfolia* Bth. in Wall. Plant AsiaL rar. I. 02 — *L. part t ft or a* Bth. in Wall. I. c — Habitat in Nova Hollandia tropica, in insulis Moluccis et in regno Burmannico ad ripas Irawaddi
17. *L. ISEPETAEFOLIA* Blh. I. I. c. c. — Herbacea leniter pubescens Toll, erebns petiolatis ovato-rotundatis crenatis, utrinque vmdib. vix canescentibus, verticillastis paucifloris, bracteis minutis, calycibus tubuloso-campanulatis glaberrimis, ore aequali, dentibus brevibus aculis V O⁹ - Species foliorum et rami* forma distinctissima. Rami obtuse tetragoni, tenuissim⁹ tomentosi >. pubescentibus Folia

- longiusculo peliolala, limbo %k pollicarl obtuso, basi late Iruncato T. subcordalo, uinnque pubescenc, floralia conformia. Cal>ce> 4 lin longi, basi allenuali \mdes sinati, deniibus latis subaequalibus. — la Indiae onentalis peninsula.
- 18 L LOGIFOLIA Bth Labial 744 f — Caule herbaceo ercclo villosu; foil, lincari subintegemmis glabnuscis terlicillaslns 6-10-flons, braceis minulis; caljcb iurbinalo-lubulo»i«, ore acquali, denlib. broissimis selaceis rectis O² — A L *hyuopifoha* differt calycibus reclis, a L. *angustifolia* caule credo, folns angustionbus longionbus minusque dislanlibus. Herba videtur annua parum ramosa semipedalis v vix pedalis. Folia 2-3 pollices longa, uinnque vmdia, ranssime dente uno allerovo nolala scssilia, bail anguslola, floralia omnino conformia >ericiillastn vix semipollicem disiantcs. Calyces basi altenuati glabnuscili, apice sriati tenuiler pubescenles. Corolla L. *hyuoptfoltae*. — Crescil in India septentrionali-onentali ad vlas circa Pounab.
19. I ANGISTIFOLIA Wall. Plant. Asiat rar I 62 - Blh. 1 c 010 - Herbaea diffusa foil. oblongo-lanceolalii v. lincanb, basi anguslaliis glabnuscis, verticillaslns 5-20-flons, braceis mmutis, calycib lubulosis, ore aequali, denhb. brevisimissctacci* rech» 2l. — Habitus L *procumbent*^, sed dnersa folns multo longionbus, uinnque longe anguslaliis, flonbus in >erticillastro numcro»ionbus, cahobui* broionbus, deniibus bremsinm. — Habiiiai in Nepalia.
20. L PHOQMBENS Dcsf Mem mus Par XI. 7. 1. 3. Gg 2 - Bth I c | - Herbacca diffusa foil, ovato-lanceolalis subserratK glabnuscis, verticillaslns 2-6-floris, braceis minulis; calycib lubulosis, ore acquali, denlib. lanceolalo-subulalis creciis. 2]. — Tola planta feri glabra. Gaulc* e basi crassa perrni numerosi lenues, saepe bipedales el ultn parum ramosi leiragoni, fere glabn Folia infenora pollicana el ullra, supenora semipollicana lenuia acutiuscula, basi rondau T. cuneala peliolala lenoia, ulrioque viridia fere glabra, margino scrraturis panels noiata T iniegerrima. Calyces parum majores quam in L. *bt/lora*, fructifen saeplos reOcxl. Corolla L, *btflora**. — *PUomtis bt/lora* Roxb Fl. Ind. III 12 el Auel. plur. (non Vahl.) — *Nepeta Hdica* Burm. Fl. Ind. 126 - HabiiUI in India onentali infenore vulgans, in Bundelkund, Benghalo, in peninsula el in 7e)lanja.
- 21 L DIFLORA R fir Prodr fl >o\ Holl. 501. - Dili I c f - Herbaea diffusa: foil (Mans grosse dentalis, ulnnq pube^contib., \erlicillaslris biflons, braceiei minuiiN, cal)cb lubulosis, ore acquali, denlib subulalis Q* — Rami 1-2-pedales, parum ramosi leiragoni, adresse pubescenles v lomenlo^i Folia remoia semipollicana, uinnque viridia v pallida, molliler pubesrenua subrugosa acuaia •• oblusa, floralia conformia, suprema saepe calycibus subbrc^iora. Mores in >erlicillaslro bini subsessiles Calyces fruciifin palenlen \. nuianies, fere 4 lin longi» basi anguslali slriali pubeiccnles, deniibus aequalibus t aliernis bre\ioribuf* Corollae albae tabus Inlus obscure annulalus. - *Phlomu btflora* >ahl, Sjmb bok HI 77. - *teucat folut rotundu etc.* Burm Tbes Ze)l. 140. t 03. fig 1. — Habiiiai in Indiae onentalis peninsula el in insula Zejlania
22. L BE>rilA>IIA>4 Hook el Am fiol. Beech >oy 204 - Perennn* ~~herbaea~~ diffusa adpreknc canescenli-pubescens ram is tetragons, foil Uic o^ain, *^uP^{ri} mrdium grouse denlalu lacvib, molliler ac densius pube^cenlib. ^criicillasiri' sub-6-H-Qons peliolum duplo v iriplo luperanlib, braceis minulis, cal)Civ* lubulosis pubescentib slnalis, ore aequali, denlib. bre>ib seiiceo-acuininal* recurvo-paiulis ^ — *Ballot a pilota* Lour I-lor Cochbinrh II 442* - Habiiiai •• Caolon Chinensium.
- 23 I PL'BESfK>S Bib I c 610 — Herbacca ramn lenuiler pubescenlib, fo^{ll#} o\atis cremijH, ba<i iruncatM tenuib, ulnnq >indib % Miblut pallide pub<*-ceniib, terdcillasiris dense mulnflons, braceiei subulau^, cal>ce broiorib, C*^ lycis lubulosi ore aequali, denlib ^ubulatis rectit ^T O* — Ab •fltni L *marr**~ Motd< differ! fob is calyckbusque lenuiler pubeiceolibus nee albo-lanaiis. F^1*

angustiora longius petiolata non rugosa. Bractea breviflora. Flores et Inflorescentia omnino *t. marruboides* — *I. marruboides* *O. glabrata* Bib. in Wall. Pl. As. rar. I. 61. — Dabit in Indiae orientalibus peninsula.

24. *L. MARRUBIOIDES* *Debt. Mém. mus. Par. VI. 6. I. 3. fig. 1.* — Bib. I. c. 611 f. — *terbacea*: ramis pubescenti-lanalis, Toll. late ovati crenalis, basi subcordatis rugosis, supra hispidis, sublus albo-lanalis, verticillas dense multifloris; bracteis subulatis calycem subaequantibus; calycis lobulosis ore aequalibus. Bubulalis reclinata. — Caules basi ramosi procumbentes, rami pedales sesquipedalesve subsimplices tetragoni, pilis albidis reflexo-patentibus praesertim in parte superiore vestiti. Folia circiter pollicaria, infera petiolata, loralia subsessilia et latiora, omnia basi late cordata v. truncata, crenatis grossis obtusis v. trunculatis. Verticillas remotae, dense 30-florae et ultra. Bracteae et calyces pilis mollissimis senectis villosi. Calyces 3-4 lin. longi, dentibus parum aequalibus, faux inclusiva nuda. Corollae albae lobus intus transversim annulatus, galea praesertim margine dense villosa, labium galea duplo longius, lobo medio latissimo emarginato. — Habitat in Indiae orientalis peninsula.

25. *L. JAVAMICA* Bib. I. c. — Caule ramoso scandente, ramis ad angulos obverse pilosis, foliis ovatis grosse serratis, basi acutiusculis et inaequaliter, utrinque pubescentibus; verticillas 5-10-floris; calycibus oblongis pubescentibus. 10-dentatis, dentibus subulatis aequalibus brevioribus. 2-lin. — *Phlomis Chinensis* Blume, Bijdragen 829. (non Reli.)

fi. foliis minoribus, utrinque mollioribus pubescentibus. — Habitat in Java inter frutices ad ripas Quivorum, *fi.* in declivitatibus intra montem Burangrang et Tankuwan Paku.

Sectio V. *ASTRODON* Bth. in Wall. Pl. As. rar. I. 61. et Lablat. 611.

Calyx lobulosus, ore aequali, fauce saepe villosissima, dentibus 10, saepe immatura strobiliformibus. Verticillas saepius globosae multiflorae solitariae > *pauci, superis nunc capitatis. Bracteae calycibus breviores

9B. *L. SISTRICHOCOSA* Bth. 1. c. Oil - Ramis rufis, hirsutis, sessilibus oblongo-lanceolatis linearibus inaequaliter, supra viridibus, subtus albo-tomentosis; bractea tubulosa; calycis lobis villis ore truncato villosis, dentibus breviter aequalibus. 3-6 lin. - Caule a basi caetera lignota plures ascendentes v. erecti aequaliter v. pedales, basi foliosi, laetia superiori subnudi, pilis rufis in parte inferiore lobulatis versus apicem ramorum adpressis densis villosis. Folia 8-10 lin. longa, margine abbreviata, basi parum angustata, supra pilis longis rigidis rufis dense hirsuta, sublus albo-tomentosa, nervo medio prominente hirsuto, floralium paria duo ad apices ramorum parum distincta, saepe sterile. Verticillas sub-10-floris. Bracteae acutae, calycis saepius dimidio breviores. Corollae *L. ieranthoides*, tubo inclusiva annulato. — Habitat in Indiae orientalibus peninsulae montibus Nilgherri dicitur.

87. *L. ROSEMARINIFOLIA* Bib. in Wall. Plant. Asiae rarior I. 01. et Lablat. 012. - Suffruticosa ramis adpressis villosis; foliis sessilibus linearibus, inaequaliter, supra concavo-convexis, sublus albo-tomentosis; bracteis lanceolatis linearibus, calycis lobis ore truncato villosis, dentibus brevissimis subaequantibus. 2-lin. — *L. tufruhmgae* affinis, sed characteribus supra notatis distincta. Rami humiles, pilis vix rufescentibus. Folia pollicaria, multo angustiora quam in *L. tufruhmgae*. Bracteis lodes molliter villosae acutissimae, calyces aequales. — Habitat in Indiae orientalis peninsula.

88. *L. BELAMIEMIFOLIA* Desf. Mém. mus. Par. XI. 2. I. 1. Gg. 1. -)th I r - Canie basi fruticosa, ramis senectate lanatis subreflexis, foliis oppositis multinerviis oblongo-ellipticis lanceolatis integerrimis, utrinque scabris, supra vinctis, sublus candidis, bracteis linearibus calycis brevioribus, calycis lobis ore truncato villosis, dentibus brevissimis subaequantibus. 5-lin. — *L. termifolia*, haec differt foliis oppositis brevioribus minus candidis, ramis saepius rufescentibus. — Ubi in Indiae orientalis peninsulae montibus Nilgherri dicitur.

29. *L. TERMFOLIA* Desf. I. c. 4. U 1. fig. 2. - Bib. I. c. 012. f - Caule basi fruticoso; ramis dense tomentosis; foliis, ternatim verticillatis sessilibus, oblongo-lanceolatis integerrimis, utrinque scriccis, sublus candidissimis; bracteis linearibus; calycibus sericeo-lanatis, ore truncato villosis, dentibus brevissimis subpaucis. 2|. — Rami lanati, lana brevi densa albida v. rufescente vestiti, nisi folia ternatim verticillata. Folia 1-1'-pollicaria obtusa v. mucronulata, margine subtus recurvo, basi parum angustata, supra pilis odpressis sericeis canescentia, sublus lana brevi sericea v. subfloccosa candidissima, floralia minora, suprema vix calyces excedentia. Verticillastri pauci distincti, versus apices ramorum 10-20-flori. Bracteae numerosae, molliter sericeo-lanatae aculeae mulicae, calycem florentem subaequant, fructiferi breviores. Calyx laevis lubulosus, dentibus aculeis, lana paucis subbrevioribus. Corollae galea villis albis densissime obsessa, tubus intus exannulatus. — Habitat in Indiae orientalis peninsulae montibus Nilgherri dictis.
30. *L. LANCEAEFOLIA* Desf. I. c. 5. U 2. fig. 2. - Bib. I. c. f - Caule erecto rufo-tomentoso; foliis, oblongo-lanceolatis subintegerrimis, supra viridibus pubescentibus, sublus canescentibus tomentoso-pubescentibus; bracteis calyces aequantibus; calycibus rufo-villosis, ore truncato pubescente, dentibus brevissimis bracteisque rigidis mucronulatis. 5 — Caulis basi lignosus?, rami erecti duri ultra pedales, pilis adpressis rufis dense vestiti. Folia basi in petiolum brevem angustata 3-4-pollicaria, supra viridia, pilis brevissimis conspersa, subtus pilis subsericis adpressis cano-lomentosa, saepissime integerrima, rarius dentibus paucis remotis notata. Verticillastri ultra pollicem diametro. Corollae galea pilis niveis dense villosa, tubus intus tenuissime pubescens exannulatus. — Habitat in Indiae orientalis peninsulae montibus Nilgherri dictis.
31. *L. STELLIGERA* Wall. Plant. Asiatic. rar. I. 61. - Bth. I. c. 6M. f - * Herbacea erecta pubescens sobcanescens: foliis, oblongo-lanceolatis obtuse serratis glabris v. tenuissime pubescentibus; calycibus tomentosis, ore truncato, intus villosis, dentibus 10 bracteisque ramulatis mollibus patentibus, apice revolutis. * — Habitat fere *L. linifolia**. — Caulis basi lignosus? — Habitat fere *L. linifolia**. — Caulis basi lignosus? — Habitat fere *L. linifolia**. Folia 2-3-pollicaria petiolo brevem angustata supra viridia, subtus pallida. Verticillastri saepe pollicem diametro, ad apices ramorum solitarii v. praesertim in ramis primariis 2-3 approximati. Calyces et bracteae tomento molli canescentes. Dentibus calycini breves molles lineares, in calyce fructifero patentissimi, nisi bractearum apices recurvo-hamati. Corolla alba, tubus intus transversim annulatus, calca pilis albis densissimis hirsuta. — In India orientali ad Aurungabad.
32. *L. LAUIFOLIA* Desf. I. c. 4. I. 2. fig. 1. - Bib. 1. c. - Herbacea rufo-villosa: foliis, cordato-ovatis, supra rufo-villosis, sublus cano-lomentosis; bracteis lanceolato-linearibus calyces aequantibus; calycis sericei ore truncato aequali, intus villosis, dentibus subulatis, demum stellato-patentibus. ?|> — Caulis erectus ramis bipedibus. Folia breviter crenata 2-2'-pollicaria rugosa mollia, floralia conformia multo minora. Verticillastri pauci, versus apices ramorum aequales densi multiflori. Florea *L. lanceatifolia*. — Habitat in Indiae orientalis peninsulae montibus Nilgherri dictis.
33. *L. IIIKTA* Spr. Syst. veget. Ub. II. 7437 - Bth. I. c. f - Suffruticosa?: ramis rufescentibus villosis; foliis, ovalibus oblongisve subcrenatis, utrinque viridibus binatis; bracteis calyce aequantibus; calycibus villosis, ore truncato villosissimo, dentibus subulatis brevibus stellato-patentibus mulicis. ^ — Herba dura perennans?, basi subulata? saepius humilis divaricato-ramosissima, vix semipedalis, rami rariose elongati subpedales, consaniter rufo-pubescentes hispide. Folia vix pollicaria veoso-rugosa obtusa, pilis rufis rigidis magis minusve hirsuta, floralia angustiora, omnia basi rotundata v. angustata, breviter petiolata. Verticillastri saepius ad apicem ramorum sulcati. Bracteae et calyces dense rufo-villosi. Folia ad faucem calycis densissime sericei. Corollae galea pilis albis densissime obsessa, tubus intus annulatus. - *Phlomis hirta* Heyne ex Rolb, Not. Pi. tpec. 2M? - *Uctu Miomihemifolia* Bth. in Wall. Plant. Asiae rar. 1.61* (000 Deif.) - Habitat in Indiae orientalis peninsulae.

31. *L. VESTITA* Blh. I. I. c. c. — Herbaceo crecra caule rufescenli-hirsuissimo, foil, ovato-oblongis crenalis hirtis vmdib. v. sublus vix canescentib.; bracieis lineanb. ciliato-hirtis; calycib. hirtis, ore iruncato subacquali, intus hirsuissimo, denlib. subulalis vix aequalib. stellato-palenticibus. 2. — Caulis robustior quam in *L. ciliata*. Folia crassa, supra pilis rugosis hirtis, sublus birta v. pilis canescentibus, apice obtusa, basi rotundata v. angustata. Verticillastri demum 15 lin. diametro. Calyces dense villosi, dentes vix lineam longi, faux pili densissimis clause. Corollae lobus intus transversim annulatus, galea densissimae rufo-hirta — Habitat in Indiae orientalis provincia Silhet in peninsulae montibus Madurensibus.
35. *L. CILIATA* Bib. in Wall. Pl. As. rar. I. 61. et Labial. 614. f. — Herba crecra pubescens: Toll, ovato-lanceolatis oblongisve serrato-crenatis, utrinque vinctis; bracieis lineanb. ciliatis-hirtis, calycib. lobulosis, ore truncato aequali, lobis pilobulo v. nudo, denlib. elongatis subulalis hirtis stellato-palenticibus. 2. — Herba 1-2-pedalis, caulis ramique pilis sparse obtuse adpressis pubescentibus, apice subrufescentes. Folia tenuia 2-3-pollicaria, utraque angustata, in var. *a* fere glabra, nervis tantum rufo-pubescentibus, in var. *0* sparse hispida, floralia confertissima, omnia basi in pedicellum brevem angustata. Verticillastri pauci, versus apices ramorum distantes, fractiferi pollicem diametro. Bractee calycei aequales. Calyces basi glaberrimi, apice tritici, faux lobis nudis, in var. *0*, pilis confertibus subclausis, dentes fere 8 lin. longi, Corolla *L. Zeylancae*, lobus intus transversim annulatus.
- fi. hirsuta*: foil, obtusioribus calycibus. hirsutioribus. — Habitat in India orientali, in peninsula.
- Seotto VI. *PLAGIOTOMA* Bth. in Wall. Pl. As. rar. I. 60. et Labial. 614.
- Calyx turbidus v. lobulosus, ore obliquo, supra magis productus. Verticillastri saepius globosi multiflori solitarii v. pauci, supremi nunc capitati. Bractee calycibus aequales v. paulo breviores.
30. *L. STRICTA* Bib. in Wall. Pl. As. rar. I. 61. et Labial. 614. — Herba crecra siccata pubescenti-hirta: foil, oblongo-lanceolatis v. lineanb. subintegerrimis, verticillastri multiflori solitarii; bracieis subulalis hirtis; calycibus hirtis subserratis, ore obliquo, lobis subulatis aequalibus. 2. — Caulis erectus, parce ramosus, eate tetragonus teretis. Folia paucis nervis, floralia caulibus eodem modo majora. Verticillastri 1-1 capitata territorialia formantes, 15-30-flora. Bractee subulatae, calycem florentem aequantes. Calyx fructifer elongatus, basi glaber subaequalis, apice parum incurvus, ore valde obliquo, denlibus longioribus quam in caeteris speciebus hujus sectionis. Corolla *L. Zeylancae*. — Habitat in Indiae orientalis peninsula.
37. *L. ZELAMCA* R. Br. Prodr. flor. Nov. Holland. MM. — Blh. 1 c. f. — Herba crecra pubescenti-hirta: foil, oblongo-lanceolatis v. lineanb. integerrimis v. paucicrenatis; verticillastri densis multifloris dimidialis v. subaequalibus; bracteis linearibus hirtis; calycibus basi glabris subaequalibus, apice serialibus subincurvis, ore obliquo, denlib. abbreviatis, supremis majoribus. O — Aoua subpedalis ramosa, rami pilis palenticibus hirtis letragonis vinctis. Folia distans, basi in pedicellum brevem angustata, apice obtuse acuminate, margine integerrima v. denlibus paucis remotis nuda, utrinque intense vincta paucicrenata, pilis raris pubescentibus demum glabrata. Verticillastri 1-2, ad apices ramorum 10-80-flora, saepius nigrescentes. Calyces forma fere *L. atperae*, sed glabrescentes, vix apice serialibus, denlibus longioribus magis inaequalibus. Corolla major alba — *Phlomis Zeylamca* Linn. Spec. plant. 820 (non Rib) — *Leonurus Marrubastrum* Burm. FI. Ind. 127 (non 1 in) — Habitat in Zeylanca, in regno Pegu prope Rangoon in Java.
38. *L. DIFFUSA* Dill. I. c. 615. — Herba crecra diffusa pubescenti-hirta. Toll oblonga v. lineanb. integerrimis, verticillastri paucis dimidiatis remotis linearibus hirtis, calycibus basi glabris subaequalibus, apice serialibus incurvis.

ore obliquo, denlib brevib. vlx Inaequalibus. © — Rami elongati tenues, 1-1%-pedales. Folia subsessilia remota, viz semipollicana hispidula, floralia conformia, suprema substentia. Verticillas remoti secundi, 4-12-flori. Bractea paucae, calyce breviores. Calyces breves, ore truncato, dentibus brevissimis. Caeterum *L. asperae* valde affinis — *L. dimidiata* Blh. in Wall PI. As. rar. (non Rolh) I 60. — Habitat in Indiae orientalis peninsula.

39 L. in SSO PI FOLIA Bib. in Wall PI. As. rar. I 60. et Labiat. 015. - Herbacea perennis mullicaolis ascendens piloso-hirta. Ml. oblongo-lineanb. integerrimis, verticillatis densis subaequalib.; bracteis lineanb. TIX pilosis, calycibus glabris subavenis v. apice viz sinatis, pilis paucis hirsutis, ore obliquo truncato, denlib. minus selaceis birtis 2|. — Caulis e basi crassa sublignosa plures ascendentes ramosi, pilis praesertim in parte superiore numerosis hirsutis, semipedales v. vix pedales. Folia 1-1 1/2 pollicaria oblusa, basi angustata, supra el subul ad venas pilis rigidis hirsuta, floralia conformia. Verticillas 10-20-flori dislanles. Bractea calyces aequales. Calyces turbinali, basi angustati incum, fere glabri, apice viz striati dilatati, ore truncato brevissime 10-dentato. Corolla alba? *I. Zeylantcae*, lobus inlus oblique piloso-annulatus, galea calyce dimidio longior integerrima hirsutissima, labium in fere as galea subtriplo longius. — Habitat in Indiae orientalis montibus Nepalensibus et Kamaonensibus et in Decra Dhoon.

40 L ASPERA Spreng Syst. veget II. 743. — Bib. I. c. — Herbacea pubescenti-hirta: foliis oblongis v. lineanb. subcrenatis viridibus; verticillas densis aequalibus; bracteis oblongo-lineanb. subnatisve hirsutis; calycibus basi glabris subavenis, apice striatis subincurvis, ore obliquo, dentibus brevibus. viz inaequalibus. O — Uerba annua, saepe erecta, semipedalis v. viz pedalis, caulis breviter hispidus. Y. lomenoso-pubescentis, ramis glabris. Folia dislanlia, breviter petiolata, inlegenima t. paucidentata, floralia conformia, suprema saepe sleriha. Verticillas plerumque 10-12-flori, viz fealpollicem diametro. Bractea calycem aequantem flordis. C. l. r. v. M. obliquo t. recto, dentibus reetis. Corolla calycem breviter excedens alba, tabul annulus internus transversalis. In var. I caulis strictior, folia longiora, ad apices ramorum crebriora, verticillas parvi approximati el tola plania viz pubescens, sed vix ul species propria habenda. Caeterum haec species statura et hirsutis magnopere tanat el forsan, cum *L. dimidiata* et *hyssopifolia*, *L. Zeylantcae* mra vanlas est — *Phlomis aspera* Willd Enum pi hort. Berol II 621 — *Phlomis Plukenetii* Roth, Nov pi. spec. 261 • — *Leucas Hukerianii* Spreng. Syst. veget. II 743 * — *Phlomis esculenta* Roxb. Fl. Ind. III 10 — *Phlomis Cephalotus* var. Blume, Diederichsen 830? — *Tumba Rhedei*, Hort. Malab X 181. t. 01T

*fi. Hiyafina** verticillas parvis numerosis approximalis — *I. Vvjhtta*** Blh in Wall PI As. rar. 1.60. — Habitat in India orientali a jugo Himalayensi secus flumen Jumna usque ad Allahabad, in peninsula, in insula Maunlio, el Bourbonna, in Java et in insulis Philippinis.

41 L. MT4>S Spreng Syst. veget II. 743. — Blh I c f - Herbacea pubescenti-hirta: foliis ovato-oblongis subcrenatis viridibus, verticillas densis multilobis, bracteis oblongis v. lanceolatis, calycibus pubescentibus sinatis, fructifens alba cloogilis incurvis, apice nulanli-reflexis, ore obliquo, denlib. lineanb. bimib. til inaequilanlis 2f — Kxemplana suppetentia manca, sed ob calycum formam speciem distinctissimam demonstrant. Rami pubescentibus > apice hirsuti. Folia latiora quam in *L. aspera*, ramis paucis lalis obscuro verticillatis axillaris, pollicem circiter diametro. Bractea ciliato-hirta. Calycis pars nulanli saepe parva erecta longior, apice profunde lobata, dentibus acutis simis (corolla parva) — *Phlomis nutans* Kolh, Nov pi spec 963 - *leucas decuna* Willd in Wall. PI. As. rar. I 60 — Habitat in Indiae orientalis peninsula, prope Segara in ad ripam fluvii Iraaddi

^ L. DIMIDIATA Spreng I c - Blh Labiat 610 (occ alibi) - Herbacea pubescenti-hirta foliis ovato-oblongis subcrenatis viridibus, verticillis multi flori

subsollaris terminalibus; bracteis linearibus-subulatis hirsutis; calycibus basi glabris
 • ubavenis, apice striatis incurvo-reOxi., ore obliquo, dentibus brevibus vix inaequalibus. 2]. — *L. nuianli* valde affinis, differt calycibus brevioribus, bracteis
 subulatis, verticillasris solitariis et habitu foliisque potius *L. Zeylanicae* a qua
 calycibus distinguitur. — *Phlomis dimidiata* Roth, Nov. pi. sp. 264. — *L. nutatu*
 Bth. in Wall. Pl. As. rar. 1.60. (vix Spreng.) — Habitat in India orientali, in regno
 Burmannico ad ripas fluv. Irawaddi.

43. *L. CEPHALOTES* Spreng. 1. c. — Bth. Labial. 616. f — Herbacea pubescenti-
 hirta: foliis ovatis oblongisve subserratis viridibus; verticillasris subsolitariis ma-
 ximis globosis dense multifloris; bracteis ovalo-lanceolatis acutis imbricatis;
 calycibus apice serialis subvillosis, ore obliquo, dentibus subulatis brevibus vix inae-
 qualibus. 2] — Herba subpedalis, erecta v. basi decumbens ramosa, rami pu-
 bescentes v. pilis paucis hirti. Folia petiolata, 2—4—pollicaria, basi angu-
 lato-cuneata, supra hispidula, sublus pubescens, rarius utrinque glabrata,
 Dorsalia conformia, suprema e summitate verticillastri eminentia. Verticillastri
 terminates, sesquipollicem el ulira diametro. Bractee virides submembranaceae,
 margine el nervo medio ciliato-hirtae. calyce. aequantes. Calyces basi mem-
 branacei laeves, apice nervf. 10 elevati. ciliati. faux intus. pilis, paucis. ciliata.
 Corolla alba, labium inferium maximum obcordatum, **annulus intra**

in Benghalo ad ripa. Gangis, In peninsula. P... itto, In Nepalia et

44. *L. MARTINICENSIS* R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 504. - Blh. I. c. 617 t - Her-
 bacea pubescens, vii canescens: verticillastri. di. Untibus maiori. globosis null
 l. nor. s; bracteis lanceolato-subulatis; calycibus membranaceis incurvis, ore obli-
 quo superne produciore, dentibus subdenis subulatis, supremo lomrissimo n -
 Herba erecta, 1-2-pedalis, caulis pilis brevibus pubescens. 0 hZ ^7
 Mia petiolata ovala crenata, basi rotundata v. saepius cuneata, floralibus augu-
 latis, suprema lanceolata subserrata, omnia rugosa, utrinque pubescentia. viri-
 dia, subtus pallidiora.
**numerosae subulatae
 aucti, basi subinflati e
 ascendente caeteris d
 nulis alba villosa, tubo intus exannul**
 Amer. 173. t. 177. fig. 75. — *Phlomis* **ai2**
 — *Phlo*

**poll. diametro. Bractee
 Calyces fructiferi valde
 d, dente supremo rigido
 verticillastri perva te-
 nepodium Martinicense Jacq. Pl.
 de Swart. Prodr. fl. Ind. occ. 88.**
 — *Caribaea* Jacq. Ic. m. I. II. t. na — *ImmJim* **parviflor** Moench,
 Meth. pi. 4011 - *Phlomis molli*, G. Huin. Betkr. pi. Gain. SO. - Hirtula Triniri,
 orbis iropicis, in Indiae orientalis regno Burmannico prope montem Taomi Don
 In Madagascariae provincia Emirnensi, In Africa Iropica occidentali et in Ameri-
 Iropica, in Indiae occidentali ioulii Triniutis et Sancti Dominici et in Brasilia

«. *L. UNIFOUA* Spreng. I. c. - Bth. 1. e. - Herbacea ereu, ten... canes-
 cenn-pubescens. T. tomenlou: foliis oblongo-linearibus. Inlegerrima T. remote, or-
 raus; verticillastri: tadi subaequalibus. multiaori. j bractea linearibus. canescens
 calycibus canescens. r. l. bri. ve aubayoia, ., pWB. elongati., ore ». | d. « X, J r
 dentibus inrenonb. brevissimis, supremo maximo. % - Herba 1, 1-2-pedalis
 miosa, caule foliis calycibusque tomento tenniamino canescentibus. Polla 2 T
 pohcana, basi in petiojum angustata, floralibus conformia, Verticillastri
 apices ramorum 2-4 distincti: in Omnis disum, supremi s. g. plus r. pro. masti,
 10-30. Oxi. Bractee setaeae lomentosae, calyce fructifero dimidio brevior
 Calyx ovalis, basi unciali., ore supra producto, infra lisso d ^ e « 1
 ximo acutissimo, lateralibus, utrinque tribus, minutis; MU ^ . . . taiZ ^ ^ *
 nidi. Corolla I. *Zeylanicae* alba. — *Phlomis linifolia* Roth 1. c. 200. — **omni**
anica Roxb. Fl. Ind. III. 9. — Linn. Syst. veg. 450. — Jacq. Ic. rar. I. 11. t. 111.
conurus Indicus Burm. Fl. Ind. 127. — *Herba admirationis* Rumph, Herb
 Amb. VI. 30. , , , O , , . . u a , U t . « . orientali, in Benghalo et peninsula

vulgatissima, in insulii Madagascaria, Maoritio, Bourbonla, Java, Douroa Molucarum et in Pbilippinis.

t *Species e genere jxcludenda.*

L. QUINQUEDENTATA R. Br. = LASIOGORYS ABYSSIMCA.

3003. LEOXOTIS R. Br.

(R. fir. Prodr. fl. Nov. Holland. 301. — Meisn. Gener. pi. vascular. I. 288. II. 196. - Bib. Labial, gener. et spec. 618. et 744.)

1. L. NEPETAEFOLIA R. Br. 1. c. - Btb. I. c. f - Bot. Regist. t. 281. - Hook. Bot. Magaz. t 3700. — Herbacea: foil, ovatis crenalis; calycis denlib. omnib. spinosis, supremo naximo ovalo; corollis (coccineis) calyce vii duplo longioribus. O — Calyx craisos erectos, 2-7-pedalis, obtuse telragonus sulcatus, tenuiter tomentosus. Folia longe peliolata, 2-4-pollicaria, obtusa v. rarius acutiuscula, irregulariter crenala, basi Iruncata v. subcordata integerrima, in pctiolum breviler decarrenlia, ulrtnque vlrldia, tenuiter cano-lomentosa v. glabra, floralia oblongo-lanceolata, snprema parva. Verlicillasri pauci dislantes, fructiferi 2-3 pollices diametro, saepe nllra 100-flori. Bractea numerosae, lanceolato-lineares v. subulalae virides, apice subspinescentes glabrae v. tenuiter lomctosae. Calyces demum fere pollicares tubulosi elongali, basi attenuali glabri, nervis obscuris medio viridibus striati, sob ore piloso-pubescentes, apice glabri, dcnle supremo maximo ovato acuto spinoso, tribus loferioribus lanceolalis aculissimis rigidis subreflexo-palentibus, lateralibas ntrinque 2-3 brevibus acutis ereclis. Corolla coccinea, extas villesa, dimidio brevior quam in *L. Leonuro*, duplo longior quam in *L pallida*. — *Phlomis nepetaefolia* Linn. Spec. plant 820. — *Leonurut globosus* Moench, Melh. pi. 400. — *Leonurut nepetaefolius* Mill. Diet. no. 2. — Uabitat in Africa el Asia tropica et bine Inde in America vcrosimililer ex orbe vcicri allata, ID Africa auttro-oriental! ad sinum Delagoa, in insulis Madagascaria, MaariUo et lava, in Indlae orlenlaUs ptaluola, In Bengbalo, India occdentali ol In Brasilia.

2. L. RAINERIANA Ttsianl, rOrto boUn. dl Padova 1842. el Illustrazione delta piante nuove o rare 11.20. f — Suffruticosa ramosa canescens: foil, ovatis, utrinq. attenuate crenatis; verticillastris densissimis bemispbaericis; calycis lanuginosi dentib. omnib. subulato-spinosis, allernis minorib., supremo maximo ovalo cuspidato; corollis calyce duplo longiorib.; filamenlis basi lauginosi, anihararum loculis conliguis truncatis obtusis. 2(— Flores fulvo-coccinci. Difforl a praecedente filamentis lanuginosis, antberarum loculis conliguis el caule lignescenie. — Crescit in Africa boreali circa Kassan.

3. L. PALLIDA Bib. 1. c. 010. et 744. — Herbacea: foil, ovalis aculis obtuse serratis; calycis dentib. omnib. iplnolis, supremo maximo ovalo; corollis (liaiosceotib.) calyces vlx excedentibus. O - Valdc affirm *L nepetaefoliae*, clifferl folii* acutioribus brevlas peiolatis et praeserlim corollis minoribus flavescenibus. Calyces omnino I. *nipptoeifilii*. — *Phlowtu pallida* Schum. Beskr. pi. Guin. 26& " — *Phlomis African** Palis, de Beaov. Fl. Owtr. et Ben. II. Si. l. 111. - Habitat in Africa aequinociiali-occidentali, in Senegambia, in Guinea prope Quila el trsue in Arabiae deserto Seonaar et la regno Owariensi.

4. L. OVATA Spr. Syst. vegcl. II. 741 - Bib. I. c. 010. t - Herbacea: foil, ovalij incisorenatis; calycis dentib. omnib. spinosis, supremo maiimo ovalo i corollis* calyce subtriplo longioribus. Q? — Caulis erectus pluripedalis, obtuse tetragonal sulcatus tomenloso-pubescentis. Folia vix pollicaria, profunde el obtuse creosui basi late truncata v. subcordata rogosa, supra tenuilrr pubescentia, subtus ••" noia, tomentosopubescentia, superiora remoia acuiora subincisa, floralia oblonga, basi angulata, pauidcnlata. Verlicilla«tri maximi *L nepetaefoliae*. Brae teae lanceolalo-lineares pungentes. Calyces forma et magnitudine *L nepetaefoliae* sed glabri v. tomenio teouissimo subcanescenles, rarius dorso pllis paacissimw_r hiU. Corolla magnitudine *U Ummri*, aoramiaca. - *Pklomis Uonitit* Una. M^{*DI<}
 62 - OablUI In Africa ausirali extrairopica.

5. *L. INTERMEDIA* Lindl. Bot. Reg. 1.1850. - Blh. 1. c. 610. t - Herbacea T. saffruticosa: foil, ovato-lanceolatis inciso-dentalis; verticillasris densissimis globosis; calycib. mulicis villosis; corollis calyce subtriplo longioribus. 2* — Habitus *L. ovatae*, sed folia duplo triplo longiora, obtuse acuminata, tomeoto paginae inferioris uti peiolorum et ramorum densiore. Verticillastri *L. ovatae* v. parum minores. Calyces ejusdem magnitudinis, sed pilis brevibus mollibus dense villosi et denlibus (8-13) brevissimis oblusis muticis, supremo laliore vix longiore. Corolla *L. Leonuri*, parum brevior, auranliaca. — Habitat in Africa australi ad sinum Algoa.
6. *L. MOLLIS* E. Mey. Comment, pi. Afric. austr. I. 242. — Foil, late ovalia, olring. caulq. molliter villosolomentosis; calycis dentib. omnib. spinosis, supremo maximo ovalo-lanceolato; corollis calyce villosol duplo longioribus. Q? — Crescit in Promonlorio bonae spei.
7. *L. DYSOPUYLLA* E. Mey. 1. c. - Foil, ovalo-lanceolalis denlalis, utrinq. mollissime villosis; calycib. villosis, denlib. omnib. spinosis, supremo maximo ovalo; corollis calyce subtriplo longioribus. 0? — A *L. intermedia* calycibus foliisquo distat. — Crescit in Promonlorio bonae spei.
8. *L. PARYIFOLIA* Blh. I. c. — Fruticosa T: foil, ovatis rugosii ramisque canescentibus.; denle calycis supremo ovalo spinescenle, inferiorib. omnib. brevisfinajg, mulicis; corollis calyce tublriplo longioribus, 6? — *L. dubia* f., Mej. Comment; pi. Afr. austr. I. 242. — A f. *ovata* differt follis minoribus rugosioribus canescentibus et calycis oris forma. Caulia lignoms videtur ei humilis. Corolla *L. Leonuri** — Habitat ad Capul bonae spei.
9. *L. LEONURUS* R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 50i — Bib. 1. e. 629. f - Fruticosa: foil, oblongo-lanceolalis; verticillasris laxiusculis; calycib. tenuiter tomenlosopubescentibus. muticis; corollis calyce plus triplo longioribus. i — Frutex erecius, 4-7-pedolis ramosus, rami obtuse lorigoni suicati breviter tomenlosi. Folia bipollicaria oblusa et obtuse serrata, basi in petiolum brevem angustata viridia rugosa, sublus icuiler tomentosa, supra lenissime pubescentia, floralia conformia, suprema saepius sterilia. Verticillastri nunc plures pauciori distantes, nunc multiori densi pauci v. interdum in capitulum approximali. Bractee lanceolatae-uneares acaiae mucat. Calyces saepius breviter pedicellarii 1-7 lin. longi, tenuiter lomentoti, pallide virentes, apice aubalria, ore parum obliquo truncato, denlibus 8-10 brevissimis subtriplo longioribus. Calyx bipollicaris et ultra coccinea villosa, lobus ktoga euanus* intus tamen laevissimus incompletis duabus Inter se sesquialteram diametris annulatus, tunc parum dilatata, galea 0 lin. longa, labium brevissimum lobis ovalis aculis lubaequalibus dejectis. Filamentum basi dilatata, apice lenissimum. Antherae quinque acutistimac. — *Phlomis Leonuru* Linn. Spec, pi. 820. — Bot. Mag. t. 478. — *Leonurus grandiflorus* Moench, Metb. plant 400. — *Leonurus Africanus* Hill. Did. no. 1. — Habitat ad Capul bonae spei.

3664. PHLOMIS Linn.

(Linn. Gener. plant, no. 723. excl. sp. pi. — Moench. Gener. plant vaticul. I. 288. ||. 100. - Bot. Labialar. gener. et spec. 020. et 744.)

Seet UI. BUPHLOMU BUL 1. o. 622.

Corollae galca maxima incumbent tomenlosa v. rarius villota, inluta et margine breviter subbarbata, labii lacinae laterales parvae appendicula lanceolata v. ovala truncata auclac, media maxima latissime rotunda emarginata v. subbiloba.

S. 1. *Lychnitis Bth.* I. c. 023. — Suffrutex. Folia floralia basi late dilatata, flores amplectentia.

1. *PHL. LYCHNITIS* Linn. Spec, plant. 810. - Bot. Magaz. l. 000. - Blh. I. c. t — Suffruticosa cano-tomenlosa: foil, sessilib. oblongo-lineare., utrinq. angustata amplectentibus. rugosis, floralibus basi latissimis; bracteis subulatis calycibus senecopilosissimis, dentibus brevibus subulatis. 4 — Caulis c basi lignosa plures sub-

simpliciter erecti, 1-1-pedales, tomento denso subfloccoso vestiti. Folia caulina basi connata-amplexicaulia, 2-3 poll, longa, vix 4 ho. lata obtusa, margine integerrima, supra viridia v. canescentia, subtus venosissima albo-tomentosa, floralia basi abnupte dilatata in bracteam latissimam rugosam verticillastrum amplectentia et calyces aequantem, suprema omnino bracteaeformia acumine brevissimo. Bractea mollissima, uti calyces semipollicares et pilis longissimis mollissimis senceis subpatentibus dense obsessae. Dentes calycini basi ovalo-truncati, apice in acumen subulatum molle abeuntes. Corolla lutea, calyce duplo longior, tubas glaber tennis, inius sub staminum insertione incomplete piloso-annulatus, faux aequalis, labium superius oblongo-semicirculare, extus tomentosum, intus marginem versus pilosum, inferius parum longius, lobis lateralibus brevibus dente lanccolato auctis, medio lato breviter emarginalo. Stamina superiorum filamenta basi in appendiculam brevissimam obtusam subproducta. — Habitat in Europae mediterraneae occidentalis siccis, in Hispania, Gallia australi, Italia septentrionali.

S. 2. *Gymnophlomis Bth. I. e. — Herbae perennes v. suffruticeae. Folia floralia basi angustata. Verticillastri pauciflori. Bractea paucae laxae v. nullae. Dentes calycini molles mutici.*

% PHL. DRUGLIERI Deaf. Mem. mus. Par. XI. 0. t. 5. - Bib. I. c. - Perennis suffruticosa floccosa - tomentosa candidissima: foliis, ovalo-oblongis, basi rotundato-cuneatis dense lanatis; verticillastri subsexfloris; bracteam linearibus. laxis; calycibus mollissime pilosissimis, dentibus linearibus. mollibus. plumosis corollas superantibus. — Suffrutex pedalis, laxis Una candidissima subfloccosa dense obsessa. Caulis subsimpliciter. Folia 2-3-pollicaria acutiuscula subcrenata rugulosa. Verticillastri approximati. Corolla purpurea, paulo minor quam in *Phi Lyehmide*. Filamentum superiorum basi inaequaliter appendiculata. — Habitat in Persia prope Eermadan.

3. PHL. AUCBBU Bolta. Dlaguid#. plant. nor. orient. V. 3B. — Caule erecto floccoso-tomentoso, superne opposito at parva ramuloso; foliis, radicalibus. petiolo limbum aequante suffultis, e basi subtruncata anguste lanccolalis integris obusis, caulibus al floralibus. sessilibus. oblongis, apice subattenuatis obtusiusculis, omnibus utrinque rugosis dense tomentosocanis; floribus in icriocillistros paucifloros remotiusculos dispositis; bracteis linearibus. paucis calycibus »ubaequantibus; calycibus plumosis tubo intus glabro, dentibus linearibus mollibus. clongatis, superioribus. tubo subaequantibus., inferius longior; corollae flavae tomentolae calycem paulo superantis labio superiori galeato integro inferius superante, tubo basi inius pilis albis annulato. %> — Folium radicale (ex specimine iuppctenic, quadripollicare, basi 7-8 lin. laxis, caulina multo breviora. — (Irescit in Persia.

1 PHL. CRIMTA Car. Icon, plant, rar. III. 25. L M7. - Bib I. c. f - Perennif > suffruticosa loccoso-lanata candidissima: foliis, ovato-oblongis, basi rotundato-truncatis, radicalibus. subeordatis crassissimis, utrinque dense lanatis, floralibus. brevibus. angustolobolunda; verticillastri 5-10-floris; bracteis linearibus. laxis; mollissime pilosissimis, dentibus linearibus. mollibus. mucicis, rotundis brevibus. — Caulis e basi perenni sublignosa erectus, 1-1-pedales, lana alba floccosa densa fere obducti, apice subpaniculato-ramosi. Folia radicalia, longe petiolata, pollinaria oblonga subinflata crassissima, nervis sub lana densa fere rotundis, caulina minora oblonga, lana floccosa, nervis subtus prominentibus, superiora floralia sessilia acuta, suprema a basi parum latiore acumine omnia pateant, oec flores amplectentia. Verticillastri circuli magnitudinis *Lychnis*, In racemum paniculato-ramosum dispositi. Bractea nonnullae subaequantibus molles piloso-lanatae. Calycibus lana breviter »i alba nervi pilis rosatis patentibus oblecti. Dentes tubo breviter, basi parum dilatati. Filamentorum superiorum •Pseudocola brevis obtusa pilosa. Antherae obovatae, confluentim in oculo. — Babiui Is Biapaala.

5. PHL. DILOBA Desf Fl All. II. 25. t. 127 - Bth. I. c. 024 f - Perennis t. suffruticosa lanata: foil, ovato-oblongis, basi rotundalis, ulnq. subfloccoso-tomentosis, verticillostris 4-0-floris; bracteis hneanb. laxis; calycib. mollissime pilosis, dentib. lineanb. mollib. acutis mucicis. 2l. — Gaules herbacci erecti raro&i, 0-0-decimcl. longi, villosolani tetragoni, angulis obtusis. Folia inferiora petiolata, superiora sessilia ovato-oblonga, quandoque ovata rugosa, vix crenata, 5-10 centimetr. longa, 2-3 lata tomentosa, canescens villis ramosis brevissimis. Verticilla florum distincta, 4-flora. Flores sessiles aut brevissime pedicellati. Bractea lineariformis, longiludine calycis, villis longis densis canescens lobis obductae. Calyx oblongus tres villosolani Kerus semiquemquefidus, lacinus linearibus aculis. Corolla magis ludo *Phi. Herba tent purpurea*, extus villosolantomentosa, labium superius arcuatum compressum, saepe profunde bipartitum, inferius bilobum, lobi 2 laterales breves parvi, medius maximus obtusus sulcatus. — Habitat in Atlante prope Majane Algenae.
6. PHL. ORIEMALIS Mill Diet. no. 0. — Bth. I. c. — Perennis v. suffruticosa floccoso-lanata Toll ovalis, inferius basi cordalis rugosissimis, ulnq. MIOMS lanatiore, floralibus basi angustalis; verticillastris 0-10-floris, calycibus elongatis mollissime pilosis, densibus. Imeanb. mollibus acutis plumobis. 2l. — Habitu fere *PhL JVt#off*, sed calycibus distinctissima. Folia caulina majora crassiora villosolana raris subnervosa. Bractea in verticillastri inferioribus paucis subulata, calycibus aquales, in superioribus brevissimae subnullae* — Habitat in Syria prope Aleppo et circa Smyrnam.
7. PHL. OLIVIERI Bth 1. c. — Fruticosa lanata: Toll, petiolatis ovatis, basi angustalis, inferius cordalis rugosis, junioribus densissime lanatis; verticillastris paucifloris, bracteis abbreviatis linearibus, calycibus hirsutis lanatis, dentibus lanceolato-linearibus obtusis 6 — liliis et bractea *Phi. itmentacae*, sed liliis et foliis corio species distincta. Liliis minus pilosis et caulibus simplicioribus quam in *Phi. onchata* — In Persia inter Bagdad et Kermarhan et inter kermachan et Armadan.
8. PHL. AUMLMU V. illd. ^pec pi III 119 - Bib I c 025 T - Perennis suffruticosa gubfloccoso-lanata foil. ovato-oblongis lanceolatis, inferius basi cordalis*, floralibus angustatis; verticillastris paucifloris; bracteis laxis subulatis; calycibus toraloso-lanatis, fructu apice contractis, dentibus lanceolato-linearibus acutis mucicis. "A- — Caulis e basi tuberosa erectus, 1-1/2-pedales simpliciter floccoso-lanatus. Folia radicalia longe petiolata obtusa, basi profunde et late cordata, margine obscure crenata, juniora densissime albo-lanata, adulta raris, supra subvillosolana, subulosa subfloccoso-tomentosa, caulina angustiora acutiora basi minus cordata, floralia basi angustata v. rotundata, oram petiolata paleni. Racemi simplices. Verticillastri distincti, plerumque biflori. Bractea paucis, saepius brevissimis v. 2-3 calycem subaequantibus. Calyces 7 linearibus longis sessilibus, basi oblongis, sub-5-angulatis, lomeno albido subfloccoso obtusis. Corolla flava *Phi. LychnxUdu*. Tubus basi inclusis squamis 5 pilosis annulatis, quarum 4 in staminibus abscissa et 2 superiores crassiores et densius pilosae sunt. Filamenta 6 caeterum exappendiculata. — Habitat in Armenia, in *Ph. LychnxUdu* lapidosis rostratis Talisch prope pagos Penmbal et hwant.
9. PHL. LANCEOLATA Boiss. et Hohenack. Diagnos. plant. nov. orient. V. JO. - Caulis herbarum induratus, basi nudo glabrescente simplici v. superne ramuloso, foil lanceolata, radicalibus longo petiolatis, basi breviter cuneatis obtusis, caulium in petiolum brevem attenuatis acutiusculis, floralibus calycem superantibus sed corollam non aequantibus, basi angustatis, oram tenuibus rugulosis parce induratis siellatis obtusis, superne viridibus, subulosa griseis; verticillastri Rubsexfloris ad caulium apicem in spicam capitulata, basi interruptam approximatis; bracteis punctis palulis incurvis linearibus calycem dimidium vel aequantibus, calyce breviter longioribus lanceolato-pentagono, densibus linearibus, lobo quadruplo brevioribus, corollae lenis hirsutae lobo angustissimo inclusae, limbo nullo, lacinis breviter compresso oblongo obtuso integro, extremis abrupte truncatis, inferioribus longioribus.

impli lobis lateralibus obsoletis parum dilatatis, in intermedio magno subquadrato emarginato-revolutis. — A *Phi irmeniacae* calycis dentibus brevissimis, a *Phi oncnolae* et *Nissolae* caule simpliciter, ab omnibus foliis lanceolatis, basi non cordatis, tenuilanceolatis et corollae dimidiatae. — Crescit ad basin rupium orientalium montis Gari in Rurdislann

10 PHIL MS50LII Linn Spec p) 89 — Blh l e t — Perennans > suffruticosa, dense subfloccoso-lanata foliis petiolatis ovato-oblongis, basi profunde cordate rugosissimis, vtriusque lris paucifloris, bracteis brevissimis, calycibus dense lanatis (f. n. o. > alo-acuminatis mollibus mucicis 2) — Caulis e basi perenni subligonae erecti, 1-1 1/2 pedales crassi, obtuse tetragoni sulcati, uli foliorum pagina utraque, bracteae et calyce*, laminae velutina v subfloccosa canescente > flavo-escens. Folia maxima petiolata, 4-5 poll longa, 2-2 1/2 lata crenulata, basi profunde cordata auriculis rotundatis, superiora minora et minus cordata, superiora uli florantia maxima basi longo angustata, omnia crassa rugosissima, floralia superiora oblongo-lanceolata, calycosae aequantia. Oculi paniculato-ramosi > cricillasti semipollicem usque ad pollicem distantes. Bracteae vix lineam longae subulatae. Calyx semipollicem crassus mollis, dentibus erectis, icuminae bractea oblucens. Corolla *Phi Lychnidum*, sed labium superius breviter acuminatum et membris lobis intermediis profundius emarginatis, lobus inferus infra sinuaturam insertionem piloso-annulatus. Filamenta superiora basi in appendiculam oblongam reclamantem producta. — Habitat in Oriente prope Smirnam et Aleppo

§). *Dendrophlomis Bth. I. c. 023. Frutices teretibus raris suffruticosae. Ii licillatae denique. Bracteae adpressae numerosae, calycem subaequant. Calycis saepius truncati mucronati.*

11 PHL PURPUREA Lion 1 c 818 — Blh l e t — Fruticosa ramis floccoso-lomentosis, foliis, oblongis obtusis crenatis, basi truncatis subcordatisve rufosis, supra subvtriusque, factis albo-tomentosis, bracteis oblongo-lanceolatis calycibus mollibus Her albo-tomentosis, dentibus calycis lanceolatis molliter icumatis 5 — Hamis, foliorum pagina inferior, bracteae et cinnamomum tomento > floccoso obruti. Folia caulina basi truncata > ovata cordatis, floralia n. n.)-lanceolata, basi rotundata v cuneata, tricuspidata multo longiora, omnia laminae emarginata, supra xilosa nec tomentosa. Bracteae numerose dense imbricatim acquantur, uli dentibus calycis acumine molli hirtudinibus luteis ciliatis. Toreae aequantae superiores. Corolla roseo-purpurascens. Labium superius rufum lomentoso-fulvum, inferius vix longius, lobis lateralibus breviter emarginatis, dente altero obtusissimo, altero lanceolato-acuminato, lobo intermedio subintegro. Annulus internus dense pilosus. Filamenta superiora basi subulato-producta. — *Phi ferruginea* Mill Diet no 12 — *Phi satuaefolia* Jacq Hort Sihoenbr III 58. t 3)0 — Habitat in Hispania australi prope Mihga

12. PHI ITU HA Sm Ipicil I 0 — filh I c 020 | - l-rufosa noccoso-lomentosi. Toll oblongo-lanceolatis obtusis, basi truncatis rugosis > ericillatis densissimis, bracteis imbricatis adpressis calycem subaequantibus (Incrasso-tomentosis, calycis truncatis dentibus brevissimis obtusis mucicis 2, S — trilex humilis*) n. n. subrectis pedales simpliciter, uli foliorum pagina inferior, calyces et bracteae v. h. n. flosa albida > subferruginea obtusis. Folia omnino petiolata, 2-9* pollirana rugosa crassa, utrinque lanata, sed laminae paginae superioris subobtusis obscure crenata, floralia superiora pauciflora. Filamenta 6-10-floralia calycis margo potius 5-remans quam dentibus (corolla purpurascens Fi)** mintae superiora sub insertionem pilosissimam, in anulum luteum subaequantem. Mill Did no 13* — Habitat in regione mediterranea, in Hispania*, insulae Boreae Iconcis et in Italia

tt. PHIL PLRSICA Bom Diagnosti plant nov orientalis \ 37 - Tola adpressis** caudo-tomentosa caule credo folioso oppositis ramis, ramis aulicifloris, flos

- breviter peliolalis elongatis, o basi rotundata v breviter obovata lanceolata acutiusculis, utrinque rugosis cernis, floralibus lanceolato-lanceolatis flores duplo triplo superantibus, verticillatis nudaeriosis approximate, bracteis linearibus mollibus tomentosus calyce longioribus, spinula minuti terminaliter calycis floccoso-tomentoso sulcati dentibus creniformibus obscurissimis obtusis; imis truncatis, inferius spinula minutissima recurvata (terminalis, corolla purpurea tomentosa 5 — 1 ovata 4-pollicana, 0-10 lin hla, superiora sensim minorae elongata verticillatis 4-5 conligui — Griseb in Persia australi inter Fasa et Chiraz
14. *PHI HLIPTIC4* Bih I c — Fruticosa subfloccoso-lomentosa folia ovata-cliplicis obtusis, basi truncatis rugosis, subulsa v utrinque floccoso-lomentosis verticillatis* densis multinerviis, bracteis lanceolato-linearibus obtusiusculis rigidis* floccoso-linearibus, calycis imbricatis dentibus linearibus rigidis pungentibus } — Kami versus apertis demum glaberrima folia pollicana, supra demum denudata, junioribus utrinque tomento breviter tomentosa verticillatis sub-10-flora Corollae purpureae — Habitat in Persia
15. *PILL VSATV* Willd Enum pi hort Derol Suppl 41 - Dili 1 c j - *Irancora* ramis divaricatis subfloccoso-linearibus, Toll parvis ovato-subrotundis obtusissimis, basi rotundata-cuneatis rugosis, supra vmdibus, bubus albo-linearibus, bracteis ovato-lanceolatis obtusis, calyce brevioribus calycibus albo-lanceolatis, dentibus calycis brevissimis obtusis v rigide submucronatis 6 — Fruticulus divaricatosissimus, rami obtusi (clragoni, lana Terruginea vestiti Folia vix semipollicana bubinlegerrima, floralia oblonga-cuneata verticillatis in ramis solitariis v bunc remotis, 0-8-flora Bractea calyce vix dimidio longiore, lamina subobovata Calycis semipollicares Corolla flava, labium superius exsertitum clutino-tomentosum, lobis inferius lobis laterales dente laevissimo aucti medius profunde emarginatus Annulus intra tubum obliquus dense pilosus Stamina superiora basi in appendicem obtusam subrectam longe producta — *Phi paritfoha* Prsl Dtl Png 80 - *Phi microphyta* Sieb in Hoi 7ul 182J II 598 — Habitat in Cihbrn et Crel i
16. *PILL ANGSTIHOIU* Mill Diet no 2 - Dili 1 e t - Fruticosa ramis floccoso-tomentosis, folia ovalia oblongiuscula obtusis, basi truncatis rugosis supra concavatis, subulsa albo-lomentosis, bracteis lanceolatis molliter albomentosis multinerviis, calycibus albo-lomentosis, deorsum truncatis mucronatis brevissimis rigidis — A *Phi purpurea* differt caule acriore et calyce truncato, dentibus 5 obscuris brevissimis et mucrone brevi acutiusculo terminali Folia forma *Phi purpureae* v *Phi fruticosa angustifoliae*, ab hac bractea diu TMP — *Phi flavescens* Mill Diet no 10 — Habitat in rupibus deserti Smaici, in Caramania et in insulis Archipelagi Graeci⁴
17. *PHI HUTIGOSA* Inn Spec pi 818 - Dot Maga? t 184) - Sbitirp et Sm Tlor Grace M 51 t 051 — Bin I c 027 t — Fruticosa ramis floccoso-lomentosis folia ovalia oblongiuscula, basi rotundata-cuneatis rugosis, supra multinerviis subulsa albo-lomentosis verticillatis dense multinerviis, bracteis linearibus ovatis ovalo-lanceolatis acutis «ubvmdibus ciliatis villosis, calycis villosi dentibus truncatis, acuminibus subulsa rigido subrecto v palente 6 — Fructus 2-4-podialis divaricatosissimus, rami tomento denso floccoso lanoli, saepe flaxsernata folia 2-4-pollicana, nunc integerrima, nunc migis minusve crenata, nunc humida, nunc vix *Phi purpureae* laliora, supra villosa iridia v vix canescentibus subtus venis prominentibus reticulata, lomento brevi Candida, dorsalibus ovatis subnerviis, verticillatis pro piruni longiora verticillatis ad apices ramorum sulcatis bini, 20-30-lora Bracteis exteores saepius lalissimae osatae, calycis breviores, interiores rarius fructus omnes calycem utrinque obtusum eune HI < nines breviter acuminatae crassae molles > indes, tomento crenatis pulu mill. et pilis longis ciliatis (aljctis 8-10 lin loui, (knibus truncatis, arumum 1 ram subrecto (orolh Ihvi con-puin Iibmm supinus ulus M|| sum n I M is duplo longius ulln jtnllutn 1 n^uiu I In lihUs Irnis irinnu IIMKIH

aucti, intermedius maximus profundo emarginatus, laciniae divaricatae late rotundatae. Annulus internus dense pilosus. Filamenta superiora in appendiculam recurvam basi producta. — *Phi ferruginea* Hortul. (non Ten nec Mill.) — *Phi lahfaha* Mill. Diet. no. 3. — Habitat in regionis mediterraneae biccis apricis montosis, in Sicilia, Aprulia, Graccia et in Oenote

ia PHIL. FERKUGINEA Ten. Fl. Neap. II. 36. t. 75. - Dlb. I. c. t - Fruticosa* ramis laxe floccoso-tomentosi; Toll, oblongo-lanceolalis obtusis crenulatis, basi cordatis rugosis*imis, supra villosis vindib., subtus laxe floccoso-lomentosis, bracteis lanceolalis hispidis; calycis villosi fauce longe pilosa, dentib. abbreviatis rigidis* subulatis. 6 — Kami ferrugineo-purpurei, lana brevi lanissima obsessi Petioli uti nervi paginae inferens foliorum densius floccoso-lomentosi. Folia 2-3 poll. longa, 5-0 lin. lata, supra bullato-rugosissima atro-viridia, pilis canescenlibus villosa. Verucillasiri 12-20-flon. Bractea el calyces virescentes*ubvijcosi ciliato-bifepidi, nec lomentosi, bractae vix aculae, calycis faux inclusis pilis longis erectis ciliata, dentes obtusissimi truncali mucici v. breviter mucronati. Corolla lutea, extus deorsum tomentosa, labium inferius paulo longius, lobi laterales exclus longe acuminati, intermedius breviter emarginatus. Annulus internus dense pilosus. Filamenta superiora basi in appendiculam brevem aculam producta.

0.? *Crechca*. foil, lanato-villosis canescenlib.; bracteis linearibus-subulatis. — *Phi frudcota* Sieb. Pl. Crcl. cxs. — *P. Cretica* Presl, Del. Prag - Habitat in Lucania el Japygia, fl. in Creia.

19. PHIL. YISCOSA Poir. Diet V. 271. - Bib. I. c. 628 et 745. - Fruticosa* ramis strictis tomeolosis; foil, petiolalis ovatis obtusis crenatis, basi truncatis v. subcordatis, alrinq. vindib. v. subtus vix tomentosis; verticilla^lris multiflora; bracteis lanceolatis ciliatis; calycibus hispidis, donlib. truncatis subulato-acuminatis rigidis sabpaicolibus duobus longioribus. 6 — *PM. ferruginea* affinis, sed ramulalibus Tirescoiibus et fit nigrotis el calycibus diuisis. Foliorum forma fore *Phi. fruticosae*, minus rugosa quam in omnibus speciebus fruticosis, supra ipsa ovata villosula, subtus tomento tenui subfloccoso parce obscurata. Verticillata sub-16-flori Racemae calycibus ciliatis-hispulac. Calycibus antheris ciliatis, ciliatiorum fere flabris, 0-7 fin. longis, dentibus (duobus) rursus cum acumine recto 2 fin. longis subulatis, inferius cum acumine breviter mucronatis Corolla *Phi fruginea* - *Phi itrens* J). Cat. Hort. Monspel li. 1. - Dili I c te!8 — Habitat in Oenote.

f. 4. *Oxyphlomis* Jth. L. c. 02S. — *Herba suffruticosa. Verticillata taepms multiflora, ramis vix trifloris. Dracena acuminata, apice n-gutae subpungens.*

20 PHIL. FLOCCOSA D. Don in Boi. Reg. 1.1300, - Bib. I. c. j. Fruticosa* s. suffruticosa ramiis docto-lanatis; foil ovato-oblongo, basi cordatis, supra tuberculatis (rius) rufis, subtus llofono-lanatis, «rinnasln» drn*c multifloris, bracteis linearibus albis-lanatis denticulatis (inis apud subulatis rufidis) gulari* unrinatis. 11 — Oculi\ b. iud. ik. raro, lana longa inclinata nuda donde ovuliccti Folia 3-5-polhraria oblongo-lanceolata, basi auriculis rotundatis* ciliatis. Jin, tinuim Mibclausis, supra pith canstrfnduH HIOSA, JH. I. HUIUH la** can. dida \TliQill. isin piuci distant™ 20-10-(lon (aljr* el bractea Una ma denimsima obtertj (omlla flala micniu lino /*/ *Samia*, lubui inus pith« P^o cis inulauif. Filia & fluruui %up«rii. ii ajipndiruU broi* oblu»a — U^o in Argypio.

21 PHIL. HICCOLOI mi, | c W - Corolla inferior* superior* utrinque miris* cenhracing uitrkrit, ralnli luurron. ilK, murromb centi' K'ljbn« unnoaiii ^ - Corolla habituque |, rarsirim omnim /*/ certe distinctissima, ad *Floccosa*, (j r i ICOC \maB14na uijrc, Pl bractea hirt

- neo lanati. - *Phi Samta* fi. *btcolor* Vlv. Fl. Lib spec. 00. t 15. fig. 2. - liblbtai in Libyae monlibus Cyrenalcis.
- 22 PHL. RUSSELLIANA Lag mss ex Bth L e t — Herbacea ram is elatis sub si mplicib , foil, radicalib. amplissimis ovatis, basi profunde cordatis caulinibq rugose, supra vindib, sublus canescenlib. lomenlobis; verlicillastns maxim is multiflons; bracteis linearib. aculissimis calycibq vindib. pubescenlib ; calycis truncati dentib longis rigidis subulatis patenlibus 2|. — Caulis 3-5-pedales crassi obtuse Iclragoni, lomenlo laxo albo lanaii. Folia radicalia numerosa, longe petiolata, limbo 0-8-pollican, obiter crenata, basi aunculis rotundis profunde cordata, supra molliter rugosa hispida, sublus tomento laxo brevi canescentia, caulina inferora angustiora, basi minm cordata, floralia breviter petiolata, basi rotundata, apice acummata. Verticillasn versus apicem caulis plures remoti, flonbu'', in quoque verticillastrq 40-50. Bracteae numero<issimac sobconvolutae, calycem aequantes. Corolla lulea, exclus lomenlosa, labu inferioris lobi laterales ovati lanceolato-acuminati, medius lalior, Kiblum Miperius parum Miperminens breviter emarginatum. Annulus internus valde obliquus, dense pilosus 1 filamenta superiora in appendicula subulalam longe producta. — *PM Herba tent** var Russ. Nat. Ins<t. Alep. II. 260. 1.16. — *PM. lunanaefolia* ft. *RutseUtana* Hook. Bot. Mag t. 2542. — libilal in Syria prope Aleppo.
23. PHL. GLANDULOSA Schenk, Plant spec. Aegypt. Arab. 90. t - Suffruticosa pilosa: pilis apice glandulifens; caule simplici; foil e basi cordato-truncata ovato-oblongis acuminatis grosse crenatis, supra pubescentib. vindib., sublus fere lomenloso-incans, verlicillasrls nulliflons; bracteis terms linearib. rigidi< acutissimis ciliatis viridib ; calycis truncati denlib. subulatis rigidis crochis inaequalibus 2< — Caulis Inpedalis v allior simplex obtuse tetragonus Folia caulina v. inferora dount, floralia 2-4-pollicaria, basi 2 poll el ultra lala, o\ nlo-oblonga v. delloidea Bracteae cujusque floris ternae linearib. lanreolntar subpungentes rigidic glanduloso-pilosae Verticillastri distantes n-20-flon Corolla lulea calycem duplo major. — Proximo accedit ad *Phi Huaellianam*, caule tamen suffruticoso simplici, foliis superioribus o>alo-oblongis, calycis denlibus erectis, galca apice Iridentata el praesertim pubescentia glanduloso-pilosa faillinic diagnoscellur. - Crescit In fruticeis prope pagom Sibail In Syriae monte Libanon.
24. PHL. LUNARIAEFOLIA Sm. Prodr. flor. Graec 414. - Bib. I. c t - Caulis herbaceo clato pubescente; foil. ovato, taprt mgotlf, tablat eanetcentii-ionicosi!>t verlicillasns multifloris; bracteis lanceolatis oblongisve aculm subulatis c.il)cibq. Mndib., calycis apice truncati fubmembranacei denlib bii-bulaliii rigidis pungentibus ^ — Corolla flava. — Uabilat in variis Peloponnesi montibus el in monte Athos.
25. PHI S4MI4 I inn Spec, plant. 810. — Vent. Choix des pi. t 4 — BoL Magni t. 1801. — Siblhrp el Sm. Flor Graec. VI. 52. l. 564. — Blh. I c. -| — (aule >crbaceo elalo pubescentie, foil, ovalis, supra rugosis, sublus canescenti-tonicosis, verlicillaMrid nulliflons; bracteis linearib. acutiimib pnngentib. calycibq Mridib. pubescentib., calycis clongali plicali denlib. lanceolato-subulatis ri^id^ pangenibus Q — Affinis *PM, RutteUtanae*. Caulis minus, lomentosus Verticillasn interdum 10-15-flon. Calyx 0-10 lin. longus, pubescentia >iscona glulino-h<» Corolla purpurca — Habitat in Euboea el Caramama
26. PHI- HICill> libill. Icon pi. S>r rar. III. 15. I. 10. - Bth. 1 c. 030 f - HIT-bacea foil oblongo-lanceolatis rugosis subdoccofco-lomentosis, ner\is petiolis pilosis, ^erticillajilrib nullifloris, bracteis subulatis rigidis >unj:eniili , (ahn> birsulis denulis subulatis rigidis ^ - <aulos e basi porrenni ITCCII bipedales iclragoni, pilis bimibus lanaii el alii!> lonpissimis palmtibus, uii petioli nfr>. foliorum, bracteae et calces hir^uli rtiln priiulaia nblusa crenulata, indma lu>, cordata, raulma rotundato-runcata \crlinllasin inaKmludine f. n- *Phi Samtar* Calycis foima Ton *PM lychmhds* pilis loii^is^imis sub|np|_M,M d<nlli<^ |_m_<eo|als> spinula brevis ternunatis (orollj Una fin *Phi l*,rhmhht* 1.1. i_m m(.

- rius galea longius, loborum lateralium appendicula majuscula ovato-truncata
Filamenta sec Labillardière non appendiculata. — In jrenosi* juxta Dama&cura
27. PHL. CASHMERICANA Royle rass. ex Dth. in Hook. Bot Misc 111 382 et Labial
630 - Royle, Illustr. of Himal plant 303 t 75a OR 1. - Bot Regist 1844 t 22
— Herbacea erecta caule dense floccoso-lomentoso, foliis ovato-lanceolatis ob-
tusis, versus apicem crenatis, basi late rotundatis molliter rugosis, supra pubes-
centibus villosisve, subtus dense albo-lomentosis; bracteis subulalis ciliatis calyce
longioribus, calycis floccoso-lanalis dentibus subulatis rigidis patentibus pilosis 2].
— Specimina suppetentia manca, sed evidenter a *Phi Iierba tenti* et *Phi pun-
gente* specie distincta. Folia majora et laliora, subtus, uti caules et calyces,
dense lana alba floccosa vestita. Flores et praesertim corollae majores Galea
dense tomentoso-villosa. Labium inferius galea longius, lobo radio latissimo
— Habitat in India orientali in valle CashmERICANA.
28. PHL. IERBA VENTI Lion. Spec. plant 819. - Bot. Magaz t 2440 - Sibthorp
et Sm Flor. Graec. VI. 51. t. 564. — Dth 1 e t — Herbacea erecta dnanalio-
ramosissima: ramis longe pilosis, foliis oblongo-lanceolatis crenatis, basi rotun-
datis coriaceis, utrinque viridibus v. sublus canescentibus, supra lucidis scabrusculis,
bracteis subulalis ciliatis calyce longioribus; calycis hirsutis dentibus subulatis rigi-
dis subpatentibus 2]. — Herba 1-1% - pedalis, rami rigidi vincti subpurpu-
rascentes, obtuse tetragoni sulcati, pilis longis villosi nec tomentosi Folia medi-
a, siccitate conacea, inferius saepe 6-8 poll, longa, floralia sessilia conformia,
sed multo minora, omnia tamen reticulata multo superant, supra glaberrima,
subtus venoso-reticulata pallida v. juniora subcanescentia verticillata 10-20-
flora. Bracteae et calyces pilis patentibus bispidatis. Corolla purpurco-viola-
cea, exclusa tomentosa. Labii inferius lobis laterales basi lancolati, acuminati li-
neari, intermedii breviter emarginati, labium superius aquans. Annulus in-
ternus pilosus, parvis obtusis sobinerruptus. Filamenta superiora basi in
appendicem aenun abrecurram producunt. In rar. *fi.* caulis pilosus et
folia subtus lomento floccoso crenatis a *Phi pungent** con-
solanter distinguuntur. — *fi. tomentosa*: — Habitat in regionibus mediterraneis specie,
in Hispania, Sicilia, Italia omni, Graecia et in Tauro
- 29 PHL I \ CIA D. Don, Ann of nat. hist. MI VJ § 7 Frustrata *fi* Trugino-lomon-
tosa foliis cordato-oblongis obtusis, verticillatis plunlori^ bracteis innicolatis
calycibus mucronato-spinosis dense albo-lanalis, dentibus calycibus uncinatis, *fi*
laminatis inappendiculatis* 5 — Habitat in Lycia epirotica.
- 30 PHL. AMSODOTA Boiss. Diagnos plant, nov orient V 37 - Pertinet, basi
frutescens caule credo quadrangulo tomentello simplici, foliis breviter petiolatis
oblongo-lanceolatis deniculatis, deniculis obtusis ascendentibus, immixtis fil-
tenuatis, sublus canis, sperne asperulis viridibus, floralibus verticillatis multo
superantibus, verticillasuis remotis paucis paucifloris, bracteis subulatis ciliatis
incum calyces aequantibus; calycis pilis stellatis ciliis longioribus oblongis
dentibus brevissimis truncatis, omnibus lacinula subulata ciliatis
subulatis tantum denium superiorum lobo quadruplo brevioribus Mibincum*, diorum
inferiorum deflexis dimidio lobo brevioribus, corolla purpurascens to-
mentella. 5 — Caulis pedalis simplex, folia 3-pollicina, 7-0 lin lala, verti-
cillasin 2-3-DI. Bracteae calycesque valde ciliales — Crescit in raonle Djoufelk*
kou in Persia boreali
- 31 PHI p n GF. Willd Spec plant III 121 - Dth I c GII - Sweet, Brit
flow gard II. t. 33. — Herbacea divancao-ramosa ramis cano-lomentosis;
Toll breviter petiolatis ovato-lanceolatis inogminis serratis, basi rotundatis
supra lucidis viridibus scabrusculis, sublus cano-lomentosis, bracteis subulatis
ciliatis, calyce longioribus, calycis hirsutis dentibus subulatis rigidis subpaucen-
tibus, — Ab *af* *Phi. iierba* ramis distincta caule impiiio%o-pubosceiie n^c
piloio, foliis angustioribus inlegornmih crenatis IHC crenatis*, sublus constant
tomemosis, verticillatis numerosioribus, narpit 0-10-fiori^, ralicibus cano-to-
mentosis, dentibus parum longioribus - Habitat in Europae austro-orientali* cX

Asiac occidentals SICCIS montosis, in Galicia, Graecia', Bessarabia, Tauria, Troade, in Caucaso, in monnbus Talysch el Beschlau cl in Persia

Seotlo II. PHLOMIDOPSIS Lnk. Hndboh. 470. - Bth. 1. o. 83L

Corollac galca subcrecla pilosa, inlus el margme pilis longis barbala, labu in-Tenons lobus medius lateralibus vix major. — Herbae vmdes piloso-hirtae, ranus sublanalac Verlicillastn dcnsi. Dracleae adressae. Corollae purpureae v albae

32. PHL UMDROSA Turczan Bullet de Moscou XIV 76 — Herbacea caule folnsq scabns, infcnonb cordato-subrotundis, superiorb. cordato-ovalis, calycis tubo scabro, deniib abbreviatis, margme nudis, bracteis linearibus ciliaiis 2|. — Habitat in China boreali
33. PHL BREVIFLORA Dlh in Wall Plant. Asiat. rar. I. 02. cl Labial 031. f - Ilcrbacca crecta glabruscula foil peliolalis late ovalis acuminatis crenalis, basi truncatis subcordatis, supra hispidulis, subius glabris, bracleis linearib calycibq suhglabris, corollac galea pubescenlo erecla, labu lacinia media vix laleralibus majore 2I — Rarai glabn v. supernc brevissime tomenlosi. Folia omnia eliam floralia longe peliolala. Pelioli glabn. Limbus supra pilis brevissimis hispiduR, subius glabr v ad venas lomenlo rarissimo conspersus. Verlicillasri 15-20-flori. Calyces uii bracieae glabri, nervis viz prominuhs, ore iruncalo jubmembranaceo, deniibus brevissimis emarginatis v. brevissime acuminatif. Corolla viz ealyce dimidio longior alba H Labium supenus ereciom lomentoto-pabescens, infenus bre>e palens. Annulus mlernos pilosus. Filamenta basi viz product*. — In India oncnlali ad Gossain Than habitat.
- 34 PHL. MACROPHYLLA Wall I c — Bth. I c. f - Herbacea elata subglabra foil longe peliolalis amplissimis haslalo-cordalis, floralib. ovalis, basi anguslatis, bracleis subulalis calycibq subciliaiis, corollae galea inlus pilosissima crecla, labu lacinia media vix laleralib majore. 2|. — Herba plunpedalis ramosa, *Phi (uberotac* affinis Rami basi glabri, superne pilis brevibus reflexis rufescenlibus subvillosi Polioli supra pilis longis rufis subscanosis ciliati Folia 0 poll et ultra longa el tolidem fere lala, supra pilis brevibus sparsis hispida, subius tomenio brevigismo raro, pracberlim ad venas, conspersa, floralia brevier peliolata, basi rolundato-euneaia. Veriicillasn in qaoque rauo plurimi remoti 30-40-flon Calyces ad angulos uii bracieae cilialo-hlspidl, caeieram vlridet glabri, 0-7 lin longi, deniibus subuiaio-acumlnaia el marglae later denies In appendicaltm broem membranaceam producto. Corolla alba. Labium soperlus erecium villosis^imum, margme subundulalum, inferius patens, lobis ovato-oblongis, tnlermedio latiorc >ix emarginalo. Annulus internus obltquus. Filamenla supermra in appendiculam subulatam rectam producua. — Habitat in India orientali, in Gossain Than
35. PHL TIHEROSA Linn Spec, plantar. 810 - BoU Magaz I. 1555. - Blh I c. 032 t — Herbacea data subglabra foil, amphs ovalis oblusis crenalis, basi profunde cordatis, floralib oblongo-lanceolatis; bracteis subulalis calycibq nubritaiis, corollac galea inlus pilosissima suberecla, labu lacinia media laleralib vn majore. 2< — Ilcrba 3-5-pedalis erecta, parum ramosa, rami purpurascenics glabemmi lacves, oblusio leiragoni Folia infima scmipedalia et ultra, profunde crenala, ulnnque vmdia et glabra, (loralia 2-3 poll longa, 0-8 lin lala, ban! sacpe hastato-dilalata et subinci^a. Vercillasn in quoque ramo plurimi remoti 30-40-flon Calyces ad angulbs uii bracieao cilialo-hispidi, cacierum \irides glabernmi Denies calycmi brevissimi truncaii submembranacci omargmati, acumine in cmarginalura subulalo rigido, lacimas lalrales oblusissimas longe superantc Corolla purpurascens Labium supenus molluer pilosiRMmum oblongum, basi angustatum subereclum, margine crenulalum, infenus patens, supenore parum longuis, lobi laleralcs o\alo-oblongi oblusi di\ergpnies, intormedius longior subroiundo-cunciformis, breMlcr cmarginalus Annulus mlernui hori-7onldli> pilosu< 1 ilamenla supenora basi in appendiccm longp rerunam producua - *PIUomotdes tuberosa* Mocnch, Mcth pi 401 - *Phfamuloptu tubcrom*

Lnk Hodbch. 480. — Habitat in Europae orientalis et Asiae mediae aprim cam* pestibus etc., in Bohemia, Moravia, Austria, Hungaria, Podolia, Russia australi, Sibira, jugo Altaico, Tauria et Caucaso frequens et in montibus Talysh et Deshtau.

J6 PHL OBLONGATA Schrenk, Enumer. plant. novar. (I) 20 t - Glabruscula. Toll acutis inciso-serratis, inferens ovatis, basi rotunda Us, superens oblongis, basi attenuatis, floralibus elongatis; bracteis linearibus hirtis, calycis apice pubescentibus dentibus subpungentibus; corollae calca recta villosissima, lobis inferens lobo medio obcordato, lateralibus ovatis multo majore. 2L. — *Phi. tuberatae, alpinae, agrariae* et *prdensi* affinis, a *Phi. breviflora* (nova, ul videtur indscripta) differi folis inciso-serratis non crenatis, corollae lobis inferioris lobo medio lateralibus, parvis multo majore. — Herba 1'A-2-pedalis simplex v ramosa. Folia majora 3-3'A-pollicana, 15-18 lin. lata, floralia angusta elongata. Corolla purpurea, quam *Phi. tuberosae* minor. — Crescit in vallibus graminosis montium Dschillkaragai in Soongaria.

37. PHL. PRATEISIS Karelin et Kirilow, Bullet. de la soc. impériale des natural. de Mosc. XV. 420. f — Caule pubescente simplici aut apice ramoso polystachyo; foliis radicalibus et caulibus inferens longe petiolatis cordato-oblongis crenatis, utrinque pubescentibus; reticellulis mullifloris; calycis truncati dentibus abbreviatis Us, nervis tubi subdentibus anastomosantibus; calca labium superans, lobis labii aequalibus, medio truncato emarginato caeterum subintegerrimo, hinc lobis abbreviatis, filamentorum appendicibus rectis elongatis 2L. — Caulis 1'/2-J-pedalis* A proxima *Phi. agraria* differit statura folisque majoribus, calycis nervis anastomosantibus, dentibus minoribus sed magis emarginatis, calca labium superans, stylis lobis abbreviatis et filamentorum appendicibus rectis, a *Phi. alpina** dignoscitur pubescentia foliorum calycumque. — Crescit in pratensibus montium AlaUa ad flumen Balkan in Soongaria.

38. PHL. AGRARIA Bunge maa. In Ledeb. Flor. Alt. III. 411. — Ledeb. Icon. Dor. Ross. Alt. Illustr. L. 304. — Bin. 1. c 03 & t — Caule herbaceo simplici v. vix ramoso hispido; foliis inferens longe petiolatis hastato-cordatis, floralibus supreme calyce brevibus; bracteis subulatis calycibus ciliatis tomentoso-pubescentibus, corollae calca intus pilosissima erecta, lobis lacuna media in lateralibus majore. 2L. — (Caulis c. basi perenni plun* subpedales, saepius simpliciter, ramis bimis oppositis instructis, pilis sparsis hispida) Folia radicalia et inferens longe petiolata, petiolis basi dilatatis subconnatis, limbo acute inciso-dentato pubescente, supra uridi, subtus subcanescente, folia caulina pauca magis sessilia, floralia ovato-lanceolata sessilia acuta paucidentata, inferens calycis vix excedentia, superiora breviora verticillata sub-10-flori. Bracteae rigidae subpungentes, calycem subaequant. Calyces vides rigidi plicati, non membranacei, dentibus e basi dilatata breviter aequalibus rigidis. Corolla purpurascens fere *Phi. tuberosae*, tubum breviter exsertus, intus iranarum piloso-annulatus. Filamentorum superiorum appendicula elongata subulata. Stylus lobus superior inferens plus dimidio brevior. — Habitat in jugo Altaico in arvis prope Semipalatinsk

30 PHL ALPINA Pall in Act. Peiropolit. 1779. 11. 205. t. J3. — Dth. I. c. 033. t. — (Caulis herbaceo simplici hispido, foliis radicalibus amphistichis profunde cordatis, caulibus ovato-lanceolatis, floralibus superens linearibus lanceolatis elongatis integerrimis mollibus, bracteis subulatis calycibus hirsutis; corollae calcae pilosissima recta, lobis lacuna media vix lateralibus majore) — (Caulis c. basi perenni) i-1'/2-pedales crassiusculi, obtuse tetragoni Petioli foliorum inferiorum basi dilatati connati. Folia radicalia 8 poll. longa, 0 poll. lata et vix in iura, ultrinque pilis sparsis bitridula, caulina pauca minora, floralia infima subconformia, supra 2-3 poll. longa angustissima mollior villosa verticillata 20-30-Don. Bracteae molles acule plunio-villosae. Calycis dentes basi membranaceo-dilatati breviter telacci. Corollae et genua *Phi. tuberosae*, atque crassior. — Habitat in tractu occidentali Anglii tubalpinia umbrosit

40. PHL. OREOPHILA Karelin et Kinlow, Bullet de la soc imp^e. des naturalist, de Mosc. XV 420. — Pubescenli-hispida* radice fibrosa, Toll radicahb. canllmsq. profunde cordaiis, fleralib. angusle lanceolans, bracteis calycibq villosu-hirsutis; dentib calycinis non emarginalis aristdlis, galea corollae labium subaequante, lobis labu lateralib deflexis brevib., intermedio illis duplo longiore bifido crenalo, appendicib. filamentorum brevissimis rectis; stjli lobis abbrevuatis 2|. — *PM. aiptnae* proxima, dignoscitur tamcn folns caulinis semper cordaiis, labu inferioris sruclura alque appendicibus Olamenlorum brevissimis — Crescil in pratis subalpims Alatau ad flumina Lepsa el Sarcban in Soongana.
41. PHL. BRAGTEOSA Royle mss. ex Blh. in Hook. BoL Misc. III. 383. el Labial. 033. — Herbacea el a la erecia subramosa: caule obverse villosu; foil, petiolaiis ovatis oblusis grosse crenans, basi lale cordaiis rugosis, supra adpresse pilosis, sublus pallidis, breviter toraenlosis, floralib. subconformib; bracteis oblongis, exlerionb. magms foliaceis; denlib. calyciuis truncali* breviter subulato-acuminalis, corollae galea pilosissima. 2|. — Bractea extenores nunc foliis subconformes polhcares, nunc oblongae inlegemmae, omnes vmdcs, uii folia supra pilo&ac, aoblus breviter tomenlosae. Annulos lubi corollae obliquus pilo*us Filamenia exappendiculata. Slyli lobus superior brevissimus. — llabiial in India onenlali ad moniem Cboor el ad Kidarkonia et Simla.
42. PHL. LAMIIFOLIA Royle mss. ex Bib. I. I. e. c. t — Herbacea humilis simplex: caule obverse villosu; foil, peiolatis lale ovalis crenatfs, basi profunde cordatis rugosis, utrinq. villosis, sublus pallidis, floralib. oblongo-lanceolatis; bracteis lanceolans subulalisse cilialis calycem aequanlib.; calycls glabriusculi denlib truncalis subulalo-acuminatis; corollae galea villosa. 2|. — Herba ascendens v. erecia, semipedalis v. vix pedalia. Folia radicalia. . . .*, caulina hs *Phi. bracteosa* similia, 2-3-pollicana, saepius lam lata quam longa v. supenora an^ustiora, floralia suprema lanceolaia, \ix fiores excedentia. Verlicillaslri 15-20-flon. Calyces apice submembranacci Corolla *Phi tuber otae*, tubus inius annulatus. Filamenia omnia exappendiculata Sijli lobus superior brevmsimus. Radix in bac el binis sub>equicilibus \crosimiliier luberosa, folia inflma minima videntur — *PhL lattfoha* Royle ex Bib. in Hook. Bol. Misc. III. J83. - Habitat in India orloatall, In Cashmerla ad moniem Cboor, In Mussooree el in mootibos Ramaonensibus.
43. PHL. SIMPLEX Royle mss. ex Blh. In Hook. Bot. Mite, III. 38*. el Labial 034. — Herbacea humilis erecu sabs Implex: caul* obverse pltosoi foil, ptllolalla late ovalis obtuMS crenalis, basi cordaiis rugosis_f ulriac. viridib. villosis_t floralib. aabssilib oblongis, utrinq. angustatis; bracteis Hnearb. cilialis calycem aequantib.; caljcu. membranacei subcolorali apice ciliall denlib. truncatis longe subulato-acuminaiis, corollae galea pilosissima. ^ - A PW. *lamiifolia* differt foliis angustionbus villosionbus, corollis majonbus, lubo exserlo. — Habitat in India orientali, in monlibus Kanaour et ad Pere Punjale regm Casbmeriam.
44. PHL. CORDATA Royle ex Blh. I.I. c. c. — Herbacea humilis erecu subsimplex: caule obverse piloso; foil, longe petiolatis ovaio-subrotundla oblusis crenalis, baai cordaiis rugosis, ulrinq dense sericeo-villosis, floralib. oblongo-lanceolain, bracteis linear!-subulatis calyce subbreviorlb. villosis; calycls villosuli denlib. snbrolandis breviler subulalo-acuminaiis; corollae galea pilosissima. % — A binis praecedentibus differt praccipue foliis ulrinq. pilis numerosis mollibus serlcels dense ve&uus An cum *Phi urnphci Phi. lamttfohae* mera vanelas? — Habitat in India onenlali, in monlibus Kanaour.
45. PHL. RUGOSA Blh. in Wall Plant Asiat. rar. I. 63. el Labial. 634 — Suffruticosa: ramis erectis simplicib. subcarnosis lenuiler tomentosis; foil, longe peiolaiis ovalo-oblongis aculis serralis, basi angusialis rolundalisse; ^ericiillastns peliolo rouliolics brxionb; bracteis nubulalis caljcibq glabns, denlib caljcinn lanceolato-subuhtis, corollis subglabris 2). — Habiiu a *Phlomtdibut* recedn, sp&ac characlcnbus *Phi brea/lorae* affinis. Rami e basi lignosa complures orerii mm-plices subcarnosi, obtuse tetragoni ^ulcali Folia cliam flotalia longe pcholata

herbacea Tiridia subcarnosa (?), siccitale subtranslucenlia venosa glabriuscula v. pilis rarissimis conspersa, 4-6 pollices longa. Verlicillastri 15-20-flori. Bractee calyce breviores. Calyces basi valde altenuati, margine paruo membrnaceo dilalalo, subenervii. Corollae flavescetes (ex Wall.) similes corollis *Phi. breviflorae*. Stamina e tubo breviicr exserla. Filamenta omnia basi nuda videnlu. — Habitat in India oriental!, in monlibus Silhet.

t *Species ignotae.*

- PIIL. BREVIFLORA Scbrenk.
 PIIL. CONDENSATA Mart.
 PIIL. SCARIOSA Presl.

ft *Species e genere excludendae.*

- PIIL. ALBA Forsk. => BALLOTA FORSKAOLII.
 PIIL. ASPERA Willd. — LEUCAS ASPERA.
 PUL. BIFLORA Royle. — LEUCAS PROCUMBENS.
 PHL. BIFLORA Vahl. — LEUCAS BIFLORA.
 PIIL. CARIBAEA Jacq. « LEUCAS MARTINICENSIS.
 PIIL. CEPHALOTES Roth. = LEUCAS CEPHALOTES.
 PIIL. CHIXENSIS Blame. - LEUCAS JAVANICA.
 PIIL. CHINENSIS Relz. — LEUCAS CHINENSIS.
 PIIL. DECEMDENTATA Willd. = LEUCAS DECEMDENTATA.
 PIIL. DIMIDIATA Rolh. — LEUCAS DIMIDIATA.
 PIIL. ESCL'LENTA Roxb. = LEUCAS ASPERA.
 PIIL. GLABRATA Vahl. - LEUCAS GLABRATA.
 PHL. HIRTA Rolh. — LEUCAS HIRTA.
 PUL. INDICA Linn. - LEUCAS INDICA.
 PHL. LACOIATA Linn. " ERKMOSTACHT8 LACINIATA.
 PnL. LEONOT18 Una. — LBONOT18 OVATA.
 PIIL. LEONURU8 Linn. — LBOMOT18 LEONURUS.
 PIIL. LINIFOLIA Rolh. — LEUCAS LINIFOLIA.
 PIIL. MARTINCENSIS Swarlz. — LEUCAS MARTINICENSIS.
 PIIL. MICRANTIA Burch. - STACIYS BI'RCIHELLII.
 PIIL. MOLLIS Schum. - LEI'CAS MARTIMCENSIS.
 PHL. MOU'CCANA Royle. - LEL'CAS FLACCIDA.
 PIIL. MOLLCCOIDES Vahl. - OTOSTEGIA SCARIOSA.
 PIIL. MONTANA Roth. - LEUCAS MONTANA.
 PHL. NICPETAEFOLIA Linn. — LEONOTIS NEPETAEFOLIA.
 PIIL. MTANS Roth. - LEUCAS ISUTANS.
 PIIL. PALLIDA Sebum. — LEONOTIS PALLIDA.
 PUL. PARVIFOLIA Bnrch. - STACIYS INTEGRIFOLIA.
 PHI. PILOSA Roib. — LEUCAS PILOSA.
 PIIL. PLI'KENETHII Roth. - LEUCAS ASPERA.
 PIIL. LRTICAKFOLIA Vahl. - LEUCAS URTICAEFOLIA.
 PIIL. ZEVLAMCA Linn. - LEUCAS ZEYUNICA.
 PIIL. ZEYLANICA Roxb. - LEUCAS LINIFOLIA.

3005. \OTOCHE%ETE *Bth.*

(Bih. io Wall. Plant. Asiat. rar. I. 03. et Labial, gen. et spec. 035. - Mcisn. Geor. plant, vascul. I. 288. II. 107.)

I. N. IAMOSA Bth. in Wall. Planl. Asial. rar. I. 03. fl Labial. 035. -- Cauli» her* barcus ereclus bipedalis el ulira, ramosus, obsolete telragonus, bre*issime P^u bescens. Folia longe peiolala 3-5-pollicaria ovaia acuminata scrrato-crcnaW* baii oblique rolundilo-cuneaU nervosa, ulrinque viridia glabriuscula, junior* •nblus tomenlosa. Verlicillailri axillarei remoli globoil, dense muliiflori l*W*~ c«l, peUoIU nolio bretlores. Bracieae tubolatae rigidae, uU denies ealycini *P^{lc}

uncinato-revolutae, corollas supcrantes Corollae parvae purpurascences' — in Nepalia habitat

3000. EREMOSTACHYS *Bnge.*

(Bnge in Ledeb Flor All II. 414. — Meisn Gener. plant vascul 1 288 II 197 — Bib. Labial gener el spec 030.)

- 1 E LACINUTA Bnge I c 410. — Blh I c. t — Foil, pinnaliscclis, sigmenlis oblongo-lanccolatis v. lineanb. inciso-pinnalifidis; calyce amplo lubuloso campanulato, apice vix dilatalo 2|. — Caulis herbaceus erectus subsimplex 1-1/-pedalis Folia radicalia semipedalia, ad pcholum dissecta, segmentis numerosis lobisque oblusis. Peioli el nervi uli caules lana longa laxa veslili, limbus demum glaber laevis Folia caulina pauca minora, minus disseccla, (loralia vix calyces excedentia Verlicillasn 10-20-flon di>lantes v in spicam icrminalem approximati, jumores lana laxa alba ommno obtecli, fructifcn laxc \iloso«lanaii Bracleae lanceolalae acuae adpressae, inlerdum subpungcnles Calyces circiter 8 lin. longi villosolanaii subconacei, inlus lacves, dentibus e basi brcu-sima truncaia breviter spinoso-mucronalis. Corolla purpurascens, lubus caljccm aequans, supra medium piloso-annotates, galea basi erecla, apice incurva, lato oblonga compressa, brevissime emarginata, extus pubescent, inlus pilosissima, labium patens, 8 lin. longum, 9-10 latum, lobi omnes late rotandall, medics vix latralibus duplo latior. Filamenta supenora baai In appendiculam obtusam subinlegram incrassala. Styli lobus superior inferiore dimidio brevior. Achaema apice densissime pilosa. — *Phiomii lacintata* Lion. Spec, planlar. 810 — Sweci, Bnt flow gard. I. t 24. — Habitat in Orienle, Syria, in Caucaso oneniali el Iberia, in collibus siccis prope Baku, in monle Bescbbarmak el in montibus Talysch prope pagum Swanl.
- 2 E. GYMNOCALYX Stbrenk, Enumcr. plant lectar (I.) 34 — Foil pmmoliparViinis, scgmenlis oblongo-lanccolatis v. lineanb. inciso-pinnalifidis, verlu illatiris du>-tanlib.; calycib tubulosis, apice baud dilalialis spinoso-dcnlalis bracleisq selatets nudis bubarachnoidcis 2|. — AfOnis *E lactntalae*, sed inflorescencia nudi bubglabra, lanugino subarachnoidea rara adpressa ab ilia optime differrl, ab *h superba* differt follis calyoibusque. — In ?loioliate lacus Balchaacb in Soongana
- 3 E. SUPERBA Royle mss. ei Bth. In Book. BoU MiM. HI. &1. «V Labial. 037. - Royle. Illuslr. of Ilimal. plant. 309. t.74. — Poll, mdloalb. maxlmls plnntlseciis, fccgmenlis 2-3-jagl9> inferiorib. petlolalit, extremo longlatimo, omnib. latis grosso crenato-lobatis, ulrinq. vmdib., florallb. ovatis acutis subinlegerrimis, caljcc ample lubuloso, apice vix dilalato. % — Folia inferior r. radicalia sesquipedalia, lobo ulumo 10 poll, longo, petiolo communi petiolulisque villosis, limbo vindi glabriusculo Caulis ereclus elatus, versus apicem lanalus. Racemus spiciformis densus, semipedalis el ultra, sed tenuior quam in *E. lacimala* \erticillastn sexllori. Folia floraha infenora ovata, supenora obovala, omnia acuiuscula Bracleae lanceolalae acuae, calyce breviores. Calyx amplus lubuloso-campamilatus, denllbus rotundato-truncalls aequalibus, breviiier spinoso-acummaiis, post anibesln vix dilalatis, uti bracleae lana alba laxa vestilns. Corolla fore /' *lar,tnalae*, tubus vix exserlus, mtus exannulatos, galea oblonga, basi augusiaia p irum incurva compre«sa, exlus pubestens, inlus dense pilosa, labium informs patens, lubi lalrales laic o\ali inlcgerrimi reflexi, medius late crenulalus, utnquo latralilcr redexus Filamcnia supenora basi in appendiculam oMusam \i\ fimbriatam incrassata Antherac biloculares. Styli lobi subaequalcs — Iljbiat in India oneniali ad clauslrum Khccra Pass dictum, Deyra Dhoun cunicm.
- 4 E PHIOMOIDES Bnge. mss in Ledeb. Flor. All II 414 — Ledeb Icon nor Ross Alt illuslr t in - Blh I c f — Foil ovalis dentalis, ca\|re lubulosn apice m dilatalo, dcnlib splnosis palenlibus 2|. — faulis fore prdalis nmosus, uti caljccs ot braeii'ie pilis long»s in »llibus alhis Inrius Folia radiculn | itmht-i o\ata obluia, basi rotundatii runosu crunia Lixc ^ublamm, caulim <t (lunl i

- sessilia acuta subspinoso-dentata, basi angustala, suprema sterilia. Verticillastri sexflori dislincli. Bractea subulalae spinosae. Calyces magnitudine el forma fere *E. laciniatae*, sed denlibos longioribus roagis spinosis el palenlibus. Corolla ochroleuca dimidio minor quam in *E. laciniata*, tubus intus supra medium annulalus. Filamenlorum appendiculae breves flmbrialae. Stylus apice subacqualiler bifidus. Acbaenia apice densissime lanata. — Habitat in Sibiria Allaica rarissime in locis subsalsis desertii montibus Arkaol el Dolenkara adjacentis.
5. *E. TUBEROSA* Bnge. 1. c. 415. — Bib. I. c. t — Foil, ovalis dentalis; calycis glabri basi lubulosi limbo membra n a ceo subpalente, lubo brevior brevier 5-spinoso. 2l. — Foliorum pelioli dense lanati, lamina lana laxa conspersa, caelerum tola planta glaberrima. Radix luberosa. Caulis semipedalis v. vix pedalis ramosus. Folia radicalia peliolala oblusa, caulfaa subsessilia, uli floralia basi cuneata, apice gradalim magis acula, soprema angusla subspinosa, denlibus paucis subspinosis. Bractea subnullae. Verticillastri sexflori, parum dislantes. Calyces fere pollicares sessiles, apice praesertim membranacei, limbo subplicato. Corollae calyce subdoplo longioris ocbroleacae? lubus lenuis, supra medium intus annulalus, galea elongata angusta, extus fere glabra, inlus dense barbata. Filamentorum superiorum appendiculae brevier flmbriatae. Geitalia e galea subexserla. A haenia pilis densissimis niveis apice coronala. — *Moluccella tuberosa* Pall. Itin. HL App. no. 101. I T. - Habitat in Sibiria ad lacum Inderiensem.
6. *E. MACROPHYLLA* Monlbr. el Aucher, Aon. sc. natur. (2. Se>) VI. 54. f - Foil, amplis ovalis grosse crenalis; calycis basi tubulosi pilosissimi limbo maximo dilatato reticulato villosa, brevissime quinquemucronalo corollam superante. % — Afflis *E. tjolucelloioi*. Folia caoliao similia sed duplo majora, floralia subaessilia orbiculala nee acominata profunde denlata, otrinque villosa, supra viridila, aoblus canescentia. Racemus pedalis densus. Bractea subulalae, calycis tabus t4 rbtchlt racemi pills lonjis densissime obteel. Calyces magnitudine *E. moluceUoitU*, ikfcfo •trln^a* VIIIOM. Corolla minor. — Cresclt In Asli mlnore.
7. *E. MOLUCCELLOÏDB8* Bag*. In I*4eb. Flor. All. If. 410. — Ledeb. Icon. flor. Ross. Alt. illustr. t. 437. — Bib. I. c. 638. f — Foil, ovalis dentalis; calycis bnsi lubulosi gubescentis limbo maximo membranaceo-dilalaio, brevissimr 5-mucronato. 2l. — Radix tuberosa crassa. Caulis 1-2-pedalis iclr.igonus ereclus simplex v. ramos 2-4 cmillens, basi el ad genicula den>is>ime albo-lanalus, caelerum pilis albidis sparsis palenlibus hispidus. Folia radicalia el infima peliolala obtnsa rugo»a_f supra hispidula, sublus molliier villoio-laoala, suprema el floralia acuta acote dentata, basi coneata. Verticillastri sexflori. Bractea parvae docidoae. CalX fructifer magnitodioe *MoluceUae* laevis, sed tabus reclus pubesceos «* lirobis aeqaaliter nee oblique dilatatus. Corolla ochroleuca sesquipollicari*, on* nino *E. tuberosa*: Genitalia H acbaenia *E. tubrosae*. — *Phlomis lanigera* Sieve rs In Pall. Beytr. 7. — Habitat in deserti Soongarico-Kirgbisici arenosi* siccis.

t *Species non satis notae.*

- R. *E. ROTATA* Fisch Mey. et Lalle. Supplem. ad indie. IX. semln. horL Pelrop-II. — Ad *E. molucclhidem* proiime accedit, calycis limbo minore oidenlcr lo* halo diffrrre videtur. ^ - Crescit.?
0. *K. AFFIMS* Schreok, Bullet, de la classe phys. math, de l'acad. imp<T. de St Pir^brg. III. 211. — Ebractea: caule calycibq. lanatis; foil, ovalis oblongis" deoiatis; calycis limbo subdilalato quinquespino, tubo longe breiore. %> ~* "'''
tuberosae proxima. — In desertis in siniMra ripa fluvii Alassu in Soongaria.

)(G?. I:RIOPIIVTO\ nth.

(Bib. in Wall. Plant. Asiat. rarior. I. 63. - Meisn. (iencr. plant vascular. I. &* " 107. — Btb. Labial, gener. el spec. 63*.<

I. B. WALLICHIAMM Bib. I. I. c. r. - Caulis e radice tuberosa ortu<? herbaceu* ^rectus tlnples, in pane superiore uti folia, calyces el corollarum galeae lao*

longissima laia albida obiectos. Folia inBma parva, superior* el noralia rhomboidea v. orbicularia, sesquipollicem lata, basi subcuneala sessilia crenala mollissima. Bracleae nullae. Verlicillastris sexflori. Calyces semipollicares sessiles reticulato-venosi, dentibus e basi late ovata subulatis subspfnosis. Corolla flava, galea semiorbicularis, semipollicem longa, inlos glabra, labium dimidio brevius. 2].? — Habitat in Gossain Than.

3608. MOLITCELLA Linn.

(Linn. Gener. plant, no. 724. - Meisn. Gener. plant, vascul. I. 280. II. 107. — Bth. Labial, gener. el spec. 630.)

Seetto I. MOLDOCA Endl. Gener. plant, pag. 529.

Calycis limbos maximus membranaceas subpentagonus, brevissime quinque-dentalns, dentibus mucronalis.

1. M. LAEVIS Linn. Spec, plant 821. - Bot Magaz. U 1852. - Sbtbrp. et Sm. Flor. Graec. VI. 53. t. 506. — Bth. I. c. t — Calycis limbo maiimo membranaceo subpeniagono, brevissime 5-mucronato.^ — Planta in omnibus parlibus glaberrima laevis. Cauies berbacel ascendentes v. erecli, parnm ramosi, fere a basi flori-feri. Folia longe peliolala, limbo 1-1 %-pollicari subrolundo, grosse crenalo, basi cuneato T. rolundalo inlegerrimo, floraliam peiloll calyces aequanies T. excedentes. Verticillastris plerumqae seiflori dltUnles. Brctete 4-5 Ho. longae laeves, basi subconnatae. Calyces sessiles, lalere superiore lft Hn., loferlore 12 lin. long!, fere 2 poll, diamelro, nervis lobl lolos nee extos promloenllbos, limbo utriouque reticolalo-venoso. Corolla limbo calycis brevlor albida, annulo intus membranaceo nee piloso, fere complelo, labiom soperlos iniegrum, Inferiorls lobi laterales ovalo-oblongi, medius bifidus, laciniis rotundatis. — *Molucca laevis* Mnch. Melb. plant. 404. — Habitat in Syria, Palaestina, inter Smyrnam et Bursam.

Seotio II. CHASMOHE PrsL Flor. Bleoi. I. XXXVII. - Endl. 1. o.

Calycis limbus brevis coriaceus subbilabiatus, dcto-decemdentatus, dentibus spinosis.

2. M. SPINOSA Linn. 1. c. - Sblhrp. el Sm. 1. c 54. L 567. - Blh. I. c 640. t - Calyeis limbo bretl coriaceo sobllablelo 8-splnoio. ty — Habitas Jf. hetu, at rlgidior. Folia mioora, denUbut nmeronniatle. lofloreeaaUa et bracleae if. Uu-VII. Calyx rigidus corlaeoa pollearit Incunrus, limbo ?aldo obllC^iD, ieiie T. labio superiore ereclo laoeolato, aplee In iplnam allenaaiy, lablo Inferior* quadrangulalo, angulis spina longa tennIntUi, slno quoque sploa mioore aucto. Corolla calycem parum excedens, annulo Interno piloso Talde obliquo, labio superiore extus villosulo, apice latissime emarginato-bifido, labium inferlus brelius, cictcrum labio Jf. laevii conforme. - *Chatmonia indta* Presl, Pl. Sic. I. XXXVII. - Bnt. Reg. t. 1244. — *M. armala* Sieb. Plant, exs. — *Molucca ipinota* Moench, Meth. plant. 404. - nabital in regione mediterranea, in Sicilia, regno Neapollono, Palaestina et in monte Parnasso.

f Species e genere exdudendae.

- M. DIACANTHOPHTLLA Pall. - LAGochilus DIACANTHOPHYLLIS.
 M. FRutescens Linn. - BALLota SPINOSA.
 M. FRutescens Sblhrp. - BALLota INTEGRIFOLIA.
 M. GIUNDIFLORA Stepb. - LAGochilus DIACANThOPHYLLUS.
 M. INTEGRIFOLIA R. Br. - OTOSTEGIA INTEGRIFOLIA.
 M. MAURLDIASTRUM Stopli. « MARRtBIUM LANATUM.
 M. PERSICA Linn. = BALLota PERSICA.
 M. REPANDA R. Br. « OTOSTEGIA REPANDA.
 M. SCARIOsa R. Br. » OTOSTEGIA SCARIOsa.
 M. TIBEROSA Linn. - EREMOSTACHYS TIBEROSA.

3009. HYMETFOCRATER *Fisch. et Mey.*

(Fisch. et Hey. Indx. semio. horU Petropolit. II. 1835. 30. — Meisn. Gener. plantar. vascular. I. 289. II. 107.)

1. H. BITUMINOSUS Fisch. et Mey. I. c. — Fructus humilis glaber, folia quoad formam *Nepetae Pannonicae* similia viscidala bitumen redolentia; cymae axillares 5-7-florae confertae, foliis floralibus oblongis subintegerrimis instructae, calycis limbus amplissimus membranaceus, faucibus clausa, corolla exserta calyce longe angustior violacea lineolisque albis picta. Carpella atheris parvis exasperata et basi foveola laevi perforata. 6 — Crescit in collibus aridissimis Persiae borealis.

3070. HOLMFWIOLDIA *Reti.*

(Reli, Observ. VI. 31. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 880. II. 197. — Bib. Labial. gener. et spec. 042.)

1. H. SANGUINEA Retz I. c. - Bl. Uf - Fructus ramulis divaricatis tetragonis glabris, saepe tuberculatis. Folia petiolo ovata acuminata, vix dentata, basi subtruncata, 2-4-pollicaria, glabra venosa, utrinque viridula. Racemi axillares peliolo vix longiores, et verticillis paucis 2-4-floris constantes. Pedicelli 3-4 lin. longi filiformes, basi nudi. Instructi bracteae (v. folio florali) nunc parva rotundata, nunc fere pollicaria, foliis caulibus adhaerentibus. Calyx florifer 8-10 lin. post anthesin ultra pollicem diametro, reticulato-venosus sanguineo-coloratus, venis 3 primariis in margine infero v. in mucrone brevissimo abscissis. Corolla 10-11 lin. longa lobata? fere glabra, labii superioris lacini vix lineam longae, inferioris lacina media 2 lin. longa. Genitalia exserta. Ovarii lobis tuberculatis minutis rugulosis. 6 — *Ustingia eoeinea* Sm. Exot. bot. II. I. 80. — *J***i***m* mftmM Josi. Ana. Mas. Paris. VII. 78. — Habitat in India orientali, in Hlodotunum in Sumatra.

3071. SBSTIMIA *Boiss.*

(Boissier, Diagnos. plant. nov. orient. V. 40.)

Calyx tubo ovato multistriato, limbo maximo membranaceo-dilatato reticulato-venoso rotundo aequali, fere ad faucem usque in lobos subaequales ovatos mucronulatos subintegros basi angustatos distinctos. Corolla tubo elongato subincurvo, in faucibus angustata, intus nudum, limbo parvo bilabiato, lobis superioribus brevibus, inferioribus trilobis, lobis rotundatis brevibus, in medio paulo latiori longioribus emarginatis. Stamina quatuor aequalia didynamia, faucem aequantia. Filamenta inferiora longiora longiusque cum corolla coalita. Antherae biloculares, loculis subdivisibilibus. Stylus apice subaequaliter bifidus. Acabacia ovata punctato-tuberculata. — Saffrutei Persici inermis habitu *Pnuii*, calycibus *Moluccellae*.

1. S. CALYCINA Boiss. I. c. 41. t. — Soffrutex ramis vetustioribus crassiusculis perianthii anserinae aequalibus, cortice grisea in fibras longitudinales Uccrae denso obiectis. Rami novelli glabri subsemipedales parce foliosi. Folia breviter petiolata obscure virentia glabra ovato-oblonga, basi attenuata truncata obtusiuscula, dentibus ascendentibus brevibus obtusiusculis, ad basin profunde dionibus ea *Prasii majoris* referentia sed minora, 0-8 lin. longa, 4-6 lata. Florae 3-5 in cymis ad axillas foliorum superiorum breviter pedunculatas distinctas verticillatos ramosculos 3-4 ad ramorum apicem effluentes, bractearum oblongarum mucronulatarum in petiolum attenuatarum, tubo calycino paulo inferius ad pedicellum directorum basin sicut calycis lobus 1 lin. longus, fuperne subrotundus 12-14-striatus, limbus rotundus membranae subrotundum pallide mucronulatum diametro 10-18 lin. longum, fere usque ad tubum faucium in parthenonem onias, basi angustata. Antherae longae, 0 lin. longae obtusiusculae mucronulatae divisae. Corolla tubulosa 9-10 lin. longa, in limbum sensim ampliata breviter mucronulata glandulosa-bilobata, Ubi breviter. Acabacia . . . ? - In Persia.

f *Species e genere excludenda.*

S MGUSTROIDES Boiss. et Hohenack. (Boiss. Diagn. pi. no?, orient. III. 5ft.)
= WEINDLAISDIA KOTSGHYI Boiss. et Hohenack. (Boiss. I. c)

3071. ACNYROSPEBmim Blume.

(Blume, Dijdragen 840 — Meisn. Gener. plant, vascul. I. 280. II. 107. — Bth. Labial. gener. et spec. 043.)

1 A. DENSIFLORUU Blume 1. c. 811. — Bth. 1. c. f — Spica cylindracea densiflora, bracteis nullifloris; foil, obovalo-oblongis aculis, basi integerrimis 2|. — [Herba 6-8-pollicans erecta, caule pubescente simpliciter. Folia petiolata ovata acuminata serrata, basi cuneata v angustata, utrinque puberula. Venicillae subsessiles, in spicam densam ovatam sesquipedalem approximatae. Folia dorsalia bracteaeformia sessilia laevia ovata sessilia acuta, calyce breviora. Calyx ovatus membranaceus pubescens subbilabialis, labium superius induratum, demum obovatum, medio magis productum, inferius bifidum, omnibus subaequalibus, fructu inflato, dentibus subpalatis» fauce inclusis nuda. Corolla calyce vix longior. Stamina 4 ascendente. Filamen nuda. Antherae locis confluentibus. Stylus brevissime bifidus. Achaea dorso et apice paleis membranaceis coronata] — Habitat in Java ad margines rivulorum in Linga Jalu provinciae Cebillon et in Manilla.

2 A. PHLOMOIDES Blume I. c — Bin. I. c, — Spt* UXA; bracteis unifloris, basi intus glandulosis; foil, obovato-oblongis, basi integerrimis. — Habitat in Javae sylvis altionibus humidis montis Buraorang.

3. T A. FRUTICOSUM Blh. I. c 643. et 745. - Caulis fruticosus, rami tenuiter pubescentes. Folia petiolata ovata obtusa late crenata, basi rotundata, petiolo cuneato alato, utrinque pubescentia, subtus minutissime glandulosa. Venicillae sessiles, in spicam laxam terminalem approximatae. Flores fere Colquhountae. Folia floralia membranacea ovata ciliata, calyce breviora. Calyces membranacei lubulosi pubescentes subincurvi, ore subobliquo subaequaliter quinque-dentato, dentibus ovatis acutis, fauce inclusis nuda. Corolla volmskoldiae, calyce duplo longior, tubo inclusis nudis incurvis, faucibus subincurvis, labia abbreviata pauciter, filamentum bilobum lobis lateralibus brevibus rotundatis, inferius lobis lobis lateralibus brevibus rotundatis, inferius lobis lobis lateralibus brevibus rotundatis. Stamina ascendente, breviter tetrameris. Antherae bilobae, locis divaricatis, demum subconfluentibus. Stylus lobus superior brevissimus. Ovula apice squamis pubescentibus densissime obsessa. Achaena....? — ^, - photaxit rotea Bojer mss. — Habitat in Madagascaria.

3072. COLQUHOUNM Wall.

(Wall, in Trans Soc Linn. Lond. XIII. 008. — Meisn. Gener. plant vascul I. 890. II. 107. - Blh. Labial, gener. et spec. 044.)

I. C. COCCISEA Wall. I. e. et Tent Oor. Nepal. I. 13. t & - Bib. I. c f - Folia glaberrima asperulis, junioribus calycibus. lomenlo lenul canescentibus, demum calycibus ovatis oblongis; corollae lobis superiore ovato. 6^ — Frutex amplius super alios arborescentes minores volubilis, rami longissimi, lomenlo parco bine mde conspersi dilute ferruginei, juniores lomenlo densiore vesiculosi. Folia petiolata ovata acuminata 5-pollicana crenulata, basi acuta v rotundata, supra altrivordia rugosa-scabra, juniora subtus incano-lomentosa, adula subnuda, floralia inferora conformia, supra minima. Venicillae pauciflorae, nunc in spicis terminatis, basi foliosas, approximate nunc in racemos breves axillares dispositas. Bractea minima Itneares Calyces semipollicares, basi angustati, lomenlo tenui conspersi Corolla coccinea, calyce duplo longior

19 pamflora folis junioribus calycibusque ovatis lomenlosis. — Habitat in Ceylonia, fit ad Oosain Than

2. *G. VESTITA* Wall. Tent. flor. Nepal. I. 14 et Plant. Asiat. rar. III. ff. t. 267. - Bih. I. c. — Foil, sublus caule calycibq. albo-lomenlosis; denlib. calycinis ovalis obiusis; corollae labio superiore ovalo. 6^ — Characteribus datis ei floribus parum minoribus dislioguitur a *C. eoecinea*, cui habitu similis. — Habitat in Kamaon.
3. *C. ELEGANS* Wall. Plant. Aiiat rar. I. 65. et HI. 43. t. 308. - Btb. I. c. 645. - Caule, foil, calycibq. velulino-pubescentib.; dentib. calycinis late lanceolatis acotiusculis; corollae labio superiore oblongo. 6^ — Praeter cbaracteres datos differt a *C. eoecinea* et *C. vestita* calycibus dimidio minoribus, corollis longius exsertis, faace ampliore et colore florum aurantiaco punctis sanguineis nolalo nee coccineo. — Habitat ad Taong Dong monlem Avae.

Tribus X. PRASIEAE Bth. Labiatar. gener. et spec. 646. —
Endl. Gcner. plant, pag. 630. — Meisn. Gener. plant, vascul.
I. 289.

Calyx subaequalis. Corolla bilabiala. Stamina 4 aacendentia didynama, ioferioribus longioribns. Acbaeolia carosa sobbaccata.

• 3673. *GOMPHOSTEMMA* Wall.

(Bib. in Wall. Plant. AsiaL rar. II. 12. - Melsn. Gener. plant, rascal. I. 200. II. 107. — Btb. Labial, gener. et spec. 646.)

1. *G. STROBIUNUM* Wall. I. c. - Bth. I. c. 617. f - Caule erecto; foil, elliplico-ovalis rugogis, supra hispidis, subtas tomentosis; verlicillasris in spicatio, terminates eongestis v. Inflmis remotis aiillarib.; foil, floralib. bractaeformib. late ovattt, ealyett MperanUIT.; ealjcib. campaoollalis molliler lomentosis, deotib. ovato-lasMttliltntn tjsvettls pftf^mbtolplo losglorlbM. * - Caolla eraatot sobsimplei, obtuse tetotfoaurfltnstf taamwos— 1-3-pedalls. Folia caulina peliolala, 6-10 poll, longa, 3-0 poll, lala, erenata, floralia sessilia pollicarin, supra fuscescenlia glabra v. apicem versus pubescenlia, sublus rugosa tomentosa, irregulariter dentala. Verlicillasri none omnes spirati, spica 4-6-pollicari v. interdum fere pedali crassa densa, nunc inferiores remoti axillares pauciflori v. nonnulli in spiculas breves axillares approximati. Corolla flava, exlus pubesceos, lubus calyem superans, vix incanos, faux valde inflata. Acbaenia sicciiale rugosissima glabra, onom allerumve fertile, caeiera saepios abortiva. — Habitat in regno Burmanoico ad Meong, Prome et in monte Taong Dong.
2. *G. VIRIDE* Wall. I. c. — Bib. I.e. — Caule erecto; foil, elliplico-ovatis darcidis, supra hispidulit, subtas pabescentib.; venicillastrls paucioois in spicam brovem lerminalem congestis; foil, floralib. bractaeformib. late ovalis calyces superantlib.; ealycib. eampanolats nolliter villosis, denlib. lanceolalis; corollis calyce duplo longioribus. 2|. — CL *strobilino* valde afflne, sed slatura humilior. Folia laete viridia flaccida, hand rugosa, tnbtos vix toneniosa. Spica brevis pauciflora. Calyx ampins. Corollae lubus brevior qoan in *G. strobUino*. — Habitat in régni Burmannici provincia Tavoy.
- a *G. HEYNEANUM* Wall. I. c. — Bib. I. c. - Caule erecto; foil, elliptico-ovalis rugosis, supra molliler, sobtos dense floccoso-tomenlosis; verlicillasris in spicam terminalem eongestis v. inflmis sobremotis axillarib.; foil, floralib. brarteaeformib. late ovalis, calyces superantib.; ealycib. campanulalis molliter tomentosis, denlib* ovalo-lanceolatis, corolla vix longioribus. % — Habitus et statora *G. strobili**** differt tomento floccoso, foliis floralibus supra rugosis lomeniosii nee glabralls* corollis minoribus, lubo incluso, labiis vix calyem superantibus. — Habitat in peninsulae Indiae orientalif monlibus prope Courtallum.
- G. OBLONGUM* Wall. I. c - Bib. I. c. 646. - Cable erecto; foil, oblongo-etliplicis ragosis, supra bispidolis, sabbas dense lomratosU, floralib. confonnib.;

- verticillasns axillanb. remotis pauciflons; calycib. campanulalis lomenlo&is, dentib. lanceolato-linearib. elongalis aculis, corollis calyce tnplo longionbus. 2l. — Caulis 1-2-pcdalis. Folia fere *G. strobilum*, sed minora angusliora. Verticillasns 2-4 axillares 0-10-Won. Corolla exlus pubescens ultra I'A-pollicans, lubo gracili, apice valde inflato. Bractee parvae lineares lanceolatae v. ovatae. — Habitat in regni Durmannici provincia Tavoy.
5. *G. LUCIDUM* Wall. 1. c. — Blh. 1. c. — Caule erecto; foil, elliptico-ovalis, supra lucidis piloso-hispidis, subtus dense rufo-lomentosis, floralib. conformib., verlicillasns axillanb. remotis; calycib. lubuloso-campanulatis lomenlosis, dentib. lanceolatis abbrevialis; corollis calyce tnplo longionbus. 2l. — Habitus prucedentis, sed robustior. Caulis 2-3-pedah dense rufo-lomentosus. Folia breviter petiolata, utrmque angustala, levissime denlata v. Inlegernma. Verticillastris 10-30-flon. Corolla flava, extus dense tomentosa. Denies calycini vix lineam longi — Habitat in India orienlali ad Choppedong orae Tenasserim et in Pundua.
6. *G. PARILOHUM* Wall. 1. c. — Blh. 1. c. — Caule erecto; foil elliptico-ovalis, supra pubescenlib., sublus lomenlosis, floralib. conformib.; verlicillasns axillarib. remold laxe multiflons; bracleis lanceolatis v. linearib. calces superanlib.; calycib. campanulatis, dentib. lanceolato-linearib. apice subulans; corollis gracilib. calyce duplo longiorib.* 2l. — Bablta praecedentibus affine, sed flores in axillis numeroalssim), laxe fasciculail. Corolla flava, extus pubescens, 0-10 lin. longa, tubo gracillimo, fauce minus inflata, limbo parvo. — Habitat in India orienlali, in Nepalia, Silhet et in insula Penang.
7. *G. MULTIFLORUM* Bib. I. c. — Caule erecto; foil, ellipticis, supra vix pubescenlib., sublus tomentosis, floralib. conformib.; verlicillasns axillanb. remotis laxe multiflons; bracleis ovalis foliaceis, calyces superanlib.; calycis dentib. lanceolato-linearib., corollis gracilib. calyce pluries longioribus 2l. — Haec species a praecedente differt praecipue bractearum forma. Folia angusliora videtur. — Habitat in Indiae orienlalis provincia Silhet.
8. *G. CRINITUM* Wall. 1. c. — Blh. 1. c. — Caule erecto, foil elliptico-ovalis, supra pubescenlib., subtus lomenlosis, floralib. conformib., verlicillasns axillanb. remotis laxe multiflons, bracteis linearibus calycem subaequantibus, calycib. tubuloso-campanulatis, fructiferis* lufrais, basi glaberrimis, dentib. elongatis scitfels hispidis; corollis gracilib. calyce duplo longioribus. 2l. — Habitus, inflorescentia et corolla *G. parviflora*, bracteis ei calyce ditinetiMIMun, folia amphora, minus rugosa. — Habitat in regni Durmannici provincia Tavoy.
9. *G. ERIOCARPUM* Bib. mst. in Wall. I. c. — Bth. Labial. MO. — Caule ascendente, foil elliptico-oblongis grosse dentatis, supra bispidulis, inlus lomenlosis, floralib. conformib.; verlicillasns remotis paucifloris; bracleis ovalibus denticulatis, calycib. campanulatis, demum inflatis tomentosis, dentib. linearibus; corollis villosis calyce duplo longioribus; achaenus tomentosis ^ — Caulis elongatus, tenuior quam in speciebus praecedentibus. Folia 3-4 poll., longa, sesquipollicem laeva, acute dentata. Verticillastris pauci sub-10-flori. — Habitat in peninsulae Indiae orienlalis prope Courtallum.
10. *G. OVATUM* Wall. 1. c. — Bib. 1. c. — Caule basi radicante erectiusculo, foil late ovalis, supra lucidis bispidulis, sublus molliter tomentosis, floralib. conformib.; verticillastris axillanb. remotis multiflons; bracleis late ovalibus, exienonb. calycem subaequantibus, calycib. campanulatis villosis-tomentosis, dentib. lanceolato-linearibus, corollis calyce tnplo longioribus. 2l. — Folia minora et laeviora quam in praecedentibus. Corolla flava pubescens, fere sesquipollicem Uicaris, lubus calyce duplo longior, faux amplissima. — Habitat in Nepalia.
11. *G. MELISSAEFOLIUM* Wall. I. c. — Blh. I. c. — Caule basi repente radicante, ramis ascendentibus, foil ovalibus glaberrimis v. supra hispidulis, sublus parce lomenlosis, floralib. conformibus, verlicillasns axillanb. remotis laxe pauciflons, bracleis ovalibus, calycem subaequantibus, calycib. hispidis, dentibus lanceolato-linearibus, corollis calyce subduplo longioribus ^ - *G. atrovirens* affinis*,

differt caule basi repente, foliis subulis in tomentosis floribusque minoribus
Corollae 13-14 lin longae, tubo gracili, apice parum dilatato — *Prattum mehssaefohum* Roxb Hort. Bengl 45 — Habitat in Indiae orientalis provincia Silhet

- 12 G AELUTIMJIM Bth in Wall I c 13 et Labial 649 - Laule basi repens radicanle, raris ascendentibus, foliis ovalibus crassis, utrinque dense velutino-pubescentibus, floralibus conformibus; verticillas in axillaribus remotis paucifloris, bracteis oblongis calycem aequantibus 2l. — Species distinctissima affinis *G mehssaefoho*. Folia 12-18 lin longa, 8-15 lin lata. Corollae flavae, 11-12 lin longae, tubo gracili, apice valde dilatato — Habitat in Indiae orientalis provincia Silhet
- 13 G PHLOMOIDES Bth. 1. c — Toll oblongus, utrinque aculeis denticulatis, supra pilosus, infra dense siellato-tomentosus, floribus fasciculatis axillaribus ty — *Prattum phlomoides* Reinw ex Blume, Bijdragen 840 — Habitat in Javac sylvibus montosis allionibus
- 14 G JAVAMCUM Blh. I. c. 650. — Foliis (majoribus) oblongis, utrinque acuminatis denticulatis, supra hirsutis, subulis pubescentibus stellatis subtomentosis, Oculis subfasciculatis axillaribus 2l. — *Prattum Javamcum* Blume, Bijdragen 840 — Habitat in Javac sylvibus montosis humidis

3G74. PHYLLOSTEGIA Bth.

(Blh in Lindl Bot Revisio et u 1202. adnot. et Labiat. gener et spec. G50 — Meisner Gener. plant, vascul. I. 280. II 107)

- 1 PH DEMATA Bib in Lindl BoU Regist. t 1202 adnot. et Labiat 651 f — Hirsutissima foliis basi rotundatis; racemo denso, calycibus amplis, laciniis foliaceis dentatis, stylis lobis clavatis. 2l.? — Caulis herbaceus erectus subsimplex ultra pedicellum, obtuse tetragonus, uti folia et calyces pilis longis rigidis hirsutus. Folia longe petiolata acuminata, margine serrato-crenata 3-4-pinnata, floribus infima subobovata, superioribus sessilibus, calyce fructifero breviora. Racemas 3-4-polliniferi. Bractae parvae subulnas. Verticilli 5-10-flori. Pedicelli rigidi hispidissimi, calyce breviora*. Calyx limbo 5-lobis, fructifer longior campanulatus vinctis foliaceis hispidissimis, laciniis late ovalibus lanceolatis aculeis, tubo aequilongis. Corolla 5-loba. — Habitat in insula Oahu ad montem Raah et sinum Biron
- 2 PH VLSTITABth 1 I c. c — Hirsutissima foliis basi rotundatis-lobatis, floralibus conformibus, verticillas in axillaribus distantibus, calycibus amplis, laciniis foliaceis integerrimis, stylis lobis clavatis. ^ — *A Ph. dentata* differt foliis minoribus et characteribus supra notatis. — In insula Owyhee ad sinum Biron
- 3 PH GRANDIFLORA Bib. I. I. c. c. f — Adpresse pubescens v. glabrescens foliis basi rotundatis, racemo laxo; dentibus calycibus late ovalibus foliaceis integerrimis patentibus, corollis incurvis calyce plus triplo longioribus, stylis lobis arcuatis ^ " Caules dum procumbentes v. ascendentes ramosi, raris juniores pilis brevibus adpressis-recurvis rigidis pubescentibus, demum glabrati Folia petiolata 1-2- f inferiora sub-3-pinnata, vix acuminata, leviter crenulata, basi integerrima subcomposita, supra glabra, lobis praesertim junioribus pubescentibus, floralibus infimis «subconformibus, superioribus bracteiformibus. Racemus 2-4-polliniferus verticillatus sexflorus. Pedicelli calycem subaequantibus, uti calyces et corollae pilis longis adpressis vestiti, pedunculo communi nullo Calyx 5-lobus 3 lin longus, fructifer auctus inflatus, lacinae obtusae, supra glabrescentes Corolla cum limbo in foribus ore 14-15 lin longa subconcaeva, extus pilis adpressis villosissima, lobis longe exsertis incurvis aequalibus, limbo nudus, limbi labium superius breviter orbiculatum patens subintegrum, in fenestris triplo longius, lacinae latae, intermedia latissima Integra. — *Prattum grandiflorum* Gaudich. in Frejre 45J t 65 fig * — Habitat in insula Oahu
- 4 PH CHAMISSOMS Bth. in Linnaea \ I 70 et Labiat 651 t - Glaberrima foliis basi rotundatis, racemo laxo, pedunculis elongatis trifloris, calycibus breviter 5-dentatis, corollis incurvis calyce quadruple longioribus % — Caulis ramosus.

- Folia fere *Ph grandiflorae*, sed uli lota planla glabemma, floralia foliacea semi-pollicana, breviter peiolala v subsessilia ovala acuta subdentata, suprema minora. Racemus semipedalis el ultra Pedunculi versus medium infidi, bracteae minulae subulatae Calyx lenuis, denlibus lanceolalis obliuisculis Corollae magnitudine *Ph grandiflorae* labio inferiore maximo — *Prasium glabrum* Gaudich in Freyc Voy 452 t C4 — Habitat in insulis Oahu el Mowee
5. PH. GLABRA Bth in Lindl Bot Regist t 1292 adnot el Labial 052 — Glaberrima* foil, basi rotundato-truncalis, racemis brevib. laxis foliosis, pedunculis inferiorib elongalis Infidis, calycib breviter quinque-dentatis; corollis subreclis calyce vix triplo longiorib, styli lobis clavalis ^ — *Ph Chamusonu* affinis, differt caulibus ramosionibus, racemis irregulariter subramosis el flonibus fere dimidio minoribus Pedunculi inferiores nunc ul in *PA* Chamusonu* elongati trifidi, nunc in racemulos abeunt, nonnulli abortivi, pedicelli interdum folia loco lions gerunt Folia floralia alia caalims subconformia, alia parva sessilia reflexa — Habitat in insula Oahu.
- 6 PH MACROPHYLLA Blh. I. 1. c. c. - Glabruscula v. apice pubescens foil oblongis, basi rotundalis, racemo brevi laxo, calycib breviter 5-dentatis, corolla reclis calyce subtriplo longiorib.; styli lobis arcuatis. 2* — Folia fere *Ph grandiflorae*, sed angustiora sublongiora. Inflorescentia *Ph grandiflorae*. Pedicelli el calyces pilis brevibus mollibus patentibus nee adpressis pubescentibus. Denies calycim erecti, nee foliacei. Flores vix pollicares. Corollae tenuissime pubescentibus — *Prastum macrophyllum* Gaudich. in Freyc. Voy. 453 t. 05 fig J. — Habitat in insula Sandwichensi el in insula Owybee ad montem Raah
7. PH. PARVIFLORA Blh. in Linnaea VI. 70. el Labial. 652 — Pubescenti-villosa foil basi rotundatis cordatisve, subtus mollior villosis, pedicellis calyce longiorib, denlib calycinis brevib acutis, corollae tubo calyce triplo longior, styli lobis clavalis recurvato-divaricatis. 2|. — Folia late ovala, saepe acumina ere* nata 3-4-pollicana, supra subrugosa tenuiter pubescentia, sublongior pubescentia subcanescentia Racemus* laxis gracilis Folia floralia rainula Pedicelli saepius 3-5 lin longi, calyx 1 1/5 lin, corolla semipollicans glabra, labus parum incurvus — *Prastum parviflorum* Gaudich in Freyc. Voy. 453 I 65 fig 1 — *Phyllostegia leptotachy** Bth. in Lindl. Bot. Regist I. 1292. adnot. — Habitat in insula Oahu
8. PH MOLLIS Blh I i c e — Mollior velutino-pubescent: foil, basi cordalis, pedicellis calyce breviorib; denlib. calycem abbreviate obtusis; corollae tubo calycem breviter superante, stylo apice clavato, stigmalib. complanatis recurvis. % — A *Ph parviflora* corollis fere dimidio minoribus et alns nolis diversa, magis affirm, videtur *Ph claiatae*, sed pubescentia densiore molliore el styli forma differit Verticillata sexflora — Habitat in insula Sandwich
9. PH CLAVATA Blh in Lindl. I c. el Labial 653. t — Pubescens foil basi rotundato-truncalis subcordatisve, pedicellis calyce subbreviorib, denlib calycim* abbrevialis obliuis, corollae tubo calycem breviter superante, stylo apice clavato, stigmalib. complanatis recurvis. ^ — Folia forma el magnitudine *Ph grandiflorae*, at minus conacea el villosiora, floralia inOma subconformia, suprema bracteiformia Verticillata 0-10-flora, infimi axillares remoti, superiores approximati (corolla vix 4 lin. longa, tubo crassiusculo pubescente, labus brevibus vix macqualibus Calyx flonfer campanulatus, fructifer auclus patens — Habitat in insula Owyhee monle ignommo.
10. PH RACEMOSA Blh I i c e — Villosa foil. ovato-lanceolatu», basi cordalis, verticillata mullifloria, pedicellis brevissimis, corollis calyce dimidio longiorib, styli lobis clavalis ^ — Habitus fere *Stachydis grandidentatae* Pubescentia subnuda videtur Folia sesquipollicana molliter rugosa, floralia infima conformia minora, supremae parva rotundata dentata, breviter peiolala, flonibus brevioribus Vorticillata in circiter 10-12-flora, infimi remoti supremi magis approximati Corolla MX 3 lin longi, forma *Ph claiatae* - Habitat in insula Owyhee monle Raah

- 11 PH * HIRSUTA Bth. I. I. c. c. — Hirsutissima foil, amplis, basi cordalis, racemis ramosis; calycib. glabris breviter quinqueidentatis ^ — Caulis, ut in *Ph dentata*, pilis patentibus densissime vestitus. Racemus ramosus « Pedicelli breves pubescentes. Calyces *Ph. mollis*. Corolla?, sed ob affinitatem cum praecedentibus ad hoc genus relata est — Habitat in insula Oahu.
12. PH. FLORIBUNDA Bth. I. c. t. — Pubescens v. hirsuta foil ellipticis amplis, basi rotundatis angustalibve; cymis axillaribus laxe ramosissimis multifloris hirsutissima, calycibus hirsutis, dentibus linearibus tubo subaequilongis, corollis calyces breviter superantibus 6? 2? — Rami dum lignosi?, pilis adpressis pubescentes. Folia longe petiolata 2-5-pollicana tenuia, pilis brevibus hispida Corambi v. cymae fere ut in *Byttropogone* ampla ramosissima. Bracteae parvae ovalae v. oblongae. Pedicelli calyce sublongiores. Calyx 2-3 lin longus tenuis, fructifer dilatatus. Corolla parva glabra, forma fere *Ph. racemosa*, at tenuior — Habitat in insula Sandwich.

3075. STENOGYNE Bth.

(Bib. in Lindl. Bot. Regist. XV. adnot. ad U 1202. et Labial gener. et spec 654. — Meisn. Gener. plant, rascul. I. 280. II. 107)

- 1 ST. MACRANTHA Bth. I. I. c. c. — Hirsutissima foil, petiolatis ovalis, basi cordatis; verticillas axillaribus distantibus, pedicellis calycem aequantibus. 2. — Hirsutis, folia et etiam calyces *Phyllotegiae velitae*, sed corollae diversissimae. Sunt enim sesquipollicares, tubus longe exsertus inctus, faux valde dilatata labiumque superius vix in ten ore brevius. Stylus omnino *Stenogynet* nee *Phyllostegiae* — Habitat in insula Owyhee ad montem Raah.
2. ST. SESSILIS Blh. I. c. f. — Glabra: foil, sessilib. rotundatis, basi cordalis corollaeis; verticillas ad apices ramorum approximatis. 2. — Caulis ascendens glaber? ad nodos pilosus letragonus, angulis aculis subsponsus. Folia glaberrima, regulariter arenata nervo-rigata, floralia minima, at conformia. Verticillastri pauci secundi. Bracteae minatae lineares. Calyces lempollicares subsessiles glabri campanulas, Irregulariter 5-dentati v. bilabiati, dentibus lain rotundatis. Corolla calyce duplo longior, extus villosa, tubus amplicus incunus, labium superius breviter emarginatum, inferius MI longius, lobi rotundati, laterales gubrecti, intermedius patens Genialia corolla sublongiora — Habitat in insula Sandwich.
- 3 ST. CORDATA Blh. I. c. — Glabra: foil, inferius breviter petiolatis, superius sessilib., omnibus ovalis, basi cordatis corollaeis, verticillas axillaribus dilatantibus 2. — Ab affinis *St. tenth* difert ramis tenuibus, foliis minus angustis, indorescentia et floribus minus. — Habitat in Insula Sandwich
4. ST. RIGOSA Bib in Lindl. I. c. el Labial 655. t. — Glabra foil, breviter petiolatis oblongis coriaceis, basi rotundatis-truncatis, verticillas axillaribus dilatantibus, pedicellis calyce brevioribus. ^ — Caulis cretus? divaricatus-ramosus**ii tetragonus, uli tota planta glaberrima. Folia r/t-2-pollicana arenata aspera rugosa (cnosa, floralia omnino conformia, flore* longe superantia Verticillas subsexillori, omne* axillares, axillae superiorum scilicet. Pedicelli 1-2 lineas longi (calyces 4-5 lin. longi glabri, dentibus oblongo-lanceolatis obtuse*, 2 infimis brevioribus, sed profundius fissis. Corolla MI calyce duplo longior fore glabra, forma *St. trophalarxoidu* — Habitat in insula Owyhee ad montem Raah et > monte igrmomo.
- 5 ST. MICROPHYLLA Bth. I. c. — Glabra foil panis petiolatis arulis, basi angustatis, verticillas paucis bifloris secundis, calycibus folia subaequantibus brevissime pedicellatis 2. — Rami elongati ramosi dilatato-floribus subcandentes, acute tetragoni Folia ||| 3-1 lin longa, acule errata Pedicelli brevissimi sub calycibus bibractolati (corolla calyce duplo longior, forma omnino *St. rugosa* §, tubus intus aequalis Genitalia exserta. - Habitat in insula Owyhee ad montem Raah.

0. ST. SCROPHULARIOIDES Dth. I. 1. c. c. f — Glaberrima: foil, pelioiatis ovatis flaccidis; verticillastris axillarib. dislantib.; pedicellis fructiferis calyce longiorib.; corollis pubescentib. calyce duplo longioribus. 2l. — Rami divaricati flexuosi subscandens? tclragoni laeves. Folia 1-1'A-pollicaria serrato-crenata, basi rotundalo-lruncala, petiolo apice subdilato, floralia omnino conformia, (lores superaniia. Verlicillastris sexflori, omnes distantes, axillae superiores sieriles. Pedicelli floriferi 2-3, fructiferi 0-7 lin. longi, demum reflexi. Calyces vix 3 lin. longi, irregulariter 3-5-dentati, fructiferi globosi subavenii. Corolla calyce triplo longior, exlus pubescens, labium superius incurvum brevissimum emarginalum, inferius brevius, lobis latis rotundatis suberectis. Genitalia breviter exserta. — Habital in insula Sandwich et in insula Owyhee ad sinum Byron.
7. ST. NELSONI Bth. I. c. — Glabra: foil, petiolalis ovatis subflaccidis; verticillastris axillarib. distanlib.; pedicellis fructiferis calyce longiorib.; corollis subglabris calyce 3-4-plo longioribus. 2l. — Affinis *St. scrophularioidi*, differ! foliis majoribus subcoriaceis, floribus in verticillastro numerosis, calycibus longioribus. Corollae duplo longiores. Genitalia longe exserta. — In insula Sandwich.

3070. PBASIUM Linn.

(Linn. Gener. plant, no. 302. — Meisn. Gener. plant, vascular. I. 880. II. 107. — Bth. Labial, gener. et spec. GM)

1. PR. MAJUS Linn. Spec. plantar. 838. — Blh. 1. o. 650. t — Soffrutex divaricato-ramosus. Rami herbacet semipedales v. pedales uti tola planta saepius glaberrimi, juniores rami cum foliis nonnullis blspidull. Folia petiolata 'A-1-pollicaria ovata acuta, basi rotundalo-lruircala v. subcordata, margine irregulariter serrato-crenata, floralia conformia v. suprema minora integriora, omnia calyces superaniia. Verlicillastris biflori, omnes distantes aillares. Bractea minulac v. nullac. Calyces breviter pedicellate lale campanulati virides glabri, laciniis ovalis aristatis, nunc omnibus aequalibus, saepius 3 superioribus in labium superius connatis. Corolla albida v. pallide purpurascens glabra, tubo amplo. Genitalia corolla breviora. 2l. — *Pr. minus* Linn. I. c. — Habitat in Europae et Africac borealls regione mediterranean in Lusitania, Hiipania, agro Tingitano, insulis Balearicis, Corsica, Sardinia, Sicilia, Italia aujtrali, In Peloponneso, tam in liltore Cariensi et in insula Zacyoioho, In eollibaa mariUniU FenUpole<t pliam io insula Madera.

t *Specie* e genere excludendae.*

PR COCCINEUM Wall. — PHYSOSTEGIA VIRGINIANA?

PR* GLADRUM Gaudich. = PHYLLOSTEGIA CIAMISSONIS.

PR GRANDIFLORUM Gaudich. = PHYLLOSTEGIA GRANDIFLORA.

PR* HIRSUTUM Poir. - STACHYS SWAINSONI.

PR INCARNATUM Wall. — MACBRIDEA PULCHELLA.

^ R. JAVANICUM Blume. « GOMPHOSTEMMA JAVANICUM.

PR. MACROPHYLLUM Gaudich. = PHYLLOSTEGIA MACROPHYLLA.

PR. MELLISSAEFOLIUM Roxb. = GOMPHOSTEMMA MELISSAEFOLIUM.

PR. PARVIFLORUM Gaudich. = PHYLLOSTEGIA PARVIFLORA.

PR. PILOMOIDES Blume. = GOMPHOSTEMMA PnLOMOIDES.

PR. PURPLREUM Walt. — PHYSOSTEGIA VIRGINIANA?

Tribus XI. *AJUGOIDEAE* Bth. Labiat. gener. et spec. 057.
— Endl. Gener. plant, pag. 631. — Meisn. Gener. plant, vas-
cul. I. 289.

Corollae labium superius nunc brevissimum, nunc flssum, lacinnis demissis, ranssime crectum fornicatum, inferius elongatum. Stamina 2 v. 4 ascendentia, saepissime exserta, labio opposita. Achaenia magis minusve reticulato-rugosa.

3077. *AMETHYSTEAE* Ltnn.

(Lion Gener plant DO. 15. — Meiso. Gener plant, vascular I 280 II 197 — Bib Labiat. gener et spec 657)

1 A *LOERULEA* Lino. Spec, plant. 30. — Bth I c f — Herba erecta, circiter pedalis ramosa glabra, saepe coerulescens, rami lucidi Folia peliolata 3-5-pamta, segmentis oblongo-lanceolatis inciso-dentatis, floralia minora, suprema miouta. Cymae pedunculatae laxae racemoso-pamculatae. Bractae minutae Calyces coerulescentes erecti glaberrimi, deotibus lanceolatis acutissimis Corollae vix calicem excedentes coeruleae O — ^- *corymbota* Pen. Enchind I 24 — Habitat IO Asia Rossica a regione Pontica ad jugum AUaicam, Dahunam etc et in China.

3078. *TRICHOSTEUA* Linn.

iLion. Gener. plant, no. 300. — Meisn. Gener plant vascular. I 280 II 107. - Bib. Labiat gener. et spec. 658)

Sectlo I. *STREPTOPODIUM* Bth. I. o.

Calyx valde obliquus, torsione pediceloh reversns. Pedicelli solilam oppositi unflorl.

1 TR. *LINBARB* Unit. Gen. pi. H. Amer. II. 39. - Bib. I. e. - Glabrum: foil. linearib, florib. solitarlls oppotillt revertlf; ealjolb. *alde obliquis. 2>? O* — A *Tr dtehotomo* non differt, nisi glabntie constanliore, statura saepius parum elatiore, foluorum forma et corollis parum majonbus toliorum forma conMans M-detur. — *Tr dtchotomum* Rolh, >ov plant spec 280 — *Tt brachiatum* Lam Illustr gen III t 515 (stamimbus dcficientibus.) non Linn — Habitat in America boreali a Philadelphia el New Jersey ad Louisianam

2 TR *DICHOTOMUM* Linn Spec, plant 834 — Bib. I e t — Glabrutn v pubescens foil peliolatis oblongis, florib solitarns oppositis reversis, caljicib valde obliquis O ~ Herba erecta /i-l-pedalis, apice paniculato-ramosissiraa Foil* infenora circiter pollicana obtusa, basi angustala, utrinque \mdia, supenora minora, floralia suprema v. omnia bracteacformia, pedicello breviora 1 lores secus ramos oppositi secundi. Pedicelli calycem fructifcrum subaequanles torti (al)X flonfer parvus vix lnaequalis, fruchfer3-4 lin. longus, valde obliquus, ()|ntibus 3 superioribus (reversione calycis infenoribus) valde auctis, basi connate, apicc late lanccoldtis acutissimis, 2 infenoribus (reversione superioribus) tnplo brevionbus liberis lalis acutis Corolla parva, tnbo calicem subaequanle, gentalibus 4-0 hn. longis exscrlis — *Tr pilomm* Rotb, Nov. pi spec 280 — llabit*¹ in America boreali a Canada ad Carohnam

8«Uo II. *ORTHOPIDIUM* Bth. I. o. 659.

Calyx rectus aequali* tymac multiflorac

3 TR *OBLONGUM* Bth I c f - Pubescen> v \illosum foil oblongis, basi aoguslatis, cymis axillarib, caljicib subaequaliter 5-fidis, corollae tubo incluso O'' Herba ascendens v crecla, semipedalis pedalisve, ramosa, pubesceniia brevi <l pilis longis patentibus magis minusve >illo»a Folia distanlia, brevitr peliolata, circiier polhcana obtusa, utrinque vindia pilosa, floralia conformia \erlicillastn rcmoti Cymae laxiuteulae muliiflorae, folio breviores. Calyces subsessiles, den-''|hui angaiu ttneeolaiis, frtrt ad basin Bitit. Corolla parva Gentalia 2-3 lm

longa exserta libera. — Habitat in America boreali-occidentali, in herbis prope Vancouver

- 4 TR LAEOLATUM Bth I c t - Villosum foliis lanceolatis, cymis axillaribus, calycibus subaequaliter 5-fidis, corollae tubo exserto 2|-² O⁹ -'' Herba basi dura erecta ramosa palmans, rami pubescentia brevi subviscosa et pilis longis paucis villosi. Folia crebra sessilia circiter pollicaria acuta, basi amplexicaulia v inferiora in petiolum brevem angustata 3-5-nervi plana, utrinque venter pubescentia, floralia conformia ad latus floris oppositum dejecta. Verticillastri axillares secundi distantes. Cymae laxae pluniflorae, foliis tamen saepius breviores. Calyces subsessiles, dentibus late lanceolatis acutis, fere ad basin calycis fissis. Corollae pubescentes, tubo tenui breviter exserto, limbi lobis oblongis declinatis subaequalibus v superantibus parum brevioribus. Gynostemium 10-12 lin longa exserta. Filamenta saepius ultra medium connata, miedum omnino libera. Antherae biloculares, loculis linearibus divaricatis. — Habitat in America boreali-occidentali prope arcem Vancouver, in siccis ad fluvium Multnomah et in Nova California
- 5 TR LANATUM Bth I e t — Foliis linearibus, margine revolutis, floribus racemosis lanatis, calycibus subaequaliter 5-fidis, corollae tubo longe exserto 6? ^P — Perenne? v fruticosum? Rami sesquipedales subsimplices dum, vix tetragoni, tenuiter cano-tomentosi. Folia numerosa fasciculata, forma fere *Rottmarta obtusifolia*, 1-2-pollicaria, oblusa, supra rugosa glabra, subtus laxe tomentosa, floralia parva, suprema bracteaformia. Racemus densus semipedalis. Verticillastri subsecundi laxiusculi 10-20-Don. Bracteae lineares r. basi lanceolatae, calyce breviores. Calyces breviter pedicellati, late campanulati, alii bracteae. Una densa saepius rubescente obtecta, dentibus tubo subaequaliter longis acutis. Corolla exclusa lanata, tubo calyce plus duplo longior, limbi lobis ovalibus obtusis, superiores minores. Gynostemium fere sesquipollicem exsertum. Filamenta libera. Antherae biloculares, loculis ovalibus divergentibus. — Habitat in California

f *Species e genere excludendae.*

TR BRACCHIATUM Linn = *ISABELLAE COERULEUS*

TR SPIRALE Lour « *ORTHOSIPHON STAMINEUS?* v. *Clerodendron species?*

3070. *TEVGBIVM* Linn.

(Linn Gener plant no. 700. [incl. tpecj — Meibum Gener. plant vaticular. I 880 II 107. — Bth Labial gener. et ipse. M. *el'143.*)

Sectio I. *LEUCOSIPHON* Sm. Ezot. bet 113. - Bth. L o. 663.

Verticillastri multiflori, dense spicati. Calyx incurvus, dentibus subaequalibus. Corolla incurva reflexa, lacinus superantibus brevissimis latis truncatis erectis — *Fraxinus Indica cano-tomentosa*.

- 1 T MACROSTACHYUM Wall. mss. ex Bth I c f — Fruticosum ramis incanis, foliis oblongis, subtus dense albo-tomentosis, verticillastri multiflori dense spicati, calycibus subaequaliter dentatis incurvis, corollae lacinus supreme brevioribus erectis 6 — Rami suberecti v. alternatim leviter complanati, lomento candido dense vesiculosi. Folia ad summitates ramorum approximata petiolata, 0-8-pollicaria, oblonga, utrinque angustata, supra glaberrima, subtus dense tomentosa. Verticillastri densi spicati. Spicae 3-6-pollicares tomentosae. Folia floraria bracteaformia ovato-rotundata sessilia, calycibus breviora. Calyces dense tomentosi incurvi turbinali. Corolla calycem vix superans, exclusa tomentosa, dimidio minor quam in *T. Canariensis*, caeterum omnino conformis. Gynostemium longe exsertum, ad basin spicae spectantia. Ovarium glabrum — *Leucostachyum canum* 6m Exot bot 113 t 110 — *Clerodendron Leucostachyum* D Don, Prodr Fl Nepal 103 - Illustrata in India orientali, in Nepalia et Sikkim

Sectlo II. TEUOROPSIB Sing. msa. ex Bth. 1. o. 664.

Verticillastns biflon, axillares v. in racemo* term males disposili. Caljx cam panulalus, declmalus, denle supremo latiore palentc. Corolla e\lii!> tomentosa, laciniM supenonbus brevissimis lalis truncatis ereclis v. vix declinalis. — Frulices Cananenses incani.

2 T. HETEROPHYLLUM L'Hent. Stirp. 1. 84. - Bth. I. c. t — Frulicosum: ramis incanis, Toll, ovalo-ellipticis, subtus v. ulnnq. incanis, floralib. conformib.; verticillastns billons axillarib. remotis; calycis recti dentib. acqualib.; corollae laemus supenonb. brevissimis erectis; ovario villosimo. 6 — Frutex suborgjalis. Rarai jumores cano-tomentosi. Folia peliolala, 1-2-pollicana, ovato-elliptica, obtusa, inlegernma v. versus apicem crenala, basi rotundata v. cuneata, uinnque cano-tomentosa v. lanata, supra inlenbius vmdia, floralia flonbui multo longiora. \criicillastn pauci 2-4-flon. Calyces brevlter pedicellali, subnutantcs recti. Corolla caljce duplo longior, extus tomentosa atropurpurca Gemtalia longe exserta incuna. Acbaema uli ovariam villosissima. — *T. Canariense* Lara. Dicull. 602.— Ilabiial in insulis Canarieosibus.

3 T. BETONICUM L'Hérit. Stirp. I. 83 t. 40. — Bot. Mag. t. 1114. - Bth. 1 c. f ' Fruhosura - ranm cano-lomenlosis; foil, ovalo-oblongis, subtus v. ulnnq. incaniN \er(icillastns biflons secundis laxc racemosis; foil, floralib. bracleaeformib.; caljtu* declmati denle supremo maximo; corollae laciniis supenonb. brevissimis, supreims lali& erect is, laterahb. subdeclinalis lomentosib; acbaemis villosis»imii* £ — Frutex 2-3-pedalis, ramosus, rami jumores cano-tomenlosi. Folia 1-1'/r'' pollicana, longiuscule peliolata ovalo-oblonga crenala, basi integernma, cuneala v. rotundata, floralia (inflmis exceplis) bracleaeformia lanceolala integerima incana, calyce breviora. Racemi laxi, 3-6-pollicares. Flores pedunculaii, purpurascntes. Calyces campanulas, denle supremo late ovato obiuslnscnlo, infenoribns breviter mucronatis. Corollae tubus subexiertus, extus pubescent, lim ftnflau inennra, limbi lobi supenores labinm superins obioletum formantet, laiertlet parrt oblooftj, tli deelluuii, infimoi oblongns concavns. Gemtalia longlnscole exserta. O\arlvn pllotlsBlmum. — *T. betonicaefolium* Jacq. Coll. I. 145. t. 17. fig. 2. — r. *canetcent* Forsl. Comm. Gutt. I\ 58. (ex Willd) — *T Modernise* Lam Diet. II. 602. — *Scorodoma belonicaefoha* Link, Ilandb. 458. — Uabitat in insulae Madcrac rupibus.

8«U« UL. TBDCRIS Glng. mw. ex BUL 1. o. 66ft.

Peduncnli axillares opposili uniflon v. laxc cymosi plunflori. Cal)x campanulatus crectus aequahs, 5-deolalus v. 5-fidus. Corollae lacimae 4 supenores oblongae declinatae, inflma oblonga concava. Acbaema reticulato-rugosa, glabra v. rarius tillosissima. — Herbae suffrutices frutescve, foliik inlegcrrimis incisivtf rans^ime crenalis.

4 T. FRLTICANS Linn. Spec. plant. 787. — Sbtbrp. et Sm. Flor. Graec. \1. 231.527. - Dill Ilort. Ellbam. t. 884. — Blh. U f - Frulicosum: foil, ovalis iniegerri-rais plains, sublu» albo-tomentosis; pedunculu umflons; caljce lomentoj»o campanulalo aequali, dcnlib. ovaiis oblusib. 5 — Frulex 2-3-pedalis, divancalo-r«mo!»us. Folia breussime peiolala obtusa, basi rolundata \. angusiala, suprfll glabra \mdia v. jumora laxissime subarachnoideo-tomenlosa, tomenio &ubius candido > interdum rufescentc, floralia conformia minora. Racemi termini⁶⁵ v in ramulis brevibus lalerales* pauciflon. Pedunculi cal)cc broiores. faeces 4-5 IIN longi, laciniis ullra medium atlingenlibus lalis foliaceis Corolla cocrulè* cum labio calyce duplo longior. Gemlalia labium aequanlia — *T lalifutium* LIO* I c 788. - Bot. Magaz. t. 245. - *T. (omentotum* Mnch. Mclh. pi. 382. - Habit*¹ in Kuropa el Africa medierranea occidental!, in Barbana a Tanger ad Algerian), in lliHpama a^Cadix ad Bagnoh apud Caput Ccrbere Galliac confine, in Had* a Genua ad Casalicio el Fondi regni iVapolilani, in Sicilia, Corsica et m»ul* Melita abundat.

5. *T. BREVIFOLIUM* Schreb. Unflab. 27. — Sbtbrp. el Sm. Flor. Graec. VI.ait.528. — Bth. 1. c. 600. — Froticosnm: foil, oblongis inlegerrimis, margine revolutfs, airing. canescentib.; racemis brevib.; pedunculis unifloris; calyce lomenloso campanulalo acquall semiquinquefido. \$ — Fructulus divaricalo-ramosissimus, ramuli breves follosi. Folia vix svmpollicaria oblusa sessilia, utrinque pubescentia brevi subsericea canescentia, floralia conformia. Raeeml vix 6-8-flori. Pcduncali calyce parum breviores. Calyx minor quam in 7. *Cretico*. Corollae purpurascentes *T. Cretici*. — 7. *Creticum* Lam. DicU II. 692. (non Linn.) — Habitat in Crelae maritimis, in insnlii Meli et Astypalaeae saxoiis.
0. *T. CRETICUM* Liun. Spec. plant. 788. - Sbtbrp. et Sm. I. c. 25. L529. - Bth. 1. c. t — Fruicosum: foil, oblongo-linearib. Integerrmfs, margine revolatis, sublus albo-tomentosis, supra demum glabris; racemo elongato stricto; florib. subsessilib. solitariis lernisve; calycis albo-tomentosi campanulati dentib. actis. 6 — Folia ad basin ramorum approximate, fere *Rotmarini officinalis*, floralia subconformia at parva, vix calyces aeqnantia. Raml floriferl pedales, ascendentes v. crecli, foliis sub racemo remolis. Verticillastri saepplsslme biflori, inferiorcs remoli, interdum sexflori, sopremi approximati. Calyx 3 lin. longus, denlibus lalis ad medium non atingentibus. Corolla rubro-purporea (cnm labio) oalyce dupio longior. Genilalla labio parum breviora. — 7. *kyitopifoUum* Schreb. Unilab. 28. - 7. *norma-HnifoHum* Lam. Diet IL 003. - 7. *Charamtmim*** Cav. Deter.t. 88. - Habitat In regione mediterranea orientali, in Inanla Cypro, ID Mkoait fienlae Hell et Astypalaeae, In Palestioa et In Aegypto. " - ' » ** r, * '
7. *T. RACEMOSUM* R.Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 804. — Bttfl e. f — Canle herbaceo Atriato ramoso; foil, parvls oblongit, inferiorib* tubdendatis, snperiorlb. integerrimsV'omnib. supra glabratis, sobtus albo-tomentosis; racemis elongalis slrictis; pedunculis unifloris; calyce tomentoso-campanulato aequali. % — Caules crecli, raml rigidi virgati acute tetragoni canescentes. Folia vix semipollicaria, plerumqae multo minora, inferiora denlibus utrinque 1-2 inslrucla, floralia minula. Pedunculi breves crassiuscali incani. Calji 2-linearis incanus subencrvius, denlibus lalis lubo brevioribus. Corolla extus pubescens, labio vix calyce dupio longiore. Genitalia labio breviora. — Habitat in Nova Hollandia ad oram merldionalem.
8. *T. LANCEOLATUM* Bth. 1. c. HerbaceolMH uU luceolaUif; bati angustalis, Ineriorib. BubdenUiU^ roterttoliU^tte^ai^ i^ab. aobtos. MbeanMeenti-pubescentib.; cymis axillarib. pedidte^laift^ ^ ^ UMtj^T, ~~calycis pubescentis~~ Mm — panulati dcnlib. lanceolaUf aentis aeqalibjlt; ^ — Bami aseendentes, acute letragoni, pubescentes. Folia 1-1%-poUIoaiia acota, inferiora versus apiccm denlibus ulrinquo 2-3 notala, basi in petlolnm brevem anguiUa. Cymae laxae pauciDorae, folio longiores tomentosae, pedunculo commni subpollicari, ramls pedicellisqae semipollicaribus. Bractee parvae linearec. Corolla extnt pubescens, calyce dupio longior, lobis oblongis subaequalibus. Stamina dupio Ion-giora. — HabiUt in Nova Hollandia prope Balhnrst.
0. *T. CORYMBOSUM* R. Br. 1. c. — Bth. 1. c. 667. f — HerbaceumT tenuiter pubescens: foil, ovatis dentatis incltisve, utrinq. viridib.; cymis axillarib. peduncu-latis corymbosls; calycis glabrioscnli campanulall dentib. lanceolalis acuiis. ^? — Caulis erectus parum ramosas, 1-2-pedalls. Folia disUnlia, inferiora polli-caria, superiora minora, floralia Inferiora conformia, tnprema mlnuta subinle-gerrima, omnia supra tenuissime pubescenlia, subtus tomentoso-pobescenlia ve-nosa. Cymae 5-7-florae, pedunculis, ramis pedicellisqae gracilibns. Bractee mi-nulae. Caljx vix 2 lin. longus. Corolla (cum labio Inferiore) calyce dupio, gmialia " ^ riplo longiora. — *Scoparia australis* Sieb. Pl. Nov. Holl. exs. no. 184. ex Roem. et Schuli. Syst. veg. mant. HI. 66. — *Aniomdes auttralit* Spreng. Syst. vcg. cur! post. 206. — Habitat in Nova Hollandia, in saxosis prope portum Jackson et in terra Van Diemensi.
10. *T. CAPENSE* Thunb. Prodr. fl. Cap. 05? - Dth. I. c. - Herbaceum trnuicr pubescens foil, basi cunealis 3-5-fidis, laciniis lancelato-linearib. integornm

3-5-fldisve, utrinq. viridib. v. subtus canescentib.; cymis axillarib. pedunculate corymbosis; calycib. glabris campanulalis aequalib., profunde 5-fidis, laciniis lanceolalis aculis. 2l — Herba ascendens? 1-2-pedalis, parum ramosa. Foliorum lacinae paucae elongatae, margine subrevolutae, sopra lenissime pubescens virides, sublus tenuiter cano-tomentosae. Gymae folia floralia aequanties Y. superiores longiores. Pedunculi subsecandi fi I i formes, 3-5-flori. Pedicelli calyce longiores. Bractee minutae. Corolla vii calyce longior. Stamina calyce dimidio longiora. — *AJuga Capetuit* Pen. Enchirid. II. 100. — Habitat ad Caput bonae spei.

11. T. ORIENTALE Linn. Spec. plant. 780. — BoL Magai. U 1279. — Bth. 1. c. f — Herbaceum erectam subglabrum: foil, bipinnatisectis, segmeolis linearib. inlegerrimis incisive, utrinq. viridib.; pedunculis laxe racemosis; calycis glabri campanulatis denub. lanceolatis aequalib. aculis. ^ — Herba erecta pedalis, basi ramosa, nunc glabra viridis, TOBC leviter pubescens v. canescens. Folia infima 1'A-2 pollicaria, circanterlptfone late ovata, laciniis profundis aogustis inter se distanlibus, Mperiora minora, floralia minula. Panicola laxa termioalis. Ramali basi nadl, tpice florum paria 3-4 ferunt, folia floralia minuta, et ideo pedunculos moitifloros specierum praecedentiom simulant. Pedunculi re vera ooiflori oppositi, calyce vii duplo longiores. Calycis dentes breves, acuminati. Corolla glabra coerulea, lacinae sapremae laeocolatae acutae, laterales latiorcs, infima maxima. Genitalia labio loogiora. — Habitat in Asia minore et in Caucaso, In Media ad rirnlos in solo glareoso, in Armenia inter Kermancha et Armadan, in Iberia circa Tiflin versos fluvium Anticetam ad torrentem Terek, nee non in montibus Talyscb.
12. T. PARVIFLORUM Schreb. Unilab. 31. ic. - Bth. I. c. 068. - Herbaceum, molliter tomentosum: foil, profunde bi-tri-ternatisectis, segmentis inferiorum latfs « b * ~~divaricatis~~ in linearib.; pedunculis folio florali multo longiorib. divaricatis ~~multifloris~~ ~~campanulatis~~ ~~aequalib.~~ nollittr tomentosU campanulatis atqialib. ~~semiquinquefidis.~~ ~~rtg ^ 0 ^ & II~~ otome ra su se — mus, all folia calyces *iMs^t5tomh ^esmoentlbiis moillter tomentosae. Folia floralia minuta. Pedicelli elongati divaricati. Flores numerosissimi parvi. Corolla calyce vix longior, coerulea. — Habitat in Armenia, in Oricle et in Syria prope Aleppo.
13. T. OLIVERIAMJM Ging. mss. ex Blh. I. c. t — Herbaceum, molliter pubescens: foil, cuneiformib., apice Inciso-dentatis 3-5-fidisve; pedunculis folio Oorall multo longiorib. divaricatis nnifloris; calycib. villosis campanulalis aequalib. profunde quinquefidis. 2p — Caulis vix pedalis erectus nti folia tomento molli canescens, rami pauci floriferi divaricati. Folia infima petiolata. sesquapollicaria, superiora multo minora snbsessilib., floralia minuta. Pedicelli crassiusculi clongati horizontales, apice tseendentes. Flores in paniculam paueifloram di»posiit. Calyx fere 3 lin. longvs, laciniit aogoste lanceolatis acutis. Corollae tubus brevis, labium calyce triplo longios glibrum, lacinae 4 saperiores elongatae acolae, infima obovala. Achaenia pills longis villosissima. — Habitat in Arabia inter Aleppo * Bagdad.
14. T. CAWSPANULATUM Linn. Spec. plant 180. - Bth. I e t — Herbaceum, procumbens glabrum: foil, subbipinnatifidis, segmentis lineari-cuneatis integerrimU incisive divaricatis, ntrinq. glabris; calycib. solitariis lubsessilib. folio breviorib* campanulatis aequalib. glabris. % — Caules basi prostrati ramosi, rami breviter *scendentes. Folia circumscriptione late ovata v. rhomboidea, breviter pe^ liolata, floralia minora, minus incisa, flores soperantia. Calyces fructiferi saepit^ reflexi, dentes breves lati subulato-acuminati. Corolla coerulea, tobui laciniisque sapremae calyce breviores, infima lata calyce duplo longior. Stamina laeinl* infima corollae breviora. — *T. dicertitorum* Moench. ex Steud. Norn. bot. 8& ** Habiut in regione mediterranea occidenUli, In Hispania, insulis Balearicis, BldH* •t in gnno Neapolitano.

15. *T. CUBENSE* Lion. ManU 80. — Jacq. Stirp. Amer. 172. t. 183. fig. 74. el Observ. II. 5. t. 30. — Bib - Let — Herbaceum glabrum: foil, inferiorib. ovato-cunealis obtusis inciso-dentalis, superiorib. inciso-triOdis pinnaliscisve, laciniis lanceolatis v. linearib. planis, ulrinq. viridib.; pedunculis axillarib. unilloris, folio florali breviorib.; calycib. campanulatis aequalib. glabris, profunde quinqueGdis; slaminib. calyce vix duplo longioribus. 2I. — Herba' circiler pedalis ascendens v. crecia ramosa, dense foliosa. Folia inferiora lala, vix ad medium incisa, laciniis obtusis lalis, superiora praesertim florali a fere at in 7^o. *campanulato* incisa, laciniis obtusis aculiseve, suprema vix flores aequantia v. iis breviora. Racemi terminalis subsecundi. Pedunculi calyces aequantes v. breviores. Calyces $2\frac{1}{4}$ -3 lin. longi virides, laciniis lanceolatis acutis. Corolla coerulea, extua glabra v. leviter pubescens, vi\ cum labio inferiore calyce duplo longior. — *T. laevigatum* Vahl, Symb. I. 40. - *T. chamaedryfolium* Mill. Diet no. 16. - Habitat in America aequinociali et ausraliore, in Mexico prope Papanllam, ad Tampico, Vera Cruz, Matamoras et lacum Sancti Nicolai, in provlncia Texas, in insulis Cuba et Bahama, in Brasilia meridional!, in Bonaria, Mend ox a et Cordova.
16. *T. BICOLOR* Sm. in Rees. Cycl. ex Bib. I. o. 060. — Herbaceum glabrum: foil, ovaiis oblongia lanceolalisve obtuaU Inlegerrimis v. inoisis, ulrinq. viridib.; pedonoolis axillarib. uniflorfs, folio florali breviorib.; ealycib. oampaoulats aeqaalib. gfabris semiquitfiuefidis; itaminib. calyce subtrplo longioribus. 9> — Raml 1-2-pedales, acute tetragoni. Folia saepiaa oblonga v. laneeoiata, snbpollcacia, Integerrima v. laciniis paucls ineisa, interdnm fetovatt, trifida, Junlora gaepe llnearia inlegerrima v. trifida, floralia 8ae>ia* flores superantla. Pedunculi brevvet, superiores subracemoal. Calyx 4 lin. longus, viridls, lale campanulalus, laciniis lato-lanceolatis acutis. Corolla coerulea, tubo incluso. — *T. heterophyllum* Cav,lc. plant, rar. VI. 56. t. 577. — *T. orchideum* Lindl. Bot. Reg. t. 1255. - r. *nudicaul*U Meycn, Reise urn die Erde I. 406. — Wlprs. Nov. act. acad. cacs. Leop. Carol. XIX. Suppl. 1. 376. — Ilabilat in Chili monlibus el in Pampas de Santa Fè.
17. *T. NUDICAULE* Uook. BotMisc. II. 835. - Bib. L e t - Herbacoum? glabrum v. teouiter pubescena: ramla vlrqatis subnodii; foil, parvls remotis triBdis, segnMitff nnearlb. obnuit, 'otrinq. vWdlIMJURib. brevinlme pedoaealatia solitariis spicato-racemosis; calydb.' eaapaaQftatla Maftflfc>jfWitnBlfiuidli eorollitq. pubescenti-hirtis. 2|.t — Raml —fq>f|>i<tmiVpappD nm**h j*mm* • (WolUU, internodiis clongatis, ramali Janlores WWIt HmWjMlmumuM donaU. Floret>aaf versus apices r&morum approximatl, magoltiidlme lonm f^o. *bicoloris*, cui baec species affinis est. Pedicelli breves. Calyces late campanula^ dentibus brevibus, latis acutis. Corolla fere *T. bicoloris* at villosior, Itcinia infima mlnore. — Habitat in Peruviae valle CanU?
18. *T. MXTICAULE* Monlbr. et Auch. Ann. so.nat (2. Ser.) VI. 54. - Suffruticosum: ramis erectis glabriusculis v. tomentoso-pubescentib.; foil, profunde 3-fidis, laciniis integerrimis oblongo-linearib., margine revolutis, sobtus subcanescentib.; pedunculis soJItarfs axillarib. unilloris, folio subbreviorib.;' ealycib. campanulatis aequalib., laciniis longe linearl-lanceolatis vix canescentibus. 2|. — *T. Pseudo-chamaepithy** Blh. I. c. 670. (ex p.) — AT. *Africano* dlffert ramis minus incanis, pedunculis omnib. simplicibus, floribus duplo majoribus, laciniis calycinis longioribus el corollis extus villosioribus. — Circa Aleppo crescit
19. *T. AFRICAISUM* Thunb. Prodr. fl. Cap. 95? — Bth. 1. c. t - Suffruticosum: raris erectis lomentoso-pubescentib.; foil, profunde 3-fidis, laciniis linearib. integerrimis v. rarius trifidis, margine revolutis, sublus canescenti-lomeniosis; pedunculis axillarib. solitariis unifloris v. inferiorib. subcymosis, folio florali subbreviorib.; cal>cib. campanulatis aequalib. subcanescentib. profunde quinquefldis. 2f — Caules c basi lignosa complures crecli, parum ramosi, semipedales v. parum claliores, dense foliosi acute tetragoni, mi folia el calyces lomenlo tenui canecenlcs. Folia dimidio minora quain in *T. Pseudochamaepithy*, jumora rum IN

brevissimis) in aillis fascicolata, floralia conformia, calyces plerumque superantia. Racemus multiflorus. Flores dimidio minores quam in *T. PseudoehamaepUhy*, cacterdm conformes. Pedunculi inferiores saepe in ramulos breves 3-5-floros foliatis abennl et idcirco baec species 7^o. *trifidum* Retzii putanda est. — *T. trifidum* Retz', Obs. I. 21. — *Ajuga Africana* Pers. Enchirid. II. 100. - Habitat ad Gaput bonae spei.

20. T. PSEUDUCHAMAEPITHYS Linn. Spec. plant. 787. - Bth. I. c. 670. t - Suffrulosum: ramis erectis piloso-hirtis; foil, profunde 3-5-fidis, laciniis linearib. integerrimis trifidisve, margine reroluUs, supra hispidulis, subtus tenuissime pubescentib.; pedunculis axillarib. solitariis unifloris, folio florali demum sublongiorib.; calycib. campanulatis aequalib. pubescentib. profunde quinquefidis. 2} — Kami e basi lignosa plures, semipedales pedalesve subsimplices, uti pedunculi et folia inferiora pilis longis mollibus patentibus hirti. Folia latitudine variabilia, at constanter linearia, petiolo laelniisque plerumque longitudini aequilatis, viridia, inferiora saepius bis, soperiora simpliciter trifida, floralia scssilia pariter trifida, inferiora calyces aeqnanlia, suprema minuta. Racemus terminalis latus subsecundus. Pedunculi calyce nunc longiores, nunc breviores. Calyx 4-5 lin. longas, viridis, lacinae e basi lanceolata subulato-aristatae. Corollae lacinae superiores denies calycinos dimidio, inflmae triplo superantes.

fi. *multifidum*: foliis angustioribus, inferioribus bis trifidis multifidisve. — *T. Mauritianum* Linn. Spec. plant. 787. — *T. Nitiolianum* Linn. I. c. 780. f — Habitat in Europae et Africae regione mediterranea, in Uispania a Cadix el Malaga ad Valentiam et Barcinonem?, in Barbaria prope Algerian), in Gallia australl prope Massiliam et in Syria prope Aleppo.

t *Species dubia.*

- SI. f. LACISUTDM Torrey, Pl. Rock, mount. In Ann. lye. New York II. 831. - ^{Bib*} L*^g|KriiM<>iuin: fcJLpinaallai 5-partlUf, in mli 3-partlUi, lacnlis linearib.; fWtbl.^{fc}>tlfortb>4^tjjljlil¹f jll<MI|ffi, pedlellls folio multo brerloribus. \$ - Caulis lignosus ramulosus? FflartnfeHora sessilia, lacnlis obtusis angulis fere glabris punctatis, superiora basi cuneata. Flores proportionem planae ragnae. Pedicelli 2 lin. longi. Calyx subcampanulatus 5-partitus glaber, segmentis lanceolatis acutis, infimo bifido v. 3-dentato. Corolla violacea?, extus villosa, segmenta labii inferioris ovata acula. Stamina exserta. Antherae subrotundae. — Exemplar 4-pollicare. — Ex hac descriptione a *T. Cubente* non discrepat nisi caule fruticoso et calycis dente infimo bifido *T. tridentato*. — Habitat in Americae borealis Rocky mountains.

feetlo I?. PTGI0B0TRT8 Bth. 1. o. 671.

Verticillaris 4-multiflora, in ipicam simplicem v. ramosam condensata. Calyx inflatus v. tubuloso-campanulatus declinatus, dentibus subaequalibus v. supremis laevibus. Corollae lacinae supremae brevissimae laevae truncatae, vix declinatae, laevales parvae oblongae declinatae, infima laeva, concava. Achaenia rugosa glabra. - Herbae v. frutices villosae v. glabrae, obovatae.

22. T. ABUTILOIDES L'Ucrit. Stirp. I. 84. - Blh. I. c. t - Fruticosum: ramis paucis bescentibus; foil, amplis cordiformibus, utriusque virgibus villosis; ramis simplicibus paniculato-rarosis; verticillaris 2-6-floris; calycibus declinatis hirsutis, dentibus ovatis obtusis, supremo parvo laeviore. 5 — Frutex 3-4-pedalis. Folia ferr *Sida* mollia, longiuscule petiolata 3-6-pollicaria, in toto ambitu crenata. Racemi densi 2-3-pollicares axillares simplices v. ad apices rariorum plures paniculati. Folia floralia parva decidua. Calyx parvus pedicellatus, fructifer inflatus-subglobosus pubescent submembranaceus rubescens, dentibus omnibus brevibus laevibus vif inaequalibus. Corolla semipollicaris rubra, tubus longe exsertus implus, limbus lacinae superiore truncatae, laterale parvae oblongae, inflatus ampliconcavus. CSCOiulit longe exserta. - *T. macrophyllum* Lam. Diet. II. ML - Habitat in India Hidera septentrionali rarissime.

23. *T. WALLICUIANUM* Bth. in Wall. Pl. As. rar. II. 19. et Labial. 671. t — Herbaecum ascendens: foil, elliptico-ovatis acuminatis, basi longe angustalis, ulrinq. viridib.; racemo simplici; verticillastris nullifloris; calycib. declinalis, denlib. vix inaequalibus. 2} — Caulis basi radicans simplex pedalis v. parum altior rufo-villosus. Folia 3-4-pollicaria, ulrinque pilis sparsis rigidis hispidula serrato-crenata, basi integerrima. Spica 2-3-pollicaris densa. Folia floralia inflma petiolata oblonga, floribus longiora, superiora et bracteae minuta lanceolata. Verticillastris sub-10-flori. Calyces pedicellati, basi attenuati hispidi, ore parum obliquo, dentibus brevibus. — Habitat in Indiae orientalis provincia Silbet.
21. *T. JAPONICUM* Willd. Spec. plantar. III. 28. - Blh. I. c. f - Herbaceum crecclum v. ascendens subglabrum; foil, ovalis oblongis lanceolatisve, basi rotundatis, utrinq. viridib.; racemo ramoso; verticillastris aequalibus sexfloris; foil, floralibus lanceolatis; calycib. declinatis tubuloso-campanulatis glabris, denlib. lanceolatis acutis subaequalibus. 2}. — Caulis ramosus obtuse tetragonus glaberrimus v. angulis pubescentibus. Folia breviter petiolata acuta, profunde et argute serrata, subtus pallida, floralia bracteaeformia ciliata. Verticillastris laxiusculis. Calyces glabri virides, dentibus subpaucis tubo brevioribus. Corolla cum tubo incluso calyce duplo longior. Genitalia labio inferiori subaequalia. — *T. Vtrginicum* Thunb. I. Fl. Jap. 944. — Habitat in Japoniae montibus.
25. *T.* Hasskarl, Tijdschrift voor natuurkunde Geschiedenis X. 187. — Perenne: foil, oblongo-lanceolatis acuminatis, basi attenuatis In petiolis decurrentibus duplicato-serratis puberulis; spica terminali implicita; verticillastris bracteatis 4-10-floris; bracteis suboblongis subrotundatis acuminatis declinatis calyces longitudine excedentibus; corolla obovata. 3}. — An *T. thalictroides* Blh.? — Crescit in insula Java.

Seotio V. STACHYOTRICHYS Bth. 1. o. 672.

- Verticillastris 0- multifloris, in spicam simplicem teretem terminalem dispositi.
- ¹ Calyx campanulatus declinalis, dentibus superioribus praesertim supremo latioribus, rarius subaequalibus. Corollae lacinae superiores oblongae declinatae, infima oblonga concava. Achaenia valde reticulato-rugosa glabra. — Herbae perennae, ascendentes v. erectae, parum ramosae.
20. *T. INFLATUM* Swin, Prodr. II. Ind. oeo. 88. - Bth. U f - Herbaceum erectum pubescens v. villosum: foil, ovato-lanceolatis, basi rotundatis, subtus subcanescentibus; racemo simplici; bracteis lanceolatis; calycib. declinatis inflatis pubescentibus villosisve, ore contracto, dente supremo latiore. — Habitu *T. Canadensi* simillimum et uli haec species variat superficie nunc tenulter pubescente subcanescente, nunc pilis longis mollibus villosa. Differt caulibus saepius ramosis, foliis interdum basi subcordatis «t praesertim calycibus vesiculoso-inflatis, apice contractis, denlibus brevioribus saepe obtusis. Achaenia *T. Canadensis*. — *T. villoturn* Forst. Prodr. — *T. palustre* H. B. Klh. Nov. gen. et spec. pi. II. 300. — *T. vesicarium* Mill, ex Steud. Nom. bot. 630. (edit. 1.) — Habitat in America aequinoctiali et australi, in Mexico prope Tampico, in insula Jamaica ad Tongalabou, prope Carthagena do Indias, in Brasiliae arenosis provinciis Rio Janeiro, ad Itapocoroia provinciae Sanctae Catharinae et prope Buenos Ayres.
27. *T. CANADENSE* Linn. Spec. plant. 780. - Bth. I. c. t - Herbaceum erectum canescens v. villosum: foil, ovato-lanceolatis, basi rotundatis, subtus subcanescentibus; racemo simplici; verticillastris aequalibus sexfloris; bracteis suboblongis; calycib. declinatis campanulatis incanis subvillosis, denlib. superioribus latioribus. — Caulis 1-3-pedalis simplex v. vix ramosus, uli foliorum pagina inferior et calycis nunc pubescentia brevi tenui canescens, nunc molliter cano-villosus, rarius subglaber. Folia breviter petiolata 2-3-pollicaria serrata, supra hispidula, rarius glabra, floralia uli bractea sessilia lanceolata, vix calycem superantia. Spica 2-6-pollicaris laxiuscula. Calyces breviter pedicellati, basi obliqui, denlibus brevibus, 3 superioribus ovalis, supremo latiore, 2 inferioribus lanceolatis. Corolla

purpurascens, labio elongato, laciniis valde declinalis. Achaenia vaide rugosa, pericarpio crasso sublignoso. — *T. Virginieutn* Linn. I. c. 789. — *T. speciotum* Hill, Vegeu syst. 14. t 14? — flabitat in America boreali a Canada ad Carolinam et in provincia Texas Mexicanoram.

28. *T. HYRCANICUM* Linn. I. c. 789. - Bot Magai. t 9013. - Blh. 1. c. 673. t - Herbaceam erectum pubescens: foil, ovatis cordatis, sabbus subcanescentib.; racemo simplici; verticillastris aequalib. sezOoris; bracteis subulalis calyce subbreviorib.; calycib. declinaia bilabialls, dente supremo latissimo. 2f. — Caules 1-2-pedales parnm ramosi molliter pubescentes. Folia petiolata I-3-pollicaria grosse crenala obtusa, basi profunde cordala, supra vix pubescentia, subtus molliler pubescentia, saepios oanescencia, rarius glabrala, superiora minora, Ooralia (intra spicam) uli bracleae sobulatae calyces aequantia. Spica 3-8-pollicaris densa. Pedicelli breves ereeli villosi. Calyx, fare *Oeymi*, dente supremo late ovato submembranaceo, lateralibns bravibus oblusiusculis, inflmis lanceolato-subulalis ascendenlibus. Corolla purporta, extns villosa. Achaenia parva globosa, pericarpio teaoi. — *Seorodont* spieata* Mnch. Melb. pi. 389. — Habitat in Caecasl orientalis nee BOB IB Iberiae pralis sylvaticis et ad aepea frequens in nemoribus el dumelis monlium Talyscb.
29. *T. ARDUINI* Linn, fant. pi. 81. - Sblbrp. et Sm. Flor. Graec. VI. 26. t. 531. - Bib. I. c. f — Herbaceam erectum, molliter villosum: foil, ovatis, basi rotundatis, ulrinq. sabviridib.; racemo simplici; verticillastrfs aequalib. sexfloris; bracteis sessilib. lanceolalis acuminalis, calyces superantib.; calycib. bilabialis, dente supremo latissimo. % — Canles ascendenles, pedales parum ramosi, uti folia pllis mollibus villosi. Folia subsessilia v. inflma b renter petiolata 1-2-pollicaria serrato-crenala. Spica densa 2-4-pollicaris villosissima. Pedicelli breves erecti. Galycis dens supremos maximus ovatas aculus, laterales breTImiml lail^Tnflmi . ftBoeotati acuminati, snpremm subaeqaamet. Cofoha alba extus villosa. . *T.*Mlfm*m~pUrr.* In Mem. toe. Upa. Pat. L m -- *ScuMtoria Cr\$H^±inn.* Spec, plañt 838. ^ 8c*ro4*iid4*dr**Hd WSHSHb. Flor. Germ, exc 311 — Habitat in Europa austrIM-^rienūRV W* «aibrtr^roi*ē Dnarō Dalmatlae, in Bolgariae montibus Ineada et In Olymp Bilbyni sylvis umbrosis.
30. *T. BRACTEATW* Desf. Fl. Ail. II. 7. 1.120? - Blh. I. c. f - Derbaceum ascenden villosum: foil, ovatis, basi cordatis, utrinq. viridib.; racemo simplici; verlicillastris aequalib.sexfloris; bracteis peliolalis ovalis lanceolalisvc, calycesaequalib; calycib. bilabialis, denle supremo latissimo. 2I — Herba semipedalis dura subramosa in omnl parte pilis longis mollibus villosa. Folia semi-uni-pollicaria obtuse crenata petioltta approximala. Racemus (v. spica laxa) 2-4-pollicaris. Calyces pedicellali basi obliqui, lablum superius iridentatum, denlibus ovalis acutis, intermedium maximum, Inferins bifldum, laciniis lanceolatis aculisj>imis. Corolla extus pubescens. Achaenia pant globosa. — Habitat ioAfrlcac borealis coliibus inculthf prope Tanger, Tariffa, Mascar et Tlemsen.
31. *T. COMPACTUM* Clenente ia Lagase. Nov. gen. et spec. pi. 17. no. 839. - [Bib. I. c. 674.] — Boiss. Voyage bot. dans le mldi de l'E>p. 515. no. 1372. t t 150. — Totom pilis albis mollibus %illosum: caulib. debilib. elongalis proslalis; foil, ovato-cunealis profunde rotondalo-crenalis, soperiorib. capilula ovata densa involu*cranlib.; bracteis integerrimis ciliatls lanceolalis v. linearib., basi attenuatis floref fuperanlib.; calyce valde ioflalo ovato, supra gibbo, ad faucem angustato, in denies quioque breves mucronatos diviso; corollae pallide ocbroleucae lobis superforib. oblongis cillatis, lateralib. maximis, inferior© obloago subcucullato. ^ — *r^{au}k⁸* numerosi aaepe 1-2-pedales infra nudi ramosi, pilis patulis mollibus bispidi. Folia ovato-cuoEAU, uUinque profunde 4-6-crenaU, praeserlim ad marginespik longis griseis birsuU. Bracleae involucrantes omnes oblongae integerrimae longe cilittae, inferiores lanceolate, supremae sublineares, basi longe aiienuaue. Calyx aeulia, pilia albis patulis hirtulns paxce glndulosus nervoso-reticulttoa, poa>aBl■ valde iaAaiut, apice ••bcooslrniciui, dente iu|>crion parum brtviori.

Corolla exlus hirtella pallide ochroleaca, laciniao superiores oblongo-lanceolatae ciliatae, intermediae minores a cat i ores, margtne subrcvolulae, inferior maxima cucullala oblonga ad basin ulrinque lobulis deniculisve duobus aucta. — Crescit in lapidosis umbrosis regionis alpinae inferioris in Sierra Nevada Hispaniae ausralioris.

Seotio VI. SOORODdU Bth. L o. 074.

Verlicillasri biflori secundi, in racemos terminalea aeepios ramosos dispositi. Calyx campanulatus declinatus, dentibus superioribus, praesertim supremo latioribus. Corollae laciniae superiores oblongae declinatae. Achaenia parva aobglobosa rugosa v. sublaevia. — Herbae perennes ascendentes •. erecti ramosi.

32. T. TOMENTOSUM Heyne mss. ex Blh. In Wall. Pl. As. rar. 1.58. et Labiat. 074. t — Herbaceum? ereclum: ramis tomentoso-pubescentib.; foil, ovalis, basi rotundatis, supra villosis, subtus tomentoso-pubescentib. canescentib., rarins subglabris; racemis paniculato-ramosissimis; calycib. declinatis pilosis bilabiatis, dente supremo latiore. 2I? 6? — Herba perennis, basi dura v. fosan lignosa 2-pluri-pedalis. Folia ampla (2-4 poll.longa, 1'/t-2 lata) mollia, subtus plerumque tomento v. pubescenlia molli canescentia, supra breviler pubescentia, grosse et acute crenata, floralia sub ramls paocularum panra subconformia, Intra racemulos bractaeformia ovata acuminata, calyces snbaeqaantla deeldna. Baemnli mnltiflori in panicuias densaa pedunculataa axillares lermnnalesque dlspoiUI. Calyces pedicellati tubuloso-campanalall, saepius pllosUslmly dentfrjopremo orato acuto, lateralibus dimidio minoribus, inflmls laoeolatis aotrmfoalls. Corolla flavescensT, tubo Incluso.

fi. glabriuculum: — Habitat in peninsula Indiae orfentalis, *fi.* in Zeylaniae monte Nuera Ellia.

33. T. BTOLONIFERUM namill. mss. ex Blh. 1.1. c. c. t — Herbaceum ascendens r. ereclum, glabrum v. lenuissime pubescens: foil, ovatis, basi rotundatis cuneatisve, utrinq. viridib. non rugosis; racemis paniculato-ramosii; calycib. dedinalis pilosulis ovoideis, fructiferis inflatis, dente supremo laliore; corollae tubo incluso. O — Radices (tcslo Roxburghio) stoloniferae. Caules 1-2-pedales, aplee pantoulato,-ramosi. Folia longiuscule peiioU 1-S-pollicaria tenuia, vix rugosa, ^rofunde crenau, floralia tub ranis panleqlae conformla mioora, in racemulls bractaeformla, caryce bnwlor. ftacamnll ^raellM ammiroil, saepe pubescentes. Flores numerosl pentrilJ, *T. SeoroilimtafbrefUuni**. Calyces ovoideo-campanulati, fruciiferl Inflatl, ore contractl. Dentes T>reres, supremus lateovatus oblusus, latcrales dimidio minores, Inflml laneeolatl. Corolla flavescens. — Habitat in Asia oriental!, in Indiae orlentalls provlncla Bllhet, In regno Burmannico ad monlem Taong Dong et in China.

34. T. VISCIDUM Blumo, Bijdragen 827. — Bth. I. c. 075. — Foil, ovatis grosse Inaequaliter serralis rugosis; racemis axillarib. terminalibq. secundis; calycib. vlscido-pobescentib.; bracteis lanceolatis, longitudine calycis; caule tetragono subramoso. 3ET — Affine *T. LutHanico*. — Habitat in Java, in homidis montans prope Tagtt ad pedem montls Pangranga.

35. X LAXUM D. Don, Prodr. fl. Nep. 100. — Bth. I. e. — Herbaceum pro cum bens? r.scaodens? lenuiter pubeteens: foil, ovato-laoeolatis aeuminalis serralis, utrinq. viridib.; racemis subsimplicib. axillarib. terminalibq; calycib. oppositis declinatis pilosulis, denie supremo latisslmo. 2(v^T — A *T. siolonifero* differt habitu, foliis anguslioribus el racemis brevibus laxis panclfloris. — Habitat In Nepalia.

30. T. ROYLEANUM Wall. Pl. As. rar. I. 58. - Blh. I. c. - Herbaceum ascendens: ramls hispidis; foil, breviter petiolalis laneeolato-ovatl acntis serralis, basi subeordalis rugosis villosis, sublus eanescentib.; racemis brevib. subsimplicib.; foil, floralib. superiorib. calyce breviorib.; calycib. declinatis hispidis bilabialis, dente supremo latiore; corollae lubo subexserlo. ^ — Affine *T. quadrifario*, sed habitu el characlaribus dalis distinctum. Caulis basi procumbens, rami vix 1-1'A-pedales. Racemi saepius vix poliicarcis pauciflori. Corollae majores quam in *T.*

quadrifario purpureae v. albae. — Habitat in Indiae orientalis montium lapidoso, in Deyra Dboon et ad Kheeree Pass, inter Mussouri et Lagrassou.

37. *T. QUADRIFARIUM* Hamill. in D. Don, Prodr. flor. Nepal. 106. - Bth. I. c. - Herbaceum erectum: ramis tomentoso-villosis hispidisve; foil, breviter petiolat^Δ ovalis serratis, basi cordatis rostratis villosis, subultra subcanescentibus.; racemis ramosis; foil, floralibus late ovalis acuminatis, calyces superantibus.; calycibus declinatis bispidis subbilabiatibus, dente supremo latiore; corollae tubo incluso. 2l — Herba 1-3-pedalis parum ramosa, canalicibus crassis saepe rufescentibus. Folia 1-2-policaria mollia, superiora sessilia, floralia bracteaformia late cordata acuminata membranacea saepe colorata, ante anthesin imbricata subcomosa, post anthesin decidua. Racemi 4-5-pollicares densi secundi rubescentes. Flores pedicellati pedicelli. Calyces majores quam in *T. Scorodonia*, dentibus obtusis, supremo late ovato, lateralibus confimbriatis, sub dimidio minoribus, infimis lanceolatis supremum aequantibus. Corolla purpurea, calyce duplo longior, tubo incluso.

O. glabrior: Racemis ramosioribus gracilioribusque, foliis floralibus minoribus vix odoratis. — Habitat in Indiae orientalis montium lapidoso et ad vias, in Jog* HloMtayaei Tulgare, in Mosaooree et Silhet, fi. in regno Burmannico ad montem Taong Dong.

38. *T. ARGUTUM* R. Br. Prodr. fl. NOT. Holl. 304. — Bth. I. c. 676. t — Herbaceum humile erectum: ramis villosis; foil. lanceolato-ovatisve crenato-serratis, basi truncatis, utrinque tridib. bispidatis; racemis subsimplicibus.; foil, floralibus lanceolatis, calyces superantibus.; calycibus declinatis villosis subbilabiatibus, dente supremo latiore; corollae tubo incluso. 3l — Herba semipedalis v. vix alior ramosa. Folia vix pollicaria, longiuscule petiolata, floralia sessilia integerrima acuta ciliata, calycibus paulo longiora. Racemi densi, plerumque simplicibus*. [†]JS5MS^b aecundi, brevissime pedicellati. Ab affini *T. quadrifario* differunt toto habitu, in Nova Hollandia.

- r 39. *T. SCORODONIA* Thunberg. Prodr. Zeyl. 161. — Bth. I. c. 677. t — Engl. bot. 11543. — 1, e. f. — NailianiwrnJirnrtiim hispidum pubescens v. glabrum: foil, ovatis obtusis crenatis, basi rotundatis cordatisve, utrinque tridib. ovatis; racemis subramosis, superioribus paniculatis; foil, floralibus minutis; calycibus declinatis villosis late campanulatis subbilabiatibus, dente supremo maximo; corollae tubo exserto. 2l — Caules simplices v. parum ramosi 1-2-pedales tetragoni, basi dari, interdum subligulati. Folia 1-2-policaria, valde rugosa, breviter petiolata, floralia inflata subconformia parva sessilia, superiora bracteaformia lanceolata v. ovata, calyce breviora. Racemi graciles laxi. Flores pedicellati pedicelli. Calyces basi infra subgibbi subinflati, fractiferi fere *Ocymi sancti*, submembranaceo reticulati, dente supremo patente latissimo brevissime acuminato, lateralibus late ovatis acutis brevioribus, infimis late lanceolatis acutis ascendentibus. Corolla flarescens, extenuata pubescens, tubo calyce duplo longior, lobis inflatis oblongis concavis, superiores breves obtusi, 2 superiores latiores. — *Scorodonia heteromorpha* Moench, Meth. plant 381 — 7. tyfoutr Lam. Fl. Fr. H* 412. - *Scorodonia-lylvutris* Link, Handb. 458. - Habitat in Europae fere tota sylvis et ad sepes.

- 4a *T. PSEUDOSCORODOMA* Desf. Fl. Atl. il. 5. L 110. - Bib. I. c. 677. - Suffruticosum erectum hispidum v. pubescens: foil, ovatis obtusis crenatis, basi rotundatis cordatisve, utrinque tridib. v. subultra canescentibus.; racemis subsimplicibus.; foil, floralibus minutis; calycibus declinatis villosis subbilabiatibus, dente supremo maximo; corollae tubo incluso v. vix exserto. [^] et 5 - A I. *Scorodonia* non differunt nisi canalicibus basi fruticoso, ramis erectis vix pedicellis, racemo simpliciore, calycibus parum majoribus et corollis brevioribus. Flores flavescens. - *Scorodonia Salinasiana* Link, Handb. 458? - *Scorodonia Foniana* Ser. Bull. bot 3WJ. Habitat in Africa boreali ad montem Laiar prope Majane Algeriae, Tanger Gibraltar et in Italia australiore.

41. T SMYRNIEUM Boiss Diagnos plant, nov. oncnlal V 42 f — Perenne ad-
pre*sc tomenlosum gnscum cauhb clatis simplicib \irgilis, foil, broiler pc-
liolads oblongis, infimis ham rotundalis, supcnonb broiler cuiicili* subscisilib,
oinmb obiusiusculis tenuissime crenulalis, ulnnq tomenloMS, sublus magis ca-
nescentib , racemo elongalo simplici aut basi parce ramoso, foil, floralib caly-
ces aequanlib v. supcranlib o\o-rhombeis, basi atlcnuato-subpcliolatis, apice
acule acummalis inlgernmis, caljce pedicello co paullo brevion suffullo brew-
ter puberulo lalc canipanulalo subbilabialo, denle supenori paullo longion mul-
loque laion oblusissimo broiler mucronalo, caelens subacquilongis brcMssimis
otalo-roiundts spmuloso-mucronalis, laleralib. paullo angustionb , corollac
fla*ceniis caljce duplo longions lubo subexserto 2]. — Gaulcs 1-1'A-pcdales,
folia infenora ppiolo J-4 lin longo suffulla pollicana v sesquipollicana, basi
8-0 Im hia, racemus icrminalis semipedalis el longior. — Crccsil in lallibus
motiis (oricis ad occasum Smjrnae *

42 1 UV^IU.Nsr I inn Spec plant. 780 - Jcq Hort Vmdob I t 91 — Dili
I c 077 — Herbaccum ascendens ramis cino-pubescentib , foil o\dhs crenalis,
basi rolundais cordalistic rugous, infcnonb sublus canescenlib , racemis sub-
simplicib iamosis\c laxis sCcondis; Toll floralib caljce broionb , caljub dc-
ilinaiis villojuhs subbilabialis, denle supremo majorc, corollae tubo ciscrio 2<
— Ilcrba pedalis ascendens \ crecla ramo>>a. Folia lemipollicana r. rarios pol-
licarn, \alde rugosa Racera el flores T. Ps&udotcorodoma, cui hare aperies
>alde affinis cst. Corolla purpurea. — Scorodonta 3fat nit en tit link, llandb
45S — Scorodoma cordata Mocnch, Merti plant. 385 — T. odoratum I am I lor
Franc. II 413 — T folts oiatu etc Ger. Flor Gallopr 277 t II — Habitat in
Europa mediterranea, Ma>>siliae, in insulis Stoechadibus el Corsica, Sardinia, (nla

43 T 1LSIIVM(LM lam. Diet II. 692. — IMb. I c — Herbaitum\ MifTuilno-
sum ramis cano-pubescentib , full lanceohlis crenalis ruposis, sublus Mibri-
nc>cenlib , nrcmis subrimoMs h\is cccondis, caljcih declinilis, denle supremo
laliore cotolhc lubo inchiso ^ — Ihbilus 7 Max\$Ucn\$is, a quo \i\ IIM foliō-
rum fornii dilTcr, diaracler \ciosimililer salis tonsians. Racemi plcumquo
laxiores. Corolla purpurascens T jlatititett — T Uxattcum I inn Mnnl pi
80 — Jcq Hort. Vmdob III. i 41. — T. Saltatrum IlofIm Flor Port 84 t 2
sec Poir non Schreb — Scorodonta lanafolta Moench, Melh. plant 384. — Ha-
bilal in Huropa ausiro-occidentlal, In Illipaaia, LnsIUDia, In Iniala Balearca
majorc in fissuns rupiam monlis Pulg-Major.

t *Species non satis nota.*

44 T S\I\|STR|>1 Schreb Lnilab 38 - Dlh I. c. 077 —Foil ovalib crenula-
lis rugosis, bubtus lomenlosis peliolalis, racemo secundo 5 — Caulis crecius
pubescens !>ub\is(idus Folia inacquallier crenulala, basi apicccque rolundna,
\enulii dense rcliculali, iipra villo brcMs>imo senco cana, sublus albida, pp.
liolis brubus msidentia, Sahtae foliis similm, sed minora, floralia pdriler pp-
liolala lanceolaia acula, infenora serrala, longiudine foliorum, supenora numiii
iniegrnma Racemus brcMS Pedunculi c.iljce paullo breviores pubosr<nles
Flores nihilo minores quam Scorodoma Laljx pilosus semiquinquefidis, (i(H-
libub lanceolalis, fere aequalibus, summo paullo laliore Corolla exius MIOSI,
tubuM longiudine caljcis SIJimna cur\i A T Matthentt differre >idciur folus
uinnque canu» — Habllal in I imiania

Seotio VII. SCORDIDM Bth. 1. o. 678.

\erlicillasln 2-0-flon disimles axillares, foliis floralibus caulmis conformibus
faljx lubulosus dirlmitii*, b.isi infra gibbus, denlibus 5 subacquiibus % supruno
laliore Coroll IP hrinae siipenores- obloiiRie deilinalac Uhacnia \.i\de \ M\
rugos.1 — Herb le iniuic \ pinnes

4» I *»PINOSIM I inn Spi r j.hnlir 70) - sbihrp cl sm I lor drier \ | n
(5JO III• I r , — ll<rbd(4iim rimis ipice spimstulib , \< rtn ill i n,

axillarib. remolis 1-G-floris; calycib. declinalis, dente supremo latissimo. 2l — Herba procumbens divaricalo-ramosissima, rami rigidi villosi, fere omnes apice spinescentes. Folia inferiora oblonga, basi longe angustata, apice inciso-serrata, superiora et ramalia parva inlegriora, saepe abortientia, omnia utrinque viridia pubescentia. Calyces virides pubescentes subsessiles, basi subtus inflato-gibbi. dentibus subspinescentibus, supremo late ovalo, inferioribus subulalis. Corolla parva alba, torsione lobi resupinala. Achaenia parva subglobosa, vix rugosa.— *T. mucronatum* Linn. 703. — *Scordium spinotum* Cav. Icon. pi. rar. 1.19.1- 31. — *Scorodonia spinota* Link, Uandb. 453. — Uabitat in Europa et Africa mediterranea, in Lusitania, Hispania, circa Malritum, in Andalusia, regno Neapolitano, inter Sraymam et Bursam, ad mare prope Jaffa et in insulis Canariensibus.

40. T. RESUPINATUM Desf. Fl. Atl. II. 4. 117. - Blh. 1. c. - Villosum: foliis oblongis inciso-dentatis, basi angustatis, utrinque viridibus, floralibus subconformibus angustioribus; verticillis axillaribus bilobis; calycibus declinalibus, basi infra gibbis lubulosis, dentibus aristatis, supremo basi latiore. Q — Herba semipedalis v. parum allior erecta divaricalo-ramosissima. Folia inferiora profunde incisa, lobis latis, sinubus angustissimis, superiora et floralia dentibus paucis aculis nolata, (lores subsuperantia. Verticillus secundi. Calyces pedicellati villosi, basi infra gibbi, dente supremo demum patente. Corolla flavescens, torsione lobi resupinala, lobus supra profunde fissus, lacinia infima laeva, superioris parvae oblongae purpurascens. Achaenia parva globosa reticulata. — Habitat in Africae borealis campis argillosis prope Mascar, Tanger et Algieriam.

47. T. SCORDILUM Linn. I. c. 700. - Blh. I. c. 670. - Villosum, rarius glabratum: foliis oblongis dentalibus, basi angustatis rotundatisve sessilibus, utrinque viridibus, floralibus conformibus; verticillis axillaribus 2-0-floris; calycibus declinalibus campanulatis, dentibus brevibus subaequalibus. 2l. — Caulis basi repens radicans, rami floriferi v. ascendentis, gemipedales v. vili pedates simplices v. parum ramosi magis minusve villosi. Folia droller pollicaria mollia, floralia floribus longiora. Calyces pedicellati breviter, basi valde obliqui v. subulsi inflato-gibbi pubescentes virides. Corollae parvae purpurascens. Achaenia subglobosa rugosa. Species cum *T. cordioides* saepissime confusa. — *Chamaedrys Scordium* Moench, Meth. pi. 384. — *T. palustre* Lam. Fl. Fr. II. 411. — *T. arenarium* (Imel. Linn. I. 140. I. 20. n. 2. — Habitat in Europa et Asia temperata humidis uliginosisque, in Iberia, Anglia, Gallia, Germania, in Italia praevalens montosis rarius, in Russia australi ad flumen Kumam, prope Lenkoran, in deserto Soongoro-Kirghisio, in Cashmeria circa Bandeh et Boliung.

48*. T. SCORDIODES Schreb. Tabul. 37. — Blh. I. c. - Lanuginosum, rarissime glabriusculum: foliis ovalo-oblongis crenatis, basi cordato-amplexicaulibus, utrinque viridibus, floralibus conformibus; verticillis axillaribus sexfloris; calycibus declinatim campanulatis, dentibus brevibus subaequalibus. 2l. — *T. Scordio* habitu simillimum, sed saepius villosius et conspiciuntur differe videtur foliis brevioribus, basi cordato-amplexicaulibus ne angustatis. - *T. Scordium* Brol. Fl. Lusit. et M. Bieb. Fl. Ta'ur. Cauc. II. 30. — Engl. Bot. i. 8>8. (non Linn.) — *T. lanuginosum* Hoff. et Link, Fl. Port. I. 84. t. 3. - Habitat in Europa praesertim australioris uliginosis maritimis, in Lusitania, Hispania, Gallia australi, Italia omni vulgatissimum et in Sicilia, Sardinia, insula Creta, Smyrnae, in Syria prope Aleppo, Tauria, nec non in Angliae comitatu Cambridge et in insulis Canariensibus.

49. T. BOTRYS Linn. I. c. 700. - Blh. I. c. } - Villosum: foliis profunde pinnatis, laciniis oblongis inaequalibus incisive divaricatis utrinque viridibus, floralibus conformibus; verticillis axillaribus sexfloris; calycibus infra basi gibbis inflato-tubulosis, dentibus lanceolatis aequalibus. O - Herba erecta v. ascendens ramosa semipedalis v. parum allior, pilis brevibus paucis magis minusve villosa. Folia fere *T. campanula* v. *orientalis* petiolata, circumscriptione rhomboidea, floralium omnia dormi nuperant. Calyces pedicellati, basi infra fere laccati pubescentes

les virides 3-4 lin. longi. Corollae parvae purpureae. Achaenia valde rugosa. — *Chamaedryt liostryx* Moench, Melb. pi. 383. — *Scorodonia Botryt* Ser. Bull. bot. 317. — Habitat in Europa australioris et Africa borealis calcareis aridis siccis, in Gallia, Hispania, Germania, Italia, Sicilia et Algeria.

Sectio VIII. CHAMAEDRYDYS Bth. 1. o. 680.

Verticillastri 2-0-flori distincti, in racemo laxo terminalem dispositi. Calyx lubuloso-campanulatus declinatus, basi obliquus, dentibus 5 subaequalibus v. superioribus vix maioribus. Corollae lacinae superiores (oblongae declinatae. Achaenia reticulata, leviter rugosa. — Suffrutices v. fruticuli erecti y. basi procumbentes.

50. T. LUCIDUM Linn. Spec. plant. 700. — Bl. I. c. f. — Glaberrimum: foliis ovatis inriso-dentalibus, basi crenatis, floralibus minoribus vix dentalibus; verticillastri 2-6-floris, superioribus racemosis; calycibus declinatis tubuloso-campanulatis, dentibus lanceolatis subaequalibus. q. — A 7*. *Chamaedryd* differet: caulibus basi firmioribus cretioribus, foliis caulinis majoribus tenuioribus (floralibus saepe minoribus) et praesertim glaberrimis omnium partium. Rami lenes, saepe purpurascens lacuissimi. Foliorum dentes profundi, inferiorum obtusi, superiorum acuti. Calyces purpurascens. Corolla rubro-purpurea *T. Chamaedryd* paulo minor. — *Chamaedryt lueida* Moench, Melb. pi. 383. — Habitat in regionibus Mediterraneae fissuris rupium, in Alpibus Galloprovinciae et Pedemontii, in Alanle et in montibus Cyrenais.

51. T. WEBBIANEUM Boiss. Blench, pi. nov. Hispan. no. 16\$. et Voyage bot. dans le midi de l'Esp. 513. no. 1370. f. — Perenne caespitosum lomentellum: caulibus basi procumbentibus; foliis subuliscantibus breviter petiolatis lanceolato-linearibus, margine revolutis integris aut subcrenatis; verticillastri 2-5-floris racemosis; calycis tomentosi declinati lubuloso-campanulati nervosi dentibus lanceolatis subaequalibus; corolla purpurea hirsuta. 2l. — Caules numerosi, basi prolati 3-5-pollicares, pilis palulis breviter tomentosi. Folia supra hirtella, infra albidolomentosa brevissime pilulosa semipollicaria, lineam aut paulo amplius lata, floralia integerrima calycibus paulo breviora. Verticillastri laxo spicati. Calyx violascens campanulatus, basi subgibbus, dentibus triangularibus subaequalibus, apice subulatis. Corollae in ten no purpureae lacinae superiores elongatae, eius valde bilac, inferior cucullata rotunda. — *T. Chamaedryd r- angustifolium* B. Webb, It. Hispaniense 23. — Crescit in dumosis regionibus alpinae Inferioris Sierrae Nevadae in Hispania australi.

52. T. PERSICUM Boiss. Diagnos. plant. nov. orient. V. 42. — Basi suffruticosum multicaule, totum pilis palulis brevibus densissimis hispido-canum: caulibus cretulis oppositis ramulosis fragillimis; foliis oblongis in petiolum breviter imbricatis annuatis, apice obtuse 5-7-dentatis, superioribus integris; floribus in axillis superioribus oppositis binis, pedicello calyce breviori suffultis racemos laxiusculos elongatos formantibus, foliis floralibus elliptico-linearibus obtusiusculis, basi attenuatis, calyces nubsuperantibus; calycis hispido-lanati obconici dentibus triangulari-lanceolatis acutis, inferioribus binis longioribus angustioribus; corollae roseae(?) hispidulae calyce subduplo longioris laciniis superioribus oblongis declinatis, intermediis parvis, inferioribus ovalo-rotunda cucullata; achaeniis nigris arcolato-insculptis. 2l. — Planta 4-0-pollicaris, folia 5-6 lin. longa, 2-3 lin. lata. — Crescit in Persia australi inter Taroum et Darap.

53. T. FRAGILE Boiss. Elench. plant. novar. Hispan. no. 107. et Voyage bot. dans le midi de l'Esp. 514. no. 1371. f. t. 140. — Caespitosum villosum: ramis fragillimis intricatis prostratis; foliis parvis rotundato-cuneatis breviter petiolatis acutis dentalibus mollioribus villosis; verticillastri approximalis 2-4-floris; calycis villosi campanulati dentibus triangularibus acutis subaequalibus; corollae purpureae vel rosae lobis superioribus sublinearibus, intermediis ovalis, inferiore infracto pendulo cucullato rotundato. ^ — Caulibus numerosi, basi nudi, steriles *duo* elongati. Rami hispido-lomentosi. Folia ulrinque pilis inollibus cineris.

secus caulem magis approximata, floralia paullo angustiora et minora, calyces non aequantia verlicillastn 3-4-flon in spicas terminales oblongo-cylindrica laxiusculas saepe unilaterales digesti. Calyx obcomco-campanulatus villosoglandulosus, dentes eximie tnnemi, faux nuda Corolla purpurea, extus villosa, calyce duplo longior — Crescit in fissuris rupium regionis subalpinarum in Hispaniae australis Sierra Tejada ad pagum Camillas.

M T CIUM4EDRYS Linn. I c - Engl bot. t. 680 - Bth I c f - Perenne v suffruticosum, basi procumbens pubescens v villosum, ramus glabrum Toll broiler petiolatis ovalis oblongisve inciso-crenalis, basi cunealiter, utrinque Mandib v. sublus canescens, floralibus. mmoribus. m denatis, verlicillastri? 2-0-floris, superioribus racemosis; calycibus declinatis tubuloso-campanulatis, dentibus lanceolatis subaequalibus. 2l. — Species in Europa vulgarissima vana pubescens, nunc lenius canescens in ramis, pagina foliorum inferiori et calycibus, nunc longior et densior in omnibus fere partibus, sed habitu et foliorum forma a *T flatio*, *maro* et *multiloro*, birsulie v. pubescens racemorum a *T lucido* constanter diversum. Rami floriferi ascendentes semipedales v vix pedales Folia supra saepe nitida glabra v. villosula, subtus venosa, floralia inferiora confertifolia, superiora bracteiformia inlegerna subcolorata Racemi secundarii Calyces biter pedunculati, saepe colorati, dentibus subulato-acuminatis Corolla rubropurpurea, exclus villosula. — *Chamaedryt officinalis* Moench, Modi plant JSJ — *T. Pseudochamaedryt* Wender Bot. Zeit 1820. I 358 — *T. multi-lorum* Horlul (non Linn) — *T. officinale* Lam. Fl Fr. II 414 — Habitat in Europa omni et Asia Pontica collibus, ad muros, rupes et vias etc, in Anglia, Gallia, Hispania, Germania, Italia, Sicilia, ad Byzantium et Trapezum, in Tauro, Caucaso et in regione Caspica

U T. CANIM Fisch et Mey. Indx. scra, hort. Pelop. 1835. p. 40 - Blh I c 745. — Tomentoso-rincaiuu, ima basi frutescentia mollis: calicibus erectiusculis simplicibus; Ml. omoogit deotalu, basi caoaliter, floralibus. Integerrimis; Terlicillastri sexfloris, pedicellis calycis longilatis; dentibus calycis aequalibus. aculis mucronulatis. 2l. — Affine *T. Chamaedryt* et *T. quadratulo*, a priori dignoscitur herba villosa mollibus canescens, terlicillastri distantibus laeis et foliis floralibus inlegerrimis, a prosteriore differt caulibus elongatis <ubMmplicibus> terlicillastri sexfloris, pedicellis longioribus corollaque MIOMS Corolla purpurea — Crescit in ttiac mediae provinciae Irjuscaucasicae bomchelia.

50 T. LFLM OPHYLLM Monbr et ucb Ann sc. nat. 12. SIT) I 55 - Suffruticosum ramis suberectis albo-tomentosis, Toll oblongis denticulatis, utrinque incanis, (loralibus integerrimis, verlicillastri 2-6-floris racemosis, calycibus subsessilibus tubuloso-campanulatis locanis, dentibus lanceolatis subaequalibus y. — A *T. tricann* non differ I m>i herba tomento brevissimo nec villosa mollis canescens et calycibus sessilibus An re vera distincta species? — Crescit in regione Euphratis superioris

57 T. MIITirLORIM Linn I c 788. - Bib I c GS| f - Suffruticosum glaberrimum v tenuissimum cano-pubescentibus fere breviter petiolatis ovatis acutis, basi nuncius, apice acute denatis utrinque verlicillastri v sublus canescens, floralibus minoribus, verlicillastri 2-0-floris distantibus racemosis, calycibus declinatis tubuloso-campanulatis, dentibus lanceolatis subaequalibus ^ Inter¹ *I hamaedryt* *1 *Ml arum* fere medium lili prioribus affine, sed ramo<iu>, ramis tenuibus, basi lignotis Folia 2-4 lin longa, sarpis lenia, utrinque verlicillastri, apice serratis utrinque 2-4 noiala Flores *T (hamaedryt)*, sed dimulio fore minoribus Folia intantum fore integerrima, >ublus subcanescens, sed constanter a *T Maro* floralibus doiuclini — lili in Hispania

58 T. MARIM Linn I c - Bib I c 1 - Suffruticosum incanum foliis parvis ovatis integerrimis, sublus incanis, floralibus mmoribus, terlicillastri 2-4-floris racemosis, calycibus declinatis bracteatis tubuloso-campanulatis, dentibus brevibus sub-

aequalibus 2l. — Ramosissimum, habitu fere *Thymis vulgatis*. Ramuli floriferi erecti 3-4-pollicares incani. Folia breviter petiolata 2-4 lin. longa obliqua, margine revoluta rarissime obscure crenata, basi rotundata, supra canescentia, subtus lomento candido vestita, juniora saepe ad axillas fasciculata, floralia conformis, sed calycis dimidio breviora et saepe villosa. Verlicillas subsecundi in spicam 1-2-pollicarem approximant. Calces minores quam in *T. Chamaedry*, semper pilis paucis canescentibus, denis breves aculi. Corolla purpurascens, exclusa villosa. — *Chamaedrys Marum* Moench, Melh. pi. 383. *r. marulimum* Lam. H. l. r. II. 414. — Habitat in regione mediterranea occidentali, in Hispania, insulis Stoechadibus, Corsica et in insulis lacus majoris Italiae.

59 1. MIGROPHYLLUM Desf. Ann. Mus. 300. t. 22. - Bib. I. c. - Suffruticosum humile divaricatum-ramosissimum. Toll. parvis ovalis crenatis, supra glabris, sublu* incanum, verticillas paucis subinflatis, calycibus declinatis tubuloso-campanulatis, denibus lanceolatis subaequalibus 2l. — Elsi primo munita a *T. flaxo* diversissimum videtur, tamen ex ab illis vanclale 0 differt nisi habitu, nimis brevibus canescentibus, foliis minoribus et (longibus paucioribus minoribusque. Corolla rubro-purpurea. — *T. quadratum* Sm. el. Sibth. Fl. Grace. M. 25. t. 530. (vix Schreb.) — *T. dnanalum* Sieb. PI. exs. 9. — Habitat in insulae Cretae rupibus.

60 T. FLAUM Linn. I. c. 701. - Bth. I. c. f. - Sibth. el. Sm. Flor. Grace. VI. 27. t. 533. — Truticosum ramis lomentoso-pubescentibus, fois, late ovatis crenatis, basi truncatis cuneatis, utrinque viridibus. v. subtus canescentibus, floralibus superioribus inlegernis acutis, verticillastris 2-4-dentatis racemosis; calycibus decemalibus lubuloso-campanulatis, denibus lanceolatis subaequalibus 6. — Fructus 1-2-pedalis, basi ramosissimus, rami floriferi suberecti, pubescentia brevi v. lomento canescenti in omni parte v. bifaria vestiti. Folia crassiuscula, magnitudine inaequalia 1-10 lin. longa, latitudine longitudinali acutangula v. angustiora constantiter crenata, margine subreflexa, basi inlegernia magis minus cuneata, petiolo brevi, supra mine gibberna laevia nitida, saepius pilis brevissimis numerosis pubescentibus, sublimi pubescencia magis minus pubescentia v. tomentosa, floralia minima subconformia angustiora inlegernia, superiora bracteiformia sessilia ovata acuta concava subcolorata. Verlicillas laxi, in fenestris disjunctis in racemum 2-8-pollicarem dispositis. Bracteae inconspicuae. Calyces pedicellati, basi valde obliqui, apice colorati (flavescentef in var. a., rubeo-dim in var. fi.), nunc vix pubescentes, nunc valde hirsuti, dente supremo parvis lallos et imbricati (orolice lalloscencles in var. a., rubro-purpureae in var. fi.). — *Chamaedryt (lava)* Moench, Melh. pi. 383.

fi. putpuicum floribus rubro-purpureis, foliis saepius subtus canescentibus. — *T. uytum* Morlet an Schreb. — *T. luctum* Sibth. el. Sm. I. c. 27. 1532. 'non in inn.) — *T. dnanalum* Sieb. PI. exs. 9. — Habitat in Europa et Africa regione mediterranea, in Hispania, Pyrenaeis orientibus, Italia australi, Corsica, Sardinia, Italia a Liguria ad regnum Neapolitanum, Sicilia, Dalmatia, in insulis Archipelagi (jacci Trequens, Algeria et in Atlante, in collibus maritimis Cyrenaeis et Neapolitanis, *fi.* in Hispania, in Parnasso atque in montibus, nec non in insula Cypro, in scopulo St. Istad prope Cinolum copiosissime et prope Smyrnam.

01 T. LUMOSISSIUM Desf. FI. Atl. II. 4. t. 118. — Bth. I. c. f. - Incanum caule fruticulosum ramosissimo, ramulis filiformibus, fois obovatis crenatis, floribus sessilibus axillaribus 5. — In fructu lomentosus cretus 8-15 centim. altus. Rami numerosissimi liliformes. Folia candida, superne pallidiora, magnitudine fere 7. V. petiolata, obovata suboblonga-rhomboidica, inferne neni cron. Ua lions piri axillares et Urminales solitarii subsessilis, folio brevioribus (alix lenis flonitatus candidus 5-dentatus, denibus aculis subaequalibus. Corolla 10-lacina. In planis odorcm suum spiralem. — Habitat in Barbaria fissuris rupium prope Africam et in Hispania.

t *Species dubxae.*

- 62 T. MTIDUM Schreb. Umlab. 35. - Btb. 1. c. 083 t - Toll ovatis crenatis, floralib. iniegernmis, verlicillastris dimidiaiis racemosis; caule bifanam birbato 5 — Gaules fruiicosus glaber, alroque, quod a foliorum commiSbura descenclit, latere dense pilo<o. Folia breviter petiolata, basi Integra, antice crcnis oblusis mnrgino reflexis incisa, glabra nitida, nervo medio basi barbata, obtusa dura, (loralia fere lanceolata, pilosiora quam *T. flav.*, sicut el calyces. Flores minore* quam islius. Corolla purpurea, aunculis minonbus oblusis non vero iruncatis — An *T. flav.* var.* — nee ullo modo cum *T. luado* convenit — Habitat in Mauritania
63. T. REGIUM Schreb. Umlab. 35. — Btb. 1. c. — Foil, ovalis antice dentalis, floralib. integernmis sessilib., verlicillastris racemosis; caule ramoso. 6 — Fruticulus sesquipedalis diffusus, rami pubescentes. Folia parva, petioli* bre\ibus insidenlia ovata, utnnqoe supra medium margims 2-3-denlaia, margimbus reflens fere concava, saturate vmdia nitida (pilis brevissim dense obsita microscopio laolum vmbilibus), soblus incana acuta, floraha minora, longitudine calycum, sessilia iniegemma. Verticillasri contigui, in racemos digeiti Flores vix majores quam *Chamaedryos*. Corolla purpurea, aunculis lineanbus elongatis ad slarainum flexuram attingentibns aculis. — Habitat in Uispama.
- 64 T. MIRTIFOLIUM Poir. Diet Suppl. II. 766. - Bib. I. c. f - Caule credo fruticoso pubescente, foil, ovalis subdentatis, subtus villosis, florib. spicatis 6 — *T. microphillo* affine. Frutex elalior, caulls ramique erecti, crassiores trretes pubescentes. Folia mediocriter petiolata ovata acuta, supra glabra et virscenlia, sublus pubescenlia cinerea, vix denlata, 3-5 lin longa Flores axillares pedicellati, ID racemum erectum terminalem disposili, in fen ores soliiam oppositi, superiores lernali, sopremi aphylli. Calyces villosi, denlibus 5 aculis subaequalibus Corollae laenia media labii infenons dilauu lubrolunda crenulau. — An *T. Man* varieutT — Or. Deaf. Cai Hori. Par. (ed. 3.) 9M. — Hablui in Oriente.
- 6ft. T. QUADRATUM Jfr-Schftreb. JJnllab. 36. — Bib. I. c. t — Poll, ovalo-rhombeis denlatis, subtat nkelt; •erllcHIMlrlt raemotls. ^ — Caulls vix •pltbamaeus erectus, basi ramosu«, fere teres, tomenlo nlycus. Folia *Man*, sed latiora, brevissime petiolata rhomboidca. basi inleirernma, ub nnpulo lalcrak ad apiceni dentibus 4-5 incisa, marline rodeia, supri niida piht brcMssimis micro»copio lanlum discernendo ob>ita, ba*si apiceque acua floralia o\ata conca>a, apico dentata pubc»cenlia Racemus itreMs Flores *Man* brcn^ime pedunculali Calyx pubescens. Corolla purpurea. — Habitat in Uispama
- 66 T. SLBSPINOSUM Pourr. ex Willd. Eoum. pi. hort Dcrol. 500 - BU I c - Foil integernmis ovatu aculis petiolalis, margine revoluiis pubescentib, sublus lomentosi», florib. racemosis, ramia spinescenlib ^ — Simile *T. Maro*, JCC Willd. — Habitat in insuhs Baleancis.

SMUO IX. POLIUM BUL L o. 684.

Verticillastri pauci, in capitula subglobooa lerminalia condennati Cal)xtubuloso-campanulatus subdechnalus, basi obliquitM, denlibus S subaequalibus v. supenonbus vix lalionbus Corollae laciniae superiores oblongae declinalae, lalera* panrae. Achaema valde rugosa - llerbac perennes v suffrutices, caulibus bafi saepius procumbenlibus ramoussimis, ramis flonferis ascendnlibus.

67. T. PIRENAICUM Linn. Spec planL 701. - Bth I c. | - Repennxilosum foil rotaodatis crenalis, utrinq %indib; terticillasris paucis in capitulura terminalo condensalis; calycib. tubuloso-campanulaiis declmalis, dcniib subaequalibus ^1 — Caules basi radicanles elongali, sub terra repenles Ramuli stenles nagelliformes ferities, breviter atcendenles, pilis patentibu* hxpidi Folia bre\icr petiolata, 4-8 lin diametro, basi truncata rotundata v cuneata, utrinque el praesertim •d margmes el nerros pilis brevibus rigidulis bmuia, floraha sub capitulo cuneiformia, braciae lioearet, calycis longiludioe Capitula sohiana terminali* k-e-n? p-er-ca ?. depreaae globosa, pollicem diametro Caljccs tubsessiles

- 3-4 lin. longi, basi glabriusculi, apice ciliato-hispidi, denlibus lanceolata acuiis superioribus parum latioribus. Corolla flavida, lacinia infima saepius purpurascens. — *Polium Pyrenaicum* Mill. Diet. no. 6. — *Teucrium replant* Pourr. Acl. Tolos. III. 330. — *T. rotundifolium* Schreb. Unilab. 42? — Habitat in Europa australis montibus Calaloniae, Arragoniae, Pyrenaeorum Gallicorum et Arverniae.
- p. Granatense* Doiss. Elench. pi. nov. Hisp. no. 100. et Voyage bot. dans le midi de l'Esp. 515. no. 1373. — Decumbens caespitosum dense hirsutum subflavicans: Toll. rotundalis profunde crenalis hirsulis, superioribus quam capitiula multo brevioribus; bracteis spalhulalis integris calyci aequalibus; verticillastris paucis in capitulum terminale condensatis; calycis campanulati hirsuli dentibus aequalibus; corollae roseo-violaceae lobis superioribus lanceolatis intensius coloratis valde ciliatis, interradialibus brevibus subcanaliculatis, basi bidentatis, inferiore cucullato. — Crescit in fissuris rupium regionis alpinae in summitate calcaerea Dornasio supra San Geronimo, ad pascua Vuceres et inter Trevelz et Cadiar in Hispania meridionali.
68. *T. CINEREUM* Boiss. Elench. pi. nov. Hispanic. no. 170 et Voyage bot. dans le midi de l'Esp. 510. no. 1374. t. 151. — Tolum hirsutum griseum: caulibus abbreviatis intricatis caespitosis; foliis, minimis oblongo-cuneatis petiolalis rotundato-dentatis; bracteis linearibus calyce brevioribus; capitulis terminalibus paucifloris ovalibus; calycis hirsuli dentibus brevibus triangularibus subaequalibus; corollae albae lobis superioribus oblongis rotundalis ciliatis, lateralibus minimis, inferiore oblongo cucullato. — Rhizoma suffruticosum nigrum, caules prostrati caespitosi, rami abbreviati fragillimi. Folia utrinque hirsuta aliquando flavicantia, cum petiolo vix 3-5 lin. longa, tres lin. lata. Verticillastri axillares subbiflori in capitula aggregata. Bracteae lineari-spalhulatae calycibus multo breviores. Corolla alba, eiliis hirsuta. — Crescit in fissuris rupium montium Sierra de Gador in Hispania meridionali.
69. *T. BLXIFOLIUM* Schreb. Unilab. 42. — Bth. I. c. — Suffruticosum: Toll. obovato-cuneatis crenatis, margine subrevolutis, supra viridibus subglabris, sublus canaliculatis; verticillastriis in capitulum terminale condentalibus; calycibus tubuloso-campanulatis declivatis, dentibus subaequalibus. — Caulis basi proeunbeotis ascendentes, saepe ramosissimi piloso-pubescentes. Folia femipetiolaria obovato-rotunda, basi in petiolum breviter truncata, floribus terminalibus approximates, flores superantia, in capitulum parva lanceolata. Capitula, calyces et lobes *T. Pyrenaei*. Corolla albicans, saepe rubescens. — *T. taxatile* Cav. Icon. pi. rar. II. 10. 1. 121. fig. 1. — Habitat in Hispaniae saxorum fissuris et Toraminibus siccis, vulgissimum in montibus Sucronis, Orcellis, Saclabis et Sagunli.
70. *T. LEUCOCLADUM* Boiss. Diagnos. plant. nov. orient. V. 44. f. — Ramosissimum humile suffruticosum: caulibus a basi oppositis ramosis pyramidalibus ramisque abbreviatis rigidis crassiusculis, indumento brevissimo canis; foliis subsessilibus cuneatis, basi alienualibus superne 5-7-rotundato-crenatis, margine subrevolutis adpressime lomentoso-griseis; floribus minimis in capitula terminalia subrotunda pauciflora foliis supremis minimis stipula dispositis; calycis brevissimi lomeniosi conico-tubulosi dentibus omnibus brevissimis rotundis, vix perspicuis, villo connexis aequalibus; corollae (lavescens calyce sesquialongioris pubescentis lobis superioribus brevissimis obtusis subdeclinalibus, intermediis decliniformibus, inferiori cucullato. — Planta palmaris, caules pro longitudine crassi, folia 4 lin. longa, apice 3 lata ramalia minora. Flores omnium minimi, capitula vix pisco majora. — *T. cuneifolium* Schimp. Pl. exs. nec Sibthorp. et Sm. — Crescit in Arabia petraea ad rupes Wadi Hebran.
71. *T. CINEIFOLIUM* Sibthorp. et Sm. Flor. Graec. VI. 30. t. 537. - nth. I. c. — Prorumbens, dense lomentoso-lanatum: foliis, subrotundis crenatis, basi cuneatis crassis, utrinque dense lomentosis; verticillastriis paucis in capitula terminalia

condensatis, calycib lubulosis tomenlosis, dentib bretib subaequalibus 2|. — A *T Pyrenaisco*, *saxattli* el *buxifoho* pmo Inluitu differt caulibus, foliis calycibusque lomento denso canescenle v flavescenle indutis, caelerum habilu ill is valde approxiraatur Folia \ix scmpollicana crassa, margimbus subreflexis Corollae albae, basi fla>escentes — Habitat in Creloe monlibus Sphacioticib

- 72 T IIAE>SELERI Boiss Elench pi nov Hxpan no 171 eU Voyage bot dans le midi de l'Esp 518 no 137G 11 152 — Sufrulicosum caulib a^ccndcnlib erectis subramosis palcnlim Inrsulis, foil linean-lanccolatis oblusis profunde crenali>, margine revolutis sessilib., qualernatim qmnalimvc dispositis pubc>crntib \in—dib , cjpilulis densissimi*, pnmum acute pyramidalis, dein o\atis, plunb id apictin ramorum approximalis, bracteis linean-spalhulatis aculis carinalis ciljccm subacquaolib , caljcis tubuloso-campanulati hirsuli denlib lanceolato-triangu—rib aculis nervosis subaequahb , corollae breviiier exserlac lobo infcnorc lanceo—laio cucullalo, reliquis abbrevialis aculiusculis 5 — Caulis basi frulicosus ascen—dens /i-1-pcdahs ramosus molliler pilosus Folia regulariter el adpresse crenata, ulrinque pilis palulis pubescenlia vindia, sub lenlc glanduloso-punciata, circiler stmpollicaria, 2-3 lin lala Cipitula breviter pedunculala ad apices ramorum 4-7-na approximata densissima Dractcae linean-spathulatac acutac, calyces* sub—ciquintes cilnlac Corolla pallide ochroluca

ft angustifolia full augusliorib lineam lalis valde retolulis, supremis integn^, cipiluli^ longius pedunculate, braceis glabns, cilycis basi tanlum hirsuli dentib acutionbus — Crescit in umbrosis regioms montanac Sierra Bermeja circa Carratraca el in raonte Sierra de Gade*, ?. in pro>mcia M.ilacilana Ii—vpaniac meridionalis

- 73 T ALPESTRE Sblhrp el Sm Hor Graec VI 31 I 538 - Bih I c 685 - Suf—fruiicosum bumile di\aricalo-ramotissimum cano- v flaTescenli->illosum foil parvis obovaio-enneaUt tubrotoodls crenalit, margine revoluilf. verlieillasins paucissimis ad apices ramorum lobcapluis; oalycib. declioalit otalo-lubulosii pilose, dentib subaequalib brevib. oblasis. % — Habila *T thymtfoho*, characteribus *T Polio* affinc et MX non hujus \anelas Ramuli dun ngidi I olia clisiintia, 2-3 lin lon^a, utiinq sub\indn C ipitula ad ipice* nmuloruni mvniludino *Ptu*, ((1 >nbu9 4-b con*>lan(ii (ornllat pjrMe albae — *T tauahlt* Sub IM (nt (\N non Ci\ — Hjbilat in Crcla ad Mirabillo et in monium sphacioti—corum siimom jugis

- 74 T (VPRIIV Boiss Diagnos plant nov orient V 43. — SuffTrulirusiim caespit >sum, tntum pi I > patulis brenb deniim gn^eo-lanatum caulib numi r >MS bisi dtciimbintib brevd^imis, parce et opposite ramosis \ simpluib MIOMH, foil stHsihb nblongis ablusi<_f basi atlcnualis cuneatx rcRulanter el minule crenu—hiis, crenib ob margines rc\olulos subcomplicalis, utnnq gn>co-lanalis, florib in npitula subrotuoda paucillora, foln> siipremin suffTulla, braceis ellipticis in—K_nriN nhces aequantib inlermixta dispoMtis, ciljris hepidi lubulosi ^hnduhs >ssulib isp< TM denlib lubo quintuple bn\iunb, dtiobus siipinorib oMtiii ob—tusiusculiH, iribiio infenorib paullo longiorib trianguhn-l.inreolatiH, corolla fln—\rsrrnic pulurula p nl>re parura exserta, achaimi> nigrin arrohlo-inirulpn^! sub hiiK (xinne piinctuhtii ^ Rami procumbentes 3-5—pollitiros folia ma—Jora 4 I in longa, 2 lalj. - Credit in insula <)pro

- 55 T P<U II M Imn Spec phnl 792 — Blh I c }• — <MffriihmMim (aiiCNcenli—lomentosum lanaium > ranu> piloHO-Inspidum foil cum ids obi n_ni> > lint i—rib crenaliH, nurgine rt\olulis \erliolhstris paucis in ripituh |:| >bosa oblon—ga< l< rminaha condensihs caljnb tubuloso-(ani| inulilis stiluk flnnlis dentib subaequalitujH ^ (auks basi ramosusimi, rami basi prorumbent s ik.cciidente* v rarius suberecli Mrpius 5-0-po|hean s ranus prdalos % lanlum 2-J-pollicare<,

Knunc tomenlo bren dtn*o, nunc hna longiore laxa > (Him pilis nubpatontibu? ^nesceois slmphces v ramosi, aplice taepiutc orjmbosi Folia constanler >ssulib,

basi angustata, mollior rugosa crassiuscula oblusa crenata et margine magis minusve revoluta, sed quam maxime variant forma oblonga v. linearis, margine vix reflexo v. omnino revoluto, superficie brevissime tomentosa, dense lanata v. pilosa, colore praesertim superiorum) cano-illa (caeruleo, aureo v. rarius viridi, crenaluns magis minusve profundis etc. Verticillatis 2-6-11 ori. Folia floralia caulibus subconformia, sed calycibus saepius breviora et cum us imbricata. Capitula ad apices ramorum solitaria v. saepius plura corimboso-glo-merata, nunc globosa, magis a *Pitoinore* ad *Cerasum* lanata, nunc oblonga v. rarius elongata spiciformia, colore et lana uti folia variabilia (in var. purpurascens.) Corolla parva alba flavescens v. purpurea.

a. flavescens foliis linearibus, capitulis hirsutissimis, ramorum apicibus flavescensibus. — 7. *aureum* Schreb. Unilab. 43. — *Can.* Icon, plant, rar. II. 10 t. 117. — *T. flavicans* Lam. Diet. II. 700 — *T. tomentosum* Willd. Flor. Deljhm II. 151. — *Pitoinore aureum* Moench, Mch. plant. 385. — *Pitoinore luteum* Mill. Diet. no. 2.

f. hirsutum foliis oblongis vix crenatis capitulisque pilosis; — *T. icgyptiacum* Pers. Enclrid. II. 112.

y. vulgare foliis oblongis capitulisque lomentoso-lanatis, floribus albis. — 7. *Pitoinore* Linn. — Sblbrp. cl Son. Flor. Graec. VI. 20. l. 535. — 7. *Pseudohyopus* Schreb. Unilab. 45. — 7. *Teulhrion* Schreb. Unilab. 40. — 7. *Behon* Schreb. Unilab. 47. — 7. *Lutitanicum* Schreb. Unilab. 47. T (non Lam.) — 7. *album* Poir. Diet. Suppl. II. 770. — 7. *trifolium* Vahl, Symb. bot. I. 40. — 7. *subtriphylloides* Lag. Gen. et sp. nov. plant. 17. — *Polium album* Mill. Diet. no. 4. — *Polium laetifolium* Mill. Diet. no. 7. — *Polium Smyrnaeum* Mill. Diet. no. 15. — *Polium angustifolium* Mill. Diet. no. 3. — *Polium ramosum* Mill. Diet. no. 2. — *Pitoinore diffusum* Mill. Diet. no. 13.

f. gnaphalodes foliis linearibus capitulisque densissime lanatis. — *T. gnaphalodes* Vahl, Sjmb. bot. 1. 41. — 7. *langerum* Lag. Gen. et sp. nov. pi. 17.

e. purpurascens foliis oblongis capitulisque tomentoso-lanatis, floribus rubropurpureis* — 7. *ichacmentum* Schreb. Imldb 44 — *Pitoinore inlegerrimum* Mill. Diet. no. 14.

C. angustifolium: foliis linearibus t. lineari-oblongis, capitulisque parvis cano-tomentosis rariis flavicantibus. — *T. capitatum* Linn. I. c. 702. — *Can.* Icon. pl. rar. II. 17. t. 110. — Sblbrp. el 8m. Flor. Graec. VI. 30. t. 530. — *T. flavescens* Schreb. Unilab. 44. — 7. *Valerianum* Schreb. Unilab. 40. — 7. *pyenophyllum* Schreb. Unilab. 48.? — 7. *lavandulaceum* Pourr. — 7. *eorymbiferum* Desf. Fl. Atl. H. 8.? — 7. *cylindricum* Lam. ex Steud. Nom. bot. 820.* (edit.) — *Pitoinore capitatum* Mill. Diet. no. 5. — *Polium terratum* Mill. Diet. no. 12. — *Pitoinore picatum* Mill. Diet. no. 10. — *Pitoinore frulicatum* Mill. Diet. no. 11. — *Pitoinore erectum* Mill. Diet. no. 8.

7. *montanum* Boiss. Voy. bot. dans le midi de l'Espagne. 517. no. 1375. — Caulibus dense cespitosis humillimis* subherbaceis* glabrescentibus; foliis, minime ovatis; capitulis minime solitatis. Tota planta tomento tenui subflavescente vestita est. —

#. *aureum* Boiss. 1. c. — Praecedenti simillimum, sed corollis intense aureis differt. — Habitat in Europa, Africae et Asiae regione mediterranea et Pontica et saepius in siccis, aridis, arenosis petrosisque locis, in Lusitania, Hispania, Barbana, Gallia australi, Italia a Pedemonte ad regnum Neapolitanum, in Corsica, Sardinia, Sicilia, in montibus Graeciae et Asiae minoris, tum in Archipelago insulis frequens, Smyrnae, in deserto Sinaico, in Tauro et Caucaso frequens et in regione Caspica. [a. in regionibus occidentaliibus vulgarior, /? in Aegypto et Creta* S, 15 et 0. in Thracia, t. in montibus Massihao, ad mare Adriaticum et alibi, y. et c. in tota regione vulgaris.]

70.1 AMPHIXIRILE Bth. I. c. 087 - Suffruticosum ramis albo-lanatis, foliis oblongis oblongis vix crenatis; basi c. cordato-amplexicaulis, margine

valde revolutis, supra leviter tomentosis, demum glabratis, sublos dense niveo-lanatis; verlicillaslrīs paucis globoso-capilatis; calycib. declinatis tubuloso-campanulais., denlib. subaequalib. lalis aculis; corollae lubo exserlo. 2]. — Habiiu el foliis varielatibus nonnullis *T. Polii* affine, elsi haec rigidiora sunt et supra minus, subius magis lomenlosa. Flores fere *T. montani* v. *Pyrenaici*, rnullē majores quam in *T. Polio*, a *T. thymifolio* differ! sUlura elaliore, foliorum forma et capilulis majoribus. — Habitat in Hispania.

77. *T. TUYMIFOLIUM* Schreb. Unilab. 50. — Bib. 1. c. - Suffruticosum humile ramosissimum: ramulis incanis ascendendib.; foil, oblongis obovalisve crenalis, subius v. ulrinq. incanis; verlicillaslrīs subbiOoris paucissimis, ad apices ramorum subcapilalis; calycib. declinalis lubuloso-campanulalis, denlib. subaequalib. lalis acutis; corollae tubo subexserto. % — Habitus fere *T. alpēstris*. Caulis basi crassus lignosns, ramuli numerosi caespilulosi 2-3-pollicarcs. Folia conferta brevia, basi anguslata, minus rugosa el lomentosa quam in *T. Polio*, minus laevia quam in *T. montano*. Flores in ramulo singulo 2-0, vix capilati. Calyces forma *T. montani*, sed dimidio mlnores, uli corollae rubescenles. — Habitat in Hispaniae provincla Valentino.

79. *T. MASCATEXSE* Boiss. Diagnos. pi. nov. or. V. 44. — Basi suffruticosum: ramis filiformib. foliosis clongalis decumbenlib. simplicib. tomentellis; foil, parvis elliplico-linearib. inlegris, margine convolutis oblusis in peliolum allenualis, breviter puberulis crebre glanduloso-punctalis pallide virenlib.; florib. in capilulum subglobosum foliis supremis co multo breviorib. stipalum disposilis sessilib.; calycis obconici glandulis pedicellalis minulis puberuli lobis tribus superiurib. triangularib. acutiusculis, duobus inferiorib. longiorib., apice allenualis aculis; corollae flavescenlis rubro-striatae puberulae calyce sesquiloogioris laciniis loperiorib. oblongis declinalis, inlermediis minimis, inferior! oblonga cocullala; acbaeniis areolalo-lmcolpUi. % — Rami leoues 4-6-pollicaret, folia 2-3 lio. looga, lineam dimidiam laia. — Cresall In moote Chebek Matcatenti.

70. *T. MONTAKUM* Linn. Spec. plant. 701. — Sblbrp. el 8m. Flor. Graec. VI. 28. t. 534. — Bin- L e t — Suffruticosum proslralum: ramis incanis v. pubescenlib.; foil. oblonpo-Hncarib. inlegerrimis, suMus v. ulrinq. incanis plants v. margine revoluiis; verlicillaslrīs paucis in capitula lcrminalia condcn&aiis; calycih. subderlinnlis tubuloso-campanulalis glabris incanisvc, denlib. subaequalib. lanceolatis subulato-acuminalis. 2]. — Caulis basi lignosus ramosissimus, rami tenues fere omino prostrati elongali, summilatibus breviter ascendeniibus >. rarius 2-4-pollicaribus subcrecti. Folia supra laeviuscula, subius paucivrnna, nee ut in *T. Polio* molliier rugosa obtusa, basi anguslata in peliolum brevjssimum, caeterum Iniludine et canescentia paginae superioris valde variant, infra semper incana, floralium par infimum capilulum saepius superat, raclera pauca brevia. Capilufa mulio majora quam io *T. Polio*, fere semper in ramulis solilarui bemispbaerica, c vrrlicillastris 2-4- v. 4-6-Doris consiamia. Calyces subsessflex, ba9i attontfali, vix nervnsi lactrs virides v. parum incani, rarius pilosi, 3-4 lin. longi, dentibus lanccolalis subulato-acuminaiis. Corolla ex albo flavescens. — *T. supinum* Linn. I. r. 791. — *Polium montanum* Mill. Diet. no.]. — Habitat in Europac australioris collibus moiuibisque, imprimis calcarcis, in Hispania, Gallia ausirali, Germania, praeserlim ausirali, lialia, Sicilia, in Gracciae monlihus Delphi, Albo el Olympo Bithyno, in Volhynia et in Tauriae surnmo nionle Tscbalurdag.

^0. *T. PLMILLM* Linn. I. r. 702? - Blh. I. c. | — Suffruticosum procumbeos r. ereclum: ramis incanis; full, angusle linearib. inieRerrimis, subtiik incanis, margine revolutis; verlicillaslrīs paucis in capitula terminalia condensalis; calycib. tubdclrlnalis lubuloso-campanulalis, dentib. subaequalib. lanceolatis subulato-acuminatis. ^ — Vix ac ne vix a *T. montano* differl caule sacpiu* ereciorē, foliis aogasiioribui et flohbus purpuratcentibus. — *T. Libaniit* Schreb. thiUb. 38? - Cay. Iron. pi. rar. II. 17. I. 118. - Hlabiui in Uupama.

81. *T. MONBRETH* Bib. Ann. sc. nat. (2 Se>) VI. 56. - Suffruticosum, procumbens tomentosopubescens. foli, late ovalis crenatis, basi truncalis, ulrinq. molluer pubescentib., florahb. bracteaeformib.; verlicillastns in capilulum oblongum condensali*, calycib. birsulis nulanlib. subaequahter 5-dentalis. 2|. — Planla humilis ramosissima. Folia illis vanelalum nonnullarum *T. flavt* baud dissimilia. Racemus capiuliformis vix pollicans hirsulus. Corolla parva fere *T. Poltt*. — Crescit inter rupes ad basin monlis Gassn in Syria.
82. *T. VERTICILLATUM* Cav. Icon. pi. rar II. 77. t. 196. - Bib. 1. c. 688. - Foil, verlicillalis lineanb.; limbo revolulo; caule erecto. 5? — Radix lignosa, ex qua caules prodeunt tceles crecli, vix pedales ramosi, tomenlo obducti brevissimo albo. Folia scssijia verllcillata, terlicillaslns approximate, in bis folia sunt saepe 6, frquentius 4, sublineana glauco-albida, limbo arcle contra nervum revolulo. Flores capilali, capilulis terminalibus, basi folio&is. Calyx turbinalus ilnatus tomenlosus 5-crenatus, crenula allera laliorc. Corolla lulescens, cujus labium tnlobum, lobo medio o\ato concavo, aunculis ulnnque auclo, laleralibus brevionbus. — Habitat in Hispama juxta Illicatanam lamara, si>c aquarum collectionem arte peractam, copiose vero in Crevillente monhbus praeserlim prope Sanctum Cajetanum.

t *Species hujus tectiois dubiac.*

83. *T. ANGUSTISSIMUM* Schreb. Unilab. 39. - Bib. I. c. 688. | - Capitulis terminalib. pilosis; foil, hoearib. iniegerrimis sobnudis; caule erecto. % — Caulis digitalis, basi flexuosus filiformis, lomento denso albas. Folia omnium anguslis*ima, fere filiformia, margine revoluta, hnea per loogitudinem insculpta divisa, vix pubescentia, nervo medio sublus tomenloso* oblusa, longitudine inlernodiorum, infenora minora confertiora. Capilula solitana parva subrotunda, e terms conglomerata densa. Folia floralia ovalia, calyce breviora, rarius pilosa. Caljx >mdis, pilis ranonbu* rectis conspersus acutus, ore barbatus. Corolla vix calyce longior alba. — *Pohum* elc Darr Ic. 1060 — Habitat in Hispama.
84. *T. COELESTE* Schreb. I mlab. 30. — Bib. I. c. f - Capitulis lerminalib. tomentos; foil, lineanb. inlegcrnmis incanis; caule erecto ^ - In multis cum priori el *F. Valentino* contcnit, ab ulroque tamcn satis diversum est. Caulis aequc tcnola, lomenio candicans. Folia slool in boo lineana rvolula oblusa, lomenlo tenuissimo subius denslore Incaoa^ breviora umen et laliora ae praecedentis, inlegemma, cum aliquis laniam erenaram veailglU. Captmla In aumluta ramorum solilana sou terna, quorum laiaralf* mlo<ra pcdasjcolls brevibus horiioouhbus oon foliosis incident. Folia floralia Inverse laaceoUla aot linearia sicut 7. *VaUnttm*, non ovata uti *T. anguttitimi*, oblusa lomenlosa. Flos minor quam antecedentis. Cal>x vindis, magis, sed laxios tomenlosus quam *T. angustutmt*, ore lomenlo repleto, dentibus inangulanbus acutis, neque *T. Valentnt* modo lanccaiis obtusis Corolla'pan a alba. — *Pohum* elc. Barr. Ic. 1081. — Habitat in Hispama, in prauccelsis monlibus regm Valcnlini, praecipue ad Cartbusiam Porta Cocli diciam.
85. *T. CYMOSUM* Pers. Euchirid. II. 112. — Bth. I. c. 680. — Flonb. pamculaio-cymosis; foil, lineanb. dentalis; caule lanato-suffrulescentc. 2|. — Habitat in Hispama prope Aranjue.
86. *T. MAJORANA* Pers. I. c. — Bth. I. c. — Spicis ovalis: pedunculis subejmiosis, foil, lineanb, margine rc\olatis; caule subGliformi. % — A *T. capxlalo* (*T. Polto angultfoltoj* ommno diversum vidclur.

ft *Species omnino dubiae.*

87. *T. ELG4NELM* Visiani, Semin. rar. hort Patavin. 1836. — Percnnc foil, cordatoblougis crenjiis pcliolaiii, racemo simplici terminali solitano secundo, bracteis pcliolali> cordalis acuminalib, pedicello longiorib, caljcis dentib. infimis medios suprenhb, corollac lubo MIOSO. ^ — In s)|valisi> montiuo Eugancorum prope Palajum
88. *T. SESSIUFOI* Il'M flarkr s Tra> l> 5V> Btli I c 0<9. - Toll lurMihH sess>lib obtusis, infenorib lanccolatis mtégi rnmin, supcnnrib bractois(j cri'm-

- ↳ elliptico-lanceolalis; florib. axillanb. solitanis; pedunculis brevissimis. 2l — Caule* crecti lanati. Folia ultra pollicaria. Flores pollicem longi, fauce barbala — Habitat in Bulgaria inter Gonstanlinopolim et Rulschuk.
- 80 T. I^{DL}LATUU Lour. Fl. Cochinch. 362. - Btb. I. c. - Foil, oblongis undulalis subcrenalis»; corymbo lerminali. 5 — Caulis frulicosu* creclus teres 5-pedalis, rami patentos. Folia ovalo-oblonga oblusa undulata subcrenala glabra opposita petiolata. Flores pallidi, corymbo racemoso terrainah. Corolla 5-fida, tubo brevi, lacinus obtusis, superioribus divancatis. Stamina lougi!>sima a<cententia. Semma 4 nuda, caljce persislente fulia. — In Cochinchina ad sepes.
- 90 T. THEA Lour. I. c. 303. — Blh. I. c. — Foil, ovalo-lanceolalis; caule procumbente, pedunculis axillanb. Infloris. \$ — Caulis fruticosus 8-pcdalis procumbent glaber inermis teres ramosus. Folia ovalo-oblonga acula inlegemma pctiolaia glabra opposita. Flos albus axillaris, pedunculis Infloris. Stamina didynama, corolla longiora. Stigma aculum biparlilum. Semma 4, caljce fulfa. Habitat in Cochinchina in dumclis.
01. T. ROTUNDIFOLIUM Poir. Diet. Suppl. II. 747. - Foil, ovalo-rolundis crecti* glabris longe petiolalis; spica lerminali panciflora; pedunculo longi»simo, caule simplici (clragono. 2l. — Caulis erecti simplices telragoni herbacei, MX pedales Folia diblaniia glabra opposita, infenora rolundata pollicaria crecnaia, petiolis folio longionbu*, supenora longiora subovala, petiolis folio broionbus. Pedunculus gracilis icrminalis ereclus 4-pollicaris. Flores ad apicem in spicam brevem di»posili, dittanies opposih v. subverlicillati subscsilcs. Caljx pubescens, acute 5-dcnlalus. Corollae tubus subexserlus, labiuni cocrucura, lacinia media submarginata, laterales oblusae. — T. Commerionu Spreng. SJJ»1. vcgelab. II. 710. — llabiat ad Buenos Ayres.
92. T. FASCICULATUM Poir. I. c. - Blh. I. c. 600. f - Caule fralieoso; Ml. subfasclenlailt angntte llnearlb. glabris, ono alierofe denle tnbtubercolalo; spica brevi termIBtil. 6 — CaalM llnosl ftuel glabri teretei ramosi, rtmali brevlssimi ad axillai ortl, foliit eoniemi rabtoMlealatl feullibos perangailt 0-8 Hn. longis, ad margines inlerdam dente ano alierove brevi obtuso subluberclulatis Flores <essilcs, solilarn opposili v. subverticillati, in spicam brocm laxam lcrminalem di^positi. Bractea o\atae mucronatae, calyce longiores Corollae tubus ventricosus exsertus. Limbus flavus >idc(ur, lobi-> ob(u<i<». — llabiat ?

11 i Species e genere excludendae.

- T. CHUAEPIHIYS Linn. - AJL'GA CUAMAEPITUY&
 T. CIK M Poir. « AJKIV CHIA.
 T. FILIFORME Poir. tx ordne excludendum ob folia tparsa
 T GEM:VE>SE Crantz. - AJL'GA GE>EVE>SIS.
 T. IVA Linn. - AJL'GA IVA.
 T. LAEIGATL'M Run. - AJLGA GLABRA.
 T. I\\MA>M Morr. - AJLGA LAXMANN!.
 T. MO ^niUI M Mill. - AJL'GA IVA.
 T. PYRWIIIHLK Crantz. - AJL'GA PYRAMIDALIS
 T. RIOMBIFOI U || Willd - IITYPTIS CANK8CENS.
 T S\\I I< IFOLILV Linn. - AJI'GA SALK'IKOLIA
 T SIDIHICIM Linn. - >EPE1A LCRAMCA.

3<S0. \\JIU\\ Luin.

(Linn. Gener. pi. no. 70). - Mci<n. Gvnor. pi «.i<«rul. I *>0 II. 197 - Bib. Labial gi'lier eI «pec. 090 J

8«ctio I. BU6ULA Btb. 1. e. 602.

Verlicilldsln 0- v. sacpiu< muliidori Corollhr *ai|mn oorulcac, roscao, purpurascenlft v. albidtc, nee flavac.

1. A. LOBATA D. Don, Prodr. 0. Nepal. 106. - Bib I c. f - Slolonib. reptanlib ; Wl. longe p<tiolaUt rottwdaiis groue deoUIU lobaiitve glabnasculis ^ - Ucrba

- nunc fere glabra, saepius pilis sparsis in rami & cl folijs hispidula Stolones ei axillis foliorum inferorum numerosi elongati Rami florum breves ascendentes v erecili Folia 1-2 pollicis diametro, basi nunc profunde cordata, nunc truncata v cuneata, Ocella inferiora caulibus conformia, superiora subsessilia ovali-oblonga, grosse dentata. Florum spica interrupta 1-4-pollicaris laxiuscula Verticilla in fenestris bifloris ditantibus, superioribus subsexflora approximati Calyx 4-5-fidus, lacinae lanceolatae acutis foliaceis Corolla pilosula coerulea | calycem triplo superans, tubo longe exserto recto, basi inclusis nudis Labium superius brevissimum lacinae oblongae, lobis dimidiatis Gemmae exsertae — Habitat in India orientali, in insulis et dorsibus montium
- 2 A HI PTA>S Linn Spec plant 785 - Ilook Flor Londm II ic - Engl bot t 480 — Blm I c f — Stolones erecti, folia ovata, obovatis, integerrimis T. sinuate caule glaberrimis — Stolones e basi tantum caulis orti cl brevior*, minus foliosi quam in *i lobata* Planities in stolonibus orlae, interdum estolones Rami floriferi erecti simpliciter simplicipedales \ rami subsessiles glabri v facibus oppositis pubescentibus Folia radicalia et stolonum priore, caulibus subsessilia oblusa, basi angustato-cuneata, petiolo dilatato, uinque viridia glabra v. pilis paucis sparsis hispidula, floralia sessilia, laciniae ovatae, basi rotundatae, inferiora flores longe superantia, superiora gradatim minor, saepe colorata, superiora vix calyces excedentia. Verticillastri infirmi remoti, supremi in spicam approximati 0-20-0on Bracteae subnullae. Calyces subsessiles, late campanulati, saepius hispidi, profunde 2-fidi, lacinae lanceolatae angustae i corolla caerulea v rarius rosea, calyce duplo triplo longior, lobus recius, longiuscule exsertus, intus basi piloso-annulatus, limbi labium superius brevissimum lacinae, inferioribus lobis lateralibus ovatis, inlucens breviter emarginatus; Stamina breviter exserta — *Bugula reptans* Moench, Meth plant VI — Illebilis in Europae et in Asiae mediae herbis, in Anglia, Scania, Gallia, Borussia Hispania, Italia usque ad regnum Neapolitanum, in Tauro et in regione Caspica prope Lenkoran
3. A. ORIENTALIS Linn. Spec, plant 785 - Bib. I c 603. f - Estolonosa ascendens piloso-lanata foia, ocellis grosse sinuato-dentatis, basi angustis, floralibus sessilib. late ovalibus ovato-lobatis dentatis, flores superantibus; verticillastri distantibus v supremis approximatis; corollae tubo recto exserto, limbo resupinato — Caules pedales et saepe longiores erecti T. ascendentes simpliciter, ubi folia pilis longis laxis dense lanata v. (In exemplaribus cultis) rarius jilibrati Folia radicalia interdum petiolata, marginibus sinuata, caulibus sessilia, basi dentatis, florum inferiora, basi semiamplexicaulia, saepius grosse lobata, lobis dentatis sinuatis, flores amplectentia, omnia crassiuscula rugosa molliores, res in verticilla numerosi. Calyces subsessiles, profunde 5-fidi, lacinae angustae lanceolatae lineares pilosissimae. Corolla coerulea, tubus calyce subdimidio longior, inclusus nudus, limbus *A replantus*, sed ex torsione tubi exacte resupinatus — *Bugula obliqua* Moench, Meth. plant, 382 — *Bugula orientalis* Mill Diet no. 5. — Habitat in Europae et Asiae regionibus Mediterraneo-Ponicis colibus et partibus siccis, in Hispania, Sicilia, Italia australi, in insula Samo, ad montem lacini radices, prope Damascus, in Cappadocia, in Tauro et in Caucaeo
- 4 A P\RAMIDAE I inn I c - Sm Engl bot t 1270 - Blm I c | - Estolonosa piloso-hispida | glabra erecta foia caulibus approximatis, v potius, obovatis, floralibus lacinae obovatis (loca amplectentibus lacinae p-rimidi His, supremis saepe coloratis, omnibus integerrimis v obscure sinuatis, verticillastri supponitur * omnibus spicalibus, corollae tubo recto exserto, tubo annulato — ||tUr specio exemplaribus in minoribus 4 orientalis vix affinis est, *cd (lonibus ronsanter chstiiKuini (aulis croculis vix simplicipedalis «impU, mtmluin uh f |n fere glabra, saepius minus pilosus Tolia radicalia plerumque non pollicana, floralia quae pariter fere lotium planae occupant mfi non pollicana

superiora gradalim minora, at omnia saepius ultra $\frac{1}{2}$ -poilicaria. Flores in verticillastro numerosi. Calyx 5-fidus, lacinae lanceolatae pilosae. Corollae lubus calyce duplo longior, labium soperius evidenlius quam in *A. replanlc*. Stamina exserla. — *Bugula pyramidalu'* Mill. Diet no. 3. — *Teucrium pyramidaie* Cranlx, Stirp. Auslr. — *A. rupertit* Schleich. mss. — Ilabilat in Europae monlosis urnbrosis, in Scotia, per omnem Sueciam excepta Scania, Oelandia, Lapponia? el in Pyrenaeis, Cebennis, Alpibus Galloprovinciae, Helveliae, Pedemontii, montibus Aprutii, in Daemo monte el in Caacaso orientali.

5. A. CILIATA Bunge, Enura. pi. Chin. bor. 51. — Btb. I. c. OM. t — Estolonosa: caule erecto elongato glabro; Toll, cauliois remotis oratis grosse dentatis membranaceis glabriusculis, margine ciliatis, floralib. infimis conformlib., supremis ovatis aculis integerrimis subcoloratis eilialis; verticillastris spicatis T. infimis remolis; corollae labo longe exserto. 2} — Vix ac ne vix slalura et cbaracteribas datis ab *A. Gnttensi* differt Planla I'/i-pedalis, caule subinde ramoso, internodiis inferioribus longissimis, foliis inferioribus minoribus. Flores spicali in apice caolis, coerulei. Bractee purpurascens. — Habitat in Chinae borealis bomidis ambrosia ad rifulum Ssi-jui-ssy.

0. A. GEXEVENNIS Linn. Spec. plant. 785. — Bth. 1. c. t — Estolonosa: caule erecto piloso; Toll, caulinis oblongo-ellipticis subovalisve, basi anguslatis, inferiorib. petiolalis, floralib, ovatis cunealisve, superiorib. flores vix acquanlib, v. breviorib. omnib. saepius grosse dcnlatis membranaceis, ulring. viridib. sparse pilosis; verticillastris superiorib. spicalts, inflmis dislanlib.; corollae tubo longe exserto. 2l — Planla statura, villosilate el forma foliorum valde variabilis, ui interdum vii ab *A. pyramidal** distinguenda, nonnunquam cliara *A. australi* et *remolae* affinis. In forma vulgaiiore caules ascendenles, 'A-1-pedales, pilis loogis laxls fillosi. Folia radicalia parva, caulina inferiora majora, saperlora gradalim minora, omnia Oacelda, mafia minusTM pilosa et dentibus T. loblt paaela obtusis donata, floralia omnia calyebos longlora, faporlora baat ampUsleaulla, aaepe colorata. Calyces seroi-5-fldi hlnotl. Corolla* e*«ndaMaaiM roseae •. albidae, tubas eoslanter exsertus, Intus annolatuR, llmbi lablom superius bre?e emarginatum •. subintegrum. — *Teucrium Genet ens e* Cranlz, Strip. Auslr. — *A. alpina* Linn. Mant. plant. 80. — Engl. hot. t. 477. - *A. foliosa* Tratt. Arch, dcr Gewaechsk. I. 25. ic? - *A. rugosa* Host, Fl. Austr. II. 120. — *A. multiflnra* Bngc. Enura. pi. Chin. bor. 51. — *A. pijramidalit* M. Bieb. Fl. Taur. Cauc. II. 32. — Lasch in Linnaea V. 413. el auct. plur. non Linn. — *A. alpestru'* DnmorL Floral. Belg. 42? — *Bugula alpina* All. Fl. Ped. I. 45. — *Bugula decumbent* Mill. Diet. no. 2. — *Bugula Geneventis* Mill* Diet. no. 4. — Habitat in Europae et in Asia© Rossicae graminosis mnnlosis etc., in Anglia?, Saecia australi, Gallia, Germania, omni Italia usque ad regnum >ea-polilanum, in Tauria el Caucaso et montibns Tafysch et in China septentrional! baud procul ab urbe Tscban-pchin-shou.

7. A. REMOTA Bill, in Wall. Pl. As. rar. I. 50. et Labial 004. - Estolonosa, basi ramosa procuraben*: ramis floriferis ascendealib. villosis; foil, oblongo-elliplicis ovaiisve, basi anguslatis, floralib. ovalo-cuncatis flores superanlib., omnib. erassulosculis subcoriacei» villosis, grosse paucidentalis; verticillastris remolis f. »°° prcrai* approiimalis; corollae lubo exserto, labii inferioris lacinia infima vix emarginata. 2l. — Ab affini *A. Geneteiui* satis diversa videtur charaderibus dati** Verticillaslri multiflori. Calyx post antbesin inflato-globosus. Corollae violaceae roseae v. albidae graciliorca el minorrs quam in *A. Genrventi*, raricrum con forme*. Labium inferius breviter fmarginatum. — Habitat in Indioc orirntalls provinriis Oude, llurdwar et Kamaon, ad Nagkanda in jugo llimalaycnsi, Dcitra Dhoun, Berali et Mirpour.

& A. OPIIRYDIS Burch. Cat. geogr. pi. Afr. ausir. no. 3700. - Bih. I. c. 005. " BSIIOBOM eracU piloso-hispida: foil, obovalis, basi aogustatis, floralib. ovalii n~~ere~~ ~~sequen~~lib. t. via svperaMib., ^~~mo~~ib. crassiusculis subcoriaceis glabri*

- villosisvc, grosse paucidentalis; verticillastris inCmis remotis, supremia spicalis; corollae tubo calycem aequante, labii inferioris lacinia intermedia bifida. 2|. — *A. Geneventi* et *A. remotae* afGnis, ab hac caule erecto hispido, foliis floralibus lalis et floribus daplo majoribus differ!, ab ilia foliis crassis coriaceis, ab ulraque corollae forma. Flores coerulei?, corollae tubus inlus annulalus, genitalia exserta. - Habitat ad Caput bonae spei.
9. *A. AUSTRALIS* R. Rr. Prodr. fl. nov. Holland. 503. — Rtb. 1. c. | - Estolonosa: caulib. ascendenlib. v. erectis pubescentib. villosulis glabrativve; foil, angustc oblongis, basi anguslalis inlegerrimis sinuatlsvo crassiusculis subvillosis, floralib. conformib. flores superanlib.; verticillaslr is inferiorib. remotis, supremis subspicatis; corollae tubo exserto, labii inferioris lacinia intermedia emarginalo-bifida. % — Ilacc etiam species varietalibus nonnullis *A. Genevensis* similis est, differi foliis praesertim floralibus anguslrioribus longioribusque inlcgrioribus, caule, foliis calycibusque pili* brevibus subadpressig, nee longis laiiis indulis, deniibus calycinis brevioribus. Corolla coerulea, tubus calyce dimidio v. duplo longior, inlus annulalus. — Habitat in Novae Hollandiac herbidis ad portum Jackson et in interiore in planiiebus Coulburn inter ropicicos el in insula Percy.
10. *A. DIEMENICA* Rib. I. c. — Estolonosa humills ascendens: foil, anguate oblongis, basi anguslatis peliolalis v. superiorib. sesailib. inlegerrimis v. •Inuaio-dentalis crassiusculis, floralib. conformib. flores longe superanlib.; verticillastris omnib. remotis; corollae tubo calycem aeqnanle, labii Inferioris lacinia intermedia breviter emarginala. 2|. — Planla bumilior, villotior ei minus erecta quam *A. ausralu.* Folia, praesertim floralia, saepias dentata. Corollae minores, tubus, ut in *A. australianae*, intus piloso-annulalus. An hujus mera varietas? — Uabilal in terra Van Dicmeosi.
11. *A. ACAULIS* Brocchi, Osserv. sulti Abruz. 22. — Rib. 1. c. — Estolonosa: caule brevissimo; foil, oblongis obovatisvc, basi longe anguslalis vix sinualo-deniatis, floralib. conformib. minorib., omnib. glabris pilosisvc; verticillaslr is paucis condensatis; corollae tubo recto longe exserlo. 2|. — Caulcs foliis breviores, vix bipollicares ramosi, saepius hispidi, interdum glabri. Folia approximala, radicalia I'A-S-pdllfcarla T. longlora, floralia angosllora, saepius Integerrima, corollas subaequanlia. Verticillastrl panclOorl. Calyces setsilef, vli •emfquInquellidi, lariniae angustae. Corolla fere pollicem looga, tubus intus pllia paucis •omlannulalus, labii inferioris laclnlae laterales Intermedia parum breviores, dimidio angusliores. — *A. decumbent* Ten. Fl. Neap, (non Thunb.) — *A. Tenorei* Presl, Fl. Sicul. I. XXXVI. — Habitat in Italiae ausralis pascuis monlosls edilioribus, in Aprulio, Calabria el in Sicilia.
12. *A. SINUATA* R. Rr. Prodr. fl. Nov. Holl. 503. — Rlh. I. c. 600. — IlirsuU: caule mulliplici procumbenic; foil, radicalib. peiolo longiorib. floriferisq. sinualis, basi allennialis, verticillaslr is sexfloris; calycib. hirsuiissimis; corollis pilosulis. ^ — Species dlflincliiisima, babitu *A. parviflorae* afflois. Flores parvi coerulei. — Habitat in Nova Hollandia ad Coal River prope porium Jackson.
13. *A. PARVIFLORA* Rtb. in Wall. Pl. As. rar. I. 50. el Labial. 606. | - Estolonosa diffusa: ramis ascendenlib. villosis; foil, late ovalts, basi In peliolum anguslalis sinuaio-subdenlalis, floralib. ovatis subinlegerrimis, flores superanlib., omnib. crassis villosissimis subcanescentib.; florib. minutis; corollae lubo calyce brevior. % — ^olia piliis longiffi albidis mollibus v. (in foliis) rigidulis villosissima, radicalia magna rosulala. Caulcs plures S-0-pollicares. Folia caulina el iloralia semipollicaria v. inferiora pollicaria, suprema vix 4 lin. longa, al flores *ubsuperanlia. Verticillaslr i mulliflori. Calyces vix 2'/4 lin. longi. Corolla pallide violacea, tubus inlus exannulalus, labium inferius calycem parum excedens, vix lalii superiori duplo longius. Genitalia inclusa. Filamcna brevissima. — Habitat in Indiae orientals monlibus Ilimalaycusibui, in Kamaon, ad Simian, Mu*o>ore Illahabad et in valle Jumna.

14. *A. BRACTEOSA* Blh. 1.1. c. c. — Eslolonosa diffusa: rarais ascendentib. villosis; foil, late ovatis, basi in peliolum anguslatis, floralib. conformib. (lores superanlib., omnib. sinuato-dentalis subintegerrimisve crassis villosissimis subcanescentib.; verlicillastris supremis spicatis; florib. parvis; corollae lubo exserto. 2|. — Habitu et villositate *A. parvilorae* affinis, al elalior ramosior. Folia caulina el floralia tnajora, verticillasiri magis approximati. Flores duplo majores, at dimidio minores quam in *A. Genevensi*. Corolla coerulescens?, lubus intus piloso-annulatus, labium superius brevissimum. Stamina exserta. — *A. integrifolia* Hamilt. in D. Don, Prodr. fl. Nepal. 106. — Habitu Mn IS'cpalia.
15. *A. DENSIFLORA* Blh. I. I. c. c. — Eslolonosa bumilis ascendens v. crecla villosa: foil, oblongis ovatisve subcrenalis, basi angustalis crassis villosis, floralib. superiorib. v. omnib. florib. breviorib.; verticillastris spicalis v. infimis vix remotis; corollae tubo calycem aequante, labii lacinia intermedia vix emarginata. 2|. — Affinis *A. parvilorae* el *A. bracteosae*. A priori differt floribus majoribus el verlicillastris approximatis, ab aliera foliis floralibus minoribus integerrimis, ab ulraque caule erectiore, infra spicam subnudo. Folia ad basin caulis approximala. Rarai floriferi 4-6-pollicares. Corollae labium superius brevissimum, inferiorius magnitudine *A. Genevensis*. — Habitat in Nepalia.
16. *A. DECIMBENS* Thunb. Fl. Japon. 383? - Bib. I. c. 697. - Eslolonosa procumbens: foil, subovatis grosse dentalis incisive, basi angustalis glabris villosulisve, floralib. infimis subconformib., superiorib. omnib. bractealibrimib., flore breviorib.; verlicillastris spicalis v. infimis paucis axillarib. distantib.; calycis denlib. oblusiusculis; corollae tubo incluso v. breviter exserto. 2|. — Inter *A. denifloram* el *A. macroperma* characteribus quasi media, habitu ab ulraque diversa. Spica taepius 3-4-pollicaris, verlinillasiri globosi. Folia floralia suprema parva, angusto lanceolau reflexa. Corollae laciniae 4 superiores oblongae erectae, fere aequales, infima 4plo longior. Genitalia «ittrta. Achaenia valde rugosa. — Habitat in Indiae orientali monllbiu Nepataujbt el Kamaoefibus, ad portum Kheeree el in Deyra Dboon et in China.
17. *A. MACROSPERMA* Wall. Pl. As. rar. I. 58. - Blh. I. c. - Eslolonosa erecla v. ascendens ramosa: foil, caulinis amplis ovatis grosse dentalis, basi longe angustalis nicmbraihicis glabris v. parce pilosis, floralib. infimis subconformib.; superioribus v. omnib. bracteaeformib. flore breviorib.; verlicillastris spicalis v. infimis subcremolis; dentibus calycinis oblongis; corollae tubo breviter exserto. 2|. — Caulis 1-2-pedalis paniculato-ramosus. Folia inferiora longe pedicellata, limbo 2-4-pollicari. Spicae 3-6-pollicares. Folia floralia inferiora caulinis conformia al minorum, superiora ovato-lanceolata integerrima bracteaeformia. Calyx rostratus lobatus, denlibus brevibus oblusissimis. Corolla parva, tubus elongatus, ad medium inflatus, intus annulatus, labium superius oblongum, apice bifidum, inferius vix duplo longius, laciniae laterales oblongae, media latior. Achaenia valde reticulata. — Habitat in Indiae orientalis montibus Punduanii et ad Taong Dong monlem Avac.

Seotio II. CIAMAEPITHYS Bth. I. 0. 697.

Verlicillastris 2-, rarissime sub-4-flori. Corollae roseae v. flavae, labio superiore brevissimo truncate

18. *A. LAXMANI* Bth. I. c. - Caule ascendente piloso-lanato; foliis ellipticisve obtusis integerrimis pubescentibus pilosisve, floralibus conformibus; verticillastris bifloris; calycibus aequalibus semi-5-fidis, laciniis oblongis obtusiusculis subaequalibus; corollae lubo incluso. 1|. — (caules simplices, parum ramosi 1-2 pedales crassi, foliis longis ovatis velut. Folia subbipollicaria ampliuscula, inferiora basi angustata, superiora rotundata, floralia omnia floret superantia. Calyces aequales pilosis viridibus, laciniis lubo aequilongis, inter se fere aequalibus v. s. Uteralibus parvis longioribus, in preno tubuloso. Corolla

- fere pollicaris, tubus brevis, intus pilis longis annulatis, labium superius fere evanidum et saepe breviter fissum, inferius usque ad lacinias laterales angustum erectum, lobum elongatum supra medium aemulans, laciniae laterales oblongae erectae, intermedia stipitata latissima reflexo-palens emarginato-bifida, lobis rotundatis. Genitalia lacinias laterales corollae subaequantia. — *Teucrium Laxmanni* Lino. Syst. veget. 430. — *Phleboanthe Laxmanni* Tausch in Bot. Zeitg. 182. 81. 323. — Habitat in Europa austro-orientali et Asia media, in Hungariae Comitatu Veszprimiensis, Transylvania, in Bessarabia, Tauria, Caucaso orientali atque Iberia.
10. A. OBLONGATA M. Bieb. Flor. Taur. Gauc. Suppl. 388. - Blh. I. c. 006. - Caule subrecto pilosissimo; foliis sessilibus anguste oblongis obtusis integerrimis piloso-hirtis, floralibus conformibus; verticillatis bifloris; calycis dente supremo minuto, inferioribus tubo subaequilongis; corollae tubo breviter exserto. — Ab *A. Laxmanni* differt statura foliisque dimidio minoribus, pilis rigidioribus et calycis forma. Kami oppositi longi, plerumque paniculati. Corolla lutea vix minor, tubus longior, labium superius truncatum vix emarginatum, laciniae laterales parvae laeviores quam in *A. Laxmanni*. — *A. talicifolia* Slev. Mém. soc. nat. cur. Mosq. III. 205. sec. Bieb. non Linn. — Habitat in Caucaso, in sabulosis ad Cyrum inferiorem circa ostia rivuli Mussa etiam circa Sallian, in Oriente inter Bagdad et Aleppo.
11. A. SALICIFOLIA Schreb. Unilab. 29. — Blh. I. e. — Sblhrp. et 8m. Flor. Graec. VI. 22. t. 520. — Herbacea pubescens: foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis integerrimis subdentatisve, basi in pedicello brevem angustatis; calycibus lomenloso-hirtis, breviter pedicellatis, dentibus oblongis obtusis, supremo brevioribus — Ab affine *A. oblongata* differt praecipue pubescentia brevi rigida. Habitus etiam (lores fere idem. Calyces majores. — *Teucrium salicifolium* Linn. ManU pi. 80. — Habitat in Oriente inter Smyrnam et Bursam, in Tauria, circa praedium Asamat in Armenia.
12. A. CIAMAEICISTUS Ging. Mss. ex Bth. 1. c. — Suffruticosa: ramis albidis glabrisculis; foliis sessilibus ovalo-ellipticis obtusis integerrimis, utrinque viridibus, tenuissimis, basi attenuatis, dentibus oblongis obtusis aequilongis. — Species distinctissima. Folia pollicaria, calyces semipollicares, basi attenuatis. — *Habia* Pertli.
13. A. IVA Schreb. Unilab. 25. — Bth. 1. c. — Suffruticosa diffusa piloso-hispida; foliis oblongo-linearibus grosse dentatis subintegerrimisve, margine subrevolutis, floralibus conformibus; verticillatis 2-6-floris; corollae tubo exserto. — Ramis numerosis caespitosis foliis 2-6-pollicares. Pili tomentosi plantae rigidi. Folia circiter pollicaria, basi angustata. Calyces sessiles subglobosi, dentibus tubo brevioribus, inter se subaequalibus v. supremo parum brevioribus. Corolla rosea v. lutea, 6-10 lin. longa, extus pubescens palens, lobus intus piloso-annulatus, calyce subduplo longior, labium superius truncatum vix emarginatum, inferioris laciniae laterales oblongae, intermedia latissima, omnes patentes. Filamenta pilosa. Var. *ft. nonnisi* corollae colore differunt. Utraque varietas interdum, at non consumer nec ad omnes auras, moschum redolet. In floribus vernalibus etiam si fertilibus corolla plerumque abortiva est. — *Teucrium ha* Linn. Spec. plant. 787. — *Teucrium motchatum* Lam. Flor. Franc. 11400. — *A. motchala* Schreb. Unilab. 20. — *Moscharia asperifolia* Forsk. Fl. Aegypt Arab. 154. (sec. Willd.)
- ft. floribus luteis.* — *A. Pseudo-Iva* DC. Fl. Fr. Suppl. 305. — *A. Iva* Sblhrp. et Sm. Flor. Grace. VI. 22. t. 525. — nabit in Europae australis et Africae borealis regione mediterranea, ad Mogador, in insulis Canariensibus, in Hispania, Gallia australi, Corsica, Sicilia, Italia a Pedomonte ad regnum Neapolitanum, in Archipelago Graeci insulis, necnon in Creta et Zacyntho, in Dalmatia var. *fl. cum a. mixta*, at in australioribus vulgior.

23. A. TRIDACTYLITES Giog. mss. ex Bib. I. c. 000. - Suffmitcosa diffusa pilosobispida: foil, coneato-oblongis, apice profunde (ridentatis trifidisve, laciniis brevib. ovato-oblongis, floralib. conformib., superiorib. corolla breviorib.; verticillastris biOoris; corollae lubo exserto. 2j. — HABILUS *A.hae*, differt foliorum forma et floribus minoribus. Corolla rosea fidetar. Filamenta pilosula. — ITabiial in Palaeslina, in summo monle Sanctae Gaiberinae el ad pedem monlis Libanon.
24. A. CHIA Scbreb. CnMab. 25. - Sblhrp. ei 8m. Flor. Graec. VI. 21. t. 524. - Dth. 1. c. — Herbacea erecta piloso-hispida: foil, profunde trifidis, lobis linearib. integerrimis trifidis ve, floralib. conformib. corolla tubbreviorib.; verticillaslrts bifloris disinctis. 2} — Ab *A- Ckamaepitky* Yix differre Tidelor nisi corollis duplo longioribus el caule foliisque binalioribus. Yar. *fi. A. Tridactyliti* affinis est. — *A. Chamaepithyt* Guss. Flor. picul. prodr. II. t& — *Teucrium Chium* Poir. Diet Soppl. II. 772. — *fi. minor*: — Habitat in Eoropae et Asiae regionis mediterraneo-Ponticae collibus siccis *ei aprjeis*, in Sicilia, Italia ausrali, in insula Cbio, Archipelagt Graeci ingalis frequent, etiam in Asia minore, in Tauria frequent, *fi. in Syria* prope Aleppo.
25. A. CHAMABMTaTYS Iento*. Unllab. M. - Engl. bot. t 77. - Bib. I. c. - Herbacea diffusa pllota: foil, profunde trifidis, lobis linearib. Integcrrimis trifidisve, floralib. conformib., flores superantib.; verticillaslrit biflorit. 2|. — Gaules numeroti, basi procumbenlet ramotissimi, pilis longit albls mollibus in omni pane r. saepius in faciebus oppositis Testitl, rami floriferi, apice ascedentes subsimplices foliosittimi. Folia ad medium triflida, laciniis folii parli inferiori (v. petiolo di la la lo) aequilatis et fobaequilongis, viridia, margine subrevolula et saepius pilis longis ciliata. Calyces tessiles, nertls pilosis, laciniis lubo parum brevioribus lanceolalit aculis. Corolla flara, exlus pubetceus, vix 0-7 lin. longa, tabus inlut pilosus brefiler exsertus, labium tuperiut iruncatum TJI emarglMtom, Inferlorla laciniiae lateralet oblongae, intermedia obovala emarglnata. Filamenta ~~pilosula. — Teucrium Chamaepithyt Linnaeus, plant 357. — *Bugula Chamaepithyt* Scop. Flor. Car. 24, 74. — *Bugula Chamaepithyt* Link, Handbch. 263. — *Chamaepithyt trifid** *DmmlnMwm&b^iL* — BbKat In Europae mediae ei ausralioris, necnon Asiae Ponticae., Caucati, Taoriae el momium Taljsch siccis sterilibut et ad vias.~~
20. A. GLADRA Prasl, Flor. Sicul. I. IXXV1? - Bib. I. c. 700. - Herbacea glabra: foil, basi dilatalis profunde Irifidis, lobis linearib. Integerrimis, floralib. conformib.; Terlicillaslrit bifloris; denlib. caljeinis lanceolalis obtusis glabris. 2I. — Ab *A. Ckawutepilhy* dlffert praecipue glabritie el floribus duplo majoribus, ab *A. Chi** glabrilie. — *Teucrium laevigaium* Ruts. NaL Hist Alep- II. 255. — Habitat In region* Medilcrranea, in Sicilia et in Syria prope Aleppo.

fttttto ID. PttUtAnSOHILIS Bth. 1. o. 700.

Verticillastrl ft-6-florl. Corollae labium tuperiut inferiore tix triplo breviot. Species Ausiralatleae.

27. A.? YIRGATA Bib. I. c f - Caulib. elongalit Tirgalii subsimplicib.; roll, oblongis, caolinis groste terraiit subcanetcentl-Yillotit, floralib. incgerrimis, ealyces superantib.; Terlicillaslrit ditlantib. 2-6^-florit longe racemosis; eorollte tubo incluso. % — Caulet 1-1'/t-pedalet, pubescentia brevi subcanescentes. FoLU fere *AnisomMt*, inferiora petiolau, tuperiora sessilia, basi angusiaia rugolosa nenrosa 1-2-pollicaria, floralia tempollicaria obtusa, basi vix anguslata villotfora unloenria. Verticillantri fere omnet cireiter tempollicem dislanief. Calyces tab* sesslles fere *Anisometis*. Corolla eliam *Anvomclis*, labiom superius erectum U^ vmarginatum, infehoris terliam part em aequans, sed aniberae omne* aequalei ** In *Ajuga*, locuffs confluenlibus nubuniloculares, nee riimidiatae. Achaenia. . . . ^ — nabiut in NoTa Hollandia inliore ad flu men Lachlan.
- » A.? TRIDEKTATA Bth. I. c. 701. f - Caulib. eloogatit ilrgalis simplicib.; foil-amlinii obloogu pelloUite, flortlib. tetailib. ovalit, apice trifidis, floret tuperan-

lib.; verticillasris dialanlib. 2-0-floris longe racemosls, corollae lubo eiserlo. 3l
 — Caulis fere sesquipedalis aabglaber. Yerlicillasn majorem parlem caulis oc-
 cupant, clrcier semipollicem distantes, fere omnea biflori. Folia floralia semi-
 pollicana. Calyces subsessiles glabn v. lenuiler pobeaceolea campanulali, den-
 libus 5 fere ad medium allingenlibus. Corollae tubas calyce fere doplo longior,
 faax valde dilalala. — Species habilu *A. virgatae* valde affinis, sed calycibft ml-
 noribus, corollis majonbus el foliis floralibus iridenUUs d Is tine la est. — Habitat
 in Nova Ilollandia intenore ad npas flumims Lacblan.

f *Species non satts nota.*

29 A REPEISS Rib. Flor. Ind. III. 3. - Blh I c. - Biennis procumbens villosa
 Folia oblongo-lanceolata, basi in petiolum angustala grosse el inaequahler scr-
 rala. Spicae terminales cylindricae. Bractae oblongae venlncosae quinqueflorae
 (verticillastro decemfloro). — Species robusta diffusa, ramis infenonbus saepe
 radicanlibus. <? — Habitat in Indiae onenlalis provincia Chittagong

ff *Species e genere excludendae.*

A AFRIGANA Pert. — TBUCRIUM AFRICANUM.

A. CAPENSIS Pert. — TEUCRIUM CAPENSE.

A. DISTICHA Roib. — ANISOMELKi OVATA.

A. FRCTICO8A Roib. — ANISOMELES MALABARIGA.

A. fURCATA Link. — CRAHIOTOMR VBB&ICOLOR.

3081. CYMAB1A *Bth.*

(Blh. fii Bot Reg adnoi. no. 1202. et Labial gener. et spec 705. — Meisn. Gener. *
 k ~ plant, rascal. I. 287. II. 106.)

1. C. DICHOTOMA Bib. In Wall. Plant. Asiat. rarior. 1. 04. et Labial. 705. - Foil
 ovals, supra glabrlusculis, vix rugosis; cymis laxis paniculalis, pedunculo gracili
 petiolo 3-4-plove longiore. 5 — Frutex 2-3-pedalis, rami quadranguli tomenlosi
 Folia b re viler pcliolala, ulnnque anguslala crenala, juoiora sublus tomenlosa.
 Pedunculi axillarcis oppositi 1-2-pollicares, dicholomc ramosl. Floret pam, laxe
 cymo^i, cymb racemoso-paniculalis. Bracleae minutae selaceae. Calyces vlx
 ^p^bfioejitea, demnm fataembranicel, fauce ooarctala, dentibus brefiter ovatis
 •eutli/demiini I^UiUsWBabtttflin fMn« tepunnico ad Taqng Done et Segain
 8. C. EL6NGATA BIL *UTifyft&Jim tnJjJB^jfiri* F''¹ densis
 brevier peduncola lffi M m <> ^ Lt m.k\ t ^ M m m / ^ A & * m \$ m * m differt
 ramis elongais demo fONTtoffs, follll^SWPiili^fotfolalM^ne^lai basi roionda-
 lis nervoso-ragoifs, dense^tomenlopU, supra Tlrldibns, "tubtus eaneseniibus.
 Cymae florum numerosae In taeammn eiongaiam termlnalem disposiue. Flores
 majores quam in *C. dichotomo*. Calyces dense lomentosi glandaloso-puneiaU,
 dentibus demum palulis. — Habitat in regno Barmannlco ad Taong Dong.

Genus quoad trlbnm Ineertaun.

3802. HO8LVNDIA *Vahl.*

(Vahf/Bnum. plant I 212. — Meisn. Gener plant vascular. 1. 2B2. II. 191 - Dih
 Labiat gener. et spec. 700.)

1. H. OPPOSITA Vahl I. c. - Palis, de Bean?. Fl. Ow. et Ben. 1. 53. t. 52. - Blh
 I. ca. | _ poll, oblongo-ovalis opposltis. 6 — Fratex orgyalis ramoslssimns, rami
 brachiali, inter folia linea villosa. Folia odorala, bipollicana et ultra, extrorsum
 remote serrala, basi inlegerrlma. Calyi tubulosus sinatu* Corolla alba, calyce
 fere dupU> longior, faux compressiuscula, limbi labium supenus erectum o\atum
 gibbum, mfcrlus hians tnfdum recurvum. Stamina 2 bre\issima, vix longitudme
 faucis, anthers minutissimis slenlibus, 2 corolla longiora anthers rcnformibus
 fuscis. Germ en quadnparlitum. Stylus fill form is longitudme slaminum fcrlillum,
 stigma bifidum. Dacca spuria e calyco facia, magmtudloc *Rtbeos*, subrolunda'
 10-angulata, dentibus cal)cis umbilicata auranliaca pubescens, intus ra\ a 8c-
 mina 4 o\ala in fundo caljcis — Uabilal in (jumcac dumctis Aquapim

2. H. VERTICILLATA Vahl I. c. 213. - Blh. 1. c. f - Foil, lanceolalis ternis. 6 - Caulis fraticosus ramosus, rami tetragoni spirali, loiter pubescentes, supernecanescentes. Folia petiolata indivisa sesquipollicaria, obovata attenuata serrata, basi apiceque integerrima, supra glabra venis obsolete nervosa, subtus pallidiora nervoso-subvenosa, nervis venisque majoribus canescentibus, adspersa punctis resinosis lucidis ope lenis videndis. Petioli breves pubescentes. Panicula minus ramosa quam in antecedent, terminalis erecta brachiata, pedunculi pariales 3-4 similes T. 2 reflexi, reliqui patentes, pedicelli oppositi patentissimi. Bractea minuta subulata sub ramificationibus. Flores parvi, extus villosocanescentes, primo intuitu *Compositae* similes. Calyx et reliquae partes fructificationis ut in praecedente. — Habitat In Senegambia.



ADDENDA ET CORRIGENDA.

- Pag. 0. no. 1. PETUNIA NYCTAGINIFLORA Juts. - Paxton, Magazine of botany II. 173. (o. fc. aen.)
- Pag. 7. no* 3. PETUNIA INTERMEDIA 6. Don. — *mtrembergia intermedia* Paxton, Magaz. or not. II. 210. (o. Ic aen.) — *Ptiimta Nnearii* Paxton 1. c. 219?
- Pag. 7. no. 4. PETUNIA VIOLACEA Lindl. — Paxton, Magai. of bot. 1.7. (e. ic. aen.) — *fi. Atkintiana*: — Paxton I. o. II. 173. (e. le. aen.)
- Pag. 12. no. 33. NICOTIANA SOLANIFOLIA Wipn. — E sectione *Polydicia* removealur et collocanda erit pag. 0. post *N. glaucam*.
- Pag. 13. no. 30. lege: NICOTIANA FASTIGIATA Nees ab Esenb. Delect, semin. horti Vratislav. 1844. coll. p. 3. adnot. no. 6. — Villosa-pubescentis: caule Jamosis[^]imo coarctato-fastigialo;^fJoll. oblongis, caulinis undulatis repandis acuiusculis, basi angustiori ampleclenlibus, inferiorib. basi decurrentib.; laciniia calycis lanceolata acotlusoulls; eorollae tobo cylindraco, calyc© daplo longtarl, aub limbo Inflato; llmbl Uolnlla rotandatit obtulala, tabl expaft tf toa4[^]*B% longlore, focm ertoto. ft ~^vIf. nHmndifolia Lindl. Misc. U 0[^] in |» Mft l« €[^] ~~bot. syst. 22, 12. no. 30.~~ -CrocU in Nova Hollandla S« V t w n CJygiwiWBLA.[^] : r[^] —
- Pag. 17. no. 13 DATURA HUMMATU Brnhrd. — ?. *rubra*: inb?ar. 0. flore pleno. - *Brugnantia Waymanni* Pnton, Magaz. of bou IV. Ml. (o. Ic. aen.) — *Datura (Brugmania) Wagmanni* Steudel — Wipn. Reperu bot ijtt III. 18. (ft)
- Pag. 50. no. 4. HYOSGYAMUS VARIANS Visiani. - Viiiani, Flora Dalmat 1.1. 24. fig. 2. — Idem csse videlur ac *Byotcyamut Canarienti** Kcr. (Reper. III. 20. no. 10.)
- Pag. 21. no. 11/ HYOSGYAMUS PUNGENS Griseb. Spicileg. fl. Rumel. II. S2. adnot. — Caole atricto simpllci pulvernento, foil, seaailib., Inferiorib. pinnaiifldis, segments oblongis acutiusculis diiuntib.; braceis ovato-lanceolali9, basi dissecto-pinnatiQdis; florib. bretiter pedunculalis ocbrolcucis; calyce relicolato-nervoso rigescente, dentib. ovato-lanceolalis acuminato-pungentibus. O — Crescit in Asia nnnore.
- Pag. 22. Spccicbus HYOSCYAMI ignotis addatnr: HYOSnAMIS PINNATIFIDLS Schleichid. — // *purpureut* Griseb. ms« (ex Spicileg. (lor. Rumel. II 52. adnot.)
- Pag. 52. no. 100. SOLANUM CRISPUM Rz. et Pav. — Paxlon, Magazine of botany III. 1. f (c. ic. aen.)
- Pag. 58. no. 158.* SOLANUM SIRINAMENSE Stuedcl, Flora (B. /.) XXVI. II. 764 - Fruticosum incrmc caule glabemmo; foil, bmi-, altoro majore pctiu-lato ovalo >. ovalo-oblongo bre>i acuminato, ba^i inacquilaicrn, altero

- mioore orbfcolato, ntroq. supra glabriasculo, sublus ad nerros subse-
toso-piloso; pedancalis oppoaitifollis; racemis paacifloris. \$ — Crescit
in terra Surinamensi.
- Pag. 07. no. 223.* SOLANTJM STAMINEUM Steudel, Flora (B. Z.) XXVI. II. 704. -
Fralicosam acaleatam: ceale, petiolis, pedunculis pedicellisq. cam ca-
lycib. corollisq. extns stellato-exasperatis, aculeis caulis recurvis sub-
validis, foliorum rectis; foil, oppositis oratis aut oralo-oblongis, ulrinq.
attenuatis spars I m aculeatis; pedancoia rameis racemosis folio brevior-
rib.; antberis elongatis corollam inbaeqantibas. 6 — *fi. subinermes*:
caale parcius aculeato, folls Inermibas. — Crescit in terra Surioamensi.
- Pag. 99. lin. 1 anteponatur: SOLANUM JASMINOIDES Paxton, Magazine of botany
VIII. 5. (c. io. aen.).
- Pag. 100. no. 1. JUANGLLOA PARABITICA Rz. et Par. Flor. Peruv. II. 47. 1184. -
Wlprs. Report, bot. system. HI. 100. — Hook. Botanic. Magaz* t 4118. —
UUoa paratiiea Pen. Enehird. I. 218. — *Brugmantia parviflora* Hor-
tor. — *BrufMamsia floribunda* Paxton, Magax. of botany IX. 241. (c. ic.
aen.) — *Juanulloa auranhaea* Otto et Dietr. Allgem. Gartenzeitng. XII.
pag. 205. f — *SwanaUoia aurantiaca* Hort — *Bruffmaniia aurantiaca*
Hort — 6 — Crescit in Peravia.
- Pag. 115. no. 7. CESTRUM ROSEUM H. B. Ktb. — LHorticulteur oniversel (5. ann*)
1841 Aoot 102. f (0. tab. aen.)
- Pag. 120. no. 44/ CESTRUM AURANTACUM Lndl. Bot. Regist (New Ser.) X., PI.
mlscell. p. 71. — Glabnim: foil, petiolatis ovalib. aculis undalatis; florib.
aeuilib. splcatis; braceis decidols; calyce locido 5-costato, 5-dentato;
corolla glabra infundibnlarl, limbo reflexo; filamenlls basi pabesoeniib.,
denticolo aactis. 5 — Cretcii in Guatemala.
- Pag. 122. no. 1. HABBOTHAJimtJMUiaaOUTIJS Endl. Transact of the bortle
Society UI. 1.1. Iffllew^{fc}HSw.}. ^{Jg}
- Pag. 122. no. a* HABROTBAMNUS CYANEL'S LindL JM> ^ffial. (New Ser.J, Plant.
mlscell. 72. no. 08. — locaoo-tomaAfam^sW orato-oblongis unduia-
lis acaminalis petieellti florili. aggregatis axillarib. pcduncularis; ca-
lycib. basi Yenircosls obtose qainquedentatis irregularib.; corolla cy-
lindracea tranecta quinqaedentata, margine albo-pubescente; staminib.
corollae longitudine; filamentis infra medium villosis. 6 — Crescit In
Peruviae montibna Tangaua prope Loxam.
- Pag. 122. no. 4. HABROTHAMNUS SLBGANS Scheidweiler mss. ex Wlprs. Report,
bot syst UI. 122. no. 4. -* L'Hortientear uniter sel (5. annè) 1843. (c
tab. aen.) — Ramallf folliq. inbtai pabescentib.; foil, petiolatis ovato-
lanceolatis acuminatis; cymis terminalib.; calyce obconico glabro; co-
rollae lacinils acoUs ciliatis. 6 — *B.jmrpureu** Lndl. Bot Regist (New
Ser.) XV., Plant mlscell. 12. et t 43. t - Io Mexico.
- Pag. 147. no. 99.' VERBASCUM WELDENII Braane mss. fi Morelto inSyll. plant, DOT.
a societ. Ratisb. edit 1.108. — Caale (bipedal 1 t redo sulcato lomentoso;
foil, radicalib. late lanceolata obtosls in peuoluni ttonuatis ultra medium
crenatis, caalinis sessillb. eerdatis io acumen longum productls, basin
ersns crenatis; racemo eolitario simplici; florib. 3-4-ois fasciculais,
pedicellis caljee duplo longiorib.; corollis pallid© rubdlis; calycib. to-
meotosis scxpartitis, ladniis lanceolatis aculis. - Crccsit in Italia
prope NoTocomm.
- Pag. W. no. 901 •• VERBASCUM MICRAHTULM Morelto I. c. Itt. - Caule (bipedali)
tereU qaandoque villosu; foil, radicalib. lanceolatis subfalcaUs acuUS
crenolatis, sublus canescentib. petiolatis, caulmis spars s sens inn aogo*
stlerlb, fersoj bajli laiegeirimia; racemo ramoso; lorib. plerumq. 1^
minatis partU saturate taieie; raljeib. tomentosis. ^? - Crescit IB*
Itallae monte VetwteaJlo Schianette.

- Pag. 233. no. 1. SCHIZANTHIUS PINNATUS *fi. humilis* Lindl. - Paiton, Mflgaz. of botany II. 198. (c. ic. aen.)
 Pag. 233. no. 4. SCHIZANTHUS RETUSUS Hook. — Paiton, Magazine of bot. I. 5. (c. ic. aen.)

t *Species mihi incognitae.*

- SCHIZANTHIUS EWAXSIANCS Paxton 1. c. VIII. 171. (c. ic. aen.)
 SCHIZANTHIUS PRIESTII Paxton 1. c. I. 31. (c. ic. aen.)
 Pag. 238. DO. 3. FRANCISCEA LATIFOLIA Pobl. - Paiton, Magazine or botany IX. 73. (c. ic. aen.)
 Pag. 238. no. 5. FRANCISCEA RAMOSISSIMA Pohl. — *Gardogia obovala* Spr.
 Pag. 240. DO. 2. CHELONE OBLIQUA Linn. — Paiton, Magazine of bot. VII. 140. (c. ic. aen.)
 Pag. 240. no. 3. CHELONE LYONI Flsch. - Paxton, Magazine of bot. MIL 900. (c. ic. aen.)

- Pag. 241. 3000. PENTSTEMON *HeritS*)

(ID elaborando hoc genere De Pentastemone genere commentatio, auctore B. WL a Trantretter [Petropoli 1839.4to.] mihi prorsus Ignota erat. Jam in Otto und Dietrich, Allgemeine Gartenzeitung XII. 273-277. exposui, quibus discreparei illius monographia ab enumeratione supra data.)

- Pag. 242. no. 5.* PENTSTEMON ARGUTUS Paxton, Magazine or botany VI. 271. (c. ic. aen.) — Wlprs. Report, bot. iyst 111.251. no. 58. — Caulib. numerosis, basi ramosissimis, teretibus; foliis oppositis subconnatis, superioribus lanceolatis, inferioribus spatulatis obtusis crebre irregulariterque serratis, supra obscure viridibus, infra pallidioribus; calycis segmentis 5 aequalibus serratis persistentibus; corollae bilabiatae labio superioris bilobo, lobis aequalibus subrotundis et subrecurvis, laciniis labii inferioris tribus laevibus coronatis utriusque purpureis, veris appropinquans lacinarum coerulescentibus; siliis bilobis. quibusque in labiis inferioribus inoarratis eodem quinto sterilibus; alioquin in labiis inferioribus declinatorum praeter ad tertiam partem usque barbato; capsula sobcompressa biloculari. 2] — Crescit in Mexico.

- Pag. 240. no. 26. PENTSTEMON SPECIOSUS Dougl. - Paxton, Magazine of botany VI. 171. c. ic. aen.

- Pag. 246. no. 20. PENTSTEMON COBAKA Nutt. - Paxton, Magazine or botany IV. M3. (c. ic. aen.)

- Pag. 246. no. 20.* PENTSTEMON PERFOLIATUS A. firognard, L'horliculleur universel 1844. Janvier p. 265. | (c. ic. aen.) - Wlprs. in Otto et Dietrich, Allgem. Gartenzeitung. XII. 350. — Elatus, tolos molliter viscido-pubescentis; caulibus strictis simplicibus molliter viscido-pubescentibus, infra demum glabralis; foliis oppositis omnibus. »e«silib., inferioribus e basiaequilata elliptico-lanceolatis acuminatis, e medio apicem versus serrulato-denturatis, demum lubcoriaceis glabralis; superioribus late cordatis, IKIM ronnata amplexicaulibus irregulariter serrulato-denturatis v. supreme inlongioribus acuminatis, utrinque molli^o glanriuloio-ptibescens; floribus breviter pedicellatis in terlicilla Mros »ubr.imn«os axillaribus congescentibus; calycis glanduloso-pubescens laciniis laciniv lanroliti« aroti» corollae campanulato-lubulosae, r«tu«i glandulor Inlabuiac labio inferiori ore ad faucem albo-barbato; antheris Rlabris; filamentis stenilicis P^{lc} spaMiulato setulis paucis rverti* in«trurto, quam ft*rtlii Innjsiori. ^ — *P. ronnatu** Drppf IDM. ei Wlprv in Otto et Dietrich, Allgemeine Gartenzeitung. XII. 276. i - Planta sprnosa 3-4-podalis. CJUI* ^trictus pae-nae C)gnae cra^ilie, Irre» molhtr |nloso-i;|jndu|o«u« i%ridus, basi demum glabralu«t pubescentia in partibus* 4iiprnonbu» tlrn-ior plantam

*; PENTSTEMON generis wisseuimi, nee mullius <>> moneo.

cineream refert, habitu *Digitalibu*\$ nonnullis baud dlssimlem. Folia radicalia non vidi, caulina inferiora basi lalissima sessilia elliplico-lanceolata acumioala 3-5-pollicaria, 1-2 poll, lata, medium usque inlegerima, e medio'apicem versus regulariler denticulata, utrinque molliter pilosa viscida, adulla glaberrima, supra nitide obscareque viridia, infra glauca, coriacea. Folia media el superiora sessilia opposita late cordata amplexicaufia, basi coalila connata, longe acuminata, a basi ad acumen irregulariter denticulata, suprema inlegerrima. Folia caulina maxima 5-pollicaria, 3 poll. lala, suprema basi non connata, sed lobi emarginalurae incumbentes, folia basi demum exresceno *amplexicaulia, superiora sicut inferiora utrinque molliler tomentoso-glandulosa viscida, infra canescenlia, juniora apicem versus purpurcomarginata. Flores in foliorum axillis brevissime pedicellati in verliccllasrum 10-12-florura congesli. Calycis parvi fere basin usque quinquiparlili laciniac aequales corolla quadrupio breviores ov.ito-lanceolnac acuminatae intcgerrimae, ulrinque, sed infra parciik, molliter glanduloso-pilosac viscidac, apice atropurpurascenies. Corolla polliccm longa, campantilala, basi, quantum a calyce includitur, in incrassationem globosam atroviolaceam inflata, turn in tubum campanulaium supra venricosum, dorso cocrulescenli-violaceura, infra albidum ablens, lota corolla, sed supra densius obsita esl pubescenlia brevf viscida. Corollao dislincte bilabiaiae labium ia peri us ineflori paullo brevius, laciniis ovalibus oblusis erecliusculif iniegris, labii inferioris laciniac Ires patentes aequales ovalao oblusae, laterales parum reficxac undulalo-plicatae, utrinque glabrac. Faux pilis raris albis obsila est. Corolla intus ad ventrem siriis longiludinalibus alroviolaceis picta, laciniis ipsis pallidis, superinribus subviolascenlibus. Stamina fertilia 4 didynam.i per paria incurvala, anlberac accumbentes corollaeque supra aripresap, glabrac. Stamina inferiora longiora pollen primo maturescenu Filamenl.j g la bra longiora, basi bulbillalim incrassala atroviolacea, infra viridia, nectar dulcissimuni exsulantia. Stamen quinlum sterile inter superiora breviora orilur, labii inferioris laciniac mediae incumbens, Oliforme album, apice luiesceni compreitan spaihalaio-dilalauium, setulis paucis reflexia obaJlum. Ovarlum ovalum glabrum, stylus fillforrais, stamina breviora subaequaos, corollae supra accumbeos. — Species pulclierrima, affinis *P. ovato*, *Digitali* et *Cobaeae*. — Crescit in Mexico, (v. v. c.)

- Pag. W. no. 35. - PENTSTEMON GENTIAISOIDES Lindl. - Paxt Magai. of bot IV. 265. (c. ic. aen.) - var. *fl. Splenden** Paxton 1. c. IX. 175. (c. ic. aen.)
- Pag. 348. no. 30. PKMSTKMON MURHAYAMJS Hook. - Paxlon, Magazine of botany 111. 265. (c. ic. aen.)
- Pag. 248. no. 42. PENTSTEMON CENTRANTHIFOUUS Bib. - Paxlon, Magazine of botany II. 50. (c. ic. aen.)
- Pag. 250. no. 50.* PENTSTEMON RIYULARIS Dougl. mss. ex Traulvelter, De Penlast, gen. comment. 23. — Wlprs. in Olio et Dietrich, Allg. Gartenzeitung XII. 275. — Caulc apice lenuissime pubescenle; foil, opposilis oblongis Inciso-scrralis glabris, inferiorib. subpetiolalis; florib. laxc subpaniculatis; calycis subglabh laciniis cllipiicis mucronaiis; corolla majuscula veulricosa, limbo cilialo; antheris ciliatis, slaminc sclrili fertilia subacquanle barbalo. %. — Crescit?
- Pag. 250. no. 51. PENTSTEMON CRASSIFOLIUS Lindl. - Paxloo, Magazine of botany IX. 107. (c. ic. aen.)
- Pag. 251. no. 50. PKXTSTEMON ARGUTUS Paxt. deletur.
- Pag. 251. posl no. 50. addalur: itt *Sptries indscriptne*.
PKNTSTKMON DKCLSSATIS hougl. m*s.
PKMSTEMON DEMICL'LATI'S Van lloutto.

- PENTSTEMON FORMOSUS Thoms mss.
 PENTSTEMON LANCEFOLIUS Van Houtte
 PENTSTEMON PIBESCENS Van Houtte.
 PENTSTEMON SPLENDENS Van Houtte.
 PENTSTEMON SUFFRUTIGOSUS Dougl. mss.
- Pag 251. no. 1. TETRANEMA MEXICAMJM Bth. - Cels, Annales de Flo re el de Pomonc (2. Sér. 2. Ann) Avnl 1844. pag. 221. f (c. ic. option.) — Hook. BoU Magaz. t. 4070. — *Pentttemon primulinui* Van Houulle, Gatal. des Cultures 1844. no. 18.
- Pag. 252. no. 7. RUSSELLA JUNCEA Zaccarini. — Paxlon, Magaz. or botany V. 75. (c. ic. aen.)
- Pag. 254. no. 1. DIGITALIS PURPUREA Linn. — (var. hortensis *tmperba*) Paxlon, Magazine of bolany X. 20. (c. ic. aen.)
- Pag. 202. no. 1. PAILOWMA IMPERIALIS Siebld. el Zucc. - Paqaet, Journ. d'horlicull. pratique I. no. 3. p. 64. (c. ic. MO.) — Paxlon, Magazine of bolany X. 7. (c. ic. aen.)
- Pag. 266. no. 1. STBMODIA MENTHASTRUM Dth. - *Carim Tumba* Rhccde, Horl. Malab. X. 185. t. 93.
- Pag. 275. no. 9. MIMILIS CARDINALIS Doogl. - Paxlon, Magazine or bolany III. 197. (c. ic. aen.)
- Pag. 275 no. 10. MIMULL'S ROSEUS Doogl. — Paxton, Magaz. of bol. 1.29. (c. ic. aen.)
- Pag. 277. ad finem generis MIMULCS addantur varietcg bjbridae horlenses:
 MIMULLS SMITDII Paxlon I. c. I. 54.
 MIMULLS VARIEGATUS Paxton I. c. 97.
 MIMULUS HARRISSONU Paxton I. c. IV. 173.
 MIMI'LUS MACKLAINIANTS Paxlon I. c. IX. 147. } C* 1C* a ~~ca.~~
- Pag. 335. lin. 15. Icge: AMPHIAISTHUS PUS ILL IS Torrey I. c t t t - Radix annua ibroaa, fibriUte eompreaaia linearibos Caallta breviasimus compressus, aplM ffolonun oMimii Itoaaitin roralan proferent. Folia droller 9 lin. long* otAoM imgra *mla racealenU. Scapl filiformes gracillm! l-1'/i-pollicares compressi, apice par slngolnm bractearum opposiarum ovahum gerentes. Bractcac subsossiles oblusae subsucculontae obsolete (rinenes. Flores minimi, radicales 2-3-ni in pedunculis broibus ~~recurvatis~~, inter folia onundis, terminates singuli inter brae tens subsessiles. **Calycis** qmnquepartiti lacinns oblongis ereclis oblu»i»»imis, minutis»ime glandulosis. Corolla \ix Imeam longa, infra attenuata, limbo dilalato quadnlobo bilabialo, lacinns ereclis rolundatis aubemarginalis, inferior! maxima. Capsula late obcordata eompressa, apice debiscens, ralvis integris convexis. O — Crescil in America boreah (Nekton County, Georgia).
- Pag J50. no. «i VERONKU PROSTRATA Linn. lin. 3. lege: o?ah-lanceol.ali« loco. *Imeari-tanefnlatis* el adde sjnonymum. *V. breticaulu* Tauscb, Sylloge p|. Raliib. II. 247.
- Pag W .iltMiur. no. 114/ VEROMCA TETRAGONA Hook. Icon, plantar, t. 580. - Frolirosa Mibdicnoime ramosa bumilis* foliu arcle quadnfanam Imbricalis otalu obluj»if cannatis, supenonb. basi lanosis; flonbus 2-4-nl» in apicibos ramulorum teifilibus; calycibus quadnpartitis, lacimlf oblongis rigidis cilialu; corollae lubo clongalo, limbi lacinia superlore biflda. 5 — llabilu *Andromeda* Mragonae* ab omnibus hujus genrrii upcirbus recedil. — *Po do carpus? Dittfenbarhti* Hook. Icon, plant. I. 547 — Ad m\ f« perennei in sammo monte Tonganro in >ova Zeeltodia.
- Pag 359. no 116 \KROMCA SKCIOSA A. Coon. - Paiton, Magazine of botany \ 2V> ,r ic. aen) — Harrison, Tbc Agricultural Cabinet No. 135. (May 1844 i p. 97. c lab lilhng. fig 2.
- Pag 368. no. 149 ' \KROMCA APPEN.MNA Tauscb, Sjllloge plant, a sociel. Ralisb. «dit. ||. 947. — Racemo terminal! laxo cauleq. basi repeote glanduloso* Piloio; foil, ovali^ obtutia tuber«nalttia. ^ - Media inter ~~crpib~~ b

foliam et alpinam, ad cujus varietalos referenda esse videiur. — Crescit in Apenninis.

Pag. 368. lin. 27 et 28. deleantur.

Pag. 380. no. 2. MACRANTHERA LECONTEI Torrey, Ann. Lye. New York IV. 80. l. 4. — Caule herbaceo (2-3-pedali) simplici puberulo obluse quadrangulari; foil, ulrinq. glabriusculis, inferiorib. bvalo-lanceolalis opposilis peliolalis pinnaliseclis, scgmenlis integris v. denlalis, supciorib. grosse dentalis, illis ad pedunculorum basin inlegerrimis; florib. in racroum lerninalem congeslis erectis, pedicellis (pollicaribus) basi declinalis, lunc sursum curvalis. 2]. — Calyx subcompanulatas profunde fissus, segmentis subaequalibus lineari-lanceolatis corollae terliam v. quartam partem allingcnlibus. Corolla saturate lulea pollicaris, lin. 2-3 diametro, lenuis subcylindrica incurvata crassiuscula quinque-dentata, scgmenlis ovato-oblongis palenlibus. Capsula brevis ovala acuminata. — Crescit in pinctis Georgiae et Floridae mediae.

Pag. 387. no. 1/ LEPDORHABDOS BREVIDENS Fisch. Mey. et Lalle. Suppl. ad Indie, sem. horl. Pelropolil. IX. 13. — Apice glandulosa: Toll, linearib, superiorib. inlegerrimis; bracleis (lores subaequantib.; calycis glandulosis denlib. ovalis acuminatis, lubo duplo brevioribus. © — Simillima *L. micranthae*, calycis denlibus brevibus bracleisque apiculo albo terminalis ab illa salis differre videtur. — Ad radicem montium AlaUu.

Pag. 405. QO. 10.* EUPHRASIA AZORICA WtUon mss. la Hook. Lond. Journ. of bot. HI. 506. — Herbae annua: caule terell; ramis sulcalis obtuse tetragonis; foil, iriangulari-ovalis acuis, supra rugulosis v. scabrellis, infra rugosis cum maculis verrucaeformib., dense piliferis; corolla alba, macula duplici ampla intus variegata. Q? — Crescit in montibus insularum Flores et Corvo Azorarum.

Pag. 411. no. 5* PEDICULARIS CIEILAIHTIIFOLIA Schrenk, Bullet, de la classe physic, nialhém. de l'acad. de St. Ptsbrg. I. pag. 70. — Caulibus caespitosis simplicissimis; foil, verticillatis bipinnatifidis, pinnulis parvis cartilagineo-dentalis, margine revolulis, subulis glanduloso-scabris; floribus deose mbspiMiii, bracieit foliaceis, inflmis bipidnalifldif,mediis pinnaliQdii; p«lyoib. eaapannUio-oyllndraeets, d«nUb. (ft) ovalis, erenis revolulis crisUIU; corollae Ubo calyces eioedefiU; gale* raeUaseola brevissimc subrostraia edealuU, Ublt Inf«riorls lobls suborbioulails doplo longiore; flamenlis omnib. glabrif; antheris contiguis; capsula lanceolata calyce duplo longiore. 2* — In Soongariae monte Ispuli.

Pag. 411. no. 5* PEDICULARIS PLATYRUYNCHIA Schrenk I. c. -Mullicaulis: caulibus siroplicib. pubescenlib.; foil, verticillatis pinnatifidis, tegmentis oblongo-ellipticis carlilagineo-biserratis; florum verticillis dislanlib.; bracleis pinnatifidis; calycibus lurgidis lanalis, denlib. (5) denliculatis; galea incurva, rostro brevi lalo Iruncalo lerninala, labio inferiore longiore; flamenlis longiorib. duobus subbarbalis. 2} - la Soongaria.

Pag. 411. no. 10* PEDICULARIS VIOLASCENS Schrenk, Bullet, de la classe physico-mathém. de l'acad. de St. Ptsbrg. I. pag. 70. — Caespitosa: caulibus simplicifloris; foil, verticillatis pinnatifidis, segmentis oblongis pccinaio-pinnatifidis, lobis dentalis; florum verticillis remolis lanalis; bracteis irifidis; calycibus inflalis bine fissis, denlib. (A) inaequalibus inlegerrimis; corollae lubo ima basi infra do, galea eroslri Integra oblusa, labii inferioris galea duplo brevioris lobo medio laleralibus minorc; flamenlis duobus barbatis, antheris contiguis; capsula obliqua acuminata calyce subtriplo longiore. 2]. — Crescit in Soongariao alpibus Dsdialyk.

Pag. W. no. 70. PEDICULARIS FRIDERICI AICILSTI Tommas. var. *Vonteneyrina* Ebel, Zwölf Tage auf Monlcncgro II. 48. j i. 2. (ig. a-b. — Caulis simplici ascendente glabro; foliis radicalibus (lalo) peliolalis lanceolato-oblongis pinnatisectis, scgmenlis pinoatipariis, lobis denliculatis carlila^iuc-

- mucronatis glabris, caulinis similib., superiorib. sessilib., foliorum axillis omnib. lanuginosis, spica multiflora densa albo-floccoso-lanuginosa; bracteis subulatis crenatis, calycis qualuor tin. longi campanulas subinflati lanuginosi dentib. quinque lanceolatis acuminatis integris; corollae undecim lin. longae tubo ad labii oram sublanuginoso, galea supra falcala, breviter rostrata, sub apice in dentes duos acuiata, labii inferioris laciniis lateralibus semicordatis subdenticulatis aut integerrimis, dimidiae galeae latitudine, lacinia media subevanida filamentis glaberrimis aut basi sublanuginosis; capsula obovato-oblonga recte mucronata calycem excedente. 2]. — Crescit in Monlenegro, in montibus Sulorman.
- Pag. 433. PEDICULARIS CHEILANTHIFOLIA Schrenk. j
 PEDICULARIS PLATYRBYNCHIA Schrenk. J deleanur.
 PEDICULARIS YIOLASGEKS Schrenk. |
- Pag. 433. legc: RHINAMHLS BIFIDUS D. Don. » PEDIGULARIS CARNOSA Wall. (loco: COMOSA.)
- Pag. 513. no. 2. GOLEUS BARBATUS Blh. — Maund et Denslow, The Botanist IV. I. 150. f — Paxton, Magazine of botany VIII. pag. 210. (c. ic. acn.)
- Pag. 573. no. 2*. LAVANDULA CARIENSIS Boiss. Diagnos. pi. nov. orient. V. 3. — Fruticosa: caulibus erectis foliosis, superne ramosis; foliis pallide timentibus lanceolato-linearibus integerrimis, margine revolutis, utrinque lomeno brevissimo scissis, spicis longissime pedunculatis oblongis viridibus, demum erubescens; verticillatis 10-12-floris; bracteis puberulis reticulato-nervosis subrotundis breviter denticulatis; calycis circumscripti longitudinaliter nectosi hirsuti dente supremo basi truncato, transverse oblongo lobulato; corollae tubo calyce paulo longiore; bracteis terminalibus comosis albidis, spica brevioribus. & — Crescit in Asia minore.
- Pag. 570. no. 1. Uge: POGOSTEMON PANICULATUS loco: POGOSTEMON PANICULATUM.
- Pag. 570. no. 3. addalv ajnon in «B: Pogo*temo% (false Pogonostemon) Auricularia flaskar, Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis X. 1*27.
- Pag. 570. adder IG. POGOSTEMON GRACILIS Hasskarl, Ijii^chrift voor Dalurlijke Geschiedenis \. IG. — (aule credo herbaceo; foliis elliptico- aut ovalo-oblongis, utrinque attenuatis breviter dentatis, superioribus breviter integerrimis glabris; floribus in spica glomeratis paniculatis; «verticillatis dimidiato-secundis aut completis; bracteis oblongis integerrimis» foliaceis; corolla alba minula; filamentis medio albido-barbatis. ^ — In insula Java.
- Pag. 570. adde: 17. POGOSTEMON CRISTATI Hasskarl I. c. W. - Gaulc credo herbaceo; foliis ovalibus ovato-oblongis lanceolatis, utrinque attenuatis serrato-dentatis glabris; floribus subspicatis c nodo singulo, racemulis 2-3 abbreviatis crispatibus bracteatis; corolla alba; filamentis barbatis. % — Crete it in insula Java.
- Pag. 570. add. - H. POGOSTEMON MOLLISS Hasskarl I. c. - Caule erecto herbaceo; foliis ovalibus ovato-oblongis acutis, basi oblique attenuate inciso-dentatis, incisuris serrulato-dentatis villosis; floribus racemoso-spicatis; ipicis antheris terminalibus; racemulis in axilla bracteae foliaceae binis ternisve cernuis bifloris villosis bracteolato-imbricatis 8-12-floris; corolla lilarina; filamentis medio purpureo-barbatis. ^ — In insula Java.
- Pag. 600. no. 4. SALVIA SMYRNAEA Boiss. Diagnos. plant, no*, orient. V. 5. — Frustrum caespitosa caulibus ad scapos ascendentes erectis pumilis a basi floriferis pilis palulis apice nigro-glandulosis (scissis) hispidis reduculis, foliis viridibus, utrinque parce et breviter pubescentibus ellipticis ovatis v. subcordatis, minute rotundato-crenatis; 5-7 verticillatis inter se remotiusculis 4-5-floris; bracteis sessilibus ovato-rotundis aemulatis calyces aequantibus; calycibus breviter pedunculatis pilis apice glandulatis

nigra lerninalis longe hispido viscoso, labio superior! paullo longiori
 Indentato, den lib aequalib, mferion bidental, denllbus omb mu-
 cronalis, corollae calyce iriplo longions coeruleo-violasceniis labio su-
 penore extus glanduhs nigris pedicellatis adperso recto bilobo, infe-
 nons lobis deflexis, intermedio longiore, staminum loculis postenonb
 Inter se connalis 6 — Scapi vix scmipedales, folia circiter pollicana
 6-8 lin lata, corollae magnae sesquipollicares — Crescit in cacumine
 montis Tarlali ad onenlcm Smjrnae

Pag 603 no 17* SALWA CEDRONELLA Boiss Diagnos pi nov orient V 3 —
 Perennis dumosa caulib fruticosis virgatis ascendenlib simplicib gla-
 berrimi*, foil carnosulis glaucscenlib, praeter nervum medium sublus
 ciliaum glabernmis, petiolo basi ciliaio-barbato suffultis, pinnaliscelis
 bijugic, costa brmsiraa, sacpius Infoliolalis, segmcnlis sessilib oblon-
 pis, basi cuncatis obusc denticulatis, iropari majon, verlicillasiris bi-
 llons, rarius Iriflons in racemum laxiusculum dispositis, foil infcrlonb
 lioralib 3-5 foliolatis sessilib minulis, calyce >ix longiorib, supcrlonb
 braclci* ovaiis acuminalis mlegris peliolulo basi suffultis, pcdicellis
 brcmssimis. calycis glabri ncrvosi labns aequilongi», supenon brevis-
 sime tridenticulato, inferioris dentib. bins lanccolalis, omb acumi-
 nato-spinulosis, corollae calyce dupio longioris (flarae) labio iupriorl
 cxlus hirsulo recto obluso emargioalo, inferiorif Irilobi lobis reflexis,
 laieralib mimmis, intermedio subretuio ad medium plicalo, anlherarum
 connective poslice dilatalu, looolis connalis 5 — Habitu folusque re-
 vert *Cedronellam (rtphyllam* — Cretelt In collibus ad urbem Demslcb
 et ad radices cacuminum onentaliom Cadmi

Pag 003 no 17 •• SAI VIA DRACOCEPHALOIDES Boiss 1 c 4 — Percnms, tola
 pihs brevib adprestitis tomenllo-asperula caulib fruticosis Mrgalis
 foliosis erect is subsimplicib, foil pinnatipartitis sublnjugis, parliliomb
 integirrimis, fuliorum infenorum obovatu> oblusis»imis, supenorom ob-
 longis, omb bnsi in peliolum attenuate, supra glabrescentib, sublus
 cinrcascentib. subencmis, nullo modo rugosis, floralib simplicib ob-
 longis acuilntculis, veniclllafrot tuperantib; vertfcillasru 4-0-Tons
 termnalib dliUnllb.; ealycls campannali adprette eaoeaeantis bila-
 biali labio superiori ioUgro, Inferiori br#rlorl bidental, denilb OTalif
 oblusis brr\iicr mncronulalls; corolla....T 5 — Forsan melloa *Byrne-
 nosphans* adnumeranda — In Persiae borealis deterto Seidkhodjl

Pag 603 no 19 * SALVIA SPIRAEIFOLIA Boiss I c 5 - Suffruticosa ramii
 abbreviatis erclis foliosis glabns, foil pinnatiscelis, pcliolo ciliaio suf-
 fullis, segmentis sessilib oblongis deutalis, utnnq doobui, terminal!
 multo majon, omb aculiusculis, utnnq, praecipue sccus nervos ad-
 presse hirtis concolonb, dentib ascendenlib, spicis broviter peduncu-
 latis e 3-4 \erluillastris 3-G-Hons remotis constantib, folns floralib
 sessilib inangulari-acuminatis, caljces non aequantib, caljcb cam-
 panulalis, pcdicello eis brevion suffultis, ad nerves sub lento Inrhlo,
 labn supenorts denlib iribus mmimis, infenons Inangularib, omb
 ocunnnalih, corolla calyce tnplu longion puberula ^ — Afhnis .S ro-
 taefohae el suffrutcotac — Crescit propo Aleppum

Pag 004 no 22 * s m i A CADMICA Boiss Diagnos. plant no\ orient V 0 —
 Frutiulosa nespiloj»i caulib reductis ad scapos ascendinUs credos,
 ul pirieji flonftra« omnes pilis patulis apice glandulos^ longis lla\u»-
 cenlib hi^pidos, foil lomentello-gnscis praetereaque pirce «landuloso-
 \iscosis», sulitus rugulosi*, pedunculo lnr>ulo ra aequmti sulTullis «b-
 longis oblusis, bin rolundalis relusis^e minute tl roliindatitn crrnulalis,
 «aopius indiMsis nnus 2-4 sepmmllis panis petioluhiis o>atis ad Insin
 hmbi aurlis setpo ftrc a basi 6-8 \erlicillasros J-I-Iloros mtir^r n -
 molos fercnlc, bracltii o\alis sessilib, basi cordalis Irtvissimc auc-

uuatis; calyce longe hispido membranaceo, tandem ample campanulato, labio superior! paullo majori, apice truncato edentulo, inferioribus denticulatis ovatis aculiusculis; corolla calyce plus duplo longiori alba, labio superiori eilius hirsuto recto truncato subretuso, inferioribus lobis relictis intermed. 10 latiori longioribus; antherarum loculis posterioribus. inter se connatis. % — Folia 1-1 1/2 pollicaria 8-12 lin. lata. — Crescit in regione alpina montium Cariae.

Pag. 613. no. 51/ SALVIA POLYADEKIA Boiss. Diagnos. plant, nov. orient. V. 7. - Caule quadrangulo erecto, superne subnudo paniculato, papillis brevissimis parvis albis obsito, caelerum glabro; Toll, coriaceis, inferioribus breviter petiolatis ovatis, basi rotundatis subcordatisve obsolete et irregulariter sublobatis, lobis rotundatis obtusissime crenatis, subtus nervis albis reticulatis glandulisque rufis creberrime adspersis, praeter papillas albas secus petiolum et nervos sitas glaberrimis; Toll, in intermed. nullis. rotundatis, basi cuneatis, floralibus ad basin ramorum pedicellorumque sitis minima triangularibus acutis; verticillatis* disianibus. 2-5-floria; pedicellis calyce paullo brevioribus bracteis multo superantibus; calyce campanulato, glandulis sessilibus creberrimis adperso, secus strias longitudinales valde papilloso, brevissime bilabiale, labio superiori Ir-, inferioribus bidentato, dentibus triangularibus spinulosis, superioribus brevissimis, inferioribus longioribus; corolla calyce plus duplo longioribus, lobo incluso, labio superiori falcato, apice longo papilloso-lanato, labii inferioris lobis lateralibus parvis oblongis erectis; connectivis poslice valde dilatatis extremitate callosa connatis. % — Canes pedales. Folia 4-pollicaria, 3 poll. lata. Corolla alba? — In Persiae provincia Irak-Adjemi.

Pag. 614 no. 56/ SALVIA REUTERIANA Boiss. Diagnos. plant, nov. orient. V. 161 f — Caule humili herbaceo pyramidato-paniculato, basi papillis albis, apertis glandulis parvis pedicellatis hirsutis; foliis radicalibus parvis, e basi rotundatis oblongis* oblongis cuneatisve nigrescentibus, uirgatis pilis cripiis hirsutis, petiolo longe et eripite papilloso auctis, caulibus inferioribus sessilibus ovatis, superioribus ad basin ramorum bracteis ad verticillatos basin silis amplius b) antheris membranaceis albis tenuiter denticulatis, margine breviter ciliolato-asperis rotundatis ovalibus breviter arummalis; verticillis* 3-4-floris subdistantibus; calicibus membranaceis subtentatis albidis breviter glanduloso-puberulis praeterea ad strias papillis raris obsitis, longiusculis campanulatis longiusculis bilabiolis, labio inferiori bidentato, superiori tridentato, dentibus lanceolatis unilobatis erectis, lobis inferioribus longioribus, intermedio lobis superioribus brevissimis; corollae albae calyce paulo longioris puberulae tubo (cuius sub fauce non verrucosus, labio superiori subincurvo compresso, inferioris lobis lateralibus oblongis erectis; connectivis poslice deflexis membranaceo-dilatatis extremitate callosa connatis. % — *AS. spinotadiffertfoliis* floralibus bracteisque aroplissimis cum calicibus alio membranaceis nec conarctis, calicibus stentatis, internodiis calycinis longioribus, nullo modo spinosis, «superioribus brevissimis. — Crescit in Persia prope haphan.

Pag. 614. no. 56." SALVIA MAGROSIPION Boiss. Diagnos. plant, nov. orient. V. 11. I — Caule elato quadrangulo, superne subnudo parce paniculato-ramoso, papillis sparsis obtusis; foliis inferioribus parvis ovalibus obtusis, breviter petiolatis dentato-lobatis rugosisque, tomento papillarum denso utrinque cernis; ramis paniculae lenibus elongatis foliis floralibus bracteis* basi ovalibus acuminatis longe acuminalis parce papillosis, his calicibus brevioribus; verticillis* 2-4-floris remotis, calicibus longe tubulosis siccatis tenuiter striatis papilloso-asperis, secus strias papillis crassioribus oblongis bilabiale, labio superiori in-, inferioribus bilabiale, denticulatis lanceolatis longe subulatis subsplensibus praeter intermedium lobis superioribus paulo brevioribus omnibus lubaequalibus; corollae albae parce papillosae

- tubo cylindrico calyce longior, labio superior! vix incurvo obtusissimo
2]. — *Gaulis scsquoipedalis*, folia bipollicana, pollicem lata — Crescit in
Persia australi inter Fasa et Chirazi.
- Pag 611 no. 61/ SALVIA TMOLEA Boiss. Diagnos. plant, nov orient V 9 —
Perennis caule herbaceo elato quadrangulo, parce folioso, superne
pamculato -ramoso, ut inflorescentia lola viscosissimo; Toll radicalib
longe petiolatis lenuib >n rugosis, parce albo-lanalis vindecentib
oblongo-lanceolatis, basi allenuatis profunde lobalis, lobis irregularib.
obtusis crosso-dentatis, foil caulims sessilib oblongis aculis acute den-
talis, bracteis late ovato-cordatis acuminatis calyce paullo breviorib ,
verticillastris numerosis 3-6-lons remolis, calyce breviter campanu-
latov iscosissimo, calycis labio supenon indentato, dente intermedio
brevissimo mutico, inferon bigdo, omb spinuloso-mucronalis, ro-
rollae calyce triplo longions labio supenon incurvo falcato glandu-
losissimo coerulco, inferon albo; connecivorum extremilate mica
abrupte dilatata undentalata calloso-connexa. 0]. - Folia inferora semi-
pedalia, poll 2-3 lata. — Crescit in rupesibus regionis alpinae Tmoli
supra Philadelphiam.
- Pag 015 no 02.* SAL VIA CHIOJVAISTUA Boiss. Diagnos. plant, no?, orient. V. 8.
— Perennib caule valde elato, basi folioso, superne nudo ramosissimo
pamculato (ni pamcula), tolo pilu brevib. viscosissimo; foil utrinq albo-
lanaus non rugosis lineari-lanceolatis elongalli acutis inlegens v obso-
lelissime deniculatis, basi rotundatis aai in petiolum brevem allenuatis,
caulims sessilib.; pamculae ramis elongatis virgalis; verticillastris 0-8-
flons remolis, basi bracteis ovalo-tn angular ib. mucronalis pedicellos
vix superanlib. suffultis, calyce campanulas breviter viscido nenoso
albido, breviter pedicellato bidentato, denle medio labu superioris bre-
vissirao, omb broiler spinuloso-mucronalis, corollae amplac nnae
hispidulae calyce plus duplo longions labio supenon falcato incuno
obtusio, connecimb poslice abrupte dilatatis unidentatis calloso-con-
nexis ^ — Folia radicalia semipedalia et ultra, pollicem aut scsqui-
pollicem laia. — Cretou ID Garia ad meridiem Cadni.
- Pag 010. no. 03/ SALVIA Fit W ID A Doiaa. Diagmtt. plank nov. «rienUl. V. 10 t -
Pumila berbactea: caule nudo, a basi paatoalate—ramoM Bjraoildalo, cum
inflorescentia tolo viscosissimo; loll, rugosis Una brevl saepe evanes-
centi superne vestitis peliolaus ovatis, basi subcordatis obtusis, margine
lobatis, lobis parvis roiondatis obtuse dentieulatis; verticillastris 3-5-
flons inter sc remolis numerosis, bracteis ovato-rotandis sessilib acu-
minatus, calyce breviorib. suffultis, calyce brevi campinulato nenoso,
pilis viscidis brevib. hispido, praeterea glanduloso-punctato, labni
aequilongis, supenon indentato, dente superiori brevion, inferon bi-
dentato, denlib. omb. spinuloso-acuminatis, corollae coeruleo-viola-
ceae glanduloso-punctatae parvae lubo calycem vix aequante, labio su-
penon incurvo bidentato falcato, inferons lobis deflexis; connecivorum
evtroiiate postica abrupte dilatata unidentata calloso-connexa ^j. —
A S I *erbaictfolta* differt minulis folis subrotundis, flonbus dimidio mi-
noribus, calycis longius spmosi dente supenon brevior et lubo corol-
lino calyce brevion — Crescit in regione alpina Canae in tadmo
orientali supra (olossam)
- Pag 017.no 08' SALMA IYPOCIHONAEA Boiss. Diagnos plant no\ orient V
8 — Caule tubsimplici quadrangulo breviter tomentello, in feme folioso,
foil omb peliolalis, basi truncatis o\atis obtusis irregulariter crosso-
sublobalis non rugo\is, superne tomentelli^, inferne ni>eis, >crlicillastris
subsexflons disantib , bracteis o^alo-rotundis concavis, breviter acu-
minatis, calyces aequanlib cams, calycis campanulati Mmn ||sr|-
duh, ad slnas praccipue pubescentis bilabiati denlib labn inferoris

- lanceolato-linearib., superioribus brevibus subrecurvis, ID termed 10 brevissimo, omnibus aculis, corollae calyce duplo longioribus tubo incluso, labio superiori falcato compresso, inferioribus lobis lateralibus oblongis erectis, connectivis postice dilatatis, extremitate callosa connexis. 2. — Caulis pedalis. Folia 4-5-pollicana (cum petiolo), 1-1 1/2. poll. lata, corolla pollicans. — Crescit in Persiae borealis monte Seidkhodji.
- Pag 653. no. 200.* SALVIA SCROBICULATA Meyen, Reise um die Erde II 45. - Wlprs Nov act. acad. caesar. Leopold. Carol. XIX. Suppl. I 374. f — Folia cordatis oblongisq. obtusis crenatis, superne scrobiculatis, inferne incanis rugosis, flonibus racemosis oppositis ebracteatis, calyce indentato tomentoso; corollae tubo longe exserto, apice bilabiato, extus canescens lomenoso luteo, intus glabro coccineo ^ — Caulis erectus herbaceus nivo-tomentosus pulverisque calcareo ubique adpersus. Folia petiolata opposita cordata oblonga obtusa crenata rugosa reticulato-venosa, superne scrobiculata, inferne incana, utrinque calcareo-pulverulenta, petioli lineis 2 longi, lamina 4-8 lineis longa, 3-1 lineis lata. Flores racemose oppositas pedicellatas. Calyx campanulatus tomentosus pulverulentus, demum bilabialis, labio superiori triangulari acuto integro, inferiore aequaliter bifido, ideo subaequaliter indentatus. Corolla longa tubulosa, tubo gracili rotundo, excluso sulphureo tomentoso striato, apice bilabiato, labio superiori breviori, breviter bifido, lacini rotundatis obtusis, inferioribus longioribus porrecto rotundato, magis minusve tuncrenato, faucibus nudis. Filamentum puberulum, antherae lineares acuminatae basifixae, connectivo basi latiore. Achasma otoides Inquelra glabra. — Crescit in Peruviae Caropo Grande de Arequipa.
- Pag 664 no 2M * SALVIA BEATIUMIATA Gardn. et Fielding, Serlun plant 1.10 t — Caulis fruticosus erecto dichotome ramoso; ramosis densis foliosis, foliis breviter petiolatis ovalo-ellipticis obtusis, basi rotundatis v. vix cordatis serratis, utrinque flabris, aequalibus. oralibus aculis deciduis; ramosis brevibus. pubescentibus, verticillatis 4-8-floris; calycibus tubulosis pedicellis villosis, labio superiore magis donlibus labii inferioribus ovatis aculis, corollae calyce fere duplo longioribus lomenosis, tubo longe exserto, labio inaequali, gemmalibus inclusis, connectivis postice lineari deflexis, longitudinaliter connatis, stylo piloso. — Frutex 2-4-pedalis, rami dichotomi, juniores dense tomentosi. Folia circiter sesquipollicana, pollicem lata, nervaria multo minora. Flores coccinei, excluso lomenosi subbipollicari. — Crescit in rupe inbus montium dos Orgãos in Brasilia.
- Pag 664. no 254.** SUAVIA RIVULARIS Gardn. lib fl Brasil no 577 - Gardn. et Field I c i 20. — Suffruticosa ramis petiolisque tomentosis, foliis peltatis oblongo-lanceolatis, utrinque altius longe acuminatis acute serratis, acumine integro, utrinque piloso-pubescentibus, floribus deciduis; racemosis simplicibus, verticillatis 2-6-floris, calycibus tubulosis pedicellis villosis, labio superiore integro, inferiore bifido, dentibus brevibus; corollae calyce plus duplo longioribus, excluso leviter pubescentibus, tubo longe exserto, labio superiore erecto, inferiore dimidio brevioribus, lobo medio integro, gemmalibus exsertis, connectivis postice hinc lineari deflexis longitudinaliter connatis, stylo subglabro ^ . * Herba J-J-pedalis. Folia 4-5-pollicana 12-10 lineis lata. Corolla coenae bipollicaris. — Crescit in Brasiliae montibus dos Orgãos
- Pag. 664 no 254.*** SALVIA MOMENTATA Gardn. lib fl Brasil no. 578 - Gardn. et Field I c (adnot. - Suffruticosa ramis erectis quadrangulatis petiolisque puberulis, foliis petiolatis ovalo-ellipticis acuminatis apiculatis, basi acutiusculis, utrinque glabris, flonibus deciduis, racemosis simplicibus; verticillatis 2-6-floris, calycibus campanulatis valde nervosis ad nervos pilatis, tubo superiore integro dentibus labii inferioribus brevibus

aculis, corollis calyce vix dimidio longioribus citius pubescentibus, tubo
 \encoso subexserto, subaequalibus, mfcens lobis rotundatis, ge-
 minalibus inclusis; connectivis postice deflexis longitudinaliter connatis,
 stylo barbato — Crescit in Brasiliæ montibus dos Orgãos

- Pag 077 no. 301 * SALVIA 1A EREAIOP111LA fici & Diagnos. plant, nov. orientalis V
 12 t — SulTruticosa, pilis palulis lora bipida canescens ramis creciji*
 abbrevialis, Toll parvis peliolatis oblongis pinnalibus Clit, segmentis mi-
 liimis crispo-plicalibimib remoliubculib, inter be villo connexis, floralih
 inferioribus conformibus, superioribus minutissimis pedicello multo brevioribus
 oblongo-linearibus integris longe ciliatis, \rlicilljblrib 4-0-11 ons in r.i-
 c emu in oblongum approximate, calycibus pedicello selacco cib aequi-
 longo suffultis cum co dense longeq albo-bipidip campanulas br\iler
 bilabialis, labns obtusissimis, superiori minutissimis Indenticulato, din-
 hb conimnib, inferiori obliquo breviter bidentato; corolla. ' 2f
 Ocsil in debilib Persiac australis.

- Fig 077 no J04 " SVLMA SAMOL1>AEFOL! \ Boiss Diagnos plant no\ oicnl
 \ U {- — Fruticosa lora bumih ramosissima ramis glauciscentibus pu-
 berulis, full minutissimis, petiolo brevi suffultis jn^u&lo linearibus pccii-
 nalo-pinnalilobalis, lobulis minimis conliguis ovatis, margine convolu-
 tis, surbum regularior comphecalis vermicularis, racomis Oofens tenuibus.
 elongate, vrlcillasns approximate 2-4-floris; bracteis minimis \aus
 li2>idib integris; calycibus. pedicello gelaopo reflexo ipsos subaequantibus
 suffultis longe plumoso-bispidis campanulatis bilabialis, labio buperior
 in-, inferiori bidentato, dentibus omnibus subaequalibus. inaogulanibus. ucuiibus,
 corolla calycem parum excedente. 2|. — Caules 4-5-pollicares inlecati,
 folia cum petiolo vix J lin. longa, 'A lin lala — Lrcbtit in dscrilib ad
 binum PcTMCum

- W 077 no J04 " * SALM V MACILENTA Doibb Dugnob plant nov orientalis \
 1J t — 1^> bulTruiliOla glabrescens, glandulis rufis bCbiilib. crobri-
 n<Kp(r>n, r.unoMsMina rann> \indib >inciis (reelis virgatis) subnudis,
 foil raribus minutissimis petiolatis oblongis lobulatis-dentalibus, lobulis ir-
 regularibus. ulrinq. 2-3 oblongis, floralibus. tquamacforiub. \ix peropiciis ob-
 longis loicgris acmis; floribus. in verticillatis paeos remoiusculoi bi-
 llos ad apicem ramorum disponentibus; calyce pedicello seueo recuno
 cum bubacquanto suffulto pilis lodgiaimib palulis plumoto-bipido bre-
 viter campanulato bilabiato, labio superior! Iri-, lorenori bidentato,
 dentalibus brevibus. lalis inangulanibus. mucronulatis, labn rrioris paullo lon-
 gioribus, corollae calyce duplo longioribus lubo subexserto; connectivis
 postice brevioribus non incrassatis loculum cassum ferentibus. 2|. — ||a-
 bilibus *Stachydis gluhnotae*. — Ad radices montium in regno flabcaicim.

Fig. 079. lin 0 10 cl 11 delcanlur.

- Pag. 670. no J10. SALVIA UU11ENICA Weinm. Observ. botanic, p. 55 no 10 -
 Foil, in fen on b petiolatis cordatis aculis repandis, inaequaliter crenatis,
 supra glabris, Hublus pilosulis reticulato-venosis; spiels virgatis. bracteis
 ovalo-acuminalibus, calyce brevioribus. 2|. — Caulis subramosus iciragonim
 hbiulosub pilosubculub 1-1'A-pedalis. Folia inferiora petiolata late cor-
 data v cordato-oblonga, sinu baseos aperlo, acuta, 2-2'A-pollicana,
 sebbipollicem cuciler lala, surama sessilia cordata-acumioata Vor-
 luilljsiri bubromoli utplunium quadflon. Bractcae ovatae, inferiores
 aLummalae, bupnorc3 acuiac vmdes v. margine cocrulco-coloraiao
 Calyx piloso-glandulosus bilabiatus, labio sxipenore bidentato, dentalibus
 brei>iniibus, inferioribus bidentatis, dentalibus acummalibus Corolla coerulea
 ultra hemipollicans, labio superior* forniralo glanduloso-pilo*io slimina
 includit iite, iifcnoro inlobo, lobo iiiUinudio magno rotundato ^hbro
 Si>lus bilidu*) parum i \brriis - (l.idim foili ar .S *Sifluslm* linn*
 (f bupi | p i^ i)ii. no ^J | i UMII in luiboM> 1 imboruu

- Pag 685 no 7 * 7IZ\PIIORA CLEOMOIDES Bois* Dingnos plant, nov. orient V 14 — A basi ramosa ramis erect is simplicib fohosis induralis, foil ovalis sessilib , basi rolundalis aculis, exitnie nenosis, pracler indumentum pruinoso sub lento solum manifestum margine longe cilialo-peclinais, bracleis folia magnitudine forma et indumento omnino referentibus ovalis aculalo-acuminalis rubescens in spicam elongalam imbricalis, flonb sessilib , cal>ce lubuloso bracteis occullalo, sub lente pruinoso praelerca parce bispido glanduloso-punctalo, corolla magna purpurea hirtella caljcc duplo longior. O — Herba 4-8-pollicans, folia et bractea 0-8 lin longae, 3-4 lalac, corolla 8 lin longa — Crescit in collibus SICCIS ad radices Mesogis supra Sardes.
- Pag 087 no 1 mSTROPOCO> ERIANTHIS Bib. delcaUir, est emm CUMINIA ERIAMHA Colla - Cf Pag 840.
- Pag 088 lin 5 B1STROPOGON ORIGAMFOLIUS B Webb, Fl Canar t 150.
- Pag 003 no 1 * ORIG4MJM LIUA>OTICUM Boiss Diagnos plant nov orient V 14 t — Glabrusculum caulibus elongatis, basi decumbentibus, superne panicato-ramosis; foliis ovatis obtusis subcoriaceis glanduloso-punctatis pallide Mrentibus; infrenob breviter pcliolalis, superioribus sessilib; spiculis ad ramorum apicem oblongis solitarius 2-3-nis\e nutantibus * bracteis ovato-rolundis brevissime mucronulalis coloratis, caljcc duplo longioribus , caljccis glaberrimi ad tertiam pariem usque hilabiati labus ad basin usque , superiori In-, inferiori bidentali«», dentibus labu superius otatis obtusiusculis, inferioribus brevibus dimidioque angustioribus lanceolatis aculis, fauce parce hirtella, cojollae caljcc plus duplo longioris gemmalibus longissime exsertis. 2l. — Caulis sesquipedales, folia inferloria 5-0 lin longa, 4 lata — (resell in monte Libano Synae.
- Pag. 600. no. 0.* TIHMIS SIP1LELS Boiss. Diagnos. plant, not orient V 10. t — Saffruicofus hamillt caetpitoiat rtmoimimuf: ramis leniub erectis, taferne nodlit, toperae bravUilae tomenellili; Toll, minimi! gUbrit ant brevissime pnberritit ngldis patallis testillib. cllicicm obtentis subcanaheculatis parce glanduloso-punctatis, subtus nenosis, cis ramorum steriliu drnmatis, floralibus similibus rnyres non acquantibus , capitulis ternunilib o>atis drnsmseculis raullifloris, ralycis pedicello an adpresso rum ^ubacquanle suffulto, pilis sparsis hirtis, caelerum glabrescenti campanulato neno<o, ad medium bilabialo, labis acquilongis, superiori usque ad medium in denes duos subulalos cilialos dmsso, fauce pilis clausa, corolla alba hirtella caljccm non superante 2f — *Th decuuatus* differ! folium longioribus tomentellis, capitulis paucisimmiQoris, cal)Cis lomcn-Ich labio superior! brevioribus, dentibus brevissimis< mulicis — Crescit ad basin rupiura calcareanim montis Sipyli supra Magnesiara
- Pag 000 no. 11.* TinMLS TEUCRIDKS Boiss DiiRnoi pi not orient V. 15 t — Perennis iuffrucicowm ramis basi repentibus, dein erectis laiuscolif; full broissime puberuhg, pcliolo cis subacquilongo suffultis **ovato-rhombeis**, IHM subtruncalis, margine moluit obtusiusculii **crassius**, subtus crebre glanduloso-punctatiff, floralibus conformibus pcliolo brevioribus , flonb in aillis superioribus 2-0, ^erlicillastroH remolos formantibus, pedicello caljccm aequante suffullis, bracicolis oblongis pedicello brevioribus, calyce brevi campanulato sub lente pnunoso, ad medium uiqu° bilabialo, labu superioribus paullo brevioribus dinhb tribu* triangulibus brevissimis lalis mucronulalis, inferioribus dentibus c basi lanceolata subulate cihatK, fauctMalde albo-barba(a, corolla rosca ampla hirtella, cal)cc plus duplo longior t ^ — *Th yraiolen** Sblhrp et Sm Fl GrafC-11 01 t 570 ncc M B) - *Th Pterella* Bth ex p - In (raccia tep-tentnonali credit
- Pag 702.no S3 * TinMIS KOTsUHAMh Boiss Diagn pi nov orient V !• t — SoffruUcotot caetpitosus ramosiMimas. ramis leniub. foliosis, ^H

pedicellulis ovato-rotundis, basi rotundatis irregularibus obtusiusculis, inferne 5-7-nerviis glanduloso-punctatis, floralibus conformibus. calyces vix superantibus; verticillas tribus multifloris in capitula ovalia subinterrupta terminalia aggregatis; pedicellis fasciculatis ramosis, bracteolis subulatis basi suffultis; calycis campanulati glandulosi hirtelli ad medium bilabiali nervosi labio superiori paulo longiori, usque ad laciniam partem in tres denes acuminatos diviso, inferiori usque ad basin in duos denes subulatos diviso, denibus omnibus ciliaribus, fauce pilosa, corolla alba calyce parum longiore. 2l. - 'a. Tota brevissime lomentellus. — 0. Tota glaber nilidus. — Crescit in regione media montis Gara Kurdistaniae.

Pag. 702. no. 23.* THYMUS CAPPADOCICUS Doiss. l. c. 17. t - Caulibus basi lignosis procumbentibus caespitoso-ramosissimis; ramis cretibus brevissimis approximatis pubescentibus dense foliosis; foliis linearibus, margine convolutis obtusis, basi ciliatis strictis, floralibus conformibus, calyces superantibus, axillis fasciculiferis; floribus paucis ad apicem ramorum in axillis superioribus capitalibus; calycis glabrescentis labio superiori latis-siruo, ad medium usque in tres denes triangularibus aculeis diviso, inferiori ad basin usque in 2 denes subulatos plumosos superioribus aequilongos fissos; corolla alba calycem non superans. % — In Cappadocia ad Ephraem.

Tag. 70V ft addatur: THYMUS O III GANO IDES B. Webb, Fl. Canar. t. 1M.

Pag. 719. no. 7.* MICROMERIA BARBATA Fisch. Mey. et Lall. Index semln. hort. Peirop. VIII. 67. — Caule herbaceo prostrato pubescente; rosetto ovali obtusis serratis denatis glaberrimis; pedunculis elongatis bibracteolatis; calycis fauce nuda, denibus sublanceolatis; corollae fauce barbata. 2f — Caules ramique elongati prostrati. Folia ovata obtusa v. acutiuscula, basi rotundata v. subcordata, pedicello $\frac{1}{4}$ lin. longo suffulta, majora pollicaria v. sesquipollicaria, 10-12 lin. longa. Flores fere in omnibus foliorum axillis solitarii, pedicello 3-4 lin. longo, medio v. basi bracteolis duabus brevibus seicis instructo. Calyx glaberrimus $\frac{1}{2}$ lin. longus, denibus subaequalibus brevibus sublanceolato-subulatis. Corolla alba v. dilute purpurascens, 4 lin. longa, fauce dense barbata. — Crescit in Nova California circa coloniam Rusform.

Pag. 720. no. 10. - MICROMERIA MYRTIFOLIA Bolts. Diagn. plant. nov. orient. V. 10. f — Brevissime hirtella mollis: caulibus erectis elongatis simplicibus; foliis inferioribus brevissimis pedicellatis ovalibus, margine subrevolutis acutiusculis, floralibus oblongo-lanceolatis fasciatis florum subsuperantibus, florum fasciatis densissimis multifloris sessilibus in verticillas remotas dispositis; bracteis subulatis calyce paulo brevioribus; floribus minutissimis; calycis hirtelli lobulati denibus subulatis lobo quadruplo brevioribus; corolla alba calycem vix excedens. % — Crescit in montibus Garae rupibus in Kurdistania.

Pag. 721. no. 20.* MICROMERIA STAMINEA Boiss. Diagn. plant. nov. orient. V. 10. — Basi glaberrima, tota brevissime sub lente pruinosa: ramis cretibus elongatis simplicibus virgatis; foliis brevissimis pedicellatis ovalibus obtusis integris, subius parte glanduloso-punctatis, floralibus sensim minoribus sessilibus aculeis calyce brevioribus, verticillas tribus sessilibus 8-12-0 oris numerosis disantibus, spicam interruptam elongatam formantibus; calyce sub lonic pruinoso-lomentello tubuloso 13-sterato, denibus subulatis tubo quadruplo brevioribus, fauce villosa; corolla rosca calyce duplo longiori; staminibus ascendentibus stylo longe exsertis. ^- — Crescit in fissuris rupium montis Gara Kurdistaniae.

Pag. 727. *Species indetrita.*

MICROMERIA THYMOIDES B. Webb, Pliogr. Canar. t. 1W.

Pag. 779. no. 18.* INKPETA CEPHALOTES Boiss. Diagn. plant. nov. orient. V. 20. t — Caulibus basi sulcatis simplicibus cretibus, basi foliosis lomentosis superne nudis glabrescentibus; foliis pedicello dense tomentoso ciliatis

- sub. icquali suffullis, basi truncalis subrotundo-ovatis crassis rigidis rotundato-crenalis, superne cinescenti-viridibus, subulose dense imbricatis, floribus in capitulum terminate longe pedunculatum, basi nudum globosum hirsutum viscidum densum aggregatis; bracteis scissis calycibus acquantibus; calyce lobuloso hirsuto ad medium usque in domo c. basi lanceolata subulose subaequales dimidio; corollae bibracteatae tubo longiusculis exserto. 2]. — Caulis fere pedales, folia majora petiolo sesquipedalibus sulcata, 6 lin longa basique loricata hypoleuca — Crescit in argillosis Persiae.
- 11)§ 778 no. 18." NEPETA VISCIDA Boiss. Diagnos plant, nov orient V 20. - Tota et aoperno copiosius per Us conspicis viscidis dense obsita caulibus erectis subsimplicibus; foliis sessilibus ovalo-oblongis crenatis, basi subcordatis; verticillaris numerosis in apice elongata dimidiatis. deorsum multifloris, viscositate adglutinatis; bracteis subulosis calycibus acquantibus; calycibus densis subincurvatis subulosis paulo brevioribus; corolla cocculca calyce vix longior. ty — A JV. *multi-bracteata* differre meositate, folia aequalibus et verticillaris clavae superioribus distinctis. — Crescit in Tmolii regione superiori supra Philadelphia.
- 11)K 780 no. 17." NEPETA GLOMERULOSA Dolss. Diagnos. plant, nov. orient V. 21. — Breviter lomentella, basi suffruticosa: caulibus basi ramosis ramisque valde elongatis creta virgata simplicibus subnudi; foliis paucis versus caula et ramosorum basin parvis, petiolo breviter suffullis, ovalis crenatis, utrinque lomentellae, dorsalibus minimis ovalis cucullatis acutiusculis integris; cymis glomeratis, inferioribus breviter pedunculatis, cactis sessilibus, verticillatis panis densifloris numerosis valde re-rolos formantibus; bracteis ovalis oblongisve acutis cucullatis, omnino aërosia ciliaris, calyce paulo brevioribus; floribus parvis; calyce lanato perhitpidalo lobuloso subincurvato ad medium usque bilobato, ore obliquo; deorsum ovalibus et basi ? «u aequalibus plomosis, labii superioris reclinatis, inferioris panis brevioribus. subulosis; corolla hirsuta cocculca calycem paulo excedens. ty — Species floribus parvis, glomeratis, inflorescentia et bracteis ovatis scanosissima — (Crescit in Persia prope Ispahan.
- P.p 80 no 2H.' ISKPETA CIDMEA Doiss. Diagnos. pi. nov orient V. 21. - Tota breviter lomentella pallide irescens full, breviter petiolatis ovalis oblongisve cordatis crenatis, utrinque leniter canescentibus oblatis, floralibus sensim minoribus oblongis acutis, deorsum linearibus; racemis multiplicibus v. paniculatis elongatis; verticillatis glabrescentibus viridibus, omnibus subsimplicibus densis multifloris; bracteis linearibus subulosis viridibus calycibus superantibus; calycibus brevissimis puberulis ultra medium fissis dimidiatis. tubulatis, superantibus longioribus; corollae albae calyce duplo longioris tubo calycem vix antequant. % — A N. *Halica* differre verticillatis inferioribus subsessilibus, bracteis longissimis corollam acquantibus anguste subulose nec membranaceo-marginatis - Crescit in dumosis Trooli * urbem hirsuta.
- VAZ HI no. 47.* NEPETA TMOLEA DOKS. Diagnos plant nov orient V. ii f - Imlumento crupulo tursula caule clavae Mmplin parva ramo-paniculato, foliis omnibus spinosis ovalibus cordatis raris, verticillatis breviter pedunculatis densis multifloris Intra xolacris hirsutis numerosis, omnibus distinctis; bracteis linearibus calyce dimidiatis brevioribus, calycibus densis hirsutis linearibus, omnibus subaequalibus lobum arijuanibus, corolla formica ralyce parum MMTLI ^ failles 2-J-prdale*, verticillatis omnes tltlmrii hirsutis siiprion *Im>Ai* supra Philadelphia.
- P«« 110 no 50 • NKPKT\ < I H\IFL.OII4 UISD Dia<noi> plaul nov orient * S3 — Caulis clavae quadrangulo brevis virue ciferato Miu>u erecto, U^ P«rne parva pauciflora-raviosa, f«ll. breviter petiolaribus, c. basi truncatis

-ml brevissime cuneata triangulari-oblongis obtusis obtusissime crenatis, superne vix in nervis, in fern c canescens, cymis densis breviter pedunculatis verticillastros remotos in parte superiorum racemi approximalis formantibus, foliis floralibus oblongis acutis petiolulatis ramis, bracteis linearibus curvatis, calycibus brevioribus, calycibus parvis lobulosis canaliculis ore subobliquo, dentibus brevibus linearibus subaequalibus lobo interno brevioribus, corollae corollae pubescentibus calyce triplo longioribus tubo valde incurvo, superne in limbo ampliato 2) — *A. N. longiloba* dignoscitur calycis plus dimidio majoris multoque brevioribus dentibus brevissimis — Crescit in monte Garrod Synac

Pig 788 no 00 'NEPETA ISPAHAMICA Boiss Diagnos plant nov orientalis V 23 - Caulis teretis parce canaliculatus simpliciter a basi parce ramosus foliis omnibus subradicalibus petiolo eis aciculato suffultis, basi truncato-subcordatis ovalo-rotundatis obtusissimis rotundato-crenatis subconatis ad nervos nigricantibus, breviter et parce sublimbo puberulis, superne glabrescentibus, floralibus inflexis subsessilibus ovatis acutis, basi dentatis verticillastros subaequantibus, calycibus brevioribus oblongo-ellipticis inaequalibus; cymis brevissime pedunculatis sessilibus verticillastros paucos paucifloros remotos albo-lanatos formantibus, bracteis linearibus paucis calycibus subaequantibus; calycis orali-cylindrici recurvi lobis himbolocis dentibus subaequantibus lobis superioribus triangularibus acutiusculis, inferioribus profundioribus angustioribus lanceolato-subulatis; corolla calycem parum exsertens. O — Floras magnitudine *J. V. mitchelliae* — Crescit in Persia prope Ispahan.

VIR 7W no 60 ** NEPETA ERODIFOLIA Boiss Diagnos plant nov orientalis V 24 t — Drovissirac puberulo-canescens caule majori, foliis inflexis longe petiolatis, basi subtruncatis breviter ovalis obtusis rotundato-crenatis, floralibus (lobis superioribus oblongis, basi cuneatis) obtusis in crinibus, lobis in riccum ovalo-oblongum subradicalem foliis floralibus intormixtum dispositis, bracteis calycibus aciculatis ovato-cuneatis 1-5-lobis, lobis obtusis rotundatis longe exsertatis mucronatis, calycibus angustis tubulosis subaequantibus deorsum tubaequalibus oblongis, apice rotundatis obtusissimis; corollae corollae tubo calycem exsertens, lobis inferioribus proventum, lobo inferioribus emarginato-lobato. O — Crescit in Persia prope Ispahan

V £ 7S9 no 72 * NEPETA CALYGINA Fml Flora (D Z) XXVI I 400 f - Perennans caerulea brachiato-rarosa in rano pubescens ramis simpliciter sinus, foliis breviter petiolatis oblongis lanceolatis acutiusculis inaequalibus, vix obtuse pauciserratis, sublimbo distincte subnervosis 3-5-venis, cymis longe pedunculatis pyramidalibus brachialo-paniculatis, confertim vix remote 1-7-flores, bracteis foliaceis flores superioribus subaequantibus lanceolatis ac linearibus acuminatis haud pungentibus, calycibus sessilibus magnam campanulati recurvi dentibus aequalibus lobis triangularibus acutissimis rotundatis, corollae majoris calycem aequantis vix subsuperantis pubescentibus lobis superioribus bipartitis, inferioribus medio subconnatis cretatis, staminum filamentis brevissimis stylo inclusis, - (aules spiliunaei pedale c caudice lignescens prodeunt — Crescit in Misopoi unum inter Orfa et Bircak

Pi 7M no 72 " NEPETA SVTUREJOIDES Boiss Diagnos plant nov orientalis V 21 — Breviter puberula canescens caule tereti simpliciter a basi fere trifloro foliis radiatis paucis petiolo eis aciculato ovatis obtusiusculis approximatis crenatis, floralibus angustis lanceolatis, lobis lanceolatis lobis inferioribus, basi truncatis — Crescit in Persia prope Ispahan

floribus sessilibus distantibus; bracteis paucis linearibus. calyces subaequantibus, calycis tubuloso-campanulati puberuli aequalis densibus omnibus acqualibus. rectis lanceolatis acuminato-spinulosis lubo longioribus, corollae lubo exserto. *Q* — Crescit in Persia prope Ispahan.

Pag 791. no. 2/ DRACOCEPIALUM AUCHERI Boiss. Diagnos. plant nov orient. V. 25. — Perenne, totum breviter caespitulosum viscidulum: caulibus prostratis breviter ramosis; foliis, longe petiolatis, limbo nullo, basi truncato obovato-oblongo obtuso fere ad basin usque 5-7-partito, lobis ovatis rotundatis, in junioribus longioribus; floribus in spicis terminalibus densis ovatis dimorphis; bracteis oblongo-lanceolatis acutis caespitoso-lanceolatis calyce brevioribus, in omni lobis, lobis lateralibus multo minoribus, superioribus induratis; calycis recti tubulosi caespitoso-hirsuti ad medium bilabiali densibus subaequilongis, labio inferiori in densis haec lanceolato-lineari, breviter subulatis ad basin usque dimidio, labio superiori ad medium usque tridentato densibus lateralibus a basi oblonga attenuato-subulatis, intermedio orato mucronato duplo latiore; corollae calyce subduplo longioris hirsutae lubo breviter exserto; lobus subaequilongis, superne breviori relucido reclinato; antheris breviter exsertis glabris. — Crescit in Persiae borealis summa alpe Demawend.

Pag m no. 8 * LAMITM JHICROPHYLLUM Boiss. Diagnos. plant, nov. orient V. 25. f — Perenne glabrusculum caespitosum rhizomale repens suberosum; caulibus glabris nudis repens subterraneis, ramulis abbreviatis foliosis; foliis, minimis longe petiolatis rotundato-reniformibus subcordatis rotundato-4-9-crenatis, superne flores involucribus, calyces superantibus; Omb. sessilibus oppositis 2-6 terminalibus subcapitalibus, bracteis lanceolato-linearibus calycem aequantibus, calyce campanulato glabro, lobis non annulatis in densis Inangulares acuminatos hirsutos ad medium usque fistulos; corolla calyce triplo longiori hirsuta cornea, ad faucem Bafammiu-porpvnoq.-nMcalaU, tubo elongato, fauce ampla, labio superiori valde elongato profunde bilobo, lobis oblongis, fauce nuda; antheris hirsutis. — Folia petiolo 1/2-1-pullicem suffulda, 2-1 lin diametro tenuia. — In (Indo orientali supra Culmam.

TIL; SJJ no 10* LAMITM KI(TIIRORIUCIUM Doi^ 1 c 20 | — Annum caulo crebro credo medulla hirsuta, basi plura opposita ramosa, ramulis subpatulis; foliis, parvis subulatis ad nervos puberulis, caeterum glabris oblongo-subrhombicis obtusissimo crenatis obtusiusculis, basi cuneatis, inferne petiolatis, floralibus palulis seriatim caulibus cretilloastro longioribus profundius densibus, inferne sessilibus, superne oblongis; verticillis densis multifloris in spicam brevem dispositis; bracteis lanceolatis calyce brevioribus, calyce campanulato superne praecipue adpressiusculo hirsuto, fere ad medium usque fissis in densis quinque e basi lanceolata subulatis, superne alius brevioribus, fauce nec pilosa, nec annulata, corolla caeterum plus duplo longior intend pupurea, labio superne integro calcato obtuso, basi allenuato, pilis purpureis superne longe penicillato-hirsuto, lobis inferioribus lateralibus densiformibus medio subpendulo, basi valde attenuato rotundato cucullato relucido, antheris hirsutis longe barbatis, calyce fructiferi pilulis aequalibus densibus rigidis crectis subspermescentibus, semmibus inqueis maculae? — Crescit in Anatolia prope Tocat, in ruderali prope Demend.

Pag 800. no. 4. LAGOCHEIXN (L. i. I. KI. U. ois) Diagnos plain no orient. V & — Caulibus raris fruticosis quadrangulis albis glabris, spicis axillaribus glabris flatrescentibus subincurvis, foliis hirsuto-scabris runciformibus ad basin usque impariis, hirsutis anguste linearibus, subitis margine revolutis, lateralibus uniuersis, intermedia inlida, omnibus apud mucronem pinulosis, calyce glabris densibus. Ureolaloloni'aribus spatulatis, margine ciliolato-scabris lubo nervoio duplo longioribus, corolla

- calyce paullo brevions galea indivisa, superne pilosissima Sf — Foliorum lacinae vix lineam dimidiam laeae, calycis tubus tres lineas longus, denies 0-7 lineas longi, lineam aut paullo amplius lali — In Persia
- Pag 811 no 4 • LEONURUS PERSICUS Doiss Diagnos plant nov oriental V 27 — Caulib simplicib., inferno glabresceniib, superne lomenosis, Toll breviter petiolalis ambilu ovato-rotundis breviASime hirlellis pallide virilib pjlmaliparlilis, lacinus oblongo-linearib incms,tioralib subsessilib, basi cuncalis 3-5-fid is, verlicillasros rcmolob albo-lanalos paullo superanlib, bracteis sclaccis subdeflexis, calycis nigricanlis albo-lanali denlib c basi tnangulan sclaccis tubum acquaniib, corollae inlus oblique annulalac labio supenon superne valde albo-lanalo, slamimb broiler exserlis %. — Gaulcs pedales tenucs, folia 0-10 lin longa el lolidcm lala, >erlicillaslri 2-3-ni — In alpihus Elamoul Persiac borcalis
- Pag R17 no 2* STAGMS (BETOMCA Doiss Diagnos. plant not onenlat V 27) CKAECA Wlprs rns — Tola pilis scllalis subadpressis in caule el pagma folio rum inferior! longionb hirsuta caulo credo slnclo folioso, foil oblongo-lanceolatis aculis, basi cordalis regulariter ct rolundalim crenalis, supra breviicr stellato—pilosus vmdib, subtus canescentib, inferiorib breviter pcliolalis, caeleri9 sessilib, floralib verticillasin inferioris bunc superanlib, supenorum minimis, verlicillaslris 5-7 muliifloris donsis, inferionb dislinclif, caelerts cooflcnlib, braciels oblongo-lanceolaiis acuminaiis lubum calycis aequantib, calycis birsoli cjlin-drico-campanulali denlib. subaequalib. sdbnlalis spinulosis nigncaniib, lubo inlus apice barbalo, vix breviorib, corolla ezlus lomentosa palhdo carnea calyce sesquolongion, lubo incluso inlus nudo 2|. — Grcscil in Acloliac regionc sjhalica in monlc Velugo
- Pag 818 no 8* STACIUS TMOLEA Roiss Diagnos plant nov oriental V 20 t — Percnms lota dense sencco-pannosa rhizomalib induralis proslalis, foil hnccohiit > oblongo-lanceolatis oblusis obsolete dcnliculalis pedunciihlis, floralib oblongi* attenuato-ncuroinahs (lores acquaniib buprintibustc, caule basi ascendenlc credo, \erticillastns densig mulifloris distaoilsfimit, bracten obloogo-laoceolatif lanceolatisvo caljces acquaniib.; florlb. pedicellalii calycis blrsuli longe campaouiali denlib lanccollals spinolotli, Inferlorib. breviorib. paolloq. anguitlorib.; corollae luleae ezlut lomeniosae lubo calyce inclaio. ty — Caules atcen-(Knles pedales, folia radicalia tripollcana, 0-10 lin lau, verticillastn 2-3 poll inter se rcaoli — ID regione alpina Tmoli circa Dozdagh
- Pig 820 no 17 * STACHYS BITHYNICA Boiss Diagnos plant nov orient V ffl - Percnms rhizomate induralo proslrato, caulib ascendentib hirsutis, Toll supra virescenli-senccis, subtus indumento subfloccoso albo folii ncnalione Mndi-reliculalo obsilis, ovalis valde cordatis, inferionb peliolatis, caeleris scssilib, floralib. oblongis flores subacquanlib, verlicillasins muliifloris hirsuiissimisdensis in spicam lerminalcm oblongam densam basi inierruplam aggregaiis, bracleis anguste lineanb tenons caljce breviorib, calycis villosi subincurvi dentib. ovato-inangularib acuiis acqualib lubo Inplo breviorib., corollnc roseae lubo inclu»o, lobio supenon abbrevialo longissime hirsulo 5 — llerba pedalm aut paullo aluor, folia 2-3-pollcana, pollicem circiler lala — Crescil in regtouc ilpma Ol)mpi Bilhyni
- Pag 822. no 25 STAGIIS GOGGINEA Jcq — Paxton, Magaz of bolanj Mil 101 (c ic acn)
- Pag 827 no 41 * STACIHS ME\EMI Wlprs Nov ad acad cacs loop Carol XIX Suppl I p 375 — llerbacca creccia canscens foil petiolalis oblonRis oblusis crenatis, basi aiicnuatis rugosis reticulalo-^cnosis, v«r-UciUislrns paucis 2-4-0-llons remotis, nljcib nmpanuhlis nnt'sren-tib, denlib o>alis oblusis, corollhs caljce duplo lonRionbus Z|. _

- Herba simplex 4-pollican* canescenti-lomenosa Folia 1 1/2-1 3/4 pollicana, petiolo 0-8 lin longo, semipolhem lata, Mibrhombca crenata obliqua rugosa reticulato-venosa — In Peruvia circa Tis^alomam.
- Pig 828 no 49* STATUS PINARDI Doiss I c 20 | - Ili^pida rhizomate suffrutico&o, caulib. herbaccis hunnlib incurve, Toll pcliolatis ample otalis profunde cordatis obtusu. crenatis, floralib. rotundalo - cuneati* »cs2»lib caljccm acquanlib acutis, verlicillaslns distinctis subMCiflons in spicani U'rmioalem approximate, calycis campanulali parce hir>ult dentib breviler Inangulanb mucronulali» subacqualib , tubo plus duplo brevionb , tubo corollae albac glabrac caljcc duplo lungion % — Rami fragiles 5-0-pollicares — Creacil in rupe&lnbus Canac lillo-rolib> cl in insula Rbodo.
- I* >' SJS no 85.* STACUYS MAGROCHIELOS Doiss I c 30 t - Pilis brevissimi* rans birlclla caulib suffruticscnlib. proslratis ramobi», ramis creclis simplicib , foil parvis lanceolalo-lincanb. oblubiu&culi» sossilib , basi aUcnuatis integris aul mmulis»imc parce el irregularier (leiiiicullalis, florib. per pana remoliuscula in axillib foliorum fere a parte infenon ramorum opposilis, brevissimc pedicellalis, calycis foil floralib subacquilongi snaluli parce cl adpre&sc hirtelli dentib lancoolalis spinulo!»i> submcuvis lubo paullo brevionb., corollae ulbidac extus Inrlollac taljce duplo lonpions labio supenon clongalo sublinean, apico Iruncato brevissirae quadndentalo, inferioris lobis lateralib ovalis, lolcrmedio mulio majori Iraosverse lation rotundalo 2|. — Rami 0-0-pollicares, folia semipolhcaria aul paullo longiora, 2 lin laia — Crci»cii in collibu^ andi:» in Persiao provincia Aderbidjan
- Pat; tvb no 85** STALIHS SCMIOMCA Boiss. I. c. JJ - Basi suffrutescens proalrala, tola molliter senceo-cmerca: ramis lapidi adpressis abbrevialis folioitj foil. par?ia oblongo-ellipticia obtuaia in petiolum brevissimum aUenuaUa rnguloala obaoleUftlme deoiieulaiia, floralib. sossilib. calyces aequanlib.i verlicillaalria blfloria ad ramoram apicem approximais; caljcij* campanulali villosi brevissimc pcliolulali denlib ovali» niucronulalu lubo paullo brevionb subaequalib , corollae purpurco-nolaccac hirtat lulto cal)icin non ^upcranle ^ - Rami 2-5-po Hi care*, frapillimi, folia MTicca J-7 lin lon^i, J lin lala. - Cre^cit in fmuris rupium Sr^ronicaruiu in isihmo Lorinlhiaco
- PiK MO no. 87* bTAUHS KIRDICA BOISJ I c JI - Caulib virgali* ramosis creclis parcissimc foliosis herbaceis quadraugularib , Toll remold pcliolo vis bre\ion suffullis obloiigo-lanccolalis acuiiasculis remote denlalif, floralib. liucanb cal)ccs acquanlib , verlicillaslns 4-8-flons ad ramorum cxlremitaicm in racemos broves subcapilalon basi nnepe interrupt los disposilis, braleu* selaccin minuliksimia; caljcis brnmr puberuli cl breviler campanulali subsessilis denUb ovalo-Inangularib oblusus* cults, lubo brenorib , corollae intense liavac brevissimc lurlcllac lubo cal)cc incluso, labiis abbreviatas % (.aulcs scsquipcdalcs palule r.imom, folia I-I'/j-pollicano, 4-5 lin. lala — C rose it in rupibus montis (jara kurdislaoiac
- PiK' HUU no 87'' STA(II)> kOTbClh! Boiss I t Ji - Tola broiler <I den<u' lomentoHo-cana caulib frulicobis ramosis, ramii iani» foliusK, foil petiolatis inlegri* ovalis obtusis, subtus cann, magis nrrvosis bre\i<Hini<' rugosaH, Roralib scsiilib oblongit caljccs superaulib v arquanlib, *cr-ticillaslris 4-8-flori<ad ramorum apic« m appro&imilix, br-irifi<subiullli'><(al>cib pcliolalitis cam> f> re ad medium mq in denies lanccolalos icutoH MibpaluloH spinuloso4 IIDSIN, corollae valdc lomenlosae lubo non ris<rto ^ PUuia U 0-polhr.iris, folia 12-H III longj, 0-10 liu lala — I restit in Kurdi>ldiu< moult <jarj

AddendU addatart

- Pag. 06. no. 432. addatur: SOLANUM ALATUM Seemann et J Schmidt, Flora (B.Z.) XXVII. II. 497. — Aculealum: caule herbaceo; foliis lobato-sinuatis in caulem alatum decurrentibus calycibus 3-partitis inermibus 5 — Ramis alatis tomentosis aculeatis. Folia alterna petiolata cordata sinuato-lobata, lobis integerrimis, aculeata, supra ferrugineo-tomentosa, subtus palhdiora, in petiolum decurrentia. Peltobus alatus aculeatus. Flores axillares in racemos fecundos ante anthesis elrcinnato-revotatos congesti. Calyx 5-partitus patens lomentosus inermis, lacinis ovato-lanceolatis aculis. Corolla radiata alba, laciniis lanceolatis. — In Brasilia.
- Pag. 110. no. 3J.* addatur: CESTRUM GANDIDUM Seemann et J. Schmidl, Flora (B. Z.) XXVII. II. 400. — Foliis ovato-oblongis obtusiusculis, subtus ramisque pubescentibus, supra glabrescentibus; pedunculis terminalibus cymosis; lacinis corollae obtusis. § — Rami graciles teretes pubescentes. Folia integerrima obtusiuscula, subtus pubescentia, supra glabrescentia semipollicaria. Bractee minulae lanceolatae pubescentes. Cynae terminales. Corolla candida. Stamina inclusa edentula. Antherae rotatae. Stigma viride. — *Cestrum vandykei* Hort. — Cratell in Mexico.
- Pag. 482. no. 4101. BYOBANCHE SANGDINEA Tbnbrg. — Hanrey in Hook. Lond. Journ. of bot. III. 142. 11 3.
-

LIBROLIXI, TPIH HÆNELIANIS.

SYNOPSIS GEMERUM.

SOLANACEAE Bartl.

Flores hermaphroditi, pleraraque quiaarii. Calyx gainophyllus persi-
sicens 5-(rarissime 4- v. 0-)fidus. Corolla hypogyna rotata campanulas,
tubulosa v. hypocraterimorpha 5- (v. rarissime 4- v. 0-) Gda. Stamina
5 (rarissime 4 v. 0) cum corollae laciis alteroa, tubo inserta, anthec-
ris bilocularibus introrsis. Ovarium biloculare v. incomplete 4-5-Ioculare.
Ovula plurima amphitropa, placentae in loculis solitariae dissepimentali
adnata. Stylus singulus. Fructus baccatus v. capsularis bi- v. plurilocula-
ris. Capsulae bivalves biloculares v. rarius evalve9, operculo circumscisso.
Semina plurima albuminosa. Embryo rectus v. arcuatus, hemicyclius
v. spiralis.

Subordo L CURVEHBRYEAE.

Tribus J. NICOTIANEAE Endl.

Capsula bilocularis bivalvis.

3838. *Fabiana* Rz. et Pa?. — Pag. 5. — Calyx aequaliter quinquefidus. Corolla tubu-
loso-infundibuliformis, limbo brevis. Stamina 5 inaequaliter plicata-quinquelobo. Capsula
arcuata inclusa.
3839. *Nierembergia* Rz. et Pav. — Pag. 3. — Calyx tubinaequaliter quinquefidus.
Corolla infundibuliformis, tubo graevii, limbo amplo plicata-quinquelobo. Sta-
mina inaequilonga exserta, corollae fauci inserta.
3840. *Petunia* Juss. - Pag. 6- 120 et 033. — Calycis lacinae 5 *spathulatae*. Co-
rolla subhypocrateriformis, limbo patente inaequaliter plicata-quinquelobo.
Stamina 5 corollae tubo inserta inclusa.
3841. *Nicotiana* Linn. — Pag. 7. 128 et 033. — Calyx semiquinquefidus. Corolla
campanulata v. infundibuliformis v. hypocrateriformis, limbo plicata-5-lobo. Sta-
mina 5 aequalia inclusa, tubo inserta. Capsulae bilocularis *valvae demum bifidae*.
3842. *Lehmannia* Spr. — Pag. 14. — Calyx lobato-campulatus *inaequaliter*
2-5-lobatus. Corollae infundibuliformis lobus brevis, *limbo tuboblique truncato*
campanulato 5-dentato. Stamina 5 tubo adnata exserta.
3843. *Nectouxia* H. B. Kth. — Pag. 14. — Calycis lacinae 5 lineares. Corolla by-
pocrateriformis, *faucis corona cyathiformi-truncata*, limbo 5-partito. Stamina
inclusa summo tubo inserta.
- 3843/. *Laureria* Schleichd. — Pag. 14. — Calyx 5-partitus *alato-pentagonus*. Corolla
tubulosa, *limbo brevi* quinquelobo. Stamina 5 inclusa, *filamenta basi villota*.
3844. *Marckea* C. C. Rich. — Pag. 14. — Calyx lobulosus *primitivo-pentagonus*.
Corolla infundibuliformis, *limbo patente* quinquepartito, laciniis oblusis. Stamina
5 inclusa, imo tubo inserta.

Tribus II. *DATUREAE* Endl.

Capsula v. bacca incomplete quadrilocularis.

3345. *Datura* Linn. — Pag. 15 et 033. — Calyx tubulosus (saepc angulatus) 5-fid us v. *longitudinaliter fittus, circunucisse deei duus*. Corolla hypocrateriformis quinque-deccmdenlala, limbo amplo palenle. Stamina imo tubo inserla subinclusa.
3846. *Solandra* Swrtz. — Pag. 18. — Calyx tubulosus 3-5-fidus. Corolla *infundibuliformi-v en trie osa q|iinque|obB, lobit undulatit*. Stamina tubo corollae inserla.

Tribus fl. *HYOSCYAMEAE* Endl.

Capsula bilocularis, operculo circumscissa.

3847. *Ify^Bcyamns* Tournef. — Pag. 10 et 033. — Calyx orceolatus 5-fidus. Corolla *infundibulifonnis, rarissime hinc fit\$a, obtuse et inaequaliter quinquentata*; stamina 5 imo tujp corollae inserta, inclosa T. exserta. Capsulae operculum biloculare.
3848. *Anlsodiu* Linn. — Pag. 22. — Calyx campanulatus *inaequaliter quinqurfidus* Corolla campanulata obtuse et inaequaliter quinquefida; stamina 5 inclusa recta, imo tubo inserta. Capsulae *operculum quadrtvalve*.
3840. *Sc«polla* Jcq. — Pag. 22. — Calyx campanulatus *aequaliter quinquefidus*. Corolla cylindrico-campanulata qninquedentata. Stamina 5 inclusa *declmata*. Capsulae subcarnosae globosae operculum uniloculare.

Tribus IV. *SOLANAEAE* Endl.

Bacca bi-plurilocularis v. rarissime capsula cvalvis.

3850. *PUcandra* Adans. — Pag. 22. — Calyx *petUagonus tagitiato-quinquefidu**. Corolla campanula!* *tubinUgra*, Stamina ft subexiarta, *bat subdtlatata*. Capsula calyce vesicario pentagono inclasa 3-4-locularis *evatoit, epiearpio demum \$ee-deiite*, placentis scminiferis subpertistentibus.
3851. *Ph^Hulls* Linn. - Pag. 22. — Caljx 5-fidus, demum auclus, saopissime \esiculoso-mflalus. Corolla campanulalo-rotata, *quinquesinuata*. Slaruma 5 inclusa. *Dacca ralyre in/latn abscondila bilocnlaris*.
- 5^1 „ *YlarararantliiiiH* Schleichld. — Pag. 28. — Calyx campanulatus quinqurfidus fruciifer inflalu^ . Corolla *Subglobo\$a* obsolete 5-dcnlata (inlus pilosula). Stamina 5 inclusa. *Dacca calyce inclusa biloculans oligosperma*.
3852. *Warrarha* Rz. et Pa>. — Pag. 28. - Calyx 5-fidus. Corollae tubus brmssimus, limbus *rolatut 5-/fdiu reflexus*. Stamina *b fauci interta* longe exserta. *Dacca c.il)er aucto itnposita 2- v. obsolete 1-locularis*.
- 3ft!. *WKherIntia* Ilcrit. - Pag. 29. - Cal)x 5-fidu<. Corolla *rotata, tubo breci*, limbo 4-5-fido subvalvato; stamina 4-5 fauci inserta *eiexterta*. *Dacca bilocularil**
3834. *Capilcam* Tournef. — Pag. 32. — Calyx 5-6-fidus. Corolla tubo brevissimo, limbo plicato 5-0-fido. Stamina 5-0 brevi*»ima ciscrla, fauci m^crta. *Bacco extucea pol)morpha obsolete 3-4-loculans*.
- 3KM. »«lanum Tournef. - Pag. 38 el 033. - Calyx 5- (v. ran us 10-) fidus. Corolla rotata (ranus campanulata), limbo plicato 5- (ranus 10- rarissimr 4-0-) Bd^ . Stamina 5 'rans»imc 4-0; fauci inserla cuerta, aniberin aequalitMin \ *inaequalibus*. *apxpe ports duobus dehiscemibus commvencilibus*. *Dacca 2- % rarius 3-4-) locularis**.
3856. *Lyc«pertlcom* Tournef. — Pag. 100. — Cal)i 5-0-Gdun. Corolla *rotata*, tubo brevissimo, limbo plicato 5-0-fido. Stamina 5-0 fjuci inserla, anlheri* subsessihbos exserlis, *apice coahiu*, inia *longitudinaUter dthuceuUbtu* bilocularibus. *Dacca 2-J-loculans*.
3857. *Atr*»»* Linn. - Pag. 102. - Caljx 5-partilus. Corolla *%fu*d%bult(orm-fmpmnuloia*, limbo plicatio 5-10-fido. SUMmt lubo inwrte 5 eiterU *. subei-
•eru. *Bacca c*1,c« paimU* tofluii bilocalarto.

- 3858 **Withanla** Pauquy. — Pag. 104. - Calyx *campanulatus 5-dentatus*. Corolla *campanulata 5-dentata*. Stamina 5 tubo inserta vix exserta. Bacca calyce aucto angulato cincta bilocularis.
3850. **Mandragora** Tournef. — Pag. 104. — Calyx *turbinatus 5-fidus*. Corolla campanulata plicata 5-fida. Stamina 5, imo tubo inserta sub exserta, filamentis e basi dilatata filiformibus. Bacca calyce parum aucto cincta, dittepimento obliterate placentisque coadunatis unilocularis.
3860. **Himeranthus** Endl. — Pag. 105. — Calyx 5-fidus. Corolla campanulata, limbo plicato 5-partito. Stamina 5, imo tubo inserta inclusa, filamentis spatulatis oblongis, hinc dorsi tubo adnatis, caeterum liberis, antheris infra apertam dorsi adnatam gerentibus. Bacca calyce suffulta bilocularis.
3861. **Jaborosa** Juss. — Pag. 100. — Calyx 5-fidus. Corolla infundibuliformis tubulosa, limbo plicato 5-partito. Stamina faucibus inserta inclusa, filamentis brevissimis. Bacca calyce suffulta 2-3-locularis.
3862. **Jaanalloa** Az. el Pav. — Pag. 105 et 034. - Calyx coloratus ovalis 5-angulatus 5-fidus carnosus. Corolla *lobulata, exacte 5-angulari*, fauce parum contracta, limbo immo 5-partito. Stamina 5 tubo basi inserta, inclusa v. antheris subexsertis. Bacca calyce ovato inflato cincta bilocularis.
3863. **Lyclum** Linn. — Pag. 105. — Calyx *urceolatus b-dentalis v irregulariter 3-5-fidus*. Corolla infundibuliformis v. tubulosa, limbo 5-10-fido v. deniato. Stamina 5, medio v. imo tubo inserta inclusa v. exserta. Bacca calyce suffulta bilocularis.
3804. **Acnischnus** Schott — Pag. 112. - Calyx campanulatus 5-dentalis. Corolla infundibuliformis, tubo brevi, e basi dilatato, limbo 5-partito patentem, reflexo (aestivatione imbricata). Stamina 5 tubo supra basin inserta exserta. Bacca calyce cincta bilocularis.
3745. **Grabowskya** Schlecht. — Pag. 113. - Calyx campanulatus 5-dentalis. Corolla infundibuliformis, limbi 5-partiti laciniis patentibus v. reflexis (aestivatione contorta-imbricata). Stamina 5 corollae tubo prope basin inserta exserta. Ovarium quadriloculare. *Drupa baccata diplyrena, pyrenis lignosis bilocularibus, loculis monotermis*

Subordo O. RICTUBERTIAI Endl.

Tribus V. CESTRINEAE Endl.

Bacca bilocularis.

3865. **Ceatrum** Linn. - Pag. 114 et 034. — Calyx campanulatus 5-fidus. Corolla infundibuliformis, tubo elongato, tuperne ampliato, limbo 5-partito patentem v. reflexo. Stamina 5 inclusa medio tubo inserta, filamenta nuda v. denis aucta. Bacca calyce cincta bilocularis v. obsolete ilocularis oligosperma.
3866. **Dunalia** K. Bib. — Pag. 122. - Calyx *urceolatus 5-dentalis*. Corolla infundibuliformis, tubo elongato, limbo 5-fido plicato. Stamina 5 tubo inserta m-
clua, filamentis tripartitis, laciniis captivaceis, intermedia antherifera. Bacca globosa bilocularis.
3867. **nabrothamna*** Endl. — Pag. 114 et 034. — Calyx campanulatus 5-dentalis. Corolla *clavata lobulata*, limbo contracto 5-dentali. Stamina 5 tubo inserta simplicia inclusa. Bacca calyce cincta bilocularis oligosperma.
- 3867/i. **Akokanthera** G. Don. — Pag. 122. — Calyx 5-partitus. Corolla infundibuliformis, (fauce villosa), limbo 5-partito. Stamina 5 imo tubo inserta inclusa, antheris mucrone terminatis. Ovarium biloculare, loculis unilocularibus. — Fructus

Tribus VI. VESTIEAE Endl.

Capsula bilocularis.

3868. **Vestia** Willd. - Pag. 122. - Calyx *campanulatus 5-dentatus*. Corolla infundibuliformis-tubulosa, limbi quinquefidi laciniis ovatis aestivatione contorta-

ralvatts Stamina medio tubo Inserta *exserta*. Capsula cylindracea *btlocularu*
loeuictde bivalvtt, valvis demum bifidis, polysperma.

- 3800 *Sesiea* Rz et Pav. — Pag 123 — Calyx *tubulotut* 5-dentalus Corolla infundibuliformi-tubulosa, limbi 5-fidi *lobu phcatxs?* Stamina 5 medio tubo inserta inclusa Capsula cylindnca *tubarcuata* bilocnlans bivalvis, valvis demum bifidis, polysperma

GENEBA DUBIA.

- 3800*l*. *Jtfetternlchla* Mickan. — Pag. 123. — Calyx campanulatus *tnaequaltter* 5-partius, focintu 2 *posttcis*, 3 *antxcu* Corolla infundibuliformis, tubo amplo, limbi Iacinus 5 brevibus aequalibus valvatis. Stamina 5 imo tubo inserta maequalia inclusa Stylus simplex, *tltgmale btlamellato*. Capsula conaceo-lignosa bilocularis cylindnca, *aptce tepttfrage bvalvtt* polysperma.
- 3870 *Cotylanthera* Blume. — Pag 124 — Calyx campanulatus *quadrtfidut* persistens Corolla hypocratenmorpba, *lactmtt 4 patenhbus* Stamina 4 aequalia, filamentis brevibus latis, anthers conventibus, apice *poro untco deh**centtbus*, Capsula ovato-globosa biloculans polysperma
- 3871 *Isanthera* N ab Esenb — Pag. 124. — *floret polygamt* Berm Calyx 5-fidus Corolla rotata 5-flda, calyce brevior Stamina 5, *aniheru umlocularibus*, *rtma tertcab dehttcentibus* Ovarium e carpidiis duobas conflaium Capsula bilorulans polysperma, *receptaculis qualuor lamelbformtbut*. Foem *Corolla nulla*, *stamxnum rudtmenta tubercultformta* Caetera ut In hermaphroditis
3872. *Darto** Lour. — Pag 124 — Calyx 5-fldus, Iacinus membranaceis. Corollae tubus *tubglobotut*, Iacinus limbi 5 patentibus, aeslivatione plicatis. Stamina 5 inclusa Stigma quinquelobum Bacca parva *dtaphana untloculans* polysperma.
- 3873 *Daraena* Tbnbrg — Pag 124. — Calycis quinquefldi laciniae ovatae. Corolla subcylindnco-rotata, limbi quinquefldi laciniis erectis. Stamina 5 inclusa, antheris aubsessilibus. Ovarium *tquamu qutnque *9c4artferis coronalum*. Bacca sicca anilocularla polyiperma.
- 3874 *Trigoera* Car. — Pag. IN. — Calyx *Huuquahier* 5-partitus, laciniis laocoelatis Corolla tubo brevissimo, fauce ampliato, *Itmbi tubtblabtalt* limbo 5-fldo, *lab to supertore brevore re/lexo*, *tnfertore ventncoso erecto patulo* Stamina 5 *urceolo pengyne membranaceo mcUi/luo*, exlus inserta subacquaha, anthers *oblongo-sagittatis continentibus* *Drupa calyce inclusa ticca quadnloculans*, dissepimcnhs tenLissimi^ Scmina in loculo gemma superposita
- * IllltenbergU Tauscb — Pag 125. - Calyx semlquoque- (ranus 5-) fldus, lobis erectis Corolla parum exserta, tobo amplo cylindnco, limbo brevi suberecto 5-fido, Iacinus aequaHbus. Stamina 5 fauci inserta, antherae subsessiles inclusae subsagittato-oblongae. Bacca globosa 4-locularU, semina pauca superposita.
- Stl<mat<c<c<c<c<c ^illd. — Pag. 125. — Calycis *quadnfid** laciniae erectae Corolla rotata *quadn/ida*, tubo brevi, Iacinus ovahbus. Stamina .', flameota filiformia, aotherae exsertae Bacca globosa *monosperma*

t DESFONTAIPHEAE

- 3875 *DetftnUlnla* Ri el Pav - Pag 125 - Calyx 5-partitum persistens, Iacinus erectis Corolla *tubcartilagnea* tubulosa elongata, limbi 5-partili laciniis *%i*~ bncattt* Stamina 5 fauci inserla inclusa, filamentis complanatis Ovarium *gl^ bo>um umloculare?*, *plaeenltt 5 panetaltbus tepltformtbus*, stylus filiformis, *stigma= capitatum* Bacca globosa *untlocularis* polysperma bemina angulata testa *cori-*acea, embryo in basi albuminis copiosi subglobosus

!! RLT7IACEAE

- 3876 *ReUla* Tbnbrg - Pag 125 - Cal)ds tubulosi *tnaequaltler* 5-^» laciniiae lanceolalae Corolla tubulosa longa, limbi brevit laciniis 5 paientibus, aestivatione Imbricatis Stamina 5, fauci inserta, antherae subsessiles scmiesertae. Ovarium bilocuUre u)ula pauca medio' dissepimento inserU), stylus simplei *fi|for^** •tigma obsolete bilobum subexsertum Capsula *compreua btioeuiant* *btioeuiant* — Caetera baud satis nola.

3877. *Loneliest oma* Wick sir. — Pag. 126. — *Calyx pentaphyllus bibraeteolatus*. Corolla *longa tubulosa*, limbi quinquepartiti laciniis lanceolatis. Stamina 5, fauci inserta inclusa v. breviter exserta, antheris *tubtestilibus tagittatis*. Styli 2 *terminaliales subclavati* inclusi. Capsula bilocularis, loculis 8-10-spermis, dissepimento membranaceo ulrinque placenlifcro affixis.

SCROPHULAREVAE R. Br.

Floras hermaphroditi regulares v. saepissime irregulares. Calyi persistens saepissime gamophyllus, foliosis nunc fere apicem usque, nunc ima (antummodo basi coalitis, nunc omnino liberis, aestivatione imbricalis, inaequalibus, postico majori. Corolla hypogyna gamopetala pentameria (laciniis duabus coalitis tetramera videtur), tubo breviter v. longo, basi aequali v. saccato et calcarato, limbo rarius aequali, saepissime bilabiali, labio superiore bilobo, inferiore trifido. Stamina libera, corollae tubo inserta 2-4, V. rarissime 5, duo antica aequalia antherifera, lateralia duo aequalia, saepe breviora, rarissime ananthera v. omnino deficientia, posticum quintum saepissime omnino deficientis, raro rudimentarium anantherum, rarissime antheriferum sed semper reliquis brevius. Antherae biloculares, loculis confluentibus interdum uniloculares, longitudinaliter dehiscentes, saepissime per paria cohaerentes. Ovarium e carpidiis duobus conflatum biloculare, dissepimentis columnam placenliferam attigentibus v. rarissime obsolete uniloculare. Ovula iodeonita analona rarissime deflexa ampeltropa. Stylos terminaliter simplex T. rarius breviter bifidus. Capsula rarissime baccata, bilocularis bivalvis, Interdum apice operculo dehiscentis, saepissime loculicide, septifraga T. septicide dehiscentis. Semina plurima Y. rarissime deflexa, albuminosa. Embryo in axi albuminis situs reclusus Y. interdum subcurvatus.

Tribus I. VERBASCEAE Bth.

Corollae tubus abbreviatus Y. subglobosus, limbo explanato 4-5-fido bilabiali, non ringente. Stamina fertilia 2 v. 5 saepe declinata. Antherae uniloculares v. subuniloculares. Capsula septicide bivalvis, valvis saepe bifidis.

3878. *Verbascum* Linn. - Pag. 127. 490 et 034. - Calyi *inaequaliter* 5-partiis, Corollae tubus brevissimus, limbi *tubrotati laciniae* 5 *tubaequales*. Stamina 5 *exserta declinata*, filamenta omnium y. 3 posteriorum *barbata*, antheris unilocularibus. Capsula ovalis v. globosa, valvis apice bifidis.

3879. *Janthe* Griseb. - Pag. 440. - Calyx subaequaliter 5-partiis. Corolla multilobata 5-partita subinaequalis. Stamina antherifera 2 villosa declinata duo *superiora barbata*, quintum rudimentum nullum. Capsula?

3870. *CeU* Linn. - Pag. 147. et 446. - Corolla subaequaliter quinquepartita. Corolla, tubus brevissimus, limbus subrotatus 5-partiis, superiora *barbata*, inferiora *exserta*, antheris loculis confluentibus unilocularibus. Capsula subglobosa, valvis apice bifidis.

- 3879/. *Staurophragma* Fisch. et Mey. - Pag. 447. — Calyx subaequaliter 5-partitus. Corollae tubus brevissimus, limbi rotali 5-partiti *lacina antica majore*. Stamina 4 *didynama exserta, omnia fertilia*, antheris unilocularibus. Capsula cylindracea *indehiscens*, valvis margine revolutis *subquadriocularis*. Semina plurima lacunoso-rugosa.
3880. *A Unsa* Rz. et Pav. — Pag. 150. — Calyx subaequaliter 5-partitus. Corollae tubus brevissimus, limbus rotatus *resupinalis*, lacina *antica superiore majore*. Stamina 4 *didynama declinata*, antheris *bilocularibus, loculis divaricatis*. Capsula ovata acula *bilocularis, valvis indivisis*.
- 3880/. *Schlatanthe* Knz. — Pag. 151. — Calyx subaequaliter quinquepartitus. Corolla *resupinalis*, tubo *brevissimo Mnc /Lto*, limbi lobo antico basi bisaccaio. Stamina ? Capsulae subcompressae valvis indivisis.
3881. *Javellana* Rz. et Pav. — Pag. 151. — Calyx subaequaliter *quadripartite**. Corollae tubus brevissimus, limbi bilabiali *tabiis patentibus*, superiore brevior *concavo-carinalis*, inferiore *concavo subcalceiformi*. Stamina 2 subexserta, antheris *bilocularibus*. Capsulae ovato-conicae *bilocularis valvis bifidis*.
3882. *Calceolaria* Feuill. — Pag. 152 et 035. — Calyx aequaliter *quadripartitus* v. *lacina potlica majore*. Corollae tubus brevissimus, limbus bilabialis, labio superiore *abbreviato truncato rotundato*, inferiore *maximo calceiformi-in/lato*. Stamina 2 (v. *in unica specie tria*) vix exserta, antherae *biloculares, loculo allero saepe sterili*. Capsula ovato-conica *bilocularis, valvis bifidis*.
3883. *Scropholaria* Tournef. — Pag. 104. 447 et 035. — Calyx subaequaliter *quinquepartitus*. Corollae tubus *ventricosus-subglobosus*, limbo bilabiato, labio superiore longior *bilobus*, inferiore brevior *trilobus*. Stamina *quatuor fertilia didynama*, antheris *confluentibus unilocularibus, quinto sterili adnato*, anthera lamelliformi, rarius nullo. Capsula subglobosa, valvis apice bifidis v. integris, *placentis demum Hberis*.

Tribus II. *BEJHIMERIDEAE* Bth.

Calyx 5-fldas v. 5-phyllas. Corolla tubo brevissimo, limbo subrotato bilabiato v. personato 4-5-lobo, basi saccato v. 1-2-calcarato. Antherae 1-2-loculares. Stigma subcapitatum. Capsula bivalvis, valvis integris, bifidis v. bipartitis.

3884. *Tylacantha* Nees et Mart. — Pag. 178. - Calyx 5-partitus. Corollae tubus brevis, *faux fomicata*, limbi labium superius oblongissimum bilobum, inferioris trilobi lobo medio basi saepeo. Stamina 4 inclusa *didynama, antheris bilocularibus*. Capsula globosa *etatis*.
- 3885/. *Callibrachya* Llave et Lexana. - Pag. 178. - Calyx 5-fldas. Corolla tubulosa, limbo brevi plicato 5-fldo, lobo infimofotea excavato, intus palati insulari prominente. Stamina antherifera 5 inclusa, 4 *didynama, quinti brevioris antherae effloa*. Capsula seplifraga semibivalvis.
3886. *Angeles* Bth. - Pag. 178 et 430. - Calyx 5-partitus. Corollae tubus brevis, fauce fornicata, limbi subbilabiali *labio superiore obtusissimo* J-lobo, inferioris 3-lobi lobo medio *production saepeo*. Stamina 4 *didynama*, antheris *bilocularibus*. Capsula loculicide bivalvis, valvis *medio sepliferis* integris.
3887. *Hemimeris* Thunberg. - Pag. 170. - Calyx *pentapkyllus*. Corollae tubus brevissimus, limbi subbilabiali lacina *suprema emarginata basi fossulata* v. *maque maximis*, lateralibus brevissimis, fauce *appendicibus 2 dentiformibus geniculata* ciogeotibus auclis. Stamina 2, *fauci inserta palmaria, antheris unilocularibus*. Capsula triplicide bivalvis, *valvis satpe inaequalibus*, demum bifidis.
3888. *Dialla* Link. - Pag. 180. - Calyx *pentaphyllus*. Corollae tubus brevissimus, limbi *quadrid* ciplanali v. subcucavi labio superiore *bijido, basi bisaccaio* v. *bicalcarato*, inferioris trifidi lacinae *rotundatis, faucis ylauduln curdifurmi*. Stamina 4 *didynama fauci inserta, inferioribus appendiculata*. Antherae *uniloculares saepeo cooilat*. Capsula bivalvis, valvis saepius *inaequalibus* v. *iodificis*.

- 3888 Nemeela Vent - Pag 1&2 et 035 - Calyx pcnlapbyllns. Gorollae tubus *brevis*, limbo *personato*, labio *superiore* v 4-/o6o, basi *saecio calcarato*, inferiore *simplici*, *palato convexo*, *fauce bicallosa* Stamina 4 didynama, fauci inserta *dennexa*, *antherae uniloculares*, saepe *per pana cohaerentes* Capsulae bivalvis, valvis *integris*, *apice oblique truncatu*, angulo ex ten ore saepius *breviter cornulo*
- 3880 Didle Btb — Pag 185 — Calyx pentaphyllus. Corollae tubus *brevis*, limbo *personato bilabiato*, labio *superiore bifido*, *basal calcarato*, inferiore *trifido* Stamina 4 *faucis inserta* didynama, *antherae uniloculares* per pana *cohaerentes*. Capsula *subglobosa* bivalvis, *valvis integris* v *vn flsis*.

Tribus m. ANTIRRHINEAE Chavannes.

Corolla tubalosa, limbo *personato* v. *ringente bilabiato*, rarius *aequali*. Stamina 4 *didynama*. Antherae *biloculares* v. *rassime uniloculares*, per pana *approximatae*. Capsula *bilocularis*, *dentibus* v. *operculis* *dehiscens*, *ranus plurivalvis* v. *irregulariter rumpens*.

- 3800 Anarrhinum Dsfont. — Pag 186 — Calyx *profunde quinquefidus* Corolla *tubo subincuno*, *basal saepe breviter calcarato*, *fauce perva*, utriusque labii lobis *subaequalibus* Stamina 4 *inclusa subaequalia*, *quinto steno brevissimum*, *antheris reniformibus unilocularibus*. Capsula *ovata* - *sphaenica bilocularis*, *sub apice utrinque poro oblongo uncalvuiato* dehiscens.
- 3801 Linaria Touraef. — Pag. 100. et 450. — Calyx *quinquepartitus*. Corollae *tubus brevis tuflatus*, *basal calcaratus*, limbo *personato*, *palato prominente* magis *minusve barbato*, labii *superioris lobis duobus phcatis reflexu*, *inferioris patentibus*. Stamina 4 *subaequalia inclusa*, *quintum sterile brevissimum* v *nullum*, *antheris bilocularibus* Capsula *bilocularis*, *locus valvulis 3-5 magis minusve profunde dehiscens* v. *apice valiula unca aperlis* o. *operculo obliquo ar-eumscissis*
- 3802 Antirrhinum Juss - Pag 221 451 et 035 - Calyx 5-partitus *obliquus* Corollae *tubus amplus*, *basal saccatus* *limbo personato*, *palato prominente faucem daudente*, labii *superioris lobis repucato-re/lexis*, *inferioris palcolibus*. Summa *InolDia ferilia*, 4 *antherifera*, *quintum sterile brevissimum* «. *nullum*, *antheris bilocularibus* Capsula *bilocularis* *loculo posuco poro m*UvtoOa£* « T c! g|2-nts *collateralibus* *dehiscens*, *reiot ulroqM* *poro ttegulo*.
- 3803 Maurandia Ortega. - Pag. 820. - Calyx 5-partitus. Corollae *tubus obsolete tetragonus*, *basal saccatus*, *limbo personato*, *palato prominente*, lobis *labii superioris erectis*, *inferioris patentibus*, omnibus *subaequalibus*. Stamina 4 *fertilia didynama* *inclusa*, *quintum sterile minimum*, *antheris oblongis* Capsula *bilocularis* *locus apice valvulis dehiscens*.
- 3804 Galtesia Dombey - Pag 230 — Calyx 5-partitus Corollae *tubus subcylindricus*, *basal vcnlncosus*, *fauce nuda*, lobis *labii superioris erectis*, *inferioris patentibus*, *subaequalibus* Stamina *inclusa* 4 *didynama*, *antheris reniformibus bilocularibus* (*sterile nullum*) Capsula *bilocularis* *globoso-vcnlncosa*, *locus infra apicem foraminis irregulariter aperlis*.
- 3805 Lophoceros Don - Pag 230 (exel spec no 3) et 035 — Calyx *5-partitus*, *lacmus foharets* *hasi subaunculatis* Corolla *campanulata*, *fauce maxima*, *labii superioris lannis erectis suboatis*, *inferioris patentibus*, *intermedia minore* Stamina 4 *didynama*, *quintum sterile brevissimum*, *inclusa*, *antheris bilocularibus reniformibus* Capsula *calyce tecta* *globosa membranacea bilocularis* *locus infra apicem irregulariter rumpentibus*
- 3800 Rhodochiton Zuccar - Pag 231 et 035 - Calyx *membranaceus coloratus* *patentissime campanulatus* 5-fidus* Corolla *lubulosa*, *fauce dilata labiorum lactis subaequalibus* Stamina 4 *subaequalia* *inclusa*, *quintum sterile brevissimum*, *antheris reniformibus bilocularibus* Stamina *simplex* Capsula *calyce nudi bilocularis*, *locus apice irregulariter rumpentibus*

3896/. *Gastromerla* D. Don. — Pag. 452. — Calyx *tubglobotui inflatu** 5-dentatas. Corolla *eampanulata*, limbo bilabialo 5-lobo. Stamina 4 didynama inclusa, antherarum bilocularium foatto apice *confluentibus*. Germen biloculare, septo utrinque placentifero multiovulalo. Capsula.?

GENTS ANOMAMM.

3807. *Cftlllnsl** Nutt. — Pag. 231 et 935. — Calyx *aequaliter eampanulatu* 5-6dus. Corolla personata, tubo postice gibbo, labio *superiore erecto %jido*, inferioris *fr̄-fidi lacinia media cucullata, ttamina amplexente*. Stamina 4 didynama inclusa, antheris bilocularibus, quintum *sterile rudimentarium*. Ovarium biloculare, *ovula in loculit gemina*. Capsula bilocularis septifrage bivalvis, valvis *apite bifidit*. *Semina in loculis gemina oblique super posila*.

Tribus IV. SALPIGLOSSIDAE Bth.

Corolla tubo saepius elongato, limbo nunc bilabiato, none aequaliter 5-lobo patente. Stamina fertilia 2 v. saepius 4 didynama, quintum sterile Y. nullum. Antherae loculi apice conflantes. Capsula bilocularis septifrage bivaWis, valvis iotegris y. bifldis, dissepimento placentifero parallelis.

3898. *Schlzanthaa* Rz. et Pav. — Pag. 832 et 036. — Calyx 5-partitus. Corolla *resupmala*, tubo *brevissimo*, limbo bilabiato, labio inferiore *3-partito*, superiore *b-partito*, laciniis lateralibus bifldis, *intermedia* oblusa v. emarginata, basi palalo prominulo. Stamina 4 *fauci ituerta ester la*, declinala, 2 *sterilia minima*, fertiliolum antherae biloculares. Capsula otata biloculans, valvis indivisis.

3800. *Salpiglotilis* Rt. et Pav. — Pag. 233. — Calyx campanulatus, *tubaequaliter* 5-partitus. Corolla *infundibuliformis*, tubo *aupeme amplilo*, limbo *ptonto* <*Hiq*oiU9r* 5-^do, laciniis emargiatis v. bifldis. Stamina inclusa 4 didynama, antheris *confluentibus bilocularibus*, quinlo alerili rudimentario. Capsula ootata biloculans, valvis indivisis.

3000. *ApUalamum* Barea. — Pag. 904. — Calyx *bihracUoUUu** eampanulatus femi-quinquedidus. Corollae *tubus bati eoniractut*, parte exserta dilalalus, limbo subaequaliter 5-fidus bilabiato. Stamina *i inclusa didynama declinala*, antherae subbiloculares *nma tramvertalt uniea apertae*, slaminum breviorum saepe *effoetae*. (capsula *nbcordata*, apice *broiler loculicide et septifrage dehiscent*).

3001. *Prillstonium* Dlh. - Pag. 235. - Calyx 5-partitus. Corollae tubus basi coniractus, superne amplialus, limbi *tubaequaliter h-lobi subbilabiati latiniit plantis*. Stamina 4 *inclusa declinato*, antheris *txUosis conouentim bilocularibus*, *nma trannertali aperhs*, vUminum posticorum saepe *effocue*. Capsula otaloblonga acula biloculans *loculicide bivalcu, valcis bifldis*.

3002. *AnthacercU* Labillard. - Pag. 235. - Calyx *eampanulatu** 5-^HIM. Corolla *eampanulata*, basi coarctata, limbo *aequaliter* 5-partito patente. Stamina *incluata* didynama, cum rudimento quinti, antheris bilocularibus. Capsula oblonga biloculans septifraga bivalvis, valvis indivisis.

3002. *Antliororh* Endl. - Pag. 230. - Calyx 5-fidus. Corolla *infundibuliformis* sursum amphaia, limbo rotato obtuse et aequaliter 5-fido. Stamina 5 *ferulia exsntu*, antheris bilocularibus, rima transversali aperti. Capsula *globot bilocularibus quadrilobis*, seplo membranaceo inferne medio placentifero libero.

3003. *BrtwalliU* Linn. — Pag. 250. — Calyx *tubulosus tubaequaliter* 5-dentatus. Corolla *h)pocratentuoarpa*, limbo amplo V-partito, lobo *poshco mtijore*, omnibus emarginatis. Stamina 4 didynama inclusa, posticorum longiorum, *antherae loculit tuprrpostit*, superiore mi no re, aolicorum breviorum, amhcn confluentim bilocularibus, nma transverse aperlis. Capsula septifraga bivalvis bilocularis, valvis apice bifldis.

3001 *rraneUct** Pohl. - Pag. 237 et 4tt el «». - Calyx *eampanulatus* subaequaliter 5-dentatus. Corolla *hypoeratenmorpha* subincorva, limbo *tubaequaliter* 5-dentatus. Stamina 4 *laelusa didynama*, antheris *conducentibus*.

- lim subbilocularibus, rima transversali aperlis. Capsula *subglobosa* septifrage bivalvis bilocularis, valvis coriaceis inlegris.
3005. Brunfelsia Plum. — Pag. 230. — Calyx *tubaequaliter* 5-dentatus *campanulatus*. Corolla *hypocraterimorpha*, lobo clongato, apice aequali recto, limbo piano subaequaliter 5-dentato. Stamina inclusa 4 didynama, antheris confluentim subbilocularibus, rima transversali dehiscentibus. *Stigma inaequaliter bifidum*. Capsula *globosa subbaccata bilocularis* septifrage bivalvis, placenlis in massam globosam liberam coalitis.
3000. Duliolsia R. Dr. — Pag. 240. — Calyx *bilabialis brevis*. Corolla infundibuliformi-campanulata, limbo subaequali 5-fido. Stamina 5 imo lobo inserta inclusa, 4 didynama, quintum rudimentarium. Ovarium biloculare, placenlis dissepimento olrinque adnatis multiovatilis. *liacca polysperma*.
3007. Diplanthera Dnks. et Soland. - Pag. 240. — Calyx *trifidus*, laciniis *lateralibus bifidis*, poslica integra. Corolla *bilabialis*, labio superiore *obcordato*, inferiore *tripartito*, lobis *rotundalis*. Stamina 4 imo lobo inserta *exserta subacqualia*, antheris divaricato-bilocularibus. Ovarium biloculare, placenlis dissepimento utrinque adnatis. Fruclus. . . . ?

Tribus V. DIGIT ALEAE Bth.

- Corolla tubulosa, saepe ventricosa, limbo bilabiato. Stamina 4 declinato, apice saepissime ascendente, didynama, quintum sterile v. omnino nullum. Antherae biloculares, loculis demum confluentibus. Capsula dura septicide bivalvis, valvis demum bifidis, dissepimento demum bipartibili, placenlis adnatis v. tandem solutis.
3006. Chelone Linn. — Pag. 240 et 037. — Calyx 5-partitus. Corolla *campanulato-tubulosa* poslice convexa, labio superiore bilobulato, inferiore (rilobo, basi barbaio. Stamina fertilia 4 *didynama exserta*, antheris divaricato-bilocularibus, *stamen quintum sterile*. Capsula bilocularis *septicide bivalvis*, seminibus compressis laic *membranaceo - marginalis*.
3000. Pentstemon Heril. — Pag. 241 et 037. — Calyx 5-partitus. Corolla *tubuloso-campanulata*, ad faucem inflata, labio superiore *emarginato-bilobo*, inferiore *irrfote*., Stamina tortilla 4 *didynama exserta* v. subexserta, antheris divaricato-bilocularibus, *stamen quintum sterile*. Capsula bilocularis *septicide bivalvis*, seminibus *angulatis apteris*.
- 3000/. Tetranema Bth. - Pag. 251. 459 et 038. - Calyx 5-fido. Corolla *tubulosa bilabialis*, labio superiore 2-, inferiore 3-fido. Stamina 4 *didynama fertilia*, subinclusa, antheris divaricato-bilocularibus, quinto *sterili omnino defidente*. Capsula bilocularis *septicide bivalvis*, seminibus *angulatis apteris*.
3010. BaMeIU Jcq. - Pag. 251 et 038. - Calyx subaequaliter 5-partitus, laciniis *ocuminato-tubulatis*. Corolla *tubulosa*, superne *ventricoso-inflata*, fauce barbata, bilabiate, superiore labio 2-, inferiore 3-fido, *laciniis subaequalibus*. Stamina 4 *didynama inclusa declinata*, antheris divaricato-bilocularibus. Capsula *subglobosa rostrata*, septicide bivalvis, valvis *bifidis*, seminibus *apteris*.
3011. Phygellu* E.Mey. - Pag. 253. - Calyx *pentaphyllus*. Corolla tubulosa, tubo *declinato*, apice recurvo-ascendente, limbo *brevi 5-fido tubbilabiato*. Stamina 4 *didynama exserta declinata*, antheris *parallele bilocularibus*. Capsula *obliqua bilocularis polysperma*, seminibus *apteris*.
3012. Colplas E. Mey. - Pag. 254. - Calyx *pentaphyllus*. Corollae tubus *brevit amplus*, basi *saccato-declinalis*, apice ascendens, limbo *subbilabiato* 5-fido *laciniis rotundalis*. Stamina 4 *didynama inclusa declinata*, antheris *bilocularibus* loculis *demum confluentibus*. Capsula bilocularis *septicide bivalvis*, valvis *coriaceis*, apice *bifidis*.
3013. Iilanthei E. Mey. - Pag. 254. - Calyx *bilabiatus*, labio superiore *3-dentato* inferiore *bifido*. Corollae tubus *amplus*, apice ascendens, limbi *plant laciniis quinque*. Stamina 4 (?) *didynama inclusa*, antheris *divaricato-bilocularibus*, *capsula oxata acula septicide bivalvis bilocularis*, valvis *coriaceis*, apice *bifidis*.

3011. *Itelimannia* Lihosch. — Pag. 254. — Calyx *campanulatus* 5-fidus. Corollae *ringentis* tubo superne ampliato, limbi bilabiali-qumquelobi *lobis tubaequalibus*, 2 superioribus reflexis. Stamina 4 inclusa didynama, antheris *subdivaricato-bilocularibus*. Ovarium *incomplete biloculare*, septis incomplete utroque marline placentaliferis nullotulalis. Stylus simplicis, stigmate *late bilamellato*. Capsula incomplete bilocularis, *alio medio septa placentifera gerentibus*.
3013. *Digitalis* Tourn. — Pag. 254 et 038. — Calyx *subaequaliter 5-partitus*. Corolla *campanulata-incurvata* *ventrivosa*, limbi bilabiali labio superiore *nobis-Iclo, emarginato* r. *bifido*, inferioris *trifidi* lacinia media *protracta* r. *lateralibus aequali*. Stamina 4 declinata inclusa didynama, antheris *divaricato-bilocularibus*. Stigma bilamellatum. Capsula *septicida bivalvis*, bilocularis, talvis *marginem inflexit placentas retinentibus*.
3016. *Pauwonia* Siebld. et Zucc. — Pag. 902 et 038. — Calyx *coriariet campanulatus* 5-fid. Corolla *in fundibuliformi* *mi-campanulata*, bilabiali, lobis 5 *aequalibus*. Stamina 4 inclusa aequalia, antheris *divaricato-bilocularibus*. Capsula *orbata lignosa septicida bivalvis*. Semina plurima *panacea, costis circinalis*, marline *in atom membranaceam, apice exsertam dilatata*.
3017. *Inastrabe* B. Mey. — Pag. 202. — Calyx *campanulatus* aequilobus. Corolla *tubulosa* *brevis*, limbi bilabiali labio superiore *bifido*, *inferioribus trifido*. Stamina 4 didynama *inruberis*, antheris *trifido*. Capsula corollae bilocularis *septicida bilamellata*, *villosa* demum *bilobata*.

Tribus VI. GRATIOLEAE Bth.

Corolla limbo bilabiato v. subaequali, laciniis subplanis. Stamina fertilia 2 v. 4 ascendentia, antherae biloculares mulicae. Capsula bilocularis septicide, septifraga aut localiter bitertia, ut *Mimulus bifidus*, rarios baccharum, ditrichum *Betonica* *trifida* *Hesperis* *trifida*. Semina aptera.

3018. *Iratiaria* Lino. - Pag. V&. — Calyx *campanulatus* 3-A-partitus *lobis aequalibus*. Corolla *tubulosa*, limbo *obovato* *lobis brevibus*, *inferioribus didynamis ascendente* *erecta*, antheris *parallelis* *bilocularibus* *Uacca* *shlo* *upprali bilobis* *Un*.
3019. *Trichomanes* Kudnph. — P. 263. — Calyx *quinquepartitus* *lacinias lineares*. Corolla *ultra* *fiuro* *irbata*, limbi *quinquefolii* *incisus* *ultra* *trifidus*. Stamina 1 *trichomanes* *trifida*, antheris *parallelis* *bilocularibus* *trifida*.
3020. *Trichomanes* Dth. - Pa. SU - Calyx *penlaphyllus*. Corolla *tubulosa*, limbi *subbilabiatum* *laciniis* *quinque*. Sursum *quatuor didynamis inclusa*, antheris *parallelis* *Inrulanbus* *contyus*. Capsula *orbata* bilocularis *septicida* *bilocularis*, *falviflora* *irris*, *apertis bifidis*. semina *paucis*.
3021. *Tapraria* Lino. - Pag. 903. - Calyx *aequaliter* *quinquepartitus*. Corolla *incurvata* *Rubcampanulata*, limbo *subaequaliter* *quinquefidus*. Stamina 4, localiter *didynamis*, antheris *parallelis* *bilocularibus* *mutiguis*. Capsula *orbata* bilocularis, *apertis* *bifidis*. Semina *scrobiculata*.
3022. *Trichomanes* #41giua Turr/an. - Pag. f. 11. - Calyx *arqualiter* *4-partitus*, *lobis aequalibus*, *inferioribus trifidis*, *antheris parallelis* *bilocularibus*. Capsula *orbata* *oblonga* *bilocularis* *septicida* *bilocularis*.
3023. *Uarraria* Ri. el Pat. Pag. 61. — Calyx *arqualiter* *quinquepartitus*. Corolla *wubrmmpmutialm*, limbo *brerissimo* *aequaliter* *quinquepartitus*. Stamina *omnibus* *ferliata* *aequaliter* *wubesterla*. antheris *Ugillato* *bilocularibus* *oblonga* *bilocularis* *septicida* *bilocularis*, *apertis* *conam*. apertis *Inlidm*. Semina *scrobiculata*.
3024. *Pogostema* Hrbrad. - Pag. 4 - Calyx *pmfunJe* *quinquepartitus*. Corolla *incurvata* *apertis* *dmhrulata*. Corolla *lobulata*. *fimbria* *burbata*, *lobis* *incurvatis* *Ucinn*. s *fubarqualiboft*. Stigmata 4, *incurvatis* *inruberis* *bilocularibus* *septicida* *bilocularis*. *Upprali* *obtusis*, *septicida* *bilocularis*, *vahtis* *apertis* *D*.

- 30 24 Pterestinia Dili — Pag 204 — Calyx 5-parlilus, lacinia *pottica majott* corolla *bilabiala*, labio superiore emarginato, infenore inlobo Stamina 4, *potUca fertilia*, antheri* *biloculanbus*, *locultt dujunctit* slipilalis, anlica *tlenlta*, v *jinthen* dimidiatts* Stylus simplex Stigma subincrassilum *sacptus ulrmqac ala membranacca cinctum* Capsula rosraia, bisulca, bilotulans, loculicide bivalvi*, \alvu» apice bilidis
- 3025 Lindenberglia Link el Otto — Pflg 265 — Calyx campanulalus, *brcitUr 5-fulus* lacinns saepe foliaceis] Corolla *rtngens*, labio superiore emarginato, mfenore inlobo. Stamina 4, emma ferliha, didynama inclusa, anlbens biloculanbus per paria approximalis, *locults dtjunctts tUpilalu* Capsula oblonga bisulta *loculuult btialut, ditteptmento e margntnbu* in/texts duphcato, demum Itbiro*
- 3025/, Millranfhus Hochsl - Pag. 200 - Corolla paiva bilabtala, faucc(?J non apci la, deflorata miirac tnslar apict captulae ovaltt insidcns
- 3020 siemodU Linn - Pag 200 el 0J8 - Calyx *tubuloso-campanulalus* Mibicqualitr5-parlilus Corolla nngens, labio *tupertore emarginato*, infcrioit tnlobo siimina 4 *ferhlia*, *dtynama tnluta*, annhem *dujuncle btloculanbut*, per paria dpprovlmans Capsula oblonga bisolca biloculans, *loculicide v \$eplicide b\ialut, In h %» b%hd%9 **
- m) ScilBt«phr«cina Blh - Pag 27a - Calyx 5-parlitali Corolla lubulosa, limbi bilabial! labio superiore breviler blfldo, Infenore irifldo. Sumina 4, didy-inma inclusa, anberls bilocularibat, per paria approzlmats, omnibus fertilibus Mjlus simplex, itlgma lolegrom dilatalum. Gaptala *hnearu nltquaeformt* bivalvli, valvis naviculanbut indivtsis.*
3998. Einos Linn — Pag 27a — Calyx aequaliler 5-partitus Corolla *hypocraterimorpha, tubaequaMer* 5-parlita Stamina 4, didynama inclusa, annhem *tonfemdtn untloculanbus* Stigma sub^essile, *utnnqac ala denliformi auclum fapsula ovala beplicide bnalvii biloculans, \alvis» demum biddis*
- 3020 Sulcra Illh — Pag 271 — Calyx bicuqualiltr 5-parlilus (orulla *infutuUbulifonuts*, limbo *aigualitti* 5 parlilo [laciuis broibus MX paltiilibih] Stamina *Jg^aUagMia tnluta*, anherib biloculanbu» Capsula bi^ulca biloculans, *tipticulc DTailli valvit denran blfidit.*
- JOJa D*iarU« Tour. — Pag. 872. — Calyx campanulalus, *decagouut gutnqueden-tatus* Corolla bilabiala, labio aqMrlore orffi(fr« *twrginaio. iofelore irifldo* (biscnalim barbalo] SUMINA 4 *Inclasa dldjuana, anikeris btloculanbus tubglo-IdbniddynStigmStiglanullalulalumCapCapsulobgibgishosibisulca dilolulansMcp-Ufrage btvalctt, valots mdvtvu.*
- *jgi Manila Loureiro — Pag 272 el 452. — Calyx campanulalus *tubaequalUci ft-Adut.* Corolla bilabiala, labio supenore biGdo, Infenore longlore irifido, basi bitfibboso. Stamina 4, inclusa didynama, anlbens biloculanbus, per paria cohaereolibus, (loculis divancalis demum confluentibusj Stigma bilamdiatum Oapsala buocularu loculicide bivalvis, valvis *tnlegrtt, medio teplulifi nt*
- 3P3& fJmitohtl* R Br, "" PflK 272. — Calyx lubulobas, aequaliler 5-fldus < o rolla *tnfundtultformit*, limbo *tubtilabtato* 5-fido Stamina 4, inclusa didjntni, filamentis *aptcc tacpe abruptc mcurvtt v dtlatatu*, anlhens biloculanbus, per paria cobacrmtibus htigma oblique dilalalum. Cappula biloculans bi»ulca, loculuido bivahi^, \alvis demum *bt/iddt*
- 30UJ I\cilullo || Ur — Pig 274 — (alyx *prttmaltcut* quinqueduilalus Corolla bihl»i.iti, hbio siiptnort bilobo, mfenore Irifldo, *lactnia media hjilbosa snmlna* 4 nulusa didjuauui, antlicrib divancato-bilotulanbus Stigma coniplanatum Capsula bil IUIIH^, lotulitide bnahis, val\i> *dtmutn btfidis, maujmtbut m/lui**
- JOJ4 IllpinctiM Null - Pag 274 (»lj\ />) *ttmaticus, tnaiquulttti piufuuU rj-dinlatus* (uiolla bilabi ita *tubaiquaUtu* J hdi, loln» mui^ n illt si min , 4 inilusa duljnama, aullniN di\ MM ilo-hl (uluibus (i|>sul 1 oblin^i 1 i| iulann», loiuliide bnaUis, \ I\|IS IIIM/I * /// n* /lit ut is 1 In it i\ «uf< 1 m I ih

3044. **Antlcharls** Endl. — Pag. 284. — Calyx ebracteolatas, aequaliler 5-parliins. Corolla subaequalier bilabialo-5-parlila. Slamina 2 inclusa, antheris *subsessilibus* divaricato-, demum conflueniim bilocularibus. Capsula pyramidaia bilocularis *loculicide bivalvit, valvis demum septicide bi/idit*.
3045. Hydrotrithe Zuccar. — Pag. 285. — Calyx aequaliler 5-partitus. Corolla infundibuliformis, limbo palente, *aequaliler 5-ldo*. Slamina *duo inclusa*, antheris divaricalo-bilocularibus. Stigma subinfundibuliformi-bilabiatum. Capsula bilocularis, *loculicide bivalvis, valvis inlegris*.
3040. **Uratlola** R. Br. — Pag. 285. — Calyx *bibraeteolatut, aequaliler 5-parlilus*. Corolla bilabiaia, labio superiore emarginalo v. bifido, inferiore trifido aequali. Slamina 4 inclusa, anlicis slerilibus subclavatis, *ferlilium antheris bilocularibut cohaerentibus*. Sligma bilamellalum. Capsula bilocularis, *loculicido bivalvis, valvis demum bifldis*.
3947. **Ilopatrlum** Haraill. — Pag. 288. — Calyx membranaccus semiquinquefidus. Corolla subbilabiata, limbo *oblique quinquefido*, labio inferiore majore. Slamina 4 inclusa, *anttea minima slerilia*, ferlilium antberis bilocularibus cohaerentibus. Sligma dilalalum bilamellalum. Capsula bilocularis seplifragc bivalvis, \alvis demum bifidis.
3048. **Bonn**?** Link et Olio. — Calyx quinquepartitus *subaequalis*. Corollae lubus *extclus*, limbi bllabiato-quinquefidl labio superiore brevior. Slamina 4 inclusa, *duobut potlieit ferilibus, antheris cohaerentibus, slerilibus ad basin labii inferioris*. Capsula *oblonga r. llinearis bilocularif, seplifrage bivalvis*, valvis membranaceis inlegris.
- 3M0. **Klcr#carp»«»** R. Br. — Pag. 201. — Calyx *pentagono-tubulosus* quinquefidus. Corollae lubus calycem aequans, limbi 5-parlili laciniis planis bilabiaiis. Slamina 2, *postice interta*, flumeolis basi gibbis, antheris approximalis bilocularibus. Capsula bilocularis *loculicide bivalvis, valvis inlegris*.
3050. **Pepldium** Delil. - Pag. 291. - Calyx campanulas 5-dcnlalus. Corollac lubus calycis longiludinc, limbi vix bilabiati laciniis 5 subaequalibus. Slamina *vjhPjM** in ««rla, filamentis basi gibbis subappendiculatis incurvis, antheris aptUßmito* bilocularibuf. 8Ugma complanalo-dilauium. Capsula globosa bilocularit; *aptce irregulariter v. subsstifrage rumpens*.
3051. **Mlcrahlhemnm** L. C. Rich. - Pag. 901. - **Cilyt campanolalus, i-dtniatui, anliee fissus. Corollae tubus subglobdsus, faoce contractia, labio superior* bretissimo Irvncalo**, inferiors triparlili lacinia media linear!-ligulaU, apice crenaia. **Slamina 2, poslice inscra, subexserta, filamentis tnedio unidentalis, antheris bilocularibuf.** Capsula bilocularis, scpliTrage bivalvis, valvis marginc planis.
- 3051 **Vandella** Linn. — Pag. 201. — Calyx lubuloso-campanulas, subaeqaaiicr >-denlaius. Corollae tubus cxscrus, limbi bilabiato-quinquefidi labio superiore, brevior. Slamina 4 fomnia ferlilia] did)nama, filamentis *anlicorum elongaiis, t^Ofi appendiculatis*, antheris per paria cohaerentibus, bilocularibus [loculis apice coofluemibuf]. Stigma *bilamellalum v. simplex*. Capsula globosa oblonga v. linearis bilocularis, scplifrage bivalvis, valvis inlegris.
3053. **Toreula** Linn. — Pag. 204. — Calyx lubulosus, lubo *angulato v. alato*, limbo *oblique 5-dentato v. bilabialo*. Corolla *ringens*, labio superiore 2-lobo, inferiore **Irilobo. Slamina 4 didynama inclusa, anlicorum /Uamentis elongatis, basi q»-pendiculaiis**, antheris per paria cohaerentibus, divaricalo-bilocularibus, loculis *demum cunflumlibus*. Stigma bilamellalum. Capsula oblonga *calyce luncor, •epiifragc bivalvis, valvis membranaceis inlegris*.
3054. **Artanema** l>. Don. — Pag. 206. — Calyx *subaequalUvr h-partitus*. Corolla *infundibuliformi-campanulata, limbo subbilabiato quadrifido, lacinia suprrma latiore*, lubo inius *quadrisquamalo*. Filamenla 4 didjuama incliisa anirorum filamentis *elongatis*, basi *appendice brevi obliibo auclis*, antheris In'loruLiriliim per paria *cohaerentibus*. Si.gma bilamellalum. Capsula subgloliow biluiul iris' scptifragc bivalvis, \alvis mcmbraiaicis inlegris.

3055. *Heteranthera* Nees et Mart. — Pag. 297. — Calyx *campanulatus* subaequaliter 5-fidus. Corolla infundibuliformi-campanulata, labio superiore *integritate* inferiore *trilobo concavo longiore*. Stamina 4 didynama inclusa, binorum anterius bilocularibus, longiorum anterius *stylus ampliusculentibus, connectivo postice glanduliferis, loculis tubinaequalibus*. Stigma indivisum. Capsula obovata cotyledonibus presiuscula bilocularis, seplifrage bivalvis, valvis membranaceis integris.
3930. *Hydranthera* Kl. — Pag. 297. — Calyx *A-partitus*, laciniis per paria 3-nerviis obtusis et 1-nerviis acutiusculis. Corolla *infundibuliformis*, limbi *trilobato* lobo uno *majori emarginato*. Stamina *tria* lobis alterna et breviora, anterius bilocularibus. Stigma bilobum. Capsula *calyce aequo* a obovato-subrotunda *mucronata* seplifrage bivalvis, valvis integris. Semina plurima *eylindracea subarcuata*.
- 3017 *Ilyogonon* Endl. — Pag. 297. — Calyx *aequaliter* 5-partitus. Corolla bilabiata, tubo calycem subaequantem, labio superiore *retuso*, inferiore *irifido, basi bicarinato*. Stamina 4 inclusa didynama, anterius bilocularibus, *per paria cochlearibus*. Capsula bilocularis, seplifrage bivalvis, valvis integris; semina plurima minima.
3019. *Lindernia* All. — Pag. 297. — Calyx aequaliter 5-partitus. Corolla *calyce brevior*, tubo ventricoso, fauce contracta, limbo bilabiali, labio superiore brevior bifido, inferiore *irifido*. Stamina 4 didynama inclusa, *filamentis brevissimis*, anterius bilocularibus. Ovarium *biloculare*, stylus simplex, stigma bilamellatum. Capsula oblonga *uniloculari bicalceis*, valvis integris, *columna placentifera libera* Semina plurima minima.
3916. *Conoclinium* Aubl. — Pag. 298. — Calyx *aequaliter* 5-partitus, *bibracteolatus* Corolla *breviter* bilabiata, labio superiore *emarginato*, in inferiore *trifido*. Stamina 4, omnia *fertilia*, didynama, anterius *tagulatis* Styli *pilati* stigma bilobum. Capsula *globosa quadriculca uniloculari quadriculca*, placenta centrali libera emarginata. Semina plurima oblonga.
- Wulffia* 9088. *Conoclinium* Bib. — Pag. 298. — Calyx *aequaliter* 5-partitus, *bibracteolatus* Corolla *breviter* bilabiata, labio superiore *emarginato*, in inferiore *trifido*. Stamina 4, omnia *fertilia*, didynama, anterius *tagulatis* Styli *pilati* stigma bilobum. Capsula *globosa quadriculca uniloculari quadriculca*, placenta centrali libera emarginata. Semina plurima oblonga.

Tribus VII. *BICINERAE* Bth.

Cinchona dentatus. partitus. Corollae limbus 5-fidus v. *aequaliter* 4-fidus, *imbricatus*. laciniis *plainis*. Stamina 4 didynama, *rarius duo* opposita, *anterius unilocularibus*. Stylus simplex, stigma parvum subimpositum. Capsula bivalvis, valvis integris v. *bilidis, rarissime carnosa* *intus isens*.

Sabtribus I. *EUBDCBKERAE* Endl.

Capsula loculicide bivalvis, valvis integris.

3939. *Conoclinium* Lour. — Pag. 299. — Calyx *brodiaeae* lubulonus 5-15-cochlearibus (i(n), *5-dentatus* IKUN). *rarius* 4-dentatus. Corolla *tubus lenis media infaelici*, limbi bilabiati labio superiore *aeque* brevior integro emarginato v. bifido, inferiore *trifido* Stamina 4 inclusa didynama. Capsula bilocularis *ehilice* Imalvis, valvis *obtusis* *nerviis*.
3900. *Hura* Linn. - *Paj?* 301 cl4W. - *r. al* *brodiaeae* *uniloculari* 5-dentato OD-*ulce* IU-nrniH. Corolla *tubhypomorphica*, (ubo I-nui *trilobato* r. *tubulifera* tubaequaliter 5-fido, lacunin *oblongis*. Slanitia 4 didynama una *nuda*. Capsula bilocularis *flattis birattis*, *limb* coriacis*, medio *hrpifon*.*
3061. *Derris* Dili. - Pap. Mt. - Calyx 1-partitus. Corolla *limb* bilabiosa, *limbi* breviter 5-partiti *limb* *oblongis*. *Sininui* -1 inclusa. *antheris* *trifido* *scmhasliti*. (*ijpiula* *u* *oidea* *m* *trata* biloculari *bnahit*, *mltu* *npice* *fii* *i* *...*
3002. *Hura* Linn. - *Paj?* 301 cl4W. - *r. al* *brodiaeae* *uniloculari* 5-dentato OD-*ulce* IU-nrniH. Corolla *tubhypomorphica*, (ubo I-nui *trilobato* r. *tubulifera* tubaequaliter 5-fido, lacunin *oblongis*. Slanitia 4 didynama una *nuda*. Capsula bilocularis *flattis birattis*, *limb* coriacis*, medio *hrpifon*.*

3903 *Cyclini* E. Mey - Pnp 300 Calyx longo lobulosus 5-fidiis. Corolljo lubus *cylindricus*, limbo pariter subaequaliter 5-lobis. Stamina didynarea inclusa 4 Capsula *carnea hinc hinc indurata*?

Subtribus II. HANDLEAE Endl.

Capsula septicida, valvulis bivalvis.

3904 *Zinnia* J. W. Schmidt. - Pag. 306. - Calyx ovalo-lobulosus 5-dentatus *bilobus*. Corollae *persistens lobus elongatus*, basi demum (MSUS, limbo sulurquiduo 5-partito, lacinis *inlegis* & *bifido*. Stamina 4 didynama, posita lubo inclusa, antica fauci inserta, *antheris minoribus* transversis saepe stentibus, *nunc omnino abortiva*. Capsula membranacea v. coriacea.

3905 *Ipomoea* Bib. - Pag. 309. - Calyx *membranaceus, bilobus, fructifer bipartitus*. Corolla persistens, lubo demum *fixo*, fauce latiore, limbo pariter subaequaliter 5-fido. Stamina 4 didynama *prope faucem inserta*, antheris exsertis. Capsula membranacea bilocularis, *septicida bivalvis*.

3900 *Phlox* Bib. - Pag. 310. - Calyx subaequaliter 5-partitus, lacinis margine membranaceo connatis. Corollae *persistens tubus calyce brevior*, limbo pariter subaequaliter 5-fidus. Stamina 4 didynama *exserta*, antheris conformibus. Capsula membranacea bilocularis septicida bivalvis, valvulis bifidis.

3967. *Sphenandra* Bib. - Pag. 310. - Calyx 5-partitus. Corolla *tubulata*, tubo brevissimo, limbo subaequaliter 5-partito lacinis *rotundatis*. Stamina 4 didynama, *fauci inserta* (exserta?) ascendente, antheris conformibus *cuneatis*. Capsula membranacea bilocularis, septicida bivalvis, valvulis apice bifidis.

3908. *Chaenostoma* Bth. — Pag. 311. — Calyx 5-partitus. Corolla *hypocroformis* v. *rotunda* (lubo brevissimo) *subcampanulata*, fauce dilatata, limbo pariter subaequaliter 5-fido. Stamina 4 didynama lubo inserta faucem *acquantia* & *revolvitur* exserta, antheris conformibus. Capsula membranacea bilocularis septemdivisa, valvulis apice bifidis.

3909. *Ipomoea* Blh. — Pag. 314. - Calyx 5-partitus lacinis *hinc hinc subfoliaceis*. *K&QH*emula*, lubo *ehngalo vitoso* posita apice gibbo, limbo *rotundatis* hub-acquantia *Uobium* ft.-M». Stamina 4 didynama *incurva*, antheris conformibus. Capsula membranacea bilocularis bivalvis, valvulis apice bifidis.

397a *Ipomoea* Linn. - Pag. 317. - Calyx 5-partitus lacinis *linearibus* & *subulatis*. Corollae lubus *elongatus* (glaber v. *lomentosus*), limbo aequaliter 5-fido, lacinis 4 supernebus approximatis, omnibus *inlegis* c. *bifido*. Stamina 4 didynama *includa*, antheris conformibus. Capsula membranacea bilocularis septicida bivalvis, valvulis apice bifidis.

Tribus VIII. BUDDLEJAE Bth.

Corollae *rectus*, limbus planus palens aequaliter quadrifidus. Stamina 4 aequalia, omnia fertilia, antheris distantibus bilocularibus. Capsula bilocularis septicida bivalvis.

3971. *Buddleia* Linn. — Pag. 321. — Calyx breviter campanulatus aequaliter vultu *ridens* v. *quadridius*. Corolla campanulata v. *tubulosa aequaliter quadridia*. Antherae 4 *subrotundae biloculares*. Stylus simplex, stigma *incurvatum* simplex. (apsil. Inloculis septicida bivalvis, valvis integris v. *trifidis*, pKuantis coadunatis, demum *liberis*. Semina plurima minima.

397i *Ipomoea* Commers. — Pag. 321. — Calyx campanulatus *incurvatus* aequaliter quadrifidus. *fornix* breviter campanulata, limbo aequaliter quadripartito. *Slimn* 4 *iliformia exserta*, corollae tubo inserta, antheris bilocularibus - *hinc ut in praecedente*.

Tribus IX. VERONICEAE Bth.

Corolla rotata infundibuliformis v. rarius irregulariter bilabiata. Stamina 4 aequalia fertilia v. saepius 2 postica, sterilium rudimentis nullis. Capsula bilocularis loculicide bivalvis, yah is saepissime juxta dissepimentum bifidis, nunc septifraga bivalvis.

3073. *Scoparia* Linn. — Pag. 331. — Calyx *aequaliter quadripartitus*. Corolla *rotata*, fauce pilosa, *aequaliter quadripartita*. Stamina 4 *fauci inserta exserta aequalia*, antheris parallele bilocularibus. Styli simplicis stigma obtusum. Capsula *globota bilocularis septifraga bivalvis*, valvis indivisis, dissepimento contrariis.
- 3973/. • *Gomphostigma* Turczan. — Pag. 452. — Calyx *aequaliter quadripartitus*. Corolla *rotata*, fauce parce pilosa, *aequaliter i-partita*. Stamina 4 *fauci inserta inclusa aequalia*, antheris parallele bilocularibus. Styli simplicis stigma *obovato-capitatum*. Capsula *oblonga bilocularis bivalvis*.
3074. *Geochorda* Cham, et Schleich. — Pag. 333. — Calyx *aequaliter 5-partitus*. Corolla *infundibuliformis subaequaliter 4-partita*. Stamina 4 *breviter exserta aequalia*, antheris parallele bilocularibus. Styli simplicis stigma subcapitalura. Capsula *oblonga acuminata compressiuscula loculicide bivalvis*, valvis medio sepnfens.
3975. *Slbthorpa* Linn. — Pag. 333. — Calyx 5-8-partitus. Corolla *subrotata aequaliter 2-8-partita*. Stamina 4-8 *inclusa aequalia*, antheris parallele bilocularibus, loculis *demum confluentibus*. Capsula *orbiculata subcompressa bilocularis loculicide bivalvis*, valvis medio septa placentifera gerentibus.
3076. *Glossoloma* Arn. — Pag. 334. — Calyx *brevis campanulatus tridentatus*. Corolla *infundibuliformis*, tubo calycem aequante, limbo *subaequaliter 5-lobato*. Stamina 2 *subexserta*, antheris parallele bilocularibus. Stylus simplex, stigma *dilatatum*. Capsula *incomplete bilocularis loculicide bivalvis*, valvis medio septifera.
3077. *Limosella* Linn. — Pag. 334. — Calyx *breviter 5-fidus*. Corolla *campanulata*, limbi *subaequaliter 5-fidi laciniis planis*. Stamina 4 *subexserta didynamica*, media tubo inserta, antheris *unilocularibus*. Styli simplicis stigma *capitatum*. Capsula *unilocularis* bit ab is, *valvis margine plants indivisis*.
3078. *Aniphantus* Torr. - Pag. 335 et OR - Calyx *inaequaliter 5-partitus*. Corolla *infundibuliformi-tubulosa*, limbo *subbilabiato-quadrifido*. Stamina 2 *inclusa*, antheris bilocularibus. Styli simplicis stigma *breviter bifidum*. Capsula *obcordata compressa bilocularis loculicide bivalvis*, valvis medio septifera *indivisis*. Semina plurima lineari-oblonga.
3070. *Veronica* Linn. - Pag. 335. 453 et 038. — Calyx *diphyus v. i-5-partitus*, compressus. Corollae *subrotatae* tubus brevissimus, limbo *4-partito laevigato*, antheris *gerrimis*, postica majore. Stamina 2 *ad basin laevigatae posticae inserta*, antheris bilocularibus, loculis apice *coarctatis*. Capsula *ovata v. obcordata, nunc w. cucurbitata bivalvis*, valvis *inlegens v. bipartitis, nunc septifraga*, valvis dissepimento parallelis.
- 3070/i. *Tetracladum* Turczan. — Pag. 454. - Calyci* *profunde 5-partito* lacinia *inaequales subcordatae*. Corolla *hypocraterimorpha, subaequaliter 4-fida*, Stamina 4, *fauci inserta inclusa*, antheris bilocularibus. Stylus *filiformis ineluctatus*. Stigma *clavatum*. Capsula *globoso-compressa bilocularis, siccitate boahis, ITM vis bipartitis*.
3080. *Faederia* Linn. — Pag. 388 et 030. — Calyx *aequaliter 5-partitus*. Corolla *lobulosa bilabialis* labium superius *integrum v. emarginatum*, in fenestra *tripartitum* Stamina 2 *exserta*, antheris parallele bilocularibus, loculis apice *confluentibus*. Stylus *impleus*. Stigma *capitatum-bilobum*. Capsula *ovata acuta bilocularis, loculicide bivalvis, valvis drum bifidis*.
- MI. C«*Urha*» 40« Dlb. - Pag. 370. - Calyx *5-partitus*. Corolla *imcurva ****** «a, limbo *ovifera-z-fida*, *udala inferior* minore*. Stamina *t₉ fauci Jo*»^{erU}

- exterta*, antheris parallelis bilocularibus, loculis apice confluentibus. Capsula bilocularis, loculicide bivalvis, valvis apice bifidis. *Semina membranaceo-marginata*.
3082. *Wulfenia* Jacq. — Pag. 370 cl 455. — Calyx subaequaliter 4-5-partitus. Corollae tubulosae tubo aequali v. subgibbo, limbo subbilabialim 4-fido, laciniis postica emarginala v. bifida. Stamina 2 inclusa, antheris bilocularibus, loculis demum divaricatis confluentibus. Stylus exserti stigma capitatum. Capsula ovata loculicide bivalvis bilocularis, valvis demum bifidis. *Semina navicularia*.
- 3981 *Caiiopyllanthus** Rih. — Pag. 371. — Calyx inaequaliter 5-fidus. Corollae infundibuliformis tubus incurvus, limbus aequaliter 5-fidus. Stamina 2, poslice inserita inclusa, antheris peltatis unilocularibus (?). Stylus simplicis incurvi stigma incrassatum. *Older a ignota*.
3081. *Gynerium* Mira Pall. - Pag. 371 cl 456. - Calyx spatulaceus, hinc fissus v. bipartitus (laciniis integris v. dentatis). Corollae tubulosae subbilabialae lobum superius inaequaliter emarginatum v. bifidum, inferius 2-4-fidum. Stamina 2, poslice inserita exserta, antheris bilocularibus, loculis apice confluentibus. Stylus simplicis stigma subcapitatum. Capsula bilocularis loculicide bivalvis, valvis indivisis v. subbifidis. *Semina in loculis solitaria v. pauca*.
3085. *Flerorhiza* Moyle. — Pag. 373. — Calyx subaequaliter 5-fidus campanulatus. Corolla calyce brevior campanulata, limbo subaequaliter 4-fido. Stamina 4, faucibus inserta a, longe exserta, antheris bilocularibus, loculis apice confluentibus. Capsula ovata bilocularis loculicide bivalvis, valvis apice bifidis.
3080. *Otiorhiza* Commers. — Pag. 373. — Calyx subaequaliter v. bilabiatus 5-partitus. Corollae infundibuliformis limbus aequaliter et obtuse quinquefidus. Stamina 4, tubo inserita didynama inclusa, cum rudimento quinti, antheris bilocularibus reniformibus. Stigma capitatum subbilobum. Capsula bilocularis loculicide bivalvis, valvis medio septiferis placentas auferentibus.
3087. *Illecebraria* Wall. — Pag. 375. — Calyx 5-partitus. Corolla tubulosa 5-fida subbilabialis, laciniis antheris bilocularibus. Capsula baccata, incomplete bilocularis septifraga bivalvis, valvis demum bifidis, dissepimento apice bifido parallelis.
3088. *Illecebraria* Humb. et Moench. — Pag. 376. - Calyx aequaliter 5-partitus. Corolla tubulosa campanulata bilabialis, labio superiore bilobo, inferiore trifido. Stamina 4, tubo inserita inclusa didynama, antheris bilobis. Ovarium biloculare, placentis dissepimento otiorhizae adaxialiter natis. Stylus simplicis stigma indivisum. *Reliqua ignota*.
3060. *Araucaria* B. K. — Pag. 376. - Calyx aequaliter 5-phyllus. Corolla hypocraterimorpha, limbo aequaliter 4-partito. Stamina 4, faucibus inserita exserta aequalia, antheris cordato-reniformibus bilocularibus, loculis demum confluentibus. Stylus simplicis stigma subglobosum. Capsula ovata bilocularis, septifraga bivalvis, valvis bipartitis. *Semina utrinque quaternis r. pandora, per paria opposita, anguste alata*.

Tribus X. GERARDIEAE Bth.

Corolla campanulata infundibuliformis v. tubulosa, limbo 5-fido piano. Stamina 4 fertilia, antheris discrete bilocularibus (cf. no. 3082). Capsula bilocularis, loculicide v. septicide bivalvis, valvis indivisis v. bifidis.

3000. *Koeberlinia* Kl. et Pav. - Pag. 377. - Calyx longe tubulosus pentagonus, apice 5-fidus. Corollae infundibuliformis tubus longus lenis, limbus ample 5-lobus paucis. Stamina 4, tubo inserita didynama inclusa, antheris basi biaristatis. Stylus simplicis stigma ligulatum. Capsula loculicide bivalvis.
3001. *Physocalyx* Pohl. — Pag. 377. — Calyx coloratus orato-ventricosus, ore contractus 5-dentatus. Corolla infundibuliformi-hypocraterimorpha, limbo subaequaliter 5-loba. Stamina 4, tubo inserita didynama inclusa, antheris basi biaristatis. Capsula loculicide bivalvis, valvis medio septiferis.

- 1992 *Melasma Bergius* — Pag 378 — Calyx foliaceus *demum xinflatus*, apice 5-fidus (orolla infundibuliformis, limbi brevis lacinnis, quinque lalis Stamina 4, tubo inscria didynama inclusa, antheris *basitapiculatis* Stylis triprolicibus stigma subclavatum Capsula loculicide bivalvis, valvis medio septifera
- 1901 *Esterhaeya Mikan* — Pag 370 — Calyx campanulatus 5-dentatus Corollae lubuloso-infundibuliformis limbus subaequaliter 5-lobus Stamina 4, tubo inscria *didynama exserta*, antheris 6 an *acutis*, n *Hostis units* Stylis simplicibus stigma subclavatum Capsula loculicide bivalvis, talus *demum bifidis*
- 1004 *Macranthera Torrey* — Pag 380. et 010 — Calyx campanulatus 5-fidus Corolla *tubulosa*, limbi 5-Gdi palentis lacinus brevibus subaequalibus. Stamina 4, tubo inscria *subaequali*, *longe exserta* Stylis simplicibus stigma subclavatum Capsula subglobo>a acula loculicide bivalvis, valvis integris (°)
- 3995 *Seymeria Prsb* — Pag 381 — Calyx campanulatus, lacinis quinque longe hincanibus Corollae lubus *brevis*, lirabi quinquefidi lacinis oblongis, demum rotato-palenticibus Stamina, 5 tubo inscria *subexserta* Capsula basi globo>a, loculicide bivalvis, valvis demum bifidis *Semina minima alata*
- 3000 Gerardus Linn. — Pag. 381 — Calyx campanulatus quinque-dentatus Corolla (*timpanulata* v *venincoto-lubulosa*, limbi semipatentis. quinquefidi lacinis *tayissine* Infundix Stamina 4, tubo inscria inclusa *didynama* r *ranus tubaequali*, antheris *nunc omnibus perfectis*, nunc duabus *immortibus* Stigma simplex v bilobum Capsula *crossata*, loculicide bivalvis, valvis raris^ime hi fidi
- 3097 1*397, I *Leptorhabdos Schrenk* — Pag. 387 et 010 — Calyx campanulatus 5-fidus Corollae lubus cylindricus, limbus campanulatus subcylindricus 5-fidus *lactenti** *paucifloris bifidis* Stamina 4, tubo inscria *didynama* Capsula compressa loculicide bivalvis, valvis indivisis *Semina in loculis solilana 1 gemma oblonga*.
3008. «i»publa Hamilt - Pag 388 - Calyx campanulatus 5-fidus Corolla infundibuliformis-campanulata, limbi 5-fidi lacinae integrae semipatentes Stamina 4, tubo inscria *inclusa didynama*, antheris *omnibus fertilibus*, loculo altero *polymorfo*, altero *minoris ditsgmls* MriU. Capsula obtusa, loculicide bivalvis^alvis biparvis v bifidis
- 1001 *Kaphalopodium flochst* - Pag 380 — Calyx *bibartolatus* si bacquidius ^p-dentatus (imp millitus (nrolh infundibuliformis subbifidus rotundato-jugit lid 1 ^tiniini I Mibiqniln *bnuht cisnta* basi tubi inscria, antherarum *Inrulu dll*)) *p ilhiufi*) », *///l > mm m diujmte sttnh* [sugma quando-lij< *tnndum* | (apsula loculicide *bnahi*), *al*is integris * .
- 1998 *Ylarrsiphon flochst* — Pag 190 — Calyx 5-partitus, lacinis acuminatis Corollae lubus *ft nun* longissimus, limbi subaequaliter 5-fidi lacinae rotundalobae Stamina 4 *didynama inclusa* antheris lineanibus *umlorulanibus* Capsula *bnai nbhqua murrano-rostrata*, loculicide bivalvis, valvis integris (°).
- 3090 *Harueja Hook* - Pag 300 — Calyx *inlalo-campanulatus* semiquinquefidus lacinis sinubusque marginibus recurvis Corolla *nnyens*, tubo incurvo, fauce nuplenti, labio superiore recurvo bilobato, inferiore patente trilobo Stamina 4, inclusa didynami, antheris *rurum loculo altero frillio oiato*, *atlen elonynto strnli* Stigma *subscrisi* stigma *cypilalo-globosum* Capsula loculicide bivalvis^, valvis diu bifidis
- 3000 *Hamilt* Hartey — Pag 388 — Calyx campanulatus semiquinquefidus. Corolla *tubuloso-clavata*, lobis incurvis, limbi brevis subaequaliter 5-fidi lacinae *latis tmlinratis* Stamina 4, imo tubo inscria *didynama* *autlms di lymis*, *loculo stenit tubulato* (°) *biloculan** plac *nlac* *di* *piim nlo* *ulrinque m^rtac* *multiimulatac* *M*h *hliformis* stigma subclavatum im *li*>suli
- 40(1) *Hamilt* (ham el *Srhrlid* — Piu «W < aht *canjpinuhlu* 1* < * 5-dentatus (orolla oblique campanulata, limbo basi bifidus 5-lobus, lobo infero 10 re majore Mannua 4, lobo intermedio *imluNa dnhiiaiiu*, *aiiluriH* parallelis *biloculanibus* Mjli *mml.cis* stigma *nuras* *Hjium* *Imyuaeforme* Capsula *oblonga* v *emarginata*, loculicide bivalvis, valvis unium bifidis

4001. Phlclrospormuni Bnge. — Pag. 301. — Calyx campanulatus 5-fid us. Corolla *campanulato-ringens*, labio superiore bifido *repliato*, inferiore paullo Ion-gioro tnfidio, *fauce hi ante*. Stamina 4 didynama reciuiscula, ontheris parallelo bilocularibus mucronalis. Stigma bifidum. Capsula rostrata bivalvis.?
4002. Ceniranthra Il. Br. — Pag. 391. — Calyx compressus, *hinc fissus, inde integer v. demum %-3-fidus*. Corolla lubulosa v. infundibuliformis, limbo *patonic v. bdabiato* quinquelobo, lobis inferioribus majoribus. Stamina 4 inclusa, antheris per pjna approximate, loculis parallelis *transversalibus mucronato-calcaralis*. Cap^ula oblonga, loculicide bi\alvis, valvis inlegris v. bifidis.

Trihus XI. RHINANTUEAE Bth.

Corollae limbus bilabiatus, labio superiore concavo, galeato v. lincari, integro v. emarginato, inferiore trifido. Stamina 4 v. rarius 2, antheris discrete bilocularibus. (Cf. no. 4000.) Capsula loculicide bivalvis, valvis medio septiferi*, saepissime intugris.

- 400J. Orthocarpus Null. — Pag. 302. — Calyx *tubuloso-campanulatus, aequaliter quadrifidus*. Corolla *personata*, labio superiore compresso, marginibus reflexis inferiore *concavo*, obsolete Iridentaio. Stamina 4 inclusa didynama, antherarum *loculis inaequalibus*. Stigma vix iTrassatum. Capsulae ovalo-ellipticae va vis inlegrs (?j.
4004. Castilleja Mul. — Pag. 303. — Calyx lobulosus *compressus, antice fissus*, bine 2-4-fidus. Corollae *ringentis* tubus compressus, labium superius *inteyrum lineari-canaliculatum*, inferius saepius brevissimum tnfidum. Stamina 4 didynama *exserta*, antheris *inaequaliter bilocularibus*. Stigma capilatum. Cap^uLic ovaiae valvae inlegrae.

- 4004i. Oncorhynchus Lehm. - Pag. 307. - Calyx *campanulatus** Infidus, lincarii bifidis *lacrata* Ubus. Corollae lubulotae Ijbium Mipenus *canuhculutim*, inrmus breviter trilobuni, supenon adpre^um. Stamina 4 exserta. Siigma c'apiatum. Capsula o^ata.

f laciniae *aruta** ****nr*** CO-
rollam fere "cedentes. Corollae bilabellae labia subaequalia, superiore *calcarato* erecto, breviter bifido. Stamina 4 didynama. iolo..., amberis bilocularibus b«, Zu *altero medifixo terminati*, aUero *filamento infra affixo*.

4000. Triphjua rla Fisch. el Mey. - Pag. 307. - Calyx (obulosus 4-ndun. Corollae *ringentis* tubus *filiformis*, labium superius *indivisum subulatum*, inferioris tnpriloliti laciniae *saccatae*. Stamina 4 didynama, antheris *lincaribus unilocutanh* J mulicis. Stigma oblongum bilobum. Capsula oblonga.

4007. Schwalbea Linn. - Pag. 307. - Calyx *ventricosus-tubulosus, oblique quadrifidus*, laciniae poslice brevissima, antica *nullo longiore et latiore emarginata*. Corolla *ringens*, labio superiore *fornicato integro*, inferiore tnfidio. Stamina 4 didynama inclusa, antheris *aequaliter bilocularibus*. Stigma subincraosotum

4008. Linn.ourouxJa H. B. Kth. - Pag. 307. - Calyx *campanulatus* Mubn«', *uahtvr quadrifidus*. Corolla *ringens*, tubo compresso, labio superiore *galeato mtnno* inferiore *iubarqualiter tnlobo*. Stamina 4 didynama, antice *mserta*, antheris *niformi-sagittalis saepe biaristalis, bilocularibus, slaminum po^ticoruni menl.bul v. nullis*. Stigma rla^alum. Capsula compressa.

4000. Omliaria Mosersclim. - Pag. 308. - Calyx *campanulatus cottatus** sub,,* *qualtvr* 5-fidus, laciniis linearibus, *interdum minonibus interjunctis* (orolla *ringens*, tubo *feupernt tnflato*, labio superiore *galeato integro r. bihd'o mfi.r' r'* tnlobo, paljio gibbo. Mjiuina 4, antica *galeam aequant.a*, post.ca *mclusa an* e lherik bilocularibus *say.ttaUs*. Siigma opium. Copula compressa, locifhn.lf delnscens, di^cpimcnlo \JI>J>» coinectente.

- 4010 Od...<l («. Hull. - Pag. 406 - C.ljx MN, p «u U, u s «*, », », », », », », », 4 Mil., (orolla rmyrii., lobio *suprvion-ya/«.(» .ompnu., ,mnr,,,Ka,,, ,,,,,,, ,,,*

- longiore aequaliter trilobo. Stamina 4 *subexserta* didynama, antheris bilocularibus, basi *bimucronalis*. Stylus *exsertus*. Stigma obtusum.
4011. *Euphrasia* Tournef. — Pag. 401 et 030. — Calyx *campanulatus*, *subaequaliter* 4-fidus. Corolla *ringens*, labio superiore *galeato bifido*, inferiore longiore trifido, laciniis saepius emarginalis. Stamina 4 *inclusa* v. *exserta* didynama, antheris *parallele* bilocularibus *bimucronatis*. Styli *inclusi* stigma *subcapitalum*. Capsulae valvae *indivisae* v. *demum bifidae*.
4012. *Parenjuccella* Viviani. — Pag. 407. — Calyx *membranaceus inflatus* 5-dentatus, dentibus *inaequalibus*. Corollae labium superius *concauum galeatum*, inferius *lincaricanaliculatum*, apice trilobum. Stamina 4 *subaequalia*, antheris *globosis didymis* conniventibus. Stigma *crassum truncatum*. Capsula *subbilocularis* bivalvis, valvis *inflexis dissepimentum incompletum* erQcientibus.
4013. *Slphonostogla* Bib. — Pag. 407. — Calycis *infundibuliformis* lobus elongatus, limbo 4-5-partito. Corollae labium superius *incurtum*, inferioris brevioris laciniis 3 integris. Stamina 4, antheris *parallele* bilocularibus, basi *acutis*. Stigma *incrassato-capitatum*. Capsula *oblonga recta*.
4014. *Bartsia* Linn. — Pag. 407. — Calyx *lubuloso-campanulatus tubaequaliter* 4-fidus. Corolla *ringens*, labium superius *galeatum compressum integerrimum*, inferius *subaequaliter* 4-fidum. Stamina 4 *inclusa* didynama, antheris *basi discretis bimucronatis*. Stigma *subcapitalum*. Capsula *ovalis lurgidula*.
4015. *Bunaea* C. A. Mey. — Pag. 400. — Calyx *lubulosus subaequaliter trifidus*. Corolla *ringens*, labio superiore *galeato tridentato*, inferioris *trifidi longioris laciniis lanceolatis*. Stamina 4 *inclusa* didynama, antheris *basi discretis bimucronatis*. Stigma *subcapitalum*. Capsula *subquadrilocularis*, apice bivalvis.
4016. *Pedicularis* Tournef. — Pag. 400. 432 et 030. — Calyx *subventricosus inaequaliter* quinquedentatus, nunc *bilabialis*, labio superiore *bidentato* v. *integerrimo*, inferiore *tridentato*. Corolla *ringens*, labio superiore *galeato obtuso* v. *rostrato*, inferior* *trifido*, patenle v. *clauso*. Stamina 4 *didynama*, antheris *multiloculis obtusis, acutis v. ealcaratis*. Stigma *capitata* Unn. Capsula *oblique rostrata** v. *rarius subglobosa* *recta*.
4017. *Khlnanthus* M. Bieb. — Pag. 433 et 040. — Calyx *bilabialis*, labio superiore *galeato brevissimè bidentato*, inferiore *bipartito*. Corolla *ringens*, labio superiore *angustissime galeato*, inferiore *amplo trilobo*. Stamina 4 *inclusa* didynama, *longiora circum breviora spiraliter voluta*, antheris *mulicis*. Stylus a *galea vaginali*, stigma *capitalum*. Capsula *compressa, scabra in loculis pauca*.
4018. *Alectorolophus* Hall. — Pag. 434. — Calyx *membranaceus compresso-ventricosus inaequaliter* 4-dentatus. Corolla *ringens*, labio superiore *galeato compresso*, apice *bidentato*, inferiore *subaequaliter trilobo*. Stamina 4 *didynama* *galea inclusa*, antheris *bilocularibus villosis mulicis*. Stylus *subexsertus*, stigma *subcapitalum*. Capsula *compressa, scabra in loculis pauca*.
4019. *Helampyrum* Tournef. — Pag. 435. — Calyx *non inflatus bilabiato-quadridentatus*. Corolla *ringens* v. *subpersonata*, labio superiore *galeato compresso emarginalo, marginibus reflexis*, inferiore *bigibboso trifido*. Stamina 4 *inclusa* didynama, antheris *basi bimucronalis*. Stigma *obtusum*. Capsula *ovalis acomiata*.
4020. *Trochilium* Michel. — Pag. 436. — Calyx 4-5-lobus. Corollae lobus *eylindricus subinflatus*, limbo *aequaliter* 5-lobus, *bilabiolim patenle*. Stamina 4 *didynama inclusa*, antheris *basi bimucronalis*. Stigma *obtusum*. Fructus *subdrupaceus, orbiculatus unilocularis monospermus* *subbivalvis*. Semen *obovatum, umbilico laterali, embryo in apice albuminis carnosus*.

GENERA DUBIA.

4021. *Ciomara* Hi. et Pav. — Pag. 136. — Calyx *aequaliter* 5-partitus. Corollae lobus *curvatus, basi ventricosus*, medio *consistens*, labio *superiore quadrilobo*, inferiore *concauo, appendice recurvata membranacea*. Stamina 4 *didynama* *inclusa* *obtusum*. Stigma *subcapitalum*. Capsula *subbilocularis bivalvis, valvis bilidis*.

4021. **Sanchezia** Rz. cl Pav. — Pag. 436. — Calyx 5-partitus. Corolla *longe lubulosa*, superne constricta > limbi 5-partiti laciniis *revolutis*, duabus *superioribus brevioribus*. Stamina 4 didynama, 2 *exterta fertilia*, antheris basi *biaribralis*, 2 *inclusa ananthera*. Sligna *bifidum*, Capsula bilocularis bivalvis.
4022. Lafuenta Lagasca. — Pag. 430. — Calyx 5-partitus. Corollae labium *superius bifidum*, *inferius trifidum*. Stamina 4 didynama. Capsula bilocularis polysperma.
4023. D'Icero Loureiro. — Pag. 430. — Calyx subaequaliter 5-partitus, laciniis *subulatit villotit*. Corolla *inclusa villosa campanulata*, limbi 4-partiti laciniis *cordatit, una majore*. Stamina 4 didynama pilosa, antheris *profunde bifidit bicornibus*. Stylus *lubum corollae acquans*. Stigma cochleariforme inflexum. Capsula *subnla bilocularis bivalvis*.
- 4023/.. Cobamba Man. Blanco. — Pag. 437. — Calyx *incurvus cylindricus*, acute quinquefidus. Corolla bilabiata, *labiis bifidit*, laciniis inferioris *laliioribus*. Stamina 4, *duo coUalerialia, tertio in/imo, quarto reliquit majore tummo*, antheris magnis. ¹ Stylus *slaminibus brevior*, stigma *revoluto-bifidum*. Capsula unilocularis, semina plurima globosa.
- 4023/> **Tala** Man. Blanco. — Pag. 437. — Calyx *acute 5-dent at us*, *denle pottico majore*. Corollae *tubus incurvus compressus*, limbo *inaequaliter 4-0do*, lacinia *postlica majore*. Stamina 4 didynama, antheris *globulo parvo insidentibus*. Stylus *staminibus brctior*. Stigma *Irilobum*, lobo *postico bilamcllato*. Capsula bilocularis polysperma.
- 4023^1. (onandron Zuccar. — Pag. 437. * — Calyx *quinquepartitit persistent*. Corolla *rotata 5-partita*, laciniis *e basi cordata tanceolalis acutis*, fauce *foveolis 5 totidemque maculis superpositis* cum laciniis *allernantibus*. Stamina 5, imo *tubo inserla*, antheris *cordalis, in tubum conicum coalilis bilocularibus, introrsum longitudinaliter dehitcentibus*. Ovarium *incomplete bilocularc*. Styli *cylindrici stigma cnpitatum subexserlum*.
- 4023A. Poarluni Dcsvx. — Pag. 437. — Calyx *ad basin profunde 5-partilus*. Corolla *lubulosa oblique b-loba*. Stamina 4 didynama *inclusa*. Stylus *clongalus subincurvus*. Capsula bilocularis bivalvis, *loculis dispcrmis*.

* * *

GEKERA &FFINIA.

4024. **Ram«ndia** L. C. Rich. — Pag. 438. — Calyx quinquefidus. Corolla *rololia quinquepartita*, *lobis subaequalibus*, *basi macula barbata instructa*. Stamina 5, *tubo inserla conniventia brevissima*, antheris *eordatis bilocnlaribus*. Stigma *ob-lusum*. Cnpsula *unilocularis seplidde bivalvis*, polysperma.
4025. **Ilalicrlea** Frivaldsky. — Pag. 438. — Calyx quinquefidus. Corolla *infundibuliformi-campanulata 5-fida*, laciniis *duabus posticis brevioribus*. Stamina 1 *inclusa didynama inflexa*, antheris *per paria cohacrentibus bilocularibus*. Capsula *unilocularis seplicide bivalvis polysperma*.
4020. **Obolaria** Linn. — Pag. 438. — Calyx *diphyllus bracteaiformi**. Corollae *canipatulatae laciniae 4 subincisac*. Stamina 4 *inter lacinias inxerta* subdidynama *brcvio*, antheris *subglobosis bilocularibus*. Ovarium unilocularc. Stigma *bifidum tubtettite*. Capsula *ovata bilocularis bivalvis*, *alvis medio placcnlifens*. Semina plurima *minulissima*.
-

OROBAJVCHEAE L. C. Rich.

Flores hermaphroditi v. rarissime unisexuales. Calyx liber persistens gamophyllus 4-5-fidus v. dentatus, nunc oblique (runcatus subunilabialis, nunc hinc antice v. postice fissus, illinc ad basin integer, nunc utrinque fissus, et idco diphyllus. Corollae hypogynae tubus demum supra basin circumscissus, v. tubuloso-subcampanulatus bilabiatus, labio superiore saepios fornicato indifido v. bilobo, inferiore trifido, quandoque obsoleto. Stamina 4 didynama, tubo v. rarius prope faucem inserta, inclusa, rarius subeiserta. Antherae biloculares v. rarissime uniloculares, persistentes, basi saepissime sagittatae, rarius muticae, longitudinaliter dehiscentes. Otarium disco carnosum, saepe obsoleto cinctum, uniloculare, placenta parictibus geminis, nunc biloculare, pluriovulatum. Stylus terminatus simplex, apice inflexus v. rarissime reclusus, stigma saepissime magnum capitatum bilobum, rarius indivisum. Capsula unilocularis, apice v. juxta totam longitudinem bivalvis, valvis utrinque cohaerentibus, septo v. columna libera. Semina plurima minima. Embryo in basi albuminis prope umbilicum excentricus **minimus sobglobosus**.

4182. *Epilphes* Nolt. — Pag. 457. — *Flores polygami*, in fenestris foemineis, superiores hermaphroditi steriles. Calyx bibracteolatus urceolus irregulariter quinque-dentatus. *Hermaphr.* Corollae labium superius formicatum integrum, inferius aequaliter 3-fidum. Stamina 4 inclusa subaequalia, antheris basi carlinaginobimucronatis. Stylus simplex. Stigma capitatum emarginatum. *Foem.* Corolla brevis obsolete 4-dentata, mox ovarium calyptratim tegens. Capsula brevis ovata incomplete bivalvis, valvis medio placentifera.
4183. *Phellipea* Desfont. — Pag. 457. — Flores *bibracteolati*. Calyx *tubulosus* 4-5-dentatus. Corolla *nngens*, labio superiore erecto bifido, inferiore trifido patens* Stamina 4 didynama inclusa, antheris basi bimucronatis. *Otarium postice glandula hypogyna ttpatum*. Stigma capitatum bilobum. Capsula unilocularis, apice bivalvis, valvis basi cohaerentibus.
4184. *ron«ph«lls* Wallr. — Pag. 461. — Calyx *bibracteolatus* >cnlncoso-lubulosus *ipathaceus*, antice ultra medium fissus, postice breviter quadridentatus. Corolla *rtngens*, basi venlncusa, labio superiore integro formicato, inferius brevioribus *ubaequaliter infido. Stamina 4 subaequalia *exserta*, antheris basi bimucronatis. Stigma capitatum bisulcatura. Capsula unilocularis bivalvis
4185. *Or«banche* Linn - Pag. 457 — Flores *ebraeleoiati* (a) *diphyllus*, phyllis discretis v. basi antice aut rarius postice connatis, integris \ incisus* Corolla *rtngens*, labio superiore erecto bilobo, inferius palente trilido staminibus 4 didynama inclusa, loculis basi bimucronatis Ovarium postice *ijumula hypogyna stipalium* Stigma capitatum bilobum Capsula unilocularis incompleto bivalvis, valvis hinc apiceque cohaerentibus
4180. *B«chn«ck«* C. A. Mey - Pag. 478 - *lion* bibracteolatus*. Calyx *tubulosus* 9**btruncatus* *tnaequiter b-dentatus* Corolla *rtngens*, labio superiore erecto fornicato bifido, inferiore abbreviate subbilobo. Stamina 4 didynama *«ffw**

- antherit muticis*. Stylus apice tubulosas, subbilabialis, margino stigmatoso terminatas. Gapsula unilocularis incomplete bivalvis, valvis basi et apice cohaerentibus, medio placenam simplicem gerentiibus.
4187. Clandestine Tournef. — Pag. 479. — Flores *ebracteolati*. Calyx campanulatus 4-fidus. Corolla *ringens*, labio superiore galeato, inferiore brevior trilobo. Stamina 4 didynama *subexterta*, antheris basi bimucronatis. Stigma capitato-bilobum. Capsula unilocularis, apice bivalvis, valvis medio placenam linearem gerentibus. *Semina 4-5 majutcula angulata*.
4188. Latiraca Linn. — Pag. 470. — Flores *ebra teolati*. Calyx *campanulatus* 4-fidus. Corolla *ringent*, labio superiore subfornicato inlegro, inferiore brevior trideniaio. Stamina 4 *subexterta* didynama, antheris basi bimucronatis. Stigma magnum capitato-bilobum. Capsula unilocularis bivalvis, valvis juxta axim placentas gemfnas conflucnes gerentiibus. *Semina plurima subglobosa minima*.
4180. Auoplantlius End). — Pag. 480. — Flores *ebracteolati*. Calyx *tubcampanulatus* 5-fidus. Corolla *tubulota b rev is ventricota* v. longa subincurva, limbo aequaliter bilabialim 5-partito. Stamina 4 inclusa didynama, antheris basi bimucronatis. Stigma obsolete bilobum. Capsula unilocularis bivalvis, valvis inlra marginem ulrinque placenlifcris. *Semina plurima minima*.
4100. Aegnetfa Linn. — Pag. 481. — Flores *ebracteolati*. Calyx *tpathaeut* laxus, *anlice fissus*, poslice acutus. Corollae tubus cylindricus subinoorvas, limbus *tubaequaliter quinque/dut* bilabialis. Stamina 4 inclosa didynama, antheris *per paria* cohaerentibus, apice truncalis, basi acula dehiscenlbas, staminum inferiorum in calcar conicum obtusum productis. Stigma magnum carnosum peltato-cordaium. Capsula *bilocularit* irregulariier bivalvis, valvis placentiferis. *Semina plurima minima*.
4101. Ily«banche Thnbg. — Pag. 482. — Flores *bibracteolati*. Calyx *color at us S-partitit*, laciniis linearibus obtusis. Corolla *ringent* incurva, labio superiore *fornicato* compresso inlegrrimo, inferioris tridentali lacinia media minima. Stamina 4 didynama inclusa, antheris *unilocularibus* pendulis, basi acula dehiscen-tibus. Stigma clavato-incrassatum emarginatum. Capsula *bilocularit* bivalvis, valvis medio placenifcris, columna cenlrali demum libera. *Semina plurima minima*.

GENUS OUBIIM.

4102. Eplrhlranttia* Blume. — Pag. 488. - Calyx *turbimaiut t-dmtatms*. Corolla *ventneota tnfdia* bilabiaia, labio faperloro *concm>o biparUio*, inferiori brevior *fornicato integro*. *Stamen unicum* Inclasum, labio Ineriori adnatom, *membranaceum*, *tylum temivaginant*, antheris 5 v. rarius 4 ellipticis bilocularibus. Stylus stamen aequans, stigmatc capitato. Capsula *globota didyma bilocularit* bivalvis scminibus in loculo *tolilariit* *tjlobotit*.

GENERA AFFINIA.

- 4102/., Ph#11sma Null. - Pag. 482. - Calycis profundo 0-partiti laciniae *tubtpathulatae*. Corolla infundibuliformis, limbo regulariter d-lobo, laciniis imbricalis. Stamina 6 medio tubo inserta inclusa, antheris oblongis bilocularibus. Stylus crassiusculus Inclusus, sligmalo dilatato lobalo dentalo. *Fructut immaturut baccalut, mullilocularit, loculit monotpermit*.
- 4102/., (0861.) Lennoa Llawc et Lexarza. - Pag. 482. - Calyx profunde 8-partitit *coloratut*, laciniit *tubtpathulatit* membranaceis, corolla longioribus. Corollae *tubulotae basi ventricosae* limbus 8-dentatus. Stamina 8 *medio tubo inserta* biserialia inclusa, antheris bilocularibus, loculis nonuisi apice cohaerentibus. Ovarium hemisphaericum multi- [!6-?]loculare, axi crassissima. *Ovula in loculis solitaria ascendentiia*. Stjli inclusi stigma capiellalum. *Frucius. . . . ?*

LABIATAE Juss.

Flores hermaphroditi irregulares, in cymas duas axillares oppositas unilaterales dispositi. Calyx gamophyllus persistens, nunc regularis, 5-dentatus, nunc irregularis obliquus incurvus bilabiatus, dente superiore interdum etanido v. squamiformi. Corolla hypogyna gamopetalata decidua irregularis, limbo 4-5-loba subcampanulata bilabiata v. obliqua, lobis acclivatione imbricalis, supremis exlimis. Stamina libera, corollae tubo inserta, lobis alterna divaricata v. declinata, duo inferiora semper fertilia, duo superiora nunc omnino abortiva v. sterilia, nunc perfecta, inferioribus saepe breviora, subaequalia v. rarius longiora, supremum quintum omnino deficiens v. rarissime rudimentarium. Filamenta filiformia, nuda, barbata v. unidentata. Antherae normales biloculares, loculis connectivi basi insertis, parallelis v. apice divaricatis, longitudinaliter dehiscentibus, nunc discretis [connectivo incrassato v. elongato], nunc in unum coalitis, infimo nonnunquam, superiore rarius abortivo. Ovarium 4-loculare, 4-lobum, gynophoro subcarnoso disciformi insidens. Ovula solitaria, e basi loculi erecta. Stylus inter lobos insertus deciduus, saepissime subaequaliter bifidus, rarissime anclavatus. Stigmata saepius inconspicua. Achaeonia 4 v. abortu pauciora, calyce immutato, rarius aucto rarissime sobbaccato inclusa, epicarpio tunc tenui, nunc duro, incrassato v. carnoso. Semina solitaria erecta. Embryo intra albumen parvissimum carnosum orthotropus.

Tribus I. OCIMOIDEAE Blh.

Stamina declinata. Corolla subbilabiata, lobis quatuor superioribus plerumque subaequalibus, binisve supremis coalitis, infimo declinato plerumque difformi piano v. saepius concato cymbiformi v. saccato. Antherae defloratae saepissime patelliformes.

Sabtribus I. MOSCHOSMEAB Endl.

Corollae laciniatae subaequilongae, lobis angustioribus declinatae subplanae. 3570. *Orimum* Linn. — Pl. 483. — Calyx subcampanulatus 5-dentatus, (lente) supremi ocellum nunc membranae decurrente alatus, dum deflexus. Corolla lobis ciliatis, inclusis exannulatis, faucibus saepius campanulatis, limbi bilobis. Inbilio superioris 4-lobi, inferioris longioris declinato. Staminum 4 declinata, didynamia, superiora basi dente r. plurimum fagiculo tippeculata, antheris lemfurmitibus connectivum multilocularibus. Stylus breviter subaequaliter bifidus. Achaeonia laevis.

3570. (*Orimum* Wall. - Fig. 401. - Calyx obovato-tubulosis, manifeste membranae, inaequaliter 5-dentatus, lobis luteis, utrinque rufis. Corollae tubulosis, lobis campanulatis, lobis superioribus quadrifidis, inferioribus longioribus declinatis. Stamina 4 declinata edentata didynamia, antheris reniformibus, confluentibus bilocularibus. Stylus brevis bifidus, Utricle complanatae dilatatae. Achaeonia laciniata v. rugulosa.

3571. *IHeaona* Blume. — Pag. 400. — Calycis *bilabiali labio superiore divito, inferiore mimmo demum inflexo*. Corollae labium superius *fornicatum*, in fen us longius *mdivisum*. Stamina 4 didynama declinala, *brevionibus ban appendtculalit, anthem untlocularibus tmbeibibus*.
3572. *Acroccephalus* Blh. — Pag. 407. — Calyx ovatus, *fructifer elongatus tubulatus*, basi *gibbus bilabiatus*, labio superiore *tubntegro*, inferiore *ntegro v. 4-dentato*, fauce nuda. Corolla calycem subaequans, labio superiore *i-dentato*, inferiore integro, lacinis omnibus subaequalibus. Stamina 4 declinala, inferora longiora, edentula, antheris *subreniformibus, loculis confluentibus*. Stylus breviter bifidus, lobo inferiore complanato. Achaenia laevia.
3573. *MoHrhosma* Rchb. — Pag. 407. — Calyx ovalis 5-dentatus, *dente supremo majori*, demum declinalis, fauce nuda. Corollae lobus calycem inclusus, labio superiore *brevis 4-fido*, inferiore *integerrimo*, lobis omnibus subaequalibus. Stamina 4 declinalia, inferora longiora edentula, antheris *tubreniformibus, loculis confluentibus*. Stylus apice brevissime bifidus. Achaenia laevia.
3574. *Orthosiphon* Bib. — Pag. 408. — Calyx ovalis-tubulosus 5-dentatus, *dente supremo oculo-membranaceo marginibus decurrentibus alatus*, demum deflexus, fauce nuda. Corollae lobus *extertus*, labio superiore 3-4-fido, in fen ore integerimo concavo. Stamina 4 declinalia *inclata v. externa edentula*, inferioribus longioribus, antheris *subreniformibus, loculis confluentibus*. Stylus apice *clavato-capitato*, breviter emarginatus. Achaenia *punctulata rugata*.

Subtribus D. PLEOTRANTHEAE Endl.

Corollae lacinia infima elongata concava.

3573. *Plectranthus* Hcrit. — Pag. 501. — Calyx campanulatus *acqualiter 5-dentatus v. dente supremo majori, fructifer auctus*, dentibus aene bilabialis v aequalibus. Corollae lobus *extertus*, basi *supra gibbus r calcavitus*, labio superiore 3-4-fido, inferiore integro, saepe longiore. Stamina 4 declinalia edentula, interiora longiora, antheris *tubreniformibus, loculis tapxut confluentibus*. Stylus breviter *tubulato-bifidus*. Achaenia laevia.
3570. *Celastrum* Lour. - Pag. 513 et 040. - Calyx ovalis-campanulatus 3-dentatus, *dente supremo membranaceo marginibus inUrdu decurrentibus*, inferioribus angustioribus, infimis saepe connatis. Corollae lobus *extertus defractus*, labio superiore abbreviato, obtuse 3-4-fido, *inferior inUgro elongata, gentillita multovente*. Stamina 4 declinalia edentula, *ban coalita*, stylus vagrantia, antheris *tubreniformibus**, *loculis confluentibus*. Stylus aequaliter subulato-bifidus. Achaenia *tubglobota lama*.
3577. *Anisochilus* Wall. — Pag. 520. — Calyx ovalis subreclus bilabiatas, labio superiore *integro*, inferiore *truncate integerrimo v. breviter quadridentato*, post unth&in *tupertore inflexo clavatus*. Corollae lobus, *extertus defractus*, fauce subinclinata, labio superiore abbreviato, *obtuse 3-i-fido*. Stamina 4 *herba* edentula inferora longiora, antheris *subreniformibus*, loculis *confluentibus*. Stylus aequaliter subulato-bifidus. Achaenia laevia.
3574. *Aedanthus* Mart. — Pag. 521. — Calyx subcampanulatus, *obsolete dentatus fructifer clausus, basi arcuatus cissus*. Corollae lobus *extertus de curtus*, labio inferiori lato, obtuse 4-dentato. Stamina 4 declinalia edentula, inferora longiora *antheris tubreniformibus, loculis confluentibus*. Stylus breviter subulato-bifidus! Achaenia dorso *concaeva*, intus bifida.
3578. *Illopothronia* Schrank. - Pag. 521. - Calyx 5-fidus, *dente supremo tubulatus*. Corollae bilabiatas labio superiore trilobo, lobis extertibus acutis, *intermedice galeato*, labio inferiore bipartite (Caelera omnia ignola)
3570. *Pycnanthemum* Hook. - Pag. 521. - Calyx ovalis *tubaequaliter* 5-dentatus, dentibus *subulato-spinosis*. Corollae lobus *extertus defractus*, *lacinia inflata* labio

superiore *quadridentalo*. Stamina 4 declinata edenlula, inferiora longiora, antheris *subreniformibus*, *loculis confluentibus*. Stylus brevissime subulalo-bifidus. *Achaenia subglobota laevia*.

- 3579/i. *Becium* Lindl. — Pag. 522. — Calyx *bilabiatus*, labio superiore *dilatato decurrente*, inferiore *truncato ciliato*, apice biseto. Corolla bilabiata, *tubo exserto*, labiis aequalibus, *superiore Irilobo*, *lacinia media fitta*. Stamina 4 declinata longissima, *tuperiora basi dilatata villosa*, inferiora *laevia*, antheris *ovatis glabris*. *Germen ditco quadridentato omnino immertum*. . . . ? *Sligma subulato-bilobum*.

Subtribos m. HTPTIDEAE Endl.

Corollae lacinia infima subslipitata, transverse subcallosa, deinde saccata, per anthesin abrupte dejecta.

3580. *Syncolottemon* E. Meyer. — Pag. 522. — Calyx *inflato-tubulatus* aequaliter 5-dentatus v. dentibus *inferioribus longioribus*. Corollae tubus reclusus *extertus*, labio superiori 4-dentato, inferiore *inlegro concavo*. Stamina 4 declinata edenlula, *corollae tubo adnaia*, inferiora longiora, antheris *oblongis*, *loculis confluentibus*. Stylus brevissime bifidus. *Achaenia*. . . . ?
3581. *Peliodon* Pohl. — Pag. 529. — Calyx *campanulatus* aequaliter 5-dentatus*, *dentibus tubulatis*, in appendicem *pellatam tuboneavam abeuniibus*, *fructifer tubinflatus*. Corollae tubus rectus, fauce subinflata, calycem subaequante, labio eupenore *bifido*, inferioris lobis lateralibus *patentibus oblongis*, medio *tubtipitato*, *basi anguttato* transversim calloso, dein *taccato oblongo*. Stamina 4 edenlula declinata, inferiora longiora, antheris *oxato-reniformibus*, *loculis subconfluentibus*. Stylus breviter bifidus.
3582. *Manyplanthet* Mart. — Pag. 523. — Calyx *campanulatus* aequaliter 5-dentatus, *dentibus lanceolatis*. Corollae *lubaa rectos*, *denies calychnos aequans*, labio superiore *bifido*, et *inrartorit trilobis lobis Uteritibus ovatis tubaeqaallbot*, *infimo taceato aeuminato*. Stamina 4 edenlula, didynama, antheris *ovalo-reniformibus**/*loculis subconfluentibus*. Stylus breviter *complanato-bifidus*. *Achaenia ovoidea tubcymbiformata membranaceo-marginata fimbriata*.
- 3582 1. *Khaphilodon* Srhauer — P. 524 — Calyx *turbinatus*, dentibus 5 subulalis, *quinque v. pluribus brevioribus interjectis*, *fructifer auctus membranaceus*, *sub limbo in alam horizontalem cohariformem producius*. Corollae tubus subcurvatus, labio superiore *bifido patente*, inferioris trilobi laciniis lateralibus *linearibus patentibus*. Stamina 4 edenlula didynama, antheris *subcordato-reniformibus*, *loculis apice subconfluentibus*. *Germinis lobi tres rudimentarii*. Stylus simplex, stigma subbruncatum. *Fructus*. . . . ?
3583. *Hypotit* Jcq. — Pag. 524. — Calyx *ovatus* \. *tubulosus rectus v. obliquus*, acute 5-dentatus [*dentibus taepe arittalitis*]. Corollae labium *tuperiut quadriidum*, inferiore *tacrato indiviso*, ad basin subarticulato. Stamina 4 declinata edenlula, antheris *oiato-reniformibus*, *loculis confluentibus*. Stylus *subulato-bifidus*. *Achaenia 01 idea v. coompressa*, *laevia v. rugosa*, rarissime *alata*.
3584. *Erlope* Humb. et Bonpl. — Pag. 570. — Calyx *turbinatus* aequaliter 5-dentatus, *fructifer auctus nulans*, dentibus *tribus tuperioribus membranaceo-dilatatis*, duobus inferioribus *mutatis*, fauce *tana alba densa clausus*. Corolla declinata» *tubo tubexterto*, fauce valde dilatata, labio superiore *aequaliter quadrilobo*, laciniis intermediis *erectis*, lateralibus *patentibus*, infimo *abrupte dejecta taccato*, *apice tubbidentato*. Stamina 4 didynama, *basi dense pilosa*, antheris *orato-reniformibus*, *loculis confluentibus*. Stylus subaequaliter bifidus. *Achaenia oblonga laevia*.

Snbtribns IT. LAYANDULEAE Endl.

'Corolla bilabiato, labio superiore bilobo, inferiore trilobo. Stamina corollae tubo inclusa.

3585. *Lantana* Linn. — Pag. 572 et 040. — Calyx *ovato-lubulosus* [1-3-rarius 15-nervius] breviter 5-dentatus, dente supremo *lateralibus latiore v. in appendicem dilatata producto*. Corollae *tubus exsertus*, limbi *obliqui laciniis subaequalibus patentibus*. Stamina 4 didynama, *anthera glabra, antheris ovato-reniformibus unilocularibus*. Stylus breviter *complanato-bilobus*. Achaenia *laevia, disci squamis quatuor concavis poslice adnata*.

Tribus II. MENTHOIDEAE Bth.

Corolla subcampanulata v. infundibuliformis, tubo calyce brevior v. vix longior, limbo 4-3-fido, lobis subaequalibus. Stamina distantia recta v. divergentia nec per paria approximate.

Snbtribns I. POGOSTEMAE Endl.

Antherae terminatae confluentim uniloculares. Stamina subdeclinata.

3586. *Pogostemon* Desf. — Pag. 570 et 04a — Calyx *ovato-campanulatus aequaliter 5-dentatus*. Corollae *tubus inelusus*, labio superiore *trifido*, inferiore *indistincto*, lobis omnibus *subaequalibus patentibus*. Stamina 4 *exserta, filamenta nuda «. medio barbata*. Stylus *subulato-bifidus*. Achaenia *laevia*.
3587. *Dysophylla* Blume. — Pag. 570. — Calyx *ovato-campanulatus aequaliter 5-dentatus*. Corollae *tubus inelusus*, limbi *subaequaliter 4-fido lobo supremo integerrimo v. emarginato*. Stamina 4 *exserta, medio barbata*, antheris *rima transversali dehiscentibus*. Stylus *subulato-bifidus*. Achaenia *laevia*.

Snbtribns II. ELSHOLTZIAE Endl.

Elsholtzia versatiles, loculis divaricatis, demum confluentibus. Stamina interdum subsaccata.

3588. *Elsholtzia* Willd. — Pag. 181. — Calyx *ovato-campanulatus, aequaliter 5-dentatus*, fructifer saepe *elongatus*. Corollae *tubus calyce rarius longior, labio superiore concavo emarginato, inferiore trilobo patente*. Stamina 4 *saepe exserta didynama nuda*. Stylus *subulato-bifidus*. Achaenia *laeviuscula ovoidea*.
3589. *Tetradenia* Blh. — Pag. 584. — Calyx *campanulatus 5-dentatus, dente supremo latiore*. Corollae *tubus inelusus*, limbi *campanulatus 5-fido lobis subaequalibus*. Stamina 4 *aequalia nuda, antherarum valvis reflexis*. Stylus breviter *bifidus*. Achaenia . . . ?

Snbtribns ID. HENTHEAE Endl.

Antherae biloculares, loculis parallelis.

3590. *Coleocroca* Sm. — Pag. 584. — Calyx *campanulatus, aequaliter 5-partitus, laciniis plumosis, tubo cum achaeniis maturis coalito*. Corollae *tubus calycem aequans*, limbi *laciniis 4 brevissimis, superiore emarginato*. Stamina 4 *brevissima*, antheris *subsessilibus*. *Discus aequalis eglandulosus*. Stylus *profunde subulato-bilobus*. Achaenia *oblonga subtriquetra, apice villosa*.
3591. *Perilla* Linn. — Pag. 585. — Calyx *campanulatus subaequaliter 5-fidus, demum bilabiatus, labii superioris dente medio minore, inferiore bifido*. Corollae *tubus calycem subaequans*, limbo *brevissime subaequaliter 5-fido*. Stamina 4 *subaequalia nuda*. Stylus *profunde bifidus*. Achaenia *sicca laevia*.
3592. *Isanthus* Michx. — Pag. 585. — Calyx *campanulatus decemneris aequaliter profunde 5-dentatus*. Corolla *calycem rarius superans*, tubo *brevi*, limbi *hinc*

- campanulati lacinus 5 *aequahbut rotundatu* Stamina 4 subaequalia crecla nuda Stylus apice breviter subulalo-bifidus Achaema *oboiala lacunoso-rugosa*
- 3503 Preslla Opitz — Pag 585 — Calyx ovatus aequaliter *quadndentatus*, *dentibus amtalts*, *fauce subtillosa* Corollae tubus *inclusus*, limbi acqjiliter 4-partiti lacinus *inlegns* Stamina 4 breviter *exterta* aequalia glabra Stylus apice subaequahler bifidus Achaema *oblonga la en a*
- 3504 Hentha Linn — Pag 580 — Cilyx lubuloso-campanulatus, *aequahto 5-dentatus* subbilabialis, fauce nuda v *xillosa* Corollae lubus *inclusus* limbi campanulati *quadrtfidt lactnta tupenore latiore Integra* v emarginata Stamina 4 aequalia glabra Stylus breviter biGdus Achaema *sicca lama*
- 3505 Lycopus Linn — Pag 505 — Calyx campanuhtus *aequaliter A-5-dentatus*, fauce nuda Corolla calycem *vtx excedens* campanulala *aequalitet quadnida*. Stamina 2, superior! *nulla v duo stertlia capilellata inclusa*, mfcriora dua *sub-exserta fertiha* nuda Stylus subaequaliter bifidus Achatma *laoia, margtne calloso-incrassala tngona*

Subtribus IT. HERIAHDREIE Endf.

Antherarum loculi disjunct!, connccUvo filiformi.

3506. Merlandra lilh — Pag 506 — Calyx ovatus *btlabtatus*, labio supcnore *con-caco tntegro* v *bretissime tndmlalo, infertore btido* Corollae lubusi calycem *aequans*, limbi subacqualiler *quadrifidi lacinta supertore mleyra | emargmata* Mamma *fertiha plerumque duo infertora*, «upcnora abortna v ranus uno alterove frlili conformi. Stylus subacqualiler bifidus

Tnbus III. MONARDEAE Bth.

Corolla bilabiate. Stamina duo fertilia, infenora, ascendentia. Antherac nunc biloculares, loculis contigaia v. connectivo lincari aftjunctla, loculo altero saepius casso.

Sobtribas I. SILTIAEAE EndL

Connecclivum filiforme cum filamento articulalum.

- 3507 ^alvla Linn — Pag 500 cl 010 — Calyx ovatus v tubuloso-campanulatus *btlabialis*, labio supcnore *tntepro v tndentato*, infcnore *btido*, fauce nuda Corollae tubus *inclusus v exsertus*, labio supcnore *integro v brenter emargtnato*, in fen ore trilobo, lacima intermedia *saepe emargmata* Stamina lupenora *nulla v rudmentana mfcriora duo frlilia, prope faucem tubo inscrta*, aolhens rfiini-diatls, *connectivo elongato, antice ascendente, loculum polhntferum gerenle*, postice deflexo, *loculo altero effoelo i nullo* Stilus apice bilidus Achaema *ovot-deo-tnquetra glabra*, satpius lacvissmia
- 3508 Audlbertla IMh — Pag 070 - Calyx ovalus *bilabtatus*, labio tupenore *ron-caco tntegro t brmter tndentato*, in fen ore bifido Corollae tubus *calycem aequant i exsertus*, labn <upcnor> bifidi lobis patentibus, in ft nor is infidi *medto tatsn** emargmato Stamina *duo infenora fertihta, saepius exserta* superiorum rudimenta *clavala v nulla, connectivo hnean, apice loculum Imearem gerente*, poillice non producto v brevisMnie *acummalo* btylus *brmur*ubulaio-biudu* Achaemia *trtquetra glabra*

Sobtribas II. ROSHARINEAE Endl

tonnectiva parva. Stamina duo fertilia

- 3509 Kvimarlnus Linn - Pag 680 - Calyx suluampanulau» *btlabialis* labio •upenore *tntegro*, infcnore *btido* Corollae tubus *exsertus*, fauco subinflata, labn> subaequalibua, superiore *cricio imargtnaio*, iofcnore *tnUdo*, lacioia *iDlcrmedi*«

- maxima coneava dependenle Stamina exserta, bast breviter untdenlata, anibcns lincanbus subbtlocularibut Stylus inaequaliler bifidus Achaenia laevia%*
- 3600 Monarda Linn — Pag 681 — Calyx tubulosus elongatus, (15-nervius) *acquat hict h-dentatus* Corollae tubus *exserlus v inclusus, labtts hneanbusv oblongtt tubaequahbtu*, supenore credo inlegro v eraarginato, in fen ore apicc breviter Inlobo Stamina 2 infenora fcrllia, *c labto supenore saepius exserta*, supcnorum rudimenta subnuda, filamentis edentulis, fanci inscrtis, anlhens lincanbus subbiloculanbus Stylus subaequaliler bifidus Achaema lae\ia
- J001 Blephilia Raffin — Pag 08J — Calyx ovato-tubulosus, *13-ncrvtus bilabtatus*, dcnlibu* ldbn superions *tribus anstatis*, infcnons *duobus submultctis* Corollae tubus »ubcx* >crilus, labus subaequalibus, supenore *credo tntegro*, mferioris patentis *trtfidi lactnta tntermedta august ion emargtnata* Stamina 2 *tnfertora fer-Mia*, c labio supenore *txscrta*, *supenora sterltta fltformta v nulla*, anthem lincanbus biloculanbus Stylus subaequaliter bifidus Achaema laevia
- 3602 ZUyphora Linn — Pag 681 et 916 — Calyx tubulosus *elongatus 13-neruus bilabntm*, labio supenore /n-, *tnfertore btdentato*, *fauce nllosa* Corollae tubus *itx ixsertus*, labus subaequalibus, supenore *ereclo tnlegro*, *tnfenore palenle tn-fido*, lacima media longiore emarginata Stamina 2 *tnfertora fertlita*, labio supenore *mclusa v eo longtora*, edentula, anlhens lineanbus subbiloculanbus Slyli lobus superior brevissimus Achaenia feicca laevia.
- J002i riadermannla Bngo — Pag 680 — Calyx lubulosus *elongatus 13-ncr\ius bilabialus*, labio *supenore In-*, *tnfenore btdentato*, *fauce mllosa* Corolla fauce campanulato ampliata, labii inrcrioris *lactnta medta lateraltbus breiwte it none btdentato*, *fauce villosa* Corolla fauce campanulata ampliata, labii inferiors *lactnta media laterahbus brevto* et laliore Slamimum supenorom rudimentli nulla, *tnfenoram antherae untloculares*, filamentto parallelac, *connect no mailiculato potlicc appemhculato*, *appcndtcibus midio coniergendbus*, *apict duet amlibus claiiht*, *lotulum stenlem eras sum yerentibus*

Subtnbus III. HORHINEAE Endl.

Connectiva parva. Stamina 4 fertiha.

- J001 Irormlnom Linn - Pag 680 - Calys *bilabtat** *U-ncrvtus*, labio supenoro tridentalo, inrenore biOdo Corollae *lubus i^sertus*, *tntus ptloso-annulatus*, Inbio supenoro *truncalo* emarginato, inferiors trilobi *lactntu brevtbus rotundahs* Stamina 4 didynama fcrliha, *anthers per pana cohaerentibus*, divancato-bilocularibu^ Sjlju^ subulato-bifldus Achaema lacviuscula

Tnlms IV. SATURhINEAE Btl.

Calys acqualiter qumquedentalus v. bilabialus, labio supenoro tridentato, infenore bifido Corollae tubus cahcem YIX acquans, limbi sub-bilabial! labio supenore integro v biOdo, infenore trifido Stamina <Jistantia rccla v. divancata aequaha v. supenonbus brevionbus v omnino abortivis.

Subtnbus I. ORKANEAE Endl.

Calj\ 10-13-ncrvib. Stamina 4 fertilu

- 3664 B>iitropoicoii Htnt - Pag 687 cl 040 - (ilyx lubuloso-cimpanuhus aequihlir'j-dmtatus, fauct villosa Corollae labio supnort subtrttlo biddo infriort patinlc inlido Slamim 4 mclusa didynima ghbra, amluris p iralk. biloculanbus Stilus brevier bifidus, lacinus bubincrassalis Achicnn hctia
- 3004/i. ZwtmrU » >iss - Pig GSA - (al>x o>alo-lubulosus 5-?urn# > tentatus *fauce barbaia* I orullat hbio supinort *pauh brcnutc* brc\icr *bthbo* inftrion jequiliter 3-lobo lar.nu. o\ilibus Sjlju* bnviUr Inlohus I.emus rlii iiorlundali& *Stamina4 biunsna* (lorca nuuti^inn *abortudum* an stmpir ")

3605. *Pycnanthemum* Michx. — Pag. 688. — Calyx *ovato-tubulosus*, 13-nervi, subaequaliter 5-dentatus. Corollae labio superiore *recto piano integro* v. brevissime emarginato, inferiore *aequaliter et obtuse trifido*. Stamina 4 subaequalia v. didynama, *exterta* v. *inclusa*, glabra. Stylus subulato-bifidus. *Achaenia laevia* v. *punctato-rugosa*.
3606. *Monardella* Bib. — Pag. 691. — Calyx saepe *elongatus tubulosus, breviter 5-dentatus*, fauce nuda. Corollae lobus calycem aequans v. breviter exsertus, labio superiore *bifido, inferioris trifidi* laciniis oblongis v. linearibus planis. Stamina 4 subaequalia v. didynama *exserta nuda*, antheris demum *divaricato-bilocularibus*. Stylus brevissime bifidus. *Achaenia laevia*.
3607. *Amaracus* Mch. — Pag. 602. — Calyx ovato-campanulatus, basi lob-nervis, labio superiore *elongato integro* erecto, inferiore *truncato subnullo* v. bideniuculato. Stamina 4 ascendente didynama glabra, antheris *divaricato-bilocularibus*. Styli bifidi lacinia superior brevior. *Achaenia* ?
3608. *Origanum* Linn. — Pag. 603 et 046. — Calyx ovato-lubulosus srialus, *aequaliter 5-partitus* v. *dentibus 3 superioribus longioribus, fauce villosa*. Corollae labio superior* suberecto *emarginato*, inferiore subaequaliter trifido patente. Stamina 4 *exserta subdidynama* glabra, antheris *parallele bilocularibus*. Stylus aequaliter bifidus. *Achaenia laeviuscula*.
3600. *Majarana* Mch. — Pag. 606. — Calyx brevissime campanulatus, *limbo antice fisso, superne complanato orbiculato integerrimo*, fauce nuda. Corollae lobus calycem aequans, labio superiore *erecto emarginato, inferiore subaequaliter trifido*. Stamina 4 *exserta didynama*, glabra, antheris *demum divaricato-bilocularibus*. Stylus subaequaliter bifidus. *Achaenia laevia*.
3610. *Thymus* Linn. — Pag. 607 et 016. — Calyx ovatus |3-nervi bilabiatus, labio superiore *tridentato*, inferiore *bifido*, laciniis subulatis, *fauce villosa*. Corollae lobus *trichnus*, labio superiore *redo emarginato*, inferiore aequaliter trifido v. lacinia media longiore. Stylus 4 m m t a «. *rarius inclusus*, aequalla Y. didynama glabra, antheris *parallele bilocularibus*. Stylus subulato-bifidus. *Achaenia laeviuscula*.
3611. *Satureja* Linn. — Pag. 707. — Calyx campanulatus |0-nervi, *aequaliter bilabiatus* v. *obsolete bilabiatus*, fauce *tub villosa r. nuda*. Corollae labio superiore *erecto integro* v. *emarginato*, inferiore piano subaequaliter trifido. Stamina 4 didynama *exserta glabra*, antheris *parallele bilocularibus*. Stylus subulato-bifidus. *Achaenia laeviuscula*.

Subtribus U. HTSSOPEAE Endl.

Calyi quindecimnervi. Stamina quatuor fertilia.

3612. *Hysopus* Linn. — Pag. 711. — Calyx tubulosus *subobliquus aequaliter 5-dentatus*, fauce nuda. Corollae labio superiore *erecto piano emarginato*, inferiore trilobo, lacinia *media majore*. Stamina 4 *exserta didynama* glabra, antheris *divaricato-bilocularibus*. Stylus subulato-bifidus. *Achaenia ovoideo-triquetra laeviuscula*.

Subtribus III GUNLEAE Endl.

Stamina duo inferiora fertilia.

3613. *Callitriche* Linn. — Pag. 711. — Calyx *fructifer declinatus ovatus subdecem-nervi*, labio superiore *truncato tridentato*, inferiore bifido. Corollae subcampanulatae *faux ampliata*, labio superiore *subaequaliter quadrilobo*, inferiore simplici *declinato longiori dentato* v. *fimbriato*. Stamina 4 *longe exserta*, superioribus brevioribus, saepe *sterilibus*, antheris *divaricato-bilocularibus*. Stylus subaequaliter bifidus. *Achaenia laevia*.
3814. *Coccyza* Linn. — Pag. 713. — Calyx ovato-tubulosus *aequaliter quinquedentatus*, fauce *tridentata* subdecimnervi. Corollae labio superior* *erecto*, saepius

emarginalo, inferiore *trifido palenle*, lacinia intermedia majore, saepe emarginata. Stamina 2 *exserta glabra*, superiorum rudimenta nulla. Stylus breviter subulalo-bifidus. Achaenia laevia.

Tribus V. *MELISSINEAE* Bth.

Calyx 13- rarius 10-nervis quinquedentatus bilabiatus, labio superiore tridentato, inferiore bifido, rarius aequalis. Corollae tubus exsertus v. rarius inclusus, exannulatus, limbus bilabiatus, labio superiore recto integro v. emarginato- bifido subplano v. rarissime galeato, inferiore patente, lobis plant's subacqualibus v. medio saepius latiore integro v. emarginalo. Stamina ascendentia didynama, superioribus brevioribus, interdum abortivis.

3615. Hedeoma Pers. — Pag. 716. — Calyx ovato-lubulosus *bilabiatus*, labio superiore *tridentato*, inferiore *bifido*, fauce *villosa*. Corollae labio superiore *erecto integro subbifido*, inferiore *trifido*, lacinia intermedia *saepe emarginata*. Stamina 2 [*inferiora*] *nuda*, antheris *divergenti-bilocularibus*. Staminum *superiorum rudimenta brevia* v. *nulla*. Stylus breviter et subaequaliter bifidus, \triangleright . lacinia inferiore *elongata complanata*. Achaenia laevia.

3616. Micromerla Bth. - Pag. 718 et 947. - Calyx lubulosus [13-15-striatus] *subaequaliter b-dentatus* v. *subbilabialis*, fauce *saepe villosa*. Corollae tubus calycem saepius non aequans, labio superiore *integro* v. *emarginato*, inferioris trifidi lacinia media *integra* v. *emarginata*, Blamina 4 didynama *edentula*, antheris *conectivo incrassato saepe divergenti bilocularibus*. Stylus aequaliter *subulalo-*, v. *inaequaliter complanato-bifidus*. Achaenia laevia.

3617. Melissa Bib. — Pag. 727. — Calyx lubulosus [13-striatus], labio superiore *palenle tridentato*, inferiore *bifido*, fauce *nuda* v. *villosa*. Corollae tubus saepius *exsertus et incurvus*, labio superiore *integro* v. *emarginalo*, inferioris trilobi lacinia media *integra* v. *emarginata*, omnibus planis. Stamina 4 didynama, superiora interdum eivisa, antherarum *conectivo saepius iocrasmo*. Stylus aequaliter *subulalo-bifidus** v. *UoinU infima longitri reurva complanata*. idM<nU laevia.

3618. Gardoqula Rz. et Pav. — Pag. 138. — Caryi *tubulosus* *submneunus* breviter *5-dentatus* v. *subbilabiatus*. Corollae tubus *longe exsertus rectus* v. *incurvus*, labio superiore *subplano emarginato*, inferioris trilobi lacinia media *latiore*. Stamina 4 didynama, superioribus interdum *sterilibus*, antheris *subdivaricato-bilocularibus*. Stylus subaequaliter bifidus. Achaenia laevia.

3619. Gleehnia Spr. — Pag. 740. — Calyx ovalis 13-nervis *5-dentalis** \ll . *subbilabiatus*, dentibus 2 inferioribus tunc longioribus. Corollae labio superiore *falcato fornicato* v. *galeato*, emarginato v. *semibifido*, labii inferioris trilobi lacinia latera *Ubus Uthoribus*, basi labio superiori saepe *adhaerentibus*. Stamina 2 et labio superiore breviter *exserta glabra*, antheris demum *divaricato-bilocularibus*. Stylus *inaequaliter bifidus*, lacinia inferiore longiore *complanata*. Achaenia *oblonga laevia*.

3620. Kelihia Bth. - Pag. 742. — Calyx tubulosus *sub-13-nervis*, subaequaliter *5-dentalis*, fauce *nuda* v. *villosa*. Corollae tubus *exsertus*, labio superiore *erecto emarginalo piano*, inferioris *subaequaliter 3-fidi* lacinia patentibus. Stamina 2 *ascendentia glabra*, antheris *conectivo crasso divaricato-bilocularibus*. Styli *subaequaliter bifidi* lacinia inferior longior *complanata*. Achaenia *ovoidea glabra*.

3621. Thymra Linn. — Pag. 744. — Calyx oblongus, supra *deplanatus*, labio superiore *tridentato erecto*, inferiore *bifido*, fauce *villosa*. Corollae tubus *subexsertus*, labio superiore *erecto emarginato*, inferioris patentis trifidi lacinia media *majori*. Stamina 4 didynama, antheris *per paria approximatis parallele bilocularibus*. Stylus breviter *subulalo-bifidus*. Achaenia laevia.

- 3022** *Dicerundra* Bth — Pag 745 — Calyx *tubulosus sub-M-nervus*, labio superioris integerrimo in breviter indentalo, inferiore bifido, fauce pilota Corollae tubus exsertus rectus labio superiore erecto o piano vix emarginato, in fenore patente Infido Stamina 4 *didynama atcendentia*, antheris divaricato-bilocularibus loculis apte aequanter acuteque calcaralis Stylus ixillosus, breviter subulato-bifidus Achaema laevia
- 3023** *Pojjogjne* Bth — Pag 745 — (alix *campanulatus* «u6-15-nim«5-dentalus, dentalibus duobus xnfemoribus duplo longioribus Corollae tubus exsertus, xntus ad faucem pilosus, labio superiore subplano erecto integro, in fenore patente Inlobo Stamina 4 *didynama*, antheris parallele bilocularibus mutias Stylus *ullosus*, aequanter subulato-bifidus Achaema .. .⁹

Tribus VI. SCUTELLARINEAE Bth.

Calyx bilabiatus, labio superiore Iruncalo integro >. subindentato. Corollae tubus exsertus ascendens, intus annulatus v. Dudus, limbi labio superiore fornicato. Stamina 4 sub labio superiore ascendente didynamo, inferioribus longioribus.

- 3024** *Prunella* Linn — Pag 745 — Calyx *tubuloso-campanulatus* in eticulato-inenosus, labio superiore lato truncato, breviter indentalo, inferens lacinus duabus lanceolatis Corollae tubus amplus, xntus piloso-annulatus, sub fauce inflatus, deinde contractus, labio superiore erecto galiato inUgro, inferiore dependens Inlobo, lacinia media rotundata concava crenulata Stamina brevis bulentata, dente inferiore antherifero, antheris per paria approximate divaricato-bilocularibus Stylus subulato-bifidus Achaema oblonga laevia
- 3025** *Cleeni** Linn. — Pag 747 — Calyx *campanulatus* \Q-nervus* oblique bilabiatus, labio superiore lato truncato inferior* bifido. Corollae tubus Unuis ascendens, in lobis nodis, labio superiore recto gaUato integro, Inferior!! <f#p#>-dentibus inlobis lobis lateralibus subrectis oblongis, in medio emarginato-bifido Alumni dentalibus gabra, apice bitutit bifida, dente superiore subulato, m/e-itoii unplanato antherifero, antheris per paria approximatis dnaricato-bilocularibus Stylus brevis suhio-quadrifidus Achaema magna orbiculata sub-nerviessa
- 3026** «icu(ellarla Linn — Pag 747 - Calyx *campanulatus bilabiatus*, postantheris rlausus, demum basin usque fissus, labio superiore decidui lobo medio in squamam dorsalem concavam rejecto, inferiore persistente integro. Corollae tubus longus exsertus rectus v incur* u», labio superiore galeato integro r. emarginato, inferioris connexi apice emarginati Kiciniis lateralibus nunc patentibus liberis, nunc cum labio superiore, v rarsissime cum inferiore coalitis Stamina edentata, antheris per paria approximate natis, slammum xnfemoribus dimidiatis, supenioribus cordatis fnocularibus Si)h bifidi lacinia superior brevis im* Achaeta tuberculosa glabra > brevisissime pubescenti-lomentosa
- 3027.** *PerlUmla* II B Kth — Pag 702 — Calyx *campanulatus bilabiatus*, postantheris rlausus demum basin usque fissus, hinc intignis, superioris decidui lobo medio in squamam tertiam, inferiore persistentem Corollae tubus longe exsertus (us circuno-is(iid(ns, fauce dilatata, labio superiore subulato emarginato, inferioribus lobis in media patente emarginata Stamina in lobis, antheris in lobis appniti-tuti* glabris\| stammum inferioribus dimidiatis supenioribus Shlus inat>qii.ilil>r bifidus Uis via laUn inferioribus super-umdentalibus \chancia nembianaceo-alata

Tribus VU. *PROSTANTUEREAE* Bth.

Calyx campanulatus, nunc bilabiatus, labiis planis integris v. inferiore bidentato bifido, nunc aequaliter quinquentatus, fauce intus nuda. Corollae tubus brevis amplus, fauce campanulata, limbo bilabialis, labiis subplanis, superiore emarginato v. bifido, inferiore infido. Stamina 4 didynama, corolla breviora, inferioribus nunc longioribus, nunc abortivis. Achænia coriacea reticulato-rugosa, stylo subsistente.

3028. *Chilodla* R. Br. — Pag. 764. — Calyx campanulatus *bilabiatus*, labio superiore *xntegerrimo, inferiore emarginato*. Corollae *tubus brevis amplus, labio superiore emarginato-bifido, inferioris irifidi lacina media bifida, omnibus patentibus planis* Stamina 4 subaequaliter *inclusa*, antheris parallelo bilocularibus. Stylus breviter et subaequaliter bifidus. Achænia ?
3029. *Cryphia* It Br. — Pag. 704. — Calyx *bibracteolatus bilabiatus clautus*, labiis *integris aequalibus*. Corolla *inclusa nungens, labio superiore galeato brevissimo*, inferioris infidi lacina *media majuscula* Stamina 4 *subaequaliter inclusa*, antheris parallelis bilocularibus. Stylus breviter bifidus. Achænia ?
3030. *Proeunthera* Labillard. — Pag. 704. — Calyx campanulatus *bilabellatus*, labii *xntegris subaequalibus, fructifera clausis*. Corollae tubus brevis amplus, labio superiore recto *emarginato-bifido*, inferioris trilobis medio integro v. bifido. **Stamina 4 glabra, antheris approximate bilocularibus, connectivo subtus calcarato. Stylus subaequaliter bifidus.** Achænia *nucamentacea, subbaccata, demum coriacea reticulato-rugosa*.
3031. *nemlandra* R. Br. - Pag. 769. - Calyx campanulatus *bilabellatus*, labiis *planis, demum clausis*, superiore *integro mucronato*, inferiore *scrobifido*. Corollae *tubus brevis amplus, labio superiore bifido, inferioris infidi lacina media emarginato-bifida, omnibus planis* **Stamina 4 didynama, antheris dimidiatis. Stylus subulato-bifidus.** Achænia *obovato-sublinguata, inter se et cum stulo connata*, apice reticulata.
3032. *Hemigenia* R. Br. - Pag. 770. - Calyx, campanulatus, *aequaliter elprofunde 5-lobus*. Corollae tubus brevis, *intus nudus* >. *barbatus*, labio superiore *subfor-nicato bifido*, inferioris *patentibus infidi lacina media bifida*. Stamina 4 *didynama antheris approximate dimidiatis*, loculo sterili difformi, Maminum superiorum *barbellato*. Stylus subulato-bifidus lacinis brevissimis subaequalibus. Achænia reticulato-rugosa.
- 3032/2. *Atelandra* Lindl. - Pag. 770 - Calyx *bilabellato-bipartitus* molles, labio superiore 2-lobis, inferiore 5-dentato Corollae tubus brevis, labio superiore *latwre emarginato, inferioris Irifidi lacina media concava majore*. **Stamina 4 inclusa antheris glabris dimidiatis.** Stylus brevissimus et inaequaliter bifidus. Achænia *
3033. *Westringia* R. Br. — Pag. 770. — Calyx campanulatus aequilater 5-dentatus 10-nervis. Corollae tubus brevis, labio superiore piano subbifido, inferioris *nervis infidi lacina media subbifida*. Stamina 4 *inclusa creta, superiorum antheris dimidiatis ferilibus, inferiorum siliis bipartitis*. Stylus subulato-bifidus. Achænia coriacea reticulato-rugosa.
3034. *Microcoris* R Br - Pag. 772. — Calyx campanulatus *aequaliter quinquentatus* Corollae tubus calycem aequans, labio superiore credo piano *emarginato-bifido, inferiore patente infido* **Stamina 4 inclusa, superiora ferilia, antheris dimidiatis barbatis, inferiorum siliis antheris bipartitis.** Stylus subaequaliter subulato-bifidus. Achænia *obovata, albicincta villosa*.
- 3034/2. *Perowskia* Karelina - Pag. 772 - Calyx *tubulosus* *5-dentatus*, labio superiore *bifido*, inferiore 5-dentato (Corollae tubus *calycem superans*, labio superioris *5-dentato* piano, inferioris infidi lacina media *marginata* Stamina 2 *superiora*

elongata fertiha dnergenlia, inlhens biloculanbus, duo infertora stertlia breumma Stylus acute bifidus Achaenia pynformia sicca disco elongalo imposila [2-3 slenlia]

Tnbus VIII. NEPEIEAE Bth.

Calyx acquahs v obliquus subbilabialusvc, dentibus supcnoribus majonbus. Corolla inclusa v. exserta, fauce plcrumque inflata, labio supenore subformcato, mferiore patente. Stamina 4 didyaama, supcnoribus longionbus, ascendeotia v. divergentia.

3635 Lophanthus Bth — Pag 773 — Calyx *tubulosus 15-nerms subincurvus* oblique 5-dentalus, denlibus *supenonbus longtonbus* Corollae tubus calycem acquans, labio supenore *tuberecto emargmato - bifido*, infcnons tnfidi lacinia *media lala crenata* Stamina 4 dislantia v *divancata didynama*, anlhens parallele biloculanbus Stylus subulato-bifidus Achaenia sicca laevia

3636 \epeta Bib — Pag 774 el 047 - Calyx (*ubulosus 13-15-nmu, oblique 5-dentatus, saepius incurms, ranus rectus ovatus, ore dentibusque aequaUbus* Corollae tubus *mclususx exserlus* fauce arapliata, labio supenore *ucto subconcaio emargmato-bifido*, inferions palcnlis tnfidi lacinia *media maxima tubbifida* > Integra concava Stamina 4, *inferionbus brevtonbus*, anlhens per pana approximate, *demum dnancalo-bilobu* Stylus subulato-bifidu* Achaenia laevia nuda

3637 Marniorltls Bib — Pag 700 — Calyx *tubuloso-campanulalus tt-5-nervt\$, aequaliter 5-denlatus* Corolla calyce *brenor*, labio supenore *biGdo*, infenons tnfidi lacinus laleralibus erectis, *media lation crenulata* Stamina 4, *tTifenoia brevtona*, anlhens parallele biloculanbus Stylus breviler *j>ubulato - bifidus* Achaenia laevia nuda

3637/, Chamaesphacoa Schrenk — Pag. 701 — Calyx *campanulatus lQ-nervU> tubaequaliter tetaceo-dentatus* Corollae lubus fliformis *exserlus*, labio supenore *piano emargimlo, infenore tnfido bre^i* Stamina 4 *easeria tubacquaha, inlluru. divaricilo-bilorulanbus* Sljlus biddus *ichatma tngona sicca oblonga laei ta u rtiet alatj-mai gtnata*

308 Dracocephalum Linn - Pag 701 el 050 - Uljx *lubulotu* 13-15-nerit<*, ore recto > obliquo 5-dentalus, dente *tupremo taepe maximo, interdum trtbus supenonbus coalitu* Corollae tubus *ban tenuis, saepe extertus*, fauce amplissima, labio supenore erecto *subeoncavo emarginato*, infenons tnfidi lacinia *media maxima subbifida* Stamina 4, *tnfenora bmiora*, anlhens per pana approximate *daancato-biloculanbus* Stylus subulato-bihdus Achaenia lae?ia nuda

3081 Lallemandia Fisch el Mey - Pag 708 - Calyx *tubulosus reetut lb-nerns 5-dcnlalus, dente supremo maximo* Corollae lubus *tenuis inclusus, fauce parum amplnti labio superwrt cannato comphealo clauso, ala lala ttneto, emarginato* infmon* tnfidi lacinia *media majon retusa* Stamina 4, *inferior* brettora, bast barbata,* inlhens per pjna approximate *divaricilo-biloculanbus* Stylus subulato-bifidus Achaenia laeia nuda

3030 Cfdronella Bth - Pag 708 - Calj x *tubuloso-campanulatus iM6-15-nw-tif suboblque 5-dentalus* (orollae lubus *exsertus* labio siiptnorc nclo subpiano *emargmato-bifido* infenons Irifidi *lactma melta maxima* stamina 4, «ⁿ *fenora bteimra* inthens parallele bilocuhnbüN stylus subulato - bifidus Ailiacnn <icca laeia

Trihus IX. STACIIYDEAE Bth.

Calyx irregulariter venosus v. 5-10-nervis aequalis obliquus v. rarius subbilabiatus, 3-10-dentalus. Corollae lubus inclusus v. exsertus, intus saepe annulatus, limbus bilabiatus, labio superiore galcato v. piano intogro v. emarginato, inferiore varice trifido. Stamina 4 ascendentia didynamia, superiora breviora, omnia fertilia v. inferiorum antherae rarissime cassae v. dimidiatae. Achacnia sicca.

Subtribas I. HELITTEAE Endl.

Calyx post anthesin inflatus 2- v. 4-lobus. Corolla longe exserta.

3040. *Melittis* Linn. — Pag. 790. — Calyx *campanulatus** *membranaceus subbilabiatus*, labio superiore lato rotundato bilobo v. breviter 2-3-dentalo, inferioris bifidi laciniis rotundalis. Corollae tubus exsertus exannulatus, labio superiore orbiculato integro subconcavo, inferiore palente trilobo. Stamina 4 didynamia, antheris per paria approximatis divergentibus-bilocularibus. Styli bifidi laciniis ovals. Achacnia laevia v. (enuissime reticulata).
3041. *Physostegia* Bth. — Pag. 800. — Calyx *mox in floro-campanulatus*, subaequaliter 5-dentalus v. subinlegerrimus. Corollae tubus longe exsertus exannulatus, fauce indurata, labio superiore erecto concavo submarginato, inferioris trilobi laciniis rotundalis, media majori emarginata. Stamina didynamia inclusa, antheris parallele bilocularibus. Stylus subulato-bifidus. Achacnia laevia.
3642. *Macbridea* Elliot. — Pag. 800. — Calyx *campanulatus membranaceus trilobus*, lobo superiore oblongo. Corollae tubus longe exsertus exannulatus, labio superiore erecto integro concavo, inferioris brevioris trilobi laciniis rotundalis patentibus. Stamina 4 didynamia, antheris per paria approximatis divaricato-bilocularibus. Stylus brevissime bifidus. Achacnia.....?
3013. *Synandra* Null. — Pag. 801. — Calyx *membranaceus inflato-campanulatus*, subaequaliter 5-dentalus. Corollae tubus longe exsertus exannulatus, labio superiore integro concavo credo, inferioris trifidi patentis lacinia media laevior emarginata. Stamina 4 didynamia hirsuta, antheris glabris divaricato-bilocularibus, locis superioribus obtusis. Stylus inaequaliter bifidus. Achacnia magna subinflato-compressa laevia.

Subtribas n. LAMEAE Endl.

Calyx 5-dentalus, limbo haud dilatato. Corolla subplana v. fornicata. Stamina c tubo exserta.

3044. *Wiedemannia* Fisch. et Mey. — Pag. 801. — Calyx *tubuloso-campanulatus*, labio superiore lanceolato, inferiore porrecto quadrifido, demum faucem claudens. Corollae tubus exsertus, basi annulatus, labio superiore fornicato integro, inferioris trifidi laciniis lateralibus deniformibus. Stamina 4 didynamia, antheris per paria approximatis, demum divaricato-bilocularibus. Stylus acute subaequaliter bifidus. Achacnia *trigona laevia*.
3645. *Iiamluni* Linn. — Pag. 801 et 950. — Calyx *tubuloso-campanulatus aequalis* v. *obliquus* 5-dentalus, denibus superioribus saepe longioribus, apice subulatis. Corollae lubus saepe exsertus nudus v. piloso-annulatus, labio superiore ovalo v. oblongo subgaleato, inferioris trifidi laciniis lateralibus truncatis v. rarius oblongis, denticulo auctis tunc muticis, media substipitata latiore emarginata. Stamina 4 didynamia, antheris per paria approximatis hirsutis r. nudis, demum divaricato-bilocularibus. Stylus subaequaliter bifidus. Achacnia *acute tritruca truncata laevia* r. *tuberculosa*.
3040. *Lagochilus* Hage. — Pag. 808 et 950. — Calyx *tubuloso-campanulatus aequalis* v. *obliquus* 5-dentalus, denibus superioribus saepe longioribus spinosis. Corollae lubus subexsertus annulatus, labio superiore oblongo bifido, inferioris trifidi laciniis lateralibus brevibus acutis, intermedia palente laevia bifida.

- Slamina 4 didynama, anlhens per pana approximate divergntt-bilocularibus,** loculis ciliaris Stylus subulalo-bifidus Achaema acule *ttiquetia, aptce truncata* 3647 Leonurus Linn — Pag 810 el 951 — Calyx *turbinatus 5-nerus 5-dcnlatus,* denlibus *subulato-spmos s, demum patcnlibu«* Corollae tubus *raro exsertus nudus \ oblique annulatus, labio supenorc oblongo integerrimo, bast angustalo, nunc formcato, inferior is patentis infidi lacimu media obcordata* Slamina 4 didynama, anlhens per pana approximate *trantierte btloculanbus* Stylus subulato-bifidus [lacinnis ranus oblusis brcvibus] Achaema *acute inquetra, aptce truncata laevia*
- 3648 Galcopsis Linn — Pag 813 — Calyx tubuloso-campanulatus, subaequaltir** 5-dcnlatus v supenonbus longionbus *spmolutis* Corollae tubus *rectus exsertut exannulatus, labio supenorc otato integro forntcato, infenoris patenlis Infidi lacmia media obcordata % semibifida, potato supra ad loborum sinus dente aucto* Slamina 4 didynama, anlhens biloculanbus, *taliula tertore roiundata a It at a, exterwre nuda* Stylus subulalo-bifidus Achaema *subi olundo-compressa, obsolete reticulata*
- 3649 Anls*meles R Dr — Pag 814 — Calyx oiato-tubulosus aequahter** 5-dcnlatus Corollae lubus *calycem aequans ptloso-annulatus, labio supenore credo oblongo, infenoris majons tnlobi lacmia media emargnato-bifida.* Stamina 4 *didynama exserta, anthcris per pana approximate, longtoium dimtdialis, breiwrum parallele btloculanbus transients* Stylus subacqualiter *bibdus* Achaema *laevia*
- 3650 Starh>B Dtb — Pag 816 ct 051 — Calyx tubuloso-campanulatusb-\0-nents** *aequatis i obhqus, denlibus 5, supenonbus uKcrdum majonbus, ranus bast co ah Us* Corollae tubus *cylmdraceus wclusus v exsittus, ptloso-annulatus v nudus, superne saepc incunus, fauce non dilalala, labio supenorc erecto i subpatente, saepius subfornicato xntegto v nx emargnato, ranus subbifido, inferioris irilobi lacmia media maxima Integra v emarginata* Slamina 4 didynama, anlhens approximalis, demom divaricalo-bilocalanbus Stylus subulalo-biGdus. Achaema *sicca oblata*
- 3651 Sphacele Dili — Fig. 844 — Calyx campanulatus, ft uctifer saepe amphatus,** *profunde (t subacquahter 5-dintatu* relicul ilo—\tIUMIS < orolln luhus atnplus, %ntus basi ptloso-annulatui, I icimis limbi 5 subbilalMJlis, infima majon emarginata* Slamina 4 *subaequaha, anthtns subapproximalis di\crgenli-bilocul, inbus* Stylus subuljlo-bifidus Achaema *laevia*
- 3652 tamlnla (olla — Pag 846 — (aljx campanulatus 10-n<rn# aequaltter** 5-dentatus Corollae tubus *exserlus, super m i entrcosus ptloso-annulatus, limbi >ix bilabiati larima supenorc late rotundita subbifida, lateralibus oblongis, inter* media Integra, omnibus aequalibus* Stiiuna 4 *didynama, bast viUosa, antbcri» di\ancato-biloculanbu!>* Stylus ⁹ Achaema *sitca laevia*
- J653 Lepechlnla Willd — Pag 846 — Calyx reticulato-tenosus tnflato-campanulatus,** Idbio supenorc bidcnlalo, inrenons Infidi *denlibus anslattt* Corolla *calycem aequans nuda, labio supenore recto iiiiiirginato, mfenoris tnldi lamina inlegri«> »ubpatcnlibu«* Sunna 4 *ilniynama, antha is apptoximatts parallelc biloculanbus* Stylus subdcqualiter bifidus Achaema *Mecca latna ngra*

Subtribus III. MARRDBIEAE Endl.

Slamina corollae tubo inclusa

- 36M Cranloicnic Kcbb — Pag 847 — Cal>x o>jlu> il<mun sufojlobotus ^>-dm-** *tatus, fauce tintus villosa (orolljc tubu*» custttus I ibio supmon bretissnno eoncam integro, infenore longiore palente tnldo, lanma media lomjion* Stamina 4 *didynama ascendentia* Stylus subaequalittr bifidus \chjtnia *laeia*
- JtiW Manilla Linn — Pag 847 — (aljx tubulusus* J-1U turns, atqualttet** 5-dentatus, *denlibui spmescenlibus \ dente supumo maxima i tribus supertonbus eoalttw* Corollae lubus *inclusus annulatus v nudus, labio tupenorc erecto*

integro v emarginato, inferens infidi lacinia *media saepe emarginata* Stamina 4, *superiora brevissima, antherae divanato-bilocularibus, inferiorum longiorum dimorphis cassis in difformibus, rarisime conformibus* Stylus inaequaliter bifidus, lacinia superiore tereti, inferiore dilatata Achaena sicca oblusa

3656 **Acrotome** Blh — [Genus quoad species indesciplum] — Calyx tubuloso-campanulatus 10-nervis oblique 5-dentatus Corollae tubus vix exsertus, limbi bilabiali labio superiore erecto integro subformicali, inferiore patente infido, lobo medio latiore. Stamina 4 intra tubum corollae inclusa Stylus inclusus, apice bifidus, lobo superiore truncato, apice stigmalifero, inferiore dilatato, basi superiore amplius, apice et marginibus stigmaloso Achaena sicca aculeo tincta, apice truncata "

3657 **Marrubium** Linn — Pag 856 — Calyx *tubulosus 5-10-nervis, aequanter 5-10-dentatus, dentibus demum palenibus* Corollae tubus *inclusus nudus v subannulatus*, labio superiore ercio *integro v breviter bifido*, inferens palenlis **infidi** lacinia media latiore *saepe emarginata* Stamina 4 didynama, antherae divaricato-bilocularibus, *loculis demum subconluentibus* Stylus breviter cl obtuse bifidus Achaena sicca *obtusata*

Subtribus IT. BALLOTEAE Endl.

Galycis hmbus dilatatus v. 0-10- den talus, nunc ore truncato inter denies submembranacco v. latissime membranaceo-campanulatus. Corollae labium superius saepe compresso-galeatum. Stamina e corollae tubo exserta.

3658 **Ballota** Linn - Pag 862 — Calyx *subinfundibuliformis 10-nervis, dentibus 5-20* Corollae lobus *subinclusus, intus annulatus*, labio superiore credo oblongo emarginato, Inferens infidi palenlis lacinia media emarginata Stamina 4, «*nervi per panam approximate*, demum divanato-bilocularibus Stylus subulato-bifidus Achaena laevigata, apice truncata

3659 **Laslocons** Btl - PaK 867 - Calyx *subcampanulatus 10-nervis aequanter* ^{u"hiri:alU#, ranS!>imC denllcullb} *qu'bubdim mitrj<tl.s* Corollae lobus, *annulatus, longioretrifido*, lacinia media emarginata. Stamina 4, *ban nuda, anther,* per panam approximate dnatcaio-toocutonibus* Stylus. Inaequaliter subulato-bifidus Achaena glabra *triquetra, apice obtusa*

J600 **Roylia** Wall - Pag 867 - Calyx basi *tubulosus 10-nervis*, lacinae 5 erectae *oblongae membranaceae reliculatae* Corolla *calyce breviter*, tubo inclusio *annulato* labio superiore erecto *integro fornicato*, inferiore patente trilobo Stamina 4 didynama, antherae *per panam approximate* divanato-bilocularibus, *loculis demum conluentibus* Stylus aequaliter subulato-bifidus Achaena sicca, apice oblusa

3661 **Oioiteffla** Bib - Pag 867 - Calyx 10-nervis, basi *tubulosus, limbo membranaceo bilabato, labio superiore breviter integro triangulato, inferiore maritimo oxato obtuso* Corollae tubus *inclusus, intus annulatus*, labio superiore oblongo concavo integro, *extus hirsutissimo*, inferens infidi lacinia media latiore emarginata Stamina 4 didynama, basi *nuda, antherae per panam approximate divanato-bilocularibus* Stylus subulato-bifidus Achaena apice obtusa

3662 **Leucas** H Br — Pag 808 — Calyx *tubuloso-campanulatus* rectus v incurvus aequaliter oblique *5-dentatus* Corollae tubus *intus annulatus in nudus* labio superiore concavo *erecto integro* rarisime emarginato, anteriori *longioris* lacinia media maxima. Stamina 4 *didynama, basi nuda* nervi per panam approximalis divanato-subbilocularibus Achaena *incurva, apice obtusa*

J063 **Leonotis** K Br - PaK 878 - Calyx *oialo-tubulosus, apice aculeatus* ^{nu} *obliqua 10-dentata* Corollae lobus *sacpius ejesertus* nervi *nudus* ^{tu} *incompletus*

annulatus, labio superiore erecto elongato integro, infenons palentis tnfidi lacima media >n raajore. Stamina 4 didynama, *basi nuda*, *anthem per pana approximatis dn ancato-biloculanbus* Stylus inaequaliler biGdus. Achaenia apice obiusa

3664. Phlomis Linn ~ Pag 870. — Calyx *tubulosus b-10-stnatus*, *saepius pltcatus*, *ore aequalit truncato v indentato*. Gorollac tubus ttx *exsertus*, *saepius annulatus*, labio superiore *galeato* compresso magno inlegro v. emarginato, in fen ore patenie trilobo. Stamina 4 *didynama nuda*, *superior a tubo corollae adnata*, *basi saepe appendiculata*, anthens sub galea per pana approximate conflucntim biloculanbus. Stylus maequaliter bifidus. Achaenia *tnquetra apice obiusa*, *glabia v. pubescentta*.

3665. Nottchaete Bib. — Pag. 800. — Calyx *tubulosus*, *aptce membranaceus 5-dentatus*, nems 5 sub apice in aristas ngidas *unanatas* productis. Corollae tubus *mclusus exannulatus*, labio superiore *galeato pxlosxssxmo*, mfcrioro patenie subaequahter tnfido. Stamina 4 *didynama*, *basi nuda*, *anthem per pana approximate*, demum divancalo-bilocularibus. Stylus breviiier bifidus. Achaenia *aptce truncata nuda*.

3666 Eremostachys Bnge. — Pag 891. — Calyx *ample lubulosus v infundtubiformis*, *dentibus 5 sptnosts v. limbo maximo membranaceo mucromformibus*. Corollae (ubus *intus annulatus v. nudus*, labio superiore *elongato galeato*, *extus pubescente*, *tnlus marymeque barbato*, infenons trifidi patenlis lacmns subacqualiter rotundatis. Stamina 4 didynama, *supertonbus ti appendiculam obtusam v fimbretam tncrassatts*, antheris per pana approximalis divancalo-biloculanbus Stylus subaequaliler subulalo-bifidus Achacm.i a pice *dvnsisnme pxlosa*

JW7 Erlophyton Dlh. - Pag 892 — Calyx membranaccus *ample campanulatus*, *aequaliter subsposo-b-dentatus* Corollae tubus *mclusus*, labio superiore *compresso galeato*, infenons pam tnfidi lacinns rotundali*. Stamina 4 *didynama*, *superiora basi incrassato-appendiculata*, aolhcns per pana approximalis divancato-bilocularibu». Slylat tubulalo-btBdas. *Achaenia nuda*.

3668 Moluccella Linn. — Pag. 803. — Calyx *amplus obltque campanulatus reticulatus*, *acute 5-10-dentatus* Corollae tubus *mclusus oblique annulatus*, libio superiore erccto *wltqm i emarqmato*, infenons hifidi Kicimia media *obcordala patenti* sumina 4 duhnama, *basi nuda*, *anths in apice filamenti lateraliter pedicellatis dnancato-biloculanbus* Stylus subacqualiter bilobus. Achaenia *acute tnquetra*, *apice truncata*

3660 Hymenocrater Tisch. el Hey — Pag 804 — Calyx *maxtmus patens membranaceus 5-fidus*, lacinns ovatis. Corollae lubus *exsertus*, labio superiore bipartilo, mferions tnfidi lacuna media emnrgmata majoro Stamina *didynama sub labio supenore*, anthens dnancato-biloculanbu!> Stylus subaequaliter bifidus. Acbaema *subotata glabia tuberculata*

3070 IUImskUidla Relz — Pag. 801. — Calyns *subrotato-campanulati memlnanacet subintegen imi* limbus maximum Corollac tubus *elongato-tncurvus nudu*>, labio supenore bilido, infenons tnddi lacinn> Ijleralibus parus reflexis, *intermedia majore oiata*. Stamina 4 d djn.ima *exserta*, *supermra apice dlatato*, antheris biloculanbus Stylus *submdntsus*. *ihaema rugosa subcamosa pet pana cohaerentta*

3070, Ntstlnla Bois* - Pag 894 - ('al)cis lubus *multistitatus oiatus*, *hnibo maximo membranaceo rotato*, ad fauccm in lobnn *subaequales murronatns*, *lⁱⁱⁱ angustatos* diviso (orollac lubus *elongatus subtneunus*, intus nudus, limbo *pano bilabiato*, labio lupenore bre|i bifido, inferior) irilobo, lacuna intorinodia majon omarginata Stamina 4 didynama, *longtnra cum corolla coaltta*, *antheri** biloculanbus Slylut subacqualiter biHdus. Arhacnia *m ata tuberculato-punctaia*

3671. Achy reaper mum Blume - Pag 81> — fjlyt *amplus*, labio *supenoif* «*«<o *trtfido*, *tnftriore parum brevior*e paiento infido Corollae calyce *longions*

- labio tupenore abbreviato emargnalo erccto, infenons semi In full lacinia media majore. Slamina 4 subaequalia ascendentia, anlhens umloculanbus. Stylus brevissime biGdus. Achacnia dorso el apice membranaceo-paleacea.*
- 3072 Colquhounia Wall. — Pag 895. — Cal)i lubuloso-campanulatus 10-ner vis subincurvus 5-denlatus. Corollac lubus exsertus wcuivus, inlus nudus, labio supcnore erecto tntegro, infenons Infidi palenlis lobis breubus aequalibus. Slamina Aduancala ascendentia, anthers demum dnancalo-biloculanbus. Stylus subulato-bihdus. Achaema oblonga tacvia, apice membi anaceo-producta.

Tribus X. PRASIEAE Bth.

Calvi subacqualis. Corolla bilabiata. Stamina quatuor ascendentia didjnama, infenoribus longionbus. Achacnia carnosia subbaccata.

3073. Gomplioctemma Wall. — Pag. 890. - Calyx tubuloio-campanulatus aequaliter 5-dentalus. Corollac lubus rectus, saepius exsertut exannulatus, tupia medium tnflatus, labns subaequalibus, supenore credo tntegro fornicato, infenorerc inhdo Slamina 4 didynama, anlherti tub labio superwre trantverte 6i-locularibus. Stylus subulato-bifidus. Achacnia carnosia.
3074. Phjllottefla Dili. — Pag 898. — Caljx ovalo-tubulosus 10-nervis, lobis 5 otalitt foltareï*, v. breviter 5-dcDlatus. Corolla calyce exterta, taepe incurva exannulata, labio supenoro subpatenie tntegro, inferiore longiore Infido, lacinia media majore. Stamina 4 sub labio superiore ascendentia, anlhens demum divaricalo-biloculanbus. Stylus clavatus subinleger v. breviter divancalo-bifidus Achaenta carnosia.
3075. Stenogyne Bth. — Pag. 900. — Calyx ovato-campanulatus 10-nen is bilabtalus v. 5-fidus, lacinus foliaceis, nunc inaequaliter 5-dentalus. Corollac lubu* exsertus tneurvus ptloso-annulatus, labio supenore erccto cmargmalo, mfrriore patente aquahter 3-fido Stamina 4 sub labio superwre ascendentia, anthm* demum divancato-bilocularibus. Stylus subacquahler bifidus. Achacnia carnosia
3070. Prasiuu Linn. — Pag. 901. — Calyx campanulatus 10-uenti, labio suprNore 1>revtter 3-fido, infenore longius bifido, lactntts omnibus [oltaceis. Corollac lubus inclusus, insû* squamuloso-annutalu*, labio fupenore ovato tntegro, inferiors trifidi lacinia media majore. Slamina 4 sub labio swperiore ascendontia, anlhens demum divaricato-bilocularibus. Stylus subaeqaaliter bifidus. Achacnia....T

Tribus XI. AJUGOIDEAE Bth.

Corollae labium superius nunc brevissimum, nunc fissum, Iaciniis demissis, ranssime crectum fornicatum, inferius elongatum. Stamina 2 v. 4 ascendentia saepissime ciserta, labio opposite. Achaenia magis minusve reticulato-rugosa.

- JO77. Ame*hy»tea Linn. — Pag. 902. — Calyx tubgloboso-campanulatus aequaliter 5-dentatus. Corollae tubus tndutut exannulatus, lacinus limbi 4 supenonbus subaequalibus brevtbus, inferiore majore. Slamina 2, tnferwra, ascendentia, inter lacinids supremas exserta, anlhens bilocularibus, oculis demum subconfluenlibus, staminum supetiorum rudimenta mtnuta. Stylus subaequaliler bifidus. Achacnia i eticulato-rugosa
- 3078 Trlclioctemma Linn. — Pag. 902. — Calyx campanulatus profunde r/Minqueftdus, nunr obliquus resuptnalis, dentibus tribus supenonhus elongaiis, duobuj» inferionhu* brevissimis. Corollac tubus tenuis saepe exsertus, exannulatus, limbi aquahter quincufidi lacinus brevibus. Slamina 4 didynama, tnfenora longtssime exserta, filamentis interdum submonadelphis, antherti subbiloculanbus Stylus subulalo-biGduq. Arharma ... ?
3079. Teuclum Linn. — P.IR 9ttJ — (J|i)x tubuhso-rampanulatus, ranui infintut acqualiler 5-denlatus \ denti* supenore sarpe latiorr Corollae lubus breu's

cxannulatus, limbi laciniis qualuor superioribus subaequalibus v. supremis majoribus, nunc brevissimis subercctis, infima maxima subrolundala, *iaepius concava*. **Stamina 4, inter lacnias supremos exserla didynama, antheris subunilocularibus.** Stylus aequaliter bifidus. *Achaenia magis minusve rugosa.*

3680. **AJuga** Linn. — Pag. 924. — Calyx *ovato-campanulatus subaequaliter 5-dentatus.* **Corollae lubus inclusus v. exsertut, intus saepe piloso-annulatus, rectus r. spiraliter semitortus,** labio superiore brevi emarginalo, inferioris palentis **tri-**fidi lacinia intermedia emarginala v. bifida. **Stamina 4, saepe exserla didynama, antheris di\aricalo-subbilocularibus.** Stylus subaequaliter bifidus. *Acbaenia reticulato-rugosa.*

3681. **Cymarla Dlb.** — Pag. 031. — Calyx *subglobosus aequaliter 5-dentalus, fauce coarclata nuda.* Corollae tubus *subexsertus rectus,* labiis subaequalibus, superiore *integro fornicalo erecto, inferioris patentis tri fidi laciniis subaequalibus.* **Stamina 4 didynama, antheris demum divaricato-bilocularibus.** Styli bifidi lacinia superiore minuta. *Acbaenia ticca rugosa.*

GENUS DUBIUM.

3682. **Hoslundla** Vahl. — Pag. 031. — Calyx *tubulosus striatus 5-dentalus.* Corollae lubus *exsertus,* fauce compressa, labio superiore *erecto ovato gibbo,* inferiore trifido recurvo. **Stamina 4, quorum duo minima sterilia, antheris reniformibus. Stylus apice bifidus. Achaenia calyce baccato decagono, apice dentibus umbilicalo inclusa.**



INDEX

oriiiim, siibordlium, trlbuiim, genei'iun,
scctlouini et synoiymorimi.

(Characteres ordinum et generum omnium in hoc Tolomine eiposilorum inde a
pagina 9*3 qaaerendi sunt)

- Acanthophora* 85.
Acanthopratium 865.
Acheiaria 884.
Aehimeneg 206.
Achyrospermum 895.
Aeinot 727. 729.
•cnUUu 112.
~~Acroset~~ --
•Acrotome 080.,.
Adenosma 205.
Adenoslegia 307.
•Adenostoma 437.
Aeolanthus 521.
Aethiopit 612
Acginclia 481.
Afzelia 381.
Agasztzia 230. •
Ajuga 847. 005.
Ajuga 024.
ijjiffoldeae 002.
Akokanthra 122.
\lcllorolophus 434.
Alectorolophus 408.
Alkekengi 22.
Alonsoa 150
Alopecurus 810
Ahine te 336
Alyuum MO
Amaracu* 002.
Amatula 101.
Amblatum 470.
Amblecta 8J7.
- Amethyslea 002.
Amethystoides 511.
Amphianthus 335. 038.
Anagalloidet 207.
Anarrhinum 186.
Anasrabc 262.
Anblatum 462. 481.
Angelonia 450.
Aniiochiluf 520.
JmitodotUta 110.
Anisodas 22.
Anisomcles 814.
Anisomeles 847. 005.
Anomalae 26.
Anonymot 201.
Anoplanthus 480.
Anoplon 480
Anlirrhmastrum 222
Anilrrhlineae 180.
Antirrhinum 221. 451. OW.
Antirrhinum 180. -183. 186. 188 ij2. 202.
4. p)l.
Antichans 284
Anlhocerci** 235.
Anlliotroche 200.
iphanochilut 581.
Apodoles 526.
Aptosimum 234.
Aragoa 370.
Aragoaccae 376.
>lr^uru# 147. 446.
Aromaria 514.

- ittanema* 2%
isanna 221
Utrodon 873
Atclanriia 770
Alropa 102
Atropa 21 2* 112
Audiberha 070
Aulaja m
iut irula 4N
- Bacopa** 28J
Baea 152
Ballola 557 SI5 805 872
Ballnd 862,-
B a l l o I e a e 802
Barishta 407
Bat/sia 372 302 396 909
BarlMa 407
Bccium 52*2
Helenia 21
Billadonna 103 112
Brlatda 400
Belli nta 2*
Benny < na 802
Bisltna 2JO 4J2
Belontca Sib *M
Heynchia 284
Btgnonta 202.
Blallana 140.
Blcplnlia G83
Bonarola J09
Bonn MI 2>^
*Bos(linnki i |~i**
Borca 2U5
liramta 281
Brarhycat paea 1^0
Br achy eons 200
Brarhyodontet 54 *
Brachyttemum 680
Brolcra 5G0
Bro»allia 2-)0
Brotrallta 200
Bruymanxui 1> 0J4 <U3
BrunfcUia 2H)
Bmm Ila 740
Buclinera 452
Burhntra 200 JOI M& JOF J12 J15 J77
Buclinereae 200
Bud lit a 2(11
Biiflilltji J2I
ButUhja Ut.
Budtlfjr.ie 121.
Buddtji , Irs 5UJ
Bugula 024
Bungea 400
- Butgsdorffia* ^54
//>|</(ropogon 576 504
Bysfropogon G87 046
*Bi/*trnpogon* 558 687 84<
- (aconobea* 281
Caconopca 281
Calaminlha 727
Calammtha 724 7^7
Calceolaria 151
Calceolaria 152 035
Calceolus 513
(allibrachoa 178
(allicarpa 331
CalUchroa 306
Calhslachya 300
(alodracon 192
(alomtlissa 720
(alorh llxlos 370
(alosphace 628
f alostacht/s ft>2
f ali/dermos 22
Campuleja JUO 301
Tampylanihub J71
(antna 174
(antuu 123
Caprana 2&I
Caprarta 263. 200 271 284 J07
Capsicum 32.
Caranga 284
faidiara *U)
*(at dialophu** 837
(aidwlhera H7
(astillejn 393
f afana 781 7S8
< odronclla 706
Ccbia 147 440
Cfiilranilicra 301
(ephalnhl/ptis 5J9
f eramanlhe 104
C'eranthera 715
Ccratorauhs H
(eslr i ncao 114
(Vslrum 114 ftH
test rum 112 123
f Aa^norraInum 188 450
< hiccottlom I ill
f harlostarhys 570
(ha%tui us X||
(haniindtt/s 151 Oil
/ hnmat pithys 928
(hamarsidn ittS HJi.
f A ri wi o r r/« M a 787.
< Imim sph icos 7U0
(husmvinc sQJ

- Chatmonia* 893.
Cheilyclit 082.
 Cbelone 240. 936.
Chelone 241. 373.
Chiastandra 773.
Chilian thm 331.
 Chilodia 764
 Gholekia 580.
Chrysoplenium 334.
Cistanche 461.
 Glandcestina 479.
 Glconia 747.
Clerodendron 90J.
Clinopodium 407. 689. 731 868.
 Gobamba 437.
Cochlidiospermum 335. 453.
 Golebrokia 584.
Coleoides 501.
 Colcus 513. 940.
Coleiu 503.
 Collinsia 231. 035.
 Gollinsonia 711.
 Golpias 254.
 Colquhounia 895.
Columnea 269. 272. 200.
 Conandron 437.
 Conobea 298.
Conobea 268. 277.
Conradia 380.
 Conopholis 464.
Corallophyllum 482.
~~Cornua~~ 43S. 77;
CotylanthenTm ..
Crabovcskya 113.
 Craniolome 847.
 Cryphia 764.
Cryptocarpum 90.
Cryptodracon 793.
 Cuminia 846.
 Cunila 713.
 r«ni7a 716. 718.
 Cunilcac 711.
 Guranga 284.
Curania 284.
Cnrvembryeae 5.
CuUam 578.
Cyanocephalus 530.
Cyclostegia 583.
 Cyncnitim 306.
 Cymaria 931.
 Cynibana 308.
Cymbalaria 1P0. 491.
(ymbochatma 398.
Cynocephalus 225.
Cyrbanlhera 206.
 f'yril/a 273.
 6'yr/a 528.
Cystocodon 381.
Cyslanche 462.

Dargeria 380. 387.
 Dartus 124.
 Dalura 15. 933.
llaturcae 15.
Dendrophlomis 882.
Dentaria 436. 479.
Dentidia 512.
 Dcsfontainia 125.
Ucsfontnlneac 125
Diamosle 268.
Diascia 179.
 Diascia 180.
 Diccrnandra 745.
IHceroi 290.
 Diceros 430.
Dichondra 334.
Dichroma 373.
Ditfls 185.
Dierbachia 125.
Dlgtalcae 240.
 Digitalis 254. 038.
Digitalis 254. 265. 391
 Diplacus 274.
 Diplnnlbcra 240.
Diplophyllum 135
Disandra 333. 334.
Ditaxia 14t
 Dodarlia 272.
 Dodarlia 230.
 Dopalrium 288.
Doraena 124.
 Doralanthera 305.
 Dracoccephalum 700. 950.
Drarocephalum 798. 7K5. 800. 84 >
Drymonphace (109.
 I)uboisi,-i 240.
 Dunalia 122.
Durieua 436.
 />w/ra 17.
 l)}snphjHa 570.

Echinosphare 071
Ehrvtia 113.
 /f/a/tne 190.
Elalinoicds 192.
*hlypha** 433.
 Kllobum 277.
 KMKIK/I.I -WJ.
Msholtziu (I)Q. 570 SK4
 EIsli o ll /l e a < 5*1.
Empedoclea *4X

- Epeteiorhiza* 24.
Epiphejus 457.
Epirhizanthus 482
Eptlhymum 407
Eremostachys 891.
Ertanthera 802.
Erinus 270
Ennus 268 301 J07 314
Enope 570.
Ertophylla 70
Enopyton 892.
Enosphaena 533
Ertostachys 818.
Enoslomum 819
Enotkymui 742
Escobedia 377
Eslerhazya 379
Euanoplion 480.
Eubuchnerae 200
Eucastilleja 393.
Euchroma 391
Eucymba 396
Eulyaum 300
Eumonarda 681
Euphloims 879
Euphrabia 401. 939.
Euphrasia 397 299 399 4JJ.
Euphranoides 299
Eurythraea 23.
Euphrasia 500.
Eusderitii 850.
Euttachya 309
Eustriga 30(1)
- Fabiana** 5
Faldermannia 686
Franciscea 452. 237 930
Freyliana 203
- Galeobdolon* 8M 800
Galeopanax 813.
Galeopsis 165 502 833
Galericulana 757
Galvina 2130.
Gardoquia 73A
Gastromena 452
Gastromerta 23U
Gentiana 58
Geniosporura 494.
Geniosporum 494
Gentiana 342
- Gentiana** 2H0
Gentiana 333
- Gerardia** 381
Gerardia 254. 265 286. J06. 380 381 387.
 388
Gerardieae 377
Germanea 501 518
Gesnera 151
Glechoma 787 830
Gerardieae 740
Globosifera 291.
Glossosiphonia 334
Glossosiphonia 390
Gomphiaefolia 539
Gomphia 430
Gomphia 4)6
Gomphostemma 890
Gomphostemma 264 452
Gomphostemma 113
Gratiola 285
Gratiola 211 214. 288 202 -297
Gratiolaceae 262
Gymnandra 371 456
Gymnandra 524.
Gymnocimum 490
Gymnocyly 744.
Gymnophlomis 880
Gymnophlomis 677
- Haberlea** 438.
Habrothamnus IB. 094.
Haemodoron 401.
Haemodoron 25
Habenaria 262
Habenaria 390
Habenaria 891
Hebe 346
Hedeoma 710.
Hedeoma 717. 718.
Hedeoma 119.
Hedeoma 291.
Hedeoma 687
- Hemianthus** 709.
Hemichloa 452
Hemichloa 770
Hemichloa 178.
Hemichloa 179
Hemichloa 150 HO.
Hemichloa 375
Hemichloa 67H
Hemichloa WH.
Hemichloa 2*0 294
Hemichloa 27M
Hemichloa 295 3ii
Hemichloa 2S2.
Hemichloa 24
Hemichloa H5I

- Uetperolhymut* 718
Ueteranthesxa 749
Heieranlhia 297
Heterocyltx 500
Heleromelysson 7JJ
Ilelerotphaee 672
theroctnum 488
Hibenberpia 125
Ilimeranthus 105
Holmskioldid 894
llolochlaina 02
Holophylla 51
Hornmneae 080
Horminum 080
Horminum 594 010 84b 872
Homemanma 272 292
Hoslundia 931
Uotloma 27J
Hum ma(u 17
Hydranthclium 297
Hydropislon 27J
Hydrotnche 285
Hymenocrater 804
Hymenosphace GM
Hymenospcrmum 390
Uyobanche 4S2
Hyoscjanieae 19
HyobC^amus 19 9JJ
Hyotnjamuhum 19
Hypema 50b
Hypnoticum 104
Hypnotum
Hypolhromia Mfc
 II > p 11 d c a e 582.
Hypsis 524
Hypsis 582
Hysopaeae 711
H(S)OpU» 711
llystopus 570 5M 777
- Ildefonsia** 278
llyogclon 297
Incarvtillea 262
Isinthera 124
Isanlhus 585
Isodon W
Isodontta 10S
/f o/)/e (u 200
Inanihcs 254
- Jaborosa* 10b
Jaborosa 1W.
Jaiiie 446
Jasmtnotdes I(
- Jovellana* 151
Juanulloa 100 934
Junpeba 74
- Keimodracon* 790
Kcithia 742
tot/Ata 743
htchxia 193
/r»ema 691
#fo/?«ta 458
Kurka 503
- 1 ABIATAE 483
Ldfucnlca 430
Lagochilus 808 950
Lagopsis 856
lagotts 372
Lallemandia 798
Lamarckea 14
Lamatckta 14
Lamieae 801
Tamtopts 801
Lamxotyput 805
Lamium 801 950
I amourouxia 393
I asiocorys 807
lattopera 400
I alhraci 479
lathrata 402 479 481
I athyrocarpum 88
Lattbractealae 541
 £a«r«ota 110
Laurena 14
liRTMidiiieae 572
Lavandula 572 040
favandula 775
lacandulaceae 540
Lchmannia 14
l cnoa 482
leonta 072
Lconoiis 878
l < onurus 810 051
Leonurus 851 878
Lcpcchima 840
Irprophora 07
leptandra 300
Lcptamntum 457
irptocarpae 180
Loptorhabdos 2J2. J87 ft]0
 I PUCIS 808
Leurat 807
LciiLotarpus 277
Icucophjllum 37b
Icucoipotu 271

- Phjllpodium 310
 Phjllslegia 898.
 Phj^jhs 22.
Physalodendron 22
Phyaloidet 23
 Ph)>ocal}\ 377
Phytochlama 21
Phytolcucat 869
 PhjsosleRia 800
Phytoxyt 845
 Picrorhi7a 373
Pmarda 291
Piper 30.
Piperella 719
Pin pea 301.
Plagiotit 527.
Plagiottoma 875.
Plantaginella 334.
Platostorn a 496.
Platumum 894.
Plectrantheac 501.
Plectranthut 495. 498.
 Plecctranthus 501.
Plectranthut 497. 513. 520. 493 4*7.
Plethiosphace 618.
 Poanutn 4J7.
 Pogogyne 745
Pogonostemon 040.
 Pogostoma 264.
 Pogoitameae 570.
 Pogostemon 576. 940
Polemonium 125.
Pol mm 918.
Polhchia 804
 Poljarcna 309.
Polydetmta 549.
Poly did i a 12.
Polygama 70.
Poly merit 62
Poiolhda 152
Poitlandta 18.
Pot aloè 3rt.
Prasleae 806.
 Prassium 901.
Prastum 800 819 89*.
PretUa 585.
Pntmatanthut 407
Probotcoideae 41^{h*}
Protopia 431.
 Proslanihera 761
Prostanthereac 704
 Prunella 745
Prunella 497 747.
Pteudanitomelet Oil
Pteudocaptiea 45
Pttudodictamnut 80J.
- Pteudomelitta 726.**
Pteudolhaptut 147. 446
Pteudothymbra 704.
Pterottoechat 574
 Plcrostigma 264.
Pulegnnn 585. 594.
 Pjcnanthcinun* 6A8
Pycnobotryt f108
Pycnonepeta 775
l*ycnotphace 671
 Pycnosiachjs 5*21
Pycnothymut 709.
Pyramidium 510
Pyxtdana 297.
- Racemotac 180.**
 Raphidoph)llum 380.
 Ramondia 438.
Ranaria 281.
 Rcctcmhrjca© 114
Retupmana 774
 Reizia 1-25.
 R elzi accac 1*25.
Rhabdocaulon 74J.
 Rliampuicarpd 305.
 Rhaphiodon 524.
Rhlnantheae 392.
Rhinanthus 439. 040.
 J1M1JMMJ*«# 301. 408. 400. 415 434.
 Rhodochilon 231. 035.
Rhynchocoryt 433.
Rhyncholopha 415.
 /fi:o<j 7J.5.
Roman a 3J0.
Koimarlneae 680.
 Bosraannus 680.
Rotmannut 845.
 Hojlca 867.
 KuNsclia 251. 938
Hustica 8.
Rwjichiana 790.
- Sabbatta 7*20**
^alplgloisIdeae 232
 Snip i gloss is 233.
 Sahid 590. 940.
 £<i't ia 5(H).
ffal%lpae 590.
Stimoloulct £31
 Sanchezia 4J6.
 Sarracha 2^.
 Snturrja 707.
Satureja 727 501. 090. 720 780
NalurrJIneae 687.

SautMurea 775
Schetoerta 178
Schistanthe 151.
Scbislophragraa 270
Scbizanlhus 232 930
Sehtxonepeta 774
Sclarea 615
Scopana 331
Scopana 331 005
Sttffrolia 22
ScQpohna 22.
Seordtum 260 013
Seorodoma 105. 004 Oil 013
Scrophulana 104. 447 035
Scrophularta 151 230 301 452
SCROPHULARIISAE 127
Scutellana 747
Scutellarineae 745
Strpyllum 684 607
Serratula 284
Sesamum 206
Sessea 123
Sestfnia 804
Seymoana 381
Siagonarrhen 504
Bibthorpia 333
Siderilis 847
Sidentu 810 830 814
Stivta 377
Stphonanthae 413.
BtphonoHegia 407
SOLANACBAB 5.
Solandra 18.
8«laneae 22
Solanum 38 033 052 b
Solatium 28 100.
Solenostemon 515
SolenosUgma 125
Sophranantc 208
Sopubia 388
Spathesttigma 205
Spergula 334
Sphacele 844
Sphaeroiheca 278
Sphenandra 310
Sptca 574
Sptcana 524
Squamarta 470
Stachydeae 708
Stachymacrts 751
Slachyobolrys 000
iStochyotypus 824
Slachys 810 051
*5/acAy** 502 7J0 7J7 812 M0 84 > 850
Staechehna 407
Staurophragma 447

Stegtonepeta 774
Stellara 470
Slemodia 206 038
Stemodta 205
Siemodtacra 260
Stenochtlum 308.
Siennyne 000
Sligmalococca 125
Stoechas 572
Stramoma 17
Stramonium 15
Streptopodtum 902
Slinga 200
Subinermia 75
Suanolloia 0J4
SymphyIlium 284
Synandra 801
Syncoloslemon 522

Tabacum 7
Tabacus 8
Toia 437
Tecomaxochttl 10
Teedia 203
Tetradcma 584
Telrahtl 813
Telrahitum 8J3
Telranema 2>1 452 0J8
Telraulacium 455
Ttucrium 002
r^uctum 780 080
TVitert« 004
Teutroptu 001
Thapsandra 446.
Tbymbra 744
Thymbra 080 705
Thymus 707 040
Thymus 400 5W 084 000 709 719 727
Tillmanma 297
Tittmannia 280 292
Iorema 294
Torema 291 293
Ton Mn 78
Tozzia 430
Tragortgnnum 097 709
Tnchotphaet ta 5J7
Inchostema 585
Tnchosterama 002
Tnguera 124
Inonjchion 457
Triplysaria 307
Inticum 435
Tnxago 408 831
7W/ia 080
Fylacaniha 178

VUoa 100. 034.
Ulnexa &40.
Umbellana 563
Usterta 220
Utedaha 274
Uicarotcta 407

Vandellia 201
Vandelha 280 204
Irni/ia 1W
 >erbasce<<e 127
Verbascum 127 430 KM
Verbaicum l&l 17a 440
Veronica 335 4M 03*
Veronica 200 fe<. J31 338 300 370 ?7J
 45J
Veronacastrum 300
Vestia 123.
 \eslleae 123
 \%rgulana 370
Vrolckia 207

Wemea 577
Westnngia 770
Whalleya 22.

Wiedemanma 801
Hilhchia 207
Withama 101
Wttharta 101
Wilhermgia 20.
Wulfonia 455. 570
*Hu//ema*300.

Xanthiophaea 5J8
 \rnopoma 725
 \uare>ia 264*
XylodonUş 5tf

Irmeloflia 801

Zaluiiantkya 300
Zap am a 521
Zalana 088
Zizyphora (H4 08b
Znyphora 080 710 718 040
Zielenia 841
Zomia 705 708
Zygos 725