



Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

780-25
Class No. 450.95
Book No. INR. 6
Acc. No. 61298



**PLANTARUM
HORTI BOTANICI
VINDOBONENSIS
CENTURIA PRIMA.**


HORTUS BOTANICUS
VINDOBONENSIS,
SEU
PLANTARUM RARIORUM,
Q U J€
IN HORTO BOTAKICO VINDOBONENSI,
AUGUSTISSIM^
MARINE THE RESIJE
MUNIFICENTIA REGIA
IN
UNIVERSITATIS PATRIvE
EXCELLENS ORNAMENTUM PUBLICAMQ.UE UTILITATEM
EXSTRUCT (J,
COLUNTUR,
ICONES COLORATIE ET SUCCINCT.£ DESCRIPTIONES.
CURA ET SUMPTIBUS
NICOLAI JOSEPHI JACQUIN
BOTANICES PROFESSORIS.



VINDOBON&,
TYPIS LFOPOLDI JOANNIS KALIWODA,
AULA IMPERIALIS TYPOGRAPHI

MDCCCLXX

Exemplar 99-



K.NTLICATIO

VA o', puhiua, n,U

It, <7 tr.-lfi;-> •

HEtXj Ijmiethm dypofour
FF.Calidurum altar
G.Calidurum dominus.


III LHub**•
JILxitUini pn> • evnde
primp r,r
turn .

M M . N-ili-i-tat>! <•,*' turtutan erub ••<•' h^tnm
in /{(7-7-i;i, •!(); agentbu
TM t-ecUpire plontii
•cmttCcv
j cent*

ptrmnant .L-
nostrum frtnkes, .

pf
•(W) sub
die nos
re itf-tir. tune

SS.L&• ,7,v-
TT-
monasterium
aber al-Norham
Concordia. But<eder*
V. Edicula ante



AUGUSTISSIM.E,

INVICTISSIMM AC GLORIOSISSIMyE

R O M A N O R U M

IMPERATRICI,

MARLE THERESLE,

HUNGARIIE, BOHEMIA, DALMATIYE,

CROATIA, SLAVONIEQUE

REGIN^,

ARCHIDUCI AUSTRIA,

&c. &c, &c.

D O M I N G S U M

CLEMENTISSIM^.

AUGUSTISSIMA
I M P E R A T R I X,
REGINA,
DOMINA, DOMINA
CLEMENTISSIMA!



juum tor tantaqne fiiperant monnmcnra illuftria fftftigii
illius, ad quod, TE regnanc 0* cur ante populo rum
TUORUMgloriamatqucfelicitaccni, cum inaliis regnisTUIS,
mm quam maxime in celberrima hac urbe, evccttc funtScientise
& Artcs liberalcs, ut ha¹ una TEcuni folium adfcendifle vidcri
pofTint; turn ccrte inter ilia numeran omnino merebitur Hortus
elefantiflinius, quo nunc iupcibit alma \indoboneniis Acad-
emia, quiqc non minus ad ultimos transmittet nepotes immenfam
TUAM lihcraiitatcm, ftvorcmquc ilium flngulnrenT, quo digna-
ris complccti omne difcipiinarum genus.

Ex hoc Horto colleclas rariores plantas ubmiffiflime depono
ad pedes M A JESTATIS TU/E. Exftruclus ille fuftcntatusque

Regia TUA Muniicentia, **nihilakrepoteft**, quod non fir totum
TUUM riopriisigitur IK~~nefactis~~ annue, **DOMINA AUGU-**,
STISSLIMA; dumquc \pateri S, prudircluh auipiciN 'II fS, quod
fine illis non funcxilict, opus, adder ifta mihiClcmenria **animum**,
ut captisinitcmaiaccr, & novxgrarixmcmor, duni vivam, *eto.*

SACR ^: CÆS AR *& REGIJB'^UE
• MAJESTATIS TIJÆ

CLIXTUM INFIMUS

NICOLAU^S JOSEPHUS JACQJL1N

PR^AFATIO.



*quo tempore AUGUSTORUM MUNIFICENTIA Jkrrexit, fforuitque Hortus Beta-
3=^BS!^fc WVw Vindobonenjis•, rtfl-/// bic Jhpcrbivit Usque
rariffimis plantis, quibus iSum, in nobilefum incrementvm, Jhu
diiqiie Botanici hujatis provwthnem, virorvm noil paucorum, &
;r herbaria bene merenthm, ditaverat benevolentia. Illarum mmc,
vti fieri fapc folet i periit band cxiguus numcrus ; & aliquant*
etiam cum ipfa interiit ipja memoria : qvas inter taincn omnino
fitiffent, quorum kgitima cognitio ceififet in ret herbaria aug-
mentum. Superftites rwvaiqte bofpites nejimik maneat fatum,
barum del'mcationes deferipüoiusque (ffierre Botanicis in hoc ope-
re fnfccpi. Scopus frit \ illas proponere tales, ut agrejuperejfe
dnbinm in earundem ah sffinibus dipniiione poff/t. Ad hoc, qn<£
mea eft opivio , nuda dejcriptio, detur etiam ejje optima , rarins
fvffcit, <? qnantwnvis forte Jhfficiat mine\ non prptercafemper
nata indc planta cognitio firvw fiabit pede. Potcrit cnim nova
dcte&a aliquando COgnata plant a redderc non [nfjicicntan. Figura
cxa&ijfima, pneterqtumi quod vno intuitu pins dot eat, mentern af-
ficiat vividius, plantaque forwam in luemorlam facilins pknius-
que rducat, legitinnv addita defcriptioni fallet nnnquam, Exbi-*

foii igitnr fürpes **magnitndine** natural! > & tmtam quidem earum*
par tern **Jemper**, ttt od totnm **bade** habitmn eonchdi commode **quest**.
Cumque ipjis etiam radicibiis; tibi hoe apte fieri per chart am lice-
bat , qnam pr opt ere a **forma majore/eligere** debut. **Fru&ificatitmis** *
adftant inter'dum Jhtgula partes, mkrofcopio etiam au8a ; dum
bac it a pojklabat ejnsdem firnilura **but usque minus cognitt;** cf
aut **mifiuta** nimis, ant in ipfa delineata firpe baud re&e perfpij
cienda. Cater urn owijjkfueruvt. Iconesnee pinxi ipfe, nee d^
lineavi; at, **prafente me, dum ab artificeperficieia ntur.** omnevi
adbibui enram, ut **natura archetypis examufim munes rc/pomle-**
rent, Qain hoc idem etiam circa colores a&nm cum fcrnpnh fuit
Quot Minis , non interrupt a Jtfk, aMquot tabulas addam, (,/»<#
jam pfcrim*fontfculta,) numero mfomptus tukrint fm kth
di non mediocre. Pauci tment carvm neajjerio futurum opus*
I line in unrverfum cento m & sexaginta due Exemplaria impriw;
curavi, coloranda crnnia; nee plum, tabulis tenets iam deletis,
in pojkrum **imprintur.** In Ope^{ris} Titulo **numerous**
Exemplaris indicabitur.





HORTUS BOTANICUS VINDOBONENSIS.

T A B U L A P R I M A.

ROSA BICOLOR.



Synonymon huitis fruticis non repcro. Speciolissimi* Rofo odnutnerari omnino merttir. Colur pagin* pcrabruin adverfae fulphurcus, prona cleganter miniatus, flosrtimquc, toiam simtkem for me ooliduccncium[^] multitudo, inirum illi dccorem conciliant. Odur vero his ipfis ingracus eft, fwrbottidusquc. Per diih ab aliis hue usque cognitis Ro(is facile diftinguitur, Ipedeffique milii confitucre novam videtur. Patriarn ignoro. Ex Hollandia hue translata l'uit. Sul) dio ogii uptake, Sc quotannis fiorct; fed fruftum benc maturmn needunt dedit, Rttni ^l.ihri armantur aculcis reflts, fine ordine positK. Cily- 'ceci hirfutuli font. Pcduncuii aOtecn, globofa germina fbtiaque fane gbberrinML Petal* ayipla, obcordaca, intcidum tnmen vfat ctnarginata[^] otnnia j.bnifcuU funt j & variant ratis facte interna longkodinttter ctiam biculure. Stigmata purpurifcunt. Juniu & Julia fiorct, vctum horti oruumciitum.

T A B U L A S E C U N D A .

IRIS SAMBUC1NA. *Linn. -ji. pag. 77.*

Iris major Itdfuti*ocbiva. CTu. frj[^], up.

*Iri** latifdia gorflHliica, odore tainbuti. *Bash.* fin. jr.

Radix firtilis eft Iridi Germanic* Linn.ci, a qua nec retiquo habitu vilde abludit. At Caul is Tcrme duplo tft foliis altior. I Im (pfr^ct oitorcm fiorum ftmhuci. Petala funt emarginna; rcHcDi-um mcilurfl tamen farpc vix notabiti. lixc violaccum eolorem liabent, elegancie 1 qnc per vents laturatiurcs variegantur: tmii lua barbata a II.it ante cum venis otifcure purpurcis. Petatt crclfla ex fufco purpumlcantis obfoieiique lunt colon*; ejuMlrnique

ctiam ferrata ftigmaca. Pollen antherarum afbicir. ("Jermcn ter» teviterque trifit Jcatam lincis vircentibus fen is notatur. Color parti tint omnitudin in varits fndividak f.itis dif.TCj.nre folet gradu fiturstionis; quod ctiam in plerique alii fndibus non mttios obtinct : unfe ncc adequate defcribi in his color ita potest, out (Jngi, ut conveniat, singulis. Floret Junio.

T A B U L A T E R T I A.

SENECIO VERBENAEFOL [JS.

Cub Seneconis /Cgjrpdt Marine ante aliquot annos femtnn accepi, & :dhuc fob codon O nomine coii in alii s liortis Boettokis audio. Non invenio uitorcari, qui hujus men inerit. Pltma annua cfl. Sata priilio \crc, (Jorc fudio Junio Julie <qne, & Augusto fe nioi perricit. Inter Linruanos flofctilofoj Scnccionct periina , a vuJ^ari diverfes calvibus non TohAcelatis, & \KT fquamub^c c. lycn. p. pacifimus. Ab Arabico Senecione tiil- fcn fotiis; Sencctont irifluro fuillintus, si raditus illi flor eft, Ceterum tota plant' cl globerritna.

T A B U L A Q U A R T A .

HOERHAVIA SCANOBKS. U*. fol. pag. ft.

Boeri.nia (ant; cnrofa. Brown. bfl. Jan. &. (j. 3.

Valeuncilla at fines folio, scandens, floribus pallide luteis pyxidatis, in umbelle mo dum dafpositis, feminis aspero. Sian. bfl. Jan. : pag. 2 it.

In pbribtti tefiii cib « crfceniem tunc plantain vidi, copicfias autem circa Jamice San Yago de la vega ultim Hispanis, nunc Spanish Town Angli nuncupatam; orbem, copiosissime omnium in ifula Curacao, ubi putini zigeres, ad determinandos turn aut:^chortos tic Ixix accumulate fa tutot tteruin t rami verius rami floreates propendunt. Jiiniona luni terc. gildimi; quo* foli oppofia, pciioUti, cortUri, olfolcrfi angulaw, titrinqnc concolorii,, tervalb ornant. 1'aluntuli ftrith St clongari a [is in&feni , »pkc pcdutcofei IUqoot jijroprioi in mbdhe ibnnam geremw, Mores ex viridl Sawc&QOt, (bmtojbai donati omni, rariu*c*ernis, nunquani obfervsto am e unico. Fructus kw fupernc tubercu*c*ircum iitlir ptr-ts Cipitaiis & afpc mvm eotn pinnta (fibra eft. Apud nos xftatcm Tub dio com intxl non agit. Fforcc in h> bernauulis a Majo ad ferum tuque auturnnum ; in f**a** nauli per uucrum muiuti,

TABULA QUINTA, ET SEXTA.

BOERHAVIA E RECTA, t. m. fol. p^-. yt.

Bochavia tforitius panitutftis; femmibus pectagonis, cnWCKtf, Gman. hurt, t Boertuvia folani i'ulio. ercib, glbr«, Anon, herb, -.

Pint* in hybcnwnlfr noftri* pienirnqtic annua, rarius bicntm, «ttt»n ttmem ilico fa. litn, erefcitm, interdum Da*c* Ieviier proctunbwitern, debilem, tnfcne viptofam licrUceumquc protrudit. Huns lolia ornant oppolita, gltbmmi, gv««, «ot*, *twii«(oi

undulata, petiolata, fubtiis cum fufulo virore pallentia. Caulis inferior, pars petioli, **mar-**
go nervusque folii inediis plurimumque rubent. Tabula quinca placentam juvencm represef-
tent; excta adultam, quando superior pars caulis in paniculatos ramos difpdcitur, ita ut
ijrnaro imponcret, ac \wedge tiverfa eflet. Racemi fructuales & tenues fuftinent flores rubcl-
ius, infundibuliformes, limbo multidentato. His filamenta sunt duo, fibi mutuo oppofita,
ere&a, corolla duplo breviora, tincleris prxidita dkhvnis. Stigma eft rubellam, m ∞ .
jrum, cipitacum, obtusiflmmum, (iam)mentis paulo iongius. Frutus eft obverfe conicus,
pcrtagonus. Floret totam atfatcm. Dium quidcm fen, fed non IXK tune vegetat, nec
flores gerit rice expanfos.

T A B U L A S E P T I M A .

BDKRHAVIA HIRSUTA.

Bucrhavia caule prostrato \wedge pubetcent; foliis ovatis, repandis. *Linn.mant, portc a.nc-*
duin cdita.

Boerhavia foliis *ovum*, floribus lateralis conipaliis, caule hirsuto procumbent. *Mill. dill. 4.*

Ex ralice annuam nudiud hos atatem excedent, fufiformi 8c flavicante caule plurimumque
duo oppofiti cn \wedge funtur, terae, herbsci, hirsuto, procumbentes, rainofi & fesquic-
pedales. Folia sunt \wedge bra, dorfoalbida, margine pilosa, ovata, acuti, **Gnutto» aado-**
lato, jictiolnta, oppaiita. Flurtius umbellads corolla eft purpurca, limbi feiniquinque-
di Indniis **amarginatis**. Filuncatum inveni Temper unicum. /Eftatcm fub djo bene agit.
Synonymum cdebrriinus *[inoatiis* in litteris *communicavit.*

T A B U L A O C T A V A .

ASTER PAXNONICUS.

In Hungaria comitatu Nitricensi crec \wedge ntem primus detexit, mcccumque communicavit CIs-
rilmus Franciscus jofephns **Upp**, Friburgensis nunc Medicina: Profefibr. t* **rtdtce**
perenni quotannis caules plures producent, uti tota planca, glaberrimi, tretes, tuicretti,
tui foliis ramisque onufti. Ilia fnt ex lanceolato lincaria, intcgerriitu, acuu, ieTilia.
Ram i nuncrofi candem fcrme alitudinem attngunt cum ipso caule, unde floret ev dftnt
ivnitmli. lit ex c.culco purpur.ifemr. Ab Allerc acri, cui proximu-; diftinctum pu-
re foliis minime (tricris, fed pouus oti[H]itn flexiJidimis, turn ctiam fijporc nullatcnus acri.
Sept-nuri florere incipit.

T A B U L A N O N A .

CUCUMIS PROPHF.TARUM. *Lm.fyji. pag. 14>*

Colocythis pthysSt, tvliinata, arabica, **ftcfii** duodecim lucis & viridibus *virgata.*
Sbtrw. Afric r.um. 6S

Plants, habitu congenerum, apud nos diu non tantum, fed vel aliquoties jum in
ktono c huidlnis rcliitis ncgleffisq[ue] fponte prodixit, McLonc vulgare oninibus pani-
lnt \wedge minor, tota fatorcm fpar \wedge tt natifeofit. Caulis & petioli sunt afperi Dtp \wedge c angulosi.
Folia sunt cordata, fubtui tpera, quinqueKjba deiuataquc ; lobo intenncdio termc duplQ

longiori. Pedunculi axillarum Stitutiori flores gtrnot charaQeri Linxano ommmodo con-
gruentes. Frufhis fuit gtobofi, gfabri, aerlets mnocuis moltibus fparfisque trmtri; vine-
gatique ftriis numero in cert is, vircfcntituK ahernaiiin & flavkntibus, Amarie coloc>Ti-
Uiidi non ccdunt. Polpa muitacft, tc mollis.

T A B U L A D E C I M A.

PASSIFLORA SERRA'LI! OLIA. L.: (yfl. pag. 198.

GranadiNa Surinamtjiis, t'jio, *blongo serrato*. Taunt. Inji. I 41.
Gnoadilla americana, Ibiioblaiigu k *viter serp*:to, petilu ex viridi *rube* cerribus,
Mn. cast. jf.

Plant perennis fruticosa IxtilJime vegttat in iifjernscijli- noftrii; catilibus, jo-
ntoribus Jevufiinc vilbiss •Itifltme fear dens. Stipula (tint itn?arn A: octiminuz. Fo-
lionim ovacorum, per totitn ambitiun 1 *viter Territorum glaborumque pefoli ducbus glan-*
dttbrutn lariibus inftruonmr. Pedunculi fimi unifori & foliati. Calyx externe viret, in-
tit tibcat. Perda pallide purpurscunt. Neff. Hi filamenta belli fjturatae purpurci funt ci>
lora, nine czrulefcutit, -ndemque pallent. Anthera fuit flavz. Seignn» vircent, Odor
fiori *ftatisus* es eit. Apud nos fructum ferre reculat.

T A B U L A U N D E C I M A.

SOLANUM PSEUDOLYCOPER8ICUM.

*Solanum racemosum, cerasorum fo*niu. *Htiuh. pin.* 167. *Verfr. § 8.*

Tota planta habet, colore atque odore similius est Solano Lycoperfico. Discrim*si re-*
[c]rio in racemi, quae ad dihingendam speciem sufficere posse, existimo. Nam in
hae planta racemos obſervavi temper annes simplices, quo rideo in Lycoperfico esse atque
confundit hildos. Bacca in eiusdem cerasi magnitudinem raro superant; sive globosae,
villoſae, flavescentes, maturiſſae interdum ad sursum acum colorum vergentes, nullo ful-
ee« tut rartus unico illoque levii, exarati. Quae in Lycoperfico f «t mutto »» res, fem-
per ttkaar, | laberrim & c r obcundiores. In Suecia fructus glabros in literis nisi alteruit
ellotis Lianzeus; quales etiam hoc anno in hotto peritissimi Pharmacopœi Jacobi Wel vidi,
cum vestigio camtii rfl urom.

T A B U L A D U O D E C I M O

SOLANUM A:THIOTRICUM. *Linn. ffl. pag. 172. Amn. c. al. 4. p. 307.*

Solanum pomiferum herbariorum. Loh. Kr. 2. 1.

Solanum pomiferum, fructu rotunda llritto tiuro. Ban. pin. 167.

Fanti annua, cum in foliorum costa utrinque media, cum in ramis & calycibus, apud
nos ('cmfir mosksr ami) subulatis rectisque; quae in Suecia nullas se obſervat. Lin-
neus dicit, unde etiam inter i *terrenis Solanum* loctvk. Avuleoi intedum . obſervavit Caspar
Bm; «| iconc Mam expedit Lobelius. 1 wib Tunt «v»a, ictbrmfuk, repando- en-
golata. (iules ter«t tubvti lo. I : res •!.<}», neku ob quem drfelf'tirn, steriles
lunt. deudimtfjuc; uu liot ngti Mtüu* in tlm qmbuidam SwJaitn obUngt, 11. plerumque

bini nut terni in racemulo communi exoriuncur,* dam fertilcs funr folitarii. Neqie ~~huc~~
tamen perpetna fuit. Corolla efl alba. Bnca eft dcpreflb-globofa , fulcis aliquot pro-
fundis exarata , nitida, dura, clcganter ex pharniceo rubra. ^Eitatcm apud nus Tub dio
agit; autumno in hybernaculum repofica fruftum perficit.

TABULA DECIMA TERTIA.

SOLANUM VERBASCIFOUUM. *Linn. O. pag. 172.*

Solanum arburefcens, vrbafci folio. *Plum, fpec 4.*

Solatium maxime tornentofum, fpinis carens, virginianum. *Pluk. dm. 3 j 1. l.116*
f. 1.

In fylvis montofis raris tnfulti Marttnici crfcntcm \i*li* hanc arbufculam, comofsm,
inennem femper totnin, Jumanam aitiddincin fuperantem, truncoquc fufTultam crafr>
fific **brocfaiili**. Apud nos xftatcm fub dio tranfigtrc potefit, floretque integrarn, at fru-
Stas neduin prodixit. Raini extrcmi, folia, pedunculi & calyces denfo tomento obvol-
vuntur. In loco natali fuliti triplet innjora jnvcui, quani hie exhibentiir in culta plan-
in. Pedunculi **terroin*icj* eriguntur**, pcrptuo biKdi; ramts icermn bificiis; dupli igitut
•bifiircatiooe tlivif.. l-luribus inodoris corolla *vit* alba. In America iiurcentem uovem-
bri vidi.

T A B U L A D E C I M A Q U A R T A .

S O L A N T U M I G N E U M . *Umu Jyfl. p_{ag}. t 74.*

Solanum fpinifcrum fruicfccns, fpinis igneis Americanum, *Fiuk. aim. 350. t 22 j*
/• 5-

In hybeniacuiis noftris hunnnam altitudinem mnlcnm excedit cleans hsrc arbucnla.
jEftate diuin tolerat; ctiamfi vkicaciir zonx catidioris incola. Mihi in America hanc
vide re **Don COfligk**, liuctiiii utiiciir elapfu anno tulit, pifi magnitudinc , Sc fljvican-
ttin. Truncits & rumi, minus ctiam foiorum coftc , obfidentur actileis fpafis reftis
ex flavo rubentibus. Folia funt lanccoiata, acuminaia, juniora villofa , adultiora glabra.
Flores motion in racemis laxi' **focanrar** ; corolla alba, interdum fubpurpurafcencie ; an-
the'ris flavis. Per taicas facile propajatur. Floret iftate & autumno.

T A B U L A D E C I M A Q U I N T A .

S C A B I O S A D I V A R I C A T A .

Ex radicc annua caults cxrcfcit untcus, tcres, levi hifutie fetber, rsmofos, p ~~mentif~~
mu». Folia funt **piontrifrh**, infenor 8c fumma minus, lobis extimis obovatis den-
tatis illc , in reliquis lincari- Inncolaiis intc*ri*que. Flores pedunculis elongatis **inf-**
dent. **Hh** involucmm eft pulphytlum , **btsqotfe**, pilofum , corollnque duplo longius.
Ali inodori, (jittnquctidi, xqmls parviquc pallide purpurafcunt ; l*ciniis* ovatis, nb-
ru'v, extima duplo maiore At crfcfa. Stamina corollam non fupersnt. Anther* pal-
lent, Gerinen **efl** vilbfum. Pcriantlium **loftrias** brevillirnum *in* quinque fewt fufc*ri*-

Ridas corollaque duplo longiorcs abit. Euerius eft membrana campanula , **ajbidft**, litn. bo iniiludentato, qua: poftca **raftu Itnbam dreamv&m Mfttn** c\panfumque. Trti **Itus** Hrinjs eft Svabiofx ochrokuc*. Su!> dia dia r!wret xftatc. Sub titulo Scabiufx Care **laxx** folio Bocconi habecur hzc planta in herbario Gronoviano.

T A B U L A D E C I M A S E X T A -

IfORINDA ROVOC. | *Am. fift. pag. 166.*

Morinda americana humifijfa hurtful w. *I. will. a.d. 1721. p. 20* j.

Morinda **faflradcoA** , **fotiti** oblongis , **togtt(Hi)** , utrinqtic »cutis ; radice **crocea**.
Brown. hist. Klm. i.p. i j 9 .

Morindatng *stifolia scandent.* *Brown. hist. Jan. 2. p. 165. 7*

Royoc humtitifum, fruitu cuprc **i!nu.** r/wa. *fptc II.*

Peric ivmenuui amcrteiinum, c tujus ratiice fit atr,-menuiiP. FM. c/tm. *287.1.212.*

A 4-

P in tn infuiarum C ribearotn sepibm, ad nisi- gines sylvarum, locisque alii fruticosi re in latenter a vicinis, delibis procumbit. Caeerum inter fruti- perintr. Dow n cum **rtmo*** fufTulta **crc&bm** fibrinsm alTiimit* ramufculis tamen /n>> (ijnalis *hk* rejircfnatur,) varn. *Rami junio* **tttem.** Trau cinc- reo vcDittir. res ftitit qtiadrausfidarc n func ojipoia, obverffc lincolau, bati atrnaata. :i cum hrcW acitminc vcl (Impicittr aana, nitida, tntegerriun. R **oktm** cominunc inxquistiter fabrotunduin **G** W matt in- iera in c **lod** in ^ **matanm** ^bit fiavutn , faccofemam , modem I iiquc. (^ :J **eft.** Aatherz iulphwrtr. Sciuin Itntc turg.tia , illinc comprefla tbts 1 me •Mu> germinavit in h **H** noftris exus sublavicus, teres, coifur parte legitima efficacite durissimam, &luin(<!<n- te multo aiiinrmj oirnofo fuccique crocci **pknfiRmo.** 1 \ b* gem exirthk, **tin&or»nKjo«** crocesm cftcit. Aqua etiam ittco (in. qni intrj ras mut : Co - fufcum. Infufum per clwrtam «l hrc radi- filtramm 1 nutnquc redimenmrn depunit faiurate purpurvi'nt. I orw effa ec radix apta tindum in uAi **cecoaootko**, qux ccrtc magna **colUgi** a **tOB*** torridj pglfc.

T A B U L A D E C I M A S E P T I M A .

DIGITALIS PARVIFLORA.

Per novem jam annos elcj^ *in huc* **pkoti** In horto pcrennat, Si fioruit quoconni; a *Julio* ad Septembries tincm. N'ctjuc **romaifcor**, **nodctum** imroduda in human faei mo verc. folia raditaiia plura c terr.i phicissimi muni tdptngi cartvi Sub Jnnij fincm «ul«s fcquumur i, **tngolati**, glabri, duos t *deuticulan*, l funt oblonjja, **icuca**, 1 *vibrhbr**, fwpermc intcrdum vix feniilnrcr Flores ft ttaii in dorfo ; *Calycs* fol <iuc. Cauln (ertrunnur in fpicittl 1 fiora, fettent fotcarii, in firjw :anm, *K* villofusca, *l* Muto Ucion A»» A. ([rum tc ubtulifluiiiti ; **tafoia** *s tridu*" . UCUJM intermedia pauxillo Ion Stmina fute

fum quatuor, fed adstat in plurimis floribus ad Iatus ftaminis brevioris ftamen quintum, & ipfum anthera donatum. Reliqua fuit, uti in chaniftcrc Linmano. Habicu igitur plants eft proxima Digitali fcrmginc: a qua diftinguitur corolla: parvitate, labiique inicrioris brevitntc. Synonymiuin non novi.

T A B U L A D E C I M A O C T A V A .

- * " G E R A N I U M C I C O N I U M . *Linn. o. fag. 4J4-* *Amotu acai. 4. p. 381.*
Geranium cicutx folio, acu longiffima, Bald), pin. 319. prodr. (3^,
Geranium apulum Coriandnfolium. Column^ eepbr. \p. 136. t. 13J.

Dlanta nnnu.i & difTufa, pubefcens tota, foliis tamen vix notabiitcr. Hie fuit petio-
 X Ian & biplnatifida: foliolis Wffe intifis, decurrentibus, obtufis. Pedunculi umbellati
 gcrnm flores pentandros pctalis donates obfokte purpurcis. Calyces laxi, rugofi & ftnati
 terminantur in arifkin. Rodra aut recta fuit, ant incurva. Seniina pilofa. Sub dtocrc-
 fcit, & ex feminibus rldapfis fpontc qtiotannis provctiit. A Gemnio gruino Linnxi foliis
 valde tenuiusquc difTuttis facile dignofcitBTi

T A B U L A D E C I M A N O N A .

GERANIUM SIBIRICUM. *Lain. fi\$. p»g. 4S6-* *hum. gcr. n. j. ; . 17.*

Ex radice perenni quotannis plures caules herbae atque annui enascuntur, qui fuit dif-
 I J fufc dichotomi, geniculati, fcrmc terete^, glabritjuc. Stipuls ad dichotomias **utrin-
 que** atUtsnt hncculntT S: acenmiuat;r. Folia fitnt oppofrta, quiiiquepartita: laciniis itx~
 qnaliter pinnatiridis acmisqic. Pe<liinailns foliis longior ex dichotomiis, vcl jam fifHs, vc!
 talibos cvnfuris cgrettitur, fuperne brands duabus roum'CQS, & femper a me obfervatus uni-
 floras. Calycis faliola fuit liirifutula brcviterquc ariftata. Petala dilute purpurafcentia fi-
 ne (Iriis uliis vix calyeem fuperant, ant itite^errina, aut leviter cmarginata. Stamina fuit
 ferrilia deccm. Plants sub dio Jiberc crfcntis divaricatio fa:pc fumma eft, qnam icona
 exhibtmn non cepiflet **dwtc** fbrau; bfac minus divaricatam in olla crfcntcm tabula ha-
 bet. Flurct Majo & fcqueutibus.

T A B U L A V I G E S I M A .

PASSIFLORA MINIMA. *Lim. o. pag. \$99.*

Palfiflora fen Flos Paflionis ctiraflavicus, folio glabro tritobato & angufto, flore fl-
 vfcctitc omnium minimo. *Pluk. aim. i%t.t- tio.f. 3,*

Illra crfcntem inveni hanc plantam xqnc in Continente Amcricr, qnam in infulis ad-
 jucentibus, ubi fruticofa amat aprica, Baccis (uis nigris tnollibusque cum Paffiflora ni-
 jjra in obfervationuni pane aftra dekripm convenit, uti ctiam reliquo habitu, ftd difTert
foliis ii)or>inc non fabbris, floribusqne. Fufiffimc & opdme ttefcripsit hinc pfantam Loe-
 fimgini, proflti \tticrc eft ex ediio cjudcin iiinrc pagina J47; quar* fuperfedco. In hy-
 bernacuilib uulhi Lctilfime excrcut.

TABULA VIGESIMA PRIMA -

JATROPHA URINS. Linn. h[ab] pag. 498.

Ricinus titimiuloidci americanis laciefccn* & urem, floribus albi*. Conn. tort. I-p. 19. t. 1 o

Riciims b&cfccm, ficifoliis, fp;uiilt> mordacibin armaiis. Ptttk. aim* 310. r. a 10./. a-

Frutcx duos quatuor pedes altus, parum lippv suu 11coun oltertimvc policeiti
in diametro Egoantc, bSeoqoc facco katens, armitur, in ran
fotitsqte, acukh aibis, liijuljti>, rcJi- r:iicisque, &urn; unde incomnnxiininain
iter effiunt pcditt; fu te Venezuela in Americae Continente, ubi n nbaloCn "pp¹
ro, Metropolis Proving tagna copta inter Cap-
s aliosque frutkes crcl ivbernaulis nollm caiidil?imi> luc veg<<i floretque
q'jotannis divert^ ttmjMjrc; 1 nec xilate terrc fiftc lanji: V, quin (xpt per-,
eit. A foliorum lapfu ckatri;c* albi remanent. j><ioUia, bafi COP*
data, altema, feniimlolu, rari unquadoba, a- HeotKu - tewicaiis-
Cytaa terminales ftiilincnt bxe 1 Icffiki mvevsquc. Pxmiaei Tnni pcn(apcc<
oboVKtl 1 revtilutis , calyceqae nnxginc cermkunte. Mjfceti!! ii ires ca
|bj qainquefidi laciniis . Fruitus quoque auleis monint. Foli
no*, nci. eft diversa a planta Linneana ibi brev;
andc fun i^na, uiuui 11

T A B U L A V I G E S I M A S K C U N I) A.

<:l i THAMEXYQU ADR ANGULAR] Z. Zool. h[ab] -I ma. pa, 186.

Fortaffc clc^ns bate arbor eit mert v<<ria> Cth*re<<li cint ra Linnei. Differ tamen ab
ejdcin p quam ciato loco fife descripsi baccis matris rubentibus, & rnis (eris
brach in in craftis) ow albos, terribus quidem, fel per costis tamen quatuor decurrentes
inxquij^ vas. Et prupteru ctiant 165 incol 1 uiramqut difflingiere norum. Centrum est
ctiam cortex ciocraoi, A; rclitua convenit. Dt oninta ; untie descriptione superedes, fa
hvbernaulis tiuret qoottnois, potea 'folia demittii uinnia, ajec (ruOnn perficit solum.
Qiotannis ctiani p<<tari debet ob niiniam r^moru^i loxorkn; nee entn effem Jybe 1—nil
his capiendis ; dum qtiotibet anao ad duut tresv> pede* tlongemur. linc hybernaulis
vaftioribti. ornamento eft.

T A B U L A V I G E S I M A T E R T I A .

DOLICHOS UNQUICULATU8. I'-frfi.te.

Doiicliorum & Ptmeoloruin < dvferiptiye difficultt tft co^timo ; qu<<m>>hrem hitnc icon*
vjno, qu<<n ' > proxinf tibolis plures Ic^ucimir alii, q>"> am exaltos hafieu.
Ilanu wmuia eil MC^O* j{!<bri ; caul* volubili ; fol tin linecubio-ovatii twUmqtir ; &
pedunculx* capiutts paucifluri* * ere . ' t plu iimtm Horn bint pedunculot ternu.
quibu^ jam in faflam ibeontibi , prodit fls atnue alterve. CaJvx AQms v,-, r-
sit scabriofulos. Vesillum extre & carina albiant. Stigma longa barba donatur. L-

gumen teres, Icviter tornofum glabromque defnic in apicem recurvatum acutum & fuper. nc cajialicularum. Semina fuit albida cum hilo niveo. Priino vrc in hybernaculis culta, ttftatem fub dio tranftgcrc potefit.

TABULA VIGESIMA QUARTA.

- ..CLEOME PENTAPHYLLA. *Lbm. Jyfi. pag. i i 7.*

*Sinapiflrum indicum pentaphyllum, florae carnæ, minus, non spinosum. Shan. bifi, jam. t. pug. *94-*

Qijjnqucfbliu lujiini folio. Bauh. pin. 316.

Capa-Vccla. Hhecd. mai. 9. p. 43. tab. J4.

Planta est annua, elegans, fæcettiæ, creta, nut glabra tota, aut infiltrata pilis rara; ad- (j)crfa, canæ **ttreti** & rimofo. Folia caulinæ & ramæ fuit quinata omnia: foliolis obovatis, acutis, tenuifime ferratis. Folia fioralia fuit ternata, obovata, obtusa, integrinipj inflima brviter pcriolftt, rcliqua fetriæ. Hacc laxæ decrant racemis longiflirium, dtit ex **tSl ftIH** (nec tamen finpiis) cmittunt pedunculum patentem & uniflorum. Culvæ foliola fuit lancolatu. L'ala alba aut carnæ. Germen pedicello purpurco longo **tenuiqM bifite**, circum quem fibrae locantur fena concoloria & arqualia. Siliqua pilis rigidis obliu(i) brei: fimbriis: ftæbn eft, hinc punctata videtur. dilate diu quidem to- leiat, Ixius tainæ in hybernacibus morimur.

TABULA VIGESIMA QUINTA.

- CORONI** \ RETICA. *litm. fyft. pag. 49i-*

Corunilla cretica lierbacca, floræ parvo purpureæ centæ. *Totem, cor. 44.*

Radix fibrofa, fulva apud nos nnnua, in hybernaculis afferata per hyemem inferdita perennum, caules cmittii pluræ decumbentes*, ramos, herbaceos, fulcato - ftrialitos vd fubpil ~~olos, duos tresque pedes longos.~~ Cufræ fructus t'oh>\ fustinctus numero incerto undceim, **tndecte**, vd quindceim, denticente interdum impari, obovata, gla- bria, ~~obtusiflma~~, lora raro rectud. Do ~~variolis ex~~ **rtdiaotor** pedunculi communes, grecientes in rxtrcintiæ Ores at jjneimum quinque, turn etiam pautiores vel plures; qui Linnæa- **Btm cbaniocm** cxæbeieqtnttar. Vxilium est fubcarnutum cum ftriis purjiurcis, aut ~~etiam~~ 1 Wa delimit^{"1"}. Alx **pat dbictnt**, aut earner fuit. Carina **longiradiM** alatim c(t alij cum ajicce lufcp. Legumina fuit acuminsta. Scnuna Havefcunt pallide. Floret ~~«ftjtc.~~

TABULA VIGESIMA SEXTA.

- EMBRYANTHEMUM FORFICATUM. Lbm. O. fag. 34*-**

Puina est li{nofa, **fdrico&i HW** gUbrit, & dc¹ ~~bili~~, ~~hui~~ uu litlmum congnenim, Trun- & rimi anno ~~es & cive~~ ¹ **Soro font tern** ;> **Jtmotm tutem font ttdpttei.** Folia ftfciuilaim **iwnoi** ornant oppof~~»»~~ Ufi leviter &: fijpc vix connata, cymbiformia, dorfo incgrj n~~c~~ crenata, obtusa *;uxi acumiwa, wbfolcte punctata, Punih five tuberculata pauca C di>

diflinfle vuenttir, ni(i folia, i> pdiuceam, laci oppofiu confiderentur, quando iunc in coElpectunt iumerolo prudcunt. Flos folitarius terminal i^{unus}, exodus, pcuttt^ttct jfftitus rubm & HneariLius. Floret *ftatc Cub dio.

TABULA VIGESIMA SEPTIMA.

LOBELIA LONOJPL08A. *Urn. fyfi.* pag. 583. *Brun. bfl. j m . p.* 553. *Jacq. kjl. amcr. ptg. i i g.*

Rflpunculis gqtini *lus*, folis ciclorei, Hore «lbo, mbo I longissimo. Shan. bfl. jan. i. p. i j s. r. 101 f. 1.

Tracbdiuin fonchi foli^u, flore albo longissimo. *Pian. ic. 253. f. i.*

Et fbris iatcgrum chiaſcherem, & plantz defcriptionem deli in Historia Selectiorum in Ait'. Nam Americanum, quibus hic non rependis addam frequenta. Dum in nostris hibernaculis planta fervitur, ut ex per integrum annum, eosque plures dirat. An pertinet in foli i natali, i gnoro; ut radix ibidem lepe multiceps videretur hoc affirmare. Semini iimtura t in apud BOS quotanni^ nmrtioa numcroſiliari. Quando in hibernaculi flat loco, ubi acr non reaovatur, atmospherae effluvia implex, pulmni & oloratus organo infelix, ut dicitur. Itm cum difficultate quis permaneat. Nec de hinc planta emittens, lingue imprimis fenfm ardens. Apud nos a Julio ad Decembrem flueret.

TABULA VIGESIMA OCTAVA.

CRATEGUS PUNCTATA.

Arbor minus nonnus forte dodecimum, aſtraliter acquisitiv decempedales. 1, ra» mos ſpergit diſſidos, & filii dia breves nullus opima perfecti, florum fab ſinem Aprisi, fructusque dans Augufto maturus. Ex lauro ſunt ſemina nullum mihi unquam copagetur facilime. Spinis plane nullis armatur. Polia ſunt obuvaca, «U13, tali SK inuita, inqualiter duplicito - ſegregata, & utriusque glaberrima. Scipule ſunt lineires, ciliim - ferrint †, cadatex. Ramulos tcreti glabrosque terminant racemi cuipoliti, (Metiaibis plerisque trindis. Floribus stylis fun- ires ſot dtrō; CJUOJ ant ptam, tatptadorei mmmiam isveni. I^ fructu carnoſe officula ſunt it daridltu numero (hjorum. Color illi eft ex aurantio rubellu- cum adisperis punctis fuscis; carni albidus. EX 1 liJinnia tiuc transveda huit tub orbons Ait.cncanx ignotx tiiulo.

TABULA VIGESIMA NONA.

BYTNERIA MICROPHVLI A.

IBTNOI hunc fruticem anni 1757, mense Februario in fructicis maritimis apicis, loco rntnofo, as! ipfam vii.irjt.iin epptdi ftn «u I, ince in iſula Domingo, folia floribusque nine p>nc deſtitutuini, fed Aiii* fr^{ibis} omnium; quos collegi, mecumque in Europa rediit attulit. Ex his ante oſto annos terra mandatis aliquot nonne frutescere latifolia in calendaris vej^ttint tk compedes; qui quatuor autumno flores quidem producent numerosiſmos, fed truUutn nctftim dedere litliim. Fabitus frutici singularis eit. Dispiciunt in r-

mos diftichos, alternos, fenfim dcrcfcentes, magis minusvc flcxuofos, horizomaliter por-
rcStos, & protcnfos fuper alios fruticcs, ut debiles fife fuftineint. Totus frutcK giabcr
eft. Truncus lignofus, tcre» & inermis cortice veftitir cinerco. Iltiusmodi funt etiam
rum feniurcs. Juniores aut em funt virides, nitidi, icnti, fubangulati ; armanturque ad
breves diftantias toti aculcis fubulatis, comprdfis, fur Cum eretfts, deciduis in ramis fene-
fcentibus. Ad horum fngiilorum iatera horizontalter egrcdiuifit folia duo (out unicum)
breviffime petiolata, ovata vel obverfc ovata, integerriina anc apice varie & insequaliter
dentata, tota inennia, nunquam majora quam ilia, qusc in cabals cxlibentur. Pedunculi
HlifiSmes & uniflori in axillis folionim plures a tribus ad novem fibi nnuuo fuccedunt,
ut in quavis ala flos fere atuoa expaifus habeatur. Hie inodorus & ex albo purpureoqiiie
Variot claractre gaudet illo, qucm in Hifloria Stirpium Americanarum defcripsi. Cujus
generis ut pateat, intdligaturqiiie endenth flruftura fngularis, exbSmi primo florem im-
{Jnitudine naturali; turn caduc ciiam magnitudinc fruftum integrum pentacoccum, capfu-
lam imam fcjunciam, fcmciique exemptum. Tandem microcopio act dupluin auSta addidi
florem denuo integrum; pctiam unum; ncftarium totum, ad cujus latura utrinque con-
fpicitor snehera fikmento brevifflK atfixa; & hnjofce ncdarri fdiolum (Ingularc, Deni-
que gernien ad [tat, forte ccentics ICIHC adanSam, Differt itaque nova bate fpecies momen-
tis pluribus a Uvtneria Linn.ci fcabra, quam in Americanarum Hiftoria Stirpium dixeram
aculcacam, videlicet foliis incrmibus, truaco ramisquc majgribis tcretibus, psJunculis uni-
tturis & floribtu fcii ~~purpuris.~~

T A B U L A T R I G E S I M A .

MELOCHIA PYRAMIDATA. *Umu O. pas.* ^ x.

MdocUa herbacea tenui(Fim,i ramo&, Totiis oblon ;o - ovaris, ilorum uiilicellulis late-
raiibuj , foliis approximatis. *Brown, btjl. jam. 3./.* 176.

In fyftematis ultimo cditi citato loco reditit ad hanc fp*ci*em Ltnnins Mdociam meam
Domingclfem. Haec, qaz frates eft Ignofus, bnmanatn (sepe excedens **ikkudioen**,
certiifime diftinta eft a Melochia prramidatt, tuta apud nos herbacea, qaantamvij habitu
lids coiignmnt. Scd an matris e8c pynmtua potcfi Qiecie ith, cui ~~Lcftlin~~ JUS tnbuit
folia parva duaruni triumvc tioeanisi losgitadine, pctiolus hirfntos iinamqtic iincam lon-
gos , caules frutefcentes & flores al'ioi ? Ncc etiam Liffiiguitna ilia planta cITc mca Domin-
genifs potcfi, nee magis cfle Linnxi pyratnidita, Aut igiuir omncs ha plants funt fpe-
cifs diltintix; aut prxter modniv varkot; aut depifta h;rc me* nun erit pvrjinidita Lin-
nsi. Eft vero Imic in caldariis nofra cultx cjulis tercs , gbbcr, cre^us & bipedalis.
Kiui tlteraJ foliis opponumtir, & inter titraque exoriuntur pedunculi commuoei tunbell*-
d (cmipoilares. Floram corolla femper eft purpurca. Fulia funt lancotata, peio ~~lata~~
~~acutu~~ 1, olmifc ferrata, gkbrt, daos ore* quatuorvc pollices Jngja. Slata primo verc, floret
•, Si fcmluu dj; Hnttira SeptembrL

TABULA TRIGESIMA PRIMA ET SECUNDA.

BROMELIA KAR ATA S. *h'mn. fyj.* pag. a j %. **fief**, hij mer. p,i<>, 9 o.
Karatas fulns akiifunis, angthifini¹⁾ & aculeuis. *Plum. gat.* 1 o.

M[rciur omnino cleans & rariffime in liortis Earopzti florens hxc plant* iconc acctrira-
illifbrart. HinC ttl>u'** modo iodictti prior majnitudioc ilb , qua in hortis
Cilirei-i Vicnniciilbus iVutliserj J«n fiq*M c.)jipecli fuit, (tirpan oprinb btegrtm, to-

lis foiiis ob i. ^{ntiam longituiinera t.} runcatis. Alton ^{cibus cind: m} CXMMK loogtt»-ii»aliter
dific fum totam, ut interioris paream. Sic enis spicatur imlio, ni si quis awimn (> jres-
se fa iiKet^ancemiJlaro fojvtnm afci> clouzur . e que A UtApctton tyvdraaatr. 8+
dix BQYclx p/anra/x, c ^{semine nact,} exigui bulbili speciem refer t, emüff* fibril tervi-
bos longique ^{• iujn.} Bulbillas ille per subsequos annos paulatim prodadew in corpus
ovotum, fibris percurre: ^{tibus subligneum,} albidumq; a, t quo rulu preflic libi fucceden-
tia Uiperiura ortuni ducutu. Hoc tandem corpus contrahatur in coUum, cuj^{as exten-} nt*t>
mgliciptci Hores tggre ^{gatam numerosi insident,} palpis membranaceis ful*i** obfonjjH atque
exms villo fuscum partim obductis ab invicem distincti. Conv, sum Cnnipeddif dkncai di-
fum simul efliciimr, omnini) tbceod atit creccau thrc< inodod, ierc tripouUctrta, Ct*rolli Iofea
calyce & germe. iic vd!u ferruginea alijsuis, in fructu persilente* quideni, fed mutati emar-
ttdique. Fructus ovales & tres pallides longi obducuntur lanagine fasca, qax tailiw fa-
cite. Ctrtex cocaceus & ex fuscum flavoque varius carm contuin mam, fucculenum,
albidum, sapore acido dulcique perdiem, & subtilitate ifjem; in qua femma nudataur
pluma fibrois unda, glabra & fasca. Decorticatu caro (MtJno non da^licet, modo *b-. ade
mat ut sint fructu*s*; tunc enim levius taurum acor percipit ir, quern u^ie otittimtit juncta
dulcedo n^oelles; at, quod fatendam istud est, raro ita modi occurruot iimmatari d^o
porem dentibus inducent, sicut tentis interdum comit paJstain & gingivas. Quan-
cunq'te tame forint insuritatem adspici, immiodci«tita comeftos tfTcciJtc d^olorem linguam
• fiquitot crebrr obfervationes docuerunt. So ismam ttmen tcri monili tilun in fructu *a
Viennensibus non fui expertus; sed absuit ei nt in rllis dulcedo ilia melka. Proks MM^o
c rtdice «d laicra matris enafemu. S BFina quocjnc noftmrnn fnivhlor facile germi-
DMI. Folia numerofa, fubulato-linearia, car. ^{lacerata, mucronata, ciliata} to- fpitlo* Tpi-
nus ferrum arcuatis v**d**dcque pungentibus, basi villa ^(externi ^uidem dcnljCmo) ferrugineo
uco nitidop icveOita, crc^a. minus rigida quam in cognitis milii congeneri il)U>, hinc fu-
peme plerumque reflexa, hucnanani fapiti ^{abitudinem} i execedmu. ('anb*o vocabulo ixico-
Ji- Kirata* ap;wllatnr. Reperitur in Loris montis & sylvaticis. ut pJurimam ad truncum
trbiicul:, cujts ttbnbr.i fructus. Illustris Linneus credit hanc Brunscliz speciem esse di-
verfam a Pifjois Caraguati Actrn; a. quis super re judicium ferre nequco. In tabula prio-
re adrt.; fructus integer, idemq; cum transverse tum longitudinaliter dicillus. u»» CU H
feminc. Jam defiuruci plant, dum animo fuscipetam hujus operis editi MM > imd^o
fiorem i ^{transversam}; ic [wrte] in tabula exponere non posui. Si quo florebit denuo, .i>r<3o,
ut apto loco li.bntur.

TABULA TRIGESIMA TERTIA.

GEROPOGON GLABRUM. Linn. fyl. pag. 110.

Tragopogon gramineo folio, glabrum, flore carnato. Raj. fapp. 149.

Tragopogon calycibus corollie radio longitudinaliter dilute in. integris, feminis brevibus:
nos, radu fraxcis. Linn. 143.

difa plus • /»». upf.

Planu annua eft ereQa & pedalis. Aprili sub dio farr dar flom menfe Augxirto. TV
u glibra e(l_f ltf*q' lebescit. Folia farr angusto-eniformia, acuminata & sefilia.
Floribdf c ellis calyx eft pleru nqic bepcapii illis. Corolla coloris carsti. Semina glabra
& vix iifper*, radii firtStt rigideque (WCfin flma farr; intermedia farr erefta. Illa pilis
pancis inqualibus simplicibusque coronantur. U*c pluribus, magis MI subbus plumosif-
que. Calycis basi interdum pubefcit.

TABULA TRIGESIMA QUARTA.

PHASEOLUS RUFUS.

Synonymam hujus plants non repeiio. Annna fcandit entile ramisq; volubilibus & vis
vifibiliter **pabefcentibns**. Petiolormn commnniim bafes petiolique proprii prtulo pu-
befcunt manitctius; magis iterum calyces & pedunculi. Foltioia glaberrimn **font** verc Pna-
feolt vulgaris, at minora; a **Pfaafcoli iotmoeni folii** fiinc **COffitamer** diverti:iima. **Sdpulk**
funt eVignx & acut;c. Raceini petiulis du)lo breviores **gernnt** flores getnitiatos aut terna-
tos; at noa una fiorcutes. **Plorcs** etim Horibus Pnafeoli irmmccni ita **congraant** figura,
ipagoitudinc & colore, Dt diftinjr-ii ncqueant. Scilicet carina & vexillum **obvede corda-**
tina concavutu reflexnnqae virent. Alx oblong*, concavae & **crefhe initio** funt coloris
iftvci, qui brvci **trtnfit** in **fordide fltventem**. Lcq;uinccn comprefTum &: acmnftiatum fc-
inii duo vel tria continct **inxqaaicer** ovata, parum comprefTa, ex **fatorate rubro ferru-**
ginea, ii\x **roft**. Floret iul) dio menfe Aagtifto. **Sebins perficit Odobri**. Patnam igno-
ru. **Foliis** & feminc a Piialculj **inamceQO**, ecu species propria, discriminatur.

TABULA TRIGESIMA QUINTA.

CONVOLVULUS FARINOSUS. *Linn, mninis. part. 3.*

Il.i»ta annna fub dio fata floret Septcmbri, S: pauca vcl nulla ante in^nientem hyemein
Icmina perficit. In caldanis **iocatl** rtorct jam initiu **Aagafti**. Caoles , pctioli, jic-
dunculi, foliaque ncdum rite cvolntn, vix confpicua pubc **obdncctar**. Caales voluMles
lcandunt, nd **ettretnitaces faWocani**, no veltui farina adipcrli, cstrcum **virentw**, I'olia
funt conlata, obfolct & **hwtqaaliter repanda**, glabm, bafibu^tjne farpc **pfoduSn** Aitwn-
jrulata. Pcdtinculi ex fblioram **tin** exeunt fulitarii, pauciflori, rnrius uniriori. CaJycis
glabri & **pallide** virentis foHola funt acuininntn. **Petali carnei** & fiibiifiindibujfbrmis **lim-**
bus eft obtufus & feniiq;<iniqui(ln.s. Tubi **pan** inferior eft **quioqatfulctts**. Aatherse ob-
lung'v **efeQgue** paliidc **czrolefcunt**. Stij^niaca doo lioetrii icrmc eqaant ipfum longini-
dine **ftyloflli CtpfoU gUbn**, fusca , **fubrotunda** , obiblece tecragona , **qoftdrflocolaris >**
valvis, Scmitu iolitarii, atra> liinc angulata, itlinc fubrotunda, kviilimc villofa.

TABULA TRIGESIMA SKXTA.

VIBURN U M D B N r.YV I M . *Lim. fyjl p«g. »i 8.*

Arbufcula Virginica hyemem noftram fub dio perfect, floruitque)am h'n ftib Janii ti-
ncm, at fruclum baccatum, ncdnin maturnm, dimitit, foriaffTc nimis adliuc tenella.
Cortke vdtitut plabro fucoquc. Folia habet ovata, acmninata, **oppoiti**, petiohta, &
cicgiabra, dorfo icivilRnc **pobcfcentU**, argute ferrat, per nervos laterales ex ncervo me-
dia usque in apices **denttom oblique** adfeendentes in initio vjldc plicata, poftea ta-
mcu **tptasK** & pl.it}i)ra; in **nail** juniwrl>us florcntibus interdum terna. Cymx termi-
italcs, liores albi.

TABULA TRIGESIMA SEPTIMA.

SALVIA VIRGATA.

Sub titulo Salvire pyrenaicæ femina hojas plantæ accepi. Non potni ad tillum Unnxanam fpcdem redocere; qu*rc propofoi «u Down. Fere uptake adam ooftran; quin etiam dc femine ddapfo fpone provec:at. Primo anno fol'u dumtaxat produxit rj»i calia, altero ciutes. Stint autem ita oblonga, olttua, Wi coniata, pctijbu, per vtBM nucroifimas cuiirracU & ru^ailiflim, creaaku, marline fimwto-unduLttt, fupermtf ac-vientia & ;la!rj, nervo tanien nedio excepto, qui, uti ttjm pctialus venxqtie clorfo- I . Mllis tefnumr, fcx vel novcni pollices lo^tgta, & duot CTMVI taca, Folii caufioa, in-(trim periohta, fuj ~~teriora~~ Iffit, tunt cmmo-cJefuata, rugof*, vi\ htrfuta. Cauiw i-foci} obtiis qudnagvjtres, ere^{ti}, strcti, quadrip^s sdaks, nmis longH «d tin^ulum icu-tum adfeendenti! us aceti, cum his ierminant ur iti raceme* virgatos ioogofqne, Bradec integrx, cordatx & acutas excipiunt singula flores ternos breviter pedunculatos. HistflV calyx rugofus, hirfuius, fukato & hilobius. Labium superius est latius & levissi ti> bi-vci tricrenatum; inferius est bilobum: dentibus acuminatis. Co oBx am ntvJC, iut jwilk-ic i alex, ore exsudentis, labii inferioris laciniae laterales sunt lanceolatrx. Antherar sufficiunt. Scruuu turn MI¹.i. Flora • Julia ad Ngvtini cim.

TABULA TRIGESIM \ OCTAVA,

CYNACKHUM ERECTUM. ; Am. Bfl. pag. 191.

Apocynum prtrmim lat, folium. Clas. Bfl. i. pag. 124.

Apocymom (olio subrotund.). AaaV. pag. 301.

Syriam ignofcit patriam tneç planri, qmm invenifc fe circ* Tripolim, NUB «•»«(circa Birrtm aii Euphratem, afferit Rizwolim. Fructus totus iglber, inordinate ramulos, qui rtqec v<! fcx peuf tkui, ere^{ti}, debiles. Ramu trate & flexiles cortice vestiuntur cincrafcente; iei*i*ucctim mitlu fundunt; juniores leviter compresi virent, p^{er}sumque intorquenctir, ac fi (1 v> subiles evafuri effent. Folia coedata, scues, integerrima glau-W per paios brcioires Gbi o>yuntur, niveumque liquorem beli illiant. Cyanæ avil- tares composite eque (lorc^ i distincte plurimos niveus & odoratos. Neçarii sunt foliola ttJ0> cjue. atba, wiiformia, stylo duplo breviore, parolis, em pctain aiiemantii, germini- que infertji. Squam* (i minifex quinque, gibbe, germini iura iieitrij Ioloids impositz, stylo accumbentes, interne uniloculares. Filamenta decern, dfceniJciitia, singula vicina duo c^x eodera punto inter duas squamus proximas. Anthers oblonge, erecte. Scylos- vifus, inverte fufiformis supra bifidum germen in collum coarctatur. Stigmas oblonga btiidiini;]ne. Fruct HI in boru uccdum tutu, liycmcm *%n m hyperoucalo. Jia ^{nia} & Julia floret sub dio.

TABULA TRIGESIMA NONA.

MALVA PARVIKLORA. / MM ;. I pag. 4*0, ^, ^, *, 969.

Malva tingitana, exerflott, parva. Pl. alfr. , 83. t. 44. f. 1.

Plants aitiMU Ait) dto in porto feritur, floresque Julio & Augusto. Attra hæc species ma- iiatn (imilitudiiHH habet cum Europea Malva rotundifolia; & qua imprimis distinguuntur canis non prostrato, sed erecto, ramis tamen frpe paucibus valde diffusisque. Tota

Icvifftme pubefcit, & fcabriufcula eft; fxpe itcrum ferme glabra. Folia funt fubrotunda, demata, & ad oras magis niinusvc lobaca. In alis (lores pauci glomerati brevkerque pedim. culati Jocamur. Calycis glaberrimi foliola extriora linearia func. Interior in fructu pacer. Pecah oblongs, emarginata pallideque purpurafcencia calycem vix fuperanr. AriUi *rugos* oris laccralibus funt obfoiete dentaci.

TABULA QUADRAGESIMA.

MALVA VERTICILLATA. *Um,j\$~pag. 460.*

Malvi (inenfis, annua, erefta; flqre mini mo. KUTufc. *Rand.* aff. *phihf.* vol. XXXII.

Malva finenfis crefta, flofculis aibis minimis. *Bocrh. iugd. t.pag. s6g.*

Malva annua rotuiulifolia, flortbus omuium ininimis albis pemaphyllis, vercictUatim genicula ambientibus. *Moris, bijh i.pag** fat. *man*, 4,

Ex radke annua 5r fibrofa ftri^e crigicur caulis teres, parum fcaber, fesqnipedalis aut etiam alcior. Folia funt fubrottnda, bail cordata, dentato-ferrata, marline fepteinlobato, fdie glabra, dorfo haud valdc **pabdecock.** Stipulx funt ovatx & acutx. Pedanculi ttfiiftori & breves aggregatim axitlis foliorum itifidcnc. Calyx eft fcaber; exterior ex tribus fbliolis fanctolatis; interior in fruflu connivens. **Petab** ex oblongo obverfe cor-dau **pslkat** cum oris ftipremis purpurcis. Sub diu fata Haret Julio & Augufto.

TABULA QUADRAGESIMA PRIMA.

L AVAT E R A C R E T I C A. *tim. fyjl. peg. 461. tort. upf. 20a.*

Malva crccic.i siniiua altifrim.i, flore parvo ad alas umbndlaco. *Taurn. cor. 2.*

Malva annua hirfuta, foliis hedcrx intlar anguloJh. *Moris, bijh 2. pag. %ii. f. j,*
f 17-/. S-

In liorto fub dio fit.i, fljrcs antumno **produca**, pauca ante hyemis adventum inatura dat femina, tuncqte perit, liurmua few altitu:linem adepta. Ac fata in olla, duin **gnmtt** tri'^orc **uamferior** in hybernacutuin, per iiucgrnni ibi hyemem virct, novosque foireS jam Kebruario producit, /r^{cc}aus matures Junio menfc. Atque (ic jam tertia in pcr-
ennam **•jc** xftatcm, & camen ncc lignca aut vrc &OOCO& Tota planca tontento, **im-**
prinlis i» foliis, fed cam brcvi obdnctitur, m in Kgura omitti potucrri apdus qtiflm cxj)ri-
ini. Ivimi f*pe Jain iniirnam caulli partem ornant, multi atque ditfufi. Tofia funt lub-
rotunda, ora i'ubquinquefida, bail fund cordaca, obtufe denmta. Inferiora pk-rumque ob-
tufe planiora minusque iacifa. Superioris, qualia funt otnnia in ramo piclo, profundius
divii;), acuta, & magis tninusvc plicata. Stipulx funt lanceoiatx> acuminatx & integr-
rimx, Pcduncuti untflori ex aiis tuliarum bini vcl terni, rarius pturos, **egredmfitor.**
Calyx ell **fobcomemofos.** Pctak obverfc cordata finiulque oblongiufcula dilute purpura-
(coot. 1'rucus umbraculu detticuttus uruas contiaet circiter *octo.*

TABULA QUADRAGESIMA SECUNDA.

STATICE ARMERIA MAJOR.

Statice Armeria. IJSW. fpt. pi. j. n. pag. 349.

Gramen marintim majus, CSuf. pana* 33.

Cuyophyllum montanus, five mediterraneu. Lab. ic. *<;::

Caryophyllum montanum major, flore globofo. BJ. jn. ill.

Tota ptanta habita non minus qtitim florum frtithira & colore convenit cum Caryophyllo montano minore Casperis Bauhini: srqtie c:iam projec:ta recentiores Botanici, sicuti jam diti Lmnxuv, 5: nuper quoqtie Ha!Icni*» fllcnmt pro steris varietate habuerunt. Solum dif'criir en inuenio in foliis, qu. Aim in hac depesta maiore ex longo lanc. h.i, acvmtnsa cum gpice incisivo, plasa, com oris albican ibm ncn'bqt! obsolecis. Sed vido, dicerimen hoc clV, conflantissimum III cuita pimtj ; ado a; neutra in alteram state trunmteror; nentrios ibmint fata slum qmm ftiquwrn m<ro n referentem plancam producant; nee inter no frutes sylvestres, minores omnes vertique graminifolias, unquam aberranteni ulhm ,t lnd lanifolium accedentem conspicere nisi licuerit. Floret altero a finione aooo. Radix fijporc gauJa adstringenti.

TABUL \ QUADRAGESIMA TI K PIA.

SILPHIUS REBINTHINACEUM,

Ex accepiis a cUriffimo D»vkk Royeno, satisque Schennitii fub dio fcmiutnii e screvo-
rotSphnw, qux primo anno fata folia produxerc radicals, altero flore*. Sci-
(tine ex radice (utiionni lort^tquc caulb (atkariat fk liipcdilts enatm t'nit, q»:
Oftofavil prtmo dc^oractiit *i >re, »i
tienfcm a me tiamlas, ix.h (ricern, dtero anno ires ctu!»
bras, credos, firmilfir «mic (v*iicul*«o), «
curfu radio nullo omatof, ad dtflt I:
ampta, cordata, acut tamco mi ion (Vim
uu pilbque ciii i *hieracu* *cali*. Folia canini
ntc tamco rufcaft, Peuoli tongi, im, corbat la , gbbri am Gabriel
fubfqua tunt *egrema*, sellis, concava. ma\$i« otitjigil & ten,
caulia; fiimma in. *liolis* daobas oppoistis ir. P*c**ti«coli c aphvilt plcri-
que; pa in fructum jum abe utrwuntur. Fltn rr pedunculi in paniculis
I tra hun. sic mutuo excipian unretn, pre poih minis in casu ap-
UterciJci, fcfcqti - in Helianthis. t.Ci Omi communis imbricatas, nitidas & fabrocundas
floris, qua*Ji** fulce cloris, obensis; extimis ovatis, brevioribus atque tredis; interioribus
conflat t ioribus. n flore, in fructu eratis. Corol-
Unceolato- oblongii, tone •; iupernc p<<ntib* i longiores, serrulifling, in-
tulz fxminac liguant in radio trt^tu , caiice dapb , p tumenter basentes. His nig-
mata duo, & Rcrmcn magnum» obverfc OVMUI: glabrum, comprelliduum spicque hi-
dematum. Hermaphroditorafn in difco numwaftwiim oco lofo faturius litter successive
decidunt a (lermine p*s*mz, post *m ttvk* in radices. Et vero hermaphroditis stylus nig-
mac* simplici afixoqae te *marinus* Sr coroli ale concolor. Anthers nigricans. Et germea
fabil forme obcufum & pube&cm. Semina r*JU u^u* grain habent fai germinis, fufca, ni-
tida & coronata marginc parvi> bideatadj. 1 icrmaphrt dorum in difco semina columnaria

5c tetragons abortant omni,i. Rcccptaculum leviter convexum inftruitur paleis oblongis & membraiiaceis. Semina maturelcunt inirio Novcmbris. Tota planta dat Ixfa i'uccum tercbimhinacei octoris. Patriam ignoro. Ut idea nafcatur totius elcganciifimx huiusc plan- ta:, tabula exhibct difciffi in B caulis fuperiorem partem. Turn mffimam cjsdem caulk partem DC, ubi in D prnry **diiaJS**) unius capiris **ridicatis** confpicitur. Inter A & C pur magna caulis defideratur. Folium ctjam radicale, quod maximum planes habuit, non co» loracum venisque folummmodo nota!)ilioribus indruftum fiftit. Alioruni petioli fnt truncati, ut ne coiufio oburta fuuirec, Adiunc quoquc flos uccrquc, femen utrinquc vifum, St paiea.

TABULA QUADRAGESIMA QUARTA.

CARDUUS PYCNOCEPHALUS. *Linn. fyjl. pag.* ; *ly.spec. pi. pag.* M ; I .
CVduus nemorofus italicus. *Burr. obf.* 91 j. k. 417.
Carduus pycnopoljxephalus fylveftiis. *Tr'wmf. obf.* 100.

Rddix fusiformis, vis digitmn minimum crafta, fnbltgnofa, **intai** ahncans, corticc vc- ftittir fusco, fibrillisquc augctur. Caulis crcchis, ramofus, bipedalis, ftriatus, a foliorum marginibus alternatim **flextofe** clccurrentibus ipinofique totus crifpus , plurc am **ptaciore** comento arachnoidco magi; minusvc albkat. Folia **font** oblonga, femipinnatirt- da, demnta cum nervis in f^ina". fubutaras /ufi.'cfcentes punjciKCS rigidisque abcnnibus, antcc pubcfcciuia virentiaque turn pla<is intermixtis magis albidis; poftic fepe fublanata LS: albidiora, radicalia minus divifj, Pcdunculi omnino inermts &: incani unicum paucosve flores (iftincnr. Calyx eft oWongns , fubtomencofus , imbricatus ex fquamis lanceolaco- fubulatis, fpinofis, punginibus, exterioribus **nugis** paientibus. Corolla purpurea turn anthra **concolore** littiratiore tifibtim **babet** vix patcntm ; cujustnodi flofculus fingutaris etiam tlqwngicur, ad latus adllanc Hofculo alio **taggh pttoio** , qualcm in radio interduin invent. Calyces cum fciniibus uiacuris integri decidere folenc. FJorct Augufto,

TABULA QUADRAGESIMA QUINTA.

E C HII P L A N T A G I NE 1 *Um. moot. part. 2. pag. 1 o 1. an varictas ?*

Echio vulgari fttis fimile *eft*, a quo conftanter dffl-rt imprimis radice dumtaxat annua, dum, **Cuva** primo vcre fub dio, eodenii jam anno florcat a Junii fine ad Septembris usque, quando fiuchi perfcelo planta intcrit tota. Turn ctiaui radix in hac planta tenuior & filirofa colore gaudet plerunujne (ncc fcincr) nibro, i-in^utneunique **fixCOIB** fiudit. Cſcrum piloliuii q 11 idem eft, at pih's ncc rij;idis, ncc qui in caule ev vernicuiis ntgrictn- tilms oriuntur. C^uiis rectus *eft*, & pedalts aut altior. Folia oblonga, obtufa, radicalia 8: **inftriori** ntcnuantur in pcciolum fongum, fupcriort fnt fccflia. Radicalia in centenis tndividuis horti noftri nulJum habuit Intitira aut nwifis ovata, qujm fnt ilia, qux in tabula reprfentantur; qiiare de fpecific dubito, Flores tocatitur, vclutt in Echo vulgari, **tn** **fpkis** fiitiois **do&gidt** &fcundis, cademque tigura fnt prndit), fed colore **mtgii** **dfluto**, & **fil** iticntii **ilbtdis** tnroliani non excedciuibus, im» ut plurimuin brevioribus, **ftyloque** albo fubliirfuto brcviori.

X

TABULA QUADRAGESIMA SEXTA.

LATHYRUS TINGITANUS. *Lmn.jyfi.pag.* 487.Lathyrus pcdunculis bifloris; cirliu liiyUyUts; ttdulis aiicrnis hnccjiam. Roy, *prodri-*
*7. pag. 363.*Lathyrus cingiunus, fi!iqui5 orobi, flurc ampio ruberrirao. *Moris. bsjL %»JMg- 1 J«*
/. 3. t 3./. 1.

Planu glaberritna 5r anntia, prmo vcre fub 1!^{lo} fata, florit Julio & Augusto. Caulis ra-
mofus uirmquc in margincm tenucm acutomqne excurrit. Pedioli angulati fultient
duo fuliola lancolau, fubtus nervofa, brcviiimc pvtwUu, eppo&i «tf alternantia; ter-
'iniancurquc in ctrrhos bitid^s, trtid^s (iimplicesve. Stipule sunt lanceolatae & acuminatae,
basique in iimilsm «mcahm, fed onko BWoreni, dcorlum pr^ylucenntur. Peduncula ple-
1 unique fntt bifJori; qan tamen euatn anitlgrus obferva i esdem in individuo omnes. Ca-
lyx fut vctillo pdrpunfcit. CorolU ioxl^n c:rgmiflans ex purp. eo nitK., vexilli di-
fus inferior fauradifine. (.:; illu alis concavis brevior est multoque angustior. Legi-
men (ascescens ad feniiti torofum i evterque compressum sex septemve semina continet, vic-
tngulata & c: fuso atque virw.

TABULA QUADRAGESIM \ si PTIM \.

LACTUCA TUBEROSA.

Sub titulo Lactuce crttic c toticre Er tecept hnjo* pla-
rio. Lacte candido, »d affrem mrantuc, target tota, vel ales in calycibus, ut ex
his, cciurn non ruditer atoilty, illico jjutc ntim exfuder. Radix perennis in crux oblonga
dispefcim*, fatit Tufca, •Jbiciatia hruis. Alrcro xrnit anno canem unicum emili, tertio
duos. Folia fusc fpinofo-dsftuu, iti-ima intc^ra, fu>eriora fuscato-pinnatida. Anque
talcem thero x testis anno flo'cem tabula plantam exhibet. Tertii autem anni caulis alter
erai folis omnibus integris; Jter dqi:to simili quoad folia inferiora; ut in hoc caulin
crane integrerrima; ea
caulis medius elongatus foliario flore terminabatur, aubus ramis axilla-
ribus tribus pacibor. Folia radicalia quoc:oit proleunt obverfe lanceolata am spathu-
la I ut <dv> foliorum floruti ftgrin vaik iudat plana. Hec in hybenaculo, in quo
hyemem agit, jam hyeme proveniant, perennique proximo vere, dgm ctttttt in con-
Chim prodit. Flores brevibos crassisque pedunculis insitunt; corollis ex caruleo dilute
purpurl centib. Semen nigrum, nitidu in. pbttum, fupcrac brevuer tcmnuutu, in-
lh'Uitur pap, o stipitato.

TABULA QUADRAGESIMA OCTAVA.

FORSKOELEA TENACISSIMA. *Lmn. f. i. pag. 323. num. 73.*
Chamædrifolia tumefolia uscarense. *Plat. oh- 97. ;. 275. f. 6. SbOm. iff. \$m. 53.*

Ex radice fibrofa & annos caulis effurgit unicus, teres, pedalis vel sesquipedalis, MM
ramosus, perim rubens, partim dilute virens, punctis adspersus fanguineis, pilis al-
bi hispidus, erectus. Folia fusc akcffta, o viu, ! basi integr, laxe ferrata, acuta, palli-
dissime virentia, margine pilis brevtbtt^c citwoi, ut

rcctis,]»ic ibidem fcabra, in facie apicc in uncum acutillinium inenrvatfa, hiflC adlixrentia digitis canjrentibus veftibnsqae. Pctioli rubcHi, trcces hifpidique foliis *i'unt* breviorcs. Flores axiltares gemiiii brraftai fufFulriimtung finguli lanceolata aennuoatt hirfacaque. Inter utrinnqtie florcm novus ram us ex ala folii egreditur, unde tune illi divergentes ad latera ranri confpiciuntur. Calycan in plurimis meis planc[^] ibmper vidi pemaphyllum. Florcm, uct notavic ceM>errinus Linnxus, omnino fiCtricatu ditftcilem inveni, imprimis propter lanam contentam, ex qua facceflive (lamina cxfilium. Hinc eft, quod in fyftonMte •fexttali hiiic plants adfignari fuus cjafficus locus regre poffit. Calycis plana & initqualia la* titiid'ine foliola bali atque lawribus birfutiffima font. Flores fuiu contpreffi. Filainenta jam extricata iiictio longinidine ijiius calycis. Siyi foat toci Jiiiftutifinii. Pech CcpfUS "-ninncravi o&o. Torus flos pcrfiftens cum fetptnibus maturis decidtr > (icque i'eri potent, qiiin diffienber femina eximamar. Floret in cjidatiis a Juoio ad Septcmbrem. Ad latus ^Jepito plants medi-c satis & ncdum valde *tttmahi* adftant ad duplum aucbss Hos integer, in qotf caljm l'olus confpici potell; turn folioluiii RngutefC cilvcts; tandemque calycc avul-(o lana, quam cirCQnukot o&o petata, S: ex qua egreifi Ipsdaiitut ftjii quuHjuc, ftjmitia- que evoJOU tria.

TABULA QUADRAGESIMA NONA*

1) R Y PIS, SP1N0SA. *Lmtu fyji. peg. sit.*

Drypis italics iculcata, floribus aibis umbellatis conpaSis. *Mich. gen. 34- tab. 23.*

Drypis Theopfarafft AngaiUtn *Lob. k. 789.*

Spinalba, foliis vidua. *limb. pmn. 388.*

Carduus fotiis tenuibus fpinohs, adinfar Junipcri. *Moris, h. 3, fag. 161. f. 7.*

A pud Satnnites perSulmonenfem tr<£h)tn muhis jn iocls hanc pltni . dicftMichc- lius, cum *eduo* opud NuriTaos, a quibus licrba aim in a vocaiur co, quod iilani libcen- ter afini depafcam. SOOUOD « Lucorali Auflriaco ante plurcs annos in hortum iotuEit amic- ctftiraus Mvginrlus, S. C. R. ft A. Ma/cftaci in cwnmercio a coifiliis aalicis, ex quo tem- porc ibidem late vc^ctavit, hfenum in bvbernaculo tranfigens. Defcriptionetn olim a me datuM rperam, «t habcatur iconi iidjun;b, Michelii certe tigira tarn erefb cmn noftro nullu iodividao congrait, nee coti^ruerc illam magii cum fvlveftribm a fe viis afferit mo- do taadaras vir amplifltmas. BH en I HI & in hono noftro difTifidima ell: plane J, ramis inor- dinatiifmc denfequo nitituo itnplexis, nttnq i in tilciniis florestibas ramulis en Ncc *arnica* aptior c(t niturtim fignra. Unicom iftiusmodi ramulmn reprxfentari curavi cum addicts in iiM.Niiuulitie natarali pi'tllu, pealo, calyce, capfaia& ieattoc. t\$tt» ex lcni- nihus altcro dcmi. anno (torc[^] pro/ert, Hycmc arcfetis tota, emori vidctnr ; at iiifcqueite verc, vlnri revik ami Oufierofos rainuios noros Ixtcque vi- remes promit; in decimum jam hie annum pemoini. I(iii)ida S: inodon eft. Rami pk- rimi, difTifi proemnbm. Btfetnl florcntes eriguntr. Suntqec ad fulia articulati, sub- quadrantilares, in laterc axillas fotiorum ioferioroffl fpe^amc utrinque Culc:itt, cwrcmi flo- rcntes tliLhotomi. Componuntur ex corticc *i'rverWi* & ex medulla filifonni tS: tcnaci.

mi fbbtilata, macfonaca, ponj»itk, uitida, < antice fulco JM, [>criifkntia, ilttnuutm muttio decui&nm: tnferiora mtegerrfaM; f«pc- rion> ad bifta iatiora pluniora & oris ciliato-fpii) Ptores fefilles vcl brcviffime pedan- cvistti in denfi diciorom dirjianmitur, qux p ramulorum prodttStoM fiagis eft minusve coflfpJcoa. < «npr<flh» virtt !a ex cdruco aJbdlunt. Amhrae ex. rulfcunt. Semma figveot. Flora xltaic.

TABULA QULNQUAGESIMA.

ALSTROEMERIA PBLEGRINA. *Linn. fyfi.pq. ny.anmn. *cai. *<. 6.*

Hemeroceilis floribus ptirparrfcemitjus macutau*. Ftnafi. irm. *•£*£• 71 I- wk 5-

Spccio&m ftirpcm primus in iuncrario lso Penivuno F<<(Jtus t! scriptis, exhibuitque da-
spouze, sit, a ma dif-
tia lineatam, qtuini crefcere in numtc quo Jam in militaris *b urbe tia legat-
to. In Amcentutibus Audemicis ccfcl vro. Quare descriptio superfedet. hoc-
cum ad'mn:b feminibz a Linnzo mecum communizans jum ab olla anna erfcede. 1" habitu
to noftro que Feuilleant figuris etiam inter fe p. abm.
non plane litmti Linnianc at -arum dffcrepan:
Apadooii longa tubera, fundi perit, ac plicatur, ac plicatur, ac plicatur,
quzdam in iconz fitue dtjin ad uilr hem in hybernaculo, medianu ztacem age sub dia. Fl-
ilio. .. or 11 -afcre.
r« J

, TABULA QUINQUAGESIMA PRIMA.

CHEROPHYLLUM COLORATUM. *Linn. fyfi. pag. 214.*Myrrhis lutea daucoides. *Moriz. hif. 3. p. 302. f. 9. t. 10. f. 6.*

Radix fusiformis, foris flavesiens, intus libs, oder & sapore aliquo Duci Cerotz *Virx-*
dita, altero statim anno caulem emisit teretcm, ratnotum, vix triatum, plb tlbtt)**
inferne cebrioz. frachum derum periit. Folia sunt supradecompo-
zit, infima hirsuta, minus media, summa nitida; foliolis ultimis lanceolatis. Vagine mem-
branaceo. Umbellit compozit plant involucrum universale habent nullum. Radii nitidi
ex viridi flavescent. Partiales umbelle sunt convexule, habentque involucella, que con-
pctas foliolis circiter 0^0, 0^0, acuminatis, permixtis, corollaque concoloribus, ni-
li quod i media fui pars magis virtut. Petals sunt cordata & lutea. Fructs „ obbn-
teres, nictus, obefas. Semina triana, foliis foliis, marginibus quatuor elevatis coloris
UrMimiei, sporis ingredi nec eris. Flora Majo & Junio. Iconi sibunt fructus Sc corol-
la in iHtiva owgtutti<nt. Illyrium pro patria Linnetus effigiat.

TABULA QUINQUAGESIMA SECUNDA.

SESE i.t AWMOIDES. *Linn. fyfi. pag. 215.*Feniculum lusitanicum, minimum, acre. *Tourn. inq. 312.*Sexifraga parva annua acris, millefolii terrestris folio tenuissimo. *Moriz. hif. 3.*
pag. 173.

Amiodes. Rad. pin. i J9.

floris plena nict. Radix annua albicans. Caulis est erectus, teres, vix striatus, & bi-
pedalis. Folia sunt bipinnato - multifida, radicalia & infima magis oblonga, cujus-
modi ad latius depilatum albit, reliqua circumscriptio magis subrotunda; foliolis acumi-
natis, planis, linearibus, spicisque pallentibus; incerdam multo quam in icone angustiori-
bus vereque stetatis. Vagine foliorum sunt roquals, nec habent membranam exstremum.
Involucelli utriusque foliata sunt linearia, actinioioati, loniuudine »Wc inqualis. Petals
sunt

fiint alba & cordata propter apicem ad balm usque antrofutn in Hexura. Anthera* purpurea, Semina parvu (kpore acri prxdita. Fructum fcorium addendum curavi, cum in naturali statu, turn lente au&um.

TABULA QUINQUAGESIMA TERTIA.

- ⁴
TORDYLIUM APULUM. *Linn. fyji. p<t».* 104.
 Turdyiium npulam minimum. (*M. cepbr. i.p. tti.t.* 114. *Moris, biji.* 3. *p. «1 6 /.* 9.1. 16./ 6.
 Sefeli credcam minimum, *Bcntb. pin.* 161.

Planta in horco fesquipcdalis & annua. Folia radicet&Ea in orbetn fita atquc decumbentia funt plorima pinnata, quale unum talula foorfim exhibit, cofta tcreti. Foliola subrotunda tut mogis oblooga, obtusa, Udaista & obeufe dentatt, ragis tninosre pubditia, breviflime pedokn, oppofita, trita inter digitos hand grata odorata, quatuor. paria Cam impart Folwk Ctolmt funt giabra & acuta. Vagina: ftrmtac, amplxantcs, pilofc. Caul wplures, tcrctes, erecti, ftriati, ratnofi, pilis pneprimis interne vctiuruur rfbis densisqne. Involuci'i.fuiiula funt fecacea. Railii umljcllx aoiverfyis fex aut paulu plurcs, ab invicem remoti, patent. Florea oinnes fuai *fertiles*. Petala aliw, lato-lanceulaca & acuta mtrorfum incurvanmr, ut htnc cordata evadant: cxaw in fiofculis umbelhe exerioribtu mscimo, birido, laciniis Unceobds. Aothene «t faro vircntes fuscefunt Ittera&cr, Strli breves albnc. Semen interne rubefdt, & hinc atquc inde depicum Sftear. Sylvfris plan. *magis* eft hirfaw quoин cuka. Floret Julio & Aagitfte.

TABULA QUINQUAGESIMA QUARTA.

TORDYLIUM SYRIA CUM. *Um. \$J. peg. *o₄.*

Tordylium fyriacum humilius, feminc granulato tnajore. *Moris, biji.* J.J. 317- *f. 9.*

t !«./ ?

Gingidium Solas Btacia: *Syriacum. Lab. ic.* 715.

Gingidium foiiiis Paitinacx litirolix. *Bau.\ pin.* 151.

Rariit annua eft, Tota pbnta ;iiis in can is brtvifEmts veftitor. Caults teres (imulquc angulofus, pfllmum unnni iltcrumve altus, tVuihnnn poadere terrain vcrfus debilis inclini! mr. **F**EM fitlU pinnata r *foliolis* obttifi/Smis, trctuto- incifis, infima & fumina ex tribus, rdqna ex qoniis. Urabdle univwftlis radii pteruinqw feni, afterni multo Ion giores fituqtjc exteriorow, proprio involuci fofo fuFuiciuntar finguli. Uinbclluuis partialilnis involucrum cfl triphyllum, extrorfum patens longiimquc, in fra&boi *ndhrxc enqpt* increfcen, *cotyledon*: s tone aflyrfexando inyolvcns, F i m in qfialibet umbdiula font pauci, partitn (effites, psrtim breviffirae *peduncu* kiti. Iewla alba, itixqualia, cordata, reflexa kteibus. lilumcpta alia. Antlici-e fiifcx, Sanina trngna; qux utrinqnc confpech propo-nuiuur, una cum fioculo genuine jam bcrefeeote. Sub dio floret Jutio 5r Julio.

X

TABULA QUINQUAGESIMA Q¹ INTA.

GERANIUM MOSCHATUM. *lam.* *bf.* pag. 414. *tf, mrJ. num.* 317.
Burm. ger. num. 2y.

Gentium jKttolis mulciforis, *cwte* dtl'ufo, foliis ovatis pinnatidis. *Hal.* *bf.* *bf.*
num. 945.

Geranium ci^cntu folio cretum **Rnmir** *am.* *Bcc. naf. part.* 2. *pag.* 93. *tab.* 82.

Geranium c^ccu foli > mofciut-Jin. *Bjtb, f:n.* 319.

I¹ lata et annua⁵r mnofit. Oitlo film terete, hirsuti, subglutinosi, creti quidem, fol
 II dholes, & qui agre subentent se se foli, herbacei roti, pedales. Stipulae sunt ovatae,
 membranaceae albidae & tenues. Folia pinnata cum impiu leviterque glutinosa pubescunt.
 i olio t fuit uoata, magis minusve ferrato-incisa, subfusca, alterna vel opposta, extrema
 frpe confluentia. Pedunculi communes hirsuti, qui ultra folia elongantur in trichotent
 pianta, umbellatum hanc paucos flores. His calyx est hirsutus, glutinosus, striatus &
 breviter aristatus. Petala oblonga & integriforma ex purpureo rubent. Filamenta sunt in-
 ter se distinctissima, nec connata. Hoc quinque gerant interuersi violaceas polline fr-
 etas flavo, basique angustior utrinque lamellula. Seignata quinque oblonga patens. Primo
 quidem inuita hec planta dignoscitur a Geranio cicutario; at vero hec discriminis ratio
 verbis difficilem exprimatur. Odore diffinguntur certe melius, qui in Geranio moschato
 moschum spicat valide, in cicutario fatidus est. Coryleones in illo semper sunt pinnatidi-
 da, nijam manu illistris Linnaei; & quibus adiudicam introiti zonella plantula in ta-
 bula aybetar. Cicutaria coeruleoans sunt cordata, semicirculare & obtusilime. Nunquam
 in horto nostro Geranium moscharum tam cicutae dificta folia habet, qualia in jone Boc-
 cotiana diciincaatur.

PABULA QUINQUAGESIMA SEXTA.

S^M > A I^M BELLATA I. A-».* «.4 IK. *ann. acad.* 5. p. 491.

F; apex cretus, decompeditus, debilis, ramis elongatis, jam priso xestis anno floret.
 Corix trunci est cinctus & glaber. Rami virent; juniores plus rufis rulis molli-
 busque vestiuntur. Folia sunt cordata, obtusiflamine ferrata, utrinque obsoleta concreta,
 »CtKA, vicensia, carmine sublobata; petalo terribus pilosisque. Stipula lanceolatae,
 integræ, aciculae & pilosæ. Pedunculi tenues, solitarii, axillares. **H + tsn** umbellatum flo-
 res numero diverso sustinent. Calyx est campanulatus. Petala faciente lucet. Capsula plor-
 runque fediculatis; localis dispermis vel tripermis; valvulis bicornibus. Semina fulva &
 tnguuta. In ciftitrio evhtur, An ericet torridit incola.

IVBULA QUINQUAGESIMA SI P I M \.

CAMPANULA CARPATICA.

In alijs Carpaticis comitatibus Scopulinus crescente. **•** *on* *Iwne ncJtm* descripsit Campanula
 speciem primus detectus clarissimus Franciscus Josephus Lipp. Laris hic candidam fun-
 did. Radix illi est fibrosa, albicans & perennis. Casus herbacei, sumi, debiles, parson
 vel nullatenus ramosi, hirsuti. **erimi**, nisi unicum sur paucifloros flores sustinent;
 atque etiam ita variant. **m Joc^c tmiti.** Sylvestri Guilleman planum tubula habet, ex femi-
 ni-

iiibus in horto enatam primi anni. Sequenribus vero annis cvafic multiramofa & muhifloru, ut uiuii planta qutnqiatrjua flures protulerit, habitu **tamea** reliquo donaca feinper cu-dem. **Folia radicatii funr ex** reniformi fubrotunda, Caulina cordata, petiolata, nirida, iiirequaliter **ferratj**, ferraturis mitktiatis & obtiills cum acumine. Pedunculus clongams ghibcrque **uftinec florem**, cai eft petalum **amplum**, exrulcum, pateiudiinum, glabrum fupermnque. Caiyci> etiam nitili **fofiolfi** fum lanceolata, fuperne ferrata aut integerrima, & aatminata. **Neftmom villofum.** Scignuris lacinx **cr«0z**, **mtgnse**, fuperne fulcata:, **fsbnu vfflofe.** Capfula eft **oblonga**, **gtabra**, trifuiicata, angulis obtufis & lineatis, triloful.iris. **Semtnfl oblonga.** **Flora** tocam xftatcm. **FraGas** & fujiuin radicale depicta cer-nujitur ad latus.

TABULA QUINQUAGESLMA OCTAVA.

ANASTATICA HIEROCHUNTICA. *Um.fyfi.pag. 431.*

Thilafpi Rola de Hkricho ilicbun. **Moris**, hijl. 1, p. i*%. f. 3. t. »y./ 2. © 3.

Rod hierichaotics. Cam. ftwr. /m^⁴. 14.7. tab. 41. J!a/. EyJI. iiwuirtfi. 0. 4. /ol. I.

fig. 1. a %.

Ri>fj hierichaaaci »rulgo difbu Bmb. *pin*, 4ti4-

In horti cnldario faca, floret Junto & Julio, femina perficit Augufto, aurtnno perit; nee unqiam in taiuutu volumeu ex^rcvir, forniam^ue tandem adeo congobatam affum-plic cujtisnodi funt ilia pi ant x exemplu, qux paitim in liiropfeis rcrum evoticarum colic-tionibus occurruin. Linna;anus generis character, ad lianc ipiem concinn.ittis, exaclc Juiic repondet; fed excludit **speciem** altcram prupcer liliuhe auriculas in eadem deficiencies, **Totu** plantula kvin'ime villala & **(cibfiufcutfl eft.** Folia oln'erfc ovjta vcl **Unceokta** in pc-tiuUim paulathu on^ntaimir, **nunc integerrima**, mine inxquatiter dentaca, miltiit; viren-tia. **Flares** alii in **axillis** folioruiB (blitarii; alii in rccnut(is ibukm dilpofm; oinnes brc-viifimc peduncdad. Pewht nivea, Scorm in **tabula** cvhihentur fructus integer; diflfepi-menflun cum locukmento; valvula cum uun^uh & locuhisead pjrietc e\tcniu; Jemcn.

TABULA QUINQUAGESIMA NONA.

CUCUBALUS CATHOLJCUS. *Lmn. IvJ. ^09. fp, pt.num. to. a. pag. 593.*

Siltfut; foliis <>v,ts **uirinque** Hijutis, **etale** paniculaco, floribus nutaunbus **cenaiiiHmif**,

Roy. il. pmlr. 447.

Lychnis vl&oGi altifliim, flore mufcofo, ocymaftri facie. **Cup. catb. no.**

Radix perennis quotannis plures cables cmictic ter«cs_t vifcofos, fuberc^o^, debiles, tri-pcdalc*, paniculatos, diffufo*, fubdicliotonios, infirnc villoios, **SoribosqtM** num-roft **OBOffWi** **Tolta** funt larKculut;), fdflilia, itucgra, acuta, fcabra, fubvifiofj, **plertqtu** plus minus revoluta. **Pedunculi commanes** uliimi funt **fabainbeiltd.** **Piorn** de die a-que llc de noGe explicant<r. Oilvx glaber purpnrafic. Petalorum alborum limbi proftmdc **bifidi** potent. Filaincenta **corolla** squilia **gereot** antheras fulplmrcas, Clima iioftnim sub dio opime fct, & **fto**< ^ J¹lio** « **Nbvembrim.** Non videtur mihi ad jianc speciem c«u Viru tas referri poffe .)j}lc»i.ina Lydmis nocturna aon vifcula herbacco flore.

TABULA SEXAGESIMA.

TRIFOLIUM SUFTOCATUM. *Um. mm. pin. %.*

Radix wnuia onto plures procubentes emitit. Folioli fumt obwaw, obm&# lkver
 longi ex media stipula binida & serrata egreditur. IO s Ji]
 ^«aX's(abra. Petit!,
 fotiorium More* fedem denfe Co, j. Cal'.
 spes ligidul« ft pa,,,(branex, seimnedoptebr
 Bis um (c offinac, antibusque, tenerim, eviores, lacerato eay. m coo-
 omnibQi c_b»^ catorej(filbpdIu cideque: per ^ distincti,
 guendis; vexillo p^auly ton giori; als lo. acutus. Multaties sulfum corollam cum
 ut «& pifilio in tabula »pporui. !•(bm_c)»u c«t«a ptur, > illi, sed non potui extirpare,
 reOe proponcrtni. Lc^umen ^ b a g y m & difiJcnnnum HOB fopcm ulv
 totam sicut in tabula.

TABULA SEXAGESIMA PRIMA.

SEL IN'CM SEG UIEtl.

Ligusticu*ii* alpi*ii* mm pereane. fen*ii* folio, floribus albi. Seguer. ver. 2. p. 41.1.13.

Tota pUata glaberrim* eft. Caulis ramique teretes pallide virent, ac medulla alba &
 fatxxtoracA farciuntur. Ramt tctlernc vix, superne leviter sunt striati; quidam etiam,
 tte ubuj'ie, in pane dorfa foli*ii* in aogulum
raotsr. Caulis vero mens evidens est striatus, bei pollicem crassus, & tres circu*ii* p*ii*-
 Cic*ii* J longius. Ad *ii* jam terre superficie Mil CX .
 [um fub\ ericillat *m* in iino ambitu phir i p*ii* calidum foliorum iw raa
 etiam ambiunt ibidem folia. Ex subsequentium foliorum ali iterum ali rami orientur.
 seque sic porro ad summam caulis folia usque, semper ascendendo ad distancias maiores.
 Sicque egressos de caule principe ramos triginta numeravi. Et ipsi hi rai **IM ikavo r*ii*H*6***
 fitnt; raitmliqt me alto*ii*, aut oppoliti, aut plerunque numero incerto versicillati, ut
 « ten*ii* viderit*ii* ad fenov ondc rfs rn norum in hac planta multitudine judicium ferri po-
 tcft. tct*ii* ramis de rami eriguntur. Quilibet ramus ex foli*ii* ali prode solitarius, adeoque
 folia numerum siunque ramos habent. In caule solo rami fortiores caulin*ii* super*ii* Mi
 produci , atioresque evolutae. In rami vero om-
 nibus contrarium evenit, minetque umbella princeps media semper elevior. Folia radica-
 lia & intima sesquipedalia **i tmpki** que ex petiolo longi, lati, semamplexiculi, nec vagi-
 natiti, crj(T) rmifi*quc » semibrans auto, in ramos subcretes striatis & ante foliis foli-
 diviso, pe divisionem superadcompositam absunt in foliola ex segreto inserviant, apice
 mucrone ltii^Lt ft iniowii) i terminata, tres quatuorve linea longi, & planiuscula. Supo-
 riore folia eadem sunt, nisi quod decrecunt divisione. Sic rami in ione exhibunt folio radicali, ex qua colta laterales quinque emerit debene. Umbella universales sunt pla-
 ne & dense, partiales magis convexae. Involutum universale aut plane nullum n i (*), j i :
 sub forma folioli unius steriusse foliolari conficiuntur. Aut vix etiam illius loco foliolari
 pinnatisdum **nut** se bipinnatum. Partiales semper adet polyphyllas ex foliolis foliolariis &
 umbellulis duplo brevioribus. Flores parvi aliquo odore hanc ingenuo pollent, esse
 tiles. Petals subequalis & ex ovato scutellatis, apice ultra medianum antruriam inflexo,
 figuram cordicam afflumens. Styli alii longitudine petalorum patentes. Scigne cif-
 simi sunt. **I**iismeoti Alba corol*ii*n %A duplam supicant, parvis & caduca. Anthers bi-



ridx flavfcuiu pallidc. Germen fubrotunduin, Icviter comprclTum & fulcatum abit in frustum fubrotundo-ovatnm, nitidum pifillisque reflexis coronatmj conftantem ex femiuibus hinc convL*vi*> & tri - vcl tjualriiilcatis, inde planis; angulis membranaceis. Piimo vere fata Ail) dij ptanta gernunspic, at tertio dcmum xtatis anno fljruit fub finem Junii & Julio maife, Septcmbri matara femina dcxit. In furamis montis Baldi jugis dchteftam ce- Icbcrrimus Seguicrus defcri[!l]lt, docuitqne , jam fub ticulo Mei •dalterint rhizotomis Veronenfibas aotam fufIt. lit ejasdem Botanki defcriptio quadrat non minus in plantam no- Or;inTcultari], cujus figum nc tamcn carerct defcriptione sua, hanc ad cuitam fictam ad- jtin>i. Tabula cxlnbct rami principalioris futnmitatcm, cum florc lente aucto, feminineque ctunn aufto eodcmque naturali in magnicudine. In fyftemate suo illufris Linnxus hanc ptantam fafpicatus eft cfTe eandnn cum Sclino Garvifolia suo, cujus figuram inter ftirpes AtiflriacJs cdendas tabula decima fefta exhibebit. Nniyptre du i hx plantr ab invicein diftant, quam at conjungi polfint.

TABULA SEXAGESIMA SECUNDA.

SEL1NUM MON N1E R I. Um. 0. pag- 207. AmTM, seal 4. ^ .269

Plants a mm a floret fub dio Julio & Augufto. Scptembri femina maturcfc^int. Radix & folia trita'at nuficatfl Dauci aiiqucm faporem odarcrnque liabcnt. Cuih fesqlt- peda IH :mt altior, glaber, ramofus & angulatus, inferne rubet. Rami fujierors tandem cau'c aitiores evadunt. Folia fiinilitudinc jniiguntur cum *Culiis JEthuti*, fed fjiola rcnuin incidentur. Sun' j^labra, bipinnia : foliolis profunde pinnatifidis ; fegmentts obloit, fubacutis, plants. Fctioli comnninis imrgtfles in membranam attenuantur. Peduaculi ftrijti, tcretes & erceti- Involticra fetacea; univrfalia patent am reNchnuur, fulijlis ninnero vari H ab oSto ad tinicum; particulariam fbtiofl Temper plarlbas, pttalfs, execrioribus Ion- git ndine ombdhilx. UntbcUs univerfolis pjnim convex*, ralde denCu Partklis (imilis. Plores ftlb; petalis ovato-lanccalatis, scqaalibas, »pkc ancorftim incurvato, hinc corda- ijs. Styli D;ucnti(fini pcrfilhinc. Semina glabra, p»rvj, ovata, hinc plana, iliinc coit- vcxa & qtiudiifulgata, m.irginibusinter (blcos fubm;branaccis, ttptxt gaudec in priacf- pio fub.iromatico, fed poftea acri ac pangente. Ad btOJ p{aux auflus lente flos confpi- citur, turn alum femca turinque ; idemquo non ~~andam~~.

TABULA SEXAGESIMA TERTIA.

F E R R A R I A U \ O t I , M r \ . Um. fyji. pag. 5 97- Mi. ic. 180.

Ferrari.1 foliis ncn~~rofis~~. Ep. nat. atr. iy6t. pag. 199. :- %. / . 1.

his ftclhit,i, cvJaminis rjdice, pnBo ftore. Bttrr. p. 791, jr. 1116.

Narciffbs iodicttSi florc faturacc purpurco. RuJb. cl. a, p. 49./ 9.

Flos indicus c vioheco fufous, radicc tuberoifa. Fcrr. cult. 168. t. 171, Moris, bijl.

*./>. 3 4 +- / 4- t. 4./. 7-

Quamvis elegans htc ptatua inn ddincita defcriptaque Cv a phiribu?, non tunen inotilis, opioar, ~~hrc~~ iota vtdebitur, fi cum tnodo cktth comparabitur. Potcft * &vn in descriptionibus adfaocduni defiderari altqaid, (pundoqnide 11 nc ijeneris qtidem charaft:r, a Linnx 1 dttot, fi-ijj in ttJtnnt rirl^ondejt. (^tin Emo tX princif);is affimp ti* aptld eandem autoi'cm in nli^m long* dallcm trtmbcsiida vaniret, fciliecc 1 ~~n~~ nova telphent nova online tmndram. Fad~~ll~~ plainx lingularis eft. Pro radicc tuber eft fulidmn, fubrotundum com-



prcfttimqne, fibrillzm unam atrcramvc **cnfikna** terr. immittens. Caules plures, sesquipedalis, tori filijoi, tcrct^o simulque pa; am compresi, subflexuosi, superne et als ramosi, jullide vircent. Hifce concoloria f^{olia} sunt ensiformes, t, **tmpf** caulis, disticha, striata, firma, altrina; prxcrquam in partibus extremis, ubi sunt integer, canaliculata marginibus arcte **cosniventibitis**; a cnule fecetlunt; longitudinem i^l gitbam in media utrinque parte «toil»iuur. Jtiriora font «uia, fupcrta obto&. Orz divise tenuiores albant. Sesquipedalis inferio ra adco H uerunt, ut apicibus suis sepe ad duos polos dicitur ab invicem. Ultima ramlorum, valde abbreviata, in spatulis convolutas efformantur, quae singule duos liorcs coflem loco juxta invicem exarctos continet, alterum nudum primam florantem, alterum prypria itcrum fpatha magis tenra ;qu^o men branca comprensam. Pedunculi paulatim incrcscunt, floresque extra spatium extremitatem successive elevant, tunc expandentes. Corollae fietent, circa vespem concurvate claudontur, incrcscunt, usque brevi **CUTJ!** contentis de germino sponte decidunt. Tunc pulposa magis falka chartam eleganti cxrulco colore tingunt. Petala supera, huius crecta flami efficiunt tubum campanulatum. Hinc parentissima sunt. Ex flavo pallent, mucillis primitus variegata fuliginea, & orata habent fuligineam vnde cyparatum similitudinemque. Hoc color constanti omnia sunt nostra individua. Altera autem petala sunt duplo reliquo negantur, nec tam ea breviore. Pilamea tris, supero roe diffinita, in annuis sunt rubrae cylindracrum connata, germini impositum, catulla duplo breviorem, erectum, albumque cum pialis lineis fusca. Anthere subovata, magaz, fusca, dilatimque silenatis incubunt, post pollinem fulvum explosum contracte & quadruplo minores. Germe oblongum, triquetram, obtusum inferiusque tres longitudine unciae partes agunt. Stylus filiferous longitudinem habet sub filamentorum, cui ces vaginae includuntur. Stigmata tria profunde bimac parent: laciniis oblongis, planis, e^l **purpurco** fusca, in cilia ex falco flavoque variegata absuntibus. Capula oblonga, glabres, trilocularis, trirubris & polysperma continet semina subrotundata cum siliqueris **ic püppa tvit.** Sn*l* dia flores zizare, hyememque radix tolerat fimo bene cultiva. In calidiss eriut colitur. capula ad hirsus i^l ingenuis nativa pitillum pedunculo intidens; statim; stigma expandit, ut divilio apparet; capula; semina tam; idemque pulpx sus involutum.

TABULA SEX^X AGESIMA QUADRAGINTA.

CENTAUREA SALMANTICA. Lam. f. pag. 575.

Jacea major, foliis cichoraceis nullibus, flore flaminco. Morit. h. 3. p. 140. f. 7. t. 26. f. 14.

Jacea major, foliis cichoraceis nullibus latuiginosis. Rul. pin. 273.

Stellaria salmantica prima. Cuij. h. IX.

Radix perennis & maliceps hyemem apud nos recte summa dure sub die, tenuis ramos in 11 hybernacula degit. Caules transversi, quinquepolares, foliosi, teretes, inferius hispiti, superne nitidi, eriguntur. Folia sunt dentata, acuta, longa, scabres, pilis albis utrinque obsita, atrovirentia; radicula spinis pinnatisoda-squamata, petiolis nervoque mediis fabres pilosa-lanatis; caulina oblonga aut lanceolata, scabia; summa glaberrima. Flores (otita rami elongatis terminant, corollis amheris utrinque niveis, corollulis extimis f. * fuliginea modica rubefacie; aux corollis omnimode rubensib. Atque hec coloris diversitatem dicitur que absinet in distinctis individuis; internum etiam in eodem. Corollae radiales aliquot, nec tamen semper omnes, sunt quadrifidae, reliqua quinquefidae. Calyx nimbosus ovatusque squame terminans r I pintiU **sim ilktifinu** & parentelis. Semina sunt nitida, fusca, subtricata, spica nigricans. **Sum** caulinum inferius alpingitur.

TABULA SEXAGESIMA QUINTA.

NA LVA JE G Y PTIA C A. Linn. *jfrft. pag.* 461. *fp. pi. pag.* 471.
Alexa vegyptia, geranii folio. *Lipp. agypt. tnsf.*

Pianw vis pcdalis, **herbacea, erefta;** caule ramisque teretibus & fcabris. Stipule funt ovato-acuminat; eac ciliattf. Folia palmato- miiltillda, profuudc fubquinqiidida, fubtus **Ijtbfpera, facie glabra,** fubciliata; ptJtiuHs fcabri;. **Pedunculi uniflori,** axillars, ibilitarii, fcabri: qttibus fuperioribus loco folii **fapponimr** (ipulfl [rip,irtita, laciniis lanceolatis. Gilvccm **exteriorera contliranot** fctse tres vcl **pauciores**, a **calyc** iutertorc ortu **tantioper** rciiiocx. Interior ultra medium quinquduJus & **pentagon** us est hirtus, in florc fubovjitus, in fru&u amplijr: **Uciniis feraiovati\$ & acuroinotis.** Petak obtonga, vix emarginata, **tpiccfemilaca**, patula, carni colons, **calycem loagitadioe** vix **Cipentnt.** Antiicrx lmt colores. H,cc, nifi ftimmus (it in **caldario aftai**, non c(j)!icjtur, at **calyc** clau-
(0 **peragitur Becundatio.** Sub dio, ubi etiam pianta **vegrtat**, cxpanfam nultain vidi, Arili-
i-jdiaco-i'ucatt, tircuer **doodeoi**

TABULA SEXAGESIMA SEXTA.

PHASEOLUS INAMOE\^T Lf S. Linn. *0. fag.* 481.
Phtfeolas ilormn *vexSkt revoluto, adycSbva concolore, Una. hart. Cliff, pag.* 359.

^{^T^ota} piantn **gibbrfl** cK Radix aniiua. Onlis volubilts, fubangnbtus & **deccmpedalis.**
X. Foltotma intermedium cs obbng>> **lanceolamm** in acumen attctiuattir, in pji-tc caulis
inferiorc **femipedale**, nut Iingius. La-nijj func itt plurimum **breviora, bail iot<ratiq&na**
externa duplo **ttiplove ht<ora.** R cemi axillars pdunctilos rcrnos codem loco ortos permit
plure?. Floi es **inelegantes**; veni to **concave reflcxo** virent; alis olJJon'is olKiifis **coacsvs**
porrefis cmnqoe carina Ipiralker intorta alc>til>us. Legamen obiongam , compreffum
scammataqne dorfo cfl arcu.ititni. S<;:jia ptnea, renifbrmia, comprefTo-piuia, ia am-
bitu fntit **fan** nica, inferiore pa<c & mc\ cum pun£Hs Guigaisds; liilo albo. Col-
or 1*le sanguineus* ineui in receotilfiinij femiaibus eft coccim."*1.* Su1 dio nMi! nos lute vege-
tat, flor^c A ifusto & femna vix dat **matura**, qtt.e in **caldariis** certiin perticit, duin ibidem
jam incuntc Julio fiorcs producit. **Africara, teftsLuiaxo, psa** jam habet.

TABULA SEXAGESIMA SEPTIMA.

DOLICHOS SESQU [PEDALIS. Linn. *jfrft. pag.* 482. free. pi. 1....,9.

Annufl planto, in cakkrio culca, fljrcr **Julio**, & fcniini largintr A»^«ftD. Ttua £>la-
bra eft. Sripol**d exortan **petiolam** commanum **fiinclto-lanceolacz** & acunii-
nate . baHque doogntor in appendicetn lincari-fanceolatani. Que vcro Ann ad exortotn
petiolorum particularium, faboy tun coaveurnqoe fii^iram habent. Potiola funt ev ea,
jntc; idem etiin oblongi & rfoogata, a si in • ifcdo inamseoo. Peduoculi **avillares**, foli-
ozri & fabftriati ^cniuu in **extremkate** p *racos flores sessiles & insuleros.* < Ijjyds pallide vi-
rgatos facinir • in ncLiminat.r, fi])criyi *semiflida.* Corollz vestillum & alm ex parp *areo*
ceruleo ;MC coiurantur; interdtnn aiain virefcutit. J» tilt) calli fum v.il.fe maniferti,
cina albida tomet. Legumina panim comprdfitt anguftJ, ploj miaiH fesquipedauI, albi-
da, unukcr m^n branaces nec rigida, rugosa, spic)^- 1" mcurvuiii mucroncm • !



continent femina rcnifofmi-obloaga . fli Lw i si, hilo albido cum circulo nigro. Amtric-
na est originis.

TABULA SEXAGESIMA OCTAVA.

SALSOLA SGD. \ r. am. f. 3. pag. 296.

Soda; kali magnum, sodi modii folio, semine cochleato. Lib. ic. 394.

Kali. /) d. pempt. i. l. 3. c. 30.

Kali major cochleato semine. Ramb. pl. 289.

In maritime nori mwiiterritne adiacentibus Europe regionibus nascitur. In hofto opere
me sub dio, & sponte etiam quomodo de feminis decidatis provenit. Planta juncta,
nitida, pedalis. Caulis firmus & teres obtusus totum ramis teretibus oppositis parvisque.
Folia sunt subulata, dorso teretis leviterque falca, facie plana & levissime trifolata, ful-
cias interibus ad extremitatem folii non peringentibus. (Qui singuli falci in foliis ad lacem
oppositam conspiciuntur forma fasciarum albarum apparent, ceterum vix animadverterendi.)
succulenta, cum rami singuli immoventur, in caulis ramarumque inferiore parte
opposita, in corundem summum alterna, longiora quadriplicaria. Flores foliorum
infundit axillis foliis, singuli utrinque foliolo laevius minimo. Calyx membranaceus clas-
1a, (nam nonquon florem expandum videre costitit,) ovatus & acutus subicat cum folio-
rum dorso virente. Filamenta alba, ad calycem duplem longioradinem exerta, inferuntur
receptaculo nec cituti, Aniht- ex oblongo basique bilobis trigonus, ac flavescens. Ger-
men ovatum illo in stylum frumentarium & staminibus breviorem. Semen nigrum nitidum.
Floret Augusto, & perficit femina Octobri & Novembri. Depilatio ad hanc inferne fitur
flos lev. (C au:lii) Can. pitho. Saperse naturali magnitudine conficitur flos, calyx
fructiger, capsula, & feminis nucleus spiralis involutus, nam etiam hic postea capsula
propria membroru tenuissima, hic dempta, circumdat.

I M ill A SEXAGESIMA NONA.

HYSSOPUS NEPETOIDES. Lam. f. 3. pag. 390. herb. apf. 163.

Nepeta caule scia quadrangulo glabro. Gras. 103. pag. 83.

Sideris canadensis ultima, scrophularia folia, flore florulent. Tura. 193.

Brunica virginicus editor, foliis scrophularia glabris, flore ochroleuca. Mirz. b. 3. p. 363. f. 11. t. 4. f. 11. Pl. dm. 67. t. 150. f. 3.

Radic pcrnua, hyrcumque sub dio perfect. Caules plures, annui, erecti, quisquepti-
bus digram crassi, branacto-trigonoi, & foliati. Rami adven-
dentes. Folia ovata, inferiora basi cordata, acuminata, serrata, petiolata, opposita. Spi-
ce caulem ramoque terminata erecta, stricta, longa, ex verticillis plurimis singulis flos-
tino impositis facta. Bracteae sessiles, cordata, acuminata, integræ. Calyx Hyssopi, sed
obtusus & dentibus duobus infuscatus breviariibus. Corolla ochroleuca etiam Hyssopi, sed
labii inferioris lacinia intermedia latiorunda crenata obversum integræ, nec biloba. Sty-
los longitudine aquæ flumina. Reliqua etiam cum Hyssopi Linnaeano charaktere congruunt.
Tota planta gkbr< et, odoreunque levius Lami habet. Floret Augusto & Septembri.

TABULA SEPTUAGESIMA.

STACHYS MARITIMA. *Limu fyji. pug. yjf. mant. gss.*

Stachys verticillaris fexfi'jris, foliis radicibus ovalibus crenaeis: fummis ovatis integerrimii, corollis colyce daplo longioribus. Gou.an.jhyr, nmfp. pag. 91.

Batonica herodea tatifolia Diofcordis. Doiuit. ven. 84- Bocc. muf. 2. p. 164. t. 1*7.
Sideritis Gilviae folio, noitrjs. Magru monfp- 203.

Radix perennat. Caulcs sunt tetragoni, hirftiti, ranwfi, bafi adfcndentes, hinc crctti, amii. l'i)ia oblongfl, obtiifc (errata, vnofa, m^jfa; radicalta & inieriora long pctiohiea; fuperiora fcflilia; rarifiiiie cordata, at plerumquc bafi attctiuata; in culta planta Icviffime liirfuta, in fylveftri fabtomeotofa; clorfo rargegda ad ftavcdiaem; petiolis hirfun. l'lores (tint laxe Quoad, &: in axiltis bntfh»raia ovataruai intcgerrimaramque terni focantir. Calyx fobcomprcfTas, villofas, ex oblonga campinulatas Sc femiqainqadidas in fc-jaths terminatar. Corolla dilate fulphures labiaai faperias inzqaalker tridenratmn, ob-
verso av Ltum, obtnllini, bail concavam eft, fuperne ptatmin. Inferioris labii lacinia inter* media duplo lateralibus *amplior & c* marginaca in difco puntis parpurcis adfpou^itur. Sct- mina generis sunt. Scmiaa funcfufca, ovai, acut, hinc gibba, illinc tsgalata. Flo- ret fub dio, altero dcmuin (attoois anno, a Julio ad Novembrim. Radix in bybermeob liycmem irandgk.

TABULA SEPTUAGESIMA PRIMA.

SI; :YLUM MEL'ANOPHLEU M. *Umu* 0. 17g. HUM. + S.

Padus /oliis obloogis, fru Burnt, afr. i‰‰. t. 84/2.*

Lauritbia atricana. *Ctrnm. hart.* 1, p. 1v j.f- 109.

ArbucuJa fob ticuij Batavo Zwarre baflboom live Arborij cum corricc nigro tran^niffa Vicnna fait, ubi, fayemen caftodita in hybernaculo, fub dio floret qaoannts Janno, fedfru2tira tieguin cuic. Habita ad Lanruni nobilem accedit, ettam iempervirens. Lignum durum cyrtice f'usco nitidoque vcftkur. Folia font lanceolatt, obtui'a, integerri-mi, fubundabta, coriacca, iaturate virentia, alterna. Petioli Si ramonim juniores extremitatCS purpurafcunt. Flores breviter pedunculti pton^{s aggregati} iniidcut avillis foliu-rura in ramulorum p.rite adultiorc Peranthiuoi inftram, parvum, cobrtranique in tres, qaauior vd quinque panes dividitar. Coroltz tabus eft brevifimitts; lirabi lacintz cⁿ 1 in-qiK-, ovare, obtufx, con^{cav}e, p rentes. Pikmeaca qaoqac, omatam brevi tnn.i, inti-guntartubo <urotis. Anthers flavae, erefl x<juant lacinias coro!!*. Ger-neli globofnro, madam, faperum. Stylus craffas & coroll 1 brevior erigitur. Stigma eft bifidom. Adeoqoe differt ftruibi; a charaikrc StderoxyU. Tutus flos coriaccus eft, ai^{que um cum pet} luncoio colorU faturite etraei.

TABULA SEPTUAGESIMA SECUNDA.

WATER A TR1MESTR1 S. Lm. 68. 100. 45. j.

Malys triracftris. Clw V7//.

Adleria folia varia. Benth. p. 315.

PLiua ~~111111111~~, radice alba crassique, erecta, diffusa, sesquipedalis vel tenuis. Caulis
ra
it teretes, sec
mique fin
iiri, pilisque albi & reflexi Infundi. Folii sunt ^abra, b* >
fi
i
c
i
t ntx nlbtenu* an;n;iu, aut c\ atver-



*fa plus imnoi triiobfl, iitterdam etiam e\ sublinato oblonga, adeoque valde variantia. Potioli font htffuti. Axillis foliorum int idcnt pslun:ali unitoci. Floribus inodoris atque eJegantibgs pctala fum rofea & tnata. Amhsnt pjlicnt. Stij^in ea purpurascunt. Orbiculus arilios tcgtt, KJ pj[ex *tdfat* fructa* (igura. Ilarct tab **BB** a Juilio ad Novembris.*

TABULA SEPTUAGESIMA TERTIA.

LAVATERA OLbia. *Lam. fij. pag. 46.*

Ati hea frutescens, folio acuto, parvo flore, Boi^ fin- > i 6.

Altice arborea Olbia in Galloprovincia. Lab. ic. 633.

*Akbaca fru^{scens}, folio icaco virente molli, Hoc specioso. Plat. aln. 24. plat. 8.
/• i.*

Terra & ottia a (kuonc ma) in her ia noftro fiores produe, hyemem supervens in hibernaculo quatuor transfigens, aliem sibi dico. Eretti fruticis forum inuidit, cauic folioli etri crullie, altitudine humana. Mijo & Junio floret. Semina pergit Angusto. Rami terete^, fmp triores villosi. Folia sunt basi cordata, lemiferolba, acuta, crenat a, dorso villosi, facie tumento vix conspicua mollis; loba media longius protracta. Pedunculus brevibus steribus ac solitariis flores singulares infident, calycibus hirsutis & acuminatis. Petala purpurascens cum flris floridioribus ex ungulis viciuntur rubris. Flores a x inodori. Antherae palpae. Stigma rubra. In fondo corollae conspicuum r ini pectorum unguis lana alba densaque, que ex unguis lateribus evanescit. Tabula etiam exhibet fructum integrum calce comprehensum, tandemque excipiunt; cum receptaculum vacuum, arillum cum contento feminis, semenque nodum.

TABULA SEPTUACISIMA QUARTA.

LAVATERA T RIt.o BA. *Lam. fij. pag. 461.*

Altice frutescens, folio rotundiore inciso. Bas. pin. 316.

Altice frutescens, prima. Chaf. hij. XXIV.

Alcea fruticosa hispanica, aceris monspessulanica incisi foliis, grandiloba, saponem geras. Plat. aln. 24. t. 8. f. 3.

Circa Oriam in Valentino Hispanie regno hinc fruticem Martio florintem Carolus Clusius detexit. In hibernaculo hyemem apud nos agens, perpetuoque vicem, alternab dom floret integrum, h unwnatnqae siculam adspicitur, foliolas totum ramofolique. Caules & rami teretes, seniores sine scabie, juniores tomentosi. Stipulae cordato-ovatae. Folia subrotunda, obcili lata, crenata, incisa, margine subtrileba, tomentosa, petiolis introuneur longioribus. Pedunculi uniflori plures ex eadem foliis sibi finali producent; quidam tamen etiam foliis. Calyx exterior est cum flore duplo brevior interior. Corolla crenata purpurascens cum strobilis floridioribus. Antherae flavent. Semina nigra in trillis continentur globis. Calyx merque eodem abvolvitur tomento, quo folia se canis. Hoc conficit in pilis numerosis apice stellatis, aliquaque paucioribus apice elevatis, in sole inicantibus, ad oculum nudum tomenti sub forma pulverulenti sole exhibentibus, diu sciasce facile abcedentibus pluribus. In tuba ad plantae latae cernuntur hi pilii in foliis partibus microscopio adserita. Aditum insuper calyx fructiger, fructus, trillus cum frumento, semenque ipsum.

TABULA SEPTUAGESIMA GIUINTA.

AMOMUM ZI\T(7IBER. *Linn. fyfi. pag. 50.*

Zingiber. **Btvam.jam.** 119. *Shan. bift. jam. 1. p. 163.*

Zingiber **majus.** *Rutn pf. amb- j. p. 156. f. 66, f. 1.*

Indchi. *Rhecd. mat. n.p. ai- t. is.*

Hec planta fpante crefcic in India Orientali. Sylvefr^n in America non vidi, fed cul-
[*m pa/fim. **TOM** gtabw eft; & odorem polfilec faporemqae proprium, fatis cenni-
tom, in foil tamen radicc **ucromqae** prxcllentcm, unic **eifirn** lice **foli** rrilmur iti **ufam**.
Radix comprefPi, sub terr-ifc extcudens fjliiiujuc, men **eft>propagimitn** connataruin con-
geries, qua: ex frj'ira, quani adulta fcpe habet, Amcriciis Audits Hand, **Qajlis** Pucte, fi-
ve p^iiiia ant pes vocari fuevit. li.c propagines, five radi^i^ partes, a dctriceiruiji vaginaruni,
infiinum caulem vctfientium, reliitis vctfigiis annuiaribus Jtinc inxqaales. Superiores, im-
•primis **juotores**, fulirotun(i;B funi, aquo ad debicuin prvcclx **trotamea**, ex apice aut fine
floribus **catilem** foliofum, aut fcnpn in florigerum aphyllum producunt. Externe cinerci
foot colaris; **jantores magjs** albent, atque **ctiMi kc<** aon raro (ttul purpurafcunt. Hxte-
iicraui **camera** lubciu **comqoe** modicu virorc **palkoteta**: ill.c magis **(ibro&ni** j qux radici-
bus wgenear teretibut, albidis, longisque. **Scapus** circirer **pedals**, rc&us, tcre, totus
(veluri **criam** caulis pars inferior,) vaginis arcliifin ambiciitibus, nullis vero foliis, vctfi-
tur; abituc in Ipcam fubovaum & obcufam, ex **bra&eis** fabrotandis arfte imbricatis urti-
ctjinque in **Una Sorem** continencibus singulis compofitam, **Spatha** membraunce «, sub-
pcflucids, ferine excolor, rceptatiilo **impolitt**, **circnmvoluM** includit **totam** floris tubum,
uti vidcrc eft ex b. Hac fpadia dempea, prolit in confpeibun germen **obfbkte** **criquetTom**,
comprefTmn, **parvum**, inferum, **fpatha corooatuaiproprac**, priori limilj, at **roinore**, co-
roilisE **tabum** involvent, uti a **Sgnrs d** ciuc:t. ID qua prxterea cjnfpicitur corolJj rnono-
pecajaj uibulofo, **fordi** de flave i^ens, cum **limbitripartki** **bciniis** acucis revolutis, Aiperiore
dopio latiore. Ante incriores du:s ladnias in | penali fu ice incriuir ncQarium e, canquam
corollz bilbiare totmoris Jibiuni **informs** trifidam parpareamqae cum **imcolis** **sdlperds** fla-
vdcentinit; cujas **lacinia** intermedia fibrotndna patet, latraces obljugc in flore eriguntur,
& tilameito, /anricc, g lateralicer confpefto, **tcombant**. Hoc (nil quis majit ncftarii
lalium fuperius vocare, ut tune ver.mi **fikmentani** **adeffa** **nullum**,) **aakam** oricur c **redo-**
ne ne&rri ex **dorfo** faucis corollx; **Sc** andec coocavatn, poftic convexum, ex ri;ura Tub-
ovata in apieem fulcacuin **uigutmtr**. **Anchers** dous, iow» iavkwm pofittt, obloagas, aU
11, adaatasqae locat **h** ; qtus inter, sd **wermumem** usqat filamenci pertio-
gens tranfit & occuitatnr iiyi-
ink, ex germiae areas inter dao corpalcuit fiibali-
ta brevia fibmentiformia b. **Srigm** et ob tufatn & vfllofam. FruSus ailocatars nmltis-
qoc **fxtxa** feminibii* apud n ^ 1! rmturiatem ncndum pervenic, **CtaJes** **fbKofi** evadunt fc*>
pis duple vel tri]lo Eongiorcs. Uli qindooqoidem in ipfim pl»n« figura integri non porae-
rint **exhtberi**, adlatir **eorundeoi** diqais volamine **molcoda** imininato, l!. Folia
snniu, **pkita**, •coraiaw & integerrfaw per p«iol« brcvi fimos **paulo** **inirt** excremita-
tnmir. Junior rccens **crudaque** radix in **Martinica** in menfis apponicar,
WJU ejusdem portio (**ula cam** bubuh ctixa comed. Eft cdam tune **hftgoiter** cris,
fed aroma longe **grttas** **polide** 1, quam **eifficata**. Sacciario quoque junior **condkor**, rf-
full drciter quadrimetris aui ptulo tdoltiof, **cortica** exteriorc **tOtoa** orbata, coftaqte &
macrata aliqnamdia in **aqw**, W nimi.i **acrimonia** tulbtur; prebotqae Gc condimeotam gra-
tum, (Vomacho **jierqiain** uttie, acre tamen unafciipcr. In **bord** **noftri** caldio culta Ho-
rcq ttucannis **Nbverabti** » **Amric*** **torrid*** plerisque iocis fluft 1a radicis terrx mm.
d im ur **Mario** aut Ap [jj. Floret tune planta circa Septembriin, **Decem** bri incipient caa-
Jes marccfcrc. Et Jauuario menfe radices folau tie terra erui in ufum, adcoqoc **tone**



fcrmc annux. Si dnttM in terra relinqticremur, feniores cvaHcrem nmh **fibrd** e fabli. gnexque, Effofic feparantur ad invicom in trutta **minors**; a terra, ratJicibus icrttibus cauUumquc rdiquis cultn op purgamur. foli pwplurcsdi<<clponuntur(tcc*nds, aiquclic fob Zingiberis alb: titulo vemiuntur. **Looge** autem **idltus** <iuu'que • me; noxnis foribus adiz- rentibus liberantir, tlum, COICA in coribus, per hor; t quotlrmecin • aquam sic ebul- licentein intmictuntur, atque pofVca exticcantur; ted ita de srotiute pan tliqua peril; qu're ohm feoabfltarw ctifteamr, fub Zingibcrii i algi no nine venalcs.

TABULA SEPTUAGESIMA SEXTA.

GLYCINE STKi.vr^{TA}.

Plama volutiili* Sc perennt* in horti catdario {jcrminav anno 1770 e famine ex America torrida + me allato. Regionis nomen adnotare neglesi. Eisdem anni mense Novem- bri j.m e incipiebat, dum hyeme super florei & folia & flores dejicit. Canles i!n{. (jnc primarii, lignoi scali, inseq d t c 'cre, name rofis canos producere volniles, ter- tes, hifitos longosq ic. Floruit tune M*jo & Jimio; copiosiss auteni d cruo Novembri, ut his intra annum florere videatur. >ia fuit ternata. Foliola ovata, obesa cum leu- la tc; minima 1 imegerinnw, p brevissimis dentisque oblia, & hinc mollia ciliata dorso qno fabincarti, fe-l qui o> brevitatem vix exhiberi posuerunt in figura. Lateralium lobus interior paucilo angustior est exteriori. Pasioli hifiti, teretes, nec fulci sunt angulati. Scipolis omnes lineares & acuminatis. Rucwmrs foliarios & hifitos sua sepe cum nova ramulo de ali foli i prii-lit. Ilk flores -irttnei a 1 ex ad trigina, geminatis vel ternatis ad brcvia intercavalla, pedice ionwa proprietorwR opc> tnl iros. Calyx est pilosus, petalis ad mm tc (ism portem brcvior: tutio ci> annulo brevissimo; limbo quadratido, incisum lan- ceolatis & aCtBtBUH is, infima paulo longiore, suprema latiore nec emarginata. Coralie ve- xtlum cit obrerft cardan:u, pace atifimum, stratum, purpureum, basi ante anguum vi- referas, calii deftituiuin. Ale oblonge, obesa, erecta, carina angustiores & breviores, purpurea. Ca rina ferme excolor, carinata, longitudine vexilli, dorso ad summitatem face usque biida, antice ad apicem emarginata. Filamenta diadelpha ex similiis diffinillimo, & ex novemido, ileu t>rin*. Aotherz oblonge, incumbentes. Germen pilosum. 1. ii. nearc, cotBpffiwi. Stylus longitudine finique staminum spicce attenuatur in flagra obs- sum, fuscom, simplicissimum, nec barbus: in purius horibz germe, styllo omn' frigideisque carens, in apicem definit obsum; atque hisce floribus calycis nullus fructus succedit. Alios legom ncn fcqtiue compreßum, acuminatum, fuscum, valde pilosum, uniu alteramvc un.iam long'ini, ntin: reßum, nunc parum incurvatum. Semina plura, reni- formia, nitida, ex fusco variegata. Plantæ hujus synonymon non r

TABULA SEPTUAGESIMA SEPTIM \

ASPHODELUS LUTEUS. Lin. 0- pag. 244. Dol. pompe. 2. L 2. 2. 10.
Bach. hfl. 2. p. 632.

Asphodelus luteus & flore & radice. Bach. p. 110.

Asphodelus, full > fiftuluf triato, non ramulos, luteus & flore & radice. Merit. hfl. 2. p. 331. f. 4. 1. 1. f. 6.

Radix constat pluribus tuberosis teretibus, digitum minimum vix crassis, quinque vel quinque uncias longis, carnosis, infipidis, flavescens. ac proximis a fictione am- nis sole folia radicalis producit, in hibernaculis etiam hyeme perennantur. 11. iudicem- lens

lem emittit unicum (**implkaffimum**, bafi forme digitum craflum, **bipedalem**, crechim, fe-re **ad** (lures usque foliofum, nitilumquc, ita tectum a folioruni imbricaturum vaginis, ut millibi, prxterquam infra ipfos flores, **pfodsat** in confpechmt. Subfeqti anno plures cau-les adfiiu. Folia fubulata, triqictra, acuminata, ftriata, glabra, fungofo-earnofa, nuc n'ftulofa, ex glauco vircentia, faperiora fenftm brcviora; patcntij quidem, fed, bafi polli-Cfhi utriiique in membranam albaciaitem attenuata, caulem obliqua cademque ratione am-plexantia, nt bine fpiralis ille vi leuur. Caulis extremam partem **hnEtex** veftiunt incn-**bnoAex**, tenucs, **fabpdlladdz** aibid.cque. Ex liarum axillis pjiunculi uniflori **egrcdiun-**tur. Tlorcs lutci fuave olen. Corolla in his tarn eft profunde divifa, ut **stgre** monopcta-la dici mereatur: quod ctiam in AfbiKnlelo **fiftulofo** verum **inveoi**. **Infrbrae** quidem in tu-bum campnnulatum **breviffimam paala**, **esternin patentiflima**, conniveot, tedttmen etiam Vic funt divifa ad usque ferme pcdunculum. Petala alterna, q-i e in flore **adimedam** cLi-ufo exteriora fuerunt, funt dnpto rcltquis anguftiora. Ex bis **iitHmuin mtgis** diftat a pro-xitnis **Uteralibos**, qtiam diftant **reUqna** ab **invicem**, Nettarii **fqoamx** nilil aliud funt **qaam** fiiamentorum bafes dilatatT, petalis affixx, flmulque connivend.) ^ennen occultantes. In ipfius germ in is fubrotundi & fexfulcati trihus fnlcis alternis profit ndiorilj us paulo fupra me-diam **alritudiann confptckar** porus, ex quo dulcis liquor exfudat, qui tandem tutum fp-atiu fquamas inter germenque replct. Hie in fruUu porus inacuUm oblongam atrovire-temefficit, tone deraara **evaodccntem**, dum **mantras** exflccatur. In Afphotielo liflulofo **bofec poros** reperio lims in **germiois** fummitatc, ulii coincidunt fulci minus profundi. 1 [-lamenta omnia dettinaneur, arcumquc denuo adfeendendo eformant. Horum **alterna** tria duplo rciiqui ^{s longia} ra iuftruuiit antlicris multo etiam niajoribus. Capfua trilocularis & **tu** **otuoda**, in **priaetpta viridis** nitida **xqaalb caroeqoe dbida** iarcla, matura evadit rugo-ft & fubfufca; in trcs valvulas integre debifeit, difleplimento medio **ioOntOtts**, **omnqtM** h fmido femen unicum continent^ argute triquctrum, «t itaque in **qaofibet locnhmeoto** fint femina duo; **nee** flmplius **none** carnofa. Floret Majo & Jimio. **Aogufto** iemiu perfidt.

TABULA SEPTUAGESIMA OCTAVA.

SALVIA INDICA, *Linn. fol. pag. 66.*

Salvij foliis caulinis Cord-itii, acute ercnatis; fummis fcfcfilibus: fljurum vrticillifub* nudis, remotiliiniis. Hoy. *prod.*; ¹.^r. 309.

Scbrca indica, flore vancgita. *Town. inj.* 179.

Radic pcrennis, in bverbaculo contra folum gelu defenfa, frpc totam hy-emem folia radtcalia prodacxt, caulcs Martio cmittit, flribu* **dejantibas Mnjo decortndos**. Plan-tttem **Tub diaagit**. Caales funt tetragoni, rarius ranioii, refH, debilcs, tripccdales, toci llidcm **fairfod**, fed inferne acqoe ad folionn **inferioroni** imjiriiii ^{h extort} ua **deaia** al-LidatjHc **ianogine** obdutti. Folia **radicaiuS**: caulina inferiors funt **petio!«W**, fupriora am-plexicaulia; omnia oblengo-cordata, hifuta, **ragofa**, in;cqualiter & finuofc dentatn, acu-13, *Ihva* caduci brevkcrqite pcdunculati in ejualibc axilla lolii (loralis live bra^lc)e terni habenttr, locamurque per vrticiKos remote ad varies **diftaadtt** in variis individuis, in-terdum triplo lonfporcs, quam tabula **Wtprimit**. Calvx hifucus, glutinofus & compre(Tt)-cantpamtlatus terminatur limlio utrinqtc **bifido** acntoqec. **Corolla magnx** galea c(t c-,mi-icfcens, in apicc pro (Mo c enilco **bcambenta** (ifTa, leviterque pitofa. Laliti inferioris la-cinix later.;lcs, & iacinix intcrnedix cuculiiformis fiars media funt \ violaccs. Huius laci-nix fund• its exterior nibct limplicitcr, interior una cum infperlis macutis **pOfparet**; limbus utrinqae ex **ftifco fulvu*** oil. Anther;? fui^t: **pottefl** Imeum contbtent. Gcrmina iuiJcnt corioii gliaidulofo cobris aurimiL Odur **pkmx** eft **Iortis & ingranus**.



TABULA SEPTUAGESIMA NONA.

S1SYMBR1UM POLYTERATIUM. Linn. ffl. pag. 4+0.
Ery iniom polyceratiam rd comicnhnrm. B.m. p. 101. Merit. bfl. :•/-
 f. 3. t. 3./. :.

Eryllum alterum Mattuoli ; liliquis parvis , quibus tlini Dcnurta. Bnk. bfl. 2.
 fff. 8^4*

Planta annua, pulmam ve! pctalis, KM nitida. Caulis ramijuv teretes. Folia inferiores repando - dentatae. Flores parvi aggregatum insident alii funt pinnati «U, CUJKI. Siliquae teretes, plerique incurvæ, atfwu, semipollifoliorum paoci, c ac Cochlea (gt^) officinalis. Flores vel pollicaref. Folk faporem tcrme eoaden f**b**nt at ret xftatc.

TABULA OCTOGKSIAMA.

MIMOSA ViRGATA. Linn. ffl. pag. 677. bot. Cl. 109. far. 251. 505.

Hinc ffucicem in tudia crefcerc, dick Hlufl in Linnus. Crescit non minus in America tortida variis locis ; (rotes ibidem dñbili rama virga ex ascendente inter vicina fe fitftcntans. Inde femina actulsi qut in caldario terra de r* pltnum produxre d epichun, jum primo etacb .imio fforntem. Runi frumenta sunt obsolete angulati, ex cinereo fusci & ignosi. juniorcs .irides, rere tngukn, plerique pauci brevissimi & vix oculo vnde conosciendis fabri; uli. Folu Junt bipinnaca; iisjma nimorū ex pari unico, subsequens ex laobas, summa ex ijtatuor, reticus ex [taribus tribuj: que frequentior divisio non tam in perpe: rum obtinet. Glandula ex flavo paleo, depresso sanguineo concava locatur in petiolo communi infra ipsum escorum petiolorum primi paris. Foliola numero incerto fit fav ad quis lectm in quiltber coila parTknart Iant oblonga, obtusa, glabra, brevi acuminata donata sut coden disticta, lobo interiore angulato, ut petiolus brevissimus veluti sp̄i folioli hteri inferi videatur. Junesta luna conspecta cibis senatur. Stigmate sunt facetr. Flores pauci, circiter sex vel ollo, aggregatum inque capitulum collecti insident extremis pedunculi - illarum aut solitarii aut gominiati. Flos unus aim re exterior glandes charactere sequenti. Perianthium campanulatum & subquinquangulari in limbum terminatum scnum, quinquesdum eritunque. Corolla constat petala quinque, aliadis, varilibus, iKTtnque louts, caJrcem ad duplum superius. Filamenta decem filiformia ut corollam longitudine excedunt. Antheris donantur nullis; pistilloque gominaude excent; unicæ nec fructum ferum. Rdi quis floribus calyx est infundibuliformis, & praecedentiam cain e duplo longior, exterum simili. Corolla etiam eadem, sed pariter longior, & hinc impli dttmnxM tamen brevior. In his anthers ; Ifunt flav e & incumbentes. Sed in hinc etiam floribus duplex differenca invenitur. Nam in aliis stylus multe germinat linearis, stylus squa, stigmata instrutum simple & obesa. Utrum uterque flor fertilis sit, non potm discernere. Scnina nitui, lufca, inqualiter subrotundis gibbosaque continentur in legumine linearis, cor(To, a semina uterque corola, fusca, acuta, nidoque. Len- tali representantur in tabula flores primæ terisque speciei: fumen in volu MM natu-

TWBULA OCTOGESIMA PRIMA.

SEMPERVIVUM SEDIFORME.

Tota plum a **glaberrima** eft. Caules teretcis, diffusi, ramoli proflratique terrae radiculas immicunt. Kami florentes eriguimur, circr ochjpollicares. Optine **fat hyemem** fub dio, & tune floret quotannis Julio, Culti; vero in olla plants, perquc **hyemem hyberascnlo iodafa, tteti florales fint fepe btpedales, at tone debiles, &, niii foicerfa alligennir,** fefc (VifK-icando baud apti. Folia glaaca, interdum robauifl, carnofa, crafTa, ftemninaca, **oblonga**, Infibus in dorfu fjluta, inferior! magts ceredi, **fuperiora magts** depreiHi, in nwnis junioribas confertfan ntcentia, in florentibas tnagis diiiitj. Cymx denfje & termuiales. Floris **charactec oranino**, qualis describkar in Scmpcrvivo Limnel, pctalis auc fK aut fcptem albidis. Cui rtumero calyx, germina, **eidemque** gemiaato ftamina ce- fpsondent. **Ne&flrii fquamohe** adfutit ntillx. Filamenta petalis concoloria bafin babent ladm. Arnhcrx fiaranc **Flos toqueScmperrivi;** fides (blorara Scdis coograt, Patriam

ign jro.

TABULA OCTOGESIMA SECUNDA.

A N T I R R H I N I M C I R R I 1 0 S U M. *Linn. mam. ah. pag. 149.*

Eue ilia, qnx in caldariOj quam qua: culta fucrat fub dio, alters ejilimiis alterci, ex r.niit:c annua **Sbrofeque** Ciulcs liabnit initiu **quidem** ercibis, (qualts **anictnlis**, uti in **tendla** -jctat dFc planto fol«, in iconc (TffKtur,) fed (empet (ImuldebSef tenuM Srvhc (e fufti-
1ere folce, apdos, brevtqac verfq terrain iaclinaeos. Tune pjiinci cvadit **omnium** ramoriili-
ma **vatdeqae dlffufe**, foliis floribas &ufHbusqut titii onufa. Ab **Antirrhino** Elicinc, cui
nroKima, **difTen imprimis** glabrkie, dum MA fulia inlima ftibhifuta tint, caulinque in-
narte itiltna rari pili confiiciaiuur, cttera lint **glaberrima**. **PedanctiU Mpiltercs**, uniflori,
IVHai it forme uncitles, parptwrfcawe? 9c pitentirtimi ex folioram fere omnium txtilts ftri-
Stt egrcdiuinur, cti:im poft 4 ~~recednos~~ nchis jjcrlltentcs. Flcjrcs cxigui, dum lente cxam-
minantur, **fam tevi/nme pilofi**, uti ~~ex ati~~ ri florij figuw sppofiw p~~at~~et. **CoroU*** calyccin
ad triplum **exfupenmcis** itqac cs itbo oeroleoque \ **tubm** **rcntricofai** albot cum per-
cntibos ftriis purpQrtB. Lahium fopei ~~nas~~ leum femibilidumquc crigitur : laciniis
~~plan:~~, obtadfitmis. **L*bu** ~~it~~ ~~separis~~ ~~semirli~~ li difco* sttofffcuf in da ~~as~~ ~~gib~~ ui **•lbidj»** ft
ex atropnrpiirco pnnftatos; Itemix vero fav cceruie, ftd>rotanda uluuixquc. La w
clam litur. Nectiirtum coniuuim ulbcc cum pun&s purparets. Aothene fmtt acropurpu-
rez **K fnbrotundx, Cspfaai** rotunda **defaifcendo** **otrinque** ticponit lamckm, feminaque
aira **melodic** in quoJibet lycvhmcnto circircr quioa. **Floret** toi.iin **seftatan**. iEgyptus plan-
tx **patria** eft. **KRi Tillim f~~4~~m** plantain fimpfttdmc dicrcet **villo&m**, Horesquc luteas, cum
nofrt conveniret illa, 1M<< H<< Pli*gaili taljul!I 3^ rcprxfcuiavit.

TABULA OCTOGESIMA TERTIA.

ANTHER! CUM LILIAGO. *Linn. syst. pag. 244.*

*Phalangitum parvu Jioiv, non ramosum. Baub, put. 29. Morit. lyl. 2. p. 333. f. 4.
I. I. 10.*

Phalangium non ramosum. *Iob. ic. +s-*
Phaianyutn inontamnn. Chtf. cur. fvjh /tfg. 30.

PJanw tota glabni *atque iuoilora fut»* (*Ho \xt c* crescit. *Junio mcnf_c ^ drc[.* *Al* agnito *le-*
sadix confat pluribus fibris reticibus, cras-
fis, mina p?rfici., & *ipis fibris* *Ait cdptcofa. I'* *radicalia semipe-*
albidts, Ion; *alia, ensiformi-linear* *eminentibt».* Folia ra-
*ditia Ar ft*qui* *», acuta, carmata; ecc plta* *nt afficit Linoxus*
de los panis. Casili *uum cnutn ahcrumvc brt* *vus sicut supra eolis medietatem, Caules*
plures cst «odcm ndicit capitc c\fu *guli, tanguli folis suis radicalibus circumdati, iisdem*
dc racctnu cvcnni. In \r locus ille, qui planta florescente motum exhibet virorem, es-
dem fructescente in circuitu itti tlHtleti|CHI -!r *ollicitur. Ab inferioribus incipiendo succellive fls*
nuns tktr ex panditur. Huic sunt petala utrinque alta, alterna fere duplo latiora, uno
ordine omnia fles; nulla vero petala, nulla dororum ordinum, nec ex his vicente linea
*inscripta, que quidem emnia fibnt.c fur f**b** numero 1107 traxit tribuit Halerus. Pi-*
lamenta glaberrima, obverse subulata, vix compressa, corolla duplo breviora, gerunt an-
thers oblonga & utrinque sulcata. Stylus staminibus longior declinatur. Capsula ova-
ta, levissime trigon, acuminata, glabra, trilocularis & trivalvis diversa est a fructu plan-*
te Haleriana. Qinim iwque mc« hit ft feudal titriusqw autotis plantae tuncopere ab in-
*vicem discrepant, noil «ur_n fupc; propria synonymi *i* sum cernmdnic pronominiare.*

TABULA OCTOGESIMA QUAR*i* A.

ALET RI'S GUINEENSIS. *Linn. sp. pl. pag. 456.*

Alos guineensis, radice geniculata, foliis e viridi & atra undulatis variegatis. Oom.
bari. 2. pag. 39. tab. 21. pralul. 84. t. 33.

In appendice ad Enumerationem stirpium a*tri* Vinlobonensis deli florescentis hujusce plus-
te descriptionem, deficiente runcu fructu, quantum in hac reque ac in congeneribus
duabus ibidem memoriis flores absentia nulli fuerant omnes. Hinc ex germine, Hyacin-
this Gmili, pericarpium triloculare femininique pluribus sicutum conjecterum furarum, pro-
poffierarnq*tic* **tiubittmer.** Nunc tandem primos fructos, eosque inservillimos vidi non
paucos; ex quorum cognita usitate patre, arbitror, in generum fabricatione nec posse
hanc plantam ad Aleriu, nec ad Aloa, nec ad aliud juis datum genus aper referri. Sci-
lioer fructus est bocca mollis, lobrotundis, succulenta, lutes cum pulpa co-
•MIBH, ma-
gnitudine pilis, comprehendens a filo longirostris corollis emarginata tuba. Semen unicun-
us, nolle, depresso glabrumque includens in urlo membranaceo confinis figure, qui bei-
si cortici bacca adnoscitur. He partes magnitudine naturali in tubulis floribus exhibentur.

TABULA OCTOGESIMA QUINTA.

CORCHORUS JESTUANS. *Urn. fyji. pag. 369.*

Triumfaca fubviliofa, foliis rotndioribas, nndulitis atqae dentatis; dentibus potremis in fetas taennes abeuaribw, floribus aUribus, *Brown, bijl. jam. 1. pag. 23.: f 2j./. 1.*

Radix atmna caulein profert fcsquipedalem, jam ftntini divifum in ramos* primarios bafi procumbeiiEcs , rnmisquc in dccurfii ornaios plarimb aliis inordinate alcrnantibns. Rarauli extremi plerique divergant- Ifx fusco rubent maximam pattern caulis ramique, & jvlis rar is obfidcotur. Folia fuit ovata, incerduna magis fubrotunda, ferrata, facie glabrt, venis dorfalibas perioloque liirfutis, Errstura utrinque inrima in foliis maporibus fetacca. Sripula; font fetace. Pedunculi breves, uniHori aut paaciflori, ad petiolorum latera cscrriititur aut folkarii aut ~~gat~~. CJIVCIS fotiola concavg, ad apicem fubtus fanguinci, patentidima. Petala flava, obovata, & intcgerrima aut cmar^inata patent. Stamina pki- ra (Juim engines ereGflque flavent cum aiuhcris luteis. Capfula oblonga , fusca, g)abra, potlicaris, fexfulcata cum anguiis naerabranaceh acuti^, apicc tricufpidaro patente cum fin- guJis cupidibus bifidis, trilocularis, trivalvis. Semina piurina, Mgalata, nigra. Floret in Cfldario a Julio ad Novembrim. Primx capfulx Septembri mattircfcunt. Pluknctiana capfalx figura obeft, quo minus hue eandcin credere plan tarn poiiim cum Alcea cibaria in PJjytoj ~~grapla~~ ibuhi ny lig, 3 exhibJ ~~ta~~.

TABULA OCTOGESIMA SEXTA.

LATHRUS IN COKSPIC WS. *Linn. fyji. pag. 4R6. fp. pi pag. 1030.*

Lathlynw oriennlis, Bore vix confpicao. Boerh. lugtt- i'-p- 42.

Radix h'brofa 5: amna catilcs p!ur« tauah debQes , utgotetoi, pedales v^l fesquipedal- let, &, uti tota pianta, gW>ro». Cirrfai omoes font diphylli. Folioi tot Kifformii, age ex angufto tanceobtt , tcumiaaca , Ail it us tribus vd quinque nervis notantur. Stip. she iminque bnccotvx, acffimuMtx Srintegerrim* petiolas longkadioe fcrc xqatnt; han 0 'utSato 1 mi Its) breviori, id media *a2x deattcolo minato- Pedunculi asiilm, folitarii, unillori , in aliis individuis ipfb calye brcviores, in alits eodem duplo vcl triplo longlore?, terminaatur fcta diverfx qaoque iongiiadinjs. l'-iorcs parvi, ?e3tillo alisqtic (h- turate rubric. cuim pallida. Legumen linear t, venofum, icaminatam vijcqoe compref- fitra femina coadoet oSto vd pauckwa fofctft angulato-fubrurundj. Sab dio Bora JU- LIO. Semina fuit macara Augufto.

TABULA OCTOGESIMA SEPTIMA.

HASSELQ.UISTIA ,KGYPT1ACA. *Linn. fyji. pq. 309. amm. acad. 4.*

Pag. 170.

Arabim hibct pnrtten Sogtiltrii 1^c nmbdHfen pkntt. AODIM , feiqctpedtlis & erc- itnfifftt ndid tlbidx, qoiddtm dc Dind ~~siptre manife~~ borf. Caulis ttmosos fo- liofus ~~sc~~ obtegitur, idqoc imprinis ad toiiorum exortum, villo tlbo moUiqaes, Fo- lit



lia inferiors funt pinnae; fuperiora fribipinnatae & tenuiora. Costa hirsuta & teres ante
ce fuko exaraiur. Kuliola itw^{qualiter} incisa, obtusa, utrinque gUbr*. nisi quid nervi
in dorso maiores sepe pubescant, ad tactum mollii, pallide virent. Ritni atiimi florigeri
& radii sunt striati & subtriangulari. Ex umbelle universali cujuslibet centro egrediente radius re-
flexus brensque, terminatus iptee in vnl-illam orbiculari & subtus virentem, facie nigrum
vilius-quc albis brvissimis vellitum. Hoc defitituntur umbelle partes. Floret
mente Juli, sua sub dio, poerigisque fructus Augusto. Quandoquidem datum s 1 innoto
character, desumptus ex planta seca, non respondet individuali, quis plurimas aliae habet
noster, itlam hie fabiangmi akl dicas vivas concordiam. *CDL*: Umbella universali
multiplex, toxquilti, *Variabilis* multiplex, plana, densior, brevis. involucrum uni-
vo-fide circiter hexaphyllum; foliolis serratis brevibusque; quorum, aut omnium, aut
paaciyrtim loco, internum dumexat aliud brevissimi denticuli, ut, nullum aut minus
multiplex adefTc involucrum, n^{fet.} dici potest. *Pinuk dimidiatum*: foliolis tribus fo-
racei^, extriorum veris, & fere longitudine umbellulae. Perianthium proprium pent-
aphyllum, parentium: foliolis senioratis, acutis; in flocculis exterioribus extimo in-
cusoate duploque longiori. *COR*: universali diformis, radiata. Flocculi exteriores her-
maphroditi fertiles. Flocculi centrales masculi & abortivi. Propria petalis quinque, albi,
ftrc oil bat'tn usque bipartitis, hinc obverse cordatis, lateribus ad dorsum convergentibus,
disci subequalibus, rodulum extimo penulo maximo. *STAM*: Filamenta quinque, ca-
pillaria, parentia, petalis brevioribus longiora. Anthers subrotundae, basi dilatatae.
PI? in floribus centralibus nullam. In floribus exterioribus germen obverse ovatum,
compressum, subhirsutum. Scyli duo, siiformes, parvi, longitudine staminum. Strig-
mata subcapitata, obvusa. *PER*: nullum. Fructu glaber, duplois figuris. Alter lob-
orbicularis, compresso-planus, margine crenulatus, cantha feminis binis planis, cum
marginie exterior c devato cretuto. Aut alterum abortivum femen, * *twe* constat fructu-
s Ictniic (tnico, longitudinaliter hermaphrodito, concavo, & in latere interiore aperto);
nam semen hoc runc margine contrallo in tricolum effingitur. Radix umbellarum peralta
fecundatione eriguntur, incurvemur, torquentque flores intromit. Tabula representat
planae & subcapitatae, obvusa. Auct. i. 1901 XII. 11. 4C. scyli magnitudine feminis.

TABU LA OC 1 OGESIM A OC I V A.

SP HUE A LOHA TA.

A anno 1769, sub titulo nova Specie lobata, radicem transmisit vir amici filius Lin-
neanus Theodorus Gronovius, urbis Leithae. Rector Scobium, qui sub dio terra
commisso tertio denum anno floruit, fructumque dedidit. Radix odora & sapore adstring-
enti proprioque pectinis constat ex ramis fabuberosis, inqualibus, pollicem crassis, ex-
tus nigris, inter subtus, non admodum lignosis, multis numerosis lobis rotundis longi-
que. Casus ex radice multipliciter plures, erecti, teretes, sesquipedales. Folia radicalia
& culma sunt in ><Wi & ptinau: foliolis oppositis, sessilibus aut brevissime petiolatis,
palmitis; lobis lanceolatis, acutis vel obtusis, acutis ferratis, leviter incisis. Foliola que-
dam minima sepe petiolis communis inferiori ran mr em occupant. Scyli subrotundae aut
alii figurae. Cyneae terminales complicitaque parunt. Florum obovariorum calyx profun-
dissimiliter dividitur in lacinias ovatas, concavas, obtusiflavas % reflexas. Penes rubra longi-
dus a filamentis concularibus parum superante. Anthers subfuscant. Germans sunt ple-
rum.

l-umqne fcna, oblonga, ftylis inftrufta breviflimis. Fruftus fimilis eft Spirxx FiJipendulx. Tota planta giabra eft. Floret JuJio. Linneus in littcrts Sibiriam pJatnx pacriam adiagnavit.

TABULA OCTOGESIMA NONA.

MEDICAGO PROSTRATA.

Medica maritima, faxatilis, minima, perennis, fblis angufloribus in apicc incifis,
feuSta parvo, non fpinofo. *Jill. bort. pif.* n o ?

Radix fublignofa & multiceps pcrennat fub dio. Caules ramofi, angulari, ghbri, bipeda, hi:rbacei, anmii, toti procumbunt humi. Fulia ternata funt ex foliolis oblongis, anguflis, glabris, apicc plcrumque denticulatis. Scipuls fetaccs & integerrimi. Pedunculi commanes axillares fnbuinbellatim florcs fulincent nuinero divcrfos ab uiiico ad fenos. Pedunculi proprii in iruchi terrain verfus iiifioihuniir. Calyx eft fub-pilolus, Vexillum leviffirae cmargiostom. Fikmenta diadelphia in fola fere bafi divi-
<ltintur. Legumen glabram, zqaale & UMRdK trei ijvros fpirales abfolvit. Floret in te^ram x(Hi en. S.nina maturantur Septcmbr. Sub titulu Medicx cochleato; giabra femina ex Italia acccpi. Vifa eft ;nii> dillincta fpecies, <pha: ad polymorphas Linn^anas, tocidem forte etiam inter fc ilivcrfii&inas fpecies, ob raJUein perennantem imprimis rectiuct non potcfit.

TABULA NONAGESIMA.

DOLICHOS LUTEOLUS.

Seinina hajtu pkotx incctim ex Americcs 7,ona torrida attuli; ibitlcniuc plantam rlcfcrij-
bcrc DCg^xi. IVovincia' ctiam non a i.iurjtx no men cxddit. Ex pJuribus diverfo
n redditu tempore tcrrx comnuftj Ceu ~~albus~~ idem lioc anno 1771 unicuin in caldario
mintvii, protiuxjeque ftirpcm berbscctfn oinnium Jxtiifimc vegeuaten, qux floruit
copiofc ab Augufto ad usque **Decembfim**, tuncqoe perik. **Primi Sores tegumea** ~~gl-~~
hi urn, tcre obuifmnque doticrunt; at nulium ex *hike* Icgmninibus ad maturitatem per-
fecti ~~AlemqiiL-~~ p<rvenic Dui:~~chi unguicul~~ ti fra&bus vid^watar *ihiil'n* futura. C.m-
tis fabangultnu ramique firme tcrces frandebam voiubile*; alii ctiam rami ires qimuor-
vc ctbito^ lun^i terra; iocombebmfc etoogati, Sii~~pulas hal~~ mk lanceolatas S: aciitniiMtas.
i'ctiu!i nngulato - fuicati & anticc cuultcnkti foliola fuftinaorunt ovxtt 0111 nia, nitida,
imegerrima & acntinfcula; latcnilium utroq'ic fobo arquali. Pctioli proprii teretes fol*
M in plant* paw viUofa. Folioiarraai Itipulx emu pwvse & ftibrotundr. Pedunculi
axillares tcrces loflgiqac flores locals:¹ id decein, fibi m>t<o fticccdcntcs, colle-
ftos in nuceninTT cipitacum comprefTiimtjiic. Calyx fen*iquay*, <\u\$ virebu pallidc; den-
ticulis ~~acuminatis~~: c\ tribas hnc ~~• lati~~ laftants labio iofcrioH; fuperiori a^tent intc-
jgu rinio ~~se~~ femioavfi). \exitumJ; ~~cic eleg~~ inter lutcum, dorfo Havcfccns, JviffmL* emir-
isaun, DolicbJ allN in!tr;ic!>atr mamJl'tn; uri"~~ue prae~~ ruin aibo &t brcvi. Ak lu-
tex. ("uritia ctim aliquita flavcdinc dilntk- ~~virebat~~. Fiii(neat) (adolph 1, fupernc omait
at) medictatcm dividcbantur, antliccs ~~donata~~ hitci^. Sttg* Vfde barbacoa. Sctnina funt
c\ obfongo rotundaLa & nigricamiQ cam IIK ally I.



TABULA NONAGESIMA PRIMA.

DIGITALIS OBSCURA. Lfes. £?.£<. 41 f.

Digitid- hifpjiica anguflitylia, Hore nigrlicantv. *Turm. i. I. 166.*

Digitalis anguihfolia hMptnict. *BCC no/. I. p. i %% i yg.*

Civil is pedalis vet IS i pedalis , in ferme lignolas & frutescens%, param miosfas , dc
acutinata, gkbra, intc^errima, **coofaoa ikennc** rameisque ramos folia ornant ex lancea, acia,
tir, sellia sic ut supra iiti> Urticatis
tur baiibus adnaris decurrere. FUCemus icrrnatis Sons cade gunteur. Calycis fo-
rit. **BraQot f.** tea & tcamtoata:. Pnifilij brev*ii* eri alia angustiora. Ca-
tiola futu iato - **fanceohta**, acuti, (openie p^tcn* iloo btc parparscentis colos ,
rolU cvtra calvccm vafle incurvatur deorfum , cxtu* fcr- colore ferrugine; fundo
fijbtus firnu! fonliite **figrdbti** Interne flavet **cam** s periore multum emarginato; in-
atroporpptireo, faux pilosa. **Ltc** Anterz pallide sulphurez. Ca-
friore ovato longiori; T ngitudine xqualib^u. Amt ,
pl'iili ovata psuiatim imgtiftatur in acumen ! gulto mente undent nine atqtc illini;
inflexum. Semina phnqtM fiint ineurva, Ao matun.
lio, Mycmeoi agit in h>iwrnaculo.

TABULA NONAGESIMA SECLNDA.

CENTAUREA C1NBR IRIA. *Linn. Spc. pl. 18. p. pag. 1290.*

Jacea ciocrjia incinista, flore paipw^{eo}. *Tru ^ eif. 72?*

Planw inferne frmtcofa lis;no& otque porcsn ramos annos ac herbaceos emitit plo-
r<, twos lulos, i^u;cmc an^ilai os, panca lata incinos, debiles, sesquipedales.
lolis piiitatiida, quodam etiam subbipinnatilia, perfolata: Lolis ineqalibus, plenisque
obtoti*, paratu lamentosis; aut subincanis, aut pallide viridis; interdum duplo maio-
rilntSi quam in iconc qui cxiu!>c:ur. **Flan** ramulos terminant foliarii; non selli-
t<, fed ab ultimo fdiota femper nm &<• < diuulte sunt quinquidie, ra-tiae¹ que-
dam quadrifide, etiam trifide, purpurez. Anthex ejusdem coloris. Styli brevem. Ca-
lycis cilia sunt fusca. Dicimen reperio hinc inter primasque plantam, cajas esse va-
rietat a I .inn to pttetur. In depic*ta* calyx valde romentosus est, qui vix est talis in plan-
tii primJ. At vinctfim contrrtruin obinet in urbisque foliis ramiique, que multa ro-
met! to incano obducentur in priore, paucissimo in nostra. Folia etiam plures tenuius-
que divisi »M iii prim 1. In eundem ultimam foliem unum stercentre ipso calyci etiam
*(l < ontiguum, ut dici sellis queat, contra morem depic*ta*. Sic nulli quidem viderunt
difta species. Floret xlUte. In li>bernaculo hybernat.

TABULA NONAGESIMA TER i IA.

ONOKIS HIR[^]IN A.

Ononis minor prima purpurea flore. *Caf. h. 99-*

Ana nis montana, præcox, purpurea, frutescens. *Toitm. ml. 40».*

AtMii: non spinosa, flore thyrsoidae carneo, polonica. &trr. v *10. j. 1114.*

'TVKa planta, «t CkUii verbt* uttr, letro quodam hamoz gravior & hircinum virut
X. oh see obita est. **Vlokot** *i; quantum ex radice dura, lignosa & perenni ferr cubitalis,
nonnumquam long

ntos, fermas unius, ramos, molli lanu-

gine obdticbs, hycme totos intercuros. Ex fertiibus fata primo jam ajtatis anno floret, Ciules procumbunt inferne; hinc adfeendunt, atquc crigunmr. Folia facie ferine gtabra, fubuis pilis obfidemur; eaulina pleraciuc **ternata**; floralia &: ramca quxdam (miplicia : fo~liolis ovatis & acute fcrat). **Sripabe** ferrate & amplxicaues longitudinc folia ferine luquanc. Mores brcviter pcdhnculati axilSis femper **gettka iaiideot**, furmantque tandem **vduti** fpicam, *m* **caulibus ipiis cripolicarem**, in minis **breviorem**. **CAyx** villofus dupta **brevior** corulh *di*. Vcxilltu ex **porporeo ctegancet rnbt**, dorfoqwe vilios liabet vix con~fpcuos. Carina **longitudine alarum** jlamentiui atque obtufarum vevillo **efl** concolor. **An~cliera**; funt **late***. **Lfigamen** fufcum **St. fubvillofam** bnli lateralri rceptaculo affigitnr. Hoc illim addico i'eminc etiatn in tabula liilitur. Nuiqiani in **HIC** pl.mta fpinas obfervavi, nun iiiijli in fj'lvcetri qnain in cvlta, Omnino **diver&ia habeo** abOuonide Linnxi arvenfi, cum iiiiti, turn (**pisofijj** ncc ad **alum** pccrineix **CyaoaytM aUati** arliitror pljntam quam ad no~fram. **Flora Janio** & Julio. In comitacu Hungari;t Liptovicnli ac Scpcufiead ficquens oafcitur. In **Brisgoviae** ctiam momibus apricis invenit **dtrHEmas** Lipp.

TABULA NONAGESIMA QUARTA.

TE UCRIU M MASSILIE NSE. *Utm. fyjl pag. 3%8. fp. pi p. 789.*

Teocrium arctictim. *Cluf. bijl. 348-*

Tescru ni **fruticofam iacnum**, creticum, florc purprco. *Ban. 3H}*(c. 896.*

Chanzdry s (ruticolk cr<tka, purpurco florc. *Town. inji. I O J.*

Radix tibrufa !i>ni)faqnc, **bytmeiQ** in fivbcnactilis apud nos agens, perennat, uti ctiam ipn' f tpc **caules** ramitjuc. Hi funt qua<lrani>ulnres, inferne frames, fubcreSi, fc~niiKdaii- *vel fev* [tiipedaltti, romenco vh **eoapteuo** incani, qnlc **etum folta** ljræf>cas caly~cesqoe **0** *odocie*. **Folui** funt pctiofata, ovatn, obtufa aut acuta, inxquaiiter **fentt**, per contractas vc~n valde rugi >i,i, pollicaria aut breviort, **ore defldcntts extretns fxpitts** rfle~xis. Rami in racemas terrnimntur credos bi quibus ex **bnOsk** five foiiis oppolms, pau~latiin OJiignitutline dcrcfcntibus, fuperioribiis tanccoiatis & integerrimis, fiores ptduncu~lati **fiagul** *egi* ediuntor, in unum **idemqae** latus vcr(i omncs, & ad **ingohim** rc:tum patentcs. **Caiyx** qV bil-ibiatu. Lflbiim iupcrius phnuin, cordatuni acuinuatumque pat~tct. Erigliur **iofertus** quadridentatuni concavumquc. Cornl!;c **purporez** laluuni iuferius eft concavum & fulnus litrfutnm. **Pthmenti patient.** Anthers fnt fufcx. Stylus brc~vior **ftaniinibus** piirpurafcit. Su!) <lio flyrct Junio & Julio. Tot;i planta fjrtem (inguta~rentquc **Odorc** fpirat, cum alio inthi cognito non comparand urn.

TABULA NONAGESIMA QUINTA.

GLYCVRRH1ZA E CHIN ATA. *Linn. fyt. pug. 490,*

Glyc vrdiiza capite cchtiato. *Bavh. pin. 351.*

Glycyrrhiza Dtofcordts. *Dod pempt. 3. hbr. i. cap. 16.**

Glpceynrhizi ccliinnta Diofcordidis. *Lob. ie. 8 j.*

Dukis radix. *Cm. cpit. 413.*

Tma planta RUIIM paninirjnc ad wflum glutinofa cfl in borto **Btoftra** Sit* alcero dc~iiuin nrinuo Honii; *hyenu* H '»'• «in_lct8QOS VCgOW. tv «dtC« priiiinii.i, tCTtlo *status* anno jjm **poSfem** diametro xquanc, prirno wet caul« **nOtfgMt pfautf**, annui,



erefti, Itipcdales^ uccres straqac. Dum in fructu -m mnirttda pbnti eft. ex plero-
 nimqnc idiom' n als ratiui propellunt breves, nec florentes. Fal* fi»M. rinnata es
 quin; >ic at pluriuum t'oligionim puris cum impari: codt amice «tniliciiUtt ;
 Ijnccolaus , acunnnJti> ; omniibus, nee iropn rxcepto % brevitiitnc Sc mjualker po
 Stipole snt lanceoUtx, ocunuaMZ & interne. l*cd«R. culi 'breves, crassi & firmi als fo-
 liorum solitarii infidet. floret denit iimum in ca{Miuiu" a fire in spicam fubruuoda
 liguuur, fmuiili propriid bnkica temmituo • luce oka (u.'jul;). In calyx labii superioris
 lacini i tnedu luU pofiet f»e inclut dtci iplum itbitutt / epem megrum, it* ue j
 rent tres dtnt« rciijui td labium inferius. Corolla vestitum dilute crenulat, saturatissi-
 me carni alrque. Rciijua fuit in flore secundum charactrem Linnianum. Leguma
 fuccedit parvum, ovaturn, campreflaia*. <c uminum, scoteis innocuis longisq; uniuers
 manum, glabrum, princ> pur(j<r tubens, maturum fuscifrons. Continet semen non
 ejm, reniforme, iiridum, compressumque. Julio flores, Septembri semina perficit. Ra-
 dices lejas plantz rectes, numerosa, digram minimum crasse, pedates & longiores, ter-
 re pr. RM i m ore Glycyrrhiza glabra fuit officinalis nostrae, pergera
 horizontaliter illas vili, tut no ram sic foliolum ad distans preferre. Veliuntur cortice
 tenu & dilata fuso, intus allicant, medullum in centro habent subdignum inque fibra lo-
 perabilem, hinc tenacissime. Gaudet fuit odore Glycyrrhiza nostrae. Recentes effica-
 te salivam carnes calore imbun, ut erit aqua, in qua lavantur. Ipse quidem,
 cortice abstrahit, albore, sed mox in superficie sibi expulsa inserviat rubet, non con-
 flanti, at in fuscam colorem brevi mutanda. Sopor quiddam constitue habet cum offici-
 nali; dulcedine tamen illa sume ET I M M M que curit. Mili quidam videtur omnino esse an-
 tiquorum ac Diocoridis Glycyrrhiza.

"TABU!.A N()NA(GES)IMA SEXTA.

SCABIO'SA PALÆSTINA. Lam. 53. ; ag. 114. nov. pag. 37.

Caulis teres unum alterum pedem altus, runcin, glaber aut parum pilosus. Folia
 sunt ex oblongo lanceolata, nisi integerius est ad basin magis minime pinnatis, c
 ferrea aut inægra, superosa magis pilosa sequi etiam pilis cilios. Pedunculi teretes, fab-
 pilosi producunt calycem communem sustinent flororum. Corolla cum foliolo rubore
 pallente rubrum habent infundibulum & externe villosum; in longumque expanduntur
 exteriores radiatum quinquetidumque, cujus omnes laciniæ sunt trifida vel pluries etiam
 incisa. Anthera fuit coloris rosi. Fructus est foliis Scabio'sa stellata. Fiaret sub di-
 mente Angulo & infrequentius.

T Mill \ NON VG1 MM \ SI 1¹ 1 IMA.

SC1RF'JS CEPHALOTES. IJM*. M. *ts. 64.

Ex fctn inibim in calyco primo vere faci entt plMttiei tre cepti Olibri. Radix re-
 rri, petmn, odor <c %ran aromatico
 ttictilin Mm irit nitit, & culuum ex sing<IM fert nodis, unde valle cespitosa densaque
 planta evadit. Folia radicis plus, basi culuum amplexantis, et ensiformi linearis, ven-
 ttntu, interbus retrosum parum flesus, dorso prominentes angulis, late vicent. Cul-
 mus triquo , nudus, erectus, sempedalis vel fiquipedalis terminatus involuci foliis
 qui-

quatuar, tan[^]itudinc Bdmodum imtqualibus, **foliorum** fi[^]ura gwidentihius , quorum mtni-
iimm **poniraf** mice **longifitnam**. Tota ptanta glabra eft. **Receptacufam** oblong um florcs
fcifiles in capitulum album J'licariuin & ex **ovato** fulmitundum cJJIi[^]ic; quibus fingulis pro
calycc tñferviunt fqiiamic oppoOtx **dose ilbae** ac **ntembnnaceae**. **CoroHam** facie glum.i bi-
valvis, infera, comprefla, albida, **icamuuta**, arete connivens; valvuk altera duplo latio-
re. Filamenta tria, capilbria, crct*i*. K: corolla dupfo longiora anthcras gernnt Jinearcs*
ercka\$ Si c\ fulpliureo pdlcncs. **Gennen fupenim**, ovale, **glbronni** comprefTunique abit
in flyliim filiformem, fcmibilidtim **ft[^]modbsnsque** (implicibus donatum. Corolla rito-ofa
fafta & iufccfccns includit femen uniciim, nudum, compreflum, fufcum, glabrtim, [>ar-
Vuin, ovatum cum acuminc obcufo. Multotics aufta ad litus adlbnt depifta **corolla** cum
ftaminibus, **piftiHum**, fctnen corolla: inclufum idemque nudutn; cutn itcrum magtitudiuc
nacuroli corolla inaturum **femen** **continens**.

TABULA NONAGESIMA OCTAVA.

CELOSIA NODIFLORA. *Lmn. fyjt.* i 87. Jtor- vyl lot.

Amaranthoides indicum itudiHorum, capititis ex aja virefcemibus. *Burnt, thef. uyl.*
p. 16. t. ^ 1. 2.

Alturantbq^{det} indicum giobofum, ad caulum nodos floridum, foliis fuliwiis,
iimitu apicc barbatis. *Piuk. aim.* 27. f. 13?/, 2.

Ex radicc fibrofa & annua exfurgic caulis faquipedaiis, teres, fubercflus, flcxiiofu? pun-
Qisqae paucis ifbtdil ptram extfperttOS. I^skaini nltcrni horizon talker patcnr, **jafimi**
• **loaguadiocm** cauiis habent. **Folia obverfc** lanccolaca, glabra, acuta, fubundulata,
integra, ex glauco virent, **bofiqtw** in **peuoJoin** mtcnumur. His **opponanmr** pedancoli
coinintines folirarii, breves & craifi. **Flora** ex albo virences St menilrsiincei **capkalam**
fibrotiidum **componaat**, **Cdjrcfa tripfa'yili** foliola extu-^ **htrfutah** in **b u n** eernuatntar,
unumqtie oppimicur binis rdquis- **Gennen ovttum** ptadicello innititur. Stif^na capita-
to - **bifidom tfltbeneqw purponfimnt**. **Ciptaii circum&tfl** & hori/oncalirer difecdens in
dnas **pvcet** 1 ovata, ftyloquc perlilientc infructa, unicum femen continent nicidum & fci-m-
gtneum. Floret ab Augufto ad Dccembrin in caidario, **CbfIUMqoe** prima perficit Oclobri.

TABULA NONAGESIMA NONA.

PHASBOLUS MAX. *Dim. fyjl pa&.* 482?

Ilnnta annua, fata priiu vrc in caldariu , florcc ab AugufVo ad O&obrim , Septembri
I. **prfant** ("cnitia pcrficit. Sub dio non rede provenit. Non qiidem volubilis, fed flc-
xnofa & dcliijs crigicur. TrunCHS, rami, pctioli & pedunculi **font** angtilati &: valdc hir-
ftiti, Tuliula fum **tcat/t, pilofit** ^ fate **OVMt** ut intermediorum Jaticudo interdum «quc
~~long~~, ~~lamin~~, ~~lamin~~ **IosJus** interior eft triplo anguftior extcriore. **Stpafat** ad folio-
rum axillas fum fu bo vat x & in acumen fctaccum terminate : ainbarum ora jnl*. cilinta. Pe-
dnocalof com munis in Horc brcvis, in fruQa clongatur. Mores pi u res breviffimc pedun-
cnlati in cvtremintte pedunculi communK (.tsuiif **fubctpiuti**. Hiiic.r, calycis exterioris
•**dioftTi** Itngulii. **loribui** ~~gemin~~ • hoOBOhlB, **taankMM** & obiiqux. Calvx ex purpureo
virxbquc pjNct. ^Fc\jltm fordide flavefcit. All fhvciu nia^ I iM fpiraliter invo-
Juu iniertic cum virore ijbet, fuperne limul putpuiaut. Lcgumen tcre*, ad femina to-



rulofum, kirfntum, acutumj'ic ntj[ric]«, veniaque : cotHlOft iircaer Autm , fj(ur»; e fa-
dina. Rumpui Gedlic. Te posse idem
cum pban m bic t*Palt a me proposita. Si isque non dif. ;m oī, illud a Phafeolo
Bin Linoi!, crt OK* piuu (veria a Limuzana, :iov»que. Semina ex Inde Orientali
nulFa tutrunt.

TABULA CENTESIMA.

Pii ASEOLUS BinNCTATUS.

Ex promt/ntorw Bon* Spci in Africa fu rum effixa femina, que calidaria honi nostri
speciem peci volubilis primo anno a mense
Augusti nevani tanc Hal m prtxfaxemm. **Plan** Nunc akero primo v.
le rjñif'-sjnc numc folios not M nmuios folios levissime vegetantes producit. // **BMM**
similansuem habet cum Phafeolo rufo, cui flore etiam conuenit, nisi quod velutum mi-
nus virescat. **Cra**, folia & racemi sunt hirsutuli. **Lc** gunen levissime villosum figura
& volumine congruit et in Plufcol?> mamocno, mttt^t tstaen surgendum propter fernium ma-
jorem critiuton, qua ptuet tn^hi-lit *l*, subreniformia, & supra lumen utriusque puncta
ferruginea insignita. Foliola sunt ex ovata acuminata; heralium laba interjtt duplo
angulior. Seipso, ad foliolis & caulis extem, sunt exiguae
& subovaceae.



T. L.

































742




T. 11.




T. 23















T. 18.























102





T. 46.










T. 4








T. 32.





T. 33.





T. 35




T. 56.











T. 39.










T. 41.









T. 44.



T. 25.



T. 46






T. 42.



T. 49.



Y - T . . .







T. 53.



T. 54





7.56.








. 68



T. 60.



















5. 6.



5. 6. 6.



T. 69.



77.



77.









T. 16.







T. 79.



K
4

D. 60.



T. 81.










T. 42



T. 86.









T. 50



T. gi.



T. g.




















J>

J~

PLANTARUM
HORTI BOTANICI
VINDOBONENSIS
CENTURIA ALTERA.


MDCCLXXII ET MDCCLXXIU

HORTUS BOTANICUS
VhNDOBONENSIS,
SEU
PLANTARUM RARIORUM,
Q U JE
IN IIORTO BOTANICO VINDOBONENSI,
AUGUSTISSIMiE
MARINE THERESI[^]
MUMFICIENTIA REGIA
1 N
UNIVERSITATIS PATRICE
EXCELLENS ORNAMENTUM PUBL1CAMQUE UT1LITATEM
EXSTRUCTO,
COLUNTUR,
ICOKE COLORATiE ET SUCCINCT.-E DESCRIPTIONES.
CURA I r S U M P T I B U S
NICOLAI JOSEPHI JACQUIN
BOTANICES PROJCSSORIS
VOL. II.



VINDOBON&,
TYUi LEOPOLDI JOANNIS KAL1W0DA,
AULAE IMPERIALIS TYPOGRAPHI

MDCCCLXXII.



HORTUS BOTANICUS VINDOBONENSIS.

TABULA CENTESIMA PRIMA-

DO H CHOS PUBESCENS. Linn. *Jyji. peg.* 483.



Jnnui hujus planti; cotyledones glabra, vix pollicares, petioloque brcvi & tiiiTuculo fuffulti figuram hilicent ex fabrotundo cordatam parumque obliquiim. Caulis eft tcre-;, volubilis, totusque obfitus inollibus pUi*. Folia font ternata, ex foljalis ovatis aut hnceabta, acuminacis, integer' rimis, utrintjile pilolis, ad oras eti'am panim ciliatis, lobo interiore llll-gii minuive *angutiove*; petiolis (juuque pilcilos, Scipulx ad t'oioh & in pedunculis iunc fencer; ad petiolos communes in caule rantiqaqt; ex ovata acmniitacx, liirfutx, bat i bus dtorlum non jirodtiiln. Peiliniculi communes bfevidlmi & rriflori infident axillis. Florc^ brcviiifTine pedunculJii llbt mano fuccedunc, florctque inrcrmcdhis ante laterales. Calyx pilofus, corolia ad unam tertbm partem brcvior, erirjitiir; ex tubo brevi leviterque cum[]rcTo in duo labia ddinit fubulata; quorum utferins tribus conftat laciniis, infima panlo reliquis lonjfiore; superius unica cum a pice bifido. Corolla; vexillum icx'iinme cniarnnnatum ac obverfe cordatum erigitur, connivet, nngoi infillk brevUEmo, callisq[ue] inftruimr ytlis, ex fitlphurco pallens cum macula central! ex fufco purpurafcente in fade, in (iurfo etiam pelluccme. Ate fublineares, obiufa;, vexillo concolores, eretta & liijitrc concava; in uiijucm brevcm {Iclinunc. Carina oblongd, obtufa, fubfalcata, al-bidaque lontjitudinc habet liumq[ue] alarum. Pthimertta diadclpha nntheras gerunt lu-teas. Germen oblongum, comprirom & hirfutum terminatur in ftylum fubuiatum, K dunatum capitato & obtufo. Legumen fequipollicare, oblongum, valde com-peffun], •cuminattim, reaum, hirfutum, fufcum Sz mtans continet Temina pioca, rotundaco - reniformia, Icnis adinftrt comprtfli cum margine acuto, nitida, faturate cine-[rfnilii cum maculii tnfeis. In culdario floruit empiose Septembri & Oftobn; Decembri piucifTiina Ieguinilia perfck. Hiurn xibue lang rens tuiit. Linnxus pro pjcrii Am*nic*-Mi idtignut. V'ideatur a gencre Duidii aliens planta.

M

TA-

TABULA CENTESIMA SECUNDA.

PHASEOLUS VEXILLATUS. *Um.fyji. jwg. +Ki. fpcc,pl pag. i° < 7.*
Phaicolus flore odorato, vjsilio unpJg patulo. iMI- fifife, / . j . 31). tab- 3}4 &*
30a ?

Ex America rorrida redux lemma aituli, <jo* an« quinqnetiftiom ia caldario fata U-
 tiffime germinarunt, a quo tetnpere omnium radix in hnnic u^ojue dtetn prcrentiavtt,
 produxicque quotannii fibrofa & 1*guclens* caules p!ttr^o hertuceos, tnnuw., ecrcto, l*ir-*
 fotos, vulubtici, lanfiflamm ft wawffilitno*. *Folius* toe ovttt, a^uta cum icni<<^orice
 fecuh, integrt, fubpiiofe & fcibriufcuit; lobo Utentliun intortor dupJo triplo* « «»g¹¹,
 ftiurt. Pctieli hirstui fulcu witiae <rxjrjn:ur. Supuk *i pettolo* purtjeultres l*caf*>^{dir}
 fetaco; ad exorium pnitorum comrntnitum baftace, piJofj: UKqec lalutx. Pcduticuli
 lungi, teretes, & gbbcrimt tut afperi ant ettam raris pffis idfpcerfl, in cstrctnitate gerunt
 quatuyrve flores eapiiatot & icrtiic feifiJn, tui 1< muiuu m *explicatione excipient.*
Calyx giaber bilabiauts & f^omit)U^tqiictidi dividitur in \mka\$ lancea^{m alio}, in scum^{m alio}
 tenuj**i* & ferc xqu»(« ; auttu* ad balin bnttci-. ifuabu oppoitti parvis. K lanceaUlo P*
 nearibus. Corotlt deg^oms fua*v*irmtod odorc^o fptrtt. Vexillum amplu m Si w< ne li-
 neatam dilute parpiiraf^ott, imerdum - *befix angis*, ratis caruleas; tu^o unquc r-
 tur. Al* faturniuj coloratx & obvaix mm carina pallidj & geniculibus in spicam, haud
 nutijfctain contorquentur, 5t t^ojliq*iu* lo*.t(nur lie; ceterum sibi simillime, nec altera
 ad balin lobats, CJ carina falcata cuniquer cum ore hauste; inque simile parte, nec simi-
 liter w dewa oppoitti, emissi gibbo canito insig^o pseuberat. Filamenta disdelpia an-
 toern dunantur lut^o. Stylus inflo rigma capiatur iren>qnc pu? etia valde. Legu-
 men lirtearc, recrt, rectum, acurut, fabbiefutum, fuscum & tres quiniorve uncias lan-
 dum Icraina include « deeem id [todecam subreniformi], aot ten, au^o - x fuso nigroq^o «
 non codem mwlu \. *rieges*; que matrum, elafstice <ij>tiliemKj, valvulae; ic spiculiter in-
 torquemio, cljbi cogit. Flora toii^o zlatem. Decembri »o1e* percunt, Aprili pro-
 dcunt nov. Non satis fuiP^{-m} tune planum - copaniere pro Phascol vexillato Linuti,
 propter dil*laminis* deforscionum, nisi ipsa vir illastra pro sua in litteris ad me 4aut agao-
 viflet. DJlenti fynonymum huw duUta:u^f ».

TABULA CEN I EMM \ 1 ER 1 I v

HIBi SCUS SPIN1PEX. Lm.0.ff.4 6.
Abutilun tmtncaxiutii, truiitul'mn folio futwutta *, flacc lato, fructu sculpos
 iiijjore. Plum, it. i.

In in Alarum C rilizierum fructuosis maritimis cre- -nttm hinc florpen vidi, inter que
 debili ie fullciuabu, n< habuum in nostris culta caldaria inuivit. I am primo
 inou Bora, butnunatn termt itutu*imein *dcpu, pa^ostis devans le ad viginti pedes.
 Hrur.cut polican critrm in p>ucM r<nw* Um*g*<n, vargnw, terae» tt crrlm <lit,
 jutiorei fctbrtultuJai. FOUJ btbet tx cooUio ov<i, artatu, bMMnf vd ott
 Dmt atigulau, Uud •dmodum icuu, uinnque fcabrluftuU, petiubm, «d(crru.
 dunculi Bllari Sc fuluini tin lolwrum mtident, peiioiofum droret looi(wtuaat.
 componitur ex du^l^t (ark igiorutn ltncariuni vcl Unccwtionim , .V *J bns piloforum;
 exterior qftis, qucdi eiiiMn nunt plunbut variantem ». *lervu*; interior femiquinq*u*ndas
 .**. CorolU mtgot, la««, etegtm, iaod«m, & lubcantpw*r* *lars* formique ex peris
 quinque obverfe av<m, <irrioqu< nervufo. AwUerx futu »urantiK». *lernos* plo-
 fun. Fructus confusa capitis quinque, undoculatum, monospermis, non daiformibus.

& martins & Invicem difcedentibus. # Hx finguta spinis armantur ternis. Spinx lateralis quarumiibet datrum vtcinariim capfuiarum adco Te invicem contingunt, ut fxpeunicam mcatHotur. Sonuis folifaria&oblonga nigricanr. In caldario floret Oilibri Sc Nuverabri.

TABULA CENTESIMA QUARTA.

JUSTICIA C1LIATA.

Radix fibrofa & pñllida catilem hcrbaceum, in ipfo jam exorm in ramos longos; cett tmirlem caule divifoin, cinitit. Atqtc hi fatit teretes inferne, fupernc obfolete quadrant hires, erc̄fri, liebiics, pilofi, fesquipcdnls, fupernc parum ram oil. Folia in toto caitle locantur oppofita, luriata, pctiolo aliato donata, lancolata, integerrima, obtofiafcqlt, facie ati'uvircntia, parencia, inferiors ad diftancias remota, fumma dcnfti & vctuti tinbrietim congefh, hinc fpicx tctragonx fpeciem frmantia. In omnium fbliorum axilfti flores ponuntur fotictrii, ftffiks, parvi & inoduri, BraQca fin^ularis utrinque flori tdfat fublineitis, viridis, cilista pilis longis atbidis. Calytis ibiiola quinque ijerfiftunt, bralcis fimilia, fctl breviora ad duplum. Corollz calyce brevitoris tubus dcorfitm intice ^ibbos luinct & albcftit. Lnbium inferius tubo duplo longius plan urn & parci:ii(limum in marginal latefcente S: jctjulitcr irifidum ddinit, touim album, exceptis ad originem gibbali bñis Iphureb cum totiictn antpoitiis punftis fulvis. Labhtmt fuperios dl ovatuin, bjdentatam, brc^iu^, concavum, crcflum, utrinque fufcefeens cmn fliis longi; vñ*. la hoc labtu locautur lamina duo. Anthers ejus:clibet flava in crurt biua ifcnic dividitar, quorum alterum intern urn brc^ius eft & libcrum; alterum externum in tibmemnni ttm inflexum. Scylt fubulati ftigma eft biriduni. Cipfula coinprc iTit, ex orbicuiaro Dtrtoqite wOgnuattM, ^Lihra, fufca, ftruAurx congencrum, in quolibet loculamcuto fernen mucum continet remforme, atrum, comfirdrum, pulvcre veluti forden^, trtnsverfc loci tarn, apicc & hiCt inftruftom cefpite piioriun fufcefantiam, qui microscopio acsminfld funt terete, fuliulati, ptSockM, & disfepiincjns transverfn in plures coocameruiunn divifi, Tota plants feabra eft. Floret in caitario toram Tftatcin. Evrum igosro. In magnittidine naturali in tabula a late re proponuntur cnplula integra, ejus valvula cum ungu clastic, fetnen cum pilis, idem pilis abfteris imem, fios integer cum brjaci-; & corolla; au&w vero lenris ope pars fuperior feiniDi- coronau pil», & corolla cum alfcilTo labio inferiori > ut confptciantur ibtit: a in h; fion mi gularis.

TABULA CENTESIMA QUINTA.

DIGITALrs LUTEA. Lam.0. pag. +M-

Dig b&t foUh calvcini* UnceoUitis, gales bifidi, Aocibut immaculaus, Hall, bijl,

JKIV. mm, 3?i.

nif;!fli* flore minore fubluteo, anjuftiore folio. Baub, b\$> a. p. 814.

It g itilis tlore luteo minnrc. Hiv. mm. in. tab. ios-

Dig ;italis lure* parva. / M%-

Digitalis mai at lut« vcl I allida, parlo flore. Baub. pin. 144.

Digitalis angustifrola Kitca, Hayh. pin. 244.

Digitalis qturrt.' £W. pempt. i. /. i. c IJ.

R«dix primo anno *«m folli f«l« r*dicaj« prodocit; inf quentibus caul«, qui funt hi pedsln ve) tltiom, erctti, obfolete i R rtmplkitBini & ([libernini. Hos p«r p totam Uciuidinon fparmn un.ant Ufa ex UnccoUoto oblongi, •cumma» obiter fem-

u, glabra, fclElit, facie frturaic vircatia, fobftetida, floralw integerrinu, i
dicolu imgis attecouata. Florc* in pedunculii brevibiH dt avili* e^redtumur
0 iiiiiii) u autem numeroli verius unum Urns fleetuntur, in den I am 5:
fbnnaates femipedakm ant taagMfcm. Hxc apice mitat atlolcfecm, fcnlmquc eo cng
tur magi*, quo flores magH fuperiores explicjnutr. Koiola catyciu font lane
glabra, acuta, & inferior! duo rcliquts piuxUlo latiora, Cjrdia tabulofa ft
ex fulphureo aSHkai. Lim'jui incrc ttavet. Labii fuperiorii p^{tent} & bipa
nix fcmiovaix & acutx ad w^m Ieviier pnbdcQOt. Infer ions tripariiti l*cⁱⁱ laterales
ad exortum fingulz notaneir gemim: punilis atroputjurcis, tcrom fuit h
nisi ibii fuprioris. Lacinis intermedii vero iongior, amplior, obusifina & rosenda
reli^r porrigitur, colore mtealat or ferrug neo, pt: que albidio supra basi vestitur. Faux
a^ibn actjuc immaciita; confici:ar, FiUmcma aibent. Anther* fulphure* tr*
qne bjfid* ante pollmis Capftila ex fabrotundo ovar* 5: scminata conunet fiaia row. F!or^c Joi
Intrrdum in plants fylveflri Hores funt dtti idio majores, qu Jin in depi^{ta}, km pauw
magi^c que remuti • folia qtoquc laci^r; at reliqu eden'. In Austria fylvetrem non
inveni. In tiucaii) Wirtenber^henti freqnente vidi. Proptc^r nostram illi JtaTM
quam lithct Hallerus sub numero }5*i* quamque op^r tiim fcpat a Digitali
nxi, prito in enuincr Dtgjulis purpurex, pe^ctea dubiuuter in obfer^c i
ilem; synoymis, dupli^r ore. Qjrumqtie per^cnt confundit V., " , ' v' loannlli. ^{***}
iconem & descriptiosem amplam Digitali. i Uicr. I invenire deta in sui i
rius tin u ram iu tabula qn aquagelima septima Flora Austriae exhibet.

TABULA CI NI 1 SIMA SEXTA.

TRAGOPO GON CALYCALATUS.

S1 tiiutu Sv orzontere seguitifoliae feminas ex Italia accepi. Nova milis p viderur,
fa, fucco tur. Radix perennat, foris nigricans, iunt all», pomcone^{1*}
ida ex Ravo aibftt, td Htn i nullum fufcidente, quem lefe etiam fun-
duot pUi.; partes relique. Sub dia fata, altero anno floruit, & sic nunc pergit flo-
re qooc; fed feminas nedium illa matu » cludit. E^c capae r^cliv* nullut cat**
vis, fed foliurum dumc4K^c ra>lic^cdt^cttni f&icvlm ; act quorum amboru i caolo
[sluirta adfcentC5, [cretr, fesqu^r ctajdt, villo & foliosi, coquondi caolem singula-
rent ia). Prod^rncular illi in pedunculani i peoc *i bylum, fructu **
befc-man, ti.tuU'um, fttb florc jocTsfTatijm, coqac unico nrwinajm. Ex ali al^{ITI}
altcnusvtf lolii peduncutut fimalis exoritir in tl^{III}; in aliis merito nullus. ^{dI** J*C}
dum cpxyifl, pctiunculis recurvatis, terram veritas unc* peudent. Calyx «Juti dupl
erit tu», interior I >>^cre, uterque circlear oclaphyllus. Squante urines in marginem
«wo> lanceolata i linnawm, lanceolata & actmtrux. In u ulu caiys et anguleum.
Corolla inodora & urinque flava cum ••them & ftigmate caacofor^r
sQQtift csapaKataw pcmttiluo^r *iv«^ci» *t^c)^calii^cadftU^c dep^chi^c «d latm. *R**
ntidum. Scinioa toaga nanno iaAniumtr^c rufifluge. jftthpliumM^cti. bant PJ
purpurtfcenif. Polia radicalis *i caolina font fohlinaria acuminata; iufina & radicis
inf i tic conabculau 9t urinque pil»l>; superi^rn plant kieqbc tvt •
r^c jy nia,

TABULA CENTESIMA SEPTIMA.

ASCLEPIAS INCARNATA. *lmn. Jyfi. pag. 193.*

Apocinum minus reftum conadcnfc. Com. *can.* 9. f. \$13. *Barr. K.* 71.

Tota planta laftc nivco glucirmfoquc fcacri. Radix confitat fibm numerous, albis, tc-TCtibttS, tajamuill cr.iffrtjc Kjuantfrus, i*«n/pciU)il>n> **an foafiaributj** ftprrrnnni '1 tauuibn.s primi anni folia *font* (xpe omnia qnatcrna; ncc flores in his cattibus prove- niunt. Portea autem kdia **variant**, uc tint oppolTta, **ana** I'd quaccrna; funcque ex *lta-* ccolato oblongs, **tcoti**, integerrima, plans, glabra & peciolata. Caulcs plurimi, digi- t«m mitiimitm craffi, **oipedalo**, nicduila Urdi, annul, am rc&iffimi aut flexu uno Jtl- terovc (**ad in** fpecimine depifto) incurvati, bafi ex exrulto purpurafcunc, exterum vi- rent j fuperne divifi in **mBolos** pcdunculitumics. Cortex c caule iacile separandus, in fi- la tenuiffiiia limiilqnc tenaciltima *ta&vi* interne poteft, vix immuum vi rumpenda; unde forfian l« **ofiUB** ,iliqiooi ecrcrc recunomicmn planta po(T« eo mngis, quod radix percn- «ei, & iiycmeni nuftram &c3tine (cut Tub dio. **PedoDCOB** communes ft rainuii floriferi tcniiinales bbpabdeuai. Ririus rami axillars producunt florc->. (Jmbdht fuit erc- ft* 5: **deo&**. Invotucra cynftant futiolis ftibuLuU brcvibusque. Pedimeuli proprii vis unciales pubefcunt & purpuaftun. Mores odore pollcnc Vantlx aliquo. **Caiydl** fo- lioh **|m:** **Lwcfloatl** & flcuininau. Pctala ex purpurco rubent, & tota reflcQuntur. Kcfbrii cornicula cretti eK purpurco pjllent. Klos (mi itrtturaquc partium **omnhnodo** congruit ctim Aidcpiadc **confISivka**, cuiu^ alibi defcrSpboctn dare cofjito- I'ruftus "La- th congenerutii (iitutitur uita cum ("(-minibus depjcti ad Jacus. FJurct Juliu. Scmina fen Septcmbri.

TABULA CENTESIMA OCTAVA.

SALVIA JEQYPTIACA. *Um. Jyjl- PH- 64-*

Hurmmum arijypipium, minimum, raniufilFiiitum. *Boerh. lugd. i.p.66.*

Radix fibrofa, ii^nufj, & pcrennani caulcm producit jam in ipfa bafi ramorum, in cat- dario interne **Hfaofam** & pcrnnanient, **pedakm**, tamfern ramofilTimuin, debilem, plus minus obfaicie tcirugonum, juvenem Jiirfimim. Folia font **oppofict**, fublanceolaw, •catt, **deadcabct**, *ragt>fk*, venofn, fcinih, unciali* **vd** paulo longiora, odoris aroma- tici **pnd**; pttJoi is & venis ta ralibus plania tcnella pilofis, exeruin nuda. In ra- mis clongatis & *toco* foliumm bracts »m« **iwomh** pixditis flores brevier pcdicllan locantir ad varias djfhnti« (oJit^irii bini vJ terni ft ntinutt. Calycif an^olati & utrin- tjuc Itirfuii iabium **fluperioi** Jubimc^cnimum eft; inferius profundc btfidum & acumiawum. **Corolla**: #lb* labium fuperel **et** bifidom; liciniis attguftis & actitis. **Ltbl** inferioris la- cinia laterak« prioribus fuit fimiles; intermedia autcm fubrotunda & wnpia limbum habet crenatum cum facia violacca aut purpuc*. Antberx exruJcfcum. Semina fum ovalia, giabra & **nigra**.

TABULA CENTESIMA NONA-

SAPONARIA PORRIfVENS. *IMH, mmt. p*g- 339-*

Lvhcm* ch»lcpcofi« annua, *foUt>* [Mrum hirus anguftis, flofcuHs carneis, pcdicu-

In infirnu* biuncaJibuj, capfulu **fat** rutundb. *Marti. h\$.%.f*g.* **541.**

minato, tmiitctHC ramos pauiios oppofitgs diviosquc. Folia fumtna quzdam integeriina **fiat ft** fuUincaria; rcliqu*^i* omnia **pinnarifidfl**, iobis exierioribus majoribus & ex. timu Jongiori; **ndicdta** & (ubfequa caulina plus minus hirluca; **canting** retiqua raineaqic magis angurta *^** fu bpiJola auc glabra, cum Ijcinii* infimis **comuvendo** ampciticauli-DUS. Folium **radicale ft** c\ conic media atiitd fcoilim **exhibitentur**, Gilyx cuinmmiis ovatus & scutus coinpoitiuir ex ibitolis **ft paleis nameron's membransceu nmcronato-arilh-th.** Corollala **piUde CKrulea** fmit qimdriftidx **R mdkntes**. Lacinia radiantium extima **maxima trtnsvofiffi** **rtigam** a pika **pranerua** petali adliucduin convoluti fuperftitem. **Profhn** compolirtis **wntosft** obinfus confht c^ **pdcis** urirtatis **ptcolii**, S: ex Icminibus ovalibus subjloli> calyculo parvo dcntao coronatis. liorct Aojjuftu & Scptembri.

TABULA CENTESIMA DUODECLMA.

N E PETA IT I Li C A. Um. fyj pag. 3 90.

Meoltaeatarnminor nipina. Bauh. pin. sis- fraJr. 110.

Radix percnii & ligno Il jirimo ^ntnis anno **foli** profert folia radicalia, altcro & fuWe-
quis cr.olcs plurituos j laks, obcofe teragooo, villofo*, •d(c<>a-
dentes, **tanaos** & . Folk font cordata, crenam, obiuij, fubvilloia, **filb-**
1, pallide sec amucne vircenti* com ntctUis vUpciGs t&btia, peioJata omnia. Spi-
rum terminates ctini(l.ii, denfa, j Vtrtkillos flo-
rts efficiuni btfites pturiml. li ttQ uceolat*, acatntatz, coocavae,
r igimditM CJACUIH, {a madio vtraetes, iaienbus attcnuatis aibutics , villu-
(x.juc. Ctlydi ftriari Ac pa >lenticuli erigtuttar, faperiorw panxtlo lonj>ior».
CoraUa c\ cameo albdic Antherat blfidz btont« porparalcune. Ha in (lore port pr-
f]latioticm f;ce extra coruui promineat, infieis filaments ; quod
etkm in slits plaruaaa di Ma flint cliaratlcri^ LinraaoJ. Qiix
ciutur a Touriidymu & Caipara Bauhino Be*leri figure, in noftroa) phntarn minitne qua-
drat. Radix hvemciu apud 110s Iub dio noit fert, fainc trinligere iliam in hybernaculo
dcl>ci. Tota adore aramtic

TABULA CENTESIMA DECIMA TERIIA.

SOLA MUM HYSRII M.

PUmtt ftoochoft, W~~o~~ndalis, & canosi ii i*m per tres annos pereWMvit, agtni iftaton
fub dio, Je hvemetn in cold ftmpemef^{ft} & femper/iorens. TrunfUI «r»,
dijrrtani cnflts, t MpioAei Srcincreus, externni vi.idis. **Ramorora**
K,, pan ico pulvenilcnto obdutittir. Folia fuit ovata, acuta,
Wtrinque tomentoft, repundo-anj;uJata, aut m«is intc^ra, **pafkb firenua**, unduliu,
ptciolata, cx a> Pedunculi odufcia, tcnlla prodcuntia in mir-
Rine fciorf Btofi »» «olK«, race-
tnofi, HUB atii panel timfadrtari. paadfemquB Bfliifloci t tomauofiu «ft. Corolla
rugofa, pallide cxfulcj, limboampb ad m nias quinque, fex vcl
lien) (cquuntnr calyx & (bmina; ita ut in ultima floris ve-
1 gemma. I ti in ntaribm Solanil tccidit, ita «iam in hoc
ftom funtdiqti, ih.;nutis delcUu vel vitio aborwm- 1 **fobroeuadoi**, de-
prefus, nitidot, obollete & inque- liter »ot •tiwi »i« fi*an», barmjs, peidolui, colo-
ratia awatitiaci, c< nice cruff & carisco , pul(a odoris ingrati cucumerim, NoMrofiffi-
moi

Bonam Linnxi dcfcriptioncm rcpetam, at aliqua figaram codcomittetur. Et wdfce ^{an}
 exurgit bipedalis, calamus crassus,
 nua, afba& rainufj cauli-
 tkn Uco-Oodolbs, interne
 ipfa ramofus bad, rrtius pawt*
 oppolita, i'ctilia, integrrima; infc
 lira; supcriora lincolaia, acuminate;
 capiitarcs, ltxi Sz atl miiimam piaoac motmn tremuli, glabri,* *r poUtcars. cgr«diu»i^{ur}
 de Istcrc execriorc ramorum ad dm lion an cyrandctn i
 rfc centU pjtentcs, in fruQdcmia !
 cam* &t puhfcccni-
 gnibus loegii supra calyccm in culnhi
 brevem. Sountaa afba iodudoattK
 ovato fubrotundim, obtut
 m plura, utr ,
 maiuraiui

TACUI.A CENTESIMA 1) ECIA.

COREOPSIS A I.: TERNIFOLIA. Lin. fij. pag. 571.
 Chrysanthemum virginianum, alto caule, bidentatum, folio aspero 1, (lore
 niiiorc fructuosa. Moris. ij. 3. pag. 23. t. 6. f. 7. f. 75.
 ChryEinrhemiMi v. virginianum, mle alai, ramosus, flore minore. Pisk. v. 100.
 t. iijy. / 3.
 Corona luiis ahufima, can. - alto. Tourn. ij. 490. Zent. var. pag. 55. I. ft-

Rafix lirnifa S: pefwrm frb d» profer' caule plana annuat, erecta, angulata;
 medirlb alba rcpiere*, a fbloritm utriusque dcurvante marginat usq; maxime
 altas, mi vidrc eft el jnrtc cardis magis inferiore florim exhibita, a quinque gd de-
 cem pedc altas, simplices, nec ramosos præterquam in sola summitate, ubi brevissima eft
 subdivisi in pcdnnnclos ramiuiculos & villosos. Folia sunt oblonga, utrinque attenuata 1 acuta, fubler: ujuc ft" aalircn» vci
 upofin; rcliua omnia alterna. Calyx smu in uel etiam totu reflexus cotilat ex
 duplii feris foliarum oblongarum, scutiform, virgintiam, glaucoficularum, & foliculis
 difci brevioru, sttmero jtKcti. Corollas in radio femineas a qpostaor *d «^o luxur
 abcut in lmlimm «puc fob laeum, tide cuoca cum laceribus involuis. Anthere
 nigresc uiu. Utriti^quc generis flocculus ctkm ad latu separatis d«bcatur. Flores leviter
 odofatt fuat, fir ueneti Odoleti aque Noventiae explicantur; unde curiosus vno
 fentioa sd matariutem ptrcnuat.

1 VBU1 V CENT!.. SIM \ I\|) ECIN[A.

SCAB: OSA TRANSYLVANICA. Lin. fij. pag. 572.
 Scabiola stiffia annua, foliis agrimonie nouant similibus. Moris. ij. 3. pag. 46.
 t. 6. f. 13. f. 13.
 Scabi ufi tnaf) ivanica, foliis agrimonie. Bryn. pradr. 1. pag. 94.

Planta 101114 ciuic efl crciilo, i ripedali vel aliari, me glaberrimo sur pilosa subaspero-
 que, inferne tereti, superne in parte ramosa inferiore penitus nm t>Qu»« foliato,
 in extra -m»uw per (Uhutumum in pedunculum intermedium duisque ramis laterales ter-
 mi-

mos inter fruchis, semper cfttKOST saicura tandem nupemme eumque primum Invent> qui femina continuit albida, crntonnia & duas tineas longs. Aculci glaliri, validi, refti aut recurmi, adAmt in cauk rami>que patici; in loiorum ocrvo medio principle^{11*} que venis utrinqtic etiani ptaciorM , vel oinuino oulti; in calycibut racemis peao^{"s^ue} rari. Nfon poflum ad uljant « Linnxaois plantii redikrc; nee alibi magii convenient fynonymum repenrc potui.

TABULA CKNTESIMA DECIMA ftUARTA.

PHASEOLI LUNATI VARIETAS?

HPoto ita habitu hxc phaia congruit cun Phafculo mfo in ubaJi triz*^i*nw qiwrn deplo i- a», at diftin*^ui* pntterquam m ~~femina~~ is nequcat. Hie aotem *tiffiiaa* ~~ibei~~ DUR quint rutj aat !>adu, fed aat cinwafcenia am ferrngine* com Uac» »b Mo td circumtfr rentiam produilis j interdum emm pundis oWe ~~curvif~~ i* aouu. Ex Utlix iw>ntt 'i"^c [ulo iransmiffa Kucrunc. Attm etiatn fi*^c* fp*^c* I varicutem ct Infuti Borbo»" a voam Tub utuio Ptafcoli ex Athery «b iiltirtri Lemoonier «« p i, Cd*^* e m » f i ^ Phtfcolo nifo diverfim, quorum fpecunina «b »I dejfantw, ex caroco albo robro purp*^*roque vari-. Confmeilimiv i vmein io b*^*ro das h*^* plants. ~~s~~ varietaes quo vel*^* OHHIK* poffout ad IWeuluui luu*^**i⁽ⁿ⁾ ~~re~~ i

TABULA CENTE5IMA DECIMA WUM A.

TULBAGIA CAPENSIS. l,nn. wmt. -M -1< 14g.

Plants oinnino f*nj*{uJar», hihitu \ illi, sive Hyacinthi cum corona denticulata Siles, iota quint,i ~~furcif~~ nn lpirrt L ~~sp~~ *rntt Aillii tivtorcm. Radix pertnd carnoi ft WidU coni>it luberibtn C'innw, plui nunui rnbororandis, dumetri bipt*^licart** fufccfcemib*, inm* aJbjji, Tiflil ilfflM tibrillii ctrtlfi cabfflom crtftat, Upati* ic*<f*^d mi. Hrc mbera fupertorcm pirtnt Mbent it) circuoicrcntta oblique drprtilai". que drca ~~lubros~~, prae*^*erit tim t'olio: ~~qu~~ :eto ckwtncbtu*, a t n a n , ut f*<p*» ** fo lit ceotnu ~~folium~~ increfcentiatn (enftm tubeum occipent. I Ita (unt linear** i **10** fa, unuin alterumve pcdemak-i, niitdj, hrte vucocu, numeroU, radtctlu «ront*^i* riora plaru, interwrt ntgtt cantbcuUw. Setpos «reSm ia cc ~~l~~ rom de tubero egrtditur faliunut, ere ~~l~~ uxnprrtfTtt* ft oUoktt iccepi, loagnadi fupeme fpttha menjbrttac« bivalvi attmUfx termittiMUi. Ex tuc Ateet'tive ~~sele~~ offrent podunculi circiuer qaindecim , reraes, tenuo. 3c irdM I Ibnantnic* umbel lat ram & vttde inrqoaien. F!t>» com ftvaeindw onnwiltl odore flavi ;**€« iWif*^0** i*^*Of*^*m pnevaleotem, Eofum ehmOtnai in*c~~e~~rum twe 4abg, qmiten In c*ll* P*^**W obfervav,, tiuwoqoidon .b boc dktnBtr IJMHCMM , n tkcoCqKftfi fpccimiM ^ »^{u1} ptu», aliqaateotH drfcrep*. Dum Sorctn attmtc eruwiog. tidetur twe twilWte pera-thio ft ptttlo, qwaad rabtun qa*^ikm* connwi cUHa&Ut. Sk kaqot pnrtct (pMwtm >Mn dek ft viride, GaJi in but obtootiM ft obfofcK oUufcque uifom », Utt.lut ~~an~~ triple bre-vionm, divifum in fc» Wckia» en «btongo ltM«okir», (wWwt, ft patmui naiMM, COTOUJ: I ~~l~~ . e paalorum onfim } MSfdut tubo «>Vt>t, nt unieurti •iMt vntturem. Muw bmbtti tlifpcfcunr ia in hhtiinn "iriuliai". ertdti, longitudi-ne calycis, falsacutus, itS*^i*«, cr*^*fiwro. ex nifa ttvngtow , per (wria apic parum convergens mi*^*MuajMprWtmdt utcafa*. Fte»mtB An, a m n a UcrlfiiM , ~~anthera~~

ger iifit mcumbcmes, didvmas, fulpliureas & ovatas. Horumtria, fitu fuperiora> infe* mimic iiiici inufuras Jimbi coroOx miners profuntlas, rdqta tria Jicu infcriora sheman* tnr com prauedcmtbus. Germen fulmmtnndum, obiolcte mtjouim 8c fuperum inftruitur ad ttjikcm jwris tribus mcllifcris. Stylus fbntniibus hr<rl or & craftus tawaauta ftigma* « obtuso, Frnfhim i:cdum tulit, quuci caplulam dTc dick Linnxus ovatani, fabtrigonain, irilocularcm&fi/mtnibus nonmillis refrcrtam. In hybermcak) Horuit hoc anno men-
te Januario. EnMbwtM ciam <orulla difciih longiudinalitc cum raminabus, & pithilum.

TABULA CENTESIMA DECIMA SEXTA.

FUMARIA N0B1L1S. /n»j- jyfi, pug. 469.

Sibificx liujus plantr fCTrina cetcbcrriril Linnxus communicavit, undc marx plants

quarto tlciniim ends anno flor« produxcrc, menfe fcijket Aprii uns cum Fumaria bulbofj, qwiui in.ixitnc liabic.i ctinKruit> verc tamen divcrfa. Radix, inicio buibofa & fubtus - if in flurcntc plnnta, qvialis depingicar, (ulidj, Folia radiciilia plura, ffiitltamza, bipinnm, gtabra, ex j^laucy vircntia; cofta communi media pentaKon* Si anticc lukata; Ittenlibm Sal lubrotundis, obtufis, lobatis & tad nitedan egrediamarplores, angulati, innnns, tribus plcruique foliis ornatii, Quanum (umninit JbJram, bndec afldftar, florcm ex ata cmittic, a fptca rcmodram, Braitex in/crior<rs hint m^z'n lob«c, >roptcrc» (imiiorcs j fupcriores funt uvm.e & intcgi ~. Ilara mbo iutco cum tjucb pfotnkcodi apicc ut^riwantc, odorant ppirant ad Trimulam vois ncccdcntcm, 8c esdm fum BMgntrnidtm m f.orto qoom in Kumaria bnbwCa , ftrufluraquc fimili, fed libm bnvorjbiu mugisquc concavis, & inactis altwntilms & ex lanccolata rigors in fciam definencibus. Facilius caitivii dillingu:uir fjiita valdc obtofi & dqardft, caulinmsqtic & jMtulis angulatis. Cauics plciunque obti m dlwgtmt a perpendiculo plamse , rarius ftanc crcfti; Jiujus>ccniudi lainui piti^ciutuni caravi olt commodiorcm in tabula foam. Scmina fumvra 8c tiitida.

TABULA CENTESIMV DECIMA SEPTIMA.

CELSIA ARCTURL'S.

Verbafcam Arc>uru». Jlmm. fyjl. pag. 170. mart* 3)9.

Verbafcum humile creticum lacuattin. Baub. pn. S40.

Verbafcum bralica folio. C.L. op. r, 9.p . S i .

Verbafcum h reftrt credcum. ift^. otar. Mf. 113.

Arcturus creticus. IdL ii/wJ ckf. I. j. CCXCI.

HOBanOlBeHo*, jJaiimm h«nc «lgantem provenirc in infola Creta inter faxa & fuper MIS, narrac. Secaodon (VilcituilsLinnxaii principia meritoCclftl, necVer- *»>fcjt fjn-Ji-v eft tln.vmi«. Kx raditc hbrnlti, ft ulbida , cauls ev[urgic fin] uloris , erc- bly, teres, fequipedals, villosus , fotofoi, initio limpliciflims, tandcimjue ex jltj fo- liorum fuperiarur riiylin. Kutz funt intqualitc ferr«o-dentata, venofa, rugoft, A: vitlofa. KanHcita S catiina infcriora ntnnwa, A' longt pctiolau ; foliolis w k{ eXtimo r>aximo-, literaiUu n minim, j>aucis, altrcni^ vd oppofids, noc mtc fe irqualfbui. Cau- 'ma rdi<juB ftint tnin'.r.*; Aii)feq»a ovato-cordk* & jmioJata; fumma corriata, tstiti, fes- "», * jjiwhrim mirtoft Ex hOTUln (ingulontm irffi» »d angulum reOtrt pednnculi ««tot tolitarii twmw, w m n, viil^fi, polUcircs, aniiuri, oppufiti vd attcrnantei.



Flores ab inferioribus faciebat mutuo in tuffo etcipiam, untie tandem in IW
vcluti rtccmui! extenditur. Klorcis inoduri & t, acrocalycem habent villosum.
Eundem corolla loigendue hysuperat, ut, ctdaca, & tubo do " * pcn^g"
limbi exortum hirutffiro. I-^m iUnenu pcrptuo qtsatuer, bath^{*} u^m itdem mulrt, pa^m
slbida, psrtim purpurea, inclinaiit dcorfum, & int infatu filii reliqui lonjjktr".
dierz did->nj cotore funt lbylo. Copula ex ov^o luhromtsda, I
bn, icuminata, & feffca, gblipuc parum in don vtivu). valvut " ltc"
totum ctpAilx acumen ttbrat. Semina minuet, n. Reliqui omni-
quadrant in Gdfae ehmQerem. Flores a Julio ad Novembrem sibi dnt. Petiolaris :11U,
Octctiri & Novembri. Ctfub mtiui

TABULA* CENTESIMA DECIMA OCTAVA-

'A TAIQ. UETRA. *Urn.fyft.* f*. 41

Planta: in hanc H[abitu] scripti in Historia Stirpium Americanarum, cuius omnibus ibidem figura-
ram hoc libro, repetita descriptione explicatum. **HabiCMI**: culta non mutari. Radili-
ci iijjnofx & rjir.t:> et trunco insitu, primo annis anno rugosus trifidans & jam quadri-
poddis, altero finiter teres & cinerascens, crassitudo digerit raro excedere milii vitis, erra-
Qus, tandem dood - campedidis, nec mire debilis fuligine se spuma, sed fructibus vicinis
ej{*t, quu* inter ertfcerc ctkm fu evit. **Perri mm** similes, prima trapezeti virtutes & vi-
fido - villofi, tai.t-m terete cineris glacie & virga; in supermo capite ramisque prima-
rii: [..mcuiati in plantae florente, quicquam pulsa plures excedunt. Folia sunt cordata,
in acumen angustata, dentato-crenata, terminali rotundata, glauco viridentia, subtus venosa nervo figur-
ante, **OCUM sijpc wnfpicao, tr**ullifimi, glauco viridentia, subtus venosa nervo figur-
ante quinque pollices longa cum petio ijl<ij tercti >d i nym seriatim breviori la caule f.
que pinnatis, reliquo minor, ex tribus; agnus color successivo ordine egredi.
Scipule p tutu (eticce tut tanc solite. Ex foliorum aliis rati fratre genere excent, aut nasi-
cus cum petuncula. Scipule autem pedunculi tenues, breves, viciis villois & axillares.
Calyx est tuberculatus, oblique quinqueangulis; lacinias lanceolatis, acuminatis & pa-
tentissimis. Corolla utcc J::: a clavaria ovata basi muscularum habent ex falco rubrum.
Anti herz fuit lutea. Germen quinquefidae stylis carnosae quinque. Capsula est ab-
longiscula cum vertice depresso & quinque-acuminate, quinquefida, glabra, tum-
idiscula, quinquedocularis, in totidemque valvulas dichilicent bilobatas & levigatis. In
qualibet locis jmemoo GMMM conrinendit circa annis tria, subrotundata, WA..... villois & ni-
gra. In insula sancti Domingi florentum vidi fructibusque gerentem Nov MMMI in cal-
dariis nostris urcc fircntc touai cflace.

TABULA CENTESIMA DECIMA CIMA NONA

CYTISUS PSEUDOCAJAN.

An variants Cyrii Cajan. *Louv. fil.* pag. 489?
Vila - - ' • " —

In ObfrnwiMiuffl Bofukarttm ptrc *pircn** egi de Cyclo illo, cuius Snamettis, f
rtn atque Brunetus evanescem fecerunt, qui colitur pallidum in America «M
trida infi-
li», & quem Linnaeus cum Cyclo Cajus, Indie Orenseis plantis, eundem habuit. Ex
Tranquillaria accepi fennit, sub rculo pectorum Tranquillarium, coloris rufi, hinc di
• • t: cyclo illo Caribico, cupus fennit cinerascens simpliciter est cum prouis adspicis
put-

poafHs fcrntgmeis, St cum macuia feinper nifricante fob hi Jo. Eodem tcinporc ex di&is infults etkfIU hxc (chima milii mittdwuar, sliundc mijii nutilfima, & quorum niagtw adluicdtim copia mihi supereft, qux ipfe attuli, nunc ctF^ca. Utrius-que fpecifici ieinina phlrinu in caldarii eodcin loco terrx mandavi, qux genninarunt omnia feliciflrae, Brevi ad aliquant altiudiiK-tn pvcetlu? fVuciccs, nulJo poterarn tnoio diftinguere ; erant enim limillimi. Sod tUOC Trjuquebarici omnes Ixtius increfcere ceeperrunt, feptimo jam menfc hanunun iktradaieni udepti, honlius oumerofis onufti, & ante ingruentem hyemem IVicti!)us maiuris. Noii ultra aogebaiuur Caribii, nee tiorebaui; & proximi anni reflate pericrunt onmes. Truntjiiebareniibus cunc denuo cojia florom fruQnumque fuit. Ideni nucidit in hono Carfarco Sd»finbroan«(i, quocum (etaifla utraque commujiicaveram. Ncc itaque pocui vivum fwrcntem ucrumque compiirarc. Apud Sloancum dickur Caribxus priino anno noil Aorerc, Tr<ttquel>ancus auccm floruit. Qui florentem utrarnque plantatn v id ere pourU, cerriitt judicabit. Interea Tr*n(Jucbaren(i) icooea exhibco; cum *Ggan vorilli*, zi *ycis, alz,* uwtnae, (hmuaum, piftlli, femina, & froQni. Oeſcription DC fuperfedeo nia;^is ampla, qwuni nit offcrat diverfum.

TABULA CENTESIMA VIGESIMA.

EUONYMUS AT*ROPURPURIFUS,

Ex fcptentrinali America tliM hsec irbu&uia, iltuadnis hmmme, (bb dto lite vijet, J«Uo menfc 60 res ^{r.} pin codia res jun aenos, fruduin vero nul-luni. Corvex tuini; & raititiuim H-murum eft QDCTGUS, ^{equalis, nec tu} berenfanu, Ratti Tunt terotes, giabri, & foli^ it) extremitatibus *cocapnfB*. Folk Cunt ^{c. oblong 1} Ian-ccobta, in ftcumen attenuate, ntriaque glabrt, dorfo vctiofn , oppofita, tcnuitfiine fer-ruata cum m^riic purpono, pedMis ionixa *urtaba\$t* psrpontt. Pcdunculi com-^{munes} tenwi, natal, biflori aut quidriflori; proprt rubentes. Ftores omnes Temper iunt tetrandi. Pctnla quoat ^{or subr} tCaodtA atropurpuraca. Calycis ferine concoloris laiix fubrotundx. Qermen ciam eft COIK ^{tar.} Styli vi cat. Anthers ftavent.

TABULA CENTESIMA VIGESIMA PRIMA.

P DEROTA BONARO'i A. / in. fij. pag. j 9 .

Boniroca ch ^{achydrifolis.} Scop. cur. 1 pag. 23. oar. f.

Uujitrou mutitana, lalica. chamedryos folio; spica laica. Mich. gat, pag. (9.

Ex Idri* nipifut*. avtilft in Hortum tr ^{immigravit} na cum [•]lii Carni ⁱⁱx rarifimis plan-^{in opera vir} 1 enulm, Balihzsarts Hacqucc, Identic naturalis cultoris egregir. To-u Uiod<r> eft. Sapor radkis fHbadftritiRens, paucus & ingratus; caulium T'oliorumque vix ului. ¹adex fibroa albida & perennis multoi craink ctulej, fpithamam vd pedein ad fumroium aftos, rereaa, ^{villoso} impfkUffifMH, crcttos & debiJcs. Foiis ve-fti ^{im} alterm),, ^{im} twilum icrni>, «lque in eadem pianta; infimis ^m naitqawn alternamtbm, nque his fenper ratione reiiquorum breviimis. C*tc-rutn latKc-jUi ftint *ut ovata, aciua, argute fcrta, kfifine villoft, brcviter petiolata tut ^{subfelliia.} Racmu^ denfu* & nutans caulem terminal , polliccm unum altcnimve longus. Flores • re vi slime peduncillatoi Impul^, bra^ca linear is ealycc paulo longior fuf-fu K PmtnUiii pcrliftwtw fdiola ejnmqnc Imcaria modo inter ft longitudine conv-^{it, motlo dtlfcrunt, port} ^{ft} ^{ft} ^{Ijplundi} coooiveodi, mida patul ^{P 1} Pcfalum f»].

ftumque ; labio fuperiore integernmo & lauoh; int'ertun iVmmitridu; I^inirt Imceoatis, planis & longitudine acqualibus. Futido corollx ad lams VbH fuperions hlaniencuiii OH» que unicum innafcitur, pc<lo brevius, album , & atuiieflint gcfstan* ohlongwn fl><<nq Ex germe ovato ftytus egreduur riljforus, coroUam exfuperu)*, j>cii>item, St tc rtrminacus ubtufo fufcoque. C*pfala ovata, acuu, crifC— *il fupenn*, oiiuc ris, longitudiruli utrinque fuko ex*r*t, t'tikt, contmci fentku plort roft « In ipfo auem illo fulco inanimate contrada ictilic in binas ttthrohl ap*<< bilidas p<'u que, fzpc tocidem iluluidu cai>fuk> •BCndOMW. Floret M*jo & Jw

TABULA CENTESIMA V1GESIMA SECUNDA.

ttTULA PUMILA. Low. fyfi. ptg. 6ii, ir-aii. It4.

ArbuftuU qua fob dio apud not crefcic, flo<re incipit fii*i 1<<m ApnM 1 OSobri ten teudw. inuarui. A Bctula nanmis propier ranios viilo brevi 3t CMICCTCO denittfim? turn ob fiJh < quun Uca, quorum in tuna kowdo txedic ut plurimtam loogiiudinct. wl ^ Corm aigriCK. Fulia uiwcrfc ovau obt nife/tc pub<L-unt, dilute virent cum lerruu- catnetlju1 t'olturuui Mimi pnr -^rediamur umiat, valde CWK***. iindrtctt & dual trtiit tineas longi. Squamat fo extretiiitattbu\$ l<iti> ic ciliatri, pifCfHo, & [.

tim circomfident. Ante fin itnw <cunc 1 tl* kwi^ nmii, <pke biturcatu biun genmih mtimn Ut<, cuinprcfli* flave tlynw jaam, ama ap<w lewc afw, preier ltju<Mi diflhtt ftitnina^q¹¹⁶ tegae in f valai, <t mijue •mentutn iml^ulnum << Ctrpmo* p<oa<*- u bttin fqotmx paucz fusfx kflblctet. JuS farmtnci fani JIH id r<fn<lof<m *'*. cn^jjentimn tw mmafc foteot, fclturii, ere^h, 4eo>i, l'obo*ni am fe virct<o, I ptodoacvMi, nwfcorn pauiw t nuntur e> ^ certo ortline n apw< atx prmia* trii, •rbkaUrtt, cu*nprC>-pk<> Cq<amftU ipf< kaud <t<feo n <nie retiqot <ittobm, fobuJati*, */\>s, fin. 1 fitcnubo*. Jtfam manirut << proxnMin uvtjye * t<<cm tn wrliulcuU perfit , &'''! , terts , rqwtulirtLiii tobo mediu prorabertme in rqw>ri tt vdtiri es*'P* iu-. Semtna futvt li((uran) mtneot gertnn ter nvnigmii m <(Oobl>ct tu de tuque difrcptt 1 <jct>erc Bciul* 1 Liooxo dato. FntOoi ow>w^u> • (^t>k mala & femen atl

TABULA CENTESIMA VIGESDIA TERTI V

RIBES CYNOSOATI. La*. #*, w. i|4

Fnet; bsmfltt akkudinii< bete coaftMfw, fob d*i* crefcfa, ex Ctaadi am gUbri ft ex fuLu nqjnc<we> tnuorooiur iafn rirnnlw— OHfmm tnk *•». paterae, ftrfcfa, ngido, rcdt * pc>t<Ke. Folia fere fuis, ut in Ri. »» ^ ^ f'd minor* ft petioin buiutoribwi, Pedum.uii tw>u< tutnqw pila alperi autent, uacum tMn ttiteranivc losgi gaunt flsni BW, qtwiuor, cuam tiUKiun. M"

JWoprl fcmipollcares brevem ad balin ftipulam habent, Calycis pallide virenris tubulis ft-
(Btovwai inflatus & ainplus in ladnias qutnquc *delink* ubJongas, obrufas, fere duplo brc-
Wores, turn ntargine purpureo virefecentes, pamwiifiinas, taniicmqe plane reflexas, Pe-
tala quinque pJana, lubrurunda, |wni & Candida crigititur, tnfera marjjini tubi calyci-
nt, Fihincenta albs antheras t'crune fulphureas. Stylus fubulatus, craflus, longicudine
corolli, ac (tmplrx terminattir ftignute capitato & bifidw. Germen hifpidum transfit in
baccam ten neric aculeatam, extcrum limilemliibc* groUularix. Florere incipit fub fincm
Apnfis, & bacc* Julio *maturescunt*.

TABULA CENTKSIMA VIGESIMA QUARTA.

DOLICHOS SENGHLLMSIS.

Radix iibrofi in csldario caulem producit foliurium, perenntem, tertiu[n] nunc *agen-*
tein xiotti annum pollicis crafficic, teretem, *pīs* carcentem quiricm, fed (uti r -ta
<juuquc [lajita]) «i taclimi alpcriculum, volubiicm, slnlfimc feudentem, lentinii, DIJ-
feure virentem, rantus emmeniem plurimot, pierosque iiveme marcefccntM. Foliafun[t]
ex fubrottindo ovata, ilciinentia in acumen breve fettila terminaturn; lateralium lobo tn-
ttrion atifjuftioic Caulina dupla imjorft fum, *t»am* icli.crcencia depit>o ranmlo. Petio-
li, dorft> ierctes, anckc fuJeo iaftrSmacor. Sttpuis tjd pcdoLM funt laiKCoUtsc, intc-
grx dtacots; at fulijla oblongx vd lincares. Fedunculi ratcniofi, quotum vcl plures
uncijs liniffJ, & tcrct», locanc nd intervalji fiores breviifimc ptodaeokCM & *aggregatos*
nunicru incerta haud rnultus, Ieviter odoratos, totos, excepto pallentc cum riron *culy-*
ce, nivcos. BraQ x dui oblun^a Sr concave adftant ctlyci campanuhto, cuius lacinia
iiilima longitr eft. Calli in vexillo adtnudum eminent, & producuntur, interqtic hos ar-
Qc comj>rclenduntur alz & carina, Legumcn ubjun^um, acuniinatum, comprefTum,
• primu viide; ad mattiritatem duui properat, palleits, & futuratn hubens utramq^c, *p-nt-*
cipuc interiorcm, enfpatam & time fcabram; nmurum volumine mulco minus cum mar.
gimbus i>pc undulacif & futurarum crifpatione magis obfulew. Scmim funt pauca, ro-
tundato-oblunga, compreifr, fusca cum paucis punclis fat u ratio rib us, hilo donata protn-
bernmec lungo & nivco, Primu a fstione nu jim duodecimpedalis non floruit; fubfe-
quis a Junio ad Sepicmbnm, & femina matura dedi[*Au^ilo*. Bengalnfem appellavi,
quia Tub tiitlo *Gatt* de Bengalees Inijjs tninsmilTa femitu illuirillimu* Lemuimier me-
cum communicavti cum alia plunbus icmiaibu* *Indicas*.

Inter hie erant etiam, quibus inferftbarur tkubs Dolichi Ltbtb, qut Antake in
Moda^afcaria vac<nr. Sjta germinarum in cal^ario, & plantam produixerunt adco p-
cedenu timilieni, eiiain p*renn>ntem, ut diflin^ui ib invicem nullo potucrint modo. Se-
mina ame'fationem, ft qua: pknix Cercbant nova, confanter diverfa dicerimen abfuive-
tunt. Huncittquc nolkhum, qucm specie diverfum • Bentralcnfi arbitror, (nam cur
ftminis conftins diverts non effet jttjue mtgni momenti in diftisguendis fpectebus, q'tam
•Jiut cuiuicunqtc panis?) nominarc polTcmu* Madapfcar'Ci''''; qui femint habet ovata,
vix compreOi, ferru^nM, hilo albo fiinili inftru2». Hoju* specimen una cum lefcumi-
nt mattiro & itwturiati proximo liftimr depiaum ad \mm. lu tkero la<re fermen eft
Huljctu Leogilenlit.

❖ ❖ ❖

TABULA CENTESIMA VIGESIMA GHJINTA.

PLANTAGO ALPINA. *Urn. >\<i. p*g. I>i.*

Planwo foliis linearibus, pUni, spica cylindrica*. Hi.: . . . n u m . 6 f T -
lluluttum iirfiuti nigncais. *Bank. pat. jyo.*

Decim percantis, iongg, ubi hi, »lbic«m, in kane prinw annt, poft<< evadens **a***
XV iior, etiam atokkeps, folia prout plurima, enifolia vel linear*, •cow, intc-
gerrima vel raris dericulis ovaia, plana, dorso nervosa, niti >, jjUt>erritum
quc imprimis in iMrginc, l'erln;>oblu vel pauto oluura. *Scap. terctd & v* Co^ A Vst*
pjts toti • attinuntur inognitis abiliqys. Spi. florcos ovaia & femipolucan* < " *
iMgis o;;iongs & . . oducra, ctiam, dum de r»fice exit, jam erigitur. CaKC» P^r ofun-
dilfime qtudripjrtiti tbiola fant iJMBbrMfect Jt inagine tufca. Brtfle* cx>n<^a, ^
in medio virens, laterib* membranacm ic nigr. *canthab.* nil in proceffum |jng^{um}
ceulatum & virentem, Corolle: JUS cum wore pallet, Wain vero « » » " » gT*
Syls eft valde hirfutuj. Amierx flvent. Floret Junto iv feqiienubus*, ^?ic* e
depinguit fructibus & »utb, Cum brides, turn ii> ^ilv« dempto,

TABULA CENT] SIMA VIGESIMA SIX PA.

PLANTAGO LOBLINGIL. *Linn. J. pag. 123. ff. pl. pag. 166. la.
B. pag. 176.*

Primo vere fab dia fan, floret Junio & Julio, hoc quippe de Augufto fcmin* perficit,
& Septembri jam radice annua perit, ut vel hoc s' nota a precedente, al-
unu cum ria dñngui posit. **btc fo** I i
pina iltisque ndicc ptrenni don. **I** folia sunt plurima, semipedata, li-
nearia, a.mi Htata, pulttrmu <
naria, a.mi Htata, pulttrmu <
niia. Sc>pi ierctc, < nies, subpubescens cl ^ilirt, lu
rum, & fpctam ft] tunc temper cretam, floritum tubovagum, fructefcentem oblongum
& inquam. Brjttaa concn, gl^lr*, ouufa, it -fajuc prot
excursit mem'iranacca piiitda. ! scanie cocte paleae sur fuscum. Filamenta
brevit pttalmn vis feperant unde in spica floribus, cuiusmodi fute depilat dax adores,
ant Kent *a ippartot. Tres ali s. m <lcflor>tf unt, ulnm metu fructum gotu
maiurum. Fwrolh'lm c> villolas & parvilo longer, **Stnm** folia nitent, oblonga,
hhc convex*i sine longitudinibz cunc tvi, cumentum & foliaria in capite bila-
coUrn qtiolibet tocakmei -. Diflepknecatum ex Itnejpl*
bet um maduor cum hucrat in Ipfab BMOMi, devtd<tquc > sine faciliore de capilla dif-
capulam ocularem relinquit.

i Mill \ (i MI S|M\ \I,(IA!|1\ SI i¹ LIMA,
PHLOX MACULATA. *t. 10. J. pag. 133.*

Rultx percentii embi prodack piurtt, secupipofiles, teretes, simplices, fabriolu-
lot, ere^o-. **U** 8t pwrf*uf<< p<r fctnip*U*(elegante, qui compontmr ex pedaocul*c* auxiliaribus multiformi. Folia rotan-
calem or mm td fiumi Mm uiqec, >nt: lvs lanceolata, in acumen fuscum attenuata,
margin glales, margin scalariulus - tellus, ulscendendo longitudine decrescens.
fumma < rKmo tlterm, itittju* »mflu Oppg&a, **F1<rtT** suaveolentes calycem habent
per-

pentapbi li-nn , vix angularam , glabrum, fuperne purpurafcentem , pctalo doplo brevio-
rcm; fuliuJis ex linear! labceoiaaCi Bends, erciris, in nibum confliveBdbas, ad oias mcin-
br—ceil, uno akerovc pan fatefdoaa fubcoalitts. Corollas limbus «x purpureo eleganct
rubet; tubus eft violaccus. Filamenta brevifima id diverfam altitudutem inferumur tu-
do corolla:, duo ad onuin limbi, paitlo infra hxc terrium, bina reliqua in tubi medictate.

TABULA CENTESIMA VIGESIMA OCTAVA.

CAUCALIS LATI POLIA. *iJtm. 0. peg. to**.

Caucalis involucris Ainvdncellis pcntaphyJlis foliis pimiiuv. *Gerard.prw.pqg. i 37.*

Caucalis arveniis ediinata l:Hj:olia. *Garid. f>o. t. 13. Bun/, pin, lfS<*

Lappnla canaria laiilulia, live caocalis. &ttb. /vj?. 3. fmrt, a. ^a?. go.

Scmina primo vcre fata, am fn!) aatamsi fincin, jjerminant tandem proximo vcre fub
dio; in lybernacuio antem repulica, euam medii hyemc. Floret a Majo ad JuTum,
qnandu pofl feminum inaturJtiunti peril tuta. Radix iiaque annua, alba & tibrofa cau-
1cm cmiitic fulitarium, crccium , teretem, llabium, uti reJjquc p^rtes plants, in ramu-
lws patubs divifum, in cultis bipedaJem, fylvchecii etiain femipettncem, & lie valdc va-
riantem. Rami ultimi, pedunculi St radii funt an^ulato-ftriati. Rrmi & truncis difcifi
interdum fundunt fuccum dilute laSeft-'ctucm, faporis amaritantis fubacris & vslde ingrat. Folia pioottfl ex bad aniplexicsuli Jt bterbat membrttucea abeunt in coftjm fubtrriingu-
Itrem. Komi (ootoblongx, profunde&rrstz, quanduqet jiinnatitide incilir, obtufx,
uppolitx, utnnquc quatuur vd qutiqtic tmn tenninaate iaipare. Haium infinit ftjtim
fujira vHginiiai C coftd exeunt, imgii remoot a proximis. Superiorutn ptginx *d vicinas
ijxqtc pitinas per coll am decurnifll. Invuluci foliola Tunt lanccoljta, aciininata , ailmol-
liurn concavs, periiltentia , marline a>£>J membranaceo ajbjcante; fub umbella univer-
It fequentk numerum rtdioruiD, *yb particuJari numerum riorum exteriorum. Radii au-
CCn aODerO VrlilJK, in culm piaua a duo!us ad fenos. Nec major cfl conflantia in Bo-
fculis exterioribus, quos a quatuor numeravi ad dec em. Qtie vero fubeo fpecimina (ic-
ca fylveftria ex Gifloprovinc, in caderti ombdla t:niios offorui ternos plerutnque, par-
cius quaterno*. Atqec itJ compardJiim crat etin plonds illi-, qix de ferninibus cafu ab-
is circa hottl murus in ruderatis fpontc provenerunt. Et iliac ft bat florcs in imbitu
Umbellulj; fercant quino< tit phtrinitim. Sylvdhil ex ruderatis iioffc'is plmta depi£h (i-
ftitur. Flofcuii periptwric fane teniles 9c cumpleti. Centrales, qui pauci adfunt, inter-
dom nulii, abortunt omncs, Dtpoce gennine deditnti. Corolla ntroquc alba eft (implki-
ter, out cum nultia rultedinc fiuTufa. Peula funt fere fuhrotundi, propter apicem valde
incurvatum antrordim cordi/brmk. So him vtipitar corolla rum exurioran petal um e\ti-
mam, quod, rciquis muko nmjm, planum eft, fcmiblobum cuin lobis rotunclatis. Pe-
rianilium proprium crt tdsnodofli confpicuom. Antherx pnllent. Germen ferulibus eft
mixinium, OVKom, tomppreffum, Tukatum , undique liifpidum fetis purpureis. Styli
gemini, ex Venice (jermlnis femibitido producr, patent. Stigmata funt fimplicia &r ol)-
ngo ovata, feni^ fulcis exarata, fetisque rigidis hifpida, fufcefunt.
FruQus integer in nnturuli tnagnitudinc, 5: flos cemralis Ienic auaus (iftuntur adfatus.

TABULA CENTESIMA VIGESIMA NONA.

ftgSSLI MI LTICAULB.

K percnnisfnb dio fata prim,) anno foil produxit folia radicalia, fubfequis caulem,
flom Au^ruit, femtna ttmuri Sepiembri A Oftobri. Atbida in plure* ramos difpc
calamum craffirt, iiiodorw, ffpore «cri & d»uu quiddtm habcote, • relit** lo-

liorutn nervis parum capiilaca. Ad exortum cauli* priou(jis, « abs etiaro mtiinoruin
rum, mat live caulcs lacrales cgredimmir, Raroi caulin paicnt, ui fubdichoimi M-
deantur. Sumaoem, mi i pfe caulis, lerctes, Itriati, vindw, medulla alto Urtti, a
egressum fifti»rnm in acutum raargmem elevaii. FolU ex p^{ctio!}« meinbr»na»o & ""P^e
xcaul i cnafcuntur, r^dicalia & interiors icr pinnata, fu!)fcqoa mmu* djvtU, fumma ierii>
ta. Coib eft «r», ftriata & an*ice fulcta*. Foliola fi tut fabfowam, K « i Plan*! Vi-
ren ia, trita fubodorata, m foli» fuperionbus focceiivc, tandem aliquoti« longior*.
feriorum foliorum, in quibr Jterajet ad eSTtr^m tugemur fulioLis p-
cumfcriptio aut fubovαιa cf>, atit foJin*affiliat*ra lecrefentib* m^{grt} oblonga.
Lcix univerfaici cunvexse, Aomni m*valvula* frpe defitare, *d pioci^o il!« ***ru: **
fomper erigumur, cwnpofitK « rtdiis ab ot>o ad ^ .gimi. UniUUot* j*rtkularc5 betnti-
ph*ri*c, valde denfx, & ptr^x, invduci o »au<Jetu polphyllOt 4 flofcolot g*1^1*
tiles omnes, albos, petals donatos xquat *lbers*, Mk , acuroiwi*, cum ip** w*
vix tamen cordatis. Anthent pailent. Geroiinum tpcx poft petalorum lapfum
ftyiii purpurtefir. FruQus I* MN St parvu* ptU*le folces*-i^ bipudbttl in feir
plana, Utinc htodprofande quadifukau cu^t angul q:e dtttwlt*. Tota pi
berrimi tft , bipedalb am p><lo tltrmr. Tabula reprxfentaf towtn caakm p
can raini* futs, cumque r*d:cc & fuUo unico radiCili, in tra prtes
ad btut in nativa magnitudine i *adios curu bvolae* parti la & fomen utriusque confe-
p*chum*; microfcopto auteni tv*thus flos*, mm fctiicu . *quidamque facies transverfa*. Am-
cillatus Sp*MBAos* i *temina* mifile.

TABULA CI N I I.MMA TRIGESIMA,

ANGELICA VERTICULARK. Urn. mart. fag. 117. 5*1.
Angelica tlpina ad nod« ttortda. 7^oMm o\$. |lf«

pltnti elegtot, to» gUbra, • quifTqw aJ fcptm pedet aUt, ft odore tl
1 fylveftri* pntdiu, ex ftminc fub dW frta, prwo anno g«wa«T», fed t<»»
flor* JoJo, portque per»aaiti Augofto frvQ&xuontm p« Se|»»*« ^
perik to«, ntt: ultt perenavit. Radet ratnefa, i%uum vsl paKoitn Crtfi
(fn Ircularibus roe, r i^uft. pailiAi, pedon longa, fUIt etiitm d^nait te»
scilla lac niveum fundie, • Mre gamlct in pi*incipio* ioyrtM oc< torti, foil port
ten allum fav a<l ft ptmgemie. Caulrt wre, *qualis*, inan, rora glim. -
Sot, dMntetri uncub vei icnuior, crtgor. Foltt ftd>c<lii Tum an
vel loogbn, circumfcnjoot triMgiiUru; cu(U i)us fibro fit ft &r€b, e
pis ft (Iria) «rta, ncc fuk»«, kunU>m co<Hi idenortbtM bipttMtK, fc
in djvribfie deertfccnubtn. I uiuuU (tint ovta, wmi, (erratt, cut
que recrurium deruif. faae nmdu .V faiunic viimttj, Uwftt biloba trilobate, ab una
ad quicuo uocis loci;*, fcfRU* omitta exctpto trrviiKdt pctjahto. Culis extremis de-
finit in ttmbcltm* infri qtiam ad aiicjuatn diftantum a ttrr qtttnquc runi nodi ..»
to m.n! »j, t_{ve} pntaacnl vmkUwia ntormncsr, ft ipA ptopfit o»
rti. Infra hoa todttti acrom Md* aJa prodcaM similn ; id^itc ua bk MV vel
etian conitnpt. Tandem cgrediumur e* twlior-mn c»»d*oor»ni al» oppuTtti rami,
hat titrmatec iU, MMMI <,aw,0, wtkiUatim r<n»S ipg. Don to ua*dU»
n*» mule merefenm, rnnc ad IMJO cantndem anm adbvc *kcrv« pedwocoJo*
«lunKHUR ombeUAr. w fie pctorw proliAr* did Mttmar. Ex proles aliqua
primaria fant, ipf* «t<n Au« ai>C<aa iimhaflilw pcofew s. Me minus foliols ra-
mies tandem> n «XIUH umbdktn tdditni. Atqoc INK qmdtm oawua in «Mfavtdo» majori-
Ntt JUCM htiMu . liiiMaMiiiiM ft tfiaatCM <*»»» «—^ aji I^Minn to zibula
dum-

taxat ramus intimus proponitur. Retro dclincacum est folii radicalis pars aliquan, non colorati, ut evicarcur confutio. Adfumr infupcr fcinen utrinque confpcftuin in volunii-
ne nativo, ejusdem ad duplum au&i transverfa diflc&io, & flos mifhis ajiuocics. Um-
bellz umverfaics ant nurix func, aut fubjc&um habent folioluni unum alcerumve lanceoln-
tum, idque **iOMgeritnaa** aut ferrutum; cxterum plans:, inrqualcs, nee denfje. Par-
tialibus umbellis, ccam plank, pro involucro est folioluni fetaccuin unicunt, fepe ddi-
cratum. Radii exteriores multo longiores funt iiiictioribus. Pctala cum flavedine vi-
reiitia, parva & imcgni apkon inflciunt sntrorftim; vix tamen cordata. Anther* flavc-
fcunt, Umbella: iatrcals ruerunt plurcs, qua nulla vd pcpauca femina tulcrunt. Scd in aliis etiam fioribui frn&gerts, rite expands, gennen nuJlum decegere potui, & vix
etiam ftylos; quum iliud detnum, corolla ftatinibisque deciduis, mole aufsum, hi elon-
gati, iu confpc&um prodilmnt. Fruftus comprefcio-planus dcliifcit in duo femina ex ob-
lungo orbiculata, btui cinargLrinta; quorum nuclei Jiinc plani, inde tantiQjcr elevaci fufci
DC tribus poruin cvrnntibus & pailidiuribut notati, cXcurrunt in margincm membran-
naccuin amplum tcnocm & riefctntem; fapore praditi & odore planti. Fruclus etiam
obfervaittur non **raro** triquetri^ feminibus conilaiites ccrnis. Umbdla in kuStapaculaeft.

TABULA CENTESIMA TRIGESIMA PRIMA.

PIMPIVELLA PEREGRINA. *Um. hji. pag. ity.*

Pimpineua **iWiftfBil** ante florfecmiam cernuis. *Gtr. prm. fag. 3 \$6.*

Seloutti peregriaan primaia. *Guf. htfi. CXCJX.*

Apium pemjrinmn, fofis fubrotundis. *Baub-fun. I J 3 .*

Daacm tctrtius Diofcotidis. *Col. a-pbr, 1. /xig. icg. t. 109.*

Radix nlbida, longa, fibris aiifla, *Si* faporis tccritni, qiam in fylvcftri ftirpe unnuam
djnifiimis Gerardns dicit, in Jiorto nortro conftantcr ola folia radicalia primo anno
prufcrr, humi ffraca, & numerofa; primo prodcuntia fimplicia, proxima ternau, fubfe-
qua alia pinnata ex dunbus plerumqite vel tribus paribus cum termintntc impari. Foliola
func fubrocunda, crenata, btfi cordata, obiufa, glabra vel leviter pubefcentia, brevitcr-
que petiotati. Cflilis iolitarius altcro inno exfurgh bipedalis, tern, tcnuiter ftrintus,
lubviSlofus, fuperne ramofus, foliis ornatus paucis inferioribus radicalium magis minus-
Vc fimililnis, ruperioribus tn (acinia^ lanceolatas & acuminatas varie divifis. Uinbcrr pU-
nx ante rlorerciniam quam maxime nutant, floreotes dcniuin eriguntur. Umbcliuui funt
convex*. Cdrem anhir involucro. Radii ftim tenucs. Flofculi ontnes /miles, & fer-
tne xqualcs funt, **dam mtaucMB** peiala «tim* pauxJlo fnt jnajoro, Pcwla alba dorfo-
quc Jurluu ajuccm **gtraot** i»tic\um , hinc cord»». Fiiamenti * rtyli albent. Antherx
patient. Germcn est fubrotundum * hirfutum. **FmQm** extguus & ex ovato fubrotundum
SrtVMtar ftylis paientiis, in bint separabilw femma fufca, hinc plana, illinc gibba,
ftriota fftifque numerotl- **ptUkfil** liifptda; inodort, & fiporem in principio vix hibentia ul-
lum, brcvi amem scernma inque faubiis fenfttm ardor^ non mediocrem excitantia. Flo-
r« Jufio. **Snaim ptridl** AtiKoftw. In Italia, Hifpanw&Galloprovincia fponte crefcit.
Siftuntr in tabula planti florifera intcurt, in qua folia radicalia folent dceffe; hinc critm
•d laiu<, plants primi anni. Turn fruc>us naturali>, idemque au&us multoties. Sic etitm
•Wfruv Hus & Dj(hlUi"s.

TABULA CENTESIMA TRIGESIMA SECUND,

ANETHUM SEGETL^{M.} Linn. mm. n. 9.

Anethum fvh cfrc minus. Bau. p. 147. prair. 76.

Fxniculum luiitanicum minus anmjum, ancihi odore. T 11m. t. 312.

Tota planta għberrima eft, odor prejda 1 Afepore anethi grteotcnt; Ex radice tenui, fibrola, albida Sc annua caufi* dsvttur spittumrus vdret, petalis, linearis crassis, cretins, rer*, ftriatu, ft ram : I bis lassaribus, acutis, & d scapo pectoli communis b*ii mcmbranae; puntae planiscula & rara constricta bellu-fub umbellw cweċ omni. Umbell* univen flos centralis masculus abortus, tut jam antea plicata & per se in flore sunt luxuriantes. Petti* pto lo plementum. **p***nfiortem difciūl orbku Urem concavum c(fici)m, quod »!m qubi»!n P* feris etiam cil filicase; postea ohong & parentia urn aptae imrorfum fito. P* ex oblonga ovali aggre difi lit in bita feminina. Huc euidem s:urx, Kifte time" I illin-convexa & tris tribus. riuq q'auktor, etiam foliis duabus notatis, margine cinguntur menibrinae exiguo ac 1 re vix observando, fulica sum, & super t gautciw acrius, in quo quoddam de aniso animadversere mihi sum visus; altero taaaat ut plurimum tñifi re. floret Julio sub diu, feminis dñi Augusti. Fruitus n. > m atq* idem a*au* integer cum liuifiyne tnosvee, itidemque salvi flos, exhibentur in margini.

TABLA (C) LKSIMA TRIGESIMA DECIMA.

SIUM SICULUM. Linn. f. Kf*g. it i.

Myrrhis foliis paſinace hæc virginalis. Mm. ^{ff}, 22.

Ducus, paſinace folio, fculw. 2< M. rjr. ^ i 71. tab. 128.

Tota planta nuda eft. Radix alba, sequipollens diametro aequa, sapori parum exsiccatrice praedita, odoris vix ullius, in ramos devitatur in terram descendentes plantæ teretes, calamus digrammique crassis; inde multiceps tales ctenⁿ pulchri per rotan exstentia emitit, teretes, non itunc*, seminiforme striatus, sequipedale, aut¹ ik*)ft* 1 viridi, flexuosa aut²; dia valde rugosa, non v. eadtm ptania, titrate forrji, petiolata & crassifolia. Radicalia sunt simplicissima & ovata; tunc irnuta; aut plantæ; aut denum triplantes. Se etiam, simplicissimum si exceptum, sic habent folia carina, in quibus superius pinnae sunt lanceolatae, ac maxima Jncifz. Pcciofi fiim ba! membranacei & implexantes. Umbella r. ft plane, ex radice circiter decem confertur, ante florulentum nascitur, postea eriguntur. Universitas involucrum supponitur ex foliis circiter ultimis, linearibus, inarginatis, patensim, virtutibus, & umbella dupla brevioribus, involucrum partiale simile est, sed etiam longius. Flores omnes feriles pesca habent, non inflexa, vix cordata, anæ dpi latitudinem fere tota involuta. Aochc sunt late. Germen oblongum, teres ft frutum virtut. Scyli brevis flavescens. Fru. linn tm̄maturai eo obtusum, teres, obsolete fulcatus, perim prope incurvatus, triquetus, quod in r. ft plane, ex radice. Scilicet quod in horro florianensi se obseruit, quod in r. ft plane, ex radice, sequitur Montanus jam adnotatus, ferme idem consigit in horro nostro; dum um i*r decent anoo* Uwkm W> i*o" 1 ** pwenm-t, flor<t()< integrum efficiunt ad autumnum usque primum gelu, tamen tristis nmb > uilwn ad jefetionem perdixit, nimis tempestive marcescunt.

TABULA CENTKSIMA TRIGESIMA QUARTA.

SISON SEGETUAL *Una. fyft. pog. sis. Huds. etngl pag. 104. Gerarl prw. 14K.*

[^]miii fetus pJonatfe, umbeUis cernui*. *Hill. b'fi. bclv. num. 780.*

Sium tereftrc, uinbellis raiioribus. *Marts. hijL 3.p. 283. j-, 9. r. j. f. 6.*

Cponte crfcit in Anglic arvis & ad fcpc folo humtdo ant lutofo, interqtic fegetes, tuin ij etiam in GaHoprovinda, utrobtqae Hudfonu &Gerardo afTerentibus biennis, in hor- to outem nuftro temper amua pianta, primo vcre dum feritnr fub dio, florens Auguflo & femina iercns matura Ociybri. Morifunus annuam dicic, fubjungens, *blia per totam lyemem vigere. Tota plants gfaberriroa eft. Radix albid*. rofifonnis, femipcdalis, au- librillis plurimis, (apyrcm btbet aliquem odcremquc npii graveolcntis, ficuti tota plants. *Fo**** radicalia a-qtic ac caulinia (tint pinnata; cufta terete, dorfo ftriata, antic canaliculaw, in longioribas foliis fcmipedali, inf'erne nuda, fuperne inftru*a*i pinnularum oppofitarum paribus a quinque ad duodceim cum itnpari terminance, fummts grndatim minodbas, extimis farpc conHuenticbus. Pinnae funt ovatx, argute & cuin breviiSmb ariftis ferrati, femipollares vcl paulo longtores, bail plerumqie incifura profundiore oppendi- cnlatz; in rM&aUlol primo prodetintibus rotundiures inimisqueferrJtT, Caolcs CK ca- dem radice enafcuntur plures, ccmralis crcttus & tripeiblis, extint frcc horizontaliter protend & parum adfeendentes, pntcnufTimi cum ramis virgsto tenuibw *divarica* dfffifnsft terrain verlus itcrum im.lin tii, foMumMi Oguftioribuj emdanque intefci-riinis fimpli- cibai & *•*, n rem, tenuif/imc ftritdancer (centcs, nullaque me EuOl alba re- pkii. UnbeBfl in plania ramyli iim.i numerofx caoOtt ex rudiis ut plunrmtm ternis, rarius binis vcl qvtterais, loogkudine valde ina-qualibtti, fufFultis iavo(ocro triphylllo angusto acuto & COOCIVO, Foliota (imifia, at quina vet quaterna, conffttuunt invotucrum Je. L'inbetula: rtures CtrndoeiK (juiny, vel pauciures, crcttos, radiis inlidentes val- tie etiam inxqualibus. FetaJa funt IJII fiuic ovaa cum apicibus incurvatis, alba vel pur- puraLcmia. Germefl ovatum comprcmini ft Ibiatnm glancefeit, in fructum increfcens verticcin atlipifritur purpureum. Ajitiierju purpuraluit. Sivli funt hreves. Omnes flo- res ferules. Fructus rotundjto- fubovertui ft comprelTus in femina dchifcet fufca, levitcr tntrorfum mcurvata, nullo nurgine aulU, liinc plana cum duabus ftriis mediocritcr elevatis, illinc convex[^] cum Itti[^] devttii ngvem, quirum quinque atternx magi* protuberant\ fnpore prxdita «ppi cum aliquii acredine. T^btln tsfaibet piantam juvenem modo caulefcencem, ut Joiu inferiors confptci poftiat, in florue plerumque Jam emtrcida & dcperdita. Tun rntmini aliquem princijwlcm fiorentem. Florem auctmii. Semen in nattirtli vuluminc, ejusdemque aucti & iromverfim dilviifi partem lutcnorem auticc ij>c- *taam.*

TABULA CE^NTESIMA TRIGESIMA QUINTA.

SPILANTHES OLERACEA. *linn. 511. pig. 534.*

I Ton pitnta imprimii Bsgac fenfnm ardoris vdde pungenti<. Radix fibrofa * tlbrd< A caulct phirimo* imfc emit tit, baft procumbentef, atque hie £rpe radiculas in ter- tin agtnict, c^terum adfeendente^, rarnofot, difufos teretes, pedales, fcabriufculo^> berbaccos. Futia funt ex fihrutitndo ovata, obtufiufcuJa, ferrutau, glabra, pctiola- *» oppofin. Pcdumenti tcrminilei, atqtc elunffMi, per nmoi ex axilli* eppo&b fum- ttornt fdiorum pofttf proHeimtc*, in dktocamo catilc politi videntur. Flos fotitsrius I, in princtpiu fuperne dqircflus, tandem apice mayn aitennatus, vel etiani *diffor-*

miter defincns, odore caret omni. Calvcs virencis 8c viltoftufculi fotiula pJcrumqoe & fervo lubxquaiii, Flofuti erctti rtavcnt ex integro, corofa incurvatx limbo quinquefi-do vel quidrirido; & \$tga& pake oblongs concavo - ejnniventi mcludumur, fpoiite eb-caicmi unl cum riunbtii tmmtnstt, at rectpta. ^onico oblong<m tune rctna-neat nudum. Semen iolitarium, obt>ngum. marginatum i fed maryiu, loco ciliis aibitii adfecntk-ntibus munitum, quorum (atom dao oppoifi mulio P^{le}rumtjue longiarcs icmen biarilhtum cificiuru, nigricans, palea semiadufam. eodonqo duplo bmrias. Ad taiuj exhitientur auch pd ea sola, florculus palea incius . i demque inde exemptus. Dcindc femen. In naturali autcin magnitudinc femen it=ru> & rece-paculum.

TABULA CENTESIMA TRIGESIMA SEXTA.

PHYSALIS VIScosa. Lam. fil. pag. 172.

Pliv: ^{dis radie} tee pemai, folijj cords: in obusin. L.-m. bm. Ct\$. 6*.

Alkckengi booaricof^repeos, Ucc< turbin*ta vii^ofj. DM. thb. pag. it.tab- »⁰

Tou plana fietala, fabromenosa, & scabriu^uUcft, nec amen vifco&. R'di* per-
em>** in! lbus crassis longisque dispeciur, superis sub itmrkaniU 8t valde ingrat.
Caoles plures, Iterbaed, obfotac an^tiUri, bafi t>mo(i, fubrrcat, (Wale*, foliū, fo-
pcne divaricate ramoli, & i inquipes Ics folia alter , sim sita, in ramis fape gemina, ha-
bent ovar, repands, bafi hanc cordata p*iol<3* crassifuscata, cum aliquo pullor vi-
rentia. Fforcs peduncolac de fulari calycen f<bc'nt ^ impundulatum, hanc pentagonum,
intis extantibus dumtaxi inquam, corolla duplo breviorem. »e<iin> germinis
recepculo propria ionscitur, flavum totum & unicolor fise allo matulu, fufinfundibu-
liforme; limbo integro & nuncum quinquedentatu; tubo villa decifimis albidisque intus
albito & hoptero. Antberj: fnlphu. ex longitudine, fHto ma qia fere reipana. Calyx in
fructu •pl<: ovarus, tumefls, ujjulifus striatus & flevus baccam comprehendit pafor-
mem, luteam, v.iVkkm, palM ptenmi d .ci de feminis ex fubratundo reniformibus fla-
v r f i b . Semen, b>ect, * caKx truU^tr adp anguncor, in «(d*rio flueret totum
zibetum . quani ciam feti fub dio.

TABULA (T\HS!\1\ IRK;!MM\ M VI IMA.

CANTIA (Linn.) Linn. pag. 133.

tpfsctneruni zeylinicum procumbens inflatum. Herm. par. 148. Reg. fil. 566.

Planta elegans, habens Commelinis communis, ex radice albida & ntfMta cantha plurimi-
prefTo*, viren; r. cum fuffu rubore, berluscos, glabros cum lines longitudinali villosa,
procumbentes, ex geniculis radiculis terra insinuentes. Folia ad genic. iU foliuri* font
tx OOlomjO MDvt folia, crassa, ad taftum pinguis, ICU», urriione nicta & levis, mar-
gin< fab-illata, plana, subfibrata; petiols membranacei, mtk, paOiii cum fruis purpureis,
A vagina subtibus. Folia terminalibus spathis infident imbricatae, simulque critham aliquam
rtferent>; fingitlh d>j lilye, biflorae, binatae, mucronatae, plana. 1. .it solum retrofure
inc nr vai r, con n i v<mn, Virent - r. cum purpura, omnino & queuor ad oculo, exteriores
primo floret< mi/orr<. A explicationem flores spathis includuntur, explicati his fit-
perminent, in ({oditxt fpittMni in compage flores unicus, nec simul priores; explican-
iur suram muiuno tempofe, A post meridiem brevi mercenatur. Calyx villosi & co-

rolla duplo brerioris *foioh* lanceolata & neuta criguntur. Petals carulca ex unguibus longis liniui tubum **formandbas** ampliantur feniim in limbum subcurdatum plenum & pjet*teo*:?linum. Filamcma fcx, erruka, **capiikria** & erc&a omancur supernc pilis concoloribus & clcn^nter articului¹!. Gennci supernc ell vilofum. Stylus filiformis dedit in *fig*ma davatuin, tiibulofum, .cxrulcum, ore cretuto fufco & apcrto. CapJuU ovata, obblcte trigona, ad verticem hirfma, calyce **brevior**, trilocutaris & trivalvis pullet, per tramparemiit (**oxani** rabe&k. Hsec in fungulo **locskiusnto** continentur gcinina, angula-w, primo mljet^b, poftca tu'. Floris caklnrio ab Augufto ad Oclobiin. Ton plama **focco** plena eft mucufo i infido- In **Ittivo** data exhibenur ctiam flos integer, **petalnm**, **capula**, **tancn** & **fbliam** fpatti, AuClum (**hstnea** & piftillum. **Ulafriffiau** linoteo femirw accepta rectro.

TABULA CENTESIMA TWGESIMA OCTAVA.

GYPSOPHILA ADSCENDENS.

Ex ratiicc percnni, albida, ramofa & litfnfcence cautes cgrediuntur plurimi, terctes, gbbri, vadic noduui, **fiJiofi**, lic;-!);Ki:i, b*fi pnprurafcentes S: procumbentcs, t.m-demque adfwCiidciKCi. Romi numerui^erininauiti iti pcdunculus tenuis erector & ramofa. Folia ex kactoluo Uoesria, mtcgerrinia, gauca, pulpofst, acutiufcua, ieffilia & appofita. Floribus inodoris peiala funt cai\;c d uplo vel tripllo longiora ex carnco albiti,i, (jltverfc ovata, cmar^irtatii vet frqpUctter ubtufj, tjuina **vd** **fcaa**. **Filamenta** palida longitudine corollam ferme [tianoa aodieras i^grunt rubras. Stylj tenuis & fubulati-cudem loii longitudine gr. lent- Klarci sub dio xitati;. Hyrcmcm rrdiligit in hibernaculo. Semina a ccleberriajo Spichmoiina at:epi.

TABULA CENTESIMA TRIGESIMA NONA.

HEMEROCALLIS PLAVA. Lm 0. pag. 549.

Henicroi:;;IS! *Lilio-Alphodeli* is. Scop. am. i.p. 11

HMKTOSUIS radke to! *serfa, carolis* rwnopefiHi. Gnul/b. i.f. 37,

Lilio^fpttudelnN lutco flore. Ciuf. h.,. 1 —

Lilium taceus, alphodeli radice. Barb. pin.

Lilophodelis latens liliorus. Lab. n. ▷ a.

Al: ttodclus tilaceus. Bed. cyft. vern. 0. y.fil- J-A^- }

Radix perennis conflat fibris longis, pluribus, ex **fufco** flavefecntibus, qax propriis fibrillis augentur, & quas inter nonnulli lii tuber **oblososi** **bienffiumir**. Folia fun; *uniformi-linen*-J, aceta, **tntcgtrrimt**, **giaberriau**, & fcapo breviora. Hie pedalis (el bipedalis, teres cum quadam angulata intjjalitate, cslanuim **crtfliu**, nudus, patotii flexuofis, & cretus, fuperse in rno fc pcdunculo* paucos dividnur, tqualibet divisione foliolo stipulaceo 'ttFulra. Ffures dc^t. tes sotiq* '««« fuavcolntia **poUotf** 1 medico „ unden gravi & incommoda. Tubus **corolla** ^^W **Uwfrtcew** **efl**, & **dimfetto** police long[er], Limbi locint interiores latiores. CapfuA supernc dciifcu tota, continens fcitioa utra & nuda. Ccfa: fob dio, & fwet junio, feflppof pccociei **Hane-** **rocallis** fuha. **Sponte mfixatem in Hi** *ngaria* *aliginosa* *per us* **Carolai** Clurtus detexit. Gmelino teste, ex folis hojas plantis, stace exarctis, autumni !mporecolieais& fu. p. manus fricatis, regain*ri de* »d, quod iiciic aUfcc*ii*, relituum netlendis tcg- min*tau*, pannis folacibus fupponi foltu>, odiibent, qu* ex hac nutricia **Dptinaa** fa-

fca in oak* omrimi feric coat inentibus. Tott u fa* w|y* plain* eft fucco »*jueo* pel-
lucido duiciflimo grato & meli pruscino, *tui ms>{* rimo guntatim inde calit. Hinc
(ormicx vix funt ibigedox. In Wo mi ali foliorum decocta cum ales & sale pro clyans-
ttbos adlubcri, imhr foUoram m, |«:, s i s m e n s nirmt. In tal>qk a km »d Utu> fitum-
mr BOB adj peula duu, ealyx disciflos, fructus integer, capsula una k-juntb, & semina.
Autta vero piftillum L^ tfair *sen*.

TABULA (1 \) IIMMA QUADRA® SIMAQUARTA.

BUNIAS BALEAR! CA. *Lam. Bfl. pag. 446. mat. 419.*

Accehcrino Linnae jam datam descriptionem breviter repeatum, ut comes ire picht
miffjl. [JUC3f. Ex radice fibrosa albitante & rufa caulis angustus unicus, pelvis •
levi, infra jirinu f^jiu tern & a-rotpurpureus, inde angul tu viridis & ramosissimus.
Folia annua sunt pinnata glabra & pruinosa, inferiorum pinnis subovatis & oblongis; cel-
lorum lanceolata & acutigrana; terminalis sinuata. Pedunculi elongati racemose flores
fuitinchi; insidiosi. Calyx cum favedine viret. Petala flavent. Anthers sunt inter-
Germen tubrotundum tc pilofum in
stylum abit longum. Silicula fibrosunda, fidei-
limento. Semina sunt foliaria, globola & fusca. Racemi fructigeri evoluti pola-
r. SelHIMJ Itln J. 11; ,
specimen figura alijs habet. Flores Junii,
km mi p.

TABULA CEK1 FESIMA QUADRAGESIMA QUINTA.

• "MM S AEG> PTIACA. /,r. . I* M| i. pag. 331.

In aliis annua & alibida caulem profert erulum, teretem, sequipedalem, infecte p^
rum hispidum, tererum furue glabrum, & ramosum. Folia radicalia & caulinia
funt pectiocta, gU'ora, nervo dorali internum pilis hispidissimo; summa integra & acu-
ta; inferiora pinnatiside flosciata & discolorata cum basi extima maiore & rorundata.
Caulis & rami absunt in racemos longos, pdlccll fructigeris appressis. Calyx flavescens
valde patet. Per JU & ftamin* fwrr inter. Silicula ex fabretudo tantisper quidcas &
obtusa procollibus inqualibus & rugis exasperatur, manu pulile fulcescens, nec mi-
jor, quam sunt depletæ vicentes. In quolibet loculamento hortis semen figuratum, ob-
lottum, sublineatum, hinc convexus, illinc longiundini fulco exstatum. Flores Junii
ec Julio; semina feri Angusto.

TABU1 V CKN'TI s]\i\ Ut \D\ \AGESIMA SEXTA.

VICIA HYBRIDA. *Lam. Bfl. pag. 418.*

Vicia sylvestris Linn, cum galba fusca. *Bod. Bfl. 1. p. 314. Hall. gutt. p. 191.*

Ex radice fibrosa plures in umbra egreditur caules, hanc pectinantes, dum vero
alitare sustentacula, elevicula fuit scandentes, striati, angulati, glabri, ramosi, pe-
dales. Folios oblonga vel obverse ovata, recta cum exigua scuta terminatur, hinc at-
que illic pilosa, in cuncta communis locutur trinque circata linea. Scipula virides dor-
fo

TABULA CENTESIMA QUADRAGESIMA.

SPIRJEAE CF-UM/EDR!FOLIA. Lin. I pag. 34?-.

Spinra chatmlyro>s folio. Amm. ruth. pag. 190. n. m. 169.

Spirza ptmtfolii. Sbath car*, r, pag. 34. pag. tab. 22.

n adix plurcs protct caules fruckofos ex cithas & ramos, junijre> aiigulou>> . fcniores
 XV abftcdente partite exteriort terete*. Fulia fu^{Jf} vtrit ovata, acuta, sicterna, glabra bre-
 vitor peudau, juniors tutitti> IcritEme viii.if*, argute ^ hwrqinliiH' !etr
 altersve fcpe prutundtore, unuin aftertitnve pollicem !jn;;a. K, centi fabumbellaci & denfi
 Hum gerunr in doros, pedunculis uniflari, infimis subgeniculatis, infklcote Calycis
 parvi, glabri, & ex flavo vicensi lfcis semiovace reflecte incur. Penh funi nires, sub-
 rotunda, obfbtetc attHginw & patentirima. FiUi>enta alba & n—1 erofir limbo calycis
 jnmfcoatar ante pc<!a, totfaeril infrafia ex rofco ltuct>. Ante tilim<o> etia<> ^ =^o
 dan limbu Iquairidlx cfiguntur ctrciter L!<em, exigua, flavz, fuhracundz & concave.
 Gentr quinque in globu*n* fulcituii colliguntur, enicntumque median stylor albidos,
 •pice iaatSkt or, obtusos, longituiine ferine ftju inum. Capsule quinque, parva, sub-
 ov<r, glabra, polyperme, stylis perisentibus coronantur, nunc falcis & veluti capi-
 tuti. Frntc m h<a uiz alt<u<uis, culis habitum non mutavit. Ex Idz
 inuntibut ab expeniifimo Hacqnet tranvinifTui fust ; qocm chnffiinof Scopd
 mam a spirxtt Linnxi chatnxdrifulia rpeekm j camlem tauncn cum h*<
 fulja sua efic, milii alfercutt ilhiftrh 1 n, Ttmper no ft ilia a uno exoru
 term, (juaterna vdquina, qnaJia Cut pi ant a: scribit Ammannus, adeff debent, nam
 ooilra phiita iftiusmuti i non habet.

TABULA CENTESIMA UIADRAGRSIMA PRIMA.

MALVA UUINSIS. Lin. fyl. pag. 460. amaz. acad. 4. p. 3 *r-

Pianta annua, trclj, hl-vel tripedalis, caule ramisque terribus, villosa, & ex fulco
 purpureis. Foli 1 fum qu. aquelob, vel triloba, lobis extenis majoribus & longior-
 bus, serrata, villosa, pciolan, venulis numerosis reticulatis, & ad cras plus minus,
 expe vix notabiliter, fusa. Pedunculi foliis breviores & valsi ussis intiden foliacum,
 extremis gorenies flores plufulos brevior pedicellatos inque capitulo congetos. Ca-
 lycis hirsuti tria foliola exteriota sunt setosa. Internis laciniis sunt latissime ovate.
 Corolla carnea est cum 1 p<u< fofo purpura & calyx puto longior. Anthere fatura-
 te cerasifera. Arilli fusc*i*, compressaque, meander linea vix elevatis. Semina fum
 Cothicji J - reniJ'rmii, nigra, & glabra. Pertuum pro paria haber. Sub dio flores exla-
 tem DWgrant, & 1J ngWKj fed rt<> 1 arilium expanduntur. Iisque silente est plu-
 ribut Malvis calidior vim reponum, qtiac, <u-ni clara solvrum optime ferant, flores tra-
 men 1 calidria tanquam rite expausos monstrant. Ad latus sellis atrovittis

TABULA CENTESIMAQUADRAGESIMASECUNDA.

MALVA BHIRARDIANA. /m & ^

Malva humifusa minima. Till. pf. 108. 1, 31. f. 2.

Malva cretica, minor, hirsuta. Barb. vnt. app. pag. 46. fig. 32. Tourn. cor. 2.

Provenit hec plantae in Modio arenosis & in insula Crete, A Mi n.M xftatetn fill* ^ MI,
 hyemam transigit in hibernaculo, temporeveris de frigiculato. J.m., I | n " fl.
 res, semina longiora matura Anguita. Caulis ha- bet pkr»» p*nt* laumi (tmot) tent***, wen-

meritofos, foliofos, brcvibusq; ramis au&os. Folia cxlo faciem obvertunt onun'a, pedita it tuiicneofis inludem proprix longitudinis, funtque orbiculata, bad cordate, crenata, obfokriiiimc fcptemlubata, rugofa, fubtus tomentofa & pailidc virentia, facie faturatius riridk inagUque gl^bra, majora diatnetri unctalis. Pedunculi uniflori, axillarw, tomtn-tufi ft lulitarii, infitttc florefcentia furfum arcuattur foliisque fupereminent; flore clauJb, verlus icrrntn clerniduntur, lie laturi fructus pendulos. Calycis foliola tria extriora funt fetacea & brevitifimk Petaia funt fubrotunda cum cxiguo actiniae, concava & faturate cainea. Amlicne funt fufphuriM'. Arilli circiter dectm, pallidi, fubviffoli, & lateriljus poroli, [imiidjores foij, non coecentur amjilins in difco communi cajycis, unde alitjui excorofuiti propefломof, & Jructum reddunt inxquakin. Scmina funt fufca & glabra.

TABULA CENTESLMA QUADRAGESIMA TERTIA,

HELICT^RES JAMAICENSIS. ^ . ^ amer. pag. 235. id. 179. fig. 99.

Helicteres liora. Linn. fpec pi. pag. 1366. num. I. j8.

Helifteres villola Sc fruticufa ; foliis cordato - acuminatis ferrads. ftrffmn. jam. I.

Jug. n o.

*Helicteres s. arbor fmii.c occidentals, mStm maore. Ptuh. aim. igs- t. *4j- / ?.*

Abutilo affinis arbor, alctixx fuito, cujus fru&u QI Ibyli apex K<ta>, quatuor feu quinque ftliqaii iuilutii, Hiiui dinfttt in (ptniB convolutis, Sloan* bijl. jam. I, /it;, a a.*

*

Ex feminiba! in Jaitukae fvlvsticis afptris *loch* hand procul a King-flon anno 1757 a me collects, stqite anno 1770 in oildtrio terra mandatis, exerecriint tres arbofubCi qti.i alterutn xtJtis annum agCtto, itnum akcrumve iiorcm, nunc agentes tcr-ttim, iim quadripedoles, dedcrunt coidem ex omnibus r;iti. mimcrofos ab Augudo ad Novembritn nsqne, JVuctum m.itiirum h'leosq; unicum menfe I'ebruario. Hujusmodi ramus medwcris com parte truiici abfuffr dep chis liititur. Habit u convenit cum conve ribus pettlokkh a me jam decrpcionis, Ab Ifora Horti Malabarici oinniu mihi difTer-rc videtur CII pturima momenta, imprimis ob fra&oi non lutcrnlicer, mi in !fura , pendunculo infertus. Rami ionimes, peduacnl, calyces > & imprimis folia vefttuntur deafo lomento, Verbtfd adinflar. Cuiln ramitjuc terces funt. Folia petiolau, akerna, crafla, cordata, actita, iiixqtialiter ckntart-ferrata, iiuerdum ftibantuata, pallidc&pul-veritlente virtntii), in Dtroqtie laterc immnnmir (Hpolil fetae & tomentos). Rami ter-mixintur iu jirtluncilos mulnHurt, ultm qa in praducuntur. Ad exortum \oro pedtineculonim nna dterave giandub locatur orbitubris giabra & faturacc vircns. Calyx fubc^{mp}n ~~alios~~, parum comp dTut, in.r ;*aliter quinqnedentatus, limbo in inferiores pjnc m^{gis} pr ~~stante fito~~, inter DC palfide rbct cum fundo angulatc fufcefcente. Petala quinque allmli, oUoo^i, & obtufj, extra CtifCtm refleauatur; lateralia fupra ba-fin in ttnko lacerc, fumimim atriaque B| ~~pedicula~~ turn. Gtrmen liirfutum valdc & qtiinqefuicatinin ~~ridet pe~~ lunculo I~~azifino declinato & villoso~~, jl'itque in (tylmn fabula-uitn, tciiucm, rcHexim, fuufulcattim, tiiferne intortnm, gennine duplo lol*i*[^]*i*[<]. Stig-^{tt*} eft ftibquinquefidimi. Ad fulcum fwini i quemlibet folioltim exorinir pafietst, Ian-cculattmi, petalitormc, atuminatum, ~~fahHun~~, per (lamina germini apprcinim, ut his ex ^{integro demptis der} mini tfpmmt. Fiaianew decctn cmfft & ercd» extra germinis fo-lioia circa gentien l^antur, occulttuiia iltud antler#rum ope, qtws (erunt atmvrnrt oblique, obloams, lures, longitudo iilini ft UMiUwft filiflMWI Ftuthis, ovatus vd ob-long, ~~fascus~~, & tomentos componi tor el captiilis quintiuc fpiraliter fid apic« usqm con, ~~olutis~~, umlociiianbus, longtudioaiiter dehifciitibus, plurima femiaa obloniji 8c iu-

fo nulla macula **fafca tiagnntur**, apicc autcsn quamioque purpurafcunt; inferiores ad b
urorfum produconiar, ibidem **htftatse tot dentatse**; fuperiorcs cfIc fulent intgerri
mi. Plorcs ex alis fbitoram **egrediaao** folitnrii, brcviffimc pcdurnjulati, calyce & ve
xillo in dorfo **hirtutis**. Co rail, t cum **tliao** viroc fuffuso **latex** vxilimn emarginatum
venis tul^is vai. **Filaments** omui:i in urtuin corpus func coalitn. Legumen pen
t'lum vel pan, oblongum, styl; >utc supcrHte rrikxa rofratum, mogis **nwnatve**
compreflum, riris jutis obfitom, fuscefens & **ottckle feniit** includit pauca fubglobosa,
ex tulco & **Biro** maculata. Floret Junlo & Julio. **Senuoi** fun Augufto. AfKnis eft Vi
cix pannonic.t: in llovx An • since tabula trigemina quarta ex dbit*, a qua fiicilliine dilcri
minatur (iorilus) **folirariis**, nec **gemdlts**, turn **macula** in ftipulis nunquam ulla. A Vj
cia lutca Lin in i diverf m htnc **hybridan**] docent v*e* viili **hirtudes**, tolitorum omnium re
tulio, **Seomlia** (oliurtim joe psbdecmit minor. Ut itaque hx ires planu: *distinctissim*
iuttr I'c vidcantur.

TABULA JCENTESIMA QUADRAGESIMA SEPTIMA.

VIC IA B1THYNICA. Low. Jyf. peg. + « 8. fp.pl. 1038.

Clymenum bitliynkum, liiiju.i lingulari, llurc minore. **Sttrb-higd.** ?j>- 43.

Radix fibrofa, dilute fusca &* perennis plures annuatim cautes gi^ntc **debiles**, ope ca
pulorum• faecium, vic., : (ferentes, argute angulatos & glabros. **Stipule**
foliis •dfidcot pbtoog«, ntriaqaa nM« acuminne -t, **argate** & intep falcr ttentati, oc
glabrz. Pctiali **tHaagakra** & acurc **falcid** foilioia geront utrinque duo, etiam unitum,
lancitil t.i vd ovata, n:ma & glabri icila. **Fforti** inlidenc fulitarii ptiunculo ajari &
breviflimo. **pSof** & virentis dentes funt acuminato- fetacei, **in&me** ex angu
ftto hncoelati. \ ex ta colon **eft** pritijo vioiacci, poftca dilute purpurci, emarginatui
fine acumin, **lateribm** vix reflexnm, ereftum, putens, & calyce duplo longius. **Ale**
riitiu palient, dciti **flaveot** Carina obtuf & vxillo duplu brcvior pallet cum apice «nd
co ex vioiacco 1 agricola s. Stylus brevis ad aiigulum rc;tmn itilexus terminacur in ftig
mt **ctajTum capicaram & barbatum**, Lc^nmcn oblongum, acuminwum, pjrum com
prclflum, liirfuim **8k** fiifcefencj fcmin.i **ptuc*** tenet gjboli, glabra & ex fuscu nigruque
varia. **Floret** Julo. **Semes** (en Aogufto.

TABULA CENTESIMA QUADRAGESIMA OCTAVA.

ONOPORDUM ILLYRICUM. l,-mu fyjl fqj. 131. (?*wn-* Wt. mwt^/. /wf.

424 . Gerard. pro. peg. 1 So.

Carduus quibusdam dictus Acanthnn itlyricum. **Waui.** bifl. 3. /wrt. i- ^a*. JJ,

Spin 1 tomentor& alteru spinosior. **Basb.** /n. 38*.

Acatithn in illyricum. **Lob.** i. 1.

Acanthium virens majoribus capitib spinis. **Ilirr.** k. jo i.

Peno anno foli* **radteria**, altcro caulcm profert quinqtpedalc m vcl altiore, jam **a**
baſi ramifum, habitu crekendi cum Onopordis Acanthia con [roeas, port peraftrum
fructum biennis in teritttrt, Ab i o differt ; illi **BM** angulboribus, caulcm farpc ipfmn
it rid tki tic haud mtili a m txcrfentiliii*, magi* albanticlms, pimmitide act dilhntias divifis
in laciniis long turw ovatas vcl Inceol. » primi **tnni** mulro **magH** funt inenna,
lanecalata & arqualm* Utuiaw. Propter folia per etak-m nmlo anguftius decurrctia
te-

tenuior etiam caulis tnatg[^]quc elongia fircit & conciliatur. Calycis foliola sunt multo laciora, etiarn reflct^J extriara oninia. CoiJi: similes. Semina paulo majora. ^{1;} ^{2;} ^{3;} caulem ter...iiuns iuerdum is taximus est, si duplum illo, quem ta >ul* hal>ct» major.

TABULA CKNTESIMA QUADRAGESIMA NONA.

ONOPOROU M. *Linn. fol. pag. 531.*

Carduus tBRKOtofoSi acanthi t_{oldo}, altissimus latitanicus. *Toern. iof. 441.*

Carduus tumeitoius, Aamthiuni dichis, n^oabicus. *Piat. dm. 85. l. 154. f. 1.*

Carduus, Acmthium d^{icitu}s, altissimus latitanicus. *Abrut. iof. 5. pag. 153.*

Acaothium tow entosum, capite & somnis majoribus, cruentibus caulinis aliis. *Barr. iof. 502.*

Sili dia I. elegans hinc & biennis plures pedes altum, eretum, agokitini₁ ca₂ vum, totum foliosum, & super medium ex omniota foliorum aliis emittentem los breves crestosque. Folia omnia fons lanceolata, nitcrta ^{L-m} longa, qinqiqic vc₁ sex uncis lata, superiora gradatim minora; omnia multum dec-irrectitia, ad oras undulata dentata & spinis pungentibus validis armata, acuminata, venosa, utrinque tomento hirsuta incisa, juniores fave nivei & tomcnti arat. hoodei denti ope cum caule connexa. Flores erethi in extremis catiis> **St** nanorum brcviifime pcdunculi vel fere sessiles >C«R|, Calycis foliola laticeolato-spinosa, inferne albicans, superne purpurea, tomento arachnoideo unita, onnia (riguntur, nulla reflextuntur vel insonane, qui sola nota faciliter ab Onopordis Acmthio & it. rivo distinguuntur. Corollae glutinose & purpuree similes sunt corollulis Onoport' Acantha. Semina etiam simillima. Flaret julio; & Augusti ib finem maturantur femna.

TABULA CENTJ SIMA QUINQUAGESIMA.

HIPPOSERIS LUCIDA. *Linn. fol. pag. 525. nov. 108.*

Dens leonis gratus, foliis erythrii crassis & succulentis. *Toern. nr. 35.*

Sax sub ito florrt pirno sanno I Julio ad Olybrium, hyumen in hybernaculo transigit, & proxima annis flores præcocius. Radix perennis, fuliginea, fibrosa, nulla, albidaque evoluta vere multiceps. Folia fusc pinnatipeda, petiolata, crassa, pulposa, infida, pallide vtrc₁ lucida; lobis subrotundis, vel subovatis, angulatis, dentatis, inaequalibus, horizontalibus, inferioribus minimis, extremo terminante angustis. Scapi erethi, apphylii, teretes, glabriuscule, folies longiores & saepe purpurascentes florem unicum sustinent. Calyx communis angulatus & glaber vir « | H ifum basin villolinfelius. Corolla Cunt later, exteriora subtem rubore perfusa. Calycem proprium dentes nullum. Germina am^o coronans pappo subplumoso, quodam exteriora paucis, alia oblonga, ik compresa utrumque marginem membranaceo. Ambra fuit penitus cancolores. Semina gressu, germinibus familiar, fulcescant. Flos ante meridiem explicatur, una alteret post meridiem hora clauditur,

TABULA CENTESIMA QUINQUAGESIMA PRIMA.

POTULACA PANICULATA, *Jaeq. biji. enter, pag. i₄g.*

Fortulaca [Mtciii, *Lmn. mart.* 2+1.]

Tplanta pfiaberrina eft, frnticofa, & fesqtiipetalis vcl altior*. Caulis fubere&us, jnferne cx folionifn alis ramus profert obfotetc tetragon os. Folia fum ubvcrfe ova-ta, lanceolata, vci ovalia, obmi'a vcl ocuri, bafi attenuate in petiolas breves, alteraa (uboppofio, ad tachmi piiigua, potpda, UKCgerrin*, infima tripollicaria, fuperio-n hrcviora. ftnicotra rccrnirutcaulem & ramos, itmpcdalis vet altiur, crtefla, cumpo-(ittx nccmil rabopp offi-, lulx Jichocomis aut inordinatius divifis, tenuibus & patenci-bus. Ftores funt intniuri, n_o microf. Cttfdi tiiphylia foliola coacsva, rubra, fubto-timda & patcntifRina. l'ctaia qoinqoe, caivce rripiro inajora, ovata, obtufa, concava, robra, pttentffima. Filamenta ad minus qoatoordecim, pat 11 la, rubra, longitudine corolla. Anther* didyawe, later. Stylos tinicus, gU;brmts, crcQus, rubefcens, apitc findiur in *figuata eria crassior* otdonga & fattirntis colorata. Gennen fubtriquetro-globosum eva...lit capfula figure fontUs, okkbl, doplkatt, trivalvis; vafntlts longitudina-liter dehifcentib: 8: Jcciduis; exteriuribus nsridis & ex flavo virentibus j interioribus H-gan Si fita btnUlimb, fed membrnatceu tenuilTimis pajlhd fobpdlacidis & fiaccircfis. Sc-mina atra nircent. Floret in caidtrio ab hora tertia pomeridtaa ad feXUin vci feptiinam. tn rupibas mnritimis Minioki & Dcmnogo vidi pmucolvD daplo ritiorem multoque ma* gts qium iti depkia ciufoin, *Iali etiam* ^aulcm magis declioKnm.

TABULA CENTESIMA QUINQUAGESIMA SECUNDA.

SALVIA NA P1FOL1A.

Allariffimo Mtrfiglio, Patnvino Botanics Profcffore, ante plur^o jam annos fub dato litulo femina Imins plantae mifla Jberunt, Primo anno folia Tol radicalia producit in arbum posita, tutguae incorobeotk, tkero ctolc*. *Hyauua* quidein dum tulit fub dio, proximo primo vtrc tanpuet, & teriat floret; fxpc Mtucn perit; unde calidioris climatic iodigrafli ridewr. *Hyeraeut* vcro tranfigens in hybernaculo, pofteaqoe terra: man-data vegetat & fiorct dtiosj BOopMHB tamen falvi* vertictUacz, in hoc terriuro ubiqu^e obv^e, magnitudinem tequirit. Interca cum CJHCIII tantain limijtudinem liaber, ut vi^x dignoscatur; utque din iirfenni dabiui, utrum rede diitinguerern? In fuliis & habitu diffini bio milh eft. Calyca fitpernc ex fanguinco purpurci divljio cadem. Coroita vero differt manifeste & conspicuer. Hrc laturate purpurea Inbijum imhec fupcertji cordato-emarginatum iljtufum de patens; labii iriieroris Udnnts Uterales Tabovmeu patu-lt\$ & longimdrae labii luperioris, hoc autem longiorem lacinum imcrmedium, qu* eft oblonga & obiliiJima, nec niiuitntni in BXORO fuo in tullum anguftata.

TABULA (I) MLNIMA QUINQUAGESIMATERTIA.

SE DUM DASYPHYLLUIT Lon..&. pag. 317.

Sedum lolits COB, o btofe, gttacti, reciculati j caulf ramofo, vifcido. *Hdi bijl. bch. num. 961.*

Sedum mirut- (putumn. Quf. hiji. L.X.

Sedum parvum, folio circulate, (lore j»rvo. fltfub. b\$. J.JMt* 69¹.

Pedtinculi tcretes & fubviHofi erigumur floresque fuftinent duos tres quatuotve, rarius fg.
 braftea ad exortum pedunculorum propriurum fuffultos , foliolum reference.
 Cal -d* \ rent is denies fuiic l'ubulati. Corolla eft cirnua. Vcxilfum emugttMOM ftriis
 nocatur rui)ij. Aix tuniiix includiint garinam iategmn. Lejrmnen tcrs , pollicare
 vd brevius, glubrum, ftylo veluri fpina acummata, reclum, Jeimina continet plura ab
 ofto od vigjnti, parv.i, ex rotundo nui&tmk, coinjircifitLlcuta, paUide fblea cum macu-
 ris.

TABULA CENTESIMA QUINQUAG1 SIMA SEXTA.

MAIA'A PERUVIANA. Urn. fyj]. peg. 460. WSUk. ill. 30.

Planta nnua adeo fmitlts eft Jtaiv.t limenfi id tabula centdfiM quadragefima exhibiti,
 ut xgre digiofc primo poffit adfpeñhi, verc ttmen diverfi. Cjulis ereftus, ramo-
 fes, [ripedalis, teres, fubvii(u<;, virMis, pfrcimqtie purpuraicens. Folia quinquelob-
 ua vel triloba, (iumjuam in hurti ipectminibai fcptcmlobau,) minus hirliua quam in !i-
 itienii, exterum vix d^ereatku Noque ia Roribus almtl video dUcridwo, nil! quod fint
 ex porpnreo nbri, neccrslei li^biahM pdbnclas commanb doogantr, fpic*-
 qae furmatn liabec, in qua Ccaindum toegkodfltan Bores ioldent pedkriftti aut fcifiles,
 ran verlt plcriqe, ncc ndcu Ctpiuri. CoaftntifliniORI dikrimen eft in artillis femi-
 nont, qtii in hac procelfibii s dentes utjs utrinque fru mlpentL Sctnina ipla fuat xijua-
 lu. Plant Tub diu couin ~~extatam~~.

TABULA CENTESIMA QUINQUAGF MMA SKPTIMA.

ARUM 5AQ1TTJEFOLIUM, lam. Jyji. pag. 60 j. Brown- bif. jam. mm. 8.
 js.

Arum ampl*! fuliis creulemmim. I'lum. it. 35.

Aram minus efukaram, fingituix fjiis vfridi>iiigriendb»« Shan. bijl. jam. 1.
 149. Jig. 1.

Arum mums ftjiitan-t fulus. Vluk. dm. ft. t. 149./. ><

TJ adix craffia, ~~intens alba, coris~~ nifija, & bnTofonni-i, libras craffas lon^sqae in terram
 AV ilcniierit; fuperne pmhiim, foliis exteriunltus marteflentibus & percuntibus, in cau-
 km ottullitur Mraem, do« trc^e uncias zquantcin diametro, fempedtilem vel akiorem,
 exicme nt^ufum t'tifctnn re^brmnqde, iattu ctmofpin Havelcentem cum mtrgiM albidg,
 qtii, puerdcnte ~~refice~~, !nm tcnx niandattir, etc ambitu novas lihras rsdicales agit, fo-
 bolemque ctbin ~~gignit ex~~ ijtorc ; ut fie pliMa lixe, dum novus Temper en«us caulis vi-
 ce? radicis »» ~~reficie & deperdine supp lerepo'Rt, cultora cv<dat veluti iminortalis. Fo<~~
 longn pel foliis innuincet glabre, fagi !(;u«, acnta, facie fmiraie vireutia, dorfo ~~lvm-~~
 ca, lejqiopwleni longn, [lcdecnque ferc lata. Dum florerc bdpfc, badsconvoluta tdliorum
 separant 11 in <na» ~~partes pe~~ C luliiim rpathaccum pcilic vel ptulo lonyiiik, ctiilurmce,
 minaturn, glabrum, antice concavu» «di lum >arr~~ri~~ejie itferiorem pctiolorum ample-
 »» ~~trare purpuraicens & excurrens~~ quibus

Qens, dorfil autem com vi in margines (feminos).
 fcapum Mflaplifikor. Es tpfo cauk tgnikm kmya»% few tutu- oea&aeat in totii con-
 1., dc COIn tanfclm cytreminrr. ¹ itiricn- hi)'ftiUrem subodo:
 len^, ex auribto collo m bnftteam hnlfime ovacm ac ndod Cocollfermeni expanditut.
 Dc (undo fptdix prc iffijui & pal lid us; CD/Si bjiin tmtilper inciaflatam denfe

Sedum minus, *folia circinata*. *Bab.* pag. 283. *Moriz.* hif. 3. pag. 473. l. 12.
Ailoon dasypodium, *Dalech.* hif. 223.

Tipar n plenum, qua hie defjinsitnr, floren: ex Tyroli accepi, ubi in rupili m ^{multis}
l «uc fp*,, crdfcit „ in Austria, quod ^{14JB (} nedium inventa. Radix fibrosa & albu-
da, (cjmrn a»tor« in fob o\$ah tootMia dicnt,) in hybernatulo nostro hybernant {Kr-
ennis, pfures «(ilicullos Kts^it tenu^, i crenes, biunciales sur longiores, basi procumbentes,
hincadftonicmw, fuperne viMolo* & vifcidos, foliosos, in cymam nudam termina-
tor, a duobus ad viginti & plures flores crenes, aliquos etiam unifloros. Folia sunt ex
fabro **rut**, ob-
perie iniqua illia, biltncarii, virent U tut i m^ flavescens cum suffulis ponitis vel ve-
nh fa, aguincis, in ramis jn nwribut in tcervos in. bricatim colletha. Calyces vifcidi virent.
PCNU ov*ta in atiit atba ftjnr, in aiis individualis ex rubeo alboque varia. Anthera nigre-
fauit, Chorader quidem Sedi eft, una cum prefentibus min. n. I^intilB. -jux geru-
nibus subfpcium vero calycis folioli perpenio difunt sex, .otLnqoe peak * ger-
muu ; (ai minima antem diuofcio, quorum fex ante petala poctumur, rc^ua f<s c'li in-
ueni alternantur. Confundit jusque hac plantu U Sedi aequa Sempervivi i BfttualM r
rtoret JL

TABU1 iCENTOSIMAQUINai JAGESI MA QUARTA.

LJNUM UARITIM UM. *M u**

Linum macrorhizum latern. *Bab.* pag. 214.

Linum latern narbonense. *Bab.* hif. 3. pag. 414.

Linum sylvestre. *Dol.* pag. 4. l. 2. c. 25.

Radix albida & perennis caules annuatim places herbaceos primit, teretes, suberetos,
glancos, f^pemc ramosos, tandem pedies aut altiores. Folia vocum caulem & ca-
mos obfident ex ovali ob , acuminata, glauca, folidia, recta, integerrima, fomi-
pollicaria, cu !»»» inferior op osica, reliquo alterna. Palunculi plerunque oppouuntur
foliolo & uniflori. Calycis suberundini foliola funt ovata & acuta. Petala finta lu-
ta. Germen gibrum. Seyli quinque flevi in frigmate abrunt hirsuta. Capula fulvo-
ctca, decemlocularis & quinquevalvis fentina inclusa ovata, comprefta, & ex favo fulvo-
fcentia. Floret totum zibtem. Tabula exhibet plantam primi anni, & ad latu cum
femine capulam, eandemque autam.

rABULACE.VTESIMA(QUINQUAGESIM, A Q I) JINTA.

LOTUS ARABICUS. *Linn. hif. pag. 504. num. 104.*

Arabica hore planta per Forskallium Europe innonuit, & celeberrimo Linneo fola iden-
tis, icona non a me donata, Cta brevem adjungam descriptiorem. Prima ver-
itas fab dio flore & Julio ad Novembris, femina perficere incipit Augusto, & lyra in
hybernatulo fervatur. Ex radice fibrosa exente caules herbacei plures, prostrati, teretes,
levissime pubefcentes, fempedales aut fempipedales. Foliola obverfe-ovata, obtusifolia,
brevissime petiolata, dorso fubincisa, iacit dilata viribus & glabris, crassifolia &
tereta infidae Mb communi comprefta. Stipulae folioli similes fuit, sed minori.



obli tent germiM numerofa fuhrotunda 8t corona: a digynae ample, concavo, angulis fa-
(cefcenntbus in amUitu exca, & refero glutine plorim. Super hoc ordo est coepulca-
tmum **dtvttorwn**, dupla longiorum pistilis, nec adeo densus. Reliquum sp*«i>ti** P*«**
tcm id vrcrcem usque OK: are occupant traCr, angulare, superficie plana, inferiors
mag^t oblong & minus que conugftz. Microscopi h* (pcc) videtur confare filamentis
connatis, quibus anthem **m** wblon age in circumferentia adnascuntur. Fruicum non tu-
lit. Credit in America torrk, ibidctnq*c* calix palam, quam ejus folia cotta in olio
cedtat. **T O M** IJ: nivcum lata fundit. Ex minoribus foliis aliquod adit*at* delincentur;
nun *nuzti* gcrmoo, «ithera & corporis volum clavatum. fa calidario Julio «ortiK- In i-
ne Plumieri exhibetur tota planta multoties dominata.

TABULA CEINTESIMA QUINQI \AGESIM VIA OCT\N^V

CISTUS LÆVIPES. *Linn. f. 367.*

Cibus fi
ens, foliis alternam confertis, inqualibus, setaceis.
Gencr. prct. /J_g. , 94. ui. , 4.

Cibus thymi folio, fixatilis, italicus. *Barr. i. 290.*

Cibus humilis malifolia, camphorum tenuissimis folio gU!is. *Phl. dm.* , 67.
t. 84. f. 6.

Chenopodus malifolia, foliis crenulatis similibus & glabris. *Raf. sp. 1016.*

Helianthemum malifolens, raro liso. *Tourt. ap. 250.*

O adix iignofa tc **rttttoft** perott; eoleque gignit plures, teretes, subfrutescens, adul-
Atos lignos, juniores herbaceos, glauco, ramulos, distilos, in iudem plantis alias
horizontales excentricas, crenulatas, paucas eradiolias. Folia sive sternit, gla-
uca, angula, gstatee, acott. Nulum folium solitarium conspicitur, sed una
cum angulis foliis folio **ok*t<do** o, triplo breviora, ruwk?. que latius claudentia, alio-
que vera stipule, de ramo **• ctufcontw**. Inter hec ex aliis foliis potest alia simili modo
dissimiles folia successive p^ont, ut fasciculatas tunc folia ramis infident. In
eminibus yillois & rariis foras locantur insulari. Calycis harfiani foliola duas
exteriora sunt lincii-u; tria interiora **irian** & unum tot. **jngtftfaN**
verdi purpureaque varia. Petala ovata & apice obtuse crenulata calycem parum superant.
Filamenta **trebia** font. **Germen** triquatu-globosum. Capitu-
la trigono-sufHrottindi, **d**isulcate falcata, glabra, trilocularis, trivalvis, femina in quali-
bus loculamenta continet gemina or***u**, bine cwti **rexa** illuc angulata; difficiuntur de nat-
uris quaque valvulis longitudinaliter emis.

TABULA C'ENTESIMA ftUlNQUAGESIMA NONA.

CONVOLVULUS DISSECTUS. *Linn. mat. 104. Jap. Ol. 1. p. 4. t. 18.*

Meretur elegans hec plantas, hoc ut **»**. **MMMM MN**, in Europa, prosequuntur in
aureo nostro, hanc oleum, compleiore icona donari, quam illa est, nec quinquen-
tum a me ultra, quando fructum examinare nolum exponerit. Tandem quidem
plana una cum floribus numerosis fructus minus se & nuditam edat. Semine ex hinc
Americano macrum portaveram, sed non occurrit ex cuius callebamis locis. Radix rotu-
perosa in calidario producit caules plures volubiles, subtillis scandentes, pilis lan-
giis mollibus alludisque hirsutus, teretes, ad aliquam altitudinem perfrumentes & fructicolo-
sus, carentem herbaceos & hyems persistentes. Petali unum ultranive unciam longi, 6-

milkerquc piloil, folia faftacet profaxk p;Jmara, utrinque glabra; lobis lanceolatis, acutis, 8k varic dide&is. Ex alis ryliorum cgrditur pedunailus. folitartBS; pilofus ad geniculofii tiMjuc, Filial ultra liot; tress, loofiatdine«kc«erfoliorMB, uniflorus vel qian-doqtie liiliorus. Cnlvx daufiis ante floris cvpanioncm eft acuminate - conicus; in iruchi ncduni macuro ovatu-aciiininnms, poft titidmii matnum patens & imrcfcens. Sunc totem ejus folioli arcte convotou, ex obioago ovata, catntettt, cum virora pallentia, lubpellucida, & tucnibrantcca. PctaVt tXbatm cum (undo interiorc porporto lirnbus mar^iu'in imhec (juijiuctobatum, lobbYocoadads cum acumin. Aatfaerc oblongae flarent. Stigma eft parvam globosum & didy mum, Cepfola (uhrotunda, parum deprgfa, mcmbnn&ce*t ii:titia, fiiceefccns, btlocaUns & quattrivtvis confifMSt i» quotitiet \a-culamento femtna gemiiia, dine coovexa, inde tngotltu, g-labra, & atra. DifTL-pimcn-tum eft tobv<fe cordacum & pcUtdam, Floret tjuuuo ad Oclolmm. Semiiia matu-recent Augufto S Septembe*re* repnfenut ramo* pendulos.

TABULA CENTESIMA SEXAGESIMA.

HELIANTHUS ALTISSIMUS L.mn. fift. pig. 569.

Ctrr)fantificmum vir^iniamnu altifjmum, puniccis caulinbus. Merit, bifl. 3. fag. 1,4.
s. 6. r. 7. /• 67.

Radix li^nefccns, rora & perentis mifro filiuntiam caules producit, et Sbl, teretes, medolla nives farctus, fex vel iulur^o pedes alt.)s, cs Tufco purjinrarcciHc colore migis mifinsvc tini>(«, valde foliuf iiam partein glajros, fuperne divifot in ramos asperos & itiliirto". Folia funi ex ol :mccoLita, acuminata, rariter atquc ot)i^o r vil etiam peduncul iftoviremil, nrtaiuata in petiokM breves & fubciliati^o, ciultna oppofta fubternn ^ f.inipcdalin, ranica inordinate alicrnania. Ramuli etongantr in exteriore oj uniHoras Icrfutus Sc c 1 uigofti v^Jte, Villufa ft ciliira, vinat & laxias patent, interior* interne nigrefcunt. Corollux in radio funt CrdMT ticdecim, ftavx, lon^x, tat intc^errini ipicc fubdentat;*: Corollularutn Li titnt^o iwud multiini d\ ventricofus. Lik-c pdbeide pallen cum cpicilms atrovircn- Anthers ni<r,j: in principio c^tra carotulas tot;c eminent, MgnMfl coofptoM tune nulto. Hoc (c brevi ewremitatibus iuh diverijentibus de anrlcormn ragioa. extricat, h-incque, lie p.nibtm iliverttemlu, ita deprimtt, ut intra corollx tubum tandem occulter. Gemtiot cum in fiofcti ttisk turn in foniam xque magna Cunt. Crefcit fub*::.

PABULA CENTESIMA SEXAGESIMA PRIMA.

HBLIAN THUS TUBBROSUS. Ltm. 0. pag, 569-

Hcfentuij indicm Eoberofata Baub. pin. I 77.

Clry lantlicnimm btifolium bftOfantffl. fldtifc. ^rwfr- ?o-

Clry faiitiemnm perenne main^s, folis integris, americanum tab<rofiiim, Amor. bifl.

5. / ag. 23. r. ft. ». r / . 19.

Corona 1bis, pr rvo fiore, tuberofa ntdice. Timnt. in^. 4R9.

Flos liilti Farncitantis; Aflor peravkmis tab<>ft». Oil. ecfr, t. p. 11. r 1|-

Flos folis pyramidalis, parvo ilorc, tuberof* radicc. tta; h/J. 355.

Sol ah,f, mus, radice tuberol'a, cf*;ulenta. Hail. Rupp. jot. pag. 1<8.

Radixannua, circiner femipedaits, tere^o, digirum vel pollicem crass*i*, perpendicularis, cmis *i'ui*, intus albirit, fibras in iot*i* decarfa luns;as cmitiii; inqtc cauki¹- terctcm, ejusdcin cralfitxi, lcabrum, tirimiin, lobligocora, medulla folid* a (ex ad decem pdcs at turn, totum foliulum, annuom, & fuperne in ramos paoicuw-tim divifum, pkrunique paucos, quia mt;riente frijorc prius pcrit, qnjm integral* pifcatur evoliitiuncm. Mcdiam circa xlbtcm radix pnmsria verrucas vcluii qnx, paulatitn increfendo, tandem Ubemc an run i *o* in *a* ifas augeimir pugno diffonncs, alias stiam minorcs, in capita f.cpc varia exttiberantes ui pureo rutwn(<, incus allida^ & carnofas *f* x *bis proxim.*) aitno i; *o* caules ex sediuniu > tque lie planca propagari pergric. Minora (ic tuber* multiplication! divantur, niaiora co- *Lii* varicquc prxparata opdmnm tlant cibum; uiide luc jiin a tango tempo; in Hun^aria in turu vcnibant, ante paucillmo; annof rtunc cium Vksuat venalia *Jia Cut m*, *scut*, *fern* W, l^abra, alec: *na*, *majora* crinc pedalia, ultra trc* *nervos* pnncipilioic per petiolum tlcurrentia. Calyen cummunis foliola funt UnccoUto-8^{cu} minata, airovncntii, p3is albidis uliata, imbrican, numcrofj, exteriora *magni p*, Corollx lutrt in radio tubum Itabt&t br<%tTituum, litbunt n *eximum*, ellpticu(n) gerrimuin %d vix e^identer bidenunnn. Ant her JC ni^rclcutit. *V* *Ex* tea. Aucumno favente tlurct Od^bxi & Nuvembn, hiac ran&OM IVjnua porfict* America utcum duo(.

TABULA CENIESIMA SEXAGESIMA ffiCUNDA-

PAS SIFLORA LAITSITOLIA. ! *ft.* jyj.

Paffiftora arbūm, lantinis foliis, americana. *Plak. am. 281. 2. 211. f.* V

Cleome us IIIJK i, fructu ciriformi, foliis oblongis. *l. a-n, tm:r, 64» t, %Q**

Marquiss. *Micranthus* *n. fax. tab. : i.* f

Tandem huc plants, ant anno o2decim de feminibus ex Martinica transmisis enata, anno prios Rorer. *fructus vero nullos*, cujs ramum pendulum flo- hoc rnos iores prudox t, I rtntern *txhibeo*, mimique node antea Mbrifti itori* chtfmderem tradō, itla, qut pam cdidenttn. I ailim in infuta M fpnnte prorenien montuii, <jutni ad ripas tocTtawun Ikiuraqi boretit denfh, quorum . *lolaeft*, mi junior** terem virtme. *l>a* tubet ex oMootfu ovata, acuta vd iutJJa, hrvtreaba, pan*, tie untgbndiuafu fuff rara IOKM fulment li tcm, bvotocri inphvIJI 5f calyci proxime adrtwif^ Uutoh Itint ovaa, acut i •V rtriter destaiia vd mtr^crrimd. < i*ltola Uncobut, ;otcfra. de vrenita, iajtM cx carueu p<Uidoqilc Wat, Petsli Mgaftef l<nceolau & »• palltm, im». Oinnia hafC fl iem frft furfum ft<aumur. ?j(t) fern tx tlbo ptirpiiff St vi(ita<co tr > I ft ctcfamer vartc^ataru & patenufOnwrum ttem. Ar maia trial vci quaruor piUct.. ;m uvatut 5r tttrmque]>qtb trei uncut lun^ut, immaturu* vire&<. mat foratur, ut levi acte le fructus compresione exiug .tide omtn cum cwn- bus palpa & ofbc ri pollit. Hrc « aquCii aftaj eti, subglutinosa, dulcis, spiciflma, & proprium iraot aroma, Ewrop». *ma minus quam incole* .:(««, <; *alis v...««* Pupines dc U<m e AnifluUuncy-SucUei.

TABULA CENTESIMA SEXAGESIMA TERTIA.

I'ASSIPLORA SUBEROSA. *Unit, jyfi. pag. S99>*

Palliliorx aifinis, hederx folio, aincicana. *Ptk. aim. IOJ, tab. n o . / . 4.*

Radix liserca 8c ramofa eft. Guiles pcrennes, ramofiffimi, & dcibles, juniorcs terctes nitidique virent, adulti olbedmc wbdicuniur fuper cortice, qu-E paujatim incrafle feendo illi fibrofain hlfomquc degenerat materiaii, intra quam tamen corcici priftinus vi ror priorque ni(idiias pcrftHuni. Run* oliicurc **pnrpan&uae**. Folia funt ovata vc! **Itncolaw**, acuw, **ptef**aM fenwrfotw vcl mtegenriro*, gUberfc«**, iipc lucida, craffiu fcuia alterna, oris ud microfcopium villoiis **Pettoio** infidene purpurafcenti, fubtus **tereti fuDeroe** fnlento cum fulci **mrgfa»ibi« bre*fcer** tiliaiis, glanduk utrinque munito obtufa'cum apiec **pwfor»to**, altertiante vcl **oppofua**, brcviore aut pedicdata. Stipula: funt **robol** t;r. **Cfn** ~~ial de axillis~~ exeunt. Sic ctiam pcdunctili plerumque gemini, raro foliuri, **qui** florem gerunt lingularem, inodorum & calyce ddtitutum. Petala quintjue ex lanceolate **oblong***, **obtafc**, **pta»i** & cum virorc dilutiflime flavidentia, **poft** fxcundauuiicin peractam **finis** ptilatim **mqpt** rubcfcimt, in fruili emarcida & **fbfca**; orta ex bafi cominuni plamufcnln & dcemfukaia, Coronx iriplicis fibrilljt extciores longiores & reflcxx fl-ivcnt cum **bafi** atropurplea. **PibrSte** ordinum interiorum breviinms ex atro rubent cum apicsin; ~~s pallidis~~. Antlicra: fiavent. Styli fmic trcs vcl qtiatuor. **Frugal** et bocce [^]vata, giabra, olr ~~reformis~~; **turaflane vtdacea**, mollis, referta puJpa dulci & ~~scropurple~~, , 1 ci illi »busque **ovatfc**, **comprdlis**, obtulis, **fafcefcaribas** & punilatis. Floter in caldo,uo **per totam** xltatem, & **fmStui** fert matures aiunerolbt autumno. Nyn aufer m tn Iviwnytniu addere Plumicri itones a Liuuau **deutt**, yuud aimium abludam a planta nostra.

TABULA CENTESIMA SEXAGESIMA QUARTA.

j i PATORIUM ALTI8SIMUM. Urn. M pag. j 37.

Eupaturium frotfceoi animum; **floribus tlbk**, ioiiis **Uaewhril i** infimis fccratis, (upcrionbus **bHagriaBga** ~~floribus~~, Claytoni. *Gvn. virg. pag. n < .*

Eopicoriuni virginianum, **Inngitlwil** & anguftKfiftiis tollis. *Mvru. bifl. 3. p. 97-*

Raj. 187.

Rndix **fab** dio perennan ~~s plures annuim critic cauls W&*~~. **tWWJ, MM** foliosos, ~~s plures annuim critic cauls W&*~~. **Folia** funt oppofita, ~~s plures annuim critic cauls W&*~~. **subeffilia**, dorfo sub- raro quedam re ~~s plures annuim critic cauls W&*~~. **ftcfa** **I»emu**, tunnquc ad mtcrofcopium vaJdc pu»6ta», te villofa & trinervia, ~~s plures annuim critic cauls W&*~~. **sciculatum infident**, ~~s plures annuim critic cauls W&*~~. **ca. Corollie albo** & qumx. **Anthera** mgrx. **ftipwu** **ilba**. Horet Septembri.

TABULA CEN 11 SIMA SEXAGESIMA QUINTA.

BRIQE1ON VISCO81JM. *Lm. fyt. pg. 549-*

H aurc, WB« gf«torf« & ~~graveolentibus. Tourn. inf*~~ **4S4-**

Cor. ~~27. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.~~ **Dod. pent. 1. l. 2. c. 32.**

Conyzza mas Monspeliensis... orata. Br. monsp. 75.

Conyzza mas Theophrasti, major Dioscoridis. Baub. pin. 265.

Ad fepes, vincas, in inclus & arvfr per tmaximam Europe mifralis pattern crefcit, culos. o jam cadem
per deem annos fubrttit, hyeme tn h bcrna. ferne fuci abignati, fo
radit plurmi, crcli, terere*, bipedak iabri Sc < .perne *--
rentes villofi li, timplices am ramuti ad baii. Iulm fuit anguitc bnccolata, utrmquc Micmuti, acuta, (trnu manii'dhus vd oWnletius, fumrm ctiam imcgcrnnM*
vitlofufcula, (tilfcabra, ptrum graveoientta, duas u 4a, inordinate a-
ternanai primi. Ext catilctn. Hflibtki vcro unuila c : :C |* weTl
* fculpcore c ri, ereti, lts folbrum in fuperK>n! cttliam Sc ramonim p»n* eveunpc-
dunculi uaifl communis. Cal, iere rci (oin>ti, fumrn tptyHi. Corolle
eft turn z, oblong, spicis bi-vel tridentate, rariis integr [•;-]
nee mliliimes lute a fex n rigini, rrinwr , P*icnri
rifimr, sumero variant a fex ad t CorotluJx dii'ci, intnene & ftigwwta eun ^
& Dabri, nt. In oamibas pappus rt ad icuicm bvmtn ploM i . > -s

TABULA CENTKSIMA SEXAGESIMA SEXTA-

UR TIC A NIVEA. Linn. fij. pag. 622.

Tunc, quo plu rimat po&iti H seres, rx fitmini font, uc n » m effe dcteam 1
binis individuis, quo l>cdtim vid<< mthi eOMigk. Ritijo icrt
glutinosa dimodum. 4in«t ft Ccabrr, ramis ffliHiHin-jiie taU
caules plu, eredm, tinhoc, tentc c . inedolM pallente pwn 1***
flescentes, inferne glabros, rtcrtm viUofidimo*. Stipula font lunc: •! «*, pc!!"^*1** in-
que se tm tenni: . Folia font latiflime five ex laborando ovatis, in acumen
noata, crenata, altcrna, Tubtn romwiio vit confpicao alb* cum w
benibus perque vesuln nmncro&finun rt <;<!>*, fupcrnt atrovircncu &
fi'a } etiolis longis teretibus. Racemi teretes, ramoi, villosi & pa-
tenter ex fctianM xlt egredtaotur tfgm*«um per tot- fupcriv<cui (•<" ^
His >rcs tlrtific inlwJtm. OI\ . five involucrum. cunit< li>U(rf) ovatis, concavis,
minatis, hirtulis, patentissimis, pallentibus, numero incerto quasue vel pluribus. Hec
colligunt germina plur*, ptn minut oQo, ov<a, K U H , hirfbtt, AM
longum filii nnco creckum & pu'fcentem. Plantas innocuas est, nec vel minimum dicit.
Floret Novembri & Decembri in hybernatulo. Etiam agit sub dia. Non usus fui
Romphii Ram: >> na>uf nt. quan synonymos hujus plantae citare, quam plura repugnant.
Species plerunque primo anno sunt simplicissimi, arque frigore hibernante
hybernatulo prirc solent. In calidio iattm <unc rtmeifi evadunt, & triticofum ha-
turn K<U arent.

TABU! A CI M ISIMA SJ \ \ { pi S; \] \ M PTIMA.

NISSOLIA FRUTICOSA. Linn. fij. pag. 471. Jacq. bij. amer. pag. 199.

f. 179- / 4*

Nea al. >1anu rt America torrda hrtio agttM aj gaJU ris nostris quam hrc Nissolia.
Ex. tMMb caules fruticos emitit plures, serratis, calami crassis, lenti-
mos,

❖ ❖ ❖

ma oncrat. Vicinas arbustulas ad quindecim pedum altitudinem scandere in
vidi. In caldariis vero nostris quaquavorum duci potest, & percurse spati
aut quadruplo longius. ^{Hyeme.} quando hic folia d[^] > ^{m & m} fub dio op.
que dependentium syKjni tf iquam repräsentat. Egit integrum ^{im8a} fl,rt, produxerunt que in horto
time. Duodecimum etatis • << • adepta p BoUnif quiuin fero. UM No-
^{us}
v
y
Pin<<; coda ^ SriBofc, tm quatuorve p cuin >_n,uri icrminante. fubov.th, ob us acuminatis, m<<gcrriin.s, brcv.ccr.
Pedunculi communes i illi colligunt flores numerosos; prodeuntque in ramulis
junioribus pendulis cv fallorum aliis, & ultra haec nudis quibusdam tuberculis; in lo-
co natali sic saepe efficiens paniculam MhA. & florigeram elegantem. In nostris an-
tem florentibus plantis rami fuer-m.-*<<. Flores inodori parvi & lati, marcescentes
M pp urbis varie ^ tur. Capsula cinerascens ex basi tereti, que unicum (reliquis
usus & faberis continet, excurreit in aliam mem-
bra. racem oblongam kJl

TABULA CENTESIMA SEXAGESIMA OCTAVA-

SINAPIS ALLIONII

Clarissimus Allionius primus nulli misit somnia hojas plantæ, cui, nam nullum synony-
mum reperi, lk-men triviale a celeberrimo datore. Ab illo tempore & pluribus
clisis sanitibus ac sub titulo semper Sinapis brasiliæ, quo in Systematis Linneani co-
mo tertio 1723: describitor. At vero quoniam sit, obstant statura nec Brasilicæ,
nec Lttftuer, *ola non oleacea, "o bver, (vi) & verbo eriq ue alia. Radix si-
bra albida & annua est. Tota plana aut est glaberrima, aut in canale fallacissime dor-
so raris rostis albinisque adspersitur. Caulis solitarius, teres, nodus, ramosus, &
fusca. Folia omnia sunt pinnatide laciniosa, obtusifolia, insipida, la-
ciniis in «q», l., G pinnate dentatae; summa corolla. Radicula, petiole
corioloed * ^ 13, alia absunt nulla. Flo *TS<<S%\$Tr* er locantur, ferme in-
odori. Qlyx cum Wigao vtreo «•» p<<- LkuuiM* Sic etiam anthers.
E: rcqua comtffi, & *Mk convH> cum ck, <*re L..nn^{as ad} ^ appref-

Jjifcun_t ulrro, & color. K-dcnc ^ ^ " ^ f Sum. Se<<JS ^ r * «•
pfanenntm altn bcotomenM * Sub d.o Horet ju-
quolibet locafanwnw contewnr circitec quuu < fusco ferru^nc
nio. Scmint perficii fub JutU finem.

TABUI A CENTESIMA SEXAGESIMA NONA.

SINAPIS INCANA. 1

peg. 45.
Sinapi foliis radicalibus pinnatis, hirsutis incanis, filique cornu suo breviori. Hall.
bjl. helv. num. 463.
Erysimum foliis subincanis, filisque brevissimis. Herm. paral. 155. Vall. par. 51.



Radix « temii fitf ferum fc fibroft & dbidi emlcm pgoit tytdajen, fuUv. etem, ta-
mcifffimam, vjios breviffia is & vi i confpicus asperuw. Folia radi..ilu ft intinu,
qualc feporatum in tabular mwjjine liftitur, font pumutfdt: feqfaaiis inzqnali(cr «C obfo-
Ica- dentaus, plerumque nitcrnanut^, obtofe, extiitw ttuximt. Subfcqut oblangi, vel
fubovaia, iinqualJter liou«o-dcnt«j , «d bafui | xpe ariculat. Summa lanc:ob« m»-
gisqu tceu, Omnu petioUta, fuUipcm. c nescens, pâisque vix conspicu IJCI*.
RJHII dongantur in racemos virgww, fup^{rr}; florentes. Per a fuottl)tei(obverfe ov*
u, & calycc pailide & v_o daplo longiora. Siliqu erigur Itur & ,4 c ^,,, vdou f ppi-
immtur, ttmnacure tifrwuJa; 1ature glabiores, breves, tenues, recte, oblong^{xgt},
comprtOie, roftro dwwi* obtullafcuio. S_<miru flivdtum. G etat ipome ia Eo»l*
•ul>r- . Sibqua nuiuu cihu adptaftittr.

TABULA CENTESIMA SEPTUAGKSIMA-

SINAPIS ERUCOIDES. Linn. fol. /eg. 445. m n . <c*f. 4. pag. 322.

Sinap hispanicum puniolum album. Tourn. fol. 227.

ivestr, flore albo, in lk* aW. ;.. 1 j :.

Lix radice ramosa albida & annua caulis erigunt scres, treffis, pâlos brevibus scaber,
ramulos, pallide virens, & feliq speditis. Folia sunt oblonga, pinnatisde firmata,
uix qualim form*, vir enia, utrinque asperiusculi, aur, nervo medio excepto, glabria,
ndje~~lfc~~ inferioris in periolam angustas, reliqu scilicet. Fani producentur in re-
CMW». Ctvx IMtrm & hirsutis rvt de vire. Petala alba, obversa ovata, subemargin-
ata, ad apicem macula flavescens interium in ignis; unguis insitum longitudine ca-
lycia treffis, nec petulis. Stamina calycem vix superant. Siliqu falcatares, glabri,
compreffaque, on* cum pcfuiKi lis pncolliont sunt, deinceps in rufrum compref-
planus n. & ad apk_n enwrgpnatum. Semina sunt pucra & rufa. Credit ad Italie & Hi-
spania vinen.

TABU A CI TEIMA SEPTUAG1 SIMA PRIMA-

SINAPIS JUNCEA. Linn. fol. pag. 441.

Sio.pi indkurn mtximiMi, Uctu, folio, Htm. f*r- a 30.

Planta annua, treffs, ramosa, bipedalis, coti glaberrima, perim lepida, caules habet
ramosque suberectos • pe_{tai}Kal; zucem & sanguines magis angularis. Radix fibrosa
albescit. Folia inferior i obverfe ov., petiolata, basi pinnatisde, interpolarer ferrata, &
scars alternantur; superiora sunt lanceolata & squarroso ferrata; summa ex lanceolato ob-
longa & integerrima propter serratum basin eradant subfessilia. Racemi in plant fru-
tione ad sex vel novem & plures uncias elongantur. Flores odorem sinapis nigra pos-
sida at fold grana; calyx paulo cum flavediis virens, petalis antherisque luteo. Si-
frisquiplicatis sunt biuncitio, obsolete quadrangularis, ad femina turulosa, levi-
icr comprcta , i inidaque. Diflippmentum ultra valvulas ad tres quatuorve linea in ro-
Arum rt sum excurrit. Semina sunt flocoscula & nigricantis. Polanculi proprii ad an-
guium annum parent. In planta floscence sepe raro numerosi de caule ramisque prin-
cipaliorib is egreditur, ut planta raro merum desinunque raro sum foliculum formet.
Tabula adolecentem illam propinat. Sub sua flvare incipit M.jo & summa dat natura
Julia. Aliam & Chinam rccale,



TABULA CENTESIMA SEPTUAGESIMA SECUNDA-
OENOTHERA LONCIFLORA. *Linn. want.* 337.

Eicpins pfanti, modo biennis, modo annua eft. Tabula annuatn exiibct , primo ve-
re facim , Scptembri Uorentcm, prod u cent cm caulem centraicm e rectum ante latera-
Ics ex procumbemi atlftentes, quod rarius accidie, dum plerumquc cmlcs latcraks
plures ex fuliorum radicalium aiilis exeunt, in orbem poiiti, jamque longi & florcntc?,
priusquam centralis prodit, Horum autem **rudiment!** in iconē jdin **apparent**. Radix
ubicas & d ;itum pollcemvc crafla promit folia radicalia, in orbem patemia, longe lan-
ceolata, vtrfus **b&fia** iffiiim aiicmiata, Icmipedalia vcl longiura, acuui, dencicutata, ci-
liata, vircenti cum nervo incdio albkante, utrinqu: pubefecnia, oblique nervofa, cra-
fuscula. Folia ejulina funt **ikeroa**, Jcfili.i , huccolata, ccterum **ndtcatibm** (iiniltr.
Caiycis fam terete*, v-jrentci, **rcifaj** ink-rior.i adfperfi puniHi fungninea, pilis albidis pa-
tulj^lquc hint, tandem bipedalcs. **Ftores** folitarii iniident foliorum c.iultnorum axillis.
Mermen eft ceres & liarfuium. Caiycis **hkfat** tabus fermi: **tripollievis** & Ariatus pailiie
rubefcit; lacinix concave virciu cum marginc rubente, ante explicationcin limbum for-
rungenuni. Corolla fuavoylcns, fpcciofe, diainctri bipollicarU, petala babet ob-
verfe cordaia, valjs emarginata, anipla, flaviifiin,i; qui color in couisivente kerum aique
marccfcnte florē mutaturper aurantia^um in rubrum. Fraclus obfoletc cetragonus, qua*
drtfakattu, hirfui* , apice quadritid^ otnufoquc. Sconce crefcit in a^ru America: au-
stralis Ii>nai(£»li. liiiiiti Jruclu> tnaturu^ •Aymrfcin-

TABULA CENTESIMA SI i> IIAGESIMATERTTA.

CORCHORUS TR1L 0 C UL AI 1S. *Linn. fff. pag. 369. ma*. 77.*

Aica p'antfl, io Europam a Forskihlio mi.Ta, fub dio apud nos argrius crefcic , in
IrtO bete vegetM, annua, p«dalis, **tott** fealtruftula, crcta, fiurens ajunio ad
SeperobrisB, **prims fetnina iub finefl** Jolii **pctffckat**, Cauies **Scnoi** Tunt terei». **PQ-**
fit font iltern., **peti**, ia, ex ovaio oMonga, **fubliftteatt**, ferrna; (**crttaris** inrimis **infi>**
tiorum musici>; fitpcriorum, nee **ctfiwa** omninitn ant femper utrinque, **ferratara** iisdem
feu terminati^l. **Stip** be funt fubfciaxsx. Pcdinciili **ferine** upponantur pctiolis , breves,
ab **an** ad tres flores brevissia IK pcdunctlbtos **ijSot** fufUrtiuct. **Cdft** purpurafdi obfo-
lctc, in (lore tlaupo (jutniiangularis. Pct.ijJ fu it o!vers^l or Kt, levjter cmarginta aut
integ rifflw, Java. **S**;amina urticer vi*g*nta, **Anther** **laxet**. **SfU^atbttni iaHi**, rtria-
tj, **s**equetta cum angulis linea exaratis, **scabra**, **spic** m (implex, **trilocaUris**, tr.vaU
v*g*. Semina parv 1 & cxrulca ierie longitudine duplici valvulii ttKountur* Cuptib nu-
tun aperta & **IaKO** firtuncur in **margne**. **Floret** xUtc.

TABULA (I•NTESIMA SEPTUAGESIMA QUARTA.

ASTRAGALUS TRIMESTRI S. *Linn. fff. pag. [499 .*

In Egypio sponte crefcit. Sn!» dio Iers primo vere, apud :ios (lores Jtinio Juliaquc,
Agusto maturos frt
A, elonga lilius largitur, hrcvi^nc tune exarefcendo poit. Ssrpc jam ante
cttilit in faba tiortem fctpu> florigr unus alterve dc foliorum fubradicaSium wxiilis cvfur-
ults t<nc did: effigit spic WiimqBI bnttb m **IKM AM** ptntuia in (olo **Br**-
do. In bono tandem cuili'. ail. 3 N, rubctlu>, **pBtg** albu tU

gidioribus appressis hirfuis, & ad bafin panim ramolu. Foliola coste communi tereti hiriutulx & creibulculx infidem utrinque tit plunmutn deccm vel undecim cum lirari, oblonga, emarginata, futilturfuta, Integra, oppotiu, (rcviliime petiolata & semipollatia. Stipule fuit fctsex & pilofl. Pedunculi co inmunes erignniur, «illtrc[^], falitsru, terete, vilioii, Iulis breviores, extenuatae rictuosa foliointes trrs qitatuorvc Hores ftulos. Calyx virens & pilis hirtus fuscis denticulos habet subulatos. Petala ft»["] P["] lide ochrolcoo. Vexillum calycem bi superat. Ate ftim obtuse. Carina concava & fuscicaw. Anther* anranti icz. Legumen subulatum, glabriosculum, bunciale, pustic carinatum, antk teres & hic longitudinaliter delicens, subapicaliter arcuatur. Semina pallide c. Reliqua flavent character habet. In n.arjine labetur kguiuob if* dtfletti p*n cum femioe.

TABULA CEN 11 MM A SEPTUAGESMA QUINTA.

GEUM CANADENSE.

Caryophyllata canadensis, agrimonie foliis. Hort. Reg. par.

Sub prtr: ato titulo radicem vivum accepi ab amicissimo Spielmanno, quz, dum jam
tnennium in horto proxime editans Geo urbano crevit, plantam constantem pro
•b hoc uci facile vel primo intuim, sic verbis vix distinguendam. Habens idem utrique
eft. In Canadensi ve > (Kta!) fuit alba, & calyx ut plurimum hervierat. Tocius ps
ix viror non aUco in u gredinem rendit. Foliola omnia magis attenuantur verius bafin.
Jim 10 Jenum ntcnf Aarn, dum Geum urbanum primos flores jam Maji initio profert.
Nullam in raiice fra[^]rantani detego. Hinc eis novum speciem propeno. Ad marginem
4 filium nullum additur, quod nec ab urbano discrepat. A Geo virginianis, cui Lin-
nus attribuit flores in floribundis mucronis, pedunculus verius florem incrassum, & fo-
fin ndictlia f^obbipinnas, quodque non vidi, proper hac ipsi separo, quam in nostram
planum mtntme cadit.

TABU! LA CEN If SIMA SEP fUA< GESIMA SEXTA.

VERBENA AUBLETIA.

E*Cjf^{<t>} s planct radix ramosa fibrosissima subida & perennis caudex jam primo anno 100-
nit p^mn ast tendentes tetragonus ramosus pedales fabicabros & fchlichotomati, ad
basim, quis terram tangunt, radices agrestes. Folia fuit opposita, in petiolas attenuatas,
fubovtta, inqualiter ferrato, incisa, venosa, buncialis. Spica pedunculata, prolixa
in floribundis elongantur, dum in principio flores capitati fuit, quales tubula reprefen-
tata minore, qui ab inferioribus sibi succedendo spicam tandem densam & bipoli-
carem ex calycibus fructigeris compolitam formant. Calyx oblongi quadrifoliat & se-
miquadrifolii dentatii fuit fucacei, quorum duas anteriores herviaras. Corolla tubus 70
lyce longior ad basim pulch, superior porporascit, incurvatur, & ad fuscum et hirsutum.
Limbus colore rosso fuscans eleganter rubet, & planus se fobabilitus in locis divi-
ditur oblongas, apice latifrons, obtusifilias, in IMM emarginatum, aut emarginatum
plures vel omnes. Filamenta fuit quatuor omnium brevissima, nubiferis flavis. Stylos
viret. Sigma est obclusum cratibulum & fabibulum. Semina qnmw, lomatia, gla-
bros, nigricantis. Tora planta hirsutissima est, florens sub dio a Junio ad Novembriam. Sub
Aubletia nomine a Dickie feminis haliti, quz genuina Verbena straudae species est, ut
ab hac neque illa n^K CTfii. In Praevis & Floride sponte crescere, illutris Linnaei
mibi autor est.

TA.

TABULA CENTESIMA SEPTUAGESIMA SEPTIMA.

CUPHEA VISCOSSIMA,

Radix fibrif & annua cniilem cmittit ereEhim, terctem, glanduifo - pilofum , valde coorn, tandem pedatem, & ex foliorum alis alternatim & fubdiftiche ramofuin, tic tot.i depi&a mca junior plants in cadem adulta pro ramo qfiodam inferiori haber quac. lulu tmx ex ovato Unccolata, bad ectcnuata, integerrima, acutifcula, ciJiata, subvili Jufa, pcriolata, omnia oppofita. Pcduncui breves fditarii & uniflori inter pctiolos de It & minis ttlcrnatim egredflmmr. Calyx flrii clcvatis notatur, tubulofus, pilis ca- !mdulofis vatdc vYk&&OS , inferne ventrkufior, bail fuperne ultra pcdunculum in gibbuni prodn&as, taterne a tergo filameatoruni rubra pulic barbatns, apicc fcxKdo: dcntiLui trihus ftperionlnis latifm>; omnibus interne purpurcis & hrlutis, poftqueco- rula! Ijpfam connivendo tebtun LbuJent.bus. IV[la fcx, ex purpureo rubra , obverfe ovata, ungue brt vi calycis limbo inferu, obtafilRmt, plans, patcmia; quorm duo fu- pcriora furfmn vcrfj triplo majora qiumor rdquis deorfum tendentibus. Illatnenta duo- decl m, liiliuata albidaquc , iiiicrumur tobo cilycino fiiprt medium. Hurum duo om- nini i lreviflima & barba pilis purportii locauter ad latera lacinia fuperioris; rciqua bar- ba prxdita alba alternate pauxilio Jongiora fabjidnmar pettJij minoribus. Anthera fla- vent. Sola s hifum - & albus crigitur. Ca-iftb ovjta, obtiifi cum fvlo fuperfrite, ca- Jycc minor, tenuiitne membranacea, pellucida, pallida, dorfo longitudinaliter dehifcens, uniloculars, Seinina a deeem ad quaruordceim, fubrotunda, comprefla, glabra, fufca, receptaculo medio columnar! carnofu craflbque affiguntur. Hoc fgnont una cum adhx- rentilnis itmiutbm , forte (jiiod Uxc tama totque intra Cawfitlam parvam contincri nc- queaiit, copftilani tunt ijifo calyce longiudinahter disrupit, extra candem (oras prodit, erig turque. Et (it hoc in omni conftanter flore ante maturtatem, ut fie in planta ant- gioi enna fcniina extra pericarpnni imcarefi ant, fng uhri pltacnomeno, quod (tirpem, Lyc iro cricrum quotai maxime alfinem, ab hoc inllgnfter ttiMungit. Floret in caldsrto, ubi, qoant fub dio, w gese h tins, n Junio adO&obrim, Peria 'jrte in zona Amen- natomda eft, qaoio iub Copher Browne i titulo uiffTa femiu fuerunt. Bmwneus vero phnOB fuc fiorcs tribuit ^cato) terminal ej penupctalos decandros. Cuphex Browneanx speciem tame i credo, quare DO en gene ricum fervavi. lu niarginc exhibentur fcorfim feme D, reccuuculuin, & flos jam disriptus.

TABULA CLNTESIMA SEPTUAGESIMA OCTAVA.

HYACINTHUS ORCIUOIDES. *Litm. fyfl. pag. 248.*

Butbum ex Pronwntorio Bon* Spei accipi, fubratundum, ftruauraque & propagandi rati, ae Uvacindio oricntali linnem , qui auimno «rr* in cttdarfo commtffiu fiorntc riroximo Februario. IA icrine transmissa »@arou mihi illufris Linnxus, efc futrn Hva- cinefxim orchioideum. Variat igkor uagioparc INK pbnta ; quod pacbit facile, li lotwt trc% llnynlmal utramqueBuxtxtumiiiam, a landau i'v0 MBqoun fynonyirus ndduflas, mcamq;e hnc compararc. ioribus ft la duo fol * W* autores tnhuunt; mea tamen femptr polyph'1^ •**. NI(lil tanca decidam, quom 'inicam lunc vidcre contigerit. To- na glabra eft. Foli int plura, unifommcr vjrcniia HK macutau, ex fubenfi^rmi bifi in figura,, IbbakOM terminau, dorfo convexi, prona parte cartnata , extretnute vero 1 nnnarri . atqua ctam iiifcmc plana, canioft, femipedalta vet Ion- giora. Scapus erigitur folis paulo longior, subteres, ad fwre* obtufe anRULatus, vireus am *Wpc;is maculis puoi! 1 U C lerru S'nei*» & ioperne detife raccmofus ex fioribus cir- X ci-

citer triciwiis. Pedimculi proprfl id aogulum ieotum egreffii, aJbiJi, bn&eo!«iw alba fuflulti, tioron fuftinent crctiafuluni. Path fex nivca td baiin usque dividuntur; quorum tru exteriors brtviora, c^{re}ta, h^{ec}ccotau, otnufiufulj, & concava, fort* ^ •pkem macula infigniuntur vireote. Tria m(criort cum exterioribut slternmtar, c*«r- fc linccolar*, obcufillima, plant, &fupenie in imibum pttcmi. Filament! albem- Anthera flavent. Cicrmc ^{texfoliatum} viree; nea pocu | u, hoc nllot poroi mcttisetz, dete- gerc. Stylus fabulatus & palle: in fl. ina abk t'eme fin; pler. Cpt U mcml>r<MC<> obtufe irifukua & trilocularii cooinct lemin pMiofEau, arrs, rmg*l'i*, & (ubrotonda cum parvo ntrfitque icumine. Odor floribttt eft fjrrmgx. I tot a_otiut in Uiert tdiNc.

TABULA CENTESIMA SEPTUAGLSIMA NONA. CHEIRANTHUS F 1 NTSTRAUS. *Linn. Jf. pag. 443. Spec. pl. pag. 914.*

Ex n_oke tvienoi rsmaft Jk tlbide primis ^{anno} ffargit ctatts intt, digium ^{minimum} eriffus vd i«titior, ertfh«, t^{empedan}. maxifmm pmen Mm p_ot^{er} nftkas, ad inCtn vb (aim ddap4 nudt). Hxc fum Unctolata, tnccgra, utrinque iacⁿ, coriacea, oU*(i*, IcfSlis, tind*M*, KCOTVIW, td caul^t tpicttn vttde confer" * frowiofa, hjreme re inftriora cadum plan, alts ad apKtn! ^{nova codem or} >^{^c} P¹* d^{un}, ^{et}ndenque ex culis ext[']ntatta «1bra» o«ca«rfii»a; z, bisi verni vel qttnerm, in P^rincipio unicus, pedale wngwdi, drtnuin pedalo, zvilli, strifti, incani. Florti cooveniunt cum (Cheirantho incano. Silqua brevio, magisque crassa, exeriffl etiam fio[']lk, ufea com msrgtac m »JbnJu. flo et Mo ad Juliom. Sem- nt pe sicut O hbrj & Novtmbri Qti^oo durti in Iternum annum, rami laterales rac- mferi punci de ciale excunt.

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA-

OXALIS VIOLACBA. *lam. ^t^' II 8.*
Oxalis tpu m_olufloro; foliu r^odk_ota>gf ternatis, foliis obverse cordatis. Gran-
ii. 71.
Oxy purpurea virginiana, radice squamu. Tourn. ijt. 89.
Oxy npurpurw yir^tti>r«, w! ore illi lone node*!*, cipitul, polypit^m defurc-
tint. baU'tUs ttt m ttbo corvtao conflati. Plak. abn. 274. l. 11. f. 102.

EkgtM plintob sibtrm fab d^o trw^o fgit, hyemem in repidatio. Sylvestris mecum comtnanicus tb ^ompHfflWa Orono* ^o virginiana plana, min cuiss illi, quam in fa- xolla inTehr Cⁿbe^o Montferr*i* fpomc provenientem vidi, foliis habent duplo minor,
tare, dum lvs ex rella nec curva linea sit, ut in culta glabri, Sberis sulce numerosis, soperne obfidentur denfo sg-
mine bulbilloriMi fuf defcentium, inter que folia egredientes radicalis omnis, & aqua lon-
gitudine scapi. Petoli sunt longi, teretes, cresti, pilis rarissimis adperfi vel glabri,
•Mwi bVi ^obeiirtct In vaginam bulbillos amplectantem. Folios sunt obverse cordata &
gkbra. Sotpi cowprerti, pttofiafculi, ft umbellaci sunt imperfelle dichotomi, flores pro-
ferunt plures, minus fu<c^o*eiwr», ertt>w», am & post expansionem crutios, inodoros.
Calycis foliola ovata, gttbn* lotriii fentw quadruplo minus, tereta, virere pallide cum
ruiii p^orvi^ojue id •ptrau. Car^oMK infundibuliformis petala sunt ex obverse ova-
to oblonga, ex violaceo rubes vura *^o* trw^o iiud adibus securioribus. Filamenta vil-
la-

loft albeni. Antfcene pfllide flavefcnnt. Germen eft viijofum quinquefulcatum & ob. lönjjum. Stigmata capitata vircnt. Etiamfi per totam *ftatem copiofiflmos gvat flores» ~~euflum wnciTffuaflum, matūrum hue iijne obtillum:~~

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA PRIMA.

ANTHERfCUM ASPHODELOIDES. *lim. fyft> pag- 344-*

AmberietUB acauic; fotis pfllpofil, terctibus, fubuiitis, fupine convcxo - planis,
Was bend- «&r4 30j.

Afatiofie fltero demum anno *Rota*. Radix pcrennat, & MM efadit multiceps, contans SI fibris numerate **fewfandboi** M»rictmib« longisque S^apus pedalis, fubercaus glaber, obfokce ongoiatos, pUne aphylus, ad felionim aliitudmcm «bit in raeemam limplican longum nrnumque Pcdoncnli proprii fcnipliIicares&paLuli faffukiaawr braitca ieweca altnd« & mtmbranacw. Flures gratura corticis citri odorem fpiram, paticifimi Tmiul florcle, mane csplicanmr, & fub vefperam claudantur tc imrcfcunt. Pctak fane Iot« c»mn l.nct media vircnte, ft patcntiinma. Filamcnu ««m iutca concoloribusq; villis lanara antheras fuftinciit fulvts. Srylas flavefcit. Gcrmen obtufe trigonum vim. Folia font radtcalia» fubUw, acuto, onticc pUnifHina, aut fuperiora vcrfus ijtundoque leviter canaliculata, fobms convexiufeula iw ut tiorh gibbus altcrum latus refpciat magis, pnlpofs, facco plena fubftavefcenn ipifliwi ac gfarinofo, inlipicia, vix ftriata, ad onis af(«:riufcula ob mjr^inetn acuttim limbo albo fubdeouto ad microfcopiuni ilumuxat obfervanit., pnedttuil, (triOa, bilibus vapinaDtibus m deofum capuc tollepta, extcriora potula, interrra magis ercda, ommio numcrofa. Floret sftate f,b dk>, hyeincm cr*m-f^gens in tcpidario. S«mioa ex promontorioBon« Spei tiabui.

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA SECUNDA-

HYSSOPUS LOPANTHUS. *iJnn. 0.pag. 39*

Ciuria floribui itivcrfif. Wifl. *gatt. pag. 338.*

Tota planta villofa eft fnbvfidaqnc; odorem fpirat forte aronuticam Ingratum Sc At Ncjxta Cataria quiddam babentcm ; btbktKpH proxime ad Calarmmhas accedit. Cerw non video, (1 qmdem gtnera ftabitkodi (Jnt, quare a Ncpeu debuerit avclli P In Cbina fcptentrionali fpotW crctit. Sab dio apud nos t*te vegetae, florens a Junio ad Sepcembris. Ex radkc lignoft, ramofa, fibrof. & perenni, caal« annuatim plures exfurgunt bipeddn, tecra fooi, cedtufcnU, ad bilm diguum minimum cratf, ramofi. Fo lia funt ex ovato c ~~cordiforme~~ » obttifc, obtufc ferntta, brcviter pedoittt, nigofifltmi, op. VoCut fatic mulhinill. Pedunculi communes padolki dupfo longiores opponuntur fibi, tdlclm yinnes vergum latus «d lliililli ^{1 i m} r" fiibdichotomi fl-nes fuftinct brcvifTi me pedunc«^{14toS} o fcx fld {1 u*tHortieccim, inverfion tot». Udit p Unu fepe foliis I¹¹ busdm scrub cum totMcm pedoncuf.^ Cd tubulofus fvriatus, p.rum in curvvus, qoiaMedeoWWi p«rfts, fubbilab.ati«; dcniculis fcim,I«>ceoUatis, feme *q*i*-hbu*, fupcrtrictibm. *infernc* duobu*. P««l, ex purpureo CTerulfcncis faux eft am- plia 1 imbM V*^{tett} ^bii ^E¹⁰¹* *ⁿ i»froris» lactrii* dlar ^n^{1,0"1*} * con- v «* hawd difcrepant 1 1 * * * Uwrdbw Ubii in(trorii, fta viciflim foperioris, cujuj la- d.J. intermedia eft •n-pl-, >** f"t>raund«, wld^ « c< o». Fihmcnu duo corolUm fopertiii. deorfum inct.rv-ntr. Rdiftii *M, coroli* tubo **bmoft**, **b^H** dorfo a. cumbunt. Stylo* intct ftunini longiora decurrat, ftigmi exerens bihdutn ft Kumnt.

Semint quattior, ovju, t: fufca, in t'und: calycis non mutati ft infra limbum vii
atbis fctnidaufi conuucmur.

TABULA UN*i!* SIM V OCTOGESIMA TIRI A-

MELISSA PYRENAICA, *Sap.*, nn. bjj. vol. 2. pag. 55.

Mcifli pyrenaica, culebrer, pf*taguii* folio, lourn. n^o 193.

Hormiaum pyrenaicum. Linn. o P^g- 401- man. ft. 413.

Gallitrichum folio rocordiore, 8are magno vtuUceo. B-^g. bjj. ;. f^g- 3 'v

Qnum charaber Linazans sit ad siccum plantam confectus, hunc integrum suto ex
viva defum, Cal: Per Mcfaton m jnopUvUum campinulatum, fⁿ lundum,
ad oras & exierne vix visibiliter pilosum, sup^r, d^pri sum & tr IORUUM, folios sexti-
turn, concavum; labio superiori latiori semirufido, dentibus acuminatis subequisibus re-
ftcxo - putilit; tabjo filertur bipartito: lacinis laeolatis, acuminatis, convergentibus,
etiam spicibus suis quandoque sepe decurrentibus. COR: munopetalis, ringens. Tabas
brevissimus & Jbidu* li cu expanditur in faciem, (nisi hanc tubi partem dicam,) compann-
lattm, ii plan, calyce ferme duplo longiorum, ex parporto violaceis, idque foris qui-
dem saturate, inca vero dilute cum lineis saturioribus, dorso depresso tribusque pli-
cis eminentibus angulis, fabras venricosam & squalem. Limbi paucimini & con-
coloris labium superius est hoc subeundum & emarginatum. Labii inferioris lacinia
sunt tres, subruende, obesa, laterales integrerintur, intermedia paulo levior & emar-
gines. STAM: Filamenta quatuor pallens, quarum par alterum atios ad labii superioris
crenus usque pertingit; alterum par nec ad limbi originem ascendit. Antherae pallens
flavo fave posuntur crassitum. rli i Germina quatuor stylum evolutum filiformem, pa-
paryscensem, longitudine corollae, una cum flum inibus ad labium corollae superius recte
tccumbens, & ligatus donatum basi tenue carnosus & reflexus. PET: nullum. Staminia qua-
tuor, subrundata, hisc angulata, illinc convexa, fusca.

Fluere incipit altera vel tertio annis anno, mensis Junio, sub dio, & perennat;
ei rtdicc nigricante digitoru crassi ramis & multicipite foliis promens radicalia omnia,
ovu, pio!, gibus, obesa, hic illic parum bullata, obrafe crtniM# inodora & fer-
me iniupta, petiolo ad marginem hissum. Scipi plures, spithamei, subereti, obesa
teurtioni, subrullosi, veris quidem fatus nullis, sed ad distansias paucis bracteis instruuntur
cordici*, Icais, integrerintur, oppositis, villasique, cum infra flores, tum sub verdi-
cillis. Flores utrinque bracteorum stilla terci iincident, breviter pedunculati, horizonta-
liter eodem viru omnes, ut dimidiatis verticilos membrantur, predicti odore aliquo lamui
gratiore.

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA GKARTA.

PSORALEA PALÆSTINA. Griseb.

A clarissimo Aliionlo fob i.-u do dicto femina accepⁱ, qua rr" r mU produvere ball
iltro !nno (!om/). H^r uent congruant cum Psoralea binominis, diversum
tamen coftiUnicm fervnt in per bo ntiKtre tensitate. Casus ex radice exsan
plures, bipedales ret ffcortft calatum crassi, tressi, debiles, breviter pilosi, serratis &
striae. Folia sunt ternata. Petioli striati & pilosi. Foliolis petiolata, utrique pilosa.
dorso subrullosa, integris; in intorn o n n vd tuuti rotu diosa; in reliquis lanceolata.
Sib-

Stipulx hirfutx, paliidx, & ex lanceolato fettets. Pedunculi foliis ferme duplo longior»» ftriati, piloli, & patentillimi, flores colligunt in capituum clegans a novem ad viginti fubodorau^. Bntth:^ Aibrotundx, extriores tricufpidati, reliquat minus. Calyx pilofus, fcmiquiuquclius & vlc infiatus, Petalis omnibus unguis funt longi. ycxilum & ake ex purptiriro pallide exruldfcunt. Catiax ulbidx apex cum purpura nigricat. Stamina disddpha. Legumen infra roitnun, in quod excurrit, est hifpidum. Et reliqua funt ad chara&creni Linnxanum, Ftoet sub rfio totam xftarem. Hyemcm agit in tcpidario. Tuberculj nulla auc in calycc aut in aiiis ullis partibus obfervo; nec vena pccurrenrcs colorant tn nofVris indiv.duis pccala. Prxcipuum difcrimen a Pforalca biruinolli pono in florum magnicudiitc, fbliorum bticodiBe, hirfutic omnium paruum magis tiuibili, inque habitus divcrfttate fac llimc obfervanda, verbis non ita expliuanda.

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA QUINTA.

SCABIOSA AI/riSSIM \.

A fra pJanta ii}arem apud nos sub dio, hyemem in tepidario tranfigic, fempervirens, - L faidco&i 8or« Jaok) & Julio, femina profrens Augufto. Caulcs in annofo ftir- p%tofi, debilci, icerces, calamo tralfiorcs, ramoli, humanum aUirudinem attingunt, luoturqac el craooo 1Jneo brevifimo pollym cralby. Ramos teretcs & vtlofos folia de sonuu oppufica, obrerifl bwccokcti obtusa, crofo- ferrau, interne valde anguftata & [irofundc demata, utrtoqoc labtotucoto&i pallide vircentia, fubfeffilis, inferiors fctnipc- Jil: I fuitmm iCtimin^u &c arg^e pinnatife jnc ioci&, PeduncuJI tcnuinalcs, ten- longi, v]llij(ijuc (Jorcin fntfaent fuaevalemtia \xd7dititn Cumbuci. I rama d ndo cTc di- clwtwtna folet, emktenj pcdunculitt intermediate. Cah s coflmanis habet fbiiola dena, in orbem pofita (ujttilarctn, angude Uiioccoiata, acuu corolla fixase duplo breviora, vil- lofa, aim abundant i frj>c foliolo uno alteroce mmori interiorc. Corollx quinquefidx & radias turn purport p.iilide exrukfeunt, aut etiam palkfcant magis. Anthcn funt car- nett Calyx proprius exterior campanuhtu* & membraiuucc^ albct. Interior ex quinque fetis confit nigrancibus & (uplo fopgforibos. M« bat lioeara & pilofic Stylus ex exruleo pult. s.tTiuumi corona exterioe membranacca cf>. Differt a Scabiofa rigidaLin- n*i, tjoil liuic ub auctionbui coroifat inbuaniurqaadritidi.


TABULA CEN IEMMA OCTOGESIMA SEXTA-

EUPnaRBIA MACULATA. *Linn. Brj. pag. It»»*

Euphorbia mininu (ijkna rtifcfccm. Brvian* jam. f. 236.

Tithym JB, rci(, chemifyc e jflera Virginian*, folns crenatis Sc macuJa fufca degjn- tcr ooi atis. Plak. ab 1. J7suf. • ? • / 8.

I);: «H loh * VBb&rnt fub dio floret totam xftatcm & twutnni quoqife parteni, HK fc« v pole, com fub dio, turn in cal- dard.i, fr nrn»ffan» auotaonis. Radj< iibrota pluro in ambitum caules fundit, ramoffi- fimos, to otwitof telluri pcdSffiinc i«imbe», Wrfetos, rubent», temet, nee d- chutomos <,,»m r-m. tkrrro-fK & ordmate. Folu funt oblong., obtuf. vd .»», ftipernc obfoltc St t^'ter fcoocolatt, OMffM & dorfo p»lofi, 6cic giabra, brniflimc pemUu, oppodu, amnioo numeroft, rat vir».», » rub». «t airopurpur^ncia, rtriu* M X , u. rainulu cwtciiii doifc ageft*. Bore* « « * & bKvUfimc peduncu.



lati **fcliertm** willis fulitarii infldeot, ob **foionun** dcnfum firam vifi **iggTegti**. Calyx ex oblongo campanulas & hiriums viret, Imbo divisus **qtwdrilido** n ^{linimo ciliato & conni-}
vcntc. Pctala fuit quamor, rubra, ma^s **amain** obfolcc lobau, jmcmiffinu, turn
disco fubrotundo **foccfecote** «b». ^{Copala el. pi!itfl. s^j,,, flavescent.} Flo* au-
sus ad margin;m ^{exhibetur}.

1 AM I \ (I \ 11 \) OCTOGESIMA SEP 1 IMA.

« "HMUM MAWTIMUM.1 ^{lin. fol. 33, 34, 35, 36, 37} Scop. carn. 1. p. 319.

^{Critchum live Fan} aitui maritimuin mtniM. Ed⁶. pat. 3* ^{g.}

Ftenicium munntini, live Empctnlt, a_ac Ctkifags. /fr. fc. 391.

Tota plinu *til* ^{verem tritaque educta cm} aratumticuin **hibet**. RmJx tcr«, calami vel ma-
teries, albida, ramosa, valde multice f», & perciiit, caulin prtrn it bipedale,
terctes, d ^{er}, iort crati, se iplos sustentare nctios, riinofcw, lioeatot, tnnuo. med ^{ulla sibi re-}
ftrto^s, modo parpurascens fuitur, modo, ut relique partes, ex viridi glucos. Fo-
hi ft, ut fobduplicato - pinnas: folialis particularibus fepios ternatis, tum etiam pinnatis
tut iiffipi cibos; pinnis ex lanceolato oblongo ^{4»}. KU^t, tntgerrimn, carnos. Col^r
font tcrtes, basi vaginantes; in inferiordus foliis longe, succellive breviores, tandem
vix ulce. Sic etiam pinnas diminuuntur numero, summa ut sint folia ternata, bifida, vel
simplicissima. Involutum universale compunitur ex foliis faboratis, brevibus, fobequ-
ibus, scutis, pinnatis, tandem reflexis, ex flavo-virentibus, a few ^{a.)} tic. 1". Par-
uale cum priore engravi. Umbella universalis convexa constat radios crassioribus, frib-
ris, & decem ad se locis. Flasculi omnes feriles sunt. Petala albida, ovata, acuta, &
patula apicem habent parumper inflexum. Germen est crassum & magnum. Filamenta
oanfli iun⁴ ioxi ^{ous} amherz infidens flavescent. Semina ex oblongo ovata, acuta, fufcfcra-
ta, hinc plana, & illuc foliatis, constat nucleo oblongo tenuique & cortice crasso &
fungoso, tria odorem spirantia aromaticum, sapore quodam spii & acri. In margine ex-
hibetur flos scutis, & in nativa magnitudine semen utrisque, & feminis differto. Flo-
ret ab Augusta td Octobrim. **nutn** m ; epidatio perficit 11 rtcttibri.

IA H U \ (I \ | I M M \ OCTOGESIMA <(I WA-

EUPHORIA PARALIAS. Lin. fol. pag. 333.

Tithymalus Paralias. Scop. carn. 1. p. 338. Concr. ep. 965. Rad. h[er]b. 3. p. 674.

Tithymalus folias linearibus, aristatis, imbricatis; fipulis umbellacibus ovato - lan-
ceolatis, floscibus cordatis, Hall. h[er]b. her. num. 1055.

Tithymalus Paralias ex locis maritimis. Dad. pompe. 3. t. 1. r. 12.

Tithymalus maritimus. Rad. p[ar]is. 191.

Candido latr rota scater, cibis glaberrima. Radex lignosa, **IWMA**, **tori** fusca, **it**
intus albidus, perennat. Casus basi persistens novos ramos seu radices caules ex-
stans gignit, omnes florigeros futuros, unde plantae multiculis erudit. Sunt vero li-
teres, erosi, pedales vel alicores, toti foliis, glaci vel rubei, simplicissimi, domque
lelio notabilis aut truncatio excederit, ex ultimorum fliorium exillis ramulis; periti super-
ne umbellatim in radios patulos quatuor vel quinque, etiam paucior, singulos hiside
ellis, crassinervis, valde glaucis, uncis, sine ordine & dense pepta, in frumenti, in-
primis mericis, valde imbricatis, in culta magna dilux. Involuta universalia fuberant.

Involucella ex cordato fubrotunda, lanora quam longa, obrnilufcula cum medio dentellulo, concava, elauca, patcmia, Sr imgerrima. Calyx fubromndus & quadrifulcatus in limbum quadridentatum ciliatutnqec dividitur. Pctala quatuor, in principio cum fatura virorc liavcnrin, poftea auramiaca, fubpcrlata, ex ungu craflo in dil'cum concavum expand, interne fubrotundum, excus quadritentamm vcl bidentatum. Singulis latnen-M infidoM uuhenr gemma fubrotund* & flavx. Cflpfula eft rugofa. Scmina funt ex fubrotundoovjea, Si aSbida cum maculis nigricantibus. Fbrcs ftcrlies funt line ordine fcrtlibu* ifitermixti. L'inque piftillium tiabent; fed Oenliuai piftillum tocun calyci eft inclufum, conftan* iicticello pilofo filiturni & pallido, cui inferitut ftylas virens, ftigmate captuto'btfidoqec tcniimaius; deocknte omnino genninc. Ad marginem calyx & pta-lumauih adpiuguntur.

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA NONA.

PO [tNTILLA PENS] VANIC A. lam.& fog' JfO.***. 76.

Pentaphylloides canadenfe, talio agttonise, Bocrb. lug<l, i. p., + 1.

E radicc perenni, li^cfccme, foris nri ritnntc, imus alba, & faporis adfringentis, I B | ta o xatis anno & subsequis evales affluge tit fcsquipedalcs, rech, (eretc, ennu, mollibos aibidi que pils hifuti, ramis treo sufti. Pcdunculi villofi ramofi extremitique fubdicliotoitu ertguottw. Calycis villofi lacinia eaueriwo foot « Uoceoiito lincarc, in w r j o r es triangulares & in plo latiorc^. Persia obverfe ovaet, eimrginau, lute*, calyce vnt tongiom. Stamina & piffHa ctam latM fuot. Scmina Ibbov^a & regofii (ekdkttm. Folk ndtccdt lbtK pinmtt 01 & t, Urfoct, terete, ac amice futata; turn ex foliulis otroqoe quaternil vel qotaii com u-ntiirunte impari, oblongis, nwllibttS, villofis, in mama* & »f vww nervosqec dorfUe pilofis, fcrato-indiis, llucam, inrcrioribus at-lernh, extribus gndl im majoribus, fefilibus, a i m i«tcnnediis quandoqec pumulis mi-muis'lteuub fobh neoplatis, obtusifculis cam pilorom &fcicoto tenrintne. Exrimtdao CoioU bifibos conBaufit. Cauliu volmnine & numero foliolorum raceeffive decrefcunt, exter am similia. StipLtx funt JaiKColatx. Floret Junio & Julio. Sepcwnbru initio fe-mina iiuturd'cunt.

TABULA CENTESIMA NQNAGESIMA.

GENISTA SIBIRICA. Lin. marr. 571.

D nodcdm «m ante anno^ femina haio) fnidch fub ctaco titulo ab ffiaAriUosM ««pr, que fan, pbm« produxec adh«cd«tn perfite «». »- « <J quinquepec ^ , erc » quidem, sed tenues & debiles, ut ipse fuf- calnum crass, nullatenqec angulosi aut hilij, c\ fiifco rinmfitmy. Raim Iuniores, etiam teretes, & nitidi, inferno pur»»iiiicuni, exterom virent, eriguntur, niultosqec rumbos axillares & simplices proggnum, ut sic ;4»kui»iev«tant • Florftiooaw.bw. Vire perculati, & foliatii, egreluntur ex ultimis foliorum alis. Calycis ex flavo virentia & tubulosi limbis est quinquedentarus: dentibus setaceis, «lio6uEatMf(fil*quilibus, sub dorso vexilli ab invicem remotis. Corolla «« hue. eft. V t f H « unKuc brevi expandunt in bracteam ovato obtongam, obiuffiflinwrn, cmtrginatam, creiian, antice longitudinali folio no, «am tateriboi «flcxam. Omnia PsJa qua lo gtu in gaudent. Anthex lineares eriguntur. Rcliqa in Horc can l-mnxatio charaQcre coo-nnos non tutit. Folia font injufc ltneolaw, tcti-gruu. Legumen maturum hosce Y a «"

mtnata, jmet^errtnii» fbbpcttoiac, inordmaie alternant*, tturwIM, iumma muttu »»^{no~}
r». Mueries eft tjbida & dart. Tuts £ Ultra elt. Radix lignea & ramo&.

TABULA CENTESIMA NONAGESIMA PRIMA.

TO If EX DUB LA.

Arbusculz semperverentis, statis ~~an~~ fl- teriutn sgentis jamque tripedalis, superematu
parte ~~an~~ exstet; candice creto, ~~an~~ digitur, ~~an~~ tictm
MM l.t.t. ~~an~~ videntur, tcreti, ad bafir obli in crafu, CO"
imtato cincrcum. Radix in cruri di ~~an~~ inceger ubfidciu, firma, inc [»]rio.
que ««nua», dcntkuli tic utjmuart viicimur mi. plus minus quadrangularis, in ^{!>>}
te dtcrnantha, peioliis tcrettb'is bre ali crubci vel unifori ex ramis novella exorintur
& (aporis fubtdfringenti^ i'cdun. flares, terces, paruli, longitudine fere perisoleum,
fjwriim & li'ic ortiinc, nunquam wuHirci, terete*, puuli
UHK bTc ^{an} vire, & ad microscopium cilium, persuit. Pe-
uja qati ^{an}, tub i-ivata, (cilia obntfitBit piana raua, aliaque, patens, & deci-
dua p*cum); ne conjuncta una cum adherentibus filamentis, ut carollam manisperam
iuipcarci; ^{an} olles. Scilicet filamenta, que num, cro O,
pans, basibus gaudent basi, quibus accretione nugulis duabus vicinis
pans, que se connectunt, ierissima canea vi vel sponte etiam dividenda. Anthera
pallent. Germen IHJK ^{an}, ovatum, ncludam St viride corollatam flagitate crasso petalo,
lancea & feniq [•]iuutkt, Eritus, tyit s-alli ad macrorhizam pervenient, quintuavis ad
Septembri m., ^{an} unc parum solidi, forsan overi, globi,
obesi, quadrisulcari, Seminum numerus quanti incertus. Fluerit sub dio mente Julio.
Hyenem agit in tepidaria, tortaifc * originis Afr. Anthus his adit in margine. Quo-
nam prox Km KCCIK a ^{an} Tomicis Linnazum genus, hinc ^{an} sibiam floripem result, donec
fructus innoverat, & iterat de genere. Ad Callicarpum reduci ob corollam polypetalam
requiri.

TABULA (IMI SIMA NONAGESIMA S3 (UNDA.

CAROUTs AI GENTATU^ bm.mm.**

Ann M ft pctUi» piaou ex rtadic« abida & ramosa in caule afflorg fructum glabriu-
laafcaai & ^{an} ipom ja ^m oripK os, scuta, glabriuscule, per rocam caulem decurrentia, spinis parum pruengibus ciliis
tfjperi* ad fimbium m, colis luteis, que in adulta mega obsoletae. Pedunculi lon-
gi, tenuis, tumentosi, ferentes sphylli & unifori evigantur. Calyx ovarus & connivens
ex fqwaw compuoKuf hmcc*ai*, ercta, deflexus in spicem foliularum & macro-
(mit, in ior* MMOCU m, in fructu novi rigiditas donum & mediocre pruengentem.
fructa nitidulaque pupillum gerunt pi-
Umn & CWCTOHO. M kmmum m*utUan mfyt & pedunculo sponte decidit. Flo-
;[;] i***Po i JuU*** •[!] *spembelem.

TABULA CENTESIMA NONAGESIMA TERTIA.

HASSELQ.UISTIA CORDATA.

Semina fub memorato utulo flcecpa a revcrcndo Joanne Jacobo Dick, fibi fie miffii ab il-luftri Spidiranno. Hac a triformibus Haflclquiftiae zgyptiacae fc mi nil JUS, in tabulse oftogtrfima: fcpriinx margine cxhibicis, folo diflerunt voluminc ad unam tcrtiam partcm »uiorc, ut ram <k!line«ione quam ddcritione fupcrfederc po(finu Sub dio terrx cotn-miOa printo vre , pianeas produxcrunt Augurto noreiutt. Radix eft annua & albiii. Chilis abipfa jam bafi i—UJM criguur, fcsquipedalis, tcrcs, ttriatas, cavus, afperiuco-fu^a pilisque brcviflimis hirtus. Folia variant, picraque tcrnaw, fuimtia vero & infira quwedam (linpiicia. Petoli tcrcs, ttristi & lafpidiufcuji oriunmr ex vagina brcv. Fo-Noh func intcgr», RtMts, utFinque villoia, obtufj; latcralia (ccfilia & fubovau; termi-nate petkdkon, coi datum in intim», in faperioribus MUCH ex ovato fulirotundum. In-votticrum unncrfalc conftM ex foliolis circitcr duodenis , fctnecis , hirlutis, reflcxis , in-d M & , umbella tnpllo hrevioribHS. Parculare ex plane GnMm, fed paucioribus patca-tifltniis \$c csterioribts umbellulam cxcedncibus. Radii tcnu^c 8c fubtus pilglliTimi condi-nrant...firihrl fjlmm ac denfam, m cnju! COJtro dclidcTstur coipus illud (ingularc, quod conlpkirur is mgfptkcm. Poralia fuit alba, patentiffima, plana, obverfc ovaw, in am-bi^m umbella majora fit radtonra, quandoque ob apiccm leviter iiflexum fubcordau, in uno tcrf infra medium ippendiculi «i*cxa auricuiata. 1 'J's radians smcius fnticur in margin.

TABULA CENTESIMA NONAGESIMA QUARTA.

CONIUM AFRICANUM. Linn. O. pag- 207. mart. iSt.fpec.pt. 1. peg. 350.
Caucalii airicana, K^om minorc rote Btxrb. lugd. I. p. 63. I. 63.

Atinua plants, nixa radke fufifornii tenni St albida, tota glabra, gfouca, & odorat* cum QQadtn lcvitici & opii fpecific, faporcinc fubacrcm tevemque apii po(lid». Fofandiadil fbt •mtriptH-f - p — , pinnulis lincanbus, obtuitufculis, pirvis, planis, ntimcrwiis, conflucntibus. Pctiob toogi, bncati, fubcomprcfli, & inancs, ex brcvia va-gina oriuntur. Culinia & ramea cijnijruunt, folummodo fuccdTive ininura , quandoque oppofia. Ctulii brcvifffimus, vtx pollicaris , <phyllus» & ttriatas , erigitur » io umbd. Jam fohitii ex olio circitcr radii* compuluam, raram, inque juniorc turn plantula florcn-«m. 'J'IMC undem m hwus ambitu ex foliomn radicalium & fubradicah'om axillis alii ciales prodenit adfccndncc*, femipecijle* vd altiore*, ramoii, ttriat, medulla alb* fub-fitulosi farli, ft, itwllttptaret. cenirli minorcs. Hinc infultis exfurgit umbcl-lifer eftcjj. Involuci livcrfalis foligU fuit ('ere fena , lanceofata, a n a b l l , brcvij, pttcnita, concavi. ttritiile i>nUc eft. Umbcjl a eft convexa. Flores in umbella centra-li fame omni tfftto; in tliil fuit pauci, qui gcrminc carcnt, ttcrlies. Flos cemralis itlo(jo feilli eft , modo pedunculatus. Petals a)b«, ovali*. acutmfcula, patentiflma, ob)me,, n longitudinalem medianam btenH tlevatam biconova. Germen muric^{um}. StvJi breves, obtu*s*, fl, flor crctli, poſle. r^cfl^cci. K.Utncnta paalis duplo longiora, aibida. Anthers sublidymz & inctwnbeni vircen cum fiiffatl puqmr*. Fructus eft ovacw, odore perr^cta & fapore aliquo levitic, in bina femina bipartibilis, hinc plana, illinc striata . n fruis obfolete muricatis. Ad marginem fuit ftos auctus , fumen in nativ« m^c;n(tu,|,)ic urinque confpectum, ejusdemque aucti transverfa fectio.

TABULA CENTESIMA NONAGESIMA QUINTA.

CAUCALIS HI/MILK

Radix annua, tres qanraorvc uncias long*, ita, albicans, teres, fit tibruli* «U^o 3a, csolem producuntur, vise fcmipecWcJit, teretem & striatum. Fob radis ex folio longo, fibris ojnvexo, fitckque fukato, IIIHMMI btpmnat*; foliolis ipsius pinnatis; iatift in lacwws UnccAim pLoas craifufctiUs fit fobacuus Caulinorum & ramorum petiuli, intprimis fitpenonirn, Junt vagimoMi fit men&ranacet: p» folio fertnc; : peciofi & iylu fuit aij Icrttin cituta. Peduncali c>pofitulu & pacili me ptenmtquc bitidam, am thtidim rarifui te simplicem, suffulam involucri M o b ooioo btcv skutntnuo angtJh Sc tntcgtrnmo; quandoque anBo. Umbelle >articuljr« conftantm* compontntur ex Ann cnirsit fubfdili, & quinque pedunculatis in tmbitti. Vidj umen eium tfiflonn & iqpcemAuraf. InvdiKh ptrti fuit foibla qumque, pstub, larKo&wJ. acuta, integrina. Germis magna, hispida pilis hamis. PΦW in pt mcipio rubra, deinde alba i ob a flexum spicem acutum L J J (if), patenlafliox, exterton pau alo majora. Filum itit brevia. Aiithene nil. Styli brevissimi. Stigmas brevia, obsoleta. Semina oblonga, IK ptaw, tnd convex* rtria, folioscen- ti & letis rectis pallidiisibus hispida rigida & timpl «f aw bitnic trttideve uncm hispida; imodis, ferme hispida, in spicis stylis p crftfttnibm PMr^itf. C«ol». r**4, pericli, pedunculi & radii fuit hispidae & fuliginei. Angusto. Ad marginem suetus reperitur itatur flo; mm in nativo volumine selenis utrin- q»e ccmfpe^em, quidemque sueti transversis festio. Quam ad nullam referri huc plantam possit Schiso horam Columaz, nec esse etiam varietas Caucalis maritima, sub quo titulo se dicit. JIM ECCCJM, taiUJUillI> IWW JHF ji(apofai,

TABULA CENTESWA NOVAM SIMA SEXFA.

AMW OQPTICiaf. Linn. ff. pag. 206, num. 56.

His quoque noticiam placeat cum socii Egyp «*.<» aim IK. in Forskahlis referimus at- ceptam. Prima vera sedis comm»& rerrx tewM prodssrt planat bipedales, 7 Angusto flores, Oboebris maturis fructibus emulsa. Refix celatum crd h ** Julio fit annua annua unica unquam sporae nunc babet. C*ulti fwnofo iWMr* teres, striatus, equinus. » / TM CM lh.u ftmimnhm, R,mt ri,ulo. M.i funi int.***** glabra; cutis *** Maifim iwinbfin*.^.,. Fobo» mnrm. (** pkB*, aorfo futu- cata, in superiore. nec <lenfr, confert umbellis a lepore ad quatuor wJ.,, ^ * _» font* quinque ad leporem, lineare, glabra, inconspicua, parva, rotula breviota; inter quae posca quandoque, nec semper, adiuncta ex parte pinnacida. Perfoliat foliis & quinque ad ollo, omnis integrina, lineata, exteriora longitudi- ne Lii, reliqua breviota. Germen vires, seme ex albo mucinum. Petala sunt tuberosa, alba, doclo hispida, ob spicem acutum: valde inflexum cordata, paucia- filamenta alba & longitudine corolla gerunt aethera atropurpurea bilobaque. Fructus tuberosus & compelles in feminae abe feminata, acuticulus, falcata, gibba, obsoleta muricata ut maxima ad oculum nudum talia non credantur, quinquefaria, odoris & fo- poris aromatici, ad spinum gravem accedens, sumique pungentis. Ad marginem su- fluvium femina hinc siue inde confertum, ejusdem solli denudis inferior pars, & so- gno | «

TABULA CENTESIMA NONAGESIMA SEPTIMA.

ATHAMANTA PYRENAICA.

Athamanta Libanucts major Haileri. *Goiun. ill. peg.* 83. X, 26"?

Scmina pyrenaica cforiftmus Gouan mecum communicavit, e quibtis fub dio fatis cnata dedans plants floruit fubfeqio anno menflbus Junio & Julio, fruSumque maturum Augufto tulic. Mtilta quidem habet cum Athamanta Libsnotide comtnitni;i ; fed habitus titriqux diverfirfimus, planrac pyrenaic* pacnctifimus & difUifus, quem ncc in cultis no- ftris hortenibus, ncc in fylvefhibus copiofifTimis Libanotidibus, cum alpinis , turn aiiis, unquam vidi, faut, ut diverfas species crcdam. Radix pollicem crafla, ramofa, & ca- pilla, foris fbfcefdt, intus pallet. Caulis bipedalis crigimr, tuft pollicetn orqaafIS, me- dulla farftus albida, fubvillnfus, qti.im maxime fulcatus & angularus, mi deiftonfrat dc- piëtt difciiffi caulis pars, vcl ab ipfo exorta ramis ornatus pntolis, fVriato futcads, ftrpo fubtrirmgulfribus , luperne giabriufcutis, oppofitis & ntcruN, proprix loigicudinh , & ipfis mmofis. Folia rjdcalia funt multtplicato^pinnaca ft etrcumlcritione ovata. Cofta* fubvillofk, inferne tcrs, & ad pinnas canaliculata, oriur ex vagina Hicintiranacci Si ftria- ti. E^onufac uitiniT funt lanceolate, acuminarz , planx , inari^inibus ad microfcopitum ciliatar. exterum glabrx, inregerriiTir, & confluences ta fotiolum ambitu ovutunt Si f- i .. I I eoftis ptnkatff&OS ad ipfam cgrefTum ex gofta principe foliola utHnque pro- detutt [uiiuca minon cradtmd pouti; atquc parcus hoc in fuliis caulinis quidem rameis- ((ic inferioribus, plane autem run obferwtor in tHdera litperioribus. Umbdlx univer- fales fuiit aiujile, convtxx, cretIx, ex radiis numerous angulatis & glabris. Qua; fifti- nir in tabula, ell in ramo; atquc ad lunc drcitei magni ndiecm tUBbeUts ram<<s omnes pcoctiire vidi. Caulcm ipfum qu;t terminat, dimiefu amplior eft. Ut icaqnc variare npuil nus culta lixe platna qiam iimirnc debcat, fi CSotMflkoi lit. Ob phot* divarica- tunction ranium exhiberc fulum potoi. Umbeltx partiales funt hemifphiTicx&denfiflimz, Jnvolveri tirriuMguc folioll funt decea ant phiro, lincaria, scuta, univerfniiri reHcxa, par- tialis patent iffima. Petals funt ex ochrolcuco albida, ex ova to fubcordata cum apice acuto aturorfum tiiffexu, dorfo pilis ptociflimb hirfuta, fubvijualia, patemililim. Anther* jKilletK. GcNDen ciimprclTum & obverfc ovttun pilis albis eft villofum. Styli funt bre- ves, IVufhis ovatus obtufusque in femina dividitur tabowta, etnerea, bine plana, il- ling bjJrido*vtUolJ & quadnfulcata, vix odora, fnporis robteril&valde ingrati. Admar- gjoen cslubciHr ("otii radicalis fubdimidia pars, Hos audus, femen luriuqtte confpe- clum, tdemque aucium difcillum.

TABULA CENTESIMA NONAGESIMA OCTAVA-

CARUM BUNIT IS. *Linn.* . 0. pg. 733. *Gwmu H-p- *o.*

BaofaM. *Ddctb. b\$. 274- Baub. bifl.* 3. part. 2. pag. 19-

Dsucus pwrofeluii vcl toriandri folio. *Baub, pin.* 150.

Saxifrag 1 monuna minor **petrofdioi** vcl coriandri folio. *Moris, bifl.* %,p. 274. t. 9.

t. I. / 16.

Pyrencia planta, tota Jabra, odiiris trita aun gn"i> primo fatioflis anno fota folia flo- ralia, itoo ctokm prefer! **M»joAJunio**, Juliu & Augufto femina , atquc tune perire in horto lotet, todfe firffenwi, digitum trait vcl tenuior, albida, odore & f- port dauci aliquo **pradki**, fundit canton vcl **ipfum** fupra originem valde ramofum diffu- fumque, l>iwdiilem. (cr<<em, lincatum , obfture purpurafcentcm, foliofum, creaam, •d nodof fxpc flcsuofuti), calami crtfTitje v\ tenuiown; quem in herbido & ubenori fo-



lu crfcencem, miām ramo/uro deWfotoremtjuc, Uf ryoncs dcciptfrct, cfanflimus (Tuiwn obfcrvavt. Folia radicalia & caulin.i inferiors fūt fūbipinnataj nimirtim compotita es cofta communi longa, fubtus convex*, antice carinatt, bafiquc p.mlitim dittaauvaginante; & ex tuliobm pctiobm cum termimme impart atrinqM tn bus, circ, mufcriptiotc fubtrunguUribus, critobiw, fanta . todfe, ft ICttiifcoHi. Caulma fupcriofi & r^{mc}Aim in v^r;rin fcifilu, & JucccJtive iupcrta cvjdiini tcnutora , ut rjndem fini fetice*. Prima 6iu poft **eocykdoM** fane simplicia. corrfato - fut>f<<und*, fcrotnlofa & ferrat. Umbdlis terminattbo* & oppoli; ellis, eretis, plani, fc\-\cl decennradiatis, foliolum tnvoiacri, ranfiinie cl imegro defietntis, fubjKitut unum alter mm c leu*, turn, Sunilia pkrtiitque ecra tajj>U >bit>lvuat inroJtKrum partule, Flofci. i in qualibet , inl>cilulj fun* i rwem *d trctfei , quo* inter vidi ^ermine <^ftwwt «6onmji rariiifiiw*. Gcr* **men** oblongum, comivcffilum, firrjo - Culcatmn, glibramqte eff- Pcwla ott «piccm inilcxam vaide corrata, ptwntuKnit A (ttt<qu<lu. Filwncniis tltm tntherx intdent fulphurnc. Fruthwex obioi M in !-m* <tifpefcitur femfat ol)long« » palitde fusca, hinc j-piana, i **M t a t n a l** stris elevatis q m» nouu, qutrum utrin^ue «Etrmr obfo- fctior crt i od>ns vix uHms, ftporu (Mhid ncc gnwi- In tm^inc liihtur fcmcti in nitu- r*ti* mtgTiitttdJrr; imu idem qusd;ni ttwsverfa fcOio, & flo», audi O>W>J.

TABULA CI N i KSIMA NONAGESIMA NONA.

PASTINACA LUCIDA. Lin. fff. 216. man. 58. Goues. il. p. 19r. 118
Pastinaca folio quasi libanotidis latifoliz. Boerh. legd. 1. p. 67.

Succa tenaci albidu fccere plura ross, odore p >J[ns, trita aut fr da imptimi*, *roo-
dio, forti, membris diu iherente, singulari nec facile comparando, & ingreco; fa-
port autcm iccrffii & pengenti liss. *Ialulas* localis **Wetm**; in qoiboi **teStom** Sew*
tum QC KKC I epenagiis annos specimen, Garelioque **IR M W i** tji= 1 a^Q nunc polli-
do, Uporem otioremijwc (aam in hinc diem fervar. Umbellifera dcgtm, totaque gla-
t>crnm«, Tub dio fau, prima **ma** produc mera folia i radical*. que nit cordaw, &
iuJ*4, cniTa, **fkm**, face acid* ft acrovientia, dorso paWditn&per **vcan** rttkuba p>^u
ritas, hinc rugosa, crenata cum denticulis aliis, magis minusve subtrioba aux subq:
obs; petiolo infructu longo, compresso, striato, **tetm** ribrofc fdido, ad **U** « **P^{ar}**,
pureo; ipsa spiculans. *Iola* radicis secundi anni & **cmBeM** infvriora coc>fruwt cu«
prioris, pr icrqtwm qoad primum prodiens tunc folium radicalo; oleat esse terracum,
cajusmoA noa cotvrftti adOac «irlit in margine. Ramea oriuntur ex vagina fulcata
crtfl* trnplotanie & eoi nivenen; ovata aut magis **fubro** cwtltri, nec lobati-
Atque hoc ita
viduis nostris sesquipedalibus. In
suis vero, quibus **tj'jm>n>m** fere » hincidem adscribir, vidic clarissimas Goues carolina fo-
lia prior < ttfOMi, (cctmtU qiiirut*. C.MS. teres, firmis, eretus, digitum erulis, me-
titiU aib* mncer i rch, p< muni longis tincm r<ano, primis axillares, adscendentis,
ultimos ultra umbellam principem dictos aquae oppositos. Involverum universit: plerum-
que nullum, vel adest unifolium membranaceum & concavum. **bcHa** unvexa radios
W>« circju quindecim striatis & firmis, Tocdem **fu**_{bt} rufi / ofnbc|tuUt p***, 1.
bus, quibus involucrum delicit perpemo. *Flosculi* orines fertiles petalis 1
ovatis, integris, sensu cum apicibus acutiorum inflexis. Otr unum **vertex** ^ <<^>
foliis. Scyli breviflmi. Semina fūt orbiculatis, compresso-plana, basi emarginata, ex-
fusca pallentia, gibes, spona A ^ r t ipsius plantæ, ad marginem in naturali magnitudine
quinque depilata; quibus aditæ flos subtilis. Fuent Junio & Julio, summa dans
Augusto.

TABULA DUCENTESIMA.

SJSOX AMMI. *Lmn. 0. pag. 21 a. Goum. ffl. p. 17.*

Ammi. Gim. *tfit. 512.*

Aium alteruro parvum. *Dod. pcmt. t. I. J. ft 6.*

Ammi parvum, foliis scenicali. *Baufc. fin. 1 59-*

Foemculum lulUanicum minimum acre. *Sbau. 4r- '««'. 99- tab. 2 4.*

Tow planti sUbra tft, & tffci oJumta. Caulis ex radice flnnua, albida, «nai«r fi-,
iiiformi, tibriUoA, p«dittq« .pii odor* & 6po« cum otigWKrtdine, cxorkar
tern lineatus, nicidus, fobdfclio.on.usf & i>edalis. Folia funt moUipBc«o - p.nn.n.
Coft^tcrcetes linear,, supra faiwtx, UR membrtmCtt. Pinnola planx, acutx, pro-
fbiHk >-irkte numeroO, ia wfctfbai jin«r« brevesque, in «ul.nn. fupmonbus «-
pSlares & bn-i>rc. Inv.lucrum ncc mvverCik ncc panialc unquam V& Oiwiesum-
Llx oliv oppaunrur, complex « r*liis* a <!<oba_s «d q»i«q«, modo longc p^dun-
ct,l₃x moda vere feffites Umbcellux inxqua!« pianiufulx unque flofculos gerunt
qumdeeim a^c (tew, «* u «, mibique vilos omn« fcrcilc. Penh .Ibid., ovaw, «n-
tt Mtuik, COttCtVi, ptwariffiB* Fibmenra fububta, petaJ.sdupbbrev.oni, cream-
fcub * Aad w» porponftme. Gainen ftrfatn» &***-. Fruftus panas & com-
pdro-rul.romnd.sr^lkmfcm.na doo, h b c j1M, ilhc gibb. & qumque ftms plu-
berantibUi HOtt», nta od.- aromatici, f,poris f«c femmum apn. Floret
lab di« Auftiffo & S^embri, pcr^tq.-c m tepidari, 8orm ad jmiiarmm «qoc. Sc-
mfau prima maturescunt Octobi. Talsula repxfer,,t pknt-im mmorem , qux tandem
moko m d k ra.»u^ r. Ad mtrgfawn «drt« fios mukotiet .uOus; mm frmen utnnquc
mnatuwli Mtflpawaiiiie; deia fmenauaum ejusdemquc
vitum transverfa diffectio.



INDEX

UTRIUSQUE CENTURIJE.

A

A

- leirit gufnccnfu.
Alfltrtrmeria pciegrin*.
Atqmi copticum.
Amomutn 7.mgits-er.
Anajhrici hicrochumica
Aneflmme fe^c-rum
Aogg'icj VLTiicifliris *
Aatbericun tfphodeloitlc
— lilitgo .
Antirrhinum cirrhoftim
Arum fbgtiicfolium .
Afdepia* tnctrnata
ATphudtlus lurcui ,
After ptnnonicut
Altragiju* rnmcfitm ,
Aihatninti pyrntica

B

- JLJctult pumita
 Bochr^v 11 ctchhi
 — — iiirfutft
 — — fciiulen*
 Brometit karan
 Bunin a-gyptntct
 — — blliciTihl
 Bvtnerit microphylla

6

- | | | |
|--------------|-------------------|--------------------|
| | p | cirripunct |
| Ctrduui | <i>argentatus</i> | |
| | py | <i>cnocephalus</i> |
| Carvfn | Huniut | . |
| Ciutiit* | imi'bit* | |
| — — | humiltl | . |
| f eltifn | nodilitora | . |
| Cellti | AtciuMt* | . |
| Cessatu | cim | f«rit |
| — — | | fiamantes |
| Cherophyllum | coloratum | |
| Chiranthus | fenestrata | |
| Cibus | Ivypes | . |
| Citix | lum quadrangulare | |
| iy | | |
| Clocoinc | ptntiphyll* | |
| Coftiuffl | afnetnum | . |
| Convolvuiu* | dille Ihus | |
| — — | ferinofus | |
| Corc | bom | affuant |
| — — | | trilocularis |
| Coreopis | aferm | •oli» |
| Coreonilla | | TfftCl |
| Cratagus | gundl | [I] |
| (Crichtium | maritimum | |
| Oreobalus | catholicus | |
| Cucumis | prople | |
| iaphus | vise | • mi |
| Cynanchum | aristum | |
| Cytisus | psuedocajan | |

D

D

- | | | | |
|------|------------|---------------------|-----|
| | igittlis | Intel. | 47 |
| 93 | — | obfciiura. | ^o |
| 31 | t— | psnifjora. | 6 |
| 23 | Dolichos | bengaienlis | %7 |
| 61 | — | futcolus. | .39 |
| 60 | — | pubeicent. | .45 |
| 85 | — | ft sq (i) pedal is. | .77 |
| 36 | — | uiiguicuUtus. | .8 |
| 35 | Dry[iis | rpinofi. | .9 |
| 73 | | | |
| 49 | H(chii | plintaginei | 17 |
| ji | Mn^crum | vilcofum. | .77 |
| 1 | Kuoiiynius | airopurpureui | .fy |
| vi 1 | Kupiiorium | aitiffimum. | .77 |
| 93 | Eirphot>ii | maculata. | .87 |
| | — | i'llinliu | .it |

\$6 E

- a 1? nrtria undnliti
^ Forskcdiiia
1 i"ununa pol

4

- | | | |
|----|--------------------------------------|----|
| | <i>Geranium</i> <i>luteum</i> | 89 |
| 10 | <i>Geranium</i> <i>ciconiunt</i> | |
| | — — | |
| | ffloflatum. | |
| | fibricum. | |
| | | |
| JJ | <i>Geropogon</i> <i>glabrum</i> . | 11 |
| 90 | <i>CiCitt</i> <i>canaitenli</i> ; | %% |
| 17 | <i>Glycinc</i> <i>friata</i> . | 31 |
| 93 | <i>Glycyrrhizt</i> <i>echinir</i> ». | 41 |
| 99 | <i>Gvpfoptili</i> i3fcncntcs | 65 |

93

H

- | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|-----|
| 40 | H | ilTclquiftia | srgyptitca. | .37 |
| 36 | I | ~ ~ ~ | BBfOMI. | 92 |
| 3a | I | III | aliltilmiif. | "^ |
| H 4 | | — — — | cubcrofuf. | -1 |
| -4 | I | HeilIcrct | jamateeofil | 67 |
| | I | fan | rooJti ftiva | 68 |

8

1

- | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|-----|
| | <i>J</i> | <i>opha aren</i> | S |
| | | <i>is fuscocin</i> | 1 |
| 10 | | <i>Julius ciliata</i> | •7 |
| \$3 | | | |
| 23 | <i>L</i> | <i>Leptuce tuberosa</i> | |
| 3 | | | L. |
| 53 | <i>I.lathyrut</i> | <i>inconspicuus</i> | 18 |
| 14 | — — | <i>tigrinus</i> | 1 * |
| 54 | <i>Ltvattfa t</i> | <i>reticul</i> | 15 |
| | | | L* |



Lcrattn olbu	3°	Saponaria portugensis
— — trilob*	30	S*kn egypiac*
— — trimcftrii	2b>	— — iidic*
,m nniiajum	-1	— — otpifoS*
lob>u li	10	— — virgata
Loiui tnbicu?	7»	Tallibia stellata
		— — diaristica
		— — * . ft', a
fet		— — transylvanica
iMtlvi xgypilivi	37	Scirpus cephalotes
— — lumenis	66	Sedum dasylithrum
— — ptrviflort	14	Selinum Moesiacum
— — JXTV*	73	— — Segnari
— — sberardiana	64	Sempervivum foliforme
— — versicillata	15	Senecio verbascinus
Medicago prostrata	39	
Melilla pyrenaica	86	S<ftb iniwniiti
Melochia pyramiditi	41	— will ii MII
MdcmbrytnibcoMra	9	SidaTM Mm
Mimosa virgata	34	— annulata
Molinia Roylei	6	Sideroxylon eucommiphorum
		Siphonanthus corymbosorum
N		* M & AtMKH
Nepeta italica	51	
Nitella fruticosa	78	
O		
Oenothera longiloba	81	— incisa
Oenotria horrida	40	— juncea
Oenopodium anatum	70	Silene somnii
— — — illyricum	69	Silene vulgaris polycentron
Oreaster violacea	84	Simsia frigida
		— — folium
P		SwUnmit TTttTinniiri
Pedicularis monspeliaca	55	— — hybridum
Pallidior latifolia	76	
— — minima	7	— " *****
— — ferratifolia	4	— — verbasifolia
r z faberula	77	Spilanthol olacrum
affine ida	94	Spiraea chamaedryfolia
		— — lobata
SMTI'SPUJLI,		Stachys macrantha
— — — — —	44	Stachys Armeria major
— — — — —	77	
— — — — —	53	T
— — — — —	43	T acutum mollifolia
— — — — —	13	Tomentaria dulcis
— — — — —	40	Torilium apulum
Phlomis bucharica	58	— — spinosum
Phyfilis villosa	64	Tradescantia ciliosa
Fragaria ananassa	61	• Drymocallis caryophyllacea
Festuca nigra	53	Trichium officinale
Festuca pratensis	71	Tulipa capensis
Fuscosella polystachya	69	
Fuscosella polystachya	83	
		U
K		
I n ni^	16	V
• bicator	1	verbena Askloria
C	1	Viburnum
owfi>t's<d>		i 4MMIM
		— — hybridia





7303



T. 124.



272

... 亂之































T. 113.



T. ita.





752.







Tig.



T. 116



7122.



















T. 188









T.108.





77-140













2524

26.





T. 142





„ m



754







T. 153.



T. 154



7188







7188











T. 163.



T. 164.





T 160.



T. 167.





T. 169.



T. 170.



T. in











T. 116.



T. 277.







7180:









T. 262.





T. 185.









T. ioi



T 392





7194



T. 198.












Fig.

T. 20.



卷之三

卷之三

INDIA, BOTANICAL GARDEN LIBRARY
BOTANICA, SURVEY OF INDIA



