

Indian Botanic Garden library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

Class No
Book No. *MOR - P*
ACC. NO. *B-8708*

r



*Je**

**HORT.B&T.RER.
SICALCVTT.123**

PLANTARUM
Historiæ Universalis Oxoniensis
PARS SECUNDA

SEU
Herbarum Diftributio Nova,
PER
; TABULAS COGNATIONIS & AFFINITATIS

Ex Libro Naturæ Obfervata & Dctccta-

AUCTORE

ROBERTO TOMOISO

Medico & Professore Botanico Regio, nee non Inclytæ & Celeberrimæ
— Univerfitatis Oxoniensis P. B. ejufdemque Hort. Botan. Praefedo primo.



OXONIÆ
ETheatro SHELDONIANO

Anno Domini M. VC. LXXX.



M E A T I O

A D

LECTOREM



*V*M primum animum ferib ad studia Botanica appulimus, sub auspiciis Serenissimi Principis Galionis Francici, observavimus complures, imo omnespene, Authores de re Botanica confuse is fine ordine ac methodo scribentes, etiam si in edendis ac illustrandis lucubrationibus operam posuerint non pauci, iique exquisitè eruditionis viri; ut inter Italos, Petrus Andreas Matthiolus, Andreas Celsus, Fabius Columna: inter Gallos, Johannes Ruellius, Jacobus Dalechampius: inter Germanos, Olho Brunfelsius, Valerius is Ericius Cordus pater is filius, Hieronymus Tragut, Leonardus Fuchsius, Theodorus Tabernaemontanus, Joachimus Camerarius: apud Helvetios, Bauhinus, uterque frater Casparus & Johannes, Conradus Gesnerus: inter Flandros, Carolus Clusius, Rembertus Dodonaeus, Matthias de Lobel: inter Anglos, Gulielmus Turnerus, Johannes Gerardus, Thomas Janhonus, Johannes Parkinsonus: omnes hi cum trecentis aliis minoris nota apud varias Nationes in re Botanica defudarunt, nondum tamen omnes, nee quisvis eorum id assequutus est, ut methodum veram is genuinam, semper is constantereandem, seu eodem semper se modo habentem, à tertio mundi creationis die, detexerit. Quamobrem non exiguum operis pretium nos faturos identidem reputavimus, post omnes superare citatos, atque multos alios mentions auctores evolutos, Historiam generaliore Plantarum aggredi, aliquot abhinc annis (dum operam dabamus per decennium Celsitudini ejus, nempe Aurelianensium Vicipriato) inceptam, Quamquam is labor is magnitudo is difficultas perficiendi nos ab hujusmodi ccepto deterrebant; adde expensarum immensam summam, is fastidiosam ac nauseosam Piclorum, Chalcographorum, Typographorum, aliorumque; id genus hominum artes manuales exercentium turbam; nihilominus quidam amici hie, animum nobis addiderunt, uirifatisper orbem terrarum clari, non solum per eruditi sed etiam bono publico studentes (quorum iudicio, a prima cum ipsi sententia multum tribuimus) qui idanobtan- to felicius faciliusque profectum iri fibi pollicebantur, quod fama nostra per totam Europam inter Botanicos ante aliquot annos evolaverat, quodque etiam e longinquo ad magnum hoc opus suscipiendum à quibusdam majoris notae excitati fuimus: horum igitur partim consilio atque hortatu, partim studio atque assensu erga rem publicam Botanicam simulati, ad immensum hunc labor em non sine faustis auspiciis accingimur. Inteligant rei Botanicæ studio nihil apud Botanicos supra citatos, alioque quorum nee dum meminimus, hucusque nisi chaos confusum is aliter in disponendis is mente assequendis plantis inveniri; atque multum interesse reipublicæ Botanicæ, ut methodus vera is genuina, a primordio mundi a Deo is natura data, imo numericis suis omnibus absoluta prodeat. Observare preterea velim Lectorem me non detestum ire tot tantorumque hominum doctorum conatibus, quibus si in multo offendi sentenda effectus venia iungam facem nobis prextulerunt sequuturis; ac quod semel pro sepe à nobis offerendum erit, cum officio suo strenue persolverint, superest ut ea que illi sibi excidisse sentiuntur ex Hallucinationibus ipsorum à nobis allatis, et Methodo nostra exhibitæ, disponente plantarum per genera et species, definiendo genera et describendo species, per Tabulas cognationis et affinitatis exhibeamus. de vena et specie. in auctam. a tellura seu simbolo naturali essentiali a fine ultimo pentam, omnium plantarum hie quinque Sectionibus contentarum, cum contentia Sectionis cum Sectione quantum fieri potuit) disponam.

In describendis hie nostris descriptis Tabulis quid profuerit urn fit observabunt Botanici; licet plerique fortassis a nobis pro Hæc oratione enarratas plantas exfliment, maluimus tamen, imo elegimus ad librum verfatorem in hæc Botanica ac æquicquid libet iudicio potius deferre, quam de nostris lucubrationibus multum dicere, affirmare tamen ac profiteri (is quidem uti speramus citra æquantid netam) jaudemus, nos laboris affe omnique studio anxiose esse, ut dare, dilucide is quæ commode fieri potuit breviter Csuccis superfluis) singularium firpium hiftoni

P & J E F A T I O

fivedescriptionespropo:ierentur,pr*mif, clafibu*feclionibusve ordine quhm faultcotMy&Lm atque expediffimo,d-gerentepplantas fecundum genera isr species, prsmittendo itidem fienefLus longepatentibus ,mt? isr intermedia, fuas not as ejjentiales a Natura data*, du* plant at certo indicw notu faciles reMunt. H<ec autem quo labore, qua cur a ac industria a nobisfunt dwfta facile is cognoverit, quiwpium multitudinem in hifct Tabulis nofirck exhibit arum tc defcriptarum, earumquevanetatem,, bfervare isr attentiu* expendere voluerit. In immenfa Herb arum multitudine illuddefideranvideo quod in alio quocunque agmine incomposito maxime expetifolet; nid enim in or dines redigantur isr veluti castrorum acies diftribuantur in fuasclafes, tumultu & fa. Outturn ommaperturbanmcefeesl. Idetiannum maxime in plant arum examine continual vidimus: cumeniminordinatamultitudine obruatur intelletiu*, errores inextricabiles,ifmorofa altercaticnes utplunnum exoriuntur: ignorato utique proprio genere nulla defcriptio, quamib accurate tr adit a, plant am cert am dtmonfrat, fed pier umquefallit • nam confufis generibls omnia CJaltemfpeciesJ confundi oportet. Cum igitur fcientia omnis infimilium colktlione isr difTimi hum diflinEiioneconfiatMc autem diftributio eft in genera isr fpecies veluti claffes feclum dferentiasrei naturam indicates, conatusfum idprstare in univerfa plant arum hiflothi ut fiqidproingeniimeitenuitatein hujufmodi ftudio profecerim, adcommunem utiidm^fo. rw-Atord^quifecundurnnaturarumfo^^^

mufterepentur turn ad mentoram adjuvandam, turn ad facultates cmemplandTtcZu, qmdemquomamdferenti* ex ipfamet naturaprodeuntes maxime Jbfbdfw&uniS?' mamfeft*, neque fallunt ut advent in* conditions, qu* n^fintfefLtuJ^Z^m^ arnpollet quoniam incompendiofubgeneribu* ordinal clauditurpLlmenfuUTantarum nu^ meru4,adeouteasqude nunquam antea vij* funt uniruinu* I: I mTM^J JF amary n nu isr, fi innominate finu nomine fui generis ip/eZe 7nZ f 7 ATM ^Z^m^ quLnt^expetunt,tanquam^Ltate"^^^ ^focktatejungunturjerumaue^^

buicordineipLaruS^^ autem fecundum e a repetere q L communi/ergenerLi u T ^ ' * T * Tr^J^T turnotitia^tpiauracertionmeffxere TM ^ ^ ^ TM c t i u * k TM ^iptione para^ utoratio. *" • nam non omnes differentias piclura expnmit

Adcurationem variorum morborum adhihu^u^* • / ? - • • TM dici'YeVmu* nrti* i,«rfo * a r wu^um* at utiles firpesobjervaruntantiquitus Me diareliqu* art*panespoftnat* f>at; ^ tamnfi MedLmapiorem isr perfetliorem red. dant, a nonnulli* tamen neglefi< £ vel etiam TM>«< ^ j -meatcma <« es. dicorum autem vet erum nemofuit qui nTi«Z7^Ufmi > " " T * * * ^ ffi M * ftuduent finon omnium fa tern ZZ^ TM*^TM?""* " T ^ fe T ^ Medicationes adhibuerunt. Atque him est quod (inquit L. I. de Antidotis) omnium ftirpium (fi fieri potest) peritiam habeat confulo; fin miuus, pluriam faltem quibus frequenter utimur. Nobis autem ftirpium Hiftoriam univerfalem

rum: fiefitrpmrnhfion*hncflurimum_gmUaclZtacSrePolJehaudduHum est. Ti_m etfifaakfit mv^n* addere,«, tmas in^kt £%££%Jfa, non invenuir facile! Quern ferns j« is norma flantas da** ^ A Z J i "ut vere riteque defcribendi, nifi eumqui frequent, atqueiterata mfpcaione, earum tre"capful femnahs feminaqu' diJl IIX£^m7J^m T^om " " ^ < ' ? QuoIZti o^ktignayu, forteftu,id_ufq JBO-ZZklfn Uf^C) 7^ qUmdoV^>, <^1 TM tatdan,fores lnmocreanonUd_K<einoflra fufra

fi J n^fT fi " fiUJ>ml o fi TM, demit- Vana h«c a quibJfdam babe, nfojunt aft, Juntvera > atque eo fine hie Pofteris r**I*> ut fcij cLophorum Cohmbn^adtam occidental, cujus ante ipfimah unquan fuit m m h a fa de. "A H V f am \ ! ffi "s l " * * * * t m ab ipfis nihilominus exprobratm,, iLentiom m fmjefacilhmm ; ipftvero Cohmbn, ut modefte illorum ingrattitudwem, fmu^ fcr imperitiam arrogannaqueoftenderet ipfis ovum p_mexit, ut fa<-mffwm< inter ipfosid reaaer^t aut fiart angulo acutofer Je faceret, quod captum iUorumfupiran cbfenans, veldefrejo ovl an- ° • gulo

A D - L E C T O R £ . J L

guK^arMopdululumfrangendo, vel ut aliterperhibetur, affumpto modico falk Jlare rest a fecit ~vwfii(fic illorum arrogantiam fimul is infcithmpofterk detexiu India Occi kntalk extabat a condito mundo, at nullus ante Qhriflophorum de eadem unquam cogitavit. Sicplfait* eadem not a generica à tertio creátionkdie afficiebantur ; at nullus ante me à not a ilia gerfrica ac essentiali in methodum eafdempertabulas cognationk is affinitatk reduxit, Seddehr`>(atk, ad magis feriapergftmus.

Inter Medicine partes, qu* haudpauc* exiftunt,ftirpium ac femplicium notitia, ut nee minima, necpofrema,ftc pr*cipua femper habit a fuit, utpote antiquiffima,qu*que ipfiarti originem contulit acpr*buit. Cum enim nulla ars medic a effct, à notitia nonnullarum ftirpium initium fumpft, quas veteres illi Heroes quibus artis inventio adferibitur, velcafu aliquo monftrante, vel a Ho modo cognoverunt: is deinde frequentibus experimentis adcuraciones variorum morborum adhibuerunt ac utiles obftituerunt. Nunctandem quamin harum quinque Seftionum herb arum hiftoria vob is Subfcjriptoribts ac Benefa&oribu* obftinxeramfidem libero, ferius hauddubie quam multi exoptaffent, is quam ipfe conflitueram. Sedmulta fubindepr<zter{pern incidunt, quibm nofira confilia perturb ari atque its moram injicicontingit :fic mihi varik ac diutink negotik occupato^acfrufira-Tionibu* impedito, hijloriam harum quinque Seftionum hue tenws abfolvere non licuit. Maximam harum Settionum quas hie complexm fum par tern, quoad earum difpofitionem à nemine (cujus lucubrationes legerimj hgftenu* obfervatamcertutfum. Ingenue infuper profiteor meam hanc methodum non ex librk Botanicorum fcibentium, fedex Libro Nature mire is mere depromptam. Ctfterummeos labores, quales qualesfunt, tametfi leftorum quorundam malevolorum expeftationifortaffis nonrefpondeant, bonosboni confulturosi&candide, ficubi lapfm fum, interpretaturos confido: quodffecerint^ reliquam quam mihi Deus optimum maxima* conceferit vitam adftudia Botanicapro meo modulo 'promovenda impendendam efe fiant.

Plantarumig aliorum fimpliciumcognitionem.apudprifcos isetiam inter neotericos celebrem fuiffe^acfummoinhonore habitam; imo perjucundam is deleftabilem, atque ad vitam tuendam fummiopere nece'fariam, non aphilofophk tantumis rmdick, fedetiam à regibm^ veteres te'lantur hiftorU. Siquidem Plant* in medendoprimum obtinent locum, cumfint UU bafis isfundamentum Medicine; quin is illk fanitaspr*fens incolumkfervatur, vitaque in multos annos prbducitur : its quippe omne. morborum genus depellitur, ac deplorati etiam interdum, quorum in extremo fpes falutis eji pofita , tuciaur<eque natali redduntur. Him authores multi Jiirpium facultates fummo ftudiofunt profequuti^ is earum format is imagines affabre fculpt as exhibuerunt, is anxia cura medendi explorarunt vires ifcriptifque eafdempofleritati confecrarunt. Ac cum quilibet pro ingenii excellentiafententiam fuam public* utilitatis caufa fcriptis divulget, nee mihi idcenfeo vitio datum iri, cum aliorum^ imo doftorum^fententias convellam atque improbem, quum nullius lucufationibus quicquam derogem , fedpotiut quicquidà meprofertur, illud omne viroꝝ, rum ingenuorum, candidorum is eruditorum Cnon autem momorum atque ignavorum cavillato* rum")judicikfubjeftumatque adeocommendatumvelim. Itaquetantumabefi, utquihq^ftadium ante nos funt ingre/fi, quanquam perdofti, gnavi is feduli Scriptores, nos deterruerint, ut nobk potius facem, imo lampadem hanc tradidife is ad eundem curfum invitaffe vrfentantur: ficuti necnofter hie labor improhus adalios avertendos inftitutua fuit, fed ad acueendum potiu* aliorumingenium, major'emque diligent iam. Sedcum plerique mortalium, etiam doctiffimi, in pier ifque plant k hdfitent, atque fdtpenwnero earum cognitionem non folum ignorent, ^{ll}TM j*o dum ipfas adpeculiaris y propria is genuina genera fpeciejque reducendi omiferunt. y j TM ^o in o eft inter mort ales qui omnia nor it necnift foli Deo convenit Plant arum omnium fimul, earumque vinutumperfeftafcientia. Cum memoriam impediãt, atque obruat t ant apiantarum copia is varietas abfque methodo certiore, quam a pr&distk omnibus Botanic hucufque tr aditur, bide multi à plant arum (ludioahfterrentur: quippeftudium hoc arduum is difficile eft, partim oo magnum plantar urn numerum, partim vero ob nominum apudAuthores diver fit atem, fed multomagis, ob defeftum ver<e is infallibilk methodi. Hinc Plant* memoria facilim excidunt, cum unius ejufdemque Plant* tot varia nomina ab authoribus proponantur, is propter tot nominum diver [it atern plant k impofttam non tantum appellationes genuin*, fed is notitia is ^omi^k>ta confunditur, qu*ftudiofos ac etiamprofefores rei Botanic* ab hoc ftudio adeo Medick neieffario feducunt. Quareftudioft complurimi, imo is Profeffbres ipfi, f*pius is ardentem

. fummk

INDEX ALPHABETICUS

Generom intermediorum in his quaiqae
Seftionibns contentorum.

- A**
Brus five Phafeolus ruber atatus, apag 71 ad 73
acetofa feu Oxalis a pag y \$I
Rad pag y 84
Alcea a pag y 26 ad pag y 29
Atctimilla feu Pes leonis pag 19 y, & 19 6
Alliariapag 2y2 pi. 6 Hefperis Allium reddens, nobis.
Allium a pag 3 84 ad pag 389
Alroce a pag 413 ad pag 4' 8
Alfine a pag y49 ad P^oSSS3
Althaea a pag y 29 ad pag y 3 7 y
Amaranthus a pag 601 ad pag 603
Anagallis a pag y68 ad pag y7o
Androfxmi'n a pag 470 ad pag 473
Anemone a pag ^ 4 ad pag 427
Anguria pag 28 & 2 9. vide 4 3 & 44
Anthyllis five Lpto affinis a pag 1 80 ad png 18 3
Antirrhinum a pag y04 ad pag yof
Arachidna a pag 9 8 ad 100
Afparguspag 2, 3, 6c4
Aphodelus a pag 3 29 ad pag 332
Afragalus a pag 104 ad pag 11 x vide pag 203
Atriplexa pag 603 ad pag 608
- B**
Balfamina femina feu Noli me tangere a pag 280 ad pag 28 2,
Beta a pag y 8 y ad pag y 97
Biftorta a pag y 84 ad pag y 8 6
Blattaria a pag 48 7 ad 491
Blitiim a pag y 9 8 ad pag 600
Brafica a pag 20y ad pag 212.
Brafica Turhtis pag 211 pi. 23 & 24
Bryonia pag 4 &: y
Burfã paitoris a pag 30^ ad 307
- I**
AcubalusPlinii pag y & 6
Campanula a pag 4y 1 ad pag 461
Capparis Fabago pag 2 84
Caryophyllata a pag 429 ad pag 43 3
Caryophyllus a pag y y 9 ad pag y 64
y-entaunum ipmus a pag y6y ad pag <6y
C. f. pag 2 82 ad P^a S 3⁸ +
C. majus a pag 2 5- 6 ad 2y8
C. minus Ranunculus prcxox
C. radice, nobis.
C. pag 4 16 pl 45
C. pag 4 16 pl 45
Chryfogonon pag z gr
Cicerapftg 7y ad pag 77
Circea five Solanifolia pag 617
Clematis feu Flos pafionis pag (3, 7, 8)
Cochlearia a pag 3 0 8 ad 3 1 o
Colchicum a pag 3 3 9 ad pag 341
Cqlocynthis pag 276c 28 vide pag 42 & 4 3 cum pag 4 2
Convolvulus a pag 10 ad pag 21 vide pag 3 6 & 37
C. vide Melochia pag 283 284
C. pag 3 34 ad pag 3 3 8
Cucumis a pag 3 0 ad pag 3 6 vide pag 44
CucurBita a pug 22 ad pag ^ y vide 47
- D**
Ens'canis pag 34y & 34-6
Dentariaa pag 2y4 ad %\$6
Digitalis a pag 47 8 ad 480
Dorycnium & Dorycnio congener. Vide Lotus pag 178 pi. 1 y & 16
Draba filiquofa a pag 2 3 3 Jad 2 3 6
Draba filiculofa pag 3 1 3 & 3 14
- E**
Epimedium pag 196, 197
Erinus, vide Campanula pag 4y6 pi. 20 & pag 45 8 pi. 2y
Eruca a pag 226 ad 23 3
Eryfimuma pag 217 ad 220
Eupatorium Graecorum feu Agrimonia a pag 4 14 ad 4 1 6
- F**
Faba a pag 82 ad pag 86
Fabago, vide Capparis fabago pag 2 84
FeiTum equinum a {^g 116 ad 119
Flos hepaticus, vide infra Hepatica
Foenum Burgundiacum, vide Medica fativa five trifoliumfalcatum pag 1 y 8pl.2
Foenum Graecum, vide Trifolium diftum
Foenum Gnecum a pag 16y ad 167
Fragaria feu Trifolium pentapctalon fragiferum a pag 1 8y ad j 87
Fritillaria a pag 401 ad 404
Fru mentum Saracenicum feu Eryfimum cereale & frumenri Sara#enici alia fpecies, Helxine cifampelos difta pag y 8 9 & y90
Fumaria five Capnosa pag 258 ad %64
- G**
Alcga pag 91 8c 9 2
Gariophyllion, vide Garyophyllusa P^g 5^9 a. S 4
Garyofilata, vide Caryophyllata fiipra
Garofmon, vide Atriplex fectida pag 60 y pi. 6
Geranium a pag y 99 ad y, 1 8
Geum Alpinum, vid. Charyophyllata (iipra/ Gitlj & Githago & Nigellafrum, vide Lychnis a pag 534 ad y 48 y
Gladolus a pag 242 ad 346 vide pag 44 i "
- G**
Glandes terrefe, vide Lathyrus pagy otkyi
Glaftivida, vide Leucoimpag 489 pi. 8 & pag +9P
Glaftum five Ifatis pag 28^ & 287
Glaux Hispanica Qudi, pag 100
Glycyrrhiza a pag 89 ad 91
- H**
Aftula regia, vide Aphodelus a pag 329 ad 332
Hedyfarum five Securidicaap. 79 ad 81
Hepatica aurea five Trifolium Hepaticum & 4, 2 4
Herba viva pag 101, i oi videitidema pag 298 ad 201
Herba Papagalli, vide Amaranthys tricolor pag 102 pi. 1
Hernaria, vide Polygonum polyfpermon pag 5-93 & y 9 y
Hefperis feu Viola matronalij feu Duma-
- cenaapag 2yi ad 2y^
Hiberis Fuch. vide Ibcris pag 3105311
Hippolapathum, vide Lapathum pag y 79
Holofeum, vide Lychnis pag y 4 < pi. 46" 47 & 4 S
Hyacynthus a pag 370* ad 371 vide etiam pag 42 2pi. 9 < S^o
Hydrolapathum, vide Lapathum pag y 79
Hydropiper, vid. Perficaria pagy 8 8 & y 8 9
Hyocyamus a pag 4 9 3 ad 49 6
Hypecoumpag 279 280
Hypericum a pag 46 8 ad 470
- I**
Beris pag 3 10 3 11
Miris tuberosa & Xyris a pag 347 ad 3 y 6
Iris tuberosa radicibus pluribus pendulis, pag 398 pi. 1
Iris bulbosa a pag 3 y6 ad pag 3 y g
Ifatis five Glaltum pag 186 187
- K**
Ali pag 609 6x0 671
Keiris, vid. Leucoium filiquofum bicap^ fulare pag 243 & 244 pi. 16 17 1 8
Knawel, vide Polygonum polyfpermon
P^g JT93. pl 6
- L**
Ablab Alpini, vide Phafeolus pag 66 6y 68 & c.
Lagopus feu Lagopodium, vel Trifolium Jagopoides five montanum pag 138 139 140 141 & c
Lapathum ejuifque fpecies a pag y77 ad pagy 81
Lathyrus a pag y o ad pag y 8
Lens pag y8 & c y9
Leontopetalon pag % 8 y
Lepidium a pag 3 11 ad 11 3
Leucoium corniculatum fca iliquofum bi* capfulare a pug 238 acr 244
Leucoium filiculofium bi* pfillare a pag 24, 40, 2 9
- Liliafphodelus pag 412 41 3
Lilionarciffus a pag 3 6y ad 3 69
Lilium a pag 4*4* ad 41 z
Linaria a pag 49^ ad yo4
Linum a pag 571 ad y76
Lotus, vide Trifolium Lotus herba penta* phyllos dictum a pag 173 ad 1 80 vide 204
Loto affinis, vide Anthyllis a pag 181 ad 183
Lupinus a pag 86 ad 89
Lupulusa pag 37 ad 39
Lychnis a pag 5114 ad y49
Lyfimachia filiquoia feu coruiculata a pag 268 ad 272
- M**
Martagon a pag 5 1 7 ad 5 2 5
Martagon, vide Lilium montanum
Martagon diftuma pag 408 ad 409
Medica, vide a pag 1 y7 ad 1 y9
Melilotus, vide Trifolium Melilotus di* ftum a pag 160 ad 165
Melo & Melopepo a pag 29 ad 30 vide infuper pag 40 41 & 5 4
Melochia Alpini, vidt Corchorus pag 2836c 284
Mercur-

INDEX ALPHABETICUS.

McixuriaUs feu Cynocrambe P^hyllonve
a pag 6i % ad 614
Moly a pag 3<ixad 394, vidē itidem
pag 4^ 3 V;
Mofchatella Cord. Vide Ranuncfj&s pag
4378c 438 pi. 14
Mufcipula, vide Lychnis paginis citatis
fupra.
Myagrum pag 314 & 31 %'

N

NApofrafica, vide Brafsica pag 206
& 21 o pi. 21
Napus pag 214 ny
Narciffus" a pag 359 ad 363
Narciffo-leucoium five Leucpium bulbo-
fum tricapful^e a pag 363 ad 36^,
vide infuper Jffi & 422
Nafturtium filiquofuina a pag 220 ad
226
Nafturtium filiculofum a pag 300 ad
iNcotiana a pag 491 ad 493
Nigellaftur, vide Lychnis pag 543 pi.
31 6C32
Nil five Anil vel Indigo pag 202 203
vide Tab 24 Se&. 2. fculptam.
Noli me tangere five Balfamina femina a
pag 2 8 o ud 2 8 2
Numularia pag 567 568

O

Oamis J^g 5?
Oclmoids, vide Lychnis pag supra
citatis 544 pl- 3 8
Odonititis, vide Lychnis pratenfis lacinia-
tis foliis, pag 5:34 & 577 pi. 8
Onagra, vide Lyfimachia pag 269 pi. 1
Onobrychis leguminofa feu papilionacea
a pag 129 ad 134
Onpnis five Anonis, Arefta bovis, vide
Trifolium di&um Anonis a pag" 16 8
adi 73
Ornithogaltim a pag 377 ad 3\$X, vide
etiam pag 423
Ornithopbdium a pag 124 ad 126
Orobtm fativus annuus pag 74 & 75^
Drobis filvaticus filiquis propendentibus
a pag 73 ad*;*?
Orobis filvaticus perenms iihquis ereChs
a pag 9 2 # g y
Ofyris, vide Linana a pag 496 ad 504
Oj It^nis, vide Antirrhinum a pag 504
ad f@6
Ouludia, vide Tulipa a pag 396 ad 401
Oxalis, vide Acetofa a pag 582 ad 5-84
Oxylapathum 577? 78 pi. 3
Oxys Plinii, vide Trifblium acetofum a
pag 183 ad 18? # # #
GxjirtriphyUum Scribonii largi, vide Tn-
folium Lotus di&um pag 171 pi 13

P

Pancretium, vide ^lionarciffus pag
366 pi. 28 & 29
Papaver corniculatum a pag 273 ad 274
Papaver capitatum multicapfulare a pag
274 ad 27^
! ^>paver Rh'oasfive erraticum pag, 277
78
Javer fpinofum luteum pag % 7 6. & % 7
..paver Argemone didumpag zj8 279
Pafalyfis feu Patalytica, vide Verbafo-
him feu Primula veris a pag 553 ad
756
Parietaria pag & QO £l 601
Paronychia filiquofa, vide Burfa pafitoris

a pag 303 ad 307
Pentaphylloides a pag 192 ad <i 9 ^
Pentaphyllum peregrinum filiquofum &
Trifolium peregrinum filiquofum a pag
287 ad 289
Pepo a pag 25 ad 27 vide 39 40 & 42
Perfoliata napifolia, vide Brafsica supra
pag 216 pi. 19
Perficaria pag 588 589
Pes anferinus, vide Atriplex pag 603 pi.
1 & 2
Petromarula, vide Trachelium galeatum
pag 467 pi. 57
Phafeolus Smilax hortenfis five Dolichus
a pag 66 ad 71
Phylion fpicatum & tefticulatum, vide
Mercurialis a pag 612 ad 614
Phlomis vel Phlomos, vide Lychnis fu-
pra
Pinguicula, vide Viola pag 474 ad
477 P^L 3
Pifum a pag 45 ad 49
Polymonium, vide Lychnis supra.
Polygala tetrapetala feu Flos ambervallis,
pag 326 327
Polygonum femine triquetrum pag 59 1 & C
592
Polygonum Polyfermon a pag 593 ad
595
Eolyf>ermon five Polyfporon Lobelii, vide
Blitum pag 5^99 VA» 6
Poifum a pag 389 ad 391
Portulaca pag 570 571
Potamogeton a pag 586 ad 588
Potentilla, id eft Argentina pag 192 &
193 pi. 4
PHapeia, vide Nicotiana pag 492 493
P^L 4* A <:
Primula veris a pag 553 ad 556
Pulfatilla a pag 427 ad 429

Quinquefolium phxum fufcum a Tri-
^ folio degenerans pratenfi, vulgari p.
203 l. ±/l
Quinquefolium feu Pentaphyllum & Tor-
mentilla a pag 187 ad 192
Quinoa, vide Amaranthus pag 601 602
Pl. 2

R

TJ Anunculus ejuifque varix fpecies a
X V pag 434 u% 1 1 4, 5 0
Rariaaniftrum filiquis articulatis pag 1, 65
6P266
Raphaniftrum monofpermon a pag 266
z£8, vide pag 337
Raphanus filveftris feu rufticanus pag
236 237 6C238
Raphanus fativus feu Radicula pag 264
& 165-
Rapum a pag 11 % ad' a 14.
Rapunculus us pag 455 456
Rapunculus comiculatus a pag 4^x ad
466
Rapunculus galeatus a pag 466 ad 468
Refta bovis, vide Anonis supra
Rhabarbarum & Rappnticum, vide La-
pathum 577 & 578 pi. 1 & 2
Rumex, vide Acetofa a pag 58x ad 584.
Ruta a pag ? o 6 ad 5 o 9

S

SAbdariffa, vide Althxa pag y 3 o &
^ . . ? - ^ P* i 7 & * n _ . .
Salicaria Gcfn. 6c Salicaftrum, vide Ly-

fimachia filiquofa pag 269 & 170
pi. i & 2
Salicornia, vide Kali g#g 6 M pi. 8 *
Sana fancbi, vide Nicotiana pag 492 pi. 3
Sandalida Cretica, vide Lotus retragono-
lobi^ pag i j6 pi. 7
Sanicula officinarum pag 61 \$ & • 617
Saponaria, vide pag 547 & 548
Scammonia, vide Convolvulus pag 12^
pl.5-
Scillapag 395 3b6
Schxnoprafum, vide Cepa Afcalonica pag
383 P- 3
Scrophularia a pag 481 ad 484
Scorpioides leguminofium filipapilion-
aceum filiquis articulatis o^ pag iz6
ad 129
Securidica five Hedyfarum pag 798 0
Sena five Senna a pag 201 ad 292
Sefamum verumpag 282 6c 283
Sesbanpag 79
Sinapiapag ^ i 5 T ad i 7
Sifyrinchium pag J4? > vide itidem pag
421 . c
Smix hortenfis a pag 66 ad 77
Smilax tevis, vid. Convolvulus pagio & tt
Soldanella Alpina pag 2 8 5 2 S 6
Solea equina, vide Ferrum equinum a
pag 116 ad 1 i 9
Sophra ^ 7 8 7 9
Sophia Chirurgorum, vide Nafturtium
tenuifolium pag 223 pi. 6
Spatula foetida, vide Xyris pag 347 Sec.
Spelum Veneris feu Onobrychis arven-
fis, vide pag 457 pi. 21
Spergula, vide Alfine pag 551 pi. 13
14 15 & 16
Split, vide Fumaria pag 260 pi. 3 & 4.
Stella leguminofa pag 81
Struthium, vide Saponaria pag 547 ply2

TAbacum, vide Nicotiana pag 491
49^ & 493
Terras glandes, vide Lathyrus pag ^ j
pi. P
Thlafpi a pag 289 ad 299, vide etiam
pag 328
Tormentilla pag 190 pl. i 3
Tornabonia, vide Nicotiana a pag 391
4, 3
Trachelium five Campanula a pag 458
ad 462
Tragacantha five Poterium a pag m
ad 115P*
Tragos five Tragum, vide *Kali pag 611
pi. 11
Tribulus terreftis pag 102 & 105
Trifolium bituminofum a pag 13 ad 1 * >
Trifolium pratenfe pag 137 1 3
Trifolium montanum five La^opoides a
pag i 37 ad x 4 i
Trifolium arvenfe a pag 3 4 2 1 14, 15
ibidem alia varia Trifolk
Trifolium us exodici leguminofa a pag
14y ad 150, vide etiam pag 102
Trifolium cochlearium feu Medica co-
chlearia a pag 15-1 ad x/6
Trifolium falcatum vel Medica filiqua
falcata feu comuta a pag 157 ad J 159
Tr^olium odoratum Melilotus & 159
Pag 167 ad 167
Trifolium Fce, a ugr « cum di 6? . jr u i pag
165 ad 67
Trifolium dictum Anonis five Ar# a bo-
^ v i s a pag, i 78 ^ i 73
Anfohum Lotur herba pentaphyllos

BACCIFERA EDIBLES & NON EDIBLES SCANDENTES

Tab. 1. Botanic.

1. *Alfarago, seu palustris aculeata* C.B.P.
Cotrus. *Frax. Clav. hist.*



i. y

2. *Ampelodesmosmos aculeatus* alibi *Andros. au*
Andros. au. Andros. au. Andros. au.
f. *Corrida. — altera, Clav. hist.*



3. *Ampelodesmosmos aculeatus* *Andros. au.*
C.B.P. *Corrida. — altera, Clav. hist.*

* Jr ^x



4. *Ampelodesmosmos aculeatus* *Andros. au.*



5. *Bryonia alba* Dod. *Vitis alba* Matth.



6. *Bryonia nigra* Ser. *Vitis nigra* Matth.



7. *Clematis flammula* *Andros. au.*
Andros. au. Andros. au. Andros. au.



8. *Clematis pentaphylla* *Andros. au.*
Andros. au. Andros. au. Andros. au.



9. *Clematis flammula* *Andros. au.*
Andros. au. Andros. au. Andros. au.



1771. In London, Jno. J. & R. Currie, Printers.
Printed by J. Currie, at the Sign of the Anchor, in the Strand.
By Wm. Woodcock, Bookseller, in Pall Mall.

BACCIFERA SCANDENTES, & non SCANDENTES

1. Clematis passionis pentaphyllos flore campanulato, nobis. passionis flore campanulato. Munting.

2. Clematis passionis triphyllis roseo, nobis. Passiflora trifolosa roseo, Munting.

v' 'trmait.' passionis triphyllis Munting
flore lobata Munting



4. Clematis Maroana pyriformis altera. Georg. Marogr.

5. Clematis Maroana Guaca pyriformis. Georg. Marogr.

6. Clematis passionis folio bifida, nobis ferrum equinum oculabile Munting.



7. Christophoriana Americana, Park. ejusque flores & bacca corymbatim in spicam congesta. Aconitifum bacca niveis & rubris. Corri.

8. Christophoriana vulgaris, Park.

9. Angelica Baccifera, Munting. Panaces Ka. & Racemosa Canadensis, Cornut.



Quo tempore illustravit Princeps Jacobus Dux
Saxoniae & Silesiae, & Comes de
Darmstadt & Silesiae. Bene Scilicet
Commissarius & Conservator, & Munitio
Commissarius & Conservator, & Munitio
Commissarius & Conservator, & Munitio
Commissarius & Conservator, & Munitio

Convolvulus Cyrenicus velus Dorycnium
qua L. in P. Porir.



Convolvulus
1. Convolvulus maritimus proter rotunda foliis no. ut
Husica maritima. Italis & Convolvulus maritimus
folio cordato, aut ovato, rotundis.



4. Convolvulus Indicus Orientalis. In hunc Sen
Baltabas Sinarum. Brasiliam in a Baltaba
Hispanorum, Ger



Convolvulus S
nobis Scammoru Syriaai. CEP

Convolvulus rajiifolij ou Hoanf, "?. Cynaol Dulu F pui-putcus folia tuhr otundo.
nobis Smilax. !a:ui\$ rraj-DoS Ger ChPtmlicus f'ialenreo, Eyp



8. Convolvulus Ceruleus hederaceus seu
Iri Jolri Si Park-Parad

9. Convolvulus vulgaris minor
arvensis, CBP Smilax leois minor Dod.

W-Convolvulus arvensis Athira folio XB-P
fcrearinus pulthff folie B I B



Autpicirt Itutfrj'r/mt Prrrjcipfr tokenntis Ducis
L. auderiir, Marchienit Martlet. Corrt'fiaG
L. auderta: & utr<: e'fulis Mail'and. B'tronrr
P'Unham. Tharsithuf, Mrjreirbroagh t, Jiofbn. tn
Nohltijum'f Bfdini Ptri*ctiffctir&inqstf

1. *Convolvulus Scammenitejiliu tnuvas nob*

2. *Convolvulus minor arvensis*
repens Rupellensis nobis

3. *Convolvulus longus*
spica folia



4. *Convolvulus peregrinus caeruleus fol oblongo.*
C.B.P & Prod flor quinque petalato & fol oblongo, nobis

5. *Convolvulus Aegyptiacus*
quinque folius, IB

a *Coitpohuius Afmrrnts n. nror,*
terk-



7. *Convolvulus pennatus* *Exohtus*
Cot-Quamoelit, Cam */B*

8. *Nasturtium Indicum*
ma j. C.P.P

9. *Habenarium*
benicarium *ffKWftum, tuwIttdKum. i-B- 'Pisum*
ffrtti aigFO afltia trwatlu fiaiuuCf.



Gull-Summiter delin.

Fred Hind Vanhove sculp.



Asperum Nodis se & duntaxo ligo D. Jacobi Goullou
Quilto Nordampsaune & Balthasar de Koutpou

1 Cucurbita lapa, varia flalbo fol. melle. C.B.P. 2 Cucurbita labor. Dal. Majoris foli flalbo. C.B.P. 3 Cucurbita oblonga flalbo fol. melle. C.B.P.



4. PrgC inixctU am} t

5. Pipo compressus minor, C.B.P. rotundus minor, Dal.

6. Pipo oblongus.

as



7. Pipo Melopepo verrucosus.

8. Pipo Clypeatus minor, C.B.P. Indicus fungiformis, Ger.

9. Pipo Ponsiformis.



Auctoritate Excellentissimi Nobilissimi & Honorabilissimi D. Asturii Capelli Cantabrigie de E. Jacobi Baronia de Capell. in Hibernia DD. Caroli 3. proregis.

Scandentes Pomifera.

1. Calocynthis, Math. Ger.

2. Anguria, Math.

3. Melo Hispanicus, L.



4. Melo, Math. Ger.

5. Melonae Abdelawi Aegypti, B.

6. Cucumis vulgaris, Pers. Ger.



7. Cucumis anguria, Tab. Ger.

8. Cucumis ariminus, Ger. Hoff.

9. Cucumis puniceus, Cord. Hist. Balsamina mas, Ger. Park.



Amstelredamum Notabilissimi, ac Honorabilissimi D. Gregorij Aeneas
Gycomontis de Hallijs, et Baronia de Eland.

Cucurbita reticulata (var. *chamboides*)
Cucurbita *reticulata* *sin.*
Arabis *Vetula* in *Alpin.* de *planta*, *Aegypti.*

imie ^ (•\> n>LniLL

Eodem *Zufir* *Arabis* *non* *flora*
de *fructu* *ut* *afirta*, *UDhit.*

Cucumis *Aegyptius* *reticulatus* *(B.P. Chate*
Aegyptus *Cucumaria* *genus* *prospulpi*, *de* *Planta*
Aegypti.



Cucurbitulus *flexilis* *arvensis* *flora* *caerulea*
maxima, *capitata* *ad* *hanc* *binis* *foliis*
obovatis *coactis*, *nobilis.*

Cucurbitulus *Africanus*
nitens, *Barb.*

Cucurbitulus *quatuorfolius* *flora* *marginata*
plana, *non* *sine* *coacta*, *nobilis.*

Cucurbitulus *major* *Italiens* *et*
maxima *vel* *potius* *auriculata* *folia*
quibus *Cucurbitulus* *Herba* *lucifera*
Soldanella *maxima* *con* *gener.*
Impert.



Convolvulus *capitosus* *minor* *Helvetic*
capitosus *ramosa* *Pinu*, *Italica.*

Convolvulus *perennis* *heteroclitus* *floribus* *her-*
baceis, *Lupulus* *foliatus* *atrobili* *inflor*, *rubris*
Lupulus *max.* *Femina.*

Idem *aut* *Lupulus* *adventus* *minor* *sine* *fructu*
nobilis *Lupulus* *foetida*, *Com. Ep. & Hort.*



Borghesi *fruct.*

Auspicio *Illustrationis* *Pinogis* *Caroli* *frat* *Regi*, *Duci*
Southamptonis, *Comiti* *Chesestris*, *Baroni* *de* *Newbury*,
nobilissimi *antibus* *periculis* *Epini* *et* *Sc.*



Cucurbita fungiformis, Gees. *Pepo Indicus minor elongatus*, Tab.



Cucurbita patrum sicuti pugni magnitudinis cortice rubra maxime uti operas & semine rubra, L.B. Chabr.



Pepo minor angulosus, L.B. Chabr. *Pepo Indicus minor*, Tab.



Pepo seu Melo Pepo loma elongata sicuti ubi apparet, aphis. *Melo Pepo elongatus*, Tab.



Pepo maximus elopeatus, Gees.



Pepo minor elopeiformis Virginiana sicuti & folia a pediculo ad umbilicum ducta, nobis.



Melo moschattellina rubundula porosa seu Melo pumilus sicuti, L.B. Chabr. *Melo fasciculata*, Tab. 100.



Melo mesohattus compressus major filis sicuti, nobis.



Melo mesohattus elongatus major fulvatus, nobis.



Melo Hesperides, Tab. Gees. *Melo longus*, L.B. Chabr.



Borghersa ferdy.

Aspicia Nobilissimi sicuti *Caroli Domini Hochstet*, filii nati maximis *Henrici Augustini D. Henrici Marchionis & Comitis Vigenensis*, *Baronis Herbert de Rufford & Consortis Leontina Cambra* sicuti *Præsidis & Majestatis a Secretioribus Consilio Nobilissimi* *Welfus Post*, *Baron*.



PLANTARUM

Hiftoria: Uriiverfalif Oxonienfis.

PARS SECUNDA,

DE HERBIS

SECTIO TERTIA

De Bacciferis & Scandentibus.

In hoc primo libro feu feBione prima herb arum, feu plant arum molh herba[^] tea materia conglantium, exordiemur I bacciferis herbs: quia major em ha[^] bent connexionem (ex libro naturae) cum fruticibus & fuffruticibus bac[^] iferis, In partis Trim[<]e Capite ultimo expllcatis. Et in primo cap it e hujus pru[^] ma SeBionis traBabimus deBacciferis Scandentibus &* non Scandentibus; in fecundo de Scandentibus campanulatis iaBefcentibus; in tertio vero de Scan[^] dentibus pomiferis.

C A T V T I.

Bacciferae Scandentes & non Scandentes.

Bacciferam plantam appello, cujus fructus exterius confat pellicula involvente fuccum. & femina. Et quae deftituuntur hifce conditionibus, improprie dicuntur Bacciferae apud authpres: five fint arborès, frutices, fubfrutices aut Herbx: & idcirco vitiovertendum authoribus putamus, qui Baccas Lauro, Paliuro, multifque aliis affignant. Improprie enim hujusmodi baccas dicuntur, ut fufius poftea declarabitur in doftrina a nobis exhibenda.

T A B U L A

- | | |
|--|--|
| <i>Bacciferae non scandentes, Asparagus.</i> | 1. Foliis acutis. C. B. P. Corrudaprior, Cluf Hift. 0 |
| | 2. Aculeatus alter [^] tribut aut quatuor fpinis ad eundem exortum [^] C. B. P*
Corruda altera [^] Cluf. Hift. 0 |
| | 3. Aculeatus fpinis horridis, C. B. P. Corruda 3. Cluf Hift. © |
| | 4. Vomejlicus, Eycht. Hortenfis, pod. 0 |
| <i>Bacciferae scandentes, Bryonia.</i> | 5. Bryonia alba, Vod. Vitis alba, Matth. 0 |
| | 6. Bryonia nigra, Ger. Vitk nigra, Matth. Sigillum Mari ^{<} £ isr Tamus, Vod. © |
| | 7. Planta recentiorum Alfinis major is facie, bacck Solani, Ad. Lob. Cubalus Plinii, Bft. Lugd. 0 |
| | 8. Clematis pentaphylla, florerofeo clavato, nobis. Marocua, feu Marocua, Georg. Marcgr. © |
| | 9. Clematis trifoliaeuflopaflionisyflore viridi, nobis. Marocua 3. Georg. Marcgr. ♦ |

TABULA II,

- 1. Clematis paffionalis pentaphyllos, flore campanulas, Monting. ©
 - 2. Clematpaffionalk triphylhs, flore rofeo, nobis. Pakfiora trifoliatore rofeo, Monting.®
- Baccifer. fcandentesf'^n^*
- capreolis, majores.]^ clematis Marocuiapyriformh minor, nobis. Marucuiapyriformh alter a, Georg. Marcgr. 0
 - 5. Clematis Marocuia pyriformis major, nobis. Marucua Guacu feu °pyriformis. Georg. Marcgr. 0
 - 6. Clematis pafionalis folio bifido, ndis. Jerrumequinum volubile, Monting. 0
- Baccifer* non fcdn- dentes, racemofig.*
- 7. Chriophoriana Americana, raceniofa, baccis niveis <sr rubris, nobis. Acomtum baccis niveis isr rubris^ Cornüt. 0
 - 8. Chriophoriana baccifera, vulgarh, racemofa isrramofa, nobis. Chriophonana vulgar is, Park. Aconitum racemofum, an Attaa Plinii, C. B.P. 0
 - 9. Chriophoriana baccifera feregrma racmofalis framofa, nobis. Chriophoriana baccifera, Monting. Panaces WP^AWY racemofa, Corn. ©

E X P L I C A T I O T A B . I .

In pdiminc, cujufque generis nomina antiquorum, cum Grzca, turn Latina, ex Theopiraito, Dioconde, 5f Plinio, alifque authqribus à Cafp. Bauhino defumpta pr^mifi, mus. MOS bacciterarum plantarum turionibus edulium doarinam, à Corrua exordie- ur; quia Corrua magis participat materiam ligneam feu duriolem, fbffruticibus magis attinem. Corrua dicitur, teffe Ruellio, quod ubi adolevit, facile corruat decidat- ve, 11c ik Horminium ^ Zh? «Zly 'ofJ^ enim eft ruo.

^ . 1. Bacciftrae non Scandentes.

ASPARG. US .fi ve C o . n . U ' D A .

ETfi xtrTn^ys vj dypdg Lyis Galenus 2. Alim. omnespropemodum teneros caules^iy tmerager-TMmina, feu ex oleribus is herbis, feu ex fruticibus, fuffrutieibu*, arboribusque voctet; au^umen peculiar^ I generi plant<z etiam tribuitur, qutfic d&la, quod cauliculos hos^ quipinm germinatimel teneo pndentat, pr<Ecipuos habeat.

GenerdoDiofcordidib. l. c. 13. 2. par&am isf fat'wum: 1& Galeno Hwxiv regim (# %AttolPa-
lufre: fle enim Diofcordes. ab^TM&g> TOMSO, quern fvl-^jeul fld eft murinam fpinam J\ meant
yulgaris eft moU: isrpaulo infcimas; Afparagis altiie, frutex eft ramofws, folia habens multa
longa, Fxniculo fimilia, radice rotunda, ggradui, tuberculum habent. Eft fheoptraffus b. Hifi.
i: *ant^ys> (idiffelalwvveampqegannim Afparagum Corrudam Graa qvertit JJ ex tota cautea
taefi, is nullum juxta aculeum folium gerit: <? ^ Hifi. \$. juxta aculeo fupillum quiddam da-
v<e fimile producit, ex quo tandem ftofcu Osipfi erumpit: radice larga, alta, numerofa, eademque
tarn crebra innititur, ut pars fuperna radicum tota 'connexa is continua reddatur, ex qua ^ I
ipforum caulium preventTM faclitatur, isc. Plinius lib. 19. c. 8. omnium hortenfium lauTif
fima cura Afparagk, isc. Eft is aliudgenus incultius Afparago, mitiu* Corrua pafTim eti-
am in montibus nafiens, refertis fuperioris Germanic campisy non infaceto Tiberii clfaris diSio
herbam ibi quandam nafci fimilimam Afparago isc is paulo infra : judicavimu* is Corrudam
bum enim intelligo fiheftrem Afparagum, quern Gr*ci Orminium aut Myacanthon vocant: is
lib. 19. c. 4. filveftres natura fecerat Corrudas, ut quifque demeteret paffim ^ A^/es Bec-
tantur Afparagi: is lib. 20. cap. 10. Asjaragi vires ubi recenfuit, fubmunt' the/lrem* A-
sjaragum, aliqui Corrudam, alii lybtcam vocant, Attici Ormwiumy hujuseffitaclorv^ Js can-
didiore major: is lib. 21. cap. 16. in totum tyina eft Afparagm.

Explicatio TabuU primae 7 Sefionis printe.

1. *A Spdragus* foliis acutis, C. B. P. Corrida prior, Cluf. Hift. FruticoEi est hxc planta ?
 • IX c{uabusaut tribus pluribusve virgis, candidis, lignofis, firmis & ramofis pradita, circa quas quina, vel fena fbliola hfinul lemper juncta nafcuntur, brevia, rigidiufctila & pnnngentia : flofculi lytei, fenis parvulis petalis conftantes, iub alls inter folia bafcuntur, odore jucundo uti violae Martiae: baccae initio virefcunt, deinde cinereum colorem induunt, femendque continentnigrum, durum: radices abprio ctpite multse, craffie, inftar Afparagi altilis, fed-breviores, nafcuntur. Hujus cauliduli prima germinatio in cibos venin^ fed cseteris tux fortis cauliculi tenuiores funt", quin Sc amariufculi, quo fit ut ingratiore habebantur in cibis.

2. *Afyaragus* aculeatus alter, tribus autquatuor fpinis Ud euildem exortum, C. B. P. Corrida altera, Cluf Hift. Fruticofus etiam est hie alter Afparagus, in viridibus & mollioribus ratnis five virgis ramofis, tres aut quatuor plurefve fpinas, ab eodem fere exortu prodeuntes, hinc inde fparfas pro foliis ferens, virides itidem, uti funt rami: flores ac baccas fuperioris majores fert, initio virides, deinde per maturitatem nigricantes, [ucco & pulpa virente plenas, qua femem includitur durum, foris nigrum, intus candidiim., ut plurimum unicum, interdum bina: radices habet plures ,cra(Tas, longas, liiperioris non valde diffimiles.

3% *Asparagus* aculeatus, fpinis horridus, C.B. P. Corrida 3* Cluf. Hift. fertius hie Afpa^ragus* cubitales habet virgas, ramofas, Candidas, lignofas, priori fimiles ; candicantibus, firmis, deorfum fpe&antibus fpinis, alternatim &fecundum virgarum ramorumque insequaliufn irvflexionem horridis; ad quos quina, fena, nunc plura, nunc pauciora folia feu aculei ex eodem capite prodeunt, (ut in Larice) prioris Afparagi fylveftris foliis longiora, craffiora^ magifque pungentia, larignis inquam foliis non diflimilia: quae commanducata fubdulcia, & aliquantulum gummofa deprehenduntur: flos inter folia ex alarum finu, longatenuique petiolo dependet, fenis itidem petalis conflatus, iifque herbaceis ex viridi pallefcenibus: deinde fruftus pene rotundus, fed qui tricoccos videtur (tamefi unicum granum magna ex parte contine'at (raro bina) foris nigrum, intus candidum, firmum, ut fuperioribus initio virefcens, maturitate rubefcens") 3c carnofiis, fuccum continens lentum & vifcidum: radice firmatur multiplici, inftar aliorum filveftrium Afparagorum, craffa, intus alba, foris flavefcen- te ; initio veris aliquot turiones fiunt, inftar Afparagi altilis five domeftici, qui illorum modo manduntur, tarn crudi, qufmcofti, cum oleo, zeeto & fale.

4. *Afparagus* domefticus, Eyft. Hortenfis, Dod. Afparagi hujus domeftici caulis , poftquam adolevit, craffus, durus, & rotundus eft, bicubitalis ac fape altior, in multos ramos diffindittirj qui foliolis conveftiuntur mollibus, vifentibus, copiofis quidem, kd exiguis, capillamenti aut fceniculi inftar tenuibus: flofculi fecundum ramulos exeunt minuti, fenis panter petalis herbacei coloris praediti, atque plura intus ftaminula apicibus luteis donataproferunt; quibus fuccedunt baccse virides, permaturitatemcoralliifimilitudinerubentes, rotundas, Ochri fruftus magnitudine, in quarum fingulisaliquot nigra femina Conduunt numero incerto, quinque, fex, Teptem: radices funt multae, craffaj, molles, fpongiofaeque, nbris etiam fcatentes, & ab uno capite feu apice fuperiore dependentes, longe lateque in jptunditatem fparfae. Datur & Afparagus filveftris tenuiffimo folio; & maritimus craffiore
 -⁰¹¹⁰ •> C.B. P. differunt tantum ratione loci in quo producuntur, atque ex alterutro (man-
 gonio) domefticus nofter manavit; idem cernere licet in quamplurimis domefticis plantis
 in hortosbene ftercoratos. tranflatis. r ^ *

L O C U S & T E M P U S,

1, ffr^a & us^{eu} Corrida prior abundt crefcit in agri Salmanicenfes lock pttrofis, is in told fere Cafidla, & Granatenfi Regno, non modo in fepibus, fed etiam m arv'vs cult iq etiamque ip. agro Narboyenfi.

2. ~~Hyfca~~ 2. Cluf. Bfl. frequens eft ad Tagumfluvium in Lufitania, atqt tet- ham in Bvtica, fijo petrofo.

3. Afparagiffeu Corrida tertia, Cluf. Hift. nufquam abundantly, quam fupra Olifeppo- nem in fabulofts lock , juxta vias nonprocul a Tagofluvie* Florent' omnes hifupra difii

Julio & Augusto, feminae Oftobrifunt matura.

4. Afraragus dynefticus; feu hortenfts^ in botfk cultkisrbene ftercoratk feliciterprovenit. Aftaragm ftlveflrh fyonte in lock humentibu&i, nc in prat is herbofis , non procul Mogun- ita. Aftaragus maritime in arenoforum tunfuilorum tonvallibm. Armories, NeuftrU, & HollanaU, ad oceani litora. Florent omnes cum domefticus, turn filveftres pr^dicli menft Julio isr Augusto , citius aliquando; atque niēnfe 'Oclobriisr Novembri, matura eduntfe~ mina. Nomina in titulh fukfatis evidenter apparent.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

A/paragi urinas nonnibil promovent¹, renibus is? veftc<£ funt utiks, atque urin^e per ureteres in veficam diftillanii odorem ingrai'um is quafi quid hircinum conciliant. Alimentum au- tem corpori humidum adferunt, femēn genitale augenti ad venerem excitant: radices cum fativi, turn filveftres A/paragi extergendi vim habent; renes i&jecur ab infarftu liber ant, peUori ac pulmonibmprofunt: decoctum earundem radicum dentium doloribus mederi author eft Diofcorides. .

HALLUCINATIONES -CASP. • BAUHINI.

PAg. 490.c0L2.pl. 2.&3. Afyaragus folio tenu- iſſimo, & maritimus crajjiore folio, C.B.P. dif- ferunttantum natalibus, atque ex bi'ce Jilvejlribus in* hortis cultis inque agro bene ftercorato, & mangonio bene & diligenter elaborato provenit domefticus, quare entia non funt multiplicanda fine neceſſitate ut vult Cajp. Bauhinus in Pin. aliique authores ab ipfo ci- tati.

Pag. 490. col. 2.pi. 4. Aſparago aculeatoaffinis, triplici fetnper jpina, C. B. P. Echinopoda Cretica, Hon. Belli, Ep.2. adCluf:tf PomeItalice.

Pag. 394. col. 2.pi. 7. Geniſta, Jpartium Jpino- fum, aphyllon, alterum,tribus aculeis femperjun&is, floribus luteis, C.B. P. Echinopoda Cretica, Hon. Belli, Ep. 2. ad Cluf. Echinopoda Cretica a Cajp. Baubino bis repetitur, ſub diverſis generibus. Plan-

tarn effe ſpinoſam tribus ſpinit feu aculeis pr adit̄ am obſervamus, Jed ad quant horum duorum generum clajjem debeat referri, in incerto relinquimus, quia nihil certi haurirepotuimur ex Hon. Belli, neque ex Job. Pona. Johannes Pona figuram pradi&eplan- ts; exhibet fine fiore , & fine caſ fula feminali, nee ſane deſcribit: tantummodo in deſcriptione montis Bal- di Italice, florem dicit effe luteum, fed ſitne hexape- tala baccifera, ut funt Aſparagi feu Corruda, an papilionacea filiquoſa, ut Geniſta jpartium, nondum nobis innotefcerepotuit,nec ex deſcriptione Hon.Bel- li, nee ex ipſius Pona-deſcriptione, nee figura ut di- xi. Proinde ad quam clajjem reducenda ſit baefſſno- faplanta, paſteris ipſamjkrentem, 8 fru&uūi pro- ducentem remittimus.

§ .z Baccifere Scanactes fniiores.

Bryonia, Cacubalus Plinii.

Bryonia, Dioſcorodi lib. 4. cap. 184. ^-7nos Aevov̄ 'vitis alba is¹ fyw̄na. o'pws̄ q'los̄ u'q̄- fipos & ἄλπιος̄ isre. dicitur. Theophrasto 6. Hiſt. 1. w^r^ Plinio lib. 22. cap. 1. *Vitis alba*qu<£ Gr̄cis *Ampeloleuce*, aliis *Ophioſtaphylon*, aliis *Melotbron*, aliis *Pfilothrum*, i&ε.

Genera duo Dioſcoridi lib. 4. cap. 184. ifr 185. *Vitis alba* qu<e aliquibue *Bryonia*, i& vit̄is nU gra, aliis *Bryonia nigra*, aliis *Chironia vitis*. Sic isr Plinio, qui nigram proprie *Bryoniam* vocari ſcribit.

§. *Bryonia* aſpera incana five alba,baccis rubris,nobis.Vitis alba,Matth. Multa longa,& tenuia farmenta promit, clavioulas five capreolos habet inftar vitis: folia ejus lata funt,quin- quangularia adſimilitudinem vitis divifa, fed aſperiora feupotius hirtutiora, candidior'aque : floresexigui, candidi feu luteo-pallidi herbaceive: racemofi fini&ws in uvis parvis, quæ initio virent, mature rubent: radix prxgrandis eft, longa & craffa, ake defcendens ex albido ſublutei coloris -y guftu perquam amaro & ingrato. Agyrta? 6c nonnulli Ri^otomi mira qua^dairi monſtra ex hujusradice affingunt, quæ ex terra eradicata, fi fit bifurcata, quemadmodumfae- pe contingit, membrum genitale puerile ſcalpello formant, etiam genitale muliebre(iacrum antrum à Laurentio diſtum) faciuius fa&a incifura imitantur, atque ad aliquod tempus a= renx feu potius terras arenofx committunt quoad partes kfae feu iaaitiaç corticem foperin- duxerint, & poſtea pro Mandragoris maribus & feminis venum exponunt. Biſtw'oari pulj;is radicibus naturaliter contingere obſervavimus, utCarots aliifque plurimis unibelliieris.- X¹ ars adhibeatur ipſis, alias etiam partes eftbrmari audafter aſlerimus; fed cym Bryonb ra-- dix -vetuſta, fit cralfa & nonnunquam bifurcata, hujufmodi ineptiae aniles tabricari facilr poſſunt

Deinde avenas femina parti vulnerary induunt, qua? in terra germinant, atque folia protrudei coniantur, fedobinopiam alimentu & aëris, in iibr.illaſ capillamentitias degenerant hæc imoilura facile percipi poteft aJrodſlatis Botanicis. Nos hanc impofturam pluries obſervavimus Lutetiae Parifiorum, & etiam Ziff Witfi & circumforaneis hujufmodi impoftoribſ pro veris wndragorc radicibus exponi/Sepimenta, dumos, frutices & arbores ſcandit, & iiperat; non tamen quarundam modo circumpulo & endo, fed claviculis feu capreolis fuiſ vicina quaſque apprehendendo iifque diverſimode fe inneftendo ac implicando. Eft & huic omnino fimilis Brybnia aſpera incana feu alba, baccis ^nigris: uva? foſe in hac per maturitatem nigſcant.

6. *Bryonia nigra*, Ger. Laevis feu nigra racemofa, C.B.f. Vitisfyl. Sigillum Marize & Tamus, Dod. Haeclongos, lignoſos, quaſi mediocris craffitudinis, rimofi corticis inltar farmentorum vitis, obſcure fubrubescentes viticulofos promit cauliculos, quibus vicihis quibufvis ſepibus, arboribu^, fruticibus, multis amplexibus circunivolvit, ac crebris intorquet circuituionibus, ab imis ad ſupremum ſcandens: capreolis feu viticulis caret; folia hederacea, cordata in mucronem acutum definentia quaſi cordis figura, mollia, ſplendentia, viridia, S^lacis x~vis_maj. haud abſiniilia: flores candidi, exigui, fuccoſi, odorati, racematim dependent: u~wx quæ parvæ ſunt & virent primo, mature cocci modo rubent, modo ex rubore in fufcuri degenerant: radix craſſa, longa, & magna, fucco glutinoſo & lento plena, adeo ut friata digitis adhaereat.

L O C U S & T E M P U S .

Bryonia a/peraſive alba, incana, baccis rubris, nobis. Paſſim in Italia, Gallia iſ? Anglia, multique in Belgio locis proveniſ: Bryonia Uvis feu nigra racemofa, Sigillum MarU iſ Tamus, in filvis opacis iſr ſimilibus locis aſyeris: Mart io men fe prima germina erumpunt : flores utriuſque BrjionU Maioproducuntur: uv& circa vindemiam maturantur.

T E M P E R A M E N T U M & V I R E S .

Ducit Bryonia alb non modo fuccus, fed iſtradicis decoſium, pituitam. Bilem flavam ducere ait Dioſcorides. Radix foetus mortuos iſr ſectndinas ſubdita extrahit; idemque in infeſſibus decotla radix poterit. Vide Vodonxum iſrc. Bryonia nigra adpr*diſia omnia ſimilis, niſi quod imbecillior ſit.*

H A L L U C I N A T I O N E S C A S P . B A U H I N I .

P Ag. 29/-pi. 6. Col. 2. *Bryonia Mechoacana alba*, C.B.P. Mechoacan non eſt *Bryonia*. *Nicomardus* florem hujus eſſe ſcribit veluti *Mali aurea* ex ſ. foliis (ſt *Ubet* petalis) majoribus cornpoſitum, e cuj m medio inſtar lobi capitulum exit, ad vellana nucis magnitudinem excreſcens, quod intercepti tenui membrana in duos partes (khifcit: in ^J^n> Jingulis duo ſunt femiſta *Ciceris* exigui magni- colore nigra. Deinde *Bryonia* radix valde eſt forma igitur *florum* & fruUuum ex *Monardus* Jjerentiam Mechoacan a *Bryonia* clare demon- diftum, flores & Jemina *Bryonia* toto

cello aliterje habent. Non eſt *Scammonium* ex libre natura; nee floribus, nee feminibiſ Mechoacan convenit cum *Scammonio*. Pur gat Mechoacan per inferior em ventrem pituitam & feroſos humores. fedqualitas purgandi nihil facit ad Mechoacan *Bryoniam* cqrjiitue?idam. *Bryonia Mechoacana nigricans* > *Jalapium* MaJilienJibus diſtum. Pag. 2p#. col. prima, pi. 7. & ibidem col. 2. pi. 8. *Bryonia Mechoaca* 7iajil C. B.P' Non ſunt genuina aut vera *Bryonia* jpecies propter antedifſas rationes, ergo male pro *Bryonia* jpecies a CaJ}?. *Bauhino* recen/entur poſt doſlrinam *Bryonice*.

I A A f f * r A A tiorum, Alfineſ majoris facie, baccis Solani, C. B. P. Cacubalus Plinii, Hiſt.

Lugd. *Alfine* repens (potius ſcamiens>Clnf. Hiſt. Canlibus iifque numeroſis praedita eſt hæc planta, baccifera, geniculis flexilibus ^ humanam altitudinem pleramque ſupcrantibus ^ piradertim ſi frutices, quos ſcandere poſſit, vicinos habeat, alioqui propter infirmitatem humi. diſtaſis: folia ſingulis geniculis feu internodiis bina adnafcunturex advarſo fita, *Alfineſ* vulgaris majoris foliis colore & figura familia^ longe tamen majora & molliora: flores ex caulicuiſ & folliculis prodeuntes ex herbaceo candidi 7 fex petalis conſtant ad medium bifidis; fin^itlis floribus ſuccedunt acini feu uvæ baccaeve ſingulares, piperis nigri, aut baecajft'm *Juniperi* vulgaris magnitudine, inſitio virides, per maturkatem nigraſ^ femine exigui & piano, nigrip iticfeu^ plen^: radix Candida, valde fibroſa, longa & farnienrjtia, quæ ſingulis annis novos caules promit.

LOCUS & JEMPUS.

Alfine scandens baccifera copiose provenit in Salmanticis in Gallia locis humidis in umbrosis, circa sepem: floret in autumno, fructum producit ineunte autumno.

TEMPERAMENTUM 5c VIRES.

Quibus facultatibus praestantur plantae bacciferae, Alfine facie, non fit constat apud auctores: cum a flore in foliis dibeat accedere Alfinarum viribus, a baccis autem, Solanis accedit. hominiferae nomen auctoribus magis usitata supra in descriptione adhibuimus. Dicitur Alfine scandens baccifera C. B. P. etque Alfine heteroclita, folia floresque habet Alfinas, fructum seu baccas Solahi, uti diximus in praeiudiciis Botanicis Pag. 392. Omnis Alfine producit post florem quae in petalis conflata, quorum singula sunt bifida, castulam Li forjwn, ergo non potest accendi genuina Alfine fades, uti illic diximus.*

§ §. Baccifera majores Scandentes Capreolis.

Clematis, Marucua, Granadilla seu flos passionis.

*JZ^A r[^] m^o g^o r^o dⁱ !j^b - 4.C 182. eademeflacfermentaria: ficd maquoniam[^] flagel-
- r[^] f[^] W - I h s f i m i l i a emittit, ac ut ilia - arborescendit: Plinio 7.24. cap. 10.
Clematis Smilaeae similem per arborescens genkulat ami? ipfam appellaverunt. A Theophrasto.
Hift. 1 o. Ar&ym dicitur, is esse arbor, quod vitis is; labrufc* modofurgit.*

8. [^][^]pentaphylla, florero feo, clavato, nobis. Marucua 2. seu Marucua maliformis. Caulem habet iamentofum ac fubruffum: folia gerit hinc inde, fuis pediculis circiter digitum longis affixa, & quodlibet in quinque lobos feftum; quintus lobus est fidium infar, omnes lobi nervo medio adherent, quique fuos nervos & venas habent: pediculus fuftinet norem elegantem & confpectu admirabilem, qui inferius tria folia viridia obtinet, fupra autem quinque longiora, inferne viridifcentia, fuperne caeruleo-purpurea, & inter haec alia quinque purpurea; dehinc Solis quafi pingitur figura, radiatim multa filamenta crispata obtinens & in orbem explicata, exteriori medietate caeruleo-purpurea, interiore dilute caerulea, vel etiam e contrario in medio floris columellam breviter, pallidam, fuperius in quinque partes diffeftam, quae ad latera curvata extenduntur. Cuique parti fpongiformi corpus lutefcens, pulverem, luteum asperum habens, adhaeret; in medio autem columellae piliformis orbiculus est ex flavo albicans, huic tres clavi fuperius infixi ex flavo albi, & punctis minimis purpureis variegati, & deorfum inclinati ut brachia columnae: flos totus fuavis odoris: fructus fequat pomum nostras vulgare filvestre, rotundus, cortice craffo, flayi exterius coloris, interius confans pulpa succulenta, vinofa-acida, crocea, & linguam croceo colore tingente, & in ilia multa sunt granula nigra magnitudine feminis pomi vulgaris, variis tuberculis infignita, & follicillis fuis propriis inclufo.

9. *Clematis trifolia* seu flos passionis flore viridi, nobis. Marucua 3. Georg. Marucua maliformis altera: folia habet magna, quodlibet in tres lacinas feftum, centinetque quaelibet lacina fuum nervum fecundum longitudinem & venas obliquas, funtque praeterea in ambitu ferrata, inque mucronem definentia, tete vinda & splendens, eodem modo ad caxilem posita, ut in prima specie: flos magnitudine & figura convenit cum antecedente, fed differunt colore atque numero foliorum, hujus extensa & majora folia inferne viridia, fuperne alba, quibus profus quinque alba interponuntur, ex medio autem flore prodeunt in orbem filamenta, dimidia parte quidem interiore caeruleo-purpurea, altera exteriori albo-flavifcentia, columella in medio rotunda ex viridi flavifcens, fuperius in quinque interdu & fex curvaturas deorfum vergentes divifa, cum fpongiformi corpore e viridi fubflavo, ut in alia?; in medio fummitatis columellae orbiculus piliformis cum tribus clavis infixis deorfum inclinatis. Flos fuavis odoris: fructus convenit cum fuperiore, fed immaturus adhuc ex viridi flavifcit, punctulis albicantibus variegatus, ad infar Colocynthis; & splendens infar speculi fume laevis, maturus autem citrinus est.

, Explicit!io Tahuls-fi>cmd& Seftionis fr'ting.

i. f. ^Lrm<itis paffionalis pentaphyllos, fl . . . jipannlaco, nobis. Faffionalis flure canipa-
 VJ nulato Monting. Hæc ?" fpecM* ; djustabula; Maruciae *cu floris paffionalisa"
 foliis acutis Cjuinquafariam feftis , atque omninoa prima foliis vcl < icic cognitu facilis,
 quin & notâ adhdc magis certâa caxeris omnibus fræ (brtis chi^ (jiod florem cam-
 pnnulatnm in margine rimbriatum producar. Ejus color JIOSI;:rt imanus non habere-
 nius defcriptiorles Bataviceeditas , fedfolummodo icone/Montii,

2. *Clanatis* paiffionalis criphyllos, flore rofeo, M.onting. Hujus Granadilla: radices funt lon-
 ga?, lateque ferpentes, craffiorts radicibfts Sarfaparilla:, ex quibus prelcucuntur caules pluri-
 nii rotndr, long!, r]exuofi, binas, ternas, quaternafveulnas longi, fccundum folium & celi
 calorem: hifce annectuntur folia cernis lobis niultoprofundius fcfts iequentis Eertisliujus ta-
 bula-, nee funt ferrara, ut fecunda (peciesprimis tabula: inter caulem & folium (aliarum
 hui us generis fpecicrummore) capreolifcu clavicute incortac atque ex eodem loco illos orit-
 tur ex pediculo biunciali, colons rofei. Csetera in omnibus partibus cum reliquis Gia; fortis con-
 veniehs.

5. *Clematis* paiffionalis triplyllos, Mœ luteo, nobis, Paflldora tiifblia, flore luteo, Mon-
 ting. Quinta (pecies numero, at tertia hujus cabulas fccunda:, convenit cum pnedenti in
 foliprum numero, effterifque partibus, nifi quod folia non tam profunde trifariam divifage-
 rat, & ronfequenter foliorum mucrones non funt tarn acuti, fed obtufiores : fiorum folioh
 fen petala miuora, prioris funt latiora, & lutei. colons, atque his nominibusquam fa-
 cillime a praedenti diftinguitur.

4. *Clematis* Marucua pyriformis minor, ntibis. Marucua pyriformis altera. Georg. Marcgr.
 Subfequeiiti Marucuiar pyriformi itidem ilore effimilis, fed minore; folia kidem funt rai-
 nora, fios quoque minor ficut & c fniftis : folia fblitaric pofita funt (quodlibet (ko pedi-
 cnlo fefquidigirum longoinnitens cordis bubulifigura) circiter quinque digitos longa, quatuor
 feielata ubilatiflima, in anibitu nihil ant pammferntta, Iste virentia & Iplendentia , ner-
 vo kcundum longitudinem eriam & venis prominentibus, adquemlib'et pediculum folij e-
 tiam taprcolum Imbet canlis , quo feanneftit aliis fruticibus. Hifce foliis herbaceis infidic
 floscliametro quaruordigicoruni, conrinen3 re. foia, quwium quinque fuperne & inferne
 rofei Hintcoloris, quinque vero fuperne rubri, inferne viridis colons, ita alternniimpofi-
 ta: iitpia hate folia filamenta fefquidigitum longain orbem ftantereda (cumin aliis fpecie-
 bus incumbant) iatis fortia, quorum inferior medittas ex lacca purpureo & albo colore va-
 i'legata eft: in centro fioris itidem columna erefta, tornata, digitum alta: faperius ovale
 corpus cum tribus ckvis- infixis ex albo ttavefcencibus, infra quod quinque bruchia rubra,
 -unftata, cartertim flavefcentia extenduntur in orbem, quorum quodlibet ellypticum corpus
 habet referens fpongpm, comprerTum, albicans, cui pulvis luteus adliEret: floria odor
 fuavis ; fnæras pyriformis.

5. *Clematis* Marucua pyriformis major, nobis. Pyriformis feu Maruenia Guacu, Georg.
 Warcgr. Planta eft viminea, lignofa, lenti Uima: cauis contortus, qnadratus, varius, colo-
 ris cincrei, aut griiei, pollicem craffis ficut vitis, & interdum bracliii crailitie, longe ier-
 Vt -> arboi-ibns 6V fruticibafie implicat: folia habet lafteviridia, laevia, fplendida, quin-
 que aut iex digitos longa, non ferrata, fed leviter quafi finuata & inxqualis figure, adhx-
 reHt* aiitein caul] pediculis fuis fabroffis ; Sr nervis per longitudinem laciniarum , tranf-
 veriim mnlDe *venulx* intexantur: florem fere infignem, quem paffionis etiam vocant,
 magnitudine rofc majoris, excerius foliis plurimis fuperne & inferne dilute purpureis, &
 quuKjue vindibus incrius, fuperius rubris. Supra hare folia in orbem expanduntur filamen-
 ta infigna, lelquidigitum longa, crifpa , medietate inceriore tota purpnea, exterior! rubrl,
 (eu expnrporeo flf albo variegad. In centro floris extat columna ex flavoalbicans, teres, &
 quafitornata, lata unum digituni; cuifuperius apex, 6valts figure, magnitudine feminis pyri
 , impofitus, & huic itidem davt extremis fais cupidibus infixi in unopunfto; infra ovalem
 autem figuram a faftigio colnmna: quinque brachia extenduntur ad larera, quorum quoH-
 libet cootkien fpongiforme corpusculum , flavo pulvere aperfum ut in Lilio: flos auteni fa-
 ciflinicperitdeceqjEtJs, & vermicoi in eo generanturuc in.cafeo. Fmctus pyriformis eft
 prioris major, inis^1 viridis, rnantrus flavicentis e viridi colons ; intus tribus lineis in ties
 partts dividitiw fecundum. .bngitudinem, inter quas lineas multi proceflis quibus fcmen
 cum

cum pulpa fru&ue^er tenu'es cuticulas anne^tur Vpulpa alba, fucculenta, glabra, inftar rudimenti avisinovo^ cui inharent in quolibet i^i|grana feminis 260. nuncplura, nuncpau- ciora, nigra, compreiTa, fplendida, quon^i^jodlibetfuofblliculoinclu'ditur. Odor&fa- por fructus dulcis & fuavis, cortex craffior fyjtj^km Mali aurantiae. Quancb xomeditur fcinditur tranfverfim (non fecundum longituaifiē'n)^ & pulpa inftarovi tremuli exhauritur. Quando autem animus eft femē colligere SferYaie," pulpa cum feminibus per linceolum leniter exprimenda & ita grana feparanda. Granaque adhuc fuis folliculis incluīa, triduo aut quadriduo char^ k?poneñca ut exparteficcentur, dein fummis digitis folliculus uni- cuique grano detrahendus, alias^a glabra funt ut comprehendi nequeant, nee inter eden- dum ore feparari.

6. *Clematis* paffionalis foliobifido, nobis. Ferrum equinum volubile, Monting. *Uxc* Ma- ruuias feu floris paffionis oftava fpecies numero, atfexta Tabulae fecundae Se&ionis primae facile cognofcitur primo intuitu foliorum bifidorum à csteris fuae fortis, negleftis aliarum partium fru&urâ & divifione, quandoquidem non nobis fuppetiit copia vidend i Montin- gij defcriptiones .lingua Batavica editas, fed tantum nudas icones ex quarum intuitu par- ticularcs & magis effentiales differentias obfervare potuimus ex noftris fculpturis ab ipfi- us mutuatis & delineatis, atque cum aliis ejuſdem farinas adaptatis. Quam ioepte & in- advertenter ipſe Montingius ferrum equinum appellat, aliorum in botanicis melius ipſo ver- fatorum iudicio relinquimus.

L O C U S & T E M P U S .

MarucuUfive GranadilUfteciesomnesffonte in regno Quito, ibidemquein campeſtribus lock Fluminumripas adamare author eſt Petrus deCiezf in Hiftoria Peruana. parte i.eap. 18. in valle etiam diſta Lile, in- montibus fronte, Monardus. Florent omnes utplurimum menſe Auguſto: fruſtus maturus menſeJanuar'w isr Februario? is'poſteaſolia amittunt, novisſub- naſcentibus,

N O M I N A .

Clematis paffionalis feu Hoſ pajfionalis aut paffionis, quod inſiore aliquot veluti paffionis Chri- ſti figure plane delineate confitiantur, Monardus. Granadilla dicitur Hifyanispræpter fom?n fimile illi quod in malis ſranatis incluſum continetur. Marococ &Maracocum quU buſdon dicitur, Marocua isr Marucua Geor&io M«rcrdvio dicitur. Nulhs harum buc- uſque affignantur facultates.

§. 4. Bacciferse non Scand^ntes racemofae.

CH K^{IS To p HO} K^{IANA}.

7. *Chriftophoriana* Americana racemofa, baccis niveis fcrubris, nobis. Aconitum baccis hives& rubris, Cornut. tec Chriftophoriana feu forte Solani fpecies peregrina opacis & filveſtribus America locis frequentiffinia eſt, in Europam delata, tam baccis niveis, quam rubris in hortis verno tempore viget; in pedalem caulem profilit radixnignor & craffior vulgariſ noſtratis cortice nigro, nee imum petit, nee divifionibus radix fpargitur, fedcoaſta in fe plurimas fibras capillares demittit; caulis purpuralcit, atque minores à principal! radice germinantes funt pulli: folia funt majora & obſeunus virentia, atque foliis Ghri- ftophoriana noſtratis ieu vulgariſ funt rugoſiora, eandemque#obtainent divifionem ternatim & ter ternatim faſtam; caulium fummitates racematim floſculos muſcoſos, albidos edunt, ſi autem microſcopio confpiciantur floſculi finguh leorſum iex alba petala muſco- fis illis ihminnlis ſubſtrata habentes apparent. Poſt flores dcciduos fuccqdunt in caciimi- ne caulium racematim jun&ae plurimx baccæ, oblongs, niveas velrubrae, quæfeminaplu- ra continent ſub pellicula; & punſtunVpurpureum in extremis fmguk gerunt. In hac planta nullatenus quidquam deleterium aut venenatum latere arbitramur, nee Aconitum proprie dici poteſt propter rationem inter nomina & vires fequentis adferendam: locum r f&mpus & nomiria ſupra indigitavimus.

8. *Chriftophoriana* vulgariſ noſtras racemofa & ramofa, nobis. Aconitum racemofirSu an Aſtaea Plinij lib. 27.c. 7. Chriftophoriana vulgariſ, Park. Chriſto^riana, Dod. Lob. Ger. Cluſ. Hiſt. Chriftophoriana cumſitbaccifera, racemofa, & raroota non ſcandens, nee

exearumgenere, qax adminiculis egent, arit |mplexu vivunt ^quia tamer." uvas fcrt, a./wm-
 'Ao? fe facile añiumerari permittit. Caulic^tMhzec promit ternos, quaternos, plures paucio-
 refve, pedern ^yi fequipedem longos: fc'Jtr^rca hos terna aut potius ter terna fuís pro-
 pwis pediculis^ommiffa, particulariaquofrx-|iñt lata, ferrata&ambitū in virore candican-
 tia: fibres tenues, mufcofi, cahtff\$>k fru\$us rotundi paulo longiores, per maturitatem
 nigri, friam lin-eamve ab una parte bitcfitantes uvarum acinis alioqui fimiles, & in uvx
 modum racematim coha?rentes: radix craffiufcula, non abfljue fibr^, fbris nigricans, in-
 terius Buxi colore lutea", vivax ac diuturna, quotannis ca^culbs & folia regenerans.

L O C U S & T E L I P U S .

Plerifque Germanic is' citra Rhenum Mofamque loci, in filvis pifehim montofis h<zc Chri-
 Jlophoriana vulgar is racemofa isr ramofaoccurrit. Floret Maio: fruttus Augufio aut ferius
 perfieitur.*

N O M I N A & V I R E S .

*Chriftiophoriana vulgarh noftras racemofa & ramofa , nohk. Vulgark, Park. Cbriftiophoriana^
 Dod. Ad. Lob. Cluf.Tab.Ger. Aconitum racemofum, an Affaea Plinij lib,o.'j.c. 7. Acb-
 mt'ps autem annumerari contingit ,• propter perniciofam isr Aconito jimilem, quam babere ere-
 ditur, facultatem: an tarn fit exitiali*, ac non minus noxiaplanta haec, quam Aconitum 7,
 dubitatur. Sed ex libro nature ^ fine ultimo (• quum Chriftiophoriana nil habet affine cum
 Aconito, plant a cucullata, cujus fengulis floribus cucullatis, fuccedunt plures thec<efeufi-
 liqudt membranace* J non iifdem gaudere viribu* deleter Us utramque conclu-dimus. Insuper
 afferimus male recenferi Chriftiophorianampro Aconito , atque ibidem cum Aconitis malecollo-
 cari àCaJp. Bauhino, ut innuimus in PrSudiis nofiris Botanicis. Pag. 376.*

.9.. *Chriftiophoriana Canadenfis, racemofa & ra/nofa, nobis. Panaces JGW^V feu racè-
 mofa Canadenfis, Corn. Angelica baccifera Montingio perperam nominatur. Hæc Chri-
 ftophonanas fpecies elegans, in agri Crnadenfis & Americani folo macro, pingui etiam &
 limofa, quin & inter rupes & faxa invia & acceflii perdifficilia ubique provenit. Radix
 pollicari craffitudine deorfum fertur, pedem & fequipedem longa: caulis rotundis ge-
 niculis articulofu&, obicure purpurafcens, medullofa cartilagine repletur: folia ^b eodem
 pediculo bina terna (in praecedentibus Chriftiophoriana fpeciebus ter terna) pediculis
 propriis quoque fingula innituntuf, ferrata, & in mucronem acutiorem definunt. Ex ge-
 niculis prodeunt pediculi inter caulem & foliorum exoutum, caulem ipfum finu.amplex-
 antes, qui in fummis florès geru#t, vitis floribus fimiles, primum herb<ceos, deinde
 candicantes, qui bus fuccedunt racematim & ramatim uvæ fub initium virentes, dein-
 de magis fa^ure rubentes, intufque pleniore femine turgent. Hifce fuavitas ineft guftui
 acceptiffima. Floret eodem tempore cum duabus prscedentibus.*

Scandentes Campanulales & Laefcentes

SECTIO II. AT. II.

CONVOLVULUS SMILAX LEVTS.

Smilacem duplkern - s bahgt ; alter am lib. 2. e. 176. uhiPhafeolumintejjh'ere cportet. Alterant lib, £f. cap. i. iff ij^\$.) quamin aiferam iff Ijruem diflinguit: illa *Smilax* hacc *Smilax* b AËta dkitur: utriufque & Plinius meminit Li^ . c. 10. at Tbeopbroflus i. Hifl. 1. 6. *Smilacem arborem, mi** Ilki fit fimilis defaibit, quam Plmius 1. 16. c. 6. *Ilicis* genus fatit : qui 1.16.C.10. iff *Taxum* a quibusdam *Smilacem* vocarifcribit. *Smilax Idtvis, Convolvulus* a Pliniol. zi. c. %. diftutvidetur , quod arborescandat, iff ehfife rircumvolvat'. Quibusdam laftone ejufdem lib. iff c. 22. cenfaur.

In priore capite hujus primse Seftionis, deduximus Bacciferas Scandentes , & non Scandentes , taniedulesquamnoneduies, in hoc capite feu membro fecundo Sczndei. tiuni, agemus de Scandentibus Campanulatis Laefcentibus ; atque primo dicenmsquid fit Convolvulus prout hie accipitur, quia latiffima eft fignfficatio feu acceptio Convolvulj. Convolvulus hoc in loco, eft **Herba** Scandens (nt plurimum) Horem producei, s monopetalum fen **tmifolinm, Campantibtom** (td^ft integrum infundo, Campanul3eautcalatlii inftar) guin& plicasquinque in margine (eu ora crreraa rotund! gent, cui flori Campanulato deciduo fuccedit capfula feminalis-, fnbrotunda, aliquando Ionga7 tribus loculamentis , membran- nis fuis propriis trifariam diftnta , in quorum fngulis "Una continentur femina angulofa, nigra aut fufca, fubrotunda ; infuperqmlibet plants pars rupta fuccum eftundit lafleum^er^ paucisexcepus^de quibus in explicacione ; fingularum fpecierum agemns ; Sicut de quibusdam non Scandentibus Convolvulis. *

TABULA III.

vulus	Reclus	1. Creticus, argenteus, nobis. <i>Dorycnium</i> quorundam Pon<£, Ital. Q> % . Mari'timus major, Italkus, fwuato folio, nobis. <i>Mariimus</i> 110-fler, Imperat. Q
	Major • Scandens	2. <i>Mariimus nostras rotundifolius, nobis. Brassica maritima, Matth. ©</i>
		4! <i>Indkus orientahs</i> In <baim}w Batistas, nobis. <i>Inhame</i> feu <i>Eattatas</i> Sifarum Peruvianum feu <i>Battata Hispanorum</i> , Get: 0
		5. <i>Syriacus</i> iff <i>Scammonia Syriaca, nobis. Scammonia Synaca, C. B. P. ©</i>
		6. <i>Vulgaris albus, flore majore albo, nobis. Smilax fais major, Vod. Q</i>
		7. <i>Gmükits</i> feu <i>Pvrpureus, folio fubroiuundo, nobis. fadicus, flaviolaceo, Eysl- ?</i>
		8. <i>Cdruteus Hederaceus</i> feu <i>trifolijis</i> ^Park-P^ad. C^ruleus^ Gir. **
		9. <i>Vulgaris arvensis, flore minore albo vdpurfuno, nobis. Smilax lavis minor, Dod. Ger.</i>
		10. <i>Argenteus Althdt & folio, nobis. Convolvulus</i> ,? cregrwus putcher, folio <i>Betoniae</i> , I. B.

TABULA IV.

Minor	1. <i>Scammonia fol'us dnnulus, nobis. 0</i>
	2. <i>Argenteus repens Rupelknfis, florerubro, nobis. Q</i>
	3. <i>LinaridL folio, C. B. P. Minimus</i> (picafol' ms, Lob. Icon. 0
	4. <i>Peregrinus c<zruleus, folio oblongp, fl_ore cyaneo, peramano, fu triplki colore infignito , nobis. Campanula cxrulea, Aldin. \$</i>
	5. <i>Mgyptincus quinquefolius, C. B.)?. iff Prod. Mgyptiatus</i> quinqutotius <i>Caftan Bauhini</i> ^ I. B. 0
	6. " <i>Afrkanus, Park, 0</i> . ;* , **
	7. <i>Pennatus</i> ^exoticus, Col, <i>Pennatus</i> feu <i>Quamodit Ger. \$</i>

Sea. I. 1) *NIVE R SWZFS OXO NIE NS'IS.* II
Convolvulus & 8. *NafurtmmIndicum* & m% C.B.P. *Indicum cum fior^iy fenarte*, ^
teroclitus isr-fuy <). *Halicacahum pet-egri* Sc^or *Indicum*, 1.8. *Pifumvefecarium*, fruclu
Generis. [^W^b-> ^macula nciu h. >\ B.P. §>.

Explicatio Tabufe t .if£\ Sefiionis prim.*
CONVOLVULIMAJORE S

1. *Convolvulus* major, rectus, Creticus, argenteus, nobis. T^i/sniumquorundam, Po-
 . Cj nx it^LJHterbaeft fruticofa*, multis ab eadem radice caulibus simplicibus, re&is,
 incanis ornata, aertudine cubiti: numerosis foliis, Gleasiigura, eodem circumdantibus,
 angustioribus, molli lanugine te&is, & quasi argenteis, unde Argentinam vocant vulgo,
 in fummis virgis bicubitalibus & tricubitalibus & altioribus, in hprt-is bene ftercoratis:
 coma est pradenfa, in qua flores candidi calathi effigie; & fruihis Convolvuli minoris in-
 ftar: U&e caret, aut modicum tribuit; etiamfi caules edat re&os, non vero fcandentes, £-
 tiam parumaut nihil Mis habentes, in ficcis & aridis arenosis proveniens; tamen pro-
 p?er conformitatem in floribus Campanulatis, Capfularumque triplici divifura & femini-
 bus binis in fingulis loculamentis contentis, cum c^teris Convolvuli fpeciebus (oarere la-
 fte nonnullis, infra defcribendis, non minus quam huic convenit, at la&efcit modicum
 aut, parumin cultis, uti dictum, quin & folus hie reftus, caeteri fcandunt aut humi pro-
 cumbunt) aptius hie collocatur inter confimiles, & re&ius a F^rante Imperato & Johanne
 Pona^ Italice, *Convolvulus Creticus*, potius quam *Dorycnion* nominatur. Hyeme folia
 minime abjicit, proinde inter perpetu^ fronde virentes feu potius canefcentes anume-
 rabitur.

SOLDANELLA . .

*Smilacis L<avis generibus Soldanella adfcribenda venit, quare & Belgis Convolvulus mari-
 timus dicitur: qua duplex est, Italica, folio finuato feu auriculis pulchris geminatis; is major,
 no^iras, rotundi-folia. Soldanella maritima, qua in officinis habetur, DiofcorldisI. i.e. 148. eft
 x.fid^On SaA<<rajk BrafJica marina: ft textus corrigatur.*

2. *Convolvulus* maritimus major, Italicus, finuato folio, nobis. Maritimus nofter, Impe-
 rat. Haec major maritimi Convolvuli fpecies (oblerva-^ Authores male plantar, ad oram ma-
 ritimam provenientes, marinas appellare pafsim, ac fiex rupibus Sc faxis infjndomarisaut
 aqua marina fitis, excreferent, ideo nos mutavimus nomen marinum in m dritimum, data
 occafiope pafsim) in ora maritima Venetorum & Regni Neapolitani proveniens, folia ha-
 bet Hemionitidis peregrin^ alterius Clufij modo, auriculis pulchris, geminatis (inquas
 nervi excurrunt) pinnata: flores profert majores feminaque majora, nigra, caetera cum ma-
 ritimo nofrate minore convenit, & apte fatis denominatur Italicus (anatalibus) auri-
 culis pulchris, geminatis; facile a nofrate foliis rotundis, Cochlearias Batavice modo • fa-
 Qis, diftinguitur, ut apparet ex forma folii appi&a, & fculpta^ in Tab. primse planta
 fecunda.

3* *Convolvulus*, maritimus noftras, rotundifolius, nobis. Braffica maritima, Matth. Braff-
 »ca maritima minor, C.B.P. *Convolvulus* hie maritimus rotundifolius, eft planta repens,
 C^u maxima pars Convolvulorum perennium Scandentium, in hifce tabulis duabus conten-
 torum) cujus cauliculi humi procumbunt, funtque cubitales, bicubitales, craffi & fub-
 rnbentes: folia funt rotunda, Ariftolochias rotunda vel potius Cochlearise Batavicae more
 cralla, lucculenta, fubcandida, non fine lafte, aut potius fucco lacteo, copiofe & affatim
 emanante poft rupturam aliquam, . pediculis longis innixa: flqs magnus, purpureus &
 albus; calices fert fubrubescentes, magnitudine Convolvuli majoris vulgaris, irao majore^
 <quos cingunt bina foliola ad eonmdem bafin fita, hoc familiariter aliis quamplurimis hu-
 jus Claffis commune eft; femina pariter ad eandem modum angulofa, binatim junfta, intri-
 fe<ij diftinftis loculamentis 4^P^fita habet, in capfulis rotundis, in mucronem definenti-
 b<< contenta 7 ad fenarium numerum.

*4. *Cokvblvulus -Ind'icus* Orientalis, Inhame feu Battatas, Sifarum Peruvianofum feu
 ^ttat^fliijpsjnonim, Ger: Cauliculos profert multos, flexiles, fatis craffls, futculentos,
 fubcandidos, fubrubescentes, ad infar Peponis; quibus folia! utcunque carnofa,

ex yiridi candicantM, Ari foliis aur potins S|f'f''' ; haud diflimilia, ex fongis pediculis
 pendentia; atque ex foliorum costa media planti i vioruntur, qui variededufti terminaiv
 tur in foliorum orbitam: radices producit m' ruberofas, longas, Pecuniar, Apho-
 deli albi, Ari petrus aut Oenamlies odorc 4*\$\$ ntilas, urrinque obtufas;¹ juncrasin u7
 numapicem, verius perficiem terra; adin! arJ vulgaris radicem, qucfum: mino-
 res, fcruntur: qu. autem aajores & integrae in if^tVoncife, folo culto, - & in fuos fulcos
 bene dufto, feliciei I it: nam intra oftavum menfem in eam craHitudinem excrefcunt
 ut edi'Sf in aliosufus , lintS Radices, caulesfit folia iblummodoobfervavi, fed curfi
 apud authores, qui ruicut', i jiaVfis meas pervtnere, nullam abfervo rnejitibntm **faflana**
 florum , nee capfularumleimna!Uim/nec ipfius feminum ; idcirco perfeftam notitiam ipfius
 plantae remittimus exaroinantibus plantam Horentem, & cum capfulis femina producentem.
 Nos ex radicibus in Wro" ^litorio Londim?ifi-cmpus, ipfarumque rupturS fuccum percepi-
 runs lafteum emaiantem * ivjqe iifdem terras commiffis obfervavimus folia, Convolvulorum
 more conitrufta, proinde ex fueco lafteo, quo **fcatebant** radices, junfta caulium & rpliorum
 fimilitudine, conjecimus tantum & conclufimus etfe Convolvuliim. Si quis'poft obferva-
 tum florem detexerit i fine ultimo, id elt flore, capfula feminali ipfoque femine non efie
 Convolvulum , poterit facile ex doftri%T nofta, in libra nature obiervanda, eandem hanc
 plantam reducere ad genus fubalcentium, cnjus fert tefferam. Varietates iunt tres a corticis
 colore vel purpurafcente, vel pallente, vel candido: radix affata frixave **fruSamn** ve^ le-
 guminuni loco Indis inferviB* Battatas triplex; India? Orientalis planta prima, quaro nos
 Convotvuli fpeciem coiiftituitmus: & eft alia fecunda Canadcnfis, qu^ ad Corymbolas, Se-
 ftione texta explicandas, inter'Chryfanthemamasamandabitur, & illic Chryfanthemum tube-
 rofam nobis dicitur: . eft & **tertia**, Virginiana, Solani fpecies inter congeneres, decima'Scc-
 tione explicandas, difponenda, & Solanqm tuberosum **Vilginiawnri** appellabitur. Vox
 Battatas male omnibus hifce tribus aflignaturab indigenis a fimilitudine radicem tubero-
 farum, utconjicio, qua; noEa communis feddit plantas toto coslo diferentes , congene-
 res ; radices , folia &c. infer viunt tantum ad fpecies deter mi nandas, non autem ad
 genera fivefumma, five intermedia conftitnenda: ergo ex libro naturae quilibet medio-
 criter in Botanicis verfatus, obfervando duftum ulcimum naturae, id eftdiverfummodum
 florendi, & eapfulas feminales , & femina producendi T facile nobifcum, unamquamque
 harum trium plantarum fpeciem^ ad genus fuum a naturaipfa affignatum revocarepoterit.

SCAMMONIA.

Σκαμμονία. Dioscoridi 1.4, c. 17x. is Theophrasio 4- W(\>^\Hf \ >< ** o. Latinis 'iScammo-
 ma , ex cujv radice • fuccut dicitur, utl r 2 fee & o/IV? " ** I - V, M Jccrdls drftriptn nofii* flan,
 1* convemrei, mji farams quadante'nus Urfu'tos\ M"> u.en\ **f***trima ; q&ea birfutkm
 Cnefda an lad rationej bafcnus non ohftrvavbnus: i* Matt Indus in Afinptiom Diofcoridea omip.

§, ConWWwSyriacus&ScammoniaSyriaca, nobis. ScammoniaMatth. Hie Co-
 volvulus, Scammonia Antiochenadifta* CamerarioTin Hort Tenuesv.tieulos tertncubitales
 & multo akiores (fecundum folium cui committitur) aliquando ad alntudinen, quinque
 cubitorum, modo habeafbaculum perticam, ali«dve admn^ulum vic.nnm.benefido quo-
 rum feibiri altum attollere pofiif' toliis donatur tngul.s, eftgie^Sagittarn parvar, ideft
 font acuminataad bafin foliorum, Snulacisj5^VsTMjons aemula: rlotcs luntCampanulati
 ex candidopallefcetes feu oW^wi utClanffim! Car. Clufii voce utar, eapfulas feminaks
 & femina, cztetorm **foz** tam.lias **iofctr**, ^ : T ^ i m ^ J f R a P h a n o . finiiltm , & fue-
 cofamhabet, unde fuccus eftindicur, poft exfcfionem ejuidem; fitexcipitur in vafis aut
 tegulis ad hunc finem pofuis qui Scammonmm vocatur, liocque **eft** medicamentur.imo-
 jhlicum, violenter ehim purat, fed corrigitur ejjis vis &c violent.* feu vehemtntia, fi p <-
 diftus fuccus incoqaatar Maio cotoneo tune a Pharmocopoeis feu Pharmacopolis Diagridi-
 um dicitur. De cujus compofitione, vmbus & facultatibus, vide ad finem explicationis
 Convolvulorum fufius.

6. *Convolvulus* vulgaris major albus, feu flore majore albo, nobis. Smila* major bi»\
 pod. Ger. Sroilacis herbae duoapud veteresrepenuntur genera; afptrum unUK
 diximus inter bacciferas feandentes ligneas, feu ligneafubftantia praeditas, K* S*
 primæ; de Smilacc- Isevi, legominofafeu liortenfi, qiae Sc Phafeolns dicimr in Secti^t rttfc

fen fecund! nujus partis, in^{er}fuaefoi [^]iniie5, Legumina, fci licet, di<feir>ns. Aft deS[^]mi-
 • kvi major.e, campanulato, -laftel' T[^]h o c in loco jam cractabitur. Convolvulusma-
 , vulgaris, viticulofis feu farmentofis > •> s, longis ac tenuibus, forfuniner<ns, Arbo-
 olius, irrutic[^]bui, fubfniticibus, vicin w'i riintculis fcpibufve obuolvirL' J circumlt-
 gatur: foUo eft triangulofo, in acutum • diemdefinente in extreme verlus p, diculum

binas auricjlas etiam acutas habente>>j;</ rolii fades eft hederac . ixvigatior-
 quc: flores e fummis pediculorum exfilhmt candidi, ampli, « lipanulaci, imo
 candid iflimi, colore Liliu candidi valde aemuli: radices fanr lujjgi[^] • noribus cirris fi-
 ni'les, intus candi, tiore-s , nac iliac per obliquum intra terrain , uu potius fuperficie ter-
 ix terms leruntur: pap&lae feminales, feminaque ipfa cseterorum fui familias sraula funt.
 Obferyaie licet, ledraro, eundem Convolvulum majorefn, florr- <-5ro.

7. *Convolvulus* purpureus, folio fubrotundo/C. B.P. Sf Prod.^T -in s, flare violaceo, Eyft,
 Convolvulus major hie annuus, covdifclius, caules longos, viti fos, paucis pilis exaffe-
 rato, vicinis perticis appofitis circumvolutos, prdmit: folia fiabe. longis& aferispe4iculis
 donata, qua: cordis figuram ffmulantur, nonmhii hifuta, prxfertim fuperiora: flores ob-
 lorgt, Campanul; ui, calicibus*lnriutisinnituntir,. Campanulas forma, ex ciruleo purpurei
 vulgo, aliquando aibi, cum in Horto Blxfenfi a nobis (jbfervati; atque turn etiam dum hsG
 Icribo, in horto liniverfitatis Bocanico publico, alb.os flores eqJHetn confpiccre licet: flori-
 bus farifcentibus, fuccedunt ciipfulu ruembranaces incus femina angulofa , triangularia,
 fufca, conrinentes, binatim ccrnis locdanientis diftinfta, congenerum more: quin & clafte-
 fic copiofe fati, &c evidencer, fi ejufdem ruaipapturfolia, caules, pedicuHve,

8. *Convolvulus* caeruleus hedraceus feu trifolms, Park. Parad. Csruleus, Ger. Convol-
 vulus hie annuus major, caeruleus, hederateus, longos, cenues & viticulofa promit caulic-
 ulos, quibus quxcunq;je prope pofita adminitula confeendit & amplt[^]titur, crebris fe-
 ie eis implicans circuitibus: folia tatafunt, & angulofa, repentis per terram Hederas foliis
 familia , tribus lobis diftinfta, Hepaticae trifoliae inftar, fed majora ; non in totum lsvia, fed
 nonnihl hifuta: flores Campanulatos, veluti[^]Smilacis kvis majoris, azureos feu profunde
 carule[^]ps gerit, quorum finguli oras plicis quinquetariam divifas , quafi quinquangulares
 profcrmic[^] qiae fie divife plicis fuis quinque, flores* fingulos quinquangulos cuilibet ipfos
 intuenti [^]pparere facile Juchmr. Hoc familiariter convenit omnibus Campanu Jatis floribus,
 non folum hujuscnpieis, (ed aliis mouopecaJis, tutiuJofis etiafii, ucDatune' & Solani fpimofi
 • fpecie[^]uus &c. Propter fiorcm elegantis faturace ca-rulei coloris, Lazura quaP I ;>zla (id
 eft cirulea) nuncupatur.

9. *Convolvulus* vulgaris, flore minore albo, vel purpureo, no[^]is. Smilax. lxx jr, Dod.
 nt. Ger, Hsc Smilacis laevismajoris minor fpecies peiennis, majore[^]ulgari(-ilior, te-
 nerior, tenuiorque : * tcnuts illi quoque funt viticulofi cauliculi, qtiornu •: nulli humi
 ptQeombunt; alii Herbas-, Vites, Frugefquefcandunt, & crel)ris circuitibus eas revinci-
 unt: folia obionga, mollia, aclivia ; Sagittaris forma & i figura accec[^]ntia itidem: rioresut
 caeterorum fua: familias parittrcaluthi infbr, nunniliif odorati, plurima parte albidu, relu-
 ceme tamtn in.ei6 diluto rubencis purpuiceolore, & radiiires inter ftejli effigie& forma ;
 variat colore fepe, " vel eit albus cum umbilico purpurco, vel punicanribus lineis aferfis,
 vet purnureis raoliis albis piftus; femina fublequuncur exigua , angulofa , fuica, carterorum
 hiiLis claffis feminum moflo, icd non copiofe perducuntur femina ad niatun'tatem, propter
 nmiuni rependitodium radicum ; hoc contingit omnibus longelatequefub terram repenti-
 bus radici])₁Si cujfcunq;ut fmfteftionis aut generis fubalterni, ut poftca patebit, in fin-
 gularonj feftionum & generum inrermtidiorum doftrina.

10. *Convolvulus* argenteus, Althsarfolio, C. B. P. Ger. Peregrinus pulcher, folio Betonica,
 flore purpureo , potius iulio Bryonia, exnoibafententia. Hujus floris cum ante diftis in
 hac Tabula, & poilea dicendis in quarta Tabula, conformitas & fimilitudo faciunt, ut banc
 lierbulam, alioqum primo iutuim foliorum luprioribus parum congenercm, nee forma,
 ilhs congruentem, hibneftamus. Vepribus atqne fruticibus, aliifque herbis ipfi vicinis ad-
 nafcitur h^c planta fcandens, illifque circumvolvitur, alioqui fi adminiculifcareat, humi
 • a c[^] nec feattollit, nam infirmioribus confitat viticulis gracilibus, villis quibus[^]Ham obfi-
 ficana, in imbuu linnata & qum cilipa, nonnure tam ferrata, imo, aliquantulum
 • Tbla, inordinate pglita funt. Altxse vulgaris aut potius Bryonis albis folis fere repon-
 / inifora tamen, gummosa, fi gultentur tubacria, & etiam tubamara , flores ex
 alara ni. [^]rdtnit, longis pediculis inhsrentes, Convolvuli floribus omniio fimiles, mono-
 petalos,

tsetalos, & ita irtplicatos; ,*at ex pltiribus jCKHi^tp margin? quinque fcilicet) conftare vi - deantur, ex candicante purpureosfeu purpdfe^ntef: radixtenuis, exilis,tfulca,pert^irās iuperficiem repit, atque ex nodis feu genjfp % Riorum fax fortis more^alias plantulas producit. Noti la&efcit: in hoc convenit tell 3nvolvulo fpicaerolio LobefitL^ de quo infra in frequenti Tabula a&uri iumus.

L O C U S ; T E M P U S .

1. Convolvulus *Creticut, rellu**, *argenteus, nobis. Dorycnium quoruhdam feu potiu* Convolvulus Creticus,, Pon<z, Italiā. In Cr eta is Sicilia Infulcprovenit: floret deflate .'.femina perficit aut umqo, adinfartaliorum Convolvulorum fcaendentium.*
2. Convolvulus *italicus, folio fenuato, nobis. Maritimus nofle'r^Imprat. Auriculapulchrk geminati*pr<ri>eii:t, ad or am maritimam Venetorum isrfecus litns mafitimum Neapli-tani regni , etiam in Hifiani* isr Infularum mediterranearum or^a maritima, cterisque calidis maritimk lock meridionalibut Gallic 'Narbonenfis ^^allifqueplagh Africa , tfrjw-nidi oppofitis, prope Tingidem, ad^oram illic maritimam, teftē Roberto SpotlVood , a^quo plurimafemina nobzs fuerunt communicata rariora.*
3. Convolvulus-*maritime noftra5,rotundifolius, nobis. Braffica maritima, Mattb. In or a maritima Gallic feptentrional, BatavU is AnglU, viget: floret deflate isfemen maturum eftautumno.*
4. Convolvulus *Indicus Orientalps, Inhamefeu Battatas, nobis. Ban at as, Sifarum Peruvia-numfeuBaitataHifpanorum, Ger. Irinovo orbe vicinifque Infulk^ illi adjacentibus, quin is in India Orientall^ provenit ; floret deflate is fub initium autumnimaturantur femina.*
5. Convolvulus *Sjriacus is Scammonia Syriaca, nobis. Sc ammonia, Matt h. In calidis pin-gui exit fob, veluti in Afī<z Myfia, is Syriapaffim reperitur, nee non in Creta Infula^ teftē Belonio: floret jftate atque femina perficit autumnno.*
6. Convolvulus *vulgaris major, albus, flore.majore albo, nobis. Smilax major Idevis., Dod. Ger. Reperiturpa/Jim circa fruteta isfepes; qude femel comprehends hea, ta<£germ de-ferit, adeo pertinacis vit* radices! funt, hac iliac rependo ; deftivis menfibz fefe propagat, is copiofe flores protrudit, nitore albido Liliorum inftar confykuos ,calathi forma amplos; per tot am *fiatevi floret, atque autumnno femina a fua perficit.*
7. Convolvulus *major annuus, purpureus, folio cordatofeu fubrotundo, nobis. Purpureus, folio jūbrotundo, C. B. P. / < / < / ,fiore violaceo, Ejjt. Convolvulus hie cordifohus feu ex-oticus, peregrinufve ex India delatus , is feminibuspropagatus apud nos turopeas; floret cum cteris fux familias, tftivo tempore, is medio autumni femina perfeele abfoluit quo citius in pulvino bene fihcore equino prtparato feritur is tranfplantatur, citms ejufdem fejnina maturantur.*
8. Convolvulus *Uruleus, hederaceus feu trihltus , Park- Par ad Uruleus, Ger. Ex India primum delation hums femē in Europam , ex quo apud nosfato, C cum fit planta an-nuaj is educato, de novo finplis annis maturantur is colliguntur femina in vernam tempeftatem refervanda, isLunte hyeme aut fub initiurtvens, in pulvino bene exflercore equino prtparato feferatur, perfecJaproductit femina verfus autumnni finm ; diuper ftiatem fuceffive producit flores.*
9. Convolvulus *vulgaris, flore minore albo,vel^mfmo> ist vano , nobis: Svnlax U_vls*mi_nor^Dod.Ger. Gv^nitur hie Convolvulus vulgaris minor, fefollumajōns albi, in berth cultis, is arvis feæetalibus, vinetis paffm in Gallia Anglia is Belgio aliifqUe regionibus/Pome, maxim detriment hortulanorum is agrkolarum, etiam in neglefiis arvis is fecus agrorum marines , viarumque fepes , imo is in pratiis ipfts , phviofo tempore,vaU demoleftus: rfivis menfibz floret, natura mirum in modum ludente in producendis flo-ribz variorum diverfprurnque colorum: raw femina fua perficit, propter nhniam fependi aut rependifacultatem, radicibus a natura conceffam. Hoc fdptcontingit repentibus plun-mis, uti obfervavimus ; natura enim non poteft duobz finibus fimul is femel 4* intenta is^ propagation radicum , isr produclioni feminum: idem obfervare licet commune lū phrimis Cbnvolvulis vivacibus , in hifce duabus Tabulis eontenti%,*
10. Convolvulus *argenteus, Alth<e<£ foliis,C.B.¥. Peregrinus pulcher,folioBf^ purpureo, IB. Hie in collibus juxta Tagum flumen, Uto folo , & inBkika^ aliis Hijpanze locis nafcentem is menfe Martio is Aprili florentem, ibidem &*

M. v N IVE.R.SA L W 7 ' X 0 . ' X I ENS IS. • i%
 ih Oariffimus Carolus ilufr ^S, % ^ J^{emine} pr-egsanum. Proffer repc/idini-
 •vidititfan C uli dittiu' pud nosfcmina edit matttra.

N C ' N A.

V /

1. Con, Ins K(SF)*r Creticus argent'e'us^rwis. Vercywm qunrundamfe, ^few Cbnw/-
 W*s deficitsPon<£, Ital. DorjcniumverumPlateau, C&£ Ifu?. Varycmum CrTricum Al-
 pin, DorycniumImperati I.B* Ctiorurn album fedikargentli* ^GtyeGnesrum album, folio 0-
 le*argmuo, rnoilli, C.b.V. Cntormnalbum Dakchampit, Lugj.
2. Convolvulus maritim major Italic-sis, finuato folio, nobk. Maritimus nafitr, Imperat.
 Aunculis fukbtu gminathquibufdamis aptiut. Convolvulus marithtutsfoldamUaffmh^
 1. B. Br/^fcff maritima major vel Soldamlla , C- B. P. B&^febe MS g«wa £.amtolfii,
 Lugj.
- j. Convolvulus maritimmajor noftrat, rotundifolht*, nobis. Bfaffica maritima, Matth.
 Lugd.Hift. Cam. Bralfka maritima feu Soldanelhr, I.B. Soldanc/la, Dod. Ad. Hob. Tab.
 Soldandlawmina, Ger. Eyfl. Vulgarity Park- SoldamU maritima minor^ C.B.F.
4. Convolvulus Imlicu* orientals Inbaiſe, Jtu Battatas, nobis. Bat tat as, SifarumPeru-
 vnum, Battata Hifyanorum, Ger. Battatas India occidentals isr Inhume Onenralis Lu-
 Jttanorum, Park, Camotes five Amotes is• Ignames, Lob.
5. Convolvulus Sytidcm (p Scamawnia Syriaca, nSbh. Scammnia Syriaca, C. B. P. Scam-
 monia. Anticcbena , Cam. Hort. Soammonia Matth. Cam. Ep. Lugd. Scammonia Syriaca
 kgitima, Park* Scammonia Syriaca, flore majore Convolhuli, I.B. Scammomum, Dod.
 Syriacumis? Antiochenum, Ad. Lob. Antiocbenum, G*r.
6. Convolvulus vulgarU major albws, majore flore albo, noi/j. ffaior, I.B. C'f. Ad. Lob.
 Major albtu;, C. B. P. /N&.. Smilax major UV'H , Do^ Ger. Lob. Icon. Ychbilit major •
 Trag. Tab.
7. Convolvulus purpureus, folio fubrotundo, C. B. P. Majorpengrinm ^ annuus, cordifor-
 mh^cdirukus, nohk. Indicus, flore violticeo, Eyfl. C^eruleus, /0/5 rotunda, Ger. Major
 c-frufeus, Park-Parad. Campanula Indiae, I.B. Campanulaaz&raSwer. Indicaprnpuro-
 violacta, Bry. Nil Avken»*, Dod.
8. Convolvulus ctervkus, hedtraceus feu trifotius, /V£. /Wa</. Coeruleus, Ger. Azjtre-
 us feu cs.rukus, Ob. Lob. Hederaceus, Ad. <* Ron. Lob. Convolvulus cerukus hederaceo an-
 gulcfolio, C.B. P. Campanula cdrulea, Dod. Azgria, MlAmbumfeu convolvulus c&ru-
 has, I.B.
9. Convolvulus vukarh, flore minort albo velpmfureo i? vario, nohts. Smila vis minor.
 Dod. Ger. Convolvulus vulgarh minor, arvenfts, C. B.P. Minor Cluf. Hiji. ?..nor purpu-
 ra/s, Ad. isr Icon. Lob. Volubil'u arvtnfis, Tab, Convolvulus minor albus velpurpureus
 iMtgorh , Park- Helxine cifampelos feu Convolvulus minor, I.B. Hifl. Lugd, Matth. Fuch.
 Cam. Ep. Helxine in fegefibus nafans, Cord, in Diofc. Iafione veterum, Helxine cifampe-
 los, Convolvulus minor, I. B.
10. Convolvulus argenteus Alh*£ folio, C.B. P. Ger. Ahhm folio, Cluf. Bifl. Lugd.
 Park- Convolvulus peregrinus, Lob. Peregrinus pulcher', folio Betotiice, flcre purpureo, I.B.
 potius Bryonue folio, nobis.

• TEMPERAM.ENTUM & VIRES.

2. isr•\$. Convolvulus marit'uM^ Soldanella mariiima major isr minor dicius, eft calida iff
 ficca temperie, tertio etiam excefiu, ficuti eft amara , falfilagincm cum acredine quadam
 gdftabilis ejus quilitas ofrendit. Alvumpurgat, crudos is? aquofos. humores diftrabit, Hy-
 drop'tis'cenfeiu ufilis, adverfatur tamen ventriculo, torticnes isr moleftias adfert: plus
 , incditmodi quam auxilii adfert. Ex Diofcoride tota htrba flomacho incommoda eft, azrh
 maxiim alvum folvit; Convniunt aim ea quidem ad acrimoniam obtundendam pingues
 :>ms.

Convolvulus hdUus Orkntalh inhame feu Battatas is ffarurn Peruviarmum feu Bat-
 ' "3f iMifpanorum, C*r. Ex nvvoorbe & Infula Dtvi Thomdt hdtc Herba delata in Bilpani-
 '9 fata in multis B*tic<t locis, itique taleofas difetla; principatum obtinet Mah^{ce}
 • tifiuY <tb ipfit incolii aut cruda, aut cofia, nunc Hifhanit etia.ii in ddiiciis, ob
 fapo-

fapork jucunditatem* is teneritatem, pofg\$ m fi in timribus Ma afave is exterhre pelle repurgata radix, is¹ in takolasfe[^]fi^{*} ,pauillo vim[^] ftillatijique Rofarv^w liquor k is? facchari momento edatur: lukM[^]ji ex Infula Vivi Thorn^{*} ddfertur. hiftar Carot[^] plurk habetur quam ilia ex Mfh ~~4/5~~; qu* ex regione Benin? gratiffim eſt r fapork. Battatat in pr^{*}dittk regionibit[^]b inHiſpania etiam radices admodv n bonum cibum^tijAulti alimenti exiftimant, meduj[^]ijwſſe veluti ſubſtanti*, inter caraes iſfrufiud[^] flafuientas tamen: fed aflat* flatus deponunt, prdefertim fi cumgenerofo aliquo vinoedantiir: ex ik eHar&fiunt cdferv* non minus grat*, quam Cydoniorum carnes; morfelli, placentuU aliaque edulia gratiffimifapork; verbo , idonej funt ad omnes generis confervas conficiendas is edulia. Nunc adeo frequentes funt in Hi/paniis, ut fingulis annk e Vak\ Malaga decem aut duodecim long* naves, Cquat Caravallas vocantj ik onuft<e H'if^v palm vwtbuntw y Temperamentofunt eodem radices, iſr coffoets' affdt ventrem emotli* unt: at crud* efl} non funt apt*, quoniam admodum flatulent*, idcirco difficilis digeftionis. Radicum Battatas genera funt tria a cortick colore , videlicet purpurafcente, v&palhnie, vel candido; radices a fat* frutuum vel Leguminum loco Indk funt. •

5. Convolvulus Syriacu* Scammonia Syriaca feu Antioeben[^] dittos. Omnes Convohuli vi conſtantpurgandi, fecundum magk (\$ minus[^] hanc doſtrinam eruimus a forma florum, capſularum feminaliurn {\$" ipſorum feminum conformium; natura indicenolm monfirante viam: at omnium horum principatum tenet Convolvulus hie quint us, ſupra a nobk explicates , Syriacus iſr Antiochenus ftu Scammonia Antiochena veVSyriaca dittus, excujus radice ſcifſa, exciptur in vaſis fuccus feſe effundens , qui Scammonium dkitur? Scammonium eſt Scammoni* plant* fuccus , qui ex radice, laſlei fud plena, incifa emanat, is- in vaſis recipitur iſr refervatur exſiccandus: cujus modum Dioſcorides I. 4. c. 171. docuit. Scammonium Pliniuſl. 26. c. 8. vocat: cujus fuccum tantum uſui Theophrastws .9. Hif 1 o. ſcribit. Scammoni* fuccus , ad Arabum imitationem dicitur Scammonium qui denſatus in maſſm cogitur, & exſiccatus, fuſcus aut lividus[^] aut cinereus aut fulvus redditur. Differenti* hujus ratione loci apud Dioſcoridem is" Pliniuſ: ille eum , qui ex Myſia regione Afⁱ* deportatur, commendat: Scammonium Syriacum is¹ Judiacum deterrimum habetur, E^{vi} farina is¹ Tithymali fucco adulteratum. At Plinio hudatur Colophonium Myſiacum. Priennſe: adulterinum vero fieri Ervi farina is Tithymali maritimi fucco, in Jud*a fere, quod deprehendi poterit guſtu , cum Tithymalws linguam calefaciat <src. Quocl vero Scammonium noſtrum not as a Dioſcoride tributa* non babeat, cauſa putatuh, quod hoc tempore veterumparandi modum non ynMtm ac TM»«"»" ff; ~~ut expreſſa, aut e ſimplicibus to ſolus~~ contuſ parerit: alioqui tanta Scammonii copia quotannts vixajfern poſſet, vel etiam Tithymali latte adulterati. Optimum eſt quod ex Antwcha defertur, deinArmenum; Europeum pmnino pravum eſt. Probatum quodpelluadum, love rarumjongi* mſtarforaminofum, color e cum frangitur fulvum taum glut in* mode tranſlucens: necvehementer linguam excalefaciens c quod admifti Tithymali argumentum eſtj is cumhngu* affrkatu^r in candiUmum liquorem lacli fimilem ſe ſuperficie reſolveſ: cito hqueſcens , iriabilenInvaldeponderofum, necHtri odork. At M^s mgentes nigr* is graves ; aut[^] adulteraufunt aut fuccis eſt ex iota planta expreſus. Mujuſ vehementm, conſigitur a quibuſdam Aloeaddita; fed reſtius. ft Malo cydomo excavoindatw, faſtiacircumdetur, is in clibano coquatur, dein contundatur, ut veteres fecere, qut Cut.aluJin fucco Cydonii coquatur: melius vero fi femina Ecemcu^h Aſiſi, -Daqa adder entur: ſie comſtum Viagr^rdium quaſi lachrymula'dicitur: in Officink Viagndium, quod mmk recens, vehement antiquumimbecillum, quare tormina excitans: biſnum optimum eſt. Succus ergo Scammoni* per inferiora vehementer , nulli ahorum medicament or urn purgantium potentia cedens, pur a at inquam non aliqua facultate calida, fed alia quadam latent e, totius ſubſtanti* proprietate, guſtu quidem ; nulla calorkvehementia deprehenditun: cuicunque Uquori aut rei permifceatur, nullam ei vel amaritudinem vel acrimoniam, aut ahum ingratum faporem commnnicat. Quamobrem nee inter calidiffima, ut plerifque videtur, fed inter moderatiu* calida iſſicca habendus Scammoni* fuccus. Extergit is educit potiffimwi bilemflamm[^] ferofos itidem tenuesque humores is quandoque pituitam; ventriculo[^]aariy magk quam ornnia reliqua medic amenta C ut Paulus &ginet&traditj ^{ox^o^e^?} monmrn. Meſues non modo ventriculo grave is moleſtumejje, verum is wt.eſtin&.fiſij'a abrn* . dere, infra rificera corrodere •> venarum or a dilatau\ totaque fu<&' fulſiaki[^]tfinth

cordi rehqifque viferibih obejfe fip\$^ilnordinatum is minu\$ opportunum eju* ufumfe*
 quuntur ahimi deliquia, ventricuiffut^erfiones autfluoresis dyfenteria. Occurritur hifce
 :ralis C eodem authore J fe Scamnr^th- in Malo cotoneo decoquatur, is in mucagine
 PfyHii, PvMorum came, aufucafi^ ^ifre lent is, [implicit er pewiifceatur, addita
 Majvcht^aut dliis moderate aftringentibij^; u\$e cater it vide Dodonaum is •%gbannem Bau-
 hinum is Simeonevi Pauli, in tertia^fft operh quadripartiti, qui difuj^de^Scammonii
 viribu* egere.

6. Convolvulus vulgaris major albums feu fore majore albo, nobis. Smilax majhr Uvis,
 Dod. Ger. Viribut accedit Scammonia, aft in minore gradu; quin & propter characlerif-
 ficam .is effentialem, in floribut, capfulh feminalibus^ atque etiam feminibM repertam no-
 tam, concludimus omnes Convolulbs lattefantes Campanulatos iifdem -viribut pdkr^efecun-
 dum magi* is rminu*. Atque hac de viribus tarn eorum, qua ir: b/c teriu Tabula quam
 quart a explicanda continentur, dixiffe fat erit.

Explicatio Tabula quart a Sectionis fecunda.

C O K V O L V U L I M I N O R E S.

1. **C**onvolulus Scammonia? foliisasmuius, nobis. Hie eft radice craffa in terram fe de-
 mittente, atque longe lateque ferpendo fepe propagat aliis radiculis, ex quibus pnl-
 lulant novas plants: folia gerit Scammonize, triangularia, multo latiora ad bafin quam
 funt Scajaimonix folia, nee funt tarn acuminata ad bafin: fiofes habet dilute pallidos,
 Campanulatos, herbacei omnino colons, Scammonia? quodammodo aemulos: capfulasfe-
 minales, tribus loculamentis, triplici membranarum ferie feparatas itidem, atque in fin-
 gulis bina continentes femina angulofa, nigra aut potius fufca; primo intuitu, fi juxta
 Scammoniam collocetur ab ipfa primo foliorum ilrudura, deinde radice longe la-
 teque fub terram repente cognofcitur, quia Scammonia radicem longam, craffam Napi
 aut Raphani majoris infar fert J La&fcit ut Scammonia carteraeque plurimse Convolvulo-
 rum fpecies, binis exceptis quas recitabimus & obfervabimus in propriis locis.

2. **C**onvolvulus minor, argenteus, repens, Rupellenfis, florerubro, nobis. Eft liu-
 ninis naec Convolvuli fpecies, per terram procumbens, fbliis eft longis, anguftis, argen-
 teis & omnino incanis, ex quibus ruptis emanat fuccus la&eus, more aliorum fuze, tribus
 aut Claflis: fiores producit Campanulatos, rubros, aut coloflinos; ex hac nota riorum
 colons, junfta incantie argentea foliorum anguftorum & . longorum, parvo aut millo
 quafi negotio dilinguitur i caeteris Convolvui minoribus fpeciebus.

3. **C**onvolvulus minimus fpicaefolius, Lob. Obf. Lugd. Linarias folio, C. B. P. Hie minor
 Convolvulus tenuibus adeoque juncis, ex eadem radice prdeuntibus, & hu. ni procum-
 bentibus ramulis prasditus eft, duris tamen & hirtutis, qui in fummo flores proferunt
 Campanulatos, purpureos feu purpurafcentes & inodoros, in margine implicates, ut
 quinqfariam dividi videantur, fiorum oris in totidem angulosdefinentibus, dum comp-
 licantur & inexpanfi adhuc funt fiores, quique expanfi & explicati angulos fuos in
 niargine* florum relinquunt quafi acuminatos: folia inferiora nullo ordine ramulis inhz-
 ^e gummofa (fi quis eadem mordeat) etiamque aliquantulum amara: radix candicans
 iingularis & vivax. Non laftefcit, in hoc convenit cum decimo ultimo fab. pracedentis.

A- **C**onvolvulus peregrinus caeruleus, folio oblongo, C. B. P. & Prod. Peregrin us caem-
 ruleus, folio oblongo, flore peramceno, triplici colore infignito, nobis. Campanula ca-
 rulea, Aldini. Hec perelegans Convolvuli fpecies minor, radice eft fingulari, oblonga,
 ruftefcente, exquacaules multi, pcdales, fequipedales, flexiles, leviffimis & curtis pi-
 lis pubefcentes, prodeunt per terram fratri; quos folia inferiora uncias tres quatuorve lon-
 ga, vix unciam lata, inordinate veftiunt, quas furfum verfus minora redduntur, perque
 margined funt leviter hirtuta: ex foliorum finu pedicelli tenuiffimi, oblongi, exfurgunt,
 fingulis ilos eleganter mayimam partem caeruleus, Campanulatus, triplici colore infignitus
 infedet, quinis plicis in margine exterius, quinifque interius, caeterorum fe familias mo-
 re. florem elegantem gerit, inquam, triplici colore notatu digniffimum, iniiipere Cam-
 t^ui^mbo circulum viabet elegantem cyaneum cV peramcenum; medium album, feu
 ^ppouib^kroleucum; tertium circulum ufque ad fundum luteum, ex cujus umbilico exe-
 :int^amiWla quinque fubcaerulea, ambientia apicem longiorem: inter circulum luteum

in fundo, & medium ochrdeucam confpicer<hV. x 'iina pin&a nigra, bifariam, riam lurfum vcrfus divifa , qua: attentius inuir-J ^ quuma apparent, & numerar poffunt. Plantula hæc cnm ob riorum copiar V < clegantem & amcenni coir neum, luteopallido 3f atbo colore interim" pfVifu pukherrima j aliq&tndi rlerem totum.album gerere, hifce omnibi t. -ribus variantem hoc anno' in Hoi to B,ot?^!co Academico publico; a fe n \e ^ Mauritania Tingitana #1 ib, ab arncofamiliari Roberto Spptfirco JChiruvgo &c Apothecario o^pidi Tingid.a: flori.bus evanefceikibus fuctcdunt capiuita membranaea , parva, aeterorunimorediviia, in teriia loculamenta.

- 5. *Convolv. 'hs* jEgyptiacus, quinquefolius, I. B. Quinquefolius, C.B.P./Egyptiacus, quinquefol ubro ant purpuro-omileo, nobis. Hie eft vkiculis tenuibus geniculatis, kevht. ?t geniculo folium exoritr longp & tenuifiimo pediculo donatum, quod in qu.. inias angufhs, longiufculas, dividkur,& quandoqtie una ake-rave bipartitur, &c cuu. t pediculo duaum aut ttium onciannn longo, funt foliola fen membrane quatuor foliofe, cingentes caulem & bafin pediculi: flores, capfulas (eminales Sf fenjina, cterioruni more habet: fcandit ut carrri Convolvuli & cauiibus & loliorum pediculis.

6. *Convolvulus* Africanus minor, Park. Hu)us folia font longa, noti divifa ad appofitionem pedicuii, ficut prcedens ; cauliculos hie plurimos per terram fratos gerit, q>-bus arête adherent folia oblonga, in exortu acuminata & in mucronem tenuem definentia; quoad flor.es, capfulas feminales & femina ipfa, cum czteris fue tribus auc claffis convenk.

7. *Convolvulus* pennatus exoticus , Col. QuamoelitCamerarii ^ I.B. Hxc plantula pn-mointuitu, nullatenus Convolvuli fpeciebus accedere videtur, propter toliorum pemvatorumeffigiem, qua: Myriophyllum aquaticum imitantur quoad ipforum di(poiit.onem& divifionem ; fed ut niultoues aiferui in Praludlis Botanicis , & paffim infra w hac noftra do^rina Univerlalis Hiftori* Herbarum afleram; toHa non intervniunt ad genus conf.tu-dum, fcddiverfas fpecies diverforum generum determinandas. H*c itaque exotica non poterit alii generi referri aut adferibi, quam Convolvulorum claffi; natura fua & toto hab.ta i^orum, capfularum, & feminum ibidem contentorum, iidem eft contorniis : lacte^etiamtufgetdilutiore: floribus eftobkmgis, mbulofis feu campanulatis in tundo,qmn-quepamis in margine, rofeo color_e hilari, lineis ^ ^ I ^ ^ ^ S S ^ S S ' % liT T 45^{dentibas} j. alternate fitu « < %* * £_m aefinence^cart.lagineo aut pallidis : fco oblongo ex fquammofo f^e^ ^ ^ kd:iingul[Y]orc & [ongiore; fomini-*mmte** cme* olx.lao, « ^ ^ S' a ^ S S ^ S k ^ alternim bus intus lgl's , n!griSi duns, **J&%J^ Myriopfylli aquatic, ritu, mi.om & hxvent cauiibus, pe_nat_a,tenu. ^ ^ g g U t« clcLI ufque, nuncplure., nunc obfcurnsviremia, pkr.bus lob.s utnnqw afl«_s -ores hh] hifm-clniar ^ t c , in'nume-pauciores umcoextremum claudente D ^ o C ^ 1 K Y n a c c a s c r a t e s a d i m p l i t e s , f e t c (a -ros vit.ailoschofos & flondos, <V^*V^TM*fc niaxime oculos confp.cienti.m lecreat horum Coiivolvulonim modo) « ^ V " t i s jucundiffima : lemen primo vere fi^ (ll,are prnfiKte horns, verfus g g g J S y aiata apparent. Augufti fine floret, fe pnma folia protrud.t, quæ Ac ens faj»« de|cb m cololi" ineunte vere, & exeunteau-heptenibn deinde trnctum perhcit; ien^{U7} 1 tamno ngido & gelido, apiid nos leptentnonalcs raro in horns lemma ad matuntatem padncit: ac vix ac ne vix quidem puma rudimenta, q^mvis ad pctlalem iæpc ak.ei-dinem affurgentem & altioremobfervavirpus;nee dum florentem propter rationesantediftas. In Meridionahbns Italia, Hifpania & Mauritania Tjneirana, tac.le&Vcopiofe ; ex quibus regionibus, femem ad nos dclatum, cum m Gallia fit hie m Hono publico tatum, P^TM' dMitplanralamipfarh,fed propterrigoremtempeftatis hyemalisfic aotumnnalis, nec «oret, nefemina frrt ; fed fingulis annis (enm fit annua) pent, atquefcmmibns es M^nd.o-nalibus ad nos miiis & tranilatis fubinde recuperator arfhite, fine flore & fruft" ».

8. AVK»*»Indicum,Dod.Lob. Obf. & Icon.Lugd.Eyft. Convolvuli hms Hetero-cliti genus a regula praccdentinn recdentis, quoad iiorcs 5c femina, »^{lc crJ}_* mus ; eriam propter fcandendi facukatam cauibus illi concef&m, Goflvolvi r>:/ diftis fubjimximus. Nafurtinnm fatiſapte diftum ob iaporem, Indicum i loer P » .., quo fponte prtvenit. Q2^{um fit} «er^{da} annua& feptimeftris, caulibus & foliffum peicu-

iis fcandens, eam ad calcem QonvolvuloiJ^n hie collocavimu3 , nefcientes quo alia referre. Eft enim planta heteroclita X^nv.a.^liita modum (efe fepibus ex perticis conftruais, ifn^Jicans. Caulis hujas eftteres, unu5s"& longus, qui in ramulos plurimos dividitur graciles, -of proinje' pebmentis ac admimppfo, quibus fulciatur, indiget: folia circa ramulos ibtunda, ti^uia, quibus pediculus, bijfiriMjs & tñuncialis fubeft veluti Cotyledonis folium fuftin^ns, cui figura admodum ^ikjs^ft, ted tenuius & teRerius ac tairarius virens: fios eft luteus cum amplo riftu in anteriofe parte, & calc'ari fatis longo ^Hõmitur pofterius; cum flore Delphinii aliquatenus convenit figurá ^ fed eft multo major & Ipngiore petiolo dependens: iioribus fingulis iiaccefcitibus, fuccedunt terna femín?, arcle tñbi-invieem jun&a, afpera feu verrucofa, quemadmodum cernere licet inChamelaea triCocco. Nafturtium fapore, omninoejus folia, flos, etiamque femina adhuc viridia redolent. Flores in- expanfi colleeli & muri^e inditi è fale & aceto confetl:^, quemadmodum Gapparidis flores in expanfi, optimtm acètarium hyemale conficiunt, fcorbuticis car?ndis fails idoneum.

9. *Halicacabum* peregrium & Cor Indicum LB. Pifum vencarium, fructu nigro, albã macula notato, C.B.P. *Halicacabum* peregrinum veficarium, fructu nigro, albã macula notato, nobis. *YLxc plantula veficaria ad *Halicacabi* genus refertur à quibusdam, ab alii ad Pifum, fed male, nee ad alterutrum reduci poteit ex libro naturae. Eft enim planta heteroclita fcandens beneiicio capreolorum, & hoc nomine cum Pifo convenit, in effentialibustoto cclo differt. *Halicacabo* congruit aliquatenus in vefica membranacea, led feminibus omnino eft difpar: ergo cum fit *Heteroclita* & fui generis, hue retulimus nefcientes, quo alio referre, ft. quis melius diipofuerit, per me non ftabit. Eft canliculis tenuibus, friatis, viticulofis, late fe diffudentibus, qui vicina quaeque adminicula apprehendunt beneficio capreolorum: folia hujus funt oblonga, divifa, feu laciniata & per ambitum profundius incifa: ftoculi e longis pediculis virides aut herbacei: folliculi feu veficas funt ^triquetras, flatu quafi diftentas, magnitudine *Halicacabi* noftratis, intercipientibus membranulis, in tres diftintos loculos eadem veficam dividitibus; fructu in unoquoque loulamento, triplici, duro, arele fibiinvicem adha^rente, cujus unicus & fingularis Piperis ft iigura & magnitudine, colore maxima parte nigro, candido umbilico feu macula a 1->&, cprdis fbrmam& figuram exprimente, unde Pifum cprdatum (inepte fatis) dicitur :umejusfruct:us nec faporem Pifi, nee flores papilionaceos ferat planta ipfa: radix tenuis, multis fibris capillatur; in fapore fructus eft amaritudo, imo fapor'eft naufeus, unde alidus & liccus judicatur.

LOC.US & TEMPUS.

1. *Convolvulus ScammotiU foliis amulus^ nobis. Aliunde à peregrinis nitionibus ex femine , ad nos .Europeos allato isr fato, provenit fatis felkiter in hortt* cult is: flora fert *ftate, atque autumnò femina perficit.*
2. *Convolvulus minor argenteus feu inearth, repens, Rupellenfis^ flore rubro, nobis. Paffim ad or am maritimam circa Rupellam à nobis repertus: floret deflate., atque ob nimium radicibm fefe propagandi defiderium, raro femina ad maturitatem perducit: fe qu<£ occurrunt funt pauca, ejufdem furm* cum cfteris fu<eforti\$.*
3. *Convolvulus minimus fpic<£-foliu\$, Lob. Icon. Linarix folio, C.B.P. In multis Hi/}>a-ni<e & LuftanU lock, atque etiam in Gallia Narbonenfi (p Germania in colle Thermarum, urbi vulgoBaden immwnte, quarto ab urbe Vienna Aufriaca milliari provenit^tefte Clufio: floret Maio isr Juw, nonnunquam tardius, in Anglic Belgidque hortis Julio videlicet i^ Auguftofloret, neque etiam ut plurimum femem fuumperfic^vt.*
4. *Convolvulus peregrinut ctruleus, folio oblongo, C.B.P. Et Prod. Peregrinum c^ruleut annuus, folio oblopgo, flore peramoeno\ triplici colore infignito^ nobis. Hie paffim circa Tingidem, et in tot a plagã maritimã Mauritania Tingitan*, vigeit floribw elegant er Piclis, vanis cohribus, ficut obfervavit primo Robertus Spotfwood apothecarim oppidanus & regius^ a quo femina hu^m ficut is aliarum rariorumplant arum , illic (ponte nafcentium^ communkata habuimm, floret per tot am pene <eflatem atque eadem exeunt e & ineunte autumno (cum fit annua) femina felkiter i\$R copiofefatUproducit apud nos.*

Convolvulus Mgyptiacus finquefoliu, LB. Mgyptiacusquinquefolim, flore rubro, nobis.-In Arabia & /Egypt0 aliifqne Africa locis hie f^onte provenit: floret- fubfinem dt^ftaik, raro femina apud nos ad maturitatem perducit; propter nimiaqi rependi facultatem*

6. *Convolvulus Africans minor*, Park, *Pafftm* Africa fífote provenit hac *Convolvulus minor* Species: aflat-: floret: uerfws autumn^&mina Cfl qua producit) fua cit.
7. *Convolvulus ptinnatfts exotkus*, Col. Q' Camerarii, I. B. E'xM.ku-s . fclik *Myriophylli* feu *Millefolii* aquatki. I :mguineo, nobk. Ex Amer) cmeh ad nos de'yUm, <>r in bortorumpulvillis^y, 0 r^fhuim adhuccalente benep, »*»./&• turn, vigp: aflate; fed ob defeclum calort>*nonaum apud tios floruit multo minus femina p.hduxit. i
8. *Naftufcinm jndicutn*. Hujas femem ex India orientali iff occidental! delatum, iff in borth fatum, cum meft ubert bane Volubilem hetroclitam producit, qua apud nos floret per * Warn, dfaiematque autumnofmina fua ternafimuljuncJa, rugofagerit, exquibmfingulk tit tiff's renovantur affatim.
9. *Halicacabum peregrinum* is *Cor Indicum*, I. B. *Pifum iieficarium*, fruftlt nigro, alba macula notato, nubk *Hujuefemina* ad nos delata ex Sent, aliifque India lock felkiter fat is proveniunt inlxrtk nojlrk cult is. Flow fub finem aflat k ip **verfus** attumni fi-ium fanina fua terna rotunda, nigra, macula alba cordiformi not at a ,*hi-veflea triffici h'ctilainento diftinfia gerit: agre apud nos pofl flores covfikuos feminaejus mature/cunt, vift favente tempeflate autumnali calido.

N O M I N A.

1. *Convolvulus Scammonia folik amulns*, nobk. •
2. *Convolvulus minor argenHm* feu *incanns*, reptns, *Rupellenfis*, flore rubro, nobk.
3. *Convolvulus Linaria folio*, C.B.P. *Minimus Spkafolitu* Ad. Icon, iff *Obf. Lob.Lugd.* Ger. *Spica folik*, Park *Volulilk tmeflrk Dalecbampii*, *Lugd. CantabTkaqtwrund-im*, *Cluf. Hi/I.*
4. *Convolvulus peregrine*, *carulem*, folio oblongo, C.B.P. iff *Prod. Peregrinus Caruleu** annum, flore perametto, triplki colore inftgnto, nobk. C<eruteu6 minor, folio oblongo, Ger. *Minor c<*ruleus Hifpamcus*, Park- *Parad. Campanula exotica*, *Hon.Fer-mf. Campanula carulea*, Aldin.
5. *Convolvulus Mgypt'm*, I. B. *JEgyptiacu** quinquefoliws_T flore rubro, nobk. **fiaiagwfolim** fiufoliM laciniatk, twin* in *Prod. Cafb. Baub. Convolvulus fi&ptiac** ****** Bry. *Algyptiacm* quinquefoliu* Caib. *Baubim^-M*_*'l TM^m JE^U<ICUS^* • Park- r is *
6. *Convob ;:Us African* minor*, Park- *Africans minor*, longo, anguflo iff acuto foXo, nobis.
7. *Convolvulus exoticus pennatus*, Col. *Quamoclit Camerarii*, I. B. *Convolvulus pennatus*, *Americanus*, Park. *Quamoclit* feu *Convolvulus pennatus*, Ger. *Gelfaminum Indicum pennatum*, flore fanguineo, *Ponæ Italice. Jafminum Millefolii foliis*, C. B. P. *Convolvulus exoticus*, annuus, foliis *Myriophylli* feu *Millefolii* aquatici, flore fanguineo, nobis.
8. *Nafturtium Indicum majus*, C. B. P. *Indicum*, Dod. *Lob. Eyst. Peruvianum Myconi*, *Lugd. Indicum cum flore & femine*, Ger. *Indicum*, Park. *Parad. Nafturtium Indicum fcandens*, folio peltato, flore luteo venulis cinabericis notato, I. B. *Flos fanguineus Monardi*, *Lugd.*
9. *Halicacabum peregrinum & Cor Indicum*, I. B. *Pifum veficarium*, fruftu nigro, alba macula notato, C. B. P. *Pifum cordatum*, Ad. *Lob. & cor Indum*, *Lob. Obf. Icon. Eyst. li/lu7n cordjnta veficarium*, I<*rfc *Halicacabum peregrinum & cor Indum*. I. B. *Halicacabumperminum* Dod. *Fuch. Lugd. Tab. Ger. Veficanafeu Haltcacabumrepent*, *Matth. Ex nojki faentiaörocumbens*, cum fit amna phmta cu)«* cauhculi precumbunt ,, feu burnt firaii funt **nifi** adminicul" *'"»"* ndjuventur, bentficw capnolorum. *RePem&ferpens* intelligi debent deradice fub terrain repente, undt vino vertetidum authoribus Mca-vw, qui indWmter utuntur wee repent, pro caulibm ; **fcarykns** aut **proa**'*** m aptius** commit. De viribu6 fat* ditlum•, ad fimm explications Tab. p,i{n* omnium Convohulorum faltem ufitorum, ceteros de quibits nil illic difium p_r,öpter analogidm conformitatem inpartibu* tendentibus ad finem ultimum iff perfeclitQneni, vfdtmpolh — ribus fuundum mack & ^{mtUu6} nitili <i^am ^bitamit.s. f

HALLUCINAjt-CNES CASI BAUHINI

in Pinact,

mqjie Authorum.

Pag. 1. i. tot. i. Scammonia *Monspelt* *folioli uioribus*, C. B. P. & ibidem p/i 11. col. 2-. Scam.,onia *Monspeltaac affmis, folw acutio** **ribus**, C.B.P. Sham Hcammoniafit omnibus numeric abfolutis Convelvuli optima fp-erics, a fiore campaiiuldo, £f capfulit ratundit, term's loculamentis diJlinBii, continentibts in/mgutn bina femina utplunnum, mfi Citli aut foli inclementia impediatiir natara conatu; , ut frpt in aliis militis pneribm contingit, nan raro., oS fieri tat em aut w defellum nutrimnti i ha dim Jpecies fupra chafa nan conveniunt cum Convolulo, Scammonia di(lf, in effentialibm fms notij, Uiamfi laSe/cant, prout omues Coufohuli Ip-eciei, except is duabus. At hie dux planxpro Seammmi* fpetiebus a CaS. Baubino alijfque autoribui denominate, jiores produwit integrss in fundo, in margine quinqdefariam dividuntur, atne fingulis fioribus fingultf fuccedunt filiquc long*, lanigerie, in media tumidie, quit in fi continent Jemina comprefa, rtijfa, pappo, aut ,lang pappofte, ferici injlar, ifvoluta (quemadmodum citterie omnes jipatum aut Afclepiadis jfpecies) ergo ex libro nature tatiodnando, avernncandit j&nt a Scammoniie fPeciebtts, atque fuic confirtibus Apozynorum aut A-Jclepiadam clajji adjungndx. Idcirco graviter lap ft fuit aut bores ipfeque Bauhiims, qni minut atencic or *mnes (quot quotfunt) librum naturx evolvtre. So' tut Cl&riffimus Caroint Clufiits oculatus fat is, recta ad genus fuum prnprium, has plantas reduxit, 3 Apecyui n, minc dunavit. Item Dodonieus fecundam, rcrtpioc tmpriaremfc cit, «W / obfervaffct Cafb. Bauhtntlf, atque librum natura di//_{te, inUr} infuxiffH, ijon inter Scimmsniit fperiei, fed ^pocynt collostaffet, cum Apocyni gerant tejferam, &.notam genericam.

Pag. 2fy. col. i. PL4. Convolvulus minor, femiic triangulo, C.B.P. Hclxine Cijfdmpelos, HiJl, Lugd, Male infiritur hire pi a at a fcandens caulibus, inter Convolvuli (ut fupra in Prielitdiis Botanicis ajjiruiimus) Jic diUi fpecies, mm Convolvulus proprie diilus fa planta velubtilu fat fcandens, laUefcens, fiorem gerent monepeta&hi feu. integrum, calatbi forma: capfilm itidrm rotundas Imigafve, triplici firis, femina angulofa, nigra aut fufca baentes, bina in anoquoque loc>lament% continences, nifi (utidiBum) incletntia Codi impediati. Hac oaten* Convolvuli anteditli £/ecies, fcandit quidem beneficio caulium, «t hoc mult is, Ji, b diverfis jil* iis militantibus, planti' fi commune, fed nee laclefiit, net jlorem produ. -ttt mottoptatum, calatbi modo; neccapfula* Jhmnaits, nee jeminij, paria aut fitnilia Convolvuli Jemini-btti ergo hieplanta ejjet bine arcenda, &adekjijim cujtitfert teffiram notamve efentialem rtmittenda. Fiorem Inc Convolvulus f_{eu} Helxine Ciffampehs fert pentapetalum, jemen triangular^, unkum, tribut fultolispro capfula infirtum, ergoadfe>generis cm"

fortes, fdttet Lgbthi, Acetofg^T ijferlic, Polygo-in d **FtuntH** Saratenici jen'^^yri jpeci'-t, r/l amandatidif bac Helxt?ie. EJI cntm fyra Frumenri Saracentci' fpecies fcantiitez & notis fitfi rffentialibus, net qtkquam babet (**snmnu/Sm** Convolvuu «jjiedebeus proprie diBis, nift quod fcandat atque vki-na quatjue antpleBatur, quod eji lomunt mult is izltis gencrib&s diverjmedi r^locandis, prout vtdt earum teJJ'era it tiatura ^* . - - ii-ie ultimo, ex libra natwa a **nebis** obi"

Pag. 29;. cot. • SaldaneSa maritime major, (i ibidem pi. . . , Soldancll. t. maritime mimr, C.B.P. Qrium hie dux planta laclefcant (S Jcandait, jloremque tapfulam, feminaque ip/a (bnvolmloruin proprie dicatorum more habeant, Camolvult adferibi, H cum ipfts m codem titulo dilp'oni debent, non autsm ab ipfts feparari in **ptculiari** divijione, ut feat Caffarus Bauhinus. Sed fit BraJJica maritima ff&itCti Sa>jnrst& DiofcoridM, ^Soldancla Neotericorim, rtf>n impediunt bsc diver/a Synonima quin dijp-oo&tur inter conjbrtes Convokulos, iofallibili arguments afue ultimo petit O. Ibidem pi, 111 .SoldancUa Alpiia, rotundifolm major, (gpag. 296. pi. 4. Soldanefld Alpina, folio minus rottndo, C. B. P. Soldanetta Ah ptia minor, Clus. Hiji. H(c dun plantulie vil habe>U affine cum Soldan'eUie fteicicbutprsdiclis, qua, nitidHum, Convolvuli fint perfeSa jp-ecies, tieccum praditlif convenient nift foliorum rotundorum fini* litudme, quod mulch autoribm biplantis denotnandii hucufque impofmt. Sed cum a fine ultima fint planta filiquojiz, ad fintm filiquofarum tctrapetalatum. in Seaiotte tertia ejfent coUocandie & dijpvrnd/e.

Pag. j98. cal. t r. pl. t. Jafmi, umMilitioij folii, C. B.P. Gelfeminum mdianumpinnatum, fiorefcanguineo, Ponx, Ital. Quamoilit, Cam. Cum bacplanta fit perfeUa Cottcalvuli fpecies (nont obfrinte Myriophyffi injiar foliorum axfyafitionc) vt fupra in ejafdem explications j nabif allata appJrct, male ivitur it Cajparo Bauhina alijfqw authonbus Gelfeminum nominator, atqtie injujhore titulo, a faa claffis Jimihbns Convolvuli diffungitur, & collocatit inter Gelfimitia, qiiibus nee fioribus, fire capfalis, necfemintbas accedit, ut fupra comprobavimus.

l'a.g. 46). col. ii. pl. it. Cneorum album., folio 0-leie ar<n>teo, molli, C.B.P. Dorycnium verum Plateau, Cltf. HiJl. App. t. **tiahhat** ConvohuUJhecijs perfeita, ut innuimus in explicatione Tab. .; diffungitur a fuic famlias caterts, & pejtis dijponitur inter frumes, cum q'tubus nil babet commune, prifter liitfeam fubjlantiam, cumh fine ultimo, ut docuimw in explicatione ipfiis, fit Convolvulus; proinde re&e a Johanne Pona ftalice fcribente, dicitur Convolvulus reB&s, Creticus; inepte fatia a cateris oimibuj dinominatur Cneorum five Dorycnium.

Scandentes · Poniiferae.

S E-C T. I. C X<T. III.

§ i. Cucurbita five Zuccha.

K OAO^VV 'My** IHofcoridi I. 2. c. 162. dicitur, ad differentiam 'w^mY^t de qua I. 4. c. 178. Meminit isr Tkopafu* i.Hift.i 8. Latinis Cucurbita, à curvatu., quod facile, Ji quid obtinent, quo minm extendatur, incurvetur.

Genera duo prima Cucurbit*, Plinio I. 19. c. 5. earner'arium, & pkbeium quod lupii refit: mfcit qua cogitur forma, BerUte veropenfili conceffa, jam vifa eft novemudum longitudim*. Semina qutroxima collo fuerint, proceras poferunt: qu* in medio rotundas, qu<e in lafenbut craifas, brevirefque.

Cfilabaffifeu Cucurbit* ih India ad miraculum ufque augefcunt, qu* in bac fold Provincia Chilè nafcuntur is, Capillosnuncupant: Cucurbitarum gcies. trope infihium, feu totiu* -variant in infimum, qu<edam immenfa mole monftrofcunt, qu* dijfeSt*, isr reficcat* exçavantur, & ex w vana vafa efformantur & effinguntur: ex minoribu* pccula aut pater as ingenwfe ctlatas concinnant, Jofephu* Acofta l.^c. 9. Sic Brafiliani ex Cucurbit^ liquidam pultem, Mingau vocatum forbent, Stadias defcriptione Brafil* l. 2.e. 12.

In hoc tertio capite Sectionis prim*, agemus de fcandentibus pomiferis, quarum deducemus notam genericam & effentialem, omnibus & fingulis in hoc capite tertio contentis convenientem; deinde fingulis fubalternis generibus notam ipfis peculiarem adaptabimus. Pomiferas fcandentes cauliculis donantur lends, & viticulofis, craffis ut plurimum, quibus aflignantur à natura claviculae feu flagella grandia & longa, intorta flagellorum vitium infar: folia habent vitigine5, lata, iinuata, apera, imo hirtutis nonnunquam molli fcotentia: flores integros in fundo, quinquafariajn in margine divifos habent; atque regula non variante, a fine ultimo petit^, fruifus pr-^ftur fatis magni, imo omnium vegetabilium maximi, in quibufctam faltem, rotundi, longi: cortice laevi, icabref hirtuto, tefliilato undulato, verrucofo tedi: verum non omnes flores frugikafunt, fruiferi enim facile cognofcuntur ex concepto rudimento fructus fub ipfis extuberante, qui maturi cortice confiant duro, cujufcunque fint fbrmx aut figure; diverforum colorum funt, vel lutei, albi virides, phaenicei, atque ex albo & viridi mixti, fere lineis, five maculis notati; intra corticem, cujufcunque colons extra, pulpa interna teneris adhuc eft Candida, maturis fun^ofa, five fit alba, lutea aut rubra; guftu dulcis & amara, feminibus plena diverfiformibus, quae indigitabunt ut plurimum genera fubalterna à nobis infra in medio, am pro hoca. Pauca veteres eaque obfeure iatis, de holeraceis hifce fructibus horariis omniferis scandentibus fcripfere, confufe Plinius ipfe, ac magis confufe adhuc Neoterici Botanici egere in diftinaionibus generum iubaiternorum. Nos igitur ut parum confufionem evitemus, has fcandentes pomiferas, horanos fruaus ferentes, ad fba fubalterna genera diftinda reducere conabimur, affignando unicuique generi fubalterno fua notam effentialem, feu tefleram infallibilem à natura datam, & fingulis convenientem, natura non variante finem ultimum. Adteramus igitur certiora & magis probanda in medium, Philofophis Botanicis gratiora & utihora. Cucurbita habet femper florem album: femina duabus eminentiis, fi mavis auriculis cornuwm, five fit album, five fubfufcum colore: omnia infuper Cucurbitas poma corticem feu cutem exteriorem duram & q<a fi lignoiam gerunt, crocei ut plurimum colons matura: folia fuot mollia, incana lanugine feu albida obdu&a, hifce igitur notis allatis, facile à caeteris omnibus fubalteints generibus fcandentium pomiferarum. dignofcuntur Cucurbit*.

T, A ' B U L A V.

- fi. *Lagmaria*. ☞
Majorfefftht. \$
Obhnga. £
 4. *Jndkus coinprefui^ maximus ^%oit\ Icon.* \$
 5. *Compnffus In'mor, C.B.?. Rotundas minor,*
Pa S*
Pepa-I &< >re luHo feu potim\ ^ oblongus, C. B. P, Major oblongits, Dod. \$
aureo, folio aifero y, Minorverrucofus, nobis, Indkus minor, dy-*
pcatus, Tab.% &.
 8. *Clypeatus minor,* P. *Indicus minor, dy-*
peatus,, Tab. {.
 [9. "*Pyrifonnk is Pomiformh, noiii.* \$
- Scandentes
 Pomifer < £

T A B U L A VI.

1. *Cohcynthb major fruSlu rotunda, C. 5. f.* Vera, Trag.* ☞
 2. *Anguria, Mattb. Lugd.*
 *
 [3. *Hifpanicus, I.B.* ☞
 Melo
 [5. *JEgrptiactts Abdelavi Diftus, mm.* \$
 r6. *Sativusvulgaris, C.B.P.Pod. Ger.* \$
 17. *Fkxuofusfeu anguinus Ad. Lob. Anguinus, Lugd.* ☞
 CHCKWW-[8. *Afininus, Tab, Ger. S'tlvefiris, frag.* ©
 [9. *fumceus, Conl, tfj'?. Balfamina mas, Ger.Q*

Explicat'10 Taluk quĩn'rf, Seftionis prim*.

• < " V ^ « ^ W ^ g^{enai}; a -> florealbo, C. B. P. *Lagenaria*, Lob. Obf. Ger. *Lagenaria ma-*
jor & minor, Ad.Lob. Cucurbita caules oblongos, viticulofos & angulofbs, ina-
s'ionnullas diltributos profert, qui adnatis capreolis vkina propeque ailiftentia admi-
nichu apprehendentes, furfum fcandunt, Sf in akum tolluntur: iolia admodum magna,
*lata, St nonnihl acuminata, Bardan3efere*magnitudine fimilta, fed mollia, albove veluti*
tomentouna cumcaulibus ac foliorum pediculis candicantia, inftar Althatae: flores e fo-
iiorum iinu exeunt magni, albidu, Calathi effigie in fundo integri, in margine autem
quinque latis & longis quafi lobis divifi: iruftus fubfequitur non un'ns forms, quandoque
enim lagenarum formam expdmens, qui m ventris modum excrefcit & turgescit, fupe-
reminente collo minore furfum verfus anguftiore; fubindevero venticofus & cr'ffus abf-
que collo, & in inferiore fede latior, Pyri quodammodo turbinatam (iguramreferens:jt-
V^{as} in longitudinem producitur. Crefcit inquit Vilnius 1. 19. c. 5. Cucurbita qua cogkur
torma, pkrumque & intorti draconis figurS. Libertate penfili conceflii, vifa elt habere
fruftum novem pedum longitudinis. Omnibus autem cujufcunque tormx cortex per ma-
tuvkatem durus & quafi ligneus, flavi colons: caro autem iis five pulpa interior candi-
da recens, lutea matura; iemina oblonga, plana, compreffa, fupiore parte cornuta fi-
ve auriculata, duabus apophyfibus enninentibus & quafi angulofis atefta: cortex omni-
um hujus generis fubalterni eft durus, candidus, autfubhjfcus: medulla fubalbida fimi-
liter ac dulcis- matura. Quod cito fit, cito perk, Ut vulgo dici folet, quod fane difturn, fi
illa alia de re dici poterit, certo certius de Cncurbita diceretur; tiam a (atione port ftme-
ftre aut oftomeftre fpatium perficitur.

t. C«car^ma)orfeffilis, flore aibd, fpliomolli, C. B. P. Scflilis, Match. Ep. Ma-
 or Dod. Omnes Cucurbitx unã aftate in fublime confcendunt, uc faftigia ak,iffima ar-
 attingant, autumnu autemfi vel unam pruinam fenferint, dejiciuniur, foliis Si
 pñitibus r pñifas marccfcenribus: fcellilis hie variat magnitudine, col;ore corticis viridi,
 } flavo.

flavo-candido, atque cortex in veterstis est dij^{us}, quo,ca:/ne'feu pnlpa feminibufqueex-
snanitis, peregre profici/cētes urceorum vicē frē\snenter utuntur, in eo vinum conden-
tes, quo per iter à fitis iniuria fe vindicare pofluit.

3. *Cucurbit a* oblonga, fiore albo, folio molli^{CB.T.} Oblonga, Fuch.Longi'jr,Dod.
Camerarialonga,Lugd. Cucurbita *hxc* longa[^]. SageJlis longis, farmentofis, ten^Jris, ân-
gulofis, vitis[^]riodo fe defundens, per humurnfefeprofternit, nifi adminicul. nafta fiie-
rit, quae cap^jx[^]olis fuis (quos fecus folia fingulos producit) facilè comple&itur, eidem eti-
am arboreb & pergulas fcandit, Ifefeque illis implicat: folia ex intervallo profert fingula,
fingularifo pet[^]olis infidentia, fere rotunda, ferrata, nifi anteriore parte acuminati an-
guli emerent, fubcandiantia, tafta mollia, leviter hirtuta, ampla admodum, Afari
foliis haud abfamilia: flores juxta capreolos & folia ex pediculis orta, figura liliaceos, al-
bos, integros in fundo, fed quinquefariam feu in quinque^q quafi lobos foliolave ftelk ni-
divifos gerit, intus iiriutos, partim fteriles, partim fceundos, qui fie facile interno-
fcuntur; fteriles, breves, & hirtutiores habent in medio apices, nee qua pediculo jun[^]
guntur tuber feu c^{*}pitulum intercedit, fiituri fructus fpes: fceundivero in medio tria
crafliufula bifidaque ftamina continent, nee ftatim pediculo hserent; nam inter \-p{os.6c
pediculum capitulum parvum, & leviter hirtutum, extuberat, Cucurbita futura, juxta
adnexum in anguftum collum definens, quod marcefcente flore, paulatim arefcit, dein-
de in magnam & longamixiolem, quam Cucurbitam vocamus longam, au&um mature-
fcit: fructus hie primùm frerbaceus & lanuginofus, • eft cortice tenero, pulpa Candida,
guftudulci, in maturitate flavus, cortice duro, pulpa fungofa, feminibufque plena, quae
plana funt & compreifa, altera parte acumirtata, & altera fuperiore latiufula, duabus
angulofis eminentiis cornuta, horum cortex lignofus & candidus eft, aliquando in aliis
fufcus, guftu dulcem nucleum includens. Tota planta radice nititur candid[^] inmultas ra-
diculas fibrofaf diftrafta.

L O C U S & T E M P U S.

*Ex Orientalibus enim & calidioribm lock Afa, Africa iff utriufque IndU, td nos defe-
runtur Cucurbitarum femina: fua /ponte apudfeptentrionales Europfos nonpovmiunt,
fau tamen in hortis cultis, out agrh faths fe lie iter in Gallia & Italia proveniunt, isr
perfetlionem attinmnt. Sed rariffirhe apud fePtentrionalesfemina perfidunt, ant fait an ad
maturitatem perducunt, quod apud ipfos frigidior fit. ~~in~~ ~~tem~~ ~~magior~~, ~~et~~ ~~autumna~~
feverior quam ~~loc~~ ~~in~~ ~~illis~~ ~~locis~~ ~~fructum~~ ~~preferre~~ ~~possint~~: floret Augusto, nec ante fere qu-
tumnumexalmmaturusejfruaus;fi forte per ternsefiaWn cMiorem licet, in Me-
ridional[^] citiusferitur, isr confequenter citing maturatur & colhgitur Cucurbita.*

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Omnes-Cucurbitarum dherfiformium frutlus fri&d & aque* funt natur*, ut reledix-
itflinius Cucurbitam nihil aliud efe, quam aquam congelatam; Cucurbit* ad ardenies
febrēs utrinaue Cid eft intra is? extra) minfice faciunt. Aqua ex immatum Cucurbit is
difillataardori capiti, quern fir iafin vacant, pricipue infantmm efficaciffime magnex-
perimento in linteoli* ponitur, out defettu aqu* difillaU, fuccu* pan ratwne ufurpa-
**r. Succus etiam Cucurbitje immature, ejuſve aqua ftillatitia, non tantum auriumdo-
lori inJiilUtu auxiliatur, fed isr oculorum isr omnium membrorum inflammations isr
Podagras refrigerat. CucurbiU femem urin* acrimoniam contemperat, (\$> tandem medi-
ccriter provocat. Succu* cum aquarofacea[^] aut per fe auribu* inftillatus, earum dolori
auxiliatur. Folia recent ia mammis puerperarum admota lac fie cant.* Oleum quod.è Cu-
citrbitarumfloribusparatur,iifdemdiutim inoleo infolatis[^]renum calorem (exterius untis
partibus contra renes fitis J extinguit. Capitis dolores pr<zfertim in febribus muket. A-
rid* cineres ambufta isr pudendorum ulcer a fanant. Eftur pajjim[^]fiate in cih aut juf-
culis elixa Cucurbita, turn quoque in oleo aut butyro frixa ejus pulpa, farina prim •<>-
cumlita isr uvarum acerbarum fucco afterfa.*

Nt) M I N A.

Cucurbit à Kóxo[^] Itio\$*(& diciturji Çucurbit a eduli* isr fdtiva. Quidart (tefte Marcdh) inter longa^s is rotundas earn ftatuwit diffef&itiatn, ut has Ktfwünji[^] Mas ow^x* vocatas velint. Itali Zuccas (p Zucchas vocant.*

1. Cucurbüt* *Lagenwiafl. albo, folia molli, C.B.P. Lagenaria major, P[^]Priör[^] Dod. Lagenaria Lob. Ger. Lagenaria, major, is minor, lab. Cucurbit a earner'ariajki Lagenaria, Hi/i. Lug. Cucurbita Lagenaria, I. B. Cameraria minor, Lugd. Hift. Corner aria dicitur quodcurvitate fua cameras, tefudines, tetia, ispergulasj candat is operiat.*
2. Cucurbita majorfeffilü>, flore albo, C. B. P. Seffdis, Matth.E]>.] Lator, Dod. Lagenaria major, Park. Lagenaria major, Ger. Cucurbita latior fl[^]afia, folio molli, I. B. Zuccha rotunda ^{Anguil.} Cameraria major\ Lugd. Hift. Dod. Gall.
5. Cucu/bita oblonga, flore albo, folio molli, C. B. ?• Oblonga, Fuch. Longa[^]Tark, Tab. Cam. Hift. Lugd. Longior[^] Vod. Auguina_i, Ger. Zuccha longa, Anguil. Cameraria oblonga, Lugd. Hift.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

EJX not a genetic a tfeffentiali Ciiturhita fuprà à no* } Symbolum Peponum, ferre florem tuteum £? balere
 j bis affignata, & ex libro naturcc deprompta, Cu- } femina oblonga utrinque iumida, J[^]omboidea & foliis
 curbitcc omnes jpecies florem producut amplum, aj- } vejiiri ajperisy) male hie collocatur a CgfoaroBaubinti,
 bum> nonluteums atque femuia longa > fufcaautl- } inter Cucurbit as, cunt ut patet ex dittis, debeat dijpo-
 ba. duabus auriculis in fuperiore parte jeminis pr&- } ni inter Pepones feu Citrullus, quorum fert tejjeram
 dita habent: ergo Cucurbita major ± rotunda, flore } feu notam genericam, florem fcilicet luteum & femirt &
 luteo. y foliö aji?ero, C.B.P. Indica, Cam.Ep. Cum } J[^]ombo'idea, feu J[^]ombi figura utrinque tumida.

§. 2. P E P C X

J[^]E.7πv Viofcoridi lib. 2. c. 164. Theophrastu* i.Hi.Ji. zi.isr Phnius I. 20. c. 2. de Pep-
 nibus, qu<t Diofcorides refert ; quil.iy.c. 5. fcribit Cucumeres cum magnitudim exaffe-
 ivyt, Pepones vocaru Peftnem diftum voluntfhn V T[^]miy[^]oq mature/cere, eo quodmaturitatefla-
 uefcunt.

Nota generica iridigitatis Pepones ab aliis frû&ibus pomifefis horariis, eft quod Pepo flcn
 remproducat aureum luteumve; femina romboidea ; & folia afpera. Semina affculpta fin-
 gulis fpecies uniuicujufque generis przeipuam indigitabunt differentiam genericam;

4. *Pep* Indicus comprefliis maximus, Lob. Icon. Rotundus major, Dod. Major hie
 Pepo rotundus craffos, afperos, fpinifque nonnullis obfitos caules promic pr[^]longos.,
 qui clavic'ulis five capreolis fuis vicina comprehendentes, perticas, frutices & fepimen-
 ta confeendunt, quæ nifi juxta pofira fuerint humi procumbunt: folia ampla funt, val-
 de afpera, aliquot profundis incifuris diviã, marginibus hirtutis: flores admodum ma-
 gni funt, calathi formã, auri colore, lutei per oram, quinqiie prominentibus angulis den-
 ticulati: fruftus magni, craffi, rotundi, aliquando oblongi, craffioribus rigis veluti an-
 gulon & lulcis depref], qiforum pulpa cortici fubjacens Candida, mediocriterque dura
 eft. Interior medulla fungofa: femem album, latum, planum, in medio tumidum, Rom-
 boideum feu Rombi pifeis figura, caeterorum deducendorum Peponum feminibus fimile.
 Cucumerum femine multo majus, quin & in margine habetfimbriam exterius planam, in-
 terius crifpam, cingentem ipfum femem. Confule Tabulam 5. 6c obfervabis femina Pepo-
 nibus fingulis affculpta :• color corticis quandoque obfeurè virens, alias albidus, nunclu-
 s; virentis autem Peponis cortex durior eft, ac veluti lignofus, albidus autem molli-
 C^{ac} tenerior.

Pepo compreflus minor, C.B.P. Rotundus minor, Dod. Pepo hie minor rotundas
 pñibus accedit priori ? nifi quod folia habeat profundius fciffa fiffave: caules etiam

gerit teneriores, iruftumqui/ minorem' & coti ,vjnenter femma paritcf minora, ejuftiem colons albid'i, ejuftdemquefigure cumpraxedentisTwajoris leminibus.

6. *Pepo* oblongus, C. B.P. Major oblongus, Dod: Pepo hie oblongus a prsredentibus duobus fupra explicatis duplici nomine di^{fl}:nsⁱⁿ:^{Pr}:^v, primo a foliorum finibus ieu incifuris **J**u^f divifuris profundis {aftis; deind [^]irudine, prasdupelanguitudo Iniftco; in caeteris oir-i\$biis cum pradiftis convenit: candk fcilicet caprcoljs; Hor-nt halite In-teuni intern in fundo, quinquochriamin margine/cu limbo divifum: icminu jiton.', alba, tumie^J, coruce cum fimbria/crifpa ipfa tegente. Septimo die exeuiicomucs ppiriationem cumM'ff ones turn Melones, Cucunicres, Cucurbits, ficu •& Angar; a ^{lucum} a qiuofum refrigTdntem luftundens, retert ad proventum celeriprtm .leccntior k-miqiimarrtas. Maguam PepQnum, Melonimi, Cucurbitarumque. Yarietatnn divttu'raa-iiK]t!c a .^{em}nis .tiatura dependere r;ftatur Columella. Tanta porrq t(t nature cpgnatio tnter. M^loics, Pepones feri Melopepones, Cucurbitas, Cucumeres, uc fepc prbprict; i"rcrs& *nomhn* f}ra;ct Latinique confuitcmu. Inveniesticim Meiones, etiam Pepones, alios oblongoa, .alw-; ro-tiindos, i colore nonuuHos luteos, alios viridts, atque utplminmm hi OIPIK-s foris f intin cortice **f**riati aut fulcati; iatns verb fuccofi, fungofi, feminibus in atuo liifcTarini'Jigefstis relerti: odore fiiavpmi, afpeSn jucundi/fimi, fapore vero fari^ dulces, femina alba, *fu-fca, fpadicea id efruffbatra; carnem obtinent intimam (in qua latent, femina) aquo-fam. Raro autem Melonum internam fobftantiam leu pulpani aquolam comtdimus, fed unacom (eminibns aurerimus. Peponummultcfuntfpccies, atqnt mfilto plures variecatcs, qua: figura, colore, & faporediltinguntnr. Eft **enimventricofa** Pepo, qui a pediculu ad ambilicum nlqne rtriatas & canalatus eft: aliuseft femina vocatus. qoiTninuseft friat^ST quidamtorum corjicem textura qnndam, reticulato m'iro naturae artificio, confperfo habent. Aliquoruni frufus grandis eft humani ctpitis magnitudine, aliquando eCiam major, nonnullomm longe aiinor. Sunt qui herbaceofunr. colore, "alii tlavo, alii pallido, iftiii nulli cineieo: interior quoque p«Ipa varia, in quibufdam enim nibec, in aiiiralbicat, in nonnullis ex aibo rufrefcit, in quibufdam dulcis & guftui fuavillinu: in uliisinfuavis ^ infipida.

7. *Pepo* minor verrucof», nobis. Cucurbita verrucofa, Logd. Abalua radice, folii8, flore, capreolifque non diftert, fob cortice elatis & t eminentibus (verrucarum aut achrochordoiuni modo) nod is pluribus tuberofis prxdito, a catcris in hac Tabula difpolit is dilringuitur.

• 8. *Pepo* clypeatus minor, C.B.P. Indicus minor clypeatus. Tab. Hujus fructus flavus est circa petiolam, superficiem in exteriore fructus parte viridem, asperam ar-
lofamque gerit, quae corticem mollem habet, raris fulcis exaratum, extremam cu-
terentiam, multie quasi lobis aut extuberantiis mollioribus atque rotundioribus sul-
eem succedentibus, exornatam obtinet, supremam partem dimidiae sphaerae depresso ta-
men undique, & minus convexae similem exhibet, inque medio sui foveam aliquam
deciduae floris latioremsuperioremsedem spectandam offert: cortex corrugatur suc-
cellu t

compr
primei , nnde ei nomen yp

boideo, Anguriz feminis i **S**^ **T**tafrudus Pyri aut Piri **di**, **S** decer-
9. *Pepo* pyriformis & p ; -ruce confat du^rQn hri lneis Ud, « a bo * vindi m3-
cukns arlt-ao: femina habent fatis ampla pro ex, gu, rate fructus, limbo etiam donata,
quod innuit eos esse ex Peponuni **gentre**.

LOCUS & TEMPUS.

Omne, b* *Pepom*tfrecies, pUrimgm nlis, iff varktates quoadfruBum h numer e proveni-
unt in ork manthk Jabubfis mam Mediterrami, fc, prope ofitg ejufdem mark, W f.t-
bulofis calidis, veluti verfus SanSiam Crucern, etiam hi Africa fronte, is fa & Hwc-
rum ftnihtts. Apud nos fiptentrmale, horttnfes funt, iyferatfni: y nifi <* & cali':
ficci fuerit, vix ad perfthionem pervtntnt eorum ftmina. Florent imtntte xftaie,
u* ft dto frantur in puhinh kne fimorak.

LOGUS & 'I E M P U S.

Trovtnit in peregrinis ngionibus meridionalibus &ontè in horti* *gre apudnos feptentrio- nales colitur. Ex JEgypto, Alexandria, del- t lujks femina feruntur, fed plant* vh&i maturitatem perducuntur apud nos, quia j im noftrum frigidius eft quUm, quod in to fructum'pkficerepoffit Colocynth'is.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Colocynthis calida isf fecca eft, vim purgativam obtinet, medico tantuyl utilis, nonco- quv, mfi illi qui art. em Elif* Prophet*, qui film prophet arum Cokey nt hides dulces red- debar, calleret"? ^Regum 4. Cum fit mochlicum medicamentum, null it famòr k mentis medicis, fed foils Jud*is is" Agyrtis in ufu eft, qui Hlam vino maceratam tsr decoftam ùs quos purgatos volunt exhibere foknt. Hier* Pier* Colocynthis adhibetur, fid nhnià vimlnà aut whmentia purgat^ Colon eft flavo: hujus medulla*feu pulpa arida utun- tur officin*: cortex variat colore, primb viridem ofiendit colorem, pofttea maculis candi- cantibus confyergitur, poftremo totus in luteo pallet, fitque durus isr quafi Ugnofus. Vt retundatur ejus ferox purgandi natura, ne intestina corrodat, admifeW Maftacbe & Gummi Tragacanth* monente Mefue. Cum Colocynthis fua natura tmarafit, it a quoque temptramento calida (yficca eft, in fecundo quidem* ordineintenfo; xpurg*ndi quoque non minorem vimobtinert, quam filveftrh Cucumps Dodonoti. Vinumpr*tereacalici(exempt- tà cum femine medulla) infufum, fi tantiffet in eo haferit, donec amaritudinem contra- xerit, per album purgat, ac per vitiofos biliofosque educit humores. In fumma, hujus succus habet quod Cucumeris agreffis præfuit; reficcatus vero Elaterii loco fuccedere pu- teft. Oportet colligere Colocynthidas sub finem anni, quando funt matura & quando color earum incipit fieri citrinus, ne collegatur ea qvfi viridis, vel dum habet a- liiquid viriditatis, quoniam medicam ex ipfa occidit, fed colligitur poftquam citroneatur pomum ejus, tunc qd perfecte matum, DOC qd mense Septembri, aliquando tardius. Mamefium ett quod Colocynth, qu* oritur in rupibus & locis aliis, efi fortioris opera- tionis, quam ilia qu* efi propinqua aquh.

N O M I N A.

- 1. Colocynthis majorfrutlu rotundo, C.B.P. Cucurbita filveftm, Dod. Pepo Cam.Ger. Colocynthis pomifirmts & pyrifo. amarum C'a femine & pulpa J feu Colocynth

§. 4. A N G U R I A.

Angura, * cxtms pomifensicaii Cucumerum, Peponumque. «t. Anguria farmentofis, viticufofis, aiferis ac hum! P am davicnlis, fup dittos P exterior cutis in fupra nomen latet, cujus exteri- or cortex eft duru- Melomim fimiC- medulla fungofa in fupra nomen latet, cujus exteri- or cortex eft duru- aut Ciicumeris aufdecerpti facilecorrumpuntur) fed diutius aifervari queunt, prafertim tritici acervis impofiti, referente MattWolo.

LOCUS

L O C U ' S & T E M P G ' S .

Anguria in calidk regionibus ffionti ut 'Apulia, Calabria, Sicilia, ac fimilibus meridionali-
bus lock calidis: apud feptent'konah feritur is provenit, fed non mat Href cit: floret
Augufto i femen perficit autumnò, in Italia, Hifyania, is calidk alik regionibus.

T E M P E R A M E N T U M f t V I R E S .

An^anxcaro qu<e cortici fubeft, cruda, fed frequentiu* cofla comeditur; alimentum con-
fert exiguum idque frigidum ac humidum, fanguinemque generat aquofum^ qui interna-
rum partium inflammationes mitigtat ist bilk acrimoniam is fervor em con temper.at: rruda in
ere commanfa lingua ardorem isr afteritatem knit, is fitimfedat, multo magk aqua
ejus haufta, qua It all per fervor em calork jftivalk frequenter Romautuntur: femen viri-
us is facultatibus Cucumerum ftimele eft.

N O M I N A .

Anguria Citrullu* difta, C.B.P* Anguria, Mattb. Lugd. Anguria filveftrk, Cam. An-
guria, Citrullus^ Dod. ut.Fuch. Citrullu* offidnarum, Ad.Lob.Ger. Citrullus, An-
guria, I. B. Italk Citrullus feu Citrullo, is Melo aqueus Gallk dicitur.

§ 5. M E L O .

Cucumerum genera cenfentur Pepones is Melo pepones, potiffimhn figura is quantitate dif-
ferentes: majores enim oblongi, Pepones', Malieffigiem referentes, Melo pepones C nomine ex
Melone is Pepone compofitoj dicuntur. Hoc genus Paladius Melones quos Melas id eft Pomeos,
à Malorum figura appellavit, quod nomen adhuc in ufu eft. Sicquetria genera Cucumerum ftatui
poffunt, Cucumer, Melo is Pep. At Melon Tbeophrasti Sj/cion; Plinio Cucumk Mali cotond
efigie; Melo pepo Gakni, forte Cucumk antiquorum.

Melo ab antedictis omnibus pomiferis fcandentibus horariis fru&ibus j femine cognofci-
tur minore & compreffiore five aureo live albo; à Cucumere, formá & cortice ipfius true-

3. Melo Hifpanicus, LB. Melo hie omnium eft maximus, quafi Citrullis live Peponi-
bus niajo.ribus magnitudine valde accedens; fruftum producit pedem & fequipedem Ion-
gum, & fatis craffum, cujus cortex eft ornatus fulcis & rigis, feu eminentiis & depreffionibus
eundem longitudinaliter à pediculo ad umbilicum cingentibus; quoad cseteras partes, cau-
les, folia, capreolos & flores cum reliquis fufe fortis convenit.

4. Melo vulgaris, C.B.P. Melo, Trag. Ger. Melo à recentioribus nunoipatus, eft cau-
liculis humi procumbentibus, longis, farmentofis, & aſperis, vulgaris Cucumeris modo: fo-
lja fatis reſpondent etiam Cucumeris fbliis, minora tamen, rotundiora minufque anguloſa;
noſculi limiliter lutei ut Cucumeris fativi: fruftus craſſiores, initio nonnihil pilofi, fulcis dc
ngis etiam aſteſti, qui modo contraſtorem rotundam flguram, (utin hoc) modo oblon-
gam obtinet; fubinde vero majores, quandoque minores reperiuntur: cortex omnium
Melonum cujufcunque magnitudinis aut figure (mire enim natura in Melonum fru&ibus
condendisludit) velviret, vel ex luteo viridis eft; planus, canalatus, fulcatus, teſſula-
tus aut reticulatus 5fc. Pulpa fubdita cortici, live caro ipfa qua: editur, ex luteo langueſcit:
medulla interior lutea vel aurea potius, humida, muſcilaginofa^efiuens, in qua femem ve-
luti Cucumeri9continetur, luteum ut plurimum, aliquando in peregrinis album. Multiplex
eft differentia in fruftu, non tantum colore cutis, carnis ſapore & odore, verum etiam
fôrma, rotunda, feffili, * oblonga 3fc.

LOCUS & T I M P U S .

Melones cujuscunque form* a* figur*, color*, fajak, aut odork, feruntur in Europe tar-
 nbPAmmdionahbm, videlicet in -terra fatisjngul bene ftercorata, isrfoleilhfrata 'Cm
 fecut^greperfelionematingunt apud sep\$entrionales, proper defeilumxaloris, Spote
 J>rovnyt mAf^ ^ / ^ i r i v ^ k ^ ^ ^ , etiam in fo. huc nrviafque plurimis locis. Flo-

t anta felicitate proveniunt, ut radix caudicicraffitudinemafequa turnipviva aliquot annis
 in folo illic vigeat, qu* quotannis Melones profert, cujus luxuries non feats ac cetera, -urn
 arborum amputatur, Jofeph. Acofia. l.^c.ij.

T E M P E R A M E N T U M & V I R E S .

Caro Melcnm ut teftatur JEtius, fi in ventriculo diutiut hdtreat, corrumpitur, & malwnisfe-
 bribus occafionempr^bet. Nonvero Melonum caro frigidaisr humidatfi^utvult Dodonoëu*
 nee difficilim coquitur quam rtliquorum Cucumerariorum fruttuum caro : ipfa enim Melo-
 num caro mollior, odor at a, concoSlionemfaciliorem demonftrat. Melones femper fine rhani-
 fefta noxa.fi fufficienter afokfintcotti, i? pine muturiedantur, atquene Melonum caro
 per concoftionem in ventriculo vitietur ac corrumpatur, noxamve aUquam infer at folnt
 ubique terrarum gentes, inmeridionalibuspr<efertim, eos cumPipere & face bar o'comedere
 vinumque generofum (pr*cipue ditiores) fuperbibere; etiam cum pane (ypaucofale efitan-
 tur. Seminh Peponumisr Melopeponum cremor febricitantibus utiliter ex hordeacea Ptifana
 CtefteMatthioloJ propinatw-, nonfolumrefrigratfitimque extinguit Jedobfruttiones turn
 hepatic; tumvaforumexpedit, is urinamprovocat: datur tuffientibus, tabidis i&marafmo
 affeftis : atque etiam contra urinx ardores valdeprodeft. Sedi? magis confert, fifeminum
 Papaverh cremor accedat, baccarumque Halicacabi, Malvx Altkxtve decoSlumfiat
 Melombu*, Melopeponibus in particular feftis, Ari, Bryoni* radicibu* isr Limomm fucco*
 ac capno We, quodkdic omniafuperet, fi aqua vitreh vafisfeu organis utvocant dl
 Jtdlatur, quafaciem mulieres adornant, isreoncinnam nddunt Medici cofmetici Nnmi
 na fat is evidenter fupra apparent.

5. Melo ^gyptius C. B. P. Melones quos Abdelavi iEgyptii vocant, a noftratibus plane
 funtdiverfi, atque differunt ab iisquos Chajar aomin^^^tioriini ufus in cibo non multum
 jucundus percipitur, caeterifque omnibus infipidiore ac molliore pulpa obfervantur. Ha^nt
 tamen femina quae aliis omnibus longe magis refrigerant. Qua de re omnes ea plus aliis in
 ufu frequentiore habent, aliorum Melonum femina parvi facientes. Planta haec Abdelavi
 a noftratibus multum diftert, nam fruttum fert oblongum, acutum in extremis, medium
 valde craffum & tumidum habet, Bohobab fruttui figure proximum. Habent etiam Aneu-
 rias a noftratibus magnitudine quoad afpectum diffrerentes; noftris quidem majores, cor-
 tice tlaviore, qux intus femina tantum, & aquam dulciffimam continent, quam ad fitim
 arcendam, caloremque multum in ftomacho, vel hepate, vel renibus corrigendum largi-
 jisepotant. Ad febres non minus ardentese& tertianas illiufce aquae ufus fummpere lau-
 datur, atque ab illis frequenter ufurpatur. Sunt qui diftillatione aquam tenuiorem ad fiticu-
 lofos, ftomachos biliofos, ad jecur renefque calidos & calculis vexatos fublevandos elici-
 unt, quam certe multae utilitatis eife expenuntur. Turcae, iEgyptii Arabefque per feftatis
 fummos caloresharum Auguriarum aquam frequenter bibunt; eique aliqui aqua? rofaceae
 Mofchi atque Ambrae paululum mifcent. His advenas honorare ^gyptiifeftconfuetudo,
 easlincetedendas orlerentes, haique per anmimin palea incorruptas confervant & ali-
 quando cariore pretio aegrotis venduntur.

§. 6. CUCUMIS.

Ei^{Tfi}xlw& nomen apud Grdcos Cquemadmodum Cucumeris apud Latinos Jge^r ale eft om-
 nium pomiferorum fcandentium horariorum ftucluum, videlicet Melonum, Peponum, Cu-
 cumerum, Auguriarum isr cterorum ejufdem generis, ut Guilandinm quoque notavit. Atia-

fæ« ONOU Sftip® Diofcoridk lib. £. c. r6^ . Thpabr'afii i. Hij -Vd/iis m^=i is xtwJoi. C«-
 aimerPhnio 1. 19. c 5. CucumVarrom a curvbre quafi Curvi, jtur.

Genera duo Theopbraflo is Viofcoridk, faivm isfdvefirk: iftnqu'it Theopbraflits,
 partim genera ejje exifimant, K / ^ Cuajrbt<e, partim negant: JL uno endanque genere^
 alms-meliores, ull« deteriores affinnant. ^Cucttmeris tria genera notcit^ Laconkum, Scytali-
 cum is Bcstkum* Plinim L c. de Cucuwre agtos, Melons^ Cucumms & Angurias cempk&i-
 tur; admonem, ea forma qua cogantur, crefcere fic fioreinfijtulamdeinifjoinira lon^ludinena-
 fci; fuSjungcns, Greece*/r/#gJ&rx Cztfj/Mfrwx fecitfeLaechicu/x, Sc?talksm, &Bo>kum:
 jic de filveftri I. i.e.!. is de ang^ino five erratico I.20.C. z.egit.

Cucumk inter pomifras fcacijdciKS horariafque herbas dignofcitur a fiorrbus muko mi-
 noiibnsPeponum & Cucurbitarum, deinde a tcuttucraffo, metlio vept^oia iiiiPTiicic emi-
 ienrc, & crebris fpinofis bullis quarlentenus Opunc'ce feu Ficus Indict imul'is, Ceu tubercu-
 lis exalpei-nEis aut pilia hiri'utia ornaco.

6. Cucimh fativusvulgaris, C.B..?. Dod.Ger. Lor.gis, farmentofis, ramofia & apheris
 caulibus, \<zx terram ftrapeS,. Cucnib hie latus reptat: circa quos folia anguloia, amplu,
 afera, ambicu ferrata Teu pociiis linuata-; fubindt- clavicular quajdam ex finibus peilicu-
 lorum oriuntur, atque ex finibusprfedlfrjs rlofculi eiumpunt dilute lutei, inrcgri infundo,
 & quinquefariam in margine divifi, aliarum lux lortis herbarum in liifce Tabuits dunlnis
 corttentarum more, rfulto minorea >epontw» Sc Cucurbiturim Horibns; deinde mifius
 quadaiitenuscraftli, medio venrioUfLipcrficieeminence, & crtbris (pjnofis bullis Opun-
 tis aut Ficus Indica: di^srsmuli, feu tiiberculis exaibratis fcarentes, feniipedem longi,
 primovirid.es, per niaturicatem lutei, in quorum fingifcraniparensfolidior mednlla feu
 pulpaeft, quz leceua comeditur, aneqaanl.adimtegram matufiratem pcrveneric; temi-
 na oblonga; pbna qndantcns,inmedio tumida.fiveconvexacandicant,qucmadmodum
 Melonum femina (mliirimum) ^lavdcunt. I .

LOCUS & TEMPUS.

SeriturCttcutnh vulgar is in horti*, 'phtgitte is^l tyrka mat /oca: Maio isjumomenfibto
 floret, ahquando dtiu*^ aliquattJo iafdii4x-it.-<runJitin rtyionh climafolifque cahrcm, Julio
 is Augujio T/KTifibuifrutlutedulesedii: Scptembri autem aJperfeffam maruritatem perdu-
 •tuUT,

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Omniun Cucuimrunfrigidais hum'tda. ordinefecundoefitemprks; farum autemminushumidd
 quam reliquorum hrarkrumfrufium, atque idcirco quafdoeduntur^ m'mh cito in ventri'
 culo corrumpuntur: fucci mam minusprevifant, alimentKinautem conferum corpori fri-
 gidum qtiidan, nee ncn humidum, exiguum, ac fucci haudprobi. Eligi debertt virides non-
 dummatiiri, matilri ifquidan is jam citrimafti tflui -non funt idonei. Semen frigidum
 quidemfed multo minus quamfruftits: aperkndi atque exfvrgendi vimpropterea obtinet: tt-
 rinaimovet, Jechiothobfimclianes apr'a;, pefticrt atque pulmonibu6 inflaitmatione fobo-
 rantibus pndefi, contufum is fork ahftrforii loco adbihitum^ cutem jplendidsm reddity
 Cucumk vu/gark, major quidm decorticatur, ac trartfvtrfun in orhkulos tenw/fimos, quoad
 fieri poterit, diffeatur, isperupfide duplici excipintr, ogitando eoufque donee aqueus hmor
 maximaexparte elkltur deperdaturque. Sic sgitat't CucumerU orbkuli, cum fale, pipe-
 re, oleo is-aceto cnmeduntur% wferunturqntndoqne Caryophylti vrientales. Infuperper
 totum annum confervantur. Skenim Simeon Sethi fabet dfyiza m teyiJDpa. m_w ^ toatw A
 llfv> frigida is humida fecundo gradu, ex hac autem appellatione Gennani partim
 SflSlttlcn is parthn Ourcften vacant, qu* ftc condit* is ex Batavia in feptntrionales
 • regwnes delau, OUTIICIS is ^tHt^enjS dkurtur, Afiud Bat ayes ipfus etiam Jcfulte
 Cucumers nuncupantur.

N O M I N A ,

Cucumis ~~ve~~ ~~bulgaris~~ dicitur *Cal>*. Bauhin. P. affini *Cucumk* feu *Cucumer* appellatur, is pro eo habetur quod a ius *HJU^* id est *CUCUWA* fativu* dicitur. Sativus, Matth. ? arh Sativus & esculentus, Ad. Lob. Hi/I. Eugd. Vulgar is, Dod. Ger. tulgarh viridis isr alb^, I.B.

7. *Cucumis* flexuosus feu anguinus , A.d.Lob. Anguinus, Lugd. Oblongus, Dod. Hujus Cucumeris fructus sponte nascuntur oblongi, sed arte recurvi crebro reperiuntur, quos inde anguinos vocant. Primo enim fructus rudimentum in fistulam aut tubam impositum oblongum nascitur, tunc pavitare quidem angustiore impleta in longitudinem incrementum capit: quin & crebro curvatum arte, si tubus curvatus recipiat idem incrementum; tunc fructus provenit serpentinus feu anguis modo curvus, unde ei nomen anguini Cucumeris. Caulibus, Capreolis, imo floribus cum antecedente fativo convenit, (sed foliis magis difflatis & ipsius fructus magnitudine, praeecipue curvatura, a fativo distinguitur. Dicuntur anguini Cucumeres longissimi Johanni Bauhino. Nomina satis evidenter supra apparent.

C U C U M I S A S I N I N U S .

"Xlcu* <U Viofcoridi, l. 4. c. 154. Theophrasto 7. Hi/I. 6. i? 9. *Hifl. "io." Cucwnh filve-
Jirps, Plinios. 20. c. 1.

8. *Cucumis* afininus, T*b. Ger. Eyft. Silvestris, Trag. Dod. Matth. Hic Cucumis Silvestris caulibus confertur farmentosis, humi procumbentibus & foliis subrotundis, mollibus tamen incanis & asperioribus: flores funiflutei feu luteopallidi, minores: fructus oblongi, glandibus calice exemptis fimiles, majores tamen, alioqui iisdem forma omnino fimiles (fativi Cucumeris fructibus tanto minus minores, quantum glans minor cono Pini) qui maturi ad flavedinem inferne vergentes, vel ultro vel levissimo contactu defiliunt, feminaeque sua cum liquore effutunt ejaculantes dim vi non sine strepore adstantem attonitum reddunt: radix multiplex, caerulea, Candida; tota stirps vehementer amara.

L O C U S & T E M P U S .

In quibusque regionibus calidis, in ruheribTM fabulosis *U^jqui>* incultis locis reperitur *Cucumis* afininus* feu silvestris*. Apud Germanos, Belgas, Anglos, hortensis est: Jemel autem fatus pluribus inde annis renascitur, feminibus* ex se factis provenit: floret per totum Junium, isr Augusti Septembri femina suum perficit idque tyrsim longe lateque projicit: radix ejus caerulea, longa, in multos annos durat, atque fingulis annis ex eadem radice folia, caules & fructus renovat, quod nulli ceterarum pomiferarum horarum plantarum convenit.

T E M P E R A M E N T U M & V I R E S .

Circa Autumnum Cucumeris afinini maturantur fructus, atque eo tempore ad Elaterium conficiendum colligendi sunt. Est enim succus iste densatus Elaterium dicitur, ex secundo ordine calefactum (Certe Galeno) is subtilis partium; extergendi, item digerendum habet: folia Cucumeris silvestris, radices, earumque cortices, uti vehementer amara, ita similiter quoque excalefaciunt isr extergunt, sed minuetur amen quam Elaterium: Expurgat autem istud Elaterium bilem, pituitam, aquosamque humores quosdam quidem valenter, ac non modo per ventrem inferiorem, sed (? quandoque per superiora. Dosis a femiobolo ad obolum, pro virium proportione: cit idem mensis in peplario subditum: naribus cum latte infusum, oculorum in morbo regio colorem emendat. Paratur ex fructu hujus medicamentum mochlicum, Elaterium dicitur, cujus colligendi conficiendique rationes in Dioscoridis pluribus verbis refert. Elaterium b&-mu. <> Dioscoridi l. 4. c. 155. ex Theophrasto 9. Hifl. 1 o, dicitur: (agitarium vertit Galenus, forte quia motu turbatorio corpus trahitur.) Elaterium Plinio lib. 20. C. 1. Hoc Dioscorides ex succo fructuum, addito extrahendi modo; Theophrastus ex femina (fructum intelligens) liquato; Plinius ex succo is femina expulso fieri scribit. Hoc ab imatu ad decimum colon candido utitur, Viofcoridi, & ginet; quoque

anno

anno antiquius non est ->is? quod virefcit probat". Theophra^ omnium medicamentorum diu-
turniffimum, 4& optimūh quod vetuiffimum. Flinius ex fhe^braflo 9. Hift. 14. ducent-
tk annkfervatum memihit. HocWippocrates vfus fuit, nunc veroooh eju* vehementiam^
non facile ufurpatur. Elateriumptimum quod leve isr candidum, is igne inftar pingue-
dink acccnditur-, Bellon.

NOMINA..

Cucumis afininusflvefirkdiclus, C.B.P. Agreftk, Eugd. Hift. Silveftris, Trag. Matth.
Fuch. Dod.ut. Cucumer Elaterii fihetrk, Ad. Lob. Cucumer afeninus, Tab. Ger.EyJli
Silveftrp5feuaftninu4, I.B. Err at km vel aftninu* Gefn. Hort.

CUCUMIS PUNICEUS.

9. Cucumis puniceus, Cord. Hift. Balfamina mas, per. Park. Hie perexiguus& tenuis
Cucumis cauliculis aliquot tenuibus, gracilibus & viticulofis vicina quzeque conicendit 6c
capreolis fuis ex alarum finibus prodeuntibus eadem apprehendit: folia non magna, la-
ta, glabra ac mollia, in quinque partes diffefta, quarum finguk ambitu circumrofe: flofcu-
li ex quinque petalis aiediocris magnitudinis, fed omnium horariorum frucluum minimi,
ex albido in luteum aut viridi-herbaceum elanguescunt: fructus oblongi aliquantulum in
medio tumidi craffiorefve, ovi columbini magnitudine, & fere foFma, fed minores, faltem lon-
giores utrinque in mucronem obtufum definentes, feu utrinque in conum fastigiati, medio
ventriofa fuperiicie crebris bullis fpinofis Opuntix feu ficus Indies inftar tumido, ac velu-
ti tuberculis fpinulis aculeatis innocentibus donato,feu fragis fpinofis frudus cujufdam Fra-
gariaemore exaferato, quj per maturitatem foris intufque rubet, fponteque iinditur, in
quibusfeminalata, fimbriata, nigra, aut fubnigricantia apparent, ubi inaruerit fru&us.

LOCUS & TEMPUS,

Non nifi fatu* hie provenit in hortis^ meliusque inHifpania, Italia^GallU meridionalibu* ca-
Udk regionibu* proficit, quam in Germania utraque, Anglia, Belgio alii/qua Septentrio-
nalibm lock, ubi tarde floret isr nunquam fruffu* fuos hie Cucumk punkeits, aliquando
lutews, atb perfeftionem ferducit.

TEMPERAMENTUM 6c VIRESES.

Obtinent fructu* hujus Cucumerk punicei, turn etiam folia, eximiam reficcandi vim, cum
moderata quadam frigiditate tempefiei medU proxima. Vulnere recentia conglutinare folia
impofta feruntur. Cum vino verb affumpta coli intejlinorumque dolores fopire, is? ruptk
convulfique utiliter exhiberijudicantur. Oleum in quo fruS{u*(exempo femine J vel info-
latur, vel in aqua calentis balneo decoquitur, aut in fimo equino maceratur vulnere in-
flammationes arces, idem facile ac cito unit ac perfanat: doloribus ac ulceribus manumiffa-
rum auxiliatur: uteri exmceraiwms mjectum curare pojje exijtimatur: punctvsac vuine-
ratk nervk utiliter adhibetur: adverfus combufionem ex aqua, oleove fervente, ferro ig-
nito, vel ipfo igne, multum confert: cicatrices extenuat: ramices quoque bujus unftione
fanefcunt, ft foliorum pulvk aliquot diebut interea exhibeatur. Steriles quoque hujus oleo
fecunda* reddi affirmatur, ft poft balnei convenientk ufum partes circa pubem ac uterum
ifio unguantur, ac demum muHer viro mifceatur.

NOMINA..

Cucumis Puniceus Balfamina mas dicitur, quod ex pomk ipfius mark maturk, oleo in^Mk^
infolatione oleum feu Balfamum Cut Chirurgi vocant J ad vulnere confolidanda pr^ftan-
tiffimum conficiatur. Cucumk puniceus, Cord, flift. Balfamina mas, Ger. Balfamina Bo-
m^fera, Gefn. Colttc. Balfamum feu Pomummirabile, Trag. NonnullkPomum Hierofo-
Umitanum. Balfamina cucumerina punicea, Ad. Lob.Tab.Momordicafructu rubefcente,
fyfi Chatantky Vod. Cucurbitafompbos à Gr^ck appellatur, quibusdam Italk Viticel-
la.

la. Balsamif&u m Situm qubd maturum pomum inioko mamahim, fit ad mutia
tittle velu&apobatfr)

HALLUCINATIONES. CA^{SP}. BAUHINI

Aliorumque Anthorum,

Cum KfilytPu T>oA., u. Cummis Jfiwfr, fab. [met jam phribm imk amis facile rtnafatur afferent? Dodmw, M<< i*mt* ex radlCE

hoc mlocoDedonxus, \$ hmc ftUfrmApLatoir Ur wmacrinMi nam at tadem radut folia, en* /< , Mm O fruSum, ptr flunmos anws Produet maturum qm fuccum V fimm» v_e/ frontevit hvi contailu lo gt « Mest in in i^oite Mafm admirtione, & t, atue sese ex iisdem propaga. , mphnbusiow urcumjlifc.. uilibili radice ma pullulan. que plantula sicut e seminibus Pag. 306. mas repens , C. B. I. m>jt adiubetur r*p2 S

ahbi a Cajp. Bathina titnijque atitt/ertlut, rum copreo/is scandati repete & jerpne convenient radi- ('bus tantnm , praprie loquendo: deinde cam jit Ctcttmem perfiUa jpeciet a jioribt & fraBu, male dij- jungitur a tateris jute forth j jtilictt Cuctmerum cfaffi, pagina no, tntentorum i & toifatatiT bast, lod.a ff Baubino (propter ufum) cum Baljamina fi- mina toto tale diverja a Cucarnertj ijuumqut Baffamina j'tmina perjictrofota rubra> & Bitljhmina ittea, ex libra nattiric mihtnt fab eodtm gentre, propter paritatem cum in figura fiararrt, turn jHiquarum, debnt alto amandari ad fiivm jiliquofaTum tetrape- talarum, ctiamjt fnt plantsc filiquofit fat generis, nan vert ittrapetaU, at flare innatrfcet iu StSionif }. Tab. is. tpxticatione.

Scandentes Pomifene & Campanulas

Suis propriis generibus ackptante-

S E C T. I. C A 7. I V-

EX quibndam libris nuperrime nobis visis, & exactiore tmtina perpenfis omnibus qui nunc ad manus sunt his varia: scandentes Herba; nobis itfo obviamdcedere' •>* circo eafdem in hoc -ultimam' hujus Sectionis primar ^ T ^ U ^ A ^ A ^ A ^ A tan<5 uan pendiccm, prsdidis Scandentibus wramque **genenbas** fubakernis addendas, opei t qnd q x rpus.

T A B U L A VII.

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| Cucumis- | { | 1. <i>Egyptiacus reticulatus</i> five <i>Luffa Arabum</i> , Vijlivg. in Atpin. dt Plantif JEgypti. Pcpo Moptim rmcultatm (afmim rbomboideoj noih. |
| | | 2. <i>Luffa Arabum</i> tunc fere frufiu. |
| | | 3. <i>Egyptiacus rotundifolius</i> , CBB. P. Chatt JEgyptih Cucumeris genus, P ₁ Alpin. de Plant. JEgypti. |
| Scanden-
tes varia
addende | { | 4. <i>A. Skulns</i> , annum, aerukits minimus, capfxdd binU ad bafin folkk cbkngis cinBa, nobis. |
| | | 5. <i>Africanus minimus</i> , Park. |
| | | 6. <i>Onquefoliu*</i> Jfyptiacm Vellingij in Profp. Alph.de Plant. Algp. |
| | | 7. <i>Maritime major</i> Italicutjnuatofw auriculatopotius folio, nobis. Marithn/fs nofter Ferrant. Imperat. |
| | | 8. <i>Ramo/ite minor</i> , nobis. |
| | | 9. <i>Perennis htmoclitus</i> , floribm kerbacei* , capfulk foliaceh Jlobili in-flar^ nobis. <i>Lupulusmasisrfmina</i> . |
| | | [10. <i>Idem</i> feu <i>Lupulus filveflris minor</i> , sine fructu. |

TABULA VII;

		(i. Fungiformk, \-Ger. Pepo Indicts minor clypeatus, Tab.
	Cucurbita	2. Indicaparva, I.E. Cucurbit* parvum genuspicgni magnitudine, coy- (tice rubro, maculk afferpo^ isrfemine rubro, Johannk Bauhini, C.B.P.
		3. Minor angulofm Tabernemontani, I. B. Pepo Inciicm minor 4. Tab.
		4. Seu Melopepo latus clypeiform abfque capreolis, nobis. Cucurbit a clypei- formk Siciliana, IB. Melopepo clypeatus, Tab.
Sca?iden-	Pepo	5. Maximus clypeatus, Ger.
tes 2:5:1:5		6. jti/zor clypeiformk Virgin, torulis isr fulck apeđicuh adumbilicum duffk;
addend*.		7. Mofchatelinus, rotundus, parvus feu Melo Saccharinus ditlus, I.B, Sacchardtus; Zo3. Ger.
	Melo	8. Melo Mofchatus comprefus*, major fulcatus, wffo*.
		9. Melo Mofcbatus oblongus o maJBi" fukatus, nobit.
		110. Melo Hityanicus Tabernemontani is? Gerardi, Melohngus, I.B,

Explicatio Tabul* feptim* Seclionis prim*.

CUCUMER - E S P E R E G R I N I ;

i. **C**ucumis ^gyptius reticulatus five Luffa Arabum, Veiling, in Profp. Alp. de plantis iEgypti. Addendus est hie peregrinus Cucumis perelegans cseteris sua? fortis Cucumeribus, supra explicatis in fine Cap. 3. una cum Cucumeris genere Cliate ^gyptiis difto. Hie Cucumis Luffa Arabum di&us, cibus quidem est inutilis, parti um tamen omnium elegantia fpeftatiffimus. Arabs in cujus horto prope Cairum urbem crevit, Luffam appellabat, Veflingio poftea Cucumis ^gyptius reticulatus nuncupatus. Hujus femina ad inclytum Botanicum & nobilem Venetum Nicolaum Contarenum a domino Veflingio tranfmiffa, & in ejuſdem plus quam urbans Florae amceniffimo pandochio, plantam cujus iconem hie adferibimus cypreffam dederunt. Foliis donatur hispidis fufcam viricjritatem pallore^hinc inde diluente, atque eadem divifuris inſequalibus profundius laciniata funt, Bryonias aut Balfaminx cucumcriae potius folia ſemulantur: florem edit amplum, ſpecie venulium, languide flavum, friatum, induſto aureo pigmento largius circum oras faturantem. iſcm ftamina capaci finu plurinia demittit, quibus appendices grandiuſculas flaventefque conneſtit. Caeterum planta ipſa numerofis capreolis iiffructa, quaquaverfum feptabunda, proxima* quaeque cincinnis fuiſ longis implicat: -fructum *promit iempedalem ab anguſto collo paulatim tumente, ventre gravidatum, fuperficie modo laſviorem, mpdopaffim verucofiorem: cortice velatur tenui, ex obfeurovirore, pro maturitatis gradu plus minufve fiaveſcente, eum vel nulli vel tenues excavant fulci, in longitudinem tamen atris lineis eleganter inferipti, a colli principio ad unibilicum veluti centrum fuum commeantibus. Cum fructus bene maturus, cortice remoto, numeroſa in conſpectum veniunt albicantiaii- lamente a fucofiore medulla ſtipata, miro adeo ordine contexta omnia, ut plane fateri ne- ceſſum fit, non eſſe rude & tumultuarium hoc opus; fed quod egregius artifex excogita- verit priuſquam fecit. Id enim evidentiffimum evadit, cum quis jam tabefadla pulpa fim- plicem implexum inſpicit. Sinum plexus hie triplicem effbrmat in longitudinem, in quo femina copioſa, Candida, cortice nonnihl inasqualia, laſrefcente vero medulla Melonum ſemula, junctim aſſervantur. tlfus hujus fructus poſterTori Barbaro non fatiſ exploratus erat, in balneis tamen publicis, dempto cum femine cortice, plexum filamentorum fuco fuo ma- didum, tergendis corporibus adhiberiafirmabat, quorum cuti morphae' faetidaeque vitili- gines infederunt, malum ^g^P^o familiare. Reticulum ipſumſi quis triverit, Lini mace- rati neſveis veluti fibris piſeditum agnoſcet. An igitur quemadmodum ^Lthiopes & Indi authore Theophrasto e laniferis arborum pomis, aut Arabes (ut ſubjungit Plinius) ex Cucur- bitis in arboribus genitis lanam para bant, ita hoc plexu decenter arefaſto, malleo ilupai io contufo & corticato, fimile fieri poſſe haud facile negaverat Veflingius ipſe.

2. Nos Cucumeris Luffa difti Arabibus, exactiorem floris & fructus Iconem, etiam ex Veflingio in Alpinum de Plantis iEgypti, exhibuimus in hac Tabula.

%. Cucump ^gyptius rotundifolius, C.B.P. Chate ^gyptiis Cucumeris genus, Alpin.

de plantis Egy J/ me minora, afcidiore & jotjindiora nofratis vujgaris
 Cncumens: I [m .fit-rant a pracedentiomfruaibis, recen.es enim ftmt vi-
 rtdes, venl r medio (AbdclaviMelcristomodoliipra explicati inter Melo-
 nes cap/, , (urns - ^es, feennum longitudineli akionbus liris & torulis canslicuh-
 ti ieu (bleat i. Colitur to i. /Egyptiacis ficut Cucumis fativus apud alias genus: floret ici-
 dem eodemcum fativo tempore, atque earundem est virium cum fativo. Fruchs huins
 ab^gyptusMedias ebncitantibLsponiguntur, qni tempore feblium seftos fedant, eif-
 demcrudosconiedendosconcedunt, fed maxinie peftc affeftis, quibus fiimme conducere
 vulgo illiccredntur: luccum cam dep wfaceo & latte adhitent podagricis doloribus, ft
 cauia ruent: calida. Aquam vero fljhtkiam ad jecoris incendia extinenenda, rnes •»-
 nammatos fedandos^tque eonindem calculos minnendos, per multos dies aegris pnspinantl

C O N V O L V U L I P E R E G R I N I

4. C^W^SLcuhisannuus, o q l w , minimus, capfula floris binis foliob'scinf **hi**
 nofais. Sculus minor, Hore parvo au^ulato, Boccon. CoSvolvoInS hie omnium minimus
 quoad horem carule, - mi, lub pnmumexortum e terra plnrima procrudit folia, denfehumi
 firata, subrotunda, qux mucronata feu in anglam acatum definunt, atque ineunte a-fta-
 te viticulosos profert taiiiculosbipedales, quos ampleftuntur furfumyferfus folia ad bafin
 subrotunda, verfus v, lh ^r-r • i >xtreni um a cuniin i t . aM & in mncfonem defincntia, ac per longa inter-
 wil altrnat«m long,s ped.cd.s pendentia ; ex finibus inter- caulem & folia latentibuso-
 aunrur nolcuh omnramConvolvulorum nobis adhuc viforum minimi, campanulati, ex-
 rulei long,onbus panterpctiolis innixi, quorum calicis bafin cingunt bina foliola angufta.
 lo gmfcua, exoppofitoadnafcentia: floribus fingulis minimis, «rulcis, campanulatis
 contlnent ?!, T^UnC ^ ' ^ " ^ branace., rotund^ tern is loculamentis fejun&r, .
 fed raro n , r T^TM " ^ ' * « aliorum Convolvulorum more. Obferva aliquando,
 VJ A ^ at ? r a lemina tan tum htere in capfula, fepto membranacco unico diimente
 D oJer in T femina ' ? * ^ " ^ m m ^ ^ ^ ^ aliis. fcepe cernere licet,
 S 2 1 n r r 7 r t r a n i C a l , aUt folL < An Convolvulus Atricanus minor Part, fit **eadem**

plane ptancidobitatnr, quia non habet ex Icone bina iUa foliola cingeneia bafin calicis.
 conciidimus ene differentes fpecies, fed aliis'utrnmqoe hunc Convolvulum rite exami-
 nannboscontroTCrfiam hanc impnefentiarnm d.fcutiendan, relinquimus-

5- *Convolvulus* ArVicanns minimns. Park. Hie nan iW*«c, fed ant bnmi caubculi
 Hernwirar, aut aliquando erefti ftant ; folia funt minima, fubrotunda, plunmis ve-i.s
 a coltamedfa, feunervo medio ad marginem foliorum tendentibus donantur fingula, &
 juxta appofitionem fingubrum foliorum akernatim poficorum coufpiciuntur- pctioli
 injKlem exorti, nnciales, fuffinences flofcuios campanulatos: fingulis floribus mar-
 celcentibus & decidennbus fuccedunt exisuae capful* fubrutundae, tribus loculamentis
 ieparaca, pellicula membranacea trirariam eadem dividente-, atque in fingulis bina mi-
 " " " , atigulofa interii),continent«rfemina exterius rotunda, ficnt in antcediftis omni-
 WMWnvolvnlipieceibuscontingit.

• 6. *Convolvulus* quinquofolius ^yptiacus, Vefling. in Profp. Alpin. de plant.^gyptd.
 Convolvulus Arabicus, Profp Alp Exot; Eleganftecplanta icandens, ornamentum eft
 tapetiisAlexandrinis confpectus ilihortis Arabum, adeo utmatrem puVhranj Arabea ipfi
 C ^ 1 r 1 v m e l l A f f i T i i o m m i c o u . A f f i r e , c a p p u l a f e m m a l i & f e m m e , e f t p e r f e f t a C o n v o l v u l i
 lpccies, non laftefcit, in hoc conven'ir. cum Convolvulo argenteo Altiase folio, C. B. V &
 Convoivulo fpicafolio tob. fupra allatis. Diverfa mi hi omnino videtur fpecies a r'on-
 yolvuloquinquetoiio ^gyptiaco C.B.P.& L&* partibus difpaiibuf. Radice enim con-
 itat longa, Ugnofa, fibrata ; caulis beneficio, &££ reptatu admimciJa omnia tranfecadit,
 & qiioconque trahes retrahelve fequetnr. A caudice exeunt virgube numerofk & Jenta;,
 five umbraculum mediteris , hortenfemve fcenam , five conchyliatis omnibus & bi-Huati;?
 Xtuftiora parietum peripetafmata elites, prompto fiexu dutloris arbir.riu.ro admit,
 tnttj folia longiufcnle produfta petiolis infiftunt lito virore ftrata; feptenis laciniis pro-
 funde difcriminantur, quarum interiores additamenta fua quoque nafti funt: *icd* prarci-
 puam plants ornamentum fios eft, quem feciindo partu, non femdquocajqnis producir
 quique vulgati Convolvuli ttoribus eft amplior, calathi aut campanula: eftgie. Is fi p^
 fuavem naribus halitum , faltem anicnamoculis casulam purpuramque ki^itev"explicit" '
 radi: 3

radiato foliojum emblematic confpicnus. ^Sinum ob'lcui. Vnb. - in quo brevjs exfurgens columelia lepidut' caput innumeris ftaminuiis hdu. > >'; flos diffiflis umbris a. folē expergetjctus fefe dilatat; eodem in . raiiu. ^fis oris connives: abeuntem ad **Hclperios** Ib^em, hiilcis dcnuo la bei .Jiande falu. . iquodc.*- inde noftis neniini copiam fe vidend) faftijrus; tandem flaccido flore, capfula: Jcle pi^{alc}-runt (Linl capitula quoad magninidinemafmulantes) ternis iocu la mentis diftintte, membrana pellucida (marufo femmc) feparanteioculanienEa-pnedi&a., in quorum fingulis bina Itmina aliorum Convolvulorum more, Orobum magnitucline liaud fuperantia, fuica k-vi- que lanuginofa reconducitur. Ex diftis facillimunicfit diftinguere bane Convolvuli Ipe- m a Convolvulo j^gyptiaco quinquefolio, fupra in Tab. 5. explicato, primo a cbrtice virgulas involvente fcabro, fecundo a foliis latioribus glabris, & ab, amplitudine ^oruni deganter purpuio-caeruleorum: quum Convolvuli quinqueiolii /Egyptian fupradifti foia hirfutie fcateant, atque dd appofitionem pedjculorum cum cauiibus quatuor cern;mtur fbiolaj denique flores multo fiint minores, ex purpura rubefcentes, aut expanfi vinofi colons "funt, ipfaque planta ex AlpinS de Exot. A^abica eit; Hortbus rere innumeris redditur oculis fpectatiflima, quafi umbel]ame, fbrn>aitibus, qui fuut fimul 7. 9. ac ali- qnajido plures.

7. *Convolvulus* maritimus major Italicus, finuato fcifauciculato potius folio, nobis. Hitjus fuccinfihiin dedjmus deicriptionem inter Corivolvulos majores, & Tub Soldaneliarfeu Braffica; maritime nomine aCafp.Bauh.& authoribuspioponitur. Ad mare (inquit Ferranres Imperatus) fe expandit fupra terrani ad >;vel 6. cubitos, folia habensjneifa finoata fea potius auriculata ad bafin , crafla , faporis falji: fiores Campanula; forma albos habct; femina continet in fbliculis triangulis hirfutis, ^**oldanella**; maritime niodb,cni omnino in omnibus (piarter folja) congener, & quiaviribns illius fimih, ejufdem eftcum ilio ufus cum e terra prodit. Eft herba laftifera. Hiftoria Lugduncnfis in App. hujus Iconem ex Rauwolfio ponit, te Braffica; maritime genus inferibit, quod **abinctnisMeahendi** aRhafe ad Almanforem Corrigiolam nominari tradit. Sed *ncc* Menbendi, necCorrigiolae nomen alteri fuat *BrsiYicx* marinas Rauwoliuus attribuit, verum Scammonia; Monfpobenfi, Folia tjus (utidi£tum) quaedam funt iaciniata, quidam non; onuiia tamtn parte fupcriore fiuuata icu atincalaca, ut **appatec** in Tabulae tertie planta 2% & in Tabula *hac fepcima largius tota ipla planta denovoexhibetur.

8. *Convolvulus* ramofus minor, nobis. Hie acxteris omnibus antcdiftis liac nota fpeciali jdiftinguitur, qjiod fmguli cauliculi in plurinos ramoa bifijreationibusfuis findantiir,atque etffinibus inter caules 6V folia protrudantur 'iiores campanulati, quibus fuccedant capfube & femina, citerorum Convolvulorum fua; familias modo. Nomina Sf nafales in titulis fuis fatis fuperque apparent, ejnfdemque funt temperament!, earundemcjue virtum cum praedicris (fecundum magis & minus) ratiocinando ex libro nature, leu a fine ultimo, propter conibrmitateni in floritjus, capfulis feminalibus & ipforum (eminibus).

L U P L I L U S.

Lllpulum a Pliniol. 21. c. 15. *Lupum fal'Manvm noimnatumvoldnt: qui Mtfteco 2. Purg,* 24. *Volubilisfolm afperis dicitur: hodkin Grgtia Bpui> mrninalur.*

Sativus eft is SiheftTts, magmtud'me differntes: fie Siheftrk forum corios minorts, rar'tores, paucioresque habct: aim Lupulus formsfruftu card: 4& contrafruftum fmns nonflore.

9. *Convolvulus* perennis hereroclitus, floribus herbaceis, capfuls **feliaceia** ftrobili in- itar, nobis, Lupulusmas&femina, C.B.P. Cam.Ep.&Hort. Hxc herba Convolvuli he- terocliti fcadentis eft fpecies, q'ae amplexu vivit fif perticas aliaque adminicula Cauiibus fuiscircumiigando fcandit. Cauliculos promit longiflimos, afpecos & birfutos: folia quo- q«e affpiiJ, lata,angulofo, Vitis atjt Bryoius ab3E potius familia ; verumtamen magis viri- dia & pancioribus inciuris divifa; flores e fummis virgutis raceniatim dependent parvi, herbajei feu fubalbid: quibus fucceduntfruftusquifolliculofi & haudmugnifunt, itfobi- li inftar ex foliolis imbricatinfleie contegentibus, feu ex cenui bus membra ins iquama- tim sed laxefatis compact!, colore fubalbid, leu ocbroleuci &c quafi adpallidum. coloiem vepentes : gravis funj)odorif, in quibits tatetfemen exiguum, (iigiicansrillacile poll,ltrobi- lo<exficcatos exicidens; radices tamen vivactsfibi invicemimplicantur.

Io. W*;fi! % ftris, miner. ex primo intuitu omnium pa'ium apparet in ipfa plan-
tagentefpontem.fep.bus Vde .cones fafi & filvefri,lift fineTaLn. fcreferamur
ad icandentrsrferbafhet.rochtas, poft Nafurtium IndiWfc Halitacabum pffim, ve fo-
num diffum, in fine Cap. 2. explicatas & Tab. 4» feujptas.

LOCUS & TEMPUS.

Lupulus nascitur inter

feu conis nitentes, rariores par... m athl u ? r o f e r t . - q u i n i s q u o a d L J s f a r L m i n o r
est fatiod, hoc contingit omnibus fibogar

no refibile et pingue defu < erat folium, atque cultura multo letior exit. Coni tam filveftris
quam culti feu fativi fape flores imutiles edunt fubpal-
lidos, qui ftnefruffu pereuntes inpoili-
nem luteum abeunt, unde ferilis feu femina auctoribz dicitur faliquando poftflores decidu-
os femina fubnigricantia profert & mas dicitur. Floret tam mas, quark femina^ aut fertiHs
aut ferilis aut om... aut »om... atfolus Masproducit femina tftate. Septembri colli-
guntur con
autem nov
f p r . ^ n l * q m a d b i c r e c e n t e s * i m a h a t i - >
f ^ - q u a ^ - u ^ ^ ^ ^ ^ 1 p e r t o t a m T M ^ o * f t a t e m p e r t i < a s a p p o f i t a 5
^ m ^ ^ f ^ 7 ^ m ^ e ^ s ^ W u m f u m m i * p e n d e n t c o m f t r o b i l h e . q u i
fiantrllf > * M » * f T M P r < d i c l u m c o l f e r v a n t u r , i s p e r t o t a m h y e m e m f o U L
2 H ^ m ^ ^ ^ ^ < * P t r e f c e n t i b u s c a u l k u l i s , i s e o p J c i p u o n o -
mine bic collocavim* inter herbas Scandentes, non autem Scandentes caulibus. is lignea fub-
fiantia donate plant as fub finempf_m partis locate*.

N O M I N A .

fcoftvolynlus/^f«a» kteroctitus, floribu* herbacels, capfuHsfoliacekftrobiliinfar.nobk.
ffiTMTM**, C.B.P. Cam.Ep. Sativus is filvefirk, Trag. Lugd, Saliclarius,Fuch.
Vod. Gall. Gefn. Hort. Lob. Ccuus mits feptentrionalium quiapatentiffimos Lupulocon-
Jitqstratlus aSfuam cerviftam conficiendam fedulo colunt feptentrionales J Gef. Lupulus
Jalittarius Cquod falices fcandat) Ad-Lob. Lupulut femina cuifollkares funt fruttus
is mas qui feriles habet floreš I. B. Lupulus* femina, C.B.P.- is- Cam. Ep. Eft
<sr,Sbontaneus, quineutiquam d culto feu fativo difert nifi partium ten^itate, quemad-
modum omnes omnium generum Plant* cnltura is mangonio Utiu* is felicius provenknt.
Sterilh Cui diffumiflofculos produkt fubpallidos, qui tamenfwefrutrupereunt is inpollinem
luteum abeunt. Hoc familiae eft quibufdam aliisfubalernis herbarum generibm, ut Mer,
curiali annu<e, perenni Cynocrambe ditt*, & mcan* maritime, (qu* omnes in mar em is
feminamfeu tefticulatam isr(fibiataam,ffft mausis,fgerildam is, fnerillemm dividuntur J Spi-
n^hU.Cannabinofirati, ifCannabi Contarenu Omnes h<* herbarum frecies (is fiqax
ali* hujus faring detemntur) producutur indifferenterexeodemfewneautte/liculatxfe-
mine cas fe, aufi fpicatae feriles quauu, s priore s omnes u t p l i m a m d i c u r -
tur mafes, pftiches aute m f r a m e . e x m a r i t a m f u n i e J a t o p r o c r e a t u r u t r a q u e m a r i t a s ,
feminafpicata non fe feminibus propagant De bifce omnibuspropnk fia, locis difcremas,
h*c obiter impr<efentiarum d'mfft f'fl'ciat,

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Coni Lupulif_umca;iidi4<yfici,caput*peimpetunt is idem facile impknt • odoregraviore ip-
fumferientes; ejufdem temperamenti funt is folia ipfa fimul aperientia is abfte_mntia.
frimi turionesfeu Aparagi Lupuli vere erumpentes mitiores multofunt, is inedulcia reci-
piuntur; obleSlamento tamenmagis (ut ait Plinius) quam cibus. Nam alimenH qui-
dem perexiguu conferunt; profunt tamen vifceribus is aperiehdo, is urinam movendo;
Jesilwrem etiamahumfacmnt. Tenenores cauliculifub exitum e terra, turiones, ipfique
que conijecur is Iif*m ab obftrutlionibus liberant; fer urinas expurgant; fanminem
pmdant: adverfu, dmturnasfebres fc ahem is cut is fStates dec Ja in fer o lag* p*.
Jesilwrem etiamahumfacmnt. Tenenores cauliculifub exitum e terra, turiones, ipfique
que conijecur is Iif*m ab obftrutlionibus liberant; fer urinas expurgant; fanminem
pmdant: adverfu, dmturnasfebres fc ahem is cut is fStates dec Ja in fer o lag* p*.
Jesilwrem etiamahumfacmnt. Tenenores cauliculifub exitum e terra, turiones, ipfique
que conijecur is Iif*m ab obftrutlionibus liberant; fer urinas expurgant; fanminem
pmdant: adverfu, dmturnasfebres fc ahem is cut is fStates dec Ja in fer o lag* p*.
Jesilwrem etiamahumfacmnt. Tenenores cauliculifub exitum e terra, turiones, ipfique
que conijecur is Iif*m ab obftrutlionibus liberant; fer urinas expurgant; fanminem
pmdant: adverfu, dmturnasfebres fc ahem is cut is fStates dec Ja in fer o lag* p*.
Jesilwrem etiamahumfacmnt. Tenenores cauliculifub exitum e terra, turiones, ipfique
que conijecur is Iif*m ab obftrutlionibus liberant; fer urinas expurgant; fanminem
pmdant: adverfu, dmturnasfebres fc ahem is cut is fStates dec Ja in fer o lag* p*.

vetidkat. Orvifia contuotiditur, copia tamen nimia amarorem ¹*, & cspiti, ²<rovo. ³^ruaedu-
 m<okfioremeffcir. Semen mpuli lumbrkta ventris necat, ⁴re ft., ⁵uran-
 J/. Vulgufeti-vetuUSahhtinticenfeSifapenumero medicinal. tur. Eju\$ J BS-
 " (Ifif wiw libr<z probe lotas & h fordibus repurgat, ^er noctei, in aqu<s lib. b. nattra*
 b>f, pnjiridk in ilia ip/a-aqua, ktorgm fuma experte, ad tertidtpartis confumptio-
 nem coquebant, vel etiam ad mediam partem, fi veemens effer alopecia. Decoctionem fer-
 vabant in ufum, ejus uncias octo mane agris jejunis propinabant, deinde stragulis injectis
 sudorem provocabant, addebant interdum Apu fve Seljui bortenfis duas aut tres, & gra-
 minis aliquot radices, nonnunquam etiam uvas passas a gigartis purgatas. De ceteris facul-
 tatibus vide Job. Baubinum pag. 153.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque AL

I'pahs floreiU frutU caret \ & contra filvtpis
 nj frūBum fereis non jforet. fydarjnitndas imrji
 In A. Bnuhiims, £!! cjiis fequacei ncotcriii, mutuati ab
 iblo in lirjtorijs fitu untverfalilius, cticntwitcj in re
 tarn manifejia; nos contra cijfrimns Lupuhim c/ete-
 rafque itic citata hcr/as cm/us, jraitam fercntej,

fiorerep, itatias, tUindt fruUtm ferre, ttviderefi.
 m Ltipnb ipfi, Mtrmriali triptiri, Caimabt tarn
 ilollratc, qham peregrina Banffted'Ma, SJrm*tbia &
 id genus alii. Sterucs jtafmina fores fine frūilu
 imtiltiter praefcraii.

Exp/icat'm TabuU octava ^ SeSionk fr'una,

CUCURBITS ADDENDA.

1. ¹^Vcurbita filveftris fungiformis, Ger. Capitaca, Tab. C. B. P. Stellaia feu feffilis Cumj
²^j Hxc CucurbitEfilveltris fpecies, molcos farmentofos cauliculos, capreolis donaros, ha-
 bet, qitibus vicing cjuxqie apprehendit: folia funt lara, lacintaca & in margine ferrata
 vitium inirar, moilia, incana; flores candidi func, & incegrj in fundo & qiiinquafariam in mar-
 gincdivifi: leminacompreffTt utrinque auricukta &rc. qua; omnia earnCncurbitam efle plane
 clemonlraiiE. Facile ^ carttrisanccdiaisCticurbitis cognofcirur a figiiradiverfa Iruftus, qai
 tandemhabetexremis rocundam, convexam adinfar exerioris & fuperioris partis fungi e-
 fcolnti (Moreilfe Gallice difti) undc fungiformis dicitur; pars autem venna pediculum
 eft concava, in orbitafeu limbo majore & viciniorepediculo mains angulis fen potras pro-
 tub'i-Yaticibus buliis notanir, & eo nomine Cucurbita major angulofa feu Itellau did fatis ap-
 ce meretur.

2. Cucurbita Indica parva, I. B. Cucurbitae parvum genus, fraftu pngni magnitudine,
 cottice rabro macolis apherfo, Sf iemine rubro, Joliannis Bauhini C. B. P. Hoc genus Cl-
 tiirbitc efrere globofum, pugnopaילו majus, verfns pediculum paiilo anguftius, corti-
 ce conftat valde crallb, fubflavo, potius rubro, maculis fufcis notato; feminibos Cucur-
 bita: mollis fraftu longo minortbns, fubris, medulla intus alba.

PEPONES

ADDEND

I.

s., Pepo ludicus, minor, angulofus Tabernemontani, I. B. Pepo minor Indicus iv.
 Tabcr. Pepo hie fruftum prorerc tumidum feu excumefcentem, periolo inrlexo & exafpe-
 rato quinquangulo irinixtim, ftriifqie per longitudinem fulcatum, in regionc media am-
 pliorem, mukis coftis modo majoribus, modo minoribus, fiuum latum inter majorum in-
 rertkia rclinquentibus, qnibus inaequalior non quidem apher redditur fruftus; cofe ip-
 fi us iruftus majores, utplurimm a medio petioli centrodefieftntes, 5c verfus ventrem
 excurrentes undique prominent, qux fecunchim fruftus longitudinem una cum finibus
 protra&i definiint in angulum, feu potius faftigiani aliquant alum acutum, cujus contrari-
 tan oemicur in Cucurbita fungiformi Gerardi; quandoquidem exterior Kujus cortex con-
 fti^mt quafi femidrculum, at illius defintt in faftigium acutum,

4. Pepo feu Meiopepo latus, clyptiformis abfque capreolis, nobis. Melopepo clype-
 atus, Tab. Cucurbita dypeiformis Siciiiana, I. B. Hie cftPepoa foliis apheris & a femi-
 ne rjiombi pifcis inft'er; qiiin & flores feit luteos. Paffim male Cucurtoca fif Pep'o ab
 anrftoribus huf-uitjuC confunduntur. Nos notam ucricque genericam & eflentialemaflignavi-
 mus;

mns; Cucurbits enim flqres.albos, folia moljia feu incaKli, femina auriculata gerunt; Pepones autem flores iuteos aureofve, folia aſpera, femin/rhomboidea in medio tumida. Hie prxprue inter *txeros* dignofitur, primo quod erj&us proveniat, fecundo quod abfque/ⁱpreolis reperiatur, & in hifce folus hie Pejo convenit cum Cucumere afinino, inter omnes fruchis horarios pomiferos. Fru&us clypeum in orbita angulofum repraefiitat, tenero eft exteriore cortice, carne luteola, firma; fapore aliorum Peponum, atque femine rhomboideo uti di&um: fru&us labia refle&untur & criſpancur. In calidis aedium cameris apud meridionales durat per totam quadrageſimam, ficut& plurimi alii diverfarum omnino formarum feu figurarum Pepones; led in humidis omnes putrefcunt. Pepones in taleolas ſciſſos & farina aſperfos/cum pipere, fale & cepisfrixos, fuaves fan's,mand^r in Italia, Gallia, Belgio & alibi ut refert Lobelius. In Gallia additur lac ipſis in taleolas ſciſſis. Diverſimode preparati diverſum habent guſtum omnes cujuſcunque formae Pepones.

5. *Pepo*^ maximus clypeatus, Ger.- Hie figura tantum fru&us in cortice exteriore clypeato diſtinguitur a Pepone ni&ximo rotundo, convenit in cateris omnibus, cauliculis, foliis, capreolis (ſuperiore excepto) floribus. Not* floribus majoribus majora fuc&edere poma & confequenter femina etiam majora, rhomboidea tamen. Variant in infinitum, magnitudine, figura, cortice duriore, molliore: colore itidem, funt enim albi, lutei, yndes dilute, aut faturate, adeo ut ſubnigrefcere videantur aliquando; funtque cortices lulcati, friati, teifulati, verrucolT&c. Nondubiumeft, quin in calidioribus regionibus ad vaſtam amplitudinem excreſcant Peponum fru&us. Vidimus unicum Peponis pomum pendere libras \$0. & amplius. Natura mirum in modum kdit in producendis fru&ibus hifce horariis pomiferis, qui Pepones aut Melopepones nuncupantur. Idem venit dicendumde Melonibus in diverſis regionibus natis & educatis, tot enim reperiuntur varietates (ejuſdem tamen generis) quot funt diverſae forniiE, corticumve colores. Omnes vanetates hucufque obſervatae, & adhuc obſervandx, a fatione, mangonio, <ſf ſub diverſo coeliaſpeau, & in diverſo ſblo fatae formas five figuras, colores, fapores, odores vanare & mutare, a femine itidem, deſtantur; natura in hifce ficut in plurimis aliis amplis, & longe patentibus generibus fic ludente. Hie maximus clypeatus Pepo habet fru&tum grandem, admodum comprefſum tamen clypei forma, laciniatum feu potius in margine tuberoſum bullatumve, prout'videre eft in cortice Pomi citrei. Sic facile eritle&on(ex eis quae ſupra diximus in tertio capite hujus Se&ionis primis) genera ſex ſubalterna horariorumfru&uumfcandentiumdiſtinguere. Vide femina ipſa I&culpta in Tabula v. vi.

VII. & VIII.

<• ^oVirginianusclypeiformis, torulis & fulcis a pediculo ad umbilicum productis, nobis. Hie PepoViminianu, caulibus, foliis, capreolis & floribus luteis integris in fundo, quinquofariam in Lr gbe partitis, & femine rhomboideo cum eſtens fui generis ſubalterni convenit, foia fru&us figura a maximo rotundo clypeato Gerardi diſtinguitur. Clypeatus enim Ger. fru&um producit majorem, convexum feu rotundum extenus verſus umbilicum, at verſus pediculum concavum, & in orbita mapre plunmas habet protuberantia prout conſpiciuntur in Pomo citreo, & vulgo apud Virginianos ^ t m « ^ d^untur fru&w, ab exteriore forma fru&us conformi cum pane placentula apud Anglos £>UtmeU etiam diao, ficut & apud Italos obeandem rationem *Berhngoz*® vulgo nuncupatur. Figura Cucurbit* *Wiformis* Ger. feu capitata Tab. magis convenit cum pane ſefomell, quamhic Virginianus, propter bullas anguloſas protuberantes conſpicuas in fungiformi Gerardi.

MELON ES ADDEND I.

7. *Melo* moſchatelinus, rotundus, parvus feu Melo ſaccharinus diaus Johanni-Bauhino. Melo ſaccharatus, Lobel. Icon. Ger. Hie caulibus, foliis (nifi"quod colons ſint magis faturate viridis) capreolis, floribus, convenit cum cſteris ſuae families: fru&um fert rotundum, magnitudine Colocynthidi pene parem: guſtus admodum grati, ſaccharum omnino aſmulantis, aut moſchum redolentis unde ei denominatio. Anarte, an natura hie odor aut guſtus contingat, aliis diſcutiendum relinquimus. Carne eft ſplva, fapore mellito aut ſaccharato, odore pergrato moſclwm redoLnte, Hujus in gulaedeliſciſcrudos frudus iuaviſſimos habet univerſa Italia, Hiſpania, a^P^ovincia, N^bo-

Sea. I. tyW IVER.SALIS V.XO NIE NS IS. 41-

Narbonensis Gallia & Ga&T Vafconica:>In illisregionibusjunio, jdrim&#Augufto e/ftaia-
tur cum dele&ament/), cun| pane tutius ; qui avide fola pulpaVefcuntur, ©bnoxii redduntur
choleras morbo, dyferiteri^^^ genus aliis fluxibus, praecipu^ in regionilktts,^yerfus Bore-
am fitis, ut in Gallia feptentrionali, Aijglia, Belgio, ubi infipidjores funt; proinde c^m fale &
pàuxillo pipers, nonnunquam loco utriufque faccharo utuiftur multi verfus plagas illas fe-
ptentrionales, prouttrahit fuus quemqueuftus& appetitus. Melonesa?grè apud fepten-
trionales prxdias gditismaturitatem adipifcuntur propternimumfrigus vernale, &im-
brium copiam feftate, fed prtfcipue ob caloris deiè&um inopiamve.

Addenda pag. 24. de viribus Cucurbita.

*Cucurbit** vires. Veteres Medici apud Pliniumde Cucurbita ita feilferunt, uteamaquam
coagulata dicerent. Galenus frigidus & humidus putat effe virtutis, idque exeoprobat,
quod ipfa in cibo i'umpta ftomachum relaxet, bibendi daferia non excitet, caetera etiam
inCucurbita talia utejus poteftatis exempla aperte-demonftrant: cruda & trita pulpalenic
omaem tumorem ; in cibo fumpta mollit ventrem;-fuccus Cucurbitarum, ut Galenus ait,
ad compefcendum auricula? dolorem tepefa&us infunditur; idem fuccus&dbloremdentium
mitigat, fi diutius in ore teneatur, fed & rofaceo mixtus, &: un&ione corpori admotus, fe-
brium reftinguic ardores; cinisaridas corcicis efficaciter combufta poteft fanare; .euudem
cinerem(utabexpertisdicitur) ulcera in veretro jam inputredinem verfa purgare, & ad
cicatricem perducere afferimus: femini ficco ilia vis traditur#, ut in pulverem contuliim &
infperfum impleat vulnera, quas cavata fuere: quidam in vino bibendum illud dedere ur fo-
lutiones alvi fluentis inhiherent. Ex Simeonis Sethi fententia, Cucurbita concoitu facilis,
& boni eft fucci, & admodum nutrit; fitem fedat, urinam cit, ventremque movet. Cali-
dis & ficcis temperaturis prodeft, inflammationes ventris & jecoris fedat; pitukofos autem
& colicbs affe&us laedit; femèn genitale minuit & Veneris appttentiam extinguit; fcnguis
ex ea procreatur confitentia tenuis ; thoraci, pulmoni & veficx prodeft. Magnam Cu-
curbitarum varietatem diverfitatemque à fetninis nattira dependere teftatur Columella ele-
gantiflimis fuus verbis, quos hic fubjicimus.

Pr<Egnanfque Cucurbita ferpit,
Unde nee eft Mis facies^ nam fi tibi cordi
Longwr eft^gracili capitis qua vertice pendet
Et tenui collo,femen lege^five globofi
Corpora? atque utero nimium quav a tumefcit,
Ventre leges medio, fohokm dabit ilia capacem
Lancia picis aut Aclai mellis Hymetti,
Aut hfibilem lymphis hamulam, Eacchove lagenam,
Twnpuerk eadmfluviis innare docebit..

Docet itaque in his fuus carminibus qua ratione ex eodem feminio longa & rotunda Cu-
curbita fieri poillit. Quod autem in carmine jam recitato, hac ipfa de re omifit, in profa
non mulcum poft addit: aquofis autem locis primo quoque tempore, non tamen ante ealen-
das Martii ferpen ponendum eft, ut maturari poffit xquinofcio confe&o. Idque de media
parte Cucurbits femen inverfo cacumine ponito, ut fiat incremtnti vaftioris, nam funt ad
ufum vaf?. fatis idonea. At fi efculentas menfe parabis, re&o cacumine de collo Cucur-
bitae fumptum femen ferendum erit, quo proluxior & tenuior fructus ejus nafcatur. Quan-
quam Cucurbits formã inter fe^diffimiles habeantur, non tamen viribus & natura fibiinvicem
repugnant. Siquidem (ut Columella tradit, & Plinius l.19. c. 5. refert) forma varia in
Cucurbitis arte & mangonio fieri facile poffit. Diligenter cuftodiendum eft, ne eò mulie-
r&ss accedant: namque ^arum contaftu facile elanguent incrementa virentium, tantoque
migis, fiiiis fluant menfes, tune enim folooculorum intuitu tenellos enecant fetus. A-
mant Cucurbits mirtim in modum aquas: nam fiprope in patens vafculum aqua fubjicia-
tur, à quinque vel lex digitorum intervallo, ante pofterum diem adrepentes cognofcentur
defcendiffe. Tanta eft Cucurbitarum, Peponum, Melonum & Cucumerum inrerfecognatio,
ut antiqui Greci &) Latini, nedum recentiores fcriptores minus accurate, nomenclatu*
turjs difcreven&i.^ J^ppocrati, uti Theophrasto, videtur quamlibet varietatem aut diftèren-

tijm gnericam horum fructum <w> m vox figurare, <f> fiartquc bullireeft, unde dxw, qnr va?, ollam & f pyxidem fig. iificac & fangirivugum viceumaj. it cornu instrumentum, indeque ibrte LStinis Cucurbita, tamen Varroni a curvando dicta putetiir **Cntnrbita**; quare quo faciSkis decernantur & percipiantur ab invicem, qua; hodie in ufum medicum & c **edi-**nariutii venerunt, gcutra ciihfla OBUK vel C<cumeres appellat. Cucurbita quxZucclia vel Zucca Ttalis dicitur depravatis elementis, a'Vw aut <ww> utroque enim modo fcribunt nonnulli Graeci; nam oww f unde enim ficus derivatur) generaliffima fuit appdlatioCn-curbitarum, Mtlonnm, Peponum & Cucumerum. Quare cucumerinae faniilii maxima; vocari polfunt Cucurbits, & commodk)re etymo acurvandodeduci, quafi-curbandoc ' qutintur Vafcones 6f Pyremi, unde Cucurbita. Nospartim propter feliorum, fruftuut. *prxcipucfeminum vsrietzceni, (ex conftkuimus genera cffinfra horariorm, aut fi mav—* Cucunier,iriorum fucVuum, d forma feminum fati diftin&oi;um, Cucurbitamf Peponcm, Colocy nth idem , Aiiguriam, Melonem& Cucumerem, Demodo ferendi exveteribus, at-q'ieetiam yeotericis quaedam de loco, tempore, fatione, cukn& mangonio, commemorata lunt. Quare hxc omnia hie duntixatm medium adferemusqae a pud Dodo^aemlegimus. Cucurbita inhortis fcruntur ac coluntur, & fub Autummfinemad maturitatem perveniunt; in calidistamen regionibus citius. Vrscoesmaxime fie redduntur, ciim Cncuvbitje, turn Cucumeres, Pepones *Si* Melones; in Copliinos aut fiftilia aut.vafcuia qujelibet, terra cri-brata, ftercore coufummato adniixto, injicienda, liquidior fac>a; Sf anticipato con'ueto tempore, Vere videlicet inchoante, femina implantanda, & cumfol& calor accelferint,plan-tulsteniiesfuntranfplantandie, w^ .quumquatenia tbliaadepts t'uerint Scfrigora&glacics noflnrns tranferiit. Cucurbita feu Zuccha-pro nota generica & eflentiali a fine ultimo (uti fupra a nobis diftum) fbminum fcilicet forma, cognofcitur a Pepone, cui magis eft conformis, qad femina producat oblonga, duabusauriailis prrdita, ergo male pailm authores Cucur-bitve nomen Peponibu^adaptant, qui femina producunt tumida in medio,Rhomboidea, cum fimbria membranacea undique femencingente. Cucurbita amara feu Colocynthis convenit in omnibus cum Peponè, tbtis, floribus&feminibus,feufeminis forma&figura ; fblaamarin-<linc pulps interiorisfemmumque coghofcitur a Pepone, unde non inepte Pepoamarus dicitur. pulpsin

Addndapag 27. de vtribus Pepomt.*

Pepones lati eduntur non modo elixi fed & in pinguialiquo frixi, Defcendunt vero per alvum haud feemter: alimetitum adferuntqaale aliorum Peponum i*p*. Pepones com-
pofli, rocundi, Meloniseffigie, intalcolas fciffi frixiq- « ^ P » Sfiarinaafperfi, fuaves admōdum eduntur inGallia, iielgio, & inriua alibi apud Meridiomles. *

Hallucinath Veflingii.

Addenda penultims: lines pag. 35. !

Pepo JEgyptiu rttkulatus^nobis. Cucumk JEgypti'iu* retkulatusfn Lufa Arabum, Vejlitag. in Propf. Alpn. de Plant. JEgypt. Quamvis Vejlinglm Cucumru nomen hukplant* afftgnavit^nos ex priuio intuitu feminis bujusplant* ad nos transfmiff^ deiexbnws tandem ad Ptpnum claffem feduri delere a conformitatefemimjmnedwtumidorumcum circulo'membraneiceoejufdemfrmt **Amntnt** idebrco cumnadat aCucumerumclaffe^qui ftm'ma obfonga, minora, fine limbo exterjtts ambienie femenproducunt-, buk denegabitur Cucumeris nome»7 & appellabitur a nobii Pepo JEgyptiiv retkulatus. Hu)m datur duplex va'ietas. Eft velfemim albo, vel nigro. Confulat LeCior Tabulate App. ad **SeUhrim** tiofiramprimam bujus Htftori*,*

Addenda pag. iK-deviribusCotocynthidis.

Fernelius Colocynthiidem calidam ficcamque **disk** ordine a", **affiaj-iffimam**, lentarn pituitam, craffos fif glutinofos humores, panterque bilem uti **ceflnra** eft) detrahete, &caquamcitrinamidque maximè exarrn **ceflnra** coiuittiffimispartibus; conterre morbis inveteratis, contumaciōis, quos neque Ago.. neque Turpetumfolvent, vehemenwrautem ventriculum, vifcera, cftjpuque contur'bare, venas aperire, & fanguinemelicere, potentius quan' Aloe aot aliad quodvisPharmacum; in-teftinacorrodere, gravibnstortionibuseadem excruciare. Quocirc-jexquifitiffimetritamdi-lui oleo amygdalarum dulcium, additaqueTragacantha aut Maftic^e concinnari intrpchi-fcos, vel coqui in jnrepingui, autalio quovis liqoore leniente. NL- ^^^rum, ne& fe-

num, nee prsfgnantium (Lijetus enim vd'fappofita Colocynthis enecat) fed stare adhuc fiorentium & robuftorum i'edicamentum «nc, vixqie nifi alierum permixdone tutum dari afcrup. dh. addracltfemif, QuodfiomninoColocynthide uti velis, acciperete iubet Tragus Germanicam noftram Pyrofimilem, ijtpotencn tam ftrenuam & immitem. Pitain ergo fen fructum Colorynthidis bene excavato, fungofamqueejus una cum leminibus medullam,cyathovini quatuorauquinquehorismacerftam, per linteolum exprime, expreffbmque fucum noftu cumcubiturirevelisbibe; quod fifeceris, videbis luce appetence, pituicam,

Icr'Tos ac vifcofoshumores, nee non bilcm, citra noxam leviter exigi. Idem medicamen-
colicis prodeft, & ad patridas ventneuli febr's facit. Mefufus Arabs intet alia hue
enda vim Colocynthidis potiffinium ca>harticam nobisficdefcriptamreliquit. Imma-
Colocynthis flatus torminofos & moleftiffimos excitat, immodicepurgat, ucetiamfan-
guinem eclncat, & fipe mortem adfrac. Peflima autem ac venenoja eft, quam produxit
unicam toca planta, qaz planta fi locoaliquo fit unica, mulro perniciofiorem fructum pa-
rit, prxfereim fi locus ille eftuliginofus vel pulverulentus, vel Thermis propinqans, vel
ferpentibus abundet. Calida eft & ficcauti difbm fupra ordine tertio, ignea fubftantia
& terrea per ufionem tenuata &«Kimie amara confac: Pituitam &c alios humores craffbs &
glutinofos magis ex profundis partibus & diftantibus ut cerebro, nervis, mufculisjunftur-
ilis, pulmone, thoraai, quamexvenis atraftos futDiofcoridescenfet) purgat. Purgatetjam
bilem flavam, ut volunt aiii. Quapropter morbis fequentibus mire fubvenit, cephalalgis;
aniquijldolorottotius cranii, hemicranias contumaci,epilepfia;, apoplexias, vertigini, aqio-
fsfluxioni inoculum, podagrae fngidar, ifchiadt maxime, ac reliquis nervorum junftura-
rumque afteftibus,'Aftmami item, actuffi antique, difpnaac ex thoracis repleti an-
guftia, ac pra:terea fumme omninm prodeft colico dolori, cam a pituita, quam a flatibus,
etiam & hydropi. Omnia autem ha?c, five ore fumpta, fiveclyftere inrefinis immiifa,pryftat:
utero autem impofita fcetum uecat. Eadem cum aceto forti affrifta, alphos, lepram, pfo-
ram, elephantiam fanat. Oleum denique fuper cineres calidos incoftum eortici pulpa ina-
nito capillos illitu nigrac, cofque ne cadant firmat, canitiem tardat- Idem auri infullatum,
ejuscaloremactinnitumfanat: incidit enim, attenuat, cergit, digerit. Scribit Dodonius
ejulUf m >mtn ad mortuorum corporuni confervationeni ac condituram utile effe, praefertim
*idem Myrrha & Aloe -

Addenda fofi vires Angurix fag. 29.

Anguriae femer urinam cit, fed minus quam Peponum femina, quoniam celerius in ventriculo
cosrumpuntur. Meliora in his funt, qua: femer habent eVjguum, calidos autem cV ficcos
ftomachos juvant; fim ardenti febre cum aceto porrigantur, valde profunt. Froprriumve-
ro horumeft naufcas ventriculi, calore excitatas, fedare. Horum inter?ora effe oportet,
nam quE forisfunt, mali fucci exiftunt, & difhcultes admodum concoqtuntur, & fere ve-
nenata funt. Habent vero & alias proprietates, ut animo deficientes propter exceden-
tem calorem reficiant. Si autem pituitam in ventriculo nancifcantur, naufcas faciunt, &
colicos effectus & hypochondriacas paniones. Hie jam Simeon Sethi. Anguria; tiuftus,
inquit Matthiolas, frigidus eft & humidus ordine fecundo, fiti arcendaaptiffimus: quo fit
<t kali ardente Syrio, cjus pulpa internâ fe refocillent. Confert adurentibus febribus &
lingnsE ariditati quam maxime. Acutos humores vincit, & iis auxiliatur, prnfertim febrien-
tibus, qui humorum malignitate potius quam abundantia fcitent, fi quidem Anguria (ut
Serapioni placet) alvum in principio non fortiter citat; ideoque non illia convenit, qui
tenuis & imbicillis funttemperamenti, macri, aucexangues: etenim eis alterantibus magis
opus eft, quam dncendbus humores, veruni quamvis id effici poffit acidis medicamentis,
infipida tamen, quæ nonnullam dulcedinem habent, utAtiguria, hifce incafibuslongema-
gis con veil iunt. Impoffibile enimeft, quin acida, & quaccum aceto paranturmedicanjenta,*
inci d" " quod imbicillia corpora macra, & exanguia haudquaquam fufti-

Inodi acids poriones maciem augent, & ventriculum lardunt.
iu ub) quiipiam acida aftringentia propinaverit, impoiFibile quidem vdetur ut
:uttionesnonaugeantur, fieain jecinore & ejus meatibus exrjerint. Etenim acida &
atringe ntia medicamenta exficcant & nihil profufhumeftant. Porroqua; infipida, & quae
craffa untfubtoniEE, <j«ibus aliqua, ut in Anguria, dulccdoinfir, fuo quidemtemperamento
, humeftant, ac fimol nfrigerant, generantque in ipfo jecinore fangninem .iquofum, qui flavse
t bias fervorerr ^T.:Jitiamcoercet, tam in jecinore, quam in venis. Cnerum,ucDodona;cis

concludit, Anguriaecaero.qme.cortici fubeft, cruda, ied frequentips coSacomeditnr: alimen-
 tumautemconfcrtex.guum.,idquefrigidumacfcmi,idum; fanguinem ingenerat aquofum ,
 qui mternarum partium inflammationes mitigat, & bilis acjAoniarWfc fervorerfl'contew-
 perat: crsda more commanfa, lingu*in febr.bus aperitatem lenit, &fitim(edat. Semen
 facilitate, Cucumeriim fimile eft.

Addenda fag. jo.de viribiu Melonum.

Melonum la or, praftantii,imum)» fcWbnsatdenribn. remedium. Semen autem me-
 dullam aqua f onti #ant al,qUo aUo ^ T ,0ngrUo prhls contufam, per «ibTMm fetac^
 um emulgent Ingu,lili 7m, qu c P annu! " ad in ftitut^ accomodatam. Seminis Melopeporivim
 & Peponam ctemor c_r_r_o^ ebnClit,ObUS UtilitCreX bordeacea Ptifana,tefteMatthiolo, pro-
 pinatur; non folum enim refrigerat, fed etiam ite fex d e t i a m o b ^ u a i o n a « t u m h e p a t i s w m
 valorum expedit, & unnam provocat. Datnr in flientibus, tabidis, & marafmo affectis, at-
 rcor^ rGuzfr i dditis partim sexha, cacca W auc Glycyrrhiz

fapavenni ctemor, accedat BaccarumqueHalicacabi&Malva:decoaum.

Addenda foji llineam vi. fag. •\$(.

Cucumis Egyptiis Chate ditus, nobis. Cucumis E gy p t i u s rotundifolius, C.B.P. Chate
 5K T urum genu S; Alpa, Fruuum du Jus ufum corporib*us in cibo, ipfis turn
 comestis, ialubrem effe apud omnes incolas inter iEgyptios creditur. Sunt
 enim ron^nti f^Mios Medici aliqui ibi, nonnullis febricitantibus crudos etiam hujus
 fX, mandos concedunt, praefertimque peste affectis, quibus Cucumeres hocce crudos e-
 fitatos fumme conducere, f on n i b u s . (qua ratione nefcit Profp. Alpinus author) perfuafum
 fit; cuuos in am^ntu f on n i b u s . (qua ratione nefcit Profp. Alpinus author) perfuafum
 & humeXnr T n T v o l f E q b l l ^ U t i l e s e f r e ratione confirmatur, quandoqmdem refrigerent
 nnnTn " num6veflexcali d i s m o r b i s c u m l a e c o a o s C u c u m e r e s h o { b e m u l t i s d i e b u s
 OS L n e Z u l t a T M h t a t e A J in cibo ^ r p ^ r e , aSt lac etiam ipforum feminum pro iifdei#malis per
 osizpeiumerefolent. Ad oculorum vero & aliarum partium c^idas inflammationes pulpa
 contula Cucumerum Mi mixta utuntur, & ad fedandos podagibz dolores, acaufa calida
 concitatos luccum Jacle oleoque rofaceomiftum, partes leniendo, adhibent. Stillacitiam a-
 quam, ad jecoris caliditatem corrigendam, & ad fedandos r^cs, turn inflammatos, turn £
 calcuhs vexatos, multisdiebus^grifsbibere confulunt, quibus lpiam latis iis conferreex-
 penentia compertum eft.

Fi, is SeBionis frimaTartis fecund.*

1. *Pisum umbellatum*, C. B. P. & Ger.



3. *Pisum sativum* var. *hirsutum* nigr. nebif.

2. *Pisum nigrum* var. *hirsutum* art. if. ut. c. l. B.



4. *Pisum spontaneum* var. *repens*, humile, nobis.

5. *Pisum sativum* var. *hirsutum* nigr. nebif.



Amstelredamum, 1722, in *Historia Plantarum* D. J. Zeyher

Legumina scandentia capreae.

Tab. 245. 2.

1. *Lathyrus arvensis* rad. tuberosa repente, nobis. 2. *Lathyrus Boticus* fl. hirsuta, nobis.

Lathyrus syl. luteus fol. pinn. C.B.



3. *Lathyrus latifolius*, C.B.P. *Clymenum*, Math. 4. *Lathyrus angustifolius* altes, J.B. 5. *Lathyrus sativus minor* sem. angul. nobis.



7. *Lathyrus arvensis* filiquis hirsuta, nobis. 8. *Lathyrus arvensis* filiquis hirsuta, nobis.



From the ... of the ...



... Nobilitate ...
H. Georgii ...
et aliorum ...
... princeps.

Legumina scandentia capreolis.

Tab. 3^{ta} Sect. 2^{da}

Lathyrus Tingitanus filiq. v. Orbis fl. duplo rubens. Lathyrus Bactrianus Capensis albus Lathyrus Aegyptius. Cam. Cicerentia Aegyptiaca. clau. h. fl.



Lathyrus Aegyptius v/r-3¹ frpmri-n.-1.0!-frox jt mint fl*ufyrv:ijr angulifid. leptomacrolebia angulace. nobis. Lathyrus angulifid. brachyplatolabus, nobis.



7. Catanance. Dod

8. Vehrus P. Ervilia. Dod.

9. L^{is} Lens minor & major.



Auspicio Reverendissimi in Christo Patris Dilectissimi Cam. Episcopi Dandenensis alpiensis ac vicar. Petrus

Legumina scandentia capreolis

Tab. 24. 25

Vicia perennis multiflora cucurula sepium, nobis. *Vicia perennis maxima domestica, nobis.* *Vicia maxima Romana folio serrato, nobis.*



Vicia luteo-pallida filiquis hirsuta, var. siliis erectis, nobis. *Vicia lutea fol. Comaebrudi minoris, C.B.P.* *Vicia major sativa vulgaris, nobis.*



Vicia fol. serr. var. variegata, nobis. *Vicia pratincola verna capreae sem. hirsuta, nobis.* *Vicia minor segetum siliquis pluribus hirsutis, C.B.P.* *Vicia minor segetum filiquis paucis glabris, C.B.P.*



Augusti Noddingii & Son.
 sculptum a Jacobo Hertze, auctore
 Norvegi de Ryckoff & Co.

Phas. CSP. 28. 1700. 10. 10.

Phascolus peregrin. similis, colore. fructus. B.P.



4. Phaseolus Indicus fl. vocatus, Park. puniceo flore, Cornut.




5. Phaseolus Indicus fructu, locustorum, minore rubro & veruculorum, nobis.

fifaptu. hirfviha- .tin i "1_.



7. Phaseolus minimus fructu rubro, siliquis erectis, nobis.



*rt. tlu, estif. mm. j-ii risti orata siliquis ma. aperta



8. Barlow. Julia D. Lagona stulp.



Auspicius Nobilit. vici D. Orlandi. Bridgeman. Mitois & Baronetti, magis. fandi. Anglit. Guf. 1712.

Legumina non t&andanita sthitiut ezyetut.

Tab. 7. Sect. 4.

Tab. major et minor.

Lupinus

100 fl. Claf. hist. 6. Lupinus peruleus minor Pimpinianus peronni. repens nobis.



iirarHTi'wiiu c<rrntrus ira/villniitr, * I.tyniutrJyLMifnJlifr'h'iirJifrru/cr.Eiifl-. &ff(rtyr'^inm ivru fligusa, s. Germanica, C.B.P.



Castanea vulgaris, C.B.P. r f Vv*%Vj\$ fywjpr I m mu r ftf Panamienis & Claf. hist. 'i?nr*iu.>/...j...i^i-ju-j/ghodoli, vulgare, C.B.P.



Amicus Nobiliss. Clariss. D. Robert Boyle, Officiarius Castellae de Barro, & de Overy, &c. 1704. *ftt>i>rutin (oryahm-

Legumina i&n fcdtidentiaj-ifcatiif em !<.

Tab. 8. Sect. 2.

Orobus Boeticus lanuginosus radice amphibia, adro nobis

Alpin

scutellus magno floru nobis



Anachidus a potius Aracoides, Her. Bell. 1.B.

5 Orobus siliqua et particular brevibus nobis. Atropalus Dig. 4. 1.B.


6 Glycyx Hippocrepis, Claf. hist.



Herbarum argentum Creticum, Prop. Alpin de exot. Park.

8 Herba minima 2 planta javanica, may et minor.


9 Tribulus terrestris, Dod.



A decorative crest or coat of arms featuring a shield with three dots, surrounded by a laurel wreath. Below the crest is a block of text in Latin, which is partially illegible but appears to be a dedication or a note related to the botanical illustrations.

Leguminosa siliqua Gemella donata.

Astragalus spicatus Americanus scandens rad. tuberosa nobis. 2. Astragalus spicatus paniculatus purpureus, 3. Astragalus perennis monsp. fl. caeruleo. T. B. nobis.



4. Astragalus perennis procumbens fl. ochroleuco, nobis. 5. Astragalus perennis siliqua Gemina Vesicam referente, nobis. 10. Astragalus monsp. annuus procumbens fl. ochroleuco, nobis.



11. Astragalus annuus rectus fl. ochroleuco, nobis. 6. Astragalus annuus, perennis, siliqua striata, sericea, siliquis, nobis. 12. Astragalus arvensis, siliqua, et fol. hirsuta. 13. Fragacantha, hirsuta, et lobata.



Aurpou D'Inbagan Colton Equillo Barmeth Nopis Clary 1718
Gallia Antli usari Dyon yroni 2MS. Desfontalium Colocleu a pulcherrim.
Luzia iridifaligabils Dalgantha ultra impema a ipatis
Bibliotheca impatiens: ser nilur!

1. Ferru
jugulari.

mujy lica. r- H p. J

y P. Lft t JM "i**i"

Tab. 10. Janus



3. Ferrum equinum capitatum
& comarum. Cel.

4. Coluca scorpioides prima et ante. Clus.

5. Coluca humilior sive quae vulgo vocatur. nobis.

6. Coluca sive polygala Valentia. in Clus.



7. Coluca sive polygala
Europaeica. nobis.

8. Ornithopodium majus. C.B.R.

9. Ornithopodium minimum
sive quae vocatur. nobis.

10. Ornithopodium sive quae vocatur
nobis.



Incis. B. Knyall
Lug. G. G. Knyall

Legumina si hauls artificii]t-y rt cvhinatLt t/e/uita ,

Tak. 2. S. 2. ad

Clypeus lanceolatus minor pinnis caeruleis, nobis.

aspera minor contorta, nobis.

visitas parvulata folio. nobis.



Onobrychis articulata sem. aspera, clypeato, nobis.

Onobrychis Canadensis triphylla articulata sem. terque, nobis.

Onobrychis maj. fructu echinato minore, nobis.



Clypeus nutteri nutteri trca' & Ur md/vty, nobis.

Onobrychis J-u-ju titruLto, „elt.it t>f adencia*

Glycyrrhiza sem. echinata in capitulum congesta, nobis.



Auspicio D-Hugonis Chisley Equitis Bonelli.

1. *Trifolium bituminosum* maj. et minus.

Leguminosa trifoliata s. trifoliata leguminosa
2. *Trifolium pratense* album.

3. *Trifolium pratense* purpureum.



c. vide Tab. 13.

Trifolium lagopus Usj mmtmamj <v>. iJTrijelium. Atywutix atyuffa ituf.

3. *Trifol. lagopus*, des trifolij pratensis folio.



Trifolium repens fl. ochroleuco.

4. *Trifolium lagopus* pennatum.

5. *Trifolium lagopus* frutescens. El Gressi



Auspicio D. Guilielmi Farnor Equitis Baroni de Esten Newton in Comitatu Northamptonensi

Legumina trifoliat & trifolia *Trifolium*

Tab. 13. Sect. 2. 17



Trifolium lupulinum latum
min. 7.

Trifolium stellatum purp.
Monsp. 1 B.

Trifolium Glomerulos oblongas
proferens ex Gemculis. 1 B.

Trifolium Glomerulos piceum
Cherlori. 1 B.



Trifolium capitulo Glomer.
vate 17. 1 B.

Trifolium pratense Salern.
sicum 1 B.

Trifolium maliflorum
nabiz.

Trifolium fragiferum ut sicutum aut
Gat. pulchrum nabiz.



Incipit B. Franc. Annot. univ. de Herb.
Hort. in agr. Rothomagensi

LEGUMINA TRIFOLIATA S. TRIFOLIA LEGUM. OSA. Tab. 14. Section 14.



1. *Trifolium Spicatum* minor p. minore
dulce montanum, manspeliensis.



2. *Trifolium pratense* canle fistuloso,
foliis subtus maculatis floribus
schradeis, nobis.
seget ad Tubaz.



3. *Trifolium flammula* m. creticum, CSP.



4. *Trifolium montanum*, manspeliensis.



5. *Trifolium americanum*, Dod.



6. *Trifolium flammula* m. creticum, Park.

7. *Trifolium montanum*, manspeliensis.



arealhJ
a secretioribus confinis.

Fe. Barlow delin. Burdett sculp.

LEGUMINA TRIFOLIATA seu TRIFOLIA LEGUMINOSA.
trifolium cochleatum seu medicum cochleatum.



trifolium falcata sive medicum falcata



trifolium dictum melilotus



trifolium dictum lotus



Auspicijs D. Athuri Chichester Equitis Aurati
et m. a secretioribus Consilis in Hibernia

LEGUMINA TRIFOLIATA (s. TRIFOLIA) LEGUMINOSA.
MEDICAE PARS 76.

Tafel Section 2

filioata filiostris filioqua
h
... f-is-1.™ HL1K

2. V<lrvt Jbtcrttff filiva
jlltous remuta nutpiitwr
'till th-rt ti ^In, fi/iii'ji'j' Fit

^jSdnitnt irtnta jiltipsii
Jijtmtit Jt'ittta, m>fal.t-ii :
imrur rattiqfa lfiititrii'ii Lvl'

4 Mr.1l,, frutrtrr:
'r'^ceta fiaHfjnet
(.mtnli.



Melilotus filiculis penduliculis
corticis candida major, nobis.



2. Melilotus filiculis pen-
dentibus corticis Lutea
vulgaris officinarum,
nobis.



MELILOTUS
4. Melilotus filiculis
penduliculis rttff II
Lutea magno seminis
pericarpio rugoso
nobis.



5. Melilotus Lutea
aurijlitiitUf nuifSn:
lutea parviflora, cortice
dissoluta, nobis.



8. Melit
prvruinfini. -
rendli .mini
Trifolium officinarum, Dad.



9. Melilotus rubra recta Lutea filioqua
corticis curia in septembris composita
rubra fanna Fovisviva, nobis.



10. Melilotus rubra alvata
rubra, nobis. Trifolium ala-
ratum alvatum de Dad. Lignol



11. Melilotus Lutea major corticis
culta reflexa hincatum corticis, nob
Melilotus Italica Fuch. 12. Sernica
minor procomb. corticis fere Alti:
mitch, Spm.



13. Melilotus Serrata
major coronata filioqua brown. 14. Mel
recurva, nobis.



sonnua deli.



Burgers sculp.



Augustus D. Nicholan V. Estempse de ...
Nicolsona Equitis Baroni ...



Legumina trifoliata, s. Trifolium leguminosa.

Tuber...
Anonis anona longa florum...



6 Anonis lutea non spinosa...

8 Anonis purpurea, praecox...

11 Anonis minima, hirsuta...

12 Anonis lutea minor s. pendula...



13 Loto affinis Anthyllis leguminosa...

14 Loto affinis Anthyllis vesicaria...

15 Loto affinis Anthyllis leguminosa...



16 Oxy s. trifolium lull...

17 Oxy s. trifolium acidum...

18 Oxy s. trifolium...



Auspicio D. Richardi Knight...

LEGUMINA TRIFOLIATA sive TRIFOLIA LEGUMINOSA

Section 2. Tab. 11. Cret.

Lotus alpinus oligocerasus
siliqua siliquaibus suis ter-
ftiut A'arlmansinm,

Lotus alpinus
oligocerasus
nil MetuptifnmjLiitto, jltrt caret mi, ^>* fflw

Lotus alpinus
oligocerasus
siliqua siliquaibus suis ter-
ftiut A'arlmansinm,



Lotus alpi
Lutm it".put buuktunitgfapmz
dentibus nobis

Lotus polycerasus
siliqua glabra & hirsuta, nobis
ornitho & pedu, nobis

Lotus polycerasus
siliqua hirsuta, nobis
siliquaibus suis ter-
ftiut A'arlmansinm,



-J*/7J:-

Lotus polycerasus
siliqua hirsuta, nobis
siliquaibus suis ter-
ftiut A'arlmansinm,

Lotus polycerasus
siliqua hirsuta, nobis
siliquaibus suis ter-
ftiut A'arlmansinm,

Lotus polycerasus
siliqua hirsuta, nobis
siliquaibus suis ter-
ftiut A'arlmansinm,

Lotus polycerasus
siliqua hirsuta, nobis
siliquaibus suis ter-
ftiut A'arlmansinm,



Auspiciis D. Guilielmi Brudgman, Arma
& stituta Subsecretarii.

Tab. 39. sect. 2.

Trifolium fragiferum s. *fragaria* eiq. officina *pentaphylla*.



Fragaria hortensis



Fragaria Sylvatica



Fragaria non fragifera vel
non v. fragifera

t PexfjyhpI MJn imij. trt*lnn^~Par&..

4 *Pentaphyllum* vel potius *hepta-*
phyllum fl. rubro, L.B.

7 *Pentaphyllum* s. *quinquifolium*
vulgare, repens, L.B.



6 *Pentaphyllum* s. *quinquifolium*
fl. albo, repens, L.B.

if *Pentaphyllum* s. *quinquifolium*
fl. rubro, repens, L.B.

17 *Pentaphyllum* dictum
Tormentilla,
Vitis.

Pentaphyllum siliquosum
Arabicum album siliqua, Park.
side App. sect. 3.



Auspicio D. Roberti Southwell Equitis
aurati, Secretarii consilii Regi Sacerdoti

ALCHIMILLA. EPIMED. JQUE Tab. 40. Sect. 2.
 Pentaphylloides *supinum potentillae* facie, nobis *supinib.* 1.B.
 Pentaphylloides *erectum*, 1.B.
 tlfspK/USfs frthtm
 Jragifi 7 um, r—iit.
 1. Pentaphylloides, erectum, fragariae nobis.



2. species minor
 Pentaphylloides *procumbens*
 intricant fragariae folia, nobis.

3. Pentaphylloides *incanum Tanacetii*
 folio, nobis. *Potentilla* 2. *Argemone*,
 1. B.

4. *Alchimilla sericea argentea* vel
incana, nobis. *Pentaphylloides* argentea
 fl. mucoso, 1. B.



7. *Alchimilla major viridis vulgaris*,
 nobis. *may. vulgaris*,
 Park.

8. *Alchimilla montana minima*, Col.

9. *Epimedium*, Dod. lugd.



Bergenia frage.

Aspicitur D.
 Ionis in Epim.
 Anthe 3c. Thib. rna. *Diarrhæa* 3c. 3c. loc.
 tincula 3c. *Prorubis*, *Curia* proregat. sa. Mo.
 asbr.

LEGUMINA TRIFOLIA

Vicia fl. rubro fructu albo nobis.




Vicia fl. ochroleuca siliqua hirsuta erecta nobis.



Vicia fl. rubro fructu albo flori minoris instar nobis.



Vicia maritima fl. albo longo nobis.



Vicia fl. ochroleuca siliqua hirsuta propendentibus nobis.



Orobus syl. nostras tuberosa rad. nobis Astragalus sylvaticus Ger.



Cicer coccineum nigra macula notatum nobis Abies Aegyptia Coea India Orientalis.



Ononis siliqua in apertis nobis siliqua Bernardi.



Ononis perennis purpurea siliqua nobis mitior Cius hist.



Ononis fol. rotunda serrata nobis Cicer syl. 3. Dod.



Anthyllus Helvetiae nobis Astragaloides Helvetiae Park.



Auspicio D. Henrici Cassenby D. nostro Caroli 2. regis Secretarii principalis.

LEGUMINA & TRIFOLIA.

Astragalus flore et caeruleo purpurascens,
nobis. *Onobrychis a. etus. hist. Tab. 62.*

Astragalus spicatus fl. pallidis, nigri
radice notatis, nob. Onobrychis 3 clus.

app'ndi^o section. 2^o Tab. 22
Astragalus fl. Trapaeanthe florib^o
max. e. et alio purpurasc. nob. Onobrychis 1 clus.



* 7

Genista partium spinosum folia
Leontodon fl. et caeruleo purpurascens
caulis nob. Lemnaea. Tab. hist. lugl.

Trifolium aphyllum
Camalensis, Cora.

Trifolium Italianum sive Melilotus
Italica verniculis incensis, I. B.

Trifolium Alpinum Rhodense
astragaloides, I. B.



£ft

Trifolium magnum fl. elegantissimo rubro,
caulis, hujus 3. clus. hist.

Nil. Anil. Glastum
Indicum, Part.
vide Tab. 2.

Anil. 6. Maris
vide Tab. 2.

Scorpioides sive vicia nobis



Auzpertia D. Hancet Soule Anil.
Reps. Carol. 2. Clus. hist.

Herba viva Linnæi acuta Herba Sentiola ul est fenz
sica Lus **pimftmirata** ^Indiæ Orientalis

horibus siliculis villosis, nobis

Ittyttri rfrir Gaeeliuia i/ufrifrtu ^trwry Marqir.



Herba mimosa major frutescens spinosa fol. angustis capsulis & Herba mimosa latifolia, capsulis acutibus Castilica
seminibus hirsuta & in capitulum collectis, nobis spinosa, nobis Mimosa spinosa de Parvambuca Zanoni.



Herba mimosa non spinosa latifolia ^f si alios 6. Btrha miwtuti turn tpuwfct r ^
huUca^artoni. fomaita Riteaniia dicta Jtasuxti στυκίανη αυ βραχί τλαλοκισ



y\$ \ Ht

iunhm Gulp



Auxiliis D. Johannis Northlegh Comitis ex officio
Dionysii & Collage Eam. Socii Comenensis

t. Stmii AifXariJntiu tucjifin Htutt
t*B PSI-rw. ifexiiri.friiur,77tn,-!tfrtiM &'<f
Hort. Sansa Uriculotta Detonlat & op. Luz.

3 'Situur TiafUt i'tffhhit .obtusis (S.!?
Sna ifiiliMjTraji'E'fi-iti.Li). & Ger Com. £ft.
Hort. Sansa, mot. juca. uoa ut. Lob. Lugd.
Sena nostris, Lox.

r ?if tii-r Jut^ (c.-m itatt •ve Indico ^'^^t,
lijth'if, i,mfi- Her-t x fiiMhr ifrrrHiiif*/
Amert, Jltirr.) ifata{>a. ric1



2. Cotinul Hort. Malabarici.

Astropiliu / *rmmfitu\$ ktrmiti tuust frefir
aphyllo flufi athmfniem oJuntittms,turhn,

7?ffj/lit,n, (iff, nrrenit tn i
Pitman frtjnrri itaii OintJ
juscum, Pharium
Ad. Lob. Lugd.



Trifolium Argentum clypeatum, Avap. Alpin.
de exot.

Trifolium glutinosum nrxaitlr,fiyintn.-m. jlurr Luteo
adv., pinnati.

Lotus Creticus, av. & c.
Hon. Belli, Epis 5. ad Uva



Dunghers sculp.

Juppius D'Henri de Decand.
illocutionem, non pndem. subgubernatoris
Armsperci ad nup.



LEGUMINA TRIFOLIA & PENTAPHYLLA PENTAPYLLOIDESQ.

APPENDIX Section 2^{da} Tab 99

Tragacantha cretica perennis a caespitibus prostratis, supra infraque
 inermis siliquosae gerens, nobis, pag. 53. pl. 5.

Tragacantha Graecae tenuis foliis
 incanis caeruleis flore albicantibus.
Tragacantha allena Quallist.

Tragacantha humilior flore
 bicolori lactea & purpurea.
Tragacantha humilior
 de exot.




Tragacantha humilior speciosior
 ramis ramificata, nobis *Traga-*
cantha altera seu *Asterium den-*
sum nobis, Prop. Alpini, de exot.

Tragacantha Cretensis
 aut *ileensis* nigra tota Echii-
 natz, nobis. *Tragacantha*
altera, Prop. Alpini, de exot.

Tragacantha tota spinosa &
Echium referens, unde *Echinus*
herbaceus dicta, nobis. *Traga-*
cantha altera humilior & spinos-
 aior *Echinus* dicta, Prop. Alpini,
 de exot.

Onobrychis major an-
 nua siliculis asperis ar-
 ticulatis, undulatis (ul-
 est aut primum & *Creticum*)
 puncta flore purpureo ru-
 beo, nobis.



Tragacantha h
 nobis.

Tragacantha h
 nobis.

PmfjtthftloMti nta.
 mum redumjrtrfr^tiim
 Sdirrernjre.rtrftj^x].!

PetiltphjtU'irt tntniJi
Jrjturr I'irto frtrtjttra
 procumbens viti-
 lo raciculos in ter-
 ram demittens, nobis, pag. 183. Ligo. pl. 2.



Burg. sculp.



Auspiciis D. Iohannis Holman
 Baronetti in agro Nor...

P L A N T A R U M

Hiftori[^] Univerfalis OxonienQs.

P A R T I S II.; S E C T I O II.

DE LEGUMINIBUS

Legumina difta putat Varro à legendo, quoniam ea non fee ant ur, fedvellendo kguntur. Græci oñtw vocant, at Theophr aßlm ^om.

Abfoluti do&rina fcandentium pomiferarum Herbarum, jam in hac Seftione fecunda aggreddiaraur Legumina, fequendo du&um nature, quia plurima eorum fcandunt, eorumque etiam fru&us inferviunt culinas: in hifce conveniunt cum fcandentibus pomiferis, ideo hie fubftituimus Legumina. Atque ut melius innotefcat quid fit Legumen in genere feu Herba papilionacea, filiquofa, bivalvis, de qua agitur in hac Seftione fecunda, affignanda venit ejus nota univerfalis 5c toti generi Herbarum papilionacearum, filiquofarum, bivalvium, effentialis. Legumen omne habet florem papilionis volantis formam aliquatenus referentem, tribus partibusconfantem, quarum major fupremum erefta, vexillum nobis dicitur, binæ alias funto labiales feu laterales, ampleftentes arfte rostrum parvum fupremum tendens, quod eft rudimentum filiquasfuturæ: fiori nuncmajori, nunc minori, colorem varianti, ficceditfiliqua (diverfe rtiagnitudinis^ bivalvis, duplici membrana feu pellicula confans, molli & carneâ exterius, dura & coriacea interius: binæ hx valvuk, fi comprimantur filiqua, imò maturo femine, fponte aperiuntur, & femina frutumivè edulem diverforumcolorum fundunt. Atque paucis hifce perfrinximus, quid fit Herba papilionacea, filiquofa, bivalvis, five Legumen.

Legumina five Papilionaceae Siliquofa; Bivalves

Scanderites Capreolis.

C A T V T I.

Pifutti; Lathyriis five Cicerçtila; Ochrns; Lens;

Vicia five Aplyca, Arachus five Cracca.

§ i. P I S I I M.

Pifum Græcis « w^ & <\$*i<ni ijocatur quod a 4[<xr» derivatum videtur, quod decorticari fignificat: plerique etiam AwV did putant, fed improprie: name* farinâ Leguminumpulvientiariū A&O did à Græcis^ Gahnus de tibk boni is^ mali fudt teftatur. Pifum vero à fifa loco, in quo ohm copiofiffime nafcebatur^ nminatam dicunt. Hujus Diofcorides non meminit, nifi forte cum Phafeolis comprehenderit: at Hippocrates, Theophrastus, Galenus, Mgineta. Nam Theophrastus* S.Hifl. ^Leguminum alia folium habent rotundum, ut Fab a-, alia oblongum & Pifum, iy hoc caulem humiprocumbentem habet: (sr 8. Wifi. 5- femina filiquæ inclufa, non intercepta, fedquafi invicem contingentia confifiunt: is? 3. Cauf 27. vermes in ipfo generantur, ob alimenti c&liq̄w intemperiem cumplu* minufve alimentiproebetur aut air immodice humi-

da* ficcufoe est, vet etiam. af, n non temfestivi humefdt. Plinim I. iS.c.j. isr 12. Pifi obiter meminit.

Genera duo sunt : est majus & minus : majoris semina reficcata angulosa sunt , inaequales angulos habentia , colore alias candido , alias fordido. Minus similiter duplex , aliud quod in boytia seritur : quod si pedamentis sustentetur . maius est : alias exivuum fructum runcus serius red- ffil , & illi? f? yW in agrisferitnr: y&r< iWtf utphirimum candidos, aliquando tamen ex purpuraobfcuros: fruttws colore luteo funde 2,^> Gr£Cis a luteo ochr£ cokre, ;m tyfiusfru* £iW we(*//d /fl/ewr re/er/, dkittrjfubinde vircnte.

TAB ' A h

Album—	1. Majw, Dod. Ger. Maj. - \ tatum, C. B. P. p
	2. Vmbdlalum, C. B. P. Go. nvtiferum. Tab. Comofumproliferum^^.^
	3. Ramutare bilonigro, nobk. Ramulare, Lugd. £
	4. Leptctobum, Cam. Sine cor the autmemkana irfterhre^ nobk. y Frutiu JTiajore allo^ ovato, nobk. Et fruFtumworeviridivelfubarUo, I nobts. \$
Pi/um	Maximum fubfufcum angubfum & fubfufcum majus, mbis. \$
	Maiips variegatum ex gtlvo iy punSlh nigris, isr minus variegatum, atia- que annuiflort rubdlo. % \ ;
Rubrum-	Spontanewn,prenm, rffWy humile* mhs* Spontaneum, mauwnum, * Spt£eZ'Ltn%ertriticu^ nohk. Fifumfitveifre, Ge, Ptfm
v	1 vulgareparvum arvenfe, 1. »• ?

Explicatio TabuU prim*, Se&hnis fecund*.

fi/i<madeo notum est lipp'<s& tonforibus, pucris & fenibus, ut longa ferie verborum, ant proluxa in ejus effentialibus aflignandis notis uti oratione, non est operEpretium. Pifum breviter habet biuncialem, rriuncialem, nunc longiorem filiquam, minimi digiti cral- fitudine proptndentem, cylindriacx format, prona parte concavam; iemina quafi fefe- contingentia aliorut" Oiultorum Leguminum more, nunc rotanda, nunc angulofa, aliquan- do ovacafeu'oblonga; colore alba, luteopallida, viridia , mfca fen fordida, imo aliquan- do fubn"»ric-intia & variegata : foliis lobacis, **beribas**, congenerum omnium Leguminum n' gnc. . ^ cau1e~ niajore flituloftoreque donatnr Piftm ; eftque a florum colore foliis majoribus, album, rubrum aut ochroleucum. Atque hęc in genere dixiffe de Pifo fufficiat.

1. Pifum majus flore albo, nobis. Majus, Dod. Ger. Pifum majus quadratum, C. B. P. Hoc ?i£vm sDodonxi cauleshabet longos, fiftulosos, frag!!<;s, excandorevirefcentes, ramofos, h ados, nifipr°P° appofitisadniicultsfuftineatur. Foliumtrequens ad fingula ge- ni ^i^mplunii modolongum, modo obtufum, cingens caulem ad nodos, ut vjdeatur perforari a caule in centro ejufdem, inter caulem. & ipfins fold meditullium protruditur cauliculus plureslobos, binos, ternos habens ex adverfo fitos, cujus extremoni claudtt caprcolus intortus; exeodemmeditulliooritur pedicuhisfemipalmaris, fustinens Mores plures, albos, papilionaceos (id est finguli flores lunt adinfar papilionis. volantis , quorum pars fuperior dicitur vexillum , & partes bina: labiales feu laterals cingunt roirrum filiquje future bivalvis fife, uti diftum fupra in doctrina de elTentkili nota Legaminum) quorum fingulisfuc- tduftiliquK fingnlis, bivalves, longa:, teretes cylindri rtgura; in harum fingUrium parte concava continentur grana, nunc plura, nuncpauciora, recentia rotunda, refic- cata angulofa. Pifum genus AUM%I appellant, fed parum proprie ut fupra diftum ; Ue>TIV.I^ fiquidem non peculiare aliquod Legumen, he* ejufdem genus ; fed pulmentari am est « Le- guminum iarinis. Fructus hujus rotundi funt, albi, autcinerei, imo fubfiavi conipic'mntiu fr- pi us.

2. Ptfutp umbellatum, C. B. P. 6f Ger. Pifum hoc nmbetlatum feu comofum vlx alia ra- tione benediftinguituracarteris, quam quod plures Hores, & confequenter pluresfiliqu. i. v. iinius cauliculi fummo innitantur. Dicitnrbelliterum quibufdam, eo praccipue nomine quod

quod flores & confequenterru & uſ involucria feu filiquas gerat vi fimmitate caulium fimui congefſas, Umbellarum quodammodo more, unde ei nomen umbellati feu umbelliferi Pifi vel comofi: cum ceteris omnes Pifi varietates, flores, & filiquas, ex fingulis geniculorum alis protrudant.

3. *Pifum* ramulare hilo nigro, nobis. Rasnulare, Hilt. Lugd. Hoc omnium eft maximum, atque feſe altius attollit, ſi adhibeantur bacali aut pcticae, quibus ſcandere poſſit: flores profert magnos, albos quibus fingulis fuccedunt filiquae *fingulx*, craſſe & tumide, cylindriacx, in quibus producuntur Pifa maxima, quorum unumquodque (pro nota ipecifica) hilo nigro afficitur, atque ſie facile a ceteris omnibus ſua fortis cognofcitur a primo iuſ intuitu: flore eft albo, aliquando purpureo & vario, partim albo & partim ex purpura obſeuro: fructu eft albo, rotundo, ruſſo, aliquando rubro variegato, fine hilo nigro. Eftque hoc hortenſe feu vulgatius majus, quod communiter venditur in officinis ſpermatopolarum, colore albo, viridi, cuius flos eft perpetuo albus nunquam ruber: at cujuſcunque Pifi flos eft ruber, fructus eft aut fufcus, ſubniger, aut variegatus aut dilute ruber. Hxc eit reguJa generalis inter gnia Legumina notanda.

4I *Fifum* pukhruni, folio anguloſo, I. B. Hujus Viticilli, quam vulgaris fativi, miſto funt tenuiores & delicatiores: ad foliorum ortum bina ſunc bliola lata, Aphaces Dodomi foliorum quodammodo xmula, ſed obtuſiora, ima utrinque parte anguloſa & ferrata, in pediculis verofoliorum, qiji in capreolos definunt, bina folia e regione oppoſita funt hinc iride, ad binarium vel ternarium numerum, Pifi majoris feu ramularis praecedentis bliis minora: flores ſitgulares papilionacei pediculis ſuis haerent, multo quam in vulgari minores, quibus fuccedunt filiquas bivalves pariter minores.

Pifa leptoloba five fine cortice duriore, Cam. Ex Vilda oppido Lituani allata, teſtē Lobelio, (bla hac ratione a ceteris diſtinguitur, quod filiquas cortice feu membrana coriacea interiore careant. Datur & aliud Pifum cuius filiqua plana, lata, curva eft, & quaſi fegmentum circuli refert; quod primo intuitu a curvitate filiquae ante omnia dignoſcitur: fruclu etiam donatur albo.

5. *Pifum* ſpontaneum perenne, repens, humile, nobis. Spontaneum maritimum Britannicum, Park. Hujus caulis eft triangularis & ſcatens geniculis, & hmi ſemper procumbit; cauliculorum ramis apponuntur folia rotunda, hervofa, quaterna, quina, ex oppoſitiſſima: atque in fummis ramulis per terram fratris, flores proveniunt oculo, decem, ſimul. Ullſti > diluterubri, pallidecaerulei in medio, quando omnino funt aperti: filiquaedentef paviter a fummis ramulis pendentes, ſingulae continent plurima femina, Pifi minoris magnitudine, cum femicirculo albo cingente ſingulagrana ad dimidiumfere, quae matura obſeuri ſunt coloris: radix profunde ſe terra inferit ad ſpithamam unam aut alteram, ibidemque late ſe diſtundit inter filices & lapillos ad oram maritimam Angliae: fructus eft amarus, ſicut & tota planta. Totaliter ſupra terram perit, ſingulis recurrentibus vernis tempeſtatibus, fibraſ multas, albas Convolvuli minoris inſtar emittit, beneficio quarum feſe mirum in modum multiplicat: ex femine copioſe procreatur hxc Pifi pcrennis ſpecies in agris cultis feu hortis, ſi feratur, quemadmodum ceterae ſuae fortis; etiamſi femina proje&a inter filices & lapillos ad oram maritimam Angliae non feliciter proveniant, ob defectum terrae; deinde avideab avibus illic lqca ilia frequentantibus clevorantur.

Pifi perennis datur alia ſpecies, a Cluſio in Hiftoria deſcripta, foloſorum colore albo, multifone in unam ſpicam congefſis itidem, & pari ratione, multis filiquis ſpicae in modum pendentibus. Provenit in Pannonia interamni, intra Dravum & Savum flumina, in jugis arcu Grebett vicinis, inter faxa rufcens, & in aliis locis Viennae Auftriacae vicinioribus ab eodem Car. Cluſio inveniebatur. Florebat illic Junio; femina matureſcebat Julio & Auguſto.

3. *Pifum* ſpontaneum nanum inter triticum, nobis. Pifum vulgare, parvum, arvenſe, I. B. Hujus Pifi parva funt grana, nee Vicix nullo majora, in quibus tamen punſta quxdam ex cinericeo purpurea conſpiciuntur, ut in Vicia vulgari, 6V ideo grana ſe femina non facile a Viciae feminibus diſtinguuntur. Herba vero ipſa & caules, folia filiquaeque, multuma Vicia vulgari differunt, ex primo intuitu Pifum ab omnibus partibus ſuis (praeter femina) kk detegit. Idem contingit Vicise purpureae, femina albo > Pifimiris inſtar. Nam quivis Botanicus fatiſ oculatus aegre poterit a fruſtu diſtingifere Viciſ. hujus purpureae femina album, Sepene rotundum, a Pifo ipſo minore fativo; Jed cum creſcentem, & florentem, ac filiquas proferentem aliquis obſervaverit, facile concludet, affi Viciam purpuream fruclu albo, Pifi minoris inſtar, Idem dicendum de Pifo hoc illo

dmfictufve est, vet etiam, mn non tempeftivt humef.it. Ptmitts I. 18. c. 7. is 12. Pifi obiter meminit.

Genera duo funt: est majm is minus: majoris femina reficcata angulofa funt ^ tn^quaks angulos habentia, cotbre alias candido y alias for dido. Minus fimiliter dupkx, aliudquodinbor-tiiiferitur: quod[1 pedament'vsuftmtetur, majuseft\ alias exiguumfruCiuncumqueferim red-dit, is itlud est quod in ngrhferitnr: flores habat utplurimum Candidas, aliquando tamen ex pmpura obfcuros: fructus colon luieo funde ^ fgn Gratis a luteo ochr* colore, quern ipfiusfi u-ftut medulla interior refert, diciturjffubindeviWJle.

T A B U L A I.

Album—	1. Majiis i Dod. Ger. Map. <i>tatvm</i> , C. B. P. ♀
	2. Vmbeilalum, C. B. P. Co., .>liferum. Tab. <i>Comofum proliferum</i> , I.B. ♀
	3. Ramulare h'ih nigro, nobis, Rawulare, Lugd. ♀
	4. Leftokbum, Cam. Sine cortice autmembrana'nTttriore, nobis. J Fruftu majore albo, cvato^ nobis. EifruftuininoreviridivelfubcceruLo, nobis. £
Pifum	
Rubrum—	<i>Maxhnumsubfufcum angubfum i*t fubfufcum majus, nobis. \$?</i> <i>Ma')U6 variegatum exgifoo is funSk nigris, iyminuz variegatum, alia- que annua flore rubello. ?</i>
	5. Spontaneum, pennne, repzns-> humih, nobis. Spontaneum^ <i>maritimum</i> , AnglicuTn^Park; ©
	6. Spontaneum nanum inter trititum, nobis. Pifum ftlveilre, Ger. Pifum vulgareparvum arvtufe, I, B. ^

Explicatio Tabula pr'mdt, Se&innh fecund*.

Pifum adeo notum est lippisSf tonfottbus, pueris & fenibus, ut longa ferie verborum, ant proluxa in ejus effentialibus aflignandis notis uti oratione, non est operrpretium. Pifum breviter habet biuncialem, trhincialem, nunclongioremfiliquam, minimi digici craf-titudine propcndentem, cylindriaca; formae, prona parte concavam; femina quafi icte cont'ingentia, aliorum multorum Leguminum more, nunc rotnnda, nunc angulofa, aliquan-do ovatafeu oblonga; colore alba, luteopallida, viridia, trfca feu fordida, imo aliquan-do fubnigricantia & vartegata: foliis lobatis, larvibus, congenerum omnium Leguminum foliis majoribus, & caule majore fitnlofioreque donatnr Pifum; eftque a riorum colore album, rubrum auc ochroleucum. Atque hie in genere dixiffe de Pifo fum'ciat.

i.T->^«majusfloreaIbo,nobis.Majus,Dod.Ger.?ifummajusquadratum,C.B.P, Hoc Pifum

I majus Dodonii caules habet longos,fitalofos,fragiles,ex candore virefcentes ramofos, hrjmifparfos, nifiprope appofitisadmitiiculisuftintatur. Folium frequens ad fineula ge-nicula amplum, modolongum, modo obtufum, cingens caulem ad nodos, ut vjdeatur perfrari a caule in centro ejufdem,iriter caulem.& ipfms folii meditullium protruditur cauliculus plures lobos, binos, ternos habens ex adverfo fitos, cujus excremum cbudit capreoUis intortus; ex eodem meditullio oritur pediculus femipalm2ris, fufinens rlores plures albos, papiionaceos (id effinguli flores (untadmftar papilionisvolantis, quorum pars'ftiperi-or dicitur vexillum, & partes bins labiales (en laterales cingunt roivrum filiqua- futurac bi-valvis &c. uti diftum **tnpra** in doftrina de eflentrali nota Leguminum) quorum fingults fuc-to dntnt fliqaz fmgnte, bivalves, longse, teretes cylindri figura; in hanim fingularium parceconcava continentur grana, nunc plnra, nuncpauciora, recentiarotunda, r<(U-cata angulofa. Pifum genus *Xsufa* appellant, fed pa ram proprie ut fupra diftum; *tfief&QIS*. fiquidem non pecuiiare aliquod Legumen, nee ejufdem genus; fed pulmemarium est «* Le-guminum iarinis. Fruftus hujus rotundi funt, albi, aut cinerci/invo fubflavi contpici^ntur lie pius.

2. *Ptfutp* umbellatum, C-B.P. & Ger. Pifum hoc nmbellatumfeu comofum vix alia ra-done benedidin^uicuræeffteris, quam quod plur_{es} rlores, & confequenter pbresfiliqujr. wnus cauliculi fammo innitantur. Dicitur umbelliterum quibufdam, eo prfcipue nom'mt

quod flores & confequenter fructus involucra feu filiquas gerat in fummitate caulium fimul congeftas, umbellarum quodammodo more, unde ei nomen, umbellati feu umbelliferi Pifi vel comofi: cum caeterae omnes Pifi varietates, flores, & filiquas, ex fingulis geniculorum alis protrudant.

3. *Pifum* ramulare hilo nigro, nobis. Rasnulare, Hift. Lugd. Hoc omnium eft maximum, atque fepe altius attollit, fi adhibeantur bacdi aut perticse, quibus fcandere poffit: flores profert magnos, albos quibus fingulis fuccedunt filiquas fingula?, craffe & tumida?, cylindriacae, in quibus producuntur Pifa maxima, quorum unumquodque (pro nota fpecifica) hilo nigro afficitur, atque *fie* facile a caeteris omnibus *fua* fortis cognofcitur a primo liuftus intuitu: flore eft albo, aliquando purpureo & vario, partim albo & partim ex purpura obfeuro: fructus eft albo, rotundo, ruffo, aliquando rubro, variegato, fine hilo nigro. Eftque hoc hortense, feu vulgatus majus, quod communiter venitur in officinis fpermatopolarum, colore albo, viridi, cujus flos eft perpetuo albus nunquam ruber: at cujuscunque Pifi flos eft ruber, fructus eft aut fufcus, fubniger, aut variegatus aut dilute ruber. Haec eft regula generalis inter omnia Legumina notanda.

4: *Pifum* pulchrum, folio anguloso, I.B. Hujus viticuli, quam vulgaris fativi, multo funt tenuiores & delicatioris: ad foliorum ortum bina funt foliola lata, Aphaces Dodonsi foliorum quodammodo aemula, fed obtufiora, imò utrinque parte angulosa & ferrata, in pediculis verofoliorum, quae in capreolos definiunt, bina folia e regione oppofita funt hinc inde, ad binarium vel ternarium numerum, Pifi majoris feu ramularis praecedentis foliis minora: flores figulares papilionacei pediculis fuis haerent, multo quam in vulgari minores, quibus fuccedunt filiquas bivalves pariter minores.

Fifa leptoloba five fine cortice duriore, Cam. Ex Vilda oppido Lituaniae allata, teste Lobelio, folia hac ratione a caeteris diftinguitur, quod filiquae cortice feu membranâ coriacea interiore careant. Datur *6c* aliud Pifum cujus filiqua plana, lata, curva eft, & quafi fegmentum circuli refert; quod primo intuitu a curvitate filiquae ante omnia dignofcitur: fructus etiam donatur albo.

5. *Pifum* fpontaneum perenne, repens, humik, nobis. Spontaneum maritimum Britannicum, Park. Hujus caulis eft triangularis & fcatus geniculis, & humi femper procumbit; cauliculis ramis apponuntur folia rotunda, hervofa, quaternaria, quina, ex oppofita: atque in fummis ramulis per terram fratis, flores proveniunt oculo, decem, fimul juncti, dilute rubri, pallide caerulei in medio, quando omnino funt aperti: filiquae dense pariter a fummis ramulis pendentes, fingula continent plurima femina, Pifiminoris magnitudine, cum femicirculo albo cingente lingulagrana ad dimidium fere, quae matra obfeuri funt coloris: radix profunde fe terra inferit ad fpithamam unam aut alteram, ibidemque Tate fe diffundit inter filices & lapillos ad oram maritimam Angliae: fructus eft amarus, ficus & tota planta. Totaliter fupra terram perit, fingulis recurrentibus vernis tempeftatibus, fibras multas, albas Convolvuli minoris infar emittit, beneficio quarum fepe mirum in modum multiplicat: ex femine copiofe procreatur hanc Pifi pcrennis fpecies in agris cultis feu hortis, fi feratur, quemadmodum caeterae fuae fortis; etiam fi femina projefta inter filices & lapillos ad oram maritimam Angliae non feliciter proveniant, ob defeculum cerata: deinde a videab avibus illic loca ilia frequentantibus clevorantur.

Pifi perennis datur alia fpecies, a Clufio in Hiftoria defcripta, foliorum colore albo, multaque in unam fpeciem congeftis itiderii, fpari ratione, multis filiquis fpecie in modum pendentibus. Provenit in Pannonia inter amni intra Dravum & Savum flumina, in jugis arcu Greben vicinis, inter faxa rufcens, 2f in aliis locis Viennae Auftriacae vicinioribus ab eodem Car. Clufio inveniebatur. Florebat illic Junio; femina maturefcebat Julio & Augufto.

§. *Pifum* fpontaneum nanum inter triticum, nobis. Pifum vulgare, parvum, arverfe, I. B. Hujus Pifi parva funt grana, nee Vicise muko majora, in quibus tamen puncta quaedam ex cinericeo purpurea confpiciuntur, ut in Vicia vulgaris, & ideo grana feu femina non facile Viciae feminibus diftinguuntur. Herba vero ipfa & caules, folia filiquaeque, multum a Vicia vulgaris differunt, ex primo intuitu Pifum ab omnibus partibus fuis (prater femina) Me detegit. Idem contingit Viciae purpureae, femina albo, Pifiminoris infar. Nam quivis Botanicus fati oculatus aegre poterit a tritu diftinguere Viciae hujus purpureae femina album, & pene rotundum, a Pifo ipfo minore fativo; fed cum crefcentem, & florentem, ac filiquas proferentem aliquis perfervaverit, facile concludet, Viciam purpuream fructu albo, Pifi minoris infar. Idem dicendum de Pifo hoc 110-

viffimo, fpontaneo, filvefti, annuo, fru&u Viciae: caules enim, folia, & filiquae produnt ipfum effe fpeciem Pifi lilveftris. Provenit inter triticum, aliafque fruges, cum in Gallia, tum in Anglia, Belgio, & etiam alibi locorum. Eft & alia perennis Pifi fpecies Clufio in Hift. foio florura multorum colore albo, in fpicam c^o ongefitorum, & pari ratione multarum filiquarum fpicz in modum itidem pendentium difcrepans. Provenit in Pannonia interamni, ultra Dravum flumen, injugis monium arci Greben vicinis, inter faxa nafcens. In aliis locis Vienna^a Auftriacae Wcinioribus, ab eodem clariffimo Carolo Clufio inveniebatur. Floret Junio, atque ejufdem femem maturum eft Julio & Augufto.

LOCUST MPUS.

Omnes h<z Pifi fativi fpecies coluntur in ho) . • agris. At Pifum perenne, reperts, famile, prwenit fponte is copiofe in or a man-ma Suffbkide, inter Aldeburgum is" Orfordiam, anno 1555. à villkis illic degentibus detettum. Vigebat in macro, fertili, fabulofa isr lafulofa agro, ubi nihil herbarum, imo nee graminis cernere licuit. Ingruente tunc-temperis annon caritate, ob defectum melioris nutrimenti, indigene five accoU illiws Plagdt maritime, faltem tenuior conditions, ad eas incitas redacti, ut quod cuique in promptu vitx fuftinendx aptum fefe obtulerit, comederent: multi in earn penuriam is? inopiam inciderunt, ut glandibits etiam vefci cogentur, hoc pabulo in fumma neceffitate reperto Utabunde viclitarunt. Nee eft dubitandwn quin > b<tc Pifi maritimi fpecies perennk à mult is retro feculh ibidem creverit, etiam ft meliore cbfonio accoU illic aliis annis refecti, hujut noh vieminere. Provenit etiam in plurimk aliis loe'vs Anglic fionte, ad litu* maritimum SufexU non procul ab oppido patting?! difio. Vide Gefnerum lib. de Aquatilibus 4. ^ . 256. qui ex verbis illic allatk, fat is luculenter hiftoriam refer t ex Domini Caii epiftolis, qui Cantabrigide Collegium Median* ftudiofis fundavit (y dita vit. Eft is^l aliud maritimum Britannicum, quod exhibet Parkinfonus, item is tertium in Defcriptionibus. aferens omniaperennia; fed fallitur, nee debet multiplicare entia fine, neceffitate, quemadmodum alibi. In, multis generibui multas adinvenit sjecies diver fas compiler Tabernemontanu*, qu<£ neutiquam dare cernenti Botanico, unquam appnrre diftinf* sjecies; fed forte varietates à job is cceb, qu<z confufionempotius pariunt animo legentium, quam dilueidam doctrinam.*

TEMPERAMENTUM & VIRE.

Pifam teftes Hippocrate minus Fab inflat, per<lvum< utcm magis, recedit Et Galenu* Pifa cum Fabltota fubftantia quandam habere fimilitudinem inqmt, eo demque modo cum Fabkfumuntur HhuabJtamen rebut, abm difcrefant, turn quod non, *que ut Fabfunt flatuknta turn etiam quod detergendifaeultatem non habeant, ideoque fegnius quam ill per ahum feedunt. Et ut ait fcbola Salermntana,*

Sunt inflativa cum pellibus, atq; e nociva,
Fellibiis ablatis, funt bona Pifa fati.

TurnerTM Medicus Anglx tandem omnibus, quotquot ventriculum aut lienem habent flatibus obnoxium, minium F if or urn ujum quacunq; ratione pr<xpar at or urn ejfefugiendum fua det nifi addatur Anifum, Cuminum, autiyintha, aut afiud aliquid £<pvm. Coquiigtu/pulverem Ment*, SatureU aharumve calidarum berbarumpulti Piforum addunt.*

N O M I N A . PISUM FLORE ALBO.

1. Pif_{um} majus quadratum, C.B.P. Pifum majus, Ger. Vod. Angulofum feu hortorum. Plinii, Ad. Lob. Quadratum Plinii, Lob. Icon. Tab. Pifum magnum peregrinum., Eyft. Pifa major a alba, l. B.
2. Pifum umbellatum, C.B.P. is Ger. Proliferum, Tab. Vmbellatum fetl rofeum, Park, Pajad.
3. Pifum rawlare bib nigro, nobvs. Ramulare, Lugd. Hift. Ma jus, Matt h. Fuch. Pifum vufgatus majus, Ad. is Icon. Lob. Minus, Vod. Ger. Vulgare, Park Par ad.

4. Pifum

4. Pifum puhhrujn folio nngidofo ^ I. B.

Pifum kpto!obum,fcam. Lptoiobwn feu fine cortice nut membrana duriore, nohh. Hoc isra-
Ha, qua non egait figtira, tantum dtferibuHtuY, quiafacile a nota aliquid certa, ipfis
peculiarly is ftecfificecoTivmiente', arliqih figurathdiferuntur.

J'ifum filiqxh atrva, plana fete deprefd, ntibis. *

V'i(umfru3u m.yore albo, ovato, nobis. Pifum fruffit rminore viridi, vd minore fubc<eru!eo<
nobis. >

PISUM FLORE-RUBRO.

Pifum maximum-, fubfufcum, angulofu, . * minus fuhfufcum.

Piium majus varkgatum tx gilvo & f j nigris, & minus variegatum, ii? ft qua aluc
R-ccies aut varietates anting Fiforum^ fkre rubella ctonaioitm^ f&te riomhribus adaptatk
tjuam facillime poterint nominari a detegentibus iy obfervantibus differential?!

5. Pi Tum Sfontaneum, perenne, humi!e,repem, nobh. Sihejlre perenn^Ger.C. B. P. Spoil-
t.tum maritimum Avglkwn , is a Hud marhimum Britannicum, lark- Cqui duos ap-
ton'tt figuras, divtrfmodepittas, pro una is eadem planta, fedfruftra , moneme Johanne
Raio,cum una tamum reperiatur Species perennhPifi difiinSfa hie in Anglm) Pifum fihefln^
Ad.Lot.Cluf HiftvGer.Tab. qui iriutihter indem dual app'ngitfigures fobnamine ma'jorii iir
minorhji quo mutuatm eft Park}7tfohm. Pifum /ihefire, Pannonicum^ Cam. Silvejfre^ I. B.

6. Pifum Sfontineum nanum infer triticum, nobti, Silvefirt 1. Park.' Pifum vu/garepar-
vum arvenfe^ I. B.

HAtLUCINATIONES CASP. BAUHINE.

Aiiorumque Amhorum.

Piffg. S4Z. col. 1. pi. Pifum vejicatum frufunigro, nlhi macula natato, C.B.P. l'ifum cordatnm & cor Indnm, Lab. Effj. Sic. Secuniium A&firin«m • ajham exilirre nature tmtifiam, li.rc jilantula mah pro fiicit Pifi hie eelocatur inter Pi fa, quorum tiota fttittiahr huic nftt iqitnm curvetit. Nos brvVltriS, ar^iitncntando < Arfinittane ad dtfinittm, tonctufamns male hie in/h bane plmitam. Prime Omnia Fifapropfie diUa fiorem habfntpapilionaceum, atqin eidm futcedentem jiliquam bivolvem, coittienretn in pranaparte fricm [tm'inum tic. sft. hac plai]»ia iSuBatenul turn Legiimicibnt, multo minus cum Pijis tonvenit, nee jlorc , ncc fUipm, nte fentitile i ergo tfti Pijis avtrrtmcanda, atqite alio mandnda, tit docuimus in i'ralnd. Botaniccrum pag. 3-fl- Eft (trim HeterocUta & fur gener't plnnta, nee vuli affociari aliis, £ fine ultimo, id rjlmadojorendt £? jTitHlfitavdi, mtiltotiiuus J'ifii. Fide tpxpliclientm Tab. ^ScSioniiprima, verfit;fintm: rffidiluiidr tpxpicattiT, & ibirkm earidem lallvtavimus Prajitr jcmteiidt facultatem capreolis, nrfecitlirt qrt. Mtlias <3 (iptius referre, appeti/indo Haluacubiim pfejirinum veficarium , Jraifn nigro macula alba notato, prfter vificam trihu lecitamentii difHnSit jepuratam, (3 in Jmgtiitluuttmtmisumaimgraatm ni'rum, alba macula, cardiformi in'ignitum. SicapitUvimus aim a I Us wynoulatmihus % ttiamfi nuttquamtoiw'n'iat Haliaicabo Solatia, at pojfeanota-Limtu. Si minus apte Otic inter fiandentes, ad firum CenvdvuoTtim, (ollixatur birr platita, aptiusqiti-:(ibet eaitditn (llgget per me nouftabit; fed rrgu/a in-faRibiii a Ftjftft amandanda (2 frparamla,nouob-
fian
err
negle
nera
L
litu prater egumina.

Pag. 343. eel. 2. pi. I.I (/ I I. Pifum IndictiM maim, minus ceitinmm t? i-irnlitium Chinenfe, C. B. P. jibriif, Latinis S3 jflpino. Non/ant hircL.c~gtintina Pifa dicenda, quia umi dooantur tapreolit; fecmido, folia babnt Vnia, miltii fbl/d/i alati\$ conjugatim cof/e medim adbirrtntibitj dnuita -, tertio, Jcaudtiit beiejicio iſtltm, won cahrcQertm > qiiibt (at ptpra didum) dtjitiuntar: ergo turn Pbaftelis jus Legiiminibus tongencribtis, van atm• Pi/is, mca. fintenlia , fujfrararitt fillht ratitme, difpom debucre a Cajjiaro Bm'hiw, cum folit ha Abri fpecics inter oniwit hejitiuita WiVmuzM l'haftelu, ji> conjidtren* tar quoad[candendi caulibui jacaltatcm. Eft Cj alia (becirs Lfpumitus fcandent etiam te.uhuits , stjbazatut jfmericanus, jpicatus, jcandns, radice tubero-fa,nobit,jfpjas Americana, Com. TerraglaudeiFir-
fuitFily, Faly! Ametuiqnam hie dffioi aebellum A-
ri jpeaebut non obftante foliorum dijpojitioe Jimilt, & Jiandendi facilitate caulibni ctiam; fed a fine a,-timS, cum poft fiorem rmarcidumpreducat jitiquamge-mellam, dupUccmve fcmixum fertcm, cum juts confi-milibus locav/muJ, inter Ajhagit^m fdtquagcmetla affeHos. yidebujus Scffionis Cap. 9.

Tag. il7. dc Levumiuibiii'cnprcolii denatis. Fa-ba i Smilax bortnjii, five Delicbus, five Pl/aJialuJ, Cf Arachidna: hicc tria Legitimintm genera interme-dia , malt inter taprtolii donata collocatitur ;; Caffpa' ft Baubino (Pifum feilicet, Lathyrntt foe Ciccnu-lau, Othrtim five Erviliam , Lentcs, fiaaa)& Aphacam, Aravhum five Craccam) tumntc Faba, vet Pbajeatus, Jive Smilax hartenfir, five Dohcbur, arc Arachidna iifdem polleant. Ex libra naturie nai dooli, ea adfua fubalterna genera , adqax pertinent, jeduximus ,tit trnrtt liet infra in dollnna naJhaLe-gaminum.

L E G U M I N A

Sive Silicjuofa^ Papilionaceae, Bivalves,


Scandentes capreolis.

yi. LATHYRUS flyeCICERCULA


L Egumen, quod Graeci λάρυκος appellant, à Colamella & Palladio Cicercula dicitur; de quo Theophrastus 8. Hist. Plutarchus in Probl. Romanis scribit Pythagoricos aversatos esse Fabas λάρυκος. *krbaqb hac dwerfa est, de qua inter Titbmahs.* *magna est, in folio-
rescenscente; siliqua-*

Vuptex est nam velfentur vel tyonte provenit: & in filve/lri, differentia magna est, in folio-
rescenscente; siliqua-

T A B U L A II.



T A B U L A III.



Explicatio TabuU fecund<e, Sefitionis fecund.*

Lathyrus convenit cum caeteris Leguminibus scandentibus capreolis, florum figura papilionacea & filiquis bivalvibus: kd à caeteris scandentibus capreoli differunt in hisce, quod folia binatim producat cingentia caulem latiore basi, atque definiunt ut plurimum in acutum mucronem, quae pariter angulum constituunt acutum, five firi latiora, five angustiora, longa, brevia, glabra five hirta: caules ramosque producit angulosos, id est ad membranaceam cinguntur hinc inde & caules & rami; quae membranacea ala extenditur ab ortu singulorum foliorum ad subsequens inferius geniculum. Hoc est Symbolum, seu nota subalterna generica, qua cognoscitur & distinguitur omnis Latin: is à reliquis Leguminibus scandentibus capreolis.

LATHYRI LATIFOLII PERENNES.

L *Atbyrus* arvensis, radice tuberosa, repente, nobis. Terra? glandes, Dod. Ad. Lob. *Li* Apios, Fuch. Trag. Terras glandes seu *Lathyrus* hic arvensis, radice tuberosa, repente, donata, infirmis seu exilibus cauliculis exeunt: folia tenuia & parvula, oblongis & tenuibus adnascuntur pediculis: flores in fummis caulibus piffo omnino fimiles, fed minores ut plurimum, & ex purpura rubent; odoris non ingrati Rofarumpallidarum, quorum singulis filiquae parvulae, oblongae, compressae, simul plurimae congestae succedunt, in quibus singulis femina quatuor aut quinque, rotunda, compressa, videre licet: radices craffe, oblongae, glandibus corporis humani formam quodammodo fimiles, fed multo majores, foris nigrae, intus albicantes; sapore fere castaneae, à quibus inferius longae tenuesque fibrae dependent & exeunt & ab eisdem aliae fibrae juxta caulis exortum, quibus oblique serpentes alias adhuc adnascuntur glandulae, radicibus ita se multiplicante stirpe hac leguminosa arvensi.

Lathyrus Boëticus flore luteo, Park. Hic 2^{us} in Tab. aenea sculptus, fit 9^{us} ordine, quia est planta annua. Vide infra in explicatione 9^{ma}.

2. *Lathyrus* filifolius dumetorum, flore luteo, nobis: Luteus filifolius dumetorum, I. B. Cauliculi hujus sunt tenues, imbecilles & angulosi seu ala membranacea hinc inde obfusa, qui capreolis suis vicinis stirpibus se implicant: folia parva oblonga, mucronata, binatim etiam aliorum more ex opposito coherent cauliculis, cana lanugine obdusa, pediculo capreolum emittente: filiculi minores papilionacei & lutei: radix tenuis Jongelateque serpit ac repit, at nullas glandes extuberantes in radicibus profert, ut superior, qui est radice tuberosa & repente. Durabilis tamen in multos annos, sepe rependo radicibus propagat uberius, quam feminibus.

• 3. *Lathyrus* latifolius, C. B.P. Clymenum, Matth. Haec *Lathyrus* species folia sua bina longissima & lata fatisitidem habet, alas membranaceas valde conspicuas, caules hinc inde cingentes, atque caeteris hujus classis omnibus partes majores passim protrudit: flores producit plurimos simul junctos fatis amplos, Pifi magnitudine asmulos, duplici rubore, faturatiore interius & dilutiore exterioribus conitantes: odorem emittunt fatis gratum: floribus singulis deciduis succedunt filiquae omnium longissimae, quarum singula continent novena, dena, femina rotunda, nigra, aut potius subfusca. Radice constat nodosa, nigra, serpente, 6c profunde fatis in terram descendente. Male à Lobelio Aa^{is} dicitur, *Lathyrus* enim de Cataputia minore officinarum dicitur.

4. *Lathyrus* angustifolius alter, I. B. *Lathyrus* filifolius major, C. B.P. Hic tertio latifolius in omnibus accedit, prater exiguitatem suam partem omnium; est enim planta in filvis caeduis una cum latifolio in meridionalibus proveniens; radicibus suis longe serpentes pariter in multos annos durans, sicut latifolius. Uno verbo folia sunt multo angustiora: flores minores etiam, & dilutius superioribus rubentes: femina minora, minoribus & brevioribus filiquis inclusa: in caeteris omnibus cum majore convenit.

5. *Lathyrus* a. w. u. w. p. m. seu supra infraque terram filiquas gerens, nobis. Haec parvula *Lathyrus* species cauliculos pedales, per terram fratos gerit, ad quorum singula genicula protruduntur bina foliola angusta, mucronata, atque ex alis inter cauliculos & folia protruduntur capreoli curti, & petioli breves itidem, sustinentes flores dilute rubicundos, papilionaceos, quibus singulis succedunt filiquae unciales, duplici membranacea ala in prona parte cinctae, quemadmodum observare licet in *Lathyrus* fativo, & yEgyptiaco, in quibus singulis continentur bina aut ad summum terna femina, rotunda; radice constat fatis numerosa,

merofa, fibrillis junctis atque infuper filiquas intra terram gerit continentes in fe femina, feminibus filiquarum floribus succedentium supra terram paria, Arachidnae Theophrasti infar. Hujus (emina communicata habuimus ex civitate Afiae Ctialepo di&a, à Domino Roberto Huntington Colkgi) Merconerffis Socio digniffimo, cum multis aliis rarioribus Afiae plantis, de quibus omnibus, loco & tempore dicemus in fingulis fe&jonibus infra exhibendis. Vide figuram in appendicc ad Legumina. Provenit in Afia, Syriaque iponte: floret apud nos Augufto & Septembri; Odobri maturantur femina in filiquis + cum iupra, turn infra terram. De viribus non confat: nee alia adhucei indita funt nomina praeter fuperius à nobis afignatum.

LATHYRI LATIFOLII ANNVI.

6. *Lathyrus fativus* minor femine angulofb, nobis. Sativus flore fru&uque albo veipureo, C. B. P. *Lathyrus* hie iativus flores edit papilionaceos, albos, rubros; albis floribus luccedunt alba femina bina, terna, angulofa: rubris autem floribus eju&dem succedunt etiam femina rubra, angulofa, bina, terna, contenta in filiquis curtis bivalvibus, femiuncialibus, in quarum prona parte eft duplex ala membranacea hinc inde dufta; atque hifce notisquam facillime à caeteris omnibus fux tribus (prseter *Lathyrum* iEgyptiacum tertium in fequenti Tab. & amphicarpum 5. in hac Tabula defcriptum, cujus icon exhibetur in App. ad Legumina) diftinguitur. Radice confat gracili, fibrofa, pereunte poft fructum ad maturitatem perduftum.

7. *Lathyrus** arvenfis filiquis Pifi minoris, nobis. *Uxc* parvula & annua *Lathyrus* fpecie? convenit cum antediftis & fequentibus *Lathyrus* in omnibus partibus generaliter eflentialibus, atque facile cognofcitur fola filiqua minore, curta, cylindracea, adinfar Pifi minoris.

8. *Lathyrus* arvenfis, annuus, luteus, filiquis hirtutis, nobis. Hie itidem convenit in partibus generaliter *Lathyrus* affignatis, at pediculi fuftinentes flores luteo pallidos feu potius ochroleucos funt longi, fe&quipedales aliquando, vulgo palrrmres, fecundum folim cui innafcitur: filiquae funt longae, afperse feu potius hirtiutae; femina itidem ibidem contenta funt rotunda, ruffa, vcl nigricantia, fuperficie crispa, afpera hirtave.

9. *Lathyrus Beticus* flore luteo, Park. Hie caules profert ternos, quaternos, ulnam excedentes, binis alis membranaceis hinc inde cinftos; more omnium aiorum *Lathyrorum*, quin & bina foliola brevia, latiuicula, angulum acutum confituentia mediantibus cauliculis; inter caulem & alia foliola protruduntur capreoli, quibus proxima quaeque aftantia admicula apprehendit: flores fert luteos, venis purpureis diftinctos, quibus fingulis succedunt fingulae filiquae longae, plurimx fimul jun&se, in quibus contineiltur femina rotunda, afpera, quina, fena, nunc plura, nunc pauciora.

10. *Lathyrus** luteus, annuus, foliis *Convolvuli* minoris, nobis. *Aphaca*, Lob. *Lathyrus* hie aflurgit caulibus tenuibus, angulofis & quadratis, geniculatis, Lente multo altipribus; folia ei funt parva, tenuia, latiuicula ad bafin, & auriculata, quae caule periorari videntur, atque in ac<tum mucronem definunt; e fingulis geniculis bina fubinvicem opponuntur, & ex horum ortu verfus pediculum tenues viticuk, & graciles pediculi fimul oriuntur, flores gerentes fingulares papilionaceos, parvos, luteos, quos filiqua fequuntur finguiare, parvse, latae, Lentis multolongiores, in quibus fingulis femina quatuor quina velata, nigra, dura, rotunda, latent, Lentis femine pariter minora, radicebus innititur parvis fibrofis. *Vicia* lutea totius *Convolvuli* minoris dicitur *Capp. Bauhino* led perperum, etiamfi nos itidem inadvertenter ejus iconem inter *Vicias* collocavimus in Tab.

4. IQCO qmnto, hoc nunc retraamus, quia non habet conditiones requifitas ad *Viciam* confituentam, id eft plunma folia univachi feu nervo medio conjugatim feu lobatim adherentia, veluti vulgo omne *Vicia* fpecie poffident; Sed cum bina folia ex oppofico cauliculi adnata, angulum acutum confituentia gerat, atque caulem quadratum alis quatuor parum eminentibus donatum, revocavimus huc (ad congenera iua *Legumina*) *Lathyrus* claffem. Vide iconem loco quinto in Tab. 3. inter *Vicias*, fed *Vicia* huc nobiscum ex libro naturae edoftus.

LOCUS & TEMPUS.

- ik .Lathyrus arvensis radice tuberosa repente, nobk. Terr<z.Glandes, Vod. Ad. Lob. Hicpro^
•vtnit inagrkfrumentacek, turn una cum ipfisfrugibus, turn circa margines agrorum: in ru-
bet is isfenticetk rep&riuntur terr& Glandes affatim in Germania superiore, Bohemia Belgi<£-
queplurimk lock etiam fyorite. In Galliapffim itidem a nob is repertx tefr* Glandes ,ednuf-
quam abundant ius quam inter fruges circa BUfasfatas, quaruniflores fuavifhnum eruftabant
odor em, Rofarumpallidarum in agrk illic cult arum hnulum. Seri pot est kic Lathyrn* radict
tuberosa , etiam femine, fed multo magkviultiplicatur is' citius perficit ur radices una enim
glans feu tuber nodofum in terrain fidemittaur, »in plures brtvi fefe^rop^agat: floret Junio
is? Julio, atque cumfrugibus demetitur, (sr ifitife Septembri aut Oftobri "poft mejsem colleclam
agris aratro denuo evoluk apparent, & colliguntur radicum glandes copiofo numero^ab.in-
digink etiam.coft<e efitantur. Per tot am hmem agri qui hifce glandibm refertifunt, a pore is
fuiufve quam facillime deteguntur, atque e<zdem ab ipfis efofl rofirh? a vide devorantur, qui-
bus cito impinguantur.
12. Lathyrus luteus filveftrk dumetorum , l. B. Hie etiam [ecus agrorum is fdvarum margi-
nes , is; in aliis lock'paffim Sfonte provenit: floret per tot am fere xftatem, atque verfmj-
nemjulii isr initium AuguftiperficiunturfilikuSt oblong^parvuU^ compre(j<z, tern<£, quatern^
exfpmuni petiolopendentes %femina quina, fena7 rotunda circulariter^ at comprefsa quodam-
viodoreperiuntur.
3. Lathyrus Utifolius, C.B.P. Clymenum, Matb. Sponte hie provenit in lock graminekfie-
cioribm PanngnU; etiam Auftrid isr StirMpratk nafcitur: floret per totam^ftatem isr zierjus
•finem ejufdem feminafu a perficit: frequentiu* in Auftria reperitur, tefte Carolo Clufw. ,-. ;
4. Lathyrus major filveftrk, C. B. P.. Alter major Narbonenfis angufticre folio, nobk. Angufti-
folius, l. B. Floret in agro Francofurtenfi; etiam in filvk Burgundiack mihi f<xpe obviufuit
isr hie, is/ latifolius fupra nominatm ClymenumMattheoli. In Gallia Narbonenfi tefte Lobelio
ivJohanne Bauhino ; flores utriufque per tot am <eftatem fere confpicuos, ad topiarias.isr per-
tkales fceñas feu attegias ornandas aptos confpicere licet, unde abufeve dicuntur Pifafempiternct
apud Angloſ hortulancs, a diuturnoflorendi tempore : femina utriufque viaturantur exeunH <£-
ftate.
5. Lathyrus <tV^^*p^s feufupra infraqueterrainfiliquasgerens, nobk. Exfemine Ha/epa ddnos
miffo floruit fubfimmjunii, is femina cumfupra turn intra ten am maturavit Novemhri.
6. Lathyrusfativus minorfemine angulofo, nobk. Sativws flore frucluque albo vel purpureo, .G<
B.P. F(ic ecliturin hortis is? arvis'ItalU, Qallice, is alibi etiam locorum: ubi sjonte pro*
veniat, hucufque ab authoribu* ignoratur : floret ineunte Maio, is filiquas perficit Jftatt.
7. Lathyrus arvensis filiquis Pifi minoris, nobis, Provenit in arvis Frumento, Hordeo, aut A-
venafatis, ubi floret ineunte reflate, eadem exeunte femina fua rotunda minor a perficit. Re-
plritur isfruclu albo is variegata.
8. Lathyrus arvensis annum luteum filiquis hirsutis , nobis. Latbyru*filiqua hirsuta, IB. In
agris Charmont, necnon verfi agrQs Chaftenoy circa agrorum illic limites a Johanne Bauhino
reperus, eundemetiam Audincourt verfusflorentem Junio, is femine maturo onuftum Augufto
obfervavit idem loh. Bauhinus. Itidem circa Lugdunum is Bafileam invenit Caf. Bauhinus.
Aos interfata circa Bicefas, is intra fepta RegU Chambort infatispariter, frequenter repe-
rimus. Lathyru* purpureo flore, filiquis hirsutis, nobis. Hie facile diftinguitur, a primo intuitu
floris fuipurpurei ab arnenfiluteofiliquis hir^itis.
9. Lathyrus Beticus flore luteo, Park Cdebut h'c collocari or dine nonus fequendo durationem
inter annuos, etiamfi fecundolocofculpitur in Tab.oeneaJ In Bmica atque a/ibi locorum in a.
grisfrumentaceis Hisjaniarum provenit.; floret illic ineifnte <rftate, is paulopoft menfan fe-
mina fua perficit. •
10. Lathyrus luteusfoliis Convolvuli minoris, nobis. Aphace, Pod. ut. (in agrisfrumentariis Uto
pinguiquefolo, una cum Tritico, Secali, atque aliis frugibu* exit: floret Maio, atque ejm fi?
per totam a/it em naturatur.

T E M P E R A M E N T U M & V I R E S .

- .j. Lathyrus arvensis radice-tuber of a repente, nobk. Terrjeglandes, Dod. Cott* acincibo^af-fumpte, difficilium quam Rap & aut Pafinac** radices concoquuntur, alimeriti tamen non minus quam Pafinac<£ radices subminiftr ant, minus quam ilU inflant, tardius descendunt, ventrem quoque astringunt: crudt etiam efitat* difficilium concoquuntur, is degrius descendunt: sunt mediocriter caliddt is magkfidt cum non txigua aftritione, inde nonfolum ventrk fluxiones, fed is fanguinkfluores,prdefer Am ex utero aut per veficam, reprimunt.
6. Lathyrus minor fativus femine angulofojobk. Sativus flore frucluque albo vel purpureo, C. B. P. Deficcat excessu feciudo, calefacit verò primo^ idem capitis gravitatem facit, ventrem turbat, fañguinemque per urinam ducit, fit comedatur) yu4 frutlws: costu* tamen bobus appofitus eodem farina: farina e'jut bonam facit alvum, urinam cit-, corpris colorem commendat. Frequentior ejut usu6 in efu^ aut potu, fanguinem cum torminibus per ahum ist veficam ducit: ulcera cum melle purgat: kni gines iy afpredinem cutk in facie, ejufdemque maculas, is reliquum totum corpus mundum reddit. Nomas gangre'naeque cohibet, & mammarum duritiem emollit: fera ulcera, carbunculos favosque rumpit. In vinomacerata femina, canum, hominum, vipe- rarum quemor fui illitafanant. Cum aceto aut em difficultate s unnt e' tormina & tenefmos lenit. Prodest etiam iis, qui cibo non nutriuntur, nucis magnitudine frixa is cum melle sumpta. Decoclujn ejut, fovendo, perniosis in corpore pruritus fanat ex Galeno. Lathyrus fativus quatenus est amaritudinis partim, eatenus incidit, extergit, atque ab obstruptionibus liberat. Ad hominum cibos profus damnatur hujus femine, est enim infuavifimum is pravi fucci. Lathyrus fativi five Ervi femine, instar Lupini preparato, cum melle sumitur, ut medicamentum o crassos pulmones thoracis humores expurgante. Candidum femine minus medicamentum rubro. In medicina is cibus (teste Trago J. non aliter quam deer arietinum usurpatur; vrinam cit efficacius Cicere arietino, in cibogratius jn ceteris omnibus Cicere arietino refertur det. Lathyrus fativi femine quoad substantiam accedit Phaeolus seu ErvilU; indigene Afri eodem modo iis utebantur, quo in Alexandria aliisque circumjacentibus locis; quin is eadem pro pulvis ficus Lentis usurpabant, sed consistit ut sunt siffior, is ideo plus nutriunt quam Lenta. Czter* Lathyrus species non pro cibo aut medicina usurpantur.

N O M I N A.

- 1 Lathyrus arvensis radice tuberosa a repente, nobk. Artkn tuberofus repens, C.B.P. Lathyrus arvensis, Park Apios, Fuch. Lugd. Hist. Pseudoapios, Matth. Terrjeglandes, Vod. Ad Lob. Ger. Glandes terrestres, Cluf. Hist. Cernx balanos leguminosa, I.B. Aracbidna, Colurn.
- Lathyrus Beticus floreluteo, Park Sculptur fecundus in Tab. anea, sed collocatur in Tab. colnationk, is ** explicatione passim nonus ordine propter durationem.
- 2 Lathyrus silvestris dumetorum flore luteo, nobk. Lathyrus silvestris luteus, foliis VicU Cperam ts wepte fie dicitur a Casy Bauhino, cum omnibus Lathyrus conditionibus polleat, nonvefo Vici*) £.#.P' Sdvest floribus luteis, Thai. Legumen terra glandibus simile^ flore. luteo 'Dod. desc. Luteus silvestris dumetorum, I.B. Silvestris flereluteo, Ger.
- 3 Lathyrus major C.B.P. Clymenum, Matth. Lathyrus silvestris latifolius, Cam. Narbonensis latiore folio, Ad Lob. Hist. Sicutis major five purpureus, Thul. Major perenn, Park Cquifalfo appofuit figuram Lathyrus silvestris spinibus luteis. Major latifolius, Ger: Major speciosus flore purpureo, I.B.
- 4 Lathyrus major silvestris, C.B.P. Angustifolius alter seu major Narbonensis angustifolius, I.B.
- 5 Lathyrus ferrenk radice fibrosa purpureus ^U^^ seu supra infraque terram si Uquasge^ rens, nobk.
- « Lathyrus minor fativus femine angulofo, nobis. Sativus flore frucluque albo vel purpureo, C, B.P. Silvestris flore albo is purpureo, Cam. Angustifolium flore albo vel rubro, Ger. Lathyrus femine angulofo, I. B. Lathyrus Cicercula, Aracus five Ckera, Vod> (qui duos exhibet figuras, quern sequuti sunt reliqui authores post ipsum scribentes) & Aracus alter seu Lathyrus minor, J)od. Ervum album fativum. Fuch, Lathyrus fativus angustifolius, Lugd. Cicercula flore albo vel purpureo, Park*

7. Lathyrus arvensis filiquis minoris, nob'ps.

8. Lathyrus arvensis filiquis hirsutis, nobis. Lathyrus filiqua Urfuta, I.B.

y. Lathyrus B&ticus flore luteo, Park- Inadvertenter hic fecundum Tab. fculptalocatur: cum fit plant a annua in loco distofuimus in fab. cognatione h is in explicatione. Quilibet poterit hunc lapsum obferre Yvareis simul corrigere nobiscum

lo. Lathyrus luteus foliis Convolvuli minoris; nobis. Aphace Dod.ut. Vicia lutea foliis Corivoli-vuli minoris C. B. P* (male a Caffp. Baubino adaptat ut ei nomen Viciae, ut supra innuimus) Aphaca, Ad. Lob. Cam. Park, Aphace Dod* Pitine Theophrasti, Anguil. Cam. Orbanche Leguminum, Lugd. Elatine tertia, Tab. Aphace Dfaforidz, Galeni, Elinii non Theophrasti, Dpd. ut. Vicia qu. < Pitine Anguil. lata filiqua, flore luteo, I. B.

HALLUCINATIONES GASP. BATHINI

Aliorumque Authorum.

<p>FAl. it. col. 1. pi. 1. Lathyrus fativus flore frū Huque albo, & pag. 344. col. i. pl. it. La- thyrus fativus flore purpureo, sunt varietates tantum diverse ejusdem speciei, variantes quoad florum,</p>	<p>consequenter fruuum colorem. Ergo male a Caffaro Baubino, Dodonao, & Camerario pro duabus dicitur speciebus habentur: nee enim multiplicari debent enit Jine necessitate.</p>
---	--

LEGUMINA

She Siliquosae Papilionaceae Rivalves

Scandentes capreolis.

M-LATHYRUS five CICERGULA.

Explicatio Tab. tert. Sett'wnis fecund*.

LATHYRI LATIFOLII ANNUL

i. T *Athyris* Tingicanus filiquis Orobi, flore amplo ruberrimo, nobis. Hic Lathyrus an-
-L/ nuus cauliculos profert quatuor cubitos altos, duplici membranâ cinctos, adinfar
latifolii, feu Clymeni Mattheoli: flores autem profert binos papilionaceos maximos,
faturate & eleganter rubros, palmaribus petiolis innitentes, quorum fingulis succedunt
iungulae filiquae longae, propendentes, tumidæ ubi apparent femina, & in interstitiis feminum
depreffe, feu filiquis inter grana & grana junctis, adinfar Orobi fativi; unde nos eum O
robi filiquis defignavimus: femina sunt Pifi minoris magnitudine.

2. Z^r Viciaoides floris vexillo Phœniceo, foliis labialibus fimbriatis, fili-
quis Orobi, nobis. Lathyrus Boeticus filiquis Orobi, Park. Hic ad tricubitalem ascendit
altitudinem, atque a principalibus caulibus costas emittit spithamam & fefquifpithamam
excedentes, quæ duplici alâ membranacel, hinc unâ illinc altera cinguntur; quod est sym-
bolum ieu nota genenca-, Lathyro ab initio doarinae Lathyrorum assignata; fingulis co-
ctis, exgeniculis caulium ortis, terna faspe, nunc quaterna folia oblonga in medio latiora, at-
que in exortu & fine in mucronem acutum definentia adnascuntur; qua: conjugatim fie po-
Tita, yici modo, coctis suis exgeniculis ortis adhærent: Lathyrus à nota essentiali toti
generi convenienter fcilicet ala membranacea hinc inde cingente caulem; 6c Viciaoides, à
forma biliorum Vici\$ more difpofitorum, diftus, apte deminabitur à nobis Lathyrus Viciaoides,
defumendo denominationem à nota essentiali, alis fcilicet membranaceis, quæ femper &
cni Lathyro conveniunt; junctis floribus & filiquis propendentibus conformis eji Lathyrus,
non Viciis, quæ in his ut plurimum sunt ere&ae, nisi in minore Vicia Cracca di&a, atque
Viciaoides constituit speciem distinctam à reliquis prædictis omnibus; filiquæ Ovob\ \ft

additae, facile'diftinguunt'mnc fpecificum Lathyrum £ cxtcr'PòTux fortis. Infuper vexillum floris Phceniceutn eft, labialia *autem petala fubalbescunt, perlarum infar.

Lathyrut viciaoides, vexillo rubro, labiälibus petalis rostrum ambientibuscaeruleis, filiqua plana, nobis. A colore floris, & filiquisnon Orobi, feu inter grana &grana corijun- ftis, fed planis adinfar filiquarum Clymeni Mattheoli. Hie facile diftinguitu* à fecundo La- tKyro viciaoide, fine longiore ferie verborum.

3. Lathyrus iEgypracusfive AracusHifpanicus,Cam. Lathyrus angustifolius (fed pepe- ram, eft enim latifolius) femine maculofo,C.B.P. Cicercula 7Egyptiaca,Cluf. Hift. Hie Lathy- rus peregrinus .ZEgyptiacus, neque tollis', neque caulibus membranaceis reliquifque parti- bus à caeteris differt; cauliculi tamen ejus valde funt infirmi, & nifi fuftineantur aliorum more, humi procumbunt: geniculis caulium conceffa i'unt bina foliola breviora angulofa, è quorum finu , inter'folia prxdifta & caule.ni, prodeunt oblongo petiolo innixa bina alia folia longiora &: lata, angulum acutum conftituentia , qui petiolus feu cofta media defi- nit in capreolum nonnunquam bifidum intortum, quo fefe vicinis herbis & virgultis im- plicat: flos hujus etiam Lathÿri fativi flori nondiifimilis,nifi quod hujusflos interne elegans fit ca?ruleus, foris ex cinericeopurpurafcens, cui derluenti fubnafcuntur filiquae ex longis'te- nuibus pediculis pendentes, alatae, id eftupernè pinnate feu duplici membrana cinftx¹, ut cernereeftin vulgari fativo, & Lathyro <Lwvtr*> fupra explicatis: in fingulis filiquis bi- na, raro plura continentur femina, domeftid feu vulgaris fativi gfanorum magnitudine, pariter inaequalia, frequentibus nigris maculis infignita: radix huic eft tenuis, gjaçilis, fingulis annis quoque periens. NotaAracum àGalenolib. de Alim. facultatibus *&™ ap- pellari, & pofteriorem nominis fylabam per x in Ariftophanis Holçadibus notatam inve- niri⁷ ad differentiam videlicet alterius Arachi A&X<™ P<™ X T<™ Czrealium trugum vitmm elt. Latini Arachum feu Craccam nominant.

LATHTRI ANCVSTIFOLIi ANNVI.

4. Lathyrus angustifolius kptomactolobus, femine rotundo, flore rubello, nobis. Hxcpri- ma Lathÿri foecies angustifolii folia gerit angufta, longa &-quafi giammea: caulefque pedales & lefquipedales habet procumbentes, ex quorum fimbns onuntur pedicuh triun- ciales, fuftinentes flores minores papilionaceos, eleganter rubellos, obfoleti veluti colo- ris; nunc fingulos, nunc binos, quorum fag^{1,2} fuccedit filliqua tenui, S, r o T d i l o n g a, truncialis fequentis fiqua cum longer, t⁸ <<>™ ^^ | onftat tenui , gra^H, annua, na, dena, rotunda, parvula.Vici3efilveftris⁵ more:

timpereunte. femine angulofo, flore caeruleo, nobis. Hie Lathyrus angustifolius i e p t o m ^ 0 ^ i r a n v m e a pariter, fed omnino tenuiora ; flq! Lathyrus toha edit ^f^V£*%£&£ pr<cedentis minorem; cui fuccedit fllija rem fert parvum, papilionaceum, cwnic onfien g f r t e ^ ^ ^ q u a m i n u t a - a r - q u a n g u l o f a brevior & tenior prxcedentis, c o n t i n e n t u r m i n u t a p a c r , a n

brachyplatolobus, flore rubello, nobis. Sed potius brachy- platolobus angustifolius, flore minore eleganter rubello, nobis. Lathyrus folio an- gultifolium tenuiori, I. B. Hie palmatis, aliquando in pingiore folo cubitalis Lathyrus, ra- dice eft tenui fibrofa* cauiex c x i < v > ^ r > - < < < < u ^ u , ^ 4 u w < , i i < t e m m i i m d , - i o n g a Carvoohvlli holoftei vel gramims holoftei minoris more proveniunt: flores parvi papilio* ^ f f i i n ^ r S r i , pro P ^ t * tamen proportionem fatis magni: filiqu* funt unciales, craflx⁷ lace loneiffimis petiolis pendentes; in quarum hngulis femina bina, aliquando ternalaten⁷ Orobi magnitudine, rotunda, aipera, fufcis maculis obiita, hilo pariter fo- 7 ^ / J y r ^ f i l v e f t r i s m i n o r , C . B . P . C a t a n a n c e , D o d . G a l l . C a t a n a n c e h a c L e g u m i n o f a dida Lathÿrorum claffi omnino congener eft, cdhftans tenuibusramofis.caulibus, quibus null* aptatae tot membrane alat*; folia habet gi-aminea longa, angufta, acuta; flores napilionaceos, longioribus petiolis ex foliorum finibus ortis infidentes, palmum nonnunquamlongis: filiquatresuncias funt long*: plus minufve, angufte ; ptonma gra* na minufa, rotunda, nigricantia, in fingulis decem autduodecim continentur, nunc plura, nunc pauciora: radice innititur inutili, poftfemen maturum fatifcente, & totaliter perc*, unte. Sitne v ^ r ^ f i v e amatoria, aut amatoria non bulbofa unguimilvia Diofcoridis:

qua^s quafi neceflitate ihcorifuiTa & fatali, adigeret ad amandiuⁿ Catanancen vocaruntⁿ tanquam anioris illicium neceffarium. Plinius ejuſque *coxvi* cordati viri confultò figuras Jiarum tacuerunt, nee Dioſcorides vires fed hiftoriam duntaxat alienam citat. De hifce nee nQs, nee quivis fanas mentis Philoſophus, folifiti multum eife debemus. Leguminis perfeéli ſpeciemeffe ex*libro nature obfeFvamus, ut ejuidem defcripſio fuprà allata hocvidenter innuit: proinde feminaejus earundem effe virinm cum caeteris fuæ claſſis Leguminum femi-rijbus certòfcimus. Deliramenta Plinii, aliorumque cum veterum > turn neotericorum, cordatis faltem bene fentientibus hujus feculi hominibus negleftui habere confuleremus: res ip(as cognofcant perfeſte (ſi fieri poterit) earumqifc vires, ſine admiffione tot figmentorum antiquorum, fabulis potius quamreſtae rationi aut experiential innitentium; hujus culpa*: ſepelæpius reuſeptipfePliniuⁿ qui ex relatione aliorum, aut antiquorum fctiptis multa futilia ⁿf inutilia pofteris protrudit. Ipfius defudationibus atque laboribus Indefatigatis multum debet pofteritas. Quicquid ex fè ſcripfit, bene admodum, fed multa perperam libris ſuis reperiunturinferta, ex ſententia& relatione aliorum, veluti agricoliarum, colonorum ruſſi-
corum, aucupum, piſcatorum, venatorum, imo Botanicorum reique naturalis Hiftoriae ſcriptoram, ad manuſpoſteriorum opera ſua tranſmittentium.

L'OCUS & TEMPUS.

1. Lathyrus Tingitanuſfiliquh Orobiⁿ fore amplo ruberrimo, nob is. Hujus femina communkatahd-
buiⁿmts ex MauritaniaTingitanaⁿ primoabAkxandro Balam,Botanicis amantijjmo & oppidi
Tingidis Syndico per aliquot annos ante obitum. Deinde nuperrime' ejuſdem femina recentiafu-
erunt adveſta in Angliam, ab amico noſtro Roberto Spotfwood ibidem chirurgo is apotheca-
rio. Floret media deflate, iſr verſus ejuſdemfinem maturantur femina.
2. Lathyrus vidaoidesⁿ florv's vexillo pbceniceofoliolk labialibusſubalbefeſcentibutⁿ filiquh Orobi, no-
bis. Hieprovtnit in Bcetica aliifque HiSpanU lock. Floret iy femina perficit eodem cum priore
tempore. Lathyrus viciaoides floribus labialibus caerulek, filiuk Orobi is plank, nobk. Pro-
venit circa Tingidem. Florem is feminaproducit <xjl ate.
- Z-LzthyrusJEgyptiacuſfeuAracushifyamcuſ, Cam. Locutubiprovenitfatk manifeſte appa-
ret in titulo ajſignato {floreſt iſperſicit ſemen*fiateⁿ quemadmodumreliqu<£ omneſprfdicloe La-
tbjiri/pecies.
4. Lathyrus anguſtifolins leptomacrolobu* Cidefl filiqua tenui, tortga J femine rot undò, flora
rubello, nobk. Frovenit inter fegetes\opioſe circa BUfas; floret Juliq is maturantur femina.
Auguſto.
5. Lathyrusanguſtifolius leptomicrolobws, femineanguſto., flore cderuieo, nobk. Floret hie pro-
miſcue Zumprcedente menſe Julio inter fegetes affatim eunao BUſis advillam Domini de la Noue?
adfiniſtram ambulacri ulmorum quadrupliciferie conſtitiaRegina Catherina de Medickjs ducen-
tk recla inſilvam BUfenſem.
6. Lathyras anguſtifolius brachyplatolobm (id eſt filiquabrevi, lata) anguſtijfimofolio, flore
elegantè rubro, nobk. Qua itut Monjpelio Frontignianum hie reperitur in lock fleck (ſ flheſtribus
floreſs menſe Apr Hi, is ineunte deflate femina ſua perficit. Semina ibidem colled a a Domino de
Fray medico Turonenſi is Botánico diligentiſſimo communicata, cumplurimk alikfewnibus circa
Monjpeliam colleck, habuimus.
7. Lzthymſilveſtrk minor, C. B. P. Catananee, Dod. Gall. H<ec Catanance Leguminofa paſ-
ſimprovenit inter fat a arva, is ad'ſilvarum margineſefe ex femine deciduo ſingulk annk de
novopropagar; in Galliapajſimfloretſub exit urn verk, is femine ſuum deflate perficit,

TEMPERAMENTUM & VIRES.

J)e tiribus qualitatibus omnium horum Lathyrorumprdetèr prdediſtos (quorum ex authoribus
vires affignaiimus)nihil dieendumrelmquiturⁿ niſi quod hominum uſui non inferviantⁿ fedpe-
cori faginando>, cujus uſu in cibo nutriuntur is impingueſcunt homines.

NOMINA.

- t+tathytusTingitfflus, floreruberrimoamplo, nobk.
2. Lathyrus Viciaoides florv vexillopb<£niceo,foliolk labialibusſubalbefeſcentibus,ſetiquk Orobi, no-
bis. Lathyrus Bxticus elegans, filiuk Orobi, Park' Alietfolik labialibuſc<xrulek,ſrfiquis
Oⁿ is flliukplank? rwbh.
- 2- Lathy-

- 3. *Lathyrus Mgyptiacus fii'Aracus Hfflanicus, Cam. Lathyrus Aigyptiacus, Ger. Cicercula JEgyptiaca, Cluf. Hift. Cicercuk Boetkafeu JEgyptiaca Clufii, Park,*
- 4. *Lathyrus anguftifolius MXTVMCX.^OI^, femine rotundo, flore rubello, nobis.*
- 5. *Lathyrus anguftifolius M7i"n/M.x.^o^(^, femiqe angulofo, flore Cteruleo, nobis.*
- 6. *Lathyrus anguftiffimo folio Be^x^^^0^* fl⁰™ eleganter rubro, nobis, Lsthyru* folio tenuiore, floribus rubris, L.B.*
- 7. *Lathyrusfdveflrkminor, C.B.P. Catanance, Vod. Gall. Hift. Lugd. Catanance Leguminofa quorundatn, l. B. Eruumfilveftre Vod*^l.herbariorum Ad. Lob. Eruumfilvefre, Ger.*

J,j. OCHRUS five ERVILIA.

Q*V* Theophrasto 4. caufarum plant. 2. Q-xb* a luteo 'Ochr* colore quern medulla refert nominatur, iy Gaza Cicera reddit. Plinio l.i%.cj.isr aim La tints Erüilia dicitur. Duplex eft, fativa qua Pifum eft minus, i&filveftris de qua nunc.*

8. *Ochrus five Ervilia, Dod. Lathyrus folio integro, producente bina foliola, capreolos emiqientia, nobis. Ochrus filveftris five Ervilia, Ad. Lob. Hafc planta leguminofa perfecta eft Lathyri fpecies (etiamfi feparatim fub Ochro aut Ervilia trafetur a**b** authoribus) ab omnibus notis fuis eflentialibus, nam caules producit angulofos feu membranacea ali cinctos (qu^æeft prsecipua notagenerica, quã Lathyri à reliquis Leguminibus fcendentibus capreolis difcernuntur) tricubitales, quibus non bina (intercedente calile) amplexicaulia nafcuntur folia, fed fimplex folium ex uno latere caulis procedens, & emittens bina alia minora qua[?] in capreolos abeunt, & terminantur: flores, qui pediculis exfoliorum finu prodeuntibus innituntur, funt fingulares luteopallidi feu *ἄκρωτις*: filiquae funt ereftas & furfum verfus tendunt propter brevitatem petiolorum, uncias duas longae, femiu Yiciam lats, fecundum umbilicum femina in concava filiquae parte nutrientes, longitudinaliter pinnata?, feu duplicialá membranace[^] (more Lathyri fativi femine angulofo, JEgyptiaci & Lathyri *ἔωα&rxv* fupra explicatorum) donate, in quibus continentur femina quina, nunc plura, nunc pauciora, mellinã feu obfcuri quadam flavedine prsdita, non exa#e rotunda, fed ex mutuo compreiTu utrinque fefilia, lineã quadam albicante media longitudine prxdita; magnitudine Pifi vulgaris albi, cum quo & magna fimilitudo, eique idem quoque efl fapor.*

LOCUS & TEMPUS.

Ex Cretafub nomine Papulles Cretkde ab Honorio Belli mifum ejus femem; floret ineunte deflate cum c&terh Leguminibus, isrper tot am jftivalem tempeftatem ipforum etiam more maturantur ejuftidem fanina.

NOMINAT

Lathyrus five Ochrus folio uno integro, producente bina foliola, capreolos emittentia, nobis Ochrus folio integro capreolos emittente, C.B.P. Lathyri Spécies feu Ervilia Vodonti TR Erfiafilveftris, Vod.ut. Ochrus five Ervilia Ai. Lob. Ochrus five Ervilia florf dj albo, Park, Cicer Ervinum quorundam, Hift. Lugd. Aracus, Maith.

§ 4. L^E N S.

L*Ens isr Lenticula <?*> Diofcoridi I. 2. c. 129. Then-hh J- ~ ' J- . r , ,, gñfcer. Dicitur autem etymologico quafi paxza ut fit q^uod pax zeta: oculorum enim aciem behitare Diofcoria uie dicitur meo de m h utra mri G. n. pax zeta: oculorum enim aciem behitare Diofcoria uie dicitur meo de m h utra mri G. n. Latin apud Genera.-Ju^ejl, arvenfts(xfakjlrk.-hied, arvenfi >ant<m, cujus Juragenera Tko.h.i 6.Plini>*

Seft. II. V N I V' t R S A L I S* O K O N J^N S I S. t f

6. Flinio I. c. Duo funt Lent ifgenera in JEgypto, alterum rotundius njgriufque, alterum fuafi-
gura; unde vario ufu tranflatum fit in Lentkulas nomen. Recent ioribus colore is magnitudine
differunt: funt entry, albi majores is gratiores; ex luteofallidi, cinerei, rufi minores is- deter-
oixs: ficflores ex albk candidi, cinerek furfurafcetes.

9. Lens tenuibus exit cauliculis, re&is, duriufculis; foliolis pfuribus, rachi feu coftae me-
diae e regione adhaerentibus Viciae modo, fed minoribus atque anguftioribus: flores pa-
pillionacei exigui funt, colore albi aut purpurafcetes: filiquae nmlta:, parvae, compreffa?,
in medio tumidae: femina rqtunda, compreffa, bifea, terna, infingulis filiquis, in medio
utrinque etiam tumida: caules vix fuperant pedalem aut fequipedalem altitudinem: radi-
cibus firmatur parvis. Dicitur Lens & Lbnticula <W & <p<*.^ Graecis. Post femina ad matu-
ritatem perdufta perit, quemadmodum Ochnis five Ervilia. Eft major & minor, fola magni-
tudine partium difcrepantes, praecipue fiorium, filiquarum, & feminum; ut videre licet in fi-
liquis & feminibus in icone ultima Tab. tertiae Sect, fecmdas fculptis.

L O C U S & T E M P U S .

In horfps is agrkferitur: floret Junto: femem perfu c it ur Julio is^d Augufio.

T E M T E R A M E N T U M & V I R E S .

TenentLentes, utait Galenns, medium caliditatis frigiditatis, deficcantamenfecundo ordinal
corticem babent afiringentem, is if forum feminum medulla veluti car ocrassi eftfucci, acficut;
terrei, aufleramexiguamhabensqualitatem, cujus cortex mult*, aufieritatis eftparticeps, fuc-
cus forroin iffisefiafringenti contrarius: quocircafi quk in aqua iffas concoxerit is dein-
de aquam fumfferit, pot us k ahum deficit: at txbicoStk Lentibws fuls affarata faculta-
temfucco contrariam habet, ut qua ventrk fluxvs ficcet, ftomachum, intefiina, is totum deni-
que ventretn corroborat: quamobrem cceliack is dyfenterick cibus eft commodus. Lens vero
decorticata, ut illam afringendi vebementiam is ea% qu<e iffamfequuntur amittit, it a ma-
gk nutrit quam qu<e cortice fyoliata non eft: fuccum craffumfravumquegignit; tar die enim
commeat, non tamen alvifluxu* deficcatur, ut ea cui cortex non eft ademptus. Jure igitur qui
largius hocedulio utuntur, elephantiain is caneros incurrunt: fiquidem craffa ficcaque ci-
baria fucco melancbolko generandofunt idonea. Eandem ob caufam vifum integrum is inculfa-
tum bebetat, ipfum immoderate exficcans: craffum enim is tardiffimum in circulatione fan-
guinemjeddit, igitur ad menftruas purgationes non eft accommodata, at mulkbri profluvio eft uti-
lififfima, ut ait Galenus- de Alimentorum facultatibus. Somnia tumiultofofa (ut fcribit Di-
cfcoridesj excitat, capiti, fulmonibus^ is nevk inutilk. Contra fubverfiones ftomachi tri-
ginta grana Lentk decorticata devorari proderit: decocta cum polenta is Ufaa podagras le-
nit, finit cum melle glutinat; cruftas rumfit; ulcer a fur gat; decoctain aceto duritias is
frumas difcutit; cum cotoneo Malo aut Meliloto medetur inflammationibus oculorum, is fedir
etian^faddito Refar-urn fucco) fuftulk; item is berfetibus at eryfifelatofis conducit adffeld
mark aqud; contra mammas vero? quibus lac in grumos coit, is qu<£ laclt nimiam redun-
dantiam non ferunt, cofla in aqua marina is im'fofita auxiliatur Lens. Oblatns fulibus ex
Lntibus cofik Efauftratri fuo Jacobo Sfrimogenituram vendidit, quoe ntutiquam tantifuere, fed
eofenurUfr^fame redatufjibere difpofuit Jacobo primogenituram, ut legere eft Gen. c. 25 .verfu.
Ultimo, I<xa, i3 & e & 3We, IZ Hff&u & pTow ^t "A^ ^g ^) fy^ ^J %mi , ^) iVA? a5 ^ e 7 0 ^J \^xi<fir
Emu TO*P<TO7DXW. Jacob dedit Efaufanemis decoctum Lentk, is comedit is bibit isfurgens
abiit, is farvi fecit Efaufrimogenitafua.

N O M I N A .

Lens vulgarK minor, nobk. Vulgaris, C.B.P. 'Lens vulgarkfive agreftk is LenticuUfri-
mum genus, frag. Lens minor, Vod. Lob .Icon is Obf. Cam. Ep. Ger. Minor I. B.

Lens major, CB.P> Ger. Cam. Ep. Lens, Matth. Lob, Major> IB. Lensfativa, LenticuU
therum genus, Trag.

LEGUMINA

She Silicjuofae Pa'pilionaceae Bivalves,

Scandentes capreolis.


J.j. VICIA 5c APHACA.

Genus 2. Alim. fcribit ab Afianis Bux did Legumen, eoquefolo nomine id vocari: At t ids vero %cl&.xo<i aut KuV<v. Latinis Vicia nominatur a vinciendo, ut Varroni placet; quod item capreolos habeat ut Vitis, quibus furfum verfus scandit, adfcapum Lnpini, aliumve calamum, cui ut adboereat, eum vincire folet. Et b<z<c duplex eft, fativa iffilveftris.

APHACA.

Legumen Diofcorides I. 20. c. 178. *V*xw nominat, qujein arvj^s nafcitur, Lente altjor_y filiquis Lentium majoribus, in quibus femina terna, quahrnave, nigrg, Lente minor a. Theophrastid Aphaca duplex; alter a olu* eft, de qua inter Intubacea: alter a Legumen, quod cum Lente iff Pifo in Leguminumgenere 8.Hift. ^.pofuit, iff Plinius I, 24. c. 5. fheophrastumfoquutuseft: Galenu* cum Vicia conjunxit.

TABULA IV.



Explicatio TabuU quart*, SeSiionis ftcwd*.

J^unitā explicatione Lathyrorum in fecunda Tab.&infuper Lathyromm Ochri &: Lends in teetia Tab. ROntentorum, aequunrjam nobis vifum eft explicare Viciarum do&riñam, quarum Icones repraefentantur in hac quarta Tab. & in Appendice Legaminum, additis qua^uru,ndam defcriptionibus., qua; non funt fculptae. Et ut clarhis appareat. do&rina Viciarum, dicemus. & in medium adferemus diftrentiam Vicias à caeteris Leguminibus, caprcolis ètiam fcandentibus. Vicia habet fèna, feptena, nu*)c plura, iymc pauciora folia alata, feu conjugatim polita, ^{um c^o & x ^eu nei v^o} medio admentia, & eo ipfo nomine à Pifis & Lathyris (ex quorum numero eft etiam Ochrus ut fupra innuimus) facile cognofcitur; junge quod Vicia major tarñ fativa quam filveftris filiquas habeat ut plurimum furfum tendentes, fluibus nbtis primo intuitu dignofcitur¹ à Pifis & Lathyris filiquis propendentibus, & paucioribus foliis feu lobis donatis. Eft Vicia aut perennis aut annua, utraque foliis confat latioribus, aut anguftioribus, hirtutis ut plurimum: flore eft rubro, allD, & luteo-pallido: eft 8c femine nigro, fufco, variegato feu maculato, albo, rotundoquafi, piano, & tumido: Viciae omnes qua: flores pròducunt rubros, femina habent nigra feu fubnigricantia, fufca, ftriata, aut maculis obfcuris variegata, excepta unica à nobis obferVata Ipecie, quae flores gdit rubros; femina tamen pulchre alba, Pifi minoris asmula, floribus eifdem rubris fuccedentia.

i. T *JTl*cia perennis multiflora fpicata cxrulea feptaria, nobis. Vicia rhultiflora, C. B.

V P. Arachus, Tab. Viciashax fpecies perennis provenit in feptibus, dumetis, & fenticetis, atque donatur caulibus tenuibus, longis, hirtutis*: foliis lobatim feu conjugatim multis, unirachi adhaerentibus, hirtutis itidem, atque nervo medio in capreolum definente Arachi in modum: flores in fpici^g(ongis mukifunt caerulei & purpuro-caerulei, et fummis ramis pròpendentes, quibus fatifcentibus fuccedunt filiquas parvse, latiufulcas, iufcse: femina in his latent parva itidem, imò vulgaris filveftris minora: radix durabilis in multos annos, longe lateque repens, atque ex eadem fingulis annis primo vere regerminat.

Datur&alia hujus major fpecies quae altius confcendit; folia habet prioris latiora, hirtuta pariter: flores fubalbidos, lineis feu ftriis potius caeruleis notatos: prov.enit ffonte etiam in dumetis & feptibus comitaeus *Oxonienfis*; unde in Hortum Botanicum publicum Univerfitatis Jæc fpecies delata fuit à *Jacobo Bobert* Hortulani filio.

2: *Vicia* perennis maxima dumetorum, flore obfcure rubente, nobis. Cracca major, Tab. Ofmunda Latinorum, Trag. Vicia hæc fecunda in dumetis etiam nalcens, eft radice itidem repente, ex qu2 ineunte vere profuduntur caules bicubitales & tricubitales; caulium ramulis atihærent folia feptena, oftona, latiora, hinc ihde rachi feu foliorum nervo medio è regione adnata: ex cujus extremo exit capreolus, beneficio cujus vicina quaeq; fcandit & ample&itur: folia inquamcoftae media? 4amulorum viticulorum adhgerehtia funt multo latiora verfuscoftam, & terminantur in mucronem obtufum; ex finibus coftas foliorum. 5c ipfius caulis oritur pediculus palmaris, fuftinens plures flofculos obfoleti rubri coloris, majores, aliquando dilutius, aliquando faturatius tintos, nonnunquam etiam ferrugineos: quibus fingulis fuccedunt filiquae compreflas, nigse maturitatem faltem adeptse, funtque majores filiquis praecedentis, quaeque exficcatae ffonte aperiuntur & femina fua eft undunt, quibus in locis negle&is & filvis caeduis fefe propagat: eft femine fufco aut nigro. Eft & alia Vicia filveftris perennis hirtuta incana, quae filveftris flore albo dicitur Carolo Cluffio. Hxc differt tantum a priore, quod folia habeat minora magifque incana, & quafi lanugine obdufta: flores edit albos, vexillo tamen fuperiore venis obfcuris obdufto: filiquae parum aut nihil a vulgaris filiquis diflerunt.

3. *Vicia* Narbonenfis maxima, tru&u rotundoatro, foliis ferratis & integris, nobis. Vicia Komana, Cam. Faba filveftris, Matth. B<na filveftris, Dod. Hæc Vicia caule eft angulari, inani/juoque, multis geniculis interfepto, ubi fua ffonte viget, ut fertur, breviori & eie&o; in hortis autem noftris longiore, ac nifi adminiculis fulciatur caduco, neque ullum ^cft folium quod imparitatem faciat; cofta folii five *pá. %is* in caprc^olos abit; quibus proximi¹¹¹¹ quaeque prope a flifentia apprehendit accomplifitur: folia magna, B^{nae} DodonaH fimifia: fl^{os} caeterarum Viiciarum formal, colore è Phoeniceo nigricans: filiqu-x omhino velut aliarum Viciarum nigrae, fed multo majores & craffiores, interiore parte albse, mollefcque

fioccos cofitinentes; in c[^]iibus plurima femina'rptunda, nigrsf, Ervilisefeminibuspauloma-
)ora, parvum umbilicum candidum habentia. Dum autem manduntur, fctorem veluti
 quendam ingratum excitant. Quandoquidem capreolis donetur, & filiquam majorem, o-
 mninoViciae filiquarum formal, feminaque rotunda ha beat, potiore jure fuse fords fimilibus
 affociatur, Viciis fcilicet, ex noftra fententia*, non autem Fabis (ut vultCafparus Bauhi-
 nus aliiqueauthores) qua* non'fcandunt capreolis, nee enimfiliquas nee femina 'conformia
 habjntf iciarum Cla/ffi, ut clare ipfam plantam examinantibus apparet. Eft duplex, veffo-
 liis mtegris, vel ferratis; folium integrum non ferratum,& plantam ipfam integram fo-
 llls ferratis onuftam fculpi cjiravimus ;/quum rara fit planta, nee ufum ullum apud nos ha-
 beat; fed tantum in paucorum Botanicorum hortis, quos varietas & ftudium her-
 barum dele&ant* reperiatur. Utramque hujus varietatem cernere licet hac hora, qua
 haxcommittochartis, cum multis aliis rarioribus Leguminibus, in horto publico Botanico
 Univerfitatis, ex Afia & Africt ad nos tranfmiffis.

4. *Vicia* fiore luteo-pallido, filiquis hirtutis craffis brevibus >ereçYis, nobis. Pulchrum
 hoc genus ^ias folia geritVicise multiflorae modo, conjugationesioliorum ut in ilià pluri-
 mx apparent, ad decem aut duodecim fupputantur folia angufta, & in acumen definehtia,
 in quibus magni vifuntur pili: floresiuntparvi;, fingtlares & luteopallidi feu ochrol&uci:
 filiquæ quoque fingulatim pveniunt primo valde. hirtuta: & taftu aferpx, ereçts, craffe,
 unciam unamcum femiffelong^-, dimidiam fere latae; in fingulis^rana jerna, quaterna-
 ve obfervavimus. Datur & alia ejufdem fpeciescujus filiquaefiint etiam fingulares, hirtuts,
 ereçlse, prioris multo minores; forma filiquarum Pifi minoris. Datur etiam & tertia neu-
 tiquam à caeteris difcrepans, nifi quod filiquas fuas fingulares habeat propendentes, hirtutas,
 filiquarum Pifi minoris forma itidem. Primas filiquis ereftis, hirtutis, Iconem exhibuimus,
 inTab.A.Seft. fecundae, locoqaarto, & aliarum duarum in Appendice ad Legumina Ta-
 bulae iV^x loco fecundo & quinto: ex ipfis plantis Icones delineandas & fculpendas cura-

*** *Vicia* lutea foliis Convolvuli minoris, C. B.P. Aphace,Dod. Hie inadvertenter in hac
 Tab^ula locatur à nobis inter Vicias, fequendo Bauhinum & alios authores, fed cum attentius
 infpexeramus, oblervavimus ipfam conditiones poffidere Lathyri, non Viciae; quippe
 quod bi[^]la[^]olia[^]cau[^]lem[^]am[^]e[^]ntia gerat, quae perforari quafi videntur a caule quadrato, &
 angulum acutum exterorum Lathyrorum more conftituunt, non autem plurima folia conju-
 eatim r^{acni} ^{leu} ^{colx} ^{mec} ^{^^} adhserentia habet, veluti omnes Viciae fpecies; ergo ex libro
 Nature difponi debuerat inter conformes Lathyri fpecies, ficut nos fecimus fupra in Tabu-
 Vs cog[^]tionis & affinitatis, item& in explication Tabulae-fecund[^] ad finem ejufdem".

*^x *ficia* maritima fiore albo longo, nobis. Hujus *Vicias* caules funt pedales & fefquipedales,
 % geniculis hinc inde (alternating aliarum Viciarum ritn)proveniunt coftae mediae,protruden-
 tes capreolos aliquot verfus finem; atque coftis fingulis folia obtufa quafi cortlata, è regio-
 ne fena adnafcuntur: inter caulem & coftam exiliunt flores albi papilionacei, longi
 qiiibus fingulis fuccedunt filiquae fingulae unciales»fubrotundae, continentes femina quina,
 nunc plura, nunc pauciora. Videfiguram in#AppendiceTab. 19. loco.4.

6. *Vicia* major vulgarisfativa, nobis. Sativa vulgaris feminenigro,C.B.P. Sativa vulgaris, I.B.
Vicia hxc ubique terrarum coli folita,caulibus conftat bicubitalibus,aliquando humilioribus,a-
 liquando procerioribus, angulofis, irriatis, cavis, hirtutis ;foliorum conjugationes fense, fepte-
 nse, nunc pauciores, nunc plures coftae mediae longse adherent, intortiles chviculasdefi-
 nenti, quibus proxima arripit adminicula: folia uncialia paulo minora majorave (fecun-
 dumfolium in quoferitur) angufta, ad extremum lata, hirtuta, eademque rachi ex ad-
 verfo apponuntur; ex uniufcujufque coftae'finu, feu ala, flores enafcuntjir bini, purpurei pa-
 pilionacei,ahquando plures;fingulofq; excipiunt filiquat bivalves/ingub quadrantales & non-
 mmquam longiorcs,tum,d3e & eminentes (falttm confp,c03e ubi apparent grana) iemina clau-
 dentes Pifis arvenfibus peñe pana-compreifa-paululum tufca aut variegatatperraro nigra,non-
 nunquam alba. Minifico foliorum lufu provenit *Vicia*,ut pene cuiquam imponat,velntr Proteu,
 ahquis, ut eadem non eadem putan poiffit; ex his enim alia funt fere rotunda, alia cordata
 verfus extremum, alia angufta & longa: flos unicus fed aliquando plures, multa purpura feu
 rubro colore pi&, brevi pediculo haerentes; & confequenter filiquae funt erea*, quia peti-
 qloçurtodonantur; eaque quoque, funtmajores vel minores; tunicae quoque>volveiffes
 Jeminafunt magis minufve depretfae, aut magis tumidae (preccipue ubi femina apparent
 ipfa) que colore funtfufcz, aut nigrs? exficcatse: feminibus copiofe (ufque ad o ~~o~~ i-

urn aliquanuo denarium mimerum) fyfcib\ variegatis, aut visbr/^allentibiis, etiam nigris onuftae; deniquealbis, quafi rotundis, parvi Pifi arvenfis semulis, & a flore rubro. pro'duftis. Eft & alia h&jus varietas, fiore rubro, femine miriore fubviridi, Halepa ad nos miffo.

Vicia major folio cordato, flore^ibro, fjuau«albd Pifimindris i^iftar, nobis. tec a foliis cordatis, floribus rubris, & femini all^o, Pifiminoris arvenfis femine fimili, facile ab alfis omnibus Viciae fpeciebus diftinguitur. Vide in Appendice Tab. 19. ieonem tertio loco itidemfculptam.

Vicia minor flore rubro, fru&uvario, filiquispropendehtibus, nobis. Ex hac denominationejacile a caeteris fue fgrtis cognofcitur. Vide in Appendice. Tab. 19. ieonem primo loco ibidem fculptam*

7. Ficit filveftris femine nigro & variegato, folio acutiore, nob^s. Vulgans acutiore folio, femine parvo, nigro, C. B. P. Aphaca vera, Lugd. Haec *Vicia* a fativa vulgari, & filveftri vulgari majore media inter fativam & hanc, diftert potiffimum femine, quod admòdum parvum, rotundum & copiofum (aliquando ad o&ona exemiffe me memini) latet in filiquis anguftioribus, Jongiofibis, magifque terctibus, & rarioribus, filiquis Vicix fepium minus hirtutis, quae ficcae nigrefcunt, nigraque in fe continent femina aut variegata aliquando.

Vicia fepium folio rotundiore acuto, C. B. P. *Vicia*, Dod. Cluf. Hift. *Uxc* fponte provenit inter fata paffim, faepe etiam in fepibus & dumetis; diftert a fativa vulgari, quod filiquas producat minores, breviores, & rotundiores; quin & femina ibidem contenta funt rotunda, nigra vel maculata; ergo craflitie & rotunditate filiquarum, & colore fufco feu fubnigroearundem, facile difcernitur hxc media a fativas filiquis longioribus, compreffioribus, magifque tumidis (ubi apparent femina) & femina compreffa continentibus. Silverftris autem feu vulgaris fepium, folio acutiore, femine parvo nigro, C. B. P. ab utraque raritate filiquarum fingulatim difpofitarum, minus hirtutarum, quaeque etiam ficcas nigrefcunt, a femine etiam minore nigro, quam facillime diftinguitur. Datur &: alia *Vicia* multiflora fpicata -caerulea annua minor procumbens, quae vix pedalem aut fequipedalem fuperat altitudinem, fola tenuitate partium, & duratione a *Vicia* multiflora fpicata cxrulea vulgari pcrenni difterens.

8, *Vicia* pratensis yerna feu praepx Solonienfis, femine cubico feu hexaedron referente, nobis. Haec *Vicia* minima fub exitum hyemis in pratis negledis & minime herbidis, contra Regiam Chambort in agro Solonienfi intra fepta ejuſdem nominis fitzm viget. Florem fert exiguum, rubentem, papilionaceum, ex fingulis geniculis ortum, atque fingulis floribus fingulaefuccedunt filiqua curtae, tenues, poHicares; in quarum fingulis coutinenturfemina anguloſa, miniita, terna, quaterna, hexaedrum referente, atque praecocitate & tenuitate partium, denique feminibus cubicis, a caeteris praedidis omnibus, facili aut nullo negotio diftinguitur;

A R A C H V \$ five C R A C C A.

F¹ *Rumentorum quoque -vitium eſt quod Gr<eci k^.^ (Theopbraſtus S.Hi/i. lo.remfcabramis duram dicit, qu<* in Lente ttafcitur J nominant. Ruelliu* Craccam appellari refert. Difert ab Aphaca is¹ Vicia potiffimum femine; nam Cracedtfemin a exquifite rotunda, nigra funt; isr ut Gaknus inquit, Ervo minor a: Aphaces vero iy VicUfemina non rotunda, fed aliquando latiora, veluti Lentium, teſte Galeno 1. de Alim. facul.*

Arachus five *Cracca* eſt *Viciae* minor fpecies in fegetibus proveiens, caſque frangulans, & nutrimento depravans, & ligans non minus multiphitate radicum fuccum nutritivum e terra extrahentium, quam crebris fui, capreolis ipfos culmos arte amplexans, ut Aphaca Dodonxi quaeſt *Lathyri* fpecies uti fupra dicim: diftinguitur a praedictis omnibus *Vicie* fpeciebus tenuitate partium.

"9. *Vicia* minor fegetum cum filiquis pluribus hirtutis, G. B. P. *Vicia* parva feu *Cracca* minor, cum multis filiquis hirtutis, I. B. *Arachus* feu *Cracca* minima, Ad. Lob. *Arachus*, Lugd. Exradicetenui, exili& inutili, quadrati, tenues, & infirmi exeunt cauliculi, importuna alarum ubertate luxuriantes: folia Lentis foliis quafi paria, hirtuta, pinnata caſterarum omnium *Viciarum* more, fibi mutuoreſpondentia, medionervo annexa, aliquando fepte-

na? oftona pana., c o n i n g pofita: flervus me aius.in tortiles capreolos varie partitos fa' ceflit. Segetem pfectocomplexu arripit & ftrangula hzc parvuh Vicia m r C . t . dum ad tres cabjtos: ex foliorn mal's, hinc inde enatis pediculis ffofc Sdun face matim ac veluti in capim liim cornefti nwnnn* r«« it "iiaunt race- fpectantes, pufilli, papilionacci, albi; quos filiquæ excipiunt totidem femiunciales, hirsu- ta (quemadmodum funt folia) quarum fingulis, bina cernave infant grana five femina, Vi- ciz fepiam folio acutiore fentibus minora, rotundiora, & magis maculata.

flor inafcit unicis aliquando, ut plurimum bini, fuave purpurafcentes ve' ceru- lei aut v. olacei, raro lyes; quos fingulos fequic filiqua parva, glabra mxce n[Tr] ceru- magn. tudme par, fed paulo longior ac tenuior. P r a c e d e n t i s C < c c s

LOCUS & TEMTUS.

t. Nrfchur circa margines agrorum, iy apathilvtftribu, circa foffat • fluminam, rivulorum actorrntimripasanut, is> frequenter m fo&mfntkofis reperitur J res ceruleas adeo den- feinfikamqutficongeSios hobet in cimk caulium Galee/r' u' Galega Germanica aut e Julio & Augusto ma- ta major folio latiore, floribus subaltis li-

2. Vicia maxima Jumetorum faffim frayemt inter femes & dumeta in Germania utraque, ubi ap- J, elktur Viv. Cbriftof^h'f' = Fbm tftate, isverf^ejufJemfimmfiminapeJcituva, Vicia fiheJMf.mcanaChfn flore albo, refertafuit in Hungary quibusdam loci: florebatMajo rni ft atque menfi fequente femem ferficiebat.

3. Vic.a Narbonefsmx,majruayot«ndoatrojolihintegrh<sferratis,nobis. Vicia Roma n3, CamfabafilvefrnMatthVulgatior Vki a foliis integrU in NarLenfis GallU (JZuanl erifq«< loasJPonte fua exit. Apudfeftentrionales rarum eft hoc LtiLen me nlti irt^mprovenitnciafodfa/rL wApulia imotibus C zi ZciafT % \$ £ * ' * ^ O * * " * * - * - , * ^ n i L b I S S

4. Vicia/o« hteo fallido, filiquk hirtutU craffis brevibn ereZis, nob*. Ad margines agro- l / m t t r i ^ Z T " c i n a Monftd i i m referta flom7unio • 7uio * A u ^ f T M » «

\$. VicnluæafoliisConvohuhminoris, C.B.P. Aphace,T)od.ut. Lathyruluieisfoliitr vuhmtnorisis aptius, nobis. Provenitpaffim in agris frumentariis, Uto tiJun r i p r o t - cumTntico, Secali, is aliitfrugibus. FloretMaio; femem Junlo is 7uH0 « £ J f u e l o l o u n a interLathyros, ubimagis idonee collocatur. f. ... ^ turum eft. Vide

Vicia maritima flore albo longo, nobis. A nomine indkantur ipfius natales

6. Vicia majorvulgar-ifativa, nobis. Sativa vulgaris, IB, Seritur in aar' * rr fcendorwn gratia quint* feminibu* hyeme nutriuntur volatilia donitica u l u , ' A bi, isc. Floret tftate ineitnte, is mediâ maturefcitfemen ipftu, JtKa - > & Mm * ' > col T M .

7. Vicia filveftrkfemine nigro is variegato, folio acution, C. B. P. 'is nobis Ath*r« T Fiaa Jefum folio rotundiore acuto, C. B. P. Ficia Dod. Chi-ZT^V v ^ ^ Lu & L inter fata, nonnunquam inter fepes is dumeta; ad aerorum P T M ; 7 f 5 ^ / f P n i u n t tur. Vtraquefloret rfate, eodemque tempore maturumeficaru»f Ua J U (u m ^ c o n o i d -

S. Vichpratenfisvernafepurtcox; Solonienfis, feminecubico n n h ^ r tis minime herbisfloret exeunte hyeme, & maturantur CeJ. A T V agT O Solonienfi i m p r a -

9. Vicia minor fegetum cum filiquis plurimis Mrfutis, C p T M n a / P T M T M n f t . Lob. In omnibus arvisfatis, is aliquando dumetis provenit U6 J m C t a c c a m i n i m a - > A d t

I o. Vicia minor fegetum cum filiquis paucis glabris nobU \ • • fegetespromifcucumpriore: floret utraouejunio i * T M * r r o v e m / ^ r f i u m e n t a , n l i a f q m frugibus ipfis,pr*cupue Avena. ^ u r a n t u r femina Julio is Augusto c U m

TEMPERAMENTUM & VIREŚ:

S.Vicia lutea folik Convòlvu Bpiinork, C.B.P. Aphace, Dod. ut. Lathyrus luteh folik Con-
"volvuli minor is j nobk. Et aptius a hotageperkařic denominator, uffupra apparet-in dp'ffri-
na Lathyrorum. Semina hujus aftringendi vim habent, quapropter ftomachi is alvi fluxiones toft a
**^r decocla Lent is modofitunt. Hanc aftringendi fa cult at em, Aphetem Mere certo experimentò*
cognovit Dodon^us, ut apparet ex Pemptadibusfuk.

6. *Vicia major vulgarkfativa, nobk. Vicia vulgarkfativa, Parks L B. Eft Vicia non modo in-*
fuavk, fedis concoflu difficilk, alvumque inhibet. 4-ertyicum ergo eft, cum natura fit hujuf-
modi alimentum, qu'odex ipfa diftribuitur vix habet quicquambonifucci Jèd craffumeftisr ad
fucctim melanchòlkum gigne h dum idoneum; monet Gd/enus Vitix friiffujn, poti'fiuntim tumvi-
ret, ejjenoxium\ nec funt qui comedunt KicU aut Cicerk frufium, nifeper famem.

N O M I N A.

- i. *Vicia perennk muhiflora fycata cxrulea, fepiaria, nobk. Vicia multiflora, C. B. P. Vicia*
filveftrk fecunda, Cluf. Hift. Vefc. Vicia multiflora feu fycata, Park, Arachws, fab. Galega
altera vel filveftrk aut Germantca, Dod. Defc. Altera major, folio latiore, floribus fubalbi-
dk linek c&rulek not at k^ circa Oxonium reperta.
2. *Vicia maxima dumetorum, flore obfcurerubente, nobk. Maxima dumetorum, C.B.P. Ger%*
Vicia Jepium perennk , l. B. f'cia filveftrk alter a vel\$. Apace Viofcoridk, Ofmunda, Trag.
Cracca major \ Tab.

*Vicia filveftrk perennk hirtutafeu incana * flore albo, nobk. Silveftrkftore albo, Cluf. Hift.*
isr Pan.

3. *Vicia Narbonenfis maxima fruclu rotundo atro, folik ferratk is integrk^ nobk. Arachm,*
Fuch. Vulgo Vicia Romana, Cam. (cuiis Pifa nigra. J Fabafihetrk, Matth. Ad. Lob. Lugd.
Tab. Faba Grxccrum, Lob. Icon. Bma filveftris^ Dod. Faba filveftrk Gr^corum feu lfaba veter-
um^ Park- Fabafilveftris, Ger. Arachus Fabaceus, is^ Faba Kairina cui femina minor a, is A-
rachm Fabaceus ferratus, femine majore, l. B. Phafeolus filveftrk, Hift. Lugd.*
4. *Vicia flore luteo pallido feu ochroleuco, filiquk hirtutis craffis brevibus ereftis, nobis. Vi-*
cia filveftris flore luteo, l. B. is filveftris luteacum galeafufcaeidem. Prior is eft tantum vari-
etas ex noftra fententia. Datur is alia fpecies hujm, filiquis hirtut ere&is minoribus; item is
tertia filiquis minonbus propendentibu : harum duarum fofteriorum Icones delineandas in horto*
Edwardi Morgan pom coenobium Veflmonafierenfe cutavimm, (srpoftea fculpendas, uti appa-
rent^ in Tab. 19. Vide plant ami is 5 illk.
5. *Vicia lutea foliis Convolvuli minor is, C. B. P. Aphaca, Dod. ut. Lathyrus luteus foliis ConvoU*
vuliminois magis appofite, nobis. Vide figuram \$.hic in Tab. 4. is Vefcriptionem inter La->
thyros ex cuju numero eft. Ibidem nomina diver forum authorum adferuntur.*

Vic'izmaritima fore albo longo, nobis.

6. *Vicia major vulgaris fativa, nobis. Vulgaris jdtiva, Parks LB. Vicia, Dod. Get.*

7. *Vicia filveftrk, femine rotundo nigro is variegato, nobis. Vicia min'or vel 3. Trag. Craccot t -*
genus, Dod. Arachus is Cracca major, Ad. Lob. Park. Vicia filveftrk feu Cracca major, Gerv
*Vicia vulgaris filveftris fmgum, femine parvo is nigr, l. B.**

S. Vich minor pratenfis vernafeupr^eco, femine cubico, nobis.

9. *Vicia minor fegetum cum filiquis pluribus hirtutis, C. B. P. Vicia filveftris feu Cracca minima,*
Ger. Vicia parva feu Cracca minor cum multis filiquis hirtutis, l. B. Arachu 6five Cracca mi-
nima, Ad. Lob. Arachut, Lugd. Arachus minor Lufitanicm, Park Cracca minor, Tab.
Cracc<ealterum genus, Dod.

t o, Vicia minor fegetum cum filiquis paucis glabris, nobis. Vicia fegetum fingularibus filiquis gla-
bris, C. B. P. Via feu Cracc* minim* sjcies cum filiquis glabr is, l. B.*

-*Notanos varias Vkiarum Species in Tab. cognationk is affinitatk addidife, qu* non continentur*
'intab. 4. dneafculpt^ quarum auqfdam tantum defcripfimus, quafdamis defcripfimus is ea-
rum et iam Icones adhibuimus in Tab. 19., App. ad Legumina. Not a infuper nos duos Vic'ias hi-
teas, filiquk fropendentibus, fcilket craffionbus is tenuioribus adhibuiffe, cum debeant effe dud
filiquk erettt-) & unica filiqua hirtuta propendente: corrige lapfum is confide Tab. 4. Iconcm
is Tab. 19. Iconem 2. is's^um**

HALLUCINATIONES CAS P. BAUHINI
Aliorumque Authorum.

V^ofcia luteafoliis Convolvuli minorū cum Jit perfe-
BaLathyri ftecies, a binis foliis triangulari-
but cingentibus caulem quadratūsp, quatuor levibus a?
Its injignitum, aptius ompno quadrat Lathyris, mi-
i nime Viēw, quōtum nota pracipua est habereplurima
foliola alata, ex oppofito & conjugatimjūtas ergo mar
'le inter Vicite locatur a Caftaro Bauhino & aliis autho-
ribus.

L E G U M I N A

She Siliquofae Papilionaceae Bivalves
Trifoliate Scandentes caulibus.

c J T v r II.

Smilax Hortensis, Dolichus five Phafiolus,
Phafeolus aut Phafelus & Abrus.

§ i. P H A S E O L U S .

Σμῖλαξ vnmjōL foliiseft Hederce, fedmollioribuscauliculis[^]clavkularum inftar-, propinquis fruti-
cibusfefe implkans, ut operi topiario inferviat, cuju* fructus Aō&a Cquaji filiquas dicasj
femina continent reniformia feu renibu* familia, non aquali colore, fed ex parte ruffefcentia, &c
DiofcoridiL 2. c. 1 j6. H<zc ab Hippocrate, Diode, Theophrasto iypkrifque aliis <foW\$ vocatur: à
nonnullis à filiquarummaghitudine Aō[^]GH is Aō[^]ov- ab aliis <p&<nōA©> (a xp<*tn\ t ut aliqui volunt
diferensj Galeno 1. Aïm. fcribente. DolichusTheophrasto 8. Hift'.o., & fLtiū* Smilacemhorten-
fem Dolichos effe iy Phafeoli genus, is ab omnibus Lobos nominari, aperte docet. \$*cnW apud
Diofcoridem 1.2. c. 130. fed fine ullisnotishabetur. Sunt tamenqui Smilacem hortenfem h Phafe-
olis folum filiquis isf femine differre cenfeant, qu<x in Smilace majorafunt, ut voluit Mattheo-
lus, quipro Phafiolo isr pro Smilace hortiyifi tandem pingere videtur, nifi quodpiclura una refta,
alter a. inflexa eft: At Anguillara Phafwlum isr Phafdum diftinguit : Author Hift. Lugdun. of-
fer it Gaïenovocem Phafeolum quatuorfyllabis prolata, a Phafelo t rib us fyllabis prolato diver-
(am efe , isr de hoc cum Erviliis fimul traftajfe. Elinius lib. 1 8. cap, 7. Fafeolis folia venofa
tribuit,

Duplicem facimus [^]vulgarem alium, alium peregrinum; vulgarem, ahum major em, fruclu longiore
[^]rens formam melius referente, qui communiter-candidus: alium minorem filiquâ anguftiore:
diftant etiamcraffitie is tenuitate. Hie variatfloris is feminis colore: ftioresplerumque candidi
pallidi, flavefcetes, purpurafcentes five amethyftini, is ut Cordus in fua kftoria cenfuit, flo-
ris coloremfruclus fequuntur. Verum in fenviē frucluve major eft colori* varktas ;funt nivei, fla-
vi, ex flavo obfoleti, purpurei, rubri, latericei fen` coloj-is, amethyftini, violacei, atrovi-
olacei, nigri, initio purpurei, deindeatri: velalbi[^] venis nigris is·lituris diftincli: [^]item car-
mi is cinereiijmilibus venis infignes: item albi purpurafcentes, orbibus albis variegati vdfba-
dicei,nigmmaculis asjerfis: nonnulli incani, atro colore, vel ab unâ parte, velutr'mquēnotat'n

Planta quas 2 [^]4 *wna Diofcoride dicitur, quod fmilacis modo confeendat in pro-
pinqua & vicina adminicula, eaqueprehendat; Smilax hortenfis folia habetcordiformia,
molliora, terna, & ternis diftin&is petiolis, binis curtis ē regione oppofitis, tertip me-
dio longiore, omnibus à communi pediculo ortis innitencia : caules tenuesjlong^{^11*}[^]
vicinis fruticibus, aut quibuflibet adminiculis appofitis adhaerentes& fefe circumvolventes
à dextra, ad finiftram obtinet; qui eoufque adolefcunt, ut ad altitudinem fex cubitorum
& multo amplius afcendant, & fcenas topiarias contexant: filiquae vagmarum cukelli inftar
longitudine fex unciarum, latitudine femiunciam reterunt, tbrofsenunc, nunc compref-
fit,

.. , profruGustamicatp sot depreffione ; c'onunentes feniina aV/depreffa (homani renis forma aut %tira) auc i, craffa, nuvlongiora, nunc breviora, diverforum(utifupra dictum) colorum. Hifcv *ns notis quafi Phafeolorum genus delincatum exprefiit Di-ofcorides, ut nulla **prorfet**; let nora. Id genus Gaientis perfpicje eife dcllarat, acque eti^n Theophrxfti achoriti- **JM&IBOX.his verbis**; Dolichiorum nomen a Diocle fcriptum tiV una cumaliorom feminiim nos morcales fientium norainibus. Scripttim etiam eft in libri^*Hippocrat:ts, deratione vttils. Exiftimo ipi'iimfic appellare iemen plants horcenis, qtiam nunc vulgo bifoi'iani nortinani: quidam AS8W, id cit filiquas; alii *ntot*: hos Dolichos eife hortenes quis conjicerepoffit, velcxiiisquae Thtoptiraf^usfcripi- s verbis, ut! **ta^oA**

A>9c? n'dgj8tS*H migm^, TTXf^t i^iyuSV^-V^A^ KJ^LITip n^VE??> TITWBJ, Aa^^J^j 3 <^t <fllAI&>?^ tEW 'A^t^UctTWrvii^^ "i*, 6'Aa fvLX/* al!*5>"<J K3" >{e^xi xapOT^(- EI ^t ^!, pauA©- ^1 Iz&ahf, id eft, aliis quidcni cau- lis'elt reftus ur Pifo & HordeoSt omnibus frumentaceis , atque attivis: aliis vero in lams potius inclinat, utCiceri, £rvo, Lend: aliis humi prc^umbens,ucOchro* Pifo,Cicerculae five Lauhyro. Dolichus verafi ligna longa affixeris, in ea confcndit & traftum kret: a- lioqiirubiginis vitiocorrumpicur, &C

T A B U L A V.

		Maximum yi.Br aftlianws^ fore puniceo, frufturenalimaxmonigro. ?	
		^z.Alboisfrufualbo tumidhre. 5	
	Major	(Fore^Pumcee^ FruSius^ AnagyridisfrutluifimHl \$	C Nigrofykmknte tumido, %
			C4. Cdojimo nigrkmacufo conJj>erfi.Q
		5. Hirfuta Park* Coubage India.	
			6. Con/re/t } AH Mpt } renal'A } Albo } Mincrl } } gro } Minor }
Phaseolus trifoliatuS	Annuus	Mabus, Stliqua- Glabra,FTu8u7- / ^{w m i} ^	A wo feu niveo. } Aurco. } Ametbyfino. } Coloffimo nigris maculis } notato. } Latericei colons. ?£ Fuliginei coloris. £ Pumcei coloris. f? //io, WCM^ difin&o. <? Cameo i\$ r c'wericeo, ve- nitfeu lituris diftut-
	Minor	8. Siliquis propendentibus re albo^ macula nigra in/ignito\$Comprejfiore, }	9. Minore latericei coloris.
	Minimus	Leptomacrobolus fliqua fruflu }	10. Viridi ovato, nobis. }
		11. TritnnUfiliqua longalata, nobit. Lablab. JE&pwrum, Alfm. Q	
Phaseolus alatus, five Abrus		12. Minor f uclli cocineo a ule n' g notaro nSis.	
		13. Majorfrutlu toto coccineojufcoisr varkgats. \$'	
		14. ViTukntm Cbinenfis. %	

Explicatio TabuU quint<z, Seflionis ficznJU.

Finita doctriⁿa Leguminum fcandentium capreolis in priore capite, fen membro prjho hujus Se&ionis, atq; notis eflentialibus & genericis, fubalternis, unicuique generi fubalternato ibidem contento aflignatis, utpoftparagaphos apparent; jam requirit ordo, ut de Leguffiliibus fcandentibus c::ulibus, non capreolis, agamus in hoc capite fecundo. Primò morenoftro folitodicemus[^]Vid/it PhafeoluS; Dolichus fiveSmilaxhortenfiſ, qua? funt fynonyma eidem Legumini c'ongruentia. *Legumina hax feu filiquofe papilionaceae plants, trifoliolate, fcandentesfolobeneficiocaulium (idque inftinftu quodam a natura ipfis datum 6c con-££\$\$\$&>)fçnihc'is 'm&av C&Ca u ^ r ^ ^ A c &c <Av<,umgyrando pertj^as, b^culos, fenticofa auf lignea quadibet adminicula appofta, a dextra ad finiftram gyros feu lineas fpirales faftitando, adfumflm baculi aut perticfæ cacumen pertingunt. Folia producunt terna cordiformia⁷ aut ut volunt aliiHederæ familia, tribus petiolis innitentia: omnes hi tres petioli terna fuftinentes folia, terminantur in pediculi foliorum txtremitàtem, quorum inferiores bini funt breviores & ex oppofito fiti; tertius autem fuperior longior eft, fuftinens folium impar: flores producit Dolichus feu Phafeolus Papilionaceos pifi formã, albos, rubros, luteopallidos, coccineos feu Phceniceo colore, aliquando faturate, aliquandodilute feu leviter tinftos: filiqu[^] producuntur, poft deciduos flores, pendentes utplurimum (perpaucis minoribus exceptis) bivalves, longiffima? omnium Leguminum, vaginſc cultelli inftar, quarum umbilico feu parti filiquas concavè adhaeret feries longa feminum, multorum colorum (uti diftumfuperius) quæ etiam funt reniformia, compreffa, majora; vel tumida minora, cujufcunque fint coloris. Quoad pofitionem filiquarum, quæ dependet a longitudine aut brevitate petiolcrum florum; funt vel filiquis propendentibus, velereftis: hi funt petiolis brevibus & vix confpicuis extra calicem florum antecedenter, & confequenter filiquarum prsditi; illi funt longi biunciales & triunciales. Atque hæc in genere de Phafeolis caulibiis fcandentibus dixiffe non abs re fore putavimuy.

1. **I**ff^{Major} five Smilax hortensis, C.B. P. Dolichus five Phafeolus, Dod. Dolichus hic five Phafeolus major caules profert.tenuis, longos, ramofos, fcandentes, 6f alcendentes a dextra ad finiftram, & in perticis ac vicinis fruticibus feſe circumvolvences: folia cordifbrmia, terna ternis fuſis petiolis propriis, ab extremo pediculi orris, innituntur: flores ex omnibus alis erumpunt numeroſi, candidi, luteopallidi, aut rubentes, fed vulgatius albi: filiquæ deorfum' pendent ex longis pediculis ſex uncifs longæ, femiunciam lata?, in medio tumidae, & aliquatenus arcuatae, extrema & infriore parte filiquarum in nnguitukm definente, in quarum fingulis femina feptena, oftona; nunc pauciora, quina, ftra, continenuir iemina, alba utplurimum, compreffa, reniformia: radices fubfuntmute longæ ac duræ. Duplex eft, hortensis ac peregrinus; cum hic[^] turn ille duplex, major & minor: omnes topiarias & perticales fcenas fcandunt& adumbrant, & filiquas a longis petiolis pendente? gerunt. Dantur of mediis & minores ejuſdem generis, 6V iſtſuper minimi Phafeoli, quorum filiquæ non propendunt, fed furſum verſas eriguntur, & eo ipſo nomine curtis omninopetiolis donantur: de hiſce poſtremo loco dicemus, fed impræſentiarum agemusdeperegrinis, qui funtiEthiopici vel nigri; Guinienſes; Indici; Americani vel Braſi-Hani. Vide Caſparum Bauhinum a pag. 339. ufque ad paginam 342. in Pinace fuo, & J^o hannetn Bauhinum a Pagina 253. ad paginam 278.

2. **Lohus** Phafeoli Braſiliani. Siliquahſc feu Lobus, enjusIconem in Tab hac quinta damus, magnitadine reliquos multum fuperat, atque femina inibi contenta caeterorum omnium multo majora producit in fuo gremio, & eo prascipue nomine Phafeolus maximus Braſihanus dicitur. Multo major eft vanetas in Phafeolis peregrinis eorumque fruſtuum variiscolombus, qui magnitudine, formã feu figura, in infinitum quaſi ludunt. Ut quilibet cam Pfalmiſtaexclamarepotent, quam pulchra fimul Se miranda funt creatoris-opera. ^{Ex A}~fñca atque America aliſque regionibus Indue-utriuſque* Orientalisſf Occidentalis, pſbcul ab hoc noſtroorbe remotis, vanas ſpecies adſefuntur. Multo enim major (inqnam)eftPhaeolonim peregrinorum vanetas, quam in iis qui in Europa naſcuntur. funt enim majores, minores, mira diverfaquecolorum varietate, cum florum, turnfruauumprzeipue, inter ſe diſcrepantes.

3. *Phaeolus peregrinus* Anagrydis fru<Sui familis, cok)re rúle'ifcente, C. B. P. Peregrinus 3. Cluf. Hift. Hie peregrinus oblonga farmenta habet, ex fingulari caule fctatim fecundumradicem ípfamprodtm̄tia, & in multos ramos divifa, lentá, oblique fe cdtorqtierH tiaftl humi procumbent^ n.fi perticis aut aliis peda.meritis fiiftineantur, quibus fefecircurri-vóluntreliquoTum Phaeolorum *raodo*; purpurafcunt eadem juxta alas, qitibus adnafcturf terna folia, minus ampla prioris, & dilutiore tolóre virenfia ., longo etiam pediculo inhas-réftlia: flores in longiufcúlis proveniunt petiolis, plerumque bini,- magni, papilionacei, foris ex candido pallefcetes, interiore vero parte, ex purpura cserule** his fuccdunt toti-dem præloftgi lobi teretes, etiamque aliquandocompreffi, fed tumid' /atis ubi fruftus ap- parent, in quibus fruftus obfervatur reliquorurt Phaeolorum fruftu minor; Anagrydis majoris fru&ui omnino fimilis, fubrubeſcentis coloris: floribus futcedunt vagina? latse feu lobi bivalves, primi lobis feu filiquis majores & longiores.

4. *Phaeolus Indicus*, flore coccineo feu "puniceo, nobis. Fafeolus puniceo fldre, Corn. Hie Indicus parum diftert à vulgari in parti bus co*mmunibus: folia enini ex longo pediculo prodeunt terna femper, quorum binaeregione curtis pediculis innituntur, tertium longiori pediculo infi(lit, omnia terna folia ex iatiore bafe in mucronem acutum definunt, coloris funt magis obfeure virentis, interdum expanfa, at in fe de nofte aut fub feram noftem contrafta: numeroi cauliculi teneri & viticulofi, adeoque invalidi, oriuntur ab exigua & fibrofa radice: flos figurá iimilis vulgaris fiori, at colore longe eft diverfus: vul^aris enim candi- duseft, hie vero eleganter punkeus, .aut cocciileus, diu durans refpe&i vulgari um feu horteiifium, quem ob praftantiam florum nondedignantur nobiliores matronae noſtrates fertis & coronis fuis inferere feu intertextere: filiquae funt longa?, craffe, craffo 6V iungofo cDrti- ce feu membrana exteriori, dum funt adhuc virides, dónate: femina iuntoblona, tumidiora* nigra, aut ex nigro & coloffino colore variegata.

5. *Phaeolus Zurratenſis* filiqua hirfufupungente, nobis. Apud Indos illic degehtes in Zurrat Gouhage dicitur. Ex India Orientali habemus filiquas hujus Phaeoli ad riosdelatas* atque hoc anno feminibus exinde exemptis, & terrae comiffis pullulavit planta ipfa, in hortulo Botanico Domini *Caroli Hattort*. Foliaproduxit obfeure admodum virentia, mino- ra multo vulgaris Phaeoli foliis, ternatim petiolis liiis diftinfis infidentia, more aliOrUm. Al- titudinem non obfervavimus, an ad perfeclionem pervenerit obfervare non licuit, quia poll- quam palmarem acquiſiverit altitudinem, deceflimus *L O N D I N O O X O N I V M*. Siliquas habet liirfutas, feu pilis fcatentes, & cutem leviter pungentes velutiurtica, mi- nores, breviores vulgaris Phaeoli filiquis: femina fufca pundlata, Fabae equinae magnitudi- ne: hilum habet album in feminis parte laterali (ut Faba ipfa nigrum in fuperiore parte) nori veroin umbilico, quemadmodum omnes Phafcoli poffident, 6V quafi finum in medio impref- fum habent: atque ex hifce notis facile cognofcitur à c^teris omnibus fae familiás. Ex primo intuitu filiquae hirfute & feminis, Fabae equinſeimilis, cognitu à cſeteris fue tribes facillimus erit hie Phaeolus Zurratenſis.

6. *Phaeolus peregrinus* fruftu tumidiore minore niveo &: verficolore, nobis. Peregrirtts 2. Cluf. Hift. Forma & nafcendimodo à vulgari non diftert *hxc* Phaeoli fpecies, farmenta enim habet valde ramofa, *qux mor£* aliorum vicinas perticas ampleclendo, *fek* caulibus à dextra ad finiftram circumvolvunt, eafdemque fcandunt: petioli longi ex fbliorum (^que femper terna funt) »finu oriuntur, in quibus bini, terni, quaterni, confpiciuntur fiiores, vul- garis Phaeoli majoris floribus forma reipondentes; primo dum recentes aperti, candidi funt, d^einde vero pallefcetes; quos excipiunt oblongae & propendentes (ut in vulgari Pha- feolo major.e) filiquae tenuiore^, qnina, fena, femina^andidiflima, tumida & quafi ovata, continentes, fine ullo hilo aut umbilico depreſſo apparente, lit in fruſtn renali vulgari: fed funt qu^ ex eboretornata, minora 6V tumidiora multo vulgaris renali fruftu.

phaeolus minor fru&ualbo, umbilico macula nigra notato, vel fruftu renali parvoalbo, umbilico circa hikm macula nigra inſignito, nobis. Hujus duas obfervavimus fpecies, ma- jorem & minorem habità ratione rruftuum renalium; utrumque fruftum, majorem duplo rainorem excedentem, & minorem ad me mifit *Robertus Spotfwood* apothecarius & Tingidis oppidi Chirurgus à fereniffimo D. Domino noſtro *Carolo 2.* diplomats conſtitutus, qui rei Botanicae amantiffimus eft, à quo fingulis annis rariorum circa Tingidem nafcentium planta- rum femina communicata habemus.

7. *P^e^/ni* inimus fruftu rubro, filiquis longiffimis ereftis^iobis. Diximus fupenus de Pha- feolis majoribus, qui filiquas fuas propendentes formant, petiolifque longioribus confequen-

ter donantur ; jam Hie aa'ealcem. adreremus in medium Phafeolos minlmos (unum an-
terum) quorumfihqusten^parv^&long^petioliscurusir -ntur & perconfequens
funterefts, non autem pfopendentes, hortenfiumfc perer more.jiie igiturPha-
feolus minimus fibquas fere longas, tenues, palmares& •£«, continences in fc
femmadena, duodena, remtorma,rubra,minima, eadem ja ndinc cflp, Phafeolo "mi-
nore Itaheo fimftii albo minore, umbilico mae^la nigra nota.o.

Hac Phafeoli minimi... Jmftutindie^oovato, filiqms longis rotundisereftis,
viridia, minora tenuia, fir^ST " 1 " ?f uip^ed3li. «OEi edit etiam tema
re: ...lis c ... angintu ... is nitene ... majoru Phafeolorum mo-
is S tz- T PirVII P 11 Onacci > tx lucco vi » dcs: ^fentibus fingula

incedunt hi q i .ktenues, rotunda; tres uneias longs, recentesadhuc virides
intumefcentes ub. appar^t femina; ia quibus fingulis continentur femina ovarav"rid^
dena duodena, mmep]ura, nunepauciora T.Pifi^8 minoris magnitudine, fed £ t. W
ovatafe, longa & vinda. Hiice paufis facivis in Italia, Gallia & c hie & alibi locorum
per plures annoscultis; nee non peregrinis quibufdam e longinquis regionil
lam, exphcatis; adjiciemiis Lablab ^gyptiorum Froperi Alpini. Ertenim Lablab ^gy-
pnorum arbor larmenrofa, quaa, crefcit ad Vicis magnitudinen,, farmentifque fu, is v.ri, mo-
do ommno extender, ac expanditur foliis ; figura autem foliorum eft itidem PI So tX
n fim.hs,nempet,c_p_m_e,tri[oiiatu_m: liores pariter fort papillionnceos, aq_uib_u_s ori^tur
filiqu. bivalves, fubloug^ & infer fabarum, (ed multo latiores & compreUiore^cernun ur-
Haarixjrviv.tannos loo&li w, dirfic.le creditu iis, qui nunquam /Egyptum^m^de-
runt; nontameninfciafeondum eft, quin iint plcraque plantsreftibili & viva radiceper
aliquot annos durantes, qua; pereuiitibus fingulis annisearum farmentisufquead radicem
iequenti anno repulluhnc 6V revirefcunc. Mulieres iUc utuntur decoao hujus Phafeoli
A-gyptiaci cum Croco, ad excitandos menies. vEg>ptii ipfi Phafeolos illos incibofrequen-
ter ufurpant, & nofracibus non minus iuaves gnftui apparent. Priterea utile cftdecaftum
ad tuffim Sc difpneeam corrigendam, urinam fuppreffam movendam. De ceteris Phafeo-
lis dittafe fatifif ad longnmagit Johannes BauKinus, a pag. 253.3d pag. 278 queni i;,
demconfule; etiam de Pifis exoticis ex Guinea, India utraque, Brafilia;6HerrJrorin M^o
<*ano allatis vide eundem.

• L O C U S & T E M P U S .

Flvent omnes hi Pbaftoli sftate, quidam citiut, qutAam tardius: femina perficiunt autuinno
Sattvi aut bcrtenfes no/irates CteftieColumeUqiz Palladiaj in Italiaproveniunt. Exotici ex
India utraque Orientali is Occtdentali h pauch abhinc annh ad nos Europeos delati iv^mta -
^_n_i...s.rut* hortPi fail, nuns iiarietat. tjuithm rfy nmltitilry /**:*...orum, eorumque fru-
dium deleat, coluntur; quin & ipfa femina annosa, variis coloribus picta, & diversiformia, vi-
fu & f^rvatu per digna, ut in armorariis feminalibz seu musæis rerum naturalium studioforum
mifervntur.

• T E M P E R A M E N T L I M & V I R E S

Smilack hortenfisfil^tqu*lobidkuntur (' ut fupra dtflum,) quoniam tr* JiU

Cofunttri q u * cumfmlnibu* unaint* latenibu* ufnZftf^nt comduntar -
veluti Afparagus
triant Phafeoli non minus quam Pifa, fimiliterque flatas expertes funt, verum jucunditate & al-
ni boieftione illis cedunt tefti

afrit. PergU SiJon A, qiimagi, rubri }ZlZtf MaJft h^s^ura

Cut ,it Galena intir w ^ / . r i f c ^ ^ 6 ' ^ . m ^ » « locumbahn
Amesescibosfumpti ventnmporitant. AlbiUZlftV' c f' < r < srtordetrantevnt.
Burn* acbum&res fiat qtumnhi. Proptm^ftl I * I \ T a V^torii < * ^ i l i o r k evne-
bonambabuudinemiopori conducunt i/urinl * "£*" * < ' / " « / « « *** ^ f e d * ?

Scf. II. VNIVERSALIS O X-O -N \ \ £ ftS I S. fl
*liquifexu corriicula dum recehtia viridia h? teneriora funtj fijwfi-finapi & Caruifemim e-
dantur, autfielixenturcumFipere7 in acetarik etiam eduntur. Addmturetiã in fuels, qui-
bus mulieresfariem concir^nt.*

N O . M I N A ,

Phafeolus, Phafiolws, Vhafdns CEtgravh Atriplick confurgit longa PbafetusJ Fafeolu, Do-
fichus is' Smilaxhortenfis, LB. *£&§?(& Xatim quibufdam dicitur, ideft/iliqua; quiapr<£
ceteris omnibus filiquis Thafeoli jlliqu<z virides isr qdhuc juniores i& ;• JUT* elixae, okp aut
lutyrã aceto i^fale admi/iti-, commode fat is eduntur.*

L E G U M I N A

Sive Siliquofe Papilionaceas Bivalves Alatse

Scandentes Caulibus.

\$.i. P H A S E O L U S R Q B E R A B R U S

Vocatus.

*i .TJSc Phafeolus hie alatus fraticofus & voltibilis planta (five Cicer fru&u rubro macula ni-
d gra notato, nobis.) etiam Phafeoli trifoliati Lablab ^gyptiorum modo, fcandens cau-
libus, perticas, baculos, ridfculas, aut quelibet alia adminicula adftantia circumvolventibus ;
foliis Derelfide vel Tamarindi, Vicia^aut Arachi potius plane fimilibus, binatim feu conju-
gatim coftas rmedi^ feu \$£% e regione adhaerentibus ad numerum incertum 14.16. aliquan-
do duodevlginti, obtufis, fine impari extremum claudente, quae etiam moventur ad folem non
fecus quam Tamarindi aliarumque plantarum, folia conjugatim pofita habentium; occidente
quippe fole clauduntur hujufmodiarborum, fruticum, fubfruticum, Leguminumque folia, ex
oppufiro conjugatim fita, 6f omnino per totam noftem cbufa manent, quoufque fol denuo p-
riatur; temporematutino, fole apparente* rurfum aperiuntur & extenduntur: flores autem
papilionaceos haec h\$ rba fruticofa, Phafeolis pares gent; filiquas etiam propendentes,
curtas, cralTas, graciliori brevique petiolo innixas habet, rugofas, fpadicei foris colons ^
unjeiam aut paulo amprius longas, femiunciamlatas, illafque aliquando planas, mucpone
inftrar hamuli curvo, interna parte albas, in quibus continentur femina quaterna, quina*
duriffima, ovalis formx, profufurubra feu nitentia inftar corallii expoliti cum probe ma-
tura funt, furtma parte qua filiquae inhaererant femina omnino atra, ebeni nigerrimi colore &
prae lasvore fplendentia. Coralliorum unionibus quascirca collum geftare folent puellsein omni-
bus plane accedunt, & quafi Paeonix feminum funt aemula; & collis monilis inftrar non lb-
lum penduntur, fed armillarum loco in brachiis mulierum geftantur ad ornamentum ; coral-
linos globulos nativi colons elegantia non folamprovocant, fed&vincunt. Ssepchujus Le-
guminis femina praedifta duriffima terras commiifa a nobis fuere, fed nunquani nafcebantur;
imo(quod magis mirum)poft trienniumeademè terra-eruta, incorrupta reperta, acfi pridie
duntaxat fata fuiffent. Semel tamen CQntigit utex feminibus magis recentibus ex Indiaallatis,
ac aqua bene per binos dies naturales prius roaceratis, & pofttea terras in fi&ili commiffis
«tque fiftilieademinpulvinoexttercoreequi.no adhuc bene calente depofita, nata fit una
?ut altera planta, cura & vigilantia Georgii London hortulani Reverendiffimi in-Chrifto
P?tris Henrici Compton Epifcopi Londinenfis, patroni noftri colendiffimi. Protrudebat fe-
inen terrae praedifto modo praeparatas commiffum, initio bina foliola, femine bifariam fe di-
vidente, & folia fupraterram formante (ut in aliis Leguminibus accidere folet) inter ifta bi-
ria folia riafcebantur coftx fuftinentes foliorum conjugatim feu binatim pofitorum ilas, quae
^x multis foliolis contrario fitu femper nafcentibus conftabant; denis, duodenis, autpluri-*

bus, nullo inipari eltr<hihri claudente. Folia" (ut supra diftunO mirum in modum a leni convertuntur; nam folia pinrtata feu alata tqngae coftae ar . "-it, 8t contram* curt.; & vix confpicuispetiolis. Semper numero funt paria, parte . unum contra aliad ar- fitiflime circa folisoccafum clauduntur, ut mucrones obtufi i terrain fpeftent; co- ftai ttidem longa;, quibus folia haerent, noftgveffuS tern¹ nturita utcaulem fere tanganc; & fie tota noSe permanent: at cum fol oritur panduntflr, & pedicali feu coirr in fuofituadangulr- fere reftas cum caule convertunmr: circa meridiem paulatimjslia coeluni fpeftare ir u, & ipfo meridie, parre luperiore, ununi contra aliud tncicem cl^i- dimturitaarftc at aliudtangat, rHiicronefqueccclumfpecreriC, contrario prorlbs modo quoiioihi permanetr-, ioftca apparerlte jam fole panduntur. Hsec foiorunrad (blem con- verfiiofpechoribtis & cm ipfam examinantibus miiabilis & obfervarione diligent! dig- nifiima, vidctur, in liac Legumine prefertim; ficut in altis etiam plurimis alatis, tarn arbo- ribns, frutrcibus, fuffhticibusfifplantis Leguaiinofis, qui propria inclinarjone a natura ipfis data & concevla, nmiationes prsdiftas, accedence &' recedente fole fine taftu fube- imt; qaeniadmodnm herba fenfitiva cujus folia & altquando pediculi fimul cum tbliifta- fmex infante, fefe aut comprtmunt aut demittunt, & brevi procedentc tempore, fplen- dente ant lucente fole,paulatim priffhnurh tecuperant fltum ftatnmve; arque diffiAiker aja poterit r^ddi ratio, quamquod ipfis a natura fie datum iuit. Hujus Abri pturimiaia; funt fpecies^""

1. Eft; minor hie (de*quo nurlc diximus) cocciaeus, nigra ciacula notatus.

2. Eft & major compreffus Abniscoccineustotus; Pifum Indicum majus feu AWus ma- jor dicitur; variat coloie, nigro, fubfufco, variegato, umbilico eminence, &c.

3. Pifum virulentum Chinenfe, feu Fabarum genus quod Abnis Latinis, Saga Javanis quibus pro folis ponderibusutuntur, Linfcdt. par. 4..Indif orient.cap. 8. item part. 3. cap. 29,& part, z.Indi* oriental.cap.4.

LOCUS & TEMPUS.

Ex India Orkntali deferuvturftmina cum majoris Abri turn minoris.,'htterorumqmc bujusfarin.*

Item ex Arabia felici & univerfa Infula Madagafcar, (sr ex China; fedapud nos fata i>ix

- *gmninant: foliafolummodofine caalilus isfruftu, maxima adhibita induftria (utfupra me- minimus) apudfeptentrionaksproducent,*

TEMPE. RAME. NT. U M & V I R E S .

Quidam tejl Carnmtrioptribent Abriftmna utilltir adbiberi dntitianihttt % ftbribus fc| puerorum; Abri femina Phafeolorum gufium babnt, quorum ufm eft in/ibo, iifque fiLg,t ij in jureclixkvefci cenfueveruat; funtvero ceteris Legumimbus duriora nee dentibutfrahgun- nir. Stomacko maxime of eft a fort, ftatufque excitant multos, <? hypochondriac knalde nox^ta obfervantur; agerrime inftomacho concoquuntur^ ispravumfuccum etiam generant.

NOMIIJA .

*

Phafeolus Indkus minorfemine coctimo •, nigra macula nottito,nobit. Pbafeotusruber Ahrut

tatu, Alpin. dtplan. JEgyft. Phafeolus ex feme Hon.BiUi Ep. A- ad Cluf. Phafeolu* exjmai*

- *qui Abrus dieitur eidei/i. Vhafrolus Indicus, vulgv Cfedfalfol P&onta Indka^ nomine Cineye isr Abrutmiuitur, Cam. Pifum Indicwn minus coccium, C.B.P. Pifum cocctneum Amencttm, Lob. Americanum, Lugd. Pifarubra exnova orbe; Cef Hort. Aracus Indict five ^Afric- dnt&filiqua Araci Indict rubn^Park- Videjohan, Bauhinum apag.26^ ad pap. 270. d?c<e- terk, in quibu* variants nature ars in h'fee mire ludit. Res ipfa vifu digna (y eka^{an}'s, Vicia Africana Cluf. exotj.^c. 15. Fabarum gus, quod Ayyptis AbrutPar. 2 JW Or.cap. Xuercoain nigra macula notatum, nobk. Abrut Mejitik Cor. 2 fadi Orientali* Fideplantam^j.Tab. ly.ubijguratur.*

HA^T TNATIONES CASP. BAUFINI*

Alionimque Authonim.

PHASEOLVS hic alatus Indicus minor, semi-
 ne coccineo macula nigra notato, nobis: Abrus
 Latini dicitur, & major totus corcinens, item &
 virulentus Chinenfis, male ab authoribus nominantur
 Pifa, Araci aut Vicia; cum prædicta hæc Legumina
 capreolis donentur, illa autem iisdem careant: dein-
 de quæ in præte Pæonia nomine inscribuntur aliis clare
 videntibus Botaniciis discernendum relinquimus. Nos
 hic prædicti Abri species cum Phaseolis, quippe caulibus
 scandentibus non capreolis, locavimus. Vide dif-

fusus in Halluanahimihus Cajjiari Baubini sopra ad
 finem capitis Pi/orum.. ^ 'rmiitadine foifarttm <ifa-
 terunt binaam & canwrt dj f^t^f^f^ITJ.
 imbari extrimim. dluuU jllqu flrp
 bus, melius hæc abri iici jprits convenitttt
 cunticere-fediptumft H&J, ^<<<^ Chert'
 bus denegatur, tnagu cam Phajeoih Leg*-
 mimbtts trifoliiUis,cd and p p ue, co l'q' u t
 hic ex nojira sententia in b' . spite qilinta, qnam ill-
 ter Ciena capite sequente sexi>.Q Sefitmis stand*.

I E G U M I N A

y«;e SiKquofe PapiHonace^e Bivalves noa Scandentes,

Siliquis propendencibus donatfe.

ibus Sativus five Ervum; Cicer, Orobus Siliquis

Propendentibus; Sophera; Sesban; Securidaca

Ec Stella Leguminofa.

c 'A 9 v r 11 i

OKOBUS SATIVUS five ERVUM.

§ 1.

Orobos Græcis, Ervum Latinis: Græcorum vocem quidam deducunt & id ipsum dicitur non
 bos, quod boves eo vescantur & saginentur. Dioscoridi lib. 2. c. 131. frutex est exiguus, tenu-
 is, folio angusto; in siliquis parva gerens semina: & Theophrasto 9. Hist. c. 22. fructu rotundo
 modo Piperis. Plinius l. 18. c. 15. Ervum vocat & cum Vicia conjunxit.
 Genera duo, sativum & silvestre: illud duum generum, candidum & ruffum; Galenus terti-
 um addit, nempe pallidum, inter priora medium: est & quartum Creticum, quod semine minore
 'ft-

T A B U ' L A V I .

ft* *mntumbos* 1. *Mimre albo, filiqua inter granam & granam junctâ, nobis. Orobus re-*
ceptus herbariorum, Lob. Ger. ☿
Majore nigro obtuso, filiqua inter granam & granam junctâ
et Orobum, Lob. Park, ☿

Cicer fativum feu. *mi* *noons, ☿*
** > VmcQminentemgulo in femine Rubro- nobk. ☿*
(Mgro, nobis. ☿
 4- *Pluriius enntentibu, anguk in femine*
Minorenigro, nobit. ☿

Orobus erenni fd-r<, Latifolius parvo flore purpureo, nobis. Orobu* Venetus, Cluf. ttiJ]. Q*
vatic Jfi h h p W . Vicia folis, nobis, Astragaloid
inter a herb ariorum, Lob. Icon. 0
*Radice tuber. < * M*. AJragatiKfdvaticH6, fneAJragoloidesLB.Q)*

8. *Sophora Lent. ifcifoliis, Hon. BelliEf. adCluf Sophora Alpin. HoxocoquomacUt, Cluf*
Cur. prof.

9- *StfbanAlfinideJH. Egypt. & Hon. Belli. Ep. ^adCluf %*
a vera, Cluf. Hif. Securidaca plurimis flofculis luteis in capitulum congeftis/diquis
granum & granum junctis, femine quadrato, nobis. ☿

11. *Stella Leguminofa, Arturo Cortuf. Ornithopodio affinis hirsuta planta Leguminofa, filiquis*
latum difpofitis, nobis. ☿

Explicatio TahuU fep • > Sefiofiis fecund*.*

nes je
 Pit?ecun!n fr. *hnt* in hac ^a Tabda content* conveniunt cum praediftis in ca-*
*dufti^rrl - - - *bula 5-explicatis, quod filiquas habeant propendentes, & hacratione*
ueaiaemin hoc capiteterrinrlWav-urm. Notagenerica conveniens ipfiseft haec O-*
nines fiViquasproicruntpendentes; fectindo pluri ma folia habent uni coftae mediae r- - -
gatim adh^rentia, & hoc nomi nddifti pnpunpur a Fhafeolis fuprà in capite fecundo exni; ^
 US, trifoliatisfeutribusfoliScIonaEis# *expiiCa-*

1. *Orobus fativus fiveErvi on femine angulofa, filiquis inter grana & grana junctis, nobis.*
Orobus annuus receptus herbariorum, Lob. Cjer. Hie Orobus caulem habet duriufcu-
non quidem r- - - am, nee tamen procumbentem fed in latus vergentem, WA
Theophrasto o. ?] citur: folia Lentis fimilit dine, parva, angufta, plura uni coftae r- - -
 • feu ?* > % *aunata, Of hbi invicem conjugatim e regione appofita: flores exigui candi ai*
lionacei: quos parv^ unciales / torofefiliqua, ubi apparent femina protuberante papi-
tar, in quarum fingulis terna quaterna que femina angulofa minorâ, g^ntal non infuavia,
latent: radicibus firmatur tenuibus. &

Orb^TM Cr cticus feminem in^e, C.B.P. Creticus, Matth. Lugd. Hie Orobo praedicto an-
*nuo fimilis, fed minutiore confat femine frhquif^ acili S. * * Orobo praedicto an-*
 TM^ *valv Ife Utun ^ fi AnglllLf Xut^ A inter granato*
 ti *Umheoh^r Co rru p tum; <<< Ervo Iervodicitur: inglar. eofis \\ dntem*
 rit. *Matheolus ejufque fequaces femine minore effe afTerunt Qui*
 eundem conftituerit, *illidabomanus. e aierunt. Cuiunque hunc & priorcm*

2. *6 >rote Creticus femine majore obtufa triana, tl^ 1. r ^*
 Theophrasti, Lugd. Ad. Lob. *Wmo Orobo fi Sv, noois. Et C. B. P. Cicer Orobenm*
 Ervo *imim, undiciture jufemen. Tuxtacauli?nl- P^ lert^ filiqua: dulciffimum C:*
 tmentes- *plures filiquas, rotundas, femiunaales TJ*TM nou ! TZmYl Wd* m prodeunt/uf.*
 berculis ubi apparent grana confpicuas *tarn nter gran a & g^na junftas, feu exiguid tu-*
 r > *tarna raro plura femina obtufa, triangula, clauden-*
 tes,

Jrobivulgaris recepti herbariorum femiibus duplo majora, crJpre albedo pallentia feu iu^alva; 1101 ingrati fapov-, qijaeab Orobovulgari non fofummagnitadinefed&nigredinc difterunt.

I f O C U S & T E M f U S .

- i.-"Orobns annum recepti herbariorum, Lob. Nafcitur hie in Hifpani<£te Italic plurimis lo-
c's; in Germania is Gallia Bdgiaque non nifi in bortis a panels ferititr " ?t'junto isJulio^
femenfuumpsrficit Augufto.
- 2- Orobns feminemajor? obtufotriangulari^C .B.P-Cicer Orob<£umTJx< ' rftcOrobusin Gal-
UteNarbontnfts is Gallo-provinci<g plerifquefatis arvisper mefesfta : >ret is feminafua per-
ficut eodem cum prime tempw- Reperitur is in Crela infula, unde ei yr Si Cretki ngmen inditum.

TEMPER AMENTUM & VIRES.

Kohas primus feu Ervum guftu eftinfraviffimum ac pravifucci, is idea abeo quidem homines abf-
linenr. Boves vero in aqua dulcoratum pascuntur. Semen redditur angulofum ubiftccum ;
filiqU£ torulis ubi aparent femina fcatent. Qualnas evidenter ingrata us in- I; iv na
tamen fame, quemadmodum Hippocrates quoque fenpfit, neceffitate coafti ad " 7;-
quam accedunt. Porr'6 quatenwsamaritudinis eftpartiafs, tammexcidit isextcgit, aiquc
ohfr^>Uiones expedit.

N O M I N A .

1. OToh"s.fatw#\$ five Ervumfemine angulofo ftliquis inter grana is gratia junclis, tiobis. Orobns
r- its berbarwrum, Lob. Ger. Orobnsfiliquis articulatis, C. B. l'. (perpram a Cafp. Bauhino
.^u^aur articuhtis, cumfiliqU£ hujts nullatenus fnt articulate; articulat&erunfiliqU£ & ex-
fictat*, per inhrftitia rumpuntur, is infingulis interflitlisftnguta cont'nentur feminafecun-
dumdoQrinam nofiram ex libra natwmbauflamis depromptam) Orobns five Ervum, Matth.
Gefn.Hort.Lugd. Ervum five Mochus, Tab. Ervum venim, Cam. Mochas five Cicer Sa-
tivum, Vod.
2. Orobns Cretkmfemine majore obtufo triangulo, nobis. Orobn femine obtufo irianguh, C.
B.P. Cher OrobntumTbeophrafti, Ad. Lob. Lugd.

§.*. C I T E R .

Cceris, quod*t'&H'r@' Gr&tis, generaduo Diofcoridil. 2. c. 126. fat'wumisfdvtftr^ fativi
gen»s alterum x?ik farietinum riddunt, quia *|>arietem figrtijlcat J apptllatur Tbeo-
pbrafto \$.Hift,\$. Ciceris magnitudhieis j'apore, iscolore, is forma plerafqm differcnt'ias ofien-
dit 0101 x^nii agio&aTsi J^I *** ^u'rar 'put TOOI Ji TO, Atvust yKvxettjtj hoc eft veluti arhtwum, Ortibtuni
five Ervinumjs inter h4cmedium:p'r*ter kAcomniafunt alba dul'tiffima.Galen.t>Simpl.dupkx,Ari-
m is Orobceum.P'iniio LiZ^i2.eft Arittinum, quod album eft is nigrumfin Ariet'm candidum
Dalecbampius inP'iniium negatjefit columbinum^quod is vemreumdkiiur, is candidum eft, eft
is dulciffimum, quod Eruofimillimum eft. At Mattheo eft columbium, quod candidum: eftvenereum^
qtodrubrum: eft Ariet'mum, quod nigrum is c<£teris majus eft. Anguillarg ires funt Species, albi,
ruftl,^rietini; albi duplices funt, arietini is erv'mi: arietim capiti arktinojtmiks; ervini feves,
Ervifewwifimiles ,tx Galena 9. decompof medic, feevndum loca. Rubei firai liter duplices, arietim
iff ervini. Nigri fimplicis funt, fob colore ab aliis diferentts.

- 3, Cher forivum, C. B. P. Arietinum, Dod. ut- Cicer hoc arittimim caules profert tenues,
isquafi, ramofos, liirktos, in latus declinances ; ioliatxpluribtis toliolis biotim &
.fjatim uni ^o fe feu P*^? e regione adnatis confiant, quorum fingularia parva Cunt,ac
•Jiricnla, hirfuta, ifi anabitQ crenata. florCS p_arv ifunt, papilionacei, candidi, auc ex purpu-
rubefcentes, qaibus fingulis fucceduntfijiqua;fingu!a;, bivalves, parvibrevef<3ue, hir.fu-
t£ itidem utkulomm modo, ac relati flatu diftentz, In quilws duo auc ad fBtinnim cn'a
daoduntut femina angulofo feu trnbinata, unico angulo actrro pnrD/Ca, Arietim capitis onjni-

no aemula; colore aut eayUic.a, aut fubrumentia, 3c nigra, quae sunt caeteris omnino angulofioria (ntvidere est in iconibus feminum alborum & rubrorum) quae neutiquam differunt magnitudine, nee figura, sed colore tantum: flores itidem sunt aut .alb., aut rubri; nigra etiam Bores proferunt rubros, feminaque minora & angulofiora, feu plitribuseminentibus tuberculifve constantia. Obfervavimus in horto Botanico Academico Oxonienfi Cicer femine etiam angulofiore rubro, multo maiore nigro vulgo dicitur. Cicer arietinum album & rubrum femine angulo unico protuberans obfervatur habere; cornu arietini germinationis principium haud subfcurum etiam ostendit, unde arietini Cicer is appellatio huic Legumini indita: radice nitidius gracili, candidius tenui; Theophrastus autem ait, radicem inter Legumina altissimam Cicer agit: quoniam inere & inconfidate fere hic exprimit ipse Theophrastus, iudicent, qui Temestrem hanc plantulam coluerunt.

L O C U S & T E M P U S .

In Italia, Hispania & Gallia in agris feritur. Perutilis eique familiaris est falstlagp. Naturae enim ejus Cut tradit Theophrastus) est cum falstlaginena fci, ideoque folium cut committitur urit% ut non nisi madefactum fridie, Plinio auctore, feri debet. Hic primum inferviat, ut omnia Legumina per diem naturalem madefiant ante rationem, ut citius gennent. Floral finis Cicer a, verum ejusdem finem femina sua maturant.

T E M P E R A M E N T U M & V I R E S .

Galenus de Alim. facultatibus scribit, Cicer effe dulcissimum non minus fiatulentum Fabam; vakti? tamen nutrit quamilla, ad venerem autem excitat, crediturque femine eju/dem generationem quoque augere, unde quidam equis admittunt ipsum exhibent: inest Ciceribus facultas abstergendi major, quam Fabis, adeo ut quidam calculos in renibus restantes comminuerent offerant. Ea autem sunt nigra, quae reliquis (ut id est) albis is rubris sunt minora, magisque angulosa quin is figura aha bk iy rubra in a) oribus differunt, nam femina nigra pluribus angulorum feu tuberculis eminentibus scaturit, alba autem is rubra majora, femper unica tantum protuberant ante eminentia afficiuntur, . Obfervavimus. femina rubra majora angulofiora ad instar nigri minorum angulofiorum, quippe eandem figuram cum ipso possidebant & caput arietinum melius refererebant, tota substantia quoad figuram nigro minorum accedebant, nisi quod magnitudinem ipsum multum superabant. Satius est fuccum nigrorum aut rubrorum majorum horum, neutiquam differentiam a nigris minoribus fieri, in aqua coctum bibere. Dioscorides inquit arietinum utrumque id est nigrum (y rubrum) propter dimum angulofiorum urinae cure, dato cum Roremar hydropticis, ait re morbo laborantibus eorum decotio; Udunt autem eadem exukerata vesicam Irenes: Legumina omnia frasca deponunt amaritudinem, verum difficile concoquantur in ventrem madefiunt, craffiorisve fucci alimentum corpori exhibent. Cicer fativum Cut placet Dioscoridi alvocommum est yurinaciet; flatus gignit; bonum colorem inducit; menses is rufat educit laceknit; cataplasmatibus modo cum trvo maxime coctum imponitur, is ad testium inflammationem valet. Madefacta umpernoa in aqua, is aqua pota lumbricos efficit, fed oportet qui utatur per fex horas jejuset. Farina Cicerum arietinum is a) cabiofts in unta prodest. Ius itidem eorum itericis confert.

N O M I N A .

Ckxfatum feu arietinum unico eminenti angulo in femine albo rubro & nigro, mhis% Qcer ^ Bis, foliis denticulate, Orfilwis bifutis anomis Cqu* Matrix Vlini dicitur j modododatur. vuko Cicer albumis rubrum aut nigrum nuncupatur. Cicer domesticum, Matth. Arietinum Vod. H. L. B. CCiceres albi & nigri dicuntur a docliffimo Camerario, Casp. Bauhino alii que qua ratione aut regula in majculmo genere usifint, - mihl nonfatis constat. \ Cicer fativum, C. B. P. Ger. Hift. Lugd. Ad. Lob. Cicer, Matth. Tab. Cicer fatum feu arietinum album is? rubrum, Park Cicer fativum feu arietinum pluribus eminentibus angulis in femine major* albo & rubro, & minore nigro nobis. Cicer nigritim > Fuch.

•HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

P^{IA} 347. coln.pl. i. Cicer filvestre majusfo-
iitt oblong^h-hijpidis, C.B.P. Silvestre, i.Dod.
* -#k Cicer fativum^o producit filiquM^o fingulares, prop-
pendentes^y curtws^h fratfas, hirsutas, utricolorum
modo veht flat* diltentas s in quarurn fingulis duo
vehria continens jemina angulosa, eminentia fin-
gulari (ut in albo & rtibro majore) velpluribus (ut
*1 nigrò, SS rubro major e anguloso) donata ; arieti-
*i wapitis ornino amula. H <ec est teffera feu not a ge-
nerica Ciceri proprie dido assignata ; efgo Cicer ma-
jus filvestre foliis oGlongis hijpidis C. B.P. feufit-
*vestre i. Dod. Lugd., non debet cum Cicere proprie di-
Uo locari, cum Cicer i. Dod. Lugd. fit Legumenfili-
qua rotundagemelLa, • veficamreferente, feu duplicem
feriemfeminumcontinenteypraditumi ideo debet Ajlra-
gaitS filiquagemella donatis affociari (ficut nos, ex li-
bro naturte edoEli fecimus in dofrina infra tradita
cap. \ & Tab. p.) & a Cicer urn numero revocari &
expungi. 'nilibet^h imtuendo lfbrum naturce, poterit no-
bifcum concludere 'bane plantam, ab autboribus male
nominan^h Cicer, propter rationem supra bic a nobis
allatam; S3 per conjequens pejus hoc in loco inter Ci-
cer a a Cajparo Bauhino alij'que authoribus difyoni:
fed inter fuas confimiles plantas, Tab. 9TM dijpoftitas,
& filiqua gemella affe%M > defcribi & locari debet.
* Pag. *7. col. 2 .pi. lit. Cicerifilveftfi minoriaffinis >
C.B r. Glaux Hijpanica, Cluf Hift. Anthyllis al-
ter a Letoti fimilis , Dod. Legumen effe ex defcriptio-
ne Clufii cottigimus i fed filiquarum non meminit Clu-
fiusy nee Jdbannes Raius in catalogo plantarum Jn-
gli <e₂ ubi nomina nuda tantumcit^hatque ejusnata-

les nobis exhibet. Conjicjo tantum, JCicerisnomiffe ipe-
ciem. Videritipfe ad quam claffem Leguminumfit re-
duce?! da , 4 fine ultimo. Hoc nobis fuijjet factHi-
mum, ffiliquas ad manus, unquam babuijjetis; aut
idem Johannes Trajns nof^h communicafet^h aut rite
defcripfiJet s aut "alii c. :homffequentes dejerptio-
nem Clufii meliyspoftit^h nem filiquarum obfervaffint.

Pag. 347.col. 2.pl/iv.f3v.Cicer montanum lanu-
ginofum ereUum > & Cuzr montanum a^h w^ooy,* neutrum
horum ex defcriptione Cajp. Bauhini in Prod, poteji
haberi Cicer proprie loquendo

Pag. 347. col. 2.pi. vi .Cicer filvestrelatifflium tri-
phyRon, C.B.P.Silvef,Dod.Cicer>Silvef. alterum.Lugd.
Not a primo quod Cajp. Jiauhinus confundat Cicer five-
Jtre alterum Lugd. (quod est Ononis frutescens verna
pur pure a nob is, & filiquis & femine fefe demonftrat efte
Ononidem, ut poftea in doUrina Ononidum infra in*
ter trifolia oftendemus) cum Cicere InjtbyPc- iatifolio
Gerardi, quod est diftinctum Legumen - Cicerefilviftri
altero Hift.Liegd. ratione ftrufurafoliorum, filiqua-
rum & femimlm. Vtraque quidem b a c plant a Legu-
minofa, est Ononis, quia triphylla : nam Ononis est
genus trifolii ut infra patebit latins. At neutra ha-
rum plantarum dici poteft Cicer argumentando a not
a generic a Ciceris. OmneCicerbabet folia alata, plu-
rima uni coftice media adjicerentia^h conjugatim pofta,
G? femem etiamangulofum, feu eminentia protuberant
te infignitum: ergo utraque debet poni inter juce for-
tis plant as tripbyllas 3 fcilicet, Ononidum claffem, ut
dare poftea dularabitur.

§3. OROBUS SILVATICUS

Siliquis Propendentibus.

ORobuA filvaticus dicitur quod infilvis proveniat. Omnes hiOrobi filvatici radice. funt
perenni & diu durante; folia habent alata, coftis conjugatim adnafcentia, uno extre-
mumutplurimum claudente : coftae foliis e regione fie onufta*, akernatim c cauliculis prode-
iint, eo intervallo quo, diftinguuntur genicula ipfa ; & dicuntur omnes \x plant^h ex
Theoplirafto, id est quafum folia ad latus hinc inde tendunt.

5. *Orobis* filvaticus latifolius filiquis propendentibus, parvo flore purpureo, nobis. O-
rbbus Venetus, Cluf. Hift. Multos ex eadem radice hie *Orobis* fundit ramos*pedales, an-
gulofos, ex fingulis caulium geniculis prqdu&os, modo in hanc modo inakerampartemin-
flexos, humique ut plurimum diftufos; folia in fingulis coftis fena, binatim & conjugatim
eafdem e regione cingentia, nullo tamen extremo foftio imparem numerum faciente, & a cse-
tens te fortis in hoc omoinodifert; Pannonici i. Clufii foliis pene Cunt finy lia, kd dilutius
virentia ; ergo facilinegotjo, foliis diutius virentibus, Stprmpue filiquis propendentibus
Hic *Orobis* Venetus ab *Orobo* Pannonico, i. Cluf. (quippe filiquis ereftis donato) diftingui-
XVLI. Earationenosdu6ti, "Orobum Pannonicum i. Cluf. ficut & *Orobum* Pannonicum 3.
Clufii, cseterofque *Orobis* filiquis ereftis donatos remifimus ad Tab. feptimam & 8. earum-
xque explicationem infra exhibendam. Flores funt papilionacei, parvi, coloris purpurei; pla-
res oblongs petiolis, ex alarum cavis finibus ortis, prodeuntes innafcuntur, namerofi in
comam quafi inflexi: -lobi feu filiquis funt oblongae, mucronat3e, Viciae filiquarum pene x-

L

m u k,

mulae, rotunjioestf.r.jen, 'leu magis tejetes & pi-opendenr.es, tnataritaternffecenr.es: fc-
men continent Orobacaeum, oblungiufculum,ilbicantisqiafi color is: radixjdura, lignofa,
mult's fibris indiverfadiftrafts&lare tendentibus donata. Vivay ?ft hie Orobus & fingulis
annis frequentiores caules profert.

6. *Orobm* filvaticusVirisfoliis, filiqiispropendentibus,floribus purpufafcentibus, n'u-
bis. SilvaEicusVici2efoliis,C.B.?. Pannonicus¹, 2.Cluf. Hift. HicOrobas tenuioribus,¹ fir-
mis tamencaulibus.confat, cubitalibus,angulofts, & in multosramosdivifis: folia alat&feat
Viciae infar, fena, oftona, interdumdena, conjugatimnicoib: mediae addenda, Lenti-
cutefiliis h'adt < , tenella, virid'la, gulu amaricante, &&calidiudillo: floresexto
rioribusalislisnm^ . > longioribus peuiolis dependentes, fiiperiorum Leguminni floribus
papilionaceis/tmics i '-purjfcnticolons, qui vetuftate inciruleumcompiutantui : lo-
bi flint longi, nigii, t ' inenies oblongiora femina, fubtufca, qnae maruritate ficca fimiliter
defilinnt, iiliquiarnmrtinicisin fefe comorquentibus aliorum Legiminum jniorum more:
radix, utfupenoris, dura, lignofa fub exortumcaulium, deorfum verfus fibrofa. Vivax 8f
perennis^eft pbnta; fingulis annis ineunte vereplures caules protruttit'

7. *Orcibws* filvatitus noftras, filiquispropend.entibns,tuberofa.radice, nobis. -LathyrUjar-
venfisradice tuberofa, Park. App. Afragalus filvaticusfiveAfragaloides, I. B. Pterperam
diciturAfragalusJohaitntBauhino, cumnon habeaciiliquamgemellam, feuduplicem (ert-
emfeminuni.iriuna&fademfiliquaiuccedente uni floripapiiiionaceo. Videfiguram in Tab;
19 App. hnjusSeftionis: non eftLatliyrua utvult Parkinlbnasquiadellitutturcapreolis.

LOCUS & TEMPUS.

5. *Orobus Venettsfeufihaticus latlfolim filiquk propendentibus , parvoftiore purpureo^ nobis*
Hujufemenprimd mifum Vemt'm adCarolumClufium, fedjibifyontenafcatut, nonmeminit
Floret menfe Maio cumpkriqut alik; Juniojulioque maturantur ejufdem femina.

6. *OtobnsfdvaticusViciafolih, fitiqukprependent'&us, floribmpurpuTafantibu**, »...
^io/e Mfl/ci/Hr in oran/A*M t& montankfihh quadam catenaproductx a Danubio ad Afye*, -va-
riU item Tannonue lock. Nofrequeniempatis hunc *Orobum* invenimus fpante ertfctntm
primo lapide'a BUfenfmm capite in Silva egdua, difta le cofte de Chail. Floret Martio exeun-
le is ineunte Aprili: fntnperfidt Junto. De viribus borum Leguminum fdvefirium pr*diio-
Tum non conilat apudaitorts.

7. *Orobusy/Wow noftrasptremm filiquk propendentibus, -radice tubtrofa, ^{nob}- Lathyr**
*arvmfis tuberofa raAhv p*1 it* Afi,a)*IM* rdvetkusft* &Tmatotks, I. B. fr*
indum.tkisfilvkinmvqreaJcennama, Call^iS Ag lia. Flor ^{!jr?}
*qua, maturat : afoliit Ulh conjugafnnpofitit, u*o mffri ««*»TM daudmte d Lat*
chlmtapreolk dnatit; JeadtirUqu Orcbi fdvatia fctxh*, radm tuberofa^^{ffa}*
*cillime Ifiinvuitor Male a C*frTMB^ubino reliquifque avthonbus pro Ajlragdo haktur, cum*
nm polleat ha&jmmlk , duplicem femmfemmw in ft ccnUnennbusfed fitiquas babet bi-
vate
*valves, k^fXf^minchdamsM^m^m^^^ W*r adjunguur*
'Orobu,

• % f SOPHERA *

8. *Sfe^G3*S<fc>* proximal B P. Frofp Alpin. de P an. ^gypti. Vl
tec exotica ex pnmo intmtu fefe man.feibt eife fpecjem Uguminis a fbl^{is} alatis conjugac-
cimreubinatinvegione coft^med.xadhsrennbus, SfarihqmH-et.amLeguminofis, bival-
vibus^uccedeiitibusloribuspaptUonamsiiedutrumhabeatadextremumcoftxnicdkfo-
lmm impar aliprum tnjus fortis Lcgaminum more, faltem non fcandentiam ; & filiquas •
reftas utvult CarolusClutius, aiorum,qiii florentem& femina producentem hahcplancam
obfervavenn^efto.jildicium: quod Il itafit, pnmovitiovertendumProiperoAlpino, d. i-;
de piftori eiufdem, qui admodum negligenter Iconem.nobis exhibuit; at ut fit nos cxhi-
mus 6guram Alpin" cum fihquis propendentibus , prout apparuit iolcone,&-
confequenslocavimus ipfam Sopheram Alpini inter confortes, id eft Leurmma nonlcau-
dencia, fiHqnis propendentibus donata. SireveraClufms detexit alteram cum filiquis c-
rectis, inter fuas etiam confortes paphonaceas leguminofave difponemus, quando ad manus
lubu-

%buerimus /Tcilicet Legumina filiquis erefris praedita'. Si Prop. /Jlpinus Sopheram fuaffl vere delinejitam obtulerit, quod neutiquam dubitamus, *tips nbn* erravimus à riofro fcopo.

N O M I N A .

8. Bcphera *Lentifcifoliis*, 'Bon. Belli Epistola 4. ad Cluf. Sopkerd, Alpin. *Hoxocoquomadit*, Cam* ~Hort. Cluf, Cur. Pofit. *Qaleg* affinis Sopberadifla*, CB.P<

§ . 5 . S E S B A N .

9. *Sesban* jEgyptiacum feu *Securidaca* /Egyptiaca articulata, Park. Sefban, Alpiri. & Hon. Belli Ep. 4. ad Cluf. Galega iEgyptiaca filiquis articulatis, C. B.P. (Obiter monendus eft leftor hanc exoticam plantam inadvertenter i Cafp. Bauhino, & negligentius à Parkinfbno defignari filiquis articulatis; fi quidem non fati intelligebant quid fit filiqua articulata proprie loquedo/ecundum doclrinam veramex libro naturie depromptam i filiquaenim articulata in multos articulos fujs interftitiis diftindos dividitur tranfverfim, & in fingulis interftitiis (ex* iiccata filiqu*a*&rupta) fingula continentur femina: vide Tab. 10. & i 1. de filiquis articulatis, & cap. 6. hujus Se&ionis.) Fruticofa hxc herba eft Myrti magnitudine, fbliis *Securidaca*?, fed longioribus & anguftioribus; ramos habet herbaceos tantum, & teneros: flores fert c/oceos, Anagyridis perquam fimiles, multos racematim ab uno ramulopendentes, - à quibus filiqualongae producuntur, Foenugrasco. quafi proximo, in quibus femina iunt etiam Foenugra^ci feminisms non parum familia.

L O C U S & T E M P O S .

LqfU6 fati'apparet intitulo. *Florttverfufinem* <eftatk; ac autjimno femenfuum apud meridionates ptrfcit, nunquam autem apud nos feptentr ion ales. Nos ex fationefemink ip/ius^ ineunte vere ex Africa communicati produximuf plantam, qu& nobis floresfolummodo protrufit, isrfatimpoiffc ob fzvitiamfrigoris exeunte Autumnoperiit.

T E M P E R A M E N T U M & V I R E S .

*His*subfrutiribus herbaceis utuntur &g)pii ad fepes texendds pro agrorum diftinfiom. *Semi* tit** t'liut hos in mtdidna ufus babere aiunt, humidumftomachumficcare^ ist roborare; ipforum quoque ufum turn in decoflo, turn in pulvere, ajfttant; ad cohibendum quemcunque alvifluxum^ atque nonminu6 ad menflruorum immoderata profluviafeftenda, ex ipfis infignern utilitatem experiuntur^isrut uno veroo dicamficur ait Alpinusjn omnibus vacationibus reprimendk illorum feminum ufum habent frequent ijfimum.

N O M I N I

Sefban Alpin. de Plant. JEgypti, is^ Bon. Belli Ep. 4. ad Cluf. *Sesban frtdicum*, Cam. Bort. *Sesban* feu *Securidaca* JEgfftiaca articulata^ Parl^ Galega Mgypiaca fdiquh articulatis (fed perpe* ramj C.B.P.

§. s. H E D Y S A R U M five SECURIDACA.

HA^vowed is? raAeiuYo? Gr<ecivocant, quam Latini *Securidacam* (velut Turnebus legepdum ccnfet, *Securidatam*) a feminis figura; niKvuvs enimsecurimfignificat: ficenim Diofcorhicf^lib.^yC. 146. *Bedyfarum*, quod unguentafii Ptficinum, femem ruffum infiliquh corniculoruv' modo aduntit*, quod fecupim andpitem *mulatur, unde nomen accepit. ApudTbeopbraftum 9" Hift. IG. *GazaSecurinam* (securi fimilem reddidit: iy Plinius I. 18. c.ij. *Securidaca*; 5'tam Gr<eci^a fimilitudine *Pelecium* vocant.

~~Gtazr~~ Diofcorides unius memlnit; at recentioribus aliquot differentiafunt. Sed qiam negligenter

genterproSecuridacae fneciebusreceiifentur,caniiderentleftores, &c confulant*Hallucinati-
ynesCafpari Bauhini,añorumque authorum, infra à nobis Icriptas & obfervat'as.

10. *Securidaca* vera plurintis flofculis luteis corymbi mode Jifpofitis, fUiquis latis, comprerfis, inter granum & granum jnnftis, feminibus quadratis, nobis. Sectiridaca lutea major, C. B. P. Vera,Cluf. Hift. Securidaca hxevera & Iegitima caules producit'a i-a-
dicemultos, cubitales & fequi cubitales rotundos; folia oblonga ex mukts foliolis (Ten-
tis rotundioribus, ut Arachi, Viciar, &familium)congefta& binatim coftse'media? f
adltaerentia, ex t o fita : flores gent elegantei' luteos in cotymbis diipofitos: fili-
quas deindecoryn pediculi (timnio annexas habet, quarum fingute funt comprefse,
futuris chirodiecai plici fm:ura more Anglicanoconfutatumfimiles, nonnthilreca-
vz, que ue etiani nfticiis feminum deprimuntur, ubt apparent femina mtume-
fcunt; femina conii, nuur extcr'ms conipicue quadrata, quas rectnter filiquisexempta
lutea apparent, tande acvaduntrufta Sf amara, ^ompreffa, oblonga, quadrata, quatuor an-
gulisctiamdonatajin medio convexa, iccuris Romans etfigie, nndeei nomen Stcnridatx:
fioresbrevis petiolohsEtent; & confequenter/iliquis, palmolongiores, nonnihtl fulcatl, ro-
te) acuto Sf recurvo, brevi aut nullo peciolo quafi hasrentes: lemen tri! apud nos perexigu-
um (& ucaitC*falpinns) omnium amarifTimimi, & fi vel minimumejus deguftetur, **ingtns**
ataaritudo (entietur. Curto autem (uti diftum) innitontar filiquE pediculf, 1 8t ideoauC
furfumfpeC^nt filiqu3:,aur ialtem angulum obliquum aim pediculo iptas **fuftinente** confiti-
tuopi. Nullius infuper plance fcmen aptius veteremlccnrimRomanam (CaroliClu/iiiadi-
cio) retertqwamhrnus, uusab omnibus Hedyfarum (^ ^ ^ f i f ^ ^ , ^) Icgitiirumcen-
fetur & Securidaca vera. Uk!«w, ab **m** fuavis, & <^ej. tcopae, td est ferta; (copar & cororac
fuave^c quibus fuavicer olencibus dclefantnr matrons nobiles.uales font etiamhajusHe-
lyfari 'legitimi flores. Hoc tamen in loco forte a Graecis pr anciphra/in fie dicitnr, cum hu-
jafemenfitamarintum.

LOCUS & TEM ? US,

*Nafcitur in Hifrij; aliquot lock, inter figetes; floret tftate, (y tadm exeunteftiiquasfert, in
quibus contjmntur femina quadrata, lti/w, matura.*

TEHPERAMSNTUM & VIRES.

*tfedyfarimeminit etiam Galenut Simpl. Midicam.6. inqunksjkdyfariaut Pelicimfemeitcoforeruf-
fumeft, utrinque anceps adivftar fcurit Roman*, gratutn ftomacho; vifcerum c' " ""
furgat. tdtm prJtflant totim htrbx. ramuli, Jedminw tfficaater.*

N' O M I N A .

Io. Securidaca vera i? Hedyfarum legitimum, Cluf. Hift. Securidata flurimh-flofculis luteU, in
capitulum congeftk; [iliquit comj>re(fis, isrintergranum iffgranumjunSiis -**Jemnibus** quidratk
nobis. Lutea major, C.B.P. Major, Manb. Ad. Lob. Hedyfarum majus, Lugd. Cam. Ger
fafyfammi. Dod. Hedyfarum majusfeu Securidaca major vera, Park. Securidaca fore luttofil
qua lata, oblonga, I B. Securidaca Hedyfarum pelicirtum, eidan : Peiicinus Tab. Gefn. Hort

HALLUCINATIONES CASP. 0ALIHINL

Aliorumque Aathorum.

PAg. 149. tol. i . pl. tt. Sccaridicalutea minorcorm-
culis reflexis, C. B. P. & pl. 111. Securidaca filiquis
plam's*utriuidentotii, C. B. P. Hiccdm Legumina,
otmfint JlhagalifpBncs jiliqaa gemilla donate, at
tirnere tñ m doSrinaTal: p^m, male a Cajfiaro 5a*-
ftiao reUqtifqie aitifboribis pro Htdyfari aut Stcuri-
datit rccrnjentur jpectbui, cum jijbagali QmninopoJ-
Jidea nt fymbstum jmotamrj)entialem.

Pag. itidem 340. col. 1. pl. 10. Securidaca dumeta-
rum major flora vario, filiquis articulatis, C. B. P. &
col. 2. pl.
rula, C. B. P. cum fintplants pr<tdrt//l'4^{na},
riculatis, diht ad Polwalam fa CiW
inter fue
plicationem. Tbf 1 q. ii. va in hae Sedione.

4. 7. S T E L L A L E G U M I N O S A.

Stella Leguminosa, Lob. Lugd. Tab. I, B. Ger. Park. Ornithopodio affinis hirsuta planta Leguminosa, filijulis stellatim dispositis, nobis. Stella Leguminosa Arthuri Cortufi, "cuidebetur rari/Tima MCC planta Leguminosa," qua; tollis exit Scorpioidis Leguminosae Lobelii, & Hofcul is Lampfana: fenienhuj (Is est exile, pufilltr In corniculis tancillim laiciatis, uni pediculo congestim adaptatis, & radiatim fteH modumcongestis; gustu Leguminoso & glutinoso. Stella Leguminosa Arturo Cortufi Lur. Hzc plantula mihi videtur heteroclita, sed sui generis, etiam si nunquam ad aiff habuerim, sed ex Ufcriptione authorum ex Arturo Cortufo tranferibentium. Flores non Jiabet papilionaceos, sed Lampfans: qualesnam sint filiquas, bivalvesne, qftales possident papilionaceae; an bivalves cum septo membranaceo pellucidodirimente duplicem feriem feminum, quaks habent tetrapetalae filiquosae omnes (de quibus afluri fumus in Sectone tertia) me latet, propter impej festam Cortufi, alioi unique ejus sequacium ex ipfo tranferibentium, delineationem Itu defertptionem ncc conjefturam quilibet facere poterit ex Cortufi ipfius descriptione, rriulto minus figurS sua imperrefta exhibit, qua? a ceteris pofteris suis, etiam cicutientibus cum ipfo, manca 6f imperfecta est, tialt & defcriptio derivata ad nos. Si haberemus plantam florentem & Tilitjuas producentem, determinatu nobis minime difficile judicarem, utri horum generum fubalternorum pneditorum claffi affociari deberet. Cum florem habeat Lampfans cichoracii infar (ut supra dictum) neutiquam papilionaceis convenit, Sit heteroclita, examinanda pofteris, ad quorum manus pervenerit: imprxfen:iarum hoc addendum esse haud abs re putamus, neotericos omnes Cortufum hoc in loco aliofque veteres? fores in multis aliis sequutos, cum ipfis erraflc; sine ultimo neglecto, id est, rlorum, japlularum feminalium itruftura, diligenti & fednla iiii pteftione non obfervativ
 :l nihil luminis rtipubiics lir^raris Botanicar, attuliffe; aut faltem multa con-
 , -w c< obfeure in fcriptis suis pofteris tradidiffe aiferimus. Sine hac uoftra methodo genu-
 ina, Vtra & iniallibili, a natara data, neutiquam p jantas ad genera foa fuprema, mifto
 minus fubaltaria feu intermedia, aut fpecies infimas, reduci imquam potuiffe concludimu^.

N O M I N A.

Stella Leguminosa Arthuri Cortufi, l. B. Stella Leguminosa, Ad. Lob. Lugd. Ger. Park. Ornithopodio affinis planta hirsuta Scorpioidis, j, uftu /iellato, nobis. Vicia fefamacea Apula Colum. sed perperam pro fynonyma planta Stella Leguminosa adhibetur hk a Caff. Bauhino.

HALLUCINATIONES CASK BAUHINI

Aliorumque Achorum.

Olyit/roporfjo affinit planta hirsuta
 C. B. P. Ornithopodio affinis plantula hirsuta
 •w/w fruBit fii-llato, nubif. Vicia fefamacet
 .. la Columns non rjl ea-dem, proitde nn Jynonyma.
 prtori JMU i Leguminosa, qmennesi Ltgumiukfon-
 ts trifiart Lampfantt. fatia fefamntea Jpula Catum-
 a fil h^atmn jiliquagemlta donation, undtnos (olio-
 tavi W* tNtr stjmgahs filiqua g^melia donates, ut
 (me re lket infra in explitatwne Tab. 9" ergo cum
 sint teto tth Hivcrfa plants, non de hurepro fivw

mis a Citjpara Sathix B adhiberi. Stc Sam Legumino-
 fam prudiclo Tum authorum Lfgumeaeffe negtmu! jiv
 jlnitti ex libra natunt. Sit ergo heteroclita /exftige-
 iirris planta, txaminanda pofteris: videant S rite ex-
 aminent, quadicimus hie B alibi, octtlati Botantci, &
 frocul dn-lto cum ex iutuutit lctium barttm dttarum
 ptantarum, turn ex diverfis tarum defcripttombus,
 culpaiidum doUiJJimam Cajparum BaiJitium audalhr
 mtatm affirmabunt! <

L E G U M I N A

Non Scandentia, Siliquis Ere&is.

Faba; Lupinus; Glycyrrhiza ; Galega; Orobus

Silvaticus Siliquis Ereditis.

C A T V T I V.

§. I. F A B A .

F¹ Aba Grdctis^mafêracitadeditla^ wlrJx)-A > * , * .. , , ,

Duplex Diofcoridi l. 2. c. 127. & 128. altera viciae dicitur, altera viciae dicitur: illa Graeca, quae tadem cum vulgari dicitur, et ad differentiam Aegyptiacae Graeca dicitur: haec Aegyptia nominata. At Theophrastus 7. Hist. 3. de communi Faba capit. nomen addendum de Graeca 4. Hist. 2. & Aegyptiae 7. exhibuit; eam sibi ait,

km effe Cinter I PLTM & magna Leguminum, panis bleam ex Leguminibus unicau- erecto caule constat t tempore s. Hist. 3.) [hac fallum: nam mina ereftn m n i T -1 & Orobl filvaticifpecies qiUBdam, aliaeque plurimse, inter Legu- mina cretto constant cauJe] Quadraginta diebu* florere is abernk lateribu* filiauari: at lib. 18. l. 12. nasci tamen & sua fronte plerisque in locis, sicut septentrionalis Oceani Insulis, quas ob id Fabariae C idem Plinius lib. 2/cap. 13.) appellant: item in Mauritania passim sil- vestrem esse. Meminit & MsryptU, fmofo caule, foliò amplò, capite Papaveris simili, v. loreroseo, (erc.

. A&uri hoc in capite quarto de Leguminibus non Scandentibus & filiquis erectis donatis obfervando connexionem & cohaerentiam horum cum Leguminibus non scandentibus etiâtn, fed filiquis propendentibus in fuperiore capite tertio, quaeque majorem affinitatem ^abent cum Leguminibus trifoliatis scandentibus cauibus, non capreolis, filiquis utpluri- mumetiam propendentibus donatis, & capite 2. explicatis; jam requirit ordo naturae ut aggrediamur Legumina non scandentia silfquis erectis^primode Faba fermo nobis erit in idaragrapho primohujus quarti capitis \ Quia maximus honos inter Legumina Fab* habit quippe exea tentatus etiam fit panis, cujus farina Jomentum appellatur, ut Plin l 18 ^ loquitur; itahodie quidam ems farinammifcent Secali, (ypatternconficiunt solidum a'c_m^h^2* trintnfufic <sr Phrifii ho Jiemagna ex par te Fabarum faring Hordei aut Ave^aHnT^ ta, panes faciunt.

Peraftâ explicatione Leguminum feu plautarpm filiquofarum .v lonacear am» non scandentium, filiquis etiam propendentibus afeftarum in cap W*lonacear am» non nuncin medium dostrinam filiquofarum papilionacearum non £ n 3 JT adferamus ftis feu furfum versus spestantibus, & ideo petiolis cS in fffis, TTM filanis fmTeu omnia intermedia Ltguminum in hac Tab. 7. contentoirum habent! d'ataruni, GeneΛ primbnefcilhaant capreolis, quia ifdem privantur. " vû P-on ^ generic, ^nfKi fe datum; fed & uisere & filiquae beritas t 5 S Quia fie ipf T" ?rUra cedenti Tab. 6. contenta, fili quas Dr LL (l endentes eru U * umi ? a utri p'dictò modp, fcilicet vel capreolis v d'atobz, T ot onil Crc n Λ f' e all drc al ter . s, anaturaconcelTum eft.

X A B U L A VII. **

A,

'Major, feu boTHnfesncentiorum^}'*
'Alba ☿
'Rubra ☿
'faba—

- 2. Rotunda oblongs, fa cylndracea
- 'Major' alba ☿
- Minor feu equina {A
N
- Minima pluribus, quintis, fenisfoiquis ex unopedi-
cuculo Crth^ feu Haironiana, nobis. £

~%. Albus—Sfiativut flore iff femine albo^ nobis. Vulgarity Eyst. Sativus, Dod. ☿

(4. Odor~atm femine' albo^ Utumtiigm varkgato, nobis. \$
Luteta~\ Tingitnnus major fmne fufco % limit isrpunftis -albk variegato ,no~
C tis. £ *

Lupinwa

\<£. Majw fatgrintot Ti'dkfa) nobis. Indicus, Corn, ^
Mcdius Gadenfis mannas birfutus, fmlmtumidonigr** limisnotato,
nob'x. Gadenfis inarinusflore c*ruko, Park, £

C*rukus\ '6. Peretinis angustifotiusrepent Virginianus\ nobis. Q
(7. Cokrevario obfeure notato^ nobis.
Minor Annuus angujtifoliusjemin^ N^ff^fti d b
Minouptihups minus variegato,
feu Tmgitanus^ nobis. \$>

8. Glycyrrbiz? vulgari*vera, feu radixdulcts, nobis. Radix dulcis, Trag.Gefa.Hort.

(Cueru/eo O

9. Galegafeu Ruta tapratia, Matth. Cam. Park-forei Cinereo O •

{Albo O

Orobis filvaticus filiquis ereflis

I
(io. Verrws flore purpureojiobis. Pannon. i, Cluf.Hifi. Q
11. Angustifolius radice Afyhoddi, nobis. Pannonicus,
3. Cluf.Hifi. ©
[i 2. Alpinus latifdlius, C B. P. iff ProdDefc. •
i •\$. Annans flore pallido-, nobis. Pannonicus\ CluftT{ft.^

Explicatio TabuU feptim^, Seftionh fecondæ.

Faba compreffa major fen hortenfis major alba vel rubra, nobis. Faba major recentiof um
Lob. Hortenfis Gcr, h. ceteris feqntibus Leguminibu3 in hac Tabula 7. dilpofitis facile
dignofcitur, quod caules feu fcapos habcat reftos (hoc commune eft cumceteris in hac
Tabula contends) craffos, ftriatos, cavos feu fiftulofiores: ad quorum fingula geniculana-
fcontur cofta fuftinentes folia oblonga, fpiffa, inordinatimidifpofita, & filic]uas protrudac
longas, triunciales, aliqui]and Gpalmares, craffas, torofas, quarum integumenca viridia & fan-
gofa funt, intus mollia, in quibus lattfnt femina omniam Leguminum maxir»3, quibusdam iif-
• quon T^Aiffis exocicis, Americis, & Orientalibus exceptis Vhafeolis. £

• major five Bana major Dodonasi caul five fcapo (verbumeft peculjare, denotans
*^ caulem Fabx) exit quadrangular], ftriato, glabro, inani, geniculis inreceptov longo
erL'fto. (>, iquandocnfeferkuripfa Fabafte fuftinet, quando vero (eorum, in terram
° cllabitur; folia geniculis promuntur oblonga, ex intervallis coftis akernatini adliirentia
tia

tia, quorum fingularia fubpingjia & craſſa fatiſ ſunt, venoſa, glabra: flores *incul* liſ caulium five ſcaporum ſpicatimproveniunt, papilionacei, ut ceterorum Leguminum; forma tamen oblonga, colore candidi, lituris nigris conſpicui, aut ex purpura nigrefcentes; Quorum fingulis ſuccedunt filiquae longae, craſſae, toroſae, intus quaſi tomentofae aut ſpongioſae y.um' adhuc virides ſunt, plures fimul junctae, atque ex eodem geniculo curtis fuiſ petiolis ortae y inferiore partetenuiores, ſuperiore craſſiores, atque interius ubi femina conduntur quodam veluti tomento candido, molli, aut lanofa, conſtant, exterius hirsuta ſunt adhuc virides, -poſt maturitatem ficior ſaſte nigrae fiunt & duriſcutae, ſicut & Geniſta?, reliquorumque omnium pene Leguminum. Faba: tamen filiquae ſunt omnium ſuae claſſis Leguminum (perpaucis exceptis, ut Phaeolò Braſiliano aliifque hujus generis ſubalterni quibuſdam exoticis) longiores & craſſiores; in quarum ſingulis continentur femina terna, quatejna, -quina (raro plura) oblonga, lata, compreſſa, humani unguis pollicis latitudine & figura ſex numero femidrachmæ pondò; colore ut plurimum Candida vel rubra, ſubinde ex rubicundo colore purpurafcentia ^ quorum ſingula in ſuperiore ſua parte oblongum veluti umbilicum gerunt, quem tegit oblongum & dilute virens unguiculi veluti ſegmen dum viret adhuc femina, at maturum & exſiccatum nigrefcit & hilum nigrum diritur; putamen feu ieminiſ potius membrana exterior, denſa & piſſaefit, feminis autem caro feu pars interior dicitur HTa'; *Wa, folida eſt, & in duas partes facile finditur (quemadmodum in reliquis omnibus Leguminum feminibus evenit) & ab uno lateregerminationis principium evidenter conſpicuum habet, præcipue ſi aqua diu maceratum fuerit, atque germen ſuum & radicem ſimul & femel protrudit, hanc deorfum, illud autem ſurſum, ex quo formantur primo bina foliola, - deinde reliqua; caulis ſcilicet & quæ; ſequuntur caulem, flores primariis, & filiquæ continentis femina, quorum beneficio ſpecies conſervantur in omnibus vegetabilibus oon minus quam in Fabis: atque hic eſt finis ultimus perfectionis generare ſibi ſimile: radices longæ ſunt ac ex multis fibris formantur. Eſt & alia Faba compreſſa minor majore, cujus fruſtuſeſt aut albus aut ruber.

^ *Faba* minor feu equina, C.B.P. Bona feu Phaeolus minor, Dod. Faba minor, Lugd. Bxc minor Faba foliis, fioribus, filiquis, & femine, majori ſimilis eſt, . ſingulas tamen partes prædiſtas minores, folia autem plura multoque crebriora habet; ex ſcaporum alis ſurſum verſus flores pluriſmi ejuſdem coloris cum Fabæ majoris fioribus emergunt; cuſtis ſi vix conſpicuis pediculis innituntur, quini, femina, ſimul congeſti, quibus totidem ſuccedunt filiquæ rotundiores, & minores majoris Fabæ; fruſtus quoque multo minor eſt, non verolatus, nec compreſſus, ſed teretiſ quodammodo figuræ, ac quaſi in rotunditate oblongus feu cylindraceus; **color** alias ſubalbicans vel ſubſiavus, ſiſ niger; pariterque ac ibidem hilum nigrum, **S** & **d** a **R** eum, **R** * **f** l o r u , **f** i l i a **n** o n q u e n u m e r o ſ u p e r a t . E ſ t & m e d i a B e n a i n t e r m a j o r e m m i n o r e m e q u i n a m h a n c , q u æ m a j o r e q u i d e m e ſ t m i n o r , m i n o r e e q u i n a m i e ſ t , c u i f o r m a o m n i n o a c c e d i t . E ſ t & a l i a a d h u c q u æ r e t a i n t e r m e d i a m & m i n o r e m m i n o r e m . T P a s ſ i m u l c o n ſ t a s a d f i n e m c a u l i s ſ u p e r i o r u m ; h u j u ſ f e m e n n o b i ſ c o m m u n i c a v i t v i r g e n e r o ſ u ſ & B e n a c i l i ſ p r o d u c t m J Z k a n o n : u n d e h a b u e r i t , n o b i ſ n o n c o n ſ t a t e d c u m a l t i ſ p l a n t a r u m r a r i o r u m ſ e m i n i b u ſ . F l o r u i t a n n o e l a p ſ o i n H o r t o B o t a n i c o p u b l i c o U n i v e r ſ i t a t i ſ c o p i o ſ e q u e f e m i n a i » a

L O C U S & T E M P U S .

ſrjma (y major Faba compnſia feritur in hortuſr agm; floret Maio ſi Junto particulatim & diu, fruſtuſfert Junto ac Julio, Auguſtoque colliguntur; quo citius feritur dicitur etiam colligitur ejuſfruclut. Majoris datur aliaſpecies, neutiquam diſſopans, niſi quod filiquas minores ſiſ copz ſequenterfritium minorem. compreſſum, album ſi rubrum, aliquando nigrum gerat: jh'jur etiam in agriſ, eademque anni tempeſtate floret cum priore majore, ceterifque minoribuſ ſupru: ita- tis.

TEMPERAMENTUM & VIRES,

wt memfcia prodidit Galensa Lj. S' m'pl. medium in exficeando (ff refrigeranda obt'went, iff admedium^>ropinquit (fneaccedunt. CarofabdepaululumquidabftergentHfacultatkontinetficut tju fdem cortex nannihiletiam adfringeni itpoffidet. Lkircp mdicorum Mnull' i' tntam Fabam cum Oxycrato decotlam dyfenterick iff c&liack iff vomentibas, quos i'Wx%) vacant, cxhibuerunt. Porro ut tdulium, flatuknta eft iff co8u difficith faba, cxfcreatioaihM ex thorace iypuhmitihm idonea; ut medicamentum^foris impofita^ fine mdefi'ta deficcat. In fodagricis fapenutnero uiuniur mcieie ex aqua decora \isrdtindc sdife fuHlo adbibito, ad nervorum cum tonmfiones, tumvuinerationis farinam ejut cum oxymellite nponunt. Adeos quosex iflu phhgincne occupavtrat^ cum pofaita tftiumiff mmmnarumafturn tft cataflafma\ namhdartescumphie mane tneillur moderate nfrigermi amant, maxim cum marm*ex lafte in ipfis concrete S°hUgmsntnpatiantur; quin lac quoque ab eo cataptafmate txfinguttur. Gal. I. l. de A'tm. fauft. inquit^ inflat Fabarum cibus quocunq; mo Jo fpparetitr, me per hngain deco&iomm id Vitiifoeft a^inere, quodi'tifi Wig minvnt negatum eft; deponitenimper illam kukquid habet fljtuktiti. Etemm manifefta Fabacea farina cutkfoules detergere conFbicitur; quod intelligently mangopes iff muliercuU, in balmis quotidie hh^untur, veluti alii nitro ac aphronitroi 4^ in univerftim l«" qitte aftringunt. Quad ft viridk iff immatura Faba^ nondumqut arefa Sla edaiur communononmum fSj uum ante maturhateh ingérinfu4jtatid}iana)ti7nrts, corporibumidionm al' moniam exhibebh, ac proinde tnajaran excrementorumvrm, mn tantum in viis intefitiorum/ed etiamper univerfum corpora habiium produce\ nmto igitur minu* quoque nutfu\ fed promptings dejicklur. Pkr'ique autem hominutn, von crudas folumfabas comedentes, una eat cmnfullln carne decoqu'unt, veluti okra confueverunt. Alu Fabai in flare fmitientes, cepas admifcent, cum in ollk ex ik pvlmentum ftruunt. Fab<£ recentes innoxigunt (tefle TragoJ incibo ergo ik utemur, ficcasoperaririkrelinqtntes. Cbirurgi colleffiones iff tumores locorum^ fabaceafafinain acto iff vappadecoUa, ac calida impofita ohoqut admixto difcutere iff fanan confurverunt; eadem farina v'mo decora, ac calida impofita omnibus tumoribus imprimis conduch, five ij in natmni* mulkrum, five in lockgemtahhm, ant quibusunque afik oriantur. De caterk ->ir%us iff facuttanbm fab* -uide/ohmmtm Bauhinum iff Simeonem PauH quiproUxi fatis de vinbus Fab<efcnpfere,

N O M I N A .

1. Fabá comfrefa major, feu horUnfifirmnthrum alba is rubra, tiobk. Faba major metitiorum, Icon. Lob. Major hortenfis, Gerard, Major vulgark^ Adverf. Lob. Vulgark, Fuch. Stitiva, Lugd. Caft. Cam. Park, Faba leguminofa feu Cyatfios, l'B. Phafeolmfativus, Dod. Gall. Buna five Phafeolm major, Dod. Quam inepts Phafealws Faba dicitur a Vodan<eo in utraquefua edit tone, cum latina; turn Qallica, fequente Ericium Ccrdum, judicent jequi kSiores, iff paifim in hifct noftrh fcriptk obfervent, rws ad certa iff determinata genera intermedia Legumina reduxiffe; adco ut facile fit obfervere aut forum nomina diverfa pcrperatn planiis iff eifdem minus appofite adapt at a'imuliff ipforum mgligenttam in confundendis plantk diver forum generum, conjutigendo fffparandas, iff feperando conjungendas, non fohun hie, ftdpafftmin complurink alih. Eatiocinando ex libronatur* fquempenitii* evolvi ffeperpaucos ante me fcribentea obfervoj Phafeolws omnis (ut fupra diUumJ fcandit caulibus^ fedFaba caulesfeufcapos CutpropriemaghloquarJ pcfertreflos (iliquafqutpariter reftas. Phafeolusigittr cum fit planta leguminofa trifoliatafcandenscaulibus, non eft. dicenda Faba; ntejujdem nomen Fabis pro fwonymo adjungi dtbet.
 2. Faba rotunda obfonga feu cylindracea minor feu equ'tna alba iff n'tgra, nobis. Faba minor feu equina, C.B.P. Faba minor, Nifl. Lugd. Ad. Lob. Faba minor filveftrk, Park. Fabafilveftrk, Ger, Bana five Pkaftolut minor, Dod. Ex bac apudZelandos ejufque fruSfus farina ^Panef Fabaceos veteranh dant, iff b^cin equorum Chine Bana equinaipffhtiturj \umntorumqutpabulum feritur, ut inquit Dodon<fus. At Sebufiani ruftici non alia pane vefcunt ur%
*J^am confite expauluh, Tritici, Secali, is rotunda cotminuta Faba. Dakchampim in Htf.
>L>ZduMnfifttnobkhictefik.
- Faba rotunda obfersgafeu cylindrace/imedia alba, nobk.

u

PLANTA SV M HISTORIA

Par I r

Faba rotunda

oblonga seu %... minima pluribus, quinis, senis, siliquis, uno pediculo exortis, seu Hattoniana; nobis. Faba ha minores & media florent & semina perficiunt eodem tempore cum majore & minore, compressofemim.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

\ Aliorumque Author urn.

B... Sit rotunda atro, C.B.P. Stfv... Fabam appttavrtut, n&iijine rationevitiovertendum judka-mus. Dt Faiii exorifix in Ca^ari Bauhini Piitact eitatii > nihil hie dkinhi, quit mdum ad mamupcv^ntnt1 aliis i...

fytciet fupra explicits* locatur ; quia pliquans & j(-mina j'ertVicia, into Cd/hlia alata euiemtenfermia, tatdes etiam procumbentw /ton treSos- ncutiquam quoad/tuts panes Faba tonvnhitrgo Casp'aro Bauhino Crittrifque aulhoribus quod Fabam appttavrtut, n&iijine rationevitiovertendum judka-mus. Dt Faiii exorifix in Ca^ari Bauhini Piitact eitatii > nihil hie dkinhi, quit mdum ad mamupcv^ntnt1 aliis i...

§. 2. LUPINLI S.

Lupinus, Dioscoridi l. 2. c. 132. Theophrasto pluribus in locis, & Gracis ceteris. Lupinorum appellatio non aliunde ducta videtur, quam quoniam in fame terra vescitur; ita Lupinus tellurem, ut Plinius l. 18. c. 1. Carnal* ut auamvts fruticetoso solo conjectum, interfolia vepresque ad terram tamen radice perveniat: vel ita dictus videri potest, veluti Lupis expositus & relictus, ex eo quod (ut idem Plinius) impune jaceat, vel derelictus, si non protinus imbr...

Genera duo Diofcorjdi, Gakno, & fhrno: fativu* ist fihxfthr. '

oecuncum genus fubaltemum fUiquofarum herbarum papilionaccaram non fcandentie- Uliquisreaisdouatarum, coriftiEuic Lpinus \ qii in genert cognofcitur a caeteris hir- claffis, quod folia fepcem, novem, nunc plura, mine- pauc'iora (pro fecunditate & tateterre) coliaerentia, in mium centrum, pediculi nempe fummicatem fuperio- quam tot radii, concuirantadinftar ventilabri quo utunttir nniliere & rntro Pi tan- calorem folis arcendum, acque hciem &c collum peftulque rrrigerandum -nooues ad ftivalis: folium integrum exradiisfoliolifvefic compofT[uni, Viticisfimiile ft * * vltet,* fupinaautem candidum &c lanuginofum; ac hajufmodi divifurfe f & prona parte ram, circaiblis occafum, veluti flaccidi-fafti dcorfum dependent: iiliaua^ u radii fub vefpe- tas depreffaique, hirtutas, furfum ereftas, breviffimis & vix confpicLus Debolio habet craffas, la- in.qnibasfuiitfeminaplana, compreffa, imo inqaiubufdam fpeciebus niinftril,n ^ nnteilE«; yanorum colorum, & variis panftuuis notata. Oli_m pro nurnis e x w Z 7, brotu da, hoc taniem ignorant,quiddijlant *ra Lupmh; quidan, fir melius J'i A J-VTM nunc nec pin,s (bfta & inftituta comparatione inter Legumina) ^ u i g ^ n ^ nd dlfantETM Li- toco duplex eft, frtivus (eu major A filveftrisfeu minorNos Hi«" i o ^ ^ con ruil: ^ tioni. A rum, qni triplex eit, albus, luteus, & «riileu8; hictWW^1V1<J'mUs Lupinumicolore flo- amagnitndine&parvicatefrnftaB. wcmuselt major, medius, 6c minor,

3. i«^/«*i vulgaripfeufacivus albus cauleafliireit/jn cavofea vacuo, exterius modicelanuginofa, firnio & n fr, refto, rotundo, interns flit; exquOjpoftqDamprimummarcidiraai funt flores ^ admintu lis reftua confl, rentfiliquae quaternE, furfum ereftae & verfus coelum I m caullum faft, igo eminences apr>a- ftijio adgeniculam fuperius fafto, ternae, in tertio inr ft end entes, zt H^ in fuperiore inct-f liqne, & ita deinceps nunc plures, nunc paaciore^fil ft 10 geniculum conftituente, bins fi cioribus luc'cedentes confpiciuntur, fecu, dum f I I 112 nonbus frequentioribus aut pr.u- flores, & confequencer filiquas plures itidem K Um A, ccelum J prafemm pluresapparer °> lemma infe continences, fi tempeftive Lpni-

his fatusseffitem[^]alidam diurnamque naftus fuerit: fcjiffingvlla elongis pediculis, ex[»] alis cau[^]ff[^]tj⁶,[^]ovenientia, f^m aut <?" nunc pluribus nunc paucioribus radiis, aut foliis in[»] cert[^]am [^]pediculi fcilicet foliorum integrorum («fastigium) concurrentibus confant, & j[^] VerLvirent[^] in adverfa Candida font, aut lanuginofa; fub vefperam feu/olis occafum velutin[»]facida deorfum nutant & cernue pendent: flores inquam in fummo caulium rdiorum papiifonacei, candidi, fpicatum feu ipicas in modum digefti funt; quibus fuccedunt fi[^]quaelatse compreffa, quodammodo durae, fubflava?, ioris tenuiter hirfutas, granis feu fettinibus protuberantibus, & valvulis ferme inter grapa & graria junftis, B[^]nsemedi[^] filiquis minores & compreffiores; intus vero filiquae funt glabr[^], m quibus femina compreffa^v al[^], qvina, non epauciora, orbiculariaquafi latent; ibris inquam funt femina alba, - intiis lutea, fapore (ia mafcentur) agariffima, qua* germinationis princpium haud obfeurum ea partequa filiquae adhaerent, & concavitatem quandam veluti exiguum umbilicum, habent: radice hie Lupinus nititur fingulari, tenui, paucis capillamentis fibrata^v

4. Zw/5 flavo flore, Cluf. Hift. OdjOratu[^] Eyft. Hie Lupinus ii; fignibus aliquot notis a vulgari & Cxtens Lupinis diftinguitur: prinio flpre luteo potiflimo odorato, adeout decerptils? s-Ger[^]fl: 2E Hifpanicas fiore fallat leviter intuentes: . flores enim gerit multos, verticilli quad in modum difponfos & fpicatum /imul,* certo quodam interposito'fpatio inter geniculum & geniculum; verfus cimam caulium (quemadmodum in verticillatis videri eft, de quibus afturi fumus m Seftione oclava) quandoqu.e duo, tres, nonnunquam plares obfervantur quafi verticilli, floriBus luteis brevibus petiolis innitentibus onerati, c loregrati/imi, ad Leucoi Keiri flores accedentes ; deinde floribus fatifcentibus, filiq[^]as profert confertim, fingulas hirfutas, compreffas, fuccedentes lingulis floribus luteis odoratis recentibus, aut de novo expanfis, continentes quina fenave femina compreffa, in medio tumida, magnitudine filveftris# Lupini cxrulei, aft colore vario feu punftulis variis notata, Linarias parvas avis canoraovi* inftar, *exalbb& fufcis fubnigrifve punftis maculata. Tota planta in £[^]Eeris fuis partibus, reliquis Lupinis accedit. Folia digitata, ut fativi albi, fed multo minora, xitrinque tamen hirfuta; caulis teres, brachiatus, hirfutuseu villofus: radix fimplex, refta.

Eft alms' Lupinus luteus Mauritania Tingitanze, ex femine ad nos mirfo a Roberto Sfofmod proveniens; cuius flore's funt paulo majores, filiquis & femina etiam majora, magifque fufca, lineis & pun&is obfeure albicantibus notata; caetera Lupino luteo vulgari fiipra diftopar!

5. *Lupinus peregrinus* cseruleus major villofus, C. B.P. Iridicus, Corn. Planta haec ex Indiis allata multo feliciter adolefcit, pulchro afpectu, & fpeftabili flbrum jucunditate preece[^]teris commendatur: cauleraiiabet cubitalem & bicubitalem, aliqu'ando ampliozem, multis ramulis brachiatum: folia circumquaque digeruntur, nunc in novem, nuhc in plura aut pauciora'foliola, casteris latiora, & in orbem quafi compa&a, in uhum itidem centrum pediculi extremum aliorum more concurrent[^], & per medium fingula plicata, longoque pe. diculo iulta, omnia fimul undl:a in fuperiore pediculi parte unicum folium ex pluribus qnafi radiis conflatum confituunt, quod pras languida viriditate canet, & in fummis caulibus eor unique cimis verticillatim hincinde per inter valla caulem ambiunt flores cserulej coloris, coronse inftar, quos excipiunt filiquas latic, breves, hirfuta?, trium quatuorve feminum capaces. Caules, inquam, folia, & filiquae, promirT[^] & Candida lanugine muniuntunfemina majora ex rotunditate valde compreffa, fufca funt, neelzevem fuperficiem habent, fed pumkofa, aperature rudem. Sapor fubamarus eft, & caeteris conformis, ac proinde ad eadem hujus Lupini farina valet, ad quae communis Lupini farina inftituitur. Semina hujus, ficut aliorum Lupinorum magis & a longotempore cognitorum, ufurpantur. Quare etiam committuntur terras quottannis, verfus finem Februarii, aut initium Martij, in calidis regionibus cifius; in feptentrionalibus, ii nonurge < gelu. autrigidum prafrigore tern pus, ineunte aut medio Martiocommodiflime feruntur bene macerata, 6f cito germinant, ae intra feptimeftre aut o&imeftre fpatium coriformantur femina, & perlciantur Septembri & Oftobri, ex quibus fingulis annis revocantur de novd, & fatione vernali tempore renovantur. Eft & afius carruleus min[^] antecedente Jioc, Gad[^]enfis di&us, femine multo minore confans, fufco, a fperofii[^]liter, ut prioris lineis nigris variegato, <k hoc nomine, junfta omnium partium conipofitione minore, facile difcernitur a casruleo majore peregrino ante dido,

« *Lupinus czerdeu* minor perennis Virginianus repens, nobis. Hie quoad caules, [^]lia, flores, filiquas, feminaque convenit turn filveftri casruleo minore, de quo infra dicem^{u s}; fed quod notatu dignum, aduratione, & rependi Tub terram facultate a cseruieomino

noce (cmnquoprima feck • »am pofldet affinicate) OKe&qtoSm18Sfc^oamft. cuJime diicernitur.

7. £ » « « fiUeftris angntifclia> flore czruleo, nobis. Silvers fegefim, Aa. Lob. cauleshabett,nmor_{es}& l_{onglor}es quamfimt lucei Lupin! cades, Si plnra n/zros •0 minora&temiiora g^ric: fiores ex purpura czraM ant fubrubens ejiam mrnoresfont: trtitus m" nor,roti]ndus, tumidds, ficut & lir-ei

T**fr~*~*V >mon P^{UJiftlJi£} obfcurioribus fnfcis notator. eufior i' & JL P^{mDSmmo£} CJ.r^{ELL}AS. Tingitanus, filveftri akior; cojus folia font angmtiora & oWcn^ui virentia, gmina paricer minora multoqne paucioribus

LOCUS & TEMFUS.

3.Lupinus vulgar* fa fathm dbus, no&k.'Par\ Vulgark, Eyjl. Coliturin bortk HiSha» «, Italue Gallic, & alibi etiam&ntium. Floret Maio, Junto; iyf -<>mbti menfp Lriturtjufdmfamn.

TM^fi*nflmiCluf.*Hifl..Oikmus, Eyft. In fatk cuhk, mul. H., i'cic *>romnit :jgdet sfiare, atauefemina ineunte isr exeunte autumno, citins aut , aPrO J "tore, perficit: in quibufdamngiombu* ubingua autnulla hems. vn eito- turn

5.Lupinus .itsCdtrukusmajorvilofitt, C.B.P. Indhut, Corn. Hujua/emen ex AmaU. canisPiam. iambus in Europam ddatum produxu plant as, qu* alias nultas ckitratm afudnosmdtptkarunt: exquibm coamumcataplurtbue JEurops locis fuerunt femina: fforei todemcum aliis Lupinis tempore, is verfTM • autumm tntium fanina fuaperfich.

6.Lt]pinus cerultp minor ftrennkVjrgintatmsrtpms, nobis. Hufus fantn ex Virginia hue in Angham non multis sbbinc anms dhtum iff fat urn produxu copirfe. hunc pmnm iff ntouX Lupinum ctrukt, <?> modern tempore fionba^isfemina fuamafulataperficiebat cumLtvh antedidit.

7.Lupinus silvestris angustifolius, flore caruleo, nobis. Silvestris fegetum, Ad Lob. Hic in arvis fegetalibus Hispania, Gallia, sponte provenit. Nos subinde invenimus inter sata circa Blasas provenientem sponte in plurimis locis: floret eodem tempore cum ceteris, & versus finem aestatis, aut initium autumnii, perficiuntur ejusdem femina.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

m pini / ^ " maceratum caliJa aqua, hominibusin cibo est,puercrum ventribus circa u impofittrnpro remediofingulari est contra vefnes. Lupimifmn * i v w , /? innu r > , m

N. Mm. Elixum enim, deteleidin aqua dulcitate nature tant Mertahisief^djh^ n / £ * * * genitum exueht amaritudinem infirmitatem qui, ita duntumum Aliditur tumenro Zib Zt ' etiatt pile tnedtoen conditum. Lup'mi faninh dura ac terreflris eli fuhRnJL P^{Jg^aTM} vei

butofuccu* quern crudmn vocam procreatur : kmtrfiSt lumbricos tui UUtus t mdklinam tumcxpofca potut: qum & decorum ejus, aut potius fuum mJ, •tur Lupmifemina, lumbricos ejicerepmft, aim quiaue forstidentidelZ f^{qm} macera. vitiligines;

NOMINA.

3. Luvms albvsfativusfore<? ferine albo, nobis. Lupinils Maf, in i J ^ , << * * * Vu & * Eyft Lupinmfovalbo, Cluf.Hift. SaTivm, Dod u A f F ^ i J ^ , Ger, Sitiv^albm ParkVul^risfativusfemineiffiorealbo, IB L^U Ger, Sitiv^albm

4. Lupinus[ilvtftri*flore luteo, C.B.P. Odoratus F*fi r; ; Ute^Tab. Lupinu* flavoftore, Cluf.mft. 7lpt£) F^{fore}leio / . ^ . lugd. Gtr. Park Videaltenus Upinl h i d r ^ a m f L a , f c u i ^ ^ W t ^ ^ c m ^ w ^ L B

5. Luymsperegrinusctruleusmajorvil/ofu., CRP? PJKW' medius wukus, Park Excticus hirfutdnu^i v\ M^lndku^ Com. Indie*. Vide.fmen Lupini minoris ctruki Gaithfu fnll T S M m j ^ fiort c<frK/m, G_A

vwnjiscuipum m Tab, aiam 7. pi. 5. infra major* c*

ruUifemey majtis, -, fuperius fcuipum. •

fit Lupiivs<*ft&r<?W minor pertnnc Virginianus repetis, nobis. •

7- LMifnasjli/efrK anguftifoiuisflore cjreruleo minors Eyft. <> nobk. Silveftris fegetum, Ad. Lob. J&Jvcfris flstrfgruleo, C.B.P, Sih/efris, MarrL Dbd. ut. Lugd. Hifl. Lupimis flore caeruleo, ClufBft.Ger. Minor, Tab'. C*mlms\ Park, Silveftris flore l •o^femint rotundo vario, I. B.

UALLUCINATIONES CASP. BAUHINI
Aliorumque Authoram.

P Ag. 34 g, rot. 2-pl- v- tupinus peregrinmpenta-
C.B.P- Lpinus Arahitw jive penta
Silm piregripim. ft>* italics. H/vc fcfontia
Ua mate printo^a Cajjt.Bauhina nominator Lupin,
cum Lupinm fit planta Jiliqiuofa papitio>we% fit
ftandeqs.jiliqtw ereth donatnsjetibiet: j.ltnta, Luff
tins Jiv. ••rinum Petite, tion ejiJ/a-
pilionia
atpommia inier*Ligiwnita, muho mum;
inter Ltptlm Qipro gruurmi Lupino h Cajjtro Bau-
hina fctet rati]uc hac fail ratiant bine &ver-
rancandam & alibi focandam cpntldimvs; ucc %jl
af folio Lapini, ut vult idem Cajj. Btzu-
hinus -.proprie loquend Qnjngitefolium /><< PcMappylh
hmbabn jiores ex qthm pdatii conflatum, atqite
figulis jhribiu fit conferuBis fuc&dt capfula ex qui-
msfilitiu canjfrifla: erge cum tve fit Lupiaus; nee
Quinqefoltumpropriediulum,mat£ locaturpag. 1+S.
col. 2. pi. V. pro Eripiuopent/hphyllo/dpar. j 2 6. col. 2.
?L* i . QmqufuliumLtpni fatia, C.B. P. Pek-
taphyllum ifti*jf*. <ir Tbal.bu Tpetitur,pag. i'S.pro
Lupi,iQ,S\$pag. izS.proFentapbylh Lupini folia, tr-
gj matifjtij eft Up/us Cajj. Baubini. Eft enim hac
plantabetenclita & fuignem,& debetadjuagiplan-

t<t Terraraira diEla Geargi>Marrgravio, UT rifo
Lujitanico fiore ptirpuree fitiqaa longa, Parl^ in
•ipp. Jtqmcxlifa tribur a fioribis conformibts,&
jiliqui OTMTsipp-s™- paterit cmuU'JS tomponi vmiumge-
nui fabaltenium commune trihus jupr&citati: fptci-
ebuJ. Dtindc htpinus ingenrre, cum filiquis dwietur
treilh, malepDJtCkcr immediate colloiatir, Spe-
j:it bzc plaita pr<sdicla L u p i n i n i a t u r
diUum.

Pag. 14S, Ficnegrittum lyx/qrte Jptr'
vam aeiminum & nedyfarum male Cajj,
hauhinoxumftiumfitirifaliumlt
mett trifdittum. delict inter jibij.
ni, Trifalia fcilket,n<nt imtem int. ipinum fit Hi-
dyfat tint > Legumina atata, feu <>ji((n** id tl ipio-
rum ctjls lid htus cartli qppmmntur, foliola ere
gione, atqite cajjte media jttfHneitct ftiioia alterna-
tim caulbns (tdej modo .•• dcxtra, modo . fimjba.
cattis, juxta gemcula) adtiarent. Infnp Lupinut
propnediUtt^cumfitjiliquu rtc^t spr isdhuT-debetim-
mediate Fa.be jubjungi & dijiimi cum tsreris /<*
jertis Legumimbis, (jlycyrrbi^a^ Galega fit Orobo
jilvatkt), filiquis refit's donatu•.

§. 3. G t Y C Y . R R H I Z A .

I 7y<. ideftjadix ditlas^ aLatiik Clycyrrbita is dulcisndix, {y.afeplafiariis barbaro
nomimLiquiritia appeMatitr.Diofcoridi i.^c.j, fruiexeft exiguu, ramisbinum cubitorum,
circa quos folia Laitifii, denfit, phguia, tafiuqiegutixofa.-flos eft Hyacinth\ radices longf,
buxdcolor•«, fatkdukes. Theophrasto 9. Hift. £3. yA<*<* **1 Mn ulj^, dukk (y Scytbka
radix, qudtn aliquihivvyXuam vocitant.

Glycyrrhiza propota gencrica habetOi quod inter filiqnofaspapilionnceas filiquis ereffis
afteftas fit omniunralriliima Herbs, radices producers profundas, lureas,6f lateper ter-
ramrcpentes, & admomndulces ; filiquas cuitas, comprefTas, fupervenientes flonbus
dilute ciruleis, feu'violaceis.

8. Glycyrrhizgvera filiquofa feu Gwmanica , C.B.P. Vulgaris, Dod, Cam. Ep. Gly-
cyrtiJz^ vulgaris vera dulcis iblia habet alata feu conjngstim cottoemedia:adha;rentia, una
adextremumlongo&impari, miikoque func GlycyrrhizE gcWnata? ficdifta? (oliis virenti-
*ora,8f majora, glutinofa : canliculi feu farmentofi viticuli fmE teneriores, anguloli, -qui refta
atcendnt (in pingui & bene fubafto folo) ad altitudineTn quinque, fex,noniniquam feptem
pedrim: flores in cimis fummis, in fpicam quafi cfigeruntur veturi Galegactiores, aliorum
LcgtMflinummore papiltonflen, exigiii, dilute carrulei: qiiibusf[iccduntfiliqu3?parvi,bre-
vesrefpefiu ipfiusplanKfatiSprocei-ar, biunciales, compreiTx, neutiqitamhifitae, fed \x-
ves; inqmbnsfuncfeminaparva, comprefl'a. Nota GlycyrrKizam flores copiofe iivis pro-
fene\ fed ncrpvzcs ederefilignas, eafque vix ^ene maturahtes femins? Hoc'concingit
Pjopter nirmiam ei concefiat fecukatcm rependf radfci'dus, hocqae cftfam'lhzre omnibus
ntisnimiarepadiaviditatepraditis: radices funt primis annis temtes, &cum rempo-

re fiunt longae, ramofe aliquando fnitar farmentorum Vitis, forisfubobfearae, & it nigricantesfufcedine, intusbuxei colons, quae late fub terram pertranfverfmn & Qbi^num repunt, utvixomnes & totae terra eruitjueant, adeo ut ufui colle&is "prove&iorib^ & majoribusradicibus,plerifqueetiam\l6cis tenuiores reliftae fequentibus an^s fegerminenjy radix hujus magno cur^i quseftu & foenore ferebatur hie in'Anglia, ubi maximal copiam mine vili pretio compan:ndam exponunt venalem, "nullis radicibus Glycyrrhizae in tota Euroj^a provenientibuspoicponendam. Potest etiam jure vendicare Anglia Croc^ itidem ftamina ffliquis alibi natis neutiquam fecunda, fed omnibus anteferenda. Forte noti haefitanter idem profere^ndum de Lupuli ftrobilis, qia neutiquam natis in Flandria aut Belgia funt inferiores, fed meaopinione fuperiores, & prsestantiores, in quibusdam fakem Anglias locis fati & educati.

L O C U S & T E M P U S .

Glycyrrhiza^c ofwfe pro-venit in Germania, prdefertyt in agro Padenhurgenfi, in Franconia ~~provenit, in Germania, in agro Padenhurgenfi, in Franconia~~ ~~optimus: in Germania Anglia & Belgia aliisque feptentrionalibus regionibus fubtiler proveniunt cum Glycyrrhiza tunc ferebat. multa minima. Salicet in Hispania videntur nimium effera. Ideo~~ ~~qte a confyhrimis temefterilk creditur: floret inquamfubfinem <eftatis, at rarofemina adperfectiam .naturitatimperducuntur, non tarn ob defeftum caloris quam a n^nio rependi aut fe fe propaganaradkibu* fub terram Refiderio; fiqu <zfitiqu <eproducuntur^ ut in Gallia aliquando & hie rarm in Anglia obfervavimws, feminamacraif' jejuna in iifdem latere confyficiuntur. Herbatantum eft^Glycyrrhiza totaliter byemefupra terramperiens, reftribili & vivaci remanentper tot am hjememin ter^aradice^ *tiamfi verfa autumni finem frut ffcere videatur, isr ad altitudinem fuffrutick adinfar. Virgultx afcendere cernatur: marcefcunt isr eju* folia, & cau^e? penitmputrefcunt ingruente hyemefingulk annk, eft tamen radice repente,' reftribili, vivaciisr diuturnafeuimultos annos durante. NonnullhGallU Narbonenfis lorisfpanteoritur, etiam Prope Later am oppidumillic: Julio i? Augufto floret, aliquando tardiu6, & Septembri filiquas, ~~je quae habet, fignat, in quibus totidemmodum fcmum pofitumum propter invicem ante ad-~~ ~~cliam in ejusdem explicatone. Dicitur is Scythice aut radix Scythica a Scythia regione in qua~~ ~~ad hunc locum. Si in hunc locum ad hunc locum & dicitur pofit propter dicit, quum exigno guffu dul-~~ ~~ci famemif fitim prticipuefedat.~~~~

TEMPERAM.ENTUM & VIREs.

Glycyrrhizae; Wixe/? dulck, temperatecalida & bumida: <ortexejus amaritudinem quandam tamen iabet, is^ calidioris eft qualitatk partkeps, fed hunc abraade^ oportet eos quibus eft u- fui, humettat autemmagkrecens; isrfucco plena radix, quam arida. Vtills eft ad raucedines tujefque veteresfedandas; difficihm refyrationem, peripneumoniam, plenritidemfanguimf- que acpuris fpuationem, phi-biftn, & omnes thoracis morbos exafyeratos Unit; tnflammati- cnesfedat; acrimaniam & falflagmem humor'um mitigat contemperatque: crudiores humores concoquit, is^ fyuti exitumfaciliorem promovet: ulcern ex^purgat in eclegiatevel olio quovis modo fumpta., aut aliquamdiu manfa, fuccovefub lingua detento: decoclum ejusrenibus aut vefic<z exulceratk confert, urin< ftillicidiomedetur, in univerptm omnibus matk occurrit db acrlbm falfis, is^ mordacibus humoribus excitatk. BUfifpr*cipue, i& alibi in multk officin- k exfucco LiquiritU feufi mavk Glycyrrhiz*, aliifque aromatk morb k pr<zdfifi\$ contribu- entibus additk, panes parvosfeu confeliones efficiunf cylindriaca aliave qualibet figura iif- que confeaionibus fuk diverfa nopiina indunt, quae 'uffi frigid* & inveterate profunf, ali- ifque fimulbus pulmonum woracifve affe&ivus.

N O M I N A .

Glycyrrhiza verafiliquofavelGermanica, C.B.P. Glycyrrhiza, Fuch. Cam Hort.Glycyrrhiza alter a, Mattb.Vulgaris, Dod.CamEp.Ger. Glycyrrhiza nonechinata Lugd. Cquifigura- ramvitiofamadhibet - H^cfiliquojaplantaLeguminofa amandabituradfibi fimiles Tabula 11. hujusStacionitexhendasJ Vulgar*fihquofa, Park Radix Scythica Gfcjrrbiqt vulgar* Germanica radice repente, I. B. Radix dulck-, Rag. Gefn. Hort. Radix Scythica, quibusdam etiam Scythke. Liquintia, Brunfel.

/* f

FAXLUCINATI-ONES CAL... BAUHINI

"Aliorumque Authorum.

Pag. 352. col. 1. 1. Glycyrrhiza capite echinata. C. B. P. Discoaridis, Lab. Collocatur hac pro
 g. Xina Glycyrrhi^a a Cajp. Ba'tbine tijic denemvta-
 tut ab authoribm; fcd-cum tjui radix primo nan fit
 <^t> at Liqoiritiir, noi hujus plants modumjiaren-
 di contmuncm cum aliis Uffimimbuspapihenactk eb-
 feroa. Uti, & jiliqita: pmitiu examinantes alio re-
 mi; it; , feparonda ip/om A Gtycyrrhi^a, pmpter
 ratiMemwme adferardom. Glycyrrimp vera Svul-
 f. <*>rispradueitpsfifisrti duiduas filiquum miciaUi a
 oiimriatei furreSm, pianos, compreffas, bivalves
 faredifpojitas; at Gtycyrrhida taptie ecbnota fiji-
 quos immeriu prtfert echinate in tapitiuum cong-
 fiat, in quaratiiJismlii uaicam catitinturfemen. Hi-
 fit TiUiwtibifti duds tx Wtenatnrjc deprampis, alia
 ammondovimms, ad fuM videlkn confartes ichinatv
 fiUqaxarumvalvult pneditmbjantai (Onabrycidamfea
 copitis gaUiitecei genttt) Tat. 11. infra explican-
 das.

Pag. ifi. col. i. pl. ill. G y r y i ^ J J o r f r i s , f l o -
 r i b u s l u e o p a H e f c m t i b i i s , C . B . P . G l a s t x a r g ,
 Cluf, Hift- Htei itiamptanta UgaminiojopaptUona-

ctp HJiliquefa nan tft Glycyrrhi^a. nequ e fapare,
 neque dji/it/iii, neque a feniimbus. Glycyrrhiypra-
 prie diiJa, radue conftat admatium dukt £f idee per
 excellntiam jivei&i •i<%. *radix dulcis dicitarifcun-
 dsjiliquam habet furretiam, bivalvem, compreffam,
 plaaam, inque jjnfratii cntinentiTi jimiiaterna, qua-
 terna, qnina, ratanda erbicstaritr: at Ctycyrrhida
 fifotfha, fiartbus ittBO-pailejctntbw, nee canlat ra-
 ditedidei, nee filiquim verit^Glycyrrhi^r, net fit/si*
 no confermia gent; cunflat mim JIUJHU muln'i in.
 ghbulum feu. tapitalam compitSii, quaram fingulie
 fitiitgemina fen jremcllit, id elf fmvuic filiquitit litipt-
 lit fteribus fucedntes conftwtur ex dupltii /diqaa
 jmtla membrana dutilicata virfuit prantm partfm
 JiliqUit, difiermiiante duplicem feriem fimintm Se-
 famaceorum, feu fefamoidit ojjit medo ad articths
 diptnriimpedum firmandos h natura dtii, •• hits
 Glycyrrhi^a filvefirts ftoribus latea pa!!e' t-C.
 B. F. /eu Glatix vulgarit CUj. Hip. n no-
 minator Glytyrrhi^a, if P^p jui bie * Do*
 iijijimo Cajp. Baubinn. Debet releg< * ft ~ntmfu<s
 clajj'u Ajhtiga Ins, dequibus infra 71 . 9. dicemus.

§. 4. G A L E G A .

GAlega cur dkatur ah barbarih ignoramus : a quibusdam tamen Rut* nomen inditum ab ef-
 feftu isfuirib'u4, no7} veroodorecujus estexpers; quidam Onobrycbm, alii Glauctm^ non-
 nulli Pohnonium, alii Polygahm veterumtijffe judkam, quibu* Wofcor'tdh dtferiphnes con-
 radkunt.

Galgaf filiquofa papiliorucea, non leandens, alata feu TA*OVXSWAK phnta, protru-
 dens mutta folia t regione coftae mtdti adhsreitia, impari longiore extremum coftsoctu-
 pantc: caules edit bicubicales, in quorum funimis cimiflofcalospSurimos papilionaceos
 five exrulcof, cinercos five albos, fpicatum difpofitos gerit; qutbus fucedunt filiquae bival-
 ves, temies, rotund3e, lon§as, omnium Leguminum hu)us fubalterni generis, filiquis ere&is
 donatornm, mnlto niinores& tenuiores, coaccrvatim & denie caulium fuperiorem partem
 ftipantes. Hsc eft nota generica Galegam a caeteris fia» fortis hujus generis intermedii,
 inhac Tabula y. contends, diftinguens.

9. Galega vulgaris, C. B* P. Cluf. Part. confratcaulibusrotiindisacerec>is, alternatim, id
 eft nuncadextra nuncafiniftra; folia magna, ikis lata ac longiora, eregione harentia,
 ampletantur coftam mediam (eu ;>'^», extreinum cote femper uno longiore impari clao-
 dcftte. Cofftffi aliernatini, modoexuno, niodeox aitero. latere, e geniculis caulium oriuntorin
 caulium cimif feu fuperioribus partibus exeunt (picadrtf numtrofi flores papilionacei, parvi,
 Arachi aut Vicixxmulu, triplici colore infigniti, carruleo vulgarker, aliquando cinerco, &
 'albidofeu fubcandicante; filiqui ad enndem modum denfeck fpicatum ftipant caules, for-
 ma oblongs, tenues, rotunda feu cylindracea; erefts, fpicam b'tpalmarem & cripalma-
 rem, & aliquando longiorem efficientes: radix lignofa, brevis, multas fibras demittit in
 terratn eftque diutuma& mulcis annisradicibus vivax ac reftibilis; ttiamficaalespoft fe-
 mini ad maturitatem perdiifta pereant, hyeme rigida tranfafta tamen, vere novo, ut Gly-

y " h i t t n .
 za, regetmunt.

L O C U S & T E M P U S .

Galega in Italia isrHifyaniapaffim mkcisymguibus&humeftisjsrpropeaquarupirivos copi>1JJa-thprovenit; in Germaniiautem,Belgia^isrAnglia,nonnififata in hortk fjkret deflate isrjennfuumcopiofeperjicitautumno: in Pannonia frequentiffime, ti'iamin Italia circa Patagium,<Sr in montibm Euganeis^ etiam inter Patavium (y Vincentiam, alibique paffim reperiturper tot am Italiam,

T E M P E R A M E N T U M & V I R E S .

Galega, ut Baptifta Sardus fcribit, aliique plurimi etiam fcriptum reliquere, ad omnes peft' denies morbos, contra ventrklumbricos, & venenaufumpta, efficaciffima eft: remedio quoque eft advtrfu* animalium venenatorum cum morfth -turn ikutj fucco epoto, (y herb a contufd plagk impofita. Pueris etiam convulfis ac comiiañ morbo laborantibus? fuccus ad dimidiam unciam fumptus prodeffe ferturXdtfalpinu* frequenter ajkritJnarvisfrugiferi\$-Hetruridit vegetare, is* fucco ejut tumentes ob venenum bovesfanatos infufo in bs. Succu* Galeg* datu* JBayroiticodleari lifor abat pueros ab epileffia, & vermes etiam expelkbat, iff a etiam herb a bvllita in patella cum oleo <sr femine Lini,fuper umbilicum ligata idm pr<*ftabat. Decottum in ~vatopSaturn cum Theriaca is- TormentilU ac Carduibenediftiaqua (tefie IngraffiaJ plurimum vaU- in pefte (y febribus malignU cum petechivis, horum omnium quoque teftis eft Dodo-*n*U5. Quibusdam aquam diftillatam in pefte exhibent, Cxfalfino authore. Contra venena afumpta eandemGakgamlaudatCamerarius; vermes quoque meat i& femine<&fucco.

N O M I N A .

Galega vulgaris, C.B.P. Galega feu Ruta' capr aria, Park, Matth. Cam. VcenumGrdacumJilveftre. Tab.Dod. Galega Ad.'isrIcon.Lob.Lugd.Ger. IB. Galega vulgarity Cluf.Hift. Capr ago vulgo, C*f Galegafiorealbo cinereo isr ctruleo, Eyft.

H A L L U C I N A T I O N E S . C A S P . B A U H I N I .

Aliorumque Authorum.

C JilezaeftUquora. papilionaceajili'quistenuibus | di8<e Sesban) utraque hxcplantafiUquas habet pro-
 x^ Peretis, confer in nacentibus donata, at Gale- | pendentes ergonon debent ha plant* dici Gale?* affi-
 jr^affinis Sophera, & Galega affinit Sesban (ma- | nes ex infra.fententia, Orobis maps' accedunt Mi-
 le addit Cafe. Bauhinus filiquas articulatas plant* quis propendentibus donatis,® in Tab. 6>* explicatis .

§ . 5 . O R O B U S S I L V A T I C U S P E R E N N I S

S H I Q _ U I S E R E C T S .

O 2?o^filvaticusperenni& filiquiserçais habet pro noti genericâ, qua diftinguitur in *e-
 nere ab Orobo annuo fub initio e*plicationis Tab. 6. exhibitio & femine anguldb
 donato, pnmo quod fit plant* perennis; fecundo quod femina proferat plana fr arqualia,
 at Orobus fuprà diftus annuus a duratione & femine angulofo cognitu facilis, hmdis etiam
 natahbusOrobi fativi, quippe in hortis nonm/ilvisponteproveniat, ficuthiefilvaticus:
 conveniunt etiam Orobi filvatici perennes /iliquis propendentibus donati & in fuperiore
 Tab. 6, explicati, cum Orobis fijvatitis perennibus etiam filiquis ereftis donatis, & inhac
 Tab. 7. exhibitis, in eo quod folia habeant majora, longiora aut latiora, & rara, bina-
 timfeu conjugatimcoftsmidia adhaerentia, & hi & illifiliquas habent rotundas feu tere*
 les, pinnas, continentes itumma pinnâ nulli angulo, ut Orobus receptos herbariorum qui
 eft annuus & femeltris aut feptimeltris planta; at Orobi omnes filvatici (uno excepto quar-
 to Pannonico Clufi infra defcripto) funt perennes feu vivaces, radicibus enim in multis
 annos

Sea. II. VNIVERSALIS O> XO W I' £W S I S. %

annosvivunt: folia, caules, flores, filiquas & femina firgulis annis recurrent!busprotru-
dunt ex e?dem radice, quemadmodum etiam Orobi filvatici?erenes, filiquis propendenti-
busj^tfati, & fupeflore Tab. 6. explicati, à quibus praecipue difterunt hi Orobi filvatici hie
j^sq^ncandi, filiquis ere&is, curtifque petiolis donati; & hacratione nos ducti hoshic inter
tonfimiles filit^uis ere&is donatas plantas difpofuimus, eoddem jungendo conformibus fili-
quis ere&isdonatis, & feparandoab Orobis filvatici? filiquis propendentibus in priore Ta-
bula explicatis.

10. *Orobus* filvaticus perennis vernus filiquis ere&is, flore purpureo, nobis. Orobus
filveftris purpureus vernus, C.B. P. Pannonicus, i.Cluf.Hift. Multoshabet hie Orobus Pan-
nonicus i. Clufii caules ab una radice prodeuntes, jpedales & altiores, firmos, ere&os & val-
de angulosos; in quibus hinc inde modo à dextra, modo a finiftra, fparfa funt folia lata, ob-
longa, binatim è tegione fita, inque mucronem acutum definentia, & coffe mediae terna fo-
lia utplurimum ex adverfo apponuntur: flores in fummis pediculis ex alarum finu ortis fpica*
infar nafcentes, Pifi aut Vicias florum zemuli, coloris purpurei, elegantiffimi, deinde u-
ti evanefcere incipiunt, caerulei evadunt: quibus tandem evanefcentibus fuccedunt lobi
feu filiquae* bivalves, longs, cylindriacae, colore fufefe, in quibus femina exigua, rotunda a-
liqua.ndd, nonSuH^i^aam oblongiufcula, eaque varia, latent; quas matura, lobis (eu filiquis a-
pèrtis decidunt: radix dura, lignofa, nigra, longa & vivax (ut in plerifque hujus generis
fabakerni Lëguminibus) per intervalla extuberans in medio, fibrofa tamen in lateribus; no-
vellas radículas fingulis annis producens. Tota planta acrimonias eujufdam eft particeps.

11. *Orobus* filvaticus perennis filiquis ereftis anguftifolius, radice Alphodjli, nobis. O-
robus Pannonicus filveftris anguftifolius radice Aphodeli, C. B.P. Pannonicus 3. Cluf. Hift.
Orobus hie Panonicus 3. Clufii cauliculos promitredos, pedales& fefquipedales, angu-
lofos, firmos, non indigentes capreolis: folia per intervalla uni coffas niedias adhxrentia,
quaterna omnino, bina femper è regione fibi invicem oppofita, ere&a, &• angufta, lon-
ga tres uncias: guftu aliquantulum acido initio, deinde amariufculo ; flores nafcuntur¹
in furculoriim fummis fpicas in modum congefti, quini, feni, candidi coloris^ Pill
aut Viciae forma: lobi feu filiquas oblonge, ere&e, nigricantes, fuperioris filiquis fere pa-
res, femin^nigro, iherdum etiam & maculofo plena?, quae per maturitatem exficcatae (quoni
lint bivalves) cum frepita dehifcentes *femen* fparfim, ut in plerifque hujus generis Le-
guminibus fit, abjiciunt: radicibus nititur quinis aut fenis; minimi digiti longitudine, cra-
fuiufculis & fimul junftis,, Aphodeli aut Paoniae feminae ritu oblongis tuberculis, pennae an-
ferinaemajoriferefimilibus, forisnigris, intusalbis.

^rô^^Alpinuslatifolius, C. B. P. &Prod.Dfefe. Râmis eft hie cubitalibus & altioribus j
angulofis, viridibus: foliisin fingulis coffis oftonis, binatim ex adverfocofis & fibi invicem
oppofitis, uncias tres longis, duaslatis, viridibus, nervofis, casterifque Oroborum pra>di#o-
rum foliis minùs acutis, è virgulis ex alarum cavis, palmaribus prodeuntibus ortis *. flores
unciales ferme Geniftaeformal pallidelutei (foliofuperiore vexillo nobisdiftoruffefcente)
dependent, ftulo ex eorum medio prominente: lobos feu filiquas & femina non vidit Cafp.
Bauhinus, florentem tantum habuit ex Pyrenseis & Helveticis montibus ad fe delatum.

Orobus filuaticus annuus filiquis ereftis flore pallido, nobis. Silvaticus pallido flore ,
C. B.P. Pannonicus 4. Cluf. Hift. Hie Orobus quartus Clufii flore pallido, filvatico pnrpu-
*?o verno C. B. P. feu Pannonico 1. Clufii valde accedit, *fed* quatuor folia longa in acutum
mucronem definentia & binatim pofita (quibus in extremo coffae quintum impar) viridiâ
funt, per *qux venx* tranfverfim a medio nervo excurrunt, fubacidi quidem initio guftus,
& poftea amarjufculi: flores pediculis ex alarum finu ortis infiftunt quini fenive antrorfum
fpe&antes, Viciae floribus omnino fimiles, albo pallidove colore praediti, qui in binis petalis
furfum reflexis pallefcunt,odoris expertes: lobi feu filiquae funt quales in 1 o. hujus Talb. appa-
rent, in quibus femina fufcum continetur, majus feminibus reliquorum Oroborum prsedidorum:
radix minime vivax eft, fed more annuorum Leguminum prolato femine maturoque perire fo-
let. Hoc multis aliis Leguminibus in hac fecunda Seftioile contentis accidit; aft foli huic
interOrobos filvaticos tarn filiquis prop^{em}lentibus, quam ereftis donatos^ pcrife fingulis
annis poft matura femina contingit. Vide App. Leguminum.

Orobus Tragacanthae foliis, floribus in globum congeftis, nobis. Onokychis Tragacan-
thaeJoliis floribus in globum congeftis, C. B. P. Onobrychis, 5. Cluf. Hift. Hie Oro'ims (nort
Onobrychis ut poftea apparebit in doftrina Onobrychidum) folia habet n.ollia, incana la-
^«gine pubefcentia, Tragacanth2Plegitimz Miis&milis, eodemquemodo uni coffae adha>

rentia quindecim & plum: mv vicena, imd eWmiun coft* occupante : caulicu'li - men.nhocoblpngioreslunr .ortice Xefti, lenti, facru contumaces / humi fefti & plerumque **nudi**, qu **A n r f m** frequences ramulos foliis fuis ala*s, **woppSeri** fitis

& in unciali villofoque pediculo multos flofculos Tra...antha flori'us proximos, canicant es, m capntfen globulumo^geftos gerunc ;deinde. nLitaanaceas fill* quas minores, Doryc mi vulgancer Hippa minibus familia continentes. A. filiquis bivalvibus Dorycnii inftar, mina Fernograxi icon venit cum **Oml** Vide hallucinationes Calp. Bauhini inter Onobrychides infra cap. 6. on obfervacas. Seniina hujus habuit Carol. Clufius Londino ad fe miffa, quibus terræ commiffis natae funt **pbftio?**, quæ feliciter & flores & femina protulerunt ; florebat Julio, & verfus **iuaufti** iinem iemi.ia perficiebat fua.

Orobis montanus filiquis oblon ^ %? fimilibus, C.B.P. Onobrychis C^falo

nore elt nbente corallh, modo: fihquas ttrt longas, nigras, uc Vicia. **Alter cftttbm** i^nfti foljas flore pmpureo, uteqe ffiditio:iginis Uvabibus don=,tl,r, ~ no ^r O- nobtycl^ca led mter **Orobis**, congenas plantas, cum quibus magram ftXSi E fai argo ^ & " " ^ & » « » ^ **pS**

am TO PHaiw circa fontes eodem modo delcribit. Floret defimntTvtre*" & ine" unte a, ^aperhcit utraqtie H3EC Orobi (pecies. (. ,

LOCUS & TEMPUS.

io. *Orobis fdatkuspfnnit vernusfdiquh ereRis flore purpureo, nobis. Pannonkus i. 6W; Hif. ntl/c^w copiofe in montana fva Leiclenberg fupra Maudenfort, fimiliter in omnibus Hif. fivisquadam ferie pro^uSiha Danubio ad Alpes. Partiskea PannonLe lock; floret Aprili at que Maio; fimen profert Julio menfe, iff aliquatido citius, aliquando tar dins feiundum clim'a in quo crefcit.*

^ *Orobis^fo^m anguflifolms radice AfrkodeH, C.B.P. SHvaticus fenmtkajiga/iifo liiis ft hquk erettii, radice Afthodeli, nobts. Provenit in prat is tbermh Badevfibus AufirUvieinis ttim in montofis ultra Danuhum has, ad filvarum illk c*duarummar^{gmS} -floret eodem cum precedente tempore, Aprili & Maio, fantnqut ptrficittuum junio is julio cumsmu tardius fecundum hytmis durationis rtempejlatvs rigor em.*

*Orobis Alpinus htifolius^ C. B. P. 4 & Prod. Ex Pyren*is iy Helve/icU montibus delatut, ubi crevit frifo, deinde florihus pallide htieis in horto Calp. Bauhini: floret eodem cum p'aditit Orobiffrecfcbus, tempore vernofcilicet; reflate femina fua perficit. **

Orobis fdatkus annuus filiquis ereftis, flore pallida, nobis. Silvaticus, C.B.P. Pamtomciis± duf.Hift. Hie provenit in eaparte PannonU, qu eft inter Dravum & Savum Burning t Vanubium in ahntia, -quæ Gbeamcaufam tnteramms Pannonia appellatur, Infupirijumorte • quodamarci Grebenvkino. tefle Carolo Clufio Vide App. ad Legumina atque ib'Jan this fau ram feu Iconem, Locus & tempus, duorum Oroborum jequentium fatis apparent in explkaiicne% pra.*

TEMPERAMENTUM & VIBES.

H. j. omnium Oroborum virtutes feu vires non mzmint Oro/us Clufius, nee ut it quam de eorum ufu dedicit ex rufitit illk indigent ubi sjonte provemebant Dair» kg_f fu_f montans, qu* Orobum 4. Clufii indigitat, eximias virtutes atribuh cli^/" G*" cetera ventnofa, morbumque comitiahm% contra lumbriccs etiam, mn minore^P ^ m t^g resquam Gakg* Ruta Caprariadm* *fw**^t*_xmS*^TM2^w? - , funt Orobi hi Legumna perennials ereMs donata, que LdmZ Gae l tttie efu

N O M I N A .

*Orobanchaceae perennis vernus filiquis erecta, flore purpureo, nob. is. Silvestris purpureus vernus, C. B. P. Orobanche Pannonica 1. Clus. Hist. is-Pan. Pannonica[^] Elysi. Astragalus[^] Colum. Astragalus filifolius vernus, Thai. Silvestris vernus, G<r. Silvestris purpureus major, *Park- Galega^{*} nemorensis⁷/tmilismultiflora, flortpurpurto (srdlbo, L.B. Phaeolus⁷ivd^{*}rum⁷ Hist. Lugd.*

11. *Orobanchaceae perennis angustifolia filiquis erecta, radice Afyrodoli, nobis. Siheftri^{*} Angustifolia radice Afyrodoli[^] C. B. P. Orobanche Pannonica 3. Clus. Hist. Silvestris^{*} angustifolia, Park- Orobanche montana angustifolia, Ger. Orobanche quorundam radice bulbosa (fed inepte, tuberosa did debuit) L.B.*

Orobanchaceae frivaticus perennis latifolia, nobis. Alpinus latifolia, C. B. P. isr Prod^{} Manca is? jeuna est hujus historia in Prodomo Caff>. Bauhini, nam filiquarum difinitionem omisit Vergo nos inimito relinquimus: 'con'jicimustantum> donari filiquis erecte; ialemis imperfecie' dferiptum lefiori offerri, qualis mihi offertur.*

Orobanchaceae Ycusannus filiquis erectus flore pallido, nobis. Orobanche filifolia pallida flore, C^{} B. P. Pannonica 4. Clus. Hist. iff Pan, Galega montana, Lugd. Hist^{*} Arachis latifolia[^] Dd Vide icones in Appendice ad Leguminas*

L E . G U M I N A

Sive

Siliquose Papilionaceae Bivalves filiquis Ereclis

donatae;

Orobanchaceae; Arachidna; Glaux Hispanica, Hedyfarum

Argentum; Herba Viva, Sensibilis feu Mimosa ;

Tribulus Terrestris.

T A B U L A V I I I:

Tragacanth^{} foliis[^] floribus Mingbumc Dngestis, nobis. Onobrychis . 5. Clus. Rift, 0⁷*
. Nigr[^] VicU⁷ fimilibus⁷ nobis- Onobrychis, Ctefalp.
1. B<eticus lanuginosus radice amplissima[^] nobis. Astragalus Bdtticis; Clus. Hist. 0⁷
Orobanchaceae perennis filiquis erectis[^] Syriacus hirsutus rragno flore., nobis. Astragalus Syriacus, Lob. Ger. 0.
3. Alpinus Claviculatus^{} magniflorus, nobis. Anthyllidaviculata[^] Lugd. Hist. 0 .*
Alpinus Helveticus, nobis. Astragalus Alpinus iff 2. Clus. Hist. 0.
Villosus floribus gkbofis, C. B. P. Astragalus 3. Clus. Hist. 0

Arachidna {Foliis Belli, I. B. Q

(L. CordatU, nobis; Arachidna feu potius Arachis Hon. (.S. Acutis, nobis. Mragalus J)ioforidis, I. B. 0

U 2

6. Glaux

- 6. *ClduxHi^amca, Cluf. fJiJ}*. k, \$
- 7. *Hedyfarum argntesm Creticu Profp. Alpin. de exot.* 0
- 8. *Hcrba mimofajrutexftnfbilk mAffi^0*'* £

iMtnor.Q

^TnbvlusnrnfinsCimhfQlhfr^, -cukato^CB.P. Tr&dustmftrk, fyd. £

§.5. OROBUS SILVATICUS PERENNIS

SILIQ.UIS ERECTIS.

Explicatio TabuU oc?av«7 Stfioni*fecund*.

1. **O**robos silvaticus 8c Bsticus laimginofus radice ampliflima, nobis. Afragalus Baeti-
cus lanuginosus. Afragalus Bsticus, Cluf. Hist. Quam
neptelarolus Cufius & transcriptores ex ipfo hanc plantam Afragalum de hominatuat,
viveant sic conulant Botanici doctrinam nostram de Afragalo ejusque nota geiwrca in cap.
5. & exhibitione Tab. f exhibitam) Cubitales & bicubitales etiamque akiores sunt huic
digici (provestiori faltem) crassitudinem iquantas, pentagoni & ang-
moli, du; ubfruticis infar, fubrubescentes & hmaginofi: folia itidem lanuginosa, fepe
mcana, & in ca costamedia regione femper fita, & binatini fibi appofita, veluti pluri-
mms aliis Legumi. dbushujus Seftionis contingit: guftu sunt primumastringente, deinde ma-
ficando fervido: flores copiofi in ciniis apparent Lupiniauc Fabse vulgaris quoad figuram
«niagnitudinem aemuli; fecundum oblongos ramulos & i virgas in superiore parte, ex ala-
rum finibus nascuntur (inquam) flores omnino albi, ferie quadam quasi spicatum digesti,
qui antequam aperiantur & explicantur, ex luteo foris nigricantes sunt: fructum ferre dicitur
in lobis, Phaeoli minoris Dodon^i familibus, parem seu arqualem, quj guftatus fauces,
°s, Stiliugoam inflammatione torqueat: radix pro stirpis magnitudine ampliflima, crassi-
tudinis palmaris, brachi^is nonnunquam, longitudinis cubitalis, qundeinde deorfum ver-
lusin binas v. elternas ramulaum rursus divisa, foris nigra, rugosa, intus Candida dura &
lignosa, ingrati faporis, quaeque aretafla cornu duritie fuperat.

2. **Orobos** Syriacus hirsutus, magno Hore, nobis. • Afragalus Syriacus, Lob. Ger. Part.
1. B. Pereleians & multum rara est haec planta leguminosa quam ex Halepa Syris oppido
prinium habuit Lobelias, postea in urceis pensilibus D. Brancionis Italico femine natam vi-
dit: folia cauliculos, imo & radices impkxu quodam mirabili cum supraquam intra terram
proreptantes gerk: cmin & florum denso exortu ex pediculis fummitate in unum con-
gestorum decore, effigie, elegantia, magnitudine & rubore amoenissimo ornatur; sed cum
bona venia Lobelii aliorumque Botanicorum ex ipso transcribentium non debet aefocian A-
fragalus generico nomme, propter foliorum lobatorum ^ fe u costE me di^ addendum
cauUculorum, r^dicum imo florum papilionaceorum omnimodam cum Afragalus confer-
mitatem. hanc omnia plunns alns Legumyn^us cum Afragalus sunt communia. N
Orobos c^teros frequentes ab Afragalorum classe arceus, propterea quod non
ant noram genericam, veram & genuinam, Afragalus tmveniencra. Vide Tab q'
tetn, ejulque explicationem ibidem, Distufus deducem HS Afragaliciim dofrnam i
• tnmuniafcu) uique variemem fpedficam, ex autopia dedactam, ut clare £V

notat. est rara quam vidit Carolus Clufius in horto Johannis Richzi Pharmacopœi Regij, cui
folia aperiabantur mollia & incana seu lanugine pubescentia, ut Tragacanthæ legitimæ fo-
lia a medicis adherentia, quind...

i: gfeqdemmodocofrz
i'ari extremum cost^ occupante: cauliculus am^ Tn^hrnhr V im^lc^m, tmo
£f lenti, fractu CMffimJ humi fusi, & plenis S, iJ oblongiores ^ M^TM colore te-
ramulos suos alatis foliis onusto profert, & in X_{ia} ? uif C^e TM^m V^ freq^tes
los papilionaceos in unum capitulum siue globum m^ff^ q u e pediculo, mukos flosen-
candizantes gerit: deinde membranae effl f. ij: I^TM^ragacanthæ filio fibris proximis,
nancnpati, siue Hispanici valvulis pares. fczZ? t^m^s. TM nores & Dorycmi vulgo
continentes. A filiquis bivalvibus Ervi anr rw ^omogrscf femnbw rignta Eim familiu
«L uorycmi Hispanici omnino aeroulis, non debet

., Afragalosproprie nobis ficdiftos, & in explicatione Tab. n" a nobis exhibitos locari, multominus Afragahis denominari, quoniam nondon 3r-urfii quagerrella, fed bivalvi & unlearn fen fimplicem leriem feminum continence, ficut videre eft in omnibus Orobi fpeci&bus a nobis hie explicatis & filiquis erefiis donatis. AppeUsAormr impoferum Orobi, *aptius mtafeicentia, quia ommmodam hrbenr. r^^1 filiquis cum Orobis, teiatitjnab cum Afrnigalis, filiquiagemdiaaftccris. C •• omncs, qui hiftorias plant:STUmedidere, tranimifin'eadnos has Sc muirasali 'bi tec Sb nomine Afragali zm Onobrychtdis; ex nota-gciierica liltis a natura dap ncoijgn; iveniunt nomina impofmi/ Hxc, en(iem planta Dominico Chabr3Eo in Sciagraphia & Iconibus. piantaram dicitur Aibagalus quidam montanus Onobrychis fjnibufdatn, atque fie defenbit: multa folia ^b una eademque radice proniit ad Lenciculas aut Tr?gacantha: folia pluririium acccndencta : taillicult interfoliorum alas oriintur dodrantes, lupirii & exiles, ^uadam lanugine obdufti, atque flotculisonufiii Vicifilvcfris iiftar tat caeruleo purpuraicentibus, quosexcipiuncfili(U«pnfilli% geminiscellulis (cmine plcnisconibntes, radix longa 8fcrafliufulca, qnx nintas fibtasSr propagities agit, ramulos dodrantes, humi fuibs, in latera tmittens. Uxc Chabm defcriptio innuit hanc plantam eflc Artragali fpeciem (propter filiquas gemellas, duplii.crii feriem ferpinm in fe continentes, & flores cx csruleo purpurafcenes) diverCamab Afragalo Syriaco Lobelii ceterorumque citorum autorum, cujus filiquae (uti dictum) font bivalves; ergo dux .diftiifta: detcriptiones eidem Iconi a diverfis aothorib- -dhibencc<r, quarum prima denotat Orobnm Imne iioftrum verum & genuinum, ab Uncafini ;aUera Afragalum indigitat, forte Onobyichidem 4. Clufii. Quam p3' onftanc audiores pndifti cum in defcriptionibus tom in nominibus promilcue affife. '5, examintrc leftor ex iis quaedicimus & hie & alibi. I pi as p]antas (dummodo feitecda eildern contemplandi) beillime poterit red ucere ad genera intermedia ex noftra doftrina, fecundum 110tani.gentncam feu te flerameilencialeni unicuique ^eneri a nobis afignatam, non promilcue & confufe, fine regula inrallibiii a natura daca, ciilibet generi indeterminato quodlibet nonun&iipe ineptefatis adtribendo, ut hucufque ab authoribus aftitatum pafium obfervatus.

3. *Orobus* Alpinas clavicolarum magno flore, nobis. Afragalus magno flore, C. B. P. Anthy Uisclaviculata, Lugd. Htc etiameft Orobi vera & gennina fpecies, ut patebit ex ipfius defcriptione. Radicem enim edit nigram, lignofam, dimidium pedem langam, fa-perneinmalta veluti caulium principia divifim, crafliufulca, laminulis corticofo; exquibus foliola multa exeunt, ionga, liurni frata, Lenti familia, utrinque ex adverfo ordine digefta: llores incacumine nudarum* virgnlarura emicant oblongi, lutei: deinde filiqua; oblongif, nigrif, bivalves, in quaruni vertice cenus villas oritur capreolo viticutacve fimilis.

Orobus Alpinus Heivericus, nobis. Afragalus Alpinus & 2. Cluf. Hift. Hie floreeft Vicia aut Cteris fimili, ex tsralco purpurafcente; lobi leu filiqu* Arachi filiqnis fere pares: ergo cum fie bivalvis Cantata, non debet did Afragalus ab authoribus, qui eft filiqua gemella diiplicera feriem feminum in fe continente.

Qrolnts villofus rlorfeus gSobofis, C. B. P. Afragalus purpurens, Lugd. Afragalus, 51 Cluf. Hift. & Hifp. Hie plantila piifilla habet rbfia, Cicematr Lencis modo coca incana: ^uUculos breves, duos, & in his fiofcillos Pifi riorum Emulos, pufillos, purpureos, congeftoeincapkolonn radix tamen fingularis nllam liabet cum Afragalo affinitatem in fill-1^m*j quE non funt gemelli fed bivalves; ergo aptius locator inter Orobos, & Orobus a nobis melius mincupatar quam Afragalus.

Orohfts flvaticos filiqnis pr&pendentibus radice tuberoS, nobis. Afragalus flvaticus, Thalii Cam. in Hort. Male ei Afragali adaptatur norten a Cafp. Bduhino caetcrifque authoribus, cum Afragali non poffildeat notam genricam, filiquam feilicet gemellam. ^ft Orobus filiquis propendentibus uci fupra innumus in capite prcedenti. Vide ejuftem fgturzm in Tab. i^ .hujus Seftionis fecundi ejuftque plantam 6. locofculpcam.

LOCUS & TEMPLIS.

f - *Orobis* dvatkus fe¹ *Batkus* bnuginofus radictamf/liflima, nobk. *Afragalus* B*ticus, Cluf. Hift. In coltibus qmbufdam fupra Ofyfipp^{mm} ^ quoi fagus flavins aikdt, inter vepres obfirvabat Oarliftinus Carols Ctufius ^ atque menfe Septembr' t iruebaf; (teindefub txltumjanuarii infiquemisjn fihofis loch non promt Hifyali, dum Cades pTo^ ifcerettr ^ orentem invmibat idem Chfius.

Cluftu-s. Nosflorentem̄ menfe Maio in Horto Botanico Regio Parifienfi (nobkeundemmonfrani u V. Vefyafiano Robino profepre Botanico pubhco,pr<eceptore noftro digniifimo^anno i 6^jfed femina Juntò <egrè isr Julio perficient em obfervavimus, quamvk contra murum in horto exotica- rum fitu^s^ isr meridieioppo/it us plant abatur.

v. &Yobus Syriacus birfutrmagnofcre^ nobk.* Afragalus Syriacus, Lob. Lugd. Ger. Parks Natales fath eviderje* velfrolatv; nomine apparent: Floret dftateip verfus ejufdem finem ma- turantur femina in'diquii bvoafaib'm, Afragalus quidam montanus Onobrycbk quibusdqin Cbabr&i, fedmale; efl exj.mmrus isrPenuinus Afragain* ultimo loco inter Afragalos asobis defcriptus^feu Onobrychk 4. Cluf. Hi/l.Chabrjeu^ confundit bane plant am cum Ofobo Syriaco^ ap- plicando deferiptionem Onobrycbidis 4. Clufii Orobo nofiro Syriaco.

3. Orobis Alpinx clavatus, magnoflore, nobit. Afragain* Alpinus magno flore, C.B.P.An- thyllk claviculataj Hift. Lugd. In fob macro & fabuletis Alpium aprich gignitur; floret vere> isr femem fuumperficic deflate.

Orobis Alpinus Helveticus^ nobh. Afragalus Alp'mus 2. Cluf Hift. Hie in Helvetiorum Alpibuso atque etiam Pannonickprovenit, tefle Clufio.

Orobis villofusfloribusglobofis, C.B.P. Afragalus purpureus, Lugd. Crefcebat hoec plantuh fecus via* in vinetorum & agrorummarginibuspertotam Lufitaniam &Hiñyaniam; flor^at^prili, i\$ femina edebatmatura Maio.

N O M I N ' A ,

•1. Orobis filvnticus <y Bjeticus lanuginofus radice ampliffima^ nobh. Afragalus Btticus lanu- ginofus radice amplijjima, C. B. P. Afragalus Bsticus, Cluf. Hift. isr Cur. P^ft- Lujitamcus Clufii,Lcb.Tab.Ger.Park,Hift. Lugd. Lanuginofus Btticus, I.B. u TT> Aa

2.Orobis Syriacus hirtutus, nobk. Afragalus Syriacus, Lob. Lugd. Tab. Ger. FarK, I.B. AJtraga- ittsDiofcondkvulgo Cbriftiana radix Rauwolf. (y Luvd CuiusfoUicuUCohiteamdoftiatudv- fientii, femem continent. Eft diverfa Legumink Becies ab Orobo Syriaco, ergo una Synonyma.

3. Orobis Alpinus claviculatusmagnoflore, nobk. Afragalus nutgnoflore, L.V.r. Park* A- fragalus Alpinus magnoflore, C. B. P. Anthyllk clavicular a, Lugd.

Orobis Alpinus Helvetica, nobis. Afragalus Alpinus Helveticus, C.B.P. Alpinus 2. Cluf Hift. fr H#. Polygala C amer. Ep quijalfam nppofuitfi^/fi^ Camafarij e Afragalus villofusfloribusglobofis, C.B.P. Afragalus purpureus, Lugd. Afragalus 3. Cluf. Hift &...

O^Uofusflonbusglobof^nobk. Afragalus villofusflonbusglobof^ CB.P. Afragalus purpureus, Lugd. Afragalus 3. Cluf. Hift &...

HALLUCINATIONS CASP. BAUHINI

Alioramque Authotum.

P... -djtragalm ejufqtrt uariae f... de- ... Cappar Bauhino ... nomie inepte til ... tur, quid ... meUamfeU Unas ceUulas, in quibus ... constant tur fenefeminutn.: atqui bee om>es, P ... fidiquis bivahibus unicamfrien ... orobiproprielo- nentibus,ergo non funt Jfragaltje

nymoadbibeturcumijfragaloviUofo floglobobo;quia jifragahu- viliSfas flore globofo eft Orobi (becies d filtqua continente Jimplicem feriem feu ordmemfemi- nams; atJjfragalus'MQnfteliactojilip... plicem [eriem]eminum continentem i deinde Calbarus Bauhinus fui eftoblitus, bis enim collocavit Afraga- lum Monfyelienfem, femel hiepag. 3?i .& pag^ 34^ col. 1 .pi. 11. affociando eundum cumSecuridacdlue "minore corniculis reflexx, ubi legitur Afravalus Mm- Jpeliacus Cluf Hift.

§.6. A R A C H Y D N A.

Q^V*Jam, utferibit Tbeopbraftus I-Hi/Ln. ex r a dicibus differentia prater prtdifiasfortiun- tur (-hoi •TMU&M**WZWM 7« * ej<uaj hoc eft feu Arachydn* radix, ejvfque quodfi- mite eftAraco: amb& namquefruUum nonminorem fuperno afferunt^i&c. Neutrum auffolium, aut

.folio simile quicquam gignit, utrumque fotbt velut s^{pi}^TM. est, hoc est infra fupdque terram fructumettii. Plimo l.21.C. 15. Arachydna isr Arachos fotiusjracoikesj tec. Vox fac^{Ac}^ v n compafita-v'idetur: i&m enim Ciceraik jpecies est, h<xc folik Js> fruBu refer? ; ^{Wu} vero tuber fignijicat, tu'pifmodi fimilitudinein quandnmru '*ahent.

Arachydna tftj>hni2 kguminofa alata,ideft, enjus filglplk mediis pturima nine dc qxoppofito folia bireftimiea conjugatim adnafcuncu^cor^ • ^acuta,uno extremm claudente, hoc commune ipfiefcuni pltirimisaliis bnjusSecrior^, prscipua differen- " Ipeftifica cbriftitit in odoproduditionisfilidiquaar'urm; namfilidij. .. fupia (^am infra (ttEjragigait, quod altishujus fortisdenegatur, nifi Latliyro cuidam minori fqui minor *(i ?iwpWa nobisdicitur in cap. i.hujusSeftionis)af trifoliotricocco reticulato, Galfoniofrutem paitterfupra infraque terram in filiqnis fuis producente : de poftremodicemus inter Trilbliu arvenfia infra in JiacScftione.

Arachydna^ Vicia? finiilis planta, fupra infraque terram fructam edens, nobis. Arachydna Cretica Belli (quo noruinetotam plantam tranfmifit) Arachydna Cretica fen potius Aracoide- " 1 B. Planta hxc omnino novaelt, cujus femenex Crets Infuls oppido Cy-lonorio Belli tranfmiffum !nIpliam,& facm pullulavit; neqoc ante H0110-ium beiiio... • .quis Boranicus earum plancanim aliquod genus deferipferit, qna: ampiicar->s a Theopliraftodicuru'ur, licet Casfalpinus Dentariifpeciem^quffbulbofaauthpribusdi-irnr, fed perperam ; fobolitra potius & aptius nobis denominatur) Aracliydnam faciat,quae umTheophrasti Arachydna meyquidemiudicio nil commune habet;quumpentaria fit terapetala(iliquofa,rlores &filiquasproducens confequenter, & aliquandoiobolemjoco fi-iquarum: hoc etiamcontin^itLiliorubrobulbiteroatque Alliiquamplurimtspeciesbas,producerefcilicetfimulSffemel rlores &fruffum& (bolem partter, id est, loco florm & cap-putarum producent bulbiOos in fummis caulium alis. Flanta autem lisc utrinqtie(id est fupra & infra terram)fructum fert & ideo merito Arachydna feu potius Aracoides J.Bauhino dicitur.

cet Theophrastis l. i. e. 1 i. Arachydnamauid quod Araco fimile est, foliiscarere afir-
-t, texcum camen corruptom merito quis dubitate poterit. Nam cumTlieophrastus fir-
-cm AracofimiJemdefcribat, aecteest finiilitudinemharumefle aur flons, ant fructus, aut
-foliorum. Aracus veroduplex abauthoribus habetur ot fupra innuimus in doftrinaAra-
-clii,unusLathyrofimi!is,qui per* fcribitur& Lathyrusdicitur, alcer per^ & inter Lentas
-nafcitur. Tefte Galcno l. de Alim. facultatibns, c, 27. filveftre quoddam i'emen rotundum
-ac durum,Ervoq; exilius datur quod & Tlicophrastus, l.8. c. 8. am'imat,an*ercns quod Aracus
-in Lente oriatur, & fit res fcahra. Cum autem planta haec noftra caule & fbliise regione fi-
-tis Lemi fit fimilis, femenque durum, & Araci feminibus non diflimile ferat, Orcho La-
-thyroque minor^ of fructum fub terra, circa radices 8; in caulibusgerat; merito Arachydna
-aut Aracoides dicenda videtur. Ergo non obftante authoritate Dofuillmi & emunfta; naris
-Philofophi, fimul& Botaniccs peritiffimi Cifalpini, quidum Dentariam foboliferam con-
-ftituere vuk Arachydnam, caditcaufa, & doftinam Theophrasti apertceludit; quarepari
-jure non poffumus nosconfitti'- bulbofas plurim3plantas,ut Lilium rubrum Sf AHii varias
-Jpecies(quippe foboliiier?- r;ichydna Thqophiafti, imo & mukas alias ? fedqudmnam
-liaberent cognacionera • item cum Arachydna Theopliraft%nccego, nee quivisocula-
-tus Botantcus p.ercipei it. Ea autem Theophrasti verba, quodfbliia non ferat Arachy-
-dna, ad Arachydnam A riyptiam potius referenda videntur,quam ad Aracoidem noftram,
-jus ita defcribitur. Herda est dodrantalıs, foliis Leguminis, Lentis, velViciis minoribus,
-brevionbus &: cordatis, feu cordis Formam referentibus.pauluhim aculeatis, binatim fen con-
-jugatim/i<^> adhirencibus; viticulis tenuibus conlbac, quorum extremis flores haerent papi-
-lionacei purpurei, ViciE infar, quoad formam- Circa radices etiam fub terra filrquas
-tertparvas,Lentisfiliquis /miles,inquarum fingulis mqdounum,modobinafeminarotunda,
-jügra, alterius vero non nigrum est iemen fed Orobo fimile. At quos fructus in canlibas profe-
-rat,haftenus nonpotukobfervare Johannes Bauhi'nusiplurimis negotiis impeditus, eam cem-
-peftatemanni qua floruit & mu&um tulit non obfervavit. A ruftids «.x»<t*u (vd est agreftis
-Lens) vocaturin Creta. Inter fegetes Sf Legumina invenitur & ncgligitur, ideo vobis in-
-S°itHonotius Bellustantumrructummitto, mictioetiamOrobi,Arachi&-Lathyrifemina, ut
-hoium Lepuminum i" hacInfula nafcentiumdifrentiam commode obfervarepoffiitis. Hate
-Honorius Bdlus. JohannesBauhinus obfervavit fenien nigium, Viciar facivxfimileefle, den-
-tibus

tibus durum attritu, sapore Piforum, medulla idba : cui album fimile forma, sapore & durtie. Ejus figuram ex plianta ficcata quam mifit Konorius Bellus parandam curavimus inquit Dalechampius. Data enim nonprovenit. Iconem etiam Clufii, quamvis falſa videretur, delineandam curavit Johannes Bauhinus. Clufius eandem propofuit Exot. 1.4. c. 16. quam ita defcribit; nullos habet cypreolos &c. Omnes & Honorius Bellus & Carolus Clufius confufe admodum ſcribunt; de hac planta, cujus nomen ſi haberemus recensibile & ex quo plantam integram filicijſ ſupra & infra terram onuftam, producere poſſit, Lathyrus minoris amphicarpi noſiſſi inſtar, toijeret omnem ſuſpicionem. Iconem utramque in hac Tabula exhibitam ab authoribus, ex Honorio Bello Sr Cluſio & Dalechampsio exculpſam, per incuriam & ſupinam negligentiã ex duabus plantis compoſitam, prodiverſis ſpeciebus diſponendam conjicimus: ut ut fit priorem 6V poſtteriorem figuram Orobum melius reſpiciant, & amphicarpum, dici, &c cum Arachyda Theophrasti melius convenire autumas. Locus indicatur fatiſ manifeſte in titulo : floret æſtate; & autumnò perficiuntur femina in filiſ tam infra, quam ſupra terram: de viribus nil apud authores conſtat.

N O M I N A .

Arachyda / *potius Aracoides, Hon. Belli LB. Arachyda Cretica, an potius Arsciaes Theophrasti, / W. Arachyda plant a amphikarpa, an Aracoides Theophrasti, I. B. Aſtragalu* Dioſcoridk quibusdam Chabri in Sciographia Pag. 153. an Araco ſam Theophrasti, Cluſ Exot. I. 4. cog. 16. VicUſimilk plant a ſupra infraque terram fruclum edens C. B. Pyrrhatz? men in filiſ ad radicem, in aliis nigerrimum, in alik Orobo fimile, in alik variegatum. Arachyditidi icon Cluſii I. B. femina VicUſatijſ feminibus familia, (ex Cretid Cydonia ab Honorio Bello miſſa ad Cluſium) filiſ quas habet eretas iy ideo nos Arachydam hie inter Legumina -x & -y3Y & v & filiſ quæ erecll donata collocavimus.*

§ * 7- G L A U X H I S P A N I C A ,

Glaux Hiſpanica, Cluſ. Hiſt. Lob. Lugd. Tab. *Glaux* Dioſcoridis, Ger. tſec leguminofa planta puſilla ternis quaternis affurgit cauliculis, dodrantem altis, gracilibus, incana lanugine pubefcentibus: foliis ferie & diſpoſitione quadam ſecundum longitudinem coſta; utrinque adhzrentibus in Viciae aut Aſtragali modum, mollioribus tamen, ſuperne videntibus, inferne incana lanugine obſitis, guſtu non nihil amaro : flores extremo cauſiculorum ſaſtigio innafcuntur conſerti capituli more aut ſpicæ brevius & obtuſi. Olyſchizae echinatæ floribus forma & colore videntur: radice candida & exilis quæ an vivax fit afferre nequeo. *Glaux* Hiſpanica dicitur, quia miſquam a libi quam ad ripas fluminis Thormiſalmonicam alluentis - Pauli in urbem ad Oſtiffimo Carolo Cluſio obſervabatur nomine vulgari carens: Glaucem Hiſpanicam appellavit idem, qui nuper plantas quæ Glaucis nomine a recentibus defenbuntur magis adamuſ Soridiſ deſcriptioni reſpondent invenit Cluſius. Floret Junio; & ſub exitu Julii aut initium Auguſti femina perficit Locus determinate hac explicatione ſupra. Virium aut facultatum non meminit Cluſius, nee am ex ipſo tranſenbentes authores.

N O M I N A .

Glaux Hiſpanica, Cluſ. Hiſt. Park, LB > *Glaux* Cluſ. Lob. Lugd. Tab. *Glaux* Dioſcoridk, Ger. *Anthyllis ahera Lentifimilk, Vod. Cicen ſi heſt miori aſi, ſi non idem, an Glaux Anguiular*, C.B.P. Quia filiſ non defenbuntur a Carolo Cluſio ceteriſque authoribus ex ipſo tranſeribentibus, an ſit filiſ quæ defenbuntur ut ſunt Ciceri, an erecll, quod nos valde ſuſpicamur abbreviate petiolorum florum, iſſ ideo nullatenus Ciceri affmem condudimus, ut ſupra inter Hallucinations Cas. J. Bauhint. de Cieere aſeruimus.*

§ . 8 . H E D Y ' S A R U M A R G E . N T E U M .

Hedydrum argenteum Creticum Proſp. Alp. Exot. Inter varia Hedydari ſecuridaceae generæ unum Creticum argenteum ſecuridaceae generæ maxime herbariis commendatum, argenteis floribus ornatum

Scē. II V NIV E RS At IS O •\$ O N I E t f S I \$. tot

natum, elegantiflimoque florum candore hæc planta conspicue cernitur: quæ est fruticosa, & flos habet coniplura Ciceris familia, atq; flores argenteos Triblioruri floribus proximos, multos in cauliculis cactimine simul «ongestos, parum olentis, gustu subdulci amarefcente; à floribus fingulis fingula cornicula proveniunt, in quibus fuit femina parva rotunda. Procul dubio hæc planta Hedyfarum maxime asmulatur à Diofcoride defcriptum, hæc præfere & verbis inquit, Hedyfarum (quod unguentarii Pelicinum, id est Secu/idadam vocant) frutex est foliis Ciceris, femina rufum in filiquis fert cactinulojuh<nioib aduncis, quod accipiunt fecurim æmulatur unde nomen accepit, ama/Aim gustu, ite feiarho utile in potu. Ad dicitur in antidota. Nascitur in fegetibus & Hordeis. Galenus addit, amarum & subacerbum aparet, quamobrem potum gratum est stomacho, & vifcerum obftrusiones expurgat. Planta hæc est perpetua & ne vel hyeme se foliis fpoliat, teste Præpero Alpirjo.

§. p. Herba Viva feu Sentiens vel Mimosa foliis alatis, cauli

adnatis, fine impari extremum costæ claudente.

Herba viva diditur, to quod si quit tarn quavis re tangat, flos illico contrahat is fub te* mies fuos ramulos rcondat, fivtroque asphendat, subito licet, adeo marcida conspicitur? ut flaccida is quæ exficcata existimatur^ attamen si quis manum retrahat illico nitenscip }>r*stinum vigorem recuperat: toties marcescit aut revirescit, quoties comj>rebenditur 7 vel manws, aut quodlibet tangens ipsam, ab ea retrahitur. Herba mimosa nuncupatur, quoniam manua mota fenescit, manu autem remota, friflinum vironm istum vigorem recipit^ fed non adeo celeriter recuperat, ut eundem perdidit post aclum: colore est Gfycjirrbiz^, is omnibus notis cum alatis plantæ Leguminosæ, foliis binatim conjugatis costæ meâU adherentibus præcipue cum Acacia is Fcenogrtco convenit, quoad appositionem folie*um, fine impari tamen extremum Jiclaudente, k

Herba mimosa constat singulari radice, non crassa quidem, led duri & lignosa, rarissime raris præditi, à quæ terni aut quaterni cauliculi exhibent breves, & statim in aliquot tenues yargas humi procumbentes & in ambitu fei'c fpargentes diffindebantur; ad fingalos nodos kequentes, longas tenuesque costas agentes, quæque erant cubitalis longitudinis, interdum longiores, teretes, lentæ, quibusdam spinulis latiuscula basi infidentibus prædite, quemadmodum in Rubi ramis videtur licet, minoribus tamen, rarioribus, minusque firmis; easdemque rursus in graciliores ramos dividebantur, frequentioribus spinulis obfitos, quorum nodis inter binas appendiculas alternis exoriebantur tenerrimi ramuli foliolis (bis binatim scè regione obfiti, quæ numerosa ferie quadam, pari utrinque numero costæ mediæ adnata erant, nullo impari aut singulari extremum costæ claudente, tenella admodum & virentia, valde familia Acaciæ foliolis (qua: dum primo prodibant, tenui, incana lanugine pubescebant; ut ex ramulo suis parvis ramulis & foliolis onusto observare quilibet intuenso ipsam plantam poterit: flores papilionaceos ferre (etiam si nunquam apud nos florentem hndbi que conspicere Xicntnt) neutquam dubitamus: filiculas feu capitella in involncris plurimis, tenuibus, angustis, 6c spinulis veluti, producit; Inter quæ femina latent orbiculata, plana, nigra, aliquando subrufa, in medio tumescens, ut videre est in feminibus sculptis. Siliquam itidem longam alterius hujus speciei affculpendam curavimus. Vide plura de speciebus plurimis diversis Herbas mimosa? fco insensitivæ, nupcrime detectæ in App. ad Legumina, quæ impræfentiarum Ieotoyem relego.

LOCUS & TEMPUS;

Hanc plantam ajacoba Gareto versus extremum Octobræ anno 1599. cepit Carolus Clufius misfam ad p j& diclum Jacobum Garetum ab illustrissimo viro, Comite tunc temporis Cumbri, e Infula Divi Johannis apertu diuite Cdifio Porte rico) reduce. Herbasentiola ideffenfitiva feufenfifica Lufitanis nominata. Lin/cot.?. 4. frdti Orientate a 7.

TEMPE-

TILM" -MENTUM & VIRES

Folia Herbae mimosae incisae, odorem herbaceum emittunt, succumque glutinosum seu mucilaginosum, qui inter rem amarum relinquitur, agitatus & deinde in ore detentus sine deglutitione ulla. Tabl. [^] ** Km, qmqtie paiatum parum exficcat : radix faporis est modera tegrat't abfque air M odorisoriiffimirecens collegia ut Allium non folum odoratum of fendir, fidiscu vit, tantaque umvi, utei adftantzmnftUrtQporttat: addtqwdv xia fit trartfpiratorii; mafikata nlidquit in ore pro mdiocri tempore maxvnam ficcita tern. Puto inquit Guiliel. Pifo bane 'plantam maximum damnun gntri bumano adferre cu-F mnhieofi exitiafa., ficut iy ntiqu* omnes plant* mimof* qu & a Guilielmo Pifone & Gebrgio Marcgravio defcribuntur. Parva hujusfoliorumpulvtnfatorum do/is fuffuitpr'ware homi-nemvita, tandemautincihocuttotuporrigendo, isrtamtn bujusfolia impunecomeduntur a pecoribai. Plura dkemus de Herb* mimof* fymebut earumqut virihwsin App. adLegumina.

N O M I N A.

Herba mimosa, viva seu sentiens, &c. nobis. Herba mimosa, Lugd. Eadem figura à Hist. Lugdunensi proponitur, quae ab Acofta sub nomine Herbae mollis seu herbae d. ... vulgo, C. B. P. (Clusius diversam figuram ab Acoftae figura proposuit, herbam mimosam nominans, & melius) Herba viva foliis Polypodii, C. B. P. Herba viva Guiland. Acofta, Lugd. Cui & Herba amoris, Herba sentiola, id est sensifca Lusitanis, Linscot. Part. 4. Ind. Oriental. c. 17. an Æschionomen Apollodori Scalig. Lugd.

HALUCINATIONES CASP. BAUHINI.

Aliorumque Authoram.

P [^] f 319~ H e b f ^{lis Polypodii, C.B.P. & p.} 360. Herb* mimosa folia ^{Fenograti filiostris,} ^{f*PP}
 t < t, fcu -,wi*" > JQ\ dektmtinter fux J < srtKplant/adif~
 Poi, Leeumin* | ««' «*» auteminter PolypodiumS
 Alufium, q*» rum alterant geneti mtiquam accedit;

à nota essentiali, spreta dispositione foliorum alatarum Polypodij, debet hac planta ad Legumina amandari, non autem huc tanquam proles natba & spuria inter plantas omnino nota generica à Herba mimosa discrepantes.

§. 10

TRIBULUS TERRESTRIS.

Tribulus Latinis dicitur, quod siliqua plantaque muricata sit: & ut Theophrastus 6. Hist. 5. Tribulo peculiare est, quod tegumentum fructus aculeatum gignit. Genera duo sunt Dioscoridi. 4. c. 1. [^] alterum trrrifln ^{quis familiare: terrestris} ^{alterum foliis est spino-} ^{inibus, & l. 21. c. 16.}
 Tbcopbrgo genera duo: unum folia Ckerk habet, nuUh&htk, ^{ahamn}
 fts. At Plimpl. 22 c. 10. Tribuli unum genus in honk, ^{ahamn}
 Tribulo urn Ocercul*folia, alteri aculeata tribuuntur.



1. Tribute terrestris Ciccris folio, feminum ^{integumento aculeato, nobis. Tribulus ter-} ^{Terrestris, Clas. Hist. Matth. Dod. & Hist. Lob.} ^{humistratis, pralongis, cubitalibus} ^{quibus adnascuntur alata seu con-} ^{adherentia, Ciccris foliorum more,} ^{gastu cum quadam astrictione: flores ex sin-} ^{orma pares, sed minores; singulis flo-} ^{spinis plurimis stipata, quinquepar-} ^{in quibus singulis latent unum, bi-} ^{na sepius, nonnunquam terna semina: radix interdum minimi digiti crassitudinem aequat.}
 reitnsCicens tolio fru&u aculeato C. B. P. ~
 Tnbulus terrestris herba est mulcis viticulis ^{rel. cum us}
 plerumque prxd. ca, qaosfrequentesnodi diftinguun'.
 jugacimpositafohaexadverfo, numerosa, cofta nSV,
 qu.buspnmo mtaita valde fimUia funt, lubacri
 R^ahslor^ispetiolisinni^flavi, Potency flosibus*
 Flos evanescitibus succedunt singulae fructus capsulae
 titò divisa seu quinque distinctis loculamentis separata,
 na sepius, nonnunquam terna semina: radix interdum minimi digiti crassitudinem aequat.

£ LOCUS & TEMPUS, 4

Tribulus tempus. Vod. Hunc ad arborum femilⁱⁿ quibus Melopej. nes Satmeptk* [feruntur[^] frequentissime reperiebat Car. Chfui hortulank is vinitribuf Ulu valde moliflum is exofum, quon^{tam} fruEtu qua Cquiper maturhatem facile depjantadej^{mis} aculm^{pr}s dito, pedes ilhrum nudigraviter offenduniur. Nos ccpiofe in fjabuletis ad ofi\ wanthnam ficundo ab ur-
lt Rupelienfi lapide iHumoffendimas inter Thiilynamwgufifoliamisr Smilacemafteram; caulicu-
los fuos albinos aut terms cubito\$Immiftrato\$getentes\infabulofi\$ illis aridh isfervide caliJh
J-lio iff Augufioflor atm[^] mⁿfk Septembri is ORobri feminaperfiaentts. Clufi[^] itidem memi-
nitfe olmbunc Tribulum terrestrtm frequenter uefcet nobfervajje in agro Monfy e Julano, zn-
ter Olivet'a, fub ipofitrem m&nibue. Hifpani apud ipfos Abrojos vocabant. Tribuhm bunc
ti^rreflreme/sér<d@vXm[^]pff<p>noluit auda Sier ajferere Carolus Clufius, fcdopt^tme quadrare ajferit
a Uenex Tribulk Tbeopbraflide fcripto I. 6. Eifi. plant arum, *x&a Svideiict, tametfi hie nan fit
valde pdicox hck in quibm Oonte nafcens obfervatur. Apud HiSbanos in arvh frcqueris fru~,
gibus infejus Trjbuhs lerrejlriffit Hr Urr& morbos potius (tefie Plinio J quam inter terr<£ peftes
£"randus: caulkulos ad quinos pedes bumifiratos protrudem nonnanquimxinvmitur.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

ai.^r.-iricenfes ejus decoRum ad P^ttuitam craftiofque bumom incidendds i\$? tvdcv. &ndos felici fuc-
cejfu clyfieribitsinjicipsrdicabant: cum tamen Galenic terream is rfrigidam qual'ttatem Tribu-
htneflri tribuat, Dicfcoridem fequitus: frv Rusejui invinomaztratusis epotu* (cum fit
nnuiumpart^{mm}) isimpofitus commor^{is} avipera opitu-latur; cum vino ttiam aitxiliatur cen-
ira vemna : deco&utn ejut re J>erumpulices meat.

N O M I N A.

libulus terrestris Cicerhfolio, feminum imegumnto acukato, nobis. Tribulus ttmflris CUerk
folio^{fru}Sluaculeato, C.B.P. Tribulus ttrrestrU, Matth.Cord. inViofc.Gefn. Hort.Lacun,
Tur. Dod. Ad. Lob. Cluf Hift. is> Hifp. C*faip. Lugd, Caft. Cam.Park> I. B. Tribulus Theopbra-
fti Anguill

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

TX u f terrejrx cum net flortm papiUonottm,
J[^] tucjijumj / , ntc f f^{um}wumme t eprofert
tdo male d^{ib}onitur mitr Ormthe p dmm & Onebry-
thidemptrfedatgumina -.jitflavin betrtxUta&f*a*
£«a*ni, a foribis pentap^{ab}flavv v. iitap^{py} Sijio
1<mfiar1 & capfufa jpiriofs, quufucpartitit, fi in
7ⁿⁱ rifu oca h^ld i j l i s i & d j j j t i / i -

gula out bina, atiquando ternstmirut ContintritibnSi
Proptr dijjiojiti OBem foliorum alatoritm i regione bi
natimfeu conjugatim pafitrum, & radii fev ntrva
medio ndhartntium[^] Leguminum multorum hit in bat
SeHione contentsram mart, tyfi f ttndem aundms
(nascitnter qua aii> rtfint) dente ajitier ei invenia-
tur locut.

L. E ' t U M I N A

S I V E

ailquot ^aceas.filiquis.gemelHs auplicem feminuni
N> feriem dbntinentibus donate.

C J T V T V.

ASTRAGALUS, - TRAGACANTHI.

§. i. ASTRAGALUS.

ASTRAGALUS (latine etiam Astragalus) Dioscoridi l. 4. c. 57. frutex parvus est, & foliis & ramis Ciceri similis: flores purpurei parvi: radix rotunda Raphani modo grandis, &c. Plin. l. 26. c. 8. Astragalus folia habet longa incisuris multis obliquis circa radicem; caules tres aut quatuor, foliorum plenos; florem Hyacinthi; radices villosas, implicatas, rubras, præduras

T A B U L A IX.

ti.Spkatm Americansfcandem*cautibu4, radke tukrofa donates, nobus. Apios Americana, Corn. Terr. des American* feu Virginian*, Park, O

2.Spicatus Pannonic«s, nobis. Onobrychh, i. wrrt, *rji, Tab. O

Perennh\ Mon J^{pe}rim c^s nohis, Astragalus Monfyelienfium, IB. Cbabr. O

Purpureus velcxrukus*

4. Floribus Vicia majoribus c*ruko-purpurfcantibus, vel foliis Tragacanthæ, nob

5. Floribus Vicia dilute violaceis aut caruleis, nobis. Onobrychis, 2. Cluf. Hist. ☉

6. Annuus } Pe YT^{fi}¥? r } »Wfin*fwb»s, mbi*. Stcuri-
^aperegrma, Hedyfarump, regrinu, ^ Cluf. Hist. i
i 7. Spkatus floribus palUJis, nigrk radih not at is, nobh Q

AJiragalus-

Perennis } -Procumbens vulgark/eufdvefir^nobk. Ghcrrthh n
veftrh, Lugd. Glaux vullLrk Lob /Zrfr[^] &

Luttm vel luHopatli-
dusjiveo-
(broleuatls)

9. Siliquis & foliis rotunda, ve/cam nfaml

10. Monspeliacus pre nobis. Astragalus Monspeli-
ensium, Cluf. Hist.

n. Beticus maritimus } eu rectus, nobis. Astraga-
lus marinus Beticus, Park, Vicia sesamacea Apula
lum. ☿

Annuity

12. Siliquis & foliis hirsutis, floribus parvis, nobis. r. uor
græco silvestri Tragi in quibusdam accedens Planta,
I. B. Cbabr. ☿

'i-MatfiBenfisforusincanisper[ev(:ramib)*r

Tragacanthæ seu Paterion

2. Granatenfisfoliis incaJsciducis/ non deciduis, flore *tio, nobis. O
nor, Ger. & J^e -is, flore albo, nobis, slina Hirci mi-

3. Humilior floribus luteis, nobis. o

4. Granatensi magnitudine par, floribus speciosis purpureis, m^{bis}. O
Humilior speciosior densius ramificata, nobis. ☉

i. Cretensis Idensis nigra, tor

7. Tota spinosa Echinum referen s <nde Echinus krbaceus, nobis. c

f. Exflkatio TabuU nonx^ SeSlk.
#

P^oft dedutticm Le^uminum fen filiquofarum papilion, v*alvium nonScan-
dentiam,tan] filiquis propendenribus quam erefris pc dntar. juuntur mhacTa-
b*ula 9* hujus capkis quihti Legumina, feu Siliquofe Papilto; i jis gemellis & dupli-
--ni femlnum feriem feu ordinem concludentibus do; iatae, Primo uotam genericam fubalter-
--nibus in hac Tabula 9^l contends eifentialem (more folito noftro) affignabi-
--jrancs fihquofas papilionaces, in hac Tabula memorata:, habent folia alata, binatim
--iijugatim cote mediae adhaerentia, unoextremum coftae claudtntc, quod huic generi
fubalterno cum multis aliis in hac Sectioe explicatis & explicandis eft commune ; flores om-
nium etiam funt papilionacei, five fint najoris, five minores, cujufcunq; magnitudi-
nis aut coloris, ficut& reliquorum omnium hujus claffis intermediorum generum. At cum
hocfolodifcriminc intercedente, quod poft floresdeciduos facedat fingul'is filiqua gemel-
\<i icl eft finguhe filiqux font duabus cellulis diftinfK, vel duplicem feminum feriem in fe con-
--"nina,Legumina cetera hujus tribus feu claffis cum redolent, turn maficatione
ici membrana tenui, aut membranacea tunica duplicata difterminante du^
pliciu , ^ . 11 ordinem feminum: atque hsec in genere deSymbolo feu teffera communi Aftra-
"-1"*-"" , in introitu dixiffe afquumjudicavinniEi. Obferuamus omnes Botanicos quotquot
ai hucufque hiftorias generates ptantarm in lucem edtdere, Afragali vocem plnr-
ntis leguminofis adaptaffe, queoiadmodum perfpicue & dare apparet in nominibus
"uis plantis affignandis in fupciore Tabula deferiptis, quE neutiquamdicendi biffent A-
ftragali,iedOrobi, propter rationes illic redditas. Subit ammunjamfummaadmivatiodum
tot doftorum hominum fcripta de re Botanica evolvo, & profundius penetro, perpaucos
finem ukimum rite confidcrantes extitifTe, id eft, modnmrlorendi, capfulas& femina pro-
ducendi, qui in plantis omnibus eft regula infallibilis; nam quarcunq; plants ad eundem
^nodum Horent & capfiks (eminales & femina cortformb producut,procul dubio eodem de-
betit reduci, ibidentiqucollocari, natura«on variante finem ukimum ; noa hacrationedu-
fti, & ex libra nature variis & reitrr.cis ob(ervationibus, non ex libris fcriptis inftuifti, 1?-
pefepinsmeditaudo, complnrmasplantasobferuavimus in vafto vegetabilinm oceanoafirtc
ultimo congenercs, abauthoribLis diffufe fparfas, at^uc diverfis tirulis &c variis denomi-
nombusanomendatoribus, fuis pofteris obrudi, quare obconfermitatem filiquarum omni-
um plantamm in hoc capite diipofitavum, eafdem hue revocavimus, &: in unum caput coa-
jecimus, nonobftante variadenominationcauthorum , qui ferjanndasjunguntSf jungea-
dasl'eparantplantas. Hoc cuilibet dare cernenti, Sc refipifas mecum confideranti appare-
bit,in fubakemi fcuintermedii hujusgeneris Leguminumenodationefeiienucleatione. Brevi-
ter Afragaluscft pknta papilionacea alata feu ioliafua binatim feu conjugatini coftr mediae
adhxrentia prodiicns, & unum impar extremum colras chmdens (hoc commune huic cum
multisSf quafi omnibus hujus Sectiois ftirpibus:) Horipapilionaceo deciduo fuccedit filt-
qlagemtlla^ dupliceniierie- minum in fe continens, & duplici membrana tenui ien tuni-
ca membranacca duplic :a, feparante duplicem praedi&um ordinem feminum.

A o T R A G U L I p E R E N N E S .

A *StragahspcKnnh* fpicatus Americanus fcandens caulibus radice tuberofa donatus, no-
bis. Apios Americana,Corn. Terra: glandes Americans five Virginian*, Park. Hsec
elegans Afragali ippecies ex America ad nos delata, radtcem habet divifam in multas alias
fubrotendas&ohlongas, in medio torofas (Olivarum magnitudine) radículas, & mediia
iibris later fe coha-fntcs ad modum Terrasglandium noftratium, aquibusveris inittofurcu-
Mos feuiirmentamultaviulia, nonvalida, Convolvuli modo pullalantia edir, quibus pro-
ximis quibufcunq; adminiculis appofitis fefe circumvolvit, & illaqueat pedamentis aut
peakis, qiunmiproceritatem fummam (ii fit planta aduka) crefcendo aflequirur : folia
iicinde naictmtur e regioncdifpofita, nuncfepteiu, nunc novem, unoad extremni co-
ft« Kumerum imparcm faciente ;-fingula funt Afclepiaolurn foiorum %««awwfajfif breviora
ni< nnilo quafi petiolo fulciuntur: liores fert papilionaceos, coloris obfeare carnci, vel
•poeius *obbAcyAts* iuliginei iufpicana cLigeftos,quibus fucceditfpica brevis^conliata ex pluri-
bus

bus filiquis gemellis in unlim centrum caulis fcilicet faftigium coeuntibus, furfun fpe&antibus, atque unicuique 3 liqu32 duplex 7ft feries feminum, fepto medio ex duplici viembranula tenui compofito, pr. edi&am feri^n feminum feparante: folia ineunte Autumn V, O&obri aliquando menfe decMunt, cauliculi que tabescunt, ^k: pofttea tubercula Olivaria radices confituentia fob terramadplefr ant, &hyeme tota interquiefcunt & fequente ve:re rege.rminant. Siliquas ex Virginia, a^quo^£bhincannis ad 116s delatas & fpica: in modufh difpofitas pingendas&fculpendascu&imus, quarum fpicam integram & filiquam fingularem apertam danius, in qua duplex feries feminum evideriter apparet. Hsec vifenda le&ori offerimms in Tab.nona: filiquas carterorum Afragaorum, pan rationedu&iexhibuimus, ad confirmandam do&rinam nojtram novam, ex libro nature depromptam, ut judicent #qui leftore>-Botanici, n<5snomina.djverfa authorum data oped, & exmatura deliberatione mutaffe, atque omnibus & fingulis hifce eMem noti generica affe&is, idem ubique nomen genericum. adaptaffe, edo&os ex libro naturae, (uti paffima noDis faftitatum in claffibus feu tribubus plantarum difponendis,) non ex authorum confufiflimorum leftione. Vide Tab. aeneam 9. Seft. 2.

2. *ASlragalu** purpureus perennis fpicatus Pannonicus, nobis. Onobrychis 1. Cluf. Hift. Tab. Hsec Afragalifecundafpecies cubitales plerumque edit caules multos, (fivetufta fit ipfa planta) rotundos, duos, humiprocumbentes, in quibus frequentia funt folia Le-v; iimilia, angufta, hirtuta, feu lanugine quadam obdufta, dena, duodena, aliquando plura unicoftaxextidverfohaerentia, uno impari extremam coftam occupante? guftu amaro & ingrato: ex alarum cavis oriuntur ramuli fimilibus foliis fepti, ex iisdem cavis alis dodrantes exeunt pediculi friati Jiiultos ferentes flores Trifolii florum xmulos, oblongiufculos, eleganti purpur& nitentes, in odros, confertim, & veluti (fpicam trium interdum unciarum longitudinem^ quantem efficientes, nonnunquam etfam longiorem, prfertim quando in femina abeunt idem flores quaebifidis brevibus turgidiufculis vauculis feu tolliculis continentur, duplici ordine conflatis quibus infunt femina exilia, dura, nigra; fapore eodem ingrato forte cum aliis Leeuminum feminibus: radix illi magna, longa, dura, in obliquas nonnullas fibras Me fparsens ut plurimum, ad pediculorum ex cavis alis exortum. Planta eft vivax ac perennis, de novorecentes fibras agens. Vide Tab. ^Seft. 2.,

3. *Ajlragalu** purpureus perennis Monfpelienfis, nobis. Afragalus Monfpellulanus, I.B. Haec Afragali perennis fpecies radice eft lignofa, dura, ci' affitudine digitali & craffiore, longitudine cubitali, dulci, intusalba; cil^is cortex craffus, fubfufcus, antequam e terra erumpi; radix dividitur in aliquot portiones five capita tres quatuorve digitos longa, ut mfi quis profunde fodiat mukaseffe plantas feparatas exiftimet, ex quibus fingulis prodeunt cauliculi fimlices, concavi, rubentes, foliolis vefici brevibus, in mucronem acutum definentibus, pilofis, arefcentibus, crebris, fie ut ad coftam imam adnexa foliola viginti, & unum impar extremum coftas claudens adnumerare quifquam poterit; in virgularum extremitate flores multi, non multum floribus Polygak Gefneri difiimiles, purpurei vel crulei, interdum fed raro albi, non in fpicam digefti, fed conglomerati in fummum apicem caulis, Trifolii florum aemuli, fed majores, quibus fingulis fuccedunt filiquae binas uncias longae, incurvae, rubentes & teretes, continentes femina minuta reniformia in duplici filiqua, duplici ordine difpofita: ut aperte apparent in filiquis fculptis. Vide 9. i' <^/Seft. 2.

4. *Afragalus* perennis floribus Viciae majoribus creruleo purpureo; acentibus vel foliis Tragacanthae czeruleo purpureo acentibus, nobis. Onobrychis foliis Viciae majoribus vel foliis Trifecanthas, C.B.P. Onobrychis, 4. Cluf. Hift. Quartus hic Afragalus multa folia promittat eadem radice, Lenticulae aut Tragacanthae folys proxima, uni fimiliter coftas adhaerentia molliora tamen, & lanugine candicante pubefcentia; lento primum guftu, deinde amaritudinem relinquente, poftremo linguam vellicante: nafcuntur inter foliorum & caulium alas cauliculitere dodrantes, - fupini, exiles, quadam etiam lanugine obdufti, aliquot flofculis onufti Vicix filveftris aut Lenticulas florum magnitudine, colore ex caeruleo purpureo acent: quosexcipiunt iliquas pufilk geminis cellulis confantes, in quibus fingulis lafet feminum ordo fingularis (quod cum adhuc immaturum effet, probe non potuit obfervare Carolus Clufius) ficutin omnibus hujus Capitis Afragali fpeciebus: radix craffimfulca, quaenmltas ex fe obliquas fibras agit; & propagines & ramulos dodrantes humi fufos, in latera hinc inde emittit. Afragalus Monfpeliano candidior, Onobrychis quorundam Chabrxi, videtur mini eadem planta cum hoc Afragalo quarto. Vide App. ad Leg-mina.

5. ^r^/ floribus Vicis dilute violaceis aut cruleis, nobis. Onobrychis flonbus Vicis dilute camileis, C.B.P. Onobrychis fecunda Cluf. Hift. Afragalus hic multesejt eadem radice

dice promitcauliculos vimineos, pedales, nonimnqua- oreTi, ' hnmijufos, crebrisno-
dis dii Ymftos^ ex his coftar exeunt,alata folia duodecir. im, aut oft*/decim, aur plura
ferente5,extu»3 tempernumerumimparemfaciente: proa •indeexa^stcnuespediculi
feu virgulae, flofculos in ipicam conertos,geientes, Pifi a a: floru-fi forma, fed Ion-
geminores, colore dilute cseruleo, vel excasruleo purpui : lii<?e fuccedunt exiles
filiq; duplicate, aliorum more,continente5 pulilluni femenyi. "xma, nigrum : radix mi-
"nimrdigiticraffitudthemfcreaequat, dura, lignofa, contort a, ^Jbc^t f_e fpargens, &alte fub
;am ft condens, rarifque fibrifdonata, quar fumnu partein aliquot capita extuberat, c qni-
^ngulis annis novo3 cauliculos fundit. Vide App.ad Legumina.

Afragalus purpureus annuus peregrinus, filiquis utrinqueferraefimilibus, nobis. Sc-
urm^ca peregrina, Hedyfarum peregrinum, Cluf. Hift. Radix longiufculacumaliquorij
bris cauliculos protruditangulosos, inque ramulos subdivifos ;ex fingulisgenicnls cofa>(-
riunttir, ex quibus fingulis proveniuntfoliola mulca, binatim& conjugaDimex oppofitofi-
ta, Vicia: casterotumque Afragalorum modo, fed nonnihil cordata; ultra 20 aliquandofup'pu-
tantur, quidefinuntin nriicum foliolumextremum cofa»claudenSj atque hoc eft commune
-libushujus claffis, utplurimumcapreolis carentibus: ex fuperioribus caulicorum alis
tculi longi, in quorumfummis extremitatibus apparent tfofculi hiantes, pdpi-
lion^ elli,pares Viciarfloribus, quiCracca dicitur minor: floribusplutibusficdifpo-
fitis, plures fimul junda: fuccedunt filiquaj paululum recui*v£,exunocommuni pedjculode-
bentes,utrinque dentata: Teras in modum, earundemque in medio, nervo lineave enrre-
JS. fupra, infra tantum leviter notatas, atque in harum fingulis loculamentis hinc in-
itributiSjfiinconvexa parteaperiantur,feminageminoverfu apparentcxigua,compreffa,
convexatamen, Lentis colore, cujufeminibusfunt multa minora,leviterque finuata. Vide
Tab. ^"seneaeplantam 8"".

7- *Afragalus* perennis fpicatusfloribus pailidis, nigrisradiis notatis, nobis. Onobrychis
fpicata floribus pailidis, nigrisradiis notatis, C. B. P. Onobrychis ^ .Cluf. Hift. Tab. Afraga-
lus hie feptimus fequicubitalibus aTTargit ramis^reftis, firmis, duris, viritfibus, inquibus
Folia Viciae infar filvefoisfnt, longa, angufta, ducdenaautqiiindena, totidenJexadvcr(bei-
Jem coftKadhjcentia, unum etiam impar extreme coftatinfidet, omnia lanugine funtobdufta;
gultu ingrato&amaro, nonnihil acri: ramuli extremis caulibus exalarum finuprodenntibus
inffunt palmares, & aliquando dodrantales, itriati, qut in (picas flofcolorum, Trifolii flores
Kmulantium, oblongiufcolorum& pallidorum definebant, quibusimpreflifuntquidamradii
nigricantes;hircefuccedebantfilitjuK mucronarat, duabuscellulisconihntes, inquibuslatetf-
men Fcenogrico pene fimile, fed minus & nigrutn: radix ei craffa, dura, lignofa, longa, a-
liquot fibrif donata, candicans & perennis. Vide App. ad Legumina.

8. *Afragalus* luteus perennis procumbens vulgaris feu filveftris, nobis. Glycyrrhiza fil-
veftis, Lugd. Gtycyrrhiza filveftris floribus luteopallefcntibus, C. B. P. Glaux vulgatis,
Lob. Claf. Hift. Craffa radtce nititur hie Afragali nobis fie nuncupati fpecies, propterra-
tiones a nobis fupra allatas, non obtante diveribrum auriiorum parum aut nihil ratiorti inni-
renciumdiverfadenominate, "< iplbrum nominandi formulis fpretis, fie appellavimn?.
Eftcnimhaec Afragali fpeci" a leguminofa, ramos vimineos per terram fpargens, tres
aut quatuor cubitos longi. JS fertili folo interdum longiores, teretes, glabros, fraftu
contumaces: folia infarG.. jirhiza; d ifponuntur conjugation!bus quatuor, quinque aut ftx,
""** impari extremum claudente ("quoft tamen non eft perpetuo) funt ea vero, fi leorfim fin-
contempleris, Pifi filveftrisfoliifamilia, fuperneex viridiglabra, inferne ex vtridi rla-
veicentiaachirfuta/aporcmeundemhabetquemradicibusreliqnonimLeguminumincfieob-
fervamus, non autem dulcem ut funt Glycyrrhizi facivse, ftu vulgaris Germanide radices: ex
folioruraporro alis pediculus circiter palma'ris & aliquando pedalis enafcitur, quj legurtina-
ccos crebrosfloresex flavo pallefcntes, aut potias cum Clufioloquendo ochroleucos fiifti-
n e E: filiquis non minus floribus frequentes, incurva», craife, gemins, 6: duplici ferie feminum
ndorfo fulcatopradita: funt; fi parsprona duplici membranula, hinc unl, illincalteracon-
flata aperiatur, illico apparet duplex ille ordo feu ferief feminnm, qua: diftermtnajitur be-
nificioduplicismembraniftefuiis, plicate, conftituentis dorfum feu partemfupi/iamfuita-
Eam, & claudentia femina, utplurimum reniformia, in hujus filiqua (ficut & in caeteroram ho-
)«scclaffisfiliquis;)Fcenugrxc i minora & : lucida, in quorum fingulisfi»u«feu deliquiumappa-
"E fi^Vi inculpcuric], & ut cernere eft in planta^' Tabul* 9""

9. *Astragalus luteus* perennis filiqua gemella rotunda, veficam referente, riobis. Cicer filveftre, Matth. <Lugd. Silveftre i. Dod. Astragali hanc quinta fpecies caulic;aos complures promit ramofos, 1. uni decumbe. ites: circa quos folia fena, oftona, hinc inde ftam mediam ample&untur, unq; impari cxtiemum claudente (hoc inquam omnibus quali hujus Se&ionis J. egiiminibus caprecjis diftutis feu <*Aa>xc<Wt Theophrasti voce utar eft. commune) fed ambitu folia hujus non func cre^ata, hirfuta tameji: flores in pediculis juxta alas è luteo palt lefcentes conglobatim {kodeunt^ atque fingulis deciduis fuccedunt filiquae rotundas, nonnihil hirfutae, mature nigra>, veficam parvulam flatu quafi diftentam aemulantes, duplici tend", membrana duplicem feriem feminum etiam ut in reliquis derimente; in unaquaque ferie feu loculamento laterali hinc inde continentur bina, terna, aliquando plura femina exigua, pl?;ia, fplendentia, etiam reniformia; guftu Phafeoli, Pifi ceterorumque Leguminum: radix fatis altè demittitur & fependofefe propagat fibrifque aliquot firmatur. Vide Tab. 9^m plantam §^m.

ASTRAGALI A N N V I.

i o. *Astragalus luteus* annuus Monfpeliacus procumbens, nobis. *Astragalus* Monfpri^l. fi-urn, Cluf. Hift. Haxfexta fecundum Tabulam noftram sneam *Astragali* fpecies iaaice nititur cand^da, fibrofa, ex qua emergunt caules friati, cubitales aliquando in pingui folo, at in macro vix palmares, imo vix duas uncias longi: folia pinnata-feu alata, aliorum hujus claffis Leguminum more, Securidacas majoris minora, ad extremam oram fiffa, humi frata. ^liw fpicatim pediculi faftigio ordine infidunt ex luteo pallidi feu ochroleuci, loquendo cum Carolo Clufio; quibus fuccedunt filiqu* rotunds valde incurve, imo parum abeft, quin uterque filiqux terminus feu finis, id eft, pars inferior ex capfula orta, & pars fuperior filiquam terminans coitu feu coalitu circulum efficiat; in fingulis filiquis torofioribus & quafi rotundis & magis incur vis (uti diftum) eft geminus feminum crafforum, quadra ngulorum, rufforum verfus, cum finu feudeliquio in eorum medio, ge*mina m'embranula tenui diffeptus%.

* II. *Astragalu** luteus annuus Beticus maritimus reftus, nobis. *Astragalus* marinus Boeticus, Park. Vicia fefamacea Apula, Colum. Hujus *Astragali* radix tenuis eft, puftilla, flavescens^ ex qua protruduntur caules rotundi, pedales & longiores in hortis, in macro folo vix palmares & fefquipalmares: foliis pinnatis feu alatis & conjugatim pofitis, pilofis, coftae mediae alternatim è geniculis orta>> adhaerentibus donantur; inter alas ex finibus caulium & coftae medi* foliorum oriuntur pediculi breves admodum & vix confpicui, in quorum raitigio in capitulum congefti apparent plurimi flores papilionacei, parvi, ex paldo albicantis feu ochroleuci, atque ftatim Uisfarifcentibus fuccedunt totidem filiqu*, quinz* fen*, nunc plures, nunc pauciores, pro numero florum, gibbofe, torofx, oblongae, vides pilofae, ficcae albefcentes, ereftae, curvo tamen cacumine filveftris Nigellx filiquis fimiles; fifTuram aliorum *Astragalorum* in hoc capite contentorum more patiuntur, fed majoremfic profundiore in dorfo & in pronaparte (fi aperiatu filiqua) interfepiente duplici membrana tenui confpicitur duplex feries feminum, quorum fingula offa fefamacca optime exprimunt, ut videre eft in planta 7^m Tab. 9^m funtque colore fulvo, & fapore leguminofò fi mafcentur, ceterifque hujus claffis conformia, fed majora, & filiquis reliquorum compv tione refpondentia. Vide Tab. 9^{ns} pi. 7^{mini}. Notandum eft iofuper filiquas quinas, fenas fimul jun&as, in Icone hac & Fabii Columni, brevibus aut nullis pediculis faltem confpicuis inniti, & idcirco facile induceremur concludere hujus *Astragali* duas effe fpecies, quarum prior erit hsec jam delineata, altera nobis apparuit fpecies in horto publico Oxoniensi, cujus pediculi ex alis inter caules & folia exeuntes fuerunt biunciales & triunciales, fuftinentes plurimos flofculos ochroleucos fimul in pediculi faftigium congeftos; quibus marcefcentibus fuccedebant totidem filiqux gemellae^ raff^ glabrae, albæ exficcatae, & continentes in fe femina tripio, imo quadruplo prions Vicia Saefamacea Columnae diftae f«minibus majora; unde primo à longitudine pediculorum fuftinentium in fummaparte plurimas filiquas, gemellas, glabras, craffiores multo ceterorum fefamahas *Astragalorum* filiquis, & femine omnium etiam maximo onuftas; concluderemus lubenter hanc noftram fpeciem diftinctam ab *Astragalo*, Vicia fefamacea ditto Columni; hie quippe curtis florum, & confequenter filiquarum pedunculis imo vix confpicuis donatiir; deinde ab hirfutie cum foliorum, tum caulium & filiquarum, jun#a fimul parvitate partium filiquatum & feminum, (cum filiquae majoris nobis obfervati hiciint glabi^ muli^ <? craffiores, Sc quadruplo majora in fefemina concluderint,) nobis & procul d^bio, aliis utrafr-

que hanc Aftragali speciem examinaturis *Afragalus praxeh'it dubitandi,*

12. *Afragalus** filiquis & filibus hirsutis floribus parvis, n. p. b. s. Foenograeco filveftri Tragi in quibusdagi? Scedens planta, I. B. Hie Afragalus palmarie fultitudinis caulibus donatus teretibus, hirsutis, ftriatis, crassiusculis: folia Tribuli terrestris minori Dalechampii paria, perquagi hirsuta, conjugatim cetera duarum unciarum ex caulium genivilis ortu adherent: indidemque fibres copiosae dimidiatim verticillum efficiunt, parvi/palliduli; quorum uniusque succedit filiqua hirsuta in acumen definens, in distichis parvis firmiter, quarum unaquaeque suis undique membranarum confectione feriem unicam cohaerentem feminum Foenograeci mihi fativi multo minorum: radix est duum unciarum, in iterili folio simplex, gractiis. Ux plantula in multis accedit (quoad folia) stella? leguminose, de qua superius, sub finem explicationis Tab. 6^{ta} hujus Sectionis 2^{ta} egimus. Vide Tab. 9^{am} pi.

LOCUS 6^{us} TEMPUS

- i. *Afragalus* > est < 7^{ta} 5^{ta} *spicatus Americanus scandens caulibus, radice tuberosa fonatissima nobis. Apios Americana, Corn. Hie ex America, locis, Virginia is^t Canada, femine celeratissima? (sr in Horto Regio Parisiensis Botanicofatus, floruit; is^t cultus a multis annis esse rependo propagavit, Zlctp- men/e Julio in Hor'to' BUfensi, (sr Parisiensis postea itidem observavimus; filiquas autem a maturitate non perdidit, floribus decidens antequam filiquae efformari inceperint. Temperamentum is^t Vires nos latent, niso quod fapor tuberum fit duki > s, ut ait Jacobus Cornutus.*
- S. *Afragalus purpureus perennis spicatus Pannonicus, nobis, Onobrychis i. Clus. Hist. Onobrychis fycata flore purpureo, C. B. P. Afragalum hunc frequentem inveniebat* Carolus Clusius ad Danubium ripas in Pannonia apud Petronellam oppidum ad viarum margines, is^t frequentissime toto M^o itinere ad Badenenses Thermos, multaque alibi circa Viennam Auftriacam, tam > citra, quam ultra Dravum. Floret Julio is^t Augusto, is^t breviter in fermenfium perficit.*
3. *Afragalus purpureus perennis Monspeliensis, nobis. Monspeliensis, I. B. Provenit hie Afragalus fecus viam in itinere Narbonensi versus prope Gigant, uno ab oppido Monspeliensi miliari, quo loco cum floribus purpureis atque etiam albis observavit Johannes Bauhinus mense Aprili: nos in Tjiacomuni, quae sita est Piclavium quarto ab urbe lapide florentem mense Maio reperimus, femina mense Augusto inter redeundum Pistoriam BUfas collegimus, in loco supradictio.*
4. *Afragalus* < or^{is} < t^{is} < Vicis majoribus ceteris purpureis foliis Tragacanthae, nobis* Onobrychis floribus vicis majoribus ceteris purpureis vel folio Tragacanthae, C. B. P. Onobrychis 4. Clus. Hist. Crescit hie Afragalus quartus in fummo Sntberg Jugo, atque in Etfcheffumfiscopulis, in quibus duobus locis florentem, jam is^t filiquas formantem eruebat Clusius Julio; filiquas autem perfidebat Septembris Propter conformitatem at em in filiquis gemellis, omnes has duodecim ante delineatas is^t scriptas plantas ad Afragalorum classem redximus, atque in hoc Caput. V. coegimus, is^t Icones tamen in Tabula nona quam ad calcem Leguminum in App. Tab. 20. aliorumque ad culpendas curavimus, non obfervante auctoritate diverforum auctorum diverfa eidem nomina sub diversis generibus imponentium. duum a natura eadem not a generica afficiantur omnes, eadem a nobis reducentur, fcil. ad Afragalos, fpretis is^t neglectis diversis nominandis formulis-auctorum, just < pro dolor > tanta multitudine nominum diverforum, h^{oc} ninum memoriam obruunt: quin & partim ineptis & nialia adaptatis is^t nominibus, partim methodo diverfa < & diverfimode confusa, involvunt omnia potius (yobfeur reddunt, quarn explant aut illudant.
- Afragalus perennis floribus vicis dilute ceteris, nobis. Onobrychis floribus vicis dilute ceteris, C. B. P. Onobrychis 2. Clus. Hist. Rata est admodum hxc planta, quam reperit in publica via ficundum orbitas Scewekelis Gotzestorf infra Viennam Auftriacam, non procul a imhoravum oppido, dum Pragam is^t deinde per Angliam proficisceretur Clusius. Floret Junio & Julio; is^t Augusti finiente fermenfium proferebat fuum.*
- Afragalus purpureus annuus peregrinus, ftiliquis utrinque ferridmilibus, nobis. Securidaca peregrina, Hedyfarum peregrinum Clus. Hist. Semina hujus Honorius Bellinus misit ad Jacobum Qortusum, que ipsam plantam observabat nascentem in scopulis apud Sebenicmn llyru urbem. Semine fape fato provenit apud nos: < estate floret, is^t fermenfium eadem exeunte, aus in eunte Autumnop perficit.*
7. *Afragalus pallidus* pertinet floribus pallidis, nigrescentibus viaculis notatis, nobis. Onobrychis !pk at a flosibus nigrescentibus nigrescentibus notatis C. B. P. Hie Afragalus. Clusio confueclufuit ad Hamburgum urbem

urban duobus fufra Pofonium '(vulgo Prefburg^t wdliaribus is adoppidum Fkhmunti^ ad Fifcbamflum^nfutum-, fuitlofupraquantDanubifim feexoneratibpublica irfnid, difdefingula- res plantas, fingulh illis locis dyntaxat eruebat Clufuis fhrentes menfe Mavsgj^i i 574; at- que kimnio pofitQigujlo menfe fanai fed <fgr admum protulerunt, nhnium pn-Pirevid<: Nat^ caducis C magna fttpartej floribus antequam in, fiji quas fbrmanpoffent, itticonjiaciat idem Carols Clufius, pffoita luxuriante pr<x nimiafoli pinguedim is humiditate.

S. Aitragahis lutetts ptrefigis probumbens vulgaris feu filveftrfs, nobis' Glycyrrlnza filvrftv. s , Lugd. Glycyrrb'tzf filveftris floribus luttopakfcentibus^ C. B. P. Repritur <s Sic in Avgliais^ ttraque Germania, is Galfia, pajtm in hchfilvofis opacis is incultis. Floret Ju;no; 4- men maturefcit Augufto. Baftliavidii Joh% B'avhinm extra portam laptdream inter*.

Vulgariter in vniebatur a Clufia in flvU, pTatotum marginibm, in pratis mnbrofis, atq'v Jt- am apertis. »

9. Afragabs lutem annuus fil^uagemella rotunda veficam referente, nobis. Cicerfdveftre, Matth. Lugd. Cicer filveftre 1. Dod. Hic Afragalus 9. in herbofts is incultis prodit traftibui, non mda in Italiafi all'ut, fid is apud Boberns: floret exeunte v're, is <eftivis menftbxt femem ftium perfiat.

10. AftH&Llus luteus annuus Mcnffeliacus proaimh-ns, nobis. Afragalus Monfrehetifium, Cluf. Hift. In Hifyantiplerifqte locis is agris Monfylienfibz ipoatepr&venit.

11. Afragalus hteus annuus Bjticus maritimus refu us, nobis. Vicia fefamea Hie Afragalus vifus Cirinoke, in Regulivinea Acquamena dicla is'feri/fbus aghs AputU, ut teftatur abhs Columna. Floret tneunte ftate; is media fanenfuum'perficit.

12. Afragalus tutus annuus ftliquis is foliis birfutis ftoribuiparv'is, 7iobis, Fxnogrx Tragi in quibufdam accedens planta^ I. B. Hie puftillus' Afragalus repertus circa Moti^Jl, ad Epifcopi Monfpdim fcaftillum, lapidtcirciter primo ab urbediftans, in loco arido. V'fx. unain aut alteram plantulam obfervavit-atque collegit Johanns Htvrieus Cberlerus 'Job.. Baubinige- ntr. Floret eademcu'mpr& diftktmpeftate, atque exeunte ftate femina maturaxdliguntur.

. TEMPERAMENTUM & VIRES .

- acultatum aut virium mdla fit mentio apud Auihores, nee qtticquam de viribus Afragahrum h- rufitkhaut aliis quibu/libet illic degentibu* uhivarU h* Afragaliffecies colleti* fuere intll- ligtrepctuit Clufimjliive aut bores qui eadmdem defcyipfere; is ideo pecoripafcendo aptos is ido- wos bos omnes Afragalos folummodo ancludimwi, dvnee diligent ioritrutina examimntur.

N O M I V A.

1 Aibi%i. \uspurpurewferennis SfUatus Amtrkamtt fcandens. caulibus, radice tukrofa dona- itL "uobk. Atids Americana, Com. Terrsglandes Americans feu Virginian*, Park, AfttWus purpure:* pennnh spicatus Pannonk™, nobx. Ombrjchkkkata flmpurpmo. CEP Cer Park- f-&- Onobryebis, i. Cluf. Hift. Tab.

3. Afragalus purpureus perennis Monfpelie° «0s, nobis. Afraget-'i Monfyefulaniu, I. B. is Cha- bra. aphia & Icon.

4 A&^S pureus perennis floribus Vicia majoribus ceru. fentibus velf illis Tra- gtecanth/nobis. Onobrycf ribus Vicia majoribus ceruleo-p. afcmribu* veifolio Traga- can' b. C. B. P. Onvbrycb^ Cluf. Hift. & Pan. Tab. Ger. Park.

5. Afragalus ferem * / " £ < * « < f * f * * * « \$ * - Omb Onobry fib fibu. V U datur ruleis, C. B. P. Onobrych Uz. Cluf. HiJU is Tan. Tab. Ger. Afragalus quidam montam Onobrybis aliis j B Flores funt dilute ttrukiyd exctruhoptu purafcents

6. Afragnlus purpureu* annuus peregrinus jthquis utnque fen*fmtilbus, n<Ms. Securidac* peregrin. Hd funt peregrinum Cluf Hft Sicuid«ca peregrin Clufti, Park, Securidaca ninque dentatis, C. B. L. ieemdae plants demons, Cer Seolope''' a, Certufi. Lunanaradiata Robini, I. B. dim Upxtmimf, Certufi. Lunanaradiata Robini, I. B.

7. A us peren us ifuatm j, nbuspa Utatis, mgm fadiU notatis, nobis. Onobrych ijcata iwiouspanws, nigrnr adv* notary C. B. P. Onobrychii 3. Cluf. Hift. is Pan Ub. <fer.

B-AfragaW, hteuspvenni, P^umbens vulgansfu^p-^ mhis^ G/ l^ fihejlris flo- rihus luuopalkjcrntibus, C. B. P. ^ p r r h j f i ^ - ^ j ^ ^ ft. GlaxxvufJ, is, Ad. Lob. Chf^ift. l^um^eumfiheftrefeu Glycyrrbiza fthefti JLfd*m, K8 K-num

d. in Diofc. & Hift. Thal. Hedyfarum, Glycyrrizatun.

9. *Afragalus luteus perennis filiqua gemella rotunda vejlcam referente, nobis. Cicerfilveftre, Matth Lugd. Cam. fcer. Park, Silveftre herbaridrum, Ad. IM. Cicer- ft hejlre I. Dad. Lugd. Tab. Sil- Tjefirefoliis mpngis hifyidis majus, C. B. P: Cicer filveftre multifolium^ I. ij.*
 lo. *Afragalzutpūteu* annuu* Monfyelienftspracumbe'ns^ nobis. Afragalus Nbnfyelienfium^ Clufi Hift. Hedyfarum minus^ Park- Hedyfarum alterum, Dod. Lugd. Minus, ijgd. Securidaca minor, lutea, Ger. Securidaca alt era feu minor, I.B. Securidaca lutea mīnor cor niculis reflexk., C..B. P. Securidaca miner, Matt}). Ad. Lob. Cam.*
 ii. *Afragalus Mem annuus B<eticus maritimus retius, nobis. Afragali^ marinus Bdeticus 3 Park. Vicia fefamacea Apula, Colum. Daturi? alia hujus ficies floribus longis isconfequen- *er filiquis longis, palmaribus { \$• fefquipalmaribus pediculis innitentibus in horto Botanico publico Vniverfitatis, qudmihī apparet perfe & I diftincla Species à pr& difto Afragalo, cujus i*flores is?fdi < {u& Cut apparet ex Iconibus Columns, isI^rkinfonyi hullispentit nitimtur pediculis contycuk, fed immediate arSie alls caulium is foliorum capfulisfuis quafi an- necluntur, nofra autem foecies fili' quas gemellas Column. It magnitudine longe fuperat, nec eaf ciempilofoi haj^et, cujus filiqua magis accedunt filiquis Afragali marini B<ztici Parkinfonyi quoad glabritiem is craffitudinem, differunt autem ab iispalmaribus pediculis fuftinentibus flores antece- Jetiteris confequenter plures filiquas. Cura eft pofteris examinare qu^ jam dico, qui ex autopia Bdtiuiy Apuli Afragali percipient efientialem different iam nifime animus longe fa Hat.*
 12. *Afragalus luteus annuus filiquis is foliis hirfutis, floribus parvh, nobis. Fosnoqr^ ofelveftri Tragi in quibufdam accedens tanta, L B.*

HALLUCINATIONES CĀSP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

t. *Stragalu Spurpleiis perennM Jpicatiis America- Jf^ nvs fcandens caulibus, r a dice tuber of a dō- nati@, nobis. Apios Americana, Cornut. Terraglan- des Americana feu Virginians; Park^ Varij varin & odis authores platitis fuis primo defcriptis nomina impoftere, fine ulla confideratione finis ultimi, id efi, florum, capfularum feminalium, & ipforum Jetinum, quibus perpetuantur Jirpes cujufcunque generis, aut foeciei, fie h primo errante authore, cateri ornese- jus fequaces author es err are (blent. Jacobus Cornutus qui deplantis Canadenfibz libelium [cripfit & obfer- vando tuberosas primi hujus AJragali radices con- fort flescum Terrce glandibus feu Apio leguminofa vul- gar i nofiratefic nuncupavit ut videre est inter nomina. Confimile ei Parkin/onus itidem cum prteditd Jacobd Cornuto indidit nomen, uterqve vero erravit. Si pri- mus filiquas gemellas duplicem feminum feriem in fe continentes obfervaffet, aut notam generic am Afraga- li cognoviffet, non hoc nomen huic plantae legumino- se indidiffet, nee alter eundem errorerr feu tap/um tomiffiffet. Data £? pofita nota r mricauniufcujuf- que generis, tam longe patens, quam inter medii ex- t^ n^ aturcc obfervata jacillimum impofterum exit cui- vis Botanico mediocriter in re Herbaria verfato, plan- tēis met bodice dijponere, eafque ad claffes fuas, qua- rum gerunt tejjeram aut notarii generic am reducere, bac ratione nos edotti a primo intuitu hujlt Jiliqu* gemelU, duabm cellulis femina in fe continēts, eu? idem cum cater is, in hoc capite ipfi congeneribus Afraga- līs diftofuimv, nulla habita ratione denomination- nis praditorum duorum authorum. Idem pajjim in hac nofra do Brina pceftabimus, obfervando quantum pe- nes non est duUum nature?, (3 regula M ab ipfa pr#- fcriptam non variantefin multumim.*

* *Afragalus purpureus perennis jpicatus Panno- niis, nobis\ Onobrychis ficata flore purpureo, C. B. P. pag. 3y'o. col. 2. p. Lvi 11. Ger. Par^ L B. Onobry- chis L. Cluf. Hift. Tab. H^ plant a est fdiqua gemel- la ap Zc & t Jfrie mfe 7P^ m to fe cōntrierucc donata, er- gp Jure est Mraguttis, nee Onobrych. bis diet meretur primo aj Carok fldpō, nee a cateris auctoribus ipfutri*

fequentibus, propter rationes in cap. de Onobrychide assignandas.

4. *Afragalus perenni floribus View majoribus ca- ruleo purpurascens vel Tragacanthae foliis, nobis. Onobrychis 4. Cluf. Hift. & Pan. Tmb. Onobrychis flori* bus Vicia majoribus caruleo purpurascens, ve I folio Tragacanthae, C. B. P. Pag. iji. col. i. pl. xi. Est Afragalus h filiqua gemella duplicem feminum Je- rietin continente, ergo male primo a Carolo Clufio, de* inde a ceteris aucto- ribus ipfium fequentibus, Onobry- chis appellatur.*

? *Afragalus perennis floribus Vice dilute czru- leis fibris, Onobrychis 2. Cluf. Hift. Tab. Qer. Qnohychis floribus Vice dilute czruleis, C. B. P. Pag. fji. col. 1. pi. X. Est Afragalus a filiqua gemella duplicem feriem feminum continent e, ergo male primo h Carold Clufioy deinde a cater is auctoribus ipfium fequentibus, Onobrychis appellatur.*

d. *Afragalus purpureus annuus peregrinus filiquis utrinque ferre fimilibus, nobis. Securidaca peregrina & Hedyfarum peregrinum, C. B. P. Hift. Est Afragalus a filiqua gemella utrinque (err ce finiili, duplicem feriem feminum continente; ergo est congeneribus Leguminibus Afragalīs conjungendus hie Afragalus, non vero Hedyfaro vel Securidaca propter rationem fu- pra allattis, tit cap. 3. Tab. 6. ejufque explication*.*

7. *Afragalus luteus perennis ficatus floribus pale- lidis, nigris r aditis nbtatis nobis. Onobrychis 3. Cluf. Hift. 6 Pan. Tab. Ger. Onobrychis jpicata floribus pal- lidis, nigris r ddiis notatis, C. B. P. Pag. 3so. col. 2. pi. ix. Est Afragalus a filiqua gemella duplicem feriem feminum continente, ergo male primo a Carolo Clufioy deinde ab auctoribus ejus fe quad bus nomiva- titur Onobrychis.*

8. *Afragalus luteus perennis procumbens vulgaris 7 nobis. Glycyrrhi^ a filveftri, Lugd. Hift. Cam. Glycyrr- rhizae filij filibus luteo palefcentibus, C. B. P. Pag. 392. col. 2. pl. 111. Est Afragalus a filiqua gemella duplicem feriem feminum continente, ergo male est Glycyrrhizae! Primo Clufioy est filiqua gemella vi pradita unicata feriem feminum continentis, fe**

cundo admodum dulci confat Glycyrrhica radice, ter-
 ti o eji Herba subfruticosa, eijcia, aha, qtiibus om-
 nibw dejlituur Glaux vilgaris Clujii: at Ajtrn-
 gali ei convenit nota yubaltema generica, conjlituens
 Ajlragalum; er^o mak Glycyrrhi^e ajjociatur. Por-
 ro nominatur Fanfim g^ecum, Dodoncco: Polygalon
 Cor do in Diofcoridem: x^edyfarum Glycyrrbi^atum
 Gerardo; fed nulla harum denominationum generice
 convenit buic, prater Ajtrnfi ndmen^a nobis ajji-
 gnatum. Vide doilrinamnojtram Jupra de Hedyjaro,
 G? infra de Polygalo & Fcenugrap, qua funt plantce
 generice omnino ab hocnojtro Ajlragalo difcrepantes.

p. Ajlragalus luteus per ennis filiqua gemella rotun-
 da veficam refere? ite; nobis. Cicer Jilvejtre, Matb.
 LugdXamMer. Parj(. Cicer Jilvejire i. Dod. Lugd.
 H(ft. Tab. EJI Jiliqua gemella rotunda veficam ref-
 rente, duplicem feriemjeminum continentej ergo? ion
 eji Cicer ut jupra comprobavimus cap. i. inexplicati-
 one Ciceris, Jed perfettus efi Ajlragalus d notis fuis
 effentialibus.

10. Ajlragalus luteus annuus MonfJ) elienfispro*

'Cumbens, nobis. Securidaca mimr^e, Siathh.^ „Lob.
 Cam. Hedyfarum alterum^ Dod. Lt ^d. Eji Jiliquage-
 mella uuplicem feriem feminum CKjtinente s ergo non
 efi Securidaca feu Hedyfarum. Cz^ hie cap. 3. bujus
 SeUionis & explicationem Hedyfar, Jcu Securidaca.

11. Aftragalus luteus annuus Baticus maritimus
 reftus, nobis Vicia fefamacea Apuld, Colum. Eft
 Jiliqua gemella duplicem feriem feminum continentes
 ergo efi Aftragalus. Omnis Vicice filiqua efi bivalvis,
 continens unicam feriem feminurit^ aliorum Legumiriuv*
 vulgarium more s ergo male denominatur Vicia r
 Rijjimo Fabio Columna, cujus nonpojsumfar
 ri jupinam negligentiam £? incur iam, dum li .
 # leguminojc Cytritic & fat is nocte, capreolis don *#>
 & Jiliqua fingulari bivalvi ajjefit, hancfuam plantam,
 Apulam ajjibeiat.

12. Aftragalus luteus annum fdiquis & foliis hit-
 futis, floribus parv£, nobis. Fwnugraço jilvefri Tra-
 gi in quibusdam accedens planta, I.B. Cbabr. Exa-
 mine tur fili qua bujus, num Jit gemella,

Rxc omnia Legumina fupra allata inhoccapite, quum filiqua gemelia duplicem icum
 feminum in fe continente donentur, Aftragali nobis funto: cumq; fub codem vexillo militent,
 idcirco eadem ad idemnovum genus confituendum elegimus, atq; ex lon^e peticijs & diver-
 fislocisfeucapitibusCutobfervare licet exPinacisCaftp. Bauhini, aliorumque auctorum, va-
 riis denominationibus) in unum hoccaput collegimus, d filiquis gemellis duplicem feriem
 feminum continentibus; junfta forma feminum officula fefamacea feu fefamoidea articu-
 lis digitorum pedum fubftitata referendum-, Legumina fefamacea feu fefamoidea aut A-
 ftragaloidea filiqua gemella, aut melius & brevius Aftragalos nominavimus, addita nota
 generica, viz. filiqua gemella, duabus cellalis diftinfca, femina in fe concinente/eu filiqua tri-
 angulari, ut plurimum curva, inflexa falcis inftar, duplici membranacea tunica ^m^ du-
 plicem dirimente ordinem feu feriem feminum. Nee hucufque norim in tot a fe^^^
 minum folliculaceorum, h^Seftione contentorum, V>^J^L^m primo intnitu filii-
 juftanhaedetexerit, quam facillimfc poterint eadem p r, x d ^ z ^ J
 qirar^m gemellarum, adjefla fpecifica, qua diftinguantur a f... nota.

§ 2. T R A G A C A N T H A feu O T E R I U M.

T r<rt< ViridPinam vertit, isr Tragacant. herba isr fjus lacrytna di*
 citur: -mafcondit^c. g. ^... tenuia, inter qu* actidei feje
 cali humiles, robusti, latiffime fufe; & in ipi isfoi; oia numerqfa, uofa fer-
 proterunt uosi Plaoccutuw, *amidi, firme re Clique. TheopbraJloy.Hi.Jl. i.lacrymam
 9 IM i* i^S large in Arcadia nafcitur, nee deterior Cretica exijlimatur^ fedetiam vifupu,
 9. kiñ I^i-c. 2i Cretagignit is Tragacantham^SpTUt albradici multum pdtktamawa
 Medos, aut inAchaianafcentil Sed de lactyma alibi agitu, infra,
 n07^ov fecundum aliquos ditlum, quia ptux herbapaludofum riguumquefolium amat: & w
 csw, quod nervis arnica fit. ViofcorUefl^c.ij. Poterium tones Neuradavocantjruhxgran-
 Ji^efl ramuti^lon&->TMolUbu4, lonmodo lent* acfauilibts, tenmbn, Tragacanth* Proxi m^i:
 fabis ovro parvis & rotundis: totus autem frutex tenui lamofa lamugine obducitur, efi que spinis
 horrida: flores funt parvi & candidi: radices videntur ternumque cubitorum, firme & nervofe. que
 proxime terram recte lacrymam fundunt gummi fimilem. Plinio l. 27. c. 12. Poterion aut Pby-
 nionaut Neurada, qu* eodemfere mdo dejenpftt, nifi quoclfm dicat Ionium her bacei color is: a?
 I 25. c. io, elflorefparvostnbuit.

Nota generka Tragacantha; Afttgalisaffinis^{quo}ad liliquas esto haec. Tragacantha est fubfiutex legumirfkius, flores edens papilionaceos, P^j aliorumque Legumin^{im} more, quibus fingulis, live^{*loris} albi, five Intel aut luteopallidj, purpurcive, liccedk filiqua gemella dtiplicem ier-tm feminum coiiritens: deinde quod est multis aliis Leguminibus["] commune, (ingulae foliorum cbfbe media^{*} muliis foliolis albicantibus, feyincariatanugineobduftis, & e regione oppofitis ornantur, nullp impari extremum claudente; fed loco folii impariif, cofta definit in ipinam longam, qua[?] verfus mucronem in aculeum acatiffimum & pungentem dcintt.

Tragacantha Maffilicnf3 foliis incanis perfeveraribus feu noft deciduis, flore albo, — riobis. Tragacantha Maffilicnfis, LB. Tragacantha five Hircifpin, Cluf. in corah ad Dodonaem Gall. Suffrutex lic est virgis mediocriter craffis donatis, extremum verfus magis craiTcfcentibus, iifque albidis five lanugino/is, ex quibusquamtim prodeunt coftae longar, rigidr, candrdi, quadrantales & infcffe, quibus fingvtlis hint inde conjugatim feu [linatimSf ex oppofico adnafcuntur mulra fbliola, incan^{itidem} latrugine obdufta, atque liujiifmodi coftae mediae gerunt pungentiflimum aculcum; & ex toliofurri & cautium aHs novi ^rtinciir pecioli fuftinentes nmerofum gregem papilionaceorum **florum** alborum, fioribus Gejilafc fimilium, qiioad figuram & iormam: quibtis fuccedunt filiquae craffis fatis, fed turp, duplici Ioculamento diftinftae, & feperatse ccnui & duplicate n#mbrfl2. Huic Adverfaria Lob. tradunt radicem longam, lignofam albam, cr'afitie digiti unius, prolixisfle^{*}H.a.s.ln bter liunmm fubmerlam. Vide Tab. 9["] pi; 10["].*

2, *Xragccantha* Granatenfis Foliis incanis cadncisfive deciduis, flore albo, no'bls. Tragacantha altera, Cluf. Hift. Spina hirci minor, Ger. Tragacantha: priori circa Maffiliam proveniente fimillima est hae planta incana, fpinofa, & fruticofa admodum, mtiltospedafes hahenscauliculos, flexibiles, htefefe diffundentes & candicantes, & dum adhucterielli func laniiginol[^], multis Idngiscoftis canefcentibus, ad extremum infpinas longas definentibus; quibus cofttsbinatim & conjugatim foliola inefnaLentis aut prioris Tragacanthae lmgula, exrgua, candida, & ctiam lanuginofit, duicis laporis hafrent: foliis ijfdemhyemedecidentibus, Loftaefcanervi ilti medii quibus foliola pmlifta nicebanEnr, in rigidas & acutas (inquam) ipinas evadunt, ut eotemporephntatofine foliisconfpiciatur, contra quam in Tragacantha priore, quar hyeme eti^m folia rctinet, nee cadem abjicit, donee nova recurrence anno acquifverit: turn demum deciduis toliis vetaftls, nerviilli medii in fpinas abeunt: loco folliculorum itliquis curtas proferebat, folliculis bombycinis fimiles, duplici ccllula diftinctas, hinc inde perpaucafemina in tc continentes: illorespapilionaceosalbos, nanmagnos, protrudebat, ex relatione incolarum circa *Guadix & la Yenta dperd* in t>ranatenfi regno^{*} in collibusex arido & inutili folocoacervatis. Florentem non Vidit Carol. Clufius, fedeodem cum praedicta Tragacantha tempore florere verifimile est. Vide App. ad Leguminaj ubi fe-

ntium harum Tragacantharum (5. exhibentur Icones.

3. *Tjagacantha* humilior flori['] bteis, C. B. P. & nobis. Tragacanthae alternm genus Rau\alfii, Lugd. Hift. App. pap jigreffis a monte Libano inter defcendendum tria nobis occurrerunt Tragacanthas ger quorum primum fuit cujus memintt doftiflimus Car. Clufius, & venvidecur fimillinx iterum, ilU humilior, form Scamen[^] afpectu, & habita hand uiny nil[^] fyfi quoj flores flavefcant, ex rotundis & fubflavis tanquam vafculis exeuntes, & per tenues furculos utrinq; impari exortu fint difpofiti.

,'^-L. A' [^]in^/TO/Jmagnitudine par floribus fpcciofis purpureis, nobis. Eft altitudine & ftata rafimilefecundo, ramos habet denfos, oblongos, colore fufco, in quorum verdce capitula multifubalbida vifuntur, qualia funt Poterii, cum floribus purpureis oV fpcciofis.

5. *Jragacantha* humilior fpinofior denfius ramificata, nobis. Tragacantha altera feu Pocerioden/msramificatun], [^]rofo. Alp. de Exot. Altera hxc Foterii pknea ramis nigris in latum diftunditur, eofque & brAes habet & c longc plures, & fpiilbs, ita ut in plants ni-
/ **hij** **yacsi** appareac; a ramorum cimis proveniunt fpica; horridae^{Sf} veluti fpinis crebris, den-
» fis totaplanta est undique ftipata, ut tota ipfis planta tegatur, Bf nulli rami extra folia & fpinas confpiciantur; cima eciam memneslanugmefpiffainrarftae, l^{tior}cs apparent. Hic fruceparvus, incanustotus, per terram ^{*}parfus, terram ipfam artingit, & vix eterrafefc crtgit; ipfufque rami fubcer fpinas obruti nigrefcuntic fubtiliores font.

6. ^{*}J5g2af? Af pretenfis aut Idcnfis higr, tota echinata, nobis. tragacantha altera, PrjTp. Alpin. de E • Hsc plian Eadcgahscx Crcta trifula pro Tragacantha altera ad Profpe-
rum

rum Alpinum miffa; radic'e nitebatur longá, crãflã, lignofã, colore nigrã, à qua qnator aut plures exeunt caulés riigri, Fotundi, duri* ligrfofi, qui in complures ramtjiosdividuntur nigros, breves, fabtiles, tótos fpinis amis armatos, fed in fummitatibus hab|n£ fpinas quafdam germinum infar, multis foliolis parvis, tenuibus, ex unã tantum parte pr^ditas, in quibus furculorum fummitatibus flores parvi, priosis Tragacanthse itidem proximae. Totahaec planta eft veluti fimilfs Echino: radix infipida eft, fed aliqaantum quafi odorata. Petrus Bellonius Ccenomanus hi fuarum itinerariarum obfervationum lib. 6. in Ida monte duo. Tragacantha? genera inveniffe & obfervaffe ait, quorum hoc eft unum.

7. *Tragacantha* tota fpinofa & Echinum referensunde Echinus herbaceus di&a, nobis. f ragacantha altera humilior & fpinofior Echinus difta, Profp. Alpin. de Exot. Hec eft planta parva jichini terrcfris magnitudine, & figura tota orbiculari terras inhatts, vix palmarem akitudinem fupra terram eminens, atque radicem ufque ad furculorum medietatem terra: affixam habens; in parte interna qua terrae adhacret, apparent ramuli breves, fubtiles, nigri, multi denfe fimul ftipfti a multis parvis tenuibus fimul conjun&is terra occultatisproficifcentes,definentes in fpinas parvas, breves, acutas, tenues, albicantes, in extremo ftellatim compofitas, nudas & fpoliatas foliis, unde fuperficies partis extiliae non plana fed ad rojnditatem inclinans, cernitur tota fpinis denfiflime ftipatis & undique horridis armata, quae fpinaeexgerminibusramulorum, qui innumeri funt, in orbem ftellarum modpdefiientes, totam fuperficiem complent ex germinibus; numerofti fiofculi papilionacei, ac veluti Hyacinthi floribus fere figura fimiles, led long&tamen minores quibus thecae parvs, oblongje, & geminis cellulis praedita, (ut in altera praecedenti Tragacantha apparent,) totum Echini dorfum exornant. Mirabilis natura quae Echinum animal herbaceum produxiffle vifa eft. Non Echinopoda Echinus hie vocari debuit, cum Echinus in orbem diffundatur atque multiplicibus fpinis minoribus & denfius difpofitis confitet: fiofculi denfius itidem pediculis purtis innituntur: filiquae parvaj Tragacanthae filiquis pares, gemellae funt, & duplicem feriem feminum in fe continent, hinc unam, illinc alteram; at Echrtopoda aculeos raro difpofitos in ramis habet, & filiquas* parvas, bivalves & breves, propendentes, & fuccedentes floribus parvis papilionaceis luteis, ergo Echinus eft vera Tragacanthae fpecies ex communi confenfu Profperi Alpini & amici fui qui plantam ipfam ex Creta ad ipfum miffit> Hanc plantam Grasci *Colofcirrbida* vocant.

LOCUS & TEMPUS.

1. *Tragacantha Maffiliensis foliis incanis perfeverantibus feu non decidulis, flore albo, nobis. Tragacantha Maffiliensis, Joh. Bauh. Circa Maffiliam & ad ipfius oppidi pomerio & in illis Galliae collibus maritimis ad Auftraum, teftè Lobelio. In Arcadia, Achaia, Media & Creta infula copiofe nafci ferib that Theophrastu*.*
2. *Tragacantha Granatenfis foliis incani* caduch, florealbo^ nobvs. Tragacantha altera Poterium forte Cluf. Hijl isr Chabrti in Sciographia & Iconibus in Granatenfis regni collibus, ar? do is inutilifolo nafcitur? teije Carol Clufio, & circa defcenfum ex monte Libanoprovenit, teije Rauwolfio.*
3. *to^4" In ufdem lock cum priore fecundãproveniunt, teftè Rau::olfio qui 2 isr 3. 4^m inter defcendendum ex monte Libano reperit, Vide Bft. Lug, in App.pag. 32.*
5. *Tragacantha humilior fyeciofior denfio* ramificata, nobis. Tragacantha altera feu poterium dterum denfius ramificatum. Profp. Alpin. de Exot. in Creta Infula ex qua fuit miffa ad Proberum Alpinum.*
6. *Tragacantha Cretenfts aut Idenfis nigra tota echinata^ nobis. Hujus natalesfunt Creta Infufa & Mons Ida.*
7. *Tragacantha tota fyinofa & Echinum referens unde Echinus herbaceus dittus, nobis Traocantha altera humilior is sjedofior feu Echinus Profy. Alpin. Je&exot. provenit etiam in Creta infula, ex qua ipfius femenfuit ad ProsJ. Alpinum miffum: fount omnes deflate is femina perficiunt verfus ejufdenifinem, aliquando citius, aliquando tardiuspro cceli isfoli temperamento.*

TE-MPERAMENTUM & VIRES.

Tragacantha (ait J)iofcorides vim habet meatus obducendi? ummi (imihm • u) (usejus eft admedicament a ocdana ad tufes, ad artrU afyritates, vocem intend isr d^ktiones in eckgmatecummdkadjuvat: fubdita ^ u e foi^* Uqu^u , ftit ^ W u W <3Uiv3*

bibita drachmapondere contra renum dolorh:t iff vefic=e rofioms admixto cornu cervino ufio iff, lottr, au't tnoc.'ko alumine fciffo. Galenut breviter de Tragacantha fcribit fimilem gummi vim babrit emplamcam quondam, qitae acrimoniam obtundat, iff fimiluer.Jeficcar?., TragacantLe lachryma (iWquit Matheolm). collyrik addit'a ncnfohm humorum acrimoniam in oculos deflu- entmm reti^dit^ fed iff oculos quoque roborat, iff magk aflringti quam fdccocolia, fr&terea lafie macerata Iff illita, cculorum unites, paibebrarum puffulas^prurimum ipjcalntmfana: va- ^tt qdpulmonum, pe£foik^ ajp"er<zarteri<£moibcs,iff medtljtrco'rumulcerlbut; fimat defnciones vmmes in guttur iff fauces permeantes, iff* tuffim sxcitantes'. Datur utiliter.yheraik re- mbia, tafia auxiliatur dyfcenterick, iff ex Cydoniorum vino pota, turn cliffmste infufa. Deni- ~que«/i(Uvigture, obtundere,ac reprimere opusefi, pr<e/ian/iffimumfuerit medicamentum. Gum- nfrddet cfieclarum, colorerukfcm, faporedulcefcais. Temperatefrtgtdum ifficcunt eft.

N O M I N A-

1. Tragacantha Maffdienfts folik incankptrfeverantibm feu non deciduk fore albo^ nobk. Tra- gacantha Mafftiienfis, I. B. Chair, in Sciaghpbia, Tragacantba, C. B. P. Mattb. Cefn.Hort. Lac. Lon. Ad. Lob.Lugd. Cluf. Car. pQS~f.Tragacantba, i. TabTragacantbaftveHlriifpimt-fiod. Ger- Tiff. Park?
2. Tiagacantha Granatenfts, foliistincanh deciduk feu cadvck, flort albo^ nobk, Trdgacantbtt altera l'cterium forteyCluf.HiSl. iff Chabt&iin Sciagrafbty iff homhw. I.B.'LO'J. Lugd. Tab. Tragacaritbx affinis lahuginofafeu Poterium^ C. B. P. Tragacantbdi i ^genusRsuwoljiii, 'LUgd, Hiji, App. Spina bird minor, Gtff. iff minor is Icon acuratioer eidem.
3. Tragacanthabumtliorfloribut lutek, nobk.. Tragacantha bumihorlutetfforib^ C. B. P. Tra- gdcantbx altirum genm Rauwolfii, Lugd. App.
4. Tragacantha Qranatenfipar magnituMne, pnbm Speciofispurplek, nobk. Tragacantb* ter- tuungs.nusfiQribwi furpurk iff fpeciofis, C. B.P.
5. TragacaiichaJHW///«- Sptciofwr, dmfiusramificata^ nobk. Tragacantha altera feu Pcterium Jaifu&ramificatuin, ProSp. Alpin.de Exot.
6. Tragacantiia CreienJJs aut Idenfisnjgra, tola echiuata, nobk. 7ragacantbaaltera7Profp. Al- pin. deExot,
7. Tragacautha tot a Tpinofa is- Echinum-referens? unde 'Echinut herbacests difiu\$, nobk. Tra- gacantha altera humilior iff fpecioftor feu Echinus, Profr. Alpin, de Exot.

H A L L U C I N A T I O N E S C A S P. - B A U H I N I

Aliorumque Authorum. - •

~jif£. iSH. cet. i.pl. it. Poterh ajfni\$ ftnofa
 1 phnta fohit Pimpinella, C. B. P. }>otcritm,Ldi.
 M.Lugd. Caf. Tab. Ger. PimpinellU ftinsfe, Claf.
 Hiji. Cam, Tragacant-bafiu Feuriam eft plant* icga-
 "iitiQfaJiliquagcmcila,duplitem{tricumfeittinam in ft
 twitnertedentila. Potcriott Fimp{ttBa diifumamnina
 *<ceditEiml>ineIlie, Ufiaribm&ftimnefeliiffie. Quod
 foplaiuajpimifa, affociatar hits Cajp. Jlaufj. reliqxijs

authoribm cumTr4Zacantba,tltiipptfyi!iBja;jj>ims dt-
 nari multis aliii jtirfibut divtrjbrum toto CQ>!Q gene-
 rum (onvenit, ergo avcUamr bine, ff amandrtur ad
 Pimpitteltant cut omnino atctdit. Dcindt male Cajfi.
 Bshinas 'Tragaeantham Jen teterittin tjufqs jpcicies
 inter Cardues jocav'it f>a£. 3 Sa. quia forta donanturi
 cum fint Legumina, revocari debnt ad fra gemro,
 toque jiltqtiti ganllispricdita, ex liiro ftatuT*.

L E G U M I N A

LEGUMINA

X SIVE

Siltquofo Papilionaqae Hliqufs Artfcuatis donate* *

Ferrum Eqiunum; Pdlygala fve CoromlJa; \ Colutea & Ornithopodium.

C A T V, T VI


§. i. FERRUM EQUINWM.

Aliquarum figura, planta hęc solea equina vel ferrum equinum nominatur: aliquibus vero ab effectu, quod equi, qui diu plantam hanc virentem calcaverint, ferris soleis exuantur. (Quam ridiculi fuerint veteres primò, deinde neoterici ipsorum ineptis adherentes; considerent sanioris mentis Botanici Philosophi.) Sunt qui ad Securidacam, alii ad Lunariam, alii ad Medicam referant.

Deductis & explicatis Leguminibus seu filiquosis papilionaceis, filiqua gemella præditis, & duplicem seminam seriem in se continentibus in superiori c.v. & Tab. 9. jam sequuntur Legumina seu filiquosa papilionacea filiquis articulatis ditata. Dicamus quid sit Legumen filiquæ articulata præditum. Omnia Legumina in hac Tabula contenta post flores papilionaceos evanidos producant filiquas transverse rugatas & lunata, rotunda contigua continetur. hæc est tessera seu novæ gencnca omnibus & singulis sub natura data, nempe non variante, nobisque monum est vel in æquino vel in æstivo instar, imò filiquæ aliquæ do bene exsiccatæ sole, cum clavorum foraminulis præsertim hæc præsentatur Ferrum equinum: in d. c. vero denomiMM orca, non a figmencis authorum ridiculis & ineptis.

T A B U L A X.

[sa alkavlium^i. Siriglarilju*, nobis. Ferrum equinum vulgare seu



I T A B U L A X I .

Scorphides papilionacea	Bupkurifi- /« , cornicu	Asperis & hirsutis	ft, Minus contort nobis. Scorpioides Bupleuri J & CBP « er. *
			II. Magk contort k, nobk. SUIqua campoide bi- fyida, Cbabr. ?
			III. Mollibus craffioribus magifquejj>ongiofis,nobk. Storpioides fdi- qua craffa Bo'dij, Gef. ?
			IV. Rtigo/its feu rigidkfiriatk iff fulcatk, nobk. Scorp'wides ftliquo knibus, Park- ?
		Portulacæ folio	jVXorniculhtongioribte iy tmttbribus-, nobk. Portulac<t folio,
Onobrycbk papilionacea	Silkulk	Artkukt asperis	(VI. FicUfolik minima, nobis. \$ r7. Reftà junctis, flore } Ruberrimo, nobis. ☉ Albo, nobis. ☉ i 8. Ante isr retro junttis, fiort purpuTorubente nobis. ☿ y.TriarjgularibuSyfeu Canadenfisvd Americana UipbylU , Tiobk. 0 IO. Major^fiu, CapVLt Qall'maam maJHs, nobk. 0 •
			Ecbinat crifiatk
		3- Aspe	kmuhkinglobulum tongejlk,PlatanpiluUinfstar, nofa. Gly cyrbiza ecbinata Diofcoricfo, Ad. Lob. Lugd, Q

Explicatio TabuU decim*, SeSHonk fecund**

Deduftis & explicatis-Leguminibus feu /iliquofis papilionaceis, filiqua gemella pridifis, & diiplicem feminum.leriem in fc continentibus, in fuperiori cap. 5. Tab. 9. jam IcuHnturLegiimiHa feufitiquofe filiquis articalatisditar^ . Dicamus quod fit Legnmenfiliqua articulata prseijciim : omnra Legumina in fee Tabu|acontenta,pofttforespapilionaceos e- vanidos prodiicunc filiquas, qux exficcat, tranfverfim rumpuntur, Bf in fingulis interftiriis fingula coritinentur femina, five funt lunaca, rotunda comprefla, five longa cylindracea. Hie eft teffera feu nota generica omnibus &c fingulis, fubhoc genere intramedio comprehenfls a naturadaca, ipl^hmemnon variante, nobifquUCHionfrante viam & hn&n. Ferrum equinum eft vd ^ » TM vel in^im: feniina font Lima; crefcenris inftar, imo filiqua aliquando bene exliccatas fole, foleam equinam cum davorum foramimilis perFeae smulancur, quemadmodum vidre eft ex nawraii figna fcnlpra in tabula 1 o. perfete enim itlicrepraefentatur: indeveradnominatio orta, non a fignentis authonim ridiculis &c inceptis.

I. Ferrum equinum filiqua fingulari, C. B. p. Ferrum equinum vulgare, Colum. Solea cqtina, Lugd.Hift I.B. Sole^equinafeu Ferri equini hicprima fpecificiradice coiiftat all, J, pauc^s donD;a fibrisgracilibus, quatuordigitorumlongitudiie, a^quaftatim plurespro- fntinturcauespalnariæ, &infolofertili dodrantaes, angulofi, frian, exquibus co/ts o-

inintur,

riuntur, folia alata SecurHacsminoris more, pinnntim feu conjugatim digefta, per extremam oramfiuata, levi^erque incorc\ili morem fifla,gerentes;exfiiiibus, inrcr foliorum^coftam & cauln^floculi exeunt lutei, rarodifpofiti; quos fingulos excipiuntfiliquaefingulares, ex suo plane pedicrtloinmxae, tres civciter unciaslongi, culmumlat£,noimiliilincurv2:&compreffs (artifictis natbneranimfpefhculum!) ddrfum his continuum, oppoiit? pars fimbriatis firmbtjs laciniofa, vel filiquae font oblongs, comprsflfecaltera parte incurvae,incifuris divife/o.raminum rotandorum fpeciem referentibus, provenienteutiinquefcraminum bri&KT; men lunauim, fculanx crefcentis figuru bicorne, procontenti feminisiigtira mimerogt tidem eqaini fbl<e fimulachra reprrfentat, undc'u'ftiore titulo *Sferro cavallo* lialitc,a i ^.iaa feminis cum folea equin2, five ierroeqaino, quama vano & ineptoaiuhomm non iacisfil)' conftantium, 5J'eFerentLium quod equis calceos fuos fetreos, five ibleas, calcata hsc plantu-hkgnminoih extrafiat.

2. *Fttrum equinum fiiiqaa mukripliqi,C.B.P. Equinum akperum* OTAOT^TW, *Equlum. Boc* • feciinduniFerifumequisiuniparvitatotius plantar, ac etiam filiquantmcopia feu mukipli-citac, quas interfoliorum alaslongo peciolo infidentes (nonutin lajuwfcla primovulga-r' leu filiqua fingialari nirodifpofita) quaternas, quinas, Slit plures Fert tenmores, ruffrefcerltes, & multomagisincurvas (litcram lunatam exprimcetes,ai3tpoti«slunamcrefcenjcm)Sf veTuti refupinas. Verbo, piimum diftinguitur a fecundo paucitate filiquisfrum ma jorum & craffar-tim, fin^ukrium, & curto pediculo infidentium ;unde apte fati? a DofitiffimoFabio Columna *iicKvd&vn* dicitur, & diftinguitur a fecundo, cujus filiquae pliirimacpetiolis longis in-nicunturmagiscurvae, & eotiamnominebeneaFabioColumnaTMv.««oMBi nuncupatur.

5. *Ferrum equinum capitatom feu comofum*, Colum. *Equirium Germanicum* filiquis in fummitac, C.li.P. Plantula haec Leguminofa eft frigidarum regionumfponte incola, arque eyam in iEquicolorum monocibus Neapolttanis, & filvula Capucinarum: radice conftat •craVta, lignola, ribrofd, nigricante ; fapore leguminofa, dulci: fruktat viticulis mult is ramofis, & procnibentibus: in quibus folia terna,cortis poftmodum qam3,nonnunquam fena, in c-jufdm .cacuminealiquando tarn denfe infidem; ut numero tredecini fint,qaaEantequam caulefcit planta p;irva fnnc, rotundioraatquedenfa ; at in caule anguloib faftorariorb geniculis hacrentia , longioribus coftis biuncialibus & triuncialibnsdifpofita, majora du imfs, flrfimiliavulgnris, illtfque laciora, rotigitudinevero paria & longiori cofe inhzreut e furamis caulium longi producuntar petioli nudi, femipedales antlongiores aliquando; in quibus veluti in capitulum congefti flores denfe in otbeni digefti & dtpciKlentos, fepcem", hoveni, & faepe plures luteo faturatocolorecinfcti,ctiigic Geniftelte; quibns evanefcentibus fingulisfmgttIsE fuccedunt filiqua:, finuolz feu undnlatz, quafifolaca parumintexta coma, Mqne incurva, ad invicem nutantes, umlulatz apparent in parte fuperiore : feminaproductum non rtm curva, nee circulum qyafi, fedNunam novam tertio die apparcentem exprimunt fingula; vti quas noneduntperforatas, ut fupcrioia bins Ferraequina, nccfemina tam incurva.

LOCUS & TEMPUS.

i/Ferrum equinum filiqua Jinguleri, C.B.P. Sponte provenit inter Nemaufiu^ isVakntiam., In Gallia Narbmaji iff Galbprovincia rperitjoh.'iauhinui redcundo Mcnfyelio;fl<irct minft Maiod iff fihhiafuajumo perfittit, ctHm in meridionalibus, tardius infeptntrianalibus rghnibm. a.Ferrutn equinum filiqua jnultiplici, CB.P, InValvetifiummotitibus fait expo fit is reperit Eabi- • HiColumna. §

3,FerrumequinumcafifatumfeucomofMnXdum.GtTmankumfiliqiihinfumimtat? C B P.Provcvtt in momkulU minhm herbdkper **totem** GaUiam, **cbundanter** in collibu* [effluvium Liggrimprope BUfo;item frequenter circapatilutum Mctfiefteufe & Gzmvam: fionunMcridwnaltb&sMarnomefife; & Mtiofmtnfount ferfcit. InbortkapudmsSept *entrionales floret* Julio iSr Augitflo; isr Septembrifeminafuaperfiat.

TEMPERAMENTIIM & VIRES.

De Viribus & facultatibus ferriequimmhilnotatu dignwn reperitur apud aut bores.

N O M I N A ,

- ir. Ferrum equinum filiqua singulari, C. B. P. Solea equina, Lugd. Hist. I. BlfcUm duplicifiguraj
 Ferrum equinum, Matth. Ccuiisr Securidacamontanaj Gefn.Hort. Lob.JZer. Ferrum equinum
 majus, Park. Ferrum equinum vulgare CLKA.OM&IVI, Colum. Hedyfarum feu ferrum equinum ^Tab*
 Sferro cavallo, Cam. Ad. Lok. def. Lunaria minor, Cafi. Solea equina, Lunaria minor, Chabr.
 in Sciagraph, isr Icon.
2. Ferrum equinum fdiqua multiplied C. B. P. Ferrum equinum alterum TroAvyJ&nw, Colum. Ferrum
 tquinum TIOAWWWW, Park*
3. Ferrum equinum germanicum filiquis in summitate, C. B. P. Ferrum equinum capitatum feu co-
 mofum, Col. Ferrum equinum comofum, Park. Sferro cavallo filicifere germanicum, Cam. He-
 dyfarum. Tab. Ornithopodio vel busae Solea equina, vel Ferro equino affinis, I. B. Sa-
 lte equine isr Ornithopodio affink herba, Chabr. in Sciagraph, isr Icon.

HALLUCINATIONES CASP: BAUHINI

Aliorumque Authorum.

JvS[^]. 349. cot. 2. pi. iv. Ferrum tquinum Ga Ricum
 jiliquis in summitate, C. B. P. Lotus enneaphyllos,
 <ft. Lugd. Hac plantula leguminosa male hie a C. Bau-
 hino dijponitur inter Ferri equinifeciesy Cum omnis Fer-
 *ri equinifeminafint lunata, feu incurva, uti ante diUum
 in explicatione Ferri equini, at hujus plant a femina est
 oblongum fete cylindraceum, ergo jtiagis convenit Po-
 iygafee, & zdeo foie inter Polygalm debet difponi, & Po-
 lygala appellari, non Ferrum equinum. mult a minus

Lotus ut vult Dalechampim; cum omnis Lotus Jit peñ*
 taphyllos feu ternis foliis in extremo. pediculi junBis,
 & bintis ad ejuſdem appojitionem cjm caule • at Poly-
 gala heec eſt alata planta, qute quatuor foliolis him
 nderachi adhxrentibus, uno extremum cojl < e occup-
 pant e ornatur; ergo à Jiliquis Artieulatis continentibus
 Jemina, oblonga feu cylindracea, eſt Poly gala, & cno-
 venis foliis apte fatis denominate nobis t^olygala Etr.
 ne, phyllos & neutiquam Lotus*

§. 2. P O L Y G A L A feu C O R O N I L L A .

HIOAU*AOV Diofcoridis l. \c. i[^]2. frutex eſt brevis paimum alt us, foliit LenticuU, guftufub-
 - acerbjts (potws Mi* abundantiam facere enditur) isr Plin. I. 27. c. 12. Polygala isre.

Polygala ſeu Polygalon vel Coronilla funt hertoe *Ao^ou&uAai, filiquofx articulate, di fteren-
 tes à caeteris fræ claffis, Ferro equino fcilicet & Ornithopodio, in hoc, quod in fingulis inter-
 fittiis articulorum contineantur femina oblonga, cylindracea, non autem lunata aut in-
 curva, ficut in Ferro equino, aut compreffa rotunda, ut in Ornithopodio, congeneribus fuiſ,
 in hac Tabula contendis: deinde filiquas habent Polygala feu Coronilla, ficut & Colutea,
 longas, tenues, ftriatas; femina longa, teretia five cylindracea in fingulis interfittiis continen-
 t s ; in caeteris, foliorum difpofitione, floribus papilionaceis, denfe in capitulum congeſtis,
 Jurimum conveniunt Ferrum equinum, Polygala feu Coronilla, & Colutea: fed Colutea eſt
 ſub. aut rionide rucez inquis articulatus prædictos, & propter hanc conſortitatem
 è fine ultimo, id eſt productione filiquarum articulatarum, hic caſdem cum Herbis filiquis ze-
 tjeulatis etiam donatis locavimus. foveis hie Joneque ſubſtantia ovaticommani cum
 multis aliis Leguminofis iruticibus filiquofis bivalvibus non minus, quam hifce articulatis con-
 venit. Hoc ubique ab omnimoda conformitate florum, filiquarum & feminum, præſtabimus,
 non obtante lignei materiâ fruticum; ſi prOprius accedant herbis à fin? ultimo, eodem redu-
 centur, propter arctiorem cognationem & affinitatem in filiquis, negle&a materia jignea,
 qua conftant, longum & diffuſum genus conſtituente in vaſto & numeroſo penu plantarum
 feu vegetabilium.

POLTGALA fivt C O R O N I L L A .

4. Poljgala dumetorum major, filiquis articulatis, flore vario, nobis. Securidiaca dunie-
 - major floſe vario, C. B. P. Hedyfarum majus, Ger. Multos atque oblongos exeadem
 Q. 2 radicc

radice fundit prima hæc à nobis propofita Polygala caules, per terram fratos[^] virides, fratos, intus concavos, & valderamofos: folia alata cofæ mediae conjugatim feu binatim adherent è regione, uno folo in cofæ extremo impari, Hedyfari legitimi Clufii foliis perquam familia, amari faporis; è fmgulis caulium & cofarum alijs oblongi prodeunt pediculi, coronamaut quafi globu[^]um flofculorum papilionaeorum Heayfari fioribus forma fimilium graviterque odoratorum fuftinentes, qui flofculi non[^] funt flavi ut illi, fed varii, ex albo rubentes: nam superiores florum partes vexillum nobis di&ae, cameae fnnt, id eft blande & dhV['] bentes, partes laterales feu labiales niveae, & carina infima licet alba roftro eft piirpurec liquas fubfequentes non funt planae & comprefTae ut Ferri equini aut Ornithopodii, fed tei[~]tes, tenues, oblongae, articulate feu internodiis diftinfta[?], quemadmodum Polygala Valentinaefiliquas, continentes femina oblongiufculum, & quafi cylindraceum, fubruffum, faporis non riinus amari, quam legitimi Hedyfari femina; radix tamennon annua ut illius, fed maxime perennis & vivax, fibrofa, repens, & longelateque fub terra fe condens, vicinaque circum circa loca occupans, & rurfum ex tenuiffimis fibris **albi** renafcens & fefe p;opagans.

5. *Polygala dumetortim minor* filiquis articulatis pallide caerulea, nobis. Securidacae 2^{da} altera (species, Cluf. Hift. & Pan. Cubitalis eft hæc Polygala minor, aut altior, multos caules ramofos à radice lignofa & perenni emittens, foliaque habens quæ in modo, secundum oblongam [^]pftam binatim feu conjugatim pofita, uno impari extremit[^]tem ejus tenente: flores in fummis caulibus glomeratim coherentes, ex candido rubentes; filiquas fufci coloris, fecurisformam, quam nos hie in Anglia 75^{ta} [^]oofe vulgo appellamus, (vocabulum [^]Sil[^]ooli eft ? igitur inftrumfentum, quo putatoriam aut arborariam falcem exprimunt) probe referentes, vel cultri genus quo noftri Anglici & Belgici futores feu calceolarii uti folent: fingulae filiquae unicum femina ejufdem figure continent. [Ex ficca tamen planta, quam mihi communicabat (inquit Carol. Clufius) Thomas Penaeus, difecbam filiquas nonnunquam longiores. efle, & fupra fecuriculam, feu falcem illam, alium articulum longiorem obtinere, qualem extreme fuperioris filiquae partes habent, quemadmodum in cone addi curabam; hæc Clufius. [^]Tota p k n u um[^]Yi eft, prafactim filiquae & femina. E t hæc minor & prior major producunt femina raro perfecta, propter nimiam aviditatem rependi fub terram, radicibus hue illuc tendentibus Non potest nee hæc prior planta Securidaca did; nee ad e[~]Wp[~] aut TMM[~]Wi Graecis, In nis Hedyfari aut Pelicini feu Securidacae claffem referri; quia (ut Clufius ipfe testatur) nullius femina aptius veterem fecurim refert, quam ejus quae ab omnibus Hedyfaxum legitimum cenfetur, quod aliquot locis fponfe nafcens in fuis peregrinationibus per Hispaniam obfervabat idem Clufius, quam ob caufam confule Tab. 6. & obferva ejufdem femina quadrarv **gulum, in medio tumidum, in m[~]fra Madricium, fecures vidiffe meminit idem Clufius, quae hujus feminibus effent fimillimae, nempe in medio quo manubrium trajicitur & adaptatur, craffae videlicet in medio, & utrinque in aciem planam definentes apparent. Vide ejus Iconem quae 1. fculpitur in Tab. 11.**

6. *Polygala enneaphyllos*, nobis. Lotus enneaphyllos, Lugd. Hift. Polygala Cortufi, I. B. Ferrum equinum Gallicum filiquis in fummitate, C. B. P. Huic herbae funt radices craffae, lignefcentes, duræ, dodrante longiores, nunc fimlices, nunc multifidae, intus albæ, quactatim plures emittunt virgulas minime lignofas, dodrantales, aut potius breviores, humi fratas, quibus conjugatim hxrent folia, ut plurimum quatuor paria, denfe difpofita, uno impari, extremum claudente (adeo ut fint ordinarie novem, unde genericum Polygalae illi indidimus[^] nomen, à clia ra & rifica nota, filiquis fcilicet fuis articulat^{is} Polygalæ in modum faelis, adjecta fpecifica ejufdem generis Polygalæ nota eandem à ceteris te fortis diftinguente; und[^]concludimus, nos magis confentaneum & magis ipfi appropriatum nomen applicuiffe, appellando Polygalam enneagKyllam: folia (vide Hallucinationes Cafp. Bauhini aliorumque authorum infra ad finem hujus capituli) familia caeterarum fuae familiae Polygalarum foliis, nifi quod int breviora, & rotundiora, minoraque folidiora, fpiffiora & magis quafi dilute viridia, nervo medio feu cofas mediae fecundum ejufdem longitudinem affixa: flores ramulorum nudorum extremoinfident lutei, ut funt Ornithopodii vej Polygalæ Valenn³? prim[^]Clufii: filiquae fimiliter proveniunt in pediculis longis, crebris internodiis interceptis feu articulatis. Idco collocavimus & defcripimus hie inter Polygalas etiam propter viticulos tenues herbaeos adinfar Polygalæ. Vide figuram, 8^{am} Tab. io^m

L O C U ' C & T E M P U S .

4. Polygala dumetorum major fit'iquts articu. tore v&rio, nobis. Securidaca major dumetorum florevarioffiquisarrkulatk, C.B.P. I 'ffima est per totam Pannomam, Au/lriam, Sri-riam, Moravian i\$ Bohemian, cum in pram turn in agrk, fecundumyas publicas rustkas; "Junio ac Julio is per totam ffitatem ; femem maturum est verfiM ejufdem finem is sub in-ium AutumnL dummodo per nimiampluviam tune ingruentem non nimium reptet radkibus & impediatur perfe&io filiquarum, consequenterque feminum.Variat interdum floris colore, qui vel totus Candidas est, velexterius albecit, interim veropurpurascit.
5. Polygala dumetorum minorfiliqk artikulatk pallide czrulea, nobk. Securidac* fecund* alle-ta (becks, Cluf. ffit. is Pan. Provenitin agro Genevenfi inter dumeta, contra pantem tram-ti lum is nusquam alibi cowfeta a Thima Fen<eo. Floret testate media isr -verfws ejufdemfinemfe-v.inaperficit fua.
6. Polygala tneapbyllos provenit paffim in prat k is terrarwti aggeribus per tot&nijaluam. Floret Maiads **Junk**; Julio is Augpftofemen fuumperficit,

T^MPERAMENTUM •& .VIRES.

Hujus planta ufum lac in mvdkribtis copiofum efficit ex multiplki experimnto Calceolarii."

N O M I N A ,

4. Polygala dumetorum major filiqk artikulatkpre vario, nobk. • Securidaca dumetorum mam fiorevario, filiqh articular is, C. E. P. Securidaca aheravel altemus fypcie. Cluf. Hi), is Pan. Securidaca major artiadata, Park- Securidac<z ahtrumgmus, Cluf. Hedyfarwn majut) Ger. Hedyfarumpurpureum, Tab. Lota enneaphyllo non diffunilii^ Lugd. Mtilhtus 5. Trag. Ornithopodium 2, vel quoddam majus, Dod. Redyfarum Scrcfwuron> Cam. Polygala dumetorum filiqh artikulath minor pallide Ctrruka^ nobis. Securidaca fecund* aU •era Species, Cluf. Hift. isr Pan. Securidaca Pen*i eadem.
5. Polygala enneapbyllos, nobis. Polygalon Cortuft, / B. Chabr. Lotus enneaphylks, Lugd. Hift. hrrwnequinumGaHicumffUquismfummitate, C.B.P.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

Securidaca dumetorum major fiore vario, filiqm ^artiwlatis. C. B.P. Pag. 149. Cel. Lpl. iv. & Securidaca ditmtarum minor ptUide csruica, C.B.P. •*¹ E- 1-i-J- Tab. 2. pi. v. Male ha time plant* in-d'gittnturbCajp. Bouliino sub Stcstridactt nominihis, E l y t a affitiant UT (daatura) Symbnh fiu

Securidaca gentrica, id est jitiquir donentur articulatis per interjitia dijHnSa fiparabilibus, debent Polygalade- nominari atque inter PolygalminllBcafi, no > tvtrQ rum Hedyfaro, ut supra innuimus in Hakiuinatumbut in Paragraphs at Hedyfaro.

§ 5: C O L U T E A .

Kow* Coktea Liparia pecdmrh, inqitiu Tbttyhraftus^ Hift. n. arborprocera fructum Jert mjihqua, magnitudine Lentis, folium mittit Fenogrxco non abfimile, i?c.

- Colute£ cum ex difpofiticme rloioi*Hm, florum, & filiquanim articutatarum, rotundarum, femina paricer rotunda, oblonga, cylindracca in fe continentium, nondifcrepanta Polygala • herha fuprad'ifta, eodem& haic & ilJas ad hoc caput redux/niiis. Insuper omnes cum Polygal- aiCr'utcs, flortsfuos compaftim in caulium fimminte pendulosgerunt, quibas il%- ifucc fitiqnx fingute, plurimifimul jun&te, rotundar, oblongs, per artiaios • tragiJcs, ztq<. "ZTM interva/lis feu intercapedinibus femina rotunda, oblongs fee cy-lindracca,

lindracea continentes, in mucronem versus finem earum definunt. Hæc est Polygalæ & Coluteæ essentialis & generica nota; quocumque modo a authoribus nominantur seu Polygala aut Coronilla, seu Colutea, seu Securidaca aut Fiedyfarum, seu Ferrum equinum, seu Lotus, seu Astragalus &c. parvo discrimine refert: quoadquidemeandem possideant tesseram seu notam genericam, ut jam dicimus, scilicet filiquis articulatis donari, sub eodem vexillo seu genere subalterno à nobis constituentur, ex libro naturæ & à fine ultimo petito, & iidem assignato, non ex libris authorum nimis multa & diversa nomina imponentium & hic & alibi nequam rationi innitentium, nee finem ultimum in nominibus suis adaptandis rite pendunt.

7. *Colutea* Scorpioides elatior & major frutescens, nobis. *Colutea* Scorpioides 1. elatior, Cluf. Hift. Colutea hax Scorpioides frutescens major ex una radice lignosa, dura & firma, bicubitalis, tricubitalis vulgariter, sed & nonnunquam contra vetustum murum ad 10. 12. aut 15. pedes ascendentes, virgulas profert, graciles, faustis tamen firmas, in frequentes ramulos juyifas: folia alatum seu conjugatim 8 aut 9 uni costæ adhasrentia, bina semper ex adverso ifei, uno semper extremum costæ occupante, aliorum Leguminum Tectyoxum more, fatwatevirentia; ingrati admodum faporis & amarifuculi: è fingulis ramulorum alis prodeunt tenue pediculi sustinentes plerumque binos, nonnunquam ternos quoternove iiores papilionaceos, floribus Polygalæ supra dictæ fimiles forma & figura, colore autem luteos, sed minores & nonnihil odoratos: filiquæ sunt teretes, oblongæ ad 4. aut 5. digitos præpendentes, quibusdam articulis & longis intercapedinibus distinctæ, in quibus fingulis comprehenduntur femina oblonga, cylindracea, femiuncialia aliquando, lævia, subfuculi coloris, ingrati admodum faporis, fingula fingulis suis intervallis inclusa habentur. Radix uti ab initio dictum longa, lignosa, lateque sub terram disperfa.

8. *Colutea* Scorpioides humilior & minor, nobis. Siliquosa minor, C.B.P. *Colutea* Scorpioides 1. humilior, Cluf. Hift. Hæc altera *Colutea* humilior & humi distufa neque foliorum numero aut fitu, aut florum forma vel colore à superiore elatiore differt, sed hujus vix tantummodo sunt humiliores, bipedales & tripedales; filiquæ & femina sunt minus tumida. Uterque hic frutex primus, & subfrutex hic fecundus, hyeme apud Septentrionales marcescunt, & novo ineunte vere ex ramis nova induunt folia, & flores copiose fatis protrudunt: filiquæ & femina inquam hujus quoad formam figuram sunt paria, sed tenuiora, & breviora præcedentis elatioris filiquis & feminibus. Vide Iconem in App. ad Legumina.

9. *Colutea* Scorpioides humilior filiquis & feminibus craffioribus, nobis. ifectus citgiaucis, virgis pedibus imo cubitalibus, lignosis, rotundis, rugor & ruffescente cortice vatos, in frequences ramos divisus: folia datl terna aut quando à a «u e o ^ Urns semper ex adverso fitis, adherent, uno impari extremam alam occi ante, *Colutea* vulgans foliis fimiia sed majora, glaucique vel cæsi coloris: flores & forma & colore Coluteæ vulgans fimiles, sed majores; quos excipiunt filiquæ breviores & craffiores, magis, & distinctius articulatae vulgaris *Coluteæ*, atque in fingulis inter fitiis filiquarum fingula femina cylindracea majora & craffiora continentur: ex Italia inter plurima alia feminariora nobis communicata habuimus ab Alexandro Balam.

10. *Colutea* five Polygala Valentina prima, Cluf. Hift. Fruticosa etiam est hæc planta, binos pedes alta, aliquando altior, multas ferens virgulas lignosas, sed molles, Sparti instar: folia fepena, oftona, nunc plura, nunc pauciora, binatim seu conjugatim costis suis è regione inhaerent, impari uno plerumque numerum parum claudente, Linds modo, magis tamen carnosa, & ad Rutæ colorem accedentia, afringentis & ingrati gustus: flores Meliloti finiles sunt, lutei, coronæ in modum fummis virgulis (quas magna ex parte nudæ sunt, & maturo femine exarefcere folent) infident; deinde filiquæ lohgae, incurvae, teretes, & præpendentes tribus aut quatuor internodiis evideritius distinctæ apparent; quorum fingula unicum femina durum, oblongiusculum, at caeteris feminibus priorum brevius & durius continent: radix dura, longa, lenta, craffiufcula, quæ profert folia perpetuo virentia in climate fervido; at in frigidioribus regionibus hyeme fuba sunt caduca, nisi in confervatoriis hyemalibus confervetur ipsa planta.

11. *Colutea* filiquosa minor coronata, C.B.P. *Colutea* Scorpioides altera, Cluf. Hift. & Pan. Hæc minor coronata, radice nititur crassa & lignosa, lenta tamen & flavescente cortice obdusa, multifque fibris prædita, ex qua plures fingulis annis ineunte vere novas producit virgas pedales, nonnunquam cubitales, lentas ficvminca læves, virides, in his temere

parfa Sfalata folia ex oppofitifolia, quina. cna, aut novena, mii coftx medlar infmertia; exiiccantis primingufns, rfeinde n' ill acrimoniarin fummis labrSguftantiumrelinquentes: floresin pedicilorumlongorim tnisnafcnntur, copiofi, legnminacei, & inorbiculari coronam congefti, flavi, miHog xlore comme-ndari: quibus fuccedunt filiquae articulatum dltin&x, fuperioribus brevifemen (ut cwtrarum fua fortis) cylindrafuim feu oblongum & teres continences.

Colutea Scorpioides Cretica odorata, Profp. Al pin. de Exot. *Colutea* hae eft pulcherrima, dbrutem pixivcniensjn Creca infula, totus 3rgenced colore Iticidus, crelcit cubital! altitudineaof akiore;fbliia, flores, & fiii qua^ vulgaris Colurex Scorpioidis nore, proveniunt, fed in hoc dfterunt, pMmo quoad tblia qua? in'extremo laciore funt & cofta; nudat pauciora adherent, quippe quinqae utrinque binatum ieu conjugatim appofita, & unum in coftae media; extremo qufjomnia verfus extremum funt latiora, coloris nci diftum' argerice: Hores effi figura & colore fimiles videantur floribus Coiutefe vulgaris Scorpioidis, nihilominus diftinctio, quod Cicticliujus Cofurea: flores fintodorati, atque Cohitex vulgaris Hores felicicia: irj fuper vulgaris funt exiliores & tenniores, albas brevioresque; CFeticarautenificraffiores funt & nigricantes, atque articulis magis evidenter apparent! bus confpiciunt, & confequenter femina ibidem contents funt multo maiora. Vere & inente Klacc: *Colutea* Cretica flores rertotomenfe Maio; Julio & Augufto filiquas matura fecunt, & fub jticim nigrefcunt. Stirpshaec frigoris eft impatiens undescgirimehyeme vivit, niGfiHnoia cuftodiatur cura in confervatoriis liyemalibus, in hunc ufum conitruftis ut conierventur phnt2 teneras & exotics, & defendantur a rigore hyemis: flores funtodorati, difumulmmque ilorent, & funt digerentes cum tevi afriftione; unde non enarunt quidam qui Meliloti loco iis in medicina uruntur. Hanc plantain nunc Srhachora non obtantehyeris rigore vigentem 5f felidter crefcentem liabemus in confervatorio hyemali, ex qua innumeros flores elegantes luteos & optime odoratos sperantis, brevi poft arquinoaium. Biennio-aut triennio abhinc crevit feminibus Chalepoad nos miffis a Revcrendo viro V. Roberto Hittington Collegii Mertonenfis Spcio digniflimo, fy Mercatoribus Anglis illic dtgentibus, & mercaturis a exercencibus numpopularibus fuis hicin Anglia, Evangelii pradicatore vigilantiflimo, i Arcus Botanicus Univerfitatis plurimas rariores Afaticas plantas debec, ficut Biblioclicij licapliirimos M.S. jndc, thha]epo fciltcet, hujus opera & cura feu induftria fagaci tranflatu hinc poffidet. Sub finem Augufti anni clnplf qo amplurimoa pro Criifit flores eleganter luteos & ocloratos, atque Septembri & Oftobri namerolbm gregem filiquarum articulationum ad pertectam maturitatem perduxit, in quibus contincbanrur femina perfetiflime matuta, quibus poterit perpetuati & confervari in plurimis Horti loctis. Vide Leguminum

Appendicem.

LOCUS & TEMPUS.

Colutea fdi quofa five Scorpioides major frutescens, nobis. Colutea Scorpioides elatior Chfu isr S" nobU; Colutea Scorpioides. i. iwmlior Clufii. Spon/e nafcuntur in-Caknkrq vkinifque Vititii& monubm abunde tumetinn in nonnullUPannoni montank quin etiam in Valena Mottfreliani agri filva rntfcl^ autobores funt Pena isr Lobelia* in Adverfarik fuk. Vhiff> ont' eprove**f, brevior; at in hortu. Ita longior isr major evadit-, iSf virga* hyemz retinet; parent exeun** vere, isr eeslate femitta admaturitatetn perducunt,*

Colutea Scorpiouks fiHquisi & femin' tbus cruffioribitt nobis. Ad oram maritimam Tingitanam it^ unde ipfiu fminahabuimits.*

• < Axn & ve Fofapla Valmtma %. Clufii. Salmanticensis grof frequens e! ife cundum viat: in • ntnatenfi, Murctaa & ya]entim regnis, [ock arenfis isr declivibut coltium obfervabat Carol** Clufiui, Apes Ulk pktrmatm mdlis ex ejws Jbribju colligere mduntur. Vulgo Salmanticensibifs Cronilla de K?y, quafi Sertula Regta, isr ifiic Meliloti vice utuntur, Granatenfis isr Murciani Lentejuela id eft Lenticxlam, Vakntini Polygalam appellant, geproindenomn commune feu Synonymumerit buic generi intermedia, Coluiea, PolygaJa five Coronilla, qua & ceteris herbis Leguminofis hujus capitis differunt filiquis tenuibus, longis, teretibus, femina per articulos in fe continentibus, longa, teretia, & cylindracea.

31. *Colutea filiquofa minor coronata, C. B. P. Clutea Scorpioides alter a Cluf Hift. & Pan. Cre- f ^nv< radiribut, fli Danubio (y Calenberg imminent. Floret Junio; & Augufto ma-*

lit. ^ i " •

^2, Coiuten ides Cretica odorata, Frofy. Alpin. de Exit. Prouenit in Get a Infula isr ar-

ca Chalepum; floret vere (y ineunte <eftate, fores fert toto menfe Maio (y aliquandb Junio; verfus finemyftatis, filiqu* articulau, crajjij, mgr*perficiuntur, in quibUs continents'fe- mina cylindracea matura flavefcentia.

TETMPERAMENTUM & VIRES.

Latlis copiam procrearefertur Colutea, non minus quam Polygala fecundum nominis etymon, pesplunnummdlis ex Colute* floribu* colligere dicujitur: Granatenfesis Murciarii I'Ji- loti vice utuntur PolygaU floribus.

N O M I N A ,

- 7. Colutezfeliquofa five Scorpioides major frutescens, nobis-. Colutea Scorpioides l. elatior, CM. HiSl.isrPan Tab Colutea Scorpioides Ad Lob. Lugd. Hift. Cam. Ep. Colutea Scorpio'^ m*- jor, Park C.B.P. Colutea Scorpioides, I.E. Emerusvubo, C*falp. >0
- 8. S C A S t o s i t h i u s e r X o l u t e a S c o i o i k s k u m i l i o r C l u f . H i f t . S m - P a r k
- 9. Colutea Scorpioides humilwrfiduis craffij nobis

lSfct, P... /... Cl... P... ri' Lugd: HijaTakt. aluLfiveFolyga- naa\$'L B... minima, ^.^frva Species, Polygala Vakti-

- 11. Colutea Scorpioides 3. Tab. C. altera, Cluf. Hift. Pan. Co-
- 12. Colutea Scorpioides Cretica ojoma, nobU. Colutea Creticajorata, Pro!}. Alpin. Je Exot.

HALLUCINATIONES' CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

P.

fill J Colutea Af fcies male J Cafraso Baubno duinguntur feu Jeorfim dilbonuntur I cum panbus donentur fili'is articulatis, continenti- businfingulis interjitiis finzula fe-i<~ *f cyhndracea, debent c* L'oi V ibidem collocar*, quancopidm eadem afficiLtur^ot* g^nerzca eN

libro nature obfervata. Quamvis Polygala jft tantum Herba, & Colutea frutex lignea mate- via feu jubfiantia donatus, propter fruttius vin- culum utriq; communè anatura datum, idejtiliquas articulate & femina cylindracea^ eodem h nobis re- ducentur Aeglefa fubjiantia Ugneae, quae est communis multis fubfruticibus bivalvibus.

^ . 4 . O R N I T H O P O D I I t M

O Rnithopodium id est avkpes, à fimilitudine quam filiqu* adunc* cum pedibus aria- Uhabent, fi^c dkm, ^uo^ue vetmbil* wogmtumnififorte ad Pofygalon Diofcoridi* I. 4.c. 142. referatur.

Ornithopodium convenit cum ceteris Leguminibus hujus capituli, foliis alatis & floribus papilionaccis, imo & fiquis articulatis; ab nfdem differt quodliliquas proferat adun- cas, pedesavicylarum referentes, plunmas fimul juntas, atque in fingulis interjitiis feu na fona compreffa, contenta in folliculis feu filiquis paululum com- midis,

1. 2. Ornithopodium majus, C. B. P. Ornithopodium, Dcd. ut. Pusillum hoc Legumen ala- tum & foliis binatis & conjugatis colte mediae adhen- ne tatione Ornithopodium dicitur, à fimilitudine i- filiquae quinq; nunc pauciores, nunc plures, uni petiolo feu pediculo vix, articu- latis & fragiles exherata, inter granum & granum quali conjunctae, ubi apparet fcau- ti-

na tumidae confpiciuntur iiliqua; paululuiireompreffa?, & adhuc virentes hirtutas, curvse; parvulis multis teimibus ac graeilibus exit cMliculis per terram ftratis: It)lia ihquam rachi adherent e fegione plurima, rotunda, parva, hirtuta, Lentis foliis minora & tenuiora: tiGfuli exigni, lutei & partim candidi, in parvorum pttolorum fastigiis denfe coacervati: filiqna? parvze, tenues, quales supra dixinnis; in quib., Tsquina, fena minuta, fubrotunda, paululum compretfa, in medio tumida, continentur femina.

Efl & alia Icon Ornithopodii depi&a, fculpta & exhibita, a Dalechampio in Hiftoria Lugtl'inenfi, cujus radicem Flbrx fcatent tuberculis nodofis; fed hod contingit ixpe & multis aliis Leguminibus, nee debet pro fpecie diftinfajaber: hoc multoties obfervavimms iimliis hujus dafliis fpeciebus natura fie fubinde ludente.

14. *Ornithopodium* minimum Sm&.Tm feu faiynd&, 'mi, nobis. Forte Ornithopodium pufillum Penae-, Hiftoria; Lugdunenfis. Forte etiam feorpioides leguminofa altera, Johanni^Bauhini. Hasc plantaia leguminofa viticulos emittit lxVe^, caySs, reftos, dodrantales. lut majores, in ramulos divilbs, fed foliola utrinque ordine pari incoftam aggefta, angaS^ora, pauciora, feu rarius difpofita, & quapad figuram Ferri equini toliolis fimilltma, quippeque notabili nervo feii coM media iere donata fint: pedicillorum extremis flofculi haerunt, /ingulis gemelli, aliquando terni, flavi, cum Ornithopodii floribus cum figura, turn magnitudine, apprime convenientes; quibus fingulis flaccefcenibus fuccedunt filiquae articulatae, propendentes e pediculornm fummis, long^, teretes, paululflm incurvze.^neecompreffe ficut Ornithopodii vulgaris & fequentis filiquae, ac proinde multo anguftiores, graciliores & glabra; nullis interim nee ftriis, nee lanugine, donate; obfeuris tamen (uti di?tum) articulis quibusdam intervallis longioribus, feminibus pariter in interftiti^ longioribus, tenuioribus, admodum parvis & fubrotundis, diftinfis. -

15. *Ornithopodium* <tiynt&sTm, ilobis. Ornithopodio affinis hirtuta. Scorpioides, C, B, P. Scorpioides leguminofa, Adi Lob. Lugd. Pufilla hac Leguminis fpecies alata feu "jraA^owAn radice nititur fibrofa: cauliculos procumlpentes habet (male Dalechampus is hiftoria fua Lugdunenfi reftos aferit) graciles, pedales & fequipedales in hortis bene cultis, at palmares 6c fequipedales in fterilibus &c fabulofis feu glareofis arvis, in horum fastigio zdmmodum iicurvus mucronibus apparent adunca cornicula ftriata, Fcenograsco rotundiora, graciliora tiuTien infunt femina, binatim inclufain fterilibus arvis, in hortis autem cultis quaterna, niina fenave, grana continentur in fingulis corniculis, quae introrfimi flexas fcorpionum caudas tranfverfis articulis aclineis ftriatis variegata & hirtuta reprsefentantia, bina caprorum cornua afpe&u pulcliro, nodis & protuberantiis fuis imitantur, unde illi no men a nobis impositum. At in pingui folo & in hortis cultis ctules funt bicubitales & longiores atque in fingulis alis eminent plures flores lutei, tesni, quaterni, imo quint aliquando, quibus totidem fuccedunt cornicula incurva.

LOCUS & TEMPUS.

13: Ngfcitur *Ornithopodium majuspaffim* in arvis arenofis is^l faluhfts, fegetalibus, ficck atque in lock inculk, veluti in collibus.^ pratc ficck is aprieis^ acfecut via*. Floret per totam* fstatem, atque fub ejufdem finem fdiquas fuas in quibws continentur parva femina comprejfa, fcrfcit.

14: ~~Ornithopodium minimum~~ nobk. bominus Agerius left am is femine communicatam fpbanni Bauhino ex agro Neapolitan hanc pufillam plantulam impertit meft. Noscio fe is abundanter inter fegetes provenientes intra fepta Regi* Chambort, otlavo ab oppido B'Ufis lapidrepenmus, atque ex femine illic colle Slo is fato figuram hanc fculpendam fub finem i o, TabuU curavimm: floret <zftate, is fub ejufdem finem perfidit femina fuurn.

15: *Ornithopodium* AI^TOI provenit in agro Neapolitan in plurimk lock juxta vias inter ScillM- Scorpiodem a forma filiquarum intortarum adinfar fcorpionk caud* appellavimus is dddidimu* Leguminofam, ad determinandum fuum gmus, fcilicet Legumen. Floret, verfafimm aestatis, & femina perficit ineunte Autumno.

N O M I N A.

13. *Ornithopodium* JU4, C.B.P. Park-Ger. *Ornithopodium*, Vod.Vt. Adi Lob. Lugd. Hi/}. Gefn.Hort.

K. Ornithopodium minimum iui&iu fiu ^.^ •, nobis. Forte Ormithopodiitm pnfUum Pen*, Lugd.hft. Forte etiam Scorpioideslegut ft altera, IB. i5. Ornithopodium *i>^TM, nohis. Omithv iffmis hirtuta Scorpioides. C B. F. Scorpi- tides legvaninofa, Ad. Lob. Lugd.Hft. Part . I.B.

HALLUCINATION^ . CASP. BAUHINI

Aliorumque Authomm.

Pjtg'3:fo,e)t.2.fl.ii; Ornhhepodium minus, C-B.?. OrnhfapQdiumpzrupjmmntAd.Leh.Lu9r, lbidem.pl.III. Omithopodium radhc tu'brxlh 110- «?!/«, C.B.P. OrnithopytiumtubcrofumDaluha&pii, fliff.Lugd. Enfia neajant muhiptcandafM nrj- fitate, cm Ormithopotiium minus fic dicatur, quia in macro iSjterili ant arenofo fi/o provtnicns, perpufd- lumtjl; at ex pufdli femine fato, in ngro pingui & vene jhrcorato protrudie tnajis : deiiidc taitro/um Dalj>-> von confititit novum jfreeiem, quia nature fit

ludatte, plunma Legutnina k radicum fihrh brotru- duntubcra: idfirco hocnonconjlitw novamOrnthf podu fpeacmjtafngsmtoffimt adele& akjfe,non d*- terminant fpeciem ijed variationem put varietatt™. Ut 7 ^ * » * modo ^ hah , ^ « igr ar- fihit Orns «ab alas' cmJHuunt d.jh»8n fades, thopod^affims l'irfutafruHufhuHiv C P famac^{ea} Apu/a, Mam. Vide Htlucina™. r1 Baubmod finer* t'xplicationis ftella Legumino- ja Ptijs. Oxen.

L E G U M I N A

S I V E

Silicjuofx PapiJionaceas Illiquis Articulatis aperis

Donate.

§. 5- Scorpions Lcgummofa, feu Scorpioides PapiKonacqi

Siliquis Articulatis.

M^o cfmoaJi; Viofcerid't l. 4. c. 19\$. qucdfamh habeat ad fimiHtudinan cauddt fcorpioris iv quod fcoTfiovum iliibt n fr<tft-n/nm-u pi auxlfin - <& J'inio I. 22. c. 15, cui Storpis dic't quodClymtTum DiofcoriJis eje Cafalpinus is Columna volunt* c"Ur7

Tametfi Diofcorides *qnius Scorpioidis leguminofar tantommrln m« • Scorpioidis fpecies, diftintis ftis notis cfTentialibus & femper codem modT'h¹ "o^s h^x cognofcibiles^in medium adferemuB. Prima fpecies eft Scorpioides Bapleori J aperis, hirtutis, minuscontortis, nobis fic difta: adSeoipioideni lepirimarTni?!?10 Jis valdea:ccdit, quam ait etc Oi #***& to* i ^frL^ 4*«™Z fat* bulampauci5foltis,feminefcorpioniscaudi effigie,Dititur <n>pn«,JfeDiofcoridi Plinial Scorpiusherbal. 22. c. 15. ex argumento nomen acceDirSromine KwI«. ei" 1110]ap"nc lacam.&jncurvacam adfunilicadinem caada- f ^ ? 5 ' . (?3>™ h TM : % r a m =>rcicr fcorpions, & roia panca habet. Valet f verfus animal fui nominis. Eft tamen Scorpis qua nos fuo loco inter fubfrutices ech

cei ***

Evplkath Tabula undetim^ Seffionis fecund^.

S Scorpioides, herba legnminofa,aflore papilionaceo luteo,& filiquis articulatis five hifpidis five friatis, facile diftnguitur a Scorpioide aquatico Echii fpecie, & ab omnibus diftis Leguminibus alatis feu ^{αλαζαγεωδης} ^{1c}, id ftt, n^o uorurum folia funt l^o unatini ⁰ conjugatim ⁰ »idis leguminofc diverfo modofe kabent;velenimfin» 1 r iugatim eregione ponmitur: omaesautemfn^ 8 0 mca? 1? sadnata ^ as curvas at- "•ipecies Scorpioidis leguminolsr ucolatifi-

ticulatimjur}ftas8t Iituofiniileshabcn*» quo venatores ad canilnis ajimium addendum idler venandum utuntur, & femiei lapon* o-nnino Legumen redoler, ut prxdida fuperiora Legumina"filiquis articulatis donaca, & inT. ib. fuperiore io. exphecata; ideirco fafdem has itirpesleguminofas hue leculimus inter coitfimiles, neglecb ftuiftunrloioiorumfpillbrumquE teinndumdoftrinamnofrrani porerir. infer 'ire ad fpeciesdetej-minandas. junfta filiquarum mrvitatemajoreauArndre, hirtutie a fuperiore ant lasvJosc, fie fingulatim fcepeciike d«lucemus fingtitas fpecies militantes firb hoc genere incermedio. Nora igitur generica Scorpioi-[^]s •itguminofi eft habere filiquam incurvam, t a liar cur vac aot litui inftar arriculitum |per interftitia junftam, & fla»^a feminacurva aut reniformiain fe conrinenterji, (IIIK alioi-urci Lcguminum more, etiam Legumina redolentia, in prsdiftis filiquis.concluduntur. jure igitur nierito Scorpio[^]des legaminofa l'unc locum inter concentra, fcilicet Lcgumina rracRcabit. Hifce pridiftis adjiciemus plantas quafdam leguminofas, filicubs echinacas, criftatas fingulathn & fpicadm, non articularim producentes.

'uligala dnmetorm minor filiquis articulatis pallide csrulea, nobis. Securidac* fecim-Gj- "Irrera fpecies, Cluf. Hift. & Pan. Hujus decriptionem exhibuimus in explicarione Tabnk'nonsuperioris, quam illic confide; ctiamfi ejus Icon fculpatur hicprima,confitcuit quintam pb.ntani ordjne in Tab. fuperiore nona.

I. GCoifoides Bupleuri*blio, corniculis a fperis, hirtutis, minus contortis, nobis.-Scorpioi-des prins, Dod. Tanieiſi unius Scorpioidis meminit Diofcorides, nos autem fefidiibn-ftafejnfdem fpecies in medium proferimus, & fculpcas filiquasdiverfasin Tabula, hac offendimos. Prima parvula ac humilifeft herba Leguminofa, aliquot teneroramulos proferens pedales, 6V longiores aliqnando in pirigui fob, qui ut plurimum in latusdeclinant&humi procumbuut., raro aiVurgunt propter imbecillitatem .caulium, circa quos folia oblonga, latiuſcula, craſſa, & fpilafatis, Buplenri foliorum xmula: in caulium cimifloſculi papilionacci lutei, fed minores, aliorum Lfcgnminum more apparent: quibus marcefcentibus fucceduntfiliqua a fperx, hirtutK, feuhifpidas, ernes viHolae in feconvoluta; fimiles, artitultnrm leugeniculatim cohxrentes, curvr inftar fcorpiontim caud[^], undeei nomen Setrpioidis: femina in fingulisinterftitiisprotuberantibus inter geniculum & geniculum nirt in-, Lirva, Innae novx effigiem rcfereiicia, aut reniformia continentur.

II. *Scorpioides* Bupleuri folio, corniculis alperia magis in fe contortis & convolutis, nobis. Hxc Scorpioidis fpecies altera neutiquam differt a priore quoad folia Biupleuri facie, nec floribus papilionaceis luteis, fed filiquis magis in feconvolutis & r pilis brevioribus te&is.

I III. *Scorpioides* Bupleuri folio, corniculis craſſioribus & magis %ongioſis litui inftar contorcis & in fe convolutis, nobis, Hxc tertia fpecies, nee foliis, nec ttoribus luteis papilionaceis, quoad figoram a pnediftis differt; magnitudine folummodo floris & craſſitudine filiquarum, molii & ſpongioſa materiategiarii, contortarum, & in fe convolutarum lirui inftar, in quibus continentur per articulos in fingulis interftitiis femina priori[^]iuplo majora, nee tarn *iai* curva.

IV- *Scorpioides* Bupleuri folio, corniculis a fperis & rugofis feu rigidis, ftriatis feu fnlcatis, litⁱⁱ inftarc*ntprtis& in fe convolutis, nobis. Qmirta ha?c fpecies folia pariter habet Uuplu[^]ri, flores luteos papilionaccos ejuſdem tormi ac figure cum pradiet\$: filiquam a fperam & rugol[^]ileurigidam, ftriis cVfulcisprxditam, litui etiam in modum co)itorram & in l'convo-lutam: iemina reniformia duplo praeedentis minora.

V. *Korpioides* Portulacae folio, corniculis kingioribus, tenuioribus ac articnbtis, noLis, Sccepioides, Match. Lob. Hanc plantam floribus papilionaceis & filiqnis arcicul<ii, :fe-men Legumen redolens m fecontineneibos, Legumen cfledeclaramus, non obtancec diverſa iigura & familiuidme fohorum congruencium cum aliis plantis tococclodifferentibus: folia eecenim file (ut & alibi) infervicnt ad tales fpecies Scorpioidis conſtituendas. Hsc fpeiics ergo-Scorpioidis Portulacae: tbjiis, caulicufeditfaiis numerosos fbliiique abunde conveiftitos, quorum terna fimul coh3frentecircamos feucanliculospn&dic>os; hortim medium impar, excremuni pediculi daudens, bina e regione poſita magnitudine & prsedpue longir, di-tie fuperat, & Portulacae foliis craſſitudine quodammodo accedit, unde ei denominatiofn^e. ifica: floſculi papilionacei, lutei, bini, ccmi & nonnunquam quini, nuncpiurcs, rmtic paue^re₃ in unimis virgulis eminent; quibus fingulis marcefcentibus fubnafentirir fit:

fingul E arjculJ.:*, cenues admodum, 6V longa:, taftigio acammate 6> refievu ; pt I" * pionis caudae rcurvatar, in quibus femina perarciculos oblonga, tenula infiU i^{rlcor}

tiif articularum latent, Gal^gse feminis forma,

VI. *Scorpioides* Vicias roliis minima, nobis. editpedales, humiles, & per terramrtratos, ternatim cauliadhserentes, & bis quatuor folii finentibus, alpernatim etiamfitis, unoimpa-
lis intevcoftam & caulem oriuntm petioli biiii. f-
ftigio binos, auc ternos, nunc plures, none
quorum fingnlisfinguls fuccedunt filiquae, longi,
gulis interfritiis fi^gula iemina minuca., rotunda, longa. Vide Tab. 20. in App. Seftionis 2'

juiora & exiliora.

minima Scorpioidis fpectea cauliculoſ
orum geniculis oriuntur coftae media; al-
s, mucronatis, glabris, in mucroneni de-
emumcoft3;ctaudenr.e,onufe;3tqueexa-
tes, triunciales, tiiftftientts in eorum ta-
tiofculos-papilionaceos, lutec
pauciores
articulatac, continences in f
rotunda, longa. Vide Tab. 20. in App. Seftionis 2'

LOCUS & TEMPUS.

Scorpioides Bupleuri folio, pierisque lock audit is moniofis, in olivet is quoque Gallic Naxbow
*fts, fyontenafcitur, circapanbulum Monffehenfe <5>*CaffeInau, incollejuxtaviama^*
*fiyLv'n Lam; floret illk menft': Aprili, isr M(tio,acfunio filiquas isrfeminafuaperjicit. **
isr maviofts Monfyelio vkink frequent Lobelb ocmrjebat, alibi rarim mfi in hrtU, uh .alto
magis luxur'mt quamin aridk (ponteproveniens. Saepe fxpius obfervavimus anuuasplnrimas,
in macris, aridis&arenofis locis provenientes, vixpalmarmattingentesakitudinem;
in hortis- fatas, ubi felicius & plenius rtutriebantur,pedalem Si frfquipcdaleni confequu-
tas ruiflè longitudinem. Hoc confpicere licet in hifce, &aiiishujus iarinae, inter legu-
minofas. non folum plantas, fed paffimi in tota congerie plantarum; adeo ut filveftres ap-
pareant diverfae omnino fpecies ab iifdem numeroTpecicbusinhortiscultis, habitajrati-
onetantum magnitudes aut parvitatit, quae, a locis in quibus nutriunairplaiitit ipfar,
dependet,

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Scorpioides contrafcorpionum (animalium ejufdemfen nominhs) iffuiiprifenti remediofeu au, ilio
efl, 18fte Diofcoride.

NOMINA.

- I. *Scorpioides Bupkurifolio corn'uulis afbtris, hirfutk^ minus cantottH^oiK. ScerfhijesBu*
fleurl folio, C.B.P. Cam. Tab. dr. Buplturi folio major, Fatk- Rtpens (perperam: procum-
*bens adhiberi JeUitj BufU~r. fi,li** JL^A. «*J. ^ /con. Prior, Dod. Scorpioides, Lugd. Dod*
*Call. I.B. Cbabr. Sciagraph.isf Icon. Auricula kpori*vtilgp, C<£falp. CatanancequQrundam,*
Cam. Clymenum Dicfcoridi4, Colum.
- II. *Scorpioides BupUuri J9lio comiculit aSferit magis in ft contortit & cmvdutk nobis ScorPi*
oidfs filiquatampotde hifyda, I.B. Cbabr. ubi figuratur. Not txfiUqua iffanaturali no-
fit m depjngendam iyfculpendam curavbnxs figuram.
- III. *Scorpioides BupkurifdiU corniculit craftioribws, moUioribut ftu magis f^ongiofm, litui inffl*
infe contctrtisr convolutit, nobit. Scorpioides Bupkuri folk fdiqtia craftja Bcelii, Ger. D
Scarpioides major, Park. Purad.
- IV. *Scorpioides Buphuri folio corniculit afytri* <y rugofts rigidit iyfirlatU feufulcatk*
infiarmfecontortitiseconvolutM, nobh. Scorpioides fiiiqmkm bin, Park.Pa". 1116'
ab ipfo difyonitur extra cldffhn inter Medicos cocbleatas.
- V. *Scorpioides Port ulac* folio, comical* afticulatit, hngioribm at t enuiaribus, nobit. COT-*
*pioidesPmulac*folio, C.B.F. Scorpioides, Matt*.<&.Lob. Icon Scorpioides Mattheo*
Portuht foho, Perk- Scorpioida Mattbeoli, Vod. ut. Gefn. Hort. Lugd. Cam. Telephium*
lMcoridi feu Slides (Quarufi fimilitudinem) C. B. P. & infra Scorpioides Por-*
tulaafolio eidern.
- VI! *Scorpioides minima Fuiafoli^ nobit.-*

HALLUCIKATIO

CASP. BALIHINI

Aliorum Authorum.

j%«:«i'i'iasaa^

ii.. Jt((li/n« i"W l*4r (fa [tminaUsli fimina, CraJ)*U fbcciu*, fior". caPJ*j^ •f^ptmm (it* di- more Sidi proiiucanti^ au^honbui,propter cim- Hum, Dioscoridis fortassis, tbitns, adinjtar Telepini) .foTmitaUminfoivtWy^ aruciuiatas; 8 ft- cum flores papilionaceos, minz leguminoza in fugulis interstitiis articulorum, a perfecte redolentia habeat, debet hic inter papilionacea filiquis articulatis in se con- volutis donata locari; non autem inter Te-

ia. Deinde hu repetitur eadem Planta, semel cum Telephio Pag. 287. Col. 2. pl. 211. & ibid. impl. 11. sub nomine Scorpioidis Portulacae folio; qua debent conjungi, non obstante diversorum auctorum nomen- clatura, quia sunt tantum Synonyma unius ejusdem- que planta. Porro male Cassaro Bauhino Scor- pioides Legumen (ut supra probatum) dispanitur inter Telephium & Portulacam, cum quibus nil habet affi- ne nec in floribus, nec capsulis seminalibus, nec se- minibus; quare amandetur ad Legamina sua sortis filiquis articulatis praedita, quemadmodum nos pra- stitimus hic, non sine ratione.

L E G U M I N A

Sive

Siliquosae Papilionaceae filiquae Anicuhu, Aferisdonats.

Onobrychis Papilionacea.

§. 6. ONOBRYCHIS filiquis ARTICULATIS ASPERIS.

Onobrychis ab asini ruditu nomen obtinuit: Latinis similiter Onobrychis dicitur. Dioscorides l. 3. c. 152. & Plinius l. 24. c. 16. folia Lentis paulo longiora, caulem dodrantalem, flo- rem puniceum, radicem parvam tribuunt. Ad Onobrychidis classem has subsequentes plantas post Scorpioidis genus, tanquam illi a filiquis articulatis omnino affines, hac nos retulimus.

Onobrychis floribus papilionaceis & filiquis articulatis asperis, convenit cum pluribus Scorpioidis speciebus supra explicatis, quoad flores & filiquas articulatas; at discrepat fo- liis, cum a Scorpioide, tum a ceteris hujus Sectionis: haec Onobrychides folia conjugatim seu binatim costae mediae adherentia habent, non e regione sed alternatim, uno impari ex- tremum costae claudente: estque Onobrychidis haec duplex habitatio ratione filiquarum, vel enim filiquae sunt articulatae asperae, vel echinatae; prior etiam duplex habitatio ratione foliorum, quae vel sunt alternatim adherentia mediae, vel

Onobrychis major perennans Siciliis articulatissima, in Sryt's ramis est cubitalibus, ferrimo & albo, nobis. Onobrychis a Jiera, Dodonaei, glabris, craffmiculis, nunc biCoU calibus, imo in hortibus enculcistnecubicali, radice eadem ortis: cauiibusco- procumbentibus, saepius tamen erectis, multis tamen folia plurima non ex opposito (ut vul- ta adherent aliorum Leguminum more, quibus costis m nascuntur folia quarema, qu- go in ceteris omnibus quasi Leguminibus fit,) sed alternatim extreme majore impari & o- na, hinc inde longa, mucronata seu in acumen desinentia, izxfoliis quadam KxloIwn:(i- gione costae finem occupante; folia inquam praedicta Glycyrrh- milia, paulo tamen breviora, latiora, glabra & glauca, exceptis marginibus, paucis villis orr i nullo manifesto nisi tantillum astringente: ex alarum sinu prodeunt furculi f. CQI clares, qui complures flores in spicam digestos serunt in summis furculorum aenosis, Genistae magnitudine sed satore rubentes: quibus paulatim fati- fcentibus

• papilionaceae

fcentibus, fuccedunt concatenatim feu potius'coa/cervatim filiqux longge, biunciales, aliquando longiores, aſperx, comprefſe, oblongje fe i /Olypeatae, fingula? adhuc virides per articulos arte junſe, cxficcats ruptu faciles, ex ternis, quaternis, aliquando quinſ filiculis Uivalvibus clypeiformibus (unde ei nonien fptcificum) conſtant, in quarum fingulis unicum continetur femem compreffum, c3eteiorum Leguminum femina maſticatione fapiens. Vivit per mukos annos in Meridionalibus tra&ibus,, ^ Septentrionalibus vero per pauciores annos, praſcipue poſtquam affatim & copioſe femina fia fudeit autumno*, & fi poſtea hyeiis rigida fupervenerit mature, antequam radix vires luas#recuperaverit, poſt partum ilium mrLiplicem feminum perit. Datur& hujus varietas flore albo, quae foio florum colore, & foliis dilutius virentibus diſtinguitur a pradi& ajam deſcripta: radix hujus eſt etiam perennis.

8. *Onobrychis major* annua filiculis articulatis aſperis clypeatis undulatim (ideſt antroſum & retroſum) jun&is, flore purpurorubente, nobis. Haec nova & peramcena Onobrychidis ſpecies caules pro4ucit non tam proceros, nee tam craſtos, quam prior perennis deſcripta: iisad eundem modum coſtas adnaſcuntur, quibus pariter folia adhaerent dilutius multo yYentia, foliis Onobrychidis predi&ae flore albo familia: flores in cimis caulium fpicatum pr. nr. ihiunt, fed funt a majoris perennis floribus colore diverſi, fu^{nc en^m} multo dilutius rubentes, admixto pauco caeruleo aut violaceo colore: deinde filiqu^{3^011^} articulatur, filiculis aſperis, clypeatis, non reſta junſtis ut in priore perenni, fed undarum in modum, ante & retro plicatis feu angulos obtuſos in fingulis articularum plicis efficiuntibus. Eſt hxc planta annua, ſpdtio oftomenſium femina ſua poſt fationem ad maturitatem perducens, & deinde totaliter periens: ſie ex hiſce aſſignatis notis haec aperte & manifeſte diſtinguitur & novam ſe ſpeciem detegit.

9. *Onobrychis minor* perennis Canadenſis triphylla filiculis articulatis aſperis triangularibus, nobis. ^edyfarum triophyllon Canadenſis, Corn. Hedyfarum triphyllon Amencanum, Park. Hums altitudo in friaidis locis duorum aut trium eſt cubitorum, in apcſis vix ad unum erigitur: caules numerofi ab una radice valde fibroſa pullulant, anguloſi, medulioſi, friati, nanc virentes, nunc pallentes, & aliquando rubentes; media caniculan tempeſtate flores prodeunt ſpſatim digeſti Onobrychidis prioris perennis primſe floribus ampliores, quorum florum petalum ſuperius & cream (vexillum nobis in omnibus Leguminum ſonbiſtli&um) faturatks rubet, reſped lateralium feu labialium petalorum; labialia ſim bina dilutius & pallidus & qu^{ua^ o^o^o^e ru^ent}: floris emarceſcentis roſtro fuccedu filiqua uncialis, aliquando biuncialis, arciculata per internodia, conſtant P^{1^u^ ^ ^ ^ 1^8} triangularibus, ſimul junto, fingulis per articulos diſtin&is & determinat. 8^{^^ 4^ ^ 11} guHſiſce filiculis triangularibus exſiccatis ſcu^{^lc maculis, alpevris, onleq enter gula femina, quafi reniformia, duplo} veſtibus prxtereunt imm ?dhaerentibus con^{ipra 3 onat 19} feminibus majora. Unde a filiculis prioris primo ^ ^ ^ a f o e d ^ f S u articulatum junto, hanc plantam exoticam **Onobrychis** ^{^ ? " S u larib ^ ^ e o c n n c ' m C a n a d e n ſ e m t r i p h y l l a m & c . d e n o m i n a v i m u s , p o t i u s q u a m H e d y f a r u m (m a) u h v i l u m c a n a d e n ſ e , d e f u m e n d o d e n o m i n a t i o n e m a f i n e u l t i m o , # e ſ t a m o d o f i a y i a r u m c " p ^ n (l i . ^ o \ \ e t e n i m t e r n a & f i l i c u l ſ e t r i a n g u l a r e s ſ p e c i f i c e c a n d ^ m d i ſ t i n g u u n t l i q u a s p r o d u c p r i m a , f i l i c u l i s a r t i c u l a t i s c l y p e i f o r m i b u s & f o l i i s o b l o n g i s a l l a t i s d o n a t a : a ſ e n t e n t i a c o l l o c a r i p o t e r a t h a e c p l a n t a , q u a m i n t e r c o n ſ i m i l e s : ſ p r e t o 6 f n e * h e c a p c i u s m e h e d y f a r i p r i m o u ſ ſ a c o b o C o r n u t o , d e i n d e J o h a n n e P a r k h o n o f r a t e i n d i t o e l e c t o n o m i n e s i n t e r H a l l u c i n a t i o n e s i n f r a h i e a d f e r a n d a s : r a d i c e n i t u r f i b r o ſ a , f u b n i g r a p r o p t e r r a c i o n e m d i f a n t e : p u l l u n t i n q u a m f o l i a A p r i l i m e n ſ e , i n i t i o q u i d e m , ſ t a t i m ſ u b e x i t u m b e n e n t i a (h o c e n i m c o m m u n e i p ſ i c u m m u l t i s a l i i s d i v e r ſ i g e n e r i s p l a n t i s) q n ſ e) i e n o ſ t a t r o v i r e ſ c u ^ t , e l o n g i ſ a t i s p e d i c u l i s a l t e r n a t i m o r t i s e x e u n t i a , t e r n a , l o n g a & a c u m i n a t a f o l i a T r i f o l i i b i t u m i n o ſ i f i g u r a , ſ e d n e e e j u ſ d e m c o n ſ i ſ t e n t i a , n e c o d o r e ; t o t a e n i m p l a n t a i n o d o r a e ſ t .}

LOCUS & TEMPUS.

7. *Onobrychis major perennis filiculis*articulatis aſperis clypeiformibus, reſta mntti*, nobis. Onobrychis alena, Dod. Hic provenit in monte Baljo, teſte Johanne Pona. Frederick Meierus Septembri obſervavit in pratis Senenſium copioſe provenientem, femina quae matrum edentem. Hanc d-obrychis, Jem, illic hyeme equis propabulo apt' mo e-xhibebant' eandem matullit collectam in via Romana Viterbam verſus H'ncicus Cherleros gener Jqknms taronim, Eadan, flore*

flnre atho ex fatione provenh cum vulgari f utraqik is rubra is alba floret vtrfus initium diftath aut ejufdem medium; feminaperfiu turmo.

8. *Onobrychis major annua f dculk artiadatn ufyerit clypeiformibus undulath, ante is retro pliatatis {5? angulos ohtufos effcientib&s, nobis. Sponte provenit in Afta, unde femina habuhn timeriffim* hujus* Gnobrychidis anno elapfo commvmcata, atquc Chakpo Afi < z emporeo nobiliffimo*

•*nosjma, cura is induftria Reverendi Vtri D. Koberti Htnirington apud nos Qxemenfes 'tgii Mertmimfu Socii dignifimi, apudmercatores Anglos illic degentes 4s vmcaturamexentes Verbl Dei difpenfaiorh fideliffimi, a quo plura indies rariornfemin, i Afiatua fperawut xfe&amus. Floruit Aitgufto menfe^ isfemen adinaturitatemautumnoperdu-x.it.

- ^ . *Onobrychis major perennis Canadenfes triphyllafiliculh articulatis a/peris triangularibm, nobis. Advenit pirnb ex Canada^ Virginia, atifque Arnmc* locis, ubi Sponteprovenit; colitur in hortis Botanices Siudioforum. Floret verfut finem aftatis, citius in Mc^divnalibu^plagis, 10^ dias in Styentmnalihus ^-, femtha maturantur O&obri is Novernbri.*

N O M I N A.

7. *Onobrychis major fatmis JiticuUs articulatis afferis dypeiformibm n&a junftis 7 nobis. Ottobrychis f?mine clypeato ai}tro major, C.B.P. Onobrychis aliera, ZW. Hedyfarum alterum clypeatum. Lob. Lugd. Hedyfarum vulgare dypeatnm, Park. Clypeatum, Ger. Hedy/nan Clypeatumflorensisfiminaferensduahmsfigurisjepr^fentatum, IB. Chair, "*
8. *Onobrychis wdor anrnta filhulis articulatis aiferis clypeiformibus tndalatis^ ante is retr - pliatatis ist angulos obtufos effickntibus, nobis.*
9. *Onobrychis major perennis Canadmfis triphylla^ filiculis artkidath afyetis tnangnhfihws, nob'is. HedyfarutntriphyllonCanadenfe^Cornu Hedyfarum triphyllon Amerkanum, Park,*

§. 7. *Onobrychis filiculis echfnatis criftaus & tavibus donata;**Onobrychis feu Caput Gallinaceum.*

Onobrychis major filiculis echinatis criftatis in fpica digeftis, nobis. Onobrychis
 1. *Onobrychis caput gallinaceum, Park. Hxc caufes profert a radice mulcos cubitales, noa lua quidem ffonte ereftos, fed procumbentes; folia habec Galegajfamilia, tenuiora cameo multo & fubtus albicantia, ex pluribus anguftis foliis binacim cofbe media; adha>rencibus, & in acutum mucronem definentibus coacervata. flores papilionacei in longiffimis fpicis palmaribus, qui aliquando dilute, aliquando magisfature rubent, nomiunquam albi iunt; atque fingulis iloi ibus evanefeentibus fucccdunt fingula: filicuk echinatx, in medio tumida?, crifta imopocius capicis gallinacci figoi, undeei nomcn Capinsgallinacei; atque in fingulis filiculis echinatis fingula continentur (emina renitorniia : radix dnrat innniltos annos.*

11. *Onobrychis minor filiculis echinatis criftatis majoribus & craffioribus aculeis pradtis donata, nobis. Hac Onobrychis minor refpeftuioiorum, caulicorum procumbentiur, etiam & radice, niultoef minor: radice enim confac tenui, longafacis, fibris cnrcnce » cauUculos maioris niulto fere breviores, eofque per terram ucplui-imumprocumbentes: folia binatim colhe per terrain \v. \x alternatim herent, majoris fimitia, fed breviora & anguftiora: Hores habtt paucos dilticc rubences^revibus^ aur nuilJs quafi, falcem confpicuis, peciolis in es: frnftus, feu filiculfe cum Ida; raro & fparfim in extremjscaulium difponunuir, tnplo lrisprimimajorcs, & rigidioribus aculds zrmantur, in quarum fingulis latetunicum lemen, tnplo etiam femine prioijs majus, renal< icidem.*

14. *Onobrychis minor filiculis clypeiformibas kvibus, nobis. Onobrychis frufluorbicoj 3 10 peltato Acacii E in ihr, Polygaljo Gefneri affine Capuc gallinaceum, I. B. Chabr. Hac li_xam agitradiceni, crafliufcuam, lignofani, & in fibras filamentortnj in ilardnctilcm, len-tam JTaftucontumacem, foris nigicantem, fitusalbam, fmplicem aliquando Sc multifidam in numero fa capita deduthm, ex quibus numero fa puiluht foJiontm aiulinrmjue fege: cauJesancemr^mires: i & dodrantalfs. in fteriii agro; at in fercifi bipedales, tcnucs. hirir. ti, ^d medinnv -; foUofi, cxtera nudi; fpicamgerant unius, dnaram, aarcrii 7 manciarum, ftotAms QVM ilwp\Kev6, YoVj?ji« Gefnen \rifrar, C^UE tatntriViC \T\m\IV\ OAwIWIWK ^CT exrrcmS^ na m in meta form! faftigiatur: ftoribiisaiitematotvtTv^AOa^siVijK.'w.t'cunt fiiiique^ .dl.iaefi/icjuarun] quodawmodo forma, dsobuspcltatia orbtenhs confantes, quodam*

quotlam veluti ifthmo determinate uhicum ~~concepta~~ < uliim, qoad brevem mtitronem profcitt, maigine ~~alias~~ . ttabili, "nec criftato uc in PolyialoGefoeri, medioprotaberaatt propper itmen contencum Cracae minoris par, mgricana rotundumqne ; finguli pbrro orbiculi prater tunicam femcn intgentcm, cxtrinicus reticulatum habet plexum, obdu&um, circaoras harefecnttm.

Onobrydis incanafoliislongioribus vel 3. in Psod. C. B. Caulem habet rotundum, ramofum incanum : folia plura acuminata, angiiib, nncofla anacxa, incaia itidcitt, ac veluti cineje affcrfa; caulicuti femipalmarea, nudi, fpicain riorum pnrpurafcenrmm, aliarumfiucfortis forma, fuftinent; quibus fuccedunt filiqux oblungx, thcanaf, incurvo mucrone donati, duabus valvutis confiantes ; femem mimicum, nigrum, phimm & iemicircuhr. continentes.

15. *Onobrychis* minor ft-xatilislutea, nobis. Polygalon minus lex at tit, Cli a br. Tota quanta eft hie plancula K palmum fuperat: radícula Candida eft & longiufcula: ioliaCapids gallinacei, fedoWafiora, pilis candidisobfita, & quidthi ftacimcmerRencia : coBraligsCH lesfuntconlimHibus cum ciccrisfux mbus loins veftiti, fupernediviJi, acquecorum extremis flofculi infident Intcoli, autpallidi, hianres, cxigni & pauci, Afragalorum poficu, -uos expdiont capitub exigiia rotunda, aliquot apiculis fuperne donata. Vide App. ad Legumina.

LOCUS & TEMPUS.

10. *Onobrychis* major ftsulk ebinatb% triftath, in ftim Sgeftk; nobis. *Ombrycbk*, *Bod.* Caput galhnaum Bdgaram^ Ad. Lob. Dievftbm Auebrogum, ubipratorumcopiamntft^m affr: is isr hpidofis hckyaacula terra tefih, bidentt tantum fcalptk, injeftoftm & diligtntttrcomminuto en Gens ferit, is? bum iniferfefhrcore vprrit, h fani'wihr ft fubfequatur fattillhne temprefondh is optitneprofiiit, dUberfisBuc i/luc can licutk, fie ve&ievs isr operiens/olum, ut in jejuno & squalidifumo jolo lartifumi prati fpeciem oftendat. Secatur fingulis annis ter, cum adoln'it isrcorrobratae/l, is pecvrigratiffimum pabulum (ft. Gaudetpracigue kek aii. lts je? fabulofis in qu'ibm floret < zilate ifftmina perficit autumnno. -Leonardus Rauvros/iuf p/ppe Arelatem in Trovincia, mtnfe Maw calkgit, aliqufndofloret Aprili in monte Afemiino, teftes Johanne Bauhino. Geneva aktndrt',)vxtaArue isr PtcchoJoihium; repent flore albo, inpfregripatione Rbftica, idem Johannes Bauhinos: provenit inBrifgoia tefle Clufto isr inmmttt Blddo afferent! JohannePoua. Exit isr in Gtnnan'ut fepmom plerifqut locis & injiobeni* agrk, [ecus fcrubes, per quaspluvk delabilur. Ovobrythk frequent eft apud Bra- Kw-dros; flrcr Julio; (? Augu/lopi ficut ferma : plurimi fiunt frata, *» < i" > b**b* P^{rova} nit.

11. *Onobrychis* minorfiliculk ecb'natU alfiatU, inajoriba*, < * craffnbus acuUtpfduis dotiati, nei«. Or- minor feu Captt gall-T.iriia^ C. B. P*. is* Prod. Httcbtmaritimi* aratojis Provindaiffuxra Dlbiam isrmmoimbu* juxta eppidum V'igns reperitur; floret Julto, is- Aitguftafeminaperficit fua.

12. *Onobrychis* minorfiltcuHs clypeiformibus l*vibut, nobis. *Polygalo Gefneri* affim Caput eal-tinacfum^ Chabr. Provenit infahktis <? tampefiribm^adfemha&prope montem qui apudGal-las Narbonenfi's dicitur fanctus lupus ; illic ccilegh Heiricus Cli crier us Johannis Bauhiiti gener. Floret eodem temporexum cfttristetontiquenter eodemtempore femina ad maiuritatem perducit.

Onobrychis intanafoliis longhr'thmvel %. CB. Prod. Reperitur in Galloprovtncia florins i, mi-na producenfhdem cum cteris ttvtpeftate.

15. *Onobrychis* minor fexatiifs lutea, ncl>is. ~ Polygalon minus fexatilt, I.B. Chabr. Provenit inlocisincultis, afyeris is? faxofis circa areim Epifcopi Montyften/is. Fkretfunu, < P mat urat Julio, Fide App. ad Livuminn, ibifiu/puatur qudam hujut clafits.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Abundare laBepecudes qu* ilia virUli isr ficca pfcuntur, multumqut « tfa ufu laltis vaccis & extern ammalibus ~~capitum contingit eppoo~~ indubitato authn hu* tr AhJ^o adimurion eriatur.

NOMINA.

10. *Onobrychis* major filiculis ebingtis
Hift. Tab. Ger. Caput gallinaceum Belgium, Ad, LobJPolygakmuUcrJ, Lugd. Oncbr,-
(Us

*chis caput gallinaceum, Park. Onobrychis folds VicUfiucluechinato major, C«B. P» Polygn-
lon Gefneri Onobrychis quibufdam, I.E. Chabr. Onobrychis Vcdontiflcre ruhro, Ej>/? .Poly-
gaicn Rh*ti cum Gefn. Hort. App.*

11. *Onobrychis minor filiculis echinat is criftatis, majcribus acueis prceditis; fiobls. Onobrychis
minor fruftu echinat0, CB. P.*

12. *Onobrychis minor filiculis clypeiformibws Ixvibws, nobis. Onobrychis fruclu orbiculatopel-
tatoAcacU adinfar, LB. Polygalo Gefneri affmt' caput Gallinaceum, Chabr,*

Onobrychis incanafolik longioributvd^ . C.B. P. isr Prod.

1 3. *Onobrychis minor faxatili* lutea, nobis. Bolygahnminrnfaxatile, LB. Chabr.*

§. 8. Onobrychis Siliculis aferis in capitulum congeftis.

: \ *Onobrychis* flore casruleo filiculis hirtutis feu aferis, ad imum Platani piluhe mocfo
Sun&is, nobis. Glycyrrhiza echinata Diofcoridis, Ad. Lob.Lugd. Hajccaucsfepenumerd
pro^i: coniplures, altos bicubitales & tricubitales, ramofos, circa quos exeunt ad genicu-
la coftae litffinentes folia oblonga, alata, ex multis fibi invicem oppofitis collefta, Lentifci fo-
liorum figura, attamen majora, viroris faturati, & taftu parum aut nihil glutinofa: flores
è foliorumalis exeunt parvi, casrulei, ejuftem atque Hyacinthi non fcripti Dod. colonis, in
rotundi globuli fbrmam commifli, quibus tandem emarcidis major fadu8 orbiculus qwi ro-
tundam, aferamque PJatanipjlulam referre videtur, mntifque.parvis, fubruffis, aferis,
& hirtutis filiculis bivalvibus conftat, in quarum fingulis fingula continentur femina com-
preffa, faporis ejuiHem cum feminibus cterorum Lcguminum: radix pro?longa, craffa &
unica eft, brachii longitudine ac craffitie, candicantis intus colonis, forisquandoqueni«
gricantis, guftus non dulcis fed ejuftem cum cseteris Leguminibus. Huic ficut & aliis Legu-
minibus fimilibus-7rAtt} W'.>Aoi*ineft peculiaris quccdam natura, orientefole fingula folia pin-
nata in latitudinem primum aequaliter explicantur, mox unà cum afcendente fole eriguntur,
atque interdiu furfum omninorigent; qua? unà cum coft^ cymbam, aut potius navifcarinam
forma referunt: occidente fole rurfum folia fe demittunt, demiffaque pendent: quinetiam
aëris confitutionibus folia alata Leguminum reguntur. J^am fidies fceni fucrint, interdiu
(tornbdoquodiaumeft) creftafunt, pluvio/i8 vero, nubilis, triftibus&frigidioribus di-
eb JS, etiam xftate, atque ipfo meridiè fc demittunt; hxc omnia de foliis intellige, non de
corum pediculis, quorum pofitus neque à fole neque ab aëris confitutione mutatur.

LOCUS & TEMPUS;

*Gnobrychis b<*cdectmaquartaplurima, inqtii Viifcoridts, in Ponto isr Cappadocia gignltur ;G/^
cyrrhizg, echinata abundat & in Apulia, inquit Mattheolus, pr<efertim in Garganovionte, ex quo
quotannis fuccu* convehitur^iy magna radicum cdpia: floret deflate Isrvtrfws ejuftem finem aut
Autumni initium piluloi exficcatas reddit, is femina infiliculitprfcit.*

TfcMPERAMENTUM & VIRE S;

*Succus Glycyrrhizæ echinatæ, ut Diofcorides tradit, ad arteria excofferationes utilis eft, quem lin-
guæ fubditum eliquescere oportet: prodeft is ardori ftomachi, aliàs Oris, Jecinis, Thoracisqve
"vitiis, fcabici, vefte<t, is' renum affettibus. Succus cumpaffifpotus fttim extinguit fub lingua li-
faatu*, fuccu* denfatws -vulneribus prodeft illi, US, commanducatmfiomacho conducit: radi-
cufn recentium decoelum adcademfacit: radix arida fortiffime trita pterygiis commodiffime in-
fyergitur. I Umu* ons ulceribus Mfyergi, p, <eter ea qu* Diofcorides ait^ refert. H<e omnes vires
Glycyrrhiz,*yer<zistkgitim<e attribui debent, non huic echinatdemea opinione, nee plus dul-
tidinis in ejut radice unquam potui guftare, quam in Trifolio montano, aliifque Leguminibus i-
ftiut farm*.*

N O M I N A.

14. *Onobryt His floræ c<*ruleo, filiculis hirtutis feu aferis, ad imum Platani piluU modo junclis
isr&&ecoh*:rent'<Cit'>nobk. Glycyrrhi^a echinata Diofcoridis, Ad. Lob. Lugd. Tab., C&iduoau-
thores duos eifibent figuras fub vulgar is is- echinat* nomine) Ger.Park, Glycyrrhiia vera Dio-*

scoridis, Dod. Glycyrrhiza Dioscoridis echinata non repens, f.B. Glycyrrhiza capite echinato, C. B. P.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI
Aliorum^uc AucJiorum.

Propter conformitatem siliquarum articulatarum, asperarum, & triangularium, adaptavimus Hedyarum triphyllum Canadense Cornuti, perperam Cornuti & Parkinsono sic dicto, nomen Onobrychidis; eandem denominando Onobrychidem Canadensem vel Americanam triphyllam siliiculis articulatis, asperis, triangularibus: quam bene, judicent aequi lectores Botanici, & considerent nobiscum finem ultimum qui nobis ponit regulam certam a natura datam, contra arbitrium auctorum, sicut hic & alibi, nomina sua plantis perperam & inconsiderate imponentium.

Onobrychis spicata flore purpureo, C. B. P. & Onobrychis spicata floribus pallidis, nigris radiis notatis, C. B. P. pag. 359. col. 2. pl. 1111. & 12. Quam inepte collocantur haec duae plantae inter Onobrychides hic a Casp. Bauhino & alii auctoribus, clare constat supra in cap. 5. de Astragalo: cum sint plantae leguminosae siliqua gemella donatae, debent ad sibi similes revocari, quae madridum nos praeslitimus cap. 5. in explicatione Astragalorum.

Onobrychis floribus Vicia dilate caeruleis, C. B. P. & Onobrychis siliis Vicia majoribus caeruleis parvascentibus, a II siliis Tragacanthae, C. B. P. pag. 3r>j>t.x.Slx. Haec duae plantae cum gaudeant siliiculis duplicem seriem seminum in se continendis, non Onobrychides sunt denominandae, sed Astragali. Primus erravit Car. Clusius appellando omnes praedictas plantas nomine Onobrychidis, quem sequuti sunt omnes auctores hucusque scribentes de plantis. Hoc observamus passim, eacum ducere cacum. & utrumque eodere in foveam, ratio sola restat afferendo, quia nullus eorum finem ultimum rite aut cum debita penetratione consideravit, sed omnes quot quot sunt sive compilatores, transcriptores, vel transfatores, ad manus posterorum complurimas plantas a suis ultimo sub diversis generibus, eademque compulerunt & confusissimas ad idem genus reducere, non solum hic, sed passim, ut observare est in tota historia plantarum.

Onobrychis Tragacanthae siliis, floribus in globum congestis, C. B. P. pag. 351. col. 2. pl. 1111. & Onobrychis montana siliquis oblongis nigris Vicia simili-

&tt*, C.5.J>. ibidtbl.xiti. H* dtutfot Onl- pfcfts istuquit bivaiii'bisfut comprttbatnmm in Of- rtnacap, f. <h Oitbojkpnt, nte jurt fejjint O'o- orycDtdi diet, cum emms OnoOrycbii vel cjt futjn- fia ia bet caput ihtfum) Jititqtiis artmittds ajpe- tiiijnwlvjunttis, velsilrtuhr tchinatt! trtfatit, si giiiati in jl'tta dtgejtesrrgp hit dux cum fan b vct,m9^i\$pririt Mnumtrawur Orobis.Inj ffarut Ba*bimiS, cmtrrtqut aatbrtt rjutjr confunduat ha* duos Qrohi,jj>ecis cum W hie citatis qttirjattt vera Jjlr?ali &ec. daitiAijfirenter omntbt Oiiobrychidis. .. £x- amintnt< }*£' > "(hcintusBotamti r,tio>. Villt' ter tmbuti, tjjlatim if fit aen mum quam nob is ap- fartbt tapjui bit nojjitdm. detetius.

pa.g. if* col. 1 ph ., dycyrri-p ctitt tdnnatt, /<A Sauhtm P.,n. Gtryrrbitm hiLza Diojirtatit. Uffl. UglL G! Glycyrrhiv: vera tkicmf* iiermamcaftu dulois radix, tJfpUnc, t- ganitriBia radice perdulct prs Jit4, in timutaulium f,l,qu» noproffiuocritijfnduat, mcliktat gerens; in quarum f*g*lu tmtv,tmur quina, /n», semina (<,mprej*,>rot>mle: atqui bmt pUmi> Glycyrrhiza fki**[f*«ri<i*L>I. LuXd. ntc habil adicem siliicem vera; ergo dulctm, ntc(iUqHM conforms Glycyrrhi

S2 7 tJl * & * , sed cum pluribus, superiores caulium partem asperas habeat in globulum t' itas, & unicum in) inter O- nobrychide. ne cum t'u***dX,f,d_cjlfub*m<r*>ajtr,n^w, SS rUhn, Tacuces Trifoliorum iKontanorum tut neterarum OnQbrythidum,jj> **irTum, trEo optius inquam iifdtm nr. ViuU Qnubfychu possit dividiin ** classes: 1. Siliiculis art- irfutis donatis: 2. Siliiculis singularibus echinatis cristatis & spicatis digestis: 3. Siliiculis birsutis in globum seu pilulam Platani inflar congestis, seu ad im- beren- latit t

i,loi''' »jc_n tapttmiun ttmgjtji. X ,

LEGUMINA


Trifoliata seu Trifolia Leguminosa.

CAPUT VII.

Trifolium Bituminosum; Trifolium Pratense; Trifolium Spicatum seu Lagopoides; Trifolium Arvense sive Agrarium & Trifolia Varia Exotica.

Trifolium, Trifolium Dioscoridi l. 3. c. 123. sic dictum, quod singulis germinationibus terna exeant folia. Τριφυλλος in Χαρισματαίσις γνήμιον Græcis.
Genera: Dioscorides solum bituminosum proposuit, quod εὐφύλλος, κωνάρη & ἀσφάλτος, quod bitumen oleat, dicatur. At Plinius l. 21. c. 9. Trifoliorum tria genera enumerat: Menyanthes, aut, vocant Græci; alii Asphaltion, majore folio: alterum acuto, Oxytriphylon: tertium ex omnibus odoratissimum.

TABULA XII.



*L*eguminibus, seu siliquosis papilionaceis, bivalvibus, alatis, πλαγυκαίαις, subjungo Trifolia via florem gerunt papilionaceum, atque semen ejusdem gustus cum ipsis Leguminibus alatu. proterunt; imo locus, Fœnugracum, & Anonis, sunt Legumina seu siliquosa papilionacea diversis siliquarum generis Legumina trifolia generica Trifoliorum secundæ parte & semina omnium & singulorum Trifoliorum infra explicandorum masticata, Pisi, Fabæ, Viciæve, & id genus aliorum Leguminum supra explicatorum, semina sapiunt. His positis notis, Trifolia in Creticum spinosum; Trifolium Lusitanicum corniculatum flore rubro, Particinsoni; Fragaria; Oxys, sive Trifolium acetosum; Trifolium paludosum sive Menyanthes, cæteraque Trifolia non pollentia conditionibus supra à me hic requisitis, non sunt Trifolia leguminosa

leguminosa; ergo debent à Trifoliorum hic proprie sic dictorum familia longe arceri & o-
maino excludi. Trifolia leguminosa differentias suas sortita sunt à natalibus seu locis in
quibus

fimiliridinc,
ne uniuscu

at, ut sequentis paragraphi secundi omnia, item & quarti & quinti para-
sed primi seu Bituminosi denominatio desumitur ab odore sulphuris,
contrita redolent: cetera omnia à spicarum aut fructuum involucrorumve
genera sua intermedia desumunt, ut perspicue & clare apparebit in deductio-
ne generis intermedii.

§.vx. TRIFOLIUM BITUMINOSUM.

Explicatiopartis Tab. 11. 13 (9. r4_

1 - T ^ * bituminosum feu Trifolium «r ukurn am: viobcemn, Mtumen redolens ,

Trifolium hoc bituminosum in fruticulis excrevit cubitalem, sesquicubitalem in
regionibus, virgultis rigidis, incanis ac etiam nigricantibus, striatis, donatum: fe

vexillum hic, sicut in omnibus leguminosis hinc Ta
cetur) binahbia Uaf^latralianobis fcdE r

femea nigrum ^ erum & l ^ S

cepto co quoci folia omn. penitus odore destituta
redolent. Serap. as Handach hachmi nominar e cuius L i -- li
3d articantam, dolores expetitmn. Tex o de Z
li, hujn, ante cades prUunt; & « ^ ^ t, ut Mattheoli figuræ minores osten-
dunt; cm vero canescit & aducln est, acuminata redduntur, quare neququam binæ fi-
gurae sepe tend. Cntfecit Dalecha. p
tenfis itidemcompiator; akerum

cum rotunda ^ m lo ^ f ^

r. 0 C U S & T t M P l l s,

Trifolium bituminosum repertum (st primu in ayyo I uenfi circa Lunam 4
ptrunwerfam Uttrunam notsmumi8 ^fnfoliui.H_ym\sfTh(Z_r<* J < I i Maffil,<y
f amen ex Italia aUatum,tm*que mandatum^lantam profent odon I> • " ^ M: fTM^m
ant nititlinferiors, femea itidemhalicum sapore referti j b ^ t a / E j '***& * f+mn
hijce sept
itur sic, ut ait Vlgiliut, non omnis fere omnia tellus. ^4 igitur hJIXm"
takjdumisrcelumipfifamiiianniuirunu SuTofbacea Terra iSSSSSI'
at, unde mom Tophaceta Neapoli imminent a Gafaio Trifolinm difius est,

b

TEMPER.AMENTUM & VIRES

Vis Trifolw, quod ASfhalibnvacant, calida isrficca est
turn laterum dolom ah ohfirumonibm likrat, ut ait Galenus, proinde infusum & po-
folium hoc non solum menses provocare, urinam mensesque provocat. Hippocrates Tri-
dit: mulkri (mqut) fi expartu sed & factus cum sumptum, tum appositum, expellere tra-
etiain uienfes eJucit iy firtume'nei non fuerit purgata, Trifolium hoc in vino a
rin*JScultan, tomitialihus, Us ttiam mi aqu^i^l
"uxiliamur. Dan autan dtbtnt fninis drachm* Z c iorum vero quatuor
«ntu^ utThnat* dditur, utait-Vkfarile* r*ol

N O M I N A.

Intotoni bitumincftm feu Trifolium cjrtrtleum aut violaceum bitumen redokns, nobis. Trifolium bitumen redolens, C.B.P- Trifolium bitumniofiw, **Dad.** Cjrf. Cain. Tab. Ger. Park*Trifo-Hum Affhaltfum, **Jtfattb.** Ad. Lob. Lugd. Odor at urn isr wn odor a turn, I. B, Chabr.

§. 2. TRIFOLIUM PRATENSE.

2. *Trifolium* pracenfcalbum vulgare odoratum, nobis. *Trifolium* pratenfealbum, C.Ij.P. Fuch. Dod. Gall. Hoccaolcspalmare promit & longiores, rotundos, fubinde nonnihiJ hir-utos ut plurimum per terrain fratos aut procumbentes: folia fummis pediculorum infini-unc **[eruaifimu]** juncb, quorum Inigub, qua* terrs ac radiqibus proxinia, rorundiora it; **qaxveco** fecundum caulea **nafcuntar**, oblongiora funt: rotundiora & inferiors cre-andidiorem maculam *St%nfai Luax* fere crefcentis fimilitudine, in medio fiiiiga-.,.nt: flores infummis caulibus exeunt iff capituli moclum, aut in fpicam breviora, .ehti, colore pallide candidi, & olfacieiti aut guihnti grati *Si* perdulces: femina in xtguis & c-jrtis /iliquis bivalvibus, **qaa'tema** aut quins, mimita* in **Sngnlis** confpiciuntur, nde hac fola ratione **evidenter** a **Trifoliis** csteris, prxcinut pratenfi purpureo, diftert, cum ujus capfuih unicum taiitiim femina infundo capfulae IUE contineat: radix Io'Aga, fibrofa, longe latcque repens & fe diftiindens.

L O C U S & T E M P U S.

Nafcitur in pratis ac humidis arvis paffim, felidus provenit in prat is Us qu <£ aquit ftuviali rigantur; fed in pratis ficcioribus, alufque krbidh mglellu locii, graliorem Birat odoremjhnficwre» xpte-jzv ('id'eft inter album & htzopallidum medio) apibws valde expetitn. floret Maio & tardius, ac deinde postprata timfa, rufus verfuijlnem <rftatis, Menfe Aagufiois Stftembri drnuo flores edit cop'tofejatis: fcminifert quaterna, quina, in ftingulis filiquis perbre-7/ibus hivolvibws, uti difiim.

T E M P E R A M E N T I F M 8c V I R E S.

Trifolii hujus cum flores turn folia refrigerandi acreflccandipotentialiam obtinent. Fertur ex borum dtcofto, **aJditomdky** enema imeftmorum rofioms ac dobresfedare, iffvifcidos kntofqm ad-btsrenteshfeink humomeducere; ex tffa veroberba tatapldfmautiliter inftammai'icriibu-simponi. Pafcuntur vero l'rb'a hat cum boves tumjumentaetera, at utili/ftmевttuli isr agmlt: flores apibusgratifunt., <y tonfickndo mdli apii, fi apes hac krbaprope alviaria cotifita utan* tur,

N O M I N A.

Trifolium ratettfe album mtlgare odar at umfliqua bivalvi, nobk. *Trifoliumprate* fife album, **£ B. P. tucb**, bod. Gall. Ad. Lr, b. Cmn. Pratenfe vulgfre, Thai. Pratenfi al/eram, **Matth.** Trag. t Pratenfe, **Qer.** Park. Ccui vitiofafigura. **J Pratenfe** 1 - Caft.

"*•• *Trifolium* pratenfe album fiii<liia bivalvi, caule fiftulofo, folio fubtus purpuronigris .calls notaco, **nobis.** Hoc cauliculos profert procumbentes, cavosfeu fiftulofbs, pedacul. C5 & fefquipedales., in **quofnm** fummis **alia** exeunt fiorespapilionacci, magiii, fubalbidu feu * ochrdencocolorcpracdici; quorum fungufis iuccedunt filiqiiarparvy, bivalves, fingulzcontinenresbma aut terna femina niimita; in hoc convenit cum Trifolio noitrati vulgart albo, acfactlediftmguitura foliis latioribus, ad extremum pediculorum fitis, & fubrus maculisnigropurpuranti!).us notatis; nollraci, vcoalbi vulgaris Trifolii pratenfis folia **fopra** infigniintuniir-ilis: deinde tertii hujus caules funtnialto longiores & /iftulofiores; filiqua:ctiam bic-vit conicquenter pauciora in fe continent **feraiKf** minuta.

L O C U S at T E M P U S.

7,-Provenit t., *tm i'l humidh gratis, *qua riguk^pr^cipui ubi aquitflagnsrnthyemejntra ft-

pta RegUChamhrt. Floret eadem anni tempestatetum nofirate Trifclio albo pratenfi vulgari, fed tar din* aliquandofemma advwturitatempducit. Vires isr facultates eafdbn cum priore cbitinet. Nee aliudnomenfortitur quam quodnos eidem ajftgnavimus. Vide Tab. decimixquart <z plant am fecundam illkfculptam, isr de novo exhibit ai^.

4. Trifolium album tricoccon fubterraneum Gaftonium retfenlatum, nobis*. Hoc inenhte feftate flores fert albos, longos,* raro difpofitos ; quorum fingulis deiduis fuccedunt involucrareticuli in modumtafta, coritinentia inipforum gremioterna femina, ternis fuis diftin&is filiculis utplurimum inclufa : evanefcente flore, ftatim. in terramdefcendunt rudi- rrientafilicarum, feftaque ibidem conduntad aliquot uncias, praecipue in fabulofis pratis a- grifve, inibi etiamperficiuntur &eo nomine nos fubterraneum nuncupavimus, & a terms feminibus (utplurimumvuti fupra di&um, nifi coclum & folium refragentur) tricoccon no- minavimus: deindeRegiumfeu Gaftonium addidimus, qUoniam a Celfitudine ejusRegia, Av- rclianenfi Duce Regis Lodovici xiv. patruo (ut noniullae alias plantar hie defcriptae) pri- nio tuit deteftum.

LOCUS Zc TEMPUS.

Provenit Fpnte ino?nnifapratis humidis cum Gallic turn Angli* isr inerketishuimdis, imo a- renofes multis humidis lock, minime herbick. Flor** ineunte tftate atque media ejufdem isr a- liquandi)- verfus ejut finem femina maturantur. VM* f^{ab}. Mmaquaru tertiamfculptam, nufquam antea exhibit am. Nomen hoc huic indidw**pani*, viginti abhnc annk aSeremj- fimo proedifto Prindpiprimb obfervat*.

5. rr^ pratenfe purpureum vulgare, nobls. Pratenfe purpureum C. B. P. Trag. Fuch. Ad. Lob. Trifolium hoc ex rad.ee crafliufcula, adultiore fere d.gitah craffitudme, fibrataundique: cauliculi funttenues ft^{riati}&partimhumi repunt,partimfunguntur, ful- hirluti: folia numero&poficu c^erorumTrifoliorummore proveniunt, nuncrotunda, a- iiasoblongiora, interdumlineisalbis, obliquis, feu candicantibus ftrus mfignita.; inter- dummaculisalbisfemicircularibus: flores autem glomerat, utplurimum, paffim in pratis rubenf perr 1. Ar. nte fc riatura albefcunt, ma^ores funt multo floribus Tntolii albi pra- tenfis vuka. rati, fuperius explicati: eft enim odore non infuavi, at multum Trifo- lio albis floribusdonato& r^eundol?c0defcri p^{to}cedunthu)us fl^{or}^, guftanti ficcitatemof- ferent H' differentiae plures lunt, ratione magnitudinis cam foliorum, quam cau- R: f^o^^{us} folia communiflime rotunda, quibusdam funt oblonga, rarius in extremo g^{om}fructuiim. m unum alterumvetolium inbinas, te mas, etiamquaternas laciniastin- nuata: non n^{cau}liculo foliorum minimorum veluti taiciculusin umbellae modum infidet: viditur: ra^ macula eft, vel nlgra, velalba, Lunae talcatae figura: floris color com- quibusdam * r^{reus}^ modo faturatior, modo dilutior feu pallidior, & perraro (uti diftum) muniter P^ s unum aut alterum reperitur degenerans in album, a contingent^ aliqua aut inter i^ ^ j d u i, aut terrae in quam cadit illud femem mixtura & naturaf Notacapfulam femim^ i^o ac & r^{re}iiqU^orum fequentium Trifoliorumjiabere in margine feu limbo fuperiore quin- hHUS, il^o u^o i^o as ftdiatim apparentes, & in fundo calycis ampulla rotundae in modum conftru- que MPⁱⁿ netu nicum femem ; non autem filiquam fuccedentem fingulis floribus bivalvem, uc m. C^on ft in Trifolio pratenfi albo, Phazo fufco, & Tertio, caule fiitulofo, folio fubtu^s rmacu- videre e la nigrapurpurafcente notato. Alterum pinnatum repens a floribus intenfius rubellis & ra- dice repente a vulgari purpureo faeile cognofcitur.

LOCUS & TEMPUS,

Scatent hoc Trifolio prata omnia ubique terrarum isr gentium, uride ei nomen ; floret Maio isr7u- nip; fl^{inim} Pfi m. n^{fn} maturat > h^{if} m^{ferh} P^occupetur. Aftringendi habet vim isr exi- RUAAcrimoniapr*ditumvidetur. De tiomimbus fatk diSiumfupra. Alterum pinnatum repens flonbws intenfius rubellis ibidem cum vulgar l reperitur inficcionbu* lock.

§. 3. TRIFOLIUM MONTANUM SPICATUM fen LAGOPOLIDE >

r^{ijfa} in hoc tertio, membrofendivifione&fub^{ter}tio § a nobis difpoficr, quoad nata- 1 les provcBiunt in montofis. Iocç aut pratis editioribus colliciiliJ, atque in f^{pi}cam longioremdefmunt, & flonbusd«verfor^{uni} colofum, fed utplurimum, ubruum, arfte in fpi-

am congeftia <ornantur, quibns fuccedunt arte etiam in fpicam Oompaftas capfute afperc,
atione quinqc fpinularum fteliae in modum/afugio caulium infillentes, & pedem leporisafperitate auc nirtute references, undeisnomen Lagopoides inditum abauthoribns: in fingularnm capfularum feminaliuf" fundo unicum conlpicir.urft'ineii rotund am, mera Legumina mafticando fapicns.

*

p_{3rs} T A B U L A XII, & X I I f.

1. *Majus fyica oblongs nobk. Trifoliummajus, 3. Cluf. Hi/I. Pan. 0*
2. *Alp'mum anguflifoliumferenne, nobk. Anguflifol'tum Alpi-Tium^Fondt Ital. 0*
3. *Annuumfolio birfuto, rotunda, Trifolii pratenfis albifbrma, nobk. Lagoput maximus folio isfacie Trifolii prawijis. Ad. *Lo5. 5?*
4. *Pinnatumfpica longiffima, nobk. Lagopus altera folio pinvato. Lob. Lugd. 0*
5. *Trutfans'wcanumCreticum^ncbii. Ebenus Cretica, Font Ital. 0*
6. *Hirfutum anguflifolium iy rotundifolium Narbonenfe fyici dilute rubente, nobk. lagopus. anguflifolius Hifyanicus, Cluf. Hifi. ?*
7. *Afiguflifolium min&sHifpamcum,nobk. Lagopwsminorfiore rukrimo, Park- ?*
8. *Arvenfe bumile annuum five Lagcpus minimum vulgar is, nobk. Lngoptafivepeskporinus^Dod.ut* Lagopodiumfeupes Leponus, Ger. i?*
9. *Minus annuumfolioioncrenato, nobx- 5*
... .. (Acuto, nobk. for for)
- to. *Minus annuum fcho crenato^^ ^ mh^*
11. *Alburn pertnne fyicft rotund37 folikincank, nobk, Trifoliummajas l florealbo, Cluf.Bfl. 0*
- i z. *Palliikluteumfeucbrokucum annuum birfutwn, nobk. \$?*

Exphecatiopartis TabuU 12. ispartkTabuU 13.

1. **T**rifolium purpureum montanum majusfpicaoblona, nobis. Trifolium majus 3. Cluf. Hift. &Pan. Hujuscaulesfuntcubitales, craifiores, nodofi :fdliaex fingulisgeniculisalternacimcaulibus adherent, longa, ftriata, dorfb magis eminence & elato^ laxavelati quadam vagina in binas appendices definente, caulemample&entia, Trifolii pratenfislongiora, illifquonon minus dura, & per oras denticulata, guftu nonnihiJ aftringente;huic fpicavulgaris major &oblongior,elegantiffimafubrorum flofculorum,è calyculis quinquepartico in margine divifis emrgentium, lerie compafta: radicem habet Trifolii pratenfis purpurei fim^c^m, vivaccm,&rfingulisannis plures caulca proierentem.

^rnyo/f<mpurpurcumanguftUoliuni Alpinum^ons Ital. Park, trifolium hoc Alpinum feu montanum radice confat longa, fibrofa, & fqu^{an}iofa furfum verfus, deorfum verfus tenuitiatunn aliquot fibras, extra albas, intus duras, lignofas ; fapor ei dulcis elt, quodammodo Licjunitiae lab primum gultum accedens, m volunt quidam cV fine ratione authores 11011 rite&esaftefacisplantas faas examinantcs antequam nomina fna rmponanf. CNecnoſa-Humaciteris Trifolii guftum in hoc percipere potuimus, faltem nllatcnus Glycynhizs accedence radicem capite oriuntur plurima folia longa^ingufta^labra,ternatini pediculis biuncia verfusterramententibus annexa, in margine levicer hirliita ;cxtolionim medioorui bini terni cauliculi, tres aut quatuor uncias longi, in cimis fuitinentcs^ores amploscol'eganter rubelli, & in fpicam rotundam ftu capinilum congrftos, qTsrum "ngul fingulapiulis, quinquefariam in margine divifis, infifhint; atque in fundo iminfcu-ju'que capfulx unicum facet femem , a'iorum hujas claiſs TrifoUorum kgurtimoforum

more.

3. Trifo/iuh

3. *Trifotium purpureum* annuum folio hirtuto, rotundo, Triolii prjctnfis albi forma, nobis. *Lagopus maximus*, Lob. *Trifblium alboincarnatum* 1 pi ea tum feu lagopoides minimum, I. B. Chabr. Hoc *Trillium Lagopoides* radice donatur tenui, gracili, tribrola: taules pltircs, dodrantales, cubitales, ImTuti & finiplice-sdint, in mukosramulosdivifi; quibus (picatini multa infittunc cap'tula oMonga, floribus ex infamatis & albisonufta, cjiibus Gagulisde, ciduis iuccedunc fingulscapfulje, quinquepartito in marginedivilx., atque in rundoaliorum liuuis fortismore nnicnm continetur femem rotundum: folia pedictilo villoib infilVuni, cy vaginafua brevi & liirfuca eundem petliculiim amplefcente terna, fubrocud; i, liciora quam longWa, hirtuta pariter: Ipicxduarimi ant trium unciarum tioribtiscoiithiitalbis, dil>tj purpuracommixti^ ex calycilius admodum villofis, in fpiinsfca pinnas 5. definendbos; feniennmajafctilum, ftihronindum, lucidum, pjllidum, Melilon vulgaris (eminibus valile ?cedens: faporiscfl Firoram, proutomnia Triolioruni Leguminoforum lerefenua.

% rr//o/j<i//purpureummonraA]mpinnatuni Lagopoidts fpica longiffima, nobis. *Lagopus maior*, 1. Dod. *Lagopus* alttra fofiopinnaro, Adverf. *loh. Hoc* ad cnbitum & *icquicabitum* exercit; caulibus craffi, rcali3 varic divaricatia *lonfpici* -ir; in >'" = lubinde ludic^ jx interdum in macro & glarefo Ho vix femiunciam excedunc, in pinguiore autem loload l>inas & amplius pertiAi-nc ar.ctas, oblonga, acumtiwca, quandoqaemuoinnciarum, ferrmccialilantadine, concinnc pa ambitomcrenata, Sdmodnm venob, qaae ibnselr ganriffimi5<innipenn2simirjrtur; terna fcmperconionfta, & ped.cul, iumn-im. in mxa qm in vaginam definens trium est unciarum, « q « « eadem vagmaormncur ramafcnli fultincntes florcs papHionaceos rohentcs, infpicani numcalem, al, quando, <In wrtn. congefiv, prodeunce s Mlibusquin. ^ part ^ in margine d.v.fis, fingut., fingpfain lun-

doconrinrmibasfcmma. f_{rDe}fcens, incarmrn Creticum, nobis. *Ebenus* Cre-

5. *irijolium* purpnrenni Y^ap ^ ponar- Friicicolanihanc Tritolii fpeciem Ebeni fecunica, Hon. Belji, Ep. 4. a • o ^ ^ ^, ^ Virgolcis lencis, tcretibu. % cana hngine pubtfcenP, Woemfigniverntt<axi q ih folia confpicilimtur uncialibus edicillis appen f. ter-

"ua uunarur noc >>>. on & a) 3cutn, villoia, albida: nores in fpica digeftos, purpuralccnns na Cytiforum mf>do^ ^ y ^ des nTliius FoMo Tritbii Dodonii, gerit, veldilute rubros, < pariterceuTn^o^ ^ iyC-, bna candicantibus irt qninns cnfpitlts rfcfinentibus ortos, unicuironicalislea l^Julo tulkini fubjicitur ncurninatur: femem in calycis fundo clauditw album, autem ro^^, vullgarjs i'emJn valde acccdens. Honoriu's Bellu s sic defcrib< Ep.^ ac lClu-

Creticus frutex est torus obliquus ad quatuor aut qeto^ de cubitorum altitudifoliaprotert terna, fimul)inaa, avR<nt<, incana, Trifolti xmula, dorfoa-nem affurgens: liquantulum prominente: flores lictans majores autem lictans majores in quibus intermixti sunt albi quidam villi, qui struthiocameli pennas, easque in minutiffimas partes divifas emulantur, & ea ratione flos elegantiffimus apparet. Videtur enim ex purpureo & argenteo formata: majora: maticric lignca, nigra, dunflimaque est: cortex cincreus, & totus HiHuns profund^{is} plenus.

Exptkario partis Tahuldt <tecim<f/tertU-> Sectionis secundae.

Rift-fium purpureum *Lagopoides* hirtutum snnuim nnguftitolium & rotundifoliuf n, fpica dilute rqbentc, uobis. *Lagopus* angutbtblius Hii'panicus, Glu". Hilt. Hoc, gen us L-agopi famine ex Hifpaniis excepto natnmeft Clufio, cujus Iconcm ad Clufium niirte W jacobus Flatau. Nos ex planJ ipfi delineandann nottram Iconem & fpicam curavimas. Catalan protiidit uruoim immediiia- e terra provcflicnteni, & plures ramos in i'uperiore caulis purte efficientem, quorum fummiscimis infifot fiofculorum numero fus grex (tacacim^ fen Lagopi intoimam provenientium: unicum inquam tulif. caulem gracilem laws f-imm i-imum, nodis quibus dam dirtinfum, juxta quos bina, terna^ oliolafeminncialia, angufta, mucronata, con(V)icjuntut; nafcentibQS ad fingulos prrdifto Enodos pediculis, (at)3 laxa ft-decaules amplefcentibus, quorum extremis terna infident folia, non orbicaba, fed longiufcu^ 3: angufta, carinara, five dorfoelatiore canefcencia, inftar rblioiumr-ulgarris I agopi: rummiramidtfincbant in iongascau iculornm fpicas, equibusemereunt Holculi vulgaris I agopi forma fimiles, & fere concolores, hoc est dilute rpbences. Simile, vcl illud ipi'o* genus

genus observasse meminit Carolus Clusius in agro Salmanticensi ad vinearum margines, dum in eorum vivebat. Datur 6V huius akeræ species foliis hirsutis subrotundis, tota scilicet pilis canis. Folium huius sculptura exhibuimus in Tab. aenea, adjectum priori jam descripto.

7. *Trifolium lagopoides* hirsutum angustifolium Hispanicum floribus ruberrimo, nobis. Lagopus minor flore ruberrimo, Park. Hæc minor Lagopi Hispanici speciei folia habet mollia, incana, angusta, innuonem acutam definita, non cæmen tam longa, ut prædicti sunt folia; caules vix ad altitudinem femipedalem ascendunt; spicam gerit tenuem, barbulis tenuioribus frangibiliorem; Mores protrudit elegantissimi rubicundi coloris, quibus finguis frangibilibus succedunt capfulx finguli, villose, pluribus radiis in margine vix rotundem stellatim onusta: quando femina in capfularum fundo est maritima. Plantæ tantummodo modum priorum in Tabula descripta. Hoc etiam legitur ex Hispaniæ in libello ad Johannem Parkinonem nomine Lagopi pratensis Bartier crevit.

8. *Trifolium lagopoides* purpureo-venosum humile annuum, seu Lagopus minimus vulgaris, nobis. Lagopus minor, Dod. Lagopus minor hic venosus caule nascitur erecto, rotundo, foliis trifoliatis, angustis, incanis: paniculas seu (picas in fumis caucolorum cæramulorum græcè molles, lanuginosas, leporinis pedibus simillimas: Sores ut plurimum minuci, albi, tantillum prominuli, quorum fingulos femina excipiunt exilia, lutea, Pifum ex teraque Legumina papilionacea, filiquosa, bivalvia redolentia & reficienda: rariofi caules toti cana lanuginosa pubescunt, quibus minuta hirsuta seu incana terna folia adherent, unciam circiter longa, culmum lata; lapore subfragrante, fœne ficcante: radice subest exilis, tortuosa, candida, fibrata.

9. *Trifolium lagopoides* minus folio acuto non crenato flore minore dilute purpureo, nobis. Hoc vix pedalem excedit altitudinem: caulem producit ramum, in cuius fumis hirsutis proveniunt capitula uncialia, ex quibus emanant flocculi papilionacei dilute nivescentes; quibus succedunt capitula quinquepartita in margine partita: stellæ in modum, continentes fingulæ in fundo unicum femina rotundum. Vide huius iconem in Tab. decima quarta.

10. *Trifolium lagopoides* minus folio acuto aenato, C. B. P. Prod. Cauliculus est pedalis, firmis, rectis: folia rarius disposita, ternis ab uno exoritur prodeuntibus Jonais, angustis, nervosis, acutis, furfuraceis, in ambicudentatis, aliquando profundius incisæ: in caulis fumis flores eleganter purpurei quasi in globulo seu spicula oblonga confiti. Est & a Vindobonum montanum purpurascens, folio obtusis, C. B. P. & Prod. Hæc caulibus ramifera, foliis oblongis, angustis, fedotifis, utrinque crenatis, caulis ramuli frequentioribus & angustioribus foliis donatur: flores quam in prioribus & purpurascens. Vide App. ad Legumina.

11. *Trifolium lagopoides* album perenne pinnatifidum rotunda foliis incanis, nobis. Majus. seu flore albo, Clus. Hist. Hoc ternis quaternis affurgit cauliculis pedalis, tirmis, teretibus, circa quos nascuntur folia rara, ferè rarius disposita, oblonga, angusta, dura, nervosa, carinata & dorso latiore, terrena fenestra ab uno exortu prodeuntia (ut in reliquis trifoligeneribus) incana seu hirsuta, ambicu veluti dentata, ab radice frangibiliora & majora. flores proveniunt in extremis ramulis, in quoscaulis separatur & eidem hinc rennunt. frequenter, spicam brevioris formantes, albocoloris & nonnullis odore pediti: radix a, minimi digiti crassitudinem arquant, fusca & denfocordata testata, longa, aliquot fibris donata. Vide App. ad Legamina.

12. *Trifolium lagopoides* annuum hirsutum pallidolutescens fenochroleucum, nobis. Hoc folia edita ternata, incana lanugine obfusa, atque ex vaginulis aliorum more pediculis biuncialibus sortis innitentia: infestigio caulium pedalis referunt, nonnunquam reclinantium proveniunt spicæ oblongæ, unciales & c. biunciales, Lagopi vulgaris infar, coloris pallide luteo potius excoloreo. Atque compositæ, floribus hinc evanidis finguis fingue succedunt capfulx quinquepartita in margine divise & fingula femina rotunda continentes in fundo. Vide de his Iconem in Tab. duodecima ante Lagopoides nennatam & refer huc Propter olerum, extra gremium trifoliorum spicatotum fen lagopoidorum Hæc purpureo illic donatur.

§. 4. TRIFOLIUM ARVENSE feu AGRARIUM.

4. Paragrajhm hie qaartus comprehendit Trifolia passim in arvis & agris sponte nascuntia, quoadversis & variis specierum formis diversimodi provectitantiuni, diverse nominantur, vel sunt flores luteo, vel Quercu purpureo; de illis primo, de hisce secundo dicemus,

Pars TABULJE XIII.

Trifolium arvense feu Agrarium

<p>Luteum</p> <p>Purpureum</p> <p>Fragiferum</p>	1.	Minimum	ri. Mains. \$	
			Minimum. •?	
		3.		ato cum unguiculis, I. B. Cha
			CaPituekmtratorigido, IB- Cbabr. ?	
		6.	Glomerulis tomentos per	provenientibus, I. B. Cb
		7.		Ltvi, nolat, C. B. P. ☿
		8.	Aspero majus, nobis,	C.B.P. ☿
		9.	Stellatum Monstresulanum, nobi*.	Triflyium flcllatum purpureum Monstresulanum,
		10.	Glomerulos	obhngosprefmns exgemculk* LB. Chabr. \$
		11.	Glomerulis	Personatti nobis. Trtfoliumglomtrulis Ptrfti no
		12.	Folliculatum	J u Salmanticum, Cluj.Hijl. ☿
		13.	Frificum folio cordate, flare	Rubro. ☉ Albo. ☉
		14.	Nofimfolio cbkngo, flore	Rubro. ☉ Albo. ☉
		15.	Veficariumminimumamjmlatum rubelfafijaro	positis, nob.

Trifolium Arvense feu Agrarium spectat.

Ex tab. 11. partis Tab. (secundum).

1. Trifolium agrarium luteum capitulum pulcherrimum, nobis. Luteum Lupulimum feu Lupulimum. Hxc Trifolii agrarii species multa habet communiacum Trifolium agrario luteo marci Johannis Baubini, quod nobis dicitur Melilotus minor tumilistrina nostra de Meliloto infra. Radicem habet exilem, daram, ribrognricis, hirsutos; folia tergemina, servosa; ^orem luteum, fed magnitudinem Horum lormdifferentem, duploenim & triplomajores sunt liuc glomerdine & ^onicapitula imitati, fed minores contrarioque sic squamarum, quarum unaruli, I^u P^u f^uira fupremum corticem Hofculorumpetalum reliqua finulboocukans.

2. Trifolium luteum Inpulimum minimum, nobis. Hxc prioris est alia species distincta mino- & exilio • fitu luimilior, \\\% enim biunciale excedit altitudinem, in humidis passim provenit & quatinos, quinos, minutos flosculos, luteos pariter, raro difpositos, in (nmmiis cauliculis #££vibus tert; quibus etiam eyanidis succedunt. Ilmina minnra, feminjens pñ Edisti Trifolii | -n Hiliⁿⁱ majoris multo minora. Prius V majus dicitur n ^nwi Bauhino Trifolium pntense feu- u'um f rmina Hore pukhriore five lupulino, ast ut supra diximus & ut infra latius patebit, frilolium prafenfe luteum mas Hore minore femine multo Jobannis Baubini est vera Meliloto fptics.

3. Trifolium luteum parvum rectum flore glomerato cum unguiculis IB f • Longs ac renuibus fibris radical nm est hoc Trifolium, niultos finui caules f^unii, o» -tis, ml- marcs- Sc lesquipalmarcs, trectes, glabros, prope tertiani albefcentes, carters n t - rntcs aoc vltimo, lura idioas lctgimms, gmda, vchoia leviter ferrata, nonn: hil etiam co. data, lon- volutis: que autem summs ramis adhenne brevibus innituntur pccioluj «rcs cum fammo caulium fastigio, tun e^u corum

eorum laterj^hbas glomcratim coherent minuti, unguiculum aviculas imitati, ex calycibi/& majufcjlilis, glabris, friatis, per extrema denticulacis, duris.

4. *Trifolium* capituloglomeratioridorloreuteo, I. B. Chabr. *Hoc* tenuem fingularem habet ra^hcem, paucis fibris donatam, ex qua furgunc caules aliquot dodrantes, fubhirfuti, atrorubQntes, vafiedivaricati: folia terna, longiora qnam ftellatifiiperioris& tantillum hirfuta, oblonga, per extremum rotunda, foliis Lagopi Fuchii fimiliat caulium fastigia <omant capitula fingularia, glomerata, compa&iora, rigidis fpinulis quafi confantia, Butomi,echinis paria, imo Bardanas echinorum aferitate hifpida.

5 > *Trifolium* luteum nodofum feu nodiflorum capitulis Thymi, nobis. Perexigua eft hxc Trifblii fpecics, fubexitum hyemis palmares & fequipalmares edens cauliculos, per terrain fratros, ad'quorum/ingulos nodos nafcuntur flofculi minimi, quini, feni, lutei, fimul & arte junfti, quibus efflofcetibus & deciduis fuccedunt totidem capfula?, ad nodos fingulos junftae, Thymi vulgariscapfulifhaudabfimiles, ipfiufque Thymi capitula referentes, in quarum fingulisfingula continentur granula rotunda, omniumfe fortisTrifoliorum minima; capfula pariter in margine eft quinquepartito divifa, ceterorum omnium Trifoliorum pfaedi&orum more. Confule Tabulas asneas 13,6c 14. in quibus obfervareeft capfulas plurium, eai;umque etiamfemina indeexempta.

6. *Trifolium* luteum glomerulis tomentofis per caviliumlongitudiinemadgeniculaprovenientibus, I. B. Chabr. Hujus cauliculi funt angulofi, glabri: folia terna junfta, ex oblongo rotunda, glabra, crenata, pediculo donata fere urfciali, cujus exortui adnata gemijã pinna majucula, ex latomucronata*, caulem complexufuo comprehendit: flofculi minuti, palliduli, glomerati, quos fequuntur folliculorum tomentoforum candicantium glomeruli, in'quorum fingulis veficulis femina iingula ruffefcentia continentur, nitida, atque apophyfeluti donata.

7. *Trifolium* Juteum capitulo fpumofokvi, nobis. *Trifolium* capitulo fpumofolævi, C. B. P* &Prod. Radiceeft hoc alba*, oblonga, fibrofa &capillata, cauliculis multishumi ipgffis, tres, quatuor, rarius fex uncias longis; foliolis parvis, ternis, oblongo petiolo hasrentibus, pjr marginem acutiufculè crenatis: floribus luteis parvis fuccedunt capitula incana, veluti ex pluribus yeficulis fibi invicem infidentibus compoflta,fpumamque referentia, quarum fingulis femina fingula, parva, rotunda, plana, inclufa funt.

8. *Trifolium* aureum capitulo fpumofofafero majus, nobis. *Trifolium* majus capitulo fpumofofafero, C. B. P* &Prod. Hoc eft radice oblonga, fibrofa; caulibus bicubitalibus tenuibus, tiexibilibus, a vicinis fruticibus fuftentatis: foliis rotundis Trifolio vulgari fimilibus, crenatis, praelongis pediculis donatis: inter quæ pediculi nudi, palmares, quandoque pedales eff'eruntur, qui finguli capitulum fubrotundum, nonnunquam parvæ avellanx: magnitudinede fuftinent, ex floribus aureis compofitum; hos folliculi membranacei, fibi invicem incumbentes, nonnihil à quibusdam filamentis exasperati fequuntur. Propter concordantiam incolore luteo florum, has tres Trifolii poftremas fpecies hie difpofuimus; at melius, fortè propter analogiam &conformitatem glomerum,ex totvefcis granulatimconjunftorum, adjungantur Trifolio fragifero, & ampullato, flore rubro utplurimum, rarius albo, præditis & infra explicatis,

Trifolium Arvenfefeu Agrarium flore purpureo.

9. *Trifolium* ftellatfm purpureum Monipeffulanum, nobis. & I. B. Chabr. Bipalmares non plane furreftos, quofdam etiam in terram prociduos fundit ex gracili ac tenui radice caules, totos denfa lanugine obfitos; folia terna, longis nixa pediculis, cordata, tantillum per oras fuperiores crenata, pcnitus hirfuta; florum glomeres divulfi, coloris piirpurei, perquam villofisconftant calycibus,quorumprnna3diduftas&radiatimdigeftaE quinque apicibus longis, radios totidem felife repra:fentantibns, ornantur. Multa habet communia cum Trifolio ex albo incarnato Johannis Bauhini, fed hujus folia non funt cordatã.

10. *Tifolium* purpureum glomerulos oblongos præferen\$ ex geniculis, I. B. Chabr. Hoc convrnit« um Trifolio capite glomerato rigido Joh. Bauhini quoad flores & capfulas feminales; diffeit autem ab e«deni in hoc, quod raacem agat duram lignofam, quas plures quidem, ut ilia, emittit furculos, fe<ip^edales, teretes, rigidos, pallide virentes, & ad fingula genicula recurvos: folia quam in iilo, diplomajora, longiora, nequaccordata, --r.tqueferata, longiufculis pediculis infidentia, qui ex membranacea quadam appendice articulos

v-ifficnte- prominent; geniculis porro capitula etiam oblonga, detifo rofculo Yufmpyipu., riimagmine ftipata, infidenc quatuorquinque autplura, fed profingulis geniculis(ngula; quorum calyculorummillisfriisdonatornm spices recurvi, rigid! interim, in aciitum de- fmunr mucronejii, nee tamenita durum, tirtpinofiim aufim dicere, nnllisitem denricnlis pradtum.

11. J"r/oAH?^>urpureumglomerulis Perfonata: Clierleri, I. B. Chabr. caulicula edit pal- nares; plures, hirtutos, foliis vctitos ternis JHctis,perext:rcmumiarioribus & quolicor- datis, pilofis, uniuictijufque coliculi faftigio capitulum hxret unicuni, majufcnlum, in Perfo- iatK modum glomeratum & ariftis longis, fed lanugine quadam albicante inreitexris, hor- •ens: flofculisinter aiiftas apparentilms purpureis, bafin aurcm ampleftuntur terna foila magna fubglomerulis hifpidia, Caryophyllacae aquaticx in fummis pediculorumfimilibr confpicua,

i2. Tri(i)/i«mpurp!reiniipratenfefollicnlatum, C. B.P. TrifolmmpratenfeSalmanricui Chif.Hift.& Pan. Lob. Lugd. Foliiculaceum feu veficarium minus purpureum, 1, B.Chabi. Hoc caalicjiliseftpedalibus, quinis ant fenis, humi fparfis: folia jrema conjunfta habec -ui petiolo adhacrentia, minora tamen Belgico, in amKtti ferraca &t parva, lividiufcull ma(ulainlignita: virgHrceretes ex alarum (inubus prodcont, fuftinentes capitella flofcul- orum,elegantiflima dilute purpura fubentium ; qnorum fingulis fuccedunc membranacei)ollicili,quinquepartito in marginedtvifi, aliarnm Trifoliorum leguminofbrum capfulu- rummodo, inquaramfingularum fundo turgido lacet unicumfemen rotundum,exile,fub- ruftbm: radix fibrofa aliorum Trifoliorum etiam more.

13- Tnfolkm ftagiferum Fnftcum folio cordato, flore rubro, nobis. Fragifcrura Fnfticom Cluf.Cur.Poft. Triiolii hujus fragiferi ficdiaitolia, a Trifcln vulgar,saIb, foliisdifferunt in hoc, qurx! Fragiferi Frifici folia fine cordata, vel debquinni in foliorum mediopatiuntur, vulgarisautem albifolianonfu.it cordata, tjoin m tionbus & leminum capfuls pncipue magis difterunt: fiores enim in globulum collecti ^rqtiam exigui lunt & dilute rubentes, aliquando albidu ouibus finsulis luccedunt capfulx ieu valcuJa membranacca, rubro* aci- nos, cum Ebmll rum colore referenda , cava, flrquafi veficula; parvx flacudiftente, in quarum fingulis tet fementulum, aiorum Trifoliorum feminSm %ura, atque omnes \x& vefici in"capitVlum rocundum concraftar, acarflenbi invicem junftaF,FragnmFragari2v«!- garis hottenfis ant Rubi Ida:! fruftumrubrum utplurimum, aliquando album, & forma,& colore valde ne font vulgomajora, unde faturatiore colore priditus

14. Trifolium fragiferum nostras purpureum folio-olLongo, nobis. Hoc folia foliorum fru- ftus longa, angufta, & mucrone obtufo non finuato pradtia, aTrifolio FrificoCluffii, ftllis cordatis pradtio, difcernitur.

15. Trifolium veficarium minimurii -jnipullatum nibellis floribus raro difpofitis, nobis. Hzc Trifolii veficarii ampullatifpeciesvix dodrantalemexcedit altitudinem, imofrequen- laccedit: flofculos globatim gerit, clegantis dilute rubri colons, quibiis tervixaph ftfocoednnt ampulla forma vefioe membranacex, pyriformes, inquam fin- evanefcentV Lntincnturfeminarotunda, fubflava feminisTrifolii fragiferi infar. Qjjicun- gulis fingU,f^e7efic\ilarUm6,7,&8.fupra&13,14) hocque i^ affociaverit non ob" quej : : (o colore duplici florum, luteo fcilicet, &c purpureo, nihil forfan absrefccric ftante diverfo

LOCUS & TEMPUS.

i & 2 Trifo^{iium} Luteum capitulo Luptdi majts to minimumproveniurtt pnffiminpratiit humidity * toko* epervm margins in dechviU fratorum l_{wi}. Florart per Mam p«7K dA_{am} a^t r,ufdtm Snemmaturantur corundum l'anna,

2. Trifolium A⁸ ?^a^«^w rTM " fore glowato cum unguulis, he NemaufA Cterle- nus ex lech bifidus is; fatty* evulfit^ubi rariu* eti_m occurrd>at. Floret? nina paulo velt perficifi ugnente *j^u (ut ante multa annua planta.) fuitfci & ex Vide Apf/ajLgumina.

*. TrtfoKuni lutem ctgtuh glomerate rM. Hoc ohfervabatur copiofum form hahtm^arvum, lunum, prope Montyelwrn, area caMlum no_{vm} Caftelneuf 4 Caftelnau path donate a-

5

6. Trifolium luteum glomerulis tomentosis &c. provenit in quatuor Provinciae locis. Vide App. ad Legumina.
* Trifolium luteum capitulo spumoso levi. Hoc circa Neapolim Itakrwi, mmaritimh ittk, & circa Monspelium, in agris & in loco Grampestate, atque paulo post maturantur ejusdem semina.
8. Trifolium aureum capitulo spumoso aspero majus. Hoc in salicetis Michelfeldae Hunningham ver-

K i^T^Mrtureum Mlatum MonUfulanwt. Provenit drcapatihulum Monfylknfe, «& * ^rJrn.ttttMBttmiffmtt tefcminaadmaturitatemprduit.
H % l t { m ^ 7 ^ o b ^ s ^ ^ ^ ^ . 'Xocfuitcfkfaminrupetx
1 o: S S T S f L <i HenrUoCterfaTohtJh Baubinigtnty. Floret sjlate, atque

sua perficit, ex quibus deciduis germinat planta autumnno, atque viget per Gallia Narbonensis & Galloprovincia, quia illic hyems non est rigida, siccis locis, circa Episcopi ca-
MwpJMo^ufn ^taJkrutJobannUBauhiginzmu & nuf^nahhadbuct-
fJT%7ete«dcmcumpr*dntempeffate-aW^^ lo post maturantur, ----ia.

>J« Treble Pnid<i *y^/fc*«r T«bol, ? » ^ ' « » * Tnfolnfnm^ %e-
Jltf^puTpumunfratferutn Frifuumfolw cordato. T^tatkj^r^T^^
finem Augusti, aut incunte Autumnno

P tuAndi-uerftsFristfhch^prffertimGTomngmfiagro.
14 iuMumpurpleumfrigifLmfolwohlongo.Boccirca Autumnumpfrincamp* iatoto, bumidis, circ* BUtfx, inhumidis camp* 3fe, ^ci ^&r»» ««/w^e ^«»»«« ^* ^TM^w;
^ruhro <*trf*Pt. etima&r&confeqHtnKrifc* continemesfermnaautrukjcunt aut al-

1 f s^k CB^rSww-5?S fer^^K
f H,c Lus Jrammaritinnproinj^ copiofj
juncos quibus fulciebatur, non procul à salinariis inter
EupeUami^propugnaculum Fort Uefprez.

mnrinlicia anthoram data opera omiffiTe & unum ant alcerum magis fi-
gnificativutn tanCUrt m medium P^0 TM^C ^0^ H uando degSierare in albos: hoc ob-
maniter flores prodact purport & TMbTM^H ^ f l ^ o d u c . n c crdcos aut vi-
«» «« licet pa&m inal»s genenbqs , nam <JTM <g^m quando al^ quæ à nobis pffi m habe-
neutiquam discrepantes quoad partes communes seu
offentiales, fed folo florum colorc.

& 5. Trifolia Leguminofa varia Exotica & alia rariora

Explicata doctrina Trifoliorum Bituminosorum; Pratenfium; montanorum spicatorum, seu Lagopi pedifve leporini forma provenientium, tam spica serunda quam longa donato-
ic; vipentium; jam reitant in hoc
rifolia exotica, minas cognita & rartora, exph«nda, mcpiendo* quai-
14.. fcilicecTrifolioniontanoGlycyrrhizite. ,

Pars TABULA XIV.

- 1. *Glycyrrhites*, Park. *Trifolium duke monianum*, Monspeliensibus. ©
 - 2. *Americanum*, C.B.P. f^B- Cbabr. *Americum*, Vod.Lcb.Lugd.Tah. Q
 - 3. *Pehatum Cmicum*, C.B.P. feProd. *Odoratumpntum Criticum ParL* I. B. Cbabr. <? »
 - 4. *A^rroSp.Atpm.dtExot.Abfa Alpinism Lotus JF^tiaca*, Park, S
 - 5. *Acukatatum Crmcum J.B.Cbabr. Trifolium fynofum Cmicum*, C.B.P. 4sProd. *Mattboked. Bauhmi. Cifius aculeate Cretice trifoliata*, mbh. \$
 - 6. >!!!« *argentmm ptrfictfiort*, C. B. P. *Trifolium argentcum Alpinum*, Font /-tat. *Cifius Alfinus argntntus Trifoliataflore Mali Perfect nobk*. 0
 - 7. *Lotutrifof/lris aCodiceCffarw*, Bod. IB. Cbabr. ?
 - 8. *Corniculatum Lufitanicum filiqua tenuireftapropmdente >nobh. Trifolium cornicu-* *WJto Ljfitewttmfioreruhro*, Park £
 - 9. *Corniculatum Crethum filiqua curva floreluteo,nobU, Cornicutatum/u/eum Creti?* *eum, Patk* Lotus Cretica filiqua curva prcpendente, flore luteo^nofch.* ^
- Festucaceum seu spica festucacea info Uata^olik* ^{r^Nmmr} _{<noh.K} 2. *Paucioribus, nobis.* ©

Explicate partis Tab. 14.

1. *Tjp Rifolium Glycyrryzkes*, Park. Dulce montanum, Monspeliensibus. Hoc Trifolium rationale dice constat longiore, & profundè in terrain sparsa, Glycyrrhiza? radice valde accedens, ex qua craisa 3c alte demiiraemerguncauliculi femipedales, crailli, quorum extremis artnexa sunt folia terna, oblonga, angusta, acuminata, curtis petiolis infidentia, nullatenus in margine dentata: ex radice craiflore & superiore parte, inter folia prardista v*ri-Unturpediculicurti, unciales & biunciales, gerentes in firmis floiculos papilionaceos rubellos, Trifolii pratenfis rubriasmnlos, quibus succedunt feminafingda in fmguliscapfulis wore aliorum Trioliornm supra explicatorum. Provenit in Alpibus Rheticis floretsstate & fab eiuiuem finem femina sua perficit.

2. *Trifolium Americanum*, C.B.P. I.B. Chabr. *Americum*, Dod.Lob. Lugd.Tab. Hoc Peregrinum Trifolium ex America delatum, aliud quoddam Trifolio bituminoso simile videtur: caules fert complures a radice excentes, rotundos, ramosos, in latus declinantes: folia in fingulis pediculis terna, tolove ex yhore fubnigra, figura rotundiufcula, primisera Hibis excunbus TnfoUi bit 11 mi 110i foTns tomia, colore & odore quoque quad-

nililixis, latioratamen, & per ambitum leviter crenata: flores e/ummm m. I. r. t. c. n. s. u. r. exiguu, tubercandidi, spicatum digefti: rruftus inde rotundi, aliquantulum p. ani: radix in plures fibras dividitur. Nates ipsum nomen indigitat: floret, & femina perficit astate.

3. *Trifolium peltatum Creticum*, C. B. P. & Prod. *Trifolium peltatum*, Park. I. B. Chabr. **g. cauli ex^cet^i^ - ^ ^ P T M ^** **nnore.** v. ofus r. A. e. i. *fol^parvsfubrotundis, tripartito divifis, paramfz h oblongis pencil is-dmiatijvcftiti: c^oliciiloriim frminU ilofcni qoatoni, qnini o r d S cedentes, & 4p,ca velat. dependentes, forma Ornithopodjji, luteopallidi liden. "uibu^ succedunt fihquae lutes, plans, membranacea; qxaC femirirnbr^o; fit cu ^U^us [tes in apice: ken nnum & alterum, TOSS2 * filamentum abcun- t; d^lciffims & efui apts font: at ubi mduraverin? a ^"LTT VTM dUm molleS -^ dici D. Honorius Bellas author est, qui femenss fibnon^T f v- !" CreB, * " In Creu provenit & floret, feminaque sua perficit i e

4. *Ahus* Profcen Atpini, de Exot- Loto Affinis nLn TR^TM^ n Tnfolii Alpini I.B. Chabr. Loto affinis ^gyptiaca c B P IfcfbSIT, Partu * bfi « Wio gnitudme, velaiquando major, foliisquaternis rotund^ribus confans C Crefcit palam ma inde coite niedise adherent: riores gent parvos, all^TM A, rPm;n, i> "I^" "I" bina hinc .ifdem floribris succedenda- ^gypti hanc plain ^ f • ^ fcmmbU; proxima, noncfitTrifolium, necplantam legn^inofa mc ST Abf % TO ^E, Ex haC defcriptione ik ^ - u. u. c. - plantas heteroclicas & fui generTs Co! T* ^^ HaIluinationes ! nfra, & bet ^gyptu. - ifloret ,fstate,& paulo poll JZ^Z ^ ' ^ ^ ^ ^ ha-

5. *Trifolium* Creticum, li B. Chabr. Trifolium spinosum Creticum, C. B.P. & Piod. MattK ed. Bauhini. Trifolium spinosum Creticum ^Sm^jr Hon. Belli, Cluf. Hij. Creticulatus Creticus Tnfoliatis, nobis, Hocradicm habet longam, capillatam: caules plures, palmares & fequi palmares, versus cerra reclinatoa, angulofolbs, in frequences i a multo utriusque, frequentibus geniculis ex vitiu purpuraceis cinctos: ramos utriusque utriusque ex opposito sibi respondentia tria folia minora, uni petiolo inhaerentia, viridia, oblonga, acuminata, in minimam spinam abeuntia: quemadmodum etiam ad singula genicula spinarum quatuor parvae, totidem interne appofitae sunt, unde Lirevispediculis affurgens riorum fingularem pentapetalum, Campanulas a Venis forma & colore (ive purpureo-rosulcum) fimilem, capitulo viridi infidentem fuftincc, in cuius medio ftamina io.;; piceis luteis prardita (capitulo inter ea latente confpiduntur, capitulum postmodum quinque angulis donatur, ftiloque prominente augetur & per murkacem petblo incurvato nis sese recondit, & in fingulis angulis femina unicorn, compressum, rursus contincc. Hue primo nomine Trifolii spinosi sempervirentis Cisti fiore, Pacavio a Laurentio Rafenaw accipit Casparus Bauhinus, polbnodum apud fratrem Johannem Bauhinum Montbelga/di collectit idem Casparus Bauhinus, cujus femina c/Snoyz/T nomine missum hierit. Vide in litterali-Iallii cinstioies huius capitulis. Nascitur in Creta, floret & femina efficitur.

6- *Trijtilium* A! pi mim argenteum Perfica; flore, CI3- V. Trifolium argenteum Alpinum, Porn Italice. Cuius Alpinus argenteis trifolius, Perficae floe, nobis. Trifolium hoc nascitur in alti/limo Montis Baldi vertice; radice constat longis, lignoso rufescente, sursum ut flus in multas propagines seu bifurcationes sese findente, ex quibus protruduntur pediculi multi; sustinentes terna folia angusta, hirsuta, Ocarum folia Mtoad figuram smulantia, lta minora, nervosa, molli & incana lanugine testa; sicut observare licet in Geranio longius radicato: catilae protrudunt quatuor digitorum altos: flores fert Mali perficis floribus colore formis fimiles, quorum singula petala sunt cordata, in florum medio muka sunt filamenta eisdem coloris, (ed cum apicibus nigris, quae ambiunt circum globulum veex brevi lanugine comiturn. Est planta elegantissima, longae seipens & consequenter perennis; provenit in monte Baldo, floret & femina perficitur istate.

7. *Trifolium* Lotus filivdris ex codice Csefareo, Dod. I.B. Cliabr. trifolium in igni in vetusto codice M.S. Bib) iodides Carfares imago rtptritur ^depingitur cauiere, (colis Tritolii, & e finu riorum foliortim exeunt cauliculi sustinentes flores (ignis trifolium) fotmt Eantngurx, cuiusve coloris) male (culpos & confufec dibiros; filiquetiam vus pediculis (uncraffiores, & sursum versus in acutissimum mucronem definunt, quae frifq^s] fi lepro medio membrataceodirimantur, utpote continentes duplicem feriem femininri jnh^ imam, illinc altera, erit plahtatctrapetalafiliqoofa, forte NaftumitipliylW species, onod graviter suspicamur: nam Prosper Alpinus in exoticis, nobis exhtbeC Naftumitii speciem sub Sii minimi nomine, cuius filiquas crafiefcunt versus extremitatem pediculi, atque defimjnt in acutissimum mucronem: An fit planta papilionacea, art tetrapetala, baud facile quivis Botaniscus conieft h'ram bccre potest iconem ex libris, cum nee benefigurerur, nee rice Aeftribatur, ideo latet nos cum Casparo Bauhino quid fit. Lotumefrenegamus qti adest tunc bina folia ad appositionem foliortim cum pediculis ip(b: nota enim omnibus Lori spectebus peculiariseft hsc, quinquefolris donari, ut postea clarius patebit in doctrina Lod Hcrfia?, quod nadmodum descripcio manca nobis exhibetur huius plants, cum in floribus turn in filiquis setiani narales non recentur.

8. *Tnfolium* Corniculatum Lusitanicum filiqua tenui rec>3 propendente, nobis. Trifolium corniculatum Lusitanicum flore rubro, Park. Trifolium hoc Lusitanicum diaum canles habet pedales, in lortiscultis, reftos, firmos, atque ex fingulis geniculis alternatim pediculis. Us suis longis pendentia habet folia, terna, longa, angusta, & ex finibus inter pediculis foliortim & caulibus proferuntur unciales pediculis filiquas propendentes, binas vinctas longas, tenues, continentes innumera femina minuta i flores quibus succedunt filiquae praedictae. non sunt papilionateae, sed ex multis staminibus luteo pallidis, cum apicibus rubric andem filiquaE longa, tenues admodum, succedunt, quarum non tunc feriem

tit in Leguminibus ut plurimum) sed confuse multa minutula femina nutriuntur. > 1-ouL Dultivavimii in pentaphyllo filiquoso Prosper Alpinus & in Tarraraira Georgit Martgravii, & tres plants quavis diverfimodi ab authoribus nominantur, acque in Jiverlocis collocantur, eodem a nobis reducuntur, atque ex iisdem novum genus constituemus. ac collocabimus in certhetoditas plantas filiquosissimas, postea nobis exhibendas. Semen huius

in fupina parte nutritur, quod confertim eidem adnafcens & quafi in infinita fei> multipli-
ers, non unica fene longitudinaliter (prout cernitur in filiquis caeterorum Trifoliorum
legummoiorum) fupina; filiquae parti adhsret:

9: *Trifolium* corniculatum Creticum flore luteo, Park. *Trifolium* corniculatum Creticum,
Proip. Alpin de Exot. Ex Creticis icidem feminibus natam hanc plantam habuit Profer
Alpinus nomine *Trifolii* corniculati, habentem cauliculos plures, longos, graciles, humi
lratos, tollis Trifoju nnnoris feu Cytifi, in extremo latioribus ornatos: flore Cictrculz,
eaiongeminore, luteo, in ramulorum cacumineunicoapparente: cuiufcedic filiqua ro-
tunda, Macropipens craffitie in obliquum ada, in qua continentur femina quatuor aut quin-
que parva, rotunda, flavescencia; filiquis ezdemfuntdulces, Pifi guftui non diffimiles, unde
mirum noniit easeff; efcultas, & fummopere pueros illis crudisinCreta vefci: fiverum
tamenfet, ut nos credimus (inquit Profer Alpinus) hanc plantam esse Creticum
tion. Jelli: a crostiffimo Johanne Pona in Historia fua celebri stirpium in monte Baldo prfveni-
entmmperbelle defcriptam, quamfanc eandem esse non plane auderet afferere ProfpW Al-
pinus, nil illiqua: in Hierazuni imagine non latae fuit, fed rotund* & inobliquum ctzuli
modoacte, quales excreta accepit Profer Alpinus, & plants illinareprotuleruntearfdern
nguram, qualem no) damus & Profer Ateinus dedit in Exoticarum dostrina, appellando
Jf^{ollum} corniculatum Creticum ad differentiam *Trifolii* corniculati Italici. Est Lotus I
pontions rolorum quinque, nempe trium in extremitate pediculi, & binorum mingrom ad
cjuldcm pediculumcauie appofitionem. Vide App. ad Legumina.

10. *Trifolium* festucaceum feu Spica trifolia foliis innumeris, nobis. Spica trifolia, Profp.
Alpm. de Exot. Park. Mirabilis quidem est natura in productione rerum inmundani hu-
jus fyftematis fuperficie vifendarum, quae & innumeras ubique etiam mirandas prima facie
edit plantas, atque in nullo genere intermedio herbarum mirabilius ludit natura quam in hifce
Trifolii de quibus jam fcribimus, nec hxc *Trifolii* fpecies & fequens Cretica minus admi-
radonis habere videntur. Prima hxc festuca trifoliata fpicis multis ramorum infar
abeadem radice exeuntibus fcatur; radice conftat crassa longafatis, deorfum ver^ bifur-
cata, atque fupraterraminpluimacapitula, exeadenradice orta, divifa; ex fummis radi-
culis protruduntur cauliculi breves, fuffinentes flofculos longiufculos, rarodifpofitos, magni-
tudine atque figura Hyacinthi floribus fimiles, albo%, dum recentes funt fuaviter olentes, qui-
bus fuccedunt femina rotunda, alba, minuta: (de capfula feminali cum nullaejusdem fa-
& z fit mentio a Prospero Alpino; an fit flore papilionacco, an filiquam bivalvem, vel am-
pullae in modum ferat, quomodum maxima *Trifoliorum* leguminoforum pars, nobis
non conftat • examinent idco potteri, ad quorum manus pervenerit utraque hujus varietas:)
a radice exeunt capillamenta feu filamenta fatis rigida, Cufcutae familia, subtiliora tamen, &
albicantia & miamnumera, fpicas ex toto occultantia, definentia in nmrones acutiffimos,
atque ex eadem radice oriuntur pediculi fuffinentes fingula folia terna, in idem centrum Cpc-
diculifci UceTM mitatem) definentia parva brevifima, angusth, elegantis pratenfis feu a-
grarii familia minor* tamen, minutim, & perpulchre in ambitu crenata. Tota planta lata
est, ac externorbemveluti aita IntoliumTM; interius nimirum, in parte terram fpe-

ante, festucacea tota planta & P ^ ^ / f¹oha f * 0 T ^ m ^ u m elegantis pra?
fe ferre videtur Pro natalibus habet Cretam Infulam: floret illic rihte, & femina eadem de-

11*. V^o Westucaceum aiterum paucitibus foliis vel Spica trifoliata altera, nobis. Spi-
c* trifoliata altera fpecies, Pro Ip. Alpin. Hxc Spica trifoliata altera afpectu est diverfa ^
jam defcripta, quae uamvis videtur eadem a totas trifoliatis, fed folia in Spica altera Profp Al-
Pmkonfpiciuntur pauciffima & quemadmodum in priore innumera; atque foecoposterior tota
frstucacea est, raffimis hic & illic apparentibus foliis trifoliatis, ut ex binis Iconibus di-
verfis in Appendice ad Legumina aifculptis apparebit.

Hifce *Trifolii* enumeratis atque explicatis fc in quinque fabalterna genera (ut appa-
ret ex paragraho quintuplici) diftributis; quemadmodum natura largam uti folitact i
alnsfirpium g^{bus} fabalcernis, ita productione tot variarum fpecierum, in h^o vaifto gene-
re *Trifoliorum* non defo^{^^^^} ibicandum est cuius Botanico plures diverfas fpecies redare,
que a diligente indagat^o tCLlt ^ d nobis exhibitis, que fingulis generibus fa-
interro:
"tplare a fp^eX^s p- nediverfas abhifte TM J. u i f c t * vestigiis & quarendoinvem-

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authoram.

Ag. 327. col. i. pi. 11. *Trifolium palustre*, C. B. P. Bod. Eyft. *Trifolium majus* 6 minus *f-hrinum.tah. Paludofuni*, Ad. Lob. *Majus & minus*, Ger. *Menyanthes palustre*, Lugd. *urn duplicifigura*. • Hoc non est *Trifolium Leguminosum* *capitulum* *papilionaceum*: omne enim *Trifolium leguminosum* *babet pro notagenerica*, quod *flores producat papilionaceos*, & *filiulas* *capitulum* *continentes* in *Je femina*, *Tabce*, *Fiji*, *Vicicvc*, *aliorum* *que* *7umimum* *more redolentia* atque *Trifolium* *hoc patijrefeti Paludofun-non pollet hi fee conditioniis*, ergo non fuit hic collocandum a *Cajparo Bauhirji* ceterisque authoribus cum *Trifolium Leguminosum*, quippe toto *cmllo ab ip* (is *diverjunt*, quoad *modum flores* (3 *capitula feminales & Jemina* *producenti*. Est enim *planta trifoliata; paludofa, feu in paludibus* (3 *aquis flagrantibus provemens*, *Juigenis & heteroclitia*, ut *postea declarabimus inter plantas aquaticas*. Deinde *compilator Historia Lugdunensis JSfulinxus*, (quifaltem in *alienam messem injeat*, *postobitum Dotlijfimi Dulechampii*, *Historiam Mam ad p ofter or urn mantis transfmifit ubique mendisf erroribus manifestis & apertisfcatem*, *ut DoFtijJimus Cajjrarus Bauhimis in Animadverfi ambus fuis in Hiftonam Lugdunensem nobis monftrat*) & *compilator Teutonicus Tabernamontanus*, quos *sequutus est Johannes Gerardus*, omnes hi inquam *entiarikte necejitate multiplicant*, *constituendo duos jitectes*, *quee neutiquam funt genumce jpecies*, *fed varietates*, in *diverjis locis provenientes*, *aut ibidem aliquando*, *quoad magnitudinem & parvitatem*, *aut foliorum rotunditatem aut eorum mucronem acutiorum aut obtusiorum difcrepantes*.

Pa*. 327. col. 2. pi. 11. *Trifolium pratense album*, C. B. P. Fuch. Dod. Gall. *Dodonaw Clufus ragus*, aliique *authores ajferunt Trifolium pratense album differre tantum a Trifolio pratense purpureo*, *jolo colore florum*; *fed longe falluntur*, *nam Trifolium pratense album differt a pratense rubro omnibus fere jkis partibus*. *Primo folia Jingula terna funt glabra*, & *macula candidiore notantur in Trifolio pratense albo*: *fiores deinde minor es ochroleucos*, *id est ex albo pallidos producti*: *atque fingulis floribus Jucedunk Jingula jiliquee bivalves*, *breves*, *continentes terna aut quaterna Jemina*, *minutaf rotunda i at Trifolium pratense rubrum jpurpureum*. *Ji omnibus Juts partibus majus*, *folia etenimma J?ajunt* (3 *hirjuta s caules lemgiore*, *crasfiores etiam* © *hirfutifunt*: *flocculi rubri duplo etiam majoris* 3 *quorum Jimpulps deciduis Juceat capitula jeminale diverjmode a prior is Trifolii pratensis albi filiculis bivalvibus conjruca*, *qua in margine quinquepartito dividitur JlelU in modum*, *aut quaji totidemfunt prula-ftellafguram ejjigiantes*, *in Cmm jus fundo ampulla: fmili. unicum jemen rotundum continetur*, ** multorum atiorum Trifoliorum explatortim hupis clajjh more* ^ *Conjule lcones* 3 *a ipfas plantas, eafq*-, *examina* ; *neq* inter *Trifolia aliandquodlibet ifthwlte curtas bivalves producit hujus T:ifc:it.* *all i pratensis filiculis J conformes*, *prater Phit n fufum* * (*fitM producit propter nimiam fesc propagandi radicibus aviditatem*) & *novum illud tertio loco a nobis propofitum in Tab. 14* " *sub nomine Trifolii albi*, *CO* " *fitulofo feu cavo donati*, " *Sfoliis fubtm maculis purpuronigris notatis infiti*: *hujusflluuh itaemfint bivalves, breviores*

* *crasfiores continentis Jingula femina bind aut terna, rotunda, exilia. Ergo Trifolium pratense album & Trifolium pratense purpureum Jint duce dijtincl* * *Trifoliorum pratensium jpeciesi quicquid voluerint citatijupra author es qui confujijime, ficut de aliis multis herbis, etiam de hijcecrijere.*

Pa. 327. col. 2. pi. u. *Trifolium pratense album*, C. B. P. Huic *Synonymum adhibet Cajparus Bauhinus* *Trifolium majus 1.* *flore albo Clujii*, *quod est Trifolium montanum album eidem Cajp. Bauhino pt?* ^ 8. *col i. pl. fi Trifolium montanum album Cafb.* *Bauhini est Trifolium lagopoides, cujtis partes ejfentiales a, Trifolio Pratenfi albo omnino diprunti Trifolium enim montanum album, est lagopoides album, emus folia funt pinnata incana, in ambitu. dent at d, caules edens alt* " *ores*, *in quorum ramis extremis proveniunt flores albi*, *in jpicam cenfert*, *Lasopi injUr*, *atque floribus albis jucerfunt capitula* *U* " *quinquepartito in margine divijee*, *in quarum li Jularum Jtando ampulla in modum facto, unicum continetur jemen*; *at Trifolium pratense album, C. B. P. liliquas profert bivalves, curtas, in quibus terna quaterna una ferie femina continent*; *ergo nee conjlituunt unam t eandem jpeciem*, *nee debent pro jynonymis adhiberi a Cajp. Bauhino Trifolium pratense album 6 Trifolium montanum album, cum Jint omnino diverfe Jpecies ex ipjo Bauhino*; *nee potest Trifolium majus 1. flore albo Clujii esse jynonymum & Trifolio pratense albo & Trifolio mantano albo*, *diver its omnino Jpecies bus ab ipjibfc conjlitutis*, *ideo fui oblitus est hic Cajp. Bauhinus. dum Trifolium montanum album Jynonymum vult esse Trifolio pratense albo toto ccelo diverfo, ut ojlenfum est,*

P(i < r. 328. col. 2. pi. iv. *Trifolium montanum angulifilium jpicatum*, C. B. P. Huic *pro planta Jynonyma adhibetur a Cajp. Bauhino Alopecurids graminea Dalechampii*, *tquam Trifolium*; *non est Trifolium a wmero foliorum*, *fed quina folia antrujla, longa, ex fingulis pediculis profert*, *ergo non potest Trifolium proprie did: nee est gramen Alopecuroides, u%* *vult Dalechampiis qui inter gramina Alopecuroidea coHoqats qui a plures flores rubros, pujillos, jpicatum in jummis jajlignt cauhum proferts mikiplane videtur Melampyri exilior Jpecies*; *er g* *o nec Trifolium cum Bauhino*, *net Grameti Jlopecuroides cum Dalechampo in Hiftoria jua Lu* ^ *vdmenfi, diCidebet, & per conjequens male hic inhprhonyma Trifolii angujifolii jptcati lacatur b Caiaro Bauhino. Amandetur ad Melampyri genus, tultus est perfecla Jpecies.*

* *Pa. 328. col. 1. pl > v. Trifolium pratense luteum feu agrarium capitulo Lupuli*, C. B. P. Chabr. *Trifolium pratense luteum femina flore pulchriore five lupulino*, I. B. Chabr. *Pro jynonymo huic adhibet Calbartis BaUhinus Trifolium minimum*, Ad. Lob. ? *J Hjt* - *Lugd. Fallitur Bauhinus, nam Iconibus ab utroque pcediclo. authore \$ Parhifono a laUs reprajntatut Trifolium minimum Lupulnum nofiras defcriptum 6 exhibitufi fculpturapernfjus; iab. 13. htms Sehlionis Jecundx, ut facile cujthet videre licet* * *flocculis aradifpofitis jpmu. Porro Trifolium agrarium DoJonai Synonymum adhibetur Trifolio pratense frteo* *captuh L k am Dodonif J omnino convenit Tnfoho prahnfi luteo capitulo brevior CB: P. feu Trifolium pratense marflor* ** minof, f < TM n < rnuito I. B. Chabr. Jr*

um enim ayarUm Dodonxi est iuiliotift
 *T procumbent, mb». ZfynLymuni cli
 Trifolio
 Trifolij
 F. B. &
 Coabrat. At a spica racemosa est Meliloti species
 ut postea demonstrabimus in doctrina Meliloti in-
 fra, & per consequens adaptari non debuit Trifolio
 majori lupulina, a quo evidenter apparet ex auto-
 pta diversam.

Pag. 327. col. 1. pl. vi. Trifolium pratense minus
 fuscum purpureum, C. B. P. Trifolium quoddam par-
 cum sive Lotus pratensis purpurea, F. B. Coabrat. Lotus
 pratensis purpurea, Hist. Lugd. Inquit Dale-
 champius in Historia sua Lugdunensi, radicem gerit
 gracilem, candidantem, param capillatam: caulicu-
 los multos surculosos, sere pedales: folia nunc terna,
 nunc quaterna: flores in ramulorum vertice copiosos,
 purpureos. In pratibus & locis humidis nascitur. Adeo
 manca, sterilis & secura est. descnptio exhibit
 a Dalechampsio ut quoniam rfferri impaffibile
 se iudicatu, nec flores papilionaceos, nee
 qualesnam M folUculi au. i. sp.ula seminales exhi-
 bet, nee i. n. explicatone, nec figura seu icon. vide-
 retur mihi mot cuiquam Iconem bene consideranti,
 potius Rabia species minor, quam Lotus
 nene posseri praece humida, sed ubi to-
 mentum Dalechampsius, idcirco nodam teris
 suo Botanice querendum reliquit

i^75

idem Dalubam-

Pag. 328. l. 1. pl. 11. Trifolium Alpinum ar-
 gentum Per. flore, C. B. P. Trifolium argenteum
 Alpinum Pona, Ital. Consule hujus descriptionem in-
 ter Trifolia Exotica plant. 6. Notandum est hanc
 plantam non esse Trifolium leguminosum, quia non
 habet florem papilionaceum; acinde oblitus est Johan-
 nes Pona adlere capsulas seminales, qua determinare
 debent gen- « descriptione florum pentapetalorum
 minutis multiscis in ramulorum
 cum capitibus nigris ambientibus ex brevi
 lanugine conflatum, I. n. l. * * * * * cmludcremuum
 baxce huius Trifolij a flore, multo
 minus a labiis >forJktQ: seSverofimiiit" mihi videtur
 Cistis

Zf7f

ISC6f

&

I

ffft*

si caps... expressisset Alpinus pentagonum, ...
 esset hac planta Cistis mas minimus si ar-
 genteus, non autem Trifolium Cisti flore. racunvndo
 ex libro nature. Aliter, cum florem pentapetalum
 Mali Persicae florum colore parat, sicapsulam haberet
 Quinquifolij aut ... illi more, poterit reduci
 ad eorum U & m f u r f i t £ / * , p l f

th UmU & » donatum, qvem*dmofm nosjr*-
 P^ntsindutrina. PentaphyfoitdudfinemhuyuSt-
 * » » * 1 namdatur illic frntaphyUoidet trfotistum
 trU £ < r U fit j o i quodafiori pentapetalo & ea pful » fe-
 itonal, piari^ minlra femina ibidem contintnt
 V Hortfntapbyllaruma fteptaphUorum) Jicdenami-
 p sam plantam d urttntvis horam daorutn generum,
 * nqu am ad Trififarum U & rnifupnum classim, ri-
 < t cere, ex daHrina univerfali nojim; ncpoteritjn-
 ? t i a m * H f i n t e n a d e i f t u P u e e n -
 phylloide, habita ration* floris, capsula fimalis,
 & seminis, redact. *
 . fa £ . ii 9 . a > l . i . p l . x . Trifalmm albumanguffiifo-
 E T M flori j / u j - u eluti in capitulum Cim g f i i t . C . B . P .
 V < r y m i u m M o n s p e l i e n f a n t , A d . L o b . C a m . C u m
 Implant* fit Lotus incana fruttifens, ex appofiti.

mftilum^, nempetemoruminex*rtm<

Sffj T U Tne iJl, ad f n f m doBrinyLtti,
 * n f r a , m n a u t e m b u i n t e r . T r i f o t i a c o U o c a n d a t l f e t
 S u e m a i m d u n f r i f u t i i C k f r t B a u l z i

v**H^fs^p rf;^vt - Tr & *m && * < > **

yyt, i. B. r. Tribuluti Tefins minor rePeru lit
 Ludg. tSfajr. jfo. col. . pi. vii. Trifcliuu %on*
 tum arvevjcructu minon, C. 3. P. Tributes minor re-
 c t * s , H i j t . L u d g . C a f b a r u s B a u r i n u s e d t B u f t x a t t f
 ritate Iliflorins Ltgdunmji frufha multiplhat mtia
 fine neeffitate, dum duos eonpViteit fpxeiei dij b tSar
 cum reverafit tantum una , nam nusc p d u
 nuncerigi, tion poffatit determihart duas p e d
 flin3a4 jpeiiti. "

Pag. 3?o. col. i. pl. t i. Cytifu, i maBm

pjulns feminales \$ femina ad cundjm . * " > * T M
 babeat cum Trifolio j b i c a
 ~ d 7 f p ' o n i i n ^ o n f i n u ^ r 7 £ i i ? ^ T ' A ^ t o

Pa . l 3 o " > I t ' p l - " x Trifolium spinofum C r r
 m u m C B . S . j a r ^ M ^ k . l d . B a u f i v i f J J

H.ijt. Tnfohum aevkatum Crtuum , fa re ' I '

pentagon*, qUte magt, fumi ecafd^a ^ f

eoui, qutmasdimur i terna folia fpecificam itldi-
 giabutu liJfcrentiam. Confute de j c r r p r i o n e m e i u t
 ; ' « 7 ^ " " " r ^ " 7 " " " " " . T M . > > >

conf(am^integri, tribu, I T " * H i M * j & i ?
 fi < mucronatis diZff L U J * tamum , « * U r

< f T M d > m nos ' p r s J H t i m A S e t l i o n e H i , q u e m
 r i t , " o n i n f t c i g * t o , q u i n t e n * m j - J - < n n * W " -
 > » - S * ^ a r u J ^ u l i r p T / b t ^ t ^ A ^

N < ^ c a t T n f X ^ U e f t ^ p a T i * " " h i n d
 j u f o

, ^uhdebuensub^ZTT

** r u m a u t q n t n t r i u m f i l i o r d m .

• L E G U M I N A


TRIFOLIUM COCHLEATUM

Seu Medica Cochleaca.

C A T . V T . V I I I .

L folium cochleatum seu Medica cochleata hoc obtinet peculiare inter Trifolia ex-
 tra leguminosa, (etiam si foliis ternis & floribus papilionaceis conveniat cum ceteris
 omni- bus Trifoliis leguminaceis) quod singulis floribus papilionaceis deciduis succedat
 capsula, quae in gyrum seu cochleam, spiralis lineae in modum, contorqueatur, & tribus, qua-
 tuor, pluribusve gyris, altero alteri imposito constat. Nota igitur generica Medicae conve-
 niens, ipsamque ab omnibus Leguminibus Trifoliatis, seu Trifoliis leguminosis distinguens,
 esto haec: Siliquae sunt helicoides seu spiraleriter intortae omnium & singularum Medicarum,
 cujuscunque magnitudinis aut figurae sint fructus capsulae. Noti infopcr folia tergemina
 semper omnibus & singulis Med. « f « ach » convenire, inter { b M m l u M f i m } l j a e
 impossibile sit à foliis ipsas Medicas ad species reducere, tribus fof om involuens
 quibus in particulari specierum deductione agatur. Idcirco à diver- d fof om involuens
 seu capsulis spirali- bus cochleatis, diverso mo- istructis, -bis, cumin Tabulis cognati-
 onis, tum earundem explicatione, varie deno- untur.

Par5 T A B U U XV.



Trifolium cochleatum
feu Medica Cochhata X Minor TUWJ-T©* j Spinofa

15. *Incana maritima, nobis. Medica marina, Lob. Icon, Clus. Hist. & Pan. Tab. Park, ©*

16. *Cilia ris feu capfu'lh ciliaribza nil grw, nobis. 0*

17. *Alba folio ccrda* fufca macula no/ato, nobis. Medica Arabka^ Cam. £*

Majon\

18. *Hifpid nobis. 19. Mtnw I fpidajiol, i. %*

Nigra

Annua~\ Cap yuia

Mini- ma

20. *Rotunda lobis. Tribulm minor rtpens & recfus, Dalecham- fii Uift. Lugd> 5? 21. Coronati^ncbh. Coronata minima Cher- leri. I B. Chabr. 5*

ExpTtatio partis Tab. decimdtquintdt Sefiionis fecund*

1. **M**edica cochleata major feWr©-, fruc}iis capfula comprerTa orbicular. a, nigra, plan; i oris L crispia, nobis. Medica dicitur, "ciuod primo ex Media in Hifpaniam & ex Hiipania liniivis, in aginm Neapolitanum introo'tif Ea foit Hodie vero in Iurtmis aliis Europx loas Tponte provenienj cernitur Medica diver forum generum, quaepailim in mukis aliis locis ^{te}ntur. Hujus Medice ma>ons planar primae radix est parva, fibrofa, multos fimdenscaules ^{palmares in}sterili & mzcxo folo, pedales autem in pnigui &c fertili, per terram ftracos: ^{folia, terna,} parva, glabra, fere criquetra & per cxirentim lata ac nonniuil crenara, niaculis interdum nigris asperfa: flores exigui, flavi, oblongis pediculis donati: filiquae feu capfulae feminales Helicoides, cochlez aut gyri in modum intortae, majores, planae, compressae, mature nigrae, oris crispis feu undulatis in ambitu donatae, ex tribus quatuorve gyris, ^{alte} ^{iv} ^{ier]} irapofit 1 cvitit; intes, magnitudine omnino angais ^{humani, aut} nummi valoris quatuor 7b Hdon<m monetK Anglicans, vnlgoagroaot difti.

2. *Medica cochleata altera major r**r*t fractus capfula compressii orbicdata nigra J*vi fine oris cnfpis, nobis. Hzc Medica major capfala nigra bvi fen abfque orit trilpis, plane diitnguitar ipfiore Hliquarum fca cochleamnj, & confequenter feminurt parvitate, pricipue autem quod cochleci fnt minores, nigriores, abfque fimbnatissuc undi latis oris in ambitu.*

3. *Medica cochleata major JiW^f frufas capfula compressa orbiculata rugnfa n|k, Uis. Hrc Medice fpecKs nova & vifnclegans, capfulam omninoa relidais 12 j. fameerit; eftenim capfula nigofa, compressa, orKc^aia alba moHn \ > 'bus djver-*

steris fus fortw hie explicate In MeridionaKbus regiombus ti, it de S a '1 S & h<c in Anglian, delate ems W, ? uod fat(Im ^ ardo Mor g * a Johan» e Raio, canico pone Abanam Westmonallenenfem innumeras nrrnlvnr n ^ . 1 / n hortulo suo Bo- fcomirwnicatis ftr n^cpropagat in hortopublico » P " TM ^ 6 * 2 5 * * * ex quibus nobis Botamico U n v r h r i t a t i s .

4. *Medica cochleata major JUNTOS frustu3 ca pfula rotunda g. obosa scutellata, nobis. Me- dica fcuttlata, LB* Chabr. Haec cubitalea, robustos, hiribcofque habtt cauculato, col- que partireftos, partim procumbentes: folia minata, fubrushifuta, circumquaque crenata • tergemina, majnciila & latialectfla, aca- nico ut plurimum haerentes, quos volutarum instar flores sunt pauci, lutei, binatim ptiolo u- todilcata; filiquae fequuntur planar exce-*

rius

rius, hlltrius veluti e fcutellis quacuor, aft quinque compofita?, uc inferior majot fejnp
per convexam fuocavo excipiat. Semina in gyris latent renalia, majora feminibus refiqta-
rum fut «aierisMedicari]m: radix eir simplex fibrofa.

5. *Medica cochleata major* Jiaafw fru&tis capfuU turbinata plana, nobis. H#c a primo
intuku capfal^qnippe twbinatar, plants, naguitud"*> Faba; eqdna?, facile diftingnitur il (c-
ruentc capfula turbinata rugola; faciliusa csetc. 'libus prsedidishujus familias figuvi
^laturbitiatacocbleic; foliis, rionbuseVfeminibus 1 Ausconveniunt omncs partie Medi-
cs fpecies (perp&ucis foliis'maculatis auttncanisl'.ca dignis exceptis) geneicam in-
termedium earum diferentiamaut aliqiiando fpecificam confitruente filiqua feu capfula e-
" uc fabrica, ut clare apparec m cloftrina hujus capitis, cufusconfule Tab. a?neam 1 5.

MeJica cochleata major tivL^m fruftuscaphntit curbinata rugofa, nobis. Msdica magna,
nata, I. B- Chabr. Ha?c cubitales & lcfq 11 icubitales canles emittit hirtutos, multisra-
Ups: 'toliis ternis aliarum more, hirtutis, mu!tisitidem, in lonnufculis pedictilis infi-
bus, donatur: floresparvi, papilionacei, lutei, binatim pedict;" crent uncial 1 & iefqui-
utn-iiii, tjuos feqiiunturcaptuli turbinatas Cfeu turbinis forma, i 'r latiori baficapfula
infidet pediado, & attenuatur verfus extremitatem & quafi in met dcfinir_) rugofe in
ambitu feu circumfrentia exeriore, circumvoluts numero fex aut pluribus gyris JIbi in-
vicem commiflis Srarftejunftis, dura;: unaquacuc fpira genii no tlenicillorum ordme ca'la-
taeft, medium fecante zonufaperpetua: femem latet in gyris renisl"ornin fimiatur.

I 7. *Medica cocbleata* fpinofa major ft*«fwf, feu cnplula rotndiore majore fpinis paucio-
ribus 6c tigidionbus, nobis. Vide Park. pag. 1116. Hsc per **terrain** (e eTc**paftdit** cubitalibu9
& longioribuscaulibus: folia parva, liirfuta, & per oram lata: iloreslutei: capfuls rotun-
da: in circumfrentialongis rigididufculis lufquedeque vergentibusfpinulis horrent, non ad-
mod um denfis; convohitioncsfunt tres aut quatuor, in quibus nunc plura, nunc pauciora
latent lemna magna, reniformia: tolia inquam per extremum lata, fingnla fingulis pun-
1 1 Ltulisrfttgi'isnotata, undehcilea carteris liujus claffis, junfta capfularum feminumque ma-
gnludine ea/umquc paucitate etiani & foiorum amplitudinefacilius a Medira Arabiea Ca-
1 merarii **daftingoitHTj** pprtafHus inquam acochleis (cu feminum enpfulis qu^druplo Carne-
I rariinuioribus & **biaatim** rariuique in pediculisdifpofitts fmaniordinaripbinarim, H[!t :ili-
quando led rarius ternarim **provetrnnt** nujus capfulse,) a Medica Arabics Canterarti digno-
fcitm culuS'felia pariter maculis nigis notantur, atcapfulae quinqse, fena?, expetioli fumni-
tate p'endent, **qaadrpto** etiam hujus jam defcripti **minores**.

8. *Medica cothleata* fpinofa major iu^aw capfula feu fpinis longioribus furfum & deoi
funtendentibus, nobis. Hxc afuperiore 7. facile cognofcitur, ptimoquod **fcgaprodoc?**
nullismaculismgris notata; (ecundoa capfiia, cufus ipinukfuntlongiores&denfiusdi-
ipo1kf, fulijue **dequeaat** furrum&deorlunueidenEes; utraqueV hacc& f. femem prodacit
majus, rcnaL-, & utriulqaecochlea eft major, nucis Myriftica; magnitudine, qns binatim
provenit tx uno p^tiolo dtpendens: unde apte **feQs** utraque \\xc Medica 8- 6V fopenqr
7. (ubnumine Triroliicochleacimaioris ipinofi *hng.ysv* militabit.

9. Ha-c Icon reprsfeitatcapfulam Medicac 8, extenfam utclariusSf dillinftius cernaytur
gyn (CEI convolutioncs fpirales& fpinul^ longiores furfum & deorfum tendentes.

* o. *Medica cochleata Sw. *fX3f* capfulL fpinofa rotunda minore makis fpinulisarmata, nol>1%.
HKC inter Medicascochlcataafpinofas minores j.^;_a v(, id eftcapfulas binatim prodacentes,
(fifponiEm, quacqpe vix rriuncialis aut palmaris fuic: cochleam gercbat rotundam vix Fifi
majoi is niaginitiudinem exredentem, binatim temper curto petiolo prove 11 ientcm, & fpimihs .
o multis latis trequenter Liifpofitisonuftam.

11. *Medica coclileata h<x^* capfula fpinofa rotunda minore, rarios fpinis craffioribus &
brevionibus **annata, mfcis**. HTC Medica annua »Ewf«* **fea** AMywpw bin as cochleasani peti-
olopendentes product maiores precedentis, atquefpinulisrarinsdifpofittis brevSribud .&
rigidionbasarmatas. ?L\ta eft humilis, vjx palmarem excedit longitudinem.

1 -2. *Mdica cochleata S^OT*; capfulj fpinofa rotunda minore & foliis quafi fpinofis, nobts.
•cc Me dicas? cochlea tEferfcs caules edit pedales & amplms, proti'udenres ex fingulid ge>icu-
'S folia terna aciiminacaproftmdefenatii, iu in {pinulas multasdegenerarevideantur Medico,
& hoc nomine facile inter cameras omncs Medicasco^nofcitur; rroftum gemjnum *atfebdeni*
pediculoproierEp^{c1^cntem}> medium quafi inter Medieascochleatasfpinofas maiores & **ftii-**
nores, fed conveniuntha; quatuor cum majoribus, **good** fi<t iii>p" non TAI^pTM, utititit
c'nines minores.

Yi 3. Medica cochleata & capfula spinofa craffiore & spinulis brevibus & rari difpofitis armata, nobis. Hac à tribtis Medicis cochleatis JtapctW feu Wp-™* fupra explicatis facile dignofcitur, quod cechleamFab* equinae magnitudine producat, rarioribus spinulis armatam, atque inter Medicas codileatas spinofas minoreshafce ity>xJ.^is feu Wp*w cochleam edatcafdem amplitudine fuperantem.

14. Hujus jam delcripta: cochleare• protraftam & extenfam clarius & magis diucidif Hehcem feu lineam fpiralem exprirrentem loco hoc iq». fculpendam curavimus, u k i bet plane cernere licet in Icone exhibita.

15. Medica cochleata rmxix&rms capfula spinofa minore, perennis, incana, maritima, nobis. Medica marina, Lob. Icon. Cluf. Hift. & Pan. Tab'. Park. Caules five ramos habet hæc Medica maritima tres aut quatuor, fpe plures, pedales, humi fufos & procumbentes: folia Triblii Cyti/i Maranthas foliis minofa, quæ cum ramulis ipfis tomentof/k-nugine obfita funt: flores extremis ramis inhærentes petiolis fuis ex alarum finibu* c'tis cxfilmnt, quini aut fcwfimul congefti, Medicæ vulgarisautSertukCampansBflorumi^ma, colons flavi: filiraædcindc glomerata; & contort* five convolutæ, in quarumfingulis, incana etiã lanngine obduftis, continentur femina renalia feu reniformia, fubruffa, reiquarum Medicarum feminibus familia : radix craffiufcula, perennis fivevivax excandido pallidit.

16. Medica cochleata •apA^jwr©- capfula spinofa minore, perennis, ciliaris feu capfulis cixianbus nigris, nobis. Hasc Trifolii cochleati fpecies radice eft perenni, longe lateque repente, Medicæ fuperioris maritime: incanfe more; in fummis caulium bipedalium furrcctorummultavafculafeu capfulas cochleatas spinofas congeftim fert, nigras, (inde appo- tcfatisGuillandino Medica ciliaris difta, quia capfularum pilinigri ciliorum pilis nigris perquam funt fimiles) unde à radice. repente, quæ folummodo Medicas maritimæ mcan< & huic ciliari Medicæ Guillandini convenit ' facile à ca?teris "omnibus annuis diftinguitur, 5f longis pilis ciliaribus nigris, a maritima'incana, jun^ta fbliorum vinditateom&itudinc caulium, facilius dignofcitur.

17. Medica cochleata minor ip&vx&r*©' annua capfula majore, alba, folio cordato, macula fufca notato, nobis. Medica Arabica five Trifbium cochleatum cordatum, Park. Hæc Medicæ fpecies multis confat caulibus tenuibus, infirmis, geniculatis, quibus infiftunt folia tergemina, viridia, fingula cordis formamquodamj^do referent^, & maculis nigris in medio notata, quæ à longis pediculis pendent, lata ad extre- tibusSc finuata: jffinubuTmterZ kujos & foliorum pedicu ds onuntur Pet.oli uncia- les, fuffimentesflofculos plurimos, luteos, ternos, quaternos* ahqua_ando plure^ quorumm fingulis fuccedunt (ineull capful* cochleatx, & hirfoa feu echinaue aliarum Medicarum tuore. Parkinfonuspåg. 1116. in eadem Tabella Icones 10. capfularum Medicarum cochleatarum exhibet, quæ neebenefulpuntur, multo minus aptenominantur: atqueiifdem ^ditfiliquamarticulatamScorpioidisleguminofe ftnatse ac fi effetex Medicarum numero, nee nomina ipfis addit: confufe has capfulas exhibet fictitplurima aliapaffim.

18. Medica cochleata minor <n>*Ur*f^a n n " a c ^ a « « « hifpidiore, nobis. CraiTuif- p'u. wcaica cochleat nuni*): . . . di Tingolans' Oc lha: cal ' li. cula & proluxa fatis eft hujus radix, fingolans Oc alba, caules multi tenues per terrain fparguntur, dodrantales, friati, hirfoti: toia terna, lubrotanda, ad Trifolii pratensis latei feu agrarii Dodonæi folia valde accedentia, ouonotabilifaporc pra?dita, pilofa, albefcentia, maximepa, teinferiore: flores parvi, wtei, plures fimul congefti; quibusacceduntcapitula plura, echinatafeu hifpida, nigra, ex eodem pediculo fimul coacervata, Pifo non ma, ora, contortisHclicibusconfantia, globola, quatuor, quinque, aliquando plura, mollibusfpmuechinulifveobvallata: iemina remform,a (cattenurmn hujus generis mo tē) ia ie continfntia.

19. Mdka cochleata minor ^ ^ f ^ ^ l p f n l a nigra minis hifpida, nobis. Uxc neutiquam a pncr quoad omnes & « ? « " * ^ d ^ ert, mfi quoa^apfulas quæ minus funt hupid* ; fUntpotiusafper^, atque Helices magis con i c J a (Oparent, ^ que fuperionis capulis paulo majores.

r^i: ^eJiCa T U ^ ^ t ^ T m T u q T (a ^ a n n i m i n a , « " n d a , n o b i s . T r i b u l u s t e r - l a « T r o r r e ^ S i r e p e n ^ B * M e d i c m i n i m ? f p e c i e s r o t u n d a , c a o l i - s i s n o n e p r o c u m b e n t i b u s , (q u e n e u t i q u a m d u a s f p e c i e s c o n s t i t u n t u t v o l u n t a n t h o r e s) q u o s u r n a n t f o l i a t e r n a , m i n u t a & e x i l i a , l o n g a , h i r f u t a , a d e x t e r e m u m f e r r a t a : f l o f c u l i p u f i l i

multifidum junctis: quos sequuntur capsula: plures hirsutae*, ejusdem pediculi fastigio adhaerentes, quam proximae arte glomeratae, iter echinatae, quatuor, quae aliquando plures simul junctis, Orobanchae fativae fere majores: radices sunt tenues & fibrosae.

21. *Medica cochlearia* *Bianca* annua, capsula minima, coronata, nobis. Medica coronata minima Cherler, I-B. Chabr. Haec Medica echinata minimae coronatae pedibus vix donatur caulibus, tenuibus, fuscis, et alternatim ex longis intervallis furcui exeunt fingulares, unciales & longiores, qui in extremis ternas, quaternas, quinqueve tantum cochleas eclinatas seu Hesperidas, minimas; fingulus tripartita aut lequialter circumvolutione constant utrinque, id est supra & infra denticulata, gemellam corollam vix miram, ut utrosque sustinente; folia tergemina, hirsuta, ad extremum ferrata, fere cordata; cum sunt ut vix conspicue appareant se fugiant quasi obtutum cujusvis, nisi propius at-

15.

LOCUS & - T E M P U

- Trifolium* *oculale* species. i. In montibus Euganeis circa Monspelium colligitur. Floret in fine ineunte, is per totam finem dicitur autem floret autem in capsula producit Tripartita: in gyrorum finem continentur feminae subrotunda, flava recentia, diliqui impatiencia aut reniformia.
2. *frovnit* hinc mapra altera nigraplana ibidem cum priorum circa Monspelium, atque copiose is? nusquam abundantias quam fecerunt uiarum margines circa BUfas. Floret, Augusto is exeunte Autumno. capsulae componitur maturum nigrum*, magnitudinem sunt unguis minimi digiti humani, aut nummi, valorem monetae Anglicanae twopence dicitur. Affatim Autumno mperditur (per terram fratrum pediculus ex utroque tyonte partem fecit atque decidit illic conficiuntur numerose fati, quae in imbricis frequenter tunc temporis ingruentibus madefacta tunc in is germinant. i. radice in terrain atque plurima folia ante adventum hyemem acquirunt is I). eminigorem tolerant, ut Vere redeunte floret primo, deinde femina, fingulus annis fundant, quibus anno in annum sese aliorum Leguminum annuorum more perpetuant. Quibus autumno a portis illic errantibus avidae devorantur.
3. *Semina* ex Italia detulit prae dicitur Johannes Raius. Floret ineunte autem in is femina copiose fingulus autem mature proficit, quibus perpetuatur quotannis hinc legans Medico Jucies.
4. *Pajfim* provenit circa Monsye Hum, maxime in fegetibus illic fati. Floret Vere ineunte, in fine femina proficit sua. Tardius apud nos bene omnes Medicis Sfecks frovniunt, qui sunt ferendz in Hike partem ante initium Aprilis, profiteri rigorem byemis: si ferantur ante, pereunt sine byeme. Apud Meridionales in Hispania in Gallia Narbonensi sponte sua fere ferunt, is per totam hyemem per seve ant, atque farina ad maturationem ante tunc amvtrnam tempestatem perducunt.
5. *Capsulas* bujmi Medico nobis communicator babuimusex Africa, opera is industrii D. Akxdndri Balam, tunc temporis Tingidk urbis Syndki a D.D. fingenofloro Caroloz. dicitur figurat: Pater fatum nunquam Alexander Balam fuit, dum in vivit esset, diligenter infirmis stirpium roratum indagator, earumque feminum collector isperquisitor indefessus, cuius laboribus plurimarum plantarum rariorum plurima rara femina debemus civitatis alta, tunc ex Africa collesta, is ad nos per plures annos cum filis, tunc hic in Angha degentes transfusa. Floret is farina matitantur eadem tempestate annicum ceterum fuit, ibi fuit feula jfis.
6. In agris is arva fegetalibus circa Montydium is in Gallia Narbonensi floret, illic coko*. apud nos in honore culta fata tardim, in A. juno, Augusto is Stptanbri femina ejusdem staturantur.
7. Adman reperitur in procul ab eppido Monspeliomense Augustoflorens, is plurimum in chins, in mntate etate atque trifurca tunc dewfimm matura sunt femina. ••
- Z. *Viraque* in agris Gafh) Narbonensibus provenit. Floret etiam ineunte fere illic ispyv Joprft femina fuaperfclit. j » ••
10. *Frimo* nobis occurrit in aridk callibits faxofis versus in mitarum cellam, non longe BUfis collect. Floret in fine media, atque femina pauca pest ad maturitatem perducit.
11. *Frequenter* in ficck is lapidofis bane circa Eremitarum cellulam prope BUfaspere? invenimur. Floret in fine femina in fine per jcir ibidem. ' _ \
- it. *Semenhuju* tanmunkatum habuim a Professore Botanie P. Sim Lugduno Batavorum ad nos misimus. Floret in fine atque in fine profest, aliarum Medkarum more maturantur femina.

- 1. Ubi provmttt incertum, inter alia femina nobU communicata hahuiinus biennio' autyVhaittio aN}inc, at unde ntjcinias.
- 15. Provenit h&c in Hifpania is Gallia Narbonenji, ad Meditrranei marh litora. Invenkbat etmm in oceani lilcre ad Tagifluminis oflium Carols Clttfus. Floret <s\$late isr Autunjio; isr fubinde fanen profm,fcJ raro pccfcr nimiam rependi feftinationem. Cditur'in hortopubhio EotankoVnivrtitaki eflque illic longioribuArainkprnedita, neque adeo cana lanugim pfiduc'ttur^ utpkrijueflripesTprdecipitem&ithngvulgainc-ance adornmmaritimam^ qu^tranfla-t£ in hortos degenerarefoknt, ut ofyrvare licet in Gnaphalh maritime, Jaco^a maritima, plmibufqui a/iis hitjus farinx plantB, qua.multum incanitei tr(inflate Smfirunt.
- 16. Projfftit in Gallia Narbontnfi% floret aftaieeodem tempore cum c^terisfu^fortis.
- 17. Provenit pa-Jim in drtiis is pratk\ floret ineunte aftatt-atquz ejts media tempeftate femina ptrfcit.
- 18. Provenit paffun interfegties prop? paiibulum Monfeliense^atque etiampropeflagnum Pe;an in liiore marts. Nos hi arvis ft&etalibus pr^dpm avenaceie circa Bhefat hanc copicfeioij n-d'tmus. Floret tftlnte^ uque paulo pofl faninaks fuas capfutas nigrasibidem perficit.
- 19. Floret verfas inhiu>n fttatis% atque eadtm finhnte femina perficit\ citim aliquando.
- 20. Provenit ftsftm in trvis arenofts is fabuhtis. Floret <gfiaU is femina fua minuta reni-formia poflea perBcit.
- 21. Provenit infna\$\$ aridis is fqualtJis GallU Narbonenfis louts, maxime in collibus prope Nem&ufium isVftiwi, ibidem crftlgit D.de Fry Medkus jam Turonenfi^ quio.abhincan-nit mibicommunifavit ejuJHem Rmen redux Monfpelto, is trartfiens Blifis vcrfua Twreman caput, quod ten<£ comm'ifjum flantulas plurimas produxit^ tfu* propter ccntextum capfith- r<;>, corona inftar, vifu isr JpeBatu ptfidigne errant.

HALLUCINATIONES CAS?. EAIWUNI

Aliorunique Authorum.

i* .*

P Jg.i29.cal. I.pi. lit. *Trifolium cofblentum* fruli: iatiore, C B.I. Medicacezhata,alur.i m&or fructus capsula compressa, nigra, pla- tm, litv! fen file orticifpis, imbh. Mrdica Jngli- w, Jyb. Medics trei species Lob. Lugd.3 tQ.fimml •in Una tahella l'ark. Hi tret pajhemi autharrs mi- x/m nppznxtre honrs complunum Afcdicaram di- ftintlartm, jine namenclatura finruliirtim, idea confif fc pijhrit tra-Mdtrt, //ot^«»a, T »'/'»'•'/'»'»#»'«<- priatu.

Pag.314.col. 'ijpl.vt*. TriMtemcothhatamma- rhiimtm tomemoftim, C. Ji. i\ Tnjulni-m corbleatu^ marhmnuGer. %Ietlica mari.ia JivcTrifaliim coehle- ntum marin&nt) J.3. Chahr. MedUamarina.M- Loi/.CrvfHijI L Tab . Om*Hort. Par ^ Pri- mo nmntifnauthsresprinter Csp. Baubinam male to fitbitmmarimtm bit ffcicutplurits alibi} addidzr* am vox maritime ah ipjis debnt ufrpari, quipp* l'laimum tleriotat prxjmtiam in mati, utFuctis ma- rinas-, Coralitum marinitm, pijsis niannut, qma vt- vitnt eJ vigentinmari; maritimtm verbdatnotatlitnt ntrts, crff) maritimx detiQminanda eifent plants O- m»ts ad oram/cu litat tnariiprovcurnci, nonna- rinivj hatfemlvitio & crimwt aatbsribiivertinius fu- pra, ijiupajftm. impegere in bane jcopu-lam •aljHnt- «nt pacicrujm&riph fits, ne inemidem cadant. Se- cunde, hitMfKledtar catbltr.tas. maritime {manic pro nomine Jnyanymo ah atnhore Hijj. \jigd*ntnjjii adth- h (tut M Iq'lf/t alter a, fed intpte fat is, cam jft %ri- falium ptfecie legLUMnefum, imo Medina cocbleata •mAu^pT©. capjida Jpinefa. mintre, prrcmtis, inra- vn, maritima; idea^ bac fila ratiatae, itmmmina fif attribula mate adaptantur, -fuaat rejiwuda 9fo. rjttmanaanda. Suntoh'rtduifac.vml/oxa venia Lobe- iiii, aiiiprimus nomrn mtinwtmf>T4 maritimeadjetit hiicTrifolin, primus errant errarr Jiinf omnts fer- quentis, niji bmc prapvnderent qua ab ipfij dicavtur

Eorum qua dicimuj & hie E£ alibi examtn prnti fit Ugmtium tf indligentmm han: mshant daduiam judtciupt.

Addenda est obfervatio Turucri qui fie in- qilit, _Onmiu-m "Sttdicarum cwlnf-jrum jbr rftu- teut: folia junt tertut, nliaram Trifohortim hgtimiv forum marc, n,r4ium lunffort fifilteuloitnixim Z'ifitur.] Hoc c.^ccris itailem omuibuiTritbljlslecmiminofis cjtconvmunc. [SimiUque rati fib Occidents emvofvi- turinfe, orieute antm eodem expanditur • FruQu's per maWntaum cubltatus feu fpiraliter in erbei addaZtus-} Louge faUitur Turaerus, dum fin- dum dicic, «m indligj debet folliculus fcoca- piula oontiaens Outtum feu <?TM,& . pers-^o.^ autem non intelligitur trudtus, qui Gracis dicj- tur yapT©, fld Icracn; hoc eviderter, patet ex ipfius Dioicondis verbis, khhiuiiom f4<trPTTCuo-

«?&.#««; ^>«%©., imppauu- 1t^7I" J^_ ^' TM(dic:i cumrecenter jfmilis est TrBfolio pratenfi, verum m pro- >«ffii foliacus smgustiora: caules producit Tri- 3 f f l l b ' q'ibusfejnetaicercericiir (fo_{tc} WS, ut jil' rurnerus aluque conneutatoes, feracn de- j^11e g'. gcuuinc iuterftctando verba Diofcori- nth maynitti .inc, tornieuti modo inter- In qua decic^jtione -viprif® nomen rion 15 tr^l:ujiv' hoc in [ocotefbivndu¹¹¹ qⁿiin ca cocnli-ata magnitudinem Lea¹³ acViti- exprimjt, nec corniculi Unpticati ac cun- iMmdincm refert: fltl mm Cnlp, Ban- hi no dctwt hie Xextuf ixiiiu* app'icari Mad¹¹ C'E falcate dc qua -agetur cap- fitquetite, P¹¹¹¹ rit Turnerus, _alias Utvir, a tins hirfutis, rebinatus feu spinofut. Jiftdicarum maxiniaTHT* fructus utplurimum f*nt l<rv" mititmarum hirfuti

Tab. nbfra decimaquimu JiuusSedionis sculptis* atque veritas hujus nostras aflertioiis ex iituitu ca^1 pfularum ipfamm magis elucefc^?et, quam ex ver-f bis Turneri perperam applicatis*

Tab. nbfra decimaquimu JiuusSedionis sculptis* atque veritas hujus nostras aflertioiis ex iituitu ca^1 pfularum ipfamm magis elucefc^?et, quam ex ver-f bis Turneri perperam applicatis*

L E G U M I N A

Trifoliata feu Trifolia Leguminofa

TRIFOLIUM FALCATUM SEU CORNUTUM

vel Medica Siliqua Falcata feu Cornuta.

C A T V T I X

Medicam Diofcoridesfntixtl. z.t.iyj. foliis & caule Trifotu^ pratenfis, filiquis torfiU colorummōdo intortisdefcnpft. M*\$vhtheqbrafto%. Hift. i. is 'i. Cauf. 20. is Fliniolib* 28. c. 16. Medico, a Medis advefiaper belia Perfarum isre. Qrdtci hunchrbam M&IKZΔ La* tint femiliter Medkam. Hifpani Mielguas, Valentini & Cutahni A\hfo, 'voce aut barbard aut Arabifa deflexa, nam Arabum Princeps Medkam Col Alafeleti' is Alfasafa nominate Verant aut em is legitimam hanc ejje Medkam ipfa Medic* dilucida apud Viofcor idem defēr iptioevi dtltter ofte?ldit, quāt tails eji^ fwtSW eo»\$ \$ &pn zpvolut Qjkipu^a ty ot' ^wytOTeuoi^ szarjalyssoa. Si <syw fvfaoTi&t. yiMT<jf' xcwX^s cinucct T^puMa ofibfvs^ I'p oTs 5' dzrpfia. izgjō- 'mpvM <p&xy \$ jui) <^@- ' ' ^ t ^ s t ^ ^ o v a > \$ xe» ©*nd>. Hoc eft cum recenter prodiit fimilis eft Trifolio pratenft, verum in progrefu folia ejusatigu* Jliora : caulesproducit Trifoliosimiles^ quibwsfrutlus accrefcit, Lentis magnitudine, corniculi modo intortus. In qua defcriptiont <nnfftiLi@*nomen adtotumfructum(uttion raroolios')referendum^ qui uti fcripfimus Lentis magnitudimm proxime exprimit is corniculi implicati ac contorti fi* militudincm refert.

Hie textus Diofcoridis, male à Tnrnero applicatus Medicas cochleata*, (iupra explicate nielius convenit huic Medicas falcatae, dummodo per fperma intdligatur capfula fructus, (non autem femem,) quas propius in Medica falcata, neutiquam in cochleata, accedit Lenti*

Medica «ljq«a falcata feu cornuta facile diftinguitur à Medica "cochleata, fupra explicata, quodK^icacofnuta aut falcata, f>aucioribus circumyalutionibusunaaut altera cum dimidia, aliquando falcis modo, filiquas feu capfulas fuas producat: nonquateritas* quinas, plureive circumvolutiones patitur, ut vulgo Medicae, cochleatae feu Helicoides fuperiorius explicatē; deinde Medicae falcatae cauleslongiores, fublignefcentesauthgnefcenies, producant. Medics filveftris varietates funt multas, diverfis fiorum coloribus tantum di^ fcrepantes. Vulgo eft flore luteo., at circa Nemaufium & per totam Galliarri Narbdnenferm, etiam in arvis reperitur flore luteo, albo, viridi Lacertaru«i semulatione, viridi œ» ruleo, dilute & faturate purpureo, nigro aut potius* fubfufco, & vario ex coeruleo & viridi compo/ito colore.

T A B U L A XVI,

- | | | |
|--|---|---|
| Trifolium falcatum
feu Medica falcata | { | 1. Siiveftris filiqua cornuta tort Hī diverfor urn colorum, nohis. Medica filit-.*
frk, J.B. Chabr* Medica flavo flore, Cluf Hift. £ |
| | | i. Sativa filiqua cornuta magis tortil'h tiobki Medica fativa, Lugd. Medica
Legitima, Cluf. ft. \$ |
| | | 3. Siliqua^ cornuta fen at a, nobis. Lunana radiata Italarum, Lob. \$ |
| | | 4. Frutescens incanafiliqua cornutaplanajobis. Cytifus incanusifiliquafalcata^
C.B.P. Cytifus Maranth*, Mhth. Lob. Lugd. \$ |

Exptyatio partis Tab. decimquint* is decimjeftmi*.

1. **N**obis. Medica filveftris J.B. Medica flavo flore, Cluf. Hift. Medicae filveftris genus radicēcrafiaculalignofaconftat, fapore fubdulci, vjrgulta emittentē cubitum lohga," vel etiam longk-ra," teretia, ftriata, glabra, hum, diffufa, in rriultos, lentos furculq^s fubdiyifa: folia de more terna, angufta, oblonga, fupremo margine^veluti corrofaf (floculi %culorum faftigiis conferti, globuli fere ntodo, aliquando fipicx inftar infident, crocei utufimom feu iiavi colonis &c.

2. *Medica fativa* five *Trifolium fativum* nliqu'a cornuta magis tortifi, ;:oKs. *Medica*, Dod.ut. *Medica fativa*, Lugd. *Medica legitima*, Cluf. Hift. *Fcenum Bur'*mdkicm, Ad.Lob. HKC *Medica fativa* in multis convenit cum filveftri, fcilicet radiceperenni, *telis'*, floribus quoad Formam, fed niagnitudine difcrepat atque hifce (equentibus; primo flores producit violaceos feu excceruleo purpureos, majores precedents, quorfequuntit cornicula cochleata adernas faltem circumvoitiones cum dimidia, fub'exortmn &riiicm earundem intorta, *Medicarum cochlearum* cap. fuperiore explicatartim modo, fed inpaacior' fpiras contorra, • duas videlicet velternas (uti diftum)cnmdrmediatis, in quibus gyrai. contnentur (emiiaa reniilia, Ciindidi.recentia, vetuftiorafubrufta: (nt< hifcefceminibus utphirimum) virgE func longi, reflis, atquecrafliores quamiu....- &dka tupra explicata : Atqie quando in agro pingui & bene fnbacro leritur ubeiuis & felicius hxc *Medica fativa* proventr.

3. *Trifolium* feu *Medica annua filiqua falcata ferrata*, nobis. *Trifolium filiqua* fal CB.P. *Lunaria radiata* Italarum, Lob. *Medica hzequam felcatam & ferratam* nppclJtmus caule & folios Triiolio pr^tenfi fimiliseft atfoliis inanabttn ferratis conftat, flore f' tco, fiii quis falcaris f< , indem, & eo nomine a Cytifo Maranthar diftinguitur quoad juam, deinde hrcfi . tum herbahurailisannua, *Cyffas Miranths* eft itibraccx, lignea lubtantiacofitans, tetus incanus diudurans. Inter nrctrasMedicas talcatasiacilccognoJatuf fili,qua lata compreffa, pollicis'neuis hmnani magnitudme, in medio tumida, ad Aunculam muris Cametarii accedence led fmciofiore & ma)ioie, ftriata, falcis modocontrafta, in circuito ferrata & quai fpinofa. Cnr tamgall. nor. male «primente; & ut aic Odalpmnsquoddam genus Trirolividi, cujusiiliquavalde lata ac ralcataerat effigie Innxfalca^, . autferr.

equini

4. nobis.

ta, plana, ugd. Pul-

cher. e fthicf_ubfme_xig2s bicubitalis, & crjeub^hs, & a. quando adu_lit6r ak10r t0 tu_sincam, s n nnospl<r<tcn_uesdivifus; tohiscft terms aliorum TrifoLoru- .e>f<l retufis & nonnih I filfw <V>* fuffincntur a longioribTM ndiculuquani m cKeris, acproinde repanda W- flores exlongis item pediculis dependent, multi, parvi, papiLonacei, lutei, Gt'iii} ^l iiiiofe floribus proximj, fed nfdem minores & magis colorati: quos iequitntar fili' hi'is, fd&ti*^C recurve, - ^oaelanjccrefcentisformiamrefernt, mqaarnmiin-aulis I ^rn^aacent f_{cn}i_n*i_{ena}^a csterorura f rifotiorum falcacorum nip.c: radix in mukosTamos ^rolos *? *f***.

LOCUS & TEM'US.

• r 1- f. Wti fpecies- *i.Fertotm GaUm*, <y ftcunJum fuvios cum Ugerem 1•& Sequa- Trifolu taKi^ ht^ aquarum tnHndantiujnalveoi abkth isdejefth confpmmmicyak* • mm, utn r blna/iidnai, dfitndijfl in terram fohdam iy firmam amequam vi aqua corru- radicu, ^{mj}> quira<li<* denudaU terra, ?'obk *influrhrisMc* lech cenfpieu* fuert frtdm* . tret m^mii: fioribui tvansfceniihus atqut dilnpfo cujufcunque coloris, fuborkbantur fdiqu* /07/g/f' st tumjje i_{nm}f_{io} u_n apparentftmina, contort^ una circumvolutioneatmdimidut, tdo magis, altquaudo minus *tortiks*. Qua ratiane Takmtmontanus Lmtem *majormjt- em fane noftram Mtdicam filvefirem appellaverit, ne'e duta comprehend?*. Compihtor hie fut t alibi ab ijfofitj nomenhoc, buic planu inept_umfatk impofitit, nan ut aliis, fedfMpfh itatnmiink male tamtn adaptafi, placmt: vidmnt ipfim anffftimm plant arum 42 tithcaticmm fpeehrum fine neceffitate pnfleri Botankl, iff facile percipient ipfum he eo fine feciffe, utplurts ceg^ifcp-utMtwPlaiitasquamcottancrBorenici Frovenit'inquam in feipibus prfegettbus r ex quibus baud facile exterminari *ftmlvhmti>6tmt* proMer r\$' S ces Cd,aum)mterramdimif^y rope Monfpdi_{umisf} LumU<hffi<>TM JnfiW? Junk , ncn folum Mk » in leas fu_pra a me diofk, fid paffimfiew nJgmts vim * /'' pibus is' agrx, pertotam Pftaviam.

2.

betfolm.' fativa autem tn Valentinoregno isrpro^c_adialoiameata mLfin Z<TMme<fts Hispam* provmci* pa(fnn_m agr* femur ubi \$ tene ^his m_rb^fitaWte » *- cem f dwarn annosptr&rat, ahquando ph_m. Serendin McMwnfriL T Varro ait) in terr

dicam

df&vmfcribii, ac femelfatam, decent anhOs aut duodecim permanere maximo cumfcenore culy
 torkfait. *H<£C Medica legitima non modo in varik HifpanU locisfyonte crefcit, fedetiamply
 rifque diligent er colitur in pecudum pabulum, fed maxime equorum, vice fcei, communfs
 quippe quod propter ubertatem fingulis annispluries demetipoffct. GallisSainft foin isr Join
 de Bourgoigne. In meridionalibus Gallic regionibus plurimo in ufu eft Medica fativa, quif
 & earum incol* rigua fua prata ejusfeminibus conferunt 7 ter eandemfecantes, reftribili ra*
 dice is inexhausti a fertilitate, dummodobt agro pingui is^l befie ftercorato, non aut em arido,
 quomagk Onobrycbk feu Caput gallinaceum Belgarmn Lobelii (Luzerne Gallis diftum) de-
 hctatur. Cum enim per Burgundiam peragraremur fub auspiciis Sereniffimi Principk Gafhnifj
 Fraud* Aurelitnenfium Duck, diverfas diverforum generum plant arum fpecies *trutinando i&
 diligent er examinando, inter cater as nullam frequentius in pluribus ibidem agrk cultk cbferva-
 vhnus Medica fativa, qu<£perutilk cenfebatur jumentorum, prxcipue equorum, pabulq hye-
 "malU Eandem in agrk humidk, is fatk lutofis^ ac pinguibus ferebant. Onobrjchijcm in
 qgris glareofis, fabulofis, firmis tamen, is in alto fitk conferebant, quam Galike paffim no-
 mine Luzerne vocant, quamvk Dalechampiut author Hift. Lugd'unenfis confundat cum Medi-
 ca fativa, Sainft foin vulgo illic dicla, Onobrychidem id eft, Luzerne^ Nomen Luzerne is Lu-
 zert a Romank provinciis mutuatur: nam Romani Onobrychidern votant Luzerne is Lnzert.
 Confule capitk v i. paragraphum 7. de Onobrychidefuprh. Nee prxterundam cenfui bane obfer-
 vationem, videlicet fpermatopolas Londinenfes vulgo venum exponere Onobrychidu feu Capitk
 gallinacei femem pro Fceni Burgundici fetmine, is abufive, cum'nunquam obfervaverim adhuc
 in ipforum officink vel granum. unum aut capfulam Fceni Burgundici aut Medic* jativs.;
 "idcirco Nobilibus is virk generofis confulerem, ut ex agrò Turnonenfi aut Burgundicofeminum
 volucra cocbleata Fceni vere is proprie Burgundici, Saincl foin dicit, acquirant is ferant in agrk
 fuk, qu<£cumtriplicifcenoreperfolvent ipfispretium; pncipue cumin agrkbene fubaclk is
 pinguibus Hr Jecetur illic apud Gallos, quidni etiam is bic inAngliat ubi terra pinguior ma-
 gifque rigud, is ubi humor magk abundat ex frequentibus ivibribu<s ingruentibus is fpius
 decidevibus, is ideo Medic*Burgundies, vulgo Sainft foin, producenddi aptior. Tanta dos
 ejuseft, inquit Plinius, ut uno fatu amplius quam tricenk annk duret: hdc efi afertio Plini-
 ana, fed. quam vera, vobk Philofophk naturalibus is Botanices amatoribus, veritatifquein-
 dagatoribus obfervanda?n <& confiderandamrelinquo. Neque ego hanc propofitam, neque alias
 plurimas ver as credo -credatjud^us Apella. Accedo Palladio^quidecemannofis amplius per-
 feverare^t^i^ci utf&piu* poffit fingulis annis retondi. Agrum ftercorat, major a animalia re-
 fcit, curefchgrota. Admciem mularum, ut Columellaprodidit, nulla res tantum quantum
 Medica fativa prodeft. Ea berha viridk nee tarde, tamen arida Fceni vice is melins faginat
 jumenta; verum modice danda, ne nimiafaginafranguleturpeccis. Denique byeme ttpudMr-
 gundos is Tumonenfes hac herbaprogramme, aut gramini intmni&ta, utuntur qui pecord
 alunt.

4. Invent us fuit hie frutex trifoliatu incanusfalccctusihCythno Infulajindetransflatusihomnes
 Cycladas, mox in urbes Grscasmagno cafei proventu. Bartholomeus Mqr ant ha hunc fubfruticem
 col legit prope Neapolin, in colle quodam qua ad Nefidemitur. Oritur referente Honorio BelB
 in Infmk Rhodo propinquus is Rhodo ipfa, frequentius tamen in Infula quadam pdrva prope
 Rhodumfita, cuiwmeneJAftachida. Floret <efate •> atque dutumno feminaperfcit fua. Nò-
 natales fatk fuperquepatent fupra.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI Aliorumque Authorum.

Lifefium frutescens incanum feu Medica, fru-
 ctu Marantitx, Mallo Lob. fanga. Cythno fimbria.
 tictirva, J. B. Chabr. Cytisu incanus, ligndfus^ ^m
 auisfalcati8, € B. p. Tag. W-p. col. I .pi. 1. ^al
 iut inter Cytifisti Cajp. Bauhtsh opllocatur: at magis
 per per amah omnibus authoribus ifipfo Cajbaro Bau-
 * det
 Cytifus fimbria ffw diftus filiquas ijfejer. at longas collis
 pffstjm, ef que du plahos aut bifurcu feu br-
 futiepubefcentes, comitentein J. femina canefceifa
 nidi/i, ab ijh vulgaris peneritu, atque b<?c

plant a Jiliquam prodicit parvam, curvam^ fau fal-
 catam^ quceexhbro nature propius accedit ad Medi-
 camfalcatam, quod me impillit ad jtidic<indum fa-
 cihus £? certius Medica frutejcentis eiff Jpeciem,
 potius quam Cytijñ -propter Jiliquam curvam feu
 falcat^ ani. Vtraquehcec planta generice, 6? Cytifus, &
 Medica, eji Trifolium, ergo cui alterutrius hujusge-
 Heris fubalterni propius accedit fine ultimo, id eiffi*
 liquis, ei er it marts affints ex dofrinb univerfali no-
 ftra: & fi Medica frutescens incan* Perpetua, fron-
 de virens, filiqua fah at a, plana, azfynhxretur aat
 mminaretur^er^fon fiabit.

LEGUMINA

Trifoliata feuTrifolia Leguminofa.

TRI FOLIUM O D O R A T U M

Melilotus di&um.

C A T V T X.

DE Meliloto Plinius l. 22. c. yAnquit, in coronamenta folio venit Mehlctus, quam S. talem Campaniam vocamus? est emm in Campania Italic laudatiffima; coronas ex hat
 tiquitas factitat in fact... odor ejus~CrocovidnuseA
 ganana: 'Zl^Zf^! * ^ spavit: **<
 figur, laudatiffima tamen in Asia... vque pinguiiffims. Et cap. 11. Melilotos ubiqu
 quanquam in Italia odoratbr^ ZndTdT^ * " * " * " M " W ^ CroCo ^ am gnill _
 Nota generica Meliloto peculiaris, qua à ca-teris Trifoliis distinguitur, est* haec; primò
 gracillimum ejus flores (e namtoiiaremiflius) fpirant odorem, melli accedentem, unde ei
 linm flores racemTim 7TM*? TM *? de folia habet la ciniata utplurimum: in fummis cau-
 confpiduntur- onik ns nguis effloreatcentius fuccedunt capful* oblonga?, aliquandoro-
 tunda?, rueofa' f' fi effloreatcentius
 orem, clutim in epCJ. cie *OTIS ^ ^ natse, confituentes fpicam biuncialem & aliquando longi-
 aliquando rug ig C ^ n d u m folium; finguk filicute curtis pedicuiis pendentes, funt afer*,
 culatse, in ^ ^ ut pl^ imum, aliquando albas; in aliis filiquas funt longs corni-
 giores'n oArVa? ^ u ra ^ l i n a longitudinaliter in iècontinentes, quas iint breviores vel lon-
 rarum' p ^ A ^ L o t o magis accedunt ra tione filiquarum bivalviim longiorum filiquic caete-
 plex- v ^ d ^ a ^ m Meli otorum. Melilotus est vel florcalbo, vel luteo, qua^itidem du-
 viobceo ^ c ^ i ^ i l l u l l s curtis, vel filiquis longis; vel denique flore dilute violaceo feu albide

Pars TABULJE XV, & XVI.

<p>Trifolium odoratum Melilotus difum</p>		<p>i. Candida major? nobis. Melilotus Candida major Trag. ^</p> <p>z. Vulgarisvdofficinarum, nobis. Lugd Melilotus Germanka. Ad Lob. Ger. i I. Majounobi* MelUotusfdicul hnl onbus, Dod. defc. \$</p> <p>4- Magnofemims pe> karpio rugofc rotun- do, nobis. Melilotus lutea Italica, Cam Hert. £</p> <p>5. Densius difpofita femine minore, nobis. \$</p> <p>6. Rarins difpofita femine majon, is.</p> <p>7. Minima procumbens palmar is folio mino- nore <y an, ufti ore, nobis. Meliloto vul-</p> <p>8. Perennisprocures fpi ca brewore' race- mofa denfifnte difyfitajer icarpio renali " Jgro, nobi. Trifoli Umagra riu? i Dod. O</p> <p>9. Re&a minima jemine F ^ n u g r ^ c i c r a f f o nobis.</p> <p>10. S^{ea} ma^{ior} odor at a, nobis. Melilotus vera, *at>. Melilotusfingularis AfinhPen .? I. Ger-</p>
---	--	---

In . Germanic* fivejtalka Syriaca

Trifolium odoratum
Melilotus di&umSiliquis penden-
tibusLongi* curvk exl
code= centra ortis\12. Syriaca minor procumbent fiv&Al-
cbimcUch^ nobis. Mdlotus &gy-
ptia Ahhimtkcb Prefp. Alfin. de
Exot. 5?13. Sj/riaai major feu Cbakpaifes ma-
jor I nol/k. §

Expheatiopart'aTabuU 15. 15. \s.

Mtilettt jMculis curtis jiT pendentibus.

1. **T**rifolium odoratum feu Melilotus fnicicofa Candida major, Trag. Melilotus 5. flore candido, Dod. dele. Melilotus fbre a I bo, Park. defc. Hæc Melilotus Candida feu jaconvenir in omnibus cum vulgari lutea, nifi quidcaules phir;s, altiores, craffiores S^ .amofiorcfi fundat: fiores etiam gerit planes j raiores,&denfias inifptcis difnofitos,candidos feu albos; Wanta eft quæ ftcundo anno port liitonem tiorci & femeo fanm perficit, quo fi copiofe & obertin abundet, ateedntte hyeme rigida rotalicer lupra & infra terrain peric poftquam femina fua perfecerit, ex quibus fingulisannis recur re nrribns fefc^ renovac. Melilotus Candida, Trag. pericarpia producit alba^ minora pericarpis Meliloti luces.

2. Triolium odpratom feu Melilotus fruricola lutca vuJgarisirelofficLoarain, noois. Melilotus valgaria, Lugd. Major vulgaris, Trag. Hæc Melilotus vulgarisaffurgit in hortisaliquando adaltitudinem ftu proctritatem humanam, mulcisalis rubefcentibusornata: foliaLoti fativa; funt acmula, crenata feu in ambitu ferrata, finuata potios, ac fi limacibus auc coclileis teftaceis mordcrentur aot comedcrentur: flofctili in fpica digelti petalorutn numero 3f fitu ut in Genifts floribus, fed funt multo magis exigui, odor tamen fuaviore Sr quafi mcilito C antle ci nonien Meliloti, J colore utplurimum lutco, valcula parva, penreitia ex cur-tis pediculis, mnturanigra, magnitadineVidx frtidis, oblonga tamen & mucronaca, rugofa exterius & mgra, tjtorum fingula continent folummodo fingnta femina parva, tectentiaJotea, vctuftiora fubruffa, quemadmodum multis altis Legumijibus concingit. Etiamfi prædictasduæ Meliloti fp^cies peparit poft ffinimum matuntarem, H niitis ferrit hyenis ex cadem denuo pullulant ratine.

3. Trifol/wotloratuni feu Melilotus luKafiliculislongioribus, Dod. dt fc. Trilolium odoratum foo Melilotua ^vulgaris ilore luteo, j. B. Chabr. Hæc Melilotus confita prope vulgarem facile difcernitur nb ipla, filicalis fuis longioitbus magifq; mucronatis; nigrisaatem convenimnt.

4. Tnfolitun odoratiTn feu Melilotus lutea (emins pericarpio magno, rtigofb, rotundo, albo, nobis. Melilotus lutea kalica, Cam. Melilotus magno femine rotundo, rugofa, J. B. Chabr. H^cMeliloti liiccarfpc-ciesduorum cubitorum altitudincm aifequitur; radice eft fimplici, refta, lignoia, alba, gracili.- cauiis reftus, angulofus, purpurafcens, rigidus, l^vis, T#O tubulo pervias, plurimis ramis brachiitibus: loJia aliarum lus^lortis more ter^emina, majori, pediculis aliquando rubefcentibus appenduncur, qua? extremo margiicronindaca, viterque crenata, nonnunquam & integra ^ Hofcult niellini funt colons, veluti Mcliojr le vulg. is, fed late! pauJo Htcuratoris, in fpjeam digefti, & penduli, fnaviterque olent <: pericarpia fingutn, fingala feminainvolventia, fu»t majors, fangofiora, rotunda, paml antnihiinuicmnata, Pifi feminis niagnitudine: rarobiii femina in onacomperiuurur caplula nifi a luxumnre natura, quemadmodum. fie iiniucleiferis, uc Cerafo, Malo Pra* coce, alnfque qiamplunmis in valb vegetantiumcolioite.

5. Meittotulatt minor floribus &c filiculis minoribusfpicatim Sfdenfe difpofitis. nobis. Hæc Meliloti minor (pwies nulli fcripta, ca«les preferc virides rrtfos, pedales & fefquipedaks, ad quoruml Jin^lagcmcula proveniunt foliaternaaliarum prardiflaruni Melilotorum more, llllllola ledad e^rcmum rotundiora; in fmmis canliam ramolia nafentnr flofculi lQtei, iequens iionbus mino>es, fptcatim drgefti, & den fins difpofiti, quorum fingria facednnt UCULE minimis tola colofis, denfiatque compact, uti fupra diftam.

6-Melilc/u* luteammor flonbus &-fi[i_culi, majoribus fpicatim &raro difpofitis, foiiis angftioribus maculis tub exortumnotatis, nobis. Caiiles profeit hæcMelilotus^mirtor einficm akitudinis cum prædifta, fed/nagis ad rubedinem in c l j n ^ s : loia lint prædifje foiiis

angustiora, & sub exortum maculis fubruberitixi's afficiuntur : in fummis niniulis pr/Dveni-
tmt fpicatim fiofculi lutei; pradi&semajores, quorum fingulos fingulae fequuntur filiculae ma-
jores & rarius difpofita?, ipicatim pariter in cimis caulium pendulas, in quibz continentur
femina duplo majora feminibus fuperioris §³ⁱ Berbaridi.

7. *Melilotus* lutea minima procumbens palmaris & fequipalmaris folio minore & angu-
ftiore., nobis. Meliloto vulgari nofrati.affinis, J.B.Chabr. Folia hujus minoris, vulgaris
Meliloti pari divifione proveniunt, tergemina itidem, parum odorata, longiora & angufti-
ora nofratis vulgaris Meliloti, per ambitum pariter paululum crenata: flores lutei, fimiliter
fpicati, fed finguli minores; pericarpia eidem fuccedentia funt minora & circularibuslineis
rugofa, in quorum fingulis fingula continentur femina. Tota planta adco cuafae brevitatis
interdum reperitur ut palmium vix i'uperet, in fertilibus praecipue : radiceconfat p'ava
& fimplici. Vide Icone's harum trium minorum in App. ad Legumina.

8. *Melilotus* lutea minima hirtuta procumbens fpica brevior deniffime difpofita femi-
nis pericarpio renali nigro, nobis. Trifolium agrarium, Dod. Melilotus 8. vel Lotus campe-
ftris, Trag. Trifolium arvenfe, Tab. Meliloti & claffem & nomen feu appellationem mereri
hoc Trifolium agrarium ivullatenus mihi dubium videtur, cui anatura donantur cauliculi
tenues, pedales & pra:umbentes, hirtuti, foliis tergeminis fubrotundis, hirtutis itidem
peroras leviter crenatis onufti: flores exigui 6c lutei, omnium minimi, in breves fpicas
unciales, nunc minores compa&i; quosexciunt parva capitula, fpicae in nsodum fafta, & mul-
tis involu'cris five pericarpis oblongis, apfelis, feu rugofis, nigris compofita, Meliloti vulgaris
quodammodo more ;* in quorum fingulis fingula latent femina fubflava.

y. *Melilotus* minima recla lutea filiquis craffis, curtis, in capitulum congeftis, femine
Fopnugrxi, nobis. Hxc omnes Melilotos minimas procumbentes excedit magnitudlne &
latitudine foliorum, quibus proxime accedit Meliloto luteae Italics Camerarii; vix pedalem
attingit akitudinem; in cimis caulium flofculos profert plurimos, fatis raros, luteos, qui-
bus fuccedunt filiquae parvae, curta?, craffiores praediclarum omnium Melilotorum filiquis,
in quarum fingulis bina, terna, continentur femina fatis magna, abangulo ad angulum Foe-
nugrxi modo cavata; hifce notis a caeteris omnibus (nifi Foenugrscum a fimilkudine fe-
minis dicatur) Meliloti fpeciebus quam facillime diftinguitur.

10. *Melilotus* major odorata violacea, nobis. Melilotus vera, Tab. Melilotus fingularis Al-
pin. Fonx. Lotus hortenfis odora, CB.P. Trifolium odoratum alterum five Lotus fativa,
Dod. Lugd. Haec Meliloti verae fpecies fingularis Alpini Pona> cauliculos habepreftos, ro-
tundos, inanes, cubitales aut bicubitales & aliquando longiores, in ramos r.uitos divifos:
folia fingulis geniculis terna adhasrentia, Trifolii bituminofi foliis familia, leviter ac fuper-
ficie tenus per ambitum crenata : exalis inter toliorum pediculum & caulem orimntur cau-
liculi unciales & biunciales, quandoque longiores, fuftinentes racematim congeftos flores pa-
pilionaceos, pallide violaceos, aut quafi ex violaceo albefcentes feu dilute violaceos,
quorum fingulos finguli fequuntur folliculi bivalves five veluti capitula bivalvia, l'via, non af-
pera nee rugofa, prxdiftarum Melilotorum more, nee pendentia fed refta ; in quorum /ingulia
plura continentur femina, ut in fuperiore 9. prxdic^, bina, terna, quaterna, (non forurim-
do unicum ut in prxdiftte) rotunda, Loti Vulgaris filiquofae feminibus majora, quae fu^t
gratiadmodum odoris, quemadmodum tota planta: radix hujus tenuis 6c fibrofa. Tota
hzc herba Trifoliata leguminofa odorata eft dc aroma cum gravitate olet; feficcata vem
6c arida plenius, quam recenter collecta • feu decerpta, eique diutius odor inhsret, qui
pluviofa & humente tempeftate intenditur.

Melilotus lutea filiquis recurvis propendentibus.

11. *Melilotus* lutea major corniculis reflexis eodem centro ortis, nobis. Melilotus Ita-
lica, Fuch. Melilotus feu Sertula campana, Matth. Cord, in Diofc. (Trifolium c ~~sigula-~~
tum 2. Dod. Melilotus Italica corniculis incurvis, Trifolium Ita^cum quibusdam ~~dicta~~
J.B. Chabr. Melilotus Synaca, Ad. Lob. Eft hsec Melilotu?/prima & major ~~corni-~~
culiscurvis pr^ditarum, altitudine trium cubitorum, alls rrtultis brachiata: ^ i a p r o n
ducit Trifolii vulgaris, aut Fanugrxi asmula, in ambitu ferrata, prsectiftarum Melilotorum more;
flofculos gerit papilionaceos luteos aut luteopailentes, globulatim provenientes, Trifolii pra-
tenfisall'i o4orati nftar; quos fequuntur filiqua? cuitx, complures, exigua?, breviores, bivalves, cor-
niculorum modo, ex uno & cdmuni pediculo ortse, 6c fimmitaibus caulium innixaj, deorfun
pen-

pentulæ ex* petiolis propriis vix confpicuis; in quaram fingulis femhincialibus coacervatim prtftpJtidentibus femina conrinentur parva, plura in unica ferie nafcentia, faporeac forma Geniftæ: radicibus firmatur longis tenuibus, fibrofis. Licet Lobelius & e)us fequaces Gerardus, Johannes Bauhinus e)ufque fimia Chabraeus duas proponunt Icones diverfas,, nori proptera)uas'funt diftinctæ fpecies, ut apparet ex ipflfts Lobelii verbis afferentis Melilotum Italicam&PatavinamexMeliloto Syriaca degenerare; ergo Melilotus Syriaca major & felicius proveniens femine' ex Syria allato, & minor fata in Italia aut (ermania, conftituunt unan: eanr^mciue fpeciem, fectindum ccelum & folium quibus committuntur, magnitudine taciturn & emiffiore aut intenfiore difoentem. •

^ia> *Mdilotus* iutea minor procumbens corniculis reflexis ex eodem centro ortis, Alchimelech iEgyptiis dicta, nobis. Melilotus i ggyptia Alchimelech, Pfofp. Alpin. de Exot. Haec Melilotus minor procumbens, Alchimelech ^Egyptiis djda, efthumilis herba fupra terram expansa & modice procumbens, fere nihil aut parum fe attollens, foliis Trifolii filiquo/i feu Loti vulgaris glabras, minoribus tamen, neutiquam ferratis: fioribus parvis luteis* racemi modo' in fummis caulibus ordinatis ac croceis fere; a quibus^fingulis promanant filiquæ fingulæ, parvas, oblique feu recurva?, femina continentes minutum; rotundum, & fubnigrum, declinans ad rubrum, odoris non omnino expers, {td remiffioris, fapore eft ftiptico cum alio amarore. Eft parva tantum herba annua, ficut & prcedentes fere omnes^

13. *Mdilotu** Syriaca feu Chalepenfis major coronata filiquis curvis biuncialibus, nobis. Hæcaules productæ pedales reftos, in quorum cimis proveniunt flores lutei, capituli in modum digefti, e)ufdem cum ceteris magnitudinis; quorum fingulis deciduis fuccedunt fingulæ filiquæ ufque ad numerum denarium compa)te jun&se, communi petiolo propendentes ^ curvas, binas uncias longæ, in fingulis continentur plurima femina, recentia fiavefcantia quæ tandem fubruffa evadunt.

L O C U S & f E M P t I S .

- Trifolii odorati fpecies.. 1. *Mdilotus Candida major*^ *Trag. In offer is* <? fakbrbjis agrorum limitibus* provenit^ fed non tarn frequenter reperitur^ quam vulgark. Floret deflate media^ & femina perficit verfu* e)ufdem Jinem^ quorum pericarpia funt alba_ minor a pericarpis Mtiloii vulgarit, qu<£ funt nigra is major a. .
2. *Mdilotm*^ mlgarislutea feu officinarum floribus tuteis fyicatim digeftp\$, reperitur paffim in agris frumentariis, (? lapidofis agrorum limitibus itidem. Floret ante mæftim, isipoftea per totam o)flatem aut floret, aut femina fuapetficit.
3. *Melilotus Iutea major filiculæ longioribus* nigris, nobis. Mdilotus jiliculæ hngioribus* 4. *Vod. defc. Reperitur ibidem in agris frumentaceis, fed rarius occurrit. In hortis auttm juxta vulgarem confita, a filiculis* nigris itidem, fed longioribus filiculis vulgatis^ facillime obfervatur diftincta. Floret is femina h<£C fpecies perficiteadem tempeftate cum prtfdiftit.*
4. *Melilotus Iutea major magno feminis pericarpio rotundo rugofa, nobis. Melilotus Iutea Italiae a, Cam. Hort. Provenit in Marfls ad lacum prope opidum Calanum, ubi ab incolis hodie Malatro corrupto nomine appellatur. Floret tardius vulgar7. ffujus femina dd Johannem Bauhinum mifit Tofanus Carolus pro Metioto Hispanica.*
5. *Melilotus Iutea (pica denflu* difjofita femine minore, nobis. Provertit in montibus pratibus Delphinatus, urtde habuimus miflam a D. Berbrdo Apothecario, rei herbaria callentiffimo. Floret (Joachora deflatis quahtcommittoprelo) in horto Botanico Vniverfitatis & durat ctdmenfemfl^ bus aut feminibus pr<egnans.*
6. *Melilotus lutea fpica rarius difjofeta femine majore, neb is. Semina hujus ex Syriaca urbe Chalepenfi commuhic At a habuimus in ufuria D. Robert i Huntington fupra memorati: eadem tempeftate annicfl crescit femina perficit in hortis publicis quæ apior.*
7. *Mdilotus minima procumbens palmaris annua folio minor e & angustiore, nobis. Meliloto vulgaris affinis folio mindre 6> angustiore J. B. Chabr. Hanc Cher terns attulit dd Johannem Bauhinum\ fed undehabuerit nondum deteftum.*
- %- *Melilotus Iutea minor procumbens ferennis fpica brevioris racemofa, pericarpio rehali nigrodenfiffime difjofita, nobis., Trifollum agrarium Dod. provenit paffim in Germania, Gi?/ftt <y Anglia fecus vias & agrorum margines is in agris frumen turn fereniibus is' novalibus, imonori raro. in lapidofis i& muro rum vetuficrum dedificiorum rudibus eorumque rimis feu fifiuris, floret ckca mæsem is diu pbfl; paffimin agris obfervare licet femina fua nigra rugofa racematim*

tim iff arfie in fpicam congefia, per ten am flra'tis caulibusfuis pedalis in nitzytia.

9. Melilotu* lutea refa a minima [mine Fcenugr&d craflo, nob is. Hujus Meliloti. penghn <z five pofiu* Fcenugraci minoris femina fueruit mifa iff communicata a D. Berbaro fupra memorato, fed ubi terrarum prov, entat sjonte, nobis nondum innotuit: floret jam fub iempus fcenufecii in horto publico, femina perfeffe menfe abhinc redditura.

10. Melilotus violaceamajor odcrata, nobis. • MeUlotjt* vera, Tak B*c mobk ptregrina Melilotus efl, (ff haudquaquametiã CallU, ItalU aut Germanic campds ornat, feda multis reiro attnis cum apud pr< edifias nationes, turn apud nos in hortis feritur. Eft peregrina b*c herha annua Europeis^ ubi sjonte proveniat nee, conftat; in hortiscultd floret, isr a*f-hm femina fya fundit, odorem quam gratiffimum fuggerentia, eadem tempefiatè anni cum pr&diftk, fed tardm maturantur*

H. Melilotus filiculispendentibu* longps curvis exeodem centro ortis, Germanica five Italica, Sjriacave refa; nobis. Melilotu* Italica, Fuch. Ad. Lob. Optima h*c Meliloti Species ex Syriica Akpo ferri ccepta ('iejlibus Lobelio (yPenaJ isr Patavii fata, quafi folinativi Oblita corniculis brevioribue is' recurvis five reflexis, fed minus falcati* feu lunatis, i\$ ignavioe odore' degenerat. : Floret xfiatè atque fejiina eadem exeunte perficit. Habuimus femina hups, frcut (y Meliloti ultimo bujus TabuU, communicata nobis à prdidill* P. Roberto Huntington ex Cbakpenfi urbe unã cum plurimis aliis rarioribus feminibus biennio abhirtc trdnfmiffi.

12. Melihus Syriaca minor procumbens five Alchimelech, nobis. fi*c provenit in Mgypto, cujus femine vulgo utuntur indigent', floret <iftatè cum cater is fu* fortis; at paulo pofl femin. fi ejufdem maturanhr.

i^ Melilotus filiquisbiuncialibu6 Syriaca five Chakpenfis major, nobh, Huju* femina miffa a à prditto D. Huntington, nunquam nobis fat is Uudando, accepta, isr. biennio abhinc ten* comijfajlantas plurimas* nobis in horto publico produxere. Ve nominibus harum omnium Melilotorum fati fuperque dittum in explications; de Iconibus con/ule Tab. 15, ^ 16. & Appendicem ad Legumina.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

2. Melilotus lutea vulgar is feu officinarum. Hujus fubftantia, ut ait Galenus, e/l [magis catidquam frifida: eft enim Melilotus primi ordinis calida iff ficca, habet etitu quid afiringens fed i/difcutt iff maturat. Diofcorides tradit Melilotum maUa* TM%£TM&* habeale facultem, at malaicam habet non Propria*, fed quatenus ^*TMM----- aut olis , il. nL U,,m* e uifcutit ac dieerit. Nam eatenus quod durum eft tenfam emollit, que ^ ^ ^ f ^ ^ ^ per hntiffuffioefi^cuM nodi facultatem difparr- i i Grteu dominantJ atque hoc modo inflammationem omnem emollit, prifertim (ut ViofcorU 2s tradit) circa oculos, Jedem, uterum aut tefies cum pafioxoclaiffimpofita, interdum ad i'o ovi luteo afato, 'aut Foenugroeci aut Triticiffarina aut femine Lini, aut capitulis Pa- 'i aver is Serideve. Sanat eadem melicerides recentes per fe in aqua iff *£&s0 five manan&q.. cantkulcera cum Una Chiavino aut galla illita: fiomachiitem dolorem iff cotta iff cruda cum aliquo ex antedictis lev at: anietiam dolores crud<e Meliloti expreffx fuccus cum p,fo injlillatus fedat, captis vero dokjem, quern K^Aa^y nominant, lenit cum aceto rofaceo irrigatus. '

10. Melito(us verd feu urbana major odor at a violacea, nobis. Melilotus vera, Tab. Melilotum veram urbanam violaceam bane vim mediocriter concoquendi iff reficcandi poffidere ait Galenus^ iff in caliditatis iff frigiditatis conjugatione mediam quodammodo^ temper at am effe. H*c cerU, facultates in hoc odorato Trifolio feu Mdiloto violacea odor at a eminenter iff confbucie apparent. Viofcorides ait extratum fuccum addito melk oculorum argemss, nubeculas, x^^ (Albugines vocant Medici AnatomiciJ iff gudt pupill^ oculorum obfeurant expurgare. ?*f-fim per tot am Europam Chirurgi oleum in quo folia florefque bujvi Trifolii (adde femina) macerata, vulnera recentia glutinare tradunt, & a£ pueroru ty enterocelas, buboftocelafqm plurimum commendant pro Balfamo. Interponitur iff arida herba'vefiimehiis, qu* M a^mvs rodantur defendere putatur.

i i. Mthloj*; lutea procumbent corniculis reflexis ex modern centro ortis • nobis. Alchimekcb JEgyptus dma, femem habet minimum rotundum, fubnierum dedinans ad rubrum, odom non omnino experts, fapore fiipneo, cum aliq uo amame% plan)a ipfa efl pawa, cujus* femem apud

apud MgyfM* in u/u exiftit, quod put ant iidem quod cqlorem is frigiditatem temperaturn efie, ficcndis ftipticitate roborare, ex quò ad hep atis tumòr es ipfòr urn ufws apud illos eft frequentiffimus, quoniam fineulla relaxation digerit is refofait, ad omnes quoque do/ores quafcunque corpor is paries occupant es foment is is ipforum decocto utuntur, mdximt adplèntidem, Unpneuijioniam, is a<f htyatis, coli, is ventricutidolorem, quibus doloribus vexati ipforum decocli calidl libram 1. bis ipdie bibunt: jnulièfs etiam uteri frangulationibite, flat'ibus ac doloribus eo fubveniunt; prefertimque ex eo etiam infeffronibu* par at is, quteenam ex Fcenugrtfd Uniquè feminibu* is Chamdimeli flonbus parat <e, efficacim ad illius is'aliarum. ^iujn duros tumor es adminiftrantur; atque ad evocandos menfes retentos\ ad rQ^orandum uèntriculum is apperiendas obffruftiones venarum decoclo fumme proficue utuntur: unde Meliloti hujus* Akhimelech feminum eft ufus apud Arabes; quemadmodum apud Grccos non femina fed flores inufum admiHuntur: anvero Akhimelech Mehtotu* minor procumbens femine reflexo feu curvo, an Melilotu* urbanaodorata flore violaceo^ anno/iras vulgaris eminentioribws polleat viribu*7 dubitatur* Sed hoc certum is verum coridudimus nos, Melilotosomnes earundem viriumefè fecundum magis is minus, nee ullatenus dubita* mix Ccum fub eodem genere Trifoliorum odoratorum quoad omnes par Us militent, fecundum-dofirinam noftjam J Meliloti omnes sjecies iifdem pollen viribut: fed^b*tres **T^o^fo) ufur* pantur^partim apud nos^ partim apud Grxcos, partim apud Arabes.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorunique Authorum.

M Elilotus major odorata violacea, nobis. Melilotm vera, Tab. Melilotus fingularis Alpini, Fons. Lotus fativa, Fuch. Ge/h. Hort. Cam. Lotus urbana, Eyft. Tur. defc. Lotus odor a, Ad. Lob. Lotus hortensiflor odor a, C. B. P. pag. 3§i. col. z. pl. vi. Melilott vera cynditiones conveniunt huic Trifolio, ergò bene collocatur inter Melilotos; at primo male Lotus ab omnibus authoribus pene, & Cajftaro JSaubino dicitur, cum omnis Lotus foliis donetur binis ad appojitionem pediculi cum caule, & tertio in exti-estate pediculi tpfius s at in hoc Trifolio turn fie jebat%K ergonon eft Lotus fed Melilotus, f, Trifolium odofittium violaceum, atque ab omnibus pene authoribus male nominatur Lotus,

Tag. 33i t col. 2. pl. tv. Melilotus Italic a folliculis rotundis, C. B. P. Melilotus lutea Italica, Cam. Hort. Melilotus magnofemine rotundo rugofb, I. B. CJjhbr. Perperam a Jobanne Bauhino, & ejus Jlmia Cbabrao ipfi mordicus adberente, atque pajjim itidem cum ipfo err ante, adaptatur hoc nomen huic Melilotu, cam hujusfemen Jit reliquarum Melilotorum feffinum more pla. tt. um, pericdrpium vero aut folliculus externtis femeni pfum involvens cater arum Melilotorum follkulo fit rugofior, femem autem ipfum ibidem contentum (uti diSlum) non efi rugofum i ergo male addidit Johannes Bauhinm, (3poft ipjum Cbabraus, femine rugo/b.

L E G U M I N A

Trifoliata feu Trifolia Leguminofa.

T R I F O L I U M F O . E N U M G R Æ C U M

di&um.

C A T V T 

F znumgrjtcum, ^{TMAS} Viofcoridis I I. c. 124. Theoph. ^{^Eift.} 13. cui. isf ~~8. H. 8.~~ 8. H. 8. yu?c4<Tys (p o^cep^ Grtcis; quarum appellationum maw pars a. filiquarum fmultitudine fumpta \$ft, qu<e corrucculis fmkis funt; ut Ceratis a cornu, JEgoceros a caprini, Buceros a bubulicornu fmultitudine.: quare Columella I. i. e. 11. fimpkeiter Siliquam; Varro Siliculam. Flinti, U6 Li. \$c. i6. Siliaam is/•²⁵⁻ c^{at}h* Fcenumgr&cum uocavit.

Genera: uniusveteres meminere; recent iores /at hum is filveftre faciunt.

Nota generica indigitans Fcenumgrccum à caeteris Leguminibus trifoliatis feu Trifoliis }^eguminofis, eft quod/liquas producat cornutas, recurvas, longas, tumidas in medio, ^{^ac}eraliter compre(Tas; in quarum fingulis latent plurima femina oblonga, fefamea, cavitate medium feminis liotante," feu femine ab angulo ad angulum lineacava w> tato.

Pars T A B U L £ XVII.

- 1. *Sattoum^nobfs, Fsenumgw cum, Matth. Trag. Dod. Lob. \$*
- 2. *Sifaefirefdiquabreviore islation, nobis- Fjznumgr&um SI-vefiuDakcbampij.Lugd. \$*
- 3. *A-Majm frifiqh longh, nobk. Siheftreaherum.'Dod /-< ' 3*
- (4. *Minus fdiquh turtis,nobh. Hedyfarum mir%anm Dal.'. I £*

Explicatio parth Tab. *decimaseptima.*

1. *pZ^tS^CTp* ^{a ti V U m, C_ B n P n L W d, F < in m g r < u m, Matth. Trag. Ad. & Icon. Lob.}
 in alas ramosque divisum: ^{w^m emittit: fingularem, tenuem, virentem, intus concavam,} ^{i Tnroln p'ratensis familia, rotundiora tamen, minora, paul<-}
 lum cordata, ^{vno^Ar} ^{quæ superiore} ^{summ} ^{res:} ^{a r S} ^{gaS, grac} ^{les, an} ^{S<ftas, in medio cumidas, inftar corniculorum recurvas}
 & in ^{acuLum mucronem defincntes, in quibos feinina quina, fcna, feptenav^, oblonga,}
 quadrata ^{> angujoia, flavelcencia, cum cavitate quadam finsulis oblique imprena, usque}
 reficcata ^{c<m gravedine quoadam jucunde olent: radice nititor tenui & candida, f_mgu.}
 15 annis percutite.

2. *Foenum* ^{imgr^cum filvestre ^,ov^TMfili_qtla} ^{breviore&latiore, nobis. Foenomgxcum fil-}
 vestre Dal ^{^m. Hilt, Lugd. Fanumgrxcum filvestre C B P. Hoc minus est lativo, caule ta-}
 mendodrantali: folia gerit terna minrpa triangUari'a, ftbwtunda aliquando, adextre-
 J?<mdenticujata:exfinibus feu'allis inter cables & pediculum toliorum nascuntur fiofculi
 Jngulnes hteopallidi, quibus fingulis fuccedatit fingul^ filiquaecorniculatse, fefquiuncia-
 t rmirvo vacuoque mucrone donate multo breviores quam in iativo, Iatiores & cras-
 res tamen, femem contiitiires minus- radicem habet longam, lignofam,&iibrofam' ^{ver-}
 sur- ^{imur.}

3. *Foenum* ^{g i m filvestre. mAwierm, maT<^s fll T's p^luri^s *Qngis, nobis/; Fcenum}
 pcum filvestre alterum polyceration, ^{C.V-?' Siiveftre altenun, Dod. Lyg^.} ^{Silvestre,}
 Lob. Cam. Recendor*^{tas & aliud filvestre Fanumgrarcum, proer prjdistum filvestre^.}
 ^ b f ^{if I filftn M^<* fim.Ie quoad terna folia serrata}
 ectos: qui-
 is geniculis

inter caulem & folii pediculum ortæ, ^{longæ, binaferales, tenues,}
 in quarum fingulis latent plurima semina exigua seu minuta.

4. *Foenumgræcum silvestre* ^{minimum filiquis multis curtis, nobi} ^{ysarim}
 minimum Dal. ^{Lugd. Hedyfari} ^{ius Triphyllon, J. B. Chabr. Hæc}
 species ^{les nonnunquam in hort.s cultis prof ert cauliculos, fed sponte crescens i}
 qs & ^{vix palmates} ^{el almases habet cauliculos, eof}
 His donales ^{diocribus} ^{intervallWistantes, fili,qu^ f^cat* fufum tendente. I,} ^{fo-}
 % ^{tri\$\$\$P?} ^{appo} ^{ante*s,} ^{totius} ^{fuædenoidem^} ^{fim^s*}
 hSisSSiotntal.csc.com.cnlat^miquis pares, numero font fa ia! ^{f' ^ T n a c e ^}

les ftriata^ aliquantulam compW^, in quammfinguUs latent terna ^{Q 1 ?} ^{gr3C1"}
 anlx ^{^rva, ^Ob} ^{Ullde l,} ^{0 ^ ulofa,} ^{fingulavitatemab} ^{^i Sad} ^{*T^}
 S o V r ? ^{g^,tur hac parvula planta ele} ^{F^nl} ⁱ ^{da} ^{»TMV»}
 farum, ut volunt aiii. ^{glum, non Hedy}

LOCUS - & T E M P U S .

Trifolii Foenugræci species: ^{i. Frovmit proPe} ^{Monspeliùm, ejusque semen collegit Cberlerus}
 in via Fronngmana ver/us Balleruch. Floret ^{Maid; siliquas vero Julio fert maturas.}
 4. *Crescit sponte in agris Monspeliensibus in nemore G* ^{ramontio^ <tc pkrifqut HispanU lock. Nos} ^{in>}

in fi&c?otih?> %C'M vzrfu* cellulam Eremitarum, non longt BUJlsdistantetr, florentem llate istfemina eodem iempore producentem frequenter offendimu*, vix palmarem illic excedebat ahitudinem, at fa turn isr cultum in hortis grandius evadit, hoc contingit mult is aliis Legznii-nibu* minoribu* fyonte in macrofoloprovenkntibus, ut alibi innuimu* supra. ISomina, Locum isc Tempws feu natales, omnium horum Fcenugrtcorum fath superque supra explicavi* mu6x plura addere de hifce imprsfentiarum mon efi mihi animus.

TEMPER. A M E N T U M & V I R E S .

Semer, F<*nugr<ici inter manifejle calefacientia (ut Galena in lib. de Aliment. Facul. tradit.) cenfetur^ eundem bominibus ufumpr<zflat quern Lupini; fumiturenim ipfumcumgaro ahifubducendi gratia, eflque huic rei multo qutm Lupini accommodatius, quin is nihil ex propria fubftantia habet, quod tranfitum remoretur. Manditur autem cum aceto aut garo ficut Lupini ; comedunt vero nonnulli Fcenugr*cum priufquam ipfaplanta femem produxerit, aceto is garo intingentes, quidam autem oleum affundentes eo opfonii vice yjintur. Sunt qui cum aceto & garo ipfum mandunt: caput autem hoc quoque modo fumptum^cOpiofius ferity quodfaciet impenfua fi qui* ipfum fine pane fumpferit: quibusdam itemftomacbum fubver tit. Sue* cus autemFcenugr*ci' elixicum mefle fumptus^ ad omnes pravos humores qui in intefiinU ha» bentur. fubducendos accommodat efi, fuo quidem lent ore leniens, calore autem do lorem mitigans. Quod autem abflerforU quoquefacultathfitparticeps inteflina etiam ad excretionem in* ftigat, fed parciu/mel efi admifcendum, nemordatm exfuperet. Indiutvjniis verothoracis citra febrim affeclibus, pingues cum eo Palmulas elixare quidem oportet: ubi autem fuccum ipfum expyffum copiofo melle mifcuerit, acurfum fuper carbones adtnediocrem craffitiem coxerit^ turn demum longe ante cibum uti convenit. Gal. in lib. deSimpLMedicam.Facuft. aitFcenumgr<*cum calidumeffein fecundo, ficcumprimordine, deindeferventes ph'egmonat irntat acerbatque: qutvero minus calid* isr magis dur* funt, eas digerendo cur at. Farina Fcs-nugr<cci, ut Diofcorides tradit, vim habet emolliendi difcutiendique: cum Mellicrato decofta isr impolita facit ad inflammationes tarn internets quam externas; Iknem cum aceto is nitro fubacla extenuat. DecoSlumieju* infeftu muliebria viala,qu*cunque ex inflammationeautpr-clufione ortajedat. "'Exprefiu* in aqua fuccus decoSli Fanugrsci, capillos, furfures isr manantia cfyitis ulcer a, i^m vocant, purpat: cum an/erina aJipe peffi vice fubieftumJocos circa uterut/^rnollU ac dilatat; oleum, quod ex eo exprirnitur, capillos isr in gmitalibu* cicatrics abjtergit.

HALLUCINATIONES CASP, BAUHINI Aliorumque Authorum.

Pdg.i4S.coL2.pl. 111 .Fotnuntgracum filvejlrept-lyceratio?i, C.B.P. F<Enumgr&cumfilvestre, Lob. Cam. Foenumgracum Jilvejire alterum, Dod. Lugd. H''zjynonymum adfert Cafparus BaubinusHedyjarum minimum Hiji. Lugdunenfts: exhijeeduabus di-funciis Fxnugrteci Jhecicbus unam (3 tandem dum conjijtuere vult, toñpindit duos diver Jos ommuoftereJ Nam Fmnumgrtcum Jilvejire alterum, J>od. H''z.

Lugd. JiliquM producit longas, bzu ft dales, tenues\ quaternas, quinas, ex alts inter pediculos foliorum (3 caulem ipj'um ortas> atqtie ipfa planta efi bicubitalis^ liquando altior : at Hedyjarum minimum Hiji. Lugd. Hedyfari genus Triphyhu, J.B. Chabr. mult as filiquite profert curtas vix femiunciales, aut ad jum^ mium uncialessomprejptf, coronantes quaji caulem ad Jingula genicula.

LEGUMINA

Tnfoliata feu Tnfolia Leguminofa,

TRIFOLIUM ANONIS feu ONONIS

Sive ARESTA BOVIS dictum.

C A T V T X I L

A Nonis Dioscoridi & Theophrasti Ancnk difla videtur à non juncanda, quod nullam utilitatem præbeat, cum aratonibus (b'mertmoraaratndkitvr J inimkafit: nisi quis ex adven- so, nomen impofitu w cenfuerit. Oviu quidam dtducunt Sa»v«i»w Sn/u, quafidicas alini oblectatio- nem: num ex Gr&ch quidam affirmant aftnosmea ft volutareis dorfum fub at uleis ejus herbæ libeat extere rA Dbffflides l. 3.C. 21. Anoxia quatnaltqui Onomda vocar, ramos habet do- jamahs, m vajores* & frutkfos^ frequentibit* gKiikulk tinfiors, mulihuiaUm cavis præ- is' capitulis rotundii: foiih puftillis, tamibm ceu LentkuU^ ad Rut* aut Lini præ- tensis idia accedntibm, jubhirkuti odoratis: ramuli if ink acutiortius horrent- dida eji. A neopbraj?o(>. Hiji. 4. Ow* juxta folium acukataeft^ aheroquoquefo radix can- isrcap. 5, verum ramkaculagracSl: folio Rut*fimilh, fed per totum alpoftitoLu io conditur: tun CQTonam ex intervallh totam freciem npufmtet: fiorem minutum fe- fh jji/iaua ut ve- feptum adit, Plimo 111. c. 15. Ononistcundum Spinam babetfolium & cat 1 / on undique habet arfrnfticvlioRut* frnili, toto caukfoliate inmodum corona: & lib 27 in r a m spinas dam OnomJa vmlunt vocare, ramcfam, fimikn Fznugrotco, nifi frutkofior . 4' Anonin qui- odore jucundo^ poji ver fyinofo. birfutiorque effet,

Pars T A B U L JE XV III.

Erectis curtk lentiformibus	Purpurea	Vulgaris { ¹ S^fiontwp.iifalhc,mbk 2, hon\$ i. : ofanptns, nobi* . Q
		Erecta { ³ . PerennHimgifolia, >obis. Anonh focat* . miror 1 ChfEO'. o 4. Annum
Turfolium A- nonis dtflvmX Siliqu-	Purpurea perennnis	6. Lutea perennis min minima, Col. o Anonis lutea filveftris
		7. Foliis latioribus craffioribus & ferr bis. Cicer filveftrè Penæ, Hift. Lugd. o 8. Verna feu præcox frutefcens flore rubro am- plo, nobis. Cicer filveftrè alterum, Hift. Lugd. o
Propendnti- btti longk bir- futk\	Lutea—<	1. Perennis major Natrx dicta, Natrx Plinii Herbarioru m, Ad. Lob. ©
	Annual	ho. Maritime mitisfoth hcidofer- rtf/o, Boccon.
	j Siltqua	ft 1. Hirfuta brevUxre^ m- bis. ♀
	0 labra	is. Longiore ^ no- bis. ♀
		Brevier^ tt- bis. \$
14	Alba puftilla feu flore ex rubro	Ar albo m'mo, xt •

Anfimtj ciJSr'planta leguminofa trifbliata feu Trifolinm filiquefum, in iioc convenit cum Fccnugra&o"; acfemina producit renalia, live in nicdodcliquium paricntia, nonautemfe-
fwmacea, id eft linea oblique fecantc iemina, uc videre eft in Fcenugrajco. Anonii dsplex
eft, ratione filiquzrum earumqQeponrione: vel eft fijjquis ere&isUntitormibijs, ideIrfj-
midis curtis Srereftis, abfque petiolrsconfpicuis, fed fundocapfula^ontiguis, Lentis mi-
n o ^ figarj; vel filkjuis pendulis, longis, hirtutis, vifcofis: eftque prior pcrennis vel an-
nua; pofterior itidem fen filiquis pendulis longis hirtis & vilcofi's, eft vel pnrpurca; lutea;
velalt><- luceacilp ariter vel perennis vel annua.

Explicatio partis Tab. 18. Srftiotiis fecund.*

Anonidesfiliquis ereQis curtis hntiformibxs.

I, A *Horns* purpnrca vulgaris fpinafa flore purpureo, filijuisereflis lentiformibus, no
X%[^] bis. Anonis fpinofa flore purpureo, C. U. P. Anonis feuf Arefta bovis vu tti G i-
nofa pnrpnrea & alba/J. B.Chabr. Anonis hxc vulgaris caulicoll exit dodrantalibus &
paulo altioribus, geniculis aliquot articulatis, ramofia, obfequiolip, duris acutifiimifque
ipinis horreniibas, jnxta quos tolia parva, tergemina, particularibus Lencis Folitsmaiora ,
colore farurate virentia : flofcnli qnoqec fecnhdum cauliculos enafcuntur forma veiuti O-
chri, fed colore utplurimum purpurei, raro alliidi, quos fequantur valvuli txigux Lentis
minoris filiquarum magnitudine, in quibus fingntis biua cerna femina, plana,rentformia, con-
tinentir : radix tonga,per terfe fuperficicni fparfa, lentaadmodum , acfra&u contumax.
Stirps hsc admodum vivax, nee facile perit, nee extirpari ex agris mfi difficillime po-
tctftT agricolis fepe molefta eft, quandoquidem radices durae ac lenta? aracrum remorantur
&.bov« ipfos fiihint inter arandum, unde Refta bovis dicitur, & Gallis *Anjlz Beuf*
Nova fub finem veris germina emitcit : per tucam sftatem floret, & Autumno fter-
ficintur iemina & tune quidem fpinofiflima evadit. Dtcitur AV>T« five o»ans Gracis, La-
tinie fimiliter Anonis five Ononis, vulgoautem herbariorum Arefta bovis, Refta bovis &rc-
irtora aratri, quod aranr;s boves ia opere ha:rere faciat, & quo minus aiatrum progredi queac
frequenterradtceshujusimpcciiinieiTtofiint. Dcirur&Acutellaaduris acutifque fpmis. In
canipis vifVis Sc ncgieffis reprecitar eadem Hore albo.

2. *Atiohis* non (pinofa pepens, nob's, Hareprtmointuitucognoicitara priore, primoqiiod
non donetui' !Jjinis, fecundo radice longe lateque repenre prxditafic.

. 3. *Anonis* purpurea fpicaca erefta pcrennis longifolia, ftliquis ereffi^ lertifbrmibus, no-
bis. Anonis minor, i.Cluf. Hift. Anonis non fpinofa flore purpureo fpir.ato, J.B.Chabr.
Multos ha-c annuatim ex radice dura, lignofa & perenni, rcpente, lurculos tert cubicales
nonnunquam longiores, rotundos, lentos, firmos tamen, ramofoS) molli hnugineobdpftos:
folia muka latiore bafi caulem ampleftentia, plexum<{Ue cerna pediculi lammitati inniten-
tia, molliora& anipliora quam in vulgari praedfta; fjmniirami feu v'wgx definunt in ob-
lon* 1 ipuram floruni floribusvulgarig quidem fimilium, fed colons ntagis fanguinei,
cipiunt filiqnae lentiformes vulgariaomnino fimiles, lemenrenaleicidem in (e conti-
, id eft finumleu deliqnitna in medio ha bent- Tota planta lento qnodara humoregra-
xer Sf quafi htrcinum virus oiente obfta eft, Fraxinelte fere odorisinJtar, nullo autcm
acuieorum vallo munita eft ficut vulgaris fpinofa fupra dirta.

4. *Anonis* purpurea fpicata erefta annua-latifolia filiqnis refiis lentiormibus, nobis.
Hujos noviterdetefts Anonidis caulesfunt bipedales, nonnunquaminagropingai, & bene
:ulto tripedales,ertfti, nutlisfpinis donati, fed mitesfunt, qnibus adhafrent pediculfatio
ongis tergemina folia fatis ampla, btecerve Anonidis vulgaris fpinofae foliis longiora (pras-
ipue inferipra) ferrcca, necvifcofa: in cauliumfunimis faftigiis fpicatum proveniuntflufcu-
i plurimi minores, purpurei, papilionacei; quibus ratifcenribus lucedunt filiculae lentiformes,
'ivalves, crechc, cmtx, & calycibusiuinimerfas quafi, & vix extra eofdem confpicuas, vul-
aris Anonidis ritu, (ed denfios multo in fpicani compellantur, (cmina minuta reniformia
W deliquaium in medio patientia, continences. Paci finiim in m^dio feminum conywit o-
mr>ibus Anonidum five aiajorum fiveminorumfpecitbus, atque hxc fn nota efleimalis ieu
g«erica diffinguens Anbnim abaliis (prscipne Fanngreco) Tritoliis.

5- *Anonis* pnrpiirea procumbens verna ieu pra-cox fruricofa annua vifcofa fi.tqais craf-
*ioribus lentiformibus rarios difpo/ics, nobis. Hxc Anonis cauks protrudic pcdales & lon-
cior <, lieneos duroi, ad quorumfingilhgnicula oiiunturtergeminaioliarotunda, vaide
Y 3 crenata

crenata, atque padiculis eurtis ex geniculis ortis innituntur floreculi papilionacei dilute rubri; quorum fingulis succedunt filiquae bivalves, continentes femina ^{iatr*} magna pro portione plantis ipsius: folia inquam sunt profunde ferrata, rotunda, viscosa. Hanc Anonidis raris & novae speciem triennio abhinc deteximus, inter quasdam raras plantas, feminibus missas ad reverendissimum in Christo Patrem Henricum Compton, mine Londinensem, tunc Oxoniensem Episcopum, in hortulo suo inter septa aedis Christi fito. Florentem Junio & Julio observavimus ibidem, atque eisdem femina collegimus mense Augusto. Jam floret in horto Botanicolliverfatis, femina ad maturitatem ad finem Augusti perducula.

6. *Anonis* lutea filiculis minima filiculis lentiformibus & bivalvibus, nobis. *Anonis* lutea filiculis minima, Col. *Anonis* spinosa lutea minor, C. B. P. (male adhibetur spinosa à Casparo Bauhino, cum hinc puilla herba nullis afficiatur spinis) *Anonis* hanc puilla fati est, nec femipedem caulis superat altitudine: radice innititur dodrantali, tenui, nuda, nigra: ex eadem fruticant tenues cauliculi veluti squamoli, auricularum cartilaginibus exficatis fimiles, \ cuibus folia exigua vulgaris *Anonidis* more terna, per ambitum dentata, exeunt; inter quae & cauliculorum finis quinquepartiti oriuntur calyces, respe&u plantis magni, rigentibus filiolis angustis, oblongis, aculeatis, cont&e; in quibus post floculos luteos deciduos filicula? fuboriuntur rotunda, breves admodum, veluti Phaeoli parva femina, aenum effigie, incurva parum, & exigua.

Anonides filiqua propendentibus longis hirsutis viscosis donata.

7. *Anonis* purpurea perennis foliis latioribus rotundioribus profunde ferratis, nobis. Cicer filiculis triphyllon, C.B.P. Park. Cicer filiculis Pens, Hift. Lugd. Cicer filiculis, 3-Dod.Tab. Cicer filiculis verius, Ad. Lob. Cicer filiculis latifolium, Ger. Cicer filiculis multifolium radice castra & folliculis brevibus, ventriosis, hirsutis, J.B. Chabr. Hinc radicibus longis, hue illuc evagantibus donatur, lignosis, multiplicibus, nodosis, fubrubris: truncosa est planta ramis fere pedalis, humi propemodum jacentibus; foliis latioribus, castrioribus, & in ambitu profunde crenatis, ternis unipediculo innitentibus, quorum bina ex opposito pediculis suis longis innituntur, tertium multo majus extremo pediculi adhaeret: siliquas fert raro difpositas, unciales in cimis caulium, longis fati pediculis pendulas, in quarum fingulis femina plura latent compressa, parva, nigra, renah? id est cavitate seu fivum in medio patientia, reliquarum *Anonidum* feminum mori, raaix reibilis & vivax; fingulis annis germina profert fau f flore rubro amplo nobis# cu
& *Anonis* purpurea J ^ ^ ^ t ^ PoUc castra longa, lignosa, multifida, cortice
t? o teaa, intus Candida: ramulis multis, furculosis: foliis ternis, fubrorundis, simul junctis & ferratis: flore amplo rubro Pifi inflar, ineunte Vere sese expandente, unde verna feu prscox dicitur. Suffrutex hic, inquam, est bipedalis, Trifolii lignescens species, per hanc fonde virens; flores fert leguminosos feu papilionaceos, amplos, eleganter purples, exeunte hyeme aut ineunte Vere flores suos protrudebat, cum in horto Parifienfi, tum 33 laefenfi, fed speciosus in eminente monticulo horti Botanici Aurelianensium Pharmacopaeorum, qui olim fuit pugnaculum urbis; quibus fingulis evanescentibus succedebant filiquae fingulis propendentes, hirsutae, viscosae, biunciales 5f bivalves cum parvulo aculeo ad fingularum filiquarum extremitatem, Natricis Plinii filiquis multo castriores, femina in se continentes pene duplo csterarum fuzfamilias majora & deliquium *Anonidum* csterarum more patientia; qua nota specifica indigitantur *Anonides* à reliquis Trifbliis. Neutiquam est Cicer ut volunc Authores pene omnes, ficut demonstrevimus inter Hallucinationes Ciceris pag. 77 Hift. hujus nostrae Oxoniensis, multo minus Cicer arboreum Indicum Jacobi Zanoni. Hic nofter novus Author male adaptavit nomen arboris, cum primovix binos pedes altitudine superet fecundo non est planta Indica, nectam longe petita, cum proveniat in montibus Delphinatus, unde nos delata & miila à D. Berhardo Apothecano Gratianopolitano. Prarditus Zanoni in hujus descriptione ei attnbuit flores galeatos, nefciens quid fit flos galeatus papilionaceos dixisse debuit ad formam rehquorum Leguminum. Effe *Anonidem* cuilibet clare cernenti apparet à foliis ternis & femine deliquium in medio patiente; Cicer autem tft planta ^ ^ ^ , cujus femina protuberantem eminentiam (aliquatulo plures) c>nuarieti rudimentum; primentia habent, unde einorr^n; ergo neutiquam Cicer, fed *Anonis* debet nominari.

9. *Anonis hitea* perennis major Narxdefra, nobis. Natrix Pljni. Heib3riorum, Ad. Lob. *Anonis lutea* perennis major vifcofa fpinis carens, C. B.P. *Anonis lutea montana*, Cam. ep. Mitis luteo floie, Eyft. Cluf. Hift. & Pan. *Anonis lutea non fpinofa Daii* .N"atrix Plinii, Hift. I., agt. J. B. Cfiabr, *Anonishic lutea vulgari fimiliseft*, - virgulis cubita Jibus, in frequences ramftlosfilis, fpinapim experdbus: fbJia renaoherent oblonga, hircu, perexrcmum crenaca, odorata, vilcoia Sztafiu glutinofa, fapore nullo evidente; flores longis nitmitur pedscnlis. *Anonidis fpinofa*: purpurearvulgaris mukomajores, lutei & confcr, tim infnnimiscmcauliiin nvenientes; filiquas unciales & c longiores, teretes, hircfuta: & vifcofa: cum filamento P^{tc} oex filiquarum extremicare, quaruni fingula; femina plura continent, colore pulla, ill[1]l...uamerarius. Herba totact hi data, pinguis, odorata, hirciuniqiii4, olcns; ut aliexponunt, bicminofum Sa gravem fetorem redolens.

10. *Anonis amflia mariti* ma mitis folio iucidofeirato, Boccon. *Anonis fiparvulacauliculis infirmis ab humo vix unquam attolitur*; foliis parvis ftratis, multumque fulcatis & hcidis vesticatft: flos eihiteus, papilionaceus; filiqua 6f femina citeris fue 'aflis familia: mitis est nee caleis pradita, estque plantula annua: radicem liabet exilejus fibra: gignunt globuos albos, ut cernere est in Ornitiopodiopaucifque aliis Legr us,

11. *Anonis lutea annua* resta Jiirfuta vifcla filiquis hircfotis L ,iori*us, nobis. Hax Anonidis luteE vifco. ir fpecies minor afcendit ad pedalem altitidiieni caulibus ere^is, ad quorum fingula genicula alternatim appenfa confpiciuntur folia longiora, trifoli3ta, vifcofa fimul & hircfuta, crenata, atque in c'imis cautum proveniunt flofculi papilionacei, lacei, minores, longis pediculis propendentts, ex quorum fummitatibus profant h'lamenta rigida, nncia- lia, quodeft familiare omnibus Ajionidnm fpeciebus filiquis propeud- ntibus d^natis: floribus fingulis evanefcendbus finguli fucceduut filiqua; bivalves, lurfiitx, vifcofs, femina in fe cone in entes rentier mia, reiiquarum Anon id um more.

i 2. *Anonis hitea annua* filiqua glabra longiore & craffiorc, nobis. *Anonis pufilla glabra frnticans* ieu Trifoliis atfinis *Anonis Cherleri*, J. B. Chabr. *Anonis lutea minor* flore pendulo, C. ii. P. & Prod. *Anonis ha>c palmaribus & fequipalmaribus fruticat furculis multis, fabrubentibus, tenuibus, glabris; quos lolia ftipaut crebra, cergemina, glabra, viridanria, circumcuca, crenata, obiooga, Medicæ noftratis foliis quadantenus /imilia, ex quorum finu- " bqs feualis prodcunt per tocos ramos flores majufculi, conformatione Legominoforum florm, lutei; Vabycc in quinque fegmenta divifo, Tlore longiora, acuta, ex rubro nigricantia: floribus Intel's -'acidnis fucced int filiquac bivalves, Jongae, turgida; facts, Sc glabrx, Cracca; minima; filiquis majores, iemina quatuor aat quinque finuat^ feudeliqium in mediopatien- tia, continentcs iingute.*

13. *Anonis lutea annua* filiqua glabra breviorc, nobis. Htec caules emittit pedales & al- tiore, qhorum geiiculjs fingulis adherent longis pediculis cema foliavifcofa feu glutinofa longa, c>- ita. - in cauljuni ciniis, longis etiam pedrculis, propendent flores lutei, fatisma- gnipr jrtione plants, raro (eufinguhtim petiolis infiftentes; quibus deciduis [uccedunt filir ,ts, glabra, propendentes excaycibus quinquefariam divifis, *Anonidis vulgariis* fil^l - raffiores multcvu quarum finguli fbin; f, terna, contineni: ur (emina.

. *Anoms piriilki hirluta* flore ex albo & rubro colore mixto, nobis, HEC *Anonis* mini- ma, omnino hircfuta, pari cutnlutea minima glabra furgic altitidioc: radice confat /ibro; t, du- ra, dbicantc, dim^fa in terram, emittente nitiks raniulos liirfutos, nibentes & incanos; iolki renia, angoftiora & longiora, per extremum duntaxat crenata, alioquin ca^fus- tgnara, iirfuta: calyces per ramos crebri, magni, pilofi admodum, in quinquelongasariftas defi- ontes,, pedictilo contorto deorfum verfus terram fpeftantes, cancellis florem complexi parvum, dilute nbrum, & ex albido aliquandomixtum, roftello ferrugineo. Tota plantula • e(t contactu vifcida.

LOCUS & TEMPUS.

¹ • *Anonis purpurea spinosa filiqua ereftiskntiformibus* provenit in sgrhatque juxta Hmites ftv margines agrorum pratorum que jed Uto^ pinguid ac reftribilifologign'tur; npritur in Germania utr<que, Galliti, Italia, Anglia iff Beige. Bom per totam tfiatem atque verfus ejufdem fi- WMi fimina producit tsistwa, > 0

² • *Anonis purpurea rufens nan spinosa* pwvenit in multis Gallic iff AnglU has-, prgcipue circa , Oxonium • florf [§ femina profert Jfiate.

- g. Anonis purpurea ereSa fkkata ptrennk long'ifolia, nobk. Anonis mitior i. *Ch. Hift. Hanc in Sileftack, Sdavonkifque prath aH fcribit Clufius. Floret 'gflate cum pr&ditia. >>*
4. Mvovnsannualatifolia^nobk. Vbifpontoriatur-jignoratur.
5. Anonis purpurea procumbent verna frute'fitns v'ifcofa, flore rubro ample, filiculis leriUformi-
bm crafftoribiis is rarius di\$ofitis, nobk. Hujts ficut is priork ignoranturjiatales: fdciter
fath in hortk provenit utraque. t "
6. Anonis lutea perenms minima, noh is. Anonis lutea fdvefrk minima^Cd. Augufloin jfcquico-
lorum incultis is depreffis atque aliisaridk loc' u e villa Merc at o via ad' mokmiina?^fl'mis
reperaa Fabio Columna, nee non in collibus aridis circa Blafas fat is frequenter eandemfiiren-
tem is femins producentem reper'tmm nos.
7. Anonis purpurea pen-ink folik ht'toribuscrafftoribus ferratk, nobk. Cicer fihejirePen<ty, Hift*
Lugd. In Helvetiorum is Alhbrogum, quos Sabaudam vocant, finibns reperiri P'itru* Pena is
Matthiat dt Label autharesfunt, ttiamin faltuofofalifto, quod Rbodanut aluit, prope Lug-
diihum gignitur.
8. Anonis purpurea p^t^rm verna feu pr<*eox frutescens flore rubro nmplo, nobk. Cicer fihejire
alterum, Hift. Lufd Cher,, arkreum Indicum perenne, Jacobi Zanom. Hujusfuitfemenad
np^miffum exVdphinatm 'montibm: floret cxeitnte hleme is ineante *ft^m ^mna maturan-
tut.
9. Anonis lutea pmnck major Natrixdi8a,nobh, Natrix Plinii Herbariorum, Ad. Lob. Cre-
fch in agrk mnofis PiclavU aliifque plurimis Gallic lock\ is frequenter illic inter fata.
Geneva jttxta .Arue ultra fluvium copioft reperit Johannes Bbubinu* forentem Julio, etiam
in agrk BniJelienftbui juxta Buttonec, ubi campu* illic eadem eft refertus, Urn & circa ca-
ftrum novum Gallice Cafclnau. Clufius frequenter obfervavit em in Galia Narbomnjium
in Hispaniis Lufitaniajunio is Julioftormew.
- TO. Anonis lutea maritima muk folio lucido firrato, Boccon. In *omnibus Sacc f: | Wⁿ | / C^r*
tati£ litoribui manlink is alibi paffim in Sicilia exit. In *Maremma etian* ... ruria nota.
11. Anonis lutea annua filiqua hifpida brevior nobk. Anok pufitiagiaporapv *icans feu Tri-*
Mik affinh Cherlm, 7. B. Cbabr. Circa Monijelium in rujxt* & fqualidxlom *collegit*
<* adls attuhtC inquitjolanms Bauhin*,), gener Cberkr**. floruit autem Maw⁷ispaulo
post filiquas tulit, aliis atque aliis profilientibus fofculis.
12, & 13. Harum femina ex Syria communicata habuimus a supra memorato D. Roberto Hun-
tington.
14. Anonis *alba pufillafeufl_f ex albo & ac parvam ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^* Ne-
ma ituncue te, do post fo euntur ad maturitatem. *De Nominibus jatis dictum in explica-
tione jfupra*

TEMPERAMENTUM & VIRES.

- ... torture* fpinof* radix excahfaciens eft, is ut Gaknfts ait quarto ordine; vtenit-
1. Anonid³? Jr incident eft: cortex ejus cum vino potusurinam dt, calculofque diffohu ac
*u\$ ufoq^u ufi vztro abftergit; decora radix inpoftca dentium dolores mitiga, ore fapius colluto.
pV⁷ " mitalibas decoilum in Oxytnelite ad dimidiam partem dari refrtt. Mattheolusfibi
...^m hominem affirmat, puhere hujus radick pturibw menfibst* fumpto, hcamofo ramice eu-
"oTm⁷ primos bujus fubfruiikk turiones ftyeafparagQS, priufquamfpinofifiant, muriacondi,
Zcibos eratiffwos ejse, author eft Viofcondes.
9. Anonis lutea perennh major Natrix di&o^obk. Bane adverfus omnia venena. prodeffe iff ad-
motam Q, intta fumptam experientia compertum eft.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

P j 2go.col. t.pl. 1. Anonis vulgariter eftio-
loris dilution purpurei, raro albidi, qits A-
' tr.w,' albo Tab. Ger. Tariijim lutto inquit
Casp. Bauhinut. Anonis pnrpureo fpinofa reptitur
jlo'rt• purpureo commumtr, ranvi alba; fid contra
Bauhinum »««|««» tadm Ipceits 'tonfpititur ploT₇

latta, ttam a c*ru|l| in rubrum 6* *1*«« eohretf
fipiffimefit degmerasia, feinan in lvt#M* 1 in quam-
plurimisplaniis , dilinntr obftrvMts, hoc nonthm
nobit comptTuut, ideā aliispojhrw notandatnreHn'.
quoverhatem hujus affirtonu Caspati Baubim.

Tag. IB). (el, 1.pi.V- jf)»nit nanfpinofa fiort
varlega-

variegata. r. 5 v ^ £ / ^ tantum prioris Natricis va-
net as storf lufo, flriis feu lineis nigris aut fubru-
bris variegatō s ergo nonjunt multiplicanda entia
fine necejitate, prout nimis (āpe ah authoribws fit,
prcepue Taberncdmontano, qui tres, aliquando qua-
tuor, varietates tantum totidem conjhtuit fpecies,
ut clarepojha declarabitur.

Anonis verna feu preecox frutefcens flore rubvo
amplo, nob Is. Cicer filvejlre alterum, Lugd. HiJL Ci-
cer iudicum arboreum perenne, Jacobi %qnoni. Cicer
hoc fivejlre alterum H\$*Lugd. ejt idem cum Cicere
arboreo Indico perēnrS J^anoni, fed inepte adaptatur
ilt nomen Ciceris, cum fit Anonis uti J^upra diximus,
P 3. de Cicere -, deinde non ejl arbor ut vult
Zanoni, cumvix binos pedes altitudine fuperet. Idem
Z^anoni flores hujus ajferit galeatos s papilionaceoJt
dixijfe debuit ad for mam reliquorum Leguminum.
Ejl Anonis ā nota fua generica s femina enim deliqui-
um in medio patientia profert^ atque bac nota cognof-
cuntur omnes Anonidum fpecies. Cicer autem ejl
planta leguminoja T ^ X ^ © - feuplurimas alas hint
inde uni rachi adtberentes gerens, femina itidem om-
nino diverJa, protuberantiamēminentem unam (ali-
quandoplures) cornu arietis rudimentum exprimen-
tid profert, unde ei nomen. At Cicer filvejlre alter-
um Lugd. HiJL feu Cicer perenne Indicum ar-
boreum, ut vult J^anoni; neutiquam ad Ciceris fed
Anonidis clajfempertinet^ ut probavimusfupra.

Ibidempag. 347* col. 2. pi. vi. CicerfilvejlreTri-
phjllon , C. B.P. ParJ^ Cicer filvejlre fence> Lugd.
Silvejlre verius, Ad. Lob. Latifolium, Ger. Cicer 3.
Dod. Tab. Cicer (ratiocinando ex libro naturae)
ejt planta leguminoja plurima folia conjun&imjeti
binatim eregione uni cojtmezmedice adnata habens ^
& unum impar extremum cojtice claudens : atque
Cicer filvejlre verius Ad. Lob. Latifolium Ger,
(3c. ejt planta Tnfoliata omnes condiciones pojfi-
dens requifitas ad Anoriidem conjlituendam s ergo
eft Anonis, hōn Cicer, nominandāhcecpanta, quern-
admodum a nchts faftum. Sit ergo, & aptius, Ano-
nis filvejltris pur^urea foliis latioribus & ferratis.
Nee poffum fatīs mirari Lobelium, qui fie ait de
Cicere filvejlri veriore Juo, viruit hac #ftate in
hortoMorgamquoddam Cicer parum adhuc no-
tum, e Sabaudorum & Helvetiorum finibus hue allat-
tum facie 8c filiqua arietini Ciceris, quod eo ufque
prxfefert, ut primo intuitu quilibet Cicer dicat s

filiqua quippe brevis, longior compreffior paulo;
fiores item purpurantes, non afefimies, fed ienlina
multa iniiora, compreffa & potius Lathyri Cicer-
culaeve femula; culmos plures latius fpargit ra-
mosos & firmiores> cubitales & fequicubital&* fo-
lia protrudentes Giceris arietini majora, craffioraj
rotundiora, tantillum crenata. Qtiamparumfibi
hzc conjlat Lobelius, ficut in aliis muttis locis, fa-
cile cernitur. Cicer (ut fupra dzBum cap. 3. de Ci-
cere) ejl planta ^ryi^ot -, at Cicer filvejlre ve-
rius Lobelii terna fert folia, //cut & relique Anoni-
des : ite?n & hujus femiia earundem feminimjunt
cemula, finum filicet in medio patientia, non du*
tern protuherantia ut Ciceris femē s ergo primo in*
tuitu nefciebat quid d^webat Lobelius^ nee plantqm
ipfam, nee filiquas , nee femina ejus ycaminauit I
Jed conjeclura inani feu indehberate quēadm<*-
dum alibi fatīs objērvare licet) protulit nomen, &
idem huic adaptavii: %uonc fecutijunt Cceteri omnes
hijlorias fuas plantaffnfcribentes, Dalechampi
Dononius; Taberncdmontano; Cicer, Par ^dorus
& Johannes Bauhinus> Cbabraus, caterique quot quot
funt Botanniçi cacutientes; omnes infove, niidwB:i^
fequentes Lobelium cticum in nomenklatura hujus
pojterioris, ficut Dalecha?npium in priore lmitantes;
inepte nomen Ciceris utriquepradicia planta* ada-
pt arunt. Deinde graviter firrat Cajp. Bauhinus
dum Cicer filvejlre alterum Hijloria Lugdunenjis i-
dem facit eum Cicere filvejlri Pence ejujaem Lugdu-
nenfis, aut cum Cicere latifoho Gerardi, cumfint du&
dijtinHa Anonidum fpecies, ut fupra j^atis (uperque
probatum, cap. 3. de Cicere, Cicer filvejlre Trlphyllori
C. B. P. ejl jynonymum omnibus rcliquis, non autem
Cicerifilvejlri alteri^ Hijl. Ludg. feu Ciceri perenni
arboreo Indico ^anoni, qui vult Cicer fuum arboreum
Indicum perenne diverjum ejfe a Cicere filvejlri al-
tero Hijl. Lugd. cum fit una & eadem planta, non
objlante nomine fuo Indico arboreo, cum nee fit Ar-
bor^ nee Indica planta, multo minus Cicer j ergo gra-
viter erravit J^anoni*

Pag* 38p* col. 1. pi. m* Anonis (jinbfa lutea mi-
nor, CB.P. lutea filvejltris minima^ Col. Hec non
donatur Jpinis, ergo errat Cajparus Bauhinus, dum
ipjattribuitfyinas, qua neutiquam in ipja apparent.

Ibidem Anonis adjungitur a Cajp. Baubino Cardu-
ispropterfyinas: debuit hie locari, utinnuimusPra*
lud. Botan.pag. 423.

L E G U M I N A

Trifoliata feuTrifolia Legummof^

Trifolium LOTV S HERBA ^{dicitur.}


C A T V T XIII.


A OI* Lotus herba (* de Loto Arbore hie fermo fion eft) Diofcoridi I.4. c. 111. triplex eft :
fativa quam aliqui Tapimov vocant, qudtinhortis nafdtur \fdvejlris, quam aliqui A t o Ly*
uuum ā loco natali appellant, caute bicubitali, autetiammajore, alismultk, foſiisLoti Trifolii
pratenfis, femine Fenugrxcī at multo minor e, guftu medic at 0: tertia eft Lotus /Egypt id, de qua
infra agetur. TheophrastoJ. Hift-9- Lotu* herbain cauktantumfoliataeft: iff cap. .n. licet^
inquit, nomen unum habed, tamen plura ejut genera funt, ut ferme <equivocafint, folio, cdule^
fl^ore fruQuque difcreta : Jfic de Loto Mggyptia egit ^Eift.io. Plinjus l.i^c.i 7. de Loto arbore
dfflmns fubkn^e fi aut^ modern nomine & herba QLotum urbanum Diofwiais-imtfligenſ J.

if. «. f. 21. all ffM i«ler & 4 « fubnafcmmts Deorum vokpati Lotox primam 'mni najji: fraud dubx Lotiunfavivam Diofcoridii intellexit.

Lotus herbajjemaphyllw, cit Tritolinm fiii quofum in pediculorum extras tana g- rens totia, & ad eorum ex ta ab omnibus aliis Tri follii, Ief m m f s diftinguitur Lotus herb., pentaphyllos co ipfo nomine dicta: adeo ut foliis, ftd omne Trifolium vice ver T pediculo annexorum sub exortum e caue ipfo. Hxc eft nota cdericalis & genericat' Lotus filiquas fert bivalves, in quibus fingulis plura continentur femim cieronmi cu- n Leguminum femina redolentia. Lotus herba Pentaphyllos a nobis dividitur in Lorum paucis rarisque filiquis donatam, quæ iterum v d est annua, vel perennis; & in l, <otum pluri- bus fil m m pitulum congestis ornatam, quæ itidem duplex est, minor seu procum- bens XI ft" a frutescens seu fruticofa: hæc omnes profeque mur difcrencias ordine noftra ufitata, diftinguendo & dividerdo in fua fubalterna genera, atque fpe- cies explicando, & fic abforbetur Loti pentaplylle K dofirina; & fi quæ alif p t- cies præter has a nobis exhibitas detegantur pofteris, poterin C addi, ficut in omnibus generibus & fpeciebus a nobis deductis & de Aueendis præftare conati famn* Lotus Jier- ba pentaphyllos ergo fit vel annua, aat perennis; vel minor procumbens, aut major refta frutescens, eaqæ alba, vel viridis.

rs T A B U U X V , & T A B U L A X V I I I





1. **L**orus annua i^tynUg^r^ filiquis singularibus binis ternifve, nobis. Lotus corniculata filiquis singularibus binis ternifve, J. B. Chabr. HEC Lotus omniam minima, «ft multifida ; jnfirma radícula terra; haeret, caufes emittens reftos, nunifrofos, pedales, ramofbs, fubrubentes, longisalbicantibus pilis obduftos, ad quorum nodosterna folia, Meliloti nobilis oUongiora, binaque niliilo quafi minora, excaulead pediculiexortumenara.' ex finu feu ala foliorum pedkutus exit singularis, tenuis, uncialis & longior, btuncialis aliquando, incujus cacumine flos unus, aliquando bini, lutei, liantes ex calycibus hirsutis; filiqua unaaat altera fuccedit, tenuis, singularis, aliquando bine, term, unciamlongK, teretes, femine copiofifimo ad denaiium fere ntimerum, tenui, Porculacs feminibus pari, ruffo, rotundo, fapori leguminofo, refertce.

2. Zo/-«jperennis»>iy.kl^t^incanaNarbonenfiuni, nobis. Lotns fruticbfis incanusfiliquofus, C.B.P. Lotii^ ifperior fruticofa vel Narbonenfis incana, Lob.Lugd. Lotusafperior frute^ens, Park. Lotus incana Narbonenfis, Tab. Trifolium argencacum floribiis Juteis, j. B. Chabr. Radix hujus singularis, lignofa, gracilis, cauJesfundit palmares, bipalmares, tcnues, hirsutos: folia terna, acuca, altera parte argenteo titore fplendentia, pilofa ; altera veroviridantia: fiores cacumini caulium hirent magni, ltitci, hirsuti, bini ternive ei laciniato & quinquepartito calyce villofo: quibns fingulis fuccedunt binatim aut ternatirri filiquaz, quarum fingub funt hirsutac icidem, & tumida: ubi apparent femina. .

3. lotta iK.yn.ifKT©' filveftris Cretica, nobis. Lotus filveftris Diofcond's, Ponr. Lotus! filveftr : Crecicns, Park. Lotus hax Cretica caulibus confat pahibus, quorum fingulis genie <lis adherent bina parva foliola, & in extremo pediculo cerna alia, non mukum bina pii^j magnitudiliefuperantia ; obfeureomniavirent* acqueex curtis admodum & vix confpicuibpediculis in fummis caulium, exgeni«ulistidem mediis, proveniuncflofruli minimi, papilionacei, lutei, bini fimul juncti: quibus titulcm fuccedunt filiquxtenues, longa?, fef <juiunctales, continences femina femine finapios minora: radiceonifot exili, tenui, fingulis annispost femina matura pereunce: femer & totaplanta cactra Legumina fapit, ta? men aliquid amaritudinis junfta aciditate infepoffidet, qurbrevi evanefcit. Notaqiiod Lotus filveftris Diofcoridis Poiise non fiteadem planta cum Lotofiliquis OrnithopodiiC?:-merarii, primo difparitate toliorum, nam folia liujus funtlata, Sf triploautquadruplornrjora foliisLoti Diofcoridis; deinde Lotus fifiquis Ornirhopodii Camerarii filiquaspJures, quaternas, quinas, tumidas gerit ubi apparent femina feu grana, id eftfiliquiarum valvnlz inccr granum & granumqua'fi junfia: funt; atqfhaec neutiquam confpiciuncurinLotd Diofcoridis Pona.

4. Lotu* & >¥*#*.*&Cretica liitea filiquis longls ereftis, nobip. Melitotns qnardamCreltic^a, Propf.Alpin. deExot. Hare ex radice tenui, longa, gracilJ, in aliquc*. tenuioresra^c^ulasdiviU, cauilicu.;o3tert longos, graciles, foliis viridibus Trifolii corniculatiCretici fimilibus, fed longioribus pediculis iniitcentibus veltitos, & petteiramftrato^, .ac.veluti Circa radtcm luxuriances, in quorum fummicacibus provenium bini flores lutei; Triiblii

fated floribus magnitBdine & figartn niiles, odorati, quibusftngulis fingulacb^iicula Wa
 retfa fondue; ,nqu e his continents femina fiavefcencia , parva, & rotunda fofii
 pnmo fubdukia mox cum modicocalorealiquantulumaftringentia. Apoficione feliordm
 trum in ped.cuh fummtate, ftbinorm adpediculi ex caule exortum, eft perlcch Lotus,
 non vero Melilotus ut vult Froffer Alpinus. •

5. Lotus *δελφαιος* Cretica lutea filiquis binis cnrvis propendentibus, nobis. Trifoliu'
 corniculatum Creticum flore luteo, Park. Trifolium: corniculatum Creticum, Profp. Air
 de Exot. Vide ejus descriptionem in paragrapho 5- cap. 7. de Trifolio fupra. Cu-
 Lotus à pofitione foliorum, nempe triim in extremitate pedipuli, & binorum mind'
 appofitionem peaiculi cum catile (videeius Iconem in App. ad Legumina) eandci). IC
 inter rtes Lotos revocavimus, non obftante denominatione primò Profperti Alpini,
 deind kinfoni, Trifolii fcilicet.

6. Lotus *δελφαιος* perennis Monfpelienfis flore luteo, nobis. Lotus pra-
 tenfis filiqua Monfpelienfium, Ad. Lob. Lotus *TM* *yoh* luteoflore, CM:m Lo Λm
 quofa lutea Monfpelienfis J. B. Chabr. Sicuthzcfibns multiradicem habrtobftam,
 alioqui crassa, lignofa, ita plur ilim a J I I f o l l i
 na, quorum duo minora pediculi exortum ex caule nascuntur, l i t i : i t e
 harent hirsuta sunt omnia, ficu caulis: unicuique cauliculo in summo cacumine ut plurimum
 bini flores adharent r-i-^ ^ -c j, magni fatis pro tenuitate plants, luteopallidi, quatuor
 ftriisaS, ., — r-i-^ ^ -c j, magni fatis pro tenuitate plants, luteopallidi, quatuor
 QW bh,n?T n? e X lon g C31 y«erumpenK3: quorum fingulis finguk fuccduntfili-
 drfrir J . . . ^ ^ ^ ^ q u a f i , & quatuorals membianaceis planis cina^ftqncntisCretic*
 Znr' f - T o r e S : m fin uli sfiliquis latent femina fena, oftona, Sandalidz Cretica: fe-
 m<? ,us multo m»wra: Radice nititur perenni vel in ninlto annos duranre, ex
 «cte novo togalis annis protroduneirr folia & caulesfuffinentes florep, & confegnter
 H*K quatuorals membranaceis cinfas.

7- Lo/w *ly>-a&.T& •n^ajp.s^A,^ annua Cretica flore fature rubro fen lioloferico cocct-
 °) nobjs. Lotus filiquofus flore rubro, Cluf.Hift. Lotus tetragonolobus, Cam.ifort-Eyft-
 ^tra controveriiam longe pulcherrima est hxc Lotus: radice nititur fimplici paucifquefi-
 ^s donata ; frequentioribus ram is pridita, bnmi mplurimum diitbfis, quorum extranica-
 ces nonnihl fefe attollunt, in quibns hinc inde fparfa funt folia terna^, femper u ni petiolo
 ^srentia,mollia, dilute viridia, reliquis duobus femperminutis &caulemambieptibus: tx
 is, inter petiolum folii & caulem, breves & crafflufculi oriuntur pediculi, terns etiam fofiiis
 usornati, fingnli unicum ut plurimum florem fuffinenCS>floris VkiX quoad figuram
 b fed miorom, degantii fatwate rubro colore uafita, 3^ => d fencum vUolqn^h,
 re ri.bn.rn, feu hololericom plane coccineum vulgo fatinuTu diffini prQvoca
 s flofculis teridnferin i«?o^Jc31 biuncilles, fclog q, fuccedunt
 iH^bis bin* alls mc-mbranacis, facis pimincndbos, undolans five eriffis (c i m ad-
 e f u n c v i r l d e s ; , c i , ^ & r a f i f c g i t t a r £ , , p i a o u s r e n p e n n i s a p p o f i n s q u a t u o r
 quibus reficcaria, lobi feu filiqu^ fingulxquadrangulz apparent exanns, quozque t a i n -
 terras grana feu femina content piSrimarocuiida, cinerace, colons Pj
 «dw liujus est annua, quani fuccedenk Seng tollere & corrumpere fo
 .rumhanc TO^*»S ^ ^ g L m i ^ n t o b f i ^ q . a t n o r a l , , f i v e . c t a s ,
 non minus aptetamen n ^ Z S ^ ^ forfitanappeUare hceret • AppellantCrctepfes
 Sandallda in Candia, unde primum in Italiam «&TM ^ fcmen,& mde ad Carolum Clufium
 Sandald = apptllatione.

Lotus

1. LMHK wwwBs>f« annua procumbens *tatifolia* *Omithopodii*, nooiS. Lotus li-
 .,ris Ornichopodii,C.B.F. Lotus pecubans dhquola, Cam. Hort. Unica ex radice alba,
 durmfcula, paucis firbis donaw, colic<jj exeunt aliqUOEf teretes, humi procumbentes & in
 aliquot ramulos divifi: quorum genicolisi tolia harent quina, exhis bina inferiora fuperioi"
 bus tribus magnitudine cedunt, naUo iapore manifefto pratdita,, terna txtrema petio
 lom occupant: flofcuili plurimilucei, qiaalesinLotocorniculataglabra^
 au 1 on^m^fi^,!, i-uccet iunc (Muz ex uno genicufo plur
 fertili folo, plures aliquando, feiquiunciam m. nuc ad iummum uncias duas longz, falcata, feu
 potius trechatz, compreffz, tumidz ubi apparent femina, atque filiquz feminum protu-
 berantias pulchre exprimant, id est clarius explicando, valvula filiquarum inter granum &
 granum

¹ granumjunt junfti; atque in unica filiqua lemna 12. aut 14. aliquandoobcervavimus, cbnvexa urrinque: filjqr funt plnrma: fimul junctse, & ex uno & communi pediculo ortf, bivalves, arcuatae, feu paulum incurve, non vero articulate, utfuntOrnitliopodiifiliquit.

9. Lotus •7nluxifa.T< & ' filiquis recurvis pedes corvinos referentibus, nobis. Coronopus ex codice Csfareo, Dod. Jtec Lotus tenuibus ac viticulosis cauliculis confat, exquibusprotr[^]dnnnirlongi fatis pediculi, fufinentes plures flores papilionaceos* luteos, quibus lucmt plurima; filiqui' fimal junfhe, quarum finguk feminibus ternis, quatuniv, funt re¹ quasvalvulas inter gramim & granum jim&as habenc, curvos corvorum ptdum dig¹ mulantes, una cum nguiculo ad firigularum extremitatem. Hi fee jiotis pra*cipue a c ^ Js diftinftu tacilis eft hax ^Lotns.. Ca-fariani autem veteris Codicis manufcripti fideni nobis (inquit Dodonaiis) aHeruic Beihardus l'aludanus, qui hujufmodi Coronopum, qualem Icon exprimit, a fevifam &c repertam non longe Tripoli & ad radices montis Libani nobis coram narravit. Nos vero tandem qualem pi&ura exhibet vidimus, contrefiavimuE, ejufque filiquas ficcas habemus in armorario feu promptuario fenjinarionofiro oftendendas. •

10. LOIHS TioA^paT^ lutea minor foliis & filiquis mfucis longioribus & tc-iiuioribus, nobis. Ha;c a vulgar i Loto corniculata glabra hiice frequenribus notis diftinguinm; p^imo in huiidid provenit & altius afcendit, folia cerna in fummitate pediculi habct bciora, majora, & bina ad ^ppofitiontm pt'diculi cum caule ad fingula geiicula, quar omnia quina pilisobduda funt^ filiquas etiam habet longiores, tenuiores & liirlutas, paricer mukas in unum capitulum congefatas.

11. Lotus ^Aywptiis^ Iiitea minor foliis & filiquis glabris brevioribus & craffioribus, nobis. Lotus fativa, Mattii. Lugd. Lotus five Melilotus pentaphylles minor glabra, C. B. P. Trifolium cornicalatum i, Dod. Kxc Lotus glabra multis exittnuibns & injrmiocauticulis, liumi procumbentibus, cjrea quos folia glabra, minora & anguftiora prioris hirtute ioiis : rlores prorert luteos, fplendentes, multos in capitulum congeiVos, feu complures fimul in virgularum faftigiis eminentes: quibus fingulis fucedunt filiquar bivalves, parva;, oblongar, fuperioris tameri breviores & paulo craffiores ; in quibus feris leminumexiguorum, rotundorum, latet: radix dura fligno(a, ex qua fingulis annis regerminat.

12. Lotus •xawJya.T@y- fruticofa Cretica argentca fiJiquisongiflimispropendentibusreçiiis, nobis- Loti tuc elcgans fpecies caulesedit frudcolbs, bicubitales, aliquandoaltiores, JUCanos, ad quorum n'ngula genicula cxeunc bina folia in mucronem obrufum cerminantia, atque in fummo pedicnlo ternamajura & obtufiora exeunt folia, omnia quina, tam fubtus quam fupra, ar¹ieii. tei lucidi (ant colons; ex fingulis alis inter pediculum folii & caulemexilint pediculi unciales, gerentes incimis fummis ternos, quaternos, nunc plures, mine pauciores flore; luteos; quorum fingulis deciduis fucedunt filiquac fiiigula; Loti vulgaris glabrs dliquisduplocraffiores, fefquiunciam longf, rotundi, propendentes, reftae, non curvs, qua nota facile diftinguicur hxc Lotus a Loto 5. Cretica filiquis binis curvis propendentibus; & fac¹ i aEteris filiquis rotundis ereftis pediculis curtis donatis, cumhujus filiqujeex ped¹ ,ommoni unci;li Sc fefquiuncialipropendeanf

aWjroAux^jilos trutefcens hirtuta alba major latifolia filiquis tenuibus Curtis erectis, no- I aspentaphyllos filiquofus villofa B.C B.F. Oxytriphylon Scribonii. Lotus filvefris, Cluf. riiijuscaulesafcenduntad altitudinem trium autquatuorcubitorum, qui in mukos ramos finduntur: ex fingulis geniculis oriuntur bina foliola adappofidonem pedicuH; id fummo vero pediculo tcma folia lata, quae omnia, u llacum caulibus, fcatenc pilis quodammodo incarns; in fmmij caulium ramis proveniunt plurimi Hofculi papilionacei, in capitulum congetti, coloris albiciintis cum nonnihilo rnbicundilevis coloris mixti, quorum fingulis fucedunt fingulae filiqua; nncides fere, tenues, rotynd^, bivalves, fimul funfbs, & veluti in capitulum compafli, continentes fiugub quina, fenave femina rotunda; radix eft longa, lignofa, niuJtis fibri Bft-atens, ex qua ineunce vere anni vertenris folia & caules protruda.

14. ZoKJw=Ayffif© frutefcens incana alba filiquis curds craffioribus & brevioribus ereflis, l)is Oxycriphylum alterum Scribonii Largi, *Ad.Lob. & Icon. Lotus Haemorrhoidalis •majoreV Triloiium hasmorrhoidate majus, l'ark. Trifolium album reftum valde hirtutum, J.B.Chabr. HKC Loti fpecies nidicem demittit loygam, reftam, lignefcentem, atque fibris em ex qaa oriuntur plures caulieuli bicubitales, in plures ramos divifi; fingujis geniculis adherent bina f'lio!a, »3tque!iiiuper pediculi fummi rau terna innituntur alia folia, prioribus duobus junfra, ejufdem fere magnitudinis; qnx omnia tam (bbtast^aj^jfu firmul & caules ipfi, in eana lanugine obducuntur; ad cout tota plants incana & alba,

maritimarum quarundam more, proveniat. In teneris adhuc plantis terna folia fuperiora foliummodo apparent, quae in obtufiorem mucronem definunt, fineduobus ad exortu^pēdīculi appenſis: floſculi plurimi in capitulum conjiuntur ex albido ruffefcente colore, paulo fuperionsflonbus majores; quorum fingulae fuccedunt capful* plurimz inorbiculumcompaftz, priors capfuls dimidio breviores, fed triplo craſſioſes, bivalves itidem, coloris fob-

ZnΛ ex r ? i o f r J U fpadic: unde propter craffitē & brevitatē filiquularum fomuhs longifculis aſteſtarum & haemorrhoidas'czcas (utvocant medici) perfede refe-

ſocn r in iT ^ ^ o i d a l e dicitur Parkinſono: femina multoprioris majora, flpvel

terna, ? F*^d^is filiquulis craſſioribus & brevioribus continentur, in fingulis terna, qua-

diclor, Z ſ. L. r. LotUf h^C feu Trifolium haeniorrhoidaleInditaliquandocaulē&foliiscand-

domur r S. ſ. q. i. quando caule & foliis? minus candid is, minusque hirtotis

cor. conſpicitur hujus duplex varietas, cnjus prioris folia funt glauci, alterius viridis coloris.

bntn flTfrT^ frutefcensincana filiculis fobrotndiseredis, nobis. Trifolium al-

fium ?f*y? hnm nonbusveluti in capitulum congeſtis, C.B.P. Dorycnium Monipdien-

hf r l r r T Dor. ycnium Hifpanicum, Cluſ. Hift. & Hifp. Tab. Ger. Dorycnium Mon-

pereme ik Hilpanicum, Park., Fruticofa^ ramofa eſt hxc Loti Monfpelienſis ant Hifpa-

tm ipocies, cubitahs^Td^uicubitalisin hortis cultis, ctiamfi ſponte" proveniens fit tan-

fbIT^ U pa U A am P iior, teſte Cluſio - Multas tenues producit virgas incanas flexibiles :

ia a bieantia Oleas more, minora, breviora tameh multo, terna, quaterna, ut plurimum quina,

Le ntu r^ uae modo anguſtiora in novellis ramis, quinondum, flores protulerunt, admodum

alb^T^ n- G Onfertim nafc entia, guſtus adſtringentis: floſculi papilionacei, copioſi, parvi,

171 nmJii prateſtis «muli, veluti* in capitulum feu globulum congeſti, fummiſ virgis iriſſunt;

quibus deciilentibus totidem fuccedunt filicute, bivalves tamen, Ervi fructus magnitudine, in

quarum fingulis ut plurimum ſingula continentur femina verſ Voloria, qualia fere funt Tithy-

m ? " P ar a l » femina, ejuſdemque formae, coloris & magnitudinis: radix dura & lignoſa ni-

gncat; planta eſt fruticofa perennis, nee folia ſua abjicit, niſi novis receptis, quemadmo-

du m 6c fuperiores duae Loti ſpecies.

6. Lotus -nt>\wj&T(& incana flore majore viridi, nobis. Dorycnio congener planta, Cluſ. Hl^ « 5c Hifp. Hasc Lotus ſupra deſcriptae plantas Dorycnio Monfpelienſium fere ſimilis, do-

7^a tur caulibus cubitalibus & vimineis, lentis, fuperioris gracilioribus Sj brevioribus, aſt latiori-

us, foliis brevique pediculo innixis, quinis itidem, id eſt binis & terms firmil junctis more

Loti praecedentis, ramulos ampleſtentibus, guſtum falſum & non nihil acrimoniae obiiientibus:

ramuſculi oblongi flores ternos a«t quaternos quinos, aliquando plures fuſtipent, Medico

nonbus majores, viridis coloris. Tota planta eſt Dorycnio Monfpelienſium candidior, imo

totaincana: ejus neque femen, neque filiquas, neque radicem obſervavit Carolus Cluſius;

ramulum, quale me quando abrupere potuit, nobis exhibit, cujus nos figuram delineatam

6c ſculptam <um ramulo Dorycnii Monfpelienſium exhibemus Tab. 17.

LOCUS & TEMPUS.

1 Lotus *oMy>xip.T<§> minor filiqui binis ternis fere provenit in fratishumidis circa Monſpeliv^ tundo Monfpelio Frontignianum eandem collegit atque attulit Johanni Bauhwo gener ejus Cheralerus.

2 Lotus^A^>ptſp*T@- incana Narbonenſium, nobis. Lotus a/perior incana Naxbonenſium, Ad. is Icon. Lob. Invia Monfpeliana Frontignianum: vtrfutus in monte Setio. Floret m? nfe Auguſto, femina ineunte autumnoperficit*

?>4>9*5. -Lotus^oAiyawpctT@- filveſim Cretica^ nobis. Silveſtri* Dhforidis, Fon&hal. ^ 4 . Lotus^o*y>TM?*(&' Cmica lutea, feliquis longis ereſtis, nobis. Melilotus qu<zdam Cretica Propſ. Aifin. de Exot. i* 5. Lotus Niy>xip.r<§r Cretica lutea filiquis binis cuwkfropendentibus noli*. Trifolium corniculatum Creticum, Pros J. Alpin. de Exot. Natales harum trium indi Jtan tur vel prolatione nominum. Florent omnes xflate, atque ſub finem ejuſdem maturantur ſi viina.

« Lotus^b A,, «. VT@- m^ A og®, ftnniis Motiffelienſis flore luteo, nobk Lotm pratenſis fi W« Monſſdienſium, Ad. Lob . **P'''fi /> ** Lotus auctore Caro'lo Cluſio in omni L Js^Zf ? jWruf r Ms, fed Narbonenſis faulo durior Metur.. h prath udisisr. bumi-

verſus ejuſdem ſemina perfic... 7. Lo-

7. Lotus $\text{L}^{\text{t}}\text{J}^{\text{A}}\text{i}^{\text{A}}\text{>}^{\text{A}}(\text{xT}^{\text{A}}\text{-TtTf}^{\text{A}}\text{AsC}^{\text{A}}\text{-OTWHfl}$ Cretnk florefature rubrofeu hohftrko cocci'neo, no-
< bis. Lotus tetragonolebits, Cam. Hon. Ey/t. Pr*vent in Cmt, unde primo in haliam mijjum
eujfemti 9?, demnc ad Clufium Sandalida appdlatkne. Floret apud nos Juntio, isfemm <yitf-
dem Julio is Auguflo matmumefl.
8. Lotus $\text{L}^{\text{t}}\text{J}^{\text{A}}\text{i}^{\text{A}}\text{>}^{\text{A}}$ annuaprocumbent laefolia filiquk OrnhbopoM, nobk. Lctm fi U qu i l Or-
nithopodii provenit in injua corju; uoi copiofe pueniem aflate reperit generofus vir D.
gias Wheeler, dum iter fuum per Graciam & Afiam in indefeffo labore perageret.
IS $\text{L}^{\text{t}}\text{J}^{\text{A}}\text{i}^{\text{A}}\text{>}^{\text{A}}$ filiquis recurvis pedes corvino. refeutibus, nobis. Coronopus ex Codice
L. J. arco, Dod. Provenit non longe Tripoli is ad radices motttis Libani. Florets/late, atqut
eadan exeunte femina maturat.
10. Lotus $\text{L}^{\text{t}}\text{J}^{\text{A}}\text{i}^{\text{A}}\text{>}^{\text{A}}$ lutea minor folik is filiquk birfuth kvghrihts is tenuioriBus, noUs.
Provenit in pratik humidkpaflim: floret cum c&terk, atqut tadun tempxfate cum ipfis maturat
femina.
11. Lotus $\text{L}^{\text{t}}\text{J}^{\text{A}}\text{i}^{\text{A}}\text{>}^{\text{A}}$ lutea minor folik is filiquk glabris, brevioribm is erailioribus, nobk.
Lotus fativa, Matth. Lugd. H<zc Lotus glabra provenit paflim in collibus andk is praik
einentibus. Floret eadan anni icmpefate cum pygdi&a.
12. Lotus $\text{L}^{\text{t}}\text{J}^{\text{A}}\text{i}^{\text{A}}\text{>}^{\text{A}}$ Crenci fructifca argentea filiquk hngiffnncpropndentibus TeELk, nobis.
Semina bujus ex Syr'taca urbe Chrilepo diffca ad nes trahfmijfa plantain fupra explicate pro-
duxert; floruit Julio is Augup; is Septembri maturabantur femina.
13. Lotus $\text{L}^{\text{t}}\text{J}^{\text{A}}\text{i}^{\text{A}}\text{>}^{\text{A}}$ frufcens birfta alba major lat'folia filiquk tatuibus hngioribus erefik,
nobk. Lotus pentapbyllos filiquofits viiofin^ C.B.P, Spontehxcprovenit prope Lugdumm
is Taurnum, etiamque invicinia Monfpdijuxta Gramontiam filvam abundat, is ad ripam I e Ji
Amnk, baudprocul Monfpdio in flagnummsrinutn deflumtk ad fjtvampcntk Juvenalk, qua
it ur ad filvam Gramontiam. Floret tflate, is oxnte eadem filiquas multas in capitulum
congeflas is eriHaiprofert incimk rataorum> indidtmque defiliunt femina matura^ixigua^ ro-
tunda.
14. Lotus $\text{L}^{\text{t}}\text{J}^{\text{A}}\text{i}^{\text{A}}\text{>}^{\text{A}}$ frufcens incana alba filiquk Curtis aaffwribusis bnvhribus ereflk,
nobis. Lotjt* h<*morrboidalis major feu TrifoHum bgmorrfaidak majus., Park- Provtnit in
filva Gramontia, non procul Monfpetio, teftibus Lobelia is Pena. Floret Julio, is vtrfm
flnem Augup au Jnhium Septembrk femina perficiuntur.
15. Lotus $\text{L}^{\text{t}}\text{J}^{\text{A}}\text{i}^{\text{A}}\text{>}^{\text{A}}$ frufcens incana alba fil'cuhs fubrotundis ereSfis, nobis. Dorycnium
Monfpelknfiwn. Ad. Lob. Lugd. Trifolium album anguftifolium floribrnveluti in capitulum
cengefih, C-B-P. Hxc Lotws mult is filiculis fubrotundis in amis ramorum exit copio/e in
agro Salmantencf is atis phrbnis Hifpania locis, fzcundum viai cenmunes^is in multis
etiam. Meminit Carolus Cluftsts ft in agro Narbonenfividdiffe frequntiffimam, etiam non modo
circa Viennam Avjlrj*, fed is plerifque PantionU locis; calidicrtiamngionemagisimanA
cdhfp'citur. Floret Maiois Junio; fanenvahulh b'mntibus exit Julio is Auguflo: tardius
ap' fipfenmonales floret, is confequenter tardius fntn ^ad maturitatvn petducit.
f A trant m'ipore Clufii Salmantica rei herbaria fudiofi^ Dorycnium vocabant, atqut
etiam nomine ante multos annos apud Monfydianos donata fuit, unde a natalih
munihus HtspanU is Monfpelienfis agri dicitur a Parkinfano Dorycnium MwfpdUnft is"
lifyanitum.
16. Lotus $\text{L}^{\text{t}}\text{J}^{\text{A}}\text{i}^{\text{A}}\text{>}^{\text{A}}$ incana flore majore viridi, nobis. Dorycnio congener plant a, Cluf.HI/}.
Equitando per ffifpaniam in Segno Valentino is qtdbufdam Baths locis bane Lot'i fpec'mri
floretem fibiobviam habuit Car. Clufius. De Natalibmfu Loco is Tempore is Nominibus bd-
•rum omnium Lotorumfatis fupra diSlum. Vide app. adLegumina,

TEMPERAMENTUM & VIRES.

ottis cormculaiaglahrafeu fativa Matth. Lugd. nobis. 11^M fupra citatafacultatem evidenter
afmngindlpoftidit.cflenimfr'igidais ficcapatura fua^idtirco inflammationibm utitis is omni-
bus qua r(primi is rfrigerari defterant; adbibeturfoepe illitione advifcerum fervidorumma-
terism concoquendam in tertianisnotbisex floribusdeoimbuto, quod etiam oculismaximecon*
dd i. Loto bac Pharmaccpiti Gallituntuf xqtte tuto acMetilotovulgtriofficinarumvulgp
diSa.

HALLUCINATIOES CASP, BAUHINI
Aliorumque Authorum.

Lotus pentaphyllos filiquofus villosus, C. B. P. X. j. Pag. 332. col. i. pl. OxytriphyUum alterum Scribonii Largi, Ad. & Icon. Male adhibetur OxytriphyUum alterum Scribonii trofynonymo hie, cum Oxytriphyllum alterum Scribonii Ad. Lob. It fynonymum Loto htemorrhoidali Parhinsoni iuuat figura Lobeln 6 Parkinoni indicat: lam Lotus L morrhodahs Parki OxytriphyUum alterum Scribonii indicat plantam multo minor em & incanam J'incanala nagine obduclam Lotuspentaphyllos filiquofus villosus indicat Lotum Lybicam Dal. Lugdunenfi, cujus figura, fi filis cateret, optime referret Lotum wAw wfrutescentem hirtutam a bam (Jflore) major em latifoliam filiauis ternutibus longioribus nobis fudidam, VLotus nZZlt & Trifolium hcemorrhoidale Park Oxyhyllum alterum Scribonii Ad. 6 Icon. Lot optime exprimit (a figura ab utroque p Moau- fa) Lotum TroAvhpc Jv frutescentem incanam albam filiquis curtis craffioribus, nob is ? qmmno filiquae optime referunt vena* hemorrhoidalescicas, undeei nomen. Ornithopos pticularij; iiquofa, Cam. Huic adfen CaJp. Bauhinus Lotum filvejtrm M Ponce. Longe fallitur, nam LotL peris filiquoja, Cam. folia habet triplo latioratf ngwra, deinde filiquas multas fimul congejas curturnidas ubi apparent femina s Lotus aut em filp hioforidis Pona folia fua terna habet exiKa, deinde Unas filiquas tenues, pianos, erclar,

quendicant binas hafce Lotos_ejfe duos diftinflas Jpecies, uti fupra monfiravimus. Confule Icones utriufqut a nobis allatas.

P.332. col. i. pi. ix. OxytriphyUum alterum Scribonii Largi, Ad. & Icon. Lot. Inquit ibidem Cajp. Bauhinus an Lotus filveftris ex codice Ceefareo Dod. Lugd. Primo Lotus Jilvejtris ex codice Ceefareo Dod. Lugd. toto cmlo differt ab Oxytriphyllo altero Scribonii Ad. E? Icoji. Lobe Hi, cum filiquis turn folio* rum Jiruffiura, ut evidenter apparet ex intuitu duarum plant arum Iconum, ergo nullus relinquebatur dubitandi locus Cafparo Bauhino. Secundo, Lotus lilvejtris ex codice Cafareo eji Trifolium folummodo, non Lotus, quia terna tantum folia gerit in extremitate (inediobttis appenjis exortui pediculi s ergo cum non polleat conditionibus reqqifitis ad Lotum conglituendam, non debet appellari Lotus, multo minus dubitando affociari Oxytriphyllo alteri Scribonii Ad. & Icon. Lob. a quo longe dijtat fuis partibus eifentialibus.

Pag. eadem col. 2. pi. iv. Lotus pentaphyllos veficaria Trifolium v eji car ium five Halicacabum. Capi, Trifolium veficarium, Prefp. Alpin. de Exot. Inepte dicitur Trifolium cum nullatenus Jit Trifolium a numero foliorum fpecundo non eft Lotus, quia nee folia, nee capfulas feminales Loti modo difpojita habet fed cum & folia & capfulas feminales Anthyllidis more gerat, debuit Anthyllis denominari, non folium, a foliorum difpojitione, fed a fine ultimo, id eft a modo florendi, G capfulas feminales producendi, ficut nos in capite fequenti praftabimus.

LEGUMINA

Papilbnacea filiquis bivalvibus curtis velicae inclufis & fine vefica.

I.OTO AFFINI* SEU ANTHYLLIS LEGUMINOSA BIVA IV is Veficaria & rotunda fine vefica.

CATV T XIV.

Lotoverbae filiquofae pentaphylle* fubjungemus immediate Anthyllidem leguminofam, Lotovalde affinem foliorum difpojitione; rtam ficut Lotus quina gerit folia, terni extremitate pediculi, & bina adappofitionempediculicumcaule, ita Anthyllis bisbina, quando bis terna gerit, hinc inde coite mediae binis aut ternis e regione adhaerentibus, imple, ampliore multo, cofte extremum claudente. Flores papilionacei & Loto & Anthyllidi leguminofae pari jure conveniunt; femina utriufque, aliorum Lesuminum e. Pifunl(Viciam, aut Fabam refipiunt maficata: at foli inter Legumina AntJiyM proprium eft producere filiquas bivalves, vefic3S hirtuf* aut incanas inclufas; alioquin filiculas mevehca, bicapfulares, tricapfulares, aut quadricapfulares, de quibus infra particular! leguminofe explicatione diffufius dicemus: addidimus leguminofam, Anthyllidis admodum a Botanicis, ut clare infia patet, reguminae eft vel vulgus nos tras, quae luteo, albo & albo; nec perlece albus, an T J 0 5 h ^ ^ ^ potest, fed extremofloris Helvetica; de his omnibus infra p atebit in dclaratione five explicatione fingularum* fpecierum.

Pars TABULÆ XVII.

(Luteo,ncbis. ©

Vulgar* fire)*- AlhoMjs. ©

obis. ©

Lot & affinis Antliyl-
lis leguminosa dS

- 4. Hispanica, Park Trifohum veficarium, Profp. Alfm. cle Exot.
 - 5. Siliqu islnrfutis artinath, C, IS. P. Auricula nmris, Cam. Peregrina. J. B. Chabr. ♀
 - 6. Cretica falcata, Park. Trifolium falcatum, Profp. Aij'in.
- UT EXUI, ♀
I. Hdvakafolm cltfeiformibu^ vobis. Afiragnloides Helvetica, Park; ©

Expluatio partis Tab if.

I Loto affinis vulneraria pntcnfi C. B. P. Vulneraria rufficaj. B. Chabr. Gein. Hort. fe. Lob. Cluf. Kft. & Pan. A. U. II. Lend fimilis, Dod. An-

taL, cerctes, tenucS) hiribti, nonnini rubentes. folia pinnata
prnguiufcula, interne hirftta "odiceque canefcentia, superne ex
dula & fabacri, at quxracernis floribus fubjecta folia funt lata, ^ gitata, oblong^ mem-
b fl e i n o r e s i n r a n t o r a f i a l t i g i o g l o m e r a t . , luteoli, odore nullo

guli ex veficula argentea lanuginola ku villofc cmicartt
Icnobi, diOo, reflexo; lob q. o bte^Ua duo parvn ^F
parvi, petalo fupre
artum minimum, rostrum minia lu-
farius albo; ex Gothardo hanc volne-
flore luteo confpicitur; post flores evanidos
incanz; in quibus fingulis femina bina, terna
incandant; in quibus fingulis femina bina, terna
includeant, r, gam & fiqua ipse vefica argentea, incana seu villofa integuntur, atque hanc
nota huic foli generi intermedio Leguminum est peculiaris, ipfumque genus particulariter
diftinctum i conituit.

a^j^wf affinis hirfiitalwrba flore fuaverubente, CB P. Lotus latifolia DaKHift. Lugd.
Anthyllis legnminofa pnrpurafcente flore, Cluf. Hift. Pan semina hujus accepit ante mul-
uos annos Carolus Clufius a clar ffimo vira Alphonfo Panc'o, qua U ntam jam deferiben-
dam Carolo Clulio produxere. Radice eft tmui, mafli
quaveri" i jacentibns, qnae ex mult is aliis toliou ^ n l u n t i n a q u a l i t e r d i f p o f i t
parte grandioribus i latioribus: caule dodr
jcit diivui iU»» MW»S, comreclol fontlateii
r-m'fingLilx veficx includuntur ut lupenons
Quidam plantam hanc Anthyllidem
maio-

remvocant
Loto affinis major, A nth "yl Us veficana H. fp. n. cn^ lark. Tr. ro. Trifolium veficarium, Profp.
M7M». de Exot- Loco aitinis Halicacabum leu vdkafWn Trifolium, Cam. Hort. Halicacabum
itu veficariam Trifoliam, J. B. Chabr- Mules abhmc
annis nata est hanc planta ex f i n i b u s
folia recedunt binatim hinc inde a-

Ldio foliorum & ex capite fuperiore radica:: atque ex fummis cs
n h l c a f u n d e n t u l a s , f e n a s n u n c p u r e s , n u n c p a n e f o r a
—, inquietarum extremistanquami
paXnaceL luteopallidi autpotins ochrofcuci, afiquid carne. colons n H
S qu Lu Ingulis veficulis htenc fingob filiqux bivalves, » nt. ne^n « ^ n ^ ^
con^Ta fatiscraTa pro pla^tenuitate, cjuldcm teregastus cum tern g

LegammaIn feminibas. • : - , : . r p p Auricula nmris, Cam. Hort. -Aw* ula
4-£0/0 affinis filiqui5hirfotis, circmam, C. B. P. Aucma
A a

muris Camerarii, J. B. Chabr. Ad Anthyllidis leguminosa genus pertinet etiam hanc

porcedulci, ex > S J 3 S 2
foci: folia akanatim 8. caalibus exe^nr mediocriter c^ * & * & * i, ta k aspera, &
in coita n^ dia dispositis, majus fit, ut e Smm impar sez cupio fere singulis foliis, conjugatim

nemdefWns : sapor iis aliquantulum fervidus: flores papilionacei sunt quemadmo-
L bus aliis, parvi, crocei, hirsutis viridantibus Foliolis circumsepd: filiqua
compressa, similes Medicæ lunatae, sed paulo minores, Ibi iovicem junctae & in fe (u) VO-
luta, hirsuta virides adhuc, semen figura renis claudunt, alcera paite gibboliim, altera fi-
nu sculpto cavom.

5 Loto affinis Anthyllis falcata Cretica, Park. Trifolium falcatum, Prosp. Alpin. Hæc Anthyllis falcata admodum est, versus radicis caput foliosa; folia enim longa, tunda & aspera, ex albo nigricantia, dense & confes im humi procumbunt, quæ ex tenuicx-
orta in latitudine semipollicarem XrfemUm desinunt obli^ seu semicirculariter:
cauliculis ex radL protrudit plures
genicolis tenn aliquand^ nunc qu^ fli fut l
& b^ quæ cingunt caulem: flo utei, aut ex albo S^ utei fastigiis
cauliculis insistent, papilionacei; quorum singulis succedunt filiq membranacei V bival-
ves, in margine fimbriatæ & sinuata, exterius circinata, unguis humani magnitudine, ro-
tunda, simul junctæ, unum eundemq
ts radicibus parvis & tenuibus. * exortu, fe caulls funiniQ i L i ? i f h æ p an-

f Par ^ A r ^ m r " - W ^ M * ad ^ i f i T M i l ^ l l o b i s - Afragaoides Helvetica,
obit, r? H n ^ l d i s j p c c t ^ 3 n J habec affine cum Afragalo ex dofrina ncfira oniverfali, n on
na S S w ? ^ ^ at ipne Parkinfonti, cauliculis prolc fnuaciales nudos, in quorm cimis
to m J : CS - ? a p i l i o n a c e i , P k r a i f t p i c a f i a c o n g e f t i A n t h y l l i d w m l g a r i s m o r e , f e d m u i -
p n e d i f t S " L / i n S a l l i s l » c « d u j i c f i i i q u ^ f i n g u V " , v e f i c i s m t m b r a n a c c i s i n c l Q f a e a E a n i m
P " i f o r m U m i n t u l i d i m l t i d e m m o r ^ " t c o n j ^ b r a p r o b a b i l i n o b i s a p p a r e c e x f o l i i s d y -
f e c t i n i V ^ 1 1 ^ l " " f o v e m e n t i b u s e x r a d i c e j o n g i l q u e p e d i c u l i s i n n i t e n c i b u s , u t c e m c r e
w i o n L n 3 n o o i s e x h i b i t a (V e r f u s f i n e m T a b _ 2 ^ J « P a r k i n f o n c " f o a t a , q n i d e f r i -
f i n e 3 , ! , T r C ^ & T M n c a m . ^ r r , n e e f f l i q n a i u m e a r u m v e c o n u . m & m c m \ n t . .
v i s p l a n t a . i c m p o n t o u e e i t d e t e r m i n a t i l a d q u o d g e n n s i n t e r m e d i u m d e b . a t r e d u - q u æ

LOCUS & TEMPUS

- * And, illi, kguminosa vvkaris pafun flore luteo confyicitur in aridh is fdulofts agris is ad TMargim ar£oruin mgl <m. Floret Mawtejumo; <yverfts tfiathfinemfaninafuaper-
fi^ci - AnthylliJemflo} tlbo ex Gotbardo babuitCar. Clufius.
- 2. Anthy His kauminofaflore purpurafcente, Cluf. Hift. Ex mmtibus fupra Apennim infraiens > -
*** Wibuf Jam'fumo, cclleftam, florefangtineo vdrubro^attultt Ckr lcrus Johanms Bauhinig: -
mr. Vloratadan lanpefiate anni turn priore vitlgari.
- 3. whyllistiifpanka veftcaria. Park- Trifolium veficar'mm^ Profp. Alpinu Ferrandes Impera-
- j m i n a t u j u s p l a n t æ n o m i n e L y g o u v e f c a r i u a d P r o f p . A l p i n u m m i p t .
- 4. Anthyllis dicta Auricula muris, Cam. Hort. Floret mense Augusto & femina Sep tanbriperfitit.
In Creta sponte rovenit, unde eius semen Thymi vocatur (id est Thymi capitati) y ^ ;
datiunfuit isr CamerariQcommunicattm. In Salamina tnjuia prope Athdtnas provenit
Vghifbeekfin Peregrinat'wnibus fuis Afiaticis.
- 5. falcata Cretica, Park, Ziataks indigat nomenipfum: floreteadem anni lemteflatt
i. AiTu... Camerarii.
vtn * & b ^ y ^ (f < t d e f t a t i c o f f o l i i b u s p u f e i f a l t u i b u t o b l o b k . A f f r a g a l o i d e s H e l v e t i c a , P a r k , r e -
J r a M o n t i b u s H d v e n c h : f l o r a e a d e m t m p t f i a t e a n n i c u m d u a b u s p r æ d i c t i s .

TEMPERAMENTUM & VIR E S.

Loto affni-
Lugd. 4 vulneraria pratensis, C. B. P. Anth E s k ^ o f i o b . C l u f . H , f t . A n t t y f o ^
Vulneraria rustica, J. B. Cbab r . H a m d e n a r i o r u m 4 . p o n d m e p t a m c u m m n o a l b o

. qM & difficultai Hbus isr renibus plurimum prodeffe fcribit Diofcorides: tritam vero cum rofa- ceo ir lafte uteri infammationem mollin impofitam; vufais utiliffimam torminibusque isfecun- dinarum mor<z, invino pot am, refert PliniuS' Gaknus utramque. Anthyllidamodkt feccau ait, De nominibus fatis fupra diftum.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI
Aliorumque Authorum.

P 4g. 1 §2. col. 2. pi. r. Ltto affinis jEgyptiaca, 0. B. P. Abfus, Jlpini. Nee habetfolia, multo minus flores aut capfulas feminales Anbhyllidis, aut Loto ajfit: ** ergo non eft uinthyllis leguminofa, nee

Lotus > A foliorum aut capfulatum fruBura; ejlenim planta heteroclita, ergo male inter Loto affines planta à Cajparo Bauhino loqatur.

T R I P O L I A

pentapetala acida.

TRIFOLIUM PENTAPETALUM ACIDUM SETI ACETOSUM,
Oxys feu Oxytriphylurfl.

C A T V T X V

Q goreifyfadi quibusdam dicitur ahacido fapore isforma trifolii: Oxys Plirii 1. 2 J. C. 12. folia terna habet. Dicitur etiam nobis Trifolium acidum pentapetalum à quinario numero petalorum in floribus.

Pars T A B U L I X V I L

<i>Trifolium pentapetalum acidum feu acetosum</i>	}	1. Vulgare } flore } Albo. ☉ } } Purpurafcente. 0
		2. Minus repens istrocumbens, nobis. Oxys Plirii Cotnicuhtnmtutmm } <i>Indicum feu Argimanum, no*</i> } <i>bis, 0</i>

Explicatio partis Tabula 17.

1. **T**rifolium acetosum vulgare, C. B. P. Trifolium acetosum, Fuch. Dod. Lugd. Eyft Oxys Pliniana, Gefn. Ad. & Icon. Lob. Oxys alba, Tab. Ger. Hæc eftherba humilis Cucujus pediculi è radice exeunt tenues, quibuique fingulis terna infident foliola exigua, tenuia, etiam pallide virentia, fapore acida; atque eorum fingula cordis effigiem quantenus referunt: flores in brevibus pediculis oriuntur & inter folia ex radice orta profiliunt, candidi ut plurimum, aliquando purpurafcentes, pentapetali; quos fequuntur capitula Ochri frudui paria, pentagona, & quinque loculamentis diftinfta, in quorum fingulis plurima femina minuta latent: radix tenuis, obliqua, ruffa, & diu vivens. Trifolium acetosum & Oxys dicitur, ab aciditate; in officinis etiam panis cuculi nominatur, quod elcuculus avis eo vefcatur, vel quod hoc erumpente ac florente cuculus appareat vocemque edat, quo etiam tempore Alleluja in templis cani confuevit.

2. Trifolium acetosum corniculatum luteum minus, repens, & etiam procumbens, nobis. Oxys flore flavo, Cluf. Hift. & Hifp. Oxys lutea & corniculata repens, Lob. Lugd. Ad Trifoliorum claffem, fed non Leguminoforum pertinet elegans hæc plantula, quæ ramulos dodrantem pedibus longos, imobreviores aliquando, graciles, rotundos, rubentes, nodofos, per terram procumbentes, & fubritie ad fingulos nodos feu genicula radices agentes, novofque furculos & ramos proferentes: folia illi Oxydis vulgaris, terna in fingulis petidlis, cortiatae- tiam > Ted minora & niagis pallide virentia, acidi faporis, quas fub vefperam & ingruente

imbre compticanyr S; veluti inumbonis cujusdam (iguram coeunt: (hoc Trifolium, nofisi, iiiiupenus diaum, aim Trifoliis hifce acerofis eft commune) riores in obWif r diculiscermaucquacern! fimuJ nafomtur, quinis petalifi UlatimdecufTatiscoiifpiai i yiu garis foprsdefcrtpti toinpres, Vlavicoloris, quibus fatifcentibus fucccdunt cornicnla oblongiora ronata, fermnncialia & feminibus roffis & exilibus plena; qus quinis locula- mentislea- ignibusdiftmaa, per maturitacemih,fcntia C^hifcctibus coiiculiai^ ' cxlunt, & iparfia. per tenant ftrata repentes novellasplantnlas, infeqaente anno b & lemma prolaturas, general: radix tennis & capillata feu fibrofa diu rpendo durat, at m multos annos fxcadem radice femina renovat, quin dr femine maturo filiqux prardiite Jocolamenris diihnSa?. taftx)llico contrahuncur fondentes femina,exqu'bus afta- tim procreantur p* n o v e l l i .

3. *Trifolium* f f Uli, c ornkdtU111 k t c m mi i"5 «ftDm Indicum fen Virginia, ^i,nobis. Hujus cauliculi refiiCint, faieaaafcendiiiitadpedaleinaltitiidincm: folia,flares,&corni- cula feu fili qu36penta&or.a&,priorUimnla,fed majora fert, Oxyos lutes pradia* minoris repenna quoad omn«feas p'artes multo majora. Deinde hxc eft peregrin Tea exotica pianta, lepensitidetti^radicc, nonaatemcaulibusproaimbentibus, fed refis donara ; undt ipccitce: diltii-gnirar a minore nofrace repente, fupra explicata, junfta an^litmlinc feu magn.tgdinc pafinna.

LOCUS & TEMPLIS.

I i- inronum acetofum vulgare album ispurpureum, nobis. Oxys Fliniana, Gefn.Hprt. Ad.Lob. Aafatur hi lock filvofis bumidioribus atque umbrofis, juxta arbcrum vetufiarum feu annofarum radices f<ep, aquofa is- fubindepetrofa mat tea ; paffim in Gernsnia utraque, Gallic ualut, Aaglia, Belgioque, in [this is humidis umbrofis fatis frequens; Afnhist Maioflioret, Gfihent'crits* pojfubcedit.

• Trifolium acetofum cornkubtum luteum minus repens is etiam procumbent, nohs < Oxysflavo Pore, Clvf. Hi}. In umbrofis circa Hi/palm locit nafcitur: olmfimikm vidifit meminit Clu- fasadmentia urbis Monfpelii. Nos frequentem fatis hatic Oximluteam npmteminfaxofis iv fqmldh circa Nanetem lock, fpome provenientiem obfervayimu* (. Prce&iut oxa toaritintam Armories inzferemus, atque omnes plant as marithnas, cum in t^a*. \turn m h fttis eidtm adjacentibus txaminartmus, faltem qu<e nobis in confyefum fefe dea <...-, ut cvr. ^

Jus factio) ciebus cptrJdarem. I «nifici Gafionh op«* certe mirandum inviftntibn is wtelligentibus ««nquam fath is V' audandilm apparuir, cu)u* aliquot abbmcanmscatagum exhibui: "W HtiL Europi ,maliquot Afaticn, Africans is Ammcanhphntis Unum integrum wgttabilium omnium in mediumproferre dtcrevi, ut obfervent pojleri, in arte doM, nos omnes omnium ewrum filaatas ad metfjodum veram is genuinam reduxifie-^ ivipr*, fequantur ,hi me,7 veLa vJimoftrum innnebrkcammtk^idtfifummaconfufion^verfabuntur.

3. Trifolium acetofum comkuUtum luteum m_{aj}«* return Indicum fm Virgimanum, nobh.^emma hfuws ex America i? Virginia multifque tnfulis iis proxmis, ditiomferemffimi D, D.m/}~; Cerott ficundi fubjeffh. paucis abbinc amis babubnus. Flora eodem tempore Cfspe tardiusj cum priore minore luteo repent^ atque jub finem a/latis utrumque hoc Trifohum comiculai^ "it, eaquelongete late fatis jparftm projicit, qiabut finguhi annis fife utrumque

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Trifoliimi acetofum vulgare datur ad Jlomachum difolutum, bentificio ejus refituittr ad tonum Juum, cdanr qui enteroce/en babent. Tempmem frigidamis ficcamOxysbabet putridisacfa- tidis cris ulcvibutmedetur, fitim arcet, atqueead_{mqu}^ Oxalisfiu Atmfapoteft.

N o M I N A.

i. iuvQ\»*. vcrv?unvui^ c j j p , Tnfolium acetofum,Bruntf. VoJ. Maitb. Lugd. Wf fotiurr.

y ilm. acetofim, Calabris Juliola C ridkuk Earbari corrupere in Allelaja ; Scalg. in Thcopk de Caitfis J Oxp^Fuch.Tur.Qtm. Alba, fab- Ger-Oxys PUniana^Gefh. Hort. Ad. Lob- OxytriphyU fott, Trag.Famscucu/ty Bru/tsf. A/kiuja,Lactm. Lon. Lujula, Fracaf. Variat colors, fioris, fos communiter laileus ef,rarius purpurafcens, unde Oxys feu Triformacidum fore albo.ispvr-purafcente7 fyfl.

P Trifolium acetofum corniculatuta lutetm minus repens funul & procumbent, nobis. Trifolium 'ofam corniculatum, C.B.F. Trifolium acetofum fore luteo, Cdfl. Eyft. Oxys flon flavo, f.HiJl.i? Hift.DoJ.fak Oxys, Ctf. Cer. Oxyslutea cornicuUta repens\Lcb.kon.Ltgd. infoJium aceiofum corniculatMn tuiatmmajut rei-ium Indicum, nobk.

r R i F o L i A

Pentaperala Fragifera feu Fragaria vefca, & minime vefca.

§ I. TRIFOLIUM FRAGIFERUM, feu FRAGARIA VESCA.

CJTVT XVh

Fragaria a fragro, ide.fi odorem reddo, difta -uidetur: >>«*» Apulei cenfetur: inter Penta- fbylla. fiorealbo f* nos potius pentapetab intelligremus, cum cernis antum Fragaria do- netur ibliis, at numero petajorum convenicFragariacumPencaphytlo &Heptaphylio.) T)j- o/coridem inielkxijje volunt: (? qu'm Moraterrtpk Servio diSia juere, funt quiad Chttmxib- tum refer ant. Pliniol. 25. c. 9. Fraga. Rubus nId&uififbd am.

Genera : lha montana 4&fjria, in montibu* isfdvU nata: allafativa, qu&in horthcultu, fru&us magnitudint, figura oblonga, rotunda, is\$ colon rubro isr albo variat.

Pars T A B U L £ XIX.

<p>Fragifera feu vefca</p> <p>Trifolium pentape- tatum fragiferum feu Fragaria-</p>	<p>i. Vulgark minor" Fru&u</p>	<p>fRubro. Q A/bo. G Media inter rubrum is' album. Q } Toto fubalbido. O Bis in anno maturo. © Pbcemcto, duplkeferkpetalormn inflore, nobit. Pragma Anglka fore fmi- l pleno, Ja\ob. Zanoni. Q 2. Parvi? ninimagnituB'Me^Eyft. O Hortenfs [5. Virginians fruflu coccineo, nobis. O major') 4- F/orf berbaceo, frucju fpihofo, nobk. Fragaria L' arboren fore berbaceo, Jacob. Zanoni. Q 5. tiirfuta minima incans, nobk. Fragariaflvefirk minimeue- Sttrilk feu- J fca feu ferilk,/cot. Lob. © minimevesca, d.Serkta feu incana, nobk. Incana feu Pentapbyllieffigie, an I Ze<<w Diofcoridk, Ad. Lob. e [7. Helvetica nana fore luteo, nobk. Helvetica no 3</p>
---	--	---

Fragaria pro nota generica hanc habeto, quod florem producat pentapetalum; hoc ipfi cum Pentaphyllo aut Heptaphyllo in genere est commune, at ex calyce florum prove- niunt Fraga, sive rotunda, live ionga, rubra liveaiba, e\$ plunbus quail vein'ulis conflata & arte sibi invicem con- jnfta, cum pulpa aqueadulci, & ori grata, 6Veonon. ine Fragaria vefra a Fragaria non vefca, & a Pentaphyllo feu Heptaphylio & Pencaphylloide C quippe fe- mina arida fine pulpa aquea in calyce gerunt j dillingiuntur; deinde rolia produçunt hir- futa, rogQfa, ternatim junfta pe- diculi extremo, quoci non cernere licet in Femaps'ylo fea mhyiu & Pentaphylloide.

Explicatio partis Tab. decimae.

Fragaria *ulgaris, C.B.P. *Fragaria* fru&u rubro, Eyft. *Fragaria*, Matth. Trag. Fuch. *Fragaria* t^hd.ut.Geih.Hort. Lob.Icon. Lugd.Ger. Inter herbaceos fructus *Fragaria* quoque locum obtinent, quorum herba pediculos tenues hirfutos, quandoque lanuginofos à radicibus prorait, quorum alii folia, alii flofculos proferunt, deinde à caulibus, eorumque geniculis fibras quafdam proferpentes demittunt in terram, quibus feipfam multiplicat: folia autem in uno pedieulo terna, oblonga, lata, per circumferentiam ferra; modo incifa, fuperius virentia, hirfuta, afpera & rugofa, inferius albicantia, quorum fingula majora & latiora quam Pentaphylli folia: flores plurimi ab uno pedieulo exeunt albidii, penr^htilj; multis ftaminulis luteis medium floris occupantibus, atque fingulos iiores fingula fubequantur *Fragaria* granulatim & rotatim feu conglobatim coacervata, exterius granulia exasperata, exiguis Moris quodammodo fimilia, colore rubentia, quandoque Candida, guftu vinofo, fua-via, quorum interior pulpa mollis, humida, & alba, ex multis veficulis pelliculatis conflata, fino-ulis fingulosacinos arillofve, id eft granapufilla in fe continentibus, ex quibus fatis de^onovotaphntain'dividua renafcitur: radix diuturna feu vivax, fubnigriogns, multis fibrif^hcamllata. *Fragaria* vulgaris eft vel fructu rubro, albo, vel medio inter rubrum & album. *Fragaria* Anglica duplici petalorum ferie, nobis. Hæc duplicem aut triplicem habet petalorum feriem in fingulis fioribus, quibus fingulis fuccedunt *Fragaria* elegantis rubicundi colons. Nafcitur in filvis opacis, nee non indumetis, paffim in montibus, non raro in collibus & filvis, fed magis proficiunt in hortis. *Fragaria* bis frucl:umferens, C.B. P. *Fragaria* genus in Alpibus, Cscf. H^hG in Bargeis Alpibus vifa fuit bis in anno fructificans, Vere fcilicet & Autumno; eims frucl:hi3 modice comprei^hus & friatuseft, fapore Rubi Id^hi: omnes *Fragaria* poftquam fructum perfecerint, alios cauliculos ferunt tenues ac fimlices, quorum cacumina ad ter^hram inclinata radican & folia producunt, quo modo veluti fobole propagantur. Expetuntur in cibis Fw.ga, quorum gratia ubique terrarum in hortis coluntur.

2. *Fragaria* major fru&u parvi Pruni magnitudine, C.B.P. *Fragaria* niagnofrufru, Eyft. Hæc folia habet majora, rugofiora, hirfutioraque, fructum majorem, parvum Prunum magnitudine æquantem.

3. *Fragaria* Virginiana frucl:u coccineo, nobis. Folia habet maiora, glauca, pro&nciuu6-laciniata, longis pediculis infiftentia dc longius latiusque per terram itrata: fructum gerit fatis magnum, efu gratum.

4. *Fragaria* major vefca flore herbaceo, fructu fpingofo, nobis. *Fragaria* arlipreafcreherbaceo, Jacob. Zanoni. H^hc folia tergemina profunde ferrata vulgans more habet, fed majora & hirfutiora, feu magis incana -, e^hc mediuilio' fbliorum inferiorum, coacervatim e terra ortorum, protruditur cauViculus reftus, ligneus quafi, & cubitum altus, qui fuffuni verfus dividitur in binos, aliquando ternos ramufculos, umbellatim quafi difpofitos, & ex nodis ramufculorum foliola-fimilia inferioribus quoad figuram gerit, fed minora, quæ non obfervantur fie difpofita in *Fragaria* vulgari: in fummis ramufculorum faftigiis proveniunt flofculi herbacei, ejuftem quafi coloris cum folii^h in quorum medio producuntur fru&us in^hter rubrum & viridem colorem, multis hirfidis viridibus pilis fcatentes, forma accedentes ad conum, feupotius in figuram coniformem faftigiati funt.

§ 2. Trifolia pentapetala, fevi *Fragaria* minime vefca.

\$. *Fragaria* fterilis feu minima vefca hirfuta minime incana, nobis. *Fragaria* filveftris minime vefca feu fterilis, Lob. Icon. Radice nititur fatis craffa, cortice rufto aftringente obducra, mi<ltis hinc inde enatis fibrif capillata; farmentis vero fuis per terram ferpentibus, tenuiffimarum fibrarum productione multas denovo radices agens: folia humi fufa habet tripartita, in ambitu ferrata, mollilanguine fuprafubtunique anefcentia, ex hirfutis pediculis duâs uncias longis, ad exortum gemina utrinque mucronata membranulae eleganter alatis: coliculusteres, hirfutis, uno aut altero folio tripartito ftipatus, fextantalibus: flofculum faftinet pulchellum, candidum, inodorum, pentapetalum, ex calyculo decem mucronatis, hirfutis folliculis donatotin medio ftaminula plurima; femina ex capituli^h, Pentaphylli capfalis omnino fimilibus, fæmie neutiquam hæc fterilis à *Fragaria* filveftri difet nifi fru&u non pulpolo) atque omnino quoad florem & capfulam feminalem 5c femina convenit aim pentaphylo & pen^htaphyl-

alloidc-proinde pentaphylli species Fragariae steriles speciebus in hoc capite
 bntis. n. J. Linximus. Nascitur in andionibus firgraminosis agrorum silvarum
 aliquando in liumefitis pratis repetitur: fructum fat Phormiceum irijucundi ilipor'

6. *Fragaria* sterilis filifera fericea feu incana, nobis. Incana pentaphylli c. H. Leu-
 cas Diofcoridi E. /i(i, Lob. *Fragaria*; arfinis fericea incana, C. B. P. & Prod, P. tiiigri-
 "•> ex quibus folia plura, *Fragariae* filiferae familia, led longe niinora, ungiem; anam vix
 icncia, crassa, utrinque incana, molli & fericea lanugine testata, in tres laciniis u(que
 -v. Jecticulum divisa & iuperne crenata: ramulos habet breves, reclinatos, flores luftinente-
 tee, parvos, litteos, stellatos; quibus capirolum calyce quinquefoliato infertacoifi, minntum
 —n« fuccedit. Hanc a Dom. Albino accepit C. Bauhinus, qui cam in Grana-
 noscopio: in filvis adjacentibus Piftavio reperimus.

a Helvetica nana, Park. *Fragaria* minima feunana flore luteo, nobis. Canalicis
 nit it or hasc enrtts, imoculiflibct Inj us classis brevioribus, vix quatuor uncias excedentibus,*
 quibustergemina adnascuntur folia, cum cauliculis ipsis humiftrata: in fummis cauliculo-
 rum nascuntur flores irregulares in trinuium, lutci & majores quam pro proportion? plants;
 fructum nondum viderat Gellerns. Provenit in montibus Helveticis. Omnesiarum Fragarum
 species flore irineunte ritate ac ante mediam xftatem fructum perficiunt suum. Nomina
 (atis super quibus; patent (uprt

TEMPERAMENTUM & VIMF.S.

Coquuntur Tritico ex Fragi* pulchellas ut HilJimas confichint^ quae est frigeratoria in inflam-
 matione lalorantibus nftius, quain fuccus, ahi Untur-, aqua i fragis distillata
 est remedio interius quibusvis jecoris & pulmonis aliisque totius corporis inflammationibus
 itique refanguenda; ad eadem fraga ipsa commansa faciunt, aqua fragorum distillata
 tione bibita cor confortat, vitia thoracis expurgat, morbum arcuatum discutit, sanguinem pur-
 jot is vinda, Aqua fragorum t/ ulceribus ork iff tingit gargariztu amiliat Uf: eadem
 faciei ruhnmis maculas tollit cottutu; ulcer a tibiaram hac aqua itblu' is r fuigari debnt,
 Unteolh in ea machfaclis isrfemperin Ulkmefitis, nonrnlh mi centos cdjlyria ex fragis con-
 Ciant, nrm P* 'Sis admifcent fefieaque distillant: alii fraga cum ale tneo v.ife recemhnt
 H trti, <.ll<£ VMitri<g commit t tint quoad in viridem aquam wutnti/r, tappftea adhcutor
 rum suffufitnem utuntur, Succti igitur fragarum exprefui ad multa utilit. Frapa-
 riam calidisi^ ficcam in ordim ficuudo tr-idit Fufchius. Ahifrigidam isr ficcam btrphno
 ord' m. Frmv inquit Cefdpinus refrigerant isr humefiant^ fiaotholk <? fiticulofn convmi-
 unt, fed copiofiort ciho caput tentant isr inebriant: aqua ex fru Ribus maturk dijiillata bi-
 bitur ad fangulnem contemperandum iiii qui fcabk is lepra labor ant.

F R A G A R I A

affines pentapetata pentaphyllum feu heptaphyllum.

PENTAPHYLLUM feu HEPTAPHYLLUM five TORMENTILLA.

Flore pentapctalo Joteo, albo & purpureo, & cetrapetalo luteo.


11) *Frax* (" quod nomen a mtrifoliorum babel, Hem iff 'emyp-Moi) Vbcorides I.4. c. 42.
 propofuit, cui folia fint Mtnth<e, quina fingnlis pediculis aliquando feptena, rare \$j(rj? in
 amoitu /errata^ floret excandidopalle/centes habet, auri <nmuks: radue/ubruba, oblon^ ilrc.
 fie isr Tbeopbrafto 9. Hifi. 14. ^mwpuWm ubi Gazf quinquifolium is quinqmpetam vertit. El
 Viimim l.&5-c> 9- qitinquiefclium multi ignotumefi. Gr*ci vecartt Pentapetes five *Camazelon*
 five pentopbylln.

HEPTAPHYLLON five TORMENTILLA.

Tormentilla quod radiceis puhis cum alumink iff Pyrellm momenta^ cavis detittum indhus
 dentium tormntum five crtt datum fedet: quam alii Paitaptyllk, alii Bificr^is ad. sumirant:
 I um qui Chryfogotium D'wforidis fufykantur; Heptapbyllon, id est feptifolium aquibusdam,
 vom'matuT.

Entaphyllum feiit Hcpiphyllim pronota generica liabet hanc, quod feiipcr • pnta on feptna producat folia five fit majus five minus, cujufcunqne magnitudinis aut colons, & quinapetala (ideft folia in flore:) in hoc convenit cum Fragaria fterili, feiut etiam capfulafeninali ex 5. foliolis hirfutis compofid, plmima minutalemina rufta leu fubruica in finu conmente.

Pars T A B U U XIX.



Explicatio partk Tab. decimanona.

1. **P**entaphyllum feu potins Heptaphyllum majus luteum' montanum flore majore, nobis. Quinqtfolium majus Theophrasti, Tab. Quinqtfolium alttrum vulgare, DotL Pentaphyllum majus creftum, Cam. Park. J-B. Chabr. Huic funt caules tubitalts. & f alticres, plures, duri, rigidi, refti, teretes, fubrubes, villofi circa finimum, in aliquot alas moil^l longas, modo bicvcs divifi : folia hirfnta Alcae rere Emula, variante divilura tiuintuplici, feptupliei, fingulis legmemis profunde ferratis: flores odore Agrimoni[^], quintspetalis ob rail? conftantes, **cdorc lotco pallido, nunc mtenfipte**, nunc dilutiore, albo interdmn; fo gulb iltlnbus dcciduis lticedunt capful[^] calyculataj, in **marginc** pluiihriamdivifa? in **qtia** rum iundo continennir plurima mintiti/lima **fenina** rotunda, fulb aut fabrafta- 'flore eft aliquando majore, altquando minore ; folia etiam gerit majora, minus laciniaca almtando minora & magis laciniata.

2. Eft & Canadenfe humilias c[^]jus **folia** faturatius vkent, flofculo[^]- maenos hteos & confequeilter capiilasmaiores ahoruni more gent.

3. **Pmtaphyllum fctt** Hcpcuphyllum albopallidum **fen** Hore ochrotenco ?&&* fmgulis

^ ^ : ^ % ^ ^ ^ l ^ ^ h ^ ^ > ^ **fa** (m < ! >) ^ **viem**,
dio uniuicujufque petali.

4. *Pentaphyllum* feu Heptaphyllum majus re&nm rubrum paluftre, nobis. "QuinquefoliRm
 paluftre, Cam. Hort. Eyft. Pentaphyllum vel potius Heptaphyllon flore rubro, J. B. Ckbr.
 Pentaphyllum paluftre, Lob. Icon. Ger. Pentaphyllum rubrum, Lugd. Hift. Quinquefoihmi
 paluftre five aqiatjeum, Tab. Hoc Pentaphyllum feu Heptaphyllon paluftre rubrum valde
 prolifas habet radices, fecundo reptatu luxuriantes, rubentes, lignofas, fibrif /apillatis
 aliquot donatas: folia fcabet quina autfeptena Pentaphylli vulgaris, non eo ordine fita, fed
 a alijs feeparatis difpofita, fubtus incana, hirtuta, fuprema parte viridantia, profunde per
 ambitum ferrata, pediculo non admodum longo nixa-, quorum unum in vaginam amplam
 degenerat, caulem amplectentem: caulis flores gignit magnos, amplos, rubentes, exquinque
 vulgariter, nonnunquam fe& Retailis compoittos, cum concoloribus apicibus Sc turbinato
 crpmio^ Fragariae fterilis amiuo.

5. *Pentaphyllum* minus re&um lubtus incanum flore albo, nobis. Pentaphyllum majus
 flore albo, Eyft. Pentaphyllum album, Matth. Ad. Lob. Pentaphyllum feu Quinquefolium
 i. Cluf. Hift. & Pan. Quinquefolium filvaticum majus flore albo, Ger. Quinquefolium majus
 candidum, Fuch. Quinquefolium album majus alterum, C. B. P. Hoc folia habet multa, Cquin-
 quefolio vulgari familia, in quinque partes ufque ad pediculum divifa, in ambitu minime
 ferrata ut ilia, fed extremis duntaxat oris, fubtus incana lanugine pubefcentia, guftu inquitio
 gummofo & emplaftico, deinde non nihil amaricante: aliquot fubhiforiuntur cauliculi exi-
 les, & tenues, dodrantes & furrefti, in fummo ternos & quaternos flores proferentes,
 Pentaphylli vulgaris fimiles, (ed profus albos, quibus excuffis apparet calyx lanugine ob-
 duftus, femina continens planum Ranunculi fere aemulum, in rudimentum Fragi congeftum:
 *adix craffiufcula, Higricans, in ambitu fe& diffundit, & multis fibrif donatur.

6. *Pentaphyllum* minus ere&um hirtutum flore albo, nobis. Quinquefolium minus alte-
 rum flore albo, Cluf. Hift. & Pan. Hoc ex eadem radice, quae nigra eft, multos cauliculos
 proferre folet, foliolis hirtutis, fecundum radicem confertim nafcentibus, forma fuperioris
 fimilibus onuftos, graciles non humi fufos fu procumbentes, fed re&tos, & fummo faftigio
 multos flofculos prioris. fimiles, albos; eftque iuperioris fpecies, fed per omnia minor.

7. *Pentaphyllum* minus procumbens flore luteo vulgare radicularum femiftensex geniculis,
 nobis. Pentaphyllum vulgatiffimum, Park. Pentaphyllum five Quinquefolium vulgare repens,
 J. B. Chabr., Quinquefolium majus, Dod. Quinquefolium, Ger. Quinquefolium majus, Fuch.
 Liigd. r^fapliyllum Diofcoridis, Tab. Hoc non fecus ac Fragaria flagellis fuis cubitalibus,
 teretibus, hirtutis & rubentibus fert: folia minora Fragaria, quinquepartita, magna, hir-
 tuta, fingulis fegmentis in ambitu altis incifuris ferratis donata, pediculis quadrantalibus
 innixa, guftu vifcido: flores Potentillae, lutei, quinque petalis confant, latiusculis apici-
 bus in medio croceis, quinque foliis virentibus, in fingulis pediculis palmo longioribus in-
 fidentibus; capfulae firperveniant exiguae, minutis feminibus replete, quae, cum pericarpio
 fpoliantur, acetabulo fiorem tegente proteguntur: radix longa cuftitudine culmi, colore
 rubro, fapore aftringente & exficcante, exficcata quadrata evadit, quod notatu dignum, adde
 quod clemata ejus adeo avide terram appetunt, ut viva fuerint defcendere a fummo muro fecus
 eundem fpacio 8. pedum & amplius quaerant terram, atque in eadem reperta, ibidem radicantia.

"8. *Pentaphyllum minus* incanum Alpinum floreaureo radicularum in terram demittens, no-
 bis. Quinquefolium Alpinum repens aureum, C. B. P. Quinquefolium 3. Cluf. Hift. & Pan.
 Minus hoc Quinquefolium ex radice iibrofa & nigricante ramos promit, humi fe fpargentes
 & Tubinde afias jpblongas fibras agentes % qui rami fummo capite multa folia proferunt,
 Pentaphylli vulgatoris fere familia, in quinque profundas incifuras divifa (quoniam finguae
 infar vulgaris Quinquefolii per oras ferratas lunt) molliora tamen, aliquantulum incana &
 fplendentia, aftringentis guftus; ex horum medio cauliculi exeunt palmares, multifidi, aui
 pro plants exilitate fatas magnis floribus prxditi funt, eleganti plane & aureo coldrc^fliu-
 tis intus croceis ftaminibus: capfula feminalis & femina ibidem contenta, aliorum YPenta-
 phyllorum more in Fragi rudimentum congefta, fufca funt 6c exilia.

9. *Pentaphyllum* minus lanuginofum flore luteo radicularum ex geniculis in terram demittens,
 nobis. Quinquefolium minus repens lanuginofum luteum, C. B. P. Quinquefolii 4" i^a fpe-
 c^i c^j, Cluf. Hift. & Pan. Huic minori Pentaphyllo multa exeunt ab una radice capita ra-
 mofa, humifufa, aliquot foliis, Pentaphylli vulgaris & elatioris forma fimilibus pradita.) hoc
 eft quae qui n^que foliolis, in ambitu ferratis, mollique lanugine pubefcentibus, confant, led. non
 ilia incanis; guftu inquitio exficcante, deinde linguam vellicante; ex iiscapitibus prodeunt
 irantales cauliculi, fimilibus, fed minoribus foliis ornati, geftantes in fummo multos

luteos, elegantissimos, quinque petalis ut superiores constantes; medium
tibus multis luteis staminibus: semina multa in caput veluti
fusca: radix lona: dura, intis crafla, toris nigricans & CenoibS Hbris donaact.
led, HI humi fiifi plermnqae fibras agunt & vicina occupant.
folium minus repens aureum, C. B. P. Quinquefolii 4^o 2^o species; Cluf. Hist. & I
hoc Pentaphyllum minus superiore nono, frequenter humi fufum fimiliter, cuju
non virent sed purpurascunt; & graciliores f folia angustiora magis villofa,
gis (errata: flores etiam saturatius aurei col , cetera conveniunt & prius nonum & hoc
11. f iis profunde fedtis subtus argenteis floraleto, B. Chabr

Ifc feBe, Gci. Hujus radix ir^umerofa [^]pitadTvMiTa rlin S ? J
fingdjs caules refti attolhintu rigidi robnS S n 'i g^oofa, - ^ f
dofti, qua derafa rubi Jagnent- fol E ? a ra. i Pedales, lan «g[^]aoap, nitU5ob-
partim es, ule, fubtus JJS tus inom f S f f * loil?ls Ediculis append qunrnr,
facanclitib breves d vifo qmram u S TM f f' \$ - £ - 2r ! caulis in ^ miquofupim va
tenulste planta, e calycibus laciniatis, albidis, f ? u flor feb d ent satis magni pro
12. Pentaphyllum minus viride flore aureo tetrapeta lanuginofis itidem, ft
mittens, nobis. Hxc Pentaphylli minoris spec !-adicul^{as} in terramexgeniculisde-
liculi ejus per terr: n strati radículas fibrofas ICS Convoie cum 7- at. ob illstoA qum cal-
petalorum quibus Shummodo accedit feque nu» Tormentilla authoribus difto: ideo hev
TormentiUz adi.mvil us propter conformitatem in numero pecalorum ;& hoc PentaphyUuni
& H h l l um Tormentilla dictum aiquando, fcdrariffime, ex nullibus unumriorem pro-
ducit pentapetalum.

13. Pentaphyllum a p otius
nobis. Heptaphyllum, uuh T_i Ur Lon Gcf » Hort- Tormentilla filveftns, C. B. P. Tormen
tilla vulgaris, Park. T h T_i Ur Lon Gcf » Hort- Tormentilla filveftns, C. B. P. Tormen
consolida rubra) Ger. Eyft. oritur ex radice craffa, tu berofa,
pollicem mag
tuber fi
nniLIS 7 S ^aPorear ftngence) ex qua viculos phires enr
nnhj fubnde ereftos, femicub.cum longos, hirtutos robB£»«., - ^ibos
mwrriaii ad fingula genicula exeunt, folia caukm ambiemia Pcnapliylli more, pauln-
lumij Jiirraa, fed divifura fcptemplici: Hores lutei, parvi, tetraperali: hoc illi folummodo
& t'einaphyllo minor! IITM ftip^{ra} explitato tamilmre inter Pentaphylla aut HentanfirvM
mna hujns cUffis. In hu^j.cauliculoobfervatnr aliqando adnatum tubercnWm f^o \o^o
rofum excrementum, concrezione pomorumquercinorum inlbr in r i ? , tUbc-
tur vermiculti feu teredines, hcxriUL^ummuftis aliisdSrum' n / ^ VT ftabuIann
niune, ut poVea clarius imiottfctet indedaftionc fingularum "irpibus est com-

TOCUS & TEMPUS.

1. Pentaphyllum f V? 9&5 W* »«*• mmamunfi re majore, nobis.
N Z 7 7 ^Cam.P^rk.7^ Chabr. Hoc prevail in plerisque Italia & Gi
NUontnJtshcis, circa fctrobium & agrorum mareLs • exit iero in Austria filvis ac ma
humnbuspratU. Quod flort tft candifo iA £ \$ ^ ^ Clufio. Floret Maio & Julu
funt hujus varietas minor, cujus folia quina aut feptena
i. Pentaphyllum canadense minus foliis saturatius virentibus floribus luteis & capsulis
joribus, nobis. Vel ex nominis prolatione indigitantur ipsius natales; floret ineunte astate, &
ejusdem exitum semina perfu.
n
llum feu Heptaphyllum albopallidum feu flore ochroleuco petalis fingulis cordatis,
dem reperitur cum primo, eademque anni * py* jworei tSr jeminu fi-mitcu a^

maturitatem.
4 Pentaphyfeira fm Heptaphyllum ma\m reElum ,/ L r,
• « « EyH. SitefiJplates monnumITrVh⁷¹ ^ Q&rffij* t*1*fi*
ref... floret junio, atque versus finem Augusti semer* fuum perficlt.

- **feeptaphyllftm minus reftum fubtwmcanm-flen** albo, nobh. Pintaphyllum ma)m flort; d!bo Eyft. Pmtaphllm fat Huinquefolium i. Cluf. Hift. is Pan. Pyovtmt nonmodo in coHeillo ncmorofofupr!Manderflorf, opidukm tepidarum aquarum fcaturiginetiabile, fedetwn i. tomntbws Uus mowofis fthis, qua "h Danubio procurrentes ad Alpcs ufque pertingunt, iff '« ficcioribm ft'wnpfjhtis, unoaburbe Vienna miliarin Moraviapraeterea, atquein•montibui ultra J)ravum amnem, & i? t Pannotiia interamni. floret Aprili iff Maio; ac fequentibus btenfib'us maturatur ejufdan fewer?, interdum deauo Autumno floret.
6. Hentaphyllum minus er'eStum hirfitumflort albo, nobis. Quinquetfolhtm minu* aherumflore albo, Cluf. Bift. is FTM Hcceruebat Car. Clufim inter faxai&fcoputos, fummis Aufriacarum <? Stiriacarum Alpistmjngk. Floret fub fimm Jumi? interdum Julio is Augufto, prout juga it hi ri^Jurms ait t fat us a nivibut funt liber a- ..
- 7- Peittiiphyllum minu* proatmbens flare luteo uulgare, radkulas ex Jitigulh genicu/h emittens, nobis. Fentaphyllm vulgatiffimum, Park. Promnit pafun in agr^ cantpis is^l hortis. Floret fub. initium <eflatis is- per totam fflatem durat; femina maturate nifi iin^ediatur nimia aviditate fefe propagandiradicibut fait, ex fingulisgenicuhs crtis.
8. Pencapliyllum minus incanum Alpinum fiore aureo radkulas exgemculism terrain demit tens, tiobts. Qtnquifdhn z. Cluf H'tft, is^l Pan. Crefdt hoc funiliter infumntk Aufriacarum Alpmm jngk qu* tamen berbofa funt. Floret fub Junii finem, in hortis eitiut.
9. Feiiraphyllnm mintx lanuginofuinflare htleo radkulas ex geniculs detmittens, nobis. QuittqusftiUi 4" 1" fyechs, Cluf. Hift. iff Pan. Nihil illo vulgat'uts, fecundum vias in tocis fiats iff mtdk Pannonice, Aufri* inferior**, Moravia iff BobmU. Florere hicipit ineunte proptmodum Vere, iff jub initium offiats ftmen perficit^ tardius in hortis noftris.
- 10, Pentaphyllum minus magis viHofumflare aureo folihaltiusferntis^nobk. Quinquefolu^^l. 2^{dj} fpecies, Cluf. Hift. iff Pan. Ibidem cum priore nafcitur, atque eodem ttmpore floret iff femina maturat.
11. Petitaphyllum reftum foliis profunde fefiis ac fubtus argenteis flore luteo^ .B. Chabr. Quinquefolium petntum ma'pt^Tab. Quittquefolium TormentiiU facie, Ger. In aggmhttsi* fecus arva, macro iff arenofo folo^ floret Maio iff Junto; Julio iff Augufloperficitur ejufdem femem.
12. Penraphyllnni minus wide flore aurco tetrapetalo radkulas in terrain exgenkulis demittens, nobis. Hoc provenit in agris, fecundo fapide ab urbe Oxcmo, propepagum dictum Cbwley iff prope Dtyrflleighb, iff Ouhiiil circumjt5isitikloeis.
13. PentapliySlum feu potitM Huftaphyllim flore aureo tetrapetalo radictuhtrofa, Tormentilla ditlum nobis; TpruientHh^ Maitb. Dod. ut. In colliculh fabuhfis is pratis eminentioribus berbofts tamen, fdivis iff opacK> non ran in apricis nafcitur, fedejft radix ac omnespanes tune minoresfunt. Floret <tfidteutp!urhnum, isr tonfiantr ^pttalis flos ejus aunws donatur, ex myriad: urn aut alma quintsnpepatisllsvufthflaeppinttr- Jdam N*;*sis libie conflit de dNaNlibas tynpou flonndi omnium bhrurn Petb dphylorum. Noinintt iin explidkiiombm ncnjaitur.

TEMPERAME-NTUM & VIRES.'

- 7- Pentaphyllum minus procumbeni vulgAre flare luteo radículas exgemculk emittens, nobis. Pmtaphyllum vulgatiffimum, Park- Hujus extrafumriteparatum in dyfenttr'ta commendatur. Pad'ix ex aceto deccfta cancro ulcerato exhibitur. Cmnerarim ait effeftcc* trnperatur*, quare tutingue, id eft int us iff extra corpori prodefi^ maxims contra omnes fluxiones. Herba Petit aphyllum coirn cum mdle is aqua ulcera oris fanat, g"igi^s medetur: trach'ie arteridi jcabritm gargari^tu is collutione luevigat: coSia in aceto ulcera ferpentia tohibet^fiflularum inquit Tragw iff cancri, aliaque manantia & putrid* ulcera fanat i'Alviproffuviis^ dyfnt^TM^ inteflinorum laffui, jgni facro is vu-lneribut, remeditm convenient eft.
4. Pencaphyllum inajus rekttm rubrumpalufire, nobis. Quinquefulium palufre, Cam. UujHsradic deco&um dentium doldres in ore dtentum mitigat: putrefcentia oris ulcera fflit: ad "tonfillarum iff aſper* arteri* inflammattones conducit: contra alvi profluvia iff dyfenterias auxiliatur. Coila cum aceto radix berpetas cobibet^ frumas difcutit, edemata iff aneurifmata. rcpmit, Foliorum fuccum aliquot diehws continuis epotum morbitmait Vioſcor'ides fanare re~g'un.- folia vero cum hydromel'ite aut dihttovino ac exiguo pipere contra fybrium circuit us bi-bi tradideruntfliditm, quodvanitate non caret.
- *3- Pentaphyllum aut potittsHeptapbjllum flore aureo tetrafetalo^ Tormenrith nobis ViBum.

Tormentilk vulgtriS, F^ Rd* Iwiff tft p t m n j, t m | S, <ST«OTUBI fjm Mil jMI

"nis numero, iff partirim tenuium: caliditatis quam minimum tenet, aflringmtis facuti .r
 ticeps % pttfal ad eadem omnia qua Quinqueplii feu Pentaphylli radi^c; fed is eadem
 t>r aflat, Adverfus peflikntes morbos magni efi uftti^ fortiter enim pptredini adver-
 fat. 'dores movet; additur idcirco antidotis is compofitionibm ebfatentibm: fan-
 guint. tque erupiomis eadem fupprimit. J)eco&um radices, aut arid* puhhs cum con-
 vni^enu tyiioerepropinatutidempotest. Sifti vtrois radix fuperfluentiamulkbria profluvia
 non modo intra fumpta^fed is forts, Jive inbalmo, aut alio quovis adbibito modo. ' Vn-
 triculum bumore madentem roborat atque reficcat: adverfue alvi fiuores is dyfenteri&uti-
 I'u efi. Datur is ruptis ex alto dilapfis, qiiibus efi fufyic'io ahqua internum ahquod vifcu^
 hpfum effe. De Pentaphyllofdiquofo ProJf. Alvim alibi d/cetur cum a fine ul'
 pert'mtat ad boc genu^ ut clariu'sinfra palebit in Halkcinationibut.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

P^ J2rf. rel, z.pla, vi>. Qmquefolium Lupin?
 fi}lio,C.B.P.Pmtap!>yHi>n&tp,4s<pv>i.,jThal. Nan
 rjl Pmtapfyllon fenupetalon, nee i fiort, nccaca-
 fittW feminaU arxvdadsaxxmsu fufyqparan hialfo d h h i
 vnbus pa*, S9 de Lupime, nee fji Lupinas peregrin-
 nus Pentaphyll, C&P.png.itf. col. 2.f>i.v.%ut
 Lupinas Analiatis fgo P Pentaphyllon peregrinum Pt >-
 n* Itaf. jicut dare fatii de emmuspag. Sif fjiilt-
 ria bajusvojtrxttkerfalis; ergo eumm fit Out*.
 quefoljum pmtapetahi^Lupim folio, nee Luptmu
 male pro ahtruro pentar, atqus bis teptitlur pri-
 mo pro \$««;«/•&•, fimndo pro Lupino, idea Up.
 fa *fi C,p. Baubinm. jfy, ac<mfPrmittate cum
 fa *fi C,p. Baubinm. jfy, ac<mfPrmittate cum
 forum, turn capfultTum fiminalium (i fimvmmcum
 Tarraraira GcQrgiiMarcgravi, &Tnfoho Lrfta

nico fiore purpneo Jtiii/jua tonga Par%. in jfpp- &
 trts plantiadidemgenusTedutrm-M, fic-tiilhc *n-
 ntimus. VidePrttud.Botan.iwfir.p< *£.4°9-,
 Pag.i26.eoL i. pi. in. TermntilloAlpmAfQUa
 fiTheo,G.B.P. Heptapfyllon, Oaf. Hijf.\& H'W-
 Binquefolium Alpinum, Tab. Pentapfyllnm argen-
 twm, J*!- Cum h«c plaita ttmbat /UJS part tins,
 ejsntialibus fiore & Jemine, imofohorumampifiti-
 ont.aecedst jihhimillc, r1Bc conclude cum daAtji-
 mo'Fab. Columns fffe jflcl/imtitaf>&prapterea in-
 ter fua forth Alihimihit fpeaetfutte colfacandam,
 vmanitm inter PmtapMla Heptaphylliave s p«
 -JormentillaaCajpareBaiiinne,?iei PeiUapbyitamHe-
 ptaphyllfamve *b aiiit authorihus dtaminari debuit,
 fed Ahhimill*.

§ : 4 - PENTAPHYLLOIDE

Pentaphylloides fie diftum Johanni Bauhino & nobis, I^ aptius mea fententia quam
 ceteris authoribusante nos icribentibus, qui Fentaphylli aut Quinquefolii nomen ma-
 ie adaptant hifce fCQUe ntu> ntis, cum tolia ^aina Fenniphylli aut Qginquetoln in uimm
 concurranc centrum, ped. icct f ummitatem, atque tolia in hilce numero mcerto colic
 jntdii plnra e regione adh> C, uno majore extremam claudente; cum i fine ultimo Ho-
 res producant pentapuculos, capfnlas feminales, & femina, Fentaphyllorum ant Heptaphyll-
 rum more, iifdem fubjungentur peragratho diftinfto hoc 4.

Pars TABULJE XX.

(1. Albofoliis alatis is birfutis, nobis. Pentaphylloides
 Majus ereffumjFlore < ereffumj. B. Cbabr. 0
 (; C 2. Luteo terk foliis pragma infiar birfutis, nobis. £
 j"3. Geratii Cupini inflar-pobis. Pentapbyllumfu
 Pentaphylloides Minosf"pit"tm\ fonts_a^at& j P'numPolentilUfacie,Cluf Hifi. ©
 feu frocumbtas 1 14- Argefiteis is ferrath'Hon luteo7, nobis. AT-
 I gentina, Dod. ut. Lob. Ger. 0
 [5. Maximum re&utm fruticofum Eboracenze^ nobis. ©

Explicauo part is Tab, vigefim*.

1. PEntapbylkids majus ereffum florealbo, folijs a^atis & hifutis, nobis Pencaphylloides
 crefium, J. B. Chabr. QumQuefoliumn-agiferum,C B. F. Quinqueblinni fragiftrum
 5-tluf.riiit Quinquetoliumira^erum6.Tab. Pentaphyllum frapftmm»Oer. Park.
 Hoc radice pr^ditum clt crafliufcula, lignola, conice laOiratiaa rubente refta, ftrenac £•
 I ftrin-

fttingenre, ex*aua pediculi pliirimi prodeutic palmares, quibus aneftuntfrtma, q
folia, binatim **fti** conjugatim e regions difpofita, hiriuta, iexrata, Fiagaris quoad hi
 fccoiifitmiam/oliorum xmulu, longerameii minora, cofta excrcmimi clamliriuiv
 um impar, ci^risdupioniajtis: w«* folia/hxc fie confrufta & per terrain ftr • ->na
 Intur cubitoaltifcr, liirfucus, CUI fuperius in aliquot ramufculosdivaiicarur amge
 nicul^narcentur n ua torria, aur terna tolia rminor, hifura& ferrata **kidsaj**, qvu .dmodum
 interidra; fcmis ramtiiculorm cimis innafantur flores pentajpetali, fatis ampli,;i]bi, in
 tiuoru/n mtdio proveniant plarima (fcaminula lutea, quemadmodum videretit in ca-"terisuf
 ^"tttjjuibw fariicentibus fuccedunc in capfulis contormibus cacteris fax claffis molta lomi
 .igentia ftul>m nucricivum, inclnfafubje^is iadiatim 5. foliolis viridantibas, liir
 concinft>t capiculm ieminibits aiidis, ruttis, oblongis plenum, & pulpa humida
 vacuum. In hornscuitis folia multo funtmajora, quaterna, quina, imguisf^diculisaut co
 ftis annexa, Pafinacs latifoliae aliquacenus familia, atque iil*r hxc majora incercdant mi
 naca qai-dam tolli vtluti in Agrimoma. •

z.*PenttytyUoides* majus ercftuni Hore lateo ^rnis foltis Fragiiria: inftar Mrfutis, nobis.
 A numero,iku 5c co«cwsa foliorum, fub inicitim, duni folia per terram itrata geric,Frugariani
 pert-efam qui^s dicret, fed poilquam caules Twos pedaled & fcfquipedales emiferir liirfo
 tos Si lignoibs, in quorum fummo iaftigio proveniunt flofculi pentapetati lutei, capfulas fe
 jninalasflf femina malta (ubrufta ibidem contnta, pulpa humida vef-a orbara, port fe **relio**
 quences, quibus feft maniftat accedere Pentaphyllo a fine ultimo, a foliis vero Fragariae;
 ideo denomimbitur Pencaphylloides majus reftum flore luteoternis foliis, Fragariae iiftar hir
 iutis, fumendo genus a nobiliore parte, icilicet flore, capfula feminali & femine, fed terna folia
 Fragariae fpeciendeterminarent.

•*fmafbylloidti*^ minus fupimm feu procumbensfoliis alatis Geranii fupini inftar, nobis.
 Tentaphyllumfupium Tormentilla!facie,Lob.IconXugd.PentaphyllumPoteinllaeiacie,Cluf.
 Hiit. & Pan. Gcr. Park. Qmnefolium fupinum fragiferum repens, Tab. Quinquetolio fra
 gifero aflini'SjC li. P. Pentaphylloides fupinum,J. B.Chaur. Quinquerolium 5. fcrpens,Dod.
 Folia pluiima pediculi^ feu coftismediis longis, ex radice craffiufcnla, longa, multorum
 car>irirm,anefunturconJBgatim ieu binacim ex oppofico, fingula ferrata ad Geranii fu
 cntia; caules palriai-es inanes, numeroft, gerunt flores parvos, luceos, pen
 jgis fatis pediculisorcos, quoram fingulis deciduis fuccedmit capiniia parva,
 continetia (, rctiquoruinminorumQuinquet'oliorimmorej femina mulca exilia, fofca, fic
 ca feu finepulpii.

4. *Pentapbylhides* minus fupinum fei protumbensfoliis alatisargenteis & ferratis floie
 luteo, nobis. Potentilla, Bruafi Match. Fuch. Cæf. Lugd. (cai ^ "rgentina filvltiis) Calt.
 Thai. Park, Potentilla feu Argentina,]. B.Chabr. Argenti .ut.Ad.Lob.Gcr. Anfc
 rna,Trag. Tab. Tanacetum agrefte, Brun". Exradlce palmar: **giore**, tenui, fubaftriiigen
 ti, folia promitpinnata, tnajAra, Agrimoniae ritu (interccdentibus minoribus foliis incerin
 terftitia majorum) in ambitu (rrara, fuperne glabra, argentea_T inferne hifutie candicance
 vefica, folia inquam ficciore& aftringentiore fapore, quam radix, pnedita firm; caillicul'o?"
 nudos fpargit, qui more Fragariac radicanr in rrram defixi, alios pediculos breves iuterloli
 ola attollit, finiplices, quibus flores infident pentapetali Pentaphylli more, Jutei; frn
 ftu,3 etiam Pentaph^lii **rVofui** fimilis. Anferinam vocant Germani, quod hac anlres in ci
 '00 deicftentur. Hue, illuc protenditur reptatu viticulorum, quemadmodum Fragaria & Pen
 taphylla quædam.

•*Pentaphylloides* reftum fruticofum Eboracense, nobis. Caules protrudit hie fubfrucex
)ipedales & aliquando altiores, lignofos, corticc coloris ad fufcedinem vergentis donatos,
 qui corticem exteriorcm pelliculamve fingulis artnis exuunc, adeo ut plures cuticulas lacini
 atim adhatrentes, eodem tempore aeftivali fcilicet confpicias; hi rur(iis in plures ramos fur
 fum verfus dividuntur, in quorum cimis finguli ant bini aliquando rerni producuntur flores
 pentapetali, lutei, Argentinseflorum, turn quoad figuram, tum quoad colorem a:muli; qui
 bus fingulis deciduis fuccedunc fingula capitula, granulatim ex aridis (eminibus contiaca,
 Riorum Pentaphyllorum&Hepraphyllorum riorum more: atqueex fingulisgeniculis **nanca**
 dextra, nunc a finiftra exeuntpedicali nnciales, fufinentesfbliadiverfimodi cdnfrufta, qua
 r uor vulgo in inferiore pediculi parte concurrentia in idem centrum, nunc terna, aliquan
 <lo bina^x^ppo/itocingentia pediculi inferiorem partem, atque in extremitate pediculi fur
 iim verfufternafolia junguntHrfimulconcurrentia, fuperne viridia,paululum rugofa, infer

nèxincanā lanugine pubefoentia, totaligna fubftantia guftus eft fubdulcis ; v adix etiam lig-
 nea fibris undique fcatet; fiores inquam funt lutei, pentapetali, Argentin[^] florum omnino
 aemu^s citoevanidi & rarius difpofiti, novis tamen indies (fatifcentibus) Wimis) (ucce-
 fcentib[^]is, quorum lingulis calyx fubftituitur Pentaphyllum more, ex qui[^]jue toliis acu-
 minatis l[^]u mucronaxis, lanuginofis, rudimentum feminis poll decidua ftaiinu^{la} (prout in
 Pentaphy^{Hi} aut Heptaphylli[^]fpeciebus) granulatim in fe continentibus. Reperitur ad ripam
 meridionalem fluvii Tees in/ra vicum Thorp di&um, aliifque variislocis, nee migus frequent
 ter infra coenobium Athelftani vulgo Egleftone-Abbey in agro Eboracenfi. Hanc plantam fa-
 tJS r2r2ff?/?&l>/Sf{7/afffflj&f% fjrsgm &toLawton, Thopphentaru/n In j'JJ/s regi-
 ombus feptentrionibus provenientium indagator diUgcntmnus; atque ejufdem pizntx
 ramu/os aliquot exficcat Tad nos att n lit Th o ^ ^ c. U. Wcom abhmc anms, durn nob:,
 bferviebat. Hachora quahxc e[^]aramus& prdocommittimus, floreteadem horto Botamco
 pubVco U m v c t o . LOCUS & . TBMPUS.

- 1. Pentaphylloides erectum > J. B. Chabr. Nafcitur in Leytenberg lock' umbrofis[^] in media filpti
 fupra Mmderftorf fit a, quo loco duntaxat aliquot abhinc annk Clufius obfervaverat. Nafcitur
 eodeKjefto in pannonianon modo in filvk exduis FannonU fed etiam ingramineis campis. Flo-
 ret Maio; fe?nina paulo feriwntaturefcunteffiuuntque. Supra Paterftorf etiam in filvis ficundo
 fere à Vienna urbe miliari obfervabatur.
- 2. Pentaphylloidejs majut reflum fiore luteo ternis foliis FragarU inftar birfutis, nobis. Semina
 hujut nobis fuere communicata ex Virginia aut Cannada, fed ubi fpeciatimproveniat nobis non-
 dum innotuit. Floret dfiate ineunte; atque eadem finientt maturantur femina.
- 3. Pentaphylloides fupinum feu procumbens foliis alatis Geranii fupini inftar, nobis. Penta-
 phyllum fupinum TormentilU facie. Lob. Icon. Lugd. Pentaphyllum PotentilU facie, Cluf. Hift.
 4*r Pan. Frequens reperit in agro Viennenfi Carolm Clufius, in extremis pratorum marginibus
 isr fecundum filvas in Silefia loch montium gramineis. Nos prope BUfas primo ab urbe la-
 pide, ad or am filv<z BUfenfis, paffim in margineftagni difti L'eftang, de pifeau. Floret deflate
 atque verfus ejufdemfinem, ftagnopr* calore <eftus multum extccato, illic femina maturacol-
 legimus quaternis abhinc luftis.
- 4. Pentaphylloides minus fupinum feu procumbens foliis alatis, argenteis isr fen Ji[^] flore'tu-
 teo, nobk. Potentilla, Maith. Fuch. Argentina, Vod. ut. Ad. Lob. Ger. Anfer'ma Tragi, Tab.
 Paffim reperitur in humidis is circa loca aquofa, in pratis humidis potiffimum juxtā flumina,
 quorum nulla amantior frequentiorque alumna. JEftate dum floret colligi debet: Propter nimi-
 am aviditatem fefepropagandi radiculis novellis, ex geniculis caulium demifis in terram, raw
 femina fua perficit. De ^ninibu^ diverforum authorum (hifce fupraditlh assignatis) fa*
 tps isf fufficienter in fmguds explicationibus" diximus:
- 5. Hujus nat ales fup a patent in explication ipfius plant*.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

- *. Pentaphylloides ereclum[^] l. B. Chabr. Herba, radix iyfemen cum hujut turn reliquorum hum
 TabuUy ficcandi ac aftringendi vim obtinent.
- 4. Pentaphylloides Argentina, Potent ilia feu Anfer'ma. Cum folia ejt[^]ist radix Cinquiti?*<
 chfiutj aftringant, temperamento à Pentaphyllo nihil differre uidetur; quart radix tertio or dine
 deficcata, minimunque caliditatis habet: fanguinem undequaque ekuentem reprimat • menfts
 m[^]lierum fifth; H*moptoicis acVyfentericis utilis; valet <? ad alias alvi fiuxiones, quo-
 cunque tandem adhibeatur modo; pulvis andxabrafa, intertritigines ztiam tumentorum in-
 fterfmjanat: prodeft iff hoc modo cruentis vulneribus. decoctum ex aqua mobiles denies fir-
 mat, is gangrenarum acorn ulceribus conduit, fc, cum Quinquefolii temperament urn habeaU
 T T m f^aCuk Tr ntim f. a TM cefl* & Er Z^o ad omia TM kt, ad qu* Quinquefolium ex Vt-
 ofeonde. Aqua Anferina dicitur in rubeis oculis utilis. Eft filpitia ad eandem ad e[^]im
 ponatur, haec ranoematus aqua pulvere generose, fufione fufione loco fel de diutu Hujus
 ftdlatmam aquam ad lentigenes omnes, maculas, fufcumque colorem fole contratum delendum
 AngU muhercuU adhibent - Si in aceto decoquatur Anferina firiatur commotos ac mobiles
 r TN r j^{quc} gl ng V^{ri} T am p^o Ce atUr, r*, r* fof fape oblitatur dentium dolores mf
 f... -- Ur r j^{quc} gl ng V^{ri} T am p^o Ce atUr, r*, r* fof fape oblitatur dentium dolores mf
 refitmt: JdmuU Uerwifain emnjLtilm. ' Omnes
 fpecies

Species Pentaphylli iff *Heptaphylli*, imo *Torment illa*, *Argentina*, & *ft qua alii hv'jm faring de-
tegantnr specifs eandem poffidentes notam tjientiakm, id ejifierempentapetalum, cu'ifuccechtnt
granulatim-f'jtrimafemina, finepulpa humida, [we arida in capfulis, ex quinque foliolv cut
flurihws vmmibus conflatis, ufdemq; gnudent vifibus, five folia habeant ttrna^ quin^feti*, isr
utplurimumjptena, aliquando in quibusdam tiovena, a fine ultimo eodtm dtbmt/nvocan I-
tidem atque fimul 'ocari, M*^l obfl^{ar}ie ^nnta divtrfitatt nomhinn a dherfis authoxibts iifdem
ajfignatorum.*

P E N T A P H Y L L I S

AFFINES, PES LEONIS, five ALCHIMILLA.

C A < P V T XVII. .

PEs leonis a forma foliorum: vulva Alchimilla, giW Akhimiflarumpr<xconn\$cfh. Nota' genenca convetiens AlchimillEeftiaec_T folium habetquafi Malvxin ocu novem angulos obtufos feu pticas divifum, Hofculi funt herbidi, umbellatim eonggrV • • multispetalis&ftaminulis herbaceis conflati, quibus fuccedunt capfuto; continentes mult; femina mimita, lutea^papaverinoferniniirtilia.

i. A *Lcbimilh* perennis vkidis major foliis exlnteo virentibus, nobis. Alcliimilk, XJL Trag. Dod. ut. Ad. Lob. Tab. Ger. Eyft. Alcliimilla vulgaris, Cluf. Hift. Cam. Hat. Alchimilla major vulgaris, Park. Pes leonis five Alchimilla, J. B. Chabr, *Stellaria*, *Mattri*. Lugd. Caft. *Leontopodium*, Brunf. Drofera & Drofium, *A<>« à rore foliis infidente. Cord, m Hift. Prior hic&.major Alchimilla exradice minimi digki magnitudine, aut pollicari craffitidine plurimis fibris donata, ftrenue astringente ac deficcante provenit: caules fi> i gunt aliquot tenues, teretes, hirtuti, ramofi, dodrantaes & pedales, quibus infichint flo- --rbacei, umbellatim congefci, quorum finguli oftonis confiant petalis maioribas, to IUS, akernatim pofitis, in quorummedio apiculi lutei: femin minutum, ta- u^ papaverinofimile: folia alia majoraftatim a radice oriuntur, longis pediculis, iefquipaiu/iribus, hirtutis; alia minoracauli pediculo brevi aut nullo adherent, interc que folii continuate reliquo pediculum ambiunt, utabeoperrbrentur, cfterum folio MaF- va; Alchimilla major accedit, folium inquam ex luteo virefcens, infva hirtutum, in ofto aut noveii angulos obtufos feu plicas divifum habet, fingulis netvis a pediculo prodeuntibus in fingplos angulos, concinne in ambitu crenatos.

2. *Alchimilla* perennis viridis minor, nobis. Hseo vulgari fuperiori majori in omnibus ac- cedit nifi partium parvicate_T eft enim triplo rtiajore in omnibus minor.

3. *Alchimilla* perennis incana, argenteafeulaicea fatinum provocans, nobis, Alchimi.!!#. genus alterum, Cxf, *Pentaphyllum* (eu potius *Heptaphyllum* argenteum flore mufcofu, J. B. Chabr. *Tormentfla Alpina* folio fericeo, C. B. P. Cateri omnes authores prxter Cifalpi- num appellando hanc plantam aut *Pentaphyllum* aut *Heptaphyllum* auc *Tormentillam* male «omina fua eidem adaptarunt. Vide *Hallucinationesparagraphi* precedentis de *Pentephylo*; bi reprehenditur Cafp. Baulinus quod perperam collocaverit cum *Tormentilla*, & authores eliqui quod male norhinaverint *Pentaphyllum* aut *Heptaphyllum*.

4. *Alchimilla* annua minima hirtuta foliis inferne albicantibus, nobis. *Alchimilla* mim- ma montana, Col. *Percepier Anglorum* feu *Polygonum Selinoides*, Park. *Percepier Aaglo- rum Lobelii*, Ger. *Chsrophyllb* nonnihil fimilis, C. B. P. Hie parvula *Alchimilla*: fpeges annua eft, ad fumum femipedalis longitudinis, ab radice minima flavicante fibrillis parum divifa: cauliculi eifunt plures rotundi, tenues admodum, hirtuti, parum rubentes ali- quando, verfus terram reclinati: folia ima pufilla, akernatim difpon'ta&cauliadhxv^nm, hirtuta, virididilutiore colore, inferne albidrora, tripartita, Ameos vel extremi Api foliis primis familia. *Alchimilla*: five *Stellariae* majori congener Sf affiniseft plnnta, fotiorumalis, utricuhs, & feminibus ibidem contentis, fimilis; folliculi feu utriculi inter folionim& cauiis finus coacervati, ut in tateris antediftis.

LO GUS & TEMPUS.

1. Alchimilla major vulgaris, Park > Leontofodium, Brunf. Collium is¹ montium Mmans est, imo defaudit ad prat a, in quibus feliciter provenit. % Maioi* r Junio {flores emicaiii herbidi, cum apicibus Juteis; Julio is? Augusto perficiuntur femina.
2. Alchimilla perennis viridk minor provenit in montium loch humidioribm % floret i&feminaperficit eadem tempestate anni cum majore.
3. Alchimilla perennis incana argentea feu fericea fatinum provocans^ nobis. Akhimit* genus aherum, Caf. In celtoribus montium jugis, gehdifquecflutibus-occurrit^ quales sunt Sabaudicein Auftensivalle, yi monte Fesperon ditto in Galha Narbonen[i, in montibue etiam Geñeva- vicinis. floret Maio & Junio; ac Julio is? Augusto femina maturantur.
4. Alchimilla annua minima hirfuta fotos inferne albicantibus, nobis, Alchimilla minima montana, Col. Percepier Anglorum, Lob. Ger. Provenit pajfimin arvis fabulofts, glareofts, imo in pratis iff novalibu*. Falius Columna in pratiſ Vahenfium reperit. Floret ineunte Junio isr subfinemjulii matura confpiciuntur femina poſt exficcationem totius Plant*. De nominibu6 fatiſ luculenter ditlum in explication fingularumfupra, idcirco nilinfuper hie addemu*.

T E M P E R A M E N T U M & V I R E S.

Folia & radix AlchimiU majoris adſtrictionem vehementem participant, exficcant mim: aptif- fima vulneribus glutinandis, vulnera eju* decocto utiliter lavantur, linteum in eo madefactum comode Mis imponitur. Muherum mammas impenſe laxas, linteum ejuſdem decocto intinclum ivimpoſitum duras folidaſque efficit. Vecottum ejuſdem epotum inter anea vulnera rupturaſ- que ilutinat, isr quod diſtum mirumeſt^ tota ejuſplant* in glutinando vis eſt, utramicesin- teſtiñorwn, inpueris potiffimumjanare poſſit. rherba ipſa & radix in vulnerarih potionibus adjungunturpulveribus emplaſticis is- unguentis, feſtit alba mulierum profluvia, facitque ad conceptionem, fuperfluas humiditates exficcando. Datur ejus pulvis ex vino aut jure cochle- ark menſura, 15, aut 20. diebus, mulieribus quibus adempta concipiendi faculty animia u- teri humiditate, ob quam injeſtumfemen contineri non poteſt.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authortim.

Alchimilla minima montana, Col. Percepier An- (Ger. eſt Alechimilla a flore & femine, ergo Percepier glorum, Lob. Ger. Cheerophyllo nonnihil (imilis, A. nglorum L. ob. Ger. Chterophyllo nihilſimilis totius* C. B. P. pag. 3?2. col. 2. pi. 111. Grctyier Lapſtis eſt hie Cajparus Bauhinus, cum Cheerophyium fit umbel- Specimen noſtrum umbellififarum pap* fig* de ff phyllo, ibi diſſuſe fatiſ bam HaUucinationtmdZ ximus. n acauu

E P I M E D I U M .

Epimedium Dioſcoridi l. 4. c. 19. cauſis eſt non magnus, Hederæ foliis denis aut duodenis, neque ſe- men, neque flores proferens: radicibus tenuibus, nigris, gravis odoris, gactu inſpido. Idem habet Plinius l. 27. c. 9. ubi aliqui Epimedium, alii Epimedium legunt: quibuſdam Epipetron e- juſdem lib. 21. c. 15. de quo nil niſi quod nunquam floreat, imitatus Iſempraſium 7. Hiſt. 8. cui Epimetrum penitus flore caret.

Epimedium eſt planta tetrapetala filiquoſa ternis, noi-in* ^ r ^ r < - f l r loncis vedi- culiſpendentibus, donata, Heder^ mulis, ipinulis^ E ^ ? . . . ? . . . petaliſ cruciatim diſpoſitiſ, luteopallidiſ, conflatu ^ ^ ^ ^ t Ucin ^ S : florem fert, ex quatuor talis atropurpleiſ, paulo minoribuſ iſſe ^ ^ ^ ^ immediate jn f ^ < < n t totidem pe- daleſ, atque hiſce notiſ ab omnibuſ filiquiſ, quibuſ ſuccedone filiquæ tenues, un- iloriſ, qui duplex confpicitur unus alteri fub ftra ^ 1 1 3 ^ 1 1 6 0 1 1 1 ^ ^ ^ p n m o i n c a i t a

Epimedium inter eaſ ſtirpeſ quæ lociſ exeunt r ^ 1 . . . 1 1 . bus Dioiconde & Plinio in humidis nafcitur • Juuſ ^ l ^ num ^ r andum, quod authon- terniſ & ter terniſ, pluribuſ aliquando m J i : , eſt hu L c h a u d magnuſ, Hederx fobis

l muitiſ aculeiſ quaſi in margine cinctiſ, neque iio- rem

rem, neque fi uſhim ferens, ut ait Flinius imitatus Theophrastam. Radic; est tenui, nigra, gravid odoris: t'pres **fertin** fummocaulisplpres, (eminncialibusJediculisinnixos, qaicon-
 ibnter exquatuyir petalis, cruciarimdiipofiris, Jutrecpallidis, constant, quibus immediate
 fubftrnuiiturtiJtidem atropurpurei, prasditislutcpallidisminores, quibus, tam supra quam
 infra fitis, fatikfntibusfuccedunt *filiq*ux tenues^unciafes, an bivalves (quod maStime fu-
 fpicamur) cum feptp mediodirimente dupliccm feiieem {eminam, aliarum plaiitaium te-
 trapLtarum more; an fine fepto medio, lit **ceroiſiac** in Chelid^nio majore 6f Fumaria Cana-
 denſi fempervireiiti Cornuti, hucuiqae obtervare non potuimus: folia, inquam, hujus funt
 ampla, terna, ter terna, longis **pedicolis** inntrentia, funtque Hederae foliorum figura, lataed
 bafin, verſus mucronem acuminata, duriufcula, & dilutius virentla, ac per circumferenciam.
 profundius (errata, &quafi in tot adjeoſ deiineatia: iicr kre iolia ex genieulis caulium
 exfiugit pediculus teres^ac pal^aiis, raro **folia ſuLi** fuperaiis, pcvqu;flr elegantes proglnens
 fiofculps tetrapctalaſj ititegros verſus fund urn, cxeiiu,s quadtipartitos, flaveſcentes; inverla
 partetoticlſm diviſionilms, quatuor fcilicet, oritur Hofculus obfeure ruber aut **atroparpa-**
 reuſjſtriiſ reſtis, cand idie, **diſpgrrcntibua**, variegatua: radix raulcas in obliquum propagines
 emittit fibris inferiu? dcmlifis; eſt teiuis,nigia, gravis odoiU- Dicitur Epimedium ab omni-
 bus authoribus, foli Aiiguilari-Lunariaquorundiim **nominatur.**

LOCUS & TEMPUS.

*Nafcitur inhumUisprifqueBtfbemiflock, iff inpratis circa BonoaiamisrVincentidm. Cafalpino
 didturplants in LiguriitinontibusTovemens. Floret Aprih iff Maio; filiquasprofirentanfub
 finw Mail obſervavimus inbortopuhiico Univerſitatis: antequamfiliquas ad maturitaiemper-
 ducentpoluerit^ iota plant a carpta iff abhia a mak feriatofthdtjlho, qui mirs puichritudine
 floris dupUcali alleſtus carpfſt, ut libra[UQ cbartatzo plantarum rxjkhtarum infereret.*

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Author am.

D bfl oridtt primo (qutmſiquantur emnet pene
 authors) tiffnt Epimeiham neque floret, nc-
 nutſi - hacſaffumrtperimus, inhacla:-
 ta **ſlirts** (kpiut, jilijitua raritit obſervavimtis, at
 in hv-mhh ii umhtp's fatis felhitirfrn'dificat in-
 aucttV&e, nonthminihntis, prapueſin o>ri-
 to l'orti h:9C0iijtratar. N>n poſſum fatis tmirart
 fatilitatm tot docſartimliomiimni, qui nimia creda-
 iitate dudi, ex autoritate Theophracij, D/ojcari-
 dts a l'hnii abnuuut poſieris pltrmla Mrvdwa,
 rittem ret examinant. Ueſtorides primo
 (quem ſtqsvtifunt pturimi viridoUiin Bſtatiſcif)
 attrbu.it Mid **ſſiaſw** caule, ſine fare, ſneſra-
 tin; & ejuſdem author iiate Cr/a/pi/ms capiiartbus
 pluitif (id tj) Fijici , J'o,tyl'Otia, Capillo vero Fine-
 ra, idianto, Polytricbp, JUx murtrix, **Seplapn-**
 Lirtgw Cerviwt) denegat flons SS ft mum,
 tmijicf CHilibujexamLnaini, emaes Ca-piL
 «/ ia confeqſietteſJrminapiUvifculitmjnr
 iu dorſo pinnriim jerre , vtqſc flit Jimi(es ex Je-
 vttteſtroditcere, I'ti comprobittum ex ſalione iUias
 -putviſcit.lt cetlett ex dprſo Lingua Cervins in Har-
 JO Botaiiwpublto Univerſitatis bieimio abhnic a
 ſaiho Baktr. • Ert^B non obſfante decreto veterum
 & **aſſenſv tteoterorumHotanicoTum**, ipſu mardiais
 Jille rat innF, true eaptn, "ita^adh/treiiititum^caitcludir
 armies {lores ferret femina, t^xqui-

bus piopagantur: ſi tempore florendi microſcopium
 adhibeatur, jhſcult rniijitijimi, & peſl Dataminim.
 (xatium Jimina pulvijculi tnjar, dare apparebant.
 aptmedium c^m flarem ſkta vijibiUmJSpropttr con-
 ttxum r arum & mirmidttm, gerat JStato, & ſihquam
 Jemitincialcm in ſe cantinentcm femina, noh ei de-
 tiegandifaut flaret, nee femina, prapter autharilatcm
 vlturumpnt aſſenſttm neottricornm Botanicorum; Jed
 tetitnt, examintnt S prohtnt Botanici carioj! M-
 Sa eayi vetermKtxm neotericornm-; u'ji biſliucinati
 favt, (ſrrigantar turn, tilt, turn hi, ne pejeri in iif-
 dempericittentur JeQpitlii, ſequendoipſorum ſcripta
 *jtHtdeb'ta cxaminatienererumipſarum.

Not* £j>imedtum dnobis inndvnunctr in hoc to->
 ca ſwlptum ſviſle : mm jit plants ſtiqmſa tetrnpe-
 Sah, pert met ad jiliguofai ret rſipcta la t pla ntas ex-
 plicandm in Seſinne frquenti trtia, Inſiper &
 tattddum nas Fentatohyllum ſex ſkxapbylltm- &
 Pent ſhyUoides ſubjuixiſſt Trzſvlio frogiſtra ſeu
Fraxin propter a/tiformtUitem in fioribus a ſhni-
 nilius i item a AhhimiUampropter folia pliiri>na, in
 idem centrum concurſentia, ſubjiituumms Pentaphyl-
 h ſeuHeptaphyUv. Quica/ique pnediUat omnes in-
 trplai'tat, quarum fiori&us ſmgtilit ſucceditiit pſa-
 rima ſviinn, a nabit undecima SeBione collocandat
 di/po/kerit, fortajſc mſlias eajdem **ſc i.**

A P P E N D I X

A D

L E G U M I N A.

C A T V <f XVIII.

V I C I A.

1. T T Icia filvatica maxima Pifo filveftri familis, T.B.Chabr. Omnium Viciarum quotquot V haftenus vider* Herat, maxima est haec, multorum cubitorum; foliis ad Vicii septum accedentibus, multo majoribus, & Pifo ilveftri respondentibus, fequencialibus unciam latus, modice obtusis: ~~est long~~ ~~purpurafcentes, extremum occupant, sub-~~ ~~sequentibus filiqnis pari cum Piforum ms nicudoc com~~ ~~preffioribus, latis dabis. radix~~ ~~crassa, nodigintercepta, reptatrix, perennis, caulim complurium propagine fertis.~~ Vicia hxc filvatica olim i Johanne Bauhino reperta circa Tigurum, & postea eandem reperit copfse circa fontem admirabilem Bollenfem, flore & filiquis prxgnantem mense Augusto, & inter ^//& Bafileam cum filiquis, mense Novembri.

2. Vid e parvum genu s foliolo long o d h G b talem M onspelio allatam dedit ramum Calparus Bauhianus angulotom, foliis alatis, costa in ea pepo s facefcente, onuftum r singularia folia fequencia Ha, graminea, -vn:culmum lata, in acumen definentia: flofculi longo furculo peculiari hasrentmulti, oblongi, (cujuscoloris non fit mentio a Johanne Bauhino) > quns fequuntur filiqu*. Cracc^ filiquis minores, nonnihil iongiore, longis pediculis innix*. R? witcantur ad Viciae .ciaflem pag. 60. Hift. noftrae Univerfalif.

Herba viva feu fentiens vel Mimofa foliis alatis caule fine impare extremum cof:2e claudente.

I Nter miranda Dei dona vegetabilibus conceffa, quae sunt innumera, nullum mirabilis con- S n T i i h T a n * f c f e o f f v t p a n d m i m o r ^ q u ^ f e n t i e n s f e u f e n f i t i v a d i c i t u r ; q u M h u - jus plants leguminof* vteymafa f, alatae foliola cofx mediae^rentia; qux plurima funt ex aaverlo annexa, kvi taftu, quafi fenfu arleaa, tu^iunt rcm tangentem, atque quadam veluti averiatione illicofefecomprimunt, & quafi ex inftahfe complicando aftutum conjunguntur aut pediculum coftamve, cui anwftuntur, una cum ipfis demittendo verfus terram inlir u, mentum tangehs higere conantur, unde planta mimofa viva feu fenfitivaauthoribusdicatur. Hujus non ita pndem pluninae fuere fpeciesdiverfx deteftse auarm T^^o ui i • l e l c u r i

Nota igitur generica plants mimofe feu fenfitivs est, quo d fif herba filiquifera bivalvis tim hinc inde e regione cofte me nafcuntur fine impare extremum claudente, hoc illi cum quibufdam aliis Legum h. i S" praallat. feft commune; fed notafpecificaC generica, fi mavult leftor) qua ab omn. bus alns Legumibus alatis filiquiferis diftinguitur, est hsc, onorl folia raftn ill; TM om nlfus tur, aut pedkoli foliorum, inqmbufdarft itidem verfc temm t S ^ I ^ P T Z f p i n o f a , a u t n o n f p i n o l a ; f p i ^ o f a , c u j u s & c a u l e s & f i i , W S [s u n d i l C i / m t w " o n f p m o t a , c u j u s c u m c a u l e s t u r f i U q u ^ l p i n i s o m n i n o d Z u u m u r " * C i / m t w " o n l o n g a s , t e n u e s & m u c r o n a t a s , r a r o d i f p o f i t a s ; v e l c u r t a ^ u d / r e r J ' i ^ ^ h l h e M o r t a s . c u r t a s , l a t a s & p l u r e s e x u n o c e n t r e .

i. HerKaviva, Hift. Lugd. Acoftg. Herba fentiokideftfrnfifi, T r a n s , L i f f i ? = - p a r - 4 - ta, a circiimforaneis illisj Wr accellatis Herba , ,, " " " vulgo herba viva nuncupa-

duosdigitos longi, foliis utnque e ^gione dLft f 2. ex>1" <t ofto ramuli (coitepotius) utplunnum adErvi folia accedunt, necdiffimiliafoli;<pT ! . r f r e l r P ^ d e n t , b u s _ O n n f i l , W * quelo;vipr.& gratoviroreoculos pafcentia, uti - f ' ^ . ^ W ^ f t d l o n g e t e n m o r a , u t r i n - cis profiliunt pediculi, quatuorfo^ia vix longiori^ « u u o r T i f a : f " ? e d i o c a p i t e r a d i - v u i i g i o r e s , f l o r e m f i n g u l i f u u m f u f t i n e n t e s f l a v u m , a p e f t n

afpe& puliherrimum; minorum Caryophyllorum flonbus fimil, em, fed rineodore. Nafcitur nohnullis Afi^ locis calidis & humidis.

2. Herba Mimofa minor fpinofa foliis latiorfc* filiculis plurimis villolis in capitulum congeftis, n#bis. *Inquin* aut *Caeeo* Indis indigpis dicitur, in mediocrem altitudinem attolitur, caulibyl'e donatur friatis, quadrates, vrflidibus, quifrequentiffimisfpinisfunt muniti.* ad latera per interv»alla hinc inde à tava' & à dextra extenduntur ramuli longiuiculi, itideni fpinofi, quilibet autem in extremitate habetutplurimum 4. folia, duo è regione oppofita, fequidigitum longa, inferius albis pilis veftita, fuperius tevia, & viridia, non ferrata: adingulosillos ramosproveniunt tres aut quatuor pediculi breves, & iniiscapitulumconfpicitur fotundnm, villofum, album, cui aliquid purpurei admixtum eft, conflatum ex pluribns floribus, poll quos deciduos fequuntur filiculae inorbem difpofe, longis pilis albis veftita?; in quibus femina continetur nigrum.

3. Herba mimofa major frutescens fpinofa foliis anguftis & pediculis non per paria'ftantibus fed in orbem colle&is, nobis. Hasc mimofaplantaeft fruticofa & ad mediocrem altitudinem attollitur; folia habet profus angufta, imo multo anguftiora caeterarum Mimofarum foliis; cofbe quibus foliola ilia angufta hixrent fequidigitum longae funt, non per paria fibiinvicem oppofita?, fed in orbem coaftae, fex, feptem aut oito numero, foliola tame% angufta illis adhaerentia, funt fibiinvicem appofita, ut in reliquis fpeciebus: color ligea fimilis Illi *Siha cfagoa* dife ut^& r flos; femina continetur in filiculis parvis»teretibus, hifpidis, fufcis, quarum multx fimul conjunguntur prout in fupgriore, figura fpongias rotundas Rofarum, quaelibet autem fricula, coacervans pilulam, habet tria grana & totidem tubercula: femina autem eft colonsolvacei paulo obfcursoris, rotundum & paulo etiam compreifum infar J Lentium, fed minus; filiculae etiam fponte defiliunt, atque femina fua (ingulf fundunt. Hx du^ fpecies conveniunt quoad filiculas hifpidas, & villofas, multas in unum capitulum congeftas; deinde utraque fpecies fpinulis arniatur, fola magnitudine & pofitione coftarum foliorumque ilfdem annexorum latitudine & anguftia à feinvicem diftert. Procedamus nunc ad Mimofas filiquis longis, bivalvibus & mucronatis etiam donatas.

4. Herba Mimofa *M'7fn/ua, xQs>A^rQ-* caulibu9 & filiquis fpinofis, nobis. Miniofa fpinofa dePernambuca, Jacob. Zanoni. Afcendit ad^ltitudinem duorum brachiorum, & caulem habet verfus radicem, penna anferina craffiore, pallefcentem, tenuem & fraftu contumacem: ramos producit cum inferiori, turn fuperiore parte quadrangulares, undique fpinis rubris armatos: in fingulis geniculis nodos feu ocellos producit, ex quibus emanant cofbe fenaipedales; quibus e regione hinc inde adnafcuntur 10, 12, aut 15, nunc plura nunc pauciora folia alata, valde accklentia foliolis Acacise Americane. Icon noftra omnia **folia fimul** conipa&a & uni coftas cfenjnnfta refert, & folium integrum ex fuis alatis foliolis confans ejufdem eft magnitudinis cum folio naturaliter crefcente in hortis. Longitudinaliter fecundum folium unumquodque tranfcurret nervus vix confpicuus. Hujus herbae Mimofae fpinofae folia vel leviffimo taftu, cum fubito motu (vifij mirum) deorfum verfus ruunt una cum cofta feu pediculo cui innituntur, & conantur fugere aut declinare cum fubita quafi averfatione in frumentum tangens; in hac fpecie non folummodo folia indicant quafi vitam fenfitivam, fed pediculus cui infiftunt folia, fele deprimit & incurvat verfus terram, ex immediata con)unftione, imo cognatione quam habet cum foliis; atque fimiliter etiam, ficut in infante, pediculi cum foliis terrain verfus *feffe* precipitant: fie idem pediculus una cum foliis paulatim & lente recuperat priftinum ftatum, adeo ut ab oculis aftantium non poffit motus in recuperatione priftini ftatus animadverti percipi, nificum tempore, & hoc iifdem contingit non folum quando manu tanguntur, fed & qualibet materia interpofita tangente, imo volatu avium aut agitatione«venti, occidente fole, %ut nebulis obfeurato eod^m, ingruente etiam pluvia contrahitur haec planta Mimofa in fe, & fie perfeverat claufa ufque ad ejufdem folis ortum. Flores non bene obfrvavi, inquit Jacobus Zanoni, quia nee bene expandebantur propter frigoris primo Autumno adventum. Facile diftinguitur hae Mimofae fpecies à reliquis deducendis; filiquis nempe, quae funt longas, quadratae & fpinis obfitae non minus quam caules ipfi, quae exficcatae coloris funt framinei, & ex longo rotundantur; femina parum cavata, & in fummo longitudinaliter divifa, figura familia grano Tricici noftratis. Cum filiquis, turn femina, xqualis magnitudinis funt cum imaginibus feu Iconicibus 17 & 2. in Tab. 1. Mimofarum à nobis exhibitarum, in App. ad Legumina; radicem habet hsc Mimofa dilute luteam, rotundam, tenuem, longan^divifaminplures alias minores, qd& ftmduntur in plurimas tenuiffimas fibras, faporis moderate acuti fine amaritudine, ac

odoriseft acutiffW, vcluti Allium, & quidorecens colte&a ofendit non fohmodoratum
&caput> fed & reipirationem tant., ut letit, ut oporteat eandem ftiger.: negravit
aftantes offendantur facilitate fua pen ; guftata enim relinquit in ore imximam ari-
ditatem.

5. Herba Mimofa nonfpinofa *MTt-nfULx^ ^r @ - feufpuria* de Pernambuco, nobis, Minio-
fa Ipuria dePernambuco difta Italica, Zanoni. Pr^cedenti ^ herba?Mimofa: Afn-re/w.^
propter contbrmitatem in filiquis mucronatis hanc fubjunximus, accedtt priori &
fequentiakitudinc &c foliorumfimitudine, iedrecedit ab ipfis quiaejus folia tafia nonfe
comfinmiinr. pra;diftarummore. Hici mukisatinisvariis kalije locis familiaris tuit adeo
ut advena& peregrins non jam habeatur planta in illis regionibas; proinde acquifivit no-
me» Mimofe Italica; ttec differt aprioribus duabns plantis Mimofis fupra allacis, primo
parvitate toeing plants, prsecipue iolioram ; deinde folia tafia non ie coniprimunt; certio
filiqilis longis tenuibus mucronacis & abfqite fpinis diftingaiturdquarta, cujusfiliqnK
funntenucs, longse etiam, fpinofe, ficut caules ipfius ; atque a fequente, primo intuitu fili-
1 cinanimciuraeni,quaefaiitcomprefi6rjacc,nigrz, feminaqnecompreflknigrain fe continen-
tes: inra tohorm &caulmm finus ieu alasoncur pedicluscriangalaris, brevis (atis, anct-
alis,&aLiqnandolongior, incujus fummitate paalatim apparet elobulusrotundne. contla-
tus ex phiEibnscapiculisminonbiis, 'granuiatis, ejuftdem roma &faor* cum Mimofa: ante-
ccdeatis capitalis, qmbuti apertis producantur flores parvi, contexti ex ftaminulis, qus
ltvrter pallefcnt, in quorum fingulorum medio (raro unica fola) freqoentius dm, tres
ant quatuor *f:hqux* fimul conjunfts, qoxcrelcunt ad longitudinem feqaiinciaUrn,& adcraf-
iKiem qnxoblervatar m Icone quinta, in qua fiflruntur ad vivumnon folumfiltquz, fed femina
6V enam folia. Hax planta Mimofa nifi obtarent rigor & frigns hyemis, fortallis coniervari
potent toco anno. Folia liujns Mimofa: ufta, non ut pradifta folia in fe comprimuntur ,
necullo modo fentiunt; fed fole occidente operiuntnr & codem pariter oricente aper-
riuntur, quod liuic cummultis *A*>«I«SJW« feu Leguminibus alatifeft commune.

6. Herba Mimofa non fpinofa •x*, TMi & r < §' feu & & % * r ? w . ' n * ' > £ & de Jamaica Patavina difta,
' nobis. Mimofa de Jamaica difta Patavina, Jacob. Zanoni. Use herba Mimofa ad brachialem
& fequbrachiaiem akicudinem afcendic; i#omnibusparcibus; communibus valde accedit
pradiais duabus, atque quartae fimilior in refridione ftu compreflioue, nifi quod tavidius feft
niovcac, atque in caule principal! *i'ca* majore nuikalolia, parcipue verfus terram, porrigat,
qmbus excenditur herba ipfa, & fi aliqaod liorum termm attigerit, etiamfi denfe proveni-
ant, maxime in caulis parte inferiore, radfcolas in arram demittit; in '•; * « -caulibns *tant*
fienfinodi feu ocelli, ex quibus proveniunt mule. riUrocundi, *? * f^T * ? am ran lls Pⁿoris
fimiies^orcicctenmtea-uq. tacilefep^ratur ^pari-lignea; colons eft djute vindis, propc
terram & fupcrius rugofis, fttt rocwrtaCWtHrar caftm apher, propter mltas extuberantias
que eminent in fupericie: rami plicati difficulterrumpuntur, & rupti confpicinntnr pleni
medulla viridis, circumvallatiportione tenni, lignea, alba: folia funtalataconjugatim feu
binatim cofa: mediae adliircntia, fuperiorts infar, fed numero plura ; ex alifoliorum na-
Tcuncur aliiramulcuii minores, gerentesin fummis caput granulatummviride > quod poftca
fiavefcit & affimulatur Ruboancequam maturefcit, in quo proveniitnt granula, quae poftca
a pert a, font lococapfuhrum riorum, conflata ex quatuor aut ^inquedenticulis, qrti ftccati
cedunt fuperioribuseomodo qui raroobfervacur, nifi in cimifloridis, nee hoc exprimitur
apiftore; in mediomulra apparent filamenta& ftamina lutea, quae poftca albelcunt & u
fummis gerunt apices minutos, rotundiufculos, coloris obfeuri & odoris tenuis, quipaulari-
tiroendocircundanc reliquum capitts, quibus deciduis lucceduntfiiiiqua!, quasvidere
nonliquit JacoboZanom prxtgrrudimenta, etiamfi hsc herba Mimofa fit pricedenti habi-
tior & validior; appropinquante menfe Oftobri autNovembri & adventantefrigore feu acre
frigido e^fycatur omnino. SOJqoas habet comprelTas, tumidas abfque pilis, protuberantes
ubi apparent femina, caique ad 1 o. fi_{mul} conjunftaa & ex commnii pediculo ortas coloris
cafranei extra, & mtus argentei colons ; in fingulis confpjiuntur femina 10 uvrum adnis
ftmilia, fednunora, ahquancuhmcomprefla, lucida, pe; dura> coloris etiam caftanei: radix
craftia digitorum tranfverfum plus aac «, fecundum te_{mpus} benignum c^idarn & fic-
cam; fekd.v.d.tinmultasal.ayad.cuiaslongas fib_{rofa} obfeureluteas faporaccri, mor-

& Mimofx ditnntur quia, ut fuperius diximus, qir rangantu, qilbet re ip'fis admoea, illico fete- .nt&caufani tangentemaverfari ob- femncar, pro*nde herbs Mimofe fenfitivx f j .iomcn jure obtinere. Theopjraftas dum agit de gSntu provenientiibus circa Merrier/ .nam hujus generis proponit pUtitam, na- fcitur, inquit, t'fcenliaris qu; edam materia circa Mw. iphim C per foe^M mareriam intelligunt alii, virgultiim alii ex textu Grxco) nonfoliis" vel ramis, vel tota forma pioprietatem fortita, fed affeptione qux accidit; quippe facies ejus f'pinofa, foliumque Filicibus non abfimile, ied cum ramulosqiiivitetigerit, folia quafi hebicata confidere pro tempore aliquo, poft revivi- fcererurfufquevivere arfirmantur. Eth^c videtur effe iEfchisiomine Apollodori fequacis De- mocrati, aquoiic Flinius fecundum verfionem Dalechampii pag. 617.1. 24. c. 17. Adjecit Apollodorus feftator ejus ^fchinomine, quoniam appropinquante manu folia contrahe- ret. Omnino perditara effeliant plantam in .Egypto credidere Bellonius & Alpinus cum illius nentiqnam meminere, & Guilandinus confident ied in ^gypto diligenter eandem: fed fruftra frutatum fuilTe; ego, inquit, iftam diu multumque in ^gypto circa Memphim Heli- opolim, Tanaim & Alexandriam, quafitam nunquam oftendere. potui. Idem affirmat Bod^us. a Stapel. Nalla fpecies herbs Mimofe fati mirandae invenitur in Afia, neque in Mala- bar, ut notat Acofta lib. de Aromatis. VMe cetera pag. 101, & 102. Hift. noftrallniverfalif Oxonienfis. Uxc a nobis hie dicta eodem rererat lctor, ubi habentur Temperamentum & Vires.

S E N N A .

S Ennam quidam Diofcoridi* Delphiniurn, alii Ptkcinum, alii Peplium, alii Empetron, alii Alypon: alii Theopbrafi Cercidem five Coluttim y^m^aln Colyteam \^m efie putant: at rem novam veteribus Gratis 4y Latink fcriptoribus inditam, isra Mauritams primopropofitam, a Serapione fob Sene, a Mefue, qui domeficam iff fdeftremfacit^ fub Senna cen/emus; cujusex Gratis folus Afuarius meminit.

Senna eft platita icguminoCa •XXS^KOUX^ producenS filiquaS propendentes rarodifpofitas, latas & comprevtas, adeo, ut fuperior membrana inferior! cohreat, funtque tumidas ubi appa- rent femina vinaceisacinis familia, atque his notifacil& Sennaa cieceris Leguminibus fili- quis propendentibus diftinguitur. Eftd<pkx, Alexandrina foliis acutioribus; & Icalica foliis obtufioribus.

1. Senna Alexandria,* five foliis acutit, C. B. P. Folia orientalia officinarum. Sena Ale- xandria, Matdi. Ad. Gam. Trag. Gefn. Hcrt. Senna orientalis, Bellon. Tab. Ger. Sena./Egy- ptia five Alexandrina Syriac2ve quus praefantiflima, Lugd. Senna, vel 2b)* Gnecis^bliiscft Gly- cyrrhizx inftar alatts, fed eadem habet oblongiora & in acumen vergentia, omnibus luis par- tibus eft vulgari feu kalica tenerior.

2. ^erej Italica, five foliis obtufiSj C. B. P. Sena Italica, Trag. Tab. Ger. Cam. ep. Sena, Matth. Fuch. Dod. Lob. Lngd. Sena alteradifta media, Bellon. Sena communis & vilior, Ge(h. HorE. Sena noftras, Caef. Hsc Sena fecunda foliis etiam conf*alatis, fed prioris multo obtufioribus, craillioribus aut fubpinguibus^ Fabarum recentium fapore, caule cubitali, aquoramuli exe- unt flexibiles; fioreseiemicantaorei, \nduti Coluteae veficariae, e ramufculis prominentes, tenui pediculonitentes, purpureis intercurfantibus venulis, quibus fuccedunt folliculi htcati reni- formes (ut in fuperiore) cujus fuperior membrana inferiori cohret: in fingulis femina plura continentur fubvirefcentia, vinaceisacinis familia; utdicam paucis, in multis conveniunt & %%c & prior, fed foliorum foima prxcipue diffcrunt- Nomina fati patent fupra.

LOCUS & TEMPUS

Loci indigit& Rtut vel prolatione ncm inuin^ prior ex Alexandria Mgypti ad nos Europeos convehit- titi\ altera/eritur in Hetrmia in agro praefertim Florentine, incampkillic.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Sena Alexandrine in maximoefi apud Europeos ufu, aper'i, ^um citat, d'g erit, concoquit, exaljat, atitnut, tduttblkm, tumatram^ turn fiavam, ac etiampitmtam, qwdfant experi-

experiemia confrobat. Mundat cerebrum, jecur, lienem, pulmonem, atque. Onmts corpork fen/us vifcemm cbfirulliones aperit. Optima eft in univerfum indk ma morbkc oimibu* diuturnis, is melancholies, idecque ddiris, amentia, rejoluthni nervoru'm^ pbtbiria^ cepbalalgi<£, fcabki prtrituuis tpikp*fi&. C&r etibz yoborat, pra/ertim ubi Us commt)'-eatur medicamentk, quaad cordk affeRusfunt idonea. <*-Efl prxterea Sens element is nllius incanmodi jneJkamentum, adeout daripoffitpuerk state, tenellis, turn etiam utewgerentibus. Fit ex foltk vinum vindemid: tempore, quodpotum ea omniapr<xflat, citra violent Jam ac noxampurgat. Folia, inquam, Scnde femmibus Anift, Carui, Famculi, Coriandri, carminaiivis diclk7 leviter puhenzatis is additk, vd knientibus^ nedkamemis, ut pulpa Cafu<g, Tamarindoru(n, J)rupo Rofarum pallidarum aut fiorum Perficorum contemperath, is mixtis decoSo Serins, optime purgant. haturin pulvere, /ed tutim isrjucundius dilutum ejus exhibetur. Laudant Arabum plerique foUkuhs Sen*, at noftri Europei foliamaghcommendant: foltkuliaennniftmatun f/>ititsgignunt, isr tortiones ventris .adferunt; /ape autem illos ante maturitatem colligi contingit. Seme Alexandrin*pulvk exhibeturcum Cafue pulpa h/crup. ij ad fcrup.iv. folia autem in vino, /crolaftis, aut aliquo alio vebkulo feu liquore adracb.ij, ad dracb-iv. per noBeminfula^ additis feminibus carminativkpr*ediifiis, is liquore percolato, is ad Vne. vj. vd v'tj. purgant tuto isr jucunde. Miruminquit Brajfavohh anno 1538. caninam appeUntiam Ferr*ri* fuijfi-morbum epidemkum, is potim fitiieextrabileosventrkuli occupante, quamexaclda pituita.- Omnes autem quos curavh (curavit autanmultos J ex infufione Sena (amtali nfihuti funt. Poterinl folia coqui cum prank aut pafiulis\ bujus decoiionis /umat patiens, ahum liber am habebit. Referantur adCap- 3. de Lesitminibm flitiqu propmdentihm donatk-

Nil five Ami, Indiso five Indica.

NIL, vel potius Nir, Arabibuseft color czrultus qti Lofitanis cam Anirquwn Anil dicitur: Arabes quocue dicunt Nil; Hispanis Azul, vulgo Ami & Indigo eu Indica fcm. AnileftHerbatmicofaexuna ridice plates prodacens ibrculos inalwudinra f« palmorum afcendentes, digit™ minorem craflbs, coloriscinencei: folia habetfamilia Ocens: tesntigoosecandidorubicundos, cumquibutTam filiculis coacervatm pendalisculifumniitate, qm similes funt vermiculis, quos vocamus aicandis, crafliufcutefun-
 f p p i Lemine nigro, quod non male Legumini comparer. Licet Marcgra
 fruce lignea confhns fubtantk., eft tantTim herba bieunio fumnio con
 mtegnis vigens.

LOCUS & TEMPUS.

Nofctur sponte locis calidk tam planis quam montuofis Indiank, facile coli poffet in Hispania locis calidis, imprimis ^ P ^ ^ Z , ^ 7anuario, fi terra fuerit bumida aut rigua Vm vero l'M-subacta, qualem Lactuca amant, in... aut fimilibus. Serendum foret atq; ium aliquid dy deratur Septembri aut Octobri, dein tempore opportuno tranferend* effent plant*. & commodhs intery allis difponenda. Denique danda opera ut zizartia fupnmaniur ne tenellas plantas fuffocaverint. Hec Fran. Yemenis tradit in comment anolo fuo de plant is novae Hispanie. Colitur in America Brafi&a, islnf^a Barbadosub/enniffimi D.D.noftri Caroli fecundi ditione. ceruleum, Indigo dffium, interpublkasmerces Europeistxonunt, darguam, qui hujus planta Si, ut vdperfeSiam e)ut Iconem cum floribus is filitiqu define- pondum eo curiositatis prov... ! curare dignatiftnt, cum nee exatla ejw Icon cum floribus & filiquis, andam & fculp... *defcripii™ ihi apud India fcriptores bucuſque apparuit. im nec exacta

TEMPERAMENTUJI & VIRES,

Anil fr. InSgo jionnibUamancat efl-qm acute calidum isficcum/ecundo gradm puh« ejuf dm medetur pbg" veteribus, fi ante urina abluantur. Folia contu/a isr tmpiaftri vice applicant, dolortm capitis dicuntur mittgare, maximein infantibus, etiam in aqua macerata iff trethro applicata.

Modus confickndi c<erukum₀ ~~Indigo~~ dictum.

Anil feu Indigō quod Mexicani dicunt *Mohuitli* & *xfkcobuilli*, Hifpani autem Azuli, fic conficitur. Indunt primo indigenae Mexicani alique Ailericani folia decerpta aeneo vafi, pleno aqua modice calida vel tepida (licet q uidam magis probent frigidam J & valde verfant, donec aqua tingatur, & aquam bene tintam feu (utcum Chymicis loquar) impregnatam fufficienter compererint, eam dein effiindunt in aliud vas five ollam aut cacabum, cui in fuperiore parte eft foramen, è quo aqua magis pura & clara delabatur, turbida autem & qua? fubftantiam foliorum exhaurit, aut quae bene impregnata eft fubfidet* ea porro percolatur per faccum cannabinum, & pfiffior fubftantia formatur in paftillos feu pilas, & pilulae exponuntur foli, atque poftea patinis compofita imponuntur prunis ardentibus ut indurentur & ficcentur, atque hac ratione paratae funt ad ufum tin&orum, ut colore caeruleo poflint lanam, pannum atque fericum tingere. Referatur ad cap. 3. inter Legumina filiquis propendentibus donata.

Aftragalus perennis foliis hirtutis caule re&o aphylo flore ochroleuco odoratiffimo, nobis. Hisc nova* Afragali fpecies perennis plurima edit folia, alata, hirtuta, cVper tertamfrata, binatim feu conjugatim p&% ex adverfo adheerentia, uno impare extremum coftae claudente: ex meditullio foliorum, per terram fie ftratorum, oriuntur cauliculi, hirtuti itidem, pedes & altiores, fuffinentes plurimos flores luteopallidos feu ochroleucos, fragrantiffimi odorfs, ad longitudinem trium unciarum in fummis caulium fpicatim digeftos, quorum fingulis fuccedunt filiquae finguk gemellae, craifse admodum, triquetrae, vix unciani longitudine fuperantēs, harum fingulae bina vel terna continent femina, ofla fefamoidea referenda, feminibus caeterorum fufe^vfortis craiffiora: planta eft perennis. Refer liunc ad cap. 5. fupra.

Trifolium pratense degenerans in quadrifolium Phaeum feu fufcum, nobis. Quadrifolium Phaeum fufcum, Ad. Lob. Lugd. Quadrifolium hoc fufcum eft Trifolii pratensis albi varietas tantum, quae foliis maculatis fulginei aut fufci coloris, aliquando ternis, fed fcepius quaternis, ^uinis, nonnunquam feptenis, donatur: nam flores & filiculis bivalves (fiquasfert, quod raro contingit propter rependi nimis avidum ftudium^) omnino conformes gerit cum Trifolio pratensi vulgari albo, difert autem folo numero & coUre foliorum; numerus contingit a iuxuriante natura, color primo obvenit à mixtura terras, falis & fulphuris, quae colorem hunc obfeure ex viridi fufcum induxerunt foliis. primè in pratens reperti, inter alia vulgaria Trifolia pratensia alba fie adumbratis: ob raritatem coloris & numerum quaternarium foliorum, à primo obfervante revulfum ex pratens & in hortum tranflatum & ibidem cultum, felicius & plenius nutritum, eundem retinens colorem vjuemin pratens poffidebat, non folum quaternaria, fed & quina, fena, producere obfervabatur folia, cumque radicibus fefe augebat; ita planta mukiplicata in horto Edvardi Morgan & inde tranfplantata in hortos matronarum nob ilium, ab ipfis confer vatur fum ma cum confidenda, quafi iummo eifet auxilio contra febres purpureas liberoruni. Multoties alibi colitur propter gratum fati & omnino diver fum afpectum & numerum foliorum, quibus tantum diftinguitur à Trifolio vulgari pratensi albo, cum quo adhuc convenit in partibus effentialibus, fcilicet flore, filiqua & femine. Referatur ad cap. 7. inter Trifolia.

Trifolium argenteum clypeatuni, Alpin. de Exot. Trifolium hoc elegantiffimum Creticum, parvum, humi procunibens, ac fere per terram ftratum, ternis donatur foliis obtufis: fibres pB^ducit plurimos in capitulum congeftos, albos quafi argentei coloris, inodoros, fapore niodice acri, quorum fingulis fuccedunt capfulae maxime ad antiquos clypeos Venetos accedentes, quinque pinnae in fingulis capfulis monfrantes, videlicet quatuor in fuperiore parte minores & breviores, & quintam in inferiore longiorem; in harum fingularum fundo unicum veperitur femina nigrum. Planta eft annua. Floret dhte, & paulo poft femina perfkiuntur. Referatur ad cap. 7. inter Trifolia.

Trifolium afphaltion Canadenfe, Cor nut. Trifolium hoc ad cubiti altitudinem attollittr, virgas habet tenues, junceas, atropurpureas, quae ftatim ©^ueUks, hoc eft ramulares propagines emittunt; fummitates in plures deducuntur, a quibus folia Loto arbori familia prodeunt, acutiora tamen & anguftiora, qualia ~~60~~ ⁶⁰ ~~pm~~ ^{pm} Diofcorides nominare confuevit; leviter etiam hirtuta funt ^{^Cv}elutioleoià pinguedine obfita (ex uno longiore pediculo naicuntur) qax diftrafta, aut ex fttritunonolent, verum cum levius attréclantur oleofus hie humor digitis apprimitur, moleftus gravitate odoris, qui quidem in novella planta Rutae eft, in adultiore hirci aut bitnminis: ³ ⁿ ^m extremae flores occupant purpurei, ejufdem form & cum ceteris Trifoliis leguminofis:

iiosis: florurfi petala intusalba font, licet à tergo purpurea ; fioiibus deciduis fuccedunt filiquae digitum longae, hirsutae paululum (quemadmodum folia) oleosae virides, extremitate purpurea, in quarum capacitate condijuntur femina lata, oblonga, medio finu excavata, ut Faba pargatrix: radix loiiga, fibrosa, ferfignifervore praedita est, acfere p^riacrimonia liri-gi«ni mordicat, qua Anemone. Anmraest planta & non nisi facione perertfiat. Odoris & coloris praestancia, locorum in quibus provenk'jatione, contingit ex Theoptirafti frntentia, iSiUv i'^, V^ai ^JeJwjuk i \$ wVrfoTtt^nlS-TOrvj'^nthabctnrc. 6.1. 6. Hist. Caufanihiijus rei esse arbitror quod haec Tritblii species apud nos velat extorris vivat. ac proinde sicut in justammagnitudinem vix adolescit, ita neque completam fructus ejus maturitatem, neque vividum caulis & floresejus adipiscuntur colorem. Qpicquid gignitur a natura, imo in maximis distantibus locis eodem modo producitur, quia ut natura ubique eadem est, etiam vires suas aequaliter ubique diffundit. Referatur ad cap. 7. inter Trifolia.

Lotus Cretica fti^Ai, Hon. Belli Ep. 5. ad Cluf. Trifolium five Lotus it&&n edulis filiquosus, j. B. Chabr- Lotus Cretica edulis, Park. Loti haec (pecies est edulis, in foro Cydonix est^{ur} ejus fructus: filiquae antequam durefcere incipiant venales illic reperiuntur, à pueris & k' minis hbentissime eduntur, succosae sunt Sf dulces, Pifi recentis gustu: multos teirae causas a radice profert: folia Trifolii, angusta, crassiuscula aliquantulum, & mucronata, ternasemper 10 caulis extremitate simul conjuncta, bina ad pediculi exortum: flores Pifi infar, quibus succedunt filiquae rotunda-, ad extremum falcatae, ac pro ratione plantae, magna. Inter fegetes invenitur, & in marginibus agrorum frequentissime passim in Creta. Referad cap. i 3^{-de} Loto herba.

Finis S-fdionh feamd > Partis secunda.*

1 & 4
Brassica caulata

a. ha it fib ra. / fl

5 BruTM i- r •itnri!nn t-uaiſydi congfr>i>a. fix

Tab. I. Section 3

4 *Brassica sabauda* Hyberna, Job



6 *Brassica bulgarica* Salisb, Dod.

12. *Brassica* cuult ApuarOptrni
Dod. Cuzior
apa, !?

fl brafitmjlhocia, hjlUugicau(iJ!or<S, ^aii



10 *Brassica Sabauda* Cris
liamSruſiita tophattr, drr

hiJittgJ-fi Foiſflifa. eu/tm•

13 & 14 *Brassica* lala & angusto apuſ folio CBP*Brassica*
Selenoides, Dod. *Tar-lathfolia*, laciniata,
& tenuis folia, hift. lugd.



Amstert
7 hJ/JO- itprth t. rn < c2 11 • V J rrtfuri
vndonhi

SILI UOSÆ TETRAPETALÆ BICAPSIILARES.

Tab. 2. Sub. 1.

Brassica

Caletae Prutii

arsaliata. Dod.
in hist.

27 Brassica sylvestris ramosa loba pene hispida nuda
Turrita maj. Clus. Hist. et Lencorn.
vidi Plant. 14. Tab. 8. descrip.



Brassica
CBPTurnip
folm tr. regt & lt hijpüli

ina repens motuæ nemos. nobis

Rapum vulgare. Dod. maj. Ger.
rolundum hist. Lugd.



folm infens
asperum.

Rapum oblongum Dod. oblongum & B.

Napus sativus hist. Lugd. Napus Dod.

Napus sylvestris Dod. hist. Lugd.



Auripens D. Johanna Cavendish
Equitis Baloei.

SILIQHOSA, TETRAPETALA, BICAPSILARES.

Tab. 3. Section 3.

Simipi nudum, nobis. Rapistrum arbo-
rum. Ger. Dark-Rapistrum, ist. Lugd.

Simipi Rapr fohoCBPSafitiurr arras Hod- Z S inapi ii>n fbfio Siliqita hirfuta.nabit-
'3afio^dL.ma^rJ,i,Do<3-



Simipi fructu fi'io. C&P-xySmnJ-
Kyl ber. rr minut, PariGer.

4-Smapifylmonfrsalanum Fate fi/M-
lufrimivmo.iUiyai iwgtfuma.tb

t Erysunum iwfaaKpht-
lihMaShiH.jf-Lvg<i•

zLiyamaarn bokcimhn&torjutatalun
CBPlrlo alier Malth^dHrfiLigd



JS'iwT lali&b'um mafQfa&rum.
'>ottraii aif't;S-/rz>fjl>J-E-ruatCot-

j-.JLrystrumtruhlphataettitufon ssillryuuislo
nohis• hRuyfiruufjleffiwix fofbio, Col.

g'. Lryximo iirmtrr hirtuk planfo aih
O&P-kProJ-



VuspicilsZ>Ouf7if/mi Cantntry
Kquilis aurali

SILIQUOSA TETRAPETALA.

1. *Nasturtium Sgl. minus. Nob. in pinguet. nobis. fiam. caucasicum. Pers. Alp. de exot.*



6. *Nasturtium Sgl. trinitate divi un. C.B.P. Sophu Chialporum, Turk.*



8. *Nasturtium aquaticum fuginum. C.B.P. aquaticum. Boj. aquaticum vulgare. Pers.*



10. *Nasturtium aquaticum erectum folia longiore. C.B.P. aquaticum Indicum, Turk.*



7. *Nasturtium pratense magno flore. C.B.P. Flos crucis. Desl. idem flore pleno.*



11. *Nasturtium aquaticum minus. C.B.P. Cardamine & Desl. hait. Lagd.*



12. *Nasturtium Alpinum trifolium. C.B.P. Cardamine Alpina trifolia, Park.*



3. *Nasturtium Alpinum minus Xewtefilw, t.A.r., nftod.*



4. *Nasturtium Alpinum minus Bellidis folio. C.B.P. Plantula cardamine alpinus. Smith. Chis. hait.*



Aggros D. Richardi. Denis. Equitis Balnes.

TETRAPETALA *J(> WULA iti.

Taf. 5. Icones 3^o

Erucis lanifolia H. B. K. **B.P.**
Erucis maj. sativa annua **runalht,**
fructu, I.B.



5. *Erucis hirsuta* Hieron. *apert. folio, nobis*
Lampfana Apala plin? Col.



Erucis syl. Thlaspius effuse, nobis.
Myagrum allfw TMafpm esu/ir let.*



Erucis syl. angustifolia G. frvijf, *füif* (&WJ i'tnatlu paiy/hriaita. rvtks. ttrXtuM >&Jitt Jf-B.
luga? udfolia J. *minus flore. luteo. I.B.*

j *Emm ihtthti* .. *Romana filiqua*
dijujfi (cko tatv I.£



Berula C. IT B*4JTTJ
berula L i
et Myagrum, sicut plerumq.

17 fin *montana cretae sa folia, flor*
alio nobis. Sicut alterum aquaticum.
Sicut hirsutior montanum, Col.

6 *Erucis carulea in arvensis cretensis.*
C. B. P. Prod.



Austriacis Dianathan Treletorus Equitis
domini in agro Carnubimae.

SILIQHOSA, TETRAPETALA, FL. BICAPSILARES, floscula unicapitata.

14. *Eruca maxima Canadensis*, Corn.

15. *Eruca latifolia*, CBP & Prod.

16. *Eruca fyl-vulgatis*, Paris.



17. *Eruca aquatica*, Ger.

18. *Eruca siliqua torosa*, nobis. *Cakile serapionis* L.

19. *Eruca siliqua torosa*, nobis. *Cakile serapionis* L.



20. *Eruca maritima italica* siliqua hastata
cuspidi simili, CBP & Prod.

21. *Eruca Negophica*, Prosp. Alp.

22. *Eruca Montpeliana* siliqua quadrilobata
gula echinata, CBP & Prod.



Guil. Bouquet delin.

Hol. Dan. Otterro. Ludovicus sculp.



Amptius D. Henrici Equiti Baluzi. Capes.

*Draba lutea Siliquosa Strictissima, CBP
lutea, Park.*

SILIQUOSA, TETRAPETALA, BICAPSILARES
3 *Draba Sffuffam rr,,rX-B>*

Tab. Section 3
*Draba alba Siliquosa, CBP, alba
minor, Park.*



4 *Draba Erysimi flore &
lutea CBP Park.*

4 *TiHiitiGrruiat annuajai-oircnh
rmfiriSKuhnQbaJffc ofLtn marint
paznu in foloorende cruj rusculo. IB*

5 *Pvita/aStffiquova Burnt
PfoJiCBTJi
Plorella ziliquosa mofThal*

6 *Raplaiam minima*,
reams latratM-fntsHtr
duatt.nobir-*



7 *CBP Ger Park.*

8 *Raphanus Aattiiliimfhtmj>eofiuiJat laani us
atPijfX BP-Palliitritn iftaed*

9 *Ratthann aqtiachtur a
t t d * uher, CBP. IK i'nd*



Auspicio D. Walteri Saint Iohas
Equitis Baronei.

SILIQUOSA, TETRAPETALA, BICAPSULARES.

1. *Leucium pceanum* maj. CBP. purpureum
caeruleum & album. I. B. & multiplex. Dod.

2. *Leucium maritimum* candidum
CBP. *maritimum* candidum. Dod.

3. *Leucium antiquum* maritimum latifolium
caeruleo porro flore, nobis maritimum h. h. h. h. h.

Tab. 6. 3. 1.



4. *Leucium saxatile* Teym. flos
hirsutum caeruleo-purpureum CBP.
Litharaleucium mirimum
cupinum. Col.

5. *Leucium luteum* Erucæ
folio CBP. *terrestre* maj. Col.

6. *Leucium maritimum* Com.
marinum Park.



7. *Leucium luteum* vulgare CBP. *luteum*.
Dod. idem fl. multiplex. Dod. E. fl. flos
Keri simpl. & multiplex. E. fl.

8. *Leucium syl. angustifolium* luteum.
CBP. *Keri*. & *Leucium syl. Clusii* fl.

9. *Leucium album* ad orah. flos
folio teridi. CBP. folio teridi. flos albid.



Assumptio D. Johannis Danovici Assumptio
nrpblif Nabiljub, mr, li
fundatoris & benefactoris

Leucotum... 5. Bistorta... Ger. Nord.

3. Leucotum... Ger.

4. Leucotum... Thlaspi...



TM



Leucotum... CBP... Col.

6. Leucotum incanum siliquis rotundis. CBP-Eruca peregrina, Clus. Hist.

7. Leucotum Montanum flore pedicellato Thlaspi bicapitulatum nigrum siculorum Doctr. Col. CBP.



Leucotum... Col.

Leucotum bicapitulatum asperum hieraci foliis... Thlaspi...

12. Leucotum... Thlaspi...

Leucotum clypeatum Serpilli foliis... Thlaspi...



Leucotum...

Homeris harteus CBP Oula masculis Dod.
multo malis Damascena purp. scaly Simplex
mulla pter nohis T. Hoffm. 1700.

IJ-IQUOSA. TE 1'BAPt/VLA-. MOM'S!! LAR6.S

3 ItcpS*i* Montana naftcAj tufaryr/ifrriu

J. HnM/fwiM Cmm

T. Hoffm. 1700.



Hnprtt ndr^rina riüttuwarittulüi*
' C&PiHit?nrholiax,'Park-

6 HfSperrtA!!mtttTrdolet;r.nohtt
Ar^r;ti.D^nJ>arkt&hijUi

1. Dentaria triphylla. CBP Triphylla. Clus. Hist.
Cerialia plinu. Col. & entrophyllos, Ger.



Dentaria vt pentaphylla I Clus. Hist. pentaphylla
Clus. Ger. quinquefolia, IB.

3. Dentaria Pentaphylla altera, Clus.

4. Dentaria pentaphyl-
lobifera, Ges.



Anaplex DThoma Henschel allent
nari a Dnglro Carolo 2 ad Ch
Daporum Regem.

Chelidonium majus Corn Park.
Chelidonium majus Corn Park.
Chelidonium majus Corn Park.

Chelidonium majus Corn Park.
Chelidonium majus Corn Park.
Chelidonium majus Corn Park.

Lysimachia latifolia Chamædion
dicta. C.B.P.




w^m

Lysimachia angustifolia Chamædion
dicta. C.B.P.

* *Lysimachia stratiocotyle* ixadno
? y jlonCBV

* *Lysimachia stratiocotyle* ixadno
? y jlonCBV



Lysimachia stratiocotyle ixadno
? y jlonCBV

Lysimachia stratiocotyle ixadno
? y jlonCBV

Lysimachia stratiocotyle ixadno
? y jlonCBV



AusprnVs Clarifi-lfrrrD-Christenhorifkre
Academy of Sciences
Publicum Superiorem,
in Equitibus auct.

SILIGUOSA VARIA SILIGUIS FLORIBUS autem inter se conferre

1. *Fumaria siligata* semper virens, Carp. Americana Siligata semper virens, Park.

2. *Fumaria tuberosa insipida* Cornubulosa Americana, Park.

3. *Fumaria siligata caperula* Danata, nobis Capulosa tubifera, de Spli Lob-laga.




4. *Fumaria radiata* non capulosa, nobis Radix, capulosa minor.

5. *Fumaria radiata* non capulosa, nobis Radix, capulosa minor.

6. *Fumaria tuberosa* flore viridi, Park.


7. *Fumaria radiata* non capulosa, nobis Radix, capulosa minor.



8. *Fumaria vulgaris latifolia* nobis officinarum, de consuetudine, C.B.P.

9. *Tumorta minor tenuifolia* C.B.P. Ge-Ca o Tt i riat a tenuifolia Eyst.

10. *Fumaria leuc.* Fumaria N.



Antiqua D. Richardi de Suman Chiro Caroli secundi, ab anno quinquagesimo alpe in Anglia regni, ad memoriam.

Johnstoni... C.B.P. niger, rotundior
radice Parisi. v. hirsutula Ger.

SILIQVON. TETRAPE. ALA.
2. Geropae non hirsutiorum locustarum
Raphanum t*wr rrriff'fr t**rr&4 rriffp^uf
dilat. nob.


Tab. 3. folio 3.
*x Jtatlutntt mngnut fptiof.tntbit P adicula



Mangra CBP
niger, Dod Ger.



Raphanistrum siliqua articulata
Glabra major & minor, nobis.
Raphanistrum alterum arborum Park.



Raphanistrum siliqua arti-
culata striata minore, nobis
Raphanistrum fl. albo striata JB.

If



Raphanistrum d'orhucoso. 'a
m*tw rsth'h



1. Raphanistrum maximum monoperrum Cera maximum
to tilmi' fcliam Mgn'era r fr rr me/-i>nir;tum.Arjt



2. Raphanistrum monoperrum
CBP & Poul. Mart. & Bauh. Paris



Arum DEduardi Hales Arum
primogeni. Eduardi Hales
Koronelli in agro Cantano

TETRAPETALÆ SILIQUIOSÆ papaver Argemone

1. Papaver Crniculatum, luteum, CBP. Eysl.

2. Papaver

Ctmiailahm Shmuctum Githfim CUP

3. Papaver Argemone -nkuia-niofactum CBP.

4. Papaver hortense Simplex Incini6*1> rum tapsutu Seminali V.



6. Papaver erraticum Simplex & multiplex cum capsula Seminali

9. Argemone capitulis hirsutis brevioribus canulatis nobis. 10. Argemone capitulis longioribus hirsutis nobis.

11. Argemone capitulis multisfariis orbatis



12. Argemone lutea Cambrobrithannica, Park.

5. Papaver Spinosum CBP. & Prod cum Siliqua spinosa.

13. Argemone lutea Coriaria



Ausspiz D. Christophers Danby Armigeri, filii Danbye, Marchionis de Danby, in Anglia, Eboracensi.

*Balsamita foetida Persida folia,
Lob. Icon. folia. C.B.P.*

SILIKUOSA, VARIA, FLORIBUS & SILIQUIS discrepantibus.
1. Balsamita Lutea, v. noli me laedere, C.B.P.
itnpafiar herba, Deid.

Tafel 8. Section 8.

5 SittaHiun*, t>atiGrrHiJfl-tftJ-



*Melochia seu Corchorus Park. IB
Anicetum & Melochia
A±o iurn, Raunoifit, h tfl-Ligd*

5 C&ffanl pcrfu/ectrfoinCBP

6 Leontopetalon, Lab L.ugd-Hift



*Isatis quernis
Park. IB*

8 Soldanella Alpina rrtaf- g Setdtint!tiA{pina
Clus-Ger-Park

106. 11.
*Isatis Sabroa vel latifolia, C.B.P. Gluthum
Sativum, Park. hift. L.ugd.*




Auctoritate D. Friedrichi Graebneri de Nollherbie Equitis
Baronetti in Cambria Comitatibus subdignissimi h. c. v. c.
quodammodo Graebnerorum familia in Saxia orientali

SILICUIOSA

Thlaspi Knfeioi/r rftunruk fytie bb
Ad. Hujum. alioq. mariv/n..C.ST.

TETRAPETALA, DISCOIDES Thlaspi fytie media tetrapetalo florum discoide

Thlaspi fruticosum spinosum, C.B.P.
fruticosum spinosum Narbonne, Loh.

Thlaspi montanum minus, latum, sepali
folio magis, C. B. P. montanum latum magis
Prod.



Thlaspi saxatile vocatum latum sepali
folio rotundis, C.B.P. longicaule, latum
montanum ferocidius, Loh.

Thlaspi Hujum Dacti compositum
mag. C.B.P. Hujum, Roth
Loh. Prod.

Thlaspi Hujum de-
fuit compositum magis
C.B.P. Hujum, Roth
Loh. Prod.

Thlaspi fruticosum vocatum
C.B.P. vocatum, Montanum, Loh.



Thlaspi Crithum fl. albo C.B.P.
& Prod.

Thlaspi Alpinum maj. capitulis rotundis.
C.B.P. & Prod.

Thlaspi Alpinum minus, capitulis
rotundis, C.B.P. & Prod.



Auspicio D. Roberti Wharwood Generis
de Civitate Oxoniensis.

SILICULOSE TETRAPITALE.

12. *Thlaspi arvense* Siliquis latis. C.B.P.

Septo medio longitudinaliter siliqua dehiscente.
13. *Thlaspi arvense* Faccarie lato, levigata. *Thlaspi*
folio, C.B.P.



.3?

15 & 16. *Thlaspi arvense* perfoliatum maj. & minus.

18. *Thlaspi umbellatum arvense Iberidis* folio C.B.P. amarum Lab. Ger.

19. *Thlaspi umbellatum* Monspel. nupturij. F.S., C.B.P.



21. *Thlaspi umbellatum* Creticum Iberidis folio C.B.P. Lab. Ger.

22. *Thlaspi* Alexandriae Cretici, L.B.

20. *Thlaspi* hoc Tittyfi adjntm Tab. 16. *Thlaspi minus* capitula retarda folio



SILICULOSA TETRAPETALA. Proceris Thlaspi in die longitudinaliter fissis foliis argenteis.

Tab. 11

24 Thlaspi Arvense Thlaspi
ceruise fol. C.B. Lucerna
1. Pars patens fructu. Col.



25 Thlaspi montanum abren
rubras fol. et fructu. Thlaspi
patens fructu. Col.



26 Thlaspi montanum semper virens.
C.B.P. Park montanum candidum
261^o h. h. h. h. h.



27 Thlaspi saxatile vermiculato fol. C.B.P.
Thlaspi montanum fruticosum vermicu-
lato fol. axia. Col.



32 Thlaspi fruticosum angustifolium Lessert
fol. C.B.P. fructu. Thlaspi fructu
montanum. 181. h. h. h.



33 Thlaspi fruticosum fol. Thymbræ
herfol. C.B.P. fruticosum minus. Gr.



28 Thlaspi zillifolium capsulae h. h. h.
C.B.P. x. Prid. matt. 12. h. h. h. h. h.
h. h. h. h. h.



28 Thlaspi Allium rotolens nobis
Scrodokthlaspi thlaspi Alarouandi
181^o



34 Thlaspi montanum glaucis folis C.B.P.
montanum 1. sed petalium. Claus. h. h. h.



29 Thlaspi parvum saxatile
rubens. C.B. P. h. h. h. h. h. h. h. h.
C.B.P. 181^o h. h. h. h. h. h. h. h.



Supremo D. Johanni
Zill. Augeri.

TETRAPETALE SILICULOSA.

Tab. 19. Section 3.

1. *Nasturtium hortenice vulgatum*, C.B.P.



2. *Nasturtium hortense latifolium*



3. *Nasturtium hortense crispum*, C.B.P. *latifolium* & *angustifolium*.



v.,a

4. *Nasturtium petraeum* * ^ / . Bin* *ratone*, up.



5. *Nasturtium pumilum vermicum*, C.B.P.



6. *Nasturtium syl. Oxycoidis folis* C.B.P.



7. *Nasturtium syl. Erucae affine*, C.B.P. *syl. Valentianu*, Clus. hist.



8. *Nasturtium verrucosum*, I.B. *Coronopus* Ruel. hist. lugd.



9. *Nasturtium Alpinum tenuissimum divinum*, C.B.P.



TETRAPETALÆ. SILICULOSÆ.

1. *Barba pastoris* mai. folio sinuato, & non sinuato. nobis.



2. *Barba pastoris* media, C.B.P. minima, Ger.



3. *Barba pastoris* maior hirsuta locale nobis. Braba minima nostris Dru.



4. *Barba pastoris* minor locale oblonga, C.B.P. parvifolia, Pulten. Red.



5. *Barba pastoris* minima forma foliis hirsutis, loca de oblonga, nobis.



6. *Barba pastoris* maior hirsuta Alpina, locale oblonga, C.B.P.



7. *Barba pastoris* hirsuta (ubi) remota folio hirsuto locale nobis. folio non hirsuto C.B.P.



1. *Cochlearia* folio sinuato, C.P.F. Britannica, Hoff. Lugd.



2. *Cochlearia* folio subrotundis, C.P.F. Baltica, Led.



3. *Cochlearia* Hederae folio nobis. Thalesis hibernica, lob. Lugd. Jor. Park.



4. *Cochlearia* minima Americana, lob. dilata, ruscata, nobis.



Aussigne D. Johannes, Archid. Comitiis de nobis, Carol. 2. Churugi, principis de copiam, quibus dicitur, Churugi, Generalis.


SILICULOSA TETRAPETALA BICAPSUL-ARF^

T. 121 Sieber 3

1. *Lepidium latifolium* CBP Casdamania latiore
Lepidium peruvianum latiore folia nobis

2. *Draba ramosior virginiana*
nobilis atrxtgar

T Ji *Draba ramosior folio CBP Park Iberis Scleranthus*
Matth. Ed. R. B. Lepidium Corn. Ep. Matth. mtom



3. *Lepidium latifolium* CBP Piperitae
Andinum sub G. Park con
reperit sed perenne, nobis

4. *Draba umbellata* var. *capitata*
Draba donata CBP Arduo seu
Draba AJTatarhuBi

5. *Myosoton sibiricum* CBP Humifera
Myosoton Dod. Pseudomyosoton
Matth. Lugd.



6. *Myosoton sibiricum* CBP Pseudomyosoton
altissimum, Cam. ep. Matth.

Refer hac duo postrema ad G. ex
Myosoton monospermon latifolium
CBP & Prod. monospermon maj. Park
Myosoton monospermon. J.B.

Myosoton sibiricum latifolium CBP-S
PhSPATkMy^J^nuhria



4' 4'

Anopisma Clarifera var. *D. In h. annis Broome*
Mulatae Duchesi Saueri Albani 1811. in
opere Hartfordensi.

SILICULOEAE. THIIIFETA

1^a Veronica spicata, terdens, E. fl. flore
ceruleo, Clus. hist. Pseudolythamium
ceruleum, Dod.



2^a Veronica spicata lobfolia, C.B.H.
Larretur lobfolia, Clus. hist. maj. latifolia,
folijs splendensibus, & non splendensibus,
L.B.



3^a Veronica spicata, angustifolia, C.B.P. varia
vulgaria maj. Clus. hist. varia, vulgaris, maj. Clus.
et ceritay angustifolia L. r. r. r.



A • ffrtmifü spüglu motor. C.B.T.
rti C.fith^er-lugd.
mü/wr, L.B.



4^a Veronica Alpina frutescens, C.B.P.
Alpina minor serrilli folio, Fona de
monte Baldi 3 fraticans, Clus. hist.



r&-

5^a Veronica mas raris, C.B.P.
raris, Clus. hist. mas, hist. lugd.
ajuryma, Dod.



6^a Veronica mas supina & vulgarissima,
C KF.mti frjnti. Ho4 vulgarior fol.
B.



7^a Veronica pratensis serrilli folio,
C.A.P. pratensis, Dod. Tenuris pe-
trorum pumilum, Ger.



8^a Veronica petra sempervivens, Fona de
mont. Bald. j. vorius pu- 6 silu. de
Chamedrys, Clus. hist. C.B.P. var.



Anspu Clavis Per. D. Gallici
Jxob MJI di apy Candano

Veronica minor alba frutescens, nobis Teucrium Chamædrys spuria majuscula frutescens CBP Chamædrys spuria lalisfolia t-B

SILICHILOSA, TETRAPETALA.
11 Veronica supina forte Teucrium pendens, Lobelia tenuis, Phytolacca spinescens Chamædrys lalisfolia

12 Veronica ramis rotundifolia, nobis hamadrya sylvarum, Chamædrys rotundifolia CBP



17 Veronica minor lalisfolia, nobis Teucrium V. Clav. hist. Perennans Ger. Chamædrys spuria lalisfolia, C-B P Park

+ Venmat scragona montana via minima, Col-Charna, Jryt Spuriat lalisfolia nurnimt-B-P

15 Veronica p. cumbrens. liisculafa htdctajolto, T>objsfyjs jml>tt>icaifia monfanum Co! C hamaari ajfine rotuidtjalra Jvltlfata CBP



16 Veronica minor angustifolia, nobis Chamædrys spuria minor angustifolia, FB

18 Veronica tenuis laciniata, nobis Chamædrys spuria tenuis laciniata, FB

i&. Virt>nicamit&nafol<it>rciisb<il hijliwgd



Am at nit Dlohannh hijft« F. Auctis Barons in aim Caniano

SILICULOSA TETRAPETALA.

19 Veronica annua uft*
polygami folio, nobis.

J0.y* rmat* fLriimsa- falig,
Trrfini 3- terretw ititir

itff-ermUq fiatfi Jit can

Ttrrshaai Chun

andryfoka floru
opiongu perualiz infidenton
nobis.



25 Veronica triphyllos caerulea,
nobis. Elatine triphyllos, laqo

Veronica aquatica minor, folio
subrotundo, nobis. Anagallis Sen
Becabungo, G'ir

Veronica aquatica perennis.

Veronica aquatica major, folio
oblongo, nobis. Anagallis aquati-
ca major, G'ir.

26 Veronica aquatica, folio
oblongo, nobis. Anagallis
aquatica folio rotundo, G'ir



47 Veronica aquatica angustifolia,
nobis. Anagallis aquatica angu-
stifolia, C. B. P.

28 Anagallis aquatica perennis,
folio Becabungo, nobis.

1 Polygala vulgaris major,
Clus. hist.

2 Polygala vulgaris minor,
Clus. hist.



Auspicio D. Edwardi Austri-
Generosi, in agro Cantiano.

TETRAPETALAE, SILIQUOSAE & SILICULOSAE. APPENDIX

Section. 5. Tab. 25.

Sisymbrium Alpinum
Rutistrey folia rotundo
 Zan. pl. 12 pag. 224.

Erica Alpina radice
Serpente, Zan. pl. 5.
 pag. 228.

Keiri Alpinum foliis multifidis
fluteo odorato, Zan.

Erica Chalopenois flore
dilute violaceo siliquis
articulatis, nob. pl. 25.
 pag. 232.



Thlaspi fr / *tfcastim*
Ericum flore al > o odomto. *Dpucaridia*, Zan. pl.
 Zan. pl. 25. pag. 299.

**I*hlasp i vmrum i* /
 17. pag. 290. & 294.

LepirfirtrnDtosevidtiLinyh
 Zan. p. 2. pag. 312.

ihatap i frttiemum d
lericcnutfuA Xevtta < y <
 ff. / iScfir! sitii, iii / *Utrajif. s*



trt.r'ntjoint mitffu.
nilihiU. / *Droba Diacordis*, Zan.
 pag. 313.

jmtfaffrujH
 V > ""** < £*

arm- / *otwnnto qtnnim:*

battue fiortutttnvj'wfv



Auspiciis D. Richardi
Edgumbe Equitis Balnei.

P L A N T A R U M

FJifto#& Univerfalis Oxonienfis

P I R T I S 11; | S E C T I O III.

t)e filiquofis cefrapetalisbivalviSus fepto medio membranaceo difier>
minant^in fingulisilliquis duplicem feriem.femfnum.

SILIQVIFAE TETRAPETALJE BICAPSULARES,

C A T V T I

§i. B. R A S S I C A,

B Raffica Theophrasto u Hi/I. 19. 'inter olera e/l, quae & est bivalvis, & corand. Diofcoridi I.2. c. 14. K^C*, quaji**&#&***> quod oculorum pupillas ladat^ dicitur. Theojthrajlo & p^*^*ov diet, in %haphano infra monebimus.

(j-cr*cr*: T>iofcoridi fativa, Jihejlris-, & tnaritirna. At Tbeopbraffio -j: HiJl. q..aliacrijj? a, alia Uvis, alia jilvejlris. Tlinim cuml.19. e. 8. IZraficse Cauliumve tria genera ex Catone c. iij. enumerajfet, flura adhuc effe refert, Cumanam^JrL cinam, Pomfeianam, Sabellicam^Lacuturrem. Jtlzo. C' p. Gracosin tres jbecies divijijefcnbit. Crifpam, quam Selinad^a ^tmilitudinefoliorum Jpii vocarint; alterant Uvem latifoliis qua Caulodes quibufdam • tertiam proprie Crarhbem appellatam* %£centloribm differentia fum pfoliorum colore, cri/pitudine, denfitate, aliifq; qualitatibus. AH'u enim color viridu, aliis candicans, aliis purpurafcens. Crifpitu/o & Itevitas, tam in Candida, quam in viridi (quam nigram vocant') rarius in purpu^ rea, reperitur. "Summa genera funt fativa, fihefim <T. maritima^ fativa, alba & rubra &c.

Dedufta explicatidne plantarum filiquofarum papiionacearum, feu Leguminum in prfcedente fecunda Se&ione, jure affinitatis& cognatiohis filiquofarum plantarum cum liliquofis, ^liquofoe tetrapetalae bivalves hanc fequentem tertiam Se&ionem fibi vendicabunt.

Nota generica qua omnes plants in hac Sedione tertia contents afficiuntur, efto hxc: omnes donantur flore tetrapetalo (id eft firtguli flores conftant quatuor petalis feu foliis in fioribus, cujufcunque magnitudinis aut colonis fint; J fecundo fingulis fioribus tetrapetalis fie conflatis, fuccedunt fingulae filiquas bivalves (id eft duplici tunica afficiuntur filiquae, hinc: una, illinc altera, quemadmodum videre eft in filiquofis leguminofis feu papilionaceis J fepto medio difterminante duplicem feriem feminum, quae communem habent matrem ipfa nutrientem, feptum fcilicet praE:diel:um nutritivum, quod poft femina ad perfedionem perdufta exficatur, & fit mem%ana pellucida, alba, inutilis, quemadmodum tunicanpfx. ita & floribus & compofitione diverfa filiquarum, diftinguuntur filiquolie tetrapetak a iiliquofis papilionaceis feu leguminofis, etiamfi convenient, quod fint filiquofae & bivalves, diverfo tamen modo conftruftas.

Plantas filiquofas tetrapetalas dividemus, vel in culinarias (quae funt calidae Nacres) filiquis tenuionibus feu gracilioribus donatas; vel in culinarias radice& filiquis craffioribus praeditas; vel deniq; in recreativas, gratum odorem furYudentes. Exordium a filiquofis tetrapetalis culinariis, calidis & acribus, filiquis tenuioribus affe&is, fumemus, quarum Braffica erit jprima. Nofta sta's non paucas Brafficas obfervavit, Vel colore, vel forma differences. Quasaamenim folio feffili patukfunt, alias contra&o capitatae, albida:; nonntillae rubrae, mgvx quaednra, feu faturo potius colore viventes. Theophrastus tria genera Brafficas ftatuit v^i <pmj> fi-
ve crifpum unum: akerum Aw^Mv five feve: tertium^* five iilveftre,^ hoc vulgOzief.<^*


• • • . . ' • • •

D ^


dicitur-

dicitur. Quibus a neotericis additur * & l * & * fy Juoruq. Brfica marina, quae est vera Brafflca species, repens & monofpermos; prater marinam Efej^oridis quae est Coifyrolvuli species, ut fradenionfravimus cap. i. Se&ionis primas hujjis Historiae, inter fcandentes campanulatas laftefcentes, & ideo a line; ultimo non hue pertinet.

TA, BxLULA L.



TABULA "II.



Explicatio Tab. 1.

1. **B**raffica capitata alba, C. B. P. Braffica capitata albida, Dod. Lugd. Haec Candida est, quas Lacutarris Plinri; est & viridis, quas Tritiana; caule nititur crabb: folia ini- cio funtia ampia, tunc, tunc virentia, crassiusculis albidioribus distincta, procerioribus interna folia in globi aut capitis formam arduillime contrahit, quae propter defectum aeris candidissima evadunt, externis adhuc latis, amplis, & facis virentibus: capitulis vere dissolutis caulis affurgit ramosus, flosculos tetrapetalos luteos sustinens, quorum singulis succedunt filiquae singulae, bivalves, septo medio dirimente duplicem seriem seminum, hinc unam, illinc alteram, arete leptc medio adhuc vindi acifzrentium, Sc inde fuerunt turritium, donec ieminaperfea maturitatem adptalint, quibus perfecte maturis efficcantur geminae val- vnte, & tunc membrana alba pellucida apparct, non folium < nifcc Brafflic < species, fed &

in; omnibus fern[^] feeciebus 'hujus St[^]i]fcis , quod cuiiibet examinanti nobiscum apparct. Videat & obfervet lector Botanicus filic[^]te pssim aflculptas plantis, fpecifice adhibitas per totam Se&onem, atibue perck>ret fingufofiliquas apertas cum duplici tunica & fepto medio, in qrlbus nutri/(bañtur£^^a, hincinde, in duplici loculamento.

2. Braffica capSifci rubra, C. B. P. DpdITab. Ger. Hxc in omnibus convenit cum priore, nifi colore fofiorur[^] Sr[^]u[^] una ci[^]coftis rulljent ; caput globofum utplurimum minus est prioris.

3' Braffica capitata pr/lycephalus, Lug[^] Braffica ex capkulis pluribus conglobata, C.B.P. Hæc radice, caule, capif^{as} conglobatis, prasdicitis par & fimilis; at magnitudi- ne capitum prionbus cedit. Vrodii^{o^a^4^u^em} naturas lafcivientis, ut ita dicam, oftentatione, fpeclatu digna, non ut fuperion%:CT^{nt} unum profert, fed plura, aliaab aliis difcreta, ih unum tanquam acervum congelb[^] e vbnofis tamen folijs conglobata, alia majora, alia minora, inufitata quadam & r[^]&J\$W[^] Q^{^^^nl^} terras libertati adfcibunt, cui femer plenius & felicius nutritum crepitu[^] & px tamcopiofum alimentum prasber, utgignendisatquenutriendis tot capitb>>>ofufficiat; nee minus adferibendum ubertati terrae feu foli, fed*praecipufe magi5>femini majori meliufque nutrito: idem obfervare licet in fru&ibuaarborum, feu nucleorum numero, & in multiplicitate petalorum à femine ortorum, in herbis multis diverforum generum, in Hac nofra Hiftoria plantarum digeltis. Hujus capita 50 aliquando, ovorum magnitudine,* enumerantur.

4. Braffica alba capiteoj[^]longo noii petiitus claufd, C.B.P. Braffica Sabauda hyberna, Lpb,jcqn. Nee minus fpeciofa hæc Braffica' 4", quam Sabztudam recentioves nominant: à feffili capitata rubra diffidet tantum colore & capitulo patuloaliquantulum,feu minus claulò, çV floribus albis; admodum fub frigoris habitudine aeris est impatiens, quare non tam feliciter apud feptentrionales provenit, ubi reliquis Braffica frequentiffime coluntur&eduntur: ad maritima, plurima & frequentiffima in Italia & Sabaudia colitur , unde ei nomen. Caule & fbliis , adeoque tota, inter Brafficas albas candidior teneriorque videtur: folia quoque fatis ampla funt, atque rotunda, per fe diutius virentia, candidis venis intermixta, quasdam etiam modice crifpa, ac vario contortu nonnihil rugofa: foliorum quoque pediculis brevibus auricula quadam foliaceas adherent: flores tetrapetali, albidi, quos non mfrtepidiore fole illuftrata terra profert; ^uippe utidiaum algidi frigoris impatiens, minus ardo foliorum implexu glomerem longiorem & minorem eflbrmans. Siliquae & femina funt ut reliquarum fue f[^]miliis. Lautior hasc, quippe tenerior,dilicacioribus xpetita,in eorum potiffimumgratiam, qui ejusnoruntbonitatem,,menfis imponitur.

5. Braffica alba crifpa, C.B.P. Braffica Sabauda crifpa, Tab. Ger. Braffica Sabauda,Dod. Hujus folia ffnt rotunda, rugofavalde, ac itaquidem rugis inxqualia funt, ut fingula ex veficis aut valvulisquibufdamcon/imilibuscongeftavideantur, fupra extuberantibus atque promir[^]ntibus, fubtus cavis, brevibus pediculis adha;rentia: color foliorum ex luteolo & albo viret, qux palide viridantibus coftis quoque intertexta funt, eadem ctiam in denfum globum coguntur, fed parvum & candicantem, dum extremitates exterins virent: flores lutei: filiquis & femine caeteris fuas farina: fimili] est hæc Bi affica. Hyemem non fert.

&> Braffica fativa albavel viridis vulgaris apertalavis, nobis. Alba vel viridis, C.B.P. Braffica vulgaris fativa, Dod. Lob. Ger. Hæc est Braffica la?vis Theophrasti & Plinii, cui 6c Caulodes. Hujus folia funt magna, lata, expanfa, Sc patentia ufque, in faturato virore, rubore nigricantia; caulis qui e medio foliorum Vere furgit, fbliiis ramofis ornatur. Flofculos profert luteos: filiquas oblongas, a[^]uales funt Rapi, & femina rotunda ejufdem aemula: radix fibris firmatur.

7. Braffica fativa rubra aperta kvis, nobis. Braffica rubra, Dod. Braffica Cumana five rubra , Dod. Gall. Hæc crebro in hortis rubro colore ex caefio vifitur, cui nunc coftas carinasve in dorfo medio foliorum rubentfok, mine & carinas & reliqua foliorum albescunt aut virefcunt 6r reliqua foliorum tunica purpurante, oris interdum fimbriatis & crifpantibus decorantur.

8. Braffica fimbriata, C. B. A Tophofa, J. B.Chabr. Tab. Ger. Crifpa & nigra, Dod. Crifpa, Lugd. Huic folia anguftora6rlongioraantecedentis foliis, ad coftam ufque m#diam lemcl atque iterum profundius incifa , per margines vero admodum crifpa; quæ ad verfa parte bullis ieu quafi ampullis numerosis protuberantibus, in averfa parte concavis i;aflim ornantur, tota quafi nÿgrefcunt aut potius far.urate magis virent/

9-Braffica fimbriata pumila[^]CB.P. Braffica Anglica minima, Ad. Lob. Reperitur hie in Anglic "hortis Braffica pufilla[^]feu Braffica totanivea, pseter extremas eras laciniofa^s

fimbretaque, plicis crispantibus Srundulirugofi ~,)iirpureis & Licis "Operas, ad corollas fen oUaftioriola ne&enda propter varium colore.^ifudigniflima. Ten:lla hax Biaifica in hortis Anglic & Gallic colitur, dum tenella adhw: efu fatisgretay fi cirri bubu¹ -n & verve* cina elixetur.

io.Brassicacauliflora,C.B.P. Dod.Cam. Ep. Florida botrytisjto. let -<r- obi, peiana¹ aut Cypria, Dod. Gall.Lngd. Cam. lip. folia; huberlu^iibiuli.i,lurigioramulto quam Brassicavulgaris, nee tam lata, dilute virentia, cfore magis ghuco, rftenora pr^ertim, ncrvis candicintibusconfpicua; nulla magna lacini^im divifura per afcibitum, longiufulca diftantia denticulata & veluti (errata: mediuminter folia in caput gomeratur, fed molliiis, minus deffo foiorum -ncubitu formatam, ex quo ftoresdeniffimo jftipatu prodenntexigni, palhdi aut candicantes, velutin umbella pofiti, qiii cum caultg^i^fuis (Aparugorum more) teneUis tenerkudine & gratia cettare videntur: atque <& idNaatoribus tantum patinisexpeti oblervabantur ab initio, Ted jam paffim vulgares funt, fivawauo & cura le- raatdr & ed ucentur. Erucs huic concolores fepe eandem depafcuntur, Vt pro Brassica can- hntiora Brassicxadaver relinquant. Obfervavimus paffim in peregrinationibus nt^-^ per Galliam hffes, emcas peculiare herbas quafdam afte&antes 8f fibi appropriatas rodere manducareqik, hide ex diverfis erucis diverfi papiliones cmanarunt.

ii. Brassica aparagodescnfpa,C.B. F. Epiphyllitis Dalr", Lugd. Gr.ifpapolitera, Tab. Ger. tolta JDIDS modolacmiata, modoplana,modo expanfa, vel rota virent,vel vem ficicofraj rubent.Sans quidem miranda haecBrassica quam Aiparagodemeffsdictmt-Herbarit^uius mentiontinGeoponicisCaffianiConftantinoattributis. Caulis huic &rami6f radixcsreranimin omnibus funtammila; folia funt hciniata &frequentiffimis divifuris incifa, qualia fane Brassicx crispax, qnx nonnnquam tota virent, noniranquam venisper ip(a folia difperfts & media cofa rubent. Huic vero id peculiare est & infignequod ex foliisromrnqnc przeipuecoftis & venis lateralibus toliou multa brevia, tprofa &c crippata, nafcuntur: floret fuo tempore &fc- menecUt, non ahter quam in rdiquis Brassicis ex caule vel ftipite, quorum teliolonim cum Aiparagis fimilitudo fecit ut hanc Brassicam aparag^dem Grzci vocaverint. Hite- neJt alparagi in jure aliquopingui, ut capi aut vervecina:, eduntur.

12. Brassica Gongylode^ C.B.P. Brassica caule Rapum gerens, Dod. Caulorapam.,Lob; Ob. Cam. Ep. Tab. Raraadmodum fpecies Brassic* haccfest, qur patulis foliis glomerem nullam fecit, verum quo f.],o figno faaleabaliis feparetur, est brevis caulis, cm alioram coma fubeft, & In R^umefculentun, extuberat. Variat R.po rotundiore^ tonporc, h« Caulorapam rotundum, ilia Caulorapum longum dicicar^KGer. Dimiir Dalechamp.o Bras-

^S3- Brassica latoApn folio, C.B. V. Brassica fclinifia larifbia Tab. fee Brtll.ca tuha^b « crispa difleaaufque ad coftam mediam, adinfar Apn latdohi, unde primo af- Brassi^fclinifiaandtifdOa ioliisdiffeftioribus difcernitur hare Brassica.

• H- 5 c a S t i ApH folio, C.B. P. Brassica felinoides, Dod. Qcr. Brassica angustifolia Tab BnSfi*³ Apiana crispa, Cam. Ep. Brassica tenuirolia laciniata, Lob. i_on. 5V Obf. Foli,ahabettirxcedencis longiora,proriindina»indfa, ufque ad mediam etiam coftam, prima tacic folia Api» cenuifolii rererentia, undeutriquet & priori&huicnomen: faultsedir utraque h^c Brassica felmiim tiicubitales, quorum cymisinnafcunturflores tetrapetalijuei, S^uostequuntur racematim filiqua: bivalves, continentes femina, duphci ferie, feptomedio pellucidofeparata, aliarum Brassicarum more.

¹ ? Brassica maritima arborta feu procerior ramofa, nobis, Exc reliquits procerior est & ftipite veluti arborefcit alto 3. ant 4. cubitorum, craflb, viridi dura estrecens; corti^e afero adulta, iniaparte verrucofo, in ramulos plurimosbrachiato in fi-pcioreparte, (eu di- vaVicato-, caulcmcm?,^{nl:} telia fortuito pofitu lata, ex viridi rubentia, aut rubore obfeuriore pertufa, non fine obduftu nebula: cujufdam glaucs, crebro nv'-arum venarum decurfu rugofa, patola, finaafaqoe: nores lutei cauhum fummis ramis - , quos (excipiunc iVivalves, palmares, in qmbns continentnr femina rotunH Hums h ula ma_ wnt wpanfa pofit femem perteccum; hyemem perFert, ac' . ta in hortis ar l acqui- nt proceritatem, ac ita durat in aliquot annos postquam , pQriesannuatim to^ . fe elfti- dene; fe^{pc} etiam laterales product ramulos, quoram h t n ovd.ah veraeXeullecu^linls potiirun^ expetita: « g g ~ ^tolm>ia Verccdit in iciaria veniunt. Hanc Brailicn, m r,p.bas oalcofo f^S^ZZT T \^7^ P^{oftea} 2^o . 660. perfeverantemobier- vav,muSj euam ad pluK^nnos cum Londini in hirto Edvaxd. Morlan, tunnnhorto pub- blico

Universitatis) in antem nostqua... in gulis aiinis femina sua Cdpiofe cdideiit. Maritt-
 nam appellavimus. juiia h^yrdicio^V^St oftendimns; arborcam leu proccrioreiti, pro-
 pter altitndi^ ^ & ranis; & m, pi'dprer 'nunierrflfam ramulorum copiam quos geritj
 quae °ni^ .jdicanr/ ipivim fiikifce d'fff4^e ^ r^0,3 filveftribns, precipuc fiiveftri Di-
 ofcoridu, feu fifcikj CramaeTliftaDofloYiu. Braffcidmneshaefpecies minim inmoduni
 • htdunt, & in C^M, ^c^ Udons craafniucantuti nani ex BrafCca fativaaperra, feu vulgari alba
 & rubra, in agro Lnne tjercoraco & (ale abwidante procreantur DraijIca:cap!tata:albiSiru-
 bra, «tque exearundemVt^TM^11!^ in agrjff fterili, fabulofo & gtereofa fatis, recnprant
 priftinum ftatum, ideft(^in!: BraiEcse Jjfcrdē in hdrtis filveftribus, & ftercore dertitutis,
 adeo ut ex leminibus ^ratūae capitata: abae & rubrs: ad oram feu niargincm filv^ Blē-
 icnfis confpexerimus Br^c^ani aperram provenire, ad alitudinem decem cubitorum. Braff-
 fici irid-rm TophoiWernRh ex Italia ad Reverend iff) mum in Clirifto patrem Hcnncum
 -ompon Epifcog^Londinenrcm tranimili), Braificam produxere Toplioiam 6f in Horto
 no Oxonienfj^i^/liorto pubhco Botanico Univerfitatis, kd hums temeti denuo facum
 filL^ejlfa<rf*jn v!Sfgarem aperram !a;vem. Idem dicendum de Btalfica ilorida Botryte, cu-
 juſ femē -.cens ex Italia ad nos raiffum, Brafficas itoridns produxit, "led femē ejuidem
 liic in Anglia colle&im & fatttm, clegenerat in Bjallicam longitoliam &: apccara, quod
 experientiaou-nib'JS compenun; fed mi!li magis quam Richardo Baal hortulano Eiarltor-
 dicnfi, qiii ingenteiD femiois BrarTicsforidi copiam collegir in horto Tuo, quod vendidit Hor-
 tolanis, comphnimis in fubnrbanis Londini loci; vulgo diclis tte jijcat^oufest degencibus,
 acqre hi cum fumma cura & indulhia eadem (emina terra: a mukis ann'is beie ftercoratl
 commiferu'nt, qui Brailicas iati-; magnas, loiiigifolias, apertas, ipfis produxere: quare praē-
 difti liortulani anipiadvertentesfe oleum & operam peididifTe, id eft, icduftriam, curam,
 labores, & magnos funipcus impenditTe fine quiftu, imo cum maximo detrimento & di-
 fpendiotemporis & pccuniarum, jppi prattliffaBaalin foro Veftmorrafterienfi Iitem intende-
 runr, accjaeex fententia non folnm JudicurrHlic icdentftimcondeninatns, ut ipfis pecunias
 quas acctpliieu, _reilitaeret, fed infuper muj&atns fuitidem Baal, ut ob jafurara temporis,
 difpnditmaiafuihuerraErrrcompenlaret praedifto horruianos. Braffice Sabaudartam hy-
 berrE quam ^tiva: femina rccenter ex Italia ad nos tranfmida Icltcirer provejiunt hie in
 Anglia, fed femina ejuitlem colleftj iic dtgenenuic in Brafflcam aperram. Braifica afpa-
 raga-desiliquando copiofe loliola criipa ex coftis & venis foltorum protrntlic, aliquancto
 ntilla, imo in vulgarem criipam degenerat. Sicquilibet veteranus iortulanus pcmntationes
 6f degenerariones BrarTicarum exnna in alteram obfervare facile potent.

6. Braffica muritima major rcpensniultifloraalbamonofpermos,nobis. Brafficamarina
 filveftris multiflora monofpermos, Ad.Lob.lcon,Lngd.Ger. Radiceconfat hsc longe la-
 Ttnofis ad oram maiitiam. plaga;feptentvionalis repente; Folia ei flint crarla, la-
 iftn,fimbriis undnlatisplerique mncisconccxtis, fubexortunie terranigiican-
 ritjus,) iia ipfaplaiva in urenofismaritimis negleſh & incuha, hifpidiora tirnultoijunt
 folia, recentia tamen adhuc procibis apauperibnsmaiiſaccolis coleranda : ex fblorum me-
 ditullio fen gremio protrudntur cauliculi bini, terni, nftincentes in (umms hftigiis plurimos
 pediceilos feu ranmicubs, fingulos fingulos Mores albidoscetrapetaJos'craffbs gerentes, qui-
 bus fingulis fncetdaiit finglacriliqu^: breviores, craffiuſcithe, quaium unicuique fingtilare feri
 vntcuni ineft femē. Frovenit in oris maritimis cum Gallic feptentrionalis,viddicet Neuftrix,
 Armories, cum ArigliE & Hibernian prarcipne verfus infulani7^rfff/ 6V prope Colcheftriam,
 altifque maritimis Angliarlocis, ubi incola? maritimi pro olere efitant, ipfam fativa: incuntc
 Vere prſferentes, A nobis Braffica maritiraa : quam Diofcorides hoc nomine defignat, recen-
 :iores Soldanellam mannam appellant, quſ a ceſſera generica convenience Convolvulis Con-
 volvulus pfoprie;diſtus eſt, uti videre eſt in Hallucination!bus Caſp. Bauhini aliorumque
 Aurhorum a nobisobſervatis adfinem cap. 2. SeSionis I, hujusHiftoriac.

Explicatio Tabula fecund*.

i7. BraiTicafi!veftrnsCrai diaa, Dod. Siiveftris T- ejufil' n. filveftris Diofcoridi dicta,
 omnino funt fimiles, niſi q'vou poſterior-fitliirfutur, albidior & ſi joreamarior: tolia fi-
 q.uidem,flores,filiqu^{3ec1dc} ibt'; iater fe^rcfpondent. Nafcitur "n praruptis maritimis locis,
 ut ai' Wofcorides: reperito/in Zelaifdisaltioribus juxtamar... ilisarenofis. Eft&Braff-
 ficz lubrJE fpecies, QuD Dodonaruspnitpro omnium mini... ft ſcre filveftri fimifis,
 caulibiifi

caulibus & foliis filveftri primam refert, nfi qugd^minora habeat.V %? in cibos admittitur., fed feminis tantumgratia feritur, ex qu^|I>rimkur oleum, qii*>d"vulgo olei ex Naporum femine exprefli nomine venundatur, fki/e at Navette GaJU, vocant^anc quibuldam eife Catonis Brafficam Dodonxus exiftimat, qu£ Crampe proprietur, #ur. Neyitiquam dnbittandum eft, quin oleum ex feminibuscujuflibet Brafficatfa)it Rapi, Napive, r:of(trufatili poffit exprimi.

18. Braffica fpinofa, C. B. P. Prod. Mattli. Eg*. Bauh. Hanc fie defcript Beti^us. Ramulus eft fine foliis, autfaltem obfeuris, prope caiys exortum • in fummo caulis faftigio fpinas tenues confpiciuntur, cauli concolores, digiti ar Uguli unius longi&jdine, ita ut videantur folia in has fpinas deiviife, cum in fummitate nulla obferventur folia. Caulis lignofus, quafi craffus in ramulo dno, alterum palmo majorem, alterum minore, rotundum, laevem, fteracum, dividitur: circa quos folia linearia longitudine, & tenuioria lata, per ambitum leviter firmata, quibus & minora inferjuntur: ramoli in fpinas acutiores & minores abeunt. Ramulum unum Patavii in horto Bfcbiano ad Camerario; alterum ex horto D. Alpini privato accepit Cafp. Bauhinus Iconem quam exhibet in Prod. & in editione lira Mal&jpji, eandem nos damus in App- ad SecYonem tertiam. Mancaeft defcriptio & Icon ideo nobis fuffe&a.

19. Braffica campeftris flore albo, C. B. P. Braffica filveftris perfoliata, Dod. Perfoliata filiquofa, T. B. Chabr. Folio confat omnino latiore, laevi, indivifo, for mae oblongae & latae fatis, caulem quoddammodo ample&ente, perfoliatae omnino plantae fimili: cujus cauliculi teretes, tenues inanes, flofculos initio proferunt candidos, quos fequuntur filiquae tenues, oblongae & angulofae. In campis fponte gignitur in Hifpaniis, teftes Car. Clufio, tum vero in nonnullis Auftriae locis. Floret aestivis menfibus, atque interea etiam femina perficit. Silveftris Crambe difta, calida & ficca eft, quia amara extergens quoque • *P^A^EII *yp<* a Diofcoride dicitur, Latinis Braffica filveftris, & a quibusdam Braffica ruftica.

20. Braffica campeftris perfoliata flore purpureo, C. P. B. Braffica campeftris altera, Cluf. Hift. & Hifp. Virgx hujus firmioreS funt, nee tarn ramoſe, quarum folia in fummo aliquantum ferrata funt, reliquis autem notis a priore non diftert quoad folia, quae funt pariter fervido guftu: flores prioris floribus fimiles itidem, majores tamen, Leucoi aut Heſperidis floribus magnitudine pares, colore vero Lunariae Graecae, purpureo videlicet, quos comicula fequuntur prioribus familia, familia pariter femina continentia; radix tarn in hac, quam in priore, licet dura, fibrifque quibusdam prxdita fit, vivax tamen non eft, fed prolato femine perire folet. Frequens eft utrumque hoc genus, & prius flore albo, & hoc purpureo, in Regno Murciano ad Eliocratem urbem vulgo Lorca diftam, in arvis & fecundum vias ubi Martio florebat; fed & primum genus fponte crefcens obferayit Car. Clufius magnacopiain arvis non longe Vienna Maioflorens. Nondutnum quin harum Brafficarum campeftrium facultates valentiores fint, quam Brafficarum cultarum, propter acrimoniam. Hoc obſervare licet in omnibus filveftribus herbis, non folum in hac Seftione difpofitis, fed & Gc alibi paffim, quod fint majoris energiae feu potestatis ac virium, quam hortenfes, quarum proprie virtutes deftruuntur a redundante fucco, ex agro bene fuba&o & ftercorato extracto.

21. Braffica filveftris Napobraffica di&a, nobis. Napobraffica, C. B. P. & Prod. Radicem habet Napo aut Carotae penefimilem, multis fibrif feu villis fcotentem, ut barbata aut pilofa dici poſſit, prima radix femper tuberofior 6c longior, quae Napum imitatur, confpckur ex hac caulis fequicubitalis, laevis, rotundus, qui in ramos brachiatus exfurgit: ad radicem una cum pediculis oblongis exiliunt folia palmaria, Brafficae filveftris modo, rotunda, inque profundas lacinias divifa, quas vero in caule oblonga funt, anguſta, finuata, pediculis carentia; flores lutei intentioris coloris, quam in vulgari filveftri, qui in caule paimum excedente inordinate pediculis infident, quibus filiquae anguſtae unciales fuccedunt. In locis^rigidioris agnNorvici, montanipotiffimum, & verſus Bohemiam colitur, & ab incolis Vorfenve Worſchen appellatur. Radix ejus eſa apta eft, quare aliqui eam ut Brafficam floridam coſidiant: pauperes eam minutim ut Rapas condunt; fie per hyemem in cella in arena, vel ad cibum, vel ad femem fequentis anni arTervant. Aliquando radix propter niniam ſtatis ficcitacem & loci anguſtiam, hgnofior evadit, quare pott fationem in area ſpatioſa plantanda eft.

22. Braffica filveftris folijs circa radicem cichoraceis aſperis, caulibus autem adh^rentibus planif. uglabns noais. Braffica filveftris Cordi, Lu^J / Brajlka filveftris longifolia, Thai. Hu,us foha conferti^ per terram ftrata ex radic5 p^romunur, binas uncias longa, feminiam lata, fucculenta, h^rfuta & aſpera, faturatiore colore viridi praedita, inter quz bipedalis

alls & akior\ at}do promitar\jaaliL qnem inordinate anibiant folia, akernatimprovementenda, glabr /tfrcaexortum latira\Ainis auriculis donata, deinde in mucronem de/icientia; in mmiS caulibus ad lo^jltudinem dodrantalem circa caulem elindem .urfnni v tonf^tim nafigntor mulri fxigui flores, quattior petalisalbiseonftant.es, quinis inft; arfcuffi^jii f_nper\$&pparenijYWbi]fque tiicceflive fucedune longiufula cornicula, cingeny a c\A?m> quifen/im veluti ilimetK formamfefeattollit: in fingulis comicuEis tenuibus, bi^EilvibJ;, duplice online contiaenturhinc hide adextris&finiftrisplurimapu- filla feniin^rufTa & acria: radix huice^albn, mukisribrisornara, quaetamen vivax non putatur Car. Cjtifio. Svontv provenit in ^erifque AuftriarcollibuslapidofiE, &pafljm in aridis & negleCtisGallia^ocis. Floret MaioSf Jiinio; Sf Julio&Augufto maturum eftfemen.

25. Brailica filveftris tqliis integris&c hifpidis, C. B. P. Bralkka fiivdbis foliis integns per terramfracis & incarffbs&vhifpidis, nobis, Turritis vulgator, J. B-Chabr. Park. Turrica vulgator, Cluf-Hifttr Hxc Brailica; fitveftris fpecies diltnguitur a priore, quod tam folia luimi l'otatin^HKex^rtum fufa, quamcaulibusadliirencia, aferafeu liirfuta liabeat, fatu- rati us virep*tfij reinora: flores, filiquje, 6f femina, confbrmia prioris; caulis tidem adeo denfe filiquis^efrttis ad palmarem & ampliozem longitudinem in mttx formam etiam fefe actol- lens, ut Turricis auc Turritae nomen fit adepta. Provenit in fepibus, in aggcribus & muris terrenis,

24. Braffica filveftris minor feu Turritis fupinaFolio Bellidis, nobis. Hxc a fuperioribus diibus, caulibnspracumbentibus,& folioomniio Bellidis fimili, facile diltnguitur. Natales & nomina apparent in explicationibus,quarefctinemus ad TemperancntHra& Vires Braffica

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Braffica omnis reficcantem iff refiringentem facultatem habet, fimul is nitrofin quendam vebe- mtnti&s abfiergmtem qualitatem poffidet, ham auHm fuccus aut decoffium ejus fibi vendicat, Subfiantia five Braffide corpus afiringmtan is reficcantem -vim rcinet. Deponit enim Braffica

- *decoSHoncnitrofam iMnc qualitatem^qudefuccoachumidoejminfidtt^quamomnem aqua\inquapri- mo decoquitur, dd/epertrabit, quamobcaufdm decofuf),I ejm.'alvum jnovet, veluti fuccus ft hi- batur; abjctto p,imo jure in quo Braffica decocia eft, ahum ficcat iff aftringit, alimntum autem corpori prabet exiguum, iff fuccum ingenerat non probum, utpote craffum, melanchoU- cum; minus tamen craffum aut vitiefum, qu<e albidxfunt, qua idcirco iff aliis pr<sfiant. Cato tamtn crippam maximt commendat^ fed huk albid# cognktt non fuere. Obfcurntate vifws lakrffltibus comftam hanc auxiliariDiofcorides author eft. Cymamejus acrioremfomacho utili- orem7 isr ad urinam tiendam validiorem efe: fale autem conditam ftomacho inimicam efie is ahum conturbare: crudam ex aceto martam lienofis prodefe idem ait. Plinius fplemiicis in*

**lbo per dies 40. exhibendam fcrihit: fertur is Brafficam ante alium cibum fumptum t- ttm arcere, neque inebriari poffe eum, qui Brafficam crudam pr&fumpferit, poffea vero 'amcrapulametiamdifcutm\cujus caufa, naturale Braffiacum Vftediffidium^quodtak eft, ui j quando in arvis appropinquaverit Viti, aut fiatim tabefiat^ aut Yitis farmenta tabefa- ctas> aut fi dum coqmtur vinum inflilletur, de cetera non coquatur, ac color ejmccrrum- patur, ut in Geoponick Caffii Diom/ii Vtenfis fmbitur- Atben^us tamen arcendi ebrktatem*

fotentiam, non foliis, fedfem'ini Braffica **aaferibit**. Conferunt vero folia omnibus iufammaU- ombns ac crdematrs cum polenta trita ac impofira, -cum fale carbunculos rumpunt. Succus Braffic* C autbore Diofcoride J cum Irideintra fumptus, ahum mollit; cum vino epotus, vi- perarum morfibus adverfatur; idem cum Fcenugr^ci farinapodagricts ac artkolorum dcbribu6 impofitus prodefl\ turn ulceribus fordidis acvetuftis: caput purgatvaributinufus: cumloli- acea farina fubditm, menfes movet. Plinitu fuccum cum vino auribus **ifufumfeu** infillatum

Auditus tarditati **prodeffe** refert: **aqv** in **qv** decocia **efi** Braffica nervos articulo fve mire ad- juvsr't ferunt; turn is vulnera recentia at utter a etiam canncmata^ qudt m%hh aliis remediis, fanaxi pof&nt, fi bac fwntur. Braffica omnibus oleribits ante fiat, earn efio aS Cato vet coBamvdtrudam, fiedi. m acctum intitigito, mirifice coquit, alvum bonamfacit, lotium- gue prtjM-rvety ac ad omi. « fr * dittos falubris tfl. Braffica laudes inquit Plinius lengum effetexequ'h cum Cryftppu idkus volumen integrum ei dicaverit, per fingula hominis man- hra dieefinm- Ante omnes autem Pythagoras is Cato earn non —rcius cmbrarunt, Cujus fintentiam vtl eo diligentizfrofequiparefi, ut nofcaturquamt naufmfitanhh 600.Pop.

'Romania. Cato crippammay.bkprobat, dunde Uvtmgrandib oliis, caule magm". Prodefi percoila **tatidh**, ft frequenicrab Usedatur. Succus ex melle c ts vifum claripcat^ angulis tantum

taitumocolorum illitus. C&ulium medulla ex cremo • amfgdalbio decofi}. 'o¹ arn r/ielle in ecle
gmatic parata-, datur lamhtnda, magna Militate, at^jjis. X>t Braffuti Ba, ifta Vkra fit «
drift.

].:m veniat folioChryfippi Braffica crifgpA
Vcl patulo & lsevi, vel glomeraia cofca. I
Prima filuritera, & ventrtmlenire par! ra,
Bullicrit modicofitaraen igne, placet. +.
Omnibusardor incft gravior, turn & C(G- Cccundij,
Nccapicinoceant vina fupcrba premni
Extumiuam rt:fer.tnt vcllicam, a:gnimque IJtnem,
Hepac & obfruftum fctnincuniquc femur.
£nd3 Socr.itit m pareret ai Brafflicabikm,
]ure erat in mortis omnibus illj iatis.

HALLUCINATIONES CASP, BAUHINI
Alioiumque Authorum.

I 4g. , i z. «l..'. pt.vi. Braffica fdtvfrU ramfa
totapene gluhra, C.B. P. Turrit* major, Ciaf.
Lijl Turruis majcr, Gcr. Par^ Primo Carelas
Gujiwhicmaeit, appdlando bancplant&m utta-
ptalam, Turritam, & csnfei^uentr etiam Tiiiqui
"cetirici tronjeriptares ex tp/b: noneji Brajftca fil-
veftrit, at vult Tnahut f\$ earn jequutm Cafp. Bau-
limit; cum enim Sliqaiuproducat temprefat, atque
fimina ibidem contents eompreffa, Leucoiorummorr,
dtbt dmominari Ltuteium <i notafua effintiaiccn-
vmientifum Leacnio, nan ttutem Brajjua autTur'
ritajicdiflo, quia 0 BraJlita & Turrita feu Tar-

ritii femina edunt rotunda, von toi>ipreffa, tit tUr*
infra denwnfrabimus in capite de Ltuceto fiUqusfo -
porro Cafpartis Bathiaus dim bant plantain tetam
pent giabram atferit, tontrarittm euuibet intvmt
fiatim apparet: nam revtr* *jt uta ptne bu-
fua.

J>a9.it2.(ol.2.pl.vii. Braffkafilvtjlris i Card'
L'ld7 Nonrifi fytmyma Snapt alhe cidem , fed efi
ea%om cm Brajpc (ihefiri, Dod. feu Crambedt'
Ba-trga maltconfunditCafp.Baubinui Sinabialbum
Lagd. camBraJlUajilvtltri i. Cordi, tjiftfdm Hifi,
Lugd.

\$Z. K A P U M,

R Apa quafi Ruapa, quod t terra eruatur, Varroni l.4. ling. ht. at verifitnihui a Gr*co ?l-ms?
Atfxnto l. 9-f- 2. yr*** Viofcoridi l.2.c. 134. arotitnda orbicular™? wdkis figure.
Genera Ttecp. l. 7. bift.6.. ait alms diverfitanm generis putare, altos negate, fed mare tantum
fminaque diffirre, is amba* excodem ft mine rrafci, fid ur effemimntur raras depomndas : nam
ft denfz pofit* fint, cmnes ma/iulefcerc ; atj.Hifi.6. Rap* filveflnvmtmnil. Sic Dkforides^
fathium is filvefire agnofrit. Plin. l. 18.f. 13. Graces fequitix, duo prima fecit genera, ma-
fculitm^femineumque, is tnodum tas ferendi ex eodemfemine. Specks veto omnium tres (c^iu J
aut enim in latitudinemfdndi, aut in rotunditatemglohulari; tertiam fpcc'um filveftrem appellavire
in longitudinan radke pmurrente, fcr l. 19. c. 5. Medici, mafculini fexusfaciuntin hkrotunda:
latkra vero concava fminim.

Dividimus infativam isf filveftrem; fflmin longam iff rotundam, five faninam istmartm:
rotunJam, in feffikm i\$ orbiculatam.^ Raparwn fnlumin India tam firax tft, •ute&inii'as
quoque publicis jfonte proveniant: it a ut cum Indi in nonnullit lock agrosfrugibus confituri tftmt,
propter ingentem RaJ>arum propagimm, ab infituito ipfif defiftendum fuerit, Jofeph. Aco-
fla l-4- c. 18. Craciquidem yyyfovK aut y>v>NASH vocabulum a figura, qu<L pkrumqut rottin-
da ff fold, Jeigt femnt; nam quod in rotundUatemcircumafum efi yw*Khoc efi B&W: i d&c
runt. Hippocrates 5fwf*fe vocabultua proglobulis crhculi ve qui devoravtur, ut catapotia «-
furpavit. Rspa tmaliquidus tmk tarn magm gignitur, ut plus quam cement libra* pemkat.
AJ Brann50.pmdusnos f«p ius irmurma Rapa vidimus in Ananknfi agro7 inauit Matlbio-
lus, & exit

pro nota T t ^ t ^ ^ flica Ponsdiftinguit, r, hancliaber, quod
folia ems afoCTora&hirfcmora productt per terran] ftrata. ur qus incau iibes confpici-
aut Pyriinfar apparet) five Jc longa, five rotunda emsradix five alha five lute? five
n)bra:flonb, a sfil<, q^ vious, & femine convenit cum Braffica. Est calida & acris planra,
euius raiJfe infervit ttidin*, qtacnncqnc Biaffican, tubcrofam dixerit Rapum , per nU ncm
ftabit- ^ars

Pars A B
UL ^ II.

1. Rotunda, (& ? Mas Thopfaafifiiniu Rap*utn/aiivum orbicuianim, Lugd. %
 Sativa I Album \$
 Rapa < J^2^j^rgafettfemina7C.B,P^apmoblongum7Trag.Obloi7gius^DoJ.\Fiavum \$
 j J 5 j Rubrtim \$
 [3. SHve/lrifiCB^- Matth, Lugd.ttb.Ger. \$ % IMgrum\$

Exptkat'w parth Tab. ftcuftddt,

1. **R**apa f?tiva rottifTd^ C-B.P. Rapuni fativum orbiculatum, Lugd. Rapum farivum rotun'djinvJi^ Chabr. Rapum nStundum majus & minus, Ger* Rapa masTheophrasti & Plinii Rapum Dioscoridisv RapHblia perterram fpargunru: ampla, ad Braffica: rubrae quo_d>^!5»fo"accedentia, atrovireitia, aspera & hirfy:a rugofaque, ad-c&ihnrirtrelaciniatJfTaporis holeracei, fervidi & acris guftando: caules cubicles & fefquicubitaks, quorum cymis infiftunt flores ramatim, lutei, tecrapetali; femem condnetur rottindum^rufum, in filiquis bivalvibus Brafficar proximum: radix feffilis in ventrem ampliffimum, capitehumano interdum paulo minorem, extuberat; tenuem radiCulam & ab ea plurimas minutas nbnllasahmentum fucluras demictens; carneconfhc.candidauniformi, foma fatis, fapore (crudaadhuc) calido& acn, magis minufve vegeto pridica, convenit fapore cum Braffica filveftri, undenosquaft concluderemusBrafficamfilveftremtuberofameiTe,' & ideo Rapum eidem Brafficx hie fubftituimus. Braffica, Rapum, Napus, Sinapi & Rhabhanus adeo fpnt limiia, ut prima cruptione vix difccrni poffint; conveniuntetiam viribus & faculcattbus, afineultimo, id eft amodoflorendi & filiquas&femina producendi; ideoapte mea fen'tentia' fimul difporiuntur & collocantur in tabults noftris cognationis & affinitatis.

2. **Rapa** fitivaloblonga **feu** femina, C. B-P. Rapa femina TheophrasH & Plinii. Rapum oblongum, T_{rag}. Oblongms, Dod. Hoc Rapom.cottvenit **foliis, florifc,** fdiquis & femine **cum** pnore Rapo **rotondo;** radices autem h.bet iongas bi_nos aut ternos palmoa, in terram deJcendentcs, craffitudme Staphyhno luteo,pro« vulgodido, pares, cibop^pcerinfignen, qua pneditK funtdulcedinem gtaiffimae. Planra **eft** Lima: nam **fccnndo** poft facioncm anno ficut& Brafficaimenmaturat. Nafaexedem fcmine marem & feminam fairotundam & longam ab Attlioribus affirmatur, fedut efteminentur rarodeponerefcuferereopportef nam d denfe ponantur feu ferantur, omnes Raps mafculefcunt. Quo terra pinguior & maeis bene ftercorata, eo niajores confpiciuntur. Aliquando 30. libras ptndentes reperiuntur T quod partim a folo, partim a femine bene nutrito contingit, ficut in Raphano alifq; r...r' nubcrofis. Habentur qua? foris & intusflavefcunt, fie & Bemae confpiciuntur radices qua: abfolute nigrs, **utplurimum** rotunda:, rarfus oblonga:, qusvulgatisdulcioresfunt.
 ^ 3. **Rapa** filveftns,C.B. P. Rapum filveftre, Match. Lugd. Tab. Ger. Hoc per omrtia min'us,fponte in fterilibus& filveftribus reperitur. Eft hoc Rapum fijveftre frequentiffimum apud Flandros & Germanos, qui ferunt hoc praxipue ut folia pabulo cedancbokus. Lu'xuriatenim tanto fbliorum numero, ut radi^t non jam tubcrofa aut rapofa, fed exilis, nee ventiofa ufpiam fit, piopter folia inceffanrcr commanfa; alioq; nin Rapa; lativa? rotunds ant ttirbinar.se fimilis, fedprimoinruiitu difcretu facilis, folio criipiore, rugofiore uberioreque, & radice mmore &• tenuiore.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Rapt cofta radix, inquit Diofcorides alii, inflammations feu fiatum pant, bumenkm teflvxam carnem creat? Vemrem, quatenus flatuofum alimemum eft, ftimulat. decotfo podagr pernk-mfque foventur, contritoqueRapo atqmimpfito juvantur; fi excavaU radici rcfacem ceratum aaulgatur <y ferventi cinm diquefc'at, exukerat perniciousibus profidet. Cym&qu* dttotij> manduntur iy urimm cient. Sapum muriaconditurn minus alimenti prsbet, fedmulto ma^gK appetentiam mrtat. Radix Rapxexcakfantis tumeSat* Semen vero ejuffon calidum ^./fcftM; cum autem fit amarvm abfiertgit, aperi^d/gerit, atflttws gigt. (tdttjta? ex. *pzhmntof_{2m}n vakre ad variolas, morbittos, nam potum femidrjchmde pendtre motbUks, fc" variola ad cutim expellit. Vakt, inquit Schroder^, femem Rtyi Uongi ad facitioremfcabid'*

mo'hillorum <? variolaruTn eruptionem; nam four&ir..ici cutim prop! ichin& fc
 potum. |£p
 Raptm filvestre, tefie Diofconde, additur medicament ^quihta ad detergenui, vinfacifh
 toque corj>oreutuntur, prtgtirtimqu&ex Lupiniaut Erv't, Tri''-c.^aut £S/wJ fieri joLnt.

HALLUCINATIONES (fCASP. BAUHifcyf
 Aliorumque 'luthorum.

P &- 90. Radices varia qttihni htdi vefcunttr, 0-
 vves hie radices, quamvii quodamntodo taberofr
 fnt, ta^fe.i Ca/para Batikino tx variis autharibus
 India Occidentalis 3 Orientalis firtppteribm allats,
 but infer untur j alto trgo i fine ultimo [neglcBa
 tubcrojiiate radic-um) detent fingulatim aman-
 dum <i j/ropriis ^uh ditjftbas adaptari, quod potent
 miibit pr/ejlare Botanuu., qui moilum fiorendi ef

ti/Apil/ufhminahs fcminaq;prt>dttcendi abfervavefit'
 Diiult Cajj>,B<iuhinnsinarfvert enterpag.gi,iz.
 terjetit fypunculos feu Campanulas, Tracbeliaj
 Cervicarias inter Napaih& Napum Rgliijlrumvt-fit'
 diffiin^endo tetrap/atbj filiquofns a Ttrspetalis
 jiliquejts. CampanulicpTicKapunnili, Trathcliaj'
 Tie Cerviearist, alia ptrtiitWi'Mjiobjlant'but rad-
 eibus in quibufdam tubero^Vi

* 5 N A P U S.

BOYNIAΣ Diofcori Ji I. 2. c. i%6.^mfigmficat'wnea itimznttfiguradedufta, quare Rafx *loc*
 noinenmagi* *ccm* *ere* *funt* * *quivelint* *y>r^* *K* *fpecies* *Qalmo*.
 Differentia*duos *in* *dukina* *Qracos* *fervare* *Plinius* *I.* *20.* *c.* *4.* *fc* *ribit*, *alterum* *Bunion*, *nU*
mum *Buniodi* *vocantes*; *funt* *qui* *Buniadem*, *Napum* *filvestremefa* *velim*. *At* *I.* *19.* *c.* *\$/* */\$*
poruiit *genera* *quinque* *facit*, *ubi* *legmdume* */Rapanorum*, *cumex* *Tbeopbrafoj*. *Hijl.A.* *defumptd*
fint *ubi* *-r* *f* *t3*. *fa*. *tihn* *genera* *quatuor* *dicit*'.

(1 - Sativus Bunn > Fuch. Lugd. Buniat five Naj>us7 Ad. Lob. \$
Napus
 C 2. Stive/Iris, C. B. P. J. ft Chair. Buniasfilvepis, Lob. Icon. \$!

N *Apm* *fativus* *Bunias*, *Fuch.*" *Lugd.* *Bunias* *five* *Napus*, *Ad. Lob.* *Napus*, *Match.*
Dod. *Caulc* *aflurgic* *cubical!* & *altiore*, *multis* *alis* *concavis*: *foli*; *i* *parte* *infima* *pin*
nis *caulem* *ramofque* *ampleftuntur*, *pediculis* *deftitata*, *aut* *us* *membranaceis* *hjErenria*, &
interiora *quidem* *finuata*, *fupciora* *vtro* *non* *item*, *in* *acumen* *enim* *definunt*: *flores* *Intei*
Braffica, • *fcmen* *quoque* *fimilc*, *in* *filiquis* *aliquatenus* *longis*; *at* *radix* *reperta* *^i* *<nini** *fi*
ventrem *extuberans*, *akiufque* *clemifla*, *lapore* *acriufculo*, *carnis* *comp^ftioi*
Quia *autem* *Napi* *in* *Raporum* *geitere* *eflc* *videntar* *Sf* *Rapo* *fimiles*, & *foliis* & *1*
phanos *referont*, *caule* *ttiam*, *floribus*, *filiquis* & *feniine*, *Rapum* *armulantur*; *it* *-o* *opinof*
Galenum *interRapani*, *qua*: *yrM* *f* *votatur*, & *Napum*, *qiii* *8W* *<dic!* *tir*, *iiu* *Uum* *ftatui* *fledif*
crimen. *Napi* *oruniiio* *Rapis* *fime* *cpngeneres*, *denfiores* *tamtn*, *acriores* *Sf* *minores*, *In*
veniri *perliibentnr* *Napi* *luceo* & *croceo* *colorein* *Bordveldiano* *Brunfvicenfis* *Ducatus* *agro.*,
quibus *prascipualaus* & *authoritas* *attribuitur*. *JB* *ll* *<<* *non* *Bwln* *clivos*, *colics*, *faxa* & *fasof*:
verrucofave *amat* *loca*.

*Napu** *filveftris*, *C. B. P. J. B. Chabr.* *Napus* *agreftris*, *Turn.* *Napus* *filveftris*, *Dod.* *Lugd*
(cui & *Bwia** *j* *Bunias* *filveltris*, *Lob*, *Icon.* *Hujus* *flores*, *fiiiquje* & *femina* *Napi* *fativi* *pro*
xtma *hint*; *folia* *crebrius* *diflefta*, *laciniataque*, *nallis* *itidem* *pediculis* *cauli* *apicxa*:
verunrradix *fflveftrem* *nawram* *fapit*, *minor*, & *poliicis* *aiticulum* *pp.rim*. *fuperans*, *turbi*
nata, *Taponsacs*. *Arufticistamen* *quacdam* *herba* *editor* *Rapo* *T* *Radiculacve* *fimilis*, *quam*
/focftn. *appellant* *GaUi*, *folsi* *s* *Rap* *i* *laevioribus*, *poft* *adolefcentiam* *Erucx* *modo* *lanniatis*;
cuhitali *Tcapo*, *auunterdum* *altiore*; *radice* *minufcula*: *floribus* *eidem* *proximi* \ • *ncc* *em* * *e*
bro *rrofidmm* *av*. *ullu* *coercent* *agncolae*, *quo* *minus* *in* *caulem* *erigatur* *quod* *in* *R* *eri* *certum*
eft *ut* *in* *radjeem* *incrementa* *capefiant* *fed* *in* *fcapntn* *attolli* *patiuntur*, *nam* *u* *e* *femins*
pvoventu *non* *medicrem* *qittitam* *hemnt*. *Semtn* *liuius* *calefaftum* *trnfe* *^* *butque* *molis*
preflum, *magnamolc* *remittit*, *quo*, *nonmodo* *adoofonia*, *fed* *ad* *lamina* *quecque* *lu*
cernarum *utujKur* • *A* *s* *etiam* *caveis* *reclnG*, *^* *J* *I* & *L* *v* *^* *fiiimlhts* & *id* *'* *ge*
nus *abas* *fimles*, *fern* *ne* *hujus* *aucupes* *pafim* *alunt*, *Autumno* *feritur* *femins* *cau6.* *A*
prli

prile floret, CucurdrMteTeniineco^filiiimo. Ex femine inquam oleum extunditur paupenim cuknis infer^Cri, aviculae etianVi^tpafcuntur uti fupra di&iim. Semina Rapi, Napi, & Braifcaae ad prse4^c^\$i?fiis fimiliter ufb|&j&ur, quareRapum &Napus radicibus tuberofis foiummodo^a^Btaflica diftinguuntur; floribtis, /iliquis bivalvibus&femyie, imo odore & fapore, fed acridCjcum iis cony^&unt.

S I L I O U O S J E

Tetrapetalse bicapfulares.

V A T , < b T I I .

S I N A P I .

Si inapi, <nW Viofcoridi l. 2. C. i 84. iff Theophrasto 7. Hift. 3, iff 6. /©^ ^ oin&cm ryVoW, oculos.enim Udit: dicitur etiam Theophrasto vim, quafi immite, ob vehement em ejus acrimo* ntami isf Athenienfes Napy appellate Plin. l. 19.C. 3. author eft, Sinapi nominans.

Vn'ns Diofcorides iff Theophr. meminere, at Pliniut genera tria facit: unum gracile, alterum fimile Rap& foliis, tertium Eruc < £.

Nota generica defignans Sinapi à ca?teris tetrapetalis filiquofis bivalvibus, eft, quod in ter cameras has fuæ fords bivalves, femina edat fervidiffimi & acerimi guftus; palatum e- iim& partes circumjeftas calore fuoa&ivo accendit ejusfementritum, adeo ut nares ocu- lofque petat, ex illis ficopiofeori ingeratur lacrymas elicet. Acaeterisculinariisfequen- tibus filiquofis calidis & acribus diftinguitur etiam ramorummultiplicitate&altitudine. Va- riis modis Sinapi nobis dividendum venit: à feminis pelliculas colore exteriore, eft vel album, vel rubrum, vel nigrum: a filiquiis, eft filiqua hirtuta, vel plana eaque brevi, vellonga, vel longiffima: à foliis, eft Rapi, Apii, aut Emcx folio diverfinodi conftruftum.

T A B U L A III.

Sativum	D. Rapae /b/0 Si Sitiquitplint -, femine rufefcente, nobis. Sativum prim, Dod* *c Sinapi hortenfis, Cord, in ViofcoL., ^	(Albo, \
Sinapi	Semine rubro m'inore	% . Eruc < £ folio, nobk. Sinapi Eruc < e folio, C.B.P. Si U vestre, T)od. \$£
		4. Monffeffulanum la to folio finuato iff laciniato, flore luteo *nimo, filiqua longiffima, nobk. Siliqua longiffi*
		5. Oenevenfe folio lato finuato tantum, flore majore, no- < *bk. Silveftre Genevenfe, J.B. Chabr- \$
		6. Monffeffulanum minus filiqua afpera hirtuta, . nobk, Parvum filiqua afpera hirtuta folio ExUdt minor, l. B. Chabr. %

1 J. Semine nigromajore [flobk. Rapiſtrum arborum, Ger. Park* \$

Explicatio Tab. 3.

Sinapi Rapae folio, C.B.P. Sinapifativumpñus, Dod. (Sinapiostresfuntfpecies; fativaeduae, & tertiafilveftris fecundum veteres; nos filveftrium aliquot fpecies veteribus incognitas esneotericis adferenius) fativo huic pi imo folia funt Rapas iimilia, aſteriorata- i^1* fedminora: caulis Sinapi rotundus, aſper & hirtus, bic^bitalis Vel altior, ramulis aliquot brachiatus; circa quos floſculi mult i confpiduntur or dinedigeſti, colore lutei tetra-

petali, valdeodorati, quos sequuntur filiquae bivalves, planae, quoniam in gurgulione dupliciter feminum onerantur, septimo medio per luciditate (dum icnium maturo terminante duplicem feriem illam: in filiqua?.. te contruistis latet. rubrum, feniibus asterarum Sinapios speciffimum fimile: colore inc. u. i. omnium femina, cujusque colonis fit pellicula exterior ^Mtu acria, iacia. Hoc in agris & horns feritur, ficus & fequens fativ.ii. Floret ineante x[hxf] aLme verliis ejufdem medium femina ejusmaturantur.

i. Sinapi Apii Folio filiqua hiffuta femine albo hit rubro, nobis. Sin a pi faivum jlterum, Uoff. Hoc foliis & cauibus ramofis, utiique aperi^ confat: primum & tertium floribus lucci refer: femine hujus album feurobrum majus, late's in filiqua hiffuta, iinteriore medulla e lutco virefcente, quod fimiliter non parum acre ac mordax est.* Sariva \sc altera i'pec'u folia protrudit Apii htilolii infar, & etiam in igris & liortis colitur. Floret & femina perfid eodem tempore cum antecedente.

3. S'mapi ErucE folio, C.B.P. Silveftre, Dod' Lugf!. Hoc Sinapi ^ % e i facivis prardis duobus praecedentibus, cuippe minoribus, proceritate diftert. Obfelk^ imls ad niargines foliarum humiditate nate adentia dum in quorum maturo ramis arborefcere videtur. In fommia ramis ficulos quoque luteos gerebat: quos fequitur filiqua teret, giabne, breves, arte caulium ramis adhaerentes, paucioni minus femina rubra inleconcentes, nee minoris acrimonia quam praedictorum (ativorum feminae Hocabique ponere nate obfervavimus] sinu is commimibfls, pr3ccipue ad arum niargines, Of in petrofis alpeis, & ruderatis locis, indumetis flfcibus, quandoque in humientibus. Viligunt omnia ("utinque Palladius) aratam ff(T fieri poflitj congefitianuerram: gaud^ pihumore, & ideo fdcius ad margines foliarum proveniunt. Seruntur ab Agricolis hietint & (emina per dunt ad mataricatem funio & Julio. Dum fcmentritom & mnlb mixtura fervurcinio Ib Sijapios. muftum a idens; unde Ga(li5 & Angli 8a] iif < pegentibus - flard appeilatur.

A. Sinapi filveftre Monfpelfulanum latifolio finuatofc laciniato, ficulo Inteominimo filiqua longiffima, J. B. Chabr. Per hujus caules fequicubiales, noiiiiliiJ rtriaros, Ceretes fere, iblidos, folia conpiciuntur Dencis leonia forma refpondentia cum magnitudine, mm laciniata divifur, glabra, autnullis certe affatu dignis pilis donata, odore & fapore acri pnr dita: flores lntei patyi; /iliquede in orruntur den finimi ^ Longiilimi, admodum acri femine refertar. Ai. Gefalpmi. air- era Irionis ^ P^cies amplior, in dubium vocatur. Florcc, & filiquas kit circa Monfpelmm nieiife Martio locis ficcis.

S-Sinapi filveitre Genevniè, J.B. Chabr. Sic dicieur fpojiranem ni quoddam genus Sinaitatini exonurcaules propter ^ m ^ onni Julluriu ^ ramofi; per quos folia Eruc ^ apparent diviura i ^ n minus frequenci diilecra, verum latitudine Monfpellulano ced. Jura ctiam diverfa; func enim tantrnn finnata, at Sinapi Monfpelhenfe folia haBet & laciniata • Monfpetieifis filiquae duplo funt longiores; flores vero minores Geneveafis floribus, cutus flores Monfpellulani floribus funt maiores: filiquae ex pediculo mediocrri longogracites; tres uncias longas, lemen bipatentibus valvulis claudite millimog, ruffum, dupli ferie, indur ^ icilocuianie i to contentum ^ fe promediu mra / i i quc feriem, hincunam, illinc alteram, "partiente Vide Be hujus & (equentis fexti Iconem jii App. ad hanc cerriam Seftione im

6. Sinapi Monfpellulanum filiqua afpera hiffuta, J. B. Cfi.ibr. Sratim e radice lignofa folia exeunt fre ^ Whtia, familia rere Erucae minoris foliis, acria; interque liac folia caules aliquot palmarcs, aut etiam aliquando infertiliore folocubjtak-s, in ramulos aliquot divifi: floribus Sinapios hujus lu ^ s parvis decidpntibus fi Uqus fuccedunt bivalves, crebhr, unciam long ^ tertccs, a ferac, ajiqua: fecundum caules ramoive afcendentes, alix longa: ab iis abfeedentes & veluri rcb.fons protenfe, fcmen daudenres mnutiflimum, faturaceroftum. Inveniebator Autumnali Km pore a Johannc Bauhino inter Monfpelium & montem dictum Efferon. Nos parvum C^ J^ f^ C^ J^ ofian nes Bauhinus) obfervavimus; m z g m m obfervabac gener Cher lerns in udis lofniis, inter Monfpelium & Thermas Ballarucanas

g, Rapii t rum Jlore] l l Ce c B p. Rnpi t rum um ^ Ad. Lob Th, ! Hi Lugd. Ger. Par K Lani p ana ver a, L d. ^ sin ag fe Bfappexeunt td.a m, oblonga, 3 fper a v duti R ap] aut Napi. d a £ ndo div < * finuata, n d d noji: am Ufafa ^ venues, lurfuti , p c d l & k i ores in agro M, f < andem ramulos, huculos exiguos, ... petalos, col or e fub luteos gerunt; quibus fubveniunt filiquae bival-

bivalves, tenur
to distincta, f
'jua hirsura/
aratro pro'
iis ii cultu.
estatem durat fl
fatis dictum. Ar

glabrae, fit&Hfgqcaritea; in quibus latent iemina dupliciloculamen-
u feparala^iigra, **ferventia** ac acriagustui, veliti Sinapi JIU
ntifctila:radix n o n m a ^ HocIrcquenterin agris,dumre(juieicunt& flon
itur, fponc naspitur; non riinus tamen fecus vias, prope veceres muros & in
"• locis fic*J) & **Sob finem Martii reperitnrinflore** & in proveftam ufque
, & femist perficiens. DpNomiuibus, Loco Sf Tcmptorein titulis supra
ad Sinapios Temperafientam 6V Vires.

TEMPER AM ENHIM & VIRES.

lx Sinapios femine cond'mentum conficitur, quojld ciborum intincltti utuntur ommsgehtes far.
CVtrumque Sinapi fativum feu hortenfe nTM* . ^pc* diciiur-, reliqua <u>w< apiv nomine itt-
figniuntur, is Sinapia fffilveftrit illi hnponiturfmftnen.) Sinapi commanducatum pit uitam elicet^
dentium dolo^jpp^gat, triluin naribm imofttum fernuiamenta cit, iyfeminas ab ittro
frangulatas, excu[?]: epileptich prodeft^ letbargkis derafo capite emplaftri modo tmponitur,
cum h[?] admittur is donee locus rubefcat admotumifchiadkisutileft: ad omms diuturns
ex frigida caufa dolores confert: condttcit, cum ex alto aliquid in fuperficiem corporis attra-
hendumeft. Extrahenlibu* emplaftrk nee non fcachiem extenuantibusutiliteradmifcetur. A-
lopeciis imoftiumauxiliatur. Sugil'ita, cum adipc^ mllt tsr cerato dekt: cum aceto contra le-
pros (y ferasimpetiginesil/initu^ tarn isr contra fcorp' tonum is ferpentum iclas. BreviterSi-
ji. r)'hs feminhmagnavk eft^ tionmodo adnares, fed is ad certbrumetiam penetrans: quod fa-
u'k percipitur, quando mntitun condhntenti tx Sinapi cum cibo ajlumitur-, viox enim nares impe-
itur cerebro ettam confentietite. Fit autemex Sinapios femine tr'to quovismodo condiment urn
J Germania, Belgium^ Anglia, Scotia, aliaqu? Stptentionahs gentes frequenter utuntur (pro-
f e fapiunt ut ait Johannes Lodovicus Fives) ut plurimum cum aceto, quandoque vero cum vino
tnu/le^ unde (ut diximus) ab ardore quaft mufium ardens iyfecundum hoc etymon Gallhfiermajus,
Bruannis Mustard diattr, fed pura aquahumecjatumvehementiusferit ismagh calefad. Pal-
ladius Ttro condimentum ex Sinapi comjwnere • docetfui, pr & tera Mum, melis oleum adduntur. Si-
napios f. > nen hiquit ad modum fixtarii unius is fimfts redigere curabis in pulverem, cuimellh
pondo quinque^ Qlei fRfy anirilib. 1. aceti acrh sextarium j. mifcebk is omnibusiHrumdiligenter
tritiij[?]. Columella alium babtt condUnd't Sinapi modum, quern vide ft vie, apud ipfum. "

HILLUCINATIONES CAS P. BAUHINI
Aliomnique Anthorum.

1" ^ /h. QQ. tol. 2. pi. iv. S'napi Jiliqna. Jur/uta, C.
<i> i alterum fatifum, hob. <S' i uip' al-
• n fitiqu birfnta ejh' dt/n cum Sinapi
ugijj'. " potiin Lai' erhfolio, Loll, ergo male
pohitur, Sin'tipi filiqtia hir/uta aCajparo Baubina pro
iLjU'cia fptie <i> Sinapi Jipiaut Laverh folio.
Pag- ffp-col-2- pi. vi. Sinapi umbelta ptirpureal

CS.P. Sinapi aUtr! tmagrtJtenof}ras, Q>ltim. Ply-
tob, Hujus fdiqux txfecata fiavefcunt, ac tacte
valvulm intrnqunt Bfemina ejaculantur, quod Na-
Jlurtio convenit pro uota gentries, ergo ijl Najtttr-
tium, & per conjsijacns male infer Smapior jficicis
a Casp. Bauhino toltocatui,

S I L I Q U O S Æ

Tetrapetala; bicapfulares.

C A T V T III.

ERYSIMUM -

E[?] Dioscoridi l. 2. c. 188. aliis <u>w< i-
quon, quod est pretiofum; aliis <u>w< quon, quod ob suam caliditatem trahendi facultate pre-
ritum fit, dictum: nam Sinapis sapore est, & multis Sinapis silvestris species est; Plin. l. 22.
25. Irio, Erysimum Græcis: ubi Erysimon Dioscoridis, cum Erysimofuge Theophrasti 8. Hist. 1.
4. cauf. 16. (Gaza Trionum vertit) confundit.

Eryfimumcumfitplanta filiquofa tetrapetala pal^/i & acprf, fejl ;^ remiffiore gradu , quam Sinapi, cumque ut plurimum Eryfimum malle fit, atqik tenuon^us filiquis & con- fequenter minoribus feminibus donetur qi&*f Sinapi, iisdem ncyfmious diftinguitur; Sinapi, cum quo rriajorem habet affinitatem quam cum fequ^jitibus inhac^fronecontentis herb'is.

Pars TAB I i L I III' . v .

- 1. Vulgar e, C.B.P. Mo, Matth. JiM. Lugd. §
- 2. Polyceration vel corniculatum, Cff. P. Mo alter, Matth* <E
- 3. Latifolium majus glabrum, C. B.; 7. Mo Apulus alter Uvi folio Eruc <£o Col. t-
ryfimum latifolium Neapolitan- *TM, Park ?
- 4. Montanum Irionis vulgarisifo^io AwrT^x/^ex^TM, fob is. Rapiftrumfilve/?refrt-
onis folio lwtxfoAe-Tr^zie^75u Col. ^ ^ j
- 5. Minimum annuum hirtutum, nobis, Eryfimo fimilis hirtafafazat^ C.B.P'- & ?^o d'
I Park £

Explicatio parti* Tab. 3-

Eryfimum vulgare, C.B. P. Eryfimum Tragi Juxta muros proveniens, J.B. Chab. Ery- finum fivelrio, Ad.Lob.Dod. Irio-Mattli. Lugd. C^f. Eryfimum hoc vulgatus Sinapis filveftris fpecies Gefnero habetur eft ramofum, durum/Joins ab utraque parte pro- fundius incifis: Sinapifilveftrfe, cui in mul'tisaccedit;refert. caulculi,tum&ramulidivan- cati, tenes fons lenti admodum & obfequiofi fe» flefu feciles; quibus arte in fummis h^rent flofculi minut, li, lutei, tetrapetaH quos fequuntur filiqu'e teretes' tenues, bivalves& .nn ciales,denfe fecundum «2 ad S v ' J * ^ n . ^ U / BUS fi ^ lls, femin a P lu ^ exigua duphci ienc laent, fopromedio feparata, aitari Itrapetalarummiquofarumhujusclafismore; ferven- ti gultu, Sinapioslenibus quafi a ^ ^ Provenit in locis faxofis juxta rudera, f c^23 femjeze, & in alijs hirculis & defertis locis. Floret Maio Junio; femina Julio & Augusto

perficuntur vel corniculatum, C. B. P. Eryfimum alterum Italicum, Ad. Lob. IriodateM f T Cy^mumE altcnim Matthioli f i p i q t i i s, par vis, quibusdam Den- tularia f T B. C. f^br. Lentas cubitoque longiores virgaS, veruferramreelinatas, pfofert hn r ar a ^ r ndurn: folia inferiora quidem Irionis Tragi foliis aliquomodo familia, noc- tryiimum iecun ^ ^ ^ ulqua mediam diifefta, reliqua quae per r^mos ufque ad cy- protunde adnervurn^aciu bt a, ^ uociq fm ucrz, unciam pi us minus longa; ex quorum alis mafcrebra, levied, rali em k ant / quibus de ap^is fuccefunt fihoc crete, modice in flofculu lutei, tetrapunc^ia / p^ores, Bi ure & ex e d g eniculo ortu bivalves duplicemferem arcum curvatx, lE^erparv omm continentes, reliquarum tetrapetalarum filiquofarum hnis lenimum runorum, lE ^ lignefc ^ paucis fibris donata. Abundat prope mare Venetorum; Sechonismore: r' o' ent a r i a a H a, quod filiquulas fere dentibus fimiles arte per caulem & dicitur Gefnero^ r l e r t c copiofe crefcere circa Monfpelmm. Floret exeunte Vere Sffemih* emittat. Cherlerus "

perficuntur «ft^te fial: f o i i u m m a j u s g l a b r u m, C. B. P.. Irio Apulus alter tevi folio Erucae, Col i-Ev^m^um Neapolitanum, Park. Foliis exit parvis, oblongis, per terram in brcti Eryfimum^ filveftris vulgaris modo, fed adulta in profundiores lacinias dividuntur nu- trantur 7. E^cx fatvae minora, ad Irionis hirtuti folia magis accedentia, & fere fimilis fed huius v e n t i a f u n t, & foliorum fumum anguftiushabent: caulem edit ut plurimum unicnm rnonnunquam plures) bipedalem, cartcris craffiolem, laevem, rotuhdum, folidum, candicantem (ficut foliorum nervos) foliis multis alternatis veftitum, ex quo petioli multi emanant folns reterti anguftionbus paucionbufque laciniis divifis, longiore & amraffiole ca- cumine, odore gravi laporeamaro, palato ftatim acri: in fummis virgis floresproveniunt multi fimul longitudinaliter fecns caulem congefti, tenues admodum & lutei, Irionis vulgaris modo; hi fibquasper cauham cacumen difpofitas proferunt copiofas, duas oncius.*.*.*' longas, ttnes rotundas, extuberante^ intus femine copiofo utrinque in fmgnlis valvulis ninnio, flavo falfq, & acn fapore. Differunt hujus fillic ab alterius vulgaris filiquis lon- gitudme & pofitvi, hx autem non h^rent arte cauli, deinde non £ habeht ahs feu ra- l . c . r - v " . . . ' T " * * ^ unquisaenius dilpoititiconfpiciuntur} «.* l . a acnotarpntremine: radix Candida, guftH admodum fervido. Eodem ceinpore cum es tens

ris floret, Ap- ^T SeririolKV'Apulia frequens a Fab-Columna obfervabatu!'. Fnfliini
 xa. Lonclintr (A;J pagiinidiftunVCjj'^7 fecundo aburbe lapide, copiofe provenien-
 m obferw 51110 in Ipfis ruderJb^J.ondini poft incendium qoad incepit fecundo
 e Septu no Dom. 166&. poft ocrimeftre fpaturfadeo denfe pullulavit paffjm,
 : facile iicui iticum aut tje%le demeti potucrit a quovjs meiibre. Hoc vidimus & ob-
 rvavimus ficur >e eft pag-458. PraHud. nofrorum Botanicorum. Floret ineimte
 ,Vere, 3f ofq ad mediam arftateni floret & Ifemcn perncit, exquodeciduoserminat incunte
 /utumno &c per hagemen durat, ut maruriis fequente verna tempeftate & floreat & femē
 . n ducat. Prate r numerofam copiam hujus-Ei^fimalatifolii majorisglabrimemorata & tam
 bundanter, imo redundanter, poft conila^Vationem Londini anno 1666. in ipfis bnjos Re-
 ni Metropolis minis inter mdcrarepertam;viit alibi à nobis dictum in Fratludiis nofris Bo-
 cis VL-illis SocmtUalogiillici biennio-poflap^lilentiali morbo fèvienteLondini, omnes
 dunum cujul<!;ui) Limilij;, qui inpaupere tisiinb, non longe flto à palatio Divi Jacobs de-
 nt, vis qunjgfc*S.tiita paiiibus ab a^dibus diftis 16at6fljite^OUft interiemnc; reli&am
 iDncubinJicua^N intrarunt alii pauperes, qui peftejtidem ablati; tandem militesqui ex-
 3 ^tfPY^P^{01,^1} P^{REC,i<^} palatii Prai/^oiiagebaut, iuarum lerumfatagenres, neall's
 ifcftis daretur pernofcario aut habitatio ibidem, asdiculas feu tigurJolum incendiofacto folo
 quaritnt. f^uo tado metu univerfalis calamiratis liberati, lecuriores & a periculc tutiores
 ndicabant. Pofannum integrum iter iliac facientes obfcrvavimus aream, cui tiguriolum
 (icatam fuetat, totamtegt ac tam denfe operiri Sophia ChirurgorunifeaNaftnrriote-
 >, ac fi deinduftria ex fationeconEigiffec, nee apquam tam denfe provenire alicubi
 .verti -, unde jam concludo calidas & acres has plantas tetrapetalas filiquofas ex cinere
 ftorum, fali& calci miftoruni, product fponte fine femine, neque unquam mihiin lino
 at? congeries Sephiaè Cliirurgorum tam denfe provenientiſ obvia fnit, cum ne vel
 x akera.ftirpsin omnibus locis adjacentibus reperiri a nobis poterat. Obfervamus
 Leuaioium luteum vulgare provenire feliciter in tectis & muris, roderibus& minis tur-
 ;paLtiorem,templortimque, ncc alibi incampis, agris, filvis, pratis, aut neglectis auC
 :iiai»arvis,vigereauprovenire animadverrimus. Racionem exquirendamaliſimprtf-fenti-
 arunrclinquemus,profefqHamar mtcl-fa Tabubs,earumque difpofkionem-

4- *Eryfimum* montanam Irionis vulgaris roljo Amm^w^jueftIBii, nobis. Rapiftrum Irionis
 "olio, Col. Hoc Eryfimum aciradicis guftu', foJiorum fa pore & divifura, m.igis Irioni
 accedere videtur. A lengis admodnm, quas profertmultac & ccnues, filiqtiis Aiw-ra^a.^.
 M&ToV denomin^tur: radice rucirur fatis longa, omnibustenuiore, longitque fibris divifa
 atqc candicante: foliis eftEryfimo vulgari arqualibus, aliquando minoribus infterilioribus
 locis, in lobos ternos binofvedivifis, cacumine acuto Irioni multum finiilibus, fed majoth
 1 - "vviridi albicanti^us, hirtuds, moUibus,pra;fernm caulem ambientibus, qua: longe te-
 loribns fobis & cacumine praedita, ut lobi duas uncias longi,cacumen vero palmum:
 mirali,aliquandoakiore, aliquando ab radice fruticofo, alis multimidivifo, liirfu-
 to, aſpero,exquofcmipedales & interdnm brevioresalrernatimerigunrurfiliquae^ adn-odum
 tenues, craiTo cacureine, femina intus ab utroque laterc hinc inde continentes nimuca,
 non mulrum acria, obfeure flavefcentia, quæ fuceſflerilnt in fummis alts, floribus lu-
 ibus, tetrapetalis, coacervatts, exilicibus ex calicibus parvis, ex^uorum fingulis
 unica filiqua longiffima (utidicrum fupra) deficiente Hore minutiflimo. Floret

ia <k Junio; filiquas autem perficit aſtate. Provenit: juxta jemitaslayofas yel macerias,
 atque aedificia moncana^Equicolorum, ctiam&in via qua: a villa Mercato ad Capucinatorum
 Caenobiumducit, & circa ipſam facrani Capucinatorum adem eiuiſle meminit Fab.Columna,
 femeneque coHegiiTe.

^*Eryfimum* minimumannutim hirtutum, nobis. Eryfimo fimilis hirtuta non laciniata
 alba, C.B.P. & Prod. Hzc provenit ex radice oblonga, alba, lignoſa& (ibroſa, caulis
 mf ""iinus, modbplurescubitales, aliquando pedales tantum, fubrubescentes,friati,hir(bti,
 ^ -rnHoin nmiulos brachiati exfargunc: folia plura ad radicem liumi ftratra, pediculi3
 at carentia,feſquiunciam longa, aſperajiiſpida, fubalbicancia, per ambicum crena-i
 P ta. aciniata ., &c quæ incauleminora ftmt, etimque baſi latiore cingunt; fecundum

rarmik, longitudinem veluti in ſpica floſculi albi, tetrapetali, pedicelli^ infideiit, qui
 inſiliquasoblongas,-iiric"tas, ſe'men minutum duplici feriecdhtinentes, abeunt. Provenitlo-
 -js.liioxofis, ruderibtis& mnrſis, utBaſilia; prope mania ad arcem Monchaſcrn. -Prin^oVerc
 H oret, Monſpelfuliquoqucin ruderibus umbroſis, fed per omni3 minor, fiſe in agris are-
 cofis

noſis inter fegetes. Vitioſa eſt figura Dalechampii ſub Ajſcoo telethio ia-Hiſtoria Lngd. quod alio pertinet. Sine pihs em̄exhibet cum caules turffolfa,hzcq; etiam (fee c^is, etia^ inde- fcnpjioneait folia paululum̄iſa, crafla, hirta^ in ipſms Icone om^ntur a ſculptore.* Icon exhibira a Caip. Bauhmo in Prodromo melius exprinvkjir pilis ſcatens^in & folia font crenata^ ut, cernere eſt in ipſt planta, fatis cuilibet ineunte V^e- obvil IV jK 0 & Tempore, Nominibuique authorum diverſis, fatis ſupra dianm in uniuſcujuſque Xpſetione.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Graa ^ vocant: nonnulli ^A.OV Chamtkum. hionh fen Eryftimifemen mflu SinaPi aut haſturtio apparetſimile, itaGalenu^cuſcultateigneumeSli?excaleſafioriwn^ eſtvero Jimul extenuans. Facitad thoracis; rheurr^tffrnos, fuppurationes, tuſies, itlerum (y^cõxendi- a* dolores cum melle d̄dinOum. Vbiautem m edegmate uti eo expedit, p^ftat aqua mace- r a turn refngeran, autlinteroinvoluturn (y ma/a piſtoria obtitum aſariſ^ihhur Jadverſus mortifera venena, addit Vioſcondes, quod cum aqua is melle cata^l^r^ n^m̄ impfitumocul* profuit, cancrts, parotidibus, duritiis a mammaram, tepium^e^Zat^uy- nihws Lobehu* iſr Penatantas attribuunt Eryfimi feminibus dotes, qu* eſt b̄matkkZ far- ton Pulmonum vociquerauc* etiam diuturn* (y prope invill*, adeo pr^fentifunt remēdlo ut /Urn firm ſuperet. Eſtemm̄quiunt moderata tenuis ſubſtantU ac incident cumhūml d* abſtergentibuspermimo, cuju* benefido craft* pituiL dtra exſiccationem mmiamincl dumur iſr mo/*popter flatumnonnihil commixtum nonmagno conatu expeZrZt^ ab- ſterguntur, artenacumigitur eſi laudatiſſimum, nemp̄i unum V idem prlparansTeducets' exempla ſuccurrunt quamplunma. Phonafeoſuiſequit Penamultos LhvemsVmZtis proved quibu* jam amifla voce & %oi,itu, limpidafonoraque vox pauculi* dill In f i t unoEryfimo, operaeximiiRondeletuJuiprimuſuf^monuit; ſyrupus autem de Eryſimo efficaciffi- mu*, cu)ws beneficio juvencuU decennio raucedine labor^antes t^cauſeſcat M. R. R. n̄. H. lami- conficiturexRondeletio. Recipe Eryfimi totm recentk anteaui n̄. ruginas, L. canores, Capillitium lujiilaginis^Juccoadhucpr̄dignantium, Glycyrrhiz* an v̄tir ii 73 bados vel Betonice, an. M. ſ. feminis Anif- y^an.M. ^florulcLianu_m, AnS^A^ m, unc. ij. incifis & conuſis omnibus ſat decoctio S. A. in ſuffici- itis, addendo unc. v. ſucci prioris ad lib. ij. vel iij. expreſſo t̄ quo (rite purgato corpore medicamento mimuſtuo) liquore diſſolve ſacchar. dia & continuo utidebet pLafmpZkm

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI Aliorumque Authprum.

PA2, id. col. 2. pi. v. Eryjimum anguſtiſolium maps, C. B. P. iapijhum%efire Irioni folio Colum.Vpagjr.col2.pLv. IMJhrum Italicum, Jiliquis longijjimis, C. B. P. ^apijlrum montanumfi-

es filices Irionis ſalia, Colum. Ba repetitur pag. 101. et pag. 111. Ergo non poteſt eſſe Eryſimum & Rappi- ſtrum, prout erravit Caſſ. Bauhinus.

S I U Q U O S I

Fetrapetal* bicapfukres.

CATVT IV.

NASTURTIIUM SILIQUOSUM.

N Aſturtium aſturtium Dioſcoridi 185. Theophrasto 7. Hiſt. 1. quaſi aſturtium quod caput calore ſuo t̄ acrimonia vel ſim̄ & aſpitas, quod cordatis faciat; vel in Jyn- coſe cardiacadiZa, plurimum valet. Latinis Naſturtium, (quaſi Naſitortium) a na- acrimonia ſternutamenta provocet: bine Plinio 1.19- ribus c. 8. CisrVarroniJananuintormnu velut torporem excieant.

Genera Thely... Nafturtium Babylonicum opti-
muo effo... 3. Efi'fr^tenfe five fativum latioribus foliis, (quippe quod,
raiculofur^;41r.61^ldabri/us ad fibi fimjjesj eft is filveftre: Mud album, hoc nigrum,ubi
de jemin^inl^ikdnfemus. Noj C religio bortenfi imprtftentiarum) dividimus in pratenfe,

Quar... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
nenci^qua^*^ r^ca d^lt^gnat^r, s^l^gnat^r p^r q^u^m eric^ eft Nafturtium, cujus nota ge-
nens^maturis woprium, quodtaftae cum fubita agilitate aperiantur, & femina acultm evi-
brent, quor^ non^ convenit Erucis. N^fturtium nobis erit duplex habita ratione involucri,
thec3Eve feu capful^ feminalis ; eft vel filifc uofum, vel filiculofum; defiliquofb nunc in hoc
primomembro inter filiquofas culinarias caWas i acres, de filiculofis Nafturtiis infra in
fecundo membro de filiculofis cuiinariis caliéis, & acribus traftabirtius. Nafturtium filiquo-
fum eft vel annuUft); vel perenne; annum efi^fe album, aut purpurcum, autluteum ; perenne
eft aut pratehlij^ili-^uaticuni, aut montaniim.

T A B U L A IV.

Annum	Flore	Albo	1. Minimum, foliis ex alter a parte crenatis colore atroviri- di, nobis. Sium minimum, Profp. Alpin. de Exot. <£
			Alpinum { <ul style="list-style-type: none"> 2. In/ipedum, C.B.P. Cardamine infipida, Col. '\$ 3. Minus Rejed*foliis, nobis. Nafturtium Al- pinum minus Refed<zfoliis, C. B.P-isr Prod. \$ 4. Minus Bellidk folio, nobis. Plantula Car- damines alterius <zmula is Sinapi pumilum album, Cluf. Hift. £
Perenne	Aquaticum	Albo	5. Purpureo Neapolitanum agrefte, nobk. Sinapi alterum agrefte. Col. £
			6. Luteo minimo, filveftre tenuiffime divifum feu Nafturtium <uv- aZpvxKov nobis. Sophia Chirurgorum, Ad. Lob. Dod. Ger. Park, \$
Perenne	Aquaticum	Purpureo	7. Pratenfej magniflora Pilleno 0 (Simpli^it^no ^ Flos cu^flos cu^buli, Br^DfdD^Ca^Cardami- (DilutepurpureoS neff^l^k^ciflore, Cluf. Hift. 0
			8. Sufmumflore albo, nobk. Sifymbnumaquaticum, Matth, *C4, Caft. 0
Perenne	Aquaticum	Purpureo	9. Majus amatum, nobis. Nafturtium aquaticum amarurn, Park 0
			10. Erecluj/1 folio longiore, nobis. Nafturtium aquaticum Italicum, Park. \ &
Perenne	Aquaticum	Purpureo	11. Minus, nobis. • Sifymbrium aquaticum minus, Cam. Ep. Cardamine \^a Dap" Hift. Lugd. 0
			Sii. Paluftre rotundifolium radice ferpente, nob^vs. Naftur- Alpinumfeu] Hum Alpinum paluftre rotundifolium, Zancni. 0 Mentanum^i^ Trifoliatum^nobis. Nafturtium Alpinum trifolium, C.B.F. Cardaminet trifolia, Lob. Icon. Lugd. 0

Explicatio Tab. 4.

1: N' Afurt'mm minimum annum flore albo, nobis. Slum minimum, Profp. Alpin. de
Exot. Sium minimum, noli me tangere di&um, five impatiens Nafturtii filveftris fo-
ljo, Park. Eft herbula haec pedalis & aliquando altior in fertili folo, fruticat refto caule,
foliis Erucae filveftris proximis, minoribus tamen, ex una parte crenatis, colore atroyiridibus,
tx caule majore plures ramuli exeunt, in quibus, ut in filveftri Eruca & itfNafturtii Xpecie-
l-us, utrinque ex oppofito multas filiquas parvse, tenues, longse, Eryfimi Neapolitani aut Na-
fturtii

fturti temiifolii lura filiquisfimj[es& proximo: reining; in fe%i*ent minuu ex albiii-
 qua:matara. contiub& aftotum era&is filiquis ejjcutantur, £V eaddgi (knim ejacul
 01 k-m prope longe fparfim novellas plantas producunt. Hoc sin cum y&? iliis r-
 fpeciebus frmiliarc, fi quis filiquasmaturas manu comprtli^ndere conatj... .0 adinihr
 nimaUs indignati femina cunfta magno cum impem in mamrm. plants filiquas comprtli
 <icmem, imo& in fadem aliaique corporis parsesjaculancur^ at<ue<_!>ccvibrantur,
 non alirer qaam fir. in planta Balfamina tcmia lutea^ .& rubra pcifn :ioti me tan-
 gere obiddiftis. Certe bnge-mirabilius videtni, quod noslaDpeconfpeanus^ hanchertaai
 habentem in flicjuis teut!\ecisfemina mr.tira, fi manus alicujus qii lingendo ; VLLC urring-
 gerc propjus accedat, ctfi vcrequidemnon atti^at, omnia feniina marura magtio impc H
 ei^cu^ari in hominem appropinquantem, i^iit niultis ex repeotua cum filic
 apere^rone, turn [eminuni cjaculacione,non kvnn inducat tirnortm: quibusprorcftodiiI>^C^ar
 jft/lit an hac plancula ad ^diionomineiVLA^Vtopere olim ab Apollodoro magno ce^bra-
 tam, quadantetms accedat, dc qua anciquicas an animal diet dubicavic, quia vduitiindi-
 gnabunda femina in illos qui ipLam attingerc conanrur, vd eti*natEijig^rernjgiint, evibrat-
 >laec ex fubscri ilipore & non injucundo foliomm, pra:ferum crnda, in acetanis djrfcamtiliroa.
 Calidi Spficca fupr. lecundum ordinem, uti fane congenera (ua Naltortia omnia. Humores
 craibls incidit cxreni]art]ue,aperic, digcrit. Uriuam feniina movenc, & loliorum ufus Vene-
 remauget, ficurEruca, deperditamreftituit. Annua eft hare plantula, fed c^niL-n fuis fe-
 minibus fie longt hu^circum circa caukmc-vibracis, prolem foam ubiquelocorum feb-
 citer propagando perpecuiHtemnanrificiir ; pnfertiminlocohumido&opaco, qaoma-
 xime deletatDr,& in quo libencius bxnriat- Reperitur prope Londinum primo laptde ab Ec-
 clefia Dm JE&Zio dicata, enndo ab Ecclesia Vctfospagnmdicbin, HvnftedmUm
 pratis teens toilas: floret cxeunte hyeme& fcpmia pethcitM^o. 1-W deriuo t
 fervidiorc, intervenientibus frequencis imbribas quibusdckxiatur, quemadmodu.-
 cohorshujusianiilix.

2. *Najurtim* anhaam Alpinam infipidum, C.B.P. Cardanne miip.da Fr
 ^orii, Col, Alpine Oardaminea infipidac nomine hanc plantiilam Infrginvit idem _, ancicu
 Gregorius Capocinus, Q»i tam inl^no fima^im iter habens *Ailing* verfus, fupra ppaceffl
 quendara repeiire no»c^{2Vli: are110^0a!} i«antulumloco, quam rccertcem fuogdtui infipida
 & inodoraoi cognovit. Radice confabat admodum brtvi, cenui, multis libris praxiic
 C2«lc pollicari longi^{cu^inci:} iucifuris feu pocius finibus Chondrilla; autSinapios agreftis *di&*
 Iructu cchinato & anglofo. Hoc Canipoclarenfes pro Lamplana in ctbo utuntur,uti dicemus i
 capkulode Lanii^{111^1} AptiL\ veriore Fab. Columns ;folia pamm apera & *hy&ixa* font) ficu
 caulis oui tennis dodrantalis; in Tummo, ramis aliquotdivifis & alternaaaa pofins, filiquas i
 loVispctiotis elatas profert,& exiles admodum digitidi Longicudinc, fed magnas refpeQu ph
 tx- in quibus exigaum feften minutum nr piinaum inlcriptnm: flores in fnmmo parvi, tea-apt
 r-ill, cmi fuccrefceiitc caule abennc in filiquasbivaJves, duplicem feriem feminiim liinc inde ii
 fe continens, nicmbrana cenui peHucida eandem diftinguente. Floret iiiun^te aftate, & pc
 totam iftattm Horet,& feminaperficit.

-i.*Niffurtiwn* Alpinum minus Reft-clis foliis, C. B. P. Prod. Ex hujusradice alba,
 & oblonga, cauciculi leves, ttuues, redirvi communicer, iividivifi, palmoque minore; proi
 foliis. long³ pediculisinfarRefeds: viilgaris praediris, in folioscres, vtl quinqnt tub)
 dos divifis: flores in caulicloramfammisalbi.mediocris niagnitudinis ; quibusfiliqu
 ftiflimae, fefquiunciales, fuccedant- In Rhstorum Alpiibus Julio florens reperituc. ^
 ex Hc-lvetiorum Alpiibnsck Pyrenzis longe minus habemus (utinquitCalp. Bauilius.
 ut tori planta abfqie radice uncias tres non fuperet.

4. *Nnfurrium* Neapolitanum agrefte tiove purpureo, nobis. Sinapi altrum agrefte,
 Phytob.. Hoc radice iirmaturparva, Cenuu ribrofa, parumfub rerram delcttidtr^al]
 ex, qua tolioU exeunt Chelidonii najoris inqilbra, viridia hiifutie apera,
 tremmn fol'mmnon retDfom utCbelidoniinia]ot'is, fedacutum & minus tjofdem
 Ka anguloluseft, atque nullii a13 dividitur: tiore edit purpneos, unibellatos
 VjX ПОВ, qnibtw fobftituiintar ftliqas alternatim & frtquti]ter cauli lixrentes, r
 < xlum tendemes (LS qoibqa ipica confici videtur jiliquarum, daorum Hi
 (w?BBMi longir.udi.ie) Sio minimo Hrofperi Alpini ^{pares,} qua; cum exficcari rW
 vecunt, aquefiante venro yd aliquo Ulas tangente difrumpntur ab imo, at< te
 unmqi* valviiis(enuia,aculanturilava,Cardanine, vel Nalbrtii prions

^uftu.i-cria, ficuci ctiam fdlij/Tlorit Mavtio&f Aprili ; &Maio & Juntio femina per tit ir. Nifi ; cuiite & advettaitc/eniinycolligirejuilerHcnltor, non colliget, qiiiamanusipfiusevad.-
 V Ftyye.eit in agjip;xv^politano in vails *Divs Marine vitte*, inter Rubos,Cynocra m ben, Den res
 Icon: :: Ranjwrtuos, nova Sr^egans hsefi planta.

5. •A-*Ituniif\veite* rnuiflime divilum feu Nafturtium *punJptffAat* flore luteo rfeinitno, nobi:j ^Sirtcoroni, Ad. Lob.Dod.Cier.Park. Nafta mum Seriphium fen Sophia Chirnr-
 gorum, lyft^nbr. Cauies promit*hoc cubitales, rotundos, duros: folia vero circa hos
 fed VuHinTime in complurima exigua fegmenra divifa, Abfyntii tenuifolii haut
 mult im diflimilja, tctujiora tamen, (untie non incite mea opinionont Nafhirtium *ft*^U
 dici poteft, a fine ultimo, flore terrVietalo & filiquis bivalvibus, odore& fajxire in-
 luner Nafturtio conformibus; neuriqaamM>(yithiu:ii i:; debet atenuirate roliorum, ruia
 folia non funi'de eflentia generica, led fpeciu^^^lantaruno, quemadmodiim pnliini demon-
 ftrabimus) colorealbida & quafi cinc-re olj^flued, prarcipueinaridis: flo!culi ad luperiorts
 virgularam EJtes ordine digefti, gignuntur perquam exigui, pallide lutei, terrapecali ali-
 orum moret !A*Eras fuccedunt filiquæ pa*vae, tenues, oblongs, unciaks; in qutbus conti-
 nentur-*nah*
 more : utA femina Qibrnbentia, dupbas focukmenris diftinfta, aliorum lntjuE ciafiis
 iiluis, Ad incunte Vere, Maio, juntio, ad JaliitmSc Auguftum floret & femina pfricit in Au-
 tumiiHmufque. Frovenit in mnceriis, locis ruderatis, lapidofis, ac non raro arenofis, atif-
 que incalcia, fed maxime dclecratur in fimmis murorum,4irutoruni a;din"cioi um ruderibus ca!
 ce conftrutits, ul>i femel nata ex ftmine deciduo fingulis recuirntibus afnia facile pullu-
 lat-. Eft foliis aliquando latioribus, aliquando tenuioribus, colons nunc dilutius, mine fa-
 toratius virentis.

6. *Nafturtium* pratense niagno flore fimplici, nobis. Cardamine alcera fimplici flore, Cluf. Hift. Nafturtium aquaticum fimplici flore, Eyft, F!bscuculi,Brunf, Dod. Huic Nafturtio tiqjjj gratis & filvis humentibus, quam in aquis, proveniente Fios cuculi pro nomine im-
 ponitm, quod florem Aprili & Maio, quo tempore apparere& cantare lolet cuculus, pro-
 tradac. folia ei exeunte liyeme ex radice exeunt rotLindiufcula , in oblongis pediculis:
 inter qua? exilic caulis tenellus, dodranraJi aleitudine, nunc plus nunc minus, circa quem
 follow colts media) adhairentia apparent tenant, Eracx foiorum divifura. Hoc obfervatu
 dignum quod, cofts mediae foliorutn liujus per terram (tratx, prKcipi>ein liumidis locis ra-
 diculas fibrofas agant, atque noveihisproducantplantulas, hoc farpus obfervavic jacobus
 Bobert; qui infyper tiipartkis roliorum cofts easterri bene humenti commifit, & radices
 egfere, quod in paucis aliis obtervare licet. Flaes in fummo canlis plurimi, candidi, 8f ali-
 quando dilute purpurei aut modice purpurafcentes confpiduncuif, parvis leucoi fioribus li-
 miles, 6tis magoi pro proportione plants, nam fuperant citera onmiaNafturtii magnituditK:
 tforuni; hiice evanidis fuccedunt exiguae filiquisunciales, bivalves, femina minuta in fe'con-
 tinencei, duplice ferie difpofira, Kinc un^, illinc altera: rp.dix librofa, inque mukos annoa
 duians. Nalciturnoncamuminaqujs, fedinlocishumilioibus, & quscreberrimenon nio-
 cio coelefti pluvia, fed & rivuorum&redundantiLim ftagnoruni aquis irrigantnr, id liumidi-
 dis & umbrofs pariter filvis reperitur. Eft tantum Sifymbrii alceriis fpecie&qnjcdam,
 cique facaltate&tniperamentofimilis , acris quoque & calida. Inter tnyriadefi noannn-
 4Uuii, reperitur unnm aut alterum iiore pleno, SK cum iit planta perennis repens in pratis
 & l'umiais locis, in hortos rranflyt;j feft propagat, ntniulta; aliE fpecies diverforum gene-
 rum tranfiatK in horros candem plenitudinem florum retinent. Dicitur Naftui tiuni'pra-
 tenfe filveftre flore pleno, J.B.Cliabr. Nailumum flore pleno,C.B.P. Nafturtium aqua-
 ticum flore pleno, Eyft. Cardaminæ altera flore pleno, Chf.Hift.

7. *Nafturtium* aquaticum fimplicium flore albo, nobis. Nafturtium aquimicum & 2. Trag. Dod. Lon. Sifymbrium Cardamine, Fuch. Lugd. Sifymbrium aquaticum, Mattli. Of. Caft. Sion Cratevas. Eruca-tolium, Ad. & Icon.Lob. Nafturtioaquatico huiccaulis eftcrassufjon-
 ges,, & inariis: folia multa, oblonga, Sfvirentia, ex pluribus inrotunditate oblongis com-
 pofita & petiolo feu coftæ adhaerentia: flores juxta alarum & caulis fuperioris partes par-
 ticulatim prodeunt albi feu subalbidi: filiquæ deinde unciaks, rotundæ, tenues, in qua-
 rum femine femina parva lutei coloris duftici fere & dufticiloculamenta fento media
 intervciunte, continentur: pro radicibus fumfibr^ tenues &candids, eidem qua paite
 iljuis iniiaicitur pluribus locis geniculatim adh^rentes. Inveniturin rontiu'm limpidiJlimo-
 rum rivulis & aliis locis purasaqaashabentibus, ttiam in impurisftagnisgignitur teliciter.

Floret ineunte iftate & per totam arftatem" femina .nat/ratuX /-Hybemi-s menfibus m
 adeptula's acetariorum loco intertur. Tota herba japoYcm Na&arrii rsten, unde t'mom
 Dioifondi dicitur *mntf&tm es&*, y Sifymbrium akerum Laxinis: aliis <{a guilu w^
 K?^vm hoc eil Nafturtium reprifencet: ab aliis vero Siunft,

8. *Ntfturi'nm* aquaricum mains fcamm, C.B.F. Nafturnumaqu;iti<yitj<hiariim, Park.
 Sifymbrii alterius lpecies altera, Thai. Hoc pro Venit amplius & mnjus; '\ <_m o rolia habet
 inferiora rotundiora, minuique acuminata, acuca faas quando caulticit y acle diftitj-
 guitar a prarcedenri fola intenfa amaritudine, adeout nulli cdu!e nifi folia e^is bull^
 in aqua, prima ejcta, & denuo coquatur infecunda ut collauri ejufdem ajnricado, & fie
 edi potelt. Hoc proveni: in Gcrrmnia indift'crei^er cum antecedence (afferent* fie Tialio)
 a quo ibla amplitudine & amaritudine (inqj*-) o^ftert_

V-Aj/ttr/JHwaqBaticumertaam tolio liftipfore, C.B.P. Nafturciumaquaticam Italicum,
 Fari. Sifymbrium -aquaticom alterum vcl mtui^Carp. Ep. Match. Nailurtium hoc aquari-
 cum erectum difteitaprimo aquatico, quodcaules edat reaos,alatos,iolia particular cofe
 liatrentia, crciata feidentata font in margine, Apii foliorum quodammodoacrAula; cum fo-
 lii, turn femina miriora & jucundiora paJatofunt, fi mafcentur; necejus radiK-r<pit,fi-
 cat prioris Sifymbni akerius fpecies altera Thalii.

10. *Nnjinf^um* aq^uat^CU^m " "ins, C.B. P. Sifymbrium aquaticum minns, Cam. Ep. Car-
 damine 4^ Dal^m^1, Logd. Siiymbrium Cardamine diflum hidutum minus fiore purpureo,
 J.B. Chabr. Ex radice tenui, fibrofa, Nafturtium minus hoc oritur; filiquislonga:: caules
 raropjmares, aliquando minores, in partes quinque Refedae vulgaris modo dividuntur:
 Horesobrineealbos, infummo comantes, quibus fuccedunc filiquaelongx, anguftis, txi^uo
 Si fubacri i'emine referti. Variat ratione loci, in aquaticis nempe plants maji
 Vinetis riguis Vilenibus milliari BafileSlonge minus reperkur; provenit etiam in Al;
 OCII liumidis. Floret ineunte iftate ft verfufejuftem finem femina fuama^m^11"

11. *Uajlurtium* Alpinum paluftrc rotundifblium radiceferpente, nobis.
 piiium paliiftrerotundifolium, Zanoni. Radiceconfat hocNafturtium rocunt
 rola,afpera, exierius fubrubente, multis fibris fcatenre, cortice ablatu contumace tefti,
 quus major & viridis furfum verfus pennam anferinam craffitudine excedit, at deorfum
 verfus minor Sf fibrofa albefcic: ex radicibus fie confmftis proveniunt folia fubrotunda,
 paululam finuata, in margine parum crenata, aut dentata, fpiffa, membranea, Uvia, modicum
 lucida, prarpue prima terraexeuntia, qua; multiscatent nervulis apediculi centromcir-
 CEimrentiam decwrentibus, UC confpicere licet in Sanicula moncana rpeundifolia mi-
 nore C. B. P. feu Sanicula montana minore Cluf. Pan. qux innkuntur petiolo ftriario ruptu
 lacili, reli&o intus nlamento nervofo: «mediniUioliori«nioliorani, a radice ortorum, pro-
 truditur caulis dodrantalis, fucb plenus, terram verfus viridis; cui atemaam ad fingulas
 aLisadhsrciit folia fimiliter rotunda, fed multo minora: in fummis caulium ramis pullulant
 raenfe Maio plurimi iloresalbi, cetrpetali aliorummore; quos fequimur filiquae breves,
 bivalves continences" fingulxdupltem feriem feminum, fepto membranacco exficcacodu-
 plicem iilam feriem feminum dmmente: filiqnspradiaacfunt tniies, ab initio virides, at ex-
 ficcari coirem mutant; aperiuimr Julio, & fi tangantur illicofemiii per terrain fpar-
 guntaliorum fue ibrtis more: feaiina funtimpertefte rotunda, (lava, luctda, fitr!
 guftus, ut etiam caterorum omnium fcitna. Reperiturinlocaaperto, ubi palcancai
 intemtorioMudenenfi, prope fontem jagemaquas limpidx& frigidillima; qui ab in u_ua
 p.ilWil)U3 *Baccara* appelbnt, & propter /itum hajus plants juxta foncem Baccaram ipia
 Baccara nuncupattir, ex cicatione Jacobi Z,anoni, fedmeliusretinebit nomencujufert tef-
 feram.

12. *Nafturtium* Alpinum tritooiatum, nobis. Nafturtijm Alpinum trifolium, C.B.P.-Car-
 damine trifolia, Lob. Icon. Lug. Tab. Ger. Cardamine Alpina trifolia, Cluf. Hift. Iberid'
 Fuclifii affinis Cardamine Alpim, J.B. Chabr. Hoc parvnlum Naiturtium nigrican'
 perteiram cofis Terpir, quibus terna femper ejufdem colons perpetuo folia in
 ca pdiciilum anguftiora, per oras latiora, & quafi orbiculata, in ambitu parui
 nata, initio tenelta, & viridia, demde dura, mernbranacea, nigricant'ia, acidii I -limiru?
 fttt, poftca acri; omliculi teretes inter foliaerumpunt; ex p'urpura nigricantes, palmarc'
 lis am ravifiimis (qua: ternis etiam eidem pediculonKa: reric) toliis praxliti: rlores extr
 mis ranis infi. Ittit candidi, tetrapetab, Cardamines pratcnfis, quam Fuchfius Iberidem nn
 cupavit, floribu* perfimiles, fans magn., pro «,,,£«; plautae: hifce fuccedunt torofe

'ojig.r filiqua: five c<pniicd;^ent;Jriarumcon)icu]is fere familia, fed minors; femineetum i'nyli licet minoierejfefta: 'radix fiimmjt tellure i'crpjt, & iubiride parvas candidai'que tiaras agit, 'fie ut taciig rarrmlts terra obrucis|pai)gi poiJit. EnreOtcnr in fiivofismotitibus uudo folo potius qupn^herbofo, fff Abietum & praealtarum arborum radices, rota liyeme etiam virens. t^orfr Taniinitib, in cultis v^ro hortis ctiam Aprili; 3f Maio femina mutur.it.

13. *Najlurti'jiti* minus Bellidisfolio, C. B. f. PlantulaCarclanimes iEnHila&Sinapipaniilum allnipcni.i'ri, Hift. & Pan- tlmcbhsecplantala affuigit caale, fed ftarim aradiceiopra foliar- "flitiltis alls di vi fo , hirftito & afero vkentc, rotundo, pedahs longicudinis; iaferna folia qu'aliatlm pronimciare ^inquitCar. Ctufius J nonpoirum, quia jam in I'cmen magna ex parte evaferac plantula bxc, cum ean^emobfervnvemni; qua: tamenfub iiliscauli inhalrebant tcinia cfant & multifida, Nafturtiitolgans & Icgitimi toliorum peneaernala, tenuioratamen, & viridin, acri guftu uc NaitnrtaajExtremis ramisflolculos fet multos, quatuor petalis pallefcntibns conitantes, fpicsejm3^)^dumcongeilos, in quibus cotidem ftamina; hi fee cvane Teen ti bus fnccedont filiqufe brevesj^ nabas valvulis confbntcs, cumlingnlaprominentc, nor;<quidcm furfum ereflaeut rcliquarumCardaminarum congcticum, feddcoriini inficxae^ M^qoibns latet Nafturtioti Alpini femiris smulurn(cmen, decjuo inter ftliculofjf radix eft fingularis, candicans, fadscrall'a, noii tamenvivax, fed qua: /ingulis anius periftodem loco, eodemque tempore cum Nafturtiolo Alpinocapfula Naitnrtaii hortenfisvulgaris, neimpe Marr.io,florentem hanc plantutam 6c femine prajgrantem inveniebam,inquit CarCloffios, quo Alyflum Galeni, Valentino videlicet regno, Sc quia plerafque notas cum N.alturnoiiiiibet, Nafturtii nomen appofite fads indidit Carohis Clufitis: ex guftu fecultates Nafturtio perlimi'eshabere cum Clufioconcludimus nos itidem.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Najlurtium fil: fire tenuijpme divifum feu Ihfluriimn fwu'^u^ai flore htlco minimo, mbis. Sopjfi. ornm. Ad. Lob. Dod.Ger. Park, Eft(authore Vuchfio J facultate reficcans is aftringensy nonpoteft efkparticeps alicujusfrigidita/i^utvultidem Vuchfius^cum fitplanta cnlida is acrh. Semen hujws ajfumptum ventritfluores fitit, adverfifs dyfenter'tas commndatur, fnryuini* profluvia **reprint***s, u?ide a Cbintrgk is Meditis cafirenjibmin magno ufuantiquity* fuit ejits femem contra dyarrbceas is dyfnteriai militum bumi **cubonthm**, ex cujus hummibus is vaporibu*prtdiclimorbiinitiumfumpfere; ideamaximopm fanenbu'Ju*ficutis C^terarum hujws familidit Nojlurtiorum potent defiderari, is ujurpari adbu in cafirh tanquam idoneum medic amentum pojrl purgatiamm unam aut alteramex.'Rheo adm'uuftratam, quia compefcit liquidltatem burnorum is taliditate fua reducit inteftina is jiomacbumad propnum fuum ionum metrumque.

j. Nafturjeium aquat'uum fupinumfiore albo, nobk. Sifymbrium Cardamine, Fuch. Lugd. Sifymbrium aquaticum, Matth. Slon Cutty& Erucafdium, Ad. is Icon. Lob. Fxcuhatem habit atlidam is ficcam adftomacacm quam **Gervum** @cijoibtch, Angti scurfy is @CDtbut nvcupr.nt. EjU6 decoSium in vino aut laSle aliquot 'diebus continue epotum multum **buicmorba** Prodeft. Vrinam provocat, calculum is arenas content ac expellit, renibus is veficgntile " •-, inquit Dbfcorides, cruduw, urmas movtt^ purgat hntigimm is ebelim tcta nofte , **matutinoqut** tempore detrakum. ExShnonePauh, Recipe magnam copiam Naftur- ' " tquatici, contunde in mortario marmoreo; exprimt manibus J'uccum, inquoportio aliqucf ferinemi folvatur, ut fuccu6 confiftmtiam fapadilutoris acquirat, is hoc fuccois Najlurtio manibus exprefo, feu glebk is pili* Nafturtii fiat quafi f.f.f. pinfentur omnta foniter ma- **nibm** autpiftillo, reponantur in convenientem locum per ocliduum, dein 'S. A.perB. MarU dijllktur fpiritus,. cujits ufu* ut hyhrnh imnfibus fcorbuto laborantibws illim cochlenr unum itemque **alterum** propinemws, Ef hac ratione ex Chclidomo, Beccabunga, Cocbkarh, **trifolio** &»•••• feu Trifolio pdudofo,fi libuerit, fpiritus dicit; namft his herbhobfermen- HdamaffuderitPS) oleum (quoddiciturjperdetis is operam, cumnon nifiprepro fue- **iente** fermentari gftium. Hafiurtii omnes **ffxeies** cum fnt calida is acres planted it/don polknt viribta^ qu<tdam magit, qugdam minut, fecundum gradus intentionis is re- **missionis** ederit.

HALLUCINATIONES GASP. BAUHI. NI- Aliorumque Amhorum.

P Jg. 103. J. Najurtium latifolium C.B.P. PL 11. Ibidem, Najurtiumhortense vuhatum C.B. P. epag. i o. col i .pi. l u. Najurtium tor ten. fecritum C.B.P male bic & confute «, Calbaro Bau- bmo inter Najurtia ftquoja collocantur, cum non fint fiquof*, ut extern bujus primi membri, 0 capitu hujus fedriculoja!, ergo inter Jiluulofas plan- tas ad fecundum membrum hujus Seclions antan- dan & relegari debuerunt.

Burjtpajhrv, C.B.P. Najurtiumpetr*um,Tabt Ger. Pag. i or. col. t.pl. dx. Najurtium, tumh hm vernum CB. P. Cardammepufilla faxatilism- tanadijndes, Colutn. V ibidem pi l x. Najurtium

Jpinum cajfala Najnrtnh^fnfis, C. B. P. Na- JIurtiumMpinm, C.B.P. ChabrJndem col i.pli. JSIaJlurtiumfilveftre OfyridisJlllfo, B. P. Tblafeian- gujlifolium minus, Dod*. Ger. IbMem col 2. pi 111* NaJurtium (ilveftre Erucce affint&xi) >P. Erusa Najurtio cognatane folio Lib. JtK (u. JIurci) & K* Lemim, C. Ju. Hhijl Omnes hveftre Ss Wajlurtii male bk colio cantur inter Nallurtia Jiliquoja, binn vah fulis longis donata, cum fint tantum frilculofce piarrta feu binisvalvulis curtis donate; debent igitur aman- dari &? referri ad Jiliculojas Jecundo hujus Seft*ifid membro coUocandas, ideJt inter Burjas pajtoris, ffita- jpi, Drabas, Cocblearias, & idgenus alias\

S I L I Q U O S &


Tetrapetal* bicapfulares.

CATVTF.

ERUCA.

1⁴ P^{uca}- > < l^{od} vdicando linguam quafi erodat: ei^<^» Diofcoridi I 2.c. 1.70. <? Theopbra*, jpo i.Hift. 9. ob fuavitatem, qu<zei in condiendk obfoniis ineft^ PlinioL 20,c. y) Genera duo Diofcoridi^ fativum & agrefte, cujus femenpro Sinapi in Iberia utuntur: (y Pⁿⁱ '2o.c. 13. Erucce filveftrk meminit. At Theophrastu* 7. Hift.t. Eruc&ymtris differentia o- mmino deeffe voluit. Erucf haud facile affignari poteft nota generica ipfi peculiaris qua diftinguatur a extent lupraailatis^dcirco fpeciatim ipfas fpecificasdeducemus Erucas.Eftq; vel annua filiquis bival-ibas,eaq;alba,C3erulea,autlutea: vel perennislutea^quxeffe reffh autprocumbens; vel maritima apnua flore dilute violaceo filiquis fungofistorofis unicum femen oblonguT, vel articulatis Plunna femina continentibus%vel lutea filveftris MonffeftTulana fi.liqua quadrangula echinata. in omnibus paffim ftirpibus obfervamus notam genericam d natura datam & confiante & mvanabili ejufdem naturae ordine Temper eandemefle, & eodemmodo fehabere, fed in 0- mnibus generibus quoad folia diverfo modo ludit eadem natura; imo mille modis diver- fimode conftruuntur folia, non folum plantarum ejufdem generis, fed & plantarum toto cccllo generediflerentium, ergo nee a conformatione feu ftruftura, nee a numero foliorum plants generice fQnt nominandae, aut ad genera teducend^; fed a fine ultimo, id eft modo florendi, & tipfulas feminales & (emina producendi, genera fumma peti debent. Hoc paffim haufimus ex libro nature, natura ipla finem non variante. Obfervamus plunmas plantas diverforum ge- Kerum familia omnino aliquando producere folia, ut fub exortum e terra a feinvicem (etiam- fi fint a fine ultimo longs diverf*) vixdifcerniqueantfolo vifu, propter foliorum fimilitudi- ^em, nifi guttas, odoratus &taftus vocentur in opem; fed fimul ac hujusmodi ftirpesfoliis 0- mpino accedentes, florentes, capfulas leminales & femina fundentes a quovis Botanico medio- enter verfato confpiciuntur, (non obtante fimilitudine foliorum) genera fua produunt. Q^{as} quxfo divinaret ErucamTanaceti foliis,hie a nqbis exhibendam,primointuitu foliorum eife plantam a Tanaceto diverfam; aut MillefoliumTanaceti folio a Tanaceto, aut Bellidem Tana- ceti foliis diffmaam a Tanaceto, antequam caulefcant, flores, capfulas feminale^ & femina fe- rantprsdias plants; fed fi flores, femina, eorumque involucra produxerint v fe fine guftu aut olfactu, inamllium vocat.s d; cermthas trespl. antas gene re diverf,s,folioramlulc>ffru- ftura & comMjfitKweomn.nq.firni^d^Tanacet^* foliis* reducinond; b * r J, l a m q r a c , queaa genuum xuij fertederam re vocari dcm J il- " a a . J ; ; - ^ ^ , l u u p n . i r r l r \ & Eruca Tanaceti folio ni hac Tabula exhibit p r i de aliis qjudicam Erucf cell,dls fol ncre mditciita tioribus, filiquis & femine, jupra d. mt.Ult. orum (uamv i ? ^ ^ f ^ em ge, folia Sc hie & alibi inferviunt ad fpedes tantum re & fap Ore) q uenivis vifu falle rent, w endum. maeternunandas, non autem ad genus confitu- TABULA

S
TABtflA V, & VI.



fi. Major fativa, nobk. *Eruca fativa*, Mattb. <?
 i 2. *Chalepeti/is caulib&s < & filiquk hufutk folik infer toribm inaculk nigrhnotatk, nobis.* <£
 3. *Hirfuta Hteracii asperifolio, nobn. Lamp/ana Aptila Diofcor'ulk < & Plinii^Coluin.* \$
 4. *Romana fivegentilk filiqua anguflafolio lato, floreallo(jperpazmve\hiteo)J.B. Chabr.* £
 [5. *Perfonk{Alpinaradke repente, Zaroni.* 0

&. Cdtruko\in JrMfis nafcens, nobis. C. B. P-iff Prod. %

[7. *Latifolia folio inlegro, nobk. Mya-grum 2. Tab. 9*
 } 8. *Angufiifoliafolio integrojtobk- Eruca [• Aufriaca angufiifolin, C. B. P> ?*
 9. *Monfpelitnfs feu viwalh minima, uebk. Eruca Monjp'elknfs flore luteo minimo^J. B. Chabr. ?*
 10. *Inodora^J.B. Chabr. ?*

*Latifolia feu¹¹.¹⁰" & **%<*** TMs. 0*
Barbareaji 2. Minor pre\Simpleincbk. & (Pletio, ncbk. 0

13. *Montanarepcns Sii foliis\710bis. Shan altirum aquatkum ttnuifolium montarwm, Colum.*

14. *Maxima Canadenfts, nobis. Eruca maxim. Canadnfts, Cormtt. Maxima Americana, Park, 0*

15. *Latifolia> C. B. P. is- Prod. ©*

16. *Major vulgatic"fat f&tens, nob. Silvtflri*, Matth. Lob. Dod. Silveflris' < Tab. Ger. 0*

17. *Minor feu pahflrh procumbent *& repem, nobk. Q*

t\$. *BeMdk foliis, nobis. 0 >*

\q, *Txnaceiifdiis% ncbts.m Eruca Indies Tana-cetifoliit., Zanon't 0*

20. *Anglka fdiquulh tsroja rotunda foliis craffis latioribxs, vcbh. Cakik Scrapwms, Lob.Obf.Lugd. 5*

Maritima ^{ul} • *Italica filiqua bafit* cui fidi [imili, C. B. P. & Prod. <?*

I 22. *Mpftiaca fotrn Ivioribus crafts, ft Ufa torofa minorv, nobis. nz maynum 3 SipitJLpuPfyAlpin. §*

z^ *Chalepenfu flore dilute violacco ftliquulis artucufatis, nobis. 5*

24. *Monfreliac%fiHqufiqttdrangtkeckmatii, nobis. Siriapi ecMaafm, J.B. Chabr. \$*

Explicatio Tab. 5

1. **Eruca** ^{fuca} ^{TMP} ^T 'ativaannua. flore albo ftriato; J.B. **CSfibr.** Eruca tStēya, Matth. Ad. JL; Lob. i. jod. Lugd. Radice tenui, alba, lignofa donatur, faporeacli: caules funtfubnirluti, cubitales & fefquicu bi tales: folia Sinapf albiminora, tenera, glabfe, eufdem cm radice lapons: flores tetrapetali, dilute albidu, ftriis nigricantibus pifti, q&i^Sūjapi albi, iago. Hx caiycibus hirtutis filiquae brevibus pediculis exeunt glabrse, qu/des in'O^f' miqua glabra, led longiores & quadrangular, à lateribus fc aperientes, per m&iBranam meaiam dilun&a?, cui adhuc viridi hinc inde adhaerent multa femina matura flava, majora quam in inapi, iam ditto, minus tamen rotunda. Eruc/m dixere quod erodat, nam fi deguftaveris, os/Jk lingnam fatis acriter vellicabit: alii f*afcpellatam putant quod urendi licentiam nanciatnr, quafi dicas Urucam, U in E verfa.

2. *Eruca Chalepenfis* caulibus & filiquis hirtutisfoliis inferioribus maculatis, noLis. **Hæc** caules protrudit cubitales & fefquicubitales in multos ramos brachiatos, hirtutos, quorum liminis fatis innafeuntur flores latis amplu, tetrapetali, albi, ftriis nigris pifti; folia per centramp ftriata, «., »wiii> laiiguuncariiigris: flonbus deciduis foccedunt miqua?curia:, hua- drangulares, hirtuta?; atque hifce notis quam tacillime ab Eruca fativa diftinguitur, cujus nee canles nee **filiqax** font hirtae, led glabrz, nee folia maculis nigris diltinguuntur. Huius elegantiiiiJB Erucae fpeciem nobis communicatam habuimus feminibus Chalepo ad nof nuffis, cam pJunbus alus ieminibus rarioribus à Roberto Huntington, penum noftrum Botanicum non fine jmproLo labore fingulis annis augente.

^h ^h ^h hirtuta Hieracii aperi folio, floribus albis, nigris lineis depiftis, nobis. **Lert-** plana Apula Dioleoridis & Plinii, **Colom.** **Rapitrum** flore albo nigris lineis depiftis, B. P. Hæc planta Eruca fativa omnino amula est, primo quippe afpedu quemlibet falleret foliis cubitalibus, hirtutis, & filiquis hirtutis, quæ in interna parte verfus caulem: radice vero est candida, craffa longa, filveftris Rhaphahi modo, acri iapore: folia emittit in terram jacentia, dura, virentia, parum hirtuta, nervis apher² magnitudine & divifura Erucae fativse, Rhaphani vel Napi, quorum folia inter fe fimilia font, fapore oleraceo: caules edit plures bipedales fere, alis divifos, fed iumma alarum folia circa flores oblonga font Raphani modo, non ut in Eruca utrinque incifa, & in hec ab illo eam airtret: hores in fummo albi, lineis nigris depifti, Eruca* fativæ modo, **radices Rhaphani** pofitu affimiles, ut ab illis Erucam quilibet facile conjicere poflit; **radices Rhaphani** filvecitns xmulas n nnu^ rnh^rofic; prorert, aroue iapore & flores edit. **Floret Martio** &

«**radici.** vero ut RapLn, Weo bl.orum ufas aptas, cum fit holmcus. Ind.gen.s est buſ) herbisenim facilevefcuntur Lampfanam appellntes. Hanc max.mePlm., delcnpt. -cbuſ) herbisenim facilevefcuntur Lampfanam appellntes. Hanc max.mePlm., delcnpt. -oni quadrare cēfmn • ci rVjonna • inter filve(l.r « **Blancas & Lampfanæ** de **Raphis** **aliSdinSfolfo** **feXfitotificandior** no filveftri loquens, il u's fX magis. **Lampfanam** repmetone, **quæ** **notarum** **defe-** **Ro^IQ^ii^liquaangufta folio** **l** **at** **hanc** **herbam** **cau-** **dam &acrem,** Erucae flore albo fun» lem acceP¹¹: J- Bauhinus Nonmberga à D. Doldiopro Eruca Romana five gentili. Foliis^ft l^tis Erucae fativæ flore albo modo: caulibus hirtutis; affiliquxdiverfae admodum a ceteris, font enim tenues valde, & longa?: flores inficcapliin- taalbicant. Col^tnt in hortis Romanis.

5. *Eruca Alpi* ^{na} ^{rad} ^{ice} ferpente, Zanoni, Ex radice hujus Erucae craffl, - fibris fcatente, profiliunt multa folia, fuperne obfeure vinda, interne fubalbida, undique lucida, carnofa, craffa, multam finuata : ex Quorum medio proveniunt plures caules, fractu faciles, verfus ten-am cortice^lbicante tefti, qui furfum verlus virefcunt; ex horum fingulis genicllis, qn*ⁱ ^{cnnt} latis frequentia, pjaccipue in inferiore parte verfus terram, exit folium caeteris • per-tehram ttratis limile, fed minus minufque inciium, atq; per **fingula** **gen** **icula** **al** **rernar** **im** **aifponitur,** caul duabus auriculisfoliofis adhajrens: ex. alis inter caulem & folia aliquando exilinnt quateriw, aut quina foliola, unciali pediculo inmxæ paulo m ^ s m inutius incifa imo quafi crispatâ, concurrentia m unum & idem centrum, pediculis: **Laue** in caulium cV« nalciinturpWM flolcuh altals tetrapetali, quoruJingula S in extremo font bifida, cup

cdm %aminulis mul^s tenuibus luteis^in medio petalorum: fingulis floribus evanescentibus succedunt filiq&as fingular, bivalv/s, coljtinentes duplicem feriem feminum fiavorun^ fepto medio m\$nr^a^c^eo feaparata^ Provelitin montibus faxofis territorii Bononienfis & Modenenfis; pr^cSjpije in morite^ Cimone inter faxa illic*

6, *Eruca* filiftris Iacifblfe folio integrd flore luteo minore> nobis. Myagrum alterum ~~Thalpitia~~ Me, Lob^Icon. Lugd. Myagrum 2. Tab. Eryfimum 3. eidem. Camelina, Ger. ~~Eruca~~ filiftris anguftifolia, eidern. Chamelina feu Myagrum alterum amarum, Park. Myagro affinis: ~~radix~~ filiquis longis floribus parvisiuteis, J. B. Chabr. *Eruca* hsec nobis & aptius dicitur quam Myagrini, ut poirea monr.rabirSus cap. de Myagro, "caulem emittit erectum, in multo ~~lo~~ fulsum verfus furcatum &: divacatum/oliis longis latioribus fequentis 7— & dilute Tidibus ornatur, non parum accedentib^leucoi filveftris Clufiifolns, unde non raro ab Herbariis pro ipfo fumitur hxc *Eruca*; dir]erttamen, quod hujus rolia funt anguftiora minusque virid>a: in cymiscauliumdenfc admodum profiliunt tofculi plurimi, minores, dilute lutei, tetrapetali^leucoi filveftris Clufii floribus aliquantukm/imoduplominores, quibus fingulis dilapfis faccedunt fingulas filiqua?, tenues, longae, plurima femina ilavefcentia gufta amaia continentes, quae fepto medio membranaceo duplice ordine feaparantur; in fingulis filiquis exficcatis, femine deciduo, appare.t feptum medium pellucidum, album, ficut in univerfa caterva filiquofarum tetrapetalorum plantarum hujus Seftionis: radix eft tenuis, lignofa, fingulis annis pbriens & fepe femine deciduo fingulis annis renovans. Semen hujus in plurimis Angliae locis contra vermes puerorum ufurpatur, quod tufum & potui cujuflibet liquoris miftum, admi.4iiftratur pueris, quorum ftomacho 6&inteftinis vermes funt infefti, unde à rr,ulierculis indigenis abufivt; U30:m*(eU appellatur.

. f. *Eruca* filveftris anguftifolia folio integro flore luteo, nobis. *Eruca* Auftriafa anguftifolia, C. B.P. *Eruca* filveftris anguftifolia, Lob.Lugd. Silveftris anguftifolia flore luteo, J. B. Chabr. Ex inflexis cubitalibus caulibus, flores promit luteos *Erucae* filveftris: cornicula filiquarum Sinaprijui-* aut Nafturtii filveftris, ubi femina in duplici utriculo latet hinc inde acre: folia anguftiora integra fine crenis aut denticulis, *Erucae* filveftris foliis concoloria, Tarchonis fere paria, quas *Eruca* aut *Drabam* fapiunt, quibus idcirco affinis putatur planta.

8. *Eruca* Monfpelienfis flore minimo luteo, J. B. Chabr. *Eruca* vinealis parvo flore luteo, nobis. Hanc Monfpelii florentem circa adlatem in quibusdam muris obfervavimus, inquit J. Bauhinus: foliis accedit ad *Eruca* luteam filveftrem, qua? in noftra Icone non bene in acumen definunt: flores funt tetrapetali, minimi, lutei: filiquas unciam longae. Provenit inter vineas circa Blaefas, cujus cauliculi funt palmares & fequipalmares, non re&i, fed fupini, in terra fabulofa & arenofa Solonienfi, Floret Maio & Junio, feminaperficita eft atemedia, & aliquando tardius.

9. *Eruca* inodora, J. B. Chabr. *Eruca* haec inodora radice nititur longâ, fimplici, cum paucis fibris lignefcente, fatis gracili: caulis cubituri aequat, ramofus: folia dodrantalia, *Erucae* luteae filveftris quodammodo fere divifura, quanquam inferiora Jacob^se pene more latefcant: flores ex luteo pallidi, & tetrapetali funt, reliquarum quarundam modo: filiqua: uncias duas longae, graciles, bivalves, femina duplici ferie, hinc una, illinc altera, continentes, fepto medio nutritivo duplicem feriem illam feaparante. Nullum ego odorem five faporis minifignem in hac planta animadverti, (inquit Johannes Bauhinus) qui florentem invenit Julio in terra argillofa Vitium, quas funt ultra Rhenum *Burkbeirn* generofi Baronis à *Schwende*, uno miliari ab urbe *Brijfaco*. Quamvis omnes fere hae filiquofae tetrapetalae calidae & acres guftui funt, haec *Eruca* tamen item & Nafturtium infipidum recedunt à regiis, quoniam funt plantae To}: ibidem tamen funt collocandae, quia conveniunt in fine ultimo, id eft floribus tetrapetalis, & filiquis bivalvibus caeterarum fuae fortis ftirpium aemulis.

10. *Eruca* cxrulea in arenofis nafcens, C.-B. P. & Prod. Hsec ex radice ruffefcente, oblonga, tenui, leviter fibrofa, caules plures palmares, rarius fequipalmares, friatos, hirtutos, ramulis aliquot braçliatis, emittit: folia ad radicem per terram fparguntur, *Eruca* vulgaris infar finuata K&P& circumrofa, hirtuta, afpera, fequiuncialia, fed etiam breviora & anguftiora, quae in caule r^riora funt, minus finuata, & aliquando integra: flofculi tetrapetali, elegantior caerulei vel purpureo-caerulei, filamentis brevibus donati, ramulorum extremis infident; quibus filiquae bivalves, oblongae, tenues & kves, femina minutum fubruffum* & acre includentes, succedunt. Provenit apud nos, ait J. Bauh. locis arenofis, utiis quae Byrfa aluit: fic quibusdam locis in muris reperitur, imo etiam altiffimis jugis dV petris circa Delfpergam & Laufden Raucorum, Floret ineunte adtate; atque media ejufdem tempore femina perficit.

it. *Eruca latifolia* lutea feu Barbarea i. (L'ior, nobi) i. Herba fantta; Baibara>, Fuch. Barlwrea, Dod. Nafturuum palultre hybernm, Thai. *Eruca itec Barbarea* djfta Rapumauc Na- I tim foliis imulacur, qiratamen laevia & glabra & cbfcure vr^fia funt, **fte** afera: cau- lifeftrectus, friatus, cubitalis Staliquandoaltior, cu'msemcdio, fere a<^ riittigium uiqite, **raranli** tiores promunt luteos; qitos fequuntur filiquae longae, tenues, terctes, in quibus exigmim & colore ruftum lateffemen, dupliceoidine, fepto membranaceo* li^jnftum: radix mediocritercraftl & oblonga eft. Proveiiit fecus viasac femitas & ad margigtes foli. imo in toffarum imisaqua Kyberno temporefcateentiiim, viret. Florecinetmte afctate, & me- dia ejuftlemrempefte femina perticit fina.

i2. Datur & hujus alia fpecies diltinfta, c^us folia fnntminora, frequentlus (inu;w, caules pares, filiquae craffiores, Sffemina g^r^iora, minus hilca & quafi fubalbicincta: c' fiani planta eftperennis, & ab Eruca Barbarea vulgo djfta praediftis notis quam bcillime di^ii^1- guirur; hajos rlofconfpicitur in hortis plenos. Vide tiorem plenum apptftum una *cm W?* qua ciatTiore, Tab. 5".

15. *Eruca montana* repens Sii Foliis floreluteo, nobis. Sium alterum aquaticutn luteum cenni folium montanum, Col urn. Hicrepticauliculis, pergenicula (aqnaricamm itirpmm mo- re) multiscapillamentisiifdem h>entibns, villofis: foliis utrinq; longis **petrolis** in iobosd. vi/rs, « in vulgari Creffione, **Crf.** valgo ditto Sio, vel ut a Matthiolo Silymbrio, fedarnplius **pttorj** dentatis, minoribusmuko, & anguftioribus, ex quorum finibus ate exeunt in iammadeniis ootris, parvisadmodUm, onoftj, qui in luteos floresparvos dchilcirat, eorumq; de<ucntiim locnm occupant liliquae tenuioresvulgaris, eodem modo **difpofitae, bivalves**, aharum IUII claffis more: in hifce extuberac femina minutum, prs maturate maturante fihqua l parum acre guftu, colore flavicante- Provenit in excelfis montmm plants, 1 reriiComitatus jEquicolorum fines & Tornempartis, quodam torrennis **alveo IT ficcate**, Septembri menfc lianc invenit Fab- Columna inter faxa repentem hy durantem atque fe propagantem. Aprili caulefcit, Maio floret, & Juiiio **perfic** inaliis montanis aquofis locis iifque frigidis.

Explkatio TabitU fat.*

14- *Eruca maxima* Canadenfis, Cornut. *Eruca maxima* Americana, Park. ^{I* = J_e d_e dro- lachanah^cErucaperegrinanumeraripotest; M ^ ^ ^ j S K T S S S i S K P^notj} limum quadoradix ejus, qua **fibns aliis** ^{c⁰1111a! : 1^0 a r i b} & **fobafra** ton **diferantar**, eo magis qualis haec *Eruca*, & *Canydenitsorpnes* n q ^ [^{r ^ t undis, & ro m c n to quodany ifperi} ^{mentum capium} ^{vestitis, quod undique folia exornat, uti Lyfimachiz, longa, acuta in ambitu crenis aequali-} ^{bus ferrata, tenui lanugine obfita; guftu subacido initio, tandem subacri, ut confuetum E-} ^{ril Cls om nll> us 1} ^{terrapctali, in quorum medioaliorum hujusclaffis more (Vaminula&pirtil-} ^{bus lutei} ^{Lin^o j} ^{colhplopoftmodum More, in filiquam eftbrmaturlongiufculam, reftam} ^{^ . . . g^O Tiistirgenteni, fapore dulcibus, matmis} ^{Augulto & Septembridgeidnis,} ^{Icmini a^i an folia, C. 13. F- & Prod. Hie caule eft cubitum excedente, albo, craffo, ibi;} ^{rarnofa: foliis glabris, pallide virentibus, ad radicem pedalibiis, profundis inciluris lac-} ^{niatis, per quorum medium nervuslatnsexcurrie, quem utrinquetoliorum lacinisbiuncia} ^{alaram inftar, triangulares, corrofe, figuradiveria; inferne & fuperne contimia!, cingur-} ^{qua; vero in caule breviora funt, & horum quacdam Enica vulgar is foliis familia, fuprem?} ^{VI} ^{ro angufta & parum finuata: incaulis fummo Mores fatis magni, aure>, tetrapetali, ihimi^1} ^{bus in medio plurimis donati; qoibua filiqui bivalves, oblongs, ftriftifiima; curvar, deoft} ^{<11} ^{pofitK, duplici loculamentodiftinftar, fucedunt. AaforteEruca^AnglicaCamerarri dob} ^{tat Ja. Cornutiis. Floret & femina perficiteadem tempeftate anni, qu3 cnerar fiiuos g<neri;}

1 i. Erwx filveftris major vnlgtiorfatens, nobis. *Erucafilveftris*, Matth. Lob-^{1(1) - Tab} Ger. *Erucafilveftris* vulgator, Park. Eruca filveftrismajor luteacauleafpero' C. B- r^ **H>> caafefoliifqae fativa** minor eft; flores lutei: filiqua: tenuiores, ca:cera refpondent: *Eruca* b^ ermicafeetida blitfeft^quoq; fativa: Wiisangnftioribus, treqaentioribus inctforis lacuiatis- Guftu jtriore **fapido reqne**, iapore mgrato & quafi fortidj: **canlibna** numerofioribus: flon. bo³ Ur. ra. cormculis in novella lerepbnrnumerofis JuHurnrnedantibus bivalvibus, dupj^{icen1} fenemfcmum lubruflefcit, ummfecontintntibus, **femmibw** Sina'nis /ilveftris [imilium. qui acnaiant, amanufcula & linguam vellicantia.

1% *Eruca filvefris* feupaluftris minor ^rocumbens&repensluteo parvoqueflore, nobis. Efficia filveftri6,*Fuch. *Eruca paluOjHs* miwor, Tab. *Eruca aquatica*, Ger. Sinapi palujlre, Ger. non emacub'^Radice coivtat hxc Jjlnofa, repente: caules habet pedales per terram reclinaates : folia fynt ei laciniata, aut profunde incifa, veluti filveftris foetida? folia: ftores gerit vivide luteoi, quibus fuccedunt filiquæplures, breves, bivalves, duobus ordinibus fe-^{na}ina in fej^mi»6ntes, fepto medio aliarum more pradi&os binos ordines feparante: radix ila^pitpdsrterram fe dínWens.

18. *BrucáBmldis* folio, nobis. Hxc *Eruca* nondumhucique defcnpta,caulesedit pedales & altiores aliquando•; in quorum cymis prcyeniunt fiofculilutei, tetrapetali, *Eruca*filveftris fctidae floribus magnitudine pares ; quibus fil^cedunt filiquæ fpicatum quafi digeftæ, longiores * & craffiores filiquis*Eruca*wilveftris fctida: ; de\$|d|eju.scaules non funt,ut*Eruca*se filveftrisfcti-*dxjetl'k*, (ed reflexi. Hife nominibus diftinguitupfb *Eruca* filveftri fctida, (ed prascipue foliis adeo *Bellidis* majoris fofis fimilibus, ut dum *per* terram adhuc fternuntur in orbita, circa radice caput, quilibet, antequam caulefcit, flores & femina producat,audacl:er affereret efle *Bellid*, dis majoris fpeciem ; fed fi guftum in opem advocaverit, tunc facillimum erit, ficut in fequente, *Eruca* *Tanaceti* foliis.)udicare à fapore calido & acri *Eruca*is familiari,& hanc & illam efle *Eruca*e fpecies, fimilitudine foliorum ipfis fpeciicam adjudicante determinationem, quemadmodum frequenter in aliis generibus obfervare licet per totam & univerfalem firpium feriem.

19. *Eruca* *Tanaceti* foliis, nobis. *Eruca* *Indica* *Tanaceti* foliis, *Jacobi Zanoni*. *Eruca* hæc folia profert multa per terram frata, viridia, *Tanaceti* foliis quoad difpofitionem & divifam haud abfimilia; ex quorum gremio exit caulis fequipedalis qui furura verfus in multos ramufculos finditur, inque horum cymis proveniunt flofculi multi tetrapetali, quibus pefentibus fingulis fupveniunt fingulæ filiquæ bunciales, bivalves, fpicatum longis petiolis cauliadhaerentes,fepto medio membranaceo duplicem feriem feminum difterminante. Tota pl^ntapuftui calida& acris eft, quemadmodum reliquæ *Eruca*rumfpecies. Antequam hxc planta caulefcit, caulefque & filiquas producat, folia ejufdem adeo foliorum *Tanaceti* funt afmula, ut nifi gl^ftus in opem vocetur, difficile erit terminate fob quo genere militaredebeat; flores vero tetrapetali, & filiquæ bivalves, fepto medio membranaceo feparataejun&o fapore calido cV acri, indicant ftatim hanc plantam ad filiquofas tetrapetalas referri debere, non vero ad *Tanacetum* a fimilitudine foliorum *Tanaceti* folia referendum.

20. *Eruca* *maritima* *Anglica* filiqua fungofa torofa rotunda foliis craffis latioribus, nobis. *Cakile*serapionis, *Lob-Obf. Lugd.* *Cauliculos* protrudit multos, partim procumbentes, partim erectos ; quibus annectuntur ad fingula geniculafoliadiivifa, *Eruca*s aut potius*Senecionis* facie, fpiffa, craffa, atque infummis caulium proveniunt flores tetrapetali, dilute purpurei, quorum fingulis fuccedunt filiquæ finguk, breves, fungofas, vix trientem uncias excedentes, rotunda?, torofa?, continentes fingulas unicum femina *Tritici* magnitudine, aut paulo majore. Provenit ad oram maritimam *Angliae*, verfus *Cantium*, *Suffexiam*, & *Infulam meridionalem Angliæ*, *Vectim* diftam; neque folum ad oram maritimam *Angliæ*, fed ad *Neuftria*e, *Armorice*que litus maritimum provenit.

ai. *Eruca* *maritima* *Italica* filiqua haftæ cupidi fimili, C. B. P. & Prod. *Eruca* *maritima* *Italica*, *Parl. Nafturtium* maritimum, *Hift. Lugd.* Hæc folia habet fpiffa, craffa itidem, fed a:guftiora, qua: verfus radicem tenuius funt diffefta feu divifa: caules erigit lngiores prascipua? caulibus, qui onerantur foliis ad fingula genicula minoribus & minutius divifis; in lummis caulibus cernuntur flores tetrapetali, dilute purpurei, quibus fuccedunt filiquæ breves, fungofa?, quatuor angulis exterius donatæ, binis obtufis, & binis acutis, fingulis fingulis fibiinvicem oppofitis, & in mucronem acutum terminantibus, quas perfecte cupidem haftæ referunt; unde ei nomen fpecificum à *Cafp. Bauhino* inditum, quo facile diftinguitur à *Calnie* *Serapionis* *Lobellii* & *Hiftorias* *Lugdunenfis*. Semine exiccato abrumpitur filiqua haftæ cupidi fimilis, & post fe relinquit capfulam fungofam petiolo adhuc innitentem, luna? crefcentis formam perentem, # cavam, figura mirajili&huicpeculiari, cui dum recens adhuc fuit inferebatux* filiquæ pars inferior convexa, quafi per ginglymon immerfa bafi concavae, cui fili -^{na} conneftebatur. Provenit in ora maritima *Italica* prope *Venetias*, & *Magolonam* in *Gallia Narbonenfi*. Floret fubnitiuum afstatis incalidis regionibus, tardias apud *Septentrionales*, ^{ibidem}que paulopoft femina perficit.

., ?2. *Eruca* *maritima* *iEgyptiaca* foliis latioribus craffis, filiqua fungofi minore, nobis. *Si-* apimarinum *iEgyptium*, *Profp. Alpin. de Exot.* Planta hxc ex unaradice longa, gracili, K-8^{na}ofa, alba, caule nno aut alterd affurgit rotundo, rubefcente, macropipiris craffitie, oblique

iurum non recto in aerea acto, cui alternatim in quolibet intervallis folia adherent, **petit** lis fans longis innitentia, crassa, pinguis, succosa, Eruca vulgaris colore, Jscobae i um inftar sinuata; in caulium cymis exeunt plunmi l'ofculi dilute, purpurei^tporms viohcei, ut in Leucoiis, parvi admodum & tetrapetali; quibus deflorfcenribus fycedunt ffligtra perbreves, fungofa, in acutum muc. iteu; in quorum fingulis jingija continenrur icmina rotunda, guftui acerrima, ad Rutæ odorem inclinatia. Similis ridem fe^ planta Erucæ maritimæ Myconi, non est tamen eadem, sed solum acrimoniam, quæ non Rutæ esse videtur, sed Sinapi; potius Ehici rrraritiini, cum & foliis crassis, spiffis, pinguibus, sed præcipue filianis monof... its, conlormis est antedictis Erucis maritimis; idcirco eandem

23. *Eruca* Chafceplifis florcd,krev1olWi51,q11s articubtis, nobis. Hrc Er«caaf«ndit ad alQtncliiteni fdqui pedal em & b.pedalemV^adem unicumedit penna anlerina malfO crasfioremverfusterram, qm in plunmosramufculos sese findit: folia liahetra fa Tpiffa & lipuata rcUquarom manrimaramErunruinCakikdiaaniniore: Hores producit Ecuidam tetrapetalos.

fir refqu.pedalem bng.tud.nem uique ad fummaE c^nas, curt*, articolatz, uno aur C uculo jonajC, in quibus latent feounaoUonga, rufti., calida & acria guftui. Hujus r5fcm

ington.

241. i R ? U onf 5 C In r a filitHa^actrangUla_c]inat3,C.B.P.Prod. Park. Sinapi ecHnattmi, j.B-Chabr. H*c Erucaexradice femipalmari, crassiufula, leviter fibntta?Sb"inte, caules procrud^ ad exorcum purpurafcentes, ternos, quaternos, aliq^ndo plur, le3, aliquandoa^ores, rotundos, friatos, fubaferos, in ramos bracMatos. }%? adrad,«m hum, fparfa, pauca, oblonga, engufta, finunta, hirtutieafpeni Lin* nuil (unfta, in caucus p^fertim tioribus filiqmfque onuftis pene n& nuata: in iummis caulmm (fpicc admodum fimilibusi exfirmmr w flofcululutei, tetrapctaii; quibus fingulis fuSanrfif gUntpfolis lans ^fe

quatuor obdnet, q « a d f c J ^ ^ ^ T, quorum qualibet latera spinulis undique raro armatum: filiquulis varvata, in medio finum ostendunt, it-jai yie of aunnoa; confpiciuntur; in quarum qualibec uticum continetur feruffuni, cochleae inftar, convolutum, acutinatatum & acreguftui. Provenitinfgetibusi MonfpeUum; floret Martio&Apcili,& aestateleminaperficit.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

• Eruca fativa cruda, ut ait Dioscorides, coitum iargiore cibo conatat; ip//^ *quoque sem*
ruce *uti diLs ItrnT ZTf*
 • fillos digerunt, atque ita reponunt. Erucæ facultatem & um medicum Plinius explicat verbis, Multo diversa est quam Lactuca natur*, conciliatrL Venerh, idcirco conjungitur ut nimio frigore par fervor immixtus temperamentum æquet & alio in loco, Erucæ semen pionum venenis & muris aranei medetur. Bestiolas corpori innascentes & omnia vitia cu facie, cum melle illitum arces: lentigines ex aceto, cicatrices nigrasreducit ad candorem cum bubulino. Foliis, ut author est Matthioli, coctis, additoque saccharo, tussientibus pueris natum illum, quod tussim sedat: semen contusum ex vino potum lumbricos interimit, jtm iLL minuit. Folia contrusa palpebris imposta visum acuunt: semen cum melle in inocula* omnes & nevos faciei illitu tollit, efficacius vero (uti dictum) addito felle bebut immumsfese
 fyradmorum authorum\ [U is'Ym7rum mm tiffh. • ft
 vitktrr. "Jtimomo Eruca ft im

- Marital*, -Er Venerem revocai
- ColameUa. Y.Xf\ix fnigifero)eritur vicina niorantcm.
- Idem. -Eruca ra|ax feCIIndo, U Eruca rriapo,
- aiacem Ovidint nominav. it. Nec minus Erucas Mi. or to.
- em La urttt us Lippi. Devorat liucas, qui cupit esse lax. covhare&lacai.

18. Ecuca Barbarea Ma, valde cakfack& nfficat, utpote faporeacrh iff Nafurtio faculty * affimubtur. AcetariisveroadA, \$™pra/ertimem* Mt/hrtii copia dttft, m-quibus qucd iiludpvtefl, 'ftaeft. Medct-Jiff eadekt fcorbuto non minut quam N.ifiurtium aquaticumjupinumfiu Sifymbfi'umdterumvd Cardamim Diofcoridis. Semenquoque cal'idum iff ficcuma-decque lenubhn part turn ut urinas evoceft' & cobxrentes cakulofas arenulas diffolvat ac ex-dlatj~J

Eruca MarltimaMgyw™fob* htwibus craffisfihqua fungofaminor^nobh. Smapimarinihn Apyptiurji, frpfp. Atpin. de Exot. HtCplanta marithna calidiTe/) iff ficca tertii nrdinis, valid* acrimonU videtur, ejufque ftminalrita ob acrimomam efficaciffima fun), qu* vino epoia admovendam urinam inferviunt, quod cfaffos bumom inddant extenuentque; datur (stqm aqua /illatitia ex totaplanta diciia admovwdem urinam^ danqueetiam ad ptukntos dolores quamcunque corpora partan vexames poteJiT Nonmtilli folia iff gemma in acetarils edunt, atqu: itiam eadem decora adfiomacbum rohorandum.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI
Aliorumque Authorum.

1 p. col. i.pl.X. Eruca maritima Italica, fi-
i hafia cuspidi fimili, C.B.P.& Prod. Ca-
kih N. ipionis,Lob,Liigd. Eruca, mariuma&Na-
juitium eidem. Hanc tribus figuris txibuitauthor
Hifioris Lugditnenfit, quarum ana Erucam Italicam
filiqua hajte cuspidi fimili repri?fntat, reliquit <c date E-
Cakile Serapienis diUamnobii offerunt. Ca-
Baahhtus duos dijUnBas Eruca maritima\$>e-
" L*-v braunaeademq; Eruca eafdemponit.

» ratanaan, i
ica maritima filiqua Imfitt cuspidi
fimili, C. 3. P. fitiquam it idem fmgofam & torofam,
non retundam, fad quatuor angulfs pnedicam pro-
fert, bink nentpe obtups W bints acatioribus, cuffi-
dem hajle referentibus: dcinde Eruca Ca^ile Se-
rapionis Lobelii folia babtt latiora minufque fi-
nuata, at Eruca faiqua bafix cuspidi fimili, C.B.P.
(i Prod, folia batet angujliora, magtfqm dipta,
fuod cuilibit clam apparet ipifantM intuentt, ft*-
rumquftmina examinant. Nos inpromptario no-
fro (eminali utriufque pricidiBie jpeciei fihqu&S hac
imra qua hue canmutintm prelo refervamus; Unde

toncludimm Cajjarum Bauktmtm fui otlitvm fuip,
qui etiamfinovam Uonemjadpsniameuravtrit, ipft
nan attitUt difcrimtn inter /hum &^;Ve maritimam
filiqua bafis cuspidi fimili, & Cakite Ssrapiionit J.obelii,
qntt>utfupra monftravimusin eqplicatwie, fast due
dijiinHn: fpecies Eruca maritime, ut apparek ex in-
triiu Uanumâ nobis exhibitaruminTab.6. ffnuf-
que Jli q f ^ fiefobg; Anij pnia de ro-
duett, recens jlavefiens, win I turn rubrum, calidan
(i acre cisterarutn Eracarum more.

Pa^Op.col. j./fl.xn. Eruca^Monfpeiacafdiqua
quadrangala ecbi>tata,C.B.P. &Pred Sinapiecln-
natum Monjpeletnfe, Hjt. Utgd. Juthor Hipfri*
LjLgdunenjs figuram fiditiam Si vitiofambiiiprop-
peniljub Sinapi echinato, nee ej"fdem deferrj/ttt) va-
let, /mm Jiozem ti attribuit bentapetaiam cum ejut
fies reliquarum hujus claffis jHrpium mare fit tetra-
petalus; injiiper Jiliqaai Cucurbitsc quafi lagenariiz
forma perperam a piaorcprimo, deinde a jculptore
exhibitas., vitiofas & mendofas in medium profert.
Cotifulat leilorplantam ipfrm vigtiem, 8 obferva-
bit Iconem fictittam,& vitiofam pag. HijL Lagd.
647.

• S I L I Q U O S J B

TerrapctaliE bicapfularcs.

C A T . V T V h

D R A B A S I h I Q J I O S A.

DRABAM, fyl&w Diofcorides 1. 2. c. i%h.lpfTtblafpi fubjungit, uriiws (qushucnon
pertinet, quippe filiculofa, remittatur ad filiculolas plantas, de quibus in fecundo
membro K^jusSefitionis agemus) fa&amniione.

Quemadmodum in capte 4". de Nafurtio monuimus duplex effe Nafurtii genus, unum
filiquofum, ce quo egimus fupra hujus Se&ionis capke quarto; & akerum filiculofum de
quo intra inter filiculofas: ita duplex Drabae nobis occurrit genus, unum filiquofum, dequo
nunc; Stalterum fiiiculofum, deqno infra pariter inter filiculofas CraSabiintis. Draba pro
nota generica habeto hanc, quod folia ejusutplurimumfinthirfuta aatincana, convert cum
cateris lxx fortis quod fit pianta calida & acris, filiquofa, terranttala, fepto medio mem-
^ranaceo feparanteduplicemferiem feminumprsdita. A filiquois bivalvibus., longis, h-

cile diftinguntur Drabs filiqonfz, a Drabis filiculifc nrtis feu fiicnlofo, Draba filiqua6& a colioefloris, eft vellotca, alba, aut carrulea.

Pars T A B U L 7 E V 11.

**

i.

J'i.MaximafiliquisflriBi(fnnk,nalhs. Lunafiliquisfi*^>cv\$gnis, CB. Lutea I ?• Arabts qwrundam, Cam. i? tiort. 0

• \i-Eryfimiflmbwi isfiliquis^nobk* SinapiisrTblaflpimtd'atprovin- cialisplanta,Hift.Lugd. Ad.ipIcon. Lob. 0

. f j"3. Repens S/ccuUnto folio, nobit. Draba 3 ** fuccukntofo- \Pmtmis \ t'o.dfyfuHiJ]. &

Draba filiquosa

< Aji I]4- Refens.& prccumbens folio villofo^ nobis. Drdbt^'- I mDa I [Cluf. Hi. © •

*'AnnuafT<ecoxpUntaDrahdifiliq^of*fu^ititit-,i^bh. Ai%con Tele- pbium DaF*. Lug. \$

\Caruka *>LFolio vire7tii crafufcuk *ohis- Leuco'mmmarinum parvuni- I Iiovmnn crofiufculo, ?-B. Cbabr. . 5

Urplkatiopaxtk TabuU fatim*.

D Raba\w.zi filiquisftriaiflimis,C.B.P. Drabal lutea, J.B.Chabr. Arabis qHORUNr ^r dam, Cam. 6f Hort Draba hxc ex radice valida & longiffima , colore fubalbido, & fapore non minus acn quam NafturtLum , caules pronut complures, ultra humanam Ion- gitudinem, gracilcsramen& circa lummicates in aliquot ramnos divaricatos, qui -vicT&t- betlam eftormjnr led- fpicaiim Hne ordine natcuntur, fiiftjntes flofculos topiofos, mi- nuos, Ititeos tetraretalos ; q^{uibu} f^{ucccdlint} Jon^g ^ ^mzgae filiquae unciales, inciident- tesduplicioridinelcmina «n«ia, folva, acna: caules veftiunt folia oblonga, triuncialia, acumimta crenata,inm"c^P^{nem} aetumdefinemia, & peroraslongeinarqualioreambitu Ia- ciniata fpeaantif s^{cZNeof} in^q ^ memittl:ex^{radl} « &is crafla qaacuor aut quinque pedes altitudine fuptrace^ rettos: Hores fert minimos luteos, tetrapetalos, (qmbusfbliola an- culta pariteri>r^{racarinter ei,Ulirur}) 9P^{os} Tecjuuntur filiqna longE, tenues: radice inquam confac maena, ^{lig} nofa vTM ^ Te^{tum} fa^port^l mordicante , & nares ferienit, acri etiam, & ii;y-inCt, diu iub terra durante, cujus caules aliquando provcniunt lati ad un- & linguam ve- cias linas ternafve. .1^l .^' ^' ^' n³tl^lra^l ^ nOnfb, jj, ^ fed&n^m j^tis ni ft *

2. Draba lutea Eryfimi flore & filiquis, C.B.P. & Eryfimi flore & filiquis, C.B.P. & Park filiq^l ^^^^feS^E^n^_ ^f^g^^-to^Icon. Hc^{phrill}1^l dentata,pediculis longiufculis ii^{iriuta,cand.da,e,radicedenfcpnllulantia, leviter iaafllbitB} nixa precipue verfus terram; alia^{init,unt,Diq,uaterna,qu,n.,[v,amicnti Lmiufcujufq; pediculi in-} oritur cauliculus infirmus, brach^{J t e SSWTM} binatimUSSTool iufiftiint flofculi pl^u ui^l...

dianm,promidit, q^{ux} i^SSSSfcLS! i*^{tei} ^s>"ndida, fingui³ an^{is} folia S ineuac Sdhte& femina paulo poftperficir Pro I*^{Creleic P^{ro}P^c Mo^{nr}ptli-um. Flortt} fano& incaucibusillis Galloprovincie fumacel^{tnit m r uani} nor^procul z Div^e Magthfe^ mi cmulos: folia albida 5f hiriuta, levicer fednia^{anis: flores illic} promit lureos,Eryfi- mi dBrpares, fapore Boniadts, Napi aut Barbari*^{lum m U m 5 f imtirrLl} nt'c/iliqu^sEryfi-

3. DraAa filifjnofa alba repens, C.B.P. pnrL^{Draba ater}) If nto fctio, Cluf. Hift. Arabia feu Draba alr^e T^a Lob,Icon, Dra^{ba} ?" ^uccu, Drubralrerarepens, Ger. Draba hicirequen[?] Lob. ApP^l LD⁶d< & Eruca mur:is cidnn. ribus,renuibus, tleindeincaputextaberanr^l iamis P ^ " ^ eft*;xc^dfm radice prodtiin- DOs, ex S<o aliquot folia quafi in orbem Hifpofica prodcunt

prodennt crafia, lucci plena, ana viriditafsi fplendenria, paululumiimuca in lateribus,acri guftit & illico hnguam vellicante ; «K horum medio pedaiis aut major exit caulis gracilis, juem per irit'erval^ambiunr., &/n5pHtilit:ur folia fequentis quarts minors, & ad pttio- itffl htiora ; rlores (iacae iiftar fiipremumyjalcree ambiunr. utin(tquenti,aibi, retrapctali, quorum ftngniisfnpc&ittnt fingulfe filiqna:te(£i:es& longs, duplici pafiter ordincfemen planum, pufij] ^, ^ffum, continentes: radix tenuis & repens late fubterramfe diffundit, & n o ^ ^ j n e a s fingalis ajnnis producic; vivax & cota liyeme virens eft. Crefcit in dedivJ monda Htrnol&a fopra 2ee&^ villa Ccenobil Gronnngenfis, ubi fero ioret, at in hortos trauf- lata matu ius cum fegutnte, nonnunqnam etiani cxeunre hyeme.

\$.Dtaba alba fiii quofa, C.B.P, Alba filiquota minor, Park.* Draba 2", Cluf.Hift. Draba *:"" repens, Ger. MofeosexeadYra radice ramulos humi fitlbsprofeva lire Draba, qui cerra obrnti aut fob ilia fefe condentcs, acque etiam ill fummatellureierpeiites, fubinde fibrasa- gunt: iideinde fummo capite numerola prpducunt folia villofa, DrabsE prarcc.ieiitis for- ma & figara familia, fed minora, nonnihl in ambitu dencata, fobacidi initio guftns, deinde acris: exhorum medio caulicnti exeunt pilmars, nonnunquam majores, refti, ceretes, viy rentes, hirtuti, aliquot-minoribus tbbis laciore bafieos ampleAentibasdonati: iloresinex- timis cauliculis fpics in (peciem nafcentes, albidijtetrapecali, quos fingolos decidentes fe-

^ut in carens liuj us farina: ftirpibus^ filiquite plans, oblongs, duplici ferie pufillum smen continences: radix Candida fibrofaque eft, ex qua ad caoliciilorum exortmi inrur ramnli, fimilibus foliisprscditi, in ktera fe difrundntes. Invenitur inTau- e. Floret maturiusuperiore,lcilicetexcnHteMartio aut IncunteAprili,

iba filiquofii fimilis plunta pra;cox annua, nobis. Pla'nta filiquola E<rfs pafitorisfi- JB.P. Aizoon TelepliiumDalni. Hift. Lugd. Pilpfella fiii quata major, Thai. Plantula aofa tetrapetala,omnino diflimilts Burfepaitoris, qua! eft filiculofaplanca; filiquoas ifeD bivalves, oblongiulcuhs, tenues, teretes, ideo aptiusmea opinione Drabarum itur quam Brnfæ pafitoris generi, ut priftitit Calparus Bauhinus. Radice con- tandida, modice fibrata: loliis humi circa radios iuperiorem partem jacentibus,

Ill orbem quafi circumdantJbus (utterneie eft in Aizoolempervivomajore) oblon- •gis, nonnihl incifis, craUis fatis, birds, RuttUcae Mm fimilibus, in caule pauci^, & fmgnk- tini geniculisadhacrencibas; caule iunconfingiiJan,nuncniiiItiplid,in ramufeolosdiviro, do- * drantali; iloretetrapetalo,candido ; cut faccedit femem in filiquisfemiuncialibas,exilibus, duplici ordine, fcptomediomembranceofeparatis. Blanenlae Jmufiapor ab initio fairuus, deinde acris, ucincsteiis filiquofis tetrapetalis. Provenit in agris frumencaceis humidis padim circa Oxonium. ioret ineunteMaio; & a-ftate femina perficic.

(s.Dralia carruJea annua folio virente crafilufculo,nobis. Leucoium marinumparvum folio virente crafliufculo, J. B. Chabrt (non eft Leucoim utvult Johannes Bauhiuis, & tins fimia Chabrsnis, quia nee filiquas nee femina habetconipreffii,plana,qui determinant Leucoi genus à oeteris filiquofis bivalvibus tetrapecalis.) Hacc parvula Draba annua caulcshabet tenues, palmars,quibusad fingulagenicuaadiiafcunturrolia rara, qua:dam uncia paulo longiora, nonnihl fiijjofa , crailiufcula Sf iucculenta,glabra,virencia; fiores illi magni pro proporti- orse plantae, vblacei; quibus fingaiis fuccedunt fingula; filiquae cenes, fen:ianciales, aliqnaS- do.longiores,aliquando Lircviores,duplici ordine feminum, (epco medio mtbraiiacto diftinfra?, contincates femina ramuta, rufta. Hanc habuit Johannes Bauhinus a Johanne Meyer ftirpinm ftudioiilimo; ubi fponte proveniar. ignoratnr, at in hortis noftrisexeunte Vere floret, & femina ad niaturitacemperduci:. Ramulus huj us figuratur inter Leucoia, expunge & hue revoca.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

AUonmque Aacliorum.

i dp, lop. col. t.pt.t. DrabaumbdatavelDra- bama/or rafitulisdonate, C.B. P. DrabaDio- fcvridii.Oilup. ArabisJiveDraJm, Iftatth. Ad. Lob. ' fii'fif 'fajjyftiutuBabytetiium) Ijt&d. ibidem col. 'pi. in. Dra! * minor tapiivluerburaloribiis, C.B. P- Braia minor, Off Hijt. Hit dicit Drab/r^um fint ^iart(ic filuahl n tetrspectalie, drbuere t> Cajparo Bau- line *m&n&ari ad Jilituhfa, fitcaade membra huj us xplicandte, «"" aaieni hie cofforgri rum Drabu filiouo'lis A^"F" Johannem lia^hirtum p&g. eol. 2. pl.u, dues exhibriffi figures Draba , a Drabam jiUqait jilriWJJimis indigitat,

ahem Drabam filhulit curtit, qua til Drabs Dio- ftorlhffu Draba jiorc albo Arab if qusruadam Cat*.

Ep& Hort.

Pag. no. to!. 2. pi. ux. Draba fore etruho gahav,CCBPP& Hrauli. Malhacpblim in nomina- tur Draba h Cajji.B^"tki>">-> tumnuftiprantattra- petsia filiquofa, nee Jiliaihfa bivahif fepti medio dirimette dtiplitm friem (tminam j fidex tyfo Ca- Jpm Bauhino floribnt eonfiatgalratis, ut in Onbi- dt, radice Aftttfadit ftwh , gtfm fcrvitori; a- romatici 8k Eft eni/n fyfntulj fjietiet gktofi* re rtrritea: laBeffit S fierem producit quafi galea- tam

tumjntegrum in fundo > quinquefariam in margine divifum , cui succedit theca feminalis triapularis, ionpnens femina minuta, pellucida, ruffa. Nos fie defcripfimus Prcelud. Botanicorum noffrorum pa*. 3oo. & 3oi. lub nomine Napuntii, appella? idola? apuntium Solontenfe urens violaceo quafi galeato flore minore. Napuntium galeatum feffe declarat primo > ex fucco labieo emanante ex qualibet parte rupta, deinde florem producit violaceum minor em, integrum in fundo, quinquefariam in margine partitum^ cut succedit capfula triangularis, aliorum Tapuncolorum more, continens femina multa, tenuia, pellucida, ruffa: quibusdam Tapunculis galeatis convenit in omnibus his partibus, videlicet Tapuntio Americano flole coccineo quod flos Cardinalis dicitur Fabio Columkpn Hijtona fua Mexicana, (3 Napuntio yirginiano

rnajorz flore quafi galeato cccruleo majore, a no* his exhendo in Semitone quint a. Tot a plant a per- (callda q\$, & majicata linguam urendo pungit, quod convenit mlfapu? iculis^ dicibus eft Jfclepiadis multis Jimul jundis: carj^s emittit pedales & alti- orcs: quibus ad genicula fingula alternatim adno- fcuntur folia oblonga, ferrah^ > G? in mucronem a- cutum definentia: infummis caMiwnpf^ jligiis^ eorum- que alis nafcuntur flores quafi galeati v^ ££^? J' olacei caruleive pradiftorum J^ aprjculorum more. Crefcit paffim in humidis ericetis & fylvis annojis, in agro Solonienfi & PiBavienfi. Floret cejlate in Autumnum ufqjue, & tunc femina perficit. Vide infra, caput de Tapunculis in Seftione quinta nojtra hujtis operis.

S I L I Q U O S J E

Tetrapctalse bicapfulares.

C A T V T V I I .

R A P H A f t U S .

RA P H A N V S vel fativus eft, vel fthefttris ; fativus Pxpavk (quafi radix perficua) Diofcridi I. 2. c. 137. pofterioribus dicitur f^ av©-, & g' pA^ as wvt&oui qu^ d'ex/mofe* atim oriatur. Theopbraftus utraque quidem voce ufus eft, fed quern Raphanum vocavit, WJk appellavit at pl<p*.w, ipfam Brafficam nom^avit; qu^ e caufa error is fuit Pl'mio ^ 9-c.15. fcrit>it, Gr*cos Raphani genera tria feciffe, fohorum differentia <src. qu* de xrayica intelligenda, cum ex Theophrasto 7.Hift. 4. defumptafint. Latinh radix (Y& Theophra* WJ quod cetera* amplitudine corporis fuperet, vel quam pauciffimis magnitudme cedat: fiqui* de m in frigidis lock, quibus gaudet, ficuti in Germania, infannum puerorum magnitudimm.*- qNU, teffe Plinio I. 19. c. 5. (yc.

Gm hoc in loco non eft noftri inftituti de Raphano fativo agere*, quern Radiculam %g.r fy- no min at maxima pars aut Konim, cum filiquas non producat bivalves fepto medio mem- braneo difterminante duplicem feriem feminum, fed filiquas fpongiofas feu fongofas prO- venientes ex floribus tetrapetalis proferat: ad finem filiquofarum bivalvium Raphani fativi doftinam rejiciemus, & hoc capite agemus tantum de Raphano filveftri quia eit planta filiquofa bivalvis- fepto medio feparante duplicem feriem feminum in fili^ls admodum. curtis.

Pars TABULA VII.

- Minimus { 1. Repens luteus foliis tenuiter divifis, feu 'Raphanus minimus repers luteus Nafurtii vulgaris hortenfis folio, nobis. ©
- 2. Major { Hortenfis feu Rufficannus, C.B.P. Ger. Park.. Raphanus rujlkus, Cam- Lugd. ©
- Aquaticus { 3. Foliis in profundas lacinas divifis, C. B. P. & Prod. Raphana- aquaticus, Tab. Ger. ©
- 4. Alter foliis ferratis, nobis. Aquaticus alter, C. E. P. & Prod. Ra- piftrum aquaticum, Tab. Ger. ©

Explicatc partis Tab 7

Aphanus minimus repens luteus folik ^ r divifis, feu Raphanus minimus re- phano filveftri feu aquatico conformitatem I. 11obls* Propter omnimodam cum p- plantulam hue inferuimus; florem enim fert tctrape

tetrapetalum luteum; jil^uulam aut curtam filiquam bicapfularem, Raphani rufticani auc paluftris more fert: radicemetiameditlonge lateque repentem, litRaphanusrufticanusauc aqtfaticus pahiftjfive, quin& udarj&midauematloca: quae omnia fe declarant Raphani filveftris fpeciem: felia autem geri/fenuiteifdivifa Nafturtii hortenfis modo; flores autem luteos, tstrapetalos, #mplos fatis pro tenuitate plants, caulibus vix palmaribus, auftefquipalmari^iis innkfis gerit; poft quos deciduosTequuntur filiquae bivalves,feu bicapfulares,curtae, vixj^iun^igles/terna, quaterna feniina acria, mordacia, in fe continentes, fi quandogerant ~~...~~ T nani^oconinibusinnaturnplantis, qua; longe lateque repunt aut reptant, quod rali^oafficiant, quia natura non poteft fimul & femel duobits finibus effe intenta, & proySlatiõni plantae cujusvis & ferninibus&radicibus, utifxpiusfupraanobisdiftum.

2~.Raphanus rufticanus, C. B.P. Ger. Park. Raphanus vulgaris & rufticanus, Matth. Major autArmoracia,Brunf.Trag.Gefn.Hort. RaphanVs rufticus, Cam. Lugd. Raphanus filveftris Diofcoridis, l. i. e. 13 8. & Raphanus (ilveftris feu Armoracia Plinii. Raphanis magna feu Raphanus nagnu , Dod. Raphanus hie ruftica'hus grandia profert folia, longa, lata, acumin^ia, crenata, facuratocolore vh. ntia, Hippolapathi foliorum quodammo semula, fed pau'o membranaceora & duriora, feu alperiora, caulem (quandopromit) tenuem, in cujus fastigi5 apparent flofculiplurimi, albidit, tetrapetali, facis exigui pro magnitudine plants, qux est fatisgrandis; quibus fuccedunt, fed raro, filiquae curtse,exigu? bivalves, vixgranumAveri^majoris longitudine excedentes: radix magna, albida & Tate repens est, guftu admouum acris & mordax. Humentibus hortorum locis g;audet, atque illic melius quam in aridis proScit, gigni & in pratis humidis Fuchfius author est. Hortos urit. Maioquandoque hujus flores apparent, filiquis poft fuccedentibus; fed hoc valde rarum est, ut tefatur Petrus Crefcen-tius; in promptu caufa est, quod nimiaaviditate rependi radicibus duftus hie Raphanus rufticLnvj, ficut & alii aquatici teneantur. Florentem Maio Genevas & Montbelgardi inpsgo Courcelk Julio&Augufto circa pontem Vaujaucourt obfervavit Johannes Bauhinus, & prope Bafileam in filvis vidit Cafparus Bauhinus.

Z'fiapbanus aquaticus folii.^in profundas laciniias divifis, C. B. P. & Prod. Raphanus filveftris officinarum aquaticus, Lob. Raphanus aqo:atic^s, Tab. Ger. Raphanu. filveftris& Raphanus paluftris, Lugd. Radicula filveftris, Dod. Hie paluftris feu aquaticus Raphanus foliis est brevionibus, anguftioribus crebrioribusqueyncifurisdiirecl:is,propemodum veluti Erucar, fedmulto quam illiusmajoribus: cauliculi teniresunt, pedalesvei alciores: flofculi exigui, lutei, tetrapetali; filiquas curtae, parv*, minutumquoruefemen in fe continentes: radix digitum quandoque craffa, obionga, alba, fapore acris, mordax vivaxque. Juxta ferobes ac ioffas, aquas habentes ffonte nafcitur, & pluribns annis vivit: rioresejus Junio menfe potifimum vigent. Radix Februario, aliquandoMartioeftbditurSf fativasloco infertur ac editur.

4. *Rafhanws* aquaticus alter foliis (erratis, nobis. Aquaticus alter, C.B.P. 6c Prod. Rapiftrum aquaticum, Tab. Ger. Cauleni emittit tripedalem, aliquando altiozem, in ramulos t^nuiter divifum, glabriores multo cterorum fue famihas, ad quorum genicula nafcuntur folia coftis aferpis praedita, profundius finuata, ferrata verlus eorundem partem inferiorem: infummis alis proveniunt flores aiLidi, tetrapetali, cum ftaminulisluteis in medio fingulorum: radice conftat longa, flexili, fibris fcatente.

TEMPERAMENTUM & VIPES.

Raphanus rufticanus^C.B.P. Ger. Park. Radix hujus admodumest acris ('utis? femenaquando haberipoffit J calida tertio, &ficca fecundo ordine* Radicis hujus contufa admodumfrequens afud Germanos fro condiment0 ufus est-, valent ejufdem radices ad qu<e fativ<z, fed vehementions funt. Oxymelin quo triduum maduerint cortices vomitumexcitat, & adverfus quarinas commendatur; quin is? cortices iffi m aceto maceraii, ficum exigujo mellis edantur, deinde aquibibatur tepida, vomitione exfurgant. Herb* folia cum vino decocla additoque modico pleOy ac Otap fa/mat is modo imfofita^ jednorh aclien h duritias inollunt, pettiniveroadmota. urind fMiddio auxiliantur- lifdemplkfit viribus is filvefres feu aquatici Raphani fecundum maju6 & winu* ; quandoquidemfunt -plants talid* is acres, is eundem florendi7 capfulas femina isfimina producendi habent modum, iifdemque gaudent natalihu*\ cur non iif dtmpolkrt dtbent viribus, cumnullus inter ipfos mutet a liquid horurn?

HALUCINATIONES CASP. BAUHINI

»

Aliorumque Authorum.

T> Jg, pif. to!, i. pi, J. fypbanus major orhktlarit A vclmtu>idus, C.B. P. & ibidem cot. 2. pi. ill. j^t-phjims minor ohfonous, C. B. P. iidem pi. t v. I(a-pbanis Crriatt, C.B. P. &. Prod. Omnts hi Rapba' ni cum funt tetrapetalx plant*, calidat3 acres, lion funt tamta JiltquDJa bivalve* Jepto media membrauco Jfpnrante duplicem feriem ft nun ft m donatit, fedjliqm'i confiattc trsf'u, fungofis, inorditiatitn

jeminafatu ma^na irtfetti-mientbu!, e>\?» >you de- bent hue in/iri inter Hiiqiofm bivalvu fit fed amandari ad camm fintm inter ftiquefM • * regula filiquarum bivalvorum videlicet, & non in- & Rapbanis equatim mngicum TUphantt rupcano palujhihjt, ej*fditf jitpradiilum.

S I L I Q U O S &

Tetrapetalx bicapsulares fragrantes.

LEUCOIIUM SILIQIIOSUM BICAPSULARE NON BULBOF

C A T V T V U I .

AETKOIOM*DiW<t/(i lib. 3.C.138. id eft Fata alba, von ratione fiornm, fed poiuis à ca- nitU cinericeovt foliorum colere: quamvk digerentiamTnforth* oftendai, fi quidem aut C.V rukh aut aibl, aulpiirpurei, aut lutei rtpriantur. PUn. 1.«. c. 61 Violas luteas & albas P gnofcit.

LEVCOION duplex eft, vel bulbofum hexapetalon trlcapsulare, q«odeft NarcitTi (pecies, dequo iut'ra in Seftione quarta inter conlbrtes Narciflbs; vel filiquoium tetrapetalum bivalve feubicaptilare duobus locn lamencis diftinfctis continens feriem (cmt num planorum compr^ep Ibrum, de hoc, inhoccapite agenras, inter fibifimiles, videlicet filiquofas tetrapctalas bivalves. Leucohim filiquofum bivalve tetrapetalum habet pro nota generica hanc, quod fiores producat qfatuordiftinfctis Sffe paratis petalis donates, cujufcunque magmriidinis am coloris; atque fingulis Horibus fic conftituti' fuccedunt fin^ulaefiiiquis, bivalves, feu bicap- iulaves, longac, cdm p'efli, continentes duplicem feriem feminum planomm & compr'eilorum, divertbrum colorum. Sic ergo &a filiquis compr'eflis, Sf feminibna planis pariter compr'effis, icxtevis hujus Eamiiias quam tacillm cilitiitiguitiir. Leucoium filiquofum quinqitf feidiidd 1/ am nobis venid a diverfa facie filiorum & capillarum: vel eft Leucoium hor- ctufe Volio incano fioribus diveiforum colorum: vel eit maritimum incanum floribus pafitei diverforum colorum, • vel luteum folio hirtuto, vel folio viridi: omnes ha: Leucoii ipecks ti liquis donantur longis, compr'eflis: vel deniqne filiquulis afficiuntur curtis, duplicem feri em feminum compr'effbrum itidem in fe continertibus, lepto medio membraneo dirimenC duplicem illam feriem feminum hinennam, illinc alteram.

/ . ^ ^ ^ (A ^ w i T o ^ notum e f t f i q u i d c - m D i o r c o r i d i f i d e s h a b e n d a e f t , f e d e f t i n f l o r u m c o * l o r e , S c r o l i o r u m t e x t u r a n a t a l i u m q u i e f t u d i f f e r e n t i a : n a m a c o l o r e f l o r u n i e f t v e l a l b u s , v e l r u b t r , p u r p u r e u s a u t c y a n e u s m u l t i s m o d i s , f t r i i s , q u a n d o q u e m a c n l b d i v e r f i m o d e n o t a t u s : v e l l u l c u s , q u i e f t v e l t t o r c m i n o r e , h o c q u e v e l f i n i p l i c ^ v e l p l e n o ; v e l n i a j o r e , c o q u e v e l p a l l i ^ 6 L ^ U K ^ v e r f a c u n t t o q u a f i a u r a n t i a c o c o l o r e . r l a v o 5 f f u f c o m i x t o . Q ^ o d a d c a e r u l e u m i n t e x t u i ^ 0 n i c o n d i s a m n e t , H e r m o l a u s & M a r c e l l u s v e r b u m n e g a n t , e v c a r u l e o a b u n d a r e e x i l t i m a n t t a n t q u e a d f c i t i i i m e i r e , i d e o q u e c x t i r p a n d u m . M a r c e l l o (i n q u i t M a t t h i o l u s) D i o f c o l o r e m i l l u m p l a n e v e r b u m l e g e b a t u r . S u f p i c i o n e m h a n c a u g e n t e a m q u o c c o i U i i u s & S e r a p i o , q u o s i t e m i d v e r b u m n o n h a b e r e c o m p e r i t i n f i m p l i c i n m a o q m n r e l i q u a D i o f c o n d i s r e t e r a n t . U t u e f i t , n o s a f f e r i m u s c u m C r f a l p i n o a r r e l i q ^ i s , n o n d u m n o b w a d h u c v i f u m , u l e o d a n h a u d f a c i e a f f i r m a m u s , c u m n e e i n I t a l i a , G a U i a , n e e h i e a p u d n o s f e p t ^ a r r i o n a l e s u (p , a n i a p p a r e n t ; a l i b i e f f e p o f f e n o n n e g a m u s c u m n o n u n a o n u i i a ^ t e l l

v.uure, &qUK no b1S noftroorb. Europeofc fecu(6nega verit dliis dedifo.

T A,

TABULA VIII.

			Alho. \$
			Cinerto, ♀
			Purpureo. ♀
			ro. ♀
			Cocc' meo. 5»
		i. Maj & s	Dilution. £
		Vnko	Violaceo
			(Saturation. \$
			Livide rubentt mdambolko. ♀
			(Candida. \$
		2. Minus	Rubente. ♀
			(punicante. \$
			rPunkeo. ♀
			Purpureo <
			(Violaceo. ♀
			Candido iff Lutto. %
		3. Variiegato ex	Ceruleo & Luteo. ♀
			Caruleo iff Candida. \$
			(Rubrfe vel purpureisjlriis no-
			Alho \ tato-^
			(Purpareis maculis notato. \$
			Dilution. \$
			Purpureo } Saturatiore. ♀
		Unico	Purpuro-violaceo. \$
			Alba. ?
		4. Flore	> Rubro. £
		colors 1	\ Sanguinehi macul/s fignato. ♀
			\ Purpuro-violaceollnmviridibus distincto. ♀
		vanegato <	jJfoffjgpaiU maculis notato. ♀
			Purpureis maculis fignato. ?
		5	Lattfol'wn, nobis. Leuccium mantimum latifolium
			*flm ctrultofurpurafannj. B. Chabr- S
			(> Procumbmsminu6jiobis. Vidamannanpem, Hort. Eyft\$
		7.	Inodorumfionparvopallidiore, n.bis. Silvtjlt inodo-
			rum flore parvo pallidion. Eyft. ?
		8.	Simatofolto, nobis. Marilimummaju*, Cluf. Hi/1. V
			a. Angupfolium.nobh. Maritimumatigupfohum, CV.f. •
			Marinummin^Ckf.Hift. ?
		Perenne	o. Sexatik Tbymi folio kirfutofire c <tru!o-purpuno, no-
			• bh. Lhboreokucoium minimum Valvmfmm, Col. O
			ci. re. T. j. l. remajws Eruce folio, nobk. Leucoium ter-
		Luteo	re/ire metjt^, Col. ^
			(• 2. Alpinumattumf!obi s. Luteum montanum, Pon. Ital. ♀
		Folio	% Purpureodilutiorefeu Leucoium marilimum foUi & sili-
		birsuto	hifh, it baciribusapkibHtinfuamdonate nobis. ♀
		Bon	is. Bra-
			1
			fica fihetirisfohis iff integris iffbfds, -* Turrita
			vulganor, Cluf. HiJl. Park- /• B. Cbair. o

Hornnfe incanum

Flcreftmplici, \ colon

Leucoium siliquo- sum bicapsulare

Marinum Annum inc&num <

Perenne

Folio birsuto Bon

			15. ytfio odmaifymo joko tucide frletidente, nobis. Rarim fore albo odoraiiffimo Camerarii, <Ejfi-??
			16. Simplex vufgarefeu ma-
		Hortenfe *17. fii.tltipkxjeuphno flere, >jiobis. Leucoium laltutn flare tmultifWi DvJ- Q	
		Lutco minore J	18. Sihtflre, nobis. Leucoium "JHvftit"»
			19. Foll« tuberculUobftis, nobh. Flos Kmimaxim"», Eyfl. O
			20. Acfe. FfosKcmfi>ij ^{dex} mcdius^Eyfi. O
			21. Grqfldion folio ferrate, nohk. o
			22. Simpliciter, nobis. O
			23. Ex auteoisf fu...
Lttcokmfiliquo- fum bkaffdan J Fohoviridi	Flore	Luteojnajore	Simpli <i>c</i> i
			Pkno

Explicatio TabuU oRava.

§. I. LEUCOIMUM SILIQIOSUM BICAPSULARE

H O J A T E N S E F O L I O I N C A N O.

i. "I" *Eucoium*'mczmm mahis, C.B. P. *Leucoium candidiim maius*, Dod. L*eucoiumaH^{um}
I ^Match. Lob.Obf. Lngd.Tab.Ger. *Leucoium album purpureum* 6V viotaceum, Vark.
Leucoium purpureum rofeuni & album hye/nalefeti diudurans, !. B, Chabr. *Leucoium fl^o*
re albo fimpliri, Eyft. AartuTi» & Awww i3», id est *Viola alba*, non tarn Horum colore, quamqu^o
caulis & fotbrum color fit albus; tomenroenim feu lanugineobduciuntur. • Folia unciam aui
femiunciam lata, palmum unum aut duos longa, tota albent, obufco mucrone **incana**, mol-
lique lanugine pubent: caulis **cribitaHs** & fcfquicubitalis, ligtiofus, in multos ramos fiflu^o
incanus fimul & lorhemofus: flores extremis ramulis haerent, ex oblongo calyce pilofo e-
rumpentes, cetrapekali, colore vel albo, vel cocclnco, vel faturatiore violaceo pndici: quo-
rnm fingulis fuceaunc fillqiac pmlum cirtiter longer, coniprefTi, tribus apiculJS in funniO
dona«, duos feminam tomprtiorum & pbiorum verfus continentes, quarfuntorbicubr'i;
nigra, circulo albo cinfh, rulla, ftport acdufculo: radice confat lignofa, alba.

2. ifKro; amaliudeft valdeparvum anguftutii florens- Florentomnesaftate & feraiiaeodert
tern pore perficiunt. Eft & incannm minus, C. B. P. *Leucoium candid um minus* & anmim
Dod. Apriore non forma, fed magninidirie *ibh* differc: caules feliaqtie haljet familia, fed
per omnia minoni: flores etiani non inius colons, fed vel rtindidos, vel rubentes, vel puni'
cantes, uti majoris: filiquas & feminaetiam familia, laca, plana: radicibus nititur fibrejls,
quac eodem anno quo fatam eft hyeme pereunt.

Lucoium Hortis colore livide rubehte mlancholico, Eyft- Facie & riorum forma¹ a'Leu-
foiis fupra allarisparum diftert, nihilivido obfeuro purpurafcence colore florum, meh
licisfolenni &, familiar'^ tmde Bcflerus, author horti Eyftectcnfis, ficnomtnarum volui^r

Habetur & idem Horemultipliciplenove ex fattone lcmiiim fimplidsplenuis & nn
tritorum, qaod eft flore albo. vel cinericeo. Idem habetar purpureum, vel rubrum C E
quod eft *Leucoium flore:rn&p flmplki*, feyft: Flore eft rubente, ex purpura
ceo, ex carruleo-purpureo; infumma ob colorcm dilutiorem & ractsrariorem
liqnot lunt; hinc *Viola nr.itroiulis purparea*, alia punicea, Fuch Tar. Lugd. v¹¹ trico
p; trea, Oer. Dbfervafur ttore candido & i loteo, violaceo & V luteo, vi*olacco & c³nd¹l?; ali,
quandotamen totus luteus, vel rotus albus occurrit.

3. Lf>co(jfl incanum maius variegatum fimplici Hore, C. B.P. Hocv3riumefti & P^{emilcl:um}
nacalweifalbo'rtibris, **Telporpnreia**, **aBtqnafi ftrua Hwoaalibos** notntum: hinc *Leucoi-*
urn vqnegatum album rubris macuhs notatura, Eyft Bry. 2. *Leucoium vanegatum* *purpureis*
maculia, Evil;

v>»<<

Ex fcmirte najoti-: teticooi bñie infiliquis nutrito &• poſtea fato proveniunt, Leucoia diverforam itidem coiorum flore pienci. Primo Vere riorerc incipiunt omnes pndiflae ſpec/les, & majorcm requirunt cu/atP Leucpia flore pleno (quib onmtm vim & alimentum impendunt in floribifs pienis prt^ucendir\) nehybernismenfibiiſoftendantnr. Dicitur Leucoiura incan um m^jſis multiplex, C. B. P. \leucojtim multiplici flore.Dod. Leucoium feu Viola purpiirea flore pleno, Lob. Icon- Flus efWel faturationis, vel di)uciorispurpurei, velpurpyro-violacei,velalbicoloris: iinc 1. Leucoium florenibropleno,Eyft. 2,Leucoiumiioirepurpureo'picrio, Eyft. 3. Lencoiumfive Keiri purpuro-violaceam pleno flore, Swer. 4. Leucoium flore pitno albo, Eyft. Bry.

4. *Leucoium* incanum mains variegatum pleno flore, C.B.P. Leucoium five Keiri, Viola purpnrca variegata, Sver.&hoc variumeft, 1. Leucoium purpureum variegatim lilnguineis fflatolis fignatim, rJry. Leucoium purpureumVariegarutn flpre pleno, Eyft. 2. Leucoium five Keiri violaceo-purpurcum pleno flore lineis viridibus diftinfruni, Swer. 3. Leucoium aHium plenG More fangtiineismaculis fignatum, Eyft. 4. Leucohim albam pleno flore purp^reis naculis fignaturrt, Eyft. Ex fatione Sf mangonio mille modis ludk natura in producendis yarietatiba?efeminibusdcfiinptisexeadernplanta, non minus in hilce q«am in aliis mukis generibus.

§• 2. LEUCOIMUM SILIQ_UOSUM BICAPSULARE

M A I I T I M V M F O L I O I N C A N O.

5. **T** *Eticſhtfn* marinumlatifGhimnmmim, nobis. Maritimumlacifoliiim,C. B. P. Ma-
1 ^rinutn alteruni laticolium, Lob. Icon. Lugd.Marinum latitblium, Ger. Park. Leucoium maricinmm tatiiblium flore *cxrvieo* purputante, J. B.Chabr. Foliifeftlatoribus, rigidioribus, hirtutoribus, profunde laciniatis, qujefurfum verufpertonantura caulibus: flores ex cxrulcd pUfptrafbobt tetrapetuli, in caulibus lefquidnriaribus & dodrantalibus; quibas fingulis fiicrtltiticffliquat bivalves feu bicapfulares Leucoti lutei vulgarisKtiri difti multo breviores &tenuiores, &• rotunds, fetnina oblonga, rotunda, in fe continences; unde concludimLis non die veitim Lejcoi'im.

6. IfHa/wimantirtiiimprociimbe/is^nbis. Leucoium maritimmm repens, C.B.P. Viola rriarinarepens,Hoit.Eyft. CaulicutiMurgithoc pedalibns, infirmis, atqueidcirco facile hofill prociimbetitibus, in plurimas alasdivific: foliisconfnac Leucor valgarisincanifignra fedilute virore albicahtia ; tloclnli tectapecalt, qui in tarneo colore modicc nibcncr, qnibusemarcidis, tbtifpitSffi exoriuntur ftUqtSt bivalves, paulalum comprefſe, planis & comprellis feminibus, duplici locubmento contends, refertſc.

f. *Leacbiuni* filveftfc inodorum flore parvo pallidiore, Eyft. Radices oblongiufculas & ;ilbefce'ntes in terram demit tit hoc Leucoium, e quarum capite numeroſa expanduncur folia, obloiiiga,tubincana, inftar Leacoii marini majoris IV, Taberni'inoiitani,varie inſqualiterque inambitti circumrofa, autquaſi finuata: caulisinte unus atque alter aflurgir., nonimnquam cubirum Kqlians, nonnanquam pedalis, in fummitate Fafciculatim gerens fiolculos parvos, paUidioces, iliodoros, Leucoii lutei vulgaris xmulos, fed minores, fiavopallidos; qtabas in ioiigis, anguftis, furreftis filiquis fitcedunt ftmina fiavefecntia, minuta, plana, comprefſa, aliorum fu* forris more.

8. *Ltucohim* maritimmm fimmeo folio, C. B. P. Leucoium maritimam majtis, Ad. & Icon. Lob. Lugd. Cam. Clnf. Hi ft. Marintim purpureum, Ger. Leucoium murinum majus purpnrreum,Tab, Hiiiccauliſeftpedalis, interdum maior, ramofusadmodum, & humi procumbens: l] ia longa, cr'afra, rhollia, canctia, & quodammodo lanuginofa, Cichorei ant Erucs modo ifb, & velnti prxniorfa: flores fecundum ramalos odorati, Cetrapetali,dilutionis purpurar, vininibritecemquodammDdbtendehtes: liifce fingulis fucceduntfiliquajfingul^ longi7 b.: planſe, comprefſe, duplicerh pl<inorum&comprerTornmfeminiinferiem, interntmbl^na media, coiitinentes: radixmultifida, fa{ nonperennis; poſteaenim l&3 flores & lemma protulit (quodaltero plernmquea fatu anno, interdum 6f tertitri blet) perit. Floret adVate, atque femina paulo poll: perficir. Eft & flore albo,»]tioid Aacbiurn maricimuin candidum, C. B. p. Marinum majus, Cluf. Hift. Keiri marinum flore candido, Lob.'lcon.

9. *Leucoium* maritifnum anguftifolium, C. B.P. Marinum minus, Cluf, Hilt.fic Hifp.Ad.Cam. Tab. Ger. Anguſtifolium, LQB. Leucoium filveltre anguſtifolium,Dod. Hoc dodrantales, te-

retes, 6^a fitis firmos habet cauliculos, in plures ramulos divisos: f&liaprioris familia, mollia item 6c incana, minora tamen, tenuiora & minus divisa: flores in ramuis floribus superioris multo minores, tetrapetali, coloris pulcherrime rubentis, imajidoque pallide rubri, & dum maturefcere incipiunt magis futuri, qualesfunt Lsuoii^a rubri vulgaris flores, odoi^ati, fed minus quam superioris: quibus fuccedunt cornicul^a oblonga, exili & nigro^a mine^a irculo albo cinfto, duplici ordine digefto, plena. Floret Juliw & Augufto eodem *CUQ* fatum eft anno, decide totaliter perit. Nafcitur utrumque, 6c hoc anguftifolium & fupenus majus in mediterranei maris litoribus, & in Hifpania & Gallia Narbonenfi, fed minus multo frequentius.

i o, *Leucoium* marinum faxatile Thymi folio hirtuto caeruleo-ptirpureum, C B. P.* Lithoreo-
leicoion minimum Valvenium. Col. Propter afhmitatem hujus cum in floribus tetrapetalis, tum
in fiqms bivflvibus feu bicapsularibus, cum Leucoiis, & natalem locum, ad difTerentiam alia-
rum Ipecierum A&paAew minimum appell/vimus, inquit Fabius Columa. Planta eft ^{eX};
gua, grata oculis propter florum copiam, colore purpuro-ceruleo venustorum, quos rn^e
Maio profert ex cajrileo purpureos variegatos, medio quid lutei aut candidi habentes, ft^a-
nunulis intus parvis: filiquas, illis deficientibus, e medio calyce foliofb profert parvas, breves,
crasfas, in apicem longum definentes, in quibus femina continentur exigua, ruffefcentia, co-
piofa, xftate perfecta: folia funt brevia, magnitudine Thymi durioris, hirtuta, colore cinerea
ficuti tota planta, alternatim viticulis denfe adnata, ut unaquarque planta carnofa fit admodum,
atque orbem viticulorum frequentia conficiat. Quamvis xftate floreat, nunquam tamen *yuit*,
femper novas identidem c geniculis denfis viticulorum foboles foliorum profereng; qua-
propter etiam hyeme reperitur, & tota fumi odore gravi ac fapore guftata putet: fingulis vi-
ticulorum cacaminibus infunt tres aut quatuor flores, quos confequenter fequunturfiq^{a3C}
totidem, duratque ad Autumnum cacumine filiquis onufto. Acris eft foliis & filiquis, linguam
magis vellicans manfa, quam *Leucoium*, ad Thlafpios gradus accedens.

§.3- LEUCOIIUM LUTEUM SILIQUOSIUM BICAPSULARE FOLIO HIRTO

*i. *Leucoium* terreftre majus luteum Erucæ folio, nobis. *Leucoium* luteum Erucas folio, C. B. P. *Leucoium* terreftre majus, Col. Ad difTerentiam *Leucoii* maritimi terreftre hoc denominatur. Floribus oritur *Leucoii* vulgaris figura non diffimilibus, iunt enim odori, & fua-
vem ceræ novæ odorem emittunt, fapore acres, umbellatim fere in fummo alarum & canjis
Parum hirtuti, rotundi, cubitalis, pluribus alis divifi, qui, cum decidunt flore^a, e pecw^o iem-
minciali filiquas emittit fingulatim & alternatim in fummo difpofitas, Lencou iimiles. at
^{hrM^oZl^ol&orcj} bifida & trifida, «hd. da. per arram ftrata, nve-
n i n n m ^ X W ^ " ' p r J E fertim ^ ^ unt V C n R I * ^ ^ T
aut Panaveris enatici folia profundis lacimis imitantur, colore virentia, parum hirtuta, mol-
lia W nfa acri fapore ficut & tota planta. Junio floret inter faxavallis Campoclaenium
fapralocum vulao diftum *ilcolkde mezo*, locis umbrofis atque humentibus frigidis que.

T², -eu co⁴ um¹! luteum montanum altum, Ponas Ital. Hoc diftinguitur a vulgari *Leucoio* alti-
fuperat humanam ftaturam. Ex una radice multos protrudit caules, quibus ad-
nafcuntur plurima folia denfe ambientia caulem, hirtuta & ferrata: floribus tetrapetalis lu-
tis & fapore *Leucoio* fativo vulgari conforme eft; fed floribus evanefcentibus, fuccedunt fi-
filiquæ longæ & trifidilimæ, & hifce fupra di&is nominibus a vulgari diftinguitur.

13. *Leucoium* maritimum foliis & filiqua hirtutis, eaq; tribus in fummo apicibus donata, nobis
Leucoium maritimum, Cam. Marinum maximum, Park. *Leucoium* maritimum Camerarii Leu-
cdiis affinis planta quorundam, J. B. Chabr. *Leucoium* hoc plurima folia edit fiffila molli-
que, per terram ftrata, *Leucoii* marini vulgaris foliis rigidiora, inaequaliter etiam finuata
focinde infar cornu cervi recenter emergentis, quod plantæ majorem pulchritudinem &
gtatiam acquirit; hic durat primo anno, fecundo vero protrudit caulem mojlem hirtutum,
bipedalem, aut tripedalem, in multos ramos brachiatum, aliquantulum crasfum, fed in
num; cui infunt toha anguftiora, parum aut nihil crenata, in quorum cymis nafcuntur flo-
res feniores inferius, juniores fupenus, conflati ex aqumr r^aU hne ^ ^ T. *Leucoii* vul-
garis: flores funt multo majores, & coloris diluco purpurei, quorum fingulis fuccedunt fili-
qus fingulae bivaves feu bicapsulares, ceterorum *Leucoiorum* moye & folijs & caules, sili-
que pilis fcitent, hzque in extremis feu fuperioribus mucronibus Vr partib; dividuntur.
& velut itapicibus in extremis prommendbu. afficiuntur f e S a S dnplci ^

in duplsci loctilarnenro continentur htiora, magis comprefla., & obfcurius vireritia: radice coufta^{loiiig-i}, alba, dura, in multas propagines iefe findente, nec'tamen eft vivax, fed fingulis annisperk, pofitqnm feminj/ad msturiraftm perduxerit.

14. *Leucoium* flore albo filiquis unovei'n difpofiris & reliexis, nobis. Brafiica filveftrts foliis ititegiis & hiffidis,&B.P. TurririsAob. Icon.Tab.Ger. Turrira vulgarior,Cluf.Hift. J. B. Chabr. Parl. Leucoium hoc fie nobis dictum mulca promit fecundum radicem folia per terrary frata, pjlmaria longitudine, Jefquiencialia laticudine, in ambitu nonnihl crifpa & firmola,aliquantnlum pifoft, coiore dilutiua virente; interquf caulesquaternos, quinos,cubitales & feYqaiciibitale³ aliquando, in aliquot ramulos divifos, per quos inordinatim nafcontor folia teta ftis ad caufes, eofque ampleftentia, foliorumBratfica: campeftris pc-riolijta; (dequain pritno hujasSeflioms capite eginrafj propeinfar, fed nmlco liirfutiora, qnafiq; iicana : fimmo canle multos tertiores facis magno³,tetrapetalos, coloris ex albointerdum pallencis & aⁱ^ai^jtK, ut cumCaroloClufioloquar,aliquandoomninonivci, quos fubftquarm LonfercitTilonga cornicula, bivalvia few bicapfularia, compreflit, duplici ferie femina plnra comprefiitidem &rufta aliorumLeucoiorum more, continentia: radixeftalbaWi-ra,& craffafatis, paucioribts ribrisinde emanancibusdonata, necvivax,akeroenima fatione annocaulcs prolato femine exarefcunt, & tota planta perit, utaitCarolus Clufius; erroris & la pi us reus hie eit do^tiflimus Clufius: nam plantain hanc per multos annospoft femina matur.. viri'feerepertotam liyemem, & ex eaden radice ineunteVere caules proErudereobfer-vavinuis. In filvis cedars facilius quamapertis collibus reperitur, Florec Aprjli & Maio & anceaEquino&iumfemina fua perficit. SculpturTab. 2.interBrafiicas; cumanota efiejtialifit Lei'.coium, revocetur hue ad confimiles.

§.4. LEUCOIMUM SILIQIOSUM

Bicapfulare folio viridi.

*

1 [^] *Leucoium* flore alboodoratiflimo foliolncidff virente, nobis. Leucoium album odaratidimum folio virenre, C.B.P.&4. in Prod. Leucoium rarius fiore alboodorato, Cam. Leucoium trncicofumtoliovindi flore alboodora to Camerarii,Eyht. Hoc radice eft mult ifida: cauTc viridi¹, ramofo, aliquando minimi digiti craHitie: foliis viridibus, fplendentibus, craffia, Keiri foliis relpndentibus: tforibuaalbis, magnis fatta, tecrapetalis, fuaviter admodtim & quidem vefperi Hcfperidummodoolentibus, auc MoMmm aut Caryophyllos redolentibus; quorum fingulisfuccedunt filiquae fingulx^{ong}^jcratfiuacutejvirides.compre[^]diiplicem planorum itidemfemimmi ordinem membrana media intercurrente continentes. Leucocii Cretici albi nomine primo infignitbatur-Hoc per aliquot annosdurat.fi hyeme in cellaaut potiusinconfervatoriohyemali in eum finem confruftoafllervetur, finfecus, pofit femina ad maturitatem perdufta, praenimio rigore tempeftatis hyemalis, apud nos Septentrionale[^] movitur funditus & totalizer, radice &caulibus.

1 6. *Leucoium*hiteum vulgare, C.B.P. Ledcoiumaureum,Matth.Lugd. Leucoiumluteum, [^]uch.Dod.Lob. Ad. Caft. Cam. Leucoium fativum luceum, Cluf. Hift. Keiri velCheiri,Gefn. iore.Lon. Flos Keiri (implex minor, Eyft. Quibusdam^{??i}>«» Theoplirafti quod totus fios flarilficus, id eft lutei coloris fit. Luteum enim colorem ilammeumdici ex Plin. I. 22.c. 8. colligunt. HuicLeucoio hiteomurali caulesfunt raniofi, virentes[^]pedalesW altiores aliquahdo, [^]rscipuequando infubgrundiis feplus humeftantur; quibusMneflimttir genicuiatimiolia iblonga,angnfta,glabra, in virore quandoque inalbicautia, majoris Leucocii foliis rhinora; ummis cautium adherent fptcatim Hores plurimi, lutei,retrapetali,perquam odorati; quos ftluuntur filiquae paulalum compreflae, oblongx, bivalves, duplici (trie femimm corhprellbrum,

•Torum, fulvorum, intus latente, fepto medio (maturis feminibus) membr'aneo,pellit-eandemferiem feminum hinc inde dlfterminance, atque in fingnlis ordinibusplarim;t

—unit continentur oblonga, comprefla, fubruffa, aliornm liiae fortis more. Totus hicfruti-

ii otii's pofit femina decidua hyemis rigorem facillime tolerat&fuftinet. Floret Mar-ufif Maio; quando autemfiyems clemens fuerit, Nativitate Cliriiri & Februario larnoque menfibus floret, fif iemina fecundilm florendi tempus funtmatura. Provenitin ttulVis muris, ruderibus, teffis aedificiorum, &aliisfaxofislocis, praecipue cakeabundantibus, paffim oblervatur: &c ad pedes vetuftorum nmrorum, anciquanmi turrium, ex feminibus matribusftlrpibus, infummis muris vigentibus, deciduis crefcere fatis t'requenttrcernitur:^hnquam in agiis, filvisaut campisapertis.

17. Est & alia hujus varietas flore pleno, cui filiquatfnnull*; colitur in hortis pangendo, furculi in terra deponuntur propter elegantiam cum riorum, mukipli petalorum congerie confrantium, turn odorem gratiffimum quert fuffundunt, }^ dicitur Leucoium minus flore pieno, C. B. P. Leucoium five Keiri duplici flore, Ad/& Icon. tob. Leucoium luteum flore multiplici, Dod. &c.

18. *Leucoium* filveftre anguftifolium, C. B. P. Leucoium filveftre, Cluf. Hift. Cam. Tab. Ger. Leucoium filveftre flore luteo, Bry. Hoc filveftre Leucoium multa fecundum radicem habet folia, Leucoiivulgaris feu muralis, quod luteo est flore, foliis familia, anguftiora tamen, viridia, amaricantis guftus, inter qu* unus, interdum plures affurgunt caules, pedalesfc fequipedales, ftriati, cainatis foliis obfiti, multos fuffinentes flores/implices tetrapetalos, flavos, Leucoi lutei vulgarisaemulos, fed minores minufque odoratos: floribus fuccedunt oblongiora cornicula quam in fativo vulgar i, itri&iora tamen, quadrata, plano, terete, *oblongo*, rufto, femine plena: radix ionga est, candicans, & multis tenuibus fibris praedita. • femine ad maturitatem perdu&o perit. Biennalis est planta⁵. Invenitur in montibus illis fupra Bademes Tji^mas, & in *Leytbenberg* falebrofis praefertim, & meridiei obervis locis. Nos florentem Maio obfervavimus in novalibus, adoram filvae *Fontainbkau* fecundum fluvium Sequanam f tis. Hoc a femine non est Leucoium; fed cum femine donetur terete, longo, rufto, in filiqua quadrata. videtur potius *Eruca*, quam Leucoium, non obtante denominatione Clufii & aliorum ipfum fequentium.

19. *Leucoium* luteum maximum loins tuberculis obfitis, C. B. P. Flos Keiri Eyftettenfis maxinius, Hort. Eyft. Flores hujus amplitudine Thalerum Philippicum fuperant: folia fu< magna, fubrotunda, multis bullis feu quafi eminentiis in foliis extuberantibus.

20! *Leucoium* luteum magno flore, C. B. P. 1. in Prod. Flos Keiri fimplex medius, Eyft. Hoc a vulgari Leucoio luteo Keiri diftoidift'ertmagnitudine&colore, qui parvum fructerri, valde ramofum & totum virentem refert: foliis est majoribus, viridibus, fplendentibus; floribus tetrapetalis.

21. *Leucoium* ferrato folio flore luteo grandiore, C. B. P. & 2. in Prod. Hoc a precedents M's potiffimum difcrepat, quod duplo pene longiora funt, angufta, per latera crenis apheris {errata, & in aculeum finientia, qu\$ fimiliter craifa, fed pallide virentia, mollia, qua parte inferna quafi lanugine apheris: flores lutei funt magni.

12. *Leucoium* luteum majus pleno flore, C. B. P. *Viola* lutea multiplex, Lugd. Ger. Leucoium majus flore luteo pleno, Eyft. Huic itidem nulls funt filiquae; cognofcitur primo intuitu a priore, magnitudine & plenitudine florum, qui funt, aut lutei, aut ex aureo aut fufco, variegati, prioris multo ampliores.

§.5. LEUCOIIUM SILICULOSUM BICAPSULARE.

VIOLA LUNARIA

diclum abufive.

V *IO*LA ratione florum, *Lunaria* vero a filiquarum forma dicitur? quoz lat^lanae qz profemodum rotund* funt, iy lunam non falcata, fed profecompletam referunt, xli d filiquarum fepti medii /plendore^quod per ficcitate nitet & fatinum album plane refert.

Pera& do&rina Leucoiorum filiquofoforum bicapfularium in prima parte hujus capituli oclavi iifdemq; quatuor paragraphs explicatis, jam operxpretium duximus aggredi fecundam 'S&* tem, in qua traftabitur defiliculofis Leucoiis Bicapfularibus paragrapho hoc 5. quae differunt a filiquofis Bicapfularibus, quippe longis filiquis donatis, cum haec Leucoia filiculofa parvis & curtis filiquis feu filiculis afticiantur. Conveniunt & filiquofa Leucoia & filiculofa, quod fi^{nC} tetrapetaia bicapfularia iepto medio difterminante duplicem feriem feminum planorum cvi>> preiTorum, quiae femina plana compreffa nobis exhibent notam effentialem, Leucoiis peculiarem, qua Leucoia tam filiquofa, quam filiculofa, a cseteris omnibus antedidis filiqu^{ofis} tetrapetalis, bicapfularibus, hujus feftionis decernuntur. Leucoium filiculofum bkapiularc dupliciter a nobis confideratur, quatenus filicula fecatur aut dividitur fepto medio pellucido; vel tranfverfim, ideft ante& retro; vellongitudinaliter, ideft dextrorfum^ finiftrorfum a fummo ad imum: de quibus fingulatim agenms, de illis primo, de hifce poftremo; c*^m ordium facieniub' a Leucoiis lunatis.

J A B U L A IX.

<p>Leucoium filku- \ lofum bicapfulare'</p>	<p>Sef>fo media dividente bi- na loculamen- tafeviinum ante i*t retro</p>	<p>Luna turn feu clypeatum</p>	<p>Latifolium glabrum majus</p>	<p>Annuum \</p>	<p>1. Flore violaceo filiqua rotunda, nobis. Lu- nar'ia Cr<£ca annua Eyfl. %</p> <p>2. Albo, nobk. Viola latifo- lia altera , Vod. O</p> <p>3- Purpuno fi- liqua oblon- gajtobk.Lu- naria Gr<£~ perennis, Eyfl. 0</p>
<p>Septo medio dividentebina loculaminu feminum a dextris isr fi-i n W^{ds}</p>	<p>Bifcutatum <</p>	<p>Alyfoides <</p>	<p>[r o. Afferum Hieracifolium majus, nobk. Luna- ria lutea Monffrelienfium, Cluf. Hi/}. ?</p> <p>11 .Vmhellatum montanum, nobk. Leucoium Alyfoides umbellatum montanum. Col. \$</p> <p>2, Spkatum> nobk. Iondraba A- lyfoides Apulafj>icata7Col. \$</p>	<p>4* Anguflifolium^Siliquk afterk, nobhs. Alyf- afferum minus 1 fum Dhfcoridk, Dod. Cam. \$</p> <p>5. Aly'jj'oides minut, nobk. Leucoium pelt at um Romanum minus. Col. 0</p> <p>6. Incanum filkulis iumidh fubrotundk, nobis. Leucoium ma- rinum Patavinum, Lobt Erucaperegrina, (fed^trptram) Cluf Bfl. 0</p> <p>7. Montanum flore pedato feu calciridonnto, nobis. Leucoium montanum flore pedato, Col. ©</p> <p>8v Spanofpennum , nobk. Leucoium luteum Spanofynmon, * Comut. §</p> <p>9- Clypeatum Serpilli folio, nobis. L ntbla/pi ffrkatum lunatum, Col. 2</p>	

Explicatio TabuU nonæ.

Leucoium lunatum feu lunarium lanfolium majus annuum filiqua rotunda flore violaceo
S S S e o , nobis. Luaria Grxca annua, Eyfl. Lunar. a Gr, ca C^f. Lob. Lon.
Viola latSlia, Dod. Cluf. Pan. Lugd. Viola lunaris i. T3b. Ger. • Bnlbonac, Ad Lob. Bulbo-
nU (Tmdicibus bulbosis) Gefn. Hort. Viola lunans feu Bulbonac, Gcr. Park. **Leucojnn,**
hoc fiiiqualimata rotunda flore violacco caule affurgit bicubital. fat.s craffo, in ramos divi-
10 folia promit virentia, glauca, lata, perambitum crenata **adinftar UrtioE** majons, aut her-
bs AlHariz vocats familia, fed majora: in fummis caulium ramis flores producit tetrapetaios,
• pulchre nitentes, purpureos aut fuboenileos; quos iequuntur iihquæ planz, lata,
colore --- rotund2e, exbinis valvulistenuiir Lmis (membraneis vel Int] Iam Lnis) compactz, in-
propemicaum --- med ium pellucidum h'mc inde femina lata, plana, comprdia, iu brotunda,
tra quas & feptum ---
obfcure fufci coloris; forma tty^ ^nxqna Aplenz latent, (epto TMf¹⁰ mthm TM^2)
femine, P^u^i q n a fi fadnum album referente, '& (eparantedupbcemf. mLnum feriem,
bi. cunan., illincakeram radices fubfunt crafe, candid^ ^^ iinoAs&tenmo
te. s, Poconiz femin* alteñus radicibus quodammodo fimiles, leammw
res,

res, intusporofae. Bulbonac aut Bulbonach voce bar) ara quidaai appellant. Nos afemine comprefTo, LeucoirfeminV Timili, Leucoium filiqua lunata vocamus a fimilitudine ejnkkm dim Luna qaafi plena, & aprias, cum ejus filiquae compreflae, ftianae, rotundas, Ltinx inftar lemma compreila, plana, fufca in iecontineant, qu^eft noca genefica abinitioLeucoiis ailignata, di-ilinguens eadem a cseterisfiliquofis bicapularibfls & bivalvibus in hSthSeftione contentis. Lrabanti pemitcfe'lJlocmetl a hliquarumrormad^nariumquottammodoreferente, & patWJ¹ lilDtmcn, quod circa Pafcha'tis folennitatem tecc femper floreat, nominant. Recentiorum pie-rique Lunai iam fimpliciter & Lunariam Graecam appellant, vel ab ipfius feminis n'gura, aut fi-liquaruni niedis membrana: argenteo fplendore, quo decidentibus per funimam ficckacem ciimfemjoe, tum ex utraque parcemembranis ieu valvulis exterioribus, nitLt: media tni'n-brana piHucida, facinum album nitore fuo reforens. Unde & Anglis horculanis dicitui \oucty. Membrana mediacandiflima&tcnui/Iima JRriis colcribus cingicur, videlicet rubto, c aruleo, hiteOjViriftiquecolorcfpectatu fatis digna. Copiolc crefcic in laitibus Turingiae fiivi, testis tit Camerarius inHortia: HoretMartio& Apriiii; primoanno non icrc caules, net floret; lcc undo ubi maturuit, perit.

" 2. *Lauchim* hmatum fen tanarium latioiiium mains alterum filiqua rotunda flore albo, nobis. Hoc priori foliis lacis & filiquis planis, rotundis, fimile eft; perrenni ntitur radice quje hye-menon marcefck: cauksti fmu cubitales. lignofi: folia mulcalata: filiqua; planar, compref- fae, rotunda?, utraqcupaulominoraprioris^ Horesaiitem protert canclidos intbr Viola; ma- tronalis. Trovenit in filvis nonnuUis GermanLt, velutiHyicinia, qua parteGc-rmaniani (pe- fiat;trans["erturadhoitofin quibusdiucinc vivit in eoniembram pellucidsnitore, ut Luni³ nodu lucentis faciem repnefetet, unde ei nomen.

z. lfiucoim majus pcrenne filiqua lunata longamucronatS, nobis. LunariaGraccafiliquis loneis^Gefn.Hort. Lunaria Gracca filiquislongioribus, Thai. LunariaRaphanitisfive Pulbo- nac radice rediviva, Lob. Icon.ttinariaGrsci perennis, Eyft. Viola lunaris 2. Tab. longi- oribus fiUqHJ3, Ger. Hoc Lcucoium perenne fiiiiqua oblongiore mucronata folii%eft latis Luna- rix prima: uift.ir, ierratis & acuminatis; flos itident purpureus aut ex albo fubcjeruleus, tetra- petalus: filiqua quaei fucceditoblongaefit, & primi Lunariifiliqnislatitudine multum ce- dit, binisetiam utrinque membranisleu valvutis exteritJribusampletentibus lemna terna quaternave, hinc inde inter membranas exteriores, & meMiam tidem exficcatam pellucidam fita. In monte Salevsenon longed Geneva abundat cum longis filiqnis & mucronatis. Tign- latainhortos hyemem pertert, virens Januario. Floret Maio circa lacum Seven Abaciaein- fignisnobilium LJominarum, quarum Johannes Bauhinusr'uitmedicus. Floribusctiamciruleis in nioutanis filvis Aufriar, Stirir, viciniarumqne filvofis locis, auque etiamin Vannonia intef- amni, authore Clufio, Ipohec magna copia provenit.

&, *Leuceium* afpenira liliquisafpcrisclypcitrmbis, nobis. LeucoiumAlyflbides clypeo tum raajus, C B. I'. Lunaria afpcra, Gefn. Alyftum Diofcoridis, Dod. Cam. Lugd. (cui & lyfiomDalr" figuraduplici) Alyftum Diofcoritlis putanim, Lob. Leucoium montanum tun- cum, Col. Minoris& congeneric memSnitColumna. Alyftum hoc diftum Diofcoridis, eft pr- dictisLunariaefpeciebus & filiquis & femine affinis fruticofa planta, inquitDiofcorides. E- herba unicaulis fubafpera, foljis longis, verfus mucronem fubrotundis, quicaulitus adhere- denit difpofica, bipedalibus, in quorum cimiloiigicudinaliter feu fpicatum exeunt flotet IUI liini tendenres, e luteo pallefcetes, tetrapetali, quorum fingulos fequuntur fingiilfe filiqo phnae, latar, ovats feu clypei forma albicantes quandofunt matur;?, exterius non laeves it arperjc; in fingulis ante &c retro inter valvulas exteriores afperasfif membranam mediam pe lucidam latent u-nia, quaternave femina plana, lata, comprdla, rotunda cum limbo albo fi' gob rotatim cingente. Membrana peliucida maturis feniinibus apparct velutt in ant< '•' % fac familias Leucoiis lunatis: radix tennis & tibrofa poft (emina ad maturitaton pe ftatbn exficcat & pent. In montibus&atperis locis cniicat. Floret Julio ac AuguV flbus; fibquis t'revi poft iucctuentibus maturis Septembri, aliquandomultocitius L rides iW i i o m m a t, non mad rabad a cane mordente medeatur, fed quod fingulw* ' tollat. A . ^ fiqutdem non folummbies^cd & finguknaa verbo ^ id ell fineulr idem & foariisnommibus M l * quafi breve k p 3rvUm reatum - fili ig * refewntibus; item & i**h»*, «««», i A ^ m ^ ^ R ' iuntur nes | ^, alia cu ^ ^ m w P ^ U ^ m b ^ m * ! ..sideriid. ? TM. HeracleU Alyflm. & H herbamtkitAMA, rub u fpeciem fiote purpureo aut i bro Alyflum vult Galenus, Sed de his fuis locis: de hoc A, y ^ Diofcoridis hic latis dictum.

5- *Leucoium* Alyffides dypeatim minus, C. B. P. *Leucoium peltatum* mirius Rpnianum, C/4. Pianta haec a radice tenui, knga, lignosa oritur, parum acri sapore, foris palda, intus candida, perenni, paucislawralibasfibris exiguis divisa; cujus folia prima per terrain jaent, triuncialia Quatuor unciaslogga, per ambitum leviter/muosa, femiunciam lata, candicantia ex viridi cinereo, taftu aspefufcula, hirsuta, & inferna parte magis aspera- & fere bullata ut in Bsgloli aut Anchufe cujusdam fbliorum fuperna parte, atqre in*plu-
ces propagines divisa ex una radice: caulibus fruticat tenuibus fupinis fere, in multas
deinde alas divisis, quibus tenuiora angustioraque folia hasrent alternatim, asperiuscula etiam,
ficte & canlis & alae.* flores incipit aestate emittere in fummis caulibus, *deinde* per alas coa-
cefvatos veluti in umbellas, virentibus calycibus inclusos, quorum primi hiant longo petio-
lo prominentes in quatuor petala, in extremo tyida, feu veluti cordis effigiem referenda, de-
cuffatim oppofita, multa intus ftaminula lutea includentia; quibus capfulx fuccedunt oblonga?,
angustae, in acutum apicem definentes, deinde latitudinem aifequentes ovalemque ffiguram cly-
pei accipientes^ foris* hirsutx, asperae, femina intus compressa etiam & plana casterorum Leu-
coiorum more continentes^oftbna^uaterna/cilicet in fingulis valvulis diaphragmate distinfis,
qifod dehfcente ob ficcitate mcapfula feu folliculo clypeiformi, pellucidum remanet, decidenti-
bus utrinq; valvulis: femina inquam rufta, rotunda, compressa, tenuia confpiciuntur, qux Ob: o-
bri menfe & etiam Novembri inveniuntur adhaerentia-diaphragmatifeu fepto medio pellucido,
ex quibus iterum regerminat. planta ante Autumnum; & hyeme locis sterilioribus incana
magis folia reperiuntur, mollioraque & minus finuata circa radicem: folia radice minus
acria, ficcante sapore. Gaudet natalibus calidioribus copiose circa urbem Romam. Undique
in facultis fruticantem hanc plantam invenit Fabius Columna. Floret aestate, & capfulas fe-
minales, feminaque ibidem contenta paulo post ad maturitatem perducit.

6. *Leucoium* incanum filio, uis tumidis, fubrotundis, nobis. *Leucoium* marinum Patavi-
num, Lob. *Leucoium* marinum luteum majus, Tab. Ger. *Leucoium* cum iiliquis rotundis
flore luteo, J. B. Chabr. *Eruca peregrina*, Cluf. Hist. Hoc *Leucoium* aliquot caules ex una
radice prodehntes habet, fequipedales interdum, rotundos, graciles, & sub exortum e ra-
dice multa folia, oblonga, angusta, cofta media prominente, incana, non nihil in ambitu fi-
nuata & quafi undulata, acri gustu praedita; at quae humi fecundum exortum radicis pro-
veniunt, lunt plerumque ampliora: flores habet in fummis caulibus fimul congeftos, luteos,
tetrapetalos, Erucx fativa? floribus minores, & Leucoii filveftris Clufii floribus maghitudi-
ne refpondentes; quibus fuccedunt folliculi feu capfulae tumidae, fubrotundae, mucronatae, bi-
valves, lepto medio pellucido divise, feparante eodem tanquam diaphragmate duplkem fe-
minum feriem compressorum, ruftorum, aliorum. *Leucoiorum* more, quas arguunt hanc plan-
tam esse *Leucoium* non *Erucam*, ut vult clarilirmus Carolus Clufius?; in folliculorum extremo
prominet ftitulus acutus: radix ad minimi digiti crailitudinem excrefcit, Candida, nonnal-
lis fibris prasdita, Crefcit quibusdam Caftelk locis incultis & juxtaviis, ubi Maio floret, &
Junio & Julio femina perficit; tardius in hortis noilris versus Seppentrionem & floret &
Femina ad maturitatem perducit. • Sunt qui *Leucoium* femine rotundo vocarint; alii *Leucoi-
ium* Patayjinum marinum, & aptius propter omnimodam foliorum incanorum cum *Leucoii*
maritimis fimilitudinem, fed prascipue cum femina rotunda, plana, compressa habeat, quas
confituunt erTentialem & genericam *Leucoii* a reliquis filiquosis tetrapetalis notam, ficuti a
nobis ab initio* hujus capitjs distum. Ergo male a clarissimo Carolo Clufio ei adaptatur
Erucge peregrintse nomen, quod nullatenus generice *Erucas** convenit.

7. *Leucoium* > montanum flore pedato', Col. Thlafpi bifcutatum villosum flore calcari
donato, C. B. P. & 8. in Prod. Medium procul dubio genus inter *Leucoium* & *Thlafpi*
constituere videtur haec planta, font enim plants congeneres *Leucoium* & *Thlafpi* recentiv-
m fententia; nostra autem diverfe: magis vero *Leucoiorum* speciebus accedit ex nollra
opinionem, quam *Thlafpi*, quia femine omnino iis affimilatur- Huic folia sunt Napi modo
circa caulem/acetiam ab radice prodeuntia, funtque hirsuta, proinde incisa, ex viridi
ca WitSetia, parum carnofa, mollia, gustu acriuscula, linguam manfa diu vellicantia:
flores in fummo caulis hirsuti, albicantes, & ex medio cohserentium alarum denfos profert
quorum inferiores primum dehiscunt *Leucoii* ritu, colore luteo, minus faturo, tetrapetali
Js» quatuor foliolis conftructi, apice inter breviamula in medio prominente, utriculos
habentes hirsutos, ut in *Leucoio*; fed hic floribus accidit, quod binas appendices rotun-
das inanes demittant in inferna parte qua petiolo hjerent: floribus emarcidis fuccedunt ca-
pfulae exigui clypeoli effigie. in ipicem definentes, lenticulari fiquae magnitudine: radix car-

nofa, longa pfdcm, candicans, lignofa, ex duki parur.i acris, minimi digiti crafiltuai
Maio flpridam habuitFabius Colamnahanplantam exoppidovulgoFi/L-mw-dicicvn **ruoifi**
bus Romans ditionis orram, cujus fiore & lemtna acria p**tepit eile ex guftu ; femai adhi.t;
immaturuni incrafolliculosobfc'rvareneqniit:idem(folurnn3,necdejnde akera ejuilem planta
in manus Columnaspervenir., nee quivis poft ifium Cohimnam exa&iorem huLLis figunm
exMbuit cum fernintbus; veriori tamtn familia; cum Columna ea-idem nos adcripfiire
jadicamus propter contbrmationena capfulac LeucoioPataVino perfimilem.

8. *Leucoium* liueumSpanofpermum, nobis. Thlafpi luteum Spanofpermon,Corn. Thli-
fpi Spanofpermon Americanum, Park. Inter innmeras herbs Leucoii Thlafpivediftentias,
quæ ab author)bus prificis & rtcentior'ibus traditi funt, nulla ljaftenus apparutt multiti-
dine ffocolorum abundintior hac nova fpecjfc, quam impTaefenciarum deferiptnri *fatnus* ;
canca emmferacitate pra'gnat, ut tnmeitn fpatiopl dg^uam bismille floribus ornetur, quam-
vis fingutftiores diem foium unum durent, ac proinde Leucoium milltflorum dici mretrn:
verumcum nulla eft hujulmodidiverfitas, qmnonquamplurimos Hore's progignac, aquibus
fanef pdtatacapfulainvolutumpari numero poftmodum- oriatftr, cumquepon totmilliafio-
rum ev^nidorum perpanci in hac fpecie ajparenc capfuls-feminales, ideomalnimns apii^
ciratefeminum cumjacobo Cornuti, atriboriloco,Spanofpermon appellare ; vixenimcota
hacplantataquinque autfex capfaia reperias: flores fignidem infiniti apparent, reliftis vcro
aridis petiolis quibus appendebantur (ut conftat ex ipfiuslcone) omnes fere dpridunt
inutiliter^capfulaq; ana autalceta tantummodofparfim hie & illic fpeclatur: folticuli feuca-
pfulse funt ciaffae, targidx & fublongi, in mucronem deftntentes, & longis petiolis pt^n
dentes (quales pendent filiquar Glafti fativi) in quibus fcm'ma concluduntur-acri fapore
prsdita : huic plant! radix eftdurior, cui mults fibrills hrent: folia funt digitali longi-
tudine, initio admodum angulh, humi fparfa, & fubpinguia, confertim geniculis adhs-
reiitia: cauliculi femipcdales non fine adnatis ramulis longiufculis Srcapillaribus, foliis
quidem vacdis, fed milleflgiculislrtrcis, tetrapetalis,oneratis. Sapor fubacris Naftuvtii vul-
garis inftar, qui leviter linguam pungit.

9. *Leucoium* clypeatum SerpUli folio, nobis. Thlafpi clypeatnm, lonthlafpi minimum fpi-
catum lunatum, Col. Thlafpi alcerum clypeatum minus Serpilli folio, Ad.Lob. Thlafpi mi-
nus clypeatum Pens, Lugd. Hujus radix cxigua, tennis, ckalbicans, fibrillis aliquandodi-
vifa tnveniur: piures emittit virtulos tenues, atheros, dodrantaes ad fmmurn, lupinos,
raro refotos, multicatiles: folia illoscircundancalernatim difpofita, candicantia, exigoa ad-
modutn, duplo minoraThymi difti durioris foiiis* eft omnium congeneruir; miniina, afpe-
riufcula, uno verfu quandoque difpofita. E medio vero viticorum, qui afera hir-
futie & candicanteobdurmmr., ad fummtim nique_caplularum feu foll'iculorum carfila?-
neorum, rocundorum , Lentis majoris feminis magnitudine, deprefforum , veluti in vvr
fpicaJifpofitornm,dependent flores unoetiam fere verfu penduli,e petiolis exiguis incurvis r
tantes; minimum quamor foliolisdivifumcalycem habentes, oculoafre fugientes, qui **Hor^a**
antquam in clypeolos lunatos abirenc, continebat: flores veluti in umbeilulam conter-
tosin fummo femperhabet 'exiguos, & omnium mJnitnos, pallentes, quatuor pet^lis etiam
conftrufotos, quiftatim tot prorerunt fblliculos rotundos, hirtutos, qJot fuerint flofculi.
in medio parum ventricosos, limbocircumdtiftos, in ima parte veluti fiTosThkfpios modoT
q'i perfeftipalexcolorefiunt, ab imo decidentesMaiifine: femem intus habent unicum ro-
tunda figura cdmpreffum, flavnm/ Plantulae fapor acris, Leticoii moddficcans. Lunatum Ion-
thlafpi dixtmus, cjjiiia lunaria: Gncaedidi modo peAdulos habetclypeatos tolliculos^iutances,
6r Ionthlafpi ab effigieSf affinicat^quamcum Leucoiis 6f Thlafpi facie atque natara habet **'
detur. Rara & clegans phntula, nee ab alicjuo ante Fabium Columnam defcripta,
admodum plunmae alie rariores. In moncium radicibus & collibus foil orienti expofi
rilibus, frequens Anverfs Valvenfium Aprilis menfis fine ilorct; &Maio femem perfirir,
apud Septentrionales,

io,3f 11. *Leucoium* bifcutatumafterum Hieracifolium majus, C.B.P. T''
Hitratilolium five Lunaria lufea Monfpelienfiura, Ad.Lob. Thlalpiclypeatun
l'an. Thlafpi majus clypeatum, Ger. Thlafpi minus clypeatum, Tab- Hoc i • LCL
«m bircutatatum Hieracifolium atherim ex Creta Thlafpi nomine Honorius' Bellas n
quod foliis- **eft** minus atheris, fed tota planta incanaeft. Excllfa ^quicolorum fii gida
juE.aherbida, *Coruino* difta, (ubi plurima Gentiana maior vcralutea) vico\k hare her
atque ab londraba Apnla fpicata florum ordine in umbelhm fere compofito diftert, n<<

jlits majoribus oolongis, litei Leucoii vnJgaris proxiruis magnitudine, fed ^{mino-}us, per ambictim fnagis finuarji, hirtutis, carnofis, duris atque aiberis, ecadice'longa, biofa, ex pullo candicante, ngfvofo, -ficcio fapore, fimul ex pluiimis germinibus •tyode- uAttbus Leucoii more; ex quiblis'caulis tenuis, hirtutis, pedalis, alus quandoque rarisin- Eerceptas foliolis, m cijus fummo parum tS^iditur; ilores vehiti corymborum modo denfi, in umbeliamdifpofiti emicanclutei, niajores fondraba: Apubefpicattefioribus, quibus fuccedunt capfulae lives, rotunds, duplices, medio petiolo in apicem teiminante, & iepti medii vicemfui- gente, ipfafque fenarante* cui utrinque conjnntas Hint fihcuLt rotundar, compreHar, planac, londraba: fpic.ua: capfuls niajores, in medio extuberantes; in quibus Jemina compreifa, parvn, flava, continent ur Leucoiorum modo , bina fciUces: hinoinde fingnlis capful is fepto mediojunfts infunt, fapore etiam ficco: fotia guftu fubdulci, npn acii. Auguito Iianc pla'utam floridam & lemne refertam invenit tabius Columna,quamLmiaria-mJuteam Monf petienfium & Lcucoium marinuiiTuiceam Lobelius vocare videtur, fed a Fabio Columna inApeuninis momibus Septentrioni oppdfitis lefta, & montana videtur 6V amari tritimt! ecum itinere abeft, ncc aiHatnm habet maritimum>, nee markima londraba Apula Cirino iis Leucoii nobis videtur, fed potius Drab^ aut Thlafpios (pecies. Infuper vifa faitfollicu.

cam adnatis non umbella; modo difpofitis. Quarediverlas fpecies non folum vaviewte orum, fed partibus eflentiaibusdiverfasnafci cenfemus. Invenitur in Valvenfium mon- tibts in ^He fupra Anverfam praniptisumbrofis fdxijuxta fluminisdecurfmm. Reperitur teftes Lobclio in pratisMonfpelienfibus fecus Lanum.aninem&Graniontium lucum. Hn- jus appingendam aliam fpeciem majoiem tollis 8x capfulis Lifcutatis ex Columna curavi- mus, cuju'3 capfula: triplo Lobelii aliorumque aucliorum fupra hie citatoram funt majbres, ncc rotunda; pbnea tota magnitudine & tolioram divifura efdiverla ab ilia Lobelii aliorum- que authorum. Copfule Icones quoad decuroccafio vidend'iTitramqie fpeciem diverlam.

i f. *Leucoium* bifcutatum asperum minus, C. B. P, Iondiaba Alyffoides Apula fpicata, 'Col. Lunaria hitea Dale", Lugd. Scucatas cum Iiabeat capfulaa hoc parvum Leucoiam fa- perioris njore duplices, fepto medio ex petiolo condnuato junftas, foliis autem Drabx aflimilisfic, utaliquam nominisprivatam& pcciliaremhaberct differentiam, IondrabamA- lyffoidem- Apahm appellavit Fa!)ius Columna, eo quod Viola; lutea; vel Leucoii Imei vul- garisfitaffinis fioribus, non vero folliculis. Radicenicitur admodum exigua, alba, ex qua folia eterra parum data., fed per terram frata, hirtutis alba, -dente, taftu mollia, di- gitali latitudine majora, oblonga forma, nervulis craffis, pilofis, fcotentia; quorum aliqua circa petiolura radicem verfu? lacini.im habent, reliqnum raris & magntsdentibus ferraca : caulcm e medio foliorum emittit rotundum, hirtutum, asperiufulum, pedalem aut paulo majorem, duabus aut tribus in fummo alls diyifam, e foliolis nialtum anguftioribus neckcini- prodeuntibus. Reliquum nudum, nifi prope ha mum duo vel tria hxrerent folia; in no Hofchli emicant Sinapios modo, latei, exigui, tetrapetali, qnibus deficientibus ab , ig panlaum loco implentfolliculi duplices, rotundi, Lends, majors l*minisma*gnitadine, fimul ex oppofito interveniente fepto medio conjunsti, utinfapeimis fbliculis comprefli, rotundi, piirum hirtuti, qui omnes compaftim in fpicEmotluni congefiti, & furfumelati ap- parent, atque Aprilis line perficiunnir apud Meridiouaics, v^finK fincm arftatis apnd nos. Sapor planrs torius parum acris. Calidarum indigena e'fliacc pLinta regionum, quemadmodur.i Apulia Sc Cirinois, iniilva prope *Divi Eoccbi Mezana zppc'nt*3.7 quiamedia eft inter agros ^ica enim filvas appellant incra campos fitas^ iiter Fyraftros, Oxyacanthas & Aphodelos, quibus toraea filvaeft referta.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

• *loiam frulex univerfus extergentem facultawn pffidit, plus lamen flares, iy inter bosqui*
 1 r'kus magk etiam quam virides, adeo ut oculorum cicatrices crajjas extenuent. Turn menfes
 bftummvet, falocbias; partum mortuum elicit, is fibibatur abortumfacit. Eft
 tfdicamentum, ut fiquod alittd, amarum: femem cum fitcufdan facuhatis aptiffimum
 i duaruvi draebmarum menfura potum menfibta tiendti medicamentum. Sed teftes Plinio
 nor vis (ft tecentibta , ideoque acriu? poft annum eft utendum- • Inter omnia Leucciorum
 wt.7, lutea calido temperamentopr*dita effe, prsftrtim arida teftatur Tragta. Fhfculi horum
 •icentes in aquadecocHis-poti centra vulva inflammat'wnes vakvt. Succus oculi in&tuipxr-
 gat eofitm^ omnefqite mpculas (y caligines difcutit. Vein ft e vino hibatur^ ncn folum wenfes,

fed isr fecundina* isr mcrtuos part us txtrahit. Aqua X/lillata bts die pot a quatucy aut quin- que ccchkarium menfura vitiis bepatts isr renum condtitft, is? Vemremftimul.it ^, »n^r, diesoTitinue ufurpata^ omnia intema Membra roborat, fangu'mempvrgat <tsrmentemcx/:ihin-t, dolorem fedat, isr quieteminducit. , Cummelle ulceraomfanat, confervqparalyticos. Meri- ts oleum d(Keiri ex fioribu* Leucoii lutei cwfcicj, ut Cbsm<emelinum,quod renuat, digerft* ac ob.id dolcres thoracis, renum isr nervorum fidar.

Leucoium maw lunatum annuum fdiqua rotunda flare vwlaceo, nobis. Lunaria Grxca, Let. Caft, Eft Piffiu calido, acri isr maro, "fle Lobdw fr*jmtmfmina, radices tamer? ace- torus, ut Rapuntiradices manduntur, netpenndejtnt acres, ut Cratev* Thlafbi radices traduntur. Abftergtt modice, calefacit,urir>amaf ut Rapuncul*,. Semen tritum turn aq«« appropriate exbilxri epileptic* fcfr Sdm^eldiu,

Leucoilim maim pzrenne filiqua obbnga mucronata, nobis. Lunaria Grcafdiquh longk, Gef*. Hart. HuLfimen abfiergit «x urn* provocat Quidam mHelvetik cbirurgJex turia- ri t PerennL contufis foliis p*rabat. unguent urn vulnerarium,. non conmmndum. Pulvis fe- mini amariffimti*, cum aqua appropnata txbibetm in epikpfia Camerario afere,,te.m

HALLUC-INATIONES CASP. BAUHINI Aliorumque Ainhorum.

P. A. 201. col. 1. bl ii, LettCotummamimtrn.Ji. > B V Letcoium muritimum ma- nuato folio. Leucoium marhimum marit'itim majns. candidum, S ^ gtademplant* « Cajp-a hhi bit rfp^{mur}; i faff, nan potcft eft fynonymum bi

repetitum. Pa- 201. col. 2. pl.Xf. LeacoiumCrttuumfpinofum ?imltit»^m > ^e ^{KB} ^P Lentium Conitum fyfyo- //• Clyf- H'ft- H*^c p^{ant}:a ere frt <*d rubitalcm rtmeioreⁿⁱ slitudinem, & in multaidurot (5 tigefoj ranros fpaTgitu.r; quo: cingunt folia eonfrtim, g>& contmunipedicalo qttafinafcentia, inatni& fffierace* cotorisper ores mnnihil dentatv; (Sjparjim in rAmis mahi floret nafcuntur, nun lietifi Jed rara d;jpoJ!ti,fiitvi,pt>itapetali,cttmuhii fta'minulis pur-

tietfoi.gertt,pavte pojl tamen dart ii jpinejievadunt,) flttfiulisriediilii fioriliu! pentapttatis decidua fuc- ad^{im} l^{im} £<'* capfulte rotunJit, multa miauta in ft cdtitntntcs fimi/ia-. Ex hue drftTiptione Caroi Cfajii a numtzoijainariepetalaruminfioribus nonpar- ifeffe Leticum, quippr Jillo-osh inrapcmlaplhn- ta; de iMkfioribus,quinU peMlit cenfiatisjitectdant capful* iotunda' jurBa foltorum ttxt&ra, qua la- nujine feu qtaji ciaere cbducunturi+btctinquam a- mnia arguunt non rffe Letuviim faltem, fe'yirjiafci ant. Blattari/e (jxeiem, tarn net flora gmttttrapt- talos, nrc jitiqwas lotigiorts, bivalves, nonpoteft did LaiUUHm, argumentantlo a notu generhitLtufoiis tomunibus (£ peculiaribiu: fit ergo Verba\$Sumjpi-

Ltutrium, Infuptrfajesfontintegrin ftmdo.quin- qwfariamm margin diviji, Rlattarie more, inquo- rum ftitigla Verba\$d authlattarin: mado tofthiun-

vanefcentibtu futctdvnt t/tpful* rotunda: ft aaad- difet Cl.,f,u; ant Pona jiluulat fr^{ru} threes bieepfi' tarts, turn rjjet extra comoverfiam Blattari* >- •>#f«« , quamfift rfi „ ifa^{ihu} ^{tf} rotundis probdihti, declare, no*^{wi}*Ltujiim jpiJefiint^

Pag.201.col2.pt... Ltucumumjlygiifadp^ fummaps, C. 3. P. Et ibidmpL ... Uu^eiumji- lyjvtides dypeatum minus, C.B. P. & pi. i.,. Lrri- mum incanum filial, rotundi,, C.B.P. mm fat plant* filnulafc, „on debutre inter Lemma J,i- quo/a dffipont fed i^{nur} fui cnf^{im}u^u f^u(ul<fms ergo lapjui eft C«fi>aTU; Baubmm.

Pa-g.202.c0L2.pl. „ Ltucioium pahjrt fiert jubcamleo, C.B.P, Gladiolus pahjht, Cluf. Car. Poji. Hac plants tx defer iptiene Cufii n alia tea us accedit Ltacoiarum fumiinr, a fin* ultimo, nee fuUii^ fieri but aut empfulis JemiuaUbit; ; c rg9 male a Ca- fpATO BaubinocoUaeaturinter Leuraia-, acceditGla-

htntenumtrat pnala florum, ncflliqiU d-il,ⁿZ locutamentu aptnts expluat Clufin^,&^ £

7.Z Id lrIU^{mettm} " * / « « » » Ex*m***t Pöjhn ad quorum TManu, peewit plant* ipfe.

Pag 200, 2^B, 2⁰, ^{tf} 20)1 Ca^{TU}i Ba^Biniu collacal Uuceium Miauofum, Htfefidcmfiu^{vudm} matronalem, S Violam tunarial, flJafJ^ tuhfas tettapetalas bivalve, plahlts inter Viol* •iTipacularer(3 Lyihvidts nuicapfularej a quom

QHefrrrtdcSytolttanar,*; rtmittantur ad fit" quojn tetraptlulas.ficut nos prtjiitimu., UtolleW y' " C'jban Baubtni, <ju, babita ratwne n«- MJO ViAuum iifdrm non fine injuria Ltuoeia, tt'Jptndtt, <t Violai tungrm adjunxit.

§ I L I^v I^l Q U O S M
 J *>. Tetrapeta[^] bicapfulares.

C A' T' • V T IX.

HESPERIS SEU VIOLA MATRONALIS.

" y 10 LA dkitur Matronalh , quod a matjgnis in horths colatur[^] apud Plin'mm I. 21. c. V 7- Htfperif cenfetur, cum ejus flos noSiu magk okat, quod fu<£ Plmim trilmit, addens ide nomen inveniffe.

Hesperis, Viola Matronalis feu Damacena, eft planta tetrapetala, Lcucoik valde accedens loribus tetrapetatis , fed odore florumdiftert, prscipae filiquis 8f femine; filiqu[^]; enimi u..t oblongar, rotunda;, non compredii: ut Leucoiorumfiliquis, continences lemen oblon[^]um rigura, nonautem planum, comprefliim, ut in Lencioium (eminibus conrpicitur. Variac colore floris: eft enim vel alba, vel purpurea; eaqie vel flore fimplici, vel plenoodorariffimo; vel eft flore viridi & inodorato vel Allium redolet quæ Alliaris Authoribus dicitur, nobis auem Hefpeiis Allium redolens.

Pars T A B U L JE X.

Horten- fis flore	}	^Albo. 0
		1. Simplicij Purpureo, O j nrudi. Q Inodorato ⁷ Twl>ti. Hifpe.rufdvejlris ^^^Cluf.Hifi. O,
		^Albo. o
Hesperis feu Viola matronalh	}	2. Pkno) Odomtiffimo [\] { Purpureo. Q
		3 Montana flore pallido odoratiffano multa venulkexatro furpureis diftincto, nobhs. Jjf [^] er [^] i TM iff vmtaM, Chf Hifi. V if Peregrinafthquisarticuhths, C B. P, Hefperh Syriaca [^] Cam. Cluf. Hifl, <5 5*. SaxatilU flore ex viridi furpuranu filiquarum valvulk intergrnum inf granum conjunSlis, nobis. Leucoium cornicuUtumfaxatik obfoktoflorefoLQ 6. Sej>iaria Allium redolens, nohh. AHiaria [^] Trag.Fuch.Dod.Lob.LugciTab. Gtr.Park,J.B.Cbabr. \$

Explicatio partis Tab. decima.

¹ T ~T Efferis hortenfia, C. B. P. Hefperis 3'. CltiH Hil[^] Icon. Leticioium Diofcoridis? lbum A J_ & purpureom Fucli. Icon. Viola matronalis, Dod. Gef. Hort. Viola Damascena, Swert. Folia protrudic Hefperis a radice longa, fubnigra, lata, perambitumcrenata: caules eniittit cubitales 6f alcioresfoliis pnedifitsfiinilibnsfed minoribusornatos: floresefum-mis alitnmVirgis erampunc tetrapetali, Lcucoiis perquam fimiles, albidi aut purpurei, diluteye parpnrci: femina in filiquis bivalvibus oblongis & rotundis gignitur parvum, oblongum, duplici ferie proveniens, fepto medio membranco nutriente hinc unam, illinc alteram; colore in[^]ru[^]b fubnigrum: radices fubfnnt fibrofar, in medio validse. Naiciturin hortu a qdo fata eft anno, Maio & Junio menfibus potitllmum, non rarop^r totam xlh- ipres ejus & filiquae producuntK; hujus tblia gaktu calida Sr acia funt, Erucæ aut ponu3 i modoicuius quidem fpeciei yidetur: fapore & bcultate proximo. Semen acre faicum aut efens. Erucam, Tlilafpi, aia[qi]eliuiuscla[lisfiliquoias tecrapc: alas catidas & acres, gu-
¹ J un- niao iapit.
 >*«S[^]«-»hortenfis flore viridi feu abortivo, nobis. H#c magnitudine quoad 6mti2s fui tEcs avulgatadiftert, tiojeftviridi&wodoro. Hoccontingicqu,tfi ab abarcu, Iocop[^]a- lo'ium

Ionian prodqcit foliaviridia, quodconfpicitur in Matlicaria alrifque plurimis.

fkfreris inodora, C.B.P. Silvtftris 3. Ckthiit.Hax aa^'ovulgari in omnibus fuis parfibSp fi- niilis'tft,ut ex utriufque colhtione vix difcrimen tonfpici poflk ; l blotioris odore, cujd; in hacnulla gratia percipipoflir,differt. Excrefcitpaflim Viennenfi agro ad monthim radic«& viflteram in coilibus fitorum margines. Floret crpi vulgari, Maio ntrnpe'Sc Junio; dicitw «*• fperis filveftris.

3. Hefperitmontana pallida odoratiffima, C.B.P. Hefperis 1TM, Chif. Hift. i^{nna}& montana, CluCPaji. Harccabttali excrefcit altkudine, mukifque ramis pradita ell:, quos confiilo ordine ambiunt folia Violse matronalis hortenfis familia, paulo tamen lafioraSf craffiora, acidinfenlo primum guftu, pofttea acri, & falivam ciente: extremis ramis inoblongisped- culis infident flores, Leiicoiiaut Viols qairpnalis liortenfis forma fimiles, tetrapetali. r^{on} explicati fed in fe contorquentes, colons admodum ineleganris & obfoleci', hoc eft pailidi & furvi, infinitis venulis ex atro purpureis, fingula petalaintercitrantibus,' odore interdum exigno atnarib^a^{vix} percipipoiEt, fub vefper'am autem gratiffimoScfuaviffimo ; unicuique flori tctrapetalo fuccedit longa, torofaque, ut in vulgaris filiqua, ferme tamen quadrangula, inquadiipliciferie continentur femina(hinc indefeptomembraneo medio valvulas feparan«> Hefperidis vulgaris feminibus firmilia, fubruffa: radix fibrofa, qus utpluvimum bieii- jium non fuperat, fed poftquam defloruit & femem tulit perire folet: (1 tamen praecifi; caulibus adfrugem non pervenire finatur, nova germinainterdum producit. Variatcxfe- imnenata; nonnullifloies maternim colorem retinent, alii aut dilutius pallefcunt, aut niagis obfoletum acquirunc colorem, crebris venis exatropurpurafcentibusdifcurrentibus.

4. Helens pcregnna filiqms articulatis, C. B. P. Hefperis Syriaca Caroeraju <"luf Hift- Lcucoiummelancholicum quibu(dam; Hefperis Syriaca, Rauwolfii. HocHefperid'is genus in Syriajnaritimiscrefcit, cujusiemenin Italiamallatum, deindeViennammirTum, plantaspro- duxit Hefperide montana odorata multo vgetiorcs, ampliora habentes folia; craffiores cau- les, majorefque flores tetrapetalos, ejuiaemetiam cnm Hefperide montana odorata coloris, id eft colore tufc«& Incido multis venulis per eorum petala difcurrentibus, fub noftem valde oxioratos, mterdm odons expertes, quibus cornicula multo craffiora, longa, torod, recurva, fucefferunt, ahoqui fupenomcorn.culis plurimum refpondentia, femem ridem fimile conti- nentia, led panlo craffius, quod maturefcere non poCuic, quia tardius florneninc plant*. Al- tero etiam anno penre foletetisradix.

5. Htferit faxatihs flore ex viridi purpurante filiquarum valvulis iucer granum & graniim conjunftis, nbbs. Leucoium corniculatum faxatile obfoleto florc, Col. Hajus radix craffa, longa, toris pulla, intus alba eft & ncrv«fa: caulis vero femipedalis, vi- ridis, hirtutus, duabus alls divifus, -in quarum fummo flores alcernatim pofiti, Leucoio fimiles, hirtuc'is calycibus exeuntes, obfoleti, colore ex luteo viriHi-purpur^nte pa- rumodori; quibus filiqua: producuntur ferme trientales, hirtuca!, nodofa; cornicuil' t*, intevramreflexs, fex autfeptem diquando plura, femina intus habentes, fingulisval- vnlis contenta, binae funt Leucon modo: iolia innnolongo petiolo, divifura Papaverisma- ritimi vel etiam Leucoii mantimi, in arenis orti, hirtuta, craffa, velutiHyofcyamialbifoliis(i- milia, fed quadruplo minora, prope caulem latiora. Maio floret, & Junio filiquas perficfti • in (axis & rupibus imo&vallis foli expofitis. Sapore dulci calefacicnte Raphani fere iⁿftar Tota planta odore gravi, noningrato. FabiusColumna faxatile vocavit, quodinfaxorumrim- mis^prarfctimquevetuftorummceniumCampoclarenillumreperiatir, & utaliquid proprix& peculiaris diverfitatis exprimeret fie defignavit. •

6. HefpervAllium redolens, nobis. Alliaria, Trag. (cui & Thlafpidium Cornutum) Fucli- S S t J i i f f I f e ? " ? " * ^ B \ Chabr - AdAlliifocietern Herbah^Alliari* congruens, r(i) omnino difterens & diverfa «««, Wo odore ab quidem contrita tota planta Allium omnino redoleat. Folia autem hu l aga funt, dilute vi- rentia, & subrotunda, ambita incifa, ac in acutum mucronem definentia: caulis tenuis ca- bito altior, circa cujus ramulos fuperne gignuntur flosculi candidi, tetrapetali, quibus fuc- cedunt filiquz tenues, parvæ, oblongæ, in fe femina exigua, nigra, duplici loculamento con- tinentes, fepto m medio membraneo feparata: radix oblonga, tenuis, duriufcula. Prope horto- rum fepimenta, veteres muros, fecus vias, vel ad pratorum margines frequenter fponfe lua provenit. Flores hujus Maio aut praecipue Junio vident; femem paulo poft perficitur; Martio aut Aprili folia ad condimenta adhibentur.

TEM.FEJ1 AMENTUM & VIRES,

1. ~~Heperis~~ ^{Heperis} feu VioU Maironalis fuccum Iflorihu* exprefum, cum aiis, infyrupo magiftrali O,omitiff<z pdefcribfr Weer de Scorbuto. ^Sunť autem VioU matronalis folia guftu quidem acriaacalida, Eruc<£* cujm videtur' frecih Dodonjo, fapore ifacuhate proxima. Matronakm porro Violam tuffi, convulfis is difficult er fair antibws mederi traditur apud Clufium, urinas infuper is fudores propellere, wcidere , abftetgere is digerere.' Semen a-cre fufcum aut ruiffefcsnsj Erucam, Leucoium, Thlafpi, guftu omnino fapit % idcirco iifdem affink viribus putatur Viola Matronalis.

6> Heperis Allium redolens, nobis. Excalefacit ac ficcat Alliaria, fed multo minus quam Allium. Alliaria dicitur, eo quod folia digit h comminvm Allium feu Porrum feclivum cum Nafturtio fat'wo redoleant quibufdam, Tblafpidium fecundum Crdtevd: * aliis Akttorolophos Plinii I. 25:C.,.5. Alliaria urinam cit, teſte Ruellic^ fi recens in potu teratUr; ficca in vino coquitur ad ferpentum itlns^ ad venena omriia eflicax % in roſionibu* ftomachi^dyſenteria-, contumaci-bus minis, ex' mulſo duobus denari'ps datur bibehda, lentam pettorh craffitiem digrit. Contra veterem tuſſin, & cum reſtna is' melle ficca lingitur. Podagras acri aceto circumlitas mulcet. Impoſita menſes excitat. Vlcea vetera purgat, is' ad cicatricem ex melle perducit. Recentia quoque vulnera cogit faring Alliancē conſperſtis. Vis huic plant* calefacloria is defic-tatoria, verum non adeo vebemens, ut in Allio. Attamen hinc certo colligi poteſt, quod ea eraſſos humores extenuare is' lentos incidere valet. Semen Emplaſtri modo impoſitum, Tſuſajeque ad motum^ mulieres frangulatu liber at is excitat. Herbam in oleo is aqua deco Ram is potam^ ajthmaticis ſubvenire ſcribit Camerarius. Sunt qui Uodon<zi teſlimonio folia enematis inco-i-quunt, qu<z vel ad coli, vel nephriticos dolores' injiciuntur, in quibu* non modo flatus inſigni-ter diſcutere, fed ex calculo dolores mitigare aceſpire feruntur. Excalefacit autem is reficcat fecundo or dine intenſo, tertio % autem remiſſo. Alliaria fingularem vim ac proprietatem, qua pu-tredini adverſatur habet, eademque ulcer a putrida ac fordida abſtergit is mundificat, minore tamen cum effiacid, quam verum Scordium. In exſiccata herba parum facultatis is virium re-manet: idcirco earn in fine Aprilis aut ineunte Maiō colligi, iy poſt quam per diem unurſi aut ala-rum in umbra ſere exſiccata* a'uiminutū wridi, nut continue in mcartario is, *rs!o, 'uccu* ex^nl folet, qui invitreis ampullis ſuperfuſo pauco oleo tiamin artnoſtres reſervatur: idem quoque Juccws fariagini inſuſu* lento igne inſyiffaripotef, is adeundem ufum in multos annos reſervari. S uc cut five fitpkx five inſyiffatws unguenth cataplaſmatifque inditur ad gangr^nam^ aliaque ulcer' aputrida, for-cUda^ac maligna, utiin traffatu Fabricii Hildani' deGangr^na is Sphacelo videre eſt. Abſtergit enim, ut antea monitum, mundificat iſputredini reſiſtit: parumque a vero Scordio diſcrepat.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Author um.

T> 4g. 102. col 2. p. VL. Heperis ptegriya Jlliquis
~~Gritculum~~ ~~C.B.P.~~ ~~Leucoium~~ ~~Syrjacum~~, Cam.
Hort, Heperis Syr^aca Camerarii CluJ. Hiji. Leu-
coium melancholicum quibusdam. Helper is Syriaca
Rautvolſii ab hac non videtur aliter differre, quam
quod Jhiojior'it, ,quod forte ratione loci eontingit.
Male dicitur hac Heperis peregrina eſſe Jiliquis ar-
ticulatis, cum Jit filiqua longa donata, bijiis valvulis
conflata: nam filiq-ua articulata dicitur, qtiandoper
iuternodia. exſiccata filiqua ruptii ejbfaclis, & in
Jinjhlis inter nodus' feu articulis unicum confine tur
feinen, quodaon conjpictur in Leucoia Syriaco, Cam.
Cluſ. jtiiſi- Ergg^nals nominatur Heperis ſtliquis ar-
~~ica~~ ~~ria~~ ~~G~~ ~~aro~~ Bauhinp.
Pog. r. 12. coli. Alliaria, C.B.P. Tragi Fuch.

Matth. Dod. Lot. Tab. Ger. Par^ J.B. Cbabr. Ma-
le ab omnibus authoribts hie citatis denominatur
Alliaria, quia allium redolet: cum enim not a ejus
generic a Jit habere fdiquas bivalves, bicapulares 8?
longas, fuccedentes fioribus tetrapetalis alby, debet
generic ad Her bos Jute clajjis filiquaf'as tetrap eta-
las reduction autem collocari ante Cochleariam^ique
ajfbciari, cum Cochlearia fit plantaſticuloſa, alli-
aria vero liliquoſa : deinde odor non facit ad genus
conſtitue'ndum, jed ſpeciem determinandam; cumque
generic propins accedat Heperidtim claJi, Heperis a
nob is dicitur ſi odqr Allii inferviet ad tale m Heperi-
dum ſpeciem deſignandc im, & fic aptius Heperis All-
ium redolens, nobis dicitur, generic, mea opinione.

SILIQUOSAE

Tetrapetalae bicapfulares. !**

CJT VT X.

DENTARIA.

DENTARIA q radish forma is cefyre nominator, qu* tanditipma ex plurihmff[^] mis, quafi dentibui componitur; quibusdam Coral/cL'es is Ahbafrites \ fun! 4''' ^[^] Violas referant: alii inter Solidagintsis Sympbytax alii inter Saxifragias: alii inter Sarikv[^] recenferent: AnCeratiaPliniiLik. c 8.

~ Dentaria est ptanta filiquofa tetrapetata bicapfularis, quaf nota hac peailia-i a exterv clafTis diftingyitur, quod radices producat tuberofas per juxtapofitionem, adinihr latifolii, aut ex plunbus Iquamisdentes albos referent!bus, SfVibiinvicem inftar tot a larum incumbent!bus, confmiais. A numero foliorum pedtculis innitentium dividitur in triphyllon, pentaphyllon&enneaphyllon;denique est Ptarmics folio, aut prxter filtquns quas producit bivalves, inluper bulbilos Jerr, pod us d;Xerim (oboles tuberofas,ex quibus terra commiuis novellas producit plantas; atque hifce notis primo in genere differt a cffterb omnibus fltqi'ofis tetrapctalis bivalvibus,&rpeciatim,tamfoliis,qaamproduaionefobo'iuia in ahs, facile inter fe cognofcuntur fpecies.

Pars T A B U L I X,

fi.Tripbjlios, C. B. P. Dentaria ^ ^ a 5. Cluf. Eift. Dentaria cordloide radice,
Ger. Dentaria trifolia, Tab. 0 .

2, Pentaphylls, C. B. P. Dentaria VI. ^{TM T ^ M © >} .1. Cluf. Hill O

Dentaria ' »' f⁷ TM ^ ^ 2. Cluf. Hi/?.. 0

*,Heptaphylos,C.B.?. Dentaria VIII. f W p ^ , Cluf Hi/I, is Pan.. 0.

5. Heptaphylos fobolifera, nobis. Dentaria baccifera, Cluf. Hift. 0

{b^Sobolifera folds Ptarmka, nobis, Anguflpliabauifera peculiars, Eyft. 0

Explicatio partis Tab. decim*.

X^{T*} Entaria "iphylls, C.B P. Dentaria i&u*®. 5. Cluf.Hift. Dentaria trirona . ao
tJ Dentaria coralloide radice, Ger. CeratiaPlinii. H^c Dentaria i> czuiemw^cn rJ-
dalem, firmum, rotundum, bvem , quem in fummo fere ambiunt term pediculi (rariffime
plurcs) finguherna folia fuftinentee ampla.mucronata, in ambitu ferrata, faturatevirem
tia, guftu fervid*; fummum caulem exornantqoiniantfcniflores.tetrapecaLDentaria'hc-
ptaphylk amili deorfum fpeftan.es feu propendentes, colore CK herbfceo pallefcete:
Mores iic conftruftos fequuntur longa eomicdl, torofa, mucronata,qua^ali^a funt Dentaria pen-
taphylk Sc h n a p b h cormcula, d est duabus valvulis constantia, dupllcen, Li femi-
num feptomedio dirwwnte feu feparante: femina Hesperidis ferefimlr fed^ff

t?^a^rafXd4

tia, fupeS K l » a ^ P n f 7 h t e TM Unt T infin nli^bloggis pediculisnafcen-
fi -kisart^r^C ilofiti^ con iffa

etiam circa mediam partem regionem, ubi ad X[^] & distltiaa, Ut crhm eX
hujusmodi definirer solent. Inveniebat Carolus HT arborum fil^ ut plurimum in A!
imminere, cum quarto genere bulbifero 3C f fiam S etiam ulera D^V "n l in nionte ^
Floret Aprili in "icinis Viennse Anftriara fil x " ? H >rcinia fil^ va Boliemiam ambi
Maio, atinmontibustardius floret &f^{emi} r^{is} allisnumilio nbus. Semine prsgna sei

2. *Dentaria* pentaphyllos, C.B.jp.Cam.Ger. *Dentaria* VI. Trent^u/M^u, Cluf. Hift. Secun-
4^u hu^c noftrc a radice nodofa §fin plurimos articulos diftin&a, tenuibus aliquot fibris ex
J tkulorum interfittis prodeuntibus doiatã., exeunt aliquot folia kmgis pediculis nixa, in
linque profundas, & ad pediculum ufque fe&as lacinias, in ambitu crenatas divila, fcabra
ta&u afpera, faturate virentia; caulis p^uJalis& amplior, rotundus, quifc>ufdam ex intervallo
foliis fuperiore partedonatus, fummo faftigio quinos aut fenos flores *Dentariar* bulbiferslori-
bus fimiles gerens, colore tamen magis faturate purpurafcente, quales fere *Violas* latifolix non
vivacis, .quam nonnulli Lúnariam Græcam appellant, quibus fuccedunt Iqpgiora cornicula,
temine quãle habent quarta & quinta Clufii plena. Reperitur ad Allobrogicarum Alpium
radices, fupra Lemanum lacum ffonte nafcens, teftè Clufio. Floret eodem tempore cum p^uæ-
cedenti.

3. *Dentaria* VII. *imnxxpufo*. ©*) -2. Cluf. Hift. Hujus radix magis eft dentata, leu inaeq^uali-
bus pluribus & crafiis fquamis, quemadmodum fere *Dentaria*; majoris. I^u*. Clufii radix,
exafpei ata, &r raris fibris inter illas nafcentibus prafilita; ex .qua prodit .caulis rotundus,
pedalis, in quo per intervalla prima folia longo pediculo fubnixa^u. longa, in ambitu ferrata-
arallioraquanTinfuperiore, nequeadeo faturate viridia.: flores in fummo faftigio *Dentariae*
V I. ^uEvap^uMv Clufii floribus perfimiles, quatuor videlicet petalis in firigulisfloribuaLeucoii
florum inftar confantes, colore fexta? Clufii non difpari. HascV II. Clufii, tertianobis, Ma-
chlinip nafcens obfervabatirincultiflimohorto Johannis Bta^ucionis, ex Allobrogibas acce-
pta, quam a radice dentata *Dentariam* appellavit Mattfiolus.

\ *Dentaria* heptaphyllos, C. B. P. *Dentaria* VIII. # €W<puA\Sh, Cluf. Hift. & Pan. *Viola*
dentaria. altera, Doci. *Dentaria* major, Caef. *Dentaria* alters, Tab. Alabafntes altera, Lob..
Quarta ha^c noftra aliquot a radice pfotrudit folia, maxima ex parte feptena, longxcoifè in-
liasrentia, foliorum Fraxini inftar digefta, hoc eftut ex adverfo bina Temper refpondeant
& folium impar extremam alam occupet; oninia in ambitu funt ferrata, tlilutius virentia
quam fextaeClufii folia, & fubtus candicantia: caulem etiam pedalem, rotundum, binx aut
ternas foliorum ala^u, iis quae a radice prodeunt non diillmiles, ornant: ad e)us autem faftigium
nafcuntur flores fuperiorum floribus pares, tetrapetali, candidi tamen colons-: cornicula fuc-
cedunt etiam parta, fimile*femen continentia^u radix minus fquamata quamfeptima? -m^u<pvK-
xsi fecund* Clufii, 8r quintas 10.?)MV fere refpondens .:& hujus %*lius radix confat tupe-
ribus per juxtafotionem conftruftis adinfar *Iridis* latifolize, non autem fquamis diftinclis
ut feptima *Dentaria* ^r^uM©^u fecunda-Clufii.

5. *Dentaria* •heptaphyllos fobolifera, nobis. *Dentaria* baccifera heptaphyllos, .C.B.P.
Dentaria baccifera, Cluf. Hift. & Pan. *Dentaria* bulbifer*, Lob. Icon.; Cam. Ger. *Den-*
taria feptifolia, Ger. non emaculati. Hxc oblonga ferpit radice denfata quidem, fedvelut
ex mi^utis nodis conftante, alba, interdum etiam purpurafcente, fubinde ex lateribus no-
vas propagines generante, ingrato&^irmirn ficcante guftu, deinde acri, ex cujus lateribus
prodeunt obloho pediculo (qti fecundum terram purpurafcit, .poftè viridis eft) ihhas-
rentia folia, feptena, terna, fcilicetex'oppofito cofts adhaerentia uno impari feptimo extre-
mumcofl claudente; omnia funt crenata: exmeolio radice emergit caulis fuffinens qua-
ternos, quinos, flores tttrapetalos, Leucoii aut Heperidis florum quidem semulos, fed mi-
nores, quatuor petalis albis, autexcandido'purpurafcentibus, praeditos: quibus fuccedunt
filiquae feu cornicula, Sinapi corniculis familia, breviora tamen, bivalvia, fepto medio pelluci-
do duplicem feriem feminum dividente, quaeuna cur%uis pediculis marcefcentia plerum-
que decidunt & pereunt, nonnunquam tame.n craffefcunt, & matura femina ferunt Heperi-
dis femini fere par quod difilientibus corniculis excutituf, fed prater id femina quod in
filiquis fert, ad fingulorum fere foliorum, quae caulem ambiunt, alas, feu exortum, tuber-
cula quasdam adnafcuntiiir, bulbulis .Lilii cruenti illius quod Martagon bulbiferum vulgo
appellatur hau^u abfamilia, ac yeluti e fquamis compafta, initio viridia, deinde pulla, in-
grati admodipi guftus, qu32facillimedifcutiuntur& prematura ffonte decidunt, terraque
d ^ t a tioyellas plantas gignunt. Reperitur hoc genus in omnibus Germanise filvis mon-
tanis. Nam meminitCarolusClufius eruiffe bulbulis Ibis onuftumanno 1548. in filvis HaTia*
nonprocul *Markburgo*, Reperitur & in M\$ia. Florere folet Aprili. Bufbuli nigricantes
Miiio confpici folent, alarum cavis inter folia & caulem inhaerentes.

^*Dentaria* baccifera foliis Ptarmic£, C.B. P. *Dentaria*anguftifolia baccifera^u peculiaris,
Etfrit. Eyft. Radice confat oblique procedente, multis car.nolis, dentatis, fubalbicanibus
at^uticulis coagminata, indeque propagines fundit,- atque caulem unum aut akerum erigit ro-

tundum, hevem, cubkalem, circa qnem arfta fede arti^ulatim fofia longa, laevi modo tenuiter ferrata, in acutum mucrotiem finientia pVriguntur, faturati viro; exortu'm fingulorum in geniculis ipfis foboles", feu improprie magis loquendo bulbuli craft fquirruti, iubobicurepurpurafcentes. Flores incacumine emicant tetrapctali, albidi, fafr^ cuhtitiidifpofiti, HQibus Leucoidi knati Bulbon^i fen Violaē L<nari3e~ Graeca: difte<W> miles. SeminanonviditBefierus(authorHiftori3e"Eyftettenfis)incorniculis; led cornicu] contormia, &femina paria, compreiTa funt, qualia confpiciuntur in Dentaria baccifera"" ut conjecturam^cit pradiftus author. Anullo prater ipfum edita eft hujus Icon..

TEMPERAMNTUM & VIRES.

Nuttas Dentariarum facultates comperit Cat. Clufiui prater ifias, quas Vlenenfes mulkrtuU DentarU baccifer* attribuunt, nempe quod e#j radkk decoctum pueris tormina patientibus propinaium utik credant, tutde nome&ab illk plant*, inditum, is quas MathtwtutDentti' rUptntaphyllo adfcrit commentarijs in Diofc. 1.4. cap. de Symphyto meminit, nempe in f&i' cnibits adenterocelas uterlnaque vulnera, pra/ertim ad ea qua. thorach cavitatem fenetrS- rutit*radices prodefit.

HALLUgWJATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

P ify. Uz. Dentaria male totlocatur fyaro hauhirto inter CaTyopbyiUtam & Epimedwm Paotiiamvt, cam ^tiibtis- ntlarn babet affinitatem. Ejitnimpantafhquofo tetrapetala bivalvu; trgo

diltt amandari adconfortesfuat pJantsj, L<uota & Hefteridet, quippe JMquofas titraptalm bivalves, pag.202, 8 203.

S I L I Q U O . S Æ

' Tetrapetak bicapfukres.

" C A T V T X L

C H E L I D O N I U M MAJUS.

XEAIafiii Viofcoridi 1.2.c.2it.cui •&*tii, idfflJ&undoavis, nommimpofi bane berbam pnmurn invtmrit, cailit fulhrum exweatorum vifum hac refihuens, ut exDicfcoride Pirn. 1.25. c. 8.. reftrti velut ideml.Z.c.zj. Cklldcniam viftti falukrrimam hirundines monftravm^ vexatfc pullorum cculh eamedentes: quibufdam ficdiftum, quo#inhiruK' dinum adventuflonat, isr difceffu mamfcac. ApudTheopbrafl.7. &ft. 14, Hirundinariam Gaz* vertit*

Genera duo Dicfcondiist PlinJ. 25. c.8. maju*, {sr min^qu^cum figuraisnaturamultuft differunt, de minort Seftwne quarto. apemus,

Chdidoniuhi majus eft planta fihquofo tetrapetala bivalvis, at non bicapfularis, quia de- Utmcur fepto medio membrane© dirimente duos verfus feminuro, & hac noti à cteris o- mmbus tetrapetaljs filiquofis pr^diftis quam facilimediftingoimr: infuper a fucco luteo ft<

5?TMIA1^3^^;S^eJ5r4^"?I«a«mnante diverfum omninogenus i «terispi»- fit Ranunculi fpecies, de ipfo inter Ranunculos Seftione quarta tractabitur. Chelidonium majus filiquofum tetrapetalum bivalve, non autem bicapfulare, eft. Vél eft Americanum aut Canadenfe, vel noftras; hoc trifariam nobis dividendum venit à latitudine vel anguftia fo- Uorum. De Chelidonio maiore tetrapetalo filiquofo Americano primo loco dicetur, deinde de Chelidoniomajorenoftrate, ejuſque divifione à foliis defumptâ.

Part TABULA XL

U. Maximum Canadense £*«**«, Cornut. 'defer. Canadense JWVM, NTA, pag. 617.
 <ty*. to- eidem *Ranunculi Vidimus albus cum figurapag. \$26. O . -*

Chelido-
 nium

Majus nostras

- f. 2. *Vulgare, mbs. Cklidonium majus vulgare, C.B.F. Cluf. Park-
 Majus-, Dod. Ger. ©*
- 3. *Majus foliis quernis iff fore lariniato, nobit. Majus foliis qiternk^
 C. 6. P* Majus ladnimo flore, Cluf. Hift. ©*
- 4. *Foliis tenuiffime MjfeSis fumar't£ Myconis injlar, nobis. 0*

ExplUatio parth Tab. decim<£prim£.

r, l'~N *Helidoniilm maximum Canadense* a««Asr, Cornut. defc. *Chelidonium maximum Ca-
 vji nadenfc acaulon, Park, defcriptione pag. 617. eidem Ranunculus Vitgineus albus
 cumfigura pag. 526. Egregia hscplanta,-five Americana five Canadensisnaminetur,perpau-
 is confat foliis, longis pediculis ex radice originem trahentibus, amplis, rotund is, glauce
 virentibus, fir Vitium fciliorum modo laciniatis: radictm habetcarnofam, ut Sf folia fucco tia-
 vo aut aureo virus quoddam olente turgida; fi qua;libet ejus pars rumpatiir, illico prsdiftus
 fuccus emanat, quemadmodum fhecus albus, aut la&eus diftillat ex Tithymalorum aut Ficu-
 Tim, multarumque aliarumherbarum partibus ruptis aut abfeiflis. Succum inquam faftui-
 dere aureum, folis Chelidoniis majoribus inter filiquofas bivalves familiare eft. E radice im-
 mediate orUr pediculus brevis, wnuis, fubrubs, fultinens flores albos, ex plurimis pc-
 talis conflatoWeluti Cyclaminis flos;brevi pediculoexit, undeei nomen <U**tf. Huic Cheli-
 donio deHorefcenci fupervenit filiqua bivalviscraftiorfeu fpiffior fine feptomediocontinens
 multa femina, majora feminibus nofratis Chelidonii majoris. Appofite fatis illi Chelidonii
 nomen inditum, cum a fucco aureo pari emanante expartibus ruptis, tum etlam a filiqua
 bivalvi,non bicapfj^lari; porro, quod Tiirundinum adventu floreat- Provenit fponte in
 America occidental!, five in Virginia, five Canada, unde feminaadnosdelata, quibuspro-
 pregata ejus foboles abundanter fatis in hortulo fuburbano Gulielmi Walker non longe a pa-
 atio *Vivijacobi* fito, in vicoejufdem nominis *Jacobeo d5co.**

a. *Cklidonium majus vulgare, C. B.P.Cluf.Hift. Park. Majus, Match. Trag. Fucli. Tur.
 Gefn.HOrt.DOUAd.LOb. (cui&Hirundinaria major,) Caf Lugd.Tab.Ger, Hujus Che-
 lidonii mai*ri= "inliculicobitales, graciles,»teretes, geniculati, ac nonnihilliiifuti, in non-
 uuntur: folia plurlaalata, in atnbitu crenata, coftae medix adherent, Ra-
 ^foliorum jemula, majoratamen, teneriora aclxviora, cificolorevirentit:
 uumms cauculorum i'afigiis brachiatis, apparent flofculi lutei, tetrapetali, cum ftami-
 nuliscjurdcmcoloris,Leucoiifimiles: fingulisfingul2fucceduntfiliquaEparv3;bivalves,quod
 notacadignum, fine fepto medio difterminante hinc inde feniin3&ut vidtre eft in pndiftiso-
 mnibus hujus Seftionis bivalvibus: in hifce filiquis bivalvibusapertis apparent femina mul-
 ta fublutea: radix brevis, intus forifque Croci colore, fibras a grandiore radice coiicolores
 etianulemlteit. Toca herba graveolens eft, & quacunq; parte lafa aut vuluerata fiicciini
 lutei'coloris acrem mordacemque ac nonnihil amaritantem fufFundit. Locis gignitur incul-
 is fecus vias, infunimismurorum cake conftruftorum, in vepribus & circave:eres muros
 ;:ilce idificacos, melius &c felicius in umbrofis quam apricis proveniens^ Toto anno viret, ab
 \prili menfc in nutltam sftatem floret; filiquae interea perficiuntur. Dicitur ^At^iw* non
 juod ab adventu ^^niv, id eft hirundinum, demum proveaiat, aut abeuntibus tills percat,
 mm utidiximus toco anno v i rens repenri poteft, fedquia excarcatis-pullis hac her^a niatres
 eftituere vifum inopinioneft, fed tamen vana &a veritate alicna.*

a. *CkdidSnium majus laciniato flore & foliis querni^, C.B. P.&Prod. Majusladniaroflo-
 ef Cluf- Hift. Majus laciniatum, Park. Majus folio nfacis diffefto, Ger. Clulidonium folio
 laciniato, J- Bi Chabr. Hoc a vulgari majore Chelidonio" non differt nee formj, nee magni-
 Cndine; iblavarietasdeprehenditnrintbliis,^quKtenella& longecenuiter incifa fane, & rio-
 Tibus alii ejufdem cumvulgari coloris, fiavi videlicet; tetrapetali enim, non quatuor petalis
 ijr in vulgari integris in fiore, (ed per oras laciniatis, conftant: his fuceilunt Jonga corni-
 calafaris craira, abtquetenuimembranafeparante femina, ficut in pradifto vnlgjajrima}6-
 . nigroTcmine fplendence plena. Tota acftate Horet & femina perteit, qaemadmoduii*

vulgare; femine ffonte decido ante brumamrenafcen| Vulgaré Gratis dicitur 5<,Latinis Chelidonium majus ut di&um, officinisChelMonia.* hoctertiamnominari poteft Chelicfonium majus multiiido folio.

4. Chelidoniummaj.usfoilstenuiflime diffe&is Furaarix Myconiinfar, aobis. Solâ foiiorm minuta dirifione feu incifione differt à fohis qu/fnis donato, nam flores fert laciniatos Htidem, quare ex femine Chelidonii foliis quernis donati creditur effg'degener planta, quia femex Chelidonio hoc foliis tenuiffime divifis colle&um, & a me 'fatum, Chelidonium foil is quernis faciniato flore produxit, atque priftinam recuperavit & formam & figuram quoad omnesfwas partes,. quodindicat effctantum lufum naturæ, nam oportet femper eodemmodo fe habeat ad diverfam fpeciem confituendam.

TEMPERAMENTUM & VIREŚ.

Chelidonium evidenter cakfacit & deficcet.ordine quidem tertio, atque fimul valde e'xtergit •, fuuws herb* ad vifum acuendum utilis eft, abftergit enim isr difcutit crāifa, qu<e eirca oculi pufdlam htrenj: aciem obtundent 1 a, & quidem, utDiofcorides ait, in aureo va/e cūmelh deco-, Dus: radix r'egio morbo medetur, & prefertim citra febrim exfellis obftruftione nato : apent enina, isab injbr. u de camf ! hafi y jecclib eta . Manducata eadem radix dentium dolo- res ffdare fertur : predest is ulceribus cura vino fuccus è foliis, caule radiceque ineunte æftate, ingus Diofcorides, extrahendus, atque in umbra ficcatus in pastillos digeftus. De Chelidonio minore hoc experiebatur Car. Clufius, hujus fuccum in levia quacumque vulnera recentia in ftillatum eadem fanare.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

P^{4g.i4;} Cajb. Baubinus cottocavit Chelidonium ^Funnriam pag. 141, & H4- inter Gmjolidam ^akm^ Aquilegiam & Nigellam, qu<e neeflonbus ^c Jiliquis convenient cumjiliquofis tetrapetalis bivalvibus , ergo * & *f' & fait ipje Cajfi. Baubinus, nee obfervavit regulas affinitatis & cognationis, dum difpmendas jungit, & Jeparandas conjungit, ut hoc in loco plntas, a fine ultimo diverfas, conjungit.

Carolus Clufius in defcriptione Chelidonii majoris laciniatoflore ^foliis quernis Jc ait, femine ffonte decido antebrumam renafcens, & ipfius fuc-

cum confefvans, nam fingulis annis produ&o fe* njine perire arbitror, cujus contrarium ctnitur: nam durat in multos anno^ (3 fingulis annis {emin* copiofe fdis edit. Et paulo ante, ibidem, floribus deciduis fuccedunt longa cornicula craffiufcula, tenui membrana divifa, inquit idem dottijjtmus & folertiJimus. Clufius; faUit hrc etiarn Clufim, nam ntlumconfriciturfeptum medium, nee znMjnsne* aue maior!svulgaris Chelidonii fiUquis cornicuhfve, ft cuillbet intuenti & obfervanti clan apparebit.

S I L I Q U O S Æ

Bivalves, & alias, variae filiquis, floribus autem inter fe tonformes.

C J T V T XII.

F U M A R I A five C A . P N O S .


F V. MARIA 7 K*:mU Diofcoridisl.^c.ii.ideofic dicitur, quod bmb* fuccus oculist ditiiff, injtarfumiocuhs molejtando, lachrymas moveaf. Genera: Diofcorides unius ff^e purpureo mmmixt at Pin.l.^c. 13. Capnos duplex eft, prima autVeslallmacem vocatun i\$ alter a Capnos fruticosaj illam Fumariam bulbofam, banē vero Cātnoh Viofcoridk cenfem^.

Fumariam propter affinitatem in filiquis; bivalvibus fine feptōmedio cum Chelidonio hue i nieriimus. Pro nota genençā hanc, habebit, quod omnes Fumaria: flores producantfimi- les; etiamp;caplulas luas feminales diverfo rnodofonfruftas edant plurima: . Omnium Fu- ri "hXnr ZZ^ZT^ CU)ufcunC,ue fint m^gnitudinis aut coloris • omnes enim Frma- q uales; funt enim v< natos antecius, cum calcari obtufa polterias, & multis modis variant. pendul. vel niiores rotund, ere,,, l ^ ^ ^ f ^ ^ & ^

don an-

x radice fibrofa, vel tuber. Ma: ratione durationis vel sunt perentis, Vel annux, autem Fumariae propter fblio/um fimilitudinem & difpofitionem, & florum omnimodam conformitatem, inter fe convenient: > flores enim pediculis eXmedio pendulos habent, quibus fuccedunt diverfiformes filiquae feu capfuls feminaies, continentes etiam femina diverfermia-, quae font vel "bellucida, nigra, velviridia, ruffa autfufca, vel denique femine Lini: de quibus omnibus fingulatim infra dicenras"4n hoc capite.

TABULA XII.



Explkatio Tab. decim#fecund&

Fumaria filiquofa fempervirens, Corn. Pumaria Americana filiquofa fempervirens,

X Park. In America feptentrionali dix Fumarias fpeci^s nafcuntur: alteiufemper virer; altera autem elapfo vere difparet, tamen viva radix fub terra adolefcit, & tefta terrae tepore propagetur donee fequenti anno repullulet; quo fit, ut prior fpecies videatur Fumariae noftratis fortis & conditionis, cujus tarn frequens in medicina eft ufus: tuberofam vero referamus ad eam Fumari\$ fpeciem, quam herbarii Radicem cavam appellant. Prima itaque filiquofa re&a furgit, caule pedali, rotundo, glabro, tenui, velut cinere a fperfo, qui levio re taftu facile deflorefcit: in foliis cafius tevor, & divifura fimilis vulgari^ amplitudo tamen eft major, reftd enim afcendit, nee procumbit; folia brumale tempus non metuunt: cauliculi alacim pullulant; floribus inapice fpicantur Radiciscavse fimilibus, colore autem diverfis; horum enim fanaliquulus carneo, os autem feu ri&us patulus fulvo aut aureo fplendet colore: fioritus fatifcentibus fuccedunt filiquae longae unciales & fequiunciales, falculas in modum ab initio contorts, poftea reftse pendentes & flavescentes mature: in quibus la rent femina plurima Milii feminum modo compreifa, rotundiora tamen, nigra, una ferie fine fePtomedio membraneo ipfa feeparante, quemadmodum in Chelidonii majoris filiquis o^jfer vatur, atque illisinter omnes filiquofas tetrapetales herbas folummodo hoc convenit: radix Sus'eft fibrofa & Fumariae vulgaris radice magis capillata. Planta haec acris, -amarae fimil qualitatis eft particeps, unde efficacius ea quae defcripta eft a Dioicoride urinamcierepoteft, fimul-

fimulque biliosos humores educere: dentibus attrita & ore diutius contenta salivam promovere confaevit; succus oculorum caliginem discutit: ita in medicamenta oculorum addi potest, ut vulgaris Fumaria. Fumaria Latine, Graecis ω dicitur, a fumo, inquit Plinius, de herymationem facit seu fumus, si oculis ejus succus infunditur.

2. *Fumaria* filiquosa bivalvis radice fibrosa latifolia perennis humilior fine claviculis flo albo, nobis. Hinc plunima protrudit folia lata / glauca, ex albidocolore dilute virentia, ex quorum gignuntur cauliculi dodrantales, gerentes in cymis spicatum plurimos floculos aibos, magnos iatis, forma ceterarum fax. Irbtis Fumariarum; quorum fingulis fingulae fuccedunt Jiiiquaj bivalves femina quina, fema, in se continentes splendide nigra: radix tftp^r-enn*: nbrola, lese post femina ad maturitatem perduca perpetuus ex feminibus decidui?, ngnwque annis novos cauliculos protrudit & diu durat. Semina hujus nobis fuere com- nunicata ab Alexandra Balam ex Mauritania fingitania, ubi sponte ere/cere obfervavic idem cirtus Alexander Balam.

3; *Fumaria* claviculis donata, C.B.P. Fumaria latifolia alba capreolis donata, nobis Fuma- maria latifolia alba, Park. Hist. Lugd. Fumaria cum capreolis, J. B. Chabr. Fumaria alba fe- tifolia, Gtr. Fumaria altera, Dod. Capnos altera Belgica flore albo, Cluf. Hist. Capnos alb? miiolia SeSphth album quorundam, Lob. Haec variat a ceteris, foliis latioribus, fed & a- liquando paulo angustioribus: floribus est aut aibis seu AaxoTs & aliquando dilute ad- modum rubentibus. Est haec Fumaria admodum tenella herba, fed altior quam vulgaris: cauliculos profert perquam tenues, & circa eos folia perquam exigua, in ambitu non intia: claviculos habet parvas, tenuissimas, quibus prope affidentibus adhasret, ac se fearligit: rici- iculi circa fastigia ω Aexol, seu non nihil albidis & dilute admodum rubefcentes, fucceden- tibusexiguis, femiuncialibus filiquis pendulis, bivalvibus, in quibus femina nigrum, lucidum, continetur; radix tennis uti vulgariis altius tamen in terram descendit. Tota herba e virore albicat, uti Fumaria vulgaris cuius non modo colorem, sed & saporem refert. Provenit circa fepes/fenticeta, aarorum mareines quoque, & quandoque prope veteres muros exit: prazcipue ad filv* margnesi ipra** «nt*tc & fi», cui nomen Cuerleton^OOD impositum est. Ex recentioribus nonnulli hanc Frtnariam Spli* vocant, ac Corydalem heAam esse exist*- /Wy cujus mentionem fecit Galenus XL de Simpl. medicam, facul. ubi Corydalis avis racnkatem refert; at Corydalis herba Fumaria hanc claviculata apparet, quae inter nothas vo- ces Corydalion nuncupata reperitur. **Flinii** vulgaris Capnos potius esse videtur, quam Pe- des gallinaceos vocari refert: nam hinc Capnos altera Plinio est, siquidem Plinius Capnos duas describit 1 i< c i-I Prima ait q«^{am Jlec*es} g^{al; hac} eos vocant, nascens in panetinis locis acie pibus, ramis tenuissimis parvisq^ floe purpureo, viridi-fimuis & nomine & ef- ^eftu, fed alia est Capnos fruticosapr^tenera, folio Corandn, cencei colons: flore pur-

h«c radices crafliufculas v^gnasfatis, & .c¹uafi Pⁱⁿgⁿ «ad infar Aparagorum jadicum: e* qmbus oriuntur cauliculi cubitales; in multos alios- ramos brachiati; quibusque adnascuntur folia, contufefatis difpofita, Thabari pratensis angustifolia more, fed minora: in fumniis caulibus proveniunt spicatum flores lutei ceterarum fUB clailis Fumariarum forma, quibus fignito fuccedunt filiquae bivalves, curtz, propendentes, parvum itickm femina, uti caeterz, p- rentes. Provenit m calidiorum regionum montibus Illyrii, Dalmatiae, Hetruri« & Narbona!: (erius floret q«^{am vu}lgans, nempe Julio & Augusto.

5. F«^Λr^Λ cuberofa inf^l PⁱΛ, Cornut. Bulbosa Americana, Park. Haec est species altera Fumaris Americanae, tuberosae, quae infipida deo appellatur, quod gustanti & olfacenti omnis P^Λelap^Λ m % L?rr XperS^{ele} C^Λamr: folium huiusmodi & velut ipenna-

ochidem nominant auctores: de flore nihil statuo, non plus quam Jacobus Cornuti, nec dum apud Gallos meo tempore florere, et nisi Robimyn ctmfexerim multis abhinc annis. In fiaata, p(hm Vigentem apud J t o Λ effj Xum. Hinc ex Canadensi folio del^{am} B, 102» tamen ^ Veipafeno Rob. no mtell. gebam *'c' «' » bet apparet esse Fumanae species a iad<ce tsi- brola.

œrçOl adinfar radicles non cavæ;•"fifnf Fumarise ortiistempus, radicum formam, & foliorum divifuram poiTidet.

6. *Fumaria tuberosa* major radice cavâ, C. B. P. *Fumaria bulbofa*, Lugd. *Fumaria alfera*, Matth. Gaft. Radix cava major, Dod. Cluf Hill. Radix cava major purpurea, Ger. Radix •Aiva vulgaris, Park. Majon huic Fumarias, jadeice cava praditas, folia funt Coriandri modo diffe&a, tenuia, dilute virentia, caefio videlicet Aquileiajfoliorum colore, quorum formam aliquatenus referunt, minora tamen: pediculi tenues, teretes, leves, palmum longi, fupra quos fuperiore parte rîofculi ordine digefti, longi, cum ri&u anterius, & calcari pofterius veluti in corniculum definentes, Linaria? quodammodo floribus conformes, dilute. *m* rubro purpurafcentes, nunclûbalbidi: femina in fbliculis feu filiquis curtis, latiufculis, planisexiguifq;, nigrum, parvum & fplendens apparet: radix tuberosa, inferiore parte feifdis & excavata adinfar dimidiati putaminis Juglandis; caro tuberosa, dum recens fublutea, ubi exaruerit in virore nigricans, guftu cum amaritudine auftera. Provenit in filvis & montibus calidiorum regionum, uti Hertrurix, Gallic Narbonenfis, & Gallo-provincia? Floret ineunte Vere, exeunte fcilicet Martio & ineunte Aprili. Eft major & minor; huic folia anguftiora, illi latiora, quæ folummodo loci ratione differunt.

7. *Fumaria* Radix cava flore viridi difta Lobelio, nobis, J. B. Chabr; Radicem adfcribit Tabernaemontanus tuberofam, integram, rotundam, Fumariae rad^:e non cava majorem, quæ deorfum verfas multis donatur fibris: folia item Radicis majoris non cava? familia, caulium {ûmmitatibus innafcuntur foliola parva, diflefa, & quafi trifida; inter quæ flores prodeunt colore virides, in quorum locum fubveniunt filiquæ curts, bivalves, Radicis cavæ & non cavas filiquaium formâ. Provenit ferius quam Radix non cava vulgaris, & flores luteos, & luteovirides, aliarum more, Julio & Auguftoedit, & folia glauca, cluent'a, hike floribiis intermixca habet. Væ* quæ ducit Florentia Piftoiam & Lucam, hanc Fumariam liore viridi reperere quidam: in illis locis, nee in monte Juliano ullibi obfervare poterat Lobelius; hanc eandem foliis glaucis & floribus albis repererunt quidam periti Botanici tempore Lobelii.

8. *Fumaria* tuberofa minor Radice non cava, nobis. *Fumaria bulbofa* minor radice non cava, C. B. P. Radix cava minor, Dod. Caft. Cluf. Hift. Ger. *Fumaria bulbofa* radice folida calcari & foliocnitaodonata, J. B. Chabr. Hæc *Fumaria* radice non cavapediculis purpurafcentibus, oblongifque fofculis, filiquulis & femine; majori fimilis eft, humilior tamen, & in omnibus minor: radix hujus tuberofa, rotunda, integra, non cava in inferiore parte, verum folida cV globofa verticilli fpecie, colore fubluteo, fapore cum amaritudine adftringente. Exit hæc circa i'epes, & vepres, & ad agrorum & vinearum margines humilioribus locis & umbrofis, folo pingui ktoque, in utraque Germania, Gallia, fed nullibi frequentius nobis in Gallia occurrit, quam primolapide a capite Blæfenfium, in filva caedua difta k *Ccfie dt* •Claille, «kf copiofe flore rubro apparuit, perraro albo. Hoc in multis aliis herbis contingit degenerare floribus à rubro in album frequenter. Radix cava major Belgis frequentior.

9. *Fumaria* vulgaris latifolia filiquis curtis non bivalvibus, nobis. *Fumaria officinarum* DioCcoridis, C. B. P. *Fumaria*, Trag. Matth. Fuch. Dod. Fumusterræ, Brunf. Thai. *Fumaria*, purpurea & alba, Ger. *Fumaria latifolia* hæc vulgaris, eft herba valde tenera, cujus cauliculi funt tenues admodum, genicula habentes, ramofi, vix furfum attolluntur nifi adminiculis fulciantur, fed in latus ut plurimum declinant; adminiculi? autem appofitis quibuflibet, pedunculorum ope in altum attolluntur: folia undiquaque exigua funt, per margines divifa, veluti Coriandri folia, quæ fimul cum cauliculo fubcandido colore virent: flores (picatim digefti exigui circa ramulorum faftigia ex purpura rubent, cum riftu anterius, & calcari pofterius; aliquando albefcunt: quorum fingulis iingula fuccedunt vafcula rotunda, minutula, at infingulis femina parvum continetur: radix tenuis refte demittitur. In agris frumentariis inter nordea poft meTem apparet, etiam in hortis ac vineis aliifque locis, tam cultis quam incultis nafcitu' • Floret ab ineunte aſtate, & per totam ſeſtatem ufque in Autumnum, cV femina maturat. Cum in flore reperitur, tunc colligi, & reficcari, ac reponi in ufum oportet.

10. *Fumaria* major fcandens foliorum pediculis flore majore pallidiore, nobis. *Kxc* omnibus fuis partibus major eft quam vulgaris latifolia. Florem fert fatis magnum, incarnatuni, cuius media pars eft intenfe rubrac folia habet dilutiusalbicantia, quorum pediculi viciH^s ftirpes aut quælibet adminicula aftantia apprehendunt, eodem modo quo Naftuitiam Indicum (nam claviculas feu viticulas capreolofve non habet) aliashumi provoluta cernitur. Radix ei eft fibrofa, qualis vulgari fupra diftae.

11. *Fumaria* vulgaris minor tenuifolia, nobis. *Fumaria* minor tenuifolia, C. B. P. *Fumaria*

tenuifoli[^]Tab.Ger.Eyft.Capnostenuifolia, Cluf. Hu?.. Lob. Dodrantalis tit herbula \z
 ctulicuiis mollibus quodammodotranfparentibus, utinWgari Fumaria, firmioribu? tam
 &fufreaïs, aliquando procumbentibus; quibus inherent folia mollicella, capillacea&i
 nuifiime incifa foeniculi modo, vulgaris foliis candidiora magifque glauca: fummos caulicul
 exornant fpicz majufcute iioiculorum purptrafcntium, vulgaris Fumaria? floribus^smin
 rum,& conertim nafcentium: radicem habet exilem; tota vero plantã amara eft. Invent
 pienique Hilpanix locis in arborum marginibas, juxta viasetiam, &femitas;in nonnullis
 tarn Narbonenfis Galliae traftibus obfervavit Carolus Clufius, prxcipue fupra Arelatem cu
 Marinea per eam urbem rediret. Nos copiofiifime oftendimus in arvis Napis fatiis, cir
 villam dictam laugirard milliari a fuburbiiis Divi Germani fitam. Flos hilari purpura rube
 clt&riorevanegato rubro, albo viridi & lut?o; imo fios totus albus aliquando eft.

12. tumana minor folio oblongo capillaceo, C.B.P. Capnos Cretica candidis fterib
 Mca macula notatis, Cluf.Hift. Sakerays Paludani, ex Syria mifla. Fumaria altera teneric
 o>riaca, Cam. Minus eft hoc genus femine ex Greta allatum, nee minus fucculentcys hab
 eauliculos yulgan, angulofos, teneros, procumbentes: folia minutim incifa & capiUacea,
 luperior Hifpanica, feddunora: flores confertim in oblongiufcula fpi,ca nafcuntdr extrem
 ^ V * " ^fi? flmiles> ^ candidiores deorium ipeaantes, extremam virefcente
 deciduam radices te

Jalioque floret, a
 cit in fequentem Z, .re. P rofe ^ ^d ffonte cadens novellas plantas pu

Fumariam ZrT or nUlfolia prXCOX femine Lini, nobis. Fumaria fpecies Myconi,Lpg.
 vir D. MvcoL-n T J ^? b ^ nibus prxdifpiftam ad; Dalcehanpiummifit dodiffini
 ca-potius r en uia ueicrib kur: folia e infdem perterramfrata cernuntur cinerea, glaf
 cavi aenl f en uia ueicrib kur: folia e infdem perterramfrata cernuntur cinerea, glaf
 frticii* fl rculofi, palmumulti, quibus folia tenuiffimaadhaerent: incauhculoruc
 noris, lar or e mlti fpicz in modum congeffi font, Fumariae vulgaris omnino imiles fed ni
 hyeme, T g n uil pur pureoele ganti candido &viridi colore variegati. Floret¹exeunt
 cadunt f . *?oCIS meretur nomen: floribus fpicatum in fummis caulibus produftis, fic
 unr m^{piC} atlm in p^aac eiscapfulis femina multa Lini feminis flgura& colore, qua? incip)
 lis f. r cere ab Inioa d fumnum fpicarum, &decidunc feu gravitate defluuntex capfu
 J. IUISpaleaceis (femineperfeftematuru) deorfum verfus propatulis: radicemhabet can
 ^aam, non profundam: floret cito exeunte hyeme, fi ex femine deciduo xftate repullet
 # autem feratur in hortis Aprili &Maio, floret per tbtam aestatem, femine Lipifeminis in
 itardiciduoferenovens. Facile difcernitur a Fumaria, Capnos tenuirolia dicta, quodhu
)us iemina fnt capfuk rotunda: vulgaris ritu, illius autem adinfar feminis Lini, ttanfigura
 tuacolare. Figura Fumariae Myconi, Hift. Lugd, perfefta plantam repra^fentat, etiamfipr^
 d^dictje duae fpecies poftremse diftintas inadvertenter a Cafparo Bauhino aliiisque authoribu
 ^confundantur, ut apparebit in Hullucinationibus ad finem hujus capitis.

TEMPERAMENTUM- & VIRES.

Fumariae fuccus, autbore Viofiortde, acris eft, vifum acuit, lachrymas prolicit unde is? now"-
 traxit. Iuitws cum gw^{nm} duplicates palpebrarum pilos evulfos renafci probibet Cater**¹
 Ma in cibofumpta, bilm per unnas trabiu Eadem plane de poftenori fua Fumaria Plinius.
 ^ << 1. 25. c.i 3. clantatem facit inuntii* oculis, delacrymationem feu fumus provocat,
 «nde denominationem accept cum apud Gr*cos, turn apud Latinos: eodem tefta eadem evulfos
 mpebrarum pilos renafci probibet Etl.27.c7. Capnon herbam qui ederebilem per urinam
 "ddunt, Galenu* 7- f^m/JTMaha* * «***» « wefqueei a/ignat his verbis: acri fimul i9
 <>*** quahtatis partiapeft nee tamen expers eftaarU. q tamobrem unnamnutam bilio
 famqueprovocatjanatqu m obftruZiones <, MillJes. ^^ jj^irum acievi

^dⁿ S: ^ lacrymarum, veluti ipfe fumus, nam hinc ei (uti dicitur) appella
 pheres easque r nei d
 X'npl. c. 14. infuperficie calida efi} in ^ u n d o l ^ ^ r fTM?*''' Wu'sL *
 ficca ordinefecndo: ab ilia autem fubfiandIT? TM' a fl* <frigo TMl**>f4» *
 M<cr^ pur f* gtoria, & attenuans, obftri^lr f^f ^ ^ ^ ajor ineftj amara &
 constringendo ventriculum, bepar & Jtega f^f ^ ^ ^ ajor ineftj amara &
 cera laxiora (? molliora robarat, quapropter qd
 attioneftn

.acionem nullo extremo egit auxiliy, cum per se purget ac roborēt. Purgatvero bilem iff adu-
fiosMmores etiam ex ventis; clawm ob idpurumque efficit fanguinem. Quare mirej>rodest
morbis omnibws hos humores frequentibus, nempelerpr*, scabiei, pruritu, impetigini, fergini
is fimilibus cutis vitiis; quia autem obstrutla liberate morbos omnes inde natosfanat, ut fe-
brēs biliofas, putridas. Herba est innocēs, quia tamen magna ubique copit luxuriate vikfcit.
Herba is fuccti* em Veris initio efflcaciffima; femer vero exitu Feris, i\$> ineunte deflate. Ve-
coftw Fum'arU acIhiBito T<zniculo obftrucciones hepatk aperit, perque ureteres urinam ducit.
Sepiafariū ex ea fyrupum conficere folent, qui rnedetur scabiei is mails puftulis. Succu*
vet'aqua* FumarU aqfillataoculis indituf, illorum caliginem, scabiem, is rubedinem difcutit
emendatque. Succu* Fumari* cum fucco Lapathi acuti, modico aceti is me His temper at us
ita ut unguentum fiat, omnis generis scabiem^perfanat illitu. Confemanturflores faccharome-
lancholicis affeRibu* is cacbefticis falutares.

Fumaria tubero/a, Radix noncava difta, ad internet* plurimas affeptiones adhibetur- Sunt enim
qui yadicem ejus in pulverem redadlam, adverfus venenum is^l pefsem in vino bibendam exbi-
beant: cum vino cakfacla pota, fi poftea in kclo te componas probe tonteStum, Judores pot en-
ter elicit. Eadem urinam trahit, is ad morbum facit, regium pota. Semen tufum ac fum-
ptum quotidianis profuviis auxiliatur authore Trago. Vt vero Lobeliut fcribit, facit adver-
mes isr maligna ulcer a. Radix ejus amara, exceftu fecundo cafida is ficca. Vigerendo, ab-
flergendo, isr defluxionem inhibendo^ angvnh is laryngis tumoribns gargarizavx prodeft, pitui-
tamque abftergit. Eadem fere Dodon<eu* tradit: Radix cava, inquit, anginas t unionfque inue^
teratos amygdalarum curat; fe ea in aquafola aut ace to facia decoflione os gnrgaritetur: huius
ziffos incidit is diffipat. Pro defi is tumoribu* palati is gingharum infytrfa ejufdempul-
vis. Cum unguentopopuleo confumit h^morrhoidas^earumque dolor es fed at. H<ec Fumaria:A
rijiohchia rotunda dicitur Camerario? cum enim habeat in radice is foliis acrimoniam, eamque
levem quidem, fi genuina Ariftolochia rotunda deeft, fine difcrimine dicitur Fuchfiws adomnid
ea adqu<* vera ufurpatur; majori commendationi est minor apud Chirurgo is mulomedica-
trices mulierculas^ qux iftius pulverem efficaciorē is delicatiorē ad Lumbricos interimendos
predicant. Radices FumarU tarn cav*, quam non cav^Tabern^montani calicUfuntih
fecundogradu, fecc<ein tertio; abfterguunt cum nonnutlaaftritwne; radix; fores is tcta herba,
quomodocunque ufurpata, in cibo, etiam isrpotu htp&tk obftruccionibH* efficaciter medentur: Sue-
CUS ex herba, radiabue is flonbu* expreffim, duarumunciarum pondere potu*^x expellit vermes.
Idemprdfat radix in vino fumpta, minore quidem of junioribus propinanda. Succm ditto modo
mane is vefferi adhibitus, cancro, filulis, c^terifque putridk ut ceribws medetur^ vuluti Fuma-
ria et'um utiliter propinatur. Ctterum h<zc, ut Fumaria vulgar is, fanguinem purificat. Omnes
h* FumarU prjedift^ quandoquidem eadem teferafeu fymbolo a natura afftdantur^ roculdubio
earunJem funt virium fecundum magvsis minus: hdcefl regulacerta is utpturimum infaU
libilis a natura data, non variante finem tyfa. Ve Cdeterh facultatibus Fumaria vulgar is vi-
de Simeonem Fault pag. 63. daflis fecund* operis Botanici quadripartiti.

HALLUGINATIONES CASP. BAUHINI Aliorumque Authorum.

[I] sfg. 14S. col. t.pl.it. Fumaria viticulis & ca-
* preolis plantit vicinis ddbarens, € B. P., Fuma-
ria Phragmites, Dod. Gal. Hac funt fynonyma cum
fumaria daviculfs donata, C B. P. col. 2.pi. vi.
fumari^Phragmites Dodonai, Hijt. Luvq, & alter a
Gs(est vulgaris abfque capreolis s ergo aupliciter la-
pufus est CaJp. Bauhimis dum ex duabus diJHnftis jpeci-
ebiiSyVulgarijciUtet & Fumaria claviculata, unam &
candem fuam fecutidamin Pinace conJHtuū Jpeciem :
in fuper nonjolym confundit Fumariatn vulgar em &
e'a viculatam pro jecunda fua^ecie, fed etiam addit
fuam fecundam pro fpeae dijHnHa, qua revera non
ejl^t & jic multiplicat entia fine neceffitate.

Pag. 14S. col. 2. pi. tit. Fumaria major tehui fo-
#<>€" B. P. Tenuifolta, Clu.J.Hij. H<ec est vulgar it
inftrar af'eminibui & Capulis eadem continemibus;
fo(fis autem ftentulacee '&' tenuiter divip,^g lauci h-
f fola foliorum capillaceorum divifur'a 6 glauco
* adzofore dijfert j caiffuiis (eminahbus & fe-

mine cum vulgari convenit. At Fumaria Myeoni,
Hij. Lugd. toto ccelo capjalis ?\$ femine Unidiftin-
guitur'; ergo male Cajjarus Bauhinus confundit proua
& eadem fpecie Fumariam tenuifoliam minorem
fiam, feu Capnon tenuifoliam Cluf Hi ft. cum Fu-
maria Myeoni Hift. Lugd. Hx dux a capfulis fe-
minalibus 6 feminibus funt dux perfeile difinfie
fpecies, ut dare fatfs ex ditlis patet cuilibet pra-
diclas jpecies examinanti. Nee minus Tabernamon-
tano vitiovertendum est, quem fequitur Gerardij non
emaculatuf, duni Radios cava major is 0U0 conJHtuū
jpecies, quatuor ru&ras, tot idem albas. Deinda Lobe-
lius Fumariam viridifiore radice cava obfervavit, &
appellavit J^adicem cvvam flore viridi, at in Iconibiis
proponitfi'ruam tuberosam, integram, rotundam; ergo
jure delet appellari Fumaria radice non cavaflore
viridi, non aut em Fumaria radice cavuflore^viridi.

Pap. 144- col. 1. pi- 1 *• Fumaria buibofa radice
non cava major, CB.P. & ibidem col. 2. pi. 111.

Fumaria radice non cava minor, C. B. P. Cum hce du<e Fumaricefint tantum varietates', tztate, aut loco, florutve colore [difcrepantes, nonjpecies dzjlintlie^ ergo pro duabus diverjis jpecies non debent a Cajp. Bauhino caterifque authoribus pom. Porro male confituit Cajparus Bauhinus Fumariam & Chelidonium

affines, quippe filiquojas bivalves, inter Delphinium & Aquile^iam qua fint diver/a omnino nature ba-hita ratione florum & filiquarum i nam Delphinium & Aquilegia debent adjuncti Aconito^ Nigelltf, Fraxinella, Helleboro albo, & 7iigro, & cteris expli-candiſ infra Settione decima.

SI LI Q U O S A

Tetrapetak fungofae, non bivalves nee bicapfulares.

C JT VT XIII.


§. 1. RAPHANUS feu RADICULA.

PA*«c Cquafi radix perfpicua) Diofcoridi I a.c. 137. pojlmoribu* dicitur *ῥαφαν* *ῥαφάνου*
§ Prices p^etd-q, quia''fatumstatim oriatur. Theophrastu* utraquevoeufuseft, fedquem Raphanum wcamtt6, ipfe fanti*. appellavit, at'pfaw ipfam Brajficam nominavit; qutcaufaer-roris fuit Plinio, duml. 19.CI^ .fcribit Grcos Raphani genera tria fecife, foliorumdiferen-tia etc. que de Braffica intelligenda, cum ex Theophrasto 7. Hift. 4. defumpta fut. Latinis ra-dix (*ῥαφάνου*) quod ceteras amplitudine corporis superet, vel quam pauciffimis magnitudine cedat: ſi ... in frigidis locis videntur, ficuti in Germania, infantium maxyora mag-nitudinem Lautli + c.s.tefte. Sic in regno Congiano, craffitudin human* tibU, gratiqu* (atom (bonteprovenire , Pigafettutin ejusRegm defcptionel. & cap. i.teftatur: aliatcopio* fikme in India provenire after it Linfc.par. 4. Ind. orientate 1 o.far. 7. cap. 19. iypart. 8-
* * Genera duó Diofcoridi^ fativum isr fiheftre: at Theophrasto fex, Corinthium, Cleon^mriy Litkotbalaffium-, Bzotium, isr genu* quod folii* Eruçdt fimilibws conftat; h<tcTheophrasti ?lin. I, 19.c.5>N^f^orumum memen fe^^ etias genus filiquofe ftatuit: at ibidem ex Romanortfi Q>ntent ia-, inquit^ noftrates Raphani alia fteen genera^ Algidenſe a loco^ longum atque tranſflucidum^ alter urn Rapi figura, quod we ant Syriacuniyfuaviffimum fere ac tenerimum isrc etiamnum ſub-jungit unum filveftre, Grxci bz^vocant, noftri Armoraceam, de qua fupra capite feptimo inter filiquofas bivalves, prasditas fepto medio duplicem feriem feminum • feparante. Quare obſervavimus aliumpr<x.cocem, ferotinum alium: pr*cox corporeeft oblongo, gracili, femi-nema'jore, in quod facile abit.Serotinus albu*, quiveloblongus^ velorbicularis: niger, qui ro-tundut, rarim oblongus, filiquis quidemma'joribus^ fed femine minore, ruber, oblong*;, corticC rubro, fibris nonnullk rubentibus, per ſubftantiam difterfes. Radice lutea Camerariu* notavit' meminit is Byzantini, femine Conftantinopoli accepto, quipojjea in communem degenerarit, rff-dicepenitus languejcente.

Raphanus- fativus feu Radicula fativa pro nota generica hanc habeto, quod fit planta tr trapetala: hocillicum omnibus aliis hujusSeftionis commune eft: fed abaliis omnibus d'f-tinguitur, quod non producat filiquas bivalves, fed fungofas, crafias, indifcriminatim plurima femina majora, rubra, infecontinentes; Srideonos, propter florem tetrapetalufl^ cum aliis hujus Seftionis communem, filiquam autem fungofam fine fepto [medio omnino ^ reliquis diverfam, Raphanum fativum adfinem filiquolarum bivalvium plantarum colloca-

T A B U L A XIII.

Raphanus	{	Niger	(Rotundiore radiu-> P*ri^ Major orbicular* vel rotundas, C.B.P.*
		O	Radice longa pyramidal^ nobi*. \$
		Sativus	3. Magnus, C. B. P. Raphanus fativus, Fuck. Lugd. ?
		4.	Minor oblongs C. B. p. Raphanus minor purpre^ Lugd. Lob. ¶



Explicatio Tab. decim^terti^.

Raphanus niger major rotundus, nobis. Raphanus niger rotundiore radice, Park. Raphanus niger, C. B. P. Lob. Icon. Raphanus radice nigra, Cam. Hie foliis, caulibus, floribus & filiquis, parum differt a fativorubro: radice autem figura Rapi est rotundj, cujus cortex est niger, multoque acrior, Rapis sapore accedens.

2. Hujus est Scaltera species, radice longa pyramidali cortice ejusdem coloris & faporis cum priore.

1. *Raphanus major* C. B. P. Raphanus fativus, Fuch. Lugd. Raphanus five Radicula magna, Dod. Radicula hanc fativa folia emittit magna, virentia, aspera, utroque latere excocta provenientia, profundis incisuris difflenda, Rapi foliis haud difflimilia, fed majora: caulesteretes sunt, inque alas parvas, e quibus flosculi tetrapetali dilute purpurei, quibus succedunt filiquae craffe, acuminate, interius fungosae, in quarum gremio spongioso latent plunima lemma rubra, rotunda, majora quam sunt Napi aut Brassicae femina: radix foris inferturque frequentissime albida, sub terra faltet, exterius seorsum supra terram rubra, tota est craffa, longa, pyramidalis, in tenuissimum filamentum definens, si conveniens folum nada fuerit: subinde vero cassior & brevior. In arena terra feliciter provenit. Vereferitur, imo exente nonnunquam hyeme in pulvillis bene stercoreatis ut tenuior & gratior ejus tenella radix edarur; sed si feratur femina copiose edendi causa, tardius post Martium exactum; ferius enim fata, radix ejus grandescit & uberius femina fert: Vere frequente tunc flores & femina copiose facit.

2. *Raphanus minor* oblongus, C. B. P. Raphanus minor purpureus, Lugd. Lob. Radicula fativa minor, Dod. Haec per omnia minor, praecipue radice, quae est cortice albo intra terram, rubello autem parte qua extra terram eminet.

Siliquosae tetrapetae filiquis fungosis articulatis donatae.

§. 2. *RAPHANISTRUM V M filiquis fungosis articulatis.*

Raphano fativo five Radicula fativae filiqua fungosa praedictae subjunximus Raphanistrum filiquis etiam fungosis & articulatis donatum: conveniunt & Raphanus fativus & Raphanistrum in floribus tetrapetalis & filiquis fungosis, hoc articulatis, ille integris fungosis planis filiquis donatur. differunt etiam inter se Raphanus fativus & Raphanistrum foliorum textura & radicibus, III9 tuberosa feu carnea radice constat, hoc fibrosa; propter enim conformitatem substantiae fungosae filiquarum, tam hujus quam illius Raphanistrum hoc paragrapho 2. locavimus immediate post Raphanum fativum, auferendo ab ipso Rapis nomen, quia filiquis neutriquam convenit cum Rapo.

1. & 2. *Raphanistrum* filiqua articulata glabra majore & minore, nobis. Rapis alterum arborum, Park. Hoc folia habet lata, finuata, non laciniata, ut videre est in foliis Sinapis femine pro nobis aut Rapis arborum, Park. Folia superiora sunt angusta, longiuscula, iive gra; Ves sunt tetrapetali, palme kitei, vettis aliquando nigris notati, aliquando lildem priviti, quorum

quorum fungulos fingulae fequenttir filiqua* fpongiofae, gla.bras, articulate, fingulis internodiis protuberantibusglabris& femine turgidis, atque .depreilio, ubi articulantur, qua? propter fungofam fubftantiam filiquarum magis accedunt a fine ultimo (id eft floribustetrapetalis& filiquis fungofis) Raphanis feu Radiculis fativis, & eo ipfo nomine Raphaniftrum potius quam Rapiftrum cum aliisauthoribus appellare maluimus. In fingulis internodiis femine, fie turgidis exficatis, ruptu facilibus, latet unicum' femem ruffum. Annua eft planta, floret pertotam xftatem, & femina fub finem ejuſdem perficit.

3. *Raphaniftrum* minimum Monfpelienſe filiquis articulatis friatis, nobis. Alfine nodofa, Gallica, C. B. P. Lugd. Hoc Raphaniftrum minus nobis fie diſtum, plurimum in agro Monfpelienſi reperitur: radice conſtat ſimplice, longa, parumcapillata, ex Candida flaveſcente: foliisprope terram multis, ex eadem radice prtis, & in orbem circa radicem coa&is, longiufculis, anguſtis, Androfaces Matthioli haud multum diffimilibus: caulibus ornatur plurimis ex radicibus inter folia emergentibus, pedalibus, nunc brevioribus, nunclongioribus, iecundum fertilitatem aut fterilitatem foli, in quo provenit; horum ramulis fuperioibflicundum cymas innafcuntur floſculi albidii plurimi, tetrapetali, (etiampiquiniſpetalisconſtare ait Dalechampius in Hiftoria ſua Lugdunenſi) quorum fingulis fucceduntfiliquaeſingulae, parvs, unciales, quibufdam nodofis friatifque globulis, fele ordine fequentibus, qu^a ii veruculo tranſfixis conſtantes, per articulationem jnnftis, atque in fingulis nodis feu globulis friatis fingula continentur femina rotunda, ruffa.

^*Raphaniftrum* flore albofriatofiliqui articulatafriataminore, nobis. Rapiftrum⁴album articulatum, Park. Hoc folia protrudit pauciora, aſpenora, undulata, parum aut nihil finuata aliquando, riuncmagisquam inaliisfinnofa, cauleſeditbreuioresprxdifticaulibus, led^a p^orioriores: flores minores non tam denſe conſpiciuntur, nec ſont flammed vel palide lutei aut dilute albi.friis nigris aut fufcis variegati • ambus fuccedunt-filiqua[^]fungofe, articulate, friatſe, minores filiquis fequentis, qux exficcati facile per fingula internodiaabrumpuntUF, atque in fingulis interftitiis finaula continentur femina ruffa aut fufca, non tarñ cahda quam lunt fuperioris femina: radix in quibufdam longa, tenuis, in alns craſlacV rotundainftar Rapiſulvſtris. Reperitur & hujuſ varietas flore purpureo aut dilute violaceo.

S-RapſomiftrumfiWant articulata friata maxima, nobis • Hoc non dirTert, a priore • niſt magnitudine florum & filiquarum, propius ad Raphani aut Radicute fativae filiquas accedentium fpongiofa ſua ſubſtanti[^]: articulantur, nt priors ſihquas fed ſont majores majoraque in articulis continent femina.

Siliquofae tetrapetalae monofpermae.

§. 3. RAPHANISTRVM MONOSPERMON.

Rapiftrum a fitmlitudine foliorum cum Rapadiftum videtur; unde quibufdam Rapafilveſtris alter* nominatur: ^ Eryjimum Theophrasti cenſent; alii ad Sinapi, alii ad Lampſanam referunt.

Nos ad Raphaniftrum referimus hanc plantam fungofam, non articulatam, fed mojiioſperman[^] * filicub fungofa involvente unicum femem, unde ei monofpermi nomen.

Raphaniftrum monofpermon indigitabit plantas hoc paragrapho tertio contentas, cum ſint tetrapetakplantae, atq; floribustetrapetalisevanidis fingulis fingula? fuccedant filicute q«^o/dammodo fungofae, unicum in (e continentes iemen; ideo Raphaniftris filiquis fungofis articuſtis, Raphaniftra monofperma ſubſtituimus; nee merentur nomen Rapiftri, cum filiqua^{as} non gerant Raporum ſiuiquis conformes, nee Myagri filiculis bivalvibus feu bicapſularibu* convenientes; idcirco a Myagri claſſe abſtraximus, & hue inferuimus cum fuiſ fimihbus.

1. *Raphaniftrum* monofpermum maximum rotundifolium, Cornut. Maximum rotundifolium monoſpermon Hifpanicum, Park. Maximum vocatur hoc Rapiftrum, quod omneshujus generis ſpecies ſuperet altitudine, & foliorum latitudine, hie vero funt Baphani modo diſpoſita; verſuſextremamcoſt[^], parte: n^ontrotunda, & in ambitu crenata, per terram ſopme ſtrata & varus aſpentatibus in ſpinulaſ fe^{taceas} levicere^{extuberant}, am p^olicudine palman; circa caukm ſubnaſcunt^{ur} urahah. ſutnneque in^odem pedi[^] o^o minora: caulisdcva* tur ad bmoſ cubitoſ & amphuſ. * ſtnatus Scan^{guloſus}, hiſpiduſ etiam (ut & foUa) in multiples furculos dmditur, ^ ^ n g e mmora qu^a in caule folia glomeratim aggruntur & ſinc. oraine locantur; furcul^o. onerantur innumera florum propagine, adeo ut integral vgeant[^] ftate quatuor petalia albiſ, exterius, & ſtaminulis flaviſ ſeu filamentis tenuibus in^oteriu^a

feriusSt piftillo viridi donentur: imicuique fiori fuccedit unicum femem parvum, rotundum, fubflavum, rotunda quoque capfula membranacea Coriandri magnitudine inclufum; vitio dum viret, paulo longior apparet, per maturitatem tamen orbicularis eft figure & ea propter & fingulari & unico femine monofpermon appellatur, fquali epitheto beandemcaufam Bfaificam marinam infigniri voluit Tumerus } quod videlicet non ut vulgare Rapiftrum (nobis Sinapi femine nigro dictum) longiori Kus filiquis plura contineat femina, fed unicum, idque unica tantum capfula rotunda inclufum. Provenit in Hifpania. Floret abundanter pertotam feftatem mille flonbus albis ornatum, ut diximus; femina verfus eufdem finem ad maturitatem copiofe fati perducit.

i. Raphaniftrum monofpermon maximum Chalepenfe flore luteo capfula rotunda friata, nobis. *Folia prima edit Sinapios more: caules protrudit bipedales & tripedales fecundum folum cui committitur, nunc humiliores, mine altiores, ramofos admodum, in quorum ramufculis exeunt fiores tetrapetali, lutei, cum munitis ftaminulis itidem luteis, quibus fingulis fuecedunt filicuk fingute rotunds, frfetse, hirtut*, definentes in apicem acutum, ramis brachiatis prardiatis infidentes, denie fati difpofitas ad pedalem & fequipedalem aliquando loflitudinem. Floret fub finem aeftatis, & femina matura edit ineunte Autumnno; in fingulis filiculis fingula continentur femina, unde ei nomen monofpermi. Hujus femina nobis communicata habuimus Chalepo miffa a D. Roberto Huntington anno elapfo.

3. *Raphaniftrum* monofpermon capfulis friatis tenuibus oblongifculis, nobis. Rapiftrum monofpermon, C. B. P. & Prod. Matth. Ed. Bauh. Park. Huic Rapiftrum monofpermo ex radice longifcula albicante, parum fibrofa, caules pedales, quandoque altiores, rotundi, tenues, ramofi, eleganter virentes, leviterque hirtuti exfurgunt: folia humi fparfa, crassa, funt Rapi foliis familia, in principio laciniata, dein fubrotunda leviter fubhirtuta: flores fecundum cauliculos pedales & tenues, veluti in fpica diijpofiti, tetrapetali, eleganter lutei aureive, quos fequuntur filiquae tuniide in medio friatae, & in acutum apicem definentes (eleganter propter frias per eas difcurrentes, quemadmodum obfervantur in femine Coriandri) feu filamentum oblongum abeuntes; in filiculis hifce. fingulis fie conftitit unicum continetur femem (unde ei nomen ficut & priori) parvum, oblongifculum. Nafcitur in agris qua itur Auguftam Rauracorum, ad domum rubram obfervavit Johannes Bauhinus. Idem fed humilior & frigosior & valde ramofum foliis parvis, eleganter virentibus, in agris circa *Hutengen* ad filvam invenit idem Johannes Bauhinus, & fimile confpicitur circa *Montpellierum* crefcens, ex cujus femine in horto publico Univertitatis fato provenit, cultud multo majus & elegantius.

4. *Raphaniftrum* monofpermon latifolium filiculis fungofis glabris auriculatis, nobis. Rapiftrum monofpermon latifolium, C. B. P. & Prod. Myagrum monofpermon majus, Park. Myagrum monofpermon, J. B. Chabr. Caule eft hoc cubitali, aliquando altiore, rotundo, tortuofa, varie & inaequaliter brachiato: foliis viridioribus, glabris, latis, linea alba divifis, latiore bafi caulem amplexantibus, laciniatis iis quoad radicem funt Cichorei fativi mode, reliquis aliquando fmuatis; in fummis caulibus confpiciuntur denfe fati difpofiti flofculi, luSeoli, parvi, *etrapetali, quorum fingulis fubveniunt filiculae fungofae utriculive longi peras fimiles, aut filicularum Burfas Paftoris forma, fuperne in duas extuberantias aut quafi auriculas definentes, quorum medio apex infidet; capfulas fungofae, quae per maturitatem, uti videret, durae taftu reperiuntur; in hujus capfulae fungofae auriculatae medio cavitas unica unicum femem funde ei nomen attributum monofpermi) ruffum, oblongum continens. Nec figuram filiquarum, nec fapore, Myagro refpondet, & ideo aptius ad junximus Raphano inter Raphaniftra propter fungofam fubftantiam filiquarum. Provenit in fati arvis paffim per Galliam, at nullibi frequentius, quam in fati inter Bkfas & *Beaugeancie*. Floret ineunte aeftate, 6V eadem exeunte femina perficit. Vide hujus Iconem Tab. 21. verfus finem fub Myagri nomine & hue refer inter confimiles plantas tetrapetalas fungofa filiqua praeditas.

^ *Raphaniftrum JiXiopxz* minore, rotunda, rugofa, afpera, nobis. Myagro fimilis filiqua rotunda, C. B. P. & Prfcd. Park. Myagro affinis herba capitulis rotundis, J. B. Chabr. Radix hujus caulem cubitalem, hirtutum, fragilem, in ramos varios brachiatum, emittit: cui funt folia ad radicem hirtuta, afpera & fucculerifa, quae maficata cum vifciditate levem acrimoniam excubent, fex uncias longa, fequiunciam lata; quae vero caulem ambiunt rina, pediculis carentia. Alata: flores palidi & minuti, tetrapetali, qui fecus caulem in fpica fernipalmari pofiti: arque fingulis fingul* capful* parvae, rotund*, rigoHe feu afpetae, in apicem de-
llente fuccedunt, continentes in fingulis fingula femina fubrotunda, ruffa: capful* primum

mun fungofae virides, per maturitatem nigr<e, medulla flava, oleaginoſa, feminibus run% donatis plena*. Annuaeit planta, ex femine deciduo fifoit fuperior renafcens. Julio floret; & Auguſto femina ſua perficit. In agris circumjacentibus Blaefas & Piftavium paffii> reperimus nos: circa Lunellam & Monſpelium invenit D. Doldius, & Lepidii, aut Thlafpi nomine NoreMBERGA tranſmiſit ad Caſp. Bauhinum. Vide hujus Iconeni Tab. 21. figura ultima, & hucrevoca. Confule Hallucinationes.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI
Aliorumque Authorum.

P Jg. pf.col. i .pi. i. Jtypijtrum flore luteo, C. B. P. Hapijtrum arvorum, Ad. Lob. Hac eſt planta Jiiiſua longa bivalvi & Jemine nigro donata, quae Sinapi omnino mordacitate accedit ſ ergo debet pro Sinapi Jemine nigro accenſeri, ſicut nos praſtitimus. Pag. p.?. col. i. pL n. Hapijtrum flore albo filiqua articulata, C. B. P. I'apijtrum arvorum, Cer. & col. 2. pi. m. J'apijtrum albolineis nigris depiſto. C. B. P. Lampjana Apula Plinii # J)iq. Jcoridis, Colum. Secundum male pro Jtypijtro tec enſetur, cum a Jiiiſua fungoſa articulata magis convenit at Rgphano fativo, unde melius & aptius a nobis duiur Tryphanijtrum a conformitate Jiliquarum fungoſarum petaliſque Jhis nigris piſtis cum Raphanijtro. Tertium a filiquis bivalvibus melius con- venit cum Erucaſativa, ad cujus genus nos retulimus, ergo & hoc 6 illud male hic difbomtur a Caſp. Bauhino.

Pag. eadem col 2. pi. v. \apijtrum Italicum ft- hquis longijimis, C.B.P. Hapijtrum lilvejtre Ino- vis folio, Colum. Hocoſt Eryjimum a' filiqua & J'~ ta facie plantae, ergo aptius dillonitur inter Bry- jima, non autem hic inter Rapiſtra* fe» K*~ Jira.

Pag. lop. col. 2. pi. v. Myagrum latifolium, C B Iu... nojpernum, Eyjt. Myagrum ffilique & J' £ *rk. Myagrum monger* cadempLvilm jenore lacinato, J. B. Cbabr. vj? & fyagro ſimilis Jiiiſua rotuſa* ^ * 4 Myagro affinis herb* Chabr. Ha duceplant* mall? tur, quia Myagrum J' dirimente dupli- tetrapetaU fiticuW* J' de b'nt Inter Jiliculofas cemjeriem J' Lepidum Veronicamque tetrapetala*

collocari, plantas quippe cijdem conform*** My qir rum latifolium monofbermon C-B-P* & Myagro Jimius Jiiiſua rotunda, I. £* non juntiliculof*, Jepto medio pellucido duplicem Jeriem Jeminum affeBcc : ergo ne Myagro affociandxt, fed cum Jin tplant cc Jiliqua Uſi Jigijſjine Jepto medio determinante duplicem Jeriem Jeminum donate, & Jemine monoftermo pra ad Raphanijtrum mono/pernum debent transfer*, ut no) pnvjlittmus cap. hoc , j. Not a nos inadverW* ter has duas plantas ad Myagri jf>eas « < £ ' ? authoribus retulijje* & Tabula 21. mnea collocaps^ ferantur ad Capita H. paragraphum 3. inter %* niſtramonojperma, non autem inter My* J' ~ cies, propter ante ditlas rationes (3 tolletur hror nojter.

Pag. pf- P* v' ltypijtrum monofpermutn, C.B-4 P. Debet J'aphanijtrum nuncupari, & melius.

Pag. 2§ i. col. i .pL x v 111. Alfine nodeſa Gallic^ C. B. P. Alfine nodoſa, Hiji. Lugd. Primo cmnc* Jlfines Jpecies conjtant quinipetqlis (infloribns) ad medium bijidis -> deinde jiliquas proferunt pyriſof* mes mini mas, minuta pluritna in fe continent eſf~ mina ; atqui hae conditiones neutiquam convenient Aljine diſtce nodoſks ergo primo Dalechambio au- thuri HiJl. Lugd. dein Cajparo Bauhino ex tpb D* lechambio transferibenti & male denominanti, vitio vertendumeji. Habet hic planta flores ſuos tetra* petalos (quamvis a?i ignoranter inadventerter quinapetala ei ajjignet Dalechampus) & capful^ fuas fungoſns, articulatas, conformes Rgphanijhis cater is, a nobis hic allatis ſ ergo aptius hic collocatur inter Juas confortes 6 confimiles plantas, non autem perperam inter Alfines Jpecies, a quibus toto ctelP dijerepat , uti nunc comprobatum eſt.

S I L I Q U O S I

Tetrapetalx quadricapfulares.

C J T V T XIV.

§. 1. LYSIMACHIA purpureacorniculatapappoſa.

AT SIM AXION i ATTPON Dioſcoridi l. 4. c. 3. Cauks mMt cu Utaks fruticos\ folia Salī&uſfökis fimiha: flos ruberpurple^ nunc faturate, mine dilute purpureus, [habetur & Lyfimachia lutea Canadenſis cujus femina non fcatent pappo, reliquae pappoi* fiint.] Sic dittra à Rege Lyſimacho Agathocklſilh, ejus'inventore: folia habet Salich viridiajore* purpureum (aureum habet vetus J [qu* hue non fpeftat, cum propter flores, turn capfu^ feminales, de Lyſimachia lutea Se&one quinta trāfabitur, quia proper rationes ill^ f ferendas

ferendas non est hujus loci, fruticosa est planta iyc. Pliniu* l-2^c. f. addit tntamei vim
 e^f -> utjumentis discordantibus jugo hnpofita ferociam isr fimultatfs cohibeat; unde videtur
 innuere, © ^ Stok yta. ^ A1«» distam ejfe. "Salicaris etiam a foliorum cum Salicis foliis fmili-
 tudine vocatur Lyfimachia proprie dicta, est planta filiquosa ^ qu < z a filiquato fctetur & coc'h qui
 auclii & increment oflõxUm eruptioni antevertit, quasi proles parente prior Filius ante patwn
 "vocatur.

Cognoscitur iyflmac&a à extern omnibus filiquosis tetrapetalis antedictis, quod (no-
 tatu dignurii) floribus tetrapetalis confitet in* fummis filiquarum convenientibus, atque fio-
 nibus fie cortflatis ex quatuor* petalis, five majoribus, five minoribus, fingulis fingula? fubfir
 ^liquae quaddcapfulares, quatuor loculamentis distin&a?, atque in fingulis loculamentis
 unica feries feminum minorum, pappo invojutorum latec; quod fi contingat, ut nos ali-
 quando obfervavimus, à luxuriante natura productio quinque petalorum in floribus, tunc
 confequenter producit filiqua quinquecapfularis, quinis distinfis loculamentis donata ;
 feminibus ad maturitatem perduftis à natura, filiquas furfum verfus aperiantur in totideni
 partes feu loculamenta, & femina plufima pappofa (ut Salix) fundunt, * qux vento ablata
 ubi ceciderint, praecipue aquosis & humidis germinant locis, & fibi fimiles producant plantas,
 imo in hortis, fubgrundiis & fummis murorum, prxfertim aedificiorum prope flumina fi-
 torum, quod faepe à nobis obfervatim in fummo tefto palatii Chambort, cujus fundamenta
 prope -fluvium Coujjon jasta funt, imo hyeme idem alluit fluvius Couffbn^ qui fetet hac
 foba Eyfimachia di^ta, atque vento femina eò delata, in rimis pluviam adefa & agerminant,
 atque vigent; idem alibi obfervare licet.

Pars T A B U L A XL

Lyfima- chia	Noftro as filiquofa -pappofa	Vitta	{	1. Latifolium, nobis. Epilobium 4 & Lyfimachia 0- Cham*- mnum maxima, Films ante Fatrem omnium nerium \ maximum, Gefn. Col. 0
				2. Angustifolium, nobis. Lyfimachia Roris marini [folis, quibusdam. 0
				3. Magno flore^ nobis. Lyfimachia filiquofa bifruta magno fl ^{ore} > C-P-P- ®
				4. Parvo flore, nobis. Lyfimachia filiquofa parvo ftore, I C.B.P. 0
				5. Major, nobis. Lyfimachia filiquofa glabra major^ C.B.P.Q
				6. Minor, - nobis. Lyfimachia filiquofa glabra minor, C C.B.P.®
Canadensis lutea qj. Major, nobis. Lyfimachia filiquofa Virginiana, Park: £ corniculata non pappofa^\$. Minor, nobis. ^				

Explicatio partis Tab, decim^primd.

i. T. Tfimachia latifolia dicta Chamasnerion, C. B.P. Chamaenerion & Epilobion., Gefn.
 Ly Ad. Cord. Eyft. Thai. (cui & Lyfimachia dVinium maxima) Filius ante patrem
 maximus, Gefn. Col. Onagra Diofcoridis 1.4. c 1 i 8. & Oenothera Plinii 1. 2 6. c. 11, cV 14.,
 cenfetur, Lugd-C^f. Lyfimachia fpeciofa quibusdam Onagra dicta filiquofa, J. B. ChaW.
 Chamasnerion, Park. ° Lytfmachix reliquas fpecies infra defcribendas proceritate fuperat
 hssc ' Lyfimachia, Onagra quibusdam putata, tres, quatuorve aut plures pedes alta: caule
 confat glabro canaliculato, fubrubente, comofo, medulla alba flingofa pleno: foliis multis
 ab imo ad fummum ficut in ramis donato, ad Salicis (unde Salicaria dicta) aut ad Nerii
 folia accedentibus, oblongis, mediocriter anguftis, unciam latis, acuminatis, utrinque glabris,
 ara admodum per ambitum veftigia creftiam oftendentibus, oblongis ad latera venis à cofta
 media fecundum longitudinem decurrente, deducis; fapore fubaftingente & glutinofo,
 non fine obfeura aliqua acrimonia: in ramis eorumque alis taberofis verfus aftigium longa
 feiTe nafcuntur flores magni, rubri^ tetrapetali, quos fequuntur filiquae longae, "quadratae,
 ^re) iquarum fute fortis more rubeites, aut ex rubore in cinereum declinante Sj fubhirfuta?,

quadripartita: feuquadricapfulares, atque in fingulis capfulis unica ferres frainu longitudinalicer infingulis filiquis contenra, feminibus matuns pnpofcatentibusreplet quartior feptis mediis, fingulis fingulos ordines fehinum nutrientibus. Verbo femina omi liyus fubalcerni generis quatuordiftinclinisordinibus, quadrifariam digeftis pappofotcmci] (iiiiiciuillimo involvuncur, perpuvilla, oblonga, cinerea; feminibus toturis & filiquis: sex cati apparent quatuor valvulae & quatuorfepta media, quibus run *¹¹r lemna in n quis, qua: pofita explicata & deorfum verfus retlexae rundunt fern:: 1, quibus i< mukiplicanr. tibicunque locorum vento ablafoce ciderint; (lores fpe[^]iut..)era hujus generis maximi, Leucioi adirjfter purpuraicentes (quorum medium occup: Candida, apicibus rubentibus ant luridis, pirtillo longiore in quatuor cracula dtun[^]-- apparent in fummis filiquis jam fabricatis, quod non reperitur in tota cohorte filiquoan: tetrapetalorum, & hoc nomine Lyfimachia dicitur Filius ante patrem : radix alba, loigc lateq repit, guftu infipido vifcidoque. Cafparus Bauhinus obfervavit hanc Lyfimachis p^{rim*} fptciem in monte *Mounts*. Mense Oftobri ieperit in monte *Baku* florentem Aug^u Johannes Bauhinif. Abundat circa *Montefgardunyiz* itur *Adincovrt* unde in hortum Ulu-. E.G. tratiftulit idem Johannes Bauhinaa. Infilvise circa Blifas & Piftavium reperimus n⁰¹ fads frequenter asitate florentem, & femina macurantem.

2. *Lyfimachia angumfoiadiaa* Cliaminerion, C.B.F. Chama: nerion G, p buccinum, Lpb. Lyfimachia filiquofa alia, Lugd. Lyfimachia 5. Cluf. Hift. Fieudolyfimacliuij purpnetwn minus, Dod. Lyfimachia Roris marini folia quibuWam, Linana rubra, HW Lugd. Epilobium (id est R-iai'A[^], .Viola fur-r filiquam) 6. Geln. ad Cord. Hxc Lynmachh minor tota quidem facie fuperiori fimilis est, tiliis nu tem est Rons marini *****f guftis, confertim multis firaul coiccr Acis & <F& Lmanr tolus fir long tedtac & lac tudine paribus: florestetrapetali, purpurans confirm. lcspons tonbus) hq«s, corniculis, fimiibus jam dife in li Lc, fed minores: rad.x repens cum pracedtis convenit.

3. *Lyfimachia filiquofa* h&feta magno flore, C.B.P. Lyfimachia purpurea, Fuch. Lyf machia lalicaria altera TTMr Lvfimachia filiquofa, Ger. i. Tab. Lyfimachium pnrpureuni, L>gd. Antonianamaior hifuta, Gefn. Hort. Onagra campeftris, Crf. Hw MluftriWJ Lyfimachiam major caules edit bicubitales, hifutos, quibus e regione adnafcuncar & fingala genicula bina folia ternasant quaternas in cialonga, hifuta, crenata, in mucroneni definentia: ex fummis raniis proveniunt Sores tetrapetali, (atis magm, glcgantis rubn coloria, nonnuncuanTMbd quinfiftunt filiquis longi., quadripartite feu in quatuor locu fingulis loculamentis continetur unica ferres feminum pappolorum, p₃Kicub fcpmmedTo ongitudina Uter adh^srenti^Um: fthqw n ficcatt: verfia cimas at> *^{ucui}an lepto^m - uacillitariam, (eminibus cum vento avolantibus, & cefe ubi vento aHafi nuntur & reflcduntur q[^] provenit in patu ftibus quatilibus, flaviacilibos & humidis lods: cecidennt, P^rAP^o r(-us cu fdc m finem reperiuntur filiquis quadrifariam fills & c apertx, (Lm^r oret *¹¹at[^] ^[^]mi(V^{ls}, partim reftan Eibus in filiquarum parte inferiore, nondum adhuc apertaj nibus parti

radice V^f filiquofa hifuta parvo flore, C.B.P. Lyfimachia filiquofa 2. Tab. Lyfima I^a & ucfi^o hifuta tiore minore, J. B- Chabr. Bipedalis est haec Lyfimachia, alias vix ch- |yicu, n ftiperans, caule rubente, rotundp, ftatim ex radice in ramos plurimos oppofuos brachiato: tolia funt hifuta, oblonga, crenata, modice in acumen definentia; filiquis lero long^{mb}-> hifutis infident flofculi eKigui[^] tetrapetali, longe minores quam fuperioris m^joris fupra defcrip³C, coloris ex rubro pallentis, vel albid: ladix multis fibris capillata. l[>]r^o, *vnic fponde etiam in aquofis, paluftribus aliifque humidis locis, ad ftimenta. Floret ftaK; femina fubruffa, exigua, Candida lanugine implicita, paulo, pofl maturat. Major est & minor, utraq; in Prodromo Cafp-Ban hinde feribitur: perenniconftac radice.

S- *Lyfimachia filiquofa* glabra major, C. B.P. Lyfimachia filiquofa, Ad. Iob. Major, Clot- Hift. Lyfimachia campeftris, Ger. Lyfimachia filiquofa Horc albo, Tab. Pseudolyfimac¹ parpureum, 1. Dod., Flore est foec pallide rubente, rarius albo. Huic cauliculi font bitales, ispenumero complures, ramofia c<retes; 5foUa latis lata, glabta, "crei>>, Salicis tolia: flofculi in fummis virgulis filiquis exigui⁵ antea enatis infident, dilute purtarius albicantes, Irequentiflime mbent, color eleganter purpureo, ceorapccal[^]aanaoqi jorescyjandoque minores: in filiqttis poftevanidos Horesexigualatent femina inquadrijj loculamento, quae molli, tenui, cand' tdaque bnugine impllcantur, reliqaarunf Uvx i^{mi}lt[^]

more: habet pro radicibus tenues filbras interramdemiflas, exquibuscopiofefopoffemitiaad niaturftatem perdu&a egregium foliorum numeruni dehuoprotrudit Plantaeft perennis.

6. *Lyfimachia* filiquofa glaBra minor, G. 13. P. *Lyfimachia* filiquofa minor, 3. Tab.*Filius ante patrem minor, Gefn, Col. Flofculi rubicundiores, alii ex rubicundo colore pailidiores* alii pirorus candidi. ^haec ab ahguftia & longitudine foliorum, & tenuitate omnium partium, a priore facile diftinr iitur. • *fiofculos* primo omnium gerit minimos prater 7TM Taberna>montani, cujus foll- fu. iu *anguftiora* & tenuiora, quze mutantur fecundum foluni. Paflimmultiplicat entia fine'neceffitate Theodoras Tabernaemontanus*

§.2_k L Y S I M A C H I A lutea corniculata non • pappofa.

7. *Lyfimachia* lutea corniculata non pappofa Virginiana major, nobis. L^fimachia luj:ea corniculata, CB, P. *Lyfimachia* filiquofa Virginiana, Park. *Rxc* *Lyfimachia* peregrinanon iTiultis ^bhinc annis ex Virginia aliifque America? feptentrionalis partibus, feminibus in Angliam delata & hicfota, ad cubitalem & bicubitalem aliquando altitudinem provenit; folia Labet prima glauca, longa, orbiculariter per terram ftrata, finuata, mucronata, palmum fuperantia, latitudinevix unciam excederftia, quafunt crafa, l^via, pailide'virentia* <k inacutum mucronem definientia, per quorum medium cofta alba, ut in *Lyfimachia* Chamænerion dicia, excurrit: pr^difta folia exeunt ex radice longa, alba, digitalt^l. rfafititudinem filperante, paucis fibris capillata; caulis exfurgitinitiorotundus, atfupra medium ob plurimoji ramos angulofus,* fubcinereus, laevis, ftatimquein breviores, "mox majores ramos, hique in alios late expanfos brachiati, qui rotundi paucidimis pilisdoriati, hinc inde parvis maculis rubentibus variegati, ex quibus tanquam ex poris pilus exilit. Ex alarum finibus p^diculus articulatus & rotundus prodit, cujus pars fupra articulum triinicialis, fitulofa, cui flosmagnus, flavus, quatuor petalis confans, extra folia effeftur, qui cum primo flqre incipit, quadranguluseft, quo aperto vel fole tantum lucente in ejus medio ftilus confpicitur, quiviridis ufque ad articulum defcehdit, & apicibus quatuor fulphurei coloris, crucis iimodum difpofitis, donatus eft, quem ftamina octo circumftant, quorum quatuor fingulis foliis appofita, alia quatuor ipfis interjefta font: hifque fingulis capitulum oblongum albicans infidet: ipfi vero flori calycis in modum fbliola quatuor, otlonga, angufta, pallida, fubjiciuntur: flos odoratus eft, nonnihil ad Keiri vel potius Liliafphodeli lutei odorem accedens, ultra diem non perfiftens, cum is qjji fub vefperam aperitur ad frequentis diei vefperam flaccefcat, un^e Ephemera dici meretur. Flore cum pedicello dilapfo altera pediculi pars fequiuuncialis fenfim ad uncias binas, etiam ternas, oblongatur, & in filiquam feu corniculumabit, & propter fenien cojpiofuni, nigrum aut fufcum parvumque, quod continet, intumefcit, quodqu<?ubimaturuit, ipfa cornicula, qux utrinque ad caulis latera numerofa fuit, in quatuor partes dividuntur: ex femine fato tota feftate & hyeme fequente fine caule. remanent plants folia per terram ftrata; at frequenti anno circa Veris finem caulefcere, & Junio flor ere incipit, & floret & femina perficit in Autumni finem, atque. cum fit biennalis planta ?x femine deciduo Autumno diiabente, fingulis annis in hortis noftris copiofe confpicitur fine caule, adventante fecundo Vere caulem erigit & femina fua perficit.

.8. *Lyfimachia* lutea corniculata non pappofa Virginiana minor, nobis.. *Hxc* in omnibus, priori'convenit, nifi quod folia producat dimidio minora & anguftiora; flores pariter dimidio aut faltem multo minores, nee tarnalteafcendimt caules; in cseteris omnibus majori convenit.

TEMPERAMENTUM & VIRES,

Aqua in qua radix LyfimachU latifolijt madutrit in potu data, duthote Diofcoride, /eras viitigat ifcicures reddit; illita quoque ulcer a malign a mulcet. Adjecit Cratevas^ inquit Pliniu6, Oenotheridem^cujuiasperfu evino feritasomnium animalium mitigantur. Eperfe Omotheraafferentia feft ulcerafanat, it a %*&<>&'&** Diofcoridis exponens. Hujus radix, inquitOahnui^ arefacla vinofum quid dam redokt; fedis maxime eft facilitate vini.*

HALLUCINATIONES CAS. BAUHINI
Aliorumque Authorum.

P^{A-44} & -4T- CafartaBitthiniu malt caSotnt
Lyfimattlix liliquo/a tetrapctaU jpecies, inter
Uigitahm, Ephemerom fcranicam , <3 Ttprtum:
cum cutm Lylimachiefint plant* coTnkulatx, tiua-
dmapjuUres & peppefx, debent remittt adfiliqiiQ-
Jiu tctrabttalat, c? cohcaru poji jrtiquofas buapju-
lares adearunfi>uni,pojll Cbdidonium gfamanam,
qmbus 4 pntulum junt affinet.

Not* aptii Cajparnm Bauhhum in Pinacepat.
Hi, Q ?4d. Ly^{mm}him dzfiriliutianem tife canfu-
J-pmam. Prime pa%. 24s. colI ipl.i. 'Lyfimacbtia
i'tut major, qua UtofcontL), C. B. P. S tbtde^col.
I.pi. (I. Lyjimacbtia lutea minorfaliu nirrit
mtatl, C.B.P. i m b . i . i . Ulyfina i a trifolia
lutea bicata. C. B. P. S tbtde^col.
ta fiole gkbofo tuteo, C B.P. Omtus h# l.yf>+
machi* iptmjc did* authoribu,, jlonm Rerunt
quints at *<petatit con/lantern-, cutvanefernti
juecedit , rotunda Piji mtdii mainitudine,
(ivifa j mult a minuta jmina non
pappoja .-, Huiment; ex did) magi) acccdunt
Juatiter predict* plant* (a numero peta/oram in
trtbm , Scaplt :!, feminaUbus) Lpbemero ti Btat-
tan* qttinta Settiant a nobh xplicandi'j, %otam te-
trapualit fdiqoufis fernine pnppofa doaatis, quaUs
J'nt Lyfimathia ptaprit fie did*.

^P>£. 141). col. t.pi. 1. Lsfimathia fpicata p*r-
pura fort PUnit, C. B. P H<" P^{ia}ta j^{ia}rem
gerit quatu aut fenk taati) donatum iti margtne,

intejrrum infitndo, I { ... hivalvB
filattarix injlar, plu ... femina in f, con-
tintfu; ergo non deb ... rtreptu ' • fib-
tyiafis quadricapfka-i ... appofo I " •
fedaptiitt mtn oj intone reftrttm
ties prtejtittimu: SeHione qmntabujm

Pag. eadtm col. i.pl. > < • Lyfimacl
rulea, C.B.P, ibidem col. ;.pi. 11, l.vfi/iim
b.-a nan ftliqu-ofa , C.B. P. Lyft madia pu., .."
jicumi jtu minor, Cluf. Hijt. ibid
LyfiMacbtia pmrp*r*-e*ruU*, C.B.P. iyfimcubi*
rubra minima, Cluf. Hijl. Omntt hmtrapanOf
'urn Satfili&rt*!* tetrapetaU, dehtnt itdtkicuhfqs
• plant as fecanda d>jlrib: Ai<ine terti* foji
itojirie txpltc^{an}la\$ (ad l/rronictu quartan j
;...: thfficj) omandari, von aetem hie p
Lyf...itbias fliquofo tetrapetafa* papprfi

Pag. etidem iol. 2. pi. 111. Lyfimackta
galericulata vel Graiiola txruha, C. B. P.
planta galeata vcriicillata futejyata , cij.,
adgale at M vertical (at asj tuteUatat refern V
oi'tava nofiretraSaudju, no., atern lyjimaihta <U-
tenda rjf, quit propnc hquendo eft Jtfiquofat<tr<fpt'
tala fSpappoja pla nta j ergo om tt prtrdid* pl*»t*
argumentando a fint ultimo, debent refen t adtr*i
bus feu. clajfes ad quas jure [pertain, non ante,
fujijijime tradi, qucmadmdum >tobl C/lfhariu Ba-
li/iits cateriqf authoris exhib tier tint.

S I L I Q U O . S i
Tetrapetata , bicapfuiarcs, tricap'fulares, quadricapfulares,
& multicapfulares.
P A P A V E R . '
* c A <P V T XV.

MH K n N a pa M»M», non minijlrando, quod vefcentcs fuk muniis fungi ncri polfmit.
tints Papavtr, Diofcoridesl.^cap.64, 6^'isr 66. quihque genera prupofuh; !,««««
K*s Ptyaver erraticum^ a flore frotinu* deciduo^ auipuaiceus, interdum dim, 11. p<>*
Vp@' Papaver fativums quod fmimtandido, quod ItAcwu™. 5.'Silveftre duplex, unitmniFU
fprnw, quod *\$*s isr quibufdam 'puU , quod e /capo fuccu* hftcus emamt.: aherum 'map*
fitveftreis ad medtcinas vakntiut. 4. Acwr w-Sf-ns, ti Si*ty_m Pappver cormculatum. a &\$"
culomcormculorum modum inflexo aut marmum. 5: t^migi^K Papaver fpumtum auuher
tota eft fpumta, quibufdamH^Ufertick-urn. [Cum h*c herba filLychnidis ipecies, non
Fapavens, nondt hums loci, ideo nos tandem remittimus ad Lychnides quintn noftni
ftione collocambs] Theophrastu* t. t.HH/). 1 55^99. Hfl.88. Sativi mntim: filveftm*
gema, HLL IB phlra notavtt, utcormculatum, nigrum, erraticum/lore ruffo: Herculanum
foto Stmhfh PMv&Lao.c.l%. Satwumalbum fc mgrvm ptopofuit is, ex UHi* fcapo ""
ctjo opium cogi mnet: at cap. 19. inter fat hum & f,h,e]re mJimn genus Rltr^fi^ trratiam
conjtittuu. SivtftnumunumKnuiQratit^quodatiqmGlaucion, alii Para lionvocant : alien*
Heracleo n^ ab alusApbron: tanum gams tjll Tilbymalion;Mtconavocant, alii Paralhm.

S. I. P. A.

§. I. FAS AVER CO'RNICV L, A T V M

Papatercorniculatum hanc noram genericam habebit, quod flpores tetrapetalos gerat, atque iliqnaa longas, bica-ofiafares aut rricapfulares, ejuadricapfulares, id est, filiquE conihnt variis * oculamentis, v iedio fepearanre vel duplicem fenem feminnin, vel triplicem quadru-
licemve: no m c^~ (1 aot: ^int va,vu,x roc e^e fews feminutn, Pa paver is cor-
rrcs re ,v antu ' fpecies & magnitudine & floris colore different©, Qintque aut
m:ljol-earutminore, vel rlore Phoeniceo,vel violaceo.

Pars TABUL/E XIV.

Papaver cornicu- * latum-	1. Bkapfulare r* 2. Xricapftllare 3. Quadrht- / are	'Flav*ChujEYft. QPapaver carniculahun luteum, Fuch ^Pbcemceo, Ati.4A.Cluf. Hi}. Papaver corniculatum rubrttm,* Dod. 9 Viofaceo, Chtf.H'tft. Papavncomulum flortviohceo. Gtfn.Hort. Ger. 5
---------------------------------	--	---

Explicatio partit Tab, decimequarte.

9

^Apaver corniculattim hiteiim K ^TM* Diofc. Tlieopli. SUveftre Plinii, C. Q. P. Fapavef
Coniiculatum* Jus, Dod. Fapaver corniculatum luteum, Fuch. Tur, Eyft. Vapaver
cgrmculatum iiavo ilore, Cluf. HiV. Hoc Papaver cornicularum mains luteuni reliqna Pa-
pavera conuculata foliis calididis & ambitu infraftisac laciniolis fuptnit, tjuaetamen non
func lsvia fed nonniliil lanijginofa, fere inftar loliorum Verbafei; caules liipt pedale.s &
fefquipedals, ijfirmiores, non recti, fedrellexi, quique in phircs alas dividuntur: fiorcs
tetrapetali, magni, ocliri colore luteo paUenr, cum umlcisftaminulis iaturatius hrcis, qui-
bus fingulis dcciduislicceduntruigula corniculacompreffa, ?ncui-v3« palmariaSf aliqquando
bipalmaria, bicapfularia, tripliciapiceinfummo tefta, fepto mtdio, tra/fo i^tts; dirimenta
duplicem feriemfeminumnigrorum: radix fubeftoblona, craJior, in mukosRCbartsa nnos.
Sponte fun in maritimis provenit, aliiqque aridis & -fqtialidis, quibusdeleftatur, Jocis. Vul-
neiaw hie herba fuccum praebe't lucctim, mqnit Dodonxiis, qui grffatas (iilfilaginem refrrt
prope maritima loca, in aridis & ^ hortis fucco illo magAa ex parte defititntr. Lapfus est
h?c Dodoiius, neque in maritim is, neque in aliis aridis locis aut hortis fuccLim luteum nobis
uiiquam contpicere licuit. Floret Junio ac Julio; verfus Autmni initiumfeminaperikit.

i.Paptiver cofnicularum Fhcniceum hircfurum, C- B.P. & idem glabrum, C. 13.P. Papaver
cornicalatLim rubram, Dod. Cornicularum tllore Phxniceo, Ad. Lob. Cluf. Hid. Hujus folia
ErucE funtfimilia, laciniatn & alte inciJa, vulgmblucei muko mipora, tdoiior3, non adeo incana
ii'ft paulaluro hircfua: caulea pedales & alriores, vutgaris catilibusreRniores, & graciliores,
procumbuntque iit ttrram: riores etiatt quatuor petajis conftantts, minores, oonnnquam
incenlb colore rubcuc, & illi prinii func quos plJica florere incipiens producit, incc-icfurl
langiitiioie & tjuodaftimodo palicnre COIQC, mediis foliisadFJjocniceum cendentibus, qua-
Icsrerein siccroHoiiegenere, qui a vulgoherbarioruniflos Adonis dicitur, iimirumquando
mediam statem fuperans planta, jam deficere incipit, & Kirfurie ilia in caule & foliis fpoliari:
adquirunt huius vigentem & vixit primum procreantem plantam compiciat, deinde jam
adultam & fenefcentem, ex florum colore, & caulis ramorum foliorumque hircfua vel gla-
britia, facile quis diverfas esse ftirpes fibi perfuadeat. atque ut verum fatear inquit Carolus
Clufius, dam Salmantici viverem mihi impofuit: floribuspra:longaf[iccedunt cornicula vix
triulia, quorum fingulis infident latiafcualaquaedam veluti O]trcula"vd oapitclia, arfue
fingua cornitula tribus loculamentis diftinftis fepearancur., in fingulis ies ies feminum ni^rorum
htef, QB2 proprits feptis mediis adherent, 67 crilar'ram dividitur tiiuniquodqiicorniculum,
Nafcitar in agro Salmanncenfi fecapjdum vias & agrorum margihts. Horet iltic Junio,
lemen antefn Julio profert, in Septentrionalibus iatjm noff nifi Aagiifta & Septembn
iiorre voluit, nifiAutumno feratur ut poffit nanfire hyemem, tune Maio& Junio ttorere
"onfpeximus. In Vienncnfi eriam agro per Moraviam atque Bohemiam'fponre nafcens&
fiores proferens Junio menfe, in arvis prifercim avena confiris fecundum vias publicas,


obfervabat Carolus Clufius, cui non cōtigit omnibus* in illis locis crocēum in hac pfanta fuccum videre, tametfi non deiurt qui famili fucto turgere eam plantain putent.

3. *Papaver cornutum* flore violaceo, Gefn. Hort* Ger.^f-*Papaver corniculatum* vřob.ceum, C. B. P. Lob. Dod.Lugd. *Papaver corniculatum* flore violaceo, Cluf. Hift. Huic folia funt multo minora, tenuiora, valdemirrofunt ditfe&a, noncandkantiãit^u^enòYum toVn, fed viridia: cauliculi tenelli, hirtuti: flos fuperiorisTion minor, tetrape'^lus, coloris ex purpuraerulei exfaturati, & nigiae Violaē pxne xmuui, fugaxadmodumū. Y¹¹. le\iilinia aura excutitur: huic fuccedant cornicula digicali duntaxatlongitudine prsdita, plerumque etiam breviora, exilia*^{duriuicula}, rigidiorequehirtutiedonata, ex quatuor diftinētis iocularienus conflata, quatuorqae valvulis, toridemque feptis mediis que velatidiaphragmatisquaduplicem feriem feminum valde exilium, coloris tt cineraceo albicantium fepearant ac diftingunt: radix tenuis,* ac inutih, vixfupra'annuum fpariumperdurat. Castellani genus hoc caciuleo fiveviolaceo flore i?o/e//tf flonnullis *Amapola* moradas* id eft, *Papaver erraticum* purpureo flore, à fucci Mororum colore appellabant, nam erraticum *Papaver* Hilpani sicuti folijs vocant. Invenitur in pluribus Hispaniæ locis, fed non nifi inter ligetes; Maio nactefloret; & Junio femina maturat. Collegit etiam Carolus Clufius in agro Narbonenfi in arvis Avena confitis, non procul Latera, fecundum fluvium Ledum pauloiniraMonfpelium.

§2. PAPAVER CAPITATVM MVLTI-CAPSVLARE.

Papaver capitati multicapsularis duofun; genera, Plinio auctore, filvestre & fativum. Utrumque ^ronota generica hanc habet6, quod tiores producat tetrapetalos; cumlcunqae coloris autraagnitudinis, atque fingulisfloribus, ficex quatuor petalis Srplunbusfta.m.nuhs conflatis, evanidis fuccedunt capita communi cortice aut tegumento obdufta, in quibus plnrLtacellol*, feu loculamenta confpiciuntur membranifuis diftinfta 7 quibus adherent innumera femina niinuta, rugofa, vd alba vd mgra ant fafca: corona teUau leu rad.ata iategunturfineula capita five longa, five romnda, & quod notatu, dignum quocunqae apparent radii in corona fuperiori capitis, totidem intus ceruntur cellula? propnismembranis feeparatae, numero incePto, nunc plures, nunc pauciores; a numero leptenario ad quindenarium faepiusmimeravinws, Idem confpicere licet in *Papavere Rhoeade*, & *Argenionsqua*: funC *Papaverum fpeci^{es}* etiamfi abauthoribus diverfis nominibus atftiantur; in fingulis enimantidife notis conveniunt cum *Papavere capitato multicapsulari*, atque fuccum eftundunt lacteam non minus ^m hoc.

Pars T A B U L E XIV.



Explicatio partis Tab. decim* quart*.

1. p *Apaver* capitatnri vulgare fe ffontaneum fimpiex femine incano, vigen in fegetibus, N' nob. s *Papaver* vulgare & 1. *Trag* *Papaver* ffontaneum fil veftre, Lob. *Palaver* hoc ffontaneumfimphce flore caule, foh, flonbus item fc capitulofativo minuscrt: flts ex czru- flL ? p P U f p U r obf?lc*nni?1. & J lltum D P ^ beum quendam co'rem refert; capitulum quoquerorandatur; fedcapiteexficcato, 6, m, turo femine, forminibns aliquot, qua par^ opercnlm ftellatumipfl infidct, circuiariter hiac; foramnula pr^diaa a natura defignata funt

font ut facilem deflenti femini viam praebeant; quod facivisoncontingit, quofnrrfdam recjufr permanent calyces fen capita, ur. nallum elabi queat fenitfn.

rapavern fativatria funt, album, nigrum, utrumque mains & minus pradi&o, quod ex fpontaneo in agris provenience fit hortense feu fativum feniine futco.

2. *Papaver* hortense (implex femine albo, nobis, *Papaver fativum* Diofcoridis album nil, Match j. Trag, Dod. *Papaver album fativum*, Lob. Ger. *Papaver fativum* :andid Hoc folia profert oblonga, latajsvia, Lacruca* foliis longiora, can- .margii. >fe: caulis fivefcapus re&is, bicubitalis, aliquandoaltior, incujus Hores canflidi, tetrapetali, in quorum me Momoxabinitio apparet cijjutulum ftel- rantisftaminuliftipatum, quodadultiim. era. am oblongam fpmavn habet, & fuperi- :aroperculo contegitur ftellato, excujusituitu&enumeratione, quot apparent radii iore capit* circulo, tot membranarum feu feptis membranactis diftinguuntur loctila- in quibus fingulis iemen rugofum, minutum, rotundum, 5f candicans copiole nu- radis fubeft defcendens io altum, quae nullius est momenti feminibus ad maturitatem tis: flos, inquam, ut plurimum candidus, vel nonnunquam leviter purpureus, & aliquan- f eftlcivitercinereo, ungue purpureo velcandido, velplumbei coloris maculis intecri. :minerlavo& hoc *Papaver* 3. & Iuteum est Trago. Odore foporitero toti **bscplanca** cae- i^claffis ftipcrat-

tf/jwr hortense fimplex femine nigro, nobis. *Papaver femineatro*, Fuc. r fati- ^rum, Dod. Hoc priori est simile, fed capitulo conftratrotundiore fi., bato: eganti Piianiceo rubet colore; femine nigricat, atque sic facile diirnguitui . | riore Ibo, feniine fcilicet nigro.

aver flore pleno albo⁷, C.B.P. Flore multiplici, Gefn. Hort. Cam. Ep. Album Poly- mtlion feu multiolorum, Lob. C^r, *Papaver* flore multiplici petalorum numero dentb, Casf. ift & Ioc majus & minus iloriscalore purpureo, rubro^rubeo faturate dilute, albo, vio- aceo & mixto, Iiinc 7. figurac apud TablTiicmontanum & Gerardum ipfum feqacntem fine •lecelfitate.

Papaver flore pleno femine nigro, nobis. *Papaver flore pleno nigrum*, C.B.P. *Papaver* iigrum PoJyanthon, Lob. Ger. Huic jungi pteft *Papaverraciniacis^oribus*, C.B.P. *Lacina- tum rubrum & album*, aliud **angaibufi** purpurcis, aliud unguibus 3lbis, I: yir.

4. *Papaver* criatatum flore 6c femine albo, C.B.-P. *Papaver* iimbriatum feu criatatum album, td. Lob. Lugd. *Papaver* flore fimbriato, Csf. Genus hoc *Papaveris* iJores habet plenos, Jbos, quorum petalafuit multiplicata, nOnraro fimbriam inftar, incifa ac diffefta ap- iarent: color liorum fsepius albidus, fubmde purpureus, quandoque ex utrilque varieper- lixtus- Rubenc vero nonnulli intenfo colore, purpujae acmulo, alii tamendiluttus, fed minus iter. Capita hujus generis, veluti filvestris feu fpontanei, hknt fuperiore parte, hcile- n ab iis excidit, quod modo albidum, alias nigricans est, profloris videlicet colore Tert. Effla itex capitulis horum omnium vulneratis liquor candidus qui ad medi- s colligitur, & denfatus opium appellatur, colligitur tamen praecipue ex lecumio hie o, non modo Diofcoride, fed & Galeno ac Pliniorum testibus. Exprimitur ex capitibus fimul fuccus, quem Mcconium nominant authores. Seruntur hxc genera in horns &a- rvia apud Afaticos, in pridicrnm uf<m. Juniomenfe flores excunt; femine patilopoft perficitur, capitulis plenis & exficcat.

Papaver criatatum flonbus rubris l^mine nigro, C.B.P. *Papaver* rubrum florum foliis crenatis, Gefn. Horc. *Papaver* fimbriatum feu criatatum nigrum. Lob. *Papaver* 2, foliis dif- feftis, Dod. Sarivum rubrum fimbriatum, Lugd.* Hsc est tantum prioris femine albo varietas/ dilcrepans femine nigro, floris enim colore variat, fubinde albus, frequenterrubens, quando- que exuero quemiftuo, & qui rubet quandoque colore purpur^, aliquando dilutius rubet; Iiinc *Papaver* flore pleno nibro multiplici incarnato, multiplici purpuraefcente miniato pleuo, flore pleno argentei coloris, multiplex album onsrubicundis, omnes hx varietates citantur exhorto Eyft. qui trafrat totlcones exhibete jafdem fpeciei vanantifcolorem in flonibus.

• T E M P E R A M E N T U M & V I R E S .

Papaverum omnium vim refrigeratorem esse testatur Galenus lib. de Simpl. medicam facult.*

* Semen, ut idem ibidem afferit refrigerandi habet facultatem omnifariam esse panibus noster ceu condimentum infyargitur, fed album nigro, eodem author, praeferat corporum noster in memcrabik

immorahlk pdtfian alimentum etiam addit. jBft autem feminis bujus faccharo incruftati in fcundk menfis quandeque ufus, cum aim tragematis, refrigerandi autem ejus tentia baud magna obfervatur% ad fomnum concili an duifi non multum eficaxeft: oleum quod ex eo exprhntur: gratum ac edule eft, panique illitum, aut alio quovis modo incibo, chra refrigeratw.nhfinfumfunitur,confi,citur autem exfecundifeuprimi ffont ami femjpe frequent im> Codik five capitulis major ineft vis, qu<£ ad fomnum cohiliandum defuxionifque ffitendas ac reprimendas plurimum faculty propinquamque fed tamenmitiorem vim Opio cliiuit. Opium for-Uffinum, hoc ignavius Meconium, utrnque quovis modo velfumptum, vel capitii applicatuffl-> fomnum ac fubinde prcfundum molefiumque foporem conciliate Opium copiofius¹ haufum, ut PUn'm afferit, tlolores omnes fipit, fed cegrius curabik malum non raro relinquit.

O P I U M five S U C C U S P A P A V E R fs.

Cpium quod eft liquor Jcu fuccusex Papaverum capitihws exprefus, aut file extrakente, „p” capiti bmpunttisffonte emanat, refrigerate incrajlat exficcatque. Sumptum magnitudine Lrvi JJcresfopot, fomnum conciliate & concotlionem adjuvat, tuffi celiacorumque affc Bibu, auxiliatur; verum fit cpiofwhauriatur, accerffito letbargo mortiferum eft. Eft < & ad capit* dolorto efficac; [inmrcfaceoirrketur, ut & aalaurium dolores fit cum Amygdahno, Myrrhairs Croco infili; oculorum inftmationibws cum ovi lfto tofto is Croco proficito. Efficatofis vulncribm cumaceto, Podgri* cum lacle milkbri & Croco utile, denique fed diftribueof ditum fomnum facit. In eo liquor* genere prsfiamffimus qui denfi* is-gravis, odoratu foporifer, guftu amarus, quique facile aquadiluitur Mv^ candidusneque afper, mqu^ m/J.. quique inter colandum non ut cera coit den/a f™ Jed fob expofitu* diftunditur, AJ. 21 n ••*ri nhfeurave lucet navfpiae am demque hoftquam extw- & adlucernam accents minime atru. ODICUIU. J. J. v. M. - H. u. t i t u t e x i t f u a m o d o r i s v i m e t i a m n u m c o i j u u u i u n t p o r r o a d m i s t o g l u c i o . a u t e u m i m u r a l u t m J - i n r . A u h e r a n t • v e r u m q u i g k n c i o f u c a t U 6 e f t , d u m d i l u i t u r C r o a c o l o r e m d e n i a e z u m m v i t i a t e ' m v a l i d u s e f t , i n o d o r u * a t q u e p e l l u a d u s , i s ? J * ^ , , , , i t L a c u n a . N o n l u l l i c a p i t a 0 ? p l i a P a p a v e r i t u n d u m t & p r e f a e x p n u n t , m o x t e r e n t e s i n m o r t a r i o P a f i u l l e f f i n z u n t , i d M e c o n i u m v o c a t u r m u l t u m O p i o i g n a v i u * . O p i u m q u o d h o d i e a d n o s c o n v e b i t a r n o n e f t i f d v e r u m i f r l e g i t i m t m e l a c r y m a , q u * e x i n c i f i p a p a v e r k c a p i t e e x i e r d t c o n c r e t u m] M o t u * h o c e x f o l i o r u m & c a p i t u m c o n t r i t o r u m f u c c o c o n f i t u m e f t , i d q u e M e c o n i u m v o c a t u m e f t , O p i o l o n g e d e t e r i n * : h < t e M a t t b i o l w s . S i c e t i a m A m a t u s , q u o d e x A p u l i a h d i e V e n t * l * * a f f e r u n t , i n q u i t , r e v e r a M e c o n i u m p o t i u * q u a m O p i u m a p p e l i a r i m e r e t u r . O p i o o d o r g r e w * 5 a c T M h e m t n s e f t , a m a r u m ^ o s i n c e n d i t < x f t u , i n f l a m m a b i l e , u n d e c o n e l u d i m u s l i c e t t r i b u a t u r e i v i s r e f r i g e r a n d i , e j j e c a l i d u m \ n a m o m n e a m a r u m e f t c a l i d u m ; o m n e i n f l a m m a b i k a b u n d a t o l e o , i d c i r c o c a l i d u m ; c u m q u e u t i d i f t u m o s a c c e n d i t , q u o d e f t f i g n u m q u a h t a t i s a c l i v e t ' O p i u m i n i p f i N a t o l i a c o m p i n g i t u r i n m a f a s n o n e x c e d e n t e s p o n d w s q u a t u o r u n c i a r u m a u t a d f u m m u m f e m i l i b r * , v e r u m m e r c a t o r e s u t p l u s l u c r e n t u r , m u l t i p l i c a n t d i m i d i u m a d d e n t e s • O i t a u t m a f f * q u * V e n e t i a n a d f e r u n t u r p o n d e r e n t f e r e l i b r a m u n a m , b < * c B e l l e n n i u * . - O p i u m r h j m i c e p r p a r a t u m d i d t u r L a u d a n u m f i u L a u d a n u m o p i a t u m . C e t e r a d e O p i o v i d e a p u d S i m e o n e m P a u l i p a g . 4 1 8 , 4 1 9 . 4 2 0 . u f q u e a d p a g . 4 2 4 . c l a f f i t e t i * o p e r i s B o t a n i c i q u a d r i p a r t i t e i s r J o h a n n e m B a u h i n u m ^ p a g . ^ i ^ ^ ^ & 3 9 5 . / / I 3 0 .

§.3. P A P A V E R S P I N O S V M L V T E V M .

Pars T A B U L i E X I V .

Papavtr capitatum multkipfulan { Eterget KS - Spinofum foliis candidkvenis not'at is flort luteo, nobis. Pif" T M f M m , C & ? ? F n d _ M a l t L E l B a u L 5 " " < - ? (6.Simplici. \$ I T ^) p \ Ma'wre < m iRubro. § trratikum five Rbeasitlorepbzniceo } 8.MinoreSimPlicij^R A ^ u r O §

Papaver spinofum luteum foliis albis venis notatis, nobis. Papave? spinofum, C.B.P. & Prod. Clqphit.- Ficus infernalis Itolorum? Peielegans & plane novum est hoc genus Papaveris 70. ab hinc annis à Cafp. Bauhinodescriptum; pedalem acquirit caulem, digitalis craffitudo, rotundum, interne candicantem, quibusdam spinis obfitum, per quem inordinata nascuntur folia cauli nullo pedic/lo adhaerentia, (td m fedium quodammodo ample&entia, finuofa & aliquot laciniatis vliyi£, ipfis laciniis & crenis margines foliorum^ambientibus, & in spinas definentibus, infcrne'canefcentia, fuperne viridia, albis tamen venis per foliorum & lacini- q/um longitudinem excurrentibus, inftar foliorum Cardui B. Maria? vulgo nuncupati, multo minus autem ampla: ex horum alis nascuntur rami spinofi, fimilibus foliis, minoribus tamen praediti, in quorum alis & caulis fastigio nascitur capitulum triangulare spinofum in tres majores firmioresque spinas definens, quo defluente & dehifcente fl^s sese ostendit quatuor petalis confans, colore flavis, corniculati Papaveris vulgatoris floris inftar, odorem Che- i' Hprui* majoris quodammodo referens, caducus admodum, in cujus medio sese exerit capi- iulum spinofum pentagonum multis ftaminibus flavis id ambientibus, quod summa parte rubefc- dum tenellum est, maturum vero & adultum nigricat & pollicaris est craffitudo, fequiuuncialis longitudinis, frequentibus firmisque spinis obfitum: femina continet in locu- iamentis suis rotundis rugosa, nigra, feminis Papaveris ceratidis rubello flore inftar, sed ma- jora, cui & perfimilem habet radicem. Annua est planta, tota flavescente illico inftar Ckdidonii majoris abundat. Floret Julio & Augusto, femina paulo post maturefcunt rugosa. An Glaucium Diofcoridis? Glaucionfuccus est herbas foliis fere Papaveris corniculati, quae fucco crocei coloris copioso prasdita sunt. Diof. lib. 5. c. 100.

§.4. PAPAVER RHOEAS feu ERRATICVM.

Papaver erraticum feu *Pole** Diofcoridis convenit cum Papavere capitato multicapfulari, quod capita habeat multicapfularia, cum corona rotunda ftellata feu radiata, indigitante multa locu- lamenta, femina multa minuta nigra aut fusca in fingulis cellulis continentia, quae capita fuccedunt floribus tetrapetalis, ejusque itidem quaelibet parsrupta fuccum effunditkaeum. Abeodem differt etiam multis nominibus; primo quod folia habeat oWcurius virentia, magis incifa, magisque hirfuta, capitula minora, flores tetrapetalos, minores, Phceniceos, atque femina minutiora; est majus aut minus.

6. *Papaver* erraticum majus feu *Wm* Diofcor. Theoph. & Plinii erraticum, Matth. Cord, in Diofcor. Gefn. Hort Dod. Caf. Thai. Tab. Papaver Rhceas, Lob. Ger. Rhoeas puniceo ca- duco flore, Ad. & Icon. Lob. Papaveri huic erratico majori cauliculi & folia nigriora sunt hirfutioraque, quae utrinque altis incifuris inftar Cichorii aut EITICX divifa: flores è fastigio cauliculorum pulchro ac rubente phceniceo emicant colore, ftaminibus nigricantibus ca- pitulum medium ambientibus ftellatum, & multis loculamentis feparatum, radiis in parte fu- periore ornatum; hujus caput multo minus fpontanei Papaveris capite, lemne nigro, potius fusco plenum; radix minor inutilis efficitur post femina perfecta. Est & idem flore albo simplici.

7. *Papaver* erraticum pleno flore, C. B. P. Papaver Rhceas flore pleno, Cam. Hort. In fatis agris inter myriades flore phceniceo refertas, perraro reperitur unum aut alterum flore v pleno rubro, albo itidem, sed rarissime, cujus femine colle&um & in hortis fatum, fatis fre- quenter, cum in Gallia tum in Anglia, plantam ejusdem coloris & plenitudinis producere obfervavimus..

S.^^werraticum minus, C. B. P. Papaver Rhoeas minus, Lugd. Papaver erraticum minus, Tab. Foliis est minoribus oblongis, non Erueae per margines divifura, sed tantummodo ferratis, reliquis partibus priori majori fimilibus. Utrumque unacum Tritico, Secali, Zea, Hordeo, Avena, reliquisque frugibus, in agris, in hortis etiam gignitur; ubi femel repertum a?gre extirpatur, ex femine quotannis sese multiplicans. Sxpe inter olera fecus margines hortorum: flores belle colorati faturate rubri aut eleganter purpurei: inter myriades repe- ritur flore albo. Maioac Junio pulchritudinis venustatque quandam gratiam arvis con- ciliant, ruberrimo colore praecipue. Diofcoridi est ^o v po'«, Latinis Papaver erraticum Gazx iicitur. .Papaver fluidum officinis. Papaver rubrum & Rhceas, quodei cito flos defluat. tkcidunt tamen flores zque cValis Papaverum generibus, etiam & corniculatis; nulli Papa- veri diutinus aut durabilis flos est, omnium herbarum fere citissime pereunt eorum flores. Est enim omnibus tam Papaveribus quam Argemonis commune, flores antequam expan- dantur

dantur membrana quadam tenui ac veluti vagina quidam contineri, quae, ipso exere-
renfe tiore, induas deliifcens delabitur partes, 7, uibus apertis & uat napei: ah apparent ito
 post det Uientia. Rhoeadis itaque nomennon modohuic fed & aliiseadem de fiufa com-
 mune *eiVe* potest, si modo a florifaciii acceflerit delapfu; quoH st i'cm-»' <- prorluvio (urr
 appaiet) Rhoeadiscognomen accefferit, filveitrt quarto ipontaiu ^{qualtrau p} oprium ctiam
 erit, cujus utidiftum citiifimeaci"acillime femer excidit: deHuiti ^{mic} ^{...}, fed minus
 manitelte.


§. 5, ARGEMONE.

^{mm} in Mum Pap'avm fdveftri ftmilis tffhc. lib. 2. c'dp. 2 o S. radices rctundam
 quodnoftr & non convenit. Sic di8a quod *\$w.ocularum nubeculoi expurget. Plhiol'tb
 Argmcnia. Mojbi iria genera faciunt, iff id deimmprobant, cujm radix **thus** redo/eat
 dtiurflinius quatuor generf agnofcere^ ut lib. 21. cap. 29. Ammomn quant Argemon
 dixil \i.gmwsboctft ^ .genuf lib. ii^ .cap. \y. Lappam canariamcujus radix jy
 tbun fi;):!' <- '-rat Argemonen nuncufari tradit: quartumgenusftatui potest In^
 lib. 26. cap. 8. riu.

* Argemomn appellari tejlatur.

-aeo Papavcri fimilis est in omnibus fuis partibus eflentialibus uteju
 icam aflignare difficile ad mod am fit. Convenit cum Papavere in multis, primo.
 ejns pars nipta fuccum effundit laftcnm, flortm gent **tetrapctalam**, cui fuccedi
 mdncapfularis, cumcoronula feu operculo radiaco; fed diftert quod florea **tecrape***
 mntominores Papaveris, imoPapaveris Rhoeadisduplominore^ fif obfoletifcudUntioris,
 rubii coloris, filiquis hirtutas feu hifpidas fert, atque Infce notis pr^cipue diftinguiwr
 Argemone rubra a Papavere Rhoead. Argemones ipecies datur capite glabro, mulcu ion-
 giore Papavei is Rhccadis capite: fpecies Argemones quae funt floraluteo, pnmointuitu faci-
lius diftinguuntur aPapavcre Rhoeadc.&reliqms rlorembrodonatis Argemonis fpecies,
 a colore Boris-

Pars TABULA XIV.



Explicatio partis Tab. decimequarta.

9. Argemonecapitulo hirtutorotundotorulis canaliculato, nobis. Argemone capitulo bre-
 ore; C. b. P. Argemone capitulo breviori hifpido, J. B. Chabr. Argemone capiculis torul^
 c|inaliculatis, Lob. Ger. Foliacmittit Adonidisi' apaverifvecornic, ilativio! a-cci, tti iuiterdifl^
 alba, ierrata, piloia: caules ex radice fimplici, gracili, multos, pedaks, & majores, liirtito^
 weniolosi. Horesiunt minor esponice, dilutiustinfte, t^trapetali, rnagnitudine Vap^
 Rhoradw flonbas multum cedentes, & colore non tam **eleganti** rubello quam est & F^*
 Kliias, ^{form} atam. en. papaveracta; ^{hifce} ^{evanid} ^{fs} fingulis fuccedunt capitula **finгда** ova
 feu rotunda, Mdonis parvi figura, canalata feu torulis & fulcisprirdita, undiquepiis rigid^
 fcatenm feuh. fp. da, operculo parvo ftllato fe» denticulate. ttBa, radiortim numero in

to^t^T* "W*?*** -wtoMBWI feu **clalarum** membrani. ^{distinctarum,}
 virkZ^ . dia?^1 fp?^ti8 H. terven. cnubus, pradifts cellulas feparantibus, ^{quibus adhuc}
 v. r a^bo, adherent plunma mmuta, alba, rotunda femina, matun nigra **ragpfrgue**.

10 - ATppncm c; Ditulo tenuiore lonpmp W. r:~
 C. B. V. Lob. Lugd. Ger. Argemone capitulo longiore spinoso, J. B. Chabr. Foliorum hujus
 divifio minuta, Nigellae citrinae Inftar, pilis asperis obfitoru m, .um per caules, tum per
 ramos

fl- admodum caducii obfolete purpurei, duplo

triplo. minorcs quam Papaveris RhaSdis, quique capitnla poft fe relinquunt longiora, temnora, brevibus contertis (pinuhs mitiufulculis hifpida, parum cauliculata, multls locu- hmentlS ieparata, in quibus femina multa minuta, nigra, rugofa matura concludunetur: ra- dix longiufulcula fimptex, qua? femine matifro inutilis relinqukur. Utraque hxc Argemones fpecies paflim^p^ur in arvis fegetalibus, & fecus folfarum margines; prarcipue eundo Londi/lo verfus njo-um €^eifCC copiofe &c hxc &c prior confpiciuntur .vlhite florencs. &r ver- fus etofil,™ in m^rat)itnla feminibus onufta gerentes. Fforent ftfaiø& Janio, & per cotam

i

magis difticta breviora &

magisdaucaquamfunt PapaverisRhoeadisfoliacinusautem quamfolia Argemones è capitulo trcvicre & hirtuto; floreni fert obfolete phpeniceum, parvum, cui fuccedii: capitulum unciale glabram (qua nota a prioribus duabus capitulis hirtutis facile difcernitur) in loculamentis pluribus triangularibus continens plurima mimita femina, nigra, matura, afpera, aliorum ^apaverum ik Argemonarum ritu.

T 5. Argemom Cambrobritannica lutea capite longiore glabro paucis fpinulis^d loculamen- torum)unfturas ornato, nobis. Argemone Cambrobritannica lutea, Park. Folia plurima Irrotrudit hinc inde inordinatim longiufulculis pediculis coftas medias adhasrentiti, uno coftas mediae extremum claudente, in ambitu profunde ferrata, faturate viridia, inter quese oritur pe- diculus ipedalis & altior aliquando, cui adnafcuntur quxdam fbliola minora ad eundem mo- dumdi\$ofita: infummicaulifeus eorumque alis proveniunt flores lutei, ampli, rotundis ^uatuor petalis confiantes, pluribus ftarrfnulis in medio ornati, circumdantes capitulum mi- nus, fub exortu adultius longum, viridè, quod fiofulculis deciduis maturummajus eft, & lon- gius cgeterarum Argemonarum capitibus, tenuius verlus caulem, craffius verfus coronam Tea operculum in varias cellulas feu loculamenta divifum caeterorum Papaverum & Argemonarum more, paululum hifpidum injun6]pris loculamentorum: plurima minuta femina, nigra ma- tura & rugofa in fe continent fingula capitulum loculamenta: radice conftatlonga, extra fufca feu ruffa in multas alias fibrillas divifa, quas fingulis annis non perk nit superiores Arge- mones fpecies, fed multos annos durat. Provenit in Cambrobritannia, eundo ex comitatu Catnetljan, {écus vias & femitas, non procul a vico diciro %Uvfozvi\$.

13. Argemow Coirvin folio, C.B. P. Argemone lutea, Pon. Ital. Oritur ex radice pal- mari coloris Tubnigri verfus mucronem in plurimas fibrillas divifa, ex qua immediate pro- truduntur multi caules palmares, refti, nuqr, hirtuti; in quorum cimis proveniunt flores papaveracei, tetrapetali, lutei, omnium minimi: quibus evanidis fubveninnt brevia, viridia, hiriuta capitula, operculo ftellato tefia, repletis loculamentis feminibus minutis, ut videre eft in casteris antediftis; in medio pradi&i floris tetrapetali confpiciuntur ftaminula alba cum apicibus luteis. Folia exeuntia ex radice per terram fternuntur formã foliorum Ra- niir^ili Coriinãri folio, leviter hirtuta, iaporis acuti, fedmultominoris, quaminArnemone. Nalcitur in monte ditto Vette fupra Feltre.

§.6. H I P E C O O N .

Y n H K o o N , ol & <<jmQicii, PdpaveriDiofcorides 1.4. cap.68. fubjicit, cumeaclem ei fit natura, qu<z fucco Palaverk. Et Ptiniut li-j.c. 11.

Uyppecoon etiam fi mihi videatur planta fui generis, tamen propter florum Srfiliquartim aliquo- m0do cum filiquofis Iconvenientiam Papaverura claffi hie fubftituendam haud abs re fore pu- tavimus: eftque quoad filiquam duplex; vel filiquisarticulatis, vel bivalvibus, de quibus hoc loco dicemus: fortaffis nullibi aptius quam hie collocari poffunt, quippe quod filiquofae funt plants*

r i. Erettis articulattsWicurvedis, nobis. Hypecoonlegitimum, Cluf.Hifl. § Hypecoon Sil'i^X^ Propendentibu* nm articulatis bivalvibus, nobis. Hypecoi alter a fj>ecies, CBP%

r - X f Ttecoonfiliquisereftis articulatis incurvis, nobis. C.B. P. Hypedoon, Gefn.Hort. I—I i/l cluf. Hift. Hypecoon legitimum, Clufi Hift. Cuminumfilveftre, Diof Italot- tin* Lb* Obi. Curninum corniculatum, Ger. Folia funt huic plants multis incifuris divifa, N n 2 figura

figurá, lore
longior. f V* f ^ R T tñuifoliE foliis v?de *o><*, molli^oTM "men, & inardum
ratis, senis C^fD^r q^a iⁿ - f ^ ramos ciivin P"*"*** fltaihM onasti font, flavis, frtisado
ferius duo l. b. l. folia rⁿ q^{UIS} maiora, nervo vⁱⁿⁱ <*i"fcrisextrema parse testa (quobtufoir
est & veluti compressa ? 9^u. & «^e loco vnginarqiiatuor aliU»pe>& -Jguis & vix nili
expanso flore conspicuis: horibus «^{nguis} % conftruffris & deci L dunt fingula
filiquaz articulate, in fingulis ramulis quaterne aut plures, longa, plane, articulis
internodiis distinctz, falcisq; instar incurvz, semen in fingulis internodiis unicum, nig
long^r lu & difficil
interZ W^o i ^ admodun[ie*imi P<*efr, continues: radix fingulamsub
dnmhZh^{blfid} ^ mult^{ue} f^{af}; annuatamen, necvixax: tota planta ingrati ^
21S Prim^m * ? Plamuhm obfcrtavit CaroJus ClufiusinGallLaNarbonenfi/
iZS r^m x, m^{AT} ^ ^ " ^ ^ " w Arelatennitincrc: delude valdc copioi'
n & S S S r S ? ^ * ^ ^ ^ ' * Granattnfi, itenuje Muciano
vent c u £ " " " 0 & ApnI) . fentn Maio man TM «t Apud nol Septetrka*
rlor,?! icd^r longetenenor, quam ubi ffonte nalcitur, vcluti Papav
^TAL 7 C^{AL} " Vldet ur lI3EC P^linn «plurimumaccedereadHypecoiHiftorL uuouG
Hvoecn is ^ OT * w^d lcl tur; & certe nulla adhuc confpefta planta, qu[^] ad Diofcc
•e 21[^] s i^{ACe} C^r o P^{tnione} Car.Clufii. Non deiunt qmdam qui ad Cuminoi
ftr ? " " " T V^{lo} fcondl de'criptum, referre malint, licet faculutes font xlitlimik;
M rⁿ HallTlcination ^ ^ adrin^e m hujus paragraph!

nfteoonhKpus propendentibus non articulatis bivalvibus incurvis, nobis. Hypecoon
im lea Hypecoi altera species, C. B. P. Cuminum alcerum Diofcoridis filiquotm, Ad
qu f Cuminum al^{terum} Diofc. filvestre filiquefum, Lob. Icon. Cuminum filveihe fijf.
UA Um^P Aiⁿ I, Lugdⁿ Cuminum f^r l' quorum, Ger. Hoc priori valdc finiile est, nifi quoi'
lien^P fcat an^{ult} ora, longiora, glaucamagis, tenuiusdivifa, fbliorum Sefeleos MaiB-
ta IS? XIU^l : C³ures funt kves, foliis & ramisonufti, ex quorum alis cxfilium flores pen-
creft^a in niucrontmde fⁱⁿentes; quibus subveniut filiquaelongae, pndentes, ncn
^ x non rcurvae, nec articulate, ut iunf. superioris filiqua;, contineres in fefemua
(^{ma} ^ ra^{am} in^{it}) iispra:cedentis, Galegxfeminibusconformia. Natales coiiniuntscuni
tol^u ff^{er} ab^{er} ce^{fte} Loljel^{io}; atque eadem tempeftate anni-floret. A priore ergo toto
Qui. Onr^{primof} iislongioribus, anguftioribus Vmagisglaucis, deiode & pⁿ Bcipoefiii-
creftis Onr^{ectis} arti^{culatis}, fed pendentibus, bivalvibus, deorfum reenrvs non furum

Utraque hae planta nialej Casparo Bauhino ceterisque authoribus ipfi nonfranti
v^{uni} tuminum appellatur, fom Cuminum proptiediftum fit tmbella femine ltnato, k
tenuill^m e divifij qt docaimus indoftrina Umbeliarum Sefloie nona cap. deCumino; at
h^z du^E plants funt filiquatA & Horibus & filiquis toto ctrllo & fine ultimo a Cumtnoubcllit
pradid^{is} fodifcrepantes; ergo non funt authoribus subCumini nomine defignand«nec Unibt
affocia^{nda} ed filiquofis fuis congeneribusadaptandae, fic forte nullibi aptCus An
verum^o lalit jungendae: quicunque melius eademdifpofuerit, ipfidabomanus; t
S[^] amvis fint filiquote, inter fe dilcrepantes, poflunrtamen filiquofe tetrapetalis adjan
l«oadaptiorinveniatur locus eis. Sunt revera plants heteroclitae frifteloquendo, fed p
pterea quod fine filiquolae, hunc imprxfentiarm, 5c jure, fibi vendicabunt locum.

S I L I Q U O S J E

Mu^{lti}capflarts varfantes [& fioribus & capfulis.

C A P U T XVI.

§. 1. BALSAMINA FEMINA seu Noli me tangere.

B Alfamina man Cucumk fhoevice & s dicitur J
injolatione oleum fm Balsamum[^] ut Chiru^{nc} * * * f^{ompi} f^{ij} ^l * * nⁿ maturis Qleo^{injeftis}
fimur conjicwur. [De hac Balsamina mare r[^] 0 " " " * * vutoera confoldtanda p^{eftantif}
leu Cucumere plianiceo diximus iupra Sectionis
primis

prifnjg/pag. 33. qua rattone ab authoribu»ha>c herba aici debeat Balfamina, ignoratur 5 feçHNohme tangere aut Impatiens knrba ip te fads dicitur propter rationes fequentes^nobis adferendas.

Balfamina femina, feu aptius *Impatiens* herba, aut *Noli.me tangere, nobis.* Hanc habet notamgenericam,* qu'a ab oi#iibusaliis facile diftinguitur, quod flos ejus producaturanterius patens .feu'hiãns cum riftu calathi inftar, & cum calcari feu corn iculotenui Nafturtii In<iici aut *Linarix Dalmatics* more in recurvam caudam definente: flori ficconftru&ofuccedit filiqua multis loculamentis divifa, quas contraftis .valvulis fingulis vermiculorum aut fpirarum more in fe convolvitur fi tangatur matura, unde illi appofite fatis *Impatientis* herbae, aut *Noli me tangere* nomen inditum: hoc illi cum *Nafturtii* fpeciebus quibusdam eft commune; à quibus in partibus tamen eifentialibus longe diftert. Eft vel flore rubro, vel luteo ; de illo de hoc poftremo dicemus, hoc paragrapho primo.

T A B U L A XV.

<i>Balfamina femina</i>	{ flore	{	1. <i>Rubello</i> <i>Perfic</i> < folio feu <i>Noli me tangere flore purpureo</i> ^ nobis. <i>Balfamina femina Perficifolia, Ad. Lot</i>
			2. <i>Luteo</i> <i>Mercurials folio feu Noli me t anger eflorit</i> ;. . <i>fatiens herba</i> ^ Dod. £

fol *Sefamum* ^ *Vod. Ger. Matth. Sefamum verum Lugd. Cam. §*

4. *Melochia five Cmborus, Cam. Park: l• B. Chabr. Olut Judaicum Avicenn**, quibusdam, ist *Melichi Arabum Rauwolfii.* £

5. *Capparis Fabago Portulac* folio, nobis. Capparh kguminofa* ^ *Lob. Tab. Fabdgo* \ *Dod. Ger. O*

6. *Leontopetalon C id eft koninum folium J Ad Lob. Leontopetalum, Matth. Gefn. Hort. Lob. Dod. Lugd. Eyft. O*

7. *Leontopetalooajfinhfolips quernis, C. B.P. Cbryfogonon, Park. /, B. Chabr. O*

c 8. *Major > Cluf Bft. Ger. Park- O,*

Soldanella \

(~~Cluf Bft. Ger. Park- O~~)

no, *Sativa vel latifolia, C B. P. Ghjium fativum, Park Hi/I. Lugd §*

Jfatk \

(xò. *Siheftrh vel anguftifolia* % *C.B.P. Glaftumfdveftre* ^ *Cam. Turn. £*

Explicatio Tab. decim&quint&.

Erba *impatiens* feu *Noli me tangere* flore patulo eleganter dilute rubente, nobis. 1 *Balfaniina femina Perficifolia, Ad. Lob. Balfamina femina, Cam. Tab. Eyft. Ger. iina, Dod, Lugd. (cum Match. & Fuch. figura) Balfamina amygdaloides, Gefn. ad Cord. nee, Caef Hase caules promit non tenues aut viticulosos (ut *Balfamina mas, qua: i: iuaugia dicitur Dodonaeo, nobi* ^ autem *Cucumis Phceniceus, de'quo inter Cucumeres pag. 33- Secl: ionis primae egimus) fedrefros, craifos, abimo ramofos, glabros, lasves, fuccofos veluti *Portulacae, inferius nonnihil fxpe nibentes, circa quos folia pblonga, acuminata, Salicis aut Mali Peificas arboris foliis nonnihil fimilia, per marginem tenuiter ferrata, e quorum finu duo aut tres, nunc plures flores erumpunt, infidentes lubrubentibus pediculis, antierius latiores ac patentes, pofterius in calcar feu tenue corniculum Nafturtii Indici more veluti in recurvam caudam definentes, colore elegante dilute rubentes: quorum fingulis fuccedunt fingute filiquae fotunda?, afera, hirtutae, Charantiae Dodonaei fruclu multo minores. per maturitatem luteae, quae ^ ponte aperiuntur, aut ta&as finduntur in quaterna aut quina loculamenta, valvulis extrinfecus luteis fa&is, immediate poft tadum fpargentibus femina oblonga, teretia, fufca ; flos ante Autumnum apparet: femina medio Autumno maturefcunt, Lucius inquam vel. l^vi contaclu valvulis feße contrahentibus cum fubito ftrepore, timorem incutientes femina circa manum tangentis fpargunt. Plerique Charantias Dodonaei' Balfamoi: maridid^ facnlnte fimilem affirmare audent, fedtemere, cum *Imjus experimentum****

a quoquani fa&um non confitet; melius* & aptits ei convenit nomen Impatientis h&bx' ut Collig<re est ex defcnpzione allata. De hujus fecufcatibus nihil afferendum est. Ubi fpoite proveniat non hquet, kd fatis frquentem ex feminibus ad nos delatis, in hortis nostris videmus.

a. Impatiens herba feu Noli me tangere fiorepatulo lu#o, nobis. Baifamina femina lutca feu Noli me tangere, C B, P. Noli me tangere, Gefn. Hort. (cui&Miliuni caprearum) Cam. Tab. Eyt. J. B. Chabr Perficaria filiquofa, Ad. Lob. Lugd. Cam. Thai. Impatiens herta, Dod. Balia mita altera, Col. Summo cefpite radices figit tibrofaf, a quibus caulis furrigitur cubitahs, dilutiffime virens, inanif & diaphanus, copiofam fuccum infipidum compreffis renuttens, poft intervalla fingulorum geniclonim tubercula tophorum podajrricorum aanola gent: folia Cynocrambeslatiora, obtufiora, mambituferrata, moUicella • ex quorumalis pedicelU teneti, m quibus e*. duobus folvolla UCe ^T>^r^ant *W.* xs^a i \ • ft' <<W affimiks, minores, corniculointortoflavi, aut ex flavo. TMU 2 ' ^ India ^T^ti-

bris faturatoribus guttati, in auorum mJk> i>Ljn^ P f T autr ubentc pueri d' f mianciales, angulofe, q ^ ^ ^ ^ 8 ConfU^ ' noiajes&quan- FA ^cu^ciicu^d^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 femme l. ^ioc^ w pury mofcmcaiaemtancntibiisincotinM S ti n' feru ^ol' 7*TM^ ^nienaptiu^ ob hanc rationemr& huic, & p ^ C f t ' ? r ^ u Coh3eret * Germanic, Bohem<<Galli^nc filivTs TmTZi "it .7.. ^ S ^ " " * Coh3eret * facile femina fua fpargendo in ho^tor^ n-m-S-^ provenit locis; * post zltatis hinc nix^ine^UsWismi^entius. Floret zltate ac verfus e^ Adolefcitcit0> iinitim femina iterum fpargendo ffonte fefe feminar Pbnr, ft >alde m Mem =ge apud nos funt fingulis t a ^ K ^ t e J ^ 1 : T f ^ 1 ^ amfparfo, nifi prmlqoan, femina maturuerint fuerint exculf!

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Hanc posteriori emfhntam Mi m tangere dittam in oh Liliorum aut n> nfpk kataw, urinm movere Gesturm ell author- TdZt ' n ^ mli decedam & liter impofuit^nkam eHaLim b t ^ ^ S £ ^ ^ Ubrumti-

*Vodmto * hEcherba f<culu>><fr>>rr,icioja & inter deLria iaknda, tefle

• 2 . SESAMUM.

Cum mofcondes ^ neopraftu* Sefamum inter fruges retulerint: is? Plin. lib 18. c. 22. frumenta egypti dixerit Sefamum, Milium, Panicum etc. Theophrastus 2. cauf. plant. 17. Semina haec, Milium, Sefamum, Eryfinum inter fruges reposuit: 19. 6. cauf. plant. 19. Sefama & Eryfinum ficca cibo idonea, non vero viridia fcripfit, Sefamum & Sefama fimilitr Diofcoridi lib. 2. c. 121. Theophrastus plurimis locis mofcondes alif mofcondes dicitur. Nunc de Sefamo dicemus, quia est multicapsularis planta erit hujus loci, & inter multicapsulares fuas affines plantas collocabimus, non autem inter frumentaceas aut Cereales plantas Milium & Panicum, ut Theophrastus & Diofcoridus. t A n a S f r i ! Eryfinum Cereale aut Eragopyrum cum fit a s s f i o n e q u i n ^ andae amandabimus. pathum, Acetolam, Biftortam & ceteras plant-

ridem. Gefn. Hort. J. B. Ch&f * w ^ M ! " " " 7 vetM. : L <<gd- Cam. Cord, in Diofcoridibus pediculis hxrentia, craffiufcula' ex ar. caulem cubitalem folia habet feimnata, fubinde quoque, faltem inferiora, finuata- e r o l ' enonnihiirubentia 5 oblonga, acumiriftu majore anteriori donati, pofteriuTscraffa fatif cau' s alls * * o r e S emican' tcalythi forma, deciduis fubveniunt filiqnae refta' fecndum caulcs Cavaprxditii albi, ^ibus fingulis demque valvulis donate, in quarum fingulis Ver^S au< n < ^ entes ! quatuor oculanientis totiformm continetur; duplici medulla praeditorum ^ U ^ n c i ^ m m u n i exalbidorum cpmprelnos convehitur, & apud Seplafario sextat venale * S ^ U S ^ m C n 5 X G r 2 c i a & Peloponnefo ad thoribus provero & genuino Sefamo exhibpnr C# ^ c a f M a c t ^ l o l u s 7 plantacujus Iconabau- <<ur, non cil genuinum Sefamum, quia rcfragatuf hiftori*/

hiltori •S, quam de Sdvimo Theophrastus Pliniustradiderunt, quod imprimis culmum non
 ^erft^vliiio craiorem altiore numerq^Qremque^ nec radices longe ptures See. fedfcapum
 Fabae Krrmlum, in quo graclurim Fabarum more filiquae c-Xeunt triquetrae -aut tetraquetrae: fit
 ergo Kcudotelamum, Cam. ep. **officinis** vulgo Gingolena, Nos hie inferuimus propter
 fiiiquam mukicapfuhrem cum fuis fimjlibus nomine nihiiominus diverfis.

*

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Oleum quod JEgyptii Sitis appellant, ad cilws in frequent if/mo est usu. Plant decofto utuntur in
 fotu ad ophthm&i ad tuffim, anklitufque diffuMltatm, •ptripnmmoniam, pfaritidem, iff
 minores duos febircs: muhrcs pro uteri dttritie fneffiones faciunt, isr utuntur ad capik
 •rfures livonfque faciei, iy ad tumores fchirrofes: plant a (y fanimbws coSiis cum vidle
 Qccatos nervos, adcombuftas paries, ad calidas inflammationes; decoftio dyfteribus ad
 dolo res, (\$r ad emollient/am ahum utuntur, & adinovendas menfiruatpurgationes. Se-
 "ium ufuseft antiques, pauci est nutrimenti. Oleum feceftqte b'tfare, ut impingue-
 v>. in ba/neis familiarijfinum babent; cko etiam admulta alia uti Algyptii con-
 unt, q/ppead cut is puftulas, afferitatem atque omnem defgdationem ex melamkohco
 e ortam, turn epoto, turn in cibk vfurpato, vel ipfts affetik pertibvs inuntlk. ..
 *tfptu. quofdam, ad cutis pruritus ejufdem decofihnem quatuor uncuti mult is diebm b .
 exhiberi. Ex Sefamo fit oleum quoMgyptii utuntur, quod amibui, Plinio tefie^ u
 fxtmfolum h&C /Egyptik maniflafueruntjedmulti alii eadem ex ipfts memorial prodidew,
 Rbafis, Avkmmas, Halt, Seraph, aJque alii.*

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI Aliorumque Authorum.

P ifg.27. col. 1. **Sefamum** a Cajpn.ro Baubina
 mult hie caltacatar **inter** Panieum S Phalatt-
 dtm, quippe frumentarias **plontot** culmit, {rra.
nifqut pahis iuchjis fradjtos; cam StJamijAiqua
 nmltu Ucvtamcnrif dtinata. fit, atque fiorem patu-
 lum cavum anterius ii cahart psjhriui donatam
 habeat, nullatews hao rations inter Cerealia dijfatu

ihbct, profiler iijum in culina apud Mgyptios, nan
 plus quam. cetera oleracea. qui ah usu poffunt jimul
 eolheari j at a fine ultimo, videlicet jfori&nt, Jemi-
 nthm a ca-p/tlii Jhmtualtbitt longe recceiitite afiit-
 vicem, (\$ Jult diverfis jigtu's militaitel diverfimoili
 a nab is ilijponenttir.

§. 3. CORCHORUS five MELO<CHIA.

*Corchori duplkkmeminitPl^tniws: allenm lib. 25. c. 13. Anttgalidemintlligens: [de qua
 inter pentapetalas cap^ila rotunda donatas Seftione quinta agemuS,] alteriuslib. 21. c. 15.
 ift^ter berbas flonte nafcentes iy in cibk ufif at as: isr 1. 21. c. 32. Akxatidrinarum cibws convolutis
 J^* id funilitudinam Mori^isrc. Et Alpino facilitate fimilkeft Altk&<z, ist J&gy>tiknil fami-
 £•9 . it gtiitius. Et Jud&i cotla folia cum carne edunt, qua fapore Acetof* prxdita funt
 'nno*ante Rauxrolfio infuo Hodeporico.*

W«s Flinii, Lob. Lugd. MelocMafiveCorchorus, Cam. Corchorus veterum, J. B.
 fMns Tuda icum **Avicennx** qmbufdam & Melochia Arabum Rampolfii. Corchorum
 is adnamcratTheophrastLis, qui obfui amarorem inproiferbium (quod alii fie, Corcho-
 us inter olera) abiit, ejufque folium Ocimumasmulacur. Pliniis us, qua? ffonte nafcuntur,
 juibus plersqiegentium in cibisvefcuntur. Corchorum Alexandrini cibi lierbaeft, convolutis
 oliisad fimilicudinem Mori. Hie planta obfervatur caule cubkali lacvi; foliis Cynocrambes
 vel Metcurialis niajoribus, duas aut tres **nncias** longis, fefquiunciam latis, per ambitum
 ferratis, qux parteima barbulam utrinque unamfeu apop*hyfin Jigulae inftar.tenuem po/lident:
 filiqua; brevi ^ediculo hrrent fingulares, quatuor autquinqueunciaslonga:, ftriatK, fenfim
 ufque ad mucronem attenuate; compluria fecundum longitudinem f* quinque ordinarie)
 . "hiibL-ncesloculamenta, in quorum fingulis unica contirtetur leries feminum fubviridium aut
 fubcaeruleorum, angulorum, parum ^uftu vifcidorum, tiores, tefte Alpino, parvi funt,
 /tkerocei, Leucoi fioribus minores.

TEMPERAMNTLIM.&* VIRES.

Corchorus feu Melodiapr*cordih, utferunt, utilk. alopeciifque iff lentiginl Bourn quoque fca-
Diem celemme ea fanan invenimut apud Nicandrum* iff ferpentium morfus antequam floreat,
jeacurp Iheopraftut Corchorum Ocimi folio dixerit, mirum eft Plinium ex alid fortaffe aauthor
J^NP^JJ^e? Lorcborumberbam effe Convolvulifolih ad fimilitudinm Mori Quart quidamkgunt
IJI cilice qui Corcboriim Pilofellam majorem efe concludunt, de quo nos fuo kco inter-p)
Xmina Melochxin maximo ufufunt apud JE\$yptios, ad omnesafe StJ*, quiblfifjz A D b e s
f^up^ur^umⁱ &&!*> f^umⁱtm ^L ^flwfi vueU ^ad
vos, refohodos atque emolliendos tumores duos qus maxima ufæft' babbt etiam
T^UZ^T^r ^dlimn ^mufcilagp qumAUU*. In cib knihil eft familiar ius vel gratis ibtr-
Me/r^uex^eUnⁱ 12. aqua vd J^Ure carnim -> * "os Bet.am elixare folemus; convivia carenM
ac fur. fmU^r ^bb >PTM^m Wntur: ex ejus cibomulti male fehabent, parumnutri,
peirZ^r ^Vf^u ^m^r ^ ? \ fX qUO ^des TM^ecerum obftruttones. Foliorum dec&um \$
chaco cZ^IIdo^r h^umem hmiidⁱ ^* * 1* > fi^u < * 4erifque tuffibus prsfentaneum currifnc*
p^ru^r capif^rime p^rogoni^r nat^r f e « ^fl^rirantibu* femina pondere duarum drachma* * f**
Chali^r quibz CreJe: l ^ T^r S^r hummi, m^r # # § * * * R^ravofiu* acidi faporis hæU^rUm ^
iZ^r ^m^r a^r nosm^r A^r ^ opera nunaam fath laudandi amicinoftri Roberti H^runt
Chalepi nunc degentis.

§•4- CAPPARIS FABAGO PORTULACI FOLIO.

Capparis Portulacae folio C. B. P. Capparis leguminofa, Lob. Tab. Fabago, Dod. Ger-
bago Belgæ Lugd > Wephiurh Diofcoridis & Plinii, Col. Ad Capparem etiam retere
fed h-^rBotanico nmi quidarftudent, Capanm Fabaginetn appellantes. Non fruticis
nt^rCClem praft fert. Cauliculof p^romith* cteretes, teves, ramofos, & circa hos
fol^r "aotlata, oblonga, crafflufcula, minora quam Capparis, Portulacae magnitudine, fpif-
fitudine, & v tota fubftantia portulacas aemula; ab imo pediculo, bina faturato colore, una
cum cauliculis virentia profert; flores vero, priufquam pateant rudimentorum Capparis
flororH fimilitudinemrefer^Kps, eompletos autem inalbicantes: ftaminibus aliquot luteis
aureifve mediis fucceduntwquas unciales pluribus loculamentis feu cellulis Hilling in
quarum fingulis unico ordine latent plurima femina comprefla, oblonga, fubnigra aut fufe-
radix tenuis in diverfa tendit. Perennis eft planta fi à rigore hyemis defbndatur. Ouibus
locis gaudeat fponde, ignoratur, fed in hortis noftis colitur fumma cum cura horrubm Truiti.
Avicennafcribit, Eft herba, inquit, fimilis Cappari, acuti valde odoris & gnvis hikiis
fructum in vaginis, quod non fine fufpicionem tranfcribentium pro faporis, vox odoris funt Wita.
Capparis Fabago cum Ardifngi convenire polle videretur, fed quis L^r on 5 lu pp o l l t
verifimiletamenquod h*c planta intelligatur. Sit interim Capparis Fabago, nec aliam lect^r
requirat imprzfentiarum denominationem. De facultatibus nihil Fabago, nec aliam lect^r
occurrit fcribendum.

HALLIRICATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

P^rax. qro. Capparis Portulacae folio, C. B. P.
Capparis Fabago, Dod. Ger. Capparis legumi-
no fa, Lob. Tab. Fabago Belgæ Lugd > Wephiurh
Diofcoridis & Plinii, Col. Ad Capparem etiam retere
fed h-^rBotanico nmi quidarftudent, Capanm
Fabaginetn appellantes. Non fruticis
nt^rCClem praft fert. Cauliculof p^romith*
cteretes, teves, ramofos, & circa hos
fol^r "aotlata, oblonga, crafflufcula, minora
quam Capparis, Portulacae magnitudine,
fpifitudine, & v tota fubftantia portulacas
aemula; ab imo pediculo, bina faturato
colore, una cum cauliculis virentia profert;
flores vero, priufquam pateant rudimentorum
Capparis florum fimilitudinem referunt
Kps, eompletos autem inalbicantes:
ftaminibus aliquot luteis aureifve mediis
succeduntwquas unciales pluribus locula-
mentis feu cellulis Hilling in quarum
fingulis unico ordine latent plurima femina
comprefla, oblonga, fubnigra aut fufe-
radix tenuis in diverfa tendit. Perennis
eft planta fi à rigore hyemis defbndatur.
Ouibus locis gaudeat fponde, ignoratur,
fed in hortis noftis colitur fumma cum
cura horrubm Truiti. Avicennafcribit,
Eft herba, inquit, fimilis Cappari, acuti
valde odoris & gnvis hikiis fructum in
vaginibus, quod non fine fufpicionem
tranfcribentium pro faporis, vox odoris
funnt Wita. Capparis Fabago cum
Ardifngi convenire polle videretur, fed
quis L^r on 5 lu pp o l l t verifimiletamen
quod h*c planta intelligatur. Sit interim
Capparis Fabago, nec aliam lect^r requirat
imprzfentiarum denominationem. De
facultatibus nihil Fabago, nec aliam lect^r
occurrit fcribendum.

"daptatum; male inquam a primis imponentihu*
guntur Capparis Fabago herba, v Capparis ft^r.
"fa. ftinofa baccifera. Sit. ergo Fabago a f mil^r
tudine foliorum cum Fabo, & mulcapularis a n>*
mero capularum, hi fee fuis confortibus ajficiand**
no autem Capparam verarum familiar, cum qtr^r
nil h4bet affine in fuis partibus ciffentialibus.

§. 5. L E O N T O P E T A L O N .

Διονύσιος Dioscoridi lib. 3. c. 11 o. *Leontopetalon, quod alii Rbapeion, l. 2j, d 11. Dioscoridi flos pur. icei color is Anemone fimilps: cujus Plinius non mem' mit. at luteumfolium objervavimus.*

Leontopetalon (id est leoninum folium) Ad. Lob. *Leontopetalum*, Matth. Gefn. Horc Lob. Dod. Eyft. Park'. Ger. *Leontopetalon* quorundam, J. B. Chabr. Radix rotunda pugnuni iniplettuberfbus multis, inasqualis, cortice cinereo, pulpavirente ex luteo, fapore amaro: liuic pediculkexeunt pedales, trifariam divili, quorum fingulae divifiones bipa aut terna gerunt folia fere rotunda, aliaintegra, alia laciniata, & veluti criſpa, coloreexglaucoilaveſcente, venofa: flores in uncialibus pediculis, o)longis foliis inter)edis, in caulibus fpicatim congeſti, lutei Ranunculiflorum magnitudine. quinq; ftriatis longis cohſtant apicibus luteolis "dmbilicũ circumſtantibus; quibus marceſcentibus progrediuntur pediculi ad palmarem lojigitiirli" em, in extremo utriculum venofum Halicacabi inſtar fuſtinentes: femem nigrum Canns Indies femini perfimile. Hanc plantam ejuſque nigram extuberantemque radicem Rapi inſtar, Mattbliolus nonmodo Venetiis & Patavii in quibusdam hortis, led etiam in Hetrurias ar^ſaliifque Italic locis naſci frequenrer, ficut in Apulia, ait: reperitur & in Cretaaliifque provinciis ac Infulis Meridiem & Orientem verſus: flores, teſte Petro Bellonio, hyeme profert.

T E M P E R A M E N T U M & V I R E S .

Leontopetalon, aiithore£raleno, digerendi, excalefaciendi, is- exſiccandi facultatem in tertio ordinepofidet. Radix^ inquit Dioscorides, in vinoſumpta demorfis a ſerpentibus duxiliatur, citiffime dolorern fopiens, Miſcetur enematk Ifchiadicorum.

§. 6. C H R - Y S O G O N O N .

Xpt^w *Vioſcorides* l. 4. c. 5 6. *meminit, quod aliqui Jacobtam mantimam, alii Tormentillam cenſent, cum tamen jui generis fitjficut iff Leontapetalon, quod ei eſt valde affinis planta.*

Leontopetalo affinis foliis quernis. t. B. P. Chryſogonon Dioscoridis Rauwolfii & Lugd. app. Caſt. Ponas Ital. Park. Chryſogonon Dioscoridis quibusdam, J. B. Chabr. Hoc Chryſogonon genuinum Dioscoridis videtur. Altitudinem Leontopctali affequitur, eſtquehuic, caule, iioribus, radiceque rotundi (x^ interna parte rubra eſt) haud abſimile: cauliculi tamen graciliores, in terram repandi, & ab origine fili modotenues", in varios ramulos divili: quorum extremis floſculi adherent confpicuimais, denfioreqojpipati poſitu, quatuorpeccalis conſtantesetiamfi Icon monſtrat quinque: folia colicoloram dorſo adhaerent gemina utrinque, & ita fubinvicem appoſita ut crucis figuram poſitu fuoefficiant, atrovirentia, in extremo latiora, diſſeſta trifariam, Sedi tridaclylidis more, aliquando adinſtar foliorum Quercus. Concludit deſcriptionis author Rauwolfiusitineriypart. i. eap. 9. itemparte 4. verumefle JD^ofcoridis Chryſogonon. Hinc Hiſtoria Lugdunenſis pag. 28. Append, inferibit Chryſogonon Dioscoridis.

§. 7. S O L D A N E L L A A L P I N A .

Soldanellam Alpinam etiamfi ob foliorum fimilitudinem adjunxent Caſparus Baſhinus Soldanelk maritimae pag. 295. Pinacis, nos Soldanellam maritimam ejuſque duas ſpecies Convolvulis adjunximus, ex quorum eſt numeroa partibus eſſentialibus, uti fupradocuimus in Se&ione prima cap. 2. de Convolvulis. Hanc autem Soldanellam Alpinam a floribus & filiquis. huc revocavimus ad fuas confimiles plantas.

1. *Soldanella* Alpina rotundifolia major, nobis. *Soldanella* Alpina rotundifolia, C. B. P. *Soldanella* Alpina major, Cluf. Hiſt. *Soldanella* montana, Lob. Icon. *Soldanella* Alpina, Cam. Ep. Folia habet fena auto&ona longioribus pediculis, nuncplura minora brevioribus pediculis innixa, cralfa, inorbemferc cir?,inata, Braific^ maritimae ^quam vulgo Vocant Sol. lanellam maritimam) Simula, fed duriora-, fuperne viridb, inferne dilutiore viriditate fplendentia, guſtu primum exſiccante, deinde acri & ingrato: flores gerit in laevi, rotundo, grac^iUj fubrubropalmariquecauliculo, binos, ternos. aut plures, pnrpuras vel faturae vel <jlilurae c^ uſq; inodoros Campanula: modoeftrmatos, cfeorſum fpeftantes feu propendentes, unico petal©

pttaloin quinque profundas crenj. (quæ aliquantum laciniatx font) & totitem aha^s jingilures divifocontantes, emedio provenieue[tuberculo, veluciquodam umbone-in Ion- gum ftylum definente, qui in corniculum evadifc oj^ingum , durum, membranaceum, nm- cronatum, virefcens, fimul congefum femem continens: radices fibrofae, candtcaBtes ex uno veluti capite pendent, quod adnaci's capitulis fe propagat. Copiofe nafcira* in Auftri* Sftiiaie Alpibusperpetuaniveteftis& obfitis; nufquam uberiorem aut*ltiore(i) conipicere licuit Carolo Clufio quam in jugo Wachfd nuncupato fupra Afthpang magnitic viri Erafmi zKunisberg Earonis liberi, ubi etiam unicam plantam laftei prcrfus candons, inveniebat prardittus CarolusClufius. Floret iftic Junio, interdum Julio oYArcufto, habit* ratione nivium maturius aut tardius liquefcantium; in hortos aucem tranflata, etiam Apn' cum Primula Veris rubra floret, clifliculter, autem cicurari poteft: Soldanella hie v:1n foliis, ac floribus: follifaliis fuptrne viridibus, interne dilutiore virore fplendencibus; < lollia interne utCyclamini rubentibus, qua; tertiafpecies eftClufio, quKque Hore eft; nult nunc facratiove, mine dilutiore, reperirur& Hiveo.

2. Soldanella Alpina minor minus rotundo, nobis. Soldanella Alpina folio r tundo, C.B.P. Soldanella Alpina minor, Cluf. Hilt. Soldanella?Alpinæ aliudgenus, Rotundifolia Alpina minor, Ger. Hæc eft minore folio, neque circa pediculum (qi gma' •iorqueeft) adeocircinato, fed fenfim ab ipfo in latitudinem excrefcente.

• §.8. I S A T I S five G L A S T U M .

wmjairvu CDhftoridihb.i.cup.zi^J folia habit Flantaginti fifoeftr^{Laftuce} aut ifrij, quaregenera duo fecit: <y Flinio LaEtudefpontane^ tertium gsnus, quod If< arim vocat
• quartum qtoJGlaftum vocilam. [ofis priori Smile aut Lapalbofilvefiri.
Ifatk fativa vtl latifolia, C. B. P. Ifatis fativafiveGlaftum, Matth. Caft. Ifatifativa 1 Fuch. Dod. nc Cord, in Diofc. Geln. Hoit. Lac. Ifotis Grxcorum, Nil Avicennae, Nil otticorum, Fragon Glaftumfativom, Tur. Ad. Lob. Cam/Park. Hift. Lugd. Lob. Gtr. Glaftum ^ Guadam, Caef. Hkis hæc fativa folia habet longa, lata, colore faturate virenuæ, /antff anguftifoliiholtismaiora. glaaca, cum nervofeu vena alba in medio: caulis bicufaitau^ altior, qui in mukosramulosbrachiatus fiofculo&xi^iospromit, luteos, tetcapetalos, pendentes, cum multis ftaminulis in medio itidem luteis: quorum flngulis fingob iuc< folliculi feu filiqii* bivalves, fepto medio brevi fatis duplicem feriem iemmiim dirimu qu.hincindea dextris&fmiltri, ipfius (epri medii ^ ^ l ^ V n L ^ n Z , vix trientem uncia longicudine excedentes: radjX *.*. nhl nMa
in * . aefendi, ^ r in compturimis Garne Narbonenfis, Angliæ & Hyberniæ, nonnullis Belgii locis: de in Germania, Italia, Hispania Galliaque, citra culturam fpon- nata reperitur, quam filveftrem appellant. Etiamfi filveftrem velut diverfam Diolcorides def- bat"iolUcuorum& florum foriram & colorem addens, dequibus miatlvcdeicriptione^ habte • cum tamen utriq; nonmodo hæc, fed& reliqaa oninia funt familia, proinde nulluni in cas difciimen altud , quam quod una feratur, alia fua Ipontegignatur. Pingue ac l^t defidc<t agrum; Maio ac Jimio Horet; femem ferius perficitur. Foliis tufis tritifqu- ^preffusin magnaspilasfiveglobosad tintun ufum digeritur: imbimntar his 1 ipikque lanæ telacque linea; aliaque caeruleo colore. Ww Grxcis, Latinis Ifatis icidei {turn. Csfar lib. V. de Bello Gallico omjies fe Britanni, ait, Glafto inflciunt, quod es dficjt colorem. Quod & Plinius lib. XXII. cap. i. teftatur; Simile, ait, Mantagini, GU Gallia vocant, quo Britannorum conjuges farpe toto corpore oblitx: quibusdam in fi nudas incedunc. Dicitur Ifatisa nonnullis Guadam, ab Italis Guado, voceut videtm"3 detorta. Hifpanis ac Gallis Ptiftid. Extat ipfius Paftelli five Piftilli nomen & qiwlficunqi" ^ fcnpnoapi]dPlinium Valeriai Himlib. 2. cap. 3. poteftauteinPaitilluici, quotlinPafti!!^{osll} uti diximus magnas pilas digc-ratuf. Nofta state Germani, Bonemi, Ifatidem & tW a p f lanr, Bc Ig< i i Ottt, Angli WMe&naaHa. Ab Avicenna cap. ci. 2. Nil aut Granum. Nil & Ami de quo Avicennas cap. 306. & Serapio cap. 283. Convolvuli eft fpecies, M ^ l i me prima diximus; elt& Legumen cujus fucco in piffato tineuntur lanx, ut inter Legumina Sc one Itcunda monuimus. • •

Ifath filveftris folia habet majoft, Laftucx proxima: caules tenuiores, multifido³. qj" danttnus rubentes, in quorum cacumine tolliculi bivalves multi fuperioris fativi longiorst"- fZrimrt-ft^{Blii ri1111} (uar"nC^{am} ^ ^ ^ P ^ ntan Xnigrefcen tifeptomediobrevil^ . i t-mcm dediftermmante. Nafc. tur uioBipeft^{ribils}& incSltisloc> maniiefteacre ^* q

cum gfftu turn a^{ct}ione praefert,proinde valentius quam fativa deficcat, atque validius humidse putrgdini refiftit. Quicunque Soldanell|m utramque Alpinam, & Ifatida utramque, jmmedſite iiliquofis tetrapetalis bivalvibij^ conjunxerit, meliorem obfervabit ordinem mea opinione.

TEMPERA^{mentum} & VIRES,

Iſis feu Glafeum, Galeno authore, valenterexficcantis eft facultatis; amara fimul is afringens, proinde magna vulnera corporis glutinat; fanguinis profluviolaborantibus partibus utiliter imponitur: tumores cedematos mirifice digerit fimul ac reprimat: omnibus ulceribus malignis is cacoth'vs mirabiliter refiftit, etiamfi putrefcant aut exedantur eadem cur at. Eadem vero is Dioſcorides. Quod fi quando (addit Galena* J vakntior Quam pro labor ant h natura appareat, folikejus iritis miſcere oportebit aut panem, aut hordeaceam farinam triticeamve aut polentam pro vincente nimirum in unoquoq; affeclu. De hujus ufu: Glaſtifathifolia tabefafia is putrefattainquemola tezfatiſe xpreſa fuccum herbaceum ſuffundunt^ qui concoquitur is? in pifiatur isr in prx grandes glebas, afervatur, & Paſtel vernacule vocatur apud Tolofanos^ indeque Anglu Belgioque ſuppeditatur ad pannorum line* que te U infeclurat. Serunt etiam in Germania, Belgio, Anglia & Hibernia, ubi folum pingue is Utum per bonam dat Ifatidem, nee mult urn Tolofana inferior em. floret Julio is Auguſto, is paulo poſt femer copioſe perficit. Hujusce etiam in Vmbria maximus preventu* habetur circa Noceram, ubi oppidum eſt Guadum, ideo appellatum quod ibi^ th frequentiffime feratur. Glaſtum fi heſtre a Plinio inter Laclucas filveſtres recenſetur lib. 2 o cap. 7. quippe quod foliis illis non fit abſimile. Planta ipſa Gratis W™ ^ P @ -, Latin L Glaſtum fat hum; quod vero Gratis immsfw*, Latin h Glaſtum fi heſtre^ halts Guado lilvatico, Gallis Paſtel Sauvage, propter rationes ſupra allatas,

HAL LUC IN AT 10 NES C A S P. BAUHINI

Aliorunique Authorem.

P 4g. ui. col. 1. pi. m. Glaſto affinis, C. B. P. Antl five Indigo, Gaii Jive Nil herb* Rorifmarinifacie Linjcb. 4. p. India Orientalis. Plant a ex qua Indigo conficitur Part. p. India Occidental. I. 4. c. 23. H(CC plant a nee eſt Glaſtum nee Glaſto affinis a fine ultimo, cum Glaſtum jit planta tetrapetala filiculofa bicapſularis; Nil, Anil Jive Indigo eſt leguminofa fanta papilionaceave, bivalvis, unicam infliquis bivalvibus continent feriem feminum^ uti probavimus Seclione fecunda inter Legumina pag. 202. atque modum conficiendi caruleum color em, Indigo diclum jillic dcduximus, pag. 20\$. neq; perfecl: am Iconem tunc temporis apud India ſcrip tores comperi s

fed cum Hortus Malabaricus ad manus pervenit menſe elapſo, obſervationem T>. Sien Profeſſoris publici Botanici Horti Academici Lugduni Bdavorum perluſtrando & figurant duplicem eleganter ibidem pguris ?4, & yf. piam & p. 102, & 1 oq. plantam deſcriptam intuendo, abunde mihi ſatisfaclum. Pag. 113. col. 2. pi. iv. Ifatis montana, C. B. P* Glaſtum montanum Dalechathpii Hiſt. Lugd. Hoc in loco videtur Dalechampus loco Ifatidis appo Juij Te figuram Campanijik cujuſdam, quam non bene obſervavit nee author Mulinam qui Hiſtoriam Dalechampii edidit, nee ipſe Cajfrarus Bauhinus quidam adverſiones fibis dedit in Hiſtoriam Lugdunenſem.

J I L I Q U O S M

Peregrine bivalves non ſepukres floribus tetrapetalis & longis flairinulis donate.

A P P E N D I X

A D

TETRAPETALAS SILIQUOSAS BIVALVES.

S I Hquofis tetrapetalis bivalvibus ſine ſeptemio multa femina in fecontinentibus (Cheiidonio majori ſcilicet) hoc novum genus - addendum xquum duximus: „ ſunt enira plants /iliquoſe bivalves ſine ſeptb medio difterminante duplicem feminum feriem, continentes

nent^s plurima femin mini - Inbn t ra aut alba, que fucedunt rloribus quatijor petalis
 exigujs &c tenuibus fubexortum, definentib;; in fitione a tbiola, Ferulae galbanitei & aut Pa-
 ftiaaoae httifolisferainibus n'gura fimtlia ; e x c o n t r o l o r i m quina aut plnra ftanunula lohga
 sdmoduro prefiliunt cum apicibus nigris, ar que fingulis finguk fucedunt filiquse bivalves
 fine interveniente fepta medio: funt autem I de plnat •, vel quinis toliis in unum centrum
 concurrent!bus Pentaphyllomm njore, vel tei nis, diffr pances numero foliorum fed conveni-
 tentes. floribus & compofitione filiquarum.

T A B U L A perk. lAppendice.

- fi. Minus \Nobk. Lupinus *peregrmus, C-B. P. Lvfinuspn
- Pentaphyllum pertgrhnan J j five Pfntapbyllum peregrinum^ Pen. ItaL \$
- filiquofitm livalve 2. Majus j Nobis. Tarmaia Brafiienfibus^ an Fraxinella Jiliq^fi-
 Qumquefol'wm folio Caprifolii, Geor. Maxfg. 5
- 3, Triphylhm fertgrmm filiquojum bivalve flore\ubrofiliqua longa Jiriflffima, nobis. TnjoU
 Lufuamatmcoruhufatumflorerubro^Park; \$

Explicat'w Tab. precedent is Appendices hit] ws Sefitionis ttrlti.]

. 1 .f\$ frtpehJUm peregrinnm filiqnofum bivalve minus, nobis. Lupinus peregrtmis, C B.
 p. 3^8.col.2.pl.v. Lnpinus Arabicus fire Pentapliyllum peregrinam, Poo3; Ira!. Q'inqv
 foli •k] Lnpini folia, C.B. R pag. 326.COI. 2. pi. vii. Pe]itaphyllum?>pA"?^«TliaL Ex5]
 azis feminibiis ad nos Chalepo tranfmiflis ab excellentinimo viro Roberto Huntings
 nat i eft hie planca filiquofa, bivalvis, omnino a caxeris bivalvibBsSeflioniatenhedivcla-
 her srpelita quoad rlcresjn hilecenim mirari licet fummam natura:aitincium.Primohic plar
 ptegrina, herbacea, plurima folia per terrain fittata gerit Pentaphylli modo, longis pedicu
 inntxa, atque l'entaphyllum more in idem centrum concurrent, pediculi fcilicet fun"
 caarn Lnpini folioram tnftar, qu£ molliufcula funt; exKorummeditulliooriturcaulicd
 pedu-isautieTnicubitalis, qui in alios ramufculos divid'itur, qutque elt rotundas, rea¹⁵ •>
 graciisT mollis cotns, iprincipio ad iaftigium nfcjuefoliolis trifolintis denfeconveftiens ;^m
 ieriors autem folia majora malto, & uc diftum Lupini modo aut Pentaphylli quina in uni¹¹
 ceatrvB (petioli fcilicet fatis longi futnmitacem) coeuntia, at folia fuperiora fecundum cauleri
 confpicua funt &trifoliata, &brevibus admodum maitancnr perJoiis denfeqoc cafflem cuB«
 vtfiiun:: incaulb alls fuperioribus umbellxm modum multi pediculi longi atis&iquak*
 apparent, in quibus finguls apparent quatana pccala parva,alba, longa, tenuia latia
 exorram e capfala, & veJkfin'm tormam f,eminisF«uteaacPaftinaeclatifolii re;
 t.mr.,alb3,levittT(.it[Hui,c3Rnituenna florcm album cum Uaniinulis quin:s, ienis,unci;ilil
 fubnigris; qnibns figgolis Jucctdant flngalz filiquas bivalves, unciales, crafiie fatis pro l'
 portione-plaiuac, non bicaplulares, fed tantum bivalves Chelidonii majoris modo, fine K
 medio dirimente duplicem feriem feminam:-in uniuofujufque hujtis filiqua: parce i"l
 iniiniralatent femlmmgti, rotunda, minutiffima. Floret pertotam arftacem,atex "i"
 cicacvanidis Jiliquas relinqui: nnciales, craffas. Anrniaeft planta, Ancumno fefe
 inotoEeafate pullulat, &lruc}timfert verfus Aatumniinitinmaucfinem feftatis.

•. i n taphllum peregrinara filiquofum bivalve majus, nobis. Tarireaia Brafilic
 Fraxinella.filiqooTa, anQuinqueroliumib!io^Ca"prifolii, GeorgiiMaregravi ? Exradiceloi
 pat--isiilamtnri spraditr!,lenta,altinlma, afiurgit caulis trefcirciter pedeslongus,multi^
 mis dpnatas: foliaejas inicnora &verfus terram fant !*»» ** n'o'm« \nUU (>ninfiuei"
 aut Lupini inftar conflata, in idem centrum concurrentia, quina, fena, feptena, nunc pa
 cigra, nunc plura, oblonga, viridia, multis nervulis venulifve interjectis, foliis fingularit
 Pentaphylli modo
 "uii"4uc:anaiiiaivt!isnaiia aonmina, fed taaumollia&glutiiiio!j:!! *
 fate caaha primb parvis Follis alternatim pofitis ornatutrif'oliatis, brevibus, fubrotund
 don alernatim prodcant adcorum appofitionem pediculi longi, lingali continentes cy
 r-^album, quatnor foliolisparvis, viridibns, acuminatis, infidena: hoccorp"
 coalitoantqnataorpetal^orts, quo (e aperitnte mferius primo prodcut filamenta 7*-
 tres attquator dig .1; hinc quatuor fbiola flovis expanduntur, qu^font creS
 vel antrorum ad latera extenduntur, egregie
 6 ftamina, feptimum in medio abie l« fil' .4aamce|rc tem, craffam faris, reTquimciam longam,
 6. bivalvem,

biva'vc;n, continencem plurinn ll .nda, alba, \vx magnituuine feminis Sinapi, sed
 qoz anolatero incifuram vfdentut
 libet rami tin pedicuii folionim am
 tios inodoras, **fed folia referunt i**
 ^Tffifclium Lufitaniaim bivali
 ctim Nue vulbro, Park, Hæc planta ,
 ribns. Ppinaa autem folia per terra
 ^a ex grenio ten mediohorum in orbem **aftonaa** protrudntur canliculi rotundi, hirliiti,
 Ctodrantales, 'inplur' mosramosbrachiar,-atque.ex finguis alis inter folia fuperiora (quæ
 fiincingala, longiufcub; angufta) & caalem oriuntur pediculi unciales, futVinentes flofcutos
 rubefcentes, ex quatuorpetalis, & qnrnis.(yii(ve, mine pluribus, nunc pancioribns ftami-
 rhrirs^conflaros, quibns'fingulisevanefcentibusfuccerluiit filiqux lbngæ, propendentcs, fri-
 ftiores, teretes, NiiitE, bivalves, coitinenres fine fepto medio infinira minutiilima **femina**
 lotKnda. A flore & filiquis bivalvibus omnes listres **fiipra** dift^plants conveniuiir, ideo
 ad iinum & conimune iiovum genus confituendura has tres generice eodcm hue reduximur
 niitjLiam in append'cem. Collocentur immediate poft Clielidonium majus, quippe bivalves
 fincitpro mclLo; fie hac rattone inter fe conveniant. Folia diverfomodoconftruSa inlervi-
 unt ad fpecie determinandas •, unde Pentaplydum peregrinum bivalve minus & majus,
 utrumque albo flore aut viridi confat, **ficut** etiam Triphyllon Lufitaniaim bivalve flore **ruan**
 Vide U'ones in Appendice Iiujus Seftionis.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI
 Aliorumque Authorum.

M ifle Cajitaruf Bqu-binut aliique anthares pri-
 mani p/a'itam hie eitatom coHoertint inter
 Pentaphylla aut Lypinot, cum nee fioribts nee ca-
 pfulii AmiuahitiS alterutrxnvtinat, tit detuimiu
 cap. (L Pmtaphylh £S Lupitio, pag. %g. inter Uui-
 futuutionet illic, & pag. \pr. tntr Halluthm-
 liones ilhc ttdtm. Dim Tirirtaia Gforgir Afarr-
 gravi fit planta priori in partibus effentialibus
 CQnformis, eidem nomen Pentapbylli **'pere^rim** fiti-
 quaft bivahiu majari's adaptavimm: (Unique cum

tertutum 'genus priorilm quadret quoad flores (3 ca'
 pfults bivalves, dejignavimus Triphyllt cornicula-
 tumLujitanicum bivalve jiorc rubro Jiliqtia tenui
 j'ropcndnti. Tzutiqiamjlare gerit papiltonttceo.t,
 idctreo avtrrncavimus a Trifotiis papihonaceis, £f
 (iis conformibttf aduaxauu in hoc capita explicit'
 tts : vide f> afr. 147: htittf najlrct l-iijlorii? pi. f, Tri-
 fylum cor nit ula turñ Lujitanicum fine ritbeute fiit-
 qm reUa tcnuipropendente.

PARTIS II. SECTIO FIS HI.
 DISTRIBUTIO SECUNDA

D E

•ulojs tetrapetalts bivafoibts, fcpto it'dem medio mcmbromodijicrminante
 infingulis jtlkiihs aupliccm fericm feminmn.

S I L I . C ' U L O S J E.

Tetrapetalæ bicapfulares.

THLASPI DISCOIDES.

C A T V T XVII.

N AlIurtio Viofcorides l. 2. cf\$6. TMttfyi fubjungit, quod hfruftts forma, qui veluti
 mfraUm iff tontyfus a fty i?ifringo, **amen** accepit; 3 ^Aao^ftov, quaftfruftumdypeautm^

GeneraJuo Diofcoridt 4\$ f/m'o/. sS-f. 13. Alterumanguftis, altrumlath folife, quod Si-
 ityi Perficum Crauvx dkitur'. jorte Raphnhus tufihanns. ' O o 3 De-

Dwhi&a difftributione prima plantarum filiqnofanim tetrapctalarum, longis filiquis de nararam, calidarum ctiam Sr acrium , cam unico fepto medio utpltinum duplicem ferier ieminumditVin^oence, quam pluribus (eptisfeudia^ragmacisplures ordtnesfeminum iep" r2n:ibns, aftechs; jam operaepretium duximus aggre'ii Siliculofas terra petalas callidas xcidm & acres, filiculis cnrris pr;er!'tas,ftpto niedio pariter.d is] ungentedu price m feriem fcmmiim; atque iittiam faciemus a Thlafpi, quoddividermis iidnplex genus fubalthernum ; prinuii eritde iis quorum filicub tranfverfini (idertante i recro) (epco medio dividuruur: K-cundLinideiisquorumfiliculElcucaprulffeminaleslongitudLnalictrdiviciuiiCLiv, id ell:, femina a dexnis & finiftriafepti medii continent ur.

TABULA XVI.

Septo mediofi- Ikuhmdirir- mctite iranf- verfim	Incanum	<p>1. Marinu^ C. B.P. Tbhfft Narbomnfe Centuncu^{li} Afyfum] folio, Ad. Lob. O Mm ' CarnX*- Ma}us-P.B.P. Afyfutu, Mattb.tffftg.d. & PeflnA% Minus, C. B. P. Minus clyfeaium^Tab. Al)j f (fumminu4Dal^Hif}.Lugd. £ if-Frutkofum fyinofum, CB.P. Tblafpi frutkofum fpnoJW Narhtienfe, lob. © Montanum (5 MjCus, .B.P.Montanum luteum majus, Park. © lutctimSer-<6. Minus, CB.P. lonthlafyi montanum incanum pilli folio C ivasiiisfiore luteo, Col. © j, Macbl'mimfeforealbo c/ifulU oblongU^nobis. fhofpi < num Mathlinknfe, Lob. Lugd.Cfof. Hi/I. O 18. Crttiatmfiort albo, C. B. P. Prod. Mattb. Ed. Baub. O ' 1 9. Majus, C. B. P. Tblafpi 3. Mattb. ©</p>
	I'triJe	<p>Alpinum capi- tttis Totundis i o. Caulibut reitts,fofin inttgrii^nob. Tblafpi "\$.Saxatile, Can^{p. Mattb. ©} Minus 11. Caulibus flextiofis foliis ferr a^g nobii. Tblafpi petr&uin Mw£h¹⁵ P.on.ltal. \$</p>

TABULA XVII.

Tblaft-i	Spica- tum	<p>12. SMquis laths, C B. P. Tblafpi Ptaty tarpon, Cam. ? Lath Uvibufqm,nobh.Tblafpt majv' Vaccari* Tab. Ger. ¥ foliis 13. fccanis, nobk. Tblafpi vulgatifniuin ' VaaarU foliis, Ad. is Icon. Lob. 9 15. Ma]w, rwbii. C. B. P. Ger. Park. TbU\$ okraceum, Tab, \$ Perfoda- 16. Minm, nobk. C. B. P. Tblafpi purnilv** tm\ velmontanwn minus, Cluftifj}. f 17. Maximum foliis inferioribus tcnuiter i''' cifisHj/pecou modo, fuperionbus a caak Perfoliat, £ t/iiodopenetratis, nobk. Tbi-'ff' verum primum Diofcoridk, Zaroni. Q₁₁ [C. Allobrogcum, nobk, Tblafpi lobrogcum Crc*ko far, Cluf^{Hijt.}</p>
		Arvenfe

&pto medio ft-
lch in dii-
mente longi-
tudinalitr

T A L U A XVIII.

Thlafpi	Septo medio fdi- culam dirimente Ion- guudinaliter*	Montanum	Primum Burfdt pafork fruffu [^] Col. AlpinuuiiBet- dk Cdernle <£ folio, C. B.P. £ ' >		
			25 Mitim rotundk folik verfus terram > in caulibu* • <ero perfoliat <£ fimilibu>s, • nobh. §?		
			26 Semper vir ens, nobis. Thlafpi montanum candi- W, Hift. Lugd. 0		
			27 Viltofum capfulis hirtutis longiufculis, nobis. Thln- bi villofum capfulis hirtutis, C.B.P. isr Prodi /. B. Chabr. \$		
			28. Ailium reddens, nobis. Scicrothlafpi Vlyjfts Aldro- vandi, J. B. Chabr. £		
			29. Parvum faxatile flore rubmte, nobis. Lithotblafpi 4. folio carnofo rotundo, Col- \$		
			50. Peregrinum capftla cordata, nobis. J.B. Chabr- \$		
			31 .Saxatilevermiculatofolio, nobis, iyCB.P. Litho- thhfpi montanum fruticojius vermiculato aculofolio, Col. 0		
			Frutkofum	Foiis 1	32. Leucoii angyftis isr longis, nobis. C. B. P. isr Park-ThlafpifrukicofumfoliisLeucQiimari, Lob. Lugd.Tab. Thlafpifempervirens, Cam.Q
					35« Thymhd t hirtutis, nobis. Thlafpi frutico- fum aherum, Lob* 0
Absque fepto medio 34- }		Montanum monoftrmum Glajii folio? nobis, Thlafpi montanum, i. Cluf. Hift. ©			

§. 1. T H L ASP I fepto medio membramo fdiadam tranfverftm fecante-
Explicatio Tab. dmm*feft<*

1. T " * H / ^ / AlyvTuoidiaum marimum, C.B.P. Thlafpi Centimculianguftofolio, Lob.

Ad. & Icon. Lugd. Tab. Hoc caules protrudit plures, ex eademi radic<? immediate ortos vimineps, reftos, palmares & refquipalmares, incanos., ficne & folio: i Polygona, aut ulx tbliorum fo»ma: in fummis caulibus flofculos fert tetrapenlos, minores, albos minulianmedio petalorum luteis, c^teroram Thlafpi Amore; capfulas tert veluti os KJtundos, prona parte cavos^ fupina convexos, i^to medio fimih'ter rotundo inaceo craiifverfim fecante & dirimente binas valvutas, inter quas & feptum medium ntur femina aliquot comprefik ante & retro. Tota planta albicat & gurtu Thbfp i aucium ndicat*: Alyflbautem Diofcoridis Dalechampii coilvenic quoad qaalitates calibres, imo fiii quisante & retro diffe&is Alyflb'eft conforme. Hoc Thlafpi pufiUum prope Monfpelium ad castrum novum, cis Lndum innem, aridisviarum crepidinibus. ertate, acque femetifub ejuftem fincmperficit.

<Iafti Alyflumdiclum campeftreniL ^ . B. P. Aiyfiiim, Match. Lugd. Cam. Alyi Tam, t Dalechampii, Lugd. AlyffirhiGi ilvgoni folio, Tab. Doftiorum omnium Sienfium, fententid apud quo^Irequc., ur hsc planca, Thlafpios generibus adnumt, i. mda eft hxc fpe^ics five Tl^afpios, five Alyli., a virtutibus: eft enim radice Candida, parvS, fibrata, fatis longa; t-Vuifcuiismultis^rotundis, ianuginofis, pcimoperterramihatrs, fleinde fupra terr Jin parum extantibus; tbliis niultis albicantibus, alternatim caulibus ad- hzocati 7US, & tanquam cinere aperfis, quafique aperfis, Thymiktioris forma, mucronatis, ;uis cum paucula acredine: flores apparent in fummis virgalis copiole lutci: "tjoi- A>dii riignfis fuccedunt fingufe fiticuls, rotund E, furfum verfus apicula donaK, prona parce concavx, iupina convexs (curellsnunodum, fepto medio membranaceo, pcellucidoexficcato, difterminante ante & retrofcmfiamnVuta, rufta in prxdiftis localisicuculo rocundofimilibus. Provenit in agris & collibus uegleftis circa Monfpelium. Florec ineunce sftate & verfus ejuftem finem Temina perficit.

-3. Thlafbi Aly^nm difiuni campeftre minus, C.B. P. AlyiTum minus Dalechampn, Lugd. Thlfi minus clypeatum, Lob. Thlafpi minus, Dod. Gall Hoc multo minus eft fupiore quoad

quoad omnes suas partes: caulculos edit minores huius fratos, foliis Thymi durioris infar densius dispositis, rotandis, subasperis & cerneris (alternatim virgulis humi procumbentibus) ornatos: in quorum fastigiis proveniunt fl. seu parvi, tetrapetali, ex vindi albicanes: quibus ligulis succedunt fidei clypeo omnes, rotunda, duplo prioris filiculis maiores, parte prona seu superiore cava, supina seu inferiore convexa, sepe pariter membranaceo, lacido exsiccato, distinguente duplicem seriem feminum fulvorum, unam ante, & aliam retro.

Ianthi fruticosum, CB.P. Thlaspi fruticosum spinosum Narbonense, Lob. t. in J. r. f. 1. pino; uin, 5. Tab. Ger. J. B. Chabri. Folia h. b. c. t. minora oblonga, acuta, in Mont. X. Un. q. a. d. fingda g. nicula, UC in monte Lu. PO observabatur, at in hortum Monphenem translatum (unde Weros. conuius attulit) folia breviora & rotundiora. P. o. f. r. f. r. I. n. d. o. d. r. a. n. t. a. l. i. b. u. s. p. e. r. t. e. r. r. a. m. Gratis, multis alis divinis, nonnihil t. In fr. w. q. n. a. m. o. l. c. a. p. n. f. i. l. l. a, albida, & incana, seu cinerea; flores ex caulculo ampe, terrain fratorum alis p. f. o. d. e. u. n. t. tetrapetali, albi, luteis in medio apparentibus ftaminibus; inen acre binis valvulis lepto medio ante & retro separatis inclusum. Floret sestate citius nam am. a. m. y. q. u. i. s. r. i. g. o. r. d. u. r. a. v. e. r. i. t. femita raro apud fros Septentrionales natantatem perducit. Hoc nonnifi in sterilibus cautibus rupibusve prope Nemaufum & Monipheum fructat, & femina fert.

Montanum luteum majus ferpilli folio, CB.P. Thlaspi luteum fupinrad Tir. I. n. t. i. n. t. I. u. e. u. m, J. B. Chabr. Montanum luteum majus, Park A. n. i. r. n. i. h. u. i. c. e. r. u. u. n. t. u. r. cauliculi fupineper terram frati; quibus adgenicula adherent folia longiuscula, angusta, inordinatim fingula adhxrentia, paululum incana, magnitudine valde xmdla: in cymis cauliculorum fie per terram fratorum proveniunt umbellatim fofculi lutei, tetrapetali; quorum fingulis succedunt filiculae peoh roma rotunds, inaculeum definentes, compreiTae, prona parte cava?, fupinS convexae, ante & retro inter valvulas suas exteriores & septum medium femina compressa, continentis.

J. Thl. faatile. incanum luteum minus Serpilli folio, CB.P. Ionthlaspi incanum montanum Col. Haeplanta media est inter violam luteam montanam & Thlaspi eoa Iiniitudiae utriusque Ionthlaspi appellavit Fabius Columna, atque a fructu orbiculato anibitu disco fimilj; discoides dicitur ad differentiam aliorum: foliis exit incanis, duris & humore carentibus, asperis, parvis, angustis, oblongis, forma & ch'gie congeneri plants Matthiolo pro Alyflb depist'e fimilibus, minoribus duplg, circa caules rotundos purpurantes per terram ab initio fratos seu fupinos, hirsutiae alba aspera obfitos: in quorum funmo flores odorati, non parget congeneribus, fed magni respectu plants, atque non in Umbella fed veluti longa f. p. B. disponuntur, colore luteo hilari aureoque, petals quatuor in cordis figuram conftruais, Lychindum quarundam more: quibus fingulis ab imo caulis ai palmarem penè longitudinem versus summum succedunt alternatim circa caules loneis (atis petiolis haerentes capfula rotunda?, Lends fructus magnitudine, incana hirsutiae asperae Ionthlaspi habentes apicem, femina compressa fulvaeque continentes. Maio & J. u. { W. Montanis & faxofis gaudet locis, quin & plena juga diligit quicorum & c S Anseli fo. Idem hoc Thlaspi radice regerminat, & post flores & femina nerseto. vivit.

Cl-l. f. J. m. z. t. r. albo. P. uliso. T. B. Chabr. Thlaspi fruticosum incanum, U. B. K. Ger. Thlaspi incanum Machinica, Lob. Icon. Lued. Cluf. Hist. Park Thlaspi f. cant. S. T. T. r. 2 i. T. M. A. coloris, lapidis asris: caules in ca. p. e. f. a. l. e. m. a. t. o. r. e. m. a. m. t. e. n. t. i. a. n. i. n. c. a. n. a. f. e. u. c. i. n. e. r. a. e. allos, quatuor petalis bilidis compates, V. s. p. r. e. t. u. l. e. s. & o. u. a. n. i. f. a. s. t. u. l. l. a. s. t. r. i. n. g. i. t.

utimque tumidis & LaniHalvuis e. e. X. TM? "A hmU. S. Pe. P. om. S. ft. peljido, med. un, iudem 2. TM. TM. A. A. A. o. A. o. 5. iufdem Ion. Til. parante radix subalbicat & fibri, m. W. J. A. e. & f. v. mi. a. «brufta & aerial lime inde le rabum infar. Floret per totam xfaSn & f. n. d. e. r. i. v. a. t. i. s. f. u. b. t. e. r. r. a. m. descendit Drabs A. plerisque Auftrbe & Moravb loci. fr. T. m. IM profert versus «) " «» inem. Provenit cultis locis; non mmusquam in B. d. e. t. c. a. t. i. l. l. u. Toram. mar. S. in «, gramineisque in aliis IJ- ue. J. g. ca. tef. w, & a Dodonso Thlaspi Machinienre cognominatur.

ffifaatur (fed aptius ab initio à Joharfrje Bauhino defcgnatur) quâ juxta Machliniam Bllgic* ditionft urbem celebrem, in qua foprimura omnium illarum provinciarum concilium tem- pore Dodonari tnebatur. Nafcitur jj:idemutplurimum in publica vjaqua ituf Antverpam*

8.72>/^iCreticum>flore albo, C. ft P. & Prod. Matth. ed. Bauh. Hoc radice eft oblonga, pancisfibrisonata, caulicujis ;palmUm fuperantibus, rotundis: foliis paucis, pblongis,an- guftis, lxvibus¹, alternacim caules veftientibus: canliculorum fummo flores cahdidi, tetrape- tali, magni apparent, quibus capfulae fati^magrx, rotundse, apice medio donatae, fuccedunt, Hoc Thlafpijccappadocici fruticantis tiorealbo perennis nomine,D.Doldius Norimberga mific.

^Thlafpi Alpinum majus capitulis rotundis, C.B.P. Thlafpi 3. Matth. Lugd. Thai. Thlafpi hoc foliis provenit à radice in r^ulta capita divifa numerofis, oblongis, fubalbicanti- I*^*^*, guftatu minimeacutis, ex fingulis raSicis capitibus, foliiscircumfufis producuhtur fmgixYi caules, (iiftinens in fummis ramis, tenuibus, plurimos flofcuclos, albos; tetrapetalo 5 ; quorum fingulos fmguke fubfequuntur capfulæ tenues, ftipantes fummitatem caulis aliqua- tenus rotunda, fepto mediq dirimenre &• (cparante ante & retro femina fubruffa Thlafpios more, acerrimi guftus. Nafcitur in Pragenfi agro, locis faxofis & aſperis. Floret medio Vere, & Junio menfe femer fert acuto fapore.

10. Thlatyi Alpinum minus capitulis rotundis caulibus reftis foliis integris , nobis* Thlafpi Alpinum minus capitulis rotundis, C.B.P. Thlafpi. 3. faxatile, Cam. ep. Matth. & HoPt. Hoc ex radice in bina aut terna capita divifaoritur, atque fingula capita radice fie di* vifaeambiunt plnrima foliola vix dimediati unguis humani latitudinem excedentia, aut Parony- chige vulgaris folia vix magnitudinefupenmtia, ex quorum medio è fingulis capitibus radice fie divife eriguntur cauliculi palmares, paucis foliis alternatim fparfis veftiti, in quorum fum- mis flofcuculi apparent minuti; albi, tetrapetali; quibus fingulis fuccedunt filicuta admodum exiguae, rotunda, tumida*, continentes femina fepto medio feparata hinc inde ante & retro, acerrimi guftus ficut & prioris femina. Perennis eft planta ficut & fuperior. Floret & fe- mina perficit eodem tempore enm priore. #Nafatur itidem in faxofis & aſperis locis.

11. Wafpi Alpinum minus capitulis rotundis caulibus fuperioribus flexuofis foliis ferratis, nobis..Thlafpi Alpinum petrasum Myagrodes, Ponsltal. Hoc foia producit in orbem humi ftrata, ferrata, ex quorum medio protruditur caulis infirmus, non redus, fed flexuofus, in multos ramulos flexiies itidem partitus^tq; in eorumcimis rariusdifponuntur flofcuculi albi, tetrapetali, qui fatifcentes capfulas feu ifiliculas fubrotundas poft fe relinquunt, ante & retro divifas Myagriforma, unde ei nomen Myagrod^es/epito pariter medio membranaceo pellucido exficcato fam&& matur^ feparante. Non eft ideA hoc Thlafpi cum Thlafpi montano minore, ca- pitulum rotuadis minoribus Cafp. Bauhini in Prodromo ex prima^ituitu fbliorum 6V ramorum-, quiañujus folia funt admodum ferrata, illiusnon; hujus caulicW funt infirmi, flexuofi, illius recti & firmi.

§'. 2. T H L A S P I fepto media mzmhraneo filiculam longitudinaliter fecante.

Explicatio Tab. decim<efeptim<z Settionh tertU.

i 2. Thlafpi arvenfe filiculis latis, nobis. Thlafpi arvenfe filiquis latis, C.B.P. Thlafpi latij^, Dod, Thlafpi (•xh&ivi&tw Grsece) Platycarpon, Cam. Thlafpi Diofcoridis & Scorodo- thjafpi, Dod. Gall'. Lugd. Ger. Thlafpi Diofcoridis Drabas& Cameling folia, Lob. Icon. Thlafpi hoc foliis eft latioribus atque oblghg^, utroque latere incifis: caule pedem alto, non abfque adnatis ramis, ..inQuorum fi»mmis, brachiatis in plurimos alios, flofcuculi erumpunt plurimi, primum albidvdemum vifefcentes, tetrapetali, cum plurimis ftaminulis in medi- tullio, atque fingulis flacce(b:*as*J>iis fuccedunt thecasfeu capfulae Utrunque tumidx 6c rotufi- diufculae., Criftr r;aili¹ herbariorum capfulis haud diilimiles, fepto medio non tranfverfim, id eft ante & retro, fed longitudinaliter, id eft à dextris 6c finiftris, duplicem feriem feminum n^nrqm, acrium & guftu feferitum, Allium nonnihl refipientium, diftinguente: zst&x tennis & feminematuroinutilisevadit, quemadmodum radices omnium ftirpium annuarum "plantarum, aut^btiam earum, qua? poft biennium aut triennium aliquando, feminibus ad ma- turitatem percitftis, pefeunt. ^cfc^erbse genus y^*F7h Grseci à fru&u feu potius capfula^quss fcutum exiguum infraftum refert, vdcant E multis hifte Thla^ios ſpeciebus, à nobis hoc Capiteenumerandis, nulla datnr qua^ xque congruat aut conveniat Diofcoridis Thafpios 4elineationi, ac hoc Thlafpi platycarpon nufquam non in arvis fatis-Galliae^ Germanise, Belgian & Anglic proveniens. Floret ineunte ofstate 6r eadem exeunte femina perficit.

o "13. Thlafpi arvenfe V'accark feu Acetofae, Iato lſevique folio, nobis. Thlafpi majus, Tab.

Ger. , Hoc folia habet inferiors, longa, angusta, Glai i'jt potius Acctoiae pratenfis folion m
 zinnia: caules protrudit pedales fcalciore, qui an .. a'tturdenfe iatts tohia longiurculis i
 bafuique ad ranyfica Clones, atque inmmisran .. eniunt rlofculi parvi, albi, tetrg pe
 tah, quorum (mgulos leqmmtur capful* bivalves, ;• parre cav3r., fupina convex^, i
 plicem verfiim feminiim ccrnereir.es, fepto medk ' lepanyite loculatnentam dexterius
 a locuhmento fimiteriore, inutroque hincindebi; • Jura continentur Teniina rufta. Flo
 rtt & lemma perficic cadem rempeftate cum prior..

fo ij o'i T i" "T' ""^~... "• "•_*—""-«"«" ^ B. P, Thlafpi vulgatilimifim Vaccaris-
 io, Ad. & Icon. Lob. Thlafpi vulgatiflimun^ Tab. Ger. Thlafpi verumcujus femine urimur
 1 ncrta, Cam. Thhlpioranarum, Col. Thlafuialtenim, Dod. Hujusfolia Jongafu"
 .cummata verlus mucrocieni, cnmduobus mncronatjsapicibus verlus appofitionem h*
 can) cauhbus: caules fimiliter habet ramiois, & pads aitudinis cum priore: Bofcoli t e W
 Hii aibidi lunt, quibus fingulis luccedunt capfulae longiufculae, bifida, fepto medio longi
 tuc.in.1 liter ieparante Itmmum ioculamenta a dextris & finiftris, in quibus hinc Hide cont
 n w ntemina_mfta, mordacia, acn3, Naftartii liortenfis feminibus familia. Ubetrimc i
 "curt in agris cultis & incultis Gallic Germaniae & Anglia;. Floret ilhte & fcraina paulo pp
 perficit.

15. Thlafpi arvenfe
 Tab. Thlafpi perfoliatum majos, JC. B. P. Park. Ger. ed- Janfoni. Thlafpi ok-mceur
 dan A PT^{lolutn} i^aI" • Lagd. Hujus folia inferiora humi procumbentia Ocimiqu.
 , 5"™ «ntar folia, prima tamen in margine pa rum ftint inciia, at qos caolibus g
 uLUiatim Ic lingulatim adherent, parum diviiii funt, coloris Mei-viridis; laulM
 pwicsexradiqueonunturpdales, inlerius rubentes, ex fingulisgeniculisaiccimitim c%cai
 roua, quaelatiore bafiBraiiicKtampcftris perloliata?more ambiunt caule-m verlus fingulag
 niciaa, witifummiscaulibusnalcunturplunminoiiculialbi, tttrapetali, fefeexpandntt-iT
 mvolucris purpareis; fingulis iioribus ipicatim fucceduntfingul^capfuklongiuleuksp
 mm bmdi, pa_rte p_rona f_eu anter_iore cavi^fupina autem ieu pofltviore convexae, fcp
 10 X, 1/1 r_ence; on girudinalicer rhiplicem ordinem feminum fublavorum: radix alba *
 Sna f - en" ^ oCa p' *n 113* n 1, 1101, 13 acritadinis eft, proinde mitior, ac interoleraceas center
 p rum inter vinetacirca Blifas & paffim in agro Solonienfi in virtis itidem provenic F^{lor}
 Tl Februario & Mmio menfe, & c Maio femina fna falva perficic.

16. " ^ arvenfe perfoliatum minus, C. B. P. Thlafpi pwnilam vel Thlafpi mpntanu
 m: "us, Cluf. Hift. & Pan. Folia hujus qua? fubexortum humi procumbtmt fant levicer vii icli
 & forma D" motor e accedim folijs Brafficae campeftis pertoliata; fed funt prioHs folijs maV :
 minora & qoe caulibás vix pgLibus genicilatim adhtrent. minorj adhuc tuncron^ n^ tior
 bafi itidem cingunt caulem a Rtm, re a um: fummis caulicorum mftunt fiofculi a!bi, tetr;
 peta fl- fjuosfingi Uosfiibrquuntur fingula: laplifaf% prior: s maioris inuk ot rainores, in luno
 pariter fitte, parte prona cavx, fupitiaconvexac, fepto medio diftingucutt longicudinaJii
 duplicem ordinem feminum fublavorum, acmm pariter & lente mordacium, Ti
 minoris eft altitudinis, proinde inter oleraceas cenietur. Sparfim inter vincta cii
 rupibus & faxofis- verius cellam ereniitarum. Floret exeunte Februario & 'me
 fcraina panlo pofit. Maio fcilicet, perHcit.

17. Thlafpi spicatum perfoliatum maximum folijs inferioribus tenuiter incit
 pecoi modo, fuperiorib e Perfoliata modo, nobis. Thlafpi verum prim
 Dioscoridis, Zanoni. Mjn, m« modum iudic natura in prodalce, foliorum hujus inferiora
 verlus terram provenien. tum, & fuperiorum caulis adhaerentium prim
 enim foliadenfe protrudit, longis coftis inniuntia, quoru - W
 haretir. q^^ tenu. uerdivififolioritm Hypecoi adklhranda •
 par Em, dende q^dam folia latiore bafi c.ngunt ca km di Ha Vn a,
 ps^era autem folia funt Integra, mucronata ac rerroniata modo cingentia caulis
 i anios ad fineula gcnicnla. Hoc in milta (r,rr... Thlafpi p...
 imo in nuUis hujus Seftionis (^ * £ ^ S n ^ «ngener, s
 guitur: infummisfamgiisranvl." l' m' «^ o ^ « s We fpec.esacweusfcmnibus -
 fum fingulis fingHic fubvenituit filicula rotunda, bifida, fepto medio membranco feprant
 ^plicem (eriem itminum; hi taiJ) uii. ita indLim r
 • "quentes. Cpol Wemina matura) fcpta nicdb rTilp lm qrum /> m3s p lc:ltini pJ ovniun
 vdecfinommbuscapulis ^ Wft S Sfr ^ ^ ^ ^ P " ^ ' s " " r ^ 6 1 1 , ^ ^
 i" Pittiafed & in Soria H ^ TM ? ^ ^ - ftovenic hoc Thhlp non * J »
 sicut cn UUI communicatum hauuit Thomas Belluzzi L«^{uc}

Botanieos in academi; i f'ina, ex Sbra, caps opera idem cominuatim erat Jacob*) Zannoni, Lectori Botanico Bononienfr. moretiefate *SefuhRaem* ejufdem feminafuapeTfleit.

T-H L A S P I; apjtnfe & Creticum umbellatum.

18. *Thlafpi* limbellatum arvenfe Ibenlis folio, C. & P. Thlafpi amanim, Tab. Ger. Thlafpi AllobrogicLim Crtico par, Cluf. Hift. Mukos hoc emittit cantes immediate ex radice in ramufculos plures lefe findentes, qaibus alternatim fingula folia fatifrarodifpofita, leviter crenata, contbiciuntur: flores infummis ramonim iafrgiis proveniunt umbellatim adinfar Tordylii Cretici florum, fed tetrapetali (~ non vero pemapetali) albidi, quorum hina funt *T&ajowT*, Si binaaliaminora; atque fingulis eva*nidis fingulae fucedunt capfote longiuiculj; ih *Uffimo* fiife, aridse & exficcatar, fepto medio brevi "longitudinaiiter diiterminante duplicem feriem feminum iubrulvorum, minorum, moidacium tamen & acrium, casteroruni huius claiils Thhfpio-n more: radicem h*et exiguam, multis iibrillis confantem,*& fcniifiibus maturis insolent. Floret arltate inter iata per totam Galliam Narbonentem, & femina copiofe eft'undit exeunte sihite.

19. *Thlafpci* arvenle umbellatum Monfpeliacum Nafturtii folio, C.B.P. Thlafpi aliud umbelUaoun Pins, Lugd. TKlafpi umbellatum Karbonenfe, Tab. Ger. Thlafpi minus umbellatum Narbonenfe Nafturtii folio, Ad.& Icon. Lob. Cauliculi hujusmulti exiinc immediate ex e&dem radice ficitt in priore; qu'ibus inordinate adherent mulca folia, temiiter diflefa adiiiihrCornu cervi, Nafturt'imm verrucofum difti J. Bauhino, fed tenuioraSc exiliora, divifarJquafi Nafturtii hortenfis, per totos cauliculos. fparfa: fiores in fummis ramufculisconfertim & in umbella^ modum albos, tetrapetalos, fuperio; • floribusconfimiles, edit: fiiiiculaslongiuiculas, in fummoMas, fepto medio mtmbranaceo dirimente duplicem feriem feminum, quemadmodum in praediftis; radix Don eft profun'da, nee mukum fibroia; fa-porceft amarohocThiaipi, fedmagis quanifuperius. uii rectptum. Inniontofifatis arvis Narbonae, ad Lupi mantis radices proveriit. Maio&Juniotopiole flores albos, tetrapetalos, edit, athifcedecidentibus Julio per/iciuntur (cniina. "

•zo. *Tblafyi* Allobrogiciini-ijarviim odorato fiore, nobis. Thlafpi parvum odorato fiore, ClnCtSft. MeniinitCar.Clufiiscum perHelvetios fibiiterefiec in Germanjam, in Ailobrogibus Thlafpi genus Cretico valde Jimile fe invenifie, tujus tames ilocea non eflent purpurei, led nivei; folionim tamen acrimonia Cretico refpondens. Vide App. hujus Sefktionis.

»£4. Ji/rf/1/*umbellatum Creticum Iberidis folio, C. B.P. Thlafpi Cappadocicum, Antr. Thl. \fi flore incarnato & flore albo, Eyft. Thlafpi Creticum, T^>. Gefn. Hort. Caef. Thlafpi Ouumr, Gert Thlafpi¹ Candis umbellatum Iberidis folio, AcTO Icon. Lob. Thlafpi Creticum quibusdam flore rubeate & albo, J. B. Chabr, Hoc caule quidem unico pedalis altitudinis, auc proccrioris adolefcit, fed crebrp alarum ftipatu ubertim fruti.cante, duro, lignofo, glabro, viridante: fob'is tum caules tum rami amiciuntar longis, exangufto principio'fi-nfim dilatatis, Iberidis folia imitantibus, nonnih.il interdum crenatis, potuilimum in inferioribus, i'apore rervido & fubamaro." Hotes nmbdlarini coherent dilute rubentes, vel rL ait Dodona'un e casruleo rubroque permixti ("t^quc dilute elegancer purpurafceticibus) petaiis quaEaor, doobus majoribus, totidem minoribiis confrant; qtios fingulos filit-uhc finglx excipiunt, Thlafpios prax^*: picvie, biidie, infracte& prona parteconcavae, fopina coiwcxse, e HHira Itul"*: iii med^*^pri}-crentes, qnieftproducriolepti mediiutrinque a dextris & finihis fcc'idum capfklx longitudinenrfccantis & dividendis duplicem ordinem ftminiimruflfornnr^trtLru&^mordacium csterorum iWfamilias more: radices habet compares, mults ^brillis conftaiues, duras, poft perbfktionem feminum inuciles. julio& Aiiignto menfijbas ilorem ac (emen profert, in hortis Septentrionalibus tardius. Datur & linitis m letas foliis indivifis ceu LinL, & dicitur Johanni Bauhino Thlafpi Gredoton alarum foliis indivifis ceu Lini. Omnes hae Thlafpi<n fpecies fiores producant unibel-yJatim, unde eis Thlafpios umbtllati ^nomen a nobis indkum.

il, Thkffi Mexandrinum *CcJcJ?i\$J*. B. Chabr. Hanc Thlafpios fpeciem ad Johannem *Euhinum* mifi? clarilimusvir P. Cor^ufus titulo plants petpulchra: Thlafpios Alexandrini. Cnille confaE dodrantali, proveniente ex radice fingulari, in multaspoiteafibrillas divitS., ia exiliuuit bini, terni, mine plures caules, tcietes, glabii, multis alifeoncayu; ad quol diFaricationes ptopaginefque fuperiore prxfertim parte folia fingula, vel uti Per foliate, ^"raufesamnlefiintiiirjubrdtunda; ramorum extremis longa fericurrique tx brevibus pedi-

culis appenduntur ilieufe rotunds Viciae feminis
 Jum 'defmentes, quaruni fingulas per longitudinem
 iininqit, id est a dextris & finiftris, vr.lvula: bipate
 mento niedio pellucido reficcato reli&o, inqne f
 guUvtemina compreffiii ruffa, exbtiorcbafi in a,
 Thlafpios Ipecics liquid habere commune cum Th
 nobis entCochlcarias fpecies, in

nitudlne, in macronem levitr ol fñ
 nirit coftuia ltuiepimentum, a qii
 liquula? deiijfcenres abfeedunt, lepi
 s loculamcntis valvulis inchifis fir
 i mucronem definnt. Videtur hae
 hederaceo Lobelri quor.d ifiliquas, quod
 ina Cochlearir.

23. Thlafpi fruticosum Perficum foliis Leucoii inftar fempervirentibus, nobis
 rimas in te
 obscure
 ad extremum
 nicula
 re
 m
 Thlafpi
 cob.
 quarumcunque
 apicibus terido
 floral v
 n? n

Thlafpi fruticosum Perficum foliis Kairi, Zanqni. Ex radice lon?a, fatis craifa fibrillas plu-
 quafiincefpiccmulta folia longa, craffa, kvia, fupr^
 «ncia C currente per medium riervo fubtiti & vix pef-
 «»«onda, mterqiaj'oriturcaulis pedalis, fimilibus tolas minorib
 aiteratim dilpofitis onuihs, qui in plurimosramos fe findit, acque in fumnus taffigiii
 -morum provenmnt umbeUarim .plurimi iiores-quatuor petalis albis conlhnes, duobus
 a oribus firdnobusduplo qaafi miooribus, quemadmodum obfervatur inThlalpiCrcucbS
 i 7L TM; 3 Ollor, Scabiola Hif
 pafica, aliifque plurimis (non obftanu aflerrion* Tn
 quiafleritfenunquam hoc obfervaile in alio Thlafpios genere, neein ali
 plancarum floribus) in horum niedio apparent plurima ftamkrala
 is ornata: odorem flores in umbella difpofiti gratum faoe (pii-ariL,,
 n? n nigiar Oci ori acceclentei: flonbus evanefcentibue fingulis fingalx fuccedunt ca
 pjuix ieu (II)CUJEpekarar,lata?, inmucronem obtufumdefinentes, cofore obfeuriore; verfti:
 ptiolum apparent quadrats, funtque bifidje, iepto medio dirimente dnpBcem (eriem fe
 niinum comprefibrum five latorum, cinnamomci coloris, quac rupta & guftar.afaporemex.hi-
 bent palatoamarum, acutum & pungentem, qaafi femer Sinapi. Floret hie Thlafpios Ipe
 per totam sftatem, fed copiofius verria tempefhee & frigore durante (lores edit. SporJB'
 provenit in Perfia, unde ejuftemcn in Italiam mifTum,ubi nunc in hortifcolitur. Nosplantan
 ranfiis adnosmitfaminiortoBotanico publico Univerfitatis acftateelapla coluimus..

THLASPI fepto medio filicukm longUudinaliter ficann:

THLASPI MONTANUM.

Explicatio Tab. decimoftavae

24. Thlafpi Y' Alpinum BeHtdiscaerulea: folio, C. B.P. Thlafpi montanumpriniuniBurff..-
 irons tructu Col. Thlafpi inpntanum 2. Cluf-Hift. Numerofa fant boic, folia humifir/
 parva: crafi "a&iuuculenta, {Pbra viriditate okeqtia, quafiquecifii coloris, Glo)u]ari£(\a
 Anguilhra Aphyllanthen aptlbt) foliis proxima, mucrone orbiculato, acn eufn • cau
 pores, rotund^pdcales, ant ctiamminore^paubanaiftioribiis & acutis & magis virentib
 Joins, rarodilpofitis, flipati: in q r
 bus marcidia fuccedunt filiculi tlu
 Thlafpios fpecies quoad vafcula
 a dextris & finiftris in focalamentis contentorum, quae sunt fubruffa, Thlafpi Cretici fer
 paria, fed minora: radix can icans, vofa, lateribus in propagines fibrolas iefe ex,
 diffundit. Provcn, tindecHv1bU slocl:
 aquarum funt turigines) imminet, quarto a Vialmz Annuaq miliari. Floret Aprili, fe-
 men fert Maio & Junio. Siliquis nonnihl variat. Hinc apud Tab. & Ger. f. arze duz ad Clafii
 & Lobelii imitationem: fic & flores in umbella, ut rege Celum
 mou
 ica, ut Clafius caterique ipfum imitantes, pinxere.

25. Thlafpi montanum mitius rotundis foliis »erfus terram in caulibus
 milibus, nobis. Thlafpi alterum mitius rotundifolium Burfae pastoris fructu;
 foliisdivifac, parumque acrls, capite exeant foli,
 multis fed Gbfcuris prardita at caulibus ad fingul
 liata tormafinpedicuto/in fitnmls caulinn
 quorumfingulisdibvenitmtcapfukoblontP
 rentes urfuperioriscapful., ahcju.ndo oW,
 «1ond,n,m Hcs, feptomedbn, e_n LancobZ
 «rna, qnaterna, continentur(i: mina parva «
 > navefcentia, parum acria, & non, at congener, All'
 auia

4,

1, .v fi-

quidgufttt ieljiicunri:i. In faxofis ribus humer-ribi rillineilfe floret; viaeMlrcato villa ad Flammiiaamm ant Capucrr indent in ver V Fu -Cohinina ; neqie eft idem cum Thlaipi pertbiaco, ut vukCaiparns i aas, prG] rations in Hallucinationi blfIJ us ca-pitis idfiaendas. «

26.T/Jalpi montanum fempervir C. B. P. jfpi mo., ui .m candidum, Hift. Lagd. hsec eltramofa filiculofaqne i bus n. hue ilTic aiferfis, caule procero, in v, rano udwifo, *cortice feabre ; ifco nig; ^fcente: foltis^ad fingula genicala denfe ngeftis, I^eucoiofiniilibus, fed mutiobrevioribus, candicantibus, gufluacribus: floribus fummisrartiiscopiofid, puffillis, candidis, coxapetalis: iemineminueincapftiliscaeterorum il ifni»n niorelonginidua'icer fepto medio feftis, femina liinc indea laterefepti mediicon- ,,, , linguam acrimonia fui pnngentia. Ad vicum qaemVocant DAjulkmi Deferii ocul Agnania cceriobio gignitur, in prarruptillimis (axis.

27. Utafpi wllofnm capfalishirnrifii C.B.P. & Prod. Matth. ed. Bauli. J. B.Chabr. Ex radicetenui, oblonga,-albicante, canlis pedalis unicus, rouundus, villofus exit: ad cujus exorcum r"3lia aliquot hurni frata, longis pediculis donata, orbiculatomucrone hirtuta ; qua ve in cauk-i mulro breviora, pediculis carentia, latiore bafi ipfum cailem ampleffintur, aqliardam levicer crenara hint: florcsaibi, letrapetali; filiquis magnaehirtuts, com-s, longo pediciilo donacar, fpicatum funimos canles ambientes; faperiore partefilfe, i.ealis duobus prxditr, fepto niedio eofdem dividente: in quorum utrifque femem raf-fcens acri fiipore praeditum continetur. *M_onfpemjfi fponfe nafcensobfervavic& collegit afo. Bauhinus. Floret a?ftatc atqueeademrinience femina perficit-

28. Tblnfpi Allium reddens, nofiis. Scorodothlafpi Iflyffis Aldroandi, J.B.Chabr. Apro tts hercule nomine ScorodotHafpi plantam hanc vocavk Ulyffes Aldroandus rerurti narurfe [gaciffimusindagator,& apud BononienfesFliyficus celberrimus. Radicentitur fingulari, Jba, paucisfibris donata, quseveluti in capita divaricatnrnumeroio foliorum ftipatn, longis •ediculispra:ditorBm,qnKexprincipioangufto fenfimovaram cjuafi figuram acqtiirunt,& fub- •otandoambifai fioiiffitar, quorum priora foliis Bellidis-quodammodo refpondent, qucdam •eviter finoata, qnardampaucisdenticulis, aliaf,renullis,donata. . Color virens eitplarimis xcoftaneryisexcurrent.bus; atquaealtemopofitucaidiculis hrrrent foba,prsf<timiuprcni_a; nmimis alls cautesampleftuncur: caulicuJorum "ralhgio «o^culi infidenc pam,aibi,eurfe t'astoris vulgansinfar, qiiaruor pecalis fcarences, cum apice & ftaminuis in medio; quoa .zpf_K. j"tquuncur fpicatumdigeftar, infummis canlibus incurvis prompt parte cava?, fupina • cortlis figuram xmulantes , fepto medio (eparante duplicem feriemfeminum. CJE- terum tot: I planta redolet Allium manifefto odoratu, etiam nan tafta. Radictila & folia vicrateo goftii praedita tiint grato, vel tantillum acredini^ in faucibus rclinquentia, non fine habicu Aliiaria: .• wnde aptiffimo nomine infignitum hoc Thlaipi ab excellent!ifimoAldro-jndo. Nova eft haec plantula, primo fie nominata ab Aldroando, & primo fculpa exlubita & Johanne R^hino. Ubi fponfe nafciturignoratur. Floret eodem ttmpore cam pradictis, cV eudeni anni tenjpeftate femina paniopoft perrlcit.

.../i parvura faxatile fiorerubenre, C, [5. P. LitThochlafpL 4. carnofo rotundo folio, "ol. Hujus radix longa facis'lsvis, candicans, dura; exqimresquatuo rve cauiciiii tndi- fatendentes, refti, rocundi, ru^ frenres: -...- uos den/a, combfa, rotunda,* parva ad- mudum folia, ne'efrtttutvlatitn*4i ••••• T circa radicemrubeftentiaaliquando, ed colont br:iiiiicrrcliqua. LCV. . ulqucad lummOspttiolos femper angufttora, lon- fiora, denfiora, feu nr .inviferentia ad flores ufqne: in fnmmisvero caalicalis flo- mli parvEumbdhr .i^rmeruncur, botris ex viridi rubentibus, circa qaoscxterius

In orbem aperm- us velati coronances umbilicum, ac compreilts qaataor ftccalk fnave- rubeu'd s lillcis eleganter depictts,- ftaminibus incus luteis ; quibus panlnnm in- il*ja (ticcrefcunt ipicatum.capfulie bifidae, prona parte cave, fupina cc .w uiedio in apicem definenteSrfeparaiite duplicem ordinem-feminum ftavorum. fta- icr haccThhifpifls fpecies,nec alibi fponfe quam in nudis cantibus ^quicoloruminvcnicur. leperitur&AEverfi ValvaefaxAfeiiintibus, in quibus parum terrsRConfpicitir.

zo.Tblajj>i peregrinmncapfula cordata, J.B.Chabr. Piilclierrimum hocThlafpiosgenus Tirinum ^b'HenricoCherlerodetefuro; pedalem aifequitnr altirixtinem ejtis caulis in aliquot amufculosdivifus: foliis ftipatar Lini latifolii facie, in extremoobtufts, glabris, jnordinatini T u alternatim appofitis, cujus ramulorum extrema exornant ffofculi exigui purpurei, quoa Ktipiunt filiqui xcordate, cl^gantiviroreconfpicui,minimidigitihumaniunguemlat3e,!inea

feu potius fepto medio bipartite: breviter, filiquis Thlafpios latiffima filiqua" 'donaei figura perfimiles: radícula duriufcula eft & alba. Plants fapor fubamarus,' non fine actimonia quād^n: femē ejus parvum, oblong un, luteolum, Line inde à dextris & finiftris fepti medii continetur, acriufciilo fapore & minine ingrato. Erimo' confpexit Henricus Cherlerus in horto D. Zuingeri, in quo florentem Jul;o, & Augaftofemina matuiantem hanc plantain obfervavit ppæ'diftus Cherlerus.

T H L A S P I montanum fruticosum.

31. *Tblafyi faxatile* vermiculato folio, C.B.P, Lithothlafpi monuinum fruticosiuj vermiculato folio, Col. Hfcric eft hxc Thlafpios fpecies, nee alibi qiwmin nudis cautibus jEquicolP-rum, ubi & Auricula muris incana, à Columna depi&a pag. 27?. de Stirp. minus cegn't^j confpicitur. Radice conftat lignofa, mañâ, alba, inter faxorum rimas, ex qua craffa, lignofa, rugofaque propago multos viticulos breves palmares emittit, anguftis, parvis, ramofis,vermiculatis, rotundis lere foliis, nigreicentibus, acutis infummo, atqueper ambitunt,parum hf' futis, denfe circa illos harentibus, at circa flores rarioribus & brevioribus ; flores vero in magnas veluti umbellas ThlafpiCreticimoreconfertimnalcentes,candidi vel fuaverube-^s* quatuor petalis conftantes, quorum fuperiora parva, iqferiora majora funt, Cretici fioribus P^ria, minora tamen; ftaminibus intus luteis.quatuor: atque ita florida invenitur hxc frutefcens plantula, ut nihil nifi iiiores fpe&es.* At poftea fuccefcentibus mediis fioribus atque dehifcentibus, exteriores & inii mutantur in capfulas brevibus petiolis innitent;es, quæ funt lat^ fatis, parte anteriore leu pronacavac, p^arte pofteriore feu fupina cqnvexa?, convexam partem nobis, cavam partem caulibus oftendentes; fuperna parte fiffe , longæ & angulofæ, non funt rotund*. Floret Maio, acaeftate femē perficit. Folia guftu lunt admumacri, femina acriori, quæquelata,compreflà & fulvafunt." Reprcritur Anverfæ Valvs lâxofis montibus in quibus parum aut nihil ter*træ reperitur.

32. *Thlafpi fruticosum anguftifolium* Leucocii folio, C-B. P. Park. Fruticosum foliis Leucocii marini, Lob.Lugd. Tab. Ger. Thlafpi fempervirens, Cam. Thlafpi fruticosum folio Leucocii marini minoris. Thlafpi arbdrefcens, J. B. Chabr. Hoc multas virgulas procumbentes edit, quibus adnafcuntur denfe difpofita folia angufta, haud abfimilia foliis Leucocii minoris maritimi; in fummis caulium fpicatis digefti, qui convertuntur in capfulas longiufculas, per medium bifidas; & inunoquoqueloculamento a dextris&finiftris fepti medii ipfarnctmtinentpi; &mina flavefcencia, calida & acria guftu; radix longa, alba & lignoia, late le lub ^rram dividens. Reperitur in Belfii hortis Spiræ, ubi Camera impenalis tenebatur onn>, in tultu fimo horto cu)ufdam Affeflbris, non modo fruticosum led plane arborefcens, folio Linariæ. Floret aeftate, atque paulo poft femina fua perficit.

33. *Thlafri fruticosum folio Thy mbræ hirtuto*, C. B. P. fruticosum alteri urn, Lob. Caul multos lignofos, duros, peddles, Frutici pares,edit hare Thlafpios fpecies, qui denfe fatis onerantur foliis Thymbrs fimilibus, hirtutis, rigidis: -atquein horum fummis confpiciuntirf flofculi albidii, tetrapetali, quos deciduos fequuntur capfulæ-longitudinaliter fepto medio feftx, atqwe in fingulis* loculamentis cptinentur hinc inde femina fulva recentia, a ^ca fubrubeſcentia, mordacia & c acria.

§. 3. *T H L A S P I montanum monoj^jnum abſqw fepto medio facente feliculam, nee tranſverſim, nen(lug:*t'Ji,alit, -,*

34. *Tblafpimontanum*, monofpermum Glaſti folio abſque fepto medio, nobis. Thlafpi rfontanmn Gkft,Jo¹⁰, C. B. P. Thlafpi montanum , . c A Hift. Hoc pedah , . c A Hift. nunquam ^ TM f >& **K <rn,o ; foliis pene BraffipecaoipeftrisipL ample tenticibus. n;monbus --: men < ^ " ^ ^ n e vircntib^ infcme c andicailtibus9 ^ r c ? r ^

19 ... a radice producit: flores in extremis ramulis nafcenti etali, & umbellam omnino annulantes, odoris exprefces; quibus decidentLs lat. P b n ^ ^ ^ edunt filiculae non lig. ... ios generibq

potius RapKaniftrum monolpermum ^ ^ ^ ^ facile concluderequos effe 3 regula Thlafpios, cujus generice

générique capinte bifida: furic, fepto medio fscante fir bdapfal3s,'aat rranfveWini. aut
cainslum longitudinem, utiupraddcujnius: hxc ta- Jiotatu digna adjicinlus, atque hie
•ollocamns imprefenthrum inter ThlafpTo^ genera, c; IK : ic Kaphaniftummono-
jermura Glafti folio appellate, pcrmenefn ftabife T oi- .. ' t a, fibrofa, tenui, fumma
• sllnre lerpntte, & nova ad latus germini prbfereite. :mt imbrofis locis Sbihenfiem
t qua inir ex ea'arce ad Sneberg, nufqiiitot alibi a (arolo t^lufio obfervatum. Floret Julio,
MiiienAugaltoad.inatuiiEatempervenit. „

TEMPERAMNT.UM & VIRES.

linen faenhatem ha: t ait Galenas, acrem, infernos abjeffas rumpit, menf:s^
fa-tusatecat, per fede: • (mfanguinolenta evacuens ifchiadick prodeft, bilemper
i (fr fuperna acetabuli ' potumfxpurgat, autbore Diofcoride. •Aatnifceturvey,
:k vrfuti thmc<£ is^ alia ejufmod'u. Acre aut mordax eflfemen vulgatijfm't & vires
habet caufklos, enkfacit enhn iy exftccat in quarto gradu, dtenuat, provocat^ i?tcidit, urit,
foindt ut Nafiurtu femer. H#t Swenkfeldius. Thlafpios varia genera fupra deduximiM,
' fit'idem omnia fint talidais acria mordaciavefecundum magh is? minus, omniatamen
it nobh ufui, quodnam wro ex midtis eligendum fit, ut illit/s femer in officinot adtbe-
confeBionem inferatur, valde fuper bac qudfiigne auSores connaverfantur. _ ExGa-
.i.de Antidot. cap. 31. omne illud quod ex Sauro, ex Creta i\$R Cappadocia adfertur^pal-
Ticripit \ verum quodnam fit illud, quia pauciffimis UneU depingitur à Diofcoride, indigi-
ffic'dlimum erit. Bauhinut Tblaff>i arvmft majia Vaccari* folio incanoproponit, quia
la cmtiia fupra recenfifa prffitare potefl. Alii Thlafyi Ofyridk folio a Caff. Baubino isr
inter N^lurtiafihefiria recenftum^ quia acerrhnwn, tommandant contra bydropem, hno
fenterkk falubre quaque effe predicant, quippe quod urinas infigniter movedt, (y notu
facit fit, quia acerrimum olfattu. Tblafyi filkults latk feu platycarpon a qmbufdam in com-
poftriovc iberiaces ufurpatur. Vide cetera apudjohannem Baubinum (y Simonem Fault de
Faccultatibu* is Viribut Tblafpios.

HALLUCINATIONES CASK BAUHINI
Aliorumque Authorum.

f.nl. 2.pl.t. Tbfojpi monta^um Glajii
A 40. P. Tblafpi I. vel montauam pehatum,
PiM. & J-fiJi. 'fbiajpi moititanum Glap folia
<Jperim & per confe/jitene abjqe fptto midio,
Pro not a genfric/i ah inilta donrinteTbla-
difimiis omne Tfilafyiproductere (ithaliu biea-
" mrd;odifUminant£ Auphcemferiem
. 'r tndtfepti medii eotitentorum,
(ilicalam producit unieum fe*
ineitem ex dejeriptione Car. Ctujii,
•inn tft dicend.t gcrnir/m Thlafpios (pecitt: qui-
ur tandem nHfticulofat motiojptrmat I J{psha-
tieet) fupcritis explicate* en
haudahs re fatCTeputabitti
%.07.cat.2.pt. 1. tll
Hicraeifalium Cf w
-m, Ciuf. pan. £-'
atunafy* . I, londraba Alyf-
j4b" *uidempl.iii. Thlafpi
,iorc calcari danato, C.B.P.

Leucoittm fore pedato. Col. Ibidem pi. iv. Tblafpi
clypeatnm Serpilli folio, C B. P. Thlafyi minimum
Jpicatum ttmattinjfol. Omrtes be quatuorplants
ilkulns preiucunt fompreflas, Jhnfna comprefsa,
•plana, infe continentes, idfo magis accedunt Lcu-
eoiifami/tie, quam T,lafpcaj , ergo avirruncandas
bine a.TIAa/peas fpethbtis & Llucoiis adjungendtis
aquum duximns. Xonfuh paragraphum ;. cap,
\ III. fapra inter LtHcoia jiltcuhja Sicapfularia, a
fflpg
Parrs ibidem pi. i. Ltacaiam Jtlyffixdti ambella-
iittitanum Cuhimita adaptatur pro fynonymo
(pi clypeato C! "f.HiJt.® ceteris illic culhca-
toiam jilyffvidcs umbillatummontaniim Cot
j- j/decies omniito diver/a a reliquis cum quibit
Jyno/zyme adhrbetitr a Ca/paro Eauhim >• ergo confkni-
iit Cafpnrns Bauhimis dust dijiinclat '(pecies pro
una Ef s adem, tumfint diver fa, ut apparct ex learn-
huiiiiTabula nana anea nojlnifli

S I L I C U L O S Æ

Tetrajectalx bicapfulares.

§. 1.

NASTURTIIUM SILICULOSpM

HORTENSE.

C J < P V T -XVIII.

aribus torquendis; quod odore & seminis
 (potius tortione) velut torporem excitans. Nasturtium nobis est duplex vel siliculosum de
 quo egimus cap. 4. Sectionis hujus tertia: vel siliculosum de quo hoc capite agemus inter
 suas confortes plantas, scilicet filiculosas, calidas & acres. Nasturtium siliculosum est vel hor-
 tense, vel silvestre; hortense est vel tenuifolium, vel latifolium; latifolium est vel foliis integris,
 vel crispatis, hocque vel magis vel minus crispatis.

T A B U L A X I X.

<i>Nasturtium filiculosum</i>	<i>Hortenfi</i>	1. Vulgare tenuiter divisum, nobis. Hortense vulgatum R, C. B. P. 2. Latifolium, C. B. P. i5r Prod. Nasturtium latifolium Hispanicum, Park. S-Crispum latifolium, nobis. Nasturtium hortense crispum amissifolium, Hum, C. B. P. i5r Prod. \$ 4. Crispus angustifolium, nobis. Nasturtium hortense crispum amissifolium, Hum, C. B. P. i5r Prod. \$ S-Petrum foliis Burfepa Jlor nobis. Nasturtium petneum. Icon. Lob. Tab. Ger. ? 6. Pumilum vernum, nobis i* r C. B. P. Cardamimpusi Ua fax a; lis mon- tana tenui & Sj Colum. O y. Vfyridk folio capsulh minimis, TOAW. Nasturtium Silvestre -folio, C. B. P. Tklassi minus, Dod. £ 8. Erwerf a \$ne, nobis. Nasturtium Jilvtftre Vahminum CluL ^ Park. ?? i Jf
	<i>SHveJlre</i>	^ micofum capjula Uvahi rotunda ajpera velhiriuta vobu \$ Jlorhum verruco Jum J.B. Cbabr. Coronopot Rudli, Euga. Ger. ? i o. Tcnmffime divisum, nobis. Nasturtium damint Alpina < i* minima, CluL Hist. @ n - - - - - Al/inum i JB. Chabr. %, ^ 2. Candidum incum femperv'rens^ nobis. Tbfoppi» species Candida, } 2 cb. aifr. Q

Explicite Tab. decimdan*.*

§. 1.

N A S T U R T I U M H O R T E N S E .

1. **N**asturtium vulgare seu hortense tenuiter divisum, nobis. Nasturtium hortense
 gatum, C. B. P. Nasturtium hortense, Trag. Puen
 Ger. Park. Nasturtium
 & familiare. Fol

lan guud] m i l [e r d i v j j ^ c ^ r ^ ; ^ b f i d . , p r o n a p a r t e c a v ^ , f n p i n a c o n v e x ? , f c V o m e d .
 * . c " i l t n c m f e m i n m n m f f e c f e n t i u m , a c r i g u s t u i f a p o r e . ^ ' ;

2. *Nafturtium* hortenfe latifolium, C.B.P. &Prod.Matth> ed.Rauh. Nafturtium latifolium Hn^micum, Park. Nafmrtium Hifpanicum, C'er. Tab. Gefn. Hort. Nafturtium latifolium, J.B.Chabr. Ex radice longa>tenui, leviter fxbrofa, caulem mittit cubitalem, rotundum, qui in multos ramos brachiatur: folia ad radicem plura, longis pediculis donata, quxncdivifa, nee laciniata, fed longa, ovata, integ.a. & in margihe obfeure ferrata: flores in cymis ramorum profert mukos, albos, tetrapetalos, & capiulas conformes vulgaris fex hortenfis Nafturtii floribus & capfulis: item & color & fapor idem. Ubi fponde proveniar, ignoratur, fed copiofe fatis in horto Blaefenii florentem & femina producentem habuimus Maio, Junio & Julio

3. *Nafturtium* hortenfe enfpumlatifolium, nobis, C.B. P.&Prod.Matth. ed.Bauh, Hoc, foliis execeptis, cum vulgari correent: folia enim crispata font & latiora, fed minus crispata. "A~**Nafturtium* hortenfe crispus anguftifolium, nobis. Hoc itidem convenit cum caeteris psecedentibus, floribus & capfulis feniinalibus; folia autem funt anguftiora & magis crispata. Confule binas Icones, quarum prior indigitat folio fuo latiore & minus crispato Nafturtium hortenfe crispum latifolium, 2^{da} offert Nafturtium crispus anguftifolium quoad omnes fuas partes, radicem, flores in cymis caulium, & capfolas paulo informs caulibus adhaerentes, priori fimile, nifi quod folia fint minora, magis autem crispata.

§. 2. N A S T V R T I V M *filiculofum filveftre.*

5. *Nafturtium* petratum foliis Burfae pactoris, C. B. P. Nafturtium petraeum, Lob. Tab, Ger. Park. Nafturtium hoc pumilum folia protrudit humi procumbentia, fbliorum Quercus inftar, non multum recedentia à Burfae pactoris foliis: flores in firmorum caulium fummis edit albos, tetrapetalos, Nafturtii hortenfis florum asmulos, quibus fingulis fingute fuccedunt capfulae, bivalves & bifidae? (fepto medio feparante duplicem feminum ruftbrum feriem, binis valvulis adextris & afiniftris includentibus hincinde alate fepti medii femina pcedi&a, calida, acria, mordacia) quae cafterorum Nafturtiorum more ad longitudinem uncialem fpicatum proveniunt in fummis caulium.

6. *Nafturtium* pumilum vernum, C.B.P. Cardamine pufilla faxatilis montana ft«o, is}*, Col. Flantula haec palmans adfumum eft pi&ur* foliis & habitu par, nee majorem fed potius minorem, utin piftura exprimitur, invenit Fab. Columna. Foliolis ex femine primum ortis conftat rotundis, deinde in lobos plurimos, ocl:onos, novenos, binatim fibi invicem e regione op;^fips feparatis, uno extremum claudente, qua?, Lentis parvas magnitudine & rotunditate divifa ofervantur, faitem qtas terrs proxima, deinde oblongiora in caule, qui in vegetioribus zYis ijWummodi vifus flores habet pufillos, albos, tetrapetalos, qui vix depingipoint; ex calyce e quatuor foliolis virentibus confiato exeunt petala quatuor alba, qux contrario verfu foliorum calycis difponuntur, ut ofto videantur, quatuor virentia calycis, iifque quatuor petala alba intermixta funt, in quorum centro ftamina tenuiffima, lutea, apparent: deflorefcentibus vero floribus fingulis ab imo capfulae ovaes fuccedunt, bivalves, Draba? minima pares & fimiles, Der caulis iummum alternatim difpofitae: in quibus femina lutea acri fapore, licut tota planta, Nafturtium xmulantur. Maio hanc plantulam floridam invenit Fab. Columna, atque fructu onuftam. Variat haec planta, nam minor tota paucioribus lobis & foliis invenitur, ut in piftura exprimitur. Gritur in Valvifium montibus umbrofis copiofe. In monofis cautibus excelfis fupra castrum rodium j Poponifcum ^Lquicolorum, inque eorum alveis, cavifque umbrofis locis.

7. *Nafturtium* filvefte Ofyri 4is jiffo capfulis minimis, nobis. Nafturtium filveftre Ofyridis folio, C.B.P., Jark. fhlapfi. anguftifolium, Fnch. Lugd. Thlapfi minus, Dod. Ger. Thlapfi minus. C. rmanicum, Tab. Thlapfi minus tenuifolium, Lon. Hoc Nafturtium fub exatium n. Kiima habet folia per terram ftrata, minora, fubrotunda, afperiora & minor* rmanielinae inftar; ex inferiore parte caulis ramatim dividuntur cauliculi, quibus adherent 4oliola exigua fatis: in fummis ramis innumeri producuntur flofculi albi, tetrapetali; quifingulis Paccelfcentibus J^Junt capful* fingul* minim*, 'bifid*', cum fepto medio fecante longitudinali. ter ipfascapfulas» in duas partes, hinc inde a dextris & finiftris fepti fedii continentes plurima femina fublutea, guftu acria & mordacia: radice conftat teniii, %nofli. Anhua eft planta.

8. *Nafturtium* filveftre Eruczaffine, C.B. P. Nafturtium filveftre Valentinum, ClnC Hift. »Park. Nafturtium filveftre Vakntinum Clufii, J. B. Chabr. Unico hsc planta affurgit caule, fed

fed t'fatim aradice fup' aiblum .nu' isdivifo, hirtuto & afpero, virentes fendo, pedalis long'itudinis, interna folia qualia i t pronunciare qoi potiit Car. Clufin^ quia jam in femer magna ex parte evaferat pla Mm obfervaverat; qua? tamen fub alls gauli iuhajre- bant, tenuia erant & multin"da, Nail • mlgaris & kgicimi folioruni pasne armula, cenuiora ramen & viridia, acri guftu pra?diu Nafturtjum: extremis ramis fert multos roi'culos, fpira infpiciem congeltos, quatuor ispalefcentibus conltantes, inqubustotidemfta- mina; quibusevanefcentibusfucceduiu luicularbreves, hirtuta?, longiufcute, duabus valvillis feu iuriajlisconftan.es cum ligula feu fepto medio prominente, qua? non quidem furfum ev&x reiiquorumcongenerum more, feddeorfum inrlexa;; inqubus Nafturtii artuli.m femerKteC radix fiogolaris, candicans, fatis craffa, non camenvivax, led qua; fingul s annis p^{erir} Eodem loco eodemquctempore, nempe MarLio, fiorente-n hanc plantam & feminC f^{em} tem inveniebat Car.Clufius, quo AlyilumGalenl, Valen^l .clicct regno, & qui. notas cum Nafturtiocommunes habereconfpiciebat pr^{us} Car.Clufius Nallu^{illf} indi'dit, quod (quantum ex guitu ejus ei judicart licuit) perfimiles feculcates habuu.

y-NaJlurtium verrucofum capfula bivalvi afpera feu hirtuu, nobis. Narturtium^{verruco-} fiim, J•B. Chabr. Coronopus Ruellii, Hift. Lugd. Ger. Coronopus repens, Lob- Lugd. Tab- Cornn cervi album repens (perperam, procumbensdebetdici) Coronopus-recta & ^{rei} Park. Coronopus Ruellii recta & repens, Lugd. qui duas ficut 6f Park, exhibec ^{ferm*} Nafturtium verrucarium & Pfetidoambro/ia, Cam. Terrs apprimat caules hxc ^{lanta} nunquam furgentes (quicquid voluermt Hiftoria?- Lugdunenlls compiler & Parkinf^{us}) fpitliameos, rigidulos, perquos folia laciniata, caefura foliorum Nafhirtii, nee ica dininju' autodore autlapore: tlofculi incaulium geniculis minuti, albi, tetrapctali, conglebacim florentes: ferroinum loculi feu capfuk fcSbrar, insequales, hhfuae feu afpera, lappulas iet^l tata?, quas exterius echini veluti parvi, fpinulis muricati tegunt, (epto medio diriment femina hinc inde in binis valvulis, in quarum fingulis granum feu femer unicum nigrum, a^{cl} acmordaxcontinetur.gigaruae vitigirieae par: radixlongiufcula, fatis craffa (HiftoriaLug^l; dunenfis 3, figuras habet. primam titulo Ambrofiar primis Mattli. alteram CoronopiP^l exDodonseo; ?^{iam} Coronopi repentisLobelii. Parkinfbusbinasexhibetfiguras fub Coronop^l rectae &c repentis nomine: fed longe falluntur & hic&ille cum fitunica fpecies.) Provenit paffim in agris negleftis ecllinato leminum involucro denfe compafto, & ad fingulos nodos junfto. Floret & femina perficic aeftate.

10. Nafturtium Alpinum tenuiffime divifum, C. B- P. Nafturtiolum, Cam. Ep, Cardamin^e Alpinaj- minima, Cluf. Hift.& Pan, Cardamine Alpina, Tab. Ger. ThlafpiKiorKanam mi- nimumDalechampii, Hift. Lugd. pag. 11 80. Hscplantula alias trium unciamm, ali;s i' dodrantahs (Clufiouncialis) folia habet minutinima tcrna, quama, feptena, id CoftaV pofita, Clufio viridia, guftu acri ac fenido, ficuttotaplanta femianciainterdumnon fit- gior, alias uncias duas excedit, fapore fervido Nalturtii infar/coliculos habet plures, inq rum faftigiis flores furti nonnulli candidi, tetrapetali, coacervati, pro plants? proportio- fatis magni; filiculae oblcngiufculae, rotunda?, in apicem acutum definentes : r^{dit} finicula, longa, fibrismultis longis donata. In ipfis Jummis Sneberg, dum per nives ^{dit} ali duritie contrititam ferreis uncis pedibus alligatis Clufius delaberetur, invenitmenfe^ u- gufto (loretitem ubi nives jam primum di(To) Hcipient. Invenitur & in Titolechms atque Salifburgenfibus monhbus, teftc Joac' ^{ur} \ .ant. -ri0. Ex Gdheri Epiftolis apparet eciam in Helvericis Alpihus.nafci.

11. biafturtiolum Alpinum capfula Nafturtii hortetiv- enrtiom 5. C.B.P. & Prod. Nafturtiolum Alpinum, J.D. Chabr. Hoc Nafttrtiobm . mciat altum eft, & jdeo Johanm BauhinoNafturtiolumdiam: radiceonftatlienofa,pi ^{donata,ex qua} cauhs brev^{is},vix^{ix} triuncialis, incauliculus binos aut ternos dividitur,pcr q- ^{floribus} vi, albi, tetrapetalicernuntur;quibus fucceduntcapfuls rarodifpofiw, bivu. Jjrotund3£,dupl><mfcnemfetinum hinc inde a laterc fcepti medii continences; toil- va,craira angufta,uⁿcia breviora. Hoc Nafturtiolan. invenit Tohanncs Bauhinns in monte h. • ux Numbre difto, prope balnea tfWx, Kftate florib;?c i^fcm inibus prlgn:111S. £x ! ficcadefcriptitidemj. Bauhinus- 1 * & **

is Nafturtium^andjdum feu inc^anmfc^{mper}viren nobis. Thlaf; (cm virf^{is} nris fpe- cies Candida, J.P.Chabr. HM planclia eft lannn^rU felii* l ^ i / ^ J i inni tentibus; donataTquas binatim conjugata,quaterna, quina, nunc plura, nunc pauciora funt, angufta, parva, uno impari excretum cofta: claudente, c^u adharent, incana

live Candida : aiores in umbellâ albi, magni fatis pro tenvicate plant? : quibus fingulis / in uicceduDt filiculze oblongiufcula, mufronat2?, birjd2e, & in apicem defmentes/epto medic ffparrante duplicem feriem feminum hinc inde à latere ejr.fdem fepti contentorum. Hoc Nafturtium diffeit à Carda, mine Clufii, primoquod folia alata plurima exoriantur à radice fumo, d^inde eadem foliola è regione a^pofita fint angaftiora, incariâ feu Candida, per terram ftrata fine foliis veftientibus caulem : Cardamines autem folia caules denfe veftiunt, & flores in Nafturtio candido fempervirenti coilfpiciuntur majores, & confequenter filicub itidem majores.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Nafturtium hortenfiferitur paffim to hortis itufurpatur ad ciborum condiment a isr intinflux: venit quoque a his cum her b'vs in a at aria. Plinius author eft, libro 20. c. 13. Nafturtium Venerem inhibere; at concludimus eon loco codtiem vel depravatam, vel Plinium ipfium naturam Nafturtii ignoraſſe, is ideo in hoc deceptum fuiſſe, fic ut in alik, credere haud difficile erit: nam Dioſcoridi is expmmento repugnat: excalefacit, attenuat, mundat, aperit, urit, extrahit, rejolvit, inddit. Animum exacuere veſcentibus traditur, unde animi torpore afectos ad Nafturtium devorandum hortatur adagium. Succus Nafturtii dentium dolores mulcet, fit calidus in aurem dolentil lateris fuerit inſtillat U6. Semen denariorum 1 o. pondo ex aquapotum bitem educit, capik vitia pur gat, uifumque chrificat. Nafturtii femen (ut lib. 7. de Sim. Medicam. facit. mgnorU prodidit Galenus J aperients facultatis particeps eft, fit cut Sinapi, proinde coxendick is capita dolores, atque adeo quodcunque aliud rubrificatwnem poſtulat, fedat ut Sinapi excalefaciendo. Miſcetur quoque remedw; qua exhibentur aſthmaticis, tanquam ſcilicet id quod craſſos fuccos valenter incidere valeat, velut is Sinapi, nam in omnibus ei quaſt fmile eft. Porro herb a areſa Elaſimilem ferninivimpoſfideſt humida vero adhuc iy viridk propter aquoſa ſubſtantU admifſionem multo femine inferior eft % adeoque fit mordacity e)us immoderataſt, tunc pane feu obſonio ea uti liceat. *P<V«N Gratis, Nafturtium Latin'k vocatur, a narium tormento, potim tortiom.

HALLUCINATIONES CAS P. BAUHINI
Aliorumque Authorum.

*I*n SeBkie feyinda Tinacis Caſt. Bauhini apag. Ydſrfeſſepaginam 1 of. continentur 6 junguntur Nalium taſn liliquoſa quam Jiliculoſa a Caſſaro JStuuhno, & malēs novem enim conſpiciuntur ſpecies Najiurtii filiculoſi, idejl, fdiquis curt is, illic conſiſte mixtce cum Najiurtiis Jiliquoſis, id eji, fdiquis

longis; de quibus egimus inter Nafturtia Jiliquoſa cap. 4. Novemprædicte Najurtii Jiliculoſi planta debent hic collocari inter conjortes filiculofas Thlaſpi, Burfa pajioris, Cochlearias, (\$ cater as Jiliculis curtis donatas, ut nos hic prælitimus. Vide Hallucinationes Najurtii ſupra pag. 226. hujus Hijlorie.

S I L I Q U O S Æ

Tetrapetalif bicapfukres.


B I U S 4 P A S ' T O H I S.

C A T U T X X.

H?~jfi fieciyapu Jantiques fuit, qua nunc Bur/a paſto Yk, amarfupiolKcompreſſis (aliu> X Capfella J dicitur: quibusdam Sanguinariis Crifyula.

Bijrfa paſtoris vulgar is major & minor foliis finuatis, loculos habet cordatos, utrinque tumidos Sdinltarmaffuppi bivalvis; *q\$md in fummo valvas habet filas adinftar Nafturtii, vel fit foliis integris loculo oblongo de hifce ordine infra dicemus. Adeo enim affines funt Nafturtium filiculofum, Thlaſpi filiqua longitudinaliter feſta, & Burfa paſtoris, ut inter has plantaſ Vidas & acres difficile admodum fit diſtinctionem adferre quoad filiculas.

TABULÆ XXI.



§.1. BURSA PASTORIS CAPSULA CORDATA.

ExpUcalio park Tab. vigesim<cprimf.

I¹ [^]Ursa pastork major capfula cordata foliis non sinuatis, nobis. BurfTpastoris mai^{or} [^] 3 Olio lion sinuato. C. B. P. & Prod. Radice eit longiufctila, tenui, **aliqua**ndo cap. iJJJaM; -atepalmum fuperante, communiter uno (ratios pluribus) ramofo: foliis acroviixairifus, a drad!cemlongispediculisdonatis, (jii3f;circacault; m absdrtas liabenc, quqtat eundrt n[^] ar<e conrtpleftuntur; floribusfic thecis cum vulgar! convenit. **Bafilix** in artnofis provenic 1"'^ "vtfcibasJociB/circa MOTfpclium. ubitamenlonge minorquoqocnotata tuir, & obfervarliert nna cum vulgar! Vide folium integrum vulgar! finuatoadfculp am z. Bursa Paflorn **maior** ^fnl^nr^ foiiislaciniatis, nobis. Barfapasto

finuato, C. B. P. Bursa pastoris major, Brunf. Trag. Gefn. Hort. Bursa pa...
 Park. Bursa pastoria, Fuch. Dod. J. B. Chabr. Bursa pastoria major, Tab. Hæc Bursa **paitoris**
 major in fertili solo pedalem a ngit altitudinem, nonnunquam palmarem riliore tou.
 radice nititur rectâ, albâ, fibrol ore fobdu... ex qua prodeunc folia oblonga,
 integra, ut supra monuimus; de laciniata, nonnulli hirsuta. E pediculis fere anc j
 alibus, cum folia superiora in Caui, btLS Hec pediculata, quidem habent, sed immediate ca Ji
 adherent: inter folia inferiora fursum ^{Veru} usini-amulos dividuntur, & illi a medio fere ad summum flouculos fuaicam
 cmittunc, pedice-U tenui femine ⁱⁿ innitentes, parvos, albos, te... - inV
 ftaminula aliquor lota hab

uiiciunr; quos fucc^QlvefcTM i ^{cor} Corymi;ati_m in fummo caule timU
 mi tai (undt- d uomen) 5£S5f*^c rdar^^ m! d utrinque, bifid* n>. >
Iacuo exortu **verfu&pedicafin** ^ S S S ^ P aiante dlP licem fritim
 femia_m capuluts ftpto medio divisif concii ^{crumenul;} w>? ^{if,tt:J} »', cordatam, l
 ludat iniolioruni testura, aiiquando foliis ;nl ^{es} Plu: inia fobrufFa. Hare Dursa pastoris miti
 poffic fpeetes, cum mea fenctruia fi< <J ^{grif} > ali qnandodiireais, utfiui s diverlas fup picap
 Stint qui ThlaJpi Burfam pastoris vul_m 7 A^P TM^t a ^ Brians pro nitione fulicV 81
 unam & candem generice effe plantam ^ a m ^ Naftonium fMreni ftliculofum I hortense,
 ^t'marint: fed corum fencenciam explodentam

III. f V X (IV E R O \$ A L I S O Q X O N V E N S J S i . o . . . 7305
 merito cnefebir. qiii capfulas Burfa? pafitoris cordaras tumida^confident, utpotediverfaSE Na-
 flarcii filiculofi hortenfis capful is, itffummo fillas. parte prona cavas, & fupina convexas reperiet.
 Infupcr, quod Lacuna monet, vii;ibus & tempera men to, laltem quoad magis & minus difterunt.
 Flortt Burlii pafitorisaxeunte hyeme & pertres menic/i pofita, i, mopertotama:fiatem & Hore*
 & fuV-n perficir. —* " ' - < * .

3-Burfapafiorh minor capiulabrevicordata foliis finuatiSjnobis.C.B.RBurfapafitoria minor,
 Tab. Burla pafitoria minima, Ger. Follajuus prioris foliis funt minora, nontamlaciniata,
 fed potius finuata ; ex quorum gremio per terram ftratorum protrudkur C3ults tin us, ant alter,
 p ciius famjnis faftigiisconfpiciuntur (lores minimi, albi, tetrapetali: qiiiibus fuccedunt fi-
 culi para?, utritique tumidx, cordatas, bifida; itidem, utrinquealaterefepti medii in val-
 lis hiScindeadextris & finiftris femina pliiima, rufra, contineaties. Hsc mihi viderui*
 toffi varietas minor fuperioris, n" fteriiibus & negleftisproveniens. Quicunque has trea
 ex uno (tmiiieortasconclulerit, ipfi non refragabimur. Sintergovarietaresrantumã natura
 fic ludente produfe, quemadmodum in aliam plantarum toliisfic variantibus pallmob-
 fervantar..

4. Burfcpafiorh minor foliis alatiscofbsmedia; e regione admentibcs, uno itrareex-
 cnLini daudente, nobis. Burfa pafitoria minor, Dod. Buifa pafitoria minima, Lob. Icon.
 Hec folia producit plurima minora, percerram ftrata, alatim feu conjugatira e regione pofira,
 moe^tremum claudente majore & romndiore, atque hoc ipfo nomine à catena omnibus
 ^radiftis quam faciliime diftinguitur: e medio fohorum fie conftrucisnim terni ant plures
 cauliculi exoritinturrientales, fuftinentesrflofculosminimos, albidos, tetrapetalos, quorum
 fingulis fuccedunt capfulac fingulx, cordatx, tumidæ, biidas, contineutes utrinque a fepti
 medii latere femina fubrassa, minora. Hsecplantadiffrert a Narturcio petra;o ftrutura toi-
 *brum: primo liujusiblia func integra, finuata tantuminmargine; illiusautemfolia funt alata,
 e regione cofhe mediaeadhaerentia, uno extremum claudente, cum foliolis parvis anguftis in
 fingulis geniculis caulium, atNafturtii pctr.ri ibliola incaule funt latiora magisque (ecta ;
 iecundo Nafturtium petraeum capfulas habrt in fiimmo fiilas, prona parte cavas, fupina con-
 vexas ; at Baria minor foliolis alatis, uno extremum claudente, cipfulashabetutritrquerumi-
 das & cordatas, ut Burfa pafitoris major vulgaris, fine h'llura in fumma parte capfulx.

§. I. BVRSA P A S T O R I S faith integrk catfula oblonga.

a fufioris major hirtuta capfula oblonga, nobis. Burfa pafitoris major loculo ob-
 long^CLJ. P. Draba minima muralis difcoides, Col. Thlafpi Veronica; folio, Richeni.
 Kujfte radix* tennis & fibrofa, inutilis & alba cauliculum palmarem, hirtute afperum,
 ramofum, aliquando vix femipalmarem, fed alis carentem emittit; ad cujus exormm tolia ali-
 quot inter (cviridia, hmi ftrata, unguishumaiimagnitudine, ovali figura, ferrata, hirtute
 afpera. . . . ~zero caulemambiuntpanca funt, &pedicul'i3 carent: rlofculi-in fummo malti,
 rapetali: quorum fingulis finguli loculi feu capfula; ptirva?, oblongs, e pediculis
 ntes, fuccedunt bifidx, (eptmedio diftingaentc fcmina parva, fulva, acra
 fiiporis, qux loculomatno&apcico relinquant iptum minus oblongum, pldacidndi, ptioli
 (ummitati mnxum. In ficcioribts&ccamp"ll-busHelvetiorumlocis Martiorlorens6f loculis
 ou'uffa reperitur. Febuario r !:;>(•••' lioribas verolocis Martio, Aprili & M<uoetiani
 invenitur. Differed Paro- j ffoctie Dalechampii magn^udine, foliis & c:m-
 le fuajoribns magHq % -, .>alt/ vero ficuti flore eft minore, eti.im petiolis mindtlbos :
 nee ita campeftrib¹¹ rfibuiijpelocis.gandet, fed parierinis faxifque humntibus imo
 frequentiorcn iii • .njribus.Saporeacris admodnmetiam vircns, ficutin tiore&iemine.

< Bu L ..iinorloculooblongo, C. B./Paronyclia vulgaris, Dod, Myofotisparva
 .11ft. Lugd. Herub Burfae pafitoris affinis, Cæf. Farvula herba hæc eft: folia
 .j, Kuiufculaproportione plantula: ipfius, minutis Alfines roliis faris familia,""
 ., e in orbem per terrain ftrata: c quorum medio caulculi plurimi tricntales, nunc humi-
 lii i . iunca'tiores^ fcnndum humiditatem aur ficcitatcm Veris, aut fofi in quoprovenit:
 in fummis caolicnlis plurimi exoriunnir exigui rlofculi, albidii, cetrpetali, qnib<s <tox fuc-
 "Vceljunt capful oblongtufculx utrinque tumida: & bifidx, fepto medio pellucido exficcato
 •Veparante diipliceni ieriem femiium fulvorum, calidorum & acrium, C3fcrarum (ua; tamias
 plantarum filiculofarum more. A Martio & Aj>rili inmntam arftatem viget, vfretac floret
 (apparet tamen citoiftivis caioribus)rh fummis tefitorum& nmrorum: etiam in negleftisarvis
 provenit **exennte** hyeme. Q_q 3 7> Bwrfu

7. *Burfa paftoris* minor foliis rrfidis, aliquando multifidis, riorum petalis bifidis .loculo oblongo, nobis. Burfa paftoria minima verna oculis obngis, J. B. Chabr. Plantula hare minima radice confat tenuilima, fibrofa tamen, ex qua per terram fparguncur foliola, orbiculariter caulis imum verfus terram Rofa? in modum cingentia, angufta., oblonga, mucro/iata, vix unciam longa, hrfuta, virentia, modo ad exoitur^ubentia, ad extremum binisawtternis circnis praedita; qua nota prxcipue a Paronychia vulgari foliis non feftis facile diftingwtw" hare minor fpecics Burla:paftoris, junfta foliorum per terram ftratorum textura Roixinfaf: petalis confht bifidis, non planis ut fuperiorejus fpecies: fapor eeft primum calido, deinde aciori, nitrofb&iingam vellicante: exeunt cauliculitriunciales, aliquando j'-almes, floj fculos multos albo.s, tetrapetalos gerentes, quibus fuccedunt loculi oblongiufcu-", acuminan, Tcpto medio pellucido remanente poft femina decidua, fulva, acria. Monfpelii floret VeJT prope *Beffordiam*. Eandem medio Aprili cum membramilis mediis illis pellucidis remanertibus poft femina decidua (quod familiare eft multis aliis hujus generis) invenit J. Bauh.

8. *Burfa paftoris* Alpina minor hrfuta foliis infimis integris ad geniculavero crenatis loculo oblongo, nobis. Burfd paftoris Alpina minor hrfuta loculo oblongo, C.B.P. Ex radice eadem plurima; compages foliorum acutorum & hrfutorum, tot Rofarum infar, emergunt, atq«^e ex fingulis compagibus, fie Rofe in modum conftruclis finguli oriuntur xauliculi trienraks, ad quorum genicula confpiciuntur foliola crenata & mucronata, qua? non obfervantur in reliquis Paronyclia? hujus generis fpeciebus: in fummis caulibus proveniunt capfulas pblongaa., fubrotunda., mucronata?, bifidar, fepto medio pellucido diftinguente duplicem feftem feminum minorum & flavefcentium.

9. *Burfa paftoris* Alpina Rofe alutea folio craflifculo Scdi vermiculati more, fed hrfjto, loculo oblongo itidem hrfuto, nobis. Sedum minus 12. Cluf. Hift. Phyllon Arrhenogonon, Lugd-Leucoium luteum Aizodes montanum, Col. part. 2. pag. 62. Acris & ingratus foliorum hujus fr* por. prarcipue fiorum tetrapetalorum & filiquarum, atq; feminis effigies, hanc plantam ad Bur*^o? paftoris rariorem fpeciem potiusquam ad Sempervivum vermiculatum Aizoon di&um Clu»^o aut Leucoium Columns, referre nos coegerunt. Huic foliorum rotundorum 6V vermiculorum ad epe denfa eft congeries, ut cuivis Sempervivum aliquod vermiculatum primo intuitu foliorum¹ apparet. Ex radice feftiunciali, tenui, longa, fatis craffa, exeunt folia oblongiufcuia, rotunda > crafia, fucculenta, vermiculorum afcaridum forma, pilis hirta, in orbiculum rotundum congeft¹ Rofae in formarr^multas plantulas adnatas ac fimul coacervatas hunc in modum ex eadem radice protrudit: ex medio foliorum in globulum congeftorum & Rofas formam effieftitium caulef¹ emittit fingularem femipalmarem & palmarem, aliquando, nudum & foliis carente^ufgye ad bifurcationes: in lummo cacumine plurimi flofculi ltei apparent tctrapetali, mtegap, non bifidi; quibus evanefcentibus fingulis fingulae iuccedunt capfulae oblongiufculaf, ti Tinid3?, oterd^ parunr compreflae, hrfutx, in apiccm definentes, feminamulta fiavain fehabentes, fepto medio membranaceo induplici loculamento dextris & finiftris fepti prazdicli fito eadeni feparante. Floret Aprili menfe, & Maio perficitur ejufdem femem. Oritur in a'llillimis montibus Villas Lacus & Cuculli Apenninis monribus ultra lacum Fucinum, teftē Fab. Colunina. In fummis Auftriacorum & Stiriatorum montium jugis inter faxa provenit, teifante Car; Clufio. Meminit idem Clufius dum eNarbonenfi Gallia per Helvetios in patriam rediret, in Allobrogum Alpibus cum aliis plurimis venuftis ftirpibus eruiffe hanc Burfa? elegantis minorem fpeciem, non Aizooi, propter rationes in Hallucinationibus hujus capitis infra adferendas. Eft in ftenlibus multo yinor. (Vide Icones Tab. 20. ibidem, n^iore & minorem aflculpendam plantam curavimus) hoc contingit a fertilitate aut fertilitate foli Ut autumamus.

TEMPERAMNTUM & VIRES.

Burfa: paftoris -vires non vulgares celebrantur, ex acetoenim (id fcribente Fuciⁱ>o } trita inflanr manonum coUdhomsfifa ac * humom confluentes cohibet: 'Luiatur fmU^&^ mmbu* qu&m fiomackus *ftuat. Suecutesus purulent is zunbu* mfundiZ VueTta fa** rufnera, mire efficax eft in comprimendis omnibus famuinu erutti Jihv* n 7 / X i <c- pccora, uca z iugua, vino turo ac aqua ptuoziali, in qua obalybz candens extinguitur, & dicitur & pora, dyfentericis ac lientericis fluxiones diu cohibet, urinoefanguinolent* medettir, fanguinis creationes, --- fumque abundantiam profubua fiftit, omniumque intermorum vifcerum quoj- Jicroftoms [J : eadem aqua diftillata per aliquot dies continuus menfura 4. aut 5. Cochlear- rium cit. Erythranum ex lino panno factum, fuceoque rftum oc moribus in- ditum, fanguinem inde effluentem fiftit : ejufdem fuccus vel aqua dif. il Uta vulncribus collen- diq

dis utiliffima sunt. Multumedunt fentzntia, ut crtdam frnguhcm i nax'ibm aliifft tmfae-
 ribuvmanantan cobiberi, fi krb' f'alicm apud bonitan incalunt, quod difficulty cndidius.
 Ridiculum est Fuchfium & Matthiolum afferere vnam papaveris eye ex refrigerantium genere, cum
 fit sapore subacri, gustui calido, proxime accedente Tblafpi, quod calefacit & refeccat in quarto
 gradu, ergo qua praestat non virtute frigiditatis & humilitatis, quippe qualitarum paffivarum;
 fed caliditate & ficcitate, quahtatibus a&ivis.

**HALLUCINATIONES CASP* DAUHINI
 Aliorumque Authorum.**

P ar , of col- ••/•• '• Burfa pajleris major fa.
 C. B. P. O ibidem pi. n. Burja
 is ma'orfoliofiniatio, C.B.P. Hit dux plant*
 vi'c'onjlftLit duM dijltucia, Jfecies, van* TM
 urfa pajhris folia, qua funt ahquando integra,
 • Lando p-nnat, imz profunde lantlata adinjtar
 • onopi; non tamendicend* funt ttiiverfmspeatt.,
 ia nonftmpttr codem modo fe babent, fed variant
 mada dicituram foliorum fecundum ficcitatem, feu
 • i lit at em ant jertilitatem foil ,• hoc (bferbare
 et in muftis aliis jpeciebus variantibns folttt quoad
 tegritatem ff divijuram foliorum. Ibidem pi.
 • i. Barf a pajforii media, C B. P. Burfa pajiarit
 miner, Tab. Minima, Qer, Htc ejietiam eadem
 camprioribtif, difo epans tantum parvitate t- folia
 linuatis, ex eodem femineproveniens : fedquamvis fi
 gyra addita fit a Tabermtmontano,quet,tfequutu.s eji
 • jobannes Gerardns, mendoj'e tamen uterque, nam
 pajjim mtiltiplicat entiajine nectffitate.

Ibidem pi. iv. Burfa pajleris minor falis incifa ,
 C. B. F. Burfa pajloris minor, Dod minima, Lob.
 Icon. Hie nobisjticittr supra Burfa pajloris
 media felt is alatii cojl* media eregianr adbxrentibit,
 tint) impart exf -tun claudente, capfuta Nafhurti',
 A join's alatii pflfa Najfurtit brona pane ca-
 va, Jnpina con mihi potiif vidretar majorem
 affinitactm cut? irtio baberr, quam cum Burfa
 pajloris proprit didx filicuh

I V>; nam i
 tr' uttetui. •••••
 nt' Ibidem col. 2. pi. iv. Burjh pajhris fimi-
 ?lifuofa major feu majonbitf foliis, C.B.P. Pi-
 ilajiliquata ,Jbal. Adoon Tilephtum Dale-
 tmpii, Ijtg. dpag. 109. col. 2.pi. v. Barfiepajh-
 [imiliffiltqiofa minor feu minorbiu jbliis, C.B.P.
 ilofella filiquata minor, Vial. £ Cam. Hort. He
 Jne til'''' • funt filUulojie, ergo male hie ad-
 Burpli pajhris filiculofas, funt
 jitttiofa, utifupra monuimus bag. 3if.pl. f.
 bajtb Hjtleri* fub nomine Drab* jiliquofit Jmila
 plant*, inrcr Drabat cap. Fi.

Xurfa pajhris Alpina rofea lut * crajj*
 ufcil'loSedi vermitulati more fi-• jeuiv ob-
 hni* itiden birfato, ttobis. >ms u.C/uf.
 Htjl. Leitcoium luteum .nontanum, Col.
 tart. ^pag. 62. Sedur m hirjutum luteum,
 "B.P- Pa^?S-i ix. Hicc planta, ut ap-
 t.arttrx dtj, it a nowt fupra aliata, non
 J Sedur. •••••
 ••••• JUS, me a eapftilisfeminalil/us;

non Leieioitt!), quanonbabcr flintlas, nee Jem ma
 comprejfa; ergo tji Barf a pajloris loculv obl'n>igo,q;ia
 ptaiittilajiliculoja tetr.ipetala,bicapftlarit,emnino
 O pirfi.de convenient aim pmdidii Bur fir pajloris
 fpeciebus quoad jinim ultimum, idtji.flores (3 ca-
 pfulat feminities j idtograviter lapjijmit r.atborcs
 qttt Sedi nonun ti impofuit. Examincnt pojteri
 tpfamplantam vigentem, qnando ndmaniis babuc-
 nit I : ttos qua damns hie, vidimus S txammavimus.
 Dacliffimut Cartlus Clufitis, aliique autores tpftim
 fequtntes, O6 quendam filtorum cumScdovermicii'
 lot*Jimililudinem, nomen Sedi nobis obtrufurunt.
 Sed not cum doUiffimo Fabio Colamna rfttgicmfoho-
 ru m pi a I I ta ru m tn confer etiats gentribts parvi fa ci-
 rurs, tamin bac, qttam inaliiis plantit : non entm
 ex jaliis, fed ex fore, lemua/hut conceptaculis, ima
 potms femine, plaritarum affinitatengeneruamdi'
 judicamut, rrijpondente pnefrtrim faporcinreliquis
 plants part ibus, etiam/i S3 congenrcs plants a fine
 ultimo reperianttr diverfo fapore : dummodo tn mm
 conveniatifine ultimo,fiore jc.capfula femintli ipfb-
 que femine, uulio modo in dubintn revocaripotest, ijuin
 tijtdcm Jintgenrcis, ut cerntr ejin J'jpeubni, fui
 aue dttlces funt, aut amari, ut apparct tn Colecyn-
 tid*, Ptpo amurus nobii dt'Sa. Uanttr f3plurtmie
 a lilt plant* fub eodem gencre rml't antes a fine til'
 tuna, quadjttrant fapore, lit Nujlurtium injipidum,
 Allium mfpidiim, Cepa duleis, Pirficana non macu-
 lataurtnt; bieomnet plant* rtedduntarelquisfa-
 pore, fedcomeniunt fine ultimo, ideji modo florncdi,
 (i cajfulas fennmalei S femrna produendi. Idem
 dicendum it multisalü filtit Utitt reccdintibut a
 rtliquis ftii generis. Quis divinaret CymbaUriam
 y LlatnenlJnaTias fj}e *Hrderic folio, nijipriits exa-
 minavent floret & capfalns feminales ipffiqtie femi-
 tia : tunc vtroindubitanter ctulihct confudcitudni cji
 turn do'clif. Fab. Culinnaeffe Linariit jpeties. Len-
 gtimejethac in lacoomnes ettunicrarejedhic obiter
 dixiffe fufficiat. Prtefcipj'it enim liominis Doits
 Optimus Haximus plant is, ur fiuctum & femem
 perficeretit mxt/i genus fuum, quod prieteriri non
 potejl, quodqite ab berbariit rei fludtofis hutufqtie
 nondiini animiitlverfum, tie qitidcm a neoterict), mul-
 to mm a Diefcoride £f antiquioribus. Not bac
 ratione duHi methodum noffram >iovam, pajjim a
 fine ultimopetitam, tanifuumvcrijjimami3 infalli-
 biltm pojhrispropontmm.

SILICULOS Æ

Tetrapetala bicapfulares.

COCHLEARIA.

CATVT XXI.


Cochkaria a foliorum forma modice cava[^]-iparvumis non valde profundum Cechkar^{re} reje-
rente, dicta: quam aliqui Tekphium[^] alii Britannicam Plinii l. 25. c. 3. volunt C^{acet}
forma (y fapore Thlasji is Nafturtiis affink fit) to 'quod eimalo, quodftomacacenifr fcdoty*
ifen vocant (Scorbutum effe volunt) auxilio esk Britannicam Plinius fcripferit.

Cochkaria areliquis filiculofis, tetrapetalis diftinguitur, quod folia producat craffiora, ob-
fcure viridia, fpiffioraque, fuperna parte cava ut plurimum, inferna convexa, Cochlearis infar;
filiculas profert pmerea rotundiores & tumidiores.

Pars TABULI XX.

Cochkaria	Major	\Fohø	< Jggf [^] ? Thlafpi	1. Subrotundo Batavica, nob is. Cochkaria Batava, Lob. £	
				2. Longofinuato Britannica, nobis. Cochkaria Britannica, L ^{ol} ,	
	J.B.Chabr. ^.				
	Minor	\panica	flore	\ Sim. Bauli. pag. 70. n°. 1. £	4. Armorica flore dilute rubello [^] nobk. £
I					{\$. Eretta, nobis. Cochkaria Danica minor erefta, C' B. P.
I					albo ⁶ . Repens, nobis. Cochkaria Amagri* InfuU fupina [^] Sin.
				I Pauli, ibidem n\ 11. \$	

Explicatio partis Tab. vigefim*.

1.  Cochkaria major Batavica fubrotundo folio, nobis. Cochlearia fubrotundo folio[^] B. P.
V[^]j Cochkaria, Dod-Lugd. Mattb. J.B.Chabr. Cochlearia rotundifolia[^] oer. V^u ^^uia,
Park. Cochlearia Batava, Lob. Cochlearia hæc humilis eft planta: tolia fert in pedicles
mediocris longitudinis exeuntibus ex radice fibrola, complura, fplendens virore, craffTa,
fpiffa, modice cava, infar parvi & non valde profundi Cochlearis, interdum in miirg^{me}
nonnihil angulofa: inter folia per terram ftrata, rotunda, prodeunt caules dodrantes & ali-
quando altiores: in caulium ramis confpiciuntur flores candidi, tetrapetali, cum multi-
ftaminulis croceis & filo viridi. Secundum eorum longitudinem: quorum (ingulos fe*
quuntur fingulae capful[^] rotundae, bivalves, fepto medio diitinguente duplicem ferief^l
ieminum rufforum, in exiguis valvulis hinc inde contentorum, uti in caeteris filiculofis h[^] s
claffis, funtque hujus filicuk rotundiores, & pleniore filiculis confortum plantarum: radj[^]
eft alba, tenuis, fibrofa & inutilis poft femina ad perfeionem perdufa: oritur in Gallic, Anglic
& V^holiandiae, aliifque locis paluftribus oceano madefieri confuetis; circa aggeres Brabant[^]
& V^mGermaniae inferioris regionibus: etiam in hortorum locis umbrati: iatis feliciter pro-
venit. Floret meunte Vere, & per totam xftatem aliquando floret, & fcm. i perficit.

2. ^u /w^{rw} Britannica folio finuato, nobis. Cochlearia folio finuato, C. B. P. Cochlearia
Britannica[^] Lob. Lugd. Dod. Hujus folia funt longa, cava in medio, in margine finuata, inq^W
mucronem definientia, totms plants fapor acis, Nafturtium reficiens, cum odore, turn fapor:
ex radice plures emergunt cauhcuh femipedales, 6, aliquando altiores, ad quorum[^] a[^] l^a
difponuntur folia minora, longa magis finuata, caulem arte ampleftentia • in fummis caulibus
proveniunt tioces fatifamph, albi, tetrapetal, cum ftaminulis aliquot luteis: quibus fetifoen-
tibns fuccedunt [^] \ * f * * * * ^ d * r f < , aut colons putamini nucS avellan[^] ex
terms: radix eft tenuis & tenera multas fibrillas demittens. Provenit ad margines T^u f^l
fluvii, adoramantimantam fettexis, quam Cantii, ficu & prope [^] omwoutl) & B^u r^l colam[^]
§

&fecus oram maritimam Occidentalem. Floret Maio, & Junio femina perficit.

3. *Cochlearia* Hederge folio, nobis. Thkfpj procumbent? Hedetae folio, C.B.P. Tffefpi Hederaceum, Lob. Lugd. Ger. Park! J. B. Chabr. HxcCochlearia caules procumbentes edit, rubēites, fpithameos, ad quorum genicula alternatim proveniunt folia Hedera; foliorum aemul[^]fedmultominok, trifida: inftmmjs cauibus fpicatum proveniunt flofculi, albidii, tetrapetali, quibusfucceduntcapfulasM»f5fS»4a2, inapicemdefinētes&bifida?, feptomēdio feparantūLduplicem feriem feminum refipientium femina Thlafpios. Provenit circa Portlandttm & ^limōtti) & in aliis Infulis maritimis Anglic. Ab ineunte Maio, ufque ad finem Auguffi floret &femen edit.

4. *Cochlearia* minima Armōncā, rlore dilute rubello, nobis. Hxc minor eit ippecies Cochlearare Batayici : folia ei-fimilia edit, fed minorā, angulofa, flores etiam minores, fubpurpureos feu dilute rubellos, tetrapetalos; quibus fuccedunt filiculae bivalves, feu bicapfulares, fubrotundae & minores, aliarum Cochleariarum more, femina in fe minora pariter continentes. Nos hanc copiofe provenientem oftendimus, in Infula ad oram maritimam Britannias minoris didal' Ifledefierepercee.

5. *Cochkaria* minor ere&a Dahica, Sim-Pauh. Cochlearia minor ere&a, C. B. P. Ex radice capillacea cauliculus tenuis, l3evis, reftus palmo minor prodiit: foliola habet ad radicem plura, perterram ftrata, lengis pediculis innixa, quxvero ad caulis genicula funt, multo minora, & rarius ferrata, ficut& inferiora verfus terram: in cauliculo fummo flofculi apparent albi, tetrapetali: quibus fuccedunt filicuk parva?, craffiufcula?, oblongae, femē minutifilium, nigrm continentes. Hxc in Danix Infula Amagria Autumno à D. Olao Worm colle&a, & Hafhiā Cochlearia: nomine mirfa fuit.

6. *Cochiearia* Danica procmbens, nobis. Cochlearia Danica repens (fed perperam, procumbens adhiberi debuit) Sim. Pauli, C.B.P. Hazcunciarum trium eft; radice & foliis priori fimilibus conftat, fed numerofioribus, inter quas cauliculi multi palmares procumbentes, brachiati, minutulis fiofculis albis, tetrapetalis, ornati inveniuntur. Eodem loco quo prior reperitur; foliis, ihquam, floribus, atque feminum oculis & guftu priori refpondet, quemadmodum Dominus Olaus Worm percripfit, & Dominus Bartolinus Cochleariae marinae parvulxrepentis (procumbentis dixiffedebuit) nomine mifit. Utraque haec pofterior Cochlearia in Infula Amagria, & fecundum oram maritimam Danias reperitur.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Cochkaria, cum fit feliculofa tetrapetalabicaffularis plants facultatem habet calidam evidenter & Jccam, -virenti Naflurtio fafore & qualitate perfimilem. Maio, quod £>\$0 %\mfy ^ctloctf-
miffii is s>(^o?licfe Cermani nominate, efficaciter medetur, in hfte aut vino decotla, (y aliquot continues diebus) pota. Eft enim fcorbutu* malum grave, fermoleftum^ac diutumum, quo abcedunt, tument, exulceranturque gingivoe: ex ore mains odor, in femoribm aut truribus livores, haud multum diffoniles tū quiparte quādam fuggillata excitantur, creberrime effhcom'uantur: fades reliquumque corpus fapenunero pallet^pedesque cedematofi, veluti in leucophlegmatia. Eft enim fcorbutus morbu* C ut ait Olaus magnus in gentium Septentrionalium Hiftoria J Caftrotrmfis, qui vexat obefos & inclufos, ac falforum ciborum efu videtur nafci, frigidaque murorum exhalatione foveri. A Flinio huju* mali fypoma os infeftans W«*IC9«*I, crura vero afficiens <TIUNCTU^A 'appellatur. Marcellus, vet us fcriptor, or is malum ofcedinēnuncupat. Ve ho!• morbo fatis diftum prater inftitutum, nunc ad curam, qua fit hac Cochlearia isr fimilibus aim calidk is acribus, [ale volatili abundantibus, revertamur. Tales plant arum fyecies in quaque regione create fuerunt ^ quales hominibus is^l animalibm ibidem natkmaximecotiveniunt, quod oculatus teftis in qualibet regione natu* document is. mult is monjlrare poterit, in quit Solinander; into confidenter hoc experwento fapenunero probavii idem Solinander. Ex plant arum nafcentium frequent ia fere animadvertere poterit quilibet medicin* praxim exercens^ quibu* morbis popularibu4, nimirum c*V^, quelibet regio fofyfibi*^l Hoc ipfum obfervatum apud Danos, Fryfios, Hollandos, aliofque. Baltici mar is hccola6, quibu6 Scorbutus conceitur morbus frequens; iftius enimquafi proprium medicamentum^ Cochleariamfcilicet, ejje, & ibidem ideo copiofe provenirejiullus non animadvertit; ficut in or a ma-
iitima Gallic etiam isr Anglu. Conficitur conferva ex herb a Cochlearia tsfacchari duplovel triplo, qud infigni commodo Uliſ datur qui fcorbuticis vitiis obnpxii cibum fafthdiunt. Fit quoque ex eadem aqua diftillata, in qua antifcorbutici pulveres <ggris prop'wantur. Tandem

ex Cochlearia succus pre-
 mm Norvegica fructus j...
 de quibus suis locis actum
 nalibus locis valeat. Diluen-
 tius succo quam diluto uti
 evacuato ac preparato, valde
 tili maxime consistere videatur, nulla commodiori quam succi formâ Cochlearia unquam exhi-
 beri potest: in eo enim minimum salis volatilil deperditur, ex quo & saccharo arte pharmaceu-
 tinarum, colore vinum Malvaticum emulans, Maio mense (antequam florem induit) paran-
 dam prescripsit Simon Pauli Lubicensis reipab. populo melioris sortis sic, Recipz Cochlearia
 recentis q. v. contunde in mortario marmoreo, &

est, con
 (quod
 farinao
 maxim exp/dit olhfolk, ij S' JXY*
 o *ccurate cbluio, tildl
 quam cum nans Cochlearia com JfIT^m fTM? "TM" *uf< lTM^{dti} >> ^nozem odmm spmnt
 ihnebh hiritum CvoSariT In H^{9no} k aivTth WBeturper ahnbkum in BM. i,

per chart am I>ibula, n: huZTiZ EL ' *p *g *w
 efentia CccLruZ^ f f
 fdiipatudofifeudilr^M^{ul} p^rfi^{am} ^4^W^{im}am (vide infra

pro dosi JT¹, ... t^Tf r C? * * " val' 9^ guttuU ad fcrupulum >>> m
 antischorbutica descriptionis prae dicti Simo^{FadL} Snttenadbp^ter enarratas aliâ
 formulae quibus est saluti Cochlearia scorbuticis. & * « balnea recipitur, ut Mis folu artus
 Scorbuticorum dolentes foveantur. Exemplo potest esse haec sctus formula. Recipe baccharum
 Juniperi leniter contusarum, Sisymbrii seu Cardamines utriusque, Nasturtii byemalis, Cochlea-
 ria, ana. M. ij. Flor. Chamemeli M. iij. Artemisia, Melissa, Rorismarini, Majoran. Thym. Hyssop.
 ana. M. i. coque in sufficiente quantitate aquae, & sub caliditatem hujus decoctionis foveantur
 crura: vel similis huic frequentissime felici successu poterit administrari, ut, Recipe Malva, Bis-
 malva, an. M. iij. Beccabunga, Fumaria, Cochlearia recentis, Nasturtii aqua recentis, Cha-
 m^{em} Ji. ana. M. ij. Rad. Malvdt Vnc. iij. Sadicis Ebuli Vm. ij. tsaccarum Jump^{eri} M. i. con-
 Ufa ac contujn *\$***&* ex hujus death in f. q. aqu* fiat fomentum ita m -yabor, », t,
 •vtflibu* undique vdan meakfeant. Hsc ex Simone Pauli opens Botanki oquadriZX Tn
 HMA, prterinfitutum dam*: proudamu* jam ad cterarum bum SeLnhP
 Ikulofarum utrapetarum expikationem* J * W M B rlanteruwfi-

SILICULOS ^ i

Tetrapetalx bicapfukres,

I B E R i S:

• CA<P VT XXII.

I & * * * * Galen Na/iur^{ti} / cund if P^{ik} ^ mocratein curat ione
 dladiverfis in loch recen/et. Nolia mVI(/<: onde, mbuens. PH^{nit} fl, en^{is} :ene-

Pars TABULA XXI.

(i. Penmrn nostras vulgark, nobk. *Iberis cardamantica*,
Latiore ferrato < Lob. o
(2. Ar.r.ita Viz^niana ramojior, nobk, ?
N<ifturtH,nobis. JSSm Naftiiti folia, £ <& £>. fol/A. cam wag-fig* Tab.
Ger. ?

Explicatiopartis Tab. vigefyn < Epwn & SeSlioms tertice.

1. **I** Bern latiore folio ferrato, nobis. Iberis, Lugd, Dod. J. B. Ctiakr. Iberts cardamantica, Lob. (cui & Lepidium Iberias Pauli) Ger. Iberis cardamantica iatioreiolio, Park. Ibrtris luxuriatcaulibus cubitalibus emittencibus^iultps ramulos.* folia interiora ei funt oblonga, muka, circaradicis caputintegra, fed in maigine ferrata, mucronata: iecuumramufculos superiores itores extunc exigui, albidi, tetrapetali; quibns fatifcentibus fubveniunt filiculs exigua:, bifidje, fepuo medio feparante dupliCcm feriem feminum minucorani, ruftrbrum: radix longa fenfimi actuatur, incus forilque Candida, faporeacris, diudurans juxta vereres muros&: in incultiscinerum marginibus paffim circa Bbefas, in viis etiam communibiis & colli- bus illic minimeherbidis. Grascis *Iottl4 JWfV*TM*!!*, a nonnullis *Ai-mSw*. A FlinioSf Latinis Iberis, Naibrtrium filveftre, & fimilicer *mam* Lepidium, . Aliud tamen eft Lepidium latiore folio Plin- nian-jm, proximo capkedefcriberiaum. ExitVimatur&iftudherba Grias dicta, de quo Apu- kitis cap.XL. cujus quoque ulus ad ifch'iadicis corfimentatiis eft.

2. /ifr<hutniliorannua Virginiana famofior, nobis. Hacc facile diftinguitir a priore, pri- ri6duration?, fecundo folia producit latiora, viridiora, magis crenata: caules humiliores & ramofiores: Hores diiplo majores, & confequenter majores itidem capfulas.

3. /<Naftartiifolio, Cam. ep.Macth. cum mag. fig. Tab. Ger. Hzc Iberis folii edit pln- rimaperterramfrata, hciniata, Erucae, potius Nafhirtiifoliis admodum fimilia, ex quorum gremio nmerofi exeunt caules, pedales, in multos ramufculos divifi faibrachiad: in quorum cymis *exeunt* plurimi fiofculi albi, tetrapetali, quos fequuntur totidem capful* exigui, bifid*, fepto paricer medio feparante duplicem feriem feminum exiguomm, ruforum, calidorum & acrinm.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Iberis eil ex quarto ordine cakfacientium^ fimilis Najlurtio turn odore., tunguflu, turn viribttis, fid minus ea defiant autforeGalena: radices, inquit Diofcor'tdesjahfacientes isf adunntesfunt, qu<z utiliter cumpinguedine porcina addito rofaceo cataplafmatk in modum ifebiadicis, horis quatuor, imponuntur, fi deinde in balneum defcendatur, isrpojjealocttsokocum hnaperungatur: qua iff Latinh a Dawocrate aliquot carminibusexplicantur lam&icis, quemadmodum folet apud Ga- Unum lib, IX. de Medicam. fecundum locos. Itidem verfe* recitantur apud Dodonxum pag.

5. Pempt. quern vide.

S I L I C U L O S M

Tetrapetabe bicapfulares.

LEPIDIUM . CATV T XXIII.

A. EnSw» Diofcoridil, 2.C.205. ficdi&um, qttod*.r7ti\$Li, feufqumnasiff maculasfacieidekat: •/ \ vd~xx>% AEOT^ iVe/?, o*^<p<>i di&lum, quod [uaammonia urenti ulceret iff excoriet, ea- qttefacultate. notoifrontifervorum velferro inuftas delet, de quo forfan Golumdlib. K Lepidium Plin. lib. 20. c. 17.

Rr:

P*rs

Yars T A B U L I XXUI. Seftionis terti*.

U.Lation {Serratovulgare, nobis. 0

LepUhm I Folio \ ^2L^f^ll^f^s^in^A^JinoCkakpeyfe, nobk.tf

13. Angufto\Longo«*&*&folumfiar,nobis- UpiJium Glasifolium,

I (_ Ch.P. Lepidiumncnrepens,J.B.Chair. © .

' Exf heath partis Tab. Vgefm:prima Se nis tertia.

1. L Epidium Plinianum, Dod. Lob. Lepidium latifolium ferratum, nobis. Lepidium s
Piperitis Cam oblonga, me
caules cubicoaltiores, ceretesac lenri V o r a mollioraqne, ambicu eum crenata:
didi, msnores, tetrapetali- 1,ofce r.^- JI^ohi.fJ.^5fW8faperioribnsfiofcaliinnarcuncnrcanr

frtris cononentnr icmmz f fi qS bJ^as vaivu J^as, in quib" s bine inde a dey'tris & fini-
iaculcatem radicibus eius cancf-TM pm^erC, Ai>>uufafus contingit propter rependimian
est (Williare) minuta, £ I ^ V : hociilli cum Teptanti tubelisonibns fefe
grminans plantas, veluti Raphanidis magna leu rulticana, & Draba seu Aral>is, aliafuw
multarum filiquosarum plantarum hujus v>wl.o . <iuivc<. ^ emert fuerit alibi qnani in horn
requirere hanc plantam: umbrosa amat loc a,necommoarida. Verccifoliaernpunt, f>°
ac Julio apparent flosculi; femina (uti die tum > raro proferr.

2. Lepidium maximum Chalepense primis foliis minoribus & ferratis secundis majorib>#
profunde sinuatis spiffis incanis, nobis. Lepidium Dioscoridis, Zanoni. Radicem demiede
in terram Lepidium hoc novam maximum Chalepense unicam, fatis crassam, ad longitudi-
nem circiter ruptu difficilem, superius viridem & s ra-
diculis lon re hac exeuntibus, quæ huc illuc rependo (cu fr. nendo. alias
plantas producunc more Lepdii vulgaris, quibus u ^ ^ «* W n r loca, in quo
plantatu r, adco ut diHiculter iacte eximi aut erui p ^ ^ < J u o d f t M ^ « r e e s t o m n i b u s r e p e n -
tibus lant p j u s h o j r f c i s . Caulem edit simplicem, q " d i q d d l i c e m . r o t u n d u m , l e -
vem hcdevirenem, qui in pingui solo proveniens, ^ " d i q d d l i c e m ; e x e u j u s
singulis geniculis, exfilunt foliola ambientia caulem, ^ 1 ^ c ^ b T M ^
sed laurimis foliis similia: in summis caulibus ram , qoemadmodum fit i Lepidio vulgari,
staminulis & apice in medio; quibus flaccescentibus totidem succedunt capsula rotunda, b
valves, includentes in se semina rassa, Nasturtii vulgaris seminibus minora. Sapor hujus
plantæ cum radicibus & foliis, tum seminibus, acrior est sapore qui invenitur in Lepidio
vulgari ferrato nostrate, ac proinde potentius est remedium contra dolorem ischiadicum, l
pram, & dolorem splenis. Hujus radix bullita cum vitriolo nigredine tingit, ut testatur Aet
his verbis, cum radice vero an tinguntur & nigrum induunt »Arm. Est auter
radix ejus uiqu.cidcn., alba, crailitudf ie digitali &c. Folia secunda fImtin
spiffa, ington. Floret ætate. lujus femina Chalepo ad nos missa a D. Roberto Hun

3. Lepidium glastifolium perenne, nobis. Lepidium glastifolium, C.B.P. Lepidium annuum
Lob. Lugd. Lepidium non repens, J. B. Chabr. Radice exit hoc tenui, fibrosa, in multos ann
durante postquam semina copiose satis prodixerit, etiamfi Lobelius & cæteri authores ipsum se
quentes annum abufive appellant. Caulem profert bicubitalem, & altiozem aliquando, qui se
perne in multos ramusculos sese findit; ramusculis sic brachiatis insistant plurimi flosculi alb
di, tetrapetali, majores multo primi floribus: hos sequuntur silicula rotunda, planæ, bîndæ, s
pto medio membranæ pellucida, & albido exficcato, differrnante hinc inde à latere sep
ejusdem medii plurima semina subrufta. Thlofniæ
acrum

=«S£3^ffi55Es
I^na^tMa^ItW^ntku-

TEM PER A M E N U M & V I R E S.

*Hujus folia, sed præcipue radices, vehementer quoque excalescunt, utpote fervida & acris gustu. Inter utentia inquit Plinius lib. XX. cap. XLVII intelligitur. Sic & in facie cutem emendat, & rejecto fæto sanatur: sic & lepras & psoras tollit semper, sa-
exukerando ita ut tamen cera
it. etiam & cacatrices & perum.*

HALLUCINATIONES CASP. BALIHINI
Aliorumque Authorum.

P 97. col. i. pi. u. *Lepidium glajlifolium*, j. C. B. P. *Lepidium annuum*, Obf. (3 Icon Lob. -Lurrd. Ger. Park: *Hujus Lepidii radices in multos annos durant/stingulis annis ex eadem radice pofquam Jemina maturaverit folia, caules, & denuo femina profert; ergo primo lapsus est Lobelius, qui omnes errare facit quæcunque suos qui Lepidii annul huic flantæ attribuere nomen.*

Pag. eadem pi. m. *Lepidium Dentillaria diSlum*, C. B. P. *Dentaria & Dentillaria Tondeletii & Narbonenfium*, Ad. Lob. *Plumbago, Clusi Hifi. Hac planta non est tetrapetala (ilicula bicapularis) ergo non debet Lepidium appellari, est enim planta*

calida (3 acris: sed hac ratione ductus Cajparus Bauhinus ut hanc plantam Lepidium designaret, multæ alia toto circulo ultimo discrepantes plantæ poterint hunc locum vendicare. Est enim planta heteroclita & sui generis, ut postea declarabimus inter heteroclitas, quæ nec inter se, nec cum aliis associari (afin\$ ultimo) possunt.

Ibidem Lepidium & Iberis male a Cajparo Bauhino difponuntur inter Japhanum filiquofum & Dracunculum corymbosum, -debuere inter conortas Burfam pajloris, Cocleariam, & ceteras a fine ultimo iisdem conformes locari.

S I L I C U L O S I

Tetrapetak bicapfukres.

D R A B A S I L I C U L O S A .

C A T V T XXIV.

R *Rabam* '£**>, *Diofcorides Vihi-cap. i. %6. ipfi Thlafpfubjungit, unius factam emione jiuvis U fcilicet, filiculis, non filiquis donata, de qua fupra cap. VI. hujtus Seftionis pag. 233, 4, 235, 236. egimus.*

*Drab** filiquofæ meminimus fupra capite VI. cujus cognitio nondum pervenerat ad Dio- oridem, nos hoc capite agemus de *Draba filiculofa* feu umbellata, capitulis, non filiquis ngisdonata, inter confortes fuas plantas filiculofas fcilicet.

Pars TABULJE XXI. Seftionis tertie*.

Oraha filiculofa repens major } *Folia* { *1. Magis incank fpar. ofyermos vulgaris, nobk. Draba vulgaris 1. Cl/ <l.*
2. Magis vitridibus Chalepenfis, nobis. 0

Ex Hicatio partis Tab. vigefimæ primæ & Seftionis tertice.

D *Raba umbdhtej* vel *Draha major* capitulis donata, C. B. P. *Draba vulgaris* i. Cltif. Hift. & Pan. *Draba Diofcoridis*, Caet Caet. Colum. *Arabis five Draba*, Matth. Ad. ob. (cui & *Nafturtium* *Babylonicum*) *Lugd.* *Draba hexpedales* habet caules, & altiores iquando in terra fertili, friatos, tenues, foliofos, quos asquali ordine ambiunt folia valde *ituta* uncialia latitudine, Huncialia aut triuncialia longitudine, in oris dentata, circa miculum latiora, ex viridi cmeracea, gustu acriufculo, quæ autem fecundum radicem nafcentur frequentia funt & majora: caulisin fuprema parte multos edit ramufculos, xquahs % elongitudinis & quafi umbellatim difpofitos, quorum fingulis petiolis finguli infiftunt flori- uli albi tetrapetali, qui fimul juncti Sambuci umbellam referunt: hifce deciduis fuccedunt

exismtEcapfube, turgidute. utiinquetumidac, fepto medio dirimcnc bino nrriculos **fir'A**¹
defmcnte'.infagalis urfcuffs unicum continetnr femer ruftum (quando tert
 mucrone/n feniën, **fat** cnim revo propter repeudi aviditatem radicibus (ut in Lepidio diximils) ei
 ceflaro:) radixtenuiscandicanseft, Iongelar.equefbrpens, quibufdam librisprsdita. mTM
 tereap-orium margines circa V'lennam Auftriacam, **gmtpcafereinferiore Aoftrla**, liacp^{^1}
 non funtobfiti, qiiKfabindeinipfisetiamarwripiflimerepit. Floret Maio & Jun'l inirio,
 fubjunii finemSf Angufti initium maturam editfemen. Mcminrt&Car.Clufius !;jnc plu^{ll}-
 ram legifTe in Infub quam **fecit** Rodanas rluviu in duo cornua **divifta** inter J>ivi JEgidii tanum
 & Arelatem, dum *Marfiteam* proficifcerctuv.

P

2. *Draba Chalepenfis repens humilior foliis minus cinereis* quasique viridibus, nobis. Hac
 diftinguitur apriore Draba Arabum triplici nomine; primoparvitate, eft enim huni^{ior};
 fecundo foliis minus cinereis, feu quafi virid'ibus; tertio pluribus filitulis, **atrinque** ttiam tunn-
 dis, onerantur cauliculi, qm copiofe fie ptoventes numeroftorem (cminni copiam facile ad
 maturicatem perd^{ic}unt, feminaautem rar'is in- Draba Arabum ad maturitattm perducun-
 tar, unde concludimus hanc Drabam Chalepenfem minore facilitate rependi cfie pndit¹¹;
 utraque **repat**, fed hscminus. Sip hi fee pradi&isnotifacilecognofciturDrabaCh;ilcp^{en} s,
 a Draba Arabum. Uraba Arabum caules protrudit>ltiores, folia magis ilnuata, &mag'S^{ci}*
 neracea, flores pluresalbos, tetrapetalos, fedperpaucas filiculas, utrinque etiam tumidas,
 infra craffiores, fupra inapiccmdefineries, fepto medio binas valvulasin utraque fepararte-
 Semina hujusDrabs ex Afia etiam ab antenominato *D.Roberto Hunt'ngion* ad nos mi(TaCX qO'-
 bus fatis provenerunt plantae, quae nobis fcm abundanter fatis produferc. Floret *eadem*
affii tempeftate cum priore.

TEMPERAMNTUM & VIRES.

Coquitur Draba cum Ptifana, ad pituitofa pt Soris vitia : femer aridvm propipere obfoniU' nifceri
feribit D'wforides. Draba hodie in eo cenfu tj barbarian, qua officinal non ingfcdiur HUTi' n1^1
Botanographorum contortulis ac minutVk de ta controverftispojllhaUths^ frufiuoftusputaM¹¹⁵
aliaiferie proxima&fergtre plantas.

~STL~I C U L O s.if¹

Tecrapetalae bicapfubres.

. MYAGRUM-
C J T V T XXV.

Mrl%v D'wforides lib. 4.C. 117. memmit, cuiRubi* folia **triiuit**: iff PlinioUb.*1.c'
 27. Myagrosdkitur: *verm quid fit, nunc non dearnim. Sunt quinoflr, mMySff¹¹⁸,*
*Eryfimium Tbeopb. iy Galeaivelint: aliis Sefamum, ob feminis fimUitudinem, <? okid/tr*¹¹*
 tern.

Pars TABUL& XXI. Seftionis terrji.

Myagrurn ^{^11}*^{1a}J^u*^{fu}f^{all}TMm majoribuscopitulis, nobis. *Myagrurn fathum, C. B. P. 5*

(2. *Mtnusfeu filvtftre minoribus cafitutis, nol>is. Myagrurn fifaeflre, C. B. P. 5*

Explicaiio partis Tab, vigefimsprima StBionis terti*.

1. **Myagrurn** majus feu fativum, nobis. *Myagrurn fativum, C. B. P. 5*

Ger. *Myagrurni Uodonn, Lugd. Myagrurn diftum Chamctina, j. B. Chab, E " S "*
TMt[^]iuguni. 1 djni, icmics, icreics, recti, tubhiriiti, tungofa medulla tarfH
 ramooi. quihusalternatim latiorebafi adnHfctinturfnlia'nrnIT*¹ nU/inm ~ 11: /o
 nuUlit: niyiC, CUMVnonimnirmit pc mmm^f N_11_j
 m. Disco- m, Lib. caule cu- fuperne on afpera in

in>ambitu ferrata, fapore oleraceo: e< pediculis fat is longis flofculi luteolijtetrpetaliori-
Bntiir: quorum fingulisfinguls fucceduntcapiulx, cordate, tumidas, (eu turgidolae, niulto
jais 'praediflis filiculofis quoad Capfuhsmaiores, &'alic[quando cum quatuor anguiis *qax*
 (enuSaa'i latc-re iepti mcdii a dextrris &finrfrtris continent oblonga^ **triangularia**, Nafturtii
 femi^bus minora, colcris fubruffi. faporis itidem Nafturtii, fed remiilioris ; qua: inorere-
 teiuacntrahuntniafcilaginem quaWam: Tadix fibrofa, inutilis feminibus ad niacnriatem
 perduCn^ Monfpelii abiindac in agris. Circa Montbelgardura Myagroconfitosagros habent
 ad'oleum'conficiendum. Vidlc Joh. Baul'inus prope *Granges*, quod cjuotannis femine de-
 ciduo fefe **renowat:** femem marurum Junii principio. Maxima eft liujus copi^i culca apud
 Gallos- etiam fax fpontis **inter** fegetescontpicitur. Provenit fatum item in A]facia& traftu
 ^hcni, tefteTrago.

2.*Myagrurn* minoiibus capiculis fea filvcftre, nobis. Myagnim filveftre, C. B. P. Myagrurn
 urcium, J-B- Chabr, Hoc longe tenuioribus ac tenerioribus coiifit virgulis quam pra:-
 edens, fed cukura fruticofior fit, tefteCamerario; femem minus in vafculisfeucapfulis ob-
 ingis, **tamidis**, minoiibus, cordis figura ; eftque herbaejufdem naturarcumfuperiore.

TEMPERAMENTUM & VIRES,

EJ V S ^JV E V SV S.

'alidum eji ut't Sefamumverum, fithnqueetlamexcitatfemink oleofapinguedtmcorporisafyeritates
 Uvigari atque expolirijit Viofcoridts att^creditur; oko ejus utunturpauperes in epulk, divttes in
 lucernk ut't Ruellius author tfl. Ruftich noflrk GallkcinqutRuelliusjChamelina aut Camamina
 ojs; ime cognita, oho conficiendo ejm femem inarek pavitkmm flagrkdcutiunt, i\$Vannk
 inaurcm vento fikntem jafixt, dum ftiiquularum recrement a -vamfcant'. turn trufatilibus
 molts fubjiaunt•, i? verfando oleum exprimunt, quo non adlumina tantum lucernarum, fedisr
 "adciborum condimenta utuntur, magnobujitsokiproventu. Fix quicquamaliudab aviculis
 invaditur, quod aVvertentes quidam hoc femem colligere fcr almdk avkulkrefervarefiudent.
 Oleum ex bujus femine eonficitur longe pr*ftanti(ftimum% efique oho Ohv* Tragijudich gratis i*r
 jucundius ; **fed cm hona** venia Tragi, quicunqueoko Oliv <e non fit conten'tas, utatur oleo Myagri
 out Rapi donee oleum Ohvxyoveniat inGzrmania, Longechudkat comparatio-btc: forte
 Tragm ftbt pzfuaudet olmmex Myagri femine extrufum, efe veri Sefami ohum, isr proinde My-
 agro Scfarr* veri vires item atnbuit. Hoc oleum frigore non contrefme perhibetur aqmbufdam.
 Fkrifqw .. 1^focis, ut apud' Sueffiones^provenit; feritur in agro Leodiens'i, apud Zelatfdos
 eliam, iyi/. &< *>&• Iⁿ Germania fua fyonte nufquam nonexire fertur , itaisrunz
 cum Lino nafcijL. ur^cujusvitium mjlit.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

T raturum fliquit Ungit, C.B.T. P.i?. ; op.
 I VX c>i- -pl- • Myagrurn alterttm Tldajpeas
 tffigie, Lob. Lujrd. Eft plants Jiliquofa feu hn^a
 ftqua pTicdha ; ergo iton debuit a Ca&aro Bauftatio
 colforart inter Myagrurn , filictilofas plantm : aman-
 d Erticam cujm eji fpezins, Ifide pag. zip.
 Hifforiiu^ plantam 7. quo not retulimut. It/i- m
 cot. 2.pi. v. "Mya^ram vwwfyerum latifo-

Hum, C. B. P. Myagrurn hortense monofiermum,
 EyiL Item pl.vu. Myagre ftmilU jihqua rotunda,
 C.B.P. cum hit dtaplant* netifint fitiquafit hival-
 ITJ , nee Itcapfulares at Myayrum , non Htbnt
 Afyagra dici, fed cum filicula fungofa conjlcnt, tini-
 cam femem com'inentr, aptiu? re/e^abuntur adja-
 pbantjtrium moiwfpctmim', quemaii/nodum nt-f feci-
 mui.

S I h I C U L O S J E

Tetrapetalae bicapfulares,

- V E R O N I C A .

cATVT XXVI:


if

V E R O N I C A apud receptiores herba eft celebratiffima, Graecis & Latinis fcriptoribus
 forte incognita, quamvis Dodonaeus velit effe Betonicam Pauli l. 7. Cafalpinus vero ad Myof-
 otidem Diofcoridis lib. 2. c. 214. At Columna ad Alyffum Diofcoridis l. 3. c. 105. referendam cenfet.
 Veronica

Veronica feu *Teucrium* (f, pro planta tetrapetala bicapfulari, nongaltata vti ticillaw u • i-
 ator) mltismodisludic quoad formam & figursm folioniiii, coloremHornra, nui est urplu-
 napmtcanden aat vtolaceus, qniqae aliqaando degenerac in rubrum, aliquando in idbom : s\$
 qac a duratione, vel pcr^nis, vel annua ; a loco est vel terreftriseaque vel perennis am *JEk*
 vci aqimuca, quarom omnium.plurini3: Hint vel fpicata;(id est flores adco denfe,per confebwns
 n icute, in liiminiscaulibas proveniunt, uc degenc'rcnt in ipicam) vel floras raro difpofit>"m
 mm* virgniis oncnntur,qtii petiolis infittunt vel brevibus & arfte cavlienUs adh2i«inbas,vd
 • S f T T ! "initUH^r- Capfuli omnium & iingularum harum Veronicaruin lunt bivalves,
 oJr!i^'Co^uormes, f5F^ome^dio fepnnnte duplicem feriem femimim a iaterc ieptimedii
 Prsd.it, conter,torum, five fiavornm, .uftorum,aut nigrorum, comprcilorum utpluimum

TABU t A XXII.

§. i. VERONICA TERRESTRES VIV ACES.



TAB U L A XXIII.

- 10. Major frutescens altera, nobis. Chamædrys spuria major alterâ seu frutescens, C. B. P. Teucrium 4. Cluf. Hift. ©
- 11. Supina facie Teucrii pratenfis, nobis. Teucrii 4^a species 3^a Cluf. Hift. Chamædrys spuria major angustifolia, C. B. P. ©
- 12. Minor foliis inis rotundioribus nobis Cl. rotundi- folia, C. B. P.
- 13. Minor virgul nonicum minus C. B. P. ©
- 14. *frmontava minima*, cSTj*"-**l** ""*"" «"»*^* ninisto- Col. 0. «TM»*« tetragona montana reft*
- 15. Rotundifotia fcutellata biscutata Teucria folio, nobis. Alyssum Vwfcoridh mont anum, Col. ©
- 16. Minor angustifolia ramosior angustifolia J. R. Chvor. M i " ' Cbamtfas ft u^{ia}
- 17. Tenuissime ladjulta ril is. J.B.Chabr. © * Cbamffdrjs fpuna lenuijime lacini^
- 18. Maxima lat. fia f oercus fok.imbit. Veronica maxima, Lugd- mna major latifolia, CM. P., o

TABULA XXIV.

§.2. VERONItiE TERR.ESTRES AHNUE.

• *f*y, PolygoniflorealbOi nobis. £
 Folio ^20. He'dmcU^ncbis. Alfine HederuU folio, C.B.P. Alfine fytria
 (prior, vna. ♀
 \21 • Caulkutis adherentibus, nobis. Alfine Veronica foliis flofculti
 TerreflrU\ ' caulkulis adh&rentibm, C. B. P. Alfine folio Veronk*, Tab-
 annua Ger. ♀
 flojcu w< i2. Oblongispedkulis infidentibws Cbameddryos folio, nobis. Alfine
 Chamtdgdrfblia flofcuIn obhngispedkuHs infidentibus, C.B.P.
 Alfine foliis Triffaginis, Lob. Icon. Tab, Ger. £
 23 - C&rulea triphylloslninc pentapbylhs, feu foliis trifidis <? qubtquifidis?
 nobis. Alfine triphyllos carulea^ C. B P. 'Elat' me triphylbs, Hi/i. Lugd. %
 ?..3; VERONIC^ AQUATICJE PÆRENNES,
 Veronica |
 Aquatka }
 perennis }
 Latifolia }
 Mit'ior }
 i^ Oblonga^ nobis. Anagallis aquatica major folio ob-
 longo^ C. B. P. Anagallis aquatka major, Ger. Gsf.
 CQ.L ©
 26. Subrotunda non crtnata, nobis, Anagallis aquatka
 folio rot undo non crenato, C. 'B. P. Anagallis aquatka
 I 3^ Lob. Anagallk aquatka altera^ Lugd. 0
 ij-Angu- }
 oha } Minor }
 Polygoni infiar, nobis. Anagallis aquatka. angufiifolia,
 C.B. P. Anagallis aquatka, 4^* Lob. 0
 li. Plantabeteroclitarotundifolia^ minus crenata, Becabungx folUs7 pentaPetah,
 capfula Alfines qumquifida, nobis. Q

ExplicatioTab.vigefimtgfecun'dx.

§.i. VER6NIC& TERRESTRES VIVACES.

§
Veromca fpicata major refta csrulea, nobis. Lyfimachia fpicaca csrulea, C. B. P. Ly-
 iimachia caeruleo flore, Cluf. Hift. Lyfimachw caerulea, Lugd. Ger. J. BXhabr. Pfeu-
 dolyfimachium caeruleum, Dod. Veronica refta cserulea, Eyft. Hie Veronica ad pedalem,
 Sf aliquando iefqmpedakm altitud'mem accedit: caules funt illi teneriores, gradliores:
 folia oblonga veluti LyfimachiE, ledambitu fatis profunde lerrata, fuperna parce virentia,
 inferioreveroparte albidiora, quibus caulcs ramique conveftiuutur: flores gerunt in fummis
 ramisfpicacim,c3eruleos, Lavendula: florum, magnitudine xmulos, fed jnodoratos, teErape-
 Lalos, q«os fequuntvir aliarum Veronicarum fpicatarum more capfiil^ bivalves & blcapfu-
 hres, cordiformes, tumidas utrinque, fiffein medio, feptomedio diftinguente dupliccm fe-
 riem feminum ruftbnim: radix multis n'brjs repens & capillata, propagine eYnittens ex
 quibus de novo alii caules exoriuntur; his fupinis longe lateque ftirps (efe multipl'icat.
 Nafcitur apud Germatios infbflisaquamrecipientibus, utaitGefnerus, facile autemitihortis
 foli exgoiitis luxuriat, locis non omnino umbrofis, femem tamen perficit^ fed aegre. Tora
 aestate floret & ftmiria perficere- conatur. Veronicam omnino ereftam majorem latifoliam
 -Gluffi refert.

2. Veronka^m2]or latifolia erefta,nobis. Veronica fpicata latifolia, C. B. P^Veronica ereftior
 LiL'foli^Cluf.Hift. Veronicaipicalatifolia, Ger. Park. Major latifolia foliis fplendentibus
 &/non fplendctibuE, J, B. Ctybr. Caules profert hscfecunda interdiim ampliores, inter-
 4<ifa non valde nimofos, fed^uam craffiffimis alis& multis nodisprsd,itos: folia contrariis
 ^ioter feptiolis (id eft crurjhtim) ad fingulosnodosnafcentia,duasaut.tresunciaslotiga,
 Hnaoi hta, craila3 ex atro viridia fplendentiaque, raris aut vix conlpiciis crenis ferrata¹, guftus

admo(hniafringentis& exficcantis, deindeacrii: in fummocaule Ipicatim creTaint mul; flofcali conferti, Veronica prioris refecxruleae fioribus tetrapetalis iosmaetiam (unites, fed colore paulo diiitiore, Scab infima pane fpicarumexplifarefeincipiue, qutm:<-l-i; 'du; fpicatarum plantarum quafi omnium Uores: floribus fingulis evanidis fuccedunt valcuhrltu capful* bivalves bicaplularelqne, duplice ordine femina in fe conrinentea, fepto nicdio membraneo cadem feparante: radix craffaefi, miikifqirc iibris donata, fingulis' anms no- veltas plantas ex lateribns producens. Invenitur & haec & prior Veronica in multis 'Panno- niE filvofis montibus, praxipue umbrofis quibus gaudet: Stiriacarum & Aiiibiacarum AJ- pium radices hasyduas Veronica fpecies, & plurimas alias alunt. Florent Janio & Julio, in hortis prarcipue, femlen Augufto & Seprenibri maturum eft.

3. Veronica anguiftifolia recta minor vulgaris, nobis. Veronica fpicata angnftifofo, CJK P« Veronica refta vulgaris"major, Clut- Hift. Veronica refta anguftifolia, Park. Hujiiftnam Ve- ronica? rectse caules ramatim proveniunt Jionprocal a radicis exortu, quibus ad fingula ge- nacula adnaicLintor tolia anguftiora, denfius difppfita, magisferrataiiuperioris, atqucin fut- mjscauiiium ranmfculis ipicatim proveniuntfior'escrulai, tetrapetali,cum mukisftaminulis in medio petalorum, aliarum fus fortis more: quibus fingulis fuccedant capfula: bifids, cordiformes, utrinquetumidae, femina hinc indeadexdris& fmiftrisfepti medii corTstntnr.es. Floret eademtempeftateannicurlprioribus, iifdemque locisgaudtt.

4. fwofficaanguftifoliaYecr3minima,noBis. Veronica fpicata minor, C.B. P. Veronica recta minima, Lob. Ger. Cluf. Hift. Veronica fpicata re\$sa minor, J. B. CKabr. Priore longe.minor hae eft, vix palmarni & lefqaipalmarem exceditaltitudinem: foliis eft minoribus, parum .aut levitercrenatis: rlores iunt cirulei; tetrapetali, denfiorescpmofiorefque, fpicati : qttt- bas fingulis abimodecidentibus fucceduntcapfuli cordatae, bifids, dujjlicem leminum it- •riem in duplici valvularnm loculo connnenr.es, iepco medio feparante duplicem hinc inde ordmem feminum fubruffbruni.

5. Vmka Alpini frutefcens nobis. Veronica Alpina fmtefcens, C B. P. Veronica 3- fru- tefcens, Clnf.HUt Hicpedaiibas &altioribusconfat furculis, duris, lignofis, lentis leu tie- xibilibus, hum! fparfis feudiffufis, ac velutitrequentibus nodiscinctis, undeexadveriofem- ptr utrinque ramuli enalcuntur virentes, in quibus bina e regione oppofita tolia, viridia, crafilufcula, longiufcula, lplendentia, mintniiUniis crenulis ferrata: extremis lamufculis infident feni,autoaoni tlofculi, ex alarum finu prodeientes, quaternis petalis coi^{iv} ates, cajruJetcoloris elegantiflimi, pallenteumbilico, & rubro circuloeum ambient anu- nula apparent, & ex medio vcluti umbone ftilus quafi probofcidi fin- .11 in latio- ribus majunbufque vukaris' Veronica aut aritedittarpm vaicuiis# comp ... uuis' exiguum, planum, ialvefcms fuccedit: radix fibrofa feu multas fibras fpargens: qum & ipfi (urcuh profiniores radki, atqw emmlongiorcs i radice (ft paululum eis terra appomtur) ati £n- galos nodos fibras,&c confecruenter radices agunt. Provenit hie irueicofa Veronica in Sr. berg & Alpeftribus Stiriae jugis, ubi Junit> rlorec: at in hortis etiam Maio, & femem ,juni.>; matLivitatem perducit. Suntqui Veronicam hancrrutefcentemad Teucr'mmmalint referr Sit Veronica aut Teucrium , aft indigent quicunque eodem nomine Tcuciii h'i plantam gaudere voluerint plantam tetrapetalam filiculofam bicapfularem parvo dikr mine* reieret-' Si autem per Teucrium intelligatur Chamacdrys, tune mucabitur alea di nominandi, quiaomnisChamidrys proprieloqufndoeftpiantagaleataveiticillata, ut inl docebimus inter galeatas verticillatas plantas, Se&ione oftava enarrandas.

• 6. Veromca masvefta (euatiurgens,nobis. Veronica masrefta, C. B.P. Veronicaaffiirgen Dod. VerorTicareaa mas, Lob. Veronica vulgaris refta, Cluf. Hift. HXQ plurimos ed caules non procumbentes, fed affurgentes atque erectos; folia lequentis foliis forma fim- lia, led magis dentaCa, <vux autem infummiscaulibusconfpiciuntur folialbnga& anguf iunt: rlores & capfula;adeundem modum fabe,fedminores;eftquefequenre viiibus Herio Duplex eft, majorSf minor; ilia latiore folio & longiore fpica, hxc anguftiote folio & ffrevioi fpica. Repencur juxta aggeres, & aliquando in faxofis. /Eftate floret, &c vtrfus eiuiikm * nem temina fua perficit.

y.Vehmca iupina vulgaris foliisferratis, nobis. Veronica m^fupinafif vulgatiffima, C£^
[^]r[^]l^kT[^]^^s^[^]'T[^]^⁻m. **Verisfea & my**
 Hae eft caulibus dodrantalibus aut longioril[^]asprocumrjentVbns .-.ii per terram ftatis;folia ejus
 latiuufcula, Chamedryoa repent.s majora, candidioraque^T fecundum margines pa.utuh.ni
 ferrata;

rata, quas exigua lanugine pubescunt? in superioribus ramulis oriuntur flocculi tetrapetali, dilute caerulei, pediculis curtis ordine, spicatum tamen, digesti in quibus fingulis decetibus succedunt filiculae cordiformes, fere membranaceo intermedio separante duplici ordini feminum parvorum, rotundorum & nigrescentium: radix tenuis huc illuc divaricatur, sicut ut prioris recte radix. Provenit in locis apricis, fabulosis arenosis, non raroluxta tumulos ac aggeres, & agroiam lepimenta; quandoque in pratis campestribus, filvis, & in faxosis reperitur. Floret per totam aestatem & femina perficit.

8. *Veronica serpyllifolia* Serpylli folio, C. r. AP. Veronica minor Serpylli folio, Ad. Lob. Veronica ratensis, Dod. Betonica Pauli, Tur. Gefn. Horf. Hujus folia sunt superiorum foliis multo minora, virentia, glabra, Serpylli latifolii magnitudine, lanugine tamen carent: alias priora foliis, ramulis procumbentibus, flocculis dilute caeruleis & capulis cordiformibus, per medium bifidis, sed minoribus, similibus: ignavahabatur & nullius usus, ut vult Dodonaeus; sed cum eisdem characteristicis afficiatur notis, floribus scilicet, capulis feminalibus & feminibus ejusdem formas, eisdem pollet viribus forte in remissiore gradu, & natura nobis monstrante viam, facta experientia facile deteguntur. Floret Junio & Julio quandoque anni (empestatibus viret).

9. *Veronica petraea* sempervirens, Pon. Teucrium pinnatum 6. Clus. Hist. Chamaedrys Alpina saxatilis, C. B. P. Ux. Veronica quinque, fex, vel pluribus etiam caulibus rotundis immediate ex radice ortis constat, non ramosis, altitudinis sesquipedalis, e quorum geniculis bina foliola exeunt (licet aliquando quaedam satis magna reperiantur) aequali ordine disposita, ut in Chamaedre, non sicut tamen profundè, incisa, admodum crassa & splendida, impenitentia, & lanugine quadam donata, sed inferne albicantia: flores fert in summitate multos spicatum, fingulos quaternis petalis, caeruleo, aliquando albido colore constantes: quibus fingulis cadentibus finguli calyces reperiuntur, in quorum fingulis capulae fingulas cordatas apparent, reliquis Veronicae capulis conformes, duabus valvulis distinctis, duplicem feriem feminum in se continentes, septem medio membranaceo disjungente duplicem illum ordinem feminum subnigrum: radices habet parvas nigricantes, quae ita nudis illis faxis montis Baldi paucissima commixta terra inhaerent, ut difficillime inde lignibus evelli possint. Floret initio Julii, & circa eisdem finem maturatur femina, aliquando tardius. Est planta sempervirens, elegantissima & pulcherrima, quae acerbi & austeri saporis esse gustu percipitur: tuberosam habet radicem, ut Tormentilla, aqua emanant fibrillae plerimae.

Explanatio Tab. vigesimae tertiae sectionis tertiae.

10. *Veronica* major frutescens aëra, nobis. Teucrium 4. Clus. Hist. Chamaedrys spuria major, altera seu frutescens, C. B. P. Chamaedrys spuria latifolia, J. B. Chabr. Cubitales atque etiam ampliores caules habet hanc Veronicae species, ex una radice frequentes, quadrangulares, subhirsutos, nodis distinctos; folia Chamaedryos fere paria, foliis illius herbas quae à nonnullis herba sacra existimata est (de qua ad Verticillatarum galeatarum plantarum finem agemus, Sectione octava) limbilima, binasemper fibri invicem opposita, per ambitum serrata, paululum hirsuta, amari saporis: summi caules in aliquot ramos dividuntur, gestantes oblongam spicam flocculorum tetrapetalorum, caeruleorum, venisque distinctorum, pluribus intus staminibus in medio, & stilo eminente, qui marcescentes integri defluunt: quibus fingulis succedunt capulae cordate, bifidae, continentes hinc inde adextris & finitris septi medii inembranei plurima exigua femina: radix fibrosa admodum & vivax, quotannis novos caules producens, qui infima parte fecundum terram fibras etiam agunt & se propagant. Crescit in omnibus collibus & montibus Pannonias, Austriae, Moraviae, & plerumque Bohemiae petrosis (herboris tamen) locis. Hujus & altera varietas inter vepres reperitur non minoris longitudinis, virgas ferens tenuiores tamen, humique diffusas, & adeo frequentes, ut magnos cespites interdum late tegant, minoribus foliis, & dilutiore flore.

11. *Veronica* lupulina facie Teucrii pratensis, Icon. Lob. Chamaedrys filifera, Dod. Teucrii 4. species 3^{ia}. Clus. Hist. H33. Cauliculos promit tenues, angulosos, veluti geniculis distinctos, pedem aut subinde cubitum altos, circa quos per intervalla folia apparent angusta, longae in margine flagis serrata inquam fere prioris Veronicae folia: infummis caulium in foliis in ramis spicatum praeveniunt flocculi tetrapetali, eleganter circa fastigia caulium dispositi, prioris paulo majore quique caseruleo arident colore: quibus fingulis itidem capulae paulo latiores succedunt, cordatas, bivalves, in quarum fingulis valvulis hinc inde alacres septi medii dispositis femina parva continentur: radix tenuis fibris non destituitur:

Hujus inquam cauliculi non in altum recte affiurgunt; nee Temper procumbentes per terrain flennuncur, kd faepe in lactis inciinantur velutt ea vegetabilia qua; -xteyixmte Theophrastus appellat, &lunctenuibns pilfe uni cum foliolis leViter hirfiiti. Nafcicur pluribus tods fli pratisjuxtaflumina, nvulos, f robesafontes, liibinde in nemorofis, firquibufdamlocis'rrfnorrbua foliis, & paucionbns rarai&^libi vero etiam ramofior cvadit-Rcperitur in filvis ac mont h s alicub^quzvelhumi^ vel ficre pallidiorc (proloci videlicet & natalium genio) nonnihil a reliqms different Junio Julio cum floribuSvigeo, ac Auguito iemina perficit.

ii. Veremca minor iolus imisrotundioribus, nbb*s. Cham^drysfpuria rotufldbilia, C.B.P. ^hamzdrys filveftns qoorunclan., CluCHift. Teuprium prare#, Ad. Lob. Teucrium minus 3- lab. Hw\erome_a caules editfemipedales, aliquandoaltfc, infirmos, quadrates, hiriutos, -adquorum fingula <nicnla bina protriidunturfoliola, qua; inreriislunt rotundaChamalryos more, & ferraca? Wioravero funt longiorn magifque ferrata, & acutiorem in mncroneradefineigai in lingulis aucem pndidis geniculis bina e rcgione difponuntur foia, qux a ternanm l d » i, n t obtutui ante & retroA a dextris & finiftris (hoc familiare eft omnibus planua, q^rdHremafobaereg. oneanneaunturgenicuJis) hirtuta, mollia: in fummisramts producuntur riore infpica alrernarim digefti, eleganter parpard, quator pecaKs roenndis confutes? cumrukislm.nulisinmedio, iqne inflorimfingpliramlocnirfiic^dSr fili-nhnm ! [^ ^ , C O r d l f o r m e i ! = b . c a p f i n J a r e s , f e p c o m e d i o d i f t e r m i n a n c e d u p l i c e m f e r i c m f e m i n u m , X 1 m . C a m m m & r e , r a d i c e c o n f i t t e n u i , r e p e n t e , f i b r i l f a s m u l t a s e m i t t e n t e . C o n f p i - c i t c v _ a r i t e r i n ^ ^ ^ 1 3 0 ^ S t i r i a , A u l t r i a > M o n v i a & B o h e m i a : p a i l i m i t i d e n r e p e r i t u r i n H i f p a n i a , G a l l i a , G t m a a i a , B e l g i o A n g l i a q u e , h e r b o f i s l o c i s . Q u o i n f t o t i t u l o l p y & a l r ^ f p e c i e s h i e r e c e n f i t e d e f i g i i e n t u r C l i a m w l r v o s a n c T e n c r i i n o . n i n e n o n p o f f u m t a u s a r t i c q m , c u m & c h a n w r d r y s & T e u c r i u m p r o p r i e l o q u e n d o f i n t p l a n t s v e r n e m a t e g a l e a t s ; h e a u t e m V e r o n i c a i n j u f t o t i t u l o 3 f f a l f o C h a n i B d r e s a u i T e u c r i a d i c u n t u r , q n i a l u n t t e t r a p e t a l i f i l j e u i o f e b i c a p f u l a r e s . J u d i c e n t i q u i J e S o r e s d e i i s q u s h i e & a l i b i p r o r e n m u s , i a l t e m i m p r a f e n t i a r u m d e h i f c e c o n f u l t n t H a l l u c i n a t i o n e s h u j n f c a p i t i s , & c l a r t u s a p p a r e b i t I U I C m e r i d i a n a l u c e n o i t r a m o p i n i o n e m , i m o d e t e r m i n a t i o n e r u , d e p r o m p t a m e f f e e x l i b r a n a t u r e , n o n e x l i b r i s f c r i p t i s a B o t a n i c i s .

13^TM Kaminorvirgalofa feumulticaulis Pannonica, nobis. Teucrium Pannonicum minus 5.CJuf.Hiir. Teucrium Pannonicum, Tab. Ger. Statimaradicc virgulasquintahax Clnf. ^eroiicadodrantales, purpurarcentes, S; Jmmiprocumbentes fundi E, qU3sexadv^" 1 -a ample-untur folia, Cham*dryos folns tornia 5c colore familia, & eodem moH- ferraca, minoratamen, guftu lmgum exficcante, deinde amariufculo. Samm; I* in ramulos dl vii3c, namerofosflo^uloa fpicæ forma naicentcs geftaat, quatuor petals conitantes; in {in-gutonim fioriim iimbihco ftaminula haerent, & ftilus e medio umbilico protuberat: flofcu'i funt CTmci coloris lacuratiftimi & clegantiffimi, aut aliquando dilutionis, & qa'afi cV« f acei. fponte prffdiff's fioribns decidentibus fnccedunt /iliculx comprefi Enmli ilum, I fbniffio femineplenz; radix etiam valde fibrofa fcvivax eft, fin Wifanink »r N P. urima al endon. r^dicem f i b r a s e x g e n i c u l i s a g u n t . N a f c i c u r f e r e , i n l X S ^ u n q u a m k . b f f w a g g e r i b u s , c v c o l l i c u l i s , f e c u n d u m v i a s p u b l i c a s i n f e r i o r i s A u l t r i a , p r a f e r t i m i n V i e n n e n f i a g r o , paulo poft femina fua perficit. Unicam hujus generis plantam inveniebat Car. Clufius ad dices montis pago Glafenfield imminentis, fecundo à Neapoli jam memorata miliari, quæ florem ex carneo candicantem habebat, circa umbilicum carnei coloris venis diftinctum; ita- mina & ftilum ejufdem poffidebat coloris.

14. Veronica tetragona montana recta minima flore a mplo, nobis. Veronica tetragona tenfi Veronic^cied^d "XmL^y ni? a i a U r O l l a m u l i m a , C ^ ? , " * T M c n o p r a q u i i n h a c p a r v a p l a n t a m a i S r n , * " " ^ O m n i b l l s f n i s p a r t i b ^ , p m e , I U e s , i s c o n g e n e r u m f u p r a d i c t a r u m f l o r i b u s ; c o l o r e f u n t p r i n c i p a l i s p a l m a r i ^ q u a d r n t ^ , r u b e f c e n s S n ^ r C a f a m m a % d u a 3 a l a S ^ u i b u s d i v i d i t u r c a u l i s o r i b u s c o n f t a n s ; f i n g u l i s v e r o g e m c o l h b i n a a d E f f T ^ e n i " * £ P l u r i b u s ^ u n c p a u c l i f p i c u n t u r T r i t i c i g r a n o r t i a g n i t p d i n e p a r i a d e i n d e f n ^ ^ W i n ^ ^ n i g a < m a g B k n d i A e m a f l e q u n n . r . h i r f u t a , o b l ^ a d m f ^ T M ^ 8 " t f a ; U n t , & i n d i c i s J ? u T M ^ * ! t u s c r e n i s ; a b f q ; p " i d o c a u l i b i i s a d h a r e n S , ^ f C T ^ t a ^ a r t e m a l t i s d e n t i b M f e ^ " f l o r i b u s m a j o r i b u s c i r c u l c i s f i n g u l i s f i n e u l * C C i r C a c a u l p ^ n i c u l a l a t i o r a : i n f u m m i s a l s , B ^ ^ ^ l u b v e n m n t c a p f u l j E c o r d a r ^ b i v a l v e s , c u r n a p i c e i n m e d i o

cediohincinde in valvulis ad exrri& finiltris continences femina fubrufta. Juniotioret, & Ju-
 Operficitur ejufdem femeu in valvulis apioeacuto ex feptomedioteunte dmfis: theca: leg
 Npfulj; *icminalcs probafihabent Juatuor foliola viridia, acuta, qua? omnium harum Veroni-
 rum capulis conveniunt: radix repit, ex geniculis compofita, e quibus fibrillae dependent.
 i ibmmis frigidilque montium paucis oritur, atque Equicolorum loco Sanfto Angeloappel-
 to.

¹ *Veronica* rotundifolia bifida aut bifida Hederaefolio, nobis. Alyffum Diofcoridis
 montanum, Park Clamas dryspuriacaffinis fcitellata planta, C.B.P.
 Veronica haec Hedera: folio, *fkfd* modum Hedera; repens, radice confat longe lateque repeiite,
 Jurinias fubinde ex eodem JRNittente fibrillas: ex radice autem oriuntur quidam viticuli
 rotundi palmares, & aliquando fequipedales, per terram refupini, rubentes, hirci, & ex
 geniculis *fcfe* radicaies Hedera modo, aliamque quarundam plantarum procumbentium
 more; ex fingulis geniculis bina oriuntur foliola rotunda, crenata, longis fati petiolis e
 regione pridiftis geniculis adhaerentia, unguem humanum lata ab initio, deinde latiora & ma-
 iora. *il* duas ufque uncias crefcunt, majoribus dentibus & hirci fcitentia: ex alis fingulis
 amfulculi gerentes floculos aliquot, tres quatuorve, tetrapetalos, caeruleos, ex tenui
 ainnuorapetio hirci prodeuntes, foliaceam bafin quatuor foliorum habentes; atque fin-
 gulis iloribus tetrapetalis fuccedunt fingulae capulae bivalves, rotundae, cutonim torml
 confnitate, fepto medio cum apice potento disjungente membranaceas valvulas ovales,
 hirci?, hinc inde fitas, in quibus continentur feminae compreffae fulvae, quinaut fenae in fin-
 gulis lateribus. Frovenit in Campockrenfium Matefii montis jugis filvofis ambrofifque, &
 xftaK prope mandras florentem confpexit Fab. Columna, qui inquit, deo difficilis est
 Alyffum Diofcoridis inventio, ut quilibet recentiorum fcriptorum foliaceum trutum edentem
 plantam pro Alyffo Diofcoridis propofuerit. Harum plura genera inveniuntur, refta, repen-
 tia, fupina, pratensis, montana; fed hujus folia longo petiolo haerent (non ita in aliis obfer-
 vatar) & rotundiora; ruftulque leucapfolje magis, rotundiores. Miramur etenim alios
 pbntas plurimas recepiffe, quae non duplici fructus five clypeolos aut folliculos habeant,
 ut Diofcorides notat, fed quamlibet finiplici iofu ap. rto & divifo & duplici valva
 proponunt, quod in multis cujusvis generis eft commune. Tordyllo quidem femina duplex
 cfe (hoc etiam contingit omnibus umbelliferis, uti in obis alibidic uni) Diofcorides notavit,
 illudque firmiter fcutus, non duplicibus fcutulis, ut de irueru Alyffum retujit. Nee Dio-
 fcoridem *i*, -> rifierant, ucfemina infimul clypeolis duplicibus, non fructui, ntapparec
 ex textu videtur in *TAKIICI* *Siffr-xfa**, *o* aTs% em/* -vw^iAa-iti, juxta qua: verba fructus ffub-
 intx-lligimr?^ vti. *dy* leoladuplicia, in quibus feminae fubktum. Quare fi folliculi five
 duplicia clypeola continent debent feminae, illa oportet valvulas habere proprias & diftintas,
 atque fie fructus effigies non fimplex, ut ab aliis proponitur, fed duplex effe debet, ut duo-
 im clypeorum rtpi acencet rotundas & ovales circumferentias flt profunditas. quae fingulae
 men cotitirere pollint, atque fructus modo concipiant & ex foliorum ortu ducant.
 osconcludimus duplicem clypeolum convenire Leucois bifidatis omnibus fupra explica-
 s cap. VIII. de Leucoio, non minus quam huic plantae; ergo difficile admodum erit affig-
 are genituum Diofcoridis Alyffum propter brevitate deferiptionis, non Iblum hic,
 d& in multis aliis; fed haec magis & pergamus ad explicationem ceterarum Veroni-
 arum hujus capitis. Fatcor hanc plantam maximam habere affinitatem quoad clypeolum
 duplicem cum Leucois bifidatis, led quoniam harum plantarum fie Alyffum Diofcoridis dif-
 cillimè meritè decernatur.

i 6. *Veronica* minor angustifolia ramifior 5c procumbens, nobis. Chamaedrys spuria minor
 angustifolia, J.B. Chab. Veronica hanc mindrem angustifoliam ^{5CK} Cluffi valdefimilem,
 fed ramifior & altiorem, foliis duplo triplove pracangustioribus prsditam, in agris Rauracis
 iterilio Hbus, & in agris circa Balneum *BrUglugen* (^opiofe obfervare eft, authore Cafparo Bau-
 hino. Talem mthi dedit (inquit Joh. Bauhinus) Thomas Plateius Bafilis collectam; ean-
 dem, inquit, florealbo reperi in hortis circa Montbelgardum.

ij. *Veronica* minor tenuifolia laciniata, nobis. Chamaedrys spuria laciniata, J.B.
 r. *C*^aniclegans eft haec *Veronicae* fpecies? caules enim erigit pedales, aliquando attio-
 f tcr^ces (praterquam crafleres, qui ab una parte quadranguli videntur J firmos, ramulos,
 ie quadam modica obftos: tolia fequentium genicula fingula utrinque pluri hserne,
 me ac proton dif (cgm^ is laciniata: ramulorum extremo capfula ex longis faffis pe-
 ennt fingulares, corticata, bivalves, Veronica vulgaris more foliaceo calyculo com-
 prehenfe,

prehenfae, in quarum fingulis latet femēn exigūm, comprerTurh, coloris fpadicei: radfēc craffiūcula multis fibrīs nigris donata. In Goritienfi agro V. *Agerius* legit. En figuram inter caeterasfiās fortis Veronicas damus. Floret & femiria itidem aeftate perficit.

18. *Veronica* maxima latifolia leu Quercus folio, nobis., *Veronica* maxima, Lugd. Chk-maedrys fpuria major latifolia, C. B. P. In Sequanis gignitur *Veronica*, quae à nonnullis maxima dicitur, ad montium confragofc prxcipitia, inter ipfa faxa. Radice eft nigra, pluribus fibrēs capillata, caulibus multis fruticofa cubitalibus: foliis Quercus, J^Mtum crenatis, femper geminis, caulem quadratum Chamaedrys inftar ^mplexantibus, quam ok-saoiām Chamaedrys genus quidam effe volunt, furculis multis ex alarum funtibus provenientiibus, minime foliofis: floribus confat minoribus, Veronicas more tetrapeflnis, puhiceis, denfe & quafi fpicatum in fummis caulium digeftis; quibus fuccedunt capfulae cordiformes, bivalves, tō-tundiores, fepto medio jundas, femina hincinde à latere ejufdemfepticcontinentes.. Floret ineunte aeftate, & paulo poft femina perficit in Sequanis uti ab initio di&um.

§.2. VERONICI TERRESTRES ANNUL

Explicatio Tab. vigefim quart* Seclionvs tertU.*

19. *Veronica* terrefttris annua folio Polygōni flere albo, nobis. Hasc eft plantula palmaris cujus cauliculi funt recli, atque ejufdem fingulis nodis foliola oblonga, angufta Polygōni inftar adherent: ex alls fingulis inter cauliculos & folia exeunt finguli flofculi, albi, tetrapetali, quos fequuntur capfulae cordiformes, tumidas, fepto medio diftinguente dupiicem feriem feminumfuffbrum, comprefforum. Radix eft tenuis, inutilis poft femina ad maturitatem perdufta, tunc exficcat tota planta. Floret Maio & femina perficit Junio, ubi fpbnte oriatur ignoratur, fed floret & femine deciduo fingulis annis fefepropagat in hortis noftris copiofe.

20. *Veronica Uedemlx* folio, nobis. Alfine Hederuk folio, C.B.P. Alfine fpuna prior feu Morfus galling, Dod. Alfine annua folio Hederulle, Park. Alfine hederacea, Tab. Ger. Aliine folio Hederuk hirtuto, J-B. Chabr. Elatine prior, Lugd. Morfus Galling Hederuk folio, Ad. Lob. Uxc cauliculis tenuibus veluti Alfine minor procumbit: folia latiufulca, hirtuta, incifuras duas (interdum pkres) Haderae aut Trifolii hepatici inftar habent: ex caulium alis exeunt flofculi tetrapetali, cserulei, longiufulcis petiolis pendentes, cum ftaminulis quibufdam in medio flofculorum; quibus fuccedunt capfulae didymae fea bivalves, fatiscraflās, & rotundas quafi, fepto medio juntae, quo feparantur hinc inde femina craffa, & fat.6 am^lapro portione plantae, gibbaforis, intus cava navicuk inftar. Provenit pafsim in arvisfatis, & hortis cultis. Floret exeunte Vere, & ineunte aeftate femēn fuum perficit.

21. *Veronica* flofculis cauliculis adhaerentibus, riobis, Alfine Veronicas foliis flofculis c-Uliculis adhaerentibus, C. B. P. Alfine folio Veronicas, Tab. Ger. Alfine ferrato folio hirtutiore floribus & oculis cauliculis adhaerentibus, J. B. Chabr. Elatine Polyfchides, Hift., Lugd. Alyffum Col. in Phytob. Haec *Veronica* radice nititur tenui & fibrofa: caules fert multos dodrantes, aliquando majores, aliquando minores, re&os, parum ramofos, hirtutos, in principio rubentes: folia longiufulca, minus profunde ferrata, nonnihil hirtuta, fine pediculis fecundum longitudinem caulium geniculis alternatim adherentia: in fummis caulibus oriuntur flofculi tetrapetali, fiibcaerulei, friati: quibus fin*gulis deciduis fuccedunt capiuk cordiformes, compreffas, bivalves, lepto medio bipartiente duplicem ordinem feminum parvorum, comprefforum, & fulvorum: radix inutilis, feminibus enim ad maturitatem perduftis totaliter perit planta; fapor totius plantae eft amaricans, Provenit pafsim in pratis & arvis neglectis. Floret primo Vere, & paulo poft femina ad maturitatem i>. thecis feminalibus producit.

22. *Veronica* flofeulisoblongis pediculjs infidentibus Chamzdryos folio, nobis- Alfine Cham^dryfoha nofcuUs oblongis pediculis infidentibus, C. B. P. Alfine foliis Triifaginis, Lob. Icon. Tab. Ger. Alfine fpunaaltera, Dod. Alfine ferrato folio glabro, T. B. Chabr. Pumiia eft haecplanta, - quas eradice alba& fibrofa caule^ of, "»«S»f«^» J D. v_nau. - ru - hirtutos, articulatos: ad quorumfingulagpnicuh^nn^Tr^ ^ Rentes, nonnihil hirtutos, longiufulcis pediculisinnitentia, nervisrubentibusTm^ r A^ arV2, nuna Temper ex adve^so, ut lunt Chamaedrys vulgaris folia, glabra tamen "Cerl^ta, «.J} g_lora <^7im latiora,»lerrafa, pediPuli femiuncialesprodeunt fuffinentes flofculi^ pediculi^ fatls ^n S^s aPPenfa: ex &''' inferne continuis conftantes, ftaminulis...^° »...«atpiir.petahsczruleis, rarmsalbk, P^ucis Itilum tenuem circumftantibus* quibus deciaen-

•dgcidentibus fucedunt locali bipartiti, cbrdifformes, longis petiolis infidentes, feptomedio fe^jrante duplicem ordinem feminlim rotuadorum & comprerlbram * flaveicentium. InvepaiSm inarvis ad radices<mur^rum, florens Maio, & femina edensfubinitiumjunii.

.-^Veronica caerulea triphyllos nunc pentaphyllos feu trifida & quinquifida, nobis. Alfine /^phyilos czerulea C B> P. Alfine parva recla, Lob. Icon. Cam. Elatine triphyllos, Hift. Lugd. Daçtiliobotanon caeruleo • fldre, " ^a' * Alfine re&a, Tab. G<#T Alfine folio profunde fefto flore purpureo feu vjpk^eo, J. B. Chabr. Plahtula hac eft palmaris, aliquando duarum aut trium unciaforo^ /iðlieulis fupinis fere &s\$)llofis, in quorum geniculis anne&untur plura folia uti diftum, terna fuperius, ^W m^ef; i^us verfus radicem, pinguiufcula ; ex quorum finu oriuntur petioli longi fuftinentelflofculos tetrapetalos, casruleos, cui poftfe relinquunt filicifas feu capfirtas cordiformes, bifidas, & fepto medio divifas prasdiftarum more: radix parva, fibrofa, & inutilis poft iemina matura. Flore& inter fegetes menfe>Martio. Obfervatur in 3gi,0 verfus *Chaftelaine* nonnihil .variare foliis non diffeftis, fed ex rotunditate oblongis.

§.3. VERONICA PE'RNES AQUATICS.

Veronica aquatica major folio fubrotundo, nobis. . Anagallis five Becabunga, Ger. Dod. Ahag^lis aquatica five Becabunga Germanorum, Ad. Lob. Lugd. Anagallis five Becabunga folio-rotunjiore flore casruleo, quorundam Berula five Anagallis aquatica, Tab. Hæc Veronica aquatica (nullo modo Anagallis) caules habet piftgues, rotundos, cavos, qui in nonndllas alas fuperiore partedividuntur: folia ex fingulis geniculis è regione adnafcuntur craifa, lasvia, pingua, fubrotunda, aliquando crenata, aliquando nbn crenata in margine, coloris obfcure viridis : flores in cauliculatorum fumms alifert caeruleos, feu violaceos potius, tetrapetdos, cum pluribus ftaminulis dilutius violaceis, quibus evanidis fubveniunt capfulx cordiformes, bifidae, » feu fepto medio feperate, prxdiftarum Veronicarum terreftrium more : radix fubeft Candida, longe repens, ex fingulis ejuſdem geniculis fibras demittens plurimas, ex quarum concurfu plurimi attolluntur caufes. Provenit in refidibus aquis & circa fontes, rivorum ac fluviorum margines. Junio, Julio ac Augufto flores, & confequenter capfulas cordiformes, longis fatis pediculis innixas proftrt. Becabuoga nominatur Germanica appellatiõne, à voce germanica #ae^tmgen & 25ung^e« mutata invocem Becabunga. Galli *Berk* nominant, unde & Berula Latine dicitur. Marcellus tamen Berulam dici refert, quam Gv- >. ""^ vocant.

2§. *Verom*^ Jca major folio oblongo, nobis. Anagallis aquatica major folio oblongo, C. B. P. Ana^llis aquatica minor, Ger. Berula major, Tab. Hæc Veronica aquatica floribus tetrapetalis & capiulis bivalvibus, cordiformibus, longiufculis petiolis pendentibus, eft or^nino priori fimilis; folia autem gerit longa, acuta, magis crenata; flores itidem tetraoetali multo dilutius purpurafcunt, atque hifce folummodo notis primo intuitu à priore rotunditolia diftinguit^ir. Exit itidem in ftagnantibus aquis, circa fontes, ac fluviorum margines. Junio, Julio & Augufto menfibus floret, & femina maturat.

26. *Veronica* aquatica folio fubrotundo non crenato, nobis. Anagallis aquatica folio rotundo nou crenato, C. B. P. Anagallis aquatica 3. Lob. Icon. Park. Anagallis aquatica altera, igd. Samuius. ValeFandi, J. B. Chabr. Veronica hæc aquatica pro radice habet fibras callares,* albas, ex quibus protruditur caul's pedalis, aliquando humilior, foliis alternim fitus, unciãmunamauc alteram longis, uncia latioribus, ex oblongo per extremum fubrotundis, glabris, neutiqnam in margine incifis, craflis, Centaurii lutei textura 3c confiftentia, formã quafi Bellidis, pediculo fatis longo, verfus extremum femper latiuſculo & fubrotundo: caulis furfum verfus in ramos crebros finditur, atque hi denique in alios minores, in quibus confpiciuntur flQfculi parvi, tetrapetali, albi; quibus fingulis fucedunt capfulae bivalves, fórdifo?mes, caeterarum fu^ fortis Veronicarum more, in binis lbculamentis fepto medio partitis continentes femina bifida. In aquofis Iſtriae obfervatur florens menfe Julio, ficut in aOuofis & paludofis plurimis locis Gallic.

27. *Veronica* aquatica anguftifolia miner Polygoni inftar, nobis. Anagallis aquatica anguftiffj'ia, C. B. P. Anagallis aqiytica 4^U Lob. Icon. Park. Anagallis anguftifolia, J. B. Chabr. Radices habet hxc parvas ex j^luribus fibrillis conflatas: caules habet pedales, fingulos, infciaum plures, furfum verfu^ plurimos ramufculos divifos, ad quorum fingulos nodos bma naicuntur ex adverfb jijilia angufta, in mucronem terminantia Polygoni, Sanguinaria diari aemula, trium quatuoive, aliquando unciarum longitudine, culmi comprelli lat^tudine,

nervo nnico pefniedinm currence ;cnonim finiWns fen alls cnafcuntur petioli fatis V
 fuftinentes floiculos ex*nii>c-lloa!bidos, tetmpewlos, quosfingulos deesduos fcqiiuntur
 p[ul£ bivalves, cordil'ormes, compreirafemina flava in fingulis valvulis continens, U, L I
 medio bipartiente duplicem feminum fulvorum verfiim, hincunum, illinc alterum. ¹¹
 aquofis provenir Helvetia;^ Gallijpque paflini juxca rivtilos, fegna, & inpaludofis&foTM/-
 ubi ftagnant aqni. Floret 2>fate cum casteris , & verfiis ejufdem finem femina fua **perncit**
 18'Pliinra htreroclitarotunditblia minus crenataBecabungJEfotiisperitopetalacapfula Atfincs
qninqnifida, hobis, rtec nova& inaudita planta partlciapat tolia Becabung#,*eYp"ftufam & **floroa**.
 Alfines quafi, made Alfinen aquacicam fofis rotund is Becabungs defignavimiis : caules proreru
 pedaks, fotundos, ad quorum geniculafingula proveniunt folia rotunda, glabra, lucida,
 minus crenata, quse primo incaica Becabungam ioliis fuis pinguibus glabri^ aemiibntur:
 infimmis vero caulium cymis oriuntur plurimi flofculi raro5f quafi fpicatum difpofiti, ^m
 tegri in hindo, quinqueforiam in marglne divifi, quorum fingulis iatifcentibus fuccedunt
 capluli quinqueforiam etiam in margine diftin&x , in quanim fingulis plurima rruica
femina, hifca, obtutum **qaafi&gieatia**, Alfines autSedi leminibus hand **diffimitia**. l'lanP
 eft heteroclitafui generis, fed propter conformitatem intoliiseandem adjunximus Veron'
 cis aquaticis, qua; perpcramauthoribus Anagallidesaquacicas dicuntur. Provenit fp^{onte!!}
 foilis prope FtochodochiumDivi Bartholomsi diftum,& prope pagum CotoIp primo lapjde w
 oppidoOxonio,aliifijue humidis locis fatis copiofe : detearuitprimoa/ffcotoBa^tT/ fi^{n0*}

1 TEMPERAMENTUM Sf VIRES.

vecon\czierrejlrk ferennU tahm is ficcith cum amaritudine est part kept, ac tuffi, incipi-
 tnti bydropi, indurate lien, ftranguri*, mfierum obftruffiombut, cecocbymU; virgbumf-
 dk coloribus confine traduntTragws, Lobelim, is? Dedont&s.' Tragit&Veronkamtotafia
 fubftantia amaram efe ait, eafdemqut fum Be tonka is Chamtdre facultatesobtinere ; atq; Teu-
 crittm vino maceratum is diftillatum mirablli is efficaciffima vi adverfus aerK pejiiltwn in-
 tempcrkm, is quafvis peflikntes fibres pollere; ad tadem etiam commendat hrbam in vino
 decoilam. Teucrium, inquit, pr<sterea vitiis lienis opitulatur, lienem tpfuiff potenter abfomit
 per aliquot dies ex ordine-ptum. Aqua Teucrifuillatitaper aliquot dies bints uncieh pota
 •oertigini auxiliatur, lentam inclditftu.itam, fanguinem purgat, flomacbum excalefad, me-
 atus jecoris aperit, fulmenk is limis vUia emendate venaspurgat, thoraci* rrofos burnos
 difiuit, nee non matricem is veficam emundatfordibm,fudoremist>enenu,n exp?Jht,regium\

*Ita dicitur in libro de calculo venarum de h. oua. alia sunt corporis istius bellentes affectiones, ut
 Pecoribus tuffientibu* pastores herbam in pufaerem reda&am cum fate exhibnt. Folia tit
 acete vel tufa, velcofia, per aliquot dies impofitd induratum lknem difcutiunt is <ibfumWt>
 Vficia Vmioli in pulvenm reda&a, ac in aqua Teucree Hquata, collutione futrida ulcer a,
 Ikbenos, firpigines, papulafque^ is alias quafvk jcabiespurgat is fanau . Idemfucctts lmb<£
 pr&ftat, vel per fi, vel cum alumwe, is ut pauch omnia condudat Tragic, Teucrium feu Ve-
 ronica non folum bominibw, fid is jumenth ad internm is extnnas affi&ioms utiUffimua
 remedium pcedat. Fuchfus ex amaritudine quadam isr vehementi affruffione, quam ingtftlt
 pr<e fifirt, calidam is ficcam efe Veronicam conjicit. Mirifice ad cruejita pufaera, &
 'ulcer a fananda conferre, fcabiei denique is omnibus cut is vitik mederi ait. Vide TraguW
 de cteris ejus virtutibus. Crato trium hperatorum Archiater Veronica textrafto contra
 pe/iem muitum tribuebat. Veronica ilia ejl optima qu<z ad radices Quercuum crefcit. Colli
 gittiT adufum Julio.*

2V Veronica aquatica major folio fubrotundo Becabunga diSta , nobb. Anagallis five Bccfi'
 bunga, her. Q^htatem ac temperiem habet calidam is ficcam, Nafiurtia aquatico firndeM,
 remtijmmn tamen: editur etiam in acetariis ut Hlud, & *J r^rm^i^ m^,n.^,^ •o_r-vi^o» W*
 tum 3CjeiKDuct& appellatum utilis qucque, eodem quo
 facultate tamen & viribus minus potens. Cum aceto & butyro tofta Becabunga, ac calida in-
 pofita is fubinde renovata, tumoribus quibufvU i« f
 Varies in magnoeft ufu , e£ nempe hi M/cutiemiit t.,
 aue id genus afeltibus curand_K utuntur tefle T ^{UHoy Jar">} »aaequow» J<-
 late. * Vide dtera ap*d Simcnem Pauli in f_m T £® "tigf* \$ «9" J* f' TMS
 Scbroderum ' ^{la° ^h-'Uopag.iit. clafis hr:}

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Ailorumque Authorum.

JH. Ag. 2⁸. col. 2. pi. vi., Chamcedrys Alpinafolia
ocatalis, C.B.P. Veronica pep. cutjefpervirens, >
ronce. Ibidem pi. vu. Cham/Mrys Alpina minima
hirfuta quarto loco in Jhtifromo dejeripta a Cajb.
Bauhino. Ibidem pLs\ ChamceUrys Aujlriacajh
his tenuijime laciniatw qua fecund* in Prod. C. B.
Ibidem pi. x. Chamcedrys Hifj>*nica foliis tenuijime
divtjis qua tertia in Prodr. C. B. Ibidem pi. xi. Chan-
t adrys Jjuria major latifolia, C.B.P. Veronica
maxima, Lugd. Ibidem pi. xii. Chamcedrys fpuria
major alt era five Jrutefcens, C.B.P. Teucrium quar-
twn, Cluf Hijt. pag*²49- coL i. pi. xiu. Chamce-
drys fyuria hederacea repens fivefcutellata repens,
C. B. P. Chamcedrys hederacea in catalogo Altroff.
Ibidem pi. x*v. Chamcedrys jfturia major angujti-
foita?NB.P. Charicedrys filveJlris,T>od. Ibidem pi.
x\;. Chamcedrys Jpuria minor rotunctijolid, C.B.P.
Teucrium tratense, Ad. Lob. Chamcedrys filveJlris,
Cluf Hijt. Ger. Ibidem col. 2. pi. xv/. Chamcedrys
jburia minor latifolia.C. B. P. Teucrium ^CluJ.HiJl.
Ibidem pi. xvii. Chamcedrys fpuria latifolia mini-
ma, C. B. P. Veronica tetragona montanaretila mi-
nima* Colum. Ibidem pi. xix. Chamcedri fyurice affi-
nis rotundifolitt fcutellata> C. B. P. Alyfium Dio-
fcoridis montanum>Colum. Omnes hceplantce fupra
ci^atce male a Cajparo Bauhino aliifque authoribus
pro Chamcedryos fpeciebus hie recitantur, £? inter
Chamcedres collocantur, cum fnt plantce Jiliculofce
tetrapetalce bicapfulares^quce adVeroniccc claffem iu-
re pertinent j Jferonica enimerunt tejjerant, flotes
jcilicet tetrapetalos, & fliculas bicapfulares, Jfe-
ronicce verce & genuince mores nee Chamcedryos Jpecie
accenferi debent, cum nee fnt galeatce, nee verti-
cillatce, ut infrapatebit latius, cap. de Chamcedre,
Se&ione oftava.

Pag. infuperli^fi^col. ifpl.v. Chamcedrys Alpina
Cijli jlore, C.P^ Chamcedrys montana frutescens
durior, Ad. Lob. Cum hcec plantula nee florem ga-
leatum, nee capfulas feminales verticiliatcu gerat,
Chamcedrys non p^teji dicis ergo graviter primo la-
p/w eji Lobelius, que?n omnes reliqui authores cce-
cutientes fiunt Jejiuti; cum autem florem ger at
quinque aut lex petalis alb is conflatum, cingenti-
bus Jlamina plurima in medio, cui evanefcenti
fuccedit globuhs hirjutus admodum Caryophyllatce
modo, ergo magis appojite mea fententia appella-
bitur Caryophyllata Chamcedryos folio duriore, fe-
quendo duftum naturce, %c?i aut bores nimium negii-
gentes in examinatioibis fuis, pla?itarum, qui-
que num rite, an feciis> nuncupentur, parum conji-
derarunt hucufque.

Pag. ititkin 248. col. 2. pi. ym. Chamcedrys uni-
caulis fycata, C.B.P. Trijfago Apula uncaulis,
Col. Plantula hcec florem ger it galeatum luteum,
fed ccipfularn non habet Galeatarum plantarum mo-
re, id eftquinquefariam in marginedivijam £? qua-
terna fe'thina in fun do \$ ergo non eji Chamcedrys
proprie diUa: cap'i'ulam emm pojlflorem galeatum
evQniduni & femina ibidem content a Euphrafce
?nore^ writ, ergodebet adEuphrafce clajjem reduci,
fj n em admodum nos precejlabimus SeUione oftava: ap-
pelleimr e'fio ILupWaJia Jpula tnicat^lis 6? tolletur
l'as authorum, Cofamnceprimum, chihck reliquo-
r'ap/imordicus adherentium. ^yca graviter la-
junt 'authores he in loco/cut ^ultoties, alibi,
is librum, nature evolventi & e:pminanti dare
J^*is apparet.

Pag. 250. col. i. pi. I. Alfine Hederulce folio,
C. B. P. Ibidem pL 11. Aljine p'eronicce foliis flo-
fculis cauliculis adherentibus, C.B.P. Ibidem pi.
111. Aljine Chamcedryolia flofculis pediculis oblon-
gis infidentibus, C. B. P. Ibidem pi. iv. Al/ne tri-
phyllous, C. B. P. Hce quatuor plantulte notam Ve-
ronicce effentialem habent, nempeflores tetrapetalos
& fliculas bicapfulares, ligula feu Jepto medio di-
Jlinguente dupiicem verfum Jeu ordinem feminurn
ergo funt verce G? genuine Veronicce Jpeciei > idcirco
?ios eafdem hue reduximus ad (ibi fimUps & con-
fortes planters, appellando Vëronicas terrejhes an-
nuas, non autem reducendo ad Alfines genus, cum
omnis Aljine proprie loquendo fit planta pentapetala,
feu quinis petalis fnguliflores Alfines conjtent, ad
medium bifidis, & flonbus (ingulis deciduis fuccedit
conceptaculum unicapfulare,pyrifforme utplurimum,
aut oblongumjontinens plurima Jemina immuta am-
bientia Jtilum nutritivum; ergo hce plantce male ab
authoribus ad Alfines genus rejeruntur cum ejus
notam nonpojideant,fea?Veronica; idcirco aptius Ve-
ronicce deniminabuntur.

Pag. 252. col. I. pi. It Anagallis aquatic a major
folio Jubrotundo, C. B. P. Ibidem col. 2. pL 11. A-
nagallis aquatica minor folio Jubrotundo, C. B. P.
Ibidem pi. 111. Anagallis aquatica major folio ob-
longo, C. B. P. Ibidem pL vi. Anagallis aquatica
folio rotundo non crenato, C.B.P. Ibidem pL vn. Ana-
gallis aquatica angujh'ofia fcutellata, C. B. P. A*
nagallis aquatica angujh'ofia fcutellata, C. B. P. O-
mnehce plantce, cum flores ger ant tetrapetalos, flicu-
lafque bicapfulares, fepto medio dirimente dupiicem
feriemfeminum Veronicarum more, proculdubio Junt
accenjndce Veronica aquaticce ex libro natura
ratiocinando y non autem fub Anagallidis aquaticce
nomine militare debent, cum Anagallis proprie
loquendo fit planta pentapetala cujus capfula eji
rotunda fne jepto medio, ui clarius infra patebit,
SeUione quint a. Collocentur ergo inter Veronicas
6 tolletur lap Jus Bauhini alior unique authorum, ante
ipfum, 6pojifpumjeribentium. Quam enim habent
affinitatem cum Anagallide videant oculati Bota-
nici, ratione duEli, & diligenter examinent quce hie
(3 alibi dicimus Jecundum veram (3 reflam regu-
lam a natura datam. Quod ad meipfum attinet, nul-
lius teneor jurare in verb a magijiri-> (j omnes quot
quot funt, errarunt, ut dare cernitur, nolite cum
tpfs amplius err are: amicus Tbeophrastius, amicus
Diofcorides, & neoterici omnes Botanici amici, Jed o-
mnibus nobis magis arnica erit veritas.

Pag. 2/2. col I. pi. I. Anagallis aquatica major
folio jubrotundo y C. B. P. Berula five Anagallis a-
quatica, Tab. Anagallis five Becabunga, Ger. Ibi-
dem, Anagallis aquatica minor folio Jubrotundo,
C.B. P. Anagallis aquatica minor, Tab. Anagallis
aquatica minor flore pallido, Ger. Hce duce plan-
tce, cum in nullif Juis partibus diftinguantur niJblo
& Iceta nutritione, neutiquam conjlituunt Jfecies di-
Jtictu ergofrujha multiplicantur entia ab authori-
bus fine neceffitate.

Ibidem pi. in. Anagallis aquatica maj or folio' oh-
longo, C.B.P. Aquatica, Ger. Ibidem pl. iv. Ana-
gallis aquatica minor folio oblongo, C. B. P. Aqua*
tica minor 2., Tab. C? aquatica minor, Ger. Hce duct
itidem eodem modo jruijra pro (tuabus Jfiecibus a
Cajp. Bauhino cceatenjque authoribus obruduntur;
cum a natalibus magis uliginofis, nu?ic majores paulo,

niinc minores conficiuntur, non debent accenferi . I multiplicant entia fine necejjitate. ftecies dijlinUa: & _ ideo jalluntur author es dum \

' SILIGULOS i

Tetrapetalae bi&ipfulares.

POLYGALA TETRAPETALA .

C JTVT XXVII.

11 o\ya\ n frutex brevis efl, palmi altitudinem petens, foliis LavenduU, gufiufubacerboC^ firiRoPlinio)fotus laftis abundantiam facer e creditur, unde nomen habet, Viofcoridi I.4* c. 142. Plinio I 27. c. 12. Sunt quino/tram inhlkxiſo velint, cum nofra potius ddOnohycH-dem Diofcoridis referenda videatur.

Polygala eft vox r TM Au<r^@:, vel fignificans Legumenalatum feu ^ Act^tf*: Aoy, ^Aw5<< Aovd^um vel Onobrychidem, de quibusegimuscap. VI. paragrapho 2. ^7. vel ett planta tetrapetala filiculofa bicapfularis, de qua agemus hoc capite.

Pars TABUL ^ XXIV .

{Csruiea. 0
Violacea. 0

Polygala tetrapetalafili-
culofa bica-
pularis } Longo iff an-(i.Mawr,nobps. Polygala vulgaris major, Cluf.Hift.GxCinerea. 0
gup folio <. f 2. Nobis.Polygala vulgaris minpr,Cluf.Hifi. Rubra. Q
MinoA }
3. Lutea, C. B. P. Lugd. 0
Alba, 0
j^, fr^i & latofolio Myrti inftar, nobis. Chamxmyrfine Hift. Lugd. 0

Explicatio partis Tab. vigefun<£quart&.

1. **P**olygala tetrapetala filiculofa bicapfularis longo angufto folio major, nobis. Polygala vulgaris major, Cluf. Hift. & Pan. Polygala major, Tab. Park. Polygala major flore czruleo, Ger. Polygala major duplex, J.B.Chabr. Polygalx appellationem apud plerofque recentiorum authorum etiam obtinet plantulahaec (valde tamen diffimihs eft Polygala? inter Legumina nobis defcriptae cap. VI.) ubiquefere in ficcioribus pratisobvia: foliis eft Lini feu Hyffopi anguftifolise vulgaris, quae eft vel flore caeruleo, vel purpureo dilutiore, vel rubello, aut interdum etiam albo variare conſpicitur. Gefnerus ab amaritudine Amarellam appellavit- Tragus Diofcoridis -mxvyyx.x^ & yA«Wefſe exiftimat. De majore elegantiflimo quod in Auftria & Pannonia fuperiore obſervavitCar. Clufius, tameditotflorum colore difcreto paffim in iifdem provinciis nafcatur, primo dicemus. Ex eadem interdum radice prodeunt quinque aut ſex virgute duriufculae, vix pedales, graciles, lentas & obftquoſe, foliis nullo ordine difpoſitis obſitx, anguftis Floris tin&orti, aut Hyffopi vulgaris anguftifoliae & minoris qux ab Hifpaniis VJfopillo vocatur, foliorum aemulis. Flores confertim & fpicatum nafcentes fummasvirgulas occupant, Fumi terrae floribus non multum abſimiles quoad difp>ſitionem> longiores tamen, & dilutionis purpurei coloris elegantiflimi, five dilutiore rubro pulcherrimo
ST cet cordu?^11^/00111^11 ^T c. apfulce P^duk, planae, Burſe paſtoris fimi-
In 21. bicapfulares, duabus valvulis membranaceis conſtantes feotonie-
dio lemmahmcindefeparante (quemadmoduminnr*Hiftis omnihnqfir.^il . 1 P. rnn-
tingit) nigricantia, longmfchuh,\ux aperientibm LI Td h7rzi filiculofis. P la n t i s ^ s
decidunt: radix craffnfcnla, brevis, lignVvi'J ,, la v f nwtuntate bnfol<
amaricans eft. Freqnens admodum eft in S S f f i ^ ^ ^ ett *i tOW P p h ?
totaq; ilia montium lerie qoza ^ r t w ^ D a X ? 9 f T a * * cir^a * wttlljJ
ufque Alpes excurrit. Nufquam non occuni, imminenr ad Auftriacas
Dravumrlumtn. FloretMaio&Junio. Alinn^: P^ PanRoniam etiam interamnem, ultra
fed cicurari non vult. T otlesob florum -enuftatem tranſtertur in.hdr<IS

2. Potygalatetrapetala filiculofa bicaT)fnlnc 1
is " 101<riS 10DE/O ^ nnnnr . V . i- Polygalu
U^o oc anguile oho minor, nobie. vulgari

Vtilgaris, C. B. P. Polygala vulgaris minor/Cluf.Hift. Polygala recentiorum, Ad. Lob. Flos Ambervalis, Dod. Amarella, Gefh. ep. Polygala minor, Park. Polygate huicquese flos Amfce/valis Dodonaeo dicitur, perquani tenues fed duriefculi funt colicuji, palmum aut femipe-
 <an aliquando longi, plurima parte procumbentes, *aut humum verfus reclinati, qui fbliolis
 ^o Siveftiuntur exiguis,, oblongK acuminatis, foHis feualis Leijpium fimilibus, fed tamen an-
 guftioribus: flofculi tetr?.jSetali in fummis çaulium faftigiis f5icatim proveniunt exigui, pen-
 duli quandofuntexpsiiifi, colore velViotefaturato-purpurafcentes, vel dilute rubri, velcan-
 dicli, odore car^tes; quibus fingulis foccedunt valvute bicapfulares, minores quam func
 thecaeBurfae paftroriae, tenuibus membranulis utrinque valde minutilis ftipatas: radix dura,
 lignofa & tenuis, reftibilis eft & de novo fingulis annis regerminans. Nunc in collibus herbofis
 qui aratro profcinduntur, nunc in novalibus & filvofis; pafiim in Gallia?, Germanise, Belgii &
 Anglic regionibus, Ixto ac mediocri foio, gignitur. Floret Maio meafe prxcipue, aliquando
 frtius: pertotam aestatem florens& femem perficiens reperitur. Flos Ambervalis dicitur
 ^Dodona^o, & Germanis Creufii3iumfl)i«
 id eft Ambervalis flos. Siquidem fie appellari
 contingit, quoniam fefto Ambervalium pr^cipue vigeant hujus flores, ac ruficae virgines
 ex his plerifque in locis corollas fibi neftant. Ambervalia autem fefta funt qux Romana
 Ecclefia Dies.appellatrogationum.Germanis CreuMagcn dicitur,tunc enim arva aiacerdotibus
 & populo luftrabantur, qui mos etiamnum durat per totam pzene Europam. An laftis abun-
 dantiam facerepoffit hæc plantula, dubitatur: cum enim apud Diofcoridem & Plinium bre-
 viffima Polygak extet defcriptio, quid hie, ficut & alibi, affirmandum incertum: verofimilius
 eft Polygalon Legumen diftum (de quo cap.VI. Seftionis fecundae traftavimus,) erTe verum Po-
 lygalon.

3. Polygala lutea 4. Dalpⁱ Lugd. & C.B. P. In nivofisjuræ montis cacuminibus profilit: radice conftat crassa, fpiffa, lignofa, brevi, candicante: cauliculis perquam multis, pedali-
 blis: folii? Lini anguftioribus, longioribus, inxquali pofitu è cauliculis prodeuntibus: flore
 conftat luteo copiofo, parvo, in fummis cauliculis nitente. Herba rara eft, inquit Dale-
 champius, vix alibi quam in fuperiore loco viva.

4. Polygala folio brevi rotundo Myrti inftar, nobis. Polygak affinis, C.B. P. Chamae-
 myrfine quorundam, Lugd.Hift. Polygala hæc convenit cum pnediftis floribus & capfulis femi-
 nalibus bivalvibus, fepto medio feparante dupiicem-feriem feminum, hinc unam, illinc alteram;
 nee aha ratione diftinguitur, mfi quod folia projlucet brevia & rotunda «Myrti inftar, fed
 minas acuminata. Etiamfi Dalechampius floribus fex petala aflignet, quatuortantu«ienu-
 meraffe debuit.' ' Crefcit in altiilimorum montium fuperciliis. Floret tardius duabus prioribus,
 aft eodem tēnōre cum lutea Polygala Dalechampi.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINJI

Aliorumque Authorum.

Nota Cajparum Bauhinum male Polygalam ni-
 vearnj'eu Polygalam repentem, Lob. Ludg.Tab.
 Ger. collocajje cum PolygalispradiStis tetrapetalis (3
 capfulis bivalvaribus donatis \$ cum Polygala repent
 {male itidem ab authoribus repens adjiciturjumpro-
 cumbens dici debuit) nuperorum Lobelii Z3 catero-
 rum auctorum Jit Herniarice Jpecies ideo eo debuit
 referri a Caj] >. Bauhino, non hue inter toto ceclō di-

verfcis ab ipfaplantas. lolygalce tres figure ti LQ»
 belio exhibentur pro una \$ eadē Polygala diferente
 tantum coloreflorum ^item & author Hort. EyJL &
 Gerardus binas exhi bent figures pro una G? eademjpc*
 tie differ ente florum colore j ergo frujira funt ab zpjir
 exhibits plures Iconcs, ficut alibi inepte ab authorv-
 bus jit.

A P P E N D I X

Ad Secciónem tertiam plantas fcilicet filiquofas & filiculofas continentem.

CJTVT

XXVIII.

I. "O *Hapbaniftrum* monofpermum capfula capitati & aculeatâ adinftraroftri aviculae, nobis.
 _] \ MyagnuiLcx Sumatra aut Soriacapfula fpinofa adinftraroftri aviculae, Zanoni. Hoc
 R=aphaniftrum monofpermum folia protrudit finuatâ denticulis quibufdam eminentibus, Myagri
 mponofpermi Cafp. Bauhini foliis familia; inter quæ exoritur caulis unus aut alter, interdum
 plures, palmares aut (elquipaimares, tenues, rotundi, lenti, cortice argenteo teai, nodofifeu
 geniculati, ex quorum fingulis geniculis unicum exit folium, inferioribus quoad figuram fimile,
 led^minus, prona parte cavern, fupinaconvexum, cum nervomedioprotuberante: in fummis
 csmlibus apparent fioresalbi, plumo/i, quatuor fibrofis petalis conftantes tam fnbtilibus, ut
 -vixmicroTcōpioanimadveJlH^poffint: quibus fingulis cadentibus verfus fmemjulli fuccedunt

capfulx rotundas cum rofiro in aculeum acutum terminante involucrum feminis, quæ
 avicula caput cum rofiro refert: involucra fingulis rupta fuggerunt unicum femem minutum
 luteum, rotundum aliquando, aliquando ovatum, adinfar aliorumfeminum Raphaniflorum. UH
 monoïpermorum à nobis fupra defcriptorum paragrapho tertio cap. XIII. "Seftionis terije.
 Non funt Myagra dicenda magis quam hoc hie defcriptum, aim Myagram proprie loqaenur
 fit planta filiculofafeptomediombranceo diftinguente duplici feriem feminum, atque
 hæc planta & reliquæ loco citato defcripta, conihnt filiqua fungofa, unicum in fe femem conti-
 nente; ergo aptius Raphaniftrum monopermum cfenominabitur quam Myagram, ficut & re-
 liqua Raphaniftra itidem, propter rationes" iupra allatas in Hallucinationibus pag. 268 h<J^{us}
 operis.

II. *Thlafpi* Rofade Hiericho diftum, nobis. Rofa Hierichuntea vulgo dicla, C.B-P. Rofa
 de Hiericho & Rofa Maria? Monachis, Hift. Lugd. Rofa Hiericontea, Tur. Lon. Lob. Hæc
 fpios fpecies affurgitat altitudinempalmarem, aliquandoaltiore. * ramufculi feu furculi im-
 mediate ex radice tenui, interne fibrofa, fuperne fan's craffa oriuntur, in alios plurimos ramii-
 fculos brachiati, atque horumfingulisgeniculisifingula adherent folia, oblonga, angufta, Olea:
 fbliorum aemula, inque alis fingulis rlofcuios fingulos protrudit tetrapetalos, ex herbaceo co-
 lore albidos: quibus fingulis fingulis fuccedunt capfulæ feu filiculas bivalves, continentes ie-
 mina aliorum Thlafpi'n more (ubruffa, moderate calida. Quo jure hæc plantuladiciturRofa
 ab authoribus, non poffumfatis affequi; nam primum hujus plantae denominatorem aut fabrum
 forceps autarsignaraiellit, dum Thlafpi cude.re debuitcuditRofam cuinihil fimilis, &/
 qua toto coelo eft diverfa planta: atquicum fittetrapetala filiculofa, juftiore titulo m^a opi-
 nione, ad fuas con fortes hie contentas plantas revocabitur. Poft exficcationem folia huns
 plants decidunt, remanentibus virgulis ramofis, lignea fubftantia donatis, quibus exficcatis
 & Ericæ in modum induratis, adnafcentes confpiciuntur filicuk bicapfulares; virgulæ fic-
 iiccatxglobatim&fineordineinfecomplcanturreticuli in modum cavitatem inTnedio feu
 interius relinquentes, exterius vero convexitatem- Hanc plantam reperit Rauwolfius in Arabia
 deferta ad litora Maris Rubri crefcentem in fabulo. Provenit etiam in Syria; in^{te}&is & ruderis
 bus illic invenit Rauwolfius. Bellonius reprehenditMonachos qui fuerunt authores denomi-
 nationis hujus plantas, imofuperititienis, cui apudvulgus muliercularum obftetricum in hodie-
 numufque diem eft obnoxia. Primo circa Hiericho nuquamapparet, teftè Rauwolfio, itidem-
 que Petro Belloni* Cenomand, atque idcirco illud facras Scripture, *Sicut plant at io Roj <z in Hi-
 ericho* falfo huic plantas accommodatur, cum intelligendæ potius fint Rofæ aliogpin appellate
iiurx vel punicese, & ideo faifum. iimul& fuperfitiofum hoc nomen a monachis inditum. Im-
 poftores monachi, ut ait Bellonius, hanc plantulam Rofam Hierichonteam appe'iarunt, quia
 planta hæc diu exficcata, fi poftmodum aquæ imponatur (propterea quod omne ficcum ap-
 petit humidum) fepe paulatim explicat, quod tolerabilis impoftuis? praetextum dedit, atque
 fpeftantibus admirationem induxit, dum affirmant hanc plantam in vigilia nativitatæ Do-
 minicæ duntaxat aperiri, vel mulieribus partus difficukate laborantibus. Aut monachi hujus
 naturam ignorantes aut de' induftria fuperftitione inebriati fcire nolentes, alio tempore non
 poffe aperiri exiftimant: fed longe falluntur, eorumque fine ratione nimium creduli fequaces,
 ut cuilibet obfervanti clare apparet, non folum in hac, fed & in aliis cum plantis, tum earum
 feminibus, ut Geranii feminibus exficcatis, quæ quocunque tempore madefacta f*e* dilatant
 & extenduntur fine fuperftitione ulia.

III. Minor ejus fpecies iloruit nobis anno elapfo in hortopublicollniverfitatis, nata ex femine
 Venetiisadnoſmiffa. Dicitur Rofa Hiericontea filveftris, OB. P. Silveftr is fpecies Rauwol-
 fii, Cam. Vide Icones harum ad App. Tabularum.

TRJ'APStI LAKES HEXAPETAIA

Section 4^o Tab 1^o

1. *Aphodelus maj flore albo ramosus*, L.B.

Radix I-JAJU ilutibuj, pvisBmuh' >> Mum apicem congestis Pradite.

2. *Aphodelus maj flore albo non ramosus*, L.B.

Aphodelus flore rubro, Lob.



6. *Aphodelus luteus tiankradict*, CRR

iffipiutrhu minnr fol. fistuloso, L.B.

7. *AfylwMtu txArui A/mrtw*, Swd.



?H*Ua, l&.Mabn/ainimtmjBS, £3Jk

9. *Phalangium parvo flore ramosus*, C.R.F.

10. *Phalangium parvo flore non ramosum*, C.R.F.



Affpung Clarissim' xxi Don. Georg' Est.
Equiti sacre' theologiae Palatinarum
Academiarum Præsidi dignissim'

Hon. Fred. Vauhauz sculp.

TRITICAE PSILLARUM HEXAPEX. V.L. &

1 *Crocus sativus floreus & sine flore.*

* < *seor. syl. aatannahijm.*

2 *Crocus vernus fl. purp. magno. C.B.P.*

3 *Crocus vernus latifol. fl. purp. magno. C.B.P.*



4 *Crocus vernus latifol. albus variegatus. C.B.P.*

5 *Crocus vernus latifolius multi. floreus. C.B.P.*

6 *Crocus vernus latifol. flavo flore variegatus. C.B.P.*

7 *Crocus vernus latifol. flavo fl. dupli. fl. C.B.P.*



8 *Crocus vernus Meriacus fl. aureo. Theat. floz. Parvite.*

tortv^m/ rtrnmi aqnfirfitiuij

nCracus vttia aiuru/hfp/itv. i*Cn>a» lunrtu (<, ft.-

C.B.P.



Handwritten text in a cursive script, likely a dedication or a note related to the illustrations.

TRJCAP5U LAKES HEXAPETALA

Tab. 3. Section 4.

Colchicum commune, C.B.E. cum cap-
itulo barba. *tct tubatffa.stifra.*

i, ('jlehtttm biflorum, A. J. f.

Colchicum kutimfrit iltiua-fa\$jtorr,
BtC&ftjWu rrttri,yii%om plittm .


*Colchicum candidum mul-
tiflorum*, C.B.E.



Colchi
a,
rnm.PotmifAf.1 futi<

ffltwn
ir itt'Yirs
Qakhiaan Btz.t'tituim AJKUMIUF
tatifabsim figrau,tJux. fail

«
C'Mn.uin •ityttn Hum.
tuiqtwij, it.tiutumnf < tfl



8. *Colchicum angustifol.* Gallicium,
leb. ad part. 2.



9. *Colchicum variegatum plena
flore*, C.B.E.

10. *Colchicum fl. pleno
& rubra*, E. J. f. v. r. c.

11. *Colchicum*, C.B.P.

12. *Colchicum luteum*, Job. Colchico-
marcisus autumnaliq. luteus, nobis.



Alexisii Clarissimi viri D. Alexandri Fossier
Episcopi Baroni & Secretarii D. D. D. D. D. D.
Secretarii in aula Magnificae Regiae
Universitatis Archiatrum Ordinis, nec non
Collegii Regii Medicorum Lipsiensium, Prof.

Him fr.J VanhrvJrmif.

1. *Gladiolus maximus flore rubro*
varietate, *Fremont. bona spec.*
Swer.

s-i fminui. /rrr.
2. *Gladiolus ibiza*
nus atropurpureus, Swer.

Section. 4.
3. *Gladiolus flore albo.*



4. *Gladiolus major floribus uno*
dispositis, C.B.P.

5. *Capitulum cum*
seminibus
6. *Gladiolus utriusque*
coloris, C.B.P.

7. *Gladiolus Indicus & violaceo*
natus flos Indici & violaceo



Goussier delin.

J. Schenk del. Danho sculp.



TRICAPSULARES HEXAPETALA.

Section 4 Tab 5.

1. *Dianthus barbatus* rotundioris a folio
 C. H. P. Nov. 1699. p. 10. Clus. Hist.

2. *Dianthus barbatus* angustioris &
 longiore folio a B. G. Clus. Hist.

3. *Syrinchium aspreum*
 angustifolium alterum, Col.

4. *Syrinchium alterum*
 latifolium, Col.



1. *Dianthus barbatus* Col.

2. *Syrinchium matius* Swer. Eyst. Dod.

3. *Iris tuberosa* fl. obscure
 viridi colore, Swer.

4. *Xyris mathi* spatula fetida,
 Eyst.



1. *Zoster fl. alba* Swer.

2. *Iris latifolia vulgaris*
 corulea, Eyst.

3. *Iris florentina*, Eyst.

Iris tuberosa Belgarum
 Lobi capsula aperta.

Syrinchii radice
 tuberosa ficta



Auspicio D. Guilielmi S. June Co. Hffii mr & K i rom
 Lond. nesciam

TRICAPSILARES

Iris *Suina* *Toma*. eimo, walbe
QCBP

f. Irit Asitifien *cxrulfu* polyantlmt
CBP

K JmDaknati
si mitorflure pur
pauo d'itiorv, i B



Iris latifolia Pannonica, colore
multiplici, C.B.P.



to. Ins lati folia. Candida, pur-
putm oenis d)J)'mcte, CBP



a. Iri f poiutlris lutto, s A
'aJutterinur, I B •



Iris pratensis andurata
folia fetido, C.B.P.



i^In* prufnus anbufN<>NQ
foida alior. CS?



if. Ckarmnritji-puifum Jiatxf
tfChatrutirt* m
pura CBF)(K/i«ft)ⁿ



Gvil-Sonmans delta.



Rok. Mhils frulp.



Auguſti Clarif. ſcri Johannis Machlſch
Medicorum Londiniſtatum S. 164



TRICAPSULARES. HEXAPETALAE.

16. Iris angustifolia, Tub
lenuff. Jria, Ger.

1. Iris bulbosa latifolia, J. Bur
hiff.

4. Iris bulbosa elegantis pericor. flor.
de Bry. parichala præca. fer. d. etc.

3. Iris bulbosa Anglica
latifolia. f. flor. alba. Siver



2. Iris bulbosa fol. cepacea, mar
tialis fl. pu. p. inodora. CBP

6. Iris bulbosa fl. luteo
aeruz. leo, de Bry

co. Sc J. Jrit-bulbosa oericolor S. Ins bulliesia
angustifolia flore
eno, Siver



5. Iris bulbosa fl. fwi jiorr. Ctus-
tuff.

te. lnti>ull>t>ta lufta. mixla. Euft

tt. Iris buibosa angustifolia fl. albo, Eujt



Anno 1714. J. Burkhart Guldend
Collegii Medicinæ Londinensis. Scud & Elst.

Sarum de Len.

Ab. Blooting julp.

TRICAPSULARES HEXAPETALE.

Section 2. Tab. 8.

Narcissus nivorus odoratus circulo
rubello, CBF.



4. *Narcissus orientalis major* Poly-
anthes. petal. albus, Eyst.



Narcissus calcei fimbriatissima
crotchi, Eyst. Darius norbandob.



Narcissus D. *terrestris* Polyanthes
totus luteus, Eyst.



5. *Narcissus juncifolius* pretiosus
major, Lvert.



6. *Narcissus major juncifolius*, Eyst.



7. *Narcissus juncifolius*, CBF.



8. *Narcissus albus* maximus
radice lutea, Lvert, Eyst.



Narcissus albus radice lutea,
mystrois idore, CBF.
Pseudonarcissus albus cultivatus,
Eyst.



9. *Narcissus*, et. *pallidus*, radice
lutea, CBF. *Pseudonarcissus* lutea albus,
Eyst.



10. *Narcissus*, et. *Eccebatensis*
lutea coronata, Lvert.
scrip. Eyst.



11. *Narcissus luteus* maximus
Pseudonarcissus luteus, CBF.



Guil. Scaumans delin.

Robert White sculp.



Asplius. Clarissimus Dns. Bona
Thoma. Casa Collegii Medicorum
Lundensis. 1711.

TRICAPSULARES

PETALÆ bulbosa calidæ & creta 2-bulbosa caliginaria

Section 4 Tab 15

fi Atllumfsium aftrittit sjllifpr-ntmn .nuk,

AMutrpüirra cgpñh faUofalmtr
tSeStü auCBJA
praxi hkPIX orodopranum K.Ha.hij

DdStadjntrum *OuthiJ}



14. *Allium palustre latifolium* nobis syl-
latifolium. CBP *purpurinum* math. Clus-
luga *arsinum latifolium* lobkorn lugd.
15. *Allium montanum latifolium*
maculatum. CBP *banquinum*
math. lugd.
16. *Porrum commune capitatum*
CBP *commune* math. yulg.
17. *Porrum* Dod.



18. *Porrum latifolium* CBP *sectivum*.
Dod. *sectivum capitatum* math.
19. *Porrum* *brincarium* CBP *ape-*
laprasum math. lugd.
20. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
21. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
22. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
23. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
24. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
25. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
26. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
27. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
28. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
29. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
30. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
31. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
32. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
33. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
34. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
35. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
36. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
37. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
38. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
39. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
40. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
41. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
42. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
43. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
44. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
45. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
46. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
47. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
48. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
49. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
50. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
51. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
52. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
53. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
54. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
55. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
56. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
57. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
58. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
59. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
60. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
61. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
62. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
63. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
64. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
65. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
66. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
67. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
68. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
69. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
70. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
71. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
72. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
73. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
74. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
75. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
76. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
77. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
78. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
79. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
80. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
81. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
82. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
83. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
84. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
85. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
86. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
87. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
88. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
89. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
90. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
91. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
92. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
93. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
94. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
95. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
96. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
97. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
98. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
99. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.
100. *Porrum* *fil. geminis capite* CBP *medoprasum*.



Hubertus. utrum Lovi. -wi. sapidat.
Aspicis Classe. nri. D. Iohannis Betti. Collegii
Medicorum. Landavensium. fecit.

TRICAPSULARES HF.XAFKTA/L r**tm bulble jini JurM^'ratin*ri**-

1. Moly latifolium Hispanicum, CBP latifolium, Eyll.



2. Moly latifolium latum odor. Allg. CBP Moly montanum latifolium flavo flore, Cluskius app. altera.



3. Moly latifolium latum odor. Allg. CBP Moly latifolium flavo, Eyll.



4. Moly scabrum flore albo, CBP Moly flabrum, Cluskius app. altera.



5. Moly angustifolium umbellatum, CBP Moly Divoridix lob. Leon. Clus. hist.



6. Moly atropurpureum, Sw. eri.



7. Moly humile folio Gramineo, CBP Cham. Moly an Moly dissocordis, Col.



8. M. kmw in caule tripartito CBP in caule tripartito, Pomerje, Roma Itali.



9. Moly angustifolium floribus majoribus, CBP Moly nana Clus. hist. minimum albo flore, Sw. eri.



10. Moly angustifolium foliis reflexis, CBP scapellum vocatum, lob. hagd.



11. Scilla vulgaris radice subea, CBP Scilla Gmra G. G. math. Bucenatum, Clus. hist. lugd.



12. Scilla radice alba, CBP Hispanica, Clus. hist. lugd.



Guil. Sommaria delin. 1683. Huk. Sont. Oth. in L. eadem. scapellum

Amosio Clus. hist. D. P. in B. Bar. Col. leg. M. 2. in L. eadem. scapellum 2. 1683

x Orrtifo(>t!iui nirdiutn, Eyfi f-Qmilhotattimtinnum-

7 Ornithogalum angustifolium crassiflori
Surcalbo varicentibus C.B.P.



B&rmshogi lani excolica

Flitr mnivrx itiaaf oXR-P-

Hjtjcinka arsomtnDrmltc^UJUii-

10 Ornithogalum latifolium foliencuri,
nob Moly latifolium Indicum squarrosam



11 Ornithogalum latifolium bulbiferum, nobis
Moly Indicum, Clar-hiff.

12 Ornithogalum luteum, Sver-

13 Ornithogalum angustifolium Campestre
luteum inimumm bulbiferum, Col



14 Ornithogalum latifolium

Rak 11616 fely

Aut picta Clara J. Duc Duc: via 11616 fely
Medicorum Londinensium Sicut

TRICAPSULARES HEXAPETALAE, radice bulbosa prothibeseo calmaria bulbosa

1. *Cepa virgata rotunda* Dod.

2. *Cepa oblonga* Dod.

3. *Cepa Ascalonica*, Matth.

4. *Cepa scabra* *bulbosa* *rotunda* *Schwarz*



1. *Allium rubentibus* *nucleis*, *lob* *Iron*.

2. *Allium montanum* *bicomis* *fl* *caeruleo*, *CBP* *Elm* *Moly* *montanum* *S* *Chur* *hist*.

3. *Allium montanum* *fl* *caeruleo*, *CBP* *Moly* *lurido* *colore*, *Sever*.

4. *Allium montanum* *rotundo*, *CBP* *Elm* *Moly* *montanum*.




5. *Allium montanum* *bicomis* *angustifolium* *fl* *purpureo*, *CBP*.

6. *Allium perpusillum* *junceifolium* *molli* *chatur*, *Lot* *Moly* *molli* *chatur* *capillares* *folie*, *CBP* *Prod*.

7. *Allium sphaerocephalum* *bifolium* *Italicum*, *IB*.

Radix *Allii* *vulgaris* *integra*, *epidemi* *aperta*.



Cepa *Schwarz* *Ado*.

Allium *perpusillum* *junceifolium* *molli* *chatur*.

Asperius *Clarke* *1756* *Edwards* *Gann* *Equi* *Bonnetti* *Colligi* *1756* *Johnson* *London* *1756*.

Hyacinthus purp
u^jTc if

•attyttlnkm & *St>>

-.:.;' acintus arbutus thero

blyacwlhusMlunti itl&ajlat*;

r



Hyacinthus Muscari luteo
flor. Eyst.

fltyachilftts BohyoMer
ntmosut di iityvati.

SJiyaa'tt'fiar Anttnjrr.
£v/J- *"


gHyaanlhus flonhui cant
DanttlwulrnatStsposihi CBP



Hyacinthis Orient a hs.Dod- u.Hyacinthus Oritnlalis^{f*}
eaule Maruloso. CB P

Hy at a n'ttt orimhiliSmlinut, isfMyaanfhui ^w^{ntalix}
Enf-tiSixeniteitjlonl>tis,E.yfi- Sfmhaus

t' 1



Awinteit (ittrifitit D.Christophori Meersch
Callipis Med. OmntJ^Krii
lirfniani Citledit-

TRICAPSULARES HEXAPETALA.

15. Hyacinthus stellaris Germanicus. bifolius, C.B.P.



Hyacinthus stellaris speciosus, emereus, C.B.P.



17. Hyacinthus ruber (Lam.)



Hyacinthus orientalis flor. pleno, Swer.



Hyacinthus orientalis flor. pleno, Swer.

Hyacinthus orientalis flor. pleno, Swer.



titti- Sort''''''* Jiltu

Rub-White leaf

noli A Urdiranitn ^,rrr''''''

TRICAPSILLARES HEXAPELALAE

17. *Narcissus*

cinniflora, Surer

18. *Pseudonarcissus aureus junceifolius*, Eycl

16. *Narcissus Tjvhi Jir tintolt*;



Narcissus flavus plerumque, Surer

19. *Narcissus* alhitt pUntifivrtSrDer

wjVurx-i&ar inult
hex calice carens.
Stellatum, Eycl

20. *Narcissus* Ttifiat shplmfnonniu fi
lyft




21. *Narcissus* dyptrichonatis calice
lobatum duplinoctis foliis, Eycl

22. *Narcissus* jitntt&liu luttus
flora p

jaXeumurn liJhvuttn

JL6-K *Narcissus bulbosum Scrothmanni*
majus, De Bry



23. *Narcissus* *Common daisy*

Robt White sculp.

Auspiciis Carolini D. Johanne King Collegii
Medicorum Londinensis Soci.



Narcissus maritimus
marinum

*8 *
Inur, CBji Bytra^wn
v. firat.

(TKirAPS ULARES IIEXAPE.TALS,

Radice bulbosa pin. / (i'it.
49 Narcissus 7. Math. itiu Titfhrut
abusjwrti.

Section 7.

37. Narcissus jacobaeae



32. Libonare lfitmlicu. 'lfete
JiluU purp. & ifit'frr.

35. Narcissus Indicus sphaericus,
flore lilacea. Bapt. ferr.

Narcissi bdtajpi variet' Bapt. ferr.
ix. & folia.



itty arm »*i ... K_f,t
Aula Britannicae Regis Johannis II. & Regis
Ludovici Decimi Francorum Archiepiscopi de Cantuariensi
Lond. Anthonio & Chislapie Prolegimus Publici

TRIOVPSRI LAK*
HEXAPETALAE

Tulipa...
C.B.P.

Tulipa...
Ejst.

Tulipa...
CBP



Tulipa scabra Colaria, Eust.



Tulipa mtutato Jlotr Pttna. Ejpl



Tulipa minor Suite italisa. C&P Bononirnw plrrumaut ifoCam



Tulipa maritima or Uilea Galiiea, C-B-P
Carbonensis minor, Dod



Tulipa Pratica bainea!a, CB-p
Pratica non aotria, E-i-



Tulipa putnitie latifolia Suiphurra



Gul. Sa...



frttrt lirmfr Qanlnair stuip



AuitfucMt CURifrt>ri b-Atlhwn Datit* rdyrtM
"7. uirjVririitiJfr; Str'tWfedMnmrF
SBarlhahimi Mniit:

TRICAPSILARES HEXAPETALA

i/rmautut pntar ptirt'Urra
'AtecSi? MlbHJto

1. *Fritillaria alba proventus CBP*
albo flore. Swer

2. *Fritillaria angustifolia lutea*
variegata magno si. CBP

3. *Fritillaria*
vulg



4. *Fritillaria Aquitanica flore*
luteo obscuro. Swer

5. *Fritillaria polyanthos*
non descripta. Swer

6. *Melagris flos maximus italicus.*
Eyt

7. *Fritillaria flore*
Eyt



Gul. Linnæus del.

Gul. Fritillaria bulb

Auspens Clariss. viri D. Samuelis
parochia Rothensfeldis ad
Collegii Sancti Trinitatis
vix Collegii Medicorum
vniuersi Socii posterius cunctis

Lilium *radice* *rfuo* *ritimif* *riritut* *trova* *Imptnalu* *Bftum* *nidiv* *Sjttuwva*



Lilium S. Corona Imperialis, multiflori & lato Gaule, C.B.P. Corona Imperialis Pavia n. 1107, E. 1751.

Lilium scorvii hnpnalisjkmtn clafte dupliciuaà cum Siliqua
tn captuinrii in a nUriSriiapiufa af



1



Auspicijs Clariss. in D Q flip an' NrJhm C'ltt ff Medicum

Abt. Scamens delin.

Abt. Blooting fuitp.

TRICAPSULARES HEXAPETALA,

radice spongiosa prostrata.

6 Liliū Martagon Imperiale, Lyl.

7 Liliū Martagon flexuosū rubrū punctatū h. non punctatū, Lyl.

8 Liliū flexuosū albū punctatū h. non punctatū, Lyl.

9 Liliū Cl. maculū p.



10 Liliū purpureo-funguineū flexuosū, C.B.P.

11 Liliū Martagon Imperiale, Lyl.

12 Liliū jliBum, augu.jhji/siu m, C.B.B

quidam flex. punctatum, cum siliis tricapsulari clausis h. apertis



Auspinis Clav. prodr. Thoma. Collig. Medicinam Londinensibus Soc. Regia. Curatorum sanctae Mariae de Bethl. in A. J. Regia. N. L.

TRICAPITULARES HEXAPETALES

radice aquantinnuū pcedit

16. Lilium Prædicium pinnatifidum Germine latiore folio nobis
Narcissus Indicus punicus Gemito latiore folio cum Semine per

17. Lilium purpureum majus Dodonæi

15. Lilium
Flore
C. & L.

15. Lilium
Flore
C. & L.



videtur & C. & L. icones
in hujus Sectione
Appendice.

Lilium Cruentum huibifidum, Jlyf t. Littum luttum, uah<, <sth radif. % f./uim rubrum atpUadli radice, C.B.P. Class. hifl



Xiaeiou ('ir.it mn D-Tiema M'htahn
Mrdirttm Loujinnmtrn. rt istwifn
imjn),u<,rti go,rf Qien Sotti-

Abr-Bleuthas Frode

1. Aloë Arabica serotina vulgaria officinarum nobis Aloë vulgaris C.P. Aloë Dioscoridis, Col.



TRICAPSTILARES HEXAPETALAE.

2. fuf-itiiefrwut, Jeiv trt fotigtittt HCttstim abeunte.



Hist. Eist.

Section 2. T. 2. 2. Flore Capricorn. 2. Aloë Americana nobis.



4. Aloë Americana flore luteo nobis. Metl & Manguei, Anton. Recch.



5. Aloë Americana flore caruleo pallente nobis. Metl Cozli, Anton. Recch.



6. Aloë Americana parva robustior nasa folia admodum serrata nobis Mexical Metl. Anton. Recch.



7. Aloë Am acido, multj t t t i * Mexacoll t t t Mrtipeci vrttiw- rum, Anton.



dulci & insli, nobis. Jpinia nobis Pati seu Metl ex quo fiunt levissima fila, Anton. Recch.



num, Anton. Recch.



Auspicio Clarissimi Viri D. Rob. Peice Malicina Doctoris apud Bathoniensis.

TRICUSULARES HEXAPET. M-tf.

Telug. Section 2^{da} Epist.

Yucca alopecuroides
Ch.P. Yucca, Ger.

foliis Alopecuroides

Yuen S'J-V lu4tiH*n>seliitJiati*n>awsihr<ft\$M,

Y'K'i' ii>>Iuc?>

if r-ii Berocianus

obtusis, nobis Yucca H:
stellatisobtusis, Munting.



Yucca Portoricensis,
nobis Yucca B.

Yucca Aethiopsica
coccinea, Cornut.

Synsperidium Indicum Vesputiani Robini,
Carr. nt.

i nus.... & fit it fin.p.



i' -, \>>J

rxittititit'it'%jolht* am fiitt HI rni/urnui ffurettiuij'nectjttitit alhu* calitr 3ytiainti nmxit'iirj ctitfititituitt...
arr oirutitio ,!fto caUc*Jtm&*-iafo,ne&i*. tonghtsatxa *<< niaanyehit tor-: . nirt/trr,)*AuratMiM mat a mart is aihit
8.



Burghers sculp.

Auspiciis Cta-ri&timi viri D. Edm. fu. H. Jitii naon
serenissimi Regis Caroli 2. famulio Mtditi.


APPENDIX gm&m.ff" T<fc a*.

TRJCAP&VLARZ


S HEXAPE TL A.

Lilionarcissus Indica p.

NornStusAft'atms tlrr exittietü KrtrctMtifrttinimtiaätier jVinvrjnu nu'üttuui caller
hifolius d' t&tx feUit aeutr* £**>' ptwfyta/i, itx ryfiex is ornate plan* rtobUBti lt*> ttiyufi***>M,
tuat'a,nobis. rfr ad fricattfylaiYT lut*it,netns_Btilboeditntt ctairtm tenu f dium, LB
Squamataz, CapXX. min. 100, coronat' tum, Chabr pag. 422. pag. 400, pl. 7
I.B. & Chabr pl. 8.



Hyacinthus taHfoliui, D<lp?
LB, Chabr, pag. 422, pl. 9.



EtHcinxhu trt politanus, IB: Chabr.*
pag. 422, pl. 10.



Ornithogalum luteovirens Cornut.
pag. 423, pl. 11.



Ornithogalum floribus subri-
rectibus longisacina pediculis
inutentibus, nobis Moly flore
subviridi, Boecon
pag. 425, pl. 12.



LiUwt abtirnjeterlris
dentibus sive peregrinum, LB
Sultan Sandach, Clus Hist. &
Pin. Eust. du Br. vide
pag. 405, pl. 13.



Lilium Canadense imperfectis
floribus seu irregularibus
alba, nobis. pag. 405, pl. 14.

Lilium cruentum latifolium,
IB, Chabr, vide pag. 425, pl. 14.



Burph, sculp.

Paulo... Clarissimi...
Paulo... Mulicino...
tertia apud Londinensis

XW

PENTAPETALAE & POLYPETALAE. PAPESCENTES radice tuberosa.

1. Anemone trifolia, Dod.
 2. Anemone hepatica, C.B.P.
 3. Anemone hepatica, C.B.P.
 4. Anemone hepatica, C.B.P.
 5. Anemone hepatica, C.B.P.
 6. Anemone hepatica, C.B.P.
 7. Anemone hepatica, C.B.P.
 8. Anemone hepatica, C.B.P.
 9. Anemone hepatica, C.B.P.
 10. Anemone hepatica, C.B.P.
 11. Anemone hepatica, C.B.P.
 12. Anemone hepatica, C.B.P.
 13. Anemone hepatica, C.B.P.



1. Anemone trifolia, Dod.
 2. Anemone hepatica, C.B.P.
 3. Anemone hepatica, C.B.P.
 4. Anemone hepatica, C.B.P.
 5. Anemone hepatica, C.B.P.
 6. Anemone hepatica, C.B.P.
 7. Anemone hepatica, C.B.P.
 8. Anemone hepatica, C.B.P.
 9. Anemone hepatica, C.B.P.
 10. Anemone hepatica, C.B.P.
 11. Anemone hepatica, C.B.P.
 12. Anemone hepatica, C.B.P.
 13. Anemone hepatica, C.B.P.



14. Anemone nemorosa, C.B.P.
 15. Anemone nemorosa, C.B.P.
 16. Anemone nemorosa, C.B.P.
 17. Anemone nemorosa, C.B.P.
 18. Anemone nemorosa, C.B.P.
 19. Anemone nemorosa, C.B.P.
 20. Anemone nemorosa, C.B.P.
 21. Anemone nemorosa, C.B.P.
 22. Anemone nemorosa, C.B.P.
 23. Anemone nemorosa, C.B.P.



24. Anemone pulsatilla, C.B.P.
 25. Anemone pulsatilla, C.B.P.
 26. Anemone pulsatilla, C.B.P.
 27. Anemone pulsatilla, C.B.P.
 28. Anemone pulsatilla, C.B.P.
 29. Anemone pulsatilla, C.B.P.
 30. Anemone pulsatilla, C.B.P.
 31. Anemone pulsatilla, C.B.P.
 32. Anemone pulsatilla, C.B.P.
 33. Anemone pulsatilla, C.B.P.



Auspiciis Clarissimi H. H. b. Uhaanis Litvni
 Collegii Medicorum Londinensium, Joco.

HEXAPETAL. V* i LN iAPt.IALA. PA*JltiUjNTiSo<Non l'ALHESU^N l iJb

1. Pulchella vulgaris Clus. 2. Pulchella alba bultswylor/ihiuliew/ \$ PiihatMaflair alt,o,CBf. 3. Pulchella li^



1. Caryophyllata vulgaris, Clus. 2. Caryophyllata alba, bultswylor/ihiuliew/ \$ PiihatMaflair alt,o,CBf. 3. Caryophyllata Alpina lutea, CBP. 4. Caryophyllata Alpina altera, CBP.



5. Caryophyllata Alpina ornatum minima, Ponce & Alpina minima altera ponce, Ital. 6. Caryophyllata Chamædrys folio, nobis Chamædrys montana, Lucc. 7. Caryophyllata Alpina Quinquifolia, CBP. 8. Hepatica trifolia, Linnæ & pieris, Clus.



9. Anemone nemorosa, Linnæ. 10. Anemone hepatica, Linnæ. 11. Anemone pulsatilla, Linnæ.



Anemone Clus. Viri D. Georgii Smith Collegii Medicorum Londinensium Seci. Kithens heri & domi amici familiaribus floribus

Ranunculus Gramosa radix
S A
rfu. Qnimota rarJicff/niba Sitnpt-
ijntata radtrrl-aut-hifl-

.{tanitnculiu ratnotus drnmiMi
ratfiteC%P*w%*t2.at*-hifl-

Axiu.ncuitLrJjlJtiaVaf,o,C A J>-Jh<-flaw.
eubrii venit dtflinrh^/l•



Ranunculus Gramosa radice
S A

ejutdemfpiea
rum Sfiniuc'-

•Nt niU at nll'N'iaiiuusSnimomr{ >dJce
J?orjAanimorii6aTntfyEyfI.

Ranunculus peregrinus Gramosa radice
Chus higt fl- albo penus rubria & flavis permixt.



Ranunculus acris radice
S A

JtaTutnniliuMplioddi radice
protj,er miniatu,CBP.

Ranunculus Asiaticus Aphodeli mdic*
plcnoj1 -Sitnduinecil-Cltt.hi/i-



A11 -f' t ci is Cl a rij.?- wnD.Aiicotai 6tan let)
CoHiQttMdicorunt landinenrittm Sorii.

Ranunculus hirsutus a. runc. Quercifolius
alba purpurea scilicet flore

11. Ranunculus nemorosus flore pleno.
Ceculeo in odore nemorosus in laticis lobis

(2. Ranunculus hirsutus) Me

12. Ranunculus Thalictrifolius
minor r. Aspidelicti radice



Ranunculus Moschodella dictus. CBP.
Ranunculus minimus septentrionalium
herbido muscose fl. Tab. 128.

15. Ranunculus dulcis nemorosus,
Tab. 128. Træg.

16. Ranunculus pratensis acria
erectus, CBP. Idem flore pleno.

17. Ranunculus pratensis acria
flore simp. & pleno, cum semine
& capitulo Coagula



Ranunculus pratensis repens
hirsutus. CBP. Idem flore pleno
cum semine & capitulo
in capitulo cuncto.

19. Ranunculus hirsutus
Ded. fl. runcifolius
cum semine & capitulo
in capitulo cuncto.

20. Ranunculus repens
flore pleno, CBP.

21. Ranunculus hirsutus fl.
ovatum, minimis lobis, runcifolius

Ranunculus repens fl.
falcata in piceo ad a. runcifolius



Anonymus D. Hamptredi B. D. d. College
Londinium 1600. 3000

Cul. Serratus d. l. n.

Alc. Bl. d. l. n. l. n.

PENTAPETALA. RADICE FIBROSA.

23. Ranunculus echinatus arvensis.
C. B. P. Echinos arvensis, Ger.

24. Ranunculus echinatus stellatus.
C. B. P. Echinos stellatus, P. N. L.

Ranunculi Arvenses & Palustris.
25. Ranunculus 3^{us} Apulii.
C. B. P. Clus. Hist.

26. Ranunculus Prutenis
Bononiensis in Park.



Ranunculi Palustris

27. Ranunculus hederae folius.
C. B. P. Hederae folius, Ger.

28. Ranunculus aquatilis.
C. B. P. Aquatilis, Ger.

29. Ranunculus aquatilis.
C. B. P. Aquatilis, Ger.

30. Ranunculus aquatilis.
C. B. P. Aquatilis, Ger.



31. Ranunculus aquatilis.
C. B. P. Aquatilis, Ger.

32. Ranunculus longifolius.
C. B. P. Longifolius, Ger.

33. Ranunculus longifolius.
C. B. P. Longifolius, Ger.

34. Ranunculus longifolius.
C. B. P. Longifolius, Ger.



PENTAPETALA. RADICE FIBROSA Graminis Aphodii pratense
Ranunculi montani.

36. *Ranunculus foliosus Plantaginifolius Ger. Park.*



37. *Ranunculus flammula albus Park.*



38. *Ranunculus montanus folio Graminis. C. B. P. Graminis. Tab. Ger. & multiplix ejusdem.*



39. *Ranunculus Graminis folio. Radice nobis et perantibus Graminis in Anthaxia.*



40. *Ranunculus Gramineus hirtus. mananthos nobis.*



41. *Ranunculus Gramineus albus polyanthos nobis.*



42. *Ranunculus montanus. Deltoide folio Park.*



43. *Ranunculus montanus folio. Aphodii radice. Col.*



44. *Ranunculus montanus leptophyllum. Aphodii radice. Col.*



45. *Ranunculus rotundifolius. Aphodii radice nobis. Chelidonium minus Ger.*



46. *Ranunculus Ibericus. rivas. Park.*



47. *Ranunculus Ibericus major. Park.*



Antypus Caryophyllus D. Gualter. Nonthum. Col. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000.

PENTAPETALAE ASI>IM)DU Amditr< i,l™,<u wAtt.-RXHHHCIL.I

Sedim. 4. Tab. 21

Ranunculus acris L.

Ranunculus fl. simplicis, nobis
falluf aulltm Wf
diamosarail-i Chut-

Rurynjiuf. lqifoliat.
mu Ftijfatrolih i. tor. i

P. ni. / qifat latihritu aft
fgakurrulo S>rr mi Ai
Gaunmi Bradhris tiri U(iui



Ranunculus montanus hirsutus,
altior, CBP montanus, III
Clus. hist.

Ranunculus montanus hirsutus
humilior, Narcissi flore, CBP man-
tani II species altera, Clus. hist.

Ranunculus repens folio
pinnatifido, CBP
I. B. Clus. hist.

Ranunculus montanus
pinnatifido, CBP
I. B. Clus. hist.



Münst. H. it
I. B.

Ranunculus montanus rotundifolius
feminus Amazore, CBP Ger.

Thora, Phthosa Daldensis,
Ger.

Thora Sabaudica,
Baed. Ger.



Antiqua Claris viri D. Thoma (Waterhouse)
Collegii Medicorum Londinensis Socii Honorarii

PLANTARUM

Historiae Universalis Oxoniensis

PARTIS II. SECTIO IV.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS,

Transclatis filiquo fistetrapetalis bicapsularibus in precedente Sectione tera, jam in hac
 II Sectione de plantis hexapetalis tricapsularibus cum propter flitmin hexapetalorum
 (Vest Snores finularum plantarum in hac Seaione contentarum fex petala feu foha
 farent' le fint ma; o, es? five minores, cujufcunque coloris) tum loculorum tncapsularum Od
 est c S u L feminales telnis loculamentis diftinguntur, five fint majores, five minores) analo-
 i T e r u S t Seaionem agendum esse decrevimus . Nota ergo genenca omnibus
 plan/s, in hac Seaione difpofitis, conveniens esto. hsc, quod fingute flores producant nexape-
 tabs quibus fatifcentibus constante ordine nature succedunt capsub tnbis loculamentis, di-
 fina'ae cuiufcunque fint magnitudinis. Plantas Hexapetalas diftribuemus quadrifanam habita-
 ratione fruaurac radicum: in prima diftributione agemus de Hexapetalis tricapsulanibus, radici-
 bus fufiformibus, nodofis feu tuberofis, fibrofisque longis pr^ditis: in fecunda de tuberofis ro-
 tandis donatis: in tertia de bulbosis proprie diftis (id est, fingute huj us tertn membri plan-
 producant radices, quarum tunica major & extenor . nvolv. tm. no rem & mterior em. & . Ua major
 eft refpcau interioris tufque a i ' » e * t u m » m , « « i a o I ^ u n t F d « ^ ^ ^ q . « ^
 nutrinnrar ras diaa; radices; fufum verius protruduntur pnmo iolia, deinde caules luti
 nlnrfflorerctftalte Thexa Vetalos, ^^ capsulae triquetrae tribus loculamentis dudu-
 Sas in quorum fingulis continents piurima femina angulofa, rotunda, lolida live mem Dra-
 nea compi^rta .) in quarta diftributione agetur de Hexapetalis tricapsularibus radice lquamata
 feu fquamofi donatis C id est, fingute radices hujus quarti membri constant fquamis imbncatim
 fiKi inuirpm adimais adinfar tegulam teorum fibi invicem incumbentium) fie ex qua-
 Z X i hac diftributione abforbetur in totum do Brina hujus Sectionis. Qaaie non abs re tore
 drnpl. ci h ^ . ^ l i c authorib US qui hiftorias gen. rales plantarum fcripfere, quod omnes
 putamus " t ^ X ' e & o h entas bulbofas appellaverint, cum omnis denominate debeat effe
 plantas nliac Seaione contentas DU ^ ^ ^ (proprie loquendo) non conveniunt omnibus fed
 ad ^ quata re idominand ^ tqu i b « ^ (.) quata toti Sectioni de-

huXrfSt^ntLhife Hexapetalis tricapsularibus, quae universaliter non debuerit
 S f t T d H e x a L a k tricapsulares. Hexapetalx tricapsulares ergo habita. rat. one folio-
 S . S . d S U 5 « f i r M M t V n « aw carinata; vel angustifolix; vel denique foliis f i r n -
 folis aut cavis: radice florum, vel tunc flore albis, capulis angustifolix, vel denique foliis f i r n -
 teo. ratione ufus vel recreativa, quoad pulchritudine aspectum florum; vel culinariae, quarum aut radi-
 ces aut folia ufurpantur in culinis viduali humano intervientes. De hisce omnibus ut line dicentur.

D I K T R T ^ U T I C M P | R I i V ^ A

Da plmtis hexapetalis tricapsularibus, rad. cibus tuberofis fufi-
formibus, nodofis fibrofisque prajditis.

QJJS. SUNT

ASPHODELUS & PHALANGIUM.


CATV T I.

ASPHODELUS .

AmpHOVELVS fie HajlularegU, fwd % « fceftri \efgiem , dum,
 flmVreferat. *** & " « nm < Diofandesl, b. i. c * ? . i 9 ? - rmmimt, cujus flo-
 i ' J Uu > em

rem *ἀσφodelου* appellat, & *ϕheopbrap* MiJl. 10. & 7. ejufdem 11, & «
jw 1. £S & 7 « * ia « i ^ Mta / Acata « / < > ^ .. Jfjbodelum Jia U, , , , , , , , , , T M T M . f
Dwnjotm marem & fembwn / cafe, & aHquos Halymon Hefiodi exi Jlnn Ji U At
tzz. c. n. jmbn StcUi. cAj. tefatar, Thcophrtftm & fere Graces & 9. tba-
goram, caulem Anthcrkon, radicem yero, mm ex oUonnLfimJl accrvxtis bulbit
(*potius dici debere attulerimus*) *constat, Affhodelum nominasse: cujusge-
nera duo faciunt, quod etiam lib. 6. cap. 22. ostendit.*

Pars TABUL'fi I. Sectionisquartx.



Explicatio partis Tab. primæ Sectionis quartæ.

1. *Asphodelus albus ramofus, nobis. Asphodelus albus ramofus mas, C. B. P. Asphodelus ramofus, Lob. Icon. Ger. Asphodelus maritimus & mas. Park. Moine*

Asphodelus
< ornant nu i S-T l u / to s r a T M l o s f U T X - r n j l f i f i l m u c r o > ^ a = < n l e m r o c u . i d u m . l < < m
v t r h n < ? " " " r e s , o j i n r r n , < * l : / > 4 " T M a n i d i n U . r ^ J . m < r i l l e n Q <
purpurascete, succosa petala secundum longitudinem quasi distinguente (ut
Ornithogali quasi florum petala virefcente linea distincta sunt) totidem quot sunt petala sta-
minibus medium occupantibus : floret per partes ut vere dicit Theophrastus , & incipit ab
fpiciantur capsulæ triquetæ , sicut triocapfulares, tribus eminentioribus protuberantiis
præditæ ; in quarum singulis continentur semina , dura, rugosa, atra, figura triquetra, quæ
per maturitatem & siccitatem, apertis capsulis triangularibus, cadunt : radice nurotfofa: t%
uno capite exeunt oblongæ, tuberosæ, eximie d i s t i n d i t a t e & l i n e a t a t e .
atque singulæ in singulas longas fibras d < n V Z 1 S _ ^ i l m fed i > ferio refede chores,
6
gullus.

zratro r f i S " cap lte P^entes; <ju* crafios admodum Napos
 .erutas, ducencas ant Pj^{ur}TM^s likas totam pependiffe putaverit, unde nihil minim
 We* u, qu, n, quag, n < & amfm c r u d i c i b u s f u f i L m , b u s , r e f e r a t . N o s m a x i m a s & c o -
 gluuos oftogmta, « m l « g ^ c o a c e r v a t a s o b T e r v a v i m o s i n O r i e n t a l ! p l a g i f i l v z i n t r a
 ^ Z ^ ^ ^ 6 « i & H b U f i l i l l i c v i c i n i s
 condein Aphodelum ofendimus.
 # & dtte a n u m o f i a s , C . B . P . A p h o d e l n s a l t e r , C M H i f t . A p h o ' W a s a l b u s ,
 i T a b . H ^ ^ ^ , ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ; * ^ ^ H . c f e c n n d u s p r i
 " o m m o n i s , G e r ^ P ^ c e n t i s ^ ^ (q u i u n i c u s e f t , n e e f u r c u f o f u s) f & f o r e , q u i o m n i n o
 o n o m m n o f i o f w t ^ ^ ^ n u m e r o f a f p o f i t e n a f c i M r . u t e r q u o r v a e a i t . o
 a l b u , e f t , q u i n « i l l o s r a d i x H i f p a n i a e , G a l l i c q u o q u e A q u i t a m a e & N a r b o n e n f i s I o c s . F l o r e t
 S e X i n M o r t i s a u t e m M a i o & J u n o ; J u l i o & A g u f t o f e m i n a t r a n g o l a n a m l o -

calbus minimus, C.B.P. Aphodelus minimus albus, Cluf. Hift. Novum hoc
 ? - # £ l i S n ° G b f i ^ s i n A p p e n d i e a n e m i n e d e f c r i p t u m , f e m i n e f i b i n a t u m f a . -
 l t t a c p o b u f t u . M i n o r e f t A p h o d e l o n i f t u l o f e u P h a l a n g i o C r e t e S a l o n e n f i s , & a b
 w P l u r i m u m d i f f e r t , n a m g l a n d u l o f a s f e u t u b e r o f a s h a b e t r a d i c e s i n t a r A p h o d e l i , n o n r a -
 f i l r e c m u l t o b r e v i o t e s & m i n o r e s , e q u a r u m c a p i t e p r o d e u n t q u i n a , a u t T e n a t o l i a , v a l d e
 C s u f t a " l o n e i a f c u l a , p o r t a c e a , i n t e r q u s a f f u r g i t c a u l i c u l u s r o t u n d u s , d o d r a n t e m a u t p e d e m
 d t u s f i n a u l a r i s , n e c u U i s r a m i s p r s d i M s ; i n q u o f p i c ^ i n m o d u m n a f c u n t u r m u l t , f l o r e s a l b . ,
 h e x n w a n t q u o m m f i n g u l a p e t a l a i n t e r n e & e x t e r n e v e r a q u a d a m l i n e a f e c u n d u m l o n g . t u -
 S i n t n o w a , p e r i n d e a c P h a l a n g i i C r e t s S a l o n e n f i s . J u l i i i n i t o f l o r e s p r o f e r r e m l i e b a
 c u m d u a e p A d i t e f p e c i e s f u o s a b j e c e r a n t , p r o p t e r e a q u e m a p . I l . s f a o t m n m e f f e
 c o n c t a n d u m . H y e m e f o l i a a m i t t e r e , & n o v a d e n i q ; a c q u i e r e . d r c a A p h . s . m t i u m m e p e b a t .
 i M h o c L p u r p u r e u s f o l i i s m a c u l a t i s , C . B . P . A p h o d e l u s f l o r e i n c a r n a t o p a l l . d o . L o b .
 I c o u : - A p h o d e l u s f l o r e r u b e n t e , T a b . G e r : H i e A p h o d e l u s f l o r e f u a v e r u b e n t e , r a d i c i b u s ,
 c a u l i b u s & f o l i i s o m n i n o s m u l a t u r A p h o d e l u m a l b u m n o n r a m o f u m : f l o r e s a u t e m e m e a i o
 v e r f u s f a f t i g ' m m a f q u e p a l l i d e i n c a r n a t e s g e r i t : f o l i a t u j d e m m a g n i t u d i n i s c u m p r a c e d e n t e
 r . n n H n . f e d m a c u l i s i n f i g n i u n t r . A n t a l i s v a r i e t a s q u x f e m p e r c o d e m m o d o (e h a b e a t i n
 S n d e l o u t t r a d i t L o b e l i u s , f i t d i v e r f a f p e c i e s , c u j u s v a r i e t a t e m n o n a b o l m e p e r n e -
 h o c A . P . ^ J l ^ e n t . I) o f t e r i , & p r x c e d e n t i s f e c u n d i A p h o d e l i v a r i e t a t e m f o l u m m o d o ,
 g a u s ,

quantum/ftm^a X' n Zblbrianominor ramofus florealbo, nobis. Aphodel«foliis fiftu-
 I & f i f " A S o d e l u S T d ^ H i t L ^ C a m . D o d . P h a U n g i L c r ^ S a l ^ n f e ,
 ^ G ^ P W ^ m C r r f e u p W a n g i u m N a r b o n e n f e , T a b . A p h o d e l n s a l b u s f e u f i f t u l o f i s ,
 p ! , k . P a r a d . A p h o d e l u s i m o f i o f i f t u l o l o , J . B . C h a b r . P h a ! - n g i u m N a r b o n e n f e , T a b . H i e
 a l b u s f o l i i s p r o v e n i t n o n l a t i s , c a r i n a t i s , n e p r i o r e s q u a t u o r , f e d i i f t u l o f i s , p l a n t s & c e p a c e s :
 S c i b u s c o n f t i f i b r o f i s , n o n a t e m t u b e r o f i s f u f i f o r m i b u s , ^ ^ ^ ^ ^
 * m o s f u r f u m v e f t i s v e r t m n ^ o f c u h m u . ^ ^ J Z X ^ £ ^ < \$ £ ^ T ^ >
 n t e u f u f i f o r m n m m a t t

Zzhmtur fibrz in unum capuc feuapicem coeuntes .t.dem . In Hiipana pie-
 fere q u o d d i f f i m u m z n i r a r . i n V a f e n t m o r e g n o n u / J u f t e r e e / r a / m s ^ f i d e f a s . N a f a f f i r
 r i f q u e l o c i s X f & a a i p f u m p o n t e m d e ^ w c o g n o m i n a t u m & p l e r i f q u e G r a n a t e n f i s r e g n i
 ? P r o i a m i n c a m p o i f l o l a p i d o f o f t p r a A n k t e m M a r f i k a m p r o f i e i f c e r i s , f e c u s (e m i t a s y . -
 i l l . c c o U e g i t C a r . C l u f i u s . I t i d e m i n G a l l i c P r o v . n c . a ; n e g l e f t . s l o c i s ; i n C i t t a S a l o -
 T n f i f L o b e l l i e p e ; t u f h i c A p h o d e l u s 5 & a b i p f o a p p e l l a t u r P h a l a n g u m C r e t a = S a l o n e n f i s ,

? S f f i M o i t t o f o f t r i a t o n o n r a m o f u s l u t e « s & f l o r e & r a d i c e , n o b i s A p h o d e -
 V * t a o r e & r a d i c e C . B . P . C a m . A p h o d e l u s l u t e u s , D o d . C r f . L u g d . J . B . C h a b r .

Aphodelus S«fcS Hafula regia, gPark. Parad. Huic Aphodclo luteo folia font fiftulola
 & angult. ora ceteri s, in con.
 feu cava, ft nata oblon, in vicoz nafi rucea lan'iova
 veva parte « " " a t a 7 u n d u s c u b i t a l i s , a e u j u s m e d i o a d f a f t i g i O m u f q u e c o n f p ^ m n j u r f l o r e s
 g r e m i f « x i t c a u l i s , r o t u u u u o ? u u 2 p l u n n i i

V² . . . P t.ANTA ^ ^ ^ / msroRiA ' Vml

plunmr inordinatin, diftohti, lutei ru xapecah' prioram floi bus hand abfimiUs fcdLJZ

olurima mrr;n / . . . itls:ttt pwtita, & terms
pnmma continentur femina trinuerra r - - r

Gerardas Afphodeil hitei ^ minoris, qui AfphodeJo

«diS !!J ArPllodelus> ^ USminor Jacisfoli, qcm-
2 1 ^ <i><<<fcm (e^uti fcut Johannes
uifdnt poften & port debitum exam^n Ar% i/bm
nmn, talis decor Afphodebs,

7. *Asphodelus minimus luteus palustris*
Anglicus Acori folio, Lob. 1.
paJuftris Augiicm, C R P S * j AfPhc

Idefa?!!i foliO, Ad, Lob. AfPh oddus iate^ paloftris
d r ? s P a l D S W , Tab. PfDdWfphodlus
<<< 5 1 vel major, Clul. Hift. Folia promr p<J-
> Iridm aut Gladioli fimilix, fecUnguJb^Eaiiikia
ravcc U; s fumlem; Ho,es c lenis petalis, ram fcami-
enres, Afphodcli lutei jemulos, fedminores: febcn
longa, gemculara, non abfquemiilris fibris ferpit,
>>oa. ^rsudoafphodclum feu Afphodelam minimum

Jdum my " " " iTM " " / P i o m q c
Nihil enim habet nudos ut Afphodelus, fed
donatur. Potest & Pseudoafphodelus m
erentiam fequentis minoris. Nascitur
etis . . .
•• rativis menfibus rewirni. Aoren

r B r fudoaipbodths DDmilin U f f o m i
f n e n i s L o b M P e m m o I p d i s f o m i
fa ^ . « J i c ; f i s f S S f a m p t e a e n c i a u ^ » p r i m o , b r e v i a , a n
or, Demand s e < J u o r a m m e d i o c a u i c u l u s g r a
& p r i o r i s f l o r u m i n s t a r p i c a m f e r e ! ; S , m f i T r
n c n a f e m i n a f u b r u l a ; ^ n t c a D u a ^ o K ^ S ^ b a c e q c o l o r e , f e d o r i s
F s h ^ e t u t p i o r S i S , o C ^ h m e m i s P l " r i m a c o i i r i
^ i ^ i d i s L a n c a f t r i X L o a d d l f f

^ ris" "ovenic in Paloftribus yj

A f p h o d e l i , W i f h f / J i o / c c n ^ S P E R A M I : N T « M & V I R E S ' 1

fr4tt: *fordiJaJe, ^f^imonerc* « Mofumpu. Tji VofV*TM°. faciuvt ad ^
«W vLLfZ Ut ?dm l * « ? » » damfntri-
> maia« . . . folla O l r a d i c e s & f l o r e s i n - u m a c o n -
«f*m Succus TadcT* n hadix * f f a r K r a / . T M t f f ' 9 < i < t i n f l a m m a t i o n s , ^ / - . I
vultsfit miicamentum n r , f o m i ^ w r o d w f i M v r L h u s m q u a m m a n o p i h u s c u m p o k n t a
< t " r . A d p J r u t t o ^ ^ - f ^ P ^ u a r n n t h
n t e " r * r u Z " , ? * T M ^ d m l * f i & c u m t b u r t ,
i k s r e d u c i t • f l / T M ^ ^ ^ ^ ^ ^ T M ^ / u r w W .
" f y p r o M , J " ? r ^ n e x c a T M « r a d k i b u s a d i g n v n
Q a n < i l h « r Z ^ 7 1 J U U m m u m d o l o r i b u s a u x i l i a t u r .
n s f w T t m l d Z ! T M " * ' S e m m ^ o r " t * ? l *

DE* HEXAPETALIS TRICAPSULARIEUS,

radidbus fibrofls praecilitis.

C A T V T II.

P H A L A N G I U M . -

Φ ΛΛ

---iai: fie diSumGaleno, S.Simpl. de Medicam. Facult.

quibufdam Ph^gium, abdiU. Leucanthemumvocatam.

Pars T A B U L J E I. Sectionisquarts.

.ri. Allobrogicum magno flore **LHümfhtrjubk**. Pbalangium fort Lili, J.B. Cbabr. Allobrogkummaju*, Cluf. Hift- O

?bahnetum < tz. Ramofum, nobh. Fbalangium ramofum, Lob.Vod.Td.Ger>
Nofirtti parvoflare) P J r ^ 0 , . . . # • r l n . J
* r 13 " "DW ramo f i nobts. Phalangium non. ramofum, Leo. Voa.

Exflkatiopartis Tab.frim < e Sefiionis quart*.

, , T \ Hdanghtm Allobrogicum magno floreieufloreLilii,nobis. PJialangiumraagnoflore, C.B.P. Phalanginm Allobrogicum maJLis,Chif.Hift. App.2.Eyft. Allobrogicum, Paik. Phalangium flore Lili, J. B. Chabr. Qu'na aut fena producit hxc planta folia carinata, fatis firma, longa, furrecta, viridia, fummjparte mucronata, inferna parte fefe amplettentia aliorum Phaiangiorum more: inter quas prodic caulis pedalis & amplior, viridis, teres firmu3,fummo affigio inter fingufares appendices (feu ex atis) denos aut plures geftans flores prorfani nivcos, majores mulco quam in Phalangio vulgari, hinc inde, aliquando in anteriorempartera propendentes, fingulosfexpetalisconitantes (quorumterna interiora btiora crispa & repanda ; exteriora vero viridi mucrone praedita) riorum parvi Lili formam quodammodo references & odoratos, equionim umbilico fena prodennr ftamjna, nnciam longa, terna tamenaiis paulolongiora, exrimaparte cum, & rlvifapicibusdonata, oblongiori graciliinmedioftilo, utcommodinsmeaopinione comtiantanpofle non videantur quam parvoLilioalbo/ floribus fie exfex petahs confruftis sdont trigona capituh tu fcllrl femer & inacquale continentia: radix in multas, candi' ngas & craflas fibras, aliorum Phahingiorum radicibus nondiffimiles dividitur, & atnaus fefe propagat. Nafcitur i^Allobrogum nionrJbns,JfiEeuamle&im^tafuidMiebEeJlIiid fir primarium Carthufianorum coenobium *yulgo Cartu/a Magna*, ubifpontenafcitur,& abipfisLihumappeUatur. t-io. r^t iiiunteaftaw; fenos, feptenos obfervavimus, mine plures, nancpauciores eclere nores prp

etate & vigore J ^ J ^ J ^ . ramofum,C.B.P. Phalangium ramofum,tol>.Dod.Tab.Phalangium tob-1 d Paik- ^ > CT,E> ,u#plialan g ium quibuldam ramofusparvo flore,J. B. Cliabr. Phalangii huius staniinis inftar exeunt folia; e mediohorum caulis affhrgit teres, in ramulos diftributus, inqoe lia^s futigio raruulari apparent Mores **candidi**, minores, fex petalis conftantes cum ftaminulis aliquot concoloribus mediis, quorum fingulis fuccedunt capitula rotunda, minora, ternlsloculamentisdiftintia feparata port exficcationenr, in fingulis horumplura continencurfemina nigra, triangdaria: radices teuues & oblongs, multa;, in (einvicem implicatf,quin & harnin finguk non deftituuntnr fibris fuis. Provenit in acclivibus colltbus apud Callos in pJuribns locis, ucin monticulis prope pagum *Sura'weSequanx* imminentibus, quarto lapide'aburbe *Lutetia* Parifiorum; alibi etiam gignitur haud procul a fliiminibus ac ripis nquarumdecurrentium. Flores videntjunioac Julio, & Aiiguito femina perfitmntur.

a *Thalanewm* parvo fiorcnnonramofam,C.B.P. Phalangium non ramofum, Lob. Dod, **Tab** Ger l'aik. Palcrius non ramofum, J.B. Chabr. Secunda barefpeciesparvo fiorepnedent'ioliiis floribus,femine&radicibusfimilis, fedcadiculus tjufdem m nuUosnunulos in

tupiore parte diftribufus eft: flores alternatim petiolis fuīs innitentes digeftos profe Antheriejiere modo, quā atis refert floribus, fed Tadicibus ab eodem divert. Provenit ibidem cum Phalangio ramofo fupra defcripto, atque eodem tempore floret & femina, pericit. Quicumque Aphodelm ramofum & non ramofum ejuſdem generis eſſe concludent, nonopitante numero ramorum eorumque radicum etiam magnitudine & parvitate numeroque. majore aut minore differentiam, non multum aberraverit a yero, cum mihi tantum videantur varietates diſtantes ſtate: idem dicendum de Phalangio ramofo & non ramofo parvo iore.

TEMPERAMENTUM. & VIRES.

Phalangium, teſte Gakno, tenuium eſt parthim is defeccant facultat? hujm folia, femin/ ac fores cum vino epota auxilio eſſe contra ſcorpionum ac Pbalangiorum itw; is tormina fa^nth b uſfuccurrere Dioſcorides tradit.

HALLUCINATIONES-CASP. BAUHINI

Aliorumque Autlorum.

Phalangium Virginianum foliis latioribus radice repente floribus petaloe ureo nobis. Phalangium Virginianum Tradefcanthi, G. Sr. Ephemerym virginianum Johannis Tradefcanthi, Parj. parad. dillium feu Moly Virginianum > J. B. in Hipp. ad Pinnacem. Idem fiore albo. Phalangium majus ramofum Virginianum fiore majore a ureo foliis latioribus & radice repente, nobis in Prielud. Botan. & Jacobo J. nom. Hxc eſt plant a heteroclita & fit generis nēe potejl admittipro Phalangio, cum Phalangium proprie loquendo fit plant a Hexapetala tricapsularis,

hec autem eſt plantatripetala, atque in medio florum terna apparent ſtamina, tribus apicibus luteis donata; quibus fingulis fingula ſtamina conſpiciuntur aq ſtrmam capitis ſerpentis oſium aperientis, in quibus continent ſemina fujca: radicem habet longam repentem, ac ex fingulo geniculis fibulas albas feu luteopauidas demittentem. Cum nō fit hujus loci hoc Phalangium feu Ephemerym, de quo ejuſdem ſpeciebus inter heteroditis plantas ad ſi t i ſecundce agemus.

DISTRIBUTIO SECUNDA -
DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS,

radicibus tuberoſis rotundis preſeditis,

QJV JE SVNT

Crocus, Colchicum, Gladiolus, Dens carinus, Syfitinchm, Iris tuberoſa & Xyris feu Spatula foetida.

c A T V T III.

C R O C U S .

Crocum puerum, cum Similacem puerum adamaret, in hunc fui nomine florem verſum Te Virgilio in PHniu 4 lib. i6. c5. teſtantur. Kpo vero filum villumque ſignificat, cuſuſ modi ſunt Croci ſtamina feu villi, qui x? oiks appellantur, qui plerumque terni, nonnunquam etiam plures in ſuo medio conſpiciuntur, is cum foli in uſum vehiant, per excellētiā Croci nomine donantur.

Genera duo fecit Thophrastm, fativum de quo Hift. 6. ejuſdem 6, is 7, ejuſdem 0 is i o, Montanum de quo 6. Hift. 7. At Vicforides. i. c. fativum eminit, qui pro ratione reſionum in quibus plantatur, variat. Sic filveſtem dicim, alium majorem, alium minorem alitū vernum, alium autumnalem: qui rurſum colon florum is foliorum parvitate aut magnitudine variat.

Crocus eſt planta hexapetala tricapsularis, radice conſtans tuberoſa, rotunda cuius floſ fex petalis conſtat in ſuperiore petioh parte; attubocavo, rotundo, immediate provenit ex radice ſine ullo caule viridipro ut cernitur: in aliis (præter Colchicum) hexapetalis tricapsularibus: divert a Colchico cii)us folia ſunt lata admodum, atque radix major multo; Croci autem tolia ſunt anguſta, graminea, hnc ut plurimum alba medium fingulorum percurrente.

TA-

TABULA II-Sectionis quartae:

<p>Autumnalis</p> <p>Crocus</p> <p>Vernus</p>	<p>1. <i>Sativus seu bortenfis nobis. Crocus autumnalis Eyfl. 9</i></p> <p>2. <i>Montana nobis. Crocus autumnalis Sod. 0</i></p> <p>3. <i>Magno flore, C.B.P. Crocus vernus herifidiwi purpureus magno flore, vel Cluf-Bijl; 0</i></p> <p>4. <i>Variegatus, C. B. F. Vernus latifolius purpureus -versicolore flore, Chf. Hist. Q</i></p> <p>5. <i>Albus vel cinereus & albus xwiegatus, C.E-F. Vernus latifolius albo fere isrobovarkgato fen friato, nobis. 0</i></p> <p>6. <i>Multiflorus, C.B.P. Crocus vernus polyambos, Eyfl. 0</i></p> <p>7. <i>Flavojorevarius, C.B.P., Crocus vernus latifolius varioflore, Cluf Hist. 0</i></p> <p>8. <i>Flavovario flore duplki, C. B. P. Crocus vernus herifidhts 2. Constantinopolitimus, Lob. Ad, part. 2. 0</i></p> <p>9. <i>Flavus, C. B. P. Crocus vernus polyambos flore theto, Eyfl.</i></p> <p>10. <i>Mefiacus flore aurata Thot. Flor&Parifm ©</i></p> <p>11. <i>Patulo, C.B.F. ± Noziliba minor, Lob. 0</i></p> <p>12. <i>Minor, nobis. Juncifolius purpureus, C.B.P. Crocus vernus angustifolius five violaceo flore, Cluf. Hist. 0</i></p>
---	--

Explicatio Tabulae Sectionis quartae.

1. CROCUS AUTUMNALIS.

1. *Rocu** Autumnalis fatus flondus & fine flore, nobis. Crocus fativus, C. B. P. Lugd. ^o Crocus autumnalis, Eyfl. Crocus, Trag. Fuch. Dod. Lob. Tab. Crocum, Mrtxb. Crocum horcenle, Cam. Crocus vel Crocum, J. B. Chabr. Inter hexapetalas tricapulares plantas radice tuberofa (id est uniformis substantiae dum fecatur, ut Fomurri, Pyrum, Rapumve) paxditas prinoocciirrit: Crocus facivus autumnalis, cut funt folia oblonga, & perquam angusta: flores fbichtxajeriali, pulcro colore caculeo, quoad formam & pediculum Cavam, rottindum, immediate ex radice continuatum, Colchicifoi' miles, cum quibus in Hoiibus maximam habent affinitatem & ormmimodam similitudinem. A magis iaturata puqpuia nrtent, & c in fingulis ftamina oblonga, terna ut plurimum, colort. flammeo fubr Lib'nria, odore ctim inauerint post collectionem forti, & capuc impecente, quae carteris jxirtibus praeduncur in utrimque colliguntur, Croci' que nomine vel *fohvxcuni*; radix fubeft cubcrofa, carnola, roturuta & diu Vivax (non a uccm bulbo/a fecundam dostrinam nostram, uti in I'rolegomemshujug Seftioidiftum est) tunica conftricta reticulari, miroartificio textafif cooperta. Sativus dicitur hic inter alios Crocos, quod ejus ftamina plurimilbut ufis, non flum in officinis, fed Scinculinis, embammatum f intinfantm loco infervienria. Scitur in pluribus regionibus, inque agris ubi kviret, ut in Cilicia, Cyrcnis, Sicilia, Italia, Germanta, Galiin, Britannia, Gandet enim, inquit Theophrastus, calcari pedibus, ideoque juxta femitas & toutes pulcherrimus exit Crocus. Ridicendum est Theophrastum nos istuc admonere, & mulco magis ridiculos non hi neoterici Botanici obnoxii uix Theophrastode inde ex Plinio idenia ilerunt, fed experientia ubiq; locorum contradicit autioritati & Theophrasti & Plinitex ipfbhauriensis, & omnium recentiorum Botanicozum tx ipfis feribentium. Nalquam melior & vegetior in Gallia cernitur quam in agro Agenfi & Narbonenft, teft Ruellio. Nufquam melior & vegetior exit Crocus quam in Anglia, & t pccipue in conitatu l'et Cfti; t D, & amujt, & nbi cbpiofc colitur circa Gaftant & Alb<l. Denique opimus ubiunque natns, qui pinguilimus recens fragrantieft odore, & colore est rutilo: pellimus tennis, lqualidus, Beficom redolens, Autumno Crocus iativus & verus florere incipit ftatim primis imbribus ut aic Theophrastus, sub virgilia nim occafti. Florem • uni/erfaliter hic fatus autumnalis & filveftres omnes, rim aumnalis,

ndes, quBm verndes, eduml ante folia (ut & Co!chiçunf, cui valdc funt affine/flonbus) quzmot iublequuntur Si hyemetoti vfrent in autumnalibus, atrineunte seftatein vernaiibus; quæ florere exennte Autumno, iftate vero nllibi confpicua, faltem per fumum iervorem. Pmer Crocum pracdifum fativum autumnalem, qui ftaminum caufa colitur, funt & plures fil veftres, (Juonim ah autumnali tempore florent., fativum flore & tempore florendi itidem aemulantes, fed uratils ; alii vernalltfopperè, qui non funt pariterufui. t

2. *Crocus klpinus* autumnalis, C. B. P. *Crocus montanus* autumnalis, Lob. *Crocus filveftris* autumnalis, Dod. Cam. *Crocum montanum* i. Cluf. Hifr Hie folia edit oblongiora, virentia, Croci fativi jsmula, fed jn quibus ftriae quxdarri inalbicant: flos dilutions purpurei coloris. Viget Novembri, ftamina fert crocea: fioribus deciduis fuccedunt Maio capfute tribus loculamentis diftin&s, in quorum fingulis femina plura, rotunda, contineiitur: radix tuberofa & uniformis, fine tunicis aut pelliculis majoribus involventibus minores ficuti in bulbis propriediftisconfpiciuntur; ergo inepte ab aùthoribus bulbos gerere dicuntur Croci. Provenit in Lufitania ; floret Autumno & brevi poft femina in capfulis triquetris profert.

^ *Crocus* vernus latifolius. flore purpureoma%rio, C.B.¥. *Crocus vemus* latifolius puiputeo ftote major 6, Cluf. Hvft. Hie fVW& ptxcedentis eflatoribus, atque inter folia e membranaceo involucro florem promit majorem fativi flore, brevi pediculo innitentem, hexaptalum, violaceum ad purpureum tendentem, unguibus 6V fummo pediculo faturatione purpura rubentibus: radix prioris radici fimilis & in edenda fobole fatis foecunda interdum: femina fert rotundum, exalbidum, in capfula tribus loculamentis diftincla.

•§.2. CROCUS VERNUS LATIFOLIUS.

4. *Crocus* vernus latifolius purpureus variegatus, C.B.P. *Crocus* vernus latifolius purpureus varicoloriflore vel 5. Cluf. Hift. Hie flores profert fuperiorum floribus amphores, ex lex petalis conflatos, quorum externa tria fbris ex candido purpurafcunt & faturiflim^ quafi arte purpuras tribus veletiam quinque lineis feu ftriaisab infima parte lurfum afcendentibus infignita funt, interne purpurafcunt, interiora vero tria vel dilutions vel faturationis purpurei funt coloris, circa unguis tamen fimilibus ut fuperiora radiis infignita: femina in triangularibus capitibus fubfufcum: folia fuperiorum foliis longiora & latiora, duabus etiam lineis fubtus diftinfta: radix paulo amplior.

5: *Crocus* vernus latifolius albus variegatus, C.B.P. *Crocus* vernus latifolius albo flore, Cluf. Hift. *Crocus filveftris* vernalis alter, Dod. *Crocus filveftris* montanus flore albo, Lob. Hujus folia Croci fativi & legitimi folia fatis referunt, nifi breviora effent: inter quæ prodit ex involucro membranaceo flos unicus tex petalis confans, in cujus meditullio confpiciuntur ftamina cum brevi ftilo in apice trifido: radix tuberofa, rotunda, pluribus corticibus tenuibus, rotundis etiam aircifca, fibras feu barbillos candicantes deorfum verfus demittens. Nulla inter Croci verm fpectes nacmagis fceunda reperitur in edenda fobole • ejus veroflòs interdum vanat, nam terria ilia extenora petala nonnunquam purpurafcentibus venis aperfa funt: interdum foli petalorum mucrones purpurafcunt, aliquando purpureus radius omnia petala fecundum longitudinem per medium fecat.

6. *Crocus* vernus latifolius multiflorus, C.B.P. *Crocus* vernus polyanthos, Eyft. *Crocus* vernus multiplex albus facie lutei majoris, Swert. Hie in omnibus partibus convenit cum priore nifi quod quinos ant fenos flores protrudat ex eodem radice capite: eft duplex habitatio ratione coloris florum, alter purpuroviolaceus lineis candidis, alter floribus candidis linteis purpurocaeruleis notatus.

~~cus vernus latifolius flavo-vario flore vel Croci verni 7^ alia fpecies Cluf Hift. Tro-~~
~~vernus latifolius conflant inopollentibus flavo vario flore fed Crocus later~~
 7. *Crocus* vernus latifolius flavo-vario flore vel Croci verni 7^ alia fpecies Cluf Hift. Tro-

2. Septimushicquaque aut fex habet folia, tenuia, W » , w m ^ ^ ^ f ^ A
 Ut in p. IX. 7. 1. m. r. « Croci odorem refert. W Utenm, flore primic
 « cron2 mZ » sobl « vatur, quorum e S r / ? - ' " ^ " ? pftalis « " * — • "

gentibus ? , ? - ? ! • loil B " ? d l l l e n l ^ currentibus & Z : bus, ab l m o ^ fumum fecundum
 puralcentes . ? , r r n a - n t e r i o r a l a t i o r a f u n t , & * T " " 8 I n t e i d l , T M v e n i s i n l a t e r a f p a r -
 p m a l c e n t . , , p e d . c u l u m , q u i f l o r e m f u f t i n e t , t o t i d e m g S e t l a m h a b e n t f o r i s « ^ r o p < r -
 . Widen, purpurei coloris fatari radiis notatum,
 quot,

¶ sunt in flore petala: umbilicum occupant tria flava ftamina, *int̄r qux* ftilus eminentextrema parte trifidus, aurei coloñs; fioribtis fuccedunt craffiuculā trigona capita adeo fatutp purpureo colore infe&a ut atra videantur & fplendētia, quae maturitate hifcentia femēn continereconfpiciunturfaperioris aequale, fed magisruffum: radix, tuberoia & unifor • mis fiibftantiae ut in fuperioribus (non bulbdfa propne loquendo, ut vult Carolus Clufius caeterique authdres graviter hallucinantes) multjplici, reticulatioreque corticēc^&a,multifque fibris feffili parte per reticulati corticis maculas feffe exerentibus pradita, raro ad^{na}tesfoboles feuradiculastuberofas proferens.

S. *Crocus vernus* latifolius flavo vario flore duplici, C. B. P. *Crocus* "ernns latifblius 2 ponftantinopolitanus, Lob. Ad. part. 2. Hie nee radice, nee foliis differt, nee fioris colore a pripre, exceptis radiis qui adeo late feffe fpargunt, utperoras triumphalorum'exteriorum dorfum inficiant, pediculus etiam floren? fiiftinus totus*ex purpura nigricante fpiendeat. Praecipua differentia confitit in flore <juī duodecim. petalis conftat, fexinternis aurei coloñs, fex externis purpureis radiis infignitis ; deinjie fingulis floribus decidentibus fuccedunt hexagona capitula, fingula femine plena. Hoc contingit a natura luxuriantē in plurimis aliis itidem.

9. *Crocus vernus* latifolius fiavus, C. B.P. *Crocus vernus* Polyinthos flore luteo, Eyft. *Crocus vernus* Mefiacas flore aureo, Theat. Flor\$ Parifiis. Hiiic folia funt' 4^{ti} Croci folijs valde accedentia, longiora tamen, & circa exortum latiora, binis candidis venis fecundum medium n&rvum per longitudinem excurrentibus, ut in reliquis Croci fpeciebus, quze emergere incipientia, floresfimul oftendunt fex petalis dum explicati funt conftantes, exterioribus mucronatis, internis paululum orbiculatis,fiavi coloris,utcunque odoratos, tria longiufcula latiufulaue ftamina diutius llavefcētia intus contnentes, & longiorem ftilum fummo faftigio in tres apices divifum, fativi Croci ftaminibus plene concolorem; cuiiiccedit, ut in fuperiore Croci verni fjiecie, membranaceum triangulare capitulum, rotundo ruffbque femine plenum: radix cum 4^m Croci radice convenit, vel etiam major eft, folida etiam & tuberoia ut funt omnium Crocorum radices (vide radice fecundiCrcxcidiffettam, ubi evidenter apparet effe uniformis fubftantiae) fibris aliquot candicantibus feffili parte donata, & aliquot tunicisobvoluta: binos, plerumque ternos aut quaternos, vel etiam plures profert flores: nulfa enim Croci verni fpecies hacliberalior in producendis floribus. Eft flore flavo, aureo & pallide luteo, qui variant ftriis nigris fecundum iationem & folium cui committuntur.

1 o. *Croesus vernus* anguftifolius patulofeu magno flore, C. B.P. *Crocus* fiiveftris Hifpanicus vulgo Nozilicha major, Lob. *Crocus vernus* anguftifolius 3-Cluf. Hift. *Crocus* hie anguftifolius foliis eft longioribus, craffioribus & incurvatis, ad medium furre&is, deinde repandis feuincurvis; flosprsedentis floreionge minor, totus, caeruleus tribus exterioribus petalis exceptis, quae foris virefcēte colore nonnihil affperfa funt: hujus radix prioris radiciforma fimilis, multo tamen minor; Frequens reperitur Gadibus, locis falebrofis & apricis, Januario florens: quin & radix multis tenuibus tunicis live corticibus duris tefta exterius, etiamfi fit folida, & non bulbofa, ut & reliquorum omnium Crocorum radices.

11 *Crocus vernus* anguftifolius parvo flore, C.B.P. *Crocus* fiiveftris Hifpanicus vulgo Nozilieha minor, Lob. *Crocus vernus* anguftifolius Cluf. Hift. 1. Icone. *Crocus* hie plura habet fbilia, an P^{ta}, longa, viridia, aliscrocinis foliis anguftioragracilioraque, rotunda, & quafi capillaria, ^{int}erquae ^{ae} jniternive cauliculi oriuntur unciales, aliquando altioresjangulofi, fuftinentes flores ^{ex} petalis ^{uc} reliqui^{onmes} Croci) ima parte flavefcētibz conftantes, intus nonnihil ^candicantibus, caeteraad caerulei h tendentibus *fiiv*\$ violaceis (inveniuntur & toticandidi) quibus infunt ftaminula terna: hifce fuccedunt folliculi five capitella trigona, feu ex tribus loculamentis conflata, exile femēn fubfufcum continentia; radix exigua nuculx five avellanse magnitudine, durofpadiceoque cortice five putamine tefta, intus alba, firma, dura, folida, fubaftingente guftu, undeapudHifpanos Nozilicha quafi nucula five parva avellana dicitur. Haec unacum priore invenitur Gadibus, atque inter Afindum (vulgo *Medina Sidonia*) & Calpen, locis itidem falebrofis & apricis. Floret exeunte hyeme, femina perficit, ut & verni omnes Croci media aetate. *Crocus vernus* anguftifolium violaceoflore 3. Clufii & i^{nm} ejuidem, unam & eandem reprasentant fpecjem, quorum l[«] floremoffert non pleoē expanfum, ^{am} florem unum plene expanfum, alterum non expanfum: Lobelius in Iconibus utramque figuram exhibet pro Cr6co patulo flore.

o 2. *Qocus vernus* juncifplius purpureus, nobis. *Crocus vernus* anguftifolius 3. Cluf. Hift. duc^{ec} inms hie *Crocus* or, din-e, tertius vero anguftifolius, nobis, flore conftat Qmniuhi mmimo ex

Aho poipiirafcente, p e f e s . f c e t a l i s c & a f e r a t e : « t « e t c e r r i c m b
SEE, S 1 A ? A d a / C f S * e r f o f o ? * . B * r & * t f
cum reliquis. G. ocis vernis, & aetate semina perficit.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Crocus fativus Autumnal* quid astringens possidet, sed superat in eo calefaciens qualitas
tota ejus essentia secundi sit ordinis excalescentium, primi exsiccantium, proinde & coquend
vin quandam obtinet, adjuvante in eo paucula illa astringente, ut Galenus ait: Sordam, id est
cephalalgiam, inquit Avicenna, facit & capiti nocet, quod non exiguo sed nimio sui usu
ficere potest, vigiliis siquidem copiose sumptus inducit, quae modum excedentes capiti & sensibus
obsunt. Moderatus autem Croci usus cerebro prodest, & superiores reddit, somnum & tor
porem discutit, letitiam pignit. Corroborat quoque thoracis crudes humores ad
concoctionem perducit, pulmones aperit, eosque ab obstructione expedit, & ad haec tam efficac
remedium est, ut subinde phtisicis in symmoneo
firupuji dimidiiaut adfuwnum inngridofis

i*quu DcZlrf mmu o tm Tk ^ r t n o n p n d f J r n u h o t i K % m i x c e n t o * * * ' A
tettbmr 7' f i f ? i u . a m m m a n n h o c w d o s u m p t u m V h f c o r i d e s r t f e r t . L a u M t r
Cracum fficerX: ! r - J ^ U 6 l m n e ^ m c m m a d ? e & i u m T M ^ b u m . « * < ! > * b i n e b o n w n c o k r t m
WfaJmtiL 10 } ^ n d < t s f e r i i i t . A d d i t u r , t o d e m a u t b o r e , a d o a s t s q u * i m a ^ t o r u i n
w t d u c u n t ^ T u r o t w m s - > f t d n o f t j a t t m a d t a p r i f f i m u m q u a m e n f e s j o ^ u s ^ f ^ u n d i -
e m p i ' a i r a i ' ^ u r i n a m c U : ^ n m m e x c i t a t : a d v u l v f t y f e d i s t a i a l d a f m a a J d u u r j m v m a d
s p e l a t o d e Z i r ^ m y T M ^ m S t u m o m i n d o l m s f e c i m t i a I ? ^ d i j a t t a i t i a . I n f l a m m a t i o n e s c r f
i b e m a « c u f t ' ^ P t f ^ M a u r i c u l a r i b u * u r i l i t e r a d m i f m t t r ^ o c u l o s a h e k h y m a i k i s e x a P
f l v n m a t i o J l 1 ^ ? * } * * * * & * < t R o f i r u a U q u o r e p r s f r v a t i l l i t ^ , ' i y b u m o r v m e i n o s h h

n* u r a t h * ; r ^ v i d e a p u d J o h a n n e B a u b i n u m p a g . 6 3 % & 6 4 0 . C r o a t s ,
i n q u i t S i m o n P a u l i , q u i i n o p p o r t u n d i t u r , o m n i b u s g e n t i l w o b f r e q u e n t i f f i m i m i u f u m n o t u s ,
n i b i l a l i u d e s t q u a m f l a m i n a C r o c i a u t u m n a l i i n u t f a t i v L a u k g i t ^ m t t s e f t & a b a l i i s C r o c i s
d i f t i n g u i t u r , q u o d f l a m i n i b u s d o n e n t u r s e d n o n e j u s d e m f a c u l t a t i s , & p r o l e g i t i m i s C r o c i f l a -
m i n i b u s h a b e r i n e a n t . A d u l t e r a t u r T * C r o c u s C n i c i f l o r i b u s , v e r u m b i i n o d o & f a c i l e
p r a e l e g i r i m o C r l c o g n o
q u a d r i p a r t i t i B o t a n i c i c l a s s i f i c a t u r
a s t n i m i a e j u s d o s i s

inmdxlnh gravitate interkrinr. Rcccrdo, ego, inquit Simon Pauli, in signi capitis dolore cum
laboraret virgo quaedam, Croci usu nimio hoc cibi concitare voluisse, sed parum absuisse quae
praesenti vitae discrimini sese exposuerit, quae ab illo tempore licet viro nupserit, enormes & juges
capitis dolores perferit ac patitur, jam fere septuagenaria. Caute itaque agamus, nec praemisere
& sine moderatione summa usum Croci commendemus opus est. Accipe duas insignes historias ex
Amat. Lusitani comment. in Dioscor. lib. 1. enarratione 25. pagina 65, & 66. petitas. Crocus
eburno ob nimium Croci usum mori. Vidimus enim nos apud Mitinam à Campo, totius Hispaniae
celeberrimum emporium, Mercatorem quendam, qui cum plures Croci sarcinulas sive involucre
emeret, & in Lusitaniam portaret, multum illius in ollam carnes jurulentas pro coena continen-
tem injecit, qui post earum esum in tam intensum ac vehementem risum prorupit, ut non multum
absuerit quin risu & cachinno tunc è vita discederet: & paucis intermissis sequutus Galeni au-
thoritatem, docet, Crocum dolorem capitis gignere; proinde non mirandum, inquit, si agaso-
quidam apud Pisauenses super duabus Croci sarcinulis dormiens eadem nocte obierit, ut superi-
oribus annis accidit testantibus omnibus Pisauensibus & Johanne Gondula Patricio Ragusino,
viro non minus doctrinà quam nobilitate claro, qui eo tempore apud Pisauenses agebat, & hoc
ita esse confi-
Itaque ex dictis nimium Croci usus, imò exhalatio nimia perniciofa apparet.

DE. HEXAPTALIS" TRICAPSULARIBUS,

Radicibustubero/is rotundis prxdius ^

C AT vT IV • \

COLCHICUM .

Km « ...nJPlurimam inCokbide nascatur, Diofcoridi lib. 4- "p-«*• «• w w p »
^jillukfumptum, wtafaciat, Cokbici appellatio apudPtinvm lib. i2.c. 9. ifftr wr-

³ ^1rfloribuseorumque colore & forma, capulis triquetris ^fed majoribus,) radici
/rotundis fiveoblongis (etiam majoribus,) & tempore florendi convenitcun
SSIIil ^funtlittugofobis, aca funtata Liliabiflitar, pignsa, fevta,
Crococ; fevta
forma iisdem fati f
radiis ambalda
m abis abimo ad fumum fccim dum foliorum longimdinemeMurtentibis:
urhue lilce notis quamtacillime Crocus&Colchicuminterfediftinguiuntur,eti3nrti«oribas,
Xibuf taberok unitormia SMuti* & tempore ttorend. conveniant. Cakhicmn est
velhtifblium idque velfoliispknis,velundulatis; ycl anguftifolium.- quoad riorumcolorem
est vcl album'purpnreum, violaceum fimpiater,vidl teffulatum, vel luteum: de hlfee omnibus
ortline d'tcemus.

TABULA lit

[1. Commune is legitim album isr pallid rubm, nobk, ©
z. Vereiffautumnoflorens.nobis. Colchicum bifloTum, Eyfl. 0

Latifolium

Tesulato Fritillaria instar

Folius

3. Plaiis, nobU
^apolitam m,
Ckf. Wfi- ©
4. z tis, no-
b bicum

Cbiooife Meli-
agrid'a fiore,
i Cornui. •)

("5. C. B. P. Cokhikum Parrno-
1 nium 3»A'jai5i* d/fo /forf
C/H/. W^ . ^ w. Q
Multiflorum candtum \ (, iat° E/khortfolio, C.B.P.
Cotbicum BiznMimvn
wlatigullu mluw'is, Cluf.
©

Flore fimpliti

l .
Cohbkum <

Cj. Montinum Hispanicum isr ***»f««», Cluf. Hiji. 3
Anguftifol'mnKA.Pumilum CroafoBk, nob'tt, Cokhkum minimum

Q. Varitgatum feu macuhtum, nobk, Cokhkum maculatum au-
tumna~~lfflra~~Olend, Hifi. Q

Flare pinto


10. Alboiffrubro, Swert. Q

li. Multiplied nobk. Colchicum poly ant hos multiplex, C.B.P. S
(12. Major,xobis. CbolcbicumIttcummajus, C.B.P- O

ColchkonarcijfM autumalh lutaisj

(13. Minor,7tobis. Colchicumlutetiminus, C.Ji.r. 0

^katio Tab.ttTtUStSthnh quart*.

1.  *Colchicum*...

& plura, oblonga, lata, levia, pinguis, Liliū albi & formā & levore satis similia; in brevibus pediculis exeunt duo aut tres paulo post Autumni æquinoctium flores (nullis adhuc apparen- tibus foliis,) Croci prædicti strobilicis cerni formā tunc colore & petiolo breviori tenerioreque affimiles, dilutius tamen carulei, aut rubri candicantesque; staminulis internis pallide luteis; singulis floribus succedunt singule capsulæ triangulares seu tribus potius loculamentis di- stinctæ, singulæ crassæ ad magnitudinem pollicis & singulæ unciam longæ (una reliquas duas magnitudinis superante,) quæ per maturitatem in ternas partes se explicant, semine plenæ ro- tunda & ruffo colore nigricante, quo maturo folia unâ cum cauliculis intercidunt; radix tuberosa & uniformis substantiæ, turbinata & oblonga, ab unâ parte in plantam com- pressior, rimam seu sulcum cum floret habens reliquo tempore non apparentem, etiam si tu- berosa & solida sit intus, quemadmodum affinis sui Croci radix, extra idem tunicis conve- stitur nigricantibus; radix inquam interior carnosâ, tuberosa, candida, lactea succo manans (fibras aliquot seu barbillas demitrens) dem quidem viret & recenter è terrâ eruta; reficcata etenim rugosa & foris incrisisque nigricet, aut obscure rubescit, teste Valetio Cordo. Sapore autem est dulci, amaritudinis tamen exiguum salivam eliciens subsequitur. *Colchicum vul- gare* seu commune reperitur in Italiæ, Galliæ, Germaniæ & Angliæ humidis, pinguibus & lactis oleosides in Messina...

p p f t q u a u o, emine matorant r: flores cirr... 4 Y a u m n i æ q u i n o c t i u m & p a u l o s o l i a V e r e ; c i r c a e o H e r m o d a c t y l o q u o i n o f f i c i n i s v u l g o u t i m u r i n m e d i c a m e n t o r u m c o m p o s i t i o n i b u s ; e s t e n i m r a d i x t u b e r o s a m a g n i t u d i n e & f o r m â h u i c s a t i s r e s p o n d e n s , v e r u m r e f i c c a t a , a l b i d a p e r m a n e n s , æ q u a l i s , n e u t i q u a m r u g o s a , m o d i c e d o r a , & t u n d i f a c i l i s , c u j u s p u l v i s u n d e t e s t e V a l e r i o C o r d o , a l i u d r e p e r i t u r C o l c h i c u m f l o r e & r a d i c e c a n d i d u m > « j u s r a d i x e s t i c c a t a , & i n p u l v e r e m r e d a c t a s p e c i e m r e f e r t f a r i n æ t r i t i c e æ , s a p o r e s u a v i 3 C d u l c i H o c C o l c h i c u m i n G e r m a n i a n o n n a s c i t u r , s e d a l i u n d e i n f e r r u r . E t v e r i s i m i l e e s t a l b i s i t t i u s & p e r e g r i n i C o l c h i c i r a d i c e s e s s e q u æ i n o f f i c i n i s H e r m o d a c t y l i n i s , n i h i l q u e a l i u d H e r m o d a c t y l u m ... n i h i l q u e a l i u d f u n d e s p e c i e s H e

... de tuberosa nZ 27. V. Hæc Wromunis p r f... V. T. ... tina candida foris & intus... Avicennam quæ ab eo scripta sunt cap. CCCII. ostendunt; Hermodactylum signi- ficandam esse plantam habentem rosas (id est flores albos aut citrinos (rectius purpureos) & meliorem esse aliam nitentem, & nigrum malum ac perniciosa venena.

2. *Colchicum* Vere & Autumno florens C. B. P. *Colchicum* historicum, Eyst. Clus Hist. Lō. Ad. part. 2. Novum & rarum hoc Colchici genus crassa constat radice, tuberosa, ut vulgare Colchicum, ex cuius infima parte caulis emergit quatuor uncias longus, ex membranaceo involacro florem præmissis oblongo pedicelo nitentem, vulgaris flori formā æqualem, sex foliis constantem, sed minoreni, quorum terna externa majuscula, interna autem tria angustiora & breviora, fæculationis paulo purpurascens esse videbantur. Nec folia nec semen (si quid culic) observare licuit Clusio propter morbum gravem, quo derinebatur, ut videre est in ipsius Historia. Ex radicibus quatuor ad Clusiam Heidelbergam missis, binæ flores dederunt sub si- prium denotavit Clusius, pot... in montano quodam nr

£ P etiam in Hala Suecorum

Frillaria inter celsulas, C. B. P. *Colchicum* Neapolitanum. *Colchicum* floribus cum Frillariæ facie pallidam, Swert. Hoc *Colchicum* floribus hexapetalum, celsulatum, quadris nigris ist. & App. r. Colchi- *Colchicum* omnino æmula, glabra, celsulatum, quadris nigris, *Colchicum* omni- nuti facie distinguitur.

"A. ColcbkmmChioenkfionhus Fritiliarr* inftar teffulatis, L. , ^Julatis, nobis; Colchicum vanegatum Meliagridis facie. Corn.' Aucumnd ftatim ineunte W, emergit, cujuslex petaliantia lurfum verfus mille quadratis teffulis nigns obfcuns qual m qmncuncem dU- pofitis obfervantur, ut in Meliagride Dodonzi; fingulis fex petalorum ^eft albefcens qu«- dairi vena, qnx per fingulorum medium ab infima parte ad mucronem ufqVc ^rorepit; iila- mentafelongiora, csmileis apicibus donata, a cavitate floris onuntur: radix hujns externs aliquot tunicis involvitur, ex nigro ruftefcens, bombace munitis, intenus carnofa folida fcuniformis iubftantiz albidz, prout cernimr in reliquis te forti radicebus; poft florem evanidum folia fert atrovirentia, anguftiora & breviora foliis vulgans & noftratis, in margi- nibus undulata, & quafi fimbriata, atque foliis fie contraftis, & floribus teffulatis magif- quenVretotibus, facile diftinguitur a prior, >9 foliis quippe plams & flonbus teffulatis, quadratis pallidis nigricantibus feu potius fufcis confante, at utrumque & 7TM & 4^{um} a reliquis S ^fffitai Aq i Bdraris aifcaia, primo intuitu difcernuntur: Videtolium undula- tum Cdchici Chioenfis adfculptnm 3* Cokhico FritiUariae flonbus ceMatis.

Tcdchicum candMum multilorum, C. B. P. Colchicnm Panonicum ^« albo floie, CluliHiram Colchicum vulgare polyanthon, Eyft. Colchicum Pannonicum albo flore, Swert Colchicum hoc multorum eft florum, quodque in quibusdam pratis Vienns Auinic vicinis, nee procul a Danubio fitis, inter vulgares plantas nafcens, multis abhincanms. oD- fervavir & emit Carolus Clufius ut in hortum iuum transferred pott etiam in pratis arcitf- renbel vicinis magnacopiainventumfuit. Quintum enim hocdenosautduodenos veletiam S S m promit flores, lafei candoris eleganti fpedaculo: hujns etiam folia vul- garis Colchici foliis zqualia, fed dilutius virentia, atque Vere duntaxat ^ ? t e c « TM & ; ~" piofmm fert femina fubrfum, in laxis capitibus tngulanbus: radix vulgans ^*TMW, Id Bizantin tamen magnitudinem non accedens. Itic & qusdam etiam reperta, quorum flo- res eleganter rufefcebant.

6. Colchicum polyanthos lato Ellebori albi folio, C.B.P. Colchicum Bizantinum ***it?«*O» -mxv^s, Cluf. Hift. Novo vere hoc genus Conftantinopolitanum terna, aut quaterna pro- ducit folia ampliffima, Ellebori albi foliis nee forma nee magnitudine valde ab familia, nee illis minus nervofa, magis tamen viridia & fepe mutuo amplecuntia. Autumno cum vulgan- numerosos fert flores, ut vicinos aliquando obfervaffe memini Carolus Clufius, ex eadem ra- dice procedentes, vulgans quidem floribus forma & colore prope /imiles, fed ampliores, craffioreaque multo pediculo innixos; foris dilutius, intus faturatius purpurafcentes & tan- quam venis quibusdam-per petala fparfis notatos, in quibus ftamina ut in vulgan: lemenfetis co- Diofum interdum fert in triangularibus capitibus laxis, triplo vulgans capitulis craffion- bus, eius radix craffnTima, pugnum squans vel etiam pugno amplior. Conftantinopoli ejus radices funt allatz primo ad Car. Clufium dum Vienna vivebat. Floret eodem cum praedi- ctis tempore; nataies patent fupra ex denominations Colchicum Bizantinum latitolmm flo- rens, Cluf. Hift. Praecedentis Iconem cum tioribus in Tabula 3eneanofta 3^{ia} exhibemus, ficut pri- sr Icon ibidem repraesentat folia & capfulas feminales coacervatas in medio foliorum.

7. Colchicum montanum anguftifolium, C. B. P. Colchicum montanum Hifpanicnm & A < m > - Moy, Cluf. Hift. Colchicum montanum minimum anguftifolium autumnale, Eyft. Huic terna aut quaterna funt folia angufta, firma, mucronata, humi tamen fparfa, faturatius virentia & .> fplendentia, vix femiunciam lata, acidi guftus, ruffefcentem colorem contrahentia, dum ta- befcere incipiunt. Flos fine foliis primum exilit Septembri, aliquando etiam Augufto, fex longis, anguftis, ex pnrpureo rubentibus petalis, totidem in medio itaminibus confans: hunc ftatim (prgeteriorum Colchicorum morem) folia fubfequiuntur, & totam deinde hyemem perdurant, ufque in menfem Maium vel etiam Junium: radix tuberofo aliorum praedictorum more, non tamen magna, multis ex rubro nigricantibus tunicis feu pelliculis exterius amifta, intus alba, folida, & uniformis fubftantiz, non autem bulbofo, quicquid voluerit Clufius & omnefeum fequentes authores Botanici, folo Cafalpino excepto; eft infuper radix infi- pida cum quadam atriftione dulci, loigiugulcula fede qualis in cacteris generibus obfervatur; adnatis itidem in radice iaceribus fepe propagans.

8. Colchicum pumilum Croci foliis, C. B. P. Colchicum minimum tenuifolium Gallxcium, F B. Chab Lob. Ad. part. 2. Novum hoc genus Colchici pumili (inquit Lobelius Adver. part. 2.) ex Galkcia Hifpania eregnodelatum, foliis confat Croci montani minoribus, humi itratis, cHiateris, quinis, carinatis, uncias binas aut fequiunciam longis: radice Avellans nucleum iquante flore una cum foliis prodeunte, fenis confante petalis anguftionbn3, pnrpuraicntibus,

totidem

rotundumque staminale & aniculis luteis prædito, è brevi pediculo parum è terra emergens eadem tempestate cum prioribus, Autumno scilicet; natales indigitantur in denominatione.

9. CckhmtmnfeptumpknoBore, CB.P. *Colchicum maculatum autumnale Bore plent*

Lj/f, fflKfM-t&ifigiefion sfienam icstemuitdidis: .Bosvcromakiplid petaiorum COJGerir, pitrpartik'chtibiis nttcuYis'inxqushbusoblongis inieftorum, admodum oculis hhndkur.

10. Cokhicum iiore p'ctio nlbo&rubro, Swert. Hoc fiorem prod licit multis petalis (catenccm, **parim** albis, partim rubris, florem plenum efficientibus.

11. Cfl/c/i/nw po'yanthos multiplex, C. B. V. Colchicum aatumiwle polyanthos Horemultiplici pl'cno, Eyft, Hoc undò cauliculo afiurgit: fiore in iummo cauliculi **confess** pcralis mulriscongeil:i,exalbo purpurafcentes, cum itaminuli^Havoapicepracfitis. **HujusCoichici pJeno** floi-e aliaeplurimc'txhibentarkonesinHorroEyftettenfi, Swertio, & **pkiriinse i&dem** a'ia: Colchici (pecics florefimplici citantur apndCalparud] &JohannemBauhinom **inHuflice, qcqs** confule. Ludicnatura ininfinitem inmulyplicatione varietatum in hoc generp, ficut in multis aliis generibus longe parentibus.

w-Cofcbiconnrci/wsautumnaVialuteus maior, nobis. ColcV.icum bteum niqjus, O.B. r. Cokhicum Ititeum, Lob.Tab. Ccjlcliicumluteumleuluteoflore,Swert. Narciflusautumnatis maJQr,Dod.C[[ifHift.Ger. Narci(Tusaucamnalis flore luteo, Eyft. Folia promic oblonga, larvia, reflplendemia, &faturateviientia, mterqua: pediculus affliirgitbrevis, fafligio tlorem unicamacUerens haudquaquam aliis Navciffis fimilem, fed. veluti Cokhici auc Croci ex fesc penile compoficum/coloreluteum, incujus medio totidem ftamina & piftellus ejufdemcoloris .• fubefc radix mediocris magnitudinis, fibras plantarum hujus ibrtis more deori'um **demitcens**. In Hifpania & Italiagignitar, acunoloco loiiioribusacangulVioribus, alibi vero brevioiibus6t latloribus foliis. Amat liumentia & pratenfiaacetiam aliquando moiuanaloca, Autumio fub finem Augufti & Septembri mcltfe floret in Italia.

13.Hu'jus reperitur & alia fpecies minor, anguftioribus toliisdonata; in reliquis cum prioreconvenit, & dicitur Cokhicum luteum minus, C. B. P. Narciffus autumnalis minor, Cluf. Hilt. Colcliicuni montanum lateum minus,Tab.Florem 8f capfulamfeminalem liabet utrumque hoc ppfterius Colchici genus at tblia Sf radicem Narcifli, id eft bulbofam propr ie loquendo, idcirco Colchiconarciffum denominavimus, quia nobihor pars xmulatur Cochicum à Hue ultimo.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Cdclitcam *Hermodatyju ofcinarum diSum,alvi dijeftionemmohttr^ pituitamque craffam ab artkulh prfertifim extrahit- Cfterum Hermodafylus, te/ie quoque Paulu Mgineta^ ftomatho noxiusaque **tarnis** adverfatur, proindealiquafunt mifcenda, quæ££ns malitiam corrigant <twbemtmiojorceammitigentque, utfuntCinnamommv^Map/icki^Zhztkritui-Pipsrlvugum. Daiur cumVxymhttfciUitUo <iut mile rofaceo pondere dracb. i. plus mimufve pro fitmentis virthits. Cokhicum atttem no/irai vulgare intta corpus fmnptum baud tutd admimfimur qu'ppe rentntitum. Neque interdum tonfulmm HermodaSyita officinarum ptin uti, n., jam nondefit nobis certkrum isf tutiorummedkamtorumubemma fat'a copia: frdtftrii cum radix Cdchki in cibo accepta Jlrangulantb emcat, ut Fungi hbales, auihore Dhfcoride,*

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS,

radicibus tuberosis rotundis prxditis.

CA 9 V T K

GLADIOLUS.

diolus, à dioTum forma., Diofcoridil. i. r. 20. Zepus & qdoyam dicitur: & Gaza Hifl. 11, & 1 in vertit. Plin. l. 25. c. 11. & 26. c. 8. Xiphion & ffi!

Gladiolus comcKterishu'iusfccunds diftributiortie convenit, quod *TMürm prnTmr /-JL-* *utis, cum quibsdam reticuUtis* **conxcites** feu tun **extra**

'extra eandem radictminvolventibus,proi^t cernitur inquib¹ - ^tnci antediftis speciebus; flores edit pariferhexapctafos, cap&las iridcm trigoiu. vi pri-cipue diftinguitnr 3 c^teris iuae fortis, in hoc fecundoniembro contends plantis, quod tuliaerfiit lata, longa, pauluim friata, inacutum mucronem definentia, gladii lamina: fbrmam refrffintia, unde ei nomen inditum.

Pars T A B U 1 1 IV. Sefrionisquarts-

i. Maximw Indian, C.B.P. Gladiolus maxima fore rubro incarnate Fromontom ben*effrei, Swert. ©*

"a. BizantiiiHs, C. B. FT Gladiolus Bt%aniinus atropurpureus, Strert Q*

Nawr^s- Radice obnga flare albo,nol>h. Gladiolus for albo, Swert. e*

Gladiolm

) 4. Floribus uno verfu difyofitti, C.B. P. Gladiolus Narbonenfts, Lob. Ideti L fore albo. 0

c., Minor floribus uno verfu difyafith, C. B. P. Gfidiolus minimus, Ad. Lob. part. 2..0 6. Vtrinq»eforidus, CB.P.Dod. 0

7. Indicus} vialaci:ifufcus,nobis. Flos Indicus eviolacco ftifeus, Terr- Senen. 0

L 8. Stagnai'n aut lacufirk Dortmundni, Cluf. Cur. f offer: pw- 40. 0

Explkaiio Tab. quart Seffwnis \$uaru.*

Gladiolus maximus Indicus, C.B.P. Gladiolus maximus flore rubrd incarnato Pm-montorii bonae fpei, Swert. Hie radicem habet forma radice Ra]Me majoris inverfa: pluribus reticulis tunicis involutam, ex cuius parte inferiore & latiore demittuntur fibra ia;&tLA partefapereiore incollum tenuiusdcfincnte protruduntur foliadena,duodena, atqneeorum meclio txitcauliscubitalisinteidnmbicubitaliii; in cujasfummo iaftigio, ad pchilem circa* longitudinem prodeunt ex geniculis flores Tatis grandes, hex a pet a li\$ ex rubro jncarnati, alioram hnjsfbrtis florum more; quibus fingulisevanefcentibus fuccedunt capfulartriangtiareSj trrbusloculamentisdrincta; fenlina'qne aiorummodo, (edmagna in fingulis continentis.

2. *Gk'Jielus major* Bizancinus, C.B.P. Gladiolus Bizantinus atropurpureus, Swerc. Hie floribus, sapfulis, feminibus & reliquis partibus coavenit cum priore; led floribus atropurpureis pricipae, Stipriore, 6f reliquisdiftinguitur.

- *Gladiolus major* radice otlonga flore albo,nobis. Gladiolus flore albo, Swert. Hic convenit cum prioribus & c^teris fui ordinis iiv omnibus partibus, excepta radice, quje habet fbrmam oblongam, atqueeo nomine a carteris diftinftu facilis ett.

4. *"^Gladiolus major* floribus uno vci>fc di(pofitis, C.B.P. Gladio!i]s, Dod. Gladiolus Narbonenfts, Lob.^Xipltion minus, CiuC. Hift. Pan. & de rarior. Viftorialis rotunda, Ejft. Gladiolb huic tolr-^Lintoblonga, compreiVa, angiipta, paululam in (uperficie friata, gladii lamina modo JpAicronata, Indis foliis mukoanguitiora: caulislivis,teres, cubitolongior, circa cujus fumum flores feaut feptem, ordine liiprafeinvicem ad imam caulis part em digefti, & genkolia fi'igulis adhaerences, quorum fingnli ex ftx petnlisconflantur, cokireparparofubentes,fp!en-j dentes (velquod ramenraroaccidit) albicanr.es: hilcefingulis (iibvniuntfinguli-capfuls in rotundum oblongx, putaminc Amygdala; majores, tiibus loculamentisexficcatseiiantes; in qijonamfingtilts plurima conmiuntur feminaeblonga, paleacea: radix rotunda, tubcrofa in:us dura, cjttrrarticulatioconiceobvoluta, gemma, altra fuper akeram inftdens, quorum Vupc-rrior Veris initio minor ac vegetior, inferior major fed flaccidior,- qui paulo poft.pcrit in plnrea fcfc fubinde mnlplicans. Frequens in Hewuria in editis fruticofis & herbofis locis in conn-tatu Goreticni, in pratis & arvis inter femes illic,

5. *Gladiolus mmor Honhus uno* verfu difpofitis, C.B.P. Gladiolus minimus, Ad.Lob. part. i. Hie priori in omnibus accedit,florihis concoloribusat minoribus,uno icidem verfu digeiHs, in pedaN gracilicanle: fofils pariterduplo minoribus: radix pariter minor. ProventinerU cctis & ncgleSis imra fepta *Chambort* finis vix- qiungentis paffibus a difio palatio. Floret Aprili & M;iiio, & actate iemina perficit, fi quando id pra.'fat, propter rependi tacultatem ticorfecciani.

. *d. Gladiolus titrinqner}oridus, C. B.P. Gladiolus, Match. (cui&GladiolusfegetaiisSf lin<"*
Gua cervinaApulcii) Cef. Lugd. Gladiolus ntrinque floridtis, Dod. Hie in omnibus cam
hia'iore

k

majore floribus imojvcifi [d. no (icisconvenk, nifi <jiiodn'iigu/isgeniculis fingul;i\$ ianalcuncuf
 flares, noucxuiv; parte lipoiiti, led hinc in.dc*j dextvis &c fimftris', fex confrintespetahs.,
 uncia parum longior bus, simul ab uno exortu prodeuntibus, ex quibus quatuor semuncia
 paulo laiorafui^fej.coloreeleganterrofeo, fedmukolstiore & piikriore, retiexis hhr'is pro
 fundioris cab^V^iguram jreferentia, rdiqua duopetala prsdiftis mnko cemiiora funt, ac-incra
 floremco.ift'ri'ta infer!usaligtiantiiium prominencandidnmqjaf longam in mecio mzcahta
 hz'iorm haJ^iit, qnsm undiquc jjurporca iinea circn^aicribit & cer/n/iiaac; fiiperipri.fferis pe
 calo ftanieft futeft tri/idnin, & inter hoc& petalum fingalaris apex. Floret Aprili & Maio m
 cipieBdoabinferioregenicolo, apsnente fe cju i infoperiote geniculoeft tlote, intetior fl;-
 , vefcit St nidimentum capfulx incipk; floribus fie graciatimevanefcenubus t'uccedunt captul*
 in roruntlo oblongs, tenuibus venulis diftintts, fhagnitadine Amygdala; cum putam'me, quac
 cum (natiftnennt, clividuntur triferiatn fen in terna loculaments; in quorum (Ingulfs coo
 rinentur phirima femina tenuia paleacea, oblongiufcula, rlava: radicem habetparvam 10
 [undam, tobcrofam, Harm & (olidzm intus, ab ima bafi verfus germina turbinataifl aliquot
 criakisSireticularis tunicis valutiveftam; qnibns detraflis, dux exigus candidis, tube
 iofiofi apparent: radices, aha alteri infidens, fuperiore quidem Vens inido minore -fed vecc
 nre; inferiore majore; & iadow; verum fiacido & fungofe. Penre & ifaacfeere incipit in
 feriorndixtaberofaVeris m'ttto, ftipernalcente alia, itafinuil decrtcentem & increfcUtem
 radkemhabet; fibras criam,ab mferioris mdicis tubcrbfe bafi emittit tenues candidafque
 Cpotemhabent radices cl J«m & moflee aremj relinqoanc cnimmpalato aliq,am a c S -
 niam aliquoamdia lingnm & ta^es arentem, & f3li,am elipleatem.

y . G / ^ w ^ ^ ^ ^ ^ . ^ o i ^ n o b i s . Floslridkas^violjfccebfufcus
 radice tuberoia *arr. Scnen. Gladioli hu)»Ifdici tnbereft effigieRapuli, colorenusalb
 bo, extra (ubruffo, corpore bmos ternoive d1gltos lacoT fuperno ife rnoque unilco an
 gufto & nonnihil
 Romae depofita
 exeunt a tubere
 cronem definentia
 ftincta: ex gremio toliorum
 fibinvicem incumbentium exilit caulis bulbofa Iridis aut Gla
 dioli more articulatus, rioribus mucronatis foliis articulatum armatus, unde (licet florem
 fimbriatum fufcum ger ladiolo magis mea opinione radice fua tuberoia & foliis accedit:
 flores in fex petala decuffantur, cirrata feu fimbriata, fubter virefcentia, fupra e violaceo fulca,
 nativo tanquam holoferico villofa, furvis & velati fuligine oblitis per ambitum cirris feu
 fimbriis crispa & corrugata, atris albidifque unguibus maculofa; prominula linea intermeante
 diftincta, quae medium praeterea ftilum furrigunt ianthinis atque albicantibus maculis notatum,
 ftaminulis tenuiffimis, in imo violaceis, in lummo luteolis capillatum. anateris amone ma
 jufculis croceis, ext

Inti inlovnia vefpcmlionun, S d S * I £ g f ^ h * S ^ ^ ^ ne obduc, Ittir, jfcvc-
 ex imo umbilico inferiore fibra **prodit modo** lo™ n ii ? • hu rufc abbe rufc jir a :
 fobolefcit. Quare factum eft ut non femel ex eodem tu fo to l' T'
obcornptamfibran, riwaprocdjlmattrcp^cer morem fetus inobf.rvatTadt L 'T'
 invefikemr: interdumquoque brevioris fibre l1gammeadhucintegro foboles nS I CIJo
 ona feu trilme l...

concludes nos effeGladioli peregrin! fpeciem. 10, COllt; intn3; unde
 7^wfwgnai; fificof rufc 10 Dootosami; hif fCar oofce m> 40, Hujtls foli ad o
 dnintaiem long.tudinem raro excedun:, craffiufcula & <itavrf. g, 40, Hujtls foli ad o
 infer Cliqnam Leucoit maritimi, viridia, duJcis rliocuj Zl - I inEer, ftitioque di&reca
 grawmpabulum, nam ad aliquot ulnarum altitndinerafnl 1? ? & anantibus urinaatilw
 inter j la emergesfapcrarc «mfpicur, floribusalbisonufh, "r
 •cavailla&infirraaparte petiolo a quo dependent nov r, <UCOlifloimibus amplio,ibns,
 ne refeactea fioris Gladioli, non profiis tamen Pmile" ubc *tuleico! ns, formal n pe
 quorum duo iupriora ob petiolum feu calycem fufum " nil nilqllc F'sit a i Kum i onftantes,
 P«Kbnt: ftingufe floribusficconftruais iucced, n r i quatum M tria Kll JM thic(11) Pfo
 Julii «orentemhanc plantam koUrJ, ^, rb, naCa val cub, ruftb femine pluifl. Sub
 in Drentia fcnuIquain alibi, HL ? I m P fit Dohminos ad pagum ^wdj &
 " P lahta aoneftpladiolnsproprie loquendo, quia

quia non est hexapetalis, neeliquamhabet tricnpfuhrm:nee eg i.e^Jojair}, ur vtilc Capa- rus Bauhinas, quemadmodum pag, 250. inter/isUa^j/stJcnscCaIp. Bauhmi, Sit ergo Planta Stagnalis seu palustris Vtvadclvti & talajc\levls,cynmco\laeabvfttiis inter fie- tei'oclitas planras ad fiHem hijus Hiftoni.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Ghdiofi radixsuperwr tkk* decofa irita & firia* admix/apama dukanatque innoxium red- dit. hrtimltai mxtaeum fcolopendratreperiunl, tejieTkopbrafto, gaudem'earneaiersa, fre* guentesque convalesantur in ea. Potest ex autoritate Dioscoridis jupetui fualalim vauo q' edite imp j/j/a ^ic<7a S- acufos extrihere. Cum farina vero loliacea i? aqua wmlja >anos di }uLiü <ai< tujfmd i mplaftrk additur. Ducit is menfts appoftta. Tradunt aiampuperiortmradicem atmvinopotnm Vtmrtm cxftimulare, itfnoremjlerilesfactre; qu'm iy fupuioranradicemcum aqua bibendam commode exMhriputrki quibus ex inieflinorum krnia W'flma in faotumdi- lahuniur. Similes ei,viresifit Pliniui lib, 25. r.21, attribv.it- Qakno Gladioli rddix Sifti- hndi, difcutiindi is-Jictndi -vim habit^ i? ofiavo de Facult. MeJicam. Simpl. Xipbii radixjna- *!w autsm fuperior, trabit digerit deficcattque.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI Aliotom(jue Authorum.

P Sg, 40,col. 2. hit tyfarefafolh augukfa, C. B- P. hn tabtrnfa- fiare objettre viridi cohre, Swert, Ibidem(? pag.41. Sijynn'ehium cjuftque jptctes &pag. 41. Gtattielus ejufqtie fpetiej. fjxc triagenerapian- ta-runtum raditibus ctmfimi tubcrojisfnah 6? impte lntnntUT a tajpara Baxbhto inter Hyacinthas ?3 idvn bulb of am , quippe vtras btlbofas plantas, arajn ractitu retrjtant. titmccii feu pelliculit ma- ribui & exterioribus iiv^tveatias trfcrjorcs rxfito- J,(S'iffat majercs rtfpcHu inferiorum itjqe adme-

fiuullittm, ix qw, dcorfum verftudmittinturfibr* feu barbilitic beneficio quartim natriuntar emnet par- tes,tamrifdices bulbefxiatra terrain, qaamreliqaa parti 1 fitpra terram, at, folia, caules^fiores, capfula fmnahs CJ femina ibidem untenta. Item pa^ 6f, 66,867. collocatur a CaIp.Bauhino Crocus. Item pag.i7,6!s) &<Sg. Colch^m: cum'hue duo genera csrijUnt raditibus tuberous, nun debuere adjvitgi Of nitt/egaig plant* perfefle bulbofr.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS, radicibus tutyroffis oblongis præ dii. CA'TVT VI. DENS CANINUS;

e s. canini nome, / 4 — ' fortituseft. Sex habetpetajain fingulis floribns, quibus fingulis fuccedunt capfute tSbnsIoculamencis diftinfta; &: liac ratione dufti eundem hie cum fuis-coiffimilibus loca' yimus. Flo3#eius vel ex purpna ruber, vel.candore micar, vel pnrpura & tandorc con- runs pallet. QniHor^ rubroeft,maculisrubris; qui albcbfteismaculis folia variegaca habet. Sicfcliaaliquando maculara, aliquandononmaculata, fit commaniter bina habet: tantum bina Ca?ralpinu?, ntplunnum terna Adverfaria tribuunt; raro cernaClufius:qaina<iamHiftorh Lngdtmenfistribmc.

Pars T A B L I L ffi V. Seflionis tport*.

Vcfiscams (1. Latiore rotiwdiorequefolio//orepurpurafente, nobis. Dm cankfloreruhröM) ^ 0 . ^ § . (^Angitfieri hngimfoliofiorealbo.nobii. dtmcamnuffiorealbo,Cluf.B^ Q

itio partisTab. quoit*Settionisquart*

D *Emcanishtiox*, .omndiorequefolioflore parperafcence, nobis. Dens canil?as pa-
 uurafoite flom, Cluf.Hift. Dens canis flore rubio, Lob. Icon. Tab. Pseudohermoclytus, Match. Lugl. Ut C
 suos herba ^{af rad/£} " producit & hTM plant, neTM e VesTM T floreS
 fol'arraro ^{af rad/£} " producit & hTM plant, neTM e VesTM T floreS
 bre (raro terna) prodeunt mutuo fe ampleffentia, & flore moTMcculenth, T TTM erum < 3 ue
 oratamen & latiora ^{af rad/£} " producit & hTM plant, neTM e VesTM T floreS
 multies ex atro purpurafcentibus aperfa, bafi angufta paulatimque vi hrZ
 m mucronem definentia, explicatS ibliis conTpiiciidILVTM 2 ff ^{af rad/£} " producit & hTM plant, neTM e VesTM T floreS
 enodi. & vacuo purpurafcenti innitens, lex oblongiufculis petalis confans, deorsu pediculo
 w ipedtans, qui aeris (folis radiis splendentibus) teporefc. fe explicat, petalozq. furtum ^{af rad/£} " producit & hTM plant, neTM e VesTM T floreS
 Cyclamini inftar, elegantis & dilutioris purpurei coloris, tenis intus ftaminibus pmpTM Meis &
 candido trifilico ftulo, nulla odoris gratia placens, fed fola florum elegantia fpeftabilis com-
 mendabilis: fioribus (ingulis i'uccedit trigonum caput, feu capfula tribus loculamentis ditincta,
 refpondentia, fed longiora gracilioraque, flavefcens coloris: radix longa, taberofa, indurata
 fede craffior, mukifque candidis fibris ftipata, & plana quadam a mendice omia
 ribus donata, qua* veluti radicum fuperioris anni & precedentTM wmaliquofveftigiafibnt; pane
 autem fuperiore gracilefcens unde caulis emergit fummae fceбина folia proferens. Quam-
 diu nullum floredat hxc planta, uncoatum axat exic follo. Coptofe nafcitur ad quoran-
 dam montium radices, herbido & udo fblo, non praecul Gritigio Stivia provincie metropoli,
 ferentiffimi Archiducis Auftria Caroli regia. Simul s plane colo i eAllo um mo
 erutam, & in Belgicam a Vakrando Doures Carolus Clufus ad t n, ff plantam me
 Sed circa Baionam itidem nafci, in vicinis Cantabrorum montiu
 clariffimus vir/medicu regms Johannes dela Rivm Flores Aprilis h
 maturius praefertim irtTiortis cuka. sc planta, interdum etiam

& Satyrinm Dalp», Lugd. Hoc Dentif canTni TecmdZ ~ / ob1 ^ Su y rkm ^folium
 ganas montibm, CDJBS folia longiora, «, acX a Z ^in 8, 11, 13 Cr 2 felt in Appennino & Eu-
 e amampleaentja; atque ejhsfl os. ^ S S S * * ' TM' t odum exeunt caulem
 candons; vel mifts purpurafcente alboque colorK 5 " * m « | Or effi, vel h&i e omh no
 nigricantibus: huic fuccedit trigonum r, Tm t f . -- conftans, ftaminibus zibis, a
 dx e, paulo fuperio^Xr P ex AZXil 0" 8 ^f'^ * » " * ~ nttae TS
 de Styli & rlaris & Obfermatione L... nomine Satyri Erythronii,
 lacteus est, aut ex purpurafcente & albo mixtus. cruno-
 hujus

TEMPERAMENTUM & VIR ES.

Stiriaca mulieres ndkkbum ex/lwf * ll*
 % < Sfknd < * tin m Ul£ f c g " / « 7 Wrgerefolere ad e man
 ... in vino autem hauffum can-
 reniffimi Archiducis Caroli primarius medicus (qui multas ejus radices Viennam ufque non
 femel ad me miffit ;) Insuper corporis vires reficere & nutrire, ex aqua vero pueros epilepticos ju-
 vare fcripfit.

H A L LUCINATIONES CASP. BAUHINI
 Aliorumque Authorum.

C Vm Dens caninus fit pi^{am}
 longa prteduta, V floribus b?xZZtm I cum fa* r . , .

DE HEXAPETALISTRIOSTULARIBUS,

radicibus tubei-ofis oblongis & rotundis pradius.

C A W r vn.

S I S Y R I N G H I U M.


Σ *Isolyria Therop. l. 7. Hist. 13. hoc peculiare habet, ut una radix primo augetur hyeme, tunc in eunte Vere qu* ** ^^^^T^J^in^eiMsrad^ crescere hyeme, verno auoque Plinius li + c. 5- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ C ^ L h r n ut volunt authores) tuLtemporeminui*contrab,tumd^ pineuefcere; «on folum futile pabulobulbof^ utplurmumroftrofullofimilis (unde ei nomen Fabio Columna not ante inditum j*

pmv

Pars TABULIE V. Seftionis quartae.

ti. Maju* Afrrenfium feu flore majore variegato, nobis. Sifyrinchium AJ-prenfium anguftifolium alterum, Col. 0

vi. Latifolium, nobis. Sifyrinchium alterum lati*



Explicatiopartis Tab. quint* Seftionis quart**

S *JC* *xrinchium* majus anguftifolium radice rofrata flore majore variegato, nobis. Sifyrffiuu Aprenfinm anguftifolium alterum, Colum. Hf c parvula planta ern. cat m« UzM^nememe lanuanu menfe obfervavit Fabius Columna nimo ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i. radix eft tuberoſa & ſubſtanti* uniformis, craſſidido, in ſabulis omn̄ capitur. *I. r. p. i.* radice ſunt anguſta, quaterna, canahculata, or radicibus duorum ſequentium *A. pul* rum: folia ſunt anguſta, quaterna, canahculata, Piras foliis ſimilia & f £ ^ o ^ ^ ^ n u m r e f p e a u p l a n t , t h e d e O m n i o t m candicante folore, & in aliquibus ſumm^ floris partes purpuro-cerule^ Sams veluli unguis luteo colore; ſtamina intus tria, craſſo & oblongo capite praedita, itez, mediana vero apicem habet alium longiorem, in ſex tenues brevesque lacinias in ſummo diviſum, ex pallido candicante colore. Variat ſtos, nam tria ex ſex petalis exteriora dorſum habent vel rubens, & lineis variegatum; vel eſt luteo virente linea inter purpureum colorem, aut obſole tam purpuram: radice conſtat tuberoſa & uniformis ſubſtantiæ (non ex pluribus truncis ſeu pelatulis *I. r. p. i.* & e ſ f a n «, f c f e iddem radice tuberoſa propagante: iſdem locubi conralterahuidſortis Apulaplantaiequens oriēbatur.

isTrinchnm minus latifolium radice rofrata, nobis. Sifyrinchium alterum lat. folium, r r' Huius radix ſimili forma, ſed duplo minor priore & oblongior ac multiplici corticeni: inreavejecta inferior barbata ut & ſuperior; ſed ex altera parte oblonga, plana, rofrata I! Hævefcens adh^ret radix, qua: anni prEcedentis erac vetuſtior, corace ſupra vegetam novam mrplifto ut in ſuperioris deduaionediximus, & in Icone expreſſimus. Uzc radice r. w k ſuccoſa eſt, atque ſapore parum amaricante: folia lata, porracea, brevia re? s Af r at udinis, tevia, ſplendentia, oris parum pilofis; fructu inter folia item l^rente ut ſpectu latiwai i. r. p. i. trigono ut ſuperioris, ſed maiore, rubefcente, in quo femina duodevixemineat «anE r tnguli . ſloculamenti ^ caſſm ^ Oro bi aut Viciae feremagnitudine. parum ^ X f t . i tvenitur Martiomenſe Cerinok, via qua ad Acquamenam vineamitur, inter Orchides' p h e g o d e s . y y % ^ . Sifyrin-

3. *Sisyrrinchium minus*, *Sisyrrinchium*, C. B. P. *Sisyrrinchium* Theophrasti, Col. Non solum illo pabulo tuberosæ hæret, sed & rostrata forma radicum harum plantarum rostro suillo similis nominis causa est, teste Fabio Columna: sic enim apud Græcos *Sisyrrinchium*, & inde ait, peculiare *Sisyrrinchio* datum est, ut una radix augeatur hyeme, tum incunte Vere, quod in *hæc* excreverit contrahatur, supernumque crescat quod manditur. Et alibi inter foliosas ab radice enumerat bulbos ^{a s}ttiberioias; quibus respondere videtur planta illa per viarum margines herbidas Cerinola Martii initio proveniens; quæ radicem habet tuberosam (non bulbosam ut vult Colonna) parvam, Avellanæ nucis medullæ parem, cortice Colchici modo obductam ruffo qui facile evellitur, rotunda forma, oblonga verò, & inferius, non ut aliæ bulbosæ aut tuberosæ, rotundam, planam & fibrosam basin habentem, sed in oblongum pro ductam, sinuosam & in acutum desinentem, delphini ^{um} emittentem, lavem veluti arte elaboratam, superiorem animalis mandibulam ^{antem}, atque palati ^{zavam} partem: ex alia parte veluti inferiorem alteram mandibulam, quæ tenuis e ^{mobilis} menti instar, ex lata tenuissimis fibris divisa, tandem denis veluti capillamentis donata, quibus terræ adheret, & alimentum trahit: inter ambas vero linguæ modo, fibra carnosa, rotunda, longa exit, ex qua se propagare videtur ut aliæ tuberosæ solent, & radix tuberosa anno sequenti efficitur, cujus rei signum est cortex inanis qui supra vegetam radicem paulo superius invenitur ut depingitur. Fibræ pullæ, diaphanæ ut Orchidum fibræ, non solidæ ut radix tuberosa, quæ densa, dura, alba, splendida est; castaneæ immaturæ sapore. Duas uncias infra terram occultatur, & supra folia emittit quatuor, quinque vel septem, inæqualia, tenuia, dura, carnosa, minora & breviora Croci favi, nec lata, sed Xiphii modo per dorsum solida, duriuscula, striata. Bino emittere flores stellatos observavit Fabius Columna inter folia terræ hærentes, sex petalis constantes, è calyce exeuntes; quorum tria exteriora virescunt, vel violacea sunt, reliqua alba, & lineis tribus violaceis per longum ductis depicta silvestris vel verni Croci modo, angusta, brevibus intus staminulis: his marcescentibus capsula remanet oblonga, viridis, trigona, Tritici grano duplo major, in qua semina turgent, & in superficie propter cutis tenuitatem extuberantia apparent, ficcata disrumpitur, & copiosa, minuta, rotunda, flaventia ostendit semina. Novembris siquæ observata fuit hæc planta radicem emittere superne, ut Gladiolus, cui radicibus est affinis, quæque tunc parva admodum erat, duobus foliis emissis, atque hyeme potest crevit foliaque alia emisit: quare hyeme radicem tuberosam crescere & pinguescere certum videtur, æstate vero contrahi exsuccam, nam Vere capsulam perficit Aprilis mense, cum floruerit Martio.

4. *Sisyrrinchium spurium majus* flore luteâ maculâ notato seu *Ιεωδελφον* majus, nobis. *Sisyrrinchium* majus flore luteâ macula notato, C. B. P. *Sisyrrinchium* majus, Dod. *Sisyrrinchium* instar, bina aut terna, oblonga & angusta: caulis rotundus, dodrantalis, in quo flores bini ternive conspiciuntur, pulchri, colore carulei, verum fugaces & paucis admodum in hortis videntes, alternatim prodeuntes, formâ quodammodo Iridis, ex novem videlicet petalis compositi, quorum tria reflexa, quæ nobis menta dicuntur, pro fimbria maculam habent plurimâ parte luteam, alia tria sursum versus aliquantulum eriguntur, quæ vexilla nobis nominabuntur; tria vero reliqua respondentia iis, quæ Iridis florum fimbriam seu mentum contegunt, lineæ trifidæ nobis appellabuntur; proportionem huic flosculo sub exortum tenuiora sunt, versus finem latiora, sursum erecta, medium petali disti mentum tenent summa extremaque parte trifida seu trifariam divisa: hinc singulis succedunt capitula oblonga tribus loculamentis distincta, in quorum singulis semen rotundum, parvum uti Rapi continetur: radix tuberosa, gemina, una alteri superposita sicuti Gladioli radix, sapore dulcis & edulis, quæ involucre quodam integritur reticulato, quod quidem majoribus spissius est, minoribus quidem minus crassum. Duæ etenim hujus generis species esse videntur magnitudine sola differentes, una quid major, altera vero minor. In Lusitania & alibi apud Hispanos nascitur. Flore ut MachJinia; Majo mense in horto amplissimo & instructissimo D. Johannis Branchionis. ^{J, if pani} *Nozellias* quasi nuculas sive parvas nuces majoris radices, minoris vero *Macucas* appellant. Dodonæo bulbi esculenti genus illud esse videtur, quod Græci *σισυρρινχίου* & Latine à Plinio *Sisyrrinchium* appellatur. Crescit Valentino regno, sed & Murciano frequentissimum observatur atque eruebat Car. Clusius, præsertim tribus leucis supra Metropolin Murciam distam.

5. *Sisyrrinchium spurium minus* flore albâ maculâ notato seu *Ιεωδελφον* minus, ^{no}bi, *Sisyrrinchium* minus, Dod. Hoc flores protulic s; ^{fyrrinchii}

"ymchii majoris fupradifri (quodmLufitaniaobfcvabar^C', - , . ^rorfus fimiles, non ta-
nen caeruleos, ut illius, fed purpurei dilutioVis colbiis, vaffL , ,ugaces&ephetnerc
nteMianiajora, fivcmenta tria, inflexa & terram fpeftanti., albamacula erant ir
Hujus radices tubero He Sctmiformis fublVantiae, &nonbnlbofeproprieloauendo, exi
manias parte, in qua FtZa &c Maroco nrbcsfitaefnrr, delate funr, inicio z£m 1590*.

HALLUCINATIONES CASP. BALIHINI
Aliommque Authorum.

Slyriudii atfupr* M3am notagtniTita fait hoc,
ut/As ptaUjrsrcrcr in Itiigtii^fiawibui , atque
Tadiecta turn **>« feu appendicefnrmttn rojtri fu-
iilirefranU tder*ut reSe nonet DoZliJJimus fr.
bhi! Colamna: atqui quaita® qttiita plattta fupra
defhripta nimpalhnt hifie timdteisribis, tdant mint
la.hctJ rottwdos fnc tpiilyfi', atqie fares Iridunt
floribi't omuatio tonfermes ; tr*» nan /ant pfspric Si-
fyrinebio diccnfa, fed turn mdiribnt actedantGla-
diod, flariliis auunti rM, videiaur mihi ambigL-ve

inter utmtju-e, QlnSdalam/ciiker^ & hiitm; JiA
cumjnt ultima mogis accedant Iridam tlajfi, id
est fto rriui Scaj> Jtilis fcmiaibut/cminibu/^ur, ciif^
tm immediate Iridtfn ttibertfaTum slajjiprxfixi-
mtu: qvicunqfc bos ancipites & iufntelmr plantas
habent- Gladioli, ajl nobiharcum partem, fiuremfili'
cet, Iridti: idea nomen Iridis pneibitGladinh t» com-
pffti vne von'ideteiminantisgenus ad qusddebentif-
duct.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS,
radicibus tuberofis geniculatim 6c per juxtapoficionem constructis.
C A T V R VNI.
XYRIS Sf IRIS TUBEROSA GENICULATA.

XTR IS & Iris tuberofa conveniunt cum cextris omnibus anceditis in fecunda hac dif-
tributione conrcntis, quod fine Hexapctak: cricapfuiare tuberofa ratlice prxdkz,
fed a caeris etiam (iilingBnntur citm modo ftruffure florum HexapetaJorum, tum Eexcura
radicBmtuberofanim. PrimoXyris &Iris cubcrofa radicesfuas toberofas, longas, per juxta-
poficioncm & geniculatim conficiunt, aquibus fecundu* longitudinem demicmntur fibrie
ex geniculis. Secundo flores producunt primo incuku novenis pctalis conftantes, cum re-
vera pofitdebiram examinacionem apparentantum fex, namterna minora & angoftiora pe-
tala carinata, Gradexciemum fifla intrefparces (qu^lingaae nobis impofitenindenomina-
bflntflr) fnbexortum adeo arfte adherent rribusmajoribus peralis repandis (qux nobis itiderr
mentadienntur) utlinguae appareant, & tantumappendices cariiiaw inciimbentesmajori-
bus,repandis pecaiis, qux pajfim fiib meiuorum nomine a nobis recitabuntur. Sic omnea
Jiictes tamtuberola;, quam bulbofae, cerna habent perala majora, &adexrremumlatoracum
fimbriadiverficoloris ; hifceEernaangufta carinata perala incumbunc, adeoq;arfte fubexefi-
tumeatycce cilemteu mentis adherent, ut protribus tantom d.nobis pajfim innofta do-
ftrina accenferi debcanc; tcrna alia pecala'fqrnmerefta vexilla demum appeibnttir. Hac
ratione conlnt omnes Iridum flores tribns mentis leu petaJis majoribus repandis cum epi-
phyftbus Cuiiingnis, abiifdem infeparabilibus fineruatura, &tiibus vexillisfeupetalis fur-
fumereais: ficomnes Irides&Xyriserunt planri hexapetala tricapfulares, neutiqtiam en-
ncapetals dicendse font ut volunt anthores.

r

Sh flifilidi fi, quafi faforiumcuhrum dicitur, dtqua Dio/corUesl 4 t 22-
te, hy&jThfiheftrU fkcpkVlin, l. 21 .c 20. Irhfilvtfrk (^ quibujdam Xjrhwata) Spatul*
frida, turn ob folii figurant Gladklum referentk, turn quodgravtm odorem exbakt, vni godi*
citur.

Pars TABULAE V^a; Se&tonis quart.

1. *Tendula folio angulofo flore obfcureviridicolore, nobh. Irit tuberofo obfcurevi. i colorej Swert. titxmoda Siylusvtrus[^] Maith[^] Lugd. Tab, Q*

ST.. *Agria fetida vel Xyrk, nobis. Xyris, Matth. Spatula fetida, Eyft. ©*

3. *Zingiber diflaflore_ albo, nobis, Zingiber C.B.p. Zingibr flortalbo, Swert. ®*

4.. *Vulgaris Germamcafivefilvefris, C. B. P. I, is latifolia majowulgark, Cluf ffift. 'his ladfolia vulgaris aerulea, Eyft. 0*

5 • *Alba Florentina. B. P. Irk Florentina. Eyft. 3*

T A B U L A VI. Seft. IV..

6. *Sufianaflaremaximoexalbonigrkante C.B P Latifolia \ ^{Ir} Sufiana, Cluf, Hift. ©*

7, *Major Afiatka tonka five 2. Cluf tiifi. I_r« Afiaticacaruka polyanthos, C. B.P. 0 %-Dalmaticaflarefurpleodilution\ J. B 0*

9- *Pannomca colore multiple, mbh. bk lalifo- 11a Fannomca colore multiplki 7 C B P J_{ris} Iffoliamajons. ClufHiJt. hk'p[^] Uci.* Eyft. 0*

1 o. *Candidapurpurekvmsidiftinfta[^] C.B.P Iris latifolia major 2 j. Cluf. Hift. 0*

r 1. *Paluftris luteafeuAcorut adulterinus, }, B. IrispaluJirU htea, Tab. Ger. 0*

Iris tuberosa radice

Geniculatim feu per juxta pofitionem com- pa a

Angujifoliul Prattnfis

Latifolia

Humltis fm Cbam&iris

17. *Foliofatido, 7tobis. Iris anguftifolia major five 1. Cluf.*

13. *Nonfwtida altior, vobis. Iris avguftifolia 1. Cluf. H:J}. 0*

j" 14. *Flare purpureo flavefcente, nobis. CbamdnrU latifolia minor o8ava Cluf.Hift.Eyft.O*

15 *Minor flore purpureo is fubmbtnit, nobis. Chamddris latifolia minor 1. Cluf. Hift. ©*

Pars TABULJE VII,

1 L *Anguftifolia Jab. Cham&im tenuifolia Ger irugramimacui pmunt quctannis folU flore Wiegatoj. BXbabr. Q*

§. 1. IRISTUBEROSA RADICE PENDULA

Exphcatw partis Tab. quint* Seilionk quart.

1. *Iris tuberosa* folio angulofo flore obfcureviridiclnrfr u- T •
 ^viridi colore, Swert. Irisbulbofapncox Cluf Hifru J" Iⁿ stuberof a flweobfcure
 Tab.Satyrium_T Caf. AdlridesHne.lcin.o pertinet hwriI c moaa yles verUs > Matth.Lugd.
 longa&angufta, angutofa,terniscanalicalisdonata- Hnfⁿ tubero(a) > cui folia funt ob-
 Iridis ; veruntamenfc minor habita rations malorum i u- gr P[^] forma omnino
 minus in obtufiore & prona menti parte fimbria ri\ gjl & um ; ob kure viret, nihilo-
 fto femine dependet, in tres rimas fatikens • femerorL[^] P¹ TM¹¹ fatis magnum perfe-
 albicat: radixbinisautternisconfattuberibus, ohlrW " r mineminus > ""tioin-
 deliinftar, &.digitos-refrentibii8.' Peregrina ftirTft imoap¹ Ce p^{end}ncibu3 Al pho-
 & udmrpsdt, qux exOricmis partibus fir-Con-
 ftanci.

*ntin6poliregiAifcusvicinis, rodequeinJraliam&Galliamal; ". entriales noftras
 . . . iafsrar. De racukatibus hujgs Irid/s nihil fcribcp " . . . ic

§. 2. x y R i s . ^ -

2. XyrB vel Irisagliafoetida, nobis. Xyrisvel Iris agria, Theoph. Dod. Gal. :iob:lctoti.
 Xyris, Matth. Lob. Cam. Ger. Xyris feu Spatua Foedda, Park. Spatula faftida plerifque Xyris,
 • 'J. B. Chabr." Spacula tctida, Trag. (cui & Ghdiolus Ualicas) Fuch. Lon. Gefth. Hort. Czf.
 Tab. Dod. HKC plantub tctida (obfcetorcgravem, quem folia abrupta edunt j caule
 foliifq; Irid) figiiraomninofimilis; *tula* t; imen nigriora, gravera tccdmq; cicicum odo-
 rem (pirant, prafrftim ft conftrictar, atque digitis acrerantur: flores quoque fimilcs, fed
 luidbreS, purpurci, fordidi & obfoleticoloris, vclut Valerius Cordna., faturarapurpura arri-
 Hentes, quicaplulanim triangulabibus rodipentis quati abiffis exorituribus iftident, qua:
 andemd. fluemibusrloribts, majoreS facb; & dehifcentes, in cres dividancur parcesfeulo-
 nilanienta, in quorum fingulis plunma continents iemina Ochri five Erviliz femiimm roag-
 nitudinc, rubentia, Pxoniac reminnminftar fplendemia, quarreficcata contrahuncur & nigre-
 (cant: radices novella; plantaribrose, fed aduicibris rotunda, tuberofo, longar, per juxta-
 pofitionem geniculatijn contexts, atque exgeniculis craffiorcs fibrar dependent. Vettribus
 & mulcorumunnorum plandsrnultKfontradicesinvicem implicitae, magnum velucicefpitcm,
 aliarHm Iridumtuberofarum more, conftrictucnces, guftu [trvidar, ficut & ipfum femcn. In
 Hsmuia & alii Italia: & Galliae locis multis exit. In Belgioaurem vix inaliis locia quam
 • ;tif rperitur. Florem edit Julio & Augufto, femcn Autamnomataratar. FiguncKuchfii,
 jrtfiioli, item JohannisBaahiniribroia radice pinguntur, dumeniniadhucjavcucsradicem
 nabetit/ibrofamleucapillarem; nbiveroadoleverint, crafiituberofa; quefunu Provenicpro-
 pc prata Si licoreos maris aggercs, & pariter inter dumeta paffira prope Montpelium^Blx-
 fasreperitur.

. *Gladiolus* foetidus^nartcimis, C. B. P. Xyrismaritima quamfluftusinlitora cum aliis pur-
 ſamcntis rejiciunt, Hift. Lug- Hsc efteadem cum priore, radicicus riuftibus maris avulfa, &
 cum cjufdem purgamentis ad litus projefta; cur primo mulcipficet entia fine necceflitate
 Dalechampius in Hiftoria I.ogdnnefi, quem fequw;us Cafp. Bauhinus, nihil eft caufa.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

X} I i tenuium eft partium, inquit Gaknus, afiriilori^digerentK <sr dtficantUefifaculnth c^m
 radix, turn multo mam amplim fruEtus, qui quidem isr unnam ciet, iy Hems indurates fa-
 nirtpQHfl. Dioscorides ail radicem contracapitk vulnera isrfratlurai facere, acukos educere,
 , & tdum oiiwe cifra dolurem ekstrakre, admixta <grh tertia parte & Centaurii quint a parte {\$
 mdk: fitwarexdemnta isrinflammationescumacetoimpoftam, acccnvulfa^rupta^cox^ndicum
 dohrts, flillkidiaurhi£ is diarrhvai; cum paffa tritum fruSium unnapotenter movert trio-
 huipottdere ex vino bihilum, liertem vero minuere cum acetopotum.

DE HEXAPET&LIS TRICAPSULARIIBUS,

r^dicibns tuberofis geniculatim & per juxtapoiirionem conftructis.

§. 3. IRIS TUBEROSA LAT. IFOLIA.

Iris, *is* vwwftHi, i.e. 1. a c & leflisanus fimit'itudine nomen accepit. Species complunseffe
 • coloreforit diffi-TznteS) idem ojlendit \ntn^ecandida^aUenit^iutC^urfUKO^CdTuhofgucysftO
 C{iliinigrasiegiMt J quamcolorumdiverfitatemnoninunofloreupmri^ videtur Dioscendes Cut
 aliqui credunt J vofuife, fi quidem de Illyricamaximeloquatur, CjUamBraffavolutin Itlyncople-
 rumque candid^ "#« pal/idU, jwmunqum httin is etiam purpurek conipexit. Thophrasto
 6Xaufar.i?~ Irisodorata estis agratia palatinomm accedit, qu* in Illyride (6. Cauf. 28. j
 tneBor quam in Macedonia: in Tbratiavero, locifaue frigidicribus adore penitit caret. Gaza 'Iri-
 te vocem. conftraticem vertit, Plift. IA i.e. 7. Iris diverficolor fpecie floret ficut isr anus cceleftk,
 unde & nomen: laudatiflima in Illyrico; proxima in Macedonia, quae longiffima, candidans & exilis:
 te/tium

tertium locum habet *Afim* amplissima isrgustu amarissima. Illjrica quotfle duumgenerumj Raphanifps, a fimilitu'dini' ('forth Afragalites Gay. isf Jqtij qu& is melior, Rizotcmis fi'brujjw nonimprobatur%ci\$Pifidica.

RecenTiores multas differentias agnofcunt: qua/e dividemzts in earn qu<e radice est genicuhta, i? eem qvg est-radicebylbofa: h<eenimisr foliorumlatitude anguftiave, florifque colore.is'ra-t'wne foci tiatath variant.

In hoccapite 8^{vo} hujus quarts Se&ionis* agemus de Iride tuberofa radice geniculatim & per juxta pofitionem conftru&a donata, cum pluribus fibris in terramdimiffis ex fingrfs prsdi&£ radice geniculis;& hoc nomine quamfacilime diftinguitur ab hïde radice bulbofapraedita, cujus radix conftat ex multis tunicis feu pelliculis majoribus & externis involventibus minores infra, atque illis funt adhuc majores refpectu inferiorum ufque ad meditullium, ex quo deorfum verfus demittuntur barbuIs feu fibræ, quibus finguli nutriuntur bulbi proprie dieti: <ftn> fumverfusveroprotruduntur folia, caules fuftinentes flores hexapetalos, & confeqnter capfulas trigonas, feu tribus loculamentis diftintasj in qubrum fingulis continentur plurima lemna rotunda aut aliquando oblonga, Pifi magfiitudine. Tertio occurrit Iris tuberofa, Zingiber di&a a calore radice tuberofa, & ejus in culina ufus; Zinglber Latinis, ^y^ttn Grscis dicitur.

Zingiber cum folia, Iridis isrfiliquam aliquatenus Xjridifimilem babeat, de eo hie agendum: quod t>iofcoridi 1. 2. c. 190. Siy^&pis; Galeno& OribafioZtyyifc?dicitur: Flin. I.12.C j.Zimpiberi & Zingiheri habet.

3./rMatifolia tuberofa Zingiber difta flore albo, nobis.. Zingiber, C. B.P. Zingiber flore albo,Swert. Zingiber & ejus filiquaJ.B. Chabr. Zingiber Orientale florefcens, Park. Gingiber & Zingiber, Herbariis, Zingiber folia edit Iridis paluftris more, teftibus Garzia ab horio 6, Monardo. Radicibus conftat ex pluribus tubeibus geniculatim conjunctis conflatis, unciam aut femunciam longis, digitali craflitudine, angufta cervice commiffis eadem ratione qua Anemones radices, cortice extenfo, ex cinere fufco, fubftantia itidem intus cinerea, albicante, folidiufcula, fibris longis intertexta, fapore fervido aromatico*, piperis smulo: e^ radice oriuntur caules fuftinentes flores Iridis forma, colore albo. In India Orientali colitur, vel radicibus feftis & feparatis, yel feminibus fatis: folia, inquam, habet Iridis paluftris aut Gladioli, non autem graminea aut miliacea, u> vult Acofta. Duplex eft Zingiber quoad fubftantiam feu confitentiam & colorem radicum, non autem quoad formam diverfum, nigrum, tenuius, at album intus candefcit & mollius eft, quod cum in tifficinis, tum culinis ufurpatur; nigrum & durius & magis lignofum & intus nigrefcit, cujus figuram hie damus. Floruit in Germania teftes Emanuele Swertzio ex relatione Dom. Stephani; nigri autem radix minor nigriorque, ejufdem autem forms eft forte Zingiber foliis miliaceis aut Lachrimis Jobi, Zingiber intus fufcum Cord, in Hift.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Radicylu Zingiberis utuntur admulta, quemadmodum nos (inquit Diofcorides) Rut a, in potioni- bus qu<£ ciboprjijniuntur coquentes, ~4&aim co&uris admifcentes. Vim habet calefaciendi, toquendi mollificandi quefto macbovalde commodam. Facit etiam ad ea qu<e oculorum fupillis tenebras efundunt. Admifcet quoque antidotis; (sr in fummâ, Piperis facultatibm quoda, .:- modo [mile eft Zingiber. Zingiberis radix excalefacit fortiter, fed non ftatim primo occurfu veluti Piper, undefane & ipfum partium minus ubi ium q i b m Piper exiftimandum eft, fi quidem tn tenues folveretur paries, & celerrime acla, ut illud fieret calidum. Apparet enim elabora* tarn ^ craffiorem adhuc quandam ei ineffe fubftantiam, nee earn ficcam & terreftram, fed humidam potius autaqueam. Radix Zingiberis condita ad effettu* ventriculi frigidus confert, Jnpta mane jejuno ventriculo. Corrigit omnem ventriculi humiditatem, ac omnem corruptio- ref & mtata n m e <? ob nimvum efumfruftuum. Infyrupo aut faccharo cpndia confert tuffi i Sf cont^ ^ I F ^ 116 ^ am pur gat atque maturat fimulis pituitam vifcidam ac left am. Valet fufufiones hepatis, generator a frigiditate isr humiditate; memoriam juvat. Sperma Pam^ A ad TM n e r e m excitat. Denique Zingiber calefacit ac utile eft in cibis; datum cum pur' % J * T M T M m m i o r i h u * M Colocynthide, Hermodatylis ^ fimilibus; eorum quemalitiâ m cor- rabib . p . era a P U c i Johannem Bauhinumpag. 746. Torn. 2. Optimum eft Malabaricum A- etiarni, J r ^ ^ ^ ^ titum, fecundum locum obtinet quod in Bengola colitur. Invenitur 4. b k v l T n m L a u r e n t H & C o m a r o . - > I U * f o h i o p i * f u n t f i n i t i m x r e g i o n e s .

to^ filveftis-M ff r n i a n i c a f i v e f i l v e f t m > C B . P . I r i s G e r m a n i c a , F u c h . I r i s c z r u f c a , D o d . > " w t t h . L u g d . T a b . I n s f i l v e f t r i s m a j o r , M . a t t h . E p . C a m . G e f n . H o r t , I r i s l a t i - f o l a

folia major vulgar-is, Cluf. Hift. Iris, in taucCar. Clufius, eftev, ea^u^irpium numero in quibus in ma varietas obfervabatur ab ipfi, in ntlam enim provinciam peregrinationem inftituit qui\$ ejus aliquod genus ante fibi non confpectum invenit, ut ex fuis Hilpanicarum & Pannonicarum ftirpium Hiftoriis, qua* feorfum funt *idkx₀* videre licet. Omnes auteq; Irides, tuberofe dividuntur in latifolias & afiguftifolias, latifolix in majores feu proceriores & minoris J; ai pumilas. Iris autem tuberoia latifolia major hortis vulgariffima radice geniculatim conjuncta conftat, & per obliquum agitur, craffa, rugofa, guftu acri, confumptoque fuperfluo humore tandem odora: caules cubitales & feftuicubitales^ ramofi, teretes: folia unciam lata aut latiora, rigida, ftriata, in gladii mucronem exeuntia: flores amceni, violacej, tribus petalis repandis per oras infimas variegatis, cofta interius ad medium ufque folium crocatis apicibus villofa; totidem furre&is obtufis mucronibus, S^fere rotundis, carinata inclinatione coeuntibus: inter quae tria longa, praxli&is fex minora, mentis feu petalis repandis incumbentia & fub exortum arte ipfis conjuncta: a, dilutiore violaceo colore tincta Win fummo niffa, mordicus in exortu ad h^rentia & junfta repandis, quibus poftica parte totidem concolores fibrae albicantibus apicibus apprimuntur. * In fumma totus flos Iridis omnes colores repraeftat, unde nomen invenit. Poft oftidium flos contrahitur exiccaturque, decidit, oblongum, ac triangulare capitulum relinquens, quod in tria loculamenta divifum eft; in quorum fingulis confpiciuntur femina rotunda, oblonga. Graviter tota herba, ut Sambucus, fere dum teritur, fpirat; praefertim pdix, * qu^ etiam guftata Coccognidiimodo fauces exurit. Iris tuberoia filveftris parum differt, aut paucis notis a fativa diftinguitur, foliis fcilicet minoribus, & hyeme profus non apparentibus, cum fativae folia hyemis (*xv'itix*) contumaciter refiftant. * caulem etiam filveftris brevijorem quam fativa fert, e quo flores viginti fere diebus ante fativae flores erumpunt, colore magis purpureo; caetera convenit. Haecft quam in teftofum culminibus, vinearum maceris & muris plantare confueverunt, qua: in hortis tranflata cultura fpeciofior eft. Fit degeneratio floris qui aliquando eft pallide ca^uleus aut cyaneus, item & albus, & eft Iris Germanica flore albo, C. B. P. & Iris Candida, Dod. fub Iride altera Iris vulgaris candidis' floribus, tob. Icon. Lug.

* *S. Iris alba Florentina*, C. B. P. Iris Florentina, Irios officinarum, Dod. Gall. Lob. Ad. Iris major alba, Illyrica vulgo, potius Florentina, Cam. Iris latifolia major alba, CluCHift. Qui purpuream vulgarem Iridem recte norit, in nullonegotio hanc albam Florentinam dignofcet: nullam quippe in radicibus, foliorum, florum & capfularum feminalium form^ diff^erentiam notabilem animadvertimus; at in colonis varietate & radice odore intentiore non modicum eit difcrimen: folia enim colore ad glaucum magis accedunt: flores gratiores odore praditi, & laete candore perfusi funt, extrmorum coftis non minus quam purpureae extra videntibus, quibus intra lutea crocomata refpondent; imorum autem foliorum margines luteas ftriae percurrunt: radices hujus Iridis ficcatx non corrugantur, & differt? lpr3cedente, quod xrlc fit radice minore. Cur Cafparus Bauhinus feparet Iridem Florentinam albam a vulgari alba feu Matthioli nefcimus, cum Florentia fit in Hetntria, ubi obfervavit Matthiolus flore albo, nam ? 5 triufque coloris Florentia? obfervantur Irides, quae folent pro Iride vendi, quae funt majores, craffiores, folidiores, candidiores & odoratiores quam funt radices Iridis vulgaris noturatis. Forte regio folummodo eft in caufa diverfitatis a noftra vulgari, hoc enim rationi confonum eft quod plantae fragrantioribus, aut odoratse radicibus, intensius in calidioribus & ficcioribus regionibus, quam in frigidioribus & humidioribus redolent, fuavioremque fpirant & fuffundunt odorem.

6. *Iris Sufiana* flore maximo ex albo nigricante, C. B. P. Iris Sufiana, Cluf. Pan. Iris Chalcidonica variegata, Lob. Tab. Iris latifolia major 1. Cluf. Hift. Iris Pharaonis vel nigra Cretica quibusdam. Hasc fena aut o&ona habet folia Iridis Lufitanicae bifloras foliis non ab familia, mutuo fefe utinaliis hujus claffis fpeciebus ampleftentia: e quorum medio caulis exit cubitalis & amplior, rotundus, geniculatus, digitalis craffitudinis; florem fuftinens omnium, tpx inquam inter Irides obfervatae fuerunt maximum, fex petalis cum tribus lingulis utin caeteris Iridum fpeciebus obfervare licet conftantewi, colore tamen ab omnibus differentem; nam tria ad terram inclinata petala craffa, funt interiore parte omnino nigra, nifi quasdam venje ex purpura candicantes intercuriant macula ab infima bafi ad medium ufque, nigri panni inftar medium petalum occupante, foris multo dilutiora funt. * terna minora iis incumbentia formata & bifida funt, & ejuftem fere coloris, paulo tamen dilutioris, licet ack obfcuram purpuyam jcedentis: tria furrefta feu vexilla palmaris funt amplitudinis & membranaceas pxne J^nuitat, plurimis iineis* unckilatis ab infima bafi ad extremum ufque petalum excurrentibus,

pardm nigricantibus, p; riy n fex cineraceo candi randans, ut Americani Pavonis c?¹ caud<m fsre imiteitur, iicernb circa unguem ntfhnihi!4iiri'uea. Nulltisodoriu h-prehendkur, led lbh coloris varierate commendabilis est.; illi fuccedunc, fed ran- ngona, crafla, midas tres quatuor int-rdiim longa: femn numerofum, fulcra: fultorma magnum, in fe: cdtinenda. ' HJCC Iry primo Coritandnopolis mill-ganti variegato: florem enim fertexalbo& nigrovariegatum, fed nullumedit odorem Ego (inquit Clafius) quia ex Sufis, Sufians provincial metropolis, primo in hortos Conftan- tinopoli vicinos, ultra i bolphonim fitos, illacam jadico hanc Iridem Oiani id nomen indicare videtur) Sufianam nuncupandam. Hyemis injuriam difficulter fert: in horco repofica, reliquis Iridis f. acie p b u s t e n e r i o r & d e l i c a t i o r : r a r i u s c a t e r i s f l o r e t , & u n i c a m u t p l u r i m u m f l o r e m p r o f e r e M a i o ; f e m e n e s t m a t u r u m J u l i o & A u g u s t o .

ca caerulea five 2. Cluf. Hift. Sevia, septena. o a o n a ^ t folia hie Iris nium Iridum ampliffima & in latum expanfa, viridis cui eru permixta videatur coloris, mutuo fe im lectentia p, equorum m, dioc, dc, m, pronn, u, cl, nuic, il, bir, L, n > cr- eti. mb. cnb. t. km vel an, phorem, rirn^ caffiorcm faptoze, l^em Lieu atanv multi ifaqe alls (joncavum: au/bys roniafi ^ l i m c i c o r o d i c " T M ^ v a g i n u l i s i n- U \ \ r Z S M S m S i s c o n . a n t e s , r o r u m t e T i n f i t a d i l u t e p u r p u r a- fcentis, atque ad caeruleum tendentis sunt coloris, mulr purpur. T f v e n i s a b i n f i m a parte & flaminea fimbria flava in longitudinem & latera excurrentibus, bifida petala exalbe- foant, gibbo tamen illorum dilute purpurafcente; tria que fe attollunt petala angultiore & ima parte quibusdam purpureis brevibus venis diftincta funt, ubi vero fe in latum feu mentum expandunt fubcaeruleum habent colorem diluorem adhuc cu florum Samburci odorem, graviorem camen, qu3dam modoi Emala! itiiir.' iis faccedunt rariores caplula craBi magn^ Fiangalaresacobwromucroneprsiw, qtiibus maturicatedchircentibusftnienintrih'. oris femini pat: radix craffa, magna, nodofa, tuberofo, geniculatim compacta, multis longis & rafisque fibris donata, lateribus ut reliquæ hujus fortis fe fe propagans; purgat, fi exfic- cetur odorata in remiffiore gradu quam Florentinæ Iridis radix. Conftantine miffa fuit hxc Iris ad Carolum Clufum à Domino Ungvad Cafareo tum apud Turcarum imperatorem Legato. Floret etiam Maio.

8. /rw Dalmarica flore pupureo diluore, T. B. Hæc cr. o e a angultiore: flores purpuræ d. singulis caulibus oblongiore pediculo inhærentes: femen in breviori triangula capsula angulofofum, pallidum & rugofum. Floret ferius Vere Iris Dâl- matica minor, Iridi bifloræ facie omnique fua parte perfimilis, fed tota minor & flores dilu- tiores aliquanto. Alphonfii Pancii Medici Ferrarienfis munere miffa Clufio, Belgii inquilina facta, unde nobis communicata. Huic valde affinis eft Iris biflora Lufitanica, flore tamen vio- laceo. Est odoris Oenanthen aut Lilium convallium Æmulantis. Floruit Vere, poftea etiam Au- tumno mense Novembri in arvis circa Conimbricam celeberrimam Lufitanicæ urbem. Item & falebrofis & lapidofis locis circa Caxcays maritimam urbem & portum, unde detulit Car. Clu- fius Olyffipponem & inde in Belgium mifit: quia & Vere & Autumno floruit, bifloram Iridem n appeliavit

9. /mladfo Jia Pannonicacolo remukidici r R P T i s I * T I - g o f a f m t h u i c f o b i a m i n u s e a m e d l a n K * - v i r i d a q u a m q u a r t a C l u f i i , f e c u n d u m r a d i - c e m i n r e r d u « 1 p U , P , r a f « M t r a m U s d o n a t u m : q u i b u s f i d e n t f l o r e s e v a g i n u l i s e m e r g e n t e s , m a g n i , v e l p r o f u s a r i s f l o r u m i n f t a r o d o r a t i , c o l o r i s v a r i e t a t e c o m m e n d a - t a n t & a t t o l l u n t u r , a u t c a c u m i n e n u t a n t & p l e r u m q u o t i n I r i d e b u l b o f a n o n n i

Mb : "am triaper la J qu 3e f l r f l m lut. ... is quemadmodum & il. terram reflex:

res radiis abipfadede ad extern £ 1 1 T P ^ ^ o n v e n i u n t , m o l d s r a m e n p u r p o - « r u m f t i r p j m f l o n b u s , q u a : c i r c a r a d ^ n ^ u o c . P l e r u a q ^ f a t u r a t i u s p u r p o r a f c i t i n g a n a p i f t u r a d e c u r r e n d b u s : v i l l o l a f i m b h , p u r p u r a f u n t f u f t u &) p a l l i d a s o n w e l c w b i d a , p a l l t n e s l i g u f e : m a g n a t r i a n a u l a r h q ^ ^ " ^ g ' t u r , I u t e a e f t , e x c r e m o v e r o e x < > b i n a g n i : u d i n » f u f c u m , r u g o f u m c o i T i n • r i - " ^ ^ ^ o ^ u f o m u c r o n t - c a p i c a f e m e n O J ^ o n s ^ v e (c e n s , ^ u l d s u c r i n q u e e x g e n i c u l k n V r r a u f n o d o f a , C u b t m r a > v u l g a r i s I r i d i s i n l a r f i c c a t a o d o i a c i f l k n a e f t , & c u n ! i i j y r i c g a s Q S l a i S l K l ^ f i r m a c a . f j u a : r e p a r g a ^ & « - c o n r e n d e r c p o f f i . e x i f t i -

exiftimatur. In montanis fupra arceijn DiVj Georgii herbido *H[^] collibus Stamphen* immi-
nentib-is, in Hungariatranfdanubian/ialiquot miliaribus fupra PoWoium crefcit. Floret.Maio;
fiab Junii finem femem maturum eft.

10. *Iris latifolia* Candida purpureis venis diftinfta, C.B.P. *Iris major latifolid* 27. C.M.
Hift *Iris Portugalia*, Eyft. Haec folia, caules & radicem proflucit priori familia, fed in cymis
caulium producuntur flores bini ex vaginulis ex pallido virefcenribus, colore autem variantes;
nam terna petala propende[^]tia candicant purpuras exoticas venis ab infima eorum fede per
latera excurrentibus, ufque ad extremam fimbriam fubcaeruleis venis conftantem; terna au-
tem incumbentia, & ligulam feu ftamina tegentia, alba funt, fubcaeruleo tamen eorum gibbo;
vexilla feu terna furre& etiam Candida, & ab infima fede multis purpureis venis diftinfta,
doneq; in latitudinem expandi incipient: flori. evanido fuccedit triangulare caput, binas pzne
uncias longum, craffiufculumque, quod maturitate dehifcens Julio femem oftendit, rugofum,
fubfulcum, Ervi magnitudine: radix hyeme folia non retinet. Floruit primum Maii initio ex
femine deciduo alterius nata quemadmodum pi fatu plurimae oriuntur fpecies diverforum co-
lorum/rion folum in biice, led multis aliis longe patentibus generibus.

1 i./ri/paluftris lutea feu *Acorus adulterinus*, J. B. Chabr. *Iris paluftris lutea*, Tab. Ger.
Pfeudoiris ieu lris filveftris lutea, Dod. *Pfeudoiris paluftris*, Eyft. *Acorus adulterinus*, C.B.P.
Acorus falfa Cordi in Diofc. Gefn. Hort. *Acorus vulgo*, Caef. Butom. Cluf. Hift. *Gladiolus*
luteus, Fuch. Icon. & Lon. *Iris ha?c paluftris lutea folia quoque gerit Iridis vulgaris*, fed Ion-
glora & anguftiora, dorfo aliquantulum utrinque extante: caul«s glabros Iridis latifolias haud
diflimiles, fubinde bicubitales: atque in iis flores complures uti aliarum Iridum, nifi quod
horum fuperiora petala omnino parvula lunt, cV praee iis qua? in veris Iridibus vifuntur. quaedam
veluti tantum funt rudimenta, ac prima lineamenta: florum fingulorum tria funt petala
rpan'da, lutea, cum fimbria itidem luteis, quibus linguk tres carinata[^], luteas itidem in-
cumbunt & fab exortum iifdem artheadxrent ufq; ad medietatem mentorum & ultra, nee
ablque ruptura inde avelli querint: tribus vexillis parvulis, luteis pariter, & furfum tenden-
tibus fuccedunt rudimenta capitum, quas tandem evadunt capfuk trigonas feu tribus loClla-
nientis diftinftae, in quorum fingulis continentur multifemina compreffa, plana, ordinedi-
gefta, cartilaginea, Lentibus majora: radices oblique oblonga?, geniculat*, cirrofae, impro-
pagines divift, colore pallide *rubentes, guftu aftringentes; atque ex fingulis geniculis de-
fruntuntur fibrifatis craffe cV longa?, quibus nutriuntur & praediftas radices, & totaplanta.
Paluftrifcus locis, & riguis & humidis traftibus Italia?, Germanix, Gallic, Anglice, Belgique
fatis familiaris. Floret Maio & Junio, & verlus Autumnum femem fuum perficit. Officinae
perperam olim *Acorum* appellavere, & majore cum errore radicibus ejus pro legitimo *Acoro*
uia-funt: nam nee forma, nee fine ultimo conveniunt, fed differunt, cum hxc *Iris paluftris*
florem & capfulam femalem poffideat omnino conformem *Iridi latifoliae*; at *Acorus* venis
iulum loco floris fert, & eo ipfo nomine viribus etiam differunt. *Iridis paluftris luteae* radix
facultatem habet aftringentem, quippe frigida & ficca fecundo exceffu; dyfentericas & alias
ventris fluxiones cohibet; menfes & fanguinem undiquaque fluentem fiftit, ac fupprimat in
potu aut aliter fumpta. Sunt & futiles quidam authores, qui folum gefantem ab omni fan-
guinis luore tutum affirmant.* *kd* haec & hujufmodi cum vanitate dicuntur. *Johannes Bau-*
hinus Tiguri aliquando guftavit flores, qui fibi tantum ardorem & fervorem excitarunt in fauci-
bus, ut fummam acrimoniam vix potuerit mitigare oxycrato: radix autem infigniter aftringit.
Nos interim non exiftimamus *Pfeudoacori* radicem iberilitatem mulieribus inducere, quin
imo utilem putamus ad promovendam conceptionem mulieribus nimium humidis ac gonor-
rhea laborantibus.

§. 5. *IRIS tuberosa pratensis anguftifolia.*

12. *Iris tuberosa pratensis anguftifolia* folio fetido, nobis. *Iris pratensis anguftifolia* folio
foetido, C[^]. P. *Iris anguftifolia major* five 1. CluCHift. & Eyft. Explicatis *Iridum tuberosarum*
latifolarum fpeciebus aliquot praecipuis fupra, jam fuccedunt *Irides tuberosae* explicandae
quax anguftiore fmit folio. Prima haec, quae & major dicitur, multa profert folia, longa, rigida,
anguftiora & nigriora quam *Tripolitana*, qua? compreffa vel confracta ingratum tetrum-
quod odorem fpirant, propemodum ut *Spatulas* vulgo appellatas & fupra explicate folia, mi-
sus "tamen graveolentem: inter *quax* caules teretes, oblongi & cubitales, interdum etiam
& longiores exfurgunt,» quaternos aut quinos flores ex vaginulis lateralibus prominentes, *Iridis*

bulbosæ versicoloris floribus formâ non admodum dissimiles, colore caeruleo saturatioribus; quibus succedunt oblonga capita, ginosa quam latifoliarum tuberosarum Iridi conspicuntur, angulis etiam eminentibus plicis sive divisum, aliquantulum membranâ tectum ostendunt: radices omnesque longæ, nodosæ seu Iride latifolia, Tripolitanae radicibus proles, foris a te vintas candicantes aut pallecentes, sapore acri & fervido, eminentem in quodam prato Rheno vicino Car. Clusius, & aliquot deinde post annos pratorum margines non procul à Wanderingstorf, qui apud Walterstorf, deinde in pratis quibusdam Hungariae apud Lindwa domini Banffy attem. 13. Iris tuberosa pratensis angustifolia non foetida altior, C. B. P. Iris angustifolia Clus. Hist. Altera hæc Iris tuberosa pratensis angustifolia, quae perdegans est, nullibi mihi conspicita fuit, inquit Clusius, antequam fongiora foii radmodum proficisceretur, habetque cobitalia, inter dum viridia, non tamen sine digiufive femiunciaelatitudinem non excedentem purpurascentis, in prato quodam, ut pleraque aliarum Iridum angustifoliarum, sunt præditæ: nec intus cavos, geniculatos, virides, summo in nigro in binos am: cernos ramulos divisib; quibus insident bini aut terni flores Iridis bulbosæ latifolia: floribus forma fimiles, odorati: quorum terna petala deorsum inflexa seu repanda infima parte, & quatenus carinato aut alii bifidoque colore venis fawraciore purpura nitentibus per petal! longitudinem Sr latitudinem excurrens, & fimbriatave foperaliocarente; tria petala fimum erecta angustifolia Clusii sunt, cum bifidis suis exalbidas illas lingulas tegentibus, & purpurei saturi sive violacei sunt coloris: breves deinde succedunt capsulae triangulares, breviores quam in Iride anente præditæ, quæ per maturitatem nigricant, & durum continues rariv ni. tenuis, dura, nodosa, imitar radicis angustifoliae primæ Clusii. Sponte provenientem invenit præ Himbergam, Eberstorf ad paludes, & est Augusto. præditæ. Sponte provenientem invenit præ Himbergam, Eberstorf ad paludes, & est Augusto.

§. 6. IRIS tuberosa humilis seu Chamaeiris latifolia.

14. Chamaeiris latifolia flore purpureo flavescente, C. B. P. Chamaeiris latifolia minor 8" Clus. Hist. Eyst. Hæc Chamaeiris latifolia minor 8" reliquarum fenini more petalU wvancur tantum perala distincti & Jc an Ce diximus sub initium lujtis capitis, fex ob- tim menta dicent: "O fennpr« r dtlcreta» quorum trin de oilum inflexa (quara nobi spaf. scriptarum. "A. . . i S S S S S ? * * * 1 * 1 longa & pax r aquar T hium fu prad A amole. . . «JBtur • coforr m 1 L . . . Itextreni o nienti mi. crone Hons pediculum averfa ? " ? # « W J M J ! I 1 5 S . . . P « « flavescen-tem, deinde d lute purpnr af Li, gulæ lineam, atque singula horum mentorum seu petalorum reflexa integunt sin- q «wcm S S -reaa tria petala vexilla «Obisdi&3 Odor tere florum Sail * ? r ColonS, ni smulns. Hue referri debet Chan^iris latifolia fiavo fir n» «7» dalc; ant Thalictri HilS-Comxijis JatioJia minor flore purpureo, C. B. P. Chamaeiris latifolia minor i. * Clus. Hist. Iris minor, Dod. Chamaeiris latifolia minor GEEC, III minor i. * Clus. etiam breviora angustioraque, qualia sunt Chamaeiris latifolia minor GEEC, III minor i. * Clus. cronata, nidridismajotsC^ . . . ofUntmilY)rts, folia enam minora: (emcmtideni minus; infloribus f, ml ca P^ triangula & mu- cas adnove . . . ftaminacwoleos habeant, infra verc" r in TM T V TM " ^ * «c omnes fim- lores in produc. l. nam omnesvalde eric difficile, natura in infimicum ludente & variate co- Chamairidum latifoliae. idruo, ^ ftuunularum, u j - . . . ~B*~>~*~*~*~*IU . ljuinn dicenduRj dc- yawmtibws colorum cftier-

[^] 7 IRIS tukrcfi tmibS'' Chm*TM mgufUfSl.

qWnois folia fiorevariegato, J-B-. C. tah-. ^ JTM ira d «ra b cio & folia grammea, an-

fimilitei-coruceteaa^{^-^^} •proventwtaquehKmin.n.aCtaiiKirKlunifpe-

^{c i M ^ K S l S f t h ^ S} prxfert.m.eaqu[^]nalxiorem caulem aiTur^t, plure que
Gmpofihirte & Baden «^» S p is simpliciter & Iris puill J v (s anguftio^{ia}

[^]SSearcu[£]c[^]def^x à Clufio, attestante ipfo in Hil. or. . .
florum differentes. complures esse Dioscorides

qui

TEMPERAMENTUM & VIRES.

fere
iores

tattmtjus contemperet, f^mTM ^ difficultereducuntur attenuate : rifpirationii
difficultath ⁿWTM I[^]-hui^vmima Pro Muumaceto, mquit Jiofcondes, poU: atm vino

W" * " " " de C. Tl nnt! 7bTZcet fi J adkh AtitoWm foveantur: coquitt
icit : vulneratis medicamentis imijta

nocet cum per J^c
mutfo is N*r<b^{lndm}>

HALtllchNATIONES* CA SP. BAUHINI
Aliorumque Authorum*

PijTSiq. tol. i. pt. M. ACDTUI atBkrintis fitu
Iris lutea paujfrui coSocatur cum Ataro lutifero
planta I. illic, fedmaU. Acorliadiiltefinttt enim
omnibus Jit is partibis rtnvenit cutnlride, pngcipue
jiaribut & caffuilisjeminalibits; ergo dtbuit turn juts
tvnjbribtu conjuitgipfontit, neu autem dijfiani cum
Atoro fahfertpTopter coiifarmittitem folioruffi; nam
yfeortts verm feu Calamus aromaticus ojficinarum
debt dijponi inter Jilantai aqaatiem panicvXatas

feu iulos firntes, (3 adjunct Cypcri odvratr facie-
bus, nun autem Acer»adaturino, qui eftprftia Iri
dUf' fies fip ra docuimus.
Pal. Pinacis i 8.39. & 40. Caffarus Bauhinus
dt Iri% bulbofa, & cnHttcate. indem inter tberofafjn
licH Iridem tubcrofam, Stfyrincf>ium & Gladiahm ;
cum Iris bulbafa, a ctinfarmitatcTadifis bitlbofe, dt-
bet inter plantas bulbafes'difptmt': bee tuiliht clan
vidmti appart erratum.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS

radicibus bulbosis proprie didis preclius.

- D I S T R I B U T I O III.

Insbulbosa, NarciiTus, Hyacynthus, Ornithogalum^Cepa,
Allium, Porrum, Moly, Scilla & Tulipa.

CATVr IX

mis BULBOSA;

Quandoquidem in prima DiftribnEtorje plantarom hexapetalorum tricapsularium cgi-
musdeHfxapecalis tricapsularibus radicibus fuffiforinibus fibroiHque donatis; & in
fecunda cleHexapecalis Ericapsularibus radicibus tuberofis & nodofis: in %" hac Diftributione
agemus de Hexapecalis cricapsularibus radicibus bulbosis proprie fie diftis donatis, Nos bulbo-
fas, proprie loquendo, pjantasappellamus, quarum radices conftanaplurimistiinicis, quar«mq;
major & exterior Temper involvit minorem, & ilia inferior & minor, major eft refpectu intericris
iifque ad minimam Sf meditullium, ex quo deorfum verfus protrudntur, feu in terram demit-
tmittitur barbin-£ feu fibrae, quarum benefido nutriuntur cum radices ipfe, turn folia 5c caules
luftinentes ttors hexapetalos, & capfulas feminales^ ipfaque femina ibidem contenta. Sicuc
U f i t b d i o r e n i t c u r Iridibus tuberofis & nodofis radicibus geniculatim Sf j>
juxtapositionem donatis, ita tertia \z c DV ft b a o Hexapetalorum tricapsularium incipiet ab
Iridibus bulbosis, quae conveniunt cum tuberofisflorum fruftura & compositione Tcapf«brum-
que figura. triangular!; difterunt tamen radicibus & foliis, cum harum radicesfint plane & per-
fettebulbofae, Folia angufta, cava, carinata; illarum vero radices tuberofe nodofe , quin 6'
loliafunt lata, comprefla, Gladioli inftar. Irides bulbofe habita ratione foliorum funt , ve!
latfolijB, vcl anguftifolix; liabita vero ratione colorum riorum, variis modis, ficut in tuberofis,

Pars T A B U L / E VII. SeSionis qaarti.

[f i. Odora, nobU. Iris bulbosa latifolia, EW. Lwd Cam. Iris
Pr*ccx \ htifolia i. Cluf. fffifi, ©
acaules } 2. Inodora Persica variegata, nobis. Irk praecox Persica varie-
gata, Baptift. Ferr. desc. ©
Iris bulbosa } Latifolia } C*ruleojhiis violaceis, luteis iffpurpleit M-
Serotinacaule }\$. Angfc } functo. ©
donala' } ca fore } Vw'aceo.Q
Atropurante, Smrt. 0
Cinereo ftrik v'wlaceis diftinfio , Smrt. o
Albo, Eyji. isr Steert. o

- Irk bulbofa	Anguifolia feu folik cpaceit	ftore	<p>4. i'lrpurco irtottoro, C. B-M Irk bulhsfa, Dod. Ger. 0 5. Luti'Oy Cluf.Hift. Irkbulhfa 3. httoflort, Dod. G 16. Major is elator, C. B- P. Iwftorc lutco, Ju Bry. 0 Luttoverficolor <7- Ramqfa, nobis. Iris vcrficohr™ CfHift. 0 %. Plena, nohis 0 (a.fallicfo, aphs. Iris ftavoflore, Cluf. Higl. 0 Luteo no.inixtb, nobis. his bulbofa anguifolia lutta mixta, Eyft. 0 11. Albo, Eyft. 0</p>
---------------	---------------------------------	-------	--

§. 1 IRIS bulbofa latifolia praecox.

Explicario partis major is Tab. fepthme Sefiiorik quart*.

1. **I**rk bulbofa latifolia praecox acatilis odora, C.B.P, Iris bulbosa latifolia, Dod. Lugd. Cam. Iris bulbosa latifolia i. Cluf. Hift. Iris bulbosa latifolia purpurea, Swert. Haeffena ut plurimum habet folia, longifolia, & latifolia, Hemerocaltidis Dod. five Lilioaphodeli foiiis fere limilia, breviora tamcn, akernatim invicem amplectentia, mollia, in terram prona, fupcrne viridi pallentia, inferne vero incana, e quorum medio flos exfitt e membranaceo involu- culo uiuifus odoratus, c'ruleus (incerdu mlactei candoris) fexpetalis confans, Iridis latifolia; (lipri delcripcae figtura, quo marcefcente utrinque alii fingularea fufte durt: nullns eft illi c'ilia, fed Hos breui duntaxat pediculo infidet ut in Croco: radix bulbofa, Candida, avel- hnx infer dulcis (namdeguftabam inquit Clufius) mukiplic! cortice nigricante in Voluta ui (pra: lctim dumflorer) aliquot fibre: crar Tac, longx, enafcuncur, quibus adnafcuntur radicles alijs; at in relicjis bulbosis tuberofitqik fieri Vr Invenitur in Lufitania, Baetk3e, collium radice bns non procnl^fc Aaa Jaffi Jae J circa Aniquei'am & Cordubam. In Lufitania jannario, in Bitica Februario fioren • L&erui E Clufius. Pofitifio re fevan K {a3&tv.&nil: caput lougum triangu Urefe utribus in jdiftinfum, in quorum fingulis multagranuk Candida matut obfervantura; ftate.

2. **I**rk bulbola prxcox minus odora Perfica variegata, nobia. Iris Perfica praecox variegata, Bapt. Ferr. defc. Radix luijus fuperioris minor; folia pandora dilute virore veluci rorulenta atq; in canlia effigiem concavj, trium atit qoatuor digitorum longim dine, duumlatitndinedefmiun- ^[.LKiguopoftfoliorumcxortimfubcxtiemum Februarii aut initium Martii flores procrudun- tur terni, quaterni, quinive pro cujufq; bulbi viribus nifi quod Coti albicant, pctala terna. linguae carinaca: & ad extremum bifidi difta dilutiore caeruleo coiore, albointerfufo livfcant, nec arte* Jftalis repandis feu retkxis adhacreant/ed immediate ex-ca!ycis rudimento fepararim exeant ¹¹tegt-ntialigulam feullam tuiiicum cum apice fc muncia]i, pallide aibido, linguis rparv xeffigiem referente: menca (eu pecala repanda hifce fubjefta, turn promintila, crocea linea intercarfante diftinfta) tuiiicis feu obfeure vifflaceis gueds & t lineolis circumlita, grandiore ianthini coloris veuti holofenca macula devexum labrum feu mend extremum obtufius intufcante fpjen- dide nigrefcuro: loco trium pecalorum furrctorum fen vexitlorumi lurfum eregi folitorum in aliiii Iridum fpeciebus, terna confpiciuntur petala, exigua, ahgoftiffima & brevia ex interftitiis petalorum rqjandorum & fblcatorum feu mentorum exeuntia, alba, conftitucntia cum catile ipfo angulum reftmi, non vero aliarum Iridum more fuffum tendentia & ex gremio petalorum orta: faifcenti vero flofcolofuccedit capiula lemnalis tribus oculamentis diftinfta, hi quo- rum fingulis Junto merjfe confpiciuntur matuum.

3. **I**rk bulbofa latifolia ferotina caule donata ^ . B, !* . Iris bulbofa Anglica florecsruleo & vto- laceo, Eyft. Hsc Iris bulbofa latifolia cades edit pdales, aliquando akiores; iiores primis multo tenuiores: & lohgoribus petalis donaps; capulas feminales wiangukres multo lojgiorecs ctiam & tenuiores; variat fioris colore, eft 3? ruteo, vblaceo 6 fatropurpurante: eft & oetulea iteis violaceis vel puronreis, fie & cinerea violaceis ftriis diltinfta, quas Su^rtius pinxit no- mipe Indjs Anglicanae bulbofa; latifotias, quae eft Iris bulbofa Anglica flor crfoleo & violaceo Syft. vel flore canclido eidem & Swxrt. Vide in Tabula 7-- radkeni bulbofam Lrifariam di(-

-Jf-

& capfulam femin<eni, triangularem, cajut- unicum loculamentum est apertnm, atqur ibidem lemna tam intus a - W, quam extra, depiaa apparent naturali magnitudine.

.§:2. IRIS bulfofa anguftifolia.

4. *Iris* bulfofa anguftifolia foliis cepaceis maculatis flore purpureo inodoro, C. B. P. *Iris* bulfofa, Dod. Ger. *Iris* bulfofa flore violaceo, Cluf. Hift. Hæc est folio craffo ac veluti cepaceo, viridiore, parte interiori friato, multifque maculis argenteis refperfc: caule conftat craffo fimioque, quem quaterna aut quina foUa ample&untur: binos ex vaginulis ut plurimum ptomît ftotes, 'uwwkemmaccédétvte>, \ttf:etd\K\m\im\md\int.T02Ltfè^^tiV\ s couâtatitem cum tribus lingulis bifidis violacei prorfus elegantiffimi coloris, interdum dilutions, in odore tamen: tria majora repanda, prona & in terram inclinata, uae nobis paffim dicuntur menta, ut in caeteris hujus fortis; hifce incumbunt terna alia anguftiora, carinata, ar&e fub exortum è calyclis rudimento adhaerentia extrema parte uti di&um bifida uioue ad menti extremum, maculam qnx pro fimbria est in mento pertirigentia: menta autem extremaj parte petaft repandi latifcula funt & fubrotunda (unde iis menti nomen) intima autem parte valde angufta, mediâ vero concava retipientia lingulas ipfis incumbentes: floribus evanidis fuccedunt trigona laxaque capita, in quibus femina rugofum, fulvefcens latet, Ervi magnitudine, quod cum maturum est crepitat fi moveantur prædiftæ capfulæ: radix fatis magna plUn'bus membranis live pelliculis tenacibus, nigricantibus, exterius circumvoluta, intus alba, & fessili parte fibris prædita, qua fingulis annis foboles circa latera profert: hujus folia novo Vere germinant. Est communiter flore violaceo, interdum elegantiffimi, interdum dilutions colons; est & atrorubens, est & flore albo in Pyrenæis, aliquando macula fiava flori albo aspergitur. Hue referenda; Ir^s bulfofa anguftifolia caerulea Eyft. item *Iris* bulfofa flore atropurprafcente, albo cinereo, & item verficolores, tricolors.

5. *Iris* bulfofa lutea inodora major, C. B. P. *Iris* bulfofa anguftifolia flore luteo, Cluf. Hift. *Iris* quarta five lutea, Cluf. Hift. *Iris* bulfofa 3. luteo flore, Dod. Hujus terna petala teram fpe&antia flava funt, aurei macula mentum occupante, a qua ad infimos unguis interna parte fparfæ funt quaedam venæ .^ dUütius purpurafcentes; linguae iis incumbentes exalbescunt, prater nervum mediur! i(\ eVxeinum petalum excurrentem & gibbum, quipallidi est coloris: vexilla feu Turrefta t^rna petala infima parte ex caeruleo purpurafcentibus venis funt diftin&a, fupern^ candicant. Húc pertinet *Iris* bulfofa lutea inodora minor, C. B. P. *Iris* Mauritania, Cluf. Cur. post.

6. *Iris* bulfofa lutea verficolor major & elatior, C. B. P. *Iris* bulfofa flore luteo & caeruleo, de Bry. *Iris* bulfofa verficoloris vel flavae variae classis tertiae prima, Cluf. Hift. Iridem hanc flavam variam majorem & omnium elegantiffimam merito appellare possum, inquit Cluf. u. Caulem non minus ahum habet quam tertia Clufii verficoloris flore prædita. Scilicet cubitalem & ampliorem; folia latiora & breviora, media fere inter illius & fecundæ Clufii: florem majusculum, cui terna petala inflexa terramve fpe&antia liitei funt coloris, & aurea macula in medio mento infignuntur, oris quodammodo purpurafcentibus, angustiore petalorum repandorum parte, quæ gibbintegitur intrinsecus multis i'ubpurpureis venis in latera excurrentibus notata: incumbentia peeala feu. carinata minora, lingulae dida, diluto purpureo colore funt prædita: tria vexilla feu petala erefta valde fatura purpura nitent, & quasi violaceafunt, præfertim medius per longitudinem extensus nervus.

7. *Iris* bulfofa anguftifolia verficolor ramofa, nobis. *Iris* bulfofa verficolor ramofa, C. B. P. *Iris* verficolor-TTOAUXAOV^, Cluf. Hift. Variat binis, ternis quaternisve floribus, iisque diverfi coloris; hæc propter magnam humiditatem a frequentibus imbribus ferax est in producendis pluribus 6V amplioribus floribus; ita multas stirpes quæ fingulari caule eoque non ramofa ut plurimum eite tolent, AWAOWS reddidit natura. Hoc contingit in Tulipis, Narciffis aliisque plurimis copiofa nutritione, adultobulbo, & frequentibus ingruentibus Vere imbribus.

8. *Iris* bulfofa anguftifolia flore pleno, Swert. Hzc a luxuriante natura accedente magnitudine & adulta tatebulbi, loco sex petalorum id est trium reflexorum & repandorum feu 1^13! elin § uaru^ ipfis incumbenpum, & trium furrearum feu vexillorum, multiplica. edit in fingulis floribus petala. Hoc familiare est permultis aliis, in pluribus classibus præter bulbosas plantas, quod observatu erit in hac nostra Historia.

anguftifolia flore flavo, Cluf. Hift. Hzc est rancum varietas *Iridis* quartæ Clufii, cu^s florfaturate luteus est, hujus dilutius flavescit. lo. *Iris*.

10. *Iris* bu'oofa angulrifolia Intea niix'ca, Eyft. Hax conttat petalisf irtim foeeis, p^rtim
 i r. /m bulbofa angntifolia florealbo, Eyir. Hujus terna «SejaJEf/inflexa latte.i lunt can-
 n, airfSI macula nlenro imprefla; Jjngoarfen perala curta, carinata, bifida, prioribus in-
 cambenria ;& terna erecb (vexiIJa di<3a) *ribn]* & circa unguis *menu* febcaruJea flint.
 TerentiasIridHmbuibofaiuir. lajiriim imprilcntiaruni in medium adferendas \sdi-
 cavimus ; flam incanca varietatecoJorum riorum, qimflngulaium Iridum ulterisiuiscstpma-
 £ veibisxprimtiequeat, ut aitClufms, qucmconfule, /ipluradefideras. Item & JoJian-
 nes Bauffinus longa vei!>onnn (crie de harum Iridura balbofaram Ipeciebus feu potius varieca-
 tibusagit¹ Maximam lianc variftacm in riorum coloribus, d lacione conciliatam effe neuti-
 qjam eft dhibitandum ; qucnadmoduni in nliis^eiicribus plancarom numerofisiafisobrevare
 licet. I rides qux funr latiorr riorc, plerdmqae bberalioresiunt in producend'is rioribus, bre-
 i&craftlorescapfulasfive crig^iim caput & sqaalis nbique crafStudinisliabent: an-
 nx autctn Irides capfulas longiores, &t iiiiima parce graciltiores gerunt. Item latiflora;
 bidisraoix brevior &craflioi.cft, anguftiflorLe.a«tenilongior&muko gracilior. Devirtuci-
 bus .mty n D>-idis bull^olaenihil cornpertum habemhs, aittabaliis enditum accepimus.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS, radicibus buibofis proprie didtis prsditis.

CATVIX.


NARCISsus.

NARCISsus² iAtlpm *Diefcoridit.*^c. i&i.iffTbeopk. 6. *Hi/i.* 6^&y.ejufdevi 12. ti-
 ci/ar, sow « *Ikraffo adohfetntt nimium feiffum adamante, ut Eoeta fabulantur, feJ a vi*
flapjfo tkndi, *quam**^TM* Gr<ec\ vacant: fwutPlinmhNam\ *quamvmlvarcifo inejfe* I. 21.
 c. ly./ejiatu: *bhtcPlutareboin Sympofir,* r. :>?rvGs *hthetamistorpidasgrhvitates efficient^*
Jhitur.

TjniutTbeBpbr&ftwwfmitut'. at Dhfcori, s different iam in fiort notat, qui albut fit, hints
crocc.:s, in *qtitibusdampurpleas*, it a ut alihi fit -^fpntds^, *atiu** xfwifcs, iyP&dol. 2 i.e. 5.
Narcifw alterfiortcancitdo, calicepurpum, a.tercaliceberlwceo; per calkemintelHgens.quodin
Jhrh media eji, nuUius Grci authorisexemplo: iyfequente cap, 19. Narcifium unumpurpleoflore,
iff alterum herltaceum dixit.

Narcifju\$ eftplanta hexaperala tricapfulambulbofa, pro notagenerica hanchabens, quod
 florem producacpecalisfciiisconfaitacen^cingentibuscalicem mediumfive brevem, ftvflon-
 JEuro tabi inftar, five in margineplanuni, five limbriatum autlaciniatnm (ubi autemluxuriat
 flos multiplici petalorum ferie deletur hsenptagencrica, non iblumbic, led inmultis aliis
 gene ribas:ex funpUce (iTiepetabruo adecertufnriumcrnma natura rcdufrorum fit incertas &
 multiplex fen (iorc plciio) aut crenacum finuanimve: Hori tacifecntt Jhcedirenputrigo-
 num !^u capfula rorunda ex tribus loculamentis conflata, in quorum fingnlis plnrima con-
 tinenat^ fcmiiaa crafib, mucronata, Pifi minoris magnitudine. HabirationefoliornmNar-
 ciflus eft vLlporraceus latifolius; velanguftirolius; vel dentque anguftiore & iunceo folio-
 vel tsocticus maximis lanflimo folio.- racione colorum in floribus eftvel Inteas;laKopalli-
 dns; vel flavus & oculiroleudios; vel torus albas: omiiesfuncvel fimpliccsleuHorefitnplici; -
 vtl nultiptces leu flore pleno; exoticorum flores fnnr ampliores Lili parvi inftar, qui -i^nt
 vel albt, vel purplei, vel phanicei.

TABULA **vm.** Sectionis quarta.



1. *Un, medio purpureo, nobis. Narcissus medio*
 2. *Toto albo, Nmijsus orient alh major fc-
 iyanthos tot its albus, Eyfi. 0*
 3. *briato medio cre-
 ukplicato j cm, Eyfi. Donas Narhmnfium, Lob. icon. O*
 4. *Lutem totitspolyanthus de Argkrs, nobh. Sar-
 affiMpolyambostotus lutem dc Argier, Eyfi.*

*l\$.fr<ecox major, nohis. Mttcifasjuncifoliusprd-
 J cox 7/ra/e0,S>rer/. o*

**lfxfce\$>/ixr IS. Mayer, Pal. O*/or<?'-' aj>r Cam. 3&ier ••
 I 7 'folws, Eyfi- O '
 7. Minor /uteut, nob/s. NarHfus iumifoim im.
 O*

*j8. Maximus alhucnlkebreui/u/eo, CB.P'. Eyft. i.
 \.Pailidtt6 calicelongoaureo, c\<
 1 JWte, nobis. Pseudonartifus
 6ics calicetutco, Eyfi. 0*

ic-Alba oblongo caffee foh
 J'fatJonarcifu4 alb&calict In-*

Longo, 'f/0 ;

*& 11. 6 ubfiavus tubo sexanguto, no-
 bis. NarWitAirtin'GZ us tit!
 hexangolari. Swert
 O-> — '-.. ^
 12. Lyteus repevs^ nobk. Pjh
 narcifut minor luteu* repen.*

"TAB. IX. Seft. IV.

*?I•j, Petals refiexU, xo'..
 Totm atbus reflexus,
 Tcttu Swert. O*

Brevi *albm \i 4- /'w'" rotundh wa-
 natU^ nobis. Petalk ro-
 tundiscircinatis, Smrt. "*

*5 'Juncifolius tuba atnplo aureua monianus minimusjiobh Pf
 donarciffus 'junifolius minimus aureut Eyfi. ©*

*1 6. Qrkntalis rtpbilis poly ant im mxtus, Eyfi. Narciffue •
 Us ncremultiplki isrpkn0 albo-lutco, C B. p. 0 ormi^*

*17. Flaw, Srvert. Narciffus multiplex totusflavu's C B P
 1 S.Albojiobis <sr Sreert.Narciffus totus nivirusmhUi , , 0*

Pleno *C. B. P. C. B. P. ©
 lice carens,*

*20. Variiegato, C. B. P. Narciffus Septentrionalis flore' pleno lutee,
 Eyfi. ©*

**21. IK/« « W duplki&triplici tuboaur
 nonali* edict luteoptem duplicate M^{is} 0, C. B. P. Septeri-
 *%OJU*jwifo&to, EyftJm" ius juncifoliusfioreplena, C/fff. o**

L Cur. poll. O

Pars T A I H J I I # DE. SeaioniarquftK.

Diētus *Leucoium bulbofum* }
Nardijfu: }
Pracox }
 23. iBi»« tribuspfifts dbk minoribus cingentibus terna berbacea, nobk. *Leucohm bulbofitjfrtrepetalon nobk. Tripbyllon, Dod. ©*
 24. My'n* tribuspetalk dbk majoribus cinpentibts tērnahrbacta cordiformia,mbk* *Leucoiumbulbofum Byiantinum. pr<ecox, Cluf. Hijl. is Lob. Ad. part. 2. 0*
 25. Maximum fcxpetdi& aqualibus dbk, nobk. *Leucoium buibofum bexahyt/on Cpotius kxapeta-%?i,nobk.J Cam. Bulbofiimpr<ecox majus I. Cluf Hift. is Van. 0*
 26. *Serotinum multiflorum fetalk fink tqualibus, nobk. Seretinum' majus, Ctuf. Pan. Leucoium bulbofum polyantbemm, Dod. 0*
SLatifolium, C. B. P. Narcijfoleucoium autumnde,
 27. *Autum-\ Srvert. o*
•nak I Tenuifolium, Cluf. Hift. Leucoium bulbofum autumalc minimum, Dcd. 0

T A B U L A X . .

Albus }
 28. *Minor, nobk. Hemerocdk Vdent'ma, Cluf. Hi/i-Vod. Nar-Maritimus I iifusPancratium maritimumflare albo, Srrert. 0*
 29. *Major, nobis. Lilnmaxdjfus Hemergcallidis facie, Eyfl. I Narcijfus Conftantwopolitanus vd ^Matb. ©*
 50. *Indicuspumilus monanthos'nobis. Atamofcovulgobortulanisdicluin.*
~.Si.?acob<£usIndicus, nobis. Narcijfus klifoliusIndicus flcrerubro,Clufi I Hip. ©
Lilionarcifusi }
Ruber }
 32. *Indicus fatK{at\ (? dilute hurpurafcens, nobis. Naraffus Indicus MI aceus fatuic)ois iluto colorepurparafctm, Boptift.Ferr- 0*
 33. *Joponkus, nobis. NarcijfusJaponicusrutihflore, Cornut. 0*
 24. *hdkus pumiluspi lyanthos, nobis. Narcijfus Indicus pumilus plyantbos, Cornut. 0*
 35. *Indicus maximus fpbdiricus floribus pluribus li'iaceis,nobis. Narcifus Indicus ffbæricus fms liliaceo, Baptifi. Ferr- 0*

§. i« NA R CISS V S latifolius porraceo folio fupltx unofiore.
 Explhatk Tab- o8av£ Seflwnis quart a.

Narcifus flore ūmplici unomedia purpurco, nobis. *Narcifus latifolius 6. Cluf Hift-X^ & Narciflu's albus circuit) purpurco, C B. P. Narcifus medius purpurens, Dod.Eyft. Narcifus i.Cluf.Hift. Hiclioiiahabec virencia, oblonga, Poni Foiis finilia : caulem angulofim abfqueloliisy dodranre ant pede altiozem, & in fimmo Horem e merol>rana crumpentem, ucplurinmni **onicom**, lubinde geminum, mediocriter ainplum, odoratiim, fex petalis Congeftum, **inqnorum** medio brevis calix eft circinata: rocundiratis,purpi]rci per oras coloris, ma quern ftariiina brevta cum apicibus luteolis : capitula inde trigona, lem'ma in cernk loculamentis **nigra** continencia: radix bulboia pluribus tunicisrotondis,oblongiufculis, majoribts, exterioribus involventibus minores fibi fubjeclas Ceba; modo, qus nucieos leu foboles ex fe demictetis, facik *itCc* multiplicat **aliam** bulbofavum&-cuberoiaram plaiuaiumricu: itidem hue pertinetNarcillusalter medio ruber& luteus **qui** toTia habet longiora lacioraqtie & aliquantuHimminus virencia; caulesproceriores, crafliores,& infingulisflorestresaucquacuor prioribiis finielel, fed mediocolore luteo : feminibus& radice neutiqnam difcrepant. Exit Narciflus medio purpureus in plerifque Gallic locis apud Heduos &Scquanos, non procul **Barbona-ubifiuit** Thermanum calidarum fcaturigines, decinioHb urbe lapjde in pratiscomaifeMaio ilorentemNarcifTumhunc odoratiim medio calice purpurco offend i-
 mus nos. * . Aaa? §.2. NAR-*

§. 2. I^RCISSVS ktfiiu's mflacpimbus floribus.

Tcifw O«e«a#s major polyanthos tocus^ibus,Eyft. Caul* hujus eftprotenlo^-^ tns, -alls: folia hab^et lata, ex vagina inleriore, qnina, fena prodenntia; in cacumine can tx i, oranace mvo.'ucrofiore'ofci profiliunt,multi&copiofi,albicantes, odorefralra res,exlex peraljs,araplis latis, conHati,cununbus ifaminnljs luteis brevibus. Hue percinr NarcM M Onenrafjs madias rotus albus polyaiuhos,& Narciffus Orientalis polyanthosmi/] totus alb Us, Eyft.

3. Narc yjw Conllhtinopolhanusminorcaiccc finibriatomediocroceus,£yn\ Donas Na bonenfi lam >_Lo b_koil_Doi Superioribas feaadibSmilisvifaashicNarciffus, minor/fli rnmfl- 7 A " u r P a i t ; 3/1US" * C3/1,x croceo cohre ^ n a t u s dngitur lex petafis niveis pcnrm*nis q.mmj/us deAi-gicr polyantlios cocoa ioteas, Eyft. Mic Narcitfusab Arsicr orixuuft autlenr ioliis fuperbiens ert: floribusluteis deniWnt duodenis pluribufvt om-ir, Lm: caulis pedalisSf altior aliquando, depreffo quidem caHclo, trocei coloris • Z ^petala ^na, exalbopallentia. Huepertinct NarciflBsOcidentalisalbus odoratus; If! .o» ^y!*- Narciffus hie odoratus amoenas minor albus flores quinos fenofve in caul nes ^ ^ " ^ ^ ^ " o w & m i n e p r o t r u d i t , a M d o s - i n q u o r u m f i n g u l o r u m m e d i o f t o l e nes leo itimim, ftellas asmulanua, radiatim concentrata funt, aureolutea.

§. 3. NARCISSI) S junttfoliu* /implex fatem fcr «i«^.

S- Abju^f jnncifolios prxcox major, Swert. Hie a foliis junceisBf flore majore fimplic perjucunde odorato, & ineunce Vere fefeexpandente, facile a cterisNarcifflisjuncifoliiis'dii cernitor: quaternos edit flores, luteos,ma)ores; calicem etiam luteum: radix intus alba, ex fa tunica nigra tçck.

&-Narcijfu6 major jimcifolius, Eyft. Narciffus liic major juncifoliijs,*pricox dictus quia ante, aliosjuncitrbljos Narc'uTqs floret, caule exit uliicorotundo,ereclo inter folia Cficutre liquiNarciffiO)TMcislivore,rlexibtlitate, viriditateque fimillinio.- poLyantlios autem e* " rotus floribus luteis, odor^tis, circinatisoi'-!* •ifbs: ejus bulbus major cum pluribusaliis >ulbiJlis adnaris, arqne capillamenH- "lo majoredeorfum fparfis cerninir Hue pertinent Narcilujs major, olius Eyft. & rtiqiri junciloiii citatiin Finace Bauhini.

7- Narciffus juncifolius Idceus minor, C. B. P is juncifolius mirror, Dod. GKn. CILt^ Hilt. Hieparvitateoris apriore diftert, atq odoratior; ester a cum praedicocon- venit. In plerifque humentibus herbofis & ir ipaniae locis gignitur.

§. 4. NARCISSI) S maghv isr brew calice,

8. Narciffus latifolius albus maximus calice brevi luteo, C. B. P n Nanafib albasmaxiams calice luteo brevi, Eyft. Narciffiis hie medina, odoratus leTc czerit balbo longiore folis itidem lo ngjoribus & in fummocontortis, equorumgremio protruduntur bini cades, quorum lingiitis linguli infittunt flores hexapetati, ex pallore albentes, in medio prorenfb& n arum crenato calice luteo. Hue pertinent reliqui Narciffi calice brevi in Pinace,Bai)hini:/itati

§.5.- NA RCISSVS magnoteoblongoiubovtl calice latifolius.

J'Naralfus latifolius pallidas calice longo aureo crenato, nobis. Pseudonarciffus albus calice luteo, Eyft. pseudonarciffiis montanus floribus dbfs calice luteo, Cluf. Cur. post. Fit> rum hums f_x pt ^\a (UBI MA c i n g e n t i a c a l i c e m l u t e u m , n m b r i a t u m

10. ^rc^albosoblongo calice, C.B.P. *PfeodonarcifTns X fl ^ Cluf. Hilt. A hfeudonamffustotalbusEyft. Nareiffus oblonga tuba, ocusa No ^ Cluf. Hilt. A tala alba & trimm oWongnr.^em, fimbriatumi, quand03S^A Ssver^ flic & fex pe- ll.N*rci#u* lobflavoBtabofcxanguIo, C.B.P N S ' F I " " ! C J t " n d o l a « c u m h a b e c . flavus nondeicriptus, Swert. Hici^bo fexan.uiari L 1 r . « a f e X a n ^ u l a H d i l t i o r ci-ttros cognofcitnr. « petaiis iubHavis cinflo Stole inter

m.Narciffti luteus repens, C.B.P. Pfendonarcifn*^«• 1 montani feu Pfendonarcifli vulgaris lwc eft cffiirip, • l t o l m i n o r l n C e o s r e p e n s , E y t l . N a r t i f f i i n f i n , , ! , ; , c a d i b u s r l o r e m - u n V u m p r o m i t e v a T r o C o i n T a b _ n o f t r a S _ e x l l i b i t ^ H i c petalis luteo fa tingentibus calicem leu tnbumnl.1_n • Prorumpeinem , totum luteum, fex cuoum oblongiorem, protcnim, inmagine tmh

atom: caules circjai&krtnir Foliis porraceis, angustis, carinatis, elatife: bul-
 itiplici tunica obceftc^Sibrante, fibras crafligres ex fe in terram demiffente.
 /ciflumrxitum luceunirfnoifcinumnirtjorem, Eyftiy^Utfeudonarciffim totumlu-
 -mum minimum, Eyft. ^ . «» i

:rciffus tocnfalbus rerlexis petalis, nobis. NarciiTustotalbusreflexu5,L I Hie
 'iiiabetalbum fineoris crcnatis,&petala lex exteriora alba kidem, refkxa, qi
 tia hacile a¹ carteris dignofcitur.

^A'ardfus petalis rotundiscircinatis,Swert. Sex pecala excenora hujusfunt inextremo
 margine rotunda, alba, & co nomine a csteris notu facilis.

5.^ra/«jniontanusitincifolius calice aureo, C. B-P. Pfeudonarriflus minimus juncl-
 lojus aureus, Eyft. Hie Pfeudonarciflbrum minimus eft, furreftistenuibiis funditur foliis, in
 quorum medio cauliculus exiit, sexit.- flbremminoremedit fex petalis jnguftis acatis priditum,
 quæ cingunt calicem aureum, tvidtjiter crenarum, longiufcule extubcranrem.

^ . 6. NARCIS SVS pknoflcre.

16. *Narciflus* Orixriralis florumulupUci & pleno albo-luteo, C. B-P. Narciflus nobilis
 orientalis polyanthosniixtus, Eyft. Suavem odorem fp^{rac} Narciffii* nobilis oriental's fe-
 ptemnuncphirium florum, ab aliisinKoc diverfua quod pluriesdecuffata&radiatim juxtafe
 habeaepetalatlifpofita, albertia; in quorum mectituUio, lococalicis, cumulancurglomerata
 petala parva, amplius diftata, alternacim alba&lutea, mira fedulitate &natafeartepifta:
 ptdculi funcvirentes: cauligex toliis,palloreviii<libus, carinatis prodiens,nudus,rori]ndus
 aditftar Porri caulis.

17. *tfahiffus* multiplex totus flavus, C. B.P. Narciflus flavus plenoflore, Swert. Narcif-
 flus plenus 4. flavofiore,Cluf. Hift. Hie totorlore&mediocandidus&plams eft.

1 *S.Marcifus* totus niveus multiplex, C. B.P. Narciflus albus pleno flore, Swert. Narcif-
 flus pleno fiore 4"% Chif.Hift. Hæc eft fpeciea Narciflj floribus albis eglice purpurco do-
 na:i tbrunda.proles, cujus Hos eft totusatbus, plenus, & uberius tmultiplicatur quamNar-
 ciifusmajor mediocalice, melinocolore.

1),*Narciflus* multiplex calice carens? ^ P. NarciiTus/ilveftris calice carens, Eyft. Hie
 icecuiita habet florum petala, acm' "itiidelutea, multiplicia, fen plenum
 ?orem conftituentia: unico affurgi; olia, carinaca, rotundiora & an-
 ^ufta: bulbumcepaceum mtikis ali • coui unicus, feinvicemcontegentibus.

? 0. *Narcifus* flore pleno variegato. sJarcilTus Septentrionalis flore pleno luteo, Evft.
 Pfeudonarciffas hie Septentrionalis i feumultipliciinunumcongefctoconfat.* caule
 aritur roctindo&protenfo: flos mul jbravkatem ptdulus,petala ultra ^o.liabens
 e lueo a'ureo & pallido colore teco calicis feu tubs, funnie lutea, criftata,qua; aliis
 petalis pallidioribus aiirjuibusetianiherbaceisexpa'nfiscircumdantur, exinvolucomembra-
 laceo prodeuncibus.

21. *N'irciffus* lutetifilveftris duplici fittriplici cuboaureo, C.B.P. Narciffus Sqxentrio-
 wlis calice luteo plenoduplicatis foliis, Eyft. Narciffus duplici tuba flore luteo, Sv^erc.
 ^fcudonarciffus pleno fiore fe triplici tuba,Cluf. Hift. Ap<p. ult, &c Cur. poft. Priori tion abfi-
 iiiiis Pfeadqnariffus bic feptjenirionalisalins, nifi quodtellatuu habeatin rlavoflortduplicia
 •etala, (iibeus pofita, acuminata; calice incenfecroceo, compaflo & aliquot parvis petalis'
 renatisin (einvolutiis contefto, atcatnen tubulato. Hue pertinet NarciiTus Sceptentrionalis
 alictple-no Luteo oris incifis, Pfeudonarcifliis vulgarisSeptemrionalis pleno calice didus: ex
 untnorpetalisrnbicatis, cauleglabro inmembranaceum tegmen defmente, cV nodoem'rrfic
 etalls Honim reflexis, pairidioribus& circinatim circvineuntibits tubum. Calice prominet mu-
 pUcibustiibisinftinfeitis, in margine fimbriatisSt crenatis.

zi. *Narciffus* juncifolius'luteusrlorepleno, Eyft. Narciffus juncifolius flora pleno,Cluf.
 or. poft. Narciffus jnnCIFolius aureus multiplex Anemones forma, C. B. P. Elegantior'furgit
 , icNarciffusluteus odoracus, bijiatim, ternatim ex uno caule prodiens: plenisfingulis flori-
 I usodoratis fingult pediculi onerantur.- folia longa juncorum flexibilkate,l2evore, & colore a>
 ula,exralice^balbofa efteit.

§. 7. NARCIS SVS Lnicoum hulbofum ditlus.

A&ww aj>ud Tixofhr.6. Hi/1, liisff. tjufdtm 13.' GaZf viokm alham VeYfit- *Leucoium*, m-
 borum phna ji eftendit, mkat ubi cerium ckmentius Jiatim,eitam ftendunfyemeexafla;

ubi vero in mitius, postea. Plin. l. 21. c. 11. Viola longissima est trimata. Fallitur hic Plinius, nan

23. Leucoium bulbosum praecox tribus petalis albis minoribus cingentibus terna minore coloris, nobis. Leucoium bulbosum praecox minus, Clus. Pan. & Hist. Leucoium bulbosum triphyllon (poti strietalon) Leucoium ranolmoii vernam omnium mini

Ad In!! Huius r^ p ^ LeucO!Ona

S & Wi tra, ac quodammodo latius foliorum colore m s accedentia; cauliculi graciliores, palmares, nudi & concavi, a vaginula unicum semper florem (plures observare non memini) promunt, sequentis minorem, nutantem etiam & pendulum, atque sex petalis praeditum, quorum tria externa omnino nivea, aliis ternis interioribus longiora latioraque sunt, radiisque solaribus illustrata aut sudo caelo alarum modo sese explicant; tria iuumim breviora sunt, & cordis, ut vulgo ab imperitis pingitur, formam sive sagittae crenam referunt, binis viridibus maculis circa crenam foris notata, interne sex extremas oras insignita: medium horum sex etiam staminuta crocea, stilusque e, candidans, occupant; odor nullus aut perquam exiguus: capita inferioribus sepe familia succedunt, minora tamen triangularia, & olivae virentis tunc experimentia; in quibus semen inquantis candidius: radix superne minor, muicistulis seu pelliculis albis capitans, externa tamen parte nonnihil nigricante, & sessilibus, parte multis tenuibus fibris praedita. Provenit in udis locis solummodo & umbrosis silvis p. Ope Blasas, & affatim in silva dicta le Coste Chaile.

24. Leucoium bulbosum majus praecox Bizantirm tribus petalis albis majoribus terna minore herbacea seu viridia cingentibus, nobis. Leucoium bulbosum triphyllon majus Bitacum, Eyst. Leucoium bulbosum praecox kiiz; mnum, Clus. Hist. Hoc priori fete simile est & inae Marti bina folia promit illi familia, fedlatiora sunt & ejusdem coloris, caulem amplexantur; cratulus tandem caulis succrescens unicum florem vaginam includit, in parte superiori similibus, duplo reremajorem, tribus externis foliis alarum modo

expansis, in parte superiori brevibus hifidem rarais f. s. maj. farfam versus foris v. p. uo. r. s. Hort. simuloentibus, & velut abulamiu calicem quendam efformantibus, Viridibus in parte superiori viridibus, reliqua parte albis. orastamen secundum crenas in parte viridia font, aurosto radiis abimis

une JL Tr. in parte viridia font, aurosto radiis abimis. Ho. & f. g. s. fragrantium uccunqae imutur hie faltri. quippiam spirare min videtur: rz Si i c major. Hoc in Vien, nfi & Leytano

25. Leucoium bulbosum praecox majus sex petalis aequalibus & albis, nobis. Leucoium bulbosum praecox majus, Clus. Hist. & Pan. Leucoium bulbosum inraphyllon (sed per apetalon debedici) Dod. Hoc folia habet Colchicon arciffi antamnalis, nobis fie ad t. v. i. p. Ca. P. de Coldiico, roliis familiama, admodum viridia & nitida, non triflorum. Triflorum. ulememedio illorum exeuncem, sefquipalraarem, nadam, ecjia linn. Oncavum, membranacum folliculum fen vaginam in ritmnotereitein, H. S. mterdum alter, raro tertius erumpit fios, rexpctalisa: qualibus coiffans non tribus albis, 8E tribus minibus lierbactis intus, utin prioribus) candidis, led exrima wangnfti ore parce vcluri macula evirid tiavefcente inietis, natans & deorfum spella

gui cymbali modo, medium occupantibus se. Havis staminulis cunj cajidicaote stilo ft. T. tngalaria, ternis loculamntis distinfra, in quorum angulis lenicn ex tunicis (extima tamen) oblongiusculum, durum continecur: radix bulbosa est, multis candidis

provtnit mature admodum, & Horem ostendit vix liquefactis nivibus in. Hoc fcit. ; menfc Maioroliaftiacopiose procrudit, Sfnaulv nft. eju. em. nonnia = piarimis HW Frunct Leucoium bulbosum flow pattilo i. c. B. Y. obis. Leucoium bulbosum ferotipolyanthemum, Dod. Leucoium bulbosum majus & multiflorum quod aliqui Acrocorion Plinii IV. f. K. I. C. B. P. Huic quinaauc f. ajimfoia, vircnc Narciflinw familia: Quorum, v. s. p. is & amplior afflirinc s. c. Qncav Hs Sf aliquianwlm planua, bisisacori ik s. p. ed: il. niembran, ce 5v ainnl. 7n. ; M. r. c. ; r. n. a. fl. t. m. a. v. Q. t. l. o. n. b. l. l. s. a. ngulis praeditus, viridia etiani, h pendulo, sex aequalibus & niveis petalis constanw h. g. io. profer. ens, tintinnaboli modo quorum extimam parcem viides r. c. r. a.

inficiunt,

Secl. IV.
inficium
dec
le

ens ftaminulis fiiuis^{^^}dioque Iaftco ftilo apice viu- i infignito: floribus
-dunt magna & trigona S? *ita, anguis obtufis Pyri in. roodirm turbinata, nigrum
jaceum, Liiioafphocieli flavdtjore lemini non abfifto&., -Cqntinenlia: radix crafa
-ea multisllicculencis tancis ctwifat maioribus, minoreskivolvenwbus, & plujpiis
ciEerarum bulbacearur.i &taberofaram liexapctalarum plancarum more. H' " " "
-ioribListribusallacisegeiminare folet, atque Maiodemum menfe flores proferre
duntaxatinteraninisPannoniirioco lianc fpeciemobfervavitClufius, fcilicet inuliginofib ^,
iavtJtWareffaU7n. Meminieetiam Clufuis in praeisLaterae vicjnis obfervaffe, cum Monfpelii

27. f. fHf/KrfllatifoHumbulbofumautnmiidetcntiilbliimi, Clur.H)[l.Leucoiarabulborumau-
ttimnale miniffiuni, Dod.LeuconarcirTolirioii minimum antnmaale.Lob.Hoc minimum antumna-
le eft ciuHcnlo palmiimalto, gracili,unicum,inter(lum alterum & tertiurs, Fcrens florem omnino
im pendulum, fex petalis cosftantem, & tintinnabnU modoformatum, iuodorum,ingrat:
* is, in quo ^{ex} pallid" flainina: Bore jam aperto demum prodeijnt quaternaut quinacapil-
v iriiliaqfte foli^ "" bullwia, fatis crafla pro plantae exilitate, e multis glun nofis tunici s
icantibus^r ..laraelt. In cxtremaBsrca,qua:LufitaniEcoiittrminaefl nonpro-
cxA Badojoz q. -" Augufiam efle exiftimant ad tinmen Anamfitam, nafeknr ,ubi Cub
riiieimOitobris, . i<ovcmbris inkiom cam fno flore eruc-bat Clnfiua proficilcens Olyfippo-
nerrt. Hue revoca Leocoinm bulbofum latirolium aucumnale 7. C. B-P. PrimumLeucoium nic
atNarciffas 23. in bac tabuh, a Rizotomis mliercttlis dicitur Violapaluftris : Germanis, GalHs
tfiaai ViolaFebniarii &Viotaalba.NarcifTus fci.Leucoium^.C.B.P. aGermanisGucta nirca
ab infigni candore appellatur. De tactikatibus liorum Lcucoiorum nihil quod ad rtram us ha-
bemus, cum aveteribusdeii nihilreperiatur proditum, & arecentioribusnihilquoqueoberva-
turn. 1 cones omiffas vide ad finem in App. hujus Seftionis.

Hotce paucos Narcifibus explicatos & iculptos tantum exriibimus, cum omnes omniumque
vanetaces exhibereadmodnmerit difficile: deuaeteriscolore variantibtis, videCafpariBaq-
hini PinacemS; JohanriemBauhinum, HortumEyftettenfem, Florilegium Swertzii, de Bry,
>>is.M<H>. Succeduntparagrapho y^{mo} Leucoim balborum, 8^oSe ultimo Lilionarciffi expli-
parij^r eorundem capfalisfimi-

icminaque icdemcon ormiaL. Ins,
Eio o m n i s deBet a nobiliore & pott'
frmina primatuminomnigenere
ftibendarnni plantaftm fint

flores & kione prxHyimus, quia deponiti-
capfula: leminales ipfa-
loqqidem radices omnium harum

ventibus minores
namatz Liliorum prope dictorum mo... ius aptiore titulo L...
nosiam utriusque fcilicet Lili & Narciffi... naturam participant, nomen hic compositum ob-
habent, ficut in aliis hujus Seftionis claffibus praestitimus. Nam datur Colchiconarciffus,
ris radice tuberosa pendula fui folummodo generis, Hyacinthus tuberosa radice simpliciter,
& Hyacinthus partim tuberosa partim bulbosa radice flore amplo albo odoratissimo, item
Hyacinthus foliis & radice squamofa Lili inftar, habet vero folia & radicem Lili, sed cum
omnino florem, capfulam feminalem, & femina ibidem contenta producat Hyacinthi, erit Hy-
acinthus, & radix squamata una cum foliis liliaceis determinabit speciem, facillimam distinctu
bos; & sic de al
Liliorum cernere est Lilioafphodelam, cujusque species di-
duel-, adum cenfemus: ita
" % M jr, w eadem p... wjateia, liliin prima Stated.

non Asphodelolili non... rnrrii* fmr. Idem in £IU gu.cnuu. potWA cs; iw
bis dicendum veniet.

O N A R C I S S U S .

Exlicatio Tab. dicim* Seftioni* quarta.

28. Lihona i albus maritimus minor, nobis. Hemerocallis Valentina, Cluf. Hist. Dod.
Narciffus pancratiam maritimum flore albo, Swert. Pancratium Monfpelienfium & Squilla
mino rmacopcorum, Gefn. Hort. Huic plantae (q... ter Narciffi genera referenda est
fecundum authores) quina aut fena sunt folia, oblonga, U Narciffinis quidem familia, sed
planta firmitraque, fubeineracei quodanmodo coloris: caulis rotundus affurgit cubitali in-
terdem

ttidii akitudine, Kudus & fine foliis, qui in cacce membranaceo un prompt involao
& codehiicente quinosaur (uios, interdum plureSM&tflorea, Pfendona
lcs Lili odorem fppzntiz? iotes omnino, prater' xceraa fex petala & ex
qui ^kii colore ?perfi confpiciuntur: e medioobh'iigo protabeiajfte calice, per oraslaciirsir fl
cxeffiex CandidaoWongjihniina, fuisapicibustfavisornata, & raediolongtoreftilo, ut
Lu> .Ibo fere: niarcidis&deflucntibus tiorjbn5 fiiffiulis fingula fiibfonE capita crjang<5&\$2
in crafitudinemiuccflo temporis extuberantia; in qtiibus femem contmetur !iigrum,magmim,
comprdiu, fungoiiim, fepajatim in ternis loculamenris: radix bulbaceajmagna^lba^ob-
longior, knto hamore plei:., nigric.nice cortice esterius obdnfta, qnse interdum adnatis
nacleis aliorum Rjrciilorum more i'de multpllcata & propagat. Caalietiam *Stiola* concila
aut confrafta lentum liumcrem extillant. In maritimis circa Vaealiana Hifpania; frequens,
& toro illo maritimo radtu infra MonfpcSium, ubi Maiomenfeforentem, Julio&/:ugufto
femen maturum terentem invniebat,&radicen] magna q^icultate ante rmi'cosannosen^--
b c Caroiar Clufiar alte arena maris ficribos aggeltam merfitnqae. Allatts etiamcrtCor
irantinopoli Viennaej^bulbusalicfuoties, inquit Clufius, dtim ittic vivebat.

29. *Lilionarciffus* albns m;iritimus major, nobis. LilionarcifTus J-lciii'-rocalUdis'tacie, Ey^
NarcirusConrtantinopolitanos vd^ . Mattb. Pancratium Indicum alttnmi verum five Nar-
ciffus Indicus alter facie Pancratii Monipeliani, Lob." Ad. par. 2. Hujus buibns Mufc;iri cral-
ficudinem aequat, imo etiam adokusmtikumfuperac & longior eV, multis tunicis involutus,
q^Tsum txtimafnfca eft, fabfequfnaiabruffa, tertia& reLquaeinleriorescandidiorcs, radice
fibrs graciliores & trequentiorcs qoam in Mufcari: iub Apniisdemum fincm (nullosultx)
adeo tardecmtgrentcs obfervavimus) fena aut plura produc'it iolia, c! uplo btioca qnanl Mi-
lirari, fed jllis breviora, & fob cxtremum Anguftum marccfecSria, didimili plane ration-
quam Htmovocallis Valentina fupra ddcfipitii, cujus folia Aug>ftoemcrgnnt,dtm dttota hy-
emeviridiapermanent. Ex cotl^m bolbd bini interdum produnt caales, fngtli tercftes
circajunmm niemrem foUiculo inclniosfexait ofto, nonnunqULiniplur.es, flores albos, parvo
Lilio non diftimik-s, medium occupante parvo calice aJbo,- in mulra;iciniasperoras fefto,
odorato, in quo ftamina fex alba, flavis apicibas praedita, & roedius ftilus albus; femem in
theis (eu capfulis triajigularibus minus, & magis rotundum Hemerocallidis fuperioris femine
Ego LilionarciiTum orientakm lubeiis appeP - inquit Cluffas, fed frequenter in Europa
fponte nafctns reperitur, tJtmCorf7ca. oJ Sard' ^ontibus altiffimis: ait ego verfus me-
ridionaitm piagam, ad oranunanamam fji Infill 1 • f *IffedeRti*, apud GalloEnon procul
Rupdla copioie fatisnafcentem&Horentemofr-id>, cujus radix arena ventq agitaca ocrvlt
ad ulnam&profijndiis latebat, adeo ut binos • mitorcs illicin vineis laboranccs advocandos
curavenm, qni plurima arena projefta tanderr bulbos nobis detexerc. Lfndecx deftripdone
fupta allaca & montaiius & maricimiis ex noiha opinione Lilionarciffus jnre ntinctpari
poffit.

30. *Lilionarciffus* Indicus pumtlms nKmantJios albus (*Attmofco* vulgo hortnbiift di-
flum J) nobis. Hiccaulcm protradit femipedalem, cui inniunir dnicusflos liliaaras albus, fex
pccalis conflans & totidem ftamuiubns cum ftilo alioram prxdifloramniare: Bos inagnita*
dine aequalis eft 'flori Lilioafphoddi Jacei; poft florem cvanidamfolia profert Narciflinisfoliis
fiiuilia, aliqnannilmJaritifcflla, magismacronaca: bulbum habet cpaceum, mnlcis tunicis
majorihis involventibus minores confantem, iquoplarima; barbriJx feu iibrx demittuntur
• jiiibustota pbntanutritur. Hmcpr^mo fiorentem oh&rvzv'imus inhortuloD.Carefi flattort,
cui ab horrolanis nomen *Atamofco*, ab Indis mutuattim, inditum fttit.

•3,u *LiiioTweiJius* iacobaeus lacifoius Indicus rubrofiore, nobis. SfarciTas Tacoba:Ds Ur
jfolms Indian mbro flore, Cluf.Hift. Sena vel plura lubebicNarciffus folia, Narciffi vul-
^arisfoiom mftar longa, adquornmlaioscinergit caolis lacvis & c enodis, innis concavua,
nmno tettigomnodrttdefinehs, membranaceum quoddam involucnm pnjurtfcedhs a-
Ions ftftineacem, equunicus flos fefeexcrebat, fex longis & anguftis petalifconfans, qdl
lia fere in m;ijons Gladioli fmg^ri floreconfpicinnenr rubrifit farari fplendenris colon, aut
infar flora Arnddinis IndKx vnlgoappeUatat, cui non valde dbfiroilis eft, i quorum medic
quia forfitan ex attritu corrupti) & medius ftilus fud quo rudimentum triangularis capitis,
quod haud dubie femem dedijlet forte etiam mar
urum, mil iple floreni prscidnt, ubi mini
confpiciendum m prfebuic poffetTor: radicem habet balbofam, Ccpis valgaribus prorfus fimi-
lem, unican k bebat eji)splantam poffeffor ipfi *mitilim* abernditinimo ViroD. Sk.
Hifvalenfi.

Hispnlenfi f.edico, qux florem-exhilo^ Junio, akerumaurem expettabat fequente mente, quooiiatu pratedente anno eadem piMthbisilli florem protulic rhenfibits junio & Quintili. Katlixliujus bulbulj, Ctpi rotundeSmil.ljnia, fupernaverotaifttti pulla; tolia prima emittit r.Li'ia,oblonga,foliorum Narcilli marit*«ru,I«merocallisValcintinadifti,arnmbra fecundumtblia tutoni atque adeoex latere, pedalis & longior emicat caulis, plerumque unus, aliqrande veir^df alter (quaticuamliocraroconringit) interdum fuceflive, dilute rubens, r.oonic'us, cavus, 8rinterius fubalbidus, qui inmembranaceam definit vaginulam, fkurate rnbentem, &adextremum acuminaann riiiamque : equaflos tmicas'erumpit oblongus.pediculo nixus viridiore qui deorfum iniexus & veluti procumbens (ut in Leucoio bulbofo veLiliorubro, tametfi non acuenatnns, deoi(umqueinclinans) fexconfans petalis eteganti minii colore rubenribus uribns fuprioribns, totidem inferioribns; quorum quod efuperiori bus medium fit, (irrecriLiseminet, reliqua dflffadlatera a medio reflefnntar, inferiores autem deorfum ^rvantur, concris ita concinnatis, utenfls ctiamfubri, cjuiabordinefanfti jacobi equitibus •r vefte geilatur, fignam valde referat, nnde jacobsi nomen ipfi a Clufio inditum. Snc porro iE-hocetegantifiino flore ihminubfepem fimilicer rubra, quorum medium aliquanto • , rongiusint?ianguhi""ita apicem definit, cjttnim fix apices tranlVerfi tiniunt, intertus fufci, fuperficie lutec pulvifculoobdiifti: cunc>>. autadmediamrcreeorcm longitudlnem medium ex interiorilms lofmm ambit; tдемсiiama reliquis duobus inerioribus toplexum; atque ubi hxc deorfum rltftunc'ur, lbmina ipfafurfum clevanrur.

32. *LUh narciffus* Indicusfaturato colorepuipurafcens, nobis. Nareiflfs Iudicus liliaceustaturato colore purpurafcens, Baptift, Ferr. Hic'Lilionarciirus Indicia jam familiaris faftos Italix, magnitudine & irormicandidoLilio par, floram pcalis magis conrinuatis-minukjue refu'pinis difpar, fiornm numero atiquando iiperior exeodem centro, caulis fcilicet fttigio exemitium, alborabroquebl^detemperatis circa calcndas Septembrts pingitur , ut ipfius pulchricudo exfangine& iaftecoaiuille videatur: albidx membrane rupto imolucro, floris petala primo modice rubent coloracioribustantum lincisin longitudinem virgata, in calathi deinde iiguram dedufiaadulto pajort fuftunduntur^adeoyel in fioribns pudibunda pulchntudo publicam luccm ernbefcit. Toto denique fenili vultu rabiennidorednm ddiorefcunt, floridiora iint,unus nmbilicns intus forilque flav^t: lex inarquafia framina una partecandicantia,in fummo fubrumentia, Funatos incrocos ex viridi flav- .e.^efinunt. Piftillus denique prolixior,coloracus, npicc multo infignitus. Viceni plnreive fl -es epeJ^ttUs fiitiEcrailis, binos feu cernos digitos longis ex atroyirenEibus,& fivedevcx'.s,fi' e reftis,modd in orbem pendnli,modoin filvad pro-:i:jlj, necnon particubtimdchifcenU'-iiL ncauiis taftigium coronant: caulispferotundus, digitum cralius, acprope pedalis, ex viridi * bfoietctt in rubicundum; folia liliacea viions& roagniendinis narciflins, aretafto jam (lore a atere caulis cnata in ipfum. caulem incumbunt. Uulbua hie inNeapolitano tepore Sciljam prope ex^quat, Jlomano fub coclo minustumet; nfttar Ei iophori fummo fub corricc membranaceo lanpfus extra pallet, ftec florem fevt, nifi adjofti mali punicimolem adoteverit. Hie etiamLilionarcifTuscaeterorummore fepropngat, parco ramen proventu/ Alter Narciffus Indicus Baptife Ferraj i difterta piiort folo dilutiore purpureo colore ;ideo inepteFerrarium judicamas daplitcm adhibniffe Iconem in riorum Galtnra.

^*Lilionarciffus* Japonicas rutilo flore,nobis. Narciffiisjapcnicns rutilo flore,Cornut. Inter oninesNarciflfs^itnaftenusapiidnosconfpe&iextitertmr, prima Tutarbitror) authontas, inquit Jacobus Cornntus,nob*!ltllm«liuicdebetur, cujus radices ex japonia allatffi, &CKnavi nanfraga, Bataviaeafi Anglica incertinn, ejeftoe inlitusartiyfum Inlulr *Gers/ey* ditioni (e-reniflimi CaroJi fecundi lubjefta: ibiitiquam bulbi incuiia projecri m liens areaofum inter Sparta maririma & vento fortiori arenam eo ptHence, qua demum pradifti bjbbi cedi,poft aliquot annos fumma cum incolarum admiratione flores nrtilos amplos &c elegante^ fp'onte dedere Ho; flore detefto, aliqnotannis ppftea radices plurinias connnonicavic Botanicis & tlegantium (iorum cuttoribus Dominus *CarolusHat/on* Hios natn fecundas nobilffimi viri *Cbrijlophori Nation* Baronis de *Hat ton* & Infuk *Gernfay* cracididae gtribnatoris, Kui^ Lifipn3rciilbfpec>abiliscil:abinitiotlijTlus leu caalis nndas ioliis, qai paulacun in pedis altitadJaem leerigit, fuperiore parte virens, iiferne mille ptupureismaculis inJaltatis, incujJS faftigio noyem ant decem riorum gemmar, totidem petioiis biuncialibusadhaerentes in haemifphericam iiguram difpofita;, qu^ prius longa & rotunda quydam vagina membranacea ctlabantur; li£ dum florem patefaciunt, in fexptcaladeduti (blcnr, fi bufbus btoacpmgtti fofe^ammittator; nam fi auc ficcus bulbus¹, aut in macro folo pofitus, macro^ flores laltem

normillos & uno aut akt-vo petalorum mutilatos pftTM. Hoc amails fen
 mili. irv *Jh i"i "'i «...» igio JJMffifi? /is&jlf (sSiti crsnteruiicut., quorum
 ix c&pjnziz non m in imuni iul, 'macies detra hi r. } Whamt|ue frufhis ec i am natant du
 acerfyos, & laves in fuTpdos vertit: GroffukcfilvaSres h'dem faciunt; in uva criipa d.
 iiv? ** Mervamu5 fptnolas, & undique acnleatas; tranfhtae in uben us folium culcura & a/
 Ijccione iterilitatem omncm deponunt, & ita facile vice vcria incuria ata loli fici
 im& flveftrem ftetumdennoindun't. An liicLirionardflus Japonicus rftHo Hore
 nt idem, an minor fpecies Narcifli Indici Baptift. Ferr. faturato & dilucio're colore purpm-A.
 fcctis, exaniinent pofteri Botanici. I'ndifti Lilionarcifii cujufque floris fingna petala duas
 uncias (ant longa; admodum angufta, & cxigna veluci lacunafulcaca, qua: jima flbris centrum
 Ijrevi acamine gracilefcunc, extrema parteintixa rtfupinumrmoreLilii montani, quod Mar-
 2gon vocatur: color.tiorifeftcinnaberis aut laccieiegantions^ vena fanguinea laon¹ um
 nediuia difcriminante: ficufex funt in fihgulis Jioribus petala, fex itidem ftant in met
 amenta, petalis longiora & pallidius rubentia, tocidem apicibus atropurpure'is ornata
 LS odor abctthuicflorieleganti, cujus defeftufi natna fapplevit vWacitate colons, yU4
 non modo pigmentorum mixtura artificio quivis aflequi nequk, fed net "^U<- haftenas Hori-
 bus fimilem concefliiTenaturam obieratum eft; naoi prxter cxtmum h. cotorem, quo
 mum obtutum hebita:, fi forceferenus dies aft'ulferit, lloiemque folmcridianusilluftra-
 intac:
 veru:
 ; mille veluti fcintillas evibrat, qaas pertinax oculus inconnivenfque vix momento
 futVincat. Subelt bulbils tunicatus priorum bulbis fimilis : folia vero non nift tabido caule
 erumpunt, quorum color nonglaucus^ necobfeurus, fed grata viriditatt renvtet.

34. *LilknarrilJ'us* Indicus pumilus polyanthos, nobts. Navciffus Indicus pumiluspolyvm-
 thos, Cornut. Huic Narciiifoquodintelicius crelcat, nccultrapalmomejas eaalis adoWfcerc.
 conieuerit, pumili nomen d.atur; radix eft carnofior, majorqu«bulbus: toliaoftoauc novem,
 Ongula palmutn longa, pollkem lata, glance virentia, non i;ech at reliquoram, fed modice
 flexuofa, juxta tetramnati;oblique prodeunt: interquxcantisbrevis, nudus8f libererump-
 pit,rehcVis l'mcinde ad latera toliis; hie non rotundus ut retquorum caulis, fed latus feraiun-
 ciam,poftquam medii palmi procericacem implevit,membranam turbinanorem in lummo cau'is
 ialtigio reliaquit, qua veluti capite flor^' * nnir7quaq;aperriapparet tandem eximius
 novem, decem auc viginti flort: -eodem centre caulis fcilicet lummitate
 aftorum umbelbtim & fuperficit. confituentium, qui profoliccelique
 ractonelanguidiusautfiituntius r ^ hici pratenfisBffigura&r. hic paulatim fele laxant;
 fex enim conftant petalis, quae ac ^ugaltis in em paulatim fele laxant;
 fecundum eorum longitudinem tertar, qoi in-iu .oricapiculum producicu.,^ i t
 criftisextuberans, quot foliafriis excavantur :inflouis medio filamentalonga, apic-
 icibus cseruleis donata: tubfuit^uibufdam floribui. ^jdicali triangulares; hi inter Ic caulis
 in fummo commiannur, miroq-, prorfus ordine difpofici, naturalem & 11 till ; i ten us arte imita-
 dam Via;mfplencam foomnc hguram: flores quoque ut afpeftu ita & fuavkate funt ineiir-
 rabilt, prsrcoioreserianii'untreliquis, ttorent(iqDidemantc Araonim,atqnepaulopoft(ofti-
 duumfcilicet)inliortoBotanicoRegioFarificnf i inutiliter fineftmine,tefteVcfpafianoRobino,
 collapfi funt.

35. *Ulionaraffus* Indicus maximus fphaeriens floribus plunmis rttbris liliaceis, nobis.
 NarciiTus Indicus fpria:riciis flore liliaceo, Baptift. Ferr. Hanc plantam alii Ornithogalum
 fphxricum, alii Moly maximtim Tndicum voc^nc, Butbus hujuslonge fcHlitkofeu feiliino ma-
 jor eft, ventrem prope rotundat^orium ferrugineum, quamvis tenue, duridlmum tamer
 mduit, imam partem protuberantem pro corpotis amplitudine lace circinat:, fibras mmim
 digitt roftar praccrafljs praelongifquediftundk. ftons vagmaad ca'endasSeptemlnis txitn
 bnccK_toini[wicttFpidata, ternoslata digitos, quinoslonga, txtuberantcinnaberefatmata
 At aliquot aica Wbnafcente .fcapo in palmum exerta, turgente jam atque urgenw numcrofi
 T S r i H T ailgUmei modola,^ tmed,hificit, nonutlinguis trifulcishom
 bilis, IDtpiaribun nonbusamabilis micet. Apparet primo conniventiumflorinna«f«
 tiiiiimaconBenes, quaeramofotMularm'ir,^, l . - /i
 r l i o i - , ' uldtim mcremento rotutidam icararekicinfilvam. bcapi
 ^furgit, tpedak& amphor, b, nosdigko, latus, exronmdo peflor, & ex virjdirubens, qi
 SitTM Fril^{nr} i^{or} • T o^{CapimU3} ! Fuitur capite de Wismore *
 rubore virem, es, in capita extumidi Tuliparum triquetro folliculo feu periclytate trifida
 fin

& milftma. Pl/rique inftar candidi C^sjino collo Narciffi cervicem defleunt, refto rigidoque: ftatu iKJSuiulii circumftant. E fingWun; verticibus eminent f#ium verfus fpe&antes elegantiffimi flores, rubro convolutoque^makium Lilio squalis, 'v/zcubfimiles,qiippe Phoeniced rliore colorati, & petalis quinis nativos^i cirros reflexiscalamiftrati, exteriore petajio cum ita&iinibus aflurgente, qux fane confpicienda ftamina fie extant, feha^ lazto colore puni'cea, & in tieidem verfatiles apices, primum flavos & grandiufulcos, deinde contra&iores, fubfer fubfulcoV, 4upra fubalbidos & veuti farina confperfos degenerant: in horum medio piftillus imc apice produ&ior, craffior, longa utrinque rimula interfecante friatus, fumma parte recurvus pariter purpurat. Omnes inter fe liores ternis quaternive digitis intercurfantibus diftant * per partes dehifcunt, nee prior floridus ante deflorefcit quamvirent univerfi; fenium illos non contrahit, fed inuifcat, ac demum decutit. Menftrua ipli vita & Ver autumnale; September fcil. eodem paritorem,perimit occidens. Haec enim multorum floren&ium capitum Hydra non c^iore {ed frigore interficitur. A florum interitu triangula capita grandefcunt, pleraque inania b, perpaucanonnullo abortivi feminis rudimento fceta, five quod nofratis Aututiini frigus re-formidae, fi^{ve} eadem apud BOS nondum robcltiae foecunditatis eft; caules tandem 5c inh^rentes caulicium penitu?.Jirefti atque in orbem diradiati fic.exarefcunt, ut floris pncherrimi cadaver fidus fit: ,aeque enim hoc in folens eft, ut Hydra niutetur in fidus; nee ifti hortorum fidcri morsparcit/pra;morfui floris decorum cadaver ingruentia primum frigora iterata morte corrumpunt,neque clavae multiplicis armatura formofum tueri germen adverfus fevi demolientis injuriam poteft: folia circiter Oclobris exitum apparent, flore non provenierite ; in ejuftem proventu ferius, extremo fcilicetNovembri menfe exiftunt, pauciora initio, fex tandem iiori praefufere, longitudo iliis bipalmaris, latitudo palmaris, dimidiati fermedigitifeultricraffitudo, retufa forma, lseta viriditas, & fukoperorasruborecircumlita; corpus humi-erraticum lateque procumbens, vita ufque ad extremum Maium five ad primos calores produfta. Hunc Lilionarciffum menfe Septembri florentem Parifiis apud Johannem Morinum, Anglum vulgo di&ium, obfervavimus, Anno Dom. 16<>j. Cujusflorum afpe&us elegantiffimusacamoeniffimus fuit, nee capfularum triangularium intuitus minus gratiolfts.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

DiSium autem Nareiffum a v&ph< refert Pk if ihusir> 'Sympof. quafi nervos hehetattem isf torpU das factem gravitates.. Diciturftiai% <<w, is- Apuieio teftes Emfy@', is<AC@- i(wn*^s, aL.T*ⁱ>m? \$w\$tf& autem proprieft Nfo^J* mentanus, eoquod ab aquisremotusproveniat^OXQM i/am-M nomen ab effeffu habet, Viofcoridi* fiquidem autoritate Narcifus vomitum etiam concltat. Eft isf aliuA bulbu* vomitorim prop.ie diRm, de quo infra Cap. fequente* Narciffi mdix, ut Galenus ait; ufque adeo facultate exficcandi pollet, Ut & maxima vulnet-a glutinet, vel ad incifiones uque^ qu<£ circa tendones accidunt: habet vero quid abfterforium is attraUorium. Eadan, authore Viofcoride, five eftur^five bibitur, vomit us movet; prodeft ambuftis cum melle trita: prjeifos quoque mrvos agglutinat impofita: laxat item malleolk diutinifque artuculorum doloribw trita cum melle tsrimpofitafubveni: expurgat ephaliniſr alphumcumVrtic* femine is¹ aceto ; at cum Ervo is melle ulcerum fordes expurgat, is abfeffus qui <egre maturan* tur rumpit: educit is aculeos injixos cum Lolii farina is? melle. Narciffus herbdeus vomU torius, ac ideo ftomacho inutilis, alvum quoque folvens, nervkinimkus^ caputgravans. Narciffi cujuſquegeneris radicem pr^manſam vomitum ciere CluſiUs fdppenunero expertus eft, quod nobis etiam compertum, dum ferva cujuſdam amid forum olitorium pet ens porraceaſoliaſibi cornpar are voluit, quibus incuria an data opeſa hortulani ejuſve fervi fecantis mult a Narciffi vulgarh folia immiſta, qu<e feffa is indifcriminatim olU indita omnes quotquot totius familU> commedere,de hoc juſculentocumfolm^ Narciffi, vomitu vehementi correpyi, me accerfendumcu* rarunt,atqueftaiim cauſam univerſalk hujus vomitionk inveſtigans qu*dam folia NarciffifiU veſtrk inter porracea folia in canifiro quo pr<zditta folia ex for o detuler at ferva, adhu& reft antia is immiſta porracek folik obſervavi, qu* cauſa fuere univerſalk hums vomit us per to* tain fatn&am-

DE HEXAKJALIS TBptAPSULAK 3U&

f t, radicibus bulbosis prop^{fc} di&is praedin's,
C A T V T X I

H Y A C ' I N T H U S .

YAwty©^{urnis} est Diofcoridi I 4. c.fyat Theopbrafto 6.Bji. 7.duplex Jttivusi&filvefrUi
(\$>ut Flint 2 i.e. 11. Hyacinthum duplex fabula comitatur, luclum pr<efereus ejus
quern Apollo dellexerat C Hyacinthum vocatum j aut ex Ajach cruore editi, it a difcurrentibus ve-
nis% in Grdteamm liurUrum A. L inferipta legatur, Duplick veteres meminere; alter PSeticu
altermedicus: illum,aliquifabulcfum vel poeticum: bunc, historicum five medicum votaik
r.urfus alms Grxcorujn^ alius Latinorumtft; Gr^corumejftHemerocallida Diofcoridhjive Lil'm
rubrum Plinii, Latinorum quidam Iridem radice tuSerofa neenfent; "Medicum vero ab uftcque va-
riat, de quo in prgfens.

Hyacinthus folia producit anguftiora; flores minores NarcifTinis, eftqii> tomofas, vel ra-
cemofusfeubotryoides (id est, flores racematim geritUnidonisflonmi rmulos ;), vel fiore
oblongo, vdfteiiar/s(^flor[)rap,taltsftellamimitamibu3O vel a loco in quoprovewt, est
vel On entails (ifque vel riore fimplici, vel pleno feupocius alrero akeri innato:) vel Indiciis :
elta rempore, vernus feu pricox , ferotinnis vel autumnalis : a ibliorum compofitione vel
latjroiijus, vel anguftifolitis: a florumcolore est czxiileus, viohecus, cinereus, ruber & albus.
De hifce omnibus ordine agemus.

T A B U L A E Sectionis quartae.

Comofus	1. Jtfajor purpurafceus, CB.P- Hyacinths {furm\$,Eyft.lRuber.	(Violaceus.
	2. Sanefius pankuh viot-'ea, nobk. Hyacinths Sttfiefius comapanku* lofa^ Colum. O ^^	(Albus. O
Hyacinthus	3. Latifolus fpa	'Cdtrukus. Carneus. • Niveus. ©
	4. Anguftifolus 3 minor \	{Ceruleus. Violaceus. feu juncifolius j Carneus.
	5. Racemofus feu Bo- j tryoides flore arbuteo	\Albus. O Ramefus caru.kus, nobh. Hyacinthm fiotryoides rame- rusj fa Bry. Park, Farad. O
	6. Albus. O	
	7. Luttus. O	
	Mofchatus Mufcari diclus	<Purpureus< (Objolete. © (Ex viridi. © Pullus [Carneui. O
	8. Obhgis pendulk\Ma}or Anglicusfm Belgicus^CarZZ*'	Ce (Albus. ©
	Floribus	Utrinqe difpofith C B. P. Hya- fUruhuf- O cintbus Neopohtanu^ Swat. \ ' ? Albus. O
	V/ I	Uno verfu difpofitis , C. B. P. Hyacinthus totus al- bus&aniUaexLufitania, Lob.Ad, Pa.rL2. 3

io.C<fr> *Td.Ger.* © **f**,
 11. *Caulis maculatus* C B. P. *Bjacinthxs orientalis*, Eyfi- 9
 fi2. (*Ceruleis* © >.
Serotinus foribus enflisj iAlbis. Q
 (i^*Striatis. O*
 i^*Flore duplid ftu ahero aheri Imata, nohk. Hyacinthusflaredu-*
plici ex albo virefcmte7 Cluf. Cur.poft. O,

T A B U L A XII.

rBifolius r (Cdtruko,
 15. *Præcox Germanicus aut Gallicusi <flore "SCarneo.*
(Trifolius (Albo. O
 16. *Spies lata depreffa feufastiati in metamforibus, nobis. Stellatus Bi-*
Zantinus five-exoticu's Someri fastigiatus lath depreffa fp'ca. Lob. Ad.
part. 2.0 ^»
 17. *Caulibus pluribus^fingulkpluribus fiorihuscnuflh, nobh. Hyacifr*
thus caulibuspluribusjforibus ornth^ Sirert. O
 18. *Autum- | \ Major, C. B. P. Hyacinthus autumnalh major, Ad. Lob.*
Cluf-Hift. O
<tf/<j itfi>or, C. B.P. Hyacinthus autwnnali minor, Cluf.Hift.
Dod. ©
 19. *Peruvians mulriflorus Tkribus *
CCdruks. O
(Mis. O
 20. *Erhphorus di8us, nobis. Eriopborus orientalk, Cluf. Hift. O*
 21. *Sqnimifti ^h"@"^feufoliisLilii, nobis, Hyacinthusflel-*
laris< "Lilii, C. B.P-Hyacinthusflellatuste<ttl-
ow>>. altera ejufdemque Aittar. iff Cur.
 22. *fatanium^nob'k. Hyacinthus tuberosafaradke^Cluf*
I Ad:part. 2.1. B-Cbabr. Q
 23. *ubnofa^partimbulbacea autumnalhfiore amplo*
albo ode, htijmo, nobis. Hyatintbws Indkus major tubm**
fa radice, Parkt O

Explicatio Tab. undmm£Seftionis quart*.

§. 1, HTACINTHV S C O M O S V S.

H *Tacintbus major comofas purpureuo, C. B. P. Hyaci/itllus comofus Martllioli, Cluf.*
 Hift. *Hyacinthus Neoceritorum five comofus Ipurius 3. Dod. Hyacinthus purius,*
 Eyft. *Hyacinthus magnns& buibus vomitorius, Lon. Hie folia habet longa, pingua, ali-*
 quantulum hica: caules longos, iubindedodrante altiores; rloresemediofursum verfus, un-
 dequaque circa caulem mukos, parvos, cavos, primumpurpurei, ubi vero flaccfcunt obfoleti
 coloris C reperiuntur rubri &c candidi) cacumine comofa: radicem uci aliorum bulbofam,
 fubruftam, acfubpurpurei coloris. InGermaniae quibufdam provinciis, iiti ij Norica five
 Bavaria, frequenter in praris gignimr; quandoque etiam ad agrorum margines apud Gallos &
 Ualos inter tegetes Hitis frequens. Apritt & Maio, fubinde Junio, ejus riores vigcat; fem-
 ooftea zftate perficitur. Hue refer Hyacintluim comoiura Belgicum album, & comofum al-
 bum Bizafitinum, Sfcomofum Hifpaiucnm C. B.P.

2^ *Hyacmtbui comofus pankula csernlea, C.B.P. Hyacinthus Sanefius panicutosS comi*
 Cotam. *Hyacinthus comofus, ramofas, purpuroviolacens nondum defcriptus, deBry. Mirum*
 quidem diftu quⁿi planta hac buUiofa Hyacinthis vulgaribus non abfimilis, pmro foliis & fe-
 m:nc vidua inirugilciaque fit adhuc viva; ignoramus qnmamfiecaufa, an tranfh^ionis colpa,

B b b ^ an

a&rica, Hyasnithi'majoris ieu i. MiffiffHli,rbliisperquamfamilia & tennia; ftaminafeu fi-
 amenta (firumpantur) oftendencia, «obadeotamen abundew E'riophori folia, qua; cum
 Jrjraum germimnt, purpuraicunt aui! alWfcntnt, incerdum pulcherrinio rubro colore nitent.
 x.UWum medio caalis oritur verno rempore fatis craffiis, rotundus' & ntfidus, admodum
 nfirmus pro fua craflitodine; hunc 2 medio ad fummumferejacmatirncohiTentes ambiunt
 lorcsbrceolisprimo propemodum Smiles, iniciointerdumvirides, au: purpurafcentes, de-
 nde palfte Havefcentes, vel ab initio pallidi, pottea tiavi, pofremo ubi tabefcere incipiunt
 itgri'cantes ant pulli, iique mucrone quam in aliis craffiore & obtufiore interdum, qui mar-
 elcere incipientes graci/fimum mofchi fere auc aromatum odorem referunt, licet in hoc
 genere flavo colore pradito gravius quidpiam quodammodo fpiret; niveo omni no flore re-
 teritur & egregio rubente, quos fane nobis videre non contigit. Hujus flavi feu obfolet all;
 • l>:<s mules rnu'to breviores funt canlibus flore^ obfolete flavo aut purpura^nte oneratis:
 • ccedunt capitula trigona, magna: in quibus feminae continentur nigra, rotunda;
 • itudine Orobanchae ant feminis Hyacinthi i. Matth. fed majus: radii Klubeft magna, albi-
 • istunicis' rum modo contexta, fir frequentibus craffis fibris ex ima fedepre-
 • eint!L>_ firmatn ^bus, nee fingulis annis. marce^fcntibus & pereuntibus, at Hya-
 cinthorum, Narcissorum, Tuliparum, Liliorum & multarum aliarum bulbacearum firpiur-
 brx. Ab fmo flore explicare incipit hic Hyacinthi ut camera; bulbaceae fpicacim Botryoidem
 florum fecentes. Obfervatur in cerdiim li^c firps caulcm in binos ramos dividere,
 Kjonum finguli muhis floribus onufti ruerint.

§. 3. HTA CINTHVS cblongoflore.

8. Hyacinthi* major caeruleo oblongo pendulo flore, C. B. P. Hyacinthus Anglicus,- Ad.
 .ob. Ger. Eyllt. Belgicus, Lob. Icon. Hyacinthus nonferiptus feu Diofcoridis, Dod. Lugd.
 i. yacintho huic folia funt oblonga, angufta, lxxvia fplendentia, Porri foliis. anguftioia & mi-
 .ora: caulis toliis viduus, glaber, teres, cujus coma riorum pondere fit mole cum primm
 Lehilcere incipiunt, gravata deorfum recun^itur; flores oblongi, teretes, concavi, in lacufte
 landunc^ per oras reflexi, coiore uclplur' -s-nlei, fubinderubri aaccandidi five nivei,
 'iol;en!grxaliquando octam dilaram pu' -s-nlei, fubinderubri aaccandidi five nivei,
 rotundum: radix bulbofa, ca' -co uci & roca herba plena,
 once in phiribus regionibus & acprscox, in aliis minor &
 MUS. PaTim provenicinf & Anglbe.

y. Hyacinthi floribus Campanulati difpofitis, C. B. P. Hyacinthus Neapolitanus,
 • were Mic flores campanularos caeruleos ^erit, integros in fundo, dtvifos in margine, aker-
 arim difpoficoa (id eft ad exeres & in inftris caulis flores dependences edit.) Eft & alters
 .JS varietas floribus unoverfudifpofitis: hic floribus donatur c#ruleis imo verfu difpo-
 itis, id eft, flores ex una tancum parte caulis promit. Et prior & pofterior fpecies, ant. fi mavis
 arietas, onfpicitur flore albo. Caetera confule Cafp. Bauhinum, Johan. Bauhinum, Hortum
 ^ f t f , & Florilegia pnedicVa.

§. 4. HTA CINTHVS ORIENTALIS.

i Q-fyacinthi Oiiencalis, Bod. Match. Lug. Cluf. Hift. Csruleus, Tab. Ger. Eyft. ES.
 auiores kit flores caeruleos, cinereos & albos campanulatos, itidem propendentes, & in-
 sgros in funco, in margine divilbs. Alter eft plures flores cirultos propendences pro-
 srens, prioris floribus ftilts fed cineraceos, quodammodo purpurafcentes, omaefque
 in Limbttis propediidentes, & reliquis non minus odoracos, feminae icidem in canfulis criaii-
 ularibus aliorum more. Hujus dacurunus major, plures proferens flores; alter minor, pauci-
 rers gerens riores.

11. Hyacinthi C3ule maculato, G. B. P. Hic caules profert craffiores maculis uigris feu
 ulcisobduftos: folia flores & radicem majora gerit prioris foiiis floribus & radice.

12. Hyacinthi Orifaatta ferorinus erectis Gtruleis vel atbis floribus, Eyft. Hyacinthi
 rorinus minimus raruleus, Cluf. Hift. 6; App. 2. Hic profert ex radice balbofaoliva; pu-
 lla! magnitudine, fulca membrana tefta, & multis fibris donata, quina aut tna folia, longa,
 angufta, -lhiata, & fupina parte carinata, vijidia, recurva, fen verfus terram recalcantia,
 in hilpurpurafcentia, nec valde cibimilia fallis Hyacinthi Botryoidis, inter qux exili, tb^t
 giacilis

gracilis cauliculus dodrantalislongitudinis, obfple^arpurafcens, kvis, fumniofastigio/u' ftnens fenos ant, fcpetijos flofcnos, concavosm Mo, "campanula inftar, &]_n fexp r^as lamias per oras div.fos inftar Hyacinth! Oriental' priSris caule maculato, fed l_m " C

SlafnccSIKSrri^110111111 " ^ " f^* ^ ^ ftilus: fm Sulis * << fm i T ^ Z ^ T F ... stinas striatas, C. B. P. Hyacinthus Orientalis lero Eyt^3 Flos hujas ex colore dilucius caeruleo, fenis venis fatUratiuf c*ruleis mix*> corifftat. Huc

tionem - IQrI g,a Prxdiaa, ^ variantmillemodis, numero&coloreflorum a' ia-

14. Hyacinthus Orientalis flore duplici seu

4 i << X ^ f e ^ H r tflore duplici, C. B. P. HyacinthTM ^ c Hyacinthus Orient' A T ^ f * H ^ cinthu s Onentalis pleno flore fubviridi, Swfirt. conllruaos adeo " ph a, Y * Hic flores ^ dr du p lice cam p TM ula una alicri innata mcruaos adeo ut minor& interior adaptetur 'majori exteriori.

Bulbi HTACI^THVS bulbus Eriophorus dittus.

fd LnZZl n ^ e r \ inter^te^ Theophrastus 7. Hi/l. 13. oenwü/, ill_{WW} i < / i / ^ ^

HTACI^THVS bulbus Eriophorus dittus.

§. 5. HTACINTHVS STE LLARI'S.

15. Hyacinthus nobis & R p o fte, lar IsGermanic »sp^coxbifolius & Hvacinthusstellarisprascox trifolins, flore ex rulo i ^ yac Fuchli, Dod - Hyacinthus ftellatus, CM Hift. Hyacinthusftellatus aliquand o rilhrü? * f * H ^ y ac in th s minor prxcoc foliis, modo binis, modo ternis, aut ficulijalt m lum, f ^ a t U V ^ S, fed p orri foliis multo minoribus provenit: floribus circa cau- ftantibus, c c J n ^ a l m a i t < m r a d i a n t i s f t e l l a e f e r e f i m i l i t u d i n e p a t e n t i b u s , f e x p e t a l i s c o n - h u m i d a v e r n a l C T l e n s U b i S c a n d i d i f v f : W h T M f u c c e d u n t c a p i t u l a r o t u n d a d e h r i , f e d f t a c b n j o f a 7 n p p a t e F i l l m a J o n s i r g n i t u d i n e i n q u i b u s f e m e n M i l i o f i m i l e : r a d i c e c o n - b r o f i s & a l i . R e p e n t u r p o n t e n a f c e n s i n p l e r i f q u e G e r m a n i a ? & G a l l i a e l o c i s u m - B l a c e s ' d i a a 7 i ^ o / P l n g U l & i n c u l t o r o l o : n o s r ^ t i m o b f e r v a v i m u s i n f i l v a c c e d i a p r e p . b r e v i a e C o J . e n e C b a i k f l o r e n t e m F e b r u a r i o & M a r t i o . B u l b u s e f t e x i g u u s & c a u l i c u l u s r e m - b u l b i s ^ U n c ^ u e i ^ e x f e p t e m v e f l o r e s a l i q u a n d o p a u c i o r e s f e c u n d u m a e t a t e m & v i g o -

16. Hyacinthus lazas dixlcn f pica t < s f e u f a f t i g i a t u s l a t a d e p r e M a (p i c a , n o b i s . H y a c i n t h u s f l l - d e p r e f l a f t D i c a V ^ f i S l ^ l l ^ u ^ l l ^ * H y a c i n t h u s f t e l l a t u s B i z a n t i n u s f i v e e x o t i c u s S o m e r i l a t a J - B . C h a b r u ^ l a t u s > ^ o b _ A d * P a r t * 2 * H y a c i n t h u s f t e l l a t u s m u l t i f l o r u s c i n e r a c e i c o l o n s , i n t e r q u x ^ l C m u l t a ^ c z ^ i a ^ l u m i) ^ c e n t i a , i n f t a r H y a c i n t h i A n g l i c a n i v e l B e l g i c i f e r e , t e r d u r n f l o r ^ C a U ^ l l U ^ u s . P a * m a n s > a ^ q u a n d o f e f q u i p a l m a r i s , v i c e n o s , t r i c e n o s a u t p l u r e s i n - c o n f t a n t e s r e S ^ V ^ r a c e m i u v a r u m i n f t a r c o n g e f t o s f e r e n s , f e n i s p e t a l i s f t e l l a t i m c o n f t r u c t i s c i n t h o , a n i ^ U m o c c u p a n t e u m b o n e ^ u c a p i t e l l o e x f e x f t a m i n i b u s , n o n f e c u s a c i n H y a - l o r i s , u n d e a ^ o ! n o m e n o b t i n u i c , f e d l o n g e d i l u t i o r i s a c v e l u t i e x o e r u l e o c i n e r a c e i c o - c e r e o s f t e l l a t o s n u m e r o r i o r u m i n m e t a m c o n g e f t o r u m e o r u m q u e c o l o r e c i n e r a c e o f a c i l e i n t e r c o i n t e b u s T e r u v i a n u m : f l o r i b u s ^ H ^ m e t a h l c o n e f t ? a m p r o x i m e a c c e d i t a d H y - n i s (a l i o r a m m o r e) l o c u l a m e n t i s d i l t e m e n n i g r u m c o n t i n e n t i a : r a d i x b u l b o f a , c a n d i d a i n f t a r r a d i c i s h y a c i n t h i B e l g i c i . F l o r e t e x e u n t e M a r t i o & i n e o n t e A - p r i i n c a l i o r i b u s ; a t i n e u n t e M a i o i n f r i g i d i o r i b u s r e g i o n i b u s .

17. Hyacinthus stellaris caulibus pluribus ex eodem bulbo ortis singulis pluribus floribus overata, nobis. Hyacinthus caulibus pluribus ifono usonultus, Swert. Hiccaules quinos, fe- nos ex eodem bulbo cotrnhir J r n g u l i c a u l e s a d m e d i e t e m u q u e f l o r i b u s p l u r i b u s , f t e l l a c i s , e e r

18. Hyacinthus stellar delo & Phalangio ramo 19. Hyacinthus stellar Lob. Lugd. Ger. J. B. Chabr. & Hyacinthus stellaris major, U. d. Ad. Hyacinthus stellaris minor, C. E. P. Hyacinth u^ au- tumnali?.

tsmñalis, Gluf. Hift. Lob. Lugd. Gq[^]-Hly.acinthus ftellaris autumnalis hie major quina fenave habet folia, latiufulca, fiexuofa, viridib,Waliquantum carinat^s, inter quæ prodit unus, nonmpquam bini, terni aut plures caufes, -J[^]Imoaltiores, fatis firmi, flofculis multis fex petalis ftdlae inftar expanfis conftantibus & dilutè purpnrafcntibus ftipati; in quibus funt quasdam ftalninula nigricantibus apicibns praedita: marcefcntibus flofculis iljico fuccedunt ten.uia admoiũ & trigona capitula, qua? brevi maturefcntia & hiantia, pufillum nigrum femem oftendunt/tjuod terræ gremio exceptum fui generis plantulas generat, qua? tertio aut quarto anno flores dant: radix crafliufcula, candicans,infima jede multis fibris donata. Hie Hyacinthus cauliculos deditClufio ramofos, quorumfinguli caules feu rami fuisflofculis (utfuperior fupra defcriptus) onuftifuere. Hyacinthus ftellaris autumnalis minor à priore ftellari autumnali niajore folummodo difTert parvitate partium. q

19. *Hyacinthus ftellatus Peruvianus multiflorustloribus caeruleis autalbisiHrotundam metam ïaiftigiatis, nobis.* Hyacinthus ftellatus Peruvianus multiflorus flore cxruleo, Swert. i'yacinthus ftellatus Peruvianus, Cluf. Hift. Lob. Ad. part. 2. Eft omnium Hyacinthpriint" elegantiffimu[^] hie", primo ex Peruvianoꝝ orbe delatus, jam hortis omnium rei Botanicae amantiupi tati.s familiaris.* folia habet multa, lata, crafta,mucronata,rfyacinthiEriophori dicli folffs familia, humi magna ex parte fparfa, faturate viridia : inter quæ nudus prodit caulis, curtus, virefcens, &terse vicinus, fummo faftigio permultis floribus metx in modum faftigiatis & fimul congeftis onuftus, qui ab imo primò fe explicare incipiunt inftar Scillas, Ornithogali 6V fimilium; in cymis caulium vix palmarium (nifi in fob pingui) pediculi oblc*igi,ex atro virefcntes,ex foliorum gremio orti, flores fuftinent odoros,fex petalis ftellseinftrar expanfis conftantes, purpurei foris colonis, intus ex purpura cserulei, umbone (quemadmodum in ftellato vulgari) fioris medium cum fex ftaminulis ilium ambicntibus occupante: poft quos evanidos fubveniunt capifti trigona, ternis loculamentis diftinfraj in quibus maturantur femina nigra: hifce enim terræ commiffis à diligente & intelligente hortulano rei Botanicae peritiilimo *Edvardo Morgan* in hortulofuo fuburbano pone AbatiamWeftmonafterienfem pullularunt infinitse plantulae, qua? flores poft quinquennium aut feptennium tulère: radix bulbofa craflaque inftar radicis Hyacinthi orientalis, fufcocoloreexterius praedita, & multis crafliufculis fibris abimafedeprodeuntibus firmata. Confpicitur idem floribus niveis; vifu peramcenis. Pro natalibus[^]primòjjabuit regionem Peru. *Floret Maiuxeunte.*

20. *Hyacinthus Eriophorus orientalis, i[^]. B. P. Eviophorus orientalis, Cluf. Hift. Lob. Dod. Cam. loigd. Tab. Ger. BulbusEriopho[^]Qs feulaiferusClufii, J. B.Chabr.* Hie eft jlle bulbus quern multis abhinc annis defideraveit'Botanici omnes, quique fumma cum diligentia apud Botanicae rei ftudiofos colituj^{*}in hortis. In maximam amplitudinem excrefcit utAllium,atq; fe mirum in modum adnata fobole propagat: huicbulboEriophoromukafuntoblonga folia, hyacinthinis fere*familia, non narciffinis, minus comofa & fuccuenta, durioraetiam, viridia, mucronata, ingrati faporis, quibus etiam minutifllme confractis tenuia queedam ftamina inftar tek araneorum deduci poffunt: ex horum medio caulis exit cubitalis aut amplior, reftus, Scillini caulissemulus, kvís, nudus, virefcens, fuprema parte adcaeruleum colorem tendens; oblongamque veluti fpicam gerit in denos vel plures verfus antequam explicetur flos diftinftram, primum viridem, fedpaulatim (dum (*hie* explicat in fiores) caeruleum colorem contrahentem: flores fenis petalis ftellatis expanfis conflant, triangulo umbone in medio protuberante, Hyacinthi autumnalis majoris floribus valde-fimiles, inodori, caerulei, fuis pariter quibus infident pediculis internis donatis ftaminibus, quorum apices initio purpurei, ubi fe fe expandere pallefcnt qu[^]dam veluti farina apherfi, qui ab imo incipiunt florere ut in Scilla & plurimis magna ex parte bulbaceis ftirpibus; flores inquam racematim & fpicatim confertos habere folet: radix crafta & bulbofa eft, è plurimis tunicis albis majoribus involventibus minores & inferiores contexta, tomentofa, & veluti araneorum telis obfita, quemadmodum fupra diftum infoliis: bulbillos adnatos ad latera babtt, & ex fede infima crafiis oblongifque fibris nitet.De cseteris Hyacinthis confule Cafpari Bauhini Pinacem, Johan. Bauhinum, HbortumEyftettenfem, & Florilegia Swertii, du Bry & Paffiei.

[^]. 6. *HTACINTHIfdlati feculiares,radicibus difcrepantes.*

21. *Hyacinthus ftellaris fblis& radice Lili, C B. P. Hiacinthus Agip^oV^M©"radicefquamata Liliũ nobis.* Hyacinthus ftellatus Aei^{pi}[^]M@k, Cluf. Hift.&App. altcra, ejuftdem An&ario ficCur^opoft. Hie folia fena, feptena aut plura fert, Lili albi (antequam in caulem abeat) foliis fimilia, e quorum* medio caulis exiltpede brevior aut fpithamams, multos flores in fum-

mo tuftinens, Hjaciothi fteUativulgonLincupatiiorii^mninopares,fcxperiliskonftamc.^-
 intenfe cxruleis five violaceis Q aliquando, ied rarias fo?cis) eminence ex mcadioquodnm ve-
 Luti unibone cum ftaminuiis fex, & ftulo, aliorum pr^cSftortm more: floriliisfingnlis decidis
 lutccidunt capitafrigona, tribuslocubmentisdiltinctaj atque mfingulis femina muka, wgra
 contiiicntur: radicemhabet fquamata,rlavefceritem,oblongam tamen,tegulis veluti tecWum
 imbvicatimfibiinvicemincnmbentibuscontextam, Liliorumfive M.artagonis3dicibusfirtvem.
 FropterenimflorencVcapulamfeminalematlinftarHyaciiithi, hie inter congeneres Wyacin-
 thosftellatoslocavimusetiamfienimradiceJqwaniaca&t'oliisLiliisconveiiiarjapteratisHyaciii-
 thus foliis& radice Lil'it, (en Hyacinthus Miffi?A®) radice fquamata, nuncupabitur. EBilcaix
 montibus rsdiccm erutam &ad D.MutontirnarportatoniprimoLobclius teftatur. Ejuldem
 radicesmfitt Joachimus Vene/ius,qnaspartimjnPyrena;is,pamrn in monte Gallic Aquitanics
 collegit. Floret rinicnteVere. Radiccm itidemejas, cmflosadvenerat albus,in monte Puiok in
 Hifpsnia idem Joachimus Venerinsreperiebat.

21. *Hjacmtbus In&lcuz^ibtrofo* radice, Cluf.Hift.Lugd.Ad.part. 2. J.B. Ohaly
 cintimsiidicusminoralbus radicetubero/a,Swert. HicHyaciiithus<quemadmo,dufi.
 radjoeftpaorofa a citeris omnibus Hyacinthis vere & proprie di&is bulbofis dlftert^, di-
 itingnitur radifc tubc-rofa feu uniformi fabftantia cbnftante, qua recedic a reTiquis Hyacinthi
 fpeciebus proprie dift'is,fedurerq;Horibitis& capfulis feminaibus convenit cum caeteris Hyacin-
 this; ideo ad finem Hyacintiorum hos duos, unâ cum fequenti & ultimo Hyacintho Dtrlof- I
 que naturam participante quoad radicem partim tuberosam inferius, partim bulbosam fup
 remiffimus; attamen à flore & capfula feminali est perfecte Hyacinthus, ficut priores dur
 obftantibus radicibus diverfimode conftitutis. Ex huius radice tuberosa, Ari Ægyptii
 locafisinflar^ fedlonge minore&graciliore, adoatifepprogantc, nonnullifqae fibrifpr<-
 dicj prodjtint folia muka, humi fparfe, oblonga, angifta, nincronata, Alln foliorumsmula;
 atque ex eorum medio plures canks afTurgunt, rotundi, longi, bicubitaies & non raro longiores,
 imofcre tritubicalts, duviufculi, bevts,minimidigiti craiTicudinemntinquam fuperantes,unde
 obniiniam iUamion^codincmactennitatem infirm! oblique, quo tempore floresferunt, ie
 colitorquenc, ac]iumiplcL-umc[i3eproci]mbunt,nifibaciis,rulcrisadmiic:ili(vefuftineantur:
 hos autcm caules per intervalla fingalaria folia alcernatimlata bafi veluti Perfoliatrtrbliaam-
 biunt, breviora, mnla, fed magis acumiwlia quam circa radicem, atqae in eorum lummo
 permnki fpicatim coliarrentes infideit: fiofes candidi, Hyacindii orientals floribus omnino
 fimiles; & ric, ait Clufius, tubers qtjs accipi tcomite Ajembergio, infequentcSextili & *
 duxerunt longa, Jmmi fparia, carinata initar foliorum Eriophori, led angftiora, 1-
 & inniucronem Ioncumdefinientia, felequeinvicem ampleftenja qutmadmodumlr!.. MU-
 folisEcanlis expertis folta/ua: avulfa & confracta,non [ecus in ftamina dtducabantur <^±\\
 dicii Erioplori toUa^iffj^^iVjvTsSsL ta^mis'leminali'bus Vi t>espoftremi Hyacihthi nuntu-
 pandi Cum,etiamfi 11" fit radice fquamofafeu fquamata& Eoliis Lili, i a" tubcroiii,29"pa
 tadice tuberosa verfus imim partem,Si -jprtim balboCa feu tunicata bulbactave in ilipriorc fui
 parte,

23. Hjrfls//j;<Indicusantunnwllis flore amplo alboodoratiflimo radice 'partim tubcro';!
 partim bulbosa, nobis. HyacinthusIndicus majortuberoia radice, Park. Hyacinthus Iadicus
 tuberosa radice non defcriptus, Swett. Hie per.egrinus auturrnalis Hyacinrlms fiorctouftat
 omnium maximo, albo, odoratiffinto, catilibus pedalibus infittent*. quos deotfum verfus circa
 radkem ambuni plunna folia, dilute virenria, .palmaria iongitud/ne, nutcronata: radiccm
 habecinferiore fua parte tubetofam, fupci'iore auttm bulbolam fen traucatum, at apparct ex
 \cone anobis exhibitâ fub fincni Tab. duodecimo. Ex inferiore,tuberoia Icilicet, parce plu-
 1 imi ctatfe ftbrae interram demittuncur, quibus nutritur tota planu.

TEMPERAMENTUM. &c V U E S.

Radix Viyaunthi AmAkam jtu Belgiei fare oblonyo cum vino alhoimbcfna, aukore V'tofcoriJe,
 impuberes ftrvart i'reditur; fiftit autem album & urinam ducit pota; at fermen majore vi astring-
 gendi p'editum est, & ipfum in theriacis medicamentis ad verfus venenatas bestias commodum est.
 Morbum regium quoque depurat cum vino datum. Galen de Simil Medicam. Ex. Hy-
 acimbi radix
 initio. I* lmo m)jir,^ula ^mata & illita fubntatm coerccet Jcu fibs mm fatUur
 e pere. men ejus cu
 tarn datu -----vuDffa babet. Oinnes hulbiatmfum, <y talefaciunt, & ad
 -Ditt em

vtnerem cone it ant; de culinarik foe diiium puto, de quibus infra dicemus, -quare Martialk Poela in Xenik,

1

Quum tib'tji: anusconjux is funt tibimortua mwibra,
 Aliud bulbk quamfatur effjepotts.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS,

radicibus bulbofis proprie dictis pradiris. '

CAT V>T XII. . ,

O R N I T H O G A L U M .

O *Ornithogalum* propter *M3eum* colorem, qui inflore nitet, fimilem «, qui in alk aui ovk Galinajum obfeqvatur, nomen accepife videtur. *Diafcorides* I. 2. c. 174. uniut, ut is *Flin.* L 21. c., 17. *Ornithogak* nominans, meminire* Sunt qui *Bulbinam Tfaoph.* 7. *Hift.* 13. is *'Athen<ei cenfenf.*

Ornithogalum, acandore radicisfimili ovis galinarum aur plnmis avium nivearum Cquafi lacaviumdicerts) deducitur. Floresgericftellatos, fexpetali3, fingulisnotisviridibus utplu-
 Vu..cm aftefVis, donatos; eftque vel flore albo, & hoc <fi *Vel umbel la tum, vel fpicarum, vclIndi- cum; vel flore lutco.* Denique de liifce in hoc capite duodecimo fingtilarim traftabitur.

T A B U L A XIII. Seftionis quartae.

- fi. *Maximum Arabicum* muhiflorum album umbilko interionnigro, nobk, *Ornithogalum Arabicum*, Cluf *Hi}*. 0
- Umbellatum* 2. *Majusanguifolium*, C-B.P. *Ornithogalummedium* ^Eyft. 0
- 3. *Minuscandidum vulgare*, nobk. *Ornithogalum candidum* vu/gdre, *Ad. Lob. Bulbutleucantbemus minor*, Dod. 0
- [⁴ 4. *Maximum* pribus albh in'humeralulibu^ncbk. *Maximum*, Cluf *App. isMyconi*, *Hift. Isugd**®
- 5. *Majusanguifolium* floribus exalbovinferitibus, C.B<P. *Ornithogithm jnajus* 1. Cluf *Hift. Afiboddus bulbofus Galeni*, *Vod. Lugd. Ger.* 0
- 6. *Majus* flore latteo, Eyft. *Ornithogalum Monfydianwn* flore hffeo, *Lob. Icon. Ornithogalum majus* 2. Cluf. *H}fli* ©
- Spicatum* 7. *Majus Pannonicum* flore albo lima vindi in dorfo prdido, nobk. *Ornithogalum fannonicum* ftonalbo^Cluf. *Rifl. is Pan.* 0
- Ornithogalum* 8. *Exotkwn feu fozapolitanum* flort minors majori innate, nobk. *Ornithogalum fteopoliranum* flore imcriuseandido exterius cinemceo^ *Sirert. Ornithogalum Neopolhanum*, Cfof *Aft. 2. Eyfi. Cer. J. BXBabr.* 0
- 9. *Vt'opofifaum* priori valde affine fi non idem, "nobk. *Hjacintusarvorum Ornithogaliprioris* flare dmuks, *Cot.* 0
- Indicum* \ *Lanfotium* Uo. *Floriferum fpbdiricum* colore ecloffimaut albo^ nobis. \ *Moly larifolium fadkufh* flore purpureo^ *Svtrt.* 0
- 111. *Bulbiferum nonfloriferum* ^nobis. *Moly latifolium Indicum* ^C.B, P'. *Caucafon, Icon. Lob.* 0
- Lutcum* i 11. *Majus fiariferum*, nobis. *Ornithogalum luteum* ^Smrt. *Ornubosah* _{UR}
- 13. *Minimum bulbifentm*, nobk. *AnguftifoMm campejln* hteum minimum bulkfum, *Coluw*, 0

§.1. ORNITHOGALVM - pm BELLAT ^ M

Explkatio Tab. Jwirarf'firf SeEionk quart*.

Ornithogatum nmbclknm maxinram Arabicanni umbiJico interiore nrero, nobis. Crum album arabico Alexandrinum, J. B. C... Ornithogalum Arabicum mulciflorum Syriacom feu Lilfun, Adeo similia, ut abisdem vix discernat quisquam, nisi in hoc studio bei exccritatus, prse. tim planta suo caule & floribus viduata > niillime >><<m Narcifli ioliorom zmula : inter \$ cubitalis emergit caulis. lavis, nudus, graci confuso ordine ambiunt ramuli sive pediculi > flwca maS^n^" ^ tinentes, Narciffims mag.it dine pares, sed Ornithogali forma omnino pr... di... in... m... t... b... f... c... k... dentes, ... petalis, ... r... al... refe... es, tr... ?H10> n,gr0) ^^mc^cdiomiorLoccypaute, qupcTambii rinfiiK lifpt-fir, m, v... ulu1]3!:-a lemma nunquam adlmc obievarejmbi lfcuic, inqt SSrlls fls s?nr - r... al11s ltu^ as eius bulbi Ycman>in ^TM> qu nigro viridem co!oren trahc "P"11113 Ume11 mcrementum capientia fenescence flore, & i cceperunt • rad 1. li.Tu k,aUt femem daturavidercliCur paulatim umen contebefct lataadmod'am f^eA - H^acintii:Em^a)can(iicans,pkTumque eroulcis tunicis conflati mcle ei d... lia^Ditu fibras ^pargente. Flortt Maio. Provenit sponce in Ara^ folia i enomi nat10. Mira est hips bulbi natura ; nam plerumque expert! fimus vix^ ui concreduatur, 31.011101.6 n, ^ ^ngD^s antl.f exemptus aliqnanto tempore afTervetur, dcinde cerra: denu, tUm en, m ^ em am gcrminare folec, etiam ante bramam, nullns autem Horere mi- iftic e^' n^ ^ retens Gonftantinopoli allatus. Nam ex eo/umcit nnmero, qui nifi Przemt jam conceptum in utero florem habeant, in frigidiores regiones tranflati nullum dent. J, CUm fr'gorisvaldeimpacins fir, nequeVienna, neque in magis Septentrionalibus ^ • r, ^menim horto ferre potuit, fedinfidtilibusreponendus, ubi bn1bi circa adnatis nu- C i t' I s ^ f f i... ogalum umbellatum majus aijguftifolium, C B.P. Ornithogalum medjum, Eyft- bulbT "i, Ve^ris^ odonasi defcription'i hujus Omithogali historiaquadrare videtur: nititurenin^ Ceparam figuram asmulanti, capillamentis fufhilo, aiTurgentibus fcliiis angu"" die v iU_Cr0 nati, s, nre ^ ex, s; i viridibus: ex caulibus fummis oriuntur fiores suis peculiarii LUU: fin^r S m n tentes; i petalis iex numero constantes explicatis, inter'ms candidis cum rtaminibus P^ ^ t x t e r t a s v e r o v i r e t c e n c i b u s .

mei Ornithogalum nmbellatum minuscandidum vulgare, nobis. Ornithogalum umbeUatum Um al^ m angustifolinm, C.B.P. Ornithogalum candidum vulgare, Ad. Lob. Ornitho- § um S-fivcvulgare.CluCHift.&Pan» BulbusIcucanthmusniinor,Dod. Hujus radixbul- oi3 candjda est, qnas mukos bulbulos adhacrences habet, vcluti racematim compaftos, fce P^nrrmm multiplicantes, guftu amaricante,lcnt3 fpumofaque mucagine maflicacosos replen- tes lolia P^om it angufta, tennia, longa etiam ad cubknm ipfum, caules moltum fuperantia, rann^*n, permediniBeorumlaftea dilcurrentulinea, incerram lhata, mollia, & inter hac ttodrantalem Sfemipedalem, tenerum, certtem & nadum, qui circa faftigium pedi- >> iut> mti < - n t i UOru(n o niciiiique Tubjeftum folioium, oblongum,membranaceum,acutum,)) i mel^, len es ^ P eta ^ s ^ nis oblongi3 Compofitos, lafteointus candore', foris non nifiper in medio csw!e! bido : n Cra qua: fhminulalatiu(cula, fena, Candida, apicibus luteis donata: ttnnis locuia cana ^ aturn; i hexagonnraftilum efamnioprofertalbidam,exquovafculuni Diofcoridisfirpr^* ^ 11 ^ 11 m' continens iemina comprefla nigri colocis. Ornithogalum geti-s Br in arvis mi_r a r maremus - > ^ crudum roandi oblervaremus. In GalHa patTim inter fe- Wquam non rceperitur florens menle Maio.

§. 2- ORNITHOGALVM SPICATVM.

lati w b ' a S J S rpiCatUlliriaailiniumflorib^ albis'innnmerabilibus, nobis. Ornithogalum x in m Myconi ^TM<i, C. B. P. Ornithogalum maximum, Ctuf.App. i. Ornithogalum ma- rabihbus, Swe't. Ho n & alu m vel Lilium Alcytandrinum iloribus albia inmime- co rntchogalum magnum Myconi oritan cobitali alutudine, i'n ttrdum

maiore:

majore: caulem habet laevem, rotundum, folidum Aphodeii mftar, in cujus superiore parte confpiciuntur Hores intus candidi, rx fex petal is conrlati; per ingiortim exortum toliolum prodc ipfium periolum ampleftens-; in^ornmmeritoftamina mulra IbtVclutiinRofa: radix cr. ifla eft, bulbofa, Candida, dulcis, inferi. >re parte fibres in orbem emitter. ^ ejus exteribrem ardbiutm cingeiites corona capitis monachorum in ihr: cum idem hnic fit fapor, qui Omithogalovulgari, tliorum & florum eadcm forma, Ornithogaliipeciem eTc cenftt Myconus etiamii oliiwii fit in lit*: cfterorum fbb'is dupio majus & larius. Raram plancam efie ait Myconus, quebis tantum reperiift, femel Toleti, itemm juxta Barmonem.

^ *Ornithogalum* fpicatum majus anguftitolum floribusex albo virefcentibus, nobis. Ornithogalum majus i. CiuCHift. Aphothiehis bulbol'tis Galeni, Dod, Liigd. C^m. Oer. Ornithoi^m fpicattBJi florevirenw, Alphodelus bulbofus Galeni Dodonari, J. B. Chabr. Maxima x folia porracea, fenaaut plnra; caulem inter ea emergentem cubiralcem & ampiiorer mi nudum, firmutti, magnam florum ipicam gerentem, qui expiicati jennis petalis conftar picuiUur, ex albo virefcentibus, & tbris herbaccis oninino; in iis fuccednnc tri; loculamcnt u." unam junfta, nigrum magnum que frmcn in fecoudnentia: radix tatiacrafla, bulbofi; is tnnis candida nribus conitans: provenit fponce primo a capite Blffilenum lapide in -, czduz difta kCojle deCbail \ floret Maio; Julio tmen matuicfeiE.

i. *Ornithogalum* fpicatum majus laeteo tiore, Eyit Ornithogalum majus fpicatum flore all...LS:P. Ornitho^aluni Narbonejite. Dod. Lugd. Ornithogalum Monfpelianum Horclaftec Lt. Icon. Ornithogalum maius E. Cluf. Hift. Hoc majus 2".... Clufii non minore akitudine affurgentem habet caulem, fupecioii fimilem, Jtd viridiorem, quem a nitdio fere ad (umnuim faftigium multoplires exornant flores, prioris qninri Hoiibus maiores, foris prxcer oias qui aibae funt omnino virides, imerius verodum explicari funt lafieiomnino candoris: iemen in rrtangulis capjtibus alteriis fimile, Itd panlo majus Sfoblongius: radix candidior & longior, in rrdum in amplam magnitudinem exmberat; folia illi, longiora, magis viriria, & extreme mucrone aenminata. Bizancinum vaide accfdithuic, i" ed paulo eft luimilms, dilutio Lctiam caule eft, & \o\ls. Sponte provenit in Gallia Narbonenfi; floret Maio & Junio.

7. *Oimibvgalwn* fpicatum majus Pannoniciim flore albo linea viriditindorfopraxlito, nobis Ornithogalum ipicatum flore viridilaftefcente, C. B. P. Ornithogalum Pannonicum florealbo, Cluf. Hift. & Pan. Ornithogalum flore alLo viridique line;) in dor(b praxiito, Swert. Ornithogalum Pannonicum, TaL Ger. Eyft. Huic Ornithogalo Pannonico. quinque aut fex ante hyemem. it in Arabico, fed prarer icliquorum confuetudinem germinant folia, humi expanla, digitalis longitodinis, ex viridi incana, & Caryophyllorum altium florum foliiforma Acolorevalde refpondentia, aliquantulum hirtuta, herbacciguftus & intlpidi: iublequent'e Aprili foliis flaccicere incipientibus, inter illa exilit dodrantaiiscauliculus rfenos aut plures fpicatum cohacrentes fullinens riores, qui e fen is petal is compofiti Maio t'ienfc aperiuntor', interiore parte non minus iaftei candons, quaminlecundo & vulgari, ri'angula deinde capira fuccedunt, nigrum rotundum femcontinentia: radix fubeft bulbola, longa, candida, lento humore plena, guftus primoinfpidi, deinde acris, bris cineracea, tenui membrana obdu&a & feffili parte multis candicantibus fibriscapillata. Illud peculiare habet haec planca, uz n; irura!i locoubi rponenta (citur, magna ex parte cum floribus onulia/itjfi K-foliis confpiciator, aufa it m jam fere cvanid'is Strlaccidis. Atin hortis cultadiucus plernmque folin rctrijerelbict, & in tnajorcmnplitudiui-m excreffet, Ipicam visenum aut plurium florum nonnuaquam proferens. Hoc targiflime provenit in nprfo illmV. lirr p^ n nrp r; jmp" fecundum filvulam pro Ul imminenrem, & Inficioribna pratis fectmdum *Damhium* in monte Badenfibus themiis mineflte, cor aquei lamontitimerie indeufq; ad Cj/t7/^rg excurrente & in Hainbergeiifin]onte apertis & gramincis locis.

8. *Ornithogalum* exoticum ftu Neapolitanum flore minore majori iimato., noliis. Ornithogalum Neapolitanum Hore interius candido excerius cineraceo, Swert. Oinithogalum Neapolitanum, Cluf. App. 2. Eyft. Ger. J. B. Chabr. Terna aut quaterna profert folia cmnata longa, Hyacinthinis non valde dtflimilia, verum anguftiora, viridia, inter quos prodit caulis firmus, dodrantem alcus^ laevis, viridis, foftnens fuperna parEe quinos, fenos, vcl etian pinresinterdam Hores, in anteriorem partctn propediidentes, (tametfi alternatim in fiognli caulis Jateribns _ nafcancur, a cijufdam membranula: finu,) fex pecalii confiantes antiim iongis, quadrantem vero uncn l>tis, interna parte candidis, enterna aucem ex cineraceo virefcentibus, orafque albashabcritibns: rloris quodam modoumbiicum occupat slter toiculos fex etiam petalis minoribus pr-sditus, _ qua; extima parte alba funt

& veluti tubulum formant, in quo apparent fex alba. ftam\tra\ta ftavefcntibus apid buc donata, & medius ft'Aus albus: ftiores prorfus erant inocj^i, quibus fuccedebant trigona capita crafliufcula, in oblongum mucronem defmerviu., ^C2i\3lem^ioyt«%m\ux.em depumenja ^e_m^ tCwjwm, t^oW commeWnt: tadix eft V^ubofa, candicans,iufca tamen membrgna tefta, mconum.fuperna partefaftigiata,infernaautemplanaperindeacOrnithogali Arajici radix, minus tamen ampla fede, fed multis candidis fibris in ambitu praedita; flores proferrebat Aprili cum in fi&ili per hyemem affervata, & Maio qua? anno priore ^nx cor^mifla.

9. *Ornithogalum* Neapolitanum flore pendente priori valde affine fi non idem, nobis- Hyacinthus arborum Ornithogali fiore, Col. Nufquam ab aliis defcriptam aut depi&ammemoranus (inquit Fab. Columna) hanc bulbofam plantam in agro Neapolitano frequentiffimam, eodem tempore cum Hyacintho vulgari botryoide florentem, eundemque agrum diligentem. Radice magna parvo oyo pari, ibris rugofa pferum cortice, atque ex albo flavicante,- fubtus corollam fibris innqmeris quibus innititur eftigante, dodrantem infra terram obruta: foliis* ab radice tripedalibus, brevibus, leniter canaliculatis, quatuor ant quinque: caule^lupra terram bipedali rotundo, kvi, ex viridi albicante,traffo: amedioflorereincipitadfa^iftnv atque tioribus altematim diCporitis, magnis admpdum, ftellatis, triunciali diainetro fenis petalisconftruftis, latis, e quorum medio flos alius, oblongus lagenuk oblongis effigie, oblongis petalis etiamformatis, bicornibus oris, luteo medio ftamine, in quibus fruftus occultatur longo apice prominente. Flos totus eft albus interius, exterius vero virefcens Ornithogali more, limbum tenuem tantum per ora habens: virens exterior color ob tenuitatem petalorum floris tranfmittitur, & averfa internaparte dilute apparet.* flores no&u clauduntur, atque etiam cum fruftus perficiunt, quos Melonis effigie friatos efformant unciali diámetro, fequiuunciam longos, apice in fummo flavicante longo: femina intus copiofa, mgra, ^pWgmatis diftinaa, Hyacinthi x mula. Hoc fi non idem cum priore jparum differt etiam fi Phalangii nomine Honorius Belli ex Cr. et amiferit, atq; Narciffus 4. Matthioli a Clufio, denominetnr in App. 2. fc Hyacinthus arborum Ornithogaloides Columnis dicatur, idem mini apparet, ficut & Cafp. Bauhino, cum priori Ornithogalo Neapolitano, non obtfonte vana denominatione authorum.

§. 3. *OR ff' ITH Q G A L V M Indicum maximum latifolium.*

¹0. *Ornithogalum* Indicum latifolium floriferum fphaericum colore coloflino aut albo, nobis. M<% latifolium Indicum flore purpureo, Swert. Moly latifolium liliflorum, C.B.P. Moly Homericum, Scillae alterum genus & Pancratium Diofcoridis, Caef. Moly latifolium, Moly Theophrasti, Dod. Cluf. Hift. Flore eft rubente aut coloflino vel candido rubente: foliis eft Scillae, ttibus aut quatuor longioribus invicem amplexantibus; cubitaliaut ampliore conftat calile, craffo, concavo, rotundo, foliorum experte: multos flores ftellatos candide rubentes vel jubalbidos, bumi (plmicam figuram conftituentes, fummo faftigio fuffinente, longis pedicellis inhserentes*, nigro in capitulo Us Temine, Ce^atum fetumv fe^^vvnv^v-. radTra craffa, alba, rotunda ^ ^ < o coiuice te^i^ . ^u^ta caulem inter folia alius plerumque exit cauliculus planus & fotiaceus feu verius folium in fummo veluti Allii nucleum gerens, initio candicantem, deinde pallefcentem^qui terra exceptus germinat, & ejufdem generis plantam profert. Ejus bulbus primo Conftantinopoli Viennam allatus fuit. In agro Neapolitano ffonte provenit, authofe ^t^nja ndo Imperato.

11. *Ornithogalum* Indicum latifolium bulbiferum non floriferum, nobis. Moly latifolium Indicum, C.B.P. Caucafum, Icon. Lob. Moly Indicum, Cluf. Hift. Moly hoc alterum genua Quifio Indicum cognominatum (quod nonnullis Caucafum barbaro nomine dicitur) quia ex India primum in Hifpaniam perlatum effe ferunt, & inde ad Italos & Gallos tranfviffe, & ^ »H forte Belgae acceperunt (quemadmodum plures altos flores rariores;) fuperiori foliis qua forma fimile eft, nunquam flores apud nos Septentrionales fert, fed loco florum nuncleos*. caulis palmaris adeo infirmus uti nifi a quo fulciatur adminiculo attolli non poffit; orafitigio conglomeratum caput fert, multis veluti Allii nucleis Mepili vulgaris magnitudine Conftans, initio viri^it>us, deinde pallefcentibus, qui etiam in terram nondum rebulb^i §erminant AUioram filveftrium quorundam more, teiluri tamen commiffiin majores mifta os adolefcunt. Radix ut Verius fuperiotis cepacea, rotunda, alba, multis tunicis a itidem <3 Uarum ext^rna fufca ve t>ftate fepe parans & alios bulbos pangens. Bulbus hujus ^n Conftantinopoli primo adveftus, nunc hortis Italia & Galliae fatis familiaris.

§. 4. *OR-*

\$. v O B N I TtiO G A L V M LVTEVM.

Ornthogahm luteum majus flonferum, nobis. Omithogalum luteum, Smrt. Cord. mdtfri Ad T <h Tab Lugd. Swert. Bulbus, Trag. (cm & Ccpa agreftis.) RieU. mD6rcond.Ad.Lob. lab. L g^ E it Ornirhogalovulg^ nJeuBulbo lencanchemo minori Foch. qjir Gcfn Dod - C ^ * > bffimilis videtur Ilh bñs, quem Leonardus Fuch- Dddoui fupra. ftefc^BX^filv_eftrem_a_gno_rinant.Sun.t«m^rcfoHa fauciora (uni- h^ Hieronimus, !^^ bum. e g rotmidus, dodra.talis, ali- : caulis brevis, tenuis,

ando^almar^, ^ ra li, Eeilbikiicanthernifloribiismuko minores, colo.e ex hrbaceo m tim r a d ^ M ^ ^ mini bas mmediocapillaceis: capitula femer terentiafunttanga- m ek^ mbErumpropriediaorurnmore: radix bulbofa eft lenti lucci, nullius o-

B S S a S n » 5 * . . « fecU S VTM^o sex in. Nosfreq^entem fads hunc biil- nmbi Sm habnimus, & ineunte Vere fiorauem in planicie fingibu confita inter m P a r S & pagum aSanfto Dionyfio nominatum: item poftca circaBlxfas inter f S ! fin" I — n e m , qua itur *d Sa.fti Diortyfii illic pag«m, fecundo a Bkfen- fium capitepkide. Floret Aprili cxennte,& ineunteMaio.

? f l S 5 U i luteum anguftoliium minimum bulbiferum, nobis. Ornithogalumangu- bulbtrenim, C.B.P. Ornithggaium anguftifolium campeftre mmimim bulb.fenim In asms cum calidarum, tum frigidaram regionum, primo VerefioLetl^cplantula Ornithog

triunciali e terra non multum. excunte, fupra quem thyrfi modo vel Cyp auina fena, grammea, tres autquattior uicias longa, in imolariota, rubentia circa ortura: in auorum centrum coacervati globuli iiftar Milii, vel Rapae feminis magmtudine, autenam ^res flavefcences & purpurafcences, folia fingula finguli emittentes fai proportionem anno m. S- at inter folioram /inas, quibulbillos circundant, penoliduoaut tres rubefcentes, " ^ i, ilores habentes hexapetalos aliorum hujusSeft.on.smore, tak- te, foris vero virente, i f k i , luperne latior, femmibns mmutis arenz mftar prominuLc, i^m po—«...—

refertur: at bulbilli illi ficcata planta ex fe in terram fparguntur, hque lemim vice po •"no frequenti inerviunt. Variat prorarionelocorum; inpinguioribustolia funtlatoria & plura; flores etiam, qui in petiolis alls divifis infunt, plures, atque in geniculo toliolum ; variat itidem quoad foliola/^x circa bulbUlos hirfutaSf candidiora funt, reliqua vero ex radice nondifFerunt. Differt ab Ornidiogalo luteo Lobelii, nam illud folio eft digitali latitudine, atque pedzli longitudine, majoribus in montibus & montium radicibus h S g i o , nos maiorem £ £ & cum bulbHU in ca.lis faitigiooffendimusinarvisprope Btefas.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Radix bulbofa Ornithogah coquitur, a Dioscoride, cumpane, atque ut Mehtbiifemen cruda iy cofia manditur. Camerariut titans Vwforidem addit, Eft man dulcis isr fuavis : ubi bocinvenitne- fcimxs innwlo nofirorum Ornibogalorum ullam dukedinem aut fuavitatemexpermur-, iino nobkamaricat. Defcribitporro isr aliud Ornithogalum Rudlmli.c.jj.quodarufncism Sueffionum agrk eruitur, cujus radix in orkm fere cotkfta, eft cortke pul/o, came intuscan- rJs-na pulpagueperauam odorata Vere velxftatt cumfrondeviret, hyemevdautumno cum ZZnturafriradWu*velluntur-> dm fervari potefi: <y ubi annonxpnmitt incpa,plebk ^ZZfaman & WTM* caftanearum morefatiat; me aliudexbumo genitumpromptiusma- bumcedit cumfrugum penuria glifat. Mtre fuibus expetitur: rura ex * M N » nam Ttkr'ncibumnonmrunt: lantiores aiam menfas ditkrum non rtfomidat. Pufr« non in- I ignu radices, qui?rc?e ajlanteschnaramterraprofandUuraut inlaUor es porcas feu liras fulcatur

fulcrum, - trutas button vomere eolligunt, multo cd/laneh fuaviom; qiti&tts, isf audit, is> in a-
neribus coctis - vefcuntur. Sutifmenfis ager Gh.iiij\$vocare confuevit. HaStmus Rudlint.

HALLUCINATIONE^CASV. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

P A%- 7J-CO1.I.|JL L .Mil] lilijloruTO,C.B. P.Mo-
ly Tbcopbrajti, Dod. Claf. HijK (SHi\$. Omit bo-
galam lnditum latifoUnm liliflorvm, noiui. Mely
ludicum fiore pnrput^o, Srvert. Pag. eadtmpl. i j.
Moly Indicum kufilitim , C.B.P. Caucasan, Lob.
(can, Ornhhogaiam Indicum latifoliam bitlbifertm,^

Hob/s. Moly plane eplptanta calida, &atm prvi*
dique Vtjiut i p&atnm enim acenutit, quemadms-
dum plermqtie liujut membri culinaria plant*: at
he plants nu orfore, necfaparc cum Moly convenient,
ergo intptt fath a CajharoBaubiao cmerifque aatho-
ribus pru Mty j^uicbu rentnfimtur.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS,

radicibus bulbofisproprie didis prxditis,

CuHnarm calidk igatTibws, tcnffituentibus fteundam part em hujut

Dijiributianit: /unique

Cepa, Allium, Porrum, Moly₃ & Scilla.

C AT VT XIII.

C E P A.

Agyptiorum numina Cepdii? Allium fl'/za./l. 19. ^ 6. ^ profequamur. Cepa a capitis
lif Kfa/wn,i'-n K*** av/j.^ui -mia, quodoculipupillai/i coinprimerecogat, uf-
potT/kunMntAriihtekni 2o.Probl.22.morda'immiumvaporelandnando pr lacrymas movendo.

Genera The th afti 1-Hift' 4" a lock cagnominata refert, Gardiam, Cnidiam, Samothrac'wn,
Sttankm, Afcabnia* <? 0^{kn} - Ai Vioftoruksl.*.cap.i%i.kng*> rotund** *hava ty can-*
diditmtmimt Plin. I-T 9-' 6. Ci ?* m^t-itgenera fpucl GracesSardia,Samotbracea, *Alf:ena, Sr-*

tania cifta, Afcalonis &c.

QiJrcaliamaw eft, ^{nia mimr} aiaa candid^ alia viridhs^ alia tufa, aliafubrubens ; aliaft^o
rotunda a laefioblo?ig^a: omnes utplurimum duplici aut triplici membrana, quasFefu* tallat, alii
* tunicas vacant. ~ e(lit<£: Sic ali<£ acerrim<£, alia mediocriter acres, aut nihil fere dcredixh
babenes Sic all* fer^{unur}-> all^e depmuntur^ ahquandofemtni^ loco bulbos gerum, ut Dale-

cl^{ampjw} no^{avit} ^ ^ ar^{te} pi^{an}tarum bulbofarum recreatricinm (ideft, quosodore, fapore,
awfloribus variis piftis coloribus fenfusafficiunt & recreant, dekftanrque, qtisqne femina
incaDfulistriangularibus profemnt rotunda, craflifufcula) his propter femina conformia in-
tev'jiciamus plantas culinarias ab ufuin culina fcxpecitas, femlneque itidem rotundodonacas;
cumque omnesfint calidae & acres guftui, facile a prioribus recreatricibus herbis bulbofis pro-
prie diftis cognofcuntar': a recreativis autem hexapctalis bulbaceis feminecompreflb mem-
branaceo duplici ferie in fingulis loculamentis contento, in poftenore hujus Seftionis parte
^plkandis, parvonegotio itidem dignofcuntur. Inter culinarias bulbolas proprie diftas
phncasexordium bcienmsa Cepa,qux& reliquis culinanisnotu eft facilis,quodcaulis inmedio
craTcfcat & intumefcat ad poUicaremamplhudineni, & fit dnploaut triplocralTior in medio
quam in ortn ant faftigio: lioc noncerniturin reliquis fux forcisculinariis phntis, atque eo
nomine facile inter ceteras bulbaccasdiscernitur. Eft a duratione, vel annua, vtl perennis:

a h^gura radix eft vel rotunda, vel longa: a fapore, acrisvel minus acris feu dulcis.- i co-
lore pt-Hiclarum eft velrubra, vel alba. Dehifce omnibus infra agemus. Nora ergo ge-

fepi eft haec, quod folia producat fitulbfa, vacua, rotunda • atque hie illi CBmq-
buldam AUifpeciebTis eft; communis; fed nota pracipua diftinguens Cepam acsteria -ft
producere caule -n medio duplo aut tri^lo ctafksw^wKm-ra onnltaftmio, uti didrum.

Pars TAB^Uifi XIV. Sefionis quart*

- (i. *Rotunda vulgar^ nobk. Cepa rotunda, Dod. Cepa atya (y rubra, Gefn, Hort.*
Annua\ isr Cepa radice Candida dulci, CB.P. Cepa^ Gefn. Hort. £
 (2. *oblonga, Dod. Gefn. Hort. £*
Cepu i (3. Afcalonica^ Matth. Lugd. 0
Perennis < (4. Sefülk juncifolia, nobk. Schcenoprafum, Dod. Lob. Tab. 0

Explicatiofartij Tab.decim^£quart<£ Seclidnk quarts.

§. 1. C E P A A N N V A.

∴ **C**epa vulgaris, C.B.P. Cepa rotunda, Dod. Cepa alba fcrubra, Gefn. Hort. Lon. Ta'b. Cepa fativa Matthioli, Lugd: Hujus" folia i'untangufta, rotunda, fifulofafeu intus cava: e quorum medio fecundo anno exit caulis fingularis, teres, in medto craffior magisque tumidus quam in ortu aut faftigio; atque in fummo ejuſdem faftigio capitulum oritur membrana tenui velatum, quatlifrupta floſculi in globuli formam congeſti apparent candidi aut purpurafcentes, quibusubveniuntplurima capitula triangu'aria,femen triangulare nigrum ittje contiftentia, fed albicantibus glumis implicitum: pro radice eſtilli bulbusex pluribus compadus tunicis, majoribus involventibus minores, aliorum bulborum proprie diftorum ritu, fibras aliquot à media deorfum demittens, qui quandoque latior Rapi inverii inmodum extuberat, non raro ovi modo oblongus; exterius pmenuibus membranis conveſtitur, utplurimum fubrubentibus, aliquando albis. Terram autem Cepa defiderat pinguem, vehementerubacl:am,irriguam, ftercoratam, ut Palladius ait. Paffim per utfamque Germaniam, Flandriam, Belgiam & Angliam in hortis olitoriiis, pinguj beneque foſſo folo, colitur. Subinde autem in areis fola femirtatur, quandoque Vere cum aliis herbis permixta veluti Laftuca. Falladius cumSatureia feriprobat,quoniammelius, Pliniusait,provenit. Seritur Martioaut Aprili; in Italia veroetiam Januario & Februario, Palladio authore; veletiamNovembri,ut per univerſam Tuſciam, teſte PetroCrefcentio. Bulbi Vere plantandi funt, à quibus femen fperatur, quodAuguſto menſe ad perfectionem pervenit. Hue pertinet Cepa radice Candida dulci •C B-F. Cepaquarta Gefn. Hort. &Cepa plurium caulium C. B.P. Cepa ovata à radicis figura Cord. Hiſt. & Cepa fe&ilis Matth. feu Cepula Columelte.

2. C^oblonga, Dod. Gefn. Hor. Cepa Hiſpanica oblonga, Lob. Icon. Cam. Hax minor eſt atque à priore forma longa radicis praecipue differt.

§.2.CEPA P E R E N X I S.

3. *Cepa Afcalonica, Matth. Lugd^.* C^{cu}i f^or^{te} Bulbus Setanius, quem Theoph. &Plinius Cepae genus eile teſtantur. Cepisaffinis, Afcaloniam vulgo, Caef Scaliones, Tur. Cepa Afcalonica & Afcalonitis antiquorui^"radices habet multas, oblongiufculas, minores, in uno acervoconjunctimnafcentes: folia habet rotunda, fifulofa, feu concava Cepae inftar, fed multo minora; raro caulem, florftn, multo minus femen fert, quia abundat radicibus denovo/in-gulis annis genitis. HasCepas Afcalonias feu Afcalonitides five Paleſtinas eſſe putant do&i, quas Galli woznt *Eſchallottes*, fervato prifci vocabuli veſtigio, qua? quod ancipitis & dubia3 ſint natural inter Cepam, Allium & Porrum, peculiarem quandam naturam, vel figuram iis tradit Theophrastus. Sunt autem Cepis fimiliores radicibus, led multo minores, & numeroſiores, fini/d compa&im crefcentes, foliisidem fifulofisfeu cavispraeditae, & crudaeincibus lautiores frequentioresque habentur, quapropter Franci etiam *Apetiti* appellant, quia edendi aviditatem excitaht.

4. *Cepa feculis juhcifolia perennis, nobis. Cepa fifillis & Gethion, Tur. Scenqprafum, Dod. Lob. Tab.* Hi poſtremi authores a foliis rotundis, cavis, fiftnloſis Junci inftar, *Srk* ſapore magisForroaccedentc,hancherbulamSehoenoprafum dixere, nomine ex Junco & Pprro compoſito. Folia nmlta promit, fed palmo raro longiora, tenuia, teretia, concava, exiguisjuncisrotunditatefamilia; inter qux fubinde cauliculi breves eminent, oapitulaquaedam teoui ^iembraiia feu vaginula inclufa/ufinentes; ex quibus floſculi proferuntur hexapeta'li,rubentes, & inftar Cepa?, fed minores multo: bulbilli fubiunt multiexigui fimul cohserentes (ſicut in

Cepa Afcalonica) a quibus i fibras plarima: ddorluifi dapicrantur: odore aut furore Ce
potius inquam Porrea, refertur cum bulbis cum totis. Colitur in hortis Germaniz, Galliz,
Beliz, Angliz & alibi. Duntaxat vig: n: ac xj lunib: s: aniiis restanc, hyemis ac trigroris ft
p2 SteTYubfc canr ac anonditur: sdiceiiopraiani frequenter at, Porratn feaivno.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

1. Ce\aoimii« acris ejiiff odore lachrymofa, calidaisr ficca, autkore Galcno, jtrdhie quarto,
tamen minus quam Alltvqn firvtt: fucj. U6 umik aquce aerejqesuhflaatjie, rdiqum cri
rum est partium, optima qua roltndilftwa, longa acrior quam rotunda, ruffe fiv. 5*3» 1''
1 Candida, ficca quam wridis, crude quanic&a, eut fak cendita. Mordkavt autan
Cep£, excepta dulci^ exitnuant^ fitimexcitant; acnniwiamcofi&depomntprjfermi Iis n
aquã tnutata; extnuandi tamen potentiam in fit quidem amttuni : flatus vero etUm di
utility urinas mouent, iff catt* alvo quam aud& utiliores, olmentum autem crud* rwy &*••
lum, cocia exiguum ccnfaunt: nflturqbiliast adverfanlut: bh autem qui crudunfac erafam
fuccum piiuitefumque cotcervaruiit, conveniunt, <a quibips menfirua ex frigiditate deficient,
libflruciaetidm apcri.unt, refugcrata malefdciunt, <isr menfes provocant. * Hamorrhide's ty
cedem lfofitiC, -vtlcum acetu imi/cic! <t, provocant, ut ait Oajtbts. Vhcorides vero ape) it has
ait efeH&ncrrhcidum, is?•. aliarutaU-A^aifiveexpurgationu^ dctralik tinkk isr in Oleum
ctyjeilh, ac glandk infljrsubJith. Succu Ceparum per nares attraflu* capupttrgat,crudes
pituitofosIntvtoresextrahit. Frequenter etiam Cepa ittcibotfiamcoffd, comesh c/i/>nis dofors
efficit, oculusUd'U,acaciememim r%ofandil, isrfenfws fivpidtore^reddit. Trita autem 'urn
fak Rutancmeile,(ank rabkfi morfuiimpofita7 prodefi.

P

\$. Ccpafeflikji <r?cifo/iaperem:k,T!obk. Scwnoprafum.J)od. FacilitatevaldePorroaccedif,efthenim
excakfadem i\$R refocans, attenuans* aperiens,urifiaiprovocar/s, calidioremiy rwxiiuu(fuccum
hgenerai, frigidos h.morescontemperat,comoquit, Miidit'vaporescraf/osfurfumwittitjeulk
<broquevioletfos\ tumultuofa infofnniit adfert, ise quacuxque Porrum,ifjud qucquepotest.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS.

radicibus buibofis propric dictis cbnafis.

C A T V T XIV.

A L L I U M.

Allium forte ab2.*te£w attire, qibd vaVknDbvrtfcai. 3-^a, Vhfieri di I. i.e. lSn.vel
qttafi 9*% <a'tth*, ideft, r'udh Sofa, proper odorem gravem: mlquod comeftum vapom ex
irmntitios ad cutim ftHat,*iy wfcntibmpandkulatiotm moveat. Sum qiti ah balanti gravi
dodore deducant, i\$ Alium j'mbant,

GeneraDiofceridlfat'mumfeufartenfe, quiidveli/mltiplkimJEgypto, velfinguhriutPcrrum,
capueconfiti, cujusnuckosCraci lyrifot nominant: aliitd fhipi\quod ^H^MAI. At Tbco-
Pfra/lo 7. ^ .4. aliudpricox, aliitd'fmi'mum: diffemntpntwa mavnittidhK fingulari'.quj-
^U^mnnucki^ 1^*dmveromuhk coagmntaptur, quos-A™ theoph. ±y\j^Gakuus;
iT^&naa LAc 55. ^ * l & f c 11. vocat. Y rrum PllioIi.19.C 6. Qenerum All"
dij... in tempore, praxox maturefcit 60. diebus, tum in magnitudine. V/fkum quoque i •
genere Græci appellavere. Allium Cyprium, al'it Amifcorodon (forte reclim Apbrofiroden J isc-
Sunt qui velint AlliumUlpicum Plinii, Alliumi Mgyptiacum Diofcoridit effi.
In Virginea multis locis Allium nascitur ab Anglicano parum differens, Descript. Virginiana:
quod ut i\$ Cape in Hifpaniola, vix un tuambenumevadit. part. 4. America c ut. Et Indi ex
quibus Europea radicibus Allium elig w, quo "vmtrkulum rvfichtjofepb. Acofla I, 4-f- J 8.
Allium est planta hexapetala, tricapsulari s, calida flMcpis trvidique guftus. A forma folio-
rum est, vel folio cepaceo, cavo, fistuloso; vel porraceo fea hito;vtlNarcinino;v! tarifiimofoliox
ratione finis ultimi, vel in summo caulis fastigio pro duciemm Bores, tumnitvle"3 fciilbboles,
ex quibus tertz committ tpianwte: vel Hores-* caplulas tnangu!ave5artjue inji 1
propagantur denuo itiaem planca; cjufdem ipecfei • r;itione radicum, vel
unica

unica confat radice, bulbacea; vel plures fimul juntas unico involucro communi te&as habet: ratione colorom ftorom, \e\ fto*es, pxodvldt abos.> tubtos -eotque dwetfrevode tuv&os, atra'purpureos Sduteos: Jiabita ratione loci, est velfilveftre, autcampeftre, vel montanum/Initiurti faciemus ab Alliis iilveftribus, foliis cepaceis fiftulofis feu cavis praeditis; quã a fimilitudine foliorum plus affinitatis habent cumCepis fuperiore capitetraditis.

Pars T A B U L M XIV.

AlHtfm < Folio	Cepaceo feu fiftulofo	Flore	1. Obfoleto, C. B. P. Allium rubentibus nuclei*, Lob. Icon. 0
			2. Eooalbido, C. B. P. Allium five Moly montanum 3. Cluf Hift. O _o
			1. Obfoktiore, C. B. P. Allimontamftecies 2 ^{da} Cluf ^m . Hift. O
			4. Purpureo capte rotundo, nobk. Allium montanum capte rotundo; C. B. P. Allium five Moh ₂ montanum 5. Cluf. Hift. Q
			5. Purfurafcen ^e minus bicorne anguftiore folio, nobk. Allium five Moly montanum 2. Cluf. Hi. J. 0
			6. Albido mofcbato lineis fufcis not a to, nobk. Allium filveftre per pufillum juncifolium mofchatum, Ad. Lob ^e art. i. Moly mofchatum capllaceo folio, C. B. P. (sr Prod. ©
			7. Eleganter purpureo, nobk. Allium fph<erocephalumbifolium, J. B. Chabr. 0
			15. Luteo, C. B. P. < s-Prod. 0
			9. Sativum feu vulgare, nobk. Vulgare, Fuch. 0
			10. Sativum altetum five Allioprajum fummo caulc circumvoluto, nobk. Scorodoprafum 2. Cluf Hi. I. 0
Porraceo feu latojovo\	1 x *	florij ^e a ^y is conflato, nobk. Scorodoprafum, Ger. 0	12. Majusfolik pgracei* latk fph<zriceo capit.e ex multk fioribus exalbidk conflato, nobk. Scorodoprafum 1. Cluf. Hift. 0
			13. Majus, nobis. Allium feu Moly narciffinis foliis i. Cluf. Hift* & Pan. 0
Narciffimo			14. Minus, nobis. Allium five Moly foliis narciffinis minus 2. Cluf Hift. is? Pan. O
			15. Paluftre, nobis. Allium urfnum, Matth. Clufe Lugd. Allium urfnum bifolium verum filvaticum, J. B. Chabr. 0
Latiffimo			116. Montanum maculatum, nobis. Allium anguinum, Matth. Lugd. Serpentinum, Caft. Viclorialis longa, Cluf. Hift. isr Pan. Eyft. 0

§. I. ALL IV M filveftre bicorne foliis cay is feu fiftulofis cepaceis.

Explkatio partis Tab. %teciim<equartce Sefitionk quarts.

1. A Llium filveftre bicorne flore obfoleto, C. B. P. Allium rubentibus nucleis, Lob. Icon. j £ \ Allium caninum alterum, Trag. Allium filveftre, Tur. Huic est pufillus oblongus bulbus, non ex nucleis compofitus, fed unico kvique capitulo perfe&e bulbofo, nonnullis indium adnatis minoribus Mt propagante: juncea pauca foliola, cava, fiftulofa feu cepacea, carinata feu fulcata, graciii, tenui & pedali caule nixa, non floribus fed nucle'is feu radiculis riibentibus onerato, qua? diu durantes & pluviali tempeftate Septembr̄ adyentante, in fummocaulis faepe germinarit, & viridiaprotruduntfoliola, quaequepoftea pr^eficcitatein terram decidentes, radices interram demittunt, ac novellas producunt plantas. Obfewabit leclor radicem ejus tunicatam, bifariam difteclam apparere in Tab. 14. fculptam.

2. Allium montanum bicorne flore exalbido, C. B. P. Allium five Moly montanum 3. Cluf. Hift. Folia habet juncea, viridia, cingentia caulem la^vem, viridem, rotundum, qui in fummo ^eiftigio faftinet binas membranaceas tunicas, oblongã caudã infignitas; caput fuftinet ex Xultis exiguis bulbis, punicantis kidem e viridi coloris, & in longiufculam lierbaceam cuppidem plerumque definent?bus, coniertimquenafcenubus, conflatarii; inter quos dependent in

ibiongfSgracilibufque pcdkulis flores, fejiientis scribiis forma & magnitiidiiiiefimiles, colons
 xalbidi, quorum media pctsla iecundum iongit(i(iicen]r& atralque oras, vena oblolerepur-
 jui-uansinticit^ .radixettamiotmidael, candicans, longisalbjcaatibus fibrispra:dira. Vro-
 venit fponfe inlonge porrefa montium (eric, <jui aStinacis Auftriacifque AlpihusadDimu-
 bium'fupra Viennam excurrunt.

3. Alitun montamim bicorne ttore oboficiore, C.B. P. Alliimontanifpeciesfecund-,'CtoL
 HiftcV Pan. Moly luridocolove,Swett. Hoccauk-memittipari rerealtitudinecumprio're pro-
 venicntem,fimilibus foliis, cavis, fiftulofis, cepaceifve priditum, cujnscoma inter laxas mem-
 branaceafqne& tongum mucronem habentes tunicas late feexpticat,HoriljHS colons vakle ohlo-
 letiplena: radix fuperiori fimilis, mideos etiam in iareribus protert, Viget eirrc Voton'iw
 Huiigaiia:n[incMeEropolii],ad finiftram DantbiifitamiomnumialjundantiHime circa Bidtnl;
 thcrmas crefcic.

4. ^/iB/smujinmomcapiterotimdo, CB.R Alliam feu Moly montanum 5. Cluf. I
 HocAllium montanum capite rocundocabitali paritcr affurgit xaulc, utido, viridi, pfcycis>
 Ins viiidibus, cavis, liftulofis Cepa; inibr obfi;o, cujus feftigio infidet caput orbicnlare,
 e mule is noi ibu3, brevi petiolo prxditis congefifTra, qui lex pctala in feigolff fiariboanunquam
 fe protfos exjdicanria habenr, lex inidem ftaminula in medio cum itilo, clegantis parpi-rci
 colons: radixbnlbofa, alba, nucleosinterdamtenui membjKa teftos, proximc canlis la-
 terjbnna i&natm habens, & feftilipSrte multas albicantes Wks: ejus odor Allii inftar eft.
 InHimgarra circa Pofonium difffeaxat obfervaverat Clufms, cum rannouicarum Bdrpiamhi-
 itonam publici juris faceret, ad vinetorum in collibus Danubio imminentibus ficorum thar-
 gines, Maio&Janiofloribusonuftum-, imoipfumhoc AUiiim ctptiolc florens firfeaamaper-
 ficicns in filva Fontsinbelkau & aliis vinetis collibusque circa Blacfas eodem temporeprepmut,.

5. Altium monunum bicoine snguftioVmm Hort purpureo, C. B. P. ADim five Moly mon-
 tanum2. Cluf. Hiti&p.an. AHim hoc quintum culncali affargit akirudine, cujus caulis alio-
 rum morcifvis, rotundus, vitidis; cui terna per intervalla adliirt-nt folia, rotunda, cepacea,
 fwperiorisanguftioraacvebu graminea: fummiis cadis caput finftinet, duabus laxis m-
 branaceiftjnicisJongiorcnucrone'pnEdicis, obvolutum, quibus fe aperientibus nmltiexigat
 bulbi finml coigefij appartitt; inter (uos iiores fex purpuraicentibiis petalis conftantes, &
 oblongs pedicnlisinhzrentesdependent: totuiidam, albam, longiscandicantibusquenbiis
 capillatam radicem habet. Widem provemccnm AU10 lecundo fupra nobia fie difto,& eodem
 etiamrempore floret.

I 6. Album nlvefrc perpufillum jncifolinm mofcbaciim, Ad. Lob. part. 2. Moly Mefcbatum
 pillacco folio, C. B. P &l>rod. Hocbulbocftparvcoblongiifculo^atfefccnn: & vduTre-
 iculato cortice tefto, ex quo cauliculustenuis, palmavis, ranfime ptdalis emergeit, circa
 quem tlla juncea vel potius capillacea, fed lineordine, quomodouicam, modorequa-
 tua loaza (qu« n, unis lata in ligni antepcutukinia Tabular 14. exprimantur.) cavB-
 ulifimimonedicifimifem) i<peni, vltum in mbccla (lifporul, aduobus volis
 tentati infident quorum finguli flofcilum ex fex petal, s aciKifcompoTicum, obfeure al-
 bentem li,neis. Flofe per medium dilcvirrenabus diHefnm & ftaminulis aliquot donacum,
 faftinent- bis capitufa rotunda, femina tnavel qmtuor, nigra, oblonga, triquetra conti-
 nentiauscceadnt- flos Mofcbi velZibetln odorem ipirat, & incollibus Monlpdio vicinis
 provenit unde D- Sakt'm^nus anno r 598 attulit, & poltmodum aliquot: annis in bortulo co-
 l>itCafn.Baulnns; floruit Maiq,& Juniolemn p^rtecit.

7. Allium phar... a umb]iom J. B. Cliabr. Vix hoc fequipalmaremaltitudincmad-
 xquat: radicara ni... f... alb a, hbrata, nullo tumcamntonco^vcaoNt^viTO TS
 coliculas fata craffua tHcfqnc Vurgk , atrovirts
 foliis cvailis & canabenlatis vetbtus: mta,oflora^gerit in glomum congestas, eleganti
 purpura conspicuos, ex qubus ft-nubqn.d m muff W. Allii haud dilli-
 midis: parum abest quin iplam plantz magnitudinem &
 tura mutatum magni J J j ; obferva ^ Roma aUqoe buibiHos ad fobanneU SS
 amaitgen< eiusCherkius. Floret tow Nlαιο, & sfate feminaperfic .;. insraenu tandr
 xftafaficfit, nt &;cztera hums lortis, & lefe renovat,anno verteme
 & ^/i>m iunciton^n bicorne luteum, C. B. P & P^M^ c. 1. n. 11 'it
 nicaalba veft.to.cauhsrotundcs, palmoakior fobi * , ob o^ca f, ltacco, tu-
 fur

Sex petalis luteis compofiti, in quorum medio ftaminula totidem una cum itilo, quibus capi-
 cqla

tula trigona, femem continentia/uccedunt* ipfi umbellae foliola funt duo anguftiffima, quorum alterum communiter longius & alterum in latius expanfum, fubjiciuntur. Monfpelio D. *Saltzmanu** attulit, & D. *Burferws* in Auftria prope *Stain & Baden* emit. Hujus pertinent feliqua AUia montana contenta in Pinace Bauhini.

Dedu&is Alliis filveftribus & montanis bicornibus foliis cavis feu fifulofis cepaceifve fiifra, am in hac Tabula 15^M. agetur de Alliis fativis, porraceis feu latis fblis donatis, quoniam AHia filveftria & montana bico/nia plus habent conformitatis in foliis cavis cum Ceba; idcirco de iis in Tab. praecedenti aclifm, per eandem rationem de Alliis foliis porraceis feunarciffinis & latioribus in hac Tab. 15. immediate ante Porrum tra&abimus.

§. 2. ALLIVM porracei < s feu lath folih

Explicatio partis Tab. *decimae quintae*.

4»¹¹ porraceis Mn s Sm X t t ^{utrum & filvestre, Sativi, Allii bulbos tenuiffimis} membranarum ex albedo purpurafcentibus veatus, intra quas plurimi cohaerentes nuclei, five, ut vocant, fpicae feperatim exiftunt & communi membrana convefitae coagmentantur, dquiblis inferiustenuesqu^dam fibrJE dimittuntur; foliis viret oblongis, Porri fimilibus fed non tam latis, inter qu^ caalis, fed aglednm taro, nee primo aut altero anno, fed ferius affumt: quamobrem & canle, flonbd^ femine carere quibusdam creditor.. Novembri aut Der- embrimenle Alhum beneientur, Palladia authore, in terra maxime alba, fofla ^fubaftra Vme ftercore, licet in alia etiam ftercorata, addit Petrus Crefcentius, proveniat, qnⁱ ferⁱ pofie Allkim menfe Septembri & Odobri, Februario aut Martio, in calidis autem regionibus menie Decembris tradit, Plantantur autem radices, ut idem ait, diftantes uno palmo, in areis.

10. *Allium* fativum alterum five Allioprafum caulis fummo circumvoluto, C. B. P. Scorodoprafum 2. Cluf. Hift. Bicubitalem habet hoc decimum *Allium* caulem, multis ab infima parte ad medium ufque porraceis foliis, Scorodoprafo 1. Clufii anguftioribus circumdatum, medio inter Porrum & Aliium odore, reliquam partem furfum verlus nudum, viridem, kvem, fummo faftigio fuftinentem caput ex multis bulbis, iy; i# Moly Indico Caucafon Lob^ difto, congeftum, & candicante membranaceo involucro, cupide longa, viridi, pra?dito tedium, quod deinde bulbis excrefcentibus rumpitur, nudoque bulbos, initio purpurafcentes, poftea exalbidos detegit; inter quos flofculi quidam nafcuntur: ea caulis extima pars cui caput ininitnr initio fe fecum fuo capite convolvere folet, ut ferpentis obtorto collo fimilitudineni quodammodo referat, deinde fenfim paulatimque (efe explicare incipit, donee tandem caput erigat: radix e multis nucleis fimpliciaut duplici tenui membrana tec^is confat, & numero fis sblidis fibrif fefili parte donata- Junii initio caput fuum contorquet, Julio vero erigit, eodemque menfe bulbillos feu nucleos ad maturitatem perducit, qui terras crediti fui generis procreant plantas. Hoc a quibusdam ^{quod} dicitur, quia caput cum fuprema caulis parte ferpentis infar fe contorquet. Hujus unicus bulbos quem habuit Car. Clufius, mirum in modum fe propagavit, & ubique in hortis cultus fe propagat, lit fuceffu temporis ejici ex hortis poterit. Hujus bulbos apud Turcas in deliciis effe Clufio referebat Augerius de Busbeque..

11. *Allium maximum* multis porraceis foliis latioribus fphaericeo capite ex floribus albis conflato, nobis. Scorodoprafum, Ger. Hoc folia liabet longa, cralfa, porraceis & longiora & crailiora multo, caulem amplexantia mollem, fucculentum, digito craffiore: atq: in caulis fummo faftigio caput craffius & majus pilafphwifteriali, membranacea vagina involutum Cepae capitis infar antequam rumpatur; qua rupta apparent flores multi globulati provenientes, albi, hexape- ?^{li}, & T ^{nefca} ! L^{ubveniunt femi} nigra, incapfuli triangularibus contata: « d« eft butt« fa, excedens Ceba. majoris magnitudinem. Tota plan! a redo let *Allium*, kd c o m p o s e partmm magis Porro accedit, unde ei nomen Sco/odoprafum quafi diceret ex Alho 6c Porro « & t t m p b n t a p; eft potius *Allium* majus de gene4s, qu^ ad magnitudinem partium Huc pemnent Allmmlativum radica. fimplici, C.B.P. 3. in Pinace, & *Allium Cypnum*, C.D.F. 4. in Pinace.

12 *Allium* majus foliis porraceis fphriceo capite ex multis floribus exalbidis conflato, nobis. Scorodoprafum 1: Uul. Hilt & Pan. Ampeloprafum 1. Dod. Scorodoprafum five Allioporum, Ad. Lob. Hoc oblonga & latiora profert folia quam decimum fupradefcriptum, Porri foliis majora, etiam carinata: caulem edit fequicubitalem, nonnunquam, bicubitalem, digitalis craffitudinis, fuperiore parte nudum, ferentem in fummo caput membranaceo involucro teftum, ut Ceba, quod explicatum multos flofculos fimul congeftos, cepaceis fimiles, fe x_N

exalbidis petalis confantes offendit: quibus fucedunt trigona capitula, in quorum fingulis loculamentis plurima femina nigra cernuntur, Cep* feminibus paria: radix fubeir *crzffa*, qvx vetufoce in *alios* majores *bulbos* fe cfividit, atque alios minores ad latera adjunftos habet, giavis, medii inter Allium & Porrum, *odoris. Junio Sc Juliotiorec. Hujus pauci Bulbi, Ornkhogaii Arabici bulbis* peraiixti, Bizantio demum deiati funt paulo poftquam Viennem Clufms veniffet, quorum *unicus* mire fe propagavit, .parviu iucleis feu radiculis exnatremantibus. Hue pertinet Allium fphsericeo capite folio anguftiore, C. BCF7« in Pinace, quod fois foiiis anguftioribus à pi iore difcernitur.

§. 3. A L L L I V M narciffinis folii*.

13. *Allium montanum Narciffinis foliis majus*, G. B. P. Allium five Moly Narciffinis folus 1. Cluf. Hift. & Pan. Quina aut fena ex radice promit folia, obion%a, pUna, (uccul«nta, Natciffi akerius niveo flore. Clufii foliifamilia, viridia admodum & fplendentia ; inter quæ cubitalis plerumque exit caulis, nudus, firmus, viridis, friatus, in fummo multos fej*ens flores, f ex JOT\$ iiffi^V^ L; coridemque in ceris itanm ude* pr^icos, (imulcongeltos, ve- t^obofamcaput confituentes, quemadmodum in Cepa; quibus fingulis foccedunt .tr> gona capitula, quæ maturitate dehifcentia rotundum nigrum^men continere deprehenduntur: radix bulbofa fimul & nodofa antierius progredicns PWrgpnau modo, «Vtm yate glocota, tanAida, multis tunicis drcnmvoluta, plunbus albis fibris pr^dita, & adnatis ^m^ cleis feliciter fe fe propaans.

14. *Allium montanum Narciffinis foliis minus*, C.B.P. Allium five Moly *allium sfoli* ^ . . . Hift. & Pan. Hoc tolia quinq; aut ft* non minus lata, fed breviora aliquantulum ft conto quent, bcr- cadens pedalem fuperiore graciliorem, fed non minus firmum, friatum, qui fummo faftigio e Jembranacea tunica multos flofculos promit m orbiculare capuc fimulcon^eftos, priorifloribus fimiles fedelegant. ore purpuramentes; capitnlisdr femine cum priore refpondel<^ frfter radice bulbofa, quæ & nodofa eft, & adnatis in ambita noa- infelicius ilia fe fe propagat. Utrafie h^c fp ecies ferius priori genere floret, nempe Julio & Augufto. Nafcuntur in Ley^{ntkr} fu P^{ra} Mandergorf (ubi tepid* funt aquæ, quarum ufu multi valetudinem recuperant, pt«fertim calculo obnoxii) & alhs itidem montibus urbi Viennæ viduhs.

§. 4- A L L I V M latiffimo folio.

i? *Allium latifolii*«^m P^{ultre}^ n obis. Allium filveftre latifolium, G.B. P. Allium urfinum, Matth Cluf Hift Lug^d. Allium urfinum latifolium, Ad. Lob. Lugd. Allium urfinumbitoliumverum filvaticum, J- B; c babr. Allium filveftre recentioribus duplex eft, vel anguftifolium feu junciolium C^{de} ")^{uncifollo} A^o bicorni lupra egimus in paragrafo i.) vel latifolium quod eft farivum porraceis foliis, aut filveftre nalciffinis, de qmbus diftum paragrafo 2^{do}. & - t^{io} - um d cemtis de Allislatiore folio przditis, & primo de urfino, quod folia emittit bina terna, an^r nã T*lmolongiora, binos digitos law, Uevia & dilute virentia: caulem dol drantakri tenueS, comantibas aliquot in fummo feftigio cauUs fiofculis camlidis, hexl S SiSm ftam^f P^ditis: pro radice bulbus eft oblongus, qui fibris plurimis quas 5 ^ d £ r * * m e m b - is conveWroviens repe^{rimus} in f i l v i ^ humidSJ 7 ^ ^ & ad rivulorum margmes per totam Burguncham, Bmboniamqne^nin opram dabamu^ in hircifcundisrarionibus p Umus. Celliffimo Aurebanenfi Duci Qaftono Ludovici G , l C " l XIII . Wi unico: ibidem & plantam dandefinam dsx^ta^ \ec ^ ^ * uowwa tt%as ^ v ^ p u S r o s e x t e r n c o V f e m i c o W i a f t o t e s , p n i m o a B u r b o n h i ? . ? z t ^ ? e S n v u l o i u m quaft ^rttoforodon dicitur, Dod. Gall. «piaæ. Allium urfinum,

16. *Allium latifolium montanum maculatum*, C. B P All^{um} Serpentinum, Caft. Viaerialis longa, Cluf. Hift. & Pan. / em^{um} angumilm»» Matth. Lugd. num, Dod. Gofn Hort Tab. cu & Viftorialis mas. Eftenim Z^) ^ ^ Allium A p ^ l - liis, hæc anguftioribus, quare Viftorialis mas & f e m ; n , r ^ c m i n a v i u e l a t i o r i b u s f o n digitalis eft cralTitudinis, fungofus, infima parte r i Z l f . T didtur v Caulis huus multos in fummo ferens flofculos, oblongis pediculist^u perne viridis ^friatus> latis confantes, Ceparum floribus fimiles, fenis inn«ft^? l e a i c a n d i d i s p e t a l i s f t e l n deinde trigonafert capitula, in quibus femerotundom 21 . u m ^ o i e d l o F * d i " * , pleftuntur & quafi veftiunt bina aut terna folia, ne vMa nK 54 ? ' " T * T M d m m T M . v o i a , o b i o n g a 6 c l a t a , G e n t i a n s m a j o r i s t o f i i s

foliis - ;ic familia ; radix oblonga, extrema parte
 mukifque valiois & perennibus
 S coute, & quodam
 iter bulbis circa ipfumadnatifrefc
 modo«tia.l;!t» involaca, qpx (it btbfos comimaim natos & coherences
 propagat, e fibris adeo P plicatis, ut dimic
 tejungere. C.piofe«afcitur in montibus qu
 esto: Uendis metal is operam dant, magnas certaf
 mumentu adversus imparorum spirituum in L s , 1 qmbus ircquendffime impetuntur,
 Victoriali s n o m e n ab effecta inditum contendunt.
 majoris cognomen dedit, ut à Gladiolo decernant : cujus radices obcort.c.s qua integrar,
 eum superiore similitudinem, Victorialem rotundam parvam ant.

TEMPERAHENTUM & VIRES.

9. Alliam sativum acre adme est, exficcat isf calefaciū quarto, ut ah G<tlen*s,acce/£u; fum-
 mam corporis cutem vesicas
 qui in ipso sunt humores
 nes aperiendi facultatem quoq : habet : ^ ^ r d r « « ^ v e w w f r i g i ^ & v n u k n m n m
 animalium icibus ; quamobrem i
 iOahn, Tteriaca ap&htur riorum. Alimntum auum
 vpon hucuv j-ravum at acrtmt ah ejw idcirco
 in aqua : eos qui calido sunt pcediti temperamento
 fuerit consueque donec acrimoniam deposuerit, vires habet imbecilliores, & succi
 quidem prabitoi: ut ait Galenus, non amplius retinet, alimenti tamen corpori quam paucif-
 simis confetf, utilivero in c, bo sumptum contra aquarum mutationes, asperam arteriam cla-
 rificat, veterem tussim tit, ac mi
 frigida auxiliatur, ventris velines
 decoctum fuerit, utiliter adver-
 sic in minus qu
 in intestinis herentes fifanit, urinas mdiccruc. ., gk pjiikntifair* contac:
 tos, reddit.
 quod & suffitu potest. <•> & N 4 ^ iiffi« f l » w M ^ ? " J ^ ;
 ustum & cum melle p ^ UUmque bj^h & alopecia*fanat. Cum Nardmoungumo
 sale & olea exanthemata curat. Ausert vero
 fures & lepras cum melle. Cum ræda & thure decoctum,
 mitigat. Contra muris aranei sive morfian cum Fici folia & Cumino imponhur-
 14. Est autem silvestre Allium omne & præcipue Op hiofcorodon Lori, fat Allkm urfnum, autbore
 wtem eiusdem folia confusu, nonnuUi in Bel-
 gio i

DE HEXAPTAAUS TRICAPSULARIBIAS,

radicibus bulbofisproprie dictis^folnslatis donans*

C J T V T XV

F O R R L I M.

¶ Si Viofcorides I. i.e. i wwantit, & in M?***TM capitacion, is? i-*oA<B&*v'&-
 finxit ; id Latini Porntm, quod porro eat, isr long lateque grafatur, vocarunt. Tbeoph.
 2. caus. 20. & ; e' iufJem22. •m'^wp 'o&.<TM tofflum Forrum addidit'. aliasj.Hift- 1,2,3,4,
 5, 6. de Porro egit. At Plin.l. 20. c. 6. est

¶ Allii, prxapue laris foliis 'prsditis, Porra (in hoccapice dcduertda) propter
 m mm in fanore & odore, turn infoliorum ftraftura, adinngerrtequuni duximus.,
 affinitate (V tPlanta hexapetala tncapffilans radice bulbofa proprie dicta & tollis latis pridita, |
 Forrum I- nCftiottiida, (eddbloiiiga1tunicismukiiCcimibtis, pellucidif1aU»is, compaailis,
 cujus radix, no

390
& in
habet
felliipartefibrata, fapore mitiore qaam font Cej*; folia non utCepa ittalofaaaitcava
Jed'lata, carinata; auqnc hifce notis à Cepa facile difcernitur.

Pars T A B U L & .XV. Se&ionis quarts

Porrurum	{	i. <i>Communcapitatum, C.ll.P. Porrumvulgare. Ved. V</i>
		W. <i>Setiivum latifolium C.B.P. Porrumfe&fivumPlimo, Vod. Porrum fe^ut</i>
		feu tonfile, Cam, ♀
		i. <i>VimarUm, C.B.P> Ampeloprafurn, Matth. Lugd. 0</i>
		4. <i>Geminocapite, C.B.P- Ampdoprafumfeu Porrum fiheftre, Lob. Lugd.</i>
	{	0
	{	5. <i>Vitigimewrll caule folium perforate, nobis. Porrum filveftre vitigmeum,</i>
	{	Gef. 0

F. xplicatio faxtk Tab. decimiquintde Seftionk quart*.

i. **T J** Orrum commune capitatum, C.B-P. Porrum commune, Matth. Lugd. Porrumvul-
JL gare, Dod. Porrum capitatum vulgare, Cam. Porro fativo folia funt oblonga, latiufo-
cula, fed compluria 6c dorfo eminentiore carinata, odore fapdteque familia Cepae, fedmitiore:
caulis, fi non frequenter fubfecantur folia, altero aut tertio annoaffurgit rotundus, laevis6c x-
qualis, nullas protuberantias vacuas in medio caulis edit, ut videre eft in Cepae caule: flores
profert in orbicuum colle&tos, incacu^ninecaulis, utCepa: fioribus fingulisevanefcent;ibus
fucceduntcapitulatrigona, ternisiocuhmentis diftmaa, in quorum fingulis continents fe-
mina Cepae feminibus familia, fednonnigra : bulbus tennis, #oblongns eft, potiffimum fedivi
Porri bulbo craffioracmajor|: quod non attonditurmediocrementerr^m poftulat Porrum; in
pingui, ftercorata & mediocriter foluta bene proficit. Seritur in Galli^ Germanic, Anglie
Belgiseque hortis, Martio aut Aprili in utraque Germania, in Italia etiam Februario. Seaivum
five feaile poft oluos à fatione menfes manens in areis fuis defecari poteft, fed quod capi-
tatum ut fiat defideratur attondendum non eft, 6c O&obri menfe vel etiam prius traasferri
debet. p^D> Graecis, Latinis Porrum, 6c Paliadio mafculino genere Porrus dicitur.

2. *Porrum* feftivum latifolium, C.B.P. Porrum feaivum Plinio, Dod. Cd. Lugd. Porrum tonfile
&c capkatum, Lob. Porrum tonfile five feaile, Cam. Porri natura eft crefcere in cervicem longam
6c craffam, magis quam in caput; adjuvat 6c cultura, denfius ferentes hortulani transfe-
runt poftea anno fequenti, altius circumobruentes fimum, ut candorem, teneritatem fimul
6c dukedinem acquirant ufque ad folia: conftat tunicis multiplicibus, longe tenuioribus C^pse
tunicis, foliis glauce viridibus, praelongis, latitudine uniusdigni, canaliculatis, non tamen fi-
ftulofis, feinvicem ampleaentibus alternatim feu hinc inde: caulis è medio foliorum exit,
fecunda aetate cubitalis, in cujus cacumine comara. gerit rotundam capitis modq floribus
Candidas 6c vafculis parvis triangularibus feminibus nigris fuceffive onuftam. Seaivum den-
fiusferitur, quod genus Neroni placuiffe teftantur authores; ut autem crefcant in caput ra-
rius funtferenda, 6ccum transferantur, fummis foliis leviter recifis, capitaretrahenda6c e "
-tremas tunicae atq leviter farculo conveUendae radices ut delumbatas ^lant. Antiqui fil^{Xu}
avit tegula {ubjecta capita dilatabant. Seaivum, autem appellatur quafi CcilTile, quia ade^A
haerent invicem, ut unura ex multis congeftum videatur: hoc genus non transferunt f^I
den, arearelinquunt, donec deficiat, femper ftercorantes; U^Xo enim folo 6c fimo 6c JLV
tamen rigua oderit. Seritur femine ab TEquinoiao Autamni. Diofcorides
turn Porrum capitatum vocat, fejungens ab altero feaivo. Haec duo Porra^{anm Tm lc alla}
aivum feu feftile noh difterunt fpecie, cum ex eodem femine ijenerentur^{Ca Pltatum & fe,}
fcrepant, quia id quod adculinaria julcula feplus defiderari folet feftivum^{f. 71 rafol ad l-}
mellae & Palladio nominatur: quod vero capitatum fieri debet⁷¹ t^v wT^{1011c} ColGⁿ
nali tem^ore uanстетervdimmivaV\Y\OTnonente. ^ VV3UVX^cium, fed autum-

3. ?orr<nifilvcftrevinearam, C*B.P. Ampeloprafum. Matth Ti A ra
ftre quod Graecis *ivmKl* & TM dicitur, id eft, Porrum vineale eft. VLu & Porrum fliven
raceis (ed anguftioribus: flore conftat candido, radice bn l W. ¹¹⁰ ^ - ?lcubitarh' foliis por-
vinetis in agrorum marginibus 6c amcenis collium loci. M¹ g¹ v. u. . 10nga% Provenit in
quafi, fed nullibi frequentius obfervavimus quam inter^{v. ne} I¹ mult?les Inter v¹ n¹ ps Paffim,
& tendendb verfus feftivum feu cuinen momis Va^c Lan 7 I T ? ? g. I o d i c i o S r a i a

t>

*** vaicnani duabus kucis Gallicanis abnrbe
Lutetia

Lutetja Parifiorum, non longe à vice *Sancto Clodovio* dicato. Datur & Porrum filveftre inodorum, C B P. Porro fimile, dictum exilius & *modorum*, Lob. Hoc in omnibus convenk cum 3^{io} nifi quod odoris fit expera

V Porrum filvefoe ^emino capite, C. B. P. Ampeloprafum feu Porrum filveftre, Lob. Lugd. quod à Matthioli Porro fikeftri eft cyverfum. Eft AWii filvefttris tenuifoWi toVio npn & ffmlll, led majore & acriore, in caule bicubitali; radice bulbofa unica, nonexnucleisconfante, Porri Cativi minofe & duriore, acriore, nonnullis adnatis fepe propagante; loco florum & i&oeffive capfularum feminalium feminumque ibidem contentorum, nucleos feminis vice fert triticeis granis pares, in glomeratis geminis capitibus, nee difpares pluribus aliis' Aivii fpeciebus. Vinetis, arborum marginibus, fenticetis & dume,tis Gallic & Belgii gaudet. Oalenus fcribit Ampeloprafum tantum a Porris difidere, quantum in omnibus aliis generibus agreftia omnia a domefticis diftenmt.; item Ampeloprafum agrefte effe Porrum; quare & acrius & liccius eo effe, ficuragreftia omnia reliquis hortenfibus, ac proinde ftomachum quam iUnd nocentius

6- forrum filveftre vitigineum, Ger. Porrum vitigineum caule tolium pertorante, nobis. Radicem h?bet & hoc unicam rotundam, duram, laevem multos nucleos a *E mittenem, ex qua protruduntur folia rarius difpofita, vagina? inftar cingentia caulcm cubitalem, fuftinentem infummo faftigio membranaceum, tenue involucrurrj, quoaperto, apparent floreshexa- petali in globum afti, Ceba? flos^ulorum inftar. A foliis ocres inftar tibiam tegentis ad Ion- gitudinem fingulorum geniculorum & cava fuorum parte caulem ample&entibus difcernitur a caeteris fufe familias.

TEMPERAMENTUM 6c VIRES.

1. Porrum *caftitatum commune excalefacit* exficeat { \$ exte?iuat perinde ac Ceba, corpus excate- > facit, crafos lentofque humores incidit, noxium tamen fuccum ingemrat, tumultitofa ac Xtrri* bilia infomnia parity oculos offendit^ vim aciem obfeurat, natura calidiores ac biliofiores Udit S ingratum eft ventriculo, inflationes facit. Cottum minus nocens^ acrimoni* fud parte depofita, iy nee fie tamen bonum fuccum corpori confert, cumfrigtdk autem okribus permixtum, quali- tatemfngidameorum contemperat. Cum Ttifana coftum isr commeftum, qu<z inpe&ore crudafunt, concoquit isr educit, fcribitur etiam in delintiu utile efe, & a/per am arteriam purgare. Sue- cm cum melle potus contra ferarum morfus* prode/i: folia fimiliter trita is impofita. Idem vero fuccus cum aceto^ tbure is la&e^ aut rofaceo infillatu* aurium doloribu* isfontui prodeft % veteres fanguinis rejettiones cohibent feminis drachm* du*e? cum <zquali Myrti pondere potde* Idem invinum conjeftum, ipfumin acetummutari prohibet, is jam convexfum emendate ut non- nulli fcribunt.

^Yonxxmfilveftre gemino capite, C.B.P. Ampeloprafum feu Prorum felveftre. Lob. Stomach) magis quam Porrum adverbatur, ut tradit Viofcorides^ plm excalefacit^ urinam is menfes ve- hemetiwtiet^ e)us efut contra ferpentum morfus utilk eft, de quo hdzcFhnius, Ampelopra- fum in vinetis nafcitur foliisPorri ruSiu gravis, contra ferpentum iffus efficax, erupt iones fan^ guinispergenitale inhihetpotum impofitumque. Datur is apartu mulieribut^is contra cank mor* Cum.

HALLUCINATIONES GASP. BAUHINI Aliorumque Authorum*

P Ag* 72. col. J'pl- in* Porrum fettivum junci- folium, C. B. P. Scanoprafum, Bod. Cum Por- rum fa plant a bulbofa hexapetala tricapfularis, foliis latis carinatis precedita, nullatenus convcnit buicplantu!^ butbofce, foliis quippe fijiulojis feu ca- vis donata> Porri nomen 5 imo odore & fapore magis Cepatum families accediti et £° inepie Schcenopra-

fun feu, Porrum junceum dicitur Bodohceoprino & quibusdam aliis auctoribus s cu, omnibus fuis bar- tibus Ceparumclafi?nagi*accedat,jure ergo totioh nos Cepam fetlzlem juncifolium petennem defivna^ vimus. In hac animadverfione, ficut in aliis memet Jubmitto judicio doUorum & verfatorum in art* Botanic a.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS;

radicibus bulbofis proprie disftis predicts.

CATVTVI. MOLY.

M... ab amolendis mor... VniwsTkofhafllts 9. Oh... Meminerere: at Plin. 1.2\$. o. duplex propofuit: alterum. - xrotun...

3fr/f omnibus fuis partibus eff?ntialibus convenkcum Attio,imo fapore non mulcim* ab Allio recedit; eft enim pknta calida & acris fervidique guftos, non minus quam Allinn: quicunqueMely Allium montanum latoribus feu'planis comprtirifque foliis habuent, ti crtmini nondandum exiftimo. Eftque a foliis, vel lato compreffoqoe folio, vel latiore, nunc magis, nunc minus viridi; a colore florum, eft vel flore purpureo, luteo, ant albo.

Pars TABULJE XVI. Seftionis quarta.

U.LatifdumHifpanicum, nobh. Moly latifoli^purpurmmHifpanicum,

Purpureum \ 2.%aZmimbdlapurpuraf«nte» C.B.P- teProd, ©

[? . Nobis. Moly atropurpureum, Swert. ~

LuttumlatifoliumJon Alia ^ l^m f^% ^ T J^ol % ^ T ^ Y ^ t ^ I urn urn flavo

6. Exoicum SoTibim abo-viridibus, C. B. P. Moly flore albo lineis viridk cobm, Swert, 0

Moly

7. Vmbellatum, nobh. Moly Diofcoridis, Lob. Icon. Cluf.Hift. ©

8. Humile foliogramintO) nobis. Cham&moly an Moly Diofcoridis, Col. ©

^ .Pefaufenfeparvumcauletriangulari^nobk. Moly parvum Pefau-

Album anguflifolium \ nufe^~Pon& Ital. 0

\o. Petalh rotunda feu orbkulatU^ nobis. Moly minus, Cluf Hi/.

\ Moli minimum albo fore, Sveert. 0

1 iii.Foim reflexw, C.B.P. Moly ferpentlnum vocatum, Lob. Icon.

\ Litgd. 0

Explicatio partis Tab. dccim^fi-xta StcHonis quart*.

k.i.MOLT

PVRPVREVM.

t. X If Oly Hifpanicum purpnrenm_T vel Moly latifbium purpEreum Hifpanicum, Cluf. Cur. 1 V I M- ^oly ktitoliam ffifpanicum, C. B.P. Moly latifolium Indicumflore... Swert. Hoc Moly omnmhujus generis maximum eft: folia habet lonea Gladioli... c;Trinata: caulem protrudit ex radice amplifILmS bipedalcraffum... Uatim (adimitar Moly Indici amho £ "nZ O r n i H ^ " i ammo... plurimos flofculos... quibus fingulis deciditibus fingul... potius di... succedunt ca... suffundit inter allium & Moly... dentes aUt purpurafcentes. Con...

ente, C. B. P. & Prod. Ex radice bulbofa exit caulis nudus & cava: quem'cinguntin inferiorepaite folia aliquot latifcula, in acutum mucronem definentia, palmaria & fequipalmaria, pe c marginem instar graminis hirsuta, pilofa: umbella caulis summo infidet, cujus flores finguli communiter tenis petalis, dilate purpurafcentibus (non quinis ut vult Casp. Bauhinus in Prodromo) pediculis

diculis oolongs & firmis infident, quibus fingulis veficula feu capfula^{tf} ^ s loculamentis d.f. tinaa in fineulis bina aut terna femina rotunda mcludens, fuccedit. Odore eft Allii gray- ort Hoc Argentina a D. Meyeroacceptum habuit Cafp. Bauh.nus. Floret *ftate, & paulo

^t^5^n at^U^ro^TM^u^Setm, S.ert- Hoc folia habet angufta, porracea, peduUa, cauto, cin- 3. mmy <uu^* * - , mo fctigio ontur capitulum conilorme, mfinitislcatenftiolculis, genca a l t i o r e r r ^ ^ am -et ^ ^ ^ ^ naUatenu8 obfervari poffunt dlftinaa, ex m<u.mis, atrop<puu< mih>appatene v ^ ^ ^ ^ membranaceoram Scabiofae Hifpanicx, & o e ^ r e konm.hifufpeaa, cum flores no? prodeat henpetalos, Moly verum& genu- inZ effe L"«ao.- examinent Authores plantam ipfam ad quorum manus pervenerit. Con.nk Tab 1g, piantam5"locopofitam; cum debeat effe 3>plancaacolare riorum, inhaPTabula male & extra ordinem difpofita eft.

§. s. MOLT LVTEV M.

ifoliumluteumprimum odore Allii, C.B. P. Moly montanum latifolium flavo fl⁴-SHffrAPP-altera. Moly flavo fiore,Swert. Molyluteum, petpetam Onuthogalum w^ce multifolium Botanicorum, Lob.'Ad.part. *z. Folia habet hoc bina, mfinu parte leaentia, decem aut plures uncias longa, unam lata, furreaa, firma, fupina parte nonnihil carinata, scc:icoloris,& odoris Allium referentis: inter qua: aflurgitcauliseno- acms C u s amen, ;ire(cens, pectem altos aut paulo altior aliquando, fultinens dis& la mgiaç h ^hrmus^a fo^h^fo>bjtariara divilo'iricenos aut plures flores nnc<- firtudo f tnZbuspedic Liifque firmis fubnixos, fenis petalis ftellx in modum expanfis libas aut ..ngio, buspemu q fufstia vos; occupante umbicum mंगा: f r f c S T x Pfla^U[ftarnmibuscinaoV^um, quorum apices etram flav, : flor.bus q< men?Tunioexplicanturtr,gonafucceduntcapitula,femennigrumim,qualecontinenoa: ra-

HUeftbulfofa eemina, ut Orchidis radicem quodatinmodo xmuletur.

e Moh latifolium flavo fiore foliis contortis, nobis. Moly latifolium luteum fecundum AI^ Allii C B 'P Moly latifolium flavo fiore, Eyft. Hoc terna profert folia, lata, contorfa, Lrt_a ut fuperius; caulem rotundum, dodrantalem, in cujus iaftigioplurimi flofcul., W^etali lutei cum ftaminulis-fex, & ftilo in medio ejufdem colons, quosante expan- r^...P rin,untoina involucra membranacea: floribus fingulis decidu.s fuccedunt fingula ca- fionemcmguntbma in o ^ ^ ^ at oe in fingulis duplex lews fem.num nigrorum, ins- pitufa.tr.bas !. ^ ^ 8 J S . . ra dlx eft bulfofa geminautOrchidis radicem quodam S S S 'S ' T ' S r P y r ^ i s montibus. Flott ineunte .ftate, atque fub ejufdem fia r f r e x o S f l t i b u s a l b o . v k i d i b u s , C . B . P . M o y , f l o r e a l b o l i n e i s v i r i d i s c o l o r i s , S w e r t .

HocfoUw caule&radice,pediculifquelongis florum,convenit cum AlliiisNarc.ffinis folns: atfls» « Rem.no involucro denos, duodenos, hexapetdos, albos, lmeavindi in dorfo at Hores ex gem h noneffe Allium fed Ornithogalum, fi vero habet odo-

notatos gent, quod nlnujmnen t ho^m nec duum ^ deriu, ^ e j r i l e m p i c t u r a m . u p l o n g i o . rem All. (q ^ n d o q u f T M g T M M T M f m s P h n t x d e n o m i n a t i o n e k C a f p . B a u h i n o a l l a t a , m , h , X f ^ u r S g g a l i % c i e s ; / f i u t i d i a m o d o r A l l i i a d f i t , d e t e r m i n a n t d u b . t a t . o - m 17 . n e n t p o f t e r i p l a n t a m i p f a m q u a n d o h a b u e r i n t a d m a n u s . n c 7 M n r L w M o l i m m u m b e l l a t u m a l b u m , n o b i s ; M o l y a n g u f t i f o l i u m

Molv an/ufifolium7 Dod. Moly Diofcoridis, Lob. Cluf. Hift. & HHp. Hoc Moly DioTcoridia bina aut terna angufta, porracea fere, habet folia, mollia, ad terram inflexa, extenoife parte lauantulumlanuginofa; interqirecanlisexilitdodrantalis,kvis,rotundus,cavus,fummafa- ftVir'parte membranaceum quoddam involucrum fultinens, exquomulti emergunt flofculi d'di fex petalis confantes cum totidem ftaminulis: radix bulfofa, avellanas niicis magni- C^A-L 'intuſalba, fucculenta, aliquantulumacris,fubingratiodoris,forisnigricantibusmem- t^U^... involuta Nafcens hoc Moly,& initio Februarii flores proferens, Gadibus ea vetens bramsinv z in mare protenditur, truebat Car. Clufius, nonprocula Sacello locum oc- urbls^re "na" H n b % . r . . .

CUPanC r n i l e folio gramineo fiore albo, nobis. Cham^moly an Moly,Diofcoridis, Col. 8. Moly idongitudo deeft, Chamaemoly nomen imponendum cenfu^mus, inquit Huic cum c f Kadfce'eftBulfofa, parva, nucis a^ellan, magnitudine, flavo cortice d o Rab. Columi e e 2 obducta

obducta: folia quatuor vel quinque à radice, per ambitum hirsuta, autumnò emittit, Graminis forma ut Dioscorides notat, magnitudine inter se distantia, nam quodlibet illorum alterum superat gradu, majus vero folium non excedit pedem. Primo cæli minimo tepore, non tantum Veris, sed ipsius hyemis floret. Decembri mense in silvestribus emittit illos folliculos simul inclusos inter folia terram tangentia, nec in folliculo septem vel decem, aut pauciores aliquando, sed Iatos flores dir, albas, **pipu X** dorsum aut virens singulis petalis habentibus, in quorum umbilico fructus extuberant, habentes, luteis sex staminibus circumdati, que simul cum orum petalis marcidis sentibus fructibus capsulis triangularibus seu tribus loculamentis diffunduntur, sed simul adhuc junctis, Pisi vel Ciceris magnitudine: capsula siccat trifariam in singulis cellulis semina nigra, angulosa

erficiuntur. Ceterum det semina & arbor non...
 oruit J » » £ ^ ^ ^
 & jam vetusth fobolem ex latere... CmiItir> mul:i p llc Iduroc O"ice cæsta inve-
 ^ ^ m angustifolium Fe A...
 triangulo C. B. \ Molypsvnm ^ r. r Pf ^ l cauie rrrangno, nobis. Moly parvum caule
 rio Pe & oreasi: canlc mfeit non L ^ S renfe, Pon - M Hoc Moly copiose nascitur in terrico-
 tudinem fcm cubita Jem rac, l r TM ^ « [c ^ e r i Molyos ipecies, sed triangularem ad al-
 raceam coJorem rendic-foiit ^ T abes Julio ofani, albam, rorantam > qu* ex albidoin por-
 t's, acuris conflato: tvlnr, m f F ? ^ ' POTacca itidem: flores habecex fenis pecalis al-
 tiplitat nuclds NarT, uffundit A11, O parem. Flor« Maio & singulis annis sese moU
 h Moly ante Ponim CX nomine J Johane Pona assignato indigantur. A nullo dtscribi
 inctr confortes T- ComperimUS, (quare eius descripi 10 ncm ac lc onem adhibuim sin Tab.;

Clu? Hist? Moly angustifolium P«alis rotundis feu orbiculacis, nobJs. Moly m am,
 Uos aut? Moly ninranialbb«ore, S«-ert. Hujuscaulis palmaris & fequinannric • J
 ? « ^ **fuffinens** flores. sex niveis petalis, non UercatTs uc Ko y D' V' S f' ^
 quodammodo sed angustiora folia affurgbac: radix STrannrfTf- IntW fen a
 agnit III H H i ^ bicandbus fibrism parte fcllillipX. "Cleans, **nucis**
 l' ^ a] bunlaguff, foliomm reflexis, nobis. Moly tinum voc tum Lob. Lu d
 cie galls] loc Moly (erpentinum (a m s ad instar fc S ^ ! » g.
 os, quod Moly Dioscoridis ortu n « S L f r s c n a m fc convoluti O
 refi«is; odor, ^ & bulbo tanican 55 ^ a i c ^ M o J ° n ' V ^ i " ^ ltratis,
 sistentes, atque in summi caulis media parte conspiciuntur bulbilli nitidi Indici Moly ritu: ra-
 dix cepacea, multis tunicis tecta: caulis quipedalis. Ubi sponte proveniat
 nobis nec dum notum, inquit Lobelius, B ^ ^ hortis satis familiare. Floret incunte
 æstate.

TEM PERAMENTUM & V T R E S .

Moly e? cahdum is acre, va AmmU
 de Allio quoad virtutes accedens; est enim ab odore & sapore tantum
 us seu porraceis foliis præditi species. Radix bulbosa Molyos valde est
 teri cum irino unguento trita & subdita, ut Dioscorides est author. Ga-
 Dioscoridem testem pro ipsius unguento irino legit m p r e a l e q u e , hoc est,
 cum farina ærina apertum uterum sanare scribit Dioscorides.

H A L L U C I N A T I O N E S C A S P . B A U H I N I
 Aliorumque Authorum.

P Ag. 75. col. 1. pl. 1. Moly latifolium li'iflorum,
 C. B. P. Moly Theophrasti, Dod. Ibidem pl. 11.
 Moly latifolium Indicum, C. B. P. Caucasum Lob.
 Icon. Ha dua planta cum nec odorem, nec saporem
 habeant Molyos, male hic disponuntur a Casp. Bauhino
 ceterisque authoribus ante ipsum scribentibus; re-
 ferantur ad Ornithogali Classem sicut nos præstati-
 mus, quia cum Ornithogali magis quadrare mihi
 videntur, uti diximus in Hallucinationibus ad finem

in de Ornithogulo, quæ illic consule.
 Pag. 76. col. 2. pl. XIV. Moly moschatum capilla-
 ceo folio, C. B. P. Allium perpusillum juncifolium
 moschatum, Lob. Ad par. alt. Hæc planta cum sit
 cepaceo folio, & odorem spiret Allii, male inter Mo-
 lyos species, porraceo folio præditæ, a Casp. Bauhi-
 no collocatur: referatur ad Allium silvestre folio ce-
 paceo & cavo, sicut nos præstimus in capite de Al-
 lio, quod vide supra.

DE HEXAPFTAUS TRICAPSULARIBUS,

radicibus3bulbpfis proprie di&is donatis.

C A T V T XVII
S C I L L A,

2 K< "ff^{TMx} • mfi* 7.&10. propofuit is? 7. Hift. 1i. ScilU EpimenidU vocat*, & gu£, au • luncupationem [ortitaftt, meminiu Sic Diofcorid. 1. 2. c 2,02. <m^a.i habeNisr cap. fequente Tntw^{**TM} quod Scillam aliqui nominant. Genera duo ScilU medic* Plin. 1.19. c. ^mafcula albisfolijsjemina nigris: isr tertium genus cibusgratum, Efimenidiam vocatum, i&c. iff 1, 20. c. 9. Scillarum in medicina albaeft, qu<zmafcula', femina nigra: candidiffimautiliflima.

Scilla radicem habet omnium ftirpium bulbacearum maximam, tunicis multis humore quodam plenis prxditam; hac folia enim nota à ceteris fuafortis cognitu facilis.

Pars TABULI XVI.

f (1. Rubra^ C B. P. Srilla, Trag. Matth. Pancratium, Dod. Lugd. fab,
i Vulgaris radice, < 0
Scilla I " C 2. Alba, C. B. P. Scilla, Dod. Scilla Hispanica, Cluf. Hift. Lugd. 0
3. Efculeta, C. B. P. Efimmidia, Theop. Scilla dulck & Candida in Cephalonia is Creta,
Cojl&oin Mefuen. 0

Explicatio partis Tab. decim <efext & Setlionh quarte*

1. {7[Cilia vulgaris radice rubra, C.B. P. Scilla, Trag. (cui 6*Cepa maris) Matth. Fuch. ^ Tur.Cord. in Diolc. Gefn. Hort. Cam. Cæf. Pancratium, Cluf. Hift. & Hifp. Dod. Lugd. Tab. Scilla rubentibus radicis tunicis folio Aloës carinato, Lob. Eft Scillae caulis cubitalis aut major, re&us, nudus abique fbliis: pluribus candidis & ftellatis floribus, hexapetalis, ornatus, Aphodeli minoribus, Ornithogali majoribus (quod quidam Scillam fepimenidiam putant) & valde fimilibus, quia imis (uti veriffime Theophrastus Hift. 7. c. 12. fcribit) explican incipiunt, quemadmodum Aphodeli & quarundam bulbacearum plantarum flores; hifce fingulis fuccedunt triangularia capitula, comprelRs angulis conftrutta, & veluti mania; in quibus tamen nigrum, planum, paleaceum femem, fed poft feminis & capfularum eflbrmationem quinque, fex, aut plura emergunt folia liliacea, lata, viridia, admodum denfa<(ive carnofa, humi expanfa, nonnihii carinata: radix craffa & ampla, multis tunicis albis lento quodam humore plenis praedita, multifque pelliculis exterioribus rubris, internas albas involventibus, inferiore feu feffili parte multis craffiufculis fibris capillata. Copiolenafcitur circa pnyffipponem, & plerifque aliis in locis Lufitaniae & Hifpanix. Floret Augufto & Septembri; femem O&obri & Novembri maturefcit. Folia jam maturo femine, & exarido caule, feffe erigunt Novembri & Decembri.

z-Scilla vulgaris radice alba, C. B. P. Scilla, Dod. Scilla Hifpafica, Cluf. Hift. & Pan. Lugd. Scilla alba, Ey& Scilla five Cepa marina, Lob. Pancratium icidem, Cluf. Hift. Huic amplitudo major eft, cujusextimae tunicas albescunt, foliaque ampliora, longiora, magis carinata & quodammodo furrefta. Abunde crefcit in mediterraneis, adeo ruftici§ exofum, ut mebul* bum ejus eruentem (inquit Clufius) admonerent ne deguftarem; florentem autem aut femem ferentem iunquam confpexit Car. Clufius. Fabianoverollges, ut ad Clufium fcribebat, anno 1592. in penfilibus hortis non modo caulem protulit, fed etiam plurimos flores (picx inftar nafcentes, fingulos fex petalis conftantes, Scilk (quantum expi&ura, quam epiftolae conjunxerat, colligere licebat) florum xmulos. rov^aTM 5) ff-JA\à Graecis, Pancratium Lâtinis dicitur.

3.5Vi//rfefculenta, C.B.P. Epimenidia, Theoph. Scilla dulcis & Candida in Cephalonia & Creta, Cofteo in Mefuen. Hasc à prioribus facile cognofcitur quod radicem habeat candidam & efculentam, aequè aliis notis a praedictis diltcitur.

TEMPERAMENTUM & VIRES,

Scilla est ex secundo ordine excalescentium, & incidentem admodum facultatem obtinet, ut Galenus ait, praestat autem assam aut elixam sumere, sic enim virtus eius vehementia exsolvitur. Assatur autem pasta farinacea aut luto obducta (ut Dioscorides docet) in cibum deinde conicitur, aut carbonibus obruitur, donec obducta pasta sufficienter cocta fuerit, qua adempta, si Scilla probe cocta non fuerit, altera simili pasta aut luto obducitur, ac de novo coquitur; nam quae ita non assatur interrimis maxime nociva est. Terretur itidem in olla induro operenti, quae in furnum demittitur: sumitur vero quae maxime est medium, exterioribus partibus abjectis: quod frustatim confectura coquitur, mutata saepius aqua, donec ipsa nec amaritudinem, nec acrimoniam habeat, frusta siccantur in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant. His Scillae seminibus ad oleum, vinum, aut acrum Scillinum conficiendum utitur. Ex aceto autem scilliticco, addito melle oxymeli coquitur; cuius ad incidendum crassos, lentos viscidulosque humores usus est. Assa Scilla portionibus aliisque medicamentis, quae unam troscam & seminum laborantibus < contra veterem tulTim dMr<l, - | .) . . i re g omor - in eleganti, Pars

nempj,?'&«**&«**, conjuh Job. Bauhinum pal 220 1 ^, .. ^ .. /n/&V... &
 ^arnparcedevoreturmio tajn l^Tto^T^f^^ TM*S *'
 ibahurn genere babentur. 'Vemnofa igitur <>;ll,l ?ff.' ^dmodum fuwi y... i,
 trovemflocifqueoboriturfcëdkaciZni^ Jt CM MeKes,radit j rotamflh y... i,
 rens Avkenna inter venenatas pläJLT ""I*?' ""t"d themäs o l t l ^f^{amoul}
 fermeant: quo fit ut invirdrbi TM^n^lcai TM<<4fgJmat* .. * ^ TM^tricu

ma, n^erocbalyJZZ:IK* ***** ^ 2 ^ ^
 avorum vitellia in aceto decoctis; quinetiam in fricta cibaria & pingua carniam jura confectant,
 recens crudumque Butyrum & extrema juvenum quadrupedum membra, aliaque permulta.

DE HEXAPETALIS TR
 radicibus bulbosis propri
 c J TV T XVIII.
 LARIBUS,

ULIONARCISSUS florefurfHm fpeaantefeu T ULIV.

TULI .., eius descriptionem & figuram primus Gesnerus anno 1560. in Appendice Card. Hist. dedit, à pileo Dalmatico vel amiculo capitis, ab ipsis gestari solito, nomen habet, idque propter floris cum pileo similitudinem. Sunt qui Anemomen, quoniam Theophr. velint, inibi Pulsatillam intelligere videatur: alii Cynorrhodon Plin. l. 24. c. 5. censent: alii ad Satyrium stri- folium referunt. Turca Ale & Zampol vocant. Theophrasti.
 Genera prima tria sunt: praecoxius unum, serotinum alterum, dubium tertium, medio tempore florens.
 Praecox caule est pedali, firma medulla pleno, quem folia plerumque terna, nonnunquam qua- terna, quina amplectuntur
 ca
 entia & nutantia, interdum in f-
 no c. le co nctim Hcen-ei ZtJ . ^^^h
 tab, Crm/PneftenUautofovi, ntlhT nctim Hcen-ei ZtJ . ^^^h
 fJ pos, abrtvarimia. ^lmi>^iCt J>'f'><lotot/laMLa
 Ser

Scrotina, caule est cubitali is^l bipedali, f«ngofa materiapkn, quern quaterna pkrutnquefolia[^], mntunquam quina iy fena[^]firmiora[^]utpluimum ere&a, nannutamia, amb'mnt: j'tmine quam in prgcoce majore, iybulbo hngiore mcjforeque pltimque confiat: fie ist cauUm jamofum imerdum habet.

Dak*, qua fracociumflore tnarxfctnte fuos **txplkant**, isr firotinif forere incipkntihm **jam** mntunt, is cum bh inHrdum florent. Sunt inter has nonnulU qu# ferotinarum magnitudincm qua ffdtcoces mn fuperavt[^]nec ittk form# abfimiles font; is UU quidemvd am-
ribus prad i *vel fracccium non majoribu**; quxdam etenim p&cotibut bumiliorts

Oni... -la aftce mucronato[^] aut orbiculato; vet tria interior[^] **orbiculata**, exterior a much
nataiy[^] **ffunt**.

Butbact. -iter phntas proprie diftas recenctur merito peregrinJ ilia planra Tulipa difh,
ob infigoeni in flore colovemculcoribus longer gratiffima tfie folet, Qjjade re Johannes
'ofthius,'

Multiflici **viteit floTum gnm omne colore,**
t Hucufque a Quick Tulipa miff's jugk.

Hancvulgus TtUipam, noscumdoaioribns Lilionaiciflum appeliamus. Liliumprium in compoficione nominis fibi vendicabit locum, proptercontbrmicatem cum Lilio incapfub feminali non folumcribus Ioculamentis diftinfta, fed cjuod in fingulis loculamentis duplicem feriem (eminum compreiTonim, membranaceorum, Lilvorum inftar gerac; porro propter radicem perfete bulbofam feu titnicatam, NarcirTbrum inftar, Narciflivoceadjecimus: idem dicendum venic de Fricillaria iea Meleagride quoad capfilamfemina(pduplicem feriemieininum compreffbrum memb'ranaceorum in fe continentem, & Inc fola ratione dufti ieparavimus Tulipam & Fritillariam a caeteris hexapetalis tricapfularibus bulbofis proprie diftis, Narciflbfilicet & Ornitiogalo[^]atqueincerjecinms plantasjculinaiias cajjd[^]s & acres,qu.ippe habences capfulas feminalc3& femina conformia iifdem.non autemLilii3,quibus Tulipa & FritciU laria accedunt. NotagenericaquadittingukurTulipa apr<cdiSis omnibasbulbofis propriedi-ais,tam recreanvis,quam culinariis, efto hsc, quod in cernorum loculamencorum fingulis duplex contineatur feries feminum comprefiorum membranaceorum;a Fricillajia fequenth quod Horem conftanrer ex fex petalis conflatum gerat, furfum rpe&mtem calathi inftar; FrMlaria veroconftanteridem florem fex petalis etiam conftantem/ed Cnacura non variance fincm) deorfumprope]identem.TuIipaatemporeflorendi,eftveIpracox,vellerotina;qnidan] confituunc mediam inter utramque: a folio,cftvel latiorc, eoquevel piano, vefundulato, feucrifpo; vel angufto: a colore, eit velmbrafeu purpurea, lucea,& alba: ab hilce, fatione mukis modts tiore[^] variances colorem producuncur Tulips: a natalibus eft Getica, Thiatica, Cappadocia, Perfica, Italica, Gallica, &c. Cum nobis non occurrat an aliquiis de Tulipj verba fecerit ante doftiflimum & diligencifiimum reram naturalium fcrutatore, fimul & Botanicum folertiilimnm, D. Gefnemm, lubet hie fubjicere quæ in fine operum Cordus de Tulipa memoriae prodidit. Anno a nativitate Dom. 1559, (emine Bizantio, vel ut alii volunt, eCappadocia, allato,&fato Auguftis in liortoD. *Henrici Hcrvan'* florebat liajc perpulchiaplanta, flore uno 'erjucanderubente, magno fati, inftar quafj Liliu rubri, ftnis petalis (fi pluribus confpiciatur, quod nonnimquamcontingit, fit a luxuriance natura) confbans.- color internuspallidus^{erac} a[^]fubrlavus, & ftamina (ex crocea ujjiacumftilo & apice trilulco. Tulipam Turci vocabulo ipf^{is} tamiJari vocant hanc elegantem plantam communirer, a forma pileoli Dalma- - :L Semen Tulipae fepe fatum Tulipas alias producic, quarum flores varioV infinitasquafi


beuittmntationes,& fepe degenerant, ut quilibet liortulanus auc riorum liujufmodi caltor experientia comperire poflit. Tulips ratione Temporis florendi, vel funt pra:coces,*quae

[^]hy«mc, vel ineunie Vere, florent; vel ferodna:qti«^vere florent,Aprii fcilicet & Maio: ii.c[^]iasfeodnbijE ficdicuntnr, quia medio inter prxcoces &:feioi:inastempore florenr, videlicet qua marcefcente prsecocium flore fuos explicanc, & ferotinifi rlorere incipienribus jam lenescunt, imo incerdum cum ipfis etiam florent; dubii etiam quodammodo appellari pofTunt, quod utrinque generis natnram referant. Nullus praxocium, ferotinarum,dubiarum reliqaarumque Tuliparum ipfinkam varjetatem* ex fatione provenientemesprimere poteft. Habica itioneftamiiiumfexin medio flornm, variant etiam Tulipar; nam florum fatntaa vel fuut irpureaautcaTHlea[^]iridia[^]lutea, &a^lba feu ochroleuca, quæftamina prddurunt caralea xpurpurca,cujufcunque.fint.colorispetala fex externa ambienda ftamina pradifia, p^{ro}-
veniunt

venmntexmatubusfionbus purports praditis.- qnaautem ftamina productintviridi^ex

liorum Tulipa sunt vel latifolia, vel angustifolia.

TABUUA XVI.



§. 1. TULIPA latifoliafeu major.

Explicatio Tab. dmmsiptim^ Seft'wnh quart*.

Tulipa przco* pnrpurea, rubra, lute-alba, C.B.P. Omnes hsexradicebnl-
 tumasmdtisefejnvolventibusconfnce, orinntur; folia ternana
 ducunt; caules rorondos, pedales, firmos; in quorum fingulis fastigiisfingli prov
 res, magni, calathiinfar aperti, sursum versus spectantes, exfperalitutplnrimdm
 (nisi a luxuriance natura aliter contingat;) atque fingulis Horibus deciduis
 tmngdaria, rribus cellulis feu loculamentis distinfra, atque inunoquoquelodm
 plex fenes. ftminam. compreflbrum. membranaceorum^oblongorum castanc?coloris c o T ^
 ptacoors Horent ante ferotinas, earumquc flores font simplicicer purpurd rabi Lr<<
 vel vane commixti ex robro& iavo inter fc confufis coloribu^ mo^
 rubro, vel utrinque radiatim per oras distin&i. Similiter observare licet
 avam, qflf flavum & rubrum : purpuream, qux album 6; purpureum colores varie
 inter se commixtos, & radiatim petalafingula iecantesliabuemnt. At illud etiam observatur
 quotquot sic nativum

2 5 ? J S are, tanqnatn ipfi extremum vale distur^: Varia
 <diverfiras in Tulipis, at non folam difficile fit, fed imo imoillibile, omnes
 femina i>volucioe^S, Ver bis f ^ ^ V ** TM^ Cm^UC nillcm pTM<<eis Tuli, pe
 cobrem, fedinvn Pt, a teru e ic puu S erminent, non omnla retinent nariviim matrif
 plantas insignem tnos colores cranstormant flores, prxfertim albae, cujus femine prognatr
 colorum varictacem prse reliquis nancifci e^perientia & diligenti obsem

tionē didicit Car. Ciufius; femina enim eodem capite nata, & ab ipso collecta, eodemque tempore, Autumno, tenax commissa (i. iuocil. tempore, scilicet verno, ferenda sunt omnium bulbacearum & tuberofamm leminij, ut feliciter proveniant; vel etiam maturius, cum propbnt feilicet defluunt) plantas proximo subsequente Vere produxerunt, quas post quintum, sextum aut septimum annum flores protulerunt, easque aut omnino albos & matrem referentes, atque albos varios, vel lateos, & luteos varibus, vel rubros; atque rubros varios; vcl our ureos, ac purpureos varios, quorum videlicet purpurea petala albis oris ornata fuerunt. Quasavum ad luteas aut rubras attinet Tulipas, plerasque proles niatris colorem retinent, faspe etiam in alium commutant. Omnes porro haccolorum differentie haud facile verbis exprimi, vni dictum, queunt. Admonet Car. Ciufius se Tulipas caerulei omnino coloris Bunqu^m vidit (hoc idem nos testamur) at florem tQum-pallide violaceum. in horto suo habuisse. Tulipam flore nigro nemo unquam observavit.

7. Tulipa ferotina rubra seu purpurea, lutea five aurea & alba C. B. P. & eliquorum authorum. Tulipa ferotina maiore est amplitudine, pedalem & sesquipedalem interdum habet caulem, firmiorem, craiorem, rotundum, fungoia materia plenum, & brevi incanaque lanugine five efflorescentia quadam aetherum: hunc alternatim amplectuntur quaterna plerumque folia, nonnunquam quina, (ena, carinata, firmiora quam in praece, ut plurimum ere & a, non iutantia aut d terram inflexa, atque adeo oris interdum reflexis ut sinuosa seu undulata videantur, aliquando tamen omnia asqualia. V summo caulis nudi supra folia infidet unicus flos magnus & oblongus, cyathi aut calathi modocavus, sursum spectans, sex petalis itidem confans, tribus exterioribus duntaxat mucronatis, interioribus orbicularis, ut in praecpe & contra: caput, ut in illa, triangulare, membranaceum, tribus loculamentis divisum, & in fingulis duplex feris feminum membranaceorum & compressum continetur, quo alimmo dehiscente sex ordines, bini in fingulis capsulis seu loculamentis feminis plani, compressi, membranacei aut cartilaginofi, fulvi aut rufescentis, majorisque quam in praecpe confpiciuntur: radix bulbosa praecocis similis, longiore tamen maioreque bulbo. conitat, plerumque in reliquis cum illa conveniens.

2. Tulipa ferotina coccinea, rubra, lutea, nivea, C. B. P. Ex his magna varietas observata, quod interdum ex rubras femine, flavae; contra ex flavae femine, rubrae natum fuit; ex purpureae femine flavae & rubrae & varibus fructibus & radiis diversorum colorum mixtae, ut Tulipa nivea oris purpurascens, Eyit.

3. Tulipa ferotina ramosa major, C. B. P. Tulipa ferotina -mXvxhA major, Cluf. Hist. Tulipa ferotina polyanthos, Eyft. Tametsi haec Tulipa non fecus ac vulgaris unico ut plurimum fructu confet caule, quandoque a luxuriante natura ramulosa ac ramulosa habet caulem, atque in fingulis ramis fingulis infidunt flores cujuscunque coloris.

4. Tulipa viridis coloris, Eyft. Hujus caulis attollitur & us, glaber, cujus summitati infidet flos fatis herbaceus & viridis, oris acuminatis introrsum flexis. Datur Sc alia, ludente fite natura, cujus sex petala partim virefcunt, partim lutea sunt, oris foliorum laciniatis; prior ab Hortulanis & florum cultoribus dicitur Pfittacus, posterior Monstrum.

5. Tulipa miniata flore pleno, Eyft. Haec a femine bene nutrita, folopinguini, recenter ex prato educta, mixta terra arenosa, stercoreque anno, commissa flores producit multiplici ferie petalorum miniati aut rubri coloris.

6. Tulipa pumilio latifolia fulphurea C. B. P. Tulipa pumilio fulvo-fulphurei coloris, Eyft. Hujus caulis palmarem aut femipalmarem vix attingit altitudinem, quatuor promens folia, angusta, undulata, carinata, Tulipae J. V. Ionfepelianaefoliis familia, inter quae caulis prodit palmariis aut paulo longior, nudus (praeter aliarum Tuliparum morem) et viridi purpurascens, iumra fastigio florem gerens sex petalis confantem, foris nonnihil purpurascens \ intus candidis, umbilicum occupante longo capitulo, sex ravis faminibus septo: bulbi aliarum Tulipiarum formam referunt, ex radice nigricante cortice te & i.

7. Tulipa Perfica variegata, C. B. P. Tulipa Perfica, Eyft. Swert. du Bry. Tulipa Perfica minor altera, Cluf. Cur. post; Hxc caulem protrudit pedalis longitudinis, fatis gracilem, quatuor foliis angustis praeditum, Narbonensis Tulipae foliorum latitudinem haud superantibus, non adeo tamen virentibus: caulis in summa parte florem sustinet delicatulum, Narbonensis Tulipae flore paulo maiorem, sex petalis binas uncias longis confantem, quorum terna exteriora paulo longiora & roncronata, foris quidem fuave-rubentis coloris, oris tamen albis, interne interiusque albis: tria autem interiora petala, quae breviora, mucronem habent nonnihil oris, & albis: plane fatis coloris: omnium autem unguis purpurea macula infigniti; famina

bulbi coi tex foris nigricans & fufcus, interiore parce molli, lanugiiH
r'ulca & cjuodammodoterrugineicoforisobfifa, quale hre RhododendriiveNtTM (erpiueil
auteafrancarum cortex ipfum nucleum tegens: femer co.nprelliim, membranaceum, in tripliti
luculamento, dupiiciferie in imoquoque cojitentum, fu.b*jfcum aliarumTuliparum more kit.

Ccn.fpiciuntur& bolbi in infiniaalaquarundamTuIip'irum, quart fumma tellurc nati, qui
etiam terras commilli, eiufdem coloris cum matre riorem (tibfequente anno produxei tint, &
ttiam eunclem coiozem retinenr. balbi adnati. InThracia&Cappadocia exeunt fpoir:&Ti>
quanim ing'entem copiam florentem media plane hyeme, Januario menfe, ii itinere
thrinopotitano invenj: Augerius Busbequius.

§. 2. 7' V L I P. A anguifolia feu minor.

Tulipa minor lutea Italica A. ^ © -, nobis. Tulipaminorlutealralica, C. B P. Tulip
Apennines, Cluf. Hiit. Hzc pedalcem vel etiamlongiorem fert caolem, ia binos vel tenios
ramos divifam, quibns fingulisfinguli infident Hores, fenis petalis confantes, foris ffbvire-
iceiuibus, intus flavis, fuccedente capite trigoho, oblongiufculo^ fios valde odoratus Lea-
coii HaviiuavcotentiaTn referens, fuperiwibusTulipir. rftags expanditur, 5f kv a meridie
fub vefperam duntaxat* folia habet aliarumTuliparum foliis anguftiora; g'iam nonnihi] cari-
nata, liibdneracei cum caule coloris, ccrsa, quaterna : femer duplici leriein fingulis Tocu-
lamenti pafeaceum, ruftum uc in reliquis Tulipis, fed longe minus: radix bulbofa, fpadicco
corticetefla, inbinas autpluresfoboles fingulis annisdividitur, non-in alcum recta mergit:
flore c cumferocinis, auc panloetiam terms. Nafciturpiurimain Apemiino monte, undeeru-
tammemiiiiicCar.Clulius, & mi flam ad ipfnni Bononia ante multos nntioa a clariffimo viro
Vlijfe Aldr&vandu Bononienfi profefibre, & omnium naturaliumrerum Scriptore ioltrtidimo.
F.icilius cxtris videtur multptlctari, nee facile perire.

9. *Tulipa minor UfcGallica*, C. B, F. minor Narbonenfis, Dod. Haec priori p^ne elt
fimilis; eftenim hui^Bs unicnluteus/tnis petalis confans, ad Liliafplideli lutei iorem
fereaccedens, ftiiminuifluteis totidem e medio natis una cumftilotriiulcoejufdemcoi oris :
bulbus exilt nucleum oblongum Allii aquat, fibique faepius adnatumalium exili quoque filo
^dnexum bnbet: folia pauca, angttfb ieu porracea, cauli per intervalla adhacrentia: Hores<de-
licatius quiddam fpinnt: radix eriam e tenuibus nervis in latera foboles feu bulbillos fpargir-
E Cebennis frontibus a *Matthia de LoM-pnmam* cruta radix, & amicis in Belgium miffii; minor
taoieneit priore inomnibtis: floresforis magis virentfs, incus fiavi, deliaitius (piranc.

Nee omnes verficolores, tarn praecoces, quam ferotinas, fingulis aim is eandem coloris
gratiamretinentjledalcerQisfcpius variant, .ut flavaevaria;& alba; variae Tino interdum anno
calididiilimiiunt, fequenti vix aliuscolftrquam rlvavus, velalbusconfpiciiir; iicrubtE varia; &
purpurese vans rionniifiquam magnas oras ti;ivas&albas liabent, (equente valde exiguas. In
lummaranca eft in Tulipis colorum variptas, ica utfnigulis an ni sad hut tialcantur quibus pares
liunquam conipectae: itaDeus optimus in ipfis Hoi ibusadmirnabilem luampoteftauem oftendir
(ficutex pra'diaisexCluflo, LobeIio, Camerario, Horto E^tettcofi, Cafp. & Johannis Baulijm'
noftraque propria obfo'vation adduftis> colligere eft) at intmtrum ter cenrum fuperare
deprtlienium fir. Sic in Florelegiis Swertzii, du Bry, iteniquc Pafari, arque ex cnumeracione
Cafpari Baahini a pag. 57. ad paginam 64. & Joliannis Bauhini a pag. 6^3. ufque ad pag. 678.
item Clufii a pag. 138. ufque ad pag. 15'.

Hie lurtf quos de Tuliparum variecatecomraentari imjirifenriarum libuit: nee mefngit quin
phiitEajixditfcTentix.tQtiipodciu:, qnamadhnc ab omnibus tam doftis Autlioribus^
nidoftisfloritis, nominaadarbicriuniprimi imponentisafiignata fervantibus, tradita; funt
ciinejue non dubirem, ijuiu >d cmmiecatas clafles tantjuam primarias reduciatq-, coir>^
fubillispofll-cxiitmem. Sicinquam admirabilem fuamin iftis, diverfis floribus pi
poceftatem oftenditDeus.

TEMPERAMENTQM & VIRES.

Dvuiribui isr fatultaiibut Tufty*nihiladbucaquoquamdnftoBotanico compertwr.**Anteo fanus*
"quidam mercator cum horuw hulborum non exiguum mtmmtm ab amico curs byffinispannk Con-
Jlant'mopoH (ibimiflum acctfifet, Cepas effg txiftinam ex illk aliquot vulgarism Cifaruni
vwdo in coptMv. \>arari \uffu: reliquas radices in borto inter Brafficas & rdiqua okracta dej
in manjatis dtdit. Johanna Mutter Phtrmacopwin Viennenfis jnultos Tulip<£ bulbos conattiW
radicum

*rhidicum Orchidum inftar quibus lo'ngefuaviores isrpalatogratiore deprehendebat Car. Clufit H^an
 •ucro idj > r < eftarent quod Satyr iq tribitur, mndum intelkxit. Ventrem replere certum est, ut haufimws
 ^a quib' ufdam militibus qui inflan friq flipendia facizbant, & mere at or is fat is divitit hortixm ra~
 rioribus per amcenorum omnis genek colorum Tulip'ps refer turn confpicientes. fame obfti, omnes
 bulbos erutos Crejeclis rarioribus w fat is magni pretii floribus, una cum caulibus barbilla quej
 is^l lavatos cum que butyro frifos avide comedere: fercula efurientibus fat h grata, at nimk car a
 mercateri, qui maluijjet ipfis aliquot plauftra Cepis onerataporrexijfejmoprandium multo gratius
 C°pis ipfis optafet & comparafiet loco fuarum Tuliparum rariorum: fed quid dicendum ^ nifi quod
 miiuibus ^ ficuti y * alii * ^ omnium condimentorum fame optimum; funt enim Tulips mea opinicne
 porch Jyfuibu*, ft cut isbulbi filveftres ^ alUque radices tuberofa plurimk, fercula digna.*

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS.

radicibus fquama duplici ^ dmodum denfa praeditis.

D I S T R I B U . T I O IV.

Fritillaria feu Meleagris feu Gaviana, potius Lilium,

fquama duplici admodum denfa, is^l flore pendente pr<zditum.

C A T V T XIX.

F R I T I L A R I A.

FRI TIL L A R I A, ab abaco in quo Scacorum lufus excercetur, *yūTm* Fritillum did exfii-
 mant, nomm habet: aliis Meleagr' vs à Meleagridk avh plumis, qua* ft non color' Isfpecie?
 tamen varkiate & difpofitione ^ isr macularum magnitudine refert.

Fritillaria ipio nota generica hanc habet, qua' a carteris, praxipue Tulipa, differt, quod radi-
 cem ex duobus tuberibus feu fquamis admodum denfis conflata'm habeat, & florem fex petalis
 confantem, fed dependentem, non ereftum; deinde folia angufta & quafi graminea; caulem
 tenuiorem multo Tulip' Convenit cum Tulipa & LiUo, quod capfulam feminalem, ternis lo-
 culamentis diftinfam, atque in unoquoque duplicem feriem feminum compreflorum mem-
 branaceorum fubruffim, producat, ficut Tulipa & Lilium; ergo à radice & pofiru florum
 junfli tenuitate foliorum & caulis, à Tulipa radice bulbacea proprie difta prxdita, & Lilio ra-
 dice fquamata donato, facile diftinguitur Fritillaria. Fritillaria à colore floris eft variegata
 faturate aut dilute, vel flore albo, vel luteo, vel flavo-yiridi, vel fufco aut fubnigro: à foliis eft
 vel latifolia, vel anguftifolia: à tempore florendi, veleft pra!CQX, velferotina. Fritillaria no-
 men neque Latinum eft, neque ab ullo veterum elegantium fcriptorum ufurpatum, fed non ita
 pridem fitum à nelcioquo plantarum rariorum culcore, qui cum florem hunc plurimis figuris ad-
 inftar quadratarum areolarum, obfeure purpurafcentibus pingi obfervaret, effigie Tabula: illius
 inquoludus Scachorum ludi folet, putaretque eam Tabulam Antiquis Fritillum fuiffe diftam
 ccepit, dufta exinde fimilitudine, hunc florem appellare Fritillariam. At non parum fuit voce
 abufus; Antiquis Fritillus non erat Tabula quadratis hujufmodi areolis interpunftata/ed vafcu-
 lum quoddam in quod primum indebantur teflerx feu aleas, ubi aliquamdiu agitatae, poft mit-
 tēLantur in alveolum, diftufque fuit fritillus, non à colore aut punftis variegatis, fed vel à fono
 quem in eo jafatas teflerx aut aleae faciunt, vel quia per eum teffera feruntur, Martialis fie ait'

*Dum blanda vagus alea December
 Incertis fonat bine isr Mine Fritillis.*

Sic aestimare licet quam ftabili fundamento plantae huic nomenclatura Fritillaria? adferibitur,
 non à Latinis foiuni, fed & Germanis jttfittillatn & corrupte <f luttUarn- Alii malunt nominare
 Meleagridem, ab alitibusejus nominis (funtperdices Africans, veLGalinse Maursde quibus
 Ariftoteles lib. Hift. c. 2. Plin. 1. io. c. 26. Varro l. 3. Columela '•⁸-^c-²-) quarum non fo-
 jlcnj plumas (ut vult author hujus indicationis) macularum magnitudine & varietate iiofcuhrs
 reprxfentat, quamvis ncn eadem coloris fpecie, fed etiam ova, fimilibns pi&uris variegata tefte

Ariftotele ^/J^* W ju» Ks«evw"»* ^ m™ JWAMI^W %<pw>w». Csetemm cum Meier • ovamaculofa his regionibus feu profus ignota, feu "mfr^quemia admodum fitir, illoi nobis die poterunt ovaGavearum; ea enimova punftis flw, luridis ad vivum exprimir :,,, fioris hujus purpurafcentis; itaque non proculhallucinabyiur, inquit Lorembergms, fi Latine dixerimus tioremGavi3num,fiveGavbfiam. Utocfit.dciiminatioadajquata & fingulispe- ciebus hujns generis conveniens, &magis apta eftohasc nobis; Lilhrm radice fqirama duplice denfaadmodnm, fermibtreduplici&florepropendente pneditamefit. Hoc iumen omr" Fritillariis cujufennque colons autmagnitudinisconvenic; at Fritillaria Meleagris !• Fritillariismaculatisrloribustantum donaris convemc.

T A B U L A XVIII. Seftionis quarts.

Fritillaria	{	Variegata	ri. Purpurea, C. B. P. ftilillarh dilution Cluf.Hift. Meleagris,
			Br*cox ^ Dod. o
			(i.Alba, CB.P. fritHlarkalba,Chf.HiJl. Q
			Serotina atropurpurca, C. B. P. FritilfarhfantrJltior, Cluf.Hift,
			Mekagrii alters Dod. ©
			^Angvftifoialuteavariegatamagnofiore, CB.P. FritMaria^uncifolia,
			Eji Meltagrk, flos. maximum italkm-, Eyft, a
			5. Flore magno p kno^ CB.P. Fritillariaforepleno^Eyft.Q
			6.Flavor/inJisPvlyanthas, CB.P. Fritillariapolyamboslutea, Eji/l. Fritillaria triceps colore ftavo-viridi, du Bry. O
			7. Smtina fioribu* exfiavovirentibts^CB.P. Fritillaria Aquitanica, C/iif. Hi/}.
			Fritillaria Aqaitoinica fore luteo obfcuro, Swert. 0
			8. Pofy^ips non defytipta, Swert. 0

Explkatk Tab. decimaoRav* SeStionis quarts.

1. **F**iffitiUarid pricox parpureavariegata, CB.P. Mekagris, Uod. Fritillaria dilutior, Clui.Hift. 6t Pan. cui&Liiium variegatum vulgo. Fritillaria, Eyft. Friullaria vu!^ris purpureoflore, Swert. Mekagris tlos, Lugd. Gavana vulgaris Lort-mberg. Venuttiflima liaxplanta pedali eftcaule, interdttimatore, rotando, tenui, loris & viridi purpuiafcente & obfoletiore colore, incusvero utTuliparum fungofo: quina pkrumque habetfolia, inrcrdum ct'iampluta, inconditoetiam ordine ptr caak-m iparfa, angufta, carinata, palmaris lon^itu- dinisfii majoris, fuptrionbus exceptis qnx breviora funt, caiik viridiora Si Narboncnfis vclHifpanicx Tulip* tbiis tiurraacolorcqiic proxima; Hos in iummo cauk fpxillime unica, (interdum bini, taro terni, omnes nacem.eodem ccmport te apciltiites) nonnutiquam gemt- |B8, inodorus, lempcrdeorrumfpeftana, feu propendrtiatintnnabnliroodo,fcxpetali8 Cor ftans utplurimum (habni oftonis am duodenisdonatasinquitClufius) qua- arcolis quiliuf dam quadratis nunc oblongiucnJis , partim candidi, partim purpurei five fatnraioria fivi carnei coloris^tkgantiilimoordinepokherrimaqiil' 6rie diftinfia (bncqaadrb tamen ad latet minoribuspr3fdita,eaq;interiore pane funt vcgttiora,variicoloribiis pitta candicantiaqutqu; pane inh2Erent, ut roiarum petala ,ungues habent^ a quorum infiroa (cde virtfctns qujed im & l.crbidicoJQrislinea ad medium ulque pttatam dnfta vidttur: lex ibmina medium rlorenioc «P^5v<<jw>rnn>.apicesprinium pallidi,dcinde ubi obvcrfi Tunt Havi &i nyafi pulverc ciuodan co.iipt.fi qnal. font onmium tere horum riorum npiccs) CIUJ Mum trifukum five tricrfwUr utinpkrifquealusflonbus, arnbiunt; triangularcdandt; ftjcredjt capat unciam - longum,fupernaparte craffius& fine corona, alioquin Narboncnfis Tulipa: caoi quo femijiumplanorum, comprcfiorum, membranaccorum dupkx (cries obftvart- ternorum loculamentorum feu cellularum quus conltanter cemunnir tres hie ficut in onmlbu nUtis in hac Srphone contentis ;• ied femina Imjus prrdife Tulip* Narbonenfi • lemin quafi germen contpuc: iur: radix bulbofa, cand.da, loi.da, nulhs twicis lepta, (td veluci in Lni fquamas denfas, kubinatuberafeaa, ecujus medioprotuberaciiHlviimjqmdam.uiidecaulis emergit iciiili pjitemultis nbnsdonata.

i.Frinllaua 3lb3parcox, CB.P, Fritillaria alba, Claf. Ap. alien & Auflar. Hujus floj

• ilbus, alterius flos fbris albus interne vciis quibuldum purpmafcntibus diftinctus; ec Swertzio Fritilliarioralbo, • Floret eodemtempore cum prima, atque florem fert album, neitiquam in 3 Eterjparcibusd priadi fert. Floret iiquam cum prscoci- bus Tulip'15, incerdum etiam Maitio & Aprili in iortis cultis. ffonte provenit in quibufdam irisd Lrgerewflumen, nonprocnr/K^/w urbe Galliccelebri; nafci etiam perhibetur in uftria leu Normannia, & Britannia minore. In quibufdam etiam pratis quadriduano itinere 'm Fainonijc, ab iis qui Conftantinopoli icdibanc, menfe Marrio florens obfervata • filvis ciduis non procula caftro difto C/wjMwe</quarEo a Blsfntium capite topide,

ii. nofe Horencem oftendimns.

friti lia atropurpurea, C. b. 1^j. Fricillaria fatnrator, Cluf. Fan. Mcleagris alcera, Dod. Friti. ... alcera Xantoflica, Lob. Ad. Fajt. 2. Flos hujas coivcnit cum prioris More, rti quofl quadras fint maltofatt Bati BSHgrfejxceraconvcnit, &rlorct' terius.

3. *Fritillaria* anguftifolia lutea variegata magnoflorc, C. B-P, *Fritillaria* juncifolm, Eyil. Hujus caulis aitolicurere & tis, glaber, cui adlrerent rarodifpofita folia, tenuia, jtincea: bulbo confat deprcfTo, rotundo, ex duabus fquamis denfis, fimul coliacrentibus & caulem ampiexanribns! florem habet fcX' pcalorom fiinspro conflantom, luteom, rubicundisquadris variegatonj, cum ftatnrralis arqueapice fequelurcis. Hue refer Fritilbriam anguftifoiiam lutcam, variegat 3m, parvoflore, C. B. P. pi. XII. & Fnrilariani Pyreiaeam obiblctoluteo colore, Eyft. pl. XIII. C. B. P.

4. *Fritillaria* Meleagris fios maximus Icalicus, Eyft. *Fritillaria*; hæc fpecies cum flore gemello propendente, colore obfoleto purpurafcente, cefiillis fegmentato, iatra quaterna: fiplta angufta infummitate pediculi iim difrula: flos ferotmus maximus didus eft Italicus.- cau- I?mvirideni, obfcure purpurafcentem, folia carinata, alternatim oppofita ambiunt, faturatevi- rencia, quem quidem pro cradicem tocum circumvel Vmnt: hunc excipit radix duplici fqua- madcnla fuperius" fcrius deprcfTa, crinita denf]sfjbris & capillamenti 3, colore fuavi.

S Fritillaria gno pleno, C. B. I^j, tritibna rlore pleno, C. B. Eyft. *Quamvis* mi- norc etufdep- rffort WE di radice & folijs; iadice m b i a i a c s d n y o l u c r i s o b d u f t J , inordina^r jrdinc expanfts, virefben^bos^'ria Haria hate oriatur. Floret menfe Martio pleno ureo, decufatis lcuris five nocis quadratis, purpurcis: nutat flos ficut & alii pr- lonam apicibits luteo colore pi^fs.

(ftrwpolyancrios flavo-viridiis, C. B. V. *Fritillaria* polyanchos lurca, Eyft. *Fritillaria* L j colore flavo-viridi du Bry. Hec ex omni parte laccior prodit pluribus florloaa nntantibus in ("umniocaulis fastigio, qui virentes hitei fimt; in ois reflex, undiqtielitiiris ob- fcarerubentibus/iirdemqac quadratis oblongiulculis diftinfti: caulem gerit craffiorem, quem quaterna tbtia, certls intervallis diflita, ambiuntherbefcentia: radice confat rotunda, binia Iqaamis admodnm denfis, fui tubertbus duobus albis fimul conjunftis conflata, ex quorum gremio veluti ex pulvino exit caulis, ternos Mores umbc Uatini gerens, atque ex riorum fingulorum pediculis fingula exeunt folia, longiufcula, angufta. Hue refer Fricillariam ramofam, C. B. P. pi. H. & *Fritillariam* umbtlliltram, C. B. F. pi. IV.

7. *fritillaria* fcrotina Horibusex flavo virentibus, C. B. P. *Fritillaria* Aquiwica, Cluf. Sift. illaiut Aquitannica rlorc ltiteo obfeuro, Swert *Fritillaria* minor oblolcco colore, Eyft, c *Fritillaria*: I'pccics niagis pridiftis fcrotina eft, menfe enim port pi imam fiorct: Jim's ifvforiuitur floribus, parte interiore ex flavo virentibus fine ulla coloum diftinfctio; nervns extnberaos & eminentior ex obfcuro viret, petalorum aix nonniliil reHcxar verifes fimt ex flavo vi rente & purpneo. Ex Aqjiitania origintm due it. Florcm inquam han- nm, fex petalis tit in prxcoce prima conftantem, quorum extremi ora; noi^aihilre- dorfi nervus panluluTp entuberat atque virefcit, interiora tecna petala txtcn !' L, omnia autem execrius ab imo petaload extrcmas oras obbletE purpun radii?, nihil flaviconfpiceretur, diftinguuntur/mterins verficoloze ex viridi Havefcenre co- ndente pradita funt, veluti fericcus pannus viridis cujus fubtegmen flavum fit: itsihnniue xumbilicoprodeunt pallidis apicibus obfita, alia aliis longiora: capfolam femi- nakm habet longam, triangularem, tribus loculamentis cellnlifve diiHnaam, atque in unaqia- que ct-llula duplex ordofeminum continetur, utin reliquis pradiilis.

^*Fritillaria* polyanthos nondefcripta, Swert. Hujus folia funt angufta, denfe caoleai Implcxantia infar Liliij Perfici: canlcmpedalcmnaba, incujuscymis feu fummis faltigiis drodennt plures flores ex fingnlis geniculis, arropurpurei, minores, propendentes rintinnabuli am noli infar, fex petalis covdatis conftantes: capfulx ftminalcs & icmina cxttfrifaxfortia

repondent. Floret ferius carteris. Hue refer Fritillar iam minimum pluribus, floribus, C/3. P*. pi.XIV. An apudrecentiores medicum in ufum veniat fritilla'ia, ClufiumcV nos in^t, o'lj florum tamen elegantiam & venuftatem expeti & diligenter injaortis coli exiftimamus.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS,

radicibus fquamatis donatis, quas funt,

Lilium Perficum, Corona imperialis, Lilium floribus reflexis
feu Martagon, Lilium floribus erectis.

C A T V T XX.

L I L I U M.

LILIV M, *t»<» & ^P^{10V} Græcè Theophr. 6. Hift. 6. Liliū florn variare dixit ispurpureum e/k, fingulis caulibusj aliā unum, aliā plures. Viofcorides 1. 3. c. 116. duo genera agnovife videtur, dum fcribit, iff rubra Lilia efe. At Plinio I. 21. c. 5. Lilium triplex, albumjubens, purpureum, quod aliquando fit geminocaule, quod Narcifum vncitent.

Nos dividimus Lilium in Lilium floribus propendentibus praditum, idque vel plani?petalis (ut funt Lilium Perficum, 6c Corona imperialis) & Lilium floribus reflexis^ quod dicitur Hemorocallis feu Martagon: vel in Lilium floribus erectis, quod est aut album aut rubrum. Liliū ergo notagenerica, ut accipitur hoc in loco, est producere radicem fquamatam (ideft, finguli ripces confiant fquamis imbricatim fubiinvicem incumbentibus,) atque hanc nota diftinguitur præcipue à Lilionarcifib feu Tulipa radice bulbosa proprie dicta donata, & à Lilio radice duplici fquamata, denfa admodum, ku tubere duplici dotata, Fritillaria fcilicet feu Meleagride; conveniunt autem omnia hxc Lilia quod lint plantæ hexapetalæ, radices fquamatas edentes capfulas tribus loculamentis diftintas, atque in fingulis loculamentis duplex feriet feminum compreffbrum, membranaceorum & fubruffbrum contineatur. Diffræntiæ à plantarum partibus defumptæ, multæ funt, quæ rei herbarix ftudiofis maxime cognitu funt neceffariæ, imo aradicum diverfa fru&u'ra variæ petuntur, quas diligenter Theophrastus explicavit, de quibus omnibus hic non agimus, fed de Hexapetalis tricapsularibus, radicibus diverfo modo conftructis donatis, quo nomine turn eas plantas intelligimus, quæ ex multis capitulis cohærentibus radices coagmentatas habent, quæ capitate appellantur, funtque tuberosæ, longæ, fufiformes, rotunda, oblongæ, & tunicatæ feu bulbis proprie didis confantes, quæ bulbaceas feu bulbosæ dicuntur plantæ proprie loquendo, vel denique fquamatæ feu fquamatæ, has plurimis fquamis fepe invicem imbricatim contigentibus & operientibus conftant; radiculæ quæ matribus adherent, eafdemque aliquando circumftant, dicuntur nuclei (eu foboles, quæ non folum radicibus matribus in terra latentibus adherent, fed & quæ ingeniculis cauiiūm; eorumve fummis fastigiis aliquando cernuntur. Græcis dicuntur Gelges, Aglithes, Aglidia grana' ficut in Allio, Moly, Ornithogalo, Tulipa & Lilio bulbifero. Lilium Græcis^im dicitur, & \u_f>ov, \u_f>ov, & x^V s Latinis Lilium, & Junoni/Rofa; Lilium album officinis. ~~Asp~~ tamen fientificæ blumam, inave ex concipitur, non Lilium unum dicitur, fed plures alios venientes flores, & proboscis, bulbaceas fquamatasque herbas fignificat. Liliū genera funt varia ut apparet: es sextuplici paragrafo, à nobis allato, utque cernere licet in Tabula fequenti à nobis exhibitæ.

I HULA XIX. Scftionis quarcae.

- Lilium atrorubens, nobis. Perfuum^ Dod. Lugd. Tab. Gr. Eyfl.*
- Lilium Sufiamtm, Cluf, Hi/I. Pan. dit Bry. a*
- Vuk'dri* fubflbida autpallifms, nobis. 0
- Purpurafcem^nobh. ©
- Lutta.mbU. ©
- 2. Imperiale, Foliti ex albo iff viridi varitgath, nobis. ©
- five-Corona •\$,Multifloraisr latocattle,nrubk. Lilium^ is Tufai
- Imperialisk TIOAL(W^S, Cluf. Hi). 0
- 4. Duplici Corona, nobis. Corona imperial/* florum
- dajjedapJki.Eyft. ©
- 5. Nonfatens, C.B.P. Tufai 4" differentia, Cluf
- Hift. 0

PUnis J

Floribus pendentibus, petal-

exts

Martagott diShm

T A B . Xk.

- 6. Monianum majm, nobis. Martagyn hnptria, Eyjl. ©
- 7. Rubrum punstatum is non punfld-rltm, nobis. Lilium Martagon foliis re/lexis rubrfe pundatmn is non punflatum, Eyfl. Q
- 8. Album punclalttm iff non punclaltum, nobis. Lilium foliis reflexis pundatum iff nonpundatum, Eyfl. O
- q. Canadense majm lutco maculit ftr-purcii ? rato, no m. Liltum Cana-(krife flort iutto tummaculh purpurek^ That. TlorfParifti. O
- 10. Purpurofanguineum, nobis. LHi-umpurpurofanguineum flort re/Zexo, C.B.P. HermoTccalHs aj/era, Matth. Lugd. 0
- 11. Pomponii, Eyft. Cluf. App. alt. & Cur. p.
- 12. Flavum, nobis. Lilium fljvum angustifolium, C. B. P. Lilium won* tanum flort liueo punflatum iff non pwflatum, JLyfl. ©

Latifolium

Angulifolium <

T A B . XXI.

- 13. Valgare odoratum, } Simplicibus, nobis. ©
- } Plenis, nobis. ©
- Album. 14. Bizantinum, iff Suhan Sambachfw Martago Constantino-politanum, Cluf. Hift. Pan. Eyft. ©
- i^ Canadense imularibta multis a Ibis, nobis. O Hk
- 16. hdkum pumceumgeinino lathre folio, nobis. Narcifla> ahui puniceus gemino latiore folio, Bapt. Fen. ©
- Purpureum } Purpureum^jj^ppimijusMod.Lob.Q
- } croceum < 18. Mimv.nobis. Liliumpurpureummwus, Dod. Ad. Lob. ©
- Etbutfiferum } 19. Majut latffoliuin, nobis. Lilium vntntvm bulbafgms, Martagon bulbifntm 1. Cluf. Hi, Lilium bulbiferum TCfi-ns floribus muho croco tint' ts, J. B. Clab.* ©
- [20. Minus, nobis. Liliumpinptrairny. Lod. ©

Album.

Purpureum

Etbutfiferum

§. I. LILIVM F-ELSIIVM.

Explicatio Tab. dech/itetioThe SeEni,nis \uart£-

Lilium Perficum, Dod. Lugd. Tab. Ger. Swert. Eyft. Liliuiu Sufianum, Cluf. Hift. & Pan. duBry. Eodem nomine inter alias radices squamatas Conftantinopoli mitiu fait hujus plantsquam. 3 radix, attero, inquit Clufius, poft meum Viennam ad venuti. cum tamencaerisci Tet candidior & niukovirulento odore pridka, leorfum terra: cor••mitetbam diverfam a Tufai fen Corona imperial! effe ratus; nee mea opinione falſis fun, nam Jiovoſubſequentem Vere mature admodum germinare cepek, candemque caulempotalit cubiralem, rotundum, nmlts circumſeptum foHis digitalis longitudinis & c hitudinis., longe Tufai Horibus anguſtioribus, illisre Imiltbus; qua; in fummo ipſius capite naſcuntur, vireſcentis ex cineraceo coloris five aeru^nixnei coloris, qualis in Tulipfrullis conſpicitur; contorquencur vero ilia & buxei ſuſq odoris: flores ha bet ſex petalis conſtantes (quorum ſingula petala deliquitium in medio patfuntur) foris porpori valde obſolctx colore praeditos, inter ins panlodilutiores, inodoros, - quorum unguetſj bvireſcunt: cſumbilicofcxiniqrſalia ſtaminulaprodeunc, purpureis apicibus primum conſpicua, qni obverſi flavopoline conſperſi apparent, triade in delongiora I bminulacoeunt ſtilum qnc medium fiorcm occupantem armulantur; ſubſequuta deinde triangula capita, five ſex angulis protuberantibus donata, quorum ſinguli biuis alis funt prsditi, Tufai capkibus fere familia, ſed minora & breviora, femine Tufai etiam ſimili, comprclTb, membtanaceo, paululum tamcſi breviora, pk-na: radix magna eſt, Tufai radrci pſcne aequalis, e paucis fcd magjiis ſquamis comexta, caudicantibqſ camen & 3 liquantula. il longionbus, multoque, ut jam dixi, cetro aut gravi odore nares l'erietue pra'dica Ploret Apriti: femene juſmat'iirum cum Tufai femine, aut paulo poſt: caulcs in (ummo r'aitigio vicenis, tnce«s, aut plunbus iioribus pendentibus onerantur. Primo Sufis Conſtantinopo[imallataeſth Myadix, ac que haece ad em de C3 ufa Lilium S[ifianun' dicitur, & Italiceſ/or ſtrfiano^ & PanackioPtr Jiatio. Ue hac etiam planta ſcribebat ad Cluſiui/Alpiiontus Pancins iwando Tufai Iconem rnittebailiſis verbis, Eanachio Perfia? w tpiantabc Uiffma, i«* ifptci ede Gihoo, e Martagon Jiverfodilla Corona Imperialis: hoc ^?, Pa.naclio Perfiano elegantiſſima t l^ planta, & eſt Liliifpecies, eſt que > fartagondivcrſum a Corona Imperiali.

§. 2. L I L, I V M imperiale five Corona imperialn.

i. *Lilium* five Corona imperialist. B. P. Lob. ton. Robin. Corona imperialis J. Dod, Lugd. Tab Cam. Eyft. Tufai five L ill um Perfictum I - Chif. Hilt. Pan. & du tiry. L Sicubitali aut amiliore afliirgit Tafai feu Corona imperiali J inrerduracaole, firmo, craſſo, intuſtingolb, viridi. rotundocjuidem, fed ſtriato, miiki[4 ueliliaceis lercfoliis, nui Kaquali, modo confufo online turn ambientibſis exornato, c-legantis, viridi^ ſplendens tunc coloris; led fat idi odor is & quaſi hircint, nares quoque pncal ſerentia; idem y le deinde ca alia pedali, nonnonqoam cnbitali ſupra folia cmicat bngitudine, nudus & ſine foliſis, neque ſtrriarius aut vi: idis, ſei laev is & purpurulcentiſcoloris; quitamen fummo tocidem pxne in yiigulos definit qtiot iiores luſlinec, ſiemp binos, ternos, qnaternos, quinos, fenos aut plures, omrtes quaſi aequaliter, ſed conTarioſitimaſcentes, ſinguloſque inter bina folia, inferioribus longe minora & anguſtiora, acquali ſtrelongitudine propeiidenteselegantiflimoſpeaculo; ſupra flores caulidenuo attollitur ddrantalf .iiiuniajore amplitudine, foliis cxilibus & anguſtis onuſtus; nomiunt juani ſupra Horſi-nallus tauliculus cminet, ied conferta anguſtorum toliomm coma; interdum etiam m alti nſti font ſupra flores, non unicus cauliculus five ramulus, ſed bitii, terni, s"t plur, luis kidem fioribus ſinguii onerati. Cum flores primtim enimpunt, inter folia hit candicantefqac funt, dcinde paulatim incrementum funtint, una etiam ſuccreſcente e3 paitecaulis (quſilloſluilinct) nuda: riorum veropedicuh* in angmento deorfum inlcci & ipſi flores pallefccre inctpiant, vcnitamcſi purpureis ſecundum pecalorum (quifenafiu, lata, & per extremum mncronata) longitudinem & latera excurruntibus, ungue autem ſingulor'.m peEalorunonnihi Uons eminenteſf ex nigro ptirpurafcente. Flos jam abſolutus & nrriturus expindit UF, tintini abulini odore dependens, aurci malt five citrei coloris, ſed palli-lioris, veniſillis purpurcis lummam vsuſt-jtem ad ſcra Eibus: ſingula floiſis petala interna P[ci]ntpfu. ſinguiſ, ſinguloribus tgerbercidis candid' s prad ta funt, qua- meridiano cciam Ible Imipicliſſimam dulcemque aquam exilliant lacrymiani Ti in niorem, ur untones propndentes vidcantur, ſed abundantius pulviali remporc; ea dcii. de iiberacula marceſcentibus

•.JH^UO in albas lacunas ab«int: ex medioilore (ex candida framina cum pallefcntibusapi-
"ib; - nrominent, breviorc cif doftilejinterea latitante. Floribus kit i I cent! bus luccedunt ear-
rn! tnbusloculamentis dilrinaa, itfquonimfinguis duplex frriesantordioeminmcompref-
loram, membranaceoram, latit: cifariula exterius fexangulofismembranis cingitur, TitinLi-
liis qaa? Martagonis nomine .nfignftntur, qaarum fitlgnk roembranKotrinque. PinoatE font
feaalatse, magna Dei omnium rerum condicoris providentia, ne dehifcentibus illis feniina
ante matU'itatem exciderent. Simt omnium Lil/ontmfemina cartilaginea, comprciTa, oblon-
2a U rotunda fubrutta, dnplici ferie infingnlts cellalis angulofisdigefta, quemadmodum in
omnibt'S Liliifpeciebus, & Tulipis Fritillariilque, Liliis congeneribus planris a capfulis & fe-
minibua eornmqpe pofitione: radix paucis, magnis, craflis, fnccalentic fqaamis compactis
(tnefninibinas & ampliuslibras pendentes, inquit Clufius, mcniiile) colore interdum albo,
nonnuhquamptirpur^cente, plernmqne autem pallido, Sf fectido admodum odore, hircom-
queuti rolia olere videtur.

lift & v'arietas altera flore rubctcentc, aut landaracae fandycfve colorem reterens, initar altaci
elixi chelanim lere: fex ctiam latis & mucrohatis petalis confat ejuftem ilos, unguibuique ex
purpura nigricantibus, cumfuis interiorc yuc", tuberculislimpidum rorem ftillantibns; lui-
jus Hofmagia venuftis fuperiois flore apparpt.

Eft & alrera varietas lioribus propendentibus luteis, in caeteris cum vulgar! conveniens.

Lilium five Corona imperialis r' mofe, C. D. P. *Lilium* imperiale Ten Tufai ft^aviS^, Cluf.
Hift. Hujus caulismduos ramos finditur aquali longitudine excrefcetes, fingnos imdenis
loribus onuftos, magna etiam iufa fupereos foliorum coma: aliquando comae adem eminens
in faramitate multifida cernitur¹.

Liliitm imperiale feu Corona imperialis foliis variegatis, nobis. *Use* eft tantum Corona im-
perialis vulgaris, cujus folia ftriis partim viridibus, partim albis, obducuntur a calce radicibus
lubftraca; hoc obfervatur in Tuliparum, Colchicorum, Liliorum alborum, aliarumque bulbace-
arum foliis, modo pra^tiSo, ctiam in friticibus, & fubfruticibus: habet Mfcro morbo inhxence
fpecici <UA: ipib affiritur, five force fortuna id contingat, live arte ffar, uti monuimus ?ix~
hid. Botanicoru-.iidftrorum pag. 277.

a, *Lifi'*-n imperiale iVu Corona imperialis mltiflora & lato canle, C. B. P. Corona im-
perialis pM)anthos, Eyft. Tufai five *Lilium* Perlicnnj 3. & Tullii mAwar>», Cluf. Hift. & Pan.
u«» Corona imperialis obfervata fut quinquagenisoV pluribus rioribus onofta, aliquando flo-
rcs lulerunc, pianos latofque 6f valdefrictatos habuifle canles animadvertcre poterit quilibet
penes quern'fit in hortofuo; atque primo anno fequentead ingenium rediifle, hoc eft, cau-
lem rotundum ternis, qaacernis, quinis, feptenifi autoftonis rioribus pradtum habuiffe.

4. *Lii* W five Corona imperialis doplici Corona, C. B. P. Corona imperialis florum tlaftle
duplici, Eyft. Hare Corona imperiaba caulem fupra illam riorum icaliter propendentium
fcritm dodrantali longitudine attollit, & aliam riorum feiem fea ordinem geftae, aliquan-
do etiam tertiam, actumdemum toliurum [uper eminentem mimcriim: eas vero ftripes uni-
enm florum ordinem lubfequentibus annis plwojppque fcre oblei vavirmis. Hoc 3b a-cjee ac
•vigore radios provenire cenfemtis, ut pecaUaris non CK fpecies aeffimanda ^{led n:} Ltnrxlnxu-
raris quidam duncanai lui^ icet aliquando pej aliquot annos duplicem florum fenem
geftare cernatur.

5. *Lilium* im peri ale feu Corona imperialis non fortena, C. B. P. Tufai 4' differentia, Cluf.
Hift. Hujus Doris color proxime accedic ad fecundum; anguftiora ramen liabet folia, illa-
ape & r"dicem nullo tetro odore, quantum quidem natibos percipi poflit, pridita. Floret
^-.ii, interdum etiam Martio fi aeris temperies paulocalidior, floret aliquando cum TiiJ-
pia prxcocibus, atque etiam mataritis; femenjuno & Julio maturum eft.

HALLCICATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Auditorum.

Lilium imperiale feu Corona imperialis: v'tiofe piHura radictm tubrefam cum plurimjibriundi-
appingiiir radix tuberoj'a is fUida qhtemanantibus: at in Diferibtioaffqaamoptm a(-
huic planta cterifqut authnribus ipfos i mi tan- fi&nat ci radutm, refitji'i bulbofa m til totft riptione,
Tib^lumconii^ pw, mt%onn, craj/h, furtuten- etiam fitmmts quot quot jam prater Bejkrum in
ra f^'ufmxfst integmtib utjt viiitre ejkx ftttffia Haue Eyjtetren/r tubrojh pingt.m hgura.
& in ifiont ipfrns radius. Chips^{vero adhibuit in}

§.3. *L I L I V M floribus repx'n^-'.u. 2 7 latifolium.*

Lilium hoc cotivenit cum carteris praecedentibus, scilicet Imperico & Corona imperi; quod flores prodiacaciam pendentes; fed differt ab illis, quia radices pluribus luan mucronatis denfe, tegularum in te&is idificiorum fibiinvicem incumbentium infar, conftruft ha beat, cum *Lilium* Impericum & Corona imperialis squamis rarius difpofitas gerant: f' id ettatnfi Hores producat penden.es, nontamen planis petalis, fed reflexis feu retortis' edit. Eftque adifpofitione foliorum > vellatitbliim, id eft, foliis lacis per vize cim genicula caulium ambicnibus donatur; vel anguftifolium, id eft, toliis ang. ,no dinacim few fine ordine aut intercapedinibus, caulibus adlisrentibus Tconfpiciui-. riabil ratione colorum florffin, eft vel petalis rubris, luceis, aut albis; iifquelingulisaliqiiantlopur ^cis viiris uigvis noratis.

Etylkalio Tab. vigefimx Sefionis quart.*

i. Ul'mm Martagon montanum majus fio^bsc reflexis, nobis. Martagon mo.iranum majus, Ger. Imperiale, Eyft. Radice confitficquaniata, fqaamis denfe difponYis, lubhiteis, milcronatis, fibiinvicem imbricatini tncumbencibitis, ttuibus refpeftn magnittidinis plants, ex aijus gremio (iirgitcaulis pedalis & fefquipedalis, bipedalis nonnunquaniq quemperintercapedines fen intervallaqaxdam, Riibiajmodo, cinguncplurimafolia, laca, brevia, ftellacim feu rotatim ambientia caolcs ad fingula genicula, funtque Lili albi toliis baud abfamilia, verfn medium cauliftergiiora, *guftiora, & magismucersKMif. iniummo caulis taftigio inimerofus grex flonim hexapetalorum, denfe difpoficorum, apparet; quorum fingula petals hiRexa, dilute rubentia, maculis nigris notantnr: in riorum medio confpiciuntur ftaniina (ex fmbfafca &c ftilus trifulcus ejnfdemcoloris: fingulis floribus deciduis fuccedunc^- • ilxcapfulsfexangularares, tribuslocutajgspus dirtinaae, atque infingalis biniordines^ "omprefibrum, membranaceorum, flRidorum, fiibrufforuni continentur- Variatflo, acubrc nai plerariqut (iibruber, aljquando dilutns aibicaufve.

7. *Liliurn* Martagon floribus reflexis rubi is punftatum & non pun&atum, . Lili -n illo ribns reflexis alcerum lanugine hirtutum, C. D. F. Hoc foliis confhc etiam lat>. featum feu radiatim ambk-ntibus caulem perintervallafeu intercapedines, fed priori bus minus 1, in dore prioris floribus plures, faturate purpurafcentcs_T & maculis nigricant'ibus diftindt, aliw, mto dilute purpurafcentes, Stmaculis carentes. Hue refer *Lilium* floribus retixis variib ->ve tertium, C.B. P.

8. *Lilium* Martagon flore reflexo albo punftatum Sf non punftatum, Eyft. Tertium hoc genus in filvofis niontibus ad Francofurti Sepcentrionem invenum, fecundogeneri proximum, Horum tamcn colore vanum; namantcqn am explicencur, foris carnei quodammodo colons Hint, expl. can vero incus albi, & n_wtl's ^uibufdaoi puipureis infigniti. Hue refer *Lilium* H_ ribus reflexis polyanthon album punctatum C. B. P. L(V, urT1) moncanam maximum polyanthon album rubns maculisaiperfum Eyft, & *Lilium* Bizaminum mmiatnra C.B.P. Rubrnnyi miniatum Cyzantium Cluf. Hift.

y. *Lilium* Martagon Canadenfe macularum, Park. Liliinm Canadenfe flore ioteoar lis purpureis, Florae Theat. Hoc folia protrudit lata, fte JIatim ad fingula etiam genilem cingentia_T per cernas aut quaternas iHtercapedines cubitalem, e medio foliorui fupremi exeunterni, qnaterniflores, finguli longisped'tculisinuitntes, qui rabr .renipajnc adsquant, deodum pendentes, luteielegantis & dilutions colons, pet lis nigris intus notacis: e petalorum centro feu medio exeunt ftamina fexcum apici^ Hores quamvis non tam fine reflexi, uc fuperioram flores, tamen propter radke: denfe & imbricatim fere incegentibus compaaam, iufnper & propter folia lata • genicula ftellacim cingentia, aptiHime hue revocatur ad fas familiai plancas.

§.4. *L I L I V M florihtu reflexis, feu Martagon angulifolium.*

io./.(itf«ajigulrioliumpurpuro-fauguineuniflorerefiexo, iiobis. Hemerocalti Sakera, Matth. Lugd. (quam cum Lilio Zufimari eandem vult Clufius) Hemerocallis Chalcedonies purpurofar. - **gnineapo Jyantho 9, Lob.** *Lilium* hoc Chalcedonicum miniamm toe Hemerocallis admodum elegans eft Lili species ut floris decus colorifqne ilammcfnitor, utriufque cinnaberis. hativi

" ; fastirii intenfi autdiluti colo:is miniati fcintillat fplendorem; e)us duas varietates aut pidres
 ^hfor^{vare}licebit. Praecox qtinos, ^nos., denoqueutplurimum, profert flores: nonnun-
 ou;im ejus radix excrefcit & laxurJK, ut caulem edat duorum ternumve digitorum latiludi-
 nis ; ferotinum quandoque diu mulifque annis unicum florem edit, at tempore confequente
 plures, fed ferius floribus pr.mi fuperior is Martagonis elapfis huic erumpunt flores; caulis
 cubitalis, caetera non diilimilia. Liliium hoc rubrum Zufiniari, Lilium rubrum five miniatum
 Chalcedonicum, Conftantinopoli miffum, *Sultan'Zambach dichm*, ab aliis *CojonadiRe*, hoc
 eft;"Corona Regia &c. habetur prxterea Liliium Bizantinum minus faturato flore *roAtw9s, Li-
 lium'Bizantinum miniato dilutiore flore. Relatum eft confpe&as fuiffe alias hujus Lili
 Bizan-
 tini plahtas, qua; florem ferrent profus niveum, in caeteris pares. NOVO Vere foletemer-
 gere. Floret Junio &paulo ferius, Conftantinopoli Viennaro Clufio delatum; ex hortis ul-
 tra Bofj)horum in Afii fitis radices fquamatas allatas funt. Hue refer ripoffunt Liliium rubrum
 pracox i,&2.Cluf. & Liliium rubrum praecox^ anguftifolium, Cluf. Hift.

11. *Lilium* Martagon Pomponii, Cluf Cur. poft. App. alt. Liliium miniatum anguftifolium
 odorum, C. B. P. Nomen ex Italia receptum referunt, rarum in hortis borealibus tempore Clu-
 iii, quia adrtatis difficillime feffe propagat, rite ipfa planta facile femèn pnebet. Flores lucu-
 lenti, nitidiflimi, miniati coloris, necad<iodumclifcrepantã Lilio Bizantino Clufii.

12. *Lilium* Martagon flavum anguftifolium, C. B.P. Liliium montanum flore luteo pun-
 ftatum & nonpunftatum, Eyft. Hoc conftat radice fquamata rotunda, feu compa&ili fqua-
 marum ferieconflata, & quail nigro infefta, inferius prope bafin fuam craflisfibrilateralibus
 fubnixa: inde attollitur caulis binos aut aliquando ternos pedes altus, paulo fupra exortum
 fibris radicum tenuioribus radiãuivestitus, & poftmodo ufque ad faftigium fere foliis fen-
 fim gracilioribus, numerosis, circumaftus ; fumma parte fecundum ftri&a & rariora foliola pe-
 ficuli craffi fuftinentur fulcientes flavos flores, odorem florum Oxyacanthae referentes, fenis
 reflexis & contortis.feuconvolutis,craflis,petalis conftantes,totidem in medio ftaminulis (quo-
 rum apices dilute n iniati coloris funt) decoros; femina, ut aliorum hujus generis, Hemo-
 rocallidis paria, comr reffa, membra/iacea, in duplicem feriem compa&sa, in fingulis cellulis
 feu capfulis trium'oculamentorum ; nam totidem regionibus fingulacapita triangularia con-
 ftant. AltP*-ius iiores tantum frequentibus atropurpureis pundis diftinguuntur, in quibus unicè
 diverfit:s confifit a luteo fimpliciter & non punc>ato flore. Oftavo loco hujus Tab. 20.
 ^dfr"!pendum curavimus florem punftatum feu maculis notatum, qui inferviet defignandis
 &exprimendis omnibus pun&atis, rubris, luteis &albis. Siliquam Martagonis floribus re-
 flexis etiam trigonam adhibuimus, claufam & apertam, cum loculamento anteriore aperto, in
 quoapparet duplex ordo feufferies feminum comprefforum , membranaceorum.

§. 5. L I L I V M floribus ereth album.

1*3. *Lilium* album vulgare & odoratum flore erefto, nobis. Liliium album vulgare
 flore ere&o, C. B.P. Liliium album, Trag. Fuch. Lugd. Tab. Eyft. Liliium candidum,
 Ad. Lob. Dod. Liliium album vulgare, Cam.' Lilio huic candido five albo, quod pulchritudine,
 nitore &ufu reliquis praefat, folia funt oblonga, lata, carnofa, laevia, in herbaceo & diluto
 ^iore fplendentia: caules duobus cubitis altiores, multis foliis {enfim attenuatis, comofi, & in-
 ter folia emergentes .• flores patuli, albicantes, verfus fummum caulis fenis conftantes petalis
 oblongis, exterius ftriatis, totidem ftaminibus è medio emicantibus, a quibus lutei dependent
 apices cum ftilo in ipforum medio trifulco ejufdem coloris: radix ex fquamis multis fimul
 unitis crmpofita, fucco lento & glutinofo plena, quo & folia & caules redundant; "rsdix in-
 ^ r , multisquamis imbricatim fibiinvicem incumbentibus, acuminatis, atque feffili Tarte
 nris plurimis conata etc, ftoet panem in norcis junio menie, & incunte Auguftino folia
 decidunt, atque tota hyeme iterum vident : Vere caulis erumpit. Flos xps & xps (est
 tagen & Narciffoz diftus xps. ut fane monimus cap. de Narciffo) à novellis xps
 xps/ur ; à Latinis Liliium &Rofa Junonis. Appellatur aupem Rofa Junonis; quod ex ejus
 lade interrandelapfonatum feratur; dehaefabula videDodonaemcap.de Lilio. Obferva-
 vimus hoc Liliium vulgare odoratum flore pleno.

1/.*Lilium* album peregrinum floribts albis 5c foliis anguftioribus, nobis. Liliium album
 Bizantinum JWAWs & ^<///^« ^w^jc^ five Martagon Conftantinopolitanum,CIHf. Hift. Pan.
 SfEyft. duBry. Martagon album, Liliium candidum Bizantinum, Lob. Icon. , Hoc folia Lilio
 vulgari albo prorius familia prodiicit, odorem habet ejufdem, & nihil aliud eft.quam Lili
 albi

albifpecies, vulgari Lilioalbo proxima; flores albos maxime
vulgari non bicolors, a diligentius observantibus agrarum
septemprehenduntur: ipsi quoque flores paulo minoribus
lilio albi veroradices in tantam molem excrescunt, m
potest, ita ut una illarum 60. flores in caule piano, tres
tem vixente fenestris (tibitque ad ingenium rediit, ficu-
natis ludere fecit: flores inquam in eximo caule plerumque contertim nascuntur.

L 5, *Lilium* Canadense impetentis floribus sive irregularibus multis albis, nobis, Haec Lilio
Canadensis species rara, non flores fixis petalis contantes producit, aliorum Liliorum non
unacumtaminulis fere & ito in medio, led plunmos suffundit pediculis, quibus innun-
tur plurima perala, alba, inodora, inordinatim & alternatim fummitati pediculi adhaerent:
radicibus & liliis haud facile a Lilio albo vulgari difflinguitur: fed floribus albis inordinatim
diffusis & inodora quamiacillime ab ipso cognoscitur.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

"Unguent is Lilia alba nasci efficitissima in Syria & Pifidia, Pamphyliaque Vioforides inquit. Lili-
autem flos temperaturam mijlam ut Galmus II, ob hiet, partim ex tenui, partim ex terrena
fentia. Radix is folia per se trita deficcant in abtergurti, ac moderate digerunt. Folia Lili-
Dioforides ait, imposita auxiliantur a serpentibus ifik, eadem fervefalla ambusa proficiunt;
aceto condita vulnibus curantur apta [ant. Succu* ~ "Ik in aceto mixtus in <smo vase cr. fu-
mtdicamentum efficitur veteribus* uheribm iff recetitioi • (nerius utile. Radix toft a
cum rofaceo trita ambusa fanat, uterum moluit, menses »itn.: vlcera ad cicatricem perdt-
cumme/levero eadem trita, nervorum vutnerationes is luxat'vves jarnit; vitiligines ig'leprat
expurgat; furfures iff manntia capith ulcera abjlergit favem nitUamfacit, purgat, & erugat.
Cum aceto is Hyofcytuni falis ac farina triticea contusa, tefium infl<. • -ma iones initgat. Pro-
pter favos jedum iijrvino, Plinitti ait, radices Lili decoquantur ~ "um appofitanor;
folvuntur: cum adipe aut oleo decoft' pilos adustis reddunt. E ~ Htingu-
per ahum travfnit'ntn' Lieni^is rupth, iff vulvis^profunt. Rectn. "fla-
talaphnuitisumma cum utilitate admifczntabcz flus maturantibus is ad j, . 11
ducentibus. Eadem etiam minoris tdlutionibus* adidem factibus utiliter decoquunt,
omnes abseffitt maturant, iff fuppurari faciunt, dohnmque fowl fedant. Semtn, Diof-
rides ait, pot urn fcrpentum morfthm advrfatm. Fit ex flcribu* oleum aut unguentum quod
Syr'inum aut Stffiatium apellatu Tjnclliendii fieri nptum^primatumque ad uteri duTtues utife. Li-
iii aqua Jilidit.^ex floribm parata, in partu facilitando iff featndm expelkndh, ivquit Came-
rarii Ksin Heart., tfficaciffima.

^, 6. L I L I I) M flo Tibu* cretlit Pbcemcek purpureh aut crceek.

16. *Lilium* Indicum puniceum gemino colore nobis. Narcitum Imlicis paniceum
gemi latiore folio una cum femine, Bapc. Ferr. IVregrinum lioc Litium Narcilij Baptista
icirario Senenfiditus, fed perpc-ramoV ineptefatis utclarins infra patebit inter Hallucina-
ones. Hoc Lilium rarum, paucis abhinc annis India delaEum, fiores Romanos nobilita-
Squamata est liuic radix pinca- nuci pa% oblongi, fex squamis majorbns contexta infima pau-
radicis veluti coronata, multis craffliuiculis fibris, inibr Hyacinthi botrioidis quern vulgo
Mufcari vocant, late extendit fubnixam, deorfum porrecto tubere callofa & fqi'-rata.; Sfr-
ptembiynetiicaulem protrudit craffitudine digitali, in rorundo Btrinque jllnnt
fangineis anguiciffue maculis punctatim, fumma parte rubentem; ind*
vagina deprimit florem Balauftio fimilem, qui ex petalis puniceis modic
complectitur intimos flofculos conremflimos, nonnihil hiantes, rubicum
vins iualbidia pediculis innixos: e fingulis flofculis terna fubrubienda, &
lidifveapicibus capitulata; ftamina confertim eminent: flofculis poReadilapfis fnbjca-
tubtrngent in folliculis ridentifcolore rubris, tiifidis auc cjniadiiridis, otivamsqnanti, ra-
ccmi fea corymbi atpctu conglobata, quibas terna, aut quaterna continental! grana, tu-
nigrafeunigella, minuiculi Phaieoli figra & magnitjdine. Bina post excelfum florem tollit
exultant, hacclcenti acqic infementxeumi fcapoadnata5: faperindafta, ovata, dcoc cic-
citr pulnios loigga, dimidiumlara, SciOaefoHiscraffitatne rqaalta, nigricantia, primo fur-
recta, iiumidcnuim jaceutia. Hie uitem Hoe five regionis vitio, live mopin aui inertia afgrt

raroque

me nofha vernat folc
'i.rbis Roms hoi'
iarbercni luani e:
, nequeParifiis

tRomie) inquitFerrarius Senenfis. Frimum taniem for-
yro in Qiiirinalibus horns purpurati principis Cardinalis
pu/purani, ut pulcherrimi Icci amoenitas Domino concolor
ervavimus per 12. annos, nee hucufqcutauidivimus illic

17 *Lilium* purpurocroceum mains, C.B.P. *Lilium* purpnreum mujus, Dod.Lob. ^ugd.
yft *Lilium* rubens **velcrowP™** maj«s, J.B. Chabr. **EliohuicnaajpH** purpureo feu croceo
caWuncproceri, longi fubinde, iedraroakioresquamLibialb>, **plermque tamen humi-**
Uores- folia font anguftiora &nigriora, circa caulem multa, led ante cjus ex **radicibus exor-**
miHa- flores fummo caule copiofi, ordinedigefVi 10,12. **antpiur.es aliqquando** ulque
S nut'-o acultra, fupra invicem incertoordmedigefi, Liliu altenus forma & magnicu-
di, 1, -e vero rubro ad croceum inclinance., multis nigris exigms punftulia literarum qua-
umhveludrudimenusarptrfi: radicesquamarz& magnxfonc,exmultisacummatwfwqua-
; fibiinvicem **incumbemibus conftru&e** ut **Lilii** albi, ted majores. **In Italia in** arv,s&
iterfeeetes inmont.buseuEm&convallibnsLiliumillu^Matthiolotefte enncat. Floret
' 1 Mr^r^nclidum *Lilium*, poft Li lmm purpnreum minus, unacum Rofis.

P³Eft h ^ v a r S s quVeft L,Lm purpu.ocrieum ta pleno, **C. B.E. Ulium cruentam**
Phcniciumfiorepleno, Eyft.

18 *Lilium* piirpurocroceum minus, C.B.P. Lilnim purpureum **minus**, Uod. Ad. Lob.
Lilium wmiceom minus non bulbiferum, Cluf. Hift. Hoc inomnibus priori accedit mfi pr-
vitace **partium**. Hoc minus caule multo **eft** brevior, cubitali aut brevior; loins linu-
liter **nicricantibtis** & anguitiorife'is & minoribus: «ores pariterc fummo caulis crumpunt, fin-
auliwmen **fuis** pediculis modo **brevioribus**, modo longioribus infidentes, colons quoque pnr-
gluu. **Similitw quibfidamigeris&DerauamexiRaisornati; Lili**
etiam'divifora', fed.paulo minores: radices habet fqnamatatas pluribus fquamts .mbncat.mleje
S e n S compos, excnjusfcdefeffilifibrKraifedenntmamr. Floret fob fi item Mau,
reliqaa Lilia antecca :ns. Dicitur minus ad diferenciam majoris praoidcntis. Hue pertine:
»- pL...: C.B.P. fcuMartagon Chimiftarum Lob.

7. I I L I V M BVLBIFERVM,

TO /i/iarabulbiferunitatifdiummaius, C.B.P. *Lilium* craentum bulbos gerens, Liigd.
Martionbulbifenlm3.Claf.Hift. Liliumbnlbifernni ripens, J.B.Chabr. *Lilium* crueutum
Wundamcaulem bulbillis donacum, Ger. Hoccauks habetprocer.ores pnore hum.hores
ma o tiores paulo qtiam minoris rubienndiores: hmcemefinuiohorum & qnandor|«
" pfs* ttor m pediculis, parvx nafcuntur foboles, qux terr, comm.fe adolefcunt, & certio
aut quarto anno flores ferine, radicibus macribus, folus ac flonbus nigris noralis inferi ptis
fuperioribus duobus fimiles. Reperitur in moncinm convallibus fepe propagans, miclcis Jen
radiculisincaulium finibus fupra terram natis, ac edam matribus majoribus intra terran
reueiitibus contorme. Hue pertinent *Lilium* bnlbifram anguftitolium O.B.P. Martagoi
ementum anguftiolum Lob. Icon. & *Lilium* bulbifrum incanumC. B.P. Marcagon but

..u.^, nobis, in Tab. precedence. *Lilium* bulbifc-rum minus,
C B P ^ .Kwonmiiuuciuiii^velLiliumpuniceum bulbifcrum 2.Cluf. Hilt.
•omnes hx Liliu fpecies Junio, alias paulo maturins, femaque perfidont Auguftc,
jbri. Radicute feafoboles incaulibui haerexefolent, doneeventoantjaontaftuex-
imo pkntisinterdumadliuc inharentea confpiciuntnr,dum fibri deorfunifpeftan,
agere (blent tanquam ad commnncm niatvem terram afpirantes &V ilia fecondi e-
imontanis Auftrije&StiriKpratis ffonte crefcant. Reperitur & apud Croat^{as}
. Ibo.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI
Alioramque Authorum.

. 1 *Uium* htikum funumm gemino latiort folio,
L t t K i Afrit**™ l'« %aniff«s i m w , L.k.
Ad. r triffui m<unts pmceui grntmo la-

tiortfolio, Bapt. Fir. Cum Ueplant*fartm magnum
hrxapttah m calatb) injiar, O nub I em , < 5 a r. maism
Liltt xmulam hnbeat, ntfiio q><> jure Authors &
Bapt ill* Ftrrerit ut Snuafj Nortitfum appitlmi ,
G J j j <>™

cum Narciffus fit planta perfefte bulbofa, at bcecfquamofa. Nullus ejipaululum in reBotanica verjatus% qui non vitio vertet Autoribw & puęcipue Baptijice Ferrario Jef>it<e> qui in hocficut in aliis multis^fe la pfum ojtendit; feque rtiimime in not is genericis plantarum verfatum manifejleprodit, phrafibus utitur, fateor, calamijlratis * imo' verbis fejqüipedalibus, fed JIudia Botanica nevel primis degujiajp labiis

pa/Jim teftatur* Hoc familiar e eft hujusfortis bow: nibus paffim falcei/i in alienam mejfem injicientibus & ut vufo de iu 11 Gattia fppis^autivi^relar.^aum qmnta JfiftffefeyaQant, ignorant tamen viam i. uatituz zn vitykm Psmponum, fie Ferrarius ignorat dijhnguere fahum % NarciJJb, ut dare conjiat futra, ergo lap/us ejjgraviter.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS,

Liliis Hermaphroditicis ambiguis five dubiis.

C A T V T . XXII

LILIUM ASPHODELI RADICÉ five LILIAS PHODELUS.

Quandoguidem hasc planta nee fit Liliijpertefta fpecies, quippe quod non donetur radicibus fquamatis, fed fufiformibus, quibus magis accedit Afphodelis; nee capfulas feminales habeat in quarum fingulis regionibus feu loculamentis continetur duplex feriefeminum compreffbrum, membranaceorum, Liliorum modo; fed femina confufe & inordinatim in fingulis loculamentorum ternorum ordinibus, Hyacinthi, Narciffi, caeterarumque plantarum bulbacearum, recreatricium feu recreativarum r: ^-, ribn poteft jure dici Lilium genuinum a flore Liliij, nee Afphodelus a radice. * fit ergo Lilium ambiguum feu hermaphroditicum & heteroclitum, aliquid Liliij, florem fcilicet, & radicem Afphodeli poffidens. Lilium radice Afphodeli eft foliis latis: a colore fiorum eft vel luteum, idquem? jufaut minus; vel Phoeniceum puniceum ye.

Pars T A B U L A XXI. Se&ionis quartis

	f	ri	Major nobk. Liliafthoddu* luteo flore^ Cluf. Hi/I. Cam,
Lilium radice Affboddi	\	Luteutj	©
feu Liliaf/hoddue	\	(2. Minor, nobis. O	
	j	3. Puniceus feu pbeniceus, nobis. LMa fphodelut funiceus, Cluf. Hift.	
	I	Lil'fafphodelus phceniceus^ Lob. o	

Explicatio partis Tab. vigefim & *prim* Settionh quart*.

i. **Lilium** luteum radice Afphodeli, C. B. P. Afphodelus luteus liliflorus, Ad. Lob. Lili J L > liafphodelus luteo flore, Cluf. Hift. Cam. Liliago minor radice Afphodelo affinis, quæ Hemerocalhs Diofcoridis videtur, Caefalpin. Afphodelus liliaceus, Eyft. Afphodelus luteus, Tab. Afphodelus Hermaphroditicus, Guiland. Lilium non bulbofum, Ger. Lilium luteum Afphodeli radice five Liliafphodelus quorundam flore luteo, J. B. Chabr! Sunt Lilio huic ambiguo feu Hermaphroditico folia oblonga, angufta, Porri aut Afphodeli fie di&i foliis familia: caulis cubito altior, teres, laevis, abfque foliis fuperius, in ramulos aut bifurcations duas, aut quatuor divifus, ir' quarum fingulis flores tres aut quatuor, Lilium album forma & foliorum numero referentes: colore ochras luteo: poft flores, craifx & triangulares gignuntur capfuk; in quibus femina nigrum & fplendens, veluti Paronias f-men, fed minus, continetur: radices fubfunt non uti aliis Liliis fquamatae & imbricatim componr^ fed veluti Afphodeli glandulofas, lutei Afphodeli radicum aemute, multae, oblongae, ab uno capite provenientes, e quarum annexu fibras quardam craffiores ferpunt, quibu: m plures^ lantasmultiplicatur. Maxima copia ffonte nafcens reperitur in Hungaria pratis uliginofis non procul ab oppido munitiffimo *Nenuetbwywar*. Dicitur Arabibus *Erifambach*.

2. Hujus datur fpecies in omnibus duplo minor priore, prxcipue latitudine foliorum & altitudine caulium.

3. *Lilium rubrum* Afphodeli radice, C. B. P. Lilium non bulbofum obfoleto colore rubens, Dod. Liliafphodelus puniceus, Cluf. Hift. Liliafphodelus Phoeniceus, Lob. Lilium non bulbofum Phoeniceum, Ger. Lilium radice Afphodeli Phoeniceum five Lirioafphodelus quibufdam J. B. Chabr. Liliago major Afphodelo affinis, Carf. Non admodum abfimilis eft hæc planta

Lilio

lio Aphodeli radici prcedenti, fed est in fingulis partibus major, firailitt glandulis oblon-
 "onnxis-'ftrunofia & alba, fustitupponaddoni ffratoo: caulis digit! crafflicudine,
 jitos altus& major, fiMofuspendis, cujus fastigium maliquot alas dividitur: folia
 inajora carinata, iatiora quam foliffuperionshitei; fiores in caulinm ramis altero tantum
 maiores, liliaceis floribus pares, p^alis fenis confantes, quaecoloretriftiorerubent intrin-
 fecus, lutealinea per mediamdecurrentead lingoef ufquetotosluteos! extrinfccus verope-
 tahad luteum magis divergunt. Dickur Hemerocallis Diofcordi, Theophrasto & Vlinic.
 Hemerocallis enim Hos est qui no&e tabefcit, oriente vero sole pollulat, teste Athenso,
 ficut Litium AfphoJeli radicc purpureum quod fugaciffimum ert; hoc enim uno die tancnm viget,
 matutino fiqaidem tempore exortum, vefperi flaccefcit; quamobrem &c proprie etiam «mj.\-
 _i ab unius die pulchritudine dici poteft. Valde luxuriat, ut testatur Clufiua, in omnibus Au-
 ftritr pUtrimisq; Germanix hortis, fuaaUCEmrepta.iteof propagante radice odiofumest, acmulto
 magisi quam pricedens luteum. Frovenitapud Croatas etiam florealbo, ot Clufio iuit relacum.
 Eacaltatea Lillii radice Ai'phodtli incompetae funt, cum nuHms hac aeiare in medicina znt
 cibatu fit ufus. HemcrocalUs autem luijus defcriptio his verbis apud Diofcoridem traditur,

J2'SxfUct wixi™«m» *?&5M x^mv ^ & -tS''' 'Vf f "7Lj* f^f i*''** * & ^ "wft*" >d est, He-
 mcrocallis folia habec&cauItmLilio fimilta, vtridijUtForrum, floresin ipfo juxta fingulos
 apophyfestres aur qiiatuor,divifura LUJO fimilcs cum primum hiare coeperint; colore ^Urtl-
 intenfo: radicem fimilem bulbo magno.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS,

ratficibus & foliis cra0ioribus donatis,

TM

A L O E & Y U C A .

C A T V T X X I I .

A L O E .

L A O H N G r r f c i , Latini is? officin* fariter Akentum hrhamipfam, turn iff ejas fuccum
 /"» dntfetum appellant j dkitur is firfs 1&1U qua non modo in terra, feJ& extra earn
 vivai. Aloeaitem Ma videtur, qaia marUimk gaudet. A mentiortbu* Semptrvwumi? Sm-
 ptrvivum mariihnum, quod Semproivi modo diu dunt, appellatur: Sedurn aniarum ColumelU:
 isrquia ejusfuccm arnars est, idtirco <sr Gentianam, qvt<x smariffima tft, Aloev Gallic am nomi-
 navit. Ve Aloe Dwfcoridtsl. 3. c- 25. quod folium habeat SalUfimilitudim, crafum, pinguc,

E rotutiditate modke latum, retrorfum pandum, utrinque fpinisraritistr brevibus.iffc.
 Proptcr fiores hexupetalos & capfulas feminales tribus loculamendsfeu cellulisdiftjncfas,
 hifcedoobus generibus, fcilicrt Aloe&Yuca, eademad^cimusftix fords confimilibus a
 Hue ultimo habita ratione ftraur^ florum & compofitionis mvolticrorum lennum, non ob-
 ftantemaEnitudine&fpiflitndine tbliorum, radiciimque amplitudine. Aioeigitur pronota
 cenerica hanc habcto, quod fir impriniis planta hexapecala rricapfularts, foliis Ipiffis, longis ,
 aculeis donara, radicem liabens longam, crafflam&tuberofam fpongiofamque mul-
 aflasemictemem, exquaiiiccuscralTus undique emanac.

T A B U L A XXII. Seftinnis quartz.

- Aloe Americana
- i. Arabka ferotina vulgark, nobk. Aloe vulgar-k? C. B. P. Aloe Dwfcoridk-, Col. 9
 2. Folio in oblongum aculeum abeunte, C. B. P. Aloe Americana^ Bod. Cluf. Hi/I, is- Biff, Caw. Eyft. Lugd. ©
(%Luteo^ nobk. Metl isf Manguei, Anton. Recch, 0
Flore <
∧.Cdtruleopallefcente^ nobk. Metl Couli, Anton. Recch. 0
 5. Parva valde ffifiofa folik admodum faturatk, nobk. Mexical Met!.; Anton. Recch. o
 6. Fruclu dulci is ncido muliiplici punk fimili, nobk. Mexacotl/«(Manguei Prunorum. Anton. Recch. Q.
[7. Anguftioribu* feu tcnuioribus abfque fyink^ nobk. Pati feu Metl] ex quo fiunt hviffpna fila, Anton. Recch. fc>
 - TM"* 1 8. farum dentate, nobk. Theometl feu Manguei divinum, Anton. J Retch,. ©

Explicatio Tab. vigejintefecundte Seelionis quart*.

I' /V Loe vulgaris, C. B. P. Aloe communis, Cam. -Mc; Tiag. Mactli. Fucli. Dod, Rauwol-
jf_fii (qux in Rama Judss copiofa) Ad. Lob. Cluf. Hift. Eyft. Aloe Soccotrina & Aza'uar,
Linfe. Aloe folia habet Scillac familia, oblonga, lata, lasvia, crafla, retrorfum repanda, utrln-
quecrenata, afera&retufisaliquoc ipinulis aculeata, lento tenacique fucco plena, arterni
viroris, inftar foliorum Sempervivi, adeo ne per hyernas menfes extra te- ram, ettam in hypo-
cauftis & canaculis Cuffpenfa, non marcefcit; fapore apud Germanos nofque Septentrionales
nonamaro: caulis inter folia affurgit friatus, ut ait Ruellius: quanj vere, i^dicerit qui Aloen
caulefcentem viderunt. Invenio quidem Plinium dicentem tolia friata, ubi Coniarius meriro
videtur legere ftrata. Caulis, ut ait Diofcorides, Antherico/imilis eft; flos albicans (qutm [enis
petalidicimus nos conftare:) femem ut Afphodtli: radix fingukr is, crafli pa It quoque infVar
in terram adaftai rota herba amariilima eft, exequoque fuccus collectus aniariflimus. Aloen
vulgarem fponte proveniente obfervare naemini, inquit Clufius, in veteribas muris nrcis
Uliflipponenfis, quadecenfus eft ad vetuftHTinnini templum in dectivi fitum, Intelligebare
etiam, inquit idem Ckdius, Valentin in vicin^ Sagunti vetuftismaris & maceriis abundanttr
venire. Aloe fie diciuir quodin maritimis proveniat, marinoque afflatugaudeat, nnde
omen. Aloe in Rama Judas copiofa, tcfte Rauwolfio, provenit. In Inlula Soccotra part.
orient. Ind. c. 6. aicitur & Azauar five Sempervivum, quocampi pleni part. 4. Ind. Orient,
• Sempervivum dicitur recencioi •• us a l' mpitcrn > vitore, quc, J hqucaril. ns conclaviu) fuff-
penfum qtiam diutifTime vigeat: mari: imum (non marinum, cum in advertent: bus recenti-
bus, quorum dux Lobelius, ac fi proveniret ac crdceret in mari) dicitur natali loco (ad
• ram fcilicet marinam) in quo frequentius obfervatur. Aloe herba plurima itidem nafcitur
in dnibaga, Bengala aliifque mnkis locis: carterum laudatiffima til, uti fupradictum, in Inftte
Soccotra, que inde ad Arabes, Perfes, Tirfcbs, denique per univerfum Europam defertnr, eam-
que obt: uifcm Aloen Soccotrinam appellant. Ddfat aucem hsec Infula ii fretu maris Erythrxi
• t-ntum viginti leucis, qua de re non minus Arabica, qu_{am} /Ethiopica did potest, quo, ' akera
• arte freii Arabia rtrminetur, altera Ethiopia, tefte Garcia ab Orto. In Regione quau: 1.
• circa capxt bon* (pel in fmu Agnada, Sanbi-asditto, ingentem copiam^ mo plenos enmpos Sem-
pervivi huius obfervabat Linfchotus, quod incolis Aztuar appellatur; viri altitudinij^.-" f'ack*
fuperat, & e longinquo vifas herbas loci incolas eTe exifti_{ma}b3t. Ea' ip^ tft herba ex qua >-
colKSoccotra; Aloen conficiunt, quam Soccotrinam vocant. Inquamphtimis Italicis cre-
fct-re con f pic it in, prxfertim Roma; Neapoli, Venctiis, Ticini & Genus, item Patavii, Verona,
Bononir & Fforentia; qui bus omnibus in locis luper sdium feneftris ac atriis, n'ttilibus in va-
• ra plenifaliracfbvetur, 3dfpectacHlum potius quam ufum medicum. Audio autem
• ii uknrriennium nondurare, in i"ngidioribus regionibus, ac Geneva Allobrogum, aiunthe-
• iem perrerre nci poffe. A marinis partibus ad nos Gallos Parifienfes (ait Kucllius) d?-
• fertar, fed folo credita nanquatin comprehendit, imo brevi caric confecta moritur, licet in
tabula-

tabulatis propendens plerumque bienniovitam proroget. In Germania, quod folia attinet, nullatenus negotio provenit, ac Autumnofe Istijlimam ostendit, hyemis tamen frigora in hortis ferre nequit, unde hyemeadventantijj (Evellitur, acin hypocaustis suspenditur, quae caula est ut in nostris terris borealibus florere rpn queat; fed exacta hyeme in hortos rurlus transfertur & plantatur, in quibus aliquantulum ugetur, fed nunquam ad frugi perducitur. Porro nulla amaritudo in Aloe nostrate reperitur. Invenitur & Iponte in Apulia & nonnullis Baetics Hispanis locis, haud procul a mari: fed & hujus etiam fucus inutilis.

& % Aloe folio in oblongum aculeum abeunte, C.B. P. Aloe Americana, Dod. Cluf. Hist. & Hist. Lugd. Tab. Eyft. Aloe folio mucronato, Lob. Ger. Aloe Americana five spinosa, Cam. Allagacy Indis, Fily agulla, id est, filum & icus Hispanis, cujus spinæ veanats Frag. America planta Aloes facie, Col. Manguei Mexicanum & alio nomine Met I Linc par. 4. Ind. Orient. fig. 19. Aloe Americana muka sunt folia humanam altitudinem attingentia, faturate virentia quidem; fed quibus infperfum videtur quippiam coloris cineracei, ut in Tuliparum quarundam foliis, aut Colchici Chioensis foliis undulatis, lsvia circa infimam fedem, trium aut quatuor digitorum tranfverfotum craflitudinē, quodammodo carinata, valde lata, mutuo fe ample & enti?, infar foliorum vulgaris Aloes., fenfim in mucronem definentia, qui nihii aliud est quam spina crafla, rigida, fusca, unciam cum femiflè interdum longa, & adeo firma, ut Americani vice fubulis utifoteant, & cupidis ferres loco suis telis adaptent; foliorum latera tenuiora sunt, & spinis subfusis aspera, fed multo magis mucronatis & brevioribus, lata basi prae-ditis & deorsum incurvis, utin Rhamno tertio Clufii; interiore parte fibrosa sunt hsc praedicta folia, & fucci plena, fed non amari. Ex eorum medio caulem nafci intellexi (ait Clufius, nullum enim vidit) brachiali cunctidine & brevioris lances altitudine: radix est crafla, longa, curva, veluti internodiis articulata, è quibus ad lafera nascuntur akernatim circa radicem majorem, matrem scilicet alis plantarum, ut in Arundinum nodis germina seu gemmae sunt difpositae. Vivax est hsc planta, multo que annos durat, radice multipliciter se propagans, cujus rei gratia & propter spinarum rigiditatem asperitatemque Indos ieu Americanos circa agros suos earn ferere confuevit audimus, item Hispanos nunc temporis idem praestare ad agros, sepium aut murorum vice, comaiuniendos & fures arcendos. C ut apud nos Septentrionales sepibus Oxycanthi, seu Spias appendicis Plinii aliarumve stirpium spinosarum fieri sole. O memoris proditum invenimus: nunc demum apud Boreales gentes; falem rariorum plantarum cultores in hortis conservantur, in fcaulis faitem coluntur, ut in conservatoriis suis aedificiis per hyemem ab injuria frigida tempeftatis arceantur & defendantur. In fobole procreanda non fecus ac Aloe legitima valde ferax. Circa Mexico tanta copia nascitur hsc planta, quanta apud Gallos & Italos vites.

3. Aloe Americana flore iuteo, nobis. Met & Manguei, Anton. Recch. Aloes hujus Americanae seu plants Met I, qtr Jm Mexicani Manguei appellan, plures apparent differentiae apud Antonium Recchum in historia sua Mexicana, de quibus seorsum in hoc capite agemus propter conformitatem in floribus hexapetalis, & capsulis ternis loculamentis distinctis, cum caeteris antecedentibus in hac Sectione quarta, etiam si Aloe Americana folia ferat Aloes vulgaris, fed longe majora 5f craffiora seu spiosiora, (arboris enim mediocris interdum squant longitudinem) utrinque spinifera, acin rigidum acutumque definentia micronem: caulem duplo majorem, de in ejus parte summa flores luteos, hexapetalos, oblongos, primo & in exteriori parte stellatos, quando sunt aperti, cum faminulis fenis, in medio petalorum. - atque iis fatifcentibus succedunt capita triquetra, femina Aphodelinofemini simile in se continentia: radicem vero craflam, brevem, fibris fcatentem, ex qua circumcirca germina emittuntur quovis folo, fed praxipur fertili atque frigido, non enim tempeftatum aut inclementioris coeli patet injuriis. tree. f ~r ficitatem fstatim marceffit: è nulla planta proventus est amplioi.

TEMPERAMENTUM & VIRES,

i. Aot vulgari*, C.B.P. Aloe, Trag. Matth. Dod. Aloecommunis, Cam. Aloe Diofcoridk, Col. Ex Aloes hujus foliis fucus exprefus in vesica aut aluta concrete advehitur, ejus autem emparandi rationem talem intelleximus. Rhodiis ipfam herbam accepi, inquit Johannes Bauhinus, inque frusta deficcari & contundi curabam, inquit idem, deinde in vas oblongum reponi, inque eo viginti diebus fini, interea autem spumam attolli, inutilem etiam abjiciendam in mandatis fedi, his autem paraculis concha superiork fucci paratam, ad quandam usque demendo apparentern ejusdem fucci differentiam, hunc in vesicam reponi, atque fof ficcari Alcenque Succo

tr'mam effici[^] fecundo demi fuccum in medio confitentem, is in utres reponi jttfjt exficcarive, at
 • Aloen hepaticam confici. Postremo obfervavi Jequi caballinam, caterarum vehni fa
 itaque hodiernuntur differentia, ex eadem tamen plmta-expreffa, optima Soccot
 latur, omnium puriffima, quadum frigidaeft[^] malkopt'icuffainfpkndida nitidaquefr.
 defilit, colon fulva aut ruffa ispellucida, inter traftaridum molkcens, in fole effiuens, atque
 fotk nitido ftifcoque' aut nigro colon bomtatempuam intus latentem abfcondens is diffimulans.
 Saporem habet infigniter amarum[^] aftrngentm[^] atque aromatkam, aliquantulum tenuem, isork
 halitum commendantem, odonmtamen aromatum is tamen gravem, Impurior fecunda fapa-
 tka, quod bepatk colorem exhibeat, difta •, primo denftor e[^] acrior, jecinork modocrenata: co-
 lore in citrinofubrttffa, is Soccotrina minus pellucida, vixque oculorum adem hmenve admit-
 tens, quanquam interim mica fplmdida fint, odore is fapore. Soccotrinam amulatur, gravius
 tammolet pauloque. amarior exiftit, magifque aftringit. Ethac quoqite calidaducitur, isrl
 gido ccelo frintur. Tertia fordidis inquinamentk multk contaminata, CabaUinavocatur, -ve-
 teranarik nlinquenda medicaminibm, cuioh idnomen videtur inditum. tiacomnium pondero-
 fiffima, aridiffima, denfiffima, colon nigro is minims trunftucetis, guftu amariffima is vald
 aftringens, non fine borribili aliqua qualitate galatum isftomachum afficiens. Eligito in quovi
 genere pinguiiffimam, puriffimam, byeme fr'Jbilem, aftate molliufculam is manibm kntefcen-
 tern, cakulis lapillifve, arenā is terra carentem, tarn guftu quam alfatlu aromaticamama
 ritudinem refipkntem, fmmum odore conciliantem, is fiffolut^f facillimam: de Alice f^fuct.
 g^{act}ribus ^{ufu}, hac Diofcorides manor Utradidit. Duofunt porr-ofucci Aloes genen
 alterum anncijim quad fit puriffimū Aloes fgx[^] isctifj"amentum ejje videtur; alterum quod a
 jec'morkimagxnem vergit. Eligito pinguem qu<t'm' " °nferit, lapillorum expertem nit.
 dam, jubflavam, fr'iabilem, jecinoris myfo coatia, A • ^ que facile bumefcat, ex'wixnuej
 amaritudink. Nigram contra fraftu contumacem improbat. Sunt qui earn gummi adulterer[^]
 id quod guftu, amaritudinē is odor'xvehementia deprehenditur, eo que indicio quod digitata.
 trita, BOB ad minima ufueramenta refolvatur: ncque defunt qui Acaiiam immifctant. Vi,
 babet a/ringend[^] fimmtm conciliandi, corpora exficcandi is denfandi, ahum folvendi, flame
 chum repurgandi-, fbinWm cochkarium menfura ex aqua frigida, aut laSlitinjar tepida, au
 gelidaebibatur; fangaink etiamnum excreationes fifit, is morbum regium emendat, exaqu
 tribus obolk aut drachmapondere inpotu. Vevorata vero cum refma aut aqua cummelk coil
 is excepta ahum folvit: trium autem drachmarum pondere perfeftepurgat, fedisalikmedi-
 camentk purgantibus admifta praftat, ut minus ftomachwn infestet, ficca veto infperfa -uulnera
 glutinat, ukeraque ad cicatrckem perducit cohihetque: eadem pecu!i?.'iter exulceratk genitalli-
 bus medetur is difrupta puerorum prspudia agglutinat: quin is condylomaia rimafque fedk
 dulci vino admifta fanat. Sanguink ex hdtmorrhoidibus eruptiones fifit, pterygia adckatri-
 cem perducit[^] lividais fugillata bypopia diSia ex mtlk tollit. Scabrm quocque lippitudines
 artgulorumque in oculk pruriginem mit'gat. Dolorem caphkfedat, ex acetois rofaceo front' tis
 temporibus illita. Sed & cum vino fluemem capilhtm cenlmet: idem quetonfillarum[^] gingivarum,
 Cfterarumque ork partium vitiis cam mtlk & -vinopTficat. C*terum ad oculorum medicamenla
 torretUf innunda is candicante tefta, ligulaque fubinde vtrjatur donee <equaliter toftafuerit.
 Lavatris Aloe[^] atque idqtod arenofum fubfidet, lanquam inutile fecernitur. Pinguid/mum
 quod lave eft accipitur. Hafienws Diofcorides. Copiofiffima hac ftirps apud In Jos is in Arab la
 Cwkfyriaat & gypt<->- unde pellibus infufafucctis in Europam infertur: ejw fuccut primer-
 dim tahdws, fed iertio exficcans, vehem[^] ntes amarus, abfque mordacitate tamen, is fimul Em-
 plaftkm is aftringens, ventrem fubducit: interim, fi quid aliud, ftomacbo gratum aut convenient
 midkamntum. Jam ut fcribit Paulm Algineta, cum ommapurgantiamedkamhi (iftom ' -d' Yer-
 fentur, fola Aloe conducit is vacua/, non elota valentine, elotavero minws[^] ventru .m, i-
 gk robarans. Bikm flavameducit, fed potiffimum qua inventrkulo exprimk venkproximif
 que viis baret, expurgat. Eft enim ex numero medicamentorum, qua Graci ab excernendo
 flercora, o[^] jwoerfw vacant, quortimque vk purgans non ultra veniculum feftextendit. Adver-
 fatur pr<£terea Aloe putredinibus ommbta[^] is aputredine omnique corruptione omnes partes cor-
 porituetur atque defendit; cadaver J etiam mortuorum confervat: ventrk tineas, lumbrkofq;
 interimit ac expellit: graveolentiam ork v'Uioftomachi enai'amemendat', am bamorrhoides ap-
 pait, menfes etiam promnvet, in ex'gua quantitate aflumptn; creditur ad reliquorum vifce-
 rum obfruioties is infartus prodeffe. Sunt tamen qui lecinoriparum commodam exiftimer.t,
 Adpurgationgn datur plus minus drachma, fubinde obuli tres aut quatuor fatk funt. Vide
 cetera d(. Alois viribm apud Johannan Baubinumpag, 698, 699, 670, <? 171, Plurima in
 Indh

tfidia, eique propinqu regionibus Provenit, uncle etiam fuccus importatur. Najcitur is in
 ^Arabia, Afia, acin loci* quibusdam maritimk isinfulk, veluti in Andro, non valde eliciendo
 fucco idonea, fed ad conglutinanfta vulnera fanequam utilis fit tritadllinatur.

2. Aloe folio in oblongum acukum abmnte, C.B.P. Aloe Americana, Dod. Cluf Hift. is Hify*
 Lugd. Tab. Eyft. AloefoHo mucronato, Ger. Lob. Hanc c*dere folent antequam nimium ado-
 lefcit, turn enim radix craffwr fit, quā excavatā, quidam liquor colligitur, qui fyrupi modo il-
 lico denfatur, k aliquantulum coclus met fit; depuratus faccharum; dilutus acetum, addito
 ocpali C radix ea eft quam ob ejus prxftantiam vini medicinam nominant) vinum, illk quidem
 in ufu, fed parumfalubre, etenim valde caput ferit, atque inebriat; nullum autem cadaver aut
 impura fentipa adeo fcetet atque illorum anhelitus, qui eo vino inebriati fuerint. Ex hujus
 germimibus isr tenellis foliisfit conferva. Foliorum prunk aflat or urnfuc cut, recentibu* vulne-
 ribus aut ulceribu^ infillatus^ brevi ea curat. Germinum iy radicum fuccu^ cum Abfynthii
 illius region^ fucco mixtus viper arum mor/ibus utiliter infillatur. Ex illius foliis paratur
 charta in ufum vulgar em facrificorum ispiplom. Ex iis^ Liniaut Cannabk modoparatls^fiunt
 Alpergate? Ccalcei genus Hifpanis admodum familiare, ex funicul context urn)florU^chla-
 mydes, cingula, capiftra, is Junes; denique font illk canabina fila. Ho rum foliorum cufpi-
 4es adeo firm* font is acutoe, utillis^ ut fupra diftum, acus is fubuU vicem prstent, bos
 cum fibrk extrahendo. Iftk fpink facer dotes illius regionk in facrificik fe pungere folent,
 etenim cufpic non infringitur, isfite alte penetrare exiguo foramine fafto. Ex hac plant a
 ignemftruunt, is tjws cineresparando lixivio idoneifunt: truncus Ugni loco ik eft: folia vero loco
 tegularum aut imbricum* hatlenus Gomara. Luem veneream hac plant a curare Americanosfo-
 litys tradit Clufius, ac ex huju* foliorum fibrk reticula contexta, ut is indufta ex ikparata,
 Hifpali venalia invfnir'u

- o). Blantatertiah <£c unica, ut ait Recchu* infua Hiftoria Mexicana, quidquid vit <z neceffarium
 effe potest, pr^ftau facile foler^jieffet rebus humank modus, in quibus innumeripenefunt ufus
 qui ab ea planta defumuntur. Iota enim ilia lignorum, fepeindorumque agrorum vicempr<eftat :
 caules tignorum: folia vero tetta <edificiorum tegendi^ imbricumJancium, papyri-, filique, ex
 quo calcei^ lineae is alt a veftium genera, qu<e apud nos Europeos ex Lino, Cannabi, Vrtica, Gof*
 fipio, aliiqf hujusmodiparari folent: è mucronibus fiunt clavi is aculei, quibusperforandk
 auribui macerandi corpork gratia Indk uti mos eft, cum dxmonum vacant cultui. Item acicuU,
 acus, tribuli militares, is ra/iilla peclendk fubteginibus apt a. Pr<eterèa. efuccomanante, cujus
 evulfis germinibus inter nk-, foliifve tenerioribus cultk Tzitlink in mediam cavitatemfillatplanta
 unica-quinquagita interdum amphoras (quod diclu eft mirabile J isfecvina, mel, acetum ac
 faccharumparantur, uti fupra diclum, Succus namque diftillatione fit dulcior; decottione, is
 dulcior isfpiffior, donee tandem cogatur in faccharunr. vinum ex eodent fucco diluto is aqua
 fontana, additkeorticibus malorummedicorumjimonumque, is dik quibutfacilius inebriantur,
 quod ea gens maxime afeclat, quafi pert<efa rationalk fu<e nature, is avida fortkbrutrum
 atque quadrupedum. Efaccharo quod ex eodem fucco (uti diximusj coquiturjarant acetumjiempe
 eodem refoluto aqua, is novem diebus infolato. Idem fuccus menfes movet, ahum lenit, urinam
 evocat, renes is mficam emendat, calculos frangit, urin<eque extergit meat us. Eradice quo*
 que refes fiunt firmiffim*, is ad mult as res perquam accomod*. Craffiores foliorum partes
 truncufque decofta, edendo fiunt aft a, fapiuntque citreafrufta faccharo condita; qtiin (p vul-
 nera recentia mire conglutinant: fit enim fuccus affatione glutinosus, qui fuapte natura fri-
 gidus ac humens eft. H<ec ex Antonii Recchi hiftoria de viribus Aloes American*.

4. Aloe Americana flore caeruleo pallefcete, nobis. MetlCotzJi, Anton. Reccli. HaccAloe
 nfarginibusfoliorum eft luceis, fpinis parvis&nigris; foliis vero modicis, ficum foliis prae-
 cedentiscomparentur: caule binoscubitos alto, digitumque lato& rubro, cum floribus ex-
 ruleis pallefcetibus, ejus cacumen occupantibus, &radicefurcuiofa. Campeftribus locis
 Mèxici nafcitur, quovis tempore, quamvis iol2 xftate melius vigeat. Seritur ex germinibus
 juxta parentem & propriam radicem ortis. Jus trium quatuorve foliorum, additis filiquu-
 lis ternis, frigentes ac craflbs humores per feceflum 6V urinam paulatim vacuat. Idem propi-
 nari fbletab Indis, enixis mulieribus aliquot diebus à partu corroboracionis gratia. Succus
 cxpreffus ab femiailis foliis, dicitur ab Indis afthmati conferre. Frigida vero confat & lubrica
 natlTra,

^5. Aloe Americana parva valde, ipinofa foliis admodum faturatis, nobis. Mexical Met I,
 Anton. Recch. Haec eft fpecies minor Aloes Americana?, valde fpinofa, cujus' folia virore
 Hhha admodum

admodum faturato tinfta **fane** Hujus folia edunrur afia, & funt guftui Indorum pta ce-
teris grata. Reperitur in montibus *Tepoflamnfibws* apuc? Americanos.

6. *Aloe* Americana fruclu dulci & acido mulciplici pi uivis fimih, nobis. *Mexatol* feu *Ma-
ruei* prunorum, Anton, Recch. Hilt. Mexican. Species efVAloes Americana; fpinoik ad gen-
vlfrf/reterendae: frufiuautem eft dulci & acido, mulciplici, acprunisperfimili, undenom-
defuidpfitiforma & fapore fruc"nis, qui in orbem Pineae Indies quadantenuselt par, eduli fu-
co p'enus, & graci taporis: folia funt (pinofa, lutea ac velnti marcida: caulis vero brevis, re/
ac craffus: radix n'brata craifaque: fruftus Prunorum in liimmo caulis faftigio funt aeniul-
obiongi, glandibus fimiles, & ex candido **pallefce&tes**, obdufta membrana, inter quam com-
netur callus candens, ac, ut diximus, dulcis & acidus, Pinearum Indicarum fapore **referta**:
feniine principio undido, ac poftea nigro, fubrotundo, duriufculo. Nafcitur in faxofis reg-
onum calidum *Tyecuacuiki*. Teniperiefitirigida&ficca: medetur oris ulcufculis e c-
lore oitis fruftus commanfus, acgeftatus ore.

y. *Aloe* Americana foliis anguftioribus acminoribus feu tenuioribus abfque fpinis, nob-
Fciti feu *Met I* ex quo funcleniflima-fila, Anton. Recch. Hift. Mexican. Hate Aloe. (vWrt/Int-
dictum) faperiori quoad florefcV fruftum fi.^His, fed foliifeftangultionibus, minoribus&i-
anioribus, magnaue ex parte purpurafcentibus: eradice provenit fibrata, cra(Taque: fpec-
tft **Pati** diftar. Parantur ex ea fia tenuiflima, qua: in magno habentur pretio, pannifque **lint**-
pretiofis **txeodis** aptiflima.

8. *Aloe* Americana ibliis pjiumentatis^obig. Tiewf// feu JWdngaf/divinum, Anton-Recc-
Hift. Mexican. Hs:c fpecies *Manguei* inter numeroC ~¹~ Moes. fpecics, quae enumerantur
ufque ad i9. ab Antonio Reecho in Hiftoria loa Mex. -> idem prnc lacnlrate & c iiora
loigS Faliorumexilibus fpinis armatorum & **radice** fibrata: folia dua.> fpithamas longafunt.
Succus vero c potus aut illitus rebreaextinguit. Nafcitur in frigidis calidifque locis, editis
accjue campeftribus, pafim in America.

Alia: funt fpecies quam plurimae, ant faltem Icones prodivcrfls fpeciebus exhibits; ab An-
tonio Reecho in Hiftoria Mexicans; fed quoniam facultate omnes funt pame fimiles, imo uf-
atque forma parum funt differences, nomina tantum Indica nobis ignoca hie fubjitiemus,
3 "Aloe *Mexobilli* feu *Met I* viride. 4¹ e **cinereo** colore *Nexme/l* reliquis etiam fimilis. 5"
Quamel leu *Manguei* montaiium, fqualente colore, fibrata radice, & longo crafioque infigni
furu Jo. 6¹ /7<^:/Z(7///^aculds!ongispurpureifque radicibus & fpinis. j^{Avi} *Tapajaxmetl*
feu *Mtingtei* *Tij'ijaxmYtxcedmtUcre* fimilis. 8" dicitur *Acamel* leu ^ngaf/arundineum al-
bidioribus juxta radicem folits, & rubentibus fpinis, atque radicibus, 9^u dkitur *Majigueli* hi-
jinim obcolorem atrum, qjanquani fpinacradicelque ex nigro fulvefcant. To™ *Xihmetl* leu
Mai pilofum rubcis-fpinis 8f radicibus, quxrariores prioribus videri poiTunt. Vide ri^{ete}-
rasdivcrfitates apud Antonium Reccrium in Hiftoria fua Mexicana.

H ALLUCINATIONES CA3F. BALIHINI

Aliorumque Auditorum-

\ Lot Americana licet feinti forriat, nihilamhs
f^ tamen inter Atanaieai plai>tas, quippe enpitatas
pnpptfeutej, Uponi iton debt: t, ut plurimi author es
vidmtat faiere, abm enim mm jolunviribm, jfd
e n"m fane differt; cum inquitm Aloe iota fatn
dijfert, pr*ctpaelt>ribnshextipet<ili>, callitib: iitritin-
gularibus ab Atanaceii **debet/ejungt**, Zpottusjimgi
fuajirttfjmitibit, jicut 1101 prrrfmmnis in hat ie-
Hiene quart., cumfiartii tapjulifeminaltbu fit
ijfide m affiuit, & a fine ultimo l/fis em nine firm lit, t
reliqua omnia nil abtuut, injupr ntqttt tnibi 17-

detur inter Sedi (petit! rtpontndu AUe, /tut Cafh
Bout/taut fecit, cam a fine ultimo a Sedi tlaffe Ion-
' gcrtedat,- mm fit impts fios fit btxapetalus 8 ea-
f/ula feminatis tribus loiulameniu donata; Sedi
autem omnei fpecies fiaribusconjUntptntapr'alit &
poji ftorei finjtu/oi evanidos capfula don- • tl
multplici, vtdnplici. Aon poteji Afo, •*
dvtt, qpfstidudinejfiatmbata felierum,
rreecat jmeultim>> idfti, fiaribus e capfula, ni-
naltbm, femtubujque in tifi m contentu, a Sedi pro-
frte HiHh.

DE HEXAPETALIS TRICAPSULAJUBUS,

Foliis Jpiflis & fucculentis & radice tuberofa prasditis.

C A T V T XXIII

Y U C A five 1 U C C A.

YUCA five IUCCA plants est peregrina, foiiis longiscavis, & radicibus craffistuberofis pridica, caulem edens bipedalem, tripedalem, nunc majorem, none minorem, in cujus fummin fastigio nascuntur innumeri flores propriis pediculis uncialibus innitentes, hexapetali, albi propendentes circumscissimam, quibus unguis accitius (in calidioribus saltem regionibus) succedunt capsula triquetra, tribus loculamentis distincta. Propter hanc rationem conformitatem scilicet florum & capsularum cum praedictis in hac Sectione eius species huc redximus, ut hujus Sectionis agmen clanderent Yucar be dux species: reliquae duae alio faneremittendis exitrustura florum exhibitorum a Moisingo in libello suo Amstelodami impreBb.

ABUA XXIV. Sectionis quarta.

(*Aloe, C. B. P. Tuca, Ger. O*)
 Vita < Fol
 C
 fucca
Spuria Peruviana foliis stellatis {
 3. Obtusifis, nobk. 0
 4. Mucronatis, nobis. 0

Explicatio Tab. vigesimaquarta Sectionis quarta.

1. **Y**UCA foliis Aloes, C. B. P. Yuca, Ger. Yuca nova gloriosa elata planta, Lob. Ad. part. alt. Hæc est planta hexapetala erica pfularis loliis longis, cavis, mucronatis praxlita, & Aloe foliis valde accedens: radicem ferttuberofam, craffam, magnam, fungofam, RapUubftantia:, feddntorem, fucci plenam, fubdulci fapore, fed pemiciofaqualitate donatam, ex quapanis apud Indos, qui *CaMva* dicitur, fie: ex huc radice plurima oriuntur folia, longa, cava, rotatim fumroam radice p;rtem ambientia, cubium excedentia, Ixvia, & dilute virentia, in acutum raucvqnem definentia, fed uon tam rigidum & pungentem qnam in fcolis Aloes Americanae, funcque ienta Sr fraftu contumacia, nee facile cinduntur, nificultroacuco, perpecuoque hyeme & r Verc&aftate virencia; exhorummedio oricur caulis tripedalis, quirurfumverfusad jiedalem & felquipedaleni longirudinem in itimcros qitafi Icir liores niiguoa, all>f>s, licx^petalos, propendentes ex propriis pediculis iincialthus & **biuncialibus**, quiapud nos Septentrionales inutUiter **dectdoot** abfque ulla capsularojB fornatione, fed in India occidental!, Brafilca fcilicet, triangulares producunt c:ipfulas tribna cellulis ituloculamentis, al'ianim prxdiftarum plantarum fopra allatarum more in bac " MC qujira: proinde Yucam hie locavimus, & Aloes speciebus etiam floribus hexapet- J donatis, led minoribts, fubjuximus. India: ommbns plagis fecus fretum Magalicum nfque ad capuc Florida:, & quam plurimia infulis Canaballes diftis provenit-Dicitur apud indigicius Indos *djoni* & *otjed* ut plurimum Yuca & Jncca-Calida & ficca est in primo gradu: hoc iirLelliginir de larcibus poftiucaim virulentum exprefliim, quarexficcant fecundograthi.

ijuca fotiis Jilamencofis, nobis-Ha:c folia habet oblonga, cava, mucronata, rotatim itidem fummam radice partem arubientia, per terram itidem ftraca, (ed faturatius virentia, cum hoc difcrimie, quod folii recentia & viridia adlmc, plurima filamenta alba efficcara, inlVar eorum quibus inter cudendum utmitur fartores feu cufores vctfimentorum; caulem ciibitalem aucbipedalem emittit, in cuiusfumma parte ad pedalem longitudinem confpiciuntur Moes ptmimi, magni, albi, hexapetali, propendentes ex uncialibus pediculis: decidnt topioli illi Horcs inutihrer etiam, per paucis exceptif, qui capsulas Ciiqutras, tribiis loculamntis dtffindai produxere

inhorto D. *Georgii Crook*-, fito in pago *Waterjiok*, fexto ab oppido *Oxonio* miliari: illica. ino 1675. rudimenta capfularum obfervavimus tribus locijamentis^{^^}rfe&e diftincti: ari. m, fed non ad perfe&am. matumatem pervenire poterant propter lticlementiam coeli. Provenit in territorio Virginiano fub *Sereniffimi Caroli* fecundi ditione, Maximam habuit copiam *Gulielmus Walker* in fuo hertulo fuburbano Londincnfi in vico S^{ci}. *Jacobi* fito, fed nunquam illic fiorentem obfervare potui; per multos bene annos vigentem habuit' praedi&us *Gulielmus Walker*.

y. *Tuca* Peruviana foliis ftellatis obtufis, nobis. & *Monting*. *Yuca* foliis cannabinis feu *Manihot* Indorum, C. B. P. *Manihot* & *Yuca*, Lugd. *Yuca* Gomarae, Lugd. & *Jofeph*. *Acoftae* 1.4. c. 17. *Yuca* Peruviana, Frag. Radix hujus alia & diverfa eft à priori, eft enim brachii unius longitudine, faepius tortuofa & furcata, /juae emittit cauliculos parvos, quatuor, pedes altos, ex quibus emanant longis pediculis innixa folia ftellata, feuejus plants foliorum, quae *Alchimilla* dicitur, aemula, obtufa, fena feptenave in unum centrum pediculi fcilicet fummitatem concurrentia, quorum fingula dimidium pedem longa, tres digitos lata funt, Cannabis aut *Alchimillae* foliis familia, quoad divifionem foliorum, fimulinapicempediculorum concurrentium. Cum non habeat haec planta, flores hexapetalos, fed pentapetalos ex *Montingii* *Icone*, nee quales habeat capfulas defignet idem, nos facile inducimur conje&uram facere, nondum bene obfervatam ab authoribus, nee bene delineatam. De ufu autem fie loquitur *Author Hift. Lugd.* Barbari in regione Peruviana ex radice quam *Manihot* vocant, farinam hoc modo conficiunt: radices ficcas feu recentes tundunt feu radunt, dein in cerniculo cribratas invafe cum aqua igniimpofito commovent, ita ut haec farina in grumos coeac mannae granatas fimilis, quae recens optima eft, & plurimum lucci corpori fuppeditat: hujus i arinae parandx negotium totum mulieribus committitur, perinde ac viris indig. ium. Provenit in re^gionibus Peru, Cannada, & Florida, & tota continente inter oceanum & fretum *Magelanicum*, id eft, quatuor mille miliarium fpatio: nullus cibus ufitatior frequenti^rque, eaque farina cum carne & pifcibus vefcuntur, non aliter quam nos pane, admirando quodam modo, nunquam admoventes manumori, fed procul longioreque fpatio, magnaue dexteritate in os conjicientes, ac *Chriftianos* irridentes, fi aliter comedant. Quidam *Arachidnam* *Theophrasti* *Manihot* hoc eflè putant, fed perperam & inepte. Haec plantam & fequentem foliis ftellatis acutis, toto ccelo ab *Yuca* foliis *Aloes* fupra defcripta diverfas eflè concludimus, à fine ultimo, fed propter nomen commune & ufum communem ibidem hie collocavimus, donec alii oculatiores, & magis verfati in America? plantarum cognitione, melius difpofuerint. Cum haec plantae nunquam ad manus noftras peruenerint, nec finem ultimum quidem obfervare nobis licuit, aliis diligentius inquirentibus & exactiore trutina perpendentibus plantas omnes pafte Americanaf toto ccelo à noftris Europcis diverfas, reinquimus. Dicitur *Cocufhaw* *Hariot* in Virginiam. Hujus folium latum in feptem lacinias divifum eflè fcribunt: at r^Jix brachii craflitie, ex qua Indi farinam conficiunt (par. 2, & 3. Amer.) qua cum carne & pifcibus, ut nos pane utuntur; ex ea & placentas & panem conficiunt, quern *Cazabis*, *Benro*; at *Monardes* fc *Acofta* *Cacavi* nominant: lie & in *Hiipaniola* ex hac fecundanum panem, quern *Cazabi* vocant, conficiunt (par. 5. Ind. Occident. 12.) ex hujus fucco potionem parant: par. 3. Amer. 1. 2. c. 15.

4- *Tuca* *Brafileana* foliis ftellatis mucronatis, nobis & *Monting*. Haec à priori folummodo differt compofitione & ftrutura foliorum, quorum foliola concurrentia in centrum, fcilicet pediculi faftigium, funt multo longiora & acutiora, qua nota primo intuitu facile diftinguitur à prxcedente foliis obtufis donato.

A P P E N D I X

AD

SECTIONEM QUARTAM DE HEXAPETALIS TRICAPSULARIBUS,

OMISSIS,

Suisordinibus feu daflbns reftituendis.

• CAT V r XXIV.

, S^uMu* iEthiopicus flore coccineo, Comt. t. Hac Gladioli species a promontono Crfeu Spite bonsppei delata, nunc prir, ora floruit Latefe Parifionim m hortov. n ex* mi i^a v a um & exoticaram ftirpium apprime ftudiofi^r/M^aAnno Doma 633 menfe K S H B . Radicem habec tuberosamunicam, eamque longe habitiois amplitudinis planam tamen ut Nux vomica, depreffam; ejus lubftancia incima teas vim colorem refert & guftanti acctima linguam pungit: radix hsc tuberofo (non bulbofo ut vulc Jacobus rornutus ? multis r' wni Jcicur, ut vulgaris Gladioli radices, fingufc emm nerveis filam^t? uaiTMn fe in plexum velati rwformem textis fimbmncur, all* ab. s. mfident << mentis au a sh ic V

Meftaco u^f verit: tolia fu (lt lndls noft^ratls fobis fi-
ine autem inter fe difparia, qualia in Gladiolo vulgari:

gur[^]lgntlelm^{^^} Suliffe TthyrVus inter folia medius erumpic, nunc unus, nunc ramofus (u^afid. .nqu. t Cornucus.) ter/s, fragilia, glaber, cnodis, acque ex nigro leviter purpurafcens; hujus fuprema pars incoccineam vel icpicam feftigiat. Adcoque hille ftorum germina longias ta verfn difponuntur, uc in Hordeo ^{twi}& vidiffnus, prias autem quam hsc apenantur, alia poft alialongius excrelcunt, tuncqne cornienbrum modo leniter incurvantnr, ac tubulum Luatum formant lutei coloris, pediculus tamen quo tubus cauli adncftitur ruber, nee mfi propius intuenti apparec cum gemino folio atrovirente tegatur. Dum tub, luyus cmemum C infexbeimabdivifun., qu^a totidem funtperaln quorum tna longiora flincfc ob^tufa coccineo colore rucilanc, reliqua tria brevia admodum & acuta, extra pun.ceo colore cocdneoque ^{nunul}li^s li^{nis} coccinm ftriato fplendent; eo itaque d.fpofita tinguntur, intus croceo, ^{fiue cordine ut retalam} & ^{n ampi} mum* ^{fbft} TM ^{im} [?] [^] ^d incepta pofita, magna, infimum autem valde exiguum, uno verbobrevioralongoiibus interfcruntur; a cavo hfcjus floris fex (tamina fluunt, quae per fupremi petali fnum deducuntur inxqualt longitudine: inferiora humiliora duo, lunttertium elatius eft, fingub purpureis apicibus ornantur fifl^a sparce Huprema, prona vero duplici linea ex pulvere luteo contefti dirtintfts: ftilus fineap^{ice} apparet, fedin plurimis hujus fortis ferpencis modo uc triulcum caput ap-

^ I S J & I S K V ^ E E I ^ i « Sif « « i fpecis nuper ex Indiis oria-

libus icccpit D. Vefpafianns Robinus Horti Regii Patifienfis per mukos annos demonltrator Hiblicu^a Huic radix cuberofoaunifoimisubftaiuise (non bulbofo uc vulc Jac. Cornutus } nuntitudine, Croci Meftiaci effigie, quam incok lubencius efitant, ficotetiam ejufdem ^{rcndm}%dices Hiipani opilionesedunt, qvns Nofelbas vocant, (vocabulo vernacule avctJanam fignificante) poftrema Eftatis parte, qaam Oporan vocant, flores fundit in fingulis caulibns nunc fingalares, nmnceaam flutes, ex fexpetalis varie coloratis compofitos: interna fi quidem paisacrulea eft, circuloque flavodivila, dorfum autem media & infima parcecine-raccLiin, media quini mucronem porrigicur languide cxruleum, elapflore feminainfolliciilolubrotundo, carinato, & tribus cellulis diftinfco, ut in Gladiolo concepta nafcuncur; folia ut in r^{de}bulbofo aut Aphodelo fibltio minore, teretia nim fune & per longitudinem ftriata, qmn & modice in terrain reflertuntitr. Referatur hoc ad capucy. poll: 3. Sifyrin-

chium illic Nar'ciffus juncitblius omnium minimus flore omuino albo calice fimbriato, nobis. Bulba/odium minimum tenaifolium album, J. B-Chabr. Narciffe hie montinus minimus qua-

terna aut quina habet fölia tenuiflima autcapillaria, viridia, humi procumbentia & fparfa; inter quae cauliculus emergit infirmus, palmaris, "tenuis, nudus, unicum fmmo flore n c membranaceofoliiculo prodeuntem fuftinens, tenellum, candidum omnino, calicis dris fimbriatis donatum: radix bulbacea, fimilis Narciflorum reliquorum radicibus, multis tunicis feffe involventibus donatis. Dicituraptefatis minimus montanus albus Lobelio.

4. *flarcifus* juncifolius albus calice longiuiculo feu magno foliis tortilibus, J. B. Chabr. Narciffus hie juncifolius (inquit Lobelius Adver.part.2.) albus, tortilibus foliis (potius dixifct petalis) donatus, calice longo & nntante petαιο pendens, prominulo ftilo feu piftillo tenui, qui anno 1604. floruit Mediacaftri Malachri.se apud D. C. Coorne, cujus ftoris Iconem Londinuni ad Lobelium mifit. Idem effereor, inquit Lobelius, cum Narciflb juncifolio omnino albo calice amplo prope Betam Gallaxiae oriundo, & empto a Nicolao k *Quilt* Rizotomo Parifienfi anno 1603.

5. *Narciffus* maximus autumnalis quorundam non amarus albus feu Pancratium Indicum, Cluf. Hift. Radice eft (inquit Lobelius Ad. part. 2.) fpithamum longg, brachiali craflitudine, multis cepaceis tunicis fubalbidis fquamosa, feu potius tunicata, extimifque cuticulis ex ruffo fubfufcis aut caftanei diluti coloris: feffili parte maiore mediocrem pugnum fequante numerosis, carnofis, habitioribusque fibris Pancratii aut Scilta inftar, qUafi trunco aut nodocolleftis & appenfis fuld. Opinabatur Lobelius Pancratii aut Sallxfpeciem, fed neutiquam; fapor enim amarus in Scilla refragatur. Septembri aut Odobri oftonis aut denis floribus (tellatis, Colchici albi Anglici paribus, fed longioribus, exit fubluteis, ex albo luridis/enis longioribus ftaminibus albis praeditis, e latioribus membranaceis tunicis Moly Diofcoridis modo pendulis, brevioribus finecaule, forte penuria alimenti inhxrentibus. Ir.tci pl'ires unicus bulbus Lobelio floruit, fed quia diu omnes in navi quafi terra deftituti, foliis vid.xi erant, tamen rudimenta confpicua, in minore buibo retufa apparuerunt, Pancratii Monipeliaci fimilia, duas unciaslata, breviora tamen, forte nondum profus enata, antperfedam Jongitudinem a(Tequuta. Omne^hi bulbi hyemis fxvioris injuria anno falutis 1^00. Londini, Antverpax & alibi amicis communicati periere, quos ip(i Lobelio dederat amicus fingularis D. *Johannes Loeus* Germanus, Londinenfis Chirurgus egre#us a naucleris reducibus ex Hifpaniola occitoe Indi^ *Teborum Capo* feu *Porto* vocata.

b'tiarciffi M Africanus five exoticus bifolius dplex foliis acutis & obtufis, nob'. Hie variat tantum quoad folia, quae bina femper oppofita per terram ftrata confpiciuntur, funtque vel mucronata feu acuminata, vel obtufa feu rotunda.

7. *Narciffus* minimus calice pleno petalis fex reflexis luteis, nobis. Bulbocodium minimum coronatum, J.B. Chabr. Narciffus minimus coronatus, Lob. *teuton.* Narciffus 21. five montanus coronatus, C.B. Phytob. Pseudonarciffi genus admodum exile, Cluf. Bulbum habet nic Narciffus omnium minimum, ex quo unicum protruditur folium, atque in fuperiore caulis parte ex vagina membranacea exit unicus exilis flos calicem eerens luteum quem ambiunt fex petala lutea, valde rettexa.

8. *Narciffu** minimus calice amplo piano, nobis. Bulbocodium tenuifolium, J. B. Chabr. Narciturhic Narciffus minimus, inquit Clufius, quibusdam Lufitaniae & bituriae collibus. Pseudonarciffi genus eft, cui folia quaterna, non lata vel porracea, fed valde angufta, ut Croci folia, feu quafi juncea: caulis tenuis, nudus, galmum alms,-cujus extremitati infidet flos evaginula membranacea emergens, qui fex petalis herbido-pallefcenibus expanfis conftat, quorum medium calix flavus calathi ipfar oblongus, verfus marginem ampins, nullis oris finuofis praeditus, ut Bulbocodium tenuifolium flore luteo fimbriato, fed xqualibus & planis: radix exiguu Narciffi tenuifolii & floribus fimbriatis radi«i par, nucem Ponticam aequ.n^ in tus Candida, tons nigricans; flori deciduo foccedit caput tnetrum, ternis loculamentis ahorum Narcifforum more diftintum. Florebat Januario cum Ulff.ppone Hifpalin proficilce erui Clufius, u V in C 0 k *Camfani* Ua, hoc eft, Campanu lam vocabant. Referantur omnes hi Narciffi ad cap.X. Sea. 4. interfua Etamilias p^antas * H miles <

9. *fyacmbu** lantolius Dab., J. B. Chabr. Hie ffonte crefcit in monte aureo Arverniz; Sh *capitulum* *corif* *US* *Unid* *s* *obduaa* -> ^ *TM* * *x* *t* 8. aut 10. obfcure viridia, nunrni... " L l in folio rum q^ amrnodo ^ ula: floresedit in fummo caulis fcios, ltpunos, nunc plures, nunc pauciores, czruleos feu eleganter ^ ut pureos, particubtim fe expandentes. lemen continetur in capitulis tricapfularibus.

I O. H *AmhU* * W l TM + J- B * Chabr * Fo l l i s cftlomris, tenuiflimis Phalangii vulgaris foliis fimili...; caulis fatis magnus, in cujus fummicat quatuor flores fpeciofi, eolore & magnitudine

tudine fimiles Hyacynthi ftellati Germanici floribus, fed tribus petalifc-tre&is, & tribus repand\$, ut in Iride parva, caerulea: radices forma & colore Tuliparum radicibus fimiles, fed raito mLiore. Aprii Tripoli obfervavi, inquit Rauwolfius.

Quamvis a flore lafteo Ornithogalon aut Ornithogale herba, ut Plinii verbis utar, deſcenda effe videatur, veruntamen hujus quodque ſpecies nonnullae florem edunt luteum feu croceum, nihilque vetat ratio minus natura varietatis ftudioſa, coloris etiam alterius plura alibi producat, quibus non floris albedo, fed effigiei fimilitudo Ornithogali nomen confervat: niſi forte, quod & fanius inter pretatur Dalechampius, Ornithogalum dictum fuit a lafteo candore bulbi, figuram ovorum avium referentis, potius quam a flore, qui cum avibus aut avium partibus, cognitionem nullam habere videtur.

11. *Ornithogalum* luteo-virens, Jacob. Cornut. Huic caulis & tolia iimul emergunt longa, lata iit in Ornithogalo Pannonico, fimiliter etiam fulcata, caulis inter haec medius, ultra nedalem longitudinem affurgit, rotundus, glaber, virensque: hunc nuiſ veluti glauci coloris halitus fulundit, cum levioſe taftu defloratur, ut in prunis, uvis. proximat unſ videre licet A medio fere ad ftigim ufque floſculorum globulus ſpicatur, adjefta cujuſque petali appendicula cujus cavitatibus flores finguli celantur admodum granorum in ſpica triticea, quax duma folent obtegi, id quod familiare eſt vulgari noſtrati Ornithogalo. Taulatim globuli ſe e cavitare ilia (ubducunt, fabieſtque eorum pediculi longius producuntur, unaque cum fiore deorfum nutant: flos tandem luteovirens dehifcit, ſex petalis confans, quorum tria externa latiffime expanſa luteo colore fimbriantur, tria vero interna in ſe compreſſa manent ut Leucoi minoris verni, mucroneſque habent intro reflexos, quibus ftamina alba cum apicibus luteis reconduntur, tria vero his impoſita ftamina apicibus carent, piftillum triangulare medium floris occupant, teminibus parvis turget: hujus in apice mollis ftat epiphyſis quax cum flore marceſcit. Nunquam floris hujus petala vento aut vetuſtate decutiuntur, fed in ſe contraa & occluſi tabeſcunt. Referatur hoc ad caput 12. inter fui generis plantas.

12. *Moly* floribus iubviridibus* longiffimis pediculis inſtentibus, nobis. Jylbly flore ſubviridi Boccon. Moly hoc bulbum oblongum habet: folia Aphodeli albi foliis familia: canlem rotundum, leevem, non raro cubitali proceritate eminentem, cujuſummum occupant, in umbella quaſi, flores e luteo vireſcentes, longiffimis pediculis innixi. Gaudet opacis locis & filvis umbroſis. In montis Medoniſe convallibus copioſum occurrit. Remittatur ad crap. 16. ad ſibi fimiles bulbos.

17. *Lilium* Canadenſe imperfe&is floribus & irregularibus mukis albis, nobis. Videdeſcriptionem ſup p. 20
18. *Lilium* et amlatifolium, B. Chabr. Bulbo inſtitur tali, quali Lilium album: caule verbodonamr, non ut caetera Liua, craſſib, fodtenoi, qui flore n producit unicum cruentum, ſex petalis latis confantem: cauli adnafcuntur folia rara, yalde lata, Plancaymſ mediae rolis firmiſſa. Dicitur Tabernaemontano Lilium 6. five cruentum latitolum. Remittantur haec duo Liha

Explicatis & enumeratis Hexapetalis Tricapfularibus plantis in priore membro hujus Sectionis in ſecundo ejuſdem membro hic tra&abimus de Pentapetalis, radicibus tuberofis feu nodofis wanulatis, grumofis, feu Aphodeli radicibus prsditis: exordium faciemus ab Anemone, «ai tubnaemus Pulfatillam, Carvophyllatam, Hepatcam triphyllam, & Ranunculos. variorum ecnerum tam propter aſtifeſtem radicum tuberofarum, nodofarumve, granularum, crumofarum q^"1 Aphodeli. Quxdam harum plantarum fena gerunt petala, quxdam plura, fed ut plurimum quina, cujuſcunq; ſint coloris aut magnitudes; in hoc conveniunt ontes. tuod fin illis floribus evaneſcentibus fuccedant plurima femina in unum coacervata, five rotatim aufglobatim vel (picatim proveniant, five fint pappoſa crinitave, vel folida aut acule-

ATA.

SECTIONIS QUARTÆ MEMBRIM SECUNDUM

Anemone, Ptilfatilla, Caryophyllara, Hepaticafeu
Tnfolium hepaticum, & Ranunculus.

CATVT XXV.

. ANEMONE .

ANEMfNH Dkfcaridi I. 2. c. 207. *Anemone Plinh L 2K C. 23* *ἀνεμώνη, ἀ vento, quod flostantum ventoflanteaperiatur, nospociusnomtn df.duftum aferimus, quodejasfcmina pappo involuta vncō ablatalongē volent, unde istkrbavenii quibufdam.*
• Genera duo Diofcoridi is PUnio, filvepe 4& fativum: bujus inquit 7nult<efpeck\$, Pbcenkeo flore^ candkante autlafleoy.aut purpureo.'

Anemone est planta bexapetala cujus flori' deciduo fbccedit fpica mulcis feminibus pappo auctomenco invohuis., onerata: radice conftat tubtrola aut nodofa. Est a laticudme foliorum, vel latitolia, velcenuifolia: rarione colorum riorum est vel flore candido, rubro purpureove, crruleo, coccineo vel verficolorē, id est, variis coloribus - mixco; etltic a numero petalornminrloribus, velfimplex, velmultiplex; a loco t... •, vcliativa; fit radice tuberola, ea^ue vellonga, aut rotunda,

T A B U L A XXV. SefionJs quarts

Simp/ex	<p>r. <i>Trifolia, Dcd. Ger. 0</i> <i>i. S'ihēflrkmapr alb^CB.P. Anemone •\$. Mattb. Anemone florealbo, Lob.Eyft. 0</i> <i>I. Clydamini feu Msh<t folio lutea, CB-P, Anemone borten/is latifolia i~ fimplki fiavo flore, Cluf. Hift. 0</i> 4. <i>Ger'anii folio rotundof>urpurafcetis, C. B. P. Anemone hortenfis latifolia 3. fimplkiflonjtuf Hifi. Anemone papaveracea^ Tab. Ger. 0</i> 5. <i>Latifolitijimplici carrteciffore, C.B.B. Ammom fortcnfts latifolia6. fimplki flore, Cluf Hifi. 0</i> 6. <i>Oenamhes frlio fere violaceo hnafaah^ nobk. Anemone Oenentbes folih fare violacce kxapbyllo, CB-P- Anemone Hnuifolia flore purpure-violacco, Eyft. 0</i> 7. <i>C<erulca Ger anil Robertiani foth, an DhfcoridhX- B.P. Anemone Roberriana, Tab. Anemone Geraniifolio, Ger. 0</i> 8. <i>Hcrtenfisverficolor, nobk. Anemoneborten'fis latifolia plena fflore^CK', Hifi. Anemone maxima poly an; bos Chalc \-hnica, Lcb.Ger.® ' "</i> 9. <i>LatifoUacoccineoflore^nobk. Anemone latifolia flare pltnđ coc cince, C.B.P.Q</i></p>
Anemone	<p>10. <i>Latifolna Chalcedonies feupolyantbes major, Pajjai. 0</i> 11. <i>Tenuifolia fore coccineo mhiphti, Eyfi. 0</i> 12. <i>Tenuifolia Bizantina fiorecarnitovivad([tmo^ FloraParifm 0</i> 13. <i>Tnutfotm fiore fupuro-violafcentepolypttalo^ nobk. Pirperampoly-pfyl/o, Flora Earifik, 0</i></p>
Multiplex	<p>14. <i>Latifolna Chalcedonies feupolyantbes major, Pajjai. 0</i> 15. <i>Tenuifolia fore coccineo mhiphti, Eyfi. 0</i> 16. <i>Tenuifolia Bizantina fiorecarnitovivad([tmo^ FloraParifm 0</i> 17. <i>Tnutfotm fiore fupuro-violafcentepolypttalo^ nobk. Pirperampoly-pfyl/o, Flora Earifik, 0</i></p>

tyttaiio Tab. vigefim* quinti* Stfionis quart*.

\$- *AN.EMONE fiore fimplki.

Anemone rriiotia. Dod. Ger. *TM*/ar, fc cognofcitur a carteris omnibus, tolia etcmr. i nec Ranunculo, n?c Coniil" *o f Wia11 f d potius infer Triblii cohērent, fiq. cUm terna, non magu a, lata, acunmiaca, iadivira, margintanrummodocrenaca: caulicoL pal-*

mumaltus, cujus fastigio infidet flos pentapetalus, fubinde hexapetalus, candidus, aut ex albo purpurascens, Ranunculi florem forma aemulatus, qui marcescit, nonnihil purpurei coloris contrahit; huic succedunt spicatyii annexa plurima femina pappo involuta, qua vento ablata hue illuc agitantur, & ubi decidunt germinant; radix etiam obliqua in propagines quaedam extubemat, non absque capillamentis fibrosis.

2. *Anemone filifeftris major alba*, C.B. P. *Anemone* 3" Matth. Lugd. *Anemone* flore albo, Lob. Eyft. *Anemone filifeftris* i^{ma} Cluf. Hift. Haec foliis crefcit Ranunculi 1. Matthioli foliis fimilibus, caulibus tenuibus, fefquipedalibus, rotundis; in quorum cacumine flores exeunt albi, quinque petalis distincti, Rosarum filifeftrium magnitudine, & nonnunquam tenuiquadam purpurei refperfi, inferiore praefertim fede radicem habet fibratam ac tenuem. Naicitur in collibus; tota planta caeteris mitior est, quare minus excalefacit & exficcat.

3. *Anemone Cychmim* feu *Malva folio lutea*, C. B. P. *Anemone hortensis latifolia* 1. fimplici flavo flore, Cluf. Hift. *Anemone latifolia*, Lob. Lugd. Tab. Ger. Haec satis ampla habet folia circinatasefererotunditatis, in ambitu finuata & ferrata, dura, firma, longoque petiolo fulta, fupina parte intensiore viriditate praedita, prona plerumque purpurascens, ut Cyclaminis propemodum folia, fervidissimi faporis: inter quae palmaris exit caulis, teres, fubhirsutus, firma parte ferens terna laciniata folia, deinde ex illis emergent pediculus, qui iorem sustinet decem aut pluribus petalis confertam, externa parte flavis, interna aureis, umbilicum occupante capitulo multis aureis ftaminulis fepto: radix tuberosa est, oblongiuscula, Tormentillae vulgaris fere aemula, aliquot fibris praedita, foris nigricans, intus alba, folida, ingrati admodum faporis, quae gustantem excitata nausea quodammodo frangulet, deinde sua acrimonia linguam aliquantulum vellicet. Lapidosis quibusdam Lusitaniae collibus juxta Tagum, atque cuncta inter vepres eruebat Car. Clufius Decembri anno 1664. & infertenti Januario, quibus videlicet in Hispaniarum stirpium Historia expressa est.

4. *Anemone Gerarii folio rotundo purpurascens*, C.B. P. *Anemone hortensis latifolia* 3. fimplici flore, Cluf. Hift. *Anemone* 1. Dod. Carf. *Anemone papaveracea*, Tab. Ger. Hujus folia sunt Saniculae foliorum pene divifura initio, prona parte nonnihil purpurascens, non multifida, & tenuius incifa; deinde emergit caulis nudus, lanuginosus, dodrantalis, nonnunquam etiam pedalis, tribus laciniatis foliis, tanquam involucro, florem includens initio, ut infuperiore tandem excrefcens florem sustinet in duodena vel quindena petala divifum, radiatum & stellae in modum cingentia difcum fed umbonem medium ex plurimis ftaminulis conflatum, qua: foris cineracei sunt coloris & hirsuta, interius mixta rubedine purpura nitentia, gratissimo affertur, medium caput (inquam) villosum, nigris ftaminulis circumseptum, quod excuius floris reluti primum emergentis Asparagi thyrfulus intumescit & ex piano villofoque five lanuginoso femine conflatum, per maturitatem quovis auro flatu decutitur, & venti ad arbitrium fertur perinde ac filifeftris Anemones vulgariter femina: radix novellarum plantarum ex femine natarum exigua olivae foliis est, vetustior autem nodosa & articulata, foris nigra, intus alba, fibris aliquot, per quas alimentum trahit, praedita, quaeque sustulata frae & a pangi ac feri potest. Earn quibusdam Germaniae locis fecundum Rhenum inter Moguntiam & Andernacum inter vepres in aprico florentem Martio confpiciebam, inquit Clufius.

5. *Anemone latifolia fimplici carneoilore*, C.B. P. *Anemone hortensis latifolia* 6" fimplici flore, Cluf. Hift. Hanc speciem habuit generosa Domina *Henfentain* Bizantio allatam, quae Aprili & Maio flores, protuligiblibiorum forma, colore, convenit cum priore, radice autem a priore differt: flores etiam simplices, fed decem aut duodecim latiusculorum petalorum numero confabant finguli, purpurei fere coloris, & non multum a 4" riorum colore recedentis, nonnunquam carnei; unguibus albicantibus, multis nigricantibus ftaminulis cingentibus medium caput hirsutum, quod etiam maturitate in tomentosam feu lanuginosam spicam, femine planum in medio tomenti continentem, terminatur.

§.2. A N E M O N E tenuifolia flore fimplici.

6. *Anemone Oenantes folio flore violaceo hexaphyllo*, C.B. P. *Anemone hortensis tenuifolia fimplici flore* 2. Cluf. Hift. Huic folia ante hyemem prodeunt quina aut lœna, multo minoribus & crebrioribus incisuris divisa qaam prioris Angustifoliae, Bulbocastani five Oenantes primas foliis non valde diffimili, magistamen carnosa, & denfiora dilutiusque virentia: caulis inter ea pedalis aut major, unus ut plurimum, nudus, hoc est, nullis foliis feptus, quadam lanugine pubescens infar caulis latifoliarum, quem circa fastigium ambiunt terna

minora Sr multiida folia ad tempiis fiorem occultantia; quibus expiicatis apparet flos fum-
mocaui infidens, crii'caloreapertus, majore qiam Anemone Geranii Robert! ani foliis ampli-
titudine prsditns conlpieitur, & (ex duntaxat pi'talis confare, licet interdunt feppena aut
oftonn acquirat purpuici&quafi violacei coloris, externa parte ianugirio(is,cujus umbilicum
occupant lamina, nigricantibus apicibus pndtta, capitellum villofum nigrumque ambjenta,
quod nullinquinani femer proterre animadvert! licet totis triginra anni-i, inquit Clufius,
in hortualuerim : radix nodola eft, multos in obrlquum quaquaverlum (pargens tenues fra-
gilefque ramos, foris albicantes, intus albos.- Hxc Conftantinopoli Viennam Auliria: allata.
Floret Aprili & inrer dum denuo Autumno ; radice mirum i» modum propagatur, nam tfr'n'il-
fimaejus tragmtnta facile comprehendonc cV repullqlant, etiam abjefta, cV nulla terra tefia;
nee mirum filemina nonedatcuauanca avtditate fingula; particular pulhilant.

» -J. *Anemone* caerulea Geranii Robcrtiani folio an Diofcoridis, *C. b. i'*. Anemone Roberti-
ana, Tab. Anemone Geranii folio, Ger. Hortenfis tenuifolia i^m* fimplici folio, Cluf. Hift.
Hie Anemone multJ habet folia novo Vere, cum prodire incipiunt, pnrpurafcentia, deinde
ex viridi pallentia, nunc trifida, Coriandrt, porius Geranii Roberciani toliis finiilia ^crgemina ^
plerumque fimul pediculis connexa, hirtuta, & in terram, utrcfte monet Diofcorides, in-
clinancia: inter qua caulis exit nudns quidem, led quem terna toliola trirariam profund'ns
inciia, media parte amplecuntur, qjasaliqu3. mdiu Horemocaltant, don. ee folts calore ex iis
fcexplicans fit emergens expandatur in quatuordecim ant quindecim perala, mucron-itajmi-
nora qitammhcifoliarum Ipeciebus, coloris vel csmlei, vel albi, (hnunulis albis, quo-
rum apices pallidi, medium liorem occupantibus; decuffo flore apparet capitellum pent
Ranunculi riiftar, conrlatum exienunibus ejufdem feminibofsi ^us, nectaput eft tomen-
tofum ut in Anemone latifolia caeterifque genuinis; ideo hi. -icanda eft, & ad Ra-
nunciforum *ch&m* aniandanda hare plama; radix digiralis pie. ^tigitudinis & craffi-
tudinis, in aliquot tubercula emintntiadvifa, liiqne (ibris obfita iliac fpargantur
inttrra, foris nigra, intusalba, qns fragmentis **fimilicer pangi** pott. ic primo habu-
trunt feptentrionales rariorum plantarum cultores ex Italia, radicibus, ;io miffis aclarifli-
moviro *'AtybonfoPanc'* w^ ferenitl. Ferrarije duels medico, *WLufawio Johanm di Brandon, i[*
aliis ejufdem copiam Fecit.

8. *Anemone* hortenfis pleno flore vericolor, C. B. P. Anemone hortenfis latifolia pleno
flore, Cluf. Hift. Anemone maxima polyanthds Chalcedonica, Lob. Ger. Hare mulra habec
folia, fata, profunde incifa, in margine levjcer ferrata initio, Anemones fimplici flore foliis
pene familia, deinde Saniculs foiorummagis arniula, majora tamen, magis d*^ nervofaque
& intres lacinias altius **diyife**, infuper in am bit u ferrata, **fapina** parte viridia flimodim, &
quafi nigricantia, prona candidiara, fervidiflimi faporis & linguamillico urentis, ante liye-
nicmechm ^ermiminua. Novo jam Vete unus auc alter caulb inter folia prodit dodrantalis,
interdum tiani pedalis loiifjucudinis crailiufcnius, nudtis, **hurfatas**, feu **brevi** hnugine (ep-
Eus, **circs** taff'giuni tmlatmfcola folia, autnullis, aut breviflimis laciniis divifa, abeodem
fere exorm prodconm & fimul tandem caulm ampleitencix, proferens, deinde binisun-
(.is lupra jam diita tolia **emcrigens**, magnum ac lace cspanfum Woremluitinet numtrofis pe-
calis conlbntem, quorum externa *Sx* maiora clena autduodena colore viridi Ht pluritmjn? prz-
dita Hint, eorum mucronibns coccineo colore leviter & virgatim ftriatimque infctis, interna
vero minora 6V angpiloradibtiore ex rubro purpura nirent, Aquae medium florem occu-
pant, ejufdem eci;m toioris, ad umbilicum reHexa cV glomeraw funt. *

9. *Anemone latifolia* flore pleno coccioeo, C. B. P. Anemone hortenfis latiFolia z^pleno
flore, Cluf. Hift. Hujus petala oftona aut plura extetna laciara & obtufiora funcfincerna
vero coccinei **prorfus** coloris: eorum ungues fiiporiore parte ex pallido Havefcutit, inrima
qua **capita** adherent coccinei **radiatira**, in pallido defiuentis, funt coloris; floris autem um-
bilicum nonoccupantglomerata&rehya petala, **at in precedence**, led villofum capitellum
nigancans mnlcis nigri, ftaminuJis cinffum, quorum apices initio pallelcunt, deinde ubi ob-
verfi, ad lubcxrnleum colorem tendunt. Ejus floris diameter tribue unciis Romanis amplior,

10. *Anemone* tenuifolia flore coccineo pleno, Eyft. Latifolia Chalcedonica maxima polyan-
thos Pafei. H^c a magnitudine **lions** cjul^ deganti coccineo colore hcilea cweris cognolcitur.

11. *Anemone* tenuifolia flore coccineo multiplici, Eyft.

la. ^wimwtcnuifolia Bizwitii B flore cameo vivacifimo Flora* Parifiis. Vide Iconcm.

13. *Anemone* tenuifolia flore purpuro-violefcente & polypetalof ptrperam polyphyllo) fr-
a. indumdoannamnoftram. Vidclconem. ^ Omnia

OmniunvAnemonaram afignare varietaEes quoad magnitudinfim >*> parvitatem florurti, eoru/nque diverfos colores laboreflet inrjnitus, acque cujuvis Botaiiici fuperans capture, datura adeo vane h\dk in hoc genere, ficut in Tulipis atque Narciffis, Ranunculis, Csryophyllis, aliifque roulis generibus, longe pace nti bits in minienfo/jce;mo leu Univerfali Hiftoria plantarum; ut de omnibus & fingulis agere (quia ex fatione indies novas varietates oriuntur)effet; Sifyphi volvcre lapidem, aur Danaidum dolium implere. Nos genera hie & alibi afignamns, ut o^ulibec poterit (iibakerna genera alaticudine & angutbafbliorum, eornmque diverfitatem afimplici velmultiplici ferie pecalorum, eorundemque'variis coloribus proprio Marre inveftigare 6f*pronunciare. Nuilus eft a nartira lin*s nomina convenientia hifce Anemonarum aliorunique generum fpecicibus imoifendi prx-fcriptus autaffixus.

TEMPERAMENTQM & VIRES.

Anemone, autbore Diofcoride, vim baberacrenK, cum ejus radix fit cattda isr ferv'idi gufl&s. Ga-knits omnes Anemones fpecies extrabmdi^ (y attrahendi, isr ora vaforum referandi, facultatem obtiuerefcritbit^itaqueradix, ait, commanducat^fjuuitamevocat: ejufquefucat* ex nanbus purgat, oculorum cicatrices extenuat: infuper fordida ulcer a Anemone expurgant is lepr&re-trabunt, menfefque appofit* eliciunt^ lac trabunt, lac quidem aitrafxre Dio/corides inquit; folia isr caules cum Pittfana cofta isr in cibo accept a mtfes etiam cien inpeffb appofita.

HALL NATIONES CASP. BAUHINI
Aliorumque Authorum.

Pd£. 174. cnl. I.pi. *M ttrruiea Gera-
mt Kjbertiani Jo .{coridis, C. B. P. A-
ncmone lfybertiana, . icmant Geraaii jot 10,
Gtr. HfiC nan ftwiiitjeit. in pappefa,ergt> nun tjt
Anemone dictnda Authboribus: femina producit fl-
iwtufarum more, piurima acucieata in unutt taput
foaeirvata> trio eft Rjinunculus caraUus Geranii
b i i folia ditmiut.

Pag, 171. col. 2.pi. it. Anemone nemorofa flort
ftiajore V- Banhini in Prodrano, C? omnes Antmomt
Jpecies ufque adjinemcof. i.pag. 177. noafant Ane-
mones fpecies quia femina lanitginofa nouproilucimt,
fed fiint Hanutuuti fpecies a jemiutbut 'aculcatii in
tapitatum congejhs ; fTAviter lapftjunl Attthates qti
errartfeetre Cafp. Bauhinam t nee hie, rite ilitjmem
tiltimum conjidtraverant.

DE HETAPETALIS TUBEROSA RADICE,

Et pluribus feminibus crinitis, feupappofis fimul congeftrisprseditis.

C A V V T XXVI.

P U L S A T I L L A .

ANentones alterum genutjit^Lifnonia vocatur, Plin. I. ii.c. it. ex Tkeeph- 6. Hift. j.
Anetioies genus CGaze traKKinvertit. Plin. I.1 i.e. 23. Phnknabtt J quod Lei monion
vacant: hanc fuvt qui Pulfatillam efie velint. Pulfatilla nominator, quodfeminum tremuli
pappi leviffimo fiatu hue atqutillac agitentur, unde isr berba vend dicitur, quart Sp*« did
ptejl.

Pulfatilla eft planta liexapetala, cujus flori deciduo fuccedunt plurima femina fimul junfta
verfufummum caulis faftigium, a quorum fingulis villofa caefaries feu comaincanefcens pro-
fflit, Eft enim planta calida & tervidi guftus, ut Ranunculi Sf Anemones fpecies • hujus
eniniin remiilliore, illius in intentiore gradu. Quoad folia eft auc foliis minus auc magisdiP
feftis Apii aut Faftinacs filveftrtstenuifolis; ratiotiecolornm tiorum, eft vel tlorc ciraleo
violaccove, rubro aut albo, vel luteo.

TABULA XXVI. =Seftionis quartus.

Pulfatilla

fkre

- 1. *Majore dilution, nobis. Pulfatilla vulgarh dilutior, Cluf Hift. o*
- 2. *Minors faturatiore isr quafi nigricantt folio magis is tenuiin incifo^ nobis. Pulfatilla vulgaris faturatiore flore, Cluf. Hifi. O*
- 3. *Alb, CB.P. Pulfatilla alba, Lob.Lugd.®*
- 4. *Pulfatilla [libre] flris folio, nobis. Pulfatilla lutea, Gtfn.Hort.,Ad. Luteo\ Lob. Cami. Ep. 0*
- 5. *l^Apiihortetifis folio, nobis, Pulfatilla Alfma 2, Lugd. 0*
- 6. *Alpina bifpidior, CB.P. Pulfatilla 1. Lugd- &*

Explicatio Tab. vigesima sextae StSlionu quartæ.

Pulfatilla folio craffiore flore majore dilutiore, nobis- Pulfatilla vulgaris diltitior, Cluf. Hill. & Pan. Pulfatilla vnlgaris, Lob.Ge-\ Folia hujus fatis Paftrinacx-filveftris feu Carots foliis familia funr, nifiabiisniagnitudine vincuntur, tenuidivifura piliiqotrcipondencia, ex pediculo longiore palmar, circiter, admodum villofo & propper terrain fubrubence appenfa : caulis ceres, cavus, denfa Ianugne obduflus,dodrantalıs, delapfo flore pedalis & major, mulcis ve! ramis vd foliis rfonanis, unico excepto folio caulem medium fey cingente & in plurimas lacinias divifo, interionbus latioribus, quod paulo aliquando infra florem nafcitur, denfo motlique tomento comacum, circnnfcbc^ l^bri auracetabuli profundiufuli infer caulem cingens, fibicjue verfus canlem continuum, qv od execrtus in lacinias numerofastenuefque finditur.- caulis laftigiofummotfos infidec nnicu; ,magnus, eiexpetalis actiminatis S. rellexiscompofirus, purpurafcens, forishirfutis, inrus ^Inber, fevemfedfua- vem odorem fpirans: medium obfidet ex oblongo rotundum capitulum, fibrıs apicibulque luttis cirrntum; poftqıam autem dilapfus eft rlos, caulis fupra folium prardi&um alcıus excrefcit, locoque fioris fuccedic comofum capitulum.ftaminum hololericetum moliitit feu villoia ca:fariecomofum& incanefcens, argentci fplendoris; appenib unicuique ihmini feminc oblongo, tereti: dilapfis porro&pri" ficcirace caducis feminibus, una cum ftaminibus appenfis, caputrelinquitur rocundum: radix craffa, longa, nigra, in plura capita incerdum divıa, fupcriuxtreliquiism3rcidorum toltorum comata^ fapore nonnihıl amarticante, & tiudem acrimonij lingtiam vellicante.

a. *PulfatUla* Hore minore faturatiore & quafi nigricante folio magis& tenuiosincifo, nobis. Pulfatilla vulgaris faturatiore toho, Cluf.Hift.PuKatilla altera,Dod.Lugd.Pulfatilla Hore claufo, Lob. Icon. Hæc floremedit: minorem, faturatiuspurpurafcentem, tardıis florentem (proindeterotinadicipocert) foliahabet longiota, acuminata, fine ordinc caulibus adharentia, Repemur & flore rubro, qQiEcft Pulfatilla tubra, Dod. Lob. Lugd. Tab. Ger, cujus petala in extremis funtobtufiora. Invenitrnonnimquam luxuriante natura flos hujus duplicipe- talorumferie confans feu pleno floe.

^*Pulfatilla* fiore albo, C. B. R Pulfatilla alba. Lob. Lagd. Tab. Ger.Pulfatilla flore candido. Dod.Hsrc tolia habet prioris finHlia,dnrrioratarnen,af florenilacicum; inter myriadesPulfatılks flore purpurcodonatas unaaut alterapore lafteo,qu2ncloq;_Tcquentiorts repcriuntur fponte in agro Nt-apolitano, referente Ferdinand^ Bnperato, atq; obradicam acrimoniam *Gengtvo Silva-ifo* id eft, *Gingiber filveitre* appellanir. In Mindenis *Sc Arvernii* montibusrepcrleEur etiam, authorePcna. Utraquehsrc fpecies interdum 8. lafteo Hore mixtim inter alias c^js generis p.antasnaicens, fimul & ineunce Vere rlores prodocens repcritur in Pannonix &c Anikia; iıivıs, iniototi Germaniar & Gallii locis inaikrs fatis communis, a. in Buigundia Andibus leu cemcorio Aııdcgavc-nij vl,ıgarıfer in locis negleais reperimus nos, ra vKvr T^, Vaffnac:f filveftris folio, C.B. P. **Polfettlh lotea.Odb.HorcAd-Lob.** o-fn dc u^u* 5- L"gd- Anemone filveiVris 5. Cluf. Hift. Hxc qoatta nobis cl- g.nscit Ipecies PidTacilla ncc ante Clufium defcripta, necaClufioıpioobfcrvata, fed iTo- HL r r ,CO Mcdiobor g«fi apud Matriacos , dum ex Italia Bafile.m profit if cere tur. urbrnJ ac !7 C^noıınunqnam minimi digiticraflitudinem arqunt) villolo capite mulca FOtruc tfolu,vulgans PuHarılb foli, ^finiılia, laciniata & multisdivifiirwfeaa, n,ol- V r P VıaV, r Jıa, P ronaau tcm paululumcandicanti;, valdehırlbra : inter qu>C>Us ulus^otundusjanugineobfitus, circa iummuh! ful,ımns ftolia, e <pib> prodic vulgaris

yalgaris Nilivitolbfamilio pediculus, cui infidct flos mucus, mater u.rⁱurirmim, & Pulfarills viUgaris move fex peralifconftans, quaclntiore parrt rJava fufit, exteriore aut<?m ob la-nuginem dilutiora & pallei.ria: in hpjus malitullio orbiculjtum caput lureisfhmimilistin-&uca, cut villofa ca:Sr>3 (iiccedm vidctur. Morecjunio, & Aiiguito nitric niar'vrinice m aflequi vcrifimile eft, cumaliis fds fbrtis. Tn Alpium planis & Taurbncnfibusnafitur, nuiquam abiHidantiusqion) circa pedem moncjs Sanfti Dernardi, goa Htlvctiosfpcfta:,

S.Pulfdiltahiez Apii borcenfis folio,C.B.p.Poifetilla Alpina 2, Lugd. Anemone filvfttris j.-ChtrHiit. Radicecfticrenuiore&breviore, minus atra: foliis Apii-hortenfis fimilibus, paulo latioribus, hirtitia, radice mambientibus, nullJs in caledodrajitalilatiugiiofb, me^lia fui parte villoio glomo pubeicenre, tx quo prodic floris atirci pediculus, fuftinens poft evanidum fiorcm femina in acervum coafta, villofa cj^Jlric aioruni liujua fortis feroinum more ornar:i.

6. Tutfatilla latea Alpina lit'pid!or, C. B. F. Pnlfatilla r. Lugd. Radice confbtt craffa, nigra, exefa; foliis Apii modo diffeftis,* inter cres lias fpecies latiflimfs, hifpidis. Omnes hæ tres pofteriores Pulfacilla: Ipecies reprinntur in ntunctJuta& in Allobrogum vkinia. Vide quatuor alias deienptns in Prodiomo ^{alp}, Bauhini'.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Efloihn Fulftillavehementer acrh, qmncunqm carports contigerit par/em, ft impmqtur trita txukeram is trodtnsK Ranunculi* baud inferior\ provide calida vehement^ tv ficca. Ab Empirickidcompert' * Bninsffltus-, quod valmrana fit kerba, quodque folia neftine ^{quodam fitef} ut ocuws qucmachodum Alium isr Gepfferi-wr; fued illa per Ahmbum ^{clp} aqaamvitlnhm mundifficdh curadifque profunt utwffifham, qu<£ isr putruiam' >». Folia, caults <? flom, inquit Mattblolut, cum ticerrimo flat gufnt, tj/calefaciuitf is' ficcant ordine quarto, Incidunt, attenuant, attiahunt^ digtrunt, tx-puTgnni extitcerantque. Radix -vrro cumfubdulck fit, w« longe aberit a temper a tx. Sunt qui earn prtferant contra pftiikmiot cuittagia, (x vtae/ta pota, iff virulentonun animalwm i&ui, fi.cumni/io bibatur, drachmamm duarum pondae, quart inentidotU adduur. Aqua I folik diflillafa vulmrafatlar, is pota fudcrem provocai* Pal/at ilia, Trago dffta krb,i venn, calida eft iff ficca, ddetque magk exteriug, quota intefiua corner is partibu* adkberi. Commendantr ad cahuhs-, gttngr*nam% puniJa vulmra^ ungues fquolidos., popular mari-fcai, verruca* <y mammillm. Radixftceftita, fimiutamentaciet: cruda vtro man/apit ait am elicit.

DE PENTAPETALIS TUBE-ROSA ET FIBROSA

R A D I C E , .

VA pluribusjpmibus crinftfs funul coiigeftis donati's.

C^T V T XXVII.

• C A R Y O P H Y L L A T A -


Caryophyllita, abodore rodickfie didiij quodvernali iempore eruta CaryophyHmn aromati-cum odore referat: vulgus ab infivni tjm tfficacia herbam benediftam <jr fanamundjm ap • fellat. Sunt qui adLagopum Diofcoridk l. 4.C17, riferant: alii refim ad Gettm Plinii I ib.c.-]. alii adejudem Ci.25.c9. Argmoniam vecant, a/jut radix thus redolent* •

Caryophyllka difljngnitur a Pullatilla quod folia habtac lobata ucplurimum hirtnta & ere-nata, femina acuIds rigidioribus feu minus pap*poft; (cmiuujus PuiratiIX,cciam donata. Ca-ryophyllaca a colore riorom eft, vel purpurea, vel lutca ant alba; a ftrutura tSiorumdi-vertis modis ludic iiacura, fedcujufcunqut func folia fotnu-, conveninnt (ine ultimo, id eft, femina arftc in giobuhim coafta rtlinqmnt fflamenta rigida, crinita aur pappofa,atque eo no-mine cum Pultatilta couveniutic, etiamfi flores producut pentapctalos omnei Caryophyllatar.

Pars T A B U L I XXVI. Seftionis quart

		(i. Minore, nobis. <i>Caryophyllata vulgaris</i> , Cluf. Hift. Q
	Vulgaris flore [^]	
		(2. Majore, C-B*P. <i>Caryophyllata filvefiris</i> , Fuch. 0
		3. Major, nobis, <i>Caryophyllata major rotundifolia</i> , Lob. 0
		4. Omnium minima, Pon & Itah 0
	Alpina Lutea <	\$Apii folio, nobis. <i>Caryophyllata Alpina minima alter a</i> , Pondt
Caryophyllata		d. <i>Quinquefolia</i> , nobis. <i>Caryophyllata Alpina Pentaphylka</i> , Ad iy Icon; Lob. 6er. 0
		ry. <i>Nutante flore purpureo calathi effigie</i> , nobis. <i>Caryophyllata rotundi-</i>
	Aquatica [^]	folia <i>Septentrionalium pappofo flore</i> , Ad. l. ob. G
		{ 8. <i>Alterapurpurea</i> , nobis., <i>Caryophyllata montana</i> 3. Cluf. Fiji. 0
		9. <i>Alpina Cham*dryos folio, nobi*</i> . <i>Cham^drys Alpina Cyfti flore</i> , C.B.P. <i>Cbam*</i> - l <i>drys montana frutescens durior</i> , Ad. Lob. 0

Explicatiopartis Tab. vigefim < e f e x t < £ Seftionis quart*.

1.  *AryophyHata vulgaris*, C.B.P. Cluf. Hift. Ad. Lob. Carr. *Caryophyllata hortensis*, V[^]Fuch* *Caryophyllata*, Dod. *Herba benedicta* 4: Brunst. Beneiiaa, Gefn. *Caryophyllatae* huic vulgari flore minore funt folia fubafpera, hirfuta, (errata, alata, id eft, folia viciniora radici bis bina, aut ter terna conjugatim pediculo foftbrum ac'nafcuntur minora, unum impar rhajus, etiam ferratum & mucronatum, extremum pediculi claudit, a[^]eo ut hoc cum duobns extremis conjugatis foliis tripartite, Tribliorum modo appareant in extremo pediculi: emedio pediculorum foliorum exeunt caules cubitales, fubinde bicubitales, tenues, qui furfum verfus ramulos finduntur, atque iingulis bifurcationibus terna confpiciuntur foliola, ardre cauli adha'rentia, afpera, nigra & febrata; pariter inramulorumaftigiis flofculi apparent lutei, pentapetali, (ibrotundi, minores multo fequentis flore, cum plurimisftaminulis itidem luteis*, quinis itidem interfingula petala fubrotunda, exilientibus foliolis anguftis, valde mucronatis, quae capfularum loco flori in expanfo inferviebant: fingulis floribus-decidentibus fuccedunt fingula capitula, afpera, ex multis feminibus in unum centrum congeftis conflata, & filamentis hirfutis, rigidis ornata, beneficio quorum per maturitatem exficcatum, veftibus pfaetereuntium adherent prasdifta femina: radix molds capillamentis fubruffis fibrata, qux exficcata *Caryophyllum* od[^]re refert. Nafcitur fecus vias, agrorum & hortorum fepimenta, intervepresetiam, gaudet opacisacumbrofis locis, magis quam patentibus atque apricis.

2. *Caryophyllata vulgaris* majore flore, C. B. P. *Caryophyllata filveftris*, Fuch. *Caryophyllata montana* vulgari fimilis, Cam. *Caryophyllata*: montanae hujus flores funt multo prioris floribus majores, magisque ad croceum colorem accedunt. [^]Quilibet ejus difterentiam ex pifturae floris intuitu-poterit difcerne[^]ein Tab. 26.

[^]*Caryophyllata Alpina lutea* major, nobis. *Caryophyllata Alpina lutea*, C.B.P. *Caryophyllata major rotundifolia*, Lob. *Caryophyllata montana*, Dod. Tab. per. *Caryophyllata montana* 2. Cluf. Hift. & Pan. Simili etiam propemodum ratione ferpit hujus lutea; radix, qua purpureainfra defcribenda, cujusetiamradicenon eft minor; equa fimilitermulti-pediculi nalcuntur fuftinentes hincinde ternas, quaternas, fubinde plures alas exoppofito, vel aliquarido alternatim pediculo annexas, alis *Caryophyllata*! purpureaj nutante flore non breviores, fed longiores Sc majores, hirfutas, ferratas, dilute virentes: extremum pediculi claudit unicum folium, rotundum/eiufdem colons, fimul finuatum & ferratum. Ex medio pediculorum foliorum exeunt dodrantaes cables, graciliores quam funt *Caryophyllata*je purpurea: cau[^] minoribusque foliis cincti, qui fingularesplerumque, nonnunquam etiam plures caliculos fuftinent, in quibus kk fiunt videndi floras aurei, pentapetali, majores, hiantes, Cifti feminz amplitudinem interdumxquantas; medium occupantTnulta ftaminula, inter quz. latet yillofa quardam congeries (eminum, qua: excuifo flore *Me* explicans mollior eft *Uryophyllia*:* purpurei nutantecapite congerie[^] femem plannm ad[^]tum crinitis filamentis oftendit,

oftendit, quod maturity Pufcum eft. Tota etiam planta lanug[^]obfita, & affri&ionis paraceps eft. Exc fpecies in fummis Alpium jugis, -nee in omnibus tamen, fed inter gramij[^],v?l fub fruticibits nafcitur. Floret flithic Junior; femē Augufto eft maturum, in hortis maturius, anà cūm Caryophyllata purpurea nutante flore. .

4. *Caryophyllata* Alpina longifolia /inuaciſ nee proinde mcifis folns, nobis. Cary[^]phyllata Alpina omnium minima, Pon* leal. Cariophyllata: Alpine minimas i. fpecies, eiderru Caryophyllata Alpina min6r, C. B. P. & Prod. Hxc minor fpecies iutea provenit ex radice craffiufcula, dimidium palmum longa, candicante & multitariam divifa; ex qua p[^]rotruduntur e, teTra folia tres uncias longa, foliorum Agrimonix aemula, fed nontam incana feu albida, hirtuta tamen admodum, fcatent enim lanugine coloris obfeure virentis & quaſi fplendentis, ſequaliter hinc inde difpofita, in margine proiinde fatis finuata; in hifce vens confpiciuntur: emedio foliorum lurgit unicus cauliculus, curtus admodum, fuftinens unicun[^]orem aureum pentapetalum, incujus medio cernuntur plurima filament[^] cum calycenon abfimili prioris & majoris lutei calyci: cauliculus eft, 'inquam, parvus, lanuginofus, rotundus, palmariis ad fumum. Floret Julio. Plailta eft vivax: exficcat Ut externi fæe famihas. Invenitur in defcenſu montis majoiis Baldi, & non procul inde cernitur altera & fequeris Tpecies foliis Apii & caulibus procumbentibus.

5. *Caryophyllata* Alpina Apii folio, C. B. P. Caryophyllata Alpina minima altera, Fon. Ital. HEC Caryophyllata Alpina accedit priori parvitate, fed differt praecipue ab ipſa, quod folia profundius incifa, & foliorum Apii, inquit Caſp. Bauhinus, potius Saxifragas criſpas feu petnE3> Tabernsemoniani foliorum aemula, ex noſtra ſententia; prima folia per terram ſternuntur ut Potentillæ folia: Caules exēuntes e medio foliorum ſunt longi, cubitales ſcilicet, fuſtinentes finguli unicum florem luteo-purpureum, qui eft reſpectu plantæ fatis magnus, habetque in medio capitulum multis longis filamentis, denſe difpofitis, plenum. • Muko magis exficcat h[^]c ſpecies quam prior quarta.../ Plantula eft rara, diu durans. Invenitur cum pnore in monte majore Balde, teſte Johanne Pona.

6. *Caryophyllata* Alpina quinquefolia, C. B. P. Caryophyllata Alpina pentaphyllea, Ad. & Icon. Lob. Ger. Hanc primum nadi, inquirunt Lobelius & Pena, putavimus eſſe Tormentillæ ſpeciem, verum radix Geranii radice fibroſa, foriſque rubiginofa, parum quid fuave redolens, quinetiam flores pentapetali, lutei, & exſerit comofa ipſis ſuperveniens Caryophyllatam teſtantur: caules erigit pedales, quibus ad genicula ſuperiora h[^]erent folia quinquepartita, aut in plura ſegmenta divifa, ambitu ferrata, cingentia rotatim caulem, Tormentillæ aut Pentaphylli ritu: flores fert minimos, luteos, quinque petalis rotundis donatos, ſtaminibus lanuginofis, pappoſis, minimis cum plurimis croceis apicibus fuiſ ornatos. Hxc Lobelius in Adverſariis. Cauliculus producit abſque ramis tenues, quibus adherent parva & pauca foliola: in hornm faſtigiiſ unicum aut binos fert flores aurei coloris, pulchros, juvenidos, triplo minores flore ſilveſtris Fuchſii, cui deciduo ſuccedit compaſtim circulus filamentorum mirabili artificio fruſtorum. Hxc Caſtor Durantes. Semen pappoſiſ donatorum non meminit, nee Gerardus, ideo inſuſpecta eſt mihi hujus denominatio: examinetur a poſteriorum habenteſtarn Caryophyllata:, an Pentaphylli, penes ipſoſerit determinatio.

1. *Caryophyllata* aquatica nutante flore purpureo calathi erligie, noBis. Caryophyllata aquatica, ii<i> nutante flore, C. B. P. Caryophyllata rotundifolia ſeptentrionalium pappoſiſ flore, Ad. Lob. Caryophyllata montan[^]pah". Lugd. Eyft. Caryophyllata aquatica, Cam. Ep. Faſuſtns, Cam. Hort. Caryophyllata major feu purpurea, Thai. Radicem habet haſc digitali aut pollicari interdum craſſitudine, ſumma tellure creſcentem, craſſo & purpurafcente cortice teſtam, impenſe adſtringentem, nodorum veſtigiiſ, quemadmodum in Acori radice, alternis diſtinſtam, anteuſ (illius inſtar) progredientem, & multis nigricantibus fibris, non injucundi proſus odoris, fed aliquantulum ad vulgaris radicis odorem accedentibus, formatam, ſuprema parte in aliquot capita diviſam, e quibus longas, ut in Eupatorio, emergunt foliorum alae, adhaerentibus pediculo tolii multis foliolis, binis, ternis, e regione difpofitis, & ferratis, modo aequaliter, modo inordinate naſcentibus, verſus extremum terna majora folia cernuntur, peroras finuata & ferrata, quorum tertium & poſtremum, extremum pediculi Hannexum, reliquis longe majus eſt, & magis orbiculare: omnia ſunt guſtus exficcantis: inter pediculos foliorum emergunt pedales, interdum etiam longiores caules, firmi & rotundi, brevioribus minoribusque foliorum alis eodem ampleſtentibus obſiti, ſuprema parte purpurafcentes, in aliquot ramulos ſimili colore praeditos, & deorfum inſeſ vivemites d-ivifi/qui propendentes ſuſtinent flores, quinque plurimum petalis, nonnunquam a luxuriante natta fenſ,

am fcp.enJ9 fuavitw. -ijbentibas&orbiculis rereconfanres^joi^ngioie tamen&anguftiore unguic, nimquam fe explicuntibus aut caliculum fuperantibus, fed quodammodo ipfi inclu/is, medium occupante villofa congerie, luteis itamiri'ulis obfita, quæ paulatim purpuricnteni coloi em contrahit, & tandem feie erigens & explicans, maturitate femē cui inharret, ut in vulgar i Gi.yophyllata, oftendit. Tota planta cum fuīs coliculis **pubfcit**. Crefcit media fere montium regione, lccisudis,cum caSanicute montansfpecic cui lafteiimt flores velutifanguineis macuiis afperfi, & Ranunculo illo platyphyllOjfubipfisarboribus. Floret ifticjunio, in hortos tranflataMaio; aliquando etiam maturius.

8. *Caryophyllata* aquatica altera purpurta, nobis. *Caryophyllata* aquatica altera, C. B. P. *Caryophyllata* montana 3. Cluf. Hift. & Pan. Merito ob riorum coWem fuperiori aquatics conjungendaeiftelegans hsc plant.1, quamquidem nafcentem nurifjuam confptxir Chifius, nec^jiiilconemhanc fuifcoloribusdepiftam illicommunicavit DoniinusPennarus, fed idem IYnnKtis ex C V. Conradi Gcfncri depido herbariodefumpfilfe fattbacur. Folia quidem huic *Caryophyllata*? ftiu, led an lanugine pubefcant ex piflura colli^crt non licuit, queniadmodum nee qua fit radice prardita, nee qualia fint qur ex ea prodeunt folia.' foli enim caulescum floribus, onoqueaut altero folio cauli adhaerente, depi^ifucre: fiors fane elegantis & fanguinei (bnt colons veluti Bizantini -Ranunculi flores. Duarum autem videtur effe fpecierum, namalteriusflos multiplies petalorum textura &ferieconfat, alterius vero fimplitantum, utriufquetamen fioris medium occupat villofa congeries, non fecus ac u aliarum *Caryophyllatarum* (peciebus, Obferuauimus in horto Blxfenfl & montanam minorer florenutante purpureo, quafseptima majore diftertbat, quodtoliaedcbat glabra, mintitufquediilefta, & florem mu'to minorem; denique tota planta fuit minor ac htm'tlior majore, feptimoloco explicata.

9. *Caryophyllata* Alpina Chamdryos folio, nobis. Chamxdrys AlpinaCifti flore, C. li JP, Chamrdrys montana frutefcens^larior, Ad. Lob. Cliamidrys 3-fivenTOitana, Cluf. Hift.i & Pan. Chamacdrys momana, Lugd. Tab. Tcucrium AlpinumCifti flore, Ger. Elegans alia Chamxdryospecies reperitur, inquitClufius, qua: dodrantalibus interdum ferpit ramulis, colore ex fufco rubente przditis, duris, lignofis, fbliicnulla fericeosambitntibu^, f.hamxdryos legitima; folia omnino refcentibus, led paulominoribus,(upra viridibns, 6Vfubnifinicanis, guftuadmodum adfringente & exficcjnte: flores ilti in oblongis **pedicula** bifrutis fingulares, albi, fenifatplurimum, interdum etiamoftonis aut denis (adco pro loci natalis ubertatealiquando luxuriat) peulisconfantcs, Ciftifarminxflorismagiiiradme, multisftaminibusin medio priditi, inodori, quibus decidentibus villofa fuccedttfeminum congeries, qualis in *Caryophyllata* Alpina luteacernicur, fed major & crmitis **flanentis longioribasornata**: radix dura & lignolact, indiverfacendens, & quibufdam nigricantibus fibriftripata; qum & rami interdum humi procumbenKs & fparfi fibras agunt,uc integri nonnunquam (cfpites ea tt-fti confpiciantur. Frcquens eft in Autti i jcarum & Stiriacarum Alpiam jugis. Floret Juniototutisillicnivibus, femē ad matuntatem perducit Augufti, dcinde **pediculi** omnino exareicunt:inhottofttranflau, in mnbtofo loco tenuiqut folo aliquamdiu perfiiit, & OH tuius floret.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

•*Caryophyllata*^ radices & folia baudobfme refucanteitrfaciMtebabent, (y nonnibiUaltfa-

Zl^f^ma^m rX^Ur fanilt^ri^ntia Ad vtnt^(\ult crt^Jitates, toll hboris, vemnatorum' *fructibus: crud^s hummi* commndti/ur. Prodejl itan hterk dolonbto, turn jicn *winem alicubi interius* cMcoquit: vifctribus inf>*Tintia exf-urgai (y flatus JifcuJif, *larfn Propman'* id Jf^con p^tiumib^ *Jmiftuntur, ?<< qjtcis, nuffi,^ atque exalte •le* Radices exfiaat* *PerZ'uZ 7* < dicoeio baud mutilmT cum rectntta, turn vitoa *tmndam.* PerZ'uZ 7 *bre aceti refperfa, vefles a tineis prafervant, & jucundo calore* *cnUm flatuunt.* s J £ *barius & recentiores calidam & fyffy* *llatam inf cundo* *lota ficcatur inufus. Mai^hhtZ* *hnd parum aftri* hmkkdt. Ea a luto, terra, & forM *iboracHtamintmtauUera quam* T^scribit recentio-es medicos Carjepfyttai* fctu uti ad *fy* *utilheriniki;* *oifaftu fptniu* recreart (y fru'diün* *borare, epotumprodte cteliaL* *dysentericu, faminarum profiuuib; illitum, enterocelis auxilio effe.* *crebrum ro-* *fruiui, is iTutmji*

HALLUCINATIONS CASP. BAURILNI

Aliorumq;ie Authorum,

P Jg. 3-M,a 122. cnlhcacCa,fp.'Baubinns Caryo-phyllatam inter fotentillam (4 Dentariam, qu# a fine ultimo nuUamcum CuryopbyUata h&btbn affittattm. CaryopbyUata aim f^ froxime a fine auedit WjatiU; id** ^iu; eidem adjun- s"pa'g 248. col. 1.pl-v- Chamedryi Alpina Cifit fiore C B. P. Cbam*drys montanafrotejeens twrior, M.Leb. OmmsClamcdryspropneloqutndorfplan- tajratcaia verticil^, at b^planta * < > * # . - pofitamhabcti ergo nan debctCbamadrytdut, mufto

minus inter Cmm^dryos fpecieta CajparoBaubiwi, cictarifquc authorihm, a yuibus haufit ipfe Baubinut, ceEocari; quum emtembitc plant a fiortminftar Ca- ryopbyllatic, & femina pappo/a in tinum coacervata gerat, licet folia habeat dura, viridia fitpcrius, & incana infrius Cbamizdryos more, attamen a [me ultimo, mea optnionc,apte Jatis appellabitur CaryO' pbyllata Chamtedryos folio, tion autem Cbamadrys a ffilmitadine foliorum cum Chamadry: folia enim, uti ficpius a nobis dtSum, nonfaciuit ad genus conjitit- endrim, fed fpccicm deter mtandam.

DE PENTAPETALI'S, - HEXAPETALIS

HEPTAPETALIS VE ,


Radicibus fibrofis & foliis ternis lobis donatis, feminibus fibiinvicem arete conglobatis & congers.

CJT VT XXIX.

TRIFOLIUM HEPATICUM, feuHEPATICATA TRIFOLIA.

^Rxcis ac Mauritanis incognita Ruffe videtur haecplanta, quae hodie abherbariis He- » -jpatica Trifolia, five Trifolium hepaticum nominatur, quod hepaticos juvet; dicitur & HerbaTrinitatis a foliorum figura, qux ternis lobis conftruch obfervantur.. Propter arfini- tatem in iioribus & feminum contextum, quae coacervatimechinata fpccie in globulum func congefata, at funt femina Pulfatilte, Caryopliyllatae & Ranunculorum, hue reduximus ad fibi fi- miles plantas fine ultimo inter fe convenientes.

Pars TABULI XXVII-



Explicaiiepartis Tab. v'tgefwidefeptimg SeStionis quart*.

(T ^ Rifohum hepaticum flore fimplice, C. B. P. HepaticaTrifolia, Cluf.Hift.. Hepatica terreftris, Gcfh. Col. Hepaticumtritblium, Ad. Lob. Cam. Gcr. Trifoliumaureum, Uod L^o- Trifolium aureum magnum, Caft. HerbaTrinitatis^Gefn.Hort.Lugd. Folia ha- ^cphntula lata,magnitudinc quafi foliorum Afari. figura Trifolii acetofi, intreslobos ... in medio tamen continua, averfa parte quibusdam maculis aferla; primo abfqiie caule arent folumniodo folia, poftca inter hxc foia ex radicibus ipfisgraciles terctefqac, fubhir- jJP?* ^Qtlice ex virore rubentes crumpimt coliculi, dodrante brewores,palmares, interdum r r^30 Inures; "in horum lummis flofculi apparent utplurimnm fenis, aliquandofcptenisSc ^ relqiupa ^ [on{tantes, in quorum medio plurima apparent ftaminula, quibusfatifcenti- ottonisptt -esfemini]m ecliinatafpccic,inunumccnruni, cauliculifcilicetfummita- bua tucedic 6 arfte fibiinvicem adhserentiam Ranunculorum feminum more, ma- tem, congefatorum, & ma- tura

tura Maio ffonte juaeque floribus expanlis Mariio iucoflere plurima concateiurjn conjnnga. Radin[^] » jfunc graciles, fibrofo, numerofo, nigrs, in diverfatender tea : loll?, hyeniepermanent: flores ficoelum clemcns fuerit, circuFrtruarii medium eruriipimt; fi rigidi:s, menfe Msrtio; fcmcn Maio matiirefcit: polt riorum defiuviu & feminu matoritatem nova fingulis anniserumpunt folia, qusaveriapartcnonnihilpurpurafcnnt, minus ta men quam Cyclaminis minoris. Reperitur in plerifqne Germanic fuperions locis, non lblum in Vjennenfiagro, fed omnibus filvis Pannonis, Auftriac interioris. Proven ic itideni, teftes Clufio, in montanis Sabaudrajfilvis, in locis oparis & umbrofis, inter fruticetain Bohcemia, & fecus yfias. Reperitur vulgore cirulto; fed fepe confpicitur fiore albo & carneo. Obferyatur in hortis ilcrepleno, caulc-o, nibro, incarnato & albo. Floris pleni Iconem adfulpendam curavimus prope Hepaticam flore fimplici Tab. 27.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Refrigerandi ac reficcandi potentia cum aftric Twm, b<ec Imbula pradita eft, hepatis caliditate debilitato cenerre fatur; nam & refrigerat? robur ei non mguum confert, jLmdatur, isr ad ramicem efficax a Baptifla Sardo peybibetur, jl rejtcctat<efulverU cochkarU menfura, ex vino attt jure aliquo continuh diebm exibeatur.

HALLUCINATIONES CASW BAUHINI

Aliorumque Aathorum-

PJ%. ilo.tsl. z.p!.t.&u.TTifoUm hepaticum flare jimpici, & Trifolium hbtaticum jhreplw male a Cafp. Bauhiua inter Tnfotrtim & Melitotum, qutpnt Trifalia jKpililn & (r.it.colioca>itar; cum put plant* cum Jllortiru tumftmiiubui racemajii in fa-

pitulum can^tjiit Rjntintu Jarum mart danat*, j debent lijriunctiit in juttgi, nori Tt i'o. papular; fflis fett LejtHntimbut trifatiatit. Fide fupra Hnllu tinnij Trifolieritmpajr. 1/.. Hifi.no/r. "cnivrtfat. Oxon.

DE PENTAPETALIS,

Seminibus fibifn vicemardlc conglobatis & congeftris radicibus & foliis varie conftrudlis **donatis.**

C A Æ V T XXX

R A N U N C U L U S .

BATP Ax 1 ov Dhfcrid. Ia.c.2o6. Rmimnfa, & Apium agreffe. Ra-

numutiti quodranarum mm humJ_K limitibus is^l opack marginibu* ftagnorum, aliorumque luimidirjLum locorum Utctur: out quod ran* inter ejus caules jiy folia frequenter invtmantvr, A[^]ium[^] quod dhifurafolforum quidm Ranunculi Apium dtmulqitur.

flor Cata-a eomplwra Difcoridi: i, Ccriandrifolik (& adMaht latitudinem accedntibus PlinioJ iuteo interdump UTfurw: 2.tanugtofitu (fdiofius Plimmjc, uodfilveftre Apium appellant: 3, minimum fhm aurco: 4- huicfiimk Uore lafleo; idem babet Plinius L25 cap. ultimo.


Ranunculus ell pbnta calida fcacris Cr^{ei}>lllcise xc_iptis) florem gettns pentaperalum, (U'litcuiKjuecoloisfitaut: magnitudes; atqae floribus fingulis foccedit congeries icminum fibn vicem adjunftoruni, five in fpic[^] five in Globi lbrmam aur %uram adaflorum, fine fpinis aliqiuondo, (pirns verout plurirnam fingulis ieminibus affellis. Suntque variis modis Ranunculi diitnguendj, prtmb ratione riorum, Cunt enim, vel flore violacto, rubro, aut albo, airt ci: his mixto, velluteo: rafipn, d_orationis, vel funt annai, vel pertmt tporis funt dolccs, nqiicptrjuci, omnes Htplurimum acres & calidi, quid'am in remiflore, bnidamin nfiore gradti: ratione ba, vel font peregrini, Afatici, IUyri, ircici, Creni, Lafianici, Tripolitani, Conftantinopolicani, vtl noftratca ftuEuropci, flrvnl garts, qui i'IncMTOofi^nUenl^lciiarvenre^iuncquHln.iniLusmrcmopungentibus, vaechinads/ jwumresiiveaqyaria.iiqvvlnciuou.svclminoresivclniontanidivcrfilormibus prrdititn!) btra ratonc toliorum, vel funt talus diverfas plantas imubncbus, Aconki, Cotyledonis, Apii.

Plan-

Phntaginis, Verfoliatx, Tnaliftri, Graminis, Rucac,Hsder3e, Be:.. oliis tenuius diflecris feu/ceniculaceis.Ratione radicum vel font ixllicibus Jibroils, ruberoia,^ .mois feu granu!tis, denique Aphodeli; habits ratioc poficionis, funt vel furrefti, vel procumben.es/Ranunculi, qui ex genie ui is caulium per cerra ftratonun fibrofas demittunt radical. De hifce omnibus dicemus ordtne, atqae eofdem diftingncmus in genera fubalterna per paragra- plios, incipiendoaBfiaticisperegrinifque.

T A B U L A XXVIII.

RANUNCULI Afiatici grumofa vel Aphodeli radice.



6. i. RANVNCVLI Ajiatki Grumofa vel Aphodeli radice przditi.

Explicaiio Tab. 28- Seftimh quarte.

Ranuncula grumofa radice flore albo, CB.P. Ranunculus peregrinus i«gramola radice, Cluf- Hift. Ex radice multisgromis conttante, qualiseltAfiatici,oriuntur primo huic fpeciei plura folia, Afiatici foliis non valde'difiimilia, & intra ilia caul is pedal'is al- tirudinisjn binosgrjcilesramosdtvifus^nlumrao hifrigio fuirinen.es rlores fingularesquinque pcCiiis conttantes rtlbis, quibus.(njaxime circa oras) fuaverubens color mixtus eft: me- dium florem obtincbant mulcarlava ftamina, oblonginfcnlam capirulum cingentia: caulem antequam in alios dividereyr, ampleftebanturalia folia, in cernas, quaternas lacinias, fecta.

^Ranunculus ramofus grumofa radice, CB.P. Rammculus Afiaticus «ta'«H&' five gromofa radice 2.Cluf. Hift. Ranunculus Afiaticus grumofa radice flore Phocniceo ruberri- mo, Eyft. Affera hie fpecies ex fimili radice grumofa primo planiora promk folia, inter qui princilis affurgit caulis, cujus infimam partem ambiontfolia in ties profundas lacinias, eafque in ambitucrenatas,divifa; mediam autem illius partem alia fingularia, eaque neclaci- niata nee crenata: fummo cauli in pluies ramulos brachiato inhxrtnt flores quinque pctalis, nt przedens, praediti, coloris Phanicei ruberrimi, fed extrema partemagis orbiculatis& Vviter crcnatis: medium florem occupat breve capitulum Ibnunibus cinftnm.

3. *Ranunculus Afj, in, us flore Havo vario, C.B.I'. Floic Havo rubris vents diftincto, Cjtli Cat. oolt & Eylt- Ex radice hi IIIU i nu, tls* gronus conttante, qualis eft Ranunculi Tripoli- rani flore rubro radix, prodcunt initio ternaam quaterna iolialongis pediculis innixa, per oras crenata, in tres lacinias divifa, quemadmodum in Tripolitano, dilntics tameiuliquan- lulum viicntia: inter qnx profilitcaulicnluslatis fitmus, foliolis intenuiores.& lrequentiorcs. lacinias divifis prxtlirus, pracfertim iisqua: fummo cauliculum ambiunt: fummo vero cauli infidet flosfatis amplus novem petalornm fimpliceferie conlbns,orbiculato mucroncfefe mu- tuo arSecontingencium& vetuci reflexorum, fiavi ad viriditatem vcr^entis coloris, qua: rtt- bellis five purpleis vt-nis virgatimftintdillitifta: medium fiorenioccupatcapitulum,quale in Tripolirano, idque mnlcis itaminulis purpurafcentibus cinftiim cernitur; fedqandoqut- dem ejus radix aliis propaginibusgritmofts au^ctur,fobolesgrumofa: adnata: iiminisvicem fup- plent. Eodemttmpore floreCquoTripolitans, licet folia cjus pnfoccius contabuerinc quam Tripolitani folia. .',.'

4. *Ranunculi^ grumola radice ilorc niveo, C.B.P. Ranunculiispercgrinusgrumofa vadice 3. Cluf Hift- & tidem Ranunculus Creticus grumofa radice fiore^veo, A.pp. alt.& Eyft. Ex radice pimolii aliquot folia prodtidt iaris anipla, hmni quafi in oibi;m[p3rfa,(fucculencia,*

viridia, fupina tamen parts albicante colore in viridi veluti cot'p'rla, in tres lacinias per oras aliquot crenis divil'a: Utter ilia qua^rni aut quini prodeint caules, yraciles, iirmitaraen, breviqoadam lanugineobfiEi, quique ex foKonim niagis inciforVim, qai-bus an-')iebantur, - alis, alrernadai plennnque, etiafi nonnanquatn tertium ramu!um produ-cunt yaivouno folio ornatum, fummoque fafiigiofuffinentfubfofcm caliculom/mquinque foliola iufco viiloobfira divifum: isdeindeexplicatus florem oftendit quinis petabs, nnciam mplis, prorfiifjoeniveisconfanreni (licetinterdm qoaedam confpici&otnrraria venisua- .e-rubentibusper orasparfa} e quorum umbilico emergic capitalum fiibfnfcis ftaminnlisjn- [LIV] Cede cjnftum, qaadmagnam gratianicandidq flori conciliabat. Flores explicat menfe Maio cumRanunculo Afiatico Plianieenm fioretu ferente, quibns fimiie capitulum, nondif- fimili palcaceo&acerofo femmeoblitum, quod inutile effe appart.

5. *Ranunculus* ramofos grumofa radice flo^e Phoeaiceo ruberrimo, nobis. Pannc-iIusA- faticus grumofa tadicc Hore l'nceniceo rubenimo, Eyft. Hie a flirplici petalorum ferte, junfto colore Pherniceo ruberrimo, facile a carteris prinio intrita diftinguitur.

6. *Ranunculus* grumofa radice fiore albo fevitercrenato, C. E. P. 'Ranunculus florealbo ve- lis rubris & fiavis permixto, nobis. A riorum petllfs albis, venisrubrtsfli tiavis ptrmixtis, acilime a acteris Afiuticb (implici SoredonarisitidemdilHngokur.

j. *Ranunculttt* Aphodeli radice flore iubpliccniceo rnbente, C.B.P. Ranunculus plno flore ruberrimo, Eyft. Ranunculus Afiaticns. grumofa radice Horcpleno, Cluf. Hift. Multa habet hie a radice prodeuntia folia, Afiatici five Tripolitani Ranunculi tohis familia, 6V ilioruni inftar incila, miriora tamen, interqus cmcrgic canlicnlas dodrantem pedis altus, gracilior quam Tripolitani, cui inherent bina folia (interdum eVfupremampiifillam,^ qnoruin infi- mm ternis prolundis ladoiis. per oras ferratis, divifum eft, altertaj quod iuprcmum, eft an- guftis quinque laciniis uique ;ul medium nervum incifis, quarum fihgnlfe anicam crenam habent, nonnmquam binas aut plures, exrima vcro binas tan tum ; t umnr) canli mhsre-t cauli- rulusqainque foliis pr*dicus, gemmamflori\$amp!eaens, qui explicatiismultiplici petalorum (crie confare vidtturCcentum citim & triginta aliquando habet) foris lubphcnic-i iniciocolons, dtijide mmiuri, interims elegant is rubri miniati ad coccineum tendentis; quorum alia lati- icila, alia anguftiora, urobilicum foris occupante foliaceo quodam capitulo minus miniato: idix Afiatici fitnplcicis fiore ruberrimo radiei fimilis, aliquot grumii minoribus conihns, & illius inftar propagines (fed rarios) ad latera ipargens.

8. *Renumultoi* Aiphodeli jadice proiifer miniatus, C, B- P. Ranunculus Afiati- cus grumofa radice plno fiore tertia, Claf. Hiit, Ranuncu^ Afiatico grumofa radice lore plno fanguineo, Eyft. Radicula dense, dnodenat, luprema paire crallincula, unocapict dependent i'uperioribas longiores, & Alprmdoli radicum omniio fmub, e quarum uunarum & JLinaruin empire feu apic c prodcunt foia liiptrioi is folitHmninofi milia; cauliter^t, tteslconeapparet, haren r bina folia, quonini unuirquodqutin tres majores mcionsdmfaum & iu*4wuoi_nal\ab: fummo caia; i mju.r.t lios trectntibus & multiplici fericdifr^filispetaliaconrbns, quorum alia alba paulo latiora, coloris miniati; e medio flore proJiLtpedicellua nnciamaltK, faftinensalium florem minorem, pl numiamen, & eiuudem colons, non (ecus ac videre alt interdum in Ranunculo tlo liberofa Si mngna r.uli. donato; cujufloeflavusaanlrJplicipetaJornnilq/urconfhjr,! qui fape nonmodofecuntlun, fio- rtmx pnm, itd&tertiumexfecndo nonnunquamproducit: exfuperiorisautem folii finu natoa eciwainulfts, da(Jbus tenuibus foluJ prsditus, cujus fttigio in bat fidulus etia m o] e- nusiecnado lere iguali s.

9-^wscK/wAlpliodtli radice flore fanguineo, C.B.I'. Ranunculus Afiatiai grumofa radice pleno flore, Cluf. Hift. Ranunculus languineas multiplex, Ger.' Pedalem habet hic caulem inter qaaterna&qnina folia, dilnta vi rid irate mtentia, emergeritcm, mc&x f palulms feu Satdonii & ateriiip Ranunculi echinaio femine pordiri folia, qoz per caulem Ipjrla mmora <k lacmura : fummo cauli magnasuiTdetflosmultipliciglom racione conftans, ficut tere in Ranunculo vul^n, polypetalo flo retoberofa rad.ee oblonga p^diro ron an- rei tamtin ut tie toons, ltd ro-cineivil ff. ml ... " a r r " tolu cauli in- harentis, ala narus rumus il m i.cr-m, led minornt: miilta i unt huc radices fimul congefta Aphodeli inftar, aut Ranunculi Lufitaneiradicibus perfimiles, Alpliodclitur- mes tamen & pallefcetes.

Pars T A B U L JE ^XIX- Seflionis quart*.

Rajiunculus nemorofus}	Flore \	i o. <i>Majore^nobis. Ranunculus Phragmites vernus flore</i> { <i>Albo <sr</i> { <i>Purpureo, f. B. fimpli-</i> { <i>ci & p. n.?, nobis. 0</i>
		ii. <i>Luteo</i> { <i>Simplici. 0</i> { <i>(Pleno. Q</i>
	ThalitrifoUo {	12. <i>CB.P. Ranunculus spr^cox 2. Tbalicri folio, Cluf. Hift. 0</i>
		(13. <i>Afphodeliradice, Park. Oenanthe Myconi, Lugd. 0</i>
		<i>i^ . Mofchatellinadiftus, CB.P. Mofchatella, Cord. Hift. 0</i>
		15. <i>Foliofubrotundo^ CB.P. Ranunculus dulw^ Trag. Ranunculus auricomus, Dod. Gall 0</i>

§. 2. RANVNCV LI filve/lres feu nemorofi.

Explicatio partis Tab. vigefimttnon Seflionis quart*.*

1 o. *Ranunculus nemorofus flore majore, nobis. Ranunculus filveftris, Cluf. Hift. & Pan. Ranunculus candidus, Trag. Ranunculus Phragmites vernus flore albo & purpureo, J. B. Chabr. Anemone 5^a Dod* Anemone nemoroia flore majore, C. B. P. Hie radicem habet craffiufculam, longam, oblique proferpentem, foris purpuream & fufcam, ^Itus albam, fapore cum levi aftri&ione acrem, nefcio quid empyreumatis feu fpinarum pifcium crenatorum refipientem, à ^ua fibrac capillares demittuntur: furrigitur cauliculus tenuis mollifq; purpurafcens, fefquipalmaris & major, citra cufusfaftigium uno & eodem loco nafcuntur folia terna, Ranunculi more, ex femiuncialibus rubellis pediculis, hirtuta, nunc virentia, nunc purpurafcentia: cauliculo fummo flos infidetunicus lafteus, alias cum unguibus colore cameo, varius, totus purpureus, petalis confans fenis, nunc oblongis, nunc brevibus & fubrotundis, in medioftamina plurima, crocea; quibus coacervatim fuccedunt plurima femina, f rcle fibiinvicem junfta, aculeata parum Ranuncolorum modo, nonpappofa: flores funtautalbi, purpurci, autlutei, fimplices. Floret novo Vere, Aprili fcilicet. Vulgares funt hæ varietates Ranuncolorum in filvis Pannonix & Auftriss, etiam toti Germanise mukifque aliis provinciis communes, circa Bladas in filvis paffim. Datur & flore pieno albo & purpureo, qui funt *Ranunculus filvarum tiore pleno albo & Ranunculus flore pleno purpurafcente, Cluf. Hift.**

11. *Ranunculus Phragmites nemorofus luteus flore pleno, J. B. Chabr. Radix hujus præcedenti vulgari albo & purpureo forma, fapore, calore, fibrifque radice tuberofis demittit perfimilis, coliculo itidem & folioium numero convenit, fed folia virentiora, longiora, brevioribus pediculis, ita ut iis quafi deltituta viderentur, concurfu fuo quafi cotylen purpurantem efficiant, in cujus medio præter duo folia oblonga, minimaque, clifc&a, crenataque, coliculi fcapus nonhiM pilofus florem fuftinet nonnunquam fingularem, alias geminum Ranunculi more, aur^um quinque petalis latiusculis & obtufis conftantem; in cujus medio ftamina crocata plurima* flos minor cftquam fuperioris albi. Tota herba fapore acri & urente prædura eft.*

12. *Ranunculus nemorofus Thalifri folio, C. B. P. Ranunculus præcoz. Thalifri folio, Cluf. Hift. Aquileia minor DaK Lugd. Hie caulem pedaliaftitudine aflurgentem habet, gracilem, ex viridi rubefcentem, in quo plurima folia majoris Thalifri ilore albo foliis colore Sc forma v3lde familia, fed minora & teneriora, amaro fapore: flofculi in fingulis alarum finibus fingulares, candidi, quinque petalis conftantes, fuis petiolis innitentes: quibus decidentibus fuccedunt bina autterna cornicula, femina fubrotundum, fubruffum, Aconiti hyemalis vulgo ppellati femina fere par: ex eadem radice præter caulem prodeunt bina autterna folia, fuprà deferipti familia, fingularibus dodrantalibusque pediculis ejuftem cum caule coloris in hixr radix impenfe amara multis albis fibrif donata eft, equarum capite alia exit nodofaradica fubinde ad fingula internodia novas fibras agens, atque hac ratione fefe propagans,*

Itoc fe perennis.. Abunde nafcitur in falu Leytenberg Manderjlorf vicino ultra Ley tarn flu, men i unto aburbe Auftrix Vienna milliari, ubi primum ilium obfervabat Carolus Clufius, Uci fte quibus filam aliis in filvis Viennenfi agro confitis. Floret Apiili; femer interdum

Maio,

Maio, plcrumqnc Junio ad mataritacem illic proveniebac.

¶ *Unmimuhis* Thali&ri folio Apliodcli radi<\$, ^{1^} Oenanthe Hedens foiis, C. B.P. Oenanthe Myconi, Lugd. Ranunculus hie (non Oenanthe, ut in Hallucinationtb«s hajus cioitis^Icclarabicur infra) parvus, inter ceteros notu perquam facilis a fimilitudine foliorum turn Thali&ri minimi foiis, folia eterim habet rerna, alata, fua propnis pediculis longiufculis innicencia, ferrata, qusque late per terram fedirf'undunt: fummiscaulium farttgiis innknntur plurimi flores, albidi, pentapctali: radix pluribus radiciis tuberofis, rotundis, fbvis, Aphodeli inftaf conftat, pendentibus a radice fuperiore longa, tuberofa, tranfverfim&r < oblique in terra latente; a fingolis hifceradiculis tuberofis leu grumofis, fibroumdis, pendent libra? oblongs, aliquando bifidje in inferiore parte. Bonus Myconus Bocanicus, & Medicus Barndonensis, Oenantes numerum auxic hoc Ranunculo, cui falfo Qenantes nomen ab ip!b primo, dcindt a Ca(p.£auhinoattiibuitur. *tixc* Oeiiianthe Myconi, ait Daleciampiugin Hiftoria Lugdnnefi, in montibus & pctrofis nata, folia prope radicem per terram fpargit morfa, Iivia, < juadantenus Hederz lielitis modo triferiamdivifa, multotamen minora, ut Ibiornm depiftorum in hac Tabula, vel magnitudinem, vtl raimerum vix tuprent & excedant, inter fe coiigc-th, atque ideo Coriandria ut Farnacactenuiffb'ar foiis fimitia, elongis pediculis pendentia, canlc enatts cubica, ab inio *rubeccu* ucc,* paucisgeniculis ciufto, terttc, lacvi, fere rtriatofif aliquantulum cavo; radices fobfunt muharut in Apliodclo, feptem, aoco Soqn *in* doquepauf.iores, crafe, conjancimpndentes, iorislurea:, intus candicantes, exquarum *ex* tremis radiculae tenucs & longa: prbducuntur; in fummo caule Mores ut in umbtlla pendent candidi, quints peralis confbntes, in medio mufcofi: quilibet fatif centibus in vafcolisten filijuis It-men maturefcit: tbiiorum & cju!slapor (ulidulcis, item & radicum)!.•• por amarus.

[4. *Ranunculus* nemorosus Mulet^allina diftus, CB.Pi KanuncuUia *t* > ofchatellina. vd Mofchatella diftus, nobis. Alchattlla, Cord. Hill. Thai. Cam. Denticulati (a radice forma) Lngd. Ranunculus feptentrionalium berbido mufcofo Hor^ Lob. Ad. & Icon. Fumaria! ulbofa (dicidebuit radice cuberofl^ minima, Tab. Radix cavaminima, fjr. Capno Plinia, Tnr. Ljottis bffataa Denticulata hxc dicitur a radice vtluti per itrnxpofitionem *t* r. idit Unis parvis coagmentata, paolarim granuhicente/albicantibus libris capillata; abhaccaoliculi multi profiliunt dodrantes; in quibus folia Apii five pocios Fumarii Iuttx, five bulbofif, in ambitu minime ferratt; rlos non in petaU explicatur Ranunculi floHs modo, fed ut in Fimpinelia incapitula angiffofa conglobatur, ex viridt liibluu-us, fingidifcipitulis quiniat Uni font flores, guftu anwro&fubacri. Ad fontium Icaturigines 6> rivulos prai. &

In otnbrofia (tpibus, in foiis & ftagnis exficcatif, nafekm turn Ranunculo 1 nemoreafi p; mo

Vere, ftatimqac farilcit. Sunt qui Albaitritem appellentob radi lurid* at fplndortm& candorem Alabaitro fimilem. Alii Mofchatellam prstcnfem in filvofificambrofifrigidiodf Qlis Galliat, Angtiar^jermanix pafsim locis ctefcctenti vocant.

i^Sgaunruht nemorosu; i, j filvaticctta Idio fobroiioddo, CB.F.

Trag. Ranimcotus auri^{coni}US, Dod! Gall. Lob. tcon. Thai. Ranunculi* lab. Ranunculus nemeroiu^Ger. Hmc tU) mt rotunda, nntltmnicu, exlulco viridia, maculis in medio latiu ricantibus notata; HUM; van 1 chro colore nitentes. In pratif Qc ali^aoBs locb & filvis cedats & znni

fat- Dicitur auricomus acapillarisllaminiHis *htcis*, in medioornp.tnr Hos pt; Petalus, etiam luteus: radicem habet fibrofam nmoafilameotiaconftaaym, LX quil

Ptrical* roconda, ferrata exeunt, criariam *emm* divtta, atqUC p^{rop}. t^hisoriuntur cauliculi pedales, in aliquot rainotee diyifi, qaonimfin misramulorampro\ N ^{ur}idulcis appellatur 1

tin mca opinioit- qnafi ncraccjisrcpefto reUqnonra Rantinc!orun <<modun, am, & ad n m j a p^{rat}ornm. Floret MartioCr Aprili.

Hrc I potius dixidet ol obrem mulien u- Apnli illam, tentram adhttc, utia turn ati fevranc. Hoicfiacceda, »Ipl.uit^{ur}, multip!^

edit, neut purnni alii Rantintuh (il

vida divilum, fed ima parte parom incifa, laevia; ttoreluteo, iniummocauis apicepenta- V'talo, f_cmine&capiteuEcongenerom,fedparvJ.

21. *Ranunculus arvensis* annuus hirtutus flore omnium miiiimo lufeo, nobis. Hie Ranunculus folia edit hirtuta, tripartita, laciniaea; dilute virentia, profunde {errata, alternatim caul'bus adhxrentia, qui funt icidem hirtuti, per terrain Iparli, bipalmares, aliquando pedales; quorum fummis alis inntifcantur flofculilutci, minimi, quints petalis (aliorum Ranunculomm more) donati, quibuscitoeffliientibusuna cum ilaminulis, rucedunt racematim Iemina minora in unum capitulutn coacervata, aculeata. Planta eftannua in agris hampntibas paffim ineunteVere florens.

22. *Ranunculus ceratophyllus* feminibus faicatis infpicam adaftis, nobis. Mdampyrum luteum minimum, C. B. P. Melampyrum perpiifillam luteum, Ad. & Icon-Lob. Lugd. Melampyrum luteum, Tab. Foliisett ter tripartitis, cervi cornuj (Juw!ammodo referentifeus: t quorum medio exeunt cauliculi plurimi, triunciales, fingnli fingutos fuitinentesrofculos, aliorumRanunculorum more, quinis luctis petalis minimis conftantts, ambitntibus rudimentum viride, q<od undtm degenerat in Tpicam uncialem, feminibus laJcaci? onuftam. Anna eftplantula hxc, pracox, &menfe Mario floret inter iegttcs Galloprovincije& Narbonenfia Oallix facis frequenter. Vide intra Hallucinationes hnjus capitis.

Pars T A B U L JL XXX. Sectiois quarts-

- 23. ArvrnftS) C. B. /*. I. B. Chabr. *Ranunculus arborum*^ Lob. Icon. Ger. **Ranunculus** fegetalh vtl 5. Cord.Hi.Ji. £
- 24. *Cretici* / I l l atur, CCBPP. faTM *aculus echinatus*, Pon* Ital. *Ranunculus* spatuftris ebinatus, I. B. Chabr. £
- Ranunculus ichmatus* 25 /Vu/?m,-C. B.P. *Ranunculus ApuUVi* quibuftlam five *Ranunculus*. j>r< xccc Afuleii Mius.ClufHi.Jl. V
- 26. *Praienfis* rotunJifolius Benomenfis, rmbis. *Ranunculus prattifis* rotundifolius Bononknfis, Park* \$

§. 4- RANVNCII ECHINATI

Explicatio partk Tab. trigejnt£ St&icnh quart*.

^*Ranunculus echinatus arvensis*, CB.P. J.B.Chabr. *Ranunculus albus* (perperam, eft enim lueus) five *echinatus*, Dod. Gall. *Ranunculus arborum*, Lob.Icon-Ger. *Ranunculus filicllris* 3. Dod. Lob. ob!. Kr.miiiculusfcgetalisvel 5. Card. Hill:. *Ranunculus* hie legetalis vtl arveniis, fic dttus aloconatdli,caiatem habet cubitalem circitcr,fubhirtucuni,]ilariter virect'litcm,<jyum, fit in piores ramos lui-fim vcfus divifim: tolia in oblonga fegmtnta,tenuia,profunde admodum mcifa,pilo&:: flora R « « , ali aquatilis, minores quam in pr. ^nfigcnere, licolos, quims parv.s feu exiguts admodum petalis, u'[-K₁ cito fugacibus conftantes, atque fingulis latifcentibus fnc- ius fubrotundis lappulis, compreffis tamen & echinatis, |cu pa- metes tracinus in coris femina-

rum aculeatis compoflta: radrcnfriabctfibrofam Inter ft Jumo & Julio menfibus floret in rngidiorftns regionibus,dtius multo in calidioribps.

^*Ranunculus echinatus ftellatos* Creticns, CB.P. *Ranunculus echinaws*, Pon I Ger. fark. *Ranunculus paluftris echinatus*, j. B. Ch₃br# Ita vocc, inquit johannw Bauhi- tm^*Ranunculurt.*, uv.di foli incolam & paludum feQ m; cui font folia At eris - divitura, led mnltio minora: radix fibroia; caales plun s palmares & in tertltl folo altiores, crebris ran us brachiati, quibus flores feminibus, involueris hispidis involutis contexta, Ranunculi arve nfis'capitults] roxima, fed quantulum compreffis, hi- is extra Montpel etiam in follis illic confpici

25. ft,wiwUM *echinatus* Hiitoi ^'J^f^{81*1} & ^ T¹¹ ovefta femina pe ^/A adoB pncox Apulcii dttos,Chf. Hift.Rannnculu Apuleii quibufdam five Ranun- Apuleii quibufdam, Park. E radice capite nolis minus laciniata, in V- ambuiitamenmcifa, uncial^ an, longioribus pediculis przdita, & lata vagina cauliculos dodrateK bbw»aw tcrnw inter Uo exeuntes amplectentia; cauliculis procumbentibus &

& quodammodo fupinis adnafcuntur terna auc quaterna familia folia, e quorum fimi ijn-
ciales pendent pediculi, qui tofcuclos ex. flavo pallefcetes, quinis pariter peecalis pitfvis
confantes, fuftitient; qaibus emarcidis apparentquina_ aut fenacornicula, mucronat/, a-
fpera feu rugofa & quibufdam tuberculis obfita, femer Inperioris fere fimile coitinehcia.

26. *Ranunculus echinatus* pracenfis rotunditbliua Bononienfis, eobis. *Ranunculus pra-*
tenfis rotundifolius Bononienfis, Park. Ex radice fibrofa, nigra, exeiinc folia rotunda, pro-
funde laciniata & ferraca, mollia, liiriuta, in mucrones initar AlcnimiHs terminantia ,faturate
vntta, unciam & amplius laca, longis fatis pediculis innitentia ; quacautem geniculis cau-
lium adhxrcnc, nee funttam lata, fedprofunde incifa, nee ulque ad medium divifa: caulem
protrudit pedalem, brachtatum, & reclinantem verfus terram: in hujus cimis proveniunt
flofculi **fata** rnagni, lucci, pentapctali, cum paucis ftaminuiis **in** nudio; quibas fuccedunt
ftmina plurima inVolucrifufcis, arperis&quouammodoechinatis, mmoribns, acuminatisin-
cliifa: femina male **exprimntar** inlconc. Floret cum csceris xitate, atque provenit inter-
riorio Bbuonienfi.

Pare T A E U L £ , X X X . Seftionis quart*.

- (2-j.Ldtvk^CB.P. *Ranunculus i\$ r Sardonis, Viofcor. £*
- Apii folio* <
- C.28. *Lanuginefus, C B. P. RanunculusSardonkus, Angu'il ?*
- 29, *Hederpceus albus, nobk, Perperam luteus, C. B. P. Ranunculus bedtra-*
ceus Vat. Lugd. y
- 30. *Cotyledonh folio, C. B. P. Cotyledon aquatics acris fepatrioualiuw, Lob.*
Ranunculus aquaticus umbilical'0 folio, Col. O

Ranunculuspaht;
'iris five aquaticus

- 31. *Et rotunda ist capillaceo, C.B.P. Ranunculus aquaticus He-*
patic facie, Lci>. \$*
- ii. *Tamum tapiiiceo, C.B.P. Ranunculus aquathustriobplyllvn*
medioluteus feu aquaticus fwniculaceus ftkbopbylkn. Col. \$
- ^^**MajoTy** C B-P. *Ranunculus lamcatus major, Tab. Ra-*
numulus flammtus major, Cer. Lingua Plinii, Lugd- 0
- Longifalias* {
- ... _... {
- Minor folus* • **^Stmtii**, nobis. **Ranunadits tquatilts an-**
gufifolius ferratus, Dod. 0

§.5- R A N V N C V L I fatuflns five aquatkt,

Exp Hcatiopartis Tab.trigefims Secl'ionis quarU.

27. *Ranunculus palustris Apii fo* **lio he** -P. *Ranunculus aquatic us, Fuji. Jlundin*
culus palustris, Co, u ui uio..*«». Lugd. Thai. Cam.Tab.Gcr, *RanunculusSardonis, l>iofc.*
Ranunculo huic paluftri bli: **itunda, laca, Ixvia, marginiboa** crtnata: tquorum mc-
A' « mteTtilcs rorondi, !a-vcs,»ittTius **vacni, fnbinde oraffi**, in aliosdivifi, in liorum ca-
apparwit flolcolj lucropallidi.minores multo quam **func** Ranunculi filveftrisriores;
C**hSfnctedwit** capuiia oblonga, **primum** emmpentis Myacanthx Afpaiaagi **caumen** aemu-
lantia: **radices** candidx, nmltis tibris capillaCE. Tota rtirps dilute viridi **fplendet** co] **orc,**
Iapaluihibn9& jmtta rivulos, non raro aiam in ferobibus, actoflis aquas habentibus, aliif-
que familibns locis provenit.

18 *Ranunculus p;iluftris Apii toliis bnuginofus, f-.C.P. Ranunculus Sardonicus, Anguil.*
Ranoncnlus 2.Matth.Lagd. Hicdiftert^ prioic folummodo quod **fiintfefa** & caules **la-**
noga, & **plmibua** toliorum incifuiia fpc^ttui
29. **RanurKuim aqnaticna hederacens,** nobis. *Ranunculus hederaceasDaK Lugd. Ra,*
lus aquaticus h^ffracens Idteus, C B: P. Ranunculus hie parvua hedcraceoacaolicuiis
1 harm **ant** aqub incumbentibus rotundis donatur, ex quorum **nodia** feu gtmculis de-
miIIUS ' **me& exiles,** atque ex **iifdctn** sentculis oriuntur plures **petioli** nnti,
folia multa, VMW-> maculis nigrb (c-u.trris notata, taibus lobii tliitijiCtii, Ilu he-
fultinenter

racea, unite liederaccus Ranunculus denominatur: ad exortum eundem foliorum cum caulis cernuntur petioli breviores, insertinentes Hofculos albos (non luteos) sicut vulg. Clip. Bauhinos) quorum petalorum obtusis seu lobatis (aibus inquam) cum plerumque flaminulis luteis* quibus succedunt feminae racemose in parvum globulum concinnata, aliorum Rammculomm more: sicut acer & rerviculus. Nascitur in rivulis & fluminibus, in locis humilibus & macris. •

30. *Ranunculus aquatilis* Cotyledonis folio, C. B. P. *Ranunculus aquatilis umbilicatus* folio, Cotyledon aquatica, Dod. Gal. Cotyledon palustris, Dod. Fol. Cotyledon aquatica, Septentrionalium, Lob. Tenues hinc Cotyledon promittunt viticulos proicijentes ac lubet de terra: adherentes, tamen quibus rosetta subrotunda ac aliquantulum alabastrum modum concava, exiguoque pediculo medio fuit, ut acris majoris fenestrationis invidenti; led plane rerrara, minora, iacurarum virentia quam legitima; Diofcoridis lilia.* flosculi perpulchri, albi, fabulosis vivuntur: fibrac tenues pro radicibus funt. Palustribus locis in venis, praevalent humidioribus, & qui frequenter hybernis mensibus ligantur. Floret Julionitico. Ilm-Lilicum Venetis officina: inferioris Germaniae appellant, led maximo cum errore, cum sit plauta calida & aliquantulum acris, sicut ejus gustabilis qualitas ostendit; provide non foliam forma sed si aculeate & viribus a vera Corydone, quae est humida: si subfrigida: substantia, differt; proinde referatur, Feperenti abftergit ad ficuti anthore Galeno.

51. *Ranunculus aquatilis* folio rotundo & capillaceo, C. B. P. *Ranunculus aquatilis*, Dod. Ge. *Ranunculus aquatilis Hepatica* iacie, Lob. *Hepatica aquatica*, Lugd. *Hepatica palustris*, Thai. *Ranunculus hie aquatilis fenestralis* canaliculata habet rotundos, tenues, &c in rectum & obliquum spargos: rosetta subrotunda, Faeniculi aut Chamxoclii similes familia, extra aquas autem rotunda & per ambrosiam «^{na}» «^{fl}» recandi (Ji Curt & odoranti, forma Ranunculi lutei apta, albi, (cum plurimis flaminulis in medio) quos vchiti in Ranunculo liortensi & filulari conlequuntur e partibus ex pluribus leminibus in unum congestis lirmata: radices tenues sunt & capillatae. In fossis & stagnis aquas habentibus & lente decurrentibus rivulis, nec non in meta corundem ripas, ac in aliis locis humidentibus gignit: Mores habet multo minores & petala obrufiora seu rotundiora; Aprili, Maio, ac subinde Junio mensibus, in praevalentibus locis abunde tenet *Ranunculus hie aquatilis*, folyanthemum aquatile quod Lisdam dicitur propter copiosam fiorum exalbidorum aquas stagnantibus incambendum, rivulos & paludos. loci ornantur. Pharmacopiorum & herbanorum plerique Hepaticam aquaticam & Horticam albam perperam in partem laiu, & cum majore errore refrigerantis Hepaticae alba loco medicamentum adhibent: facilitate siquidem hie *Ranunculus aquatilis* calidus est, & Ranunculo filulari similis.

32. *Ranunculus aquatilis capillaceus*, C. B. P. *Ranunculus in aqua fontis in capillaceam Cunitatem* sicut, Ranunculus trichophyllum aquaticum medioluttus, Col. Defc. Aquaticae formae lacetta trichophyllum quoad locum talem. lisdem locis aqua fontibus innatata hic campriore, atque deinde lisdem locis concaendus in flumine tamen priori, primo quod fola folia producat capillata, non autem lulu lisdem locis, aquas innatata. <RVn> Mores supra aquam elatos, pentapetalos, scissatos quasi, petalis longioribus & scissatis prioris riorum petalis ornatis. Tos, plurimis in malis locis in Inteis flaminulis prominentibus quibus marentibus ruffit capitatus, rotundus, in globulum fere coarctatus, nunc trishujusfortis cernere lisdem Radice ex fingulis cauliculis capillari producunt, nunc aquaticis in mentibus mos est.

35. *Ranunculus palustris longitollus major*, C. B. P. *Ranunculus bneokens major*, Tab. *Ranunculus flaminis major*, Cicr. *Ranunculus minimus* longo folio Lingua Plinti, I. fl. Cli. Lmgm Vlmii, Lugd. Fl ammo la palustris major, C. B. Phyt. In uliginosis & palustribus exit ituhis hie Lingua Mini i Dialectum putatur: sicut ead est bienbhalia altiore, crasso, latius lube de ramos de dno, per quem veluti per ramos alternatim lilia Producantur pediculi longitollus, ramis ramos, crassifloris, glabra, macronata, & ft fetidi: tunc extrema inhzrent ramulis magni, a floram Ranuncabnnn fo quoc petalu lursis, (ubmentis confbnt) quorum medium propter angust sobfident nomerofa unroloribus pervenit hic capitaparva ex nnd fipfi: reinibu) u fimm dhSS parva nucis avellanae magnitudine, superius aculeata, & inferius afflebitiobus, saporis itidem calidi & urentis: radix compluribus fibria nxi terra ulij 1 in iuuLiir. Provenit in paludosis & ita nantibus aquis inter Juncos & Arundioe*. Horczfatec

34. *Ranunculus*, *Nadna* longitoliolus minor, C.B.P. *Ranunculus aquaticus anguifolius* Ad.* Lob. **Lagd.** *Ranunculus* **piyM***T*\$ < *ptim* & 'major, Thai. *Ranunculus tanceatus* minor, T. *Ranunculus Hammeus minor*, Ger. *Flammula*. *Ranunculus*, Dod. Hie *Ranunculus flandin'* uj minor caultculis **afforgit** pedalibus & fefquipedalibus fere, nonnihii gntculatis, circa'quoj folia fnntoblonga, Salicis angtififoliae **fimilia**, aut lances smuln qua Chirurgi ucuntur in aperiendis venis : flores minores, pentapetali, lutei, fplendentes & pallidiores paulo fuperioris; femeracematimincapitula congefum, utinaliis iuaefamilias: radices i'unt fibrote UE-plurimorum Rammculorum inaquis & aquofis provenientiumradices. HumidisSf riguis locis pratifqae gaudte, pwlcrtni obi **fterilias** & arenofum (blum. Apud Hollandos felicer **aaotefcic**, ubi bictibicalem quandoque affequitur altitudineni.

35, *Ranunculus* paluftris loiiigifolms minor ierratus, nobis. *Ranunculus aquatilis anguftioliolus ierratus*, Lob. RaiiLinciius Inncejcus (rratus, Tab. *Ranunculus flammcas icrratus*, Ger. **Flamraida** Rijiuculus tolio **ferratp**, Dod. *Ranunculus hie* parum a priore cliff err, **nifi** quod folia aliquando proferataliquantolatoria S; per margines aliquaado denfe, **aliquando** rarius **foffata**: fit varietas cantum prioris ex lufu naturae provenicns, per me nonftabit.

TABULA XXXI, SefHoni, quarta.

Vlantagink folio	C <i>i</i> .C.B.P. <i>Ranunculus folio Plantagink</i> , Ger, <i>Ranunculus Pyrenausflort aibo</i> , Cluf Hifl, 0 (37. <i>Pyrcn</i> < <i>£us albus</i> funpkx^Park forte idem cum priore, O
Gramirii'O folio	{ - \$ 8. C. B. JP. <i>Ranunculus montanus g amineis</i> (Simplici) } fatiK, Ad. & Icon. Lob, fion luteo } ao6b. O } Plena }
42- Betomcx folio, Park- 0	J'43. <i>Lanuginofm Apiifd'w</i> ^ CB.P. <i>Ranunculus alter faxatilismontanus Ajpbodell</i> radio:, Col. © radkc I 44. <i>Uptopbyllos</i> , C. B- A <i>Ranunculus tmitamts Leptopbyllos Aphoddi</i> I radic^ Col. ©
45. Prdcoxrotitndifoliusgramlatara&ht, hols. Chelidoniummitius, Matth. DoJ. Tab.Ger. Eyfl. 0	46. Minor, Park. <i>Ranunculus tanuginofusgrumofa rttdice</i> minor, CB.P* O Ubricus << Ma-g ^ par k, Cluf. Hifl. ©

TABULA XXXII.

Auttumlif_ latifolius	^%. <i>Creticiis latifohue</i> , Park- O T49- Si'xpficK Nobis. <i>Ranunculus Lufitanicus</i> Bullatus { Flore magn. } • autumn a Us, Lob. Obf'i [50. Pkno^ nobis. <i>Ranunculus Utifchus multiplexferot'mus</i> . Cornut. o \$.A ^T o<< bullatus fiore parvo, nobis. <i>Ranunculus lufitanicus</i> , Dod. Lugd. 0
Htrfutus < ei. Humilior flore Narciffi,	5 i. <i>Altior allws</i> , C. B. P. <i>Ranunculus montanus fecundus vet fcundi fpecies priina</i> , Cluf Rift', Q C.B.P. <i>Ranunculi montani ficundi fpc-</i> ties aftera, Cluf. Hifl. ©

- 54. Rutaceo folio flore fuaverubente, C. B. P. Ranunculus pr* <cox 1. Rut* folio: Cluf. Hift. 0
- 55. Purpureus caiyce villofo Fdich Platen, l. B. Chabr. O
- 56. Seu Alfinus minimus albus vel luteus, J. B. Chahr. 0
- 57. Alpine humilk rotundifolius flore minore, C. B. P. Ranunculi montani frimi Y fpedesi-. Cluf Hift. O
- 58. Alfinus humilk rotundifolius flore majore, C.B.P. Ranunculi montaniprimi fpecies fecunda, Cluf. Hift. \$ Sy'Afhodeli radice, dittus Pthora major, nobvs. Tborā Valdenfium month Baldy Cluf.Hift. Aconitum-pardalianchesi. feu Pthoramajor, C.B.P. 0
- 60. Affhodeliradicediftus Pthora minor, nobis. Thora Sabaudka (y month Baldi, I Tab. Ger. Aconitum Pardaliancks alter urn five flora minor, C. B. P. ©

§.6. R A N V N C V L I montani folw diverfimode confruttk.
 Explicatio Tab. trigeffim < £pim < z Sefthnis quart*.

16. *Ranunculus monranus folio Plantaginis*, C.B.P. *Ranunculus folio Plantaginis*, Ger. *Ranunculus Pyrenæus flore albo*, Cluf. Hift. *Ranunculus Pyrenxus foliis fublongis non lacirii* atis flore albo*, J. B. Chabr. Pedali, imo etiam ampliore altitudine aflurgit \xc Ranunculi montani fpecies, caule rotundo, fatifirmo, viridi, perquem alternatim interna, aut quaterna, difperfa funt folia, fatislata bafi caulem ampleffenti'a, ternas aut quaternas uncias longa, unciam vero lata, mucronata, multis venig ab infima fede adextimum mucronem procurentibus diftinfta, viridis coloris qualis fere eft foliorum Braille* campeftris, quorum oxx tenui nfolli- quelanuginealba obftitae: fummo caule eK foliorum, quæ minufcula erant, alis exeunt terni, quaterni, vel etiam plures oblongiores petioli, fmguli caliculum quinque foliolis conftantem fuftinentes, ex quo flos prodit quinque petalis prxditus femiuncialibus, tenellis, prorfus niveis, cujus. medium occupant frequentiilima, parva ftamina, flava, cum orbiculari capitello, nullius aut perexigui odoris. Quum vero primum e terra emergit hxc planta &c antequam in caulem abeat, bina duntaxat aut ad fummum terna profert, folia, tres uncias inquam longa, unciam lata, cralTiufcula cV firma, multis etiam venis fecundum longitudinem diftinfta, ut quodammodo ad Plantaginis latifolia? foliorum formam accedant: caput radicis hirtum erat (ut eam ob caufam perennem effe, inquit Clufius, mihi perfuaderem) - quod deinde in multis cralTiufculas, albas, tibras dividebatur. Floret in Maio. Provenit in montibus Pyrenæis, ex quibus ejus radices crutsE à Johanne Venerio, & ad Johannem Hogelande miffa feptuaginta 6c amplius abhinc annis.

37. *Ranunculus Pyrenæus albus fimplex*, Park. Hie parum aut nihil difcrepat à price- dente, {olummodo floribus quinquanten Tdenfe in fummis caulibus proveniunt, fimplici itidem petalorum alborum ferie conftant, caetera priori convenit.

38. *Ranunculus montanus gramineo folio*, C.B.P. *Ranunculus montanus graminii* Ad. & Icon. Lob. *Ranunculus gramineus*, Ger. Tab. *Ranunculus* hie afpectu lxtiore ik iicre pentapetalo luteo cum pluribus rtaminulis/in medio, ejuſdem coloris; radice & femine ract- mofo prorfum pratenti Ranunculo eft fimilis, verum folia pauca habet, eaque Gramini adeo fi- milia, ut vix, nifi florentem obſervaveris, à Gramine dignofci poſſit, prſertim locis frigidis, ubi caulis palmum & fequipalmum non excedit. Paſſim obvius hie in pratensibus locis, aridis, Narbonæ pone publicum diverforium montis Lupi, & in aridis Mindeni Ruthenorum paſcu- nis nobis, inquit, repertus. Copioſe fatiſ provenit in filva regis *Fontainbelleau* inter cellam ere- mitarum & pontem quâ itur ad celeberrimam illam Regiam in medio filvæ fitam. Sercnini- mus princeps Johannes Baptiſta Gaſton Regis Ludovici XIV. patruus, dum illi in hircifcundis la- tis operam dabamus, noſ miſit in prædicitam filvam, nbfque reduces Bla- ſas interrogavit, num Ranunculum gramineis foliis illic obſervaverimus; etcnim nec nobis eun- dem obviam habuimus, auii m t i n f % *) r - - r . r . i

M» amenle Apnh finiente nos eo milerat, etiamfi mynades tune opem voca^c! b ? ^ ^ * T M A V T M T M a fimilitudine fol.orum, necdum guſtu in toties fi^afta^ ^ ^ Y . filcil S^na^ u ndus aiferuit nos oc ul i ſea proſ ea vice foiflc, ſequemul- Deriif F^ wk J. l^bl. t unaem Inter DE^ I^ ^ ni Eremitarum cellam & pontem multis retro annis re- Maio florea t T. C ? eg CUaire, q^uaP^r opter nos eo denuo remiſit, atque menle mus u-r n n w f Ima , r e n t ? m c o P i o f c & redundantcr ib. dem oftendimus. Hxc dediwi- » lo-umtaceremus, dirhcile admodum eire cuilibet plantas d. llinguerc a foliis, propter

nimiam conformitatem plurimarum plantarum in ipsarum foliis, nec base planta facile intuen-
do. folum morlo à Gramine distinguitur aequantior, nisi gnilius advocetur in open), MHC
à fervido gustu nullo negotio à Gramine cognoscitur diverfa; idem dicendum venit tlt^u-
rimis aliis Raiuinculorum fpecibus, quipropter similitudinem foliorum cum aliis plantis,
vix ac ne vix quidem difcerni poffint, ut obfervare eft in hoc capite, Ranunculos dari folio
Aconiti, Btonicx, Plantaginis, Hederar, Perfoliatae, Coccydonis, Apii, Fcniculi, &c. quom-
nnes fummacumdirricultate reduci poffiunt foliis, eorumque fructura, ad genus Ranuncu-
Lrum antequam flores pentapetalos, & ftamina racematim in unum caput compa&a proferant \
me not^u generki dtefla, 'abfque ullo Jitgotio folia determinant fpecies (ub eodem figno mi-
litantes. Idem dicendum de multis aliis in vafto hoc vegetabilium numero.

Ranwicului gramineus montanus ilore pleno, Dod. Hie neutiquam a priore flore finiplici
dit Vert, nisi multiplici petalorum ferie, hoc contingit in multis aliis liujua generis, & pa/lim in
plurimis genenbus liujus operis a luxurtante natura.

39. *Ranunculus* gramineus montanus radice villosa plurimas fibras cradiufculas ex inferiore
parte emittente, nobis, *Ranunculus* graminus momanus butbofus (perperam, eft tuberofus)
Col. Fig. a eide fcripdone *Ranunculus* leptophyllus buibofus C utrobique peccat Columns;
non debet diet bulbofus, cum bona veniadofidimi Columnae, fed tuberofus) Col. Copiofus
Kicii Equicolorum montibus, fupra *Jiva Philippe* ant rum vene rand um Maio florere inci-
piens invenitur radice oblonga, cervice villofo cortice nigroque obdufta exterius, ex qua duas
uncias longx, carnali fibra:, inimocraffiores, fii pendulx paluftris radice modo, capillai-
bus fibrillishirfotac, Cerramndiqae amplexat^s, producontw, interias vero intra prardi-
ftum villosum tegumtntumtuberoia (nonbulbofa, ut vult Columna) radix invenitur, Gla-
dioli modogemina, alrrrn nlrcri infulens vetuftiori, atque corrofa: parum praecedentia anni,
t qua fibra: ortum ducunt: folia huic prima duas uncias longa, qua: paulatim majorae i Tici-
ntur, & patfliu III ad lummlim Equant, circa radicem pillofa, reliqua Ja: via, colore clnereo al-
icante, perlongum veniaⁱiftntia, oftonumero caulem cingunt dodramalem, junceum, du-
bue geniculis & io Sikablqualis diftinctuni, in iummo virens caput habeate jft, quod dchi-
ens florem luteum edit, fplendidum, ftaminibus incusdenfis plurimis; calice etiam tunc
c[quinque]p3icito: triiftntm deinde capitatum, oblongum admodum, (quamofum pei-ficiens, &
compafto feminerotundo, fed apice rofrato, ut congntnerum, refertum.

40. *Ranunculus* graminus hirtus monanthos, nobis. Hie ex radice cnberofa, mulcis fi-
bris (catente, pliirima protrudit folia, *anguih, graminea; ex quorum gremio exit unicus
aulis raris foliis itidem anguftis & gramijieis veftitus, in cujus summo unicus apparet flo-
culus" hirtus, quinis conlbnis petalis rotundis: cui fuccedjnt femtna aculuta, in glo-
buluni congefta, aliorum Raminculorum more.

41. *Ranunculus* gramineus alter polyanthos, nobis. Hie multis conftat etiam foliis gra-
mincis anguftis, exeantibus ex radice fibrofa: in caulis faftigio exeunt quini, fenjpetioli,
uncialcs, finguli iicum fuftiuentes {bfc aluni, quinis pecalis mucronatis conftantem, qui-
bus fetifcentibus fuccedun| plurirma. fcmina acafcata, arfic fibi invicem coharentia.

42. *Ranunculus* mnrrans Rfronica: t blio^r Park. Folia funt huic multa, immediate e ra-
licorta & longis ptdiculis imiixa, mulris repisobliyiis afperfe, & quafirugo Hi, in mar-
ine crnaca, at<u< Become* folia zmulantia, mfi a uod fin: mioora, f up. rnc viridia,
in Ferne incan3 & argentei colons, Argentina: aut Poccntiheinftar: cxhorum medio onun-
tur atiliculi vre palmares; fed iradi ad cimas ufque, in quorum fingulis unicus apparet flo-
I culus, quinque petalis albis tenuibus & mucronatis oonftans adinfar fiorum Ptntaphylli,
ique eoruro medio apparent ftamina lotea: flos quinis foliolis vitidibns acutis in dorfo
vnatur, <.visr Facre loco vaginae c'xigua: flos nondnm expaufi: femma compacrim aculeati?
macronibus fimul coherent; radix conftat plurimis fibris adipftarradicis Bettfnic*. Tora
planni, id eft, folia & radices, amara eft, gustu auftero fir afringente pndica eft.

45. *Ranunculus* lanugmosus Apii folio radice Aphodeli, C. B.F. *Ranunculus* alter (a^ut ttiis
morttams Aphodeli radice, Col. Frigidarum regionum incola hrc eltplanta, proveniens
in laxofis humentibus montanis. Radicem multis craffis fibris fummoefpirc naerenibus, A-
fnhodeli modpjpndi Ea conftat, craffioribus juxta radicis caput, femperque decreTcentibus,
p aivis, pollicis longitudine, multis capillaiibus fibrillis immixtis: petiolos edit cavos & inimo
la rns 'ampketntes; caulem hirtutum, umbeltitarum ritit, quibus folia infident primum lata,
du abus tantitn ferraturis divifa, dcindntagispr^tondc, atque etiam in tres lobus divifa,
lobofque tribuE dtneibus feparalos habet ut finguli lobi videantur terna folia proiundt incifa,

ac et i : m denial . femp . que niajora , utriusque hirluta , inferne albidiora . * cruiem Vere emit tit
 totu dunn i , kirfutan , lefquip :: dalem , alisdivifum , in quo tolia magis divifa & tenuiora fine , K-
 tiolo , ex quorum finutxeimcramuli , InquibuE fiorcsinagni , pallidi , pentapetali , ungnis n^i-
 ynnidme . Itamim "tis inns'luccis , quibus iruihisfeniiniicialis Ipicjetn modumracemarimco-
 haret , f . rainibnsfibtJnvicemar&ecohErciltibas . A prilimenfe floret . In /Equicolorumman-
 ribus prope Divi Aagelixedemdiiaam^ juxta mornia enriqua Saracenia d'ida etiam ob[erva-
 vir Fab. Column.!

44. *Ranunculus leptophyllos* Aiphodeliradice , C. B-P. *Ranunculus moiuanus* kptophyi-
 los Al'phodeii radice , Col- Radix hujus , Afphodtli motto , plurirtistuberculis (non bulfjilli?
 nz vulc Colurana) ttepcnclntibusolivxmagiitiidiie , aKjne etiara rortmdioresfunt , infjram
 tetiuen^lefinenEcs." ex hisconiunfctim folia oriunrur divifa , primo BnHrocaitani tolits familia ,
 interran proclivia , vei alias refta , petiolis hirditis rubencibiistntntalibtilque iunixa : exh-
 rura iyliorutn pediculonim medio piotniditur caolis dodrantafe Martio : & in hujtis fumnio
 fi r.iirfus , puichr , fplendenc , quinis pttalis rotundisconftan^ , luteis ftaminibtis medium ,
 ut in ilrjfis , occupancibns , quibnsdefiuencibus fncedit capnt oblongum , fpics femianctalis
 inltar , exfeminibus denle compaftis Sc aduncis ,Imul adhxrentibus confraftum , utin con-
 2«ieril)DS : csulta feminm horum fpicaoi (uftinens hirluniB eft , fingalais , rotundas , rabens ,
 raropjuribus qtiam duabtis vel tn!us alis d' mfm , circa ti. • us funu ilam quafi , folionim lobj ma-
 jores longiotcfqne font , brevi ant ntillo pciolo hxtentes akernatan . Martio floret , Veris vco
 fine petic itnrejusfemen , Locaamatherbida , icdpiagaia colliumCampotlaitiilium atque
 Æquicolorum ,

^%- *Ranumulm prcxoxrotundifblius granulata* radice , nobis . Cheb'doninm minus , Mattli.
 Trag. i uch.Dod.uc. Ad.Lob. Lugd.Tab.Ger, Fyrt- ChelUionin roeJuwlfolia minor , CUP .
 Maria Jr Scrophnbria minor.2. iirmiskl. Hscorrhoidum herba , Hi-ron. Branfw. , Plaata
 hfcvivct lubtotundis toliis , kvibns , glabris ac replendentibus , Hedera : ioliis minoribus :
 inter hat caulicali a-nucs , Ueves , vis-triunciales , liumique plunnn pane procumbenr.es ,
 liolculos prommtliircos , fenis , feptenis , nunc plaribos pttaiisdonatosRantinniloFLin) modo ,
 quibus valdt accedit habiia rationecapinili txigui , fubrotundi , exteminibus arte filuinvic-
 cem cuhxrentibus compoCti"; radix tenuibus fjbris conftat , qtiibas in imum apiccm cpliaerent
 granul oblonga ovata , criticcis granis mjjora . Nafcitur in praris fctus vias , ad Icrobes iof-
 lufqueinopacisjSf umbroffis , locilque riguisSrhumciitibus ; vulgariter paflim iaeoqrt i ieyeme
 reperitur tiorttis . SeiiisptEalis ad fepcna7 oftbnna , novena , imoduodenaaiqiiandopt
 git , fecundum itawm & vigoremradicum gianulatarim. Rcptiiturfif ilore pleno .

46. *Ranunculus lanugmofi** grunitil^ radice q^inor , C. B. P. *Ranunculus radiat* 4.
 CluL Hijl. *Ranunculus ltyricHs* , Dod". Lob. Tab. Ger. Eylt. *Ranuncu!* us minor , Park.
 Folia hujus mcunte Vere q u'erna aut quina cxennr , longo pediculo innin a , obkinga & 3#-
 gufta , candid. denfaq. , bnugi le obfita : cau]s gracilis , pedem alms , minoribus toliis , an-
 gultia itidcm teptns , .& ram ulis aliquot p' KIHUS , quibus flores infident aures coloris , v.klc
 i'plendentcs , tqoinis petati . conflati , inodori , interdum gemelli : rad . , xmu! [^ brt , ibus & ex-
 rina p^rreobtufis tulKrculis fi^ : grumis Tricici grana non multum fuperantibus conftabat ,
 ut peucinCh'elidonbminorc , qiiibusnliiteKuiort : fibrz intermixta . Multas proles ea ge-
 nerat . c iblec , matw adhxrences , at in Rano&nloTripoIitanoClufii , vel fobinde ccnoc iibras
 inbabentes , procd I It- Iparfas . Hunceruebat dufius ftorentem in monte Hzz iburgenti duo-
 • Tupra PofonitiniHungariar mltiaribus , quaoccanum fpcfht , prilertin . in eorum tu [iinlo-
 mt ambitu , qui recnter 3 talpis fafioli erant , propter terra cruti mollitcm .

47. *Ranunculus lanagmofts* pnrnofe radice major , C. \. \. . Rantmculus Illyri* i. s major ,
 Clat. Hilt. Park. Hicnjajor^&ktioriboa foliis . ciule& floribusmulto ni ajotibus magisque
 »cani v im mmicrofia radicibus ut magis commode llym'; ; major dici pollit . Is
 upon onimbu hortis fatis familiaris , tiuia late pertemicsfibras . lubindcnovasplamasgc-
 nantes , tele fpargit & magna loca brevi occiipar .

£> plicatio Tab. trigefima fecunda. Sciti enk quart, e.

48. *Ranunculus Creticus latifolius* , Park. *Ranunculus hic radice* habet ex pluribus tu-
 bercffis long isradiculisconhitam , dco lum verfus in acutum mucronem definentibus , forlum
 verfus in a j.umcocun n , tils , Alph odeli moit , ex qua exeunt caules pedales & altiores aliquan-
 do : folia nter iotafunroranda , profunde laciniata , & leviter finata : foliola gemculis le-
 prioribus adhaerentia funt tenuia , oblonga , paululam etiam fin- . . . ad quorum appofitio-
 nem

nem caulis versus medium in ternos pluresve ramulos dividitur: atque fingulis finguli innituntur flocculi lutei, amplis fatis, quinque petalis mucronatis constantes, ex quorum medio plurima flaminula lutea, suis apicibus luteis pariter onerata, quibus evanescentibus succedunt femina multa, aculeata, in globulum coacta. Ejus femina ex Creta fuit primo mittum,

49. *Ranunculus latifolius bullatus autumnalis Aphodeli radice magno flore*, C. B. P. *Ranunculus grumosa* radice 1. Clus. Hist. *Ranunculus Lufitanicus Autumnalis*, Lob. Obf. *Ranunculus Lufitanicus Clusii*, Ger. *Ranunculus* hic quinque, sex, aut plura habet folia, circinatae parte rotunditatis, in ambitu ferrata, per terram expansa, splendens, & veluti tumentia buliataque superne, nervosa & lanuginosa inferne, ingrati initio faporis, sed postea ferventissimi: inter folia aliquot exiliunt pediculi veriusquam cauliculi, dodrantes fere, fepius breviores, villosi etiam & veluti lanugine quadam obfiti, finguli fuftinentes florem luteum, odoratum, quinque, fenis, ottonis interdum, aut pluribus petalis constantem, quous excuffis, vel sponte defluentibus, capitula, aliorum *Ranuncolorum* capitellis aut *Fragi rudimentofimilia*, apparebant pallida: radix ex multis, crassis, longiusculis tuberculis constat, *Chelidonii minoris radicibus granulatis duplo longioribus*, quibus plurimae intermixtae sunt fibræ; temporis autem successu succrescente planta ex adnatis separari & in plures plantas pangi potest ipsa experientia, ut ait Clusius, demonstravit. Frequens occurrit circa Olyffipponem inter oliveta, & in plerisque Boetiae locis, ubi florentem Novembri mense vidit Chiffius; in hortis floret citius Octobri & Novembri, quin & folia retinet tota hyeme in Maium usque mensis, aliis nobis paulo antequam florere incipiat repullulantibus.

50. *Ranunculus latifolius bullatus autumnalis flore pleno de prolifero, nobis. Ranunculus latifolius multiplex ferotinus, Cornut.* Hic folia plurima Plantaginis latifoliae formam & amplitudine versus finem Obris edere solet, quae solummodo in ambitu sunt obtuse crenata, nervisque resperfa quamplurimis, qui non recta ut in Plantagine, sed transversim inter se coeunt, quique sunt in averfa parte confertiores: foliorum pediculi lati, oblongi, albi, finuati, una cum foliis, dum crescant, in orbem humi procumbunt; inter ea cauliculi plures paulatim ad palmum circiter attolluntur, quorum finguli fingulos in apice globulos virides lument, qui dum expanduntur, aureo splendore fulvos flores exhibent, Bellidi aut potius Hepaticae flore pleno figure fimiles: multis enim petalis parvis actitis constant, quorum quae primo ordine locantur longe latiora sunt, quae vero deinceps, angusta, brevitate; medium hujus floris umbilicum occupat globus alter viridis, qui marcido priore elatior factus, in alterum florem priori congenerem efformatur, quod est maxime Ranunculi speciebus familiare, quanquam etiam id aliis usu venit. Hos flores Theophrastus *toowjvs* vocat. Ranunculum esse demonstrat fapor acris & adurens, radix etiam Aphodeli, quae conveniunt plurimis aliis hujus maximi 2x longe patentis generis. Haec est tantum prioris Ranunculi Lufitanici varietas, multiplici petalorum ferie scatens seu abundans à luxuriante natura, quod plurimis Ranunculis tamen (ponte in agris, quam in hortis cultis nascentibus convenit.

51. *Ranunculus latifolius autumnalis parvo flore, nobis. Ranunculus Lufitanicus, Dod. Lugd.* Hic folia etiam habet lata, venosa, laevia, relucens, indivisa, margine tamen aliquantulum incisa: pediculos ab ipsis radicibus mberofis Aphodeli instar, palmares, abque adnatis: in quorum fingulis flosunicus, parvus, hexapetalus, luteo auri colore resplendens, odoratus, taminibus in medio concoloribus, inter quae capiculum emicat: radice constat è multis, longis, cauliufculis grumis compacta, instar radicis Tripolitani Ranunculi, quae longioribus grumis Aphodeli more componitur, colore ex albo & fusco mixto extrinsecus praeditis. Hujus Iconem ad vivum expressam epianta Crericofemine, ut feribebat, sibi nata mittebat diligentissimus Beticus *Jacobus Plateau*, illam autem folia ante hyemem, quae perbelle ferr, promere, & adnatis se propagare animadvertibat idem *Plateau*.

52. *i?tfwtf^f«>5 montanushirfutusalbus altior, C. B. P. Ranunculus montanus fecundus vel fecundi species 1 % Clus. Hist.* Quina, fena, producit ex radice folia, magna, viridia, dura, Ranunculi illius glomerato seu globofo flore quern nonnulli Trollium appellant, (hunc non fit Ranunculus? fine ultimo, sed Aconitum, ideonea cum aliis hujus fortis ad Aconita mandavimus) foliis haud ab familia, non nihil hirfuta, tribus scissuris ad pediculum usque pertinentibus, & aliis prsterea minus profunde divisa, fapore initio dulci, postea aliquantulum amaro, pediculis firmis, crassis, & pedem longis innitentia: caulem inter illa exeuntem cubitalis longitudinis, nudum, singutarem, firmum, aliquantulum etiam hirfutum, intus cavum, qui in fuhimo fastigio terna habet folia contigua, profunde laciniata, pene instar Anemonidum; deinceps caulis dividitur in quatuor aut quinque longos, teretes pediculos, quorum finguli

fuffinent unicum florem, quinis petalis fatis magnis, rotundis, & atbis confantem, medio-
 c-iter odoratum, multis ilavis ftaminibus capitulum occupans umbilicum oingentibus, quod
 extuffo flore apparet magno planoque femine onQftum: radix eft veluti prxmorfa & multis
 nigrcantibus fibris prsdita. Frequens nafcitur in *Sneberg* & *Snealben* & aliarum illic vicini-
 arum pratis fublterioribus. Floret Junio, femem maturitatem adipifcitur Augufto. Hujus
 eft & varietas akera ptfprafcente flore, quas dicitur *Ranunculus montanus hirtutus*
 purpurafcente flore, C. B. P. *Ranunculus montanus* 3. Cluf. Hift. Florem habet pulchrum,
 ex quinque petalis orbicularibus confantem", qux inferius purpurafcunt, fuperius in lateri-
 bus ex albo purpurea funt, reliqua parte albiifima, multis luteis ftaminulis medium occupah-
 cibus, calyceque ex quinque foliis herbacei coloris confante: feminaut in reliquis *Ranun-*
culis compa&a, ex nigro purpurea & mucronata, parum comprerTa, & paufquam in aliis
RanunSulis majora: radix in fummo fetofa S< multipliciter divifa, ikpius Cruciate modoin-
 ciia, & in multas fibras divaricata. Tota vero planta pilofa eft. Crefcit copiofe in monte
 lura è regione urbis Genevenfis. Floret Junio, femina Augufto funt matura.

^*Ranunculus* montanus hirtutus humilior flore Narcifli, C B. P. *Ranunculi montani* 2.
 fpecies altera, Cluf. Hift. In celfioribus prseditarum earundem Alpium jugis multo humilior
 & magis hirtuta crefcit hanc *Ranunculi* fpecies, pedalem altitudinem non excedens, flore paulo
 majore (& qui *Narcifli* florem album medium calicem flavum habentem square poflit) eoque
 magis etiam odoratoquam prioris. Serius floret priore, nam eum duntaxat florentem repe-
 riebatur Clufius, quum in inferiore jugo, alterum jam femem femimaturum habentem obfervaffet.

54. *Ranunculus* Rutaceo folio flore fuave rubente, C. B. P. *Ranunculus præcox* 1. Rutæ fo-
 lio, Cluf. Hift. Hie folia aliquot producità radice tuberofa, multis fcatente fibris fetaceis,
 multifida, Rutæ foliis non valde diilimilia, molliora tamen & magis viridia: flores autem ha-
 bet amplos, ante ipfa folia emergentes, forinfecus H nm initio emergunt ad fuaverubentem*co-
 lorem tendentes, internecandidos, duodenis aut pluribus petalis confantes, umbilicum oc-
 cupant capitulo viridi, ut in reliquis *Ranunculis*, multis albicantibus aminulis, quar flavos
 apices habent, fine odore: flores fuffinet cauliculus teres, initio purpurafcens, deinde ex vi-
 ridi pallescens, quem ambit unicum plerumque folium (raroplura) exiguum, aliquot laci-
 niis divifum, lata bafi cauliculum amplectens: floribus deciduis fuccrefcit capitulum, ex
 multis (eminibus craffiufculis coacervatum, Tk) rae *Valdenfium* five *Ranunculi grumofa* radice
 tertii Clufii penc fimile. Nafcitur in inferioris *Sneberg* jugis & vicinis montibus; fingulari eft
 radice, craffiufcula, tuberofa, uti dictum, plurimas fibras emittente, in hortos autem tranfla-
 tus multis adnatis radiculis fepe propagat, multoque frequentiores fibras fpargit. Floret in
 hortis plerumque Aprili, nativo autem loco, videlicet frigidiore, ferius, led brevi poft folu-
 tam nivem, qux jugis illis infidet. Provenit etiam in monte Baldo, tefte Johanne Pona, qui
 eum fub nomine *Ranunculi Coiandri* blio exhibet.

. ^*Ranunculus* montanus purpureus calyce villofo Felicis Plateri, J. B. Chabr. *Plantulae*
 hu^us facies, dihgénique confideratio facile intelligentibus differentiam fui à reliquis *Ra-*
nunculi fpeciebns oftendit. Vhnta eft dodrantalis, tolia habet veluti in digicos diffcSa, par-
 tim acanthulorum exorta long, spçdicnlish»entia, partim ex ipfis pediculis pendentia; in
 fummo cauhsfof infidet *Ranunculi*, quinque petalis fubrotundis prarditus, fingulatim aut
 aiiquando binatim purpureus, villofilimo & veluti byfléo. ei concolore lanugine obte&o ca-
 l>cc. Felix Platerus in *Alpibus* *Valefix* legit, ?c leftum in herbario fuo *ficco* adfervabat ex
 quo Johannes Bauhinus delcripfit, ac pingi curavit.

56. *Ranunculus* ^ *Alpinus minimus albus & luteus*, J. B. Chabr. *Omnium Ranunculorum*
 quos vidit, inqmt Johannes Bauhinus, minimi funt hi in montibus Rhtticifcolleai; prior ra-
 dicalicula cedentibus, quidam aut trium unciarum altitudine eft, uno alterove foliolo or-
 natus; rariam fecantur *Hederæ* imitar quædam, rotunda in margine duntaxat *Ge-*
renii columbini modo ferrat; 1, modocrenata, craffiufcula: flos fummo cauli infidet albus auc
 lateus, quinis parvis admodum petalis mucronatis leu acuminatis confans, cum ftaminulis in
 medio cæterorum *Ranunculorum* more.

pnmi Ipecies 1. Clul. Hilt. Hie prior muln r. *Ranunculi montani*
 habet folia, aliquot fciifuris divife, & in ambiET' rousa or 31A C^T au
 pernepra^dita, latiscrallafive carnofa, fervididim^fimirV in ^ vjiaui T fplendentw]uc lu,
 fingulans, brevis, dodrante minor; ttoremalbu' L T ^ pedl^ulus ^ltur tenuis,
 nurcmalbus, minorem, quinis petalis conilantem luiti-
 nciis

nens, inodorum, cujus umbilicuro ftamina crocea occupant; deciduo flore apparec capitulum immaturo Fn go fimile & multisfeminibusgranulatimcohxrenDbusconians: radix mritis rflbieantibus fibris pradita eft.

58. Hujus altera fpecies eft : cujus folia in tres profundas lacinias divifa, *Sc Illx denuo* aliquot incifuris donace; cauliculo ab aitero non differt, *fed florem muko* amplio rem gerit, eumque interdum duplici petalorum ferie conftantem, alioqui colore fuperiori par t-ft, & eodem tempore fefe explicat, radix quemadmodum in illo, qua? fupremâ parte extuberac, infernâ fibris longioribus donatur. Nafcitur uterque in fummis *Sneberg* & vicinarum Alpi-^umjugis, confragofo folo, & pene in ipfis petrarum Muris: Junio ifthic floret, aliquando ferius, prout nix maturius aut ferius folvitur, in hortos autem tranflatus Aprili ilores profert niveos.

59. *Ranunculus* Aphodeli radice di&us Pthora major, nobis. Pthora Valdenfi immunontis Baldi, Cluf. Hift. Ad. & Icon. Lob. Thora feu Pthora, Gtr. Aconiturri Pardalianches 1. feu Thora major, C. B. P. A radicibus Aphodeli, flore pentapetalo & femine Ranuncuiis multiconformibus, nufquam aprjus, quam ad Ranunculorum claffem referendam hanc plantam (praecipue à fine ultimo) putabam. Caulis hujus plants tenuis, junceus, valde kvis, bipalmaris aut tripalmaris, cui fecundum longitudinem adhaerent terna, qnaterna folia, qua: funt rotunda, pauulum dura, tevia, fubviridis colons, tendentis ad cfruleum, foliis Grafti colore haud ab familia, eleganter in ambitu crenata: in fummo caulis emergunt terni, quaterni petioli, unciales, finguli fingulos fuftinentes flores luteos, pentapetalos, minores floribus Ranunculi pratensis vulgaris, nonnunquam xquales: quibus fingulis fetifcentibus fuccedunt fingula capitula exploribus feminibus coacervatis conflata Ranunculorum aliorum more: radix conftat 10, aut 12. tuberibus oblongis, Aphodeli albi radicum icmulis, cum fingularibus fibils à fingulis pendenribn-?, feu infra dimiilis: nomen obtinuit a <p%&9 qux fignilicat corruptionem, venenum, mqrtemve, qu\$ funt certa indicia hujus plants.

60. *Ranunculus* Aphodeli radice didus Pthora minor, nobis. Thora Sabaudica & montis Baldi, Tab. Ger. Thora Valdenfis, Dod. *Ranunculus grumofa* radice 3. Cluf. Hift. Aconitum Pardalianches alterum five Thora minor, C. B. P. Plantula hxc unico affurgit caule kvi & piano, ex cujus medio pullulant bina folia, nec plura, ex multis parvis foliolis conflata, & hac ratione prsecipue diftinguitur à Pthora Valdenfium majore; infuper flores edit pentapetalos, luteos, quorum fingula petala innt rotundiora petalis prcedentis: radices itidem minores, cetera convenit cum pracedente. Uterque hie *Ranunculus* Pthora di&us, florec Martio & Aprili, atque femine maturatur Junio. Natales utriufque in nominibus patent.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

*Omnes Ranunculi qualitan, ut ait Galenus, vehementer acrem poffident, adco ut turn dolore exulccrent: hac ratione fi moderate isr convenknter utare, Pfor en is lepras excoriant is ungues Jivellunt: turn lefrofis fi'igmata digerunt is acrobordonas isr myrmecias detrahunt, quîn is alopecias juvant, pauco tempore ad: nota: namfi diutius in b<ereant^ non excoriatur folumij> fa cutis, fed is in cruftam uritur, atque b*c omnia caulis is foliorum funt opera, ac fi imponas cauftica feu urentia ferracendentia. Porro radix arefa Sia fternutatio mm provocat, fimiliter a His qu<e valenter deficcant: fediir dolentes denies ita juvat ut frangat eos valentifcilicet ex-> ficcatione; is ut femel dicam, calida is fecca valde eft radix, turn unherfa adeo herba. H<£C*

Galenus.

32. *Ranunculus rotundifolius* pr<*cox Aphodeli radice, nobis. *Chelidonium minus*, Dod. Ger. Poteft herbula b*c verna. prscox ab hirundinibus nomen invenife fuum; nam circa ipfum hirundinum advent urn apparere incipit, fed tamen priusquam ipfk recedant, jam diu evanuit. Hoc nomen appofite magk convenit *Chelidonio* majon^ in tertia Seclione exphcato, inter tetrapetalas filiquofas herbas cap. XL *Cbelidonium minus* calidam is ficcam qualitate poff/det, ipfo majore *Cbelidonio* filiquofo eft acrius ac calidius, *Ranunculi* potentia* proximum, ideo ipfum inter *Ranunculos* confituimus, juntu fine ultimo^ quo convenit cum *Ranuncuiis*. Cutem valenter^ ut Gden. is Diofc. aiunt, exulcerat, fcabros ungues ejicit: fuccus radicum per nares attracliu, aut ipfts iinpoftu* i ca P^{ut} P^{er} tyfa nares expurgdt. Pofterior <*tas ad bt morroides radici* bws unâ CUM adherentibus granules utitur, qu<e hujus fucco cum vino aut labor ant is urina permixto fspiu* allots contrahuntur, ac dolore fopito refucantur. Sunt qui exiftiment^ vel veftatam folummodo herb am prodefe adverfus earundem dolores pofe. Sed bif^jana utpkrimum habentur.

45, ^46- *Ranunculus palustris kngifolius minor foliis plants iff ferrath, nobis. Ranunculus fiammeus minor iSr fenatus, Ger. flammula vulgarit t&terU Ranunculi fimilis rfl, atr'vs jStgUiter, exulcerans iff veficas faciens citius iff promptius, imo cruftam induccns. Ejufffjn pecaera emcamur, idea arcent fedulo pecus cpilioms, ne eo Ranunculo de-vorato infiammentur pr&eordia, indidmqt moriantur, ut videre eft in balantiumextk, qua: hujus pabulo ambufta fuere, teyle Lobdio in AdverfariU fttis.*

58, (?59- *Ranunculus Afphodeli radice difflus Ptboramajor? nobis. Ptboravaldenfis^ Ccr. Et Ranunculus Afpbodeli radice diBus ?tboraminw, vobi\$. EthoTaSabaudkafeumontkBaldi, Ger. Tab. Perniciofa iy venefica hujus duplkk Ptbor<£ vis. Nafdli fertur excedere mdhtiam. Tantam autem ffe aiunr, ut homo quidempr*cipue, dcinde iff quadruples ferum, ac aliud etiam, fcilicet domefikum, •uulntr.atum aut iSlum telo hujus fucco ii/iburo illitove, intra femihoTam pekat ac morktur. flegatur tamen mortferum, inquit T}odon<gus\ji bibatur aut devorttur, tametft aifque noxa idnon fiat, Vtunturjucco venatores adferarum vtnationim^ quern exprtffum iff preparation inbulinhsvant cornibus, ad fagittas intingendoi veveno ac toxico pTffintaneo. Vim ejus experturi acum in eo fucco inficiunt, qua ranam pungant, qua ft illico moriatur, prsfntianeum judicani venenum-, ut author eft Gtfnrus. Af>ud Valdenfes iff in montibus vkinhs in phrimo efl ufu fuccus hujus btrb* exprefius, (? in ungulis aut cornibus bourn affervatus iff in foro publico venum expoitus, ut hoc fucto inficiantur venajorum fagitt<e, quibus maStaniur fere damnainfertntes incolh, prediifosmontis hab'ttantibus.*

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

P 4g. 17, col. 2. pi. vi. *Jfanuncultit folio Jconitiforc alb« multiplici, C. B. P. J(aauntutit pUtu> Jiore alba, Cluf. fjrjf. Eyjl. Dtbet tranjfirri ad <>l. 2. ft. VII, VIII. IX, S x. tot. *?*\$,* t%2. dtindt Ranunculus mtntanui alius Aconitifoliosiert majors pi. vn. cat. 1. pat.igi.3Ranunculus montanui Atmhi folio fieri; alia minor (perperamhabit Cafp. Bauhinus majere) pi. VIII. tot. qitfdmpag. tS2. & %catiitnctiluf Amiuti folio fitre albo multipliti fajr. ty\$.c»l.2.pl.\-i. « fynunatui mwtanitt Jfcenti folit flort globafa pag. i\$.r Cti.t-fi.tX, (3 J(atmmtlul tnantanui Jctmitifaho m*£it9 fitrc pi, x. Omnts ha prgttS* plant* nan fint fynvneuli dieend*, turn ftnina monbaieavt atuleata in unttm expat tangftm, Rjnuncutorrtm mtrt, ftd runt futmiMi feu Dittos ftninales mtmbranacroi fimul/unHas, a Actmti ritaftminabiu-Tim*ibnbnm fntnmtij prawt, ad Acomt, iff dibrm rptrii, appellando Atoratum fy tit. tidiPrmlud. Ratan.pa*. l.t.*

Ya£. tgO.t\$J.3.}l.Vi. 7(auu,cului aquatuut tr, thephylbn mtialttttat Cal', Bkrprritur hitffupra fajr. '41.cot.2.bl. vi. *Ranunculus aquaiuu: ttebtftythn mtidio luttus vel fytnitntulits aqaatuut r-niulaian n<y!+>»*, Ctl. Nen poteji ejji£Adi-*

lifelium aquati(uv\ folu'i Abralani J^minrui. Jora Viapfttlo, <5 Kantncuhu tqamus capliltuu: cum una C? tadt/n planta nunpotrji adaptari duobiu ytnrtbiu, (S Millifolie & Rgtiuntuto; trga lap/us eft Cafp, Bauhinus, t'itdpag. j?f. Prttut. nojir. Bt-t am car urn.

*Paft. igo.cal. i.ft.vi. fynUnculut ajuatiau feyledisnh folio, C.B.P. Cotyledon aqttatita, D>d. Cum femennengeratRanumuii, nsarfi reputandot genuinni Hanunttilut; idea ft tat monutmuspag, }7T-Prmlud. Bftan, aha tffit renittenth b*i piama, nt(aptius mca opimonc rtmitti pot eft ijaam ad httert-e lit IK aquatitai plan tuts, ttiamfiiiatktrttntia <>/ hit fculptn.Jarn rjut figuram turavimvs.*

Pa%. i tj. to!, i.pt.'i, Atmiiuum J'anlatiantbet I. fitt fthtra ma/er C.B.I'. Utat.j.pl. n. Aiviti-tum pardalianeber attramfiveiTitra minor, C. B.Pt Male a CafpartBauhino attrrifcut autbtribiu dift' tur Aitnito, turn AcQnitum fit planta (utullara, (-fitt fiugutu fieriitt fuctdvnt pttirt Jibuti* feu d-/fuU /trmnalts mrniranactt; at jut h* Jam plant* Junt genuine Rsnuntuli fpeiirt a Jlariumi prntap-ta/u (i frminiut multu: rattmatint in a num caput toatervath; ergo aptius n tubiiredatuntur nd'jud- fontsplantas, RantHnuloiJtih(tt,qu<im ad Jiwti.*

Finis Seffionis quartis Partis fecund*.

TRICAPSULARIS LACTESCENTES CUMB*NUI-iT\$JiltrrJ, ixinnr.

Silva 3^o Tab

1. Campanula maj. Ia3ffa*t, lab.



2. Campanula perfoliata, lab.



3. Campanula folie serratis (rotundata), lab.



4. Campanula folio subrotunda (C. Prus)



5. Campanula spinae glabra (C. Prus) (C. Prus) (C. Prus)



6. Campanula minor magno flore, actis.



7. Campanula pyramidalis minor (Prus) (Prus) (Prus)



8. Campanula Guttierrezii (Prus) (Prus) (Prus)



f'riiu.' «A*W focr.Ctii

9. Campanula Alpina (Prus) (Prus) (Prus)



10. Campanula s. Rapunculus (Prus) (Prus) (Prus)



11. Rapunculus j.-hvnt Tif*fc-'f\$R- (Prus) (Prus) (Prus)



Sub auspicio Dom. Guilielmi Gapa
Pharmacopoeum hodiernum factum
a magistro anno 1672, premissi Dno
Alexanderi a multo anno Pharmacop.

Tab. 10. h. 10. f. 10.

Guilielmus Saumanni delin.

rr JW inafh • I'B t :z 6 Campanula
in Rapuncul

Campanula
rwiiuu '0,-fnt fblü!
is/Or rfotmluh?

Camparmh Jht ThuktiuuiL AT
(amvasiufir /luixiJtm Jcf.iutsciaU.
' • I m = idfm m /••'

Campan
toclf



-S-

II

Campanula
t ifrman*

30 Campanula hortensis filia flore

Campanula
ptrufvLr m*irtm.

32 Campanula hortensis Ra-
punculi radice repente, nobis
Trachelium ex maritima.
lob. ad.



>

^rmmidjtf whit i-centuj
I

34 V / wu 6 TahhtEJiu.
<Ar<fryTh.ktiütwt
folij aq. Park.

Rapunculus
folij And**.-?>wh Hirun
culis
um IturtUMM i Λ

wchuli floca folij
ffyh i. hifu. >u, f& Campanula



y

v



Antipias D. Johanni Opsi
Pharmacopoeia Lindschecian
folij & radice repente. Rapi Carh
& fava poffona pharmacop.

37 Campanula hirsuta pyramidalis Vahl
rardi. I.B.



38 Campanula hirsuta Bononiensis I.B.



39 Trachelium ruscifolium Aplerog I.B.



40 Trachelium minus album I.B.



41 Trachelium caputatum hirsutum Gen.
minus foliis. Boiss.



42 Trachelium hirsutum altissimum
asperius foliis. Boiss. I.B.



43 Trachelium minus, frangulocornu, nobis



44 Trachelium minus Globosum, Duss.



45 Trachelium minus Echus, fol. nobis




A->te




HERBARIUM MUSEI HISTORICO-NATURALIS
MUSEI HISTORICO-NATURALIS
MUSEI HISTORICO-NATURALIS



4v



% s



lf))

tttt

&~|-A

HERBARIUM AFRICANUM MONSIEUR DE LAURENT



Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

Herbarium Africanum
Monsieur de Laurent
Paris 1754

HERBARIUM MUSEI HISTORICO-NATURALIS
MUSEI HISTORICO-NATURALIS
MUSEI HISTORICO-NATURALIS



HERBARIUM MUSEI HISTORICO-NATURALIS
MUSEI HISTORICO-NATURALIS
MUSEI HISTORICO-NATURALIS



HERBARIUM MUSEI HISTORICO-NATURALIS
MUSEI HISTORICO-NATURALIS
MUSEI HISTORICO-NATURALIS

1. *Asclepias tuberosa* L. *Asclepias tuberosa* L. *Asclepias tuberosa* L. *Asclepias tuberosa* L.



2. *Asclepias tuberosa* L. *Asclepias tuberosa* L. *Asclepias tuberosa* L. *Asclepias tuberosa* L.



3. *Asclepias tuberosa* L. *Asclepias tuberosa* L. *Asclepias tuberosa* L. *Asclepias tuberosa* L.






N it * > fr

iiM


* . . * ||



* > ni



lf



lf





Planta hanc in Africa et Asia in locis calidis reperitur.



Planta hanc in Africa et Asia in locis calidis reperitur.



Planta hanc in Africa et Asia in locis calidis reperitur.



Planta hanc in Africa et Asia in locis calidis reperitur.



Planta hanc in Africa et Asia in locis calidis reperitur.



Planta hanc in Africa et Asia in locis calidis reperitur.



Herbarium Imperiale Vindobonense



Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...

Planta quae in ...
Sunt in ...
Sunt in ...



Solanum Sarracenicum
Solanum nigrum, major, et
Solanum nigrum, Park.



2. *Fraxinella Sarracenicum*
altissimum, var. lobatum, modo
fundus, Seminebusque minor
etiam nuda, Nilone, in
Europa, et



1. *Potamogeton rotundifolium*
C.B.F. Potamogeton latifolium
Deo Potamogeton vulgaris, Park.



2. *Potamogeton*
Potamogeton



1. *Potamogeton folia lato* *Splen-*
dentibus, C.B.F. Potamogeton
T. Dod.



2. *Potamogeton folia*
angusta splendentibus,
C.B.F. altorum, DeL.
legumibus foliatis.



3. *Potamogeton*
pallidiflorum,
Boiss.



1. *Potamogeton* *nuda* *non* *maritima,*
C.B.F.



2. *Potamogeton* *nuda* *maritima,*
C.B.F. lob. torn.



1. *Potamogeton* *nuda*, *C.B.F.*
Phacelia repens, lob. torn. Park.



2. *Potamogeton* *arens* *Sive*
Hydropteris, C.B.F. Paris
Sive Hydropteris, L.



1. *Polygonum latifolium,*
C.B.F. non rotundifolium, in
Europa, et, Germaniam
lob. torn.



2. *Polygonum* *mar-*
itimum, lob. torn. in
Europa, et, Germaniam
lob. torn. et



3. *Polygonum* *spicatum* *inter* *Germania*
Lob. torn. Boiss.



Auspicio Gulielmi Borae Phari-
macoyscorum Londinensis
Soci.

MOLLIENTES SEMINE, aspero & rugoso spinoso & flore herbaceo semine minuto lucido donata. Tab. 5. Section.

1. Beta alba vel pallifera, CBP Fallo. hist. lued. B Dod



3. Beta rubra vulgaris, CBP rubra, Dod & platycaulos



6. Beta rubra radice rapae, CBP Rubra Romana, Dod



7. Beta Cretica semine aculeato, CBP & Prod Matth. ed Bas



2. Spinachia semine racemoso non spinoso, ne bis.



1. Spinachia semine racemoso pungente & spinoso, nobis Spinachia semine spinoso, CBP



1. Bonus Henricus, Matth. ed Bas & Tota bona, Dod



2. Blitum album magis, CBP Dod & minus Dod



6. Blitum nodypermum (6. semina aspica) CBP



3. Blitum rubrum magis, CBP & Ger



4. Blitum rubrum minus, CBP non rubrum, Dod



1. Parietaria officinarum & P. communis, Dod Heine & Bonnier, Sed. ni. Germ. Litorea sive Praticorum



Guil. Simonet delin.

Hubertus Van Olleren Leodienfis sculpsit

Insuper Abrahami Hudsoni Phoeniceo, Londiniensis Sc.



Prunellus tricolor, nodis pendentibus, nodis Glomerata, nodis
HIM. Cit.



Atriplex latifolia, Atriplex foetida, Atriplex adosa, Atriplex adosa



Atriplex foetida, Atriplex adosa

A. y. na Gulielmi Clarke Pharm. Londinensis Soci.

MOLLIENTES *flore herbacea, fructus minuto nigro Donato.*

Tub. 22. Section

9. *Atriplex Mori fr. acta major fragifera maj;*
noto Quercus fructu, infra haec persequenti



10. *Atriplex fragifera media, nobis sylvestris*
fragifera. Clus



11. *Atriplex fragifera minor, nobis Atriplex*
sylvestris, capillata habetur. B. P. Fr. & Macer
ad Bauh



12 & 13. *Atriplex folliculata hort.*
Atriplex alba, spalliatu ab uno
hortensis vulgaris, C. P.



14. *Atriplex folio deltoidei, triangulati, sinuato*
lenticulato hastato cuspidati, fentili, nobis.



15. *Atriplex arguta, oblongo folio, C. P.*
vulgaris arguta folio, cum folliculis, B.



16. *Atriplex filicaria, folio*
sinuato, nobis, B.



17. *Atriplex folliculata maritima, C. P.*
Atriplex maritima locustula, C. P. marina.



18. *Atriplex Halimi folio, C. P.*
Halimoides, lob. B.



21. *Atriplex folliculata marina*
Ut in m. ialihknt fuhrofus



22. *Holcus argutus, folio*
procumbens, C. P. Ger.



23. *Holcus vulgaris, e. Portulaca, Ger.*



Guil. Sanmarco delin.

Hubertus Van Obergen Leodiensis sculpsit.

Atque in Johannis Fletcher Pharmacopoeum Londinensium Soci.

1715
10 - ikish

MOLLIENTES Flores herbaceae semine minuto idfra vñstifer.

Sffm.f. V ab 33

1. Kali itenitit atk&ttu ttiitaf,
C.B.P. Soda Kal' nuñhiuruJLufd.

z.K&li JtoriJuiit ijñiint
tuMnla JL'tUribiti until
frYt-itiCPir, &GCfvi.

Kulf ulmi iint
Jl*rt&iH,Jlofa>n.

»Kali tmaut itlhtin t/muirjppfi
dents, CB.I* Kotl albitlx mitUü

r.->,v



/> I...

^

2. Kali Gazanla minoris folio
C.B.P. Kali floridum ripens
amandis Neapolitanum, Col.
Riet 2.

£,KahALgHpntaini fylusi-aiif
fanau &Mrjfafu, EJyEKah g.
Jpe WL,?rOJf*. iit>i'l. i'Xfrt.

h-Kitt, .Iryhirn t.^rn;n
Rm-^mfii, 'ift t.ugJ
j.No. 2.6*f

J Xjli gñtetilatwn nhmm
rrt mhuu, C li. ? A',JF Ambi'i*
X,Ltujiu •hiiftin



^A^

/N

3. Kali fruticosum
C.B.P. Salicornia, Dod. Kali
Ph. Lycaea Alp. vocat.

g. Kali fruticosum
nobis Sclerum minus frute-
cosum alterum, C.B.P. Ver-
miculatus frutex mior.

n Kali fruticosum magis
alterum, nobis Sclerum minus
mum abbrexiense uermicosa-
lobum, Loh...

4. Kali spinosum effusum, C.B.P.
Uragum Matthioli Lob. Lycaea



m

5#i

se; ^-

^

Autpi
Pharmazie
& Moq
tri.tnitit I) l^ifj.

Mentha sylvestris L. -> U<V L. id. int mus
Dioscoridis in Floris CBP Ponsi Dod
Fuch Matth in horti clausa arboribus nobis

Mentha sylvestris is- / *mentha* Dioscoridis
Floris BP *mentha* Matth Koch Dod Ponsi
Fuch Matth in horti clausa arboribus nobis

Atrcj-trü/tr nwrhina itfba Jataf & P
mundana h/bsalaha perennia
Cynocrambe, mentha, Fuch hod

Mittariaffs mon Jana Jpkak
rtoku-



Cynocrambe seu Phyllon arthemagogon
Dioscoridis Ger Phyllon hortulatum BP

Cynocrambe s Phyllon Artemagogon seu
Fenoulium Ger Phyllon hortulatum BP

Cynocrambe Dioscoridis CBP
Atrina fide nova plantae Col

Eupatorium perennans s Agriemum
CBP Eupatorium Gratiolum Lat
Icon



Agriemum perennans CBP Agriemoides
Gal Puri

Sonchus officinarum CBP Natica
Dod vulgar ultrr D'tapn; m. Puri •

Solanifolia Grana abla may
Cera luteiflora in luga Ker
CBPfi

Solanifolia Cereus alpina
HCTOH-min! sa Col



Attspims Thfima H arren

J* <!! rmtacopon 'tmt Lt'.

Attspims Thfima H arren

J* <!! rmtacopon 'tmt Lt'.

VARIÆ

PL.4 HTM ADIMNIXG SECTION I §

APPENDIX Section 5th Tab. 33

Campanula rotundifolia var:
crassior, nobis Ervius
efcorida Munting.
ad Tab. v. Sect. 5. pag. 255.

dntrvtOftUtn fiiVilCtimctI Jewr-
fiupffctirn t-fitxn/i riiwul
ntixitnii.CJLPJ&tyrnat nvjynv
(tonejC.JL4CPrtHf.J*t£. jxtatfa. Tettg.VidtJ*-6</xr£. +J*-

Vista martin rnr/nr hir:
mi* irtoJana, nirbii. pl. 4
p. 48. 778



Scaahittmt Storw-1

Vffl - 82

"rnUjhfttmthij.i-affim'
piJi.ot-a.fMta j^*3

Rtitt t1 l uifait. ujiOru.r.
ppts&M filf* jcatffiti&u

Vicia pubescens rotundifolia
pubra, nobis pl. 5. pag. 275.



Linaria annua semine ruz
pauo Chalopenis minor Lecta
floribus globis linearis violaceis
anatis calice 2 foliis un:
cinclibus constructo inader:
tibus, nobis, pl. 24. pag. 208.

Geranium minimum
glucum prostratum Betonica folio,
nobis, pl. 5. pag. 208.

Malva alveolaris ann. fi
tundifolia toribtM asfij etn fefiu jm.trtm*ffuUrt

Corpini
cap:
pag.
528



Burgh. fcutp.

Aspiotis Iovannis Michell Pl ma:
copacorum Lotnlin*nxitrin Soci.

Lychnis umhstifero mo>t,ttt; 7+gehth uumtamiJUrr JMstnit riliwi-tif lattjoif'fX*"
Lychnis umhstifero mo>t,ttt; 7+gehth uumtamiJUrr JMstnit riliwi-tif lattjoif'fX*"
Lychnis umhstifero mo>t,ttt; 7+gehth uumtamiJUrr JMstnit riliwi-tif lattjoif'fX*"



Lychnis umhstifero mo>t,ttt; 7+gehth uumtamiJUrr JMstnit riliwi-tif lattjoif'fX*"
Lychnis umhstifero mo>t,ttt; 7+gehth uumtamiJUrr JMstnit riliwi-tif lattjoif'fX*"



Lychnis umhstifero mo>t,ttt; 7+gehth uumtamiJUrr JMstnit riliwi-tif lattjoif'fX*"
Lychnis umhstifero mo>t,ttt; 7+gehth uumtamiJUrr JMstnit riliwi-tif lattjoif'fX*"



Lychnis umhstifero mo>t,ttt; 7+gehth uumtamiJUrr JMstnit riliwi-tif lattjoif'fX*"
Lychnis umhstifero mo>t,ttt; 7+gehth uumtamiJUrr JMstnit riliwi-tif lattjoif'fX*"

V



Ampt... Jstltfnt Am. hor.
ruAiii Rr^tt lf...

P L A N T A R U M

Hiftorise Univerfalis Oxonienfis

PARTIS H. SECTIO V.

Be

H E R B I S

Ex numero capfulum & petalorum denominationem fumentibus.

D E

TRICAPSULARIBUS LACTESCENTIBUS,

Monopetalis, corniculatis, & galeatis.

CATVT I.

CAMPANULA, RAPUNCULUS, CERVICARIA
SIVE TRACHETIUM.

*R*apunculus vulgo dtBus, yoyjKn dynei, Tfypum fiheflre T>iofcoridi l.z.c. 135. male cenfetur: & à T.linio Lzo.c.^apijihejtns nominemaiepraponitur. Jliis Iafioneejufdernl-ii'C.zz. creditur, cujus t amen verba, reBius ad Smilacem Uvern veferuntur. Erinus J^Qcandri & Viofcor.l.q.. Erineon Tlmii l.2j. r. 7. ex Columna fententia. In hanc clajfem & Campanula ifloris forma nominate referenda fun*.

Dedu&is filiquofis bivalvibus papilionaceis in Seftione fecunda, & bicapfularibustetrapetalis tarn filiquofis quam filiculofis in tertia, & tricapfularibus h'expetalis in qtiarta; jam propter connexionem & congruentiam capfularum aggrediemur in quinta hac Seftione Tricapfulares monopetalas plantas explicandas, & tricapfulares pentapetalas; bicapfulares etiam monopetalas &c.

Dicitur Campanula a forma floris adinfar campanae (id eft, florem habet integrum in fundo campanula? in modum, etiamfi quinquefariam in marginedividatur) & Rapunculus à tuberositate radicis infarparvi Rapi; Cervicaria apud Latinos, ficapa^AK* apud Graecos, quia medetur afteftibus feu morbis colli; dicitur itidem & Uvularia. Nota generica conveniens huic generi, eft, quod quaelibet plantas pars ruptafuccum eflundat la&eum, capfulam feminalem habeat tribus loculamentis diftinfam, in quorum fingulis innumera femira lucida, ruffa, ieu fubruffa fuccedunt; eftque a forma florum vel campanulata, vel corniculata, vel denique galeata: a forma radicis, ut plurimum eft radicetuberofa, nonnunquam fibrofa: a foliis, eft vel glabra, eaque latifolia vel anguftifolia; vel hirfuta, variis formis 6c figuris contexta: a colore floris, eft crulea, vidlicea, purpurea, alba, lutea, feu ochroleucos.

T A B U L A I. Sefcionis quintal.

1. *Laflefcens*, Lob. *Campanula lattefcens foetidior*, Cluf. Hift. *Pyramidalis*, Lugd. *Lutetiana*, Eyft. O
2. *Perfctfolia*, Lob. Cluf Hift. *Campanula? nedia/Cccruko*, C. B. P. O
Dod. *Rapunculus perficifolius magno flore j* - - -
3. *Caerulea* Joh^h* ferratk, Eyft. *Rapunculus Alpinus feu Pyramidalis minor*, quii.inProd.Cafp.Bauh. O
† (L. *Subrotundh*, C.B.P. O
Didure CdtrukatFolii* <Js- Longis, nob is. *Campanula Alpina glabra flore di*
C - "(. *lutSfime c&ruko*, J. B. Chair. Q
- Campanula glabra* 6. *Magnoflore*, nobvs. *Rapuntim five Rapunculu* nemorosus magno flört*, c J. A. *Erinusmagnoflore*^ Col. O
7. *Pyramidalis minor*^ nolis. *Campanula Pyramidal*^ minor, *Profp. Alfin. de Exot.* O
8. *Pyramidal*^ alter a feu *petromarula Cretica*, nobis. *Petromarula flu lattuca PetrxaCretica*, Pon.Ital &
9. *AlpnaTragopogi folio*, C.B.P. *Trac helium Tragopogifolius*, Cluf.HiJl. G
f 10. *Anguftifolia feu Rapunculu* filveftris umbellatus anguftifo-*
| *Hus, ncb'ps. Rapunculu*umbellatus 2. Cam.Hort.* O
- Vmbellata* <_i^ £_aif_a feu *Rapunculus umbellatus latifolius*, nobis.
{_ *Rapunculu* umbellatus 1. Cam. Hort.* O
12. *Capitatapetr*<ea, nobis. *Rapunculus petreus Profp. Alpin. de Exot.* ©
- §. 1. CA MP A NV L A major glabra, feu *Rapunculus major glaber*.
*Explicatio Tab. prim<e Sedionis quint**.

1. ^ *Ampanula* major lattefcens, Lob. Lugd. *Campanula Pyramidalis feu Rapunculus hor*
vj tends feu la ti ore folio, C.B.P. *Campanula major*, Dod. *Campanula la&fcens foeti*
dior, Cluf. Hift. *Campanulala&fcensPyramidalis*, Ger. *Pyramidalis*, Lugd. *Pyramidalis*
Lutetiana, Eyft. *Campanula hzec major folia liabet prima feu terrae proxima*, glabra, lata,
Viota nigrx forms finiilia, paulo tamen majora, *qux vero circa caules*, quos validos & prse^
akos promit, oblongiora, utraque iaturi viroris.* flores fecundum caules gignuntur plurimi,
campanulati, Rapunculi vulgaris floribus majoresacpatientiores, Campanulisac tintinnabu-
lisrere affimiles, integriinfundo, quinquetariam in margine divifi, caeruleo nftentes colore ;
itaminiibusinmediocandidis: radix novellis plantis oblonga & digitalis crassitudinis, rupta
copiamlattei colons fucciefrundens, vetuftisveroinmultas.fibrasdiftributa. Ubifponte pro-
veniat incertum. Floret Julio & Augusto: medio Autumno femina perficit.

2. *Campanula Perficsfolia*, Lob. Cluf. Hift. Ger. Park. Parad. *Campanula media*, Dod. *Campanula angustifolia cserulea & alba*, J. B. Chabr. *Rapunculus Perficifolius*, C. B. P. *Phyteuma Matth. Lugd. Cam. Cxf. Haec Campanula procera est*, ad cubitos duos ascendit; caule est ingulofo/igido, ex atro virore splendente: folia fricla, non multum culmo latiora, palmo longiora, rigida, kviter denticulata, proximecauli adnascuntur alternatim; e quorum alis pediculi prodeunt unum, duosautplures flores sustinentes, campanae vel calathi figura ut in Rapuntio vulgari aut superiore, sed multomagispatulos feuhiantes, in quinque acutiores lacinias dehiscentes, colore ut plurimum caeruleo, rarius albo, apicibus concoloribus: hifce fingulis fuccedent capitula term's loculamentis distincta, ternilque foraminibusinferius pertusa; ex quibus exeunt lemna plurimai mmu^ ruffa. pellucida: radix huicquam Rapuntio vulgari minor, magisque nbrola & tortuosa. Provenit in Alfatia inter Sultz^k Zenne urbes, item circa montem Sakv*, & in colic la BaftU prope Genevam. Nos in filva Regix *Fontainbelleau* prope pontem a dextris qua itur Panfus in przdittam Regiam pftendimus copiose la:is provenciccm. Floret Junio & Julio.

3. *Campanula caerulea foliis ferratis*, Eyft. *Rapunculus Alpinus five Pyramidalis minor*, C.B.P.& Prod. Radix hujus Rapunculi vulgaris forma, tubercula: ex qua caul. unus oritur, leliqu. palmar.s, qui foliis pallide vircentibus, per ambitum crenatis, acumioatis, unciam latis,

treslongis, alternatim cingitiir; in fummo flores pauci, caerulei, Campanula vulgaris form, pedicellis Jongiifculis, annexi, filio oblongo ex fingulorum medio prodeunte dnati, propendent: quibus finguijs capitulum oblongum, trifarium pertufum, ut in cæteris fæ fortis Campanulis fuccedit, cui femina minutum, ruium & pellucidum includitur. In Italia provenit, fed locus excidit Cafparo Bauhino.

4, *Campanula* foliis fubrotundis, C. B. P. & Prod. Ex radice tenui, repente, caulis fequalpalmaris, leyilanguine pubefcens angit, quæ folia pauca, fubrotunda, diâs uncias longa lataque, pediculolongodonata, tenuia, fubafpera, per ambitum ferrata, cingunt: incaule fummo flores pauci, dilute caerulei, Campanulas formâ, longopetiolo deorfumpendent.es, è quorum medio longus filius exfurgens extra florem fertur. Hanc Cervicariæ minoris rotundi-folli nomm Ql). Sigfridus Helmfiadiom. Hæc a Campanula hortenfis Rapunculi radice differre videtur altitudine, foliorum longitudine, riorum magnitudine & numero, quæ pro radicibus multas tenues, tranfverfas, & oblique repentibus fibrashabet, ita ut ex hortorum areolis vix extirpari poffit, a quibus radices oblongæ, candidæ, Rapunculi radicibus fimiles, demittuntur.

§. *Campanula* Alpina glabra flore dilutiffime cæruleo, J. B. Chabr. Pulchra eft hæc Campanula, quas nobis à D. Agerio Argentinenfis clata, flore eft dilutillime cærulei coloris; is collegat in vertice montis Tirolenfis: nihil hirfuti aut aperi nobis in hac planta apparuit. Parvus ramus eft ferè pedalis: folia aliquid habent fimilitudinis cum Hieracio Sabaudico, incircuito ferrata, minora funt præcedentis foliis: flores etiam minores in unum latus verfi, ex brevi pediculo nutantes.

6. *Campanula* magno flore, nobis. Rapuntium five Rapunculus nemorosus minor magno flore, C. B. P. Erinus magno flore, Col. In Aprenfium colle quodam, caftro fubjacejiti, Decemori menfe hanc Erini varietatem erimus adhuc florentem, ut in lconca ad vivum xprefimius, inquit Columna. Radice eft craffa, fibroia, ex albo parum rufèfcante, fa pore dulci, ut Rapuntium vulgare laftefcente ac perenni, ut conjicere licet ex novella fobole, «& radicis rugofa capite: folia cum caule promit primum exigua, rotundiore cacumine, vulgaris Pepli magnitudine, deinde longiora, qua vix uneiam æquant, vel fuperant, femper longiora fanguiftiora, illaque in extremo acutiora, quas caulis medio hasrent. caulis tenuis eft, pedalis, fritatus, paucis foliis interceptis, irmpjusaftigioconfpiciuntur flores, ex quinque bliatabafi, anguftifolia, ut in aliis, Campanulas aut Trachii modo, unciali longitudine, & femiunciali fere latitudine, in quinque laciniis margine inciis, obfolete carruleo-purpurafcente, venulispurpurocaeruleis perlongum depidus flofeft, laciniashabens colorem agis faturo, apicem in medio trifidum, intorto cacumine, quinis etiam ftaminibus eircundatum: capfulas ternis loculamentis diftinclas, ut in congeneribus, in quibus femina arenas infarminutum, pellucidum continetur, quod quando perfectum per foramina terna decidit. fota planta laftefcit, dulci fapore edulis, g#atamagis in cibo quam vulgatum Rapuntium.

7. *Campanula* Pyramidalis minor, Profp. Alpin. de Exot. Elegantiiffima hæc planta in valle Sanctæ Fidæ prope Baffanum opidum duobus milliaribus, in locis opacis & humidis, quam (^ quod fciam) non vidi, inquit Profp. Alpinus, ab aliquo defcriptam, neque alibi vidi eandem nafcentem. A radice tres, vel quatuor, vel plures etiam caules aflurgunt bicubitales, & etiam longiores, recti, graciles, rotundi, ex quibus hinc inde ramuli muki afcendunt, inferne longi, fuperne breves, ita ut fervato æquali ordine in iis ramulis, quæ pyramis cum ramulis floribusque appareat, unde nos Campanulam Pyramidalem minorem nominavimus (inquit Profp. Alpinus) ad differentiam Pyramidalis vulgatæ herbariorum, quod hæc Campanula oftra longe amplior fit. Ex fummitatibus verorum ramulorum flores propendent numeroſi, qui parvis Campanulas funt fimiles, colore aut caeruleo dilutiore, aut candido, hasque Campanulas funt cum fuis filamentis (tanto artificio à natura libratas, ut artifex peritiffimus ita perbelle vix eas faceret) deorfum propendentes, figura florum qui in vulgaribus Campanulis fpeftantur, fed paulo majores; colore, ut etiam diftinctum; aut candido aut cæruleo-dilutiore, fua viter olentes. Hæc ftirps interne juxta terram admodum eft foliofa: folia vero fpeftantur ionga, viridia, inferius iatiufcula, & in acutum definentia, magnitudine & figura quafi ad Rapunculos accedentia, vel ad Intybum filveftrem; longe tamen extrinſice undique ferrata/uperne longe minora, tenuiora, ac magis mucronata cernuntur fingulaque ad unum cujufque ramuli in Ouale exortum: radix prædittas plants prægrandis, craffa, brevis, nucis Juglandis fere magnitudine, figura tamen longior, in acutum definens, colore albo fere tranſlucido, M Rapunculi itidem radicem maxime inclinans. Sapor vero infipidus & vifcidus obſervatus

elt* Stirps perertniseft, &tjuo annolior,eoradices habet numeroiores &crafliores.

8. Campanula feu Perromarula Crecica, nobis. jttapunculus Creticus feu Pyramids is altera, C.B.F. PetromarulaCreticaleu RapunculusCrecicus, Park. Petrbiarnjff feuLaftnca petr* a Hon. belli & Pone Ital. Haec Rapmtculi fpecies peculiaris Cretx infulx, nee alibi fpontr nafeens ad hue obleruaca. -Prima folia qux prudemu on fernine (ato, fmi rotunda, vduer folia Viols Mania:, &panim in roargiae dentata, attpvircnBa;fccuiido anno poftiationera plores caales proferre jotundos, ttriaros, ad bicubitalero altitudinem ti ramulos filfbs, qaoniB fingulis innalcuncur plurimirioiculi, rubeiites, campanulad, fuiinquariam in margine proht[i;is divifi Btrettexi: qu'bus evanidis focradunthecsetricapfalares fconrinentes fonin^ lucidi, lubnifta altorm Rapuiculorum more. HicR.ipunculus a liurc qnkjqneftriam pro iudiusin margine divifo adinibr g.ilcatoriini, meliasad finem R'apunculoram rejicerecur. Radix eft magna, alba, in plurtsraditulas divilii, ex qua rupta laftens luccus cman?t, ficu extoiiiis: perenniseft planta, diudurans, atqut fingulis annis "ex eadem radice protrud' n jva Folia: debet camena tngorearccri apud nos Septencrionales iakem.Videfinem hujusc.

9 Campanula AlpinaTr3gopogi tolib, C.b.P; Trathtlum montanOrn, Co!. Tnchliam Tragopogi Folio, Cluf. Hift. Radiceni habet ctaffiuculani, albidam, l;!fte(centem,& tx tpa plnrimas fibriflas dimiffas productnteru: folia funtlunga, angufta, dmiatcola, Croci auc Tragopogi forma & magndtodine. Vctis fine cantes pedales, fobnifaentes atque Imfatosi quibos articulatum folia rarafiag_u,lj, genicttiisadherent; in caulium fumniitatibus denie proveniunt fiore parpurei, noli tor ma, Trachdii vulgaris niido, ex bafibus ftingulis quinque Foliolis viridibna conlrruffis: ftrmina it idem minuta"pcllHcida, in thecis tricaptbiaribna ob fervantur, qcalia Hint rtiltjaorum Rapuncalorunvfemina. Tora planca itidtm I it dtcli.it, uc carera; (111 Ibrtis. Radix perennjs eft acqic dolt is, dffi apta, ficu vulgarisRapnncall radix.

10. Campanula glabra umbellata angufta folia, fei' Rapunculus umbellatus anguftifolia, nobis. Rapunculusumbellatusanguftifoliu8,.C. B. P. Rapuculus filveftris umbellatus 2.Cam. Horc. Hie tolij Dlibet fei' mentis multo minors flranguftiora paucioraque: tiorcsminorc3, cscrucos, nun cam patente^plures fimnl in unim capitulumcongeftos,cam filoin medio fingulorum, qui in margine qinqneferiam aliorom more ctiam dividuncur: (tmina in t!u-t# tuicapfularibuSfpellucida icidem, producunrur.

11. Campanula nmbellita lad folia, Teu Raptmcilius uml^|atns hrilolins, nobis. Rapunculus nmbellatus latifolius,C.B.P. RapimctiJus filve^isumbeJlatosfiErnleus majorJhaL Rapuntulus fflveftris umbellatus 1. Can, Hbrt. Hujusfolia font bciora, ftrmiunciali talitudine,mticroni ta, in margine pilola: caulcm erigic dodrantalcu, |ulis fcotentem, in cuJHS.fummo fed igio provetimnt pl: rrimu folcult, in onuin caput coaccervatt, cerulti, integri in Iundo nol. r mtar, fingulis quinqueferiam in margine partiti, quorum ab fing cidus fucccdnrl capfulx tribus loculamentis diftinctx, atque in fingulis locularaencis plarima tonrinentnr femina, InbrirUa, pdlucida.

12. Campanula glabracapicaca petraz, nobis. Rapunculus petrus, Profp. Alpin.de Exot. Naf c i c u r h w U t f i l rans prope Ballanum in agro Marofticeni a Brenta-flumine vix tenia milliard partedihte, ;n coll: lapideo Septentrioni expofito, radice Rapunculi albâ runs laxoromfixa, Qtprdpereamagnokiln re eruatnr, vixque integra: radix, inqnam,ei oblonga digit] minors crailiric, caraoia af alla, Rapunculo vulgari maxime fimilis, lapore dulci, lubacti, unde in acctariis Rapunculi modo, ut judi o, elt latis accepta g' tfrsi: ex radice folia com: ura [crt longiiFimis Vediculis ratilibiis inhzrentia, Hcti era folis carnosifimilia, minora tamen, longiora, m: gilqoeinacutam dttinentia, tennora, colore vinui nigrefcentia: e foliorum medio prodeunt tres furculi, graciles, recti, longi, r ptund^dodrar, tales cum parvifoliolis longis, cenoiDUE, mringac lu rnotis, fuis petiolis caulibus adnaxcentibus • in calicularum cacumine capitulum parvuro, rottindum, aliquando oblongum extuberat' floscul' complurimis caeruleis, ^{di} uium congeftis, inodorw: quibus fingulis fuccedunt capfulæ es, tribus loculamentis ^{di} uiz, in quorum fingulis plurjma minuta k-miid cedunt capfulæ es, tribus loculamentis ^{di} uiz, in quorum fingulis plurjma minuta k-miid rum rimis nalcatur. cicuorumiuixlbii is more. Petrus dicitur quod in laxo-

TABULA II. Se&ionis quints.

	13. <i>Efculentus</i> , C. B. P. <i>Rapunculus</i> ^ Matth. Dod. £ I^ <i>Nemorofus angulifolius major majorefflore</i> ^CB.P. Rapunculus fihefirts major*, Eyft. §
Rapunculus minor glaber	151 <i>Folioferrato rotundiore flore Convolvuli</i> , nobk. <i>Rapunculus</i> I . folio ferrato rotundiore, J. B. Chabr. 0 116. <i>Alpinus minor rotundifolius</i> , nobk. <i>Campanula Alpina minor</i> † rotundifolia. 0 Ij. <i>Vulgarkfolikimk rotundioribusfinuatis non ferratis</i> , nobk. <i>Campanula minor rotundifolia vulgark</i> , C. B.P. 0 i S: <i>CymbalarU aut Heder* folio</i> , L B.E. isr Prod. © K). <i>SerpillifoHo</i> , C.B.P. izr Prod. Q
CamL . plabra minor	j 20. <i>Ramofior minor flore dllica'nte</i> , nobk. <i>Erinus Nicandfi</i> , Col. Phytob. § 21. <i>Arvenfijio</i> nobk. <i>Campanula arvenfis minima</i> , Ved. <i>Speculum Venerk</i> <i>majus</i> , Park* <i>Onobrychk</i> , 1. Dod. <i>Avicularia Sylvii quibufdam</i> <i>floribu6 purpuroviolacek*</i> J. B. Chabr. &? 22. <i>Arvenfis erefta</i> , nobk. <i>Speculum Venerk minut</i> , Ger. Vark: i^ <i>Pentagonia perfofiata</i> , nobk. § 24. <i>Cordifolia longiu* radicata</i> <i>Catana</i> , nobk. <i>Campanula rotundi</i> folia longiut radicata, Boccon. 0

CAMP ANV L JE feu RAPV NCV LI glabriminores.

Explicatio Tab. fecund* Setlwnk. nrii.

L>. *Rapunculus efculentus*, C. B. P. *Rapunculus*, Matth. Catm. Dod. *Rapuntium parvum*¹, Ad. Lob. (c^u & P^{es} *Locuftas Avicennae*) Ger. *Rapunculus hie vulgaris*, vemis *Acetariis ex-*
petitus radice eft tuberoſa, mirwmi *digiti craffitudine*, *Napi aut parvi Rapi fimilitudine*, *alba*,
dulci, *folia ex oblongo ad extremum rotunda*, per terram fparguntur, rfonnihil *hirfuta*
iub exortum: ex horum medio *caulis exoritur cubitalis & fequicubitalis*, *hirfutus itidem*, *cr-*
nulatus & laftefcens, *tbliisyeftitus acutioribus*, *pediculorum expertibus*: *flores formam no-*
kae imitantur, *peroras quinquefariam diyifi*, *cxrulei ut plurimum*, *nonnunquam candidi*,
quorum firtgulos excipiunt vafcula oblonga, *ternis conftantia loculamentis*, *quorum unum-*
quodque foramiie in fuperiore parte praeditum cernitur, per quod *excidit femem maturum in*
terfam, *minutum*, *fubruftum & lucidum*. Provenit *pafim in arvis non cultis*, & *collibus fil-*
vofis pratifque, atque *inter fegetes*: *quinetiam in hortis colitur in ufum acetariorum quadra-*
gefimalium, ut *radices grandioieſe vadant*; *producitur iponteetiam in yeprius* & (*epibus*,
Um calidaium, *quam frigidarum regionum*. Floret *Maio*, atque *femin* perficita:ftate*.

14 *Rapunculus aemoroius anguftifolius major majorefflore*, C. B. P. *Rapunculus filveftris*
*n^ior** Eyft. *Rapunculus filveftris Ncrii toliis 3*. Thai. Hie *tolia exhibet etiam anguita*, pro-
F *fl. l. rrata*: *iiores vero ampliores majoreffque*, *no lae alicujus patientioris in modum*, *quin-*
quefariam etiam in margine partitos: *quibus fuccedunt capſulae trifariam junftae*, *fungulae fin-*
ouliſforaminibus perforatse, *prioris more* 1 , c . . . r

15. *Rapunculus folio ferrato rotundiore flore Convolvuh*, nobis. *Rapunculus folio ferrato*
rotundiore, J. B. Chabr. *Complures ftatim a radice attollit hie caules*, *cubito altiores*, *non-*
nihil anguloſos, *fubhirfutos*, *fimplices*; *quibus ab imo ad fummum adnafcuntur alternatim folia*
nonnihl hirfuta, *uncialia & fequiuncialia*, *femiunciam circiter lata*, *pauca unciam attingunt*,
inacutum mucronem definentia, per *ambitum ferrata*, *obliquis venis a medio nervo permar-*
eines exporrefctis: *fummus fcapus flores ex intervallo profert*, *Rapunculi vulgaris floribus fi-*
miles quoad fundum integrum, *tintinnabulileu Convolvuli floris infar*, *fed parum in mar-*
m. finuatos tantum, *non profunde diviſos*; *calyculo pinnato exiguo perfimili calyci fuperio-*
ex pediculis uncialibus & fequiuncialibus, *tenuibus orto*: *radix alba*, *craffiuscula*, *Ra-*
um, *l' vul^aris craffitudinc* Colle&am *habuit Joh. Bauhinus Campanulas nomine prope*
g. V. in gn^ia. *Folia in principio caulium imum verſus ferrata & rotunda*, *fuperius mu-*
cronata,

cronata, ferrata pariter, breviflimis & vix confpiru'is pills obfien. Florec acfate, & ad eundem modum quopriores, capfalasfemales&ieminaprofert.

16. *Rapunculus* Alpintis minor rotundifolius, nobis. Campanula Alpina minor rotundifolia, C. B. P. - Campanula minor Alpina, Cluf. Hift. d. d. (vitioid ad Higura.) Radix liujuscic prioris eft cubrofa, plurimasemitiens fibres: folia fim: rotunda, ferrata, aliquatenus mucronata, longiflimis pediculis innitentta, media ferrata etiam, & magis mucronata, longisidcm pediculis innitentia: hille notis praecipue a fequenti vulgari rotundifolia Campanula dift^a Hzc eft vera figura Campanula: Alpina: minoris Clufii A Cafparo Bauhino primo exhibitata, euarafi vicehujus Alpinx minoris, Clufins adhibuerit Iconcm Campanulc minoris rotundifolije vulgaris & pafinn obvfic A primo inuiui Iconis liujusfacflimediitinguitur a feqgente vulgari.

17. *Campanula* vulgaris minor foliis ion's rotimdioribus • fin. ua. tis non ferracis., nobis. Campanula minor rotundifolia vulgaris, C. B. P. Campahirfa filvefrid minima, Dod.¹ Campanula minor rotundifolia, • Lob. Campanula "rotundifolia", Ger. Hajos folia pr; <ia' & tern proxima rotunda funt, paululum finunta, non profunde ftrata, ur: jrioiis minoris Alpina: , Viohenigri fatis familia, fflstamen duplo criplove minora; .qus yutcm caulibus adherent oblongi & angufta fithc, Lini ant Caryophylli foliis anguftis^rqiram. familia: Hores in fummis cymis canldm confpauantur parvi, cirulei, caflpamilati, longb pediculis pendentcs, cxruki incpam ut plurimuni, inccrdumalbi; Kifcedeadois fubvciinnt capfular parvar aliarlm Campanularuni more, trilariam colia: reites, tribulqie foraminibus perforata:, ex quibus decidunc femina parva, lucent la: radix Uyige lateqae ferpit.

1 & *Campanula* Cymbalariae aut Hedcrs folio, C. B. V. & Prod. Campanula folio hederacco fpecics Cancabrici Anguikrs, J. B. Clrabr. • Tenella adinodum eft plantula lixe, confans coliculis tenn»bas, palmaribus & feqnipalmanbus, ramofis, per quos folia tenera, hilari viroto perhila. Hcdeva: vel Cymbalaria? tiguii, quorum tamen lacinuc fant atiiiiiuii'; Hofcuhts pediculo, fili infar ceni'i, loueiufulu infid-t, unicus, gradlis, oblongus, quinquefariam pet fammas oras laciniacu.^acarnileus, ceteroquin pallidus.

. i q. *Campanula* Serpilli tolio, C. B. P. Prod. Tota plane a, floribus exreptis, be r pi Hum referit mm radice eft cehui, obliqua, tenuilimis fibria capiflata, Sc Nine inde repente, cauliculis plurimis rubeiibus in terram reflexis, cni novis fibeliis adhxreot, inque ramulos phres tenuiores dividuntur: quos folia Serpilli vel potius numularia: qite fant purpuraficnt a, totm sub rotunda, duo femper appofita, quaedam majora, quaedam Serpillo minora, crenata, fubtus pallide virentia, pediculis breviffimis, & leviffiraepubefcentibti, ambiunt: cauliculi aliquando in pediculis nudo, riores fuffinente scanipalatos, definant: aliquando ex caulicilonim latebulbus pediculis trunciales, n fummo midi, floribus ornati txlurgum: flores bini rej terry Campanulic formi, ex exroleorubentes, deorfumftitiant rfs, Gngali fingulis pedicellis donancur. in Baldomomehsmc Cimpaiwilamlept Cafp. Bauhmus, quinf L> . *fafchalk Gallits* tarn III

20. f^a » « / , Hore mtnore albicante ramofior, nobis. *Erinus* Nicandri, Col L m, vto^a rinus major f. olumnjr, J. B. Clrabr. Erinon plan tarn han appellatur antiqui, qirtala Acum **fucenra habet aeqac cmittit Caprifci majp, qm** T Plinids **poft Caprtfici** defcripcionem ita lumc dtferipfic; **Herba quoqut quam Graci Erinien want redjmdainboe kcopwptergntilaaiem: & quia Oeimi folia aatequam cadem ed** uo« I S . ! m o i obrev^a, Oc^m oides; & quia aqoarica loca diligit **I ifta hit: hTce** condi-

is Uioforidistx ipfoallatifa ColBMna. aocfli on- fule. Radice confiat tuberofo, parvum Napum squante ad fummunij Candida, guftui - uavi, ex dulci acerba, acetarns afpetita, laftetcente in medio, vtl imo paruro (tuberata) cc a qo3 I-1³: ? ! 11" ! .. ^0 ei, ci ^ i " 11 toliis fim, l = 3, miiion vtro, medii Ocimi I, plus equalia (per caules m-ttaaoraoiccenjitticplnrcs, fecundtim loci anoiqm temperiem, pedales vel majores, angulotos, t<cs: quos folba Wq Def etiolis alternatim circundant, longa, anguftioraque, minus ferrata, ille^r t<cs: quos folba Wq Def fine caule, atque poftca caule pradtam, diverlam abfqne dubio cenlebit, nil" dorocultam • obfervave lit: iolia quidtni, qoz antequam caules ederet habebat terra

• uxHBentia, marcida evanefcont, nec in [la um pin., inveniuntni: ex foliorum zlis ra ul' CXCUnr, n^ uibltis ficuc in caulibus ftores Maio vifunta i petiolis pi vis" hirente^a cavi ft' hirente^a cavi ft' **ctiam porpOTfcin** ^ ^ Tfcff ^ ^ * 1 ! l extremo < III' edii, colore albicante & r "i^a. mtusitiium nabentcs, cutuawpcKintres parvas partes dividitur: quidur fccatit

ficcatis florom bails extaberat, qua hffrutajest, ex quinque viridibus toliolis compofita: fe-
nien perccicjtnio, ac Julio minucum, fulcuni, compretfum, guiru acerlmm, cum pet-
fettam & ficcatam est, per terna eapfolaforamina, qua? rune pervi.i funt (ut in omnibus hu-
ms generis contingit) decidit. Toca planta ex radiceufqne ad riorum calyces lafte (cater
dulci difrupta. Hi notx fupra allatr Erino convenirevidentur ex Fa bio Columna. qui fati
nrolixt in Phytobafani fiii pag. 151,103,104,105. agit de Erino. Provenit in locis aquo-
II fluviorum ripisacvallibus, ad routes, & in montium radicibus frequentiflima.

'21. *Campanula*- arvenfis minima, Dod. Speculum Veneris, Ger. Speculum Veneris majus,
Park.'onobrychisi.Dorionaei, Lugd. Onobrychisalcera Belgium, Icon. Lob. Eyft. Avicu-
lamSylviiquiba^lam floribus pnrparoviolaeab, J.B. Chabr. Parvula hxc planta propter
conformitatem cum RapunculisfeuCanipanulis cum in floribus turn in capfulis feminalihas
triciptuhribus feminibufque erigins, Jucidis, pra-cipuecumfuccum ef/undat la&<.um,Cam-

B --1;- amesniMBtra- Huiccauficnli funt tentlli, dodiantales, intenues ramufculos divifi,
parte Knmi decumbentes: to! ia circa cauliculos parva, per ambitum Isviter crenata:
floi 'am, violacci, antinpuniceo purpurti, pulchri, copiofi, patentibus quinque divifi-
ojitl pentapetali omnino apparentes, inrcgri tamenin fnddo Campanula: more, ftamine
in n ' candido, qui inreidiu patent & pentapetali apparent, circa vero occa-
fumii...s LedndontOT, & inqLiinqtiangularemformamcontrahunuir,quam etiamnondamaper-
ti uti aiir Campaiuilx reterunc: i.itlicts plutimis confanc ribris tenuiflimis, qux fingulis
annis pereunt poir perfectumjemen. Inagris ftumentariis, inter fegetes pafiini in GalliaSi
AngUa fertili & tec undo folo exit. Junio & Julio floret. Gampanuianan videtur efic ipe-
cies,nontamen lafiones, inquit Dodonacus, cum vulnerata lac nulhim tundac: fed longe iJ-
liturvir do&iffimos, lactenm enim fuccum album quaelibetjusparsrupta, adhuc novella,
iundit.

22. *Campanula arvenfts* mini ma ercfla, nob'is. Speculum Veneris minus, Oer. 1 ark. Viota
avenfis' & pentagons, Tabi A luijusradice tenui^racil^caulic^iafnirguntref^pauciores,
nares, firalciores in folo pingni, cavi, ad quorum geniculaTR)iervantnr folia alternatim
caulibus adhseroria, finuata, crifpa: ex atis vct-Cus cimam caulis apparent rlofculi campa-
nulatiquints petal is quafi acutioribiis prioris donati, minores, prodeimtes ex rndimentis
Bgalaribus capfnlaram; non **tafflvifu** elegantes font, qnam prioris rlores: cadacis fiori-
bus obfervancnt capfelaE triangulares, longiores & crafiiores capfulis prioris, afqaeinha-
umfintnilislocLitamentis continentnr plarima femina minura, pdlucida: in fummis capfu-
lis, ootKemen admatunitatem perduftnm recinent quina foliola,qo2 fucreloco calycistlo-
nis. Planta est aniniaficut&prior, inter fegetes etiam repetitur rlorens, led cardiaa pri-
ore

22 *Qmwth* pentagons pcrfoliata, nobis. Hujus folia profundius ferraca, rotunda,
m cattlemarobicntia, dodrantalem, aiiquando'in pingni folo alciorem, tidcoarfte
c **uli** adherent folia, nt ab ipfo caile perforar) videantur: in fummis caulium & fecan-
dnffl ipfum ad genicula, naicanrur Mores campaimhui, raajores & eleganter czrulei, hifce
fingolis lacedant filicuk fen capfuk criangulares friplici local.lmcnto diftinSx, lemma
fiibrufjt vulgaris Campanula? arven^ r«miiniHIS paria, continentes. Planta est
anmta lele renovans (eminibus fogaUs annis. Natftfes ignbnunus, fed dm coluimus in
Vlorcr ineunte arftac, ^ fingula perficit verfuscjuldin finem.

24 *Campanula cordifoliaminima* Catanalonginaradicata, nobis. Campanula rotundrolia
con. Radix luijusake in terramdepafla est, in plurimas propagines tomcrito
Catana, Boc neobduftaa fifla, exquibus plutimi protruduntur cauiliculi pt-dales, duri,
ieidi;' quitus feendum longitudincm adlixrent folia cordata, exigua, paululum finuata
A- ucronata, vixHimidinm ongoisminimi digiti humani excedenria: in fummis caulibus
* J;piciuntur' ilofculicffirulci, campanalati', aliarum fLix^ortis^muli, integri infundo,quin-
iam Jn m argilivifi: quibus fingulisfnccedantfingubecapfulae, ctmisparrislocula-
ti 'partinv, mionim fingula contiaenc lemcn pellucidam, ruffum. E rimis faxorum
"raowentem hanc plantalam prope Catanam invenit Paul us Bocconc. Planta est perennis,
florens atftace,-

Omnes Rapunculi campanulati, vel glabri majores, five glabri minores, vci hircuri, fuccum lafti fimilem colore prarbens ex cauliculis aut foliis abruptis vulneracive: fiores-Nolx, Campanula; aut tintinnabuli inllar, campanulati apte dicantur a tormi campanar, qui non-dum completi feu expanfi, qtiinquangulares funt, quidam plus quidam minus, **quinquefa-**riam in margine divifi, integri autem in ttmdo, unde ei nymen Campanula?: capfulae iemi-nates, triangulares, & tribus foraminibus, perforate (excepta Campanuladifta Viola Man: quie quinque donatur foraminibus & per confequenseft quimiuecapfularis } ex quibus cmi pofliiit ftmina rufta, fulva, aut aurea pellicuda.

T A B U L A III. Seftionis quintar-

- l.* *Mnorannua foliisincifis, ffibh. Rapumulws minorfolihs inci-
fij, CB.P. Erimis minor feu Ihipumuli minimum gams, Col. \$.*
26. *Hnfuta Oomt folio cailtem ambienie fiore ptnduh[^] Boccm. '4*
ty. Maxima foliis lotiffth, CB.P. Trachdtum maju Bbgarum*
fve Gigant(um-,Gtr. 0-
28. *Major vufgarh asperior fcükVrtic*, CB.P. Traebtliitmfolia*
Vrtu, Cluf. Pan. o*
29. *Cervicaria major Uvior fiore all® wagno, J. B.Chahr. 0*
90. *Eortenfts folio & flare ebhngo% C B. P. Viola Mariana, DeJ.*
Chf. H.ji. Medium, Matth. \$
31. *Pertgrina maxima hctniathfotik, C. B. P. Medium Dhforidis*
Rauvo^i, Cam. EfJ. B. Chahr. \$
\$2. *Honenfis Rapunculi radice reptnte, nobh. Traebelum in ma-
ritmk. Ad. Lob. 0*
3 5. *Mm Echii floribws villofts, C B. P. iff Prod.*
34. *FolikEcbii[^] CB.P. is Prod. Trachdium tbyrfoides Cluf.*
Hi/I.
*^Montana fatiit Amhufa nobU. Rapumului ment anus feu Tra-
cbi[^]:tm montamm, J. B. Chabr.*
3 6. *Lychnideaj. B. Chabr. Ljebmdm fpicies Mjcom, Lugd. Lychnh*
fiheflm CampanuUfiore, C. B. Pbyto.

Traebelum fivt Campanula

TABULA IV.

37. *Hirfutum Pyramidah Vaterandi, J. B. Cbabr.*
3^S-&« *Cervicaria Bonamtafisparvofiore, J.B.Cbafo.*

40- *Minus album J. B. Cbabr.*
41. *Caphatum hircutum gramintU fotik, Bocccn."*
42. *Alnffimum* hircuium asperius foliis hircuth florihus*
parois,
Campanula fmTracklmm J'S'^g
/' «[^] 43, Praienfe fore conglomerate, " nobis. Traebelum minus, Ded.
Gal. Ad. Lob. 0
M-Petraumglabofum, nebh. TraebtliHmPar< £ummaius, Pon.&*
AS.SptcatumEcbijolik, mbi. Campanula foliis AncbuU fat-*
bus obto^is, CB.P. Atpecuros Affirms autbufdam Ecbi»»
j. momanum Dakcbampn, J, B. Cbabr.
§• 2. *Tritapfulam lafiefarttes campanula:jt hircuia.*
Expticatk Tab. trtt Sefiwni, quinta.*

25. *Campanula minor annua foliis incifis, nobis. Rapunculus minor foliis incifis, C.B.P.*
Erinus minor feu Rapunculi minimum genus, Col. Nova hac est plantula atque pulchella,
ex Divz Mariz virginis monte advefta: radicem habet parvam admodum, teneram, fibris
fcitentem, atque Rapunculo five Erino Nicandri Columnae fupra explicato fimilem fapore,
lacte-

laftefcentemque: folia ermtit parva admodum, unguis humani digici ampiitudine, pnrum hirtuta * fublortga, Iacioraquein fummo, & per extremni (erraca raris diviuris, nam crae proximiora iunt radice octo dentes circiter habere videntur; iuperiora vero minus dentata, atque floribus haerentia, binos: caulem emittit à radice ex fingulis foliis; alis divifum ita ut exigua hæc planta fruticofa videatur, angulofum, hirtutum, tenuem: folculos edit Aprili meafe & Maio inter folia, ex calyce parum hirtuto, 1110111 qpinque folia defmentc, HE in ceterisliujus fortis cxcuntcs, oblongos, cavos, JimilcsTrLidieliorum floribus, purpureos, intus phtillum ftdomve itaoam, iiTftimmotripticidiviluraincorEum, ut in congeneribus, continentes: icmcn pcrficit Junio ac Julio, minutum admodum, hircum. Totaplanta (ucco turget laflco,dulci, uc Rapnriam vulgare, itautfitiapor palato gratns. Nos.copiofeoftendimiiis HI icinere Piftavio Rupcllam verlus, indeclivi colliculo inter faxa nafcentem, menft Julio ,tiderti Horencem.

v

26. *Campanula hirtuta* Ocimi rollo caulem ambicnte fiore pendulo, Boccon. Caule conL: ncdali, hirtuto, friato, innmteo: caolicnlos divaricato, qnos ambiunt folia ampla & ilia qv.jnue noil leviter hirliica, Violas Pentagon^ vulgaris arnuh, caulem ampleftentia, fed majpra: fios in fiimtniEaie cauliodonim pendulus, pnrpureus, Campanularum forma, variis ioliorum appendicibas, qaafi auricula adtlorum bafiii appofitis^cinfus; fequtinturcapfolas f.miiia^es, rribus foraniinibuspertuui; ex quibus decidit (emeu minucmn, fubruffum& peluciciuni: radice innititur esili, qua; fingulis ainnis perit. *Mtfana in loco difto b Rirtgo nafcttor.*

27. *Campanula maxima* foliis latiflimis, C. B. P. Trachclitmajus Belgarum, Lob. Park. Trachclimn mains Belgarum five Gigancoro, Ger. Folia profere cres aut quatuor uncias longa, ietquiunciam in medio laca, aferaferugofa, (en .ici, in nicdiocava, colons dilute viridis: caulem babetbinos, ternos aliquando cubicos altum, ad cujus genicula obreivantur pradifta lolia, qæ iipeiius evadnat miuora, pracipue vcrfus ilores, qui in fuinmis ramis ipicatum provtniunt, campannlati, integri in fuitdo, quinqoeferiam inmargincd'tvifi, colons exaibido teodntisadviolacom; fingolae divifuræ in oris iioram pauhilum rccurvantur, atqac cfaodo mulia finguloritm florumexiehs^cerniiorftilna *lucas* criferiam partitus, fii-uc incxteris tioribiis hajus generis: radice couftatcralfa, repente^mulcisfibriscidem annexis: capfuiam feminalcm habecfatisamplain,tribos tbraminibus infeiius pertufani, ex quibus feratna rufia decidunt in terram.

2^ . Cm anu l: mjjor vutgator aperia foliis Urtica,, C.B.P- Trachelium foliis Urticse, Cltf. P3"* VoteareciditBl.Hirt. Cervicaria majorDod. Trachdiommajus, Lugd.Ger. Campanola major & aperia foliis Urti«, J. B^Chabr. Mulcumad Viol.im Marianam quorundam feu Medium Mat&ioli accedichaec Campanula major. Radix eft alba, Rapunculi inftar coberod, varic in fe cop.texta, lapore itidtm ejns non minus grato: emles cubitales, & auctores utpntimum, icmper dicitur: in quibus auctorem uatuncur folia Urticæ majoris foliis valde fimilia, pilofa, acutiora: flores ex foliorum alis carulei, violacei & albi, nolæ aut parvæ campanæ fimiles, Violæ Marianæ floribus multo minores, calyce parvo, nec ut in illotoruliscanalato, in toliola qtiinque, ficuc & flos quinqueferiam in oris, divifo: ftilus triceps, colorepurpnralcente, albidovelJwrfegced, (arrefltor ibmijiulisftipncarluteolis. In Pa. QioniaflE Aoftria, uih^Clufio, Btillambato&funefilv^qiiscYrachliamtltica foliis flore, lubzr, lco norialantrfublilmiora juga, ut 5ne^ffg,&alia familia itidem. Eft& florealbo,quod in Sil cis & filvis cardnis, falwofia crefcit. Proven it iridem pa/lim in filvis *cxdu'is* ad Icps Gallie Angliaeqne.

ay.Ciinjmnttfa fenCervicaria major Isvior fiorcalbo magno, J.D.Chabr. Hscnmltum dfftert u Caripanola Urtioe folio, cum vix apparentes habcat pilos, acque ferratura funt liuic mitiores, nccita iuxqualts: tosalioquin magnus, albns. Tota planta priore minor atqne tenerior apparet. Hanc pi an tarn Joh. Batihmo dedit D. *Agerius* nomine Cervicaria; jiuioris fiore magno albo foliis glabris.

^o.OtspanuU hortefofifialio ofloreobiongo, CTB.P. Viola Mariana, Dod.Lugd. Cluf. Hift.. Medium, Match. Folia habet oblori£fa,bta, fubnigra, apera.nonniliil hirtuta, vulgaria lofi foliis nigwora, miaora, mimsq; apera; caries deinde fee undo anno profeit rotundos, reflos, ramofos, aliquantum tnamliirlutos, circa quos folia familia, fed mtnora; flores in is virgis exeunt oblongi, ampli, cavi, patuli, pci oras incifuris (juinqueprufundis recurvis divifi; coloris utplurimum caxuleo-puipurei, foMnde candicans, \A tjuibus fingulis jamina duo aur tria, Candida: flores, inquam, prinquam dchifcunt, quinquanyilares func:

noltfiores capiEutum nafciniurfuperiorcpartelatirs, qulnqnequoque angalos habens , qum- que vafcutts veluti caligulis alperis & hinucis, debrfum IU'penuennbus vdfctam ; in qoo fe- men exigoum, fubruiti, & cms cujiio Caftanea: fenftns echino exeraptus, propemodum cobria: radices fiibfiaffl longT, craife, eandkte, non mgrati feporis. Nalacarinfilvis& montibus, necnonopacisquibofdamtraaibus kalia?, Germania?. Janio & Julio mcnfibns Horec; It- rntn panlo poll: prodticit, nee enim fimul, fed particubtim Horet.

^Campanula peregrina maxima laciniatis toliis C. B.V. Media H Diof<?oridis Raowot- fii, Cam.£p.J. achabr. Incerfrodetafepefcae in akam affnrgit Viob Mariana; Uodonxi finiiiis piama, nee ita obvi» cuivis apparet differeoria, pncerquani in i: liis, que in hac planca dvifa magis(iint,Cichoreiinftr; rioresetiam magia panduntur, fololis divilurisfi- imacis affectb inorberadHpofitia; radiciaaqfct'rfasmajor quam capitolortjin feminm, qnae timu-n nondumeraiu'matura, quandoRaLwol/iuseadenicolisgerat. Crefcit inprotunda V renebroia valleLibani, tefteeodem feiawolfio.

^c. Campanula hortensis Rapanculi radicc repenre, nobis. Trachelium in maicimi' Lob. Trat-helii genus mollioribusfoliis, CluCHift, Orvicaria 4. Dod. CervtcaTtam .1- vcftris, Eyft. Caula hacc Cervicaria breviores tiuir, lolia lata, & Oi vicaria vulgari- ma, minus tamtn aipra, minuiqiii- per^mb'rumcrenaca H' res deor sum pencte. jloiiis nrplurimum dilute & quafi ex caeruleo rubi. I is purpura; 0 radtcibus rmlrx C(nu A ti .iii(- veriffi & oblique ferptntcs radicola- fibiatx, ieu h'bixcraiiioies,a quibus mulct alia?, oblongaf, candidi radirula; Rapaoculi vulgaria radiclms (unites dcmittnnrnr; ita FjcUeieipfam pro- pa^at & late ierpir hare Tracbelii fca Cervicartae fpecies. Sccusarvoi um margtoes in Zchin- dia, & alibi etiam in locis non nmitlmis repertur: capfulas, kniina ad eumlem nicdum cum priqpiibns format. Floret eodem cum •liquis ceimpore.

33. Campanula tuliis Eclni iloribns villofis, CB.P. & Prod. A radice oblongu: uk: folia angufta, quituoratitquinctie ndaslonga, fnbafpera, prodeime: inrt-r quarcaulis pal- matis, rarius pedalis, rotund us, fabafper, paucisbrevibasoVangnffisfoliis veltittj, ocorgit: ex caios iummitate,rfloresnViciales, campanubti Itu campanx parvst formi, qnini, lini,ra- riik-i, alcernatim difpofiti, brevibos pedicnlis dependent, qacffna extremitates, qntmadn o- (lum & calyces, pilioblongi pappi inftr ambirint. Hare in Baldo & Heivwiorum Alpbis reper iro , in motue Gochardo & Frafro.

34. Campanula foliis Echii, CB.P. & Prod. Cerviraria major reonifolia, Thai. Tra- dieiimu Thyrfoides, Clof. Hlft, Mnlitatiabet h<c Campannla folia, anj ufa, hirluta, Echii foliis Fere familia, inter qnse exoritur pedalis caalis, firmios, miaini digits crall radine, fibratus, & mnlcisaiig' .itis, ob Eongis hirlutifque foliisfeptus, aenj os mtdio ad fummm rhvrlus ka potiuu Bwum inter Folia Littntium, pirtcherrimoordinedifpofirorim, Ti chelu a urllapuncui rloribus fimUium, fed minorum.iv.lkiftiHil'-jiit ftitpot'nisocliro't aci color is, cialfafpicana- Icitur: evanefcentea Hurts in capitula tranfennt, exile fubJavnmqncftfmencontinenria: ra- dix craffa eft digitt amplitndine, ru&oio corticc tefi; candidans & aliquot fibris donata. Tora planta luccolacteo terger. Onturin Sneberg & Miisvictnis jngi. Obfervata etiam a Clifioin afcenfu Iwuierg ad IUvuiaimedltiore cumalofupraCarnobium, & in quodam mon- tano prato, q aa e uiveo niunte defo nfus*ft in Re&naw Abatis Ne wbergensis ar cem. \oiet junio, & Jallo;fcnnina petfcitAagofto&Sepfertrbri.

35. Campanula montana foliisAnclui'ar, nobis. H:ipunculus moncanus (tu Traclv. Vum >narmm, J.B.Chabr. Folia multa propttr terrjm promit, in quibudani duabus uncis ofg;ora; in aliisqnadmplolongiora,ad Anchuram accedemia, ex angafto print! io renfim »te:< I nfm deinceps in acumen definenria, acrinqc hirlfata, nonnihl creiarn 1 We: inter hare catrlia Brnpleit, cubitalis, hirlfiitus, enodis.unoaut altero foliolo exiguo donatus: flores in caulis capo fupiore quinque aut plures, finguli in fingulis pediculis oblongis, magni fatis, Campanula Fuchii fimiles, ex caeruleo albefcentes, calyce hirlpido ba- fin complectente: radix craffiufula & longiufula, efui oras. Provenit in pl... montibus. <am in mt >pan in montiboa Stiri< pi ope C r//<DOT A'T./;::;' 1 lotet zitate, & femen.>:mlo poft rntit nunutum l

ipanh 1 chnidea, J.B.I Chabr. Lychnidis fpecies Myconi, Lugd. Lychnis i...flve chnis fceitris Campanula: flore, C. B.Phvrob. Ratii ce conitat tuberosa, inferius f...br.itJ, lmon 1 kjtton ni wnga, mgrefcenee extra, nervum intas habrnnte, i in profundum acta, fapote dulci cum affricione: ex eadem ramulos fundit multos, rot tin dos, villofos, in .IMOS, viv palmam excedentes, in quibus folia angufta, ptiofs, Tncara, per taaliculo? inccrto online dilpo*!'

feu diftributa, leviter afringentia: in funpio caulium vertice flores exeunt campannellas fimiles, quales in Convolvulo, rotundi in niargine, ex candido nonnihil purpurei. Quum nulla in defcriptione fit capfularum nee leminum mentio, nee dicitur la&efcere, facile inducerer credere non effe ex Campanularum feu Rapunculorum proprie di&orum numero; fed mihi apparet ex Icone florum effe Convolvuli ipecies: examinent potter] plantam ipfam quam ex montibus Div* MarU à Monteferrato habere potfunt. In montibus & locis maxime ficcis provenire Myconus ait, nee alibi a fe vifam, quam in montibus Div<z MarU à Monteferrato.

37. *Campanula hirtuta* Pyramidalis Velerandi, J. B. Chabr. tfrimoanno (inquirjoh. Bauhinus) caulem mihi non produxit hæc Campanula, qua* fequenti demum anno in tantani crevit altitudniem, ut facile ianceam xquaret caulis hirtiutus, medulla iar&us; fblis veftitus, inferne & fuperne hirtutis, acuminatis ferratifque, Campanulas FuchnVaccidentibus: flores longa ferie campanulas imitati, Rapunculi vulgati floribus haud majores, cserulei, peroras hiuir'ati quinisdivifuris, ex unocauliculoplures: quibus finguhsevanefcentibusfmgukefucedun: capful^, tribus loculamentis divifae,> atque in fingulis prxdiclis cellulis, fingulaconfpiciunt toramina, quibus eftunditur femem ficcatum, minutum, pellucidum, aliarum Campanularum 6c Rapunculorum modo. Vrovenit in Sclavonia, unde ejus femem habuit Varkrandiis Doures, atque i ple Campanulam pyramidalem appellabat.

38. *Campanula* feu Cervicaria Bononienfis parvo tiore, J. B. Chabr. Infignis & diligens Botanicus D. Age'rim^ medicus Argentinensis, hanc pulchram plantam dedit nobis, inquit Johannes Bauhirms, nomine Gervicaris Bononienfis, utpote qua? Bononia? copiofe provenit, ea licet non integra, bicubitalis erat: caulis rotundus, fungofius, nonnihil asper: folia caulij fine pediculis hasrent, eundem fereampletentia; in quo differt à Campanula hortenfij epente flore minore: funt etiam iis latiora, latitudinis trium unciarum, longa quatuor, plus minus ferrata, interna parte albicantes pilos habentia valde exiguos: fummitas quæ floribus ornata^ pedalis eft, & quam pluribus floribus abundat campanulatis, ramulis multis brevibus duarum unciarum adhaerentibus xapfulas & femina ibidem contenta confbrmia caeteris hujus generis.

39. *Trachelium* ramofum floribus plerifque fingularibus, J. B. Chabr. lift nobis, inquit Joh. Bauhinus, fed nefcimus unde, planta ficca ex Tracheliorum campanulatorum minorum genere, fpeciofa, cui radix craffiufcula, tberofa, laclefcens, uncias quatuor longa, parum lateribus fibrofa: folia ad radicis caput fuperius, & craffius multa, curtis pediculis infilentia, uncias duas longa, unam lata, modice ferrata, cV in acutum mucronem definentia: inter quæ oritur, caulis hirtiutus, pedalis & altior, in ramulos divifus, qui definunt in folia bina brevija & angufta, exque eorum medio oriuntur campanulati flores, bini, terni, purpurei, fat is magni, quinqueariam in margine diviii, integri in fundo campanae infiar: quibus evanidis fuccedunt capfulæ fenfinales & femina cæteris conformia.

40. *Trachelium* minus album, J. B. Chabr. Obfervabam (inquit Johan. Bauhinus) anno 1596. Augufto menfe in cultu fimo horto D. Frederici Meier Trachelium minus floribus albis, parvis, multis fimul in fpicam compa&is, quæ provenit in lummitate caulis cubitalis hirtuti; foliis iongo pediculo, hirtuto itidem, innitentibus, uncias tres longis, duas latis, non in acumen mucronatnm definentibus cacterorum Tracheliorum more, parum asperis-

41. *Trachelium* capicatum hirtutum graniineis foliis, Boccon. Palmaris &: fequipalmaris zfa Jiuc cauliculus: folia longa, angufta, graminea, leviter hirtuta, & ad radicem plants per extremum retuix, circa verocaulem acuminata; in fummitate caulis flores apparent multi iimul conjuncti ac veluti incapitulum congefiti, Trachelii pratensis vulgaris flore glomerato; ajp. Bauhini ritu: atque floribus exficcatifuccedunt capfulæ tribus loculamentis diftin&f, continentes femina numerofa, ruffa, peliucida aut fubiufca: femem habuit Paulus Boccone ex Ragudi.

^i. *Trachelium* altiflimum hirtutum asperius foliis hirtutis floribus parvis, J. B. Chabr. Radicem titur craffa & fubdulci: caulem erigit bicubitalem vel tricubitalem, craffiufculum, hirtutum, foliis ornatum anguftioribus, longis, ad Echii folia accedentibus, asperis & multis echinulis pr^ditis: flores confertim conglomerantur, ut in Trachelio pratensij vulgari, campanulati, fed njulto minores. Cum tamen planta multo fit altior, & folia anguftiora multo, facile ab eodem diftinguitur: capfulas feminales Sc femina ca?teris conformia gerit.

^y f. *Trachelium* pratense flore conglomerate, nobis. Trachelium minus, Dod. Gall. Ad. Cluf. Hilt. Cervicana 3. five minor, Dod. Caules habet pedales & aliquando altiores: folia multo minora Trachelii Urticæ foliis, candidiora, minufque aspera, minime hirtuyca, oblonga,

Sulvis foliisfiliora : flos-'S campanulati, minors prædic-ni Trachelit flo'ribns, colore pro-
xini Viols nigrae, dilutampurpuram referentes, qui non uti aliorumfua: fortis deorfum nu-
t. m., fidmum erefti in globum eftbrmantur & pluresfimul lummo caule exeuntes; radices
allicum Trachelioruro radicum scmlae: lacte totaplanta fcaer., & ex feie eft'undie fit (juae-
J i bee ejus pars rmpatur. A pleriqueCervicaria minor appellatur. Nafcitur in pratis &
plerifque aliis aridioribus locis fenticofis.' Floret junio & Julio menfibns, & fubAugufti
exitum, aut Septembrismitium fmina ad perfectionem peccudit.

44. *Traihlium* petrium globofuni, nobis. Trachcium majus petraeum, Ponaj. Campanula
Alpina fphserocephalos, C. LSP. A radice lignofa quafi br rugofa, colore pallidepnrpurafcen-
te, exeunt cauliculi rrtulti, ftriati, fubhirfuti, cubitales, Stcumruborevirides: qui inordinate
emittunt folia, oblonga, nigricantia, crenata, fua printer htrititlecommunita, pronapartepo-
ridimum, ubi etiam albicant & Salvia: folia quodammodo referant, magis tamen angufta Sr mi-
cronata, inter qua; verfus radicem parvula quxdam toli&la prodeunt: in fummo caule .
flores mulci, acervatim congefti qnemadmodum in Uiperiore, fed magis in globur
mati, qui formam reprxfentanc tiorum iupra dift\$ Crcvicaria? pratenfis, fed minores fu» ji,
&: in quinque, quandoque feptem, mucronatasfiruras divifi; quorum fingulis excun' .ina
multa, fublutea, quorum medium modoprobocidifegreditur, verfus cacumen fiti uni,
quod maturatum. birtircatum Si aduncum evadit. Decedente Auguftoflorensconfr; ir, at*
qtienlisper plures diesconlervatur: undePonahuctenus feminimimeobfervare potucrir.
Inter rimas aperiornmlapidummontis Baldi lolum circa Coronz templum re^ritur.

^•*Trackditwi* fpicarum Echii roliis, nobis- Campanula foliis Anchafe flOTibasobloogis,
C.B. P. Alopecuroa Alpinus quibulclam Echium monraimm Dalr". J.B.Chabr. Radicem
liabet pollicaris roagnitudini^, fenfim gracilfcntem, palmo longiorcm, \ apopliyfes ali-
quot abeuntem, teneram, rubenEem, • caulem felquipalmaremautdodrantaltn, crailitie re-
(pondentem radici, cavum, fingularem, hirfutum, crebris loltis veiHtum, aliis palmum fere
tongts, aliis brevioribtis, potiHimum fuperionbtis, latitudine femiunctali, Itifpidis, ad Eclii
folia accedennbus; thyrfum triiim unciarum, autpalmarem fi majufcula fit planca: gerh rio-
rum inter folia emergentium, excarruleo pallefcntum, oblongorm 8f pet oras quinqucfar-
riam-dtviforum Ipicim; erunipentibos c m^dio riorum ftaminulis aliquot, ffflo prs citicris
longiore tritido: capfuk feminalea Scfemina carteris Campanutis contormia funt. Crefcit
in altillimis Sabaudis montibus.

Enarratadivifione EUppnculorum campatmlatorum, iifque vd in glabros m:iorcs, 6V mi-
norcs, vdmhiribtdadlmfis: jam in hoc paragrapho agendum ftatuimus de I^jpunculi? cor-
nicnlatis, qui ob ftamina c floribus prominentia, rariores A elcgantiffimag offerunt Rapuh-
culorm varietates, in quorum frutturi cximia artis induftriaconipkitu^nuibus parens lla-
tura in vanandts plantis ejufdem generis obleftatur, ut obftrvare eft in hoc apitc Kapunculo-
romthoramfloraadeofegantesarvenoftifunt, utnonpaacamconfpicicntibus ipfos, ipfo-
rumque numerosas varictates, delefationem & vduptatcm adcrant neccfle fit.

Pars TABULIE V.

^d'Sfuatusftu Abpecurcides, **nobis**, Rapunculut Akpicurides lon-
giorefeioL, Cluf. Hifi. 0

47 • Folio obngofpica orbicular^ C, B. P. Rapunculut AhpecuroiJti
orbiculari pan-fpica, Cluf. Hifi. ©

48. Rmnojut Scabiofa atf>'tsulo cotrukOy rtobh. Rapuntium altrii*
leptophyllumcapitatum. Cot, \$

lapunculum corrticulatus

AlP™? | 49. *Petræus jriinor, nobis. Trathdium Petr*umminus, onæ*
| **ltd.** ©

ptrenms | e_o <f> arvm, nobh. Rapunculus Alpmus par_vui *comofus*
| J.B.Cbahr.V

Si. Pujounari* G allor urn folio <sr Tradxhi ftort, Chf. CuT. pif. ®
52. (almanJes c*nleiu, nchk. **fracbtlium umbdltfrum carufaw**
Poit£ It at. 0

^Alpmm artguflifohitt^obit. Rapuntium Alpinum *ng*fifob&
alUTum, Cot. ©

§.3. RAPVNCVLI CORNICVLATI.

Explicatio partih Tab. quint £ Sefiionit quintis.

46. *Raputtcultu* corniculatus fpicarus feu alopecuroides, nobis. Rapunculus fpicatus, C. B. P. Rapuntium majus alopecuroides comofo Hore, Ad. Lob. Rapunculus alopecuroides longa fpica Cluf. Hift. Rapunciam alopecuron, Dod. Rapunculus fpicatus five comofus csruleus Sc'albus itemque folio maculato, J. B. Chabr. Prim3 hcc fpecies Rapunculi corniculati a finerioribus danipanalatis differt, quod huic func prima folia per terrainfrata, lata, feu fabrotanda poftea fecundum caules longiora: caules dodrantes & pedales, fumml parte vclati fpicara parvorum riorum plenani proferant, quorum fingulj antequam pandantur corniculi cnjnfiain fimiliLndinem referunt; aperti vcroin quinque lacinias feu foliola

- ang'jft³ I'fiduntur, colote alias &: frquentius cxrulei, alias dilute violacei, alias fforibus fingnia capitnlarVa fuccedunt minora, ternis foraminibus percufo,^ mulca cin :li3 fumum taitigium fimul arfteque compofira; in quibusfiiigulis numerofafemina, min fabraffa, Sc'lacentia continennir. ^radices candidac, tuberofo, aliorum complurium pr» uni Rapunculornm campanulacorum more, & eo nomine Rapunculus vel Rapuntium iicicur, quafi dicas parvum Rapum, Napam potins, ob folius radicis, quam magnitudine & iapore cum Rapunculo campanulato habec, fimilitadinem: alioqui folia flint Violae Mai'tir, longis pediculis appenfa, nonnunquam macula nigia notata, qoaqna in ftriSa longaque fuprius in caule cabitali, inani, angulol'o, & lac fundenre: in cujus faftigio fpicatus polcher flos caeruleus auc purpuroviolaccus ex multis cornictilis circa bafin in (egmenta arcijan Bffis compaftus, ejufdem itidem flos cinereus, albiifve quoque reperitur. Dicitur Alopecuron ab ipu fpica plena mirnitorum riorum quac jam apercis flofenlis moll is & veluri launeinofa, vulpiuniquie caudis propemmodum fimilis. Gignitur in locis filvofis & opacis ptngiii lutofoque folo, in Galli;i, Anglia Belgioque. Nos frequenter in lylvis opacis lecundo lapide a Blstfenfiacn arbecapitali reperimas; album ibidem & in filvi Kegix *Fcncainbdkau* opacis & umbrofis, quin & in prardiftis locis roliis maeolatis obfervavimus: non nifi *m* montofis alfiofe pratia & convailibus Mintltni \$x Nurbona: Aquitanicaevlcinia pinguibus obfervavit Lobelius.

47. *Rapunculus* corniculatus folio oblongo fpica orbiculari, C. B. P. Alopecwoidea orbicuhiri pene fpica, Cluif. Hift. Rapuntium corniculacurtirarrusmontannm, Col. Rotundum globoumi capot atqii purpurafcentem csulemconficiunt curtiatque nutantes corniculi, funVa baJin quinque viridanrium foliolorum in fummo caule fitam, in orbem concinnati (ex quibiis noniL-nlubaltermim gencricum Rapunculis in hocparaphocontentisinditum:) ii ex calveibiisprimumorbiculareinincinmobfblecocoloreducunt, ficut Orobi craffefcentes, deinde in iimiium neque curvum fttis corniculum definentes, acque inter ipfos centrum petsntes, anmiuirs & implicat't, paulatim vero perficientes cornicula Isevia illaatque fnnplicia, alis.il tenuius dimidio & i» fummo triridumexcrere incipient; dtindecirca tubiculum imumincipiuntfe JnuofeSf undatim in quinque partes per longum findere,ac pofterius in tentieslimbos le dividentes atque dilaunces ad romam noitracis coli cui linum aptatur ad nendnin, ita

* abinternocorniculo-feparantar.cireaimntt,* ventricofam effbrmant eflSgiem; inter quos, rumpunt lutta Jbfliaa quinque: perficicnte fe flore corniculorum apices triridietiam eranrtiores effefti torquentar, arque lacinise illxtotumabinterno corniculo tlyrri erligie foarantar acque ita creels permanent, donee tandem feminum utriculi, quibus infident,tur- <i Ecere incipiant, & invcrfi'recedanc deorfum fpeftantes, tune enim fimiles Rapuntii vulgaris calyces quinque apicibus oinati foraminumtriumnotasoftendercincipiunt, qui poftea perfecti nonfecus ac congenertsperforancur, femenque copiofum hilvum, parum latius Trachelii dng«ftitpli montaiu femine decidit. Floret Augufto; jEquicolomm altiffima frigidaque .:ug3 *forbid** *Corvino*'dicta diligic: radice niticur Candida, craffiufulca, refta, perenni Rapuntii vulgaris inlhr, minore ramen, atqneper terranmachiata admodaai, iitptures ex u- 110 radicis celpite plantx perh'ciantur: iolia ima la:via, Rajjuntii vulgari armnla, rotundiora ih inic'io Viol^ porporcac vel Campanula? Pyramidalis diftas accedentia, majoris diglti luimani latitudine, per ambicumobtufedentata: cauli pedali ftriacocirca ipfum inuim oblonga nscrntfoUafcpca, aliquando phira, altematim, vulgari Rapuntio fimiliora, per ambitam idtnfioribus dentibns divifa, & a medio caule ad iimum duo ant trja acatiora, aniftiora lonais intervallis, difpofita, utnudum caaleni refinqant. Tota planra dulci lafte

target, guffit fuavi in mandendotum radix &foli\$,ut Rapuntium vulgarediftum.

48. Ranunculus vamoiuscorniculatus^cabiolitapiEulo ciruleo, nobis. Rapuncalus cor-
nicuhtusScabiofae capido caeruleo, C. B.P. Rnpuntium akerum leptophyllon capitatum,
Col. Scabiofa media ferrata anguftifolia liore Globular!*, Ad. Lob. Scabiofa media, Lob.
Icon. Lugfi. Sea bbfaov ilia, C3m. Scabiofafilvellrtii minorctnilea, Eyft. RadiceeftCandida,
craila, panels fibris infrius doiiata, in fuperiore paiu- crafla, corricofa, vililolaj deperditis
iiavefcentibus caulibus, pcrenni rgerminame quidem radice admodum iracicat (hillitur
egregie cgregius Do&or lynceus do'iiflimus Columna, qui lianc plantain efle pcrennem
aiicnt, nifi dima Neapolicamini perennem hiciac; nam apud Galtos & Anglos ffatim peric
poft femina ad maturitarem perdafta) ab tino in quibuidam 30. pares caules ex codtm
imo radicts capite exortosiivenjmus, omnctjtueHoium capitulia globofis ornatos, fipius
vero 5*7. aur pauloplurcs, quorum medius aliquando mii»-dividitur ala, rarinsplunbus;
cauiium longitudopedalis & icfquipedalistere : quibus folia angufta, Lini armula, btiora ca-
nv.n parum, finuofis orisconvolution?, ut in pitrurt foliorum exprefsimus. atqut h^...
niolli hirta, ficntSf rubefcentes parumcaules, quos aktnianmanibiunc denie folia J rcdicta,
tertiaminfummo nudam partem relinquentia: in quorum lumnio, omnibus infra bi in itcl-
laram viridantium Ibliolorum fex aur fepcan fcratis oris, conferti, caerulei flores ir, orbca
globofum capoc formant, undecognomen. Flomm effigies primumoblonga, I^vis aac<}uam
pjudantur, fed expanfi in quinque lacinias dividuntur anguftas, parvas, breves, mediam ha-
uentes rtellalam pufit!am, albentem,clatain a floris tundo leu cenrro, atque itilum capitneu-n,
oblongum : cumdehifcereflores incipiuntcapituiuminimo coronanC crcultis IUhilis, alias
minutas& Candidas inrra fe habentibus, thyrfofque cmictentib as, verumdecidentibus • jmo
cseruleis, pufilli internE albi ftellular rtmanent, calycibus viridibua mfid*
medto captculiad fumtum emicantiliuu: atqnc denuim omr bus defluxis viride ftellatum
etiam rmanet capitnlam, otricalisfemina concipientibas, fuperiori non diflimiibos, mino-
ribus vero atque periolo t bafis centraprodenntibos ; itaque pulchram tomam planca: eodem
tempore confpicics. Capinil.;qpidem alia botryola nondum Horida, alia tiellis cai-
nata, aliacaculcis majoribiis, SraJliisniinoribos, alia albis viridantibulque, prout perfecti-
ora mataraqtif eruntcapitula : |i-mcn e rbramimbus utriculorum, (ongenerum more, decidic
fulvum, minat:flimum,fpplendid'jm, minimi lirini iupra delcripti& pi^ttmodo. Tor a planta
kite dulci fcacet, non iccus ac reliqsu coageneres Rapunculi omnes in hoc capite <ontenti.
Augafto & Sepcembri florentem in agris novalibus fecus vias inter r'uiclw m & Is!, las co-
piolc paiftu oftendimas.

49- Rapumufoi cornicdarus Alpinus • petrus perennis, nobis. Rapunculus Alpinus cor-
niculatus, C.B. P. Trachcliimi pctrarum mraus, Ponz. B radice est tuberofa inaequali, quafi
f x plurimis griimis compafll a, alba, digiti craffirie, aliqnancto lignofa, pallida & rugofa &
palmar: ex q uia caul'tcuSus modo unus, modo plures, te rjuis; r flnar us, unciarum quatuor
exurg i : fli qope larurattvirentb tennia ad radicem, aliquando ex rotunditate oblongata,
Bellid:3 crnlca: formS, communitci fubrotunda, crenata fea potius ferrata, Alliaria inftar, fed
minora, pediculis unciat quatuorvelqt; inque longis przdita ex radice unacum cauliculis ex-
furgunt, qm vero cauliculis & quidem padicolis brevioribus adhsrem , longiora funt & an-
• gaftjora, proi undius l ; d raritinciki, qnoram fjüitta vd IcnaJtcllsin rrodiu n floribus umbel-
^•ndifpofitis fabjiciuntur, qui caulicolt fomawinfident, & ex Hi *
tis, & ex crruleo-parpnracfenriliis conltant, q'ii tx c>ycibus pediculis latis, bre-
atthdonatis produnc, ex unoquoque calyce Hos untis nd exorram cm
:n"rtq«c angaftatus, 5r in extremitate divifus , formam Cucurbitz vitrez referens,
rginefcu, aris incifurz fuperficiarie quinque confpiciuntur, apertus
in medio ramifus, in medio ramifus, in medio ramifus, in medio ramifus, in medio ramifus,
tus ex foliolis fea potius incifuris, feu totide mdiviluris compofitis, filamenta aliquot exhibet,
inter quz ftilus iOnHlOr ijrOdl) fufidio bipar, itus, aliquando inftar Capreoli v' illfil
contortis. Semen non fuit obfervatum a Jo . In Baldi montis jugis inter precipitia
propendit, ubi Augufto mense invenit Joh. Pona.

50. Rapunculus corniculatus Alpinus perennis parvus, nobis. Rapunculus Alpinus cor-
nicu'mispu...us, C. R. P Rapunculus Alpinus parvus comofos, J. B. Chaly. Radice est
... ex veteribus loliis reciduis, rdo Celtica videre est, crafla
nfm amerola, unciam unam aut •ilrcrtii k nga, culnum
duamunci arum nca fine lolis, quz anguftiora funt: cujni eacumini iiore, infident Rapun-
cul.

culi comofi prsediai florum aemuli, qui fyere caerulei quantum ex ficca ptanta colligere licuit Totanni Bauhino, ftilolongo, recurvo, prominente extra florem Cacarbiw in modum factum. Fifta i'uitplanca fecundum ejus longitudinem. Hax planta videtur liabere nonnulla familia cum Rapunculomontis Daldi fupra defcripto, fed vaicula & ftilus in Tabula pitta diverfa apparent, atqoe floresminores fefeoftenmt. .. :. ^

ci i^/wuWorniculatusPulmonarisGallorumfoho & Tracheln flore Pyramidalis villofa faxatihis latifolia, ClnCCur. poft. Trachelium faxatile foliis Pulmonary GaUorum, C.B.r\ RancPlantamrinquitClufite) nihimifureveraiduspaterGregonusdeRegio, profcn^ione£a-pucinnis, ipfique nomen dedit Pyramidalis viilofe fuatilia latifolre: imple non obiervabam iiftmitidem Clufius, led ejils hiftoriaracum Icone vivis coloribusexpreffj ad me mittebat Placencia annbChrifiti 1 ^07. una c«imSiliquafrorumdifceptatiuncula & illoram variis Iconi-
''s- quoniamnonvulgariseft -, &-anemihe defcriptainreperjo, 4TM hiftoriam qua-
Mpfo accipicbam, fedLatio -m (nam italico fermone fc%taerat) in hac mea
A :e'locnmhabere volui cum ^ierifqoc planrisraiiS; cognitione dignis, a nullo
adKm od equidem fciam, in publicui.. prolatis. lioni confuiat lefior & patris Gregoru
&meL reherbria promovnda prnnEnium ftudium- Habet hare planta radicem candi-
canteA ennem, five plureaaanos darantem: ercnimquafdamcraffiflimaserememini,
qme ob htemnodos vel tnbera contraxewnC (upra iaxa intra qusnatar, inftar Rhodiae
mdicis, vel Campanula laftefcantis ftecidtona inveterate, qualem aliquando in hortis 00-
fervari niemini: ex hac radice profiliunt inrer dum plures cauliculi, teretes, inaequales &
contorti, palmaria longitudinis, brevioresvel longiores pro loci in quo pbntanata, autve-
tulhtisiprvjratione; illique molli& Candidalauigmetecti, fingulis pe es annis, novis
& recentioribus fequtnte renafcentibns, quifammo feitigio multis eleg us floribus cae-
rideis", fpicae inmodumdigtftis.funt ornati, ut uiTxachslio minore, jeeedunt etiam
vafcula Traclulio minori familia, miriutiflimo & vix obcxilitatci 10kmineplena,
longiofcula amen potiusqum rotunda^ coloris ex fpadiceo fulci: inde equalitetc
fpartacanlicoloambiunt, adPulnaonai^Gallicas (quae Hieraciigei >nini fimilitudi-
nemfatis accedentla, cum magnitudine turn crenarumjii ambitu tque ipfa eriam
Candida hmugine termfobfita, prona parte prxfertini qua terram (p :. Toca planta
laftefcit & ad Sonchi odorem proxime accedit: faporcque eft dulc'i, prsfertim radix, lit
n-ne Rapunculus vulgaris; eamqueob caufam Rapunculusfaxatilis moncanus Uoronici fo-
lio nuncupari poifit, vel Rapunculus montnnus faxarilis Pulmonariae Gallorum folio & Tra-
chellii tiore. Ndfcitur In fjo*is niontibus Brixianis, circa fpecuum oras inter duriffima faxa,
ut Honfinc magno iabore radices erui poffint, licetcommodis ad emendas radices ferreis in-
ftumentii fepialcule tentarat praediftus Gregoriusde Reg.o; nonnollastandem cummole-
ftia edaxit, quas in hortura cranft^lit. Iltud porro in hac planta notatu dignum, qund nuf-
quam obfervata prfterquam inlocis cavernofis, in quibus nalli alis phntae proveniunt,
quod magis mirum fiepms animadvertere nequiiivitprjediftus Gregorius de Resio Capucinus
qua rattone htimorem quo aleretur fugereaut caleftemaerem cxapere poffet, niillapr2fen:im
juxta apparente terra. Verum eniravero cum nos moitales naturae fecreta curiosius rimari
nondeceac, utqur noftrum intellcaamiepiiffimcluperent, foliDeo.qui omnia novit hsc re-
linquenda funt.

e- - *Rapunculu?* corniflblatus Valerianoides cxrulcus, nobis. Trachclium umbelliferum caeruleum Pon.Ital. Trachelium hoc attingitattitndinem circiter duorum pedum, faltem in calidioribus regionibus: radice conftat fat is cuberofa, emictente plurimas Hbras: caulerotundu in varios ramulos in fuperiore parte bracluato, in quibus plurimi tiores umbellarim proveniunt, quinis petalis in margine divift, integri infundo, cum ftilo feu corniculo in medio, florum Valeriana; Indicae omnino imuli, ac Valerians majoris floribus perquam fimiles, colons eleganter caerulei, aznrciw, fa pore eft acri, aliquaiiulum aftringente; ladtefcit qurii betejus
irs runta, & capfulas ternis loculamentisdivifas habet aliorum Rapuncolorum etiam more. •
folia func membranacea, crifpa, in ambitu (errata, mudronata: florensdiu durat. Floret
T. ljo- femematurum eftAaguio: fiores, inquam, numerosos caeruleos feu azureos vifu per
l hros unibellarim in fingulis fupremis ram is geritcitm cornicoloruni ferie afpectu perquam
1.1.g Ubi fponteproveniat ignotum, ex ho:to D. *Contareni* ad Johannem Pona fuic
miffia Nos Ti^m pl» res an nos in vafe fictili ;luimus in horco blaefeni.

*- *Napuncu/* ^ crniculatus Atpinns angurti(lim3 folio, nobis. Rapuntium Alpinumango-
\foliumalterum, Col. Frater Gregorius^Regienfis Francilcani ordinis Capucinorum, na-
turalium

taralitiffi rerum perquam ftudiofiis & peritus, inquit Fab. Columna, amicitizergoatque fua
 humanitatisinmefigno mwltas ex Germanisemuntibus ftirpes ex/kcatas raifir ad me anno
 16xo. inter quasrariores & hanc ad Rapuntii genus idem retulit; fed hoc corniculatum
 etiam ha bet florem, fimilem Rapuntio montano **corniculato** Col. fupra defer ipto, fie enim
 ex ficca planta excipirur: radice eft longa, crafla, perenni, qua: raultos haber. in fummo ce-
 fpicesannofos,exquibus nova germina proferuntur; ioliifeitlongispollicesquatuor, **ango-**
 ftiflimis.- caule tenui, vixfupra folia emicante, nnicolatiufculo intercepts foliolo, **m enjus**
 fummo (los eftglobofus fimilis alterius noftratis corniculati a Columna defcripti: ex ah is ger-
minibus caules etiam & flores alios proniit, fruftu & femine, uc cenfemus, etiam **fimilibns** ;
 non enim (inquit Fab- Columna) ex ficca planta obfervare petuimus.

Pars T A B U L A V. Secliom's *qulasx.*

- Rafiuuntiumgaleatum <
 Virnnianum feu } (54. *Coccineo majore*, nebk. *Trachelium Amerikanum*
 Americanuk } *Flore i* feu *Cardinalis Planta*, Park Parad. £,
 (55. *Violaceo majore*, vobk. 0
 56. *Bl<xfinfe* feu *Solonienfe* *Flore violaceo minore*, nobts. ©
 57. *Cretkum* feu *Petromarula Cretica*, Park, Theat. &

R A P V N'CV I I C A L E A T I.

Explicatio partis Tab. quintx Seftbnis quintx,

54. *Rapuntium* gtleatum Virginianurti feu Americaiium coccineo flore majorc, no!>is. tra-
 chelium Americanum, flos Cardinalis **Barberini, Hift. Mexican. Trachtliom** Amencnnuni
 rubrum, Baptift. ferr. *Trachelium Americanum* feu **Cardinalis** planta, Park. Parad. Ex ra-
 dice perenni veget; fibrofa, candid a, lateribus repente, ctfpite facile fe propagante, teneraja-
 ftefcete, dulci ai 53ucacalidirate, plures caulesfive foboles fecundum radice **vetuftatetn** &c
 ubertatem prinio'. -**refolia** in terra ftrata emittunt, vulgari Rapuntio non difl!milia, nifiquu
 majora Sf obfeuriusvirenrria ficinorbem juxta radice caput expaiifa, qua: deinde in **livi**,
 rotundo, candicante fed angulofo caule, bipedali aliquando haerent, qui craffior & vegetior
 eft Rapunculi vulgaris caule, arque eidem alternatim hirent biuncialia aliquando, aliquan-
 do triuncialia, parum incurva, per ambitum dentata, quasdifruptalafteum fucciimcttundunt,
 verumnooitacopioium ut cater3f fua; ibrtis plantar. Folia decrefcere folent a **rntdio** caule
 ad fumum ufque in quo flores coacervatim infpicam**longam, craffatn, dodrantalem, tV in**
fummo duplici umbella coronatam dthifcunt. **Junii** inirio m mcriديوياibus, ta'dius apitfi Sep-
 tentrionalesfpica producitur, & flores **rariordine inter roliorum alafenfe** **excruntur, brevi**
petiolo haerentes, & ex calyce quinqnefoliato Rapuntii modo tuln!olonguncialia aut fequun-
 cialia, coloremfummounacumqnis petalis (arure coccineo **hilari admodum**; paulatim
 dehilcentes circa finem **Junn autinitim** julii **inqninqne pccala coccineaicidem dividuncur**
galeatarnm planrarwm quodammo more, novoquidem riru in hoc gem-re uttria perala de-
 pendeant effigie bjr buhrum, SrbinaaJia fuperiora & anguftora, **veluti aae** obliqua?tiibu.'uni
 medium exiguum, ex ilorum centro five **mSdio** emicantem, amplexentur, colore etiam eic-
 ganter coccineo, in ciijusfummo capuc **catruJeum fiveviolaceum**, avic»!a:cujufdam roftrum
 incurvum aemulans, profertur; ab aliis congeiaeribus (loribus hi variant, ut non eampanalatos
 led pocius galeatoi flores imltari videannu, pnrum ad Gladioli flores accedenres, quan-
 qoam naturafinctubulofi **8cinraargiaalidiflfaionedifferentea**. Hujus floris mediusti:Lu-
 liis heximatur in eomelkus liquor uon paucus repentur, qui etiam in Viola Mariana congenre-
conlpicirar.- hujus flores infiailibus **fiinimocumftadio colamar** & expetuntur; quia copiofi
 & Man coccineo coiupicui coloreoculis volopratem & dtlectadonem adferunt, tum **qaiap**
 tim Horentes ditmus daiant & permanent quidam Hores florcntes deflorencibus aiiis; fruftus
 in MlycibusquinqDefoUti. extubjtioas **oUemmar** perfefti, **tribus** foraminibus perJo-
 mi ex quibus **finguhs** f_{cm}ina flavicann a i a m ^ con'eneril)Uscftltlunt> ^ &

famil TM perficm,,tUr ftmma in "l^ioribus regiombus, rTro m fri.idioribusJ mara-

flit ^ ^ WH/ ^ g. r a (exclisVi r inia n ^ flore violaceo **maiore, nobis. Ha ^ folkfant,** rions
 ZcsITc ^ I ^ magi, ^ * & VmUm,, fmaca: "quorum, alis. (urlum **verfus t** xcant
 flores ex caly_ubu₃ qHinqHrfuliatis.hjriutis, integri in **fojido**, piotundius **inmai** gine divi t
 pai:-

purpurocaeruleifeavjolacei; quibus fingulis fubveniunt capfulse tribus loculamentis diftindje, atque in fingulis confpicitur foramen ex quo decidit femem minutum, liracidum, aliorum more. Folia,inquam,majora funt&obfcurlus vhentia,inorbem itidem fubinitium juxta radicis caput expanfa, quæ eft alba multifida. Tota planta kicle fcatet, ficur reliqu[^] omnes hujus generis.

56. *Rapunculu** galeatns Blæfenfis feu Solonienfis flore violaceo minore, nobis- Draba flore caeruleo galearo, C. B. P. Rapuntium urens Solonienfe, Catal. Btelen. in folio. Hie Rapunculus galeatus flore violaceo minore radicem habet Afclepiadis, id eft multas fingulares in unum apicem concurrente9:ex qua caules emittit bipedales,quorum fumms faftigiis eorum-quealis fuperioribus plurimi flores, galeati, minores, caerulei innafcuntur, Ra,puntii American[^] coccinei (quod flos Cardinal is tl[^]iturColumnae) &prioris ma/oris caerulei omnino aemuli: quibus flaccetcentibus fuccedunt capfulæ, triangulares, aliorum Rapunculorum hujus claffis more, continentes femina pellucida, xu?iz, atque fingula*: capfulæ fingulis foraminibus perforantur, ex quorum fingulis numerofa, minuta, praedifta femina decidunt matura& ficcata, quibus p;opagatur planta. Tota planta percalida eft; pscipue ejus radix maficata linguam urendo ptingit: perperam Cap.Bauhino DraBa dicitur. Crefcit in humidisericetis h filvis annofis paffim in agro Solonienfi, alibique in Gallia verfus Piftaviam. Rapuntium galeatum fetè declarat ex fucco lafteo emanante ex qualibet parte adhuc viridi, rupta: adde capfulam feminalem & femina priorum capfulis & leminibus accedentia.

57. *Rapunculu6* galeatus Creticus feu Petromarula Cretica, Park. Theat. Petromarula feu laftuca petraea, Hon. Belli & Pona? Ital. Vide ejus defcriptionem paragrapho primo ubi oftavum occupat locum, quia ejus tios quinquefariam profunde dividitur, ficur galeati pripre^s tres: debet hue revocari & aptius in hac ultima Tabula difponi cum fuis fimilibus Rapunculis galeatis.

TEMPERAMENTLIM & VIRES.

- i3.Rapunculus *efculentus*, C.B.P. In caliditate Isr frigid it ate confifit Cait Matthioldm in Ep. Cam.) radix, ncn longe abeft à temperat is, imo nee in aliis qualitatibu*. Eftur cruda radix ac pariter cottain acetarils, quxmaxime guflui placet, isr appetentiam excitat. deditur quod radix elixa & cum longo pipere devorata laftis ubertatem in nutricibus faciat. Radix, tefte Lobelio, Candida, tenera, acetar'm verndtquadragefim <z longe Rapo aut Raphano delicatior. Lqcl'pi copiam augeri quidamnutricibus elixa radice ex pipere fumptaexploratum habent. In Italiâ, Gallia, Germaniâ, hyeme, aut ineunte Vere non/blum radices in acet aria afumunt, fed isr radices poffunt is in Anglia, fi ferantur in honk, huic ufui infervire.
- 21 .Campanula *arvenfis minima*, Dod. Viola *arvenfis* isr Viola *pentagonia*. Tab. Folia bujus antequam planta in cauliculos protrudatur menfe Februario inter fegetes, ubieo tempo re isr Martio eolligitur, in acet ar'm cum aceto isr fak manduntur apudGallosavide, atque Earifiis dicitur queue de V Euefque.
- 28-Campanula *major* isr *afperior* foliis Vrtic*, C.B.P. Guftuafringit, isrhinc exficcandivim illi ejje quifque conjicere queat; afringendi habet facultatem, ideoque decoctum illius unice adyoris exukerationes, aliaque ejufdem mala, qu <z ajiriclione indigent conferre cenfent: utills haucidubie etiam ad alia qu*vis ulcer a, ob infignem quam obtinet in exiccando facultatem, inquit Fuchfcwi* P^orro radices omnium horum Rapunculorum refriger ant is pot entU funt ^ isr nonnihl afringent'ps; poffunt autem omnes una cum aliis in acet arils edi. Sum etiam qui Cèrvh cari <£ radicum decoctum adverfus or Is isr tonfillarum infiammationes conferre affirmant, Dodon <z- < «5. Radix alba isr tenera acet arils apt a jejunio, vernopr <ffertim, Lobelia*.
30. Violte *Mariana* radix refrigerantls is- nonnihl'a/rlingentiseftfacultatls isrpotentU; efuiut aliorum filvefirium Rapunculorum apt a eft, isr non incommode acet arils additur.
- <√6 Rapunculus *Alopeuroides frica longa*, Cluf. Hift. Huj&adix, ut fcribit Schwenkfeldiws, priufquam caulem protrudat, elixa isr manfa cum fak, aceto isr oko macerata, cibi appetentiam parit, Jlomacho prpdeft isr urinas elicit.

HALLUCINATIONES CAS?. BAUHINI
Aliorumque Authorum.

Rifyuiiuttis nemorefai angitjlfolitif parvo jlore
C.B.P. pag, Qi, col. i. pi. mi. Campanula
lutea linij'olla. Lib. Gr. stapincitlu; xcmtirojas i.
Tab. & paf. ZI^ttl. l. pl. tX. Linamjihjtjirc fatt-
um fb/iu Jabrotundis, C'.B.l'. Campanula lutea Li-
nifitia, Lob. L*ffj. Bis ripefttur in Pmace pag.
«J. fmb T^apnncuto, iipag. J'4- fit Lino: tton po-
icjtrft tSLinuM 8 ^aputitultf; ergo male cit :t
CaJp. Bankisui.

J2. Campanula arvcafu minima, Bod. VioU ar-
venfis (i hola pentagania, tab. Jffrit Daikn.rut
bant plaiftam nan takeftere, tontrarium crnritur
tuüüüü rumpenti folia,- *rgt fallitur dsdiffimns

Dodonitts.

4S. Jfapumulus Scabiojit: api tula titrates, C. B. !'-
tag. gi. tt. i. pi. v. Hapuntium alterum Irptopt/yl-
lon capitattim, Col. Fabius Columna ajffrit hanc
Hgpunmli fpecitm ejfcpercn *-lenEe fallitur
tejt tpxnientia.

J^apunc-^t'Blafmfis feu Jy. — .tftsgaleato fia-
rtviolae nre, iiohi!. Malt Oraba Jiore tam-
ieo ifr >tur Ca/p. Baithno in Future J ag.
W pi- vin. cum fit Hapunc'i gal-ati
, moiHiwm m dacinna hijjtis te 'f'a
. f7. Fide ibid. Et pag. lis. jupra c it aba
... ,T HaBucitatiintt ilic.

DE TRICAPSULARIBUS PENTAPE1ALIS

Qjiarum Cenien odore pmeatn refinam unitatur ;

SV NT \$JU E

Hypciicum, Arcyrum, Coris & Androfacmum-
C AT VT II.

Yn . i ^ « ii AtJyirau/tT, siSiKlctw, «' Si x«jt«tpriT«, quoniam [men odore pintam refmami-
tatur, Diofecridi l. 3.C. 171. is'Pliniol. 26. c- 8- Hyperkon quod alii Chamfpitin^ all
Corion appellant^Per/crat a vulgo, quod folia foli cbjdia innumtris fer amimbus [eaten videaiur
bine isporofa quibufdam dk'ttur-

Genera: Dicfcorides prater vulgatum **Hyperiatm** iv alterum fiquente capite rxbibit, quod
Amr^T, «' ATx-j&tUis, d' Aif-pisaijn dicunt est, Hjprki gntui magnitudint dijans^ cutrt majti is
tico ita fit: is Andraftcmum dki% quodfruftK, qui refnoft odorit eft^ at nit u digai vetttti auoi
tur: iSr fequentecapite A.^tmu^«,' si d,,, ^, ; si An^: ah Hyjvriio iSf Afeyro difert, 196.
Plimo I.e. is L26.C. is. Jupltx tfti **Hyperkum**: aliudolersceof ruthe tenuicubitali^rubente,
almd quod Corun appellant folio Tamancit, tec. **Eidtml. 27.C.5.** Afar urn feu Afcyroids Hy-
pmugmuteft, cuju, com* triUvttu, crucntam, qua dc caufa quidatnbane AndrnUmumi
vert. Idem c. 4.

Monopetalis **tricapfalaribns** in ptinio capite hujus quinti Scftionis expficatis, ii^dem
adjicimus cricapfulares pencapetaJas piftnras in fecundo &c **tertio** capice esplicaiKl.¹
pctr conformitatem 6f connexionTM, prxcipuc in numero capfularum. Eciamfi monQ^r.cu&
in pnmo **capiteexplicatz**, floies prodocant inttgros in hindo, in raarginetamenquinque^
rum dmduntur, Sr quandam etiam in floribus obfemnt analogiam: ideoqut iifdem has
Pentap...ala: "i lecndofif tertio capite contencas adjecimas.

TAB-UL A VI. Scftionis quinti.

Hyperikum

1. Vulgare, C. B. P. Matt. b. Lugd. EyJl. Tab. Hypericum vulgare feu Perforata car-
le rotundo foli... olinj>tbTis, } .B. Cbabr. O

2. i Folio brevior, ... Hyperikum Syriacum is Alexandrinum, Lob. 7. B. Chab. *
1 ? • • • • • "ünia % • • • • • f um glabrum, C. B. P. Hypericum minimum Jaf
Septentrionale, Lob.

4. Legitimum feu Coris legit. m DiD/i
Majus vel Hispanicum, C. B. P. Hypericum tomentosum Hispanicum
Cluf. Hift. 6

5. Supinum
tomentosum Minus vel Morfpclia(Um c Bm Pt Forte idem cum priore injü
isrmdan loco proveniens. «i

f6. *Perfoliatum i\$ perforatum, C.B.P. Androjdemum aherum ApuJwn, Col. 0*
 j. *Minus glabrumereUumpulcbrum^nobk. Hypericum pulchrum feu 4. Trag. 0*
 %*Fcetidum capitulis longiflimis filament it donath, C.B.P. Tra'gium legit inum*
Pond Ital. Androfamum fcetidum feu Tragodes, Eyji. 0
 9. *Bifolium glabrum perfoliatum nonperforatum, nob is. Androfamum Campoda-*
ren fe-> Col. °
 A J r
 Androjdzmum\

io. *Quadrangulo glabro^nobk. Afcyrum, Matth. Fuch. Dod. Lugd.*
Afcyrum di- Ger. 0
Hum cauk\ 11. Rotundo hirtuto foliifque hirtuth, nobk. Aridrof&mun alter urn
 1 *hirtutum, Col. 0*
 12. *Maximum ('fruttcens quafi j bacciferum, nob is. O*
 [13. *Flore iff theca quinquuupfulari omnium maximk, nobis. 0*

§. 1. H T P E R I C V M.

Explicatio Tab. fextce Seftionk quint.*

1. H *ypericum* vulgare, C.B.P. Park. Hypericon, Dod. Hypericon vulgare five herba perforata caule rotundo foliis glabris, J. B. Chabr. Ex radice fibrofa, multitarium divifa, buxio cortice inteftâ, virgukfurguntcomplures, rigidas, lignofe, rotundae, fubrubescentes, in ramos divife, cubitumunum vel amplius aitx: folia Majoranae, glabra, vel Centaurii minojris Lobelii, nervis perlongum excurrentibus donata, innumeris foraminibus Soli objepta pertufa effe videntur; fapore ficco & afringente, cum aliquoamarore; flores in extremis ramis copiofi, lutei, ex quinque radiatis petalis compofiti, ftaminulis multis cum apicibus concoloribus praediti; quibus fingulis fuccedunt capfulas triplices fibiinvicem ftrifte junftae, in quarum fingulis femina multa, parva, ex nigro ruftâ, pinguis; fingulae feparatae & exficari incipientes granum Hordei magnitudine xquant, fapore refinofe, amaro & ingrato, teftè L&belio, atque tarn flores, quam capfulae femine gravidae, fanguineum fuccum reddunt. Nafcitur paffim fecus fepimenta hortorum & margines agrorum filvarumque, ac nomraro in locis herbofis, fubinde etiam humentioribus. Junio, Julio Auguftoque menfe floret. Apud Diofcoridem inter Rutas filveftres (cumipfiuspeciescredatur) hujus defcriptio etiam legitur. Foliis modo latioribus, modo anguftioribus variat, quod Tragus duabus figuris expreilit: caules quoque ejus quod in humentibus provenit, quadrati funt, alibi vero rotundi: hujus etiam minor fpecies toliis non perforatis eft; eft & varietas alia caulibusprocumbentibus, alia furreftis, quae omnia à ludente fie natura à folo humido vel ficco contingunt.

2. *Hypericum* folio brevior, C.B.P. Syriacum, Lug.Ger. Syriacum 6c Alexandrinum, Lob. J.B.Chabr. Folia hujus quadruplo funt minora, rotundiora foliis noftratis Europei, qua? lummis cubitalibus virgultis confertim tanquam in verticillis exeunt: tiores noftratis iloribus fimiles fed minores.

^*Hypericum* minus, Dod. *Hypericum* minus fupinum vel fupinum glabrum, C. B.P. *Hypericum* minimum fupinum feptentrionale, Lob. Exigua haec Hyperici fpecies fibras prolixâ? pro radicibus habet, ex lignofe principio pendulas: coliculi funt per humum fufi, prxtenues, palmares & aliquando dodrantes, crebri, modo fimlices, modo in ramulos deduct, per ^uos folia bina ex adverfo pofita, Serpilli foliis paria, glabra; flofculi pentapeali, minores multo, fed Hyperici vulgaris ritu funt conftrufti ex quinque minimis petalis, luteis, acutis feu mucronatis, cum plurimis ftaminulis curtis concoloribus, rfnagnitudine proportionaliter foliis refpondentes. Inericetis & udis fabulofis arvispaffim in Gallia & Anglia, in pafcuis arenofis & fterilioribus requiefcentibus agris. Floret ineunte xftate, & femina paulo poft in tricapfularibus parvis thecis, aliorum fyx fortis more Hypericorum, per-

A. *Hypericum* feu Coris legitima Ericis fimilis, nobis. Coris legitima Diofcoridis, Pona 2ltal. Cori's Matthioli, Lob, Ad. *Hypericum* hoc, Coris di&um, aifurgit altitudine ad cubitalem 5f bicubitalem caulem, in multos ramos brachiatum: cui multa adhaerent folia Ericis inftar, alternatim & denfe diipofita: in lummis cimis proveniunt flofculi pentapetali, lutei; ex quo* rum centro ftu medio proveniunt multa ftamina concoloria: floribus fingulis fucceduut ca-

>!uUternae ftri^te fibiinvicem JUK&E, femina fingulae in fe continent: radix eft lignofa; caulca,

caules, inque
à Matthiolo.
sus protrudu
tatim proven

Spergular marina folia æmulantia, atque ramulorum fastigijs finguli innascuntur flores pentapetalij, lutei, majores secundi paulo, at multo majores tertij floribus, exalbido rubentes, cum multis staminulis luteis in medio: totus autem flos cum staminulis aliquando ex Matthiolo lutescit, satis gratum odorem suffundens: semina «TM in encnr in cap iulis cribus conjunctis, ut in prædictis: radix est lignosa emittens plurimas fibras te ... oia retinet viridia per totam hyemem.

5. *Hypericum supinum tomentosum majus* vel *Hispanicum* ... *Hypericum tomentosum Hispanicum*, Clus. Hist. Est hoc multis ramulis ... præditum: numerosis confertisque folijs illos ambientibus, vulgari ... similibus, sed plane tomentosus & incanis, (pictor in villis explicandis negligens fuit:) ejus flores secundum ramulos lutei, pallidiores tamen & minores aliquantulum, quam in vulgari: quibus succedunt capitula seu vascula, vulgaris capitulis similia: radix est dura & lignosa; sed & ipsi rami per terram sparsi subinde fibras & radículas denuo agunt. In convallibus quibusdam non procul Salmantica crescit, ubi Julio mense florentes plantas, inquit Clusius, inveniebam, adeo late sparsas & diffusas ut ampli petasij orbem æquare possent. Martio insequente in maritimis Valentini regni locis, etiam floribus onustas, conspiciebam. Nos copiose in fluvio *Cousson* & in alijs stagnantibus paludibus passim intra septa *Chambort* invenimus. Vulgari *Hyperico* est imbecillius & minus odorum. Altera est species *Hyperici supini*, etiam tomento obsita, in *Montpeliano* agro à *Lobelio* observata, quam palmo non majorem esse asserit, priorem autem supra descriptam esse hanc quod censeat *Lobelius* injurius est *Clusio*; nam plantæ dissimiles sunt: priorem *Clusii* eandem asserit, quam in observationibus pro minimo *supino septentrionali* usurpavit.

6. *Andro*

Eradicc fibLoO, r!, ben, oblicl, riJi B. P. /ndrofi, muni, altem, Apulnn., Col rotunda limbo alternatim 2T ongiungum decurrente, in caulis

imo plius alijs divisis, atque geniculis caulis folijs binis ramorum hærentibus, ex opposito, atque adeo ut à caule perforata videantur, ut in *Periclymeno* & *Androbidiora*, & imperceptibilibus fere punctis nigris per oras depicta, lucem etiam ex poris transmittentia ut *Hypericum* vulgare. Differt ab alijs, nam circa caulis summum non decreta pelvicalæ, per ambitum minus dentibus serrata, ut pene fallant oculos: flores insunt cacumini multi coæcervati, veluti corymbi, quorum calycum foliola, & florum petala depicta sunt punctis illis nigris, minutissimis, non elatis ut in superioribus: florum botri, antequam pandantur, rotundiores & compressiores sunt alijs, & minores, sed oblongi parumper fiunt dehiscere incipientes, colore pallidiores. Aprili & Maio floret: petala florum cava & latiora superioribus sunt, nervisque per longam ductis, ac etiam ut calycum inscripta tunc inferne apparent: coma trita, tam antequam floreat, quam fructus habens, sanguineum suum succum emittit, quo manus inficit, ut aliæ congenere plantæ, resinoluntque emittit odorem: Junio Julioque fructus perficit. Differt hæc à *Campoclarenfi* foliorum tenuitate, quæ illis minora triplo fere videntur, acutiora, levia, molliora & lucem transmittentia, atque in summo imis majora: differt etiam nervorum discursu in folijs & floribus. Hujus ortus in campestribus Soli expositis calidiorum regionum, illius vero in umbrosis montibus, frigidioribus, septentrionalibus. Hujus folia, inquam, sicut & sequentis sunt glabra, acuminata versus mucronem; at vero sunt hujus multo majora versus basin; ubi cauli committuntur eundem arte amplectuntur, ita ut à caule perforari videantur: sed præcipue ab *Hyperico pulchro Tragi* differt in hisce, quod primo florem producat majorem, & foliola quinque calycem constituentia habeat crenata seu paululum serrata, thecam tricapsularem etiam majorem, rugis undique scatentem: hoc neutiquam in foliolis capsularum basin sustentibus *Hyperici pulchri Tragi*, nec in alijs præterquam in *Hyperico*, *Coris* dicto, gemitur.

7. *Hypericum minus glabrum erectum pulchrum*, nobis. *Hypericum minus pulchrum* seu 4. *Frag.* Hæc *Hyperici* species pulcherrima est, caule conitat t* «rf S tenuj.-

tenuiHimo, cubiulicV altiore, nonnunquaainibehte- flore lutM *«** *I V
 (przcer minimum fcptcntrionale Lobeiii) floribus mfor_e 2, C T j' S ^^
 yerlusbafin arete caule fine pedicdiaampWtenti aSSsfextir "n E? UT' TM " 8 ta,
 y, Euarou, undad. ffo%aldec, !ore&c
 los blmcses & aapafae. profek in fipe, lore tS ^ u b S S S & f £? g
 r? corymbos difpoficos; fingulis peSicalis curris

clum. Bin, tauquam lafi mntentes, pfcnis, non crLtis, * in fterior fcxco' V?nTM
 us Honbus'-ccdunt capful* mmoresitidem, ttmslocalatlfeH i₃, diftinfce fa quorum fin" "
 guls nur .« d t t i m feminu rafti. Hoc verum Diofcoridis Hyper?cTM Tr-a »
 ft qu. " firfeftima rcfinolnm cdorem %!»«. Proven^ Tag h l ^
 filvilique & ericetis .
 eadem exeunte.

8. A*dtof*mm fetidum cap. ngiffi_{mis} filamentiS donati c_B_R T ra um legiti-
 mum, Ponz. Androfemum fetidum feu Tragodes, E
 le est tereti, levi, ramolo in superiore parte: foliis ad
 garis majoribus; glabris neuti am ertufi eti
 dulo; ^oribasmaximi; siciliaLprorims L L in V Pore Bt OIIIIllbus vWc 1? * aci''

mollanina tria long, cmicanc: S L S 3 ? t S S S £ ^ f S ^ , C * H
 fempervirentibus in calidioribnsregionibi ^ ca Zh ^
 raro
 cum
 gine
 m liquidam, quæ Tragum feu hir-
 ota planta fecus rivulos ac fcaturi-

9 ^ r c S A n i r glabi P Crfbliatumnon P«foTMtum, nobi8. Androfemum Cam-
 Lt non wribruun. 17 ^ ^ - "FoUftach. Afcyruo, fc_a Hypericum biWmm gla-
 Drum non pctoracani; U.D. ^ . Hums nlantrp n ; » r«ni- a a H

folia geniculis abfque periolo hxrenria habent es? , 7ercTM ^ ^ 1 ^ B ^ esproducens,
 via, infernalbidicra, nee poros tranflncHos habenda fl ij H " T' V I r % n ^ ,
 d, fto qua lucm per tthra poros etnfrinuit; MnSiS J S S S ^ f r t r i f i u l a
 n nfema parte

d. colorum brev. tacem; admediuni nfque caulis Temper majora & longiora, eramchli lon-
 gitudinc, & fequunciat fere totinidme; e tiedio vefo cadis ad fumum ufque decrement h
 mmora, anguftiora ut admodnm tenuia fint. hx iHb alz prodeunt mult! firveluci coh ^
 rente., dwifam umbeUam cofficientes dffiti adhac florefcunc, Origani & Centauriiminoris
 modo: floresquJdem Mdim non diflimiles Hyperico, nifi magnitudine, pnnftis nm\, in-
 fcripti fees oras petalorM, flornm a^ calycalorum, in quibus pn_nai illi nigri e pi
 tenuiffimo breviffimoque fultineri videntur , biiffitfci modo, qu^ etiam in fummis folmlis
 alarum est: deflorefcentibus floribus proten
 dentefemagiscaulifacuminc, als illsdviiJim-

aRjuealicluper alias alternacim (uperdie videtur, in q«b_{u3} MIV«s fruftas ha^nt
 nquefoiiatos, nc in Hyperico, quorum baf feufiAdo Mnccthm ^pfijJa trfparfita, in en-
 finguis locuL|ment₁sfecdl, !i₁J_{at}cfemen_cOpor₁n₁, nigmm_i minutunMitpnnfios. q.,!
 n eranonis fine ddc_r.b, iolet, qwqne a Diofcoride notatur verbo & li.#im Hoc non
 ^Kuminfemin. seff. gitatqoemagnitadineobfervat. ir, fed in fiomm, cojycum atqir folio
 ^nimfruftufuperfice, ycluti punftsmfcriptomnigris atqueparum elaris. OdorphnJ"
 KBV & fmftuim prxfatim.refinoius atque ficcum nigropurpureum ianguineum floresfrnS
 ftaminum apices, ut m Hyperico, triti emittint. In valle oritrn Campochnenli loci, nZ
 iroffis ; & per Matefium montem fcptcntrionelibas lods. In umbrofls filvis FcntaiXuZu
 epe a nobis confpiciabatur : Julio menfe illic floridam invenimus
 toatmMuu

ro W^^Atcyr. imdiaun. cauleqnadranguloglabro, nobis. Afcyrum, Murh. Fench.
 tod Ad, Lob. Lugd. Ger- Afcyrum vulgare, Park. Afcyrum hoc altius aflbrgit Hyperico ; fo-
 aejus majora, glahra, albidiora; torammofa haud apparent: flos ficut Hyperici: capfel*
 ;idem females forma finles exiguis punctblis refperguntur: radix durior: fuccus fa_d-
 nincus ex hujus Joins or Honbns ifianac, fi terancnr autdigitis conficiuntur. In umbrofls
 nibufdaw locis cV pratis hnffidid filvilique reperitur: flores & femina Hyperici vula_{ar}i₃
 'ribus &c feminibus conformia ad maruriratem perveniunt.

11. Androfdtmm A fey rum difhun caule rotundo liirfuto, nobis. Androfx*mim a) iterum liir-
 furum

rum lib. quatuor, oki Terebinthi lib. duas in quibus funde foliorum foris is femina Hypericum contuforum mediocriter q. (. quod £ tandantur in ampullam ant aliud vas vitreum fat is amplum, omnium capaK) exponitur foli per oculo ant dectmdies, deinde coquantur in eodanvaje, quod impontur cacabo, in cujxt /undo injicitur firemen^ mi vai innitatur, dm ante ebullitione vase bent clauj b, p fteafaSa coctura is expreffione renovantur folia, floris isrjbnma Hybrid a feati. Jem ffr ' fit" additcmvim. Hoc Balfamum verum Peruvianum <tquat, atque vulmra <p> ulcera ci .

I Balfarnn Peruviano. Aliter, Recipe fummitatem Hyperk't is oki communk, fingulo- r u in lib. duos, Myrr<e iff Gumm'tElemi, ana. unc. duas^ Terebinting unc. quatuor, Alxs unc.

•iftickes^ana. uric.fan. infundanturbulliantq-ie^mdiphmateS'. A. fit Bilfa- iducens morbis, qmbm is prius. San'ma i?ifufa?fino per quadraginta dies cur. It fc'hka. "' fcoride. Si bibatur vinum in quo fttmna.^ flores is folia fat infufa, peilit tert'wnasx. "'«Seodemtefte. Tnllura forum Hyferici (gregiumeft medi- camentum in mania mirofun, ' knit* B.Simpl. 149. Hypericumcakfac(re.ftccare,tenui- oueffe ejjmtia, itemqut ukeraj ire docet.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authonim.

P iffir. zi. & i%Qw eo/oeitt Cajp. Bauhinus Hy- tricum, Androftmm, jifyrum & Corim-tum arntf haplants) mi dtUum^fint ptntapctala trua- plalaTcs^nale bit ihjponantur inter GTatiolam, manop- etatam buapfularem qut^lantam, & ptyzonunflo- re herbacto & jemne unicotriangittaripratiitum: " debuit aijungi pentapctalis trirap/alanbus, fjbifni- Itbvs, ut Viola martiis, jilvtfhioupijut male locatii ab codan Baabino inter Lappns ££ Luceia bivaivia, fag. 199, f 200.

P*g.iSo.eot.t.pl. re, jfftyrunt, Led. Dod.Ger.jf- fcyrum valgart,l>art(. JJiyrum I >. MatthM jijeyrum, **M**ttbuuLffid. Iftpffum jfftyrtm dMum caule **k**quadrad>huiB\$. Bp. IH 2 **h**ffig. a Oiy **maida non fpe-** (iaji adhibetur & par. \$j, appvnitur figure Jjyri^It emm tranppofirto fixumrum) ex horum jtg&ra tft jf Jcyrum fault tjuadrtingulo glabra ; trigomais omnta list namma adhibentur prefynonymit turn jfndrofa- rno(eti Aftyro hirtuto, C.B.P.vet Afcyro (ante rotunda

hirputt, nobi; vel Androfrmo ulttro hirtuto, CeL Huic pejiremafynonyma font Afcyrum A I I drofcmu. ni Matth.FoL ed.Baub. t>ch. Afdropiemum Hyptri- totdes, Ger. J(ata filvefiris HyptTicoides, Dod. !ly- pcrium Androfatimm dictum , J. B. Chair. Jmire- fanttm> Leb. ergoewfundit Caffi.Bauhi/m; Afcyram palujire flabrum mule quadrtmguh cam A/ryro cau- le rotunda hirtuto feu Androfomo hirtuto , C. B. P. Dtiitdc Ajjyrnm it. fivt Hypericum bifvlum pla- brum non perforation tf v. Androjitmatn a'tcun feliii Hyperici ahquibui Hypericoidts, C. B. P. An- dryK!Hum,Lob. fune una & eddemplantai idea mal- t aCaJp.Baabina pro duabus dijlitihii citattur.

Page. 280. toi, %. pi. 11. Corit cirruha mar'nima , C.B.P. CoraMt>njf>il,*ca, Ad,Le6.Gtm.Ta6. <Cu- rit ijuorutidam, Cluf. H>Jt- HxcpMitn tjigaleata, ""<?*"**& difpanitur turn Core ientHUt Btic* fit>ili, quic ejl jjuiciej perfeBa Hyprui: nmandttur ad fm- mgMeatarum, & tollctur lapj'us Cajp.Bauj/uit.


DE PENTAPETALIS TRICAPSULARIBUS c AT v r III

V I O L A rorundifolia <Sc Jan<rifolia.

V /pla i« Dioscoridi l.^c. 122.a His b> mp^uffi, Violapurpurea, aflork colon \Thophr. r, fc,p j5, lav.(Sc i.Hifi. 21. iw/iitoi/aAuw; nigram Vwlam, a florum colon nigricanthpur- kBTif, wf' Flit3.l.2uc,6. ExViolk,qua fyonteaprkisis macrk lock proveniunt purpure*, tatiore folio fiatim à radice carnofb exeunt, faUque Gr£CO nomine h cterk difcernuntur, <ip- pellata la, ut ab bk iantbina vehk. to G r£ CK vccatum in Qtoponkts Meander crtdidit', Hemolao referntU I^{UO}<^ Nymph* quiedam loni*, florem turn Jovi pnum munerc dederint- Alii hi vo- lant did, quod cum Jupiter pudlam b adamatam in vaccam converter, tm a florem hum pa- bulot/uJproduxmt, qui pmptr ipfamafus^ab ipfa nommacceperat. Uxnc LannkVtola^ quafiVi- zula.

Generaptum Plinio, purpurdc, tutex, albje: fed depurpurek primum, quarum unumgenus pud Vhfcoridem & ^{vinium}.

TABULA VII.



§. 1. VI

OLA

ROTVNDIFOLIA.

Expttcalh Tab.f,ilimisia,mi, quints.

1. **V**iola Martia purpurea flore simplici odoro, C.B.P. Viola purpurea, Fuch. Matth. Lugd. Viola nigra, Dod. Cluf. Hist. Viola martia purpurea, J.B. Chabr. Inter prima Veris munera sunt Viola martia purpurea ex radicibus fibrosis, aliquando in plura capita divisis, folia emittentes ex rotundo nonnihil oblonga, serrata, longis pediculis appensa, inter quae petioli è radice quoque enati, singuli singulos sustinentes flores, ex caruleo purpurascens, odoris suavissimi, calcari donatos, è quinque petalis compositos; quibus evanescentibus subveniunt capitula rotunda in tres cellulas carinaeve dehiscencia, semine albo, parvo, rotundo seu oblongo plena. Viret hyeme pariter æstate, frigoris patientissima. Provenit in locis opacis juxta dumos, muros, agrorum hortorumque margines; pingui solo plurima frequensque emicat. Flores ut plurimum Martio, in calidioribus regionibus Februario, aliquando etiam Aprili profert. Reperitur copiose in colle dicto *le Costè de Cbaille*, secundo à capite Blænsium milliari, flore rubro & albo simplici. Inter myriades sponte nascentes quædam reperiuntur, quæ à luxuriante natura flores plenos emittunt, eosque vel violaceos, vel albos.
2. *Viola Martia inodora silvestris, C. B. P. Inodora, Dod. Viola martia canina, Eyst. Rãdice est sarmentosa, tenui & longã, vario reptatu hinc inde penetrante tetram, densa & longa finem desinerent, supina parte leviter hirsuta, viridantia, pronã vero glabra, dilutius virentia & fere luteola, interdum subpurpurea, in ambitu serrata, gustu viscido, pediculis tenuibus quadrantalibus: cauliculi pauci, quos ad alas involucria foliosa, acuta, in ambitu hirsuta, complectuntur, flosculos in ramulorum summitate proferunt, Viola martia odoratae similes, quinis petalis constantes, quorum supremum longius protensum reliquis, calcari deformat, purpuram utrinque secante fascia alba, qua ipsa albedine reliquorum quatuor petalorum, saturata purpura tinctorum, unguis colorantur, nulla odoris gratia, in medio stamina lutea, cum strobore virente: caules subinde ad cubitalem nascuntur longitudinem, inque ramos deducti foliis vestuntur; floree uti supra dictum gerentes, quos subsequuntur filicuz longæ, in tres cellulas de-*

dehifcentes, femine albo oblongo farçlas, copiofo. Obfervatur paflim ad macrorum & ficcorum agrorum & pratorummargines; itemindumetis & filvis, florenseodeni tempore, quo purpurea vulgaris odora, fed multo diutius perdurans.

3. *Viola Marococi* five *Granadilla** foliis, nobis. H*c *Viola* exotica Americana floribus femine & capfula feminali, *Violas* noitrati Marti* omnino conformis eft, fimilemque violaio colore pr*ditum fert florem: folia folummodo habetlata, finuofa, in ternoslobos hederacos p-ifur.de fatidivifa, *Granadill** feu *Floris paffionis* triphylli modo, unde ei nomen datum. Hanc plantam habuimus ex horto Ebqraceni Londinenfi dqno hortulani cujufdam nomine *Blackburne*, qui femem hujus habuit.ex Virginia anno 1653.

4. *Vizlz* mania i^ajor hifuta inodora, nobis. H*c à radice innumeris 5bris fcatente folia emittit plurima, latiora fen ampliora, hifuta, pediculis fati longis, hifuti/wtidem, innitent/a; non repit *Violas* martias more, riec ramulos edit ut *Viola* canin'a: inter folia exeunt alii pediculi ex eadem radice orti, finguli ^ngulos fuftinentes flores inodoros, ampliores floribus *Violas* marti* feu odor*, dilute c*ruleos, lineis albis medium petalorum percurrentibus. Floret Martio & Aprili menfibus. *Viola* hæc flores copiofe fert, & ideo a rufticis colliguntur & mifcenturflenbus *Violas* marti*, atque venuni offeruntur officinis, fummo cum detrimento reipubfa. Hoc obfervatu dignum Apothecariis, ne impoferum decepti decipiant clientes, U medicos prafcribentes Syrupum genuin* *Viol* marti**. Copiofe provenit in montofis filvis circa Oxonium.

\$.*Vwla* paluftris rotundifolia glabra, nobis. Hujus radix alba geniculata, multis fibris ex fingulisgeniculisexeuntibus horizontaliter, non deorfum tendentibus, prsedita (quodmultis radicibus diverfarum plantarum aquaticarum contingit) ex cujus fuperiore parte protruduntur pediculi tenues, quorum fingulis fingula innituntur folia, rotunda, giabra; atque exindc etiam exeunt alii pediculi tenues, fuftinentes flores faturate violaceos, duplo aut triplo floribus *Violas* martias minores, ex quinque parvis petalisconflatos: floribus flaccefcenibusfubveniunt capful* long*, tenues, tribus loculamentis diftinçel*, aliarum *Violarum* filvcftrium more, in quorum fingulis continents plurima femina fubfufca. H*c *Viola* facile a latifoliis omnibus diftinguitur, primo à natalibus, quippe in humidis & paludofis muſco obdu&is reperitur;fecundo,parvitate florum violaceorum; denuo foliis rotundis. Floret Aprili, Maio & Junio; femina perficit menfe poftquam flores protulerit. Provenit ad margines fluvii *Cher-vill* inter Oxonium & CEiater<eatOtt. Utraque h*c fpecies, quarta&quinta, deteçla fuic à *Jocobo Bobert* decennioabhinc

6. *Viola Alpina* rotundifolia lutea, C. B. P. *Viola montana* floribus luteis, Lob. Obfer. *Viola montana* prima, Cluf. Hift. *Viola* martia lutea, Ger. Folia habet hæc *Viol* nigr** feu *marti** fere familia, minora tamen, breviora, rotundiora, & e viridicolore pallefcencia, calido guftu: cauliculos item angulofos in quibus fingulis bini aut terni flores ex alarum finu prodeunt, *Viol** vulgaris floribus minores, flavi, inodori, quinque petalis confiantes, quorum infimum majufculumeft, & quinque radiolis five nervisnigrisinteriore parte diftintum; reliqua,exteriore parte: femem in trianguliscapitulis, qu* maturitate dehifcentia, cxiguum, nigricans, aliarum *Violarum*, prxfertim colore, feminibus fimile emittunt: radix alba, cra/liufcola, mul-fas propagine e lateribus procreans, candidifque longis fibris hifuta eft. Abundanterna-fç[r] in omnibus Auftrias<StSturias Alpibus, Junio atque Julio florens; in cultis autem hortis A^li. In Borealibus etiam Angli* montibus invenitur.

§.2. V I O L A LONG/FOLIA.

7. *Viola* ere&a flore c*ruleo & albo, Eyft. *Viola* arborefcens, Matth. *Viola* elatior, Cluf. Hift. Mater *Violarum* Dalr". Lugd. *Viola* furreftis cauliculis quibufdam arborea di&a, J. B. Chab. Hxc eft maxima & altiffima omnium *Violarum*; nam eft furreftis cauliculis, cul^itum a-liquando aids, angulofis: folia fubrotunda, vulgaris *Viol**, fubjnitium faltem, prima verfusterram *mula; fuperiora longa ad uncias quatuor, alia longiora, alia breviora, angufta, ferrata, qu* cultu & mangonio majora evadunt, & latiora redduntur; adcauliumgeniculaaliaemergunt foliola mi-iora& laciniata, perambitum etiam ferrata, colore *Violas* vulgaris marti*: flo-ris quoque quinque petalis confiantes, in circuitu dilute violaceis, qui longis infident pediculis, cfoliorum finuortis, quorum petala duolateralia interna parte villis obfita, & fub i-ulo pulchellis ftriisdecorata: floribus fingulis emarcidis fuccedunt filiqu* long*, non rotun-æe, in ternas capfulasfeu carinas di/if*, atque dehifcentes femina plurima effundunt alba,

parva, oblonga: radix totaribrofaeftacperennis. Tora planra (a pore vicidoeft, & multa commnia habet cum Viola tricolor quoad difpofitionem foliorum. Planta eft perennis, fed cur arboream dixrint quidam, non video, tftenim herbacea; altior & cftior iuftiore titulo dici potuit. Spontanea occurrit inter vepres in Galliae Angliaeque montium jugis, atque ?<> in filvis aliifq; quibufdam locis. Floret non modo Vere, fed & tota aritate in Autumn ufque aliquando.

8. *Viola erefian Jovis* (jos Theophrasti, C.B-P. Viola afluigens tricolor, Dod, Gt tricolor five fios Trinkatis, J. B. Chabr. Pulcherrimi flores eorumque varietas cft. horros tranflata, cultudigni judicatur, quosquinquepetalisconfantcs. " r?sad-verfa facie fpeftatiriofferrevideas, modotorospurpleos, modolurci/aleo & purpuro variegatos^Iterque ctiani verficolora; pc¹* * longis tu., ex foiorum alis ortis, qua; modo in feme hi¹ rotunda, ilipp^r ,,i ambir.ii ferrata & laci-niac^caulibusexeunt procumbenribus non iurreclis, - radite tenui & fibrofa or-femen in pericarpis triangularibus, turgidulis, mini- .,topioi'um, Ipknckium. Vere uu-cum Viola nigra martia, aut paulo port emicat, zftate dein tota & maxima Autumni pa, re floret. Exitinpturibus Iocisaridis; nafcitur & in hortis & crtbroquidcniia fponce, filveitfj fpeci- ofior & i elegantior.

9. *Viola tricolor hortciifis* repens, C. B. P. Procumbens, nobis. Viola tricolor, Dod. Viola flamme-a, Cxf. Viola hxc rlammta cauUculq; affurgit dodi"antali, triangirlo & ftriato, foliis pet intervaila anguftioribus Viola valgajri, magifque ferratia, aliis tennibns intermixris: c quorum fummo cauliculus exit fiorem luftinens pentapetaluni triplici tolort diiini^tum; inedio veluti flamma radiat Hava ad ponicenm vergens, i^ambitaalbicatfupernbpartibns, folium infimum vloh^eum laturatius eft, ideo Hos afpeftn vennfns eft, at fine odore. Se- ritar (Imine a matronis aliifane cunofis & ftudiofis elegantium Horuni; fingulis annis moritur, fed facillimoproventu renatcitur ex Ilmnc deciduo: nam ubi Icnel lata f'utric, non opi- tft rteram fcere, fi permittatur fanentefcere. Floret per totamxllttm, atque todtni Eeffi- pore femina perficit fubfulva, in capfulis oblongis triangularibus.

10. *Viola bicolor arvenfis*, C. B. P. Silveftris, Icon. Lob. Viola tricolor petria. Ger. Viola Trinitatis minorpetrsa, Tab. Eft hae humilis admodum planta, Folia productnslurfuta, minflsiiimarginc ferrata: caules debile-s per ternm ftrari: Hores itidem aliquando triuni coiorum, albidu, exiulei & lutei; aliquando binorm, albi & rca:rulti, omnium minimi, e*- pertes odoris: capi'ulx feminales feu carinub minores, minora femina, fubrotundj, IUI* ruftaqueinfcecontinent. Eft phnta annua ficut oftava & non;t prxcedentts, utquerloreE per Eotamiftatemiiiurvis fegetalibia & neglcchs.

11. *RO/4 montana lutea grandiflora*, C.B.P.6VCant. Viola flammea lutea, Lugd, Viola nammea major paUido colore mixta, Eyfl. Ilmimos h<c tx una radice profert caules, pediculis, Srfimili I ram of o ST ^ Uos P" i<trvalla ad fingula gewcob ambiunt folia Viol* I ' , I ,, ns irt" ia; ongtora, craffiora, fwcti plena, Itvittr & r^rius dtntata, apophyfr bus ad latera oblongis it propnde bciniatis, amarinfenti RU(Vi)s & nonnilnlacris: A fummia alis longi onuntur pediculi triangulares, tendli, finguli [iiftineBtw fiorem omnmi nu i }fl' hoc genere videntur maximum, quirts petalis acvulgarrs Marra confancem, quorum du<> fupenora extremis ons ex ca:rulto purpnralcunc, circa umbilicLim pa Hid i funt coloi is, *¹* Snusn ca-ruleo purpuralcentibus rdperfi, trinifque pnrpureis radiis ex umbilico en E!twfinfigniti; infcriaspetalom latins eft, aurciferecoloris, feptenis radiis parpurcis, a bum- ^ mtercurfantibus macalis, ex ciruleo purpurafcenti infimo labro notatum; odor flavuill- >> H I lauduas mfcuns, ex ciruleo purpurafcenti infimo labro notatum; odor foui "ft. j cral J i u eu a ^ pitula oblonga, qu* in ternas partes feu canfcas dchifcentia, t cmen l i m . i ' S v ? ? ^ I f i Num, rotundunMTwturkatctulctim, Violt tricolor is femini p * * "

r.....:.....n. PIOCZ P^{ctie} tota arlatc. Eit&alia hums vanens omnino flav3' r...:.....n. PIOCZ P^{ctie} tota arlatc. Eit&alia hums vanens omnino flav3' gratiam flori adferunt; aliquantulum enim odoratior videtur. Rcpcur & tiore toto pur- pureo. Hyvarietatts colorum ex feminio proveniunt, ficut in aliis mdtis fpecicbus acci- dere folet

12. *Viola Alpina* folio in plures partes diffecto, C. B. P. Viola mont.inalolro mulrifido,!' B. Chabr. Rara hae Viola species a Johanne Bauhino in monte Newbrts reperta balneum Warmes fimplici fere radice hzrebat; folia longiuſculis pediculis mtdbotm ftatim ortu, in decem longiuſcula & anguſta ſegmenta, ſingula Linarię tolia reltrentij (neta

vofecundum longitudirfem decurrente) adpediculum ufque diffe&a, guftu glutinofo, reliquarum Violarum more : florem, qui turn deciderat, non obfervavic idem Johannes Bauhinus, fuperfrikibus tantum adhuc filiquis tricapfularibus, in tres carinas hiantibus, quas pediculi breviores quam fbliorum fuftinebant.

13. *Viola paluftris* Pinguicula vel i^o* dodecatheon Plinii, Gefn. Cam. Pinguicula)>u SaniculaEboracenfis, Ger. Cucullata, quibufdam Crias Apulei, Ludg. Pinguicula, veiLijpailo Gefn. Hort. Cluf. Pan. & Hift. Venufta& elegans etiaTn eft hxc plantula, quaterna, quina, nunc plura, nunc pauciora habens foliola, Gentianelae fere familia, per terram frata, ciic? radice cap'it latiufulca, deinde in mucronem definentia, i'atis der^fa, pinguia, fucculentaque, tenella tarrien& dilute virentia, potius pallefcencia, amaricantiſ guftus: exhorum meditullio unus aut plures Oiiunturcauliculi, riudi, fere palmares teneri atque exiles, quibus infident fingulares flores, utpJunnum violacei, aliquando carnei vel albidi, cauda five calcari prominente, quemadmodum in Confolidae vulgaris vtilgodi&a; five Cymbalarias flore : iis fuce^unt rotunda capitula, mucronatoapice praedit^minutum, longum, nigricans femem continenda: radices tenues funt, flbrofe & candicantes. Provenit in omnibus fere pratis uliginofis, in quibus crefcit primula Veris'flore rubro ; qux albo eft flore fponte provenit nonmodoin *Sneberg*, *Durenjlain* ^lizzmque Alpium jugis, in locis afoluta recens nive adhuc madentibus, fed etiam permixta illi qua? purpureoeft flore in omnibus fere prardi&is pratis pallim locorum. Maio floret, & Junio femem perficit, in Alpiis vero ferius. Pinguicula, inquitGefnerus, ia&o a nobis nomine, appellatur hxc planta, qua? florem caeruleum, ut *Viola martia*, profert inodorum: folia humida, mollia, lasvia, abfque nervo (ni fallor) ut *Lingulaca* vel *Ophiogloflum*. Nafcitur in paluftribus. Hascille. Infnpere hae planta tam quas flore eft ixriileo, quam qu33 albo, plerifque Anglic locis invenitur borealibus, in quibus *Primula veris* flore rubro permixta crefcit. 55uttettOO?t, ideft, Butyriradicem, a pinguedine butyro fimili, qua fiflurasin vaccarum uberibus fanarefolent, ap^ellari audio: a meridionalibusvero Anglis, apudquos etiam nafcitur, H2>^ite^oot vocari, quiaoves interficit, fi ob cibi penuriam vefcantur-

TEMPERAM<NTUM & VIRES.

Viola: martid flores is folia temperiem h ah tnt frigid am is? humid am. Flores quUem omnibus inflammationibws internit, lattrum potiffimum isr Pulmonis utiks funt: peftorh , affer* arterioe, me non faucium afferitates is'fcabrities leniunt: jecinoris, renum is' vefic* nimios calores refiinguunt: ardentemfebrum ardor em mitigant: bilk acrimoniam obtundunt \ fitim ar cent is fedant. Quod ex Violls fit tyxntTw, five uti Aftuarius nominat os&Tnov, fi ex diluto decoquatur in quopluries recentes flores fuerint macerati, ahum knit is bilem per inferna educit trium aut quatuor unciarum pondo fumptum. Fit ex *Violis oleuvi*, quod refrigerandi humeftandique potentia pollet, temporibws illitum fomnum clementer conciliate quern calida autficca temperies remoratur: cum ovi luteo fedis is haemorrhoidum dolores mulcet: additur quoque utili/Jime cataplafmatis refrigerantibus ac dolorem fopientibu*. Fit aut em oleum in quo flores Violarum macerantur, aut ex immaturis olivis Gr^esi *fun&, & s i^l^ov nominant; aut ex amygdal'ps dulcibus-, uti *Mefues* ait. Sint is FwU ipfa recentes frigid* humentesque oportet, arid* en'nn jam deperdita humiditate is minus refrigerant is caliditatis nonnihil adept<£ videnthir. Recetiores aridas *Violas* medicament it, qu<£ cor corroborare creduntur, utiliter admifceri fenhunt. Folia Violarum in olerefumpta refrigerant, humeclant ahumque leniunt: for is ad mot a calidas omnes inflammationes mitigant cum per fe, turn cum polenta impofita. Imponunturis aftuanti ftomacho isoculh, Galenoteſte: Diofcorides fedi etiam excidenti imponifcribit. Prodeffe autem excidenti fedi poſfunt, non uti afiringens aliquodfedem repnmens, fed veluti molliens is tnalaficon, qualiafapenumeroprius admovend^ quam reduci ea profertiminflamat a queat. Plinius quoque ait *Violas* crapulam is gravedines capitk kvareimpofitk cofonh I Ifaftuve; difcutere etiam anginas, ex aqua pot as. Id quod pur pur eum eft ex *Violis* comitiaibus ..icderi maxime pueris in aqua pot urn: femem fcorpionibu* adverfari dicitur.

Viola tricolor a plerifque Jaceanominatur (eft tamen is aliajaceacapitata, pappofa, qu&ni-ra nominatur) alii* *Herba Trinitatis* propter triplicem florum color em dicitur. Qualitatem habet frigid™ quidem, obfeuram, fed humidam manifeſtorem, lentiglutiñofique fucci *Cuti Malvs*)particeps: emollient if, ed de caufaſacultatis, verum minus quam ilia. Prodeſt, ut ccntioresaiunt, febric'itdntibus, maxime pueris is infantibus, quorum convulfionibus, comitiq̄lis

mitialUmorbi acceffionibu* fubvenire creditur: ebmmendatur ad Pulmonis pefforifqueinflam-
 mationes, is adfcabietn corporifque prurifum: ulceraquoque glutinare fertur. Viola inept
 collocatur a CasJ. Baubino pag. 199, iff 200. inter Lapfam ist Leucoiumfiliquofofum, cum
 +ws nullam habet affinitatem nee in floribus, nee in capfulis feminahbus femimbufve.

DE MONOPETALIS BICAPSULARIBV

Digitalis, Scrophulafia, Verbafeum, Blattaria, Nicotiana, Hyofcy

CATVTV.

DIGITALIS.

T~Mtlis quod flores digitate referant, nomen habet. Sunt qui ad Verb afcum, alii ad Alifmā-
 J L / I genus alterum Plinii refer ant. At doclifimus Fabius Columna, Ephemeron Dioscoridv,
 l.4.C. 85. cenfet.

Pars T A B U L £ VIII. Scaionis quint*.

- Digitalis LuU
- 1. Purpurea folio offer 0, C.B.P- Digitalis vulgar is, Park, l• B.Chabr. 0
 (2. laifolia, nobh. 0
 - FerrugineaXi. Anmfiiifolia, nohk. Digitalis angufiifoha flore ferrugineo, C.B.P.
 (Digitalis gilvo flore alias ferrugineo, Lob. 0
 - C4 Maſno flore, C. B. P. Digitalis lutea amplo flore, Fon & Ital. 0
 (.\$. Minor parvoflore, nobis. Digitalis lutea parva, Lob. Icon. 0
 - 6. Perfoliata glabra flore violaceo minore, vel Digitalis Firginiana LyfemacBU facie
 foliis fubruberentibus flore violaceo minore, nobis. 0
 - 7; Minima Gratiola difta, nobis. Gratiola 7entauroides, C. B.P. Gratiola, Matth.
 Dod. ut. Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger. Gratiola feu Gratia Dei, J. B. Chabr. Gratiola
 flore albo & Gratia Dei, Eyft. 0

Explicatio partis Tab. ottav* Seftionis quinU.

! ' T \ Igitalis purpurea folio aſpero, C.B.P. Digitalis vulgaris, Park. J.B. Chabr. Digi-
 J L / talis purpurea, Dod. Tab. Ger. Digitalis J. B. Chabr. Vulgatiflima eſt hæc Digi-
 talis, quæ purpurei floris eſt, nuncfaturatoris, nunc dilutionis, perraro albidis: cui folia
 iunt longa, lata, fuperne viridia, inferne incana, per ambitum crenata, aſpera, Verbaſci fo-
 liis quodammodo /imilia, minoratamen minufque lanuginofa: caulis reftus, rotndtis, bi-
 cubitalis aliquando in fertili folo, a medio furfum verſus compluribus floribus gravidus, non
 orbiculatim aut alternatim, fed ab uno caulis laterere caulem cingentibus, fupra invicem au-
 utaiunt I* MAov difpoſitis, deorfum verſus dependentibus, forma oblongis, cavis, nigris in
 funtlo, daſrylotheſis propemodum fimilibus, calathi aut digitalis fatorii munimenti effi-
 gna q? are a or as coccm eo? excepta infriore parte, quæ propter nonnullam admiftam
 albedinem cameo eſt dilute colore, intus vero flmiliter purpureo, inferiore parte (qux 6V pilis
 longiſobſita eſt) verſicolore, albismaculisintercurfantibus: floris fundo interius & penitius
 adnalcuntur ftamina alba aut purpurafcentia, contort^ qu* apices didymos croceos, gutta-
 tos, iultinent: atilus tenuis, purpurafcens exhirtuti oblongique pericarpium mucrone proten-
 ditur: cm polteaincluſum continetur femina minutum, in binis capfulis adhuc viridibus fi-
 mul jundis, membrana media intercedente, & duplicem feriem feminum minorum,
 fubrutorum } d. ft. nguente: radix pWimis confattenuibus fibris. Plerifque Germanix, Gal-
 la, Ar. } o. C. f. laX0As, flivo fis & TMS^ atque in montium convallibus ſponte & co-
 pff: e. fl. ubi eſt. } o. ^ ^ * E4 * l. fiore albo & dilute cameo, qux inter myriades
 vulgares purpurei coloris reperitur, a quibus nec tollis, nec floribus, nec capfulis feminilibus,
 ſed ſolo floris colore differt.

2. Digitalis bifolia flore ferrugineo, nobis. Digitalis trauma ferruginea, Park. Parad.
 Hæc Digitalis roia protertoblonga, fulcata, nervofa, atronrentia, averla parte fubhirtuta -

rolns Digitalis ferrugines; angustifolia: fequentis latiora, alcernan ^m caulium geniculis adha-
 henna, qui font bipedales, fuffinentes in raftigiofpicatum plures nores uacrvlottiear
 ris ntu, mtgrosmfndo, majores levi crenarum ve%io per ambitum incifos, toris
 hirrutos, ferruginei colons, intus eodem colore (aturatiore & ftriis varieaati^ nific-
 prodnftiore villofo propendente, medic ritn hiante, latntibus in fndo Horum anic
 ue riorum locum fuccedunt thecs bicapfulares hmx, arfte fibfmvice ^m adherentes,
 J; acute mucronata, cralliores multo Digitalis angustifolia flore femina ^m apfulis;

)-n- -A, m paria [!] ^{inc} ^{nde} in duplici loculamento, rufta, fcdmajora^ntinontes.
 ferrugineo, C.B.P. Digitalis gilvo flc^e alas ferrgrtneo,
 .. ui.g ⁿ ^s ^{uft} ^{lo} ^{re} J-B; Chabr. Cauis hujus bi^os cubitos alcus/ft
 in d i o n t e r c r a f l u s . « . . . ; c u j u s c a p f u l m m u s i n a l a s a l i q u o t d i v i d i t u r : l o h a ; X * i l
 tabs angustifolia **A U m U s** pnox.ma, longa, anguth, acuminata, atrovirentia f.pe The
 nervofa, inferne fubhirfuca, drernatm, caul, adnafcumur: fiores longa ierie thyrhoide ^d ^z ^l
 & i, Dgicate porpurTM multobrev.or.s rigidiorefq.c, toris tori S r i , ferruginei color's
 intosriaa h.ancedonac, latentjbusin fando S.lccundam fuperioremfloris partem apparend
 db» ftamimdU cum apinbus uteis: mfidec flos calici ftellato qtunque radiis conLti,
 wlnti bafi recurve: flonbos decidiis fuccedunt thec* bicapfulares, duobus loculamentis
 m.c,-o113c1sd,ft,n^,fe_p torn_e diod_1 frern_1, na_11: cduplicem f_crie^ ieminum lubruftorum ficu
 in D,g,ral, priore la titol.a Horeferrugmeo : 1₁₀U3 folia funt pntcedenda anguHomioie"
 capful femmalesiphquefemma pr.onsfuntminora- Atqueinhifceconfift^{pra} ^{ci} ^{quad} ^{Trt} ^f ^f
 rentia iocer majorem & hanc mmorem.

4;1^g>& h» magno flore C.B.P. Digitalis luteaflore am_rlo,PonrItal. Exradice
 lujn tuberofo, longa, mains crallmfculis fibrns fcatente, cxic caul's cubitalis & albed o
 alcio^rotundus, brvis, circa qnem Uiadifponunturalternatim, loiiga, angiiifta,glabra, dilute
 nridia: mgulmm fumm_s ij j f c j w apparent Intel, integri i n W patiu & hia.tcs

excant
 adh **ISSaSi** ^{rum} ^{entibus fuccedunt capfulz binz virides}

ac arae junto, pyramidales, >pton_1c_d_1o determinant* duplicem fcri -m lemiiium, fic-
 ch* fponre zvcnmtur.xqat&mwz fubrufta, mdra^inuta eLd.nt: SSSSS^H
 brevionbus, flonbus multo majonbus, capfulis kminalibus reminibnfqJe itidt-m (equentis
 majonbus, tacile ab ipia cognolcitur. Floret circa medium Augufti, & verfus fineni Septem-
 bris matwrantur femina,

5. Digitalis lutea minore flore, nobis. Digitalis lucea parva, Lob. Icon. Uxc minor eft
 priore, atque minoris degantiae; toliifeftanguiiiioribus magifque viiidibus, xqualem adipi
 teitur altitudinem cum priore: fiores eciam Ipicatimfertluteos, triplo pva;dia^ lutex Hori
 bus minores, rnt^os .n fundo & qninqaefariam in margine prorandius diviibs: quibus
 Jjcceduiit capfalx & fiauna ibidem contenta multo niuora. Nafcitur fponre copioie m
 lilva fontainbelkaum colhbns illic Betula fcatentibus.

6. Vmitflk; perfoliata glabra tiore violaceo minore, voi Digicalia Virginiana Lyfimachie
 iacic, tous iubrubicibus ilore violacco nu;iore, nobis. HxcDigitalis Virginians elegans
 fpeciw caules promit bipedal%, lukulx-nr.es; quos ambiunt per intervalla ad fingula g_c-
 nicula binatdk nmcronara.Lrmoniimajoris^rimo orcu, foliifhaudabfimilia,cxadverfoad
 nallentia, q3» it caule F!rorantur,Lyfimacl)ixquodammodo£mula,qii^adco3ra_e crulem
 ciDgunt ut Digitalis Virginiana pertohata merito dici poffit: ex alis ad genicula ftperiora
 ciulcuntur pediculi alios procreantes; quibus innafeuntur rlores calyce & forma Dach-lothe-
 ca: feu Digitalis minoris nili quod Hos integer in fundo tantum, in margine quinqucfariam finue-
 turucNicotiana femina, coloris violacei: in fundo autem Horis fen tubi qatuor ftauinola
 arcawta latent, quorum fingnlorum extremo, aliarum Digitalium florum more,' duo apponim-
 cor tfticuli 1 -ubtlli, Icntifonnea in fuperiore tloris parte: eft enini fHhis propendens, verfus
 inkriortm partem luteus, laniiginofus.- poft fiores evanidosfingulos fuccedant thecs bica-
 pfpplars, inmucronem acutum biturcatum definentes, continents* in k femina minnta, infi-
 nita, cacteraroniDigitaliani more. Nomen indigitat natales: riorctarltafe.atquc cad em exe-
 lintc & ineiinteAutumno femem perficit (uum).

V .7. Digitalis minima Oratiola difta, nobis. Gradola centatiroides, C. B. Y. Grariola, Matth.
 Uil.uc.'Ad.Lob. Lugd.Tab.Ger. Gratiola a]bo rlore & Gratia Dei, Eyft.' Cauliculorpro-
 hxc plurimos, dodraritalcs &qQadrangulares, frequent iaque circa hos folia, angufta,ob-
 Qq q 3 longa,

longa, Hyflbpi vulgaris familia, fedglabra, cujus-&ipfa herbaeffigiem & formam referc, nifi quodnon ut ilia crigatur, fedaliquatenus humi procumbat: flores in tenuibaspecliculis oblongi efolioram **alia** exeunt e dilute purpureo albidu, integri in rundo, quinquofariam in ei gine divifi, aliarumDigitaliumflorum aemuli; quibusevanidisfuccedunt capfulae binatim a&ie fibiinvicem, adhuc virides, adlmentes, interceflu membrane **radix**, feu fepimenti diiimentis duplicem feriem fcroinam minorum, hincinde contentorum, Digitalium more radices frequenter geniculatas, Graminis canini modo ferpunt, & a nodis Jibras muit,; uimitcunt. Saporcm cota herba infigniter amarum obtinet. Nafcitur ffonte in paluftribns, **hri** midis ac uliginofis. pratis Germanic, Galliae, pnEfertiminpratisGew//^pnmolapidcabi: .Lc Lutetia Parifiorum! fecus fluviolum *Goblin* dictum. Floret Julio& A'jgufto; raro propter nimiam rependi av' iditatem feniinaad. maturitatemperducit, ndtiequod tempore fanifecii mecitur florefcens, fed in hortis femina in capfulisfnis feminalibus, Digitalis capfulis conformibus, omnino familia collegimus.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

'acultatem Digitalis folia, cum amara fint ^calidamisftccam obtimnt, cum nonnulla expurgam viconjuti Siam; interim nullistsjunt ufus, nee medicamentk ajmifcentur: flos folus folafulchritudine is¹ forma placetgratufque est, Sunttammqmnnoxiamis venenofam qualitatem hujus folia babereaffirment, iaque evidenti experimento cogmtum, Nam cum ex huju'S iff aliarum barbarum foliU cumovis plaant& eifent faftg, quotquot eatgujlajfent ntque edijjent, mexfese male habuijje iy advoinitiomm irritari dkxmtit. Digitate purpureaplurimi fit ad omnia vulnerafananda, inquit Lobelias in Adverfariis, Somerfiti AnglU rufika turba bujus decofip ftribricitantibispurgatioms iff mterdian fuperpurgationes is? vomitiones humidioribws alvo molitur.

7 .Digitalis Gnwi/d diftajiobis. Gratiola^Dod. ut. Ad. Lob.Tab. Ger. EftemmGrmolaut armrijjhna^ it a ttiam temperie cakfaftoria is reficcans, eximiamfimulexpurgandi cum per fuperkrem^ turn per inferkrem ventremobtimns. Educit nonmodo Untampituitam, vmimiy crajfamip flavam bilem. Vrodft. ad diutinos coxehdkh dolores & inveleratasfebres, five tertianat, Jive erroneas alias: jecur is henem expurgat, ab obflru&iombus Hberat, ventris lumbricospellit, putredimbus adverfatur. Vofis macerate & infufdt aut hv'itcr deccfidt est abuncia i. ad duos vel plures. folia impofita confohdant iy glut want recentia vulnera. Pafftm in robuftis corporibus a prattkU bujus fculi commaiJari Gratiolam reperietU, prsfertimad movendaihydropticrum, aquae. Eft vero, ctidid, isfticca temperi^ tamvioknter purgat, ira^*TM, ut Heileboro compareri poffit; tptidam Tithymalofeu E/uU comparant i fed omnino ab bujufmodi medictzT ZiT ** vU>kntk djiinmiumfuatfami auandoquidem benigno Tafath ff

HALLUCTINATIONES CASH- BAUHINI

Aliorumque Authorum.

Digitalis ¹ vel pallida parvo flore, C. B. P. **SSLus** a parva, L. 244. col. 2. ¹ ibidem pl. xv. Dim aits angustifolia lutea. C. B. P. Digitalis lutea parva, Icon. Bii adhibetur Digitalis lutea parva Loomii pro Synonyma a Casparo Bauhino; cum planta 11. & planta xv. sint una & eadem, non debuit Bauhinus multiplicare entia sine necessitate, nam ex nostra sententia 11. planta, item 111. & xv. indi-

tant tantum unam & eandem Digitalem minorem parvo, quod examinatis evidententer apartbit . 103, & 104. collocat Digitalem inter Auriculam urfi seu Santiculam, & Lyfmachiam, & Veronicam, & disjungit a sibi similibus Verbafco, Blattaria &c. ergo nullam sibi proposuit methodam genuinam & veram Casp. Bauhinus.

DE MONOPETALIS BICAPSULARIBUS

C A T V T V.

S C R O P H U L A R I A .

Scrophularia *nodosa*, *isr ab effeiu, quod ad Scrophulas prodeff cjedatur, nomen accepit. Alia nodosa, alia fibrosa, nodk carens.*

Scrophularia florem habet parvum, brevem, inttgrum in fundo, in margine quatuor latibus constanti, firoina partebirida & furfum reriexa, interna ut labellum propendente, **doabiw** a'is latera claudentibus, ttui ftilocum ftaminulis emergence prarditum; atque floribus **gnguli** & fc contruciiE & calycibus quinquefariam divifis innitentibus, ftice4unt vacula fen **capful*** pyramidales, arte fimui **jancte** dum adhacunt virides; exficcate, aliquidantuluni mucronata: & divils, feptomembranaceo difterminante duplicem feriem *knar* num, miiutornm tnlvwum aut fibniftonim. Hifce notis affimatem & cognationem cura ceteris monopetalis bicapfulanibus, a fine ultimo (id est, modo fiorendi & capfulas feminales, ipaque femina producendi) delumptam ostendit. *Scrophularia*, habita ratione durationis, est vel annua, vel perennis; ratione foliorum est, vel foliis Urticæ, Lamii, Betonicæ, Scorodonis, Sambuci, Papaveris rhæadis vel Rutæ modo divifis; ratione colorum florum, est vel rubro, vel luteo, vel obioJeco & variegatocolors; ratione radicam, est vel radicc fibrosa, vel nodosa cuberofave.

Pars TABULA VIII, & DE

Scrophularia	#	AnnualFolio	i fl<™r<ibroj B.Cbabr. %	1. <i>Vrtic<€y C.B.P. Scrophularia peregrirta, Cam. Scrophularia</i>
Rad'w \$FO>rofa	Betomcefoliit^ncbis, <i>Scrophularia aquatica major, C.B.P. Btonica aquatica, Lob. Ad. i)od. Lugd. Tab. CIT. ©</i>	r<j- <i>ScorodonU, nobh. ©</i>	6. <i>Samhuci capfulk maximit, nobis. Scrophularia peregrhia Park- 0</i>	
				Vivifts<
C9. <i>Tenuiffime^feu Ruia caninaminor\ nobh. 0</i>				

Explicatio psrth Tab. oftava? is nov£ SeBionit quh^{ta}.

1. *Scrophularia* *anmn* folio Urticæ!, C.B.P. *Scrophularia peregrina*, Cam. *Scrophularia* *flora* rubro, J. B. Chabr. *Scrophularia altera* elegans, Park. Hæc *Scrophularia* ex Creta feniine nata aliquot ftolones a radice fibrosa profert, cubitales & fcfquicubiralts, quadrangulares, ex arto purpurafcentes, quibus folia mucronata parrim rquali, partim iniqua]i fitti innafcunttir, longiufctilopedrculo appenfa, (Irticæ rolits non difUmilia,* fed kvia, non mordacia LITICX lieu, latilque mollia, iupernt faturata vtridirare nitentia, iiferne ncqualu-itri'ex quorum alis brevesemerguntramuli, quadranguli ectam, infimi[cs;tios, fcdlongemt' res divifijluftinctesparvqscalyces^nquinquelaciniascftosAin hike flofcuks coloris ex

f

atro

atro purpurei; quatuor laciniis confantes^ fupernā bifida & furfum reflexa, Merna ut la- bellum propendente, duabus aliis latera claudentibus; atque flonbus fmgulis fingula fuc- cedunt vafcula feu capfulse duabus cellulisdiftin&as, fuperiusaliquantum mucronatae, fepto medio duplicem feriem feminum minorum hinc indepartiente, quae omnia referunt Scro- 1 ' ulariam teffera f ua eifentiali' a fine ultimo defumpta. Tota planta odorem magis fctidum fpiyare videtur.

2. *Scrophularia* annua folio Lamii flore luteo, nobis. *Scrophularia* flore luteo, C.R/P. Ger. *Scrophularia montana* maxima, Col. *Scrophularia magna* amplis foliis, J. B. Chabr. *Lanium Pannonicum* 2. five exoticum, Cluf. Hift. *Galeopsis altera luteopallida*, Park. Fo- lia primum nafceyitia rotunda funt, Lamii foliis quodammodo forma, *Uxticx* pllis villofis familia, nifi ampliōra ut plurimum effent, mollique lanugine villofa, plngui & lento quodam veluti rore leviter afpera, du-m novella funt, in ambitu ferrata, longis pediculis tulta, inter quas altero anno emergit caulis quadranguius ut plurimum, aliquando fexangulus (utriufq^m enim formaenaicuntur.) molli lanugine pubefcens, per quem ex intervals aequaliter, fed adverfo femper fitu, in nodis fparfa funt folia, modo bina, modo terna, fuperioribus minora, & brevio^ibus petiolis inhaerentia: in quorum alis, unnc bini nunc terni, pro foliorum numero exi- liunt pediculi unciales, tenues, firmi, hirtuti, ternos vel quos flores fuftinentes concavos, integros in fundo, anteriore parte nonnihil hiantes, exiguo labello prominente, & tenui ftilo cum ftaminalis emergente, praeditos, colons lutei, aliquando e viridi pallefcantis: unicuique fiori decid&o fuccedit theca bicapfularis, fepto medio feparante duplicem feriem feminum minorum, nigrorum, aliarum *Scrophulariarum* tormā: radix fibrofa obliqua, multis fbribus capillata. Hujus caules hyeme pereunt, fed novo Vere, interdum etiam ante hyemem ex femine renovatur. Floret Maio, femine Julio maturum eft, deinde tota planta radicitus pent; nonnunquam tam^ in calidioribus regionibus ex eadem radice, poft femina ad maturkateni perdufta, repullulat.

3. *Scrophularia* radice nodofa fctida, C. B. P. *Scrophularia* major, Brlnsf. Ad. Lob. Caefl Lugd. Tab. Ger. *Scrophularia minor* Janfon. in Ger. *Scrophularia vulgaris* & major^ J. B. Chab. *Scrophularia*, Matth. Dod. Haec quae major cognoniatur (ad differentiam *Scrophularias* minoris, fcilicet *Chelidonii* minoris, cui nomen *Scrophulariae* minoris a quiliudam imponitur) quadrangularibus ac fubinde cubitoakioribus affurgit caulibus, colore obfcure purpureo ni- gricantibus, interius vacuis: folia ab uno veluti geniculo femper bina, ex adverfo pofita, lata, acuminata, per margines crenata, *Urticae* majoris familia, fed majora, nigriora, haudqua- quam taftu urentia five pungentia: fiofculi in fummo alarum pravuh colore obfeure purpurei, tormā exiguas caflidas fatise xprimentes; femina inrotundis, fed tamen acuminatis, bifidis capfalif (fepto medio membranaceo fatif fpiifo dividente duplicem illam feriem feminum mi- niutorum) continentes: radix albida, nodofa, tubercula plurimaprotert, obliqua utpluri- mum; fingulis annis idcirco progerminans. Secus agrorum margines, in fcrobibus ficcis & iilvis non raro provenit, iteminaquis juxta *Betonicae* aquaticam. Floret Julio & Augu- ito, ieraen lub hancm Augufti autinitium Septembrii maturefcit in thecis fuis bicapfularibu^ exiguum & multiplex, nigrum. Tota planta fctidi eic faporis.

4. *Scrophularia* radice fibrofa, nobis. *Scrophularia* aquatica major, C. B. P. *Scrophularia* maxima radice fibrofa, J. B. Chabr. (Figura tranfpofica, *Sideritidis* enim apponitur figura lo- co *Scrophulariae*) Quadratis caulibus ad cubitos binos, ternos altis, crefcit haec *Scrophularin* quibus folia *Scrophularis* vulgaris colore zmula, figura an tern *Betonicae* adherent, quae fci rata, atro, viridia, foetida, inobtufum mucronem, ut *Betonicae* vulgaris, definunt: flores, vaicula bicapfularia acuminata, & femina, majorie *Scrophularinae* toribus capfulis feminalibus & icmmibus accedunt: verum radix non ut vulgaris ftrumofe feu nodofa, fed mnumeris fibr i contexta; he foliis *Betonicae* infar atque radice fibrofa, quam facillime primo intuitu vul- gari tolus acuminatis & radice nodofa tuberofave diftinguitur; infupe^ hxc in aquis ad alti- tudinem vin aliquando exfurgit. Provenit ad foflas aquarum, & juxta aquas prohuentes c-

Flore, Menfibus Maio & Junio; Julio k Augufllo maturefcit femine. Scrodon b f? liis, nobis. Hxc afcendit ad alciudinem bipeda^m, atque caulis eV j Sbrach h Ur, W dr « Mf, multis geniculis donaras; ad fingula Ken cui bin^ 7

ScrodoniahaL^ti po ffi, F. ! " " " " " in P^ f^ d^ ai8 celhli^ sterna producat, p. o point. Florem fert unciahbus pediculis innitntem, integrum in fundo,

quinquefariam in margine partitum laciniis quatuor ferruginei color is, infimil virefcentis ; ex fundo floris exeunt quatuorftamina fubviridia, perbrevia, unocum (tilo ejuoque apice ejuodem color!!; hifce deciduis fuccedunt capfula? pyramidales, mucronata?, adhuc virides ar&e flibiinvicem junctae, exficcata? apertx, inque fingulis cellulis femina continenttir minuta, fubfufca, ca?terarum fua fortis more.

6. *Scrophularia Sambuci* foliis capfulis maximis, nobis. *Scrophularia peregrina* aitera, *Vzík* Canife hujus afcendit ad altitudinem bipedalem ; folia habetalataakernatimpofita, uno extremum claudente, dilute virentia, ferrata: in fummis ramufculis ex alarum fimbibus exeunt flores, multo amplioresca?teris fax fortis, fublutei, elegariter ftriis pallidis pi&i; quibus fucctdunt capfulas multo majores caeterarum capfulis, in duo loculamenta partitas fepto medio, in quorum utroque multa continentur femina majora & craffiora ceteris fua? clafli'feminibus.%

7. *Scrophularia* foliis Filicis modo laciniatis, C. B.P. *Scrophularia Cretica* i.Cluf. Hift. *Scrophularia Cretica latifolia*, Park. Huic pjodeunt initio folia humi expanfa, Scabiofz primis foliisnon valdediffimilia; deinde fequicubitalis aifurgit caulis, quadrangulus, cavus, viridis angulis purpurafcentibus, interdum .etiam ea parte, qua? à iole illuftrata eft, purpureus, cujus infimam partem ambiimt longe ampliora folia, in multas lacinias divifa, exadverfonafcentia, deinde reliquum caulem alia, quas alata Cunt Filicis aut Aleftorolophi foliorum adinfar, multis laciniis pradita, qu^ rufus in alias longe minores & in ambitu ferratas fecantur: à medio caule adfumum ex alarum finu nafcuntur rami, etiam quadranguli, foliis prxditi/ & illi fimiliter in alios ramulos divifi, fuftinentes flofculos infar utriculorum,cavos, integros in fundo, virefcentes, firariam in margine leviter divifos, *Scrophularia? vulgaris* floribua non abfimiles, ex flavo virefcentes, fex diviflonibus feu laciniis conftantes, quarumbinae infimae funt valde. exigua^,& inferne aliquantulum reflexa?; qua? in lateribus funt paulo altius attolluntur, & fuprema parte aliquantulum purpurafcunt, fed binae fuprema? majores funt reliquis, & quodammodoreflexa?, purpureiqueex atrocoloris, paucis & brevibus flavis. ftaminulis ex umbilico prodeuntibus : radix pollicari^ pene magnitudinis eft, in multas craffas fibras divifa, albicantis colons: an verofit perennis nihil affirmare poffim, inquit Clufus, quandoquidem non per aliquot annos coluerim, fed lemne ex Creta accepto nata fuit in horto *Johannk Mullier*. At mittebatur fub nomine Ruts filvefris. Nos ex fatione ejuodem feminis vidimus afcendere ad akitudinem bipejjalem, fed ingruente hyeme periit; fie in ambiguo reinquimus: donec coluerimus peraliquot annos nihil de durationepreferrepoffumus.

8. *Scrophularia* major *Ruta canina* vulgo difta, nobis. *Ruta canina*, Ad- Lob. Lugd. Tab. Ger. Cluf. Hift. *Scrophularia altera Ruta canina* di&a., Park. Radix hujus eft craifa, longa, à qua fibrae plurim^ dimittuntur in terram ; ex eadem multi furfum verfus protruduntur caules cubitales, aliquandofef4uicubitales: quorum geniculis adnafcuntur folia, *Papaveris Rheedis* foliorum asmula, fuperne tenuius divifa & denfius difpofita: in fummis caulium ramis proveniunt tiotes multi, iiorum ceterarum *Scrophulariarum* forma & figura, ri&uque donati exterius, integri in fundo, cum ftaminuliseidemadhxrentibus: hifce fingulis deciduis fuccedunt fingula capitula bicapfa^iria, minora ceteris antedictis, in bina loculamenta divifa, in quorum fingulis plurima femina min'uta, fubnigra continentur. Tota.planta fctet, auc falcem ingratum fuffimdit odorem. Provenit in aridis Italia?, Gallias; fed nufquam abundantius quam ad ripas Ligeris, illo procul Bkfis. Floret fub initium Julii, & tardius; Augufto & Septembri femine fuum periicit.

9. *Scrophularia* minor *Ruta canina* difta, nobis. Hascft planta pedalis duplo minor priore in omnibus ; folia protrudit ex geniculis caulium multo tenuius diftecla: flores integros in fundo, quinque laciniis in margine divifos, ftamina & ftilum admodum breviaex fundo lioris orta habentes; quibus fatifcentibus & eyanefcentibus fuccedunt capfukomnium minima?, bifecte? virides adhuc arte junfta?, & ftrifte unita?, pyramidalem exhibentes figuram, acum'ine pungente pra?ditam, fed exficcatx fponde aperiuntur, 6c femina plurima minuta, fubfufca effundunt, leminibus caeterarum itidem minora.

TEMPERAMENTUM 6V VIRES.

Scrophularia facilitate eft calida (sr ficca: folia abfterforia viprtJita, ad prava i? foetid a ulcer a plurimum prodeffe feruntur: cum melle fuccu horum tlecofiws cur at ulcera contu/a, fi mam isr fero contimth. di^bm contrita isr fuper focum calefacla folia ufdem hnponantur.*

Vulgarts nodofa ad duros glandularum tumores

nodofam cum-butjromfulfo contujam, loco baud infohto fed

m abique lucesfu.

Diri nnn-hnrfl.-r agas, quampere unguenti unex succo Scrophularie Betonica aquatica diste folia, absterforia vi pradita, ad prava & fetida ulcera & kerum succus cum melle decoctus.

scrophularia, Latini firmas, vulgo es prodesse fertur: alii radicem humeni diei quindecim repa- Arucas de hominibus p. 111. »MUJInua*unant, Scrophularie Betonica aquatica diste folia, absterforia vi pradita, ad prava & fetida ulcera & kerum succus cum melle decoctus.

HALLUCINATIONES CASP. BAUH^T Aliorumque Authorum.

P^l JZs⁹ col 2. p^L " • Scrophularia palustris nonfoetid* five aquatica minor, C B. P. Betome* Wate* septentrionaliutn fades minor, Lob 06. Ibidem pi. , 11. Scrophularia aquatica major ^ J = Betonca aquatica, Ad.Lob. Bod. Lugd. Tab. * \$^a ratiōe Betonica aquatica dicatur non 7eTū, cr ^ U^o dūle, Betonicu vocitetur, quod non jecus ac Betonica vulgar* umbrosa & frigidā amet toca, utmuit Lobelias in Idverfarii, p^L 230, u. I* ratio certe quoque frigida est. Mefamus memrem rattonem cur non debeat did Betonica, Betonica ex libra nature & a fine ultimo est planta Zaleataverticitata, at b*c est planta monōbetala bicapsularis; ergoneutiquamdicenda Betonica, fed tcephalaria; igitur ignaviter primo Up/us est Lo-

belius, & per consequens omnes authores ejut fa ces, qui non attentius jinem ultimuplantam (iderant. Deinde maximopere authqribm vn[^] eji vertendum, quodpecies biqus generis nunc appel lent j'ub nomine Lamii Pannonitt, ut in v. planta pag. 336. Clusio authore, plurimcc sub Galeopjdis nomine ab authoribw nominantur mendofo jatis, quia Lamium feu Galeopjis, turn Sideritis, Junt planta galeata toto coelo a Scrophularia diverfce, qua, uti diElum, ejlplanta monopetala bicapsularis: idem dicendum de its qui hi fee pi ant is Ifitcc & Clymeni nomina adaptarunt. Porro Scrophularia collocatur inter Serratulam & Stachydem cum quibus nihilhabet affinitatis: feddebut affocian cam Digi- tali, Verhafco, Blattaria. &c.

DE MONOPETALIS BICAPSULARIBUS CAVVT VI.

VERBASCUM

V^l Verbascum φλόκος Dioscoridi l. 4. c. 104. δ φλόκος κρη, quasi φλόκος flamma, quia hujus pro elychniis usus est.

vare, Dod. cumfintgalear&vertXt, ^ o f T vdlr, Matth. & Verbium fil- c. 104. Sect. 9. ad quas jure spectant.) Præter has species est & tertia, quæ Lychnitis & Pelyallus foliis crassis, ad lucernarum elychnia aptis. Et Plinia l. 20. c. 10. Tab. cum Græcis

ffpbaa atfa ramk llZrl r . J fr^l Br⁴* lat^oTM, P'lofa iyc. Siheliri folia F-

partia monopetala (id est, flore constat integro in fundo, etiamsi quatuor sunt pyramidales seu coniformes, brevibus pediculis constantes) bicapsularis: in hisec convenit cum Blattaria, sed illius capsula

Verba* funtmulto ^ I ^ ^ ^ olia imt ^ ^ ZTM?TM! ?TM^l*0 ^ P-iveruknta aut atania, ficutjacea & Scobe inter capitatas pappelcentes; & Malva, Alchæa, Alcea, inter mol-

Pars T A E U L J E I X .

1. *Mm latifolium floribus luteis* arSle caulibm **adbsrntibm** fine i johis angustis interflores axanamibus, nobis. Verbaſcum **Lifolium** **lutwm**, C.B.P. Verbaſcum **mas** iff **Candela regia**, Lob.

2. *Maximum odoratum meridionalium floribus luteis iff albt* arSle caulibus **adbⁿntibus** isrfolih mult is anguſth interflores emanantibus, nobis. Verbiſcum **maximum** **mtridionalium** odra **Incanis** < **turn** litteum is album, J. B. CbSr. Verbaſcum **femina** fore luteo t?iagno, C. B. P. Verbaſcum **lycbnite** minus., Ger. £'

1. Et pulvtruktis floribus luteis parvti rdcematim ptoenkmitibm, nobis. Verbaſcum **pulverulentum** flore luteo parvo, ? . B. Chabr. £

4. *loribus albparvh ractmalimprovementibws, cumfiaminulis itidemalbh, nobis.* Verbaſcum **lycbinite** flore alba parvo, C. B. P. Verbaſcum **fycknjte**, platth. Lob. \$

5. *Perennefloribus luteis racematim provenknuhits'ftamimbm pitrpurafantibusmbk.* Verbaſcum **vigrumflon-ex luteopurpu^{*} rafcente**, C.B.P. Verbaſcum **nigrum** **Sahifolium** **purpureo** Me, Ad. Lob, 0

6. *Papavtristotniadati valderamofumfloribushttekparvkra-ccmatimprovenkmibus, nobis.* Verbaſcum **nigrum** folio **Papa-^{*}veriscornhuhti**, C.B.P. Verbaſcum **'criſpum** iff **finuatum**, J.B.Cbah. \$

•j. *Craſſtonbis[^]nobii.* Verbaſcum **nigrum**, Vod. Trag. Verbaſcum **amruſtifolmm** **ramofum** folio **craſſto**'rt, l. B. Chabr. g

Exp lie at'w part is Tab. nonk SeRionU quint*.

Verbaſatm **foltis** incanis mas latifolium fioribns Iurejs arte caulibus adhierentibus fine tibliis anguis inter flores emaruntibtis, nobis. Verbaſcum mas latifolium luceum, C. B. F. Verbaſcum latifolium mas, Eyft. Verbaſcum mas & Candela regia, Lob. Tapfus barbatus, Ger. **Verbaſcum** latius, Dod. **Verbaſcum** album, vulgare five Tapfus barbatus • communis, Park. Verbaſcum mas, Tab. Verbaſcum hoc vulgare, ad tres vel aliquando quattior cubitos excieſcit, & ex radice alba, craſſa fitis, muſns h'bras a le t-mittente, ca[^]Icm **itidem** craſſbm, fingalietn, reflum, nunc incnivni profert, mine mulcis alls brachiatum, lanugiiiofum incainimque: folia quodammodo **Enulx**, longa, lata, **mollia**, incana, ten incana lanugine pubefcentiatoca, nullo aut brevi pediculo itanat;), majora & **interiora** per terrain ipai la, l'upciora cauli adnata minora, qua: ommt pro xtatx- v. uianr, cjiijedam tomencoia, alia rugofior;], ilia magis pulverulenta: caules, lit) diium, modo fingulares, modo plures bntthiati, liinc tanca /igurarum diverſitas apud^{*} Autlores: (lores intcp,ii in ftindo, fir quinqueſariam in margine diviſi, longo thyrſb plures arte & quail fimul juncti, luctt, odore obſeuro, noningrato, in medio apices ejuinque, d'uo glabri, lutei, reliqui **a16idi, laiwiginoſi**» Horuſ in inleriore ſpicx **parte cadere incipientibus** Iticedunt capſeipyramidales, nmcronatf, **pankluni icidem** liiriuti, bifida; fepto medio **divſitj memorana** (eparante, **in& natricnte, *dnpuccm ſerim feminm, lſinc** unam, illinc **alterim**, minſtorum, tubuſcorum, pari Livicino Icmimpariim. I'Vequertinimcreperitur;uxra • agiorum arborumcijiie margines, aggeres, **ſcrebea**, aiiſque-in locis noncultis. A Inlio menie inAuninum **oibo*** rlorrens repretur.

2. *Verbaſcum foliis incanis maximum odoratum meridionalium floribus luteis & albis arte caolibus adh^{renrib}3 6V foliis mulctis anguſtis inter flores emanantibus, nobis.* Verbaſcum maximum meridionalium odoratum litteum 2n album, J.B.Chabr. Verbaſcum iii (emina fioix **WCO** magno, C & P. Verbaſcum maximum album femiia flore ſubpallido **Lotoleon**. Verbaſcum **lyclmitc** minus, Ger. **Excellit** hvc maximum odoratum meridionalitrai Verbaſcum **fl, m** maenitudine, ita & mulcitutl. inc folio rum, tumetiam odore fuaviori **omnibus Verbaſci** ſpeciebus. Vanecas etſi vidccmiupra **de&ripci connoico, in interſtiEiita-** lluruni **tanta** copia rolioljorum'anguſtorum, miicronatoruiif. jue conſpicitur, ut , n imointuitu

apriore difcerni facile queat; floribus luteis & interdum albis exit, [quinquefarian] m margine divifis, etiamfi flos fit integer infundo; petala exteriora quina arantur lineblis rubric odore fuaviffimo, nee in meris priori communi diilimilis. Flore eft luteo vel albo, tmde dupl- itim Ifonema urhores Lobelias ScGerardus poiueriruffra pro una & eadem plantadiverfi coloris flores edente, Provltit incampertxibus Italiae, Gailla:- Floretafiate, atque verfussotn- ni exitum lemna minuta, fubruffa, in capulis (uis, binis loculamentis diftinfis, gcrir

. f^rta/a^afoliis incanis & pulverulentis floribus luteis parvis racematim proveni- nobis. Verbaſcum pulverulentum flore loco parvo, j. B. Ckbr. Totum hoc Verbaſciu lil- fimo uWetjuaque pulvifculo tandicante, inferius tamen copiofiore quam fuperius, obdudum eit, led qui facile diradipoflit, iuis riorum talycibus caultbuiqui. idantibus: furgit vtro Giulecubita U^a cetiam niyjqre, recto, friato, duro, fractuque conu .ici. meduilamal- bam in le continente, per qaem folia pedzlia 6f lelquipcdalia longitudine, latitudme tere pal- maria & ftfquipalmaria, rugofa, acuminata, paululum in ambitu ferrata, gravis fi Ircenturodor is iapore herbaceo cum tantillo amarore: fuperior pars innumeras ediCpropagines, folii?par- vis vctitas, floribus numeroſis, parvis, luteis, nullo inigni odore donatis onuftas, pediculo brevi nixis, colore autquar nexplicentur partim lutco, partim candido, .proprerpulviculum iub quo Krent, qui expmfiqui injucfariam apparent divifi in margine, inregri tamen in fjin- do, & vulgaris Verbaſci jloribus confprmes, fed iisquadrupjo funt minores, in quorum fm- gulorum medio (lamina & ftilus apurent unicum apicibus mis: quibus fnbveninnt capful^a pyramidales & bipartite, femina minttta, liifca continentes: radix longa, craffia fenla, in- terius albicana, exterius rubens, fapore amaro. Floret intra mornfa Modbelgardi a i>orta des gFavks di&a ad portam propc Caſtillum Junio & Julio; femina perficic Septenib

\$. Verbaſcum tolms meanſioribus albis parvis racematim provenienti boscnm rtaminiiniis kit! em albis, nobis. Verbaſcum lychnite fiore albo parTO, C. B. P. Lychniris^a ift. Lugd. Verkleimi ! ychnite, Matthi. Lob. Verbaſcum Matthioli, Gtr. Phlomos maſalter, Verbaſcuip lychnite Mat- thioli, Lob. Folia hoc edit multa, craffa, hirtata, "Verbaſci ftipi^a defcripti, Tapfus b>ba- tus li&, armula: inter guae cnulis oricnr fingalaris, foltis anguſtioribus, incaats ſcu villoſis vertiens ufque ad liihircatipncm ramorum; Quibus innaftinuur Hores muhi, lurti, minores, ra- riantes (ecundum cerium & folum quibus committuntur: capfuli- fncedont pyramidales, b:fulcat3f, (eptometliodtvi!j:: in <)uibis coneinentiir liinc inde in binialocolamentis lemna mi- nuta, papaverinis leminibus fimHia. Reperitur ad margines filva^a um 6r agrorum. Floret ^aftate atque paulo poſtfemen luum perncit intheſis Lfkapularibus.

5. Verbaſcum ioltis viridilms perenncfloribus luteis racematim provenienribus lbminuli:: purm pafctlitmus, tiobis. Verbalaim nigrum llore at htcu pqrporafcentt, <. B. P. Verbaſi lllll nigrum, Dod. ſefc. Trag. Lob. Icon. Tab. Ger. Verbaſcum ni^arum (alvifialium purpureo More, Ad. Lob. Uicitsic Verbalcaa nigrum, quia Imic fatmratt virent folta, haudquaquam lanuginoia aurmollia. ucprictdenti-j, fed aliquantuhunaſpera, & noſſifflij maveolentia, (cmta in m v gine; magmtodine foliorumqtiani, ciii iud<m ruiBnUrts tai, l:is rclpo KU nt: Hores minores, lute!, itamini]jus & fttlo in medio pt*diri; caplulr pyramidales, bifulci itidwti: nec radix eft diverſa auc multum difterciis. *

• 6. Ferfaſcnmfdus viridiLus Papaveris cornicukri vnldc ramofum floribus luteis parvis race- matim provenienti bus, nobis. Verbaſcum nigrum folio Papaveris corniculati, C. B. P. Verbaſcum cnipum & finuattim J. B. Cluibr. Haic yerbaſcoliratinfina folia per ctram ftrata, ſefqnpal- rncirciter longa^a apaveris corniculati tutei n^a bdo fmuata, dilute virtJltia, paulolorn turluta, fup... que caudus auiztent, breviora, & i^a acutiorem mucronemdcfintnti;), krt he- deracea, pulvere afperfa utrinq, magi. ſcamen inkrne. Videntui nnflo pedicuſt' c: alis pre Q & continua^a jores parvijutei, blattarix Horibus An abfimid«i in quinque ſegmenta in margine diviſi, integri tamen in fundo, it; nitnil)Ui cocidem vilionSi purparalcentibus, medium ejuſdem floris occupantibus, apicibus_ croceis dona: is. Secu- vias in Italia provenit. Floret iftatecam ceteris, & verſus Autumni initium ſemina ad matu- ritatem perducit.

7. Verbaſcum foliis viridibus craſſioribus, nobis. Verbaſcum nigrum, liod. Tng. Verbaſcum 3. Matthioli, Lugd. Verbaſcum anguſtifoium ramofum folio craſſiore, J. B. Chabr. chrum hoc Verbaſcum communicavit D. Agerius Johanni Bauhino collectum, ut aiebat, in ſiria. Folis eit dodrantalibus, uncias duas & ſemiſſem latis, ſpiffis, albis, veluti lanugine pulve- rulenta obductis: caſtilibus, quantum ex portionibus datis iudicare potuit Johannes Bauhinus, ramofis, ut in Verbaſco minore; floribus aureis, minoribus quam in vulgi.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Iceatiores mollium lanuginofirum Verbaſci foliorum drcofto promptwfs cum Man b&morrbol-
das utilher fovent, nam is Jolorem fopiunt, { y ipfas, h&morrhoMm reftccando refohunt' /lo-
res ktei.capilhs luteos tingere poſſe putantur; ecfdem cum exiguo oleo in fi_{mo} aliquot d'ubu*
tiwceratos^ dome videlicet exfolutifuerint, ad htmorrboidum dolorts pqfleriores commandant
Verbaſci dezoRum tolltt ocoloruiA ardorem,fi eo abluantur; ſquaſiilatitia in eos injecJa lucn'-'
mantes exficcat. Dioſcorides in alviprofluvio utiliter cum vino rubro dyi, decoſtuwmte ruptL
convulfis^ is tuffcixh'ri auxiliary dentium itiderp dohres mitigare refert?

HAL LUCINATIONES C A S P. BAUHINI.

Aliorumque Authomm.

Psfy. 240.(01. 2, pi. 1, Verhaſtm. iatk *Salvia*
folia, C.B.P. ſerbaſitum frutumum *Salviſy*
Hum luteo jüre, hub, li ibidem pi. 11» *Verbaſtitum*
an^ujiis *Salvia f&lii's*, C. B. P. Verhaſcum jüvejire
feliisSalvim tenuiſlit, lob. icon. HIT bntc pi antic
neutiquam dicnaa ſmfjint ytrbaſtiſpitics nit autho-
Tibui propter iüctnam tannſſinem foliontm, J'erbaſci
folia acctsk/itcmfujn }t-rbaſ<i amn&fUt.Jtt integer in
futidOfit in *matvne mtinquitſariam dxvijus*, cuiq; de-
ciduQ ſticcedtt tltca ſfimalh tiicapularujtuitta lon-
tittit fmina minutulajtt tidre ejtin ipjis Perb&ſti
mpſtilis, item in l)igitalir,Scn>pl>ulariic, Biattarnr,
CratioU, Nicotian*& Hyo(cy<tMyſ\$ idgtmis alits
tjſſim ctajſij : ſed mm detiamnatm Jtutndnm du-
SritMm tmj/ram, ex libra, naturs de/ampiam; tie-
beat anabilhrfartt, (id ff. ſienim, cttppfullht-
miuahbns, ip/iſque /rrniabns) HrfutM, nctitiqaam
ha bina plant* die ends funt ferba/ci fatties, t., ce-
lunt Cajj). Bauhiatis rcltjitiique: autljprej : ſed cum
vrtritiſatim dijpoſttei gerant jlui es & *capſalas* qmhit
inltidmi'tr *fmina* Sah'iir mere, id *ejf*, *injingulit*
capſu(is,quisqufftrtilmin marline diütſj , jerant
V femnaitt capſul^ fundo, Jucccdentta jiori-
^nkat:sk vtrtteiſatarumplantarumririti Sal-
botius ſiitug feu (ilvejirts diewdjt tſſmt ſpt~

• o «, y idea *Salvite fitvejihii feu ſatsitt obtinehtürt*
"omen genericum a nobts ajpgnatum, -inter gaha-
ris' ve.rttai!atasplatu&f Sidionc adava *txplicandas*.
Culttbet tar noſtri Jiriſta eonjiderntti apparebit
• *uit^f*. D/fl'iſiüſ debjtce intervtrtuiUatasgaka-
tat dttctmus, hſc juſſieiant inprteſcatianta,
lhidtmpl.\\Vcr>aſtmamtoſttlvi<tfalio>CB.P.'
Thhmos lydmitis ahtra 'Syriaca, Lob, Ferba-
(cum ſihtſrt *lii ſi*, Ltivl. ſtrbaſcum lych-
nit iijriacum incawm furn wit ate flora linro-
fohmtani, J. ſi.Cababr. Ibidem pi. tv. *Verhajcum*
i'tlnotitmo*Salviaferio*.C.B. I>. Verbaſcum ſaſ-
Hum exoticam, Lob.Litgd. Horum flat ce/ijlat ijitiuu
petalis bi/idii, a^ue capſalam *fert pyamidaltm*
fo'tiüiüittmpluüima *fmina* minute, nun an a pi-
JhOa in media *taſfulm-*, Lychimlum mort; ergofunt
Lych :!ri, tioa t'rbt.ſni, a ſains nuana lamghit
vbdcH/si »4m hoc etiam <oikcms Lychnidt fenna-
riir, aütſque etiam Lychmdum jpeaebns, auarum
John tomenta tegt folciu. yerbaſrtim ſv. arc a Hore
p j j f . l r k i i) f a r i t *
•it/him nb author/bus niartmmcitut cam na/t/t
demur folia, we floret, *mgra,fatwratt* v'india dtbem
dici.

DE MONOPETALIS BICAPSULARIUS

CAT V T VII.

• - B L A T T / A R I A .

Btattariatn, Plbi.f.z^c. 9. ftc *efyrefit*; eſt fimilh Ithafca *ba-ba^* qux *ſſpe fallitpro*
ea capta, folih minus candidU, catdntltU phtribue, lore farce. Hxcobjeci.i Blattas Lift
conty. ibit, idi'cqite Rom<e Blattariamvocat,4>£t ille. Hoc Vic/chutes t. +.c. 104. Ytrbaſco,
ſihtſiri cui flat tft nitre™, tr'tbuit.

* *B Uttaria* pro nota gencrica miadiftlngntnr i Verhaſco, hanc habeto, vi^, quod (blia fiabeat
iirpltriiüHinimagisviridia, minora ; &c cjiulas rorundiores, loii^ioribua pcttculis mnicences.
E(H colore florum, czralca, alba, [area , vcl gilva : rarionc radicum eſt vel perennis, vcl
annua.

Pars TABULI IX. & tota X. Sectionis quintis.

- :i. *Violaceo nobk. Blattaria flore purpureo, Ger. Park, ©*
 Pmnis < *Flore* (z-Gilvofeuobfolen *Coloris, nobis. ©*
 7. *Cretka incana folik birth conjugatim jiofttis uno majore extremum dan-*
dent^nobh. Verbaſcum Jrutkofumaur Kulatum, Pon^fal. 0
 I^ *Cretka Pilofa foliis Unk conjugatim pfttk uno majore extremum dattdente,*
.. nobk. Blattaria pilafł Cretka Arftut quorundam^f.B.Chabr. 9
 l. *Ramofa floribntiteklaminulk purpureis, nobk. Blattaria Plinii, Hod.*
*Ger, obf. iff Icon. Lob- Verbaſcum nigrum^ Park, ¥ **
 Annuat! \& *Minore luteo vel alin flaminulu purpure'is, nobk. Blattaria flore*
 \ *luteo, Ger. Par^ Blattaria Intea, J. B- Chabr- 5*
Flore j - Majore luteo iff capſwla itidemrifajore, nobk. Ejufdemvarietatma-
 1 *j^0 T <£fM<* acukata. 9*
 Blattaria (*S.Cretica ftttofafoliis Leucoidi incank^ nobis. Blattaria Cretka (p^trwfa, Park-*
 Exotica \ *Uucoium Creticum finofum, Cluf. Hift.*
 (9. *Ragufiana incana multifida, nobk. Blattaria incava multifida, Botcon.*
 ^, |~io. *Glabra communh folio hcuto, nobis. LyfimadAa fpieata*
 Major *purpura forte Plinit, C. B.P. Lyfimachia purpuna commu-*
nis major, Cluf. Hift. ©
 [11. *Lanuginca folio fuhrotundo^ nobk. 0*
 Rubra fpieata 12. *Minor, nobis. Lyfimadna rubra nanfiliquoja, CB.P. Lyfwiachia*
*z. vel minor florerubro, Cluf. Hijk o**
 13. *Minima pluribus cauliculk procumbent (bus, nobk. Lyfimachia It-*
nifolia f>urpuroc<eru!ea, C. B. P. tyftmachia rubra m^minu, Cluf.
Hi/l. o'
 \ia, *ftfa]or, flpre luteo, nobk. *Lyfimachia luh'a major qu<e Viofen-*
ridis, C. B. P. Lyfimachia lutid, Cluf. Hift. 0
 Blattarix aff^U *fhma* 15. *Minor flore ttittofolip punftis nigris notatit, nobk. Lyfimachia 5.*
five, minor lutca, Cluf. Hift. 0
 16. *Bifolia Uvis flore atbo Epixmeron ditld, nobis. Epbemerum vel*
potius EpbtrmTumfpitium^ Dod. Ger. ©

Explicatio partis Tab. non <e iff totia decline.

1. **B** itf//jrwpcreniis flor violaceo, nobis. Blactaria fioicpurpiro, Park. Ger. Blattaria
 jflor *CEXMCO* vel purpureo, J. 13. Chabr. Folia mnkahabet perterramfrata^mccltQ-
 encer hta, acrovindja, abfque ferracura ulli in margint; ex querum mediooriuntnr catiles
 plures, cubitalcs j media parte k-re, furfum vcrfus ornantur floriUis inpgriſ in lundo
 qainquetanam in marginc- diyifis, longis pedicolis innirenribus & nuius difppfitis, col
 purpurei com «aminnlis aurei coiofis: radicem hake pollicarem, mukia fibria ab cadem
 proaetinnous clonata.

% S r "I" Pereno 1 > flor Si^TM f « obfoleti coloris, nobTs. Folij *hnjra fmc* mult., ma-
 amplos,
 "eraneosfeodaatcrabeUos gilvos, imegrosinfundo, ouio-

^ *Bbt*k percennkCretica incana Foliis binjs conjugal p3fti3 ono majorc extrnnam,

claudente, nobis. Verba cum fruticofumauriculatum, Ponce Ital. Folia proferr longa, pedaliafere, alternatim ex caule exeuntia; appendicibus five lobis binis e regione costam' amplexantibus, quinto folio in extremo costa? maximo; omnia folia praedi&a, incana lanugine crassa fuht obdn&a, ta&u dura & piofa, ficut caulis, qui rotundus, bipedalis & alismultis è foliorum finibus prodeuntibus divifus : flores in funamo caulis & alarum proferr, kd in caule prius, deinde in alis, itautdiutius floreat: ab imo incipiunt flores expandi (ut in caeteris hujus & Verba fci fpeciebus) • qui magni funt, pollicari diametro, colore auri hilari, integri in fundo, quinque parriti in margine, purpurafcentem habentes umbilicum & ftamina lutea, hirtutie magna, tenuiffima, purpurafcente praedita; quibus facieentibus. fuccedunt capfute rotundas, bifulca?; in quibus hinc inde femina exiguum, utin caeteris, continetur. Floret Maio. Planta eft perennis, nova femper ex imo germina, proferens, & propter ftiores hilares & diu durantes hilaris ac venufta eft planta. Oritur in Creta teftè Honorio Bello.

4. *Blattaria* annua Cretica pilofa foliis conjugatim pofitis uno majore extremi miclaudente, nobis, *Blattaria* pilofa Cretica arftus quorundam, J. B. Chabr. Verba cum foliis fubrotundis' flore *Blattaria*., C. B. P. & Prod. *Blattaria* Cretica incana rotundo laciniato folio, Park. Hujus caules funt rotundi, hirtuti, pedalis & *fefquipedalis altitudinis; quibus adherent folia alternatim fita, & per binos lobos ex adverfo pofita, uno extremo reliquis quintuple majore claudente costae feū pediculi extremum (omnia folia hujus incana lanugine obducuntur in meridionahbus regionibus, at in frigidioribus hirtutie tantum fcitent) versus medium caulem in ramos brachiatur, quibus adhaecuntur flofculi lutei, parvi, ceterarum more, longis pediculis innitentes, quibus iubveniunt capfulae minores, rotundae, parvae, itidem bifuleae, continentes hinc inde a latere fepti medii duplicem feriem feminum minorum, fufcorum aut fubnigrorum; cum flores & capfulae feminales, turn femina minora (unt. Videtur mihi diverfa planta à praecedente, cum praecedens Columnas fit perennis major, haec etiam annua minor. Provenit inters faxa & muros in monte Baldo.

5. *Blattaria* annua ramofa floribus luteis ftaminibus purpureis, riobis. *Blattaria* Plimi, Dod. Ger. Lob. Obf. & Icon. Verba cum nigrum vulgare, Park. Hujus folia obfeure virent, hevia funt, haudquaquam lanuginofa & aliquantulum replendentia, oblonga, & per margines ierrata, minora quam Verba fci -multo: caules reai, in alas divifi, breviores quoque funt, quos fuperius conveftiunt flores, ut plurimum lutei, minores, ftaminibus aliquot in medio purpureis & hirtutis, non nihil odorati, • fubinde tamen dilute rubentes, autobibletio colore purpurafcentes, quandoque & nigrae Violae eleganti colore nitentes: quibus iuccedunt duriufcula & rotunda vafcula, majora quam Lini, longiufculis pediculis nitentia: femina vero in duplici loculamento nigricans, minutum: radix dura adnatis fibris tenuibus. Paflim in pluribus Italiae, Germanic utriufque locis juxta aquarum margines, in lutosifaggeribus, & haud longe à fluviorum ripis provenit, & «quidem qui lutei coloris frequentius, purpurei rarius, Violae nigrae coloris florem ferens juxta Albim in Bohemia reperitur, & femel fata facile deinde fingulis annis in hortis redix. Floret hxc *Blattaria* à Junio in Septembrem ufque: femina interea perficitur. Videtur mihi *Blattaria*? fpecies, primo à foliis obfcure virentibus & replendentibus; aft certiere indicio a pediculis longis & capfulis rotundis quae indigitant *Blattariam* fecundum doctrinam rifeftam.

6. *Blattaria** annua flore minore luteo vel albo ftaminulis purpureis, nobis. *Blattaria* flore luteo", Ger. Park. *Blattaria* lutea, J. B. Chabr. Hujus folia funt longa, angufta, ferrata, mucronata, obfeure viridia; caules funt bicubitales, in fumma parte ramufculosedentes; in lummis caulium longis pediculis innituntur flofculi raro difpofiti, lutei, in Kgri in fundo, quinifegmentis rotundis divifi in margine, in quorum medio dint ftamina quina, pilis purpureis tecla, - quibus fubveniunt capfulae rotundae, bifuleae, calycibus quinquefoliatis infidentes, inque capfulis duobus loculamentis diftinftis continentur femina plurima junfta, hinc inde adharrentia fepto medio adhuc viridia, exficcata fufca à feinvicem fejunfta, Papaveris infar. Planta eft annua.

7. *Blattaria* annua flore majore luteo capfula itidem majore, nobis. *Blattaria* flore amplo, Ger. Lob. Icon. Lugd. Bktaria flore amplo, J. B. Chabr. Haec folia habet laciniata & profunde ferrata, viridia: amediocaulae dejuide mci mas obfervatur foliolum anguftum, non ferratum: ad oppofitionem uniuufcujusque pediculi floris cum caule, atque ex finibus fbiorum, exeunt flores curtispediculis innitentes, fatis magni, coloris aut purpurei aut lutei, binatim aut ternatim fecundum fpicam fiti. Planta eft biennis feū bima; pofquam femina maturuerit, perit.

8. *Blattaria* Cretica fpinofa foliis Leucii incanis, nobis. *Blattaria* Cretica fpinofa, Park. **Leu-**

Lencioium Crecicum fpinofum Cluf. Hift. Glaftauida i. Cretica, Port- leal. Glaihwida Cre-
 tenfum Belli, Ep. -j. & ad Cluf. Cluf. ap. i- Blatcaria hare (pinofa crefcit ad altitudinem
 cubitalem & bicubitalem, furfum verfusin plures ramuicubs, duros, liguolbs fparfa, qtuos
 cingunc folia confertim nafcentia, incani & cineracti coloris, per oras laciniata, fimul & den-
 tata & iparfim in raiiulis multis fuperioribus flores fiavos fert, integros infundo, quinispe-
 talis, (ubrocundis rnmarginedivifos; in medio hmina concoloria profert; rami pcedicri ini-
 tio fati funttenelli, paulo poll tamen duri, lignofi & Ipinofi evadtnt; floribus emarcedi. s fuc-
 cedunt capfuls rotunda?, bifulca:, Jongiufculis pwiiculis inokeotes (hocarpichanc plantam
 effe Blattariam, noa Verba fcu: n, cx do frinanoftra; mufro minus Lcriicoium ut vult Clufius alii-
 que authores ipfitm fequen. es) conti nentesie mi naminata, pi uri ma, fulca, diiobus locula men-
 tis tsvfa, feptomsdiodiriroeneeduplicem firiem, hinc unam, illinc alteram.'

9. *Blattaria* Ragufiana incanamultifida, nobis. *Blattaria* incanamulrifla^ocon. Flores,
 capfuli & femina lujus Blattariameife arguunt .• folia vero magna mukiplicilms^ protundis di-
 vifioni! nis incifa, colore viro recandicantia; Abfyitthii l'ontici vulgaris fbliorum aiqna Cenns
 rmula. Ramnm iniicum hujus planti abfque radice habumius (tnquit V. Boccone) a Jo-
 hanne Maria Ferro Veneto aromatario, qui Ragnfa alkitum effe aflirmabat.

10. *Blattaria* rubra Ipicata major glabra communistolio acuto, nobis. Lyfimachia (picata
 purporea forte Pini, C. 13. P. Lyfimachia piirpurea communis major, Clffl. Hiih l' laidoly-
 fimachium purpureum alterum, Do > \: Lyfimachia purptirea, Lob. Cxi. Cam, Tab. Lyfima-
 chia purpurca fpicata, Ger. J. B. Chabr. Foliabina, g[abra, atiquandoterna, rariusqi LKLi n; i,
 caulem ambient: caules promit rectos, bicubitales fere, quadrangulares, articuhtos: fopa,
 intjiiam, t fingulis geniculis bina, glabra, ex adverfo locaca, pblonga, acuminata, ad I \li-
 machii verae lutca: folia fati accedentia : Hofculi fiiperiiscLiui^ni ad fenaipedalem longit^
 dinem vertici Hatim ambicntescernuntur Sf fummuni caulis vdliunr, intqgriinfando, qairi-
 quefariam ueplurimum, 11011 nunquam fi;n iam in margine prorunde (adsdivifi, colort- tkganti
 rubences: femehsradquaqaoinmfiKqnia qnadrupartiris, lanigeris, Lyfinrachii fitiquola; mo-
 do ; fed iithtcis oblonginfculis bipafinario DS, Blattaria: forma & ritu, duobus locumen-
 tis di [binftis, liinc indc: radix cralTa, dura, foris nigricans. Planta hccdurabiliseft naturae,
 fitlocis ex itaquofis, joxtanpasrluminum, & *in shis perindt humidis. Floret Julio 8f An-
 gufto, Autumnoleminaincapfulis bi fu Icis pe 1 fie it more abarum Bbtfariartm.

ix. *Bktaria* rubra fpicata major lanuginola foliofubrotundo, nobis. Hic Uluctaria no-
 bis fie dicta, a deckna pno redttert, quod fitfoliis fubro[undis, incanis ; niulibus itidtm la-
 nuginofis; Lyfimachii E autem purpurci communis Clufii folia iint glabra (itemcauks) ob-
 longa, mucroiaca, crteraei par.

12. *Blattaria* rubra fpicata minor, nobis. Lyfimachia rubra non BUquofej C B. V. Lyfi-
 machia teennda vc+minor, vd minor fiore rubro, Clnf. Pan. Lyfimachia purpurea
 minor, C (ff. Hilt. Hie eft Immilior & decima multo minor, pedalc m & fdqui-
 pedalett altitudinem raio fupcnms: caules illi teneriores, oraciliores, , [lj: , ttfa, iguli cci. im,
 fupiore pane cauKs in plures ramosdivifa, (^ ad » crfo j m t T k Ivlii. LIU. s. f o ^ VII! garis
 maions multo minora 8r angoftmra, fibiinvkcm oppofita; fi mordannir lenra & gum mofa
 fnnt, deinde nonmhil acrmionia: & • amantidiiiis exerentia: qiir vero in fummis ramulis
 nafcuntnr, conFufuni habenc ordinem, neque ad cobarbatosant verticillorum inibram-
 bientes lummtcattm caiihum, hexapetalos qiafi; ttiamfi integri fint in hmdo, fex tamen pet-
 is videntur confarc extenus, colore rubro, fhmimilis ex umbilico prodenntibus: radin dura,
 lignola non repens utlapcnons; fed ex todem corpore multos catiles fingnlisannis pi
 rens, & lubindclateribiH k propagans, multis Uriftern adhxrtis. Hrovcnitmi; itis Pan-
 nonta: locw mpratis humidis & Danubii infulis, frequentinime veto ultra l'ofonium vuko Ptc-
 maturefcit Augusto & Septembri.

13. *Blattaria* rubra fpicata minima pluri bus caul iciliis proaanbentibra, nobis. Lyfimachia
 linff« a purpurocarulea, C. B. P. Lyfimachia: i rubnnuii Di. i, Chtf. Hilt. Hxcttodrantaliscu
 altitudinis & itatim fecundum radicem ramulos in luttia tundit, p\ aciles, virides, frequen-
 tibus foliolis anguftis, inftar foliorum Lini, fed lzvioribus obltos: inter quos nafcuntur! fin-
 gulares, nterdum gemini calycali, longiufculi, qial« fere ID Lyfimachia rubra minore: e
 quibus emergit fofculus, integer in tundo, a" ia« targim q unis quafi petalis conitans, ex pur-
 purco caruleis: quibus defluentibus fuccedunt cjpitula mn- ra brancea, bifida, cal, ulis 1"
 * clufa,

clufa, exili teminecandicante plena: racix longiufpula, fufca, aliquot fibris donata. *Uin* fponte proveniat incertuA: at a D. Mera accipiebat Clufius.

Bhattari & affinis plants major (lore luteo, nobis. *Lyfimachia lutea major* qua? *Diofcoridis*, C. B. P. *Lyfimachia lutea*, Cluf. *Hift. Trag. Fuch. Ad. Lob. Cæf. Tab. Ger. Eyal. Lyfimachium legitimum*, Dod. Fruticofa eft hsc planta, & multis cauliculis affurgit re&is, plurima parte rotundis, nonnihil angulofis, geniculatis, -duos aut tres pedes altis: foliis ex fingulis nodulis ternis quaternifve oblongis, anguftis, Salicis fimilibus, ambitu haudquaquam incifis: flofculiinfummis alis exeunt umbellatim lutei, quinis petalis iubiotundis in extremitate confantes; quibus fuccedunt capitula rotunda, quadrifariam aut quinqueforiam fe aperientia, parva, ^v *Coriandrb* feminibus magnitudine fimilia; in quorum fingulis loculamentis plurima femina continentur, minute, *Blattarias* feminum omnino semula. radix tenuis per obliquum (erpat,& in pluribus locis circuracirca radicem principalem progerminat. In paluftribus & aquofis juxtq rivulo5, fcrpbes, aggeres, ac margines agrorum aquis madefieri (blitorum gignitur. Junio Juioque florens reperitur, iemine pragnans Angufto & Septembri.

i\$. Biattaru affinis planta minor fiorelateo foliis nigris punftis notatis, nobi9. *Lyfimachia lutea minor* foliis nigris punftis notatis^ C. B. P. *Lyfimachia lutea altera*, Cluf. *Hift. & Pan. Lyfimachia* in alis roliorum dorens, *Cxi Lyfimachia* 3. five minor lutea, Ciuf. *Hift.* Habet Hxc pedalen Aaulem, tenuem, friatum, cavum, nullis nodis feptum ab imo, brevibus binis foliis, vel potius vaginulis, ad fingulos nodosex adverfo nafcentibus cinctum, quas circa medium caulem paicuntur longiora iunt, angufta, tenella, exviridipallefcencia, tenuibus quibusdam venis oblique fefta, ex quorum finu enafcuntur unciales pediculi, tenues, fuilinentes florum mufcoforum, quinque parvis fliivis petalis conftantium (prodeuntibus ex medio Iongiufculis tenuibus ftaminibus cum apice aureo) veluti fpicam: radice nititur longa, hac iliac le* fpargente, ad cujus internodia irequentes crefcunt tenues 6c quafi capillares fibrae, quilibus plerasque aquaticas itirpes donatae funt; adnatis fe propagat. Nalciur haec, *Schilickjo* referente, in locis riguis ad *Alpium Kanfbumo* vicinarum radices. Eadem eft cum *Lobeii Lyfimachia* in *foffis Gandavi* e regione palatii principis. In *Hollandia* circa *Amftelodamum* magna copia inter arundines, &c.

1 6. *Blattari* < *eafin* s planta biolia kvis, florealbp Ephemeron, nobis. *Ephemerum*, *Matth. Ephemeron* vel potius *Ephemerum fpurium*, *Dod. Ger.* Hxc planta *Blattariae* iinis nobis *Tevidetur*, quia foliis prodit oblongis, latiufulculis, verfus caulemdurinfculis, glabris veluti Ifiitidis foliis, fed tamen minoribus, cingentibus ad genicula cauliculos complurimos, rotundos, altos fatis, non fine adnatis aliis minoribus: quos fuperius fpicatim conveftiunt candidi flofculi, quinque petalis confantes, haud niagnis, fingulis in extremitate fubrotundis, (iiccefiive a medio caule ad fumum prodeutes & feexpandentes; quibus fingulis fuccedunt capfulae rotundae, quinquifariam fe&x, ieu quinis loculamentis diftinfte, atque in fingulis plurima femina minuta, **nigra, continentur Blattari feminum rito.** *De facultatibus Blattari nihil Plinius. Sapor antan ac amara ejus qualitas gufiabilh calidamiyficcamejfe Jftantur.*

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authbrum.

"JP\ Jⁿ. 239, 240, & 241. *Caſparus Baubinus* collo-
Iⁿ cat yerbaicum & Blattariam inter Horminum &
Fjbiopem, Galeatas verticillatas plantas, O¹ male,
cum Horminum & Mthiopsis fpettent adgalcatas ver-

ticillatas, yerbaicum & Blattaria autem fint mono-
pet alebtiapfflure, alebuene iijitur ajfociari fibi Ji-
ilib nty ut nospr Jtitimus habita ratiidiflorum &
capfularum.

DEMONOPETALIS BICAPSULARIBUS

CATVTHIT.

NICOTIANA five TABACUM-

Nicotiana a *Johanne Nicotio Regis Gallic Conciliario* dicta, cujus opera anno 1560. Gallii innotuit, quam Vlyfipone, dum legati munere fungeretur, a *Belga* e *Florida* Infulare duce alatum accepit. *Tabacum* ab e)u* nomink *Infula* dicitur, tefie *Monardo*.

Nicotivi c nota generica hacc efto, quod flores longiore tubulo confantes habeat, integros

infuiulo, magis anguloibs in margne, qjinqe etiam pliris angulofis promirrentibus (prarter lerriam qui Hyotcyamus lutetis elt;) floribus evanescencibus fingTilis fingula- fucedunt capfularoblongs, tumidx in medio, extenui principio ecalycequinquefoliato herbaceo & in tenuem frufumverfus mucronem definentes, fepcoduplicate arfte fibiinviccm adha:rente& ieparanre duplicem ordinemlemmtimminutorum, lubbjlcorum verfusdorfnni uniufcujufqne fepti medii.

Pars TABULA XI.

Nicotians	} <i>Longifolia feu folio mucronato acutv</i>	} Major	1. <i>Latifolia^ nobU. Nicotiana major latifolia% C. B. P. Tabacum latifolium, Cam. Eyft, Pawn latifolittm, Cluf. ad Monard. 5?</i>
			2. <i>AMguft'folia, uobit. Nitotiana major angujlifolia, C. B. P. iff Eyft. Tahauum anguftifmtm, Cam. Fetumangvft'ifol'mn^ Cluf.adMennrd. \$</i>
			3. <i>Minima, mbis. Tabacum minimum^ Cam. Paum.-5. Cluf. ad Monard, \$</i>
			4. <i>Latifoliafeu (Minor capfula rotunda friapi formafloribus luitU minoribiisfoliis folio fubrotundo i rctundk ohtfurevirentibut glutinofis, nobit. mcoriana minor feu (. Hyafcyamus luteits, Eyjl. Hyafcyamus luttus, Dod. Cam. Ger. \$</i>

Explicatio partis Tab. undtcimq StSionk quint a.

1. **N**icotiana major latifolia, C.B. P. Nicotiana major, Tab. Tabacum latifolium, Cani. Eyft. Hyofcyamus Peruvianus, Dod. Cam. Ep. Petumlatifolium^ CluCad Monard. Sa * fanfta Indorum, Ad. Lob. Ger. Tornobonia quia ajjTornobono niila, Cif.. Vppowcc indigenis Virginix. Caules ad tres vel plures cubitos non raro attolluntur, ramis nonnullis brachijs, qui loliis noniullaeriam conveftiunttir latis, oblongis, acuminatis, majoribusquam Intei Hyofcyami, mucronatis, OxyLiparhifere fimilibus, latoribus, mollibtis tamen & dilute virentibus tenuiterque hircucis, quiquandoque caulific sdharrent, ucipfum ampltfti videamar, alia se pediculo non exiguo prominent, vifcofautmelle illita vidcanrur cum canlistum folia : (lores oblongiore forma, inrus concavi, integri in fundo, fed longiores, tnbittntar, in margine patnciores, quam Hyolcyami lucti, in ambitu leu margine qmnquangularcs, colore dilute uliquando dihitius rubclio & in margiHe propcmo dimalbicantes.- vafcahbicapfularia, fepto mtdiodiicriminace duplicem, ordinem feminum minucorum, numeroferum, feminibus l'apaveris multo m'morum. Ex America:, quam Indiam occidentalem vocant, pros-inciis, inter quas *nq/pPeru* est (quin & non multis abliinc annis in Virginia, copiole colimr ab Anglis illic »abitantibus, 6V populo Septentrionales regiones habitanti aftattm inde fubpeditttir) in taro p^aTM primevenit. abihortia fatis relicitr adolefcit, Septmeftri nut Oftomeftri fpacio ad ablolutionem feu nwturitatem perveniens obfervatur. Stritur Vere, fub Julian) aat Aogultum aut quandoqne fertis flores edir, . poftca Autumnofcmina ad maturitarem perducit. z. *Aicotiana major anguftifolia, C.B.P & Eyft. Tabacum anguftifolium. Cam. Tabacum ajcerum minus, Lugd. Hyofcyamus Peruvianus minor, Dod. Petum anguftifolium, Cluf. ul a^ola^a [Jⁱ]. Tabaann five Herba fancia minor, Lob. Icon. Humiliore caulis 6; foliorum **habiW** ^"guitiore diftert a priore. Hujas **fectmd*** foliaplernmque in acuiorem mticronem abtunt **wntf** ^{o C; III, ann} tuntur: Horum **qaoqoe** p^proventu locupleiore, eorum <ue*co!orc mtitulum ^{vui} g^us licrbariorum huic feminas, uc Nicotianae latifolia **majoris maris** assignat.*

3. *Nicotiana minima, C. B. P. Tabacum minimum, Cam. Tabacum five fana Sancta minima, Lob Lugd. Petum i 7. Cluf. ad Monard. Hxc Nicotiana minima, **folhs** est Hyofcyami *** i Dodo'nii **macronatis**, anguftioribus pediculis adhirentibus: floribus minoribus ^' q^{nto, przdif} **tis** non obfimilibus, fatuianus purpurafcentibus, quinqucfariam in **margi**^ itidem divifis, **leaproltmdjus**: dodranalis elt herba, Jacic aczteris nondiverfa, **nffi** qu^ fit minor, eodem etiam **tervido virenttqof** 7^olru prrdita. **Eft & alia minim dodrantali**^ fac: etiam a ceteris vix **mu It um differetts, nifi quod Hofculi Hyofcyami** lure i multo fir nU* **norcs** « flavo herbaceo itidem: folia Doromci aut Plantaginis anguftifoliz, minora & angu^h **ora** Palmonariz: radix **pufilla, fibrata.***

4. Nico...

4. *Nicotiana minor*, C. B.P. *Nicotiana minor* feu *Hyocyamus luteus*, Eyft. *Hyocyamus luteus*, Dod. Cam. Ger. Multo humilior est *Nicotiana* primâ feu *latifoliâ*, cubitalis, aliquando altion caule conftat rotundo, pingui, leviter hirfiito, faturatius virente; in quo folia Tubrotuïda, pinguia, vifcofa, utquafi meile glutinofô obduci videantur, & parum etiampilofa, Solani furiofi foliis haud abfimilia: flores in dentatis foliaceis calyculis è alabafticulifve, qui quinquefariam in margine finuofa, e flavo languidiorem pallentemcoloreTninduunt *Nicotianæ* *latifolias* floribus muko minores, minufque patuli, abfque mucronatis angulis plicantibus, inquinaobtufolabra divifi: hifce deciduis fubrotunda capitula fuccedunt in fummo priapum omninoreferenda, (unde âquibufdam, ut Gefnero, *Priapeia* à fructus forma dicitur,) lividopallefcantibus feminibus, *Nicotians latifoliae* feminibus majoribus^referta: radixfubtus demiffa, annua, fibris lateralibus multum obfidetur.

TEMPERAMENTLIM & VÍRES.

Nicotiana calida {yficca est, isr quidemfecundo or dine exfententia Nicolai Monardis. Adeft el narcotica feu ftupefaciens-vis^ turn isr per albumpurgatoria, nee non, ut Monardes feribit, al&xi-pharmaea qu<edam; faporem mducit, mentem emovit, is fimilem ebrietati confitutionem adfert velfolofumo accepto, ut teftatur Andreas Tbevetut, cum fit calida is- ficca *Nicotiana* in fecundogradu: itaque calefacit, refohit, mundificat is aliquantum aflringit, ut ex frequentibus qualitates judicare licebit: confert enim ad cephalagiam, hemicranian, tetanum, dentium dolores: peclomvitia, lienis is jecoris obftrucliones, cruditates ventriculi, ventris tineas, nephritides, fuffocationes uteri, articularum dolores, perniones, venena, polypum, pdagram, impetigines, capitis fcabiem, aftbma, famem, fitim, recnationem is alia innumera, ut diffufius docetur apud Jchannem Bauhinumpag. 262,263, is 2.64. Tluraqui voletdeviribuTabaci feu *Nicotian**, petat ex Raphaels Thorn^bymno de Tabaco, is Michaeli* Neandri *Tabacologia*. ^ Qui vituperia Tabacivoluerit, confulat commentarium Simonk Paulideabufu Tabaci isThiepag. 32.

DE MONOPETALIS BICAPSULARIBUS

C A T V T I X.

H Y O S C Y A M U S .

Y° w ^ *Dio/coridi* l. \ c 69. id est, *Faba fuilla*, vel *porcina*, quod apri ejutpafu refolvantur iff convellantur prsfenti mortk periculo, nifi aqua copiofa ftatim Ifork is intus polluerint, ut *Mlianu** prodidit. *Dioscorides* differential trespropofuit: unamfeminenigro, floribu* penepurpleis: alter am femine fubflavo, fioribus lut eh \ tertiam mitiffimam, candidi ftork is j'emink. At *Vlimm* I. 2 5.c. 4. *Afollinari* generaplura funt; unum femine nigro; alter urn candidiws-. tertium *Irionk* femini ft mile : quart urn candidi feminis in maritimis'. item tuffifemink.

Hyocyamus est planta monopetala (ideftfloremintegrum in fundo habens) quinquefariam in margine divifa, atque fingulis floribus fatifcentibus fuccedit capfula quinque pungentibus apicibus donata, cum operculo bullato, prona parte convexo, fupina concavo integente eandem capfulam cylindriacam, continentem plurima femina, mine nigra, aut fubrufta; nunc alba: atque hifce notis quam facillime diftinguitur generice à *Nicotiana*, cum qua plurimum habet alioquin affinitatem.

Pars T A B U L £ XL Scffionis quint*.

U. Niger vd vulgaris, C.B.P. Cluf. Hift. Hyofcyamus niger, DoJ. Hyofcfcntts I vulgaris, Eyft. ?

(i. Major vd^ViofcQrtdis is 4. Ptim'u C.B.P, Hyofcyamus alhus, DoJ. Albusj Matth. Ad. Lob. Lugd. Eyft. Cer. £

(.3. Minor, C.B. P. Lob. [con. Hyofcyamusalbasvulgaris^Cluf. Hift. <£ ("4. Major, C. B. P. <jr Frod. Matth. ed. Bauh. Hyofcyamus Craicus alter, Cluf Hift. &

Luteus Cretans < 5 Mmu c.B.P. Hyofcyamus 4. vd Crakus albus., Cluf. I Hift. 0

Hjefcyamus

- 6. Syri&cuiy Cam. J. B, Chabr. Hyofcyamus
- fieri riibdh\ C.JI. P. Hyofcyamus peregrinoftort rubella^ Cluf Van. 5

Flore rubella vd purpurafwte J 7. JEpyihcut caulkuh fpnofiffimU^nobU. Hjofcyamus cauhculis fy'uw Jt C B, P. Hyofcyamui JEgyptius, Cluf. Hift. Hyefcyamu: j_ cu^iatit< flanpur purafcent e.)'B.Cbabr- \$

B.Flore variegato, nobis. Hyofcyamus albas /E^y>tm, Profp- Alpin. tie Exct. Hyrfcyitmus albus VeJIHngii in Proff. Alpin. '\$'

Explkatio partis Tab. ttndedfftd SeBknis qu'mtdt.

¹ - T " " Toftyamts vulgaris vel niger, C. B. P. Hyofcyamus vulgari, Eyft. Hyofcyamus niger, Dod. Ad. Lob. Ger. Hyofcyamus niger Tulgaris, Cluf. Hift. Apdtbaris, Cordjtt i. Hyofcyamus hie vulgaris niger diftoa Fafea fuilla, Dens caballinus, Cxi. Al Sj Herba Apollinaris, Cam. E radkc albicante crafla & parum fibrofa proven it caulis crallus, ramofus, cubttt procerior, villofus, quem irapari fitu vdiunt oblonga, pinguia & quidantnus tannginofa tolia, marginibus laciniata, & divifuram Pcdisanlcnniicti Atriplicis titoltircferentia, lummum ejofaftiginmcontractom, fecxplicans in*tr rblia, cam in c.ule, T ani adnatis laceralibas fciatim promit flores circa unil>ijicim purpuraicentes, c tiavo os, 6c van is oblolece purpnafectirium nervulorum rcfitxibus & gyris obfitea, foetidi ttmirm, quamcoupLnrii, odori: lios emarcidosexcipiunt Balaufii forma va ngii tcretes, ventricofi, ftrptme (pro ratione pttaloram florum ; (inriulculo occufi^ 2 ' ? ' ' tmlas cnfpWacaa rigences dirempti& opercnlo rocuntlo,

paverum feminum colore, depressa, exigua, copiofa, fepto medio difterminante plurima pradi&ta femina hinc inde. Pallim in neglectis ruderatis & fmetis prope villas reperitur. Floret Junio & Julio menfibus ; semen perficit durante autumno.

2. Hyofcyamus albus major vel 3. Dioscoridis & 4. Plinii, C. B. P. Hyofcyamus albus, Dod. Matth. Ad. Lob. Lugd. Ger. Eyft. Hic facie germana cum Hyofcyamo vulgari cognitionem prodit, foliis licet latioribus fit & rotundioribus, tactuque veluti oleaginofts, mollioribus, hirsutis & viridibus : flores pari forma & fitu oriuntur, ni. nores & alpe aibefents»: feminum quoque calyculi respondent, fed citra rigentes culpidcs; funt autem in albis granula ciora, depressa, scabra, feminibus pradi&ti m?g« pa«cfcenria ; exqoibiis ecleri ortu, M& quo fatus est anno, sese perficit, & semestris aut lept. mcftris est vitr-Hunc maririma rmlcra afj-e- przfercim ubi Rh in mare influit, alunt: citius floret priore, citiusq; semen itidem perficit.

minor, C. B. P. Lob. I^otl* " y^0 ^ 1 " ^ albus vo^aris, Cluf. Hi* Foliis cftcandidioribus mollioribusque, nec ita raciniat, fed potius finuofis, brevibus, ta t'fcr aliis, longiore p ediculo fultis : flores illi albi minor lures & laviores.

4. Hyofcyamus IHECM Creticaa major, C. B. P. & Paod. M. a^«i-Banh. (atdiboi efl cubitaibus, ramofis, rotundis, molli lanugine o circumfo s, hirsutis, longo pediculo donatis, ex q^ « peditdi l_aniginofi ex liirgant, flores fultinentes ex calyce hirsuto, in q., inquc apices fctfo> prodeuntes, oblonges, Lamii

Lamii Melyffbphylli forma, quinquafariam divifos ; ex horum medio ftaminaquina purpurafcentia, apicibus flavefcntibus & cum ftilo oblongo ejuſdem colons, eſteruntur: fioribus dilapfis- calyces indurantur, quifemen minutum, fubruium continent. Semen hujus Cafaubona accepit Johannes Bauhinus.

5. *Hyofcyamus* Creticus luteus minor, C. B. P. *Hyofcyamus* 4. vel Creticus albus, Cluf. Hiſt. Tota hæc planta mollior & tenerior Hyotyamo albo jam deſcripto: folia longiorepediculo ſunt innitentia, molli lanugine prædita, latiuſcula, minus finuofa, fed magis ferrata, vitiginea quaſi, minora tamer* & teneriora: ramos habet candidiore lanugine pubefcentes: flores profuſe aureos, interne circa umbilicum violacei coloris: radicem fatiſſimam Napi fere inſtar. Perennis ne eſſet, an non, nihil ſignificabat Jacobus Plateau, qui ejuſdem femina ex Creta habuit, eundemque coluit.

6. *Hyofcyamus* rubello flore, C. B. P. *Hyofcyamus* Syriacus, Cam. Hort. *Hyofcyamus* peregrinus rubello flore, Cluf. Pan. *Hyofcyamus* Syriacus, J. B. Chabr. Hæc planta rara a Paludano ex Syria delata, profuſe cum-ſequenter convenit, foliaſteriorum latitudine difcrepans. Ipiſſima planta, teſte Camerario, plerumque Iconis quantitatem quinquies in ſe continere deprehenditur.

7. *Hyofcyamus* iEgyptius cauliculis ſpinofiſſimis, nobis. *Hyofcyamus* iEgyptius cauliculis ſpinofiſ, C. B. P. *Hyofcyamus* /Egyptius, Cluf. Hiſt. *Hyofcyamus* peculiaris flore purpurafcente, J. B. Chabr. Cubitalis eſt hie altitudinis, ſubnigrae digiti craſſitudinis; caulem acquirit in hortis firmum, molli incanaque lanugine præditum, per quem hinc inde ſparſa folia, præcedentis foliis non abſimilia, fed minora, breviora faltem, frequentibus profundiquelaciniis diviſa, tenuique (dum adhuc tenella ſunt) & longa lanugine pubefcentia: fummuſ caulis in aliquot ramos nutantes & inflexos dividitur, qui alternatim anguſtiora, minoraque neclaciniata liuſſimum verſus geruntfolia: calyculos vulgari, ſimiles, in quinque cupides fatiſſimas definentes: in quibus flores colore quodammodo vulgariſſimi, hoc eſt, pallescentes, & purpureis venis diſtincti, initio naſcuntur, fed deinde in paulo majorem amplitudinem excreſcentes in elegantem ex rubro purpurafcentem colorem mutantur, faturatioribus tamen venis, nee umbilicq purpureo, ut vulgariſſimi nigri flores, fed candidante, ftiloque purpurafcente & quinque ftaminibus exornato: floribus ſuccedunt bullata, quemadmodum in vulgari, capitula, (emen etiam ſimile continentia. Natus Cluſio ex femine, quod doctiſſimus vir Bernardus Paludanus Frifius ex Syriaca, /Egyptiaca peregrinatione redux, Patavio ad Cluſium miſerat *Benze* nomine. Eſt forte ille quem C. V. Rauwolfius apud Chalepum obſervavit l. 1. c. 19. ſub Hodceporici. Nos femina ejuſdem plantae ad nos tranſmiſſi habuimus ex territorio Chalepenſi, a nunquam fatiſſimo laudando benefaictore noſtro D. *Roberto Huntington*. Jam floruit in hortopublico, atque femina edidit.

8. *Hyofcyamus* albus ^gyptius Profp. Alpin. de Exot. *Hyofcyamus* albus Veſlingii in Proſp. Alpin. *Hyofcyamus* hie igyptiacus albus exoritur a radice plerumque ſimplici, per fibras tanicn craſſas varie deduſta, caule ſepius unico, nonnunquam geminis, furreclis gracilibus quidem, fed firmis; hi plurimis deinde ramorum brachiis multiplicantur, quibus utriſque mollis inſperſa lanugo caniticm ante ſenium addit: per caules hinc inde ſparſa ſunt folia, oblonga, ex mediocri latitudine in acumen definentia, vulgariſſimi *Hyofcyami* foliis longe minora: his pariter ex denſata lanugine albicans tomentum, dicitur vix exprimendum, infratum eſt oraeque crebris incifuris dentium ferræ & mulis, prope medium imumque caulis ferrate omnino videntur: flores circa fummuſ caules calyculis ſuis emergunt, paulatimque ab anguſtæ cervicis latiores, quia labella blanda in rifum ducunt. Exterius ſimplici candore nitent, interius ad mixto rubro cum flavedinis portione variegati: dilapſis floribus calyces haredes feminaque ſuperfunt, alba, puſilla, quas humorum, ac potiſſimum fanguinis impetum per venas ventriculi & pulmonum efficaciter coercent, dolorem item meningum, pleuræ membranæ, tum coli inteſtini graviffima tormenta mitigant. Naſcitur cum *Hyofcyamo* luteo juxta pyramides ^gyptiacas, nonminores illas (quarum plures viſuntur) fed majores tres circa Memphin arbem conſpicuas, immenſi laboris opera, & quaenon vane Plinius Regia? pecunias vanam ſcintilem oftentationem judicavit. Floret arſate, & verſus autumnum femina perficit.

TEMPERAMENTUM 5c VIRES.

Hyofcyamus albus omnihutſuis particulis refrigerat, dolor es omnes fed an s: adverſum acres calidæque deſtillationes oculorum aliarumque partiū inproficit. Sanguinis eruptiones iſtæ wuliebria corâ beneficit proſtuvia: ad tejiū aliarumque partium inflammationes adh'ibetur. Profunt ſub-

indefifolia impanantur folia, quandoque eadem cataplasmatispennifcctur. Eft iffheim-
 nis foli>snonnunquamufus; additur vero iff antidote dolor em fopientibm: radix commanfa,
 out in aceto decofia, dentium dohresfinirepoteft. Breviter, Eyoftyamm fimikm Op}a ac Myconio
 facultatem babet: immimtquoqueiyabipfo, quod ab ilis,periculum. Teftatur Diofcorides
 folia in okrt fumfta mentis emotiommfacere. **P**Utsats **t**im foliis menttm torrunipi ait, ft
 infttfo,inquaplu-va quant quatuor dilituhe, bibatur: mii'wr autembaktur candid'tor, quan
 Medici,inquitDbftorids, recepire, de'wde. luteus; nigerutdeterrimws improbatur. Galeni
etiam nigrum infaniam ac foporem adfint (tffmnat, buncquefiavum five luteumprcpinqttam ob-
 tinmfacultatan ; fugiendumutrūmqueut inut'ikmif vrntnofum: ainJidumveroadfanationis
mxim idoneum efe. Piftones ac AnJcgavenfes Hyofcyamum adverfus pruriginem pluriumm
 commendant, indequc Vtrnaculo fermonc 1* Herbeauxtignesvacant. Sice* iritm herbariu-
 ms tarbombusJiTfpergere folent, fumumqw'exbalanlem mambjts fxcifere, cc eo frigore con-
 traffas prurigines tolli afftrunt. Vide cetera apud Johannm Baubinuin^ Simenem Poult
 pag. 347, 348,(9' 549. Satins, inquit, eftomni Hyofcyamo abftimn quamcumpmtukvit&
 sgrictijufvis obvii.,legitimum, fcilicet album, noneligeTt,4sc.

H A L L U C I N A T I O N S C X S P. D A U H I N I.

PA&. iSf.ttlaiat Cajparm Bitubinut Hyoftya-
 mam 8 N'cotianam inter Mandrajtoram, plan-
 tarn bactiftram^miferamve (iju<c jure a finr ulti-
 mo fabet a fanan St'itm's) (3 papaver quer} ejt plan-
 to, ttrmfitala mtUitapfatarii ; fed a fine ultimt,
 nte Hyofnamtu, iwc Nisitiana, alterutri forum

convenit **i**ti rrg> npthtt £f ffyofiyamm £\$ Nuotiana,
 quippe bicapfulars & meuofieta/,r piantit, rtfport-
 anlur cum fitu jimtthtt birapfulanhn' monoprtah'i,
 Digitalt ftitctt, firbafto, Slattaria, Scrpj/hufa-
 ria, (Ic.

DE MONOPETALIS BICAPSULARIBUS

F]ibus riauanterins. <5ccalari pofterius donatis.

C A T V T X

L I N A R I A .

CVm Linaria qu'tbufdam Amirrhvniftecies videatur, isr an Antirrhinum Plinu fit **quiJam**^A
 dubitant, idcirco eandem Anirrhinoimmetliatcprxoncmus. QuibufdamOfyriscentft.,
 exquj **G**fkmfccuh, ut isr nunc in **Italia**, fcopa confickbaniur. oTM>u* foMs eft)ini initio nigris,
 dcin rultfetntibus, <src.Diofcondil.%c. 143. iff F tin. l. 27. c. is. Ofyris foliij est **aigrü** ft*
 Uni fmimimtionigro, dan **rubftaatp**, <?c. Linaria **Ut'mm**, quod foliis Linifit.

Z-iMMj dt |«a«ca bicapfiilaris monopttab, **cujnsfiore**sintegri in lundo, riitu antierius,
 calcan **poftenoa donaufimt: foteealari pofterh»pTomioeittednmeft infioreabAndiThi-**
 no diftinguitur, at poit florenj evankiiim& hujiisSf illius Factiusdittinguunturgencr;) inur
 fe; namLinaria primo habetcalcar **In pofterioicfloris parte**, quo **deftitaitnr** Antirriinum.
 Secundo, Linaria habetcapCuiam Icminalcm duobus loculamentisdftintam, **feptomedi**ofe*
 paranteliinc imam, illinc alteram ferjem Icminum, aut comprellbrum, jfoliaccornm, qu*
 funt alias nigra, alias Fufca;autangu!olbrumrngoforuhvc,aut denique rotundonim.- f exccata

t ap[|H]ana perittrrurum d'erru/AtAnvrrumny,er;in/rfHortnjgItacr.Hu diinarum3n
terms, naUocakari pofteriosaffiaetr^fed immediate calyci bliaceo, herbaceo,quinqocpartito
 immergitur;deindt capiiila feminalis Antirriini,eciamfi bifariamdividatur fcpc medio, tribus
 tumen **foramiaibw** (miumverlLis **btenditer** pertonttr,a[qucfeprum **ttwdhuH nnlto magis** <")-
 Iomhal)tr,feminaplurint3 nigra, autiufcarugofa itideni (iliadhirentia**ootineos** litri""l11-
 Lmana ergoelt vtl kminc toliaceodrnprellb, toque nut nigro aut tuito, vd **ngolofeil** nJg«⁶>
 velrotundo: ratione durationis **veleftperenniavelmima**: ratione ioliorunu-itvd latifolia.
 Cucu fi ⁸mo of K ¹iam ¹poftis; vel ¹cribus ¹caulibus ¹ad ¹vecuribw ¹rd ¹capoat ¹ad ¹dingob/g


t tis. vel an & tnu11»i^ tjuL liitioit colortjTi rioriin dr vf'l /filiff' -il'm „,^ i ., ^i IJCI*

I^olertcoloris: ftqu, **bifopei** vcl **folusgUbritglaacis.vclhirfiitis^d^i^icffTO^^K⁰¹**
 TABULA

Linariae femine faliaceo, compreffo, nigro aut fufco; angulofo, rtigofa, fubnigro, nut fufco Sr rottmdo.

T A B U L A XII. XIII. Sf pars XIV,

			<p>1. Dalmatka maxima folik Laitri for? magno, nobk. Linaria latifolia Dalmatics magnoflare, C.B.P. is Prod. Linaria maxima Dalmntica folik Lauri⁷ J. E- Cbabr. <f</p> <p>i. Latifdia triphyllas ficula[^] Bcccon. \$?</p> <p>3. Triphyllas. cxruka, C B. P. Linaria Apula, Cot. V</p> <p>44 Ttrapylla tenuifolia, nobk. Linaria tetrapybyU</p> <p>* annua I Vi lutea minor? Col- Linarfa quadrifolia ^{1. 2. 3.}, C. B. P. ^{4.}</p> <p>5. Lutea parva erefta, nobk. Linaria lutea parva annua[^] J. B. Cbabr. ?</p> <p>6. Angufifolia flore majore luteo, nobk. £</p> <p>7. Minima maritimavtfcofa folikhirfuikflor'tbu[^] iutek, nobk. *%</p> <p>8. Minor CARulta rcfra, Park- 5</p> <p>9. Linaria pumila ttrapykylia[^] Boccon. \$</p> <p>10. Vulgark folw luteo majore, nobk. Linaria vulgarity Eyfi, Linaria vtfgark lutea, Ger. J. E. Cbabr. Q</p> <p>Perennk < { Fiore pallno rifiu { Ui. Purpureo, C.B.P. Linaria inodora flore albicante, Cam. Linaria flore albkaitite, Eyfi. 0 2. Aureo, C. B. P. Linaria Pannonica 1. Cluf. Hifi. Tab. 0</p>
<p>Linaria < Semine</p>	<p>Fol'tateo compnffo, nlgio atit fufco</p>	<p>Perennk <</p>	<p>[13. (Myrk feu Linaria alba, Lob. Park. 0</p> <p>Liliariacprennes femine angulofo feu rugofo, nigro aut ftifca</p> <p>14. Linaria tenuifolia derulea, nobk. Linaria oerulea Dah Lugd. 0</p> <p>15. Afpalagi, Corrudapricrkdisti Clufio[^]folik[^] nohis. Linaria Mollugink facie, Boccon. 0</p> <p>16. Purpurea major odorata, nolk. Linariapurpurea major odorata, C. B. P. Linaria purpuroctruleaelatior[^]EyJr- 0</p> <p>17. Pumilafupina lutea, nobk. Linariapumi/a ftipbu hita, C. B. P. Linaria Htspanka 5. Cluf. Hift. 0</p> <p>18. Moravka procumbent c<erulea, nobk. Ofyrh purpuroctsrucha repens, Ad. isr Icon. Lob. Linaria Moravka 1. Cluf. Hifi. 0</p> <p>iy. Quadrifo(iacd n-uhaprocumbens[%] nobk, Linaria 3. Stiriaca, Cluf. Hifi. 0</p> <p>20. Eellidk folio, nobk. Linaria Bellidkfolio C. B. P. isr Prod. Linaria odorata, Dcd. 0</p> <p>21. Semptrvirens folik longiffink, nobk. Linaria fempervirens, Profp. Alpin. at Exot, 0</p> <p>2. Cdtrulea cakaribm cblongk, nobk. Linaria Cdtruhacakaribui oblongk[^]. B. Cbabr. 0</p>
	<p>Angulofo, rugofo, fubmgro aut fufco</p>	<p>Perennk <</p>	



§. 1. LINARIA (mint foliaceo, comfrep, nigroaut fufco.

E-xplkatio Tab. 12, 13, iypark 14.

1- **L**inarh maxima Dalmatica folii? **Lanri Hore ntagno, nbbis.** Linaria lacifolia ; **Dalmatica,** noHoir, C.[3.1]. & Prod. Linana maxima Dalniar. icafoliis Lami, J.B. Chnbr. Folia maxima hax proterc tnagnitudinc Scr^o Horum Laiiri domertici, ad Linarix ramen toliovutn Ibrmani accedtmij, uncias duasauc criamirealouga, pediculis carentia, unciam fufc tata, in mm irate cauiiumftmper **breviaia** & angufttora, omnia tamen in acutum apiccm dcfi- nentia, nullo taniem ordiuc (**ervaco** tjukmambiunt, qui eft lignofus qua Ji, rocundns, fir- mus, cubium laptians, **tnramos brachiacs:** infummofaftigioflores habec Linarije vul- gans lloibus formi fimiks, fed triplo Taltem majores, ex lutto ruftcfcentes, aureofvc, ma- gni Ltudine Antirriini mapris; cjuibus cmaccidis fuccedunt capfulse binisloculamentis diftiur, lepro **meiabnmaceo dtibngueme dapUcen** fericm leminum comprefibrum, nitmbranaceo- rum, nigronim, x<:nutum adeo ut veico vel leviflimo tiantc, imoaura Icuhalitu, avolart tJ- cile poilint. Semen hujus Floreiitia^a Cafabona miflbn ad Jokannem Bauhinum nomine **Unftia** maxima Dalmaticx Lauri foliis; item & fub nomine Lin :u \x tric icant is Creti car ac- ceptitidm. Floret jefbte atque interim eadeUi finientepericitur femem.

2. Z. i/7dTM Iacitoliatii! ylllos Sicula, Boccon. Caules habet] icrotundos, gbbros, **pedales,** fubindcmajorts, (juandoque plures ex una radiccexeuntes: fotiaterna, fubrotunda¹, Iarvi3) **glaaca,** muam lata, nonnihil longioraj Ordinacimexadveric inter fc abfque petto! * difpofita* bina tanqum in tummo caule, in cujtis **excremo** (pica florum cminct Linaria: vulgariis riru ; -H^{0*} resiin^uti **anterias** ri&u flavo, & poftenus calcati feu cauda cirulea pallcfcfntedoiiantu^r Jtquuntur capfuk congntntvum more, itiquibus concinctur lemencompreflbn, iubnign^{'''} radix fabeft fibrofa^ Horet **aftate in mootibns** Hybliis circa Syraculas, & alibi illic p i ^ perkar. Bauhiniaaa Linaria **triphylla** latilolia, execpta nocabrathi.it/ **in caulis** funimite eum'notha ommnoconvtnic.

3. I/iw¹ triphyllos ciral^{ca}, CD. P. Linaria triphyllos **Apnla, Col.** Valenrini Lin^{^1} mtenon bins accedre videtur hxc Linaria, **CerinolanU agrismedris nffimobvia** qn«¹ l'ice alba, tenui firmatur, ex qu. • **plar** < CMI iT catties **pedaka** Imciunt (alitji Kindofing^{n1*1} caule invenitur) leves, albicans, rs, loins per cenienla terniv, mtactis, ' TJaulo major IL^{'''} lationibus, acntioribusque, cinereo colore Ruci aur Braiita.- cirra iumnum vero • **caulis**

alt<

alternatim cliipofitis; quibus Martio menſe flores primi coacervati, czrulei, minuti, extumefcentia labia tantum fuprà habentes, qui paulatim crefcente cauledecidunt, & capſulas inter folia remanentes relinqtiunt rotundas Linarias fuperioris modo: in quibus foliaceum, compreffum, latum, nigrum, atque reſpe&u plantas magnum confpicitur femen, fapore palatum calefaciente, nee dulcj necamaro excedente. Provenit, ubi fuprà di&um, in Cirinplanis agris incultis. Floret arſtate; femen eadem perficit.

4. *Linaria tetraphylla tenuifolia*, nobis. *Linaria tetraphylla lutea minor*, Col. *Linaria quadrifolia lutea*, CB.P. Reddenda eſt & huic familie plantula haec vefbris *Linaria*? feu *Ofiridis* congener, etiamfi ob foliorum quaternum numerurrCruciafe fimilior, antequam floreat & capſulas fuas producat, yideatur. Plantula eſt pedalis, exigua, exiguaque radice praſdita, viticulis multis aflurgens: fedcaulis eſt treftus, geniculis fingulis <quaterna folia> promens, in imo minora, atque e medio ad fumum nohquaterna, fed alternatim fingula & breviora folia, Lini & *Linaria*? *aemula*, colore Braſlicx, interne canaliculata, caulicruciatim reſt: à harentia: flores in fummo cauliculi faſtigiopauci, petiolis brevibus pendentes, calycibus quinquebliatis, hirtutis infidentes, effigie atque poſitu *Linaria* vulgaris fimiles, verum multo minores, atque etiam luteſcentes: capſulas craſſae, rotundas, (ex lineis diſtintas, apicello in fummo emicante, atque in binis loculamentis, fepto medio diviſis, femen foliaceum feu compreffum, lunatum, nigrefcens, ut in congeneribus, latet. Sapor idem amarus ineſt, ut in aliis. Aprili menſe floret, & xſtate perficitur femen. Oritur in iſdem locis, quibus *Ionthlaſpi lunatum Columnar*, *Valvenium* (cilicet campis.

5. *Linaria lutea parva annua ere&a*, J. B. Chabr. Sunt huic caules dodrantaſes ex radicibus parvis, albicantibus, plures, tenues: folia teneriora & angitiora multo, nuncre&a, nuncretorta, ſpiffioraque quam in caeteris, colore glauco, terna, quaterna aut quina, ex certis intervallis adhaſentia: fioſculi lutei in ramulorum faſtigiis, *Linariae* forma, circumcirca crocei aut aurei, fed quadruplominores, odore nullo; quos excipiunt globuli rotundi, aliquando oblongi, bifariam fepto medio ſe&vi, continentes in fe femen parvum, orbiculatum, compreffum, iufuſcum: radix tenuis eſt. Eſt pſanta femetriſ* aut feptimeſtris. Hue pertinet *Linaria Hiſpanica* 4. Cluſ. Hiſt. nifi quod fit flore caeruleo dilutiore ad cinereum tendente.

6. *Linaria annua anguſtifolia flore majore luteo*, nobis. Hujus folia funt quaſi *Pſyllii* foliorum *aemula*, longiora: caulem producit ſequipedalem, cujuſcimis innafcuntur flores lutei, multo majores quam pro tenuitate plantae; femina cojppreſſa, nigra. Circa *Birdegalam* in fatiſ arvlis provenit.

7. *Linaria maritima minima viſcoſa foliis hirtutis floribus luteis*, nobis. Haec *Linariae* nigris ſpessies folia edit hirtuta, viſcoſa, fuperioris foliis multo dilutius virentia, piis ſcattentia: cautes femipedales, in quorum cinys flores fert minimos, luteos: quibus evaneſcentibus ſuccedunt capſulas rotunda, bifulcas, aliarum *Linariarum* more, continentes femina nigra, compreffa feu foliacea, non autem ut *Linariae* 2*. aut 3¹. §. anguloſa aut rufoſa. Provenit in arenofis maritimis *Armorice*, ubi nos copioſe ipſam florentem, & femina nigra compreffa ferentem, offendimus.

8. *Linaria minor caerulea re&a*, Park. defc. *Linaria minor caerulea* eidem, *Icone*. Plantula haec tenues emittit caules, quibus tenuiſſima & longa adherent folia exeuntia ex geniculis; hujus, inquam, folia parva, glauca, per terram ſtrata, longis pediculis innituntur conjugatim Teu binatim adternarium auc quaternarium numerum, ex adverſis poſita, uno extremum coſtae medias claudente, mucronato etiam & parvo, ceteris conjugatim coſtae adhaerentibus haud abſimili. * e medio horum exeunt cauliculi bini, terni, pedales, quorum geniculis adherent folia longa, tenuiſſima: in fugimis caulibus flores caerulei aut violacei innafcuntur, majores multo frequentis *Linariae* flore minimoluteo: floribus cadentibus ſuccedunt capſulae minores, rotunds, bifulex, minuta multa femina compreffa, nigra, in fingulis cellulis, fepto medio diviſis continentes. Seſe fingulis annis ex femine deciduo renovat haec planta.

9. *binaria pumila tetraphylla*, Boccon. Proplantas tenuitate radix fatiſ craſſa plurifariam in varias biturcationes diviſa, non fine fibris quibusdam adnatis: cauliculi tres aut quatuor palmares, geniculati, per terram ſtrati, circa quos folia parva, ſubrotunda, quaterna, ex eodem geniculo orta, Cruciatas *Dodonaei* magnitudine, decuſiatim ad geniculacernuntur: floſculos non obſervavit *Paulus Boccone*. Ad montes *Hybkos* prope oppidum *M'dilli* nafcitur.

§. 2. *L INARIAL perennes femine foliaceo, compreffo, nigro aut fuſco.*

iſ. *Linaria vulgaris luteo flore majore*, C. B. P. *Linaria vulgaris*, Eyft. *Linaria vulgaris lutea*, Ger.]>B. Chabr. Priuſquam flores haec *Linaria vulgaris* producat, adeo iſthymalum

cyparitum auc potius Efulam mcnutur, nt nifi lac deeflet, a Tithymalo difficile admodum cfi et diltcernere, tanca eft harum duarum in foliis fimilitudo: at flores in Thyrfum fuperiorem congcti Linaria ritu primo intuitu abenore illo prohibent; & qui hujus in pofteriore pane caudam five corniculnm calcarve Cohfblidje regiae inftar, riftumque anteriore parte (qui & Antirrhino & Linaris in genere commtinis eft) obfemverit, facile defcernec a Tithymak. : floribus hujus evanidis luccedit theca bicapfuhris, rotunda, fepto melilio diitinguence duplicem leriem feminum compreflbrurn, nigrorurn, aliarum prcedentiuromore: radix lignofa, dura, alba, varias hinc indefibrasemittens; ac fuo reptatu in lior tb odiofa : fapor hujusamaricat, Reperitur interdum floralbo, m eft Linaria lequens alba, Eyir. Hanc Linarism lutcam vuigarem a vnlf,art Efuladifcernit verfus fequens,

Efula Utiefcit, fine laBt Ehc&ria cre/cit.

Floret peradbrem, interea femem frum'feric:c. Provenit paflim in Germania, Gallia, Ang'ia Belgioque, fecus agrorum margines & aliis in locis {ponte.

11. *Linaria* flore pallido Hftu purpureo, C, B. P. *Linaria* inotflora flore albicante, Cam. *Linaria* flore albicante, Eyft. Hie proceritate' afreram non excedit, toliis autem plane la c'toribu^ eft & l*te virelcentibus ; floribus albicanribus.riftu purpurafcente decoris^ multo rarius difpofitis floribusvuIgaris *Linaria*., qnidenfius & fpicati in cimafummas caufium veftiunt.

12- *Linaria* floce pallido riftu aurco, C.S. P. *Linaria* Pannonica i.Cliif. Hift.&Fan.Tab. Btcubitali excrefcit hie magnitudine, re&um fcrens caulem, la?vem, viridem, mulctis foliis fativo lino fimilibus circumreptum, qui fuperiore parte in mulcos tenues brevifque ranulos divifas eft, fcrentes ravos flores *Linaria*: quidem vulgaris floribus repondentes, fed mtnorts & pall' tiores, riftu non nihil villofo Sf aureo: femeo in vafculis bifulcis, lepconicdio Liiaia i^ vulgaris inftard'tvifis,exile, nigrum/compreirum: radix longiufcula, candicans, mulctis tenuibu5 & majufculis fibris in hitra expanfis nixa. Perennis eft planta, fummo capite fin gulis annis novofcates profcrr., fed en lateralibus fibris non germinacut vulgaris. Tot plann amarhitcuta eft. Crefcitin montium declivibus., fecundum publicas vias, fit in loci Gramine nudis fuprapofonium ad UanjiDium, *Gumfafikinhen^ Lejtenberg^* atque cthmtin M. ravia. Floret Junio ac Julio, interdum etiam Augufto & fubinde fcniem protert.

13. *Linaria* leu Ofyris alba, Lob. Park. Ex radice oritur hxc *Linaria* lignofa, multis bifurcationibus inferius divifa, mltifque fibris indcemanantibus; ex qua protruduntur mulcaules lenti, mulctis foliis anguftis, ^ongis, inordinatim difpofitis quofti, haud abfimile ioliis vulgaris lutcx: in caulium cimif provetliunt Hofculi multi fpicatum difpofiti, pallide albi vtlgaris tbrma, icl magnicodine eos excedentes : femem in bicapfubribus thecis, ieptomed' o tli;)unftis & feparatis, tbiaccuni, comprciTum, nigrum: radix eft alba, longa, *rsila fatia, nmltos annos durans,

V3- *LINAR IJE Jtererwes femine angu/rfo fiu rugofa.*

16, *Lijjarh* tenuifolia carrulea^ nobis. *Linaria* ca;nilea, L>alr". Lugd. Radiceni habet hxc duram, l'gnofam, albam: tolia proyimt iradicem *Linaria*; modo inordinatim diipofici, fed ttuuiora, anguftiora, brevioraque *Linarix* majoris odorara, quina, fena, exunogeniculofi ^ prodeunt capillacea, tenuitate Jfi*dira: ramulis multis gractlibus, capillaccis kidi m Jo 'its, lemiuncialibus, veftitis : infummis ramis ad femipedalc m altitudinem flores fpicati proveniunt minores, aliarum *Linariarum* rorma^ opiofi, ex cirulco albicantes, in thyrfi n* dum congcti; qnos decidentes vafcala fubicquuntur interne valde compreffa, fupernecra fiora, bifida, fepto mertio diftinguente duplicem ordinem feminum ragoforum, fubnigrom' Gignitur in aridifqualitntibus & apricifcirca Monfpelium. floret Matodefinr.tc, & p'UI o poft femem maturefcit

15. *Linaria* v*a Aparagi Coruds priorifdifti Clufio ioliis, nobis. *Linaria* Mollug'mis' acir- Ru(b on* Cul " luicnoftrx *Linarix* funtcubitales, rotundi, ramofi. fubrHbentcs: toli- n' icwm lo ngai inftriora circumgeniculaftcllatim radiata Moliug'iiiiis inftar, fop' cri y i^ r mir r' lte dif' ofit^ iHaque Kali modocarnofa. folcocanalato per longitudincin * Y ^ n turrflo r' tClX verfu; i Hlcm Autumni hu) us *Linaria*: folia rrigoris in clemcnu. urt' fpj; [IQ tunda • r' " tti & vlll g' ari8 *Linaria* minorcs; floribus fatteentibus fuccedunt cap' id^ d<n fen'm. JTM , lemina ?teotm dt) piici fdhll^ (p w medio difterminante hmc it' r' ret Panormi, & copiole etiam alit' in Sicilia. An *Linaria* Crtica anguftifolia Clufii. Eyft. Li. 16. *Linaria* purpurea major od' jrata, C. li. P. *Linaria* purpurocxrulea elatior, i' naria altera purpurea, Dod. *Linaria* purptirca magna, J, B. Chabr. Bicul italc m ^ longa, nigr,

nigra, contorta, lignefcenreradicecaulem emitcir, eumque fubrubeftentem, teretem, glabrum, firraum, in ramos pniongos divifim, foliisiongioribus, viridibus, lfcvibus, glaucis, Lini fativi fbliis- fimilibus circimifepnim: flores aliarum Ltnarianimmore, fedmmores, longafene, pedali, aliquando fefquipedali, per fummos ramos nalcLmrur,anEroriurnhiante5,poitid parte caiidam feu calcar promentes, colore elcganter purpureos, minores muUo quam func Li iar is lutes vulgar is flores, atque fpeciem omnium Linarianim elcgant'iimam pra>bent diu florente3,acque vifum mirum in modumideftantes: producic in parvis vafculis rotundis, bifidis, fepco tncdio pcllucido ftminibusadmaCuncatcmperduffis, dupl{cem feriem feminum non htorum & comprevlbvum, laevium, nigrorum pricedentium Linariarum more, fed rotundorum, fufcorum, aut fubnigrorum. Floret per menses ternos jefstivales, atque tntereafemen porficic ufque in Autumnum. l^fcitur in Hungarian, Auftrlec 8r Moravijr .colium acclivibos plerifque, afpeftu jucandiflimo. Plantaeft pc^rennis.

vi, *Linana* pumil,afupina lutea, C.B.P. Racione cauliumprocumbentiumhuc jam pertinet. *Linaria* Hifpanica 5. Cluf. Hift. *Olyris* flava filveftris, Lob. Icon. Ger. Patmaribus exicvkeulis freqffentibus, liumi fparfis, quas veftiunt folia vulgnris foliis familia: extremos ramos occupant multi flores, flavi, vulgaris Horibus minores, veluti in fpicam congefiti: quibus fucedunt capitula minora multo quam in vulgari, exfguo femine anguloib & rugofa plena: radix tenuis& Candida, vulgaris modorepens. Salmanticenfiagro aridis locis provenit, ubi tota fere adhcc floret & femina producit, nigra matura, iniqualia & rugofa.

18. *Linaria* casulca procumbens, nobis. Ofyns purpuroca-rulea repens, Ad. Si Icon. Lob. *Linaria* 4. Moravica 2, Cluf. Hift. Tenuibus Liniinfar, & luu-nidiffufis foliis cfthic Moravica *Linaria*, valde freqffentibus, anguftioribus, fine ordinedifpofitis, craffliuiculis, coloris csfii, in plures alas nonnunquam divifis, quarum faftigium occupant mulri, fpicæ-ritu, confercim nafcentes flofculi minores, cqlore cartuleoutpliiirimum, nunc violaceo, interdumalbo: quibus iuccedanc capitula femine rugofa, jafco aut fubnigro plena, hinc indeà latere fcepti medii, quoduplexfeminumordodiftinguitur. Perenniseftplann, tiorensifate in Moravice collibus, eodemque tempore femina ptrficiens.

19. *Linaria* quadrifolia aeruled procumbens, nobis. *Linaria* quadrirblia fupina, C B.P. *Linaria* 3. Stiriaca, Cluf. Hih *Linaria* Stiriaca repens, Eyft. *Linaria* hac cauliculis eft palmaribus & hwui fafis, quos ambiunt folia *Linaria*: vulgaris quodammodo armula, multo mi-nota tamen, craifa, lucculenta, colorisex herbaceo^ndicannis & veluti c^fii, non rcmer per ramiilos farfa, ledferie quadam terna, fspius quaterna, eofdem ampieftentia: flofics forma Vulgaris funtfimiles, (cd elegantiffimo colore praediri, ex violaceo quodammodo purpurafcentes, labro inferiore ubi hiac aC dednSo riftu aperitur plane aureo, gufhis amari: iuribusfucedunt vafcula ctafsfufcuh, qmmaturitadedhifcentia duas cellulafoftendunt, fepto mcdiodiiterniinantceaidem, femine parvo, compreiTo, nigro plenashinc inde: radix tennis, alba, multos ex uno capite ramulos proicrt, arque fumma tellme procumbentes: fubinde iuextremum Autumnumflorec: plantaelt percnnis, florens in fummis Alpibas, 6f id to Gcfnerus *Linariam* Alpinam nominat.

20. *Linaria* Bell'idi? folio, C. B.P. & Prod. *Linaria* odorata, Dod. Lug. Cluf. Hift. Lob. Ger. Ofyrisodorata piirpurea, Tab. Singular! afTurgit lia-c caule. eoqnenonnunqnamcobi-tali in aliquot Ceanes jamalas (nperiore parredivifo, quos obloiiiga folia Lini infar fepiunt, *qux* tamen itlCia radicem humi fparfa, citerarum longe majora Jacioraque, Bellidis majoris foliis familia fuit fcd per ambitumprofundiusferrata; pleraque etiam per caulem fparfit, altius incifa: *tios* exiguus, copiofus, cxruleus, ornatus riftu & cauda, tanquam caetera *Linaria*., Lavenduli pene Horibus concolor, aliqtiantulum odoratus, extrema parte hamuli modo iuenrus, cauda aut cornicnlo minore donatus, virgulas feu ramulos superiores fpicarim obfidet: iis iuccednnt valvulas, rotundac, junaa:, *Linaria*: vulg^ris ritu, capfulis fcilicet bifulcisconihntes, led mu'tominores, in dupliciloculamento, fepto medio membraneodiftinguedupliceniferiem *fcatinom* pufitlorum, fubnigrorum autnigrorum aliqtando: radice eft fingnlaricandi-
* canre minimi incerdum digit! craffltudincm arquante. Sponte provenit montofis Caftellslo-cisjaptdofa& aridofolo, ubi Aprili fiorntcm, Maio Junioque femina perficientemobfervavit Clufiis. Nos pafim & aftiitim infabulofis agriSolonienfis locis negteftis, irem inter fegetes intra fepra regiiE *Cbamhort* vidimus durantcm poft femina ad maturitatem perdufta^ttque ex ea-ttem fadice pullulanteft fcquente Vere, quicquid incontrarium dixit Car. Clufius.

21 *Linaria* fempervirens B foliis longiffimis, nobis. *Linaria* fempervirens, Propf. Alpin-de I yet." h'y. fcfflinibns nobis adveftis natamhanc plantamperpetuo virentcm, & per feftatem

totam florentem accepimus, quas Botanicae cognitionis fluidios elegantissima planta vivaest. Haec exit caulibus multis, cubitalibus, ac amplioribus etiam, re&is, rotundis, colore incasruleum nigricantibus, foliis utrinque alternatim longiflomis, tenuibus, angustis, latitudine ad Linum accedentibus, vestitis. A radice multis fibris caulis scate caules emittit; in quorum fumros fastigiis, spica? modo, flores producuntur plurimi, parvi, casrulei, elegantes, cum riu & fronu\ feuanterius, potterius cum cauda aut calcari btevi, tenui, inflexo utin Confolida vulgari. regali, ceterisque Linariae fperiebus: floribus hifce finguis succedunt capfulas fingulae, bifurca & fepto medio pellucido divifae, continentes hinc inde femina rotunda, minutissima, nig*a: radicibus niptur multis, longis, caulis, albicantibus, ab uno principio radicis, apice fcilicet, ut in Phalangii ramofi & non ramofi radicibus obfervare licet. Hanc fitirpe-m plures fibi ,perfuaserunt eife legitimam. Ofyridem antiquorum, de qua Dioscorides ita habet. Ofyris frutex est niger, ramulos terenstenues, lentos, fra&uque contumaces, & in iis folia terna, ^uaterna, quina fenave feu Lini, nigra initjo, deinde colore mutatorubefctntia. Deco&iim ejus juvat arquatos; amara est, & apprime utilis ad tollendas e visceribus obftrucliones, unde mirum non est fi ejus decoctu>n faneti&eros, & urinam efficaciter jmoveat, ex quo etiam Urinaria dicitur. Floret aestate, atque ineunte Autumno femina maturefcunt.

22. *Linaria caerulea calcaribus oblongis*, J. B. Chabr. Radix rortuofa, dura, alba, fibrata: caulis finguiaris, fimplex, pedalis, glaber, teres, gracilis: folia alia adverfa, alia alternata, uncialia, angusta, acuminata, laevia; flores per fumum caulem eo ordine quo in Linaria vulgari crefcunt/eadem forma, dimidio minores, calcari fere longiore, caerulei, quinque herbacei coloris angustis longisque foliolis bafin fuffulcientibus: vafcula minima ejufdem formae & fruturac cum caeteris. Cherlerus gener Johannis Bauhini attulit ad eundem colle&am in Italia in viis prope Viterbam.

§. 4. *LINARHE annua femine ahgulofo feu rugofo Jubnigro aufufeo.*

23. *Linaria triphylla minor lutea*, C.B-P. Valentina, Dod. Lob. Hifpanica 1. Cluf. Hift. Haec Linariae fpecies multo est uberior & caflior vulgari, ternos, quaternos caules ab una radice proferens, pedales, interdum ampliores; quos ambiunt Centaurii minoris folia, infima parte verfus terram plerumque terno ordine difpofita, luperna vero, temere nulloque (ervato ordine fparfa, & alternatim cauli adhaerentia; extremi caules luteorum florum veluti spica occupantur, Linarias vulgari fimilium, quibus tamen riftus lanuginofus est: cauda five calcar puipurafcentis est coloris: hos fequuntur capitula rotunda, apice prominente in medio, qui est produ&io fepti medii quo duplex feries feminum diftinguitur: radix est finguiaris, cafliufulca, caules plures emittens. Circa Valentiam Hifpanix, in pratibus & locis umbrofis, Martio florentem obfervavit Clufius.

• *Linaria annua* Chalepenfis minor ere&a flore albo lineis violaceis notato calyci ex quinis roliolis uncialibus conftruftoinfidente, nobis. Haec Linaria parva annua afcendit re&a ad pedalem altitudinem; in cujus caulibus vifuntur tolia comprefla, uncialia, raro per cauliculos fparfa: ex horum finibus oriuntur flofculi albi, lineis parvis violaceis notati, & quod obfervatu dignum calyces fuffinentes pra>diclos flores habet ex quinis foliis compreflis uncialibus conflatos, & longitudinem multum capfulas ipfas fuperantibus. Semen hujus communicatum habuimus a D. Roberto Huntington in territorio circa Chalepum colleclum; quod est angofum & vrugofum, fufcum aut fubnigrum.

25. *Linaria minima foliifhiriutis floribus obfoleti fufci coloris*, nobis. Haec tenuis Linariae fpecies folia habet quodammodo Antirrhini cujufdam xmula quoad compofitionem & nr uticem: flofculum habet minimum, fubnigrum aut fufcum, in foleti coloris, fed omnino Linariae fpeciei fufficiens & calcari potterius donatur; capfulam itidem binis loculentis Antirrhini rolinimor in modum, fepto medio eadem diftinguente. Male itaque ab authoribus pro

Antirrhini rolinimor in modum, fepto medio eadem diftinguente. Male itaque ab authoribus proponitur ut clausus in Hallucinationibus deducetur. Infatis arvis & hortis ubique provemt.

nes folio, Park. *Linaria h<c i foliis triangularibus Helxines* Cicuta, capfulis femininis, caeteris omnibus antedictis; floribus Linariae: nos ex ramis & figurato, cum nec flores, nec capfulas feminales, nec femina pediculis pendulis, & conocephala; obfervent offeri, ananus pervent ut pinguenda & diligentius fenbendam ab artificibus curent.

§. 5. L I N A R I A folio fubrotundo[^] ftmim rotunda-

Linaria m^{*} folia babit Helxines, at minor^{*} iff rotundiora, pilofa, isrc. in fegetibiu Diofroridi I, 4. c. 40. Idem Ptmiusl. 27. c. 9. Elatims nomine.

Cymbalaria a *Cymbalo* nomine duxi/ie videtur : quibusdam *Umbilicus Veneris* al. enfitur: at *Hermolaus Barbaras Capnon primum PlinnLz[^].c. i\$.efe creditit.*

2j. *Lin. Iria* hirtuto folio fubrotundo flore ex herbidoflavelcentejnobis. Elatine a fubrotundo, CB.P. Elatine Diofcoridis, Ad.Lob. Veronica temina[^] Match. Fuch. Ljod I. Ger. Cam. Lugd. Verbafeutii quorundam eidem, qui Matthii[^]li fit Fuchfit adhibet figuratw vtra Linaria: fpecies ex radice parva, alba, fibrofa, crebrosper tenamexpauitcauliculos. lihil vel mifimum humo feactollentes, tenues, viUofos/& fubindenonnihil rubentes; ft[^] am Veronica minus acuta, rotunda fere, mollia, lanuginofa, (apore amaricante; ex quorurr ufquifque ala pedicelles rubefcens, viliofos, femiancialis & longior enatus florem fuftinet calice qiiinq; foliis hirtutis confante pra=ditnm, Linarias omnino fimilem, calcari breui pofft. nuj, etiam labelloq; leu riftu anterius ex herbidoflavelcentefinte colofe, fu per lore adverfa lacinia, bifida, pulla; fubqua[^] latent apiculi partini nigri: unicuique flori emarcido fuccedft capfula bivalvis, fepto medio ditmguence duplicem feriem leminum tufcorum, anguloforum, Linarias feminibus conformium: eft planta femeftris.

28. *Linaria* hirtuco folio acuminata in bafi auriculato, nobis. *Linaria Hedernli* folio, Col. Elatine folio acuminato in bafi auriculato flore luteo, CB. ?. Elatine[^] Matth. Caft. Ltigd. Blatine refta, Lob. Elatine altera, Dod. Lob. Icon. Tab. Ger. Cum hax & prior flore, capfula Sf femine, nihit^a Linaria differunt, fed folo foliorum afpectu, hue revocavimus non abfque racione. Hsc eft tota magis fertilis, nee humo artollitur, viticulos longiilimos fpargens, tollis Helxinescifampella?, fagifca; mucronis alati forma, mtonibus qnam jam difflar Elanes & magis acuminatis : flores confimiles: capfuls feminales bifulcx Linariae ritu, (emenque angulohim, a fperum, fufcum, omnino Linariarum inftar quae continentur in paragrapho fecundo. Floret Julio & Aiugfto, cVoflobri femina perficit. Crcfcit in agris & inter vices in Galia ucraque hacc fpecies Linariae. Inarvis demerlafcgetein Anglia, pofterior ferins floret, rep[^]iitur folio acuminato, differens a pritra foliis rotundioribus, ad bafin minus auriculatis, ac Hribus qni fubcarulei vel caeru Jciiiunt prope Moufpef Tuluni in luco Gramntitio & hinci» de circa vlas occurrit.

• 29. *Linaria* minima hirtino folio acuminato in bafi auriculato flore luteo minimo, nobis. Hcc in omnibus priori accedit, excepcia magnitudine, eft enim duplo ant triplo parcedente in omnibus minor.

30. *Linaria* folio glabro fubrotundo Hederae folio Clemacitis, nobis. *Linaria Hedera*: folio, Col. *Cymbalaria*, Matth. Lugd. Cx(. Caft. *Cymbalaria* vulgaris, Lacun. *Cymbalaria Italica* hederacco folio, Ad. Obf. Icon. Lob. *Cymbalaria* foliis hederaceis flore caeruleo, Eyft. *Cymbabriallofeulis purpurafcentibus*, J.B. Chabr. *Umbilicus Veneris* orlicin. Lonic. tx paritinis rimis maderieri folitis pcndulas lbrase vibrat hxc, renues, purpuriifccntes, terctes, laves, longas. nervo, quem facile itringendo liiqu>c cortex farces, in varias varie fibrillas fafcfcntes, per quas folia eft cernere longis appenfa pediculis, hederacea, angulofa, luperne atrovirentia, inferlus Cyclamini modo purpurafcentia, cenerafucculenta, obfeuro quodamamarore p[^]cdica. - ad exortum porro pediculorum, quibus hrent folia, tortiles ftirgunt alii pediculi, quibus flores finguli infident Linarii rei norcs, purpurafcentes, ritia pallido anterius, calcjri breui admodum pofterius domrtt: floibus evanidis fingulis fingula fuccedunt capitula bicapfularia duplici locubmento diftinfta; fepto medio feparaitte femina parva, rotunda, angulofait[^]ii cripta Liii3ris inftar fufca, hinc inde alate fepticontenta tV indenurrita. Linaciam lianc Vnetos & Pataunos Pharmacopios penuria partim, & partim ignoranria verfe Co[y]lodonis Populeo ungtiento mifcere tctatur Matciolus. Lobelius etiam Hores ex luteo virentes falfo ciadferibit in Adverfariis. Nafcitur, utiditnm ab initio, in anrquis uliginofisque idificiorum parieribus, maceris sf faxis. Iidfm pollere viribus quibus Linaria cernm eft, indicio petito ex fine ultimo. Floret per totam atthem, ac eqdem teruporeufque ad Autumnum

¹ ftmina p-rficat.

TEMPERAMENTUivt & VIRE"S.

Linaria vulgaritluteo ftoresmajore^CB.P. Linaria vulgar^, Eyft, Aqua Littaria aim drachmk duabm corkis Ehuli in pulvtrm redafitfumpta urmain potenter cit, quarehydropkis idmedicamen'mn exhibendumeft. Herba ipfavino deccfla acpoia morbum regiurn difcutit, item <y jccur Hh'rat ah objiruSiionibu^.

HALLUCINATIONES CASK BAUHINI Aliocuraque Aiichunim-

f) jfg.iti.cot. t.pl. i. Linaria Scspatia, C.B. P. Herbajudioforum,Tab. HxcpUnta nan ba-florem antenut ^Hu, pajleriuf taicari danatum, net capfuiam femirmlem daobus htulantntts diflin-Uam: erection eft Linaria a fimilitudine foiorum nngtifforum, Gi oblongorum Linariie mada : folia non fariunt adgenut conftituendum, fed adpfties deter-minandas, ati ftipiusdiHum. Linaria feopariatjl planta fui ftuerti, antuda fiortndi, eapfulas feminalet (3 ipfa femina produceedi; wee prater folia aliquant affinieatem habet eum Linaria, trjro a Li-nariiseil averruncanda & ad heteroclitia/\$ fui :jrt-neriti plantar amandanda ; fiend not prirflabiniis ad farm hujut operir.

Ibidem pi. f .eel ,J. Ofyris fruteftiens baieifera, C.B.P. tafia paetka Mtmfpetienfium, Ad. Lob. Cam. Ep. H*c tfti herba battfpera : ergo inter baeeife-ras reponenda, nonafimiltadinefoliormLitiar^ti, intr Ltnarias, eum folia uti dieiam nihil fact tint ad genus tonllituendum, fid fpeeiei deter minandas, fe-undum docfrinam nojlram ex libra naturg batflam.

?J].2U,rt/. i.pi. vi. Linaria 'majorfolio/oea-pitula luttis,C.B.P. Linaria aurea,Tr#£. Item pi. vii. LinnTta mititr faltefo capita/a, C.B.P. Li-naria aura, minor, Tab. H* plant* nil nifi folia

geruat Unariit, nee jlorem, ntc Capfutam femina-ttm, tmulto minus femma Linarix ftrtnt.; erg* nan fant Linitritit dkenifji; florem ettim p'irgs aurte injftiT explurimif Jlamhiulu luteis eonflatitm'tmbtm\ qui pftjica abit tnpappus; trgo jure merito Virgo-aurea faltiij.inariie nsbis appellahlur.

Ibiitem col. 2. pi. xv. Linaria main ana fiofeutit al-bitantibm, C.B.I', dnthyljii montana, Ligd, !,;-naria adulmina, Tab. Ntbl poffidtt Lintri*, a fine ultimo, h<tc planta ; crpa ineer httrrachtl's pUntat rffet di/pontmla, ntn a Jimitudme foherum infer Linariat. His poftis, Linanafcoparia , Ofy-nt baccifera frutefceni , linaria aura Tratt, 8 Unarm montanafive Anonymoi Clyfit.nonfuiffentab autbmbus Lmart* ditcnda, mutto minus a Cnlban Baubino inter Lutanns receiifendit.

Ibidtm, Linaria. altra caj>illtteeo folia, C. B. P. ft. x 1 1. Linaria ttuifalta, Lugd,]?Jt plant* ptmapetala, ergo non tfti Linaria : videtur efe Sf at&taei, fed propter imperfeilamQ mancamipfiut dtjtriptionem a Daleihampian Hflaria fn_a Lag-dumenfiallalam, cumnc qaidem eapfuliu defttrbat, rtHmfuimm judicio aliorum Botaniorum bee S<* determinamia jiribinmi.

D£ MONOPETALIS- BICAPSULARIBUS

FJoribus ridu antierius, nulfo calcari pofterius donatis,fed calyci herbaceo quinquefoliato ihimerfis.

C A T V T X I.

A N T I R R H I N U M .

L ychnidem agriam Pl l. 25. c. 10. J # 4 «Oakno £&* raquoKitocalo abcr^tJ mmm tamen ut Diosco-Antirrhinum (cum mtr afa^imtmfTM» «• it*****
Technidem agriam Pl l. 25. c. 10. J # 4 «Oakno £&* raquoKitocalo abcr^tJ mmm tamen ut Diosco-Antirrhinum (cum mtr afa^imtmfTM» «• it*****
Antirrhinum & Anarrhinon Dioscoridi l. 4. c. 133. dictum, quod fructu fit vituli narium simili. Theo- phrafto 9. Hift. 21. Anarrhinon, fructum tanquam nares vituli parit. Plinio loco citato An- tirrhinum five Anarrhinon, five Lychnis agria. Sunt qui velint ab eodem l. 30. c. Cynoceph- alium herbam dici, id est, canis caput, quod seminis conceptaculum canis calvam
cu' tar* exuta

exutam reptffentet. Veteres unius tantum meminiffe •videniur, at recentioribusplures funt dif-ferentia-

Antirrhinum cftplanta mOnopetala, bicapfularis, floribusrichiaiiiterius, abfquecalcaripoterfus, pars enim cjus inferior immediate calyci hetbaceo quinquepartito immerf/itm : capfula bifariam diftinguitur in duas cellulas utrinque femina continences, qua: tibus foraminibus forfum verfua & quafi iateraliterperforantur, quorum duoterminarmi cellulam I inferioren, & tertium fuptriiis in cellolam fuperiorem: in ambabus cellulis co nntur plu- l rima femina, liibruiia aui fujgpt Lmaria: autem capiulae bitariam furfum ver' .pcriuntur I continences in fe femina aut raica, aut nigra, compreffa, toliacea; aut anguiofii, l ave ant ro» tunda .• atquehilcenotis interle quamtacillimediftinguuntur Lmaris&Anr, : ma.

Pars TA B U L JE. XIV. Seftionis q'lintx.

Antirrhinum J
 Flortenfmi
 Anguftifolium majus fore^K 2 • Albo^o nobk. Anfirrhinum flare albo, Eyji.
 & flore albo cm rubris eidem, §>
 3. Rubro, nobis, \$
 4. Latifolium majin flore rubro vel albo, nobis Antirrhinum flore rulo, Eji. %
 5. Arvenfe J'eu filvefire minus, nobis. Antirrhinum fihepe^ Vod. Eyft. £ •

. Explkatio partis Tab, derim<equarta SeSionis quint*.

i) 2,9,4. A Ntvrhhntm majus longiore folio, nobis. Antirrhinum magnum, Dod.Gal. J~\ Antirrhinum majus, Cam, Antirrhinum, Dod. Latin. Ad.Lob. (cui & caput canis & caput vituli) »Tab. Antirrhinum puipureum & album, Ger.Os Leonis, Csf. Antirrhinum flore rubro&albo, Eyft. Aiuirrhino ranles funt rotundi, glibri, ramofi & fragiks: folia mulca, utplurimumlo^ga & 3Cuniinata, LinariaEfimilia, fedmajora, fubinde breviora Iarioraque-, flores fecundum caules in fuperiore parte inordinatimdigefti, form3oblongi, integri in fundo, anteriore parte laciores, durn conclufi, IK nafcuntur, permanent, ranni ori quodammodofimiles, & aperti hiantts Leonis rifum aemutan.es, coiore rofeorubentes, aut candidi, vel ex candido dilute purpurafcentes, non raroetiamfublurei, ei videlictrcui folia latiora & breviora; quos deinde capitulum fequitur oblongum femiunciale, luperiore parte anguftius &»tribus fgraminibus narium viculi autcaninicarjttisfimilitudine; inquibrjs continetur hinc inde furfum & deorfum verfus femem niifltiplcx parvum, fufcum aucfubnigrum, rugpfum: aliquando e radicibus non magnii fibri dependent. In hortis apud I-Salos, Belgas, Gallos 6V Germanos colitur & feritur, Florere incipit Maio, & reliqua, deinde sftate floret &: femina perficit, Hyemem autem, nifi cltmens fuerit, aut in cellis vinariis lepofitum, HI Belgio abique injurianon fuJint-r. Ditirur & Leo heiba, quern inter flores)lumelia 1.10. refcre fie feribens,

Narcift comas (y Mantis feva leonis

Ora feri.

• Jte_m infra ojcitat iy Leo.

Cicerum Antirrhinum inutile in medicina, ut aitGalenus, Hoc crefcens invenitCamerarius to jgro Monfpdienfi & Igemaucnfi & circaSalernum flore incarnato, luteo, candido. An- crrrhinnm pnlchemmmn flore luteo grandi fna ffonte nafcitur inter Savenam & Gcnevam. Flore habetur rofeorubentc, aliquandomaculato> ex candido dilute purpurafecnte 6V can- dido, Eyft-& flore albooris rubencibua^ ruberrimis oris luteis, Eyft. inmosiis Florentia: copioie nafcitur. Reprcitur in via frequenter in GnlTiaNarbonenfi, qua itur Aigremont, aliif- queinlocis. DaEur & tolio rotundiore latiorc & majore cxtciis. EftSf aliud Antirrhinum ioliodiifcft& Monfpelio delatum ad JohannemBauhinum: racile eft now.

S. *Antirrhinum* arvenfe minus, nobis. Antirrhinum minus, Tab, Ger. Antirrhinum par- vum'five caput fimiac,'- Anjirrhinum filvetre, (five Phytsuma) Dod. Eyft. Antirrhinum , rubrum

robrium vel album arvenfc, Thai. . Ofyris dicitur frequenter ab Sgyptiis, quia ob similitudinem capitis vitulini dicata fit Ofyridi eorum Deo, ut bos. Hoc dicitur filvestre, quod fativo minus achumilius est, & modice hircucum. Cauliculi huic sunt tenues, ramosi: folia oblonga, angusta: (lores nona cl fummumcaais, fed. in finibus juxta foliola exeunt pediculis curcis vix visibilibus innixi, Antirrhini majoris floribus fimiles, fed minores, colore nubo, purport*, aliquandb albo: capicula sunt minora, fimiliter breviora, tribus foraminibus in superiore & an-riore laterali parte pertusa, pellicula integens, viridis, qua: exsiccata & perdita canis blvariam refert: radices subfunt tenues, alb^fc Nascitur circa margines agrorum, & iripfis agris: Julio & Augusto floret, hyeme perit; istiva enim est herba. Dicitur Oroncium, Archigenis, Aoranium ^uoque, quod auriginem morbum levet. Rariufuse fit in medicina, ac*propv:er fioris elegantiam in hq' tils colitur. Fabulosa 6c superfitioia quardam auctur turde i Vntirrhino contra peftra, incantationes & veneficia.

ILLUCINATIONES CASP. BAUHINI,

Aliorumque Authorum.

PA&. 112. col. 2- pi- vi. Antirrhinum **orveni** ni/nut, C.B.I., A>itirrhiiim minimamjtbaLCam. J. B. Chati. Antirrhinum atterum minimum ripens, Lab. lean. H*t parvula piana floret profirt Linaritr cum tauia feu talcari in pejiortore parte, (i capfutam bipartitam fursam verjus, nan autrm fint caeary & triim foramiuibns pertufam; ergo est IJnariie emma perfiii <tfierier, igitar neutiquam Cajjurro Ha u hi no catitiffjut author/lls dicendiimfu-ijjht Annrrbinum, fed Liuarua, quamaqitiiUmptf-fdet tferam fea fymbalum Trqittjitum ad Unari-**m ttutjuit&nidum. Deiuic male Lebelim repatim**

adhibnit, procumbttitem liixijffe volui: fid nee protulitt, multo minus rep^nti! fcrpit i **rrgomagtsvi'** tin vertendum Lebctta, cautirulos nimjuai hirjktot, ereRos habtt, ergt > nwpotejl diet rtpensjenfe Lahtl'ii, net prucumbens fenfu ntijha,

I'ag. I U. II. ', G if J. (oilodcl CaffcartK Baulriit ut AnUrrkinUtn & linariam inter CtryabhyHitm **Li-** num, (ant qutbtu uihl ajjiuitalit htntcnl, a fine til- iima, **cum** Antirrhinum C/ Ijtatiatjnt menBfrtatiC^ Caryaphyllts au'tem Cf Linum ptntaptaln h(rbs_, de **OMAM** infra **cbtuuUm** Ucoproprh.

DE TETRAPETALIS QUADRICAP*JULARIBUS.

CAIT V T Xlk

R*U T A.

Ittem Diofcortii I. yc. 52. Tkeopbrajlo I. Htl. 10. ha dkitvr quod taMital fua ^r/vM » ¥>*» (fimtn cojgmctet j ut Sicandri fibol. **tradit.** Ruta Flin'w I. 19. r. 8- uhi fmriJi modu y^{il}<ft- R<>* forte JitiZaGrico fa; **finkU** emm Mam in rebut MobuntfiatU «*

Genera: Dirfcondi I. c. alia fatwa is borterfs: atia'imntana isfilwpi*- is hsc tidm **f** lex *C f^m **Ruta** mntaria <* fiMtjw* fntiva is bonnfi acrior ejl, is in **cibk** dmnata: est emmin kortenfi gtnm efui apt'wr, qut juxtt fcm provenit: fihefirk fativ* quodmmmodo JnmtKejt, isj"p. 33. vocam alamnum fdvefirtm Rut am, quod in Cappadocia is Galatia Afi- **attca**, Moly dmtur Frutexfolik hngionbus pZon candidate. Sum qui Rutam ham ti<n- *S «S1» 2r^sT «. fifl*fa» **Mot_hisc. Tkophrajlo Ruta cauSceunowJlat is arbor'**

ur: & 2. Hill. 1. ex balmite exit de anullione **F** s = 11:0 a blura sunt & 1. Hfl. 16. Rutula folia carnofa habet, fed caro in latitudinem diftenditur, non in rot- tatem craffatur: Plinio I. 20. c. 13. Sativa folia latiora, rami fruticofores: filvefti h horrid*.. d effectum est, & ad omnia acrior, &c. Addit Pythagoram in bac marem minoribus berbaceique co- **loris foliis a femina difcreville, cam latioribus foliis is co/ort***

Ruta clt planta tetrapetala, raro pentapetala, & tunc est quinquecapfularis (itidem hoc a luxuriante natura illi, ficut multis aliis generibus, contingit) ut plurimum quadricapfularis: omnes capfulae virides adhuc ftrictae funt, atque exficcatae fingulae apertae, femina angulofa effundunt nigra; cum folia, flores & femina, tum caules contacta gravem, virofum, naucofum & tetrum, ingratumque emittunt, & manibus communicant odorem: folia habet alata, binis, ternis conjugationibus affixa coftae mediae, extremum claudente folio trifoliato: in aliis foliis est plurifariam divifis.

Pars

4 *Ruta filvefris minor*, C. B. V. Tab. J.B-Cliabr. *Ruta filvefris tenuifolia*, Cam- Rura filvefris minor, Dad. Ger. Hare filvefris altera minorcaulemcubite altiore emittit, cujus fcapus in furcillos crebros lxxvelque dividitur, confertis floribus herbaceis onurtos, quos dehnlos lequuntur capitula retragona, multo mnora quam prarcedentis: folia fatis craffa, cerviiffim** ''' fta. *Idem* fervor & virus quaercpemintur in filvefri majore *Ruta*. Provcnit prope C, inter fax a. Floret circa adtatem, femina prok rtSeptembri.

5. *Ru* penfis tenuifoiia florum peulis villis fcatentibus, nobis. Hare cumpriore quartain ; quadrat lcTe,ni(i (quod notatu dignum,) petala qnatuor florum eleganti fpe- iiaculo m villis feu pilis lute is fcateant, qni diverfitatem a pradciera te-nuirblta latis tiare denio • caplulasfeminales product tetragonas, minores, capfulis Ruts quarts pares, atqu • ulis loculatnensis, qux fi^it quaterna, minutiora femine, angulofa, mi- cora excerar \iom prxditarum Rutarum femintbus.

6. *Ruta* 1 flore magno albo, C.B.P. *Ruta filvtfris Harmala*, Matth. CluHHift. Lugd. Harmt ! intinopolitanwD, Csf. Harmala, Dod-Tab. HamialaSyriaca, Ad Lob. Exigoa & pedal' • *c plantula, multos ab una -ad ice **cmittens** cauliculos, pedales, plurimis ramis donatos, ex viridinigris; in quibusfolia longa, denfa, pinguia & carnofa, liturarc vtrentia', multifida, Napelli tenuifblii (quernquidamAntichoramvocant) foliison vaktediflimilia, gcfitu lento, gummofo, amaro, aliquantutum tamen mortlaci: Horesin(iim- mis ramis candidi, quinis petalis conrtanres, multisinmtdio ftaminulis cum apicibus con- colorifuis priditi: capita capictiIisRuta;-hortenfisma)ora, moUiora taraen quamilla,Sf tii- angularia, lemene relerta inacquali, angulofo, rufto, aliquando nigrefcence: radix dura tit, minimi interdum digiti craflkudinem iquans,fibras colorc ex luteo pallcfcence emitcens. Tota **aatOB** ptanta graveolentis atque ingrati eft odoris. I'rovenit in arcnofis circa Alexandriam tefte Bellonio. Wurimam in Caftclk nova & circa Madntium & *Qaudalaiara* collibus 6> larto fob provenire prodit Clufius, florere Junio& Augufto, feptembri maturefcere; (cd Sc flore & lemenepragiwntcm effeOciobii.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Eft Ruta bortenfis, tefie Qaleno %. \$imj>l. 49. *ex tafackntiumisr ficcantium or dine terth, ist le- rtuium hifuptrpaTium, ad vntrh tormina & calicos, fafftones fffificatiffima ; tamfidecvRumi!' tins quam oleum d)fter^bu^*vnmifctai\ vel deniquefi epitbana ex tit pares. Vtraque Rut a is^ horttnfu isfdvtfir'n urendi vim habet, cakfatit^ exulcerat, ur'tnam c/>, menses duett; at cum cibo, turnetiampotu^alvumfifir.femeninacetabulimenfura vmobibirum contraethaliimedicamtn'a tfi pro amidoto: quin is folia ptrfi fumpta out cum nucibus juglandibut aridifveficit, veriena irrita isr intfficacia rcJtluTit, fimili modo fumpta contra ferpentium iftiu valtnt. H<£Cgrata isrtxpetita contraventna poftMithridati-smtmoriamfimpervetertbui fuit. Hominesufqueadeo veterum esfermauia cwffifi unicc earn hoc ipfo die contra pftim ig aha -umina commaidaM, Mithridati auro cbarionm fmj) e wj « Quinti Strtni Sammomci dt Midicina vtrfibt n confla, cujut hi funt,*

Antidotus vero mulnsMirhridatica fertnr
 Confbciatamodis; fedmagnusfcriniaRcgis
 Cum raperct victor, vilem deprendit in illis
 Synthesin, 3f vulgata fatismedicamina rifit.
 BtsdenumR.u«tolium,falis6V breve granum,
 Juglandefque duas, totidemctim corpore ficus:
 Hoc **orientedic** parcoconlperla Lyio
 Sumtbat, **naetncBsdedeiatqaz** pocuh mater.

Qui Ruta vesci nolunt > <itconfulendum, ut quotidie velbalfamo RuU, veliffus aceto, input- licum prod... »ar» <?alia larpvrisanuncleria inungere mn averfentur. Gmturami tataftu bihiaRutaexnnguu, dtcaihverocumanttbo ficco tormina atvipottI fedal' Facit is adpeciorts latexutnoe dotard, fbirandi diffimh .<... • ir pulmonum inflammationes, (oxenaitum^ articularum "• Inruwnuf. rr. minur. J^ & rigores, febrium circuitus repetentes pota, velut ante dictum. Idem ad inflationes coli, vultoe, relique intestini cum oleo decocta & infra vultoe etiam strangulatui medetur, si trita cum melle penitali sede tenus imponatur. For- vesacta ex oleo & pota lumbricos expellit: sed & articularis de'oribus ex melle & aqua

cutemfufa morbo cumficibus adhibetur. His iijdem inpotu auxiliaturjtemque decoSia in vino ad dimidiat-parteſ is affriSta: cruda quoque <is condita in cibo aciem ocukrum excitat^quin is oculorum do/ores impofita cum polenta knit. Caput dolentibua cum rofacea is aceto fuccurrit, ac profuentem c naribus fanguinemfifh trita is indita. TeftiuMinflammationibus cum laurinisfoliifimpofita, iy papuhrumeruptionibu* cum Myrtois cerato prodefi. Cum vino autem aut piper e ac nitro afriffia vitiligini tlb<z medetur, is cum iifdem illita thymos ac mynticias tolljt. Contraimpetigines cum melleisalumineutiliter imporiitur. Opitulatur is acie/> ^oculorum^hebetiori, fi additisfceniculi fucco ac me Ik. oculiipfio inungantur. Erifypelata,%rpetesis ulcera in capitemanantiaewn aceto^ cerufa, (s rofaceo, inunfione-fanat. Ipfayby Rut a Aliiorum Cepammque gravem halitumemendat^ feoft efum priorum commanducetm^ At montana (1 copioſe efiuf nnterficat. Atqueſifub id tempm^ quo floret-e incipit ad muri&^ °cjndituram colligatur, cutem rubifacit, ac inflat cum pruritu ac vehementi inflammatione, edy. itaque unftis antea manibm is facie colligcre oportet. Tradunt isrfuccum galinacefcpullktpifyperfum feles arcerere. Illiu*femen epot^um contra interaneorum vitia eft ejjicax: ideoque anidotis utiliter imifcetur: contra incontinentiam win* toftam feptenh diebm potui dfffd(is ceifabit. Rut a itidem in futilm puheremredacfd is drachma ponder e ex vino hauft a fugat dolor em capith à caufa frigid a or turn. Rut<e recent is in mortario lapideo contritdt fuews unciarum quatuor, in eoque drachm* femh dfl<e fctid* diffohta, cdlide bibita^falutar^pſefi medicina morbo caduco ; fanat etiam clavum, is diutinumcapitk dolor em. Rut a tandem quocunq; modo ufurpat a,interne five exteme, oculos (uti diclum) reddit acutos is claros, lacrymafque ficcat, idem hoc mo net ſchola Salemitana^

Nobilis eſt Ruta, quia lumina reddit acuta:

Auxilio Ruta?, vir lippe videbis acutè.

Item Foenicuium, Verbena, Roſe, Chelidonia, Ruta,
Ex his confice aquam, qua? lumina reddit acuta.

Venenk refifiit utindidem. Salvia cum Ruta facinnt tibi poculatuta.

Ex Ruta ſihefiri conferva, oleum is acetum fiunt. Compoſitionem diverſimode ex Ruta faclam vide apud Johannem Bauhinum pag. 198, 199. Confule Tabern&montanujn Teutonice editum: de Rut<e facultatibus uterque prolixè fat is agit.

Rutas Syriac<2 Harmal dill* femendatur adpurgandam bilem atram magno auxilio, ſi Matthiolo credimu^4, paraturq; Uepotandum hec modo. Con'ficiuntur in mortarium marmoreum grana aliquot prim clariffima aqua ahlutajs deinck ligrieo piſtillo teruntur, affunduntur quaqu<z unc. 4. eademq; piſtillo aliquantifrer miſcentur^ demum linteolopercolatur cremor, cui adduntur mellk optimi unc. 3. is olei Sefamini aut Amygdalini-unc. 1. is idomne propinatur melancholicvs, facit enim copioſas vomitiones, nee eft hoc medicamento aliud valentius contra comitiales. Scribunt Arabes hujus Rut* femine inebriari homines adeo ut ſubinde diutiu* dormiant: maxime confert in to melancholia genere quod ii Heros appellant. Recipitur etiam h#c Ruta Syriaca, nee eft levis momenti in pilularum dillarum foetidarum compoſitione.

DE PENTA.PETALIS QUINQUEC APSUL ARIBUS

C AT V T XIII.

G E R A N I U M .

rE^vo» Vioſcoridi l. 3.C 131- à gruini capitis imagine in fummo ejus cacuminevfenda, nomen habet: at mentions a^ ciconU roſtriefflgie, roſtrum ciconUnominant. Geranium is aliquibu* Myrrhk', aliis Myrrhida^ nlliu* Myrrhida') Pliniol. 26. c. 2.

Genera duo Vioſcoridi: alterum foliis Anemones, alterum foliis Mafa<e. Plinio triaſunt :primm fimile CkuU, foliis minoribu* , faporis is odoris jucundi: ſubjungit is Gr<zcorum fintoitia alterum foliis Malv^ iſtertium Anemones.

Geranium iiro nota generica hanc obtinuit a nattra ipſi datam, ut florem gereret quinis petalisconfantem^ atque fingulis tbribus deciduis iuccedentes quinque capfulas fingulares mem-

Geranium

Ptrenm

18. *Fetatk reflexh, nobk. Geranium viontamim fufcum, Eyft. Lob, Lugd. Geranium fufcum i*r ?nontanum, Doel Geranium Fhfumflore reflexa^ Pbtum feu fufcum { J. B. Chabr, 9*
19. *Petalk reUh & fanis, nchh. Geranium pullo flore^ClufHiJt. Ger. Park, Geranium Fhtumft- [ve fullo fiore Clufii, J. B. Ov. ' - ©*
20. *Radke A/phdeli, nobh. Geranium rad'uegrum '., .B.P. Geranium tuherpfumtS.PlateaU) Cluf. Hifl.is 4. h 1 Famgieidm. Geranium magnum folio tnfido fiorcpurfutt- h, ?B. Cbabr.*
- O**
21. *Tuberosum majut^nobk. Gtranium tuhercfum.*-J 0*
22. *Nodosum^tiobh. Geranium nodofum^CB. P.\ • ark.' Gtranium - 5. nodofum Ptartau, Cluf. Mifi. © <****
23. *Argenteum Alpinum bngim radicalum, Pcn, -ark, Geranium Alfinum argenfoum, Gtr. w*
- i&t.Romanumverficdorefivejlrjatoflore, nohps. Geranium Romamtm •verftcolar fiveftriai'urn, Park, Parad. O*
25. *Mofcoviticumpurpunum, nobit* Geranium Mofcovincumpurfurwm, Park ©*
26. *Trlfte^Cormt. Geranium trifle feu l7idicimnoifuolais, Park: & ij.Fteridum feufolwimanh tenuiffunt divifis flore-rubicundo, nobh. • Geranium f&tidum. Park-O*

§. 1. GERANIA ANNUA.

Exj'lica/io Tab, decim*quint*.

Geranium annuum minus batrachiadcp Bohemicum purpuroviolaceum, nobis. Hujus
^ j f tolia omnino Rajinnenli Batracliiidisfolorumfunr ymula: floresfat (atis magnos, pentapctalof ptiropoceruleos, quibus deciduis fuccedunc femina pariter quina, nigra, roftro adhxrenta, gruinum caput & roftum referenda. Hoc iblum inter Gerania batrachioidea aiimium tft, & ideo intercaetra notu facilius, & propterdurationcm annuamliuc inic-ruiumus, Rcteratqtiicunque voluetitaclGctania batxachioidea perennia. Florec ineunte iftatc, atque cicopoit iemtna pericit.

2. *Geranium folioMalvx rotundo maias, nobts. Geranium folio Malvse rotundo, C.B.P. Geranium columbimim, Tab. Gr. Pes columbinus, Dod. Ad. Lob, (cui & Geranium akerum Diofcoridis) Cxf. Huic folia funtrorunliufcula, exiguxac minoiis Malvitolorumxmulj, minon, interim candidiora, minus glabra, ambituquc ftrrata: caulicididodrantales, fubindc altiores, tenues, nonniliil pilofi, humi procumbentes/miilibus foliolis conveftiuncur; qimrimi alarum taftigiis fiofcucli iDfident parvi, pentapetali, fubpurpnei **fenrobeili**, aliquandoalbi; quibus fiiigwlis (kcidentilius fuLiveniuntcapfulK (in quarom fingnlis coiitiuenrur femina (in«uKO vtrfus bafin, qainqaefibrofia filamentis cxinde ortis, in acutillimum aculeum dt/i-nentibus, prrditi; qua' giuini capitis inira,&gruis roftum fupra refrunc, unde nomenclomune liule generi adapta[um,&^{rte} facts: radixcenuis& fibrdfa, fmgulis annis peiens. Na- {cirfr (ecus vias, locis in neglefcis & incolcis, pailim & ubiqne cerrarum. Floret plurima s-ltatis parre, quotempore femer perficic- ex quo deciduo fde propagat fingulis annis. Duplex eft, ma jus & minus, niajori caules majores,& folia majora & paulo molliora; minori omnia minora & folia aperiara. Sic tolia modo in protundiores, modo breviores & laras iacinias divifa func: Horis magnicudinetiam **differntt**: iiore tiiplo majore & caerule clegamioris coloris ex liortp dciprope Monfpdiimi **habetw**.*

2. *Geranium columbinum majus ioliis imis longis ufque ad pediculum divifis, nobis. Hoc folia'ima non rotunda finuata, <t iecundum, fed uncialia & fequiuncialia habet, incifa& divifa ufipw ^ i^tlitulum, Heptaphylli ant Cannabis iulioruni more, cotorefaruratus viridia: fecundotiores, pediculos conllmiles, nifi quod Hores & capfulas feminjtes ipiaque femina Horibus&fentibus habet maioru. **Teraaboc** fpecies & quinta in agris & praeis Ora- niuni tirtumjacentibus a **Qlubo Boltr** juniore **deteaz** hie **inter nateas** Geraniomni*

gente ; ex tbiiorum alis pediculi fingulares oriuntur, trientales, aliquando quadrantales, tenues, rigidi, villoli, rubentes, qti in pediceKos minores quatuor, quinque, aut fex fiflt, flofculos pencapctalos, (ubcieruleos in umbdlagefant: quibus est roftmm breve, quinia capfulis ad bafin feminibusfuisornatum: radix fimp]ex₇craftliufcula fibrata,alba,faporeecKiemcum foliis,

1 o. *Geranium* mofchatum, Eyft. Cam. Ger. Park. Huic affinis est *her.* fpecies invent a rior, tota major,coloredilutids virente, odore gratomofchi: foliisnon itaalte inrifis & nonnunquam tantum ferratis. Circa Borboniam copiofe fatis crefcentem invenimus nos. Crefcit etiam circa Monfpeliam & Geneva *ifu flam palais.* Virens reperitur Februario & Martio. Bafili^oitobri in irincre Mucenfi reperit Johannes Bauhinas. Dicitur "lofchacum ar-venfeab odore mofclii.

1 1. *Geranium* Robertianum fioredilute rut^ollo, nobis. *Geranium** Robe- 1 Jirinmm. C. B. V. *Geranium*Robertiamim, Ad- & lepn Lob. Dod. Cam. 'Ger, Gerar fbercangm muralc, J. B-Chabr. *Geranium* Robercianum vulgare, Park. Rupertbna vi • ' arf Herba Roberti & *Geranium* Diofcoridis, Lugd. Obvium ubique in ruderibus Gt 1 Jm Robercianum radicetenui,colorebuxeo, qux caules furrigit dodrantales & gpfefefles, liirfittos, geniculatos, rubentes maxime circa arciculos, & prope terram ramoibs: folia partim a radice, pardmexgenJGulisbirfatt, pcdk^o etiam r'ubenteliirfuto, Matricarhe tcrediviliira, fegmentis primariis dnncaxat tribna, odore ubi teritur Paftinaca?, laporc jftringente, per onis aliquantnlmri rabentia; intercdum totaplanu rubet: Horespurpurei, diluciorepnrpura friaci, pecali* quinisconfntes, ecalyccliirfuto acrovirente qainqaepartito emicant, apicibus in medio croceis: quibus luccedunt roftra acuta & mucronata, uncialia qaandoque, quins capfulas particul-jres, adhucvirides juntas tot idem firminibus oncratas babentia. Occmrk non raro floribusalbisdonnrui.¹ Provenitinhnmidis umbrofis, vetuftis muris, in ca:fis& pucfidis arboribus, loctique frigidis fit umbrofis. Floret Aprili & coca pene reflate, quo ternopore femina perficit. Hue pertinct *Geranium* Robertianum altenim, C. 13. P. *Geranium* violaceum,Tab. Ger.

1 2. *Geranium* lacifeliumannum caeruleo flore acu longiflima, nobis. *Geranium* bitifolium longillima acu, C. B. P. *Geranium* Creticum abnasm Jia-macodes, Lob. *Geranium* Creticum, Cam.Tab.Ger.CluC Hid. Park *Geranium* fpeciofum f.rcticum atuttmm longiflimis roftris, J. B. Chabr. Hoc *Geranium* late terram obumbrar, ramulorum hirbtorum, nodofbrumque congetie, foliis pridicorum longis, hirfutis, nonnihl rubeiibus, finuofis& ferraris, fapore acido & afringenre : flores cffrnlei,amocni, magni, peicapctali, CUOS liitcant calycis dehilcentis quina foliola e itriads fills media membranul3, pellucid^o, 3lba,commi/lis compofita: acus plusquamaliquandopalmary longitudinead bafin quiniscaffioribus feminibus, majoiibis, feniuncialibus& fiirfotisornata : quibus prificcitate a¹ ftuomedio nutritivo fefe disjungen- tibus,&• fpiraliter diamonds in ie convolventibus, apparetftilus quondam nutriiVHs ad plufquaia uiedinm midus. 'Provenitlponce circa Monfpelium, teftc Clufio, & circa Hil'palim, etiam exCreta dtlatum, unde ei denominatio. Floret Julio &Augufto, Septembriveroraa- turat femem.

1 3. *Gnanium* Apuhim Coriandri folio alterm odorum, Col. *Geranium* Coriandri folio odorun), C. B. P. Folia lufjusaliquaam cum Cretico Lobelii fimiJitudmem habere vide-ntur, 'nnia namque *lolh* cum illis quadrant, at icliqualatiara multum, laciniata magis Matricarix noftratis divifiiris, nifi puruni cHenc retufiora, ad Coriandri piopecaulem folia accdentia, mollia, liirlutie vix apparente obduaa,odorata,ut Acus molchaca difta ex hoc genere Geraniorun, longis petiolis fubrubicundis rulta,circa radicem parvam,flavam vel ruffefcentem, brewem, C terra parumelata, auriculas leu alas in imopetiolo circa radicis caput, nndeoriun- rur, habencia rubras: caulem profercMartio autMabhirfutum,gerticulisdiltinfum utCre- ticum&congenera,inquibus bina rolia minora brevioribus petiolis ex genculo &'binisil- lis etiam barbulis cartilagineisnibentibus donata,jit in congeneribus,fedmajoribus; ex quorum finu femipedalis cauliculus hirfutus, atque vifcofus exit, bafin habens quinquepartitam, ex qua pctioli quatuor aut quinqt prodeunt, Hores *automata* coloie violaceo, purpureo dilute, qmnqoepecalisdonates, cxhiiiutis toli6lisquinis^oquascalycis vicemgerebant, prodeuntibus, acutis in fummo, fed non pungentibus : his floribus fruftus longi, unciales &c lon- giores, veloti figura roftri aviura, prxcipueciconia:, unde nomen, comtcoloram effigie lucc- cedunt in imocraniores, in fummotcnuiores, ex quinque filamentis h'brofifcompofici, exfic- catisfeminibus verfus bafin difrumpuntnr,& a ftulo nutritivo feparanfur quina fem ina,hirfuta tieU f. am: itisunci^oibus^oquxinlemctipfacontorquenturgyralitervicularummore' atque

atque tunc obloigx ftae, hirtutar, filum inferms nudum relinquunr. Maio perficitur Cirino- lse, necalibi vidimus, inquit Columna: In agrorum five hortorum marginibus elatis ftequens occurrit fapore admodum adirringente. Invenit urediam aliis in loris montanis, ucincomi- tatu Valvenfi per femitas.

§. 2. GERANIA P E R E N N I A.

14- *Geranium* Batrachiodes folio Ar.oniti, C. B.P- Geranium 2. vtl **batrachiodes** alcernm, Cluf. Hiil. & Pan. Geranium batrachiodes crrulenm. Tab. Geranium batrachiodes, Ger. Uod. Gratia Dei, Lob. Icon., Geranium alterum folio Aconiti **uitente**, j. B. Chabr. Hoc donatar folii; frsq̄uentibus, nicentibus, prodcuntibus ex radice tuberofo, pluribus craffis fi- bris **donata**, felic Rantunculi platyphylli auf Aconiti lycoftoni pallido flere fbliis repon- d en ti bus fere, rugofis, fibhirtutis, in aliquot profundas lacinas divifis, in ambitu ttiam fer- ratis, q̄se guftata in itio adfringere Sflingam exficcare, deindenon nihil calefacere **depre- lienduntur**: cauiq̄ aflbrgic cubital! ut plurimum, firmo, rotundo, genicularo, in multas alas diviio: lummi ramrv? blongisped! Ctilis floresgt. -ftant, quinque petalis confiantes, Geniiniib; !- tratliiodis, quod in hortis Bdgii 3lirur, floribus forma parts, panto tamn m'mores, non ut jlli ca-rulei, verumcx **pyrpnra** rnicientes; decemftani inibus cumftilo ex umbilico floris pro- deuncibus, deinde oblonga ereftaq̄ne rofta, non inflexa ant inclinata, quinis utriculis ad eo- rum bafin turgentibus, & fingulis fingula ft-mina in it- continciitibus, q̄tE **maturitatt** beneficio tilamentorum fibroforum recurvantur verfus metlium **ftiii**, a horum **Geraniorum** more: **ra- dix** rereradici prioris Clifii rcfpondet, & fumma teilure in plura, trafta, inttni (. quf **rubentia** j capita cxmberat, q̄os fibras ttiam agentia, fingulis annis **aogencor**. Crefcit hoc in Pannoni- cis Stiiacii que Alpibus, mifquam tamen abundanrius **croam** ftipra *Gamingam* in illo afcnfu et *Harenalkn* jugo, ad flublinu-s fcopulos *Vurmftaia*; in quibus Horet Julio & Augufto, in hois- tis auttni **Maio** couipicitur florex purpura rubente, albo, ^ & partim albo partim viol; , **co**; **menfe** poftca **femina** perficct.

15. *Geranium* Batrachiodes odoratum, C. B. P. Geranium Batrachiodes alterum, Dod. (*Geranium* Batrachiodes longius radicatam, Lob, Lugd- **Ger.** Geranium macrorhizon, < am. Eyft, Geranium **Batrachiodes** Jongiis radicatam, J. B. Chabr. Spcftabili flonim amantate nulli Geranio ccdir, q̄i ex calyce globofo, ftriaco, rubente, hirtutoque, odorati e- micant; purpuroviolacei, ex quints petalis compofict, furrefto ftaniiiium purpura fcentium al* tiore-cinno: oriuntarincaolibus geniculacis, dodrantalibus, cubito nonnnnqaam altiori" bus & Kirfutis folij, tiivitarii quodammodo Saniculx, es virort **incana**, pilofa, odorem fpi" rantianoningratiim: radix oblique afta ftrpit, longa, minimi digiti crallitudints ribris Sf tu* Uribus genicuhus donata, toris rubtna, intus albacuni adirftiune valida, nefcio quidar O* matici guttoi ot Vtrtns. I'rovenit in filvcilribus, ac locis exit par um cultis, plan is pot i **LE** qv^ montanis. Et hoc & prius perenne ad hortos transferuntur. Flores plutima paKt ftatis vigent, **qoo** tempert & feminaperncit.

16. *Geranium* batrachiodes **n h m i oln**™ & « au, o & « nH «, varittm, nobis. J. B. Chabr. Oeranjumbatrachiodes, G/atia Dei Germanorum, C. B. V. Geianium **batrach** iodes, LJodXani, Lugd.' Geranium 3 batrachioidea majus, Cluf. Hift. Foliis eft limilitas cum vulgaris. autecrte vix notabili differentiavariantibus: caules Cunt bicubitales. T<»a p u **Lanigine** quadam albicante obrefta: flores violacci aut a!bi, aut ex albo & violacfo mixti, \ quinispcwlisconihnces: cal) xctijm quinis conftat foliis, c quo, **flore** decidnie. roftum «• I **mcr^it** notabih hirluue prxdicum, unci amplius minus longtim, defincns in apicem tcnac*. (u n' rin^ Tv^ 1^ ^ 1^ u^ (icdr, i Cfm ') » ♯^ **tasemm** filamenn capreolorum mlbr v ontor ' , , , ' T™ kumi **femn?** i uisenpiulis invdnta, **mat** liafi ; Klhircntia, obloiiK" ' " III! : * puuo, Lipored, lci^ rato; mtolirsaurcm mtlhis faporeffitu dignusrtpcritur. Spont que A... tis CoTmmhe c/0 TM^n P^roctli a Danubio, binis fupra Viennam millribos, • dif- etiam in Bohemia non procul a b i d o r r i b i l f i a r i b u s a b u r b e P r a g a d i f f i n t e , v i - cinisque Francofurti P^tJs **fitagris** gramine confitis. Flores imuntezftatc producit, & **leli*** aturcicunr.

17. *Geranium* sanguineum maximo flore, C. B. P. Geranium sanguinarium, Eyft. Ger. Geranium hzmatodes, Dod. Gal. Lugd. Cluf. Pan. Geranium hzmatodes fupinum radice reprice Lob. Icon. Huic multafant caules admodum ramofi, frequentibus nodis cincti, villis obfti, fuperne qua folum fpeftant purpurafcentes vel rubentes: folia & fingulis geniculis bina, con- trariis

rrari.sped.culmnafcntia.GcraniicoIumbinalcermsfofiis haudmakum ahfamilia ^m Quin
 quelacmiasadumbihcumfcredivifa (q_M magnaexparcein tresaliasmmoresbciniasS
 funt) lanugmepubelccnna, fuperncvirentia interne nonnihil canefcentia, mfta finTM
 exficcaue: ex fopcnonbus alis oblong, narcunt.rpedici.li, fingdi ^{mmSs&atmS}.
 remoter reliquas Gerami fpccres maximBiB, quinis petalis confantem, parvs Rofc aut Ciffi
 nian[^]flonpaiem[^]oIorcrubrofangmneove[^]ndeeiagnomen[^]ecemintusrtaminulisJarentibnJ
 demde capita mucronata feu roftra pciicagona (bbveniunt, femen (nti reliqua hinWlaffi ? in
 rumefcentibus utpcnlts fingulis fingula continentia, quod maturum cum fbnitu exilic cirrim"
 yolventibus in fenWnt.s.queradmodum inxsteris utriculorinnfilamerMs,qi<ni, fufcend^{TM*}

tibus capfulas totidem habentibus,coiuience*^m fe femina adhuc nondum oerreffe cxficr-?r,
 radixfatisrafla,rub,fcens,ahquoc films Uonata,novasfub terram propaginw finptilis annis It
 uera (p arg^{^^} non modo fimiliter fibras agunc/ed «iam craffioribus radicibus interdum fffe
 firmant. Nalcitunnonniba3Pannonia:& Auftri* infra [^]//wwcaedmsrjonranisfilvis edi
 toribufqoe gramme.s locis. Mons pneterea arci Gr_r&« imminens[^]tf?r[^]UM in Pannon

— ,,,,,. u,_{IKii} muiiiciisyewtrij'rlwHnz in rannonn
 intramni totus ferceoGeranio confirus, quaparteoccidencem i'pcflat; ^{iiUzczhmFrancos}
 furte vicinseo abundant. Nos copiofeinliva Bononienfi fcundo ab urbe Lutetia Parifio-
 rum lapideditanteoftendimus, 30. abhmcannis. Floret Maio& plerumque ccca actate, &
 codcmremporemattira edit.

18. *Geranium*. Phamm feu fufcum petalts rcfiexis, nobis. Geranium monranum fufcum,
 Eyft.Lob.Lugd. Geranium fufcum &mtiritanum, Uod. Geranium hifciim five maculatum,
 Ger. Geranium fufcum, Park. Geranium phsum Horc refiexo, J. B. Chabr. Sptciofum admo-
 dum eil hoc Geranium, foliis amplioribus qaam barracliiodis, in ofto plus minus legmen-
 tad ivifis,angufta in excremis/ed latiora vcrfus pediculum, fubhirfiita, nigricantibus macuhsaf-
 perfa, pframbitum Jatiufculis crenis confpicua,nulla"ordir!c praxlita: Hores fumniitati in fid en t
 p[^] ntapetali, purpnei obfeure, &i pene fufci, latis magni, accedences ad flores Geranii tolio
 ocforato, qui camen iuverfe feu repande concorquentiir atquerefleftuntur inmtdioapicum:
 flores evanidos feqtiantar roftra uncta longa[^]adquorum fingulorum bafin inferiis vcilus ca-
 lycem quinqiefoliacum ccrapEorcapfoIa! quma5, virides adhucarfte fib! ^{vnt/v\ v} guarum fin-
 gulis contmentur fugtila (emina fufca auc fubnigra. Kafcirr in quibuiclaiHGtrniaaij; locis.
 Floret acflatecnm carte ris,& durante eadem femen marurefcic.

[9. *Geranium* phacum feu fufcum petalis rcfis feu pianis, nobis. Geranium ptillo flore,
 CluC Hift. Ger. Park. Geranium plixtim five pullofiore, Clitfii, J. B. Cliabr. Cubiralcs fre-
 quentesque ab una radice producc caules, firmos, geniculatos, virides, hirtutos, liingnneis
 vcluriguccis aperfbs, laquginc pubelcentcs, in aliquot ramos clivifos • in quorum fjiigfo ad
 fingnla geniculalongi enafcuntur pedituli, in qui bus bini Horesquinque Kiciniatis (prxctr ic-
 i rquoruni ufitatam forma m) peralis conftantes, quae laciniata petala 11011 obi'etvantnr Hlfcu-
 paira Iconiim Clufii, aiitParkinfoni,aur Johannis B.uihiniChabii'ivc, qui IcoQesdcIanipfere a
 Clufio: coloretft faturatus tubtnte 5f tjiiiafiatio,medium Horemoccupatitibua mukis fhniinu-
 liscumftilopromint!irt:pet3ia quina. Horis liujulufca five pulla lunr, plana, ^{reQa<}, ^{flonrc}
 panda feu rerlexa,atgue eo nomine facilediftinguitur a Gcranio praccdcntc 1 8. /emina deinde
 Jljiccediir in valvulie feacapfuliaad bafinroftri qoinis (fiftinfiis, fingnia in fingulis propriis
 flu capfbis indufa, ^{qix} una ^{torn} capfijlis matur irate £atcemcre eft in rtilifjuis Gera-
 Jiti fpeciebus) convolvontur in le, & poftca (emina ex capfuiis defiltntnt fufca • folia idi ex
 radice Anita, ampla, mollia, Iatiogine obdafta, excema partenervoili, Geranii ^{bzircluodk}
 familia, qiiinis, fenisautftptenisprofundioribusincifuris divifa, non tamen ufjoe ad
 titiiliilicum,deinde peranibicumk-rrata, qualiaetiam futit a fingulis nodisfub ipfis infignka:
 ncurmagna, tnberoQ, in mulnis craifasS; rubentesfibras tlivisa".

20. *Cetarjium* radice Alphodcli, nobis. Geraniaqi i;idice grumofa, C. 13 p. Geranium 4.
 Bulbofum Pennari, ClufHift. Tul)crofum fextum Plateau eidem. Geranium bulbofbm Pen-
 "nxi, Ger- Geranium bulbofum doftoris pennart, Park. Geranium magnum folio rritido fiore
 purpurafcente, J. B. Chabr. Radicem habet ex mates parvis tuberibus obloagis'conflaram,
 Alpliodeli inftarconcunturibus in apicem fuperiorem, qua? omnia tubera oblonga funt, ftrfi.
 Ibraia, atqueX fingulis tubcribas ink-me fibra fatis cralfa propendet.- caulem eniittit ca-
 ; m_tgnicniatnm,atqne juxta radicem& genicula parnm ruljencem: e fingulisJisgtnicuiis d_{uo}
 (oieiuftcalis pediculis infiftentia, internas utpltirimum.qninasaliquando parteadiffifla[^]
 dm fintuls in ambitu itUEqialket incifx funt: e fingulis janduris)«xca roliorum exortum
 ^trinquefoliola rnti[^]ronata exoituntur: Hores in fmmis ramulis binarm proveniunt, brevibus

petiolis mfidentes, rofeux quinis petalis conflati, rolore ex purptireo rubcfcentes, forma flo-
lum Geranii czruleis fioribus prardici, led paulominores; toHolss quinque mucrdnarisap-
parentjbtis ininterfittiis petalomin, qua ante expanfosflores inlerviebant iifdtm pro **calyci-**
bus feu involucris. In Daniae agro Halrhienfi provcnit, unde doSifltmus & **Cfofip** nmicif-
firmis D.Turnerus CollegiiMedicorum Londinenfium focius artulit, Stdonoipti Clufiode-
dir. Floret **aestate**, & femina eadem **doraote** perficit.

ij. Geranium niberofium majus, C.B.P. Geranium tuberofum, Dod. Lugd. Ger. J.B. Chabr. Geranium bulbofum, Lob. Geranium bulbofum viilgart, Park. Incptc abaothpnbs dicitur bnlbolum, **taberofijj^dici** dubcr **fecondmndoarioam** nofram.) cuberorum apciusdi-
citur, qaiæjus r<^lices **confant** tuberibus nniormis fublincis fi lecentur, non **aatem iunt**
runjcis majoribas, involvntibue minorcs; ergo inadventencer plurimac plants, qua: rtvera
funt tiibrofe, ab authoribus bulboiæ recitancur. Geranium hoc uiulcis luxuriat cauliculis
ttiiiiibus, terecibu5, & aliquaiuidm vaniofis: folia ut Ranunculi phragmitis in **mnkaa** licinias
divifa ad Anemont^-yyulHametian] tolia acccdencia, majora tamen: Horcs in liimms ra-
mulorum alis ekgantcr fed dilute rubentes, extguis rofisperfimiles ttrt, ptntapctabsTqui
ilccidui oblongum, tenuem acviminaiumque inltar gruis rofti i pott It rtulum lelinquunt; **ad** cujus
bafinqoina capfuL, viridesadhuc fimul junfti Tlnq'uefe nurrientestocidem femina, quæ cum
feminibus exficcatj, ope filamntorum quibusadhxrebant inter nutriendum in fe convpl-
vuntur aliorum Geraniorumfetinum more: radixcrafla, rotunda, tuberofa, tripliti rubere
compaftili conflata, qua tranfverfim **kSa** unitbrmis apparet **fnbftantii**; a tuberibus ipfis p!u-
rinw fibra: lariscraffe pendent, jeneficio quarum radices nutriuiuur. Crefcit in **Dalmatia**, 11
lyrico nonnullifque aliis orictitcm verfus provinciis, locis tnculti, **nullo ferente**. **Apt***
(itrmanos, Gallos, Anglos, Belgafque & alibi Iwrtenleeft: tota kreaçtate **floriferumcfe**

li. Ceraniam nodofum, C. B.P. Ger. Park. Geranium 5. nodofum Plateau, *CM.* Hid. **Gerauoin** 6. tubcroium Plateau cidem. Aliquoc hoc a r ad ice prom it folia, longis **pedtenli8j**
fads firmis **innitentia**, in quiqucIacinias alee divifa, inter qui binauc terni caules **affiir-**
gunt pcdales, graciles, ex rufcopurpuraicentes, geniculati& notlofi, binaad (ljigulosarticu-
los leu nodes krentes folia, longis'pediculisinrtitentia, &cs adverfoorta, **intresatJtquatno**
lacinias duncaxat fefb, dcinde e mediis **alls** loigiore pedictilos protrudit, in quibus fingulis bini
Itmper flores conjugatim nafcuncur quinque per alis **cotdaxis** ftudtlitjiiium in mediopaci*
entibus (ur ttores malvacci) conftantes, purpurei coloris, fed quibuldam faturatif!
venisdiftinfti, **piocabrance inmedio rnbroambooe**, lummotaliigio in quinque partes lill"
quideinde in longiuftrumrotellum tranfit, quod interna **partc** in tunicntibus qiiinis utric
(cnitnaquinacontinec, maturitate, ut in rtli<iuis, ffonte exilicntia: radix nodofa **ctl&**
nicul.it.!, **aliquot preterea** fibris longis, cra/liis don a c a. Floret Maio, & tota dcince]
in A^tumnam **ufque Bores&&mina ferrenon** dtfinit. Hanc piantam una cum ICOIK
turtum Mo-no Humim impofitam utbcm impcrialem ad **Clufiom** mittebat boncftiflimus ** [
Jacobus Plateau, qua: femine fpoiue **deodeni** **Ucica dcinde fe** prop; j<avit i
tinet **flu** tuberofum quidem cum **pribrc**, **etiamfi nibera adnafcantur caolibus** circa
bretn & cOftobrem qua? anno feqHtnK non appamtre.

23. Gt'r/i//w/iargemeumAlpiiumlongiusradic3cum, I'on. Ital. Park. Geraniumargcntt
Alpinum, Ger. Radicem protrudit tuberofam, longam, rcfta in [trram defcendentem, (tt,
jum verfus terra: fupercitum in Una ant tema capitnla brachiatam, ex fingulis quorum <:3?
luit **quina** (cnavefolia, longiffimis peiliculis nitentia, inquinafenafvc lacinias divila, ear-
que tnbram verfus mucrones **feftaa**, mollia & **incanJ** LuiugincoWufta, ArKcntma: col-
nicer roha onuntur pedicul. **alii** longi, in **faftigio** (ultmentes Horcs binos, **tenw . fatis an**
quints petalis **bifidis conftantes**, pallido rubris lincis notatis: in medio apparent ftanuna^111
iiilo quibus fobveniunt toftra, brevia, aliorum more femina ad bafin corum **fcreiuu**. **
peiwbatm in monteBaldo a **Jobamu Poaa**. Flora junio Julioque, xftatcielmuj perfic
tur Ictrnnam **rapibm Suram** fpeaantibusorientem.

^Gnan,um Romanum verficolor five ilrutum, I'ark.Parad. Hocmulta lukt folia<J
Vf TM " ^ " igranotata verfus toliorm d.vifuras, qua: in quinasaut fcnuflje-"1^
divia, " 0 " v?Ud in 35 f'^ tun, quoad iormam, **tum coiem valde accdunc O-jB**
fulcofeu illo, n... quod fint minora: inter folia oriun... & aiores, tu...
ad f...cula: in faftigio caul...
ftanS que venis atropur...
icptus naminulis quibuld TM, **hbfoccedaqt** -olh, ad bafin gcr.ntia quuus **capfulas**,
e^flon^finidorumcftftilt.si
toidem
femina

totui dantts pecori anmnt'ifve'cruenta m'wgent'thws prodttfe.

16. Geranium fanguineum maxima flare., C. B. P. Geranium bdimatodes, Vod. Slavonics mulieris ha jut decoSium ex profluente aqua minfice commexdant in capita graved'we^ ft finciput ubi dolor eft eoabluat'tr,deinde herbadecoda fupmmponatur^pofiTemo (quod'fuperfuiionenon caret) iff in prof''' . . nde aqua haufita^ abjiciatur: ad fanguimm comprimenJum imprimis commemlatur.

MALI UC "NATIONES CASP.^ BAUHINI

Aliorunique Aathorum.

P stg. US, eel. r. jt. \ . G.i at ' » Batrarhtodet | jfsrezartcgatQ, C 3.1'. Geranium variegatum, Eyft. Hoc Geranium vi'idem eji cum V. Jin if tr.n-tam tolcre digtTi, trftoprodivcrfafjicae aCajparo Bauhinn at&ibtri n«n debuit.

)>ag. eadrm &(tl. eh^t^l, v11, Geranium ia-trafbio/dts, Cvll»m grais Getnmnarum,C B.P.Gearaurjm\$. fitch. Qruinalh S.Dod.ZSGTUNalis Derion.r/, Ln<[d. Efttatittm Gtranium Jtyl/trtiaaum infra a Caffpare B a ubi no in Ptmacc citatum; trgo ma-U bu oCajpara BatihinoproGeranio batrachnde hie litatxrCJ colfotatur, mttttipticat cairn tiuiajme ne-iffte.

• Pa^tarftminL'tadem pi. ix, Gtreminm tubtr-fum majut, C.S- f. iSctL*.pt. X. Gtranium tube-refam mam, C. B. P. \$ Cam. adto jhrilit mihi vt-

dturCamerariidtfcripth minorit, ufrejici mtrta-tur, nee Jheciij tjlhahenda majoru.

Pag. cadem col. i.pi.xm. Geraniumparvum ft-Itii ?{anunctii, C. B. P.Gtranium S- fti Stlmatui-tenfe rojhatum, Ctuf. Hijl. Ntc tiujtu defcriptio rjt 'Ura; idto anftjjeicies aifiitSa in incertq'TiUnqui-mus.

• ?"£. ^P- e"t' -pl-V' Geranium fypertiattumpri-mum,C.B.P- Geranium Robertia7ium, lW. Lab. y pt.vi. Geranium Rjibertianum alterttm, €- B- P.p.Vi. Gtranium grmaU, Lugd. Geranium violaccum, Tab. Ger. Dcnot&nt hire (ynonyma Geranium fyber-tianum fimpliciterfine difiunUiane duarumfpttierum, ergo mahadhibrt Cajp. Baubinui duos dijiniua: Gt-ranii fyberciam jpttes.

DEMOLLIENTIBUS PENTA PETALIS,

Seminibus in > Jus r^tatim cingenus ftilum nutneivum.

QJV A s v NT

. M A L V A : & A L C E J -

C A T V T X I V .

M A L V A ;

Alva malva Dioscoridi. l. 2. c. 144. & Theophrasto 1. Hist. 5. à μαλίσση ab emolliendo IW^fitrenomen baba \ ttian P\mol. 10. c- 21. WMnt'e: tdque propter naturalm lent-rein fuum tit Paulws ojjent, undt aMartidi l. 1 o. inollis vocatur. Larinh Malva, is Vamni quah moha, quod ahum mdlht, qua antiqui in acttarm cum Laftuca ad alvum fubducenda utebantur.

Duplex eft Diofcortii is Plmio -Jativa is filvejlrk: fubjungU Plmm duo tjft gwra, q** felicrum amphtudim dijarnuntur, majorem Gricos Malcptn vocare in fativk \ ah tram M/iH' 1 char, efilvefthbut, cut grandt folium & radices alb*, Altbjia vocatur, isc. Tkopbrajlui^ plkm txprjmere videtur, dm i.Hift,s.^A. Malvam ittarkrem tranfm fcribL k" tofim wtelligens-. dum.vax 7. Hifl. 7. ait Malvam coqui is cibo idmeam ejft, vulgatm Mal-vamutnuit. Antiquitu* in Malvarumfoliis fcriptitatum, Cinna antiquus Poet a indicate cuj*

f n l > n(e'p'umU> " ? " m / # r f &tf he respexife plhapram, qui »i nlianus MM 1 TM* v 1 *o)tvcejvium jatiiUii/mum file dtctbat.

lortiro, — *'—?— mus prop^tr ronlormitatem cum florum pentapeta-ranium certo numero, quinario fcilicet, producit femina in captulis fuis peculiarHms, arde cingentia bafin roltri, ita Malva incerto numero multa femina propriis itidem the ura, five glabris five afperis, circulariter gerit ambientia ftilum fungofum noennvam: infupe. olia Malva lunc rotunda aut laciniata ficat folia Geranii. Nota igitur generica Malva fit hac. Omnis Malv.1 tit planta pentapetala, produccns poff florem evanidum multa femina femi-circularia, five glabra, five afpera, cingentia ftilum nutritivum, fungofum, qu. d hoc M; nri-dia arte fibi adherent jungunturque & placentam cafcolumve rotundum referunt. rione magnitudinis, eft vel maxima arborea; vel minor; vel minima: rione loci, vel hortenfis, vel filveftris: rione colorum florum, vel eft flore minore rubro, violaceo, vel albo.

albo, vel lneis iqualibus fubpurpureis ftriaw, denique ve] flore majore Rofae inftar, qua; Malva hortenfis dicitur, cujus rlos elt vel fimplex, ruber, ruberrimus, lufcus feu fubniger, luteus lc LI luteopallidus, qiii reperitur flore majore caeterarum more, & minore; vel multiplex (ea flore plenumjiibiis pr^diftis coloribus prsdicus :rationefolioruⁿⁱ "el eft folio [ocundo, finuato, multifido, vel **Hedene** vel **Betonics** foliis: ratione duratio is, 'ft perennisvel annua, **cadefcens** urplurimum, vel acaulos, id eft, floresadeopropinqm. regent, w nulli percipi poiliit caules, acque ejnfdem eft generis cum Malva hortenfis re & femine.

Pars - T A B U L A XVII. & XVIII. Secti, - ^ui
M A U I fitvestres annuae.

1. *Hirfuta folio cordato^ nobk. 15?*
2. *Trim(flrk flort cum unguibm purpurek famnibus multU mgrk rotundk fubter membranaak crbkulk duplytatklatentibus, nobk. Mdma trimeflrk, Cluf. Hifi. Maliftaft'wa Hifpanica, Ger.*
3. *Folikcrifpk, nobk. Malvafclikcrifpk, C.B.P. Malva crifpa, Dod. Cam. Ger, Eyft. J.B. Chabr. 5*
4. *Rotundifoha flonbm omnium minimkpentapetalk albk vertk'tl- latim getiicula ambie.ntibus feminibnfqut arife eifdem vertkilhtim ilidem adbrnttibw: curtk pedkulk, nobk. £*
5. *Hirfuta folik Hedene inftar angulofls, nobk. \$*
6. *Folio vario, nobk. Malva folio vario, C. B. P. 'Malva fldata, J. B. Cbabr. 5*


M A L V £ f i l v e f t r e s perennes.

7. *Procumbemflore minore albo folio rotundo^nobk. Malva filveflrk flore minore folio roivndo, J. B. Cbabr. Malva filveflrk pumila, Fuch-Dod, Malva vulgark flore albo, Park.- ©*
8. *Proccrior feu datior rtEiave flore majore fubrubente autpurpureo venkfaturate purpurek pifto folio ftuato, nobk. Malva filveflrk refia, Cord'.tnHtfl. Malva flore majore folio flnuato, J. B. Chab. 0*
9. *Hifpanica flore cameo ample, nobk. Malva Hifpanica flore ample, Park, 0*
10. *S'tcula folik mofchatit crifyh, Boccon. 9*
11. *Betonix folio, Boccon. Jacob, Zanom 0*
12. *Seu palu/lrk, Bifmalvaly Ibijcut, nobk. Althaea Diofcoridk iSfPlinii, C.B.P, Althsa, Mattb. Fuch- Dnd. Tur. Tab. C cuiisr Ibifnj Ger. Attb*a vulgark, Cam. Tbal. Cluf Hid. Eyfl. 0*
1 j. *Folio profit ndc lac'miato isr ferralo, nobk. Allbeea folio prof tin- de firrato five dent ato, J. B. Cbabr. 0*
14. *Hifpanica folik mollioribit* undulatk in margine, fupirim mi- ck fulphurek ad fokm tucentibus donath, nobn, Q*

M A L V B, maritimi arborea?.

- ~i\$. *Vencta diffd pa'rvo fare, nobis. Malva arborea, Mattb. Ep. Mat- va arborifeens, Dod- Cam. Ctf Eyfl. Malva arborea, f. B. Cbabr. £ •*
Marit *Una arborea U6. fto/lrat Blitannica ,nobis. Malva arborea noflrai, Park, \$*
I r *7. Folio acutn aurku. lato'Htdtr<£infiar, nobk. Althfafrtitefcensfolio acutopart'o flore, C.B.P. Althsa arborea Olbi<e, Lob. /cm. Althta*
L *arborefcens, Cam. Tab. Ger. 0*

MALVIE hortenses feu Rofer.



Explicat f i. My* i V Alfilvefins arnuu.

MAlva hirsuta folio cordato, nobis. Caules edit multos, hirsutos, bicubitales & altiores, quibus adherent folia diculis etiam hirtis brevibus innitentia. res pentapetalo, s Hnrl, ^ «.1, s prodeunt pdicuh alii breves furtincntcs Ho- rimz majores, secunde vero minores, dilute rubentes: quibus succedunt caseoli aut lacentula instar nutritivum gerentes. P • L V n u l u (emma fcl) unaria rotatim cingentia stilum gustu: semina perficit Asia. Annuu est planta: floret Julio & Augusti.

2. Malva annua trimetris flore cum unguibus purpureis feminibus multis nigris rotundis subter membranaceis duplicatis orbiculis latentibus, nollis. Malva trimetris Clu Malva aestiva Hispanica, Ger. Malva trimetris flore cum unguibus purpureis f ^ J : B _ ch2br: Bipedali altitudine crescit hac Malva species trimetris aut quadrimetris »o terete, midu, b uagine tamen aliquantulum obsito, qu di- fributa^bi unt folia, ten viridia superne, & in cinat: nata tamen & in am? f f remum caulem & ramos amplectent, i anguba £ T, TMm h i i h f T ad Alti « pene formam accedentia: flores summis ramu h i i h f T ad Alti « pene formam accedentia: flores pur coloris unguibus i urat ore purpura mfectis; prodeuntibus ex .ml iico ftU nib... pa UidiSjviUj; 2 TM i T P 1 ^ 1 8 r « u ^ i ^ men.brariaceis dioli infe super e parte cavis, duplicatis, circulariter seu rotatim latent semina nigra, plana si * qualia: atque hac sola nota à ceteris Malvis notu perquam facilis est hac aestivalis trimetris, quia omnium Malvarum semina rotatim cingunt stilum aperte visibilia huius 30- tem semina infra circulo... fibris

3. Malva crispatu 9ris, Lob Malvacrispa, i Y c S 1 • " ^ M dot Tab. Ger, Eyft! M ^ brevis homini, caule constat crassiusculo nonn i> Imit Malvx, licet (irannu^{3*} rigid osU, ntwlo m concavo & in ramos fissa: folia palmaribus peg l>1 anguilloso, viridame, g * 3 ^ furis: g-abris appensa, latitudine memorabili satis, brevibus p illa dorttfa; n<n K¹¹¹¹ laciniata sunt, sed etiam crebro flexu, reflexuque per margines oifpa: floresadpedicul^

qui folia fuftinent exortum **brevibns** petiolis infident, minores quam **Malva** fiivefrtris pumili ieuprovolu'tx, colore ex dihililmo rubore albicante, ex qumque peralis compofit, **calycehifato, virefcente, quinqncpartito**, inquovifuntur in orbem congefata femina Malvx pumilx fcminum acnub: radix fibeft dodrancaJis auc longior, alba, mediocriter crafla, fa- jore,ucin reliquaplanta, glntinofo.

4. *Malvtt* annua rotundirolia nonbns omniim mniimis albts p stalls vemcillatim ge- nicuia ambieneibus&fcmiibusarfteiidcm **verticillatimadherer**, nobis. Hax Malvæ fpecics aicendir **ad** alritudinemquatuor aut qmque pedum, atque **i^olis** genicidis pluri- mos edit flofculos, albos, pentapecalos, omnium minimos, arfr ert **latim caules ad fin-** eula eenicula **amplcftentes abfgoe** quafi pediculis: floribus fat; - < ib igulisfin^ula fuc- cedunt capicul^ ex plurimis fem **in!** bus femicircularibus, cortic- gt ^ftis, fotatim **fa]** **circuiaritrablentibns** ltilum nutritivum: folfa inferiora fun: rotUKda, i^ciniata & **crifofo**, • **fuperiora** oblonga, fiuuaca: flores funtpatvi,quinis parvis^moomniamminimis^pcnlisalbis conftantes; quibos **denfc** circa genicilionesdifpofuis iuccedunc circiili **fen** cafeoli minimi arete **eefidcnBsadhjtrcetes**. Planta eftantia, quæ, poflmultiplicia^ini^mfincaleninaedi- **dcrit**, totalicer perit.

t.J.Maht afinua hifruca foliis Heclera: inftra angulofis, nobis. Caules huius funt admoduni hiriuti, ijuin & folia eorumquepediculiqubus innituntur hifrutie pariter lcatent: floreslia- [CC minores, **pentapetalqs**, a: finguli petala deliquium patiuntur, adco ut bifida In extremita- te apparean: hifee fingulis finguli circulifeuorbiculi cafeiformesfuccedunt, inquibuscon- fpiciuntur plurima femina circulariter ambicntia ftilum nutrktivum, aliarum Malvarum more. **iPlantactf** annua fiorens aetate, atque femina verfus ejuftdem finem perficiens.

(*f.Ualva annua* folio vario, C. B. P- Malva ftellata, J.B.Cliabr. Radicceft aiba, fibrofa, caule rotundo, tubitali, in plures ramos **brachiato**, quern foliacingunt pallidcvirentia/iii- feme **candicantia**, craflifucula & nonniliil lanugnoi;! , fed figuræ in eodem ramulo **dtverfe**, horum quidam Bryoniæ iormar, qna:dac acuminata, duabus alis donata, qurdam fubro- tunda, nngucmmora,omnia taftien in ambicu (errata. • flores pentapetali,parvi,puapurafcen- tes,itaminibus in umbilico pallidis,pedicellis oblongis **infidenc**: leinen htec **in** capiculis niem- **braHaccis** & roliaceis, quinque foliolislongis mncronatis cinftis (lellxin modum, unde ei Mal- VÆ ftellata nomen inditum ajolianfie Bauhino, Temicircularæ, cingens rotatim itilum nutri- civum. Argentina XS.*Salfzinannut* ad Cafparam Baulinum mifit. Floret **sfiate**, arque codcni tempore femin3 femicircularia **perficit**

§.2 H A L V E fifeofires perentes-

7 *Malva filvefrtris* perennis procumbens flore minore albo folio rotundo, nobis. **Malva** filvehtris Folio rotundo, C.I3.F. Malva filvefrtris rloreminorefolio rotndno,J.B.Cliabr.Mal- va filvefrtris pumila, Fuch. Dod ut. Malva filvefrtris repens pumila, Lob.Lugd.Ger. Malva **volgaris** iiore albd, **Park**. Inter filveftres hsc eft minor, cufcauliculiprocumbunt, fakem laterales, qtiipercerramfratricernuntur, mediusatcolhtur&cft ereitus, non autem omnes fiinc creiti ut vlgar'is *^{cu} procerior'is caules: -tolia funt rotundiota& minora muko nnjoris, in ambitu tenuiter ijicifa: floculi exigui &albidi, **pentaperali**, longiufculis pedicdis inni- **fcenina** lunt multa, minora, cingentia Mum nutritivum: radix alba, crafla & longa **eft. in** pKnuis n'brasdefinens fub terram. ^

"g *Malva filvefrtris* procerior feu elatior reflave flore majore fubrubeautpurpleovcn- nis **fatarateporpureia** pifto folio finuato, nobrs. Malva filveftisfoliofinuato, C.B.P. Mal- va filvefrtris elatior, Fuch. Dod. Gal. Malva filvefrtris reaa, Cord, in Hill. Malva flore fub- nibeiuo Cx(. Malua flore majore folio finuato, J. B. Cliabr. Malva filvefrtris, Ger. Malva vukaris'flore purpneo, Park. Hæc eft foliis interioribus rotundis, aliquando finuaris &c- lofis. percircumferentianilevicer crenatis, glabris, lacvibusac virentibus: caules emiccic- rotundos, cubitales, quandoque bicubitales, imo nonnnjiquam in pingui- ft altiores: circa quos cernuntur folia finuata, crenata, l'dngis pediculis innitencia, at- cx (inubus inter caules &i pediculos exeunt floculi pediculis non mediocris longittidi- ^ n_jtent'es itidem, ex **dilute** purpurcorubentes (aliquando dilute violacei, perraioomui- • ibiJi) quinis petalis deliquium in medio patientibus, reliquonim petalorum Malva- donati, **venis** faturate rubentibus pifti: adeo ut rlores pulchen imi venis **hifcc** rum ^{mo} ^{cc} ^(xj) caU^leni **I medio** fere ad verticem exornent, qui venufateRofis non **cedent**, jUDcnn ^ j o r . **floribos** fingulis deciduis fuccedunt fingulacapitula petiolisfatis longis

innixa, leviter immucronem fastigiata, circulariter filum nutritivum cingentia, & adhuc viridia ar&e fibi invicem cohascentia, orbiculum parvum efficiunt, Lupini femine non majorem, ex pluribus feminibus congesti, exsiccata vero, à se invicem separantur & decidunt, capsulis femilunaribus inclusa, ex quibus in terrain deciduis fere quotannis renovant: radix alba, crassior, sursum & deorsum in multas bifurcationes fibrasque tenues divisa: utraque hax Malva, 6 prior, minor & haec feci nda major filveftris, exit in incultis locis, uberius tamen solo fecundo, non sterili; prior minima non raro in rudibus ac aliis perinde incultis ac neglectis locis. Reperitur à Juniomenfe in multam aetatem utraque fiorens, interea iemen earum maturitatem pervenit.

y. *Msfoa* perennis. Hifpanica flore carneo amplo, nobis. Malva Hifpanica flore amplo, Park. Theat. & Grad. Exc Malva crescit aequo modo nostratis majoris: caules surrigit rectos, bipedales & tripedales, multum brachiatos, ab imo ad summum foliis vestitos subrotundis, paululum tamen finuatis & leviter crenatis: flores exeunt ex alis, longis fatis pediculis innitentes, rubri aut carnei, amplis fatis, quinque petalis, lineis subnigris fingula petala percurrentibus donati, fiffons»-ula concoloria plurima in medio habentes: praecipua differentia qua distinguitur à vulgari, est haec; petala riorum sunt, majora seu ampliora, rotundiora, in margine paululum flutuata, incarnati seu elegantis rubelli coloris, no Ciu se claudentia, interdum fere aperientia: floribus fingulis deciduis subvenitorbicularibus seu cafeolus aliarum more. Planta annua; sponte provenit in neglectis Hifpanias locis: floret ab ineunte Junioufque ad Augustum, quo tempore femina perficit.

io. *Malva* perennis Sicula foliis moschatis crispis, Boccon. Caules hujus plantae non semper humi procumbunt: folia undulata sunt & crassa, Malva vulgaris magnitudinis, suavi quodam odore moschi fragrantia adhaerent; quin & eorum pediculi, fingulis appendices five unguibus cinguntur: flos pallidus ad citri colorem accedens: femina Bamia? par. Tota planta levi denique lanugine caret. Ad Agrigentum & Saccam viget plurima in locis argillosis.

11. *Malva* filveftris Betonicae folio, Boccon. Jac. Zanoni. Humilis est haec Malva species cauliculo palmari & bipalmari, infirmo, per terram strato, seu versus terram reclinato: foliis in longiori bus pediculis Betonicae foliorum forma constat, minoribus, in ambitu crenatis, circa cauliculos paucis, e quorum finu pediculus exit longus, flosculum unicum aut alterum sustinens, Malva vulgaris facie, purpurascens: fubeunte femine Malvae vulgaris. Hetrurix alumna est haec Malva, quam in pratis illustri illius Gaitan* gentis *Terrichio* distis, circa Pifas non sine molestia & toedio multarum circuituum quasi latentem invenit Paulus Boccone, atque inter Icones exhibuit, quas mihi communicavit anno 1674. generosus vir D. *Carols Hatton*, scientiae botanicae summus cultor, ut publici juris Oxonii facerem, quod a me presertim tub titulo quarundam Iconum & descriptionum plantarum Sicilianarum, etc.

12. *Malva* filveftris vel palustris aut Ibicus, nobis. Malva filveftris l. Cxi. Malva: agrestis genus l. Gefn. Hort. Althaea, Matth. Fuch. Dod. ut. Tab. (cuius Bifmalva) Ger. Althaea vulgaris: Cam. Thai. Clus. Hist. Eyft., Althaea five Bifmalva, J. B. Chabr. Ex Malvarum non Althaearum familia secundum doctrinam nostram prasrogativam tulit haec malvacea plantae. C quae plurimis auctoribus Althaea palustris dicitur) quippe quod sine ultimo conveniat cum Malvis aut Alceis, (eminibus scilicet circulariter cingentibus filum nutritivum, non pluribus capsulis arte firmi junctis, in fingulis plurimum femina continentibus, ut Althaea omnis secundum doctrinam nostram novam & veram; aliter fiet, ut apud omnes auctores cernere est, summa confusio congenerum. Hae Malva palustris nobis & aliis paucis se dista, utilitatis multipicis nomine commendatior, radicibus multis innititur bene habitis, albis, mucagine lenta, quam manum aceratione ve deponunt, turgidis: caules bicubitales & proceriores, tenues, teretes, hirsuti, angustotubulo pervii: in quibus folia alternata Malvae vulgaris multo longiora, lineola serrata, mollicello tomentoincana: ex alis flores prodeunt Malva vulgaris luredae forma led minores, rari tantillum ac carunculae declinantes, quinque petalis, aliarum Malvarum modo, constantes, in quorum medio filus quatuor apicibus purpurantibus & obfuso S S I C 7 T. jemen u. Alcom P. ffi ^ < in Malva vulgari relinquitur. Nfd. Augusti mensibus; Septembri & Octobri semen perficit.

fand' Co n f r n r' T is fo l o d C laciniaro & de ^ to, nob. Althaea. sub j...
ch c t a m t X S T l. ^ T: p r i h a b r > r t o h o e f t m o l l i, h i r f c ^ v u l g a r i s A l c h < * m u l o, p u l -
tam lacumato & tenuiter ferrato: flog majusclo, rnbente, fiiloapicil«sornatopurpuris

pureis vel nigricantibus : folia, inquam, sunt incana & mollia, in tres lacinias majores divisa : flores etiam minores quam in Pannonica, Belgicas floribus respondententes, sed colore differences, nempe qui tori carni sunt fiveincarnati, niukis intusfaminibus nigricantibus, C3> tera vulgari fimilis. Gaudet humidis Pannonias locis, & fecundum rivulos fitis. Floret Julio, & versus Autumni initium femina maturat.

\\Maha Hispanica foliis mollibus undulatis in margine fupere micis fulphureis ad folium lucentibus donatis, nobis. HEC Malvas species folia producit mollia, undulata in margine, fuperius: >icis fulphureis ad iblem splendentibus donata: caules e^Jit bipedales au Uri-pedaies: flores & femina aliarum Malvarum modo. Perennis est pt>nta, quia e^e perpej^ua^ronde viret, ut Althaea *Olh'ix*. Provenit in Hispania, sliique meridionalibus locis.

§. 3. M A L V M mapititn*. arbor e<z.

1§. *Malva* maritima arborea Venetiae & parvo flore, nobis. *Malva* arborea, Matth. ep. *Malva* arboreicens, Dod. Cam. Of. Eyft. *Malva* arborea, J. B. Chabr^Mafva arboreicens & *ispia Klw* Theophrasti & *Malva* arborea Plinii. Caudicis altitudo decem cubitos aliquando x-quat, aliquando plus minuve fecundum formam cui committitur, aliquando quaternum, quintum cubitorum tftcaudex, alias folidus, brachiatus, & lignea duritiei, fuperne alternatim vestitus foliis roseis quidem Malvae amplitudine fuperioribus, at crebris divifuris, filvefrimatis respondentibus, taclufere Althaeae infar, admodum mollibus viridibus & fubinde ambitu plicatis: his minora aliaprope finis alarum succedunt: alas laterales inter folia frequentes ostendunt pediculos oblongos, firmos, qui obfidetur floribus malvaceis, laete rubentibus, & circa media ftaminula capitiacea ungue tenus maculis faturatiore rubro infestis ac radiatim cltspersis notantur: radix valida est, & multis caulis fibrarum processibus firmata: femina deciduis floribus succrescent aliis malvaceis prsditis feminibus familia, orbiculatim placentaefpecie coagmentata, sed diplomajora & craffiora. Camerarius in horto medico folio 95. & Dodoimis fol. 64. lib. 1. afferunt frequenter reperiri in itinere quo itur Pisum ad portum Liburni, tum ad Veneticam & fucus litus Tyrrhenum & Africanum, ubi per multos annos durat. At apud Septentrionales in conservatorio hyemali recondi debet, ut conferretur a frigore & pluvia ipsam destruentibus. Hic est ilia *Malva* arborea, quam Rauwolfius Halepi ab incolis veteri Arabico nomine *Eaur* diciftribit, fob cujus gratiosa umbra deambulare liceat. Galenus hanc vocavit. Floret aestate, atque versus ejusdem finem femina ad maturitatem perducit.

16. *Malva* maritima arborea nostras, Park. *Uxc* priori in omnibus quasi accedit. Stipite est (secundo anno lignoibus humanibrachii craffitudinem arquantibus, fubinde viridi, fubinde rubente, atque ex ejusdem alis protruduntur folia incana, laciniata, fuperioris foliis haud ab familia, mollia veluti holosericus pannus: flores sunt amplifatis, dilute rubelli, forma fiorum *Malva* vulgaris, sed paululum majores: radix magna, Candida, & quasi lignosa, multis fibris longis protensis praedita. Provenit in Insula *Dennie* dicta, tribus milibus a portu regio, & quinque ab urbe *Brijola*: irt fuper prope tiguriam non longe a castello *Hurft*, e regione lufulje *Ve^tis*. Nos copiose offendimus in insula dicta *Piere percée* ex ingentibus rupibus conspicienda & modice terra tecta, contra Britanniam minorem fira, missi eo, ut totam oram Armoricarum, atque insulas adjacentes perlustraremus, atque rariores plantas maritimas observaremus jutu & libralitate ferenissimi principis Gaftonis Franciae, Ducis Aurelianensis, cuius peritiam in cognoscendis & decernendis plantis ulque in hunc diem non potum fatis mirari: omnes enim Botanicos quotquot fuerunt, in Galliis ab anno 1650. usque ad annum 1680. durante quotempore Celsitudinis ejus operam in hirciscendis & examinandis plantis dedit, non iblum acquavit, sed multos parafangis longe fuperavit.

17. *Malva* frutescens folio acuto auriculato Hederas infar, nobis. *Althaea* frutescens folio acuto parvo flore, C. B. P. *Althsea* arborea Olbix, Lob. Icon. *Althaea* arboreicens, Cam. Tab. Ger. Haec, non (ecus atque *Malva* arboreicens a vulgari, differt ab *Althaea* communi: paucioribus enim foliis, fervidiore coelo (quale in maritimis Galloprovinciae atque in Insula *Olbibia*), & proventu tanto fruticat ut ad fepes constituendas lat (it: multo enim folidiore 6c lobuftiore (capo est quam *Malva* arborea Veneta, aut nostras maritima, falignae quasi conretionis, inque arboream ferme texturam verfo: flos item *Malva* vulgaris, sed major & rubellus neefemen difpar, quod fatum plantam parit minus incanam aut hircutam, *Althaea* paluftri anlofiorem, speciosiore, quia attollitur in altitudinem arboris, fubstantiamque possidet firmam, & quafi ligneam, perclurant cauks & folia auriculata, imo in Septentrionalibus aliquot

5 H ifident folit
hyemes rttimnt folitofxviore: femtna circularity, aliarum Malvarum more, cingonr fliluni
niitritivum: Provenit in OILia infula & Galloprovincia fponce, floret iftate, femina Autumnno
perfcit.

\ M A L V J E hortenfes feu Rofe*.

\ 8, Malva Rofea f ibrotundo Hore fimplici, nobis. Malva fativa anttquorum, qux cul-
tnarbortfcitjThe^ .1. Malope, Flinii. Malva horteiifia, Lugd.Gcr. Malva rofea /implex,
Pajk. Malva rofeu cofi T ••• Icon. Malva hate horttnfis five rofea difta, folia prom it verfts
terram. u/npl
"• a&icantia, al'pt-riora & majora quam filveftris Malva, pii-
mo annoron; -, ^(.ondolaciniata & mucronata: fecundo etiam anno canleaS fi-
\c icapum reftym, fimplicem. quatijor am: q unique cubttos altum & non raro altiorem, fe-
cuiidum foluni cui committitur, cui prieter in'eriora Folia, Horcs e pediculis brevibiis ad-
herent majores mtltoquam filveftris, altoquvformia non admodum diiltmiles, quatioque fim-
plice6&qniqBC pVal^rum, fiequenter vcro multiplices, colore aut candidi, paliidi, auc
lulphufei, lacei aut rubentes, iique ant dilute ant faturate, imo aliquando farurate
fufco ad nigredinem tendenre ; his fnccdif orbiculus rotundus , craflinlcultis inftar
tafcoli ex multis feminibus majoribus deliquium in umbiltco patientibus, Ferrum eqninuin
pjrvinireiciciuibus,ro!jicaeleganterrfriatainvohitis fingulis, & fie tunicatiscirculariteram-
biMitibna ftulum nntritivuni coagmentatus: radix longa, albida, Itnta aciefilfacili . qme
alte defcendit in terram. Eftperennis planta,poftlemen ad maturitatem perduxerit lolra de
novo procrudtr,acqueplantaipfa in multosannosdurat. Serituiinhortis. Tcmere autfponte
prpveniens in Europa non reperitur. Altero anno a quoferinircaulem, uci difium, pioicrr. re
Horcs Julio&Aiignlloedit: femtneSeptembri & Oaobri perfefto caulis marcefcit , * radix
tamenatiquoc annis reftat, Vcre novo Folia nova profrens. MaAap Grxcis dicitur, & ad diffie-
icnciam aliarum Malvarum jkaAXy iran^nwi, id eft, Malva hortenfis, anoiinulJis vcro Rofa ttra-
marina & Rofa hyemalis.

1 9. Mafoo fiortenfis feu Rofea folio fubrotundocaulefcens flore fimplici minore luteo p;illi-
lidoChaleptnfis, nobis. "nixz priore neutiquam dift'eri:, nifiparvitac partium, pra<rup
flore pallide ltiteoduplo mioort. Semina liujus cumicmine Malva: Chalepenfis acaulismultif-
que aliis communicatahabuimus ope Sciuidullria ft RobertiHuntitigton fipius nobis fupra
memorati.

20.Maha Rofealolio fubjotuntlo flore pleno, C.B.F. Malva Romana multiplex, Trag.
Gcfn.Horc. Mulva Rofea multiplex, Lugd. Tab-Ger. Malva hortenfis multiplici flore, Dod.
Flos eft multiplici petalorum ferie, flflicacefola ratione a priore fimplici dinert: fiositied
vanat colore ficat&fimplex prior. Eft cnim colore albo, pallidoteuo«hro!cuco, luceo, in-
carnato, rubro, puniceo, fufco fen Tubnigranre aut pullo, hinc trts (igiira: apudTabernxmon-
tanum&Gerardumj&quatuorinHortoEylVcttciiifiJedinutiliter fculptx& exhibitz.

21. Malva Rofa folio fwrotundo Chafcpenfia acaulos Horc pallide luteo, nobis. HxC
p»rrara & admi ratione digna Malva CMepenfis, foliis, ra4ice perenni, floribos eornmque n-
gnitndine feminibtifque, nentiqmni a onjorc M;ilva horcenfi lutea proccra diftinguitnr, Icd
quod notatu & obfervato dignuni, flores plui imos, pentaptalos, pallide lutos jnxta ti-
prodqeit, abfque ullis fere pediculisquibus innicantur; juxta terrain Ctiam femina Malva; hor-
tenfia (minibus in omnibus, ctiam pene magnitudine paria profert, qua; aliquando txiguis &
vira non perceptibilibus adlwrcnt pedicutis, humi procumbentibus aliquandocaulibuspc-
fai*kWu'pcdalibus donantur. Plantadicitur*«<<A(^, non quod dcfiniatur oninino
fSj? L^{ic} adcoljre vis, ut raro, aut nnnquam apparcat, ut inCarlinaacaulc alFiiqac
uldamperebrevibus admodumcaulibusdonatis plantis.

J VY? *K & m* Wioficus obfeure viridi, nobis. Malva rofea folio ficus, C B. V
S n l ^ "BB "3 Ta > Ger. Hxc eft fipaci« prim^ intulu diftin tu fic

liola ad pediculum u
milia: flores fu
filit prceipua
quando lutei, in divifura foliorum con-
differentia, unde Malva mfa peregrina folio ficus obfeure viridi nobtadicta^

TEMPERAMENTUM fie VIREs.

7, 8. Malva filveftris proccrior & atior reclaque, & Malva procumbens pumila. Moderatum quen-
dam & repidum calorem cum humiditate filveftris is utraque h*c Malva vlttnci : fuctui ejni •
d*

ac glutin
recte scilicet

Ht qtu aperte agrestem Malvam melto remeffe borten firefert, tametsi Dkfcori Lhor-
tenfimprserferat; ui quoneca, nec Galeno accedmdum, nam fiheftri, baud dubie fui aptior,
ac fauivora inter olera ncn pofiremo est loco. Comimndatur ab Hefiodo

— Νόστιμα τῶν κλάδων — Attun mardis,
Ouji'Smttx μάλ'αχι TIIX, Αποδίδω μὲν ἴσως

Sttltineque fount, quanta plm dimidium fittoto;
tfeque quam magnum in Malva is Afpbodeh knur:
fahancfanmt'um iff Horatius Epodon Ode 2. fcribit, — Et gravi
Malva; (alubrescorpri.

r

fytrit atttan Malva, nt **Oaknmai**^mediaeriter: fuccum vetohtgemrst craffiarem, ahum<rf.
tit lubricarn, **acduran** m hollifa gile dntandafte diti d m fo totum quod jpm. Ja, fed auiaeh-
tinofa. **Holia** m dts subverff Kommsu uleat as i fcti * fcti fcorpionum, vffrafum m fcti fcti Uium
venenamnm hfimrum tfcacufuntfvnfnknm; bh wo trim cum okoprh Lperunk mam
Cutmofcords anjwfmuntur. Adores, furfures omnesque in cute asperftatescuv veteri dec
r Bkfrri Jm twnphtautdamperperam ^ ty hakntj impofitafllu Erijfipdatk qunqm
ambu/* unhter adhbenlur;. mefimarum dohresac rofionJs, 'cL fo fionurn LfeJn, &

ffmptaeflmt. Datur & fuccu* parturientibu,, utp Jr Lfacilio Lreddatautex
vinodecoiitim. Infurma, veficam, renes & intefiina, iboracem isrpulmcnes iuvat

1 % iMn/ihtfirk vel palujirkfeu Mfats, nobk. Multiple bujm in medendo nfum declarat
Dtofcndes ik verbh decoBa Malva faluftrh, Alt baa Ma, nut in vino aut aqua immerfa, out
ptr ft pot a efficax est contra vulmra: Mm ad (Irumai, parotid*, abfeefus mammarum, Mam-
maiwnes^vtufiones fed*inflationis nervorum rigom, fiquidemdifenth is ncoqu^rumpn
tiradacatruanperduat Coda, utMumeft, adjeSioJdlpefuillo aut anfmnotmlLbiLc
ut malagmat* lentor fiat, fnt ad vulv* infiammauoJs prtctufione fque in peRo fubditl
^commeodmfunguuyununere-. oneravuh* rehquiafqueh pa/tu eiLbit \$M££
Z T T T T f r m f U f n J J T M > A 9 " > » dixhnL.fu^perfecutu:, tandem
addt- Altb** in ommbut fupra JiSli* efficaaor radix, prscipue tomu Uisrqifaut: coda in ami
alvumfittit. Eadem and* <: n latle decutla pernitiotie tuilibet tulfi meltur. Bppocrim
vulneratk fmcntibusque dtftafanguinis radicU decaff* fuccum bibendum dedit, & £fan vvt
neribus cum mlhig urina: item contuftsjuxatk, lumentilw, ismufculU, mrvh artiuiilh
impofuit: is afibmatitU acdyfmitritk invino bibendam dedit. Mirumnmradktoad

1 3/& 19. Malvs Umfk fat rca flora ccquunt in wo veteri, ut hitur 'apud Cmtrarim
m hotl<, quo> prunes ablmunt & ftnnt. Vtuntur mam ad uyalatk rubbm compe-
ktndKjmpnrm rubentts rojas vmtantk quoad colorh rnmhtudinam. Ege, inquit Johannes Eau-
binu^florum drcoSto fithaur **utor** hi fucitate is ardo fe lingu* isfaurium, is quia / " *
• hflonbu* nullam **agnefco ad/hiffionm**, rtvndum intelliga quo fucteffit Johannes
ad p... Libavius
Simonem Pauli pag. 385, 386, & 387.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI,
Aliorumque Authorum,

Pv* f. Hf. nt. t. p Lvi, Miflva fbliertrio, C.B.P.
6 Prod. Ma'va tmejtrisli fmilit, Cluf. Jlijl.
Cum Co/barns Baahmnt dteribat jltttham folio vario
in l'rwronie, atqae rjafiiem lcnncm rxhibeat, toto
CKUdivtrfam ab htmtMalv*fvvjrlf, ClulitnHi-

Jitra; tdtircaplant cenjat, rum ex htinibat, turn He*
fenpttmfias utriufque divtrfis, fapfmrffh ;ime fri
oblnumCaJisarum Bauhtium, dvtnduas omnmodi-
j/ntfas Tila/vit fydetad unam tandemque redu(i,
fib p.anta w.inPtntce,

DE MOLMENTIBUS PENTAPETALIS

Seminibus tnuitts rotatun cingentibus ftilum nutritivum donatis.

C A P V T X V .

A L C E A .

A iiUi* Viefa ... ah «A*», auxilio fearemedlo-, cum ejus radices dyf- ... Plinio 1, 27, ^ . 4. Alan. Gnerifilveflrium Malvarum Vicforidts, quir, m/tmthit, adfcipfit.

Quat inter fe al lunt plants jure merkoqualicatena quadamconneconuir, atquehinc Alce.: & Althaea de neceflitate ordinis Malvam confequentiir. Alcea igitur, authore Diolco- 1 il.; Maivz eft tantum ipecics filvtftris,hjbens folia fillaad Verbenaca:foliormnifimi[itudmeni. Ex itntenua aucem tiofra Malva eft plants eniollitns, pentapecala , (eminibiis niultis ciicu- tartter (en rotatini cingeritibus ftilum in niedio nutritivum dowata ; liifce pariter conditionibus pr^ dita eft Alcea ; ergo a fine ultimo Alcea poteitdici Malva, necomnes Alcei: fpecies habent ioliJntiiTii, nt vulc DiofcorkJes; excipiuntnr enim Alcea montana rotundifolia Coltinim. & Alcea villofa Dull", quorm roEiaimaiuntMalvBe modo tomnda, etiamfi fuperna earundem folia (nit tenuiter laciniata&fifla- Quicunque igitur Malvum Alccam, & Alceam Malvam dixerit:, per mt nonftabit. Camactem veteres,& ipfos fequentes neotericiBotanici, ad du- plex cnpit Malvni & Alceam reduxerint, quia diverfo nomine gandeit, nos Alccam hoc cap, XV- CKplicabimus, iidnobfrantecontormitate Malvaecum Aicea in partibusclTentiatifcus, prae ipuc lioitbus&ftminibus: cafdem junganc quivoluerint,parvodi(crimine refert,

Pars T A B U L S XVIII & XIX. Sectionis quinta.

Table with botanical entries. Left column: Aha, Herba, Annua. Middle column: 1. Folio rotundiore incano nobis. Althza frutex, Lob. Ger. Althza frutex prima, Fftitex < Clttf. Hijl. Alth<sa fruticans Hifpanca, Eyfi. 0 Cz-Sjriaca^ncbfc. Alth&afrutexfecunfa, Cluf.Hift. 0 S-\$. Yulgmk, nobU, Alcea vulgarit Bod. Ad. Lob. Lugd. Park. Malv* Verknaca, Ger. 0 Pcrehnk la-^lioroiundo Ucimato^nobU. Alcea peregrina, Cluf. Hijl. Alcea rotundifolia lac'miata^fwe Malva moniana, Col. © 5. CannabhiQfolio, nobk. AlceaCannabina^C.B.P. Alca Cannabina vd FentapbfM folio, J. B. Chabr. 0 6. Vdhfa feu bnfuta, nobis. Alcea villofa Dal^i. Lugd. \$ 7. Fbarnambucava Carfmi folio fivfculis minhnh lutm fanim compreffo fimpliciroflroihnato^nobk.Alth^aCarfmifoliisfloribus luleis, Buccon. M(ilva(6t7iuadtPharnambuca,JacobiZancni. ? % ,Vijniana Carpimfolthfloculfc minimh luttkfem'ine tnnngitLui duplici roflro fzu aculfo frf < edito, nohk. 5

Explhatio. Tab. 18. <? 19. Seclio'rtk quint*.

* A h^ta frutefcens folio rotundiore incano, nobis. Akliara trutefcens folio rotundiore 4 ^ I ^ n Q » C . B . P . Alrhzafrucex, Lob.Ger. Althya trutcx prima, Cluf. Hilt. Altha? a truticansHirpanica,Eyft# Hxc Alcea, non Althza cum meris aothoribus, nobis dicitur, quia.lemma rotatim j a] circularitercingentia ftilum nutritivum ecriit, non autem capfulas phrimis locukimentw < 1) Vmaas utvo|umus |IOS- R ec, incam, Alcea jn MxAm procc . ritatem nterefcir, obi arborefcens dia : eft enim ftj -rib|S^ gn6 s; firmi cortice tomento v rftitis ; folio Malvarum minorum manitu di ne, a li ^ [civite. finimo, alia Alth « modo in nonnihil oblon candicante, lanuginofa, — lofis nixo : ex quorum ahsexonuntar flw« Malva vulgatiors, fbrU« pares, purpuratcen- tiLn ung atis, foliofo & hirluto calyca, in quo poftcaorUluscri- natorum fmmomnigricentium, pellicul a a lba contectorum luctrf! P 2. Alcea a bf e cens Syriaca, C. B. P. Althza frutex fecunda, Cluf. Hilt. Non minus tamr n ele-

comprefFa,compo,fintex mulcts feminibus craflis, lunacis, aſperis , rotatim cingentibus ii:
nurririvum, roliolisquinis tanquam procaljceobvoluta: radix perpetua, cujus mflitæ prater
majores & crafliores alia fibrofa? radicata apparent, extra & intiis albs, guftu admodum
viicido. Pluribus Htingark&Anftrii'lociaciica fepes nafcentem obſervavieCluſius, atqtie
in Hailſa circa Francofrum ad Manum confpexit idem. Floret ineunte acfbte: femina per-
h'cit Auguſto & Septembn.

6.4ktaiurtma. feu villo&, nobis. AlceH hirfuca, C. B.P. Alcea villoſa DaK Logd.
Radiceeft jfelncmlongS, eruffe candicante, paucisribriſcapilbta: canlibus multis deniil-
iinſ>'.tiiugine hirfii/ris (quamobrem Alcea villoſa nominata eſt Daicchampio) pednon
nmlcur.ial'-iciiSjiis, .^''riframbirum mukamrenato, intriadvifo, lanuginequoque ſpiffa
tecro; flore phasii,ceo, parvo, ſpecioſo, Traçielii vulgaris Horem magHitudinevixfuperante:
fru&a fen fexnrae nigro^ml motlum placentaepermde ac Malvæ valgajis, tntna tolliculum mul-
cis fo!ioliſconitantem'ctaufo, denſis ac iualperis pills hirtum, & undique friftnm fen
Kmini occultentem, uc in Halicacabo. Nafciturad radices Inn momis: etiam inter fegetes
Bljrfis&oppido fio^jfb*^ interjeftas. Floret Maio menſe, & fciiina Junio & Julio matt-
it cunt. Vide in principio Tab. 19.

7. iiffaPharnambucanaCarpini foliofloculisminimis luteis femineſimplici roſtrodonato,
aobis. Althia peregrina femine roſtrato flore luteominimo, nobis in Praelnd Botan. pag. 229.
Aktea Carpini folio rioribus luteis, Boccon, Malva annuade l'liarnanibuca Jacob. Zanoni.
Hujus folia funequafiCarpini Ulmive, aut Melochiacfohorumimula, alternatim caulem am-
bicocia rotundum, rectum, iciquipedalem: incenius fummiſramulisnafcuntur Molculi plurimi,
minimi, Iticei,ptncapetal!: atque hilce deciduis fucedunt arte ia circulum difpofitaicmii,
cmpeii aculeis finguhribus piingentibus przdita, roſtri inftar,umie roſtratar Alceae d nomtn
impofuimas:radiceonlbcfibrofa: toraplantaeftvfcidofaporc. Sifcratar Aprilijemcnaanl
perlicitanteSeptembremexactom. Provenitin Pharnambucaaliiftjuclqcis India:oriental!..

• %.Alcea Virginiana Carpini [oliofloculis minimis luteis femine dupliet roſtro feu aculeo pra-
dito, nobis. Hac Alcea Virginiana in omnibus convenit cum Alcea Pharnambucana, niſi quod
ilKus lemna ſint triangularia, njinora,binisroſtris feu apiculis in fummo prardita^qua nota efftn-
cialitera l'harnanibucanadflert,qu3£ feminecompreſſomajore: unico roſtroicu apitulo longiore
donate ceraicor. Semina hujiis hoc anno ha buimiis nobis communicata,a peritfflimo ac dili-
gentiffinio Botanico Johannt Bamſtr, non ita pridem Collegii Divz Magdalenac capellano,
nuncapud Anglos in Virginia Evangelii pniedicatore, eo I reverendiflimo in Chriito patre
Henrko ComwosEpitcopoLondLnenfimiHb,cum pluribus aliis Ecclcfiæ Anglicans paſtoribus,
ucpopulum Illic degentem, paſtoribns deſtitutum, infruerent. Vide ulriroam Tab. 18.

• TEMPERAMENTUM & VIRES.

Ex empUflicoTitm medicamentorum tiuncroefe Atceam7 is ft.Ha, qu& glutinofumquid ac knlum
hahnt, is etiam radix ipj" a, qu^gluAnofa, duki* <? media aftringens apparet gv/lantibus,
abundtmonſrant. ifincſatis confiat Alcetj/n citra inſtgnan turn taliditatem, tumfrigidita-
ten ſccarc, ac pkine empafikorum ccnſiflentiam obtinere. Cekbratur ad atliginm ccuhrum
ab empirkis, ut non difint qui credent radkem Akejt e tollo fitfpwfam ackm aculorum ſupra
modum acuere is t^{er} pS⁴ & *C & J^fmodi non carent vanitate, fitmd is vhc endulaſmt,
Silveſtre • Mafoſgenw ? <^{am} Alceam vocari Tragws dixit, ft hrb <£ is radkk decoffum vino vtl
aqua l hibaiur, tonimbus wteflinortmmnedioeft, ruptkiſcenvulfis tonducit is tptulatur.
Breviter Malva Romana, Alcea, Malva vulgarit is Ibiſcttt, omnibus calidh dolonbui ictius
corporis aprinu coriducunt.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI
Aliorumque Autliorum.

J^'^_B*'f_i.'.'-p_i VI. /iUt'itarbtrfeciui Syriaea
tru'a if dltra arbriffuij ſylfC^
AuaSyrUta, Eyſt. De-
nota
* & **, a b r: 7 J''V^{ma} ^h^y^mf^{tn}.
Althia frutex ſecunda Cluſi deſtat ſecundam Al-
ceam fruteſcentem noſtram, quia ejus ſemina circu-
lariter cingunt. Nilam nutritivum, ergo non fuiſſet

/tlthita Hutihia Caſp, Bauh.CiiltrifqUt JudwibttS,
fid Alcea, tx libro tiatura rattacianniie.
I'ag. Jiy. tot. l.pl.-Yit. Atta.*vtp(aria,C\$-l-
Jhta Vntta, Tr<£, Dtd GaU. Iji^d. FylL Cam c-
}UI tirca fill tivalacrum feminatejit naiitit focolit-
meatii tlijüütftütn, nan ſait ijuthortivt ditttuU Alien
[tdAlthga.lbiatn,ſi. i\ . Mem inditaſiart ms^N*,
C.B.P. SabdaTijf*,Lab.Dt>d.La&d.i£<. Ihdtmfi.

lift. 10. Ahra Jfi-Uta. parvo fwre, C B. P. Sai-
Jviriffa aliaflJigd, Ibidem pi. xu. Jitca Indiem
iltera parvo fare, C.B.P. Jidem.pt'.xiii. Jt-
ta Mgfp-iin.a vitfofa, C. B. P. jtbclmofcb /Fgypti-
rum five Abutilum Avtteniue, Pmt.ltal. Onmn
r plain# dicetida ft'ijhfit. Athta, cam ftliquis
-H fllliittlii feminaLi multicapfuUtrrt ftu piuumh
(i)ttiamenis dijtniim gerant.

Pn^, JIJ. cot. i. pi, i, M^va paluftris feu
a, nobis. Alt%aa Diofiordis, S J'liaii.
Ahhma.vtd^arh Cam. '17>al.Clitf.HtJl.Eyjl. Cumfc-
tinagcTa't tirtularter tntentiajHlum nttritivum
,OTC Malvs vulgarfr «&*litdefi quam Mnlvapa-
ijln's, ncqac fittrjUffftari Jltbicn: jhedibus pro-
rationes fupTaditt<M> crgononahjanteaitth's

re Diofcoridii y PJim'i ctrUfortmtjut authorum
,it>turieorum, Mafaa, non Mbsa rjet dictiuU bxc
pfanta.

Pa*. Ji6. eel. t.pl.n. Atbea^BTmajerr,C.B.P.
Ahh#a Paimoitita te tja Chf. Hift. & ibidem pt.
in. Jllthxa latinat , >fl. l'. Altbsa l. Cluf.
Pan. Gibidempl. i :-'i</na frunfensfolio rot tin-
dioreincano, C.B.P. ujthaaf-attx l.Chf.Hijh
Attbtajraticdn* Hijfrniea, i ' , , y l . > , Alh
fruttfeent folia aaita parvo C B. P. \ eft enim
mtigno flare M"i"~
d C J p B

Gcr. Alhaa a i v r a l l i a a u . w L . ob. Ha e-
mats plants fmit s ; quinta, eft Meloc
frutt/centi's aut at

DE M O L L I E N T I B U S P E N T A P E T A L I S

Donacis plurimis feminibns conrentis indiverfis apfulis *conjunctis*.

C A T V T X V I .

ALTHIA.

Alyssa, alius *Alcea*, quæ in silvestrium Malvarum genere est: Dioscoridi l. 3. c. 163. sic dicta
ab *alys* quod remedium, vel *alys* medendo, quod hujus multiplex usus sit: hinc Diosco-
ridi quod inter pumas utilis sit & *alys*, pluribus remediis polleat: & Plinio l. 20. c. 21.
abeft Wn excellentianominata, qu'xaquibnsdam Ariftalth&a dicatur.

Genera unitts folum meminenj. ut Tketyhrajlit* 9. Hj/2. 5. uli Gaza Hibifcum reddiifil: aty.
Hift. 9. florein *mdinum* tril>ui&

Diximus fuperius fitb imcinm capidsXV. Malvam & Alceam Cqiemadmodum nosdifpo-
fuimus) vix acne vix quidem poffc a le invicem diitingui quoad rincm tiltimum, **quia in eo**
conveniui **Qt fopra** monuimus. Kota atitem **geflerica** qua Althæa ab Alcea & Malva difcer-
uitur, eft hxc. Altxa port florem quinis petalis conitanrem cyanidom, cujus ftrutura
ciiioadnumeruni pctaloium omnibus eftcommnis, producit plurimascapfutasfimul junftas,
lea in plarimaloculamentadivifitf,irfqnaruin fmgults plurimacontinencurfeminacu)iiirciint]ue
tomac aut coloris: hoc non repritur in Malva & Alcea qua; femina gcruntrotarim leucir-
cul:iriter arte junfh Sc cingentia fitam **nntrittvum**: atque hac ratione diftingnuntuv Althæa:
fpecies nota ten **ceffera (na generica aMatvaSt** Alcea, qux omnes ancea confundebanturab
authoribus. **Nosfeqacodo** duſrum authorum.in terna capita **diftinxinins:poffqnt<joidem**
per peragraphos diitingui, quar.doquidem conveniunt Horibus fuis peiuapecalis & (apore vi-
ctido: (ed diftert At: lisa, qu^nadmodum nos candem **difpofatmas**, ab'Alcca& Malva.

nyamdiu expanfi funtflores, magis rubentes apparent per biduum autpiduum: in medio petalorura eftcapitulum viride, multis ftaminibus luteis, ut in Rofa cernitur, obduftum,quod vergens ad maturitatem multis fcetet figis&fulcis in exteriori parte, decem aut duodecim ; in quibus fingulis protuberantibus loculamentis continetur ferres feminum ma jorum, oblongorum, nonnihil lividorum &asperorum, quae funt numero fiffim^ modice incurva & parte gibbofa villofa aliquando, nam in uno tantum folliculo feu loculamento ad numerum incertum cernuntur, 6 Vin omnibus iuis propriis loculamentis hasdinos ferme renes figura repr^fentantia 163: numerantur, quibus color ex fuivo gilvus, toto corpore funt punftata, afx^ra pnmicis , nftar, circa umbonem piiiis fubalbidis, raris, dimidiatum digitum prolixis & in fetis aculeofre poi yx^ra horride capillantur: Optimo microloppii tubulo femina fingularia W^^facen, rJerunt qualis in Icone Ferrarii Senenfis obfervatur. Cqnfulc Ferrarium Senenfem l.^r & e Florum cultura pag. 479. ufque ad pag. 502. ubi partes omnes hujus Althææ i Vis diffufe deducit.

3. "*Althæa* Theophrasti flore luteo, C. B. P. *Althæa* Theophrasti five *Abutilum* Avicennæ, Matth. *Althæa* luteis fioribus, Ad. Lob. Ger. *Abutilum* Anguillafa?, Dod. *Abutilum* Avicennæ, Eyft. *Althæa* IEC *Abutilon* Theophrastodifta caule aflijrgit rotundo, duriufculo, ramofa, duas aut tres cubitos alto, quem cum fuifalis conveftiunt folia lata, fubrotunda, fed acuminata, albida, mollia, tenuiffime hirfuta, Cucurbitinis familia, è longiufulcis pediculis pendentia: flores è foliorum JIC ramulorum finibus exigui, lutei, pentapetali: fructus rotundi-, nigri, crifpi, ex multis parvis capfulis fimul junftis cohasrentes, in quarum fingulis femina plura, nigralatitant: radix in radiculasmultas, fibrofastenuelquedivariatur. Peregrinaeft planta, necalibitjuam in hortis confpicua. Floret media sftate, eadem exeunte & verfus Autumnum fenfina perficit: alitejr & melius defcribitur à Johanne Bauhino, fie; *Abutilon* J. B. Chabnei cum *Althæa* vulgari de. mollitie certa^e videtur: radice conftat pai va , alba, fubdulci, fibris aliquot adnatis donata*: . caulis foris tomento molli totus eft obfitus, pinguequid attritum manibus allinens, incanus; cortijci, qui facile delibratur^ fubeft lignum Saligni infar, candidum & durum, medullam fucculentam viridem continens; ex caule folia nullo ordine nascuntur, pediculis palmaribus xitenria h minus lata, circinatæ quafi rotunditatis niii in mucronem definerent, lanugine incana & infigniter molli obdufta: ex horum alis rami producuntur, atque indidem flores itidem prodeunt Caryophyllatae aquaticæ, intenfe crocei, friati, è quinque petalis compofiti, medium occupante apiculorum glomere: tb-tum vero florem compleftuntur quiri que folia incana, lanuginofa: floribus fingulis fuccedunt tomentola capitula, juglande nuce paulo minora, iuprema parte plana fere ex 1 o. aut 1 2. folliculis latiufulcis, compreffis, fingulis in mucronem acutum definentibus, in orbem juxta fe ante poffiticoniata : in quibus fingulis femina fere femicircularia, compreffa, fufca, medulla, dulci & alba plena. Cafpnrus Bauhinus fcripfit fe obfervaffe hanc plantam vigentem ad duos cubitos altam inter Bononiam & Ferrariam: femina fata Martio & Aprili menfibus folent fub finem æftatis florere & ineunte Autumno perficere femina.

4. *Althæa* Theophrasti fimilis, C. B. P. *Abutilum* Indicum, Cam. J. B. Chabr. *Abutilum* Indicum Camerarii, Park. Hæc *Althæa* flore eft pallido, fubcandido, five medio luteo, pediculis hirfuto, fie & novella folia ac caulis, non tamenejus ad taftum mollitie qua vulgnotum *Abutilum* Italicum. Pediculi in fibras divulfi foliis venulas fpafas fubminiftrant fpadiceas, folio in adverfâ parte exiftente pallidiore, interna vero (eu averfa faturatius virente : caulis penes internodia eft fubruffescens Worem excipit folliculus fubniger ex multis caplellulis compaftus, femina in fingulis continens multa nigra , exterius involucrum cellulas conflituens, ex viridi tiavefcens: radix pallida, fibrofa.

5. *Althæa* p^luftris Cytini flore, Ad. Lob. Park. *Althæa* paluftris, C. B. P. Lugd. Tab. Ger. *Althæa** hortenfis five peregrina, Dod- Sida vulgo, Cam. • *Althæa* Sida di&a quibusdam, J. B. Chabr. Planta hæc Sidæ nomine folium habet circumfcriptione *Abutili* putati, ex rotundo in acutum mucronem definens, delicatum, molle, villofum & per ambitum ferratum; illo magnus Malvæ rofeas florem asquat, oblongus in ficca planta, ftaminibus in medio longis, colore præditus, ut voluit Adverferia, purpureo faturatiore quam Pasonise aff Malvæ iativx, aut Cytini, juxta & in fummis cauliculis vifuntur tempore vindemiarum utricui rotundi, globoii-, quinquangularitamen fpecie, phaeco velpullo colore Ariftolochiae effigie prx-nantes, Smyrnii feminis aut Miliini nigri coloris & magnitudine: radix hortenfis Malvæ radici umilis: caulis cubitorum duorum. Melioreft jgura Dodonæi iliâ Lobelii, Parkinonî & Johannis Bauhini Chabra^ive, qui omnes ex Lobeliodefumpferunt. Ptovenit, teste Camerario, in Italia copiofe circa flumen *Althæa* non procul ab *Anguillara*, qua dacur tranfitum in

532
Fioret vcrfu . finem, raro femina pe s ad macuritatem. *

6. *Mib&a* . • peregrin a force Rola j.os Plinii, Corn. Planta lix quajn h^{frica} gignit, quotannis ex radice viv.i, longa, alb. nri, circa Matum menfem erumpit; caol^{ba} bci rosundos, virides, medulla plenos, unb verbo malvaceos: folia fubrotunda, & aliquo modoCyclammi, pio men Mori noftratia alba;foliareiirunt, prompt parte molli & tenui la'imgiie cantfcunt, a, . tiorum inftar, fupina aliquanto magis virent: cujufque caulis laftigium ^{la:ulos virides} amittit, nonpaucos, qui finguli fingulis pediculis inniruncur teretibus, & "ar . s .tilulis oblongis & anguftis omni ex parte circumdantur: orimitur hfe • fule . f . f globulin diftant inter fe aliquo imervallo egregioque ordine . [ilp.], cimden) globulum obicpimit, qui dam«maturicate tiehifeit in quino oque fuo coodjta quinque fundi: latifiroa penla qus rofeum floiem atqueetiamanpliorem Malva rofea Lobclu : inhajusflonsum-bilicofat panicu nui fuka, qualis in Horibus Akliaræ rruticis co/ffpicitur. Hæc Aklua, quamvocamus rofeam, florem edit vcrfus finem AuguftiRofo fimplicisflori fimilero. Ha:ccfi!visAFric^{nis,ol}>iorisgratian],[ranflatafaitinhorturnRegiuml^{ar}ifieniemanno⁴⁴.

7. *Altb*a* Indica magno Hore petalis latis & obtafwi nobis. Alcea Indica magnoflore, C.B.P. Alcca Americana, Gluf. Hift. Sabdarifta, Lob.Uod. Lugd. Eyft. J. Li. Chabr. Caulcm Uafet rectum, itriatum, purpurafcentem, binos aut ternoacubitos altum, velctianiaitio-rem. (i in horto, aut pingui folo (eratur (in fililibos brevior eft) quem ab imo multa anibunt viridia.folia, nulla iervata fuic bine inde iparla, inrima lcrntn quidem in arobito, fed non laciniata, qua: medio cauli hsrent in creslacinias dentatas divifafunt, fuprema autem inquinque Canabinornni fofiorum inlfardtftlefta^{umrno} faitigio yclutiln gemmularuro& angultorum foliorum fpicam dt^{nente} : fingulares fert in fingulis alis calyces molli ter echinatos, t quibus fingulis exit fios magnus, quinis pecalis prarditus, coloris ex albo pallefcntis^{uoitur} ungues fatura & nigricante pqrpura, radiacim petala in fe Ipargsnte, infecti funt, uc in AlchME veficaria inftioris Hore: rloris umbilicium occupant multa ftamiria, apicibus longis pradita, 6f ftilus mediusfuperna parte ramofus, albus : fioribus valde fugacibus (nam If a^{*f} funt) fuccedunc brevia, echinata, acaminara captcula, pencagona, interius villis obfita. It-men OQSH-nencia, quale fere fere Stramoniscapfula.: radix quidem multis candicantibus fibris uclurimum coriftrat, fednoneitvivax, namliyemeadventantcpcric, cV fingulis annis fatione renovanda apudSceptentrionales, imoMeridionales, na.mferoadmodum, nempefub Auguftirl-nemautSeptembrisinictLirii floret, & frigt^{is} fit impatiens, prinix tnmpruina; tamcorrumpit. Solis orientis radiisdeleftari videtur 6f irequenti rigatione. In kalia primo ejas femem dclawna, Sabdarifta: appellatitoe (nefcio an talenomcn apud quos nafdtur obtintir)⁴ ex Hifpania profpecie Malvæ aut Althiac potjus.eltgantisliaud dubic ad nos dclata ; idco atl Althiacæ clafTem reterendam juclcanius propCec involucruni feminalt quinrupliciloculamcntorum numero pridicum. Hæc eft Eefiera a nobispropoiita,qua AUhia? omnes in hoc capite donjinrr, hfc: neutiquam Mulvarum aut Alctarum fpecicbusaccedit, cumieminafingula, propriisca-plulis mvoluta, Stcircularicercingeiuiat filum uurricivtmi geranr.

Z.*Altbda* Indica flore parvopetalisangitftis &at-itis, nobis. Alcca Indica'parvo fit. C.B. P. AlceajEgyptia, C(uf. Hift. Sabtariffa alia, Hift.Lngd. Bamia Alexandrina, Cxi. Bamia,Alpin. Cam. Belli cp, 5. ad Clu/ium. Ptegrina etlam til b.xc Althysfpccics, ex JEgypti Alexandria primum femine lcalix communicfta, unde Galli, Germani & (btlgx lia-buere appellacione *Bamia delCayro*. Rotundo aucem afiirgit caule, re&o, virefcente. fcl- quicubitali.cui inhaerent eriam nullsferie difpolita folia, circa infimam quidem caulis partem Malvæ ioliis pncfamiliaria, angulofa & inambitu (errata, a medio verocaulis ad itmimum in* quinque pscfeadas lacinias inftar' foliorum ptioris Sabdariftæ divifa,dilutiusvirenHa:rlor-resinalisnaftimcur, Sabdarifedam fomd>& cqlorc lere fimiles, pubefcentes videlicec.mi nores tamen, fed nan fniuis fugaces: bis fuccedunt cralliufcula, tonga, pentagona, villis obfita &• miiconaca, capi^t«b femem Orobi feu potius Lcontapetali (eminis inftar coneincmia, lanugine taVicin leviter ttrera: radix in aliquot fibras fpafla, non vivax tamen, nam primz prui-nx ttiani coram plantam corrumpunt, ut ad tru^m ptrvenire nequeat. Dofitflimus Pjofpcr inus Bamiam appellat & frequentiffiniam nati tradic. PrztereaBamia, inquit, eltplnnta adA*dwe magnitndmrti acccd- , floribns, aureistarnen, a quibus iLiCtuaquidamfiuncfimilesparvisCDcania. umentis variispartici, quxfeminaparva, lubnyra, rotunda, concmenf, &c.

9. *Mikau* ^gyptia villola, nobis. Alcca ^gyptia villofa, C. 3. P. Abclmofch ^gyptiorum
five

fare Abutilon Aviceuna?, Pon. Ital. Quod pla'ita propofita à Neotericlypro Abutilo Avi! cennz fcumtantumfit Althaea paluftris lutea j non fit Abutilum legicimiim facile innotefic ex notis; quum Avicenna fuoactribuic folia qicumerina, qua? non obfervantur in Abutilo modernorum, folia enim hujus' iuntpotiusPyri,'& fructus rotundus ficut Mefbili, fertionion-gus ut vult Avicenna. Sit hxc plantula Abutilon Avicennae, inquit Profpe/Alpinus, quia folia habet cucumerina & fructum longum. Caulem emittit quatuor pedum, plurirariam brachiatum, cui appenduntur folia multa, hirtuta, ftellata, haud abf familia Cucuibitae foins: flores funtfimiles Bami*, led petalis acutioribus& luteis,fructus itidem *; quibus fuocedunt femina, mofchum redolentia,magnirndine baccarum Myrti majoris, cclòre nigrc:.. rarificem -habet fatis craflam & fibrofam. Tota planta fucco lento vel viico&^tcc; fapaniheVhaceo eft in Europa.

i o. *Althxa* iEgyptiaca mofchata Abelriiofth di&a, nobis. Alcea A^yptiaca mofthata Abe!-mofch difta, Park.. Hasc Althxa aprcedente,caule, foliis paffimhirtutis differt; folia infu-per habet finuata, adinfar Hyofcyami Cretici: florem minorem, magis mucronatis petalis & in-tentiore luteo colore donatum,mofcum reddlentem,fed femina multw magis: radicem maguam fibrofam&.vifcpfam habet. Profper Alpinus meminit plantae quam ^gyptii Mofch appel-lant & ejuodem femèn Abelmcfch, quafi dixerit fuprem cujus femèn mofchum orientalem redolet, & ab odore ibidem nomen invenit, quod ipfius femina mofchum praefantiffimum fa-pore atque odore ^mulentur. Arabes idcirco mofchum orientalemipfifeminiibus familiaris ita adulterare folent ut vix à pentis adulteratio cognofcatnr, quam tamen poftea tempus detegit, cum non dm prasftantem hunc fervet odorem, eteniminadulteratofuavisille odor brevi tempore exhalat & refolvitur. Hxc planta affurgit unico caule, reclo, rotundo, Canis pilis undiquealbicante ob/ito, qui aternatim folia longis pediculis nitentiaedit, magni-tudine & figura Staphis r.griac folia referentia,neque ab Hyofcyami Cretici foliis longe recedunt: exiifdem alis inter pediculos & caulem ariuntur pecioli unciaies, fuftinentes ilores quinis petalis mucronatis donatos: quibus fuccedunt folliculi fatis craffi, rotndi,»angulofoi,nigre. fcentes femina nigra, parva, lunari figura continences, fapore fubamarefcentia, odoi is moichi praefantiffimi.

11. *Althtta* yeficaria Veneta, nobis. Alcea veficaria, C.B. P. Dod. Alcea Veneta, Trag. Dod.Gall.Lngd.Eyft. Alcea Bononienfis, Gefn. Hort. Alcea peregrina, Tab. Ger. Solifequa', Ad. Lob. Althaea hxc cauliculis exit rocundis, ramofis, haud firmis, fed facile collabenti bus: foliis veroaltisincifuris diffeftis, per margines crenatis, bvore, fplendore ac colore, tum & quodantenus forma ad fativi Acanthi accedentibus, fed tamen multo minoribus: flo-re6 pulchri, malvaceis fimiles, quinis petalis conftantes (ubalbidis feuocroleucis, fed in medio acumbilicum verfus eleganti colore nigricantes,è quo auri coloris ftamen eminet; aperiu-n-tur hi tribus aut quatuor horis poft folis exortum & hora unâ aut fequihorâ vigent: relinquunt poft florem folliculus patens, in quo capitulum rotundo-longius, hirtutum, quinis aut pluri-busloculamentisdifhnaum & divifum, in quorum fingulis continentur plurima femina paulo majora frequentis, nigra: radix mediocris longiDudinis fibras emittit. InAtrcbatum SeMorinorum finibus juxA agrorum margines reperiri ac ffonte progigni fertur. Italic, uc ditioni Venetorum, aliifque provinciis haud incognita. Floret Maio& brevi poft incipiente a?ftate peric

i 2. *Alcea* veficaria Capitis bon^ fpei, nobis. Hasc à vulgari Alcea Venetorum à multis an-nis detefta in paucis differt, nifi quod caulem producat reftum, firmum, pedalem, & all-quando akiorem: folia habet firmiora, rotundiora & glabriora, ftoremque majorem, cujus fqundum nigrioris & elegantioris eft coloris, femèn autem prxcedentis minus : cetera ei par.

DeAlthia;* feu Ibificiviribus fupra diftum, inter Malvse vires, quod ad Althsearum in hoc capite contentarum vires attinet, cum fintpentipetate& vifcofo fapore praeditae, i f m c u s a f u e c i l e p o f f u n r , in iismalisad quaevel Malva vel Alcea commendatur.

H A L L U C I N A T I O N E S .

Lthaa arborefcens fylah Stnenjis florejimpli-ci tipleno, nobis. Male dicitur Malva Parvïn-ntio, cum Malva femina circulariter ambientiajti- << m 'nutritivumgerat s at bite femina inplurimis lo- < .y lament is angulojis fert; ergo apt ins ad con/imiles Aklmas feilutt reducitur. Lneptius multo dmtur

fyfa Stnenjis a Baptijla Ferrario Senenji: fi iiovus hie tyro in Botanicis cognovijjet naturam (3 efientiamfyfk, non J{ofam appellajfet ,• ergo cum nee J^ofa u/la rationedici meretur, Jit propter rat tones ante ditto Althaa Stnenjis J^ofk fore.

DE PENTIPETALIS

UrpJunnum ad medium bifijis umcapfularibus.

CATV XVII

LYCHNIS

ut *Dkfcoridl* I, 3. c. 114., & 115. *du* < z *ffrcies*, alter a %
 U ξ • dlla *vx*it£)fM *Lychnis filvefiris* dicitur, *frimam*, *Lychni-*
 dem con .. *nominatam*, -viditur *Thofhjeftm* 6. *Hifl.j.* *Lychnidem* vocaffe:
 fcr *Plini* . c. 4. I *Rofa Grxca an/aur:* *aym Lychnis agria e/l Antirrhinum*, *fic-*
cerrtkres *Dy.mid:* *noua y lura nhflantit vnpoſum, dcquibut* *crdine.*

Lychnis est planta penupetala, feuplanca cujus flos quinis pctalis confat, quorum fin-
 cuh iint bifida urplurimum, acque fingulis floribus deciduis fuccdr̄t involjjer,un] uni-
 cum pyramidale utplarimum, aliqñando obiongum, cuifedesfeti ftilus nurritivus m medio
 est, circa quem fcmina mulca miimtadiftriburatijnc, eadem protegente vafculo (en involu-
 cro, five pyramidali fiveoblongo, in quo feminumfedes nmtam partem cavitatis replet, &
 undique feiinfteeft 3vafcu!ofcu involucro, quod cumxarefcit, dehifcit in mulcas rimulas
 fatfum vcilas, & plerumque ofculoquodamiemeneffundit, rectirvatis infummoveleti den-
 ticulii. Qmnes *Lychnides* ubi adoleverint, lento quodam Sf glutinofu liumore, fuperiore
 parte caulis illitar obſervantur, pracipue verſus nodos feugenicula, cam fubtusquam iupra
 (quxdam plus, quxdani minus;) cui plerumque & cnlices, parvs mnfer Sf foimica: tanquam
 vilco capſe, inharrenc alixque quifquilje, unde a quibufdam autlioribus *Mulcipula*, **quafi**
 herbt! captans muſcas: ab alijs *Vifcaria*, qñafi vilcidaauc viſcoſalierba dicitur. *Lychnis* a
magnitadipe, est vel major vet minor: 3 foiiomm iſtufmra est, vel latifoiia vel angñtfolia; ca-
 que vel folijs glabris, vel incanis **fen** tomentofis, liirfutis aut liirtis: a fbliorum numero est vt
bfñsr̄tt adverb fitia, vel pluribusſimuljunctis: rloribuseſt utplurimiimqñinis peta:is ad
 medium **bifidis**, fed raro finediliquio **confpictor**: a colore florum est, vel **Bore** illo, ocroleuch,
 luteo, ex albo viridi, rubro, phtfticeo, aur?jitiaco: a duratione est vel perennis, vel annaa.

TABULA*XX. Scftionis quintx.

Herba {
Silveſtrk {
glabra {
Lychnis {

1. *Been album* feu *Palaverſpumeum* *authonbin* *Qlabr* &. 0
Hirſuta: 0
 2. *Anguſtifolia* *matins* *Anglhapocumkni.nohk*, *Lychnk marina*
Anglica, *Lob. Gfr.* 0
 3. *Pturibu** *folik avguſtk fimul jtñſth ad ftngula genicuh, nobk.*
Lychnisfilvtphtarimkfolik fimuljunfk, C. B. P. *Lychni** *fil-*
vtflrH c8avaauf. *Hifi.* 0
 4. *Mosrw laſſoUa viſcoſa flcrum paalk fupra albis fuhlm vi-*
fwttſy mtrdiuſt tontrahmnh^ nobk. *Lychnk filveſtrhj*
 5. *F/oremſcofo, nobk. Muſdpuhmuſcofoſlm, T.B.Chbr. Sefa-*
motes magnum Saimanticum, Cluſ Hi/I. 0
 6. *Anguſtifolia v* *Mf^ t**c^x riibra fokk Caryopbytlek, mbk. ly-*
chnis ſilveſtris viſcoſa rubra avguſtifolia, C. B. P. Lychnis ſit-
veſtris quarta, Cluſ. Hiſt. 0
 • 1. *Majoranguſtifolui viſcoſa alba fetelk quwk finpuHs auinqut-*
 C^P. *LychnHf^firkdecima, Cluſ. W®*
 X. *PrattñſifloTt admodum Uameto, nobk. Flos cuculi prattñſis,*
Trag. Odonuns. Cluſ Hi/}. *Caryophyllm prannſis fij Flos cw*
culi, C.B.P. ſi *Simpli* { *Rubro.* 0
i-Albo. 0
*Pleno Rubre*0*
 9. *Incana repens, C.B. P. Ocimoides Lychnitis, Col.* 0
 10. *Foliz glabris calyc duriore, Boccon.* 0
 11. *Noſſiflora minima flore exiguo, Boccon.* 0

Lychnis } Silveftris } jⁱ 2. UMifor, ycbmsne&iflora, 1 -tides mill-
 } glabra } Frutext florutn^Cam. Oci . rum no&ifiorut/ijlort aim, tyft. ®
 } } I i-\$.Myrtifolia Betn albofimitis, nobiir Lychnis fil-vefinsfimfct-'
 } } I [virens Ocimafirum arbcreum/r' , -virfns, Cluf Hi/I. O

§. J. L T C H A" / D E S O L A, ? M.

Explicatio Tab.vigefimdt Seclionk quint*.

1. **T**chnh filveftris perennis qua; Been album vulgo, nobis.^ Lyci'nbt filvc i • quar Been J r vulgo, -C. B- P. Lychnis filveftris, Dod. Eyft- been album, Gefni Tior . r. Dod. Gall. Lugd. Thai. Polemonium Dod. Gall. Lugd. Thai. Poi^ . I. j'apav ameom (propcer asperginem fputo fimilem) Ad. Lob. Cam. Ad .filveftris i-ychnidis ciaiem feu ordinem rekrri pofleviddtur Lychnis a recentioruni nonnullis Been album vocitacum, Cau- liculi huic tomplures fiint" tcnues, teretes &geniculati, atque e fiogulis articulis folia bina oblonga, htiufculn, acuminnta, Polygoni fere familia, e regione fibiinvicem oppofita, Ixvia feu glabra utplurimum, quandoqizchiriuta, ex albido virentia: flofcuialbidioxoblongis c- fumpences calycibus tenuimolliqueniembranavelatis, pluresfimulcoli3»rentes, deorfum nu- tant: capfulv fubrotundaequinis denriculis recurvis, aliquandoreflis, in raftigioornatar: in quibus itmen nigrum continetnr: radix alba & laris proluxa, Ted tennis. PluribusperGnl- tiara, Italiam, Germaniam, Angham, & nbique terrarum reperitur Iocis ; in herbofis&lxm collibus frequenter exit. ^Lttatc floret, Junio nempe menfein Auguftum ultjue, quo tem- pore femina perficit. Vulgo Been album nominant ad diflerentiam alterius, quod rubrum cognominatit, idqueVaieriana marina rubra dicitur. Neutrum tamen vcrum Been Arabam eft. Appellatur vero 3 nonnullis Papaver fpumeum: at cum Papaverc (imilicudinis nihil habet. Diverfi diverfo mode authores nomiunt, (cd fecundum regulam a natura datam eamque inrallibilem, icilicet a fioris Sfcapfularfeminalisipforumquefeminumconiormitatede- fumptam, cunr ca:terishujus daffifeft vera &genuina LycJinidis fpecies.

2. *Lychnis* perennis anguftifolia marina Anglicaprocumbens, nobis. *Lychnis* marina An- glrca, Lob. Ger. Ike *Lychnis* glabra eft, nt prior, multo tamen minor : a radice craffa plurimas fibras rcpentes hinc imle emittente procruduntur cauiicul) mulri, pedales, denfe Enmi frati, quorum geniculis a radice ad fumum adhaerent bina, ternave toliola glabra, minoraSf anguftiora prioris, Halimi ferecolore: inhorumcymis vifunturtiofcuipuluriniipen- Cstptali, aibi, bitidi, multunt quoad formam accedences floribus prioris, (ed funt multo mi- nore •, in quorum medio plurimacernunturfamina, quibus deciduis fuccdunc capfuls fin- pula: ejuodem formx.& (igura; cum capfulis prioris, nifi quod fintminores, calyce minore lo- liacco etiamcircumveiliti:: inhanim fingulis plurimacernuntur femina nigra, pariteradhr- entialtilonatricivoinmediocapfula: fito. Trovenir adLancaftrirorammarkimani, dibi- <ju- etiam in Anglia. Floret coiU-m tempore cum priore.

3. *Lychnis* filveftris phirimis foliis fimul junftis, C. B. P. *Lychnis* filveftris 8, "ClnrHftt. *Lychnis* filveftris 1. Cluf. Hilt Lob. Lngd- Tab. Ger. Gnicularos criam liabt caules hxc 3". nobis, remits, inpluresaladivifos, pedalts aut majores : rolia in fngofta genicalis iaferiug terna» quaterna, aliquando plura^longa, latiufula Polygoniinftr, fiperuis plura, angufti- ora, breviora, Pfyllii rere paria , coloris viridis candido perfufi S: quafi cifii: iiores in fummiif ramulis nafcentes quinis petiilis, anguftis, bifidis (eu in extremobifulcis confantes, incernapartccandidi, externaaliquantum purpurafceiues, & antequam omnino contabe- aiufefe contrahentes & infc circumvolventes ;«hifce finguliscapfubfucceduntadmodum •^oblongaT.quinisdenticultE reftis infuperiore partedonati, femeparvum,lubrorndum Papaveris Rliccadis feminum armula, colore cinericeo continentes : r.iditem fatis craflam, al- bam, mult'fidam habet, altero anno pereuntem.

4. *Lychnis* filveftris ieu momana latitblia vilcofa riorum petalis fupra albis fubtps virc- fecntibus interdiu fe contrahentibus, nobis. *Lychnis* filveftris flore albo, Eyft. *Lychnis* lilvtftrisnonaClufti, Ger. *Lychnis* mont: r- lati folia vifcolh alba, C. 13. P. *Lychnis* filveftris minor alba, Parif. Hax multa fecundur icem hnbctloliala digitalislongitudfnis iVnfm in latirtidincm fefe explicantia, fubcxtrcm 1 wronata, viridia, nonnihil villofa ad Lyclini- drSfilveftris iloreallx) (qux in omnibus^ -...nciis vulgaris) folia quodammodo accedenti^, longetameii **angnffiora**, acidiufuligufus: caules deinde pedales, fubinde cubitalespi--

dofos & geniculatos: fingula geniculaample[^]tuntur folia bina, ex adverfo fita, latiore pedicir-
lo, aliis brevioribus & mirioribus circa fumum caulem: fummisalis innafcuntur longe fati
petioli, ternos, quaterios vel etiam plures flores fuftinentes, quinque petalis bifidis & ad ex-
trtmum divifis conftan[^]es, binas appendiculas ad bafin uniu[^]fcujufque calycis fuftinentis
flores albospupa, fibus virefcetes, habentes, quinque ftaminulis medium umbilicum oc-
cupantibus: floribus mar;efcentibus & contractis inque fe convolventibus, ut in precede-
nce, fuccedunt oblonga, craillifcula valcula, mucronata, quinque crenulis incurvis donata, femine
exiguo, rotundo, cinerace[^]plena: radix fibrofa & perennis, fingulis annis novos ex radice
num[^]erofiores caules profert, qui properadicem procumbentes fibras agentesfacillimepangi
poffunt. Proveniunt[^]dStiriacarum Alpium & Snealben lupra Ccenobinm Neubergenfe, abun-
dantiuscari[^]en Ktfero faepius a Clufio commemorato.

5. *Lychnis viscaria* fil[^]re' minicofo, C. B.P. Mulcipulaakera flore mucoso, Lob. Lugd. Mu-
fcipula five Amoraria akera, Lob. Icon. Mulcipula mucosa fiore, J. B. Chabr. Sefamoides
magnum Salmanticum, Cluf. Hift. Tab. Cam. Ger. Ad Lychnidis filveftris etiam fpecies non
inepte referripoife putat[^]Clufiuseam plantam, quam nonnulli Salmanticae Sefamoides ma-
gnum nuncupabant. Aliquot cauliculis aifurgebat pedibus interdum cubitalibus, ex un[^]S
radice prodeuntibus, rotundis, geniculatis: foliis longis fere Olex iimilibus, ad fingula ge-
nicula contertim nafcentibus, caefii coloris; floribus in extremo caule & ramulis fpicatum aut
racematim congeftis exiguis, coloreex herbido pallefcenibus: femine incaliculis feucapfu-
lis pyramidalibus furfum apercis utin congeneribus, cineraceicoloris: radix fati craffa, can-
dida, perennis, fumma tellure multa folia, longiora & verfus extrema latiora, mucronata ta-
men fpargens: iumms caulis & extremi ramuli, potius ramulorum nodi, lento quodam & vi-
fcido humorequafi glutineteni obfiti funt, quemadmodum plurimx Lychnides fiiveftris.
Tota planta amara eft. Nafcitur in lapidofa & arido (olo circa Salmanticam, etiam in Narbb • •
nenfis Galliae agris: magna verocopia in Auftriae falebrofis collibus aliifque defertis locis.
Nos copiofe nafcentemoftendimus infabulofis collibus per univerfam Galliam, at nufquam
abundantius quam in filva Regia *Fontainbelkau* & intra fepta Regis *Cbambort*. Ali etiam fo-
lebat in hortis Belgicis, inquitClufius. Ex eodem autem femine plerumque dux diverfe fpe-
cies (nos potius dicimus varietates ejufdem fpeciei) enafcuntur, non illae quidem forma dif-
fimiles, fed earum una florem majufculum duntaxat profert fterilifque eft, altera feminifew,
minorem florem habet. Tota a?itate floret 5c femina interim ad maturitatem perducit.

6. *Lychnis filveftris angustifolia viscaria* prsecox rubra foliis Caryophylleis, nobis. *Lychnis*
filveftris viscaria rubra angustifolia, C.B.P. *Lychnis filveftris* 4. Cluf. Hift. *Lychnis filveftris*
viscaria flore rubro, Eyft. Huic unicus initio eft caulis pedalis, amplus, geniculatus, viscosus
(interdum plures) ex viridi purpurafcens, prscipue ubi funt nodi feu articuli: bina ex fin-
gulis geniculis fibi invicemappofitaproferens folia, longa Caryophyllorum forma, mucronata,
nrma, craillifcula, viridia, amedioad fumum fere multis floribus ex alarumfinu longis fati
petiolis prodeuntibus onuftus; qui quinque petalis conftant eleganter rubellis ad purpuram ru-
tilantem tendentibus, clariore dilutioreque coronilla medium umbilicum occupante, nullo
tamen odore praeditis: hiice fubveniunt /embranacea (attamen duriufcula) capitula feu ca-
pulae oblongx, tumida? in medio, &apertae in fummitate, quinque reftis aliquando recurvis
denticulis confpicua?: in quarum capacitate continentur plurima femina racematim sdhuc
viridia, cingentia ftillum nutritivum, arida autem difcutiuntur per foramen in capfulx fupe-
riore parte fitum, ficutin aliis fuae fortis, admodum exigua, ex ruffo nigricantia: radix craffi-
ufcula, nigra, qua? multas fibras fpargit & fingulis annis novos eofque numerofiores caules pro-
ducit. Provenit in omnibus Pannoniae & Anftria; inferioris filvis montanis editifque & her-
bidis locis atque etiam filvis ad Francofartum vicinis. Floret ineunte Maio, femine
Junio maturum eft, nos abundanter reperimus in filva dicta *la Foreft de Rouffy* fecundo a Bli-
lenfium capite milliari trans fluvium Ligerem.

j, *Lychnis major angustifolia viscaria* alba petalis quinque fingulis quinquefariam laciniatis,
nobis. *Lychnis major angustifolia viscaria* alba, C. B. P. *Lychnis filveftris* 1 o. Cluf. Hift. Septi-
m[^] huic noftr* fingulis annis ex eadem radice novi prodeunt cauliculi per terramparfi 6c *Aib-*
inde area nternodiadice, agente, dcinde Iqrfumdeno fefeerigemes palmari alciuclic,
facies, g[^]enulata, bina folia n[^]gn[^]g[^]uliculis g[^]eniculis ex adverfooppofita ferentes longiufcula,
CUTo mUCron C V India, p[^]Omin ulo dorfo: liorts ^ fummis cauliculis & btcalibus ra-
m[^]ulis el[^] S[^]ntSS, can[^]id[^]l, q[^]'? q[^]f P <al < C fingulis quinquefariam laciniacis feu divifis,) m fm
g[^]lis; ex[^] c[^]ns, conftantes, inodon: quibus fuccedunt oblonga valcula in medio tumida

guinia rccurvisdenticnlisin lummicate j... "ii Lydiiiidum capiulaumi more, exigaa nigricanre planoque feniine (qaanod'q... nitatem cum Armeriisfloribitsh;!):-: c vi detar}, reterca: fibrofam habetradicem, quami;!uepangerdicc!:. "ift&alialHiju5fpc\$KM mulco minortbua & anguftioribua tbliis, minore etiam fiore. •~xtt"i fuperiori non difpar. Utraque mvenitur in itopulo illo pnrruptoque jugo Dtire/laitt... acofecundoiupra Gamin-gammillari: & naec eft Lychnis angaftiibfia minor vifcofaai... P. vel 10 albaalia fpe-cies, Cliif.Hift.

8. iycMK*pratenfis flare laciniato fknplcti & pleno, nobis. "ocaB pracenfis, Trtg, • Flos chculi, Lon.Ge&.CoI.Tab. Odonricis, Glnf.Hiflr. Odontitjs quonmda... n, fgTo». A®-, Thai. Armerias filvefirid, Dod. Ve[onica filveftris, Dod.Gal. Caryop... MCcnfis fiorelatiniacofimplici five Flos cuculi, C. B.F, col. i. pag. Caryapiv, ... repfia lloct; pleno, G \$• P- ibidem col. 2. Floa hiccuculi diftus dofte... lam ju... oDon-titis Plinii elt: anguloiim liabet certecaulcm, geniculaium, cx m^ . ^ . iritiiq c parpnraicentem; txgc]iicilispuiimapari:ctoliacrcri3ntaliqLumt:iilumoblona,quamCaryophylli vulg;irismajo-ris iicic>M, colorehcrbaseovirentia^: ^iofenlosinfnmmo cauliculosuni parvnlos, pcmapcn-Ios, ad esyemutn laciniatos, ex^uis Caryophyllia filveftribus perfimilts, verum minores, pluves (Tmul in quaifdam vcUiti umbellam congeflos &c fingulos paiticubtitn podeiaftes & temper fere Rofarjtabore lplende'lites,punftis interim candid is circa medium diftinflos,inrevd um rari^atos,rarifllme candidos. Similem priori habemus repertam Lytlinidcm in pratis,ea parce #qui inter Oandavum & Antverpian fita, floreelegantiiniio^ . imti coloiis. Ornac lic JIos,mul-tupliccciiilonim (eriefolummodoa priorediltindusjiortorum areas. SponteGefnehis,(irt.i Gryphii lacus ripas in Helvetiadfe repertum fcritbit, fed mulco quam in hortis minoiem. t'los tuculi lioic fimplici provenit in loci.i htimidis, tit in prncis 6f adpratorum marginesac nbtts, led mulcoquam in loitismenor;mature Aprili ii'pc mente auc micioMaii fiorct 3c ljraca oinat.

9. *Lychnis incana repens*, C. B. P. Ocimoides Lyc'nicis reptante raciice, Col. Foliis clt p^rvis, ab radice ftatini binis (iiiguliwgenicuiis lurencibusjoliortim Lyclmulis coi-onarise Etflii-fis, fulicec incanis, pilofis, cujnon minus quani LychiidiisCoronariaetoliaadtychiiia rbr-mand;i apta videncur: rudicc temii adniodum rirmatur parum fobonraradefcndente at que n rcpantre, piurimas fibrillafsid fingulos nodos protrudenre, ex quaplncs frnicant ...jli, ronuidi, incatli, Iiiriuti, bina loliola fingulis geniculis lisrencia h^bentes, <viz in imo minora runt, dcinde majora in medio viticulo, quod contra evenit in pknris, ab radiet-ftatim foliata ante caul is erupt ionem, ut in Thtophrafto legitur, hiifuta, esrnofa, incana, Ly-clmidi Coronarta:fimilia, fed magnttudineflt forma Ocimoidia Volimoni?: Btlgis dictaimula, Cuiits etiam ficuti iilinrum congenerum rku ttoresedit Aprili atque Maio menfe carididos, quiii is petal is conftruflos, ftamtna intus quinque habentes, atque finguh rotia in fummo, qoblatiora{unc, dividuntur binatim nt ioHiculi Thlafpios,cujas capfula longitud'maliter di-viditnr, in fanimo, Junio femina inlungis pevicarpiis, mollibus cartilagiticifijue ptriicit, lulva, angulofa huliicaque. Pricarpium feu capfitla fem'ualis. non ut in reliquie Lyciiniidum fpecitbits, onininoobducitur, ftd tantuni bafin quinque foliolis conftrufLint habet ut in A!fi-nes fpeciebusobfervare eft, dequibuscap. [eqaeote. Hnjusradix vivay admodum eft, ideo-nulcLini Imricacattjue petoonat,terramque ipfitisloliis operit. Saporplanta; dulciftft. Hanc herbarii tn crritorio Neapolitano herbam h<c>ariam vulgo appellant a laftisetiendi facultate ipfisnoca, quare non inepreliebariorum temellar unique vulgiis adeliiciendumlac copiofum ucur, atque ptantam ficuti reliqua olera jolculis admixttsovisdiliuptiscoquunr, non fine Piperis atque Amarici modico, vel uc alii folent in placentulam eftbrmant, cujus l magnam aftis copiam promere experimento fe habereafferunt atque hodieutuntur. Ex igiur tamcalidam&humidam neqadco tcireni fubftantis participem effe concludi po-teit. Spontcac frequeris oritur in monte Div£ Marti Virginis nomine appellato, locie hu-mentibus pctrofis.

10. *Ljehtk* foliis glabris calycc duriore, Boccou. Ex Siculo femine Lutetia: fatojmtaeft planta ha-c, caulibus; pedalibus, gracilibus, geniculatis, iramofis donata: foliis ad fingulos ar-ticulos binis fibi appoiitis, anguftis, duris, per extrema valdeacumiriatis, prorfus Vetonica; carYophyllcx jemulis: floribusornatur in far ^caulicorum ex calyct oblongo, canalato, dilute purpleis quinque ptalis prarditis, r... iis, bifidis : quibusevanidisfuccedit ptricar-liumoblou&unugracife, longioye pediculo^... turn; femineniiruco, tufco pra-gnans: in nso-clivia circa Mairunam locis crpiofc naltitur.

11. *Lychnis troftilioraminimafloreexigii*(\,Boccon. E raifice parva,lcniter fibiata,caulici; tos plurcs, teiives, prrmumper cerram itratos edit:' folia ad genicula fingula, bina eregi-on^pofita, angufta, uricuilia, Linariie minimi aureae (tu Speigitlae xmufa gerit jjarcpatva Lychnis, quorum infinu toliota alia duo naicuntur breviflinia & tenuiflima: eriguntur demoni cauliculi (tipatu nurherolbgedctilaci, multiplies in ramulosdivifi,nontiihil pilofi nt& folia, quorum qua:ad liimmitaK-h accedunc ienfimbreviora&latiora fiunt. In fummitate & folio-rum ulcimis alia iubrubri exeunt fiolculi, pentapetali, in extremis bifulci, AHines minoris magnicedine, caplulis min iis, Lyclinidum more, longis pediculis interti. _ Tota plantula Lid genicula vjfcido\feng;hitino!b quodam liquort maims contrectantiuni inficit,

tz.LjtMii frutejci-ns iioftiHota, n'obis. *Lychnis nocriflorfl* , C. B. P. Ocimafterum no-ftitijpnim fibre albo*, Eyll. Radix non alte defcendit, mediocrisgracilitatis, cuulem Itrmepe-dalcem, ex itervallis geiicfulatum prpferc; cui folia riilnrcnt part urriqne fitu,Saponaris loliis angnftara & parum hiifuta (ut in Ly^inide filveftri alba, qnara & multiHoram in hortis coli-mi;s) oblongata & Itriftomucronch'nita, viridia, fplendentia: flores in lummis ramorum f?Rnbas cmin'bs excaiyctiisfnatis, (ubhifutis, atqite^glutinifo humore adeooblitis, utmu-fcrs minutas & jliainfidentiaanimalia infefta cohibcant, Sbbraiffrant, Saponarij itidtni Unoloa-, circa fummas oras bifidis petalis & modice tv.trejpitacibifs punicantibus con-ftantes : noftutantum& humidioris aeris aflacu qdorem (baviilimum emittences explic^ri: **fefflen** liicrcelcit iifdem **caljculii** oblongis,& media parte niagis tumentibus,fuperius etiani alt-otumLychnidum calyculorum inftar quinquefariamiiffig ; quod qnafi in racemum compiictum , cong!ymeratumque,maturirate cincraceicoloris exignum,a!Kiruni Lychnidumfeminibus fimite.

19. *Lychnis finteicens myrtifolia* Been albo fimilis, C D. P. Ocimoides tiuticofuni, Cam. *Lychnis filvellris fempervirens*, Ocimoides arboreum fempervjrens, Claf. Hilt. Hujosnova; Sc elegantis Lychrtidis ipeciei lemna 80. abhinc annis ex Italia miira,Ocimoidisarborci Imi-pervirenria appellatione habnitCar; Clufius; cni mulri ab eadem radice procleont rarai,do-drantales, alicjuando pedales, lignofi, crafliufcuii, nodofi vHlde, fed fragiles ; nodis Jingulis Lfa fempcr adnafcuncur ex **advedb** interfe folia, Bellidiffufiis non majora, ab imo angultoiui Li:uniexpanla,miicronatatamcn,viridiaadmodum& fmlt-iuk-i^ia .-tfummis ram is alii nateun-tur pttioli femiunciales, quibus infident fiore pentapetali, pingnibus membranaceiscalyculis indufi, quijque bifidis peralis conlhntcs, coloris quodammo carnti; t qeorum pifdio tema, gracilia incurvaque prodeuntftamina: quibus evanirlis fingplarfuccedunrtapCuirpy-ramidales, concincentes plurima fenina racenutim adharrentia ftulo nutritive, ficut in priore 12"". Vide Icones urriufquefciliceti 2, fie 1 ^ .inTab, 20, Radix candiac, pauciffjueiibris priditactf. Petennis tamencftipfa planra.

TABULA XXI.

<i>Lychnis Ufffolia</i> vitiJis flo- ribus in capitulum denfe wgeft^	r	r	Flore } Simplicii { Albo. ☉ Incarnato. ☉ Miniato feu aurantiaco. ☉
	Chakedonka bir/tflfi" " J "	14. Major 1	
			16- Montana flore glohfo lu'teo, nobk. Billis mmtamfL re gtobofi lutev, C- B. P. Gfo'iuftaria montana lurca, Col. 0 ij.Silvefinslatifeha^ Cluf. Ht/l. five Mufcipula maxima Auricula ur ft facie, Park; ☉ [1 % .Viftatia maxima Cret'un Alfinde Exot. Pari^ O

j. 2. LTC HN'IUES htifotU vkides foribta in capitulum denfe conglfis.
E*f>ticario fab. vigtfimjtrims Sefionit quint*.

14. *Lychnis Chalcedonica* nore alboincamato m'miato fimp!ici& pleno, nobis. *Lychnis major hirsuta flore coccineo*, C. B. P. *Lychnis Chalcedonica five Constantinopolitana miniata*, Ad. Lob. *Lychnis Chalcedonica* Tab. Ger. 1 ychnis Bizantina miniato fioic Cluf. Hilt. Fl-s Constantino poiitanns, Dw. *Lychnis Chalcedonies*, Park. **Lychn?d*** huic Chalced^ craciiceplares, bicubitalcs, tenocs, genicuiati, inanes; folia e geniculisfin-gulis

ulis bina, oblonga, aliquantulum versus appofitionem cum caule lata, versus extremum acummata, obfcure virentia, nonnihil aftra & hirsuta, ficuti & caules; flores quafi in latas umbellafaut potius in capitulumdenfecongefti, afpectu pulchri, aeterum inodori, colore floris Calendula?, purpurei Lilii five maturi Mali aurantii corticis exterioris, fubinde dilute rubentes aut candidi. Flores, inquam, donantur fimplicibus quinque petalis, ad medium divifis feubifidis, unde crux Hierofolymitana, nunc Melitenfis, qua equites olim Hierofolymitani, nunc Melitetifes, infigne aureum cruceatum ad modum huius Lychnidis fiorisgerunt in peftore pro figno equeftris illius ordinis. Eft & flore pleno f. c. multiplici petalorum ferie. Semen floribus fimplicibus cujuscunque Lorisevanidis fuccedit exiguum, fubrotundum, copiofum, in longis atuminatis vafculis feu capfulis cartilagineis: radices longa, in plures tenues radículas divife, aeftu aliquantulum acres. Seritur in hortis femine primae Confantinopoli delato, unde Lychnis Confantinopolitana feu Chalcedonica dicta in Italia quibus primo detefta fuit. Junio ac Julio altero anno floret, deinde per plures annos radicibus in hortis durat, hyemis & frigoris fatis patiens.

15. Hue pe-ine Lychnis minor flore epeceino, C.B.P. Flos Confantinopolitanus minor, Dod. Flos minimus, Lugd. Sola parvitate a priore differt.

16. *Lychnis montana* flure luteo globofo, nobis. Bellis montana flore globofo luteo, C.B.P. Globularian-jntana lutea, Col. Radicem habet haec longam, pedalem, minimi aegritudine, craffibuscortice fufco pallido, quædulla intus lignofa, dura, fibris in terram fequentibus multis tenuibus circa fororum exortus, in reliquo vero radicis rarioribus craffis longioribusque; iapore ficco, gravi odore, acuto: folia ex illa denfa (pluranamque gerrina fundit) oblonga, Cochleas Anglicæ modo, digitali in fummo latitudine majora, minora vero funt reliqua, tevia, elata, carnofa, rigida, oertis nervis & intra carnem minimis extuberantibus. Sapore, inquam, amaro, cum acrimonia quadam: inter quæ ex fingulis propaginibus pedales exeunt juncei, rotundi caules, aut parum majores, asqualiter craffi, unico circummam tertiam caulis partem geniculo duobus rectis foliis in «recepto, in quo purpurafcunt. In fummo vero capita funt orbiculata, quatuor apicibus foliorum duorum contefta. quæ caule perrotata videntur. Scabiofemodo compofita, quibus hiantibus copiofi, utriculihirsuti, purpurafcentes, in globum compofiti, flores emittunt luteos, ftellatos, odore Geniftæ non ingrato, quinque petalis conftructos, denique ftaminibus longis, medium apicem, craffiusculum, bicornem, pallentem & latum proferentes, ex fructu in quo infidet emicantem: capfula quidem intra florem adhuc ovalis, tenera pellicula tegitur, ut femina extuberare viderentur; defluxis vero per maturitatem floribus, hirsuta fit, atque utriculi modo aperta alium habet intra fe duriorem ovalem capfulam Lychnidis modo: in quo femina nigra, compræffa, rotunda, fed parum incifura divifa, quæ, aperta in quatuor partes pericarpium ore, vento excutiente decidunt. Floret Junio, Augufto mense perficiuntur femina. Montium altiffima juga fupra villam Flammianam quiculis Marerii comitatus, loSerrom, loco dicto, quod est fupercilium mentis, incolit, in quo Globularianæ casruleæ Monfpeliensis copia est.

$n^{1 \wedge \wedge 1 \wedge 1} f \wedge f r$; $H^{a t i \wedge \wedge \wedge \wedge}$ **Hil.** *Lychnis filvestris lacifolia Clusii*, Ger. *Lychnis filvestris* latitoha Clusii five Mufcipula maxima Cretica Auriculæ urfi facie, Park. Hæc radices habet fibrofæ Primulas Verisinfar, equarum capite folia promit fatis ampla Auriciuæ urfi vulgo appellate flavo flore non valde difflimilia, candidiora tamen, & lanugine pubefcentia, etiam illis crallora, denfiora, & fucco abundantia: altero demum anno a fatione caulem producit duorum aut trium cubitorum altitudine, firmum, rotundum, fucco quodam glutinofe obfitum, a quo mufcæ & aha minuta infesta infidentia detinentur magno fatis numero: in fummis ramis plurimos profert flores veluti in umbellam congeftos, etiam ad centefimum interdum numerum, fatis tamen exiguos pro planta magnitudine, quinque petalis bifidis conftantibus, coloris exviridiflavefcentis. Hujus ferfen ex Italia ad Clufium miffa a Tofephode Cafabona fereniflimi ducis Florentia Botanico, cum ex Creta redux effet Mufcipulæ Auriculæ urfi facie nomine, cum plurimis aliis feminibus ex ea peregrinatione relati.

i 8. *Z. jkte* vicaria maxima Cretica, nobis. Vicaria maxima Cretica, Profp. Alpin. Vicariæ maxima Cretica Alpini, Park. Planta hæc est foliofa emergens ex radice longa, craffitie pollicari, alba, femim ac femim gracilefcens: dura & carnofa fert folia, innumera ferè inferius gracilia, fuperius lata, & in mucronem acutum definentia, denfiffime fimul ftipata, Auriculæ; i rfi flore luteo admodum fimilia: inter folia exeunt ramuli, numero plerumque decem & plures, etiam aliquando, femicubito longi, graciles, rotundi, rare geniculati, albicantes, humiditate admodum vicida obfite, a quorum fingulis geniculis bina folia utrinque e regi

fita'exeunt, parva, oblonga, tenuia, aliarum Lychnidum foliorum figura: in fummis vero caulibus ramulve juxtageniculosferunt foiiola binatimautternat m:,exgeniculispliircs flores xcedem centro ortos, Luicialibuspediculisnixos Mufcipula: vulgaris fimilesgerunt.-adeo ut ramulorumfummkates^Hiribus multisfcateantpentapetalis,p;irvis, quorum fingulis fuceclunt vafcula parva, 'otm uinqueaut fex denticulis, reflis furfum verfus, una cum foramine in medio donata, ex qu' iditur femn nigrunimaturum, parvum copiofum, ut in ceteris fua: fbrtis Lychnid Noneft hxc cadcm cum pñore, uc apparet ex'diverfis defcriptionibts& Iconibu deappendicemad finem hujus Sec^ionis. Confule Vrofp, Alpitium deExoticis pag, i, 5. jui diferentiam plan.e percptibilemadfert. Lychnis 9. Clu(ii& Lychnis inc:ll repens C. B. P. Ocimoides Lychnitis, Col. in hoc paragra*pho defcripta? debent amandari ad filvei fires hirCritas ^ 4.

5 TABULA XXI.

* <i>Lychnis coronaria</i>	I	(Albo. G
		19. <i>S tivae</i> ! Siwplici \Rubro. Q
' <i>fivecotnaria</i>	flore	(Puntta'to, 0
		\Pkno rubro. Q
	20. <i>Silvejrk</i> , C.B.P. <i>Lychnis run nata</i> , Ad. Lob. <i>Lychnis umbellifit</i>	
		<i>Montana Helvetica</i> ^ Jacob, Zanoni. 0

§, 3. LTCH N ID E S majores coronaria Jive cotonar-U.

*

*ExplUatiopartis Tab. vigeftw*prim* Sefi'tonfcquint**.

19. *Lychnis coronaria* fativa flore albo rubro pun&ato fimplici,& rubro pleno, nobis. *Lychnis coronaria* Diolcoridisfativa, C. B. P. *Lychnis*, fativa vel coronaria, Dod. Gall. Gefn. Hort. *Lfchnis coronaria*, Ad. Lob, Lugd. Dod. Cx(. Exrad^cemultum fibrofa caules exeuntrefiti, cabitaies, & fefquicubitales, teretes, raniofi, incana lanugint pubefcentes, in nlas.iliquoddivifi, ad quorum fingula genicula folia oriuntur bina, ex adverfo pofita^ *Salvia*-toliis paria-aut paulo majora, oblonga, obtufa, craifiulculi, mollia, fupra intraque denfo villo canctf ^ores ex calycibus oblongis, canaliculatis, (id<ft rigis Sc fulcis villofis) emicant, ;x dorati, coloris albidu, r_ubri, ex carneo candidoque mixti, quinis petalis latiufulcis conftaur.es. Rofuiam exprimentes, /ingulis autenipetalis appofiti apices bini,acuti,rigidi. Pnecervulgarem flore fimplici variis colonbus pifto donatam, reperitur vulgo in hortis flore pleno rubro, quz eft *Lychnis coronaria fativa multiplex*, C.B.P. *Lychnis flore plenu*du Bry. *Lychnis coronaria flore rubro pleno*, Eyft,

£0. *Lychna coronaria filvertris*, C.B. P. *Lychnis coronaria rure nata*, Ad. Lob. *Lychnis ambellifcra montana Helvetica*, Jacob. Zanoni. Ex radice magnum (tlpitem foliorum per /ram frntorumemittit hie *Lychnis coronaria filveitris*, ejuldem romns cum foliis L> tlini-^{1s} coronariKfativi, crafiioracamen, dyiriora, cartilaginea, magna Sf villofa, attamen viridia: Xoonab media protruduntur caulcsplurimi, villofi itidem, quadrati, albi, in medio cavi, >dis feu gentulis exceptis qua? rarodifponuntur & crafTefcunt, ex quorum fingulis exeunt bina o'ia txoppofito diipofita, nucc a dextris & finiftris, nunc ante & retro ut cernitur in wnaibus, caulequadratodonatis: in fummis caulium ramis nafcuntur plurimi floret, umbellatim difpofiti, {tinguli quinis petalis rubentibus cordatisfcubifulcisconfantes; in quorum medio exit ftilus, citifdem coloris; flores, inquam, in capitulum congefiti, pulchri afpectui cernuntur: bif^ccvanidis fuccedunt capfukftmul junfti, oblongac, falcatx exterius, & vidides, ulquea. "umerum dtnarium, capiala incerior cartilaginea, lupt-riiis quinqt cristatis denticulis donatur, "ua cqmforamine, ex quodecidunt femuia, fubruffa, paululum plana* turn parvulis protuberai>tn;. FloretMaio, i'emina perficit JulioSf Augulto. Repritrurin Rhætz Alpibus flore hortenfii odoratiore, teftc Gefntro.

Pars T A B I U £ XXI. Seaiomsquin^.

(Simplex. 0

UuAlhj

(Multiplex. 0

I *Lychnis fihe/irh*
*hirfitM major^**Perennis* i 22. *Foiis Cochleari* < *e Britannic* fi, n amplo Saptmari&*,¹¹⁸

(Simplkl 0 *

'2y. *Sedminus hirtaflare rubello* <

(Plenn. Q

(2\$. -F!orf. *minoretarneo^nobis.*'Q*Annua* < i^ *Chalepenfisflosculis carncis pedkulU infirmis biuncialibus infi-*
C • *dntibts^ caffulh fere rotunJis, nob'a, <?*§.4. *LTCHNLDESfihtftresmajoresbirfuu.**E-xplkauoparth Tab, vigefimg primestfuonk quint*.*

11. *Lychnis filvefris liirfuta perennis alba fimple^multiplex, nobis.* *Lychnis filvefris alba* (implex & *Lychnis lilvefris alba multiplex*, C.B.P. *Lychnis filvefris alba*, Dod. Gall. Cam. *Ocimoidé?* *niajus*, Cxf. *Lugd. dcimafruium ieu Ocimoides*, Matth. Lac. Tab. *Caft. Lychnis Uic filve-irLs geiiculatis eft cauUbus ioliifque mollibus* *Lychnidi coronariacfatifimilis*, minus tamen cana'aur bnuginofa; foiiis item anguftioribus & cauUbus tenertoribusplurefq; alas bcientibus; floribusctijm minorrbaa, coloiccai didis aut rubentibus; calycibus majoribus planis, inqibus femem par yum, rotundum, fuLmigricans; radicibiis longis Sf digitalis fubinde craflitudinis, Juxr; i] > rrtorum arvoramqne margines & alibi fpafoace exit. *Transferturctiam in hortos, pixcipueei-quarumquandorjueflorumpetala multiplicantur.* *Plurimaxftatispatte in Autumnum ufque Horct.* Hue p^itiiiet *Lychnis prolifera Hore viridi*, C B. F. *Lychnis agrefts abortiva- multiplici florcviridi*, Lob. *Icon. Qcitpafrum flgrepleaoviridi*, Cam. Ep. in' Matth.

ii. *Lychnis filvelhij hiriuta perennis foliis Cochleari j E Britanic Efreaniplo Saponarii E, nobis-Caaiibusefhtec fefquipedalibasaat pedalibus, parcim]nimi procu m ben ti bus, parr im ereflis, genVculis craflioribus: quibus adnafconturfolia oblonga, hirfuu, forma Cocfuearix Britan-*
nicæ: in fun *imis caulibus conrpKiuiuur'tiores ampli, Saponarix ripnim armuli, qi^bus (11-*
gulis deciduis fuccdunt cajMiikr pares conuentes pariafemina.

23. *Lychnis filvefris minus hiriuta Hore rubello fimplici, nobis.* L**ychnis (iUftris five a-*
qnaecta parpt^jtafiraplex, C.li. i^. *Lychnis filvefris purpurca, L>od. Liigd. Lychnis filve-*
fris rubellotlort, Lob.Ad. Hxc radiceft noniumagiia; gracilioribus cumcaoliboa, cum
fblis, partim liirfutis viridibus, m-c mollibus, tede^paJlidolierbacci;* ilores illr rubelli, e-
legantes, tjuinis -peuli ad tiuca bifidia oonflance6, #coloris dilafioris ROCB infar; quiboa
lucedii pericarptnn roliac<<um, oblongum, jnvolvens capfuhm duram, oilongani, jeeiam
cartilagi *neam, in qua continentar femma fufca. Hujus in hortis confpicitur varietas, cujus*
liores iibelli ekganter multiplici p?talorum fcrieornauiur^ dicitur qucCaftp. Dauhino Lych-
nis pwrporca multiplex, Lychnis filvefris flore plenorubro, Eyft. Eftnim dirtiicta [pecies
a priore Lyclinidfi Jilvefty birfata alba, ut apparer ex defcriptione uti-iufque- Provenic flore
iiibio fimplici pafflm circa Londinum, Ox<uum & alibi in foiijs & ad margines fepium filva-
iiiiivjUL-iiumidiorum pafflm.

tdf. Ljcbnii filvafris hrffiuta annua flore minore carneo, nobis. H*c in molds convenit cum
prifre; at differ primo durations, fcenndoflore m gerit minorem carneum Sf cito evani-
dam. Vide App.

35. *Lychnh Chalepcnfis annua foiiis pa rum hittis & anguftis Hofcdis caincitpediculis in-*
furnis biunciaKbus" infiltcnribus capfnlis fere fotundis, nobis. Hare a longftudine pedicu-
lorum, licitcet biuncialium, a quibus dependent primo flores & conlequenter capsulae feminales
notu facilis eft a cæteris fuz fortis Lychnid'bus. 24. & 25. habuimus feminibus Chalepo
miffis a D. Roberto Huntington antet plurimas alias rariores Afaticas plantas, quæ nunc cicur
vtrui offcrntt prinhorcopublieounivcrfittis.

Pars TAB.QL/E *XI. SecYionisquiutx.

- 26. *Lychnis filvefirhiicbis. Lychnisprimh'Chif. IHftA* rFurpurta, ☿
(Alba.?)
- 27. *Lychnis a difia, DoJ. Ger. f. B. Chair. ?F*
- 28. *Lychnis hlongh mua onai is fhirt'amplo rubella capfula ohlpngapyratnidaii,*
nobis. ☿
- 29. *Viscifa libra mult is folia a:-\up'nparvh cingentibus genkula fuperior*,*
Lychnis filvefirtris tertia, Cluf. Hift. ☿

i NIT) ES fegetaks ttiajores glabra.
Exjdkatio Tab. vigesima prima Sectionis quinta.

26. *Lychnis viscifera purpurea latifolia* levjs, C. BJP. *Lychnis filveftris p'nnia*, Chif. Hii. *Mucipula five Armoraria altera*, Lob* Lugd. *Viscifera fativa*, Tab. Crafiulculos habet hxc caules, rotngdos, genclulatos, in makas abs divifos, f'tipra fc inija geniculaltncoSf vifcido quodacn liquorc obfkos; quibusplciumque inhrrenc euliecs & minuca hujulmoili infcia : folia.ad fingulagenicula bina eregione pofua, e viridi candicancn, & quaficarfuf, latisampla, amplectentia cu'ulcm arfte adgenicula, utcoqnaftprforari videantnr: Honesicrt mukos in iibellam congeltos, pulcbr«s, rubros utplurimura, nuncalbidos* ijuinque pecalis norf bifidis conilantes: femcn in teneilsvafculis, oblongis, parvitm, rotumlum, Papaveris Rhoeadt itillar, cineracci colons continetur: radix, crifla facts Ik fibrof.i, fjiara tibi platit.i Horucrit 6 lemna perfecerir, lubj'cquens liycr.is corrapert lb!ct. Nafcitm inarvis& inter fger.es fabulofas. Flort-t codemquo lata eft annoMaiomentulque in Autiumnum, quotempore femcn perficit. Hue pertinent vit, vnr, & ix. Cafp. Batiliiti in Pinace.

27. *Lychnis fegetum vaccariadi&a, nobia. Lychnisfegetnmrabra toliisPeifbliats,C.B.I.* *Vaccaria*, Dod.Gelh.Ger.J.B.Chabr. ArTiirgit hfc lychnis vaccaria dida lupra d< tem, teretibus, geniculatis, glabrisac rotund is rirgblis, in alus divifis ; quarum genicnl articulisnodifve [jin.] lolia^longa^laEvia^icumtnata, iibiappofita, verfuscaultmita conjun&a ut-unita appareant: eminent in fingJlis virgularum fummis capitua liicis magna, rncmbranis ftjiatis cont^b, haatl di/limiliaLyclinitlis filveiliris capitulis, fedminora, in quibus I tint n ptxficitur fligram, Jlie uti Mclanthii ftgetum, flolcuvo ancedente tenoi, rabente, ptitt^petillo pauklunicordato: radix in fibras aliquot divife'.Totalierba adco dilute vuet, ut fub- rirf-^{vritn cur} > plerityuc in arvis alitfq ae Fegcalibas prxfcriim reftibili & litofolo proven it, f^{cfio} fffvo in Autumnum ufque florts & interta temporis femcn peilicir. .Hallucinan- qniQla(tumaut aliquam ejus Ippcchm jodicanc Ad tinituram fiqidtm inm^s, muko mi- nus^{Xr uleo n fct} quod Ifatis przftat.

28. *Lychnis hlongh mua onai is fhirt'amplo rubella capfula ohlpngapyratnidaii,* nobis. Hxc floremgeric aniplum, tlcgi'nter rubtllum, cui fuccedic capfula vct- um caffa fatU, in longum acumendefyicns, pyramidis inmotlum. Vide App, LvcW n^{ns vicoa Fa r?} niukis foliisangultis par vis cingentibus genicula fupeviora, nobis. >< *Mveftria viscifera mbra altera*, C. B. P. *Lychnis firxfrtris* 3. Glul. Hill. *Vilcago m)Ot*, ijjiW, V^{Cillcu, Sranios pofrt} lixe *Lychnis* in muka brachiola divtfos : folia 2. Clolfii an- lemeh in cal- *nitare nigricantia: flores quinque etiam petalis, conilantes rubentibus:* fcumi rj(ii^ J^{elti} P^lisca;ter3rumL>clin)dun]fLn)inifimilc, fed parvum fans, & fo' IO, plciifnuer a^^{anih} > t orrupit. In arvis& inter fegetesrcrtlcit5f in'pingtii i -aiteliE vcteris locis*. Floretcodem quo fcritur anno (emiaaoKUideni perficit

Pars TAB UL XXI. Seftionisq¹hntz.

- Lychnis fegetalk major birftta*
30. *Lanuginofa nohis. Lychnis filveftris* \$• *ffifi- Lychnis fdytflris birta, Lob. Ger. 3?*
31. *Nigettajym feu Pfmdomdanthium die!* *Nigellafrum, Vod. £*
32. *NigeUajtrujnglabrunminus ditiaflofc* *er rubella, nobis. \$*
33. *Latifol'tacalkidhfinat'uturgidis, nobis. 1* *scaliculisjlriatis^Gcr. £*
34. *Atigujifolia caliculis ftriath turgidis, nobis. ^ychnis fifaejlri* alteraincana caliculis fuiatis turgidis, Lob. Lugd. 5* . *#

§. 6. L T C H N I D E S fegetales *major* *Ujde.*
 Explicatioparth Tab. •uigtfim <gprim & *Scilicet* *quint**.

30. *tycbnis-* filveftris lamiginofa major, C. B. P. *Lychnisfilveftris* 5.Cluf. Hift. Lugd. Tab. *Lychnis filveftris hirta, Lob. Ger.* Multoscaulicosexunaradice profert htifutos, rotundos, longiulculos, cxtersiimi *Lychnidum* minotuni infirmiores&aliquando in terrain procumbentes, geiiculatos: foliain fngulisgeniculis bina, long'a, mollia&ianugine qgadam canecentia: inter quacfloresalternatim fecundran ramulornm longitudincm e geniculis ipfis nafcuntur, fuperioruru floriLus forma fimiles, quinispetalis conftantes, fingulis inmedio diliquium patientihas, majores autem, *h* dilutiorecolorerubentes, vel utita dicam, inqnicCluius, incarnati: femcnin vafculis exterioribushiiifutis, interioiibuscartilagincis, quinisdeniculis parvis donatis continenir, foramine etiam fuperiore in capftilxinterioris parte pradtis, :xquo profuit (cmencxtcrarum feminibus fintile autpar, filfcruftum : radix craffa &fibrofa. Annua eit planta fiorens 6f femina perficiens dtate.

31. *Lychnis hirtata* (egetum major, nobis. *Lychnis* alia inter *Triticum*, Csf. *Lychnis atvenfis*, Tab. *Nigellafrum*, Dod. *Picudgmetonthinm*, Match. Lac- Lon. *Ad. Lob. Lugd. Thai. Ger.* Foliiseftobfongis, anguftis, acuminatis, culmcr cubito akiore, rotundo&hurfuto, l:ue leu calycibus hiriutisieu pilofis: Hore obfeare pnrpureoad puniceum inclinante, *Lychnis hirtatae* fimili, (t'ndnajaore, exqiiifcispetalis cordatis conHaro: femine nigro, enmafteritate. quadam amaro, (fnodinoblongis capitulis mqnbranaccis five cartilagineii, tegumento hurfuto, iiriatofcucanaliculatoobduc'iK. continetur; atqne in fingulis interftitiispetalorum] aparent foliola angufta, tenuia, oblonga, hurfuta paricer, fupeiantia longitudjnem petalorum: r ad ice eit ten iii pereu nte annua tim port femina ad maturitateR) perdufta. Faflim in agris una cum frumentis gignittf- Maio ac Junio cum iiore viget, ac brevi poft maturefcit tenien.

32. *Lychnis fegetum Nigellafrum* minus glabrum dicla flore eleganter rubello, nobis. Hoc yigeliaftrnmjriore rnilto liumilius vix pedalcu excedit altitudineni: fJorem habet minorem; quinqueroioliola conftituentia calycem nonexctdunt petala riorum, ca piam habecprioiiistenuiorem: iolia& caults nontam (eatentpilsr utprioris. Vide ultimam plantam Tal>. - 2. & hue *veier.com* 3 1. *Lychnide* hiiliifa fegetum najaore.

33. *Lychnis hirtata* filveftris *Kirifolia* cauliculis ftriatis turgidis, C. B. V *Lychnis filveftris* tertia, f;ltj]. *Hi(r. Lychnisfilveftristertia* calicisftriatis, Lob. Lugd. Tab. *Lychniscalciicilisftriatis*, Gcr. M^fcipnla major calice turgido ventriofo, J. B. Chabr. Cūbitalem emittitcaulem, *retuum*, ftan'm aradiceramoliim, craflmfculunij hurfntmn, ftriatom, fragilem: iolia Ocimoiclis fpeciofi, hurfuta, mollca, e? ramorumdivaricationibu? foliorumq; finibus extremis exeunt, quibus iiores ex pediculo fati longo appenfi quinq; petalis bifidis ptirpurafcenribus orto Sole-flao calcuitibus conftant, apicibusinnedioalbis: fub calice oblongo, invohicrohurfuto, pulchrd irriatoteftolatcttmeiipulthium, nonnihlad papavcrinum accedens, fed liiajns, compre- lum, ftriatuin, cinercum: radix robuita elt, refta, cx latcribus n'brasproducens- Tota pUinta ad taftum vicida: iolioiumfaporghitinosus. Frovenit in arvis & inter fegetes fabulofas: at in pingui folo coilegit Clufius in plerifqne Caitellae veteris locis. In hortis eaam eodem qiiio iatJtlt anno floret a menfc Maioufque in Augufhtm aliquaiido, qiiotempore lemna perficit. Hue pctinet *Lychnis* tertia filveftris anguftifolia calicu'is curgidis ftriatis, C. B. P. *Lychnis filveftris angollifolia caliculista. rgidts ftriatis*, Lob. Lugd. & quarta etiam *Lychnis autumnalis rforeobfolcto calicnlis turgidis ftriatis*, C. B. P. . . . " : . . . ?

*Lychnis anguftifolia caliculis tuvtritis ftnatis, nobis. Diftert a pncrc parvxatet. in 4-, *

Pars TABULA & Scttionis quintx.

35. Seu lanuginosa minor, Lychnis filveftris f ?Albo. \$
hirtaminima.Lob. Ger..1 • ^Jf/wo, 5?

(Vno verfa difpofitiscalice ro!u?h!o^nobfs, %
\$6.Fkribu-<ilbis|adiferiminalim difpojilii capfulh longbribus cylindraceut,
C nobis. p

- 37. S'egaumminima, nobis. Alfinc cornicufata, Cluf. Hifi. Lob. Lugd. Tab. Ger.
- 38. Montana procumbms, nobis. Lychnis vdOctmoidesmntammpensy C. B. Ocaro/vgeni folio., Lm'/. Ad, Lob. 0
- 39. Minim? rigida Cbtrkri,- B. Cbabr. 0

^ .7. LTCHNIDES\$ miaoreshirfut*.
Expliatio partis fab. vigtfimxpnmJt StSianh quinu.

35. Lnhnh filveftris liinuginofa minor, X. B. V. Lychnis fflveftns 6. Cluf. Hift. Lugd. Lychnis filv^ihis hirta minima, Lob. Ger. Lychnis filveihis minupa, Tab. Lychnis hacc omniu* minima cauliculo affurgitpirceicr palmari in macro folo, aliquandododraiuai in pingtii, gtniciftato, ccnui, Ianuginolo: ad fingula gtnicula Icu iotcrnodta bina, tenuia, longiucua folia, lajluginofa pariter, nafcunttir: tiorec inordinati, alEtinatim exfingulis genicidis produnc paLvi, pnrpurci <*loris, aliquandoalbi& puldicrimorubromixti, aliqiiandodegantr rnaclisrabbellis ad nigredincm vergentibna nm.ui, finguli <t quinqc petalis n : hidi donati & longiulctdu peicarpfb exteriore Irhuginofa prxditi, interiori membranact o feu cartibginco incluiii font (cminaniinuta, cineracta : radix tenui,s& iibroij, SeraeftrisdliB pbjata, cujqvevariet Kea quoad colorem. Reperitur in collibas Saimanticefibos circa Salmanticam ipfam jacencibus incr faxa.FlorccMaio Si junio.-verlusfinem ajlbci!tmtn perh'cttium

. 56. Lychnis• fegecummeridionatium-annuahirta Horibus albisuno verfo dilpofiti.s, nobis. Caulem emittit pedaletrijrcftum, cujus fuigulisgenjculis bina e regioncadnafcuntnr folia angufta,hirfuta; vrliiscymas pltiimostatrlloresalbos^iinisangultisjKtalis ad median) hi Jkiiidonacos'JbL'lulalijue tjuuif imulante.s, atque uno verfadilpofitos: qaibo»fucccdon plula oblongz, pericarpicq cxttriore hirluto, toprula*tiitcriore cartilaginca continctc in fi it-iiima minuca, fubnigra. LJatmctiam hujos varittas, qux in plurimis cumfu] nit & tiorefnon uno werfudifpofltos, fed indifcriminacim rirca c.mliuni (urarnil pfuiaa vco prioris'longiorcs quafi cylindriacas. Vide App.«

37.Lychnis fegetam minima, nobis. Lychnis fegeta m minor, C.B.P. Alfmr?coniicuj.ir Clul.Ktt.Lob.Caft-Lngd.Tab.Gcr. AUBconwculata Clofii, j. B.Chabr. l'almari herbula, unico caule coniVans, quini aliquot ratnuloj fur lum vcijus divtditur, eoqsegci Uto,tenero, fubhirfuto, utAlfmevu lgnis Annicula muris dict tDodonxo, Call. Folia Alfne! ioHorum annula (unr, niulto tameo lon^f! fubhirfuta, binactiamnt advcrfo appofiratx ijter- vallis;alarum cavis infiilcnt paliiii flore^,candicantes:quibus fuccedunc membtanacca & tran- ti-aventiaconiicuUgallinaceorum caJcariamtbrml, c]uarlert:of,uot!.tniconrptrla huroou de- "tiulontur: Icmcn in illistxigunm, macuritate Digram* ni'lix inutilis & an^aa. Tota :Wua infipida eft. Inter fegetea Frcqwusin agro Salmancictnf), Author : Clufio, ubi tiorec producit, & eodem t>eunte femina per :icie 1

38. Lychnis minima rigida Cherleri, J. B. Clulrt, RigiduJacfthaculanU, doom i'iuui< IM velOcimoides moncanum hirtyuim piocumbens, nol is. Lychnis vel Ocim 10ides rcpntns, C.U. P. GVimoides rei pens, Ca:iv Ocimoides Polygoni tfjlio, Ad. Lob» i's alterumgeaua parvotm, Cstf E cauliculis gracilibu, geniculatis procum- U-ntibus, teneris, flexuofis, hir futis, Allintsauncub murisdiftiobiii fi «lis similibus, t>* lia profertbina juxta geniciib, Olexfiivttrris, Myrti au[Polygoni (irailia, ted hirjata admo- rioribus obi ^L...Ll...c* ; qui Hor<< pc m a pet .! t ,mi n tmc bi fid i, i n 1 :alvealis exte- Saponaria concolote.

39. Lychnis minima rigida Cherleri, J. B. Clulrt, RigiduJacfthaculanU, doom i'iuui< an Padum, collibus umbrofis & filv o(is & jiixtalcpes frequenter 011 St. , atque is montibus herbidis & nmbrofi, etiam fecus rivulos e faxorum commiffuris. u'c irun ucline raro palmum attingit, & est ollicolis- laris ramofia; folia ad fingulos no- dno bina, en adverfo Vnm, lemiu..cia breviora, peranguita, pilofa : ex quorum alis nafcun- tur

tur calyces fem'ticiales, fulcati, perqtiamf , a:quabiles, Kirfuti, aferi, e quorum finguloruni)pice flofculns profilit, qucm prs. . jitate vixviiusca^it, purpureus: radix dura, ligiiofo. Colle&afuic perCherlerum generum Johannis Baulv ni -ope Nemaufim juxta nxolenciinim.

Pars pofterior TABULJE XXII. S uinta.

[4*0. *Maritimaprocumbens flri£ii(ftmis hngis* 7obis. 3

41. *LSngimibmfolih incams florum petalisq . ion bifidis^ nobii. Q*
^i. *Tauricut calyce amplo longo birfuto fion tu.?mamph,nqbj.s. Caryqpyll-*
lusamplta %Chf.Bfl. (3

43. *Arvenfis minor vulgarh birfuta, noba. C- yphyll. arvenj futm*
flore majore, C. B.P. Carjopyllut bokfi .«. Gtr. e

44. *Maritima incanaiy tomentofa^ nobis. .^ryophyllus t'omentof*. ., B. P.*
is Prod. 0

&t%, *Caulibus ad genicula foliofi^ nobis. Auricula murk flore pulcko albo*
J.BXbabr.v

Lychnis minima

[46. *Brfftd umbelhfera, nobU. Camphyllut arvenfts umbtUi-*
fr.'j.B.Chabr. 0.

Graminca < r ^J-^jore^nobis^Gramenkucantbemum^ Dod.
Glabra^Flore^Lugd. Gramen fioridum ma)x\ Tab. 0*

1. ((\$%.Mmorejobk. *GramenfioridumminttsJab.Q*

49. *Arvenfis folio glabro plumbei coloris, nobis, AlfimvtrnaDal"-. Lugd. 5*

50. *Muralis, nobis,- Caryophyllas minimus muralis, C.B.P. Tunicamim-*
ma Dal". Lugd. \$

51. *Foliis Laricii fiu tenuiffime divifis^ nobit. Auriculamurispuhbmficrefolio*
•miuiffime dfai/b, J. B. Chabr. a'

§ 8. *LTCHNIDE S maritime arvenfis, viinUnde^nariig.*

Explkatiopartis Tab.vigefim < eficumU Sefliotiis quints,

Lychnis maritima procumbens frifitilTimisLongis foliis, nobis. Httjttscaalculi perter-
mmt Itraci, q nib us itricitifiima innafcun tur folia Jonga ; atqie in geniculis raro drlpoftioa
fiof fert, albos, minores, pentapccalos, ad medium bifidos : qtiibus pereuntibus fnceedmt
capfula; oblonga?, plurimis fem ini bus j'nbruiSs circa ftium nutritivum proven ten tt bus ono-
ra:x. Proveaitinlabntofia manrimis Armories & circa Rupellam hzc planta annua. Floret
verfus %ucumniim & todemtempore lemma in capfulis cartilagineis aliarumLyclinidum more
j)crfictt.

41. *Ljchnk* longioribus foliis incaois Horum petalis quinis non bifidis, nobis. flic Lychni-
dis parva: Ipecies a foliis longis iacahis Sx riorum petalis non bifidis (quod in perpaucis contin-
git Lychnidum fpeciebus) nbtu facillima. Reperimus 110s hancprpulchiam minoremlychni-
deminericetisfabulofis, fcxmilliaria a Borbonum capite diltancibus, faris frequenrem, nee
alibi a nobis confpefta.

42. *Lychnh* nTinhnocalyce Limplo longo liirfuro flore itidem amplo, nobis. Caryophyllus
filveltris8. Cluf. Hift. Caryopriyllus mon.tanus Chilli, Ger. l'aik. Vtconica coronaria qUK
f^ryophyllus pumilioTauricus Clufii,']. li.Chabr.Longiufcula radkefibrofa cerae figitur h2C
Lychnis, e? qua exeunt pediculi unciak-s & fcfqiiianciales, uno aut alteronodo articulati, binis
grajrifbeisfoliia adfingula genicula veftitt, finguli fingu,los flores fntinentes, magnos pro
rouoitone plants eqoinqoe ptalifconttatos, ex calyce hifuto, unciali,frtato, inqutnque
iciiiiiasdivifo.* Horemnon inepcecum Gentianellx Helveticx flore comparari pores. Pro-
toit in Taoro Carinthix monre, (010 tenui & arena fplciuktirc referto. • Floret fub finem julii
& Augufti.

45. *Lychnis* arvenfis minor vulgaris hifuta, nobis. Caryophyllusnrvenfishiifutus flore ma-
jore, C.B.P. Caryophyllus holoitius, Lob.lcon.Ger. Holoftium caryophylleum, Tab. p|u.
rimos protrudit hie Lychnis cauliculos humi fratros, ad quorumfingufa genicula cernuntur
bina tolia angufta, hirlita.* in fummis caulibus proveniunt floftuli quinis petalis albis con-
ftantes, fiognlisdiltqainm patientibus, aliarum Lychnidum more: quibus fatifcentibus fuc-
cedontcapful* oblongx, qainisinfommodrnticniiadineai, atquein uniuofu'ufque capfula
parte fuperiore eft foramen tulidens feniina Lychnidtim reliquarum more.

44. *Lychnis niaritimica incana* & *tomenECi.*- nobis. Caryophyllus tomentofus, C.B. P. & Prod. Csryophyllui holoftius romentofus, j. b. Chabr. Ex radice fibrofa, tenui, late ferpentent oriuncur plurimi cauiiculi, nodofi, hum! procumbentes, fefein mrjltOsrumulos pedales dividends: fingulis not'is bina adha:rent toliajaciufcula, bhinciamlonga, incanaSf tomentofa, inllar Gnaphalii Amer.cani • in fummis ramtjiculorum feftigiis nafcunciir fingulatim, aliquandobinatim,tlorcs fati af,jli, albi, quinis petalis profunde & ultra medium divifis conftantes: hifce fingulis fuccedunr capfuteoblonga^ninisidentsculiscrepacisinlummitate aperta^, & femina minuta fufca fwdentes quando mntura, Raro femina ad maturifarorn perducunN tur propcemijTiiani repenai aviditatem, nt in aliis rcpentrbns plantis cernitur p;iiiiim. Hue refer Lychnidem tomemofam anguftiblram feu holoftium anguftifolinm,C- B. P.

45. *Mfhnis caulibusadgenicula foliofis*, nobis. Auricula muris flore puldiro albo, J. B. Clisbr. Radice CQntat taiiil, vario reptatn vaganre, fibrarumquc c geniculis.demiffiinim ope iirfus terram appfelienden:e: caules auteni tcretes, geniculati, in ramulorum taftigiis iliiies liabent amcnos, lafteos, quinis petalis in medioaliquo ufque unica clivifura incilis & rriatif.ompofitos, quostotidem adbafim viridantia fbliola fultine'nt, in niedio vero pcCalonma ftfUninaflrtilns coloreluteocerntmtnr: folia ad genicula fupenorabina fere femper libiinvicemoppofita, interdum plora, hirtuta, iemiuncia longiora,ex latiorc bafi finepediculo, ienfimin acumen definentia. Non elt vulgalis hare planta, Geneva; camen abandac, Iremque sd Rlienum in cautfbus& cojliculis.

46. *Lychnisgraminea hirtuta umbellifera*, nobis. Ciryophyllus arvenfis ninbellifer-, J. B. Chabr. Holoftium caryophylleum, Tab. Radice efthxc Lychnis dura, fibrofa: folia vero fimE craifiora, laciora, hirtuta: cauliculi tenites, parvi, itidem hirluti, rotund 1, fpithantari, cribusaut (juaroor geniculis diftinfti, equibusnafenttur binarolia inlrioribus, qui aradicc > proveniunt, 2Equalia: funiniitatibus caulium fekadt feptem infident rlofculi, aliquando plures, aliquando pauciores, ex eorum centro in fummitate longis pediculis lbrrefti, albi, pntaptt'ali, fingulis pptalis prolunde feftis& divifisr fiore fingiiloscvanefcentes fcquuntuicapitula parva, longa, cartilaginea, leminarufta in iecontinentia, prlorum more.

47. *Lychnis arvenfis glabra flore najore*, nobis. Cujophyllis arvqjifis glaber Horc majore, C.B.K Gramen Leucanthemuni, Lt^d. Dod.Ger. Hojollium Diofcoridis vt *Lychnis Be* gmetx, Ad. Lob. Holoftium, Ruellii. Gramen floridum majus, Tab. Ad Lychnidum g"ins perrJnet hzc parva plants, a fine ultimo, neglefti foliisgraminels.* caniculosgrit a radicibus repentibus multos, tcnues, tereccs, crebrogeniculatos, facile in terram, nifi propc nafcentibus fruticibus rulciantur, prooumbntes* folia ex fingulis geniculis bina, contra fe pofita, angufta, mucronata, oblonga, duriufcula, Gniminis tamen hreviora: fiofcuii t fummts caulibuserump.unr plurimi, albi, pncapctali, ad medium fingulis petalis bifidis,^Jr fuus propriis pediculis infidntes, Leucoi rloribus niiores, qui funt tantam tetrapetali, fldibus fuiguli^pertuntibus fuccedunc toltictili otjlorsgi, in quibusftmtn parvum, Milii femini fimile: radices funt cenus & gtnicubtx, plarimasfibrasinteTramdcoaittentcs. Secosicribes, agrbruni margines & aggtrts, locis truticofis & opaciscrcbio reperienr. Floret Maio & Juniomenftbiis& nonraroicrins qu>>quc.

48. *Lychnis arvenfis glabra Horc Danore, nobis.* CaryophyDos arwnfis glaber flore mine, f. b. l. Hofofiii Ruellii diveritias, Lob. icon.Gramen rloritlum minus, Tab. Granocn I. *Leucanthemu* malterum, Ger. Serius hoc floret priore, tenuioribus, quadratis viticulis: fiofculis ex longis pediculis laeteis, pentapetalis, prioris aut antecedentis floribus multo minoribus & ad medium bifidis, apiculis rutilantibus: capitula fuccedunt, floribus minoribus minora etiam: tolia pante m^m) nora 3 re panda, bin a eregione fingulis caulium geniculis adnafcentia : udix ficoC j r i S r ? a r reptiE it idem. Malta habet hie planta cum Alfine noltra longitolia conuininia, nes & r mV|S J U n i m Or -v ttiora ami n hafiet Ebfia. Il>ultm proven it pafim (ecus 3r,roruni n piiore Cl o C f C u m P r i o r e vulgarrtr ennitur, abtindateriam in fcpibus. Floret ttiam tardr"

49. *Lychnis arvenfis glabra Horc Danore, nobis.* Alfin< verna fej. Lugd. plumbei fcn f'St ^re*j,e3ttti&Candida: toliisAlfinarumciterarum finiuhl-n., Irvibus, ivido pallefcntis coloris, circa raditem multis Ci rar innixij raulid >fib: fuliisIntn-tx fingulig genitulis prodcuntibus, & ciulem ^ pleftentibus, interde n rdi " n P u " ^ s ; flolculis parvis, albi • ptntapctalis, ad medium fere bifid' • arunjrloribus fimilibus. Sapouis aquoli & tatui. Nondum prorfus exaff unut menft- Horct& appttente Vctc,cum alir media cftace Horcu obftr'

50. *Lychnis minima muralis, nobis.* Caryc̄r̄ dlus minimus muralis, C. B. P. Tunica minima D?lp̄. Lugd. Hæc in fabuletis, aritiis tocis & muroꝝ fubgrimdiis nascitur radice Candida, in multas parres filia, valde fibrata: cauliculis quamplurimis, dodrante non altioribus, geniculatis, fucculosis, flexilibus: flore parvo quinque petalis non bifidis confante, ex albo puniceis: quibus subveniunt capfuk pyriformes, sese in fummitate quinque denticulis crenatis aperientes, minuta femina, fubruffa fundentes per foramen in superiore capftik parte fitum.

51. *Lychnis minima foliis Laricis feu tenuiflime divifis, nobis.* auricula muris pulchro flore foliotenuh Time divifo, J. B. Cliabr. Folia habet pergenicula tenuia, lariceafei Laricis foliorum infar: ramulos multos, dodrantes, rigidos, ligneos quasi, a radice crassa, dura & perenni emittit, in quibus rarodifponuntur flores, fatis magni pro proportione pl^{*11}^, albi, pentapetali infiffentes calycibus fatis crassis. Frovenif in mCiicibus circa Genevam ut Thuiri. Floret versus finem ætatis, quo tempore femina etiam sunt matura.

§. 9. LTCHNIVES SaponarUditl*.

*SaPonaria diffla, quod fafonk viam prt̄kat ad pannos purgandos: quibusdam Struthium Diofcoridis I. 2. C. 193» qui vulgonotu' m̄scribit, fullone# bipmgandislankutuntur. Plind. i. c. Ra~ diculdlavandis lanis fuccum, habet, mirum quantum confer ens candore mollitieque: addit Struthium Grjcas vocare, florere deflate, gratum ajpeffu verum fine odore, fpinofum iff caulę lanuginoso: femina ei nullum ejfe (cui ColumdU versus repugnãt, a Syrioque venit quas femine radix: J radicem magnam, qu< z concidatur ad diSium ufum. EtI. 24. c. 11. tingentihu6 radibulam is ramospr< tparat, quam Struthium vocarid minus à Gratis. H<*c SaponarU 4. convenient, nifi fpinofam dice'ret. Nonnullk Vrciolarh Plinii L22. C. 16. Sunt qui Alifma Viofcbroidis l. y. c. i6<). cenfeant, cum multas Alifmatk notashabeat.*

Pars prior TABULvE XXI. Seftionis quint*.

ychnk Saponaria

{	Major	(52 Simplex, nobk. 0
	Minor	C53. Multiplex, nobis. 0
	Anglica	Anglica concava, nobk Saponaria Anglica convoluta folio, Park* Q
	Minors	55 • Ramofa admodum bene radicata Neapolitank difia Saponaria lanaria, nobk. Struthium radicum Diofcoridh Lanaria Imperati. Q

§. 9. LTCHNIDE6 SaponarU die?*

Explicatio priorkpartk Tab. vigefim* fecund* Seftionk quint*.

52. *Saponaria vulgaris fimplex multiplex, nobis.* Saponaria major lævis, C. B. P. Saponaria, Trag. Dod. Ad. Lob. Caef. Tab. Cam. Ger. Eyft. Saponaria major, Lugd. Saponaria vulgaris, ^{ar}k* Struthium, Fuch. Saponaria vulgo diftæ caulcs funt glabri, tenues, rotundi, geniculati, cubitales aut altiores: folia lata, venofa Plantaginiflatifoliae, Gentianae cruciate potius fimillima, fed tamen minora, e fingulis geniculis bina ut plurimum, & prsefertim radibus viciaiora, deorfum reflexa: flores in fummo caulicorum & circa fuperiora geniculis muki, odorati, calore alias pulchro rofeo rubentes, alias dilute purpurafcentes aut canJH, qui ex teretibus oblongis calycibus exeunt, ex quinque petalis commiffi, in quorum medio exigua quadam ftamina: radices crassæ, longae, oblique ferpentes, quibus fibræ quadam dherrent, Veratri nigri radicibus fimiles. Juxta fluvios & torrentes, in locis apricis passim in Gallia, Cambria & Angli* occidentalibus ffonte nascitur. In hortos tranflata din durat & vitæ est perennis prout repentes radicibus alis omnes plantæ. Junio cV Julio floret, raro femina fiunt matura propternimiam rependi aviditatem, quod contingit, uti didum passim, in aliis, repentibus cujuscunque generis herbis. Saponariam appellant ab abftergendi petentia, quatum folia, tum radix pollent, fuccum enim quandam ex fe remittunt, dum confricantur faponifere modo extergentem.

53. *Saponaria concava* Anglica, C. B. P. "od. *Gentiana concava*, Ger- Saponaria An-
 glica convolutifolio, Park. •Saponarfiht vs Anglic folummodo eit peculiaris, quoad
 radices repentes, priori omnino est familis, lod eaa habeat tenuiores atque caules etiam
 exiliores, rotundos itid'tm,rarioribufque artic lonatos, acqae ex hoium fingnlis protru-
 ditur unicum folium; n" quod sub exortum ambit geniculumcaulistpfuniquecaulem
 aiiitVaginajinmodumet -.npieftitur circularirer, adaliquod fpatium antequam fefeex-
 paadat, fi omnino fefe < at quod raro e:iam contingit: folia funt canalata, Gentians:
 inttar, obtufioremin m icm dcfinentia: caules non ramificantur, u>{iunmis,tantum,caa-
 liumcimbttitKintuc ttro juaternive flores, curfis petiolis innitentes calycibus immerfi ,
 pentapekali, quorum fingala pecala obcufioFJ apparent prtoris peralis.* flores iidem funtco-
 loris pajlide aibicancis ad^rubcedinem tendemis, null i us odoris. Nunquam icmen perft&um
 ftrrein Anglia obfervat^ fuil • lit Blasts colle'gimus, in horro ibidem, femina perrefc matura,
 q emadmodum in vulgar!. Provenit in fnvula difta S} >inny non procul a Lmhbouow in comi-
 tatu Northampton!!.

54.. *Saponaria minoi*Dal|. ".Lugd. Ocimoides minusCreticum flore rubro, j. B. Cliabr. Ex
 feniine Crecico nomine Ocimoidis minoris tiore rubro a Cafabona miflb nara est plain a hare,
 caulibus confans pcdalibus, Im futis, temjibus, plurimis ex radice temii pullulantibus, ad
 quorm articulos conlpiciuntur bina folia, ^blonga, ^irfuta, rucrone obtulo , c quorum alis
 raniuli duo adverfi germinanc, in fafigW fiorts rubros fuitinents.

55. *Lychnit* ramola admodum bene radicata Neapolitanis difta Saponaria lanaria, nobis.
 Stiuthium radicatum Diofcoridis indigenis Neapolitanisdiaum Lanaria Ijnperato. Struthinm
 antiquorum, Munting. Lanaria hacc crticit in Calabria, nomen hake Lanarix quia radice
 &toliis critisutuntur adlanaspurgandas. Folia producit angufta Lychnidis ,UE Polygon!
 infar: cautt^edic pedales, ramoibs admodum, adquorum genicula prodeunt tolia minon , •
 breviora, atque in ranifs valde numerosos profert flores, ptnrapttalos, albos, quibus fingul-
 lis fucceduntcapfulsrotunds; iiquibuscontinentur femina minuca, nigra, magnitudine Mi-
 lit; Saporis est amari.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Lychnis caulibm adgtmcula foliofa nobk. Auritulamuris fukhro fiore albo^ J. B. Cbabr.
 (ft naturde in caliditate wnptrata, affectibm cmdti medtriiur flora, 7/taximeque caduco
 juccurrunt. Nonnulli confervam parant, alii e floribus aquam diftillant, quam infantibus epi-
 lepsia correptis propinant. Extrinsecus ad paralyfin, & resolutionem nervorum extollitur. Lych-
 nis arvensis glabra flore majore & minore nobis. Graenen Leucanthemum, Dod. Lugd. Ger. Gra-
 men floridum majus, Tab- Refrigerandityfucandivipoikt, quare fafiainmationibu* ocuhrtun
 adbibetur centufum (% anplaftri hca impcfitum. Idem fuccsts pr< gflat, ft fintea in eo mj.
 fiant iff applkentur. Aliiaddi&ai mhrumnfiammatkms aquam ifloribm d'tfillant.

Saponaria quidtm calidam i& ficcameffit temprit refatur Dodonam/facuitatt autem ab/lergeriJt
non exigua pr adit an. Prxffv, inquit Schtttmkffldius, mtrcfum txtergenttmqut emirtirfuccurn
ttndevipoUtt abfltrfor'iaadto ut ctjuritpituittam ezapitt eliaat^ acfternutamentattiovtat^afta-
ta-violntia utparttan mortuum rxcut'wt. Rufika gem pulvere afcandtt putrorum expellit
Abftrgrn fcabim & entries culis faditates. Maatlai unflucfai vftimntQTwn tollit, ft en
Saponaria btrba lavemur.

HALLUCINATIONES CAS P. BAUHINI,
 Aliorumque Authorum.

Lychnis montana viscosa alba latifolia, C. B. P.
 pag. 207. col. 1. pl. 1. *Lychnis fivestru ntna,*
Cluf. Hift. Lychnis Alpina fufnila fotio trarunte
fve Musca Alpina Lychnida flore, C.B.P. par.
 206. col. 2. pl. 15. *Lychnis fivestru nona, Cius. Hift.*
 Noua Clufi non potest esse synonyma plant* pnm
 col. prima Bauhini, cum pl. 15. col. 2. nempo Lyb-
 nide Alpina pumila folio gramineo fve Musca Al-
 pino Lychnida flore, ergo sui oblitus est Casparus
 Bauhinus.
Lychnis fivestru Campanula flore, C. B. P. pag.
 206. col. 1. pl. 1. *Lychnida fivestru fpecies Mycan,*
 d. Non est Lychnis a fine ultimo, sed Campanu-

la; rrrpprifntUpfiUtl My(tnut 9 Dalechampsii
 ip[n]*e mam BaibtHUf.
 Brlli, mentana gUbejt Utnfi,T, C B- P. f* 2-262.
 col t. p, (jUbutarin latrt neat ana. Col- lne d-
 :mo,fi,(r/burfnt p / minalibus femibusq;
 tfti Lyhmi ftinbut imttu in ttbit&m <***%
 f faUuntur e OUmnm « ufparii B
 apparet tx tirftnptiant olUt* a Fail* Cthmn* W
 n? I tonr. Cxfult iifmptimtm fmf* & I**
 infra tn Apptndttt.
 Coryephytmiprmtttfii fitrt lattutt* fmfiti'
 f> Ct (uttifJiditMJUrfplK», C. B. P. p*Z. "rL*
 .pl. vi i, a vii 1. funt Lyhnnidit jfctriei «**?' j

... (eminibus, ergo male all autbarihus nomhiantur Citryophylli speciei. De baCHaltucivationi. ttijfi- Jiuin eapite (U Caryaphyllif.PagMs.exhibentur C/X' ryophylli bolejt arvenfes a Capnro Baitbinopra- ryopbylh, cum rcvca a fine ultimo fint Lytimidum r i, de bit j)T oh xins sgeomts in c afrit Caryopbyl-

to; am ifra. 'a/partis R.tubintts immediate Viola matrimali lunaria fit tetrapetalif bieapfularibiti fuli LyehniAcs pmtapetalas unicapfalarti, erg fait «VTM a- noiiftquendo itbrum nature-

DE PENTAPETALLS

Ad medium bifidisunicapfularibus.

*C AT 1) T' XVIII

ALSINE. - ' -

A Aol • Diafcoridi 1.4. c. \$7. quodlucos, quos <LM nominant, is timbrgfa /oca. am;t: isr / * « i id eft w-.tris auricula, y nod imfcuhrum auribstj folia familia babrat.Sk Flirty 1.2 7.c.4. Alfine quam auidamMjofotenappellant, vafiiurmhch, utidi<y Alfimdifta. Vniivs utraqt meminit, j^Jatplantaeftquinis petntis ad medium bifidfe & capfulafingnlari pyramidaliconftans, incojnaroeidio circa ftiluiu nucritivum-plurima adlmcnt fcmina, minuta fivefafca, rubra aut fubruffa. DiiVinguitur gnerice i Lychnide tenuicate partinm S^precipuefbliorum.

TABULA XX^ . Seftionis q umtz.

1. AltHJima vemorwn^ nohk, Al(im altijfima nemorum^ C. B. P, Alfine maxima^ Lob. Icon. Park: © Maxima laiijoia*. 2_ Mon)ana^ Smilaci* injlar, fore lacimato, nobh. Alfine mntma L maxima txJeracea, Col. Fark. V.

3. Major, C B. P. Alfine marina, .Dot/, fab. Cer. Alfine five Ktpia major\ Lob. Icon. 0 . 4. Media-, C- B. P. Alfine media is minor, Dcd. Lob. Icon. Lugd. 5

5. Mubicau(is, C. B. P. Alfine minor, Puck. Dod. Gall. Lugd. Tab. Alfimminhns Minor } Vi)d. Ad. Lob. Cam. Ger. ?

6. Linicapimlis, C. B.J>. Alfimpetrtti, GeriPark \$

(7. Major, C. B. P. Alfinepalupk, Tab. Ger. 3

Aqualica <8. Media, C.B-P. Alfine font ana, Tab. Ger. 0

(9. Plantaginis^olio>> Ger.J. B.Chabr. •

r to.Majorfolmfubrotundii dilute virentib^ nobh. Alfinesjwrh 3. Did. deft, * Hqfuta^t 1.Alieravifcofafoliislongis fnturat^vinnitibitt,nobk. Auricula murk y

Affine

(Vod-Gall. Alfine fpurk 4. Dod./ol. y 1 2. TmufifiamufcvfaX.B- V: Alfine mustofa Dal". Lugd. y

13. Major fore alba, nobh. Aftnifp-ergula, Ad. Lob. Sptrguia, Dod. Lugd. 5

14. Afinor-flofculofubcxruleo, nobis. Alfine Spcrgtilg facie feu Sptrgula minor fubc<£ruko fktuh , C.B.P.isrProd. \$

15. Maritima major fermnh flan vio^aceo, nobk. I Spergula manna Dal' . Lvtd. ©

[16. Nigro^ circulo membrnacm fle \ cintlo, nobis. 5

)i7.FuJco,eirculomembranaceo,lbidocin. I fla, nobU. G

ft.Omnium minima reda*nicaulit, interdiufloreclaufo^ aoMuaftr^ nobk. ♀

19. Iodides Skula, Boccon. ?

20. Facie Paronytbu 2. Matbioli, Boccon. \$

21. Mar'ttima Sicilian* longlns radical a HerniarUfoliis-, Boccon. 3

Explkaho i £ SeWonis quint*.

i, H i/J7f altiflimanemorum, Ct P. Alfine »ajor, Dod. Cam. Tab. Ger. Alfine major & Xx gemiina Diofcoridis, Lngd. ^viii.j^ .ima, Lob. Icdn. Park. Centunculus vitictilis cubi tali bus, Cff. Ajuiv-; (\ ies fuec est major & procerior quæ cubi tali bus, fubinde trtjni altioribus aflurgitcaulic vice compluribus, teretibus, renuibus, gtnicnlatis: toliis e fingulisarr,kulisbiiiis,iblis, longioribus quam funt Pariearias folia, quibos fatis forma refpondtnt/ed iivia funtpilis lanugineve carentia, dilutiulquevirenria :cauliculi aliquo modotranjpaYemes apparent, at circa geniaila tMutt admodum quandoque lubrubenc, vclut caules: rlofc.uli in alarum lummo candid uli, quiniſpetaljsconftantes, profunde binatimdivifis, vehuigraminkLeucanthe miDodonKi, fed tamen minores^oblongisfuccedentibusha^d niagnlo uapitulis, in qaipBSfpntinecur(emen lubruftum : radix ex cenuibus capibmentis fibrataeft. •Provenitinterfepres.mdumeus&rubiSjlocisopacis Sralfiofis, prope fontes vel I roliuentes aquaſexit.

I'.Alfne montanafolioSmilacis inftar florelaciniato, nobis, Alfine montanalatifoliaHore la-iiiaco, C. B. P- Alfine montana maxima hederacea, Col. Park. In umbroſis excellbrum montium CampOwlarcnfium atque j£quicotorum denſis filvj collegit mulcis abhinc annia FabiujColumna, avulgari mdjorc fupra dcfcripta toliorum magnitudine atq«e toro liabitu ilLiore differentem: folia magna, per ambitumliirfuta, Smiiacig foliis proxima, rion Hcderi ncvultFab. Columns, duasunciaslata, tres longa, unduliitia oris Malvæ ritu, ut finuata videantur, cauli hacrentialongog[enuiqiiepetiolq] l>ini exoppofito, geniculis viticulonon, qui reiti funt vel fupini, litrfuti, rotundj, medulla tenui, dura, ut vulgaris, fed alz ex imis pediculs prodeuntcs repunt,antequamHorefca'nt: flores-vero in fbmmocaridicantes, quints pt-ralis laciniatis & profunde diviliskonftances, petiolwloagisinſidentes, bimcerniveaumc:o; fingulis (ycceduntcaplulae bogs,'cumentes in media, inqmbasmimjcom, fulvum, copiofumque continetur femem, Augutto tjoret&Scpttnihri perhcicur. Pttioli lultuientes caplulas foot re£i atque elati, non uc in vulgari deorfum ſpeftantes.

3. Alfine major, C. B. P. Alfine marina, Dod.Tab-Ger. Alfine fiveHippia major, U. Icoj?. Centmiculus, Caf. Alfine majorqui& mediaquibufdam, Lugd.pag. 1 682. Hi* Alfines ſpeciesveltmhami procombit; c?uliculi cjiB tceces, tenuts ac geniculaci, bus ramuli exeunt: folia vcluti prioris fed multo minora, veluri' tota itidem pbnta, qignituciinc primarmulcumcedit, iflenim omnibus partibus minor: rtofcult fimilittr d capitula veluti primzoblona: radix pennde ribrofa.

4. Alfim media, C. B. P. Alfine media & minor, Dod- Lob. Icon. Lugd. Caft, Hippia minor, Cord. Hilt. Hit qinfra fimil's terfii, fed longe minor: coliculi tenerrimi lunt : toliof.1 nodum minuca :. riofculi exigui pjioiuni forma: radiculx ttnun'iima:.

5. Alfim minor multicaulis, C. li. Pflfcftilfoe minor, Foek. Uod. GalJ. Lngd.TaH. A Hint• minima, bod.fol. Ad.Lob.Cam.Ger. Qiiinta luce fimilis fecunda\ icd longe minor*: cv^culi tenerrimi funt&minuti, coacervatim excuntes tx ana radiet: loliola admodum minuta : flo-Jculi exigui, pentapctali^Ibi, radiculz trtiuinimiSf (ihroile. Iluret a^tate& \erfaſejuſdem nncm femina parva, ruftj producit in capfulisx^guis pyrifornii!us.

°-^//i« minor Linicjpitulis, C. B. P. Aifint minor fufruticis inftar, Thai. Alfinepci tjer. Park. Hac cauliculis abundjt teretibus, tenuibus, denf'c & coaccrvaEim ex uiu radicu Foccnntibns, vix ftmipedalibus, inTcinvia-m it* implicatisutccf,3ittmreltranctruntofu"rum genicula foliolamulta, longiulcula, glaberc eregiooenakwntor: florfs font »«*» ^ ^ K ^ ^ li: ijuibtis fingulwfubvjniuntc, \ iculj , oblongn, alwrum ALftnamm !arma, longus H^pc" ii-iiiiircntKi : radixtenuis& tiluolj. Provcnil inter (AM & in mntoram funimis.

in ailuH '7 "riuatiu maio^ C. B. P. Alfiac paluſti i, Tab. Ger. Hie A!lines ſpecies provenit gani cidmi" IT m ultunia (^*ai» W" ^ 8 *mr cl:fl:is A ^ , aes ſpeciebus: radicem habet lon-Rbrat' n "" ^ nei B: aculatam, ex cujus ſingulis g(.niculisonuruui plurimr, bnviuUn.

• nl mil cum ſcedit forma a radiccGralinis cantni: inftiinmis cduhum faftigns »«^{HI(1)} m C ^ S ; rima capitula minor (j;a COMI minuU) 'll ruttj. CLt(Junt plu (j;a COMI minuU) 'll

gimil us fonriu vi 1 * Alfine font ana, T. Ger. Hrc provemt ill rtipis ex i:1 j .A'orumfinanl-i ' . " , as lial*er;tfik! s fibrofa: ex omnibus !>iormduntiiir plunmi rauli- oli, j geniculaenmtuntut plunma !on33, acata, nmcronata, c "®^{mc} */

fpofita, vir idisdilute colorisifloresproveniurtiffumFiiscaulibusaidi, pentapetali, bifidi, qu6j feqitrntniTapicuia parva, femiu mi.j :*,.,iii (econtint-ntiica?Lerarum Alfinarum more,

9. *Alfine* Piantaginis folio, GerTj. B.ChabV, *Alfine* vulgari^erfamilis est hare: radix fibris ftamincis capillata: ramuli quern ad mod um & folia pilofa, longiufulcis pediculis appenfa, fobrbrmcta, ovata, nigriora cum differentia norabili, quod per longum r.c-rvi plantagiiK-i decurrant: fiofclni parvi, albi, nondivifi ad medium ciEeraruirrmore. ProvenU in humidis ad fepes & endometts Galliar, Angliar, &c.

10. *Alfifii* hirluta major foli is lubrotundis dilute virentibus, nobis. *Alfine*puria 3. Dod. defc. HiEc Alfmeni fecandani omnino rfferr, nifi quod folia fint tota hiifuta-, ^;ii!u'-ijj_s m u l-fovirefcant 6c obcufiora dilutioraque fint foltis fequentis: caules 6f foliaetiamfontminoris Alflies : tlofclni quoque albidu, penrapetah: capitula& feminacapituJisBf feniuiibus jcqucnt i s reipondenr.

11. ^A/sfhirfntaalteravifcofa foliis toiigisfaturatius virentibus» nobis. AuricuFa muris 3. Dod. Gaife Al fine fpaH%4. Uod. lol. Hujuscaulcs per rerrani itrati cctaonmr ad genicula pmpuintcentres, exqUibiis l»na exeunt folia,oblonga, hirtita, fatuiadtis virentiafoliis prioris, in quorum cymis oblervaiicur flofcali albi, quinis petalis ad medium fere bifidis confatues: qnious fingulis deciduisfubvepiuaccapfulicartilagiijeafc, oblongse, continentes in fe femina nitniita, lubnitta. Provenitin minis &fubgrtimdiis(kpiusuna cum priore. Floret excunte Aprili HIJUC ad Mainm, quo Cempore femiua eciam perficic.

12. *Alfint* tenuifolia mulcofa, C.B.R. Alfinemufcof;>. DalP". Lugd. *Alfine* liarcnmfcofa^inrjuic Dalechampius, in truncis putrium arboftim, in iidisaiipfrginc parietibus, & aliisopacis hnmidilquelocis profiic, ladice tenui, brevi, capiliata, ramulismukis humi itratis& fparfis, aterratamtn modicc fefe atwllentibns: roliis parvulis, cxilibus, capillari tenairaredcnfis: rlorcdon;itur albo, non bifido, cui fuccedit femcn exile in loculis parvis, quinqueridis altarum Al fin arum more.

13. *Alfine* Spergula difta major, C. B. P. *Alfine* Spergula, Ad.Lob. Spergula, Dod. Lugd. Sagina Spergula, Ger. *Alfine* cenaifoKa alKra, vcl terrefttris ahera Tfi^JpvM@', Col. Caulicilis exit hare tenuibus, rotandts, geniculatis, dodrancem aiit pedem aitia: lohola circa genicula radiantis Itellxmodo, in orbem dilponuncar, parva, tenuia & angufta, multa fiAjul congefta : iloresintummocaalicoloruni c&ndidtrii, Alfines floribus perfimiles: quibus luccc lont parvula, deinde ronuida aorbiculara vatcula Lini paivi capittlis familia, quo^d magnitudinent non divifionem : inqntbusfemen condicur parvum, rotondum, nigrnmfeufn- fc'im; radix anuis e(V. Sericur in arvis& potiffimum Aucumno, ut hyeme, & primo Vere, cum alia pahul.idctectrint, bobus prsbeatur. Vulgoap^d Brabantos^punc appejlatui atnue inde Latine Spergula. Nonnuili Polygalum nominant, quod lafris abundantiam bobus promovtac. El'tura gulinis&columbis, qua; nonlolum cicra noxam fublogunt, vccunjectiani hac pafVe & ova r>lura & rreqnentius&cicuderetrednftur.

14. *Alfine* Spergula: facie feu Spergula minor fubcarruleoflofculo, C.B.P. & Prorl. Radite nititnr oblonga fimplici, parum capillata &*albtcanre : cauliculis est multis femipedalibus in rerrani rflexis gemularis : geniculis Jingulis bina toiiola, inttrdumplur;;, brevia, fubexbrtum abtl membransl, 3f tenni tefli, cirrcraangufta, viridia, inctro nwmero prodeunc, ut 3; pedicelti, quibus finguisfinguli Horcs, lubc.rnilei, vdpurpurocaruJci violaceive, aliquan- clo itnari infidenc: quibus uc in Spergula vulgari vafcula orliicil.it.], minutum femcn continetia foccedrfmi hiflmi apud nos ad Icmias viarum, in arenofis cV gareofia locis reperitur.

1 c, *Alhn?* Spergula major maritima peretinis rlore violaceo, nobis. Spergula marina DalP". Liifd. Similitudo qax huic herbs est cum Spergula vulgati in locia nmbrofis, incultis, atque ctiam aliquando culiis nalcenc, fecit utSpergula marina dicrerur quod in niaricimis proveniat in hoc illis diiimilis quod adcaultum articulospauciora, breviora& candidiora folia ferat 'fiores majorts violaceos, quandoqudem guftulalfafit, utcreracplanti-maritimff, qua: marinam aq" ^ prolificimu.

16. // // > < Spergula arm»a lemne foliacconigro circulo mcmbnanaceoalboctncto, nobis. Hare v'ukail Spergulx quoad reliquas omnespartesjadeofimilis est, uc pafihn in agris arenofis fegfralil'us cnnlp'ctfii, dirficulterdiftingui pullic a vulgari, nifi femtee, fuod est compref- (m,* foliaetum fen membranaceum, album excerius qaaficirculoalbo cingente in medio fe-

^{aCl} HuiuspericnroV alia varietas cujus femtn cftcomprcfTum, foliaceum, minns, in me-
dio ^fcyfl, circulo pariccr albo ci nit um n- W.v racione a priorediffere: vulgais gut jf

Sparguls -fenien est rotundum, Alfinis vul^iis mpdo. Utraque hsc species detefta hnt a nobis tn arvisvegetalibus circa Rupellam& in nrvisarenofis intralcpiaC/w^r/fitip. Floret fffitate cum priore, nequepottit diltcerninifi feminibas; nj reliquis partibus vulgari omni- no accedic.

18. Afine omnium minima refta imerdiu flore claufo, no&a aperto, nobis. Caiiculof producit h&c vix triuncialesad(ummum palmares, quorum nodis feq geniculis apponuntur bina ioliola eregione ditpofita, acuta, Lingua: paiterinx familia: in caniculorum lunmis naicimturflolculi rarodifpofiu, finguliquinis petalis albis, ad 'medium bifid is, aliarum Alfi- iKirum vtlLyeheidum more, conitantes, qui vix imerdiu lucenre fole confpiciuntnr aperti proptertenuir.ar.em partium. Hocvalde fmiliareett pluribus Lychnidum Bfquibufdam Al- ftnanimfpeciebuB./ Crefcicin arenofis,humidis,filvofislocis pallimcirca Blifas. Nofcanclctn cxhfb"[nmus iticat;ilogo Blxfvfi. Tub Alfine minima noitiilora nnicanli flore inaperto.

19. Alfint lotoides Sicula, Btfecon. H'nus plantulx caulkuH tunt fubrubes; g^{eniculati} u invalidi feu humi fparfi: folia quoad lubftantiam feu concextiim non numerum, <juatlance- nus ad Loti Lybici Ual - five Tiiiolii vfcicarii feu Halecacabi Ciimerarii figuram accedunc; rlo- fcnli Sicapiulx Alfinis vutgaris modo vernicillacim cauliculos ambiunt. Prope Cacanam in I'-jlliftribus&humentLbuslocisinvenicPaulus Bocconc.

20. Alfine facie Paroynchia" fecunda; Martbioli, Boccon. Trilms auc quator raimilis liumi jacencibus, Alfinis rblis numerofis : copiofis etiam Hotculis in fummicacc colurentibusdona- cur hxc Alfinis species, accedensadformam Pajronychiasfecundx Matliioli. Annuatftplan- tula. Exit pallim in maritimo litore motlicr cavicacis ad Pachinum promontorium.

21. Alfnic niaritima Siciliaiw longius radicara Herniaix toliis, Boccon, Non defpiciemla cfthsc Alfinis species licrbarum ftudiofis, neque enim fe h;ibctfnt vulgares Alfinis species. Radice eninj nitkur, pro planci modulo, fonga, cralVa, dura C;tryophyllum feu Lychui- duni more, adnatis enam appendicibus quafi ramofa, aut potius multis modis fiircata: ab hujus capitefuperiore cauliculi innmneri denfo cepite gignuntur: circa quorum genicula folia funt vatij; uniquidem plantx,in Sicilia Herniarii forma & magnitodinc: alreri vtro Aifiiu s ma- rinmaeNeapolitani"CoU]i]ini';flbres,captiili- kminales iemirutqueipfafunt prohus Alfinis vul- garis.1. Secundum ibliorum varietaccm duas Icones appingendas curavit Paulus Bocconc, vi- delicet fub Alfine longius raclitctaHerniaribltis, & Alfin^anguftis loliis, Vide Icones huh^s Alfinis pag. i8.&Tab. ro.Pauli Bocconc. Harumomnium crium Alfinarum Icones exbi^{uit} Paulus Bocconc in HiiWiararioFuniluarumpbntarum Sicilian, Mclitac, Guliiz& Icalbf, quem confule.

TEMP^RAMENTUM & VIRES.

Alfine Morfus galin* dittra^ ut inquit Tr3gu«, rtfriquantem <y humdl.mttm^ qutmitdinoJum ^ tulaca, **obtiftet** facuhatem. Aquadtftillata ea/dem baht vim, ftdiy hoc Mi xperktitia tri- fi<il, quod Us qui dimurnil morbis isfinagnkudint fpitudiaurn ccnfumpti funt, vtnbufque dt- itturt (srnacnfcuTit, uti/il/ima l; t, vel pivimfOta. fit Jam-afantibus in<:t?iwk 3hibn, iy tfgiludimbjii txbihtri Jebet, 'ham'nc.n foium internm Inflammationes refingr-'h f* iff impedit qui acctdere foffunl morbos^ ut fyafmum. Herba iffa^ fuctus iy aquadtftlUt a non fe- (•MatquePoriuliKdtac Sedivulmfibusc'afijis, ac ukeribm utiiffimafum impofta, iihra, (? [tx Hits colluantur. Ex fuccc unguntna rtfriquantta ronfici peffum, infammatwnibks jecor* o'iorumquevuhcrum ccimnodiffima, non minui quam Populeon, Alftnes n^joris autnc Jif⁶ J decdia una ium fplicU Alh&*y additcfuhere Ftervgrsci aut Iliirti fti ccatumLwitur & fiat otaplafinj, aufirt in inflammationi in quocumque corpore papenft calididelo plimpticetur. ffr⁶ mata ad' fupurationempeducit i atque mffumantiaricna difcutit anttquam adfuft)>ur<itiv^{flEn} y m. FBlia Alfinti nri jordi debcflainacetoty fcur valent contra pTuntummanhx ram, ft ufdan abluamur. Ffifgn frigid* isr hupndftrictis* efitntis quart citi a rftiititione m refrig' TM << ut Qatnm ait^ ocultruninflammab' mbui cum/wMnta, aut/xrc Diofcoride v iponitur: fuccus auriwdoloribu* (ex caufavidelicetcatida) infunditur. AvicuU caveis inc b/ez cum fafiiJtmt, bacberba mnantur, unJlaffmnaaquibufdamduitur.

.HALLUCtNATIONES CASK BAU-HINI

Aliorumque Authorunt.

P⁴ Alfint IffdrthUM*, rrnttlur, C.B.P. Aifnt folio Veronica, Tab. Gr. C. Lr. Alfine fparia prior, Otd. thbdtmpi Iktdtm ft. in. Atpnt thamadryfolia, folculo r- Alfne Veronica folio fofculo, taulttutif adit* dicalo longa infidentibus, C. B. P. A. l' ur Triffag^o

"i\$ folio, Lob. Icon. Tab. Ger. Ibidem pi. iv. Alfine Tripbyllos carulea, C. B. P. Alfine reUa, Tab. Ger. Hee quatuor plantuU notam Feroniccc ejfendalem habent, nempe flores tetrapetalos & filiculas bicapfulares fepto medio diltinguente duplicem feriem jeminum -, ergo funt vert & genuine Veronica fiecies : idcirco nos eafdem ad Veronicas remifimus. Vide cap. de Veronica Seblionls 3-pag. 3^ hujus hijtorice: von tqjjunt Alfine s fiecies diet cum Alfine protrie loquendo fit plant a pentapetalafeu quinis petalis ad medium bifidis confians, quibus decidut* fuccedit cabfulapyramidalifeupynformisi. ergo male ab authoribuspmo, G? a Caftaro Bauhino feCundo, ad Alfinengenus feferuntur, quum ejus notam neutiquam pojfideant.

Pa? 5 o col. 2. pi- vi • Alfine fcandens, bacctfera, C. B. P. ~CacubalusPlinii> Lugd. Ibidempl. vn. AlfinebacciferccfimiHsfuisacims. C. B. P. • Suntplanticefcandentes baccifer* ; ergo alto debentreferr. Vide taz f-^{hu}m Htfton* de Baccifens Jcandentibus ; érto male-propterflorem quintspetalu conjtan-temáb aüthoribns, & denuoa Caft. Bauhino ad AU

fines genus teferuntur.

Tag. ifi. col. i. pi. XV. Alfine verita Androfaced coyitulti jub 6. in Prodrómo Cajp. Bauhini defcripta. Ibidempl. xvi. Alfine affinis Androfaced dita major; C> B. P. Androfaced alter a, Mattkl. Lugd. Cluf HijK Cam. Tab. Androfaced annua fpuria, Ger. Ibidem pi. xvii. Alfine affinis Androfaced dita minor> \B. in Prodrómo defcripta. H# tres non habent teffétam Alfinés % ergo, male ab authoribus t\$ Caftaro Bauhino inter Alfinés fpécies collocantw\ Ibidem pL xviii. AlfinenodofaGallica> C. B. P. Alfine nodofz Dalechampii, Lugd. Primo omnes ^lfines Jfiecics habent flores quinis petalis conflantes ad medium^ ut plurimum bifidis ; fecundo capfulas proferunt tyri-formes, minimas, minuta plurima in fe continentes femina ; ha Condi&ifries nputiquam conveniunt%uic plartra quafloré* habet tetrapetalos, quibus fingulis fuccedunt filiquæ oblongæ, unciales, fungo/<e, articulate? y conformes Tjaphantjlrís ; ergo aptius eo remittitur a nobis pag. 26\$. Jwjús Hijjoria, vide Hallucinationes illic.


DE P ENTAPETALIS UNI CAPSULA PI B U S C A T V T XIX.

VERBASCULUM five PRIMULA VERIS.

P *RimuUveri**, quod primo Vere floreat^ Diofcoridi* l. c. i 04* <p\ofufis\ff flinü l, 25. c. 1 o. Pblomides cenfntur. Aliis vero Flinii I. 25. c. 4. iy L 26. c 11. Vodecathon, cui funt folia feptem Lattucitfimillima alutearadice exeuntia. Verum apud Plinium I. 2\$. c. 10. Alterum penus Alifmatps infilyk nigriu6 majoribmfoliis videtur.

⁹ ' *Perbafculum dicitur quod folia ajpera birfuta Verbaſci injiar habeat. Primula veris, quod exeuntc byème iff primo ineunte Verefloreat, fie dicitur.*

Primulavcris eft planta pentapetala feu quinis confians petalis cordatis feu diliquium in medio fingulis patientibus cujufcunque colonis aut magnitudinis: quibus fingulis deciditibus floribus fuccedit calyx foliaceus, quinquefariam laciniatus, in cujus gremio eft capfula membranacea, oblong^ continens plurima femina circa ftilum etiam oblongum nutritivum : folia habet afpera, hirfi^ unde capfulis oblongis & pericarpio oblongo, foliis alperis jirfutis^ uam facillime ab Auricula urfi capfulis fubrotundioribus & foliis glabris, incanis aut pulverulentis pra^ dita diftinguitur. Primula veris eft primo vel pratensis, velfilveftris, velturcica, a focis in quibus provenit. Secundo eft vel odora, vel inodora: eft vel roturidifolia, vel longifolia: a colore florum : eft vel florealbo, pallido, luceo, aureo vel rubro, purpureo, variegato ex albo & rubro: eft quædemum vel flore fimlice, vel altero alteri innato, vel pleno: vel /in-
gu } } s, pediculis finguli innafcuntur flores, vel unico cauli in feftigio plures flores inherent umbellatim.



Explicotiopartis Tab.vigefin* quart* Scftionk quim*.

1. **V** Erbaſculum Pratenſe odoratum, C.B. P. Primola veris major, D«{ . vel floribus luteis odoratis, f !* * imbu a prate ^ ^ I , Ad. Lo . Ger. Heba Paralyſis vulgaris, Trag. Primula veris odorata flore luteo ſimplici, J. B. Chabr. Folia promit lata, rotundis tamen longiora, rugoſa, aſpera Betonice loliorum inſtar, quibus tamen majora: ſunt & dilutius multo virentia, per margines nonnihil aut exiguum ferrata: aſurgit e medio cauliculus tenuis, nudus, ſemipede aut aliquando dodrante non altior, in cujus cacumine pluri- mi pediculi oriuntur ſuſtinentes ſinguli ſingulos floſculos ſaturate luteſcentes, odoratos, fre- quenter deorſum nutantes, quibus ſingulis deciduis ſingula ſuccedunt capſula, oblonga, involacro ſeu calyce foliaceo cincta: in medio capſularum plurima apparent ſemina, ſubruffa matura, cingentia ſtilum nutritivum: radix fibroſa in diverſa ſpargitur. In floribus huius non exigua differentia, quandoq; eleganter lutei reperiuntur, ſepius pallidi, ac dilutius colorati, qua- ſique albid; odorati admodum frequentius: multiplici petalorum ſerie nonnunquam etiam reperiuntur. Primula hæc Veris pratenſis amat loca humidiora non tamen omnino rigua: re- peritur quandoque in campis apertis & patentibus Martio & Aprili florens, ſi hyems clemens fuerit etiam prius antequam Ver inceperit.

2. **Verbaſculum** proliſerum, C. B. P. Primula veris flore gemino alt,ro aJreii innaro, Lo|, Lugd. Primula veris proliſera, Tab. Primula veris flore geminato, Eyft. Ger ' Hjc iacile cognofcitur ex flore altero alteri innato ſine ampliore aut longiore deſcriptione.

3. **Verbaſculum** pratenſe potius ſilvaticum inodorum, C. B. P. Primula pratenſis pallida, Ad. Lob. Primula pratenſis inodora luteo-pallida, Lob. Icon. Primula veris elatior pallido flore, Cluſ. Hiſt. Verbaſculum non odoratum, Fuch. Primula hæc priore caule, & pediculis plurimis ex caulis faſt.

'8>ort>s luilincntibus plurimos floſculos':

at folia habet aliquando majora: flores majores, pallidos, quorum petala majus diliquium patiuntur nullo odore commendabiles,- fimiles floribus Primulas veris odoratæ, nifi quod ejus flores magnitudine & colore luteo magis pallido diftinguamur à prima: involucrum, capsula feminalis & femina ibidem contenta paulo majora. Locis gaudet filveftribus, dumetis & filvis casduis, aliquando ad prata dumetis & vepribus vicina descendit.

^ *Verbaſculum* *mcznum* rotundifolium luteum montanum iEquicolorum, nobis. Primula veris incana lutea, C.B.P. Paralytica montana rotundifolia, Col. Variat hæc à congeneribus supra diſtis rotundioribus fuiſ admodum foliis, tenui, longo, trigono & trientali petioloinfidenti*-bus, ere&is, carnofis, venofis^inferne incanis, lanofis finuofis oris, ut crenata videantur: è radice carnofa, obliqua, multis fibris albis Ellebori modo carnofis dependentibus, atque humum amplexantibus, odoratis, fapore acri amaro, atque palato patum odorato: caulem dodrantalem emittit vel majorem, loci & alimenti uberioris caufa, rotundum, tehuem, nudum, Junci aut Cyperi modo Thyrfum repræfentem, ut Dioſcorides de Alifmate tradit. Hujus caulis faſtigio fummo innafcuntur decem flores nunc pauciores, nunc plures, luteo colore hila-ri, ex calycibus ſhifutis, incanis, quinquefegmentis in ore diviſis, diliquium in fingulis petalis patientes aliarum hujus claſſis more; in capsula interiori pericarpio exteriori incluſa continentur feminamulta (eunumerpfa, nigra. Provenit in iEquicolorum montibus fupra Flaniinianum loco *lo Serorne* dicio, in cacumine Septentrionali oppoſito lateri humenti. Maio floret, & Junio perficitur femina.

5. *Verbaſculum* Alpinum umbellatum majus & minus, C. B. P. Primula veris flore rubro, Cluſ. Hiſt. Cam. Primula veris flore albo, Cluſ. Hiſt. Hæc neutiquam ab umbelliferis prioribus diftinguuntur, nifi i^{m^o} quod in celſis Alpium jugis naſcantur, & 2^{do} quoad varios colores quibus diverſi modi flores afficiantur. Sunt enim earum flores fubcærulei aut carnei coloris, rubri, ruberrimi raro etiam candidi aut exalbidi. Omnes tamen cujuſcunque coloris circa umbilicum luteoli funt.

6. *Primula veris* Alpina minor variat etiam colore, eſt enim albo, rubro, rubente, fubcaeruleo ſrc andore confuſo.

7. *Primula veris* minor rubra Eboracenſis foliis parvis glabris Auriculæ urfi inſtar, nobis, Primula veris flore rubro, Swert. du Bry. Hæc planta in monte *Englhorrow* in comitatu Eboracenſi proveniens à reliquis montanis diftinguitur, primo foliis glabris, ſplendentibus, Auriculæ urfi firmilibus; fecundoflores producit umbellarim difpoſitis, eleganter rubellos, minores, atque fingulis fuccedit capsula oblonga, Primulæ veris formæ atque figura, fed calyx brevis eſt ut iunt calyces Auricularum urfi; ergo mihi videtur ambigere inter Primulam veris & Auriculam urfi, quia folia & flores habet calycemque Auriculæ urfi inſtar, at capsulas oblongas Primulæ veris inſtar. Plantam ipſam ad nos tranſmiſſam habuimus opera & induſtria *Thorns Lawſon* peritiffimi & diiigentiffimi traſtatum Septentrionalium plantarum rariorum ſcrutatoris

8. *Verbaſculum* filveſtre majus fingularibus floribus fingularibus cauliculis infertentibus, nobis. *Verbaſculum* majus fingulari flore, C. B. P. Primula filvarum, Ad. Lob. Lugd. Primula veris humilis flore pallido, Cluſ. Hiſt. Primula veris filveſtris flore pallido, Eyft. Primula veris minor, Dod. Hæc Primula filveſtris minor foliis primam & tertiam refert, fed tamen funt multo niinora: pediculi tenues, plurimi, fingulares in mediis foliis attolluntur, breves, vix palmi ahitudine; in quorum fingulorum faſtigiis floſculi finguli apparent quinque petalis ad medium cordatis feu diliquium patientibus donati, pallide lutei, pium quoad formam floribus fimiles: pericarpium & capsula; ipſaque femina itidem familia: radix etiam fimiles in fibras dividitur. Reperitur aliquando floribus herbacei coloris feu obſcure virentibus, & in hortis multiplici petalorum ferie confpicitur culta.

9. *Verbaſculum* *Tmcicum* feu Carchichec Turcarum, nobis. Carchichec feu Primula veris Turcica Tradefcanthi, Park. Carchichec Turcarum five Primula veris Conſtantinopolitana, Comut. Hæc multos protrudit cauliculus fingulares, vix palmares, quibus fingulis flores finguli, amplius infertunt, quinque petalis conſtantes, fingulis diliquium in medio patientibus, variorum colorum, rubri, purpurei faturatidiluti, fubflavi, albi, quorum medium cujuſque luteo colore donatur, quæ non minimum eis addit gratiæ.

TEZVPERAMENTUM & VIRES.

Ri-centiores Verbaſculi fratentibus is filveſtribus hos effectu* affignant: Trita folia imponuntur efficaciter dohribus articularum. Radicum decoſto veſicæ & renumque obſtruſiones ſolvuntur. Juſ herb* Propinatur is ill'mitur dverſa rupta, luxata is livenia, Quod vero hæc eadtrmpffint,

temper-amentum eorundem palam docet: forum enim adfiringunt fi guftavcris: amara is modice acriafunt, ut hot nomine deficcandi is deiergendi facultatem quamillis Gaknusa dferibit, hahfie nemo dubhare debeat. flosfrieiamtemporn herbariicalida is fuca efe fiatuunt. Et mlierts forma is pulcbritudini colori* facki fludentes^ fucco ilhrum e floribtK exprefo fac'wn'iUinunt, quod macula* rugafque, is alia ejuj'dan vitia minfict dtergt'ant. Blia guftu nan ingrato, in okre plucntulh is acetarii*: junique admodum utilia capiti, nervis is^l humorum ex decubitu puiredlm nut mflammatbriihw^ ecquevulneraria habetur. Effe Primulas writ fa cult ale reficcantes, fed exiguum ant nikil calidas prodidit Dodonam. Adhihentur isbi Aptspkna^paralyfi is articolorumdolorib&s. Aqua florumis conferva anodyna ist hypnotka juvt medicament a. Dccofium radicum Primula: vulgarii in fero lafth aut zyhogala alioveidoneo vthkuio fumptumfingulanejlisptdfiantiffimum, ut perhibent, remediumadverigtixm. Flares ergo Primula verkodoratfi cenfervd-forma par-alyticisconveniunt* Matthiohi fiUoiitiom aquafn toti&s phnu fronti illitam capitis dolores mulcere afferit.

t) E PENTAPETALIS UNICAPSULARIBUS - C A T V T X X.

SANICULA ALPINA vel AURICULA URSI.

Sanicula a fanandis vulneribws: Auricula urfi a forma foliorum dicitur: an tti9flo. five *Sanicula* i folik Phntaginh, fed angufiiorib&s, is in terram convexis, isc. Dioscoridis I. 3. c i6y. Et Plinii l. 25. c. 1 o. Alifma five Damafonion folm Plantaginitjedanguflioribitsfnagifque Iaciniolis convexifqiw in terrain, isrc.

R Non dubium est quin ad l'rimularum veris classem referenda; sine hi venusta; plants SaniculjE feuAuricub urfi difti, quia fimiles func & format & temperamento. **Sanicttia** Alpina five Auricula urfi **est** planta pencapetala ieu **planca** quinis petalis confans, Ongulia dilicijium in medio patientibus, cumftaminulis mufcofis in medio: Horibus fingulis deciduis luf.cedunc capfula: fmgulx, (ubrotunda?, cartilagineae, calycibus immicrix, ad mediam **olqneqBinqaepaititis**; tqliis glabris, incanis, aliquando pulverulntis, acque hifcc notis, capflis fciicetrotundis, calycibus brevibusfi fciisminoribus glabris **facile diffineoitor** Sanicula Alpina feu Auricula urfi i Primula **veris** capfula obJonga, perienrpio itidem oblongo, &foliis asperis, rugofis, hirfjiris, prrdita. Auricula urfi variac foliis & Horibus; **tolliis** lafvibus& viridibus, interdumincanis vel canefcentibtis, denfionbus, tenuioribus, maioiibus & minoribus: floribuspallidis, luccis, aurcis, rariflimecandidis, vel ca?ruleis, **rubri**, ral>errimis, exrubro & albomixtis, flf ex litteo & rubro mixtis, iilqut modo majorilus, "fiodo minoribuff, mododenis, modo vicenia atqoe tncenis.

Pars T A B L I L 8. XXIV. Scttionis quintx.

1. SankuU feu AuricuU urfi affinh flanta Androfaee difta major, nob is. *Androface altera*^Mattk Lugd. Cluf. Hifi. 5

\2. Mojolrutca, C.B.P. Auricula urfi, T>od. Aurkula urfi feuflei I luteoi. Cluf. Hifl. ®

J3. Minima cfruleis floribus, nvbis. Auricula c<srukisporibus, G(f^m Hort* Auricula minima, Ger. o

14. Rubefcens folio non fmato, nobis. Aurkula urfi 4. Clyf. Hifi. *Auricula urfi rubefcens*, Ger. Q

\\$* I'lllofa folih Borragingk, nebk. Auricula urfi Myconi, Hifl.

M oatanai^ laufolialaciniata, nobis. Cortufaj, Mattb. Cluf. Hifi J> B. **Cbak**, 0

§. 1. SANICVLA AndmfactdiEla.

tphcatiopartis Tab. vigefirn* quart* Scttionh quint*.

1. **S**anicule affinis planta Anc' difta maio u imbis. Androfaccitera, Mattli. L>ff Cluf. Hifl. Cam. Tab. Androlace annu iqua^lia, Ger. Muka funt huic iolia humi ^ pan³

panfa, foliorum Plantaginisaemula, fed minora, trinervia, colore ex viridi pallefcente, m ambitu dentata Ilicis fere foliorum infar, molliatamen, iucculenta, guitualiquantum lacri, inter quæ ex illorum rhedio circa inuminterdum quini, ieni aiurguntcauliculi palmares & fequipal- fnares in hortis bene ftercorffis, herbaceicoloris, aliquando purpurafcentes, ftudi aliquantum, nonnunquam villofi, qui fummis fingulis faftigiis corollam iuftinent quinque orbiculato- rum foliorum, nonnihiletiam dentatorum & lanuginoforum, unde quini, feni, nunc plures emergunt pediculi, calyculum ferentes herbaceum, lanuginofum ab initio, quinque foliolis donatum, five in quinque lacinias deinentem; in hujus ineditu Hio fioiculum fert album, quinis petalis non bifidis *donzum*: hifce fingulis vafculafuccedunt tumeicentia, femina niuita conti- nentia, inaequalia, rufta, Primulas veris feminibus non difparia, fed majora: capitella cum foliis pramanfa, afringentis initio guftus, paulo poll: amari & acris deprehenduntur: radix illi unica, tenuis, paucis fibris tenuibus capiljata. Annua eft planta, nam prolato famee tota planta exarefcit & pent- Copiofenalcitur inter fegetes circa Badenfes Thermas fupra a Clufio fcepius memoratas, atque adeo in locis Viennenfi urbi vicinis. Matthiolus ex Syria ab amico ejus femem mirum ait, verum non neceffe erat tam procul arceflere quandoquidem pro- pius a Chifio in prxdifto loco repefta. Floret Aprili, femem vero M'io. & Junio maturum eft.

§ 2. SANICVL A *Alfma feu Auricula ur(i)folik ferr at k.*

2. *Sanicuh* Alpina lutea, C.B. P. Sanjcula five Auricula urfi, Matth. Dod. Caft. Auricula urfi i. tlorclutco, Cluf. Hift. Ger. Auricula urfi floribus luteis, Câm. Tab. Eyft. Auricula urfi propter connexionem & affinitatem in fine ultimo ad Primulam veris pertinet, folia lata, è virore albicantia, eius foliis rponderent rtfi laevia efflent abfque rugis, & carnofa, glabra, atque omnino craffiora. Huic pediculus eft tenuis, teres, qui e mediis foliis effertur & tiofculos inaftigio caulis profert plures fimul jnc⁰³ ex eodem centro, caulis fcilicet fum- mo o^ientes, Primulæ veris pratensis fimijes, quinis petalis confantes, in medio diligiium patientibus, luteos. ut plurimum, albos, aliquando purpureos ant dilute rubentes: floribus fin- gulis fingulis irfecedunt capfulas fjbrotund^e, calycibus quinquefoliatis brevibus infidentes; in quibus fingulis plurima nutriuntur femina circa ftilum nutritivum: radix pluribus, craflis, oblongis fibris firmatur. In petrofis & pracruptis Alpium jugis, iifque multo tempore nivofis, fubinde apud Helvetios locis Oenoponti finitimis, etiam in agro Goritienfi Salvatino monte & in PeVnnonias montibus, prafertim qua? purpurei eft colonis reperitur. Vere unâ cum aliis Primulis veris floret. Hujus majoris & minima Icones fculpendas curavimus inter Auriculas foliis ferratis praedicas; extern hue. poffunt referri magnitudine & parvitate fo- liorum, florum colore variant. es, eft enim flore purpureo, quæ eft Sanicula purpurea, C.B.P. Auricula urfi 2. Cluf. Hift. Huic adde 3. Cluf. Hift. 4, 5 ^ 7 - & c.

3. *Auricula urfi* VIII. figura, Cluf. Hift. at X. Cur. poft. Auricula caenileis flolculis, Gefn. Hort. Auricula Alpina minima, Lob. Lugd. Tab. Auricula minima, Ger. Hujus folia un- gue'm magnitudine vix asquant, inferne circa fedem anguftiora, fuperne & extremo latorum, crenata, viridia, nervofa, fuperius minus denfa, guftus amari: ptdicellus inter folia exilic vix digitum tranfveffum altus, unicum, interdum alterum, florem ferens dilutius ruben- ris five carnei coloris, è fimbriato calyculo obtufiore prodeuntem, inodorum, intus etiam circa umbilicum Candida lanugine pubefcentem, nullo prominente ftilo. Neque hujus fe- men obfervare licuit Clufio, quum non quovis tempore jugum in quo nafcitur, propter diffi- culties confcendere potuerit: ide^i* Ckfius, nee in hortum cum fuocephite tranilata ad frugem unquam pervenerit: reliquarum tamer Auricularum femini rpondere arbitrabatur idem Clufius: adnatis mirum in modum fe propagat, & interdum magnos cepites occupat, can- dicantes fibras è fingulis propaginibus demittens. In *fummo Sneberg* jugo primo obfervabac Clufius, neque ullo alio vicino jugo poftea eidem (e obtulit. In *Tauro* tamen *hjudtnhr* etiani invenitur, & cum illa rara alia fpecies per omnia quidem fimilis. Sed folia magis pallefcunt & flores funt laftei, dicitur minima nivea Cafp. Bauhino in Pinace, qua? eft Auricula ur/i flore

albo E it.

§.3. SANICVLA foliis non ferratis.

4. *Auricula, urfi* Alpina rubefcens folio non ferrato, nobis. Auricula urfi 4. Cluf. Hift. Au- ricula urfi rubefcens, Ger. Quarta hxc Auricula Clufii minoribus eft quam fecunda, foliis car- nucronatis, in ambitu non ferratis, fuperne laevibus & fplendentibus, inferne ex vi- ridi; illis fibris & vinofis, minoreque acrimonia & amaritudine praeditis quam aliarum folia: iwi pallenuu

flores illius fecoii difpecie ifimtlcs, protVndioribus laciniis feñi, colore dilutius rubente, incus circa timbicum incana lanugine villofi, ihlo prominence, bini, cerni, aut ad fumum quaterni fummo uncialis cauliculi faltigio innalcen.es, duplici petalorum nume*ro in flore proveniences, ideft dtem: femer in parvis vafculis reliquis majus & hi (cum: radix minor & nigrkans, atque adeo numero fa ibbole incerdum **fcie** piopagans, uc latiflimos cefpir.es occupct. **Invenitor** in *Sneberg* reliquifqu^ vicinis moncibus, & Stiriae Alpi bus freqienci liima eft. **Paulo** ante meum deceflum, inquit Clufins, Rizotoma? muliercutae fingulis arnis in forum Viennenfe venalem hanc Saniariam Alpinam feu Auriculam urfi intercicapemnt- Hucpentine Sanicula Alpina alba foliis non crcnacis rr.C. 13. P. Auricula urfi 6. Chif. Hift. & Auricula **fiore** pallido, C.B.F. quscil Auricula urfi pallido flore, Cluf. Hift. Cur. poft, & 3. Sanicula Alpina minima p>lofi, Q.Q. P. & Prod.

§ 4. S A N I C V L A ROTVNDIFOLIA.

*, *Sanicula* Alpiita villofa toliis Borruginis, C. B. P. Auricula urfi Myconi, Lugd. folionim figurapilrs mukisobfitorum lacilea prrdi&is difcernicur, eamque pinxit & delin- avic Myconusa quoDajcljampius mucuatus& nol)is fie cxliibuit. Radices multas emittit tenues, lere capillatas, fufcas, petris inherences, **gofnafringentes**, circa quas toll a per hummrcpuntliorraginisqvriadancenusfoliis fimilu, in ambitunonnilil finuara, in fuperricieiu- periore aipera, rugofa, craiTa, ntrvofa, piiofa, maxime prope radices, ex iis enim ad rbliorum exortum magna pilorum congeries tomento cuidam & veliiti juba: aflimihs enafcitur. Eadem folia tam fuperne, quam inferne villofa **font, ataocinambitopilinbique raffefcont;** ex foliormm medioduo aut tres cauliculi emergunt rotundi, dodrancales, tiiiluti, (olidi, luc- cofj, purpurafcentes, cumdulctdine adilringntes, in quorum **fafttgiia Bores apparent** ex- luki, ex quinque petalis fubrotundis compofiti: in horum medio ftaminula lutea vtluci ex va- fculo grani hordci figura, fed majore, in imo riori^pofico, excuntia. N;itcitur in **umbrosis** montofilque locis, noinunquametiani humidis.

6-*Samcula* mont.uia htifolia bciniata, C. B-P. Cortufa, Matth. Cluf. Hift. J. B. Cliabr. Cbrtuli* hujus folia pediculararadice mox narrs hirent, (extantali quotjuoverfus latitndine, aut majore, circumfcriptione qu rotunda, **aeqaabUitacm intercipientibos profundiulcnliac^** flirts: caulesnudi & enodes tbiaccum in cacumine geruntealyctm, cx**qaofeni ant** plures **pro-** deuntpedicelli, femitmcialcs, fmguli florem unum grentes, Auricula: urfi flotibus ret; **on-** **dentem**, quinque purpureisconftantem **petalis;** umbilicum **obOdeotibas** luccis apicibus, e qtiottiam itilus longiufulcus extra florem prominte; radix **fubeft efibris numerous contexta.** tftthaccSanicula montana rotumlilolia lacinkua **C.B.P.** duplici **figna exhibita apud Cla-** **fiaro**, tjacnikcuti funt Taberni-montanus & **Gerardaa** fub Sanicula montana ChtLHift. & Sanicula montana Clufii Tab.Gcr. & Corcufa Matchioli Cluf. **Hift,** Saniculx **Alpinac** feriore Icone Tab. Contuixrariore kone Gcr.

TEMPERAMENTUM & c VIRES.

Sanicula ~~montana~~ feu Auricula urfi prsfertur ad tmroce tasetboraciivulmnu **tarn** intm ~~fun-~~ ~~pa^~~ ~~qyam~~ ~~me~~ ~~enus~~ Uhta. Fm'jda & ficca efl & afringii, tfit Matbioto is Dodotiso, ft quo- ~~tudu~~ ~~in~~ ~~potu~~ ~~folia~~ injufa bibantw ad -oulntra conglutinan.la aliquot dirbui cominuh**petal** ~~on-~~ ~~ducunt;~~ ~~potiom~~ ~~bm~~ addita aut per fe dectfa. * Column Auricula urfi vires Primal* ve, ~~in~~ ~~vibidum~~ ~~culde~~ ~~est~~ affmhfm ultimo, t*r Mfmatis **adferibir.**

Aqua(x Satticula ~~montana~~ feu Auricula urfi Myconi fer vitreum organum distillata ad frangen- ~~duin~~ ~~Caltuium~~ ~~I~~ve in vesica sive in renibus valde effeacx est, id quod Myconus vir bonus & do- ~~ctus~~ se experientia reperisse asserit. Eadem aqua Hispani adversus tuffe utuntur: quam ob ~~causam~~ plantam hanc Ycrvatullera nuncupant; alii a foliorum copia **Pefeb** vocant.

H A L L L I C I N A T I O N E S C A S | > . B A U H I M

Alio iu inque Authorum.

P /g. 243. col. 2. pl. ... Sanicula montana ro- ~~tundifolia~~ major, B. P. Sanicula montana 2. ~~Gaf.~~ Hift. Efl. Ibidem pl. 111. ~~rotundifolia~~ minor, C. B. P. Sanicula ~~montana~~ alter- ~~ius~~ ~~species~~ altera, Cluf. Hift. Ibidem pl. xv. Sani- ~~cula~~ ~~montana~~ longifolia ferrata, C. B. P. **II* ttt**

planta **turn tijftrtm }** * **fieiom rtntritam** a fua ul- ~~tima~~ ~~tem;~~ ad Sedi classem ~~trjp~~ ~~n~~ ~~«neifla,~~ ~~tt~~ ~~namnt~~ ~~Sannulm/~~ ~~uura~~ ~~Cofrart~~ ~~Bahtni,~~ * « **feh** ~~tptm~~ ~~k~~ ~~viftrm,~~ ~~Ibidem~~ ~~p~~ ~~v.~~ Sanicula montana ~~pur~~

fioe calcari donato, C B. P. Pinguicula, Gcfh. Hort. Cluf. Pan. & Hijt. H#c null am habet affinitatem cuqi Sanicula montana feu Auricula urfi > ergo male hie collocatur. Eji Viola palufrls ut notavimus p. 477-hujus Hijtoria,

Pag. 241, 242, Gf 243. Cajparus Bauhi?ius collocat Pnmulam verii & Auriculam urji inter jEthiopem

feu Horminum ALthiopicum, quod efl planta gale ata> verticillata, & Digttalem, qua efl planta monopetala bicapfularis, at Primula veris & Auricula urji funt fentapetaU unicapfulares; ergo null am rationem habui Caffiaepus Bambifnusfinifii^qui flvcraregula anatura Qata& invariabilis fecundum quamdebent plantte dijponi.

DE PENTAPETALIS LINIC AP SUL AR I BUS

Cylindraceis femine nigro compreflo piano prgpdus.

C AT V'T XXI.

C A R Y O P H Y L L U S .

Caryophylkm feu Caryophylle'um florem ah odore Caryophyllorgm, mentions nominarunt; bunc alii Cantabricam Flin'nl. 25. c. 8. qu<ein Hifpania a Cantahrk Divi Augufii tempore repertafuit, effevolunt. Aliis efl-Vetonica five Be tonic a altera, internotha Viofcorid'tt, nee forte inepte. Alas Herb a Tunica; quibufdam Iplnum Theoph. 6. Hift. 2. & 7. ejufdem 12. fed male. Quidam inter faxifragios numerant, prefertim filveflre genus, - quod Galenus^ detuenda fanit. Sarxiphagon appellate videtur: namifilveflris noftra calculum frangit, isr eduat, quod Gale* nws de Cefiro feu Betonica in Gallia proveniente iefatur, Hermolao not ante. Forte iy Tbeophr. 6. Hift. 1. isr 6. per Jovkfldrem, inter Coronarios frutices minutk foliis conditum^ cujus flosfine odore t ant urn in coronarum ufu, filveflrem Caryophyllea?n intelkxit. Armerii flores dicuntur a Gallico nomine Armoires is? Armoiries >

Genera fumma duo funt; altills i\$ fdvefir'vs* Altills fyecies multa, magnitudine, colore i& foliorum numero differentes: flores namque funt vel minores, vel medii, vel majores, vel maximi: vel multiplici, vel fimplici fiorum textura, tnajoribus vel minoribus petalis con fiances; funt. colorenivei, dilutapurpura candicantes, croceo rutilantes, miniati aut verficolores, ut candidi isr purpurci croceive, candidi isr rubri, candidi rubripunfifulis afferfi: rubentes aut violaccg admixto purpurei, rubei lafteis notis afferfi: ficque guttati, aut Rof* filveflris colore. Sic ex uno caule duo fiorum genera partim candidi, rubrifquemaculis afferfh partim crocei: fepeetiam unop'ediculo flores d'werficoloresv'nleas: aliquando unusex alio mediws excrefcere confjneitur: aliquando in una planta flores triuw colorum: in fumma mangonio isr arte in bis floribus magna varietal fit. Silvefirium quoque magna diverfitas exiftit, isr in magnitudine, isr colore isr fioris isr calycis figura, pleriquetamen fimplici flore funt.

'Caryoi>bylku6 fios feu Caryophyllus efl planta pent-apetalacujus fingulapetalaut plurirnum funt multifida feu laciniata, atque fingulis floribus deciduis fuccedit capfula oblonga, cylindracea, pluiima (cminanigra compreffa habeas circaftilum nutritivum contenta. Efl Caryophyllus vel jortenfis feu altills, vel filveflris, utraqiit vel flore fimplici, vel pleno, qui multis modis variat quoad colorem, cifque vel perennis, vel annuus: vellatifolius, vel anguftifolius. A mangonio & arte plurimae cernuntur Caryophyllorum fpecies & multas varietates differentes magnitudine & Horum colore, utrequirerenc tractatum peculiarem, nam fingulis annis fecundum divtrfundima diverlafque regiones multiples varietates producuntur, quibus fere in univerfum omiilis, quofdam adferemus in medium vulgatiores tantum.

TABULA XXV. Seftionis quintar.

Hortenfn *	Multiplex	<p>j"i. Ruhr, C. B. P. Caryophyllm mxnim fore rubro, Eyft. v</p> <p>Mnximm \ 2, Varitgam, CB. P. Ctrycpbyllus maxima* varkgatus, Eyft. Caryophyllm multiplex i_ maximus, Tab. Ger, w</p> <p>3. Major ah ilk, CB. V. Ciiryophyllus domeficiut, Maiib. Ca?n.Caft- Carypphyllus flore mapre, Eyft. 0</p> <p>fM ^{ius} altilh, GB.P. Variorum colorum, Eyft. sy ©</p> <p>5. Minor floufkno, C. B. P. Caryophylltts multiplex vimor hoitorum, Lob. Icon. 0</p> <p>6. Mali axirantii colore, C. B. P. Caryophyllh Sile/iacus mi niatitA florepleno, Cluf. Bft. Caryopbyllus plains mi* n'utocolors, Eyft. &</p> <p>7. Supiniti flore. rubro plenaargen. ^{is micis asperfo, C.B.P.} Caryofbylltf fore mirtore pkno rubescem ^{punctatus,} Eyft. &</p> <p>S.Laciniatut, C.B.P. Caytybyllm purpunwsflore mul tiplici profunJelacimato, Lob. Jcc?i, 0</p> <p>9. Simplex foremajore., CB. P. Oryopbyllus flos (implex, Vcd. Caryc pbylus ftmplici flore, Sxvtrt. 0</p> <p>[1 o. Arborefcens Creticu*, C B. P. is? Vrod. defc. Caryophytlus fdvftm arborefcens, Park.. Betomca corcnaria arborea CnticaJ. B. Cbat. ©</p> <p>11. Fitfillut omnium minimum unjco flore, nobk, Caryopbyllus 1". Cltif. ^{Hi} \ Caryophylltts ft heft rh bit milh fore unico, C. B. P. 0</p>		
		Carytypbyllsa \	SUveftrhi	<p>ii. Juncifolius cdrukts Monfpe Hen fium, nobis. Cdryopbylltm ^{eruleus,} tab. Get. Apyllanthes Monfpelitnftum, Lob. i\$ Ad. Lvb.'J. B. Cbabr. 0</p>
		Pfamariut feu pro-1 ftinde ljuniatu \	Floribus	<p>^ 1 •\$. Irtodorti"feu tenuiff'tme difeflh? nobh. Caryo phyllws plumarius, Tab. Flos C aryopbylleus mi nw, Dad. 0</p> <p>[^ 14. Siaminulh cornicul.it h, tiobk, Cryo phyllws phest it 5. Cluf. ^{Hift.} ©</p> <p>Odorat* ^{it, Sine ccrnkulk. nobh. Cwyopbyllhn} yhj, C. Caft ©</p> <p>16. Lanugincftt birfuth, nobis, Carro Piyilma ^lumarim purpurocsrul/tu [Tab. Ger. ©</p>
		Hortenfis Barbatus	Simplex	<p>(Rubro\nobh. 0</p> <p>14. Multiplexfeu flore plena ><</p> <p>(Albo, nobh. 0</p> <p>j"i 8. Latifolius.nobh, Caryopbyllus barbate ^{lor} ^{terf s lat /i y} C B. E. Armeria altira ^{mHth} floribu* in latum orbiculumcongffu ^{s, Lob. l en.}</p> <p>19. Anguflifotiu4,nobh. Csryopbyllut barbdtm bortenfiu anguftifolitK, nobit. Armtr'u rubra fiort fuaverubtnte, Lob. hen. 0</p> <p>j~20. Aftguftifo/iitsptrpaucis capfulis donatm^ 'nobis. Armerti SilvtHrU \ fthe/IrisjecunJa, Lob. Aon. Viola barbata angvflifoli* •></p> <p>amttus * Lund. <</p> <p>*uLanf_{minul}ts capfulis ^{finl} ^{unr?is} don ^{amftu} ^{pwp} ^{lyy, nobh.} Armtrtaprcijtra, Lob. Icon. ©</p>

§. i. *CARTOPHTLLVS bortenfis multiplex.*
Explkatio Tab. vigefim quintis Seftionh quinti- <e.*

i. *Aryophyllua* maximus ruber, C. B. P. Caryophyllus maximus flore pleno rubro, Eytt. Speciofa tam riorum quam foliorum & calycis magnitudine easteins omnes congeneres anteccllere facagit hie Caryophyllus ruber, cafteroquinillorumfocietatem nullatenus recufat.

2. *Carjophyllm* maximus variegatus, C. B. P. Caryophyllus maximus multiplex variegatus, kyft. Caryophyllus multiplex maximus, Tab. Ger. Magnitudine florum Caryophyllo maximo purpureo flore multiplici refpondet quidem, coloris vero variegata & eleganti diftinctione illi quafi palmam praeripit, cum albore confitet nonnullis punftulis ac maculis faturate rubicundis, tota etiam petala imo tofos flores inficiat, calycis craffitudine aliquam cum Anthophyllis fimilitudinem habeat, cum quibus etiam a Lobelio comparatur, foliorum herbaceorum luxuria & amplitudine omnium reliquorum familiam ducere videtur. Hue pertinent Caryophyllus maximus & pleniflimus colore mixto carneo quibusdam corniculis laeis du Bry. 2. Caryophyllus maximus & plehiflimus colore varto in diverfis petalis, fcrlatino, dilutius rubente albo du Bry. 3. Caryophyllus maximus & pleniflimus colore rubro faturatiore, ftaminulis tribus niveis in medio, du Bry.

4. *Carypphyllua* altilis major, C. B. P. Caryophyllus domefticus, Matth. Cam. Caft. Caryophyllus flore majore, Eyft. Caryophyllus multiplex, Lob. Icon. Tab. Ger. Hujus datur varietas multiplex i., Caryophyllus multiplex flore albo, rubro & carneo, Eyft. Swert. 2. Caryophyllus pleno flore colons albimifta & fparfa rubedine, du Bry. 3. Caryophyllus albus flammulis ruberrimis, Swert. 4. Caryophyllus albus lineis rubris fubtiliflime diftinctus, Swert. 5. Caryophyllus multiplex flore ex purpura rubefcente, Eyft. 6. Caryophyllus flore majore partim carneus, partim albus, rubris ftriis ac punftulis variegatus, Eyft. 7. Caryophyllus multiplex fingulis florum petalis e rubro & albo colore dimidiatim divifis, Eyft. qui eft Caryophyllus multiplex major, Lob. Icon. 8. Caryophyllus plenus colore umbilico tenus rubfcens fta florum Perficas mali, foliis latioribus, Eyft. 9. Caryophyllus plenus purpurafcens punftatis petalis, Eyft. 10. Caryophyllus purpureus punclulis intenfe purpurei coloris, Swert. 11. Caryophyllus fubviridi colore, Swert. & 12. Caryophyllus luteus ex Polonia, Ger.

*. *Caryophyllu** altilis medius, C. B. P. Hue pertinent 1. Caryophyllus albus cremefini coloris & Caryophyllus minor albus lineis purpuroviolaceis diftinctus, Swerc. 2. Caryophyllus miniatus medioalbefcens, Eyft. 3. Caryophyllus pleno flore violaceo de Bry.

z. *Caryophylltto* minor flore pleno, C. B. P. Caryophyllus multiplex minor hortorum, Lob. Icon. Caryophylli fpecies exigua pleno flore coloris carnei, du Bry.

6. *Caryophyllu** multiplex mali aurantii colore, C. B. P. Caryophyllus Siiefiacus miniatus pleno flore, Cluf. Hift. Caryophyllus plenus miniato colore, Eyft. Hujus dantur varietates i: Caryophyllus dimidia parte mali aurantii colore, altera Candida & permifta, du Bry. 2. Ex femine libenter provenit, fed alii flores nativum eumque faturatiorem aut dilntiorem retinent, alii albi, alii rubri fiunt: nonnulli fimplici quoque petalorum ferie conftant, Cluf. Hift.

7. *Caryophyllws* fmpinus flore pleno rubro, argenteis micis apherfo, C. B. P. Caryophyllus 7. pleno flore, Cluf. Hift. Caryophyllus flore minore pleno rubefcens punclatus, Eyft.

8. *Caryophyllus* multiplex laciniatus, C. B. P. Caryophyllus purpureus flore multiplici profunde laciniato, Lob. Icon. Varietates hujus tres 1. Caryophyllus multiplex laciniatus flore carnato, Eyft. 2. Caryophyllus purpureo flore multiplici profunde laciniato, Eyft. 3. Caryophyllus purpureo flore multiplici laciniato, Eyft. Caryophyllus purpureus flore multiplici Bry

& 5 wcrC#

§. 2. *CARTOPHTLLVS bortenfis [implex.*

9. *Caryophyllus* hortenfis fimplex flore majore, C. B. P. Caryophyllus flos fimplex, Dod. Caryophyllus fimpliqi flore, Swert. Mira & variarubarum macularum & guttarum apherfine potiffimum a praedi&orum genere difcrepat, a caeterarum tamen turba neutiquam excludendus hie Caryophyllus fimplex, ejuoque varietates; nam magna eft varietas in colore floret enim flos fimplex miniatus, eft pallide purpurafcens, vel incarnatus: eft verficolor uttarum f macularum rubrarum apherginem: eft variegatus, cujus folia albefcentia ftis rubris apherfi fiunt: duo pofteriores in Horto Eyftettenfi proponuntur, nomine *Caryophylli* fimplificis hoitenfis yrcfcoloris, & Caryophylli majoris filvdtris variegati.

§. 3. CANTOPHTLLVSfilvefirh simplex.

ID. Caryophyllis filv,fftris arborefcens Creticus i. C.B.P & Prod. Caryophyllus fi vcftris aibordcens, Proip. Alpin. Exot. Dctonica coronariaarborea Cretica, J. B.Chabr. Caryopny&os hie filveftrisavboreus Creticasquinque-toliis iiafcttir in montibus Creta: Infulazbicubkalis & am I lioris aliquandoaltictidinis; ca«dicduro,longo,digiti craflitie, col ore albicante, denfege- iiiiicciato, a qiorami mnlti procc-dunr, oblique forfam iiff, denfeitidem brachiati in aliosl% nus, vt! trnosfaulicuos, in quibus multa germina innmncris loliis longis, terraibus, filve- ihijCaryophylli foliisfimilibns, ex eodem ortiinafcentibus referta,apparent: interqpaex- eint pedicuii cnaes, flores caryophylleos, parvos, pctapetalos, odoratos, purpuiafcentes in alb'im iurtinentes. Florctmenfibns Junio &-Augufto. Hyeme in Hypogxum repofitos mul- n anntsduat.

11. Caryoj>hyffus {iUeftiis pufilhis omnium minimus unico fiore, nobis. Caryophyllus filve- ftru i. drtt Hift. Caryophyllas filveftris humilis ilore unico, C B. P. Hoic dodraiualesfunc r;uliculi, tcretts, genicubn: tolia infingtlis genicnlis bina inter (eoppofita, oblonga, nngu- tra, d«ra, nuicronata, colorerjnaficyfio: tioscalyculorubente cmeigens, fingiilscauh«lis unicus (interdum.biiti) quinque pttalis contons, knct'fimbriatis, 'colons in purpna m- bentii;, ci«a umbiicum hirvrtos, & fataratiorepurpura nitens atque odoratns : ex cijus me- dioumbilicoduobrevin ftaminula prominent: lemcn'in calyculisoljlongis palcacctim, tom- jretiam, lulcum : radix long3, tentiesh'brasfpargens, e cnius capiteplurts cauliculi late in ambira&conftrtim fefe dirVundunt fibrafefjite fubinde agunt. Invenitur in Haimborgenfi monte, j duobtis fnpralV;lonium, infra Vicrinam aotem OLto, milliaribus. Floret iitic Maio, in hoicu: ctiamtranfl.itaraditxAprili.

12. Caryophyll«5 filvitris juncifoliuscirulcusMonrpelicnfium nobis. Caryophyllnsca:ra- lensMo! nfiium, C.B. P. Aphyllantlits Monfpeliciifium, Lob. Icon. & Ad. J. B. Chabr. Carjophjlluscrruleiis, Tab;Gcr. Maltosjiinccosenodes caules bi palm ares in glarcofsciim- ptsciicaMonfpelium,atin liorris pedalcs&altioreseniitnthicelegiins Caryophyllus cirulcits, 'nfmgulis tiosratismn^iiusproportioncplanti^rruleus, pentapetalus, umcus lit' iiatc m (uninx), excalyceoblongo^ylindnifeoerurnpens^aliartim fllvdhiiim mort,gultudul- ci: radix hbrb mt!ci, tongis, contxttis, lignofis, duns albifqae tonftat, circa iblia'multa graminca , ctlericer martclctntia , prorrudnr.tur. Proven it Monfpclii pi ope Ccijltlnevf in monte, &qoaitoi Front• nianwin Monfnclio: in locis hxofc float illic Aprili in cacamine nJOUtrs, fep CvertllsfinemM•iii&iniui]mjtimi

§. 4. C A K rOPHTLL.V S II,„,arius feu profunde laciniatus

13. Caryophyllus pmmantis BoreinodorotenuifTmc iliiii^o, nobis, Caryophyllus (loret enu- illime diflecto, C. B. P. A/T (far>opll'y! ius P^unijri)»-- rab. Flo*catyophyllcusminor, Dod. Sit] er- ba recentiorum i . Lo>. Bctomra coronari; five car oph vlca Horc rennicer lacinii to ma- jore alt & dilutius ru ^ J . b r . Fini.ioribii&longioriboact cauliculis Bet hze corCnr ^ J . b r . Fini.ioribii&longioriboact cauliculis Bet hze ncc odo «f; fejofrcctiamflore non minus prafonde pronw laciniato ncc brevibas ^, tacei un^or^om^ aut dilutius ribcnris & quodammodo carnti colo- ns brevibas P.P.P.P. § amblicu circumferentiana in unatjuc varietate occupanri nullis fimilitet ornicu!s) faldecem (tainmtbas tit in ticconica coronana minus rimo!n: pr°- minentibus 2hofpul^oli!^ r;dice Seiiorendi tempore convenitint. Bctoniram lianc coroiva- riam Cloufus invent i radices montis oppitlo Millehag imminentis tertio i-re à Vi iiiVj ml' liari. FI03 nunc albus, nunc dilutius rubtns& earneus, <jiii floret ineonte Jll.itt, <MO I&&* pore femina r lte C" f:tl nniisa»temapiiclCitimanosiii pratishtmiidi setiam reperirii eleft- fnc r, efetri r ni est Caryophyllus filvdhis flore purpurafctnte& ulro floc< i^l carnato, E_vft flo; hujus aut purpurafcens fuzvis odoris. Vide descript ioncr -OS-pi-^ I,

14. Caryophyllus plumarius floribus odoratis ftamimil corniculatis, C. B. P. Car)op^h- lus filveftris e Claf. Hift. & P. II, Vide descriptionem auf.Hift.pij' oribus odoratis fine corniculis, C.B. P. Caryophyllus filveftris tertius, Claf. Hi 16_Cj|1 JWhi iUirilh, odoratis lanuginofis hiid;ris, C. B. P. CaryopliyUua plumarius pur-

Seft. V.

V N I V E R S A L I S Q I X O N I E N S is.

pnrpuroceraleos, Tab. Ger. Caryophylus filvefris flofealbo, Eyft. Flos hums alerius flores purpurafcente lanuginehifuti. Sic millcodis/udi, n a S I d S i ryophyllorum tam nworum, rnorum, mediorum & maximorum, tamhortenfiu vefnun, , enamfi Johannes Ruelliuscaryophylleum florem mcog'nimm v S T rit atque ejus judicium optimum videtur, nam certe Vetic*altenusautCantabric* rum hums flori fimilis eft. Mirum creditur, ait, ut tam Celebris flos, S S a vetenbus f.lent.o prztermiffis, q< amplitudine, pulchritudine varietateque colorum florum Roia iion inferior videri poteft.

§. 5. CAROPHTLLVS BARBATVS.

Armerius flore pleno rubro Eyft. Armenus pleno Hore, Clul. Hift. & Pan. Armeria alba & rubra, multiplex, du Bry & Swert. Caryophyllus floribus congener est Armerius flos Gallica appellation nomen apud recemini.

Botanicis mutuatus, qui in mocaulis & rammorum fastigiis niltos flores confertim nabitentes & velut in umbellam feucaput congestos habet: folio caryophylleis fobis latiore, Hujus, inquam, flos duplice, mpl. ee aut multiplice petalorum ferie, confat, eftque vulgator rubro Hore, rar, t, r albo unde, Arn, er, a alba mukiflora dicitur Svret. Hue pertinet Caryophylus barbatus iore rofeo, C. b. P. Armena moltis & feparatim pofitis floribus duplicibus & magnis

18 *Caryophyllus* barbatus hortenfis simplex latifolius, nobis. Caryophyllus barbatus hortenfis hifohns, C. B. P. Caryophyllus Carthufianorum i. Tab. Armeria altera m n k i s b h turn orbiculum congestis floribus, Lob Icon. Hujus folia binatim proveniunt firgnlis, Imlis adhaentia caryophyllis tolu multo latiora, & minus rigida feu dura, plurimos flores in Migio cauhs feu ramulorum confertim nafcentes & veluti in caput feu umbellam confertos te, t, iimphces, pentapetalos, qui multis modis ludunt quo ad colorem, nam vel est flor rubro communter vel albo; habetur & albomaculis rubris notato: vel est diversicolor ex albo & rubro & medio; h mci. Armena simplex flore rubro, Bry & Swert. Flos armerius ruber, Eyft 2. Armena flore albo Bry, Swert. Flos armerius albus, Eyft Flos armerius variegatus, Eyfti

19. *Caryophyllus* barbatus hortenfis simplicifolius, nobis. Caryophyllus barbatus hortenfis angustifolius C. B. P. Caryophyllus Carthufianorum a. Tab. Armena rubra flore (uaverubente, Lob Icon. Armenus flos alter, Dod. Armenus Pannonicus flore simplici, Clnf. Hift. Hic a pncordifferttantum parvitate car angustia foliorum praeecedente. Hujus quinque sunt differentix, 1. Eleganti est flore, eo que aut plane rubro aut laftei candoris maculis asperfo aut niveo ons carnei colons, 2. Omnino mveo, 3. Flores pauciores dilutius rubentis & carnei coloris 4. Flore est purpurafcente ons albis. 5. Flores die primo & fecundo quo aperti sunt laftei prorsus candoris, lequentibus paulatim albedine evanefcente, tandem omnino purpurafcentis ficut in eadcm umbella flores lafteos, alios exalbidos, & media ex parte purpurafcentes alios omnino purpureos, confpicere liceat; imo holofericeo colore eleganter fafurate tinelos.

20. *Caryophyllus* barbatus filvefris annuus angustifolius perpaucis capitulis donatus nobis Armena filycftns 2. Lob Icon. V. ola barbata angustifolia, Lugd. Radice est hzc Armena brevis, Candida, mod. ee fibrata: foliis gramineis fed longioribus, nigrioribus, aliquantulum Inrlutis, prope radicem nullis, in caule paucis, binis per intervafin ad caulium nodos alarum modo junctis: caule nunc fingulari, nunc multiplici, pedali, geniculato, furculis ex alarum finii non b. n. s ex adverfo, fed fingulis, ex altera tantum parte prodeuntibus: in quorum fastigin caulicuh multi, longi & graciles, in multos veluti barbules pilose extremi divifi unde Armerium Barbatam appellarunt. Flos est puniceuselegantiffimus, fed minimus, colons tamen nitidum imprimis vavidi. Locis fabulosis, macris, lapidosis, kd apricis gaudet. Maio 6c Junio paulo post femina foliacea, nigra furfundit.

21. *Caryophyllus* barbatus filvefris annuus latifolius multis capitulis fimul junctis donatus nobis. Armena prolifera; Lob Icon. Caryophyllus filvefris minimus, Tab. Park. Carvonyhvlushic Yolia habet viridia, graminea, obtufa ab initio, humi jacentia: e quorum medio eripitur caulis brachiatus, cujus gemculis adherent tantum foliola: in fummis lrt capulas Curces breves, fimul junctas j ex quibus fingulis gradatim exeunt finguli folioli, dilute rubentes omnium minimi, qu. uix excedunt calicem ipfos fuftinentem, unustantum apparet flosexnanfus, aliquando bin. conjunctum, unde fucceffive feu gradatim diu floret: floribus evanidis anptirnt fingulx capfulas brevissimas, fimul junctas & arae fibi invicem adhxrentes, quarum finilix in fe continent plurima (emina, nigra, foliacea: radix tennis, dura, alba, fingulis annis fiens & fefe fingulis annis propagans. Provenit in fegetalibus & neglectis arenosis passim Floret Junio & femina perficit Augusto.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Temperalura media prdditos atropyblyhos flores whit Tragus; funt qui ex rubrk conferva, ut zn tant, conficiunt, quemadmodum ex Rosdi, Buglofdt^loU^floribm conferva faccharo covdki confm verunt. Ejufmodiconfe8ioimbicinitaticordk,prifertirninardentibusfebribus <jppriweconducit alii accto impenunt flores rubros Caryophyllorum-, quodjucundo odore emmmdant: hoc acetumdi loribus capitkolfadu> isillitu tempwibus^opitulatur. Flora Caryophylli campefirk^quinatur, t&ttrk calidiores exiftunt^ difi^dlantur, ea aqua fingulari experiment o ad' pellendumcalculum, men fitraduum ant trimncoebkarium bibitur, calida ficcaque facultate pollere bos flores perbsbt (turn Matthicks is fineindicia poteflefft odork fragrantiais fapork amurukniia qudtmnn \shiiipurpleocoloro nitent, pr#flant adomncs tordk affefiuii vertiginem^ apoplexiam, paralyfi. is convulfcnehi, ex Bitonic* aut Amaraci decoficpoti. Adfrvantur faccharo mnfolium adpr <£ diilaomma units, fedetiam adverfw venena vmenoforumque ammaliumifttt. Vantitr contri pej?ilenti <e comagia. Succusvalentius operatur <x univnfa planta txpreffus^ haujlws ehnh qua tuor unciarumpondere^ ubi morbui invafcrit, liberal- ¥r <xfiant fihefires qucque ad ea omtia at qu£ fat'watprfflartdix'unm^verumhngeremiftxsoperantur. lucbfimfilveftrk fuccth,tcalculi alUrendo ac educendo, me non com'uiati ntorbo laborantibm a recent ioribttis ut'ilem cr-'di fcriptun rdiqut. I'fdiftant, inquit \$cbvreii(kfeldius7purpurco nitvnirs colore Caryopbyllos aramat'h doleni' <: corroborant ventriculum, cerebrum, cor is pwr^ unde commendant u r adomnes prsdiflo- rum viftrumssffi Qus antidntifqut inferuntur. Succus baudinferiore\ qui egranit tinSforik Ker- mes diSlh colligi/ur, in cardii affeUbu, palpitation^ lypothhnui, incapilis mal'ti^vert'ijive apa- pli'xh, pjralyji is ccnvuffiönr, tephalaalg'ta, isc. atqutventrHuliimbicilitate, cardia/gia, i&e.prd fiantihmuwrrantJimn. Co;/imodi/imeetiaminfefribus malbnKfr^pi^atwr. Aatum floruuu ryopbjllorum oxyrrbodank utihtapermifcetur. Qui plura Jefiderai deCaryophyllecrumffot vinbus (s ufuf legat Takrn <£momanum, qui ex ik 'is vinum is f/rupum atqut oleum fieri manorat. Confule aiam Simonem Faultquadripartiti fui operkpag. ?4i, { 5-242.

HALLUCINATIONES CASK BAUHINI,

Aliorumque Auchorum.

P. Ag. MO. col. i. pf. vi t. CsiytfMm pratenfis lacinate, CB.P. Odaatti'n imp&afim J. jYon tli Caryophylhs a natafua^merua, fed Lychnuu lliidrm tel. 2. pi. Vm. Caryepliylult pra'-vjit fart pitndLythmt tfi planta pntapittaU utplurimum capjtla tartila^ntta pyramidal* aut long' prsdite , in qua tentincuntrjtmitta plu- " V * " fi ? * " r * " ^ " i at/juijitiquaftu capful* bu- L £ £ r / T-? \$ * & * ^ madm, dvm menu, - capfula sunt oblonge, cylindracee, continentcs femina foliacea, nigra, uti ab initio hujus capituli de- Ham, Olinvitiu Plinii nentiquam dicenda fuffet Caryophyllus nec Armerius, erga laffi sunt antherae omnes quibus maritatus adhaferat Caffarus Bauhinus. Pag 209. col. 2. pl. x. Caryophyllus Carinthiacus ruber, C. B. P. Caryophyllus filveftris 4. Avel Tauricus Claf. Hift. & Pan. Ibidem pl. xi. Caryophyllus Alpinus calyce oblongo, bifido, C. B. P. Caryophyllus pumilus Tauricus fivo s. Claf. Hift. cum pericarpium & calycem foliaceum reliquarum Lychnidum more ha- beat efl Lychnu, ut monuimus tpttt de Lye-mde xvii. fupra, ergo male difpon' fur prime a Clttjie , deinde - - -

f""eKajtrt,C E.P. Caryophyllus holoftius, Itb.hen. G. r. tout, *p) I, »phyUut'ialo'(ivi tvait C. B. P. Ibidem pl. lit. Ciryoplntttfln- Caryl.,: C. B. P. Ibidem pl. iv. btB*nuf,li»j.Ubro, C.B\ i, lj*fd- ibidem pi. v. Ca* ejlotr n/ajerr, C. B, P. Grit- lüdtmpf, vi. Gny< Ruelius arvenfis, Lab. Icon. Ibidem pi. \ 11. I Caryophyllus arvenfis glaber minimus, €B. J. - Eum nulla harum plantarum ly mlO. 4. I; poffideat Caryophylli

HtutijUüm aatheribas fit fuijftnt denemin jttnt Lyibnidn jp<tits ut monutmut tap, xvii. sig. malt prime ntmtnaatttr, dtndr difpenunt-' • inist Co- ryapbyllm, trim pajf. cadtm tel. tadem, L. 1, fl. xi pi. tt 1, apt. iv. malt ttiam mil ant ur (>re Cary- pliylt fptrirbss a Caffare Bnubma.

Pag. HI.tel.t.pi. 1. Caryophyllif maji flate glo- b>e, C. B. P. Gramtu manna n majus, i'ab. \ Pan. Ibidem pi. i i. Caryophyllus montanus minor. CB.P. Qramtn ntannum mum!, Tab Claf. Pan. A'en btbtnt tietam 'intriram Caryophyllorum fpa- did er urn , tr*e matt notnnantur ab cut hern pejusfac dtjp'unumur m Caffatt Hauhtne.

Pasc at I. ft. 1. pt. 1. Caryophyllus saxatilis folia framtüi mmbeUalis tor-: nbn, C. B. P. Symphytum jrtrgtiifi fivo Gypophyton n. ifui, Tmt. Ibidem col. 3.pi- II. 'Caryophyllus n faxaf ««, I. B. P. Symphytum petraeum fivo Gypophyton mtnus, fhal. ibidtmpLw. Caryoj byllus faxifragus CB.P. S*xifra%ca nnt%<ta,Maitt). I.eli. Lord Cam An/*xif'r4*a liaiarua, Cam J'onr. Jbdtü'^^M Cary yhytttt Jaxifra^m Jhigefiar , t, • Caryo- filviftrti fiere mtaitnt, C. I. P. Saxifraga fivo Jaxi- jrafta, antiquarum, jid.UB. Icon. I. inde pl. vi. Co- ryophyllus saxatilis Erte; j aliu umbellato carulo C. B. i & Prod. Ibi Umpi. v. i. Caryophyll" till! Jyuit flly Tütmtjui rtf>rni , C. B. P. & Prod. Ibidem fl.Mu Caryophyllus saxatilis fardus r- brii, C. B. P. & hru l. Caryophyllus m mmt m*** C.B. P. •• mtnim, lj,jtd. Qmntt b* ?*** natnm Pjijidnt Ire < f f * * I * C. par o Bauh i nominantur Caryophylli

pre Caryephylh *tunjrutur. ... f: ^ L p e l p u Caryephylhs liqttjtüt qui CaryephySmp-tyavftu, C. ft ft. Tiv. funftit pU* * tetta-it*, C. B. P. & Prod. tx Arftripptvu Mmtm *CM{p.B*}hi**, m*! * * l letpre vtr* t3£t*Mt* Caryephylt fpecu. D 2

D E P E N T A P E T A L I S

capulis oblongis bifidis, femina minuta *in*. fe continentibus.

C A T V T XXII.

C E T A U R I U M M I N U S .

Cent aurium duplex est: majus de quo infra Seclione sexta intercapitata pappescens: Minut aliud, quod *wi&ztn -mtux&i x̄*, A^{OV}, quoniam /oca rigua amet, Diofcoridi l.-i.c.h. At Theopbraſto q.Hift. 4- »»*£ Ae*7o»»Mo. Panax tmuifolium dicitur- Tlinio lib.25. c.6. Centaurium alterum cognomine Lepton[^]quod aliqui Libadion vocant[^] quoniam fecundum fontes nafcatur: Fel terra propter amaritudinem fumam dicitur. Gallis Exacon C^Z[^]&va^{med}endo) quoniam omnia mala medicament a pot urn e corpore exigat per ahum. Tertia est Centauris cognomine Triorchis, iyc. Hie Plinius

Centaurium minus hunc locum sibi vindicabit cum fit planta pentapetala, capula longa, bifida, tenui donata, continente plurima, minuta, puſilla femina. Centaurium autem majus cum fit planta capitata pappescens remittetur ad fuas confortes capitatas pappescens Seclione 7TM. contentas & ad jungetur Cyano, Jaceae & Stxbe, cum quibus convenit in partibus eſſentialibus a fine ultimo petitis.

Pars TABULAE XXVI.

Centaurium minus	{	1. Perfoliatum, C.B. P. Cam. Ep. Park- Centaurium prius te alterum, Hift. Lugd. Centaurium prius, Lyft. Centaurium minus perfoliatum flore luteo, Tab. \$
		2. Folii non cingentibus caulem fed verſus caulem lunatis, nobis. Centaurium luteum parvum Lobelii, Ger. Centaurium parvum luteum flavo flore, Cluſ. Hift. Centaurium luteum minus vulgare, Park. '£
		3. Perpuſillum, C. B. P. Centaurium luteum novum, Col £
		[4. Paluſtre minimum [^] no bis. \$
		5. Rubrum, nobis. Centaurium minut, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut. 7ur. Lugd. tab. Centaurium minus vulgare, Park- Centaurium minus flore ^{C Purpureo} ^{Pureo} ^{Albo} \$
		6. Purpureum puſillum feu minimum [^] nobis. £
		[7. Album minus fpicatum, C B. P. te Prod. Matthioli ed. Baub. \$

Explicatio partis Tab. vigefimae & ſextae Seclionis quint*.

1. **C**entaurium luteum perfoliatum, C.B. P. Cam. ep. Park. Centaurium prius & akerum, Hift. Lugd. Centaurium prius, Eyft. Centaurium minus perfoliatum flore luteo, Tab. Radice nititur exigua, fibris criſpis, cenuibus, candidis capillata: caulis ei eſt pedalis, aliquando altior, rotundus, viridis, fed albo quodam pulvifculo pubefcens, qui digitorum aſtrifitu facile deraditur: folia ex intervallis bina, aut potius unicum, u^{tr}inque mucronatum, craſſa, arnoſa, Centaurii minoris fimillima, latiora multo, rotundiora, non ita venoſa, concavo alarum finu lacunoſa, & Dipſaci modo veluti pelvim aut alveum efficientia, quo ros imberve contineri poſſit: ex alveolorum medio furculi exurgunt nunc plures, nunc pauciores, qui flores ſuſtinent aureos, petalis conſtantes quinque, ſenis, aliquando oſtonis. In aſperis & faxoſis gignitur. Tota planta guſtu eſt amara. Huic ſimile eſt caulibus foliisque Centaurium aliud luteum minut[^] in hoc difcrepanſ a ſuperiore quod nullos ſurculos edat, ut ſuperius, quibus flores infideant, fed in fummo caulis taſtigio florem ſingularem emittit luteum. Iſdem in Jociſ reperitur, ejuſdemque eſt guſtus. Vide Hiſtoriam Lugdunenſem pag. i 291.

- [^]Centaurium luteum toliis non cingentibus caulem, fed verſus caulem lunatis, nobis. Centaurium luteum parvum Lobelii, Ger. Centaurium parvum luteum flavo flore, Cluſ. Hift. Centaurium luteum minus vulgare, Park. Multis conſtat foliis, Saponariae vulgaris nondum milibus, minoribus⁸ tamen & candicantibus, perque terram ab initio parſis; inter quas caulis exit ro. Hinduſ pedalis altitudinis, geniculatus, & cingulis nodis folia Centaurii minoris aut Hyperici

berici semnla, bina Temper inter feoppofita, atqueverfus appofitionem turn caufedeliquijm patientb fenhinata; fbmmi ramuli r^iquot fiores Hyperici Horibus fere ilmtfes, faturarioris lutti colons & plane aureos fullineV: femenduinde in vafculistenuiffimum, fcobisinftar,ni-grum: radix Candida tenuifque. Provenit laetofblo, incollibus juxta Tagimi, **obi** abincolis *fbnper Nova dkitat*, quod roto fere anno floreat.quafique renafcensconfpiciutur: etiam in afiis HilpaniK locis,atqueagro Monfpclienfi ; etiam in Gallia & Anglta in montofis& ficcionbus pratis& patcuis Eilexienfium &in comitatuCantii interGravcfendiam& Cobliam flonbus onurtam obfervavit Clufius.

-.\$. *Cent annum* luteum perpufillum, C. B. P. Centaurium luteum novum, Col. Dodranta-**taliseft** plantaliaec: radicc perquamexigua, lignofa, patience : **foliis** in imo ftraris ab initio, **tit** hi congeneribus vulgacis flore purpureo, fed minoribus, cauli angulofo binisoblongisioliolis tregione per intervalhxxrentibtis ut in vulg^ri,-fed duplo minoribas, Rucx proxtmis : m fummovcrofloresbinos"fertaut unicum.longis calycibus pro ball infidentes,pentapetalos,coIore luteo, Maio menfe hiantes, femineexili &minnto ut in pizdiftis. Sapor plants admodum **airaras**, Ted non tarn intcnfus utvulgaris minoris,purpurei, Hanc inemine obfervatamhuc-ii(queaurdepiftam,inquit'fiibiLisColumii3, in maririmis oppidi difti vulgo *Torre delta nun-ciata*, nonlongea Stabii minis in **Ri/iw mantis radice** prinium invenit prxdiftus Fab. Columna.

^.*Cntaurium* paluftrc luteum minimnm,nobis. Huic radix alba fimplex **fibiis** multis donata ; **folia** ait **radices**] parva,3ngufta,oblonga:caules rriumaut quatuordigitorum altitudineaffurgunt: ramofi, ad quorum fingulagenicula duo ex adverfofoltola,anguTla,acuta naicuntur: flores in fimmiciribus ramulorum prodeunt longis pediculis innitentes,lutei,exigui,pentapecali,fere **km-PCRclaofi**, ex quinque peE^lis conHati: vafculum **feminak** oblongum per matilritatem in d ^{uas} carinas dehiicit & fcniens efiundit minutifilium, fubrotundum, exniftb nigricans. Totius herbulx fapor amarus. Plantulaertannua , quac perfecto **feminctocaliter radicitus exarefcit**. Vegctat in humidis& paluftribus locis aeftate exficcat.

5, *Centaurium* minus rubrum vel album, nobis. Centauriumminus,Trag. Match. Fucli. Dod. nt. Tur.Lugd. Tab. Centaurium parvum, Ad.Lob. Ger. Centaurium minus vulgarc, Park. Centaurium minus flore purpureo & albo, J. B. Chabr. Exigua herba eft hoc Centaurium minus, caulicnloafibrgitangulofo, dodrantemautpedem alto: folio Hyperici Perfbratadifli **forma** & magnitudine: fiores in fummis virgulis e puniceo colore in purpuram rubent, Lychnidis fativi floribus minores, qui interdiu& exorto fole patent, Tub vefperamvero **redadnntar**: hos **capfdz** lequunturexiguacoblonga:, granoTriticiilmiles, inquibus iingul is femina minutinimaconcinentur: radix **fabeftdnra**, parva, nullius ufus, pofl femina macurata. Loca amat herbofa^aratro non profciffa, aliquanciutm, fed non omnino, rigua. In **Italia,Gallia, Germa-nia**, Anglia Betgioaefatiafrequens. Julioac Augufto uniicum Horibus6fcapfulisfeminalibuslegicur. Flos commuiiiter puniceo colore in purpura rubec, alicjuando albus eft, rarius ferraginei coloris,. Variat etiam rations foli Thcopfirafto hift. 5. monentc, in humidis cnim altius excrefcit, inariclia vix ttuas aut tics uncias xtjir.ir-

^.*u^fl^Hr/ampiirpiircum* minimum, nob'is. Cauls biuncialcs vtl criuncialcs ramattm **fert** hocCencaurium minimum: florespur*pureos, minimos, pentapetalos: capfulas feminalcs, minores& ieminamukacxilia, Centaurii vulgarisminorisrubrimodo. In humidis circa itagna ilhte **exficcata** locisitidcmprovenic. riorencem obfervavimus vix uncialcm aut biuncialcm vcrius finem Augufti, atque itidem capfulis **faninalibos** onuthim.

l.CttUituum minus fpicatum, C. B. P. Prod. & Match", cd- Bauh. Ex radice parva, alba , brola,cauliscxfurgirinplurimostamulospalmars & fefqui pal marts, friatos divide : ioii-mi: parva,ptdculiscarcncia,quorum prima (en inferiora funtlata, rubrocunda,Iuptrioi3 angutta,acnnunata quaadoque **bina,ad<rfo*ku** caulem amplexantiajloris albi, oblongis calycibus innixi,ab inio larfum vtrfus per caulem Inarfi,fineuli, utplutumum, exuna caulis parcc fibiinv-

patentes e **T** ^{Uurt} *sculptor non recte expreflit : floribus evanefcentibus fingulis fuccedunt fingula capfula, o. L. agz, semen minutam, ut in vulgari, continentes. In montibus Euganeis Patavinorum & hinc inde circa Montepellum reperitur monente Casp. Bauhino in Matthiolo fuz editionis.*

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Magni multique ufus eft Centaurium minus rubrum. Herba ipfa contufa & impofita vulnera glutinat, vetera ulcera purgat & ad cicatricem perducit. Decolla eadem & pota bilem humoresque crasses

ntles, palmo minores, aut aliquando equates emergunt, quos utrinque ambiunt folia vulgaris
 ibrma, propemodum rotunda, fed parva & plus quam decuplo minorum, quorum nonnulla leviter
 fimbriata: ex horum finu pediculi tenues, oblongi prodeunt, quorum /inguli florem purpura-
 centem, parvum, oblongum, quinque petalis constantem, fimbriatis in medio brevibus, fu-
 nt: hinc fuscit capitulum parvum, apice donatum, minutissimum femine continens.
 Hæc in humidis plurimis locis, prope *Cafielnovum*, non longe Monspelio diffunditur, & passim
 in palustribus Gallicæ & Angliæ. Floret eodem tempore cum priore, aliquando tardius.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Secundi aut tertii ordinis efficcantium esse herbarum vaporibus gustu admodum aflringens ostendit:
 ejus vero is fitul modice refrigerans: is hincjionsiy folia trita & impofita, vulnera (\$ qu<z-
 vh ulcera glutinare vahnt: eadem cum vino fumpady fenterias, ventriculi imbecillitates fluxusque.
 ac humiditates fanant. Conducunt is ad fanguinis refluxiones profluviam mulierum, i& ad-
 omnia interaneorum vulnera is ukera, poti/Jimumpulmonum. Vinum in quo herbarum hujusmodi ad-
 cofa, ukeribus fumme corifert, fi hoc laventur is abfiergantur: folia cataplasmatik ritu illita
 ulcerum a putredine juvant aut bore Fuchfio. Sed is fuccus quoque foliorum is herba ipfa illita
 recentia vulnera glutinat. Vrdzctyuum ejus vim esse dixit Matthiolus, adverfus puerorum ente-
 rocelct6n cum illita, turn pulvere haufila.

DE PENTAPETALIS

Capulis in medio tranfverfim horizontaliter fedlis.

CATV XXIV.

A. N. A. G. A. L. L. I. S.

A NAGALLIS Viofcoridi l. 2. c. 209. Anagallida aliqui Corchorum vocant, Plinio l. 25. c. 13.
 Genera duo Viofcoridi is Plinio, {lore tamen distantia: quæ ctruleo efl flore, femina: quæ
 phceniceo, mas ifdem dicitur.

Anagallk est planta pentapetala capulis rotundis in medio tranfverfim horizontaliter fe&is
 adinfar duarum bullarum margine tenus jun&arum, in quarum medio est filius nutritivus, ro-
 tundus, à quo circulariter nutriuntur plurima femina, mjnuta, fubrufta, matura. Anagallis
 est vel annuaeque duplex, mas flore phceniceo, femina flore casruleo (major quas est latifolia
 vel angustifolia & minima feu pufilla casrulea:) veleftperennis flore luteo, nemorofa difta.

Pars TABULE XXVI. Seaionis quintae.

Anagallk	Flora	C*ruko	1. Phceniceo, CBJ?. Cam. AnagallU phoenicea mas, Ad. Icon. obj. Lob. l. B. Chabr. Anagallk mat, Dod. Ger. \$
			2. CB P. Anagallk femina, Trag. MattL Fuch. Dod. Tur. Lugd. C Alb\$ Ger. <Flora > (Purpureo. £
			3. Folik bink ternifve geniculæ ex advtrfo nascentibus, C. B-P. I Anagallk tenuifolia MonelU, Cluf. Hifi. App. Alt era Anagal- } Ik tenuifolia, Ger. \$
			4. Pufilla feu omnium minima, nobk. £ Luteo nemorum, C. B. P. Anagallk lutea, Ad. Lob. Lugd. fab. Ger. Ana- gallts lutea flavoflore, Cluf. Hifi. 0

Explicatio partk Tab. -vigefim& fixu Setlionk quinU.

1. \ A W/J5 flore phceniceo, C. B. P. Cam. Anagallis phcenicea mas, Ad. Icon. Lob. J.
 JHLB. Chabr. Anagallis phcenicea, Tab. Anagallis mas, Dod. Ger. Anagallis floribus
 phceniceis obfokte purpums & carneis, Park. Anagallis Alfici) fimilitudine refert. Can-
 liculi

licui ejus triangulares aliquando fed frequentius quadrangulares , qui non attolluntur fed per terram fparii jacēt: quibus pauca parvulaque folia acuminata, non toto ambitu rotunda, fuperna parte virent, averfa vero exiguis nigricantibus pun&ulis notantur: flores in tenuibus pediculis, oblongis, è finibus inter folia & caules exeuntibus, aut puniceo colore rubentes aut obfoleto purpurei, aut albi caerulei, pentapetali: quibus fingulis tuccedunt capfulse finpull, rotundae infar feminis Coriandri, quæ bifariam mature & exficcatae tranverfim horizontaliter fecantur ; atque in finguis plurima femina, minuta, iubruffa, continentur cingentia ftilum nutritivum, rotundum: radix tenuibus fibris confat. In arvis juxta femitas & in hortis ac vineis non raro utraque cum mas, tum femina prodit, frequentius tamen flore rubente. Totaseftate potiffimum tamea Auguttomenfe florem fert.

2. *Anasallis* flore caeruleo, C.B.F. Anagallis kmna, Trag. Matth. Fuch. Dod. Tur. Lugd. Ger.' Ab Ana2;alHde phoeniceo flore neutiquam ettigie diverfa eft, fed duntaxat colore.

2 *Anamllk* cxrulea foliis binis ternifve geniculis ex adverfo nafcentibus, C. B. P. Anagallis tenuifolia Monelli, Cluf. Hift. App. altera. "Anagallis tenuifolia, Ger. Aaagallis tennifolia flore cavneo, Park. Hæc plures ramulos ab eadeni radice fpargit, pedalis longitudinis, quadrangulos, utpraeditse Anagallides, quideinceps alios minores à latere procreant, cinctos per intervalla longiufculis & anguftioribus foliis quam prxdiftas Anagallidis folia & ad Gratiolae Miorum forrum plnrimum accedentibus, atque ex adverfo eidem geniculo femper adhxrentibus, ut plurimum binis numero interdum etiam ternis, raro pluribus, iifque aliquando ineodem ramulo; equorum alismagna ex parte totidem petioli, quot folia, cauliculos per intervalla fimul ambiunt, fummo fastigo fuftinentes flores quinis petalis constantes, colons cxrulei, umbilico tamen purpurafcente & phoeniceis fioribus majores, e quibus exiliunt exigua ftaminula, ut in prsdiftis. Abunde flores profert, & plerumque toto trimestri ipatio: flonbus fuccedunt orbiculata vaicula utinaliis fupradidis Anagallidum fpeciebus, familia etiam femina continentia, quibus deciduis fequente anno novæ plants generantur. Annuæ feu æftivalis duntaxat eft planta. Semen Gadibus accepit Johannes Monellus Tornacenfis, atque idem Carolo Clufi communicavit anno 1602.

A, *Anagallis* pufilla feu omnium minima, nobis. Flanta eft hæc minima, vix biuncialis, in humidis fecundolapide ab urbe Bkfis proveniens ; flofculos gerit casruleos, vulgaris Anagallidis triple minores: capfulas feminales & pariter femina multo minora.

t *Anwallv* luteanorum. C.B.P. Anagallis lutea, Ad.Lob.Lugd. Tab. Ger. Anagallis lutea flavS flore, Cluf. Hift. Anagallis lutea Numulariz fimilis, J. B. Chabr. _ Dodrantales, funthuic r2muti,-rubentes,teneri, fuccipleni, humi fparsi, in quibus multaolta^ Anagallidis phoeniceo flore foliis niajora, binafemperinterfeoppofita, acidiufculi iapons: exalis prodeunt flores Anagallidis vulgaris floribus formâ fimiles, fed majores, quinis petalis constantes, flavo colore pr^diti: capitula rotunda deinde turgentia, Anagallrdis vulgaris capitulorum irmula, minora tamen, femina etiam non diffimile : tenui & late ferpente eft radice, quinemmpifiramulihrimi fparsi fibras agunt: ideo difficulter femina ad maturitatem perducunt.Nafcitur in *Hogebergin* fummo fere jugo inter arbore^ & in aliis montium *Etcher Dureftain* vicinifque jngis: nos fatis frequenter in locis opacis & umbrosis per Galliam florentem oflendimus menie Julio & Augufto, raro femina maturefcit.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Habet Anagallis defucandivim citramordacitatem, nonnihilquoque coloris & quandamtrahm di facuhfitem, adeo ut infixâ corpori extrahat, author Galenu. Diofcorides ait, utramque AnaaUiem mar em fcilice t isr feminam mitigandi vim habere, inflammations arcere, adaclos corpori nculos extrahere is nmasçohibere, fuccum item cafutgargarifaturn purgare, naribu* infitfum dentium dolores lenire, ft in adverfam narem injiciatur: retuf* oculorum aciei auxiliari is aema cum mel/c purgare: contra viper arum morfus infervire; jecinoris ac renum vitia reprimere, Cæx vino bibatur. Quidam mulier LutetU aqua Iphocnicea Anagallide diftiUata multos fufufione I borantes curavit. Poteft autem diftillari, tefte Holerio, cum melk. Verum fuccuscummelleper mfius is infillatusidefficaciu* prsftaret; nam aqu* diftillaU nihil fere aliud funt quam infipidum pkylegma, parumque au: nihil de vinbus plant arum unde extrahuntur, in fe continent.*

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Altorumque Authorum.

P Ag. ifz. cot. UfrL t. AnagaUk aquatica major (ohofibrotunda, C. B. P. Anagailnfeu Becabnn-ga, Oer. Ibidem col- 2. pi. u. Anagall's aquatics minor folio fubrotundo, C. B. P. Anagallit aquatica minor fiore pallido > Ger. Ibidem pi. It I. Alia-ftttSaaquatica majorfolio ebloti, ^e, C.B.I^- Anagallit\$ aquatica, Ctr. Strata major, 'tab. Ibidem pi. IV. .ttiavallh aquatica minor folio ohlongo, C.B.P. J'ta^aHis aquatica minor, Gf. Ibidempt.x. Ana-guils aquatica foliis Puteгии Serjtillive* C.B.P. \$*umaltcrum (3 Anagalla Aquatic a it* ag. Ibiitnpl. vi. slhagaUii aquatica folio non creuato, C.B^P. AM^aliis aquatha tertia, Lot. & aquatica altera, hl&.Lurd. lbidetffpl. vii. Anagalluaquaticaan-gufifolia\C-B-P< JnagaUii aquatic* 4. Lob. lew.

Ibidem AiiagaUis aquatica angujlifolia fnttUata, C. B- P. S Prod. Omnei _ his planta cum jhres gerant tetrapetalos fticulafqut bicapfilaris hngitudinaltter* in bina locutamenta fetitu Veromcarum more, proculdubio fant receu/entic pro Veronicis a-quitticis, non eitim futtt Anagallidti ratiocinanda Cxitbronatura-yCtim Anagalhs proprie loquendo fit ptanta pmlapHala cujns capfua eft rotunditia media fpantt fcje aperiens tranfverfim bar\ontaliter fine fepto media djhrminante dupijeem fciam femi-1111 m ergo omnei pradifia planta neutiquam Anagal-tides aquatics dicndafn'jjent CajbaraBatihino aliiif- qut Authoribiu. Vide pag. 32j, hujts Hsjh rrie, ubi dijf: ifins dt bac Haltucinatioiu eginw.

DE PENTAPETALIS

Capfulis per medium -tranfverfim horizontaliter fedis donatis.

P O R T U L A C A.

ANVA?" &i*» ipfa PortuUca Viofccridili.c^S^0- cut genera dm, Andrachm, i\$ An-tfaubnefilvepkfla*folihejicraffioribus atque de?ifis, bipetrojis nnftiur: aliquando inher-it* folih Ole<£7 fed minoribusntdq, vtrum phribus (sr tenerU: caulicuh rubicundijfqum-tihuts, hi terraininclinatit i\$rd. i Attkofp Tdftn A^Atu, herbam \caufcf FEditarum 10. lsr 4. ejufdem 3. cxhibct; dein AM&.%UH arborem l. Hifi. 8. iff 15. 4- &\$•4- Portutacam GazpTtd-dit. Perum Plint as Li?c. 20. jefibit Fortttlacm qttam Pepkon vocat, non multum fativa effica-cbrtmefk: ubi Portulacam cum Peplio berba diverffiffima confundit: caufaerroris^ quodallqiii Pe-plion Portulacam aertftan vocarint: confundit etiam vires fik/eftrk zumfativx Porni/ac* vtiibia.

PoTitiaca eft pfanta pencapecala capfulas producers oblongas, gr;mi hordii majores,pti me-dium tranfverfim horizoncaliter fcttas; **folia** crafia, fucculenta atque pingua. Propter analogkim Portubcae in fine ultimo, id eft in numeio pecalorum & capfulis conformibus cum **capfofis** Anagallidis, eandem Anagallidi fiibjuximiis, & quicanque Anagallidem Foliis fpiffis, craflls, fucculentisdonatam pvonunciaveric, eidenidabimusmanus: utcunquemelius hie difponicur à fine ultimo quam a foliorum CpiiTitudine aut fucculentia cumSedo Telephioque, ut fecerc Cafp. Bauhinus aliique authores qui **Hiftonas** generales nobis exhibuerc. Vide ejufdem Icones in Appendice hujus Sefcionis. •*

T A B U L A Pomilaca* in Appendice Sefcionis quintis.

1. Latifolia feu fativa ••••• (Viridibus, nobis. Portulaca fativa, Dod. Park- \$
 C (Flavis) nobii. ?
 Portulaca } 2. Anguflidia feafdvfirhC & P. Pcutulaca filvefiris7 Trag. Matlj. Tub. Dad.
 ut. A.J. Lob. lugd. Gtr. Park. ?
 13 • Minima flort albo, nobis. \$

Explicatio Portulacain Apptndice Sefcionis quint*.

Portulaca lacifolia feufativa, C.B.P. Portulacafativa, Dod. Park. Portulacafiorten-fis, Trag. Fucli, Dod. Gall. Gefn. **Hort** Portubca domeftica, Mauth. Ad. Lob. Ger. Porculaca latioribus foliis, Of. **Sathrsehuius** fen Portulaca! domefticae caules non raro do-dranrales, pedalesnonnunquam 5f **infolofertili** longiores, rcretts, cralli, fubrubes, iuc-culenti, bves, rerplendeiites, per terramjhati, in alasquafdarndiftribuuntur: folia uncialis & relqiiiDnciaJislongitudinis, hiciufcula, cratTajpingua, lucculenta^glabrajvirentia, inttdum in hoicrs flava, a tergoalbidiora: Hofculiminuti, pallide lutei/pencipccali ad .innexum fo-liorum

liorum cum caulibus gignuntur, exiguis aut parvis pediculis innitentes: fuccedente capitulo exi?uo, t>blongo, granoHordei paulo majore, per medium tranfverfim horizontaliter fe&o, herbacei ac virentis colons; incujus gremiocirca filunTiuttftivum, capfulae fuperiore parte decidua, conipiciuntur plurima femina, pufilla, nigra: radix fibras habet. fatifcarTas.

2. [^]Portulaca anguftifolia fivefilveftris, C. B. P. Portulaca filveftris, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut. Ad. Lob. Lugd. Ger. Park. Portulaca arvenfis, Tab. Portulaca fponte nafcens, Cord. Hife. Portulaca minor, Gefn.Hort. Cam. Portulaca filveftris minor feufpontanea, J.B.Chabr. Pafsim in hortis & vineis per Galliam nafcitur fpontanea & filveftris Portulaca, multis numeris minor quam fativa prior, tota caulibus fuis terra appreffa, nechumo furgens: radice eft craffiufulca ficut & ramis fucculentis, multifidis: folia ungui digiti minimi fere paria, fucculenta, craifa, pariter atrovirentia: flores pufilli, lutei, pentapepli, in medio mnfcofi: quibus fingulis fingula; capfnk (uccedunt, oblongs, per mediuum tranfverfim horizontaliter feftx: quibus ablatis aut fponte cadentibus confpiciuntur plurima, pufilla femina, nigra, circaftilum nutritivum. Huc pertinet Portulaca' arvenfis, C. B. P.' Portulat'aexigua, Cam. qux mihi videtur varietas prioris in ftenliore folo nafcens.

3. Portulaca minima flore albo, nobis. Hæc plantulaeftuncialis autbiuncialis: inhumidīs arvis ineunte Vere foliola fpiTa fatis pro exiguitate plants per terram frata producit, exigua, anfufta: fljbfculos ad nodos producit albos, pentapetalos, menfe Martio & Aprili; quibus deciduis fuccedunt minutila femina Portulaca feminibus omnino conformia & nigra itidem. Vide Icones harum in Appendice hujus Se&ionis.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Povtulacai/l/; habet, ut author eft Diofcorides, aft riftoriam^{n*} ^ ^ T T ^ V refrigeratoⁿam[^]Lob. Impofita cum poknta cumcaptU, tumoculorum doloribus, ac CdHrh quoque inflammationibus, itemque ftomacbi ardoribus & eryfipelatis ac vefic<e denique cruciatibus auxilioeft. Succus condmfatus cumgummi Tragachanth*. ty Arabicopulverifatk iy in pilulas redatlus plurimum confer t in urina cruenta. Pro cibo porro fumptadentium ftuporem iy ftomacbi ac intefiinorum & luationan fluxionemque demulcet. Erofione teniatos renesisvfefecamadjuvat, acveneris impetus exfolvit; funili effecluprodeftejutfuccu* epolut, etiam in febribus efficac: valet is dm multumquz cofta. contra teretes lumbncos, cruentam etiam excreationem ac dyfenteriam: itemque ad h<zmorrhoidas is? fanguinis eruptiones nee non adverfu-s fepts morfus, oculorum medicamentk utiXitex admifcetur, ac intefiinorum flux'Sfye labor-antibu*, erofifve vulvk infunditur; quiniy ad capitis dolores abftu ortos cum rofaceo aut fimplici oko irrigatur, eminentes quoque in capite papulas cum vino extent. Vulneribu* denique, qu<z ad fyderationemfl>eBant, cum polenta imponitur. Vide coeteras vires apudJohannemBauhinumpag. 679. & Vodorixumpag. 661,

DEPENTAPETALIS

Capfulis plunbus loculamentis donatis.

C AT V T XXVI.

L I N I I M

iox Vio/coridilib.2.c. 125. Theophr.S. Bft. y,qui^ cauf 21. in Lolium tnutari fcritbit7 [quod eft falsum] Linum Plinio l, 19. c. 1. cujtts genera ratione loci natalitiirecenfet. [^]Linum eftplantapentapetala capfulis pluribus artefibi adhuc viridibus junftis donata. Eft habita rationefoliorum, veilatifolium, velanguftifolium: ratione durations, eft vel annuum, vel perenne: ratione colorumflorum, eft vel flore omileo violaceove, rubro, albo & luteo: **eftque vel foliis glabris, vel hirsutis; denique vel fativum vel fihneftre.**

Pars TABULJE XXVI.

Linum	Latifolium	Perenne. <	Annuum C£jukum	1. Sativuir, nobis. <i>Linum fativum</i> , CB.P. Trng. Dod. <i>Lwum vulgare c<erukum</i> , Ad. Lob. g	
				2. Arvenfe: feu inter Avenam^ nobis. <i>Linum filvefire</i> , Trag. Tur. £	
				^Majttt <i>Ceruleum capitulo majore</i> , nobit. ©	
				4. Minus <i>Caeruleum capuulominore</i> , nobis. 0	
				Hirfutum	z. C<ieruleum, nobis. <i>Linum filvefire latifohum birfutum c&rukum^ C.B.P. Linum filvefire i. Cluf. Hift. 0</i>
					i. Candidum *>urpureis venk dijiinfium^ nobit. <i>Linum filvefire latifohum^ .Cluf. Hift. 0</i>
				Glabrum luteum	7. frr.vr.tm fruticcum, nobis. <i>Linum fruticofum n'we urn? C.&P. Linum fruticofum 7. Cluf. Hift 0</i>
					fS. <i>Cretum arboreum</i> , nobis. <i>Linum aTDOfe-um</i> , Profp. Alpin. de Exot. 0
				Annuum lutium folioi	y. <i>tiarbonenfe five maritimum^ nobis. num. filvefire</i> , Mattb. Dod. Qi
					1 o. <i>Pannonicum</i> , nobis. <i>Linum filvefire Fan- nonitum. Tab. 0</i>
	it. <i>Ad fingula genitula floridum</i> , nobis. <i>Linum luteum filvefire latifolium</i> , Col. 0				
	C12. <i>Latiore</i> , nobis. <£				
	(13. <i>Anguftiore</i> , nobis. 5				
Anguoolium	Folios	Silvefire r	Annuum lutium folioi	"x^Floremagno^C.B.P. <i>Linum filvefire 5. anguftifelum 2. Cluf. Hift. Linum fil-CCderuleum</i> , nobis. t)	
				vestre 3. Dod. Tab A <i>Album qu'inque petalis purpureis li- nets difiinfis</i> , nobis. Q	
				5* F/oribus dilute purpurafcentibus velcarnk% nobis. 0	
				^iB. <i>Rartoubus-</i> , C.B.P. <i>Linum filvefire tenuifolium ></i>	
				I Ger. W	
				1 17. <i>Anguftis isr denfioribus^ C.B.P. Linum filvefire J fore cfruteo. Cam. Ep. Eyft- O</i>	
				iS. <i>Cbamalinum</i> , Cluf Hift. <i>Cham^linum</i> , Lob. Lugd. §	
				I <i>Albumminas^K). Catburticum^Ger. Linumpratevfeflofculisexigukan-</i>	
				L <i>Jkantibus</i> , C.B.P. §	

§. r. LfNVM LATIFOLIVM.

Explicatio partis Tab, vigfim^ fext <£ Seftionis quintis.

1 • I *humfativum**, C, B, P. Trag. Dod. *Linum viilgare cacruleum*, Ad. Lob. *Linum*, Matth. -L/Fucli. Cord. in Diofc. Tur. Cif. Lugd. *Tenuibus ac rotundts caulibus fci? virgh aiurgit Linum hoc fativum* : fojia ei oblonga, angufta, acuminata: flores in. fumnis ramis (peciofi, colore carulti, pentapetali, quorum fingula pctala funt fubrotunda aim ftominulis prominentibus in eorum medio. - hilcecvanidis fuccedunt parva, rotunda, orbiculata capitula five vacula, in plura loculamenta diftinfta, in quorum (ingulis plurima cernuntur femina oblonga, coniprclia, Uicitta^ in medto tumichi, ex lulyocolore punicantia: radicibus nititur exiliwoiis. Pingui ktoque folo, locis Kumilioribus & non ficentibus felicibus provenic. PingHiihum, uc Columella ai, f_o_him & modice humidum pofcit. Aliqui, inquit Palladius, macro folo rpinum ferunt, ita afti^uicur at *Linum* fubtitc nafcatur. Plinius fcribit feri in locis iabulofis, maxime uno fitlco, nec magi, feftinare aliud, urereque agrum & dejeriorem ipfum taccre, qnod & Virgilius in Georgicis teftatur,

Vrit *Linicampum* fefts, urit *Avens*,

Vrunt *Utbd* perfufa *papavera* fomno.

Seiitur

Seritur Linum Vere, Maio & Juniomenfibus floret post messem Plinius lib. XIX. cap. I. virg. iofae merguntur in aquam putridam, iole tepesfactam, per octiduum pondere aequo depreffe, maceratas esse indicio est membranalarior, iterumque inverfs ut prius sole ficcantur, mox arefactein faxotunduntur malleoftupario^iuodproximum corticifuitftupa appellatur detenoris Tini lucernarum fere hminibus aptior.

2 Huepertinet tnum arvenfe, C. B. P. Linum filveftre, Trag., Tur. Caulibus & capfulis feminalibus craffioribus & fecitoad folempoft maturitatem apenentibus a pnore iatrvo lo- Inmmodo differt, & inter Avenam vulgoreperitur.

3. Linum perenne majus caeruleum capitulo majore, nobis. Hoc a pradiftis facile diffinuitur primò floribus & capfulis majoribus; fecundoduratione, est enim perenne.

TTinum peenne minus caeruleum capitulo minore, nobis. Hoc caules fumgit non redos, rWrii« dedreclinantes: folia fu* t jnguftiora: flares & capitula quadruplo. immora caputXpraec'edentis: in hoc convenit utrumque quod fit perenne, & hifce notis 3« & 4^m - fa - *i - ^ mo & .2^ . diffinguuntur, atque jaterle magnitudine & parvitate.

Tihum filveftre latifolium hirtutum ca^ukum, C. B. P. Linum filveftre latifolium, Lob. T on ^ Linum filveftre i. Cluf. Hift. Ex radice craffiufcula & can3icante unicum, interdum Cure's fert caules, modopedali, interdum¹ majore altitudine affurgentes, craffos, 5 rmos, hirtutos (uperiore parte in plures ramos divifos: folia qua? eos ambiunt reliquis fux iortismaiora vend? hirtuta, Jnimum digitum lata, gummofo guftu, deinde amaricante: ranmli ab infimo ad fumram floribus quinque petalis conftantibus onufti, omnium maximis, Malvavulgaris fere aemulis, caeruleicolaris, aut vegetioris aut dilutioris, cum quumque internis ftaminulis Lcem habentibus: quibus fuccedunt capitula dura, mucronata, quinque tolius five apophyfibus comprehenfa, & quafi calyce involuta; pr^difta capitula in varia loculamenta fepahntur qu* maturitate hiant, feminaque in fingulis continent fati?i Dm femibus fimil. a, 1 a n nLn cantia, fplendentia: radix perennis est feuvivax, fingulis annis repullulans, caulibus quæet. amantehyemem proferens tenellos, foliis multa lanugine hirtutis onuftos. Floret Junio ac Julio, femina maturum est Augufto. Frequens est multis Pannonis fupenons & Auftriae inferioris locis editioribus & ficcioribus, gramineis tamen, ut apud Polonium, & Feronellam quæ veterum Carnuntum creditur.

A Linum filveftre latifolium hirtutum candidum purpureis venis diffinftum, C. B. P. Linum n pftrehtifolium, Cluf. Hift. Linum filveftre latifolium foliis hirtutis Tithymali heliofcopn, T Id Hoc pedales, graciles, lanuginofos, quaternos, quinos ab una radice prom. t caules, in quibus Lini latiuscula folia trinervia ad Afcyri formam fere accedentia, nee multum a pnoris f r ^ ifrr ^ nantia hne inofa: extremi cauliculi in binos aut ternos ramufculos divifi & He ^ ^ ^ ^ n ^ o l r t * circumflexi, pleni funt floribus qui bimo aperiri inc3 Lini florum d f vifura Jed majoribus, fuperiori fere squallibus, candidis, quos multt purpures vens interfcindunt: femina & capitula in quibus continentur, prioris Limiimilia: radix perennis est, craffiufcula, longa, candicans, raris fibris circumlepta. Apud Colibnum Lufitaniae urbem. Conymbra diftam, celebri Academia clarum. Hanc Lini fpeciem duntaxat meminir far Ciufius ad defertum quoddam & folitarium templum menfe Novembri repullulantem repèriffè & in illius anni cauculis femina colleam in Belgium attulit, quo terr* commhTo u Sp i a n t a nata est cubitalem excedens altitudinem, latioribus quam natali foliis, on* fineulis annis fub zftatis finem quidem floruit, fed nullum iemen præsbit.

7 li«K» ifruticofum niveum, C. B. P. Linum fruticofum 7. Cluf. Hift. Linum filveftre 2. fl. albr Lu?d. Dodrantalibus pedibusque fere exit cauculis, femper virentibus, quos e r o f a f o l i a ° exornant mediae inter Thymi & Piyllii folia magnitudinis, fubalbida: flores T ^ d e fuperioris oculo majores, quinque petalis ut illic conftantes, omnino nivei, fummisra infident: quibus fuccedunt capitula multis loculamentis divifa, in quibus fingulis m u b n t u r femina aliorum Linorum more: radix dura & lignola est. Exit quibusdam decontine filvaru^ locis fole iUufracis- Floret Junio & Julio, atque fubinde femina profert, in fatum tertio duntaxat a fatu anno ferius floruit, nee femina tulit.

Linum filveftre Creticum arboreum luteum, nobis. Linum arboreum Profper Alpin. de R ^ n i u m plantae Cretic^ pro Lino arborico accepit Profper Alpinus, eo nomine ita vo- Exot. h ^ a , o r i l i y ^ f r u t i b u s & omnium maxime feminibus, quæ magnitudine, figura & colore catum a n L ^ ^ m i n i i) l l s familia ut vix difcerni poffint ab ipfis. Planta est arborefcens quafi, funt ^ e o g o b l i q u e a f t i s , g r a c i l i b u s , r o t u n d i s , c o r t i c e n i g r i s : f o l i i s L i n i f a t i v i f e d l a t i o ^ c o n f t a n s r a t n i r - : ' o l i a m a j o r ' a c c e d a n t , d e n f i s & u n d i q u e r a m o s c o n t e g e n t i b u s : i n c a c u m i n e r i b u s , u t a d N i y r t i l • E e e e ? p r o -

producti flores ilavi, pentaptali, & tosiculi n... apiulares fuis pediculis finguli adlix-
rentes, fa pore valde atngto: capfulx magnitudine rum viluntur, atque ilgura pyramidali
contantes extrorum Linorum modo, isma in d... istoculamentis continentes Lini fativi
feminibus omnino familia. Vrovenitin Creca Inful... lorer. sftate atque eadem durance fe-
mina fiii perficit.

9. *Linum* maritimum luteum, C. B. P. *Linum* n... re, Matth. Dod. Lugd. Cam. *Linum*
maritimum luteum, Ad. Lob. *Linum* Narbonense, Lob. Icon. Ab una radice caules affur-
gunt plures cubitales, qui superius in ramulos dividuntur, per quos folia mollicella, laufcula,
breviora quam Lini fativi, infipida: flores extremis harrent ramulis Lini, fed colons lutci,
amrjicantes; quibus evanidis succedunt capitula minora mlto quam Lini fativi capita, fatis
amara, femina aliorum fuf fortis more contiuentia. !... rocul a mari in pratis ac herbofis
locis in Gallia Narbonenfi juxta prata - St litora l'herbkt... Naibonenfis, ac in rtr ftagnum
At Ferrou. & mare fruticat pedalibus & fequipalibus ra...; >, ref[is, pumerofis, gracilioribus paucio*
ribusque Lini vulgnris foliis & Lentis. Junio ac juttu femine & "pericarpis minoribus multo
lativi cernitur.

io, *Linum* filveftrifolium luteum, C. B. P. *Linum* filveitrc 3. Cluf. Hilt. *Linum* filve-
ftrc l'annotictim Tab. Multos etiam ex una radice *Linum* hoc luteum rer. caules vulgaris fi-
miles, plerumque mmen breviores, Hypericinon valdedillimilcs, aliquantulum rubentes, fir-
mos, maiuiciliis tolilslatiufculifque & crafiufcutis, 3^o. Clufii terepaiibus, nofl birfutia ta-
men (eddurioribus leptos, perquam amari faporis: Mores in fummis caulibus copiofbs mag-
nos quiiique cti; impicalis coiiftantes, perelegantis Havi colons, qtiinque etiam itaminibus
t medio prorumpentibus, & c tot idem gradlionbus brevioribusque villis: femina in conic-
fioribus capitulis, paulo minoribus reliquorum capitulis, nigricans, fed non ipkiultn. m l
liquorum femina: radix fnc crefcit crafl'afed contorta, albicans, aliquot fibris donata,
annis repullulans novofqut^l caules producens. Exit abunde in monce Badenfibus
chennis imminente, in locis item ad filulam Licbn pago vicinam cum alitjuocallis fpeciebus.
Floret §< frmen profert cum 2*^o. lantolio hirfuto caeruleo.

11. *Linum* luteum ad fingtilagenicula iloridum, nobis. *Linum* luteum filveftr latifolium
Col. Hyemali gaudet tempore *Linum* lioc in pratensibus, ex argillofa humentique tellure erutum
eft Decembri mense: radice nititur lignofe, parva, intorca, ramis pluribus ex caudice in fimmo
trifidis, & duorum digitorum intrftitio, exgeniculis prodeuntibus roliis; ac in fngulis ge-
niculis florem habet luteum, cui lucediccapfuia in plurimascellulas divifa, utin catteris iux
fortis, cui etiam femina comprefum, lucidum feu nitidum, lufcum, amaro par um fapor:
tios & fructus quinquifoliati infident ball exiguis & angui Vis loliolis conftrux. Scmine ex
AfrenfibulftoTi-oniae fata planta extit, quae flores & femina a fare perficit. Folia in imo
cxigua, Si per catilctii fmpcr majora & c Lino duplu Utiora in nxnla porien^ftniper ad cacumtn
ufqut deertfeentia & minora anguftioraque.

12, & 13. *Limim* minus luteum nmmium tolio laciore Sr aliud folio anguiflore, nobis.
Utraque hsc fpecies vix palmarem ant ad fumum tlodrantalem excedit alcirudinem, flo(culos
fert utraque luteos, pentapetalos, capfihs feminales caeterorum capfulis confewmes, Tcminaque
ibidem contenta paria fed minora, folohoc difcrimine intercedente quod unius folia fine la-
tiora, alterius anguftiora. Ltraque fpecies fonte crefcicin filvishomidis circa BlaclJs.

§.2. LINUM SILVESIRE.

14. *Z. ifl* < flrl lvefre auguftifolium flore magno, C. B. P. *Linum* filveftr 5. anguftilbium 2.
Claf. Hift. *Limimangu* Uifoiium fi Jveitrc 3- Dod. Tab. Cam. ep. Dodrantes, nonnunquam
pedales, habet hie fpecies Lini/ilve Urfcauliculos, graciles, firmos, reflos: folia Linivi Lini
anguftiora, daravmattonat₃₁ virentia, amaricantia/ iiores in lummis cauliculis multos, magnos,
qumque ptta is prxd, tos, nunc cxrulcos, nunc albos, quinq pnpureis lineis diftinaos Toti-
dem fbmmalh & qpinque fepmtis apic. bus ex n>edio umbilico piwlcumibus, odoratos; fe-
menin rotund. s va cul< plur_{mis} locul. mentis diftinfis phnun, n, t, i, ans, fplenden_s fativi
Lmieminil-us hmile: nidicem candicnuff-m rlnr^t*, -1:!. ci J f
r 1
ovos can... i< 1
t. iui. m r ciuram, aliquot nbris donatam, ptrenncm, <
liti Hilis annis n
Aultriz & Pannoniz editioribus locis, atque fecundum publicas vias etiam apud
hdu cum ul, uoc rupc, io, om Linorum fpeciebus. Floret Junio, femina perficit Julio & Au-
gu

mmiionmiliscavoiu&foliomi litate,tenuitace,norumq.; formal dentq; ndke: in riorum dmitaxitcolorc est different! liyei at' .nons non funt^edaerulei, in **candidam** laneucfccnces & qnafi **cioeracei**: ca' i '5 fuccedenna longe amphora f unr, nee **toinoraquarainfattvo. Fbrebatifti** S» ...Jemenextremojalio&meunte Angufto

" i s IWWM {ilveftreangntifolium floribns dilute purpurafcentibns velcarneis, C.B.F. **Linumfilveftre Sineuftoanai** * •**Clmf. Hift.** Huic bins fine vel tern* virguk, dodrantaes, firma: licet valde <raciles, **quas** foiiola Lino lativo multoanguftiora & mmora ambmnt: lumms **vireulitemi** antqnaterni,nonnunquampiures,mfldent floiesuperioris floribtis forma squall & colorc ferme fimiles, fed dilute parpnrcioitcanclidominores, **fetivi Lini floreoi** non mukiiMi exccdcnces : quibus I p i r f n varias celluias diitinfta atque in fingulis (e- **mioa mnltio** minora cor, **lis,canditaas.percnnia taaen.** Harefpec.cs to po- • v ar j c w s obfrvata pr Cbiro nultis abhinc annis **inantenore** Madritiamfilvarparce, nnr lee undo ab urbe **Lutetia** i pide ditt^c, inter **gtamina** loco aperto, & millis arbonbns confito- ibidem a nobis confpefta & { o w ? P TM » ">llibus heiiidisper totamGallianifere, fl^'ns Tulio&femenlubrinemaftatifi^rficiensobfervata fait 30.abhinc annis.

, T / O T nWcftreanguititbliumfoliisrarioribus, C.B.P. Linum filveftre 2. Tab. Lmam **fibreftreicnutfolram**, Ger. Quidupliccm habecejafdem plantx figuram eodem nomine **infigm-** tan Hoc folia habet tenuia, rarius **feennidm** caulemdifpofua,& *hoc* nomine diftinguicur a cjEtrcprsdiftia: florem fert *exruleum*aliquando album.

17 / . » » • filveftre anguftisSc denfioribus foliis, C.B.P- Lmam filveftre ffore CJ- ra l < 1 Cam. ep.Eyft. Linum filveftre 4. anguftitolium **a.Glnf. Hift.** Linum filveftre **ttniafo.** **linm** Lob Icon. Tab. Compiu: es funt hnic cauliculi, terctes, (irmi, pedaliai longitudims, vin- **S f r e ^ S s folofia** Linifitveftris fimilibu^exviridi fobaruleis onuft., fummoht_(gi)0 f f a l 3 r.'mUlosdivifi: quib»mf.dentfloresinttufe «**rdci**, quinque petahs conftantes /**acrvtLinf** florfbos **fmillimi**, *quinquenam inmediolhminuhcoademqie* 2piabus Iparata continences: **femen** in capituliscraffioribus, rotnudis, **Linifattvi** non minoribus, n'tgrum, oblongtim, **planum**, (**ativi** k-minitere par: **radixcandicanscft**,peicnnis, aliquantulumnbroia (dt:)icla^atur in Icone major piftoris diligentia) amariufcali guftus,deinde iuavis, acrimonia: rar^icens in variis circa Viennam Aultriae locs fpontnaicitur, prarfertim ingramineisaccliviratlbis &c jnxta vias. Floret Maio & Junio, inctrdum etiam tora aestare, lemen vero maturefcic verfits eiuidein finem.

18 / *inum angoftifoliam* filveftre minus, C. B. P. Linum filveftre 8- feu Chamzlimim, Cluf. Hift Chamjelinmn, Lob.Lngd. Chamxlinumperpuffillum, Ger. Linum - -puffillum candi- canribus'fl6ribas,Cam. Exili, rot undo, dodran talique aut paulo majorc a c cauliculo 8^ml. liocnarviimLinumClufiifluemadverfofituutinHypericobinaaliqiiandoqii :t-rnaampleftun- cur fotiola, angnffci, Lie via, mucronaca : fijpernus ca ulftiJus in aliquot ramulos (cm per 'Jividi- cur, qui inoblongis pediciilis exiguos flofculos, quinis petalisalbis confhntes prorerunt lu- ce'is incus ftaminulis prsditos: quibiis fuccedunr. parvacapira Lini valculis quoad figuram omninofimiUima, minora tamen, loculamentisfuis variisdirtinfta : in quorum fingulis larcnc femina minuta, pellucida, lubiufla: radix tenuis, aliquo: cxilibus /ibria donata. Annuaf eft plaiua. **Provenitia herbofis** collibiis & moncanis Auftria: atque Pannoniaerocis. Floret Ju- nio& **Jolioatquemenc** Angufto femenuum perficit.

1 a.Linum pratenfe flofculis exiguis, C. B. P- Linum filveftre perpiifillum candienntibus fiori- bus Can'. Linum ffiveftrecathart:aim,Ger. Linocarpos, Thai. Hoc Linum pc-pullllum cathar- ticum oritur a radicibus ttuibus, albis, fibrofis, imortis, quinis aliquando cautibus dodran- liibns ad fummm pedalibus, fubrubrils aliquando, aliquando viridibus, lefe verfus fum- m in quaternos v^rios ramufculos dividendibus, infimis caulibus viridibus: cauliculos am- f lia'bina fibi e legion'e appofita,tenuia, livlu, viridia, Lentisfoliorummagmtudine, edium eorum percurrente: fumms caulium ramufculis imiafcuntur rlofculi albi, pen- nervom (sQ|jrotim|^ ^**qooram** medioftamina apparentlutea, quibusdeciduis i'uecedunt car- rapetali, ^ pluraloculamenta divifa, in qui bus fingulis continctur bina cernave fe- **prcellaioq** **lacia,Jiitida**, oVfubHava. Seminematuroperittotaliter planta,fingulijannis niina, mm ^ ^ ^ ^ provenitcopiofein inculcis & pratis pailim in Gallia, Anglia Belgio. t, mine tele .[i(:u)]|C'Vercgerm inante ex terra pullulat & floret toca lerc xftate, quo tt-m-

FEMPERAMENTUM & VIRES.

I. *Linum fathom*, C. B.P. *Trag. Dod.* *Hujus femine Gal. lib. i. de Aliment. Facult. ait, nullo quidem friv, uti obfonh, cumgaro ncn fecta ac facilio fale utuntur. Utuntur isr cum melle permijcentes quidam vd panibu* ip(um afbergunt. Stomach autem noxium isr concoclu difficile, eximiumque corpori aliment urn exhibet. Quod vero ad vent rkdejeElionem per tine t ipf urn nee probaveris necvituperaverk. Exiguam tamen urin<tmovend<£ habet facult at em, qtttemagh appart, cum frixum fttmitur : tuncaurin ahum quoque magkfittit. Ruftici autem bo- mines eo f<epenumerq, utuntur, frivO tufvqw mel admifcentes. In lib. vero de SimpL medicam, Facult. Lini fmin efum ftatuofum eft, incul^etiamfi frigatur; adeo fane recrementitia ht miditate plenum eft. Eft veroprinoordtne quodammodu iaud*a>\ sr bumiditatis ac ficcitatit in tmdio eft fiium. Quantopere autem flatuofum ac.t.ccrementitia I umiditate plenum femem Lini fit^pauctsabhinc annU Meddelburgi inZelandiaantmadvmipktuit^ cumfrumenti aliarumve frugum inopiam, pkrtquetx civibu*paneisrlikUedxircottvsvescerentur: diflenta enim bkval- de cito hypochondria fuerunt, isr fades alUque paries tumida facia, quorum non pauci ftc nf fecit aim mortui funt. Nequeenim aliunde b&tfymiomata quam ex recremtntitia fentbth bu- miditate, qu& flatukntiam'parit. Lini femem, ut Diofcorides memorise prodidit, eafdem quai Ftnugrscum vim obtinet: difcutit & emollit omnem intwsforifq', infiammaticnem cum melle isf oko exiguaque aqua decoilum aut melle coclum exceptum; cut is in facie vitia, quas ip*Mtt vocant, crudum isr varos cum nitro iy ficubu* imfofitum tollit» cum lixivio vero parotydes duritiafque difcutit: krpates favofque cum vino decofium expurgat, ungues fcabros eximh•, cum pari mo- dico Nafurtii <b mellk, qu<* inpeclore vitiofa, educit; cum melle edypmaii* modo acceptum ttlljim knit. Venerem exlimulat, fipipereis melle acceptum pro placenta hn'iu* afumatur. Huiua decoilum ad interam^rum vulvtqoc eroftones tmmittitur is alvi exciementaeducenda: inieffu ad uteri tnflammationes -veluti F<tnugr*cum perquam utile e/i. Oleum quod ex fndnt ejus exprimitur muhplitem ufumbabet, nee enim a piBoribm atque ftatuariis aliifvt artifti- bws expetitur fdum^vel adluternas tantum utile eft, fed etiam medico ujuimaxime infervit : nami? duritiae omnes mollit, nervortm tetitiones contra&ionefque laxat\ dolores illitum l' pit. Sunt etiam qui bibendum exhibeantlateris aut coli ddort laborntibts^verum recensft opoVti• rancidum etiimfaclum isrnaufeamexcitat, (& plut quam par eft calefacit. Vide c<£tra6 facul- tates Lini apud Simonem Paul't pag.jj^j^daffis fecunda operaquadripartiti.*

9. *Linumpratenfe fhfeulk* exiguit, C. B- P. *LhiumCatharticum*, Ger. Park- Hocpurgativafa- cultate prdtditum eft. Recipe Lini cat barticimanip.j. dum floret {f femntefcere imipit urta cum foliis isr ratice, infundantur tn vim albi faive laElh Vnc. vj. fuper cineres calidai per Tto- ftem,fattacolatura adde fyrupiRofpallidar.Vtic.j.bibaturippurgabit jucunde fatii. Hoc medicamenturi familiare eft Hjbernis, nanttullh etiam Anptis in occtdentali plaga degentibus.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorunyjue Authorum.

1} Az-3'4-c>t. i.gl. ix. Untm jilvcjfrt httutn I fatii'i fabretuntitf, CB.P. *Campanula lutea* U- f. 101 M. d. g. lJf. Jf & fine ultimo, id est, E3 capful* femiuali, *Campanula*°; rrf* male bit #e- eaust inter Lini jptriri a Cajbaro gauhine. Dtuide *Campanula lutra Inufesia LebttHb** rtpetit a Co- fparo Ba*htnt,htcprt Linopai. 114-ttl. I .bl. ii.tf juprapafryi.tot.,. j>r, fapuncuhnt tfti *Campanula-lutt*Uwf*H>* tijft is [yntmym* pnculo & Lino; ergo Cap. Bauhinus oblitus est sui, aufintmultimum hmnstuit diftenert a fine ultimo fputuhti, H>(vitiivm*md>m*m*ibm df th>: QU butufque (rtbcatiiniyui ntrltiitt fintrtt ul- tlimm in dtitminatidn plant if habittr.

Pog. 214. vol. 2. p. 111. Uuttm Jltrjtirt ati£Upl tf aenfiurrlwt feliuifiert minor t, C. B. P. I j no m fit. vtfirt ttnuftiinn, (ier. ihnUmpl. iv, LnumfiL re atititiln filtu rarianoui, C.BJNL>tum filvrfin

Ienutfolium, Gtr. fiiim *Linum* fihtprt ttuifiltMH Ger. ntn pvtijf tijft fyntnymum & Lino filtu an**Jtf dtntfortbiK f\$ tin* ftlih ntntrtbut : tifp iapfiu tji Cajjarut Bauhmus. ladtm prmttrta lien tin mdm- iinar inCtranlo non tmaculate, (itradut pToCha* mlint, btTpuftiit adhibtt lctntm Thlajp-.tt minrtit ytttd jlyfl'um minimum diutur liatecbaniapiainiit- jiona LxfAuntf.

I'ajr. 114. (ol.i.p-Lvi. hiiim minimumjUUatum gavn ;.in S'rotiiamcli ijutbufdam dunur J'aJJiunrt laxatlnmimr. Cum ntt jitrmmfc mffulant ft- ntnahm h>btat i.tn), nso tfftt LiH*mdu [part RoubtHt. Sit f>!*it,i jut ftnttuaut V*] faxatiln minor, aut Un^ua at-j, dutnda, ntnpos *ffc l.mum. infuptr ljnmm fit pUta m*L- tapjutant malt ft/nattr * Cafbar* Baubina tntit Lianiam httmpfitUrim (f Onihrytkbm «ri. ften- fcu Campanulam arvenfem tricapsularem.

DE MOLJENTIB li S

iFlore lierbace nine triangular! donatis,

c AT \r xxvii.

L A P A T H U M .

C Vm Hippolapatbi utriufque radix pro Rs.. in dupk tnplave dofi ufurpetur,

mineprimo loco de Rha?wrbaro five P• -^vticoj q*. ufdam eft ex Lapathigeneribttis ape-
mus. Rhabarbarum Diofi, nbuiff Rbeum^uJM lantum radicem defcribh, di6htm
Nunt. Romank Rhapor \y_k ntufn. Arabibm Raved is Rhabarbarum: cu)u* "neraMe-
tium i, Mekkam. puogdeleTU \pogerepurr • wtkbuufjerit, vaealeftaRchab' rram tnerbttr-
cific'marum, colore minus vai uwsch' ituts odorato, mint& denfum, ac j aculua e minus
folvente. Virumvidtur Diofectdes fuumu. tin Rhabarbarumnofirum, cujwsMi fact m eminit,
fed Rbaponticu, cujas Iconem tobdius propofuit, intelligere,

TABULA XXVIL.SefHonisquintz.

		Ti. Mor.tanum Rhabarbarum offitinarum, nobh. Rha verum antiquo- quorum fier. Rhabarbarum Profp. Alpin, de Exot. Eba iff Rheum
Rotur Jifolium I		Diofcoridk. 0
		2. Alpinum fiu Hippolapat hum five Rhabarbarum monachorum . I Dod. ©
		3. SUveftre Oxylapathum diftum^ nobk. Vrylapathum, Fuck Matth. 0
	Majus	4. Hortenfe feufecundum Diofcoridk^ nobk. Lapathum bor- tuife, Gtfn. Hurt. Lugd. Lapathumjativum, Dod. 0
		5. Aquatum folio cubit ah) nobk. 0
		6. Sanguineum feuruknSi nobk. Lapathum fonguineuvt', Ad. Lob- Cam. Han. G
Lapathum	FO/O acutofe- j	
	lucris lacibus	7. Folio acuto crippo, nob'r Hippolapathum mi- nas^ Hift. Lugd. Gtr. t. Lapithum aqua- tkumminu*, J. B. Cbabr. ^
	Minus aquatum	Z.Fbre aureo nobk. Lapathum ^{4m} w, J.B.Chabr > ©
		(Nobk. Lafathum m. ^uticum , ty Minimum aquatum \ Lob. Ger. Parkj Aquatum minut > C / . B.Chabr'. 0
		\plankisrUvibut folk fubrotundo, nobk. O
		Ti i.Subrotundo. 0
	10. Seminutn invo!ucr\ , , "j	ii.AcutoCbalepenftj ^
	I criats y o l d ^ I ^	Fidium inftar- Lapathum pukhrum Bommkn . J. B. Cbabr. 0
	14. Maritimu'm fxtidum, C.B.P, ty Park 0	

^, 1. L A P A T H V M montanwn rotundifolium.

* Explkatio tab. v'tgefimdt feptimx Sefiionk quint*.

L Abithum priitanriflimiim Rliabarbarum officinamm diflum. nobis. Rha verum an-
rlmiorum Ger Riiabarlnrum , Piofp. Alpin. de Exot. HypH^{a1}jat^{llim} maximum
ThnicumThracicum vcl Rlia barbarum verum, Park. Rha & Rheum Diofcoridis.
Vereprotrudit hoc Lapathum, diftum Rhabarbarum, capac rotundum fu-
cimineui. ~? fa_{ngol}A. lutea, quodexpansum fefe dilarat in plurima folia, paulatim

fefe expllcantia, prirromujtum crifpa&infe con'plicata, fubruba, qu# omnino ddata
 \vvh evzdurit, ampla, Me rotunda, fingula fingmVs Vipedalibus pediculis innitentia, poli-
 cem crafiis, qu2e magnitudinem adepta in folot>ingiii& himienti bipedalem etiam acquirunt
 longitudinem & latitudinem fere parem; colorii*fun:faturatevirentis, guftusacuti: in me-
 clio hujas foliorum *J°. aut 3^<anno protruditur. caulis, craffus, non tam akus quamLapa-
 thihortenfis Patientia dicfi caulis, quem am ple^untur folia minora, rotunda etiam : infum-
 mis caulibus (picatim proveniunt fipres herbase^, exalbidi,quinispetalisconftantes, in limbo
 exteriore mufcofi, herbacei in medio: fingulls floribus deciduis fuccedunt fingula femina
 tñang^ria, fubflava^uffave, tribus foliolis vice capfulx, aliorum Lapathorum more, inclufa ;
 nnde dare conftat effe Lapathi fpc^icm atjn<i ulrimo, imo& ufu prxtantiffimam, proce-
 dente tempore radix grandefcit, multis pi^aginibus inde propendentibus /ornata, colore
 tñi fubrübente extra, intra vero flavefcete: ablato ccifre^& cr.tçnc^& radix apparet fublujea,
 nniltis venis fubrubicundis ipfam percurrentibus. Radix hxc Jilig<inter exficcata, fl^vum
 rciinet coloiem, atque maficata falivam flavo iride^i colore th'git. Nafcitur in agro Sjnenfi
 (\X inde ufque Vsbeken in Turciam, hinc Vr-n^hs defertur. Vel ab Arabibus Tfrcicive
 mercatorib'is cum aliis aromatis mercibusque pretiofis Alexaidriam ufque, & Cairo, Da-
 mafcn-ji & Tripolin in Syria fitam.-delatum, itinere terreftri, quod durabilius & carius. Nunc
 aarem mari navibus advehitur ex China 5f, Mofchovia idque facilis, fed citius corrumpitur.
 Floret apud nos dilate atque verfus ejuſdem finem femina maturefcunt-

2. *Lapathum hXymunifolium* rotundifolium, riobis. J.B. Chabr. Kyppdlapathum rotundifolium,
 Ger. Hyppolapathum rotundifolium montanum, C. B. P. Hyppolapathum rotundifolium &
 Pseudo-Rha receitiorum, Ad.Lob.Lugd.Hippolapathum five Rhabarbarum monachorum, D6d.
 Hyppoapathum rotundo folio, Lugd. Lapathum hoc montanum feu Alpinum radice nititur
 craffa, longa, furcata, cujua fingulx furcx plus quam pollicarem crailitiem affequentur, rugo{ae &
 intenfe ilavefcetes. Sapore amaro: caulis bicubitalis & altior aliquando, profunde fulcis exa-
 ratus, rubefcens çW^lismultis donatur : folia funt Bardana?, notabilis latitudinis, rotunda,
 glabra, fed qucaammodo rugis fcotentia & dilute viridia, qnx pediculo rubente & itriatoap-
 penduntur; rioreſ in fummis caulibus fpicatim 6V denfedigeruntur, mufcefi, herbacei, & alas
 fere totas obfidet: floribus fingulis fuccedunt fingula femina triangularia, nonnihil ruben-
 tia, contenta inter terna foliola quæ iint loco capfularum. Nafcitur, auctore Cluſio,
 in omnibus jflgis Aipium Stiriacarum 5c Auftriacarum, praſertim circa humidiora loca, ad
 quæ armenta ftationem i!^c habentia zeftivis menſibus, aquationis gratia, convenire ſolent;
 frequentiffime etiam & in Rhætiſe Alpibus. Floret aſtate & circa ejuſdem finem femina eſt
 maturum.

§. 2. *L AFATHVM acutum feu mucronatum majus.*

Lapath. : " iTheophrasto i. Hi/i. 9. inter olera numeratur: iſtj. H'ifi. 2. tot a forma cum perfe-
 tum eſt Bet* proximum cernitur. A**U*» Dioſc.l.i.c. 140. ^ efefiu nominatur, a**.*±™exi-
 nankndo^ quodfoliorum decottum ahum eMliat, iſr exinaniat. Latinis Rumex, ut Plinio l. 19. c.
 21. qui Lapathofativo, (ſrl. 20. c. 21. Oxalidi tribuit.

Genera qttlnqM Vioſcoridi^ t^jyJun^n, wx&TW^ a^iöi, oJaA^ i'^axdna^, Tbeophrast. 7. Hi}. 4.
 "generaplura funt, (y c. 6. in filyeftre <?urbanum partitur P/inii* I. 20. c. 21 meminit fativi^ fU-
 veſtrk, Oxykbatbi, Hydrolapathi (ſr Hyppolapathi.

Lapathum tPphntz emolliens inter holeracea habita, cujus flores funt herbacei feu rnuſcofi;
 atque fingulis floribus deciduis fuccedunt capfulæ ex tribus foliolis mucronatis compoſitæ;
 in quibus fingulis unicum duntaxat continetur femina triangulare, aut nigrum, aut luſcum.
 Dittinguitur generice aB Acetofa, quod illius radix fit amara & purgans, Acetofa autem o-
 mninoacida. Lapathum à loco, ell vel montanum, hortense, filveltre aut aquaticum: à foliis,
 eit vel rotundiolium, vel acutum feu acutofolio: à capfulis, cft vel capfulis planis, veldentatis.
 De montano^r' èjo^i optimo Rheo five Rhabarbaro egimus fupra, jam de LapAho ejuſque
 varis ſpæiebus agendum decrevimus.

3. *lapathum acutum*, Ger. Oxylapathum, Fuch. Matth. Lapathum filveſtre acutum, Lob.
 irag.Dod. Lapathum folio acuto plano, C.B.P. Lapathum acutum five Oxylapathum, J.B.
 Cluſij* A^c ubiti & feſquicubiti altitudinem excreſcit caulis hujus Lapathi acuti multis alis
 concavus, ftriatus, (ubrotundus: folia Bcw longiora, venofaſic in acutum niucroneni dñi,

nencia,

ntntia, panini aut nonnihil in ambitu ferratn, npdo etiam fubrotund?, fapore fubacido: fiord mufcofi, herbacei, copiofi fepundum cn^liuV.luperiorem parteni: q^ibus fmguljs cvanidis finguta Icmiia tiitjuetra five triarigularia fucadunt, ternis ioliolis mucronatis, ex virore rubec-encibus, incluia; radix dodrantalis circic;r, crafiitudine digitali, crocea, fapore amaro. Appetente Martio folia emergent, Junio floret, verfus finem-Augufti femina perficiuntur, Spoate fua gignitor inhumefiis hortis, paluftibus locis & praciscirca Mas.

4. *Lapathum* hoitenle folio oblongo leu 2-Liofcoridis, C. 13. P. *Lapathum* hortenfe, Geili. HoiC-Lugd. *Lapathum* fativum, Dod. Hippolioarhumfilveftre, Match. LugL ; Hippolapathara magnum, Ger.. *Lapathum* facivum five Patie.-Ma, Park. Hoc eft priori La pat he .viit" -fitnile caul femine, radicelonga luteaque, nifiqacwiioiidnabeat majora mollioraque, paula crilpa drintorta; caulernrpuitoaltiorr-m, ut, qui Ivfmnis akitadinem non raro aflequarur.

c *L.il>atbum* aquacicu. ; • ?raii>*cuT>icaii,€B.P. *Lapathum* maximum aquaticum *dye* HydroUtiatbum, J. B. Chalv. *Lapathum* paluftre, T ib. *Hydrotapathum* magnum five aquaticum Ad.Lob. *Hippolapathum* nfilveftre, Mattel. Huic majoti *Lapatho* aquatico radix mapis ipfibras dedufta eft qaam vel *Oxylapar>*" vel *HippolapatKo* radice tons n'gra, intus buxea,cumtiorar)iliafriftioneamaricante.v .Caules-hujus furgunt nd cubttos clnos, iliquando altius InuUo,floribu3, involucris feminum, & feminibus, imo *t foliis *Lapatho* acutr fimileeft, nifi quod liujus rolia magis fintacuca,iliitauttm non tam acntaJoiig'ttidine cubitali 6c fcfquicobitaliinaquofis, item iaeviora mtiiilquerugofa, leviter crilpatis oris altqaando pradita, iubacida &c ftremit aftringentia. Provenit *Lapathum* hoc maximum aquaticnm in foflifurbiurn, & piluftribus fen aquofis, & ftagnantibus locis, rivulifque ad margines Huviorum. Hocexiftimo, inquit Joh. Bauhinus, yariare a^ulgari *Oxylapatho* propter fitum natalemvc locum, quifacitit videjturdiverfa planta obinfignem tolitorum amplitudinem.

6. *Lapathum* folio acuto rubence, C. B. P. *Lapathum* rubens,Dod. *Lapathum* fanguineum, Ad.Lob.Cam. Horb *Lapathum* rubrum, Cam.in Match. Dicitur *Lapathum* rtigrum aut rjtbrum & Runt-x nigr aut mber 3t Sangaia Draconis, fed ptrperam , nam fuccus aridos q'li Sancniinis Draconis nomine inorlicinjs venumdatur, non exherbai:r.c, (cdomni-noex alia ftirpe coiligitur. Facillime inter cetera tui generis *Lapathocognofcitur* hoc fanguineum *Lapathum*, quia folia prolert longa, angufta, valdemucronata, rubra auc potius venis rubri" faneuinei coloris obfeuri aftefta: equorum medio oriuncurcaules brachiuti feu rairificati ejuftem coloris, atque in horum fummis proveniuntfpicatimfioree nuilofi, herbacei, femioatriariguiarw, minoiajncapfiilisfiveinvolucris'tribiisparvisfoliolis triangulisconfntan-Cihos: radix etiam eft rubra aut rubicundi coloris, atque hike nous fanguineis feu robrifl a ex-teiisomiiibusnullo negotio pnmo intuitadifcernitur. Floret Junio & Julie. Augufto demum femina. perticit.

t. 3. *LAP AT HUM aquaticum fm acutum minus.*

7. *Ltyatbum* folio acnto crifpo,¹ C.B.P. *Hydrobp[ithum* minus, Hil>»Liigu Ccr- Park. *Lapathum* aquaticum minus, J. B. Chabr. Huic etiam natales font aquae, led non nifi limpide&fcntanr, trans quafefundo exerit cauliculos teneriufculos, iiactidos, graciles, nonabf-dje&fcntanr, trans quafefundo exerit cauliculos teneriufculos, iiactidos, graciles, nonabf-que liinc inde tilamentis, utcaeteracaquatics planfa;, Jlipantibus & penduljd : tbia font admotUimrentii Sfoiolkcella, neetamenaquae innatarfia ricu Potamogctonis. fed cre :ia, viridaiitia exftro, lanceole formi, crifpa tanten,anguftioraquam Pocamogetonis Lobtlii& PenE in Adverfariis Pufullum Fontilapathum & *Lapathum* tenellnm vocati.

fi *l at>i'tbum* aquaticnm ramofum tolio" augufto acuro Hore aurco, nobis. I apatlmtu folio ,/mm finre anreo, C. B. P. *Lapatlii* filveftis genus 4^{lmm}. Dal^{l"}. Lugd. *Laparum* anthoxanthon, 1 H Chabr. Hic*Lapachi* fpecies putatur planta quam nonmilli l'mghes Chironium folio I rhi* tloreareo a Vlinio diftmi effe arbicrantur. Radice eft brevi, Irjltata & fibrofa.dura, V ^nf canlibusduobuoatrribusangulofis,palmialntudine:foliisoblongls,anguftis,&dcndT fit is : #ribus confat in fummis ramulis aureis, undc anthoxanthon, id eft lucei cirtm*Lapatlium*nuncuparunt.

l >tbum minimum. C. B. P. Aquaticum minus, J. B. Chabr. *Lapathum* minimum aqua-9 l Ai en park. Omnibus partibus minus eft*Oxylapathovulgato*, ceteratifimilliticiinli LOO. Uopeculiar habere videtur, quod ftatim a radice ere caulis in alas incipit di-mum: i^{nrcr} m ^ lffim]s a iis florestx certis intervals, 6V conlequenrer femina verticillatim jrtdi, in qu^ru uaniimufcofijutci, fingulisgeniculis oppoftro foUolo Jigular tnftar. Lo-pjpvniuuq • TM ^ JS M [:]oict Julio & Augufto, quorempore & paulo poft ftmma periicit.

is provenit hunc

10. *Lapathum filvestre folio subrotundo ser...* involucro laxi seu plano, nobis. Hoc pa-
rum aut nihil differt ab undecimo infra deler... nisi quod ejus seminum involucra ex tribus
foliis constata sunt plana, laxia, undecimo... aspera sive dentata.

Lapathum filvestre folio subrotundo ser... involucro laxi seu plano, nobis. Hoc pa-
rum aut nihil differt ab undecimo infra deler... nisi quod ejus seminum involucra ex tribus
foliis constata sunt plana, laxia, undecimo... aspera sive dentata.
Lapathum filvestre folio subrotundo ser... involucro laxi seu plano, nobis. Hoc pa-
rum aut nihil differt ab undecimo infra deler... nisi quod ejus seminum involucra ex tribus
foliis constata sunt plana, laxia, undecimo... aspera sive dentata.
Lapathum filvestre folio subrotundo ser... involucro laxi seu plano, nobis. Hoc pa-
rum aut nihil differt ab undecimo infra deler... nisi quod ejus seminum involucra ex tribus
foliis constata sunt plana, laxia, undecimo... aspera sive dentata.

Lapathum filvestre folio subrotundo ser... involucro laxi seu plano, nobis. Hoc pa-
rum aut nihil differt ab undecimo infra deler... nisi quod ejus seminum involucra ex tribus
foliis constata sunt plana, laxia, undecimo... aspera sive dentata.
Lapathum filvestre folio subrotundo ser... involucro laxi seu plano, nobis. Hoc pa-
rum aut nihil differt ab undecimo infra deler... nisi quod ejus seminum involucra ex tribus
foliis constata sunt plana, laxia, undecimo... aspera sive dentata.

14. *Lapathum maritimum toetidum*, *C. B. P. Prod-6> Park *Lapathum* hoc maritimum foe-
tidum radice est & jauleatorubeite, pedali, incurvo, quom folia atrorubentia, **subrotunda**,
longis pediculi? Sonata, 6: uncialia, interdum finuata, communiteralata, ambiunt: **exquo**
rum finu ranv... liirguitt, finilibus foliis cinfri, quorum fuperiora leviter perambicu in dtn-
tatafunt: in gaulis... ommotlofculi mufcofi, quafi in fpcadifpofici: quibus uericali terniitoliolis
con tan... Jtundi, fatismagni, (**eoiea** commences **ftcedanc**. Hart pbnta dum **vire**
gravis... .5, **fc** inniuritimU nonlonge MonfpelVulo provenic.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

1.1-ap. *Lapathum* (*Limum rotundifolium Rhabarbanum officinum diflum, nobis. Rhabarba-*
TU;:: Ipln. ds Exot. Erpwegat tnm Rheum feu Rhabarbarum, per infirm, bilmslavam
iSr qu.i. tituitm in praximis vtis barentm. Vtili ac cemmodatx eo fur patio omnibus
quosbii. 'vfeftat, ut laborantibtsncutis tehrttani fribui ; iQerkii^hepitkh \ toih
firt in pit... peripneumonia\ angina, mfaniam, furore, rnum, vefica (5 omnium intern&r
rum parthm in Ltou: icmbns, (y frsfrtrim ayfipdactii afffikmbui, tamxctanis quam in-
trnh. iJiiliJiiWm am Rheum jtcinori iyfiliti, prater tnm quod bilhfos pravofque tx-
*purget bumorei, (y ibobfirufiutribmrngtm expediat, robur qucque maximum tpfu vif*ceribnt*
confer!, Iiaut hauitt... Commodiffima
iiijfi QQ utififfi Tfia t ili I... vicinovi elle medicamenta Galen. XI. Methodi affevis... videlicet mi-
winn babtni & txpur\ tndi <? aperk ndt, aflwymdique polita potent urn. Mo dust > > ibitienis
ad ij.macerati vero una cum dmidia aJiij. D<uur in calidwnbus quiditn m... bis cum
Laura fotybtat aiteriuu nature fmulh dituto, aut Mutuh Itquore vel ttiatn few toft
vir f X Vm aih aUl ^"ow^ripoufl. Exhibetur q q fl
*ga tu ry *jt SvHm? TM^t TM^i M *M^mem -, tale dyftrmrkis is czlfieii auxiltatur *
>> Mmdtmvitwfti hmetiim ahum demde rfrimit Or cohtiet. S, Jlit ioJ<n%odo

is cum astringente zfiqj bpermixtum. Innoxium, tr. fuit Meje.

I.

Lapathum Alpinum folio fubrotundo, nobk. J.B. C. b. Hyppolapathum feu Rbabaxbarum menaeborum Dod Lapathinnbujktqmdrhaha-banimvnmachzrunvoiaturpurgandivim ohtuKtjubtore Fu'cbfio funpulverem ndaru. ndrth. pondere fumatur. Neque idmirum admodum cum Diofcorides ipse omnium Runkum olus ddc Mum ahummollirc, atque decoctas eorundem radices cuin vino refio morbo correptos emendare, 4 bilk nimirum per inferna ed' Mionem, tffletur. Quomodo co utidteaU docet Traguf, Magnaru, vmumjnquit, Ucradtx cumpufi HoZi' km (umf'tai' h'kzmaisr bth» per inferiors evacuathymoo. Recipe Radixjtrid* drdc. j. Zihithe- ~, f. fcrup. j. inpttherr. redige, fwiejejunus Hffure calido. Pro Rbabarbaro quibcccfubflituunt "idofi' utntur. Z. aix digeru, abltrgit, pwvocat, vtundat, aperit, nonnibu afringit. • flavam isr fa ofos b.. -nores educit... Folia. :emra in okribm eduntur ademolliendnni ahum. uccits, aitMatib^ls^-i cum falphhrc rflitusfatbiemfd'tat, cum Lupincrtnnvero farina yttieines alphas iy a'ia\$ cutisinfefiyyip rJerir. Radic'ndilutuinx vino pan. turn prffttat ad • j- rffum cakuhs. Idem facit raJkhfcjcepulvh drachms pondere ex men -co pot as quin- c, i vn ex Marubii deeflo haufas diruginm cur at. Lcco RL*ihoc utebatur Lazarus a Scbevrende, L qui aibat purgare fi adduplum Rhabarbari exhibeatur.

Lapathum omm temperitn baba nonnihil fr'gidam is quoddam quidem exi'uih r.; moderatam, aliudvtro iment^em; reficaint veroomnia, fed non omnia aqualiter. Sativi Lapathi fli. i. qu<z ifculaita funt frigiditatemquidemexigsm, bumiditatemvero ma'prem cbtinent, ac itna lentorem, unde facile accito quando eduntur per ahum difcenduii. Vwfcorides etiam omnium dccotlo c'lere ahum tmollirc tradit, quod is Horat'm annotavit fermon. l. z. Satyraquartafiz (crikns,

--Si dura niorabitur alvus,

Mugilus & vik-s pellncobllantia conchi,
EcLapachi breviahcrba.

Srevern auicm appelht Lspathi berbam, priufquapt caulis tnatut fuerit, p'fcipue quo temper' cfu' i' f. v herbo- idonea efi. Editur attem h<£C coda Jed minws quam Beta vetetiam Sphacin' ('uavii: fucctm ingt'rierat humidum^aediocrittr trajjum, isparumalmnti confertman.

autem folia cum frugifitaiercfmant? feminavcro bujut turn isrfatrva ac etiam Oxali- i temitate quadamfubjlanti* refrigerant, valde reficcant is adflringunt; contra dy/en- :ccojujcosafexi^venrriculiexbilibijerfioresiEr'faflidia, tumis' adverfm fcorpiotum at Viofcrdes refert, bibuntur, profunt isr fanguimm fpxtennbus (i-L't'. a Acacia^ Aittbore i apaihiacutiradix cervifx infufa huditiffimum antifcorbuticuw bat-turD. Willis £&

HALLUCINATIONES CASF. BAUHWH,

Aliorumque Authomm.

T"> it 114 ctLi. pl-n- LupaUium bonnfe ft*
V Spinachia femine spinofa, C. Jf. P. S? »i*tbU,
Fuch Dod. Tab. 2. pag. 117. col. .fi. III. LAPA-
CB P Spinachia jilvepit Taftmofo ffmtwt. IM^L
defe. Spinachia nobilis & i. Trag. Ibidem pl. v. 1. a-
pachum harenfe feu Spinachia ferula, C. B. P. Spi-
nachia jilvepit, L. Cam. Spin* *£.
naitllh-j. -Cam. Spin* *£.
fpecies recenfentur cum
alaria, ha.
o a fine ultimo nan dtbnt Lapa-
thtdni

pag. 116. Lapathum uniuofum,
C. B. P. Lapathi floccos fecundam genus, Lugd.
Bonn Heavins, Brunf. Trag. Matth. ed. Baub. Tab.
Ger. fir*b***j
fir* b***j
8 a *
Lapathum Egyptium
ado, C. B. P. Beidel-far,
Prosp. Alpin. Offar vulgo in Egypto, fructus vero
Beid. et Offar, hoc est osum ex Offar. Graviter bal-

lucittatumfuijft Cnyb. Bauhinumbu i» Vmatt fuo
ttBticM, iUmintr Jj»f>»tha rofotat batte piaxtam
pro Lapathi}, ejl rrim Jjw uitmfu l'alx-
Jliniim five d-gyptUtittm CiaJ! tn (at llijhria. T-Ji,
inqttam, jiptynum prtma a tacit dam qtticlibet e-
jmpart rumpitar man/inte; ftituida afiliquufni-
icatanupnt Tfcrtk, irmimbufine contprejiti jub-
rubrujtve ourtit ibukntouatin; hijir iioitif f/cct-
ftadtaut jtpocyno ctntvnieHt'biti, Apotyrium ftj*
dit vtl midiocntr rrJfte Botatiim rrfati, neittr-
qttsm Lap at bum a fi mi Us a dint foliorum turn fitlu
Lapathi.

pag. uf-eol. t. pl. 11 .Jjtp'Atbam folio anitt rrr-
fpo, C. B. P. Lapathum atut»m eijpam, Tab. Q
Lapathum aquathum min»f, CB. Pl-npafhum mtmu,
Lob. ljtgd, Fab. Item Lnpftmm minut, Gtr. fpy-
dralapatthumaquatitum miW, J. B. A* & r. It Hy-
drolitpiuhum jat. nm tjttfkm (Irrarili non tma-
att. tnfiriant uttam ii eandm Lapathi ifrteiem; inde
Jejuimrtapftmptmo' J' iibernitmontanam btf, tjurm'
ttmodum tn mritt) ntiir, atqur ilium fct/aututn tfe
Gr raj ilmn tanqtnm ejtiffn'n'n, £T hac rat tout I
v, til t pli cat tntia fiat r it front Cajb. Kaultnus,

}. 4. LAPATWUy ilk fubrotundo.

to. *Ldpdtbum* filvestre folio fubrotundo fer Tivolucfo lævi fea piano, nobis. Hocpa-
rum aut **rtiitil** diftert ab nndecimr infra defer Aifi quod ejus feminum involucra ex tibus
foliolis conttacaftiitplana, lart'b, undecimi : laTperafivedentata.

11. *Lapaibum* filvestre folio [ubrorunde mis invohicris dentatis, nobis. Hujus lofia
funt latiora quam fequentium, pallidins vh , p!ana, & non ad margines crispa aut dencata,
valdeaccede'fiski ad decimum iupra defr- m, maculis fubrubrhis etiam notannr: caules
cm:»ic bipedales; ramofos feu in r " culos brachiatos, qui plurimis floribus herbaceis
denfeper intervalladifpoflcis on . . . us fingulis fingL¹ⁿ (cedunt icmina tnungulana,
inclula ternis fbiolis valde hifpiuis& inmatqine del i culat J: It. ' infoper pallidius^r"
Oxybpathi criipi. Provenit infbfTis & j =ftis in t t •tecimo Lapathi.
tolio fi undo feminis involucro lævi B.no, atque vi Mx quidem ab eL^coi di-
fc ii. i ^ad perfeftioiieinvotucroru, • li^orumfet , Floret itidem ^aguito,
feptem! • i Oftobri; ii>volucris hifpidis,d(-¹\-.'adeeir ^ ntho/ilveiU'i folio iridemiub-
romudo inis involucro kvi feu piano, pr. 'tui:u facile diftingnkur. '

is. *L tan* Ctialepenf; ' . :ic<to icminu. wolucris profundedencatis, nobis. Hujus
cauli*v;i 1 nr ' i altitudinem fequipedalem , ad cujus fingula genicub m-
(citarBOJMrti'ii. - ,ntn; flores ibidem producantur conkrtim nafcentes, lierbacei, at-
qae ftngulos dc-ciduos fequuntur involucra valde dentata, quafi fpin^fa, in quorum fingulis
fingula continent ur femina trtangnlarin, ut in eferis Inijus clailis.

i^.*Lapathum* ramis procumbentibus (eminis involucro dentato Foliis interioribus *BdvatO*
infar, nobis. Lapathnm pulclirni Bononienfc, J. B. Chabr. Pulcluum fane **eft** lioc Lapa-
dium BononisE primonafciobfervatum, fed riunc paffim in ccmiteriis, ¶ neglcftisfipeano-
bis obiervatLin- m. Ex craffa radice multa to'ia, pleraqueduarum uncianim longitidme >
pediculo^ 'sxc longitudinis profert, unciam plus minus lata, in medto proiunde
utrinqK pondente fidium infar, undeideiominatio,verrusxtremafubrocunda: <¶
mediorc ,am caulispedalis, nonnunquam (elquipedalis, exitin plurimos ramos incurvos
brachjatus: ad fingula genicula tiores herbaceos,mufcofos, aeterorum Lapatliorum more pro-
rert: quibasfingulisfuecediit terna foliob, angulofa, exterius liifpida , continentia *ktaioS*
triangularin, fubruffa, ca;terorum Lapathorum (eminibus paria. -

14. *Lapatum* manriinumfaetidum,"C.B.P,Prod.& ParJc. Lapnthumhocmaritirnum tce-
tidum radice eit 8f^auleatorrubentc, pedali, incurvo, qaem foliaatorrubentia, fubrotund-i,
longis pediculis Sonata, & uncialia, interdom finuata, communiterahca, ambiuuc: ex quo
nini finuranv Turgunt, fimilibusfoliiscincti, quorumfuperiora leviter per ambitum den-
tatafunt: i caulis "ammoHo£culimufcofi,qu;fiinfpicadifpofiti: qu'ibusutriculi cernisfoliolis
con'Vir otundi, ftris m;igni, itmen cominentesfucceduni:. Hie planta dum vires
gravid ,5, it in maritimis non ionge Moni'pet'ulo provenit.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

1. Lap. ^sthanriffimumrotundifoimmRbabarharum officinarum difiitm, nobis. *Rbabarba-*
i um, 1 "lis. de Exoh Expttrgat **enim** Rheum feu Rbabarbarum, per inferna, bilmfiavam
iff qua. • :>ittitamin proximis vth bdirentem. ^ Vtilis ac commodaex eo purgatio mnnibui
quosbit. hifeftat, ut laborantibus acutis isrtertianisfebribttt; i£tmcU,hfpi-tkit i ^{ccn} .
fert in pk ., **triptetimnia**, angi?TM, infania^furore, renum, vefic<e <? omnium intern*-
rum partiuin inH^matknibm^ is prefertimtryfipelattis afft£ioritbu<s, tamxtank qttam in-
itrnk. **VtiUffiMn** certe Rheum jecimri **iyfilii**, **prater enim qmd** bilicfos pravofque ex-
pur&et himores, & ab cbpuffionibat meat us i expediat, robur qucque maximum ipfis viftribut
cctifert. hau,tbaudtemere Rheon vita **bq&is** k nonmillh dittum **vUeatdjk** Commodiffw*
emm ac utilffima talia jetinori efemedicmema Galen. XL Mabodi aftrit: qu* videlicet mi-
xmbaknt^f expurgandi & apemndi, (ftringaidiquepofitapotentiam. Modus exhibition^
a arach.j. adij.macerativero una cumd'tmidia adij. Datur intahdioribu* quidtmorbiscum
Cicdcrei, Intybiaut atterin*nature fwnlk diluto, aut fWlatitio fauorevt! etiam ferolaMs•
ft vero calor abefl ex vino albo aut Rbenano daripoteft. Exbibel ur quandoque left wn, fed it a *t
nulta ejuiparsvminimumfentiatadufiomm ; tale **dyfentrkk** is celiach auxiliatur \ expyf
gatis fiquidemvitiofis humoribus ahum dcindereprimit is cohibet. Siftit eodemmodo ^{lojium}

& superfluentes menses, sanguinosque undique fluores praesertim per vesicam, sed in exigua quantitate, & cum astringente aqua permixtum. Innoxium, inquit Mesues, Rba medicamentum, omni tempore & omni etati salubre & pueris & gravidis.

& Dod. Lapatbi Jtn hum quod Rbaba'barunjmnaefarmnwcaturpleandivimobnmt, su-
thore Fuchfio, si i. u. htrim rtdaSumdrub, pondere famatur. fleqtte idmirum admodum cum

Dioscorides ipse omnium Runicum otas d' lum alvumdlire, atquedecoftmeorundem radices cum vino regio morbo correptos emendare, b bilis nimirum per inferna ed. tionem, restetur. Quomodo eo uti deceat, docet Tragus, Magnarum virium, inquit, haec radix cum pusillo Zinziberis sumpta a phlegma & bilem per inferiora evacuat hys moao. Recipe Radicis aride drac. j. Zinziberis scrup. j. in pulverem redige, sume jejunus is pure calido. Pro Rhabarbaro qui hoc substituunt duplici dosi utuntur.

Bilem flavam & servat iatbfifa, cum Oilpkirei Uitutfcabkmfanat, cum Lupincrumve. oyanna
*??jnfitad «fi» TM& i^ednft.. rent. Radich dilutmn ex -vino pan turn prfiat ad
mgines, WTMMA Jffl £# T^kfcIC£ pdvk drachm* fondtrt ex mm -co potu, qiun-
etiam ex Marub. J., «A*,?*, trurinmcurat. Loco Ri >*i hoc utebatur Lazarus a Schewende,
qui aiebat purgare si ad duplum Rhabarbari

Lapathum omne temperiem habet nonnihil frigidam & quoddam quidem exiguum ac moderatam, aliud vero intentiorem; ressecant vero omnia, sed non omnia aequaliter. Sativi Lapatbi folia, quae esculenta sunt frigiditatem quidem exiguam, humiditatem vero majorem obtinent, ac unam lentorem, unde facile ac cito quando eduntur per alvum descendunt. Dioscorides etiam omnium decoctio olere alvum emollire tradit, quod & Horatius annotavit sermon. l. 2. Satyra quarta sic scribens,

— Si dura mombitur aivns,
MiigilusSe viles pellenc oblhntin concha,
EtLapnchi bievisherba.

Brevem autem appellat Lapatbi berbam, priusquam caulis enatus fuerit, praecipue quo tempore esui haec herba idonea est. Editur autem haec cocta sed minus quam Beta vel etiam Spinachia suavis: succum ingenerat humidum, mediocriter crassum, & parum alimenti conferentem. Oxylapatbi autem folia cum frigiditate ressecant, semina vero hujus tum & sativae ac etiam Oxalidis cum tenuitate quadam substantiae refrigerant & ressecant & adstringunt; contra dyssenterias ac caeliacos affectus, ventriculi & intestini, ut Dioscorides refert, bibuntur. Plinio. Lapatbi acuti radix cervisia infusa laudatissimum antiscorbuticum scorbuto.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHWI,
Alioiumque Authorum.

PA, us tel i.pt.n. Lapatium kortnfi&*
Path. Ual. "•

nun fjiinvjo,
'cmifu, L»sd.
m pl. v. La-
ffifiC. Sp
Zi**3**<ty*>B* iuu fro

Spag. eadem col. 2. pl. 1. Lapatium unguosum, C. B. P. Lapatbi flosferis secundum genus, Lugd. Bonus Henricus, Brunf. Trag. Matth. ed. Bauh. Tab. Ger. Tota bona, Lob. Dod. Thal. Nec hac planta a sine ultimo accedit Lapatbi, ergo non debuit a Cusp. sine ultimo accedit Lapatbi d' spm.

lucinatum fuisse Casp. Bauhinum hic in Pinace suo caustico, dicitur inter Lapatba colocat hanc plantam pro Lapatba, est enim Apocynum Scorzum seu Palaestium five Aigptiacum Ciusi injtii Iljloria, Est, inqt/am, ylpocynum primo a tate dum quirti bet e-jmpari rumpitnr mananti; fnuidu a'liqrti) ferietalanugine refertis, feminibv'qus (omprtijis ftr-ritrbhfive aurei's ibidem.emdi-tis; h'fcc iwit's Afil-piadi ant Apacyna convenient!!/us, Apotyntm ft prodi vtl mediomt.tr i'df'te Boia-nica versatu, neuttquam Lapatbam a frmhtudint folioritm turn folia

J'ag.nf.col. i.pi. 11.Lapatbum folio acutt cri-
jpo, C, B, P, Lapatbam ecurum cnspum, Tab. g
Lapatbum aquaiicum minusC.h-T-l.npathum miiim,
Lob, Ltgd. Tab. Item Lapatbum minus, Ger. Hy-
drolapat hum aqvaticium mtms,J,B, O'itbr. Et My.
drolnpaibtm fativam tjsfdm Gerardi non emu-
cil. cauficiu-nt unam & tandem Labatbi jjiinem; inde
sejuit.'ir Zap/amprmoTtbernitmentanut! bit, qucri!'
adttiodu-m tn mulct's nltis, atqtie tihtm ftiqintum tffe
Gerardum tanqutim cjmjmium, S hac tathnt nobit
mtiltipliat mtiafne ratigne Call. Fauhinwr.

Efffj DB

DB MULLV NTIBUS

Et refrigerantibus flore herbaceo semine triangulari donatis.

CA'PV' XXVIII.

O X A L I S CETOSA,

OJ&VK .dicitur Gracj-s: Ac .mis ab acore quo praedka eft: foliis, flo-
 ribus,acquefeminetnangola• ^edic t-^Tt-ho. fed cHmIcapathi<-radix fit ut-
 plurimiimlutea, reucrocea & amara,.pu. . Oxal. cidæ & alstringente
 td&tigerai " e, hoc foionemine interfe b iinti ^ tofa. eft ration"0
 nmi, vj? ia, vel anguftiolut; Vaque vel : vc-Jciifpa: L...Jicum, vel i
 filrola,pi• velfinoata, c^ncfenrepente, - ^iirepen •Ituberota: a k > -^v^1
 pratcnfis, mbergenfis, Ron"- Cretica, M ,itica,vei wlitana: eftque tandem
 L; chiratiotii •rtnnis v' im tacieri us a praten,fi vulgar!.

ADULE, XXVIII. Sefcionis quinta:

.. yulgarh feufarta, nohk. Aatofa vulgaris. Park; Dxalk vulgar is folio

,titenJiS acuminato, J.B.Chabr. a

2.Crifpa>nobh. Oxaliscrifpa>a,Tab.Ger.J. & Chabr. Q

3.Mofchovitica sterilis, nohk. ©

4.MaximaJLB-P. Qxalh majorBrochgnbtrgenfis^Thd. 0

Montana

. Radice ntlapedali aufefquipedah Layatbi inflar ahfque fihris, nobh. <•

o. Ragufiana radice tuberofa, nobk. Oxalk txhtrofa, Lob. Lugd. Hod. Tab
Ger. Acetofa Ragujiana, Jacob. Zaroni. ©

Feficaria 7. Americana fdlik hngijftmkpediculk donatk\ twhk, Acetofa vejfcariafqc-
pjina, Eyfl. \$?

Ace/ofa

Z.Tingitanamajor perennk repens folik longk fimiaik,nabk. Acetrfa
rennk TingitanadentataJatSI>. Zaroni. 0

C 9. Franca five Montana, nobk. Oxalhrotundifolia, Dod Lugd. Tab. ©

Rotuw

, (lo.Eboracensis folio hi media deliquium fatiente, nohk. ©

(it-Anguftifoliaelator, nohk. Acetofa angupfolia clator, Fork,®

^lata-iii.Minar, nohk. Qxalk minima, Dod. frag. OxalU minima finuata

<- \ vervkirhi^Gtr. a

* 3. Cr^tica femhiz acukato, C. B. N is Prod. \$

14 *-ipolitaMOciw folio, C B. P. Acetofa fiea^litana Ocimi folio

§• i. A C E T O S JB. larifoli* mnjoresfolioacuto.

Explic it to purtk Tab. vigejim* o£lav<£ Seilionh quint x.

* A C^{no/flJ}tenfi3,C.B.I'. Acetofe,Brnnsf.Lon. Acetofa major, Caft. Col. Acctol:i vul-
 x"Vg»KS, Park. Oxalis,Trag. Matth.Fuch. Dod. Ad. Lob.Tab. Get. cmacul. Oxalis
 major, Thai. Lugd. Oxali; five Acecola, Ger. Oxalis vulgarts folio acuminato, J. B. Chabr.
 CaulespromkhscAcetofa cubkoalciores, ftriacos, concavos, iiniultas alas divifos: folia
 Biftorti foliis minora, acuminata, qua pediculfadhirenc,mncronata pinnatavc, fuccnlenta,
 acrovirentia, faporea_ci(i₀). HoresrretherUceos, involucra & femina Lapathi acuti; radix
 fibrofa, laiea, ftrem^f_{lcca}m_c& aftringentefapore. Ubique in prarisSr filvis humidis qnolib
 bet sftatis tempore vigeie obfervainos. Floret atfate, & verfits ejufdem finem ftnina per/icic
 2.4cert/«crifpa nSW Oxaiis crlfpa, Tab. Ger. J.B. Cliabr. Hscnarali loco tempore
 florendi.&modocrdendi,apnorcplatenihil variat, nifi quod nacura Ibliiacrifpis in hac
 mire ludac. Earnautemlcoic cyrcilum exhibeie ftatuimus, negenerali nottra-Hiitoriae Oxo-
 nie'nfii quid temereffit,

3. A</fl/rf fierilis Moichovitica, nobrp. pi—parumdifi ilquod fig foliofior rotundior,&omnino minor: rirof- spFOtrndi^ iu^ j i iemina at- pud nos ad maturitatem perducit; <nde ; tisftenhs denominate, lneunte Vere, ejaa folia cum fine teneriora, acetariis funt apu. 1.

4. Acetofa moncana maxima, C. B. P- Ox |br Brockenbergenfis, Thai, an Oxalis altera, Czf. Hwr omnium fixæ loctis folia prod^; jra fpiffiora, Betae mo<n rotunda, pallide tre'ntia: caulem craffioreinedit&breviorcu^rcris: floribus, femm .iucris lemini- bufqtie, cumcjcterisconvenit.

5, y W a montaoawdicer^ra pedaliame -aft. . . . Me fibfis i Hscprovenitradic*re& Tefquipedjtf at, sadterenus, prout.

••nvui^ri, quoad ntc" Onshujus clafi.s. (^rt/3 Ragufja n ^cetofa akera minor radice a, "TRagufia- anorii.Ox? - ofa.Lob.Dod.Uigd.Tab.GerC c UIL, jxalidem praten ipra tern * : fbliis pans niagnirudinisBc aalis alasami [^tantibtis,inferior autem 6 .erram longi^ nediculisnixis: fit herbacei, ftaminulis luteis referti, fpicatum fuperioi B asparcjadl -aFfiipncraj ibustube- r'fi, piiinTjendulaevelOcnantliesradicibusi.inilibas, I[

7 Acetofa Americana foliis longifiimis pediculia donata, (. u. cana peregrina, Eyft. Ex radice caufes plures, rorundi, friati, larves, cnb^aiea, reclin- nati ptodeunt, fjjimox in plures ramos oblongos brachianrur: toliahabet pallida v, vcluti nitrofo pulvereobfita, anguloia,non tamen ut in vulgari biforcata auc alata, fed potius Atripli- cis forma biuncialia, & pediculis triuncialibus donata, mollia, carnofa, lapore acido, ex quo- rum finukis alz furgunt toliis minoribus, fed eadem forma onufta; in q^ai nm at & caulis fum- mo fiores exigui, niafcofi, veluti in (pica diipofici,eniicant: quibus fruft'is fohacei (extenui- bus, ruffeicentibus membranis ejegantiffiiais vciutlis, veluti Fritiilariaey u - ' tlonbus, pcreas difcurrentibus, conipofiti) uc in aiiis, fed qiiadruploquam in vulgar! majv irvts pe- dicellis dependentes, fuccedont; quibus femmatriangularia, oblonga, ruftt 'plcn- dentia inclafa continentur.

8 yltfo/fl veficaria Tingitana perennis repens tolns loiigis (mantis, nobis. AcetoK perennis tinetona major dentata, Jacob. Z.anoni.Non roinovis etr nots hxc Acetofa a foliis bciniaris feu finoofis quam fextaa radicibus fuis tuberofts,Foliaprotrudit e terra plorima, longa,mncronara, or ofonielaciniata feufinuata, injoundplata: e medituStio hoium exit canlis ->r <eram ftratus, "lcuiustienicLiIanafciturfoliumtriangLilaieitidemfmuaconi:infummisc, iafcunturtlo- res mufcofi: quibus finguiis fuccedont veficstriangdaresin gremio concinc uaa cnangu- laria • radicem profeit craillam, repe^{ntcm mutns fibns} feacenwm. Cop,oie it In M w canialfingitana,undeadnosnifit^/of<ntffl-jBd/tffli hue in Angliam.

§. 2. ACETOSJE majoresfoih rot undo.

c, Acetofa rocondifolia hortensis, C.B.P. Oxalis rotundifolia, Dodi Lugv Tab. Oxalia Franca five Romana, Ger. Oxalis repens rotyndiori folio, J. B. Chabr Lndit; hare acetoft Franca five Romana iotms modo rotundis, c—>wit^an^TM R,rTM:« velChclidonr "ionspro- ximis modo alanim appendtcibns donatls, alias fagiccx mihir nuicronatis |vi jprlu- chiBfoliorommodo, colore glauco, pinguitfculis, delicatoque acOrtpracdttis = manes, ubito loiigiore,?: "floculi è ftaminulis feu fibris componuntur, ut in prxdiftis, UIL. O tamen ru- ribus'-femenfingulisfloribusunicum fuccedit citaiigularc,quandofemensfcit, namradix bis repii fub terram, ficur & caules fupra terram procumbunt, ur cornered* in priore: ra- Jf" We eft minus acido, fed magisficcoqppam folia.

Acetofa rotndifolia repens Eboracenfis folio in medio deliquium patiente,nobis.Hiim3 I)oi humiprocabuntufuperioris : folia funt rotunda, fpifla, virentia, cum deliquio in me- oia. ^ alcsteraconveniucum priore. Provenit Jn comkatu K^OTfi/llW/f, illic reperta \?6* [io, quoa A por, ltcario Londinenfi, & diligece fcrotatore rariorum plantarum in Anglia fejSiK W&} Tj-tjg rbntem diftum iSublanDuCtcl inDHfeEDac, agro foeffiinte ad illultriti- provementiu Z^)mt7;imv^ Eqnitem Baronettum Grandis Coiilliii Anglican! Parlia- mum Dominum jo menti procomitatu Westmerlandie delegatum.

o. -J. ACETOSM minores longifolia

eoIataa nOuttifoliaelatior, nobis. Acetofa anguftifoliaclatior, Park. Hare II Acetofn^{ncc} ^caulesfint tenuiores., altiores: folia kidem aliguftiova &longi- fequente anicu - ora, cætera ei convenit.

12. *Acetofa* arvenfisianceolata, C.B.P. Acet[^]faifliinorlanceolata, Park..Oxalis minima? Dod.Trag. Oxalis minor, Matth. Lùgd. Oxalu^u minimá iinuata vervicina, Ger. non emacul. Qxalistenuifolia, Ger. .Hæc Acetofa prolifas ligiofafque habct radices, valde fibrofas, rubentes, hucilluc reptaaes, in plqra capitadiv.ifas,-"quae foliaemittunt unciam longa, & aliquando ampliora, ad imum juxta appofitionem pediçuli auriculata, guftu reliquarum infar acido: ftofculi longosefficiuntracemos, ftaminulis lut-jis onuftos, quibus fingulis fuccedunt fingula femina trianguhria,minima. Hæc razione loci m?jor minorve reperitur. HincTabernaemontanus duas pingit Iconeb quem fequuti finnt Gerardrd ' & Jbh. Bauhinus ejufque fimius Joh. Chabrcus, ctiam'Capf. Bauhinus in f inace. H[^] ^rvè,s,XIII, XIV, & XV. Capf. Bauhini differunttantum iecundnm fertilitatem & Aerilitatem foli.

13. *Acetofa* Cretica femine aculeato, C. B.IP. & Pi^H ^vc radi :eef parva, ruffefcente,fi-bro'a, inlumma tellure h-aerente: cauliculi? quandoque pluribu. f., pa.mum fuperantibns, aunu reclin?.tis, quandoque una, led in ramulos Plaghiato; foliis pirvis, oblongispediculis/Ionatis, auriculis-carentibus: ^tlofculis multiss, ex.g[^]*^ pufcofis, c rca ramulos femipalmes, in modumfpicde alternatinidifpofitis: quibus fememicedit tenuibus membranis aculeatis inclufum, cui pediculus oblongus, ircurvus, in medib tumidus, ut in Caltha, additur'. Junio floret, & femempaulopoftmar. «riL'.

14. *Acetofrt*, Nè;:poiuna Ocimi folio, C.B. P. Acetofa Ocimi folio Neapolitana^{^w*^^6"} e*, Col. Prater foliorum differentiam, quæ huic Ocimi modo flint fequiciam lata,carnoia, ovaiifigura, petiololongohasrentia, veluti nitrofo puivere obfita, acido fapore, utin congeneribus, cauli h[^]rentia alternatim, ex quorum finibus alasfurgunt minoribus eodem rriodo. foliis veititae, inquam & caulis fummo in fpicam, utinaliisflores emicant, congeftri, parvi, herbidi, lutefcetes, mufcofi, ac etiam circa fumma folia hasrentes foliolis quibusdam parvis, quinis pro calyce: quibus fructus fuccedunt foliacei, ut in aliis, led huic miro nature artificio "bubulinm caput r[^]primentes, nam collo caul; luerent, & inde adcapitis extrema veluti cornuaparum iner fecurva, paulo inferius veroac veluti è regione oculorum, aures veluti apparent utrinque&fupercilia & ab his reliquum'dependens capitis totius Iconem exprimens: caules plures ab radice exeunt, aliquando pedales aut majores, parum angulofi ac veluti ftriati: radix tenuis refefu plantae in fumma tellure haerens. Totius plant* fapor acidus nomen indieat, utincongeneribus. Frequentiffima eft hæc Neapoli in fepibus, ac tenuibus locisV^{32'} lertimPanfilippi&Mergelinc. Autumni fine exit fpontelocisfupiadias, Vere caulem edit, æftate perficitur.

TEMPERAMENTUM & VIRÈS.

Recentiores Actofrn Jlatuunt efrigidam (9 ficcam in fecunJogradu, inquit Vuchfiu. Dignity "pent, incilit, inquit Swenckfeldiut, nonnihil humores kntos. Ventriculùm ftuantm refrigera*,->i>p>ntum ciborum excitat, iecinork calorem contemPerat. Biliofis ac peftilentibm febribusadwjtatur. • Radix Acetof* hebatis is*venaruin meferiacarumvobfrufwrnes fihit, infebñbm utihs. ^Smen additur medicaments cordiahbus. Aqua difiillata is juccu* in Jrequenti funt ufii. Febrientitus contra celum, fitim'iy Jejetlatn affitmtiam forrigitur. Bftivis mm- [[bus Acztofa ciborum multorum utile eft cbndimentum (srfalato gratum.*

D E P E N T A P • E , T A L I S

Seminciriangularidonatis.

C A T V T XXIX.

B I S T O R T A.

B. Ificrtadicitu+^ quod radice infe contort a isconvolutaconfitet: quam aliiLimonij <diu Br^l~ tannic^ alii Beben rubrifteciem faciunt. Huju* Plinitts I. 24. c. 16. isr I. 25. cap. 1^l. • initt Dracontia mem'wife videtur. Forte ejufdeml.2\$.c. 13. Molybd*na,ideft Plumbago, quod plumbum*, oculi vitium to Hat. Folio eft rugofo latiore., is" minus rugofoanguftiore.

ParsTABU^XXVIII; Sectionis quinta.

Pi. Mash'intorta, '4ik rotimdiatribus rugofis, nobk. Biftorta, Dod. Biftorta

Major radices ^ g ^ ^ d ' grito&mw** rugofis, nobis. Biftorta folio

i minutrugofa) 'babr.Q

r% Sett AMna, Cam. ini : ©

Biftorta

Alpina minima sobolifera, nobis. Ger. Chj. Hift. Biftorta minima, J. fythabr. t

rforw major r*1 S j h S S S lagis bitartsu 7 " Jiftorta, Dod. Biftorca major; Cli-f. Hift. orinlon! / pcdiedi. promit^longa, l» k «««

Lapathi tolius minima, ver... er qux ex medio exeat caules, pede al... rotundi, minoribus aliquot fo... : Ipica in fastigio exiguis flosculis e ditatore... purpurascet fatilcentibus succedunt fingula semina triangulata... Sbm capil- i vadix tuberofa, rassa, oblongior, geniculata, nonnunquam retorta... teriore vero pulpa non t, unam foliis rugofiori ajore, illam vero radice majore! major radice minus intorta, C.B.P. angustioribus & levibus scumina i monte lura. Biftorta major prio ac lutofo solo. Maio ac Junio fit

r S ^ - ^ ^ P ' - ' CaLnMatth, H,cfimiliseft priori, fedmultominor: folia • r mnnlis nulchre riunftnlis qaibndam distinta & yelnti ferrara apparent.

ill ? S r l l S ?ohi8 variis rOtpndis & longis, nofe. V.ria, Park H,c no, folam terna f r 4 1 ff brevHubrottinda, fed e ti; in bina, tern, folia longa, angustal habrt, fXeuM omnia ff JS «: 5 K ! vii palmare., coi fpicatum adnascunrur flofe, «pentapetali, ..no-

res, quibus sin g 3 n a fobo lifer, nobis. Bife) rta mi|, or, Ocr. Gb .ffil orca minimaj.3. Alpinaalia, Cam. H^c radices pollicari crassitie m mor; . ^ . . .

Chabr. Mini ^ albam & capillatam: caulis ei furgit dodnntahs, vel a hqu an major .foliis vesticns paucis, angustis, oWongis, acutis, nullope 0 . TM , ^ di orca folia unciaL aut femntal a, unciam plushca mfeme ^ j £ g j

viridantia; tpi bus comata albicantibus, teqt undo, oblongo seu ovato, ruffo, quod mihi dui, SSSE cong tur a

/ nftasvid" radix vulgarisbngc miuor, contorta tamen& gcmculata, &ris nigricans &

111 A ft iaca umisciriacarum Alpium jugis C^pi gramme vct.es. FToretial'0, m hortos TM SA " ,nw ubitocm^m&mag_nitudinemnolnmmutat) manxma. *4onfpelii repent Jo. veTT

Bau... circa montem Gangen. Geneva in monte TunL ProvenitetiamincomiotnVestnKr- lan... P rope Crosby Ravenwaith inter septa D. Pic eam ibidem repererc. TEMPERAMENTUM & VIRES.

Facultate Biftorta frigi... cum rificatione valde astringens: radix menses & undiquaque san- g inem p... innSarutn'hucium yofis inflammatwnibm fuccurnt: gwgivzt firmat dt. modo 4^m ja 10^m co iUto. Idem foffunt folia tofemina, fed minus efficaater. Pulvk ra- cocto aut ccoi dicis

I

dick Bistort & cum ivr < firva Rosarum usitr patise...
afcut deflu-xiones^menfes, urinat fift. Poteft. iagn. u...
pulverkdracb. ftiwscumpariprttlverkfuccini port...
Arum, ifr Aprum, Bacciferai cur. Tuffilagine Peta-

HALLUCINATIO CASV. BA t f HINI.

P A P E T . A L I S

Spicstis femine tumido'ir.aiigulo doi atis.

C JTVT XXX.

P T A M O G E T O N .

II Olympeum, quasi fluminibus vicina, quod palustribus & aquis innascitur...
& Aliano l. 6. Anim. c. 46. quo summitatem, quam floribus & semini...
&c. subjungit: Castorem hanc aliter aquosis nascentem: hoc Myriophyllum aquaticum videtur.
Potamogeton est planta palustribus & aquis innascens, flores...
gestos gerens; quibus singulis singula succedunt semina...
bus tum seminibus propius accedit Bistortæ & Persicariæ...
forces, potius quam inter aquaticas plantas, quæ inter se neutiquam...
ne ultimo conveniunt. Potamogeton distinguitur à foli...
viori pediculo nititur & lineis in longum ductis...
quod longiore pediculo constat & folia transver...
bus, inque vel latis vel angustis, vel foliis serratis, crispis &...
denique pusillum fluitans. De hisce ordine dicemus.

^ S I M I A S

Pars TABULA XXIX. Sectionis quintæ.

- 1. Rotundif
Trag. M. Lab. ©
um, Ger. Potamogeton,
- 2. Angustifolium seu folio Salicis, nobis. Potamogeton Salicis folio, C.B.P.;
Potamogeton angustifolium, Tab. Ger. ©
- 3. Latis, C. B. P. Potamogeton 3. Dod. Ger. ©
- 4. Angustis, C. B. P. Potamogeton 2. Dod. ©
- 5. Serratis, C. B. P. Oxylapathum aquaticum, Lugd. ©
- 6. Crispis sive lacuca ranarum, C.B.P. Fontilapathum pusillum,
Foliis | Ad. & Icon, Lob.
- 9. Minimum seu)
Potamogeton minor folio Quercus, Ger.
Boccon.

Explicat io partk Tab. vigesm* mnd Sectionis quinta.
1: P Otamogeton majus rax anell folium, nobis, Potamogeton latifolium, Ger. Potamogeton,
Trag. Matth. Fucli. Lugd. tab. ^ ^ j, Potamogeton Græce, Fontalis & Potamogeton Lati-
nis dicitur. Olhcimsignotaclherba. Potamo2e amat: p > v ^ ^ L ^ \ fl p n a o i b u s vicir...
I ttm floribus & seminibus spicatum on
tra aquam eminentia, ex qua quidem brevi define"®™ Tantfamilia, denra & panloex-
picturam damus, esse Potamogetonis (speciem: caulem namque rotundum potest herbam, cuius
habct, geniculisjn.

soft. V.

te/tepnm>, e quibus Ff " ^ ^ ' ^ g " p TM os Biftorts aut PcSicari* infar prota;

bus, aquo filquelocis. Floret Julio menfe. Potamogeton Salicistolio, C. B. P. Po-
2. ^^^ < ^^^ 8 T pftift> liu <>, Tab. (L. Potamogeton, Dod. Pro-
tamogeton 2. Dalr. Lugd. mam g, s geniculatis, radicales exiles & albas exgemcu-
-venit caulibus per aqua, florf> la g oin vigis coman) ^^ appre hendit: ex fingulis arti-
•> cauium. r n i T i e u n l o n g o J d i c u l S V. <, longiora quam in prior. ^otamogetone,
cuhs fingula fol. a P < hanc ab ilia d. ftinguendi) tra./verfis l. ne. s virgata, cum
crassiora. & (qua " V " T m d u f i s d i f c r i m e n t u r J > S o r e s t p i c a t u r, n f a m m o c a u l i u m p r o y e -
r o n s H * > S S K r f f a j ! a i n m m e p o i n, d u
n b - l o n g a h a r e n r e s p e t E f t f i t
n i U h t, r u b r i, l o n g a h a r e n r e s p e t & l u s S e q u a n o r u m / E f t a t e f l o r e t,
n m f ^ - " > ^ j £ ^ : ^ ^ . B . P o t a n o g e t o n 3 D o d d e r H f c t e n u i b u s
a c t l e s c a u l i b u s l m ^ : i n a l a s f u b i n d e d i f t r i b u t i s: f o l . a t a c i u n t l a t a, o b l o n g a, a c i -
m i n a t a, m u l t o q u a m p. o r > m . B O r a : e ^) i o r u m l t a i r i t l a t a o b l o n g a p r o c i -
u n t, . . n f ^ J i f c ^ l s u " < s f o i n x: a c c e i n d e l e m i n a ^ m i d a, r o t u n d a, v e l w. A p h a c e s:
i n t a s <> u f c o f o M m m < w i s h u u e m i n e n, : " n t u m m o d o c a c u m m e,
r a d i x n b r o f a t u n d o ^ a d t e r t a m e n m a r i t i m e a e f u a t t q l l u n t u r, v e l u t . . . f i n n
S ; S d S S S c i v k a t e a d I d a m B r a b a n t i, c i v i t a t e m p a t e t . J u n . o, c J u l o

(pica: florentes confpiciuntur. c g p. Potamogeton altera, Dod. Hscept
4. Potamogeton foliis angustis splendens, c g p. Potamogeton altera, Dod. Hscept
major species, albicanthibus & articulis radicibus secundum aquae fundum repit, a quibus (exi-
guis fibris deortum emittis) cauliculi affurgunt tenues, oblongi, geniculis intercepti; inferius
parvis, superius autem majoribus & longioribus, angustis foliis adnotis, quorum medius ner-
vit dures, subinde filis alienis instar folii fastigium superius eminet: flores in crassa spi-
Tfubrubent. Subaqueis vero herba h< una com foliis suis conditur, fob fpuz fapetem.
r Tn ftisnantibus aquis apud Holandos fais frequens.

nent. Initagnanti DJ (Haro l- . B. Oxylapathum aquaticum, Lugd. . Hnjus radix est ge.
•TX^SZ<MLS emitted quibus valinh. ret. prints incenodis me.
mculata, ex lingi lis g t d os ; -ne aut fex. Cubitos longos, in aqua fluitntes: to-
fans • caules e d i t u s i n i p a m i b u t o r e n a t a a k a r a t a m l o n g o f a t s • i n t e r -
V T A I Z I g u f t u l u o l l i c o l i n e d u l u m f e r t i c e t h y f u e n e t e a p r o f f u s
villo per caules TM tm <, > & i f i c r . N a f c i t u r j n v a d i s a m n i u m p r o r u n t u t A r a n s .

fpecie qua n J ^ T M ^ ^ f i v e L a d u c a r a n a r u m , C . B . P . F o n t i l a p a t h u m f u f i l l u m , A d .
f ^ ^ > a a i c i m i n o r p G l l m r H H i f f t . T i b u l u s a q u a t i c u s M o h a k i l f o n b u s .
f e ^ B i c u b i t a l l , t r L u b i S e f q u e a u t l o ' n g i o r e s p r o a q u , p r o t u d e t e e x a d o c e p o t e r e m q c
S a n n c a u l e f i v e (c a p o s n o d o f o s (q n i T e f i c c a t i l e n d f o n t a c f i e x . b l e s) c i r c a f u n i . m . m d m -
f o s i n p l a n e s r a m u f c u l o s , a l t e r n a t i m f e r e n t e s i n f i n g u l i s n o d i s f i n g u l a r i a f o l i e , d u c t u m i n c i a -
r u m i n a e r d u m l o n g i t u d i n e & f e m i u n c i a l i l a t i t u d i n e , t e n u i o r a & q u a f i t r a n f p a r e n t i a , i n a m b i t u
a d e n t i t i z & f i n u o l a u t l a c i n i a t a v i d e a n t u r , c o l o r e e x v i n i d i p u n i c c o : p e d i c u l i e x i g u o s ,
p a n d i c a n t e s f o f c u l o s , r a c e m i i n m o d u m c o n g e f t o s f u f t i n e n t e s , o b l o n g i , c r a f t i u l c u l i i n t e r
f o l . , o r u n t u r , o n x b i n a f e m p e r e x a d v e r f o n a f c u n t u r c o n t r a n o q u a m i n t e n o r a m o d o : f i n g u -
f o l . T A l e r u m q u e q u a t e r n a a c u l e a t a g r a n a , f i m u l c o h ^ r e n t i a , p a u c a m c a n d i d a m m e d u l l a m
l s f i o l u l ^ r c e d ^ n t . r a d l c e s i n f i m a p a r t e a d f i b u l a g e n i c u l a o b l o n g a s , t e n u e s , c a n d i c a n t e s
c o n t i n e n t s w e . i b u s f i r m a n t u r . & a i i m e n t u m n e c e f f a r i u m a t t r a h u n t . T o t a p l a n r a a q u i s i m m e r -
f i b r e s a g n n t , ^ u & f i n u o l i s m a g n a c o p i a i n t e r T r i t i u m a q u a t i c u m m a j o r e m t r u f t u c d u l i , &
g l t u r . i n l ^ r e a l b o n a f c e n t e n i , a t q u e J u n i i i n i t i o f l o r e n t e m & i e m i n e p r e g n a n t e m o b f e r v a -
N y r t i p h i a m y a a q u a l i c a t e n t i b u s e t i a m p r o v c n i t .

vit Clnfia?. Intoms wa p rotundis lous minimecifi Is? nobl8> fec efttantumvarietas fr
^^^ L K p L n o n p l a n i ^ u t f n p e r i o r i s , l e d r o t u n d i s , e o d e m t a m e n m o d o g e -
p e r i o r i s c a u l i c u h s t e n l e a p . ^ f i a f o l i o l a a d f i n ^ i o s n o d o s f e r e n t i b u s > p e r i o n s b r e v i o r a ,
n i c u l a t i s , b m a t e m p e r m t e f ^ ^ ^ ^ - ^ ^ n o m i n i b u s . p a r e o m n i n o d i f l e r t . I n
m j c r o n a t a , i n a m b i . f f i p a r a q ^ n v o s d e e n r r e n t i b u s n a f c i t n r .
l a c u n i s f e c u n d u n p . n r f o l i o Q u - c u s , G e r . f e e c a u l e s e x r a d i c e t e n u . , p l a n a , n o d o f a , b i c u b i -
• b . P o t i n o g e t o n T M w o y o ^ n r o s e s f e c u n d u m a l t i t u d i n e m a u t p r o l u n c i a t e m a q u ^ , v e r -
r , a l e B & t n c u b i t a l e s p r o l e r t . a ^ g G g g g ^

ius lummum in i^ultas aladlvifos, atinfiigulis g^niculis unicum iolium, quandoq; binas uncfe
 iongiim &c femiunciam latum, tenue, {plendens, ciifpum & undulatum in margins infar *Qnet*
 cus foliorum, coloris ex viridi rubentis : in fummis caulis ramis proveniunt rotundas quafi uvar,
 exquibus fingulis exiliunt rlofculi rubicundi adinfar riorum *Quercus* \ fingulis fioribus deci-
 duis fuceduntquatuortenuiagrana, mucronata, fimul junfta, atque iifce notis à prioribns
 difcernitur. Provenit inpaludufis flagrantibus & pifcinis prope Abatiam diftani Durfaro inter
 comitauit* TV -toniam !k *Sufexiam*,

y.*Poti.* >p« pufillum fluitans, Boccon. Proradicibus funt huic fibraslongiffima:: cau-
 liculusdodt. rend ramofus: folia longa, tenuia, inordinatim difpofita, penecapii-
 lacea, quand^.;- iaeni;.' feu Peucedani foliis familia: fiofcuH in biunciali pediculo fiiic
 miiicofi, fpiqati, fubfei Jibus granis ri^nutis & 'peris compluribus fimut junftis. *Catanf*
 efontibuseduximus, inquit PaulusBoccone, lpecie; huic longe a -iplior prope Lutetian, if
 Scquana tiuvio vifitnr. •

9 TEMPERAMENTLIM & v ^ R Ì

Potamogeton, inquit Gakvus, aflrwit (y nfrigeht) fimiluer *PUygono*, fed efentia ejm *crassior*
oiiamPclygQni. Vwfcorides re^ rarefy aft'infæ fimiliter ait inutilepruriginibus is, malis
dapafcenuhiKvetufti^ uk keffe. Plinim-ex vino dyfenterich & cwliacis mtdtrifcribit,
ufwnquetffi in ^ l. •

D • E P E N T A P E T - A L I S

Spicatis femine tnangulari donatis.


C A T V T XXXI,

PERSICARIA five HYDROPIPER.

P *Erjicarta* dirititr *Latinh*, a folioturn forma , h<ecvd mith acidave fat>ore,vel acrh e{), *ilia*
Jdmmnculofis, veliiscarentibta. '&&<<*& *Diofcoridi* 1. 2. c. rqi. id est, *aquancum Piper,*
"Moisrfapmnomnbabet.

Ptrficaria a numero petalorum florum fpicatum digeftorum feminibusqne ipfis, foliis, nara-
 litnlqne valdeaccedit Fontali feu Potamogetoni, ideo eanclem huic fubftituimus in hoc cap, 3 -.

Pars TABULA XXIX.



E-xplkatlo partis tab. vigeſima non* Stftionis quinta.

1, & 2. **P** *Erjicaria* mitis non maculofa, C. B. P. & culofa, eidem. Per-
ficaria mitis, Ad. Lcb. *Perficaria* Fuch.
 & *Plumb* ^ *linii* ^ *Di* ^ *am* ; *Follonini* H^habet ilia cum *Perfica*; arboris

Dod. Lugd. cui *toliis* fimilitudo *nomen ei* ^ *Latinos* ^ *5* ^ *eni* ^ *f i n i l l i a* > ^ *onga*, acuminata, f i -
miliqne venarum *decurlu* pradita, sub... ^ *ardum* livida maculanoma, undemacu-
loſe cognomen, fapore altringente acerbo, ^ *rubentes*, ramofi, geniculaci.- *Ho-*
res infpicis feuracemuli *Biftortæ* fimiles, colore purpurafcente vel albo: foli ^ *liquando* ma-
culas in g. as in medio habentibus, aliquando iis carentibus: ſemen fufcum, latum, TMbrum &
 iplendēL: radix ſenuis, obliqua, lignoſa, & fractu contumax. In humidis & fimilibus locis,
 m.

colon for'dido qvdammodo refer at, Iketmulto imitat fit, Frumentm Saracenum dicitur, quig ex Africa primmti ddatum creditur: namvetenbut non cognium, vel non ufitatum, velriegkfluu. Dodondus affrit.

Pars TABULA XXIX. Sefionis quintar.

- 1. Restum, nobi*. Frwmntum Saracenum, Mattb. Lugd. Fegop^v Polygonum hederaceum five] r?n, Hod. *
- 2. Scandens, nobi*. Frumenti alterum genus, C#f. Convolvulus mi- nor femine triangulo, C B. P. Ydubilh nigra, Tab. Go: 5

-> partis Tab.vigtfindtriondiSeElww quint&.

1-T7 Agtyyrtn, L>- frumema'cearum nmero Fngopyron vel Fegopyron effe vide-
 1 Xⁿ tur.'fubindeetiai.. ^ente neceffitare pani,s(- -r cum eo conricicur: habetia
 culmoslrves, rotundoc, [triacos, rubicu'idos, in plr "ifos: folia Hederae niollora
 minoraqne fenyds pi-oxima: flores parvos, candidos, penrapetalos, racemofos: fcfflini for-
 didp colorenigricantia, triangulatia Smilacis nigra: (quam Malocociffum veceres nomiiant)
 familia, fed pahulum majora: radicibus nicitur p'rvs & fibrofis. Nafcitur qualicunque folo,
 ne-fiiff. ullim nnnrumvis priHuni ninriimv rotahi": rfnriipr-inijiril-ini: rirmmf nnnvbiir. ce-
 neque ulhim quantimvis pndum macrumve tepui:: gaudetimbribus, cicoqueprovenit,ce-
 lriter marurefcit. Serif ^rcioac Aprili, acnonraroa^etinopabulicaufa, pleiifqGei"-
 mania; locis, 'Braban; t paniae, mukifque aliis locis Gallic, prascipue in agroSolonicnu
 nonlonge Bkfis d^r .ix ttiamnoiiiincognicHni. Tridencina rura, rVumentaue Foro-
 julienfia Saraceno, .rs ett Mattiitolus, nominanc. Germani fuperiores i}ctui)ioji, inferi-
 ores Buciticiocpw aut IBuuMwpot quae Hirci antFagi triticum fonant, unde Anglice 13NCMDIC«
 dicicnr. Clare confac non efle Ocimum necDiofcoridis, qnodtltherba odorata Bafilicum
 difta, nee Vatronis quod eft pabuli genus. Evidentiflinium eft ergo effe Frugcm novam qn^
 veteribus neccogmta, necudtata veKaltem neglefta iuitr.

2. Frummtum Saractnicum alterum Convolvuli modo fcandens femine criangulo minore ni-
 gro, nobis. Frumenci alteruni genus, Cif. Polygonum hederaceim, Col. Convolvulus mi-
 nor iemine triangulo, C. B. ?. Volubilisnigra, Tab-Ger. Aliis MalococilTosConftancini Im-
 peratoris: aliisOrabaacfac: aliisHelxineCuTampelos: aliis Elatine: aliisCentoncalasPlinii
 1, 24. c. 15. quiGracis Clematidicatur. Huic praetenuesmultifuntcirroium infarfubrnbent-
 tes vkictili, quibus Fruticibus omnibus quxcunqueconcingat vicinis fefe crebrifcjenffivp¹
 lutionibusimplicai, acqufcunque proxima arripueric more tortili conlcendit, nullis ucens
 capreolis, fedviticulis fuifqiosex radice mediocriter ctafla, miiltirta emitr.it: 'ab imisal
 fumma proferpens : folia lata (unc, longa & acuminata, HedersfoliismoHiora tenerioraqoe :
 flores exigui, candidi, pencapetali verticillacim verfus genicula coherent: (cmcriCrianglarc
 vehitiFegopyri, fed minus & nigro reflplendens colore, tenuibus fubrumentibus membrariis
 veluti glumis inreg'fiur. Crefcerc juxta fcpimenta 6V in vineds obfervarur. Vindemii cem-
 port lemeu perficitur, ex quo nec aliitnde primo Vere oritur.

TEM?ER AMENTUM & VIRES.

1,Fnimentutn Saracenicum feu fagefyrum Tritiko quidtm, Secali ac Hordco, **mintts** nuirit, plus
tamen quam Mihumaut Eankum. Pxdmentaria ac placenta, qu<£ ex ejus farina confickntur,
 facile concoquantur,cito defcendunt, **alimeatumue** corpori adferunt exiguum quidtm nontameri •
 mahm aut vitiofum. Pankqm ex eo aliquando, cogenteanmn* penuria, coquitur, lut farinam
 ejvsadmixtambabet , humidu* eft cittujque defcendit, acflatulentiplu* obtinet quam exSecali
 coZt*. Herbamviruhnpruifquamaturueru' boves jumentauepafcunlur. Semine.all
 umgenuspafium atitjnnc finguefcit. 1 1 J J " " " 6 " " 1 nacc-

2.. umentu Saracenicu genus alicium, Cef- facultatem comperit am aut probat am hucufqtie nttUam
 ibei.

HALLUCINATIONES CASP. SAUHINI Aliommque AutWum.

P Ag. 27.EryJimum^Sr/amwm coUocantur **inter**
Psnicum S Phalarideat, quffunt Ctrcaliafcu
 frumenta, ifrffi qmhits nil habeat affine baiitta ra-
 tiant fin' "h»mi: quatenusfunt ahrana: fin cu),^
 /nulls f hut a non Hebent bane ham obtinerc, fi
 c., :uium doBrinam najira •umvrfahs Hijhrin, Ut
 Sefamo con/ah pag. 181 %* H'Jteru in Halluci-

natione Sefanz.

Pag. 2p]. Frumenti alteram gaim, Ctf. Polyga-
 num >td*raceum,CoL blah I-jungitur a Frumen-
 to **Saraenko cajus, a fine ultimo,** est vera & genuina
 ifelle il fcdz, non. autem C<tivohuli propne ditli,
 ut fufius «'«'»'« ta>. 2., hup, Hijhrm **inter**
 Hallucinationes Convolvularum quas confule.

DEPENTAPETALIS

Semine tnangulari & multiplici donatis,

CAT VT XXXIII. >

POLYGONUM.

17 *Olygonum* Dioscoridi l. 4. §. 4. a copiofis genkulis quibus coy *angustifolium* Plinio l. 27. c 12. *rolygonon* Grtfcivqcaxt. *quamos Sanguinaria*jp.

Genera duo Piofcoridi, mat & ftmina, de femiita inter Eqi .. species: mat à feminibus tri-
angulari Lias fvb fngulk filtk turgntihji*, **cui flostft** aut candidws autpunicem\ **Flimui** I.e. qui plltra genera faciunt per hoc marem intelligi vo. 'unr, appdlariqut a multitudine femink aut detitratefrutkis Call'igonon; alii Polygoriaton^a frequentia gemculorum <src* ubi quatuor genera recevfentur. Primitim eft Polygonum vulgare: alterum Hermann: tertium Polygonum femina Tfiofcorida : quartum quibufdam Cafia **lirifea** Monfpelienfutm videtiir: jhl rcff^tM tribuitur **tiplon-** tē qxiam Polygoni nomine propoftiit ClufiUs. De Polygono **Vrtina** (euEquiieto, & Cafia lignea **Monfpelienfium** alibi **agemas**. Lie Polygono & Polygono **fern^m** & Aiithyllis difto nunc.

polygonum eit planta multis geniculis fcatens, cujus flos quin - pcealis, aualbis a tit expurpura albicancibus, acque fingulos flores deciduos fequunt a **retains** triingularia, nigra ant fnfca. Poly^onam vulgare mas eft ratione foliorum vel mm vel **angaftifolium**, ratione loci eft, vel **agrefte**, vel maritimium.

Pars pofterior TABULJE XXIX. Sefironis quintse.

F SLatifilium, nobk. Polygonum mm, Matth. Fitch. Dod.ut.Lugd. Po-
lygonummoi vulgareSanguinaria is Centumnodia, Ad, Lob. Ger;

i. Vutgare < (01) > longo. %

Anguftifolium fol'w\

I (Brevi. \$

2. **Maximum longtfftmk** canlkulk (srfdiis, nobk. **Polyqnum maximk foliis**,
Park\$ *

Polygonum m

('Latifolium^ C. B. P. Folygonum maritimum minjus **Park**, 5

3. **Maritimum** AnguJlifolium, C. B. P. Polygonum marinum alterum Dahcbam-
(pit, Lugd. ?

4. **Procumbent folio non deciduo brevi umhelliferum feufioribus in capiuhim conge-**
ftis, nobk. **Telepbittmrepens folio non deciduo**, C. B-P. **Telipbium** 7. five **legtti-**
mm Iwperati, Chf. Hifi. ©

{ 5. **Montanum minimum niveum i&ferieeum**, Ad. Lob. Lugd, **Polygonum montanum**
niveum minimum, Icon. Lob. ^

.J&. Coaifcrum, Cam.ep, Kofmaczck Po/onk. ^

&,i. POL TC 0 NVM femine tria'nguldri donatum.

Erplkatio partk pofteriork Tab. vigeftuiA non <e SeSionk **quints**,

lm -r\ *Olygonum* latifolium, C B. P. Polygonum mas, Match. Fuch. Dod. IK. Lugd, Polygo-

I ri'jm mas vulgare Sanguinaria & Centumnodia, Ad. Lob. Ger. . Polygonum doc maa

molds tenuibus, viticulofis, oblongisprocumbitcauliculis: circaqiosfolia virentia, longiora

& aneuftiora quani Hyperici aut Rucae Hypericoidis cernuntur: fiofculi pcrexigui, pencap-

tali albidu, aut ex ptirpuracandicances aut rubentese geniculis exeunt: quoscollapfosfequiui-

'femina' triangularia: radix cenus, longa, nonabfquefibris, fubindecandida, nonnQllislo-

C"rf brubet. Provenitlocisincultis, vias acfemitaslonge lateqne & radices murorumfub-

^He occupat eriam non raro juxta rivulos, item inter fegetes frequenter. Hue pertinent

!r[]m oblongo anguirqne folio, C B. P. Polygonum 5. Tab. & Polygonum brevi anguftoq;

f i r B P Polygonum 2. Tab. quae funt vanetates piioris variantes (ecundum ccctutn & **folam**,

3.10 Po/wtwawmaximnm loitgiffimiscauliculis & foliis, nobis. Polygonum maximis **foljis**,

1 fi Hoc cauks protradititiquipedalesA nonnunquam bipedales cortice rubente teftos.in

i Park.ng.n ^ • & cacK r(S tenerioresdivifos: geniciilaincaulibusloigioreintercapedine

multo plures ramos G g g g 3 , djfpo.

diffonuntur quamin prardiftis: folia font duplo triplovePolygoni vulgaris longiora & tenuiora, i angultiora, magifque mucronata: flores itidem rariusmuko in geniculisdifpontmtur,ex pin- V pura albefcences,pentapetali, quibus pariter tngularia femina, parva, fufca,filcedunt, Hu- 1 jufeminacum pluribus feminibus aliarumrariorum plantarum Chalepo tranfmiflahabuinjw biennio aur triennio abhinc opera & induftria D. Roberti Huntvgton.

•\$. Polygonum maritimumlatifdium, C. B. P, Polygonum marinum majus, Park. Hocmul- tis cauliculis,etiam humi ftratis, fcatec geniculis relertis, tit vulgare, quibus folia f piffiora, bre- viora & ktiora prioris; colons fupeme & inferne candicantis feu cinerei: flores finguhg geni- cuiis prioris vulgaris more adherent, qua: membranialbis integuntur ;Horibtis finguliseva- nticeutibus focceduncfemii-^riarlgularia, nigra, majora fere duplo feminibus priorisvulga- rra, membranialbis iicluia." Nonnulquamm Adnatico,Venec66> Anconenfilitore fabulofo, ffpiflinje auteminmediterranea Narbonenfi ora, abifqueMarianisaquis adCttum montem leuproniontoriiim Polygonum hococnrr.it. Paffim ad litusmaritimum Armoricar; etiamin j! tnofis marislitoribus in Cornubia&alibi. ^Hue pertinet Polygonum maiitimumangultifo- lium,C.B.P Volygonum marinum alterumDal^Lugd. folummodo foliis anguitioribu^lif- Idt apuorelatitolio.

4p Polygonum pene pro umbra, folio breviora, floribus in capitulum congestis, in vultu a radice fimmo-capita^Nazamentues virgas, fummaatthure diftulas, pedales, interdum bre- I.....T foliquando longittjes; non enim fontiaqualis longitudinis, quas in condito ordine fcipiunt habent fia, pralertim novellas, qua; interdum florem non ferunt, nam qux Hores dant rarpra phii foliaolia, majora&brevioraqaainrliqnonrm, craffiora, nontamen fucculenta ut Tele- multis fl, colons quidem viridis, cui zruginenm quippiam admixtum lit: extreme virga;

) culis, quinis petalis albis conftantibus & conertim leu in capitulum congestis o- nuira,qmbus marcefcentibus luceduncangulofo v?.icula,criangularia in fe femina continencia: Sfi! J S. S. J * " i cialltudinTM interdum acquirat, leuta, candicans, in aliquot radículas de-

It plant. & fingulisanmsplures novas virgas produced ve- Urrl^ff- r e " 7xest UJUS Florentia mi lam » Ferrante Tm,peiaoadClufium& 5 jofepho Si n omine, fed perpcram nominatar, utvidcre licebic infra, inter Hallncioationcs hujus

%Potygonum moncanumminimum niveum& fericeum, At Lob, Lugd Polygonum mon- tanum niveaw minimum, Lob. Polygonum moncanum,Tab. Ger. Paronychia Hifpanica,Clmf

Longe elegantillima eft hanc plantula, mukos viticulos humi fpargens, dodrantaes naa- tur ?W mterduni tamen pedales & c loi^giore in hortis cultis,nodofos: quibus adnafcuu- roial'olygonimansminora, & viridia-quidem in noveltis plantis, fucevlu autem tem- porisntimerofa&confertifnma, eaque acerofo, membranacea, prurfus alba, ficut tota planta

infhr ?|^q?misconfavev, tieaturgracimmofpeaculo; Hosilli candidus Polygoni vulgaris fl>,,1? , acico exdi inter niembranuhillaslatens, ut vix appareat: femem minimum, hnrS §uIareuC?oI ygonivulgaris: radixoblonga, gracilis,candicans. Nufquamabun-

aanciaoqnam petrofis & ficci, coUibas SalnjaqticivicimsobfervavJtChirraa, trans Tbormrm. nuvium, etiamcircaValentiani&MurciamobfervaviEidem, &lapidofo illocampofopra An- TM," FocuU D. Martini diverforio, qua itcr Majfiham eft, fed muko minorem & unciales ramulos cauhcubve habentem. Florebat Maio, & Junio femem perficiebat.

i : J ; 3 r COC^m Polonis WftMtl*- Hoctnuiffimis prodit foliis & mucronatis, cau- dS !, 1- H dis : flofci3lis in flininiitace caildidis inter ^»TMTM virefcentes. Ad ra- ionS locis. madllarcitur elegantiffunocoioirecommendatum. Provcnitinatenofopo-

TEMPERAMENTUM & VIRE S .

Succus Polygoni maris vulgaris epotus ni fanguinisque rejectioni prodest: nem moria & arvi ftuoribus. Addit deinde & stranguria laborantibus prodesse & urin mi exacte, ut ait Galenus, discrim- pntibus demorsis cum vino po- na ficit: iff ad febrim anJLL hycam antea ccl(JZ%U was (tdgmitaliximulura toimiefat it. Folia »«O! berpetis, eryfifdatk hrfaiv, rionibus, ademath

edmatii isf vuhmhut recentibus impontintur. Vide c&teras facultates Polygom apud Job. Bauhimimpag. 376. Tom. 3 - to peg- 43 8.435* & 44°. f ^ tertix oprk Botanki quadripartiri Simmis Pauli ubidifufiuividcri pajjunt.

&.2.P0 L T G 0 N V M Pclyfermon feu muhigranum. -.,

Guam vis ha: plantula: fequences non feniine triangular! donentur ut Polygons fupcriora , tamtn propter multiplicem nodofitatem & flores pentapecalos t rfdem pradi^tis fubiticuinius.

vi. Litoreum minus floftulk ex fpadiceoalbkantik B. P. is Prod. \$

Milkerana diolum \ Hamaria | Brfuta, nobk. v

[2. Majus } Glabra, nobis. }
[Major Afrkana, Park- £

i 3. Minus Miikgrana minima, Lcb. Icon. ♀

^ ParvmnfloraalbovertkiWato^J.BXhtih?, £ , •

5. Motifanum Vermkulat^olik, C.B.P. Vewgculata 'inontanitmvaplanta^ Ccl. \

6. Kmwcldi8uM flofculi*
[VITIDIBUS, NOBIS. ♀
[Albicantibus, nobis. ♀

Polygonum Polyffrrmon

[7, Minus folih Serpilli, C.B.P. f urn ahcrum pufillo vermicnlato Serpilli folio j-BXhabr. Ad. Icon. Lob, \$

8. Cbamdfczs folio, nobk. Antbyllisinarinma. Cham < gfyafunilis, C. B- P. 'Anthyllis maritim Narbcnenjium alltra Cbamjefycafacie. Ad. isr Icon. Lob. Lugd. ?

9. Leatifolium, nobis. Anthyllis maritima lentifolia, C B. P. Antbytlis mantima lentifolia prior Peplios effigie, Ad. lion. Lob. %

10. Alfina folio^ nQbhs. Antbyllh mantima Alfinefolia, C.B.P. Antbyllk marina incana Alfinefolia Narbonenfium, Ad. Icon. Lob. Lugd. 9

ExpHcatio hu'ju* precedent Tabula.

Polozonum liroreum minus flofculis fpadiceoalbicantibus, C.B.P. & Prod. Exradicnla ^caulicance. tenui^ blongiiifcula^ rodeiintviticiiipluimi^ enerrimi^ erterramiparfi, r.mofi&dodranrales, foliolis oblongis, anguftis& albicancibus alwrnatim cinffi, adradicem veroloDgioribxis&biancialibDs: viticulomm fnmmitanbus flofculi plures mmutillim,, incus albi foris fpadicii infident ; qnibnsfemina minuciffimaSr copioiiffima, utfingulicoliculieowrge

arenofis ad Viefam fiumeii Aummno florens reperitur, etiam in Lnfatja ubi locis arenofis, in ripa flnminisNiffle provenit. Nos copiofe provenieitem lianc plantain offendimus J fabuloJis prope nontem Neuli qua iter eft ad palaeiom R^ia* "> Pag? DmGermani en Lay fitm.

tolmusfiv, I^ttegrana major, HenM glabra. nobis. Hernari» glabra J. B. rlnbr Herniaria, Dod. Lngd. Tli; il. Tab. Ger. Herniaria mulcigrana fcpillifolia. Ad. Lob. Are fiibjefturo folam occiipat Inxurielwacompliiriumramurculoiuni hae plantula, qnosx flhr^dicLilatundithinci[ideparros, teretes, crekrimisgenicilis interceptos, nd quorum

genicula adverfa folia exeunt Serpilli minora, glabra, ex viridi luea, guftu acri: eodem T erumpunt mirum in mod um nmeroJi tiofculi ey apitulis luteolis compofiti. Locis gaudet li< arenofis reperituretiam innlignofisfedpaEentibus&folixpofitis Iocisjunio, Julio, incuit Sj A (to *f_re[ue]lSi Eft & alia hujus fpecies hirtuta cujus caules & folia cinere obdu

necon E ^ tertja ^ ei. nJar-ia-f-t-u[icora viticulis lignofis, foliolis ohlongiufculis denffimis, forte Herniaria imaiorArVricana, Park. Hxc enim major, amplior, ereftior&ciEterisaiHediftis

ramofior, ca tera cum prscUttis convenit. 3. Polygoni tm minimum five Millcgrana minima, C.B.P. Millegrana minima. Lob. Icon. Herniaria altera, i nra il. Parvula efhsecplanta, vixtriuncialis, orta in rjmbroJis rbffis CTfenni

radice unicum caulem v. unciskm emittit, in quamplurimos ramurculosflivifiimjqm In ci mis multiplicem fultinenti mimerum flofculorum candidorum: qnibus fingulir pltirima femi femiqj lucniM. uiideeinonien.

'A *Vohmum* parviimflore alboverticillato, J.B. Chabr. Semipalmaribus aut palmsribus conftat cauliculis, gracilibus, rigidulis, frequenter geniculatis, in aliquot ahos ignores diviis, ex quorumgeniculisunciam fere a feinvicem diftantibus bina emergunt folibla, Hernianse xere fed potiusCbmdyces inter rotunda, fed minora: inter qua: flofcuh exigui, candicantes, vtrticiUatim inteñifffinws apiculas taftigiati: radícula exigua, fibrata, ficcs fapor nullus maniteftus. Provenit in frobibus foffique & agrorum marginibus.

5. *Tolygonuw* montanumYermkulatae foliis, C. B. P. Vermiculata montana nova planta, Col. Eradiceadmodumtenui, albicante, fibrillis clivifa, viticuli plures fruticantrotundi, candican- tes, denfe geniculati, ex quib>#ampliores refupinatur alas: foliolis digitali longitudine, angu- ftis admodum, rotundis, ca"' bfi, lWibus, vermiculatisonerantur', non diflimilibus Sempervivi niioris, renuoribus niulto ac etiam acuminatis, fed non pungentibus: cum flore re incipit hir- futos parum circa fiores, viticulos habet, fingulifque geniculis & alarum cavis flores fingulos edit denfos ut plures vicTeantur fimul emeVgentes ftellati, colore virente, in medio pallida QXI- gua ftaminula haberites, confpeftuivix fe^objidentia, quibus fruftus fubeft ac fuccefcit ijtri- culi modo iidem quinque radiis fioris i^vmanentibus. Quare ex his videtur plantis qua? florem iruftui infidentem emittur^i.primainquefruftum concWiuunt quam flores, vel eodem tempore, 8f fi magis fruftus confpiiat, ufin Cucurbitis aliifquepomiferis horariis plantis, Lyfimachia filiquofa & fimilibus. Fruftus hi pallentes cumficcantur fiunt, parumque hirtuti, nee me- dnlla interior, quas albaeft/a cortice feeparari poteft., quare potius femen quam fru&um appellare debem us, & vnteger^perieftus decidit. ^ftate floret & perficitur. Inplaniscel- forum montium locis inter iquicolos&Tornempartis fines, in quibus etiam gens ilia meffes legit, hanc reperimus, inquit Columna, inter fegetes fruticantem plantulam,^ e terra palmum fe attollentem, fupinam.

6. *Polygonum* Germanis ftnatneli, Trag. Polygonum felinoides Hnatoeli, Ger. »natoeli, Dod, Saxifraga Anglica, Lob. icon. Hoc Polygonum palmi plus minufve altitndine affurgit, te- nues virgulas, crebro geniculas, complures & ramofas promit: circa quas folia tenuia & exi- lia: flofcilli e finu foliorum herbacei coloris: radix fibrofa, tenuis & oblonga: tota herba una cum cauliculis & floribns virefcit. • Sabulofis ac aridis, etiam aliquando opacis aut riguis gaudet, perccelihumidamconftitutionemfelicius provenit. Eft & hujus alia fpecies cujus illores &: folia omnino albefeunt. Lltramque hanc invenimus nos in neglectis fabuiofis extra fe- pta *Chambort* in agro Solonienii florentem & femina ferentem Julio & Augufto.

7- *Polygonum* maritimum minus foliis Serpilli, C. B. P. Polygonum alterum pufillo ^{verm. i.} culato ^erpilli folio, J. B. Chabr. Ad. Icon. Lob. Polygonum alter um Serpilli folio Pens, Lugck Hoc rarum & haftenus indiftum ramulis & cauliculis eft furculofis, prolaxis, gracilibus, Serpilli inftarhumifparfis: e geniculis foliola prodeunt pufilla, teretia, fucculentq. Thymo parvo nofratri aequalia & fimilia: radix prselonga, lignofa, fapore amancante, calidmlculo. Inco- hkis maritimis Galltoprovincias non fecusacHerniarialuxuriat.

> AVSWAS DiofcoridiL^c.i.^ duplex efi: alt era job* Lent) fmitibu*, moll'ibn: alt era foliis Aiug£, de quainter Cham<xpytides SeStione ofjava agetnu^PUnites 1.26.C.8. illam Anthyllion vocat.

8. *Polygonum* maritimum Chamaefyces folio, nobis. Anthyllis maritima Chamaefyce fim- ilis, C. B. P. Anthyllis marina Narbonenfium altera Chamaefyces facie, Ad. & Icon. Lob. Lugd. Anthyllis Valentina, Cluf. Hift. Lugd. PeplionfivePep^s, Dod. qui in medium adtert de- fcriptionemPeplios^tfiguramadhibet AnthyHidis ^{Val} entinx Cluf. Hift. Chamsefyce Dal^{Pii}. Lugd. Ex unica vero radice multos profert cauliculos feu viticulos dodrantaes, humi ftratos, ramofos, fubrubentes: foliola Lentis exigua feu potius Chamaefyces (cui tota planta adeofimilis eft, ut primo afpeftu Clufm fcellerit, illam tamen diligentius confiderans ladeo fucco carere deprehendit) & plerumque cum fuis ramis velutiquadamfalagine aasperfa, fed etiam falfi guftus: flores enafcuntur puiilli, quinif foliolis conftantes exalbo purpurafcentibus • radicem habetfingularero, nigricantem. Hanc plantam nufquam alibi quam ad foffas urbis Valentin confpexit Clulius juxta ea_mportam qua^ Regiam arcem fpeftat. Fiorebat Aprilis initio.

9. *Polygonum* maritim^ lentifolium, nobis. Anthyllis maritima kntifolia, C. B. P. Anthyllis manMa lentitoha prior Veplios effigie, Ad. Icon. tob. Anthyllis Portlands lend- folia Per., Lugd. Haeciammmaritimis locs ^{procumbit exmk} m^u j^{alf} -- C. J. -- 64 -- 11:18:42 est Hermans aut Chamaeyces: flores calycuhs ^{i j n Ar, ^: ^ << i o u s} i w, i w i b < w u c TotaBDfm falfo, acidulo, lafteifucciexpeL nec ^S r^r Chamaefyceftattienda, ut quidam ^{occludun tur} diderunt.

AV . *Polygonum* maritimom folio Alfinis, nobis. Anthyllis maritimaalfmefoli^C.B.P. An- thyllis

Phyllis marina incana alfinefolia Narbonenfium, Ad. Icon. Lob. Lugd. Paronychia altera, Matth. Lugd. Habethax fo^a Pepii longiora : flores parvos, copiofos, racematim cohzen- tts, albos: folia habet Alfines aut potius Lenticulae, fed per intervalla qudam quafi circa ge- nacula exorta numerofa, copiofiflma: in fummo aggeftis, mufcofis flofculis albiquis, floridum quafi nomen Anthyllidis oftentantibus: feminisetiampufiUiferaciffimi&fummis,^uftu ama- ricante, fubfalfo, nitrofo, calidiufculo. Variat foliis modo fubrotundis, modo oblongis. Vide Iconeshorumin Appendice.

TEMP.ERAMENTUM & VIR3S.

Herniaria infigniter vim exficcandi habet, ut creditur, folidandi t· ferruminandi ex Dodon*o. Herman* five Millegran* tresinfignes facultates tribuit Anguillara. Succut, ait, potu* aut herbaefitata veletiamemplafri viodo plag* impofita morfis à viper a auxiliatur, Secundb empla- Jlrur ex ea herniam mire re/ituit. Poflremo jecori prodeft is ittero: aqua enim dijillata is tit a cur at intra otto dies. Camerarim aquamdiftillatam optimrñ pr*dicat in calculo. Toly- Qoni Herniaria appellati decoctum feliciter, (falculofis profczre r^fe^rtur. Apud Clufium ipfum exficcatum is in pulverem tntum bourn a^tbtie equorum vulne^wm^acykeribus in^perfum, vermes in ñs nntos abigere is enecare; pr&tervero facultatem qua calculofi:prodefi adverfus hernias etiam utilem ejfe.

HALLUCINATIONES CASP. BA HINI

Aliorumque Authorum.

\ Jv.2%7. col. 2. pl.w. Telephium repens folio J[7ion deciduo, C. B. P. telephium Imperati in Jua Hijt. Cam. telephium 7. five legitimum, Cluf. iijj. telephium omne cij planta fucculenta cujusfo* iiafuntfpiffa, denfa, humore fcatentia, & capfulas plurimas Jimui jnttas gerit Sedi injtar, cujus eji lhecies aut genus valde affine in omnibus fuifparti* bus ; atqui telephium Imperati aut 7. legitimum Clufi nullis bar urn conditionibus^preditum efi% ergo non fuiffet Telephium dicendum pimo authonbtis, delude nee Caffaro Bauhino. Flores enim profert pentapetalos : quibus fuccedunt femina triangularia

atque folia denfe per geniculationes caulibus adhe- rent; ergo apte reducitur ad Tolygpnnum ratioci- nando ex libro natunc non ad telephium cum autob- rib us.

Pag. 281, & 282. collocat Caff. Bauhinus Polygo* num inter Coridem & Symphytum petneum & Se- dum, cum quibus fine ultimo neutiquam convenit; ergonullam rationemplantarum fine ultimo conven- tientium habuit Caff. Bauhinus tn affociandis plantis: ob aflinitatem florum, capfularum ipforunque ferni* num debent planta di^poni.

. i

DE MOLLIENTIBUS

Foliis fpiffis, floribus herbaceis, iemine rugofo aut aculeato donatis.

CATV T XXXIV.

BETA.

B Etam Diofcorides I. i.c.i 49. nxhx^nomimant, dicitur is o-eurxo* ab impulfu, quod facile ^{exc}efcat: Beta vero -quoniam figuram liter am & > dum femine turget referre videtur.

Genera: Diofcorides nigramis candidam fecit: is Theophrast. 7. Hift. 4. Candida fapvre nigrh praflantior, qu* Sicula (nunc Ciclapraclis J appellatur: at 7. Hift. 3. is filveftris in genere Carduorum meminit, qu*tamen folia acukata non habeat. Plin. I.19. c. 8. ex Theophrasto, Bet*, a, colore duo genera Gr*cifaciunt, nigrumis candidiw, quodpr*ferunt_o appellantque Siculumx nofiri (fubjungit J Bet*genera faciunt uernum is autumnak. Idem I. 20. c. 8. candid* nigr* ufum pr*ponit is filveftrem, quam Limoniumvocant, addit, quam Diofcorides I. 4. c. 16. Mi^tutm

Beta eft planta emolliens holeracea, foliis & coftis fpiffis : floribus herbaceis luteo-vire- fcentibus, femine rugofo verrucofove, autaculeato donata. Variis modisludit natura in produ- ctione foliorum, coftarum, & caulium aliquando. Eft enim radice fibrofa, eaque vel fpontanea laritima, vel hortenfis, quz eft viridis, alba aut pallefcens, vel rubra, vel major Sicula, eaque -I iridi, alba, lutea, rubra aurantiacave eft cofta, vel radice Rapa? longae rubra, etiamfi fit foliis ve . v . 1 vel denique eft Cretica femine aculeato. Qu arum plantarum traftationem jam ag- v u ^ / i vhnte^s ipias intuearis earumque finem ultimum, hunc IOCUL- fill heuti^uam ven- gi eritimu ^{dicant, nulla chun} ^ ^ ^ ^ ^ exigua cum haftenus traditis & recenfitis < xternae faciei neces-

Hhhh

fifudo

fitudo inrecedit, multominusflorumfeminumqucfimiiitudo; verumcnm& ipfsefintplantV
cmollientes &holeraces,nefcientesqaoaU6referre,hic collocaj* libuitanteSpinachiatn, Bli-
tum, Panetanam, Amaranrtvotn & Atriplicem emollicntes etiam.

TABUL/E, XXX. Seftion\sq\untx.



Beta i Radice. *Hortenjis* \ ["2. Alba velpa/escens, nobis. *Beta Candida*, Tn
 \ Fuck Tur. Lugd. &?
 i-'* iy-Rxbravulgarity nobis. *Beta rubra*, Trag.
 \ Fibroi_a < " -1 \ Sicula seu Syriaca nobis. &
 \ Ger.Park.? Rubra, nobis. &
 - A-Platycaulos, nobis. *Beta platycaulis* Lugd. ?
 itubemma, nobis. ? •
 ^Aurantiaca, nobis. \$
 in/lar,nobk. *Beta rubra Romana*-, Dod. *Beta eri-*
 6. *Carna rubra Rape oblonga*
 lithizos, Lugd. &
 7. *Cretica fen* de spinoso seu aculeato, C. B. P. J. B. Chabr. &

Exphtatio partis Tab. trigefim* St&ionx quint*.

1. **B** *Eta* fpor^n_smarj_tjmacornnil]nis viridis) nobis> Beu fi^veftris [pontanea marina,
Lob, obf. ^^^P^pealoliaprotrudit viridia, vulgaris Bete firnilia, cumqoi-
busdam venis rubr... & curre itibus, aliquando iis carentibus : caults prorrudi-
cubitales & bicubitales, rubros aliquandol, aliquandovirides, fed cenaioreshortenfia Bcti:
in ceteris convenit cum hortensfi. Provenit in iabulofls maritimis Gallic & Anglix : nee puto
hanc specie differre ab hortensfi viridi,

2. *Beta alba*
vdpallefcensquiSicula&Cicla officinarum , C. B. P. *Beta Candida*, Trag.
Fuch.Tur. Cord. in Uiolc. Lugd. *Beta alba*, Macth. Ad. Lob. Cam. *Beta folio viridior*e&br-
vior e, Cxi'. *Beta* hęc, quam exradicis &foliorumcolore candidam vocant, radicem ligno-
sam habet, minimi digiti crassitudine, mediocriter lonirram, candidam: folia dilutius virent
Lapathi fativi modo, crassa & succulenta, sapore nitroso: caulis duos cubitos altus, aut etiam
major, gracilis, striatus, multis alis concavus: in quibus longa serie flofculi exigui ex folio-
rum alis apicibus luteis constantes, quinis calycum foliolis obvallati, quibus etiam semen suc-
cedit rotundum, & superficie asperum, album aut fuscum.

3. *Beta rubra vul* C. B. P. *Beta rubra*, Trag. Dod. Ger. Park. J. B. Chabr. *Beta rubra*
vulgatior. Ad. Lob. Lngd". *Beta nigra*, Matth. Fuch. Hęc foliis brevioribus, atrorubentibus
aliquar... rimum foliis rubentibus : radice est alba, foliis solummodo diffinimur...

4. *Beta platycaulos*, Lugd. HaccftdegeneradoBetz vakaris cuiu. ra*. 1 r •
quacernafve undas, bliola protrudit excodemcaulc adeoSnf Iatefcitad EernaS
praecipueverfiiscimas, ubi femina proveniunt, hocconrin UC v J X_ cerni po<ir ipfecaulis,
^Imge_n eram^tmAj_pa_rago, Intybo, Cichorco. Hl_e_raciosT, gl^ln^U^A^aliisphm^ s diverfo-
Chamcrarii aliiqque mulctsherbis, imo in arboribos&frnrtJk 7% a fali a fii i quis ftrifliffimis

s. & / « Sicnlacoftahta, alba^ Lma. rubra, r_n £ • i^TM^t^" ^" ^ ^ ^ ^ ^ s^alicjuando.
Sicilia femina adnosdelata, & fata in noftria horti, !J - ^urantiaca, nobis. Ex Syria &
diverforum colorra. vms> coltas producit medias, palmam latas

6. *Beta rubra mdice* Rapp^ C.B.P. *Beta rubra R*
Icon. *Beta erithroi*hizos, Lugd. fee caule foliifq^0^"1Do d^a P umrul) nim fativum,Fiith.
betcarnofas, rubras&altquandorubaWis, crair v. ct. icu illbind e dilutius : radices ha-
quise inceriore pulpa rubent & ori qua_m rel]nUam S. pi Saut: Ra P Isoblo ngis formSfimiles,
hortis *Beta on* icris, & folum amat madensA- gratlores Clbot: iue apriores. Serirai in
Eotn asfa^p virt non & hyemc: atrer_n, utu m_ ato PP^o" uniinme VcreSf Julio,
femen ;id nut... i urfi^c; Julio
eiuenta pn_Uiqum caulis exeat, alio-
quill

Hum cibbinutilis futira. Rperitur<iteaa jamdiftaradice tancum buxea differens.
 7. *Beta* Creticafcmine Ippnolb feu aiuleato, C. B. P.J. B.Chabr. Betæ hujusCretica? folia
 CinEiioilratis non multum difiimilia, nifi quod vix unquam 3d eam magnitudinem, quantum
 •obfervarelicuit, perveninnt, cafteroquin larisfpilTa, per extremum rotunda, a*: fakem ob-
 tufa ; iuxta pediculum nonniliil alata : iiofculi parvi, lotei, at! iingula-incernoQ.n 5< in ramu-
 lorum extremitatibus verticillatim proveiiiientes: quibas efflorefcenn'bu? fnbveni»nti-capfulae
 echinatf leu fpinoiic aculeatasve, &nafcuntur circa caulem ad jmcula ex fbJiorurti alifufu-
 perne intres fpinas radiatas dcfinentes, coftis pulchris donate, tranfvcrfisque cancellis re-
 ticulata:, quarum unieuiquefemenineftoblongum, pelticularutii ceftiitit, medulla alba: ra-
 Tiii mulct, cabitalcsyel roinores, ex radice annuafupra- terrain IV-e_ extendunt. Si hsc non
 i.ai ufiiipail'.c yomen Betas adSpinachiam porius referrem-

TEMPERAMENTUM & VIRES. /'

Beta idJid't **bumidum** i" frigidum eft o/us, quod-adjunSam **quantum** [aljlilagimm isrnitrofamfa-
cultatm Sahet, unde & txtergtt & pern#f&pituitam ev&cat. f&eta auttm **editur** is? cito defcen-
 dit.nlvum ad exumendum excltatfTjfrtyn cum jure in quo dettyuil* Cmnpa,abfqjuntfitata,
 depofita nitrojitate, mtina rxtergit ac ahum irritat, Nutrhnentim a%tem ex Beta qualkunque
 tandem txiguum aut nuUtm corpori accedit, idqut minus quam ex LttSluca prohnm. Succut autem
 naribus bidiita pituitmn.clementerextrabit is- caput purgat. Decoffitmfiliorum iff radkumfur-
 fures ac kntes abfiertgit. Radix rafi **mmikd** cort'tce atm, g!^«4^ . TMMo, impofita infantium
 ahum ad exftemntorum expulfiomm invitat, pnefertim exiguofoale confperfa. Beta rubra non-
 nrbil a/lriSHonis particeps ahum minas movet, fed dbo minus idonea. Btt& Romans radix men-
 (ibm.fybertyii cum fate is aceto condita Acetarii locofubhide cotta infertur,palato isr ori grata.

Beta nomm fbi adfc'tv'it quoniamfiguram Uliterx Grzcf dum fmine turget refemvidetur,nam
fummitatem in cacumine reflexam cbi me: id quod testatum nobis reliquit Lucie Columella infuo
 carmine de cultu bortorum, canem^

Nomine tum Graio feu.litera proxima prima:
 Pangimrincridocti mucrone magiitri,
 Sic & humi pingui ferratae cufpidis iftu
 Deprimkur, tolio viridis, pede Candida, Beta.

Ad Bet arum coauramvinum iff piper exfeli fcribit Martialis hid verfibas,

Vtfapianc fatuas fabrorum prandia Beta?,
 O (Itiani faepe petet vina piperque coats.

De ceteris viribui confide Job. Bduhinumpag. 952^^953.

•DH MOLLIENTIBUS

Foliis tucculftntis flovibus herbaceisfemiic fpinofo & non fpinofo, eodemque ca*
 rfrtribus pr;cJitis.

C A' <P V T XXXP.

S P I N A C H I A-

Hoc genus Spinachiam nofra actas appelbt: nonnulli Spinaceum olus: alii Hifpanioim
 obs-'Spinaclia dicitur a fpinofis feminibus, hsecappellatio convenit priori tantum
 non a uteni feqiiientibus; ergo fit olus Hifpantcum femine fpinofo, & non fpinofo feu Leritifcr-
 mi, & fine femine feu fterile.

Pars TABULA XXX. Scftionis quintae.

j" i. *Spinofa, nobis. Spinachia, Fuck Matth. Dod. fab. Spinachia*>

! <T ' Prjcpnans ' Ad.Lob.Lugd Ger% Spinachiamai^Cam, 5?

Sfuucl-M •^uif) p g ^2.Non fpinofo7rtobis. Spina'cbia femine nonpungertefolio tna-
 I jor'e rotundiorty J.B.Cbabr- \$

3. Steri. ^5, C. B- P- Spinachia **fmirta**, Lugd. Cam, <£

H h h h2

£x

Explicat' to partU Tab, trlgefim < e Seftionitquints. ,

i. O Pin -•••ia femine rpinofa, C.B-P. Spinachia, Fucli, Matth. Dbd.Tab. Spinachia, Ad. ^{Lob}
 ^^ L Spinachtas, Cam. Spinofuniolus, Gefn, Hort. Spinachiaobfeminadura &
 Spinofa ^{Gr} iitioTibus<<^*araricaceiiiiifLtmedico:atiisSeutloIapachum,lioceftmedif
 natura Betam & 1? .thum: aliis Seutlonmlache propter facultatem mollieidiquam
 comm.ii.im hubet cum Spinachia BILCO veleciam Atriplici cognata est: folia proiert
 mollia, obfeure virencia, uua, acuminara& latiore bafi triangula, juxtapcdiculumfe-
 penumero una utnngie p- Stfiionedivifa: caules tereces, pedalea, intus concayos,
 fimilibus foliiscbnveftico^ juxtaqoa;, tum& iibftigiis.ramulorum fiofculi lierbacei, race-
 n3acim coherent, luccedentemolliter fpiiiobfemine: radix tenuibus fibris conf;t. Inhorrii
 facillimo cultii provenft, folum vixullum refugit. Qtiovisreterenipore anni fciipotcft, Verc
 fatacito adolefcic & inDra duos menlcs perficitur, quæ vero Autumnoferitur, tion ita celeiiter
 crefcic, led perhyemem rectpa^, moxprtmo Verefemen profere.

2. Spinachia femine r< •i:~j>^iofo, CJ3.1¹¹. Spin3cJya femine noii pungente folio majore ro-
 tundiore J. B. Chal! "hia filvcftris racemofa femine, Lugd. Hift. Spinachia haeclonge
 major, majoribus, quam Spinachia prior, nee non rotundioribus, caeterbqai mol-
 licie & fetaofap iiiiibus, quemadmodum & floribus proxime circa caulem ad pediculo-
 r< m exortumnr icofe: at jemi ^{li}v^{lii}equuncurcong;lon]erata,multa,vlutr>iii racentilum, len-
 ticulis fere paria, p itnnda, nllis fpmia horrida, cineracei coloris. Palferes
 & alia aves iijus femtn. valde vids. Hyemem non tam facile fert ut prior Spinofa.

9. Spmadaa fteriUs, C. B. R. Spinachia 5. Trag. Spinachia temina, Lugd. Cam. Florec
 quid em hæc Spinachia, fed fennais infecnndafterilfcit. Hocpkiribus aliis generi bus est com-
 mune, utCaimabvLupdo, Mercuriali, Cynocramps, &c.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

*Eft Spinichia bumida plane ist frigida ordineferefecundo^ humida magit ex okrum numero, quo-
 rum fufi anria aquopor, isrfapor quahtatis expers^cito iddrco defcendir is ahum emollit. Editur
 decofta, fedalimenti exiguum aut nihilconfert. Flatulenta nonnibil efi & nauftiam facileparit,
 nifi Z'mz^ben aut alia fimili comiatur: recipitur is infer cruda acttar'm ream enata, prius
 falktt quam latiora afuhnatafueruntfolia. QuttTt&affarus Bauh'niw inter Lopatha Spina*
 chiam colhcaverit non poffum fat is ajfequi cum neutiquam Laps t ho fine ultimo accedat uti innit-
 vnut capitede Lapathofupra. Vide Hallucinattoes lapathi illic.*

D E M O L L I E N T I B U S

Floribusherbaceisferamibusnigri^ lucidis, donatis.

C A T V T XXXVI.

BUT I^m.

BA.tfuDiofioriML*.c.iw.qti<iJiB**if abjhietumvet proper inertiamisvihtattm vtlob
 infultum fatuume Jatorm. Felas a & U% pifee omnino inutilideducit: licet is Midum is
 infultanfignificei. BlitumPliniil. 2.c.22.

Genera Uenpbr. 1 .Hifl. ? .pluradixit, at nee Diofcorides me Pliniux differentia tnpofvit.
 Aliud ma}wscjt, aliudminit6: utrumque album is rubrum,

Blitum est Pl^{ia}emolliensifloribusherbaceisjeminiibusnigris|plendntibiisjnvolutiscsr-
 tilagineisfeu membrans mvolutisprxdii. Adeoaffine est Amafanf ho lit difficile fit veram&
 pnnum ejus diftctentomaffignareab Amaranthisquibufciam. Hoc przeipuum camenefo
 diftrimen <p fTMJ<<>> fcm.s mvolutum habet Blicum membranaccum, albnm^nuc,
 quale cenntunn Lapatfn nodi.qooacllubihwii. Amaranths autem caplubm rotandam
 habet,
 coloris .ctios. acquefic acle niter fediftrngtmntur. Eftenim Blirum vel mains bipedale &
 reftm, bocqt ' album vv.r.de vd rubrum: vel minus quod est folio Gtis fSflb, vd'
 v^{tl}, i a f a n v • «h vel minus fptfib Polyip^{ermum} dicrum Cafilano Balb

Pars TABU'L/E XXX. **Sb&fenfe qtini**

Spinachix facie, nobis. Tut a bona Spinach facie, Ad Lch, Tota bona
i.fmnnt Lob. Dod. Thai. Bonos Hmrkws, Tra. Mattb. Tab. 0

f 2. Alburn^ nobis. Blitum i. Blitum album, C. B. P. Lugd. Ad. Lob.
„ n BUtum album, Mattb. i. Blitum fativum album, Gefn. Hort. &
Majm rettum] ? R ubrum, nobis. Blitum majus rubrum, C. J. P. Blittmmliens,
Dod. Blitum pukbrum n rubrum, J. B- Cbabr. £

Blitum
i Annuum

4., Alburn, rtpbis. Blitum minat C. B.P. Ad. Lob. \$
\$. RiSru/a, »obis, Blitum. ubfjtm, C.B.P. Blitum mi-
ntis rubrum, VoJ. Gal. Blitum minus rubrum fupinum,
Lob. Icon. \$

6. Poljfpptmon(h'ftminktop).I); Poljfporn Caffiani,
Ang^illarx, Obf Lob. Bli k »-L ob. \$

*E*p7kat*o partis Tab. tr:gefim<e Seftionis*

Blitum perenneSpinadiias facie, nobis. Tota bon« facie, Ad. Lob. Tota
 bona, Lob-Dod, Thai. Bonus Henricus, Crunf. Trag. ; ^aii. 1 a I). Ger. Hsc **eft** vem&
 eenuina Bleri fpecies, quamvifa viribus Tora bona iecentioribus difta, atque a Cafparo Baii-
 hino Lapithi generibus, fed perperam, annumeratur. Caulesedtt compiores, crairos,fblio-
 fos, pedales, velpauloaltiores, cujusramulis furfum verfus herbeci, racemofi, adharrent Ho-
 fciii, acdeinde feniinaBliriait Atriplicis femula : folia quæ longis iiniEunrn pediculis lata
 func& acuminan, forma quodammodo folionim Ari, fed Candida & veluci iarina refperfa,
 crafla: radix in pluresradtculasdivaricatur, colore veluri Oxylapathi, interiuslurea. In in-
 cultis locis acfa>p(:numeroruderatis, (ecus vias, vetres muros& agrorum fepimentafrequen-
 ter reperitur, Tunioac Julioprarcipuecum flore viget.

2. *Blitum* majus album, C.B.P Lugd.Ad-Lob. Blitum album, Match. Blkum majus, Dod.
 Blitum fativumalbum,Gefn.Hort. Adduosauttres pedes actollitur: caulis ejus rotundus,
 gen'culatus,qui inalason paucas dirtribuitur: folia lunt hita, aenmntata vcluti Atriplicis,
 fed virentiora , leviter albicauiia, glabra : flofculi in fummisraniutis fpicatum proveniunc her-
 bacei: femina hrvibtis mem bran is inclufa, in fumrn^ it idem ramuloium faitigiis racemola: ra-
 dix multiplicibns fibris deorfum demitritur.

S i, iJ/i7<<«rnajusrLiknim,C.B. P. Ger, Blirum majus rubrum, Match. Ad. Si Icon. Lob.Cam.
 Caf. Blitum rubens, Dod. Blitum pdlchrum refum ma gnu Ill rubrum, J. B, Chabr. Facile
 adolefcit hoc magnum rubftftn, radiceftpollicari, fatua_T ut cota planta, caule rrtulofo intus
 extraque fnguineo rubore perfufo,concoloremqne fuccum precilu icmitcente: rofia Betaccis mi-
 nora ,magisru^ora, qua co'lum fpeftaiit erubro nigrtfeunt, in (upina prnce hilarms nibcnc:
 fiolbuli mufcofi fectuidum caukm apicdis pallidis cemfme: (**emeu** Arnplieb Jilveitris vel
 Amaranthi, nigrnm, nicens. Una cum Arripticum (pecicbus viget & floret.

iL.Blitum minus album, C.B.P. Ad. Lob* BHumfilveftre album, Gefn.Hort. Blitum filve-
 ftre minus, Thai. Hocfoliis, caulibus virefcit, partim procumbit, partim refta afcendit, &
 [tores in fpicam digeftos &confqnter **femina** fuis membranaceis involucns ixlufa fpica-
 tim in fummiratibus gerit.

e. *Blitum* minus rubrum, C.B.P. Hoc priori valde accedit nifi quod caules omnes hnnii
 os gerii> ad quorum genicuta (eminaracematim proveniunt, non autem fpicatinifum-
 cauibus, exitifco viridantia ; folia ramuliquicaliquandornbAit.' utnque hsc fpecies mi-
 nor provenit ihhumidis, pinguibus locis. Floret verlus Autumnum.

6. *Blitum* minus Polyfpermon aleminiscopia,C B. P. PolyfporonCa/Tiani, Aug.obf.fif Icon,
 Lob. Lugd. Aci iplex filveftis five Po]y]permoii,Ger. A feminibus & floribus mufco(ls,botry-
 on difliniilloDS,qatbns otuifti numeroft. cauliculi, pedales, aliquendo in pingui ib'otu-
 ajiquandc exiliores, fie denominator: proventc imis foliis Soli ; Atriplicis filvf-
 [unimismenoribus mulro&dcliacioribus. **Hoc mire** captui auchore Caf-
 iifit AnguiUara experimento nixus: radix alba,gracr -1 venit in fterqui-
 liinis circa pagos. Floret verlus Autumnum.

T E M P E R A M E N T U M & V I R E S .

Bietumol//**, Galenus ait I. VI. de Simplicium medicam. facult. est escukntum humid* frigid'sque temperature wfecundo excejfu à temperatk. Alimenti autern corpcri prxbet exiguum, ut 12. de Aliment. jacviu. ex'oleribus est ^V°*s feugustabilh qualitatis expertibus, quorum substantia aquofior est. Hujusmodi nutem olera non solum exiguum nutriunt^ fed & adfacilem dejectionem funt propensa, non tamen vet- .^nter, cum nulk ipfts adfit quality acrk aut nitfofa, qua ventrem ad excernendum excitet.

D E M O L L I E N T I B U S

Floribus herbaceis femine nigro pellucido donatis,

CAT VT^ XXXVII-

PARIETARIA.

E A Diofcoridil. 4. f. 86. à femine aspero vestibus tenaciter adhtnnte, rcspA'juov G*aleno6. fimplquodper dices hac delectentur. Plin. I 22.c. 17. tfefx/we O¹ Perdicium. Parietaria quod in parietink exeat: f* hde Muralk herba C < gf I. 2. c. 3 3.

Parietaria ejt planta ^nra^^. la floribus pluribus herbaceis ex luteo-virentibus, feminum involucris totidem hirtutis, foliis Mercurialis admodum formà fimilibus, hirtutis itidem donata; unde ab exiguis involucris, asperis & hirtutis vestibus pratereuntium adhaerentibus, dicitur Heixine Diofcoridi: est autem respe&u magnitudes foliorura, vel major, vel minor: eaque vel Ocimi vel Alfinis folio.

Pars postrema T ABUL7E. XXX. Sestionis quintis.

\.Officincrum < sr~Diofcoridis, C.B.P. Heixine, Brunf. Matth. Fuch. Lugd. Cam.

Parietaria $\frac{1}{2}$ C¹ cui is Vrceolaris Scribonii. Ad. Lob. (cui isr Vitriola (sr Perdicium) Lob. Icon-

I 2. Minor Ocimi folio, C. B. P. Parietaria exigua 1. Trag. 0

13. Sic ula Al fines folio, Boccon. 0

Explicatio partis postrem* Tab. trigestmdt Sestionis quintis.

1. TTJ Ariel aria Diofcoridis & offidnarim C. B. P. Parietaria, Dod. Tab. Ger. Park. J. B; jj_ Chabr. Heixine, Matth. Fuch. Lu|t. Cam. (cui & Urceolaris ficut & Scribonio) & Ad. Lob. (cui & Vitriola feu Perdicium) Lob. fcon. Casf Vulgaris est notirfe Parietaria vel Parietaria à natalibus fie c'j&a herbariis. Caulibus est hirtutis, ramofis donata: folia habet Mercurialis forma & figura, hirtuta, atrovirentia, & aliquando nitentia*, per ficcitatem faltem; floculos confertim circa caules ex foliorum alis floccos coccinei colons imitantes, primulum e nodulo emicantes; post fe ftamina ostendunt, apiculis obfeure ex albo purpurafcentibus involuta, qux fi filo evolvere coneris subfultim excuiTo pulvere, cum impetu, fpeftaculo jucundo, fe expandunt repanda, in medio feminis rudimentum circumdantia: radix flbrofa. Hanc nostram Parietariam EA^VUS nomine delineaf Diofcorides his verbis. Cauliculos promit cenes ac fubrubescentes, folia Mercurialis hirtuta: circa caulium genicula proveniunt, veluti exilia femina aspera, vestibus adhxrentia. Dicitur & Parietaria quod in parietinis exeat, aique eadem de caafâ Muralis herba, Herba vitri & Vitriaria, Urceolaris & Urceolaria, quod tergendis urceolis vafisque vitreis efficax fit. Diçta autem Heixine quod aspera foliorum hirtutie asperoque femine, tenaci nexu, vestimentis obviis adhasreat. Perdicium a perdicibus quse earn eHtare folent. Nascitur iux<i muros, parietes sepefve, in ruderibus ut plurimum, & iubinde invinetis, ac ipfis murorum rimis frequentissime. In hortis etiam plantata ita provenit ut inde vix abigipoiit. Maiomenfe exiit, Julio & Augusto fomen profert: radice hyeme folia refat: incalidis regionibus toto anno viret, in muris prezeipue; at in frigidis regionibus pereunt tolia & : menfe Marcio prorumpunt,

2, & 3, ^ri^rw Sicuia Alfinis folia, Boccon. Parietaria minor Ocimi folio C.B.P. Parietaria exigua vel i. l' : ag* A Panatana vulgari Matthioli, & à Parietaria Ocimi folia feu i. Tragi differthaec Parietaria Vi^ohistantum, qua font frufturafce figura minima, atque magnitudine Alfinis majons parv. cones & Tragi & hujus proponunmr in Iconibus Pauli Boccon Tab. 24.

Rari-

fuamin **plantamm** Sicili[^], Melits, Gallia*, &c. A. denotat Parietariam vtulgarem, a Parietariam Oci mi folio, C. B. P. feu exiguamvel 2. Trag. **BB** Parierariam Siculam AlfineE folio, Boccon. HjecParietamAlfinesfolio pallim perunivertarj Sidliam vircr, inmontibusHybkisoppido *Milelli* vicinis, Catana:, Merlins & Agrigenti fa[^]ms.vidimiis & legimus, inquit Panliis Boccone.

TEMPERAMENTUM & V

Urn habent folia Helxinei refrigerant em, aufiore Diofcoride, iff aj 1, quart impofittfandnt hues facros, ceadylomata[^] ambusia, panoshicipientes, omnem l'aneu ac tumores. Suetut ejtit cerufa admixta. illitus eryfpidata iff berpetefanat, ni\$ cerate cyprino aut adipe bircino exceptu*: Prode/l iff tuffit diuturidifutcm cyathi mnfura baujlss. Tanfillk quoque inflamiMtis utiliter gargarizatur iffiU'mitUT[^]aumm dolori cum rofaceo inflillata prodcflftilla'titiaejus aqua-, factm abflergh iff nitonm addit; Retentions trntm unriarum pothkrt fuccuin cpotujn TmoranUm urinm citoprovocare aixnt: herb* folia itifar cataptafmatk cum cleo iff amygdalfc dulcibus permixta pttbi iff dokntibus ioefc impoffd", ialctili/is iff urin<£ difficultateiaborantit>us?pr<ejidiofuit. Sunt qui folia cum vino iff quuktiffCretko permifceant \ fed cumoko{tmygdalarumdulciumcitiUSDohrem fedant. Eadem nonnibilcoftvfa iff confricata recenii vulneri impofua iff fanguimmfuppimunt iff vulnns ipfui" plvii* t ft triduo nan permutata maneant, fanant.

DE PENTAPELIALIS

Snicatis feiiiinibus nigris fplendentibus donatis.

CATVT XXXVIU.


AMARANTHUS.

Ai/d&^r¹ dicitur quuft immarcefc[^]dnlk., eoqitod bujm fios decerptus »ori marcefcac, iff cum cuntti flores defecire, aqua madefactm revivifcat, iff bybernai coronas faciat[^] utbabet l'U- 21 • f. 8. At Theopbr. 6. Hift. 6. ^dicitur Gaza fiamimvertit.

Airaxantbus eft planta fpicata, cujus fingnli flores quinh pttalis in extxemo margine contant: atque floribiis fuccedunt feminamuita, n[^]ra, fplendeiuiatplurimLmi, aliquandoalba, **aliquando dilute rubella**, **Amaranthus** floribus quinis illis pecalis **mulco** confpeftioribus conlaccillimeablitoHoribustierbaceisdonacodiftinguitur. Aniamhusdtvelrloribusvemcillatira, vel Ipicatim difpofitis: Am a ranch us Ipicatas eft[^]aniculis propendentibus, **iifqneuefc**, **minealboautrubro**: vel panicalis fniTeftrs, quietvelmajor, niber, viridisaut phecnicejs varianfqc gradus rubictindi colons: (omnes hipsrdifti abundanc femine nigro, ac ruber femine albo vel eft minor, r u be!! us, qui eft aut fpicacuSjCriftatuSjautglomcratus, ant lute us, aut lixaniineus, qui itidemeft fpicatus aut criftatus.

Pars TABULA XXXI. Seftionis qninne.

V • ' I {V&r[^]esflti* feutr kolorihpsfeuvariecoh ratkPfittaciplumasreferenti" II foUa TMs, nobk. Amaranth™ tricolor, Ad. Lob. Tab. Ger. Eyfl. \$ ij'iridibwi macula nigra Bliri itiflar notalk, nobk. £



*Explkatiopark Tab, trigefim*pirn* Settionis quint*.*

I. **A** *Mawnt bus Mūs* variegatis feu tricoloribus feu foliisvarie ccloratis Pfittaci plumas rere-
rentibus, nobis. *Amaranthus tricolor*, Ad. Lob. Tab. Ger. Eyft. *Symphonia* five *A-*
maranthus tricolor Dal?“, Lugd. *Herba Papagalli* & *Blitum maculohim*, Dod. *Blitum* hoc po-
tius quam *Amaranthum* praemifimus *Amaranthispicatis* immediate, cum flores, & femina
racematimad fingula genicUJji gerat, Bliti modo, aptius mea fententia *Blitum* diceretur. Sit
Bhtum adjungendum *Blitis* c? p. fuperiore, fitve *Amaranthus*, parum refert. Radice eft brevis,
candida, infurculofasproj^gi.nesdiviia: cauleunico pedali, rubente, foliis Bliti alternatim
pofitis, viridi, rofeoSjuteo colore pi&is, fieutin fingulis foliis adultis& perfectis ea colons
varietas (pfittacorum plumas referens) jucundiffimum intuentibus prabeat fpe&aculum: !^e
men profert inexiguis-involucris viliofis, racematim ambientibus caulem, & cauli adhaerenti-
bus fine pediculis; cum flos nee fit pulcher aut fpe^tabilis, perinde ac fi natura tantum venu-
ftatisac gratis prius in foliaVontulerit, ut deinde pi&ura riorum oblita eosvix inchoates re-
liquerit, atque vicefloris elegantis folia flavefeentibus puntisviridibus & rubris notata lar-
gita fit. Datur & hujus notha fpecies cujus caules foliaque virefcunt fine maculis, trium colo-
rum in foliis, folia etenim habet Bliti infar macula nigra tantum in medio affecta, neutiquam
in ceteris drtinguitur ab *Amarantho* foliis tribus coloribus piclc. Imo varietas colorum in ver-
ficolorum *Amarantho* ipfo variat, in altero hilarioreft, extremo flavo, medio puniceo, reliquo
viridj, aliquando viridiyte;,,: u'oro, in altero obfeior, ilium *Teminam*, huncmarem appellant.

2. *Amaranthus* paniculis propendentibus femine albo feu *Quinfa*, nobis. *Amaranthus* ma-
ximus, C. B. P. *Amaranthus* major paniculis fparfis, Eyft. *Cmfua* five *Blitum majus* *Peruvia-*
nu'm, Cluf. Hift. *Amaranthus* hic maximus in hominis altitudinem excrefcit, caule craffo, ca-
naliculato, fubrubente, ramis crebris ftipato; folia acuminata *Amaranthi* minoris more., te^d
majora, ex viridi purpurafcentia, rugofa, infipida: flores turn e fummo caule extremifque ra-
mis, tumefoliorumalisemicant, infpicaspalmares&fefquipalmares, imopedaes aliquan^o
digefiti, eaifrequentes&jubs infar, nonnunquam inlatum luxuriantes, colore fuligineo
autpurpurbfoletioris, ftaminulis luteis; quibus femina fuccedunt minuta, alba, miln ex-
corticati magnitudine.

[^]*Amaranthus* paniculis propendentibus femine rubrofloure ferotino elegantis coccinei co-
loris, nobis. Hic *Amaranthus* in omnibus convenit cum priore nifi qu^od folia am^od folia am^od folia am^od folia am^od
fubnigra notata habeat, iecundo paniculas habeat itidem propendentes, longas, at elegantis
phoeniceae aut coccinei colons; atque fioribus deciduis fubveniunt femina leviter rubra leu pm-
chre rubella, in hifce prscipua confitti^ differentia

*. *Amaranth** major paniculis fureftis rubris'viridibus phoeniceis feucoccineis nobis.
Amaranthus fimplici fpica, C.B.P. *Amaranthus* anguftifolius fim phcl { p^olcata p^olcata p^olcata, Obl*
&IconuLob. *Amaranthuscoccineus*, Ger. Hic foliis eft Blitoanguftionibus, oblongis, acuris,
integns: caulibus rubicundis, in fummo brachiatis; quorum fummitates infpicas p^oloris *Ama-*
ranthi rubri fataro colore fimplices abeunt velmultip¹¹⁰8, lux condunt femina n^ogra,
pellucida. Hue pertinet *Amaranthus* major paniculis rubris, Eyft. cujus figuram damus: Radices
habet longas, fibratas: caulem bipedalem, ftipatum, in quo folia Blito latiora & oblongiora,
fubrubentia, fubinde magnis & obfeuris nigricantibus maculis mfeSa, ao mucrone finita, am-
bitu quandoque leviter & tenuiter circumrofa, alarum ut & caulis fuperiorem partem panicu-
lae origae obfolete rubentes, erec^{3e} ftipant, exilibus & medio tenuibus ftamineis flofculis, qui-
nis petalis exiguis, mucronatis confantibus, & poftillos femine in hifpidisloculis condito nu-
meiofilimo, albo, minuto, cumulatim confarfto; cacumina caulis plerumque in bifidam fpicam,
compreffam, nutantem fubinde, extolluntur.

5 *Amaranthus* minor paniculis iurre&is luteis luteopallidis aut ftamineis fpicatis, glomeratis
& criftatis, nobis. *Amaranthus* panicula incurva, C.B.P. *Amaranthus* holofcericeus, Lob. Lugd.
Amaranthus holofcericeis ftinguineis reticulatis fioribus, Ad. Lob. *Amaranthus* criftatus, Cam.
Eyft. Folia *Sojani* & *Atriplicis* *Hehines* foliis longiora habet, in caulibus alternatim exeuntia
fefquicubitalibus, rubris, nitidis ^ vertices verfus brachiatis; cacumina fingula exornant fpi-
cas holofenceap, nibro colore tina* & multipliciter coagmentataj, criftata & in fummo latio-
res feu concrete ac vane reflex^: in quibus continentur femina exigua, nigra, fplendentia,
Amaranthi tnconns, asmula, vel vulgatoris minoris purpurei. Hicex eodem femine nigro va-
riat quoad compntionem lpicarurn; cftenim fpicatus fimpliciter, vel plurimas fpicas con-
glomerates, vellata-s compreilas enftatafe fert: differt colore etiamfpicarum, eft enim luteo,
lut^o-

luteopallido, vel limoniaceoftiamitieovecolore- Idem dicendumdeprscedente qui fpicam proferr (aricfiam; viridem, **rabram** Horace vel dilute, feu phieniceamcoccineamve : omnes t:m majores quam minores panicnlisfuneftis (emina producing nigra, excepto .Amarantlio 'maiore paniculis robris Eyft. qui {emina producit alba. Muhis mod is hid it liarc planta In dica quoad (picas fctipaiiiciilas, colorem riorum, & lemma quzfuiir alba, rubra fru dilute ru belta, & nigra.

TEMPER AMENTUM & VIRES.

Amaranthus brofluviatinguima fifiit ulcer.-; que faniemanantia curst, aiunt **enm** mentions fa •
 • adtfe fn/id'a ficcaqueeffe, quart Horum infufum epotum iy dyfetericis prodefe, isnnenfium **abundantiam** cohibere albaque uHrifiurioms^propterea crutnta explicates kvare7 prgfemm cum
 111 pedicare aut pulmonevas aliquod r^opt(m,fueut^ nee id fine ratwne; n\$M Amaranthi cmnes, author* Lcbdh\refrigerant, re/mguunt & refia^ant.

DEMOLLIENTIBUS

Floribus^iufcofisluteis femin^ nigrodonatis..

AT IXT XXXIX,
 ATRIPLEX,

ATOW* TM& w a'kV << 3 ^ cm o8av0 ^ a^ fatu l^eaf Tbeopb. 7. Hiji. r. *ἄνθος ἄλευρος*

olwaureum, a lutlo fiore\ quern fat DiofcJ. 2. c. H5- Genera duo Diofcoridi isrPlimoL
ritina20. filvejlre is fathom. Dividimus^inquit Caff. Bauh'mm, in bortenfers, fihejlrem fcr ma.
 Atripltrx. eft planra emolltens flori **JUS** mufcofis, Iutds, & femine nigro ntpiurimuni donata.
 A ft pore eft **infipida fen** htua, vel falfa: ab odore eft utplurimum odoris expers, vel fuaveolens **odorata** vel **fcetida atqae ir^raofluni odoris**: afoiis eft vellacifolia, vel angnftitblia : a loco **ftfilvefiris horcenfis fea culinaria**, vel **maritima** incana; a modo producendi femina, tit vel racmola non baccifera, vel baccifera; vel eft femine fingulan binis foliolis inclti(b,eaque ve^lhortenfis, velfilveftris, vel maicima incana ;dehifceordme dtcemus

Pars TABULJE XXXI.

I ;	Fatua f'u: wfpida	1. Major, nobis. Atrip/ex five Pes anferinus la- 'tifioliut laceris laciniit, Ad- Lob. Pes an- ferinus, Fuch- Dod. \$ i.Mifkr folio aattiore, nobit. Pes anferinm alter five ramofes, J. B. Chair. 5? fo.Csndkatite, nob is. Atripkx fUveflris fmuata^Ad.Lob. Atriplex iulgittior /i/iuata, Lob. Icon. \$ {4#Saturatemrmtefpka fv.brubra^nabU. Atrip/ex fiU veflrh altera, C.B.P. Atrip/ex Fitneier^taminor^ Thai. \$ 15. J.tiriiin rralfa procumhent^ nnhU. ☞
Sifaefiii* rachnofdJ	Foliofi- nuato	6.Olida feuf&tida, C.B.P. J.B.Chabr. Carofmouy Dod. Vuharia, Tab. Lugd. ? Odorafive(7.Vulgarii,nobis. Botrys ambrcfioides, C.B.P. Botrys, Trag. j fuaveolens^ Matth. Fuch. Dod \$ (8. Americana Mxieamve^nobis.Botrys Ammcana, Park. 5 rafeiiCV-MaJ0r,nobit4 Spinachiafragifcra, UorK Farnefiani.% MOT 10. Minor,nobh. Atriplexfilveflris baccifera, Cluf. Hifl. \$ (t 1.Minima, nolh. Atriplex filvefirh lafpulaibabens, C.B.P'. is Prod, ☞
Atriplex	Fragif. fructu	

fia. Alba feu pllidevirensiobh. Atripkx Jativa'alba ,Lob,
Homnfts \ boa. \$
113, Rubra, nobis. Atripkx bortmfis rubra, C. B* P. Atripk* J
I rubra, Tab. £

fi 4. Deltoids triangulari finuato < s mucronato baft.t cuspidi
fimili, nobis. Q

ffru I W-oblongo [t.\$, Vmd, itobk. Atripkx vulparkaneufifolia cum
\ follicul^y.B.Cbabr.^
j i6. G!auco autcejo, nobis. Atripkx anguftifofy
I laciniata minor J.B.Cbabr. 7?

Sem'me fing\>
laribink foli-
ofk inclufo

j-i 7. Lrtamcta, nobh. Atripkx marina, Matth.Dod.

/triplex I

Annua 1 8, Hahhifolio, nobis. Atripkx balimoiJes, Lob. J
Obf. Atripkx fihtfiris racanofa foliis ihtegris:
J.BXhabr. %

Maritime,

v 9. Folio dehoide trianpulari minus incano, no
> bis. O

Pmnnis

20. Minimanguflifolia maritima. Bmon.
21. ^fate-feu Halimus latifolim fruticosus.
nobis. Q

22. AngupfoMprocumbais, nobis. Halimm 2.
Cluj. Hift. 0

2 3. Anguftifjmwfolio, nobis. Halite vulgamftt
rcrtulaca marittma, Ger Forhilaca maritimé
<tt.rur.Ad.Lob.Tab. ©

iris inodora.

F Ub- "Wfim*pim* SeQhms quint*.

1. A Triplex filveftris latif lia, C. B. B.

l\ lislnciniis, Ad Lob° Arr' / j ., Atli plex filveftris five Pesanferinus hicoliolus lac
Lon. Lugd. Cam. 1 Tab AH A7" ?
atorma foliorum Pedem'anferin ri Pnc « Jf genas referenda vulgaris occurrit hsc lieiba, quam
ac ramofa affurei-• folii • " " ^ A P' l' i' m' i' n' g' e' n' a' s' r' e' f' e' r' e' n' d' a' v' u' l' g' a' r' i' s' o' c' c' u' r' r' i' t' h' s' c' h' e' i' b' a' , q' u' a' m
marginedivifis- fculi ex CUCUnie lIEr • atS, l* vibus, fplendencibus, aliquot fimibus in
um adh^rens ijf.:- n gU n . mu JCO^5 fubrudent: femem ramulorum cacuminibus lacema-
cusveceres p? ias fe' lin, fatis fimilt est, rad ix in mulf asfibias dividitur. 'Se-
frequens exit. «c floret 1, n lli r S^ar l^> i l n incultis ac defertis, liumentibus nonniliil locis

2. Atriplex filveftri latifolia ZS ^ ^ n d ^ t i u m cum ceteris Atriplicibus filvftiilms.
ramofas, J.B.Chabr. Atrinlvf a AtripfcBfdiSns Pea anferinns alter fiw
difiert a priore, quod folia p S c l i r ^ 3 fclia alcerar q^C Chenopodi « " i 2. Tab. Use
lore est flmiratius virente. "cutiora, tenuius divifa ; lmina minors, & tota planta CD

S' Atripkx fiUcilns folfo filu, ar lte, C B n P, Atnp!eX flveftris finuata > Ad_ Lob-
Atripkx vulgator finuata, Lob Icon " ^ lican ^ filveftlis vulg: ins, Ger - Atriplex filveftris vul-
ganor m3, or f inuata > park < Hanc dift, ^ Clva invol|cns femi " TM constat, etiam folia do-
centd. Iermien, qwnigricant plumbco V? ^ lbi| » m, CDmqUah, bcns aff ociatur in viarum mar-
ginibus, treqoens etiam circa mania t r ^ 1 cta? Foliis minoribus, angustioribus, foillis obtule
per ambitom finuatis, fioribus ex I_K 1 n h e a t .
mgra fpletidentia, plura membrani-
angiilanbus, mcmbraii3 ce is, i n c i j f i j
i finul inclufo, cuni fativi semen unicum binis foJiois cri-

4. Atriphy filveftris altera folio fi
filveftris 1 C.B.P. At, ip! ex Sii vclii
Eriplexa - filveftris I. Match n . " ? ^ P 1 " hbrubra, nobis. Atripies
procericau uc quaternos iz n . primz
fecnte & mm. ii hortensii non admodum dissimili,
led paulo radnow >: ilore in . eoa: e, j n t hortensii, anguloso, pin jun n-
lium : ^ adice fibrata, infuburbiorum fi_m n g e s t o in f m m r t a r i b n s i ad-
etis & tollis passim.

5. *Atriplex* procumbens folio finuatojucido craffo, nobis: Plantaest pedalis, procumbens: folia habet craifa, psona partelucida, ihmargine finuata; caules & folia utplurimum funt rubra: femine onerantur caules fummi r'acematimcompaço, cacterarum filveftriũ more, nigro. Reperiturĩ humidis pinguibufque terrenis locis circa Blxfas. Floret & femina fua nigra minuta perficit eodem tempore cum caeteris filveftribus.

§. 2. A TR I? LEX racemofa fetida.

6. *Atriplex* fetida C. B. P. J. B-Chabr. Garofmon, Dod. Vulvaria, Tab. Lugd. Admodum foetida hxc Atriplicis fpecies, corruptaputridaquefalfamenta, ac teens horum jus graviffimo moleftoque odore, longe fuperat, imo putidos meritricum loculos olet: exignis procumbitcauliculis, Circa quos foliola cobre formaque Atriplicis, fedminoramulto, potius Ocimi, omnia tamen exigua & farina qua/i okdu#:a: flofculi pufilli, mufcofi, lutei: femin minutum, nigrũ, involucris fuis membranacei^teftum, racematim proveniens velut filveftris Atriplicis, fed multo minus: radix t'enuis, fibrillis rionnullis capillatur. De hac fie aiunt Adverfaria Lobelii. Eft^m Nitiobrigum agro alijfque locis quamplurimis negle&is herbula Atriplici verſe accenfenda, lecus vias frequentiffima, tenera, parvula, humicaulicuiis procumbens: folia candore micantia Ocimi forma s/quaTi^polline interfperfa. Hanc notiilimam fecit odor inerat, teterrimus & fere infejqem: odoratu, namque hircum olet teter fpiritus exhalens opplet nares, quoimbuti, querunturWmulti, imo omnes, qui eandem olfecerint aut tantumpedibus proculcaverint, fe meritit^in iũTpm^iocTilos fubodorarts ciTe: planeque referre odorem ilium virofum quem profitutaelibidinifcorta eximpura colluvie congefſta fpirant, unde vulgo Vulvariam, Futinariam dfeitant, atque autumant. Hæc tetriodoris herba illitasveftium muliebrium plicas canes fagire, atque arefto veretro veneris æſtu aftos, illas amplexas cuperemire, præferim in templis ubi tetrius odor ille ingratusfpirat& minus difflatur. Rxc exLobelio. Vulgo appellatur A triplex olid a feufoetens, Vulvaria, Garofmon Cord, in Diofc. quaſi garum five liquamen pifcium olens. ErratCaefalpinus dum femine carere affirmat: alii AtriplicemCaninam dixerunt, quiaeam ex urina canum nafci putant. Locis incultis juxta femitas nafci^audet & in hortis, femel ad hortos tranſlata diutine recurrit: annua eſt ut reliqux Atriplices, cum quibus viget, viret ac perit.

§. 3., A TR IP L EX odora feu fuaveolens.

7. *Atriplex* odora feu fuaveolens, nobis. Botrys ambrofioides vulgaris, C. B. P. Botrys, Trag. Matth. Fuch. Tur. Dod. Ad. Lob. Cd. Lugd. Tab. Ger. Botrys Aitemifia Turcica, Eyft. Botrys altera Ambroſiae fpecies cujus femin Amomumofficinarum quibufdam, Cord- in Dioſcor. Hxc ioribus, involucris& feminibus eſt Atriplicis fpecies odora, etiamfi Botrys dicatur ab authoribus, fed perperam, propter femina racematim provenientia, nam hoc convenit Atriplicibusup'radefcriptis, non minus quam Atriplici odors tarn noſtrati, quan. Americana?, Eſt enim herba pede vix altior, re&o & unico caule affurgens, in nonnullos tamer ramnos difufo ac diftributo: quos folia utrinque laciniata, atque profundius incifa, inftar foliorum Erigeri, exornanf femin in racemulos colkaum, circa totos superiores exit ramulos, more aliarun^prsEdiaammAtriplicnm: radix in fibris abit. Tota herba per macurkatem in vindi lu.teo lanquefcit, colore aliquando rubente: odorata & fuaveolens eſt planta& tota quaĩ gummofolentore prWita, qui colligentium manus iniicic: ante vero quam adoleverit& cum primum prod'erit folia inferiore parte omnino rubent. Nafcitur in Italia & Galiia circa profluentesas&forſtes: reperitur vero in fabuloſis ac aridis, inolivetis quibufdam: facillime in hortis dolefcit. Annua eſt planta fub autumnĩ finem femina maturans.

8. *Atriplex* odora five fuaveolens Americana Mexiocanave, nobis. Botrys ambrofioides u anã C.B.P. in App. Botrys Americana, Park. Atriplexhxcodora Americana altrips^ utur in olures ramos divifa: folia quodammodo filveftris Atriplicis anguſtifoliae funt xm& teniminferioia latoria, ſuperiora anguſtiora atque finuata & dentata Atriplicis ritu: ſcaulibusproveniunt infiniti flofculi, herbacei, fublutei ficut & pricris: femina infiſlummi, ^ gra p'ocluçit5 membranaceis involucris incluſa, ſuperioris feminum omnino a- Td minorã & exiliora, & ut ait C. Bauhinus in Appendice, radice eſt oblonga, fuſca, niula, lea ^ rig cin ^ aj i ntUS Candida; caule pedali etiamaltiore aliquando, in pliguifolo bicapiU^arl)US ^ ru b ent e, quandoque rotundo, ftriato, pilisleviflimis&rar'llimisafperfo: fo. pedali, eoqnf fu oblongis, finuatis, pediculis longis donatis, 6V abfq* e ordine caulem liis pallideviren çibus exortumramuliunciales, ut in^c^teris Atriplicibus filveftribus timbientibus: ad nngu . 11 i i 2

racemosis, fupradefcriptis, emergunt, pluribusveltripitulis racemosisalteinatim difpofitis onutti, **quibus** Imgulis folioluniexigtnimiubjckuriqibus; apertis, (lofcuii exigui, InEoli, Dt in Botryvulgan conipiciuntnr, hifquefcmenminucum, nigrum, copiofmiici; c fuccedit. Hantaetanmta, cxfemmedeciduofcie propagtins. OdordgratusSf imiveoltns, exredensodorum prions. Floret Augafto & Septembri', femina perficit Autumno. Nomen Natales indicat.

§. 4. ATRIP LE Xfragifera feu FragarU frufiu.

Mrtt/x Mori Frullii mijor feufragifera maior, noLi3. Spinachia figgiicra, Son. Feme-
fr. Atrijflexh« iragiferaroiisacufu a even's nondiferr, (edfaporem inusarido, eftautell lolio pcius Spmachit: hos huic ert ipfc&Ute, ex n,ultis petalis herbaceis & n^lcofis
coacervatus » alls f" ^ j « a w propcoKorajB comim.dl^ren, • fiorem evanidnm fiquirur
fructus f ? Frag-in* mibraut Mori, cxnj.-ItKarillfstiinnibuive ptlicula rubra cc^s fra-
pmmrbrum perbellen.-prsfemans, elegantis rubic^idiflimi coloris, fapore eftm.idemlicr-
cia, ut

10. *Atriplex Mori* fructu minor feu fragifera m ^{navi, f a t u i S f infipidi c T}
Hift. Elegans est hac planta, ^{Atriplex silvestris baccifera, Cluf.} inquit Clufius, in Hispaniis non observata, **fedante**
biennium ad nos missa ^{Francosortum a Jacobo Plateau cum hcone ipsius mant) delineata, ctJ1} a Jacobo Plateau cum hcone ipsius ^{delineata, ctJ1}
paucas notas adscripserat, ^{equibus hac ejus historia continetur.} Affnpuici ^{singulati ra-}
dice paucis fibris praedita terni aut quaterni caules, interdum unicus statim radicis capite di-
visus in aliquot ramulos pedem aut circiter longos, inaequales & angulosos, in terram procum-
dentes ^{bus aliis ramulis donatos; in quib} ^{dnascuntur}
folia ^{um latus, modo in alterum dispo} ^{fin angalda, qualia in AtripHcis}
ZrJa ^{bus, incana:}
qu.bufdamiWic ^{as ofi menta, quod}
aM eMa da^ mentitmtuT ^, ^{^ ? aEunC;ire " ^ lum colorem contrahen-}

inHapaverectnicittviolace mHn ^{Fntment,exlgua, TM<nd3, cineracci colons, qu} ^{ere}
mitaVroperiffce ^{ffi n ab r iT ^TSf*} ^{E andem TM*rikm} plantainin **Tirolenfico-**
onem iter facere, ^{sub} ^{I ? ft n m magis ^^ icantem & fuis frnffibas onuihmadeo}
leg.ncibus, ut ipsum etiam ad vefcendum invitarent. Florentem & fructum ^{Frangi magnitudine}
fc ^{centem elegantem & visui gratum: plantam ipsam singulis annis florentem &}
ton ^{habemus in} ^{horto publico Universitatis.}

11. *Atriplex Mori* fructu minima ^{> nobis.} *Atriplex* silvestrislappulas h^bens, C. B.P. & Prod.
Exradice ^{perov3, fibrola cauliculi} ^{palm3ies, itriatiemittiiritur, qucs folia atrovireina, parva,}
angulosa, alteratim ^{offit} ^{i ! a a - reviljus} ^{pediculis donata, cingunt: ad quorum exortumbp-}
adhaerent, ^{tembragru} ^{fllOttan;} ^{imodofimiles, Coriandri feminis mgofi magnitudine,}
plicis ^{infipidar} ^{parva, erectae no} ^{P^iriim, iti fingulis veficis continentes. Hanc Am-}
tofo G^liW ^{nonenf} ^{niincD<DoldlllsadCafp, BiluhiniinimifiE; ac inmonre veriT}
defcriptis. ^{is fs. exeref} ^{C^C Floret eodem tempore cum duabiis fragiferis fapra}

H-S-ATRIP L E x faninefmguhri bink foliolh inchfo.

12. *Atriplex hortensis* ^{pallide} **wrens**, C.B.P. *Atriplex* faciva alba, Lob. Icon.
At ^{radice nitium} ^{annaltum descendente} ^{ex fativa viridis, Cord} ^{L in Dtofc.} *Atnplex* lire (bciva alSa
i&albus, aliqñandombeceni, ⁱⁿ ^{isniulriscapillara, fsc qua chilis erigitur redus, vi-}
cuor cubitos excrefcens, mnl, ^{is} ^{ore narrf rottindus, fnpertore quadrattis, ad qua-}
denique in mucronem defi ^{nentJa} ^{cum bit51} ^{s apendicibiis pinnacis verfus pedicu!umSag'tta-}
riammfctie iminfar, pingui; ^{fuccola,} ^{On} ^{ga • in novella} **platacandicaatia** (tint, **pertnde** at
ft ^{sefin} ^{a effent; quum adol} ^{everint colore sunt ex lut}
fult ⁱ ^{ne dilat} ^{"viridiu: incaulJaril} ^{summis flores} ^{numerofi coacervantur, mulcofi, txigui,}
d<iiiiifif ^{-femen unicum} ^{succedit compressum,} ^{binis foliolis rotundis membrana-}
ceis **indafu**

[^ .HujuB. • ^{ies in omnibus} ^{quadrans cum}
bellum incluai, [•] ^{priore, otceptocolore rubro, autad ru-}

14 *Atriplex* filveftris annua tbio- .iangulari finuato & mucronatohaffoe cripidi famili," nob'is. Hfc Atriplicis Ipecies ' .11 foUis luburbanis humidis provenit: folio eft trian^ulari, acifto-^iacronaco, hafta: • f famili, caul lma procumbentibus, pedalibus & fe^nipedalibus, pediculis longis inn. in quorum f is alia femina multa proveimmu,

•Tingula binis foliolis rugofis aut vi-rrucofis, ntangul ' t.
15. yjrmfex angufto bblongo folio, C. B.P. Vi " cum folliculis , .i.u. & ejnfdem alia Icon. bbTenriua viveut folia, ut pxnc a -i folia pcoxime accedentia, latiora camen, aenminata, fobindc (quam, -"imc fimiata excreicit aiitemadcubkalera&fcfcjtficubitale maltitndiieiii.- . ntnplias finuatae: femina fingultirin fcrt inter bina loliola feu pericarpia folliculr^a, ftcetiam rhoipiboidea, onrerra in pediculia ramulorum, ^usdchiicenpa, unicumoftentantiemen rotundum, comprefTum, m-

U[6/i/n>/fx3ngiirifolmhcini3ta mi^or, J.B.Chabr. Hasc parum in omnibus diftinguitur, neccanliumakitudine, nee foliis firiafe, njpt floPHras auc fblicuUs, fed folocolore glaucu. miLcdio, cauliiim,&lbliorumadir>farraait[inurum plantarum utplmimum; cseteraconvecum i'operiore.

&. 6. AtRt&LEX maritimfeutfalimui.

17 *Atriplex* maritima lacing CB. P. *Atriplex* mari ^li, Dod.Lugd. Cam. Gev. Acricpx marina repens lat« fciir=r;~!:=^ Ad. Leb.-----wrina repens, Lob. Park • Atrip'ex markima, J.B.Chabr. Hzc humi fpargk carriescubiuits, niimerolos, excraflafatisradice exortos, totos aibicaitcs, per quos &fcliacandicantia, finuata, Pedia anferinifi. milli'a • flofculi per extrema ramulorum potiffimum murtofi, racematim congefti, & inter bina foliola.rimola feu afpera, in dorfo aekata , fingulatim fingula (emina condncntur, Repentur Tergefttadfelinaain marislitore. Lobeiuis in licoreis mediterrancis & Adriat.cisnuiquam noiLlfeviam hanc Atriplicem liumi fratam habuic.

1 8 *Atriplex* Halimiiblio, CBP. *Atriplex* halimoides, Lob.Obf. Atnplex fiWeftris racemolii foliis integris,,.) B. Club. HKC foliis incanis feminibus folliculacets membranis binis inchifiscoiivenitcunipriore, nifi quod folia habeac-iuegra, auc parum finuata, nee proiunde finoata ut *Atriplex* marina.

10 *Atriplex* minima perennis folio dekoide trianglanrimusincano,nobis. Acnplex hicin Sarifimis Anplia; & Bcl-u provtnit caulibua bipedalibus, mulcis, lignofis, humi fratis, acque rnediofu'ieaolongiore, adquonimfinguloanodos proveniunc folia triangulana, fin^atata-m,n& •cmminata.coloreniagisincano Atriplice quarta annua folio trianglan dekoide, fed minus Halimo frutescent : flores profert roucofos, herbaceos, c^terarum mamimarum mllre- qmbusfingulis fuiccedunt fingula femina, binis rolliolis verrucofis in dorfo predictis.n-clura:' radix cftlonga,brachiaca, dijdurans, ficat& Halimi c&eri marini, TI rec eod^m cemporeconiLXtcrisHalimileu Atriplicis maritimi Ipeciesus.

to.*Atriplex* minima angu[tiibliamaritima,Boccon. Foliialiuc angui> Il mi-nimi facie, incana pulveris a fpergine marifqte vkjng feraper iordenoa • a...sfol. licalis » duobus ioijolis en3ngul,aribu3 compofiris, fpicarum n.ore fimul pa .jntinentur, fiticn3tamenp<diats binis foliolis inclula, mgra, rpicamtqquafraccmofan component fol-liculi Kali minimi fonnS. ABigaronc PharmacopolaexScschadibusallaram habuic hancplan- *aJB Pan i n3 fjoccone. Planta non muko major eft Icone pag. 30. plantarum ia Sicilia, Melica &c a Paulo Boccone collestarufn.

AAi W DiofcoridiI. t.c. \zi.,idtfi, marinwifcu maritimmoquod in marlttmhprwauat: I dtim ut Pliniuil.ifrc 22. Olu mariimum falum, iff indtnomtn, nam iff alibi quitim in Tbhmttprovenit: quodveroPliviusfineafpirammlegat^fartefaSumquia Snlinus Alimon Ata wfci Prodidit,mrabilieft'fui, quodco admorfo interdiu nulls fames fentiat, ttimtu mminimpfitumfit> quodfamem arceai. Et fpucl Tbeoph. i.Hifi. 20. S^fm kgitur ubi.Ga^

fa^{TMmva} fo ufolia feu Halimus fruticosus lattfolius, nobis. Halimus frnticosus latifolius, Vp Halimns latirolius, Ger.Park. PortulacahTc maxima marina Halimu? ' 'a, cftfru- C L V nmlS CUUSOTIaiUHI-ia, uuu im<0...<<.Y i i u u i j l l l l f >>. V << X < u u . *ir Imnolus, candidioraque, duriora Portulacx raarins " - : : : vefos nerticZ cm oduc m rex ajjs purpureos, Bliti aut Acrididsfloribusliauc abfimils.* femina cimasflorespr .. : : a con tij]e, l[ur fingula, ut in prardiflis, nigra, Atriplicis fativa: aut Atripli^, veroimer bina Tii i 3 1 cis

2. *Hicisiculum ligno (um floribus pentapetalis memfn) iaceis, Boccon. Radices hujus robustae sunt, atque altius in terram descendunt, subinde humano crure vel etiam coxa craffiores: ab his virgae phires, ligno exoriuntur, in tenues ramos distributas: circa quos folia Kali minoris non cedere sperant, fed bina femper ex adverfo citè proferta respondent: iiores aetate albi, pentapetali, patuli, membranacei infaralarum papilionis, qui longo ordine, spe & ab ille elegantia, dense congesti ramulos omnino conciliatim onerant: femine cochleatum exigua rubente tunica coopertum. Juxta Saccam, Caenam, & Agrigentum reperit Paulus Boccone ubi vocatur ab indigenis *Liita* atque ejus cinere in hntes mundandis & dealbandis maxime utuntur. Vide Tab. 31, & 32. plantarum Sicilian, Melitae, &c. Pauli Boccone jibi duas plures exhibet Icones, nempe Kali illorens & non florens, & femine pragnans.*

3: *Kali* minus album femine splendens, C. B. P. *Kali* minus, Ad. & Icon. Lob. Lugd. Eyft. Ger. Etdem natalibus gaudet cum reliquis, ora fcilicet maritima, fed tibiis ac caulibus est minopibus multo, minusque carnosior, angulicibus, nee ita rubentibus, fed pallido virentibus, unde vulgo *Blanchette* apud Gallos quai; *Kali* album vocatur: femine exiguum, nigrum, Lrticas fimile. Non folium calidioribus regionibus, sed etiam ad Septentrionem Angliae, Neuftris Belgioque familiaris est hxc *Kali* femine.

4. *Kali* Craffulas minoris folio, C. B. P. *Kali* floridum // *epens* Aizodes Neapolitanum, Col. part. 2. Maritima etiam est hxc nova planta noster marifrequens inquit Columna, occidentalibus expofita, quae ex minuto admodum, arenae infar, fensi tace oritur non modo in faltinginosis maritimis, sed etiam in mea terranis; *Kali* dicitur SM bmit fibrofam, initio parum fuperne rubescentem, & ex illa bina, craffa, carnofa, veluti vermiculata, fed latiuscula foliola profert, supra humum expansa aut parum elata, ex quorum finu bina alia digital! longitudine, parum canaliculata & rotundiora, Aizoi fecundi Diofcoridis ssmula emittit, in fummo parum craffiora, deinde ex adverfo alia bina, & fic deinde in viticulos produfta geniculatim alia, ut in ramos dividatur, & in terram procumbat; (ed adulu refupinis affur it parum viticu Vis n quibus alternatim folia erimpunt, & ex illis fingulis alae; in quibus iiores in craillis petiolis, mediodie folle illustrato profertim dehifcunt, candidis barbnilis, tenuibus, radiantibus, multo numero, ut plurimum medium exiguum umbilicum luteum habentes, ex exiguis luteis ftaminibus compositum, quae facile mane & fero occulantur clauso flore, recedente profertim folis affertu, his fructus succedit quinque angulis definitus, totidemque apicibus carnofis vallatis, in quo lemen copiofum, minutum, ex nigro fuivefcens continetur, & calyx itcllatus quinque paruta lmea dehticit. ut femine decidere possit perfeccum, atque in hoc Aizoi calyci non parum diffimilis. Auguito mense floret & Septembri lemen perficit, Tota planta falib admodum sapore est gustu cui ai psum gustare cenfeas; fuccofa porro & carnofa est, aspergine quadam splendida hirtutis viticulorum & foliorum depicta est argenteum quid vel potius chrifallinas micas habere videatur. Radix parum fia vicans tenuibus & longis fibris humum petens. In terrems editis ocismantimis, fionarenofisoritnr. Saca in hortis laeteprovenit, verum gracilior. Hujus Plants cinis igmtus fecile coit & congeneram more in vitrum tranfit, vehementiore faltem igne.

5. *Kali* Aegyptiacum foliis valde longis & rufis, C. B. P. *Kali* 3* species, Profp. Alpn. de Exot. *Kali* Aegyptiacum, Park, tnicocaulae exit in plures cauliculos fefe findens, procumbentes, qui ut plurimum refert: fingulis geniculis bina oliola, longa, subhirta aflnascuntur verum terram etiam fefe reclinantia propter eorum longitudinem; cauliculi tenuiores, nudifunt, folia spnatiufque ad cimas, ubi plurima folia, longa, hirta proveniunt, proccedentia haud diffimilia, fed multo breviora, inter cms producuntur fiores tenues, expurpura candicantia multis tenuibus ftaminibus in medio ornati.

6. *Mi*, Arabum i. genus Rauwolfii, Lugd. Gal. App. *Kali* Arabicum J. B. Chabr. *Kali* minori J. i. G. a liaud abimile est, deinde prodit caulicutorum agmine, in varios furculos, graciliores cupiformes: quibus iumme-tenus adherent capitula penitus repleta, fob quibus angustiffima acuminata que fohola forma & vinbus *Kali* minoris jam di i, cum kvioquadam acrimonia, inferna parte penitus alba, fpernecineracea, inquit Ranwolfius, cui dicitur *Kali* Arabum 4-g' nus, Aegyptns *Ojnen* diftum, inchois *Scbinan*. *Kali* Arabum 1. genus, Lugd. Hift. pag. 19. App.

7. *Kali* geniculatum alterum vel minus, g. g. & *Kali* Arabum 2. genus Rauwolfii Lugd. Gal. App. Hic ex izrt cfla fatis multos iurculos succulentos, geniculatos, pedales & bipedales protrudit: in quorum tummis taftigns proveniunt fpicatum multi flofculi mufcofi & herbidii; quibus iubvenjunt femina nigra, oblonga. Surculi ad genicula craffescunt & fuperius internodium videtur mien in, mtexius temper, unde obfervantur inferiora internodia craffiora Cuperio-

Z. Kali geniculatim majus, 'C. B. P. Sah^&nia, Dod. Kali Kellu jEgypttis. Hanc Salicor-
iium reccnuor ^tas appellat, eit enini imcf Kali fpccies annueranda. tamer. fi minus ad ul'tim
expetatur. Kali arricular. umnon. miHi vorant. Cyuliculisai Turgii: terctibus, cobito alcioribus,
ramofis crebris geniculis articulatis "blqne foliis, qui nti prioris Kali minus difti fuotem-
pore rubenv radix fibrofaeft: fuccushujustiti lupeiionslalfusqnoqueacmocdax. Multofre-
quenciflimaefit hicc plantain tjuibuflibetmaritimis oris cum u'eani, r, um medicerranci maris, qu
Salicornia vulgovocaror, firc Kali, geniculatum, fed effigie mukum divcrfa&cuju folia videitui
teneri turiones ramulorum ; Hint enim e radice fibrofio^- pernmlri cauliculi. cubicales, rftti,
denfius genicukti, extremis quafi ioliis craffis, pi/iguibus, caniofis: iruftibus rubentibus cre-
bris geniculis infercis pijtidatim quafi parvoru^i alabafrorum infrar, quadaih Equifeti-fimi-
litodine, 8f connaa refta, obtufius niucrQnata imitantibus; gultu noninfulfo, nee tempera-
mento am ufo a caiteris diipari, fed (B?gire neglesta.

q. fial't fruticosum minus flore minor-, nobis. Sedum minimum arborefcens, Lob. Lugd.
Huic mqoit Lobelius, omnium longe. Tpintmo gaoa&^alia vermiculata, ex Syria aportedo folia
funt quam Sedt minoris vermiculati Uinora mintifque Ipiilli: caulicjli func cubicales & bicubi-
tales aliquando. - inqmbus ad alas Wjfc colifl presrainores, herbacei apparent: radix in multas
radiculas fibratas findi in deorfum -- & fLi)3, lupertu fatiS era (fa & lignofa-Jignofque emittit
fiirculos perpetuis foliolis vtrmiculatis, ex glauco viridibus, denfe ad geuicula onuitos.

to. *Kali* kucicofum majus aic^vl in flore majore, nobis. Vermiculatus frutex major, Lugd.
Vewnicahrifittdcis variccas mte. y. ~. l'um V-'S: " Tum I; !, .. i'mi (fa a cut a, anguib, crailh, glau-
jcaitidem SedivermiculaciformS. Totap! antama) or & lignofior fruttTcit omnino, & effiib-
fnitex lighofns: flores producic ittdem ex herbaceo luceos, fed majores: lemtnafunt uti Kali
nigra, & hac ratione nfti lios duos traticulos averiuncavimusa Sedis, ntque ibis confortibus
Kalifpeciebus adjunximus.

2. *kali* spinofa affinis planta, nobis, Tragum, Match. Tab. Tragon Mattlioli, Lob. Lugd. Ger.
Hie plaiira eft fpecies Kali spinofa: caules protrudic pedales, aliquando alciores, fefe in plurimos
ramufculos tortuofos findens, niultis firatentes foliis craffis, fucculentis & spinofis, colons &
formi Aizoi: ex alis exeunt lappiilae spinofe, quales cernuntur in Tribulo terrtftri.

TCMPERAMENTUM & VIRES.

Kali c'al Utniy facum est, ficcior veto {& cal Mwr ipfius cinh, qui ad quart urn qualitalk utriuf-
tqu&gratfara aecedit. Vrtmli bic iff cauftieam vim babet, colliquescunt hoc contriti faphksis
• in material?! apt am vitreh vafis conficimdk iff conflandis di/hlvuritur. Intra corp&s exigua herb*
hiim quantita&ajfumpta-Tionmodeurmat, fediy menfes potentr ivocat: fetum tarn vivtm,
quam mortuum ejkit: aquofos per alvum humores ducit iff hydropicospurgat. Major quat Mtas
pernkiofa est is exitialis. Fttgantur bujif farbdit dum uritur iff odore iff fumo ferpentes. Mi/ce-
tur vero link iff its qu<e ad fcabiem iff culis fceditatan faciunt aedicamNs: superfluum ac
extertcetitem in ma/ignis ulceribus carnan facile **aJintit**, ut Avicenna iff Serapio referunt. Flos
chrijialli, five ut vulgo Axungia vitri, infignlter reficcat Jcahkm cutifque f<?d'> .^s facile tollit
fi aqua in qua dtzollws aut potim infufus paries infdLe crebriitifoveantuT iff Inventur- Kali i.
AhioiiC. B. P. Cbabr. Kali Lee: fpecas IDUialbUr^otmulii% d&aplanta eft falfa atque acri
fapore pnsdita {'mguamfrhm, uftl Alpino. Kali webkatum majts est Antbyllh falfa quam po-
pularit MCHs Jobannts Major, quondarn Vniverfitat PsfarifiensurfSlor magnificat, bit verbibus
diferibit,

E cineris mafra falfaque Anthyllidis herba
Formari flammis lacida vitra foienr,
Sic cinisatereram, cineres nunc fokorinatros;
Sed nitidum corpus fummo habebo die.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI,

Aliornmque Authorum.

P C B P Sedan minimum arborestem vtrmicula-
tam. Lwl Ibidempl. ^ Sedam mwas frvti-
casum alttrum C.S.P- yermiculatifratisvarie-
tas major, Lob: Sedum est planta pentapctala fen-
quini peralix constans, atque flori evanescenti suc-
cedunt plura loculamenta distincta, semina plurima
in se continentia cujuscuque fut. forma & figura

Sedum mill at fruticosiffo, folia; atqtic he ilua plant a iion pulint hifte rnditt-
sibus; ergo malh adSSdk fpiiei ab duthotihvspTi-
k, dri!ukaCasp. Ba»brnoreferuncur, 'um nil nifi
folta cum Sedo minor(trrtti folio f-.* vtrmiculato
commune habtant. Folia enim ut'fapc a riosos diRum
Tio> ifaciunt adgenus canjHcueiidum: fiores autcm E?
femennigrum minutum gerunt IQdt, tdefrc Kali
foliit vcrmitulata (}(ciebm qtenj'inda flint.

DE MOLLIBUS

Floribus herbaceis.

T XLI.

IAMBE seu PHYLLON.

MERCURI

immatura Celsi 25. c. 5. Ideo Græcis 5 & Mercurialis Theophrasti 9
Hil. ty. 9^a cenfetur,

Gemma Vhfortid, feminae/liff atay, fc, Dmitfhfthe mat, quam TMTM % i * m i f i & u, VM < l.

Mf*i* feu Cynocrambe ceft planta mollis k ibas herbaceis & feminum Mivolucris
hiffati * u apens binatini unftis m quorum fegulis ur^a turn continetur femell. Est enid vd
tefticfilata (etninis fecund^a vcl fpicaca ft. lli, fea feftH. Cynocrambe diftingiitn^a a Mercl-
r. ali non jartibus Guseffentialibus, fed primo dufttiowj Jccondo folia confit viridioribas,
eft enim planta pe.enms r.d, ce repente pradita, cffine vel cefticulaca mas, vel fpicaca femina.
Phyllon neunquam icidem dffert a p^a dftis quoad flores & f^a iia tefticulata; est dim plan-

pen^a, & Phyllon bins & cauibus incanis lanugine alba obduftis.

Pars TABULA XXXIV. Sectionis quintæ.

1. E. Tejlkulata five mas Dh Scoridis & Plinii, C. B. P. Mercurialis mas,
Matth. Fuch. Doj.

Annua

2. Spicata five femina D Jo Scoridis & Plinii, C. E. P. Mercurialis, femina,
Matth. Dod. Ad. Obj. & Icon. Lob. Lugd. Tab. Ger. ♀

3. tjlhdata J. C. B. P. Mercurialis canina mas > CoL Menu
rialk femina Matth. Fuch. Dod. ©

Mercurialis

4. Spicata, C. B. P. Mercurialis canina femina, Col. Cjnd
J aamt femina, Cam, Ep. Cynocrambe five Mercurialis

Tejlkulata, nobii. Phyllon tepcuhtum,
C. B. P. Phyllon arrfenogonon, Lob. Hon.

Incana Monffdienfis Phyl- j. Lugd. 0

(on dicla) i. Spkat a, nabit. Phyllon fpkat urn, C. B. J.

Njyfton theligonon Theophrasti K Vod. Phyl-

L & m marificum, Chf Bft. Cer. Park- O

§-1. £/fft/i (/^Z, /5 ANOVA.

Explicatio p^artii Tab. trigefim^a quart^a Sectionit quint^a.

Mfuri^a testiculata five mas Diofcoridis & Plinii, C. B. P. Mercurialis mas^a Matth.
ch. Dod. W- Lob. Lugd. Tab. Ger. Mercurialis fraum fcrcns, Ca. Mercuria-

naCa, leviter virenrb * mi n. me diff i » guunt, qm inter fe fimillima funt, levia, glabra, mucro-
que anuloli S a f ! " a, TM^{Mw} [crrat^a fapore nitrofo, calidiufculo & nauibolb: caules its *

iom^a i^a SS^a folo, Seniculati, quos

vindiufculi, rnufofrⁱ qui in quacuor petah parva, lli
iuccdunt bina te^anum-mvoZr^aZT^a Wro TM^{gn} aut herbidorum dlentanc: quibus fingi

lingahnicumfemenfinK" S n ^ al^a p^ara, ^ i ! n, s pediculi, mcentia, continent^a
lemii "•" ^ a r l u t a S 7 i r O t U n d u n i, Involucra, tftte Dodonsro, ad Apannw

talive temina Uiof^aRm. ^ Plinii c. B p Merc Bria i i 3 fortina, Match.

5? P i. Lob. Lugd. Tab. Ger. Mercurialis florenSi Clf. Mercuriali te-

fructa & pereunt nullo succedente fcoaioc. Reprcritur Mercurial^a
hortorum fepimenta.

§. *. M: r -

MERCVR R f/lh:- pervmk fdwfuhCymcramkdiUa-

- j^m/ris/i* njontanaCelticulata.C. P. P.Mercurialisakera velmontana^Czf. 'Mercurial!!!; 'caraiimas CoL Cynocrambe, Hbtth.Fbch- Dod. Ad. Lob. (qui ami (igura utymqueexprel- 'fit") Ltied.'cam. Cyndferamb? filreftris hac Mercwiaitei prioien anmiJm fatis refe:t: cau- 'licMlieiirereiiclii, firmiores,dodranta!cs fnnt: folia arius-viiMK, & Hint majorn: lcnii.1 bin.- 'in duobus ofttcoiis Mrftiis c!audunttir,nnictnque unicum: r.'-dix fibrofa, Candida, brefabttt; 'ram\<0>rcdiens fcrpit; .u«de foliaatrias vireiitibus, & -Jtiice longe lateqac fyrpenre, diftin- 'ftiitur aMrcrmialf mareannua vulgari. Tota he/ba virofi odoiisingratntaredrcfr: in filvis ac 'aliiftierende umfcrofis gignitur: virer vigetqicjtotdm quo attrra Mercurialis mas prior anni 't mnore- fepiiA* concineniHi in inyplncns hilpidis binis,mcmbranaceis fepimentis ditiinftris, 'in imedicolotergemina, Tota xflta^viget ucrqaq&hac Cynocrar^bt mas feu ttfticulata,

4. MtTCXTUtlis montana (piciua, r/B.T. ^rctjriaHsc3niiiafcni]ina,CoL CynocAJje five 'Mercciialis Emilia (ilvtibi;,, Cam. jVynocrambc Ft-mina, Cam.cpirom. inMatth. cd, Bauli. In 'Cynocrambfi &ac fenoina <foUorun<5HS petli< nli nrrignatnrtrca ant quacaor aiitqinq; pedem 'lotio-i cenes, ftriati; in qpibos.fiolc^jierbacffi in fpicamtligelti, •ernia tbiolis herbaceis 'contltntes; .inquibus fbraimt^ herbacea: flofclnvlvifiqtiam, fpcatun proveniunt herbaceiina- 'tiliter &ex3tefcntt percuiKqil^'^I^o rclifto lerainc: lumqunriies temin^IiujnsJynocrani- 'bes fiJveftris fioribns-projrefiitit.....~ ,

4 & . ? . MERCVRIALIS pmnh marina incana Ffylhn &Ba.

c Pto#fffltefticlatimi,C. B.P>li^o» mas feu irrhenbgonon niaijxirum, Ad.Lei). Pliyllon 'anhucionon/Lob.lcoii. U&d. Phyllon nranncUm,Clu(" flift. Park. Ger. Phyllon hoc; ArAp- 'nogontiMtcrom vco Tlieligonum dicitur. Phyllon arhenongpnon & Tlictgonon to'io mcano 'Monlpelienfiun] pedales & cnbitale^ibent caules,molcos,totos candido tomento pnbeicentes, ' & per iftatCTi figndfenres, qui in Snosexadverb pofitos oidine ceito alulucuntur.* folia ob- 'lonsa & ffibrotnda, crailiufctih, nervola, mollia, lanugine incanl tefta, ad caulnm articulos 'or^mntur : Hofculi in marequidem minimi, ad junfturas brevibos-pedicnlia nixi, vix appren- 'tes ante fniftus funtdio apices colore Ochri pnllido: fruftasamejn Hintgemelli, teiliculaci, ' r n Mffriili & Cynocrarife mare binis villofis & incanis loculis reticulatorum. 'j'orecomprehenfi: (emina, injiic Lobelhis, ut mmons Helocropit oqllunt, immacura 3Ibid;', •maturaverocyanonitenrcolore,rotunda&quamPipiTismaiora, guftu fervida & notinihil 'irauia • radix lignofa, exilis: Mores ipicad racemofique vtltnti in Mercurial! anni^ Won- 'ft»eUenfibos hxc planca meriro Phyllon Dtoforidis appellate eft , qaamvis \<nk^> yOfcari 'cradic proftter fimilicadineinforteqaandamqnarahafceccumOlea: folia enim habiR oblonga ' & caidicaiitia nt Olei folia : iteffl Bryotiix accedit propter florem mufcoium,ex herbaceo vi-

6 Phyllcn fpicarum, C. B. P- Vhyllon rlieligonah TKeophravDod.Lugd. FriiJnifieap, Ger. 'Cliif Hift Part.Tab. HicMercurialis pedifnis ouiiia incana Phyllon femimficum dlda, 'neutiqna™ difti^gainic amare nifi quod r p! « 3 114 oribus onultis f r m ^ minibus facceden- 'tibns quod contingit in Mercurial! atmua & perehni Cynocrambe dtfta. Iltiaque nalcitur, ' la'ibitClufius, in moltisHifpanijE cVGalliarNarbonenfislocis, lecumfum Has, ubi Aprili, in. 'rerdm matHrius' florfc. In Belgio veronon nifisftate & fingalis ami is ex ftmine germinat, '«t,dnonnalloscherbartercill;idtofoshaspUntasvidi; jnquitjoh. Bauhinus,Circa Monfpeli- 'Aaguftovigentes&.florcnces&remiivFrenEes,meiifibusintcfdii!] Aprili, Maio& Junio.,

TEMPERAMENT LIM 3r VIRE S .

M 'alls ammdtoim maris, tumfemin* caufa is folia tarn inpotu, turn okrummodo in cibo ac- 'm habent ahum mlbendi, emoHiant enim iff abjeigttnh unJe hodie in enemathfaqutm-. 'CEf av iffereur'iaii3eji ufihiisfuccoitidemphimmuitTititr feplafarii tefharmatepwiad, 'nijftmus ^ conficieftdjfm, 7"° adfopitam vjmexpulfricem txcitandam at (pit ad zkndam, 'dm atqueckeh.Umulvum,ijpymts..tylhiTtur thfjquzMtrcur'WH fufco, ml n- 'Jppofitis, wims gmsisvorn* mm ifunefuancaufyAbfmlladacruBeParimi- ' ife nm Uditbiohsis•RiuUm: decoftotum foliorumjufculumhilmiyaquofS 'ri/ice jw" J. ^Q^qu'ukmif ficca cfl tanperatura • neutrn tamtnpnmUm gradatm me- 'JlZntem vifcera £ ut ait Galena j obtim is digcrman fnuUattm. Mirm quod 'da- tijtergn K k k k a tidh nt

traditnt Dlofcorides isPlmiusfi femin*soft tur^n^nes*admixatur Mercurialis femina tn-
 tave bibatur, at femina concipiatur efficere: fin .ero tsafsula, • maremgeneran •
 Cjmocrairibc facilitate priori refrondet, folia quidem cum cauliculis ahum moment is inter okra ,
 7eapiqttejt%t,tedKoS*kerUiti* pituitam, bilm&aquofa dmahunt.utWiofccridesfcribit:
 I hylli arrbenogom potu mafculifexus fieri part us, ut Thdigonifaniml Theophrasiu* is Dicfcorides.
 fcnptum rdiquere. Salmanthmfautriufque dzcoftwm omnibus animalibuia cane rabidodc
 .norfis propinantmagnofucejjH. Granatenfibus vero Mauritanis prafertim ad muliebres mor-
 bos magno in ufu eft Phyllon.

DE PENTAPETALIS

^ Vmmum involucns fuperui- hi/pidis ^ hirtutis bims j ^ J ^
 9
 feminibus r'epfctis don^isl
 -C y/ P «U T .X£jff£.
 EUPATORIUM GR^COR-a^M feu AGRIMONIA.

E ^{Vi0fC0n:l 14t £ -&-^»} Orihifio in c6lte0nihm is ' W™, 'irf ^ Hepatic*,
 «£ mventore Muhndate cognomento Eupatore habefe. *authoritatem habet. Sunt qui ve-*

Eupatorium seu Agrimonia est planta pe«fcipetala, foliis mulcicalatis&ninutis, uno extremum claudente, & semina...» uiuu3 tliipiffil! Lappulx instar' in (iipcrroreparce, in cujus gremio bina, tern a qaternave femina continentur, pars involucri versus petiolnm curtum lzvis & glabra est. ; iemtnisinyolucrummaturum-fuffefcit&cernuum fth propendens

Part TABULÆ XXXIV, Seftionis quinte-

fw minus odor a^nobis. Eupatorium Gr<ecorum,AJ. Lob. Eupatorhtn Gr<gccrum \ •kupaforiumverttm, Lugd. Agrinwnia, Dod. Caf. 0 ' five Agrimomd | 3¹ °fa Sanionenfn feu BUferfs, nobis. 0*

*J i.nj>r*t,m-n fiumaximeodorata Romana, tiobis. Eupatorium Ct- terum odoratum & aromaticum, Col. ©*

4- *Agrimonia fimilis planta, C. B. P. Agri_mides > Col. Q*

Explicat i kTah+srigefim* quarta Seftionis quinta.

E ^{1.} **Ssa** *Eupatorium veterum seu Agrimonia inodoraftu minus odora, "obis. Eupatoriiim Grz- corum, Ad.Lob. Eupatorium y Match. Fuch. Tar. Tab. Eupatpriuni verum, Lugd. A- nia, Dod. Ion Caf. Folia prol^{tr}t A grim cilia oblonga, in plures utrinque lobosdivifa, e regione rachi seu costz mediz adherentia, C^i in: iu*s A, i's part, CU, ar, bus familia, fed latiora & molliora minusque saturo colore vi- n- hirtuta, in anljiro ferrata feufecim dum margines funde nat : e a. is G. i wSto? hirtutus tridcm? cubito alcior, duriufulcus, subt gtfcs?: i c D ' l m J . f i i i i 1 wSto? hirtutus tridcm? cubito alcior, duriufulcus, ribus ftaminuis in infomm TM ? T V C r f u s i i o r c u l i c x e u E - p a r v i , l n t e i « p e n t a p e c a l i , c u m p l u - c i n i d u m c a u m r s i U r U m r n C d l o b t e w s ' A E d e m : h i r t u t e m ; q u i b u s f i n g « T s d e f l o r e c e n d u s . f e m i n a f t - f e n i n n m U u n t h i r ' A A ' T A A A f p i ^ t i m ^ c a t ' t i q u e s a n t c e d e n t e r , p r o v e n i u n t : i n v o l u c r a m a t f i r a f u b t u b e n t & D r n e c K m f " M g W n H i n e f e r e , q u a e d e o r f u m h u t a n t f e u r e c l i n a n t u r .. " m a b i n a , r e r n a q u i ^ H q a m b u l a n t i t i m b e o v e f t i t u i a d t m e n c l a p p u l a r u m m o d o : f e - d i o c r i s c r a f t l u d i n i s e f t U P _ U r a l n l o c « J a m e h r i s d i f t m f t i s c o n t m e n t u r : r a d i x o b l o n g a m e - f e p i m e * a p r a t o n i m a c a r V o r u m ^ l C a t i V I T M T M e f t p e r e n n s : i n l o c i s p a r u m c u l t i s f e o i i s v i a i s , m e n d e i n d e i n m u l t a t n a r f t a t e m V ^ r ^ e i n f i l v , S A X l t) a n l o m e n f e , a c f e r i u s u o t q z : f (t i ' b u s . V - c i t u r & L a p p a i n v e r f a j i l q u e i n A u t u m m i m d u r a t i n c a b l i u m i u p e r i o r i b u s ' p a r . d e o i i m r i d e n t i a p r o d i i c a t ; E S ^ X a p p a r u m n j f t a r £ ? e r ^ & f p i n u l i s p r a e d i t a , i i i i q B k l i i i i i n s . a u t o r i t a t e i D h a b t t ; m a u « n i a b h u p a c o f e i n v e h t o r e n o m e n & R e g i a m ,*

2. *Eupatorium odoratum Santoncnft f«, m V "r A . . * • Hrc folia habet ad eundem modum c o l e t i e u U t e f e n l e , A g n t n o m a m e d i o m o d o o d o r a t a , n o b i s . p r i o r v u l g a m . f e d m a g i s o d o r 4 t a ; m i n u s , a u t e r i*

atitemquamRomaiia feu fequeiis, & m^rltLobeliusinXantis Pi&ayia? Galliae finititni's livis editur Agrimonia, quam odoratam vocat* propter odorem muko fragrantiozem, eamque in hortiscolebatfupeno5ibusanniseruditusmedicusLamouzeus,inquitLobelius'Advfr.Pag.3o8. Nos hanc Agrimonise* fpeciem invenimus in filva csedua & fecundum margines pratorum adja-centium filvae caeduas di&as k Co/tide Chalk pri'mo aut fecundo lapide ab urbe Blaeis distanti.

'%, Eubatorium'raaxime odoratum, nobis; Eupatorium Diofcoridis odoratum, Caft. Eupa-toriumalterum odoratum & ar-omatitnfl, Col. Agrimonia odorata, Cam. Haec Agrimonia a prsdictis distert, primo colore foiiorum minus viridi, fecundo akius attollantur caules* tota plants major est pradiclis, denique odorem fuflundit fragrahtiozem, Ternum etiam in-volucra ipinofiora mulpo caeteris predi&arunfAgrimoniaLm invohicris funt, crafflora, ma-joraque; in hifae notis praecipuacoafit.it diffejntia'. Haec est vera & genuina Agrimonia Di-ofcoridis odorata & aromatica; icic^raeferenda vulgari inodora & ingrata?. -Minim quidem • natura?infutitum ut iniildempratis jbrifque filvarum tam brevi intervalloieu distantia vul-earm prope viliam Chaik, & ad marines pr^tor^hi illic fitorum ueperias odckrataa priorem feu fecundam odoratam, ut ab Odiverfamun^fquifque, nisi jiore & fructu eam em eflet, judicaret, jcd odor fragrantilimu^&colpr foliorutn dilutius viridis statim determinat eam eise distinctam a vulgari fpeciem/ ^ ^ e t ^ . tertia major colore est florum pallidior, tafu vifcofo & odoris fragrantia nobilior ^k iapore aromatico jucundiflimo afringente: radice est ex nigro rubente, fibrofa, cum ?^iq<uis vero excepta magnitudine & odbre aromtico eadem dicerettir. iEftate & Autu?ri~ v^Mri^m^m^ . tr^a^ . * r^61: cbb?.tim adherent ex adverfo cofts mediae unoextremum cofts claudente, ferrata, dilute viridia, vifcofa, valde odorata.. Provenit in agro Romano juxta Praeneste. in eodem colle & femita, & in agro Mahello utramque& vulgarem & odoratiffim^m hanc Rbmanam invenit Fab:Columna, floret asfate, atque An-tumna(einina.ad n^taritatemperducit. Has Agrimoniae ties distinfas fpecies in horto pub-lico tlnivcrfitatis ioiprselentiarum cultas habemus.

4, Agrimonia fioii!is planta, C.B P. Agrimonoides, Col. Propter aliquam cum Agrimoria quamhabetfimiFitudinemhanc plantam Agrimonoidem appellavimus,inquit Columna, cum Latio reierre ignoraremus^ Huius radix parva est & fibrofa, lignoia & rubescens: folia habet terr^e proxima, longis, hirsutis, dodrantalibus, rubescentibus cofts ho:rentia, Fragariae fimilia fed njgria & piurae regione coftseidemmedise adhaerentia & Agrimonia?mc;do difpofita, plurima majora,inter haec alia parvula etiam binatim difpofita interlunt,ut in Agrimonia obfer-vatur, hirsuta omnja, mollia, per aiiibitum ferrara, dentibusfeuferris Agrimonix minoribus Sc acutioribus, verum rotuhdiora: caules producit plures, veluti fupinos, hirsutos, rubentes, alis tribus velquatuor diviios,. in quibus folia minora haerent,, paucioraatque rotundiora,'auriculas habenti^eirca catilem, ut in congeneribus : in quorum fummo tres%it quatuoc infunt utriculi, hirsuti, asperi Cytinorum more & forma, parvismultis incifurisjar orafim-briati, luteim habentes florem parvum Agrimonias,quem in aliquibus locis v^ ex er^ fed intus post ilium tcfte Columna,fruSum concipit.Campoehri vero ilium explicat omnino obfervavit: quo'decifo fruSus producituroblongus, retundus, Tritici grano aequalis, hginariae Cucur-bitae modo binis tere.tuberibus formatus, & perfectus.ex fe decidit hiantem utriculum relin-quens. Aprili mense floret^ &Maioperfraturfemeii. Saporecft abftergente,ficcante6c ama-10. Odorataetiam est, media inter bene%olente<l & vulgarem Agrimoniam. Locis incultis inter vepres & frutices ad Matefii radices invenit Columna, feptentrionem respicientibushu-mentibusque , & in iBquicolorum poftea montibus etiam in meridiei averfis locis umbrosis. Hanc propter amarbrejii faerie quis pro Arabum Eupatorio fupphere-poterit, quamvisnon ij2 fit infignis amaritudinis &fortis, ut dicunt, ei sequiparari poterit ex fentenm Columnae.

TEMPER AMENTUM & VIRES.

Citra manifestam caliditatem afiringehdi me£ocremvim Agrimonia obtinej, is" una temperem Cic-cam. Galena Eupatorium tenuiumefe parfium aferit, '& incidendi expurgandique facilitate prdditum,quocirca & jecinoris obftrufiones expurgare & firmulvifceribm robuafiringendifua facilitate addere decottumfoiiorum; hepaticis ignephreticisfanguinemquefpuentibus is- mingen-aentibus confert femem, Vlinio authore, dyfentericis in vino potum auxiliatur. Addlt Diofcorides • & jecuribus & fji>phDntlvA- rmmmpfit /uvilijp(TE. r. TM r. u. * />H a cum a Jip_e fu i U_0 impofita ulctr'h. • bes difficilem cicatricem contra&entibus medentur Diofco ridequoque autiore; radixcrAJjiorJoris • fu/co rubore prddita, aara, exficcante O* moderate ayimmgemeefacillitate adde&afupfaintuarnh R k k k 3 a f i e f i .

af'SJibus ut decofiinn dilutumve colore limpido vim 4L>ij>l.ueat, tepotum vifcerum hp.uhprx- frtun tomimnfluiiau intanpmanqmfedetcmmr,, cmigai obflruSlicnts tyrefint tbqutfuc- cum c\$tm*rtpnflumintTOcbiaofervant. Parue Bemhw Cardinal tloqutnMimus affauU edarertiki , nnibm expellendasnikil utiliu-s freperijje,quam afhduumufm''''''''' illa iia ex Agnmomafivt EupatorioGrawum. #at L d m:

HALLUCINATION ES CAS*. BAUHINI
Aliorumfue Authorum.

PslZ.Sio.tLi.pl: i, EitpatoriumCf.niithinam, (. B. I', upatonim Aficsnfia CTiduumjCkl, u- patonum vulgart, Matb.Tur. Dud. Lu&t. H«c ejtplants, pappefa inpalukjss & bitnudisprovenhu t4ctriopapej(>uibiii tn SedionefeplMa a nobil ex-BitadundiaHgidebt, nonttiJianU nomineEupato- TII ah aMforibtrofignaff, mllattmstmvent cum i-JipstonaQrscorum fen Jgnma.xia inpartibuj f' jentiahhiti ergo vitiovsrttmkm Co/panBaabim q«i mtos mmnt Eupatorit, lum Eubatorio Grace', ritnjtu Jgnmonitaffitiavcrh. anabina aquatica folio triportito divifo, C. B. P. H aquatilo, Dod. Bidens fo k inpartno divifo, C*{. fo m pl 111, Cannabina a,«ht«a fol,o non divif, C B. P. Eu- patorium unum femina Septentriona lum, Ad.

S hon.Uh. H*plant* rap Hut corymbifer/rlid Co* rymbifemi StfHatsfixtm* uobit dtjpojitas rtfrendx Jan? erg? ma/c hie «Cajbafri Butthifo (habita ratxmt uominity&aturujit ihtqtut authors prime, & &\$. Btiuh» 'tij'etundofactre ob/h-vu/m/.i/ul/a habjta ra- *one no. gener uir 3 rfeentialis,qua (oC/gmrrJ (on- penit; am, fal)em cmivoiire debtt ex libra nature collocant». lbt dim col. 2.pi. vi. jfgrimaititt jimia C.B.p. jffrtmfBoidcs,Cgl Foliarum aliquam cam prae idef y< Agrimoniu vcr'tJic chih jmilittu£- rteta 'jh/bt, fed jlortm, fcmui Sf eap/alam /rniir&~ hm dl>?rjmadi ptHcwt ; cr^o nan ejt zera & genuina 4^ji.'-nix Gratorum Jpencr,f?elnot, at W- «Wf. for>jut,l.'>ti'n/i. nruii: .utei quo alia rifirt ad- junxtmus Agrimourtt prnpur aliquaitm, quii''' lw- btinfaliH.JürfutifJtmilitudwem.

D E P L A N T I S

i-lonbus.mufconfetninum involucrishifpiais donati*

C A T V T X L I I I .
S A N I C U L A .

Sanicula officinar Sideritide tertia traxiffe videtur. Doctiffimus Columna sub Sanicula (prout hic accipitur) est planta foliis lucide virentibus, floribus muscosis & semi- num involucribus h'is hispidis donata HHC6 "om.n.bus abfAuriai!. urfi & SdSdlihfemo guttato, qur l vi S .v2 ulz etiam authoribus dicuntur, fjeile dffinguitur SanicuFa ac Diapenfi ta.

Pars TABULÆ XXXiy. Sectionis quintis.

1. Sanicula officinarum, C. B. P. Saniculi, Trag.Vod.ut.Tab.Ejfl. Sankula Diapensia, Ad. Lob. Ger. ©

Exptkatio parti* Tab, trigfa* qMaru StZHonk quint*.

SAnicula arum CBP* ^"^^^Trag.Dod.ut. Cx~.Cam. T^b. (cul & Confolida HuinqnefoliaT Evft' s—P* Eoa tercpDiofcoridis S' C u i & ? iaPcffi A TL Lob_ o*F" Diapensia," Brunf. Matth/ cuhs a radice promk Ian lucid . . . * nthu,lc Saniculi complura;qua \a oblongts ped- derencur, Vitisfoliis ideircoemnd Vren,ia, & quidem rotunda; nifi innartes qumqaedivi- re v ^ in nmbitu furrata excremilm,? iuo fua, i_ caniljoraniulto St-virentia & fevore ni- ;rancem5Utpcdem,alti, a d d i ^"^^P'l's rubcentibus: aflirguift inter hsc cadiaili do- iucccdente feminero,tu,ldo, ar TM I ^ t ^ l 'ng^rumcnctimintfloculi mufcofi, albidi ; fccnK velbbus Lapparam *^^£?w? iffvo S"o .mc!lllo, pncrercimcium adhere-

fertar&adliortosiaqnibaadbidiS P, au^e AP^inS^m & * } * > Ixco humidoqw folo: tranf- Htibr litijusfciia coco anno nkeai . . . dC J ullolt TM ina fiia perficit &' macnrac.

TEMPERAMENTUM & VIRES.

Ceterum Sanicula Diapensia dicla ut cum aftrictione quadamguftu amaricat, itapraterquod expurget iff abftergendo roboret calida iff ficca eft quidem or dine fecundo. Su ecus adfafianda vulnera datusprodeft. Datur iff decoctum ejws quod fanguinis fpuifionem iff dyfenterias curat :fordida etiam vulnera hoc abluuntur. Humores frigidiore difcutit ac reglvit in aqua decocta, iff cataplafmatis modo impofta; mifceturpotionibws quas vulner arias appellant.

D E D I P E ; f ~ A ~ ~ L ~ I S

Seminum byolucris hirfvitis donatis.

C J T V T . XLIF.

S (L A N ! Ft) L I A .

Pars TABULA XXXIV. Seftionisquints.

Ci Lutetiana major, C b ^ > Ore*a Lutetianajt^Lob. Icon. Valechampii, Lugd. Ger. Circdta < 0*

(2. Alpina minor, C.B. P. Circdta minima, Col 0

Explicatio partis Tab. trigefim quart* Seclionis quint*.*

1. 0 *Olanifolia* Circaeadi&a major, C. B.P. Circaea Lutetiana, Lob. Icon. Dab^{'''}.Lugd. Ger. ^{^^^}•Circxa,Eyft. Folia habet Alfine majoris, mucronata& glabra, jucida: caules pedales & altiores in umbra, reftas, fraclu faciles: flores ex purpura candicantes, dipetalos atque uniuicujufque petalum ad medium bifidum eft cum multis ftaminulis fiifcis in medio horum duorum petalorum; nee in tota tohorte herbarum aliam novi, cui natura florem dipetalum largita fit praeterquam Circaeae, quae obfervajcio notatu digna: feminum involucra funt rotunda, kirkuta feu afpera, veftribus laneis pccetereuntium adhaerentia: radices funt multae, lenta?, profunde in terram fe demittentes, & longe lateque repentes, quibus largiter fe fe propagat, fimulacradicemegerit. Vires hujusnondum funt detefta?. Eftenimplantarariu[#]ima[#], & fingtilaris propter flores dipetalos, etiamfi fit in omnibus filvis umbrofis humidis reperta.

2. *Solanifolia* Cvcz2 Alpina, C. B. P. Circaeaminima, Col. Hanc Francifcus Gregorius Capucinus Circaeam montanam, pumilam appellavit; adeo fimilis eft Circass Lutetiaⁿ; Lobelii, nbn illi quae Amara dulcis dicitur& Solanum repens-Circeas majori itidem omni (ui parte aded fimilis, fed adeopufilla, utvixIconemfuperet a Fab. Colmna allatam pag. 78. part. 2.& nobis Tab.34. verfus finem; perfe&a quidem eft &*iymmetria refpondet majopi in omnibus, radice, foliis, flore & fruftu, quam ficcam accepOColumnaã prasdifto patre Gregorio.

HALLUCINATIONES CASP. BAUHINI

Aliorumque Authorum.

PA. 16\$. col. 2. pi. 1. *Solanifolia* Circtca diUa floribus, nec involucris feu femirium capfulis feminiflitor, C. B. P- Circtea Lutetiana, Lob. Jit ibi- nibufve cum Solano conveniunt; ergo male a Caffaro
fkrhpl¹¹ Solanifolia Circaea* Alpina C. B. P. Cir- Baubino coliocantur inter Solahi fpecies Bac erf eras
mⁿina, Col. Nⁿ habent affine imo nee folijs, nec
c²² ...m- Pul Nⁿ hnhpnt aff,nt>. into neh Jalur.npn - plantOS.

Partis fecundae Se&ionis quintae finis..

BOOK CARD
Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

Call No.: MOR-p... Acc. No. A-8708

Author: Matsson, R.

Title: *Plantarum historia univ.*
- *folio Oxoniensis.*

Name of Borrower/Code No.	Date of Issue	Date of Return

INDIAN BOTANIC GARDEN LIBRARY
BOTANICAL SURVEY OF INDIA