

2.35
L

TABLEAU ENCYCLOPEDIQUE ET MÉTHODIQUE

DES TROIS REGNES DE LA NATURE.

BOTANIQUE,
TOME SECONDE. II

PAR. le Citoyen LAMARCK.


P. 13



A P A R I S;
Chez PANCKOUCHE, Imprimeur-Libraire, rue des Poitevins N°. 13:

M. DCC. XCIII.

1793



A V I S.

L E S Soiifcripteurs ne doivent faire relier aucune des parries de ces Planches tTHistoire Naturelle; les discours qui accompagnent plufieurs livraifons déjà publics, n'e'tant pas terminées. Lorque les Planches qui reprefentent les Animaux feront finies, oꝝ nous efpe*rons qu'elles le feront cette année , nous indiquerons toutes <elles qui doivent aller de fuite , pour ne former qu'un volume *kfrktfar* de ceux des Arts & Metiers mécaniques. Le discours doit être auffi relié %trejhent & dans l'ordre que nous indiquerons*

Nota. C'eſt par erreur que dans la quarante-quatrième livraifon , le frontispicédo premier volume de cette matière porte PREMIERE LIVRAISON ; /ife^ToME PREMIER*.

R. II fie

316. B R O S S t.

Carad. effi.it.

V-rf * L. charmi , y-fi Je. Cor. tronquée. Ca^f. a S 1o^s , \<ii, ij ertne.

jCaraS. nat.

Cat. inonoj hy'le , charini , quinqnefi^e : a ie-
cnn urea risciongoes , aaaminies , tiro^L^s ,
de U lo:igii in dc hcorolK¹.

Cor. mono ~~etale~~ , conoiJe, tronqtiee au foin-
met, emtere.

E.'ivn. Cinq, enfernices *tia'.s* la corolla.

I'i?. Ovaire Tu trieur? pentagon*¹; Style fu-
ouie, |>juscoartqufi la corolla Stigm. Jlm[jle].
Pine. Ca. ('ule an ndie, marquee de cinq it I lot's,
a cinq loges , rcrouvrte jar li" ciiice \ er-
filUnt, t^m^ii^i, clurnu , coimveiit, ouverc
par i< cotes.

*Stm** nombreufes, trcfi-pctite^i

Tableau des espices,

22(St. BROSSE variant. Did. i. p. 4.70.
L., n. JcsboisaeSaint-Donui^ui;. \)Atbeiffneau
de 3 ou ^ pieds.

317. A R G O P H Y L L E .

Curak. effent.

CAL. J"-fiee J" pdtaiflP. Tuhe ntcrieur pyrairi-
dal, 5-fionc, cromjue; C*L\ ieuu - lnfe-
rieure • ~~3~~-loculaire.

CaruS. nat.

Cat court, quinquefiJe : à cYCoup, pojntues.
C>r. Cinq petalcs t lanccolcs, trois fuis plus
Jon^s que le calice ; ouvcrts.

Tube intercur | yramidal , pentagone. tron-
qnc, ouvert au Ibmrnet, forme d- filets nom-
btcux, coimvens , reunis dans U-ur pattie inf.
f,tam. Cinq Biameij, /iibtitts , p.tt^clics at
recejtuclc , eofertoes dmas lc tube. Amheres
ova lf5.

Bvtaniqu. Tome If.

316. B R O S S M A.

Chdrus, tifent.

V - T. carnofus , 5* - fi-his. Cor, truncata,
Ci;f. f-iucubris , poj)Tpenna.

Charad. nat

Cut. monoDbylluB , carnofus , quinquefiJus : la-
ciniii obloigis, tcyminatts,, eredis, longi-
tudinc coroilce.

Car. mono^euJa, co.nid^ apice truncata, Integra.*Seam,* Qoinque , incluCt.

Pifi. Germen faj erum I pemagonum. Stylus
lubulatus , corolla brevior. Stiguii simplex.

Perk. Carfula fubrotunda , quinque futcis di-
vifa, quinqueociilads, te3a calyce j'erllftente,
aoij li^Lo , carnoib , connivente₃ lateribui
Lervio.

Sem. Piuriaia; minucilGma.

Confpe3us fpecierum.

2261. BROSS.EA *iocevtea.T. ru.*

Ex lytvis Domiugi, Tj Plum. Gea. 5. Burnt*
Amor. t. 6f, f. 2.

317. A R G O P H Y L L U M .

Charad. ejfent.


CAL. JT-fi3us. Pi'tjla f. Tub us interior pyra-
midatus-, f-goiul", trunCatus. Caj-f. femi-
infera, 3-locularis,

Chitmcl. nat.*Cal.* br.'v's , quinquefiJus: hciniis acntis.

Cr. Pftab quinqte, lariceolau. Calyce triplo
majora , [.atentia.

Tubus interior pywunidalis ; pentagonus ,
tmncatus , a; ice | ervius , conThos capillif
jiuiunis , conniventibua , ball connatis.

St 'm. Filamenu quinque, fubulata , recptaculo
inferu, tiibo inclul'a. Antlicrae ovate.



* PENTANDRIE MONOGYNIE.

Pi/7. Ovaire demi-inférieur, turbiné, plane.
en-defl'us* Style filiforme, de la longueur du tube. Stigmate globuleux.

Peric. Capule semi-inferieure, hémisphérique, aplati en-deflus, triloculaire, s'ouvrant de trois cotes.

Sem. nombreuses, arrondies, poreuses.

Tableau des espèces.

2262. ARGOPHYLLUM *lui fiant.* 18i. j.p. 248.
L. n. la Nouvelle-Caledonie. Arbres fruitiers.

Explication des fig.

PI. 111. ARGOPHYLLUM *lui fiant.* (a, b) Fleuret. (c) Calice avec le tube intérieur. (d) Pétales séparés. (e) Tube intérieur, coupé, montrant les famines. (f) Lamelle groffie, (g) Ktamine. (h) Style, stigmate. (I) Capule. (k) La même groffie & coupée.

318. LICIET.

CaraM. ejfent.

CAL. court, à 3 ou 5 dents. Cor. tubuleuse. Etamines velues à leur base. Baie 2-loculaire, polyperme.

Caracl, nat.

Cal. monophylle, court, perfistaw, droit, à trois ou cinq découpures.

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube cylindracé, plus long que le calice, un peu courbé. Limbe quinquefide, ouvert.

Etam. Cinq filaments, fubules, attachés au tube de la cor., veius à leur base. Anth. arrondies.

Pift. Ovaire supérieur, arrondi. Style filiforme, plus long que les étamines. Stigmate bifide, un peu épais.

Peric. Baie arrondie ou ovale, biloculaire.

Sem. Pluqueurs, réniformes, attachées à la cloison épaisse dans le milieu.

Tableau des espèces.

2263. LICIET d'Afrique. Dirt. n°. 1.
L. épineux, à feuilles fasciculées, linéaires, rameaux roides.

X. n. TAfrique, T> t.pctius > etrffftes > &c.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Pijl. Germen femi-inferum, turbinatum, fu^{ra} planum. Stylus filiformis, longitudine tubi. Stigma globofum.

Peric. Capule semi-infera, hemisphaerica, fu^{ra} plana, trilocularis, tristylat. Q. h. i. f. cens.

Sem. Plurima, globofa, porofa.

*Confpedus specierum**

2262. AKGOPHYLLUM nitidum. T. in.
E Nova-Caledonia. For/I. Gen. i5. L. fljhpl.

Explicatio iconurn.

Tab. in. ARGOPHYLLUM nitidum. (a, b) Flos integer. (c) Calyx cum tubo interior. (d) Petalum separatum. (e) Tubus interior diffusus, staminis exhibens. (f) Idem ampliatus. (g) Stamen. (h) Stylus, stigma. (i) Capsula. (k) Eadem aucta & disjecta. Fig. ex D. Forfi.

318. LYCIUM.

CkaraS. ejfent.

CAL. brevis, 3 f. y-dentatus. Cor. tubulofa# Stamina bafi villofa. Bacca 2-locularis, polyperma.

Characi. nat.

Cat. monophylius, brevis, eretetus, perfiflens, tri f. quiquetidus.

Cor. monopetala, infundibuliformis, Tubus cylindraceus, calyx longior, subincurvus. Limbus quinquefidus, patulus.

Stam. Filamenta quinque, fubulata, tubocorolte inferta, bafi villofa. A nth. subrotundata.

Pift. Germen superum, subrotundum. Stylus filiformis, flaminibus longior. Stigma bifidum, crassituberculatum.

Peric. Bicca subrotunda, velovata, bilocularis.

Sem. Piura, reniformia, diflamento media incrafato atExa.

Confpedus specierum.

2263. LYCIUM Afrum. T. H2. f. 1.

L. spinosum, foliis fasciculatis, linearibus; ramis illris.

Ex Africa. T> Michel. Gen. t. to S.f. %*

PENTANDRIE MONOGYNIE.

2264. LICIET de Chine. Did. n°. 2.

L. épineux, à feuilles presque ovales, pétiolées; rameaux pendans; calices quinquefides.

L. n. la Chine. T> Style plus long que les étam.

226j\ LICIET 'afeuilles étroites. Di&n°. 3.

L. épineux, à feuilles lancéolées5 rameaux pendans; calice trifides.

L. n. la Chine, &c. B Calices à 3 lobes.

2266. LICIET d?Europe. Dift. n°. 3.

L. épineux, à feuilles lancéolées, obliques, un peu charnues; rameaux flexuets, cylindriques.

X. n. l'Europe au Arale. T>

11(^7. LICIET de Tartarie. Did. suppl.

1^, épineux, à feuilles falciculées, presque linéaires, charnues; rameaux couchés.

X. n. la Tartarie. T> Arbtiff. e'tale', trainant.

2268. LICIET Capfulaire. Difl. n°. f.

L. épineux, à feuilles lancéolées, minces, glabres; pédoncules & calices pubescens 5 j'épicarpes capfulaires.

L. n. le Mexique. ft Cor. en roue.

2269. LICIET glauque. Dia. n. 6.

L. épineux, à feuilles arrondies-ovales, acuminées, glauques; panicules terminales.

L. n. le Pérou. "b L. hétérophylL miirr.

• LICIET (tetrandre) épineux, à feuilles ovales, obtuses, charnues; rameaux anguleux, glabres; corolles quadrifides, tétradiques. Le Cap de Bonne-jeSpérance.

* LICIET (inerme) sans épines, glabre j à feuilles oblongues; fleurs ramafées, pédonculées, litigues barbus. Le Cap de B. Efp.

Explication des fig,

Fl. 111. f. r. LICIET <?Afrique. {a, g} Rameau compofé, avec des fleurs. (c) Corolle entière, fé-pavée. (*0 La mème ouverte. M Etainine. (/) Calice, fl. ls, &) Kftil- (A; Bale entière. (f) La mème coupée cranverfalement. (/) Semences séparées.

PL lil. Uz. LICIET dt Chine.

PENTANDRIA MONOGYNIA; 5

226f LYCIUM Ckinenfe. T.112. f.2.

L. fpinofum, foliis fubovatis, petiolatis; ramis dependentibus; calycibus c^uinquefidis, £ China* T> Stylusfiamibus longior.

216; LYCIUM barbarum.

L. fpinofum, foliis lanceolatis; ramis depen* dentibus; calycibus trifidis.

£ China, &c. T) Sty I. vix longitudineflaminim:

2166. LYCIUM Europceum.

L. fpinofum j foliis lanceolatis, obliquis, fubcarnofis; ramis ftexuofis, teretibus.

Ex Europa auftrali, T>

^16^J. LYCIUM Tatafuum.

L. fpinofum, foliis falciculatis, fublinearibus, carnofis; ramis decumbentibus.

E Tataria. T? Pall.fl. RoJJT. t. q\$.*

2268. LYCIUM capfulare.

L. fpinofum, foliis lanceolatis, tenuibus, glabris; pedunculis ca'.ycibusque pubefcenti* bus; pericarpiis capfularibus.

E Mexico. T> Cor. roiata.

1269. LYCIUM boerrhavixfoliutn.

L. fpinofum, foliis fubrotundo-ovalibus, acu* minatis, glaucis; paniculis terminatis.

E Peru. T> Ehretia.... UUerit. Stirp. t. z.j.

* LYCIUM (tetrandrum) fpinofum; folii* ovatis, obtufis, carnofis; ramis angulatis, gbris; corollis quadrifidis, tetrandris. L.f. fuppl.

* LYCIUM (inerme) inerme glabrtim; foliis oblongis; floribus aggregatis, pedunculatis, ftipulis barbatis. L.f. fuppl.

Explicatio iconutn.

Tab. 112. LYCIUM Afrum. (a, 5) Ramus cotnpo* fitus y cum floribus. (c) Corolla integra, Teparata. (^) Eadem aperta. (1) Stamen. (/) Calyx, liylus. (/) Piftillum. (A) Bacca integra. (0) Eadem ttanfverlu* fefla. (/) Semina sepaavata. Fig. ex Mich. & ex lleri.

Tab. iii*f. 2. LYCIUM Cneif.

2 PENTANDRIE MONOGYNIE,

319. CESTREAU.

CaraS. effent.

CAL. court, à y dents. Cor. tubuleuse. Etam. glabres, avec une petite dent. Baie i-locul. polyfperme.

CaraS. nat,

^x*CaU monophylle, tubuleux, très-court, à cinq dents, droites.*

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube cylindracé, grêle, très-long : à orifice un peu dilaté. Limbe quinquefide, ouvert, court; à découp. ovales, régulières

Etam. Cinq filaments, filiformes, attachés au tube de la corolle, munis d'une petite dent en leur milieu ou vers leur base. Anthères arrondies, à Torifice.

Pift. Ovaire supérieur, cylindrique-ovale, de la longueur du calice. Style filiforme, de la longueur des étam. Stigmate un peu épais, obtus, à peine échancré.

Ptric. Baie ovale, biloculaire (i-loculaire selon Linn. & G&rtn.)

*Sem. Pluieuses, anguleuses, attachées à la cloison, qui est épaisse dans son milieu**

Tableau des espèces.

2170. - CESTREAU noSurne. Dift. n°. I.
C. à fleurs pédonculées, presque en grappe, verdâtres; filaments dentifères | baies blanches.
L. n. TAmérique mérid. T>

2271. CESTREAU du Chili. Difl. suppl,
C. à feuilles étroites-jancéolées, garnies de stipules; fleurs presque en grappe, fafciculées, tenu jayne verdâtre; baies violettes.
X. n. le Chili, "b Arbriff. fort rameux, de 3 à 5 pieds, subfl. en plane terre en notre climat.

3272. CESTREAU à oreillettes. ma.n°.2.
C. à fleurs pédonculées, presque paniculées; stipules en oreille, enroulant le rameau.
L. n. le Pérou. T) Voyez l'Hérit. Stirp. t. 35.

+2*1\$. CESTREAU à baies noires. Dift. n. 5.
C. à fleurs fafciculées presque feffiles; à limbe

PENTANDRIA MONOGYNIA.

3ip. CESTRUM.

CharaS. effent.

CAL. brevis, ^-dentatus. Cor. tubulofa. Stan*, glabra, cum denticulo. Bacca 2-locularis^ polypferma.

CharaS. nat.

Cal. mcnophyllus, tubulofus, brevifimus, quin^ quedentatus, erodus.

Cor. monopetala, iiifundibuliformit. Tubus cylindracdtis, longifimus, tenuis: fauce subdilatata. Limbus quinquefidus, patens, brevis; laciniis ovatis, aequalibus.

Stam. Filamenta quinque, filiformia, tubo corollae inferta, in medio aut verfus bafim denticulo notata. Anthers subrotundac, intra fauce m.

Pifi. Germen fuperum, cylindraceo-ovatum, longitudine calycis. Stylus filiformis, longitudineltaminum. Stigma craffluscum, obtusum ^ vix emarginatum.

Peric. Bacca ovata, biiocularis. (i-locularis, ex Linn. & Gartn.)

Sem. Plura, angulata, diflēpimento medio in crafflato affixa**

ConfpeSiurfpesierum*

2270. CESTRUM noaurnum. T. 112. f. I-
C. floribus pedunculatis, subracemofis, vi-
refcentibus; filamentis dentatis, baccis albis.
Ex Amer. merid. T> Dill. Elth.t. i5\$.

1171, CESTRUM Parqid.
C. foliis anguliflo-lanceolatis, stipulatis; flori-
bus subracemofis, fafciculatis, ex luteo vi-
refcentibus j baccis violaceis.
E Chili, 't Parqui Feuill. obf, 3. t. 32. C
par qui. L'Herit. Stirp. q. t* 36.

2272. CESTRUM auriculatum.
C. floribus pedunculatis, subpaniculatis; sti-
pulis auriculatis, ramulum cingentibus.
E Peru. T> Uediunda. . . Feuil. obf, 3.
t. 20. f. 3.

2273. CESTRUM vespertinum*
C. floribus fafciculatis, subfeffilobus; lin

rpENTANDRIE MO^OGYNIE,

pointu j baies en forme d'olive, d'un violet noir.

Z. n. la Jamaïque , Saint-Domingue. f Ixora / acq.

2274. CESTREAU *a fleurs pdles.* T*i&.* n. 4.

C. à grappes compofées, axillaires; fleurs petices , pâles ; feuilles ovales-oblongues , acuminées.

X. n. la Jamaïque, &c. T> *Feuilles grandes.*

2275. CESTREAU *à feuilles Urges.* Did. suppl.

C. à grappes très-courtes , axillaires; feuilles ovales , glabres , rameaux & pétiolées un peu tomenteux.

X- n. les pays chauds de l'Amerique. T> Z* M. Richard.

2276. CESTREAU *feuilles delaurier.*

C. à fleurs presque feftées , axillaires , fasciculées : à limbe obtus j feuilles elliptiques, coriaces, très-glabres.

L.n. PAmerica? CeJlreauvinimeux. DiS. n. \$*

2277. CESTREAU *tomentous.* Dift. ri. 7.

C. à fleurs ramaflées , feffiles , terminalesj rameaux , feuilles & calices tomenteux.

X. /z. l'Amerique mcrid. T>

2278 CESTREAU a? . *Blanches.* Difl.n. 8.

C. à faisceaux de fleurs pédon^ules; corolles blanches; à limbe obtus, réflechi; feuilles ovales-lancéolées.

X. n. la Havanne. f> Xe Galant de jour.

2279. CESTREAU *a oppofées.* Dift. suppl.

C. à feuilles oppofées , lancéolées, nerveuses, un peu coriaces; fleurs en faisceaux , feffiles , axillaires:

X. n. TAfrique.

Explication ies fig.

Pi. 111. f. 1. CESTREAU noBurnt. (a, I) Sommité d'un rameau, avec les fleurs.' (c) Corolle ouverte. (d) Etamine. (e) Calice , ftyle. (/) Piftil. (a 1) Baie entière. (b i) La même cou-
pée tranfyerfakment. (c 1) Placenta mis à nud. C d %) Situation des femences. (e %) Sentences vues de chaque côté. (/, g 1) Les m&nnes coupées, avec la figure & la fituation de rembryon.

Pl. i n. Fig. 1. CESTREAU 'a fcūlUs oppofits.. On a mat rtprifinti Us ficurs.

PENTANDRIA MO^OGYNIA, /.

acmoj baccis olivaeformibus , è violaceo-nigris:

Ex Jamaica , Domingo. T> *Burnt. Amer.* t. i5j.f. t.

2274. CESTRUM *pallidum.*

C. racemis compofitis, axillaribus; floribus parvis pallidis 3 fol. ovato-obl. acuminatis.

Ex Jamaica, &c. T> *Sloan. Jam. I.I. zo^f. 2.*

217?. CESTRUM *latifolijum.*

C. racemis breviflSmis , axillaribus } foliis ovatis , glabris; ramulis petiolifque fubto^ mentofis.

Ex Amer. calid. I> An C. hirtum. Swart^ P*rodr. qg.

2276. CESTRUM *laurifolium.*

C. floibus fubfeffiibus , axillaribus , fasciculatis : liirbo obtufo ; foliis ellipticis , coriaceis , glaberrimis.

Ex America? T> *Laureola Pluk. t. \$5,* fi.C. laufifolium. VHerit. Stirp. t.^q.

1277. CESTRUM *tomentafum.*

C. floribus confertis , feffilibus , terminalibus; ramis foliis calycibusque tomentolis*

Ex Amer. merid. T> L.f. suppl. |5oJ|

1278. CESTRUM *diurnum.*

C. florum fasciculis pedunculatis; corotlis albis; limbo obtuforeflexo; foliis oyato-lan^ccolatis.

Ex Havana. T> *Dill. elth. t. |5q.*

X179. CESTRUM *oppofitifolium.* T. 112. f. 2.

C. foliis oppofitis, ianceolatis , nervofis, fubcoriaceis ; floribus fasciculatis , feffilibus ^ axillaribus.

Ex Africa, 'I D. Sonnerat.

Explicatio iconum.

Tab. 112. f. 1. CESTRUM *noliurnum.* (a% t) Summitas ramuli , cum 'floribus. (c) Corolla aperta. (d) Stamen, (e) Calyx, ftylus. (/) Piftillum. Fig. ex fie so. (a 1) Bacca Integra. (b 1) Eadem tranfverfiin fefta. (c %) Recept. denudatum. (d %) Semimum Cms. (e 1.) Semina ab utroque latere fpeftata. (/, g 1) Eadem diiTefta, etm figurā & fitu embryonic. Fig. ex girtn.

Tab. 1 ix. f. 2, CESTRUM *oppofitifolium.* Thru malt depi&i.

320. NICOTIANE.

CamS. ejjent.

COR. infundibuliforme, régulicre, 7 fido. Etam. inclinées. Ca^f. biloculaire.

Camēl, nat.

CaU monophylle, ovale, femi - quinquefide, perfisstant.

Cor. monopetale •> infundibuliforme. Tube plus long que lecalice. Limbe ouvert, femiquinquefide, à cinq plis.

Etam. Cinq filaments, fubu'les, prefqu'auffi longs que la corolle, montans. Anthères oblongues,

Pijl. Ovaire supérieur, ovale. Style filiforme, de la longueur de la corolle. Stigm. échancré.

Pe'ric. Capule ovale, ou- ovale-conique, marquée d'une rainure de chaque côté, biloculaire, bivalve, s'ouvrant par le sommet. Placentas en demi-ovales, attachés à la cloison.

Sen. nombreuses, ronniformes, ridées.

*Tableau des espèces.*2280. NICOTIANE *a latae*. T&EL.

N. à feuilles-lancéolées-ovales, sessiles, amplexicaules ; fleurs à lobes pointus,

L. n. FAméric. O *FL rouges*.

2281. NICOTIANE *fruticosa*. Difl.

N. à feuilles lancéolées, subpetiolées, un peu décurrentes sur les côtés ; tige fruticente à la base.

X. n. la Chine. T> *Fl. rouges*.

2282. NICOTIANS *mjlique*. Did.

N. à feuilles ovales, obtuses, sessiles ; fleurs obtuses.

L. n. l'Amérique. © *FL funjaune pâle*.

2283. NICOTIANE *paniculata*. Did.

N. à feuilles en cœur, très-entières, pétiolées ; fleurs paniculées, obtuses, en maïs.

X. n. le Pérou. O *CorolU lo^gue, <Tun vcrd jaundâtre*,

320. NICOTIANA,

CharaQ. ejjent.

COR. infundibuliformis, regularis, j-fida. Stam. inclinata. Cap. bilocularis.

Char act. nat.

Cal. monophyllus, ovatus, femiquinquefidus, perfiitens.

Cor. monopetala, infundibuliformis. Tubus calyce iongor. Limbus patulus, femiquinquefius, quinqueplicatus.

Stam. Filamenta quinque, fubuhta, longitudine ferè coroliae, adfcendentia. Anthers oblongre.

Pijl. Germen fuperum, ovatum. Stylus filiformis, longitudine cor. Stigma emarginatum.

Peric. Capula ovata, aut ovato-conica, utrinque linea infcipta, bilocularis, bivalvis, apice dehicens. Receptacula dimidiato-Ovata, punata, diflcpimento affixa.

Sent. numerofa, reniformia, rugofa.

*ConfpeSus speeler urn.*1180. NICOTIANA *tabacum*. t. irj#

N. foliis lanceolato-ovatis, feflibus, anflexicauibvs ; floribus acutis.

Ex America. © *Fl. rubrU*

2281. NICOTIANA *fnulcofa*.

N. foliis lanceolatis, subpetiolatis, lateribui subdecurrentibus ; caule basi fruticente.

E China. Tj Anvar. *praoccidentisi*

1182. NICOTIANA *ruflica*.

N. foliis ovatis, obtusis, petiolatis j floribus obtusis,

Ex America. © *Fl. pallidè lutei*.

1183. NICOTIANA *paniculata*.

N. foliis cordatis, integerrimis, petiolatis j floribus paniculatis, obtusis, clavatis.

E Peru. O Feuill. obf. z. t. to,

2284. NICOTIANE *glutineuse*. Did.
N. à feuilles en cœur, très-entières, pétioleées; fleurs en grappe, unilatérales, courtes, irrégulières.

L. n. le Pérou. 0 PI. très-vifqueuse.

2285. NICOTIANE *piquante*. Did.
N. à feuilles en cœur, crénées; grappes recourcées à tige hirsute, piquante.
L. n. l'Amérique méridionale. T?

2226. NICOTIANE *du Mexique*. Did.
N. à feuilles oblongues-ovales, radicales; tige presque nue, fleurs en grappe, pointues.
L. n. la Vera-Cruz. F. étalées sur la terre.

\$287. NICOTIANE *axillaire*. Did.
N. pubescente, à feuilles un peu ovales, presque feillées; pédicules axillaires, unis lors 3 fleurs tubuleuses, obtuses.
Z. n. Monte-Video. Seroit-ce une Jaboro-fet

NICOTIANE (*naine*) à feuilles ovales, feillées; fleurs obtuses. Petit tabac du Chili.

Explication des figures.

PI. 113. NICOTIANE *a tabac*. (J) Fleur entière (b) Calice. (c) Ptilil. (d) Capsule entière. (*) La même s'ouvrant par le sommet. (/) La même coupe transversalement. (g) Semences séparées. (A) Superficie réticulée de la femence. (f) Embryon mis à découvert, d) Sommité de la tige, avec les fleurs. (w) Feuilles caulines séparées.

321. S T R A M O I N E .

CanzS. effent.

CAL. tubuleux, anguleux. Cor. infundibuliforme. Ca[^]f. fub[^]locuiuiri.

Caract. nat.

Cal. monophylle, oblong, tubuleux, ventru, quinquangulaire, à cinq dents, caduc: à base presque orbiculée, perfillante.

Cor. mono; ^tale, très-grande, infundibuliforme. Tube cylindracé, presque plus long que le calice. Limbe subcampanulé, à cinq plis, oblique excentré à cinq lobes: à lobes acuminés.

2284. NICOTIANA *glminofa*.
N. foliis cordatis, integerrimiis, petiolatis; floribus racemolis, secundis, brevibus inaequalibus.

E# Peru. © A3. Stock. zj5j. t. z.

2285. NICOTIANA *wens*.
N. foliis coriatis, crenatis; racemis recurvatis; caule hirsuto, pruriens.

Ex America merid. T> Burnt Amer. t. zt 1.*

2226. NICOTIANA *pufilla*.
N. foliis oblongo-ovalibus, radicalibus à caule fubnudo; floribus racemosis, acutis.

E yera Cruce. Mill. ic. i85.f. z.

1187. NICOTIANA *axillaris*.
N. pubescens, foliis subovatis, subfusiformibus; pedunculis axillaris, unifloris 5 floribus tubulofus, obtusis.
E Monte-Video. Commer. Cap/,%-lacularis.

• NICOTIANA (*minima*) foliis feffilibus, ovatis; floribus obtusis. *Molin. chil. t5j.*

Explicatio iconum.

Tab. IJJ. NICOTIANA *a tabacum*. (a) Flos integrer. (b) Calyx, (c) Piftillu. Fig. ex Tournef. (d) Capsula Integra. (e) Eariem apice dehiscens. (/) Eadem transversim feffa. (g) Semina fcljta. (f) Seminis superficies reticulata. (i) Embryodenudatus. Fig. ex Gtrtn. (I) Sunrmitas cauts cum floribus. (m) Folium caulinum separatum.

321. D A T U R A .

Charact. nat.

CAL. tubulofus, angulatus. Cor. Infundibuliformis, plicata. Capf. fub[^]-locularis..

Charact. nat.

Cal. monophyllus, oblongus, tubulofus, ventricofus, quinquangularis, quinque-dentatus; deciduus: bafi suborbiculata perflente.

Cor. monopetala, maxima, infundibuliformis. Tubus cylindraceus, calyce ferè longior. Limbuseredo-patulus, quinqueplicatus, obcurè quinquelobus; Jobis acuainatis.

8 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Etam. Cinq fliamens, Tubulés , plus courts que la corolle, adnés à (on tube. Anth. oblongues.
Pift. Ovraire fu_x érieur, ovale. Style fliiforme, droit, un l^{*i} ius long que les étamines.
 S-iomatein [eu c, ais, obiu6 , » deux lames.
Peric. Capful? un j.eu caarnue, ovale, échinéé
 c u g.abre, lenii-quidiiriocnloire, jofée fur ia
 bafr uu calice. P^{*}ac in as faiiUns, é ais , con*
 vext-s, { onfiués , attac: ésà la cloifon. #
Sent, nombreufes, réniformes.

Tableau des efpkes.

* *CapfuUs kerffies,*

S288. STRAMINE fême. Did.

S. à ca₄ lulcs ovaies , é, incuies , droïes ; épines lu, érieuret,trc&-giaaaet, convergciKei# Z, n. le Qiine. Q

228p. STRAMOINE commune. Did.

♪.a ca_x fules ovales, é_r ineulet, druites ; feuilles glabres , ovales , à beaucoup aangi.5.
 X. n. l'Amér. iraintc; i_unt ponuiUjie en Europe. O La pomrne épineufe.

228o STRAMOINE pourprie. Difl.

S. à cap fules ovales, é_A insuics, droitesj feuilles glabres , anguleufes; tige pourprée_F
 L.n. .. O Corolles bLéudtrcs%

229i. STRAMOINE fiftufufe. D:ft.

S. à capfules globuleuiVs , tubercuieufes , penchées j feuiiies angueufes ; tige d'un brun pourpré.

L. n. l'Egyjte. O Cor. vloleite en-dekors₃, blanche en-dsdans₉, & Jbuvent double ou triple.
 Bile varle à capfule mutique.

2292 STRAMOINE pubefiehte. Di<9.

S. à ca_t fules g'obi>Leufes, é^ineufes, penchées ; caiice cy.inürrique; feuiiies prefqu'en-tières, pubefcentes.
 i. n. llnde , i'Afri<pe. O Cor. blanche.

* * *CapfuUs UJjes ou mutiqucs,*

2293. STRAMOINE life. Dift.

S. à capfules ovales, droites , inermes ; tige herbacée.
 L. n. l'Afrique. O Fur. de la Str. commune 'i

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Stam. Filanienta quinque , fiibulata , corolla breviora , tubo adnata. Antherae oblongae.
Pifl. Germen fuperum , ovatum. Stylus filiformis , rpftns, ftaminibus paulo longior. Stigma eraffiucium, obtufum, bilamellatum.
Piric Ca; fila fubcarnofa , ovata , eclinata , aut glabra, ^mi-guaJrilocuUris^ban calycis imo^ta. Recsi t_t feminu-n j rominnla, crafla^ convexa ,] und4ti, ciLf_r imemo affixa,
Sem. numerofa, rsniformia*

ConfpeSus Jpecierum,

* *Capfu'a echinatas.*

n88. DATURA ferox.

D. capfulisovatis,f. inofis, ereftisi fpinis fummis, maxi.nis, converg^ntibus,
 E China. © Band ic. ujz:

228p. DATURA fira^oniam. T* H.J.

D. eipfiuis o/atis, f. ino^s, ercfis ; foliif glabris , ovatis , mUiMiigUii&. E* Am 'rir.i, nunc vulg. r er Euro^am. O. Gartn pag 132.

xipo. DATURA t'tuto.

D. ca]fulis ovdtis, i, ino^is, ereflis; foliis glabris, anguiatis; cauis ^ur_x urdfccnte# Ex . .. f O Force' var. sequentis,

22pi'. DATURA faftuofa.

D. caf.fuiis giobofis , tuberculatis, nutantibus ; foliis anguiatis, cauie fusco-_pur_t urafcentc.

Ex iEgypto O Cor. extiis viofacm , intu:_i abida_y Jospe dupVcata vel triplicata,
 Variat capfula mutica.

2292. DATURA metel.

D. ca| fuiis giobofis , f^inofis, nutantibus; calyce teretij foiiis fubint>gns,pubefcentibus.

Ex India , Africa. O PL omnium fatidijjinta*

* *Capfula tevesf. muticct.*

2292 DATURA Uvis.

D. ca^fuiis ovatis , eredis , inermibus 5 canle herbaceo. _m L.f.fuppL

Ex Africa* O Jacq.hort.j.t. 8z.

225)4. STRAMOINE *en arbre*. Did.
S. à capsules globuleuses ovales, inermes, penchées; tige droite, arborecente.
L. n. le Pérou. T> *Le Floripondio*. Cor. pendantes.

2255 STRAMOINE *armenteuse*. Dic.

S. à capsules globuleuses-coniques, inermes; tige frutiqueuse, farmenteuse, grimpante.
L. n. la Jamaïque, &c. 'Arbrisseau à tige farmenteuse, très-longue. Cor. lâche, lâvie d'une teinte pourpre. Limbe à lobes non acumines, mais crepus & flétris. F. velues légèrement en-deffous & sur les bords.
0.. La même ? à f. très-glabres des deux cotés.

Explication des fig.

PI. 115. Fru&ification de la Stramoine, t'appelée Tournefon. (a) Fleur entière. (*) Corolle ouverte. (c) Calice. (d,e) Calice ouvert, pistil. (f) Ovaire. (g) Capsule enroulée. (A) La même coupée en travers (i) Placentas mis à nud. (l) Semences séparées.

322. TRIGUIRE.

CaraS. effent.

COR. campanulée, irrégulière. Godet flaminière, à; dents. Baies sèches, à^loges, Sem. géménées.

CaraS. nat.

Cal. monophylle, femi-quinq^{ue}fide, perfisant: à découpures inégales, pointues.

Cor. monopétale, campanulée, irrégulière. Tube court. Lèvre ventrue, plus long que le calice, quinq^{ue}fide: à deux découpures sup. un peu réfléchies.

Etam. Cinq filaments, très courts, dilatés & réunis à leur base en un urceole membraneux, à cinq dents, environnant l'ovaire. Anthères fagittées, conniventes.

Pif. Ovaire supérieur? arrondi, à deux (1) lions. Style filiforme, droit, un peu plus long que les étamines. Stigmate en tête.

Péric. Baie sèche, jaune globuleuse, fillonnée, quadriloculaire (quelquefois biloculaire).

2294. DATURA *arborca*.
D. capulis globofo-ovatis, inermibus, nutantibus; caule arboreo, eredo.
E Peru. T> *Feuill. obf.* 2. t. 46. Cor. pendu U.

2295. DATURA *farmentofa*.

D. capulis globofo-conicis, inermibus; caule fruticofe, farmentofe, scandente.
Ex Jamaica, &c. T> *Solandra grandiflora*. Swart^ Inacl. Stockh. ij8j. t. XI. Pro Jr. p. AZ. Cap/, carnofa, cortice craifo, fubpul-* pofa. F. fubtus margineque leviter villofa.

fi. Eadim? folds utrinque glaJberrimis*

Explicatio iconum.

Tab. 115. Fructification Datura?. Ex Tournef. (a) Flos integer, (t) Corolla aperta. (c) Calyx, (d, e) Calyx apertus, pistillum. (f) Germen. (g) Capsula Integra. (A) Eadem transversum secta. (l) Recept. fern, denudata. (l) Semina separata.

322, TRIGUEIRA,

CharaS. ejgent.

COR. campanulata, irregularis. Cyathus ftaminifer, y-dent at us. Bacca ficca, ^-loculari^^ Sem. bina.

CharaS. nat.

Cal. monophyllus, femi-quinq^{ue}fidus, perfittens: laciniis inaequalibus, acutis.

Cor. monopetala, campanulata, inaequalis. Tubus brevis. Limbus ventricofus, plicatus, calyx longior, quinq^{ue}fidus: laciniis duabus fupcroribus, fubreflexis.

Stam. Filamenta quinque, brevissima, bifida dilatata & coalita in urceolum membranaceum, quinquedentatum germini circimpositum. Antherae fagittatae, conniventes.

Pif. Germen superam, ubi rotundum, bifidum. Stylus filiformis, rectus, flaminibus paulo longior. Stigma caeruleum.

Piric. Baccia ficca, fubtillobofa, fulcati, quadrilocularis (inter dum bilocularis).

io PENTANnRIE M0N0GYNIE.

Sent, geinincés, prcfqif ovales, comprimées, un peu fcabres, dont fouvent une avorte.

Tableau des efpc̄cs.

2206. TRIGUERE *mijquée.p|&*.

T. a`feuilles oval es-lpatu lees, den tées, un feu velucs; pédoncules & ciiices laineux.
L. n. TEfpagne Q Cor. violette.

2207 TRIGUÈRE *inodore*. Difl.

T. à feuilles ovales-lanccoiécs, très-entières, liifes j pédoncules & calices giabres.
L.n. r.Efpagne.©/e/zV/point vucetteefpece.

Explication des fig*

PI. 114. TRIGUBRE *miifyuée*. (a) Corolle vue en avant. (b) La même vue par le côt̄s, (c) Etamines. (d) Urceole des étamines. (e) Etamine t'éparée, avec l'anthere vue en-déhors. (/) Piftil. (g) Fruit dans le calice. (h) Le même mis à nud. (l) Le même coupé pour faire voir les loges. (I) Semence. (m) La même jiepouillge de Ton écorce. (n) Partie fuperieure de la ci^e, avec les feuilles & les fleurs.

322 * MARKfiE,

CaraS. ejjtnt*

CAL. long, f-fide. Cor. hypocratérif. I limbe obtus, prefque régulier. Capf. cylindrique, 2-locul. polylisperme.

Caracl. nat.

Cal. monophylle, long, pentagone-prifmatique, pattagé au-delà de moitié en cinq découpures linéaires, lancéolées, aiguës, droites.

"*Cor.* monopéatle, hypocratériforme. Tube cylindrique, plus long quele calice. Limbe ouvert, à cinq lobes, plus courts que le tube : lobes obtus, planes, prefqu'égaux.

Eram Cinq filauiens, cgaux, dela longueur du tube. Amhcres à Torifice.

Pifi. Ovaire fuperieur, oblong, /Q tenninant en un ityle court. Stigmate.....

Petic. Capfula oblonga, cylindrique, un peu pointue, biloculaire, environnée par le cal.

Sent, nombreufes, cylindriques.

FiiNTANDRIA MONOGYNIA.,

Sem. bina, fubovata, comprefla, fcabriufcula, altero fxpe abortivo.

ConfpeSus specierurn.

2296. TRIGUERA *ambrofiaca*. T. nq.

T. foliis ovato-fpathulatis, ferratis, l'ubvillofis : pedunculis calycibusque lanatis.
Ex Hispania. 0 *T. ambrofiaca*. Cav. difj. k.

2297. TRIGUERA *inodora*.

T. foliis ovato-lanceolatis, integerrimis, tevibus; pedunculis calycibufque glabris.
Ex Hispania. © Cav. difj. z.

Explicatio iconum.

Tab. X14. TRIGUERA *ambrojluka*. (a) Coroll an*ticefpeftara. (5) Eadem à latere vifa. (0) Stamina, (rf) Urceolus ftammuvn. (c) Stamen feparatutn, cum antheraintusvifa. (/) Pillillum. (g) irutlus intra caiy-cem. (/z) Idem denudacus. (/) Idem feitus uc loctila apparent. (0) Semen, (m) Idem decorticatum. Fig. ex D. Cavan. (n) Pars fuperior caulis, cum ibliis 8c flotibus. Ex Si ceo.

322. * M A R K E A.

CharaS. ejfent.

CAL. longus, y-fidus. Cor. hypocrateriformis : limbo fubccuali obtufo. Capf. tcres, 2-locu*laris, polyfperma.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, longus, pentagono-piifmaticus, ultra medium quinquefidus: laciniis linear-lanceolatis, acutis, ereAis.

Cor. monopetala, hypocrateriformis. Tubus cylindricus, calyce longior. Limbus patens, quinque-lobus, tubobrevior : lobis obtufis, planis-, fubrcqualibus.

Stam. Fiumenta quinque, EBquia ^longitudine, tubi. Antherce ad faucem.

Pifi. Germen fuperum, oblongum, definens in Itylum brevem. Stigma.....

Peric. Capfula oblonga, teres, acutiufcula, bilocularis, calyce obvallata.

S:m. plurima, teretia.

Tableau des espèces.

229S. MARKÉE écarlate. Did. fuppl.
L. n. la Guiane. T> PI. frutefcente, firmen-
tenfe: à feuilles alt. fimples. Pedoncules ter-
minaux. Fl. écarlates, difp. en corymbes
paniculés >pendans.

323. J A B O R O S E .*Car ad. effent.*

CAL. court. Cor, tubuleufe, y-fide. Filamens planes , attachés au sommet du tube. Stigmate en tête, mucronée.

Cara&. nat.

Cal. monophylle , court ? semi-quinquefide : à découpures pointues.

Cor. monopétale, tubuleufe, quelquefois préf que campanulée , beaucoup plus longue que le calice. Limbe quinquefide: a decoupures pointues^

Etam. Cinq filamens, courts, planes , attachés au sommet du tube. Anth. en cœur , droite^.

Fiji. Ovaire supérieur , arrondi. Style simple , de la longueur du tube. Stigmate en tête, mucrone.

Peric. . . . ; (*j-locul. Commerf.*)
Sem. . . . ;

Tableau des espèces.

22pp. JABOROSE àf. entières. Did. n°. X.
 J. à feuilles ovales , entières, obfc. dentées ; fleur longue, tubuleufe.
L. n. les env. de Buenos-Aires. Commerf.

^300. JABOROSE roncinée. Did. n°. 2.
 J. à feuilles finuées-en lyre , dentées; fleur courte , subcampanulée.
L. n. Monte-Video. Commerf,

*Explication des fig**

PL 114. JABOROSE à feuilles entières. (a) Feuilles radiales. m. Fleur entière. (c) Corolle ouverte. (J)
Called jipitii.

*ConfbeSus specicrum.***225)8. MARKEA coccinea.**

Ex Guiana. T) Rick. in. aS. foe. nat. parts, p. toy. Pl. frutefcens, farmentofa, glaberrima. Fol. alterna. ped. terminates, corynbojb-paniculati y penduli.

323. J A B O R O S A .*CAaraS. effent.*

CAL. brevis. Cor.^tubulofa, y-fida. Filament* plana , fummo tubo inferta. Stigma capitato-mucronatum*

CharaS. nat.

Cal. monophyllus , brevis , semi-quinquefidus: laciniis acutis.

Cor. monopetala , " tubulofa, interdum subcampanulata , calyce multo longior. Lirnbus quin*. quefidus: laciniis acutis,

Stam. Filamenta quinque , brevia , plana, fummo tubo inferta. Antherae cordatae, ered<e.

Pifl. Germen fuperum , subrotundum. Stylus simplex , longitudine tubi. Stigma capitatuai> mucronatum.

Péric. . . . ; (*yloculf Commerf*)
Sent.....

*Conspéctus specierum.***£299. JABOROSA integrifolia.** T. 114.

J. foliis ovatis, integris, subdentatisj fforc longo, tubulofa.
 Ex Agro-Bonarienll. *Scapi i-flori.*

2300. JABOROSA runcinata.

J. foliis finuato-lyratis , dentatis; florebrevi , subcampanulato.
 Ex Monte-Vid. &c. *Scapi ut inpr. fol. taraxacU*

Explicatio icortum.

Tab. 114. JABOROSA integrifolia. (a) Folia radical;*, (4) Flos integer, (c) Cojolla aperta. {<} Calyx pifillium,

324. B E L L A D O N E :

CaraS. effent.

COR. camp an u'lee , y-fide. Etam. diflantes.Baie 2-loculaire , pofée fur le calice.

Carad. nat.

Cal. monophylle , perfiftajit, quinquefide : à découjures pointues.

Cor. mono^étale , campanulée. Tube court. Limbe un peu ventru, plus long que le caiice , quinquefide: à dédbup. prefqu'égales.

Etatn. Cinq filaments , fubulés, attachés à la bafe de la corolle , connivens dans leur partie inférieure, divergens en-dehors (upérieurement, arqués. Anth. diftantes, un peli épiaffcs.

Pifl. Ovaire fupérieur, ovale. Style liliiforme , de la longueur des étamines, incliné. Stigmate en tête , divift par un ifillon.

Périem Baie globuleufe, j.ofee fur le calice , bi-loculaire. Placentas opj.ofés , faillans , conyexes , attachés à la cloifon.

Sam. nombreufes, réniformes.

Tableau des efpeçes.

2301. BELLADONE *mandragore.* Did. n° 1. fi. fans tige , à hampes uniflores. L. n. 1'Europe aufl. aux lieux ombragés. % Bale pleine , i-hculaire.

2302. BELLADONE *vulgaire.* Difl. n°a. B à tige herbacée, drQite; feuilles ovales; fleurs d'uniorprebrun. L. n. laFr. , Tltalie , &c. % Pi. dangereufe.

2303. BELLADONE *couchée.* Dift. suppl. B. à tige herbacée, couchée ; feuilles ovales, glabres; corolles très-ouvertes. F. n. lePdiOU. O Cor. prefqiten roue, d'un blanc pâle & jaunâtre. Fl. en ombelle, axill.

3304. B/LLADONE *arborefiente.* Dift. n° 3. B. à tige ligneufe, arborefcente; feuilles ovales-oblongues, pointues j péd. ramafcs. L. n. TAn ér. mérid. ' B. à feuilles de' JV'I cotianc. Di3*n%. Ceftraucampan.DiQ. n% ff9

324. A T R O P A.

Charaft. effent.

COR. campanula, y-fida, Stam. diflantia. Bacca 2-locularis? calyciinildens.

CharaS. nat.

Cal. monoph^lius , perfiftens , quinquefidus: laciniis acutis.

Cor. monopetala , campanulata. Tubus brevis. Limbus fubventricofus, calycelongior, quinquefius : laciniis fubzequalibus.

Stam. Filamenta quinque , fubulata , è bafi corollae enata, infernè conniventia , fupernè extrorffum divergentia, arcuata. Antherae diftantes, crassifculae.

Pift. Germen fuperum , ovatum. Stylus filiformis, longitudineftaminum , inclinatus. Stigma capitatum , fulco divifum.

Peric. Bacca globofa , calyci infidens, bilocularis. Receptacula feininum oppofita ? prominula , convexta , fepto aftixa.

Sent. Plurima, reniformia.

*ConfpeSus fpecierwn.***2301. ATROPA *mandragora.***

A. acaulis , fcapis unifloris. L. Ex Europa auftr. in umbrofis. Tp *Baccafolida>i-locularis.* Gacrtn. t. 131.

2302. ATROPA *belladona.* T. 114. f. 1.

A. caule herbaceo, ereftoj foliis ovatisj floribus purpureo-fufcis. EGallia, Italia, &c. ipJacq. auftr. 4. t. 309.

2303. ATROPA *procumbens.*

A. caule herbaceo , procumbente ; foliis ovatis , glabris ; corollis patentiflimis. E Peru. O A. *procumbens.* Cav. ic.p. 5j. tab. j %. Fl. umbellati , axill.

2304. ATROPA *arborefcens.*

A. caule fruticofo, arborefcente ; foliis ovato-oblongis , acutis; pedunculis aggregatis. Ex America nierid. J) Burm. Amen t. 2iG.f. !• Corolla alba , laciniis revolutis.

PENTANDRIE MONOGYNIE.

2305*. *BELLADONE frutefcente*. Did. 1A4.
B. à tige ligneuse, très-rameuse; feuilles en coeur-ovales, obtuses j pédoncules presque foliaires.

L. n. l'Efpagne. T> Cor. d'un verd jaundâtre.

Explication des fig.

PL 114. f. 1. *BELLADONE vulgaire*. (a) Fleurettière. <(J)> Corolle séparée. (c) Calice. (d, e) Étamines. (f,g) Pétal. (h) Baie. (l) La même coupée transversalement. (j) Semeées.

PL 114. f. 2. *BELLADONE frutefcente*.

325\ M O R E L L E ,

Caras. effent.

COR. en TQUC Anth. souvent réunies, s'ouvr. au sommet par 2 trous. Baie 2-loculaire.

Caras. nat.

Cal. monophylle, semi-quinquefide, droit, pointu, perfittant.

Cor. monopétale, en roue. Tube très-court. Limbe grand, plane, ouvert, quelquefois réfléchi, quinquefide.

Etam. Cinq filaments, pubescents, très-petits, inférés à l'origine du tube. Anthères oblongues, conniventes, presque réunies, s'ouvrant au sommet par 2 trous,

Pift. Ovaire supérieur, arrondi. Style filiforme, plus long que les étamines. Stigmate obtus.

Penc. Baie arrondie, quelquefois ovale, glabre, biloculaire. Récept. des femelles convexe, charnu, adhérente à la cloison de chaque côté.

Sent. nombreuses, arrondies, comprimées, nichées dans une pulpe.

Tableau des épices.

* PI. fans piquans.

2306. *MORVILLE feuilles de moline*. Di<5.
M. à tige érigée, fructueuse; feuilles ovales, tomenteuses, très-entières; omb. compoées.
L. n. TAmerique. T> Mime port que la suiv.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 13

2305. *ATROPA frutefcens*. T. 114. f. 2.

A. caule fruticofe, ramosissime; foliis coriaceo-ovatis, obtusis, pedunculis subfoliariis.

Ex Hifpaliia. T> Barrel, ic. 273.

Explicatio iconum.

,JA ,^{bx}if⁴r^{f*x} A T A ? P ^ h illadon*- («) Flos integer,
(g) Corolla separata,(c) Calyx. (d, e)Stamina.(7%)
Pitillum. (A) Bacca. (i) Eadem transversa fedla. (j) &
mina. Fig. ex Mill.

Tab. 114. f.i. *ATROPA frutefcens*.

325- S O L A N U M .

Charas. effent.

COR. rotata. Antherae subcoalitae, apice poro gemmo dehiscentes. Bacca 2-locularis.

Charas. nat.

Cal. monophyllus, semi-quinquefidus, erodus, acutus, perfittens.

Cor. monopetala, rotata. Tubus brevissimus. Limbus magnus, planus, patens, subreflexus, quinquefidus.

Stam. Filamenta quinque, pubescens, minima, fauci tubiinferta. Antherae oblongo, conniventes, subcoalitae, apice pbris diobus dehiscentes.

Pift. Germen superum, subrotundum. Stylus filiformis, staminibus longior. Stigma obtusum.

Perk. Bacca subrotunda, interdum ovata, subglobosa, bilocularis. Receptac. fern, convexum, carnosum, septo utrinque adnatum.

Sent. plurima, subrotunda, compreflata, nidulantes.

Conjunctus species.

* PI. thermes.

2306. *SOLANUM verbaefolium*.

S. caule inermi, frumentaceo; foliis ovatis, tomentosis, marginatim; umbellis compoitis. Ex America. T? Jacq. Hon. t<t. 13.

14 PENTANDRIE MONOGYNIB.

5507. MORELLE *aurkulée*. Did.

JV à tige inerme, frutiqueufe; feuilles ovales, très-entières, tomenteufes; ftipules en oreilles, entourant le rameau.

L. n., Mid de Bourbon, ft *Grand arbriflreau* tomenteux comme le précédent, cor. glabre.

2308. MORELLE *feuilles defauge*. Did.

M. à tige inerme, frutiqueufe; feuilles ovales-lancéolées, tomeijteufes en deflbus ; calices & corolles tomenteux,

L. n. la Guiane, ft *F, entUres i dmepédonc.*

230\$. MORELLE *feuilles delaurier*. Did.

JV à tige inerme, arborée ; feuilles pétiolées, ovales-oblongues, tomenteufes en deflbus ; panicule terminale, dichotome, divergente.

L. n. les bois de l'Amér. mérid. ft

23 xo. MORELLE *effUde*. Did,

M. à tige inerme, frutefcente; rameaux effilés; feuilLes ovales-pointues, toment. en deflbus ; pmbelles feffiles.

L. n. les Canaries? J) Rameaux prefque far msntcux, sup. dichotomes. Fl₉ violetus.

£311. MORELLE *faux-piment*, Did.

M. à tige inerme, frutiqueufe; feuilles lan-

céolées, on Jeſſ , glabres ; ombelles feffiles.

L. n. Tiflede Madère, "b Fulg. le petit céri-

fier d'hiver, Vamame desjardiniers."

2312. MORELLE *diphyUe*, Did.

M. ^tige inerme, frutiqueufe; feuilles glabres, géminées, dont unc plus petite; cimes courtes, Jatiales.

L. n. TAméricque. T> f* ov(tles-lance'ole'es, un peu obtuses,

2313. Jtf ORELLE *fombre*. Did,

M. à tige inerme, frutefcente; feuilles lan-

céolées-ova^s, prefqu'ondées, glabres; cimes

courtes, latérales.

L. n. la Martinique, T> *La Barren**

2314. MORELLE *à g'rappes*. Did.

M. à tige inerme, frutefcente : feuilles lan-

céol^es, ondulées, preftjue finuées: grappes

droites: alongées.

L. n. ... viquet

PENTANDRIA MONOGYNIA,

2307. SOLANUM *auriculatum*.

S. caule inermi, fruticofo: foliis ovatis, integerrimis, tomentolis; ftipulis auriculatis, ramulum cingentibus.

Ex infula Mauritians, ft *S. Mauritianum*. Scop, delic. inf. 3. t. 8. AbfqueflipuUs.

2308. SOLANUM *talvifolium*.

S. 'caule inermi, fruticofo ; foliis ovato-lan-

ceolatis, fubtus tomentofis; calycibus co-

rollisque tomentpfis.

Ex Guiana, ft *Anf.fubinerme*. Jacq.

2309. SOLANUM *Uurifolium*.

S. caule inermi, arboreo; foliis petiofatis

ovato-oblongis, fubtus tomentofis; panicula

terminali, dichotoma divariçita.

Ex America australis fylvis. ft *L.f.fuppl.*

2310. SOLANUM *virgatum*.

S. caule inermi, frutefcente; ramis virgatis) foliisi ovato-acutis, fubtus tomentofis; umbelli^

feffilibus.

E Canariis? ft *Kamifubfarmentofi*, fuperne dichotomi. Fl. violaceo.

2311. SOLANUM *pfeud>-capficum* %

S. caule inermi, fruticofo ; foliis lanceolatis,

repandis, glabris ; umbellis feffilibus.

Ex Madera, ft *Baccee hyeme ru^errimi*, cera*

Jlformes. Fl. albi_y minimi.

2312. SOLANUM *diphyllum*.

S. caule inermi, fruticofo; foliis glabris,

geminis, altero minore, cymis brevibus

lateralibus.

Ex America, ft *Jacq. collect*, z. p. jjz.lc.

rar. vol. z.

23T3. SOLANUM *trifle*.

S. caule inermi, frutefcente; foliis lanceo-

lato-ovatis, iubrepandis, glahris; cymisbre-

vibus, lateralibus

E Martinica. ft *Jacq. Amer. 5o. t. 40. / z.*

2314* SOLANUM *racemofum* *

S. caule inermi, frutefcente ; foliis lanceaw

latij | repandis undulatis : racemis longis,

redis.

Ex Maitinica. T) *Jdtq.Amer. t. 36.*

PENTANDRIE MONOGYNIE.

231 y. MORELLE *de la Havane*. Dift.

M. à tige inerme, frutefcente : feuilles oblongues-lancéolées, entières, luisantes: grappes 1 auciiflores.

L. n. la Martinique, &c. f) F. unpeu obtufes ; fi. bleues, grandes.

2316. MORELLE *nodi* (*lore*. Di<2.

M. à tige inerme, foible, frutefcente : feuilles ovales, entières, glabres rraueaux dichotomes, ^paillis aux noeuds.

L. n. Tifle de France. T> Ombelks lat. pidomulks ; fl. petites, blanchdtr̄es.

4317. MORELLE *'aetoile*. Diét.

M. à tige inerme, foible, frutefcente: feuilles entières: féd. fubgemineś: fl. plane, fteliifcre.

L. n. T) F. glabres y ovales-lanceōties y acum.

*3i8. MORELLE *fugace*. Did.

M. à tige inerme, frutiqueufe : rame?jix dichotomes, tr̄cs-divergens : péd. folitaires : fleur plane, ftellifère.

i. n. TAmer. meřid. T) Fl. très-fügaces ; cor. blanche, 'a'etoile jawidtre.

23 ip. MORELLE *fycioide*. Dift.

M. à tige inerme, frutiqueufe: rameaux très-nombreux, fpinefcens: fleur plane, fllifore.

L. n. TAMér. mqrid.? T> F. petites. Fl. blanches. Bales rouges, petites; à fern, ojfeufes.

2320. MORELLE *ramajjēe*. Dift.

M. à tige inerme, frutiqueufe; feuilles ovales, obtufes ; pédoncules fimples.

L. n. la Guinée. T> Les anth. font unpeu %ftparées, comme dans beaucoup d' autres ejp. de ce genre ; mais elles font perfore's aufommēt. Cor. violette.

2321. MORELLE *terminate*. Did.

M. inerme, frutefcente; feuilles lancéolées, ovales, jreiljue très-entières, pileufes j om belles terminales.

L. n. PArabie. T> T'ges couchies, ram. vers ieurnormu. Cor blanche.

PENTANDRIA M0N06YNTA. IJ

2315-. SOLANUM *Havanenfe*.

S. caule inermi, frutefcente; foliis oblongo* lanceolatis, integris, nitidis ; racemis paucifloris.

Ex Martinica, &c. T? Jacq. Amer. t. 35. Swart^ obfp<.'82.

2315. SOLANUM *nodiflorum*.

S. caule inermi, debili, frutefcente; foliis ovatis, integris, giabris : ramis dichotomis, ad nodes incrafatis.

Ex infula Mauriti. T> Jacq. collēd. 2. p. z88 & Ic. ran vol. z.

2317. SOLANUM *Jlellatum*.

S. caule inermi, debili, frutefcente j foliis integris j pedunculis fubgeminis ; flore planow ^ ftellifero.

Ex ... J) Jacq. collēd, j. p. 25q. |Ic. rar. v. z^

2318. SOLANUM *fugax*.

S. caule inermi, fruticofo ; ramis dichotomis, divaricatiflunis5 pedunculis folitariisj flore piano, ftellifero.

Ex Amer. merid. 1) Jacq. collect, q. p. zzj. & It. rar. vol. z.

2319. SOLANUM *fycoides*.

S. caule inermi, fruticofo /-ramis (pinefcen-
tibus, numerofiflimis ; flore piano, ftellifero.

Ex Amer. merid. ? f> Affin. prcedenti. Bacco
'rubra^ parvx s fern, ojfeis.

2320. SOLANUM *aggregation*.

S. caule inermi, fruticafō j foliis ovatis, ob-
tus, aggregatis; pedunculis fimplicibus.

Ex Guinea. T) Atropafclanacea. Lin. VogeU
Ic. rar. t. iff. S. Aggregation. Jacq. collēd. 4.
p. tzq. & Ic. rar. v. z. foL nimisparva.

2321. SOLANUM *terminate*.

S. inerme, frutefcens ; foliis lanceolato-ova-
tis, fubintegerrimis, pilofis -y umbellis termi-
nalibus.

Ex Arabia, 'I S. terminate. Forsl. JEgypt.
q5. VakLfymb. & p. ^o.

16 PENTANDRIE MONOGYNIE.

[^]322. MORELLE *douce-amère*. Did.

M à r̄ise inerme, frutefcente, flexueufe ; feuilles lūpérieures, haftées ; grappes en cime.

X. n. l'Europe, dans les haies. T> *Cor. violent*, *Baies rouges**

H323. MORELLE à feuilles épaij/es. Did.

JVl. inerme, frutefcente, velue, fubfarmen-teufe; feuilles ovales, entières ou finuées-anguleufes, unpeu obtufes; fleurs pendantes.

X. n. TAfrique. T) *Fl. plus grandts que dans la précédence**

J2324. MORELLE *tégorée*. Dift.

M. inerme, velue, frutefcente; feuilles inférieures, très-grandes, finuées-pinnauifides : les supérieures en coeur.

Z. n. la Guiane, T? *Bales jaundtres*.

532;. MORELLE à gros fruits. Dift.

M. à tige inerme, fuffFrutiqueufe j feuilles ovales-cunēiforres, ondées, prefque finuées, glabres.

Z. n. le Pérou. T> *Tige bajft. Fl. gr. bleues*.

^{2326.} MORELLE de Quito. Bi&.

M. inerme, fuffFrutefcente j à feuilles pref-qu'en ccur à dents anguleufes, tomenteufes des deux côtés ; pétioles & nervures pourprés.

X. v. l'Amér. méridionale. T> *Baie jaune, très-groffe*.

2327. MORELLE de montagne* Di&t.

M. à tige inerme, herbaceej feuilles pref qu'en coeur, ondées.

Xt n* le Pérou. % *Rac. tubéreufe. Tige bajfe*.

^{2328.} MORELLE *tubéreufe*. Dift,

à tige inerme, herbacée; feuilles pinnées, à foioles emigres; cime pédoncuJée,

X. n. le Pérou, le Bréfil. 0 *Roc. tub, bonne à manger, Vulg. la pomme de terre*,

^{2329.} MORELLEfiuiOes dz pimprenelle. Did.

JVl. tige inerme, herbacée | feuilles pinnées, à foioles entières ; grappes finiples.

X. /t.le Pérou.

PENTANDRIA MONOpYNIA.

2322. SOLANUM *dulcamara*.

S. caue inermi, frutefcente, flexuofe ; foliis fuperioribus, haftatis; racemis cymofis. Ex Europae fepibus. J> *Cor. violacea. Baccs rubra*;

2323. SOLANUM *craffifolium*

S. inerme, frutefcens, hirfutum, fubfarmen-tofum; foliis ovatis, integris, jvel finuato-angulofis, obtuifculis; fioribus pendulis. Ex Africa. T> *Dill. Elth. t. 2,73. Cor. purpuro-violacecc.*

2324. SOLANUM *tegore*.

S. inerme, villofum, frutefcens; foliis inferioribus, ampliflimis, finuato-pinnatifidis j fuperioribus cordatis.

Ex Guiana. T) *AubL Guian. t. 84.*

2325*. SOLANUM *macrocarpon*.

S. caule inerme, fuffFruticofo; foliis ovato^ cuneatis, repandis, fublinuatis, glabris.

E Peru. T) *Mill. Jc. IQS. t. 294.*

2326. SOLANUM *quitoenfe*.

S. inerme, fufffrutteens; foliis subcordatis, dentato-angulatis, utrinque tomentofis: pétiolis nervisque purpuracentibus.

Ex Amer. merid, T> *FeuilU obf.j. p. 61. t.qff**

2327. SOLANUM *montanum*.

S. caule inenni, herbaceo; foliis subcordatis, repandis.

E Peru, ip S. *tuberofum minus. Feuilt. ob/l 3. t. 46.*

1328. SOLANUM *tuberofum*.

S. caule inermi, herbaceo; foliis pinnatis, integerrimis j cynia pedunculata.

E Peru, Brailio, O Rad, *tubewfa y efculenta*, luxurians.

2329. SOLANUM *pbnpineUifolium*,

S. caule inermi, herbaceo; foliis pinnatis, integerrimis; racemis fimplicibus.

E Peru. Lin. Amoen. acad. q. p, zS8.

18 FENTANDRIE MONOGYNIE.

à dents anguleuses ; ombelles simples, penchées; fruit noir.

X. n. rEurope, aux lieux cultivés. O Feuilles vertes, presque glabres ; fl. blanches.

2338. MORELLE velue. Did.

M. à tige inerme, herbacée ; feuilles ovalées, velues j dents anguleuses j ombciles simples 3 fruit jaune.

Z. n. la France au ft rale, &c. 0

2339. MORELLE de Guiné'e. Via.

M. à tige inerme, herbacée, muriquée fur les angles ; feuilles larges-ovales, émierées, glabres 1 fruit noir.

L. n. la Guinée. © Fr. plus gros que celui de &i Af. noire.

340. MORELLE anferine. Did.

M. i tige inerme, (ubherbacée; feuilles ovales oblongues, finouéesj un peu velues: les plus jeunes to/nent cuies ej- deffous.

L. n. Tifle de France. Ombelles lat. Jimples, paucijlorcs. fl. blanches.

2341 MORELLE d'Ethiopie. Did,

Al. à tig[«] inenne, herbacée j fetiilles ovales, ondées-anguieufes, nues ; fruit toruleux.

I. n. TEtliopie; la Chine. © Fruit rouge > grvs, déprimé.

JB342. MORELLE trlangulaire. jy|&.

M. a tige inerme, herbacée , trigone; feuilles oblongues , ovales, très-entières, nues ; cor. d'un violet pâle.

L. n. les Indes orient. © Fl. petites. Feuilles dicurrentes Jur leur pétiole.

p. La mime ? à tige t&tmgane, fcabré. Du Cap de Bonne Efpérance.

2343. MORELLE feuilles étroiteu Dijft..

M.inerme, fubherbacfc , à feuilles ctroifef-lancéolées , un peu obtufes , nues ; corymbe terminal.

i. 7i. les environs de Buenos-Ay res.

^344. MORELLE fcabre. Dtf.

Al. inerme, .fubiierbacce, à tige fcabre-far

PENTANDRIA MONOGYNI/..

dentato-angulatis; umbellis fiuiplicibus , nutantibus; frudu higro.

Ex Euroy.ce cultis. © Fol. virid. nudiuscula. Flores albi.

2338. SOLANUM villofum.

S. caule inerini , herbaceo ; foliis ovatis, hirfutis , dentato-angulatis ; umbellis ftmplicibus; fructu luteo.

Ex Gallia auArali, &c. ©

23 Jp. SOLANUM Guineenfe.

S. caule inermi f herbaceo, ad angulos muricato ; foliis lato-o\atis , integris, glabris; frudu nigro.

Ex Guinea. Q Dill. Elth. 1.174. f. 364.

2340. SOLANUM chenopodioides.

S. cauie inermi, fubherbaceo ; foliis ovato-oblongis , repando- finuans , fu*hirfutis : junioribus fubtus tomentofis.

Ex inf. Mauritiana. An f. chenopodioides. TeuilL obf %. t. iq.

2341. SOLANUM JEthiopicum.

S. caule inermi, herbaceo ; foliis ovatis , repando-angulatis , nudis 5 frudutoiulofo.

Ex iEthioj ia, China. © Fr. ruber \$ magnus , dtprejjüs.

2342. SOLANUM triangulare.

S. t*aule inermi, herbaceo, trigono; foliis oblongo-ovatis , integerrimis , nudis; corollis pallide violaceis.

Ex Indiis orient. 0 ? Halicac. baccif. Rumph. amb. 6. t. zff.f. z.

fi. Idem? caule tetragono,fcabro. S. quadfan-gular'e* Suppl 147.

2343. SO LA NUM anguifolium.

S. inerme, fubherbaemm ; foil'is anguflolanceolatis, obtufiufculis, nudis j corymbo . terminali.

Ex Agro-BanarienG. Commerf.

2344. SOLANUM ycabrum.

S. ineiqp, fubherbaceum i caule tuberculis

PENTANDR1E M0N0GYN1E.

de mb.erculfs , r.in; .in?: j la bafo ; feuill?s oblongues , lancolée>, pubifcentes.

L. ii, le l'irou. •f Mclongenedu Pfrrou.Fm'u ovule.

ft. Ellcvark a/, appsnckulecs^pre/que pinnits.

234f. MORELLE failles He poirier. Difl.

M, inerme, herbacce; a festrilles ovales, entières, nuts de cheque C&t; panicuta ter-mimlc; cal. ubtui.

L. a. la Martinique. Jo/ Martin.

234/6. MORELLE grimpante. DJft.

M. inerme , j i tige volubile ; feuilles en ovales, j 1 dantes . tres-molles en-defiou*, pinicuies terminal's.

L. «. Surinam. Tige, furbacie,

*547. M.-RELIE en tyre Dia.

M. inerme , b. srbacee , droite j a jteuilles en lyre , hastee s , tomferitenes.

L. n. le Ja, on. PI. tomsntue/e; mats a, calices & pddonculespropres , glabrcs.

• MORELLE {avkuln'tre) h tipc incrme , frutiqncuit' > leuiileslnmcés-j.-innaifiitiles ; corymbet terminauXi De la Nouvelle-Zclands.

• MORELLE (Uxc'mUe.) 3 tige fuffrutiqueafe , inerme , trfts-glabre ; fcuilles ptmnatihdes ; à déc. lancOolees , pointnes ; pamcules axiil. gemindea <JU terneea. Dt hi Nouv. Zilaade.

* * PI. mufies de piqmvis.

2348. M OR E LLE mitongine,. Did. -

M à ug' inerme , berbace^ j feuillrs ovales , Bnuiea , tbmenteufea j caicesu j quans rares; fruit oblong.

L. a. Its Indes. O Vauberg'me.

t. La mime a fruit ovals₃ bkinc. tameloagint ov/Jerc.

2349, MORELLEY;/i D\a.

W. a tige iK-rbaccc, garnic de piquana : fc uilles oyalea, mi j. ii iiiHa"r.s , umKTucufesj cal. a piqrkM: fru^dblo

L.n. rinde. © EllsfembU n 'en qu 'urn vanite de In priccdesui.

PENTAXDR1A MOXOGYNIA. 19

{eabfo, bafj _rcpentc; fuliis oblongo-lanceoluis , pubefcsntibusi

E Peru. ?! Mdvtgc:ui y &c. Ftu'dlie oh/ 2,

fi, Vamufoliit appenJicutatis y /uhp'mnatis.

234^, SOLANUM pyri/ollum.

S. iniirnie , herbaceum ; foliis ovatis, iiuegris , utrtnquc nudis ; panipola tcrtninaii ; cayribus obtuiis.

E Marunica, Floras/ querd/olii. , majufcutl.

2346. SOLANUM fiandens.

S. inerme, caule volubijij foliis cordatis, ovjm, t! 1^ en den I i bus , iubtus molliflunigj paniculis ccrminalibus.

E Surinamo. Lin. //typl. 1 47.

2347. SOLANUM lymrum.

S. inetme, herbaceum jCreclum 5foliis lyratolafutis, tomemofis.

Ex Japonia. Thunb. FL Jap. gz. PI. tomitit^ to/a ; at pedketli calyce/quas gLibri.

* SOLANUM (avkulare) canle inermi , fruticofo; foliis fiouato- pinnatifidis • corymbi* terminalibus. For/l. FL aujir, n°, toj.

* SOLANUM (buinuutair) cuilefirTrucicofo, inermi, glaberrlino;foliis 1 innaiifidis: lacinii* lanceolatis , aqids; pariiciiis axiUaiibus^ binis ittiiUve. Hart. Kcu'.j. 247.

** PL aculeate.

2348. SOLANUM meloagena.

S. caule inermi, herbaceo.j foliis ovatis, finuaiis , toraentoGsj; olyrilnis nirii aculea tis; fruti oblongo

TM* [ndiis. © FruCi. subviola.....ux , eduHt.

f. idemJraSa o'veto , alb. Melongena, ov/gera. Ex hort. Paris.

2349. SOLANUM infaiwm,

S. ckilc aculcato, If rb,tcpo : folib ovuis fubliuiittis , toinetitoli.?; calycibus acuieads* fr 11'oblo'-go.

Kx Iiiii.i. 0 Moris, fee. z j./. 2._/; z. Pluk. c. zzG./.j. Klteed. muL to. c. 74.

20 PENTANDRIE MONOGYNIE.

23so. MORELLE *de Ceylan*. Did.

M. à tige garnie de piquans, frutiqueufe; feuilles ovales, finuées, iiibtoir.emeules: cal. à piquans: fruit oviforme.

L. n. l'ifle de Ceylan. Elle a des rapports avec la pricéd.; ma is elleen eft dlft.fi elle efljriuiq.

23f.1 MORELLE feince. Did.

M. à tige garnie de piquans, herbacée; feuilles en cocur, anguleufes, iomenteufes, à piquans: baies herilTees, recouvertes ^ar le calice.

L. n. le Malabar.

£35*2. MORELLE brune. Did.

M- à tige garnie de j.iquans, dure, prefque brune: feuilles ovales, finuées-lobcés j piquans d'unpourpre brun: fruit globuleux.

L. n. FAmérique. © Fl. grandes, violettes. A La me me a tige & piquans moins colores; cal. - verds.

435-3. MORELLE *de Campèche*. Dia.

M. à tige garnie de piquans, hériflée : feuilles en cocur, oblongues, à cinq lobes : finus obtus, étevés.

L. n. TAmçrique. 0

23>4- MORELLE *mamnuiforme*. Di&

M. à tige herbacée, garnie de piquans ; feuilles en eccur, anguleufes-lobées, vciucs des deux côtés, àfiquans.

L. n. lesillesde l'Amériqtie, O Fruit jaune, en poire renverfee. Lapomme telon.

23S5 MORELLE *paniculeé*. Did.

M. à tige & petioles garnis de piquans: feuilles finuées-anguleufes, glabres en-deffus : fleurs paniculées.

L. n. le Bréfil. F* tomenteufes en-dej/bus; cal. inermes.

235-6. MORELLE *chevelue*. Did.

M. frutiqueufe à piquans; feuilles ovales, finuëcs, anguleufes, tomenteufes ; pétiojes j,é- doncules, & calices très-échinées, prefque chevelus.

I. n. l'ifle de Cayenne. T> Le blond. Les pi- quans des calices, des pedoncules >&c, J'etace's, mcus, très-nombreux.

PENTANDRIA MONOGYN"

23yo. SOLANUM *qylanicum*.

S. caule aculeato, fruticofo : foliis ovatis, linuatis, fubtomentoiiis ; calycibus aculeatis : fructu oviforme.

Ex Zeylona. Scopol. delic* infibr. 1. t. 1. bucca jlava.

23fi. SOLANUNLferox.

S. caule aculeato, *herbacco : foliis cordatis, angulatis, tomentofls, aculeatis ; baccis hirtis, calyce obtedis. Lin.

Ex Malabaria. Statura S. melongenoe.

235-2. SOLANUMfufcatum.

S. caule aculeato, duro, fubfufco : foliis ovatis, finuato-lobatis; aculeis purpureo-fufcis : frudu globofo.

Ex America 'i Q Cal. tomentofi; cor. violacea. fi. Idem caule aculcifque minus coloratis. S. fuf* catum Jacq. colled. i.p.*5i.& ic. rar. 1.

2353. SOLANUM campeckienfe.

S. caule aculeato, hirto : foliis cordato-oblongis, quinquelobis : finibus obtufis elevatis.

Ex America. O Dill. Elth. t. %SB.f. 3^7.

23f 4. SOLANUM mamnofum.

S. caule aculeato, herbaceo : foliis cordatis, angulato-lobatis, utrinque viilosif, aculeatis.

Ex infuhs americanis, O Fru3us luteus, pyri inverfi forma. Pluk. t. z%6.f. 1.

23f\$. SOLANUM paniculatum.

S. caule petiolifque aculeatis : foliis finuato-angulatis, supra glabris : floribus paniculatis.

E Brafilia. Pis. bras. 181. fig. ext. cal. inermes.

235*6. SOLANUM crinitum.

S. fruticofum aculeatum; foliis ovatis, finuato-angulatis, tomentofis; petiolis jpedunculii calicibusque echinatifiinis, fubcrinitis.

Ex Cayenna. T> Fol. ampla, supra inermia, fubtu's rariter aculeata ; fl. maxim'u

:j,, JYIORELLE de Virginie. Dift.

JVl à tige anguleuse à piquans j feuilles pinnatifides, à piquans de tous côtés j ayant des découp. finuées , obtufes ; calices à piquans.

L. n. l'Amérique. O Je Vaidel'i/ledeFrance.
Fl. violates, fr. sphériques, peats , panachés de vert & de blanc > avant Uur maturité.

235-8. MORELLEfodome'e. Dift. ^ •

M. à tige frutiqueuse, cylindr. a piquans; feuilles pinnatifides, finuées, d'un vert foncé, à piquans de toute part; calice à piquans.

L. n. l'Afrique. T> F.prcfque glabtes>fl. violettes.

23 \$9. MORELLE de Caroline. Dift. .

M. à tige annuelle, à piquans; feuilles ovales-oblongues, finuées, pinnatifides, fubha flees, à piquans de chaque côté ; grappes lâches.

L. n. la Caroline. % Tige dure, presque fuf-ruitiqueuse.

2360. MORELLE citée.

M. à tige herb icé e, à piquans ; feuilles en cœur, linuées , anguleufes , ciliées, à piquans ; ^cJoncules c urts, paucifiorcs.

L. n...TpF. d'un vert no irat* re.

2361. MORELLE heriflonne. Did.

M. à tige fuflFrutiqueuse très-piquante; feuilles eifcoeur , lobées, anguleufes , velues, piquails de chaque côté.

L.n-J) Fl. blanches } anthere's fiparees \$ jpe'donc. courts j laúraux.

2362. M9RELLE hdrijfe'e. Di<3.

M. frutiqueuse , à piquans ; feuilles en coeur , anguleufes , tomemcufes , à piquans ; péd. latéraux , ramafcis & très-velus , ainfi que les calices.

L /U'inedelaTnnite. T>

236s- MORELLE coagulante. Difl.

M. à tige frutiqueuse, à piquans; feultes ob-longucs , ondées , finuées , tomenteufes , à piquans : lobes arrondis , eiitiers.

l.n. TARabie. T> Feuilles obtufes, tongues de upouces. Sts baies fervent à coaguler le lait.

2364. MORELLE pyracanthe. Did.

111. a tige fuflFrutiqueuse , a piquans j fetiillgjlrj

2357. SOL AHUM virginianum.

S. caule aculeato angulato; foliis pinnatifidis undique aculeatis ; laciniis finuatis obtusis , calycibus aculeatis.

Ex America. G Jacq% colleS. z p. z85. & ic. rar. vol. z. folia viridia, venis albis variegata; spin& ritvs a recta*.

23;8. SOLATIUMfedomeum.t. it5. f. 1,

S* caule aculeato, fruticofo , tereti; foliis pin.ntifiJo finuatis , unJique aculeatis , intensè viiidibus; calycibus aculeatis.

Ex Africa. 1) Her/n. lugdb. t. 5j5.

23 fp. SOLANUM carolinienfe.

S. caule aculeato annuo; foliis ovato oblons , linuato pinnatifidis , fubhaftatis utrinque aculeatis; racemis laxis.

Ex Carolina, %. Jacq. colled. 2. p. 18j. &ic. rar. vol. z.

2360. SOLANUM ciliatum.

S. caule aculeato herbaceo; foliis cordatis, finuato-angul&tis, aculeatis , ciliatis; pedun* culis brevibus, paucifloris.

Ex Ip S. capfcooidesyhcvt. Paris.

236 r. SOLANUM aculeatijjimum.

S. caule fufruticofo aculeatiffimo j foliis cordatis , lobato-angulatis , hirfutis , utrinque aculeatis.

Ex..... T> Jacq. colled, z. p. too. & ic. rar. vol. 1.

2362. SOLANUM hirtum.

S. fruticofurn, aculeatum; foliis cordato-angulatis, tomentofis, aculeatis' ; pedunc. lateribus, aggregatis, calycibufque hirfutifimis.

Ex inf. Trinitatis. T> FahLfymboL z. p. 40.

2363. SOLANUM coagulans.

S. caule aculeato fruticoTo ; foliis oblongis , repando-finuatis , tomentofis^ aculeatis: lobis rotundatis , integris.

Ex Arabia. T> Forskxgypt.p. qj. vahl.Jymh Z. p. qj.pl. tomentofo-incana.

2364. SOLANUM pyracantkos.

S. caule aculearo > lufliuacofo; foliis oblon-

22 PENTANDRIE MONOGYNIE.

- oblongues, pointues, finouées - pinnatifides ,
toinenteufes: piquans droits, prefqu'ccirlattes.
X. //. Madagascari. ft *F. tongues de j polices*
ou davantage , à piquans de chaque côté.

336?. MORELLE *ftmmoine*. Did.

- M. frutiqueufe, à piquans ; à feuilles amples, prefqu'en cocur, finouées-anguleufesj à piquans rares, un peu tomenteufes en-defibus.
X. n. les Indes orieatales. T> *S. acanthi folium*,
hort. Van's. caL inermes.

3366. MORELLE *flndt*. Dift.

- M. frutiqueufe , à piquans; feuilles oyales , finouées-anguleufes , tomenteufes en-deffous : à piquans droits de chaque côté.
X. //. Tlnde , Tlle de France, b *F. blanches en-*
deffous i épines glabres ; fr. pet its y écarlettes.

2367. MORELLE *ondée*. Dift.

- JV1 frutiqueufe ^à piquans; feuilles ovales, ondées, un peu tomcnt. en-defibus : à piquans nuds.
Z. n. l'Inde , TUTe de France. T> *Jof Martin.*
fr,gros, orangis.

2368. MORELLE *hétirophylle*. Difl.

- M. frutiqueufe , à piquans ; feuilles ovaJes , finouées-ondées, un peu toment. en-deffous : jes autres plus petites ovo'i<ics très-emières,
X. n. la Guiane. T> *LeblonJ.*

2369. MORELLE *de Palefline*. Dift.

- M. à tige frutiqueufe, à piquans; feuilles obliquement ovales , ondées & tomenteufes, ainsi que les piquans;
X. n. la Pdlefline, 1'Arabic T>

2370?. MORELLE *marginie*. Did,

- M. frutiquenfe , à jpiquans ;feuilles prefqu'en cocur, finouées , ondées , blanches & tomcut. en-deffous : à bord blanc
X. n. l'Abyflinie. T> *Trcs'-belU efpe'ce>tomen-*
teufe bjort blanche fur la plupartdefes parties.

2371. MORELLE *tomentufe*. Did.

- M. frutiqueufe, à piquans; feuilles en cocur, j ondées, ton.enteufes,inermes: les plus jeunes j, ayant un duvet pourpré.
X, // l'Afrique. T> *ram* a piquans très-fins**.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

gis, acutis , finuato-;,inn:itifidis, tomentofis : aculcrii rtfiis, fubcoccineis.

Ex Madagascaria. T> *Jofph. Martin. Folia*
spithamea vel longiora , utrinquz aculeata

236\$. SOLANUM *flramonifolium*.

S. aculeatwm, fruticofum j foliis ampiis , subcordatis, finuato-angulatis, rariter aculcatk , fubtus tomentofiufcuiis.

Ex India orient. 'b Jacq. mlfcoll. z. p. zg8. & ic. rar. vol 1. pL 6-pc.dalis.

2366. SOLANUM *indicum*.

S. fruticofum , acu lea turn ; foliis ovatis , (i^ nuato-angulatis, fubtus tomentofis : aculeis mrinqve reftis.

Ex India , Infula Francicca. T> *Burnt. %eyl. r#*
io%. Rheed. mal% i. r. 36. txclu/h dill.Jyn.*

23^7. SOLANUM *undatum*.

S. fruticoRun , aculeatum ;^foliis ovatis, repandis, fubtus tomentofiufcuiis : acuidfs nudis.

Ex India, Infula Franciar. T> *Rheed. mal. z.*
z. 37.

2368. SOLANUM *heterophyllum*.*

S. frūticofum, aculeatum; foliis ovatis, finuato-repandis, fubtus tomentofiufcuiis : alii* minoribus obovatis integerrimis.

Ex Guiana. T> *Aculei ramorum recurvi.*

2369. SOLANUM *fanOum*.

S. caule aculeato , fruticofo ; aculeis tomentofis , foliifque oblique orntis, repandis.

Ex PaJeCftina, Arabia. T> *S. incanum. Forsk*

2370. SOLANUM *marginalum*.

S. fruticofum , aculeatum; foliis subcordatis , iinuato-repandis , fubtus incano-toinentofis;; marl ine abjo.

Ex Abyffinia. T? D. Bruce. Jacq colleS. t. p. 5Q. &ic rar.fl. albidiy baccaflavefcens.

2371. SOLANUM *tomeitofum*.

S. ffuticofam aculeatum j foliis cordatis, repandis , tomentofis, inermibus: tenellis purplureo pūlverulentis-.

Ex Africa. T> *Bocc.fic. 8. t. 5.*

PENTANDR1E MONOGYNIE.

- 2372. MORELLE à fruits rouges.** Did.
M. frutiqueufe, à piquansj feuilles prefqu'en cœur, ondées, toifient, à piquans rares; baies écarlates.
Z. n. . . J) Ce ri*eflpeui-itre qu*une var. de la précédent*.
- 2373. MORELLE rolde.** DiA.
M. à piquans, frutiqueufe, bafle; feuilles ovales, tinuées-anguleufes, à piquans, prefque glabres: piquans droits, blanchâtre6.
£. n.....ft Tige droite, roide. un peu ramife, haute (Tun pled \$ fl. blanches, f. point ues).
- 2374. MORELLE naine.** Dia.
M. à piquans, frutefcente; feuilles ovales, obtufement finuées, à piquans, prefque nues : piquans droits, blanchâtres.
L.n%.... ft Tige drone > ram., haute Jtunpied & demisfl. violettes ; calice garni de piquans.
- 2375. MORELLE anguivi.** Dìd.
M. à piquans, frutiqueufe; feuilles ovales, finuées-anguleufes, torn, en-deflbusj calices inermes.
/. n. Madagafcar. T> [Herb. dé M. Thouin.] Grappes latér, très-courtes. On mange les baies.
- 2376. MORELLE arbucule.** Did.
M. frutefcente, à'picjuans, glabrefe feuilles oblongucs, lobeés-pinnatifides, obtufes, à piquans: piquans recourbés.
I. n. le Cap de B.-Efperance. T> Arbuile d'un pied & demi ; feuilles petites \$ piquans blanchâtres ; fl. blanches.
- 2377. MORELLE polyacanthe*** Did.
M. frutefcente, très-piquante; à feuilles linéaire^-lancéolées, un peu dentées, à piquans dts deux côtés : piquans droits, en épingle.
L.*n. Saint-Domingue. T> De Vétang. pédonc, unflorts j baies très-petites.
- 2378. MORELLE de Bahama.** Did.
M. à tige frutiq. à piquans j feuilles lancéolées, ondeep,-obtufes, reflechies fur les bords : grapf es fimples.
L. n. les Ifles de rAmerique, ^. Fl viokties.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 23

- 2372. SOLANUM coccineum.**
S. fruticofum, acu lea turn ; foliis fubcordatis ; repandis, tomemolis, rariter aculeatis: baccis parvulis coccincis.
Ex . . . T> Jacq. mifcell. %. p. 329. ic. rar* vol. f.
- 2373. SOLANUM r:gidum.**
S. aculeatum, frutelcens, humile ; foliis ox'a-tis, finuato-anguldfis, aculeatis, nudifculis: aculeis redis, albiJis.
Ex . . . Hort. Paris. T> Caulis ereSus, rigidus pedalis ; fol. acuta, fl alb.
- 2374. SOLANUM humile.**
S. aculeatum, frutefcens, foliis ovatis, obtufc fmuatis, aculeatis, fubnudis : aculeif redis, albidis.
Ex . . . Hort. Paris. J) Caulis ram. ereftus, fequipedalis; ft. violacei; an S. capenfe. SuppU
- 51375-. SOLANUM anguivi.**
S. aculeatum, fruticofum ; foliis ovatis, finuato*angulofis, fubtus tomentoGs; caiycibus inermibus.
Ex Madagafcaria. T> Commerf. baccas parvx, rubr& y glabres y efculentce*
- 2376. SOLANUM milleri.**
S. frutefcens > aculeatum, glabrum : foliis ob-longis, lobato-pinnatifidis, obtufis, aculeatis : aculeis recurvis.
E Cap. B.-Spei. T> . Jacq. collèct. 4. p. zo\$. & ic. rar. vol. z. An S. trilobatum. Lin.
- 2377. SOLANUMpotyacanthos..**
S. frutefcens, aculeatiflimum ; foliis linearilanceolatis, fubdentatis, utrinque aculeatis : aculeis redis, acicularibus.
E Domingo, b Burm.amer* t. zzq.f. i.ped. uniflori ; baccæ m riimæ.
- 2378. SOLANUM bdhamenfe.**
S. caule aculeato, fruticofo ; foliis lanceolatis, repandis, obtufis, margine, reflexis; racemis fimplicibus.
Ex InfuUs Aineiicanis. T> Dill. Elth. t. zj..

24 PENTANDRIE MONOGYNIE.

2379. MORELLE *a piquans rouges** Dift.

M. à tige frutiqueuse, à piquans ; feuilles lancéolées, acuminées, très entières: piquans rouges; grappes fimples.

L* *. I'Amérique méridionale. f> F/. *blanches*. Elle pcrd presque tousses piquans par la culture.

2380. MORELLE *de Buenos-ayres*. Did.

M. à tige frutiqucufc, garnie de piquans inférieurement j feuilles ovales-oblongues, ondées, finuées, presque glabres, inermes.

X. n, les environs de Buenos-ayres. T? *La tige des vieux pieds perdes piquans*.

3381. MORELLE *feuilles d'oeille*. Difl.

M. fubfrutefcente, à piquans, glabre; feuilles pbtufes, finuées, fubpanduriformes: piquans très-petits, recourbés.

2. n. lesIndes Orient. T> Sonnerat. fl. grandes ; cal. petit r mutique*

3382. MORELLE *ndcracantke*. Did.

M. frutiqueuse, à piquans; feuilles ovales, acuminées, un peu toment. en-deffous: piquans très-petits, rares, recourbés,

L. n. la Guadeloupe, le Bréfil. T)

3383. MORELLE *crotonoide*. Did,

M. frutiqueuse, à piquans; feuilles ellyptiques-lancéolées, glabres en-deflus, tomentcufes en-defbus, inermes : piquans droits,un peu rares.

JL. n. laMartinique. T> Jof Martin. Rameaux, pinôles, ped. & calices tomenteux & blanchd-tres ; sommitis ferrugineuses.

5384. MORELLE *gigaruefque*. Did.

M. frutiqueuse, à piquans; feuilles ovales-lancéolées, inermes, blanches 5f tomenteufes en-deffous : cyme tomenteufe, droite, fubterminale.

JL. n. le cap de B.-Efprânce. T> ArbriJJéau droity s'dlevant à plus de to pleds ; piquans courts y Ifirges'a kur bafe j. ft. Sun violet pâle.

3385. MORELLE *farmenteufe*. Did-

M. à tige garnie de piquans, frutiqueuse, presque grimpante ; feuilles ovales-lancéolées, entières, un peu anguleufes, à piquans fur la (ptc ^ iur iv pétio'es*)

PENTAKDRLi MONOGYNIA.

2379. SOLANUN ^{^um.}

S. caule aculeato,fruticofo; foliis lanceolatis, acuminatis > integrerimis : aculeis rubris ; raccemis fimplicibus.

Ex America Merid. T> Ptuk. t. zxS. f*. S. fl% albi ; petalis anguJJcs.

2580, SOLANUM *bonarienfe*.

S. caule fruticofo, infern̄ aculeato ; foliis ovato-oblongij. linnuato-repandis, fubnudis . mermibus.

Ex agro bonarienfi. Ty Dill. Elth. t. zjz. fl. albi y magni, cymofi, nutantes.

2381. SOLANXJMacetofcefolium.

S. fubfrutefcens, aculeatum , glabrum : foliis obtufis, finuatis , fubpandurifonnibus : aculeis minimis, recurvis.

Ex Indiis Orient. "B Cal. parvus, y inermis 5 cor. ampla*

2382. SOLANUM *micracanthos*.

S. fruticofum , aculeatum : foliis ovatis , acuminatis , fubtus tomentofiufulis : aculeis mi nimis, rarisi , recurvis.

E GuadeJupa, Brafilia. T>

^383. SOLANUM *crotanoides*.

S. fruticofum , aculeatum ; foliis elJiptico-lanceolatis , supra glabris , fubtus teueilto* fis , inermibus : aculeis redis, rariufculis.

E Martinica. T> An S. obfeurum D. vahlLfymb. % p. q. tomentum breve % in fummitatibus ferrugineum.

2384.. SOLANUM *glganteum*.

S. fruticofum, aculeatum; foliis ovato-lanceolatis, inermibus, fubtus incano-tomentoii : cyma tomentofa , erepta , fubterminali.

E cap. B. Spei. T> Jacq. colled. 4. p. i%S. & ic. rar. vol. %. S. niveum, vahlJfynib.x. p. 41.fl. pallide violacei.

2387. SOLANVU^Jarmentofum.

S. caule aculeato , fruticofo , fubfeandente; foliis ovato-lanceolatis , integris , fubangustis , ad coftam petiolofque aculeatis.

PENTANDRIE ttfONOGYNIE.

L. n. TAméricique merid. T) F. glabres > UJJes & mutiques en-deffus ; fl. blanches ; pét, lancéolis i fruits rouges.

S386. *MOKEIAJE feuilles defifimbre.* Dift.
M. à piquans; feuilles fub bipinnatifides , vélues, à piquans : à lobes dentés j ftigra. bilobé.
L. n. les environs de Buenos-Ayres. T> ?

2387, MORELLE *comae.* Did.
M. à piquansj feuilles pinnées-pinnatifides , à piquans : anthères inclinées , corniformes: rjnferieure très-grande, très-allongée.
L. n. le Bréfil. f> ? Fl. jaunts > jin peu irrigulieræ.

* MORELLE [*chauve-fouris*] , à tige fruti-queueufe , à piquans; -feuilles en cocur, entières : cor oil es prefqu'irrégulieres ; anthcre inf. plus allongée. *Des îles Canaries.*

Explication des fig.

PI. iif.f. 1. MORELLE *fodomie.* (a) Fleur emigre. (A) Corolle séparée. (c) Calice. (d) Baie emigre. («) Lamême coupée. (/) Sommité d'un rameau.

PL 115.f. 2. MORELLE *pomme-d'amour.* (a, i, g, c, d) Fleurs d'apr&s Tournefort. (e,f) Fruit suivant le même.

PI. us- f. ?- MORELLE *muhifide.*

PI. 115. f. 4. MORELLE *pinnatifidc.*

326. P I M E N T .

Cdract. ejfent.

COR. en roue : baie cortiqueufe , sèche , à 2 ou 3 loges.

CaraS. nat.

Cal. monophylle ^ quinquefide , droit, perfftant.

Cor. monopétale , en roue. Tube très - court. Limbe semi-quinquefide , pliflé , ouvert: à decoupures larges., pointues.

Etam. Cinq filaments tr^s-petits, fubulés. Anthères oblongues , conniventæ.

Pijl. Ovaire fuperieur, ovale. Style ffliforme , plus long que les etamines : fligate obtus.

Botanique. Tome II%

PENTANDRIA MONOGYNIA. 25.

Ex Amer. merid. Ti *S. scandens* y *Swartz* prodr. qy. *S. lanceolatum.* Jacq_m collect* V p. z8ff. & ic. ran vol. z.

2386. SOLANUM *fifymbtifolium.*
S. aculeatum ; foliis fub bipinnatifidis , villosis, aculeatis: lobis dentatis; fligate bilobo.

Ex agro Bonarienfe. T> ? *Commits, herb.*

2387. SOLANUM *cornutum.*

S. aculeatum; foliis pinnato-pinnatifidis aculeatis: antheris declinatis, corniformibus j in* fina ifiaxima, produxitima.

Ex Brafilia. T? ? *FL lutei* y *fubincequales.*

* SOLANUM [*vespertilio*] , caule aculeato , fruticofo j foliis cordatis, integris : corollis subirregularibus : anthera ima produdiore. Hort. Kew- 1. p. %5z.

Explicatio iconum.

Tab. 1 if. f. 1. SOLANUM *fodomeum.* (a) Flos integer. (^) Corolla separata.. (c) Calyx. (4) Bacca integrata. (e) Eadem diffedta. Fig, ex Tournef. if) Summitas ramuli.

Tab. iif.f. 2. SOLANUM *lycoperiticum.* (<*>&>€ ,d) Flores ex Tournefortio, («, /) Fruftus ex eodem.

Tab. 115. f. 3. SOLANUM *multifidum.*

Tab. 115. £ 4 . SOLANUM *pinnatifidum.*

326. C A P S I C U M .

Charail, ejfent.

COR. rotata. Bacca corticofa , exfucca, 2 f. 3-locularis.

CkaraS. nat.

Cal. monophyllus , quinquefidus y eretus , per* filens.

Cor. inonopetala, rotata. Tubus breviflatus. Limbus semi-quinquefidus , plicatus , patens: laciuiis latis , acutis.

Stam. Filamenta quinque minima, fubulata. AntheraC oblongæ , conniventes.

Pifl. Germen fuperum, ovatum. Stylus filiformis ; fiaminibus longior; fligma obtufum.

D

* PENTANDRIE MONOGYNIE.

Péric. Baie cortiqueuse, sans pulpe, ovale ou ovale-conique, à 2 ou trois loges, creuse, colorée: Récept. des feni. attachés à la cloison, défléchés.

Sent, nombreuses, reniformes, aplatis.

Tableau des espèces..

5388. PIMENT annuel. Did.

P. à tige herbacée; pedoncules foliaires : fruits oblongs, pendans.

L. n. les Indes. © *Vulg. lepoivre long.*

238p. PIMENT a gros fruit. Did.

P. à tige frutefcente; fruits épais, presque cordiformes.

L. n. les Indes. T) *Le poivre de Guinée.*

23P0. PIMENT conique. Did.

P. à tige frutefcente; fruits ovales-coniques, droits.

X. n. les Indes. J> *Capf.hb. ic.317 ?*

2391. PIMENT eerife. Did.

P. à tige suffrufente : A^uis subglobuleux, foliaires, droits,

i. 71. le Brefil. T> *Fruit petit, ce'rufijérme.*

2392. VIMENTjaune. Did-

P. à tige frutefcente, flexueuse ; rameaux & pétioles veinés: fruits ovales, pendans, triloculaires.

L. n. TInde. T> *Lepiment de Mozambique.*

2393. TIMEKTpetites baies. Did.

P. à tige frutefcente, lisse; pédoncules subgeminés : fruits ovales, très-petits.

Z. n. TAmérique mérid. T>

2394. PIMENT de Chine. Did.

P. à tige frutefcente; pédoncules fasciculés : fruits coniques, très-petits, pendans.

L. 71. la Chine. T> *Fr. mucroñes par le style.*

239f. PIMENT frutefcent: Did.

P. à tige frutefcente; feuilles lancéolées : fruits oblongs, foliaires, presque droits.

L. n. les Indes orientales. Tj *Sonnérat.*

EENTANDRIA MOXOGYNIA;

Peric. Bdccacorticosa, exfucca, ovata vel ovato-conica, bi f. trilocularis, cava, colorata. Recept. feminum diffq. imento adnata, ex* fucca.

Sem. plurima, reniformia ^compreTa.

ConfpeQus Jpecierum.

2388. CAPSICUM annum.

C. caule herbaceo; pedunculis folitarijs: fructibus oblongis, propenJentibus.

Ex Indiis. 0 *Capf. aQuarii; lob. ic. 3iff.*

2389. CAPSICUM groffum.

C. caule frutefcente ; frudibus eredis, incrafatis, subcordiformibus.

Ex Indiis. 'F Fructw malifer' magnitudine.

2390. CAPSICUM conicum.

C. caule suffrufente : frudibus ovato-conicis, furreftis.

Ex Indiis. T> *Folia prcecedentibus ntnora.*

235? 1. CAPSICUM cerafiformc.

C. caule suffrufente : frudibus subglobo* fis, folitariis, eredis.

EBrafilia. T> *Piperfiliquaparva.j.B.z.gqq.*

2392. CAPSICUM luteum.

C. caule frutefcente, flexuoso ; ramulis petiolifquashirfutis : frudibus ovatis, pendulis, triJocuJaribus.

Ex India. "5 *Sonnerat. fr. lutti.*

2393. CAPSICUM baccatum.

C. caule frutefcente, lievi; pedunculis sub* geminis : frudibus minimis, ovaibus.

Ex America merid. "& *Fol.fubtus nervosa.*

23P4. CAPSICUMS/I^.

C. caule frutefcente ; pedunculis fifticulatis: frudibus conicis, minimis, pendulis.

E China. T) *Sonnerat. Jacq. hort. 3. t. 6j.*

23P;. CAPSICUM fmufcens. T. 116. f. 2.

C. caule fruticofo; foliis lanceotatis: frudibus oblongis, folitariis, fuberdis.

Ex Ind. orient. T) *Kumph. amb. 5. t. 88.ft3.*

Explication des fig.

PI. 116. f. i. Fructification du Piment; *iapres Tounefort*. (a) Fleur entière. (b) Corolle séparée. (c) Calice. (d) Piftil. (t, l) Fruitsentiers. (g, h) Les rôfimes coupés en cravats. (i) Semence séparée.

PI. 116. f. 2. PIMENT frutefcent. (a) Fleur séparée. (t) Corolle ouverte. (c) Calice. (d) Etamine. (e, f) Piliil. (#) Fruic coupi. (A) Rameaux, *d'après U Sec.*

327. C O Q U E R E T .

CaraS. ejfent.

COR. en roue, Etam. conniventes. Baie 2-loculaire, recouv. par le calice enfié.

Camèl, nat.

CaL fnonophylle, perl? , campanulé, perfftant, femi- quinquelije : à découp. acuminées.

Cor. monopétale, en roue. Tube très - court. Limbe femi-quinquefide, grand, pliflē : à découp, larges, pointues.

Etam. Cinq filaments fubulés, très-petits. Anthères oblongues, droites, conniventes.

Pift. Ovaire fuperieur, arrondi. Style liliiforme, prefque plus long que les étamines. Stigmate obtus.

Pe'ric. Baie globuleuse, petite, fubbiloculaire, recouverte par le calice grand, véniculeux, fubpentagone, fermé & coloré.

Sem. nombreuses, reniformes, applaties;

Tableau des espices.

* PI. frutefcentes ou vivaces.

2396. COQUERET *fornrdère*. Dift. n°. 1.
C. à tige frutiqueuse; rameaux tomenteux : feuilles entières; fleurs ramaflées.

L. /i. TEfpagne, rifle de Candie. T>

fi. *Le mimo à rameaux en ^g-^ag ; feuilles plus larges.*

2W COQUERET *en arbre*. Did. n°. 2.

C. à tige frutiqueuse arborefcente; feuilles ovales, ondées, leg. dentées, tomenteuses en-deffous : fleurs la plupart fafciculées.

I. n. les env. de Campcche. T> *Tige deq à Gp.*

Explicatio iconum.

Tab. 116. f. 1. Fru&ificatioCapfici, ex *Toumefortlo*. (a) Flos integer. (*) Corolla separata. (c) Calyx. (.) Piftillum. (e, /) Fiustus integri. (g > h) Iidem transverfim (edi. (i) Semenseparatutn.

Tab. 116. f. 2. CAPSICUM fmufctns. (a) Flosfeparatus. (^)Corolla aperta. (c) Calyx, (d) Stamen. (e, /), Piftillum. (g) Frufhis diffeaus.(^) Ramulus, ex S²c&c.

327. P H Y S A L I S .

Characl. ejfent.

COR. rotata. Stam. connivemia. Bacca 2-locularis ? calyce inflato teda.

Characl. nat.

Cal. monophyllus, parvus, campanulatus, perfftens, femi - quinquefidus : laciniis acuminateis.

Cor. monopetala, rotata. Tubus breviffimus. Limbus femi-quinquefidus, magnus j plicatus : laciniis latis, acutis.

Stam. Filamenta quinque fubulata, minima. Antherae oblongae, eredae, conniventes.

Pijl. Germen fuperum, fubrotundum. Stylus filiformis, flaminibus fere longior. Stigma obtufum.

Peric. Bacca globofa; parva, fubbilocularis, calyce ampio, veficario., fubpentagono, Ufo, coloratoque tefta.

Sem. plurima, reniformia, comprefla.

Confpz&us fpecierum.

* Pl. frutefcentes vel perennes.

2396. PHYSALIS *fomnifera*.

Ph. caule fruticofo; ramis tomentofis : folifi integris j floribus confertis.

Ex Hifpania, Creta. T? *Fl. parvi, axill.*

fi. *Eadem ramis flexuofis; foliis latioribus.*

P. flexuofa. Linn.

2397. PHYSALIS *arborefcens*.

Ph. caule fruticofo, arborefcente; foliis ovatis, repando-dentatis,fubtustumtofis : floribufbaggregatis.

Ekwnpetchia. T? *Mill. diU. t. zoG. f. z.*

D x

a* PENTANDRIE MONOGYNIE.

2392. COQUERET *f. d'origan.* Dia. füpl. C. à tige frutiqueuse j feuilles ovales, entières, un peu ondées, obfc. tomenteuses : fl folitaires.

Is. n. le Magellan. T> Commers.

2399. CC

Ivanie. Dift. n°. 4.

C à feuilles ea cœur-ovales , ondées, un peu nues ; tige herbacée : fleurs unicolores,
Z. n. rAmérique septentr. %

5400. COQUERET *alkekenge.* Dift. n°. 6.

C. à feuilles géminées, ovales-pointues , entières; tige herbacée ; calices frudif. très rouges.

L. n. TEitrope , aux 1. ombragés, %

3401. COQUERET / *d'anferine.* Did. fuppl.

C. pubefcent, à tige droite fubfrutefcente ; feuilles prefqu'en cocur, dentées , anguleuses: pétioles décurrens.

L_K n. le Pérou. Tj. ? Fleurs jaun&trts , à 5 ca-ches brunes.

^402. COQUERET *vifqueux.* Did n°. y.

C. à feuilles géminées, ondées, obtufes, fubtomentueuses : tige herbacée, paniculée fup.

X. n. la Virginie, Buenos-Ayres. %

* * PL annuelles.

S403. COQUERET *anguleux.* Did. n°. 8.

C. très-rameux , à rameaux anguleux , glabres; feuilles ovales, dentées.

L n. les Indes orient. & occid. Q*

104. COQUERET *de PhllaJelph.* Dift. n. 10.

*C. très-rameux , glabre -, fniilles ovales , ondées, dentées : pédoncules plus courts que la fleur.

L. n. l'Amérique septentr. O

\$40;. COQUERET *pubefcent* Dia. n°. 9.

C. très-rameux , à feuiiles prefqu'en cœur , dentées, velues, yifqueufes : péd. penchés courts.

L. n l'Amérique. O*

fi. Le mime à f. plus larges } pédoncules prefque droits.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

23p8 PHYSALIS *organifolia.*

Ph. caule fruticofo j foliis ovatis, intégris , fubrepandis ? obfoletè tomentolis : florib* folitariis.

Ex Magellania. T) An ph. curajjavica. I. ?

2399. PHYSALIS *Penfylvanica.*

Ph. foliis cordato-ovatis „ repandis, nudiuP- cuiis; caule herbaceo : floribus unicoloribus« Ex America septentr. Tfi

2400. PHYSALIS *alkekengi.*

Ph. foliis geminis , ovato - acutis integris ; caule herbaceo : calycibus fruififeris % ruber- riñis.

Ex Europa , in umbrofis. % ped. i-flori.

2401. PHYSALIS *chenopodifolia.*

Ph. pubefcens, caule eredo , fubfrutefcente ; foliis fubcordatis , dentato-angulatis : petiolis decurrentibus.

E Peru. T> ? An Phyf. peruviana. Lin.

2402. PHYSALIS *vifcofa.*

Ph. foliis geminis , repandis, obtufis , (ub- tomentofis: caule herbaceo, fuperñe pani- culato.

Ex Virginia, Bonaria. %

* * PL annu&.

2403. PHYSALIS *angulata.*

Ph. ramofiffima, ramis angulatis_y glabris: fH liis ovatis, dentatis.

*Ex utrifque Iniiis. O DHL Elth. t. tx.f. iz**

2404. PHYSALIS *Philadelphia.*

Ph. ramofiffima, glabra; foliis ovatis, re- pando - dentatis ; pedunculis flore brevioribus.

Ex America septentr. O

040;. PHYSALIS *pubefcens.*

Ph. ramofiffima ; foliis subcordatis , den- tatis , villofo - vifcofis : pedunculis ccrnus , brevibus.

Ex America. O

»*. Eadern foliis latioribus ; pedunculis fube • reSis. Alkekengi barbadense , &c. DHL Elth. t. 9. f. 9.*

PENTANDRIE MONOGYNIE.

2406. COQUERET *noueux*. Did. *fuppi*, C. herbacé, rameux; à géniculations noueuses : feuilles ovales-oblongues, comme rongées, pubefcentes; fleurs pendantes.
L. n. rAoiérique 0 Fl. petites.

2407. COQUERET à *feuilles Urges..* C. droit, rameux, velu, pubefcent; à feuilles en cœur, prefqu'entières : pédoncules courts, penchés.
L. n. rAmérique. 0 Coq. dt Barbade. Did. n°. 12. Pedoncules uniflores.

2408. COQUERET *couché*. Did. n°. 1 j\| C. très-rameux, couché, hifpide; à feuilles prefqu'ovales, obfc. anguleufes, inégales à leur bafe : corolles campanulées.
L. n. le Pérou. © Tige & feuilles fucculentes; calices fcarieux ; corolles grandes y d'un violet bleudtre.

2409. COQUERET *nain.BiA.* n°. n. C. très-rameux j à pédoncules fructifcres, plus longs que les feuilles velues.
*L. n. les Indes. © Je doute defajynonymie**
* * * (Les nicandres) *calices a'angles* " tranch. *sub5-phylles.*

2410. COQUERET / *deJframoine.Di&*. 13. C. rameux, glabre, à feuilles ovales, dentées-anguieufes 3 calices du fruit à angles tranchans.
L. n. le Pérou. © Tige droite ;fl. bleudtres.

2411. COQUERET *flnde.* Dia. n°. 14. C. rameux, glabre; à feuilles ovales-lancéolées, entières, lilies : calices du fruit à angles tranchans.
L. n. les Indes orient. Sonnerat.

- COQUERET (*ariflé*), - à tige frutiqueufe; feuilles oblongues, entières, glabres: rameaux, pétioles 8c pédoncules lanugineux; dents calicinales ariflées. Des Canaries. Var. du coq.fom-nifère?

Explication des fig.

PI; 116. f. 1. Falsification du Coqueret *Alkehenge*, *L'esT•urnifort.* (a, b) Fleur entière, vue en *£?£?§8;* (e) CoroUeféparée. (d) Calice. (0 Piftil, (/, *) Calice du fruit. (*). Baie. (i) La nrfme coupée tranverfalement. (/) Semences.

PENTANDRIA MONOGYNIA^A 29

2405. PHYSALIS *nodofa*. Ph. herbacea, ramofa: geniculis nodofis; foliis ovatp-oblongis, (uberojis, pubefcentibus: floribus pendulis.
Ex America. © A proceed, diverfa.

2407. PHYSALIS *latifolia*. Ph. erepta, ramofa, villofo-pubefcens; foliis cordatis, fubintegerrimis : pedunculis brevibus, nutantibus.
Ex America. Q *Ph. Barbadenfis.* Did. n*. 12. *Exclufo Jacquinijynonymo.*

2408. PHYSALIS *proflrata*. T. 1 M. f. 2. Ph. ramofiflma, proflrata, hifpida; folia fubovatis, obfoleté angulatis, bafi injequalibus: corollis campanulatis.
E Peru. © *Jdcq. colled.* 1. p. gg. & ic. rar_m *Vherit. fiirp. t. %%. phyflimenfis.* Retz. fafc. 5. n°. 54.

2409. PHYSALIS *minima*. Ph. ramoffiina: pedunculis<frudiferis, folio villofo longioribus. 1.
Ex Indiis. ©

* * * (Nicandras) *calyces acutanguli%* *fubS-phylli.*

2410. PHYSALIS *daturafolia*. Ph. ramofa, glabra; foliis ovatis, dentato-angulatis : calycibus fruAefcentibus, acutaiH gulis.
E Peru* © *Alkekengi.... few* t. %6.*

2411. PHYSALIS *Indica*.

Ph. ramofa, glabra; foliis ovato-lanceolatis, integris, lrovibus : calycibus fruftefcentibus, acutangulis.
Ex Indiis orient. *Barrel, ic. 1129.*

* PHYSALIS (*arifata*) cauie fruticofo; foliis oblongis,integris,glabris : ramis,petiolis-pedunculifque lanuginofii; denticulis calycinia jariitatis, *Hort, Kew.* 1 • p: 244.

Explicatio iconum.

Tab. 116. f. 1. Fructificatio Phyf. *Alk&engi,* e* *Tournefonio.* (a, b) Flos integer, defuper infisque vifus. CO Corolla separata. (d) Calyx. (e) Piftillum. (f,g)Calyx fru&us. (A) Bacca. (f') Eadem tranverfim fccta. (0 Semina.

50 PENTANDRIE MONOGYNIE.

PI. 116. f. i. COQUEIVET *couchi*. (a) Partie supérieure d'un rameau. (b, c) Fleurs entières. (d) Cor. coupée. (e) Etamine séparée. (f) Calice. (g) Pifill. (A, f) Calice du fruit. (h) Baie détachée.

328. I U S Q U I A M E ,

Camél, effent.

COR', infundibulif., irrégulière, * *f lobes*. Etam. inclinées. Capf. operculce, 2-loculaire.

Camél, nat.

Cal. monopaille, tubuleux, un peu ventru inférieurement, perfistant: à bord divisé en cinq déc. droites, pointues.

Cor. monopétale, infundibuliforme. Tube court. Limbe irrégulier, ouvert obliquement, à cinq lobes: une découpe plus large que les autres.

Etam. Cinq filaments pubescents, inclinés, attachés à la base du tube; Anthères ovales.

Pift. Ovaire supérieur, arrondi-ovalé. Style filiforme, de la longueur des étamines. Stigmate en tête.

Peric. Capsule ovale, obtuse, un peu ventrue à la base, marquée d'un sillon de chaque côté, coupée en travers sup., & s'ouvrant par un opercule.

Receptacles féminins, demi-ovales, opposés, attachés à la cloison.

'*Scnti nombreuses, petites, irrégulières.*

Tableau des espèces.

2412. JUSQUIAME noire. Did. n°. 1.

J. à feuilles amplexicaules, fines, laciniaées, très-molles : fleurs presque sessiles.

X. n. les lieux incultes & herbes de l'Eur. ↳

2415. JUSQUIAME reticulée. Did. n°. 2.

J. à feuilles caulinaires, subpetiolées, finement laciniaées, presque glabres : corolle pourpre, veineuse > reticulée.

I. // le Levant, d' F, radicales, obtuses*

2414. JUSQUIASIE blanche. Did. n°. 3.

J. à feuilles pétoliées, finement obtuses ; fleurs sessiles.

I. n< l'Europe au fort rale. 0

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Tab. ir6. f. i. PHTSALIS *p'oftrata*. (a) Pars funeraria ramuli. (b, c) Fibres inregri. (d) Corolla diffusa. (*) Stamii separatum. (f) Calyx, (g) Piftillan. (k, i) Calyx fructus. (l) Bacca foluca.

328. H Y O S C Y A M U S .

Charac. effent.

COR. infundibuliformis*, inaequalis, y-loba. Stam. inclinata. Capf. operculata, 2-locularis.

Charac. nat.

CaU monophyllus, tubulofus, infernè subven-tricofus, perfiftens j ore quinquefido : lacinias acutis, erectis.

Cor, monopetala, infundibuliformis. Tubus brevis. Limbus inasqualis, obliquè patens, quinquelobus : lacinia unica reliquis latiore.

Stam. Filamenta quinque subulata, inclinata, bafi tubi inferta. Antherae ovatze.

Pift. Germen fuperum, subrotundo - ovatum. Stylus filiforaijs longitudine fldminum. Stigma capitatum.

Peric. Capsula ovata, obtusa, bafi subventricosa, utrinque fulco infculpta, bilocularis, fuperne circumfciffa, operculo dehiciente.

Receptacula feminifera, dimidiato-ovata, oppofita, diffimento affixa.

Sent, plurima, parva, inxqualia.

Conspedus specierum.

2412. HYOSCYAMUS n-ger.

H. foliis amplexicaulis, inuato-laciatis, niollidlmis : floribus subfoliibus.
Ex Europea ruderatis, pinguis. &

2413. HYOSCYAMUS reticulatus.

H. foliis caulinis, subpetiolatis, inuato-laciatis, nudifculis: corolla purpurea, venofo-reticulata.

Ex Oriente, & Camer, kort. t. zz,

2414. HYOSCIAMUS albus. T. 117.T 2.

H. foliis petiolatis, finuatis, obtusis : floribus fedibus. 1.

Ex Europa auftrali. O Blachir, t.m%

PENTANDRIE MONOGYNIE.

2418\ JUSQUIAME dorée. Dift. n°. 4.
J. à feuilles pétioleées , anguleuses - dentées : fleurs pédonculées , à limbe jaune.
L. n. l'Europe austral , le Levant, ip

2416. JUSQUIAME feuill. dckite. Dift 11°. f-
J. à feuilles pétioleées , ovales - lancéolées , dentées-anguleuses , lîfles : braftées entières,
L. n. l'Arabie , TEgypte. b Pétiolés longs.*

2417. JUSQUIAME fluette. Did. n°. 6.
J. à feuilles lancéolées , dentées; les florales inlérieures géminées: calices épineux.
L. n. la Perse. 0 Tigegrile de 5 a' 6 pouces.

2418. JUSQUIAME de*Sibe'rie. Did. 11°. 7.
J. à feuilles ovales , très-éminées ; calices tubuleux : les friujifères enflos-globuleux.
L. n. la Sibérie. % Cor. d'un violetpdle.

2419. JUSQUIAME^ pendantes. Did. n°. 8.
J. à feuilles, ovaies , entières ; fleurs pendantes ; calice glabre , hémifjihérique.
L. n. la Carniole. Tp Cal. court.

Explication des fig.

PL 117. f. 1. Fru&ificatioW'tlf la Jusquiame , d'après Tour/icfdrc. (a) Fleur entière. (f) Corolle séparée. (c) Calice. (d) Calice ouvert* piftil. (e)-Calice trudHf're. (/) Le même coupé , montant la capsule. (g, A) Capsule avec son opercule séparé. (f) Receptacle des femences. (/) Semences séparées. (m) Opercule vu de dessous.

PL H7.f. 2. JUSQUIAMB blanche, (tf) Partie supérieure de la tige. (*) Capsule fermée. tc) La même ouverte. (<) La même coupée transversalement. {e) Semences. (/, g) Les mêmes coupées diversement.

329. M O L È N E.

CaraS. ejffent.

COR. en roue, presque régul. Filam. barbus. Capf. 2-loculaire , polyperme.

Caract. nat.

Cal. monophylle , quinquefolie , perfifflant ; à découp. ovales-lancéolées , droites.
Cor. monopetale , en roue , un peu irrégulièrre. Tube très-court Limbe ouvert , partagé en cinq lobes ovales , obtus.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 31

2415-. HYOSCYAMUS aureus.
H. foliis petiolatis^angulofo-dentatis; floribus pedunculatis : limbo aureo.
Ex Europa austral , Oriente. ip

2416. HYOSGYAMUS betafolius.
H. foliis petiolatis , ovato-lanceolatis , dentato-angulofisis , lacvibus : bradeis indivilis.
Ex Ar. -^Egyp. a* *H. muticus. L. H. datora. f.*

2417. IIYOSCYANUS pufillus.
H. foliis lanceolatis , dentatis : floralibus inferioreibus , binis : calycibus spinofisis.
Ex Perzia. O Pluk. t. 37.f. 5. ^

2418. HYOSCYAMUS phyfaloides.
H. foliis ovatis , integrerriinis ; calycibus sub-tubulofisis : frustefcentibus inflato-globofisis.
Ex Sibir. Jp Lin. amccn. Acad. 7. t. ff. f. t_m

2419. HYOSCYAMUS fcopolia.
H. foliis ovatis , integris ; floribus pendulis ; calyce laevi , hemifphgericò.
Ex Carniolia. Tp Jacq. obf. I. t. 2.0.

Explicatio iconum.

Tab. H7.f. 1. Frudlificatio Hyoscyami^ ex Tour-nefonio. (a) Flos integer. (3) Corolla separata. (3) Calyx. (<0 Calyx apertus, piftilum. (e) Calyx fructifer, (/) Idem excisus , capsulam exhibens. (g,k) Capsula cum operculo foluto. (/) Recepraculum feminum. (0 Semina separata. (m) Operculum infra fptc-tatum.

Tab. 117. f. 2. HVOSCVAMUS albas, (*) Pars superior caulis. (*) Capsula clausa- (c) Eadem dehiscens. (d) Eadem tranfervisca- (e) Semina. C/,^) Eadem diffideta. Fig. ex G&rtn.

329: V E R B A S C U M .

Characl. ejffent.

COR. rotata , subsequalis. Filam. barbata. Capf. 2-locularis , polyperme.

Characl. nat.

Cal. monophyllus, quinquefJus , perfiftens : lacinias ovato-laiiceolatis , ereflis.
*Cor. monopetala , rotata , subin^equalis. Tubus brevidimus. Li*ii*bus patens ? quinquepartitus : lacinias ovatis , obtusifl.*

32 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Etam. Cinq filament filiformes, inégaux, plus courts que la corolle, barbus inférieurement.

Anth. comprimées, arrondies ou reniformes.

Phjt. Ovaire supérieur, arrondi. Style filiforme, incliné, de la longueur des étamines. Stigmate un peu épais, obtus.

Feric. Capsule ovale ou globuleuse, biloculaire, bivalve, s'ouvrant par le sommet. Placentas demi-ovales, attachés à la cloison. Cloison double, formée par les bords rentrants des valves.

Sem. nombreuses, ovales, légères, anguleuses.

Tableau des espèces.

&4% MOLÈNE officinale. Did. n°. I.

M. à feuilles presque ovales, décourantes, tomenteuses de chaque côté; tige simple.

L. n. TEurope, aux lieux incultes. o*

* *La même astigmate biloba.*

2411. MOLENE thapf&ide. Did. n°. 2.

M. à feuilles oblongues, décourantes, tomenteuses de chaque côté : tige rameuse.

L. n. & Fl. plus petites que dans hi priced.

2412. MOLENE phlomoide. Did. n°. 5.

M. à feuilles ovales, toment. de chaque côté ; les inférieures pétiolées.

I, n,* la France, Allemagne, Italie. &

\$423. MOLÈNE mucronée. Dift. n*. 4.

M. à tige très-haute, roide, rameuse au sommet; feuilles un peu décourantes, toment. de chaque côté ; les supérieures très-mucronées.

L. n. Tide de Candie, ^ Tsigde 6 à 8 pieds.

2424. MOLÈNE lychnète. Difl. n°. y.

M. à feuilles ovales lancéolées, presque glabres en-dessous ; les inf. pétiolées ; épis graciformes.

L. n. PEurope, aux b. incultes. o^ *Epis longilobes.*

2425. MOLÈNE noire. DiA. n# . 6.

M. à feuilles pétiolées, en cœur-oblongues, presque glabres en-dessous.

JL. n. l'Europe, aux b. incultes. % *Fl. jaunes; Etam. hirsutes et pollens pourpres.*

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Stam. Filamenta quinque filiformia, inaequalia, corolla breviora, inferne barbata. Anthers compreffe, fubrotundas vel reniformes.

Pijl. Germen superum, fubrotundum. Stylus filiformis, inclinatus f longitudine flaminum. Stigma craefliufculum, obtusum.

Peric. Capsula ovata vel globofa, bilocularis, bivalvis, superne dehiscens. Receptacula feminum dimidiato ovata, dissepimento affixa, Diffidimentum dupicum, ex inflexis valvorum marginibus.

Sem. numerofa, ovata, subangulata.

Confere Sus specierum.

2410. VERBASCUM thapfus.

V. foliis subovatis, decurrentibus, utrinque tomentosis; caule simplici.

Ex Europea ruderatis. rf¹ •

x. *Idem astigmate biloba.* Verb. Bicolle,

2411. VERBASCUM thapfoides.

V. foliis oblongis, decurrentibus, utrinque tomentosis ; caule ramofo.

Ex Europa. <*

2422. VERBASCUM phlomoides.

V. foliis ovatis, utrinque tomentosis : inferioribus petiolatis.

Ex Gallia, Germania, Italia. &

2423. VERBASCUM mucronatum.

V. caule altissimo, stolido, apice ramofo j foliis subdecurrentibus, utrinque tomentosis : supérieurs argutè mucronatis.

Ex Candia. ^ *La Bulardière.*

2424. VERBASCUM lychnitis.

V. foliis ovato-lanceolatis, nudiculif*; inferioribus petiolatis : laticis racemiformibus.

Ex Europa ruderatis. & *Flares parri, futalbi.*

2425. VERBASCUM nigrum.

V. foliis petiolatis, cordato-oblongis, superne nudiculis.

Ex Europea ruderatis. % *Filum. Jlaminum villosa, purpurea.*

2436. MOLKNE «*i feu'dles d'ortie. Dn*. n°. 7.
M. à feuillfis j ciolées , prefqu'en cœur, grof-
fement demdes ; corolles pomluses.
•£. \$ prefque glabfts en-dejj *tus.*

1427 MOLKNE *Je Chabc.* Did. a°. S.
*M. à Feuillrs pétiolées , presqu'en cœur , crè-
oei^es , i ncisées , en lyre à la base , vertes ;*
Esp. voisine récid.

2428. MODÈNE *finée.* Did. n°. 9.
*M. à feiilles radicales , pinnatifides , ondées ,
tomaii euses; les caulin. amplexicaules , presque
glabres : les raméales premières oppoées.*
Z. n. la France austral. & Tige fort rameuse.

2425. MOLÈNE *ondulée.* Did. n°. 10.
*M. à feuilles radicales , pinnatifides , ondées ,
L. a, la Fr. aullinalres fflles, A la p; tige
: effilée i fleurs sessiles.*
*/, le Levant. La BlUariire. Tige faible , à
rameaux Mches.*

5430. MOLKNE *à petitet fours.* Did n°. 11.
*� pinnatifides-roncinées , tomen-
teuses des 2 côtés , radicales ; tige rameufe ,
] refuc nue : fcturs très-petites.
t. n» le Levant ? (ikri. de M. Jujfeu.)*

2431. MOLKNE *ineufe.* Did. n°. 12.
*a tige feuillée , épineuse , frutescente.
i.. «. Tille de Candic. b fige très-rameuse.*

2431. MOTKE *en lyre.* Did. n°. 13.
*velue , à feuilles radicales , en lyre-pin-
nées ; les caulinaires inégalement dentées ,
preii que sessiles : calice pentaphylle dente.
L. n. l'Espagne ? Ttgeifajpfc,dn>zz.*

2432. MOLKNFw; Baerha-c. Difl. n°. 14.
M. it feuillcs rcfqu'en yt& ; fieurs i effiles.
£. /.. TEJI. austral. o

2433. MO3. ÈNE *ferrugineuse.* Did. n My.
M. i feuilles un peu velues , rities : lea c^u-
Hotanique. Tome II.

2436. VERBASGU *urticæ r^ffm.*
V. Fo peliplat, fibcos, ^rofsc ferratis : torolla purina.
Ex . . . V. nigro aijinis.

2427. VERB A SCUM a. *xix.*
V. foliis petiolatis, fubcordauv , crenatis ,
bi'i inciso-lyratis , viridibus ; racemo pan-
culato.
Ex Gallia aust. o Vill. Delph. A. 2. 1. 13.

2428. VERBASCUM *senatum.*
V. foliis radicalib, pinnatifido-repandu,
tomentos; caulinis amplexicaulis , tu-
diusculis : ramicis primis , opposi
Ex GilliauJl. t^A'. ladniatum. Lugd. 1302.

2429. VERBASCUM *undulation.*
V. tomentosum ; foliis radicalib, is, flnuato-
cri!is ; caulinis fibibus , iniiivLus : caule
vii gato ; floribus sessiliib, £.
Ex Oriente. V. græcum , fraticosum ; folio
fin ua :o, canddifim. Tournef. it. i. p. ; jy,

2430. VERBASCUM *parviflorum.*
V. foliis ~~matido-~~ runcinatis , utrinqueto-
mei ~~tofis~~, radicalibus ; c mle raxnofo , nudixif-
culo : floribiis minimis.

Ex Qiente 7 Fo/iid tarax&i at taaaatoja.
2431. VERBASCUM *spinosum.*
V. caule folioso, £
Ex Canda. inoTo,frutsecnte. L

2432. VERBASCU \{ *lyrrum.*
V. hirsutum ; foliis radicalibus , lyrato pinnat-
is; caulinis inæqualiter dentatis , subsessilibus ;
cal) ce pentaphyllo , ferr'.to.
Ex Hispania f /"ol. radicif& Raphani.

2433. VERBASCUM *Sorhavil.*
V. foliis sublyratis ; I oribus sessilibus.
Ex Europa anfrali. O Mill. ic. e. 273.

2434. VERBASCUM *ferrugineum.*
V. foliis subvillosis , rugosis ; caulinis sub-
E

34 PENTANDRTJE MONOGYNIF.

linaires presque feillées, à crénélures régulières; les radicales oblongues, doublement crénelées.

L. n. l'Europe auflrale. *ip FL ferrugineufes.*

2435-. MOLÈNE *purpurlne*. Did. n°. 16.

ill. à feuilles presque glabres : les radicales oblongues - ovales, crénelées ; les caulinaires en cœur, presqu'entières: pédonc. folitaires.

L. n. FEur. auflr. a* *Cor. d'un pourpre violet**

5436. MOLÈNE *blattaire*. Did. n°. 17.

M. à feuilles glabres^ les radicales oblongues, *Sinnatifides linuées*, les caulinaires en cocur-*Smcéolées*, dentées : pédoncules folicaires.

L. n. l'Europe. & *Herbe aux mites.*

3437. MOLÈNE *blattaridide*. Dift. n°. 18.

M. à feuilles presque glabres, oblongues, amplexicaules ; les radicales, finuées-crénelées : pédoncules très-courts, fubiflores.

Z. n....Pedoncules gemindes ; *cor. jaune.*

3438. MOLENE *feuilles de bugle*. Dift. n. ip.

Al. à feuilles radicales, 1112es, ovales, à longs pétioles : les caulinaires iefUles : tige ilmple. *L. n.* le Levant. *Cor. verddcre^ rayée de jaunt.*

2439. MOL&NE-d *tige nue*. Did. n°. 10.

M. à feuilles laineuses, ridées, radicales; hampe nue.

I., n. les Pyrénées. % *FL violettes.*

* MOLÈNE (*Aemorrhoidale*) à feuilles ovales-oblongues, retrécies à la base, tomenteuses, obfcurément crénelées ; grappes allongées, fpiciformes: fafceaux de fleurs fans braflées. (*Vifle de Madère.*) &

* MOLÈNE (*pulverulente*) à tige rameuse, calices farineux, falciculés: fleur j a line. (*La France auflrale.*) d*

Explication des fig.

PL 117. f. 1. MOLENE *officinale*. (a) Fleur ouverte. (*) Corolle fèpard-e. (c ,d) Calice , piftil. (c) Capfule entifere. (f, g) La même coupee. (h ,i) Sen.eixs séparées, avecleur réceptacle mis à nud. (k) Sonniété de h ti^e.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

feflibus cequaliter crenatis : radicalibus oblongis, cordaiis , duplicatio crenatis.

Ex Europa auftrali. % *Hon. Kew. n°. 7.*

2435-. VERBASCUM *pluyniceum*. T. 117. f. 2.

V. foliis fubglabris : radicalibus oblongo-ovatis, creutis ; caulinis cordatis , fubintegratis: pedunculis folitariis.

Ex Europa auftrali. b* *Cor purpureo-vialacec.*

2435. VERBASCUM *blattaria*.

V. foliis glabris: radicalibus oblongis, pinna-tiffo finuatis; caulinis cordato-lanceolatis , dentatis: pedunculis folitariis.

Ex Europa. & *Cor. lutea; alba in var.*

2437. VERBASCUM *blattariooides*.

V. foliis nudifculis , oblongis , amplexicati-libus; radicalibus finuato-crenatis: pedunculis breviflimis fubbflores.

Ex Hon. Paris.

2438. VERBASCUM *bugulafolium*.

V. foliis radicalibus, ovatis, longè petiolatis, nudis; cauinis feflibus : caule iimplici.

Ex Oriente. *Tournef. it. z. t. 181.*

2439. VERBASCUM *myconi*.

V. foliis lanatis, rugolls, radicalibus; fcpo nudo.

Ex Pyrenaeis. *ip FL violacei.*

* VERBASCUM (*hamorroidale^*) foliis ovato-oblongis, bafi attenuatis , tomentofis, obfo-letè crenatis ; racemis elongatis , fpicifor-mibus : fasciculis florum ebraéteatis. *Hort. Kew. n°. /f.*

* VERBASCUM (*pulverulentum*) caule ramofo ; calycibus farinofis , fasciculatis ; flore luteo. *VilL delph. z.p. 490.*

Explicatio icDnum.

Tab. 117. f. I. VERBASCUM *thapfus*. (a) Flos e panfus. (3) Corolla separata. (c, d) Calyx , piftilluin. (e. Capfula integra. (f,g) Eadem diiQftta. (h ,1) Stmina separata , cum receptaculo denudato. Fig. ex *Tournef.* (0 Summitas caulis.

PENTANDRIE MONOGYNIE.

PI. r 17- f. 1. MFILEHE *purpurine*. (a) Pirtb Capé-
rietire de la tige. (b) f'-uille radicals, (d) Cipule
entière, (c) Ln memo ouverte. (f) Sa coupe trai:ver-
sali. ff# Une di il-s valves vuc tie côte interne. (h, i)
Semences ftpiret-s. (/, «) Les mdtnes coupées en
diversi fens,

330. CALAC.

CaraS. ejjenr.

CAL. court. Cor. iniundibulir. y-fide. Bale a t-
loges.

CamU. not.

Cal. fort petit , quinquefide , poima,peififtant.
Cor. mono^étale, infimdb uniforme. Tube beau-
coup yhis lony que le calice , cylindri [ue,
I tus ventru à l'orifice. Lhnbi ouvert, partaïic
tu ci&q découp. oblongues , pointues , plus
courté quo le tube.

Etam. Cinq ii! anens tOs conrrs, attachés an foni-
me: du tube. Anthres ~~oblongue~~, ai'ontice*
Fiji. Ovaire ruj-erieur, arromii. Style filifoj me,
de la.on^ueiirdu tube. Stiyiali; un pen cpais,
fubiiili ae.

Péric. Baie p refque globuleofeg petite , bilocu-
liire : a cloil'on mince , insfmbrajieufc.

Sent. (biitaircs ou geininces ^f ovales, un peu
comprimées.

Tableau dts eftces.

2440. CALAC a'milles ofrtifis. Did. a°. I.
C. à leuiies cliiptiques, obtufes.

Ln. rinjc.: ft Arbjfeau ep'utzux , iris-ram.

2^A.1. CALAC fiaUtei default. Did. n°. 2.
C. à feuilles lncé le^s-ob!ongues , mucro-
ncé!, plus étroitos vers Jeur peu!*,*.
L. n. InJe. t) Fl. petrees.

2JJ.2. CALAC mhrtoide.
\\ a fciuilles ovales , pointuucs.
L. n. \es Ind« ork-ntales, b t7^ i finilles
ovales. Di3. n°. j, RamtauxJichotonuj.

2.H.3. CALAC d'Arabie. Did. fup]l.
C. à f'uil'es ovales-pointues , sans veines ;
raraeauxTeJi supérieurement ; d.cc.deJacor.
inéaires.
L. it. t'Arabic. f> Feuilles faroisi ghibres ,
prefquejeftli es ; ramelux Juhocomcs.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 35

Tab. 117. f. Z. VERBASCUM phdnicrunr. (n) Tats
faperior caulis. (i) Folium rsdicaJi. Fig. ex Siccо. (d)
Capfu:i Integra, (e) f.^).im iehitccRS. (f) Ejus sectio
tra^fvt•r^aljs. ^ a!vuaapa^einte^!la^J-•(^.IIa.[^,h,i)
Semina separaca. (t,m) E.idem dilleila. Fig. <x G*xn.

550. CAIISSA.

Characi. effent.

CAL. brais. Cor. infundibullf. j"-fida. Bacca 2-
locularis.

ChitraS. nut.

Cti I. minimus j qui inquelidus perutu li
Cor. mono^etaia, iiifundib uniformis. Tub us c-
lyce multo loncior, cyliliiricus, fauce vtn-
tric olior. Lin 1 bus quinquepariitus pawns :
laciiniisi obk'ngis, a cutis , tubo bi'cviortbus.

Stam. Fllaments rjuinque breviffitna , apici tubi
inferu. Anthers objongæ, intrafaucem.

Pijl. Germt'n fuperum , fubrotundum. Stylus G-
iifonnis, longitudine tubi. Etigma crallucl-
tnm, fubbiiidum.

Peric. Bicca lub^lobofa , parva , bilocularis ;
dille interito teoi i membr tnaceo.

San, folitaria vel bina, bvau, fubcompcefia,

Confps&us specierum.

2440. CARISSA carundas.T. 118. f. 1.

C. foirs ellipticis, obuifis. L.

Ex [njia. b FAres jafmino similes.

2 u i. CARISSA ftlicina.

C foliis laooeoko-oblongis , mucroiiaiis ,
vcrfas r/edoluro aoguJliiribus.

Ei India, f) Sonaerat,

2442, CAKISSAjpiaarim-T. riS.f: 2.

C. folii3 ovaci.i, acutis.

Ex Indis orientibus ij Fol. ut in a pne-
cidmiibits ixquisite venosa.

2443. CARISSA ea'alls.

C. foliis ovatis, acutis, avemis ; ramis superne
villois ; lacinis corollæ lanceolato - linea-
ribus.

Ex Arabia. b Antura. Forsk, p. 63. C. e hilts.
Vahl. symb. t, p. 2x.

2444. CAI-AC /*Tafüique*. Difl.n^o. 4,
C a feuilles en coeur-ov^iles , mucronées ,
prcfque fans *veiiics*, perfi llamas; chines bi-
lulcs an lommct.

L. n. le CapdeBonna-EfjjtTance; *fj* *Fturfks*
tu *Fragonpiquant*. *FL blanches*.

Explication dti fig.

PI. nS. f-1. CALAC afeuil'ts obtuftis. (a) Pamcau
férar!'. (t>) Flcuis. (e) Corolte osven. (d) La m'ne
2Vr-c les eraninss failbtis. (r, /) Caitcj: , pifil. (g)
Fruit cutter. (A) Le mëms coupe. U) Semence.
Pi. 118. hi. CALAC mirtoidé.

331- G Y N O P O G O N .

Caraa. effatt.

CAL. f-tlji', perfiflant. Cor.infundibuliforme,
abbiloculaire.

CaraS/tat Venime tous Porilice, vclue int. Bale pedicel-
très-petit
qui
Cal. ironophylle. , perfiflant . femj-
nquefide:| decomp. [biaiies, pointues,
droites.

P Cor. monopetale , infliidibiiliorme. Tube cy-
liidrique, pl'ss IOIT; qut- !e calice, \
fous leliinbe, rcfil'rccit **rifice**, Lirabc plane,
partage en cinq decoupures **orales**,

Emm. Cinq filamrns, trcs romi;, attach^ :w-
dcffis de la partie **moyeniK** du tub^ de la
res droites , lineaires , a L'en-
Pijl. Ovaire supérieur , ovalc. Style filiforme,
pkii court qj >. Stigmate globuleux ,
Sam. prefuc foliiajr-s , Toi vent **avonées**.
didyne , vclu a< fbinmei.

Pine. Bai Tableau des ovaie globuleuse, co-
nace, contonant un noyau caitiUgmeux, fjb-
* GYNOPOGON C <&<#) 4 feuilles verti-
dikas ttois ii trow , lanceoées, D; vol. 3.
peg . 62.

PENTANDR T A M O N O G Y K7 A.

1444. CARTSSA *ardtdna*,
C. foliis cordato-ovatis , **mocronatis**, fub-
areniiis, **perennantibus**; f^inis apice bifidis.

ECap. B.Sjici. ft *Arditina hispina*. L, *Pritm*
*ad proprium genus hanc amaa*xvi.

Explicatio zcottum.

Talj. 118. f. 1. CA&IS&A carundas. (n) Rimutus
folutus.(ij Ilercs. (c) Corolla apert.t. (:) **Eademcum**
ftaminibus eminentibus. (c, f) Calyx ,pifillum, (g)
Ftnfltu iinteger. (h) Idem diflectus. () Setnen.

Talj. 118.f. i ARCSj jinaram.

331. G Y N O P O G O N ,

Ckarad. effmt.

GAL. y-fidufcjerfifi?iw. Cor. **infundibuliformis**,
filb fauce veniricofa, intus vilioIJ. B.icca pe-
dicll-ata : **nucleo** iubbiucuun.

C/inruS. nat.

Cal. **unonopbyilus** ^ minimus , feiiiquinquciidits,
perfiflant : lacinjislinearibus ; acutis, ciLdis.

Cor. nionopetala , inFundibulifcrniis. Tubuscy-
lindraceus, calyce longior, fub **apicevestri-**
tosus , ad fauc^tn **coarcbus** < Lunbus ptanus,
quinquifpartitus : lacinias ovatis,

Stam. FilanuMita quinqui , brevittima, tubo fu-
pijmediummfwtaiAntlienerufltc , luicaces,
inrra tnnium.

Pijl. Ger. men supercrum, ov.uum. Stylus fiiiformis , tubo brevior. Stigma glob*sum , didy-
mum , a[ice vinofuH].

Paie. Bacea pedicellata , ovato-globoft , cori*-
cea , laxa nuce cartilaginea , fibbiloculari.

Sam. subfuluarw , fepe abortiva.

Cnpeclts fpicitrum.

* GYNOPOGON (*fiellatuia*) totils v. eriti-
cill.-us , terais j i-nccolati. fjjf^ IA* inj.
feiet. & Urn.

PENTANDRIE MONOGYNTE.

* **GYNOPOGON** (*alyxk.*) à **feuillea** verticil Ices cinq a cinq, ovoides. *DiU. ibid.*

* **G Y N O P O G O N** *rit ant à feuilles po po-fées*, ovales, nerveuses. *Di3. ibid. Absque defcpi.*

Explication des fig.

PI. nS. **GYVOPOGON** *d'apr's M. Forjltr.* (a) Fteur re. (i, c) Corollecvtrcfi. (d, t) LtaminL- (6- paree. (fig) piflil. (A) Stigmite e^r_{fl}-> (<) Ovaire coupe, (j, ^{cult ent} jive, (mj La mème coupe cranlv.

332. DENTELLE.

Caract. tifnt.

C\L. fiipciituir. Cor. inTujidibulir. 5"-fide; à dcoup. à 3 dents. Capf. couxonneej 2-locul.

Caraci. nut.

Cal. fupcriour , quinquefidc : à dcotip. fubulcs, droites.

Cor. monopétale , infundibutirorme, plus Icngue que le calice. *Tube s'élargissmt bifnl blement en mi limbe quinqR'iitle, ouvert: à cinq dcoup, pointues, parta^ccs en 3 dents , dont celle tin mib'tii cA plus alongée.*

Etant. Cinq Siamens , courts , fubulcs jStiachés à labafdu tube. Antheres oblon; yes.

Pijl. Oviire infcrieuri, arrondi , velu. Style couit, un peu c^ais. Deux igflates oaiverts, pluscj.ais & jjkts !(j:gs que it* flyle.

Peril. C'JJ luic globuleufe , vclutf , court; inée par le calice, biloculaire.

Sen:, nombreufesj ovalcs.

Tableau des espèces.

2445. DENTELLE rampante DiA. 2. p. 270.
L. n. laKouv elle-Caledonie.

Explication des fig.

PI. iiS. Fruffifie?ron de h Dcnelle , *après Forjer.* (a, b) Fleur de grand. nat. (c) La même grofie du double. (a) Corolle tr-s-groBe 8: coupe. (c) Etamine. (f) Piflil. (g) Fruile de grandeur mt. (A) L. même grofie & coupe.

FENTANDRIA MONOGYNIA. 57

* **GYNOPOGON** (*atyxia*) foliis veriic'llaus, quinis obovatis. *Forji. Ex inj\ narfokite.*

* **GYNOPOGON** (/nift/«iO foliis oppofius, ovais, COJILIS, *Forfl. Ex infulis jhiietatis.*

Explicates iconum.

Tab. 118. **GYNOPOCON** *ex D. Forftr,* (J) Flos Integer. (*>*). C'trolla aprra. (d, t) Stamen separatum. (f, g) Piflillum. (A) Srijms anflum. (i) Qt'men difiectum. (l) Qacca. (mj liadtm dill-cha.

332. DENTELLA.

Ciaraff. ejftnt.

CAL. fuperus. Cor. **infundibuUformis**, 5-fida : laciuiis 3-dentatis. Capf. coronaia,*2-lotul.

Chtir&ft. not,

Cal.fupeTUS, quinqueparriims : htciniis fubulatis, ereBis.

Cor. monopetala , infundibuliformis , calyce longior. Tubus fcilfim anipiatus in limbum quinquefidum , patenrem ; lacjniis acutisj trideritatis : dendculo medio produdiore.

Slant Filamenra q\iinque, brcvia, fububta , ad baiim tubi inferta- Antlwrai oblongx.

Fiji, Germen infertun, fubrotimdu, vijlofum. Stylus brt-vis , cr;niifcului. Sttginata <uo, ftylo craflora longiora patciuia.

PrvcCipula globofa, villof , calyce coronata, bilocularis,

• *Sem.* Pkirma, ovata.

*ConjpeSus specierum**

2445. **DENTELLA repms**,
E Nova Caledonia. *Forjl. gan* t. rj.*

Explicatio Uoam,

Tab. nS. *Fructificatio Dentellæ* , <x D. TotJler. (a, b) Flos magnitudine naturali (c) Idem duplo auctus. (d) Corolla multoties aucta & difecta. (e) Sumen. (f) Piflillum. (g) Fru Etas ftignit. lut. (i) Idem auctio & difectas.

333. V O M I Q U E.

Caratit. effent.

COR. tubuleufe , y-fide. Baie i-loculaire, poly (perme : à écorce préfque ligneufe , fragile.

CaraSt. nat.

Cal. court, monophylle , campanulé, quinquefide , droit, caduc.

Cor. monopétale , infundibuliforme. Tube cylindracé , plus long que le calice. Limbe quinteide, ouvert.

Eturn. Cinq filaments de la longueur de la corolle. Anthères oblongues.

Pifl. Ovaire fup^rieur, arrondi. Style firaple, plus long que les étamines. Stigmate un peu épais.

Piric. Baie globuleufe ou ovale , grande, uniculaire, pulpeufe: à écorce préfque ligneufe, caflante.

Sent, nombreufirs, orbiculées, ou irrégulièremen^t an^uleufes; cornées, un peu grandes.

*Tableau des espices.*S446. VOMIQUE *officinale*. Dift.

V. inerne, à feuilles ovales^ pétiolées ; cimes fubterminales.

L./z. i'Inde. T> *F, oppofies> arrondies-ovales,*

2447. VOMIQUE *bois-de-couleuvrc*,
>[. inerne ; à feuilles ovales, pointues, préfque felfiles; vrilles fimples.

LB n. l'Inde f? *Cime lat. pauciflorc,*

2448. VOMIQUE *potatoire*.

V. in Tine, à feuilles ovales-pointuei, pétiolées; corolles velues à rorifice.

L. n. TInde, T> *Cirnes term. Bales pgtites 3 3-spermes.*

3449. VOMIQUE *épintufe*. Did.

T. à rameaux épineux j feuilles ovoïdes ; co-roiles barbues à l'orifice > à peine plus longues que le calice.

333- S T R Y C H N O S .

Charaa. effent.

COR. tubulofa, y-fida. Bacca i-locularis, polyperma : cortice fublignofo , fragili.

*CharaS. nat**

Cal. brevis , monophyllus, campanulatus? quinqueidus , eredus, deciduus.

Cor. monopetala , infundibuliformis. Tubus cylindraceus ^ calyce longior. Limbus quinquefidus, patens.

Stam. Filamenta quinque, longitudine corollas. Antherx oblongs.

Pifl. Germen fuperum, fubrotundum. Stylus fimplex , flamihibus longior. Stigma craflifculum.

Peric. Bacca globofa, vel ovata, magna, unicocularis, pulpofa: cortice fragili, fublignolb,

Sem. Plura, orbiculata aut irregulariter angulata, cornea , majufcula.

*Conjettus Jpeciem.*2446. STRYCHNOS *nux vomica*. T. 119..

S. inermis , fojiis ovalibus, petiolatis; cymis fubterminalibus.

Ex India. T> *Rheed. mal. 1. t.. JJ.*

2447. STRYCHNOS *colubrina*.

S. inermis, foliis ovatis, acutis, fubfelli* bus; cirrhis fimplicibus.

Ex India. T> *Rheed. mal. 8. t. suf.*

2448. STRYCHNOS *potatoria*.

S. inermis , foliis ovato-acutis , petiolatis ; corollis fauce villofis.

Ex India. T> *L.f.fappl. Rheed. mal. 7. t. j..*

1449. STRYCHNOS *Jpinofa*.

S. ramis fj.inofis, foliis obovatis; corollis fauce barbatis, vix calyce longioribus.

PENTANDR1E MONOGYNiE.

L. n. Madagascar. T> *F. quinquenerves*. *Bate groffe*, *potyfp** à *pulpe d'une aciditi agriable**, *Vontaca*. *Flacourt. p. izi. n°. 13.*

- 2450.** *\6OMIQ.UE de Saint-Ignace*. Did.
V. inerme, à rameaux fannenteux, grimpons ; fruit pyriforme.
L. n. les Indes orient. T> *Five de Saint-Ignace*.
Cor. tubuleufe, *fort tongue*.

Explication des figures.

PL iiij.VoMiQUEojpcIW*. (a) Corymbe florifbre. (A) Fleur séparée. (cj) Rameau fructifbre. (<0 Baie jeune. (x) La même coupée transversalement *be* plus grande. (/) Semences.

334. C O Q U E M O L L I E R .

Camel, ejfent.

COR. campanulee, courte, à cinq lobes. Capf. globuleufe, cortiqueufe, 1 locul. polyperme, int. un peu pulpeufe.

CaraS. nat.

Cal. monophylle, petit, perifflant, femiquinquefide : à découp. oblongues, ciliées.

Cor. monopétale, campanulée. Tube de la longueur du calice. Limbe partagé en cinq découures oblongues, demi-ouvertes.

Etam. Cinq filaments, plus courts que la corolle, initialement au-dessous du milieu du tube à une membrane qui en garnit int. le fond. Anthères acuminées.

Fiji. Ovaire supérieur, arrondi. Style épais de la longueur des étamines. Stigmate obtus, perfore.

Fine. Capule globuleufe, cortiqueufe, grande, uniloculaire, ne s'ouvrant point, un peu pulpeufe intérieurement : a écorce fragile.

Sent, nombreuses, ovales, oblongues, luisantes, attachées à un placenta charnu, central.

Tableau des espèces.

- 2451.** *COQUEMOLLIER d?Am.* Did. 2.99.
L. n. Sainc-DoiTiingue. b Tige droite, très-JimpU, feuille a jhmme.

PENTANDRIA MONOGYNIA. SP

E Madagascar. T> *Pluk.t. ijo. f. q. Bacca globofa*, *maxima*; *pulpdacido dulci gratijim*. *Sem. globofo-compreffa*; *margine fub-acuto*.

- 2450.** *STRYCHNOS Ignatia*.
S. inermis, ramis farmentofis, fendantibus; frudu pyriformi.
Ex Indiis orient. T> *Ignatia amara*. L.f-fuppU Goertn. a. qjj. t. 179.

Explicatio iconum •

Tab. 119. *STRYCHNOS nuxvomica*. (a) *Corymbus florifer*. (*) *Flos separatus*. ,c) *Ramus fructifer*. (d) *Bacca junior*, ie) *Eadem separata*, transversaliter fett^ (/) *Semina*. ExRheed. & kerb.

334. THEOPHRASTA.

CharaS. ejfent.

COR. campanulata, brevis, 5-loba. Capf. globofa, cor ticofa, i-locularis, polyperma, intus subpulpoa.

CharaS. nat.

Cal. monophyllus, parvus, perfiftetis, femiquinquefidus, laciniis oblongis ciliatis.

Cor. monopetala, campanulata. Tubus longitudinalis calycis. Limbus quinquepartitus : laciniis oblongis, eretto-patentibus.

Stam. Filamenta quinque, corolla breviora, infra medium tubi, membranas fundum interne cingenti inferu. Anthers acuminatse.

Fiji. Germen superum, subrotundum. Stylus crassus, longitudine ilaminum. Stigma oEitu-furn, perforatum.

Feric. Capula globofa, corticofa, magna, unilocularis, non dehiscens, intus subpulpoa; cortice fragili.

Sem. plura, ovato-oblonga, nitida, receptaculo centrali carnofo affixa.

Conopeus Specierum*

- 2451.** *THEOPHRASTA Americana*. T. up.
E DominRO. ^ *Burm. Amer.t. 1x6. Swartv. Obf. p. 58.*

Explication des fig.

Pi. II9. COQUEMOLLIER d'Amérique. (a) Flleur entière. (b) Corolle séparée. (c>d) Calice, piftil. (c) Piftil séparé. (f) Capsule entière. (g) La même couple transversalement avant sa maturité. (h) Semences séparées. (l) Tige garnie de feuilles & de fleurs. (J) Feuille séparée, une fois plus petite que nature.

335, A N A S S E R .

CaraS. effent.

COR. urcéolee, à cinq lobes, velue inc. Stigmate didyme. Capf. oblongue, 2-valve, 2-locul.

CaraS. nat.

Cal. monophylie, petit, un peu campanulé, quinquefide, perfistant.

Cor. rnéopétale, presque hypocrateiforme, velue intérieurement. Tube ovale, plus long que le calice. Limbe quinquefide, ouvert: à découp. ovales-poussées, un peu concaves.

JStarn. Cinq filaments, très courts, épais, attachés au tube. Anthères fagittées droites, incluses.

fift. Ovaire supérieur, ovale. Style cylindrique, un peu épais, de la longueur du tube. Stigmate en tête, didyme.

Petric. Capsule oblongue, biloculaire, bivalve: à bords des valves courbés en-dedans.

gem. nombreuses, globuleuses, attachées à deux réceptacles oblongs, centrales.

*Tableau des espèces**

2452. ANASSER de Bourbon. Did, fuppl, A. à feuilles ovales, un peu obtuses; corymbes latéraux.

Z. n. rifle de Bourbon. T> Arbuste à feuilles opposées.

2453. ANASSER, des Moluques. Did. fuppl. A. à feuilles lancéolées^ pointues: corymbes subterminaux.

L. n. les Molucces, T? Je n'ai point vu cette plante.

Explicatio icon urn.

Tab. 119. THEOPHRA STA Amcrhana. (a) Flos integer. (A) Corolla separata. (c, d) Calyx, piftil. (c) Piftil separatum. (f) Capsula Integra, (g) Hadem ante maturitatem transversaliter avata. (A) Semina foluta. (l) Caulis foliis floribusque onus. (l) Folium separatum, magnitudine namiali duplo minor. Fig. ex P. L. & c* herb. *

337. A N A S S E R .

*Charact. effent**

COR. urceolata, y-loba, intus villoso. Stigma didymum. Cajjf. obionga, Z-VAIV'IS, 2-locul.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, parvus, subcampanulatus, quinquefidus, per Ollens.

Cor. mouetteala, subhypocrateiformis, intus villoso. Tubus ovatus, calyx longior. Limbus quinquefidus, patens: laciniis ovato-acutis, subconcavis.

Stam. Filamenta quinque, breviflora, crista, tybo inferta. Antheras fagittatæ > eretas, inclusæ.

Pift. Germen (iperum, ovatum. Stylus teres, crassifolius, longitudine tubi. Stigma capitatum, didymum.

Peric. Capsula obionga, bivalvis, bilocularis: salyularum marginibus introflexis.

Sent. plurima, globofa, recepculis 2 oblongis, centralibus affixa.

*Confpus specierum**

2452. ANASSER Borbonica.

A. foliis ovatis, obtusis, corymbis lateribus.

Ex Borbonia. T) Commerf. Anajfer, Juff. Gen. 150.

2455. ANASSER Moluccana.

A. foliis lanceolatis acutis, corymbis subterminalibus.

Ex Moluccis. T> Cortex fictidus. Rumph. amb. 7. pag. i%* t. 7.

336. ARGAN.

CaraS. effent.

COR. prefqu'en roue, 5-fide. *f* écailles alternes avec les div[^] de la corolle. Drupe Submonofperme,

CdraS. nat.

Cal. quinquefide, p "vt₉ dro?t , perfiftafft.

Cor. monopétale, en roue', quinquefide: à décaup. oblongues, obtufes, concaves, ouvertes.

Cine] écailles lancéolées, alternes avec les découp, de la corolle.

Etam. cinq filasneH* fubules, de la long, de la corolle. Anthères oblongues.

Pifi. ovaire supérieur, ovale. Style fubulé, de la long, des étamines. Siigmat obuis.

Perk, drupe ovale ou arrondi, imiloculaire.

Sem. noyau ovale, lifle, marqué d'un ombrage à la bale, monofperme.

O B S E R V A T I O N .

Il faut diJHnguer les argons des caititiers, principalement par les icailles appendiciforrees de la corolle. Les bumalia de Swart^> doivent être réunis aux argans.

Tableau des espices,

245f. AR. AN noir&ere. DiA. n*. 4.

A. inerme, à feuilles periflames ovoides, coriaces ; ped. à peine plus longs que les fleurs.

L. n. le Cap de Bonne Esperance, T^y arbrJJ, la'aeux> à rameaux roides, courts > tortus.

2456. ARGAN maftic. Did. fuppl.

A. inerme; à feuilles periiflantes lanctolées fointuées; fleurs jaunes.

I. n. lesiflies Bahama. T? Arbre de So.pieds[^] feuilles luijntei\ a pétioles longs d'wi à deux povees. Fruit Jaune.

Botanique. Tome II.

336. SIDEROXYLUM*

CharaS. ejfent.

COR. Subrotata, y-fida. Squam?e \$ cum Uciniis peuii alternze. Drupa fubmono* iperma,

CharaS. nat.

Cal. quinquefidus, parvus, eredus, perfiftens.

Cor. monopctala, rOtata, quinquefida : laciiiiis oblongis, obtufis, concavis, patentibus.

Squama? quinque lanceolate, cum laciniis petalji alterncc.

Stam. filamenta quinque, fubulata > longitudin# corolla. Ant her'ce oblongs.

Pifi. gernien fuperuip, ovatum. Stylusfubulatus, longitudine lianunum. Stigma obtufum.

Perk, drupa ovata vcl fubrotund3, unilocularis.

Sem. nux ovata, nitida ? bafi hilo nowa, unilocuUris, monofperma.

O B S E R V A T I O N .

Sideroxylum à chryophyllo diftingui debet, prascipue Jquamis app^ndidfbribus corollas. Bumeli Sirart^H , ad fideroxylum referenda Jünt.*

ConJpeSus fpecierum.

245f. SIDEROXYLJJM inerme. T. X20. f. 1.

S. inerme, foliis perennantibus obvatis coriaceis ; pedunculis vix ilore iongioribus.

E Cap B. Spei. f> Dili. Elth. 5^7. t. 26\$. Folia obtusa, crajja, r'igida.

2456. SIDEROXYLUM maftichodendrum. T. 120. f. 2.

S. inerme, foliis perennantibus hncelatifs acutis s floibus luteis,

Exinfulis Balaamenibus. T? Jacq. collad. 2, p. 2JJ. t. 17. f. j. Cornus... Catesb. carol. 2. t. 75.

F

32 PENTANDR1E MONOGYNIE.

24*7. ARGAN *lufant*. Did. n°. 7.

A. inerme j à feuilles ovalcs-oblongues, glabres, lufantes petiolécs, ped. ramaffés txillaires.

L. n. St. Domingue. T>

24*8. ARGAN *feuilles de faules*. Dift. suppl.

A. incrme ; à feuilles ovales-lancéolées, acuminées, lufantes en deffus; fleuw ramaffées latérales.

L. n. 1'Amerique Merid. T>

24,5*9. ARGAN *pauciflore*. Dift. suppl.

A. inerme, à feuilles lancéolées acuminées glabres : les plus jeunes un peu velues; fl. axillaires.

£. /z. rAmerique mcrid. T? *Drupes un peu 5-gones*.

2460. ARGAN /wi&/£ Dift. suppl.

A. inerme; à feuilles oblongues-ovales, un peu obtufes, glabres, ponduees en deflbus j fieurs latérales prefque (efllles.

L. n. la Caroline. J) *Drupes arrondis, z-permes, de lagrojj d'un grain de poivre.*

2461 ARGAN. *argente.* Di&. suppl.

A. inerme, à feuilles ovales retufes tomenteufes; fleurs pédoncul^es.

L. n. Cap de Bonne-Efperance. *& *Bacca t-fperma.*

2462. ARGAN *Joyeux*. Difl. n©. y.

A. inerme , à feuilles lancéolées-ovales , obtufes, toment. & foyeufes en deflbus, ca-duques; ped. fafciculds, axillaires.

X. n. la Caroline, ft *Feuillage de Caimitier.*

2463. AJRGAN *de la Loulfiane*.

A. épineux , à feuilles caduques lancéoléet yeineufes.

I. 71. PAmericque fept. T> *fleurs fafcicuUes, Axilldires.*

SL464 ARGAN *ovoide*. Did. suppl.

A. épineux; à feuilles ovoi'des, obtufes, en coin à h bafe, glabres des deux côtés.

L. n. TAmericque meřid. T> *Richard, fleurs httrales > petites yfaſcicule's.*

TENTANDRIA MONOGYNIA:

2457. SIDEROXYLUM *nitudum*.

S. inerme j foliis ovato-oblongis glabris niti* dis petiolatis, pedunculis confertis axillaribu& E Domingo. 7)

2458. SIDEROXYLUM *falicifolium*.

S. inerme₅ foliis ovato-ianceolatis acuminitis fuperné splendentibus; fioribus confertis lateralibus.

Ex America merid. T> *Achras falicifolia.il*

2459. SIDEROXYLUM *pauciflorum*.

S. inerme, foliis lanceolatis acuminatis gla* bris ; junioribus fubviilofis; fioribus axilla-ribus.

Ex America merid. T? *Bumelia \$-gona* ? Sw.

2460. SIDEROXYLUM *punSatum*.

S. inerme *> foliis oblongo-ovalibus obtufius^ Chilis glabris, fubtus pundatis ; floribus late-ralibus fubfcflilibus,

E Carolinia. T? *D. Michaux. fl. non vidif*
An hujus generis ?

2461. SIDEROXYLUM *argentum*.

S. inerme, foliis ovatis retufis tomentofis % fioribus peciunculatis.

E Cap. B. Spei. T> *thunb. Mff%*

2462. SIDEROXYLUM *tenax*.

S. inerme; foliislanceolato-ovatis^ obtufis, fubtustomenfo-fericeis, deciduis } pedunculic fkfciculatis axillaribus.

E Carolina. T> *Jaeq. obf 3. t. 5q. rarni rigidU*

2463. SIDEROXYLUM *fychides*.

S. fpinofum, foliis deciduis lanceolatfe ve-nofis.

Ex America feptentr. "6 *Duham. arb*, 2. t. 68

24^4. SIDEROXYLUM *olovatum*.

S. fpinofum; foliis obovatis ? obtufis y bafi cuneatis; utrinque glabris^.

Ex America merid. T? *an Bumelia rotund**
folia. Sir art prod. ^Q.*

246f. ARGAN *multiflore*. Did. suppl.
A. épineux; & feuilles ovoïdes en coin, obtuses, glabres, coriaces; pédonc. divises, fasciculés, latéraux.
L. n. le Cap de Bonne-Espérance. *Ti Fleurs petices & nombreuses.*

2466. ARGAN. *dicandrique*. Difl. n°. 8.
A. épineux; à feuilles caduques elliptiques*.
L. n. PAmerique sept. *T> Bale à 3 ou 5 Jorges.*

9467. ARGAN *fitideXm.* if. 10.
A. inerme; à feuilles presque oppoſées, fleurs très-ouvertes.
L. n. Saint-Domingue. *T) Ted. axill. uniflores, nombreux.*

Explication des fig.

PL 110 f. 1. ARGAN *noirdtre*. (a) Fleur à parfumé. (b, c) Corolle, taminés. (d) Ecailles de la corolle, (e, f) Calice, pétal. (g, h); Fruit. (i) Ramus fleuri.

PL n.o. f. 2. ARGAH *maſtic*. Les fleurs & le fruit (selon M. Jacquin).

337. CAMITIEL.

Caraꝝ. effens.

COR. campanulée, f-fide, à limbe ouvert. l'aie subdecaiperme,

Caraꝝ. nat.

Cal: petit, perfistant, quinquefide: à d'coupures ovales obtuses.

Cor. monopétale, campanulée. Limbe quinquefide: à découp. presque arrondies, très-ouvertes, plus courtes que le tube.

Etam. cinq filaments, subulés, attachés au tube non faillans. Anthères arrondies, didymes.

Pifl. ovarie supérieur, arrondi. Style très-court* ftigmat obtus, subquinquefide.

Fric. Uic globuleuse, grosse, à dix loges, quelquefois monoperme.

Sent, foliaires, offeufes, un peu comprimées, ittaées, marquées d'une cicatrice.

246f. SIDEROXYLUM *muhiflorum*.
S. spinosum; foliis obovato-cuneatis, obtusis glabris coriaceis; pedunculis divaricatis fasciculatis *lateribus.
E Cap. B. Spei. T> flores non extricati ± à facie % ad hoc genus refero.

2466. SIDEROXYLUM *decandrum* ^ ^
S. spinosum j foliis deciduis ellipticis. LV
Ex America septentr. "b

2467. SIDEROXYLUM *fxtidijimum*.
S. inerme; foliis suboppositis, floribus patentifloris. L.
E Domingo. T> Ped. axillares s. uniflori ^ copiofi.

Explicatio iconum.

Tab. 120. f. 1. SIDEROXYLUM *inerme** (a) Fl* separatus. (b, c) Corolla 3 (lamina. <Q Squamae coroll*). (d, e) Calyx, pétalum. (f, g) FruAus. fig, ex Dillenio. (i) Ramus florifer.

Tab. u.e. f. 1. SIDEROXYLUM* *MaflickodndrQH*; Flores fructus ex D. Jacq.

337. CHRYSOPHYLLUAf.

Charaꝝ. effent.

COR. campanulas, y-fida : limbo patente. Bacot. subdecafperma.

Charaꝝ. nst.

Cal. parvus, perfiflens, quinquefidus : laciniis ovatis obtusis*

Cor. monopetala campanulas. Limbus quinquefidus : laciniis subrotundis patentiflhnii tubo brevioribus.

Stam. Filamenta quinque, subulata, tubo impofita inclufa. Antherae subrotundae didyma?.

Pi/7. germen supernum, subrotundum. Stylus breviflatus. Stigma obtusum, subquinquefidum.

Peric. Bacca globofa, magna decemlocularis, interdum monoperme.

Sem. Solitaria, offea, subcomprefla, nitida, cicatricula nota.

Tableau des espèces.

0468. CAIMITIER pomiforme. Di & n^o. I.
C. à feuilles ovales, à ilries parallèles, tomentueuses, ferrugineuses & luisantes en deflous.
Z. 7¹ les Antilles T> *Feuillage très-brillant en deflous. Fed. axiaires, fasciculés, à-peu-près de la long, des pétioles.*

8469. CAIMITIER. acuminé. Die*, suppl.
C. à feuilles ovales acuminées, fériées parallèlement, tomenteuses, luisantes & pâles en deflous.
I. n. Saint-Domingue. T> *Jof.-Matin, ped. un peu plus longs que les pet.*

2470. CAIMITIER àfleur étroite. Dift. suppl.
C. à feuilles hirsutelles, fériées parallèlement luisantes, toment. & ferrugineuses en deflous ; baies en olive.
L. n. Saint-Domingue. T> *Jof. Martin. Baies irrégul. d la bafe, cont. 1 ou xfemences.*

5471. CAIMITIER olivaire. Did. n°. 2.
C. à feuilles ovales-oblongues, toment. & luisante* en deflous; fruit monisperme, en olive.
L. n. la Martinique. T> *Diffère-il du priced. ?*

J472. CAIMITIER argenti. Dift. suppl.
C. à feuilles ovales, acuminées en faulx : les plus jeunes toment. luisantes & argentées en deflous; les adultes, glabres des 2 côtés.
L. n. la Martinique. T? *La Barren.*

A473. CAIMITIER pauciflore. Dia. suppl.
C. à feuilles ovales acuminées, presque glabres des 2 côtés; aïfelles pauciflores.
Z. n. la Martinique; T) *Richard, feuilles pe* tacs.*

2474. CAIMITIER à grandes feuilles. Did. suppl.
C. à feuilles ovoïdes, glauques à peine toraentes & nervées parallèlement en deflous.
£. n. la Guiane. T> *Stoupy. vul. le jaiine-rctuf. feuilles de la grand. & de la forme d* elles de Tacajou.*

Conf. Stus specierum.

2468. CHRYSOPHYLLUM cainito. t. 120.
C. foliis ovatis parallele ftriatis, fubtus tomentofo-ferrugineis nitidis.
Ex inf. Caribaeis, T? *baccamagna, 10-bcul. Corolla certe 5-fida [non z o-fida, ut in \$Aa • ractere Linncei j.*

2469. CHRYSOPHYLLUM acuminatum.
C. foliis ovatis acuminatis parallelè ftriati** fubtus tomentofo-nitidis pallidis.
E Domingo* 't An *thryf. monopyrenum.* Swartz prodr.

2470. CHRYSOPHYLLUM angulifolium.
C. foliis lanceolatis, parallele ftriatis, nitidis, fubtus tomemoi ferrugineis ; baccis olivae-formibus.
E. Domingo, ft *folia okas vel liguifli, superni ftriata nitida. Bacc* bafi inaquales» fubdif- perm&r*

2471. CHRYSOPHYLLUM oliviforme.
C. foliis ovato-oblongis fubtus tomentofo-nitidis ; frudu monispermo olivae-formi.
E Martinica. T) *Burnt. Amer. t. 69.*

2472. CHRYSOPHYLLUM argenteum.
C. foliis ovatis acuminato-falcatis : junioribus fubtus tomemoi-nitidis argenteis ; adultis utrinque giabris,
£ Martinica. T> *An chryf. argenteum. Jacq**

2473. CHRYSOPHYLLUM pauciflorum.
1., Foliis ovatis, acuminatis, utrinque fubglabris; axillis paucifloris.
E Martinica. T> *Conf. Jacq. Amer. t. 38. f. 2.*

S474. CHRYSOPHYLLUM macrophyllum.
C. foliis obovatis ; fubtus parallele ner* vofis glaucis vix tpmentofis.
Ex Guiana. T> *Folia caffuvii magnitudin* & forma% Semina non compreffa, magna.*

3475*. *CAWITIKKfyn/orme.* DiA. n°. 4.C. à feuilles ovales-oblongues, acuminées 1
glabres de chaque c&tej fruitpyriforme.*I. n. laguiane.* Tj *Fruit jaunt ,bon à manger.*

• *Sidtroxy h̄ides hfleurt*
dépourvues d'écailles.

2476. CAIMITIER *lauroide.*C. à feuilles perfiftantes lance"olees, qndulees
glabres; pédoncules très courts, calices un J
peu pointus.*L. n. l'Afrique T> Argan n°. I. Dift. x.
p. 244.*2477- CAIMITIER *milUmn.* Dift. fuppl. jC. à feHilles perfiftantes lanceole'es-ovales,
acuminées luifantes; calices arrondi».*L. n. le Cap de Bonne-Efpérance. T> Pidon-1
tules axilUires, blanchdtm, ramaffis, longs
£mv. 3 lignes.*4478. CAIMITIER *du Pirou.*C. à feuilles perfiflaiues oblongues ttés-gla-
bres, pédoncules fafciculés courts; drupel
monolperme.*X. n. le Pérou. T> Argan du Pérou. Did. j
n°. 5**

* CAIMITIER {ride} <k feuilles oblongues, »
acuminées glabres des deux côtes j fruit acu-
miné ride.

*T) La Jamdique.**Explication des fig.*

PL. 110 CAIMITIKR *pomiforme.* (a, I) fleur en*
tière (c) Corolle. (d) La même ouverte, kiffant
à decouvert les étam. & le piail. (e, f) Calice.
(g) Baie entière. (h) La même coupée transver-
salement. (i) Semence séparée. (l) Rameau avec
des feuilles & des fleurs.

538. J A C Q U I N I E R

CaraS. ejfent.

CA!"r iil!^7 ^x&Rmt, cor 10-fidc. Baie [CAL. y-phylus, perfiflcs. Cor. lo-fida. Ba-
ca i-f^erma.

2475. CHYSOPHYLLUM *macucu.*C. foiliis ovato-oblongis acuminiatis minqu*
glabris; frudu pyriformh

Ex Guiana. T> aubl. gui. 1. t. \$%.

* *SideroxUcides floribus*
squamis dcftitutis.

2476. CHYSOPHYLLUM »W&<0/>A2«J.

C. foiliis perennantibus lanceolatis indulatis
glabris ; pedunculis brevifimis, calycibus
lubacutis.

Ex Africa. T> pedunculi purpurei^ aggregati.

3477. CHYSOPHYLLUM *miUerianum.*Q. foliis perennantibus lanceolato-ovaris acu-
minatis nitidis -3 caiydbus fubrotundia.E -C a P. B B S P ti, * &deroxtlon,... mill. . . .
t. 299. S. mm. Jacq. colUS. 2. p. 49.2478. CHYSOPHYLLUM *mangVdh.*C. foliis perennantibus oblengisgiaberrimis,
pedunculis fafcicubitis brevibus, drupa mo-
nofperma.E Peru. 1> Dombey. MangliUa. Juff. gen.
151.

CHRYSOPHYLLUM (rugofwn) folios
oblongis acurainatis utrinque glabris, frufini
acuminato rugofo.

Swartz. prod. 40

Explicatio iconum.

Tab. 126. CHRYSOPHYLIUM oainito. (tf, k) flos
integer. (c) Corolla. (d) Eadem aperta, stamina
pistillumque exhibens. (e, f) Calyx. (g) Bacca
integra. (h) Eadem transversum secta (i) Semen sciu-
tum. (l) Ramulus cum foliis & floribus. fg. ex Brum & Jacq.

338. J A C Q U I N I A *

Ckaraa. effent.

%* PENTANDRIE MONOGYNIB.

CaraS. nat.

Cal. Pentaphylle; à folioles arrondies concaves perfiftantes.

Cor. Monopétale. Tube campanula, ventru, plus long que le calice. Limbe à dix découp. arrondies; dont cinq plus intérieures & plus courtes.

Etam. Cinq filaments, fubulés, attachés au receptacle. Anthères halées.

Fiji. Ovaire supérieur, ovale. Style court, ftigmate en tête.

Perú. Baie arrondie, acuminée, uni-loculaire.

Sem. Solitaire, arrondie, cartilagineuse.

Tableau des tfpices.

B47p. JACQUINIER à bracelets. Difl. n°. I.
J. à feuilles ovales-cunéiformes, eny. fix
cnfemble; ped. raineux.
£. n. la Martinique, &c. T> *Feuilles coriaces*>

B480. JACQUINIER/ *deftagon.* Di&. n°. 2.
J. à feuilles lancéolées, acuminées, env. dix
enfemble; pédoncules uniflores.
X. /I. TAmérique xmérid. "6 F. en itoile.

B481. JACQUINIER /£*&£*. Dift. n°. 3,
J. à feuilles lin&iires, acuminées, eAv. 4
cnfemblej pédonc. uniflores,
L. n* St-Domingue. T? *Ram. dfchot. noueux.*

* JACQUINIER (*veirrux*) à feuilles ovales-lancéolées, veineufej, prefquc inembraneufes*
b l'Amérique.

Explication des figures.

PL i n. f. 1. JACQUINIEA, £ 'raclets. (a) Ramus
fleuri. (b) Fleur séparée. (e)• Fruit.
PI. ill. f. 1. JACQUINIEA liniaire.

339. ROPOURIE.

CaraS. ejfent,

CAL. j-fide, cor. en roue, à y-lobw^ baie
velue, 4-loculaire | po yfperme.

PENTANDRIA MONOGYNIA^

CharaS. nat.

Cat. Pentaphyllus : foliolis (ubrotundis concavas perfiftantibus.

Cor. monopetala. Tubus campanulatus ventricofus, calyce longior. Limbus iofidus: laciniis fubrotundis j quaruin quinque interiores breviores.

Scant. Filamenta quinque, fubulata > è reccptaculo orta. Antherse haftata?,

Pi/l. Germen fuperum, ovatum* Stylus brevis. Stigma capitatum.

Peric. Bacca fubrotunda? acuminata, unilocularis.

Sem. Unicum fubrotundum, cartilagineumt

ConfpeStus fpecierum.

2479 JACQUINIA. *armiUaris.* t. xai. f. I.
J. foliis ovato-cuneiformibus, fubfenis j pectunculis ramofis.

E Martinica, &c. Jacq. Amer. t. \$\$.

2480 JACQUINIA *rufiifolia.*

J. foliis lanceolatis acuminatis fubdenis ; pedunculis unifloris.

Ex America merid. T> *Dill. Elth.* t. 123.

2481 JACQUINIA *Unearls* t. 121. f. 2.

J. foliis linearibus acuminatis fibquaternis j pedunculis unifloris.

£• Domingo. T> Jacq. Amer. t. 40. f. 1.

* JACQUINIA [*venofa*] foliis ovato-lanceolatis venofis fubmenibraceis. Swart^ prod. p. 47-

Explicatio icanum.

Tab. 111. f. 1. JACQUINIA. *armiUaris.* (a) Ramulus floridus. (A) Flos separatus. (c) Fruktus^ tab. xii.f.i. Jacquinia//iwr/V.

39 ROPOUREA.

CharaS. ejfent.

CAL. y-ffdus. cor. rotata, f-loba. Bacca vilbfa 4-locularis, polyfperina.

PENTANDRIE MONOGYKIE.

Caras. nat.

Cal. Monophylle, profondément quinquefide: à découp. arrondies.

Cor Monopétale, en roue. Tube très-court. limbe quinquefide: à découp. arrondies, velues en dessus.

Etam. Cinq filaments, velus, attachés à la cor. entre ses découpures. Anthers à 2 loges.

Pil Ovaire supérieur, arrondi, velu. style filiforme. 3 ou 4 stigmates oblongs, pointus.

Pe'ric. Baie ovale, velue, grosse, quadriloculaire.

Sem. Nombreuses, nichées dans une pulpe vive, douce, jaunâtre.

Tableau des épices.

2482. ROPOURIER de la Guiane. Diff.

L. n. les bois de la Guiane. *J> ArbriJJ**, à tige simple. feuilles spinées, verticillées. Baie jaune.

Explication des fig.

PL. 121. ROPOURIER *it la Guiane*. (a) Corolle vue en dessous. (b) Calice, pistil. (c) Pistil séparé. (f) Baie entière[^] plus petite que nature. (t) La même coupée transversalement. (/) Partie de la tige. (g) Foliole de grandeur naturelle.

340. RAPANE,

Caras. effent.

CAL. j-fide. con en roue, j-fide. baie. iphélique[^] i-perme»

Caras. nat.

Cal. Monophylle, très-petit, periflant à cinq ou six découpures.

Cor. monopétale 9 en roue. Tube très-court. limbe profondément 5-fidés: à découpures arrondies.

Etam. Cinq ou six filaments, attachés au tube à la base de chaque lobe. Anthers oblongues.

Pil. Ovaire supérieur, arrondi. Style très-court. Stigmate obtuse.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

^

Charas. nat.

Cal. Monophyllus, profunde quinquefidus: laciniis fubrotundis.

Cor. Monopetala, rotata. Tubus brevifimus. Limbus quinquefidus: laciniis fubrotundis, supra villosus.

Stam. Filamenta quinque, villosa *, corollas intra lacinas inferta. Anthere biloculaires.

Pist. Germen superius, fubrotundum, villosum. stylus filiformis. Stigmata 3 f. 4, oblonga, acuta.

Pirii. Baccaovata, villosa ^ magna, quadrilocularis.

Sem. Flurima, in pulp ^ viscidula lutea dulci aiduntaria,

Confpus specierum,

2482. ROPOUREA Guianensis. t. 121.

JEx Guianae fylvis. *T> Aubl.* i.t. 78. Camax, schrth. gen. n°. 36/. *gmeLjyfl. nat. p. 4034*

Explicatio iconum •

Tab. 121. ROPOUREA guianensis. (a) Corolla inferne viva. (i) Calix > pistillum. (c) Pistillum separatum. (d) Bacca Integra magnit. naturali minor, (e) Eadem transversum scissum. (f) Pars caulis. (g) Foliolum naturali magnitudine./^ ex aubl.

340. R A P A N E A.

Charas. effent.

CAL. j-fidus. Cor. rotata, y-fida, Bacca sphaerica, i-perma.

Charas. nat.

Cal. Monophyllus, minimus, periflens, quinque vel fex-dentatus.

Cor. Monopetala, rotata. Tubus brevifimus, Limbus profunde 6-fidus: laciniis fubrotundis.

Stam. Filamenta quinque vel fex, tubo ad bafin funguli lobis inferta. Antherae oblongae,

Pil. germanum superum fubrotund^jn, stylus* brovifimus. Stigma obtusum

Péric. Baie sphérique * uniloculaire.

Sern. Une feule, globuleuse.

Tableau des espèces.

S483. RAPANE de la Guiane. D'ft.

L. n Cayenne & la Guiane. T? *Arbrijf. rameux au Jbmet. Fleurs blanches, latérales^ rmnaJJ'ees, presque fejdes. Baie violette.*

Explication des figures.

PL 122. RAPANÉ de la Guiane. (a) Fleur ouverte. (A) Calice. (c) Le même diverti, piftil. (d) Dé-coup, de la corolle ; étamine. (e) Etamine séparée. (f) Piftil. (g,h) Baie entière & coupée transversalement.

54J, M Y R S I N E.

CaraSt. effent,

CAI. Partagé en j\ cor'. Semi-y-fide. Stigmate laineux, laillant. Baie fubj-fperrae.

CaraS. nat.

Cal Petit, partagé en cinq découpure* presque ovales, perfittantes.

Cor. Monopétale, presque urcéolce, fen\i-quinquefide: à découp. fenii-ovales, conniventes.

Etam. Cinq filaments, très-courts, attachés à la partie moyenne de la cor. Anthères oblongues, droites, non faillantes.

Vift. OvaTe supérieux, globuleux, remplissant l'intérieur de la corolle. Style cylindracé, plus long que la cor. perfittant. Stigmate grand, lani\gineux? pénicilli-forme, faillant hors de la fleur.

Péric. Baie ou drupe globuleux, uniloculaire, presque avant la maturité.

Sem. Une feule, presque globuleuse, attachée sur le fond de la baie.

Plic. Bacca sphérica, unilocularia.

Sem. unicum, globofum,

*ConfpeStus fpecierum**

2 j-83. RAP/ NEA Guaienfis. T. 122.

Ex Caienna & Guiana, 't AubU %. t. 46. famara Linnai ex d. Jwart^ obf. p. 5i. an Jideroxylis affuior.

Explicatio iconum.

Tab. 122. RAPANE Guaienfis. (a) Flos apertus. (b) Calyx. (c) Idem apertus, piftilum. (d) Lacinia corollae, stamen. (e) Stamen separatum. (j) Piftilum. (g,h) Bacca integra, & transversale fexu. Fig. ex aubL

341. M Y R S I N E-

Caraft. effent.

CAL. j-partitus. cor. semi-y-fida. Stigma lanigerum exsertum. bacca fubf-fperma.

Characl. hat.

Cal. Parvus, quinquepartitus: Jaciniis fubovatis* perfittentibus.

Cor. Mpnopetala, fuburcéolata semi-quinquefida, laciniis femi-ovatis connivemibus.

Stam. Filamenta quinque, breviflora, medio corollae inferta. Anthirae oblonga, eredac, non exsertae.

PiJI. Germen fuperum, ^obofum, corollam fere rep lens. Stylus cylindraceus, corolla longior, perfftens. Stignia magnum, lanigrum, peniciliforme, exsertum,

Péric. Bacca vel drufa globofa, unilocularis, ante maturitatem j-fpercna. gasrt.

Sem. Unicum, fubglobosum, lundo baccx obliquè adfixum.

FENTANDRIE MONOGYNIE.

Tableau des Espèces.

3484. MIRSINE à feuilles pointues. Difl. n°. 2.
M. à feuilles ovales pointues, dentées en fice
dans leur partie supérieure.

L. n. TAfrique. T> Arbriffeau -toujours verd.

3485. MIRSINE à feuilles rondes. Dift. n°. 2.
M. à f. ovoïdes arrondies, denticulées, sup.
Cult, au jard. des plantes. T> Arbriffeau tou-
joursverd, a feuilles petites & nombreufcs.

- MIRSINE (*fcabre*) à baies sphériques &
tuberculeufe*.

Explication des Figures.

PI. ill. MIRSINE à feuilles pointues. (a) Rameau definé d'après le fee. (b) Fleur entière ^ séparée. (c) Rameau fructifère, d'après Goetner, ayant des feuilles mal-i-propos tris-entierées. (d) Baie entière séparée. (e) La même couple en travers avant sa maturité. (/) Situation des germes sur leur réceptacle dans sa jeunesse. (g) Semences non mûres, séparées. (A) Sentence foliaire, dans sa maturité. (i) Sa coupe verticale, montrant la situation de l'embryon dans le périperme. (k) L'embryon séparé.

342. C A L I G N I.

CaraS. effent.

CAL. turbiné, semi-quinqueGde. pét. o. <kam. attachées à l'orifice du calice. Drupe 1-sperme.

CaraS. nat.

Cal. Monophylle, turbiné, semi-quinquifide, ayant 1 bradçes à sa bâfe.

Cor. nullc.

Etam. Cinq filaments attachés à l'orifice du calice, & oppofés à ses déchirures. Anthères ovales, biloculaires.

Pifi. Ovaire superficier, arrondi, velu. Style (latéral ?) étacé, courbé, un stigmate obtus.

Peric. Drupe en olive, charnu, fibreux, glabre, pointillé.

Sent. Noyau ligneux, uniloculaire, x-isperine. Botanique. Tome //.

PENTANDRIA MONOGYNIA. &

Confœus specierum.

2484. MYRSINE Africana. t. 122.
M. foliis ova vatis acutis superne ferratis.

Ex Africa. T> Frutex femper virens

2485. Myrfine rotundifolia.

M. foliis obovatis rotundatis superne demiculatis. cult, in hort. Parif. 'tan Myrfine retusa. do rt. Kew. vol. 1, p. 271.

* Myrgne (*fcabre*) baccis sphæricis tuberculato*
fcabris. Goertn. de frut. 1. p. 282.

Explicatio Iconum.

Tab. Hz. MYRSXNE Africana. (a) Ramulus ex ficim delineatus. (b) Flos integer segregatus. (c) Ramulus fructifer ex Goertnero cum foliis perperam integerrimis. (d) Bacca Integra separata. (e) Eadem immatura transversim septa. (/) Ovulorum in immaturo receptaculo fitus. (g) Semina immatura separata. (A) Semen matrum foliarium (/) Ejus testis verticalis, cum fitu embryonis. intra albumen (it) Embryofeparatus. Fig* fruct. ex D. Goertn,

342. LICANIA.

Charatit. effent.

CAL. turbinatus, semi-quinquifidu*. Pet o. flamfauci calycis inferta. Drupa i-iperma.

CharaS. nat.

Cal. Monophyllus, turbinatus^ semi-quinquifidus. bafi bibradeatus.

Cor. nulla.

Scam. Filamenta quinque, fauci calycis infert, laciniis ejusd. oppolic^. Anthem; ovatae, biloculares.

Pifi. Germen superficier, subrotundum, viilofum. Stylus (lateralis?) fetaceus, incurvus, stigma obtusum.

Peric. Drupa olivaformis; Carnosa, fibrofa, glabra, punctulata.

Sent. Nux lignosa unilocularis, 1-sperma^

Tableau ties efpetcs.

2486. Catfgni blan; % D-a. fijpfl.

*L. n. La Guyane, dans les bois. b Arbrif-
fcau de 4 à 5 pieds, à feuilles alter Wi /HW-
ples presque sessiles, blanchâtres en dessous, ac-
compagnées de stipules. Fleurs petites en épis
terminaux.*

Explication dts figures.

PL. 122. Caligni blanc (a) Calice-vu en dedans. Etamines. (b) Bractées, calice, étam. ins j ovaire. (f) Cou-
p3 iii! c>lice, ovaire, style, stigmate. (i) Drupe eoi-
(e) Noyau. (j) Rameau av;c un cpt.

347. TAPURE.

Caract. effent.

CM. partagé ei I fix pises. Cor. 1-pétale, ringens: e. Etamines inégales. Stigmata à 5 lubtrs.

Caract. nat.

Cal. Monophylle, partagé en six \c.jup. ova-
les, concaves, veluesES dbliors.

Cor. Monopetalc, biiabice : a Imc supcricure
droiisi,, concave, triobce a fan formm. t ; à
levrc infer, plus counc ? partagée en deux ,
a lobes obtus.

TLtam. CIIICJ flamcs incgaux , attaches à la CO-
rolic, dontquati re sont didynamiques , & pla-
cés fou> la lèvre supér. & le cinquième très
long, ataché à la base de U lèvre infer. An-
iheres ovalcs.

» *Pifl.* Ovaire fu; erieur , ovale , irtgone. Un fly-
le, long, velu , courbc. Sugmate it trois
Jotes.

Vine. . . .

Sax, . . .

Tdleau des efpecis.

2487. TAPUUS deUGidanc. Did.

*L. n. LPS Cuis de la Guiane, b Arbriffean
à f, JmpLs , alternas, Fleurs axillaires.*

Explication des figures.

PL. 122. Tapure de la Guiane. (a) Fleas en teuton.

Conspedus Jpcitrum.

2486. LIC AN IA incana. t. 122.

Ex Guyana, tnlylvis. T>*Aubl.* Gu'taa. t. 45.
Frucex org):alis, jaffis fipi flaceis alternis ,
simplicibux , subjkffilibus fubtus incanis. flores
parvi j Jpkati, terminates.

Explicatio iconum.

Tab. 122. Licetia incanii, (u) Calys intrl vifus. Sta-
minia. (*) BraSe*, calix, ftiminj, grincn. (O iecio
calycis, germen, lyhis, Iligmi. (u) Drupa intcgra.
(e) Nux. (/) Ramulus cum Tpica. Fig. ex Aul.

345. T A P U R A.

CharaS, ejf.nt.

CAL. 6-partims. cor. 1-petala , ringens. Sum.
iiioEtjulia. S^guu 3-Jobum.

Chirad. nat.

Cat, monopliyi lus, sexpartitus : Uciniis ovans,
concavis , cxi us villosis.

Cor. monopetala, b: labiata: labio supertore e-
recto , concav. a pice trilebo; labio infe-
riore breviore biparito , lobis obtusis.

Stam. filamenta inque , inaequalia, cord, ||1^> Jn
ferta, quorum - quatuor didynamia , fob i^bio
fuperi., quium longiiGmuoi c bali Ubii in-
feriorih enatm : Anihera* ovatae.

Pi/? germe1 fuperum , ovatum. trigon:m, fly-
lus 1 , longus, ii-ruLJt, iiicui'vus. Siigma tri-
lobum.

Peric.

Sem.

Cinspedus fptchrum.

^487. TAPUR A. Guiane< fis,

Ex Guianæ sylvis. b *Aubl.* Guyan. t. 48.
gtm. s dislinctum>i Rohita Schreberi.

Explicatio iconim.

Tab. 122. Tapura gios:enfis. (x) nan a.-panfus.

(b) j Utacties qU(fruitienem le calife. (r) fleur ipa-
loiiiie. (J) cal: ce ouvert. (e) Corolle ouverte, piffl,
étamines. f^JCoroll, étamines, style, fligmac. (g)
Piffl sépare. (h) Portion Js teuillCj flturs pirtni des
écailles.

344 SCHOPFIE.

Carat. eJl. int.

CAL, turbiic-aiigti!, demi- firtrieur, ay i!ents.

Cor. campanulee, a 10 lIII us infericurem.

Carat. nat.

Srigaate j-fide: Drupe j-lucubire
per monopbyne; turbine angul., i cinq dents
per prolorides, ad: inférieur. à l'ovore.

Cor. moropctale, campanulée, à dix flJlons in-
férieurement, 8t a y dticoupures triangulai-
res, pointues, refl. cJiics.

F tarn, cinq filameiit uis courts. A inheres c idy-
nics, droites , a l'orifice de la corolle.

FIJI, ovaire demi-itiftjrieur, turbine, couronnée
dans le fond de la corolle par une glmde ft-
jiii-gtobulcufc, poroiifo . Style cylindrace ,

droit, plus court que la corolle. Sqgmate en
tete trilide.

Peric. d 5 loges.

San. en petit notnbre.

Tableau des tspecces,

2488. SCHOPFLfi & Schnber.

L. n. . . L'auteur ne Auctie ni dfeript: on ni
synonymie de teiu plaa.

344. CAMVANULE,

Carat. eJl. int.

Con. eampamilee, Filaraerw chrcis & conni-
vens à teur. baft. Siigmae 3-fide. Capsule
inK i eure s"ouvrage sur les co ces par des trous.

Carat. nat.

Cal. supérieur, profonJcm. panagc ci\ , déc.
pointues.

Cor. moilopétale, campanulée, semiinqnquefide
qui se stetrit sans tomber; à découpures clarg.
poin•acs, ouveacs.

O³ Bractea 3 calicern ful-
lidentes. (1) flos expansus. (2)
Calyx expaaftr. (O C³) corolla aperta, pifflum, stamna.
(3) Corolla, stamna, ftvlus, ftigma. (4) Pifflum fe-
matyn (A) Pars folii; tioc-i inter t³ uaumlas. (1)
Pars ramuli. Fig. ex Aubl.

344. SCHOPFIA.

Carat. ejfe.it.

CAL •urbinaio-ar gulatus; 5-dentatus, feriii-fu-
perus. Cor. campanulata, basi 10-sulcata.
Stigma 3-fijum. Dm, pa 3-locular; \$.

CkarnS. nat.

Cal. monopliyllus, utribitato-angulatus, obfol.
quinqueäentatus, graelen ii fernè In crustana.

Cor. monopetala, campnulata, basi decensulca-
ta, quinquefida; Laciniis triangularibus acutis
re flex is.

Stem. Filamrnta quinque, brevittiaia. Antheræ
didymx, er«5x, in ore corollx.

PiJL germe lemi-inferum , tmbinatum , iniri
corollam coronatum glandula fenu-globofa,
porcfa. Stylus corolla brevior , cylindraccus,
crcdus, Stigma capitatiiniij triiitluiii.

Peric. drupa j-locu!aris,

Sem. aliquot.

Cespedus Specierum.

2488. SCHOPFIA S. treberi.

Habitat . . . m Cudonium arb: refcen3 ? D.
TPakljymb. j. p. \$6.

344. CAMPANULA.

ChamU. ejftnt.

Con. campanula a. Filamenu basi dilatata, con-
niventia. Stigma 3-fidum. Capf. infera , fo-
raminibus laics aliter dehiscens.

Charad. ;:at.

Cal. fuperus , quinquepanmis j !aciniis acutis.

*Cor. monopetala, campnulata, feni-
quinqnquefida, marcescens; laciniis latis acutis patulis.*

si PENTANDRIE MONOGYNIE.

Etam. Cin.j litamens, coum> elargis aleurba fe en écaillcs cumiiventes. Anthercs drones, plus longues que les fibmens.

Pijl. Ovaire inférieur, an^ulcux. Un style filiforme, plus long que lcs' ctamines. Siigmaic partage en trois decoup. roulees ea deliors.

Pmc. Capfula inferieure. mrbinfe ou ovale ou priTniaiique , anguleufe, a^-togen, raremem à cinq, s'ouviant iateralemem par autant dc trous qui donnent iffue aux feinences.

Sem. nombreufes j petites, adnées a un placenta en coloime.

Tableau des especes.

**Filiilles prefqut lijer.* Calices à Onus jimpl&s.

2489. CAMPANULA *Cemfitne.* DiS. vH. I.
C. a tige uaifiores; à fcuiLles ovales gtab. eiuieres un yeu ciiit-es.

L. n. Lej monugnes de la Suifle, le mont Ccms. ip

34510. CAMPANULE *vefullne.* Difl. OJ ppl.
C. a tige unierto le nue, u feuilles ova les dentées & glabrci ainsi qie le calice.

Z. n. Le mom Vefute en Picmont. %

3491. CAMPANULE *hdhrdUnne,* Dlft. supl.
C. it tige 1h, presque nue; folullea ci- liptiquo - lanctoJ^cs dentées.

L. n. Les momagnes du Picrnont- %

2492. CAMPANULK *unifhare.* D'ift. n°. 2.
C. a tige uniflore, cilice aitill long que la coroi:.

L. n. Les momagnes de la Lapponic. <jp Je at Uj coruto'is pas.

2493. CAMPANULE *Cimhataire.* Difl. u°. j.
C. à feuilles pétiolées en cœur: à tñq lobes gkbris, tige lache filiforme.

L. n. L'Euro, dans ics Ueux converts. PL très délicate.

2494. CAMPANULE *a feuile de cochlearia.*
DiD. n°. 4.
C. à tiges simples uniflores; feuilles infér. à très longs pétioles, en cœur-arrondies, crêne-

PENTANDRIA AIONOGYNIA.

Stam. Filain. ^{anta quinque}, brevia , bad dilatata in fquiumuliis connivtnies. AmherX fiUmemis longioics, ereft<E.

Pi/?. Gernien inferum,angulatum. Stylus I,filiforme, ctnisj IUiniibis longior. Stigmatripanituraj laciniis revoltuis.

Perk. Capfula infera, turbinata vei ovata ve I prifmatici, *ungulata* , [li-loctiiri.?, rarius J-toculatis, totideoi foraminibus tateiaJibus e-mittens iemina.

Sen. Jiumerofa, parva, receptaculo columnari adnatato.

Conf/eSus Jpederum.

* *FjVut l&vlujcula.* Calyces fi.iubus fimpLk'tbus,

2489. CAMPANULA *Centra.*
C. ctufbosufufloris; foiiis ovausglabrisintegriirrie fibclliatis.

Ex Alp. liuveticis , inque Cenilii monte. *¶*

2450. CAMPANULA *vtfu.hu*
caule uniloTO fubuudo , foiiis ovalibus d^ntatis calycibus lie glabris.

In mo:ae Vt suio pedanon. 7Z all on 1. 7 / 1 .

2451 CAMPANULA *bellar.* **a.**
c. <.. le unifloro, subnud 0 i foiiis petiolatis elliptico-lanceolatis dentatis,

Ex Alpibui Pedem. *Tallion** pcd. t. 8j.f. 6.

24512. CAMPANULA *uniflora.*
C. cauie liiiiHoto, cal_yce carol lam ~~æquante.~~ iiii.

Ex Alpibus lapponicis. *¶ lin. fl. lo';>, t. 9. f. S. 6.*

2491. CAMPANULA *Aderacea.*
C. foliis pétiolatis carJatis qumquelobis glabris , caule laxo filiformi-i-

Ex Europa, in umbros, Mori/, fee. 5. t. 2 f. ix.

2494. CAMPANULA *coeklearifolia.*
C. caulis simplicibus unifloris; Foiis infer. longissime petiolatis , cotJaio - fubroiuittii

lees ; les supérieures plus petites subspatulees poimues.

Z. n. Les Alpes de l'ulie. *JfUur ptnchee,*

20\$. CAMPANULE *elatine*. D1&. n*. §

C. à feuilles en coctir di-mces, pubefcentes, pttiolees, liges couchées, pédoncules capillaires *multiflores*.

Z. ft. Les momagnes de l'Europe auflrale.

2455. CAMPANULE *d'Autmhe*.

C. à tiges aniilores, fcuilles c^ulinaires cn'aies crendces, calices penchcs.

Z. n. Les inoniagnes d: l'Autriche.

2497. CAMPANULE *en eon ft.*

C. à riges mulii Flares, en toitfle; femilles ovalos crenelles pétioles; les supérieurs plus titroites^ Heurs penctnes.

Z. «. Lfis montagnes du D.tuphine. *Elk tflicie corme varicrc dc lit prectd*, dman did.

245>S. CAMPANULE *ajkuil. wades*. Did. n. 7

C. à fmilles rad. reniformes denteesj les caulinaires illéaires éUoites.

Z. n. Les paturages fees & montueur de rEurope,^{1?}; ^. */ti mimtf a fiuillti caulia. ov-i-le-slanctolus petia;ées.*

2499. CAMPANULE *a feuttiis étrohes*;

C. à liges multiflorcs, feuilles inf. lan'C'tolter, ovules petioScés; les caulinaires lintaies é-troits puntucs fbfniés.

Z. n. Lei régions auRrales de U Fiance, *Touts la plante est glabrz**

2499. CAMPANULE *lore.*

C. j' uge un peu velue inférieure rem., feuilles infér. ovale^{ee}; lfs fuper. ctoitL-s Unccolees; ^eur drone urnn.

V^{er} aiffelles fnu.qxitlquc3pa.fi: urs qui ivor-teat, iS. La même velue partout. Elle a aussi dcpei. Fi. avortantes dans les aiffelles supér.

2501. CAMPANULE à f. de lin. Did. n° 8.

C. glabre, à tige droite multiflore; toutes les feuil>s fettJles; les inférieures ovales, les fu|cii:ures lancéolées-linéaires.

crenatis, suprioribus miioribus subfpi-ulatis acutis

Ex Alj'ibuj **ittlidtf. karrel.** ic, \$5t}. n^oah^l Jyebol, 1, p. 18.

2495. CAMPANULA *elatbes*.

C. foli^w **cordaiis** **dentatis** **pubefcentibus** **petiolata**, **caulibus** **piottraub**, **pedunculis** **capillaribus** **multifloris**.

Ex Eurof x anUr. Al()inis. **offim**, t, 7 / z.

2496. CAMPANULA *pi.lla*.

C. caulinii **uniRo**^{is}, foli^s ciuiinis **cvat**^{is} crenaii', calvcib^u; cerr^{is}.

Ex Altib. Autrie. *Jacq. obf.* 2 p. 30. t. tS.

2457. CAMPANULA *cespito*^{sa}.

C. caulinibus **cespitosis** **multifloris**, foliis ovalis **crenatis** **pcuplam**; supr. ms wgaLiotibxis iloribus cerouis.

EM Alpibus Delphinen^u. *Camp. Alpina* ^{ro} dif. minor. *Bat h. prod.* 34. fl. dan. t. 189.

24^3. CAMPANULA *rotundifolia*.

C. foiliia **tidicalibus** **reniformibus** **dentatis**; **culinis** **angurti** **linearibus**.

Ex Enropæ pascuis, montofis fcc^o; eadē? foliis caulinis ovato- lanceolatis, petiolatis.

2499. CAMPANULA *angustifolia*.

C. caulinibus multifloris, foliis inferioribus lai^o colato- ovatis petiolatis; caulinis linearibus aiu*lli*is acutis sessilibus.

Ex Gatlh auftralL, *precedenti affinis, sed diff. enf* cum Omp. Gmel. Sib.* 3. t. 33.

ajoo. CAMPANULA *subuniflora*.

C. caule inernè subhirsuto, foliis imis ovatis; superioribus angusto- lanceolatis; flore terminali erecto.

Ex Alpibus delphin. *Camp. uniflora*, vll. t. 10. in axill. sup. flores minimi abortiunt.

Eadem undique bifurca. An *Camp. yatden* sis allion. fl. pedem. t. 6. f. 2.

2501. CAMPANULA *linifolia*.

C. glabra, caule erecto multifloro; foliis omnibus sessilibus imis ovatis, superioribus lan- ceolato- linearibus.

54 PENTANDRIA MONOGYNIE.

£**n. Les paturages ie3 nioniag. de la France.

2502. CAM[PANTJLE *d'ufur.*

C. à tiges diffuses, fetiilLes petiolees di Intées en scie; les inférieurs en cncur, les fupdri. lancéolées; pédoni ales umllorcs.

L. a. L'Italie, la Snifle. % Elk a des rapports avec la camp. elatite tt U eafttpari. caufante.

2503. CAMPANULE *hah* Dic. n°. 9.

C. à fcuillea 10ides droi[::s, les radieales lanccolces-ovaiesi panicule aalce.

L. a. L'Europc dans tes chaitips^. Quelques hotan'fles prennent pour clli um varieté de la campan. n°. 2498.

2/04. CAMPANI[L]E *raiponce.* Dic. n°. ro.

C. a feutiles ondulées; tes radic. lanceolées, parlicule refTcrcc.

L. n. L'Eyrope , pecs les haies. o*

2505. CAMPANULE à feuil. de pécher , Dic. n°. 21.

C. à feuilles rad. ovoïdes : les cmlinaires liacaires-lancéolées, léger. dentées, sessiles, dillantes.

L. n. L'Europe , dans lej bois , let lieux incultes. 22

2506. CAMP A N U LE *a ftuUL de pramrque.* Dic. n. 12.

C. a f-uilics toutes Imeatres, dentelers fur les bordli. tiges trts Gmptes, fit;urs u roites sessiles.

L. n. Le levant, ift t'igt fe termite en e'pi.

3507. CAMPANULE à feuilles de linIre. Dia. n°.

C. à tiges effil:cs y paniculées au fommet ; feuilles petites éparfes linéaires - fulbulcei , fleurs terminales.

L. n. Monte-vieo , dans le Paragiay.

2508. CAMPANULE *pyramida/e.* Difl. n. 14.

C. à feuilles glabres dentées en cœur: its cmlinaires lancéolées, tiges effilées très-simples ; ombel;es sessiles latérales.

L. n. Le Carniolie. ♂ Tiges droites, de 4 à 5 ieds presque simples , effilées ou pyramidales.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Ex GiHicE pf cuiis alpinuro.

250.i. CAX1PANULA *difufa.*

C. caulibns diffuiis, foliis petiolatis ; ferrat-digitalis, infeiiorib. cordatis, fuper. lancocco-YAUS; pedunculis uiiflor. wabl. fym.i. p. 18

Ex Italia , Helvetia XT Barrel. ifs q\$j. cauf. cum camp. elatines n° Z-qtyq-, & camp, jiagiii n°. 2540.

250^ CAMPANULA *pan* la.

C. foliis Iir.di.s ; rudicaiibus lanceolata-o\va-ibus, pauiiula patula.

Ex Europe arvis. j" campanula HU, tUh. t. 5'8 f. (58. affinis Jequen ti.

2J04. CAMPANULA *rapunculus.*

C. foliis tindulaiisj radicalibui lanceokto-ovalibus, panicula coardita.

Ex Eurofa; sepibus. rf<

2jo; .CAMPANULA *persicifo* Ua.

C. foliis radicalibus obovaiis: cautius lanceolato•Imearibus subferratis **fclliibus** rcniotis.

Ex Europe f^lvis, rudcraus. 22

ayot. CAMPANULA *ptamuestfblia.*

C. foliis omnibus (inearibus margins denticul:tiibus) limp lk ill nn is, Uoribus er<rc-t!5 fci^ilibus.

Ex OKeme.fiorts tnapice naulisphati.

2507. CAMPANULA *Unarioidei,*

C. caulibus virgatis apicc paniculatis, folii exiguis 1 j;arlls Uneari- fulbulatis, floribus terminalibus.

Ex moiuc - viJto in r.uar|uaid.

2jo8. CAMPANULA *pyr intidalis,*

C. foliis levibus ferratis cordatis ; caulinis, lanceolatis, caulinis simplicibus, unibellis sessilibus lateralibus.

In Carniolia. ♂ In hortis culta. Cauhs e-rell , 4 seu 5 pedales , subsimplices y virgiiti seu piramidales.

2509. CA M PA N UL E a Jfl. pianos. Difi. n. 15.
C. à feullcs oblongues crenelles , coidea
files; fleurs droitcs planes.

L. n. L'Aniericjue feptemrionale, Tj. Tig? sim-
pie, drake, roide, haute de \$ a 6 pouces.

ajio. CAMPANULEd/o^r styles. Dict. n. 16.
C. iifdiilles petiolees , un peu ci cœur , forte-
lent deniees ; Heurs pencil*es , style faillant.
L. n. la Sibérie , la Tararie. fl. petites.

2510. CAMPANULA /•riplaque. D:a. n. if.
C. à feuilles en cœur , obtusément dentées ,
JI longs pel itles; tiges ascendantes paucisiores.
Z. n. li Sibérie. Fl. petites à style faillant.

2512. CAMPANULE à feuilles de lys. !ja.
n. 1\$.
C à feuides lanceolées ; les cauli. à dents
poiniuies , fleurs panics penchées.
I. o. La Sibrie , li Taruric. a*

2515. CAMPAN'ULE gentianoides. Dfl. n. ip.
C. à feuilles ovales lancéolées dentées pres-
que sessiles , rameaux uniflores , fleurs turbi-
nées étendues , à stigmate quinquesido.
Z. /? la Sibérie. T. l't.gLibre, un peu g lau-
que , feuilles éparses.

2516. CAMPANULE rhomboidale. Dfl. n. 20.
C. à feuilles toutes sessiles rhomboïdes den-
tées ; épilache subunilateral , calices dentés.
L. n. Les mont. de la France aust. & de
Pit lie. T.

2517. CAMPANULE à fl. d'aufer. Dict. Suppl.
C. à tigs anguleufe U uilles sessiles ovales-acu-
inées, dentelées en scie, écartées ; fl. sessiles
axillaires & en épil.
L. n.... du jardin de M. le Monnier. Cor.
tres-ouvr. style faillant , montant ; stigm. 3-
fid., calice réflechi.

2518. CAMPANULE d'alpin. Dict. n. 21.
C. à feuilles lancéolées dentées ; les inf. pé-
tiolées , les supérieures sessiles ; fleurs pen-
chées , style faillant.

L. n. l'Italie , aux lieux ombragés & h. i. mt.
des j p: es de BafTano. %

2509ij. CAMPANULA pliniflora.
C. foliis oblongis crenulatis rigidis sessilibus,
floribus erectis planis.

Ex America fe^i. i; conf. cum campanula
Ainericana, Lin.

2510. CAMPANULA stylosa.
C. foliis petiolatis subcordatis acutè serrati-
tis , floribus nutantibus , style exerto.
Li Sibria, Tataria. Camp. gmel. fib 3. t. 27.

CAMPANULA periplocifolia.
C. foliis cordatis , obtuse serratis , longe pe-
tiolatis ; caulis adscendentibus paniculosis.
Ex Sibiria. Praeced. valde affinis.

2512. CAMPANULA liliifolia.
C. foli is lanceolitjs : caulinis acutè serratis ,
ilioibus paniculatis mutantibus.
Ex Sibilia, Tatiria, &

2513. CAMPANU1.A gentianoides.
C. foliis ovato-lanceolatis ferratis subsessili-
bus , ramis unifloris , floribus turbinatis pa-
tulis , stigmate quinquesido.
F.x Sibiria. TT GUtel. fib. 3. t. 28. Camp.
grandiflora. Jacq. Hort. 3. t. 2.

CAMPANULA rhomboidalis.
C. foliis omnibus sessilibus , rhomboidibus
ferratis ; spica laxa subsec. , calycibus dentatis.
Ex alpibus Galliae, Austr. & Italie. -f

2515. CAMPANULA affrroides.
C. Caule anguloso virgato ; foliis ovato-acumini-
tate serrulatis remors , floribus sessilibus
axillaribus et spicatis.
Habitat.... in horto n. k- Monnier. Cor.
patentissima ; stylus exsertus , adscendens ;
stigm. 3-fidum calix reflexus.

2516. CAMPANULA alpina.
C. foliis lanceolatis ferratis : inferioribus pe-
tiolatis , summis sessilibus ; floribus cermis ,
style exerto.
Ex Italia , in locis umbrosis humentibus ,
prope Bassanum. T. Alp. exot. t. 340.

S< S PENTANDRIE MONOGYNIE.

2517. CAMPANULE c.-tpue. Did. n. 22.

C. à feuilles liliées, pétiolées, un peu en cœur, doublement déclives en face, incisées, fl. latérales et terminales, en épis.

Lm n. le Levant. Fl. coxirtes, très-ouvertes.

***2518. CAMPANULE enftiforme.** Did. n*. 23.

C. fruticose, à feuilles enifolées dentées glabres, lames longitudinalement j fleurs paniculées penchées.

L. n. Île de la Réunion, ft

2f19. CAMPANULE à fleurs jaunes.

C. à tige paniculée, feuilles lancéolées, doublement en face ; découpures calicinales ovales colorées > aussi longues que la corolle.

L. n. Île de Madère. % Pl. glabre, fl. ligm. quinquefides*-

2f20. CAMPANULE verticilUe. Difl. n°. 24.

C. à feuilles lancéolées-ovales, dentées verticillées j fleurs verticillées-éparfées, en épis terminaux.

L. n. la Tartarie orientale. % PL glabre; tiges simples ; fl. bleues, petites penchées.

2521. CAMPANULE ^oyfitne. Difl. fuppl.

C. à tiges puciflores en touffes ; feuilles glabres émises : les radicales pétiolées ovalées arrondies, les caulinaires oblongues-ovoïdes effilées.

L. n. Autriche, dans les rochers des montagnes. ip Petite plante, à tiges de % ou 3 pouces. Cor. cylindracées, barbues à leur orifice.

2522. CAMPANULE dUicate.

C. à tiges diffuses liliiformes, feuilles très-petites lancéolées subundemées réfléchies, cor. partagée en cinq.

L. n. le cap de Jijon-Espagne. jy Ce n'est point une lo belie, Jes ant hère* it ant disjointes. Sa cor. est fans doute monopétale, quoique profondément partagée en cinq.

2523. CAMPANULE fezflilore.

C. couchée, à feuilles linéaires-fubulées entières i fl. axillaires foliaires presque éfylées.

Z. n. le cap de Bonne-Espagne Les feuilles irrégulières à dentelures rares.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

2517. CAMPANULA crifpa.

C. foliis lacvibus petiolatis subcordat? cato-ferratis incisifis, caule firrijlici j floribus lateralibus 3c terminibus subfusipicatis.

Ex Orient. Tournef. ftigma 5-fidum.

2518. CAMPANULA enfifoitU

C. fruticosa, foliis eniformibus ferratis glabris longitudinaliter ftriatis, floribus paniculatis nutantibus.

Ex infula Mauritiana. T>

2j 19 CAMPANULA aurea.

C. caule paniculaco, foliis lanceolatis duplicito - ferratis ; calyciniis ovatis coloratis corollam sequantibus.

Ex infula Maderae. % L. f. fuppL p. 141. PL glabra. fl. ligm. 5-fida.

2710. CAMPANULA verticillata.

C. foliis lanceolato-ovatis ferratis verticillatis ; floribus verticillato-farfatis, in fpicam terminalis.

E Tataria orientali. % Pall. it. 3. t* G. & ed. gall vol. 8 p. 26\$.

2j 21. CAMPANULA zoyfi.

C. caulis cespitosus pauciflorus ; foliis glabris integerrimis : radicalibus petiolatis, ovalibus (ubrōtundis, caulinis oblongo-ovatis effusibus.

Ex Aujria, inter rupes alpium. Tp Jac. collécl. 2. p. zzz. & ic. rar. vol. a. cauf. 3-pollicares, cor. cylindraccijs, ore barbate

2S22 CAMPANULA tenella.

C. caulis diffusis filiformibus, foliis minimis lanceolatis subundentatis reflexis, corollis quinquepartitis.

E cap BoniB Spei. T) Camp, tenella. I. f. Juppl. tql. lobelia tenella. spec. pl lightfo* tiaoxycoccoides. VHrit. Jin. u 4.

2*23. CAMPANULA feffdiflora.

C. prostrata, foliis linearifubularis integris, floribus axillaris foliariis subcladibus.

E cap B. Spei. Lin. f. fupp. 135. conf. cum lightjootia fubulata. VUerit. fen. t. 5.

PENTANDRIE MONOGYNIE.

:>P4 CAMPANULE *fifcùule'e*. Dift. fuppl.
*Q. frtrriqu.eufe, à feuilles très-petites ovalrs
vn peu demées coriaces recourbées; fl. glo-
merulces terminates.

L. n. le cap de Bonne-Espérance. T? fl.
comma dans les précédences.

2 p j \ CAMPANULE *lobellolde*.

C. très-glabre, très-rameuse; à feuilles lan-
céolées dentées feffiles, fanicules terminales
unilaterales, cor. infundibuliforme.

L. n. File de Madère > dans les lieux creux.

* Feuilles hispides ou un peu fcab res*
Calices à finus fimples.

2526. CAMPANULE *df. larges*. Did. n°. 2^.

C. à feuilles ovales-lancéolées; tige très-fim-
pie cylindrique, fleurs foliaires spédoncées,
fruits penchés.

L. h. l'Europe dans les lieux montueux et
ombragés. %

3.J27. CAMPANULE *ganniae*, Dift. n. 2<J.
C. à tige anguleuse; feuilles pétiolées en
coeur acuminées groflièrement dentées, calices
hispides*

L. n. l'Europe, dans les haies. % *Orlf. de la corolle barbu.*'

25-28. CAMPANULE *rapwiculoides*. Dift. n. 27.
C. à feuilles inférieures pétiolées en cœur-
lancéolées dentées, les sup. lancéolées feff-
Hies; épiefBlc, à fl. unilaterales.

L. n. TEurope aux lieux ombragés et cul-
tivés. T£

252p. CAMPANULE *d* Bologne*. Did. n. 28.
C. à feuilles ovales-lancéolées, fabres en
defibus, feffiles; tige paniculée.

L. n. l'Italie / le Car^oole.

*S3'o. CAMPANULE *gramine*! Did. n. sp.
C à feuilles étroites linéaires-fubulées, tête
terminale,

L. n. l'Italie, sur les montagnes. Tfl fieur
ramajfée en tge.

PENTANDRIA MONOGYNIA. si

2524. CAMPANULA *fajliculata*.

C. fr-uuicofa, foliis minimis ovatis subden-
tatis corhceis recurvis; floribus glomerati^
terminal ibus.

E cap. B. Spei T> An *C. fafciclata*? L. f^
fuppl. 139. Ex herb. Sonnerat.

252;. CAMPANULA *lobeliooides*.

C. glaberrima rair.ofiffiina, foliis lanceolatis
ferratis fTijbus, paniculis teniunalibus fe-
cundis, cor. infundibuliformi.

In loc. latebrofis Maderx. *Lln.fuppU iqo.*

* Folia kifpida vel fcabriufcula.
Calyses finubus simplicibus,

2526. CAMPANULA *latifolia*.

C. foliis ovato-lanceolatis s caule simplicif-
fimo tereti, floribus folitariis pedunculatis,
frudibus cernuis.

In Euroj^oce montofis & mnbrofis % *Cal.*
glabri.

X\$21. CAMPANULA *tracheUum*.

C. caule angulato; foliis petiolatis cordato-
acuminatis grofl ferratis, calycibus hiipidis.

In Europae fepibus* Tp *Cervicarla major** dad.
pempt. 164.

25*28. CAMPANULA *rapunculoides*.

C. foliis infer.oribus petiolatis cordato-Ian-
ceolatis ferratis, fuperioribus lanceolatis feff-
libus; fpica virgata, floribus fecundis.

Ex Europe umbrofis & cultis. ifi

2J2p. CAMPANULA *Bononlenfis*.

C. foliis ovato-lanceolatis fubtus fcabris feff-
libus; caule paniculato.

Ex Italia, Carniola. Moris, fee. 5. t.q.f. jjj;

25-30. CAMPAMyLA *graminifolia*.

L. foliis anguftis linearifubuiatis . capitulo
terminal].

Ex Italic montibus. Column, phyt. p.zi8.

2;3L CAMPANULE *glomindie*. DiA. n. JO.
C. a lige fnipule un pen rude ; feti'lies racii-
calcsalongs pétioles ; lej canlinaires semi am-
plexicaules; flairs fl/Hles , itte le-rmitiale.

[•] *Fkurs prefque tomes en tfe terminals.*
Feuilles radices ovales-lanceoUss,

[C] *Flctts prefque routes en tete nrminale.*
Feuilles rud. en cccur.

[v] *Flews cparfei tc long de [la tige], dans*
Us aiffcUts des feuilles.

Z. /?. les Jleux fees & montueux de TEu-
rope. ir,

en, 2. CAMPANULE *dt roche*. Dirt. n. jr.
C. a tiges 0mpetes rult-s , feuilles ovales-
oblongucs VKIUCJ fcffiles; t@e tertniale.

L. n. fur les mont. de l'Italie , fur les rocliers.

2J-33- CAMPAKULE *ce-iiccaire*. Dia. 0.32.
C. hifpide^ a flcurs fcITtcls, ttte terminale;
feu! lies lanced lees - lincaires ondulces crn-
n U:es.

L. n. L'Emojpej dans les bois montueux &
picrrt-ixx.

f34- CAMPANULE *thyrof Ut*. D'&. n. 34.
C. hilpide, à grappe oblongue terminale,tige
très sim le, feu! ICS 1.1Mf, olées-linéaires.

L*n. les moitt.de la Suifle, do llulie , Sec. &

25 tj. CAMPANULE *tuntigirteufe*.D'id.- n.33.
C. Kifpida-lanuBincul e, a feuillcs ovales ridées
crénées rétrécies en [.et'oU-, ii^e Gmple,
fl. preiqtie i effiles évasées.

i. n. La Tartarie. rf¹ ft. tatefales & term.

i/3<?. CAMPANULE *tomenteufc*. Ditf. n. jj.
C. a feuilles radicales longues spatulées cré-
ncUes , les fup. en néiformes ; fleurs pé Jon-
culees un pen en c, i, calicc tomtntcux.

L. n, le Levant. Tournef. coy.

2;47. CAMPANULE *argentic*. DIcl. n. 36.
C. a ft uilles oblonguet croicei tonieni culcs
argentecs, tige paniculé1, nuneaux uniilores.

L. a, Lc Lciant. Taurnef. Cor.

2jrji. CAMPANULA *glomerata*,
C. Qanit: fimj lici subefpi
long petiol p fer
• tii, caulinis
floribus tellis us , capitul-

[| «] *Fin res fere omnes in capitulo term!* natu.
Folia rad. Ovuto-lanc^Uta,

[ff] *Floses fire omnes in caplt'ulo terminali.*
Fa/ia rad. cordata.

[y] F/KVM ^er caulemfparfi, in axillis fc-
lionum.

Ex Europffi ficcis St. montolis

2 ; j 2. CA M PAN ULA ^etrad.
C. catilibus (impHcibus afperis , foliis ovato-
ob], hirfutis feffilibus j caj;iiulo terminal!

Ex Italia; momibus, ad rupes. Band it 890.

2533. CAMPANULA *cervkaria*.
C. bilpida, fioribuals, capitulo ter-
minali, j'oliii lanceoato-linearibus undulatis
crenulatis.

Ex Euro].te afperis fylvaucis. Ft. dan-
t. 7S7.

2,-J4. CAMPANULA *thyrjhidea*.
C. hispida, racemo ovato oblongoteroiipali,
canle simplicif. , foliis lanceolai o-linearibus.

Ex alpibus Helve tix , Italix , &c. ♂

273;. CAMPANULA *lamugimfa*.
C.'Hil o-lanugmofa, foliis ovatis rugofi*
crtizaiis in petio inn attenuate, caule fiii^li-
ci , Soribus i'ublefffi'bus pamlis,

E fataria \ <& .Ati dimp. pc egrbus, Lin.

2534. CAMPANULA MPintofa.
C. foliis raoicaliims loogis fpatherulaos ere-
nads, fumniis cmiciformibus ; fioribus j.t-
duncularo subfpicaig , caJice tomentofo.

Ex Oriente. Cal. coroltd duplo breviar.

2;"37. CAMPANULA *argentea*.
C. foliis oblongi* angullis toinentofo-argen-
teis , cuule paniculato, ramis uniHoris.

Ex Oriente. Caps, turbinata , angulata.

2538. CAMPANULA*/ *de calamertt. Di&*

C, pubefcenie, a tige rameuse c uchée ; fev'Ues cauinaircs ovales-arrondies crénélées fubp'-tioées „ les raméales petites poincues, cor. pubefcentes en dehors.

L. n. File de Naxo , dans l'Archipel.

2539. CAMPANULE *limonhilde*. Did. n. 63.

C. à rameaux ouverts effilés , feuilles radicantes elliptiques liffe\$ très-entierées, fleurs fefiles ternees.

L. n. le Levant.

2J40. CAMPANULE *effilée*. Difl. suppl.

C. à rameaux effilés , feuilles rad. lanceoleé^ dentées fubpétiolées ; les raméales très-courtes, fleurs géminées feffiles.

L. n. le mont Liban. rf¹ fl* petites, f. un peu fcabrt.

SJ41. CAMPANULE *caffante*. Dift. suppl.

C. à tiges couchées, rameaux unilateraux multiflores; feuilles pétioleées : les radicales reniformes.

L. n. le royaume de Naples. *jp Elle paroit avoir des rapp* avec la C. n. z5oz, dotu il faudra la rapprocher.

2J42. CAMPANULE *kifpide*. Dift. n. 40.

C. hifpide , à fleurs droites , calice dela longueur de la corolle.

L. n. le cap de Bonne-Efpérance. Voyage dz Thunb. 'ed. franpai/e , vol. 4. p. j5z.pl. IV.

*;43. CAMPANULE du Cap. Did. suppl.

C. hifpide , à feuilles lahcéolées dentées , pédoncules très- longs uniflores, capfulles échinées.

L. n. le cap de Bonne-Efpérance. O

25-4. CAMPANULE *e'rime*. Did. n. 38.

C. à iige dichotome, feuilles feffiles : les fupérieures oppofées, à trois dents.

& n. L'Europc auflrale. O

25*38. CAMPANULA *calamenthifolia*.

C. pubefcens , caule ramofo decumbente; foliis caulinis ovato-fubrotundis crenatis fu-petiolatis, rameis exiguis acutis, corollis extus pubefcentibus. •

Ex infula Naxo, in Archipelag. *Tournef, cor.*

*S39- CAMPANULA *UmonifoUa*.

C. ramis patentibus indivifhr, foliis radicalibus elipticis laevibus imēgerrimis, floribus feffliibus ternis.

Ex Oriente. *Conf% cum fequente*.

2^40. CAMPANULA *virgata*.

C. ramis virgati?, foliis radicalibus laneeolatis dematis fubpeuolatis ; rameis bicviffimis ? floribus binis feffliibus.

In monte Libano. *Lahillard. ic, pUdec. zp. 11. t.6.*

2741. CAMPANULA *fragilis*.

C. caulibus procumbentibus, ramis fecundis multifloris; foliis petiolatis : radicalibus reni* formibus.

In regno Neapolitano. % *Cyrill. pi. rar. t. XI. f. z. flores magni.pl. glabra, inter* dum lanuglnofa*.

2y42.,CAMPANULA *hifpidula*.

C. hifpida, floribus ercdis, calycibus In-gitudine corollas.

È capite B. Spei. fuppl. p. iqz. causes hif* piü , ramoji , \$-pollicares. *Folia linearis^ lanceolata*.

2543. CAMPANULA *Capensis*.

C. hifpida , foliis lanceolatis dentatis , ped n -culis longiflimis unifloris, capfulis ltri^ofis.

E capite B. Spei. 0 *Commel. amfiel* %, t. 35.

2^44. CAMPANULA *erinus*.

C. caule dichotomo, foliis feffliibus : fupe-rioribus oppofitis tridentatis.

Ex Europa auftrali. O *Column, phyt. t. 37.*

tfo FENTANDRIE MONOGYNIE.

aytf. CAMPANULE erinoide. Did. n. 39.
C. à tiges diffuses, feuilles lancéolées un peu dentées, décurrentes par une ligne cabre; fleurs pédonculées folaires.

Z. n. PAfrique, i'fifpagne. ©

* *Calices à finus riflchls.*

2f±6. CAMPANULE naine. Bid. P. 41.
C. à tige uniflore, feuilles radicales ovoïdes cilées cabres; les caulinaires lancéolées à dents rares, calice hilpiJe.

I. n. les mont. de la France, laSuiife, &c.
PI. de z ou 3 pouces. fi. groff'e.

2J47. CAMPANULE//^&i^. Did. n. 41.
C. à cige uniflore j feuilles rad' fpatulées, les caulinaires étroites lingulaires très-entières, fleur droite.

X. n. . . . on l'a donnée pour¹ la C. uniflor.

2548. CAMPANULE barbe. Did. n°. 48.
C. à cap'fules quinqueloculaires, tige pref-qu'à une feule feulic; ks feuilles lancéolées j les cor. penchées, barbues.

L. n. les Alpes de la France, de la Suiife, &c.

2549. CAMPANULE fourchue. Dift. n°. 43.
C. à cap'fules quinquelocularies, recouvertes, tige fourchue, fleurs penchées*

L. n. la Syrie.

2550. CAMPANULE molette.

C. à caule fulea^uLiquelocularies recouvertes, tige r&mèufe couchée, feuilles ovales fef-fites.

L. n. la Sicile, l'Efpagne. PI. pubefcente. fl dentées, petites.

2551. CAMPANULE à groffes fleurs. Did. n°. 44.

C. à cap'fules quinquelocularies; tige drône, non divifée feuillée j feuilles oblongues feffiles.

L. n. la France > Tltalle, &c. dans les bois flont. fi

PENTANDRIA MONQfJYNIA.

25-f.; CAMPANULA erinc
C. ,caulibus diffufis, folii ferrates decurrentibus linea pedunculatis folitariis.

Ex Africa, Hifp^nia. 0

* *Calyces finibus reflexis.*

25-46. CAMPANULA nana.

C. caule unifloro, foliis radicalibus obovatis cil'ato cabris; caulinis lanceolatis raiiter dentatis, calice hifpido.

Ex alpibus Galliac, Helvetice, &c. Camp. • allionil. vill. pi. delph. z. t., to.

*25*47. CAMPANULA liguliris.*

C. caule unifloro; foliis radicalibus fpathii* latis > caulinis anguftis lingulatis intcermis, flore ere do.

Habit.... Ex horto parifienf.

*25*48. CAMPANULA barbata.*

C. cap'fulis quinquelocularibus, caule fubu*nifolio; foliis lanceolatis, corollis cernuis bar baüs.

Ex alpibus Gallic, Helvetia?, &c. Jacq. obf. z. t. 37.

25-49. CAMPANUIA dlchotoma.

C. cap'fulis quinquelocularibus obteAis, cault dichotomo, flonbus cernuis.

Ex Syria Folia oblonga, fcabra. I.

2>10. CAMPANULA mollis.

C. cap'fulis quinquelocularibus obteAis, caul* ramofo decumbente, foliis ovalibus feffili-

Ex Sicilia, Hifpania. Boc; JiC. t. q\$. f. 1. barrel, ic. 759.

2551. CAMPANULA medium.

C. cap'fulis quinquelocu!aribus; caule eredo indivifo foliofo, foliis oblongis feffilibus.

Ex Gallic, luliae fylvis apricis. ↗ In honk culta.

£ p. TA MTANULE *ponSuee*. DKt. n°. i⁵
• illestadicali s pétioles ovales-
iun.,,,..u. .:\$ j Seuxa penches velut~s &
ponfluces intérieurement.

L. ;i. la Silx'rie. Fl. blanchatres en-dehors.

2573. CAxMPANULE TO iaflf». Dift. iv'». jfi.
C. a ci| tides Quinquelocu^{laires}; feuilles in-
forieures o\ales dentées pétioles; les cauli-
naires prefijue ~~seffiles~~; Btui très-grande
i elviloine.

L. a. rifle de Candie. F/. / « « kteuj^{vale}.

2^54 CA M P ANULE *tuba h-uhj*. Dlfl. n«. 47,
C. a cajfules recoinctes, "feuillcs radi^{cates}
pctioii^{es ovales}, inégalement dentées, in-
ci/iies a leur i⁻afe; 9 cauLui^{ires} dentées
Kilties, Wcw oblongue,

L. «. Rfle tie Ca ndie. 17; ei un peu couchées.

2;;y. CAMPAKtU.E en t. w. Did n°. ^.
C. liijido , ii tige tres-fimpk, f=euilles li-
ncairt-s trcs-ent:ére^{teura} akemes fefflies ,
épi fort long.

i. .: le Valais. tf

ajs6. CA;MPANULE à belles purs.

C. hif,ide . i fcuilfes linéaires, dentes en
crtmelures : K. inf, fort Icngues? fleurs sub-
panicu^{les} penches.

Les reg. av^{stales} de race. Fr X- \$9 le 3-
fide , rameaux uniflon^s.

s-sn- CAMPANULF. des Alpts. DitV. n°. ^o.
C. a tige fimpk mcuJes uniflores axJl-
biil-s ;i deux fcujllcs.

X. w. Jt-s momagnes dc l'Amriche, &c. %

A;;8. CAMPANULE des'rochert. Did. n°. 5-1.
C. ^ capftiles a ciii'j •rètes recouvertes,
- feflirs ahernes penches , fe uillea ovoides
crcitelces.

Ln* rifle de Candie, panui les rochcrs.

ajyp. CAMPANULA A JJMa. Die. n°. 52.
C. a trtj liiles trilocwlaires recouTerifiBj tigc
paniculec.

£« n. li Sihi-vic , t'Autriclie. Feuliles oblon-
guts j pnjqite tintures.

2552. CAMPiNUU *puncta*».

C. hirfiua , foliis radicalibus petiolatis ovato-
acutis ferraiis ; floribus cernuis intus punie-
tatis villofis.

ESibiria. Gmel.fib, 5. t.30, Jtigm.3-fiJum.

2553. CAMPANULA prfvifcrmh.

C. capsulis quinquelocularibus foliis infelio-
ribus ovatis ferratis petiolans, ouiuu sub-
felliJibus ; /lore moxiino petyiformi.

Ex Crcu.-Totir/if. cor.

2554. CAMPANULA tubul-/-^.

C. cai.fulsi oba-dis , loliiis rxdicalibus pe-
tiolatis ovatis iiuequaliter de Mtis bad inci-
sis; caulinis ilongis fenaus fejjibus, llor^s
oblongo.

Ex infuJa cretica. Toumef. 39.

2555. CAMPANULA spicata.

C. hifpida, caulfmipliciJILmo, foliis Uine-
ribis integris crimisj Roribusdlicniis fcflifibus*
fpica praelonga.

In Valesia. <P Allion. ft, pedem, t. qSf. a.

2556. CAMPANULA /;^.-fa.

C. hifrida, foliis linearibus dentato-crenatis:
inferiovibua prxlongls , iloribus subpanicu-
lads nutanibus.

Ex GdlUi merid. Tp Pourret, c/tlor, narb. 13.
folia inf. ut in a:mp. Gmd. fib. 3. I. \$t.

2SS7- CAMPANULA alpina.

C. caule simplici i pdiuucitlis unifloris axil-
laribii diphyllis.

Exalpibusauft., &C. % Jacfi. attfir. z.e.ttS.

2558. CAUVAItULAfixatilu.

C. capitidis qirinrjetarmatis obtectis , Iloribuj
alcnijj nutamibus, foliis obovaiis trenatis.

In Cretae fcopulis faxofis. Barrel, ic. 813.

2SS9- CAMPANULA SiiirUa.

C. caj fulis triloculaibus obiectis^ caulk pa-
niculato.

Ex Sibi da, AuAria. Gmd. fib. 3, t, 29, Jaeq.
ji. aufir* z, t, aoo.

*2 PENTANDRff MONOGYNIE.

2<;*Co.* CAMPANULA *hf.de violate* Dia.

D°. S3-

C. a cal.f. recouvertcs; fcuilles radicales en recur cienelees petiolces , Sears gns des pés- doncLiiOcsT calice hifpide.

/. n. la Siberia? PL Ugfrentent vdue.

256u CAMPANULE *hturopfylU.* Diffionn.

C. à F. prefqu'o vales glabres tres-emiercs , tiges diffuses.

L. n. ics ides de l'Archipel. *F. caulin. arron-diis* pettier,

2,562. CAMPANULE *a tmis denes.* Didion.

C. à ~~capsule~~ s qiiiiciuelocuiaire, tiye uniflore , fcuilles radicaics a trois den is.

i. n. le Levant. F. ^</. *LmUoUes*, cu/ie'i- Jbtmes.

S.J63. CAMPANULE *a petaes fUun.* Ditt.

C. a rige rameufe fup. fcuiJle^ rad. a longs j cuoles ovoides crenelecs , tes cauui 113 ires ovales - tancioleej retrcdes & inciftes à la base , flcurs panicuées.

L. n. le Levant, *Fl. pttjeji normreufes.*

256\$. CAMPANULE *en tyrt.* Dia. n°. 5-7

C. hispide , à capsules recouvertcs, feuilles rad. en lyre: a iobc terminjl en coeur, Hours latérales & terminales fre que fTiles.

Z. a, le Levant. *Cor. campanulic* , à limbe ohtus, *dvij'e midincretmeti*

25-6;. CAMPAN ULE *laamit.* Dia. n». j 8.

C. à capsules récouvertes pe Joncijlt;cs,f feuill. dentées : les rad. en lyre , les cau. lancéolées.

Z. «. la Grèce. Il faut ^n-*A garde ^ne point rapprocher à cette espèce ni à la précédé hs synonymI du M. CHALUX. A.

2566. CAMPANULE *de Sym.* Dia. n°. S9-

C. à capsules recouvertes , feuilles bérissées : les cjuulinai- les lanceolatcs, alecs dentces, lige I rés- simpla , fl -ursfeffd

t, n, k Sylie > U Palcftine.

PENTANDRU MONOGYNIA.

25-^0. CAMPANULA *viotafolia.*

C. cipfulis obtcfllis; foliis radJcalibus cordatis crt-natis f:eLio!aiis, flcribus ainplii peduncibisiis, calyce bii^ido.

Ex Sibtria? *Cam. carpatica* ' Jacq. h.i.t.Sj.

2561. CAMPANULAheterophylla.

C. folia fubovalisglabrisiiuegerrlmis, caulis difiufis.

Ex infulis Archipebgi. *Tournef.* u_t t. pag.

243-

2?6i. CAMPANULA *tridantata.*

C. capulaquinqucloculari , caule unifloro, fotiis radicalibus trrdentatis.

Ex Orionie. *Mtrnc*, 44. *Sikrcb.* dec. 3.

25-63. CAMPANULA *parviflora**

C. caule Tupernc ramofo, foliis radicalibuj longè pctio Ut is obovatis crfnaiis , caulinis* ovdio-tancoolaua ball mtentmis & incilis, floribus pantculati^

Ex Onenit.Tournef. tor. *calyxfinub*, reflexu.

2564. CAMPANULA *lyrata.*

C. liifyidajCapfulisobteais, foliis radicalibus tyratis: lubo terminalt cor ditto, floribus lateralibus &. tcrniinalibus iiibidlllibui.

Ex Oriente. *Camp. fali'u profundi incrfs* > fru3u durv. *Tournef.* tor, exelufi jyaonymo.

236s. CAMPANULA *taeitiata.*

C. 1apsuiliis obteAis peduncujans, foliis Terra- us: radicalibus lyraiis, caulinis hnceolatis.

In Grecia. *Can.p. grisca faxatHis* , Ja:ol-ejf folio. *Tournef.* cor. & it. or. vol, 1, />. ZGQ. PL glabra cor. turbinato-patula.

2566. CUTPANULA//.illa.

C. caps-iliis oh:etis , foliis hints : can]mi* lanceolatis ferr:lib, cau!e simpli^illimo, Horibus feffilibis.

In Syria, Palæstina.

2jtf7. **CAMPAKULE** *comfit**. Oift.
C. i tige hispidé rameuse, feuille; oval-<
pointues dentées fessées.

L. n. L'Arabie. Ft. pedoncules.

20%. **CAMPANU^{LE}** *Jet.* "DiQ: fulpl.
C. u cij.fulcs K-couvrctes, leuiHes l...
trts-enucres, pcdoncules axillairesu...
tige hcri...ee.

L. n. le Levant. O FL *ronchées, vélues en-
dchors.*

* *Capulet alonge.es prifm*;* *tiques.*

2f5p. **CAMPANULE** /[^]i<>\ Dia. n°. 60.
C. a capfules columniformes quuijuel>scu-
hires, i tige ligneuse, feuilles linéair cs-fubu-
'es, pédoncules trcs-longs.

L. a. It cap de Boni:^e-Espér: mccc. b

2j-jo. **CAMPANULA** *douce* w. Dift. n°. 61.
C. a ti; e très-rameuse diffusif!, fi.*ullés (>blon-
gucs un pen crênelée-a, fleurs fit-
laires.

L. n. IXurope, daiis les bKds. [©] Cor. plane,
en ro...e.

2. ^{id.} n°. 62.
C. ;t ti;e un pen r:micuféa la bafc , dn'ite;
fcuilles oblongescrcnciees, cali<ss ramalitc
plus iongsqaclacorolle.

L. ^. rEuro^eauflr. Dims Jes champs. 0

2572. **CAMPANULE de Thrace.** Diet. n°. <S^A
C. à tige à peine divifee , ircz-tMiicutc ;
fcuilles linéaires acumincs.

L. n. la Tbracc ou Romanic. Q

2573. **CAMPANULE perfolih.** Difl. n°. 6\$
C. à tige simple, feullea en cmuz iii; ^{mees}
amplexicaules, fleurs fc (files ramai...ees).

L. a, I- Virginie 0 F/. axitkirts.

2S 74. **CAMPANULBfl** *icoide.* Dift. suppl.
C. à tige droite grêle; feuilles subulées, Jcn-
tées en cils, par : Clle Jill pauciflore.

L. n. le cap ik B Esp. F. courtes, paro: ^tfir

2^67. **CAJVIPAKI** ^{ULΔ ed.} >JIU.
C. "aulc hiftido ramofoj foliis ovaio-<^{cultis}
ferratia feffijibus.

Ex Arabia. Forjk. Fl. &gypt.p. \$a.

2?6\$. **CAMPANULA** ^y *trigofa.*
C. enjjufis obtcdis , foliis lanceolatis int-
rimis , pedunculis axillaribus unifloris ,
Caule trigofa.

Ex Otieme. © D. WahL fyn.b. 3. pag.
34

* *CapfuliX chngactz pr'tfma:ice.*

2^9. C **AMPANULA frutkofa.**
C. capfulis columnaribus quinqueloc alarlbus,
caulc fruticofo , foliis liicid>fubuLaiis, pe-
duncuiii longissimis,

JEca].itefl. Spci. T)

2770. **CAMPANULA freculum.**
C. (Mule ranofissimo di ifufo , foliis oblongis
fubcrenaus^ floribus foitiailis.

in Europa , inter fegctes. 0 Cor. pUna ,
rota

2571. **CAMPANULA hybrida.**
C. caule baii fubranoso striato ; foliis oblongis
crenatis , calycibus aggrecatis corolla
tongioribus.

L. Europa aust :. inier ftgetes. Q

2;72. **CAMPANULA Pentogonia.**
C. coule (libdivifo ramoifflnio, folii. linearis
bii5 jcmmnatis.

In Thracia. Q An pT&cedtfius vancias ?

2\$j\$. **CAMPANULAPERFOsata.**
C. caule fimplici, foliis cordatis dentatis am-
plexicaulib., flor Lmsfeffilibtisaggregatis.

Es Virginie 0 Barrel. !c. tt 33.

2574. **CAMPANULA ericoides.**
C. caule eredo gracili, foliis subulatis dentato-
ciliatis , panicula nuda pauciflora.

E cap B. Spuri. Son.-rat. apolemonium roel-
loides. L. suppl. 139? A* camp, j'ttbui...sta.
Thunb. pi, c, pnodr.38 ?

\$4 PENTANDRIE MOXOGYNIE.

«j7f. CAMPANULE *luifante*. Did. fuppf.

C. à tiges fruticuleuses à leur base; feuilles ovales-lancéolées dentées très-glabres, fleurs terminales, à corolle une fois plus longue que le calice.

L. n. le cap de Bonne-Espérance.

* CAMPANULE (*ondulée*) glabre, à feuilles lancéolées dentées ondulées, fleurs pendantes terminales. *Du cap de Bonne-Espérance.*

- CAMPANULE (*poreuse*) à feuilles radicales ovées, les caulinaires lancéolées; tige ascendante, fleur en grappe. *Du cap de Bonne-Espérance.*

- CAMPANULE (*couchée*) à feuilles ovales crénelées glabres, tige couchée, fleurs axillaires foliaires. *Du cap de Bonne-Espérance.*

- CAMPANULE (*capillacea*) à feuilles linéaires-filiformes entières glabres, fleurs alternes, calices glabres. *Du cap de Bonne-Espérance.*

- * CAMPANULE (*linéaire*) à feuilles linéaires entières glabres, calices hispides, tige droite. *Du cap de Bonne-Espérance.*

- * CAMPANULE (*ferrue*) herbacée, droite; à feuilles lancéolées dentées recourbées, ciliées & ferrues à la base; panicule furcée, fleur en grappe. *Du cap de Bonne-Espérance.*

- * CAMPANULE (*paniculée*) à feuilles lancéolées-ondulées hériflées, tige anguleuse hirsute, fleur en grappe. *Du cap de Bonne-Espérance.*

- * CAMPANULE (*cendrée*) à feuilles lancéolées entières, glabres; tige laineuse, fleurs terminales blanches. *Du cap de Bonne-Espérance.*

- * CAMPANULE (*unidentée*) à feuilles lancéolées dentées glabres, tige simple, fleurs en grappe. *Du cap de Bonne-Espérance.*

- * CAMPANULE (*grik*) à feuilles linéaires-lancéolées obliquement dentées, tige dichotome, fleurs foliaires terminées. *De la nouvelle Zelande,* &c.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

2; 7j. CAMPANULA *nitida*.

C. cauliis bafi fruticulosis; foliis ovato-lanceolatis dentatis glaberrimis, floribus terminalibus, coroliis caryce duplo longioribus.

E cap B. S^{ei}. Vherit. f. cert. angl. z. t-\$.

* CAMPANULA (*undulata*) glabra, foliis lanceolatis dentatis undulatis, floribus petiolaris terminalibus. *Camp. L JuppL iqz. Thunb. prodr. jg.*

* CAMPANULA (*porofa*) foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolatis; caule unifloro, floribus racemosos. *Thunb. cap. prodr. jg.*

* CAMPANULA (*procumbent*) foliis ovatiscrenatis glabris, caule decumbente, floribus axillaris foliariis. *Thunb. cap. prodr. 39.*

* CAMPANULA (*capillacea*) foliis linearifiliformibus integris glabris, floribus alternis, calycibus levibus. *Thunb. cap. pro Jr. 38;*

* CAMPANULA (*linearis*) foliis linearibus integris glabris, calycibus hirsutis, caule erecto. *Thunb. cap. pwdr. jg.*

* CAMPANULA (*adpreca*) herbacea erecta; foliis lanceolatis dentatis recurvatis bafi ciliatis adreflexis, panicula decomposita. *L. f. fuppL. 140.*

* CAMPANULA (*paniculata*) foliis lanceolatis lindatis hispido, caule angulato hirsuto, floribus racemosos. *Thunb. cap. prodr. 38.*

* CAMPANULA (*cineraria*) foliis lanceolatis integris glabris; caule lanato, floribus terminalibus foliariis. *Thunb. cap. prodr. jg.*

* CAMPANULA (*unideneata*) foliis lanceolatis demiciliolatis glabris, caule simplici, floribus racemosos. *Thunb. cap. prodr. jg.*

* CAMPANULA (*gracilis*) foliis linearilanceolatis obfoletè ferratis, caule dichotomo, floribus foliariis terminalibus. *Forfl. Fl. aujr. p. 10.*

* CAMPANULE

- * CAMPANULA (*triphylle*) à feuilles ternées **lintaires**, *splun* icilicci trois à trois. *Du Japon. F. entières.*
- * CAMPARI UU (*tetraphylle*) à feuilles quatre à quatre oblongues dentées. *Du Japon.*
- * CAMPA~~U~~LE (*glaue*) à feuilles sessiles ovales dentées glauques en-dessous; tige anguleuse paniculée, pédone, uniflora. *Du Japan.*
- * CAMPANULE (*bordée*) à feuilles lancéolées ondulées dentées bordées, rameaux faibles, fleurs terminales solitaires. *Du Japon.*

Explication des fig.

PL. 123. F. 1. Fructification de la Campanule, d'après Tournier & Miller. (a) Fleur entière, à finus du calice non réflechis. (b) Autre fleur, à finus du calice réflechis. (c) Calice. (e) Corolle. (e) Étamines. (f) Étamme séparée. (g) Étamme avec le pistil. (h) Pistil. (i, l, m) Capsule. (n) Receptacle des femences.

PL. 115. F. i. Campanule raponse. (a) Capsule enlevée. (i) La moitié coupée en travers. (c) Si loge antérieure ouverte. (d) Une femence séparée. (e, f) La moitié coupée en deux sens, pour faire voir la ligne & la forme de l'embryon.

346. ROELLE.

Caract. eff. it.

C_{IR.} infundibulif. à limbe y-fide. Filaments dilatés à leur base. Stigmate 2-fide. Caps. inf. biloculaire.

id. nat.

Cat. superieur, monophylle, tnrbin- partagé ancolées.

Cur. mo hopétale, infundibuliforme ou campanulée, plus longue que le calice, à limbe partagé en cinq.

Etam. Cinq filaments dilatés à leur base. Anthères subulées conniventes.

Pist. Ovaire inférieur, oblong. Style filiforme, de la longueur des étamines. Deux stigmates oblongs, aplatis, ouverts.

Botanique. Tome 11.

* CA~~M~~ HLA (*triphylle*) foliis ternis linearibus, floribus verticillato-ternis. Thunb. Fl. Jap. 87.

* CAMPANULA (*tetraphylle*) foliis quaternis oblongis ferratis. Thunb. Fl. Jap. 87.

* CAMPANULA (*glaue*) foliis sessilibus ovatis ferratis subitus glaucis; caule angulato paniculato, pedunculis unifloris. Thunb. Fl. Jap. 88.

* CAMPANULA (*margine Ha*) foliis lanceolatis undulatis serratis marginatis, ramis debilibus, floribus terminalibus solitaris. Thunb. Fl. Jap. 89.

Explicatio iconum.

Tab. 123. F. 1. Fructificatio Campanulae ex Tournierio & Millerio. (a) Flos integer, finibus calycis non reflexis. (b) Flos alter, finibus calycis reflexis. (c) Calyx. (e) Corolla. (e) Stamina. (f) Stamen separatum. (g) Stamina cum pistillo. (h) Pistillum. (i, l, m) Capsula. (n) Receptaculum femencum.

Tab. 123. F. 2. Campanula rapunculus. (a) Capsula integra. (b) Eadem trauertiæ secca. (c) Ejusdem locularium anterius aperitum. (d) Semen separatum. (e, f) Ejusdem sectionem cum tunc & figura embryonis. Fig. ut D. Atm.

346. ROELL.

Charact. eff.

Cor. infundibulif. limbo 5-fido. Filamenta basi dilatata. Stigma 2-fidum. Caps. infera 2-locularis.

Charact. nat.

Cat. superius, monophyllus, turbinatus, quinquepartitus, perlitens laciniis lanceolatis.

Cor. monopetalis, infundibuliformis vel campanulata, calyx longior, limbo quinquepartito.

Stam. filamenta quinque basi dilatata. Antheræ subulatae conniventes.

Pist. Germen inferum, oblongum. Stylus filiformis, longitudine flaminum. Stigmata duo, oblonga, deprecta, patentia

Peric. Capsule cylindracée, couronnée par le calice, uniloculaire ou biloculaire, s'ouvrant au sommet par un trou rond.

Sem. nombreuses, anguleuses.

Tailler des espèces.

2576. ROELLE ciliée. Did.

R. fruticuleuse, à feuilles linéaires-subulées ciliées; à pointe droite; fleurs terminales solitaires.

L. n. l'Afrique. b Ram. prolifères, unifl. .

2577. ROELLE reticulée. Did.

R. fruticuleuse (?), à feuill. cS droite; , ci- liées : à pointe refléchie.

L. n. le cap de Bonne-Espérance. Elle a l'aff- peil de la Gortère ciliée.

2578. ROELLE à ép. Did.

R. fruticuleuse droite, à feuilles la nccolces ciliées, fleurs terminales presqu'en ép.

L. n. le cap de Bonne Esp. Fl. ramassées.

2579. ROELLE /guarreuse. Did.

R. herbacée diffuse, à feuilles ovales recourbées dentées, fleurs terminales ramassées.

L. ... le cap (ie Bonne-Espérance.

2580. ROELLE filiforme. Did.

R. fruticuleuse rameuse paniculée : à rameaux filiformes; feuilles très-petites, ovales, den- tées, l'ecourbées, décurrentes; fl. solitaires.

... cap de Bonne-Espérance. b

a;81. ROELLE mouffete. Did.

herbacée diffuse, à feuilles ovales dentées refléchies, fleurs terminales solitaires.

L. n. le cap de Bonne-Espér. Feuilles glabres.

2582. ROELLE decurrente. Did.

R. herbacée, à feuilles lancéolées ciliées dé currentes.

L. n. le cap de Bonne-Espérance.

Peric. Cipula cylindracoa, ciyce coromta » unilocularis vel biloculjris, a^Ice j'oramin© ioc niscens.

Sem. iiuniero fa, angulata.

Conspectus specierum.

2576. ROELLA ciliata. T. 123. F. r.

R. fruticulosa, foliis linearis-subulatis ciliatis; mucrone recto : floribus terminalibus so- litariis.

Ex Africa. b Hort. cl. f. t. 3J.

2577. ROELLA reticulata.

R. fruticulosa (?), foliis strictis ciliatis: mucrone reflexo.

E capite B. S} ei. Petiv. m u/I xi. F. i5y. Con eria ciliaris. habitus.

2578. ROELLA spicata.

R. fruticosa erecta, foliis lanceolatis ciliatis, floribus terminalibus subspicatis.

E cap. Bonae Spei. L. f. suppl. 143.

2579. ROELLA squarrosa.

R. herbacea diffusa, foliis ovatis recurvatis dentatis, floribus terminalibus aggregatis.

E cap. Bonae Spei. L. f. suppl. 143.

2580. ROELLA filiformis. T. 123. F. 2.

R. fruticulosa, remolo-paniculata: ramis fili- formibus; foliis minimis evans dentatis re- curvis decurrentibus; floribus foliariis.

E cap. Bonae Spei. b R. squarrosa. Berg. cap. F. 42.

2581. ROELLA muscosa.

R. herbacea diffusa, foliis ovatis dentatis re- flexis, floribus terminalibus foliariis.

E cap. Bonae Spei. L. f. suppl. 143. Conser- cum præed.

2582. ROELLA decurrentis.

R. herbacea, foliis lanceolatis decur- rentibus.

E cap. Bonae Spei. © L'herit. sert. angl - C I?

Explication des figures.

Pl. 123. F. 1. ROTELLE ciliée. (a) Plante de grandeur naturelle, dont on a supprimé la partie inférieure. (b) Fleur séparée. (c) Calice couronnant le fruit. (d) Corolle. (e) Étamines. (f) Style. (g) Capsule environnée de petites feuilles. (h) La même mitre à nue. (b & i) Sa coupe longitudinale & transversale. (l) Semences sèches. (m) Semences coupées en travers. (n) La même coupée longitudinalement.

Pl. 123. F. 2. ROTELLE filiforme. Portion de la plante, de grandeur naturelle. Figurée d'après le sec.

347. RAPONCULE.

Caract. effent.

Cor. en roue, partagée en cinq découvertes linéaires. Capsule inf. à deux ou trois loges.

Caract. sur.

Cal. su. étrier, monophylle, partagé en cinq découp. pointues, demi-ouvertes.

flr. monopétale, en roue, ouverte, partagée en cinq découp. linéaires étroites recourbées.

Étam. Cinq filamenta, plus court. que la corolle. Anthères oblongues.

Pist. Ovaire inférieur. Style filiforme, de la longueur de la corolle, recourbé. Stigmate bi- ou trilobé, oblong, roulé.

Peric. Capsule arrondie, couronnée par le calice, à deux ou trois loges, s'ouvrant de chaque côté par un trou.

Sem. nombreuses, petites, arrondies.

Tableau des espèces.

2583. RAPONCULE pauciflora. D'Or.

R. à tête feuillée, toutes les feuilles lancolées.

L. n. les Alpes de la Suisse, &c. 25

2584. RAPONCULE hémisphérique. Did.

R. à tête arrondie, feuilles linéaires étroites très-entières.

L. a, 1c. montagn. de la France, la Suisse, &c. 25

Explicatio Icohum.

Tab. 123. f. 1. ROTELLA ciliata. (a) Planta magnitudine naturali, pars inferiore remota. (b) flos separatus. (c) Calyx fructum coronans. (d) Corolla. (e) Stamna. (f) Stylus. (g) Capsula foliis circumvalata. (h) Idem demidata. (i & l) Flos sectio longitudinalis & transversalis. (l) Semina soluta. (m) Semen transversè secum. (n) Ejusdem sectio longitudinalis. Fig. ex Gerna.

Tab. 123. f. 2. ROTELLA filiformis. Pars plant. X > Kuglit naturali. Fig. ex Sicc.

347. PHYTEUMA.

Charact. effent.

Cor. rotata, 5-partita: laciniis linearibus, tipis inf. 2 3-locularis.

Charact. nat.

Col. superus, monophyllus, quinquepartitus; laciniis acutis, erecto-patentibus.

Cor. monopetala, rotata, patens, quinquepartita: laciniis linearibus angustis recurvis.

Stam. filamenta quisque, corolla breviora. Antheræ oblongæ.

Pist. germen inferius. Stylus filiformis longitudinalis corollæ, recurvus. Stigma 2 seu 3. fidum, oblongum revolutum.

Peric. capsula subrotunda, calyce coronata, bisetum trilocularis, utrinque foramine latetali deliquescentia.

Sem. plurima, parva, subrotunda.

Conspectus specierum.

2583. PHYTEUMA pauciflora.

Ph. capitulo foliolo, foliis omnibus lanceolatis.

In alpibus Helvetiis, &c. 25

2584. PHYTEUMA hemisphaerica. t. 124. f. 2.

Ph. capitulo subrotundo, foliis linearibus angustis integerrimis.

In alpibus Galliæ, Helvetiæ, &c. 25

S PJ NTANDRIE MONOGYN m.

2. \$. RAPONCULE ovale. Dic.

R. à tête ovale, feuilles linéaires-lancéolées avec des dents rares, bractées linéaires.

L. n. !< Alpes du Djuiihinc, du Piémont, &c. ♀ Tige haute d'un pied. Fl. bleues.

2586. RAPONCULE orbiculaire. Dic.

R. à tête arrondie, feuilles dentées ; les radicales en cœur pétiolées ; les supér. sessiles.

L. n. les montagnes de h France, Ja Suisse, &c. ♀

fl. la aième a feu i lies caalii es linéaires.

2587. RAPONCULE elliptique. Dic.

R. à tête arrondie, feuilles dentées ciliées : les inférieures oblongues-elliptiques à longs pétioles ; les sup. sessiles.

L. n. les Alpes du Dauphiné & de la Suisse. Bractées courtes, un peu élargies en cœur.

2588. RAPONCULE feuille de bétaine. Dic.

R. à feuilles radicales en cœur oblongues crênelées ; les caulinaires lancéolées, épiaoblong i. v. h s mont. du Dauphiné. ♀ N'est-ce pas une variété de la suivante ?

2589. RAPONCULE à épi. Dic.

R. à épi conique oblong, feuilles radicales en cœur dentées, capillaires bilobulées.

L. n. les pâturages des montagnes. ♀ Enfouies érotées, linéaires.

2590. RAPONCULE colletée. Dic.

R. à faisceau terminal, sessile, environné de bractées en cœur ; feuilles dentées : les rad. presqu'en cœur.

L. n. les mont. du Dauphiné & de l'Italie. Elle varie à feuilles ovales.

2591. RAPONCULE pinnacé. Dic.

R. à feuilles épaisses, feuilles pinnées.

L. n. l'île de Candie. N'est-ce pas une lobée ?

2592. RAPONCULE bipinnacé. Dic.

R. à feuilles bipinnées dentées, grappes termin.

L. n. les environs de Canton. h Fl. Marcher. Eau lait, turbinée, percée, triloc. polyssp.

PEKTANDRIA MONOGYKIA.

2585. PHYTEUMA ovata.

Ph. capitulo ovato, foliis linearis lanceolatis rariter dentatis, bracteis linearibus.

In Alpibus Delph. 6c, Pcduei, ^ i Phyt. Scheuer. t. 39. f. 2. etiam. t. 7. f.

2586. PHYTEUMA orbicularis.

Ph. capitulo subrotundo, foliis ferratis : radicaibus cordatis petiolatis, fi{ r. ftflllibu*.

In alpibus Gillix, Helvetiae, &c. % Larrel. ic. 525.

t. eadem f. liis1cauribis lius. i³rt. C harmelli. Vill.

2587. PHYTEUMA elliptica.

Ph. capitulo subrombico, foliis ferratis ciliatis ; inferioribus oblongo-ellipticis longe petiolatis ; supremis sessilibus.

In alpibus Delph. & Helvetiae. Affinis precedenti, sed diffincta.

2588. PHYTEUMA betonicæfolia.

Ph. foliis russicibus cordato-oblongis frenatis ; caulinis lanceolatis, spica oblonga.

Ex alpibus Delphini. ♀ Villerj. vol. i, pag. 518. t. 12. Flores parvi.

2589. PHYTEUMA spicata. t. 1*4. r. 1.

Ph. spica conico-oblonga, foliis radicalibus cordatis ferratis, capulis bilocularibus.

In pascu. alpestribus. ♀ Vassat foliis maculatis, spicis cernuas & spicis ochroleucas.

2590. PHYTEUMA comosa.

Ph. fasciculo terminali, sessili, bracteis cordatis involucrato ; foliis dentatis : radicalibus subcordatis.

In alpibus Delphini & Italiæ. Pon. Bald. 177. Barbel. ic. 889.

2591. PHYTEUMA pinnata.

Ph. floribus fasciis, foliis pinnatis.

In Creta. Rapunc. petromarula. -J.B, 2. t. 812

2592. PHYTEUMA bipinnata.

Ph. foliis bipinnatis ferratis, racemis termin.

In suburbiis Cantonienibus. Lourcier. Fl. Coch. p. 172.

PENTANDRIE MONOGYNIE.

2593. RAPONCULE de Cochinchine. Dict.

R. à feuilles bipinnées ridées, péduncules divergents terminaux.

L. n. les montagnes de la Cochinch. h? Fl. blanches. Baie inf. arrondie, percées, uniloc. polyssp

Explication des fig.

Pl. 124. F. 1. RAPONCULE à épi. (a, b) Fleur vue en-dessus & postérieurement. (c) Fleur non-épanouie. (d) Etamine parée. (e) Calice, pistil. (f) La tige entière, courbée par le calice. (g) La même s'ouvrant de chaque côté par un trou. (h) Sa coupe transversale. (i) Une semence séparée. (l, m) Coupes du perisperm. (n) Embryon. (o) Partie supérieure de la plante. (p) Feuille radicale.

Pl. 124. F. 2. RAPONCULE hémisphérique. Représentée d'après le sec.

348. SÉVOLA.

Cara 1. effrni.

COB. hinfundibuliforme : à tube fendu d'un côté longitudinalement. Limbe latéral 5-fide. Drupe infér., à noyau 2-loculaire.

Cara 2. nat.

Cal. supérieur, très-court, quinquesfidé, persistant.

Cor. monopétale, irrégulière. Tube long, fendu d'un côté dans sa longueur. Limbe latéral, quinquesfidé : à découp. ovales-lancéolées membranées sur les bords.

Etam. Cinq filaments courts, capillaires, insérés au réceptacle. Anthères oblongues, droites, séparées.

Pist. Ovaire inférieur, ovale. Style filiforme, épaisse supérieurement, plus long que les étam. sortant par la fente du tube, courbé vers le limbe. Stigmate aplati, velu.

Peric. Drupe arrondi, ombiliqué, uniloculaire, Noyau tuberculeux, ridé, ovale, biloculaire, dispersé.

Sem. ovoides, solitaires.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 69

2593. PHYTEUMA Cochinchinensis.

Ph. foliis bipinnatis rugosis, pedunculis divaricatis terminalibus.

In montibus Cochinchinæ. L'heureir. Fl. Coch. p. 172.

Explicatio iconum.

Tab. 124. F. 1. PHYTEUMA fructuosa. (a, b) Flos superius petiolaris vallis. (c) Flos non-expansus. (d) Stamen separatum. (e) Calix, pistillum. Fig. ex Tenuif. & ex Secco. (f) Capilla integra, calice coronata. (g) Eadem fornicata, illa utraque latera dentata. (h) Ligula sectio transversalis. (i) Semen separatum. (l, m) Peripheria sectionis. (n) Embryo. Fig. ex Gartz. (o) Pars superior plantæ. (p) Folium radicale.

Tab. 124. f. 2. PHYTEUMA hemisphaerica. Fig. ex Secco.

349. SKVOLA.

Charact. effrni.

Cor. infundibuliformis : tubo hinc longitudinaliter filio ; limbo laterali 5-fido. Drupa infera : nucleo 2-loculari.

Charact. nat.

Cal. superus, brevissimus*, quinquesfidus, persistens.

Cor. monopetala, inæqualis. Tubus longus, hinc longitudinaliter fissus. Limbus lateralis, quinquesfidus; laciniis ovato-lanceolatis, membranaceis.

Stam. filamenta quinque, brevia, capillaria, receptaculo infera. Antheræ diffunditæ, oblongæ, credidæ.

Pistil. germin. inferum, ovatum. Stylus filiformis, luteus crassior, flaminibus longior, è fistula egressus, versus limbum incurvatus. Stigma complanatum, villosum.

Peric. drupa subrotunda, umbilicata, unilocularis. Nux tuberculata rugosa, ovata, bilocularis, dilatata.

Sem. obovata, solitaria.

7°. PENTANDRIA MONOGYNIE.

Tableau des espèces.

2594. **SÈVOL** de plumier. Did.

s. à feuilles ovoïdes très entières aliœ
cadiœ, drupes lisses.

X. n. les Antilles, le Sénégal, &c. b. *Arbuste*
non lait ux, à feuilles alternes. *Ses fruits*,
ni anguleux, ni toruleux, ne sont point
couronnés par le calice.

2595. **SÈVOLA** des Indes. Dift.

s. à feuilles ovoïdes à crénures ondulées
au sommet, calice persillant, drupes toruleux,

L. n. les Indes orientales. b. *Fleurs des dichoto-*
mies pédicellées. Fruits couronnés par le cal.

Explication des fig.

Pl. 124. F. 1. **SÈVOLA** de plumier. (a, b) Fleur vue de chaque côté. (c) Étamines, pilos. (x) Drupe entier. (e) Le même ayant son bout coupé transversalement. (f) Nouveau coupé. (g) Le même rongué.

Pl. 124. F. 2. **SÈVOLA** des Indes. (a) Partie de la plante d'après le sec. (b) Frukt entier. (c) Le même coupé. (e) Noyau découvert. (e, f) Semences. (g, h) Les mêmes coupées. (i) Embryon séparé.

349. DEF FORGE,

Caract. effant.

CAL. turbiné 5-fidé. 5-pétales. Stigmate à deux lobes. CAP. semi-inferior, acuminée par le style partagé en deux, 2-locaire, polyperme.

Caract. nat.

Cal. turbiné, semi-quinquefidus : à découp. lancéolées ouvertes caduques.

Cor. Cinq pétales, ovales-lancéolés, un peu plus longs que le calice, presque cohérents à leur base.

Etam. Cinq filamenta filiformes, alternes aux pétales, de la long. du calice. Anthères oblongues.

Pist. Ovaire demi-inérieur, ovale-conique. Style de la longueur des étamines. Stigm. à deux lobes.

PENTANDRIA MCWOGYNIA.

Conspicuus speciem.

2594. **SCÈVOLA** plumerii. t. 123. f. i.
S. foliis obovatis imarginatis, calyce decli-
duo, drupis lœvibus.

In ins. Caraïbes, Sénégal, &c. b. *Lobelia.*
Plum. Burn. Amer. t. 165. f. 1. Pedunculi
dichotomi. Flores en dichotomiis sessiles.

2595. **SCÈVOLA** Konigii. t. 124. f. 2.
S. foliis obovatis superne crenato-repandis,
calyce persistente, drupis torosis.

In Indiis orientalibus. b. *wahl Symb. 3. p.*
36. lobelia tascada. Gartn. t. 25.

Explicatio iconum.

Tab. 124. f. 1. **SCÈVOLA** plumerii. (a, b) Flos utroque latere visus. (c) Semina, pilosum. (d) Drupa integra. (e) Eadem capsula trapeziformis dissecta. (f) Nux separata. (g) Eadem rupicata. Fig. ex Plum.

Tab. 124. F. 2. **SCÈVOLA** Konigii. (a) Pars plantæ ex Sicc. (b) Fructus integrus. (c) Idem dissectus. (d) Semen decorticatum. (e, f) Semina. (g, h) Eadem dissecta. (i) Embryo separatus. Fig. ex Gartzero.

349. DEF FORGIA.

Charact. effant.

Cal. turbinatus 5-fidus. Petala 5. Stigma 2-lo-
bum. Capsula semi infera, stylus >*-partito acu-
minata, 2-locaialis, polyperma.

Charact. nat.

Cal. turbinatus, semi-quinquefidus: lacinia lanceolatis patentibus deciduis.

Cor. petala quinque, ovato-lanceolata, calyce
paucis longiora, basi subcoherentia.

Stam. filamenta quinque, filiformia, petalis al-
terna, longitudine calycis. Anthere oblongæ.

Pist. germen semi-inferum, ovato-coni euro.
Style longitudine staminum. Stigm. 1-
lobum.

PENTANDRIE MONOGYNIE.

Peri. Capsule semi-inferior, acuminate par le qui est partagé en deux & percée, bilobata-irc.

Sim. nombrufx

Tableau des espèces.

2596. DEFFORGIA de Bourbon.

L. n. l'île tic Boui^{on}. In Com. arbore, gine, dans toutes ses parties. *F.* alt. lanceées-ovales, dentelées paniculées à terminales.

Explication des figures.

n. 125. DEFFORGIA de Bourbon. (a) Ramus chargé de fleurs. (b) Fleur non-épanouie. (c) Fleur entière, ouverte. (d) Calice, étamines, pétal. (e) Femelle safranée. (f) Calice, pétal. (g) Capsule acuminate par le style. (h) La même coupée en travers.

350. ESCALCNE.

Camci. ejus.

C. à cinq dents, persistant. Cinq pétales, lingulés. Stig. en tête aplatie. Baie semi-inferieure, 2-loculaire, polysperme.

Caract. nat.

Cal. monophylle, à cinq dents, demi-supérieur, persistant.

Cor. Cinq pétales lingulés, obtus, plus longs que le calice, ouverts.

Etam. Cinq staminis, montant entre les pétales, plus courts que les pétales. Anthères ovales, marquées d'un sillon.

Pist. ovaire demi-inérieur, arrondi. Style droit, épais, court, persistant. Stigmate en tête aplatie.

Peric. Baie demi-inferieure, arrondie, entourée par le calice, biloculaire, operculée.

Sem. nombreuses, petites, enfoncées dans la pulpe.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 71

Peri. Capsule semi-infera, styllo 2 partito per filum acuminata, bilocularis.

Sem. numerosa,

Consp:us specterum.

2596. DEFFORGIA Bourbonica. t. 125.

Ex insula Bourbonica. In Arbor, in omnibus partitionibus glabra. Folij alt. lanceolato-ovata, serrata. Forgefia Juss. gen. pl. 164.

Explicatio iconum.

Tab. 125. DEFFORGIA Bourbonica. (a) Ramulus floribus non-expansis. (b) Flos non-expansus. (c) Flos integrus expansus. (d) Calyx, staminis, pistillum. (e) Stamen separatus. (f) Calyx, pistillum. (g) Capsula styllo acuminata. (h) Eadem transversim secta.

350. ESCALOKIA.

Charact. Effent.

Cal. 5-dentatus, persistens. Petala 5, lingulati. Stigma capitato-depressum. Bicc:t ferr. infera, 2-locularis, polysperma.

Charact. nat.

Cal. monophyllus, quinquelobatus, firmi-supinus, persistens.

Cor. petala quinque, lingulata, obtusa, calyce longiora, patentia.

Etam. Elementa quinque, inter petala adscendentia, petalis breviora. Antherae ovatae, sulco exaratae.

Pist. germin semi-inferum, subrotundum. Stylus erectus, crassus, brevis, persistens. Stigma capitulo-depressum.

Peric. B.tcca semi-infera, subrotunda, calyce cincta, bilocularis, operculata.

Sen. nuuictofa y parra, al dulantia.

Tableau des espèces.

*S9'7- ESCALLONE *dentelie.*,

L. n. TAmérique mérid. au détroit de Magellan, "b Com. Atbi'Ile très-rameux , ay ant h port d'une airelle. Cefl peut*stre U mme que VEfcallone myrtilloide. Di3. vol. %. p. 395.

351. PAYROLE,

Cora H. eff<nt.

CAL. inf. partagé en cinq. Cinq pétales connivens en tube , réfléchis au flammes. Siigm. à deux lobes. Péric. biioculaire.

CaraQ. nat.

Cal. monophyile, prof, divisé en cinq découpures ovales pointues.

Cor. Cinq pétales, presque réguliers, oblongs, droits, connivents en tube; à l'ouverture réfléchis, dont un plus large est échaudré.

Etam. Cinq filaments plus courts que la corolle , inférés au réceptacle , droits. Anthères ovales , à deux loges,

PiJL. Ovaire supérieur , arrondi. Style de la long, des étamines*. Stigmate à deux lames.

Perk. . . . biioculaire.

Son.

Tableau des espèces.

2f\$. PAYROLE de la Guiane. Dift.

Z. « les forêts de la Guyane. T> A'brijJ'. afeuill. alternes. Grappes axillaires, courtes. FLjaun.

Explication des fig.

Pl. iz;. PAYROLE de la Guiane. (a) Ratneau muni de feuilles et de grappes. (b) Fleur non-ouverte. (c) Fleur épanouie. (d) Calice, étamines, pétal. (e) Calice, étamines (f) Etamine (mauv. fig.) (g) Calice, pétal. (h) Pétal séparé.

*Con/péclus speclcrum**

2597* FSCALLONIA /errata.

In Araericamerid. in freto Magellanico. T> Smith, icon. pi. fac. x. p. \$z. Conf cum Efcallonia myrtilloides. L f. Jüpp. p. 257. Genius deftigla proxirnum.

351. PAYROLA.

CharaSt. effervt.

CAL. infer US , f-partitus. Petala y in tubum conniventia , alicie reflexa. Stig. 2-lobum. Pericarp, biiocuiare.

Charact. nat.

Cal. monophyllus , quinquepartitus : laciniis ovatis acutis.

Cor. petala quinque, fuhaequalia , oblonga , ere&i , in tubum connivencia; apicibus reflexis , uno majori emarginato.

Starn. filamenta quinque , corolla breviora ? receptaculo inierta , eretta. - Antheice ovata , biioculares.

Pift. gerumen fuperum , fubrotundum. Stylus lohitudine ftaminum. Stigma bilamellatum,

Perlc. . . . biiocuiare.

Son.

ConfpcSus fpccierum.

25-58. PAYROLA Guianenfis.

In fylvis Guianae. T> Aubl. Guy an. p. 249. t. pp. fruttsxfol. alierms. Racemuli axillares.

Explicatio içon urn.

Tab. iif. PAYROLA Guyanenfis. (a) Ramulus cum foliis fr floribus. (b) Flos mapertus. (c) Flos exppn-fus. (d) Calyx ftamina , peltatum. (e) Calyx, ftamina. (f) Stamen, (g) Calyx, peltatum.(A) Peltatum separacunu Fig. ex Aubl.

352. TRACHELB.

CaraSt. effent.

COR. infundibuliforme, Singmate globuleux.
Capule inlériure, j-locul&ke,

CaraU. nat.

Cal. supcrieur, trts-peim, psrtagc en cinq.

Cor. monopetale, inrundibuliforma. Tube cylindracé, très-long, très-menu. Limbe petii, paruge en cinq dco up. ovales, aim-tes.

Etiim. cinq iilampnsc^iliaires, de la longueur de la corutle. Amhirds arrondics.

Pip. ovaire inferleur, trigone, arrondi. Style filiforuw, une fois plus long que la corotle. Stigne gloUulcux.

Perk. capule arrondie, obtufément triJotée, triloculaire, s'ouvrant à la bufe par 3 trous.

Sem. nombfcufes, trcs-pcties.

Tableau des ejpeces.

3S99- TRACMELE *bhut.* Di<5.

Tr, raineufc, droiie ; a feuifle* ovales, den-
Uss, planes, flcurs en cor-

L. n. L*ial. let-ev. dam Iw liux couvens. tf-

atfoo. TR.ACUTILE à stiles mtnwu. Dift.
Tr. un jL-11 druite, a f, Lineaires ciliées his-
j-tdeci.

L n. le cap de Bonne-Eff^rance.

z6at. TKACHELE difufi. Difl.
Tr. ;u's-ramcule, dieule; à rtnwBtt Jivcr-
gens recourbés, feuilles fiibulves.

L. a. le cap de Eonne-Erprrance.

Explication des fig.

Pi. iifi. TKACMIII MMW, M Fleur entifere. (i> La
mfine I coroll dicoupee. (c) Calice, ptilil. (a) Cap-
ful- emière. (<) La mime coupe iianlverUicmeuc.
(/) fiett^{nes}.

Qbfirv. Supprime/, le genre Klmmie. La plant*, i'éta-
blement ftoreculcufe, doit due rappuncc aux eupatoires.

Botaniq II.: Toms II.

JJ-2. TRACHEL IUM.

CharaS. effent.

Con. ijifundibulif^mis. Stigmi globofum.
Capfula infera, uiloculris.

Chara3. net,

Cul. fupcrus, minimus ; quinqupartitus.

COT. [noi!o;ilindracs, long:Llinius, ti/uiflim. limb, parv.
quiuepartitus; jciiiisovatis, patuiis.

Stam. filamenta quinquecapj capiluria, loogiludine
coroilcc. Antheræ subrotunda.

Pif. gti men inferum, triquetr o-fubrotuni!um.
Stylus tiiifonim, corolla dujilo - ion^ior.
Sugtua gbb1um.

Pfr<>.capfulafiibyotunda,obtufc triloba, trilocu-
lrb, irb ui brini b d b inf m dhifcens.

Sent. numcrofa, minima.

Conspeclusfpecierum.

25\$. TRACHEL1UM carni&tim. t. 126.

Tr. runofum ereduni, Joiiis ovaiis icratii
planis, Huribus corymbofis.

ID Iulix & Orichtuisumbrofis. &

3600. TRACHRLIUM *tenuifolium.*

Tr. eteAiufculum, folia iiuearibus eiliaib
hifpidit.

E ay, B. Sjei. *L.f.fup,* I^.THHRLJI.C. 38.

2601. TRACHEL1UM *d-fufum,*

Tr. mnol"illimi, diffusum; ramis diviriLatis
recurvis, foliis fubulatis.

E cap. BomeS[t]. L.j'.fuj-p. 1^3. Thunb. ibh.

Ex pliatio iconurn*

Tab. 116. TRACOTtoi~~c carafe~~. (a) Flo* integer.
(b) E idem cotolla ~~diffusa~~, (c) Ca|yx, pilUUuin. (d)
CapruU iri~~gr~~- .(.) IUDem it^ufvetliiu fcita. (/) Se-
tnlui. h ig. tx Toiirntf.

Obf. Genus Khuni t deteaWfi PUau, vert- fiofculofa,
ad tupatojia referendj tit.

K

353. CONOCARPE.

Caraft. effent.

Fleurs ramassées. Cal. fup. partagé en cinq.
Cor. o. Cap. nombreuses, i-fyermes, att. à
un axe commun, & embriqués en cône.

CaraQ. nat.

Cal. supérieur, monophylle, très-petit, par-
tagé en cinq découp. pointues, droites.

Cor. aucune.

Etam. Cinq filaments fubulés, droits. Anthères
globuleuses*

Pifl. Ovaire inférieur, comprimé, obtus. Style
Ample, couit. Stigmate obtus.

Péric. Capule très-petit, arrondie, compri-
mée, convexe & gibbeuse-deflus, concave
en-deflbus, à bord membraneux de chqur
côté, ne s'ouvrant point, uniloculaire.

Sem. une feule, ovoïde.

*Des capulcs nombreuses, embriquées en un cône
ovale-globuleux, confluent le fruit.*

Tableau des espèces.

*602. CONOCARPE droit.

C. droit, à feuilles lancéolées, cônes panicu-
lés & pédicelés.

L. n. l'Afrique & les pays chauds de l'Amé-
rique, aux lieux maritimes. f^t *Manglier*
droit. Did. 3. p. 6\$%.

2603. CONOCARPE couché.

C. couché, à feuilles ovoides; cônes presqu'en
grappe, fdfliiles.

L. n. les lieux marit. de Hie de Cuba & de la
Martin. f^t *Manglier couché*. Did. 3. p. 6\$%.

354. BRUNIE.

CharaS. effent.

FL aggrég&s. Cal. fu{ érieur, à ; divisions. j
(ctales, onguicul. caj^f. très-petites, 2-locul.

3S3. CONOCARPUS.

CharaS. effent.

Flores aggregati. Cal. fuperus, y-partitus. Cor.
O. Capf. plurimse, i-fpermae, axicommuni
affixce _y in conum imbricaix.

CharaS. nat.

Cal. fuperus, monophyllus, minimus, quinque
partitus: laciniis acutis eredis.

Cor. nulla.

Stam. filamenta quinque, fubulata > ereda.
Anther< globoise.

Pifl. germe inferum, corr> refluum, obtufum.
Stylus (implex, brevis. Siigma obtufum.

Peric. Capula minima, r.tundata, comprefla,
fiipernè convexa & gibba, inferne concava,
marginé utrinque membr|naceo, non dehif-
cens, unilocularis.

Senin unicum, obovatum.

*Capulcs plwimcB in conum ovato-globofum im-
brkates &axi comm. affixes, frust. constituant.*

Conpus specierum.

2602. CONOCARPUS ereSa. t. 12.6. f. 1.

C. ereda, foliis lanceolatis, conis panicula-
tis, pedicellatiq.

Ex Africa & America calidore, in maritimis.
T). Arbor ereSa. Folia acuta. Fl. fub-
lutei.

2603. CONOCARPUS procumbens. 1.126. f. 2.

C. procumbens, foliis obovatisj conis fub-
racemofis, fcfluiibus.

In maritimis Cubæ & Martinics. I) Frutex
procumbens. Folia oltifa.

354. BRUNIA.

CharaS. effent.

Fl. aggregati. Cal. fuperus, jr-partitus. Petala f_y
unguiculau, Capf* tunimse, 2-loculares,

PENTANDFUE MONOOYNIE.

Caract. nat.

Cal commun polyphylle, arrondi, embriqué, multiflore : à folioles ovales-iandolées,

Bropr monophylle, supérieur, quinquefide > pointu, perfiftant.

Cor. Cinq pétales onguiculés, ovoïdes.

Etarn. Cinqfilamens capillaires, inférés aux onglets des pétales. Anthères ovales-oblongues.

Pijl. Ovaire inférieur, turbiné ? ptibefcem. Deux ftyles rapprochés, capillaires. Stigmates obtus.

Peric. Drupe fee, inférieur, très-petit, tomentueux, biloculaire.

Sen. en petit nombre, comprimées.

Receptacle commun muni de paillettes, velu.

Tableau des espèces.

* *Têtes globuleuses* > *non-feuillées*.

2604. BRUNIE *nodiflore*. Did. I, p. 474.

B. à feuilles embriquées, trigones, pointues, droites, cquarbées en-dedans.

L. n. le cap de B.-Efper. "5 Feuilles courtes, glabres. Têtes frusifères laineuses.

2605. BRUNIE à *paillettes*. D&. n°.. 2.

B. à feuilles trigones ferrées embriquées sur cinq rangées; têtes à paillettes faillantes ? colorées.

L. n. le cap de Bonne-Efperance T> •

*606. BRUNIE *lamagineuse*. Did. n°. 4.

B. à feuilles linéaires trcs-menues ouvertes calleufes au sommet; rameaux pileux, lanugineux; têtes nues globuleuses,

L. n. FAfrique. T> *Etam. ccurtes*.

2607. BRUNIE *abrotanoide*. Di&. n°. 3.

B. à feuilles lancéolées glabres ouvertes réfléchies; têtes globul. nues^prefqu'etipanicule*

L. a. TAfrique. "b F. calleufes au sommet.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

n

Charact. nat.

CaU communis polyphyllus,fubrotundus, imbricaius, multifloius ; foliois ovato-lanceolacis-

Proprius monophyllus, fuperus, quinquefidus^ acutus, eredus, perfiftans.

Cor. petala quinque, unguiculata, obovata.

Stam, filamenta quinque, capillaria, unguibus pctalorutn infcrta, Amheise **ovato-oblonge**.

Pifl. germen inferum, turbinatum, pubefcens. Sryli duo, ap^roimiati, capillares. Stigmata obiufa.

Peric. drupaexfucc^, infera, minima, tomentofa, bilocularis.

Sem. pauca, compreflfa.

Receptaeulum commune paleaceum, villofum.

ConJpeSus specierum.

* *Capitalis globosus* aphyllis.

2604. BRUNIA *nodiflora*. U 126.

B. foliis imbricatis, triquetris, **acutis, ereditis**, fubincurvis.

E cap. Bonce Spei. T> *Germeu ctrte inferum*. Stam, pmlonga.

260f. BRUNIA *paleacea*.

B. foliis trigonis quinquefariam imbricatfs adpreflis, palcis capitulorum exfertis coloratis.

E cap. Bonae Spei. T> *Berg. cap. yd.*

2606. BRUNIA *lanuginosa*.

B. foliis linearibus tenuiflimis patulis apicē callofis; ramulis pilofo-ianuginofis, capitulis globofis nudis.

Ex Africa. T> *Pluk. t. 3 iff./ 4.*

2607. BRUNIA *ahrotanoides*.

B. foliis lanceolatē glabris patent-reflexis, capitulis globofis nudis fubpaniculatis.

tx Africa. hBurm. afr. 1.100. f. 1.

Ka

76 PENTANDRIE MONOGYNIE.

2608. BRUNIE *verticillie*. Dift. n°. 7.

B. à feuilles trigones obtusiflues glabres; rameaux verticillés en dîne, têtes glabres terminées.

L. JI, le cap de Bonne-Espérance.

* * A tins dont le calice commun grand & coloré y forme une collerette.

Les fiaves.

2609- BRUNIE *radiée*. Dia. n°. 8.

B. à feuilles linéaires-lancéolées trigones, racine pubescentes, calice radié à folioles int. colorées.

L. n. cap de B.-E/peř. T> *F. calleufes au somm.*

2610. BRUNIE *glutineufe*. Did. fuppL

B. à feuilles linéaires trigones, rameaux glabres, calice radié à feuilles toutes colorées.

L. n. le cap de B.-E/peř. T> *Elle a les feuilles & ses bractées plus longues que dans la précédente, & ses têtes glutineuses.*

Explication des fig.

91* xif* BRUNIE *nodiflora*. (a) Fruit ou tête fructifière. (^). Récept. commun mis 3 nud. (c) Paillette du réceptacle, (d) Drupe couronnée par le calice. (e) Pétales ongulés. (/) Eram. en rameau. (g) Drupe. (h) Sà coupe transversale. (l) La même ouverte dans sa longueur pour montrer la situation des femences sur le placenta. (0) Sentences (éparées).

355. F H Y L I Q U E.

*CaraS. effent**

CAL. Aipérieur, ay divilions. % pétales très-petits. Capf. inférieure, couronnée, à 3 coques, femences solitaires.

Caracl. nat.

Fleurs subaggregées, le plus souvent ramassées en mèche.

Cal. superus, turbiné, 5-fidé, tomenteux en-dehors.

Cor. Cinq pétales très-petits, squamiformes.

Etam. Cinq filaments très-petits, inférés sous les pétales. Anthères simple*.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

260S. BRUNIA *verticillata*.

B. foliis triquetris obtusifluis glabris, ramulis verticillatis aigiatis^ capitulo lisglabristern) in alibus.

E cap. Bonce Spei. l> *Lffuppl. if 6.*

** *Capitulis calyce communi ampliato colora* toque involucratis.*

Stavia.

2609. BRUNIA *radiata*.

B. foliis linearis-lanceolatis triquetris, ramulis pubescens, calyce radiante foliolis immissis coloratis*

E cap. Bonse Spei. T> *Breyn. cent. t. 8z.*

2610. BRUNIA *gtutinosa*.

B. foliis linearibus triquetris, ramulis glabris, calyce radiante, foliolis omnibus coloratis.

E cap. Bonse Spei. T> *Prccedntivalde affinis, fed dijtinda videtur.*

Explicatio iconum.

Tab. xi6. BRUNIA *nodiflora*. (a) Fruitus integer^ (i) Receptaculum commune denudatum. (c) Palea receptaculi. (d) Drupa catyce coronata. (c) Petala unguiculata. (/) Stamina clavata. (g) Drupa. (k) Ejus efflo transversalis. (i) Eadem longit. dinalter aperta, cum feminum fita in receptaculo. (/) Semina separata. Fig. ex Gctrtn.

355. P H Y L I C A.

CharaU. effent.

CAL. superus, y-partitus. Petala \$, minima. Capf. inféra, coronata, 3-cocca. Seminibus folitariis.

Char ad. nat.

Flores subaggregati, sepius confertocapitati.

Cal. Superus, turbinatus, 5-fidus, externè tomentofus.

Cor. petala jT, minima, squamiformia.

Stam. filamenta 5, minima, sub petalis infera* Amhcrae simplices.

Pift. Ovaire inférieure. Style simple. Stigmate obtus.

Piric Capule inférieure, arrondie, couronnée, quelquefois bacciforme, à 3 coques bivalves.

Sent. Solitaires, presque ovales, ayant un ombilic faillant.

Tableau des espèces.

z6u. PHYLIQUE ericoide. Dift.

Ph. à feuilles linéaires subverticillées, rameaux florifères courts à têtes blanches cotonneuses,

L. n. le cap de B.-Efp. T> *Petit aibnjeau en buffign toujoutrs verd& enfleurespendant Vhiv.*

2,612. PHYLIQUE fiipulaire. Did.

Ph. à feuilles linéaires éparfes avec dei flupies, diviliions calycinale corniformes lai-neufes en-dehors.

L. /. lecap deB -Efpe'.* *B *Stipules fubulies.*

2613. PHYLIQUE luifante. Did.

Ph. k feuilles linéaires courtes ouvertes lui-fantes en-deffus : Jés florales lanugineufes ; têtes ovales.

L. n. le cap de Bonne-Efperiance. T> *Rameaux divifeś courts prolifères. Pétioles lanugineux.*

2614. PHYLIQUE à f. deromarin. Diét.

Ph. à feuilles linéaires un peu planes droites blanches en-defibus, têtes ovales tomenteufes.

L. n. le cap de B.-Efp. T> *Feuilles à bords légèrement routés en-deffous.*

261 y. PHYLIQUE axillaire. Did.

Ph. à feuilles linéaires * lancéolées blanches cn-defibus, fleurs séparées, grappes feuillées terminales.

L.n.... lejardindeParis. T> *ArbrijJeade2 à %pieds , à rameaux tdekes, redreffis^ divifés.*

***6i6. PHYLIQUE if. depin.** Di&.

Ph. à feuilles linéaires étroites planes glabres des deux côtés, fl.glabres en grappes panicuL

L. n. le cap de Bonne-Efperiance. T> *Arbrij de \$ à 6 pieds ; grappes de fleurs enpanicules terminates, comme dans diverfespiries.*

Pi/?, germen inferum. Stylus simplex. Stigma obtufum.

Peric. capula infera, fubrotunda, coronata, interdūmfubbaccata, tricocca: coccis bivalv.

Sem. folitaria ? fubovata, hilo prominulo notata.

ConfpeSus fpecierum.

2611. PHYLICA ericoides. t. 127. f. 1.

Ph. foliis linearibus subverticillatis, ramulis floriferis brevibus, capitulis tomentofoincanit.

E cap. Bonae Spei. T> *Frutexfafquipedalis ramojiflimus, erictfformis Jimpervivens**

±612. ?HYIACA JHpuclaris.

Ph. foliis linearibus fpariis flipulatis * divifuris calycinis corniformibus extus lanuginofis.

E cap. Bonas Spei. "b Burnt: afr. t.f.t.f 2.

2613. PHYLICA nitida. n.

Ph. foliis linearibus brevibus patulis supernc nitidis : floralibus lanuginofis, capitulis ovatis.

E cap. Bonae Spei. T> *Sonnerat. Folia marginib. revol. Petiolilanuginof An ph. eriophorosiAit.*

2614. PHYLICA rofmarinifolia. n.

Ph. foliis linearibus planiufculis fubtus incanis ereAis, capitulis ovatis tomentofis.

E capite Bonac Spei. T> *Sonnerat. Folia lortgiujcula, augusta subfeffdia.*

261 y. PHYLICA axillaris. n.

Ph. foliis linear-lanceolatis fubtus incanis floribus diflindis, racemis foliolis teiminalibus.

.... ex bortoParifiensi. T> *Fl. tomcentafifolitarii in axillis foliorum fuperiorum.*

2616. PHYLICA pintfolia.

Ph. foliis linearibus angullisplanisutrinque g]»bris, floribus glabris paniculato-racemofis.

E cap. B. Spei. T> *Sonnerat. Linn. f. fuppL iff. FoliapunSo callofo terminata. Calix scuriofus, corolla brevior. Conf. vahl. fymb. 3 p, ±u*

78 *ENTANDRIE MONOGYNIE.

1617. PHYLIQUE *d grappes*. Did.

Ph. à feuilles ovales glabres, fleurs simples en grappes paniculées.

Z. n. le cap de Bonne-Espérance T>

261%. PHYLIQUE *parviflore.pj&*.

Ph. à feuilles fubulées aiguës fabrées subpilosas, rameaux paniculés multifiores,

L. n. le cap de B.-Espinace T>

2619. PHYLIQUE. *tyre*. Dift.

Ph. à feuilles linéaires-lanceolées; celles des petits rameaux un peu hérissées, têtes terminales, feillées, fruitaires hérissées.

L. n. le cap de Bonne-Espérance. 1>

2620. PHYLIQUE *brunioide*. Dl&Ph. à feuilles¹ linéaires-fubulées glabres & comme ponduées en-deflatis, à bords roulés en-deflatis; rameaux florifères en corymbe, têtes terminales.L. n. le cap de Bonne-Espérance. T> *Elle a un peu le port de la brunie radiee*, n°. 2609.2621. PHYLIQUE *pubefcente*. Did.

Ph. à feuilles linéaires fubulées tomenteuses en-deflatis: celles des jeunes rameaux pileuses, épisplumcux, à bractées villeuses, filiformes.

L. n. le cap de Bonne-Esp. T> *Elle diffère de la suivante par ses plus étroites Ojesfi. en épis*.2622. PHYLIQUE *plumeufe*. DiS.

Ph. à feuilles bncéolées - fubulées blanches en-deflatis : les supérieures pileuses, têtes plumeufcs terninales.

Z. n. le cap de B.-Espinace. T> *Arbriff.de 3 pieds*.2623. PHYLIQUE *bicolor*. Di<9.

Ph. à feuilles linéaires pubefcentes, calices communs plus courts que les fleuris.

Jj. n. le cap de B.-Espinace. T> *Rameaux effusus, rouges & chargés d'un duvet blanc*.2624. PHYLIQUE à *i pi*. Dift.

Ph. à feuilles en cœur fagittées acuminées, tomenteuses en-deflatis glabres en defus, épis Jaineux.

Z. n. le cap de Bonne-Espérance T>

PENTANDRIA MONOGYNIA*

261^ PHYLICA *ratemofa*.

Ph. foliis ovatis glabris / floribus fimplicibus paniculato-racemciis. Lin.

E cap. Bonne Esp. T> *B&keae cordata*. Burnt, prod. ex D. Vah2618. PHYLICA *paniflora*.

Ph. foliis fubulatis acutis fabrbris subpilofis, ramis paniculato-multifloris. Lin.

E cap. Bonnes Spei. "5.

2619. myLICA *Jlrigofa*.

Ph. foliis linear-lanceolatis, ramulorum hirtifuto-fubl trigofis, capitulis terminalibus feltiti bus folitariis ftrigofis.

E cap. Bonae Spei. T> *Berg, cap, p. jo.*2620. PHYLICA *brunoides*. n.

Ph. foliis lineari-fubulatis fuperne glabris sub-pundatis margine revolutis, ramutis floriferis corymbofis*, capitulis terminalibus.

E cap. Bonae Spei. T> *Jof. Martin. Breyn. cent. r. 7. An phylica imberbbs't Berg, cap**2621. PHYLICA *pubefcens*. t. 127. f. 2.

Ph. foliis. Jineari-fubulatis fubtus tomentofis: ramulorum pilofis y fpicis plumofis, bradeis villofis filiformibus.

JE cap. Bonae Spei. "6 Sonnerat. An phylica pubefcens f Ait hort. Kew.

2622. PHYLICA *plumofa*.

Ph. foliis lanceolato - fubulatis fubtus incanis j fuperioribus pilofis, capitulis plumofis terminalibus.

£ cap. Bonae Spei. T> *Burnt, afr. t. 44. / - 3*2623. PHYLICA *bicolor*.

Ph. foliis linearibus pubefcentibus, calycibus communibus corolla brevioribus.

E cap. Bonnes Spei. T> *Ramiyirgati rufefcentes & albo-pubefcentes*. Lin.2624. VHYLICA *fpicata*. t. 127. f. 3.

Ph. foliis cordato - fagittatis fubtus romentofis supra glabris acuminatis y ffcis latnatis.

£ cap. Bonnes Spei. Ti Sonnerat. Lin. f. fuppl.

PENTANDRIE MONOGYNIE.

262;. PHYLIQUE *refleckie*. Did.

Ph. à feuilles en cœur, tomenteuses en défibus, papilleuses en-deffus, réfléchies: les fup. villeuses, têtes villeuses terminées.

L. n. le cap. de B. Efp. T> *Pétioles unpeu
Icngs i bords desf. refiuchis cn-dejjous.*

2626. PHYLIQUE en cœur. Did.

Ph. à feuilles en cœur-oyales un peu planes tomenteuses en deffoisi, tige prolifcre, tête pauciflores.

L. n. le cap de Bonne Esperance. T> *Les tites
de fl. femblent pèdonculees**

2627. PHYLIQUE/: debuis. Did.

Ph. à feuilles ovales-oblongues tomenteuses en-deffous, fleurs subglomérées.

L. n. le cap de B.-Erpérence T).

* PHYLIQUE (dioique) à feuilles en cœur , fleurs dioiques.

Explication des figures.

PI. 127. f. Z. PHYLIQUE *Iricoidt.* (a) Capfnle en *xirkre*. (A) La trême groffie. (fi) La même coupée en travers. (c_M d) Les j coques ferm^es, & une s'ouvrent plus grande que nature. (e,f) Semences séparées. (g\ k) Semence couple tranverfalement & longitudinalemc. (l) Sommite de la plante.

PI. I17. f. 2. PHYLIQUE *puhefcntc.*

PI. 127; f. j. PHYLIQUE *a tpL*

Fl. 127. f. A. PHYLIQUE *plumtufe*; («A) Capfule ombiliquée. (hb) Semences séparées. (t) Stmence coupée longitudinalement.

3S6. D I O S M A.

CaraSt. ejfent.

CAL. y-phylle. \$ pétales. Difque y-fide , envir. Tovaire. 3 à y ca;fules réunies. Semences à tuniques.

CaraS. nat.

Cal. Pentaphylle : à folioles ovales pointues periflantes.

Cor. Cinq pétales, oblongs-oyales, obtus, subonguiculés derri ouverts.

PENTANDRIA MONOGYNIA; 1\$

262s. PHYLICA *reflexa*.

Ph. foliis cordatis fubtus tomentofis suprà papillofis reflexis : fuperioribus villofis % capitulis villofis (erminalibus.

E cap, BoicE Spei. T> *Sonnerat. An ghylica
callofdt Lin.f.fuppl. i5\$**

2626. PHYLICA *cordata*.

Ph. foliis Gordatoovaiis planiusculis fubtus tomentofis , caule prolifer, capitulis paucifloris.

E cap. Bonae Spei. T> *Burnt, afr. t. jft.f. r.
Comm rar. t. 12.*

262J. PHYLICA *buxlfolia*.

Ph. foliis ovato oblongis fubtus tomentofis j fioribus subglomeratis. Ak. *Here. Kew.*

E cap. Bonse Spei. T>

* PHYLICA (dioica) foliis cordatis, floribus dioicis. *Lin.*

Explicatio iconum.

Tab. 127. f. I. PHYLICA éncoches, (a) Capfula Integra. (A; Eadero auda. (h) Eadein diffito. {c>d) Cocculi ires daufi & unus dehicens naturahbus major. (e>f) Seinina separata. (g>k) Semen tranfverte & (ongitudinaliter feaum. Fig. txD. Gmnn. (i) Summitas plantæ. Exficco.

Tab. 117. f. 2. PHYLICA pubefcens. Exficco.

Tab. 127. f. 3. PHYLICA fpUata. Ex ficco.

Tab. 127. f. 4. PHYLICA plumosa. (ak) Capful* umbilicata. (b b) Semina sepirata. (c) Semen lozigi-cudinaliter feaum. Fig. ex Gartn.

3f6. D I O S M A.

CharaS. ejfent.

CAL. jr-phylhis. Petala \$. Difcus y-fidus, germen cingens. Caj^f 3-; y coaliuc. Scm. ariliata.

Charact. nat.

CaL pentaphyllus; foliolis oyatis acutis perfittentibus*

Cor. petala quinque, oblongo-ovata, obtusa, subunguiculata citdo-patula.

So FENTANDRIE MONOGYNIE,

Un difque quinquefide ou à cinq parties envir.
l'ovaire,

Etam. Cinq filaments Tubules, aicernes avec les pétales, Anthères ovoïdes.

Fiji. Ovaire supérieur, environné par le difque adná à sa base, anguleux. Style simple. Stigmate en tête.

Ytric. Trois à cinq capsules ovales-acuminées, comprimées, réunies par leur bord inférieur, distantes par leurs sommets, s'ouvrant par leur future supérieure.

Sem. Solitaires, luisantes, renfornées chacune dans une tunique cartilagineuse qui se sépare d'un côté.

Tableau des espèces.

£628. DIOSMA *fcabre*. Did. n°. 1.

D. à feuilles opposées un peu épaiées linéaires-fubulées carinées, cabré sur les bords & sur le dos.

L. n. le cap de B.-Efp. T> *F*, canaliculées entrelacées.

2619. DIOSMA *a'*. *croi/e'es*. Did. n°. 2.

P. à feuilles courtes un peu épaiées trigones obtuses glabres opposées en croix.

I. n. le cap de B. Efp. T> *FL terminates*, en petit nombre, *prefjue fejjiles**

8630. DIOSMA *af. oppofées*. Di4. suppl.

D. à feuilles fubulées aiguës opposées.

L. n. le cap de B.-Efp. T>

3531. DIOSMA *velu*. Did. n°. J.

D. à feuilles linéaires aiguës velues, rameaux pauciflores.

X. n. le cap de B.-Efp. I?;

3632. DIOSMA *juniroide*. Did. n°. 4.

D. à feuilles linéaires incurvées glabres carénées à deux rangées (se points én-déflbus).

t. n. le cap de B.-Efp. T) *Fl. blanches*.

3633. DIOSMA *ericoide*.

V. à feuilles linéaires-lanceolées, convexes en deux rangées, deux faces opposées.

PENTANDRIA MONOGYNIA,

Difcus quinquefidus seu quinquepartitus germen cingens.

Scam. filamenta quinque, fubulata, petalii alterna; Anthers fubovatse,

Pift. germe superum, difco bafi adnato circumdatum, angulatum. Stylus limpex. Stigma capitatum.

Peric. capsulae tres ad quinque, ovato acuminatae, compreflie, margine imroseum coarctatum, apicibus distantes, futura superiori dehiscentes.

Sent. foliata, nitida, arillo cartilagineo bindehiscente inclusa.

Confpedus specierum.

262\$. DIOSMA *fcabra*.

D. foliis oppositis crassifolius linearifubulatis carinatis, marginibus dorsofoveolatis.

E cap. Bonae Spei. T> *An D. succulenta* Berg.

2629. DIOSMA *dtcujata*.

D. foliis brevibus crassifolius triquetris obtusis glabris decuflatim oppositis.

E cap. Bonae Spei. T? Sonnerat. Commel. ran. 2. *An D. erieoides* Bergii non vero Linn.

25jO. DIOSMA *oppofitifolia*.

D. foliis fubulatis acutis oppofitis,

E cap. Bonae Spei. T> *Commel. rar. I. t. t.*

2631. DIOSMA *hirtuta*.

D. foliis linearibus acutis hirsutis, ramulis paucifloris.

E cap. B. Spei. "b *Ramuli inflorescens* proliferi.

2632. DIOSMA *rubra*.

D. foliis linearibus mucronatis glabris carinatis fubtus bifarium pungens.

E cap. Bonae Spei. ft Pluk. t. 547. f. 4.

2633. DIOSMA *erieoides*.

D. foliis linearis-lanceolatis fubtus conyexis bifarium imbricatus*

*L. n. le cap de B.-Efp. 't Dfasma afpatatoid**
Did. n°. 12. *F. alt ernes.*

2634* DIOSMA *af. courtes.* Did. n°. p.
D. à feuilles éparfes fublancéolées trigones
ponduées en-deffous, coiymbes terminaux.

*L. n. le cap de B.-Efp. T> Rameaux prefqu*op-
pcjis , trichotomes.*

26-tf. DIOSMA *a'fl. en fto.* Did. n°. 7.
D. à feuilles linéaires embriquées fcabres
ciliées, fleurs en tête alongée.

L. n. le cap. de B.-Efpfrance T> •

26^6. DIOSMA *cuprefjiforme.* Did. n°. 8.
D. à feuilles linéaires demi-cylindriques un
peu fcabres droites embriquees, fl. folitaires
effiles prefque terminates.

*L. n. le cap de B.-Efper. T> Fl. très-petites ;
f. comme dans la précédente.*

2637. DIOSMA *effilé.* Did. n°. 10.
D. glabre, à rameaux effilés filiformes, feuilles
linéaires trigones ponduées en-defibus, om-
belles terminales.

*L. n. le cap de B.-Efper. T> Pet. ongulculés li-
néaires obtus unefois plus longs que le cal*

2638. DIOSMA *af. de romarin.* Did. n°. 11.
D. à feuilles lancéolées-lineaires glabres rou-
lées fur les bords, pédoncules axillaires &
rrminaux capfules très obtuses.

L. n. le cap de B.-Efplr. T>

2639. DIOSMA *hériflé.* Did. n°. 13.
D. à feuilles linéaires - fubulées canaliculéef
hériflées fur le dos prefqu'embriquees, co-
rymbes.term, en tête.

*L. n. le cap de B.-Efp. T> F. héiffeès de poils ;
pet. linéaires obtus plus grands que le cal.*

2640. DIOSMA *cifioUe.* Did. n°. 22.
D. à feuilles lancéolées roulées fur les bords,
fleurs grandes fubterminales, calice cilié
pondué plus grand que le fruit.

*L. n. le cap de Bonne - Efpfrance. T> F.
glabres.*

Ecap. B,Speil> *Pluk. t. *rj\$.f. f. folia tnqu**
era , fuperne canaliculate , apicibus aduncis.

2634. DIOSMA *brevifolia.*
D. foliis fparfis fubalanceolatis triquetris fubtus
pundatis, corymb is terminalibus.

E cap. Bonee Spei. T> An Diofma capenfis,
Lin. ? Ai folia non verè oppofna.

2635*. DIOSMA *capUata.*
D. foliis linearibus imbricatis fcabris ciliatis f
floribus capitato-fpicatis.

E cap. Bonse Spei. T> *Folia femiteretia.*

2636. DIOSMA *cuprejjina.*
D. foliis linearibus femiteretibus fubfcabris
eredis imbricatis , floribus folitariis feffilibus
fubterminalibus.

E cap. Bonae Spei. T> *Pluk. t. rj\$. f. 2. folia
ovata ex Linnao!*

26yj. DIOSMA *virgata.*
D. glabra, ramis virgatis filiformibus, foliis
linearibus triquetris fubtus pundatis , umbel-
lis terminalibus.

E cap. Bonse Spei. T> *Petala unguiculatalinea-
ria obtufa cafceduplo longiora.*

2(^38. DIOSMA *rofmarinifolia.*
D. foliis lanceolato-linearibus margine revolutis
glabris, pedunculis axillaribus & texmina-
libus , capfulis obtuffiflimis.

E cap. Bonse Spei. T> *Fl. pedunculati.*

2639. DIOSMA *hirta.*
D. foliis linearifubulatis canaliculatis dorfo
hiitis fubimbricatis, corymbis terminalibus
capitatis.

E cap. Bonae Spei. T> An Diofma vittofa ?
ThunD, cap. prod. p. 43.

2640. DIOSMA *dfloides.* t. 127. f. 1.
I), foliis lanceolatis margine revolutis, flori-
bus amplis fubterminalibus, calyce ciliato
pundato frudu majore.

E cap. Bonx Spei. T) *Ciftus. . . . Pluk.*
t. 34a. / 5.

Sa PENTANDRIE MONOGYNIE.

5641. DIOSMA uniflore. Dift. n°. %i.

D. à feuilles ovales planes fubembriquées, fl. folicaires feffiles terminates.

X. n. le cap dc B Efper* T> *Elle eft bim diflin-gueé de la pricéd, parfes / plus larg%os, plane*, Ofesrameaux un?/lores.*

Z6+2. DIOSMA àf.de bouleau. Did. n°. 2O.

D. à feuilles ovales crênelées y úiolées, pédoncules filiformes axillaires fubfafciculés.

X. n. le cap de B. Efper. T> *ped. inferie|rs^ Jblitaires; les autres gcmincs & enfuite fnf-ciculés. Jeur.es rameaux velus.*

2643. DIOSMA élégant. Did. n[#] ip.

D. à feuilles ovales glabres , à crênelures glanduleuses y péd, axill. tiiiformes gaminés.

L. n. le cap de B. Efp. 1) fl. d^un violet bleud-tre; f. quatre fois plus petites que dans le préc.

2644. DIOSMA cilié. Did. 17.

D. à feuilles ovales-oblongues ridées carinées, ciiiéds fur les bords & la carène j urnbelles terminates, pédoncules velus.

X. n. le cap de B. Efp. T> *Petit arbriJjT. très-rameux. I leurs blanches à ant hens pur p.*

2645. DIOSMA myrtoide. DiA fuppl.

D. à feuilles lancolées planes hifpides fur les bords , ombeiles terminales , pédoncules glabres.

X. n. le cap de B. Efp. T> *F. bordées en def-Jous ; fruits bicapfutaires**

2646. DIOSMA perforé. Dl&/uppl.

D. à feuilles lancolées acuminées un peu ciliées , coiime perforées fur les bords par des points tranfparens , ombeiles terminates.

X. n. ie cap de B. Efp. T> *Diofma cilié variété 0. du dièt, aun^g 17. les pedoncules font pubejéens.*

2647. DIOSMA embrigue. Di&. 18.

D. à feuilles ovales mucrpées ciliées em-briquées, ombeiles en tête iermin^les , on-glets des peules trfc- longs.

/I. La même à feuilles réilchies.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

2641. DIOSMA uniflora.

D. foliis ovatis planis fubimbrxatis , floribus folitariis feflibus terminahbus.

E cap. Borne Spei. T> *A prcccedenti diflhic* tijima foliis latioribus planis , ramls unh-florls.*

2642. DIOSMA betulina. t. 127. f. 2.

D. foliis ovatis crenatispetiolatis, pedunculis filiformibus axillaribus fubfafciculatis.

E cap. B. Spei. T> *fades bent las nan*; folia jparfa , in margine punSata y non in disco. An D. latifolia. L. f. f*

2643. DIOSMA pulchella.

D. foliis ovatis glandulofo-crenatis glabris y pedunculis axillaribus filiformibus geminis.

E cap. B. Spei. T> *fruticulus elegans , ramu-Us dichotomis , f.prarced. quadruplo minora.*

2644. DIOSMA ciliata.

D. foliis ovato - oblongis rugofis carinatis margine carinaque ciliatis ; umbellis termina-libus y pedunculis hirfutis.

E cap. B. Spei. T) Piuk. t. 411. f. 3. *folia Jübcarnofa , vix acuta.*

2645. DIOSMA myrjinites.

D. foliis lanceolatis planis margine ciliato-hifpidis , umbellis teruiinalibus , pedunculis glatris.

E cap. B. Spei. T> Jof. Mart. Seba vol. 2. t. p6. f. 6. An *D. marginata f Thunb. cap* pro dr. 43.*

2646. DIOSMA perforata.

D. foliis lanceolatis acuminatis fubciliatis , p unftis marginalibus pellucidis fubperforatis, umbellis terminalibus.

E cap. B. Spei. T> *pracedenti affinis; at dif-fert foliis minoribus , anguijionbus margine fubperforatis.*

2647. DIOSMA imbricata.

D. foliis ovatis mucronatis ciliatis imbricatis , umbellis capitatis terminalibus, petalorum unguibus longiflimis.

je. Eadcm foliis reflexis%

PENTANDRIE MONOGYNIE.

Z. n. Ic cap de B. Efp. T> Onglets des petales fitiformes ou capillaires.

2648. DIOSMA lancéoli. Did. *

D. à feuilles lancéolées obtuses fubpileuses fleurs axillaires geminées.

L. n. le cap de B. Efp. T>

2649. DIOSMA barbu. Did. 14.

D. à feuilles en cœur pointues glabres, umbelles termiales.

L. n. le cap de B. Efp. T> • F. fejfiles, am* plexic. petales barb us.

2650. DIOSMA tetragone. Did. if.

D. à feuilles ovales piliées en carène, ciliées, embriquées sur quatre côtés ; fleurs terminées foliaires.

L. n. le cap de B. Efp. T>. Voyage de Thunh. id. franpaise, vol. 4 > /> 3\$, pi. 5.

2651. DIOSMA bifide. Dift. fuppl

D. à feuilles lancéolées embriquées, péloncules ramifiés terminaux, pétales bifides.

L. n. le cap de B. Efp. 1) fleurs tn ombelle denfe, capitée & terminée.

* DIOSMA (d' Afie) à feuilles alternes lancéolées glabres, grappes subterminales. De la Cochinchine. Arbre de 6 pieds. Fl. jaunes.

• DIOSMA (lineaire) à feuilles linéaires obtusas gibras ouvertes, fleurs terminées foliaires. Du cap de Bonne-Espérance.

* DIOSMA (ovale) à feuilles ovales glabres marginées, fl. axillaires foliaires et géminées. Du cap de B. Efp.

• DIOSMA (cre'nelé) 1 feuilles ovales crénées ponduées en-defibus, fl. axillaires foliaires. Du cap de B. Efp. Yoyez le n° 264a.

5;7. N E R P R U N .

CaraS. ejjent.

CAL. urceole, 4 ou f. fide. 4 ou f. pétales très petits, recouvrant les étam. Baie à 3 ou 4 f. fern.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 8}

E cap. B. Spei. T) hartoghx imbricata. Magaz. ftir die Botan.j. r. j.

2648. DIOSMA lanceolata.

D. foliis lanceolatis obtusis fubpilofis, fioribus axil 1. geminis. Thunb. prodr. cap.

E cap. Bonx Spei. T> •

2649. DIOSMA barbigera.

D. foliis cor Jan's acutisglabrif, umbellis terminalibus. Thunb. cap. pro dr.

E cap. B. Spei. Jy folia fejfdia f ampxicau* lia ; petala barbata. Lin. f.

2650. DIOSMA tetragona.

D. foliis ovatis C-mplicato-carinatis ciliatis quadrisariam imbricatis ; floribus terminalibus folitariis.

E cap. B. Spei. T) Thunb. pi. cap.prod. <gi Lin.J.fupp. n5.

2651. DIOSMA bifida.

D. foliis lanceolatis imbricatis, pedunculis aggregatis terminalibus, petalis bñndis./tf^*

• E cap. B. S/ ci. T> Jacq. colleS. 3 p. 178. t. 20. f. f.

* DIOSMA (afiatica) foliis alternis lanceolatis glabris, racemis subterminalibus. Loureir. fl. cochinens. p. 200.

* DIOSMA (linwisi) foliis linearibus obtusis glabris patulis, floribus terminalibus folitariis. Thunb. cap. pro dr.

* DIOSMA (ovata) foliis ovatis glabris marginatis, floribus axillaris folitariis & genunis. Thunb. cap. prod.

* DIOSMA (crenata) foliis ovatis crenatibus punAatis, floribus axillaris folitariis. Thunb. cap. pro Jr. folia oppojita ex Lin.

3S7- R H A M N U S .

CharaB. ejjent.

CAL. urceolatus, 4 f. y-fidus. petala 4 f. y nrima, flamina munienii, bacc. 3 f. 4 fper-I ma.

L x

- CaraS. nat.*
- Cal.* urc̄colc̄, à 4 ou ; découpures pointues ouvertes.
- Cor.* Quatre ou cinq pétales très - petits , en forme d'écailks, recouvrant très-fou vent les étamines , quelqufois aucuns.
- Eta.* Quat. ou cinq filamens fubulés, plus courts que le calice. An th̄res petites, fous les pétal.
- Pift.* Ovaire fuperieur , arrondi. Un %le. Stigmate bi, tri ou quadrifide.
- Peric.* Baie arrondie , nue , à 2 , 3 ou 4 fe-meuces.
- Sem.* ovales- arrondies , cartilagineuless , ayant un ombilic à leur bafe.

*Tableau des espices.**Les épineux.*

- 26 f 2.** *NERTRVN purgatif.* Did. 1.
N. à épines terminates , feuilles arrondies ovales acuminées nerveuses ; fleurs quadriides dioïques.
L. n. FEurope , dans les haies. T>. *Tn̄ge droite*, quelquefois arborie.
- 26H.** *NERPRUN des teinturiers.* Difi. 2.
N. à épines terminates , feuilles ovales-lancéolées un peu velues en - deflbus , fleurs quadrides dioïques.
L. n. la France méridionale,&c. ft. *Feuilles beaucoup plus petites que dans Us pricèd.*
- 2654.** *NERPRUN, des rockers.*
N. à épines terminales, feuilles très petites ovales obtuses dentelées glabres.
I. n. les mont. de lItalie, &c. *T>f. hi|f.*
- 2655.** *NERPRUN hf. de buis.* Did. 4.
N. à épines termiualfs ? feuilles ovales obtuses très eniières.
L. n. lItalie , TEf^ agne , la Barbarie *T>•*
- 26\$6.** *NERPRUN oleoide.*
N. à épines terminales, feuilles oblongues- ovales très-entières veineuses pubefcentes.
L. n. la France méridionale. 1) *Nerprunpu-hefcnt.* Did. 6.

- CharaS. nat.*
- Cal.* urceolatus , 4 f. j-fidus; Iaciniis paten-tibus acutis.
- Cor.* petala quatuor f. quinque , minima, fqua-miformia , flamina liepius munientia , inter-dum nulla.
- Stam.* filamenta 4 aut y , calyce breviora , an-therx parvae , fub petalis.
- Pift.* germen fuperuui fubrotundum , Aylus unicus ; fligma bi, tri, f. quadrilidum.
- Peric.* bacca fubrotunda, nuda, bi, tri, f. te-trafperma.
- Sem.* ovato-fubrotunda , cartilaginea , bafi hilo notata.
- ConfpeSus fpecierum.*
- Splnofi.*
- 2612.** *RHAMNUS catharticus.* T. I28,f. 2.
Rh. fpinis terminalibus , foliis fubrotundo-ovatis acuminatis nervofis , floribus quadrifi-dis dioicis.
Ex Europe fcpibus. T> *Caulis ereSus § inter-dum arboreus.*
- 2613.** *RHAMNUS infiSorius.*
Rh. fpinis terminalibus , foliis ovato-lan-ceolatis fubtus fubhirtutis , floribus quadri-fidis dioicis.
Ex Gallia auftrali , &c. 1> *Caules in ioco natali procumbent es.*
- 26^{f±}** *RHAMNUS faxatilis.*
Rh. fpinis terminalibus , foliis exiguis ovat* obtufis ferrulatis glabris.
Ex Alpibus italicis , &c. J) *lycium ital.* Dale.
- 26[^].** *RHAMNUS buxifiUus.*
Rb. fpinis terminalibus , foliis ovatis obtu-fis integerimis.
Ex Italia, Hispania , Barbaria, T>.
- 26;6.** *RHAMNUS ol aides.*
Rh. fpinis terminalibus , foliis oblongo-ova-tis integerimis ? venofis pubefcemibus.
Ex Gallia merid. Hispania. T> *Vatiat foliis minoribus margine rejlexis.* Barrel, ic. ppj*

PENTANDRIE MONOGYNIE.

2651* NERPRUN *lycioides*. Did. J.
N. à épines terminées, feuilles linéaires très-émincées.

L. n. l'Efpagne, la France mérid. T? Feuilles étroites glabres.

265;8 NERPRUN *de Ténériffe*. Did.
N. à rameaux spinefcens, fleursquatrifides ou trifides dioiques, feuilles oblongue* obtuémenc dentées toujours vertes..

L.n. Hie de Ténériffe. T>.

265ss. NERPRUN *de Chine*. Did. 7.
N. à épines cerminales, feuilles ovales dentelées, rameaux divergens.

L. n. la Cline. T> *Arbrijf. famenteux*.

2660. NERPRUN *a cinq feuilles*. Did. 8.
N. à épines latérales, feuilles à 3 ou \$ folioles.

L. n. la Sicile, PAfrique. T) *F. pétiolees* ayant 3 à *Sfolioles en digitations*.

2661. NERPRUN *dtsIndes*. Dift. 10.
N. à aiguillons oppofésaux feuilles recourbés, f. oppofées sur & rangées en coeur renverfè.

i. n les Ind. orient. T> *Arbrijf. glabre*, *y rameux* % à feuilles pétiolees.

Efpèces inermis.

***662.** NERPRUN *abois rouge*. Dift. 11.
N. à feuilles lancéolées - linéaires fort iongues finement dentées, fl. dioiques,

L. n. la Ruflie. 1> Ses rameaux font quelquefois spinefcens.

3663. NERPRUN *daourien*. Dift. 12.
N. à feuilles oblongues ovales acuminées dentelées, fi. dioiques.

L. n. la Daourie. T> II reffemble au N. *purgatifi rruiis il eft inerme*, & ses feuilles font plus oblongues. Baie disptrme par Vavertc meat dune \$ejim.

2664. NERPRUN *farcomphalt*. Did. 15.
N. à feuilles ovales coriaces très - emieres échancrées au fouuneu

PENTANDRIA MONOGYNIA. H

267. RHAMNUS *lyeioida*.
Rh. fpinis terminalibus, foliis linearibus integrerrimis.

Ex Hispania, Gallia auft. T>. Cluf. hift. i. p. 1 to. Barrel, ic. \$96.

265*8. RHAMNUS *crenulatus*.
Rh. ramulis spinefcenibus^ floribus quadri- fijis tritiJisve dioicis, foliis oblongis obtufe ferratis sempervirentibus.

Ex ins. Teneriffa. "b Ait. hort.Kew.y. 263.

269. RHAMNUS *tkeeanans*.
Rh. fpinis terminalibus, foliis ovatis ferrulatis, rainis divaricatis.

E China 1}. *Pauperibus Thea fuccedaneum*.

2660. RHAMNUS *pentaphyllus*.
R. fpinis lateralibus, foliis ternatis quinatifq.

Ex Sicilia, Africa. T> *Bocc.flc.* \$. xi. *Jacq. Obf. sup.* 17.

2661. RHAMNUS *circumscifffus*.
Rh. aculeis oppoïtitaliis recurvis, foliis oppofitis bifariis obcordatis.

Ex India orient. * ft *Baccaficca calycecircumscifffo bafi veftita*. Pluk. t. 426. f. 4.

Inermes.

2662. RHAMNUS *erytroxylon*.
Rh. foliis lanceolato - linearibus praelongii futiliter ferratis, fl. dioicis.

Ex Ruffia. T> *Pal. fl. Roff. x. t. 6**. & 63. afflais Rh. *lycioid*.

2663. RHAMNUS *dduricus*.
Rh. foliis oblon^o-ovatis acuminatis [ferrulatis, fioribus dioicis.

Ex Dauria. J) Rh. *cathartico similis*; fid diffen ramis inermibus & foliis magis oblon* gis. Vide Pall. fl. Roff. z.t. 61.

2664. RHAMNUS *farcomphalus*,
Rh. foliis ovalibus coriaceis **integerrimis** emarginatis»

85 PENTANDRIE MONOGYNIE.

L. n₉ TAmérique. T> *ombelles ped. axil-hires.*

266r. NERPRUN *grimpante*. Did. 16.

N. à tige volubile , feuilles ovales très - cni-tieres ftriées.

L. n. la Caroline. T> *Liane rouge.*

2666. NERPRUN. *tetragone*. Did. 17.

N. à feuilles ovales coriaces dentelées gla-brées prefque feffiles , rameaux tecragones.

L. n. le cap de Bonne-Esperance. T> *Feuilles oppofées.* N*eft-ce pas plutot une ejpece de cajjine?

2667. NERPRUN *des Alpes*. Did. 18..

N. à feuilles ovaies doublement crénelées rayées, fleurs quadrifides dioi'des.

L. n. les montagnes de la France , la Suifle , &c. T> *Feuilles glabtes.*

Q. Le mēine à feuilles oblongues Qvales poin-tues, pédoncules commc en ombelle.

266S. NERPRUN *turñ*. Di& fupp,

N* rampant ₅ k feuilles ovales-arrondies cré-nelées , fleurs quinquefides hermaphrodites.

Z. n. les montag, de lItalfe & du Carniole. T> *Tlges très-baJJ'es , italics ou rampantes , adhrentts fur Us rochers.*

MC69. NERPRUN *affaulne*. Did. 20.

N. à feuilles ovales acuminées crénelées re-ticulées en-deffous , fleurs hermaphrodites.

L. n. l'Amérique fept. T?.

^670. NERPRUN *boudainier*. Did. 21.

N. à feuilles ovales très-emieres, fleurs her-maphrodites X-fides , c^ices glabres.

L. n. Ids bois de TEurope, T>.

2671 NERPRUN *a larges feuilles*. Did. 28.

N. à feuilles ellip[;tiques acuminées très-en-lières , fleurs hermaphrodites, calices velus.

I. n. les îles Azores. 1) *Stipules fubuldes (r̄s remarquabks.*

PENTANDRIA MÔNOGYNIA.

Ex America. *Rh. ferreus.* V*|L|:Jymb.\$p. 41.' t. y8.

266 *. RHAMNUS|volubilis.|

Rh. caule volubili , foliis ovatis integerri-mis ftriatis. *Lin. f.*

Ex Carolinia. *Pluk.* t. 368./3.

2666. RHAMNUS *tetragonus*.

Rh. foliis ovatis coriaceis denticulatis gla-bris subfetilibus, ramis tetragonis.

E. cap. B. Spei. T> *Lin.f.fuppl.* 163* *Thunb** *cap.prodr.* ^, *Folia ccflint capenfis* , *Jed mi** *nora.*

266% RHAMNUS *alpinus*.

Rh. foliis ovatis duplicato-crenatis lineatis, floribus quadrifidis dioicis.

Ex Alpibus Gallic, Helvetia , &c. lyHall *Helv.* n° 823. t. qo.

• Idem foliis oblongo-ovatis acutis , peduncu-lis subumbellatis. *Rhamnus hydrienjis.* Hacq. t. 2. f. 2.

266%. RHAMNUS *pumilus*.

Rh. repens , foliis ovato-subrotundis crenati^, floribus quinquefidis hermaphroditis.

Ex Alpibus Italicis & Carniote. T? *Jacq.* coll. 2.p. 141. t. it. *Rh. rupefiris.* Scop. earn. p. 164. t. J.

2669. RHAMNUS *alnifolius*.

Rh. foliis ovatis acuminatis crenulatis subtus reticulatis, floribus hermaphroditis.

Ex America fept. T>. *LHerit.fert. ang.* p. S.

2670. RHAMNJSfrangula. T. 128. f. I.

Rh. foliis ovalibus integerrimis , fl. herma-phroditis y-fidis, calycibus glabris.

Ex Europx nemoribus. T> •

2671. RHAMNUS *latifolius*.

Rh. foliis ellipticis acuminatis integerrimis , floribus hermaphrod. calicibus villosis.

Ex Azoribus. ft VHerit.fcre. angl n° q% t. 8. *Seip.fubulatx Jpeciofe.*

PENTANDRIE MONOGYNIE.

- £672. NERPRUN *alaterne*. Did. 22.
 N. à feuilles coriaces dentées toujours vertes , fleurs dioïques , (ligmate trifide).
 « (commun) àf. *ovales lanceolées*.
 fl. (à larges feuilles) af. *ovales pointues*.
 y. (eliiptique) af. *elliptiques mucronées*.
 /. (if. rohdes) af. *rondes à dents ipineufes*.
 L. n. l'Europe auftrale. T).

2673. NERPRUN *kybride*. Did. 24.
 N. à feuilles ovales acuminées crénelées préf que perfihines , fleurs androgynes.
 I. n. inconnu. Colt, dans les jard. T> *Ilfere-produit con ft. le mime par les femences. Les nervures lat. defesf font difflants , & rtont point de rapp. avec celUs du N. des Alpes.*

2674. NERPRUN *rayé*. Dift. 23.
 N. à feuilles ovales obtuses rayées mucronées par la nervure, fleurs hermaphrodites.
 L. n. la Chine, file de Ceylan. T> *F.petites entieres*.

- z67f. NERPRUN *d'Afrique*. Dia. 49.
 N. à feuilles ovales-pointues cintées , fleurs polygames , (ligmate 3*fide).
 L. n. le cap de B. Efp. T) *F. glab res. Ilparoit que c|fi le RH. CELTIFOUUS deM- Thunb.*

2676. NERPRUN *caffinoide*. Difl. 27.
 N. à feuilles ovales coriaces glabres obfcurément dentées , rameaux anguleux , fleurs axill. préfque feffiles.
 I. n. Saint-Domingue. 1> •

- 2677- NERPRUN *de Surinam*. TjEt. 30.
 N. à feuilles elliptiques glabres luisantes perfflantes à dents aiguës , fligmate 3-fide.
 I. n. Surinam. 1) *Tre*-petit arbrijf.*

2678. NERPRUN à vrilles. DiGt. 31,
 N. à feuilles en cœur très-eniieres, rameaux à vrilles , fleurs hermaph. fligmate trifide.
 i. n. l'Afrique. J) *F. glabres en-deffus , un peupileufes en-deffous.*

PENTANDR1A MONOGYNIA. 87

2672. RHAMNUS *alaternus*.
 Rh. foliis coriaceis ferratis sempervirentibus, floribus dioicis , ftigmate triplici.
 «. (communis) foliis ovato-lanceolatis.
 0. (latifolius) foliis ovatis acutis.
 y. (ellipticus) f. *ellipticas mucronatis*.
 K (rotundifolius)/ *rotundis spinojo-dentatis*_m
 Ex Europa auftrali. T} •

- 2^73. RHAMNUS *hybridus*.
 Rh. foliis ovatis acuminatis crenubitis fubpe⁴ rennantibus, floribus androgynis.
 I*atria ignota. cult, in hortis. T> VHerit fertm. ang. p. 5. *Hybrida ex D. CRentier, Rh. alaterno patre , mat re Rh. alp I*0. At origo dubia mlhi videtur.*

2674. RHAMNUS *lineatus*.
 Rh. foliis ovatL obtufis lineatis nervo mucronatis, floribus hermaphroditis.
 Ex China f Zeylona. ^ . Bum. ZeyU t. 88.

- 267f. RHAMNUS *prinoides*.
 Rii. foliis ovato-acutis ferratis , floribus polygamis , fligmate triplici.
 Ecap. B. Spei# T> .UHirit. fert. ang. p. 5* t. 5, *celtis.... Burnt. Afr. t. 88.*

2676. RHAMNUS *cajjinoides*.
 Rh. foliis ovatis coriaceis glabris obfcuri clematis f ramulis angulatis, fl. axillaribus subfeffilibus.
 E Domingo. Tj Jof Mart.

2677. RHAMNUS *Surinamenfis*.
 Rh. foliis ellipticis argutè dentatis glabris nitidis perennantibus , fligmate trifido.
 E Surinamo. T> Scop, *delic infibr. 3. / . io, t. s.*

2678. RHAMNUS *myfiacinus**
 Rh. foliis integerrimis, ramis cirriferis , fit hermaphroditis, Aigmate triplici*
 Ex Africa, -& Ait% *hort. Kew. 1. p. 266. Fl. umbellati axill.*

2679.^ NERPRUN à grappes. Djfi. fupp.

N. a feuilles ovales très^entieres luifames veinées traiffverfalement , grappes axill. & terminaires, fyle partagé en deux.

L. n. l'Inde. T> Rameaux panicule't, feuilles glabres, grappes menues.

* NERPRUN (A Com/im) à feuilles oblongues-ovales dentelées veineuses lisses à peine caduques, fleurs hermaphrodites en grappes axillaires. De la Caroline. Baie q-fperme.

* NERPRUN (à tales rondes) à feuilles oblongues dentées glabres , fleurs hermaph. en grappes , baies trilocuiaires. De la Jam.

* NERPRUN" (myroïde) inerme , à feuilles oblongues ovales très-entieres luifantes en deflbus. De tInde.

* NERPRUN (glanduleux) & feuilles ovales obtufément dentées glabres glanduleuses à leur bafe, fleurs hermaph. en grappes. De Madere fy des Canaries. Arbijf. non épineux.

* NERPRUN (life) inerme, à fleurs hermaphrodites axillaires fubgeminées , feuilles oblongues très-entieres coriaces glabres. De tile Sainte-Croix.

* NERPRUN (àf.de polium) inerme, à fleurs hermaph. axill. prefque feffileSj feuilles lancéolées très-entieres blanches & toutes enteufes en-deflbus. De la nouv. Zélande.

Explication des fig.

PI. II8. f. I. NERPRUN kourdainitr. (a,g) Fleur vue latéralement & en-deffas. (c). Calice. (d) Calice , p^{tr} .(c) Etamines. (l) Une éumine séparée avec son pétale. (g) Pistil. (k) Baie. (0) La même couple tranfverfalement.(l) Semences.

PI. iz8. f. z. NERPRUN purgatif. (a) Fleur mâle. (h) Calice. (c) Pétales (d) Ecatnines. (0) Fleur entière. (/) Calice avec les pétales. (g) Pétales séparés. (A) Fleur sans pétales. (l) Pistil > & une famine. (/) Pistil séparé. (m) Baie. (n) La même groffie & coupée en trarers. (?) Semences. (P) Rameau fructifère.

2679. RHAMNUS racemofus.

Rh. foliis ovatis integerrimis nitidis transversim venofis , racemis axillaribus & terminalibus, ftylo bipartite

Ex India. T> Sonnerat. An. Rh. tnyrtinus Burm ? at folia supernè tantum nitida.

* RHAMNUS (carolinianus) foliis oblongo-ovatis ferrulatis venofis la&vibus vix deciduis, fl trib* hermaphroditis racemofis axillaribus* Walt. fl. carol.p. 101.

* RHAMNUS (fphatroppermus) foliis oblongis ferratis glabris, fl. hermaph. racemulois, baccis trilocularibus Swart^ prod. jo.

* RHAMNUS (myrtinus) inermis-! foliis oblongo - ovatis integerrimis fubtus lucidis. Burm. Ind. p. 60.

* RHAMNUS (glandulofus) foliis ovatis obtusè ferratis glabris baft glandulofis , floribus hermaphroditis racemofis. Ait. hort. Kew. %65. Frutex inermis^

* RHAMNUS (lavlgatus) inermis , floribus hermaphroditis axillaribus fubfelfilibus , foliis oblongis integerrimis coriaceis glabris.fi/A/. Jymb. I. p. 41.

* RHAMNUS (polifolius) inermis . floribus hermaphroditis axillaribus fubfelfilibus , foliis lanceolatis integerrimis fubtus toAientofo-niveis. Vahljymh. 3. /> 41.

Explicatio iconum.

Tab. xi8.f. 1. RHAMNUS franguU. (a , t) Flos & latere & supernè vifus. (c) Calyx, (d) Calyx penula. (e) Stamina. (/) Stamen separatum cum petalo. (g) Pistillum. (A) Bacca. (i) Eadem tranfverlim feffata. (?) Semina. Fig. ex Mill.

Tab. 128. f. 2. RHAMNUS catharticus. (a) Flos maefculus. (*) Calix. (c) Petala. («0) Stamina, (e) Flos integer. (/) Calix cum petalis. (g) Petalum separatum. (A) Flos abfque petalis. (i) Pistillum, ftamen. (0) Pistillum separatum. (m) Bacca. (ji) Eadem aufsta & diffeda. (p) Semina. Fig. ex Mill, (p) Raroulus fructifer. Ex SUco.

3;8. CUNOTE,

*CaraS. ejfent.**CAL. y-fide. \$ pétales onguiculés, en cuilleron, op polés aux étam. capf. triloc. 3 fperme.**CaruS. nat.**Cal. monophylle, turbiné, quinquefide, perfift. à découp: pointues presque conniventes.**Cor. cinq pétalés égaux, onguicutes, creufés en cuilleron, inférés entre les div. du calice.**Etam. cinq filmens Tubules, oppofés aux pét. Anthères anondies***Pijl. ovaire supérieur, trigone. Style cylindrique, trifide supérieurement. Stigmates obtus.**Pen. capifile-fèche, arrondie-trigone, obtuse, environnée à la base par le carlice, à trois coques ou triloculaire,**Sem. folitaires, ovales.**Tableau des espèces.***2680.** CUNOTE d'Amérique. Did. n. 1.

C. à feuilles ovales pointues en face trinerves, leur base, grappes axillaires longspédoncul.

*L. n. T Amérique septentr. T?***2681.** C^ANOTE à petites feuilles. Did. suppl. C. à feuilles oblongues-elliptiques très-petites à dents rares, panicule ternunale enip. de cymes péd. & alternes.*L. n. la Floride. T> Très-petit arbuste, à feuilles à peine plus grandes que celles du ferpo Ut.***a.6%2.** CÉANOTE JtAfie.

C. à feuilles ovales dentelées trinerves à la base, pédoncules axill. rameux multifl. plus courts que les feuilles.

*L. n. T Inde, Ceylaa, Ile-de-France. Nerprun d'Afie. Did. n. 25.***a.6%3.** CUNOTE recliné.

C. à feuilles ovales très-entières, ram. pendans, cymes axillaires plus courtes que les feuilles.

Botanique Tome II.

3j8. CEANOTHUS,

*CharaS. ejfent~**CAL. jr-fidiis. Petala \$, unguiculata, facata, fiamiiibus oppofua, Capf. 3-cocca, 3-fperma.**CharaS. nat.**Cah monophyllns, turbinauis^quinquifidus^perflens: laciniis actuis subconniventibus.**Co| petals quinque, cequalia, unguiculata, facata, ex incifuris calycis enata.**Stam. filamenta quinque subulata, petalis oppofua. Anthers subrotund.**Pijl. germen fupemm, trigonum. Stylus cylindricus * fuperne trifiius. Stigmata obtusa.**Peric. capula 'ficca, subrotundo * trigona « obtusa, bafi calyce cinda, tricocca vef trilocularis.**Stm. foiiuria, ovata.**Confpeftus fpecierum.****620.** CEANOTHUS/Americanus. 1.12\$.1.1.

C. foliis ovatis acutis ferratis bafi trinerviis, racemis axillaribus longè pedunculatis.

*Ex America septentr. Jy Cotnmel. hort. z./.8p#***2682.** CEANOTHUS microphyllus

C. tiliis oblongo-ellipticis rariter dematis exiguis, panicula terminali ex cymis pedunculatis alternis.

*Ex Florida. T> André Michaux. Caules tenuet subfiliformes > dodrantales, ramosifflmu Folia ferpylo vix majora.***1682.** CEANOTHUS Afaticus* t. 129. f. 2.

C. foliis ovatis ferrulatis basi trinerviis, pedunculis axillaribus ramosifflis multifloris foliis brevioribus.

Ex India, Zeylona, Mauritia. T> Katap Rtieed. mal. 5. t.%qj. Carpoduu forft.***2683.** CEANOTHUS redinatus.

C. foliis bivalvis integerrimis, ramis dependentibus, cymis axillaribus foliis brevioribus.

90 FENTANDRIE MONOGYNIE,

L. n. les Antilles, ft Les pidcnc Us cal. & Us jeunes font charges' defoils couchés & rouff'dres. Voy. Nerprun veiné. Did, n. 2\$**

3684. CÉANOTE *ferrugineiOf.*

C. à feuilles elliptiques poimues très-entières, pétioles pédoncules & calices tomemeux & roufsâtres.

L. n. les Antilles ft Sesfeuill. font plus grander que dans Us deux ejpées qui pricèd. Les plus Jeunesfont ferrugineuses.

268y. CEANOTE *de Cuba**

C. à feuilles ovales obtufes très-entières nées tomenteuses des deux côtés[^] cymes axillaires.

L. n. Hie de Cuba, ft ArbriJJhau ayant le port du viburnum lantana.

2686. C&ANQTE *d'Afrique.* Did. n. j.

C. à feuilles lancéolées obtufes dentées, flip, arrondies. -

L. n. TAfrique ft Arbriff[^] toujours vtrd.*

- CfiANOTE (^rflAei^)feuilles>valesen coeur acuminées dentées, capfuls s'ouvrant en trois ya||es+De I He de Tahiti.

Explication des figurts.

PI. 129. f. 1 CÉANOTE <£Amiriqu. (a) Sommité de ?ameau fleuri. (t) Fleur enrière. (c) Up p6cale avec Ton étamine.

FL 129. f. 2. CÉANOTE tApt. (q) Rameau chargé de fruits. (^) Fieurs. (0 Capful** entières. (i, c) Q|pfules partagées en trois.

359. C O L L E T I E R .

CaraQ. tffent.

CAL. urcéole, y fide, ayant int. j!p!ise)écailles. Cor.<o. Capi. à 3 coqués, 3-fperme[^]

*Car ad. nat**

Cal. monophylle, urcéolé[^] à bafe perfittante , " ayant inférieurement y plis en forme d'écailles. Limbequinquefide: à découp.oval. réfléchies.

Cor. nuHe.

*Etam. cinq filaments publés; très*courts, inférés cnxre les divitions du calice.*

FENTANDRIA MONOGYNIA-

Ex infulis Caribxis. ft Brown, jam. t. z\$.fl si. PHerit,firt. angl.p. & Rhamnusdiipticus Ait. Hort+Keiv.*

2684. CEANOTHUS *colubrinus.*

C. foliis ellipticis acuiis integerrimis, petio- Jis pedunculis calycibusque ferrugineo - ta- nientofis.

Ex infulif Caribseis. ft Rhamnus colubrinus, Lin. vogl. ic. rar. t. io5. & DiU. nofrù n. i5.

268y. CEANOTHUS *Cubenfis.*

C. foliis ovalibus obtufis integeriimis rugofis utrinque tomentofis, cymis axillaribus.

Ex inf. Cubef>ft Rhamnus Cubenfis. Lin. Jacq. hort. 3. t. q\$. Did. n. 4.

268(5. CEANOTHUS *Africans*

C. foliis lanceolatis obtufis ferrafis > ftipuli[^] fubrptundis.

*Ex ^frica. ft Pluk. t. tz6*f. 1.*

- CEANOTHUS (*capulanii*) foliis ovato-cord. acuminatis ferratis, capfulis trivalvibus dehif- centibus* Forft.fl* auftnp. 18. n. nz.

Explicatio iconum.

Tab. 129. f. 1. CEANOTHUS *Americahus.* (*) Sum- micas rami ftoridi. (^) Flos integer* (c) Pecaluin cunt fiamine.

Tab. 129. f. 2. CEANOTHUS *Afiatricus.* (a) Ramulm frutifer. (4) Flores. (cj Capful* mtegrx. (rfj^Capfu!** triparticx. Ex ficco.

359. C O L L E T I A .

CfiaraJt. effent.

CAL. urceolatus, 5-fidus, intüs plicis[^]fquau- focmibus. Cor. o. Capf. 3-cocca, 3-fpertnd,

Ckara d. nat.

Cal. monophyllus urceolatus bafi- perflflentc ; intüs plicis quinque fquamiformibus inflruc- tus. Limbus quinquefidus: laciniis ov. reflexis[^]

Cor. nulla.

Stam. filamema quinque fubulata, breviflma, ex incifuris Cilycis eaata Antlieix oyate.*

Pi/I, ovaire supérieur, trigone. Style cylindrique.
Stigmate trilobé.

Piric capsule à trois coques posée sur la base du calice. Coques subreniformes, cohérentes par leur côté intérieur.

Sém. folitaires*

Tableau des espèces.

2687. COLLETIER ipineux. Did. suppl.

L. n. le Pérou & le Brésil. T> Arbrijf. très raméus, à tiges & aérien opposées paroissant quelquefois presque sans fil. « 7z/w */ afparagus horrid. vu rafpvagus aphyllus, ou stilex.

Explication des fig.

PL. 129. COLLETIER ipineux. (a. A) Fleur entière. (i) La même vue tendue. (b) Calice étendu. (d, e) Partie inférieure du calice environnant le pistil. (f) Réceptacle du pistil mis à nud. (g) Fruit, (ft) Légerement coupé transversalement. (h) Semence. (l) Réceptacle du fruit déposé. (m) Rameau chargé de feuilles & de fleurs. (n) Lèvre éparée.

360. CASSINE,

CaraS. effent.

CAL. à 5* divisions. 5 pétales alternes avec les étamines. 3 stigmates. Baie ronde, 3-lobée, 3-perme.

CaraS. nat.

Cal. très petit, partagé en cinq div., perfilant.

Cor. cinq pétales, un peu cohérents à leur base, ovales, ouverts, plus grands que le calice.

Etam. cinq (lamens subulés, alternes avec les pétales) Anthères arrondies.

Pijl. ovaire supérieur, conique. Style nul. trois stigmates.

Perk. baie ronde, drupacée, arrondie, triloculaire, ombiliquée par les stigmates.

Sam. solitaire*, presque ovale.

Pi/7, germe superum, trigonum. Stylus cylindricus* Stigma trilobatum.

Perk. Capsule (ficocca), bâti calycis imposna : cocculis subreniformibus, latere interiore cohæseremibus.

Sent. solitaria.

Conspicetus specierum.

2687. COLLETIA ^i/io/i. t. iap.

EPERU & BMFILIA. 1> Jof. Juff. & Compterj frutsx mmofiff. & Jpinofi JJ. Folia parva oppo-fita, oblongo-elliptica, Integra vAapice fubden-tata. Ped* lacerates, subfalciculati uniflori.

Explicatio iconum.

Tab. 129. *Couma sphofera*. (tf, A) Flos integer. (b) Uterus iuperne vifus, (c) Calyx explicatus. (td>c) Pars inferior calycis pistillum cingens. (l) Receptaculum pistilli denudatum. (g) Yru&us. (h) Membrana transversalis sectus. (i) Semen. (k) Receptaculum fructus separatum. (m) Ramus foliis floribusque onustus. (n) Folium separatum. Fig. ex icona Josephi Juff.

360. CASSINE.

Charad effent.

CAL. y-partim. Petala y, ftaminibus alterna* Stigmata 3. Bacca- exfucata, j-locularis^ 3-perma.

Charact nat.

Cal. minimus, quinquepartitus, perfilans?

Cor. petala quinque, bafi subcoalita, ovata, patentia, calyce maiora.

Stam. filamenta quinque, subulata, petalis alterna. Antherea subrotundata.

Pijl. germen superum, conicum. Stylus nullus* Stigmata tria.

Perk. bacca exfucata, drupacea, subrotunda • trilocularis, stigmatis umbilicata.

Sem. solitaria, subovata.

\$2 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Tableau des espèces.

2688. CASSINE du Cap. Dia. n. r.

C. à feuilles oppofées ovales fctotufes dentées, rameaux tétragones.

X. /i. le cap de Bonne-Espérance. "&

ft. la même à corynibes plus lâches. *Caff. colpoon.* Ta, cap.

2689. CASSINE d'Ekiopie.

C. I feuil s oppofées ovoïdes coriacées très-eritières > rameaux cylindriques.

L.n. l'Afriquir. T> *Caff.*, à f. convexes. D'iQ. n. 7. *Corymhes axillpidoncuUs tris-courts.*

?6<)O. CASSINP: de Magellan. Did, suppl.

C. à feuilles alternes ovales-lancéolées pointues obtusément dent. fl. axill prefque feffiles.

1. n. le Magellan. T? *F. glabres, coriaces.*

Explication des fig.

PI. i)0. f. 1. C AS SINE tfEthiopic. (a) Fieurs de grandeure nature He. (b) Les mêmes groffies. (0 Calice. |d) Le mème avec le p'til. (e) PiltiL séparé. (/) Fruit uaiflant. (g) Le rrême conp^ en travers.

PI. 130. f. J. CASSINE du Cap.

361. C E L A S T R E.

*Carat effent**

CAL. a y lobes, j. pétales ouverts. Ovaire enfoncé dans un difque. Capf. 3-gone, 3-loculaire. Sem. arillées.

Caras. not.

Cal. très-petit, monophylle, plane, semi-quinqefide ; à lobes obtus.

Cor. cinq pétales ovales, feffiles, ouverts en étoile.

team, cinq Blamens. fubule^ de fa long, de la corolle, alternes avec les pétales. Amh/tr^s pet.

Pifl. ovale supérieur, très-petit, enfoncé en partie dans nn large difque. Style court*, ðiigmate irriide»

PENTANDRIA MONOGYNIA.

ConfpeSus specierum.

2688. CASSINE Capenfis. t. 130. f. 3.

C. foliis oppofitis ovatis obtulis ferratis^ rauwVis tetragonis.

E cap. Bonae Spei. T> *Dill. h. he It. t. 236**.

j3. Eadem corymbis laxioribus. *Burnt, afr.* t. 8ff.

2689. CASSINE Maurocenia. x. 130. f. 1.

C. foliis oppofitis obovatis coriaceis integerimis, ramulis teretibus.

Ex Africa, ft *DHL h. elth. t. tit. Goert.* t. \$z+f. q. *Corymbi axill-pedunculati bnvijjimi.*

2690. CASSINE MageVamica.

C. foliis alternis ovato-lanceolatis acutisobtuse ferratis, floribus axillaribus fubfeffilibus*

Ex Magellania. T> *Commerf.*

Explicatio zconum.

Tab. r)O. f. I. CASSINE Maurocenia. (a) Flores natu^ rali magnitudine. (b) Idem audti. (c) Calix. ^) Idem cuim pifillo. (e) Piitillum separatum. (/) Fruflus immaturus. (g) Idem fedus Fig. ex Dili.

Tab. 130. f. 3. CASSINE Captnfis.

361. C E L A S T R U S .

Charas. effent+

CAL. y-lobns. Pet. y, patentia. Germen difca immerfum. Capf. 3-gona, 3-locularis. Sem. calyprata.

*iCharaQ. nat**

Cat. minimus, monophytlus, planus, fenù-quinquefidus: lobis obtufis.

Cor. petala quinque, ovata, feffilia, ftcellatim patentia.

Seam, filamenta quinque, fnbulata, longitudine coroila, petalis alter na. Anthers minimae.

Pifl. germe fuperum, minimum, difco lato panim immeifum. Stylus brevi. Stigma trifiduni*

PENTANDR1E MOTFOGYNIE.

Peri, capfule ovoldc, obtuse, trigone, tnloclnlaire, trivalve: a valves div. par line cloifon.

Sim. en petit nombr. ovales, gkbres, em ~~veloppées~~
eh panit; dans unc tuiii^iic color. & (juajritid

Tableau das tfpica,

Efpces inermes.

2691. C K L A S T R E de Firglnh. Di &. n. 1.

C. h feulleJ ovales tres-entfrtes, à grippes term indies.

L. n. la Virginie. T> *Cap/*, a 3 lobssarrondis.

2692. CfASTREgr/Mpafl/. Dia. n. 2.

C. a fflfvolumibile , jcuillcs ovales tcumince denielcts.

L. n. le Canada, ft *Capj* a3 lubts arrondis.

3693. CELASTRE a/, de myrte. D&. n. 3.

C. a feuilles ovales dentelces, flcursengrappes, tige droite.

L. «. la Virginie , la Jamaique. ft.

3.6\$^. CELASTRE à trois paintes.

C. a feuilles oblon^ues-ovales iuifanres très-erotierw a bordsrcflcchis, capfutesà j poinies.

X. n. le cap de Bonnc-Efp. "b *Cajfmekfiu'dl. bff'S.* D.fl. n. 6. *Capf. turbinie*, charges de 3 aites cjurtes ovales-potntues.

26\$p. CELASTRE à f. concaves.

C. a ffluilJesovales-arrondics dures veineiifes tnVemicres concaves e«-delfus , capfulcs retufes mutiques.

L. n. rAfrique. J) *Pulg** le petit cerifttf des hottentais. *Pidonc.fimp!*. *axil!*. *fibfafckuUs.*

26\$. CtKSTKK à f. d'olivier.

C. a feujles ovales-IjiiccolOes trcs-entit res marginees, corymbes pedonculcs axiihiires.

L. B, le cap de B-Xfp(Sl. T? *CafmeAf. d'ol pier.* Did. n- 4.

2697. CELASTRE *Caffrmit.* Dift. 6] pl.

C. u ifiiitJts oval<> j.iDiiuies aiix deux bout dentces perfifancw, llcurss axiiakes.

PENTANDRJA MOMOGYNIA. 93

Per/c. **capfuta** obovan, **obtufa** , **crigona** ,trilocularis, irivalvis: valvis medi^o ~~leptiferis~~.

Sew. pattca, ovat.i , glabra , arillo coiorato , quadritidoque paitin inv^mu.

Confpidus fptckrum.

Xnermis,

1691. CELASTRUS *Ballot*^{ms.}

C. foli is ovatis intcgierimis, racemulis terrinalibus.

E Virginia. T> *Pltk. r. z8, f. 5.*

2692. CELASTRtJ; *jeandins.*

C. catitc voiuLiili , fuiiii ovatu ^{acuminatis} ferrularis.

E Canada, ft *Duham, arb, t.t,* ^{95.}

26\$1. CELASTR 'US ntynJ'Uus.

C. foiiia ovatis ferrulatis, florat>us racemofii, caule ercdo.

E Virginia, Jamaica. Tj *Sloan, jam, hisl.* ^{2.}

2694. CELASTROS *tmufyUatia.*

C. fotiisoblongo-ovalibus nitidisintegerri mis niargine reflejtijs , caj.ful is tncufpidatis.

E op. Borne S^ci. *hSvoaymas* _____ Bu Afr. t. 97. / . t. An C. *ryflratus.* Thunb. cap. prodr. ^2.

2695. CELASTRUS *etmeavus.i.* 130. f. 2.

C. foliis ovato fitbroiundis rigidis reeoHa imegcrrimis fuperne cptiavi«, «ijfiUtt_{mQ}£₁ inuticis.

Ex Africa. Tj *Hon. Paris. Ph;k. t. 180 f. 4*
CJuadnsLhtU.firp. t. z5. *Caffin.n.\$'.DM.*

2696. CEMSTRUS *oltoidv.*

C. foUis ovitu-lanccolaiis inte_Renimis m»wi na • us , corynibispeduncularis aiillaribu*.

E cap. Bonx Spd, Tj An *cdajlru* Uurwus f* Ihunb. cap. prudr^a.

2697. CELIVSTRUS *c-Tjpiiffjj.*

C. foUis ovaris inriicuc acutis i't-rmii perej»

j>4. PENTANDRIE MONOGYNIE.

L. m. les îles Canaries. *J) Pétioles rouges.*

269\$. *C̄illASTREi/:depeuplienTHA.fuppl.*
C. à feuilles ovaies acuminées en face, ombelles axillaires presque feuilées pauciflores.

L.n. le cap de Boqne-Eip. T> *Cap/, oblongues ovules.*

2699. CÉLASTRE *trigyne*. Did. fuppl.
C. à feuilles oblongues-ovales obtusément dentées, ombelles axillaires lâches pédonculées, feuilles presque mil.

L. n. l'Ifle-de-France. T> *Vulg.* Lebois Jacot. *Cap/I globukuji) d3 loges dijpermes, jfligmates, ou^Jfyles tfés-courts.*

3700. CfLASTRE *orliculi*. Dift. fuppl.
C. à feuilles presque rondes acuminées dentées, pédoncules axillaires subtritides,

Z. i. le Japon. T> *Jrhriff.* à rameaux ferrugineux, glabres, parfois de points blancs.

9.701. C&LASTRE *EponSué*. Dift. fuppl.
C. à rameaux grimpants pendus, feuilles ovales en face.

L. n. le Japon. T) *FL iparfes ^folit. pidon ul.*

£702. CfLASTRE *Jlrii*. Did. fuppl.
C. à rameaux droits dressés, feuilles ovales acuminées dentées, pédoncules épars uniflores.

Z. n. le Japon. T> *F. opp. cap/. 1-4 loges.*

^703. CfLASTRE *aiti*. Did. fuppl.

C. à rameaux ailés.

L. n. le Japon. *'I ram. &/euiliis oppo/és.*

5704. C&LASTRE *conujlibe*,
C. à feuilles oppofées & alternes elliptiques dentées, cymes axillaires dichotomes.

L. n. l'Arabie. T> *Voye^ dans mn Did. tart.*
Catha, pag. 654.

KJpices ipi eu/es.

270j. CÉLASTRE *ci/ deluis*. Did. n. 4.

C. à épines feuillées, rameaux anjū leu x, feuilles pyoides pbt un peu depi^es; cymes latéralci,

PENTANDRIA MONOGYNIA,

Ex inf. Canariis. "5 VAerie./en. angl. t. to.

269\$. CELASTRUS *populj/olius*.

C. foliis ovatis acutinatis ferratis, umbeliis axillaribus subfcflibus paucifloris.

E cap. Bonec Spei. T> *Jo/ Martin. An eel. acuminatus.* Thunb. cap. prodr.

2699. CEL-ASTRUS *tigynus*.

C. foliis oblongo-ovatis obtuse ferratis, umbeliis axillaribus laxis pedunculatis, flylo subnullo.

Ex infula Frandae. T> *Sonneratia Comrher/ fiutex. Flores perparvi. Stigmata 3f vet flyli 3 brevijimi.*

1700. CELASTRUS *orbicular us*.

C. foliis rotundatis acuminatis ferratis, pedunculis axillaribus luteo-trifidis.

Ex Japonia. f> *Thunb. jap. p..97./ul nomine C. articulati.*

2701. CELASTRUS *punatus*.

C. ramis scandentibus punatus, foliis ovatis ferratis.

Ex Japonia. T> *Thunb. jap. \$j.*

2702/CELASTRUS *firiatus*.

C. ramulis erectis ferratis, foliis ovatis acuminatis ferratis, pedunculis sparsis unifloris.

Ex Japonia. J) *Thunb. jap. g8l*

2703. CPXASTRUS *alatus*.

C. ramis alacis.

Ex Japonia. T> *Thunb. jap. 98.*

2704. CELASTRUS *edu'is*,

C. foliis oppositis alter illique ellipticis ferratis, cyans axillaribus dichotomis.

Ex Arabia. ^ *Cathaedulis. Forshj Egypt. 63.*
Vahl fymb. 1. p. 21.

Spinofl!

270*. CELASTRUS *buxl/oiius*.

C. (piuis foliofi*, camis angulatis, foliis ob-ovatis obtusiflub dentatxs j cyiplslateraibus.

PENTANDRIE MONOGYNIE.

JB. Le même à cymes multiflores. *Ct/ajl/e'multiflore.* Dift. n. ;.

\mathfrak{f}_f n. l'Afrique. T>.

270\$. C&LASTRE *pyracanthe*. Di#. n. 7.

• C. à épines nues, feuilles oblongues ovales: à dents rares très-petites prefq̄ Tépineufes > cymes dichotomes.

X. /nl'Afrique. T) *Capf. à 3 logespolyfp.*

1707. C6LASTRE du Sénégal. Dift. n. 6.

C. à épines feuillées, rameaux cylindriques, feuilles glauques ovales-lancéolées à dents inégales, cymes latérales pauciflores.

L. n* le Sénégal. T> *Arbriff. à rameaux rouges* [redacted] aujard. de Paris.

2708. C6LASTRE à pethesfUurs. Díd. fupp.

C. à épines nues, feuilles ovales crénelées, pédoncules filiformes plus longs que les feuilles.

L₄ n. l'Arabie* T> Style nuL Stigmate subtrifide.

* CfILASTRE (*Ihniaire*) épineux, à épines feuillées, feuilles linéaires entières. *Du cap Bonne-EJpérance.*

• C^LASTRE (à feuilles entires) épineux, à épines feuillées, feuilles ovales obtuses très-entières, cymes latérales. *Du cap Bonne-EJpérance.* F. riflichies.

• C^LASTRE (*Jili/orme*) inerme, à feuilles lancéolées entières, rameaux filiformes, fleurs axillaires. *Du cap Bonne-EJpérance.*

• CfILASTRE (*micropkylle*) inerme, à feuilles ovales obtuses émierées, panicules terminales. *Du cap Bonne-EJpérance.*

• CfILASTRE (*ceuché*) inerme, à feuilles ovales dentées, fleurs axillaires, tige couchée. *Du cap Bonne-EJpérance.*

362. SENACIER.

Caraa. effent.

CAL. y-fide. Cinq pétalies. Un flyle. Capf. x-
l o a te j a v a ve.

TCNTANDRIA MONOGYNIA. 9S

fi. Idem cymismultifloris. *Cclafirus hispanicus.* Hon. Pans.

Ex Africa, b.

2705. CELASTRUS *pyracanthus.*

C. fpinis nudis, foliis oblongo-ovatis : deqr tibus raris minimis fubfpinofis, cymis di^ chotomis.

Ex Africa. % *Gasrtn.* *, p. 85. t. g5.

2707. CEI.ASTRUS *Senegalenfis.*

C. fpinis foliofis, ramis teretibus^ foliis glaucis ovato-lanceolatis inaequaliter dentatis, cymis lateralibus paucifloris.

E Senegal. T> *Adanf. C. phyllacanthu**. L'herit. fert. angl. 6.

2708. CELASTRUS *parviflorus.*

C. fpinis nudis, foliis ovatis crenatis, pedunculis filiformibus foliis longioribus.

Ex Arabia. T> VM. *fymb.* %. p. zt. *Catha spinosa.* Forsk.

*# CELASTRUS (tinetris) fprnofus, fym foliofis, foliis lineai ibus integris. *Lm. j*, fuppl. 53.

* CELASTRUS (integritoliusy fpinofus, fpi-nis foliofis, foliis ovatis obtufis imegerrimis, cymis lateralibus, *Lin. f. Juppl. i5j. Thunb. prod'*, qz.

* CELASTRUS (filiformis) inermis, foliis lanceolati^ integris, ramii filiformibus, flori* bus axillaribus. *Thunb. prodr. 42.*

* CELASTRUS (micropkyllus) inermis, foliis ovatis obtufis integris, paniculis terminalibua^ *Thunb. cap* prodr. 42,*

* CELASI^US (prccumbens) inermis, foliis ovatis dentatis, floribus axillaibus, caule procumbente. *Thunb. cap. prodr. A2.*

362. SENACIA.

Ckarad^ effent.

CAL. j-fidus. Petala_r. Stylus i.. CspC ~~i-loca-~~
u_r i_s_b_v_i_s.

CaraS. nat.

Cal. très-petit, ouvert, quinquefide; à découpures ovales.

Cor. cinq pétales oblongs, obtus, plus grands que le calice, ouverts.

Etam. cinq filaments fubulés, un peu plus courts que la corolle, alternes avec les pétales. Anthères oblongues.

Pift. ovaire supérieure, ovale. Style de la longueur des étamines. Stigmate bilobé.

Perk, capsule ovale un peu comprimée, uniloculaire, bivalve,

Sem. en petit nombre, ovales-réniformes.

Tableau des espèces.

37OP. SENACIER ondulé.

S. à feuilles presque opposées lancéolées ondulees, cymes presque terminales; capf. polyfpe.

L. n. YL11z-de-FTzncc.l>Ce laftre ondulc'. Di&. n. Z.Vulg. boisdemerit.

3710. SENACIER lanceolé. Dift. suppl.

S. à feuilles alternes ovales-lancéolées à dents difiantes, fl. axillaires, capsules polypermes.

L. n. rHie-de-France T> F. glabresi. Pédoncules très-courts.

3711. SENACIER elliptique. Did. suppl.

S. à feuilles elliptiques obtuses très-entières, fleurs axillaires presque en faîceaux.

L. n. les Antilles. T> F. glabres, pitiolées. Cap/, bivalves.

3712. SENACIER maieen. Dift. suppl.

S. à feuilles presque opposées ovales-lancéolées dentées, capsules difpermes.

L. n. le Pérou & le Chili. T> Voye^ dans mon Difr. (vol. 4. p. a.) tart. May ten.

371j. SENACIER odogone. DiA. suppl.

S. à feuilles elliptiques anguleuses presque sans nervures perfoliées, capsules monoppermes.

L. n. le Pérou. 1) Feuilles glauques. Semences grilles.

PENTANDRIA MONOGYNIA,

CharaS nat.

Cal. minimus, patens, quinquefidus : laciniis ovatis.

Cor. petala quinque oblonga, obtusa, calyce majora, jatemia.

Scam. filamenta quinque fubulata, corolla paulo breviora, petalis alterna. Anthere oblongae.

Pift. germenfuperum, ovatum. Styluslongitudine flaminum. Stigma bilobum.

Peric. capula ovata fubcomprefla, unilocularis, bivalvis.

Sem. pauca* ovato-reniformia.

ConfpeSusJpciemm.

2709. SENACIA undulata.

S. foliis suboppofitis lanceolatis undulatis, cymis subterminalibus; capfulis polyfpeifhis.

Ex inf. Francise. T> Commeif. eelafrus unduUktus. Hort. Paris.

2710. SENACIA lanceolata.

S. Foliis alternis ovato-lanceolatis rariter dentatis, floribus axillaribus, capfulis polyfpermis.

Ex inf. Francisc. T> Cap/, obcordatcc vel reniformes.

2711. SENACIA tlliptka.

S. foliis alternis ellipticis obtufis intcgerrimis, floribus axillaribus subfalciculatis.

Ex inf. CaiibCis. J) Richard, folia & inlor./centia Rhamnt/arcomphali.

2712. SENACIA maytenus.

S. foliis suboppofitis ovato lanceolatis ferratis, capfulis difpermis*

E Perua & Cile T> Maytm. Few. ob/ 3. p. 39. t. 27.

271J. SENACIA oSogo-a.

S. foliis ellipticis angulatis subnervibus perennibus, capfulis monoppermis.

E Perua. T> Celaftms oQogonus. Vherit./en. angU p. 7.

3714. SENACIA

2714. SENACIER^A Aiw^A. Dift. suppl.

S. f feuil: elliptiques pointues un peu dentées, cymès axilläues dichot. de la long, des feuilles.

L. n. l'Inde, Ceylan. T> *Pi. glabre*; fiuilles oppofées i fr. bilocul.

363. F U S A I N.

CaraS. ejfent.

CAL. ouvert , en partie couvert par un difque plane , 4 ou y pet capf. 4 ou y-gone , à 4 ou 5 loges , fern, arillées.

CaraS nat.

Cal. monophylle, ouvert , partagé en 4 ou ; pieces , 4fe partie couvert par un difque plane; à découpures ovales ou arrondies.

Cor. Quatre ou cinq pétales ovales , planes , ouverts , plus grands que le calice.

Piji. Ovaire fuperieur , acuiainé, en partie enfoncé dans le difque du calice | un llyle court, lligmate obtus.

Peric. Capfulcolorée₉tétragonone ou pentagonone, à 4 ou ; loges, à 4 ou y valves; à valves feptiferes dans leur milieu.

Sent, folitaires ou en petit nombre , ovales , enveloppées d'une tunique colorée & prcf- que pulptufe.

*Tableau des efpeces.*271. FUSAIN *commun.* Dift. n° 1.

F. à fleurs quadri tides , pétales oblongs un peu pointus , capfules à lobes obtus.

I. n. les bois & les haies de PEuropc. T> *Sesjruits miirs font fum rouge éclat ant.*

2716. FUSAIN *àfeuilles Urges.* Dift. 2.

F. fleurs la plupart y-fides , pétales ovales, lobes des capfules à angles tranchans & en formes d'ailes.

L. n. les bois de la Suifle , l'Autriche > &c. f> *Grandarbrijf* if. oppofées**

3717. FUSAIN *galeux.* Did. n. 3.

F. à fleurs 4-fides , pétales arropdis d'unpourpre brun, rameaux verrueux*

*Botanique. Tome II**

2714. *SRftACUL ghiiea.*

S. foliis ellipticis subferratis acutis,cymis axillaribus dichotomis folia requantibus.

Ex India, Zey lona. Tj *V&hU symb.* Il» p. qx* *Mangifira glauca.* Rottb. aS. nov.havn.

363. E V O N Y M U S .

CharaS. ejfent.

CAL. patens difco piano partim teftus. Pet. 4 feu y. Capf. 4 feu y-gona', 4 f. y-locularis** Sern. ariilata,

CkaraSt. nat.

Cal. monophyllus , patens , 4 feu y-partittiff difco piano partim tedus : laciniis ovalibus vel fubrotundis.

Cor. Petala 4 feu y , ovata y plana , patentia % calyce majora.

PiJl. Germen fuperum , acuminatum , difco calycis partim immerfum. Stylus brevis. Stigma obtufum.

Peric. Capfula colorata , tetra vel pentagona » quadri feu quinquelocularis quadri feu quinque-valvis ; valvis medio feptiferis*

Sem. folitaria vel pauca , ovata, arillo fubpulpofo coloratoque obvoluta.

*ConfpeSus specicrum.*271 y. EVONYMUS *vulgaris.* T. 131.

E. floribus 4-fidis , petalis oblorgis fubaou^A minatis , lobis capfularum obtufis.

Ex Europae fylvis & fepibus. T> *Ev • euro* pecus.* Lin. Bulliard herb, franc, t. %%\$5.

2716. EVOKYMUS *latfoliuji.*

E. floribus plerisque y-fidis , petalis ovalibus, capfularum lobis acutè angulofis a**B** fonnibus.

Ex Helvetix, Auftriae , &c. fyivis. ^ *Jacq.* Aufi. j. t. 289.

2717. EVONYMUS *verrucofus.*

E. floribus 4-fidis , petalis fubrotundis pur* pureo-fufcis , ramisverrucofis.

L. n. l'Autiiche, FHongrie. T? .

2718. FUSAIN *no'tr pou-prs.* Difl. 4.

F. a lleurs 4-iidcs & j-iiues , peules arrondi> d'un pourpre-brun, rameaux liffes.

L. n. de PA 11 cf, feptent. Tj. F. *pit'&tees waits la tatoltes, liffes,*

2715. FUSAIN *JAmiriqu*, Difl. ;.

F. i flours toutes j-liJcs, feuilles fellllcs m*s-emieres.

X. n, TAnicr. feptent. f>, *Arbriff* toujours vert, ram. Of, Ofpaft,*

-720. FUSALiV *odomm*, VIA. 7.

F. a flcurs t-fides , feuiUea oblongues 1O-mfcs tmiercs.

i. n. iejapon. B F. *mmaffe'es aux commite'i Jes rume>iaxjl, blanches, oj^rantts,*

37:1. FUSAIN *du Japon*. Did. n. 8.

I*, a Ilcurs quuddrill^es , f. ovales obtufes dcueées.

i. n, le Japon Tj . Pet. *blancs arrondis.*

~Qbf. L'evonymus *Insrnis* de Forsk *est une efpiee duckna.*

Explication des fig.

Pl. 131. FUSAIN commun. (a) Fleur entière. (b) Calice. (.) Pétales. (JJ Csiit^a- . difque & imnnites. (<) Une étamine séparée & profile. (/) Calice , difque 8fp. fil. (g) aptlie tiKitre. (4,0 La même s'ou- iranc. (/, ffi, re) Si-trirrces av>x k-ur tunique propre. (v) j^tiKtice nut, (-) Raineau garni de Scurs.

3^4. H O V E J T i

Cara3. effeni.

Cal. ;-fne. pét. roulés en dedans, Sijgin. 5 H.e. Cap. ^iotulaire , 3-fenne.

Cara8. nac.

Cal. nonophyUe , plleux B fa bafe interne , pertiftant, quiikjuefJej i dcoup* ovaii.s, réflechies caduc. ic3.

CL/. <inq pétales ovoTdes , rrcs-obius, ouverts, roulés en dedanJ par lesbords, cnveio; pant lrs étamines , inser's an ralice entTC fes dé- coupures fc tic niC-me longueur qu'elles.

Ex Aullria , Pamonia. ft *Jacq, Aufl.* 1. / . 49,

2718. EVONYMUS *airopurpureus*,

E. fioribus 4 iidis & y-fidis , petalu fiibrotundis pHrpureo-fufcis, ramis ixvibus.

Ex America boreali. t> /rtf^. A, vend. a. f. rxo. Pedant, comyrtjft. ah.

2719. EVONYMUS *amtricanus*.

E. Ho rib us omnibus j-fidis , foliis feffilibu* integrerimis.

Ex America boreali. f> *Frutex fanpervirens** *Commei. ion, z. r. 5**.

2720. EVONYMUS *tobira*.

E. floribus \$ tidis, foliis oblonM* re mils in-tegkie.

Ex Japonti. T> *Tkunb. ft. Jap.* (?p. *tobira Kämpf. amain, exot. t. 757.*

2721. EVONYMUS *japonhus*.

E. floribus quadriudis , foliu ovatis obtufis ferratis.

Ex Jiponia. fj *Thunb. Jap, p, zoo.*

Okf. EVONYMUS *inermis* Forsk ejl ochna Jpec,

Explcaua iconum.

Tab. rjT. EVONYMU< vul^rh.'(a) Flos integer. (A)

Ca'i x. (t) P;t;lj. (-/ Calyx, discus , fbinina. /t) S:amen

>jr3liim & aii&iiu. (O Calyx, discus pittfHliTn.

(S) Ca;V|H1J intspra. (A^) Kadem dtlitfcens. (/, m, /1)

5tniij>a aril^ia. (O) Semen dtnudarum. f/g. ex MiJ. (1)

Ramal us floridus. Exji.1.0.

3C4. H O V E M A.

CharaS tjfenr.

CAI. j-frdui;. Pet. f convoluta. Stjgm. 3-fidum.

Caj f. 3-Iocularis , 3-f perma.

Charts. Ad .

(,•/ mottoj-hyiias , bifi interne pilofus , per- filer,s, quiaquiciidm : Uciniis ovatis rcfleiis. deciduis.

Cor. Petala *quinque cibv.Ua obtutlfUma , pa-tula , convcluu, ilninina obrolmuia, calyci iiucr ti[niias iuietta , earuuique lortgi- tudine.

PENTANDRIE MONOGYNIE,

Etam. Cinq filaments inférés à la base du calice, enveloppés par les pétales. Anthes arrondies, renfermées dans les pétales.

Pift. Ovaire supérieure; style droit, plus court que le calice. Trois ligatures ouvertes, réfléchies & obtuses.

Peric. Capsule ovale - globuleuse, à 3 cellules, triloculaire, trivalve.

Sem. solitaires, lenticulaires, très-glabres.

Tableau des espèces.

2722. HOVENE du Japon. Did. 3. p. 138.

L. n. le Japon. Arbre médiocre, ayant tafpe3 d'un poirier. Pedonculs ckarnus bons & manger.

365 VENANA.

Car ad. effent.

CAL, inférieur, à 5 lobes. \$ pétales. filets nombreux qui naissent du réceptacle. Stigmate fubrigone.

Caract. nat.

Cal. monophylle, court, à cinq lobes arrondis.

Cor. f pétales ovales - arrondis, 3 fois plus grands que le calice, ouverts.

Etarn. 5* filaments, dilatés à leur base, de la longueur des pétales. Anthes ovales, vrillantes. Des filets nombreux, plus courts que les étamines, inférés autour du pifil pour le réceptacle.

Pift. Ovaire supérieur. Style un peu épais, plus court que les étamines. Stigmate obtus, presque trigone.

Peric.

Sent.

2723. VENANA de Madagasc. Did.

L. n. Tide de Madagasc. X> Arbre. F. alternes + ovales, retuses, coriaces, glabres. Craptes lâches terminées, Pedonc, compri-

PENTANDRIA MONOGYNIA.

w

Stam. Filamenta y, bafi calyces inferta, petalis obvoluta. Anthera fubrotundata intra petala recondite.

Pift. Germen fuperum. Stylus erebus, calyx brevior. Stigmata 3 patulo-reflexa, obtusa.

Peric. Ca^fu'a ovato-globosa, trifolia, trilobularis, trivalvis.

Sem. solitaria, lenticularia, glaberrima.

Confertus specierum*

2722. HOVENIA dulcis. t. 131.

Ex Japonia. Thunb, ft. Jap, 101. Sicku. Kampf. amccn. ex. p. 808. ic. 809.

365 VENANA.

Charac. effent.

CAL. inferus, y-lobus, petala y, fetae plurimae è receptaculo. Siigma fubtrigomim,

Charac. nat.

CaL monophyllus, brevis, j-lobus : lobis rotundatis.

Cor. Fetala y, ovato-fubrotunda, calyx triplo majora, patentia.

Stam. Filamenta quinque, bafi dilatata, longitudine petalorum. Anthera ovatae vera tiles. Setae plurimae, (laminibus breviores, è receptaculo enatae, circa pillillum.

Pift. Germen fuperum. Stylus fminibus brevior, crassulus. Stigma obtusum fubtrigonom.

Peric.

Sent.

2723. VENANA madagascariensis. t. 131.

Ex infula Madagascariac* T. COMMERS, Arbor, folia aft. ovata, rufa, glabra. Racemi taxi terminates. Pedoncili comprejji%

too PENTANDRIE MONOGYNIE.

mées , portant à Uur sommet des fl. ramajfies & feffiles.

Explication des fig.

PI. i) I. VENANA *de Madagafcar.* (a) Fleur entière. (b) Calice. (c) Etamines , piftil avec les filets du réceptacle. (d) Sommité de rameau , avec des péduncules.

366. POLYCARDIA .

Caract. effent.

CAL. a y lobes. \$ pétales. Capf. coriacea 3 - j Juges , à 3-y valves semi-feptiferes. Semence^ demi-tuniquées à rombilic.

Caratt. nat.

Cal. monophylle , court y ouvert , partage' en S lobes arrondis.

Cor. \$ pétales ovales-arrondis, plus grands que le calice , ouverts.

Etam. 5* filaments courts , alternes avec les pétales. Anthers ovales.

Fiji. Ovaire supérieure , un peu globuleux , environné par un disque plat. Style court. Stigmate tronqué , un peu lobé.

Feric. Capule coriace , préférable ligneuse, ovale, à 3 ou 4 Sc rarement cinq lèvres , à auant de valves : à valves épaiées , dures , semi-feptiferes.

Sem. foliaires , quelquefois geminées , préférable ovales y demi-tuniquées à l'ombiliac.

Tableau des espèces.

3724. POLYCARDE phyllantoide. Did.

L. n. Tille de Madagafcar. T>. Arbriff. gla-
bre \$ ay ant des feuilles alternes , lanceolées-
tvlées, les unes entières & stériles, Us au-
tres ichançries au sommet & florifères.

*Explication des figures**

PI. 1}2. POLYCARDE phyllantoide. (a) Bouton de Heur. (J>) Fleur entière , ouverte. (c) La même vue en-deffous. (iQ^araine. (e) Piftill (/) Sommité d'un laniacu.

PENTANDRIA MOKOGYNIA:

apice flores aggregatos fejfitcfque fuj!i~nent.

Explicatio iconum.

Tab. n.i. VENANA *Madagafcariensis.* (a) Flos integer. (/) Calyx. (c) Stamina , püHllum cum fetis receptaculi. (d) Summitas ramuli , cum pedunculis» Exicc*

366. POLYCARDIA .

CharaS. tffint.

CAL. y-lobus. Petala 5*. Capf. coriacea, j-jT-locularis , 3-j-valvis: valvis semi - feptiferis* Semina ad hilum semi-arillata.

Charad. nat.

(*at. monophyllus , brevis, patens, y-partitus; lobis rotundatis.

Cor. Fetala y, ovato - fubrotunda, calyce ma-
jora, patentia.

Scam. Filamenta J, brevia , petalis alterna. An-
therae ovatse.

F ft. Germen fuperum , fubglobosum , difca piano circumdattim. Stylus brevis. Stigma truncatum, fublobatum.

Peric. Capula coriacea , fublignosa , ovata % tri vel quadri & rarō quinquelocularis , to-
tidem valvis : valvis craflis y duris y feud* feptiferis.

Sent* folitaria , interdum bina , fubovata , ad hilum semi-arillata.

Conopeus Specierum.

2724. POLYCARDIA phytanthoides. 1.132.

Ex inf. Madagafcariae. T> COMMERS. htrb+ JuJF* £*n* P* 377* Frutex^ glabtr,f. alternis,
lanceolato-ovatis , alis integris & flerilibus ,
aliis apice erarginatis & florifiris*

Explicatio iconum.

Tab. 1? 2. POLYCARDIA phyllanthoides. (a). Gemma? floris. (£) Flos integer , expanfus. (c) Idem intérne yifus. GO Stamen, (r) Piftillum. (/; Summitas rami. £r
fcca.

367. OLIVETUR.

CaraS. effent.

CAL. partagé en y. y pétales. Drupe ovalc : à noyau fubtriloculaire.

CaraS. nat.

Cal. très-petit, partagé en \$ découp. ovales, obtus, concaves, periflantes.

Cor. S pétales arrondis, ouverts, unc fois plus longs que le calice.

Etam. y filaments fubulés, courts, inférés au disque du réceptacle. Anthers arrondies.

Pijl. Ovaire supérieur, arrondi-conique, foulé, tenu par un disque glanduleux. Style court. Stigmateobtus.

Teric. Drupe ovale : noyau épais, très-dur, fubtriloculaire : ayant très souvent deux loges arborées.

Sent, oblongues, un peu comprimées, fubgeminées, l'urie avortant confitamment.

Tableau des espèces.

272f. OLIVETIEK oriental. Dia. 4. p. 737. O. inerme, à f. oppofées, multiformes par l'âge, ombelles pédoncules axillaires.

L. n. Tide de Fra*fc. T> Arbre qui vane singulièrement dans la forme de fisif. suivant l'âge des individus.

2726.^ OLIVETIER <TAfri<iue.

O. a f. alternes 8c fafciculées, rameaux épineux, fleurs axillaires, presque feffiles, ramifiées.

L. n. le royaume de Maroc. T> Argan à pethesfeuilles. Did. n. p. Petit arbriff. épineux, toujours vert.

Explication des fig.

PT. 132. OLIVETIBR Oriental, (a) Rameau fleuri. (b) Feuille d'un jeune individu, d'après M. Jucquin. (c) Feuille d'un jeune individu, d'après mon herbarier; (d) Feuille d'un vieux individu, d'après mon herbarier, (e) Owbelle Kparée. (/) Drupe entière. (g) Noyau découvert dans la partie supérieure. (k) Drupe coupé transversalement. (/, <, >) Seinences separ&s. (I, m) Semences couplées*

367. E L I O D E N D R U M .

Chara3% ejgent.

CAL. y-partitus. Petala y. Drupa ovata: nucleo fubciloculari.

*Cham3. nat.*Cal. minimus, y-partitus: laciniū ovatis, ob[^] tuis, concavis, periflentibus.

Cor. Petala 7 fubrotunda, patentia, calyce duplo longiora.

Stam. Fi I amenta y, fubulata, brevia, è difco recepticuli enata. Anthers fubrotundae,

Pijl. Germen superum; rotundato-conicum, difco glandulofo infidcns. Stylus brevis. Stigma obtufum.

Perk. Drupa ovata: nucleus crassus, durissimus, fubtrilocularis: loculis duobus fecipiūd abortivis.

SenK oblonga, comprediuſcula, fubgemmata, altero confianter ab[^]rtante.*ConfpeSns fpederum.*

272J. ELIODENDRUM orientate. 1.132. E. inerme, f. oppofitis, aetatc muhifonniis, umbeliis pedunculatis axilt.

Ex infula Francis. T> Jacq. icon. rar. z. t. 32.. Rubentia. Commers. maff & Juff, gen. p. 378.

yj26. ELIODENDRUAL argan.

E. foliis alternis fafciculatique, ramiff spinofis, floribus axilladbus fubleffilis coil* geftis.

E Marocano. T> ElxodendfUm argon. Retfr fafc. €. n*%Q. Sideroxylonpinofwn. Lin.

*Explicath zconum**

Tab, MI- ELiODFNDRUM Orient die. (a) Ramus floridus. Ifx Jacq. (f>) Folium junioris arborfc, ex D. Jacq. (r) Folium junioris arboris, ex kerbario ficcm* (d) Folium vftutioris arboris, ex herbaria ficca. (e) Umbella separata. EM D. Jacq. (/) Drupa integra. (g) Puuraen supcrne denudatum. (A) Diupa fah Verh feCta. (/, H) Semina foluta. C[^] at) &**\$ dedca. Fig. ex Gmn.

104 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Sem. nombreuses, un peu anguleuses, attachées à un placenta filiforme.

Tableau des espèces.

«73i. GENIOSTOME des roches. Did. 2.
p. 62\$.

X. n<

Explication des fig.

PL 13 j. GENOSTOMEA/ rockers, (a) Fleur de grandeur naturelle. (A) Corolle un peu groflie., vue en deflus. (c) Etamine. (d) Piñil. (0) Capfule de grandeur uaturelle. (/) La même grol&e & coupée en travers.

371. P O R A Q U E B E .

Caras. ejfent_m

CAL. à 5* dents. Cor. partagée en \$ découp. ay ant jfoffettes à leur furiacefup. Amheres 4-gones, réunies. 3 fligmates.

Caract. nat.

CaU monophylle, très-petit, à % dents.

Cor. fubmonopétale, partagée en j. Découp. oblongues, pointues, convexes en deffous, concaves en deflus : à cavité double : la fupirieure divisée en 2% & l'inf. div. en 3.

Etam. 5 filaments imcaires, plus larges supérieurement, épais, inarginés. Anthres droites, oblongues, tetragones, réunies, iaiitant une roue de niouUn à eau.

Pi/7. Ovaire supérieur, arrondi. Style court. 3 fligmates*

.

Setn.

Tableau des espèces.

2732, PORAQUEBE de la Guyane. Did.

i. n. les forets de U Guyane, T> ^l*bre 'a f. fimples ^ alt ernes. Fl. pct'aes, en grappas axillia res.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Sem. plurima, fubangulata, receptaculo filiformi impofita.

ConfpeSus fpecierum.

2J31. GENIOSTOMA rupestris.t. 133.

Forjl. gen. t. 1%.

Explcatio iconwn.

Tab. 233. GENIOSTOMA rupestris. (a) Flos magnitudinenaturali. (b) Corolla fupernè vila* parim auda. (c) Stamen, (d) Piñillum. (e) Capfula magmtudine naturalx. (/) Eadem auOa & diffe&a. Fig. ex Forfi.

371. P O R A Q U E B A .

Charas. ejfent.

CAL. y-dentatus. Cor. f-partita : laciniis fupra fcrobiculis quinis diflinfla. Antherap 4-gona?, coalitae. Stigm< 3.

CharaQ. nat.

Cal. monophyllus, minimus, f-dentatus.

Cor. fubmonopetala, y-partita. Laciniae oblongx, acutæ, fubtus convexs, (ùprà concavx: fcrobiculo dupli : fuperiori bifido, inferiori trifido.

Statn. Filamenta y linearia, fupernè latiora ; craflà 5 marginata. Antherac eredae y oblongas, ietragonse, coalitae, rotam inolendina* riām referentes.

Pi/?. Germen fuperum, fubrotundum. Stylus brevis. Stigm. 3.

Peric. » • •

Sent* « • •

ConfpeSus fpecierum.

273a. PORAQUEBA Guianenfis. 1.134.

EK fyivis Guianse. X> Aubl. Guy., p. 123. t. ^7. Barnriafchreb. gen.

Explication

PENTANDRIE MONOGYNIE.

Explication des jijg.

PI. M4- PoRAQUEHF de la Guyane. (a) Boufon de fleur. (J-) Calice yu eiwteffin. (c) Lemfimevuen-deffons. (d) Calice, piftil. (e) Corolle vue inférieurement. (/) Corolle vue en-deffus. Etamines réunies. (g) Un lobe de la corolle téparé & une étamine. (A) Le m&ne rcmfermaït fon famine. (i, /) Etamine vue par-devant & par-derriire. (m) Piftil. Etamines. (n) Piftil

372 RINORE,

CaraS. ejfent.

O L . partagé en y. 10 p&a;les: les intérieurs plus petits, oppofés aux extéricurs. Etam. inférées «ux onglets des pétales. Stigm. obtus.

Carad. nat.

Cal monophylle, velu, partagé en y découp. oblongues pointues.

Cor. 10 pétales ovales, oblongs, concaves; y extérieurs plus grands; y intérieurs plus petits oppofés aux extéricurs.

Etam. j filaments courts, inférés à la base des pétales extérieurs. Anthers fagittées, s'ouvrant de bas en haut.

Tijl. Ovaire supérieur, arrondi, velu. Style velu, plus court que la corolle. Stigmate obtus.

Perk.

Sent.

Tableau des espèces.

2733. RINORE de la Guyane. Did.

L n. les terrains défrichés de la Guyane. ft Arbrijf. à f. alt. jl. en grappes.

Explication des jijg.

PI. iJ4.RiNORE^/tf Gtdane. (a) Bouton de fleur. Pldoncule muni de demécailles à la base. (b) Calice. (c) Fleur entière. (d) Fleur ouverte & groflie. (0) Pécale extérieur. (/) Le même avec une étamine. (g) Pécale int. (^) Etamine fépirée. (i) Piftil enveloppé par les pécales intérieures. (0) Piftil séparé.

Botanique. Tome IV.

PENTANDRIA MONOGYNIA. ioy

Explicatio iconum.

Tab. 134. PoRAQUEBA fcuienanjls. (a) Flos non expansus. (b) Calyx fuvernib vifus. (c) Idem infern^ vifus. (d) Calyx, pifillum. (e) Corolla inferni vifa. (/) Corolla fuperne vifa y (Umina coalcta. (g) Lobus corollat fregregatus & ftamen. (A) Idem Satpen inclu* dens, (i, /) Stamen 4 fronte & 4 tergo vifum. (m) Pifillum. Stamina, (n) Pifillum separatum. Fig. en AubL

371. RINOHEA.

CharJd. ejfent.

CAL. § partitus. Petala lo : interiora minora, extenoribus oppofita. Stamina petalorum tinguibus inferta Stigma obtufum.

CharaS. nat.

Cal. monophyllus, villosus, J-panitus : laci* niis oblongis acutis.

Cor. Fetalia 10 ovato-oblonga concava. y exteriora majora; f interiora, exterioribus oppofita, minora.

Sum. Filamenta j* brevia, ad bafim petalorum extiorum inferta. Antherae fagittatae, à baft ad apicem dehifcentes.

Pifl. Germen fupemm, fubrotundum, villo* fum. Stylus corollâ brevior, villosus. Stigm* obtufum.

Peric.

Sem.

ConfpeHus specierum.

2733. RINOREA Guianenfis.x. 134.

Ex Guianre cultis. Ti Aubl. %\$. t. 93. Juff. gen. p. a.87.

Explicatio iconum.

Tab. 134. RINOREA Guianenfis. (a) Gemma florif. Pedunculus bafi bifquamofus. (9) Calyx, (c) Flos integer. (<0 Flos ape rtsift& auftus. (e) Petalam ext. (/) Idem cum ft^mine. (g) Petalam int. (A) Stamen separatum. (/) Pifillum petalis extioribus iovolutiuu. (I) Pif* tillam separatum. Fig. ex AuhL

O

106 PENTANDRIE MONOGYNIE.

373. R I A N E.

CaraS. effent.

CAL. partage en y. 10 pétales : les extérieurs plus grands, connivens à leur base, alternes avec les int. Style en mafue. Stigm. obtus.

CaraS. nat.

Cal. monophylle 5 partage en 7 découp. ovales pointues*

Cor. 10 pétales ovales, pointues, cinq extérieurs plus grands, connivens à leur base ; cinq intérieurs plus petits, alternes avec les extérieurs.

Et/im. f filamens très courts, inférés à la base des pétales intérieurs. Antheres oblongues*

Piji. Ovaire supérieur, ovale, marqué de 5 côtes, velu. Style «liarnu» en mafue. Stigmate obtus.

*Peric. . . .**Sem. . . .*

Tableau des espèces.

2734. MANE de la Guyane. Dift.

X. n. les forêts de la Guyane. T> Arbriff. à /T oppojl dtntées.

Explication des fig.

PI. r;f. f. 1. KIAHF. de la Guiane. (a) Boilton de fleur. Ecailles. (b) Calire. (c) Flur épanouie. (<0 Fleur ouverte & groffie. (0 Pétales extérieur. (/) Pétales intérieur ayea fon étamine. (g) Etamine séparée. (A) Piftih

374. e O N O R I.

GiraS. effent.

CAL. partage en y. y pétales connivens en tube à leur base. J écailles à la base des pétales. Style flexueux. Capfwle oblongue, uniloc. 3-valve.

CaraS. Mat.

Cal ouvert ^partage en \$ découp. oblongues pointues.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

373. R I A N A.

Ch'iraS. effent.

CAL. y-partitus. Petala 10: exteriora n?ajora> bafi conniventia, interioribus alterna. Stylus clavatus. Stigma obtufum.

CharaS. nat.

Cal. monophyllus, y-partitus ; laciniis ovatis acutis.

Cor. Petala decem;- ovata j acuta : quinque exteriora y major a, bafi conniventia ; quinque interiora, minora y exterioribus alterna.

Stam+ Filamenta y brevissima, bafi petalorum interioruin inferta. Anthers oblonge.

Pift. Gormen superum, ovatum, torulis X diffinAum, villosum. Stylus carnofus, clavatus. Stigma obtium.

*Peric. . . .**Sem. . . .*

Confpus speciem.

^734. RIAKA *Guianenfis* t. 13^ f. I.

Ex fylvis Guianie. T> Aubl. zjy. t. 54. Jaffl gen. p. 2,87. ubi frus. dejeribit.

Explicatio iconum.

Tab. T 55^ f. 1. RiANA *Guianenfis*. (a) Flos non expanfus. Squamx. (b) Calyx, (c) Flos expanfus. (4) Flos apertus & auftus. (e) Petalum ext. (/) PetaJui int. cum ftamine. (g) Stamen Teparatum. (A) Piftillum Fig. ex AubU

374. C O N O R I A.

CharaS. effent.

CAL. y-partitus. Petala quinque, in tubum bafi conniventia* Squamae j ad bafitn petalorum. Stylus flexuofus. Capfula oblonga, uniloc. 3-valvis.

CharaS. nat.

Cal. patens, quinquepartitus; laciniis oblongis acutis.

Cor. \$ pétales ovales-lancéolés, connivens en tube à leur base, ouverts à leur sommet. Cinq écailles inférées à la base des pétales.

Etam. f filainens très courts, inférés à la base des pétales. Anthes oblong, droites.

Pijl. Ovaire supérieur, arrondi. Style filiforme, ondulé en zig-zag. Stigmate en tête.

Peric. Capitale oblongue f trigone, uni-loculaire, trivalve : à valves un peu comprimées, portant les femelles, dans leur partie moyenne.

Sem. globuleuses, attachées au nombre de 3 dans chaque valve à un placenta longitudinal.

Tableau des espèces_m

aritif. CONORIA undtre. Did. 2. p. ptf;

L. n. les forêts de la Guyane. T> Arbriff. à f_m gppoées, ovales-acuminées, entières[^] veinées. Grappes term, plus courtes que les feuilles*

375. R U I S C H E.

CaraS. effent.

CAL y-phylle, ayant en defibus une bradée charnue. Cinq pétales réfléchis. Style o. Fruit i S loges.

CaraH. nat.

CaL pentaphylic, perfiflant: k folioles arrondies, concaves, embriquées; ayant à la base une bradée charnue, entière ou lobée.

Cor. f pétales ovales, plus longs que le calice, réfléchis.

Etam. Cinq filaments aplatis, fubulés, plus courts que les pétales. Anthes oblongues, couchées.

Pijl. Ovaire supérieur, ovale. Style nul. Stigmate aplati à 4 ou 5 rayons.

Peric. Baie ? à 4 ou 5 loges.

Sem. . . .

Cor. Petala quinque, 'ovato - lanceolata, bafi in tubum conniventia, apice patula. Squamae quinque ad bafnn petalorum infenae.

Stam. Filamenta quinque, brevissima, ad balan pcularum inferta. Antheice oblongze eredae.

Pijl. Germen fuperum, fubrotundum. Stylus fijiformis, flexuarius. Stigma caputum.

Peric. Capitula cblonga, trigona, unilocularis ^ trivalvi^: valvis fibcompreffis, medio feminiferis.

Sem. globofa, 3 in medio singulac valvse, placemant longitudinali affixa.

Confpe&us fpecierurn.

273 f. CONORIA flavefcerts.

Ex fylvis Guianae. T> IUuflr. t. i\$5. f. JU Sub n. Rianx. Conohoria. AubU i. p. £££• t. Q5- PaJbura Guianensis ejufd. 2.p. 2t. t* 380. Ex obf. D. Rich.

375. R U Y S C H I A .

CharaS. effent.

CAL. f-phyllus, bractea carnofa fubjeda. Petala f₃ reflaxa. Stylus o. Frud. j-locularis<

CharaS. nat.

Cal. pentaphyllus, perfiftens: foliolis fubrotun* dis concavis, imbricatis; bafi audus bractea carnofa, integra vel lobata.

Cor. petala quinque, ovata, calyce longiora, reflexa.

Stam. filamenta quinque, piana, fubulata, petalis breviora. Anthers oblongs, iacumbentes.

Pijl. germen fuperum, ovatum. Stylus nullus. Stigma planum quadri feu quinque radiatum.

Peric. Bacca 7 quadri feu quinque locularis.

Sem. . . .

Tableau des espèces.

- 5736** RUISCHE 'af. *declufier*. Dift.
R. à f. ovoïdes, obtusés, fl. à bractée entière, en maïtie.
L. m. les bois de la Martinique. T> *Arbutus parafite*.

- 5737.** RUISCHE *de Guiane*. Dia.
R. à f. ovoïdes obtusées, fl. à bractée fort grande partagée en 3 lobes.
t. n. la Guiane. T> *Bra3. un beau rouge**

Explication des fig.

PI. IJ J. f. X. RUISCHE 'af. *it clufier*.

PI. 1 jf. f. 2. RUISCHE *de Guiane*. (a) Bouton de fleur fans bra&ée. (J) Fleur ^panouie. (0 Bradée. Elle est atrachée au calice par son milieu, (d) Etamine. (e) Pifil. if) Ovaire coupé cranverfalement.

375. A N G U I L L A I R E .

CaraS. effent.

CAL. partagé en y. Cor. i-pétale, prof, y-fide.
Baie sèche, i-loculaire, 1-(perme).

CaraS. nat.

Cal. monopaille, perfilant, partagé en J dé-
coup, ovales-lancéolées, pointues.

jCor. monopétale, profondément y-fide, à dé-
coupures lancéolées, ouvertes, une fois plus
longues que le cal.

Btam. f filaments très courts, inférés à la base
de la corolle. Anthers (lignées, drcites.

fift. Ovaire supérieur, globuleux. Style filiforme,
plus long que les étamines. Stigmate simple.

Ptric. Baie sèche, globuleuse, coriace, uni-
loculaire, mucronée par le style.

Sem. une feuille, globuleuse^ marquée à la base
par une saillante ombilicale.

Tableau des espèces. ^

- 2738.** ANGUILLAIRE *de Ceylan*. Did. fuppl.
A. à panicules terminées ; les pédicelles

Conféclus fpecierum.

- 2736.** RUYSCHIA *clufiafilia*. t. itf. S. r.
R. foliis obovatis obtusis, floribus bracteis
clavata indivisa.
Ex Martinicae fylvis. T> *Jacq. amer. t. ft**
f. %.

- 2737.** RUYSCHIA *fouroubea*. u 13.; f. 2.
R. foliis obovatis obtusis mucronatis, floribus
bracteis prsegrandi triloba.
Ex Guiana. T> *Aubl.guy.p. 2.44. t.pj.*

Explicatio iconum.

Tab. 155. f. 1. RUYSCHIA *clu/iifolia*.

Tab. 135. f. 1. RUYSCHIA *founubta*. (a) Gemma Boris
abfque bractea. (f) Flos expanfus. (c) Bractea. Parte me-
dia calyci adharret. (d) Sumen. (e) Pifillum. (/) Germen
transversum. Fig. ex AuU. & exfico.

37\$. A N G U I L L A R I A .

CharaS. effent.

CAL. jr-partitus. Cor. r-petala, y-partita. Bacca
exfusca, i-locularia, i-fperma.

CharaS. nat.

Cal. monophyllus, periflens, quinquepartitus:
laciniis ovato-lanceolatis, acutis.

Cor. monopetala, profundè quinquefida: laciniis
lanceolatis, patulis, calyx duplo longior-
ibus.

Scam. filamenta quinque, brevissima, bad coro-
inferta. Antherae fagittata?, credce.

Pifi. germe fuperum, globofum. Stylus fili-
formis, ftaminibus longior. Stigma (im-
plex.

Ptric. bacca ficca, globofum, coriacea, unilocu-
laris, stylo mucronata.

Sem. unicum, globofum, infra fovea umbilicali
exsculptum.

Confésus fpecierum.

- 51738.** ANGUILLARIA *Zeylanka*. Goertn.
A. faniculis terminalibus : pedicellis sub-

prefqii'en ambelle : feuillcs ellipt. con.ices , très emicres.

*L. 7i. l'ifle de Oylan. f> Pdit nrbre, ayant tajptllifun ccrfitr, &s feuiUcs font elliptiq. epaijjei_f coriacet, gta>rcs, vei*euft* 0 al- r ernes, Il y a d*\$ bra&es fubtile'es, counts & caduques à fa bafe des pidi&lles.*

273 9, ANG UILLAIRE *de la Guiane*. D3& L A* à gra_r pes axjll. & leriuniales , *I. ovules tcamioiet* très cinieres.

I. n. lea foras de la Guiane. T> Arbriff. it 6 anpitis. *F. glabres^fruitsjdunes.*

3740. ANGUILLAIRE./e *laJm&jue*. Dia. f. A- a paniculc termiuale , corolle rtiflOcliie, {. ellipt. emieres nerveufcs / lige arbor<te.

L. a. la Jamsique. I? Arbred'environ \$opitds. Ft. purpurincs.

=741. ANGUILLAIRE *kf.d-turner*. Did. f. A. à giappcs limples axillaires & lerninales, feuillcs laiccolcci - ov*lei obiufcs cntiercs coriaces.

L. n. Jcs Antilles, fj Let feuilUs fontgtuires, fangiies de q à 5 polices, eparjes 0 nunaffecs eux fbamitu,

2742. ANGULLAIRE *if. langws.'D'.&. f.* A. a paniculcs ;iloiii,c(s , axil I. /. lanceolces-oblong\ies litfes ires eiuicies.

L. n. rifle dc Fnince. T? v Ig. bow de pin "de. F. tongues de 5 à Gpouces.

ANGUILLAIRE *chnophytle*, Difl. f. ;i panic tile lerminale, j'. ovilcs-lanc^{éolées} acuminces denteeles dortfes en dtffous.

L. n. St.-D^minguc. T) Pa/ieulecompoft'e, en pyramide I^e termin^e It. Bales rouges. FUur, rtoicttcs.

' ANGUILLAIRE (hreriflore) a grappw Ja :crj1«& axillaires compoft'es, flcuii en om belJcs, **feuilles** obJon^ues acuniinccs entities, Uge li^ncufe I*Amir. (Us ciinusts chtads dc)

* ANGUILLAIRE (parade) a grappwaxill. f'mples , f. fcfllics 1 a net-n lets o vales ra} écs. Tig;e lignaife. Morufer; ut.

umbellatU, foHis clliptkis coriaceis intc-gcrriniis.

Ex Zeylona. T> *Tumt* . &c, Burm. Z cyl. r. **to}**, *Badvla*, Jufl', p. ^ao. *Ardifia ka~ilis*. **Vabl**, Symb, j. p. qo. *Angullt*. *Zcyclanicn*. Goctin. t. yy. *ieacona*, llutlr. c, 136*. / a.

273P. ANGUILLARIA *kacorta*.

A. racemis axij!uribtis& terniiialibua , **foliii** ovatis **acumitiaua** inttrg^rrimis.

Ex Guiaiw fylvis, T) J'cic rea. Anhl. t, \$53. illuflr. t. **ij&jj**. Ex objl D, RH hard.

2740. ANGUILLARIA *tiaijblie*,

A. jranicula irniinali, corolla rcflexa , foliij t-ilij'tcis imegm nervofis , caule arboreo.

Ex Jamaïca, ft *Ardifia tinifolia*, Swaxi. 4.8. jtifmnum Jorte., Sloan. Jam. h'tfl. 2. t. **xos**.

2741. ANGUILLARIA *laurifolia*.

A. racemis fiivipUcibus axillaribus ft itrminalibij , foliis lanceolaioovaii* obtulisinreyyiis coriacet.

Er inf. CaribzeU. f? JulT, herh. Ikibaiba. Surian. herb. n. 7^0. An ardifa Coriucta.

2742. AXGLIJLLARIA *Btmhefia*.

A, pamcumclon^ms aiillaribus ; folia Un-c^olato-oblongis itcvit us integerin;is.

Ex infula Francia. 1>*Banhefia*. Comtn erf. Juff_w hfrb. & gen. p. qza.fub badii.

27-tf. ANGUILLARIA*ihrysophylla*.

A, paniculairer.inilt, foliis ovato-l:!:iceo!auia cmniiuut ferriUii* fubtus uriis.

E Domingo. f> *Celtis*.,, Plum, ameri- ic \$0, An arjishi ftrrutata. Sw ? Fi, violacei.

* ANGUILLAMA [*buriflom*) racemis late- ralibu^ aiiijaribus «otnpofius, floribusum- bellatis, foliis oblois, gis acumina As intgerri- • n, i *; caule fruticofa, Sw~ n.^jub ardifa.

* ANGUILLARIA (*paraficica*) racemis axii. Hui^Hcibus, foliU fessiliibus lanceolato-t-ovalis liicalis; Ciuite fruticotu. Swartz sub ardifa.

* ANGUILLAIRE (elevée) à grappe axil!. f. ovoïdes à bord canilagineux & dense. *Vijle de Madère*.

* ANGUILLAIRE de Bahama. *Bahs noircs.*

Explication ties fig,

PI. I*6, f. I. ANGUILLAIRE de Bahama, (a, h) Baie entière & coupée. (c) Semence séparée. (d, « f,g) Diverts coupes de l'utérus. (A) Embryon séparé. *Jaccore fig. i,*

PL 156. f. 2, ANGUILLAIRE de Ceylan. (a ji) Baie entière. (b) La même coupée & la partie. (c > d, e) Semence entière & coupée. (f) Embryon séparé. *leacore. f. X.*

PI. X36.F. 3. ANGUILLAIRE de la Gulan. (a) Rameau garni de fruits. (A) Baie entière. (b) La même coupée dans son écotée.

377. THEK.

CaraS. tffcn.

CAL. semi-y fide. Corolle infundibulif. h tube court. Drupe presque globuleux j fine, dans un calice en vifflc : à noyau 3 ou 4-loculaire.

CaraS. nat.

CdL monophylle, campanulé^ perfi/hnt, tomenteux, (emi-j-fide, à découpures ovales demi-ouvertes.

Cor. monopétale, infundibulif. de la longueur du calice. Tube court, Limbe j fide : à découp, ovales, ouvertes.

Etam. cinq filaments très courts, inférés à l'entrée du tube delacorollc. Anth. globuleuses faillaiues,

Tift. ovarie supérieur, ovale, velu, entouré d'une glande courte 8c urcéobire. Style fiiiforme > droit, un peu plus long que le calice. Stigmate obtus bi ou trifide.

Perk. drupe presque globuleux, déprime', à auQtre lobes, velu, fubereux, fine, caché dans un calice ample, enflé & membraneux.

J^foya fubglobuleux, terminé par un tubercule rond, ^-loculaire ; à axe excavé.

\$em. foliaires, comprenées.

OBS. *litsfieurs Jburent font fex fides.*

* ANGUILLARIA (excelfa) racemisaxillaris, f. foiiis obovatis margine cartilagineoferratis. Ait+fib ardifa.

* ANGUILLARIA Bahamenfis. Goertn. t. 77. f. I, *ICacorea.* t. 136. f. I.

Explicatio iconum.'

Tab. i}6. f. 1. ANGUILLARIA Bahamenfis. (a, i) Bacca & integra & diffetta. (c) Semen folinum. (d,e^f,g) Seminis festiones yariae. (k) Embryo separatus. Fig. ex Gocrt.

Tab. 116. f. 2. ANGUILLARIA Zeylanica. (a, a) Bacca Integra, (b) Eadem diffedU, femine demto. (c,d,e) Semen integrutn &c dilleftam. (/) Embryo separatus. Fig. ex Gvrtn.

Tab. 136. f. 3, ANGUILLARIA Uacorea. (a) Ramulus fructibus onuftus. (f) Bacca Integra, (e) EaJem diflc&a Fig. ex Aubl.

377. T H E K A.

CharaS. effent.

CAL. semi - \$ - fidus. Cor. infundibuliformis : tubo brevi. Drupa fubglobosa, ficca, intra calycem veficarium : nucuo 3 feu 4* loculari.

CharaS. nat.

Cal. monophyllus, campanulatus, periflens, tomentosus, semi quinquefidus : laciniis ovatis eredo-patulis.

Cor. monopetala; infundibuliformis, longitudine calycis. Pubus brevis, Limbus quinquefidus : laciniis ovatis, patulis.

Stam. filamenta quinque, brevi(7ima, ore ti'bl corolae inferta. Antherae globofae, exferrx.

Pifi. germen fuperum, ovatuiti, villosum, glanduUrceolari brevi cimftum. Stylus filiformis, erodus, c&lycepaulolongior. Stigma obtusum bi feu trifidum.

Peric. dnipa fubglobosa, deprefla, quadrisiloba, hirfuta, fuberofa, exfucca, imra calyeem am-1 plum, inflatum, membranaceum, latens.

Nux fubglobosa, tuberculo rotundo terminata, quadrilocularis ; we intus cavo.

Sem. foliaria, comprefla.

OBS. *Flores fuese fexfidi**

PENTANDRIE MONOGYNIE.

Tableau des espèces.

22744. THEk des Indes. Difl.

L. n. les forêts de l'Inde, de Ceylan, &c.
T? Grand arbre à f. simples, opp. rameaux jfrgones, fl. petites.

Explication des fig.

P!. 136. THEK des Indes. (a) Calice frons^s par le dédoublement. (b) Le même ramollie dans l'eau. (c) Drupe entier. (d) Noyau découvert en partie, adhérent inf. i un brou *pais. (e) Le mème mis à nud. (/; Lemême coupé transversalement. (g) Semences vues des deux côtés. (kj) Embryon séparé & à nud. CO Panicule terminal.

378. C E D R E L.

CaraU. effent.

CAL. a y dents. \$ pétales presque réunis inf. & adnés à un récept. en mafue. Capf. ligneuse, y loculaire, y-valve, s'ouvrant par le sommet. Sem. ailées.

CaraS. nat.

Cah mono phy lie ^ très-petit, campanule, a; dents, fe fiétriflant.

Cor. J pétales, inférieurement presque réunis en lube & adnés à un récept. en ITiaiTue, distincts supérieurement, obius.

Etam. Cinq filaments pubescents, attachés au réceptacle, plus courts que la corolle. Atères oblongues.

Fiji. Ovaire supérieur, globuleux, élevé sur un réceptacle en mafue (ibpentagone). Style court, cylindracé. Stigmate en tête aplati.

Perlc. Capsule ligneuse, ovale j-loculaire, quinquevalvo^ s'ouvrant par le sommet, valves cad.

Sem. nombreuses, comprimées, «mbricoës», se terminant inférieurement en une aile membraneuse.

Réceptacle central, très-grand, ligneux, pentagone & à 5 angles.

PENTANDRIA MONOGYNIA. in

Conjepus specierum.

2744. THEKA grandis. t. 136.

Ex fylvis Indite, Zeylons, &c. T? Theka. Yheed.maL 4. t. 27. Tedona. /f.fuppl i5.i• Gaertn. &+ 5j.

Explicatio iconum.

Tab 136. THEKA grandis. (a) Calyx coriugatus. (b) Idem in aqua emulitus. (c) Drupa Integra, (d) NUK partim aenudata > w|Lith adhxrens putatnina craffo. (i) Fadem denudata. (/) Eadem transversa f;fla. (g) Semina ab utroque latere spicata. (A) Embryo denudatus. Fig. ex Genn. (J) Panicula centnialis. Ex ficco.

378. C E D R E L A .

CharaS. effent.

CAL. y-dewatus. Petala y, hfernè subcoalita 6 receptaculo clavaio adnata. Capf. lignofa, 7 loculam, y-valvi*, apice dehiscens. Sem. aLua.

GharaS+nat.

.uL mono[;hyllus, minimus, campamilatus, f-denutus, marcefcens.

Cor. Petala y, inferne in tubum subcoalita & receptaculo clavato adnata, superne diflinda, obtusa.

Stam. filamenta quinque subuiata, receptaculo infidentia. Corolla breviora. Antheie oblongi.

Pijl. Germen superum, globosum, receptaculo cavo subentagono elevatum. Stylus brevis, cylindraceus. Stigma capitatum, deprellum.

Peric. Capsula lignofa, ovata, j-locularis, quinquevalvis, apice dehiscens, valvis deciliatis.

Sent. numerofa, comprefla, inferne in alam ineinbiaoaceuin definentia, imbricata.

Receptaculum centrale maximum, lignosum, pentagonum, j-angulare.

U2 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Tableau des espèces.

274?. CEDREL *odorant*. Dift. i. p..6efo.

L. n. les A mil lei & l'Amér. mérid. 1> *vulg* acajou à planches_y ou cedre-acajou.

Explication dts fig.

PL IJ7. CEDREL *odorant*. (a) Bouton de fleur. (i) Corolle coupée latéralement_y laissant voir les &am. le pifti & le receptacle. (0 Réceptacle. Pifti ETamines. (d,e) Calice, piftiJ. (f) Etamine séparée. (gj) PiSil groffi. (A) Capfula coramenfant à s'ouvrir. (i) Se-roences.

375. M A N G U I E R .

Caract. ejgent.

CAL. y-fide. f pétales. Drupe enbaie, fubréni-forme : à noyau i-fpermis filamenteux en-dehors.

Car ad. nat.

Cal. partagé en cinq découpures ovales-lancéolées:

Cor. cinq pétales lancéolés[^] plus longs que le calice.

Et*m. cinq filaments fubulés, ouverts, Antères presque réniformes[^].

Fiji, ovaire supérieur, arrondi. Style filiforme. Siigmate simple.

Péri*, drupe en basse, oblong, presque réniforme, un peu comprimé, glabre.

Noyau oblong, comprimé, filamentueux-en-dehors, uniloculaire.

Sent, une feuille, grande, ovale - oblongue, obtuse.

Tableau des espèces.

^746. MANGUIER commun. Dift, n. 1.

M. à feuilles firoles oblongues-lancéolées, panicules terminales, drupe très-grand, réniforme.

*

£. n. les Indes Orient. On le cultive dans les jardins, comme arbre fruitier, h scs faul.jont

PENTANDRIA MONOGYNIA,

Confpectus species.

274\$* CEDRELAL *odorata*. t. 137.

Ex inf. Caribscis & Amer. merid. T> Brown. Jam. t. to. fig. t. Goerip. t. ^ j.

Explcatio iconum.

Tab. IJ7. CIDRELA *odorata*. (a) Flos non expanfus. (b) Corolla lateralirer fefta, ftamina , piftillum , receptaculumque exhibens. (c) Receptaculum, Piftillum. Stamina, (d, e) Calyx, piftillum. (/) Stamen separatum. (g) Piftillum aufsum. (A) Capfula dehifcens. (i) Semina. Fig. ex Brown.

379. M A N G I F E R A .

Charact. ejgent.

CAL. S - fida- Petala \$. Drupa baccata fubreniformis ; nuce 1 - (perma , extus fiaimentofa.

Charact. nat*

Cal. quinquepartitus : laciniis ovato - lanceolatis.

Cor. petala quinque lanceolata , calyce Iongiora.

Stam. filament[^] quinque , fubulau, pfftentia. Anthers fubreniformes.

Pifi. germeh fuperum , fubrotundum. Stylus filiformis. Stigma simplex.

Peric. drupa baccata, oblonga, fubreniformis, comprefili cu a, glabra.

Nux oblonga, compreffa, extus filamentofa, unilocularis.

Sent, unicum , grande , ovato - oblongum , obtufum.

ConfpeSus Jspecieruflk

274.6. MANGIFERA *indica*. t. 138[^]

M. foliis fimplicibus oblongo - lanceolatis , paniculis tejrminalibus > drupa maxima reniformi.

Ex Ind. Orientalibus , & in hortis culta obfrudus eculcentos. ft Mail. Rheed. mal.q.. t.

pétio es,

PENTANDRIE MONOGYNIE.

pétiole's, glabres, nerveuses^ tintures. les fruits sont gros, jaunes ou tougt&tres, très-favorables.

j3. Le même à feuilles plus larges.

2747. MANGUIER *k fi. Idches.* Did. n. 2.

M. à feuilles simples presque feillées ovales-lancéolées, fleurs pentandriques, druyx ovale-arrondie.

L. n. rifle-de-France. T> Panicules allongées, lâches, terminées.

2748. MANGUIER *fitide.* Dift, iuppl.

M. à feuilles simples ovales-lancéolées, fleurs pentandriques, pétales réfléchis, drue en cœur arrondi pubescents.

L. n. la Cochinchine, les Moluques. T) Grand arbre, fruit plus grandes que celles du Manguier commun. FL rouges.

2749. MANGUIER *axillabe** Dift. n. 3.

M. à feuilles simples ovales-oblongues un peu obtuses, panicules axillaires & terminales, fleurs décandriques.

L. n. les Indes Orientales. f> Drupes globuUux.

2750 MANGUIER *pinnl'TKet.* n 4.

M. à feuilles pinnées avec impaire, panicules latérales, fleurs polygames décandriques.

L. n. l'Inde, Madagascar. T> Panic, ample FL petius. Drupes ovules.*

* MANGUIER ? (agrappes) i feuilles simples lancéolées-ovales, grappes terminées rondobrées, drupes ovoïdes. *Le Malabar. Son fruit caufique comme dans Us anacardes.*

380. H I R T E L L E ,

CaraS. ejfent.

CAL. y phylle, réfléchi. y pétales. Etarn. très-longues. Style latéral. Drupe presque en coin, 1-férme,

CaraU nat.

Cal. pentaphylle : à foliolw ovales-lancéolées concaves, réfléchies, velues-en-dchors.

Botanique. Tome II.

PENTANDRIA MONOGYNIA. ujf

X, 2. *Mangifera domefiica.* Goerin. t. 100* Flores submonandrifilamentis ^txyius fterilibus.

f. *Eadem foliis latioribus**

2747. MANGIFER/Y *laxiflora.*

M. foliis simplicibus subfeffilibus ovato-lanecolatis, floribus pentandris, drupa ovato-fubrotunda.

Ex inf. Franciae. |> Panicula elongate laxa terminata.

2748. MANGIFERA *fatida.*

M. foliis limplicibus ovato-lanecolatis, floribus pentandris, petalisreflexis, drupacordato* fubrotunda pubefcente.

Ex Cochinchina, Moluccis. T) Loureir fl% Cochinck* p. ipp< Manga factida. Rumph* amb. 1.1. 28.*

2749. MANGIFJ?RA *axillaris.*

M. foliis simplicibus ovato-oblongis obtusiffulculis, paniculis axilkribus & terminalibus, floribus decandris.

Ex Indiis orientalibus. T> Drupa fubrotundae.

2750 MANGIFERA *pinnata.*

M. foliis impari-pinnatis, paniculis lateribus, floribus polygamis decandris.

Ex India, Madagascaria. T> Lin.f.fuppL IJ£. Drupa ovat<x.

* MANGIFFIJA? (*racemofa*) foliis simplicibus lanceolato-ovatis, racemis pluribns terminaiibus, drueis oboyatis. *Cattu • Tsjtru. Rheed mat. q. t. Q.*

380. H I R T E L L A .

CkaraS. ffent.

CAL. y-phylus reflexus. P^tala y. Stamina lcn-giffima. Stylus laieralls. Drupa fubcuneata, i-férme.

CharaS. nat%

*Cat. pentaphyllus; foliolis ovato * lanceolatis concavis refi^xis, extus viiifolis.*

P

*4 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Cor. cinq peules, ovales, droits, colorés.

Etam. trois ou cinq filaniens fctaccs, trcs 1 o g, un i>eu dilates & comprimes à iear bjle. An- tiicrts arroiodics.

Pif. ovarie l'ipérieur, arrondi o vale, im pen comprimc, vdu-Siylc Iliforme, presqu'aussi long que l'écamines, naissant laicraient de la bjlc de fovaire. Siiginaic fiojple.

i. ric. drupe prafqu'en coin, ciurgi & rctis su- ptricuremciii, mi ^tu coi. ppiimé, obscure- ment trigonc.

Koyaude mciie forme que le brou, unUotui.

l. cm. une feul^.

Tibtaiu des effe'ces.

2751. HIRTELLE à grappes. D'dd. m. ii.

H. à grappes axillaires, lmples fort longues : pédicelles simples, flef. b. i. échandriques.

1. a. lesfotLts dela Guyane. b *F.ovalts-okLngues j mumincts fgLi&rcs, ent'teres.*

17J-2. HIRTELLE *pamicule.* Dift. n. 1.

H. à grappes terminales composées, pédicelles rameux, fleurs subpentandriques, scuilles entières à leur base.

L. n. Its A;tilles. b F. ovale f-oblonguel, azu- minées, pubescentes ctt dtjous.

2753. IJIRTELLE; *vendant.* D'A. n. 3.

H. à grappes terminales composées, flcurs tubtriandriques, feuilles échancrées en ccriir a Irur IIJIC

i. n. rAsneiique. 1>*T.pubejhcnts en-dtffvus*

27y4. HIRTELLE «i*. Dift. suppl.

H. à grappes axillaires & terminales compo- sées, fleurs pentandriques, (cuifces) illitiques, échancrées à leur base.

t. a. la Guian:.. b f^< c7 **h différante de P'spèce n°

* IIRTELLE (*tit Prou*) k flcnrs triandri- ques, petties échancrées. L<* f'crou, Drupt eunet jrm€, Ires obtus aujomaut.

PEKTAKDRIA MOXOC YNIA;

d r. j? t-iala quinq it c, ovau, 1red olonta •

Stan; filanii tria feu qui que, setacea s Ion- gi Rm», bafifiibdiatau&t compre Ea. Amheric t>rotundae.

Pif. germen Hiperum, *fnbr otundo- owium, compressusculu ii, villofuco. Stjliu fiiiformis, longitudine ferè flamitum, i ball & l- tere germinisortu*. Stigma simptx.

Peric. Drupa fubcuncata, fu^crnc liiior & t lufi, panim compreiU y obfoleic ctigooa.

Nur 1 % ura 1utaminis, uniliculaxis*

Seat. 1micum.

Confpe3tts specierum.

27JI- HIRFELLA racemojk. r. ryS.

H. racemis axillaribus simplicibus prilonjis, pedicellis indivisis, floribus liiblu xandris.

Ejt f Guyana fylvis. fi .^KW. Guyan. \. pS. Fl. exandri.

2752. HIRTKLLA panicula'(I.

11. racciujf tr mninalibus compositis, pedi- cellis ramosis, floribus subpentandr. foliis basi integris.

Ejt inf. Cafiba is, b *Hirtella*, Jacq. smet. t. 8. &p'i&. t. 11. J!, ai&i, j-andri & sepe 5-andri.

2753. HIRTELLA pendula.

H. racemis terminalibus compofitis j. floribi;s fubtrijndrts, foliis basi cordato - etiarji- natix.

Ex America, B Stum. tris. ta.iturn oh/in zvi.

2754. HIRTELLA hirs Itta.

H. v eeponis axillaribus & ter cninajibu; compo- sitis hirsutissimis, floribus pentandris, foliis elipticis basi emarginatis.

Ex Guyana. b *Hirtella paniculata*. Valb. ^wb. t. 43. t. 31.

* HIRTELLA (*cosmibueno*) floribusimndns, marginat. peruv.

p, 10; t. 2.

PENTANDRIE MONOGYNIS.

J«I. A Q U I L I C E.

CaraH. ejfcnr.

CAI. y-fi ie. s p«aW. Urcole à y ! obes, flaminifère int. Baie g. ^bulcu: ^{applatie, tortueuse,} sub s-sperme.

Carall. nat.

Cal. monophyl. lie, tm¹ biné, quinq; icfile, plus court que la e corolle.

Cor. cti iqpeulMOv.ilf*, pointiis, sessiles, ouverts. Urcole monophylle, environnant l'ovaire, plus court que h corolle, flaminifère, partagé en cinq découpures échancrées.

Etam. cinq filaments courts, inserés rmrc Its découpures de l'urcole, courbés en-dedans. Anthcru ovales, versatil-s, conniventes avant U fcconJation.

Pift. ovaire supérieur, orbiculé. Style simple, plus court que l'uroloie. Stigmate obtus.

Péric. baie orbiculée, aplatie, toruleuse, à cinq ou six loges.

Sem. Tuairej, ofleufcs arrondies-trigones, préf min.

Tableau des efp>ces.

2755. AQL'ILICK Ai InJts. D1ip. 217.

A. à feuilles bipinnées, pinnules Imctolces, tige frutiqueuse, baies pentaspermes.

L. n. Ics lni es Orie Jtales, T7 Vulg. boh de source. Arbrisseau ay iini ie port lit. a fureau. f. gfabrcs, amylos.

2756. AQUILICE *criput.* Dia. suppl.

A. à feuilles pinnées, pinnules elliptiques oblongues, tige anjiuelle crêpue, fruits à six graines.

L. n. le cap de Bonne Krp, T77/re<ir/ iculée, à angles membran. & criput, haute dt 2 à 3 pieds.

* AQUILICE (de Ceylan) à baies applaties orbiculaires hexaspermes. L'île de Ceylan. Le leez sequata à la tige cylindrique pubescente, f. simplement ailées.

PENTAKDRIA MONOGYN1A. it;

5S1. A Q U I U C I A .

Charatt. effent.

Cal. 5 fidus. Petala f. urctoln* j"-!obu» intus flaminifer. Bacc globolo-deprella, torulosa, Tub -i peruma.

Ck..rii8, nat.

Cal. monophyllus, turbiruius, ijuinquffi.iut . corolla brevior.

Cor. petala quinque, ovata, acuta, sessilia, patens. Urcole monophylle, germen cingens, corolla brevior, flaminifer, quinquepartitus : laciniis emarginatis.

Siant. filamentum inque, brevl, inter laciilia UJ'ceoli inserta, incurva. Anthere ovr ex, versatiles, ante faecundationem convcnies.

Pi ft. germc superum, orbiculatum. Stylus fimpex, urceolo brevior. Stigma obtusum.

Peric. Ecca orbiculata, depres b, torutofa, quinque feu l'exlocularis.

Sem. subrotundo-triquetra, subcanecata.

CoaJptSui fpethmm.

2755- AQUILIC1A SJ-^{bucina}. x. 159.

A. fojiiis bipinnatis, pinnulis lan. ceiatii, caule fruiiolo, bacis pentasper tws.

Ex Indiis Orient h Burm. ind. t. 24. i. 2.

Rump. imb. ^.; 45. Nalug 1. Rherd. mal. 2. I. 26. Cavan. di. 7. p. 371. t. 218.

2756. AQUILICIA *crispa.*

A.) olliis pinnatis, pinnulis oblongo-elliptici, caule annuo criso, fructibus hexaspermis.

E cap. B. Scei. w Leea crispa. Lin. mant.

Mwb. pl. rar. t. 50.

* AQUILICIA (ollis) baccis depressi, orbicularibus hexaspermis. t. 139. f. 2. Aquilicia ollis. Gossin. t. 57. f. 7. An lees sequoia, Lin?

Explication des fig.

PL i J9- f. i. AQUIUCE *Jts Indet*, (a) Bourotvdcftjur.
(t, c} Fleut entiere, auverte. (/) Calice.(r) **Eun**
r/j Pi(HL. (#) Bnie entire. (A) Semenee fcpanK. (i)
i'eueille & corymb*.

PI. i;p. F. i. AQDILIC6 df *Ctytan*. (a, i f C_{iae} en-
tiers. (0 La mime coupee. (j) Semence feparic.
(f, /, ?>*) Diverfes coupes de U meme.

382. TODDAL L

Cara.3, eff. nt.

Cal. a y dents , y pebdes. SUgnmte fellile ,
applu. Baie fcche , a 4 ou y loges.

Carad, nat.

Cat, trcs-petit, monopbylle, a cinq dents.

Cor. <ittq [•] ties, ovales-oblons ^ concaves ,
be'a'jcoup plus Jongs que Ic caltcc.

Etam. cm j fljmens fubulcs, droits, de la lon-
gueur Ues petales. Amlicres ovales^ un peu
grar.des,

Pij? ovaire fupercur, ov.ilr, rrmpliHant la co-
rolie. Style nu!. *Stigmata* applati , tronqué ,
ubfcuicinent à y loives.

Pfr>c bate f&rhe, f-ififorme , globuleufe, tin peu
pu:nduce , à quatre ou cinq loges.

Sem. fo:tairo, vales.

Obf. Dans fluficurs inJiviJusde mon herbicr,
j'ai vu lea flours toutes femelles.

*Tableau d<.s ejjnices.*27f7. TODDAU *asiatique*. Dia.

T. à tige•, ramcaux & feuilles munis di pi-
q.-ans, Foiioles i'veales-lancéolées un peu dem.

/j. n. lnde. Ti drbrijj, Aérisse de piquans courts
ft in crack ts , même sur la nerv. moyen u rfur
JoUoUs. GraptiaxiLpLus.cou.rus ^ut Us f.

27I-S. TODDALI *tuisant*. Dia.

T. à piquans rates , folioles ovales veineuses
luisantes presque striées & incernes.

Explicatio iconum.

Tab. rj9. f. i. AQTJUICIA &tmS<cr;w. fu) Flos-
non ex^nfus. (§, c) Flos integer, apertus. (0 Calyx.
(-) Snmen. (f) Pitillum. (g) Bacci integrn. (A) Seme
iVpsrauin. fi j Folium 8: coryibus. // j. « D, Cayan.
& ex ficco.

Tab. ijP^F. i. AQUILUIA otllis, (a,i,) Races in-
tegra. (-) Hadem difleAa. (d) Semen separatum.
C* J/J 31 ^) £jufdcin ic̄tiones van*, f^A. « Gartn.

382. TODDALIA.

ChuraS. effent.

Cal. dentatus. Pcula j. Stigma fcflle, dc-
preilunu Bacca ficca, ^ feu ^-locuiaris.

ChiiraU. not.

Cat. minimus, monophyllus, quinquedenatus.

Cor. Petals quinque, ovato-oblonga, concava,
calyce muho longiora.

Stam, fi!amenta quinque , fnbuUta, erefla , lon-
gi•I line pctalorum. Anthers ovuve , ma-
jusculeæ.

Pift. germa fupmim , ovatuni, coi'ollain im^{ptens}
Stylus nullus. Stigma depreOoui, trun*
caiutn obfoleti* quinquelobutn.

Ptric. ILeca Ticca, pilifbrnus globo(a, fubpunc-
tata, quadri Tui quinquclocularis.

Sun. folicaiia, ovata.

Ofrf. In pluribus speciminibus bcrbarii noflxi
flores onIDCs foemincos obfervavi.

*ConfptSus fptcierum.*2757. TODDALIA *afiatua*.

T. caule, rtmis, foliifuuc aculeatis , folkolis
ovato-larieolaiis (ubfcrmatis).

Ex India. Ti Paullinia afiatua. L. Kald-Tod-
daii, Rhted. mat. 5. t. qx. Pluk: 1. 36*. f. 5.
Racen: axill. fbiis bnrioru.

2788. TODDALIA *nU'ia..x*, 139. f. 1.

T. fubaculeaU, foliolii ovaus, venoiw nili
lbt Litis incrimibus.

PENTANDRIE MONOGYNIE.

'Isle-de-France, Ceyhn. i> *Feliala* à bords repliés tn <hjous> Oobtifes on term, par urn potnte ucs imD ujjit.

- *?&\ TODDALI à f. étroite^r. Difl.
i . incrme , arolioiesctroit^Lnceoiccs vei-neules luifajltcs cn-ddl'us, ram. pubefcem.
£. a. lliide. fj Grappet axill, tres-courtes.

2760. TODDALI ktuie&m^a.

T. inermc, a folioles Unccolcw icotnineesun peuiu^ntcf, grapp« Rifaicrniinal, tifiqaaarifide*.
X. «. [tie do la Réunion. Tj C<<*espèce a beau-
ort avec la suivante.*

2751. TODDALI pankul*. D\£L.

r.j(i_{cn}, ne, à foliolesoi rales très states, pa-nxulc termimie, tleurs qwdcifidSr.
I. «. rit de France. T, F. alt. pétiolées , émées de points transparens; pétioles margnées.

Obs. Dans toutes les espèces de Toddali les f. sont ternées ^1<<folioK_z-sparoilicn, percces i ar des points twnj.al em.

3<<j. BUTTNERE.

Carat. j Tente.

CAL. j-fidc. S I••f•t^jiwarquès,3-lobc-saLi ro
a Jobe moyeii alonyd ei ^{langue} itc fiii forme.
Capfulc a J cuques, niuri^ute.

Carat. nat.

Cal monoj phylle, quinquefide, caduc: à dé cou
puixs ovale<<Iajn pétoliées pointues très-ouvertw.

Car. cinq peta'es ob-longgs, arqu is en-dedans.
peucoii nivens, dilatés & trilobés à leuriom-
mct: a lobe du tñiiifualoiigcen unt Unguetti filiforme réflechie en-dehors.

Vrc'ale i cinq dents , environnant l'ovai re.

Etnm. cinq Jijatnens Abate*, infires cmre l<<
d^nis de TurccoJe, coin" s, dirigés en dehors,
caches fous Ics ifcaatioiu des pétales. A
tliires ovales Uidymts*

PENTANDRIA MONOGYNIA. 117

Ex i. •(FranciK, / ceylona. j, Burm. Zeyt.
t> H-lariat nmis fufihuteis^

27

LIA angustifolia.

inceolatis venosis
descendentibus.

Ex India. 5 Soamnu,

2760. TODDALIA hneolata.

V? Cr? lis, foliolis lanceolatis acuminatis ni-
titudinis, racemis & floribus

loribus

qua jiriri Jisr.

Ex inf. Mauritana. 1} Cat nmers, racemuli pan-
culam brevem & terminalem efficiuntur

2

T. incrinis, foliolis ovatis glaberrimis 55 pan-
cola terminati, floribus quadrifidis.

Ex inf. Francia. 5 Jef Martin ha-
bitu suuus 4 spemae. 4

Obs. In omnibus Toddaliis folia ternata sunt,
& foliola punctis pellucidis videntur
pertusa.

383. BUTTNERIA.

Chara8. tjint.

CAL. 5-fidus. Petal: arcuata, apice 3 - lobata;
medio in ligulam formem producio. C psu-
la 5-cocca, muri a.

ChamS, jiai.

Cal. nonophylli» *V inquefidos, deciditus: lac-
mis ovato ceolatis acutis patentissimis.

quinque, oblonga, arcuato-inflexa,
ventia, apice dilatata atque triloba:
lobomedio in ligulam filiformem extus re-
exam producio.

Urceolus germen cingens, quinquedentatus.

Stam. filam urceoli i quiique, filiula, inter dentes
urceolus p xtorsum porrecta,
dynae.

jig PENTANDRIE MONOGYNIE.

P:jl. Ovaire supérieur, globuleux, à cinq filets. Style lâche, court. Stigmate obtus, pentigone.

Péric. capsule ovoïde, échiniée, constituée de cinq coques bivalves, s'ouvrant par leur côté initiaire.

Um, solitaires, ovales.

Tableau des espèces.

2762. BUTTNERE *l'Eaf. langues D-d.*, n. 1.
D. 1 feuilles lancéolées - linéaires, munies d'aiguillons sur leur pétiole & leur côté.

L. n. Tropicique Mirid. LaGuia: 1. b. Arribiff. crèmeaux angukux, munhdepijanicrofhus.

jameauK à cinq angles munis de piquants, tige ite.

t. <. Ic Perou. Tj F. gUBres.

2764. BUTTNERE i/ fac**iif.* Dia. n. 5.
B. à feuilles en cœur acuminées demeures pubescentes : ex-deiTous, pétioles inermes.

Z. n. Ic Pérou, 1) *Arribiff.farme.iteux*, man/ 4 piquants.

2765. BUDNERE *cylindrique*. Did. n. 4.
U. afrii illes ovales-lancéolées acuminées très-entières ; rameaux cylindriques mous de piquants.

L. n. Ic Pérou. t) *Capse petite*, trfs-Aérifiées.

?-}C6. BUTTNEUE *apetiiiesf.* DiA. n. ;.
B. Rameaux îles en zig-zag, folioles internes ovales échancreées presque pétiolees.

L. n. Saint-Domingue. b *Tigs rret-tr'mtufe. Haueaux débiles*, inermtJy aymu d.ijlipules spin lis, membr.

EXTiction des fig.

Pi. 140. f. 1. BUTTNERE à f. ovale. (a) Bouton de fleur. (b) Fleur épousée, de grandeur naturelle. (c, d) Pétales grossi. (e) Fleur entière considérablement grossie. (f) Ovaire, arrondie, étamines. (g) Étamines séparées. (h) Capsule entière. (i) La même coupée transversalement. (l, m) Coques séparées. (n) Semence isolée,

PENTANDRIA MONOGYNIA.

P':fl. grnicen superuin, globofum, quinquefulcatum. Stylus fibuktus brevis. Stigma obtusum pentagonum.

Perk. capula globofa, muricata, penticocca : coccuiis biwlvibis intus dehiscentibus.

Sem. fulitaru, ovata*

Conopeus specitrum.

2761. EUTTNERIA *scabra*.

B. foliis lanceolaio-linearibus, cofti p_oiolifque aculeatis.

Ex America Merid. Gui.ina. fj Aubl.t, gS. Cavan. diff. 6. r. T48./, t.

2765. EUTTKERIA evata. t. 140. f. 1.

B. foliis ovatis ferrariis, pctioLuinermibut, ramis culnqungularibus aculeatis, tiulcerere o.

E Peru, hfof* Juff. Cavan. diff. 5. 1. 149. f. 1.

2764. BUTTNERIA *cordata*.

S. foliis cordaiis acuniinatis ferrariis flibtui piibefcenibus y peioliis inonnibus.

E Pom. b *Dombey. Cavan diff. 6. /.* tSo. Umbellæ pedunculatæ axill.

236. BUTTNFRIA *temvaulh.* t. 140. f. 2.

B. foliis ovato-lancobtis acutinaiu iucgerriiiis, ramis aculeails reretibus.

EVetu. TtJof. Jujf. Cai van. diff. 7. c. 149. f. 2.

2761 BUTTNERIA *microphylla*.

ii. rjmis t_oxuosis laevibus, foliis inerMiibus ovatis enarginatis subpetiolatis.

E Domingo, "ff Jacq. hart. 1. t. 2\$. Btirm. /f/nrr. f. ^5^/. a. Cavan. £\$'. 5. t. *^8. f. .1.

Explicatio iconum.

Tab. 140. f. 1. EuTrnjiitiA tn>a(j. (a) Gemma ftorir. (b) Flos expansus-magnitudine naturali. (c, d) Petalum aut. (e) Flos integer, multoties auctus. (f) Germen, urceolus, flamina. (g) Stamen separatum. (h) Capsula integr. (i) Eadem transversim secta. (l, m) Cocculi separati. (n) Semen. Fig. ex D. Cavan.

Cxra3. ej/ent.

CAL. y-phylle. 7 petales alternes avec le 5 **fol.** d; i calice. 5 cœliaxes, envir, à l'extérieur de cils glandulifères. Gipf. 1 loculaire, 3-valves.

Carat2. nat.

Cat. Iartagé eii cinq folioles lancéolées pointuées concaves ou vertes persistantes.

Cor. citfq pétales ovales obtus caduques de la longueur du **caGce**

Cine > une fois plus petit es que les pét.
^ all. n'ee eux, environne ! i l'exicipatde
po E, nombreux glanduletua nommee.

Etitm. cinq filaments fibroés très-court. Anthesloignes tétragones, s'ouvrant au sommet.

Pi^. ovaite fu; érieur ovale. Style simple. Jclat longueur des cuimmo. **Sigmat-** obius.

Perc. capfnle ovale, acuminée, uniloculaire (ilocul. selon Juss.), trivalve; à bords des valves rcco ut bes CJI sedans.

Sent. nombreuses, très petites, attachées parfties ^ux bords rentrants des valves.

Tabkau dc- espèces.

3767. SAUVAGESE de Cayenne. Dic.
S. à tige très-rameuse, feuilles ovales-lancéol.

L. n. *Guian* Tu P / . d'env. de ux picJs. / alternes, dentées, nervu-ses.

O. varictc plus petite, d la Jan aI*jue.

2768. SAUVAGESE des Antilles. Dic.
S. à tige presque simple, feuilles étroites-Uncdolées, stipulis Tort toignes.

L. Antilles. O Elle est plus petite que la précédente, dont elle semble n'être qu'un var.

2769. SAUVAGESE fluette. Dic.
S. à tige siiforme très-simple, feuilles oblongues sessiles à dents rares; stipules très-petites.

L. n. l'Amérique. O Tige Je ± 5 pouces.

Chant3 fJJ, nt.

CAL. 5-phyllo. Petala 5, calycis foliolis alterna. Squamulæ 5, extus ciliis glanduliferis cindæ. Cap. f. i-Uxularis 3-valvis.

Charact. nat.

Cat. quinquepartitus, persistens: foliolis lanceolatis acutis concavis patentibus.

CV. jetJC quova ta, obtusa ;, decdua, longiudiit calycis.

minores, extus cindæ pilis numerosis apice glandulosis.

Stam. filamenta quinque, subulata, brevissima. Antheræ longæ, tetragonæ, apice dehiscentes.

Pist. germe superum, ovatum. Stylus simplex, longitudine filum. Stigma obtusum.

Perie. capsula ovata, acuminata, unilocularis (3-locularis. Ex Juss.), trivalvis, valvarum marginibus introflexis.

Sem. plurima, minima, valvarum marginib; marginib; affixa.

Conspicuus speciem.

2767. SAUVAGESIA adima. t. 140. f. 1.
S. caule ramosissimo, foliis Ovato-iaffccolatis.

Ex Guiana. *Aubl.* loo f. < u SiipuU pedi-not a-ciliatæ. Ped. uniflori.

Bro wn. Jam. t. J2.f.3. III. 1. 140. f. 2.

2768. SAUVAGESIA erecta.
S. caule subimplici, foliis angulo-lancifoliat. stipulis prælongis.

Ex inf. Caribæi. O Jacq. amtr. 77. t. Si. /• 3'

2769. SAUVAGESIA tenella.
caule siiforme simplicissimo, foliis oblongis rarer dentatis sessilibus; stipulis minimis.

Ex America. O Communis, d D. Richard.

Explication dcsfig.

PL. 140. f. LSAUVAGESE<fc *Cayenne*, (a) Calice ouverc» corolle, piftil. (f) Corolle ouverte, fans piftil. (c) Calice. (d) Etamine. (e) Capfula. (/) La même coupée en travers. (g) Capfula ouvette. (Jij Sentence. (Fig. mauv.)

PL. 14c₄ f. 2. Variett de la SAUVAGESE de *Cayenne** (a) Fleurepanouie. (b) P&ale f par*. (c) Calcc. (d) Fleur fans corolle. (e) Etannine. (Fig. nuuv.)

3\$\$. GLAUCE .

Caras. ejjent,

CAL. campanule, a y lobes. Cor. o. Capfula 1-loculaire, j-valve, f-iperme.

Carad nat.

Cal. monophyile, campanul , colcr , perfiftant, quinquefide : ´a d coupures ovales oblongues, obtufes, droites, ouvertes au foaimet.

Cor. nulle.

Etam. cinq filaments fubul s, droits ? de la longueur du calice. Antb res arrondies.

Pifl. ovaire fuperieur, ovale. Style filiforme de la longueur des t tamin s; Stigmate en t te.

Peric. capfula globuleufe^ acumin e, uniloculaire , ´a cinq valves.

Sem. au nombre 4c ckiq , un peu arrondies. Placenta globuleux u s-grand , alv ole par Us femences.

Tableau des efp&es,

5770. GLAUCE maritime. Did. 2. p. 723.

L. n. TEurope , aux lieux maritimes. % F. oppos es.

Explication des fig.

PL 141. GLAUCE maritime, (a) Plante entiere , He grandeur naturelle. (b) Fleur grossie. (c) Calice. (d) Etamines. (e) Etamines avec le piftil. (/) Piftil s par . (g, h) Capfula couple avec fr fans placenta. (i) La m me ouverte* laiflaut voir les femences.

Explicatio iconum.

Tab. 140. f. 1. SAUVAGFSIA adima.(a) Calyx aperatus, corolla, piftillum. (A). Corolla aperta fine piftillo. (c) Calyx. (<O Stamen. (<) Capfula. (/) Eadem tranfverfe fciffa. (g) Capfula aperta. (h) Semen. Fig. ex AubL

Tab. 140. f. 2. SAUVACESI'E aiimat varietas ? (a) Flos expanfus. (f) Petalum feparacum. (c) Calyx. (^) Flos abtyue corolla, (r) Stamen. Fig. ex Brown.

38;. GLAUX.

Charas. effent.

CAL. campanulatus , y-lobus. Cor. o. Capfula 1-locularis, j-valvis , j-fperma.

Chani t nat.*

Cal. monophyllus, campanulatus , coloratus , perfiflens, quinquefidus: laciniisovato-oblongis, obtufis, eredis , apice patulis.

Cor. nulla.

Stam. filamenta quinque, fubulata, ereAA, longitudine calycis. Anthers fubrotundac.

Pifl. germen fuperum , ovatum. Stylus filiformis longitudine Aaminum. Stigma capitatum.

Peric. capfula globofa , acuminata , unilocularis, quinquevalvis.

Sent. quinque , rotundiufcula. Receptaculum glebofum , maximum , feminibus excavatum.

GonJpeSus Jpecierum.

77° GLAUX maritima. t. 141.

Ex Europa, in maritimis. FL dan. t. 548.

Explicatio iconum.

Tab. 141. GLAUX maritima. (a) Planta integra , magnitudine naturali. (b) Flos auctus. (c) Calyx. (d) Stamina. (e) Stamina cum piftillo. (f) Piftillum s paratum. (g, h) Capsula diflecta. (i) Eadem aperta , semina exhibet. Fig. *M Mitt.

386. RORIDULA.

385. R O R I D U L !

CaraS. effent.

CAL. y-phylle. y pétales. Anthères à base féro-
tiforme. Cap. 3-loculaire, 3-valve.

CaraS. nat.

Cal. pentaphylle, perfifant: à foliolcs lanceo-
lées , ouvertes.

Cor. cinq pétales oblongs, égaux, plus grands
que le calice.

Etam. cinq filaments pubulés , a éernes avec les
pétales, opposés au calice, courts. Anthères
oblongues, droites, s'ouvrant au sommet par
deux pores, se prolongeant à la base au-dessous
de l'inférence du pétiole , en un tubercule
féroiforme.

Fiji, ovaire supérieur, ovale-oblong, pointu.
Style simple. Stigmate pelté , presqu'à trois
lobes..

Peric. capsule oblongue, acuminée , arrondie-
trigone, triloculaire , trivalve. Les cloisons
oppoies aux valves.

Sem. foliaires, ovales, anguleuses d'un côté.

*Tableau des espèces.*277*-s **RORIDULE dentie.** Did.

R. a feuilles linéaires-lancéolées sessiles den-
tées par des cils inégaux glanduleux & vif-
queux*

L.n. le cap de Bonne-Espérance. T> *Arbutus*
rameux% haut de 2 ou 3 pieds. F. éparfes &
rapprochées aux sommets des rameaux. Grappes
paucifl. & term.

* **RORIDULE attrape-mouche.** Efl-ce une
espèce distincte de celle qui précède?

Explication des fig.

PL. 141, f. 1. **RORIDULE dentie** (a) Fleur entière (b)
Pétales (6p*x6. (c) Etamines. (i) Ovaire. (c, /) Capsule
ouverte. tig. fa^rh Uftc

Botanique Tome II.

385. R O R I D U L A .

CharaS. effent.

CAL. y phyllus. Petala \$. Anthers bali fero-
tiformes. Ca^f. 3-locularis , 3-valvis.

CharaU nat.

Cal. pentaphyllus, perfiflens: foliolis lanceolatis
patentibus.

Cor. petala quinque , oblonga, xqualia, calyce
majora.

Scant, filamenta quinque , pubulata f petalis
alterna , eaiyci oppofita , brevia. Anthers
oblongse , creflae , apice poro gemino de*
hifcentes , bafi infra filamenti infertionem
produetae in tuberculum feroformem.

Pift. germen fuperum ovato-oblongum,acutum»
Stylus (im)plex. Stigma peltatum , pubtri-
lobum.

Peric. capula oblonga, acuminata , rotundé
trigona, trilocularis , trivalvis. Diflēpimenta
valvis contraria.

Sem. folitaria, ovata , hinc angulata.

*ConfpcSus specitrum.*2771. **RORIDULA dentata.** t. 141. f. I:

R. foliis linear-lanceolatis ciliato-dentatis
feñibus , ciliis inceijualibus glandulofis vif-
cois.

E cap. Bonne Spei. T> *Frut ex ramofus*, 2
feu 3-pedulis. Folia, fparfa ^ conferta in api-
cibus ramulorum. Racemi terminales, pauci^
flori.

* **RORIDULA mucicapa.** Goprtn.defrud. I. p.
298. t. 62. f. 8. iltuftr. 1.141. f. 2.

Explicatio iconum.

Tab. 141. f. 1. **RORIDULA dentau.** (a) Flos integer.
(b) Petalum separatum. (U) Stamina (4) German. (e, /)
Capsula aperta. Fig. exfico.

Q

PI. 141. f. i. RORIDULE attrape-mouchc. (a) Fleur entiere, épanouie. (*) Petale. (c,d) Etamines. (0 Capule entire. (/) La même couple, (g) La vime s'ouvrant. (h) Placenta central mis à découvert. (/) Sentences. (k *) Semence coupée. (m) Embryon séparé.

387. T H E S I O N .

CaraS. ejftnt.

CAL. fuperieur, i-phylle, 4 ou y-fide. Cor. o. Noixinf. fans valve, 1-fperme.

CaraS. nat.

Cal. monophyile, fuperieur, femi-quinquefide : à découpurcs ovales deini-ouvertes.

Ccr. nulle.

Etam. cinq filameos fubulés, courts, inférés à la bafe des divifions du caiice. Anthères arrondies.

Pijl. ovaireinftrieui, arrondi. Style filiforme, de la longueur des étamines. Stigniate un peu épais, obtus.

Piric roix inférienne, globuleufe, cruilaceé, uniloculaire, fans valve.*

Sem. une feule, arrondie.

*Tableau des efpcées.***2n-2 THESION KnophyIle.¹D|&.**

Th. à tiges paniculcesii^érieurement^fcuiHes linaires, fleurs pédoneulées.

X. n. leslieux fees & montueux del'Europe.^;

1773. THESION des Alpes. Dift.

Tli. à tiges prefque fimples en touffe, feuilles linaires, fleursaxillaires feffiles quadrifides.

L.n. les momagnes de l'Europe. %*

3774. THESION panieuU. Did.

Tb. à feuilles lancéolées dillantes, rameaux anguleux diflus, fleurs terminates.

X. n. le cap de Bonne-Efp&r./ tris-pttites.

Tab. 141. f>5. RORIDULA muficapa. (a) Flos integer axpanlus (t) Petalam. (c,d) Stamiña. (e) Capful* >integra. (/) Eadcm diffefla. (g) Eadem dehifcens, (h) Receptaculum centrale di-tefturo. (i) Semina. (k, l) Semen difleAiun. (m) Embryo feparatus. F/^

387. T H E S I U M .

CharaS. ejfent.

CAL. fuperus, i-phyllus, 4 feu j-fidus. Cor..ov. Nux infera , evalvis, i-fperma.

Chared, nat.

Cal. monophyllus, fuperus, femi-quinquefidus:, laciniis ovatis eredc-patulis.

Con nulla,

Stam. filamenta quinque , fubulata , brevia^ bafi laciniarum calycis inferta. Anthers fubrotundse..

Pijl. germen infernm, fubrotundnm. Stylus filiformis longitudine flaminuin, Stigma cralfiusculum obtufum^

Peric. nux infera, globofa, crufacea^ unilocularis, evalvis.

Sem. unicum , fubrotundum..

*ConJpeSus Jpecierum****2772. THESIUM linophyllum. t. 142. f. I.**

Th. caulis fuperè paniculatis, foliis linearibus, floribus pedunculatis.

Ex Europae fccis montofis. %.

2773. THESIUM alpinum.i. 142. f. 2.

Th. caulis cefpitofis fubfimplicibus, foliis linearibus, flor. axillaribus fefliibus quadrifid.

Ex alpibus Europat. jp Gasrtn. t. \$&

2774. THESIUM panUuUtum.

Th. foliis lanceolatis remotis, ramis angulatif diffusis, floribus terminalibus. Thunb.

E cap. Bonæ Speci Lin. mans. 5t.

2775. THESION *unilateral*. Did.

Th. à fleurs prefqu'en'épi, unilatérales, ciliées, laineuses, feuilles fubulées.

L. n. le cap de Bonne-Espérance. *Tiges couchies. F. linéaires-fubulées ouvertes.*

1.776. THESION *alongi*. Did.

Th. à feuilles liaéaires-lancéolées aiguës, rameaux flriées alongés, fleurs prefqu'en'épi.

L. n. le cap de B.-Efpérance T>.

1777. THESION *hipis*. Did.

Th. à fleurs en épis liliés, feuilles fubulées très courtes. & très-aïftantes.

L. n. le cap de Bonne-Espérance.

2778. THESION *à fl. en tite*. Did.

Th. à fleurs en têtes (éflites terminées, feuillets ligneux trigones fiffes bradées un peu ciliées.

L. n. le cap de Bonne-Espérance T>.

2779 THESION *effilis*. Did,

Th. à ranieaux droits effilés prefque nuds, feuilles fubulées courtes très-diftantes, fleurs terminales prefqu'en ombelles.

Z. n. le cap de Bonne-Efp. *Ombelles petites.*

2780. THESION *hypericoide*. Did.

Th. à feuilles oblongues-ovales, ombelles pédonculées triflores formant une cyme terminale.

I. n. la Virginie, &c. % *Lesf. reffemblent à celles du millepertuis common ^ tn&is elUs font alt., Oc.*

orj%. THESION *fcabre** Did,

Th. à têtes pedonculées, feuilles trigones très-héritiflées sur les bpr^sd sur la carène.

L. n. le cap de Bonne-Espérance ft.

2782. THESION *amplexicaule*. Di&.

Th; à fleurs prefqu'en'épi unilatérales ciliées, laineuses, feuilles amplexicaules.

L. n. les montagnes du cap de Bonne-Efpér.

277f. THESIUM /i/ea.

Th. floribus subfpicatis fecundis ciliato-lanatis, foliis fubulatis. *Lin.*

£ cap. Bonae Spei. *Lin. mant. a z. j. Caules decumbentes** Thunb. fi. cap. 46*.

1776. T H IUM yunale.

Th. foliis liuejtti-lanceolaiis acutis^ raoii (Iria^ tis elongatis, floribus subfpicatis. *Thuab.*

E cap. Bonae Spei T>.

2777. THESIUM *fpicatum*.

Th. floribus fpicatis tevibus, foliis fubulatis breviflimis remouflimis.

E cap. Bonge Spei. *Liu. mant. 214*

2778. THESIUM *capitatum*.

'th. floribus capitatis feffilibus terminalibus: foliis linearibus triquetris levibus, bradeig fubciliatis,

E cap. Bonce Spei. *Ti F. fparja, crebra.*

277P. THESIUM *virgatum*.

Th. ramis ercdis virgatis nudifcutis, foliis fubtilatis brevibus remoijifimis, floribus subumbellatis terminalibus*

E cap. Bonae Spei. T> *Umbcllctparvct.*;

2780. THESIUM *urnbeUiUum*.

Th. foliis oblongo-ovatis, usnbeUis pedunculatis trifloris cyaiaq̄i tenninalem eiBcientibus.

Ex Virginia, &c. Tp *Folia hyperici perfled alurna & impcrforata.* Pluk. t. 342. f. I.

2781. THESIUM *fcabrum*.

Th. capitals pedunculaté, foliis uiquetri marginé carinaque fcaberrimis.

E u p. Bonoe Spei. T>.

2782. THESIUM *ampUxicmU*.

Th. floribus subfpicatis fecundis dliato-lanatis, foliis cordatis amplexicaulis.

£ cap. Bonae Spei montibus. *Lin. man. %%^%*

124 PENTANDRIE MONOGYNIE.

5785. THESION *af. charnues*. Difl.

Th. à feuilles ovales pointues charnues, rameaux dichotomes, fleurs terminées.

L. n. le cap de Bonne-Esp. *F. alurn. glabres*.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

278?. THESIUM *euphorbiooides*.

Th. foliis ovatis acutiscarnofis, ramis dichotomis, floribus terminalibus. Thunb.

E cap. Bonce Spei. Berg. cap. 74.

3784. THESION *triflore*. B&.

Th. à feuilles lancéolées, tige anguleuse, pétioles denticulés axillaires trichotomes.

L. n. le cap de Bonne-Espérance. *?idoncuks*2784. THESIUM *triflorum*.

Th. foliis lanceolatis, caule angulata, pedunculis axillaribus trichotomis.

E cap. Bonne Spei. Lin. f. fuppl. 162. Thunb.

J fl. cap. 4G.

278y. THESION *épineux*. Difl.

Th. à feuilles fubulées épineuses au sommet, fleurs axillaires.

L. n. le cap de Bonne-Esp. *F. ouverte* A term, par une épine.I 278;. THESIUM ^{i/2o/i//»}.

Th* foliis fubulatis apice spinosissimis, floribus axillaribus foliariis.

E cap. Bonae Spei. Lin. fuppl. 161. Thunb.

J fl. cap. 45.

3rj%6. THESION *ray**. Did.

Th. à feuilles lancéolées diflantes, rameaux fléchis droits.

L. n. le cap de Bonne-Espérance. *Fl. axill. pe-*
donculécs.I 2785. THESIUM *lineatum*.

Th. foliis lanceolatis remotis % ramis ftriatis ereditis. TAunb*

E cap. Bonae Spei. *Fl. axillares pedunculatū*
Lin. fuppl. i6%.5787. THESION *rude*. Did.

Th. à feuilles linéaires-fubulées recourbées en-dehors, fl. axillaires.

L. n. le cap de Bonne-Espérance.

I 2787. TUESIVM ^{j^uarro/um}.

Th. foliis linearifubulatis recurvato-reflexis^ fioribus axillaribus.

E cap. Bonae Spei. Lin. fuppl. p. tcz.

2788-. THESION *catfant*. Dia.

Th. à feuilles ovales trigones carinées décurrentes, tige anguleuse, fleurs axillaires.

L. n. le cap de Bonne-Esp. *Fl. feijUes*.I 2788. THESIUM *fragile**

Th. foliis ovato-triquetriscannatis decurrentibus, caule angulato, floribus axillaribus.

E cap. Bonae Spei. FL feijUes* Lin. fuppl. 162.

2789. THESION *hifpidule*. Did.

Th. à tiges paniculées diffuses; feuilles lincain. I fubulées hifpidules, fleurs terminées effilées.

L. n. le cap de B.-Esp. *Tges de 4 ou Spouses*.I 278[^]0. THESIUM *hifpidulum*.

Th. caulibus panicul. diffusis, foliis linearifubulatis hifpidulis, flor. terminal, fefillibus.

E cap. Bonce Spei. Sonnerat* J) Fmticulus.

2750 THESION *a corymbes*. Did.

Th. à rameaux roides presque nuds, fleurs en corymbe, feuilles linéaires fubulées diflantes J décurrentes.

L. n. le cap de Bonne-Esp. *Corymbes* touns, rameaux > pedonculis, lauraux & ttr * minaux.I 278[^]0. THESIUM *ftriaum**

Th. ramis flridis nudifculis, floribus corystofis, foliis linear - fubulatis remoti* decurrentibus.

E cap. Bonae Spei. *Corymbi breres, ramojly, pedunculati, terminates 6* laterals*

Explication des fig.

PI. 141. f. i. THESION *UnopkylU*. (a) Fleurentifere.
(*) Calice, famines. (0 Calice vu de côté. Us fig.
.d, e, /, font mauvaifes.

PI. 142. f. z. THESION des Alfa.

388. QUINCHAMALI.

Cat ad. effent.

CAL. inferieur , globuleux , à \$ dents. Cor.
fupérieure, tubuleufe. Sentence inf. recou-
verte par le calice.

CaraS. nat.

Cal. monophylle, inférieur, globuleux, coriace,
obfeurément à cinq dents , perliflant.

Cor. monopétale, tubuleufe, fupérieure^ quin-
quefide: à découpures demi-ouvertes*

Etam. cinq filaments très-courts , inférés au tube
de la corolie vers Ton sommet. Anthères
obloogues.

Tift. ovaire inférieur, globuleux. Style filiforme.
Stigmate subcapitée.

Peric. nul.

Sent, une feule, sphérique , inférieure, recou-
verte par le calice perfillant.

*Tableau des ejpices**

2791. QUINCHAMALI du Chify. Did.

L. n. le Chily. T> PL fruticuhufe , 'a /
liniaire Sy éparjesifl. en t(te ombelliforme &
ti rntinale.

Explication des fig.

PI. 142. QUINCHAMALI du CWy. (a) Fleur entifere.
(b) Calice. (c) Coiolle,, ovaire,, & calice c up^. (d)
Corolie coupeee dans la longueur 3 ^lamines. (e) Ovaire
épar6. (/) Piftil. (g) Semencfr.

" Qbf. La cor. est ua cal. fup' r. I

Explicatio iconum.

Tab. 141. f. x. THESIUM *UnopkylUm*. (a) Flos in-
teger. (f) Calyx * ftamina. (c) Calyx latere vifus. Fig.
ex MUL

Tab. 141. f. z. THESIUM *Alpinum*.

388. QUINCHAMALIUM.

CharaS. effent.

CAL. inferus , globofus, y-dentatus. Cor. tu-
bulofa , fupera. Semen inferum ? calyce
tedum.

CharaS. nat.

Cal. monophyllus, inferus, globofus, coria-
ceus , subquinquedentatusj perfiflens.

Cor. monopetala, tubulofa, fupera, quinque-
iida : laciniis eiftfo patulis.

Stam filamenta quinque , breviflma , tubo
coiollæ verfus apicem inferta. Anthers
oblongae.

Pift. germen inferum, globofum. Stylus filifor*
mis. Sugnia lùcapitatunu

*Peric** nullum.

Sent, unicum , fphacricum > inferum , calyce
peTiflcnte tedum.

*ConfpcQus fpecierum**

2791. QUINCHAMALIUMai/^f. t. 142.

In Chile. T> Few. obf. 3. p. 5j t. 44*
Santolina... Fre^ier, y. 107. r_r 16. JuJf.
gen. 75.

Explicatio iconum.

Tab. 142. QUINCHAMAUUM ChiUnfc. (4) Flos. 1 V
teger. (i) Calyx. (j) Corolla , germen & calyx dif-
f.itus. (d) Corolla longitudinaliter. fiffa | ftimina. (e)
Ovarsumfepaiatum.(/;PiftiUum. (g) Semen^flff. txjfcoco-

Of Specini. commuñic. a'D^ JuJL

389. L A G O C I fr

Carp8. ej'ent.

Ombelle simple; à collerette 8-phyile, Involucelles uniflorts, 4-phyiles, capillacées-multifides. Calice plumeux. Petales £-cornes, j ferneries couronné par le calice,

CaraS. nat.

Ombelle simple. Collerette de huit folioles pinnées et dentées.

Involucellesuniflores,tetraphylles: à folioles capillacées-multiplicées.

Cat. supérieur, pentaphylle, perfifflan: : à folioles mukifides piuvieuses.

C#/cinq pétales, plus courts que le calice, bicornes*

ptam> cinq filaments capillaires, de la longueur de la corolle. Amheres arrondies.

Fiji, ovaire inférieur, arrondi; un feul flyle, de la longueur des étamines. Deux stigmates, dont un est tronqué,

Peric. nul.

Sent, une seule, ovale-oblongue, un peu velue, couronnée par le calice plumeux.

Tableau des espèces.

9.J92. LAGOCIE *cuminoide*. Diet. 9 p. \$j6.

L. n. Les îles de Par chip el. Q. *Ombelle glo-wierulfCj laineuse*.

Explication des fig.

PI. 141. LAGOCIE *cuminoide* (*₉B) Fleur vue en face & latralenient. (c) Foliole du calice. (d) Ombeille. (^) Piruëufepfieure de h pbnté. (f) Feuille séparée. (g, h) Frukt encier. (l) Semepce. (l) Semence vue en face interne où se trouve joiit une aurore feraence vorrée. (m) Semence coupée transversalement. (n) Pépérme mis I mid. (p, q) Embryon yidansfa ~~transvers~~ (éparé

389. L A G O E C I A ,

CharaS. ej'ent.

Umbella fimplex, involucro 8-phyillo. Involucella uniflora, 4-pbylla, capillaceo-multifida. Calyx pennatus. Petala 2-cornia. Semen 1, calyc coronatum.

CharaS. nat.

Umbella fimplex. Involucrum odo-phyllum: foliolis pennato-dentatis.

Involucella uniflora * tetraphylla ; foliolis capillaceo-multifidis/

CaU fuperus, pentaphyllus, perfiftens : foliolis multifidis pennatis.

Cor. petala quinque 4 calice breviora, bicornia.

«Vij7*filamenta quinque, capillam, longitudine corollis. Anthers fubrotundae.

Plft. germen inferum fubrotundum. Stylus unicus, longitudine flaminum. Stigmata duo: altero truncate.

Peric. nullum.

Sent, unicum, ovato-oblongum, fubhirfutum, calyce plomofo coronatum.

Confecclus fptcitrum.

2J\$2. LAGOECIA *cuminoides*. t. 141*

Ex infulis Archipelagi. 0 Gartn.t.Zj.JuJJl gen. SLZ-J. *cuminoides*. Tournef.

Explicatio iconum.

Tab. 141. LAGOECIA *tuminomUs*. (a, b) Flosfuperni & latere yifus. (c) Foliolum calycis. Fig. ex Tournef. & tx herb, id) Umbella. (r) Pars fuperior plantar. (/) Folium separatum. (g>h) Fruktus integer, (i) Semen. fO'Ejufdem latus intemum, cum aonexo femine abortive (m) Semen tranfverfe fefuni. (», o) Perifpermum denudatum. (p, j) Embr,yo in situ, & fq ~~parac~~. Fig. c*c Gmrtn.

ENSTAKDRIE MONOGYNIE.

350. PITTOSPORE.

Caras. effent.

Cal. /-phylle, caduc. j* petales ; à onglets connivents en tube urceolé. Caps, sub 3-loculaire : à loges remplies d'une résine liquide*.

Caras. nat.

Cal. peniphyile, inférieur, caduc.

Cor. cinq petalej , à onglets connivens en tube urceolé, & à lames ovales-oblongues ouvertes.

Etam. cinq filamens. Antheres...

Pijh. ovairc fupérieur? ariondi. Style filiforme. Stigmate...

, *Perk.* capfule subglobuleuse, anguleuse, mucronnée, à deux ou trois loges, à deux ou trois valves : à loges remplies d'une réfine huile; à cloifone oppofées aux valves.

trois ou quatre, anguleuses , attachées à cloifon.

Tableau des effects.

2793. PITTOSSORE *aftruikls menues.*

P. à capfules subglobuleuses , ridées , tri-valves. ^

Z. «... fruit prefqpt comtne dans le celnstrus pyrac.

2794. PITTOSSORE *Aombelhs.*

P. à Capfules bivalves, scabres par des points élevés.

L. n.+. capfule ilangle & utupeu comprirnée.

2795. PITTOSSORE *coriace.*

P. à capfules bivalves, feuilles oveides obtuses très-glabrea coriaces.

L. n. l'iffe de Madère. Tj arbre... à rameaux feuilles subverticillées. Cal. timenuux.

Explication des figurts.

Fig. 1. PITTOSSORE *af. menues*, (a, h) Capfule
part. (c) La ménie coupée. (^) Valve

PENTANDRIA

390. PITTOSPORUM.

CharsM. effent.

CAL. j-phyllus decidnus. Pet. j: unguibus in buna urceolatum conniventibus. Capf. sub locularis: locuiis telina liquidaplenis.

CharaS. nat.

Cal. pentaphyllus , inferus, deciduus.

Cor. petala quinque. Ungues in tubum urpe latum conniventes. Laminae ovato oblongas patentes.

Siam. filamenta quinque. *Antheræ....*

Pi/I. german fuperum , subrotundum. S... fiiifurmis. Siigma....

Peric. capfula subglobuloib-angulata, mucron bi feu trilocularis , bi feu trivalvis : IQ refina liquida fcatentibus j diffepimentis v... vulis oppofitis.

Sem. tria feu quatuor, angulata, difTepimento adfixa.-

CoafpeSus specierum.

2793. PITTOSSORUM *tenuifolium.* 1.143.

P. eapiuiisiubgloLofisrugofistrivalvibus.

Habit. . . . Gtrrtn, 1. p, 2.SS. t. 59.

f- 7-

275*4. PITTOSSORUM *umbellaeum.* t. 243. f.%, P. capfuiis bivalvibus, puntis elevati* fca-bris.

Habitat.... Gam. i.p.2.86,t.5\$.f 7.

2795. PITTOSSORUM *coriaceum.*

P. capfulisbivaivibus , foiti^y obovatij ob... glaberrixiis coriaceis.

Ex Madera. f> Hon. Kens, a. p. 488. Vahl. jymb. %.p. 43. Cal. tomentoijhs.

Explatio iconum.

Tab. i^, f.i. Prro poRUMft*nuifolium* uitegca & dehifcens. (c) L>4eta didct,

1*8 PENTANDRBE MONOGYNIE.

ffj>ar&e. (e) Sentences ftpar&s. (/) Embryon vudansle perisperme. (f) Le même feparé.

PL. 14). f. i. PITTOPORE a' ombctcs. (a) Capfulle entiere. (5) La mme olivette, (c) Sentences, (d, e) Sentences couples.

391. CORYNOCARPE.

Cara3. ejjent.

CAL. r-phylle, y petales. y ccailles alterne* avec les petales, glauduliftres à leur bâte. Noix i-fperme.

Car ad. nat.

Cal. pentaphylle : à folioles oblongues concaves ua peu colorées.

Cor. cinq pétales arrondis, retrécis à leur bâfe, droits. Cinq écailles alternes avcc les pétales, étroites , pointues , un peu plus courtes que les pétales, munies chacune à leur bâfe d'une grande globuleuse.

Etam. cinq filaniens fubulés, inférés à la bafe des pétales. Antheres drônes oblongues.

Pifi. ovaire fup&rieur, globuleux. Style court, tiliforme. Stigmate obtus.

Perk, noix turbinée en maflue : à noyau uniculaire.

Sent, une feule, oblongue.

Tableau des tspecies*

2796. CORYNOCARPE af. giabres. Dift. 2. p. 107.

Z.n. la nouvelle Zelande. T)f.alternes^ovoides^entieres, Panicule term. FL blanches.

Explication des fig.

PL 143. CORYNOCARPE af.glabres. (ag) Fleuremi&re (f) Calice. (a) P^ral. (*) Ecaille glandulifere. (/) Fta- mines, (g) Psfil. (A) Noix entiere (de grandeur nacurelle.) (i) La mme coupée tranverfalement.

392. POLYCARPE.

CaraS. ejjint,

Chi. y-phylies, y petales plus courts que le calice. 1 llyle. caps. J-gone, ^-valvc, i-ioculaire, polyfperme.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

rata. («) Semina foluta. (/) 4Embryo intra perispermuni. (g) Idem separatus. Fig. ex Gcerin.

Tab. 14.; f. 2. PITTOPORUM umbellatum. (a) Capfula Integra. (A) Eadem aperta. {c) Semina. (d > c) Semina diffepta. Fig. ex Gcerin.

391. CORYNOCARPUS.

CharaS. ejjent.

CAL. y-phylus." Petala 7. Squamulae f, petalis aliernae, bafi glanduliferae. Nux 1-fperma.

CkaraS. nat.

Cal. pentaphyllus : foliolis oblongis concavis lubcoloratis.

Cot. petala quinque, fubrotunda , bafi anguftata ereAa. Squamulze quinque , cum petalis alterne > angulficC , acutse , petalis paulo breviores , fingulse bafi auftx glandulâ globofâ.

Seam, filamenta quinque, fubulata, c bafi peu-> lorum. Anthers credae oblongs.

Pifi. germen fuperum, globofum. Stylus brevis filiformis. Stigma obtufum.

Peric. nux turbinato-clavau : nucleo uniloculari.

Se/n. unicum, oblongum.

ConJpeSus Jpecierum.

2796. CORYNOCARPUS lavigata. 1.143.

Ex nova Zelanda. T> Lin.f. fuppl. tS6. Forfi. gen. t. iff. JuJJ.p. z88.

Explicatio iconum*

Tab. 14). CORYNOCARPUS Uvigata. (a,b) Flcs integer. (e) Calyx. (^) Petal urn. (i) Squamula glandulifera. (/) Stamen. {f} Pifillum. |k) Nux integra. (i) Eadem tranverlim fe&b. Fig. ex Forft.

392. POLYCARPIA,

Charad. ejjent.

CAL. j-phylus. Petala y, calyce breviora. Stilus 1. Capfula 3-gona, 3 valvfc, i-loclaris, polyfperma.

CaraS.

Carad. nat.

Cal. pentapbylle, perfirtant: à Folioles lancco-
lées , poimtcs , concaves, l'carieufes.

Cor. cinq pctales , ovales oblongs , plus courts
que le caiicej (juelrjucJou très-peuts, un peu
ecliancres.

Etam. cinq filamens filifbnnes, un peu mem-
bra; couli-fait diiUiifls , plus
courts que le cal. anthercs OTI!.

Pi/7, ovaire fuperi<nr , ovyle , triyone. Style
Jim pie , tie u longueur iius etouun. Sugg-
mate ubtus.

Perie. capfule ovalt-poin.ur , trigone , uni-
loculaire , trivalve , enfermée dans le calice
perfistant.

Sem. plfseurs (4 ou 7) ovakis, un peu com-
primées d'un côté , lilles attachées au fond
de la Capl. par des cordons ombilicaux.

*Tableau des efpeces.*2797. POLYCARPÉE *de Tfrfriffe.pi&*

P. a t'ges cou^:ees , feullea fpatalces fubver-
ticillees , caliceu argentes-verdatres.

L. n. le pic de Teneriffe. O journal <fHifl.
naturelle y n°. XIII, p. t. planchesS.

2798. POLYCARP^E *a corymbes. T) | &.*

P. a liges [Jiib^cetucs, feinles Iu'i^i; es aignés
fubverticilecs , paniculo fourchut; en co-
rymble.

L. n. linde, Pifle dc Ceylan. Stipules Jia-
rieufes , comue dans Us paraniquet. Oilices
trgent es.

279\$. POL.YCARPKE rougeAm. Did.

P. a tiges suffrur queules à la base a= iidames,
feuilles tineuret-ftibtilces , pmicale dicbot.
en corymbe ro<geatre.

L. n. l'Inde , le Malabar. T> ? *Ar *y? beau-
coup plus grande ?; e /i pricidtue. F, sub-
verticillées.

Botanique. Tome IV.

Carat. nat,

Cal. pemafyhliS , perfiftens: foliolislanceolatis
acuiis concavis fcariofis.

Cor. petal: quinq nt, ovato-oblonga , ralyce
brcyiora , inicTilum minima , fubci nar-
giruta.

Stum, filamenta quinque , fiLTtrnia , bfji sub-
met branacea , omnib diitiufla y calyce bre-
viora. Antherae ova

Pif. ge rrnen fuprruin , ov-attim , trigpium.
6r/lus simplex , longuuiiine flaniinmn. Stig-
ma obi usum.

Peric. capfula ovato - acuta , trigona , vilo-
cularis , trivalvu , calyce]erfistente in-
clta.

Sem. plura (6 feu 7) » ovalia , hire sub-
comprefla , la^ via , fiiniculu umbilicaliibua
in fundo capfulx atTixa.

*ConfpeSus fpeciermn.*47517. POLYCARFCKA *ter. fa.*

P. caulis proflratis, foliis fpatalbulaoa fub-
verticillatis calycibus ai'genteo-vtrid. alis.

Ex monteTenerirTa:,0 (Z>c/a Hiy-.) Radix
multtetwtis, Cauiel fubdodranu des , rat noft,
diffuſt , undiqac on fr. ti.

2798. POJICARPGXA *corymbofa*,

P. csuUbiij s ubefcentibus , foliis linearibus
acutis fubcrticiUaus, panicula dichouuno-
corymbofa.

Exliuli.i, Zeyloma. Achyranthes corymbofa.
Lin. i'arunyckia.. Burm. Zyl. 184

2799. POLYCARPÉA *spadicea*.

P. culibus baii fuilnuicoiis afcedewibus,
fotis lincari-fubulatis , panicula diciotomo-
cory...bofa fpudicea.

Kfc India , Malabaria. f> ? Sonnerat. K.im.
Maililiu. lihcd, nidi. 10. p, til. t. 6'6'.

* CARPODET,

Cara3 effent.

CAL. feuui-fiuipcrieur, ttfidenu. j" perales. Stigmate en tête applaiic. B tie gtobuleufe, annullée au milieu, f-loculaire. *PL 143.*

*On croit qut c*efi la mUme planu que U Ceaoote d'Afie.*

393. MESIER.

CuraS. effcat.

CAL. peciilhnt, panage en *f. f* peulea, J drupes ovales-reniforules, J-Joculaires, 1-fpcrnu's.

CaraQ. nat.

Cal. partagé en cinq d'ccoupiires lanccolees, pointues, ouvertcs, pcriiiUmes.

Cor. ciii,q petales Janceoles, pointtis, ouverts, un p^u j [us longs que le calice.

Etam, cinq (lamens capilliires, afcendans, plus courts quas les ptiales. Antlieres airondics.

Fifi. ovaire fu^crieur, globuleux, quinque-fide. Style fciacc, droit, de U hauteur des étamJns. Siignite simple.

Peric. cinq (InipM, ovoi'dcs-reniformes, uni-Joculares, dittanies.

Swn. folitaires, rettiformes, enfermées chacune dans une coque presqu'offeuse.

Tableau des ejpeces,

1800 MESIER denti. Di3 4. p. 138.

L.n. I'Inde, Je Malabar. T> .Arbrijf. i'tnviron % puds, toujors verd. F, atierne, hm-itolcts, dtnties. FJ. jiinatret5, en times tcmuuiks.

Explication tks fig.

PI. T-ij. MESIER de ft' (a) Fleur'ntiece. (i) Calice. (e) Peiale. (fi) Etamines styleec le & Us 6'a res réuiss en uu glubule applati & i cinq cotes ou ltbes, (e) Ftuit ei.tietj ^ns l'h maturite. (/) Infertion ti'un drupe f^l ^ceptacle. (g) Novau coupj dans fe lon- séparée. (0 La roSme toupee, (i) fmbi yon.

* CARPODETUS *Forfi.**CkaraS. nat.*

CAL. femi-fuperus, y-dcntatus. Petala y. Stigma ca^ itato-deprefTum. Bdca globofa, medio annutau, y-locularis. *Tab, 143.*

Ad Ceanothum Afaticum refertur. Vide n<. 2682.*

391. MEESIA.

Charaft. effent.

CAL. y-parthus, perfidHens. Petala y. Dni^ x #, obovato - rciiformes, 1 - loculares, 1-fpermae.

CkarnH. nat.

CaA quiiquepartitus : laciniis UnceoIatU acutis patentibitis perfiflefirihtw.

Cor. pmala quinque, lanceolata, acuta, paten-tia, c^yco pauid longijra.

Seam, iil.imen; quinque, capiilam, adfcendcn-tia, petalis breviora. Antherafubrotunda:

Pifl. germen fuperum, globofum, cquinquefi-dutj]. *Stylius setaceus*, eredus, altutuine fla-jninium. *Sigma* firuplej.

Feric. drupæ qujnqne, obovato-rcn!formes y unilocuarea, diffines.

Sem. folitaria, renilbnrra, pmamine fubofleo inchifa.

CtifiJpcClns fpccierum.

2800. MEESIA T^raftf. t. 143,

Ex India, Malabaria. T> *Mccfia*. Gocrtn. t. 70. f. 6. *TjoeaW*. Rhn-d. nial. r. p. 95. t. 48. *JPalpara Scfajeb. g<a.* n. 3^8.

Explicatio iconum.

Tab. 143. MEESIA ferrata (a) Flos integer, (b) Calyx. (c) Petalum. (d) Stamina cum styllo & ovario in globu-linui. (e) fructum quinque-torulosum, coad-anaris-(r) Eruc-tus matus integer. (f) Inser-tio driipar in ricepmulo. (g) Nux longitudinaliter dissecb, leni:is inser-t lanem exhibtBs. fA) S=tmrn fep^rauiin. (ij* Idem diflviL;En. (*> Embryo. /, ex Garca.

* t O P H A N T E ,

*Carat'. effctie.*CAL. y-fije. y petales, onguicuics. Fruit fuperieur, **velc**, **i-fbcrme**. PL. 143.

77 paroit devoir être rapporti au ge/ire AValtheria. Voye^eegene.

J O N G E.

CaraS. effettit.

CAL. fupericur, pamge en;, y petales, Siigmate globuleux. Capfule cornering j Dbbiloculaire.

aSoi. JGNGE eml-iquée.

Arbusie ? a f. arrondhs, ~~effetit~~, mhrlqutts, FL axil/.

II fam If rapporterau gen. Ecaiones, comme nouv. cfp. Voyez le gen., R°. 350.

3H- C L A 1 T O N E.

Carad. effete.

CAL. 2-vaIvc \$ petales, Stigmaic j-fidc. Cap iule t-locubire, 3-valve, 3-fj;enne.

*Carad. nat,*Cal. diphylle, perfiflam : a folioles ovaics un jjeu poimues, ~~opposées~~.

Cur. cinq pétales ovales ou oblongs, abtys, retrécis à leur base, plus longs que le calice.

Etam. cinq filatnens fubules un peu plus courts, ~~que la corollc~~, chacun inf-rc anx onglets des pétales. Aiitheres oblongues, coucfeies.

Pifl. ovaire fuperietir, arrondi. Sijlc simple, de la longueur ties cumines. itiguut tri-fide.

*~~N~~V. Capfule ovale, uniloculaire, trivalve, enfennce dan~~c~~ le cilice.

Sem. au nombre de trois, arrondiei.

* LOPHANTHUS. Forjl.

1 Chora at. effent.

CAL. _j*-fiJus. Petala \$, unguiculata. Fntdus fuperus vilofus, i-fpeft^{ius. t. 143.}Affis iJfah/ieriar, O ad hoc genus font nfcrendum. Vide ~~W~~alA.

* I U N G I A. Gærtn.

Lharaa. cffetit.

CAL. fuperus, j-pariitus. Teula \$. Stigma globofum. Capful a coronata fubbilocularis.

2801. 3UNGIA habricata.i. 14.5.

Gnittt. dd fruU. 1. p. lyo. t* 35. Suf-
frtuexiAd efcaloniam reforendj, Uli ~~hova~~ species.
Vide genus n°. 350.

394. C L A Y T O N I A .

CharaQ. affair.

O

CAL. 2-valvis. PctaJay. Stigma 3-fiJum.CapruU I-Iocularis, 3-valvis, 3-fpemu.

ChamS. nut.

Cal. dijJyllus, pcrlillens : foliolis ovatia acutifculia opj ofitis.

Cor. petala quinque, ovau vcl oblonga, obtufa, ball anguttata, ~~(alyce)~~ 'ngiora.

Stam. lilimonta quinque, fubtilata, corollapaulo breviora, ilngula unguibus petalurmii iiiicria. Amlicrffii oblongs incunibentes.

Pifl. germen fupcrnm fubroiuntluni. Styl'i' fimplex, longiudiuc lUuuuiui. Siigma tn-iiJuni.

Peric. capfula ovata, unilocularis, ~~trivalvis~~, calyce inclufa.

Se/n. irk, fubrotunda.

392 PENTANDRIE MONOGYNIE.

Tableau des épices.

2802. CLAITONE *de Virginie.* D3ft. 2. p. 40,
Cl. à feuilles linéaires, tige herbacée; simple.

L. n. La Virginie. % *Filaments des étam. riunis dans leur mot tie inf.*,

1803. CLAITONE *de Siberie.* Did. 2. p. 40.
Cl. à feuilles ovales, tige herbacée, simple.

X. n. la Siberie. % *die ressemble à la précéd., mais ses folios plus larges.*

2804 CLAITONE *hf. depourpier.* Dift. n. 3.
Cl. à tige arborescente, rameuse, droite i feuilles arrondies-cunéiformes.

I. n. J'Afrique. T>*Elle a le port i*une Crayon de fer opposé, charnus. Il est singulier que le fruit ne contient qu'en une graine nue, sans pericarpe.*

Explication des fig.

PI. 144. f. I. CLAITONF. *de Virginie.*

PI. 144. f. 2. CLAITONE à f. de pourpier. (a) Fleur encière vue en-deiTus. (t>) La même vue en-deflbus. (c) Fruit non mûr. (d) Le même grossi. (e) Sommet de la pi. avec ses flfbres.

395. G R O N O V E.

CaraS. effent.

\$ pétales & les écam. attachés à un calice campanulé. Baieftche, inféricure, i-fperme.

CaraS. nat.

Cal. monophylle, campanulé, coloré, supérieur, perfiflant, partagé en cinq découpures lanceolées.

Cor. cinq pétales, cunéiformes, une fois plus courts que le calice, infére* entre ses découpures, droits.

*Etam** cinq filaments subbulés, droits, inférés au calice, alternes avec les pétales et de leur longueur. Anthers droites didymes.

Pifl. ovaire inférieur, pentagone. Style filiforme, droit. Stigmate en tête, aplati.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

Conjunctus species.

2802. CLAYTONIA *Virginica.* 1.144. f. 1.
Cl. foliis linearibus, caule herbaceo simplici.

E. Virginia. % *Racemos laxus urminalis, pedunc. uniflor.*

2803. CLAYTONIA *Sibirica.*

Cl. foliis ovatis, caule herbaceo simplici.

E. Sibira. Tfi *Limnia.* ijg6. ^ 5. Gartn. de frus.z.p.zzt. t. 125./J.

2804. CLAYTONIA. *portulacaria.* 1.144. f. 2.

Cl. caule arboreo ramoso eretto, foliis subro* tundo-cuneolades.

Ex Africa. T>*Jacq. collect. 1. p. 160 t. zz.*
Geus diJlinSum > ex D. Jacq. cui tribuit fern, unicum, nudum, alato-triquetrum.

Expticatio iconum.

Tab. 144. f. i. CLAYTONIA *Virginica.*

Tab. 144. f. 1. CLAYTONIA *portulacaria.* (a) Flos integer superne vifus. (t>) Idem à teigo spedatus. (c) Fructus immaturus. (d) Idem auctus. Fig. ex D. Jacq.

395. G R O N O V I A .

CharaS. effent.

Petala \$ 8c flaminina calyci campanulata inferta. bacca ficca, infera, i-fperme.

Characi. nat.

Cal. monophyllus, campanulatus, coloratus, superus, perfiflens, quinquepartitus : laciniis laneeohitis.

Cor. petala quinque, cuneiformia, calyx duplo breviora, ex ejusdem incisuris enata, ereta.

Stam. filamenta quinque, subbulata, ereta, calyx inferta, cum petalis alterna, eorumque longitudo. Anthers eretse didymic.

Pifl. germen inferum, pentagonum. Stylus filiformis eretus. Stigma capitatum depresum.

Peric. baie pentagone, à cinq ailes, fèche, couronnée par le calice fletri, uniloculaire.

Sem. une feule, ovale.

Tableau its especes.

280J. GRONOVE grimpante. Dift. 3. p. 47.

L. n. Vera-Crux. 0 Tigegrimpante, hispide, accrochante. *F. ale.* petiolees, lobees comme edits de la vigne.

396. V I G N E .

CharaS. effent.

CAL. très-petit, à \$ dents, *f* petales, cohérens à leur sommet. Baie supérieure, fub j- (j)peime.

CaraS. nat.

Cal. très-petit, à cinq dents.

Cor. cinq petales lanceolés, le plus souvent cohérens à leur sommet, & se détachant de leur bâfe[^] tombent ensemble comme un *calyptm.*

Etam. cinq filaments fubulés, demi-ouverts, caducs. Anthers arrondies.

Fiji, ovaire supérieur, ovale. Style nul. Stigmate en tête obtuse.

Peric. baie globuleuse, pulpeuse, quinqueloculaire avant sa maturité, mais uniloculaire lorsqu'elle est mûre.

Sent, au nombre de cinq ou moins, oïfueuses > turbinées en cœur, semi-biloculaires.

Tableau des especes.

2806. VIGNE vinifire. Dift.

V. à feuilles palmées lobées finouées nues.

L. n. le Levant, maintenant cultivée dans les climats tempérés des quatres parties du monde. T> *Arbrijf au-fumenteux.*

Peric. bacca pentagona, quinquealata, ficca, calyce emarcido coronata, unilocularis.

Sem. unicum, ovatum*

ConfpeUus fpcierum.

2805. GRONOVA scandens. t. 144.

EVera-Cruce. 0 Mart. cent. 1. t. 38. Jacq. collid. 3. p. tgj. & ic. rar. %.

396. V I T I S.

CharaS. effent.

CAL. minimus, y^jidentatus. Feta f^ apice cohaerentia. Bacca fupera, fub - \$ - fperma.

CharaH. nat.

Cal. minimus, quinquedentatus.

Cor. petala quinque, lanceolata, fsepins apice cohaerentia & infar calyptree bafi abfcedentia & fimul decidua.

Scam, filamenta quinque fubulata, erefto-patentia, caduca. Anthrac iubrotunda?.

Plfl. germen fupexum ovatum. Stylus nullus. ^a Stigma capitatoobtufum.

Perk, bacca globofa, pulpofa, ante maturitatem quinquelocularis, at maturitate unilocularis.

Sem, quinque, aut pauciora, oflea, turblnato-cordata, semi-bilocularia.

ConfpeSus fpcierum.

2806. VITIS vinifera. t. 14;.

V. foliis palmato-lobatis iinatis nudis.

Ex oriente. Nunc culta in orbis qnatuer par* tibus temperatis. T> *Frutex farmtntofus* > *cirrhis oppofitifoliis.*

34 PENTANDRIE MONOGYNIE.

2807. VIGNE *de Unit.* Dift.

V. à feuilles palmées lobées rudes, vrilles racemifères.

L. n. l'Inde, le Malabar, *fy baits très-groffes, verddtres y sub-trifpermes.*

2808. VIGNE *à f. en occur.* Dia.

V. à feuilles en cœur dentées velues en defibus dans les aiffelles des nervures.

L. n. la Virginie. fi.

2809. VIGNE *tomenteife.* Difl.

V. à feuilles en cœur fubtrilobées dentées toment. en defibus.

L. n. les Antilles, l'Amerique fept. T> *die paraii très-diftin3e de notre achit tomenteux*, *n°. tfftj.*

»810. VIGNE *de Virginie.* "D&.

V. à feuilles en cœur, fubtrilobées dentées en fcie glabres des deux côtés.

L. n. la Virginie. T>

a 811. VIGNE *heteropkylle.* Difl.

V. à feuilles simples incisées à trois & à cinq lobes dentées en fcie, nues.

L. n. le japon./? *dmte quecefoit une vigne, fi ses bales font couronnées par le calice.*

2812. VIGNE *à trois feuilles.* Did.

V. à feuilles ternées : les folioles arrondies, dentées.

L. n. l'Inde, *•\$! jes folioles font arrondies, c'efi peut-itre notre ciffus,* *«°. • 65.*

2813. VIGNE *laciniit.* Dia,

V. à feuilles quinée[^] : les folioles multifides.

L. ii.... T> Cefl peut-itre une varieté obtenue par la culture de la vigne vinifère.

2814. VIGNE *du Japon.* Did.

V. à feuilles quinées, fubpediaires, glabres: Us folioles crénelées, avec des fileis fur les crénelures,

£ /<.le Japon. Tige herbacie. El. a[^]petales.*

PENTANDRIA MONOGYNIA.

^807. VITIS *Indica.*

V. foliis palmatis lobatis afperis, cirrbis racemiferis.

Ex India, Malabar. T? *VaWa + pira -pitica.* Rheed. maU 7. t. 7.

2808. VITIS *cordifolia..*

V. foliis cordatis dentatis fubtus ad axillai nervorum villofis.

E Virginia. T> *Sequent! affinis^fed diflinSta.*

2809: VITIS *labrufca.*

V. foliis cordatis fubtrilobis dentatis fubtus tomentofis.

Ex inf. Caribseis, America fept. T> *Sloan, jam., hift. 2. t. ito.f. q. PluL t. 2^5./1.*

2810. VITIS *vulpina.*

V. foliis cordutis fubtrilobis dentato-ferrati* utrinque nudis.

E Virginia. T).

2811. VITIS *hetcrophylla.*

V. foliis fimbrijcibus incifo-trilobis quinquelobisque ferratis nudis,

E Japonia. Thunb. fi, jap. p. 1 oq. *baccaglobofa^ calyce coronata, disperma.* Thunb.

2812. VITIS *trifolia.*

V. foliis ternatis : foliolis fubrotundis ferratis. Lin.

Ex India. *Folium caujjionis.* Rumph. amb.S. t. 166. f. 2, in *icone Rumphifoliolaovatafunt.*

2813. VITIS *laciniofa.*

V. foliis quinatisj foliolis multifidis.

Habitat... T? *Corn, canad. t. i8j. Foliola baft interdurn coadunatafunt**

2814. VITIS *Japonica.*

V. foliis quinatis fubpedatis glabris: foliolis crenatis; crenis ariftatis.

E Japonia. Thunb. fi, jap, io^l. Fl. *4-petalū.*

2 Si;. VIGNE à cinq feuilles. Dift.
V. à feuilles quinées : les folioles pétiolées ovales demeures, tige fructifère.

L. a. Le Canada, t F. glabres, Ittisantes en de J'us. Vrilus oypofees auxf,

3,316. VIGNE filiforme Did.
V. à feuilles quinées : Les folioles ovales dentées, tige herbacée filiforme.

L. n. le Japon, F. g'abres. G'appes ax ill.

2817. VIGNE a fpt feuilles. Dia.
V. à feuilles compufées de fept folioles ovales très-émises.

X. n. leelndes-oriemales. I? Tige grimpante.
F. digriffets, glabres. Grappe terminale.

a818 VIGNE à f. dt perfd. Did.
V. à feuilles furcom^osces : ICJ folioles latérales pinnées.

L. n. la Caroline, la Virginie, T? F. bipinnées & prtfut tnpinnt's* Folioles ovules indies ou grojjiirement de.tas.

* VIGNE (palmee) à feuilles palmées jlabres : les dcccoupures incisées demeures, ombelics CH forme de grappe. La Vtghdi. ft

* VIGNE (jphudt) à feuilles j-inncés 6eatis en fcie glabres.

L. n.,, mmeuux pnurprc's. Pedoncu<les fourchits. Fl. en petiurs omleiles.

* VIGNE (At &p) I feuilles quinquangulaires dentées toineiuénies & frrugiucuses en-deiTous, fieurs prefqu'cit c*t*i. Le op de Bonne-Espe'rancē.

* VIGNE (cirrheufe) à feuilles temées, ve- lues : les folioles ovales dentées. Lc cap < Eon;if Esperavet.

Explication des fig.

PI. 145. f. 1. VIGNE vinifera.

f. t. parties At U fruflfication ttaprh Tw
(a) Fleur efflégK. (c,d,t) Corolle tombant unecot-ffc, (/) Euwin-L'S, pilli. (fil. fl. ft) entile. (i,l) ta mCme coupe. (m) Semence

iSiJ". VITIS quinquefblia.

V. foliis quinaiis ; foliolis p^{et}iolatis ovatis A ratis, caule frutetceuii;

E Canada. Tj Hedera quitiqwjolia. Lin. Corn. Canad. t. too.

2816. VITIS fit'iformis.

V. foliis quinais : foliolis ovatis ferrariis, caule herbaceo tillformi.

Ex Jap. Vitis peataphy Uii. Thunb. fl. Jap. iof,

2817. VITIS /; epraphylala.

V. foliis feptenatis ovatis integerrimis. Ida. rtarau, 2.13..

Ex India orientali. fj Cuulis fcanJens. Folia <jkata, glarii, Rucemus terminalis.

2818. VITIS cxboava.

V. foliis supradcomponitiis : foliolis laierali- bus pinnatis.

E Carolinia, Virginia.^ Pink. t. qta. f. z. Folia bipinnata & fubiripinnata. Toliola ovata iacifafeu groffefer/ata.

* VITIS (palmata.) foliis palimiis f-labris : Iseiniis ferrato-incilis, umbellis recemofis. Vahl. fymb. 3.p. 4.2.

* VITIS (pfanara) foliis pinnatis demato- ferwtis ghbris.

. VaM.fymb. 5. p. qj. Canfer. cum ciffo orlntali, n°. 1629.

* VITIS (capenfit) foliis ruquangularibus dentatis subtus ferrug'no-tomentosis, floribus ftibj licat is. Thunb.fl. cap. prodr, /, 44. An Ciffua tomentoD^{n°. 2623}?

* VITIS (c'zrrhafa*) foliis ternatii vil oCis: foliolis ovatis serit is. Tltuiib, fl, cap. prodr. p. UQ.

Explicatio icon. tun.

Tab. i4j. f. 1. VITIS vinifera.

Tab. u.; f- i^e Parte fructificationis ex Tourneforth. (a) Fls integer. (c, d, e) Corolla calyptræ infav. decidens. (f) Stamna, pistillum. (g) Pistillum. (h) Baccæ integra. (i, l) Eadem dissecta. (m) Semen separatum.

3P7. L I £ R R E.

Carad. effcnt.

CAL. demi-fup^crieur, a y dents* j" peules. Baie couionnée, a 5 femencet.

Carad. nat.

Flcurs en ombelle : 4 collereue très - peme muludentce.

C«l. tR-s-petit, deini-fujjcricur, a cinq dents : les dents cadiques.

Cor. cinq petal^{es oblo}DgJ, larges a leur bafe, ouvcits, dcmi-reflcchis.

Emm, cinq filamens fubules , altcrncs avcc les pt:u!fs₃ tie nocmc longueur qu'cux , croits. Anthercs ovales , CJUCII. , bitiJcs itJeur bale.

Pijl. ovaire turbné, derriur, cntoure par le calk^{e adhérent}, Siylc fimple , tresscourt. Stig^{mate simple}.

Park. Baie gtobuleufe ? couronnci', a cinq loges,

&m. foltaires, grandc*, gibbcufcj d'un cote, aiigukufes de l'autre,

TabUott d s espèces.

281. LIERRE *d'Europe.* Difl. a. p. **yit.** • L. if. ovalc* & lobées , ombelle **folitairc.**

£. n. TEliope. Xt arbriff. farmentcux , rament &grsmpant* F. coriacea , lijt/s , altemes.

aSao. LIERRE *tcnbbuhinact.* Di5. fuppl. L. a fcullles tii^JLtes septenées elliptiques très-enieres , ouib. 110mb, difp. en grappes.

I. n. l'iflc de Ceyl. m. T> ifi/tf It fruit 1-jptrme , comme l'enjala A Rhetde , (Aort. ma/ . 7. f. aS J, i^ncflpas dt cegentre.

* LIERRft (pendant) 3 fcuelles ovales-Unceolées entieret , pédoncules trC-s-longs pendans. b La Jamaïque.

* LIERRE (pen hi) 1 fcdilles ellipu^tes coriaces ; ombelles penchées hri f.hériques. b La Jamaïque.

397- H E D E R A .

CharaQ. effcnt.

CAL. r^mi-fuperus, f-dentatus. Petala y. Bacca coronau , 5-fperma.

Cham3. nat.

Flores umbellati : involucr* minimo muldeniato.

Cat. minimus, femi-fupents , quinquledenutus : dentibus deciduis.

Cor. pttala quinquCjoblongi, hiii Lau , pattirij, Tcmi-rt-ilcxa.

Siam, filamentaquinquiie, fubulan- peuiisalBW-na, eo ^{rundem longitudine} , enaa. Anchera; ovatac incumbenies, bjfi bifidsE.

Pip. pernicn rarbinaum, femi-inferum , calyce aJnato dnfiuoi. Stylus fimplex , brevifilius. Stigma fimplex.

Peric. bactaglobofa , coronata, quinquelocularis.

S.:m, folitarl^a , mag>ns , hinc gibba , inde anguhu.

Consp &iu speciem.

afir9. HEDERA Aciix. r. 14;.

H. folis dvarislobarifque, uinbdla folkaria- Ex Europa. r> Fmu x farmentofus. reptw & scuteiu.f. co*:*ea, latia, alte-nc.*

2820. HEDERA *trebinthinacea.*

H. follisdigitalia ft: ptenatis ellipticis integerimis , umbellts pluribw; racematim dig. flis.

Ex inf. Zeyl. injea. Ti Vahl. fymi. 3. p. 43. cat. margo integer. Pelula6, linearia, Staut. 6. Stylus 1, Stigma acuru/n.

* HEDERA {pettdula} fofoliosato-Unceolatis integris , pedunculis longiTimis pec dul. Swart[^] prodr. St.

* HEDERA. fn*ci ans*) fol iisclipticUcor. umbellis miumibus hemiff hæricias. Su prodr.

Ex, Eca