



# Theoretifche Anfangsgründe

der

# B o t a n i c

oder

Erklärung der Grundsätze der naturtirfjen claffen,  
eintheilung und der *hunft* die Gewächse zu  
beichriben und ju ftudieren,

v o n

A. P. de Candolle,

Prof. der Botanik, Director des tor. Gartens zu Montpellier tc. sc.



Aus dem Franzöfischen überfegt,

v o n

Dr. Sob- Sacob Römer.

---

Zweyter ebeil, emente ubtbeitung theilung,

des Versuchs eines terminologischen Wörterbuchs  
enthält.


di

Zürich,

F. Güssi und Comp.







## Borrrede.

JDurcJj ft? gortfdjyritte, mefd>e hit £3otanif in ben  
3 legten \$>ccennien gemadjt *Iyat*, unb aucfc tt)o6l burd)  
tie \$ftobefud)t unfcm ^age, alte <Sad)cn mit neuen  
SQSorten ju bejeid)nen, famen fo unermefjfidj ttete  
neue Siudbrucfe in bie ^unftfprac^e bee ^oranifer,  
ta§ man aud) bet? bet vollpdnbigflen ^enntnij; bee  
Linné'schen unb Jjebni3'fd?en ^a-minologie in ©e#  
fahr geråth,, mau^en SSotauiff cjanj unb gar nid^t  
me]>r ^erjle^en ju fonnen, tvenn er nic^t allenfall<  
fein SOBefy tt)ie e^ je|t anfdn^t ©itte ju roerben /  
nit ctnem ngenen 50B6rtei\*bud)e au^gerupet fyau

Oh t\$ Qttbitnftlid) fei), biefe ©eparat'SDBorter/  
bucket alle in eineni SOSortebuc^e j« famnieliyy unfc  
neben ben dftcrn and) tie neuern ^unflau^brucfe  
aufjuflellett, barüber mag ber @eti'au(^ bt\$ voxlits  
genden emWeiben,

^bie £3cvfaJTer (benn |d) bin bem gretmbe, t>el/  
cher mit bit) tiefev Arbeit tie gr^gtf J^utfe leistete,

tinb of)tic bcffen t&dttge 9Dlitn>firfung bag 9066rtct6uc&  
nod> mid)t in biefer 9(u\$bet)nung (tftte ctfc^eincn *tint*  
nen, eg fcftyl&M, ifon alg SSJittmfaficr anjuerfen;  
nen> jmb eg ftcb bennijjt, bag fie ton *i l m a ^ e i t e*  
*n i* mnad}l&§|Qtt fjaben, wag bin.gje bflf bef;  
felben fo Ieiçf)t tint) bequem unb nu^lic^ mac^en  
fann, a(g m6glid^»

@ie fcfcett gro^n ^^eH« jebem STOorte ben **Mah,**  
men beg 33ecfaffer« betjseffyt, ber c« juetfl **eins**  
fttyrte, obec ber, wenn e« jc|t in etnem anbern  
©inne genommen wirb, juerjl btefe neue ^enntng  
tent 2Bochte gab, £>fe gtnne'f^en ahen SBotte flu>  
tnit S. bejeic^ntf, unb bie Sinne'fc^e throning **steht**  
obm an.

@ie foaben fi(^ auf basi fovgf4[tig|le **gehüter,**  
%e eigene ^Hefnung Abec btejj unb jened }u fagen,  
inbem, n»enn fie biefe<5 Wtten tljun woflen, fie ents  
»«ber ba\* »otliegenbe 95u<^ gat ntc^t fdjreibw bu<^  
{en, obev«ed }u etnem titMty mtt)t aid &rcd>2Ka^|C  
fo volumtniftn SBetfe Wtten autteQnen mfiften, urn  
ju be»»eifen, bap tteaet^t aUed, ma\* bie. tftmffc  
fptacb.e bet SBotanifet bebatf, fid) wit t6 bet **Schö:**  
yfer biefft Sptadje inniget ffl^te ar<'man ti i^  
itadtftylt, auf— bet^na^e fo eiele Sblhm 6rin<jen  
Ke^e, ate ^iet <8ogen ftnb.

**S**o n̄ie SJtaſſeret) unb 9>oeſie tyre ©renjen Oat,  
 tie feine b,erfelben iüberfdjreiten barf, o&ne 9>&ama\*<sub>41</sub>  
 fteret) ober 9>ebauteret) ftatt fcerjerfcſcenber tfunft ju  
 tterben, fo foil and) ber SBotanifer, fcſeint eg,  
 meſjr nid)t bur\* SBorte fagen tvoden<sup>9</sup>, al6 ber^flnfl\*  
 ler faum burc^ ©riffel unb 9)infe( auſ}ubrūcſen wv  
 ntag, ta aud) ber >erjldnbige ^ünpler ffd) oft ge;  
 jwungen (Ie^t, ber ©pradje beg SSctaniferg **dasjeſ**  
 nige ju fiberlafj^n, n>a^ weber garbe no\* **6chwārje**  
 barjufMen im ©tanbe ifL *di* ifl aUcrbings; eine  
 sehr ric^tige S3emetfung be €an^oUe'0, ba§ ber  
 mittelmäßigſte £opf bur\* bie (Kege(n ber 6otanif\*en  
**Sprache** gejwuugen mirb eine fcſ;r gute ^3efd)reibung  
 ^ne^r ^flanje ju Itefern: allein, tvenn bie ©pracfy  
 der ^otanifer'eine <t oracle ju werben bro^t, bie  
 faum ber geleſjrteſle SJlanbarin me>r ju uerſle^en  
 ttermag, tute foil ber gemeine' S^ineſe ſie faffen unb  
 begrifien? **Wir fyabtn** auf er ber Waiter Don £f)ina  
 ein **Sprachwort**: aUsufcbärf mact)t **ſchartig** ;  
 Hub ein Sdjclm 6er mcbr tbur ale **er kann.**  
 Siefer ©prfid)»6rter foKte man *and)* in ber S5ota\*  
 nit, ober ttielmeſjr *bet)* ber neuen 6otanif\*en 9BBort\*  
 münze **Egedi** fepn unb bleibetn

**B**ey biefen @runbfdſrn fonnten Me ?Qerfaffer  
 ſich nicht zu höherer Pflicht rechnen, als das .

&leifHgjfe }« fommeln, mi fiberafl jerfheut war  
t&eitt tamt bie jcmgen, Die etfl anfangen SSotanif  
jil ftubieren,fcbie nid)t afle« ba& bet? bet Jjaut  
l)aben , toai uta jti ©ebot^c fianb, Da^cnige toet;  
fle^en m^cn^tva^ ffe ol)ne d(;n!id)cu 2(pparat nid>t  
fetd)t begreifen werben; tf>ell6 bamit bteJspemn und  
SSJieifler in ber ^unfl, n>enn fte ^ier wahrnehmen,  
trie etn gutcr \$^ei( beg 3iud)e£ bet; **Babel's Thurms**  
6au and) bie SBotanif• getroffen ^at, auf()6ten mðch:  
ten biefen 5(ttc^ nod) mefy r über bie ^duptec ifjrer  
©6f)ne unb @nf€( }it bringen/ bic, ivenn eei fo fort;  
totytt, in ©cfafjr getatljcn, aud^ il)u 95dter nic^c  
tne^r ju ^erff^cm

S^ gibt einen sBlittthwQ }wifc^en ben ^afjuen,  
tie bat ©enie unb SRabame (a 'Oegle betritt,  
SDtcfet SBeg fd)cint |x||6 bie t/id /^rm ju fer>n ^  
tinb btefer ntu\$ (let^ öffn unb rein ge^alten roerbem

Ueberjeugt^ t>a\$ ein SBfrterbud; nie }tim fyfa  
mati\$en hom age wiffenfc^aftltcfeer ©egenfldnbe!  
bejUmmt fcpn faun, unb beflimmt roerben barf/ fja^:  
ben bie SSerfaffer be^ t)ot(iegenb^n ffcfr fe&r gef)u:  
tet/ etnjelne 9(rtifel etnetf botanif(^;termtno(ogffcben  
**Wörterbuches** ju ftjflemattfd)en \$(b^anb(ungen ju  
erheben/ in n>e(c^en man nic^t of)ne vide ^Rü^e ben  
ycrlangten Unterudjt ftnbet. @ie haben, ~~daher~~ z. B.

n̄djt untet bet Qtubtife SBfott atte gotmen unb **Fis**  
guten bcc SSldttcc abgetyanbelt, fonbcn jcbe betfel\*  
ben untec bem tyt jufommenben 2hftbtuc̄e\* 3Ran  
wirb bafjet **Estr** jebe\* ?Ot^fjI 6a^ bejeidjncnbe djatraf;  
tetiflifc^e SSe^wcrt bag bet? einem ^auptworte **steht**,  
unb nid>t tai Jpauptroort auffdjlagen müffen. **Aus**  
fciefer @nrfc^tung gcf)t jugleic^ ber groÙe 3Sortf>eif  
^rt?or, t)a§ man jebe\* 5Ra^lbett ganjen Umfaug  
einrt SDBorte^in alien feinen ^erfc^lebenen £5tbett;  
tungeit unb SSejie^ungen genau fennen unb mftv  
^en (erntt 9Ran vergletcfte j# iS\* nut bte 5(rtifef  
& quads, angulatus, articutatus &c. SDBtc **hoffen**  
^ierburc^ n̄d^t 6lo§ bem ^nf^nger, fonbern, **infos**  
fetn wit *and*) gtd^ten ^ei(e« jebem ^uebcucfc fetti  
et(4utetnbe^ 93et)spiel betjgefügt ^ e n , bem iSota;  
ttifet felbjl 6et) S)emonfitatfonen> bie et anbetn **16ec**  
btefen cbet jenen &infiau\$btu<f ju fyalm @eleven;  
t)tit f)at, nu|lic^ gewefen ju fet)tu 2fuc^ ^effeit  
n>ir ^iet eben tctomtf) SJlatetialten ju einer ^6ch(T nfc.  
(f)igen Otebuction unb genauetn ^Seftmmmt^jt bet  
6otantfc^en @pcarf)e gefiefm JU f)abetu SGenn man  
in manc^en anbern ^thftc^teu in unfetn \$agen fid>  
)U überjeugen (Selegen^ett ^atte7 ba^ eff gutfet), ju  
bem 5(Iten jurücfjufe^ren, fo tvfrb man auc& **vies**  
lef^t tyj bet ^etminologe bet Sfiotanif nodj jti **dies**  
fern **Gefühle gelangen.**

**Man h**cit fyt<sup>x</sup> tic (ate{ni(\$e 6ptac&e }um@tunbe  
**gelegt**, unb fftyrt bie Sngli jtyen , \$ran}6jifc&en ,  
3talfenifc&en unb \$)etttfd)en &mftau\$btučße am Snbe  
(efonbertf auf, bamitt ber S)eutfc^e ben 2(u6(dnber,  
tint) fe(6fl ber 2(u3(ānber ben 5Deutfd)cn (ctd)ter unb  
fcfcnctlet ttct(lcl)cn Jii6ge, a(6 wtnn i)ia aUe Spta;  
cf)en· timer einanber getDorfni toixcn/'unb biefcg  
fletne 9056rcer6uc^ tyezbmd) bat fd)rccfJic^e %tfcf)eti  
Unb ben mtuf)fe(igen ©ang etner ^>ofngtottc befdme.

91 · futcf)ten ben 7abel nicf)t, fibetfufftge SBorte  
aufgenommen }tt ^a6en/ ~~t>tettecf>t~~ trdfe ung e^ct  
berjenige, ba§ n>r ju tvenig erfldrten, unb auf bie  
**Quellen zurückgewiesen haben.**

R1140

---

A. II

A.

A bat tor SBortcrn aui bem ©riec&ifc&en bie **vers** ncincnbe 95ebeutung bti Alpha pHativum, unb be\* jeicbnet alfo/ þag bagjenige/ toatf burc& bai barauf folgenbe SBort angebeutet ttirb, nictt fcör&anben if!. ©O **Beiß acalýculatus Q^nt %t|d)**, **anantkosy ofyne TSlume, ar/iizos;** ofcne **Wurzel.** SBir merbcn bicjenigcn SBortcr/ bie fþy au\$ bicfec **Bes** mcrfting **etflaten** Iaffen / ncfþt mfy befonbcrg auffu^rcn.

ABRRRVIATUS, A, UM, **libQtih^tf ift ubevfyaupt** a|M, toa& in fecnre (gntwicfelung dcwaltfam aufgcbal^ ten ;u fepn fcfcyint. Jumcilen nenfft man ettt>ad abgc; furjt, wa& abgefiugt ifl, obcr n>a^lcdtec a(g (ang iff. (Eigentlid) mirb abcr biefeg SBort nurn>om j?clcf)c **(Ca-//a; abbreviatus) \$tbtaud)**t, tCUH CC um DielC^ **fürzer** ifl / aid bie SSlumenfrone, txe an COAONILIA **Emerus.** **Nach Billiard ist alles, was** brcUcc a!^ (ang **ist,** **abgekürzt.**

**ABORTIENS, ABORTIVUS** a, um, \***abortieren**, ttuvb nid)t btog i?on Sruçf)^#t^| bie t>or bet SKcife abfaU len, obec oon Slumcu bie feiue \$viid)tt 'bringen (mte bée innecen 95lumcf)en in bee SolDe t>on DAUCUS Cnrota) t>on S^crii / bit Uitti ©amcu bninge (trie an ber OIEA), fonbern Don aKem gebrauc^t/ n>a^amciner ^Pflanse fid) ncfþt ge^ðrig cntvictclt. SBeo ben **älter-** ren **til e^ gleitd)^ eutenb/ menu e^ ton Slumen ges** braUC^t **WC^nu)^I /\*70J masculus, slerilis ; fcei) den** S^cueren nut **castmta, stamina, tveuu ^ t?ou ©taub;**

**gefäßen** / unb mitt *incompletum*, *Stigma*, foenn e\$ tOtt  
 © f übfor gebraud)t to i r b .

" ABORTUS , **tfl i g f a** 11, wenn 6(ü&en&c Wanjen mtt  
*tooUommncn* roeiblidjen *OtQamn*, au\$ STOangel an S5e^  
 fruc&tung, ober aug mad immer für einem 3ufalle/  
 feine reifen gruc&te bringen. JDecanboUe f)^t iff  
 feinen t|)eoveti|d)tn Slnfang^rünben bet *fdotanit ba&*  
 jentfle / tt>aS cr *tfligfaf!* / *Avonement*, Mangel an  
 g nroé l u n g betgt / jwac febc fcftarfftnntg / aber et;  
**mas**

ABRUPTE PINNATUM L., @. *P ari pinna turn.*

ABRUPTUS, A, UM, @# *Trnncatnt.*

ABSORBENTIA VASA , £' t n fa u g e ft b e (5 e fa ^ e.

ACALY CULATUS , A, UM, *teld)lO&* , ©. *AphyUus\**

**Eigentlich** o^ne äufeiren jfelcf).

ACANACEAE nauntc (feealpiñ bie (Tic^oraceen beg  
 3ufficu .

ACANTHON , @, *Spin a\**

AGAUUS L., f leng cllo 6/ n>af fc̄tnenoberfeinen  
 beutlicftēn (Stengel *bat*, }• S5. CNICUS unb CARLINA  
*acanlis*. — *Acaujis Pile us* an ©d)tt)āmmcn ©. «Sej-  
 «7w. gg iff oft frjnonpm mit *Caulis brevissi-*  
*in u s*.

ACCESSORIA ORGANA, ^ e b e n o r g a n e , n>df>e  
 nur bet) senoffTcn ^Jflansn, unb beo benfelben balb *an*  
*den* €yinf)rung^ ^, balb an *ben* Sortpflan^une^organen  
 sich befinben/ obne njefemli\* ju biefen ober ju jenen  
 zu gefören; wie J?a«re/ ^ac^eln/ ©fugen. Accessoria  
*folia* £ Am phi gas tria; f. a. *Apothecia* unb  
*Margo*.

ACCIDENTALIA RÉCEPTACULA , f<sup>¶</sup> Accident alia  
*vasa p ropria*.

\*H.CCIDENTALIA REGEPTAGULA AERIS , f. *Lacunae*.

ACCIDENTALIA VASA PROPRIA; J U f ll 11 'g e C I 'g C H ^  
 t ^ ü m l i ^ e ( B e f l g e finbna^>jDccanboIlle^o&len/  
 fvelclje burct) Sufatt·in bem ©emebe ber?;, \*t entffe&ai/  
 uub buxtf) Stnftderrng eigenec cmber&n>o abgefobertec

**Gäfte** anfleßt *tsmtn* ffnb. ©0 bringf *bai* £arj bet  
5Rabel(6l\$ee öffers bid in *bat* 9J?aef unb in *bit* tompfoa\*  
tisfren ©efäge.

Accisus, A, UM Bernfcbarbi, wag am ©eunbe einett  
Ginfc&nitt bat/ e in ger íf fen ifr

\* ACCRESCENS, fortw a4> fe n b , n>ad nadr bee  
\*S5futbe nod) foetfodcOf/ n>ie t>er 5?eld» an Dec PHYSA-  
us (£)ecanb). @^ fattn unb mug abet\* and) lint  
wad) fe n b 5ec§ett, inbem

ACCRESCENTIA ntcf)t blog *ba\$* ?Bachſen überhaupt  
(25ecanb.) / fonbern aucf ba^ Ueirwa^fenſeyn  
be^étebnet/ unb

ACCRETUS, A, UM, at|gzvoad)fcn/ ver-  
tt> a d? fo n, -Tttt ir^enb dnem 2^eile gdicfyfam gusam-  
mengeleimt, bezeichnet / und roofft auc^ fortwachs-  
ſend.

ACCUMBENTES GOTYLEDONBS, wenn von zwey Cotys  
(ebonen bee eine bee ud)Un, bee anbere bee linfen  
©amenfette \$ugefc>rt ill, unb bie S7ānber nad? bem  
SRurfen unb bem Saucfte bin genibtet ffnb, fo ba% bie  
Berührungsflåd)e bit 2Jd)fe bed 3amcn^ buccOfceifjf,

ACENIUM £ m f, eine einfamile gemöfonlid) n-orfene  
Frucht / bertn 5ruct)ff)u[le mcf)r ober minber innid / fo^  
n>ofl mit bee Samenf)aut, aid mit bee SRobee bed  
jteld)ed gufammenftångf, \$. 5?. an ben fogenanntea  
@yngene|f(ien, ben Composiiis. ©iefe grufte fpeingt  
nidft auf / unb ibe Snbodpetm ift t>om Epicaep t>ee;  
fcl>ieben.

AGERBUS, A, UM, J>erb, t>om ©efc^macfC/ }. 55.  
bee ©djleben.

ACEROSUM FOLIUM L., «n Ilnienformfaed obeepfeje^  
menfoemiged fieifed f meifhnd and) im SBintee \$vun  
6Uibenbed f&latt / bai, an bee \$aftd mit einee feinen  
häutigen 3c^eibe umbudt ift; j. 93. an bet f 3J?re /  
ſicht. 33aume mit folcften Slattern, bie man XX as  
be In nennt/ beigen H a b c l & d l ^ e r (^ceroj<e)\*  
**ACETABULIFORMIS**, E, ACETABULOSUS, A, UM, nach

0 **paliſtbur** Sfarm etneS' S&ccfKrS, r a i t me&r aber minber einaebogenem ^anDe, in fform ciner ©atatiere, ciner tt>erma fiefen ©cfjuſſel rait meſcr ober minber ein\* geboſjenem SXdnbe, tt>ie **ber** tfclcfy **am** MARRUBIUM **ace-**  
**tabnlosum.**

ACHASCOPHYTUM, f. A c asc op hy turn.

ACHFNA fleeter; *Achenium* **Richard.** S.

**Ac enium**, wilb *P ericarpium* **M edicus.**

ACHROOS/ ei(enrttſct f a r b e n l o a , nad) JDcan; bolle abec fllicic^beDcutenb rait wem'g gefaſcht o&ec p a H i d u s,

ACHYROPHYTA fttdit, *mi* gamilte; ſirm'eB *Calamariae.*

ACICULARIS, E, j ^ a b e I f 6 r m i g . <5D?ct(len< t>oti **Haaren** ober Sorffcti/ We fe&r fein fpigig sulaufen, gar ntd)t ober nut ttenig ccftg ftnb, unb an bee 35aft^ ft\* tttoa\* ^erDtrfen; j. 9. an ben ftefTeln; man ge; braucftt eff aber aud; t>om ©tengel (*Caulis*), j. «5# an SCIKPUS *acicnlaris*, unb au\$ t)on Blatttern/ **j, gj.** SCIRPUS *acicularis*, ASPARAGUS *acutifolius*, 3ut&eileil tfl e\$'fonom)m mit *subulatus*.

ACICULAIus, A, UM, ^jebrauf)t JDcanbolle t>on ©amen, bie an bet OberTaſſye mic feinen unredelmägi\* gen, tt>te mit ber 6piſc einer 3}abel gectgten Stceifen gezeichnet ftnb.

ACIDUM, ©aūre. 93on ben in Pflanzen vorkomnbenen ©auren, al^: t>om A. aceticum, **E**ſſigſäure, A. benzoicum, BcnjOëflure / A. citricum, **C**itronenſäure / A. gal lieu m, fijUu0r<lure/ A. kinicum, **Chinasäure** / A. inalicun^pKepfelfilure/ A. oxalicum, ©auerPleefäure/ A. pmssicum, **Blausäure**, A. tartricum, tOeinflemdure/ lebri bie **Chymie**.

ACIDUS, A, UM, **f**atier, n>af me&r ober rainbec nad> b't0r ober jener ©aure ſefjmccft.

**Acies**, (gr<\*rj> / ber 2)urc(fd)mitt jweper §l<Jd)en; gewöhnlich bie £ ^ n t e. 3?acf) J^inF (jaben bie Pflanzenſtengel feine ^anten/ fonbern Grashe.

ACIETATUS , Bernfc. / f antig, bu\ unb me&rtotn;  
felig.

AoiiORMis Jarg. — JojCtt./ f. *Acicuharis*\*

ACINACIFOHME FOLIUM L. , f5 b e If 6 IT HI t'Q / **ein**  
jufammenflebrütffeS fTeifc&iftC^ 35latt, *bai* an bent **ges**  
toölbten Slanbe bürnt / an bcm geraben b(cfec ill, 3.  
35» tttr MESEMBRYANTHEMUM *acinaciforme*. fo~~ecans~~  
boUe crflärt *ti*, oXi etn jufammmaebrücfrtg / brct);  
**fantiges**, cttoati aufaebogcneg 95la« nüt ftyarfem ^iete.  
**Auch** cin Dotfbmmen' af>nlt> *QtfialUUi* P erica r pinm  
*acinaciforme* fyat *Hinne'* am Mesembryanthemum  
aufgefiett w 95eO Bcrn^arbi l(l *acinaciforme* **Feils**  
*ffomig*. \* <?>arne bemerft ridjtifl/ ba§ an bem **Fo**-  
*Li u m acinaciforme*, tDC^C^ etlt t>rCl>fantigC^ **Blatt**  
ifl/ bit fd)malere ©eitenflacfje / a(^ bie obere/ etnett  
S3ogen nad) innen/ bie untere ffantc bingegen/ etnett  
SBogen nacf) augen befc^teibt-

ACINUS, T, nanntc £tnn' jebe einjelntHeine Seere/  
aud beren mestreren eine jufammenocfgte \$eere *be*,  
ftt) i. 93. jebe efnjelne Heine fogenannte S3eere *an bet*  
Srucjt einec <?>tmbecre / Ulaulbeere. (B^rtner bfn^  
gegen, ntefr ber dafTifd)en S3ebeutung fid) náfternb,  
nennt etne noetc^e/ buedbfe^einenbe / faftige, einfdcftertge  
95eere mit betn^arten ^ernen / n>te bie \$eere *an* einec  
sffietutraube, *Acinus*, **Fornerformige** 12\$ere,©aft;  
beere\*

ACOCCA SEMINA, f ^ 41 e n I o fc 0 a m e i t / ©a;  
men/ an tvelfyen bee ^er ^e Decft/ nacft su feott  
fdjeint; tote an **RHiziFHoflHorus**.

ACORMOSAE, fii c II o f T (5 e w a ^ f e , beren  
flatter unb Stamen unmittefbar *ani* ber SBurjel fom;  
men / J> 93\* COLCHICUM *autumnale*.

ACOTYLEDONES L. ^flanjen o&ne ©amen^ppen  
unb 6amen61attc&en. Sine etoenc ^ffanjenda|fe nacft  
Juffieu, su iDelcfer £inn'e's fryptogamtfle~~n~~ **gebö**  
**ren**, **Unb** Hi^arb's *Exeinbryonaceae*.

**ACOTYLEDONÆUS** EMCRYO Htc&arb / tf{ em **Embryo**

o&ne n>aſren Gotplebon. SDfe&rere **Pflanzenphysiologen** läuflnen bai Safepn Don VfTanjn ofone ©amentoppen. • ©ie *SemPna acoryledonea* (*muttetrtuckenlofe Qat men*, 25orPb.), bringen öftertf plantas mono- unb polycoiyedoneas, *toti an ben Sarrnfräutern unb SRoofen.*

ACKIS, E , L., fcbarf, fotoobf t>om ©erucfte/ 5. S5. TEUCHIIM *marnm*, altf fcOlit @efcf)inacfe J. 53. SF.DI;M «c/-d, unb t>on if)rer SBirfung auf bie S}aut, j. s# RAWUNOULUS *acris*.

AcRoroMus Bern6#, n^aiJ nur an ber ©pige ber gunge ©efcbmacf erregt.

ACRONUS Reefer / {• *RecepCOyCutu tn pro^ nriu nu*

' ACRMPIRA wad) (BretD/ *bai ^tbttd)tn bti tnti iwicUcn* ©erftenfeimerf.

AciIJLEA.O-CILIATrS, A, TIM , ft & d) € I i Q , W i IU t petigf airtr 9?anbe met 'fiecfyenben ipäarcit ober Qor^ ſten, ober aucf) mit Spaavtn unb f{ed;enbeu Sorftcn; **bendes an ben** Slättern ber meiflen CARDUUS unb CNICIJS.

ACULFATITS , A , UM, L. (I & d) c 11 g / mit ®tad)cln befegt/ tt>ie bie Oberfläc^e ber flätter *an SOLANUM jodomaicum* | *btt* 9lanb berfelben *an ben* meiflen CARDUUS unb CNICITS^ trie ©famme, Wtflt, ¥>lattt nnb Sblmntw ftiele *an btn* metflen Hofcn ; ber ©truuf an ASPIDIUM *aculeatum\** Sa‡ *Receptaculum apicnlatum* bit SReueren wawtt *Hinnigt^ule atuin*, voit an **Cicho-mutt**, ECLIPTA. |3, ^Kilattim.

ACULEUS , 1 , L., ^ tac^cI / eine ()arte **stechende** Spīe, bie btot? aug ber ffinbe entfprin^t/ unb nrif biefer fid) tcfa bem 6ol\$e beg 6ten<le(g unb ber 2lcTe, ober^on bem unter benfelben selcgenen \$arend;t)ine bee S31dtcer unb ber \$rud)te Uidyt, unb To me^sieben lägt, bag baffelbe barunter n>e(lid glatt if! / ft. 2i. anbett Rofe/t. Jiimeaen enffle^en and) <Stad)Cln bnvd) bie am etengcl übng bfeibenben %lattfiele, n>ie am c a //

*dex Utib Cormus aculeatus, t)Ott Cocos aeuleala  
linb POI-YPODIITM aspcrum. 2(lid) fltl &CH \$rud)tCn  
unb ben i^ut crt becStacfjelfcfjtvammc&atmán ©tacfeln  
Aculei fl Echini\**

ACUMEN, INIS, eine latige (SpifcC/ lint) jCbe fpifcifle  
SBerlängcnutfl u6crl)aupt. *fcecanb.*

ACUAUNATUS, A, UM, L., *I<X II g3 II. <J t f> I. tj f,*  
*wa^ in cine pfriemcnförmigc ©pt@e ffd enb'ct; irgend*  
*cin Sbcil cinec ^flanjc, beffen gpi&c lang vorgezogen*  
*iff/ unb in cinen fcfer fpiftigen SBinfcl ?ulduft, fo daß*  
*baburc^ Me SHcftung ber 97anb(mie Dcutlid) geändert*  
*roirb/ unb bie JKanbcr tveit lantfanu\* al‡ toxbev fid)*  
*einafiber näbern, wnb bepnabc paraffcl ju laufen (irc^*  
*ben. ©o iff' an mebrcren ^eofen cine .Anth era*  
*acuminatai thie an SPHAGNUM; an LAVANDUL\ Spica*  
*£\\thracaea acuminata \ dtt L^T^Yhtf\$^sy/ite^tris*  
*Cilt a cumin at us dens calycis; Citt acwninatutn*  
*folium an LAMIUM album \$ Cine acuminata Li"*  
*gula an BKIZA minor; Ch acuminatuni op ere u\**  
*Iurn an DICRAXVM. pulvinarium ; CuJe acuminata pa\**  
*raphysis an CmllCh 3)ODfen; Cn acuminatunt*  
*pet alum a|| CLADIOLITS graminifolius; eine acu-*  
*minata Squama an LVCOPODIUM clavatum. Ben*  
*©copoli' iff e^ ©pnotumt mtt tfcwtfz/j.*

**Acuminosus**, A, UM, lanfljugepfifit mit flaefcee  
**Spig. Decand.**

ACUTATUS, A, UM, f p i'Q i'g, nennt man edtett  
SBtnfeUber eine fcfe, nac^ 6 a y n e , biC/ Infofern fie  
Don geraben fiintcij cntflebtn./ in etnem 9>uitcte ffc^ en^  
ben/ tmb nicftt in eincr getf&lbten ?inie.:

ACUL'E ANGULATUS f. *UHgul a t It S. A CUTE CRE-*  
*KATUS f. creu a t us. Acu11: DEMIATUS f> dentam*  
*t us. ACUTE EMARGINATUS f, em a rgin a tu j .*  
*ACUTE INCISUS f. in c is us. ACUTE SERRATUS f, ser-*  
*r a t us.*

**Acutiusculus**, etxoas fpiQi'0\* 3u alien Ber  
ziehungen, toit A cm us.

ACUTUS, A, uw, L., fp jQjg und (fy neidend.  
 Sfrgenb tin S&efl cinc >Vflan\$e / befien <fnbt in einen  
 fyi&isen/ jebocf) nic&t ffcc^enbcn Slacken; obet <ffper\*  
 tOinfel julauft; J. 3). *acutus dens calycis* an bet  
 j£ri)je/ flc<ri *Echini* am Hydnum , *acutum fo-*  
*lium an bCt 2\$lld)£) acutae lamellae, b\|t an*  
*btx untct'ct] ©cUe- ctiicu fpigigen 9Binf( 6((bcn/ rote*  
*an me(>rerm 95l5ttecpiljen; «ci^« *Ugula an POA**  
**trivia/is I acututn operculum* an HVPNUM *cordi\***  
**folium y acntnm p erian t hium* an ANDROSACE J*  
**acutum pe t alum* an ORCHIS *mascula;* aer/f\* r a-*  
 7»J an bCC @d?le{?e; *acutum Stigma* an CYCLAMEN  
*europae.um.* %|i SRebChDOrt Usit ncute b}tt\$  
 gbraufW um ju jct^ett, bag ba^jenige / toa^ butd)  
 bat naebfotoenbe 5Cort 6c^td)ttet micb, fpt^gee obec  
 fd)netbenSiraW acttjofonltd) i|l/ {. S. *acute angu-*  
*lalus fpigtDl'ntlig/ acute dentatum,* fpt^ig ges  
 5ai?nr; *acute serratum, mit {pitmenQ&Qe\$&bnen.*  
 8D?an bemerft aucfe bm £rt, wo ctoat fpi§id iff/ ob  
 ^ bit SBaftd eft/ ober bte unb bic @pi@e juglei\* K\*

ADAMAMINUS, n>te Qiamawt glänjenD.

ADDUCFTIA VASA, f# *Spiralia vasa.* f£\$\$ibt  
 jebocf) auc^ grabe, mte an Sagittaria unb an btn  
 garrnfräutcrn,

AnnucTORGs, f» *Prospyses.* %

ADELPHIA, bag S3cctt)adfenfet)n bet ©taubfaben.

ADEN,ADENOS, JDrfife/ f *Glandula.* %<sub>n</sub>  
 Sufammenfijungen au\$ bem @ried)if(\*en ttfeb biefed  
 Wort ^åuffger aebrauc)t aW ba« Sateinisc&e.

ADFLUKNS Bern&./ <5>inauffIie@enb.

ADHAERENS, ^ufam mert & lingenb /.an irgend-  
 etma^ angefcimt; eine 3rt ton Serbtnbung, bte §wi-  
 fcften deleft unb fitucfrtfnoten offert ©taftfeat. jDecand.  
 3ntt>eilen iff e^ ©i)nonr)m mit cohaere ns, unb öf\*  
 tcc^ beseicftnet t\$ b(og ba^ mcc^anifc^e Slnftansen t>on  
 ©amen/ bfe mit SBieberftaftn Wrfe&en fmb, i> 93. an  
**Cynoglossum** K./ a n ben f t l e i b e r n berßverge enben.

**ADHAERESCENTIA**, bas 9(neinanfttrHt6enurfpruit0Uc6  
fre»er Sfceile. JDecanb,

**ADIPOCERA Vauqael unb Braconnet, ein Princi-\***  
**pium immediatum IV. (Jlaſſfc\* Jr'C t ttca d)6.**

**ADNASCENS Journcf,/ ADNATUM Kic^arb, f, £ »/-  
j III us.**

AUJNATUS, A, UM, L., a n g e t s a c|>fen/ n>aſ mit irgenb etnoatf anberem (Juuen (Sower bilbet, obet }u bttDcn fd>einc; im eigentlichen ©inne' n>aſ mit fei; ner 93ajt^ an 'tincr oberen (oOer untmn) ^I^e mit einem anberen (iōrprcr t>crtx>ad)fen iff. €6 tvirc in febr manni\$falti&cv SBebeutung *Qtbvaud*)U Adnata Anthem, tpenn bee ©taubbeutel an freoben (Setten bee ©pi^c bed 3taiu>faben6 ancjctoact>fcn iff, und ein Dach an berfe(6eft ju 6i(i3tn Wcint, \$. 23. an der **Grainbude** nac^ VOiUbenovo. 9?åd) SDecanbolle, meui er fetnet ganjen Sänge nad; mit bem ©taubfaben t>erbun^ ben 'tfl/ töte *an PARIS, an ASARUM europaeum.* j£)e\* çanbollc nennt ubec&aupt *adnatus ha&itniat*, tt>ai tnlt feiner gan\$en gtaſ^e mit irgenb ei^em ant>erm £6ei(e tecbunben i(l. Eine aufgeleimte 5!Ruſe (*adnata c a - lyptra*) i(l bicjenifle, bie fo fell mit bet jfapfel t>er\* bunben i(t/ ba§ fie and) bann nid)t abfält, mantt fie 9an\$ serriflfen ifl/ tx>ie a n PHASCUM. *Adnatus c a - l y x* iff bep eini^en ber *calyx superus*, *toxt* an ber (Blocf enblume; beffer fc^eint ed aber^ n>enn man mit biefem QBorte jencn ^elc& bejefc&nete/ ber meber *obm* auf bem grucfttboben, noc^ unter bemfelbm iff/ unb ben man *calyx semi inferus* nannte/ tote an etnigen ©ajr iffragen; — *adnatum folium*, fcemttbad 95la tt an fetnet \$aſt£ an etner obet ber anberen Slaſ^c\* mit bem ©tenael ober mit bem 2lſte t>ewac()fen ifl / p 35. IUNIPBRUS *Sabina*. Ueber feiner 35apg mit bem ©tamme t>erbunben# fo *ba% btefe ftei* tfl/ *supra basin adnatum*, iff bad SBlatt ań SEDUM acre, jfmne nennt bicg auch *tidnato - sessile*, unb £ayne nennt e\$ *fotiwn circumscissum*. €8 ifl ©pnpm; m mit /\*<\*\* *solutum*\*

<§6Clt bk% fltff a|X(i) tJoin Petio Itls adnalus , wenn er ncfst ofone 33crle6un9 bciS ©tammege t>on bemfelben lo^selofet tOttbetl tann, j- 95. an ASTRAGALUS *Tragacantlia* — Don? *Pedunculus adnatus*, fot\* der SHumcnfKcl ber ginbean feinem Setfblatte; — *adna-*  
*/7//w o perculuni, XOtWXi tt, XOXi bt*) PHASCUM, alt ben SQanben bee Säd)fe aŋcjetvad}fen 'cfl; — *adnata* rec ep t ac nla, .fi)Cim flC <Ut btC SHapp ttl bCt @a^ mengebäufe angetvacftfen ftnb/ 3.^8. GRNTIANA. *Adnata Spor angia obtV Sp o r angidi a*, finb diejenigen bie übevatt, bber nur oben gegen bfe dündung hin fed auf einanbec liegen\* *Adnatae stipulae*, die innig mit bem 35Iattfiicle ober mit bent Stengel vers tvacftfen finb, n̄ie an DOLICHOS *Cafjang unb* eintgen (bXyt\*OP^n unb ASTRAGALUS ; \*— *ladaatus Stylus*, tocnn fcer ©riffel nut ben \$>li|mmbii|tutn ober SRcfta^ rien t>ern>ac&feit cfl/ n̄te an GANNA, *Adnata integrutn e nl a seminis*, ftnb bci VTJebLCU6 bie semina vestita, tt)te an ScABiosAj alata, Me an KHEUM; SU-berosa, rote an ^A.LIUM; lignosa, ivte an PE'IVFRIA; lanata, mic an FORSKALEA, unb bie i?aunge ^>ulle tpie an CIRCABA.

AONEXUS, f. *Adnatus*. <§en>o)n(td) 6eſeic^net| e^ abcr eincn letc^teren @rab Don SSerbinbung.

ADPRESSUS, A, UM, L., angebtrücf t/ iff tin| Sl? ober ein 9?Iatf, ober ein Slatffiel / ober ein ©cfyuppe, iDenn biefe 2f)et(e ben ©tcn^el ober bie Sleffe, ober bie nabeilebenben flatter unb 3d>uppen mit einei: ober ber anbeven S(ac(;e berü^ren/ tt)te {, 95. an *ARE- NARIA striata*, CHONDRILLA *juncia*, LATHRAEA *squa- maria*. 93on Slumenflielen unb 5ruñ)ten, ). 93. t>oñi @cf)oten/ gilt biefef uu in 93ejug auf ben gemeinfct>afttid>cn 93(umenfltel, ober auf bit ©pinbel, mie an HORDEUM distic/mm, feffener in jpünftcftt auf ben@(eiii gel/ roie an ERYSIMUM offidnaie. 5Senn bie 95lätte an bie Srbe angebrürft ftnb / mie an ber PINGUICULA fo fagt man biej? *Qtir>ot||ld*) au^brücflicf) / fo toie roeni

angebriicfte Sljeile mit Dec ©pifce nacfc abtoärttf flefdjtt  
ftuD.

#ADPROPINQUATUS, na&efle&en&r/t&enn getoiffe  
S&eile bðcf)iten\$ etnen 3oB n>ett turn einanber *fitl)cn*.

ADSCENDENS, L., auf trårt e g e b o g c n , 90?att  
QCbtaudrt biefen Slutfsbrutf jivar getoof)nltc& nur t)on je^  
ncn ©tengcln/ Die mit i&rem untcrjlen Xbcile fjortjon^  
tai auf £ec &bc lit&tn, unb mit if>rem o6cr(?en ftd)  
fo a ^ ar t ^ bcu^en, fcaf? i(>re So^enfjð^e aufroärt^  
fic^t; obet b|e nad) anbmn feu freest in Me Jeðse  
(?eigett/ toie an TRIFOLIUM pratense; infccffctt nennt  
manaud) 2lcf?e, n>ic an eppreffen, flatter, ^lumen^  
ffelc, ©eaubgefage unt> ©taubvcflC/ fogar einjelne  
SBlumcnblåttcc unb S&eile bcrfelben / tt>ie Dèc Sippe,  
•^uffleigenb/ n^enn fteeine äfynlidje Jage baben; t). f).  
nut an bee 3pige aufred;t/ obet auftoävt.^ebogen  
finb\* Se^fpieU foicrûbcr ftnbau ASPALATHUS, ORCHIS,  
ACONITUM *Napellus\** *Adscendens Fl o s jfl let)*  
*Hinne' Die SSInne aller .Qibpnamiffot @»)mnofper^ii(?en,*  
bie Me 5eugung^tf)ci(e in ber&berltifce t>erbirgt ^Z^  
*scendens Caudex, aufwattencigenben* ©tocf  
nennt ^tPt'Qbenote jebe 23erlängerung bee ©en^äc^fe  
fiber ber Srbe, ober über jener ©ubfian;, mld)C ju  
i&rcc Unferlage btent: finné nur ben obcren S^etl  
ber SQJurjeL Set) einigen tfl e^ ©pnonpm mit *in -*  
*curvusm*

ADSCENSUS r^érttier / f. *Caul is.*

ADSECTUS Bernl?., getrennt/ n>a^ unfer **der**  
**Mitte** getbeitt ifl«

ADSPERSUS, A, UM, \*überfleut/ unregelmägig  
**mit** entfernt flcbnbcn Srufen/ n>ie **Die** ©taubfaben  
an DIGTAMMUS / ober mit £aaren, tvie bit flatter an  
Den **Möhren**.

**ADSTRIGENS**, **TIS**, **z u f a m m e n z i e b e n d**,  
from ©efc&macfe flemiflfer 9>flan§entf)eile/ { . SB. *ben*  
gruc()ten ber ©dS)leb{/ bee SBurjel ber SSormentiHe,

ADSURGENS , f As surg ens.

ADVERSUM FOLIUM, L., *leitvoitte ge fehrt, umqervenbet, sugewanbt, ttenn bie %oldt Qe\$en SO?ittag\*flefe^rt iff; anbeee celdeen eg bamttfie Folium adversum, wann eitt aufeec&t |i(\$nM Q3latt fo flcfebrt iff, bag eg ntdjt rait einer obce mit bee anbeeen %lad)t, fonbern blog mit bem SXanbe ge.qcit ben ©tenflel binfie&t / unb n>ann ein bcrijontaleg 95latt bie SRnnbec, nid)t bie 3^d)en, auf unb abfoartf ^ fc>rt bat; tt>enn bie £)urd)mc(Ter ber 9)icite eing. red?^ ten aBinfel mit bee gcboberflaie biiben / % ^ . LACTUCA Scariolai alfo ba\$ &tQCtit|)eil Don Folium adversum. fraynt, bet) tt>eld)em eg cm Slatt 6e\$ci<\*not/ ba\$ mit bee obeeen glacfre bem ©teggel ^ugetoanbt ifl/ toic an L^crvcMJirosa, unb an b^n meiften tyflan\* jen. ginige nennen folium adversum bagjenige iBlatt/. bai mit feinee obeeen ^taç^e gegeu ben \$oei;ont abt n?ae« flefe&rt ift. Berfenbout nennt ein Slatt adversum, tvenn bee SRanb gegen SKittag gefebet iff. £mne' fulwt AMOMUM alg SBepfpiel an. ©ie SJelteeen 9e6raiid>tcti eg al&tt)nont)|n Don opposite.*

Anui.TERiNus, A, VM, b a (I a r b 't z v €n b. 3n^ beifen neunt man aucft \$(Tau\$cn/ bie 'ffrc 3frr fottpflau' JCn fO / tvie "VERBASCUM adulterinum, PELARGONIUM adult erinum.

**ADUNCUS**, A. UM, *ty&tenformig geFrümm t, zugleich abet an bee ©pige (iumpf, j. 53. bag 3?efta; riun an ACONITUM.*

AEGYPTACUM CLIMA, *bag bem Slequinocitalclima am nåd)ikn iff; jtt?ffc^eno unb 55° 91. unb @. 93.*

*AENEUS , A, UM, btaun Qthnlid).*

ARQUABILIS, E, glei'4>fläd>ig, nennt man *bai*?aub an S'lccf>tcn, roenn bie £>berflact?e obne Uneben^(>citen iff/ oDcc, menn auc^ Heine Uuebenf)eiten ba finb, biefelben both akid)fbvmi§ hbet bee Obeeffäcfte sich vertheisen / {< 35. an PARMELIA vUellina.

**AEQUALIS**, E, gleidj, gleic^formtg/ in ^tf)e verschiedener SsejC&ing — *Aequale Antkodium,*

ftcnn tie 3>laftc&en, ftoraug Me atlgemeine 95fumen\*  
 btdt beffe&t, nur etne 3tcK>e bflbcn-/ unt> gicic^^lang  
 flliD/ \$ 95. TRAGOPOGON. — *Aequalis Caulis*, Wtnnt  
 •r (Stengel fiberaD gletcb bicf, o&ne tfnoten iff, ofue  
 ©elcnfe un6 (Slicker / oftne alle (Einf&nurung (iDecan\*  
 bollc nennt bieg ricfrtiget *acquaint*);; \$ 95.be\* ©chcift  
 am LEONTODON. — *Aequalis Calyx* L. tint) <5 o -  
 ro l/« L., wenn Die £l)eile/ in n>eld)e bet tfclD) obec  
 die S5(umenfrone getfteilt i(t, gtcid) grog unb glefd) gc;  
 formt (inb/ {• ©• BORRAGO. — *Aequale Filameii-  
 cum*, xotnn bit @taubgefage allt' gletcf) lang ftnb/ }•  
 35, an bet tfpfelblutfce. *Filum aequale*, 6C9 Cons  
 ferien / n>te bepm Stengel / |\* %. an GONEIVRVÄ in-  
 testinalis. *Flares aequales*, ttoetltt 6C0 zusammens  
 gefegten SSIumen/ ober in\*£)o(ben, bie einjeln en Blus-  
 men aUe t>on gleic^er gorm fmb/ }. 95. LBONTODOW,  
 ERYNGIUM. *Aequale Folium* > beffett 2>afl^ tt)tC ge\*  
 tt>8bnlic&/ an beoben Getten gleicfo iff; *aequa ha in-  
 ternodia*, fcenn Otc @e(enfe am Stengel gleid) finb,  
 {• 95 GALEOPSIS *Ladanum*. *Aeqiales Lamellae*,  
 ftenn bie SSIättc^en am · \$ute bM 6\*wammeg torn  
 ©tcunfe big an ben SXanb bed fyutt\$ ^inlaufen / j\* 5?.  
 AGARICUS *crinitus*. *Aequalis margo*, gUicbr&nbigr/  
 tfl bee ^u( an einem \$iI\$C/ n>enn becfelbe überaD an  
 feinem Umfange t>om ©trunfe gleicft entfernt / n>enn  
 a(fo ber ©truuf im STOittelpuncte i|i; *aequalis pani-  
 cula*, n>enn bie Slefie nach alien ©eiten ffcf) aiigbretten  
 Unb Dert^etleit, \$ 95. POA *trivialis*. *Aequalis Poly-  
 gamia*, bit ttflt *OtbmmQ* btt XIX. (Jlaffe bed 2in'  
 né'schen Spstemes. — *Aequales pori*, J. 95, mi  
 den meifien JSLoc^erptljen / wenn fie ton gleicfKr ©rō^e  
 finb. *Racemus aequalis*, n>enn bie 95luuien nad>  
 aUm @eiten unb nad) aOen 9Zid)tungen fteben / h 35\*  
 HYACINTHUS *rapemosus*. — *Spica aequalis*, ft)ie be©  
 llacemus; j. ^, NARDUS *aristata*. — *Aequalis Sty-  
 lus*, tvenn bcr ©riffel eben fo lang iff/ aW bie ©taub^  
 3efaf§>/ j.SB. amCafracf. — ikeca *aequalis*, tvenn

*bit SBüctfe an ben Woofen auf alle Oeifen &in gleiche Ausdehnung bat, — Aequatis umbella, town bh Blümchen an ben aufierffon OtraMen ber sole>e ben fo grofi finb/ al6 an ben innercn, unb ircpn n4b überbieg bie augerjten SSlutnenblättcr bee augerfleit SIumcfK" nicft grögec ftnb al^ bte inntwij j. ^.*

**ERYNGIUM, SKLINUM @, Ae quatus.**

Ar«QUALITER DENTATUS , f. D e 111 e S.

AEQUALITER NERVOSUM , g I c' i d) n c r v i g iff etu SBIatt/ tvenn bie ber Sänge nad) Mnlfsluf^nenben Cefäß: bünbcl aQe glcic^ bicE ffnb / rote an PLANTAGO lanceolata.

AEQUANS, glei&lanQ, Mna^e eben fo larig, a|i ba^jenige, voomit man e£ oergleii^t. So ftnb an DIANTHUS ckinensis bte Squamae calycinae tubum aequantes.

AEQUATUS,gleic^/ e b e n , o)ne Höder, Knos ttn, SBarjen/ S«^cl)en» 6onon9m bon laevis.

AEQUI-ALTUS, Don gleict)ec ^öbe\*

AF.QUILATERUS,-A , UM , g I e i d> fe i t i g / nennt man ein fantigc^ %latt, beffen Duecburcf)fd)uift ein flleidtfeUiget JDrcod flibt, j. JS. MESEMBRIANTH:MUM aequilaterum.

AEQUILONGUS , g I c i c^ I a n g,

AFQUIMAGNUS , g 1 e i d) g n o f .

AEQUINOCTIALES, nannte finn^ jene ^Jffanjen/ be^ ren QMumen ftc^ \$u einec gmifTen bei(nimten O tunbe des Tages öffnen / unb meifien^ aud) tviebet fd)Ue;;en. Humboldt be\$ei\*net mit biefem SRamen jenc ^flanzen, bie jtvisc^en ben 2Benbefreifen tvad)fen / einf Tropicæ genamu. SRa\* 25ccanbolle abec ftnb e\$ Pflanjen, bie ftct) eftert toåbrenb tt>rkr Saucr ju einec befrtmm; ten &h|nbt 6jfnen unb fcftliegen,

AEQUIVALVIS, g l e t c ^ f U p p t g / tt>enn bie' SHays pen gleid) grog ftnb.

**AERIFERAE VESICULAE Kot^ / bie SMaScfoett an tcn|**

**Tangarten**, Die man für männliche Geschlechtstheile hielt.

# AERUCINOSUS, *tupfeughn, tin in's Bläulic  
o)t jie&enDctf Crün/ n>ie am Crüufpane;* \$. 95, an LATHY aus *odor at us*,

AESTIVALIS und AESTIVUS, n>a\$ im Sommer blühet oder treibt. *Aesiivalis area, Qommetbeet, flic Pflanzen*, Die nur Oeu Sommer üUv bet) uni im Freyen aus halten.

AESTIVIUM, @ d m m e r ^ a u 6 / ftortt Pflanzen wärmerer Climate Den Sommer übec gefalcen merben.

AESTIVATIO, Blütt'en\$ei.t; auf) Dec Zustand Der Sfumcnfrone tor trer (Entfaltung in Der Knospe. - 93efcbaffens)cit Dev ^Jpanie tm Sommer,

AETHEOGAMIE, bei paltif. Beaur., DU Cryptogamie Linné's.

AETH EOS, f, *A no trial u's*,

AETHEAEUM OLEUM, *flud)tiQeB Oehl;  
aetherium Solum, Me 06cl;!en 3ilpen^ipfc(»*

AEVUM, f Period us vitae.

AFFISI, E, *toai nut irgenD cttt?a^ S&efanntcm verbandt ist.*

AFOKA PERICARPIA, Die erfe Gia|Te bet) Camel Hue.

AGAMIA |fledev, f. *Cryp togamia*.

AGAMUS KiC^arb, [ Neut er.

A GEN 1 us Harriet^, f. Neuter.

AGGEDULA, na\* #ecfe«\D!e Buc&fe DerSKoofe, ©• *GongyLangi urn*,

ACCLUTINATUS, a n 0 e l e i m t. Sine fc&c icic^fe Art oon 25er6inDuih>9 bep mldw fc& bit t>ebunDenen Theile mit eintfltf S3or(5d)t s>ne ScrcifTuna trnucit laffen. @o fi<D j. ^. Die @taubflcfaſe und deleft? Matter an Die Slumenfrone/ und Die SlumenOlattac miter fcd) juDeilen jufammenaeleimt, und Die i?eki) 5&Rte an Den Coofen.

AGGASGATUS, L., **Gehäuft.** Dieser Ausdruck

ftirb ein mat fcftt beflimmt ton einer natürlicfyen  
 spffanjenfamilie gebrauc&t / in tt>elc&er tide Slumett  
 mit unterfloac&fenen ©taubbeuteln auf einem gemetB\*  
 fc&aftlic&en gruc&tboben in einer gemeinfcyaflicsten 93lu\*  
 menbedfe fle&en/ \$• 95. ©cabiofe/ tDeberfarte, ©iefe  
 gamine iflbie *btxAggr.egatae*. *flinne* 'nannte aber  
 and) ©often, Slftetbolben unb jufammenlefegte **Blus**  
 men, bann tfägcften, 9le&rcn unb jfolben im **Allgemeis**  
**Titn Aggregatae**. gerner bejeic()net er fe&r bes-  
 ftimmt eine flemifie Slrt ton 'gruc&ten (*fmctus ag-*  
*gregati*), toek&e auf einem 9emeinf&aftlid)en \$TU\$U  
 fcoben torfommen, ^ne eine anbere *alt* eine attgcmeine  
 S}üUt ju *fyabtn*, j. S. bie ber piatarten, beg **Spar-**  
**Qanium**, ober tt>eld>e, nac^ JDecanboIIe / au8 **mehres**  
 ten Sruchtfnoten befleben/ bie urfpriunglic^ mebreren  
 SMumen angeborkeit/ j. 93. bie Ulaulbeere. Sirten bie;  
 fer *fmctus aggregati* finb na\* DccanboUe:  
*Syjicarpa* 3t<f)airb / \$ZiQt; %dpftn unb T&ttt,  
*'aggfegatae Baccae* L. (ober *Utriculi*), foQen fe&r  
 ieutlid) feon an ADONIS *capensis*. Unbefhmmter  
 (rau(4t man biefcn SlugbrucE ton 3tt>iebeln (*Buibi*  
*aggregati*), *tocwx* an einer 3ftiebe( tiele anbere an  
 ber 95aft leid)t mit berfe(ben terbunbene Sftiebeln fi^en,  
 j\* 93\* am\* j&noblaudj>e/ *torsu^lid*) an ALLIUM *nigrum*  
*sibiricum*! — tOtt JMO^pCU (*fie mm a aggregata*)  
 totnn mefrere j^hogpen bic^t auf einem tyuncle beo  
 €nanber fiefsten/ {• 95. XANTHOXYLUM *fraxineum*; —  
 t>on 95lumen|ieIen {*pednnculi aggregate*}, twmt  
 me^rere berfelben bic^t beo einanber (!eben n>ofür man  
 <ber 'ofterg UndC^tig *flores* Ober *fmctus aggregati* fagt/ {» 95\* ASPERULA *arvinsisi* — t>on ben  
 ^aaren (*pubescencia stellaris aggregata*), MCW  
 bie ypaare fiernförmis ffnb ^ unb bife ©terne an jeber  
 SBorfie ober ah jebem ©traftle *toitbcz* fleinere **Sternchen**  
 bilben, j. 95. an Alyssum; — ton SJBurjehn (*aggro-*  
*gataradix*), totnn mttym 3tt)iebe(n ober 5tnoHen/  
 mittelft eisenen Sufattomenbangeg an ber Safft **dicht**

**vensammenstehen**, § 35. ALLIUM *m̄grum*. %utotiUn  
l(l aggregate\* radix (l)noni)m\* fut grannlata.  
9?0tl SBoefCtt {Setae aggregatae), foemt ffC bidjt  
ffefoen auf einem tyuncf tuie ait BUYUM empidatum  
etc.; — t>on 3Je^reil (*Spicae aggregatae*), wenn  
eine Skfjee au^ mefjrcrm dnjclncn bcfle^t/ **wodurch**  
**fie juglcid**) i^re waljenfocmige g\*m twlicrf; §. 3.  
**ORIGANUM heracleoticum.**

Ac REST i s , E , 6cjetcf)nt bait) eine tofbln>ad)fent>e  
Wanje, im @cgenfa^e twneincr im @arten ^^ogenen,  
unD jtar im clafffc^cn 6innC/ 6a(t) eine blo§ auf  
9lccfcrn tint) Ubauttn QCbhQtcn @runt>eit Mufia t)or^  
fommetlDe Aflame/ Wie VERONICA, *agrestis*, ADONIS.

AGYNUS , A , UM VLOS O&C PLANTA / f> *Mas-*  
*culu s.*

**AGYRATUM f\* Ex annulat inn.**

AKENA , Flore franc. AKENIUM K1'4>^/^/ f\*

yiceaiu ?n<sub>m</sub>

ALA, 51(itpinFel/ if! 6et> 5eu åltcren Botanis:  
fern bet SBinfef, t>en ein 91l mit bem @tenge(/ oder  
cin 33latt^ oOec 53lumeu(?icl met bent @tcugel oder **Uste**  
bilbet/- gleid)bei)eutent) alfo mit bent -2Sorte *Axilla*.  
SBep ben SReueren binsegen if{ ^ / ^ nut berjenige SSin^  
fcl, ben eiu 31fl mit bem Stengel/ obec ein Smeig  
mit bem Slfie nad; aufmårt^ bilbet. <^>a;ne nennt ifm  
3Cflac^feL 3n t>iertfad>cr 3aW/ ^ r/«e, 6e\$ci>net  
eg bte jwei juc @eife (iel>enben Slumenblrfrer an eintc  
©c&mitterlinflSblume/ j. S. an bee ^rbfe. Shuct  
**Die** \$aut / bie bee gluçjelfscuc^t an bee' ©cite unb art  
der ©pifie umfagt/ tt>ie an bee UlniC/ ^ cf^e/ am  
Khoirnc, nennt man glügel/ «/.^e L., fo n>ie bic  
Heineren jjäute, bie einige ©amen umgeben, j. ®.  
We bee tfelbe/ beg paflina?, bie man bann *and*)  
©nCrtf Jaftlt. ©. *Pteryginm.* <EhC& il **a l a**  
no\* bie Sortfecung bee ^lattfub|lanj an bem Blatts  
ftiele obeeanbem ©tengel (twofcee aiatiis, a, u m,  
geflügelenee nacl; ^tnB/ ctn ttibent, oder

*Hftetblatt* (*Stipnla*), *bai* mit *bent* SBtatttife  $\triangleright$ ee\*  
toac&fen iff.- *Mad*) 3acc|irin / *bat* jufanimensebrücfte  
Sln&angfel anf bem SKuden  $\triangleright$ ec Corner (*SRectaeien*) De;  
©tapelieit/ ttmtf DpiUbcnotD *Appendix* nennt.

ALABASTRIJM obee ALABASTRUS (mie Pliniue *bit*  
Slofenfnogpe nannte), iff na# **jELinf** bit 35lume toe  
i&eee (Sntroicfelung.\*

ALAEFORMIS, .f I'age If dr mi'g. @o nennt  
man SSlumenbWtter obr *Md*)blattd)en, *bit ben* \$lht  
geln etner &d>tnettetlin^blnme 'af)n(id) finb / j. %. an  
POLYCALA, unt) *bet*) *ben* Saubmoofen nennt man *bit*  
S5Wtter **f**l u g e l f o r m i t g (*folia alaeformia*),  
*toenn* fie nl\$*t* in bee €O?itte, fonbe^n meftc auf *bet*  
einen @eite ber SSafid angefteftet fmD, {• SB. an bee  
NECKEHA.

ALAR IS, E, ^ a t / jumal bet) *ben* 9(e(teren/ auch  
bei *SJnn'e*, ^aupg gleid?e 95ebeutung mit *axilla ris*,  
*e*; *ei* fottte jebo^c^ nid)t gebrauc^t n>erbett/ ba *alar*  
*foliumein* 95statt be\$eid)net/ bad on  $\triangleright$ cr 2(flact>fel  
(a/a) *fle^t/ t>ie* J. 95\* an RHINANTHus *CrUtaGalti*,  
unb a/ a i r w p e d u n c u l n s einen im2l|itt>infelfle^enben  
S3lumen(iel bejetc^nc, n>ie an CHIRONIA *inaperta*,  
ALSINE *media*; *baflos alaris* cfne ^lügelblütbe,  
unb *f met us alaris* cine *f* Ifigelfru^t an bem *Wes*  
*bet ifroni*) *bet* ?0?oofe 6cjeicf>net/ n>o man durchaus  
nid)t barauf fte^t/ ob ffe an bev @pi^e ober am @runbe/  
ober {ur @eite belfelben  $\triangleright$ orfcmm. 3ludf) bie in bee  
£}ei^boppe(und fd^eibenförmigee 93(altee *bet*) *ben iaub\**  
moofen Dorfommenben 2)luf()cn, nennt man *Slügclblu^t*  
*tt^tt/ flores alares*. Sine *Seta alaris*, bie in  
bee \$(attfcfteibe (?cl)t/ eft an FISSIDENS.

ALATE PINNATUM , g e f l ü g e l r g c f i c b e r t /  
n>enn bee S3(attfiel eine^ deftbereten tolattei itoifd>en >  
*ben* 33(attd>en geflugeU if?, o^ne *baft bie* an bemfelbett'  
^eeablaufenbe 95lattfub(?anj mit *ben* Slättcben in \*8m  
**bündung** (lun'be/ h %• BIGNONIA *fulva* Gav.

ALATUS J A , UM, L., g e f l ü g e 11 / ttemitman

*tlntn* ©fennel *obtt* ©trunf / ber *an* ben ©eifert *ton*  
*bem* berablaufenben SBlatte ober ?aube mēt *ciner* 2lrt  
*ton* *fyaut* eingefagt Iff/ 5. 2% *Caulis a la t us* am  
*LATHYRUS*, *an* ber *SCROPHULABIA aquatica*; *T&ttM*  
*fcarbt* nennt rñcn 66rper *alntus*^ n>enn cr leifienartifle  
**Erhöhung**en an fetter dberflåd)\* ^at/ Die ^leidj **die**  
**bleiben.** *Stipes alatus* an bet *WANAA alata*. Der  
*Stylus* felbfl iff iumeifen «/ ^ «J. 3luc^ ben **Blatt**  
*flicl* nennt man *sepufleU* · (*Petiolus alatus*),  
*feenn* bad 95fate ju bujbēn ©eiten an bemfe(bm btf ju  
*fetner* 9aff^ beraßlauft, unb *juçjlcid*) en>as ausges  
*febnitten* ifl / wie an ben ^omeransenblättern. **Einige**  
*unterfc^ciben* ben geflügelten S3faetf?icl turn bem **ges**  
*ö^rrren* baburc^ / ba% an jenem ber SBiattfiicl etnen t>on  
*bet* ©ubflanj bed Slatted abroeicfrenben Slnsafe ^af,  
*ber fid?* eor bem Slatte cnttvicfdt, unb beefed bebecft.  
*Slud)* 5rūd)tc unb ©armn finb ^cflu^clt/ n>enn fie mit  
*einer* ^äuti^cn ©ubftattis am SianDe cbei\* *Sliiden eint*  
*default* fitlb ; fo f)at bie HalesiætnC *Drupa alata*;  
*fo* ftnb bie ©amen am Laserpitium vierf 15geliq,  
*(quadrialata)* fo iff bad *Legume n quadrialatuni*  
**an** *LOTUS tetragonolobus*. (Einige nennen **bie** £z\*  
*lieu la carinata* an *TULASPI arvense* tint *Silicula*  
*alata*, ©. *Samara*.

ALBEDO, tociše §arbe mit aden ifren Seüancem

ALBESCENS, perblet c^en b/ ctn?a^r KOQA ur;  
*sprün^licf*) eine anbere \$arbe *Qefyabt* ju gaben **schelnt**,  
*unb* nun tn'd SBet^e jtebt. JDecanb.

ALBICANS, f# *Alb escens*.

A LB [ D us, t> é 1 £' 11 d) / ein matted **schmußiges**  
 ®rt8/ j. 95. an ben SBlumen t>on *ASCLEPIAS Vincetoxicutn*.

Ar.Bico, bee tf?et>lt{?\*U/ bet burc^ fleine  
 |6d)immelartcn auf ^Jflanjen enfffebt/ unb burcfr **Jn**  
**fiffidhe:**

**ALBO - MAGULATUM**, xózi%gef11cft, nennt  
 man flaßter mit unre^elmä^igen mifcn glccfen, |. 95.

*CXI LAMITTM maculatum, PtflMONARiA officinalis etc.* SBenn bicfc ^ccfen nur am SKanbe (inlaufen/unb bafelbff jufammenfliegen, fo DaS fie ben Stanb ein^faffen, fo netmt man biefl:

ALBO- MARGINATUM , voe\$vanbi%, vert firl bert / tute an einflen pelargonten. SBenn biefe glecfen aber f&r flWfl n>ckben, fo bgg tin Slatt be ^nabe balb tveigHcf) unb t>alb grün t(l, fo nennt man bieS:

ALBO - VAIIEGATUM , wei\$pandd)iett, tcU btcg bet) étnit0cn Durd) SuUuc cntarfctcn pelargontert öfters bemcrft n?irb.

ALBUMEN ©ifrm.r jEytDeig/ *Perispermum*, **Zus**sieu, *Endospermnm* Kt'4>ai:b. Siacf (B^rtrtCt'n ist EDweif bie ©amcnfubflanj jener ©amen, an welchen, ttenn fie trocken (inb, ba^ Slattfebrcben nid)t deutlich 2u bemerfen iff, unb bet) n>elcyen, n>enn fie fetmen, bafTelbe aOein über ber Erbe er^eint &old)t 3amen nannte (Bartner JgytDCi^lutige{*Albnminosa*e}) tm @e^enfage ton *Exaibuminosis*\* Slacy ^DecanboIIc t(i an einem <5amen attei Kpmeig, n>ad nid)t Embrt)D iff/ nicftt bamit jufammenbangt, feine ©efage barbte^ thet/ ant>ielcn©amett feblt, balb bornactfl/ balbboljig, bald fUifcbtd „ ba(b fotnig. unb ba(b ffarEmeblattig iff. Nach Kict>arb iff e^ jctte 6ubffan\$ be^ @amen^/ bie t>on ber (Samenfyaut; unb t>on bem (Entbroo verschieden iff, unb biefen begleitet / obec gant obet theitoeife eins buDt @obalb alfo ber Cmbro ntD^t ganj narft unter ber ©amenbaut liegt/ iff Gfymeig ^/ ttie am Weizenforne K- £)iefe meblige 3ubffanj nabtt das Würzel, c^en fo lan^e, bi^ e« tm @tanbe iff / ft\* felbff aus ber <Erbe ju ernabren. ©ie roar einff fiufflfl / unb iff nur ber aerbicfte erftarreee SXeff ber Amniosflüssigkeit, bie ber (£mbn)o nic^t me^r ju feiner grna^rung nöthl ^f>attc. ©amen bie bicfe ©ubffan; babm, unb bie (Bärn nee *albuminosa* pennt/ nannte 3\*\*flieil *perispermica*, Richard *endospermica*, unb bie *exalbuminosa* des

(Sdrtner jmb nadf) 3ufTieu *epispermic\**, unb nad)  
**Richard** *perispermica*. — Alb ume ny beffet -^/-.  
*b u m i n a , t f i* fewer ber SEyroei0floff in ben \$flan\$en  
überhaupt; Cn Principium immedialum bet IV\*  
Classe, bad Dec gfopmte fennett lebtrt. Safoer

ALBUMINATUS, ALBUMINOSUS, A, UM, \*ttad  
**Eyweig hat, eywei altig ist.**

ALBURNUM, &plint, ba\$ nod) **weiche weiss**  
Icf>e £o(\$ am ©famme / t)a^ fo cbtn au\$ bent 95af?c  
gebildet n>urbe/ unter n>e(c^em ed litQt, unb mit bem  
es noc() {ufammen^angt/ unb bad nun anfangt ju er;  
härtten. **Es** ifi Retd bläffer/ unb bilbet *an ben £)ifo;*  
tplebonen t>ic äugere/ an ben 9Jfonocon;Iet)onen bie jn^  
nere Sage.

A L B U S, ^, UM, L., eim matted 2Cctg/ trie an  
LYCHNIS *dio'ica*. Sine *I\*actescentia alba* tñl (Id  
EUPHORBIA, LACTUCA.

ALEPIDOTUS, A, UM, .ungefd.) t l & c r t /  
fd.>u p p e n l o s. SOfan ^ebraud^t ed t>on fftei(en, bit  
fonfl befd()uppt ftnb/ unb suftctlen an eini^en SJrtCtt  
oftne @d;uppen t>orfommem ©o &at man i.fd. rami  
alepidoti.

ALGACEAE (Blebirf^ / ALGAE *bit*) *JLinne*, toattn  
We III. Orbnung bet XXIV. (Oaffe, tt>o fie in ^ ^ A --  
restres unb *aquatica* *QCt^Ult VQUXbttl*. 3C^ ^>  
r t i i B / K<?t& unb U)iIIbenort> begreifen nur Die  
le^teren nod^ baruntec/ unb nennen biejenigen ALGAE,  
£ ange, an n>eld^en .bet· SBebel Derfcbieben geformf/  
bie %xud)tt unter bee Oberfläc^e jerfireut, unb bic @a^  
men fcftleimig flit>. ©ie leben unter bem V&afict, j.  
95\* bie *Fucvs*. — ©. Kott'0 Bemerfrmgen fiber  
das 6tubium cryptogamtfe^ec tPafJergetp&frfe\*  
Hannover, 1797\*

ALIMONIA, andyBu?nor unb *Lympha*. **TAj**  
**Gaft** ben bie ^flanjen einfaugen/ unb bann ganj obec  
t&eiln>eife fj\* jum 9?a&rungdfaste berejten.

ALLAGOSTEMON, finbnacO iTJönd>, jene **Pflan**

jen» in beren Sfumen Die- ©taubgefage tt>ed>fefo>eife auf bent ftelcfoe unb ouf ben SMumcnblättern **stehen**, ober auf biefcn unb auf bem grucfctboben.

ALLIACEUS, A / U M , L . , n>aſ nati) ?aud) fcbmecft ober riCCt / tVtf THLASPI *alliaceum*, PELTARIA #/-liacea.

ALMGATUS, A, «JM, nentlt bit Flore franc, jenc SPflanjen, bie fid) an ben benad)baraten ©egenfiānbeiv on n>r(d)cn fie binanfIcttern, burci) ctflene falter be; **festigen**

**ALPESTRIS**, E, nxtf auf 23ora(pen tv̄ncf)^

**ALPINUS**, A, UM, tt>a^S auf fooben 2llpen tv̄ac^fl. Sllpen pntj Serge, Oeren ©ipfel obne \$aſume unb mtt cmlgem ©cOnee bebed't i(i. *Alpinum* *CUma* begreife auf ber n&rblicfoen ^emif?>b5re bie fānber t>om 81° big sum 51° m Slmerica unb Stftcn / unb big jum 60° in^uropa; auf ber fubhdKti t>om 56° bit jum 50° t)ann aUe ^ erggipfel fiber ber (Scftneegrānie. *Alpinum rolum*, cf! eine blog burd)'SSerttefung t>ett **Vegetabis**lien enellanbene/ *fdwav*^, tmmer letd)t bfeibenbe (Erbe; Me reinfle fo^enaunte ^flansen; ober ifauberbe.

A LSI N KFO RM IS CO HO LLA , 111 I C V Z ft f 6 V ftl t g e BIumenErone ^ menn funf ganje ober eingefc&ntftene cber f|ct|)Ciltc SBIumcitblätter mit fur\$en 9?ci)e(n in et item fünfblättrigen Jteld>e ftef)en; J. 93. ALSIWE/STEL-

### **LARIA.**

ALTEnNATIM L. Ober ALTERNE PINNATUS , A, VM y ab t D c d p f c l n b g e f f e b e r t / njemr an em' em seſieberten SBlatre bie ^Iatfd)en abn>ect>fe(nb ftcben, uicftt gegenüberflebenb , tt>te an VICIA %iennU, Kom-KIA *Pseudo-Acacia*.

ALTERNATIVUS, gett)6btlicfster ALTERNUS, A, UM, L., we c ^ fel t D e i f e f le b e n b , (im (Se^enfatjet>on **gegenüberſtehend**) beneid^net gmep ober nte^rere an ir; gend einem 2i>äle einer ^flanje abwcbfelnb, ober oif entgegensefe^ten 6eiten in eiuer unb berfelben (Ebene, abet nid)t in glcicfjer £6f>e befiiMtcfte Singe; ober

**Dinge** / bie / toenn ||t auf einer unb berfelben (Seiter  
ober mn einen Stttelpunct berum fte&en / nicſjt unmite  
telbar fointereinauber gejieflt ftnb\* %m \*xft?n 8<sup>a,lc</sup>f  
foaben n>ir folia ahernai^, tcecfcfeltretfe ftefcenbe  
Blätter / bie in ungleicfyer <Entfern& uon bem Boden  
fiber einanber ffeben/ an ben Jteucojen; ebenfo wed:  
fetaoeife flefcenbe Snoepen, {fit mm a\* *alternae*)  
an Dm Slütfern, an Den SBtibtn;'-\*">\* *alterni*,  
toecfyfelweife (tef>eui)e Slefte / ttenu jtvifd)en jtoci> auf  
einer ©cite jrebenben Soften/ an ber entgedendefegten  
©cite itur eiu Slfi ftcf>t, tote an ben Kofen , Ulmen;  
noec^feitreibung geflellte *Itefyvdpen* (*aitemae spicu\**  
*lae*), an ben Doen. 3m jtt>epten SaHe ftaben twir  
n>ed)felweife gefieflte £tufd)nitte ber SHumenfrone (*la-  
cinae alternae*), an ber 3ri6; *stamina alter-  
nn*, twnn fiē ben jteted); ober QMumenbfattern, ober  
ben €nfc()nitten , nicht gegenüber gefleot/ fonbern 5tji;  
fcfyen benfelben eingefügt ftnb, j. 93. am Jiaud>e.  
3}od) eine SBebeutung be^ SBorted *akemus ifl*, n>enn  
ton nte(>reren in einer SXel>e flcbenben SMngen ba^jenige/  
toelc&etf jtpifc^en je jmep unb §n>et) berfelben innenfie^t,  
eine ^igcn(d)aft beftftt, t>dcfc benjenigen *fefylt*, zwi-  
fcf)cu n?elcf)en ed gefleldt ifl. 3o ftnb j. 2% bie **Staub-**  
fabenam ALLIUM Pomtm abwec^felnb breller uhb **drenz**  
. **fpiftig** (*filamenta alter na latiord*)<sub>f</sub> an ben Dian-  
tlvus abmec^felnb fyofrer; fo ftnb aucft bie\*\$ (umenb(ätter  
abn)ed)felnb brötter unb fdbmäler an meftreren *tauten*.

- ALUTACIUS, A , U M , ober ALUTATIus, (tc^tgelb/  
tote toeif?gegerbte.6 £^ber\*

**ALVEOLAR is (TELA CELLULOSA) JtfiiF/ f. Com\***  
***plexus cellulatos elongatus*,**

**A L V E O L A T U S , f. fa vo'su s.**

**ALVEOLUS, <?>6fcIz, Heine 3iulb^Iungen/ in**  
»tve(cben trgenb ettoai t>crflecht (ieg\*

• AMAHINA '(E&ompfw B t'r c r f l o f f Sin Bes  
f{anbt()ei( ber <Pflan\$en/ ben bie gbpmie unferfucft\* Ein  
Piincipium immcdialuni 11. CA.

AMARUS, A. UM, L., B ftt ier, *text SBermuff).*

AMBITUS. 3m Sinaemeinen W I&nb irgcnb <inw glädje.

AMJinosrAcus, A, UM , L., nannfe *finne* eincn *flatten* nwbn̄gen @eruc&; fo fagt er Dom SBocfe: *odore gaudet ambrosiaco*, unb IUHldte ba&er aurf) 6ag (latf# riechenbe mc^tfanifcl)e Sraubenfrau GHENOPODIUM *ambrosioides*. • *Ambrosiaca an a Iep tic a, wirken* (fast Jinne, nic^t riec|>en) ivie §lm&ra, Moschus, Zibeth.

AMENTACEUS, A, UM, (at}d)eñfovmig, i dt}d)entt(tQCnb. *Amentaceus flos* L., tj Dag Amentum fclbf / m|d)ti &inne' ali erne su\* fammcngC^aufste SBlume 6ctrad>tCt. *Amentaceus rache mus* unb *amentacea spica* tñi' blCJenige / bté UC^ fpn^motif) alg ein ffcine^ braunlic^cd ^nopfcf?en er^ fd)eñt / bann abcr fc& ccrlangcrt, unb in fleinc 9icffe Dbcrg^cn ft̄d) jertbeiU, bie itt geringen Sntcrnungett ouirlformig übet einanbev um ben ©tengel fterumfhfren; j# 95. EQUISETUM. *Amentaceus Spadix*, jj{ ^ fa^ena&nhcber ^olben an BORASSUS *flabellifer*. *Amentaceae* finD naturlü&e gamilienbf» Batfcb. 3uñfteu unb tUnni.

AMENTUM L., Zat}d>en. ©nfabenffirmigeretn^ fad^et (nld^t afliflcr) flemdnf(\*aftli\*cc Sluraen(lcl/ bee nteiftcn^ ftängenb unb me^r obet minbec bifyt mit©d)uppeit (efcgf tñr untct n>otd>en bie S3(umen ft^cn, ober feñt furj geflieltflnb/ ober unfer tveldjen fid) tcenidittn\* bit %cftufa tung^roccfscuse bet ?>flan&c befinbcn, j. ®. bie \$äg\*en an ten tPeibcn/ pappeln, ^afeldauben / Klüssen. Sin ben Uktezen nannten bie\$|U<nba\$ fta%o)d)en insbes fonbere Nūcamenut?n. 2\$ü|iavb voiil nuc blog mānnz UdfC obec 6(06 toeiblidjt S3lumen in einem fäßchen wissen; ti &ibt icbod) junjeilcn Sftfttc bacunter n>ie an bm SBeiben/ an ft>elcften OPiUfe^noto *Amentum præcox* bagjenige nennt/ n?a^ ror bem55lafferau& schlage sum aSwfc&ein fommt *Amentum coeta-*

*neum> foa\* fllelcbjeitig mit ben Slattern fid) \$etgt.  
Amentum serotinum, toai ttft nacht erfolftCr Stlfo  
wicelung bet Setter blüftet.*

AMMIANTINUS Bern{},/ (5raulid)\x>ei|^

AMMODYTES, f. *Ar enarin s.*

AMNIOS, AMNIUM, LIQUOR AMNII nad) tTja|^  
**pigbi**, jene gaHertartige, ober einer \*Pflanjenmi(d) <|W  
ltd)e 5eud)tigfctt/ bie irfi nocf) flefc^c^ener Sefruc^tung  
mcrbac tofrD/ unb bie b'em €embrpo/ welc^ec in btr;  
felben fc)n)hltmt/ jur Sftabrungr bicne. Sa^< n>a^ ba^  
ton übrta blecbt/ fott bat .Albumen 6i(ben. ©ie  
^ofo^mld) ffi eine foide SJmrito^piutff^feit / bie gun>e\*  
(en in einem eigenen ©arfc, bem llmnioBfade, tinQtf  
fc&fofien tj. iDecanb. £chtcnen be\$cid)net bai ©ore  
Amnium allcitt 6ci) Bem&arb t unter bem Seamen  
**Eyweißhautchen.**

- AMPHANTHIUM nennt OnP jene au^Breitetett  
FruchtSoben, n?cld)e, rote an ber Jfeifle unb an beit  
Dorflenien / bie Slumen efnfd)liegen.

AM PH mi us, nennt man jene ^fTanjen/ feelcfre  
fwo()l im SEBaffec/ al^ auf bem Sanbe t>egetieren fönnen«

AMPHIGASTRIUM , nennt ^c&art ba^ bet) ter;  
fd)icbenen 3ungermanm'en mit jtoe^jetlichen Slattern/  
» SS. an ber IUKTGEHMANNIA tamarisdfolia, einjeln  
in ber 5D?tte be\$ ©tensed / unb {mar auf ber untereti  
<&titt befinblidbe 2lfter6(att»

AMPHITROPUS EMBRYO Ki^arb/ totnn bet  
<embvt)o fo QtboQtn ift, ba\$ feine bt) t>cn €nben faff  
Sufammeuffogen, »nb ^e^en ben 9!a6e( f)in QCvid)tct  
ftnb#

AMPLECTENS, umfaffen b / nennt man jebett  
Xhetl an ciner ^flante, ber mit feiner S&af^ feine  
Stüze umfagt. ©efdjiebt 6fe§ nur jur ^alfte^ fo  
nennt man biesen £6eil balbumfafitnb, *semiamplec-*  
*tens.*

AMPLEXATIUS EMBRYO W4>\*\*\*' Wttl Würzel  
chen a umfasst.

**AMPLEXICAULIS**, *Qtengeluntf&ffenb,*  
 ttflcnb ein 2&eil eincr tyffanje / ber mit feiner qsaftg  
 . iibct ben Stengel f)?nau^ra^t/ unb benfelben bcr Quere  
 nad) rinflSum&cr ganj umfagt/ j. S3\* bract ea am-  
 plexicaulis an SALVIA nustriaca; ettl folium iun-  
 plexicaule an bit J3iurssiCA ojeracea ; peliolus  
 amplexicaulis an LicUSTICUM L^visticum ; s tip ula  
 amplexic/iulis an ben <Erbsen. tDiflbenoto MtlanQt  
 ton cincm ben Sfen^cf umfttfielenben Sglatte, Dog tt  
 5erjf&rmifl fev 5 rt fann afer nucl) pfeil^ ober fpftg\*  
 ober nierenformifl fci>u, menu eg nur auffigf, unb mit  
 feiner Saffc ben @teuge(/ ixx'e tinnt foiu / ton a (fen  
 ©eitcn / unb quer, b. I), frorijenfal umfagf. 2)ie /<sup>ff</sup> o.  
 li a \*muscorum untfaffen/ tvenit fte amplexicaulia  
 ftnb/ bin QunQtl mit einer bunnen fyaut — Semi'  
 amplexicauie ncmif man/ tt)o^ nur mit ber  
 \$a(fte feiner S3afi^ ben Stengel umfa^t, au\* n?a^  
 nur ben Stengel jur Jpälfte umfagt.

AMP/EX us, A, UM, II nifa £ t , nennt manjene  
 flatter, bit, tvaf)renb.fte'nod) in ber jfno^e emge;  
 fct)(o(fen iiegen / fo gefdtet (inb / bag it)te bet)btn auf  
 einanber (iegenben Seiten t>on ben btqben Qeitn beg  
 tor^erge^enben ebenfo gefalteten S3latteeJ bebecfr merben/  
 n>e an ber IRIS. jDecanb. \* ^^; Bernt<rb'i if! jeber  
 SDetl umfa\$t, in ttelcitem ein anberer (ber Umfaffenbe)  
 fo eingefugt iff / ba\$ er .ton bem Stoemigunggpuncte  
 an, nadf bem flCflenuberlebenbenettoa&fortgefellt, unb  
 mittym jufammengctDad)fen iff. *Semiampiexa,*  
*ialbumfa^t* ^tngegen nennt man jetie flatter in  
 ber j^no^pe/ bie nic^t toUfommen QC<|cnübct(lc|itnb  
 Stfittlt, unb an ifrrer ^tttelrippe fo gefaltet ftnb/ bag  
 Die fyalfit cimi jeben Slatted füf \$mifd)en ben {two  
 . Slacken be^ gegenüber(Tebenben \$latte£ beftnbet.

AMPLIATUS, e r t r e i t c r t, p e r g r ^ g c r t;  
 man foſlte e^ eigentlic^ nur t>cn ^o&lungen gebran^en.

AM PLUS, A, UM, voeit, g r o g; tf **sollte eigent:**

|id) nut turn J&o&lungen gebraudjf twrben; toenn e\$ x>on Sfocilen an SPflanjcn ftberfoaupt gebrauc&t n>irb, fo 6ejeid)net e\$ eftoatf me)ri\* a(g blog jjrof\* (*grandis cbtv jnagnus*).

AMPULLA, f I a f e , @ dt>Iau(^; ^n runber ge\* fcftloffenet ^o^lcc Sörpcr an bjer ©urjef, obec an bem ©tengcl obct an ben 25(attern ciniscr SBafftrgcwåcfyfe, }. 95» an UTRICULARIA. 91n ben ^ucu^arten f>aben biefe 95lafen/ bie man einf fogar für bie gcuc&t ber^ felbfn btelt/Oefonbere *fiotmm.* Willbenovo.

### **AMPULLACKUS PETIOLUS, f inflatus\***

AMYGDALOIDEUS, A^ UM, *iiutnbelformig, ifl* 6et) Bern^arbi eine -Slac&e / wenn ifec ^mterrarb einen ^reWabf(\*nitt bilbet, unb bie epifce einenaBJnfel.

AMYLUM naify fi>ompfon/ *Fecula* nad) fo a « c^oy, *Qt&vt*" obec 25r^ftmc&1/ ein etgener 35e\* flanbt^eil bet ^ffanjen/ ben bie 6bt)tnie unterfuc^t (Em Principium im media turn II, @kaffV»

ANABICES ? nennt *Electee an* ben **Cryptogamisten,** *toai* VX>iÜbenon> fm 3IOgemeinen CO/-//\*/J nennt; **auch geschlechtslose Pflanzenindividuen.**

ANACAHPYLA FOLIA , 5 u r ü cf gefd> U g e n , finb jcne flatter an ben ^Roofen, bie alle nad) alien ©eiten (>in nüt bee ©rifjc nac^ bec €be gefriimmt ff^feen / J- 95. HYPMUM *sqrarrosum*.

ANANDRUS FLOS, eine ^luntC/ bie feine männli; c)en ®cfdfeci>t&f)e(le tjat, alfo teetbhet) i(T, f>a(>ep **An andr a e Utb**

### **ANANTHERAE.**

ANARHIZAE Hidx^fb/ ^Pflanjen oftie **Wurzel und Embryo.**

ANASTOMOSANS FRONS , a^er^flig/ tfl bee **Weder,** tt>enn er afigunb feaarformig ifl/ «nb biefe **Neste** flc^ n>iebec berbinben, fo ba^ ba^ ©anje einem **Nesje** gleid)t / j. 33. an HYDRODYCTJON *majus.*

ANASTOMOSES, bai i neinander Münden, die neb-

fōrmic SBcrāflelung Dec 3lbern in Den QMafern / 95lu;  
menblättern.

ANCEPS L., \$voey(< bneibigf fceigf ein gu\*  
fammengeDrūcſter @tengel/ ber an Den siwt) gegenüber;  
jle&enDen @eiten fcfrarfe @raf&c bat/ §8. SISYRIN-  
CHIUM *anceps*. gj?an fagt aucfr t>ort einem Slatte\*  
Dag e\$ ?t»cyfd?iicib:g fei), feenn e\$ ffeiftste, jufam\*  
menfleDrūdt/ unD an Den entfle^enflefegten @eiten fcfn̄et^  
. DenD i|i/ §5. an ALOE. fargtom' nennt ein ^ o-  
lium *anceps* ein fcftwertfohnūgei S5Ia«/ Daff itf Dec  
SRitte bepDer Släcken einen ^ruoc(ic)cubcn fid ^at/  
ffcie an IRIS *Pseudacorus*, ACORUS *Calamus*; bit  
SHten nanhten Die§ *pugioniform* e. <fi fann nid)t  
6^)nonpm nut iz<c/?;j fepn / inDem Dei; OuerDuccit^  
fd>nctt eine£ ^epfc^ueiDfgen Sörper^ Die 5i<)ur einec  
fan;ette ^aben mug. 3nDe(fen nennt man t)ocf) aucht  
eineit *caulis* *anceps* eihcn runDen @tengel/ Dec an Den  
6e9Densesenüber|lejjenDen@eitcn cine Dunne fc^ma(e^aut  
fta(/ tt>ie an HYPERICUM *perforatum*\* Sttvag jtuej)\*  
fc^neiDige^ famt mo^( me^( ®wttty alt Jtvei) fcaben,  
nuc mftiTen aUe übrigc (iumpf, unD nut jtpei) Ditrſen  
fc^arf fetjn.

ANnnoGYNus , A , UM' , L., eine Vflanje oDer *tin*  
^liit&en|lanD / nwan @taubfleſage unD @taubtvegc ^  
\$Uid) (jcDocft nid)t in einer uuD Derfelben 55Iumc, unD  
nid>t aid b(og ctnbaufig ^ fonDern nur auf einem unD  
Demfelben SrucOtboDen unocDentlid) Ducc^einanDerde^enD)  
uorformen; fo ifi an GAREX *nemorosa* Die 2lc)rc erne  
*Spica androgyna*, mfofc'iit in Decfelben SSlumen mit  
@taubgefagen unD Slumen nut @taubtDCgcn\* t)or(om^  
men, abec feine Sroittcrtlumen, @elten finD A m exit a  
*androgyna* an SALIX *Caprea*. ©, % *Dichoga mia*

ANDROPHORON, nennt tfjfirbel Den adgcmeiuen  
fleinen iva\$tt, Dec Die Qtanbbtuttl an Dem Stbenbaumc  
trägt.

ANFRACTUS ober SPIRA , jiennf man jebe cinjclne  
3Sjenbung an einer Cpirale; Cfcraubengang.

ANGIOCARPI FUNGI, f. *Peridium*.

ANGIOS, braucht man in Sufammenfscungen aug  
bent @ried)ifcf)cn, urn etnen jjuftonb turn SSebecFung  
cber Giinfchliepung aufjubrütfen ; &aber

ANGIOSPERMUS, A, UM, L., \$Pflan\$en met Es-  
mm We in einer tfapfel eingefcbloffen fwb. *Angios-  
permia*, We II. Crbnung tcc Xiv. Slajfe bep Linne.

UNGULARIS, E, unb ANGULATUS, A, UM, unt>  
ANGULOSus, A, UM, tti nteig unb ect'ig. Es  
n>are ju n>unfct)en / bag man ben erfieren biefet Auss:  
bcncFe immer gebrauc^en moc^tc, um bit 2BtneI, bie  
an ben Släcken torfommen / J. 95. an Slättern unb  
blattabnUc^en Xbeilen/ unb bm \$toet)tn, um bie Cörs:  
pectt)infel / bie Jtantcn, @ratbe :c. ju be\$iecbnen. Man  
braucht abec biefe Slu^brüfe obne Unterfcbieb / ober be:  
jcicftnetmitcrflcrm bōfyflcnd batijenige au^fcbHegh, was  
fid) aneiuem SBinfcl befinbet, winHlft&nbis ifi, \$• 93.  
*Acuieus anguiaris*, tin <Sta\$tl, bev an einemaBinfet  
(lebt 9Bo *angulatus* einen ^örpernoinfel bejeiebnet/  
bilben fir> immer, (Ircnge gcnommeit/ einbringeube  
SBinfcl in ben Släcken be^ Sôrpcr^v bie baburd) gebil:  
bttvottben. ^nDeflcn-nennen einige f'Sotanittt gerade  
btn fiutnpftt)inHi\$cn Crtamm mit baudjigen obeir cons:  
t>eyen SWdb^n <<</>> *angulatus*, unb ben febarf\*  
ect'igen mit augflebbobl^n Släcken *caulis angulatis*.  
Es ill babec nötbid / biefe 9(u^brüfe befonber\* aufzus:  
f&bren. SJ?an bat erne *Ant her a anguiata*, wenn  
fie mebrere \$u\$it)cn f>at, fo bag babitrcfr mebrere Raw:  
ten, gctvebnlich Diet bit futif cut?cf)en, n>té an ben  
\*>cw>achfenen &taubbentcln ber Cpngenejiften, an bet  
C<!pc ; *Calyx angulatus* an . DATI^RA ; c an I is  
singulars, t&em bee Crtengel Cratbe / <fcfen hat, bit  
Slacken abec twtieft finb. 3)an unterfc&elbet bicrbep/  
ob ber Crtengel (lumpf (*obtuse*) wie an ber VICIA  
&iennis, Dbt fi&aifecfig {acute *angulatus*) tOM

en Lamium if!, ofcfcyon man bag erfiete getoðbnlid) twrci) 3ufammenfcceuH9cn *ani gonos*, lettered burdc gufammenfejungen au<sup>^</sup> queter audjubrutfen pfirgf\* SJ?an jáblt ferner bie ©ratbe obeir Gtfen ober 5?anten, linbfeat fo eilC *Capsula triattgularis* an BULBO-CODIUM; *trig on a atl GLADIOLUS commanis*; *tri~quetra ail HYACINTH us*; *quadrangularis* an GAUJIA; *tetragona an OENOTHERA*; *quinqueangnlaris* ail CAMPANULA; *sexangularian* ALSTROEMEBIA U:f. f.; t'tntn *Caulis triangularis tOXt* an CACIUS *tregularis*, ob\*r *Caulis trig onus tvtC* ail ALLIUM W<sup>..</sup>ww/w, obet *Caulis t riff net fir Xoit* an SIDA *trique\** era, tt)obet) afar ueben ben fc&arf m ^anfen aucht nocf) bie filadmt>olitommen then fconmiiffen; einen *Caulis q uadrangulus ot>CV qnadr angularis* atl fall alien *foibynamiften* ber I. Orbnun<sup>^</sup>/ unb anbett (Cahen, unb eilten *Caulis tetragonns* an PELARGONIUM *telragonum*) titXttt *Caulis quivqueangu\*laris* an Si\*ARTIUM Scoparium unb *Caulis pentufonns* an CACTUS *pentagonus* unb fo fort/ biß auf *mult an gularis* ober *mult angul us*. &o toiC bet) Sufanimenfegungen aug ^ue/cr müffen aucht bet) Sufammenfegunden aug ^onos bit Sfacfyen eben/ bie ©ratbc ober .fitoitten mfijfen abeu (lumpf fepn. — *An# ul a turn .Foliumy aid glað)\*/ tvobeo man entweber bie bttaugfcbenben SSinUl befonberd angibt / uub faflt: folium triangulare, tote an ATRIPLEX horensis, ober quinque angulare, Uje an TROFAEOLUM majus, oDer fid nur cm attgemeinen begnügt ju fagen, bag bad SBlatt ecfig fty/ tvte be? TVSSILAGO /'«rfara. SBenn bad S8latt einen Stengel', ober SUattfiel; äbnlichen Sörpec bilbet/ fo 6cjcicf)ncf man bie baburcd entitanbenen \$\$\$nten burc<sup>^</sup> gonos, unb nennt fo 5. 25. bie Dierfantigen 3labe(n an PINus nigra, inbem man (illjeit bie ^fan ten jáblt/ /olla uimonga. — *Angu-lous Fruclus tfl* an ANCELICA, GUCUMIS *acut-angulus*; *Angulaii Pgri b<|)* einigen *þðcherschöwâms*.*

*men , angulatum Pollen an VIOLA, angulalus Stylus tint) angulosum oDer angulatinn S t i g - via-, n>enn Die 5Rat:6e Dicf, unD mit tiefen gurcf>m fcerfefjen tft, Die foertiorfstebenDe tfanten bilDen, n>ie an MUNTINGIA unD an Den (Burlren. Sin Dem Tim\* riffe nac() ecfiged R e c e p t a c u l u m annul at urn jfl anEQuisETUM; angulala Sem in a JnD an RHEUM, RUM EX. Angulosus fottfe nad) Bulliarb Dort &tt braud;t n>erDen / too man Die 3af>l Der 5U3tnfcl oDec Sctcii nid)t bejlimmt angeben null.*

**ANCULUS**, L., **Winkel**, **Ecfe**, ist bald Det @urd)fd)nitt \$t>e)er finien / Die Den SKanD Cincc 5(ad}C bilDen/ tote an ecfigen Slattern; 6a(D der Durchs fd)ntte^cpcr Sfnien / Die Die 2Id)fcn jtoeper Pflanzens tbctle ftnD/ j. 33. Die 2ic^fe Def @tammeJ und Dec Slefte / oDer t>ti 3lfle^ und Def %>|<xtu oDer Blumen- Réeled; bald Der a|xi Dem llmfange De6 Slatted heraus- tretenDe ff)cU, er mag nun t>on jtcp geraDen oDec ton jmc;) frummen / oDer oon einer geraDen und einec frummen Etnie eingefctfloffen fcpn, j. 35. am 3tf?orne; balb Der £mrd)fd;ntt (toepcr Slacken, fo Dag cinSér; peyointel entftebt, Den J£/nf tibatl? nennt, unb ben man Durd> gonos bejeid)net, n>ie an Dem PELAIIGO- KIUM ieira\*qnum. Socft fagt man Don Der ftapfe( bet OXALIS ? *angulis dehiscens*.

ANCUSTATUS , r>er)ct>iti ål e r t, tvenn ^låchen cDer ^örper (eigoulicb foHte ei abet nur t>on Flåchen gebraucht roerDen) ftcb gegen Die ©pige oDer Basis ju fo t>erfcl)infalcrn, ba\$ fie einen feßr fptfcfgn Winkel bilDen. ©o nennt maw meforcre Slatter folia un- gustala, unD and) Die SXife an AIHA inontuna, Panic ula cmguslata,

ANCUSTIFOLIUS , {d>malblattvig, tvai fd)målere Slåter bat alt Die übrigen ju eiuer und Dor; fclben ©attung gebörigen Scfen; 5. 35. CAKNA *angu- tlifolia*.

ANCUSTUS, f4>m\*l, ettva^/ Dffen Långendurchs  
II. 2\*

meffer jenen ber SBrilte um *dielerf u Uttrifft.* defter\*  
ttirb *ti* jebocfr mc&t abfolut, fonbern nur \*in SSerglei;  
**dung** mit etn>a^ anberem/ *xoai* breiter iff/ gebrauc^t.

ANISOS, ungleich an ber 3^1 / *bafyt*

'ANISOSTEMONES unb ANISOSTEMONOPETALAE

**Wachend.** Pflanzen, in deren Blume die Zahl der Staub-  
gefâße nicht jener der 33lumen6(âtter gleid) if?.

ANISOSTOMUS, t(t ein fe(<\$ oder eine Blumen-  
frone, Deren n>e\*feln>eife Einfd?nitte ton gleicher Form,  
aber etn>a^ fCeiner fnt).

ANNICULI, *bit* befannten gabrrtinge im Holze.

ANNOTINUS, A, UM, *idfytig, r:ai aUc Jahr*  
neu roert), j. 93. bte 35lärter an unferen SBeiDcn, Oe  
jdbcltc^ abfaUen; tvatf nut cin 3abr fcauert; nur em  
3a()r att iff.

ANN U LA RES TORULI an ben Sonfert>en/ pnb  
teulffartige t)om 3e0ensen>ebe gebilbete Singe.

ANNULARIA VASA, K t n g g e f a^ c ; fo nennt  
man fe&r entfernt geroate Optcaf^efâgc, bee \$un>eilen  
toegen t^rer meit au^etnanberfiebenben aBtnbungen  
<&d)kifm bilben. Wan tcift fte nur bet) ^flianjen, bee  
fefyr xafd) emporf^iegen. 3. a. *Linearia vcy>a*  
*lymphatica* unb *Genicula.*

ANNULATUS, A, UM, *tingf&vmig, unb mit*  
einem SRinge Derfe&en. @o iff *annulata Capsula*  
*tine* tfapfel/ bie *vin&\$|xnit)ct* mit einem aedlieberten  
SWnle ober @aume (*annulus, simhria*) umgeben iff#  
ber ba macbt/ bag ffe 6ei> t>oUer SJefte, ber Quere nad)  
unrede(mâ§id auffpringt, n>te an mebreren Sarrnfräu^  
tern. *Annulatus caudex, tin gtvingeltct* @rocf/  
toit an ber CORYPHA *rotundifoia*, iff berjenige, an  
n>ed\$em bie Steffe be^ abgefaDenen Saube^ in regel\*  
mdgjger Sntfernung rinseiförmige SKarben bilben, unb  
*annulala radix rhiz omaloidea, tin QttingtU*  
*tit* SBut\$c(ftotf, n>eun bie ^Burjel an iftrer Oberflâc^e  
mit ring^um laufenben erftabeuen unb Dertieften &tti\*  
<t)tn fleieicfeiKt iff/ tPte an POLYGON um *Bislrla.*

CYPERUS *esculentus* bat einen astnittcfen geringeltert jñotlen, *Tuler annulatum*. (gin geringeltert @trunf/ *Stipes atmulahiS*) rote am AGARICUS *procerus*, t'Upberjenige / bcr mit einer i?auf, bie einen King urn iftn ber urn bilbet/ umgeben iff, Cargione nennt eineit geringelren @tengel beujenigen, beffen @djeiben an i&rem obercn Snbe einen JKing bilben/ tt>elc^er bett @tengel umfagt/ toie an POLYGONUM *orientate\** *AnnulaLa Theca* f. *Annul us*.

ANNDLÜS, L., King / ifljenc bünnefaut, bie ben @trunf manner *tyil^t, tote am AGARICUS procerus*, an fctnicm oberen &f>ei(e rcngfSrmig / ober roie eiti Halsband umgtbt. @iefc ^aut, bie &un>eilen bict unb fleischig, jutoetlen bloß fabtg / mand)C^ 3Ra( eine bloge Wulst ifl, (>ing urfpriünglicf) mit bem SKanbe be^ Sjntci jufammcn, unb beDectte in bee 3ugenb bc\$ \$i(\$e^ bie unter bem fyutt befinbUd}en @lätter ober *ibd)cv btfitU ben*, n§ fid) aber fpätec Io^, unb blcibt, rote eiu J^al^banb/ mét ben SReRen um ben @trunf, ben .fie umgibt. King , *Annul us* if{ ferner jener elaflb fd>e unb geglieberte 6aum (*Fimbria <?>ebtr. / ^1/mii-/u5 elasticus 35ecanb.*) / rock^er bie Sapfeln me&rerer garrnfrauter umgibt/ unb ffe ber Cuere nacl) ring^um^ec auffprtngen macfyt. Werner if! ber SKting an ben 3Roo; fen *Unnulus <^ebw., Fimbria tpi'Ub.*) / eine Dünne ftymale / elafifc^e unb gejabneUe ^aut, bie unter bem Secfel berfelben liegt/ ben ffe burcfr ibre Slaflicität abroirft.

ANNUUS, L., efnfa&rig^ eine ^flanje, bie nur ein 3abr, eigentlic() nur ben @ommer fiber bauerr, fo furj er auct) immer in manc^en tanbern/ rote in gapplaub bauerñmag/ j- SB. bte 6ommergrftc. SRan beutet bie furje @auer btefer ^Jffanje genribnluD burd) bag 3eid)en ber @onne (◎) an, meldn\* eiue einjabrige ^flanje bejei\*net. *Annua folia* L., SSfatter, bie nur einen 6ommer fiber *Damn*, tpce *annotina*.

ANOMALDS , L., *aUd an eitter flJffanje/ tva\$nid)t fo if!, tt>ic e\$ fletoðbnlicfo ju fci)n pfIcgt- SBcnn an titter SHume 5. 25\* nut Diet ©taubgefäge ober t>ie: SBlumenblätter fcorfommen, tta&renb an atten Slunflk fcer 'ubriflen ju berfelben (Sattung 'sebðrigen SPflanjen fünf ©taubgefäge obtt fünf 33(umen angetroffen tvctv bin, fo ifi bieg tine *plcmata anomala*. 21 He áf)nlid)C 216tt>etd)imgcn einjeluec 2Jctn t>on bem *aUaemtimn* ®attun&4 \* Samilien ^ Orbnun^ ^ obec Claffend^arafter/ fcrgleichben in jebem ©ofteme t>orfemmett / ffnb untec bem 92amen *linomalien bctannt* Kay twoUte biefeu Slnomalien *babntd*) abbclfeu, ba^ er 6ep feinen Herbis Unb Arboribus étne étgene *QlaftC* Den *Anomalae* annabm / unb feinem S3et)fpiele fofgten t>iele. — £inné wannte *gemma anomala* biejenifle ^nodpe / bieu^ Dielen eigenen ©c^uppen befiefft, n>te an bee Sicfyte, im @egenfa@e Don oppositivae unb allernativae. *inomalus flos* bet) Journcfort ift F/05 *difformi\**. unb *irregular is'* bet) j£iñne', *Anomala Corolla* bet) Cossettt/ ethe Dielblátrige unregelmáüifle SSiu\* menfrone, n>ie an VIOLA, DICTAMNUS 2c*

ANSA Jarg. '(Eojf.J|f *Funic ulus umbilicalis*.

ANTHERAL., *Q,taubb eyttli* ttc oberste Theil bti ©taubgefäge^ / ber nteificng runt) ober länglich, unbtoti), *Qdb*, rd)»ar\$ ober blauUcf) ober grünltcf) gefärbt ift/ unb ber in feiner jeHt^en \$6r>(e ben &er; fd)Ubcn *Qtfavbten* 93(umenf{aub entftatt. £)ie fcd)\$ fd?marjcn lanfllid;cn @6rper in einer Julpe, bie gelben Stnbtd)m an ber. ©pifie ber §a6en in einer Srbbeer; blütfa ffnb ©taubbeutel. £tnné' nannte einfi *and) bat* ©amenfdulcben (*Sporangidium Jyebvc.*) an ben SWoofen *Anthera*, n>ie tPt'Ubenow in ben neue?en Seiten\*

ANTHESIS i(l bet) tPillbenow bie t^oUfommenfte Entwickelung ber Slume, bai £)ffenfeon berfelben; bet) Decandolle ber 2lct be^ \$lübeng / bat 5lu^(?auben bcf ©taubbeutel; beo anberen bie Slütftejeit

ANTUOCEPHALUM iH^rt^rb/ f. *Anthodium*.

ANTHODIUM, allgemeine Blumenbēcfe,  
ill t̄er £e(ct) ber fogennanfen jufammengefeijten SMumen/  
ber aide Heine Stamen einfdjlicgt, j. S3. an bet @oiw  
tjenblume, an ber £>iftel. ^fcrforfc rennet Die 311?  
famniengererjte Bl&tfre sum SSlüt&enffanbe, unb nennt  
biefen 3>ut(jen|fanb *Ant ho dium*, ober *Anthoce-*  
*Qhalon*. ©. a. *Capitati /lores, Ufc com-*  
*munis Calyx, unb Pe rianthi um.*

A NTH os, £ I u m e , burc&auff gleicftbebeutenb mit  
flos, unb\* b^uftd\* in 3ufammenfe@ungen au^ bent  
©CtCCifcfcten/ \$• S3\* *micranthus*^ *polycfnlhusy rhiz-*  
*anthus etc.*, (letnblumtg / pielbliimig / xout\$eb  
bluim'g 2c

ANTHOSTECIUM , nennt iS^r^art *aUti an* einer  
*Sdlumt, toa& n>aber SBefruc^tungocflan, nod) field*)  
ober S3lumeufrone ober 3Mtartum *ift*, mie i^ūUe,  
£>etf blatt 2c. ^tnf nennt ade Sectbjätter jufamm  
*Anhostegium.* \* .

ANTHRACINus, f o t l f c b w a r ^ , bTaultcf)fcfcmarj.

ANTHURUS, B'l u m e n f c ^ t o e i f , nennt JEIB  
terldngerte S3(umen|tiele mit bufcftelformtg gefleaten  
Slumen; &epne einen ri^penformigen S3lüt^enftanb mit  
ffeinen unanfe5nlid)en *bid)tftct)enben* unb fe^r furjett  
Slumen^icldjcn, bie man ^ßer t̄or SBfunic^en uicf)t sieht,  
j. S3. an ben Tdnarajirfren.

ANTITROPUS, *i(l nacf)K<d>arb jener Em6ri)o*, der  
eine ber fage be^ ©amenfefne^ entgegensefegte Richs-  
funs bat

ANTHORSUM VERSUS, votw&rts getvenbet/  
was mit feiner @v^i^e deden bie 6pi§e etne\* Theiles  
hingefehrt ist.

ANTROSUS, A, DM, *toai* eine Fruchthöhle hat,  
*Thee a antrosa* , bie ett>a\$ fleifcbifl iff/ §. B. Eu-

ANTRUM, fr u c f c t f c S k l e / nennt iTi5n4> unb  
^Hebtua jene 2|rt ton Srucbt / bie anbere Vomum  
nennen; cine fleifefcifle gruc^t mit einer S}bf>U, bie mit

einer eigenen *fyaut fefi* umfleibet 'til, unbfrepe ©amen ent&alt

APERTIO ifi bep JDecanbolle *bai* Oeffnen *bit* S3lume.

ApERrunA, bie Heine Oeffnung an eimitjen (Statit\* ieuteln\* *Aperturaesuctoriae*, ©augöfnungen, tiefleinen Oeffnimgen an ber untcrlen glad>e ber flätter.

APERTUS, offe ii/ [f>of]/ mit frepem **Zugange**, im ©egenfafee Con flefcftloffen: {, 95. *fa ux aperta*, bet offne ©cf)lunt) an 0\*osMA (*Synonymi mit nuda*, per via) im @Cgenfafe t)OU/^«^ dans a an AN-CHUSA, CYNOCLOSSUM \* *corolla aperta an CON-*VALLARIA *majalis* tm ^egenfage t)On *corolla clans a* an HYACINTH us *comosus*. Sin **Sporangidium**. *apenum*, eine offene ©adfcuctyt/ i|l an && BLASIA §. SB. trijenifle, bie t>on it>rcc (gntstefyung an, an btt Spiße eine eigene £)effnun8 (>at <fine offene frucht (*fruc-*H/J *apertus*) *ift* an CR^TAEC us *Oxyacatuka*, tt)O t>C fleifcfttse ^ude oben offen ifl/ fo bag man auf t>ad **Pes** ricarptum btneinfeben fann.

APETALUS L., o\|nt Blumenblart/ &gt; **Bartsch** cftne jteld!) unb Jfrone, a(fo nur in Segug auf **Bluz** men; §. 93. am CHENOPODIUM. Kay unb &aller haben eine eigeqe Slaffe *Apetalae*. *Apetalu?ji os* Tournef. tH ber *Flos incompletus* VaiH.

APEX L., ©pi'^e, ber ber 93afid irgenb eined **Organes gegenüberstehende Punct. Decand.** Man fpricht in biefer ijinfu&t bon einem an ber ©pifce **aufs** fprin^enben ©tailbeutel (*Anthera apice dehiscent*) tme am SOLANUM ; ton einer an ber ©pifee auffprin\* genben ftapfel (*capsnia apice dehiscens*) | # 95. am Hlo^ne; t>on einer an ber ©pige {tveonäbniflen 95lu\* menfrone {*corolla apice b idem at a) X*Oit am Garex; ton Saftnen / bie an ber ©piße jufammenbängen (*dentes apice cohaerentes*)| man **Wlterfcjeibet apex caul is ,folii, pe tali etc. al\$ bit Spiße dieser**

**SE&ele.** *Apex U\)* Kay ift fot>iel aid 0raubbeutel;  
aud) 6et) '(Eournefort nod).

APHRODITA nannte maneth>ag ungutfn#/ jeneqjiffan\*  
jen, bte Nine 25efruc&tung\$organe/ f einen @amenflaub be\*  
figen, bei> toelcfcen abcr ber (game in einem befruc&tenben  
©c&leime/ ofjne aDcn grudjtf not en/ ffecft unb rcift. Sincere  
nanntcn jenc ^flanjcn Apkroditae, bi^uit Die foeiblfc^en  
@cfdlccf)t^tbcilc t)oafommenau^gc6i(bct b<ft6cn, tint) an  
n>e(cOen bie mānnlic^en fo fc&r Dajttitfctjen ^erborgen ftnb/  
ba§ man (te^aoon Durcfjau^ ntd>t unterfcftetben tann.

APHVLLUSL., b! attlo 6. 5D?attbatetttblattlofert  
(Stengel, bi>. einen ©tengel obnc ffatter, *Caulis aphyll-*  
*Ins, an VFRONICA aphyila; ci(i blattlofe\$fibpcfyen {Ca-*  
*pit pin rn aphyllunt)* tt>0 feme%iatCt UtltCt t>em(dbttl  
(inb / an PLANTAGO *Ptyllium\ tintn Flos aphyllus*  
*s. nudus, tomn* bee tfelcft an einec SSlume fefolt, n>ie  
an Pulsatilla; bad gnfgegenflefegte t>on W O J apeta-  
lus; — eine blattlofe SraubC (*racemus aphyllus*)  
too (eine fläffer smifd)cn ben 93(umen sieben / an BER-  
BERIS *vn/garis*, unb eben fo eine blattlofe 2lefre (*Spi-*  
*c a aphyila*) wie bie fficrjleña^re. Ein 6latrtofeir  
Guirl {*verticillns aphyllus*) tft berjenifle/ bee  
feinef>ecfblätter an fetner 95afi^ bat, toitam LUPI-  
NUS /r/^//j. — <£\$ gibt fein ^a\$60amifc^ed (Be;  
feacN obne S5lätter,

APICALIS MARCO, bet !fnbtanbf berSianbait  
bee ©prfee-

AI^CULATUS, A, UM, tft nac& foecanbolle tit  
toai / toai fie) in einen *Apiculus* oerländert. tPiU^  
benovo ftingegen nennt einen Sccefel bornig (*apicu-*  
*latnm oper culnm*) unb tit\m [\$tUd)tt>QbCn (lacfC^  
(ig (*Recep tacuum apiculatum*), ftentt er ttit  
fleifebigen (le^enben furjen erbabenen @piften6efe§c ifk<  
*Apiculatum Folium*, fpt^ntragenb / i(l ba^J?au6  
anSJfoofen/ n>iean GYMNSTOMUM *minutulum*, Yotnti  
bet ffleroe aug ber Spige bed Slattt\* &ert>ortit</ unb  
grün, braun ober rot{} iff\*

APICULUS, nad} JDecanbolle/ cine furje flein\*  
 ©ptge, Die nid)t febr ffeif if}; auf) ein Jjaar obec  
 eine baarförtnige ©pig\*/ bie furj utit) nidjt fefr Heim iff.

APLOI'EIISTOMATI Bribel / f. *Peris toma Simplex*.

APOCONES, eine 2lbtbeil 11113 unter t>cn SD?oofen, be\*  
 ten inneretf uuD åttgere^ ^crtflomium mcber Zahne noch  
 Wimpern hat.

APOPHYSITUS, mit einem 9Info ge versehen.

APOPHYSIS, ifl tm Siasemeinen jcber Ansat; ;  
 hey SDecanbolle jcDer n>cnd re^dmngioc^6cfer; bet)  
*Toittbenow* ecne grtpeitcrung an Dcr 95afi^ der Büchse,  
 Me bidnmilen febtr flein / unb faum m c r f.l indd;es  
 mal aber grōger ifi ate Die S3iid>fe felbfl. Weiflenti eff  
 fie Met unb fteifcfytd r unb pnberg ^farbt; an ciijigen  
 9Diiofen abet/ tt>te an SPUCHMJM luteum unb rw-  
 ^r//i, eine teller\* ober glorfenförmifl au^gefpannte ^>aut.

APOTHECIUM, J̄ru d>r l a g e r , i(l nach Ttdpa\*  
 tue an ben Slecfrten bafijeni^e, ftaf {PtllbenotD  
*Thai am us* nanntC/ ba^ ^rucbtlage?' ein So&rper Don  
 t>errd>iebener 6r6§e unb \$orm / ber in feinem ffuneren  
 bie JtieproDuctione or^anc fon>o>l al^ bie ©amen e(n\*  
 fc^Ue^t / beren Sebaltniffe man erft &Maf>r toivb, n>enn  
 man fenfrecbt bünne @c^eibd)en bat)on abfd)neibet unb  
 unter bat (Sontfnmifroffop bringt. 2)tcfe ©amenbe^  
 Walter öffnen fidfauf ber Oberfläcste bed gruc&tlagerS,  
 unb treiben ben bent fecn(?en ©taube cfynXxdftn ©amen  
 tmrd) btefe nut bem ben>affneten Slu^e benrerfbaren  
 X)echnungen. Slrten bc(t>on `finb: *Peha> ScuteMa, pa~*  
*tellula^ Cephalodium, Tuberculum, Trica, Lirella,*  
*Olobulns, Pilidium > Cistula , Qrbiculus, Strom a,*  
*Sp/iaeria.*

APPENDICULATITS, A, UM, f. Appendix.

Arp&NDix, llnl? ångfcl; menn e^ febr ffein  
 tit \* *Appendiculum* iff im allgemetnien jebe\$ Vflans  
 jenor.qan, Da^ gleiebfam überflüffid an einem anberen  
 ju bänQtn fc^eint. 3D fagt man/ etn 55(att(iid feo  
 mit Slnftångfeln t>erfe^en (*Petiolus appendiculatus*)

toenn fid) an fciner 93afi\* ober an ber 33 a ff 3 bed %tau tettfleinere glattabnlid)c SUNfage/ an if>m befinben, bte entweber ton bem SMatte (>erab, ober toon bent @tenfle binauf aefommen finb/ tt>ie an SILVIA qfficma/is, SOLANUM JJulcamara, toa\$ CfUgC appendiculato-nuriculatmn nenuen. 2lud) ein an ber @pige beg Stengels ^ängenber gsiattjriel f>eigt bco eintgen (**Ber-kenbourt**) Petiolus appendiculatus. **Gewöhnlich wird app endiculatns nur t>on blattal)nltd)en Anhän^: fcln gc>cauc(>t/ unb if! bann öftcr^ Si)nonpm t>on auricula tus. ' %||tt)tiltn iff Appendix (Spontym fllC Neciarium, tt)ie 6cp bCh Appendices, . ffillf an ber SBlumcnfrone beg BORAGO. 2lud> bie @faubbeutel an VACCINIUM habtn 2fnbangfel, unb fogar bee 5Tjabd / ber bet) Polygala tnit einem bkrialwigen Krön: d>en appendiculatus [K Appendix nennt Willde: now an ben @tapelien ba^ / n>a^ Jacquin Ala nennt. @. -r^/^/. ©. auc6 Periphyllia.**

APPLICATUS, ift bet) JDecanbolle ©ononom mie a dpr essiUm

APPOSITUS , fla 4> anliegenb, j. S. Spatha apposita an eintgen 2(loen. 9?act Bernhardi, tweim ein £>eil ber £>ber; ober Unterfette an ben Raud ciner anberen fiogt\*

APPROXIMATUS, g c t ^ u f t , "Wefi toaf sebr bēc^e gebrängt an einanber fiefft. 9)?an fagt t>on Slattern bafi fie gebauft (leben (folia approximata) n>enn fie fo bid)t an einanber fleben, ba\$ man ben ©tengel ober ben 3lft gar nid)t gema&r ft>irb. j. ©. SEDUM sexangplare. IX>iUbenOtD erf (art approximates unb confenus fur fpnonfltn; jdEcancbode un; terfefyeibet approximatus o|i rapprociS, ge^auft fie\* ftenb, t>on confertus a|i approckd, bidyt flebenb\* 39?an bat aber auc) approximata i>olv<\*i ftenn fie na>c am ^ute fle()t, unb man fa^t auc^ Don gwen t|n|e|nen Sörpern, n>enn fie n^be neben einanber stehn, approximatus, a, nm, |, S3. Stamina appro-

*odmata an bit AMETHYSTEA. Siacfc &ern&arbt' batf bag, toai approximatus* (gen<fyert) ift, nuc cine Since totit abffc&en.

APRICA, OHUM, fonnige *ty|ā§t<sub>f</sub>* too bit tyftonjen fe&r ^etg ßaben.

APRICARIUM, 6 o n n e n ( i d U 0 / jut SItifitabme unb \$ur 3(u\$teHunfl ber @etoāc&fe betf ägpptifcben ^IU ma^ an tde Conne.

APYRENU\$ A, UM, o^ne 5fern. ©ne *Bacca apyrena Qtbctl Ctnge CulHCrte BerberiS, Ultb Vitis.*

AQUARIUM, DP^ffer be&^lt e r / JC Cultur bit 2Baff>tpflan\$cn in ©drten.

AQUATICUS, A, UM, AQUATILIS, E, *Pflanzen*, fc̄tc im fugen SQBaffer / tint) mciflcn^ an Den Ufcrn *biffU* ben leben iDecanb. / ober an naſſen ©teBen Bull. *Slad)* BuIIiarb ijt Cine *PI ant a aquatalis biejeiltgC/* bie im IBafTer fd)mimmt obec unteroefaucf)t i(t.

AQUEUS L., burc&ftd)tig unb ot)ite garbe tote SBaffer.

AQUOSUS, A, CM, L., n>a^ etnenfcf>r *wäſſerigen* ©efc^macf bat / tote bit betannnt ^au^murj. *Aquosum Camb i u m Uttnfy.*, fX> a ffe r fa f t, cine burd); *sichtige*, mei(len« farbenloſe Slufflflfeit in ben SBafier\* gefaß̄en. *Aqjmma vasa*, bunne runbe emfac^e un^ *gleich* bicfe ©nage, toelc^e 2Ba(Tcrfaft ent^alten; fie ftnb im (gplintc unb \$olje.

ARACHNE, © p i n n e n g e w e b e , .bet ©pinnen\* getvebactide Ueberjug cinder \$f[ansent6et(e.

ARACHNOIDEUS unb A RAN EOSus, ettpad an *tyflan\** {en/ n>a^ entn>tfer rnie 6pinnengen>e6e#au^ftebt/ obet tt)ie mit ©pinnen^webe u6erbecht ju fepn fdjeint. *Er:* fiereg tfl ber §afl bet) bem fpinnentbeartigen *Ringe* (*Annulus arachnoideus*) ait eintgen *ty|||t|*, *XO|t cm* AGARICUS *sanguineus*, ber gen)o(0n(i(& banu äufy fe&r balb terfd^minbet, unb nut am ©tnmfē etntge Saben (agt, bie man often? gang überfteftt; *Leſteres* an bem fpinnenfteinbeartigen 5?clc^e (*Calyx arach-*

*noideus) bti ARCTIUM Bard ana, an ben Slaſtern be\$ SEMPRRVIVUM arachnoideumiaxi ben fpinnentoebartlgen %otbt xd)tn{p appus arachnoideus) bit HYPOCHAERIS archnoidea. Tel a araneoxa f. Tap etium.*

ARBOR L., £ a u m , in 3ufammenfegunflen mit grie\* cOifdjen SEBorten *Dendron*, nennt man eine ^Jffanje mit boljigem, nacftern / an ber S&afid einfacfoem ©ten' flel (beffen 3leffe ^no^pen tragen Bull.) / ber menigfeng breo mal 9J?ann^boc& iff. JDecanb. ©iefe ^Definition/ fot>iel man äicf) ba^cgen etnt^euben faun / iff bocf) bcfiec aid jene CPiUbenotv'a: „%aum iff eine Wflnjc, beren ©tamm t)ie(e 3^^)^ bleibt ^ unb an ber ©piſc in Sleffe getbeitt iff." *At bores finb bie VII. Samtliе bet) ginné.*

ARBORESCENS, *bauin&l>n|i<bf* ftaſ einem 93aume ft\* nábert, tttoai mebr aW ein ©traucfo iff; j. 95. *Cisrus incanns*, ATROPA *arborescens*. *Arborescentes Filices*, bauni(ifnlicf)e ^arrnfraūtcr, b^beneinen einfac^en an ber ©pige mit 5Bebcln befechten ©tamm/ ber nie tcrtcfet roerben barf/ n>ei( er fonff pleicfy ab; ffirbt/ nnb ber n>eber Sleffe nod) neue ©tamme auS ber 2Qurjel treiben fann. 35ep einigen / *toai atlmá^ltg holzig wirb.*

ARBOREU\$, b a u m a r t'i g . ©o nennt man einen **holzigen** ©tamm, n>enn e/ étnfacf)/ jyiten *nadt* iff/ unb oben einen SBtpfel ober \$rone bilbet. (Er iff nuc ben 93äumen eigen / ). 93. SAMBUCUS *nigm* (m @e^en^ fa^e bOtt SAMBUCUS *Rbhuis%* — *Arboreus Can dex*, ein baumartiger 6tocf / iff berjenige, ber aufrec^t ffe^t/ unb bem gangen &ttodd)ic *bag* Slnfeben eineg Gaumed flibt; j. S3. an \$almen unb einigen *fiawn*" fräutern. SRan nennt aber *and)* öfterd ^Jflanjen arboreae ffatt *majores* ober *fruticosae*, tt>enn (ie <jrögcr ober me^r ^oljig a(d bie Derwanbten Slrten ffnb. S&aumartige tytfanjen bejeic^net man mit bem Seic&en des ©aturn (^).

**ARBUSCULA**, AE, B à u m c b e n , ein fleiner S3aunt/

befftn ,f6&e jene *txnti* ?0?anne\$ *nifit* fci-en SKal fiber\* trifft. 3Decan&. 6i)nont)m &on *Sujmiex* Bull.

AKRUSTIVUS, A, UM, mag citicm Otraucfje å&ulicO if?. *Arbustiva*, etne gamilie 6ci> finné.

AKKUSIUM f. *Frutex*. *Arbusla tint* liafuctcfjC Samilcc 6et> *HinnL* Wrbotete in 6rfrten.

ARGTUS, fd^mal, j. 55. *arctae Lamellae*, Cnge dnltogenb / *vaginae arctae*, CHIEQUISRÍUM.

AKCTIATUS, g e b o g e n, ntit tw gemolbtcn ©eite OUflDort^/ J. 05. *Legumen arcuatunt-an* ORNITHOPTS, per/msillus; *Lamellae arc ualae* an! niebwr ^n SBltafterpiljen / j. 35. AGAWCUS virgweus. gtne *arcuala theca* if! an HYPNUM *Jilicinum*, *Arcuatus Embryo* f.falcatus.

AHF.AE, 05 a rce ll b e e r e/ bicin Siabatett/ *Areolae*, qet>etU ftnt).

AREGTUM, f# *Ercctum*. 1

ARENARIUS, *toai* im 3ant)C tDacf>ft; tin Sandgeswächs.

**AREOLA**, *Beetchen bei Köhling*, durch Me 3ffjc / i'inien unO 5Btncfcl bcarcnsten flcincn Hügelc^ett oDer Sfad>cn am *Thallus*. 93ergl. *Area*.

AREOLATUS, (*Thallus*) neqartigee *Haub*, 6em nITigen å|mIt\*, abrr nut tDurfclformigen Diiffcn

fleinen crbabenen etma^ \$ufammcnfTo{jen^en gelDcrn btt fiCt) t Wie an UHCEOLARIA *ocellata*.

ARGENTF.US , ARGENTATUfi , f 11' b t r.tD Z t g / Unb trt 3ufammcnfc^unqcn aud fceiu &tUd)iid)cn argyros, roei§ unb filbcrlflanjjenb / J. 95\* bie untere ©cite ber SBlattCC an POTLNILLA *argentea*. Argent o f. a-/bo murginatum Y>er|dbert/ nennt manein SBlatt/ bag am SKanbe n>ei? dn^efagt tfl; noenn c^ in bee SRffte weigflcieft iff, nennt man ti albo- ober argcnteo-variegatum> t>ei^ ^ panad> iert / ge^ flecft.

ARGILLACEUS, lt<\$tgelbbraurt. *Argillaceum*

\* o / u m , Sbonbobcn, auf ff>onerbe / bie im naffcn  
Suftanbe fcfyfupfrig ifl unb jufammenbänflt/ bepm Srocf\*  
licit aber erfärtet.

AKGILLOSUS, t>a\$ auf# Stljongrünben n>5f>it.

AKCOS , in Sufammcufegungen ani bem ©riec()U  
fcften f?att *Candidas*.

ARGUTE CRENATUM, f. i c u ^ e *crenat urn*.

ARGUTUS, ttatf fc^arf if?, im ©egenfafje ton  
ffrimpf unb ruulfftg- @o nenut *dinn*' bie ©amen t)on.  
©urfenunb 3J?elonen *Semina arguta* im ©egcnfage  
t>on ben@amen bet\* j(urbt|fe/ bie *margine tumida*,  
*ob Lusa ftnb*. *Argute derUata*, fd;arfge\$@a(miv  
nennt man flatter / -beren 3af>ne fpi^ig unb febr beue\*  
kd> abgefegt finb/ wie an PIMPINELLA *Saxifraga*.

*Argute serratum* , f, se rratum.

ARGYROCOMOS, filbertreig/ ft1berbaarig.  
93et) ben (Bnap&alien biejenigcit/ bie weige SuW  
f^ up qy a b t n .

ARHIZOBLASTAK , U n w u r 5 c 11 c i m c (!) naef)  
Willdenow, tvenn, n?ic an aBaffctpflanjen unb ®d)nur,  
roßerpflanzen , bem ©amen Da^ 6cf)na6c(cf)cn fe()(t.

ARHIZOS, tr>a^ feine SBurjd f)at/ n>te einige 6d;ma^  
ro^erpfJanjen.

ARIPUS, A, UM, t r o ^ e n obec xj^rtrocf ftct,  
im @eflenfae t>on fafrig, j. S. bee JteM an MELISSA  
*officinalis*. ©pnonpm mit *Scari os u s*.

ARILLATUS , A, IM, nut eincr ©amenbecfe fccrfe\*  
(>en. 95ollfommen bamit ocrfe&en (*pcrfecte arillata*  
*semina*), ftnb bie ©amen an Evonymus; unt)o(lfom;  
**men (imperfecte arillata)** bie ©amen an Poly-  
gab, ^flanjen mit ctnblattriflcv S&lumenfroue (>aben  
nie *Semina arillata*. ^ubeftcu nennt man *bod*) aud>  
bie *trixQtixQtn*, mit einer fet>r jartcn loefcren ^aut eiiu  
flefa§ten ©amen bec Pilularia, *arillata*. Arilla-  
1 a e ftnb eine \$ami(ie bei) Barfd>.

ARILLUS , 1, L. , @ a in c n 6 e cf e / nauute Jinne  
bie augere fret; ab^e^enbe %aut bef ©amene! / bie aber

**abstebend**, ba\$jenifle, *tvati* mit ir^cnb *ttwai* anberent/n>ot)on e£ abstebt / eincn rec&ten 2Binfel btlbet.

ARTERiFOEMiTnR, a r t c r i e n f 6 r tit i Q , nennt Bernbarbt bie Smfccilunfl ber ©efägbünbel in eincm aberfacn SBlatte/ n>enn bie Sleffe D'crfelben ffcf) auf **mannigfaltige** SBetfe t>crt^étkn.

**ARTICULATIO**, (&elen\$, ifl nacht **Decandolle**, im 2(l(gemcit>en jene Stctte in bcm ©ctvebe einec **Pflanze**, an tt)dcf)cr jn>ci> £6eile, bie in ibrer 3u^en6 bafelbil jufammenbingen / in einer bcflimmten tpcrfobe t^reS gcbenS fi\* oftne merHicfte Serreiffimg trennen / j. 95. bie ©tefle, an *voeldjct bag* Slaft einc^ Sirnbaume^ am **Aste** fist; an ftelcfrer über^aupt jmep Xfteile **zusam-** **mengesfügt** (tnb. defter^ nennt man aucf) **bloge** **Ans-** fcbbt>eUun^en obec SSerengerun^en *Ariiculatio*. **Das** 3RitteljiucE jmtfcf)cn \$n>et) ©clcnfca ifl bann ein ©Ueb, **Articuius**, unb **ttJirb** öfter mitt **Ariiculatio** verwechselt.

**ARTICULATUS** L., g e g I i c b c r t, beieicfonet jtwar im 2ll0emémen ettt>a&, *tvai* ©eknU bat, alfo **gglies** bert-ifli; inbeffén bcutet e^ bod) einen eigcnen Sau an getviffen ^3flanjcntbeUcn an, bie man degliebci't nemu« *Arliculala aris ta-> f. £• eniculata*; *Arliculalus bulb us* tt>trb aid ©ononom' Don *compositus QC\** braud)t/ tt>te ail CROCUS ojfficinalis; unb **tton** radix-a rlieu Jala , tt)te au LATHRAEA , AD ox A. *Arliculalus caulis* L., ifl ein ©(en^el mit resdmagigen, an ben ©elenfen eingejogenen ©liebern, j . 35. CACTUS , pE^ LAKGONIUM *telragonum*; uub eben fo ftnb auc() bie *ft la arliculala* an Sonfert)Cn / tt)te an *CONFERRA compressa*. Slnbere moden iftn *an btn* @e(enfen t>a^ bicft/ unb t>emed)feln c&n mit *nodosus*, rote bee *Culmus articulatus ttirflici*) öfterg ifl. *Arliculatum Filaméntum*, ftcnn ber Stauffabeu ein (beweglis dfo\* tDillbO Slicb angefe^t bat; j. SB. *Qalbey*, Kos- marin; *articulalmn Folium* L., ein gegliedertes ober fact)ertgc^ Slatt ifl naip &i nné dasjenige, das

duſ meſjreren Slattern beffe&f/ beren eineg aug ber  
 ©pige beg anberen &er&em>āc&jt / n>ie am CACTUS;  
 naſfr Cargione an CITRUS aurantimn; nad) anberen  
 feagjentge/ bag innentuenbig f>ſI unb burd) Ouer\*  
 fdjeioemdnbe get&étt/ augen njaljenförmig i|i, tuie an  
*IUNGUS articulatus* unb an anberen @fnfen. £6enfo  
 iftaud) jutpcilen Cine *articulala Bractea* gebaut. —  
*Articulation Lomen turn*, eine fleſltebvyUrte ©Iſeber^  
 bülfe tPtHb. (toad ein \$(eonadtnud }u feon fcf)e(iU)  
 feenn Die Oj^rabt^etlungen augctf)alb beuflic^ \$u febett  
 ftnb/ unb fi\* Ieid)t in (Sliebet theilcn (ajfen, \$• S. an  
 HEDYSARUM ; auc^ dbnlich gebaute ©c^oten nennt man  
*Siliquae articulatae*, ft>ie am RAPHANISTRUM wo:  
 bet) jebod) immec Die ©clenfc cin,aejogen flnb, nichē  
 auffpeingen / unb 9ltcbertt>eife abfallcm — *Ari/cula-*  
*tus pedunculus* L<sub>M</sub> tvenn ber S3lumen(lie( ani  
 etnem obec mebrercn ©lieberu beſte&t; j. S\* an einigen  
 Pelargomērt/ ober o^ne Siegun^ burcft Stnoten setbeilt  
 iff. — *Articulatus pit us*, em geglieberteS kegelför<sup>s</sup>  
 mtged ^)aat A bad tn r^elmaſſit^e / eupatf eingezogene  
 ©licber gct&ctt iff, j. 35. ait VRKBASCUM, LAMHTM pur-  
 pureum. tPtUbenow bemerft/ t>aſ biefe ſaare zus  
 ft>eilen ben §jibll).6rntfrn btv 3nfeſtcu å()ulid> finb. —  
*Articulata Spica*, geflliebcpte 2lel>rc / tt>enn fete  
 ©ptnbei berfcblben ta ©elcnré abgefegt tfl, j. 95, TRI-  
 TICUM , OPHIOGLOSSUHIU *Articulala Radix*, geglied<sup>r</sup>  
 ierte SBurjel / n?enn eine 5?>otte au\$ ber anberen treibt,  
 fo ba\$ bic ganje gSurjel aud (SHebern zusammengesetzte JU fci)tt fdictnt; J> S. IRIS germanica, OXALIS ;  
 Batf4> untcrfdjeiDet fe&c ric&tig bit gegliederte 2Bur^  
 jel t>on ber geinieten obct ge^a^nreu baburd) / ba\$ fe n>ber in SBinfel flebogen feon barf^ tt>ie t>ic gc^  
 fnt'etc (*geniculata*) noc& ati ben SnDen ber ©elenfe  
 t>ortef>en , tt>ic bte ge^abnte (*dentata*). *Thallus*  
*articulatus* ncnut man jened taDenformtfle 2aub an ben  
 Sledfoten/ an t>elcftem bie jRinbe bur\* nngformige Risse  
 flleic&fam tn Sabm setbeiU ifij »• \*• an PARMELIA

*divaricata. Articulato- pinnatum folium*  
 L., gelenftoeife gefieberfe\* 3>latt/ toenn ber gemein\*  
 $fd)aflid)$  Slattfttel gegliebert iff; tt>enn *bit* Slattcften  
 einetf gefiebertcn Slatted an ber & $\pi\%$ t aud einanber  
 entpringen; roenn  $\ddot{e}$ r gemctnfd^aftlcc^e SBfottfliel auf  
 flefnen übereinanberffe&enben Slafte&en 6cffcf>t, bie,  
 n>ie beom ge^Uebcrtm^lattcgelenfmctfe terbunben finb/  
 unt) Me S&Iattcben jmifd)en ben ©Uebern in *bm* &  
 lenfen aufftgen / n>ie an RHUS *copallinum*; tvcnn ber  
 SBIattfttel auf fo t>iet @e(en(en befiebt aid \$laatt\$enpaare  
 (a finb / j. S3\* LATHYRUS *articulatus*; mm zwischen  
 jebem \$aare de^enüberfte^nber SHattcfen ber *gemein-*  
 fc^aftlicste S(attf?iet mit einem 6lättrigen ^crt>or(?c^enbcrt  
 Sianbe eingefafit i(i/ {• S. FAGARA *Pterota*\* — £>e\*  
 canboUe ncnnnt gegUeberf/ tt>a^ bur\* ein Sdenf feji;  
**fist. (S\* *Geniculatus* unt) *Nodosus*.**

ARTIGULUS L., (B f i e b ; Don ben Sangarten unt>  
 6onfert>en» ©iefe ©iebec finb bon t>erfct>tet>ener gorm,  
 unb ber ^eil, two fie jufammengejogert finb, toirb  
 (Belenf (*geniculum*) *Qtnanqt*, *tvomit ti bfitti*  $\ddot{e}$ r;  
 toec^eft totrb. Sag 55?ittclf?ucf gtmfcften jtveo ©elenfcn  
 t|l CidCn1CC^ ©Heb/ *articulus*.

ARUNDINACEUS, fd)ilf&bnlid} y' Arundinaceaey  
 eine SamiUe bet) Kay\*

ARVENSIS, E L., n>af auf Slecfern (ober in ben  
 Sracfylberln unbetoppcln, Bullo n>ad}jl, g, .\$. ME-  
 LAMFYRUM *arvensd*.

ASCENDENS f Adscendens.

ASCIDIFORMIS, f4>Iau4>artig., n>ag einem  
 ©C&fouc&e abnltd) iff. Saber *ascidiformis* Brae tea  
 bet) ben bepben ©attungen ASCIUM unb RUYSCHIA.  
 SUfe ©cf)auc^e n>etben balb t>on einem gefrummtten  
 Sblattt gebilbet / beffen SXanber 5ufammengenad)fen finb/  
 tPte an ber SARRAGENIA ; balb t>on einem ftoblen 951atte,  
 roie an CEPHALOPHORUS ; balb burct) eine befonbere  
 Srweiterung ber ©pi\$e ber SRtttelrippt eined Blattes,  
 (Pie an NEPENTHES.

**ASCIDIUM**, *Qd)laud), tin* blattartiger & ofcr,  
WUnberformiser Skper, ber mancfcf S9?al an feiner  
oberen Oeffnung emen ©ecfel bat, toelcfcer **ffl** sumeilen  
Offhet, ©eto&bnlich i|t int einem folcfcen ©cfclauc&e,  
**wie** an NEPENTHES *destillatoria* retneS SBajfer,  
ASCLEPIADKAE, eine gamilie bep avebicutf.

**ASCYRUOLIAE**, bie brepjeftnte nafürlicbe Glafie *in*  
**der** erilca Slu^abe ton ©copolfs Flora carniolica.

ASEXUAL is , ASEXUS , f, *Ne u I e r.*

AaPAAAG\*, eine §amilie bet) 3«fT^u^

ASPARAGINA, © p a r g e l f i o f f, toon Kobrtquet  
fm ©p&rgcl *cntbedt.* Sine ei^ene t>e^ctat>thfd>e **Mas**  
terie in biefec ^flanje/ Die Die <fb9mce unterfud;t. **Ein**  
Principiutn im media turn 11. (^affe»

ASPARAGUS, ^ p r o ff e n , nannten Hay und **Tours**  
nefforr bie jungen Pcfcf)igen 3a[)rtnebe au^bauernbec  
©emäcbfe\* St'e nabmen btefe Senennung torn **Spars**  
del t>er/ an tt?cld)cm btefe Sriebe am beutlic>fien **fnd.**

ASPER, r a u ^ z fc^arf/ n>enn bteOberfläcfre **durch**  
Heine, mie frei>em Slu^e aber nod) bemerfbare/ \$uncte  
oberfurje jieife ^aare, fc^arf geioorbeu eft/ j. SB. H E -  
LIANTHUS *wmuus.* £m'n'e 'unterfc^ebet e^ nicfrt Don  
scaber. ?D?art bemetft, ob irgenb ettvad auf ober *abt*  
*toåvti* geffricben, n>e \$• 55. ©cannen, fd)acf iff\*

ASPRRCU-LIFORMIS ^ @ P T C II g tD C & 11 f 6 t ttt f fl/ .  
iff bet) Palifot Beauroi'e elite 9?arbe *an ben* ©rāfern/  
toenn bie %åtd)cn an ber epige bcrfelben fo dtiUUt  
fmb, mie bie SBorffen an einem eprendtvebel; {• S3\* *an*  
**TAIPLASIS** palifot 75tauv>

ASPEKIVOLLAE L. Sine SamiHe / bie grogw 2f)til\$  
.in bee L Orbnun^ ber V, (Slaffé frorfommt/ unb bep  
rauben Slattern bier natfte©amenM/ }• \*• £<sup>CHnj</sup>w,  
ANCHUSA, BORAGO.

ASSERCULATUS, *Uiflig*, ifl n a\* *Ibevnbatbi* eine  
£)berffåd>e, rcenn bie ®ruuDf<<\*e ber (irl)6l)unflcn auf  
berfelbeu lana i|h

AWURGEWS *L.* f unterfeteibtt fC& ton *adscendens*

*babuvd), Daß ti anfaßfid; abtoarf^/ unb bann erfl aufV  
toðvti ffcigcnb bebeutct. Slnbere ne&men eg für burc&aug  
gleic&bebeutenb mit adscendem, tooUcn eg aber nur auf  
iene SfreUe angetoenbet n>tffen, t>le m̄dfoe (Stengel fmb\*  
Slnbete tooflen, bag eg bogenfpemid aufn>årtg fieidenD  
6eDeute; anbere tejeic^nen bamit bit etettung ber SBCa^  
tet an ben ©innpffanjen 6e© i&wnt Srt>ac&en» JELinné  
flnbet eg für ülerfliuffifl.*

ASTICHUS, un re i<sup>g</sup>, nic&t ft einec Siet<sup>^</sup>e gc<sup>^</sup>  
fleKt; fo nennt man eine Sle&re *untcibig, spica as-*  
*ücha*, wenn bit SBlumd<sup>^</sup>en nic<sup>^</sup>t in einec fteifte fie&en/  
j, SB. LAGURUS *ovatus*.

ASTOMUS, tanbloe, J. S5. *Theca astoma*  
*CbCt Sp orangium aslomwn* an Pbascum, two bit  
95u\*fe flefcfelbflTen blcibt

A T E R L., r a o e n f d b t o a r j , ba^ rcinffe unb bum  
felite 6c&tt)arji/ \$• 35. t)ie ©amen ton Aquiiegia,

**A**THALAMI, glec<sup>^</sup>tcn o<sup>></sup>ne, beutlic<sup>^</sup>e Stuchtbehälter.

«**Öhnhäuser** nennt sie KoWng»  
ATHERA, f# *Arista*.  
**ATRAMENTARIUS**, nach **Decandole**, fcfttar\$ wie  
Dinte.

ATRATUS. gef<sup>l</sup>fet Dår 5t pacft ©ecanbolle\*

**ATROCINEKEUS**      b u n f e l & fc^ fa r b c n

ATROPURPUREUS, *bai* bunfdfte 3to<sup>^</sup>, bepnabe ing  
Schwarze zie&nd, f sparglob, j. SB. SCABIOSA *atropurpurea*.

ATRORUBENS, b u n f e l r o t ^ / n i e DIANTHUS afro-rubens. \*

ATHOVIRENS, flablg run / fe^t bunW grim, tn'g  
JDunfelblaue unb ©\*tt)arje iie&enb/ j. SB. PINUS ni-  
ffra 7 KHODODENDRON *maximum*.

ATTENUATO - SUBULATUM, V C t b Utl ttt ^ p f t i Cf  
m e n f d r m t g / an Dec S5afig Ian\$eftenf6cmi9, bann  
fcfyned pfriemcnf&tmigtDie an, DIDYMODON homomallum.

ATIENUATUS L., p e r b u n n t , langgefrecrt Dunn  
unb fcfermal |iaufenD aegen Die ©pige, Wtnn fi\* cts

*toai men bit JBafg twfcfrmålett, fo wirb t\$ a|t& bthdiid) bemerft/ J. 95. folium basi altennatum, <£& foBte nur &on Sorpern gebrauc&t noerben. Amen-turn attenuatum fj an SAUX vitellina; attenuates Vedunculus an CAMPANULÄ patula ; attenuatus Scapus an ORNITHOGALUM comosum; Siiiquaatte~nuata au RAFHAMSTRUM, Sf*ei*. ©ecanboUe tñ eg @0# nonpm mitt ^ i r g a t u s , toenn eg ben ©fcngelbetciffe\**

ATUS, A, UM. ©iefe Slugflanggfolbe 6cjetç&net/ bag dasjenige, was turcf) bag 4jorfledegfe SBort angebeute ist, wirklich in todem SD?aße tor^anben fcr), \$. SB. Radicatus, to&\$ tint 5Burjel M. (Ebm fo auc^ die SQBorte bte auf/cr unb phoras augge&en; &. 95. *Florifer\*) antophorus*,

Aucrus, A, NUM, L., iff ein 3D?al ©onon^m mit accrescensy unb eću anbereg 9)fal mitt calculatus% feenn eg stct urn Calyx unb Anthodium banbelt. 2Jlg ©ubffantiD bebeutet eg bei#8lct beg SBac&feng\* *Auctum petalumf. Ooronatum*.

AULEUM nennt Vnn& jutt^cflcn bte Slumenfrone\*

AURANTIACITS , A, UM , AURANTIUS , A , UM , &Je 6^ fannte ?Pomecanjenfav6e an fcftön reifen ^Jomeranjen\*

AURANTIUM, p o m e r a n \$ e , efne ei^ene 3Jrtt>on Stuc^t/ bte £tnhe Bacca corticata nannte/ bte a6er 2Decanb. unb anbere / unferfc^eiben / infofern fie aufien mit etner t>id)tcn, flctfcf}i^m / reic^ltc^ mit blaufen Scuffen Durc^cjemobcn cn Static xungtbm, unb t^nenmenbtfl mit bauttgen 3ctt<n t>ecfe&en iff/ bie man t̄ort einanber ablöfen fanit / o^ne fie ju nerretffcn\*

AURATUS, p e r g o l b e t / nennt man ©lafter/ tt>enn fte am SRanbe gelb finb^ £>ecanb. &ält eg für emcclea mit aureus, ba tt blog'bie \$avU betrac&tet.

AUKEO-VARIEGATUS, QcIbbut|t/ gel&p a n a \* \* i e r t / nennt man ©lafter / bte in ber QWitte gelb finb / j. 95. AMARANTHUS 6/- unb tricolor\* 28ie bad vorige bur\* jfranf&ett entfianben.

, AUREUS, g o l b g e l h / ein reineg 9efatrtfltcg gläns

jenbed ©elb/ bera ©olbc in bee gaebe fffmltcft/ J, 35,  
ANTHEMIS *lincloria*.

AURICULA,  $\Phi$  e fc r 4> e n , bejctc^tiet tm afgemef\*  
nen jebed'fueje eeitcnan&aangfel t>on bee goem eined  
:0(>rläppcbend; tXJtUberforo.bejcic&tiet nad) @4>reber'n  
fclo§ bte fleinen S3lått4>en untee ben Slåttern bee 3un\*  
*getmannicn*, bie in ben QBinfeln bet ©laifter etnanbee  
flegenübeeffeefen / unb fleine gefittelte folbcnförmige Goe\*  
percſten *bilben*, mit biefem Tlamen; £mF aber belegt  
nur bie blattartigen 9lnfågt an ben Slåttflielen, n>ie  
an ^omeranienblättecn / bamit.

AURICULATUS, AURITUS, L., *Qtofyt*, ntMt ttUU1  
etn Slatt, bad an ber Saffd jmet) fleine runbe, *nati*)  
außen gebogene/ Don bet übrigen ©ubffanj bed flattened  
getrennte gappen f>at, unb bem fpiegSrmiflen åt>nlid>  
ifl, nur Da;^ bie Sappen tmglld) fleincc •unb runber  
finb / feo e« nun SBlatt (*folium*), ober SBlumepblatt  
(*petalum*); g, 35. SALVIA *auriculata*. ©ec Blattiel  
i(l ged&rt/ menn ec an bepben @eiten mit einer blatt-  
artigen \$aut / tt)ie an CINERARIA *cordifolia* verſe |n  
iff, bie tueber mit bem Slatte, nod) mit bee 93af!d bed  
Blattes iufammenbångt. 9iu\* übeebaupt ailed, n>ad  
Anhangsel hat. T- SBeo 7&evnfyatbi i(l *auriculatus*  
toai in bee 9)?ftte eetpeiteet unb an 6ct>ben Qrnben fo  
verschmålert iff/ bag bi^ ©eiteneänbee einmal ibee  
Richtung beeänbeen/ unb ffdfy tpeit (ansfamee aid t>oe^ee  
cinanbee nå^een\* Snbltcf) aud) nt>^ bad, toad n>ie bie  
ftugere £)f)rmufd)el geflaltet unb gefaltet iff, j. 95\* **IUN-**  
**GERMANNIA** c*Uaris*; w>o man bann auct) ðfteed

AUKIFOKMIS, E, *ohtfotmig*, unb &toaeeic^tiger,  
|« S5« bc9 PEZIZA *auricula* gcbrauc^t\*

AUSTRALE CLIMA<sub>y</sub> t)on SJet^icptén bid an bad **Cap,**  
**Peru**, ḡfa ilien.

AUTUMNALIS , \*<sub>f</sub> iQdi ittt, ^eeb(!e bluf)t. *Autum\**  
*nalis area*, faevbftbeet, fiic \$flan\$en fr^nbec SOBd\*  
tf>ei(e / bie aud) ben ^eeb(I beo und Deeteagen, im  
SBintee abee bebeckt tteebtn mulfen\*

**AUTUMNATIO, Qamenvcife, 23totta&faH**

**A**VENIS unb AVENIUS, A, UM, ^ber I 0 6 / was feine beutlid)tn Slbero obet kippen bat; %tote **Laurus Camphora**, CONVALLARIA *Polygonatum*.

A VERSUS, A, UM, a b g f w e n b e t, toenn stoet) ^fac&m mit bem Sfanbe aegen einanber fe&en, ®n *Folium avewum ba& mit bem SRanbe ae\$9t ben* ©fengel (te&f # ill an LACTUCA *Scariola*.

AXILE SEMEN, elu ©ante/ bee in bee 3laſe 6ec eingebclbetcn'ober toixtiltiien Sc^fe ber \$tud)t Uegfc ,4.n7i5 *Embryo* o, ettt Entbryo/ intrarius, bee bep Sänge naef) in ber Stctfe bed Sn&o^pcrm^ (iegt

AXILLA. &et SBfnfel, toelfien enfmeber ber 2(ff/ ober bad Sblatt obet bet. %lumtnfttl mit bem etenget fojbilbet, bag ber ©c^etlef biefeg W&mteW &em bit €rbe juſleft&rt iff. S»n erffen gaffe iff ei ber 5((lwim^ Fcf &Ua)> im jn>ei)ten ber BlatttsJinfel, im britett ber tSi'mUl be\$ \$liimenffie(e& £>bitc beronberen 3ufa& bejeid)nee axilla ffefS ben BlatttrmFel. £>a()cr:

AXILLARIS, p, ^noad in bem 55lattn>infe( ftti)t, ei fn) nun Anihurus, tutē an ben 2fmarant&en, ober Bractea obet Capitulum^ tolz an TRIFOLIUM agra- rium c^.; ober Cirrhush\$> ttne an ben Waffiftoren, obec Corymbus lt>ie an AGHILLEA tanacetifolia^ obtt Flahelium obet Jios solitarlus toxé an ANTRRHINUM Cymbalaria unb folglicft aucft fructus; obet Gemma, toie an ben meifferf .Snodpen ber Sdume; ober Glomerulus, toie an AMARANTHUS albus; obet Pedunculus Sy toie \$ 3\$. VERONICA arvensis; ober Racemusj twe an GHENOPODIUM ambrosioides ; obet Ramus, Üte ait ANTHEMIS Pyrethrum; obet Seta, toie att HYPNUM velutinum; obet Spina, Me an CITRUS aurantium; Obet Splca , toie an POLYGONUM Persicaria. SRan nemtt ein Slatt folium axillare L., wenn eg ait bem SBtnfel eimed Sffed mit bem 3tenge( ffc^t/ tote an CICER arietinum; attein bann iff oicfme&r ber 2lf axillaris, unb bad Slatt subaxillare. 9)fan überfegte

*ax ill arts, e, balb burcfc ad>felft£nbüg, hcilb burd)  
winFelftnbig; aOein btefe 2lu\$brücfce ftñb ntc^t beutfcb,  
unb man fagt beffir, bie SBlume K. ffe&t in bem Blatt  
ober Sfflioinfel 6. a<sub>t</sub> .4 7 a unb Alar is,*

AXUPENDULUM SEMEN,\*ttt ©amC / DCC (M 6CC **Spiße**  
fce\$ ©amenflel>äufe\$ ftanqt / t>K Buxus.

AXI\$, 2fd>fe, ilberf)aupt jcne £tnie^ bte man  
ffcf) t?on bcr ©pt\$e tin<6 Organs jur 9Baftes bim^cjo^^  
btntt; bantt aucf) j^be^ bünne unb lan^c Ot&an, auf  
ftelcbem anbere 2bctte n>te auf ifyrer ?ld)fc flc^en. ©o  
iff bte epinbel einer SRidge ober Ql^ve cicutlicf) if)re  
Slcftfe (©4>raber 6e\$eid>nct aber mit bem Sjjorte i\*»\*  
bte 2lc)f)fc einjehter 3kf)rd>cn unb ©ra^blümcben); fo  
iff bag 6 Julfecrt bte ?f4>fe ber gruefcf. 55e9 j^erfce  
iff Axis ber aememfcftaftMc^e 95lumenffel be^ \$agd)eg&

AZUOEUS, fcfcrtf a l t c b l a u , einfefjj foeffetfunb  
(attti, brennenbe^ 55Iau/ rote bad an ben fietnen 2lf  
yengentianen / an GENTIANA **verna**.

## B.

BACCA, L., B e e r e , iff nacft ^tnn^ jebrt ntd&^  
auffprinaenbe flieifeftige Happenlofe Vericarpium mt( nacften 6amen. ©a &teburd; ber 93^ri|f bon SJew ni(t)t f\*arf befftmme iff, fo unterfcfteb iTiönd) bte t>abre Beecc (-Pacea vera), bte' feme gacfter f>at unb in n>(c^er bte @amen oftne \*£)rbnuna **liegen**, ton ber 3(fterbeere (*Bacca spuria*)toti<t)t \$äd)tr **hat**, unb in ber bte 6amen in irgenb etner fcftleinbaren £)rb\* nunfl ffea^n. Sine anbere 2lrf t?on 95eere unterfd>teb (Burner alt Acinus. Bulliarb nennt eine S&eere cine nid)t auffprtn. oenbe grud)t, bte entmeber etn **fleis** fcfHSed, fafti^e^ ^ertcarptum **bat**, unb feme 3}u§ **ent**: **ba**(t / ober bte ibre ©amen in einer breQariftgeq fflafft **liem hat**; bte' enbficft/ menu fté gefront tff, an ti>rer **Spiße** ntd)t burcblficftert iff. iDecanboFle nennt jebe **fleischige** 5 n\* t o fte@tin/ bie feme <wbere ilf/ eine

Seere, J. 95. bē 95eere einer Sraube. **Eine zusammens**  
 gefetjte Beere iff biejenige/ bie auS mebreren ein\*  
 fad;\*n fleinen befffft/j. 95. Die limbeere. S8ep@co?  
 poll / ber auf) Die iturbijfe unter Die 95erden recftnet/  
 ift bie Bee\*e *Cm* boppelte /Sburc&au\* niftt anffprin\*  
*Qtnbe %tud)tbūUc, voot>on bif au\$eve ftautrg obtt ttmi*  
**holzartig / bte inner\*** fafttfl ober fJcifcfia iff. 95CQ  
**Gärtner**'n iff jebe ffeifd)ige SSrud)!/ bte ntd>t readme  
 gg in jftappen auffpriu^t, Bee re übe^aupt (*Bacca*), unb er^eebnet bleeder: *Acinus*, *Pomum*, *Pepo*,  
 unb bie eigcnflidfoe.'*Bacca* (*Dacca stn'cte sic dicta*).  
 £>Ufe lefe<re beflreiff nun atte^r n?a^ 35eere übcr&aupt/  
 unb tveber *Acinus*, noc^ *Pomum*, nocft *Pepo* iff,  
 felbff bte *Bacca spuria*. tflcbicua, bee *jtblt* faftige/  
 dttylofitne @amcngcf)aufe eine S3eere nennt, unterfd)ei^  
 bet aW Beere: a) bie n?a&re%eere (*Bacca vera*)  
 mit fciner Ober^aut unb pfif^ atteg ^ad^, n>e bie 30\*  
 ^anni^beere; b) bie rinbige Be?re (*Bacca corticosa*)  
 tnenn eine faftige @tibffani in eincr Oarten ©cftafe  
*Cm3cfcf)pfiffen* iff/ trie bie ^Qmeranje; c) bie 2(fter#  
 Were (*Bacca spuria*), bie tor ifcrcr JXeife in *ftatyv*  
*dttfailt* iff/ tmē bie Seere ber Spafirfc&cj d) bieBeere  
 ©copoli'a (*Bacca Scopoli*), *tin* faftigeg obec flfew  
 fc^ige^ ©amengebäufe mit einer (ebcrarfigen *Obtfyaut*  
 obec ©d)alc 95ep Bernfrarbi iff 95eere biejenige \$tud)t,  
 an ftelcfyer bet ©amcnbebälter auf einer ober me(>reren  
 einanber einfOliegehben fteicfyen/ oft faftigen unb flieU  
 fcfrigen &d)aUn beffe^. ©. *Aurantium-*

BACCANS CALYX, f. *Baccatifs*, *Baccans*  
 T A c c a , eine 95erdenfapfel »o bie äugere SinfaffTung  
 ber gcufc&te sapfelartig iff # bcefe aber im unreifen 3us:  
 panbebeeranartig war/ toie an.SiLENE *laccifera*.

BACCATU\$, faererenarttg; ntan M f° einen  
 A rill us *haccatnsy tomn* bie ©amenbecfe bid und  
 fieifeftfl iff/ ttje an Euonymus; *calyx haccatus*,  
 toenn ber jfelfeft fleifcfartfg tpirb; wie an Blitum; fe^c  
*nnid)idli(i)* nennt man ben Sdd) ber SRoft *Calyx*

*baccatus; tint Capsula baccata, totnn bitfyaut berfelben tt>eid> unb fl̄ctfc^tg iff, unb irgenbtoo auf\* fpringt/ J. ?\$. SILENE baccifera. SBfan fcertoecfofelt fie offertf mif Baccacorticata, unb Idgt bie inner\* ©ubflanj ber tfapfel lilfc&ig fepn. Sine Drupa baccata, menn fle mit ciner festr faftigm SRinbe ura^ geben i(l, \$• S8. Sivfdbm, ^Jſtrficftc; ein baccatum Legum en un(> Lo men/a'm, tvenn unter einer t)du\* tiQtn Dbttbaut tine tveicste marfigc ober fleifcftige 5J?affe ttegt; einen Pepo baccatus, totnn ec'mit einec febc Jveic^en faftigen 9)?afi\*e angefuåt i(T, j . 95. BRYONIA, PASS I FLORA ; dn Rec eptaculum baccatum, n>enn bcr 5rurf)t6obm fet6fl beerenart^, faftig unb fl̄ff c tt>tjan ber ffirbbccrc; Semina baccata^ tit SDecanboUæ Sampdermes mmt, f. • S rcoqj^r-me5; Siliculcrbaccalay @d)btd)tn tOtld)\* nit auffprinseti/ unb faftig fthb/ J. S3. GRAMBE tatarica. SInbere red)nm auch) Me fdjmammiflen unb (eberartgcti 2Ifterfd)6tc^en t^on MYAGRUM<sup>1</sup>, RAPHANUS etc. hierher. Thee a baccata, bit f&tttn tnti)alt> fr S3\* die Baccapfel bcr IRIS.*

BACCIFERAE, L<sub>M</sub> dne natürlicfte Samilic **bey** Morifon. **Alles was Beeren trägt.**

BACCIFORMIS { *be erenab nlid).* *Bac ci-Jormis Utrfcülm an, ben fyitnbmn, tt>q me^rere folcste beerenarttoje ©c^lauc^e auf einem ttoentg' OeutU d)en Polyphorum fle&en. Sin btn (Ecbbeeren n>irb ber fleifc&igc grucfttboben auc^ ein becrnartiger \$rud)tboben , Receptac ulum bqeciforme \$tt nannf.*

BACILLUS, ducft BACILLUM, Qt5dd?en, nnnt Vcfrariue ba« (traucftarfiae unb 6ecf>erf8rmifle 8aub bet 2icf>enen/ I\* S5. *an* LICHEN rangiferinus<sub>y</sub> LICHEN pyxidatus. — tint nnnt jenen fleifc&igen f&eil, totld)tt, nad) i&m / fc& jiatt cities ©amenblatte^ au^ bem ©amen einer #t)acintf>e enttt>icfelt / unb ber \$De' canbolle'n ba^ (Samenbtatt feC6fl ju feon fcftetnt, f-a-

*ciUus. ffintge nennen aud) bie 3tt>itUld)tn {bullilli)  
bie flich an eintgen Jauchben an tver 35aft^ bet ©olbe  
bcfinbeii; unb in ben tfapfeln me&rerer SlmarplliS/  
Jtocz'///.*

BADIUS, f *aftanietmr* ober leberbratin,  
etn (tested 23raim, bad efroaff itt^ Stoc^e oberSpurpur'  
far&ene jiebt/ j. 93. IUNCUS *badius*,

BALAUSTA nennt iDecanbolle jene 2frt t>on©tefn\*  
apfel ober 5J?i^pel/ bie man an bent gemeinen @rana^  
apfel pnbef. \*

BALSAMICUS, in SSejug auf ©erucft unb ©efc&macFr  
boef) finben nfcfyf a((e etn unb baffelbe £Mng 6alfamifd^»

BALSA M U M, BaI(a m, etn dgener 6arjiacr  
9Jflfanjen(ioff / ben bie G&pmitc unt€rfud)t. Sin PHnci-  
piftn immediatum III @la|Te MC) £ucC|tiet.

BALTCATUS, geFrdn3t/ tmtnt Bern^rbt' cine  
unebene Oberfläcf)^ tvenn bie letfüigen €rboßungen *nacfy*  
ber 6pi§e *bidet*: *wbtn*.

BARBA, B ^ r t , nennt man fomof)! me>rere 6u^  
iAelmeife bet) einanber *flebenbt*, unregefmagtg (nad)  
fffnnne parade! ober etn^aS regelmägig^) an berfc^iebe^  
nen \$flan\$entbei(en *Qtflctitt* fyaave, j. 9. an MESEM-  
BRYANTHEMUM *bctrlatum*, aid aucht bie Unterlippe  
einer rac0enf5rmtgen ober madfierten S3(ume L., ober  
bie ftppe bei 9le!tarium^ an einer Orcbtf. C^eia  
nennt £ar&a bie (&rc\*nne, (Einige nennen eine Sir\* t>ott,  
^ubefcens ber flatter *Barba*, totlchei palifat 7g>zcl|i\*  
x>ois jebocfr nur auf @luma, ©taubfiben, \$stud)ttnot  
ten unb SSlatt&autfeen befd>ranft. Sie *Qaftfaben*  
(Fila) an mcbreren IBIS gelten auc& 'fur *Sdavt*, unb  
fiber&aupt mefcrcere baar^ ober fabenf5rmige Sörper in  
ber ;6effhung bed *Seltyi* ober ber SSlumenfrone, nte  
an THYMUS, ANCHUSA.

BARBATUS, A, VM, bat tig, toitb nut imerfleit  
©inne beg Sjjorteg T&art (*Barba*) gebrauc^t, unb  
inbiefem ©inne 5aben to|t einen *Calyx barbatus*  
*fault cm 3\$ymian*, eine *Corolla fauce barbala*

<it ber Anchusa; *Petala barbata* an ber Iris;  
*Stamina barbata* an Verbasciūm; *Stigma bar\**  
*baium* an ber *tDidc*. 2lud) bte 2Btfnfel ber SMattip\*  
 pen/ menu £aarbuſcl)el Jte barn tefinben/ n>ie an ber  
*iinbt*, nennt man *A Mi la e nervorum barbatae*>  
 tinb ben SRanb «m Jjute ber ©cbroamme/ (*marg^p*  
*barbata*) t>enn er mit unregelmägtflen J&aaren bfefct  
 iff. *Barbatus flos* &ip. i(l *Flos ringens* y unb Bar-  
*bata superficies* f. *S tell at i pili*.

BARBULA, Baſt c^c n, nannte Reefer ben Hew  
 tien bartfSrmigen @6rper, feelcften bte SBimpern bed  
 SKaule^ bllben, bte an jenen Sortulen, bie Bnbel  
 ©yntrtc^ten nennt/ jufammengleimt (inb.

BASAL is MARGO, ffi r u n b r a n b/ ier SKanb an  
 ber 3aff£.

BASIGLOSSUS, anr@runbe ber 3unge fc^mecfenb\*

BASIGYNIUM Ktc^arb/ iftbai *Thecaphorum*  
**Ehrhard.**

BASILARIS, tvad an ber \$altd fltb t foecanb.  
**Gehr** oft *HI ei &|)t|ont)tn* mtt *axillaris*; j. 95. aM  
*appendix basilaris*; in ber erjlen Sejebund a8W  
 ^aben mitr einen *Stylus basilaris*, ttoenn er aud ber  
 Saffc beg §ru\$tfnofen£ cntfpptin^t; eine *Arista*  
*basilaris*, bie an ber 5Baf« ber ©pefjen ffe^t; j» 5B  
 an THICHOPIUM *caninum*; tint *Set a basilaris*^ bit  
 an bet S5afJ^ beg gKoogfiengeW jie&t, n>ie an BUYUM  
*annolinum*; einen /1os unb *pcdvnculus basi-*  
*larU*, ber na&e am ©runbe be^ ©tengeW flefet.

BASINERVIVM FOLIUM ober PETALUM, iff das,  
 jentge / bejfen ^auptrippeu ober Slerfcen aQe t>on ber  
 S3aftg beg Slatteg ober beg 93(umen6tatteg entftminden,  
 unb *btytiabe* parallel mtt bem SKanbe beffelben gegen  
 bie ©pige fortlaufen. 9)?an jáblt btefe 3leri>en ober  
 Svippen / unb nadr 'brer 3af)l ill ein Slatt ein^ zwey:  
 &re^PtcR5ftinfnerptg:c\_t (n/iñ- 6i- ^ri-, *quadrat-*  
*quinquenerviumj*\*

BASIS irgenb'eineg iPflfanjenorAaneg / eg mad *toai*

“

immer fur eine.Sage ober gorm *fyaUn*, iff ffetrf ber\*  
jenige \$unct, an n>el&em e\$ mit fecner ©tuge ober  
nut feinem falter jufammcn&angt, ober burfr welc&eti  
bte ©efage eincS biefer bepben fief) in tbm *verdreißen*.  
JDecanboOe\* VPtQbenoip fftnnt/ getvi§ ju *beschränkt*,  
ben £)rt/ t^orauf bie c^anje %Iume/ unb n>enn biefe  
tergangen iff/ bie grucftt fe(lfi§t/ Basis, gjjan fagt  
g^w^r aKerbin^ t>on ciner #apfcl, bie an berSafi^auf^  
springt / *capsula basi dehiscent*', aUCiti tyillbenoxv  
selbst *trtlavttin* %latt fur abgelofet, i a s i *solutum*>  
ftenn.e^ fleifc^ig unb n>a(\$enformig ober pfriemenformig/  
jugletcl? „aber unb jitm nur mit bent oberffen Specie ber  
fflafi^ figenb iff, unb mit bem (Stengel feme Serbia  
bung 5U ftaben fd>etnt / nur locfer gufamtnenbangt 5,  
S3^EDUM *album*. Basis sem in is iff bet) (Bavt\*  
nern jene SWcste beg ©amen^?¹ in twlcjer fid!) t>er  
9}abe( befinbet.

BENZOICUM ACIDUM, Ben^ o e f a u r e , cine  
cigene ^flanjenfaure,

— BKRYLLUS, A, UM, *cin Ud)U\$ blaugrun*.  
BESIMEN Reefer/ iff bie Spora *Hedwigs*.

© a. *Gongylu*

Bi, BI^? toaiS ju jtt>e9en t?orfommt/ ober zweymal  
torbanben iff ; alfo :

BIALATUS, ^tx> e y f l ü g e l i 'g , §. 55. bie ©amen  
an Pastinaca. 3)fan qenttt auc^ ©c^metterUng^blumen  
Dorjuejtmcife *bialatae*, tpeim fte fct> burd; bie Gro^ g  
Oer Slugel augjeic&ncn.

BIBRACTEATUS , mit *tfoet*) £)ecfblattern *versehen*,  
Hie ber 5felc& an GRATIOLA officinalis\*

BIBULUS, burffig, n>a\$t>tel aBaffer t>erlangt. ^

BICAPSULARIS, E, L., tt>ag jtt>ep ifapfeln tragt,  
|f S3. PAEONIA, ASCLEPIAS.

BICARINATAE SILICULAE , b o p p C l t f a J > n ^  
f d r m i g e @4>6t4>en finb jene/ an welcfjen jebe  
filappe fabnfStrmig au^geboblt, unb mit er&aben en  
fielformtflen SXurfen t>erfeten tft/ tPie THLASPI,

BICEPS , \$ wey *I'op fig*, tit ber 9\*8\*1 dasjenige, roa3\$*n>er>* ftopfe M ober bilbet, \$ 93 ACACIA biceps ; maa nennt aber aufr *ba& in bet* 35otanif ;mei>; f&piffl , n>a\$ smco Jüge bat! <5o iff JDecanbolle'\* *carina biceps tin &tijlffd)tn*, *ba& aui* jroeg 35lu\* menblättern beffef)t, Die oben t)\*m>ac^fen unb unten freo finb. ©o nannte man SQurjeln *licipiies*, *bit fic^* unten in \$met) ©\*cnfel fpalten\*

*Bicoccus*, f. *Dicoccus*.

BicoLQR, 5u>eyfar big, *mi jtt)ft)crleo* Jarben auf einec unb becfelben Slac>e bat; \$ 95. CYNOGLOSSUM *bicolor*. Qäufift fceroecfofelt mit *Discolor*.

BlCOMPOSITO-PIMNATUM , *boppelt* ^Ufattt^ mengefe^t gefieberr, bem boppelrgeffe^ bertten 93latte abn(id), aber baburch t>cid>i>en / Aag t\$ an bet ept^e eniffad? seftebertwicb/ tote an DAUCUS *carota*.

BlCOMPOSITO-QaiNATUM, b o p p e l t \$ Ufa m: mengefe egt fünfja^lig/toenn fibber Blattffiel an btt Opt&e in fünf £)Ct(e jertbeilt / unb jeber berfelben an bee @pi\$e funf %latU)tn träge, S3\* GUSSONIA *spicala*.

BlCOMPOSITO-TERNATUM , *bOppelt* zusam: mengefe^t breyj^&liig/ wenn an einem dreys t&eiliflen q5[attfiele an ber @pt\$e jeber SE&etungeffels bm, bco etn>a^ toerroactfene Slafftc^cn figen / .tvie an AEGOPODIUM.

BICONJUGATUS , » *Bigeminatus* unb Si- gem in us.

BICORNIS, L», ^to cytorni'g, nie bie frucht an CHONDROSUM, ber ©taubbeurel an PYROLA\* an ARBUTUS, ber an ber ®pi%ot jn>et) pfifmenförmige Slu&pücrfe fat. finne' btlbete barnad) eine uatitrUd)\* ^PPanjenfamilie/ bie er *Bicornes* nannte.

- BICRURIUM FOLIUM, \$ wey \*en fe I i g c a B U t t , nennt &apne ba^jenige/ b%e burc) einen 2Ju6fcf}nitt n>eit iibec bie ^älfte in jtvep S^cile get^eilt iff,

blenoëittum etnan&er abfle&en/unb an bet)benSeitcn burchr sparafelen begränjt finb/ biePAssi FLORA *perfoliata*\*

BICUSPIDATUS, A, UM, *Utile BICUSPIS*, \*>XO t^i fpi' 13 ig / entmeber an be^ben (Enben eine ©ptge bil> bcnb/ n>ie *Legumen bicuspis*; ober an einem <fubc mitt jtvcp ©pifcen twfoben, mte *Stigma bU cuspidatum* an CHEIRANTHUS. @. a. *Bifid us.*

BIDENTATUS, 5 u> e? j a^ & H't g , n?afi nur {n>c^ Zähne hat, ttie Die Oberlippc beg \$clc&e\$ t>on Thymus. Decandolle \*nennt aber bagjemse *bidentatus*, toai 3<bnf>at, tt?eic&e n>ieber ^ejabnt fmb, alfo bag, toa& eigentitct) boppelt gesafrnt, *duplicator dentatum*, tft. 251C *Folia hidentata* an ben S^oofen ftnb nuc an bee ©pifie amepiafcrna.

BIENNIS, L., j t D e ^ f ^ r t ^ g / nentu man jene Pflanzen, bte erjl im jtvepren 3afere blü&en/ im erfieii Jahre nur SBurgelblätter tretbea, aber bann aucf)mad> ber SSfut&e, alfo im jtvepten 3a&re/ (lerbenj j. \*• Winterkorn, QPinterrettig / *Verbascum*. gp^an j ^ zeichnet biefe ^Pflansen mi( bem 3ctcf;cn beg \$Rat\$ V« M̄rere jmepjafrride \$fTan\$en erreic^etv in Orangerien fle&alten, and) bat britte unb bierte 3abr, ©a man bai Seic&en beg SSRarg (J\*) auc& jur SSejeic&nung bee Sliimen mit ©taubgefā^en (ber bañner) gebraucfyt, fo márc eg/ bamit aucf) nicftf bie fieinfte Zweydeutigs hit ubrig bleiben fönnte, beffTer, bie zweijährigen Pflans mit biefem Seicfren: 6 (bem umgefbrten 3cicf;en bee Venus) anjubeuten. *Biennia folia* , bie jwep 3&rc lang bauern.

BIFARIUS, L., s w e y r e i & i g / ft>enn gewisse £>r,qane in \$r> 9ieif>en get^etlt ftnb; fo faft man, flatter fepen *bifaria m imbricata*, ycotmi\* i>i'g/ ba\*3ieaclf6rmig / tuenn fie fo über einanbec liegen, ba% ste nur \$t>er) gerabe 9W&\*» &w ©tenget Ober am Slfe briber Ein *bifariam ordinalus Sorus* i|I berjenige/ an tt>elc&em/ tme an *ANGIOPTERIS* unb DANAA, bie grüc&tc beg ^auf\*eng Zweyzeilig,

▷. & en jfofl) ftei&en ffieben, eitifgt, tote flPffterftig, nact> 2inne, meimen, *bifarius* fc&liege jcbeftmal aucf) ben 95egrijf Don gegenüberflefcen efn, n>aS bofo Im ftretiflften ©imie nid)t-baju gcbött S5ei> anbereit (tote Bulharb) bebeufrt *lifariam* auf 3t»eyedey tPeffe. (Eargione nenne /o//a *hffaria* QtQtnubtvütt gettbe flatter/ bie segen cine 3eUc gefcf>rt finb / tvie iWSiLENE *Armeria*.

BIFERUS, A, UM, L,, *fta& jn>ct)mal fm 3a^cc93fu\** menträgt/ im S^>&Hnle unb im Jperbil\*/ tvte jtviſd)cn ten SBenbcfretſen.

BIFIDUS, A, UM, L., *j w c ^ f p a l t i g / ivaS* 6er 8ånge ttacb/ unb nichtgang bid in bie 5D?ittc, in \$t>ei) Sbeile fo gefpaltcn (*Jissus*) i(! / bag bfe SRanDer/ n>di&< ftc bilbcn, acrabc finb / unb bcr 5ttinfcl / jpel^ \*et fte t&cilt / ein fpt^iger SBinfld ifl, bee mit feinem ©cartel na\* innen lieflt <f& barf nur etn €nfd>nitt ba fepn. ©• *Fissus*. go M man eine *Anthera hijida*, bte limenföriwg/ unban beoben €nben ges fpaltcn if! / tvte an ben mciften ©räfcrn ; einen *c a l u x bijidus* a n UTRICULARIA; eine *bijida c a p s u k* bit an becSpige in \$t>ei) SEbeile gcfpaltcu- iff/ j. 55. CXREX *arenaria* y cinen *bijidus caul is*, bcr oben in itvei) \$t>eilc qefpalteu iff, j. ^ . HIERACIUM 6</i-dnm; einen *bijidus^ cirrhous*, J, 55 LATHYRUS *tumidus* ; cine 6/’re/a *corolla* an ben meiffcn ra^ cftenf’ormigen SBtumen; einen *bifidus d e n s*, bee an feinec ©p̄ge in jmep S&eilc gefpaleen iff, & 95. an DICRANUM, TRICHOSTOMUM i unb ebaifo ein *Filamentum bijidurn*, j. 95. CRAMHE; cttt *Folium bijidum* j. Sg# ^n BAUHIMA scandens. 23erfen{?out fccrfWyt untcc Folium bifid um ein 95latt, ba^ jmcpmal gefpalten ifl/ beffen (finfesfnifte (inienf&rmis unb gerabe fmb; *Lamellae bijidae* an AOARICUS *muscoïdes*; cine *Ligula Tfijida* an ARUNDO *arenaria*; einftt *Lob us bijidus* an ORCHIS *Morio*; etlt *Perianthiu m hijidum* an bm nv tfhn SMbpnamifitn; tin Pet alum

*bifidum* an RUDDKCKIA *purpurea*, SILENE *bifida*; tint Spin a *bifida* atf CARISSA *Arduini*; etne Siliqua apię *bifida* an CHEIRANTHUS; tin Stigma *bifidum* an miftriren Snjianen unb ©pngenefitfett j tit neit *Stylus bifidus* an RictNus.

BJFISTULOSUM FOLIUM j|i ein Sfatf f bag to'u an LOBELIA *Dorfmanni*, lang ifr, nnb jibC9 rbt)tcnf&vt tn'W, Qkichlaufenbe ^o^lungeti in fid? bait^/ alfo b o p p e l r ö ^n g if»

BIFLORui^ A, UM, L., <\$tveyblnmig, toa\$ zwen ?lumen on feiner @pi\$e trägt, fct) ed nun bet Stengel (*caulis biflorus*), tt>ie an VIOLA *biflora*; — o&ec Dec 35fumen<iel f t»ie «n LINNAEA borealis, GERANIUM *Roberlianum*. (\$?ef)me fcmfcn fid) eittett. *Pe.dunculus biflorus* a|i Hnm blltd) itofy Ottt tvadrcne 25lumcnf?iele Qebilbttcti, nnb babntd) zwens blnmis genrfeenen Sblumttifiitl); obtv bit te lumenſcheide {*Spatha biflora*}, J. SB. NARCISSU\* *biflorus* obtt bai \$ltyt(i)tn (*Spicula* f, *Valvu a biflora*) j. 2J. ~~A~~ A aquatic a, two itt>tt> %liimd)en in tinttn fiddjt fsh. ~~BIFOLIATUS, was zwen Blättchen hat.~~

**BIFORUS** nennt man bai f tt>a£ flow Höhlungen obet Söccer bat.

BI\*HO»S, nad> ©ecanbotlc, toa\$ auf bryden Slacken eined %lattc\$ ioadbft, cm ©c^cnfafee tott epiphy llus u||b *hypophyllus?* vorzüglich von chmaroßerpflanzen.

#### BIFURCATIO, f. *Dichotomia\**

**BIFURCATUS**, n?af fid> tn jmep Slefle ffreift / die von bemfc!6en ^Juncte autfflebcn; Spnonpm mit <// chotomus y nur Dap Diefc0 mcifleni tvie&ett)ot)lt, unb in einen me&t fpifitgen 3BinW gct&etlf bejeid)ne^

BiGEMtNATus y L., tin jufammcnflefe^ 95latt met stoent Qabtlfrmigen Wattfücht, bet an jebtv fcmtz <Spilen IY\*>t) flatter fragt/ |. S- MIMOSA *bigemina*. Cleicftbeutenbmit JDOPPCIt^t» cy \$ i^ 11 g ober:

**BIGEMINUS**, A, UM, bWPilt f {U Jir?CDCO stehend.

BUIIUtrb Mrffefct aber unter /lores bigemini vier SSlumen an einem SBlumenfiele, bit ju sn>ep unb jweo stehe.

BUUGUS, b oppelt gepaart gefiebert, n>rb ton einem gefteberten Slatte (*folium pin-natum*) flcbrauc&t, tt>enn eg nur j>eo \$aare ein\* onber^eflcnubecjlebenbe SSIättcfsten ^at, j> 95. Vicia Faba| OROBUS vernus.

BILABIATUS, L., 3 w e y 11 p p i 9 / <sub>tf</sub> n\*nnt man etnen ifelc^/ obec eine SBlumcnfronc / offtc ein 9\*ccta\* rium / ft>enn fie cinbfattrig, unb am @\*Iunbe in jtoeo einanbec gegcnübergejleate €inf\*nttte get&cilt ftnb, wel\* e oft wteber gcjabnt obec eingefc^nUten, unb fo \*gelagert (tnb / bag bee elne ogen / bee anbere unten ju leben fommt\* ©o tfl J. ». CaZya: *bilabiatus* an GLYCYRRHIZA, *Corolla bilabialis* an LAMIUM o *Cucullus bilabiatus* an HELLEBORUS, *Stiff ma bilabiatum* an IRIS.

BILAMELLATUS, ^wc^p|attiQ f toa& aug j<sup>wen</sup>  
flatten Uftfyt, i. S5. Stiff ma bilamellatum ~~an~~  
KAEBCPFERIA.

BILATCRALES RADICULAE, ^ TP e 3? fe't t'I g e |X> Ut!  
3 el ^ en / bie mit i^cen @pigen nach ben 6ei)ben ges  
rabe entdegensefegten ®tittn bti @amen & àUnisses  
jeric&tet (tnb / n>te an MENYANTHES.

BILOBUS, L., s i r e j r l a p p i g, n>ad au< j<sup>wen</sup>  
gappen be|tc()t/ fe> e£ Blumenfltel, n>ie an SILENE  
orchidea, GERANIUM striatum ; ober 2\$latt/ tt)e an  
SALISBURIA adiantifolia, obet 0C^dtc^en (*Sili-cula biloba*), tt>ie an Biscutella. 3im>eilen iff ed  
aucft ton ©amen gebraucft/ fijnonpm mtt Dicoty-ledon. Sie SRanber bee jappen obec (Sinfc&nitte finb &tec conbey / unb fie finb buccft feinen 5ffitnfel, fonbeni t>ielme^c butcfy eine nad) innen fic& ernoeiternbt 95ucft getcennt. Q.Lobatus.

BILOGULARIS, L., 3toepfac&eri'g, toad in feu  
nem 3nneren itpeo &'?<\$ cine ©c&eibetpanb ton ~~eins~~

anber gefcennfe J^oblen &at; fo (jat man *tint 4 nth era bilocularis* ah.ben SKoffeln / £>rd)ifcen; eine Uacc a *bilocularis* an SOLANUM *sodomacum*; eine *Capsula bilocularis* an Veronica, Syringa; eW *Drupa bitocularis* an OLEA europaea; *tin Fo\** *Hum biloculare*, n?enn ein Itintcnfprmr:^c^, *inncw toenbid t)ot)U# %latt Durdc cine &d)Cibctoanb Oer Undt* nacht in jt>eo §åd)er getbeilt iff/'fine an LOBELIA /9or^ manna ; *biloculare Legumen*, tt>Ctltl die j)u^fe t)er Sånge nad^ tnicedy tine 6d>eit>cmanD (tx>c(d>a afer ton t)en mit i(>ren ^anten nach einnoärtf sebogenen happen Dec ^ülfen *Qtbilbct tuirD*) in jtt?ep S'a\*cr getftedt iff/ J. S3<sup>x</sup> am Astragalus.

BIM us gleid)beDeutcn& mif 6 / en 7115.

BINATO-DICITATUM, f. *BinaLum.*

BIKATO-PINNATUM , \$XX> t ? \$ &fy I iQ ', Qtfi tt b e r t / menn au^ Oer (frpige Oed SBlattfltele^ jmcp gefteDerte S3lattc^en entsprin<jcn / 5. fd. In ex circinali\$.

BINATUS , f. *Bin u s.*

BINERVIUS, iroeytippiQr toai \$rocP Stippcn &af\$ \$. 9. folia binervia an Den gaubmoofen/ n>o aber Oiese jmcp SRippen tneiffend fo furj fint>/ Oag fie Dem blogen Sluge rippenlo^ erfdd>emcn.

BINIFLORUS, |va£ jrocP Did^t neben einanber stes flen&e Slumen ^at/ j. 25. ONONIS geminala.

BINUS, L., BINATUS, L., 3toey3i&li g, was an einem unt> Demselben Orte su \$teren debt; Linné nennt ein gestoeyree Blatr (*folium binatum*) Datjenige gefinijerte Slate, an n>el\*em \$mei> flatter »bne Dertvad^fen ju feon / mit ibrer SBafS jufanunen auf Dec 6pr§e eiwed SBlatttieletf (Jeben; j. 85- VISCUM album, HYMENAEA Courbaril. „©inD Die bei)Dcn Blättrchen eines amenten Blattes . saat Milldenow. abfoärtf in borijontalcc SRichtung aeboflen / fo nennt man Dte§ ein gebunbenea Blatt (*JoHum conjugatum*).'' SSe9 ton meisan iji folium geminatum

tint) *binatum mit conjugatum* gleichbedeutend, fo We *flores bini* fynonpm intt<sup>^</sup><sup>^</sup>cs *gemini* finb\* Siha/i<sup>r</sup> *pedunculi* finb an ben t'tfprarien. fir'naii Kami an IASMINUM officinale. CLEMATIS Vitalba; *Binae laciniae calycis* an SALVIAJ *binata* Semi\* na an ben Umbettiferem

BIPALEACEUS Kid?-/- f. *hi glum is.*

BIPARTIBILIS, *toai fid*) letct;r in jwep 2l>eile thtli Cen lagt<sub>f</sub> wie ber §rud>tfnoten an bin l<sup>spocynneen</sup>, tie (gamen ber Umbelliferae.

BIPARTITO-LOBATUS, 3 TO e? t & e i i i g l a p p i g, toenn bte €nfd}nitte big über bie 55J?itfe geften, ges toölbte SKanber baben / unb ber 5lu^fc^nite eiñe Ducht, feinen ftumpfen 5BinfcI btfbet

BIPARTITVS, L., ^trey tl> éltl'g / f. *Partitus\** *Bipartitus Corymbus* iff ein 33o(benf?rau\$/ ber auf ei:um SBIumenfftele f?etf •, welcfter (id!) in jn>eo gletd) lange \* 2/efie t&eilf, 5, 55. an Mtspn.us Pyracantha. 3un>ctlcn, jebocb fe&ler&aft/ ift ci ft)non|)jn mit **bifidu**\*.

BIPERFORATUS, L., *toai an ber <5pt|e unb an der Basis* ein foc&, ober an biefer ober jener jtoeo Söccer bat.

BIPETAL.US , f. *Dipetalus.*

BIPINNATIFIDUS, L., b o p p c l t flcfi'ebert g e f4> 11131 > n>enn an einem gefiebert flefd)li\$ee< iaubt ober Slatte bie gfnfdjniftt wieber aeftebert je^ ftf)li|t flñb# ttJiean OSMUWDA *cinnamomea*, on ACHILLEA *tanacetifolia*. €me bipinnatifida Frons rjl an IUNGERMANNIA multifida. @» a. *Pinnato-pinnat ifidus.*

BIPINNATUS, L., ift 'ein @tenflel (*Caulis lipinnatus*), beffen gcfieberee Sleffe jn>et>rdbig gefleOt finb; unb ein TS>|att' tfi e\$, wenn ber demeinfcbafliche SSIattfiel iu btqbm eeiten mit einer unbefimmten ®7ende t>on Slattftielen befel^t iff, beren jeber ein m f eberteS 35(a(t bilbet, bie aber in émer gbtne liegcn, ] t S3< MIMOSA *Farnesiana*, unb ATHAMAMA Li'6a-

*notis.* — *Bipinnata frons*, fyat gang bit ©eflaft terti boppelt geficberen %lattt\$, §. \$. an CARYOTA, ASPIDIUM fragile. (Sin boppeltgeft'ebertertfloos\* tfengel (*Surculus bipinnatus*) hat ganj bie (Se\* ftatt cities gefjebqffen, nur bag feineSlefie mieber ebeti fo regdmægtg alg bie be^ ^auptftengd^ gefpaUen ftnb; I\* 95\* an HYPNDM parietum. vSononom mtt rf<-  
plicato- *pinnatus*.

BipuLviNATps, A, UM, f, *Pulvinatus*.

BIPYREN4, *follDipyrena* heißen.

**BIROSTRATUS**

©c^nabl ^ t, nie bie ©amen mebrerer ©räfer, mó; gen fie nun ton 2lrfatigf<sup>lu</sup>, obec t>on bcr ge^eilten 25afi^ bee ©rijfel fterfommen.

BIRUPTILIS, £, f\* *Ruptlis*.

Bis BIPIDVS, b oppelt get&eilt, nenntmati einen Stengel/ ber 5meptf)eilig/ unb an ben @»iget loieber jmeo^eilig til; er untefcfc&eibel( fi\* t>on bent tabtlfotrnform *babwvd*), ba§ er nuc jwpmal *getheit* ist, \$• ^\* LYCOPodium bifidum.

JhsERIALis, \$toeyi^eitu'g; inbejfen M es noch einifle eigene SSebeutungen; fo ftnb bie Slåttdjen (/ amellae) an ben ©eftwamfeyen smct)cctf>rg, menu ein (anaed unb ein furge^ 33fattd)en mit einanber abt lOCfflt, j. 95. AGARICUS ventrificatus; Semina biserialia finb an bit Ittoe, am ASTRAGALUS ; Sort biseriallest boppelreifttg / toenn bie ©amenfapfeln in in>ep obec me&ceten bicfrt bep einanbec fieftenben Jinieti qucr in>if4ei>ben Quecabecn fanlaufn/ j . g j , an DAMAA, ANG|oPTf(iis,PoLYponium vutgare\* 9Ran unterfdjei; bit genau bie boppelrcibtgtc <?>Sufd>cri t>on ben mni> lichen ^oppelrei&igeH ^ i u f ^ e n (<Sor/ subrotundi biserialcs) t>on ben Dorigeu unb 6on ben linienformii gen boppelrci&igeiu<&auf\*eiivor/ Zineart-s 6iw-r&rles). ©ie runben boppelreffiflen ^äufeften bilbett tueft SRe&en t>on einselnen'6am\*nfapfetn# fonbem toon

**ganzen** runbitit ipäufAen, unD ebenfo Die limenffirfiijjiejjiton Itmcnfdrinigcn £äufd)en.

**BISERRATUS**, f *Duplicalo-serratus*.

Bistrus, j we y b orfli g, j. ®. Die 3ntf>cra an INULA, Die £)rufe an LAURUS- ~

**BISEXUALIS**, eine 9>flanje Die v\*\*V @efcfdec&tet SUf)Id) bat; ein 31»itter, roenn e£ Don einet 5:JuniC/ eine ein & áufige ^Pflanje / tvenn e^ OoneV ncr ^panje übcrpaupt gebräud)t ftirD\* ,

**BISI'ERMUS** (Oil DISPERMUS )Ci§CtT.

**BITERNATUS**, L., b O p p e l t i> Ve ? t,&%> 11\$, wenn tin Drei)thetlider S(atfflie( an jcDer @pige dren Blätter fat} J. 3&# EPIMBDIUM alpinum. (g# **D u - p I ic alo - I cm a turn.**

**BIVALVIS**, L., zwey Flappig, was aus zwey Xlappen bcftbt; fobabennureumi *Calyx bivalvis* ali Oluma bco twlfn (Srafcrn, J.S. Triticum; *Capsula hivalvis* ;. S3. an Scrophularia unD Digitalis; *Corolla hivaUis M gluma*, \$t>Ct>ChCt, bet) t>OGt @räfern/ J.5\$. Tiilicum; *Indusium bivalve*, tint Sccfc Die bederf&rm9 t|}/ unD (ld> in jmco ^appett t5eilt/ J. 95. am Hymenophyllum; *Spatha hi\* valvis*, Die au^ jroeo gegenitberiebenDen Slaftern 6e^ f?cf>t, tote an Allium. ^afi ade Siliculae, vSiliquae unD Legumina ftnD ffttet^lappig.

**BIVASCULAHES**, nact) *Hermann bit* je&nte ^(affe ftn@offeme^, tvel&e Die Wlan&en mit jmet) Jtapfeln (ober mit Jt>ei> fjom^ oDer napff&rmigen S^cbern nat^ cini<)en SZeucren) tntfyalu ,

**BLAST EM ATA, ZAmE**, Die Der SBurjeljtoct hers vortreibt.

**BLASTOCARPUS**, Kic&arb/ ein Smbroo/ Det in setz ner grucfct()üHe feimt.

**BLAsxorHonus?1(c** m^> Ki#\*rb jener J^eil eis nes (Embroo mit gtogem 5Burjeldjcn, n>elc^er Dett jtcim tragt. (fi&rtnet ncnnnt Dieg Vitellus.

**BLAST us, tjl nac& Kic^airb** jener S^ett eine^ Ems

**br̄yo** mtt arogem sjjSrjeicftn / toelc&ec \*ft\* bur\* bai ffelmen entmicfett. € attein ill feimunflgfä&te, unb Wlbt etnen fleinen toaljenförmiflen \$rpec (bag fleinerc \*on ben 6e»ben Gorpcerfren, tooraug ber Embryo endorhizus raacroporus -beſte&t») b« tn ftfn **er Mittte** unb burj\* ben ^gpo6laf\*u\$ an bcm gnbo^perm **beſeftigt** iff\* @eine bepbeu Snben (tub fret).

BLEPHARAE, nenne £ m H t e aBtmpem **oder Zahne**  
**des 3)aules** an ber Sudjfe bee gjfoofe.

**Bombycinus**, feibenartifl, bem ©effi^le  
nach.

BOREALE CUMA, im n8rbli\*en Europa »on Sapp;  
lanb big **asig.**

BOTRYS, f. *Racemus*.

BRACHIALIS = *ulnaris* = 24 **Zoll.**

BnACHIATUS, L., <trmf 6rmi's (na\* **Wilder**  
novo f\|nont)\n mit (Zecu55a/u5), tvenn bit übet  
einaber fiefyenbe \$aare geaenufer?e^enber 2lcle **ff**  
iDe^felmete burc^freu^en unter rec^ten SBtnfeln/ j. 25.  
RHINANTHUS *Crisia gain*, gbenfo finb tyc 2(e?e in  
einer *Panicula Irachiata*. £>ecanbolle ntmmmt  
eg **far** fl(ei\*bebeutenb m\t *divariaatus*. **Bulliard**  
unterfdjeibet mit SKedjt ben armfSnm'gcn **Sten** g,  
beffen Slefie / tote bte Slme am 3Renf\$eu dtfitUt finb  
.(*Oanlis brachiaius*) oon bem freujtreife **armförmis**  
gen **Ofengel** (*Caulis decussatum brachiatus*).

BRAGHIUM = *ulna* = 24 £ott.

BRACHYPODUS Ki^Arb, ein Smbr^o beffen **Wür**  
ietcfsten furj iff/ im ©e^enfa&e ton *radiculosus*.

BRACTEA, L., *ftebenblatt*, (6eſfer PieOeic^t  
Sferfbhatt) nenht Jiinnejcne ©lätter/ bte (eoobec  
|totfc^en ben Slumen jte&en unb feſtr oft eine ton ben  
ubrigen Slättern terf^iebene ©eftalt, @u6ffan\$ unb  
Sarbe baben. iDecanbolle nimmt biefeg SEBaf bepläu^  
fig a\xd) i\_n biefem 6inne, nennt abet bai £)ecfblatt,  
nenn eg n^eber in \$onn nod) in fiavbt abmeid)t/ F o-  
liumfloralc, unb (aſt "nur jene S)edb!after a(g

fcafjre ©etfbflätter *Qttttn*, toefcbe an *htm* SBlumenfftefe ober an fefnrc \$afW fifcen; btejeniflen/ tt?eld>e on ein> jlnen %lumcnfiM<t)m bt& flemeinfraftlic&en SBlumen\* fitelc\$ ftfccn, ncnnter {Decfblfotfcen (&r a c \* e o \* a e). *Bractae florales* nennen einigeJene bleibenben ©etfbldtter, mld)t nad) bet Sefrucfctffid btt S5tumm tmmer grôger merben / Die ©amen beef en unb fc^ufeen, unb mie biefen eine étgene ^ucfte (Conus, Galbuius, lulus) bili>en« Q5cofpfe(e t>on einém ©erfbâatte flnb an CORYDALIS bulboSQy LAVANDULA, SALVIA. ?IJ?an lönnte fie ôftcr^ mit bent tfelcfye t>ermed)feln; biefer melff after mtifttni btt) reifen ©dmen^ ftafyrenb bit SerfMâttcr faff immer grün bletbem

BRACTEALIS, nennt man einen Sfumenffcet, bet mi( bern 3>ecfbiatec t>ertDadE)fen ffl/ §. 95\* an bee JSLmbe.

BRACTEATUS, L., *bedbl&ttvig*, tt>a\$ mit tit rtem 2>ecf6lateeberfefteniff/ tt>iePedunculus hracteat us an SILENE nulans; Racemus an CONVAL-tARiA majalis; Spica an LAYANDULA Stocckas; VerticHlus an NEPETA Cataria, MARHUBIUM. Flos bractatus iff Ux) B&Utarb tint Slume obne SBlumenfrone unb ^eld) / bie baftut ein 2>ec!6(att ober meftrere 2>etfbatter erbalten bat ^ bie bie 3\*u9una\$or\* gane emb&Qen. Semina bracieala finb nic^t ganj DoDfommen runbe febr bfunne blattförmige ©amen/ bie fid) ictcfyt bie^en (affen, n>ie an ber Culpe..

liRACTEiF^itus, f« *Br acteatus*\*

BRACTEIFORMIS, einem SeiJblatte abntid), tt>ie finige Softer / bie man folia bracieiformia ntnnt.

BRACTEOLA *lint*, fcedblqfttd>tn, gefielte Titdblafttv, bit in gocin unb @t5ge Don ben übri^n t>erfcf)ieben finb.

BREVIS , fur j , tta< fürjet iff aW abnlicbe\$f)an^ Sen / ober abnftcbe ^ffanjentbeile; fo bat man j. S3\* *Filamenta brevia*, bit fucjet jtnb aW bie SBlumetu {rone an SYMPHYTUM; einen Pedunculus brevis an *Qyzncu\$ robur*, im ©esenfa^e t>on *Quercus*

*pedunculata*; einen *Petiolus brevis*, btt f ürjec iff alſ bag Slatt, nad) anberen bödjlenS ben &iertett Sbeif beffelben betraflenb/ an QUERCUS *pedunculata* tm (Segenfage Don QUERCUS *robur*; *Bami breves* foerben in Sejug^uf Den ©tengel / menn fie fürjer aK Refer fift, mirj genannf/ wie 5er Oriffel (*brew's Stylus*) tnth iff/ WK» w furjer if? a(^ We ©raub defäge. ©er gompara(tt) unt> 6uper(atto i(I für fts> verj ändlich.

BRUMALIS, E, L,, f *hyemalis*.

BRUNNEUS, t̄eefbraun/ if? ein reined fatte< SBraun / bad ftc^ t̄em 3c^n>arj näberf.

BULBICEFS, 5Tt>tebeIf 5pfig/ toenn ber \$iiiv Ulftoct, msm SScrbectung t̄er flatter an U)ter S a ^ einer Swiebei å&nlicft n>irt/ unb au^ bet \$aftf biefer 3n>iebel 9BurjeI\*en freibt; j. 95. PHLEUM *nodosum*, A VENA *bulbosa*, unb atfe fogenannten *Bulbosae* uns ter ben ©rafen, bte auf trocfetKm leic^tem Boden zwiebelföpfig werden.

BULBIFER, BULBIGER, S t O I I e n Obtt Zwies bel r r a g e n b nennt man einen 6tengel, tenner in ben Slattminfeln ^noUen ober Swiebeln trågt, j. B. LILIUM *bulbiferum*, DENTARIA *bulbifera*, auch an BRYUM *annotinurn* btt Surculus. Sine Sapfel i(I smiebeltradeb/ toenn fid> bie ifapfdn, fiatt ©amen ju tninge/ in groiebeln wtoanbeln, n>ie an ALLIUAC SAorodoprasum. *Bulbifera monocoyledonea*, wentl <& ber Smbroo juerfi in ein fleifc&igetf ©tabc^en fter^ längert, bann fein äuſerf{e^ Snbe P\* in ein {ftiebel; artiges ^ügelben t̄erOicft, roorau\* bann enblicft ein Blätten enfttebt/ tt)ie an PHOENIX, BULBINE,

BULBIPOAMIS, jtDie be Ifdr.m tfl/ J. 95. Perichaelium *bulbiforme* an Fix MARIA,

BULBILLVS, nenne ©ecanboUe jene j>i>Martifleit tfnollen (bte man gewo&nlid) *Bulbi* nenne) n>el\*e fi\* ta ben Slattmmfeln einifler 5Pflan?en/ \$ 95. an LILIUM *lulbfferum*, an ber \$afW ber 2>otben manner Fauð:

avton, unb an btn SEBurseltafern emffler ©ajrtfraelaett/g. **S5** SAXIFRAGA. granulata befinben, unb bie, totnn man ffe abnirttmt, fortmacftfen\* ©• Bacillus. Hint nennt Die jwiebelartigen \*)ropaflined mit angebrüdten £duten Bullb ill us.

BULBOGEMMI, £mE, iff ein jAiebetartiger **Vros** pago, mit bacftjiaelformiam (obec feineu?) tauten.

BULBOSAE, eine natürlcſte ^amilie bee **Pflanzen** ben ben dltren SSotanifern; StDicbcIgetoacfe fe.

BULBOSUS, zvoiebelig, zroi'ebelartig, matt bat einen C and ex intermedins bulbosus, uact) Q?ifll>cnotD/ bee gleic()bebeutnb ill mit 1>ulbiceps; linen p\*7us hulbosus, menn bad ^aar an fdnei\* Safid ^in ^ugelcften bilbet/j. 95. CENTAUREA /acca, ECHIUM ; tinen jtf>tebelartigen 6ttunf, Stipes bulbosus , an ben 2fmmaniren. 2)te Aa<fc r bulbosa iff nichts ans beted aid eine Swiebel\*

BQLBO-TUBER, iff nacf) ^atoler ein **fugeliger** \$!|oUm, ber ftd^ atif bem £alfe ber iPffan;e befinbtt, unb£fftrd/ fo mie ber ©cbilb bee Srcielb, ton bee Safid bee flätter bebecft iff, j. 95. am Qaftane.

BULBULUS, B^ut^TOt c b e l, X i n b e l ( Cayeu) nennt man jene Heine ©peoffen obee 3n>iebeln/ ftelc&e ftcb in ben SQinfein bee augeeen ©cfeuppen bzt 3n>iebeln beftnbem Hint bejeic^net bamit bie fnotten' aetigen ^eopagined an ben ©eiten bee aSuejEL **Tours** neforr nannfe ite Adnascns, 7id>arb Adnatum, **Dos** boene Nucleus.

BULBUS, L., 3 t r i e 5 c l / iff nac^ £i;me' ein auf bee SCBuejel aufji&enbed Hyberncaculum; nach **Will**, bmoxv tin Peifct)iger, balb aud Slättern ~~zusammen~~ sefegtee/ balb btc^tee/ mebr obee minber timber bicfee ft&rper / bee mit einem in 3tuctftcf)t feinee ©röge fletnen CSurjelffocfe feff jußammengctx)ad)fert iff, tx>etd>cr legtere balb an bee 93aftd, balb abtt and) in bee 3Ritte ftgt, unb fonad) balb and bee 3)?itte / balb aud bee Safid treibt <5ie befle^t aud einem feffen fafttoUen jtörper,

auf ben ©c&uppen/ au\$ *bm* eiflentlic&en 3toiebctblattern,  
*ani bet* 28ursel, unb aug bem 2lnfange bc\$ ©cbafte\*.  
©ie iff, tDie jbecanfcolle bemerf t / eine 91rt Don *Ay-lernaculum* ober ifrie& (eine 2lrt Don \$no\$pe) / *bit*  
auf bent Jjalfc aber auf einem fel>r furjen fcfcitbenar^  
tiden 6forfe aufigt / bait) unter, *balb* über ber grfce  
(mofl auch an (^tcnaelt tit *btn* S3tatttt>infein, unb *ftatt*  
*bet* ©amen in ben ©amenfapfd) ift, unb Me entme^  
Jer mit ^aufert/ mie an *btt gemeinen* gtmébel/ ober  
mit (Scfyuppett/ ivie an bcr £ih'e befletbet *ifi*. ©fe  
unterfcfcibet fid) Don ber jfrogpe baburcb / *ba\$* an bt<\*  
fer bie ©d}uppcn Don furjer ©aucr ffnb / tvåbrcnb jte  
an ber 3tx>ebel *mnoxgftmi* fo Ian^e bauern, *ali* fi^  
fe!6(l trcibt; (unb bag fie no\* bep iftrem *ieben*, *iM*|  
åbnlid)e hårper ju crjeugett im ©tanbe ifl), & mepnt  
baber/ man fönne etne ?n>iebc( einen immerttäbrenben  
Xcieb nennen. ©• aufy *Bulbillus*. 2)te tfnoOen an  
ben Orc^iben nennt man unfd?tflicf) *Bulbus*, fo n>ie  
bie SSetrþtdung am ©trunfe *bt\)* ben 9(mmanign. Da^  
hfot *IQeauvoie* nennt auc^ berfömmilt'cb bie *Wctbitfung*  
bed palmed jtvisfjen bee 2)afi^ beffelben unt ben SBur;  
geln *Eullus*. ©artner be^eiebnet barilie jeben Pro-  
pag-o *hulbiformis*.

BULLATUS, L., feltener BULI.OSUS, A, UM,  
**Blasig**, nennt man bie#£>berfla be eine\* 93(atte#s  
n>enn ite umifcben *bm* SKippen in blafenförmie (Erba^  
zjbeubeiten aufsctriaben i(l, bie Die! b ber emporf?eigen  
als bie Sftppen felbst/ unb unten concad ffnb/ g. 93.  
**SALVIA hullala**, OCYMUM *builalum*. *Semina*  
*bulata* ffnb auf bee einen ©cite flacf), auf ber anberen  
cotter, trie *btt* ctnigen ©ternpflansen.

**Byssaceus** j b y f f u a a r t i ' g , #nennt man eine **St^**  
fcrpflanjc, bie fein rooUicj, unb bem 3abenfcbimme( (JBy«u5) åbnli\* iff/ j. ». bet) mebreren 2(rten oon  
Agaricus. *Byssacca v ol v a* eine fcfcytmmclartigc **aus**  
feien jartcn Safern beffebenbe **SCBuff**

BYSSI, e ^ i m m e l r @ct^ci\*fe obne £aub, **aus**

<sup>^</sup>darf&rmlgltt obet borfliflen me&r ober minbtt ttäffert\*  
gen *Sabcn*, bie tt>abrfc&einlicf> auf ibrer Überfläche  
<Samen traan. <Eine gamtlie beg **Batfb.**

## a

CACUMEN, gleicftbebeutenb tnit *Apex*\* ber **Eis**  
*btpnct* einer \$flanje ober einet Organetf/ bet bee  
S3aRg gegenüber f?ef> **Sac**> vb^ne aDe. ©pigen ju\*  
famtnengenommen.

CAD.WERINUS, mad nadft 9Jafe riccfet.

CAOUCUS, I.,, t i n f l l i g , voai frū^er abfaKt  
^K ba^enige/ nut bent if t>orfommt. Ein *Calyx*  
*yaducus* faff/. tt>ie am Vftofcne, fru^er ab / al^ bie  
Slumenfcone, bte an *Helianthemum caduca* i(l, tt)Cit  
fie boc ben übrigen Sbetlen ber 9lumt abfaDt Sin  
*Annulus caducus* an einem ^ilje faßt tor (Snttoicfr  
lung bed ^tlje^ ab/ note eine *Volva caduca* tot  
bettt **XjIL Bracteae** unb *Stipulae caducae*  
fallen/ n>ie an ben ^afelnüffen unb SBetbeit/ lange  
tor ben SMattern ab/ unb btefe felbfi flnb *Folia ca-  
duca*, feenn'fte lange tor bent ^erbfie# nod) tm **hals**  
Ben ©ommer abfafttot/ j. 35\* an *DAPHNE mezereum*  
PRUNUSPadus. *QitSpatka* an mefcrerenSnjicbeln  
it>te bie ^üUe (/neoZu<^iim) an mebreren Umbel\*  
liferis faUt tor ber Sntticfeiung ber Slumen ab / tvit  
bie *Palea* an Tagetes, unb ber *Pappus*, at  
mehreren @i)ngeneffien. 2)ecanboQe erf (art/ ju 'affl  
gemein # *caducus ali ttmti, bai* in ^oige ber Slblö;  
funs jene^ OlieDe^/ moburcf) t\$ mit einem atdbert  
&rgane terbunben i(l/ abfaQt/ trie j. S. bie 95wRer  
an unferen gaub^Aiern. Vffanjen / bie balb nacl) t^rec  
Snttvtf fe(und ju @runbe geben/ trie mebrere **Pilze**,  
fimb aucf; *Caducae*^ unb etne Samilie bet) **Batsch.**

GAEUULEO-PUUPUREUS tft ein 'bunfele^ **Violet.**

CAERULESCENS, tu'^ Slaue jiebenb.

CAEUUL£US, blau überftaupt/ genauer ein reined

©fail/ n>ie t£ bai tytisma batbietbtt **Mb bit** VERO-NICA *Chamaedrys*. SBep BuHiarb ifl e\$ fpnonpro mit *cyaneus*. 23e& 23arf4> birtimelblau, bergblau.

GAESIUS> b l a f b l a u , ein blaſietf, in' ^ Sraue Steftenbe \$lau. S5eo eintgen auch) ein blaſlto met§Jtd)C^ o^ec dfauItdKg ©rūn, unt) fpnonpin mU *glaucus*.

CAESPITOSUS , f# *Cespitosus*.

CALAMUS, *Qdyhaftfyalm*, i(l em einfacier ft ant a: tiger fyalm ofync ftnoten f bet m^r ober mtnOef cōbrīt ifl/ fcifie an ben Bīnfen, 6ebr oft fpnomjm mit *Culmus*.

CALATHIFORMIS @ali'6b. / baſſtu&tlf&vml\$, unt) boſf ntit geraDem Oianbc, wee Da^ 2rtufgef{d}irr; Da^ t)te SnglanDer t o ^ / nennen\* S^ a^ fpnottmn mitt^ eJ mis p *haericus*.

CAICAR, © p o r n , tine Sire t>on £ont, obec facff8cml8er ofcer fegeſſSrm̄ger r8^c:g^r SSerlangfrung/ gegen ben \${ismenfiie( bin; ein s^ ^nlid) fabler H̄dcer , ben balb bte Slumenfrone bilbct, toti an AQUILEGIA , LIN ARIA; balb bee j?c(d>, n>^ an bee Balsamine ; balb Da3 ^etiQonim f mfe an bcr OR-CHIS. 3an>et(en befinbet ftct) in ber 6prge ber inneren i?5i)lHn9 eine ©rūft, bie ^onig ober SReftar abfonbm; jumeilen m̄rb Diefer £ontig aber aud) anber^mo a^e^ fonberf/ unt> flie^t bann in bai fyotn. ©> Nectarot he ea<

CALCARATUS , gefp o r n t, tvai mit cinem &pot\* fe berfeben iff; J. 35. *calcaralus Calyx*, anTROPAEOLUM ; *calcaralum Neclarium* an VALERIANA. Synonym mit *Corniculatus*.

CALCAREAE, ^pflanjen/ bee nut auf ^aiffelfen obec Saltbaben (solum cateareum) Qebcii>ea f j\* 35. LICHEN *calcaneus*.

CH'CIUI, taltwrigf ein matte\* undurchſichs tiges 9Beigw 8Ber foDte glauben/ Oag ein Schuh, calceus in ber SSotanif Kalfweiß heißt?

CALDARIUM, warines haus, worin die Tems

peratur ffetg \* 9 bi\$ i5° St. tfl / für bte ^flanjen au\*  
tern ági)pttfcf)en unb. inbifc&en flima.

CALEFACIENS, *toai* auf ber gunge £tfce erregt.

GALEVOARIUM FLORAE, iff *bai* Seqeidjnig bee  
SJJonate, in tt>elcfoen in getmfTen gánbern ?>flan\$en an;  
fangen ju treiben, ju blü&cn, i^re grücfte \$ur SReifc )u  
bnn^cn, unb *it)vt* flaſter fallen ju laffen.

CALIDUS, to arm. *Calidac Plantae^ tyflantfn*  
a|x& ()tiftat *ianbttn*, *bit* naſc) bent £f)ecrometer, beſſett  
©iebepunct 100° unb ©efrierpunct o i(l/i>en40°^Bar^  
me tJcrtragen, unb *bet)* menig ©aDen unter o ju  
©runbe *Qtfyn*. *Calidum Clima*, jtvifeſten bem 35°  
unb "ben QBenbefreifen/ mit Slu^fc^luffe ber bſfreien  
uncte.

CALLOSUS, f4 **wieſig**, was mit 6cfyn>ielen *bi\$*  
feſt / ober felbfl fc^miedd ill. ©0 nannte *tinne'* im  
erflen Stinne bie flaſter ton BRYONIA aZta unb *dioica*  
fcf)n?ielig (*callosa*), unb Cournefort bie ©amen be^  
eigentlicfyen SlpfelS *Semina callosa*. (ginigenennen  
Die mit (Ktt)ieligen Jt6rnern unb faferigem Sleifc^e t>er;  
fe^ene 55eere an SAPOTA einc *Bacc a callosa*.

CALLUS, *Qd)voitlt*, cine er^artete *bibbtt SBIM*  
tertc, n>ie bie ©cftmtelfn an ben ^dnben Don geuten  
bie (!arf arbctten. 2)aber *calldsus*, fc^roiehg, t>ot  
Sbetlen, bie gárter unb {after aid gen^obnlid) / unb  
übrigen6 t>erfcſtieben gebilftet ftnb , g. %>. bie ©c^tvtcle  
*an bet* §afrne t>on DOLICHOS.

CALOPODIUM Kunipl?/ f. *Spalha*.

CALPA, ijt beo Reefer bag fajl fiftcenbe *Sporans*  
gium ber SKoofe.

CALYCATUS, nennt BuQiarb eine \$rucf)t, ~~§~~  
emern bleibenben «cl\* e umb&ilt tp/ unb g e b ^  
aud> &on einer SBIume/ bie einen delef M (im ©egen  
ſaſe !>on Acalyculatus) aber feine ^lumeufrone.

CALYCFILORUS, mm bie SSlumenfrone auf bem  
tfeldje fiſt. ©ecanb. SRad) anberen, 95lumen oftne  
SSlamenfrone/ mit blofiem 5?elc^e/ tpie an ELAEAGNUS.

CALYCIFORMIS, *toai* einem field) a&nlid) **iji**, *teld>artig*. <Sb nennt man bie Jjüffe an HEPJL-TICA *triloha tin Involucrurn calyciforme*.

CALYCINALIS, geftoßnKcfyet: CALYCINUS, n>a\$ einen deleft gat/ ober Die Sonfiffeni beffelben beffct/ Ober jum jfelfcfje gcl)6rtober auf bemfelben fr(jt, ober benfelben bilbet/ *tOit bag Folium calycinum* an ten SRoofin / bie *Glum a calycina; calycima Bacca ifl* entmeber cine 93ccre bie auf bem fleifcOtg sen>orbenen Jtelc^e otec ©c^uppen cnffffef>t, n?te an BLITUM, IUNITERUS, ober eine torn *fieldn gefrónte SSeere/ n>ie ROSA*, CRATA EG US. *ILinne* nannte Blus menfroncn, an tx>eld)cn bee ^elcf) fe^It/ unb nur grüns licf)c 95lumen6lätter ba ftnb/ rote an £auru^, einei *Corolla calycina*. £>ic metftén, beuten bantit eine einem ^elc^e af>nlid>e Slumenfrone an. **K Übung** bei ieic^net abec mit *Corolla calycina* jene Blumenfrone, bie nuc in *ifyvtm* Untert&eife mit bem Relche fcereinf iff/ unb au^ bem j?el\$e ju entfpringen scheint, tote an» PRUNus, RIBES. *Calycinales gldhdulac* als SRectatfen, finb an BICNONIA radicans. *Calycina phylla* f. *Phyfla*. *Calycinales spinac* finb an TRAPA.

GALYCOSTF.MON, *totnn* bie ©taubgefaße auf bent ^eld)e ftgen. 35d) <Blebitf4> unb **Nönd** sind *Calycoslemon* unb *Calycostemonis* Classen.

CALYCULATUS, *get eld) t, ifl<sub>f</sub> toenn t& ton* Calyx unb Anthodlurn Qebraud)t toivb f Qleid)bct\*cw, tent) mi ta u c ^ u j, unb beaeidjnet einen jielc^/ ber an (MfcgSqftg mit einer ober mit me&cereu 9tcif>en Slaf^ tenflp^uÖt ift / bie gleicfyfam einen neuen field), urn benmhercngröieren ftld) ju bilben fc&einen, { . S5. **an ben** |CltiHn, **an** LEONTODON, CICHORIUM, SBenn e< aber ©on Pappus gebcaucftt n>icb, fo be^ beutet c\$ ate *calyculatus Pappus* einen bautigen fiber ben ©amen beroorragenben gjauO / bee bie 6pige **b**es ©amen^ tc&nt / unb ber entweber gans (.integer),

nid)t elngefttniften iff, trie am Tanacetum, ober ge; b&lftet (*dimidiatus*) iff, bie\*S;>t&e beg ©ameng mir jur Jjalfte umgibt, tôte an INIUA *Pulicaria*<sub>y</sub> *dysenterica*. *Calyculus Flos Hinne'*, iff *Compleius VaMam*. 9lnbere nennen aber *calyculatus* *Flos* biejeni0ef *too* nur ber ffe(d> borbanben if!/ unb bie Slumenfrone *fe|>it*, unb *btinym* bierber bie **Kätzchen** (*Amenta*) unb bie \$CLpfCn (*Strohili*).

**CALYCUS, das K el d ph e n,** bezeichnet theils eincn sefc fleinen ^e(d^ / tfteite cinen ^benfclc^, bee mtgen ati bent n>abren 5teld)e befmbtcfr ill / *toit an gi?alt>cn*, an ben Slefken; *tbtlti*, unb im uneigentlic^en **Sinne**, eine SKefyi tjon 3läfttc^ctt/ bie ffcfr an ber **Eas sis** bti aHgemeinen jfclcfeeg alg eben fo tück **Nebens** blätte^en befinbet/ toie *an Qitvifftn zusammengesetzten* S5(umen. 95et> £tn'né unb tP^ttermg i(l eg bie ei\* gentli^ Samenbecfe. 9lucf) bie fleite ^rone# bie auf manc^en ©amen a(g Ueberfeleibfel ter^iumenfrone jurürfbleibt, unb eine 3lrt t>on *Pappus bilbet*.

**CALYPTRA, L.,iTlut\$e,** eine jar:c lorf re \$auf, die flappenförmig bie 3pige ber 93ücfse ber 5Koofc bebecft <5ie ifi ber *SUfl* ber bertroefneten bauttgen fclumenfione (*Perigonium*), bie jerplagt unb t>on bee 25ftd)fe aufceftoben toirb in bem Slugenbltcfe / too ftcf) bag ©txelc^en berfelben t?erlän^crt. 35co ben älterett SSofamfern, j. 95. Journefort/ i(l fie fynonora mit **Arillus**.

CALYPRATIM RUPTILIS, f. *ruplilis*.

CILYPTRATUS ARILLUS , müQc& enar t i g e **S a s** men be c f e, ifl biejenige/ bie nur bie Spie des eameng, n>ie bie 3Rüße bie ©pige ber **B** (per 5)foofe bebecft. *Calyptrati Museiy* bet) **Dillenbotes** jenige ^ bie mit einer Calyptra berfeben (tnb.

CALYX, .L., Xelc^. SBenn eine 58lume \$re» **D e c k e n** bat / fo nennt foecanb. bie áuger? blattartige Selct>. tTi6nd) nennt Die grüne <?>uUe, fte mag nun aufyn ober einidu ba fte^en, j?elcf). <fg gibt aber

b o \* effenftae gfcfarbte Xelcbe / tt>ie an RANUNCULUS,  
 unD grime Blumen, n>ie am HELLEBORUS viridis\*  
*f&t|) Zoumefon* bejeicfcnet ftetd) immer nuc Die äuge te  
 J&ufle, n>enn Deren jn>et) Da jtnD, unD roenn nuc erne  
 diiUe DocftanDen tfl / fo nennt er Dtefelbe Daun 2seld>,  
 n>ann fie mit Dec \$cud)t t>cny>acf>fcn if!, ©copoli unD  
 3ufTie« nennen jeDe dugere J?üHe Xelcfc/ toenn Deren  
*itot|) t>orbanDen ftnD/ unD jeDe ein\$elne ober einfa^e*  
*Qfilt ifi and) field) Ut)* ftnen. BuHmrb tt>ta, Dag  
 ta^jcnc9ej?e(cf> fci>, n>ae? eifte ununterbroc^ene gortfegung  
 De^ unmittelbaren etu^unc te^ Dec VfTanje tfr, unD  
 an fetnec tnneren ^lac^e mtt jene SteKe jufammen;  
*Uwt> aug n>el\*ec Die ®efcJ[e<t<&eUe.* enffpringen\*  
 SBenn eine S5lume Dcet) ©etfen bat, fo tfl Die äugerfidl  
 Dec ecfle Xel4> 6ei> Qcopoli, bit mittUu Dec jwepte  
 deleft, Die innecfie Die SSlumenfrone^ Opre«gel ecu  
 Hart n.:c jene Jjatte fuc field), Die mit eaufloffmingeit  
 terfebentft. STCab £mne tfi Dec ^el\* ton Dec duger en  
 SKinDe Dec ^flianje gebilDet / uectcortnet 9em50nItd) DOC  
 Dec 33lume / mit <>el\*ec ecmeflenSdleW) fciele &nfd)Mtu  
 hat, unD feint €tnf\*ntte tvacen t>on Den SBlumenblättecn  
 ©Dec t>on bm einfjdjnitten Dec SBlumenfconc in jtueifel^  
 ftaften Satten DaDuccfr su untecf\*eiDen, ba\$ (ie Den  
 etaubgefagen segenubec jlefeen/ n>abcenD Die SBlumen^  
 biattec abmectfelnD, oDer tvec^fetoeife mit Den etaiib\*  
 flefagen gefleUt finD. 2lbec Dann t>attt Die Sulpe eineii  
 jfelcb unD feine g5lumenblattec\* — Calyx glum a  
 nanitte Jiinne Die augece Jjtutte'bep btn Slumen Dec  
*Gräser;* 3&fTieu nennt bit jweote, bit innece Quilt  
*Calyx* bep £&r&arc tfl bat Perianlhium  
 siapL Dei MnnL S- Gluma. ©. a. Perian-  
 lhium unD Verigonium unD Indusium\*.

CAMBIUM ffireto, Ofian? enfaft / ein fc&ort  
 auiJ8<btlDetec ©aft in Dec SPflanje, Dec juc unmittelba\*  
 cen ^cnåbcung dewiffcr 5fbetle beflimmt ju fe>n fd;eint^  
 Kit i\* S3. Dec ©aft jt>if\*en Dec SKinDe unD Dem Holz  
 an Den £&fotyledonen.

CAMPANACEUS , ft)tr& 6\*9 \*altttn 93otamifttt für  
fl)nonim mit *campani/ormis* unb *campanu-*  
*la tus* gebraucft\*

CAMPAMFORMIS, glofenf^rmig, nennt man  
\$xciebeln, bit tint\* ©(ode a&nlicfc fe&en, toie bit  
3it)ic6el on GLADIOLUS Jissi/olius. 2lrdj> Me tfiutje  
(Calypira) unb bte BlumenProne er&ielte gufteilen bie  
55c\$eid)nung *campani/ormis* , tt>ie lefctere an LEUCOJUM  
vernum, unb bee P'i Zeu5, tt)iean AGARICUS Jimetarius.

CAMPANULATUS, L., glofenf.d r m i g, mtnn.  
bit dioifft fid) aKmaftlid tttotittt gegen ben @aum  
bin/ fo bag ba^ @anje bai 3lnfes>en einec @ocfe Qtt  
to'mnt, \$. S3. bie SSIumenfrone bet (Bloderiblume,  
tie WlaygWcfc&cn. Jtirwe befinierte florfcnfirmitig  
aid bagjenige f mi an btv S&afif baucfttg if}, unb  
feime SKofre bat/ unb bod^ gtbt er bee HEMEROCALLK  
tint corollac~~campanula~~ *tubo cylindrico*. 2\$ernt  
barbi erf (art biefe ^ocm \*|\$ bann entfleftnb/ n>enn  
einer Jpalbfu^el ober ^a(6e((ipfe em ^rl(lucf aufge^  
fegt i({\* (£3 if! ber SRüfre tx>crtf, ben ©cbraucf) bie^  
fed 3Bovtt\$ butd) 95ci)fpiele ju erlautern. *Campanu-*  
*lata*. Apophysis, glofenfSnm'gen2(nfaQ/ nennt  
man benjenigen, ber ton ber Sucfyfe getrennt/ of>ne  
@amen, ^auttg, fret^f&rmt / unb mit bem 9tanbe  
abtoavti in ©cflalt einer ©lorfe flebogen ifl, \$. SB. an  
SPLACHNUM rnrum; campanulaia Caly ptra<sub>y</sub>  
tint glofenfirmige tftuge, biejenige, bie tDeitfibet  
bie \$ud)fe reic^t / unb eine glofenfdrmige ®tftalt fat,  
J. SB. ENCALYPTA vulgaris; campanulatus Calyx,  
ben ffelefry d(odenf6rmig / an ARETIA? CHIRO ~~NIC~~ fru-  
tescens; campanulatum Nectariuman ~~NAR~~cessus  
triandrus; campanulatus Pileus, tt>enn ein ~~uf~~/  
lt)ie an AGARICUS Jimetarius, oben febr COn>ejt, ail  
ben Oeiten setter unb ^erab^angeneb iff. gj?an 6e^  
({tmrnt öfter^ nod) bie ©lorfenform genauer, unb fagt  
AbQtifa\$t glofenf^rmig, bred\* campanulatus^

*obi on go-campanulatus, .länglid) gloctnfSrmig, toit an CONVALLARIA Polygonatum; campanulalo-glob osus , toit an VACCINIUM myrtillus; Cumpa-nulato-patens , tioie ail CAMPANULA patens, CUCIJABXTA Pepo.*

CAMPESTRES PLANTAE, L., bte nur auf unbebaufen/trocfenen, fonntgen, winbigen *fyl&ctn ^coet&en, j. \$.* ERYLVGIUM *campestres* über^aupt tn <ebeneti unO ©tcppen. 92o,d) <^>ayne foil auf **Feldern mehr Moos als @ra^ n>ad)fen, ma^ i.n ©iiDen n\dt) iff.**

CAMPHOKA , ctn principium immediatum **III.**  
**Classe in Den Wanjen- 2)at>er**

CAMPHORATUS, ma^ nac^ ftampfycv vied)

CANALicuLAius, '11nt|t txjf6 vin ig , btt tingt  
nacf) oben in dne SRinne aitfgeböblt, oOer gefafstet.  
**Büdi**rb n>(d abet butfyaug nid)t, ba§ ein tinntnf  
förraige^ 2?fatt gefielt feo, unb in feinem £)uerbt;r\*^  
fcf)ntttc etnen Wintel bilbe, toit bet) &&yne; eg fott  
UbiQlid) nut einen SSogen im Querburchfcynitte bar^  
flellen. SKan nennt etnen (Stengel rt'nnenförmicj  
{*Caulis canaliculatus*}), xotnn tt auf einer ©ette  
tief au\$(Kfjcf)tt i(l/ fo &a§ et efnen ^alben ^o^(en (?p^  
linbtt bilbtt; ein 25I«rt rinnenformifl, menn ed eine  
lange **tiefe \$utd)t in fether 5D?ittetci\*»>e ftat, ober fel6fl  
rinnenförmig mit fefnen bepben SKanbern eingebogen ff{/  
tDie an HYACINTHUS *racemosus*, ORNITHOGALUM UOT-  
beUatum; tint ^>ulfe rtnncnfSrmtg, n>enn fië an bee  
obercn SRart tief gefurc^t i|i/ j. 35. LATHYRUS *sativus*;  
einen Blatrhel oberBlumenfië[(innenf6rmid/ wenn  
«r an^ec oberen eeftte eine tiefe/ bee ian&t nad) bers  
ablaufénbe gurcfe hat, toit an TUSSILAGO Peiasifes;  
till *Stigma canaliculatum* ifi an COLCHICUM; tit  
nen ©trunt (*Stipes*) nnnenförmig / wenn er auf  
etner ©ete eine tiefe Sängenfurcfe f)at, tvit an bee  
DANAA *alata*. gjne Drypa *canaliculala* ifi bit  
Srucht ber Sttanel unb ber *Arylicose*.**

**CANALIS MEDUIXARJS, 'Markröhrre, jene wal:**

tcnfSrmige £5&lung, in mld)tt bai Wiatt in bet SIMM  
bti ©tengeW (test.

CANCELLATUS, gegittert, tta\$ n>ie StHgran;  
arbeit gebilfret iff, \$ SB free #elc& an ACARNA *cancellala^ bai* 93fatt on • HYUROGETON *fenestralis* per\*  
foon, tt>o frie. ©efagbunfrel fid) gitterformig jcrafMn,  
unfr. fo mit etner <^aut umfleibet fint> / frag \$tt)ifd)ctt  
i^nen (eete SXaume b~~e~~t6en / unfr foftoftl an frer oberett  
nK an fret unteren glac^e frie \$aut fe^r. *Cancel-*  
*laia semina, btxtn i&nQ&fittiftn butd)auerlaufenfre.*  
Jinien frucc&fceujt tottbln<sub>f</sub> finfr an GLAUCIUM, an ONO-  
PORDON. 9lud) frie flefreujten fyaate, mttteld tveld)ec  
Die ^lappen an frer Since gufammenftangen, nennt  
fcinrte *Pilus canellatus*.

GANDIDUS, erflart tPi'UbcnotP ffie fi)noni)m mit  
lacteus, mil^tvet^/ un> 'erflart e^ tod) a(d blenfrenfr  
n>et§» iDecanbolle 6ejctcf)net rtcfetiger framit etmti?  
toai tint. fc^r reine fteige S^^be ^af. 95ep Rowing  
ftlbertcetg unfr gmuhd),

GANESCENS, tx>ei0It\$gr6U/ toad tt>egen eittget  
loeniger aufgeft&ten fyaavt meigicf) ju n>erfien anfangf.

CANUS, grauhd^tcei'0, b U f g r a u , nennt  
man fra£, m\* nur n>egen feinen aBottenbaare\* / ofret  
ftegen angefrtudter Qaaxt meip fc^eint, j. 95\* GISTUS  
canu5, CARDUUS canu5; — md)C tt>et§ aid gtau.

CAOUTCHOUC, J'-ourcr. / ein Principium immc\*  
diatum III. Slaffe in fren <plan&en>

CAPENSE CLIMA, bat jHima am 93orgeburge free  
fluten Soifnung / unfr auf fren Gebirgen. ▷on Peru,  
SKeuueanir unfr 230(ant), 25at). £)ie Franjen ▷efr Ges-  
genfren frauern bep und im ©ommer im grcpus; fors-  
teen abet im SBinter cine Semperatut Don f 5°\*

CAPILLACEUS, gebrduc^lic^er capillarity  
Ixavformig, totnn ttxoai fefer long unfr burnt unfr  
fein rote ein S?aat iftf }. S3. frie flatter an ARTEMISIA  
Abrotanum. Cap illaceus flos f» Apetalus,  
aucftftnom mit capiiliaris.

CAPILLAMSNTOSUS, f. *CapUlaris*.

CAPILLAMENTUM, Cournef./ f. *Filamentum*.

CAPILLARIS, fraarförmig, éntpaljenförmiget  
 <Sörper bee fo fctn iff/ aid em £aar. 60 ^at man ef\*  
 nen *Culmus capillaris* > ber fabenförmig / uni) fo  
 frrettaW ein J?aari|t/ \$ SCIRPUS *capillaris*; eitt  
*Filamentum capiUare*, bad. fo fciu tt>teetn £aac  
 ifl/ \$.25. am tOái^en; etn *Folium capiUare*, bat  
*Ufa* fein t|l/ faff Ourcfaus\* fetne Sceite &at/ unt> nacft  
 eintgett auc& linger iff aid etn farfienföhrnge^ 93latt^  
 • 53 an SCIRFVS *capUlaris*, an MYRIOPHYLLUM  
*demersum*; *capUlaris Frons*, etn Jntarfdrmigev  
 t Peb k/ tvenn ec áugcrff fein/ lang/ oft t>erf\$iet>ett  
 geboQn, einjeln obec ge^áuft/ einfad) ober áffig iff,  
 wie an CONFerva *cespitsa*; eine *Glandula ca~*  
*pillarisj* anRIBES unb SCRO?HUX.ARIA ; einen Pap-  
 pus *capUlaris ali* ©flnonotn mit *Pappus pilo-*  
 \*us uttf) *simplex.*; ti||t *Radix capUlaris*^ bit a|X\$  
 Uht Diefen unb fcinen langen Safern beffefj\*, mie an  
 benmei{en ©c^ffern^ unban SCIRPUS *acicujarh*, n>o  
 ed ©t>noni)m mlt filvmentosus iff; etnen ££/-  
 Ac \* *capUlaris* an ACARICUS *epiphyllus*; - *Stylus*  
*capUlaris* töte *Filamentum capiUare*. *Tub u-*  
*lus capUlaris* an mefreren <fonfert>en» 3an>et(ett  
 beseid^net *capUlaris and*) etn 3Rag / ^aarbretr. \* \$e»  
 iTJönfon/Boer^aape/ Kay n>aren bte *Capillare*\*.  
 {§arrnfrlurer) glaffen.

• GAPILLATA RADIX, ^aari'g iff bie 2Burjef/ **bis**  
**mit** feinen ^aa^nliefsten gafferbchen. ^efegt ifi, was sehr  
 oft fer Fall ist.

• **Capillitium** perf., baS *ftaatneti*, bit sehr  
 fetnen,, Salt) einfac^en/ balb áflijen J?aare ober **Gáden**,  
 an melfeeri bte ©amen pber ^apfeln 10 ben flWjen mit  
 eingeflofrenen gruc&ten (ben SaufepHjen) befefltgf  
 linb; \$ SS. Go TRICHIA, STEMOI^ITIS.

CAPILLUS, <5>aarbreit/ bte gaúge be\* S u r ^  
 messers cinctf .^aar^, be^na^ bet implfte Sbetl einet.

fēmie. **S**Rafy *IDeanboUe eine fyalbe ünie, too ei abet nut von Slättern, nid)t t>on Cttelen gebtaucfct tohb. Slud) bit baarfōrmigeti 2!&eife in bet Scut bet \$il\$e nennt man *Capill**

CAPITATUS, L., f o p f f S r m i g / toenn eimjelne Stbeife an thrcr Cptgt **fīl** in erne .ffusel obec in ein Aöpfc^en etben; memt meforece ein\$elne Sbeile fo \$u\* famin?n,qef>aufst ftnb/ bag fie etne Augel ober emen jfepf btlben Coflebrauefct ^tnné ben Slu^bturf F/ o s *capitatus* 6C1)HYMUS *serpyllum* (latt *Vapitulum*, obfd)on cr nut egen biefem Stamen bie iibtbeilung bet 6ongeneft{en bejeictjnet, ju welc^et bte 2?i(lelrt **ges** 66ren. *Capital\** *pili glanduliferi*, **fopffōrmige Haare**, nennt man. ^aare nüt etnet tunben £)rufe on bet 6pige, toa^ C opoli *papillosum* nannte. Sine {opffdfrmge 2tet?rc (*Spica capitata*) ifl an MENTHA *crispa*. Hint fopffdrimigc tfarbe (*Stigma capitatum*) ift etne fugelfōtmige / unten ffact) jufam^ ntengebrücfte Slarbe / j. 95 HYOSCYAMUS, NICOTIAN A ; tt)e(d)e bann/ mo fte ffe^en 6leibt/ eine fopffōrmgc @c^ote *siliqua capitata* obet eine fopffōrmige ^)filfe *ilegu\** men *capitatum* bilbtt. SRan fagt aber aucf 5ftettf/ *sili'quis capitatis, leguminibus capitatis*, 3pic is *capitatis*, tt)e man ein fopjfōtmigeg Solb^ ceen (*Umbellula capitata*) nennt; obet einett fopffōrmigen (Quiri (*Verticilius capitatus*) toenn b(e \$(umm fo Mcft jufammengebrdngt (le&en/ bag bennafc eine ^albfugel barau^ gebilbet toitb, I\* S5. an EKYNGIUM , an CLINOPODIUM *vulgare*, PHLOMIS *tuberosa*. S>U *Capitatae* toattn bet) K\*p / Boew taa^e, ttacbenborf, £inne unb Batfc^/ natfitlicfee Samilien\*

CAPNELLUM, f. *Glomerulus*.

CAPITIFORMIS, f. *Gon gyloides*.

**CAPITULIFORMIS**, P o p f f d r m i g ; nennt man eine **Fugelrunde gestielte** **A**taogblume/ tt)iean BRYUM *andro-gynum*, too bie Umfdjagtfblatter fief) fd>Itegen. **Raw**

ttemtf «u\* eintge Heine fdjimmelartige ©\*toāmme  
*capituliformia Re cep ta c ula.*

CAPITULUM, L., X d p f\* e n , tt>enn jtfcenbe ober  
 feepna&e fiscenbe SBlumen fo btc&t an einer (SteUe neben  
 einanber fle&en, Dag man fie von Serne beona&e fur  
 tint einjifle, meſjr ober'mtnber fugelffirmigc SSlume  
 &alten fönnte. JDecan&olle nennt au\* t>ie &ufammen\*  
 8efeſten fopff6rmiflen SBlumcn *C a pi tula*. (Etntfle  
 ttJolTen burdjau^ nur bann biefe tföpfcoen aW tvafera Ca-  
 pitula gtltn laffen, n>enn (te am Snbe ber Sleſle  
 unb gweige auf einen aemeinfc&aftHc&en Slumenffiele  
 unmUtelbar obec mitulſt Htntt ti&tntt aiumenflcele  
 fiſen. 2)iefec Slutſtenflanb ifl t>or\$ſiflH\* beutltcfr an  
 GOMPHRENA glohosa. *Capitulum* ift foſlat fpno^  
 nt)m für ben £ut eineS <pil\$eg geworben/ unb fLinni  
 faſlte: Muscis capitulum est *Capsula*. 3(1 bajS  
***Capitulum Hoffmann em Gongylangium sli-  
 pitatum ?***

#### CAPREOLUS , f *Cirrus.*

CAPniFicATio, *taprification*, nennen einifle  
 bit SBefrucftung, anbere. bai SKetten ber gru\*te bur\*  
 3nfecten, \$.»• bee Setgen tm 3lr\*ipel bur\*, CYNIPS Psents.

CAPSULA, X a p f e l / ifl btx) finne tint gruc&fe  
 &uOe, bie auf cine beſimmte SBeife auffpringt; bie  
 SJleueren besetcftneten bamit «&htner) tint §nt\*tl)ulle  
 aug etner meſer ober minber ſefien unb trodenen v^yt,  
 n>el#e balb t)auti\$, balb leberartig, balb feolja rtig tt;  
 unb bie einen mit btm ^Jericarptum t>er»a\*fenen cher  
 men, ober me&rere Samen einf\*lieg(/ 6feer\* tti ga  
 bur\* 6\*eben>anbe «etbeiU t(l/ unb enweber flac  
 nicht, ober auf t>erf\*iebene SBeife ft\* bfintt,. J. ».  
 an bet ©eite, ttteanben, tfampanulen; ^onjontttf  
 tt)ie an SANGUISOR\*A ; bet &&nqt na\*/ wi^an CoN-  
 VOLVULUS; 4nbetrB4(t6# tt>te an SAGITTAKIA, unb  
 am fcäufaffen, tt)ie bei ben meiflen Vffanjen, an btt  
 epi'S\*. SBenn ft\* bie flapfel 6ffnet, barf fie-a u.\*  
 tttoai ffeif\*t8 fet>n. 3la\* ftürtner se&ort fern u\*n-

*culus* unb *FQWCUIUS*, unb fctne *Samara* Uttb **Cap-**  
*\$n/a strfctius sic dicta* (br ju fetnicr bcr oben ange\*  
 fu&rfen Slrten gebört) flferber. Sftac!) tfiebicua ifl  
 alles jTapTcl, n>ag ntd)t £ulf fe unb nicfot ©cbotc, unb  
 was trocfen ifl; nod) tTfoncb, mi aud) nicfet **Cap-**  
**sula circumscissq. obit Epistamatumifi;** nad) **Scos**  
 polt jtbig troctene auffpningenc ©amcn^ebaufe, in  
 n>eld)cm Oie 6amm ntcbt an ber 9?atf) and^eftetftnt^;  
 nad) JDecarrtolle id *Capsula*, *Rapfel*, jebe tro\*  
 Cfctte gruc^t/ bie toebev *Fotliculus*, *Le^umen^ SHU*  
*qua*, nod) *Capsula circumscissa* iff. 3|ud) ben bett  
 garrnfrautcru ifl cuiic \$apfcl, n>o fte abec metfiend  
 mtt eineni elaffifcben 9iinqc t>cfe>en iff \* mit bem *Gy-*  
*romq*, Bernbarbi' nennt jenrt X)barium **Rapfel**,  
 tn melc^cm bic ^ramcn am inneren *TRanbc* bet **Zwischen-**  
 ftant) **beHftidt** **finb\*** *Capsula* \$irtbel f *Theca*,  
*Spor an gium*, *Pyxidium*, *G rctnum*, *Car-*  
*pitulum*. *Capsula* tflalpig&t' / *Anthera*<  
*Capsula* f» *Utriculus*.

CAPSULARES FRUCTU\*, 2\ a p fe I f r u d) t c / bie beo  
 t>oDer SKeife t>on felbfl auffprin^cit/ trorfen ftnb/ unb  
 mtfrre ©amen enthalten. ^DecanboIIc reebnet Berber :  
*Follicul us*, *l/-eg umen*, *Siliqua*, *Pyxi-*  
*diunij Capsula*. *Capsulare legumen*, **taps**  
 felartig/ id bie ^ulfe, menn fte aud einfadjett/ **häutigen**  
 an einanber gereibten ©tucFrn beffebt\*.

CAPSUUFER, xoai ^apfeln tvagU

GAPUT FLORUM, f. *Capilul um\**

OPUT RAPICIS. ©o nennt Bofe dc radicum ortu  
 jenm \$unct bee SBuvjet/ w (te ben ©tengel betubtt#  
 im ©e^enfage bon *Caudex radios*, be? ber entgegens  
 gefegte \$)unct btcr>on i{< .

CABIFS, ihutttertorm

CARINA, L., Q>d>iffd>en, ber unterffe Theil  
 finer (Scfymetterlinggblume/ber nacftenfprmis gettummf  
 ist, der gaftne gegenüberftebt, bU Befruchtungswerk  
 zeuge etnfd}iegt, unb au^ ben &n>o unterden Blumenz

*Uāttetn* befieftt/ bie unter ft\* ber *Un&e nad) btttoad)\**  
 fen/ jutteilen aber auc& flanj fret) finb. 3m legteren  
 %aik nennt man *ba\$ &d)ifyen* swegblaftrifl, *Carina*  
*dipctala, toie an* ERYTHRINA, SPARTIUW. gjfan nennt  
 ftucfy eine *ettoai* fcfrarfe J?er&orrafluna, einen @>raff),  
*bet an bet* unrccrfcn ©eite einer &ori\$ontalcn gjacbc,  
 ober eined Slatted/ belfen ©eiten unt^r einem fpigi.oeu  
 SBinfel jufammengebocjen ftnD/ bee fiāfle nad) baftiii\*  
 (āuft/ *Xiel (Carina), nnb ba\jet*

C'RINATIFOLIUS, ēm 95latt mit einem \$iele/ twltibet  
 meiflend t>on ber 9Kitte(rit>pe gebitbet mitt>.

CARINATUS, L., *getic* 11, n>a6 mit etnei\* folcfrett  
 i&erborraguna t>erfebeniff; babec *carinatus* Calyx,  
 ftenn ber *iañ\$e nad)* erf yabene ©ireifen über it>n obet  
 fcine 2f)cf(e bin(aufen/ jmifcf)en n>e(c'en bie 5(ac^e  
 meiflen^ cin^ebruct iff; eine *carinata* Glum a, an  
 PHALARIS; *carinatum* *Folium^* an GALIUM aparine,  
 SPARGANIUW, HEMEROCALIIS ) car mat um Ne eta\*  
 riūm , an UtRiouLARIa; *carinata* Va Ivula fttt  
 THLASPI, 2(ucftéint^e Cotyledpnes finb *carinatae\**  
 ©eltener n>trb *Carinatus* fiir Navicularis gebraucftt,  
 Borfjbaufcn erHart *carinatum* *Folium* fuß ein  
 SHattf beffen 30?ttcfrippc bet? £ānge naO fo er^aben  
 iff/ bagfkfo bie ©citent&eileetma\* na\* abn>årt^ beaten!

GARIQPSIS „. Ki\*, / 3 o r n f r u 4 ) t # eine trofene·  
 einfamige gru^t, beren grucfetbñflefo fefl angefoac&fen  
 iff / *bafi* man fie mit ber eigenen *fyhle* bet ©amen<  
 oernoecbfeln fönnte, n>ie an ton 0rafern.

CARNEUS, *fleifdbfatben*, blaffer *ali* rofem  
 f^ben, *i*, SB, GYPSOPHILA *Saxifrqa*. ©ononpm mit,  
*Incarnatum\**

GARNOSUS, L., *fleifc^rg/ befien©ubffanj etoai*  
*fcffunb faftiD/ meftr ober minber bemjenigett at)||Ud>*  
*i(i/ tt>a« man SSreo ober gleif\* nennt; fo fat man*  
*ein carnosum Albumen, iüberbaupt/ »enn et jmW*  
*f\*en t>em mebiigen nnb fnorpeli^cn in b(t 3J?itte ftetf,*  
*nnb in^befonber^/sensu stricioroenn e^ cine kemu obec*

mandelartige Consisten<sup>t</sup> hat, oder gekochtem Entweisse gleiche,  
 und ~~Idy~~ fd>neUett Idgt; em *carnosum* Ant rum nacf)  
 SKebicuS, bag aug einemlfoebr ober tteniger faftigen  
 gleifdje befiebt/ note an BERBERIS, CRATAEGUS *tormU*  
*nalis*; tint fleifaige ©ftmenbetfe (*Arillus car-*  
*nous*) *xotnn bit fyaut tttoai bid unb faftfe tfl/ mte*  
 an EVOMYmus *europaeus*; tint fleifc^ige Beetre/  
 Me ntebr ober minber faftigeg \$leifd) bat / ift an SO-  
 LAN U M, ATHOPA; *carnosus* Calyx > toenn Cc {tot;  
 fdjett ben taften mtt einer marfigm @iöfian\$ au^gei  
 irüttf il!j einc fteifatge Xapfel tt>ie an MESEMBRYAN-  
 THEMUM ; einen fleiT4>igen @tengel ober^rrunB^  
 bet mcid) unb faftia, obne ^olsfafern unb bepna&e  
 tt>ie bad Sleifcft in einem Slpfel iff/ {• 55- an PORTU-  
 LACA *oleracea*, BOLETUS *bovinm*; tint flctfd)tg6  
 JDtrupa/ beren Slcifd) einc jtcmlid) feffe Consisten<sup>t</sup>  
 ^at/ ffcft (etc^t fc^neiben lägt; ein fletfcfeige\* Blatt,  
 tt>enn bad ^areitc^pm \$tx>ifd)e» bee £)bert)aut ber Blät-  
 tec febr faftig i(l/ j» %>an ber ^augwarj; fléft ^ige  
**Früchte**, an totlfytn bai Sleif^) (*Sarcocarpium*)  
 weich, unb t>on 6cei)artger obec ffeifebitger (Eonfiftenj  
 iff. ©ie fd>lief?en xntx^tni nut toenige ©ametj ein/  
 unb öffnm flc^ (menu fie nic^e anfanstn ju faulen)  
 fteo bee SRöffenicfte t>on ft\* fe(6l. ^tecber gefeörett  
 tie Drapa, IVUE; , Nuculanum, Pojnum, Pepo f  
 Aurantium, Bacca; tint fleifc^tge 4>ülfe, totnn bit  
 SHapptn ber ^ülfe ober i&re Serengerungen au^ einec  
 feflen, aber etwag ffeifc^igen unb weicftn staut befie^  
 b^n/ J» \$5. an GERATONIA *siliqua*; tint fletfc^tge  
 Zbvbiafvuty, totnn bai %lti{d) ber §ru\$t feft unb  
 ttmd roeich ifi, j. SS. an bem tfürbiffe; eine fleifc^ige  
 tthirjel/ bte ibret. Sonfiften} nad) bem Sleifcfje nabe  
 toinmt/ \$ &• CAMPANULA *rapunculoidcs* > BRÄSSICA  
*napobrassica*; einen fleiffygen ^ru^rboben (Ae-\*  
*ceptaculum carnosum*), |x>U an ber 5(rtifd)ocfe  
 unb Srbbeere; elite fleifc^ige Jefla, btt) beerenartiaen

©amen. @. *bacca Wfm^ pulposum, ^uc-  
cul en turn.*

GARO S. SARCOCARVUM. 9)?ctapf)orifd) nennt man an ^flansen gldfcb / *toai tint fleifcbige @on^* Offenj bat/ benn feime \$Pfanje bat wabr^ Sleifcb-

GARPOLOGIA, bie fefre bon ben grucfrtn bet **Ges  
wächse.**

GARPOMOAPHUM, nennf mannadte5?nofpenober 3n>iebeln, bte ©amen h&nlich ftnb/ unb bamit t)cme\*^ felt n>ecben 16nnen / n>ie an mebreren J!audjen# unb bit *Gongyli carpomorphi an bin Qtvamien.*

CARPOPHORUM , *tint, Srud?ttt&Qtt, tint*  
**Stüge**, bie auf bem gcud)tboDcn cntfprmgt, unb ben ©taubtwg allem trågt / nict)t abet bie ©taubgefäie unb bie ^umenblätter. \$Ran untecfdeibct ali ttttn bti \$V\|d)ttvd&tt& bai *Thecaphorum> bat Polyphor um,* unb bie Seta.

GARPOS , f. *Fructus.*

CARTILAGIIfEO-SERRATUM FOLIUM, t HO Vp C l i Q flefigt, menn bet fRanb tnoxptlis unb flefagf ist, tolz an einigen SKoo^blättcrn.

CARTILAGINEUS, t n o r p e l t g , Don bet **Conis** (tens unb bem 2lnfef)en einef jfnorpeW; j- S3\* *cartilagineum Albumen*, fall bornarttg unb t>om 8Baf>fer faum obec nur wenifl er>eic()6at; *Arillus cartilagineus*, stenn bie ©amenbecte birf unb fieif iff/ fOe an GOFFEA arabica; *cartilaginea Capsula*, btxtn filawtn fnorj>elarti« / obec btun @\*eibett>anbe fnorpelig finbj *Folium carlilagineumj XOtnn bai Sblatt* am SKanbe bart unb tnotptliQ, tttoat aufgetrie; *Un*, burcftfeeeinenb/ mebr ober minbet fldb iff/ h ®. an SAXIFRAGA *Cotyledon*, an bee AGATJC. **SBey** Woofen barf ei nacht IPiUbenow/ au\* »ebec **gefähnt** no\* gefdgt fei>n\*

**Carunculatus**, *lgfhwärzchen ähnlich; j. B.  
das Nectarium carunculatum an SEMPERIVIVUM  
tectorum.*

{JARYOPHYLLACEUS unb CTRYOPHYLLEITS , *n el fens*  
 4 r t íg / iff eine S3lumenfrone mit ffinf SBlumenblättern,  
 bit lange TJágcl baben / unl in einem langen *tinblátU*  
 riflen toaljenförmigm tfelcbe ffecfen, § 95. an DIAN-  
 THUS, SAPONARIA. Sluch ett&atf/ tt>a\$nach SRelfen **richt.**  
 JDaber: *Caryophylleac* > *tint§amilſe bei Tous*  
*nefort, £tnne unb 3iifficu.*

*CARYOPSIS* , f, *Cariopsis\**

CASEOSUM ALBu^fEN, nennt (BártneC ein **Ehweig,**  
 bad bie @onfiffenj.eiueg \$armefatifafcd ^^^ bem bár^  
 ttxt unb gleichfam fanbart'de *forncben btwemiffit* ftnb.

CASTAMEUS) f a f l a n i e n b·r a u n , fpnonpm mit  
**badius.**

GASTRATUM FILAMFNTUM, *entm&nnt*, nenntmati  
 ein (^taubgefäß? obne @taubbeutcl/ roic an CUNILA,  
 GRATIOLA , bercn }tcp finb / an £RODIUM *cicutariuin*  
 fünf. 9flatt nennt/ ob^lcfd) febr unfcbrrflcb/ auch  
 tt?cibltcf)C 93(umcn / beren @efcblccbt^tbe(e ntcbt gebörtg  
 enttvide(( finb / cber bencn / *tok tn bcr Syngenesia*  
*Polygamia* necessarian (ie Þcarbe feblt, *taftvitttt*  
*f&lnmtiu*

GATAPETALAE COROLLAS . fin p, tielblattrtifle 95(u^  
 ntenfronen, bie untm etn>ad unter fief) aerroaebfen ftnb/i  
 f^ie bie Stamen ber gRal&enartep, bie aUt übnejen S o/  
 tanifet unter Die bitlblätngcn S3lumcnftoneu jáhlen^  
 unb bie int @runbe boch einblattrtg finb, benn bie  
 SSIumenbtätter fallen nicht cmjela / fonbern bit ganjc  
 SBlume fällt mit aQen Slumeublattern auf einmal ab»

CATENATI SORI, f ettenfotmiQ, finb bie ^auf^  
 cbeti / totnn ^tioct) langc linieufonni^e i^aufeben fid)  
 öfterg burcbfreu\$en# fo bag fie be^nabe bie ®tfalt  
 einet j?ette befommen / nöte an HEMIONITIS *lanceolata\**

CAIENULA, 2 J e t t c b e n ; fo nennt man **den Schnel;**  
 let/ Eiatcr, totnn tt, n>te iunjeitea, untec bem **Bera**  
 grftgerungglafe bctxadbttt, einec fUinen/ au^ **schraus**  
 benförmigen Ibeilen geflochtenen \$tttt abnlich iff\* V **B,**  
 an ben ©amen bee **Marchantien.**

CXTENULATUS, f e t t e n f o r m i g / nennt maiv ju\*  
**weilen** einige Otretfcn/ fcie aud crf>abcncn unt) inetner  
 9iet(>c fortlaufenben £>rufen befie&en, fo Dag &ie fiber\*  
*flåd)e*, antveidbetbie ©treifen t>orfommen, ben glü\*  
 gelbettfen einiger Sarabud gietcfct. Car^ione nennt  
 due sufammengefegte S^icbel (bep' t&m *Bulb us articulatus*) and) *Bulbus catenulalm*, unb **tac^steht** auc& j)iecutec We Slfterjtviebel an HORDEUM **bulbosum** y HQLCUS *bulbosus*.

CATULUS, f» Amentum.

GAVERNOSO-CORIACEA , gru&lfl leberartcg ifl We SRu§ an **ANACARDIUM**.

CAUDA, *Qfyvttift toai Ammet fur ein am Ende irgend eined Organed flecenbed, langed, faben; förmiges, weicbed/ biegfamed; bem ©c&tt>eife eined Thieres ähnliches SInbängfel. SWeiffend iff biefed Sin; hängfel an bet ©pi\$e bei ©amend unb ber Jjautfruc&f/ unbmiit fetnen £aaren befe\$t, ein SXefl t>ed ©riffeld/ tt>ie an PULSATILLA, CLEMATIS. ©a^Ct*

CAUDATUS, *mai gefd?w&n\$t, mit einem lan^gen feaarigcn, biegfamen^ fabenförmigen Sörper an bem einen Qrnbe (ber ©pi&0 t>erfe&en ifl, n>ie Semen caudatum an CLEMATIS; Petalum caudatijn, bai an feiuer S3aftd einen Sortfag bat*

CAUD£x;.0t orf / fo nannte Kuelle unb £our\* ncfort ben ©tamm ber SSaume; *Hinne' ben* auf unb nieberfieigenben Sbeil ber SSBurjel/ wot>on[jener oft be\* ©tengel n>irb; f jtoifcfoen *beyben* liegt, toie an einigen ^Oblgen>åc&fen/ ber *Caudex intermedium*, *bit* þalb ein ©tengel unter ber grbe, balb eine SBurjel *ubex bet* grbe iff. *fLinl* nennt bie Sajid jabriger ©tengel olfo/ *xoe|<he*, na\* bem Slbfferben bejfelßen, *bai* 2ln\* feben einer ISurjel geh>innt/ *unb* im nacftffen 3^re neue ©tengel treibt\* VX>iHl>enotp nennt *ben* ©tamm ber iUalmen unb baumartigen garrnfrauter *Caudex*, *bet Uine SRinb^&at*, *unb nut t>on ben* Ueberbleibfeln bed

*f8lattftUlti* fceflečbet Wirb; ber *fttg* nur ?aub, née flatter *ttaſt*, unb nut aud btr ©pige trelbt.

CAUDICIFORMIS, *ftodartig*, nennt man eine gaferwurjel, beren abfieddenber £betl ft\* nicftt aānjlicj) in gafern auffödt/ fonbern einen, toenn aud) nut ja^ rigen 2Burjelffocf bilbet/ n>le an MERCURIALIS *annua*.

GAULESCENS, nennt man eine <Pflanze, Die einm tjeutUc&en ©fenget trågt\* £ubroig nannfc aber auch cine fpinbe(f6cmise SBurjel/ tote jene an ber geltcrt SRube / etne *Radix caulescent*, eine 35enennung, n>omitt £m n̄e nur biejenigen SBurjeln bcjeid)nefe, bie über bee Srbe bert>ortceten / unb jum ©ten^el tverben^

{. 93. BRASSICA *Rapa*.

CAULESCEMTIA, f. *Habitus*.

· CAULICULUS Kfd),, ba\* Q t e n g e l c ^ e n obec ® t i ' e l \* e n , jener £&etl ^ ber *bai* ©cbnabelcfcen mit ben gotplebonen Derbinbet. Sumeilen nimmt ec ed je; boc^ für gleic^6et)eufeni) mitf f ebercfcem 35ei) £inE i(t *Cauliculus* jebec einjelne ©tense!/ foenn beren me&cere auf bee 9Qutje( ffc^en.

CAULIFOIIMIS CADEX INTERMEDIUS\* *flenf geiartiq*, i(t bee mitt(ere ©torf / bee untee bee <ſebe fid> beftnbet/ unb bad Slnfeften eined ©tengeld fyatf in ben ee fic\$ writert/ S 95- an LILIUM *bul~hiferum*.

CAULINUS, L., nja^ aud bem @eettgel entfpringt, obee barauf fefifft&t, nid)t an ben SJeflen unb uid)t an bee Sffurjel. 6o baben n?ie *caul in a folia* an Echium ; *caulini flores* unb *fructus* an DAPHNE *mezereum*, *caulina hyiemacula CM* LILIUM *bulbiferum*, *caulini pedunculi* unb *c aulinae stipulae*, bie nue am Stengel .fjangen, mie am £>ittv, baume. Batfd? unterfd)eibet eine *radix caulina%* bie ffc^ am ©tamme 6effn5et\*

CAULIS, L., @ t c n g e l # iff jenee £&eil bee Pflanze, bee ton fcerSBurjel an ^etvo^licf) aufmdrtd flrebt / unb flatter unb Slumen trågt\* Cour^efort

nannte tiur ben ©tengel frautartiger tyflanjen canto,  
fo tote man aucft jeſt nod) nur felten boljige Stengejcau-  
fes @teng cl<sub>f</sub> fonbern gefo&bnlid) @r̄fmme nenitf. ©•  
*Surculus unb Truncus; Connus* unb as-  
*c end ens cau dex , aud frons.*

- CAU.OCARPUS, ttjenn bie jjruc&t am (Stengel figt.

CAUSTICUS, f. Urcns.

CAVUS, JJOM/ tva<sup>^</sup> nur eine etnjige inncre J?6Wc  
tat ©o nennt man *bit* SCurjcl an ber COAYDAUS  
*bulbosa*> Die 6ep DoOer Silbung turn ft\* felbfl ^o^I  
n>irb, rfne fiadia cora. gs ifl n>o&l ii^erpüffifl  
einen Selc<sup>^</sup> unb einen *foliiculus cavus* ju nennen.

CELLA<sup>^</sup>nennt ©copoli eine Drepfacftē Sruc&t&fiffe/  
n>ot>on Die innerfle auffpringt, Me au&erfie (joljig, t)te  
mittlere fleifcbifl id/ n>ie an Dec PONTOPPIDANA.

CELLULA, 3 e l l e , eine jetier J?6)len im 3<sup>^</sup> 9<sup>^</sup>  
tt>cbe, bie baburcf tcntfttbt, ba\$ (id) bit \$aufe beffel<sup>^</sup>  
ben t>on einanber geben. ®te ifi me>r obetr mimbec  
fec<sup>^</sup> ecfig/ unb Don aOen @eiten gefc6(o|fen\* \$eo  
Ttc<sup>^</sup>an'ua bte grōſeren Se<sup>^</sup>älter .in ben 7lpotl>ecien,  
ftelcfye bie flcincren cinc<sup>^</sup>licgen, unb bie fleinen (ān<sup>^</sup>U<sup>^</sup>en.

CELLULARES DUCTUS, ^cllctjgdnge, ftnb jene  
f<sup>^</sup>malcn StpfcOenräume an ben SRānbern ber 3e0en/  
bie man bcym £)urc<sup>^</sup>f<sup>^</sup>neiben berfelben (eid)t btnmft.  
9)?an nannte fie e<sup>^</sup>ebem aucfr vasa reducentia  
iutūdfubtcnbc ©efäge.

CELLULARES FOLLICULI, \$elien{d)la üd>q, fint>  
iene Heine J?5&Iunflen , t>eld;e ubtvail \$mifc&en bm 3U  
'en , unb jtutveilen an befuummtcn &uflenfefec regels  
mäßig gelagert fmb\* ©ie finb gen>5&nlic<sup>^</sup> grōger als  
die SeUengänge/ unb \$uc 2lufna&me bee eigenen ©afte,  
n>ie beg ^arje<sup>^</sup> bet) 3label&6l\$ern, ber 3J?il\* beo £us  
p&orbiten/ bed Oe&iefi in Sitronenfcfralen befBmmmt

CELLULARKS GLANDULAE ^Birb./ Je l l e n b r üſe n,  
nennt man biejenigen / bie blog au<sup>^</sup> ^eaengemebe ges  
ftilbet finb, 'un<sup>^</sup>.in feiner 93erbinbung mit bm &v  
faſen fieften. ©If fcftainen Oaju bejlimmt/ einen ©aft

auSjufonbertt/ unb beißen bafcer **a u s f o n d e r h e**  
Jjrūfen. SBenn fie in SBlumen ft\* beftn&cn / netmt  
man fie. «?>orngbrufen, tflectarten.

CFXLULARES LACUNAS, % e l l t n l t i d e n , ftnb groffc  
\$of)(en / beren SBánbe fclbft toiebet auS 3eHengen>ebe  
fcefleben, & 35. in SPAROANIUM.

CELLULARES PORI , f# *Inc onspi c ui pori.*

CELLULARIA DISSEPIMENTA, \$ t | i tt| QtVO tk Clt ti t  
ge &d>eibevoanbe, fint) ^fctejéniflenv Wld&e b(og  
Dur\* Sln^ufung t>on einer 3)?affé Don JeHengemebe ge^  
bilbet werben; wie an GLAUCIUM. gj}an nenntbiefe 9lrt  
ton ©C&ebetV&ben and) *Dissepimenla spurict,*

CELLULOSA RECEPTACULA AERIS ACCIDENTIULIA, f\* Lar  
cuna.

CELLULOSUM , nennt Ktc&arb eitte Srucfyütre, bte  
vielfächerig erfç&eint/ abec auf einem einfächerigen  
Fruchtknoten entfianbcn if?.

CELLULOSUS , 5e II tg/ nennt man irgenb **etwas**,  
toa\$ Ubt' Heine unter einanber t>erbunbene Spδ^kn bar?  
ffeDt/ n>te bie bed SeHengemebeg ftnb; m\$ aug 3e(^  
lengeroebe befiebt *Cellulosa Bacca*, beren gletfcf)  
mit Senen burcf)\$ogen iff/ ffi am Aurantium. *Cellu\**  
*losus Fructus*, iff bie Sructb, am SKetfigeran bcit  
j^appern / n>o bad 3nnere becfelben in mebtere un?Uid)t  
3cUm ober ^Sblen getbeilt ifl/ in n?ctcf)cn bie @amen  
Uegcn; obne burcb eigene 6c^eiben>anbe tJOn einanbet  
getrennt jufepn. BüHiarb\* *Cellulosa Radix ifl an*  
me&reren rfibenartigen SQBurjeln bep intern SSerberben.

CELLULOSES COMPLEXUS unb CONTEXTUS, f<sub>A</sub> Stra  
tum *ceilulosum*.

CENTIMÈTRE, = 4 Jinien Unb J&^

CENTRALIS, tt>at ani ber Wiittt fterDottreibt/ in  
bee mttt flebtoberliegt; J. &• *centrale Albumen*,  
urn welcbed bet <embrpo becumliegt / ber e\$ entn>ebet  
ganj t>erbirgt/ obet trie einett Sting emfd)li^e; *Cen*  
*trale Dis\$epPmentum%* ttemt'lk Scheidewände

\*

mit 6er Sruc&fadisfe jufammenjanaett/ unb mit bet SWfc  
ſic& turn Den \$3anben bet fituth trennen j *centratis*  
*radix bulbosa*, bie ben etengel au\$ i&rer Sftitte  
fyert>ortrei6t/ foie an *GALANTHUS nivalis*, *ALLIUM safi-*  
*vwm*; ober noas in bet *COULE* flebf / tote F Z o s *cen-*  
*traits*, bit SSolumen in bet 3J?tte bet *CC&ei&c* ober bet  
*Colfte*; *Neclarium* an &r \*lefTel; *Petiolus*  
an einem fc&ifbformiden S3(afte; *centrale recepto-*  
*culum seminis*. bet) ©artner, ttjelc^e^ enfweber fe6(f  
bee *S&C* ber 'gxuc&f 6i(bet/ ttie an *RHODODENDRON*  
ober mit bet gruc&fac&fe t>erunben if?/ ttie an *CrM-*  
*BARIA*, ober ton. bem tnneren EKanbe ber ©cbeibeftanbe  
*Sebilbet IDivb*, tt>te an *TULIPA*; *centrale semen*,  
tt>emx bet (Same an ber 3lcfse ber grudjt figt; fp foie torn  
Enbrt)o, tpenn berfe(6e in ber 2lcfse be^ En>eiff e^ r aifo  
mitten in bemfe(6en/ liegt/Ober bie 6omen&aut ganj au^  
futtt; *stipes centralis* tvenn ber @frunf in ber 3D?tte  
beS Jjuttf befektigt if!/ t>ie an *ACARICUS campastris*.

**GENTRIFUGA RADICULA**, nennt man fcatf 2BurjeI^  
c^en im ^eime, tvenn bie ©pt?e beffel6en t>on btr  
Sle^fe ber grucft lvegfleric^tet iff / unb jmar abfolwt,  
t e^y einfac^er ^ruc^t/ relativ bet) jufammengefegter\*

**GENTRIPETA RADICULA**, n>enn bie Saftf berfel;  
ben gegen bie Siuffenfeite/ ober gegen ben Umfang ber  
Fruct geric^tet if!. Sructt toirb fjer im adgemeinen  
genommen. *Centn'peta Semina^ beten* 92a6e( nacht  
bem 3Ritte(puncte ber grudge gertdijset ifi-

**CENTRUM**, ^fiirte! piincr / »irbfaf! immer  
ttur t>on bem SRitteljouncte ber gi^ur/ utib nur im 3lfli  
S^meinen Don bem 3Rittelpuncte irejenD etne^ 6orperf  
flrtrauc&f. *Centrum M Centron* f. 6cp (*Jalcar*).

**CEPHALANTHIUM H^arb/ f. Flores capi-**  
**ta ti.**

**CEPHALODIUM 2f\*arfub/ bat Xn6pf<hen**,  
iff Don bem SRapfcjen (*Patrilula*) nur dadurc^  
unterfeyiebeh/ bag eg met)t cont>ep iftr ba\$ bet Rand  
Oaranfafl immtitfeWt/ unb das es me drc unregelmäfig

iff, <E\$ tritt a(f Keener J̄potfer *auj* ber SXinbenfubflanj  
f̄ert>or, iſt ^~~tx>f>n̄c^~~ gefārbf/ fcalbober ganj fugel\*  
fōrmig, gbroeUen oben *txoai* eingebrutft, unb etmad  
geferbt, felfen ein n>entg seflielt, t>at / unt) mit einem  
ben \$Eimbl̄cittd)tn̄ abnlic&en SParendjgme angefuDt, bat  
cnttotbtt grucfotfōrner / ober\* aud) 3ellen unD Slafen  
zugleich enthält.

**CEPHALOIDES**, fnopffōrmige **flechte**n,  
Flechten mte fnopffōrmigen gruc^tbcbältern am Snbt  
der Zweige des Laubes.

**CEPHALUM**, f\* *Capitulum*.

**CERA** S&ompf./ ein Principium immediatum  
*bvitUv* Slaffe an Den ^PfTatijen.

**CERACEUS**, f\* *Cerinus*.

**CEREALIS**, t>on (pflanju (bet) und Suropaccn, @ca;  
fern) Die S5rot gebem

**CERINUS**, r o a ^ e g e l b , aufē tote *SQafyg* glānz  
gend.

**GERNUUS**, genei'gt, übergabogen, i(! ein  
Mitteljustand jtt>ifd;cn ^ān^cnb un> nicfenb (*nutans*)  
toib abet gar febr oft bamie t>erf>e<\$et> 3)fan nettnf  
einen @tengel genei'gt (*caulis cemuus*), n>ent  
er aufrecyt ift/ unt) nur feime 6pi@e eine ^orijontale  
SXicteung &at/ tt>ie tDi'Ub. fagt/ ober gegen ben Jporijont  
^erab^ebogen ifl, n>ie anbere ibn beftnieren; obertoenn/  
n>ie Bern&arbi fagt, ber ^ntertbeil aufrec()t/ ber  
Stütfelf&eil tvaflrecftt, unb ber S3orbert&eil berab&äiw  
*Qtnb* ifl. (*Ebenbte\$gilt and*) tum einem *Flos cemuus*.  
Sine Ki'fpe genei'gt tvfe an MELICA *nuians*; einen  
Blumenfti'el ober eine Jfaube übergabogen/  
n>enn bie @pige bed 95lumen(?iele^ ober ber Sraube auf  
bie @eite ober jur €rbe gebogen ifl. £iinné t>erlangt  
t>on einem übergabogenen Slumenfiele nod) in^befonbere,  
ba§ er fleif fep unb fi\* ni\*t biegen laffe, n>ie an CAR-  
PESIUM *cernuum*^ CARDUUS *nuians*, BIDENS cer-  
**nua**; BuIIiarb n>iQ aber gerabe bad Entgegengefe\$te>  
**Schlaf**ft, unb twlangt/ bag badjeltige/ toaggeneigt

(cemuuus) jft, geffürjf feg- ©ne fibergebogene Urailbe iff an CoNVALIARIA majalts. Eine Umbella cernua ifl an PIMPINELLA peregrina. Eine Thee a cernua ifl biejenige/ bee' an ber 25a jfa ges frümmf i{l, rocc an HYPNUM Ruiabulum. 95ep Büs liard ist cernuus unb nulans t>UMd)t nid)t ofynt (Stunt), synonym.

CERVICULATA APOPHYSIS , b'tcf&alfiS/ ninntmait den Slnfag / .n>mn er alg \$ovtU§un& bit 2f)eca ünt voll ©amen en^eber in eine furje -2Caljc obec in eine Kugel jufammengejogen tx>irf>, toit an DICRANUM cervicratalum.

CERVINUS COLOR, &jrf4>braun«

CERULOTRICA CILIA, ifotnattiQ frau&ge\* vounbene t P n n p e r n , Die am ©runbe hornartig oermac^fen / unH an bet; @pi\$e manniQfaUiQ gewunden ftnb / (ie[>en an TORTULA.

CESPIITIUS unb CHSPITOSUS L., r a f e n a r 1 1 g/ ftenn nte^rere blåfrige @tenge( aug einer unb berfek ben SBurjcI fe^r bid)t bep einanber fieften / unb aucf; öfterd too(> foçjar butc()floc^ten ftnb / tote bie Safern tm Soufe. SKan nennt abet auc^ jene tyflanjen cespitosae, berett ffiurjelblatferfef)r t)id)t bet) einanber ||v btn, |x||b gletc^fam SRafenftücfje ju bilben febeinen. Seo^ fpide t)on beoben jlllb CAMPANULA cespitsa, SAXIFRA-GA cespitsa\* Frons cespitsa ifl an CONFERRA cespitsa, too mefyrere baarformige 3Bebe( aud einer 3Burjel ^cruorfommen ^ unb ftcf) nad) alien @eiten tote SKafen au^brdten. Cespitosae paludes fñO bit Sorfmoore,

CHAEIA, CHAITA^ f, Seta\*

CHALAZA (fidrtner, ber<?>agel ober ber innere Wabel, ctit ýpunct an bet innectfen ^aut, ber bie 6tette anbeutet, m fie t>on ber SRabelfc^nur burdjbo^rt toirb. Siefer <Junct if! flemöbiilid) gefärbt/ unb bilbet einen fcOtvamm^ea muliltgeti gorper\* @r Itcg<sup>t</sup> cnttveber

unter bet Slavic ober jufloelen siemltcf> n>ett baton tntt fernt/ unb bann nennt man t&n Rap he. & iff mef\* jens schwielig.

CHARTACEUS, papjerartt'g. @o if! \$• 55. bee elaffifcf>e tmnne Arillus an OXALIS, tin aril I US char\* taceus, unt) Die Jpaut me&rerer gac&er.

CHLOROS, in Sufammenfe&unflen aug bem @rie\* d)ifcf)cn glcicftbebcutenb mit Fi?i?//5. £)nf)cr aucf) Chlrosis, BIet4>fuc^t (*Etiolomeni*), twpn Die grüne Sar6e t^erbleic^t, unt) bie ^Pflanjc wetglid) n>ttb.

CHORDA PISTILLARIS (Torrea/ f. *Stylisc us*.

CHORION Wlalpiigb. ^ cine 6ret)arf?ge Flüssigkeit, n>dd)e/ bor bee SJcfroc&tung / bie ^anjc 5)?anDcl ju (ilben fc^eint / unb bie mit ber SKeife t>erfc&tt>tnt>ct.

CHRYSALOIDEAE COTYLTDCNES, P Up P Ct| & J) nU t d>e ©amen la p e r t, finb an Convolvulus, n?o fie einem unreifen , in ber \$uppe Hesenben ©c^mctter; lénfle a^nHc^ finb.

CHRYSOCOMUS, mit flolbgelben ^elcfcfcftuppen obec ©tra^Ienblümc^cn; tvie an ben ©naptalien i\*nb ^ r ^ fant^cmen.

CHYMIFERA VASA, & *Spiralia vasa*.

CICATRICULA, vi a r b e , jene? Junct an bee ©a\* menftaut, an n>etd>em bie Sffabelfcftnur an ben ©amen befeiigt ioav. 9)?an unterfc^etbet baran &n>et) mef)r eber minber beut(ic&e S^etle, bag *Omphalodium* unb ba\$ Foramen. 3fm affgemeinen ifl abec Cicatri-Qua unb Cicatrix, tfarbe, ba^SWa^lan irgenb einec ©telle, roelcfyed entf?ebt/ na^bem irgenb ein Xt)til ffd) t>on berrelben Io^se(6fet bat; j. \$. bie 3?ar6en an bem Stengel unb an ben Sleflen, toelc^e bie bafelbfl cingefülfiten flafter uac^ iftrem 2lbfaUen jtufudiaffen.

CIGATRISATUS, txavbiQ, xoas\$ mit SRacben t>erfe^ &n ift, die ber *Caudex intermedius caulinforniis*, Don ben abgefadenen Slattfhelden an CYCLAMEN europaeum narbig if!; tote ber ©tengel (*cans Us cicatrisatu9*) an vukw gupfyotbimi an der Bas

*fig beffefoen* (eintge Gotten, bafran ēmem *Caulis rfcatisatus* KeRe ber aorigen flafter oor&anben sepen, (*Ramqpta*); n>ie ber tt>ur3elftorf *an POLYPODIUM vuh gare*, bet bur\* (ja« 2lb(?erSen ber ©trifnfe SBertie\* tungen unb SHarbēn auf ber £berffād)e er&alt j foiebie -flefie (*Rami cicatrisali*) *an EMPETRUM nigrumtotn*

\*\*\* *noytauuenen*

**CICATRIX FRUCTIFICATIONIS, Befruchtungs-**  
**narbe**, jene *t>on* Curpī entbecfte ©tette an **der Narbe**, too ben ber ^efrucfotuna ein efoener Sanal (*Ductus spermaticus*) (tcf befibet, ber bie **befruchs** tenbe SKaterie in *bag* ©amenforn leitet. 3n tbrer **Nachs** tarf^aft licgt ber *Zcim.* ©. a. *Cicairicula*.

CICHORACEAE bepUaiUant/ tnb bft *Semiflosculosas* Cournef , unb bte *Lingulalae* 6e> Pontefcera. Sine Orbnung beo 3uffieu.

CIUA, VJ p'impērn, etwa\* fieife ^aare, bie am SZanbe einer %lād)t metfiend parade! nebeu etnanber tit ecner unb berfelben ^bene mit biefer §(a<\$e, unb öt einer *tinit \$Ui< b* entfernt *fiefon*. *Qafot* aucfr bie abw licfbeit Organe *an bet SSIfoo^buc^fe t)orsu^n)eife Cilia* (tPimpērn) genannt werben.

CILIARK unb CILIATUS, 'xoxmpttlq, im **eigente** Li\*en ©inne, mg mit SQSimpem befegt ij# \$. ^ 0 1-?/a/Mm *Anthodium*, tocnn bie 35latfc&en beg ge^ meinfcbraft<cf)en flefcfce\* am 3lanbe mit fleinen feineit ungfeicfeen Sorftenbaaren befegt (tnb, n>ie bie Cyani bC) ben €entauveen; *cilia ta Brae tea*, an SAL VIA austriaca; *ciliatus Calyx* an SALVIA pratensis; *oiliatum Folium* an THYMUS serpyllum, CNI-**cus cilialis**; *ciliata Ligula>* bit am dlanbt mit toeit au^einanber fieftben furjen j^aaren befegt ist, \$ %. an ANDROPOGON *Gryllus*; *ciliata margin>* an bem fyixtt einiger qJilje; ein *Teristoma ciliaium* an me&reren 9Roo^bucōfen / bie feime toimt perartige Sortfegungen bilben; *ciliata Petala obec laciniae Cor oil ac* an RUTA unb MENYANTHES.

*toi*

*Cm. Cir.*

3n einem tteifeten ©inne nennt man felbfi b  e *ftantcn* ober ©raf&e am Stengel hoimperig / tve  n jie mit pa; raffel tfefrenben J?  rcfoen ober S&orjlen befe&t fug, tote an einigen ©alien, •j - 95. an GALLIUM -Aparincj an VEHONICA *Chamaedrys*. %m ftitifsm &innt tnblitf) ttenttt man ctnen *Pappus ciliatus*, n>enn We etn>a^ jufammengebrifcfen (leifen 95orflen (*Setae*) an ibrem SKanOe *tvicbcv* mit feinen i?trcf}ea 6efe@t ftnb; mite an HEDYPNOIS; unb **tuobl** duc^ elne *Spica ciliata*, ttenn ^a'are jtrifeben ben gilwincfoen (ie5Vit/ obec t>ieb niebr, n>enn / tt)fe an MELICA *ciliata*^ jebctf einjelne S3lumd?en n>imperig t(i. gnbltcf) tt)irb ba^ 2C  rtc^eit *ciliatus* nod) ofterd mit anberen, bie Silbung bed SRanbe^ irgenb etnetf Organe^ bejeiebnenben aB  rtem **terbunben, j. 5\*** *ciliato-dentatus, borfliq* ge\$&bntt roenn bit inncre ^ctbe ber 3<^fne eineg bop^ pelt qcjaf)nten Wauled mit \$abnen uhb S3or|len ab\* tt?ed)felt; *ciliato-serratus*, tt)ie bie S'apfel an CAREX *arpnaria*; *ciliato-spinosusy* rote **bie** 23(after an CNICUS *acaulis*. *Ciliatae* ftnb CilC \$at milfe beo Batfcb.

CIMICARIUS unb GIMICINUS, *toa& nac^ SBanjen tiec^t/ tt?ie CRRIANDRUM sativumy RIBES nig rum in feiner 3nfcf)t.*

CINCIWNATA FOLIA , f. *Tortuosa* unb C/r-**rkata.**

CINCTUS, L., n>ad ton trgenb einem ZhtiU **um^** geben ober umfr  llt i(l. 3?arf Bern^arb  ; beffen ©cb tenffac^en ton bem SRanbe eine^ anberen Xbetleg urn; geben ftnb. **3 o ifi bet)** RUTA *ba   Receptaculum punctis decent cinctum, be?* LEONTODON *Calyx basi sqnamis cinctus; semen cinctum, an ARE-NARIA, 13 R YON I A.*

CINERASCENS, to11g11'd>afd>g ta u > ein9Beip/ bai nut tocnift Mi ©raue jiebt, unb fid) bem afcj?; grauen n^ert.

**CINEREUS**, afc&grau/ ein bunflered ®tau

*alt bat SSorige / ber Bathe bet 2lfc&e 'a&nlic& , i« 35.  
CENTAUREA cincrca.*

CINGENS, *mi irgenb tttoat umgtbt, \$ 95. C-  
tyx unb Glandula german cingens hit) LAURUS.  
<§. cinetus nad) Bern&ar&t.*

CINGULUM ^ebroig, f. ./in/iuZiis filicum.  
CINNABARINUS, 31nno ber rot&/ öftcrS syno  
npm mit *Miniatus*.

CINNAMOMEUS, 31 in in t f a r b e n f unt) nach  
Stmmmt nécfyenb oDer fc^mecfmO\*

CIRCA, r i'n g a u n t / in S3ccbint)un8 mit irgend  
eimcrn 3Borte bejeic^net / bag ba^jentge, n>ot>on bit  
SRebe 'tfl, fid) ring^um bagjenige beftnbet, »omtt bat  
SBorf circa in Serbinbung tfet)t

CIRCINALIS L., au#\* CIRCINATUS, ^ntdtm  
f ö r m i g , a u f g e r o l l t ; wag auec, eonber ©pifte  
fle9cn btc »a|ig bin, auferoft 1(1/ »te eine §aav  
focfe auf bem 8Biddeifen. So nennt man einen *Stas*  
4>el aufgerollt / (4 c u / c u 5 *circinatus*) itfcnn er  
mit feiner ©pifie na\* innen aufgeroOt ifl; ein Blatt  
feftneefenföcmis / obec Dielme&r erne 2\$ no ape schönes  
cfenförmig/ (na\* Batfty gefräufelt) tt>enn ba«  
flanje SBlatt in bee *Snotpt* auf fcincr Wiittlvim ton  
ber ©pjge nach bet SSaftg fo aufgeroflt iff/ ba§ bie  
äugerc eeite nad) innen/ unb bte inncre nadfr augen  
fommt; j. 95- an *bin* garrnfräutcrn. Ein *circinatus*  
*Pedunculusy* ber fi# fcftnerfenförmifl juſammen^  
roUt/ i(l 6eo reifenbec gcu\*t, an LYSJMACHIA m-  
morum unt) an CYCLAMEN europaeum. 95eo jD^cam  
fcolle unb BuHiarb ifl *Circinatus and)* fononom mit  
*orbicularis*; bepanbeW rait *cochleatus* unb  
*spira lis*.

CIRCULARIS, fr ci u f ö r m i g / eiflentli\* nur  
ber Umrig etner ^ugel / ober ber ilmfang einer teller\*  
ffirmigen giac^e (*orbicularis*) momit man ct oft Dew  
wechfelt

CIRCUMCLUDENS, uttif\* lief €n b ^ »enn em

ima&nlic&er Zfott eft^tt anberen uniflürtet, aber juglech am ganjen tonercn 9tanbe mit ibm t>fn>adjsen if!.

CIRCUUCLUSUS, u m f c b l o f f e n , ber • St&eff/ toeldjem em anberer fo rtngefügt iff/ bag biefer urn\* fc&liegenb . (*circumcludcns*) ttirb.

CIRCUMDANS, u r n g e b e n b / <tnf&eit/ ber ci nm flnbwn fo aorbirgt, bag biefer babon umgeben (*circumdatu s*) Wtb.

CIBCUMDATUS, u i t t g e b e n ; tioeiin ein Zfyi| »on rinem anberen an feiner ©runbfad)e toeirbotrlcn n>irb.

CIRCUMNATUM FOLIUM , ringaumwac^feit/ ntnnt Jyayne tin S5!att im ©egenfafce t>on so/u^um unb circumscissum, wenn e^ birf unb fleicfeifl, unb an feiner ganjen ©runbflaçfte mit bem ©tengel ober mit ben Sle/Ien berbunben if?; \$• 95. an%S£»uM *album, villo sum.*

CIRCUMNEXUM FOLIUM, runbum perbun; ben, nennt &ayne ba& 35latt an SEDUM sexangu lare, bai runbum an feiner %afi& angebeftet if!.

CIRCUMPOSITIO, T t b l e g e r / marcolte, ein9lf!/ ber noc0 an ber SBblutterpflanie bängt/ ber aber, nie; beraebogen in Srbe ober 5(J?oo^, bafelbf QQurjel tretbt/ er ma& un&erfeftrt geblieben ober eingefcfnitten ober gebunben worben feon, urn eine VTülf (bourrelet), bert>oriubrinsen / auf toelber bann bauftgct QBurjeln fommen.

CIRCUMSCISSUS, L., hat berfc^tebene Sebeutun\* flen. ®fan nennt eine 2 U p f \* l runbum in ber XTiitte auffpringenb (*circumscissa Capsula*) wenn fte eine trorfene fugelige \$tud)t bilbet/ biębur\* eine borijontal ring^umber laufenbe <5paltt fid) offnet/ imbficb in \$>e> balbfugelf^rmifle JNaopen tbeilt, tt>ie an ANAGALLIS. 2lm HYQSCVAMUS bftiUt (it fid) auf abnliefte SBeife oben / am portulalf an ber Basis. rt von Frucht hülle, unb nanntepe tyxidium. Circumscissum folium^ iflgKu&bebeutenb mit adnala-sessiU\* for-

*cumscissum* *V e r i d i u m , i s b r e i g z e r r e i s s e n d*  
*ifteinllmfolag, bet tunbum serreigt, fo bag ber obere*  
*£&eil ft\* bon bem unfeten töte ein £fetfel frennir, j. ».* « «  
*ber ©attung ARCYRIA. Kunbum aMffpringeno ill*  
*fine &autftud>t, ttenn jtē in bee SRiffe runbum einen*  
*9lig oefommt, unb fo abfpringt, totē j. S3. an AMA-*  
*RANTHUS. ©. a. Ruplilis.*

*CrRcoMscRiPfio, L., Umri'0, bie 9aUttit*  
*buttt) bit äugertfen q>uncte einet SIä\*e obet emt\$ Gtot*  
*»<tg, obne aae SRücfftcbt auf bie dinbiegungen / &e\**  
*joagen ttirb. »ei> einem eitfarten SSfatte i(i alfo bet*  
*Umrii b. er SXanb be^ 55latte^ felbst; btt> einem iufam#*  
*mengefefcten bin9<fl<n «ne imaflinare but\* aOe augctden*  
*^uncte bti SSlatti laufenbe £ime.*

CIRCUMSCRIPTUS, umf\*rieben, fagt man  
ton acfär^en 2&eiien, n>enn Die Satben f\*atf t>ot  
einanbet abgefembtten jtnb.

**CIRCUMSEPIENTIA FOLIA, umbüllende Blät-**  
**ter, bte be» ber Sfiafrt (im Sc&Iafe) fidr in Form**  
**tint\* 2rtcfrter\$ aufticbten, aW ob fie bie jungen Erieb**  
**fclrif&en woaten, »ie an bet MALVA pemviana.**

CIRRHATCS, r « n \* e n f 6 r m t ' g , »a« bie Sotw  
einet SKanfe f>at, obet ben ©ienfl berfelben letflet, j.  
fb. bet 23lumenfHel an einigen paulinicn / ber gemem\*  
f\*aft!i\*e Slattjitel an einigen SRfmofen. aKan  
nenni a u \* / o Z / a *cirrhata* gewunben, »enn fientcot  
nut anf bet gl5«e / fonbetn auti am SJanbe unb. «»  
bet <5pi|e auf mantbetleo 3(tt gebtefft unb getoBt |«no.

, CIRRIFER<sub>DS</sub>, itgenb ein 'S\*tt « . " p » J « 2  
bet SRanfen tfagtj fo id ein *Caul" oirrln/erus* an  
ben Bürb/fTen, «in *Pedanculus oirrhiferusan*  
CARB.OSPERMCM, VITIS; ein Pe\*/olut cirrai/e-  
ru« an SMILAX.

CIRRHOSE PIWNATOM, f; *Cirrhosum* **r a n k i g e s**  
CIRRHOSUM IOUIH, 1", effr **mehrere Ran-**  
**S3!att, ba« an feinet 6»i6« in ««< c6<|: mehrere Ran-**  
**Jen ubetge&t, j. 35. GLOMOSA superba\* FUMARIA**

*capreolata* utt) *clavicolata*. Sftad) J&ulliatb if! abet b̄teg nur ranHnf&rmig, unb *cirrlosus* bebeutet nach ibm einen gemeinfdfaftlichen SSIfattfiel, ber fid> In cine tt>abre 9Janfe enbet/ roie anLatbyrus, we man bann foldje Slatter auch *cirrh'osa -pinnata* L. nennt, t»rlfvantig gefiebert. Sin 3}ooften nennt man aud) Slättcr / bcren @pige in cini>aar fid) endet, *folia cirrhosa*.

**CIRRHUS**, L., btc K ^ n P e , (Babel/ cm grüner, fadenförmiger Sörpcc am ēnbe ber gemeinschaftlichen SSIfatttele/ bet) jufammen^cfegten Slättern/ obet am ©tbe ber SKtttcirippe einfad^er flätter, obec an ber ©pige ber 35lumenjicelle, ber meifien\* fptralf6rmi9 Qt'< bi'Ci)t, balb cinfad) unb ba(b dffl^ i(?) unb tvoburc^ bit \$flan\$en an naſefle(>enben Sörpern finnaufflcttcrn, binanranfen, unb fid? an benfelben er^alten/ j, S3. Die SHanten an £vb|en, Keben.

**CISTA**, i|tbe9 ©copolieine breijfac6e©amenbuffe# Don ftelcfter Die äugere bautig / bie innere faftig obec fletfd)ig, bie mittlere bauttg , md)t auffprtugcnb if?/ tt>ie an PASSIFLORA, LIOUSTRUM ; btx) J&ctnbatbi jene **Samenhülle**, in tvclcljer bie (Samen am ©eroölbe (For-nix) befeftist finb

CiSTELLA, f» C IS tula.

**CISTULA** , bai hl̄fed>en, ein tugcligeg, anfang\* Sefc&IoffeneS Srucftlager am gnbe beg ?aube^/ bai mit naclten ©amen t>oUgefiat Iff, bie an gäben hāns gen/ unb emen jfern ju bilben fdjeinen, bat aber spä: ter auf eine unredelmägige SBeife auffpringt, fid> enU leert unb b^bl wirb / tioic bie LYCOPRRDONES , SPHAEBOPHORON © a. *Gongylangium^ Sphaerophori*.

CITRICUM ACIDUM , eine \$Pflau\$enfaure / beren Eis genfebaft bie ebpmtle lebrf-

**CITRINUS Limoniengelb.**

CLADOS , in Sufammenfegungen aüg bem **Griechis-schen** flatt **Ramus**.

CLANDESTINUS, vttbotgen, toat man niccf  
**deutſtlič** ſte^t / J. 35. Blumeii (*FI ores clandestinē*)  
 Die in ifcrec £uffe t>erblüfen / o&ne Dag man fie Deut\*  
 Iic() unD leicOt bemeeff, j. 33\* SILENE *clandestine*\*;  
*Panicula clandestina*, eine SXltfpē , bit toabrenfr  
 ibceff S5er6tu6eng in Dec Slattfcfreibe t)er6orgen bleibf.

CLAVIſFonMis, E, f, *clavatus* a, um,

CLAVATI PI LI SIMPLICES LYMPHATICI, f, &im\*

### *Jilices p Hi lymphaticū*

CLAVATJM CORNU fiOillb. , f. *Ala*.

CLAVATUS, L. , te u len fōr m t g / mi anCer  
 6pi6e fc>tea tcvbi&t utib fiumpf juauerunbef ifi, tv  
 flentUd> nut Don Görperformen; fo ifl Die ©ranni  
*Arista clavata* an AIRA *canescens*; Dec deleft feu\*  
 tenfōcmig an ftieieu ©ilen cn; Die \$apfel an PAPAVEK  
*Argemone*; Die SMumencone feulenfoćmig / n^em lie  
 eurildttig, unD Die 3ib(orc uacl) oben aOmd&(^ t>ec^  
 Ditft (nac^ Batfifc tvieDec ettpa\* t>ecengt) unD juge\*  
 tunbet ifi, vôte an ALOE *verrucosa*; bet ©taubfabett  
 feufenfoćmig an YUCCA *aloifolia*; bit ©tfifen ait  
 PASSIFLORA *foeiida*; bee ©aftfaben feulenfōcmi8  
(*Paraphysis clavaLa*); bai Perigonium ifl  
 an Dem SPHAGNUM UuUnf&tmiQ; Dec 95(umen(!tef an  
ANTHEMIS *clavata*; aud) Dec Blatrflie'l iE e^ ūfrer^  
Sinfeulenfoćmteet Sput, (*Pileus clavatus*)ivenn Dec\*  
felbe étnen mitt DemStrunfc gufammenljångenDen feulen^  
förmid*ci* Söcpec bitDef, iff an CLAVARIA. ^eurenfirmrl^  
Sleftean Dem SRoogfiengel(*Ramuliclavati*) fmb a|| bet  
ToRTULA *ruralis*. ^in Hecep taculum *clava-*  
*turn* XoAd^ti fce^licf) cic&tiget Spadix *clavala* ge\*  
nannt n̄it / iff an ARUM *maculatum*, tt>0 bet jfol^  
ben cunblich/ nuc untenmit ^lüt^en btbt&t, oben bet\*  
Dicft unb jugecunbet i(t/ aud) an ben HYMENOPHYLLIS;  
tin *Styius davalus* ifl an LEUCOJUM *vernum*;  
unb ein <\$ti\**rma* *clavatum* an SA^TOLINA.

CLAVICULA, CLAVICULUS, ♀ Cirrhous.

CLAVWORMK, n a g e l f o r m t ' g , toenn ble®tlittnt  
rānber nad) ber 0pt§e ju plōgltd) tyre 9Kd)ti.ng ier\*  
ändern, ilavt auffeinanber fasten, unb beflo fdjneUer ff&  
gegen Die 23afte ;u roieber näbern.

GL.UTSILIS if! nacf y Ktdxub ein lattgfuñi^cr €m^  
bryø, beffen OBürjeldjen atte^ WcbviQt \*öUi& ctnfcfelc^/  
ft)ie an ZBA Mays, Coix.

CLAUSUS, gefc^lofreti/ ttmm eine Oeffnun^<sup>4</sup>  
entmeþcr Durd) ba^ Sufammentretm ber 9Bānbe obec,  
buccb frembe baran 6effitb(ic5e @6rper Detfd^toffet iff; W  
ill j. ©• bee field) am SRettige nur burcfo bie na^e unt>  
an ben \$(umenblttern bicf)t anliegenben Slattc^cn ein  
*Calyx clausus*; &je Slumenfrone an MKLAMPYRUM  
nur burc^ ibre IBanoe flefd)lofl"en/ unb etne *Corolla*  
*clausa*; an THYMUS bmcQcn tñi bee ©cftlunb beg j?ek  
c&e^ buccf) Soten eerfcftloffen (*faux villis clausa*)  
unb an GYNOGLOSSUM ber Sdjlunb bet **Blumenfrone**  
turd) geröblbte 6d}uppen geicbloifeo (*faux clausa*  
*squamulis*). *Fasciculus clausus* i! derjet  
tiige, beffen Siefte gebrängt eingebogen |tef)cn. Sin  
*Hectptaculum clausum* baben n>t enblich an bet  
Jpefff\*/ t^o e^ eine fusfle^ obec btrnenformige Oeffalt  
bat, innenroenDid f)omr unb an feiner inneren Sfac^e  
mit ben ®Iumen befe&t iff. *F lores clausi* (aucfe  
oftert *inaperti*) nennt man 6alb btejimgen/ beren  
Slumenblätter ober €nfc()nUte ft\* nie t>on einanber  
tntfernen; balb biejentgen/ an n>elct>m ft<^ biefe S&eifc  
nict)t gcbörig enttvtfeln/ fete an SILENE *inaperta*.  
Sin *Sporangium clausum* iji an RIGCIA, rocntt  
e^ flett defJ(ojfen cbet mit einer ©pti^e berfe^en iff.  
*Vmhella clausa*, beren 9(ele Qtbtanst unb einge^  
bogen fte^en / jeigt (eft an DAUCUS *Carota* 6eo reifem  
©amen.

CLAVUS, t n u t t e r t o r n , etne Svantfyit an ben  
©amen ber @rafarten.

. GLYPFATDS, fd)ilbf6tmiQ, tm|b, flac^/ in ber  
Dritte etwas conver.

COADNATUS, *Smbf)tilld)CV* COADUNATUS, *UbtUttt*  
*2un>étlcn tttoai toai no&e iff, o&ne ffd) ju bcrüforen /*  
*oDer me&rere unter sicr t>ern>acf)fene Sörper. ©• Connatus.*

COADUNATUS, COADUNATAE, *titi titatUttUd)\* Ords*  
*nung bei) finni Coadunatut toirb aud) ali*  
*«©pnonpm t)on Connatus Qcbvaudjt, j. SB., jttiar*  
*fcfr uncigentlid), Bacca coadunata, an den*  
*«grüd)ten br tflagnolien, Man will jedoch etwas*  
*fcamtf 6c\$eicf)ncn, n?a^ @puren feiner Don'gen 23crbinDuug*  
*ober fünfzigen Srenttung an fid) trdgt/ nur tDenig ver-*  
*ft>ad;fen/ gleici)fam nur jufammengcbcftet ff{. Coa-*  
*dunata folia L., stnt)\* nur an ier 95afijj fecOe vers-*  
*bunfcen; ^>avne erf (árt te aber 5urd) gegenüberstehende*  
*flafter / beren Slattflicle an tder 35all^ zusammenfles-*  
*fen / J. 95. LONICERA 'Periclymenum^ Bernhardi*  
*überfegt coadunatum al\$ \$u{ammenQepa\$t, unb cts*  
*Härt e^ tmrcf) jufammen^eflefltc gørpcr, Die fid) mit*  
*tbren Sk cn fo bertüren, Dag man äugerlic; feme |*  
*Srennung bemerft. @. a. Conjugatus.*

COAETANEUM AMEwTUM, *ein gleichzeitiges Rätzchen, ist*  
*bagjeniae, totlchrt mit Den Slattern juglofd) erscheint,*  
*tt?ie an SALIX alia, ©pnonprn mit: COAEVUS.*

COALITIO, f. *Adhaerentia.*

COALITUS, tt>a\$ blog jufaflig t>ertt)acbfen iff; *in\**  
*toeilen jeDocft aucf) aid ©i^nonom t)on arfna/u5HnD*  
*coadunatus oDer Connatus, tt>ie e^ 8inne*  
*felbj! t)on Der kTlonabelpfccic brau\*t. ©ie ©raub\**  
*tcutel finD subcoalitae an SOLANUM, unD eine coalita*  
*Capsula ifi an DICTAMNUS.*

COARCTATUS, g e b r a ñ g f / gebraucht 5De<inbolle  
*um aufrecftte unD febr Di\*t geDrångt (iebenDe 3(eie ju*  
*bejeicftnem 9lHein Diefer Slu^Drud bejei^net jugleict)*  
*eimeinn>árt^ gebogenfeon De^enrgen/ marfgeDranfltlff;*  
*ein jenåbert <\$ti)n an Der ©pigej fo fluD an eincr Pa-*  
*nicula coarctataL., ivie an POA rigida, J3RO-*  
*mollis die Slefle mit ihrer Spize gegen sich und*

*ban fliittlait fltfe&rf; einige aerlangen aber, ba\$ an einer PANICULA coarciata jugleicfo aufr bie SBlumen; fliele faum lāncet ah? bfe QHumen, unb aufrec&t sepen. Sluct bēe gebrānflten 9lefle an ber POPULUS dilainaia finb mit ibren ©pigen nad) bem ©tamme ju einn>arts gebogen. (SinRacemus coarctatus iji an bcr OLEA. europaaa. Coarctatus Peduncu I as ftirb öfterdli tm (Stgenfafee >on patulus gefrauc't. Unb nicfjt felten ifl eS' tm @egenfaße t)on ertveUcrt/ dUatatus^ unb bejeidmet j\* 95. in ber €O?tte eingejosen/ unb an tfer 3pi@e unb an bee 93ajj6 ermeitere.*

**COCCATUS**, tojig, n>ag fo au^crcftntften If?, bag We SBuc&een SBinfel/ unb bie Sorfprünge 95ogen bilben.

**Coccineus**, fc^ar lac^rot^r toit Sovnblumtn.  
Oft fononom mit *Phoeniceus*.

**COCCULUS** obec **COCCULUM**, in? iebem ©fnne Simmuttt)um Don Coccum; bep (Sātnern aud) jebctf dntelne gac^ eineg *Coccum*.

**COCCUM**, ©pringfruc^t/ Snopf/ Sopf/ due 2Irt Don ^a4> (*Loculus*), totltyti mittelfi einer an ber 93afid beffe!6en gelegcnen ^auti^en Seber mit @en>alt, mit *dlaflicitat* auffprin^t, rofe an ben £u; p^orbtcn\* 2lnbecc nennenbag ©amenforn *Coccu*\*, roenn ed ein\$e(n in einec 3ede lUgt/ unb biese 3eHen ju wet)/ breo, fünf twtt>acf)fen (tub/ unb (larf &at>or^ ragltt/ tvie an *GALIUM*, CHEORUM *tricoccon*, an ben (Beranien, B&Uiarb nennt an einec Sruc^t, bie mehr obet minber runt) tf{, unb babei *btutlitf*) runbe Höcker Don beitimmter 3Jnsaf) barbietbet/ bie bur\$ eben fo Diele gängenfurfyen setrennt roerben/ jeben dies fer S)bdh,- und ba^/ n>a^ tnneuroenbis ba^u gehört, *Coccum*. (B^rtncr nennt *Coccum* eine \$n> obec mebrfäc&erige, armfamige / mit einem ©aulc&en Derfc^ &ene ^ruc^t, bie flett>S&nlic& an ben ©c^eiberoänben in eben fo Diele gefcfloßlene gaſcjev auffprinfl/ beveu jebe^ nur einen ober jmep Derfe^tliegenbe ©amen *cnu tyalt*, unb beren fnorpcligc obcr beinbarde 2Baut) mit.

(EfoffHcifdt in \$n>et> 'tflappen auffprinflf/ unb t)ab^ mcfr  
oder mincer tfcfr t>oit bem äugerēn Specie bed SPericar\*  
piūnis entblögf. 5)ifr€af?ccī&af fe&lf an manc&emCoc-  
cum, fīœ an IATROPHIA, MARCARITARIA.

COCHLEARIFORAIIS, (&a^ jmai: 'offerd (6ffelf6»  
mīg bebeutef) obec

\* COCHLEATUS, fcfcnecf e n f 6 v m i g , mi n>te  
t)ie @ān^c an bem gcm6bntcf)cn ©djnefcn^c&äufc gei  
tt)unben ifl, j. S8\* bag ©c&ldfdEien an PHASEOLUS;  
bie ^ülfe an ben meiflcn Slrten Don MEDICAGO, mo  
bie SirfeOinien fibereinanber unb ^jeſjet Me 3pt\$e tm^  
mec Neiner julaufcn, Sluct mc^rere *Coyledones*  
ftnb *cochleatae*.

COECIFORMIA RECEPTACULA f, *COCCiformia*  
v asa propria\*

, COEGIFOHMIA YASA PROPRIA, flttf Wit flUC^tf^  
flem £)e&le angefütte SRo^ren\* Kamonb cnfbecfee fie  
in' ber ©c^ale ber Srücfre ber ©olbengemać&fc\*

COENOTIALAMI , Q tlit C I H \) Su fl g e **fle** **dh**;  
ten, ftnb 6er> ?fd)anü6 Otejcnigen/ beren Fruchthez  
halter {urn 2l)ei(e aud ber ©ub|lans bed Saubeg **zusam**  
mengesegt ftnb.

COHAERENS, 3 u fa men & a ng en b/ mad mit  
fetner Saffd {ufammen^ändt/ ntc&t eingefiift iff/ fad^  
2DecanboUe» ^nbeffen ftnb bofr bie @taubbeutel an  
EUPHRASIA, OAOBANCHE, an ben Vtild>en (*Anhe-  
rae cokaerentes*) auf) an ben &eiten unt> anbtt  
© \* % jufammen&ånaenb, unb bie 3å&ne an bem Manic  
manner 5)?oo^6üd)fe ftaitden an ber inneren Reihe ges-  
radezu mit i^ren <3vi%om jufammen, SBep **Billiard**  
bezeichnet cohaerens ttmi, toai ctnea S^ei( eitted  
anberen augmac&f, tin ©egenfage Don adhaerens, toat  
nur aufgelfmt beo ibm be\$eicfrnet. 5S>an gebraud^t ed  
im ©eflenfafce Don adhaerens, inbem cohaerens eine  
fo innifle 33er6tnbunfl audbrücff, bag btejentflen Xl)ciU,  
welche jufoneuf)an(jen/ cohaerentes fmt>, tin ®ant  
ies, em ©tūct bilDen, biejent^en £&eile abet, bit nut

aneinanber Ijangen/ *adhaerentes* ffnb, fcerbunben jtnb, ofcne ein @anje\$ ju biUfen. 2fn ber Kofe ift bie 95lumen\* frone *adhaerens* am \$eld>e ; im THESIUM, cm DAPHNE / tft fie *cohaerens*. <g. conmrifus unb *adhaerens*\*

GOLEOPHYLLUM, bad @ dfe tbt enblf tt\$en / iff na\* tTjirbel jene fleine ©cfiei&e, Die gemffe So^ f9(ebonen bilbm, urn Die 55a;fg beg geOercfjenS ju umbuOfett/ mfe an Den ©ra^artcn.

COLEORRHIZON Wtirbel/ ein Heine\$ Slnb^nsfel/^ n>el^/ n>ie cine @d)cit>e, getoiffe SBürjelc^en an\* iftrem Urfprunge um^üllt / j. SB. an Den ©rafetn.

COLESULA ftecer, Det fleine ^dutige ©acf, aue[ njcl)cm Die <Sporz an Den Yebcrmooven &ert>ortreten> Siefer ©acf beffnbéit stift an Den 3ungermannien tti gocm einer ©4eibe an ber Saffc be^ 35tumenfttcle^, unb <xn Dm Wlar^antfen in ©efialt t>on ©era^len an ber §rud)tfc&eibe; inbeffTcn fc^einen biefe bepben Orgas ne t)etfc(t)eben JU fcpn. ©. *Perisphaerium*.

GOLLAPSUS, 5 ufa mert gef alien, ein Zus fianb < in steldjen ber 9Bebe( manner Xangarten unb €nfert>en bepm Jroden gerätf) / unb ber bemerft wers ben mug\*

GOLLARE Büll./ f. *Annulus*. GOLLARE **Ris**  
**ħard**, f. *Ligula*.

GOLLATERALES GOTYLEDONES, fet t XO & t tB fit? **ħende** ZotyUbonen, bie ineinerunb berfelben twticalen Sbene fo geffeOt ftnb, ba\$ fie nuc mit i&ren tnneren SKanbern einanber berü^ren fönnen\*

COLLINAЕ, \$flanjen bie auf £ügeln tuac^fen;  
DIANTHUS *collinus*.

CoLLiQUAftiEJNTi SACULUS, f. *Amnium*.

COLLUM, h\*|e, iff ber obere Slbeil ber Röhre etner 53lume/ unb ba^ 3Ritteljfutf \$n>ic&en ber Wurs jel unb bem ©ceitgd/ wo jene Ji\* etmag verðünnt, ton toelct>em einige §afern aufmactd^ bie anberen abs wärts (ieigen.

COLO RAT us, gefärbt/ ij! in ber 9>ofantf alles,

*ttai n|d)t gtfin iff/ roenn rt .5?eW ober Slatt obec S5ecf Hatt iff, unb jebe \$(iime b\* nidjt roeig iff. ©o ifiber \$eld) an XERANTHEMUM *annuum* gefärhb'; fo finD *bit* flätter an AMARANTHUS *Iricolo?*, *lividus* gefärbf\* © c f a r b t nennt man fewer ben Kanfc bes&utes on einem *tyil<sub>5</sub>c*, *xoenn* bar ganje *S;ut unQcfavbt* ift, 4»nb nur ber SRnb eine garbe *f)at*. SBenn ber ^ut eine beftimmte garbe bat/ unb ber *SRaab* beftelben eine anbere/ fo npirb biefe^rbe beftimmt angegeben.*

. GOLUM^ eine befonbere 3lrt ©on gruefctbaben / ^ auf einetfl Saulcften eine fdjwammfse/ me^r ober minbec fcoflfoiyytiene jfugel f?e^/ an ber We 6amen figen\* ©• f/acn/a.

### COLUMELLA, f. *Columnella*.

GOLUMLLATUS FRUCTUS, CJte \$W<t) Wit tlCm 6amenfauld>en (*Columvla*).

Go LUMEN Sournef. / f. Axis\*

GOLUMNA, &&uld>en, totnn *bit* ©taubfaben unfer einanber t>em>ac^fen finb, rote an btn SRonabefc Pbfien, an btn Wlalotn.

COLUMNARIS, (SultnfdrmiQr toai tint @åu(e bilbet; J. \$. *Receptaculum columnare*\*

COLUMNELLA, JL, *bai* © a m e n {& u Id) c n, auch *Columnula*, tin buñner\*fabenf5rmiger in der Mitte ber biidrfe, beren 2ld;f?cr bilbet/ *flebtbnbtt* Cörper, an meld>em ber ©ame befeiftigt ift. Wan nennt ihn bep bm SOfoofen aud) *Sporangidium*, unb er iff then bag, toati bet) ber fiapfel ber pbánerodamifc&eti '©etvåcbfe ba« ©lulcfcen (*Columlla*) f>eiit, nämlic\* l>^ Dunne fabenförmige görper, ber mitten bur\* bee •Sapfel ge^t/ unb *bit* ecfceibencwnbe befeiftigt. Willf benoto bebält jebod> ben 9iu^Drad! *Columvla* 6e ANTHOCEROS. Sr ifl an ben ip&anerogameu meifienS no\* t>orbanbeii/ weun *bit* ^lapi>cn bereit^ abgefallen finb, rote an bta (geramen. 2lud; bte Hervorragung auf bem %oben eintoer ed)roämmme/ an roeld;er das %aat&cfled)tt (*Capituium*) an&ttoaffltu ill, nennt

**man Columella.** <§\* a. *Styliscus, Stylidium*  
tint) *Sporangiopfiorum.*

GOLUMNIFERAЕ, eine *natiūlitfot =Orbrung bet)*  
*fiinne\ bie VTldvaceen.*

COMA, 0<\$ O p f, ein S3ufc^C1Don JDecfbl&tern,  
ber bie-6pi&e getviffet Sle^rcn ct>er Srauben front/ j.  
S3. an SALYIA *Horminum*; Don £Iat&tern, n?te at}  
fcr Jfnanaa, n>o bicfe Scfcblarter ubcr aOe SSlumcn  
sefMlt ftnb; ober cnblid) t>on unfrud^tbarert Blumen,  
t)ie an HYACINTH us *comosus*. @, a\* *Vellicula*  
**unb Vesma.**

GOMATUM SEMEN (**B^frt;**, f. O e ^ a .  
COMBINATI FRUCTUS, v et bu n bene ^rūd:  
te, finb btcjentgen/ n^cnn mc^rcrc **Samenbehältnisse**  
**ben** bcr Srucfytrife in einm Sörpcr t)ecn>ad,fen ftnb\*  
**Ebenso Capsulae combinatae.**

**COMMORIENS** J fllicic&wrflc&enb / jugleic^ mit sters  
bend.

COMMUNIS, E, gemeinf&ftlich, all:  
ge tne in, fat fcet) t>erfc(jibenen Pflanzentheilen vers:  
fc^iebcne Sebeutung. *Communis Calyx* ist das,  
ftad tX>tU5enotp *Anthodium nanntCf* anbere *Peri-*  
*anthium*. *Communis Corolla*, iff gkicfybcheu\*  
tfnb mif *Corolla composita* dCC FZos *compo-*  
*silus*. *Communis Gemma*, Cine ^flO^pC/ bte 55lat^  
ter unb SBlutbensugkic^ entbolt; *communis Glu-*  
*ma*, bie aufwfien 3peljen an eincm©ra^n^rc^en nac&  
BuUiairb ; ba^/ n>ad man oft erg ^dcf)fpelje ncnnf.  
*Commune Involucrum*, tine Jjütte bie me^rcrc  
S5(ut)ett umgtbt *Communis Pedunculus*, aUQtt  
mctnet \$(uraenfice( ijl berjenige^ auf tt>el>cm aUt fibril  
gen ecnjelnen (tcbcn, g. ». bee mittlere @tiel an einec  
SfD^anni^beertraube / auf n>el>em jebe einjclne S3ecrc  
nmteffi emed flctncn *Qtieltni* befeitigt if!; bet ©tie!  
einec 2>blbe. *Communis Peiiolus\**, iff an einem  
{ufammensefegten *Sblattt* bie SSerlangerung bedjenigen  
**Blattstieles**, burc^ tvelc^en bad Slatt an irgenb einem

Sljeile ber 9Jffan\$e feftfgf/ unb ouf welcfiembieübrigen SBlättcfren betf sufammenaefe&ten%lattetf eingefujfir ftnb/ g. 9. an <£>oJunber. *Perimetrium commune*<sup>^</sup> cine Srucfetfnoten&ſtte / Die me&rere grucfotfnoten urn; gibtj *Placenta communis*, bie mebrere ©amen traot; *Commune Receptaculum*, iſt nur an ju<sup>^</sup> fammcnſeſe<sup>^</sup>en \$(umen / unb ent<sup>^</sup>ält afle \$lūm\$en, tvorau<sup>^</sup> bie {ufammengefegte S3(ume *btſlebt*, unb im ter golge av.<h bie ©amen; am beutlfc&ffcn jiebt mattibn an LEOMTODON *Taraxacum nac*<sup>^</sup> abgeflogenen ©amern. (*Sini&t nannfen febr unfd)tcfltb jenen G&rper/ in tvclcfien bte ©taubfaben ber \$?ono; £>i unb \$0(9<sup>^</sup> abflpfriſitn t>er>ad!>fen ftnb/ *Filamentum commune*. %i 3Jame einjelner 9lrten bebeutef e<sup>^</sup> *Qemein*, taoft'g. *Communes Calycinae toavtn* etne Piaffe **þey**.*

GOMOSUS, Jva<sup>^</sup> mit étnem ſüfcfttet, **Schö**pfe, Don Slattern/ 2)ecFb(dttern ober ^aaren an ber (O))tge lk& enbet ; \$• 95. *comosum Capitulum*, an BROMELIA *Ananas*; *comosus Racemus*, att FRITILLARIA; *comosa Radix*, bie an ber Spize f on ben SKetten ber SlattffteU / n>ie mit einem Haarsfcufcfyel geffont'tft/ J» 23. an AETH<sup>^</sup>SA *Meum*; *comosa Spica*<sup>^</sup>, an LAVANDULA *Sloechas*. Man nennt and) n>obl bte ©ecfblätter felbfi/ bte einen fob <#en ©cftopf btlben/ *Bractae comosae*. Seltener btbenut eg befyaart. *Comosae* ffnb eine Familie bei Linné.

COM PACT us, bejetcbnet auf ber etnen ©ettetbaS, was feiner ©ubfianjnacb bid>t unb fed/ compact iff, wie flätter, beren Jettengetpebe unb 5Jarenc&t)m fe&c dicht iſt. \$# am Sirfcfclorbeer; auf ber anberen Seite lk es ©pnnonpm mie *coarctaius*, unb iebeutet etwas, ma\* fe<sup>^</sup>t bic<sup>^</sup>r unb gebrāngr (iett. ©o'5a<sup>^</sup> ben IDir étne *Panicula compacta* an *PQA rigida* und rfura, eine «Sfiita compacta att ORICAWITM *majorana*.

COMPLETUS , V 0^ | ffan b̄ig. *Completes Aril\**  
*lus, iff berjenigC/ bet bm ©amen gan\* umgtbt;*  
*completus Embryo^ fret avA bem freflen SBürjel\**  
*c̄ben, ben (Sotplebonen unb bem geberc&en beffe&t;*  
*compleia Dissepimenta, tjollffambige ©cfeibe\**  
*'tuanbe/ £ie aOentfoalben . gefc&löffene J?o(jlen bilben/*  
*welcbc untec ftc^ feime @emeecnfcf>aft 6a6en / rote an be?*  
*Sirne\* Completus Flos, etne t)ol((?an£)ise 55(untC/*  
*i)re deleft unt> S&Iumenfcone ^at, tvenn <\*jd) aQenfaOd*  
*anbere £)rgane fe^(ten. foecanb. %et) VaiHant ift t\$*  
*fpnom mit auctus flos. S5eo eincgen fonon^m*  
*mit hermaphroditus flos. 95et) anberen barf*  
*tturbie ^ (umenfrone/ 6eo einigen burc^aud nic^td an*  
*finem Flos completusfcf)kn. — Completus Fruc-*  
*i u s\* roenn ein beut(icfyef Vericarpium torftanben iff/*  
*unb Die einfafye ober Dielfad^e ^o&(e beffelben einett*  
*ober meftcere ©amen tntbaU. Completum Pistil-*  
*lum, mnn \$stud)ttv\*tcn f ©rijfet unb SRarbeDor^an^*  
*ben finb. Complelus Racemus unb completa*  
*Spica> mnn bee gemeinfytaftlic&e 35lumenfftelring^*  
*«m mit S5lumenfcefcfct iff/ \$• 95\* POLYGONUM Bistorta*  
*fur biefe / PHYTOLACCA decandra fur jenen. ' Com\**  
*pZe/zis verticillus, tpenn ber Ouirl ben Stengel*  
*ganj umgibt. Completa Volva, hit ben gangen*  
*©d?wamm umfruUt/ unb bann getvobnlic^/ n̄te an*  
*AMANITA caesarea JS, am 6trunfe bangen bltibt*  
 COMPLEXUS CELLULGSUS, f, *Tel a cellu-*  
***losa.***

COMPLETUS ME.MBHANACEUS, £>& Ut Qevoebe,  
 ein @en>ebe/ bai au\$ lauter {ufammen^ängenben %åut  
 ten Don road immer für einer \$orm beffe^t / unb bit  
 @runblage aBer ^fianjen bilbet. <££ iff tntn»?ber {eOig  
 Ober gefagreidS»»

COMPLEXUS TUBULABIS W\irb., tin&autiges Ges  
 mbt aui einer gewiffen 21njaf)l Siö^rm, ober Gefäß  
 bie ununterbro^ien fortiaufen; R^bren gewebt.

COMPLEXES UTRICULARES, if! 6ty *UMBELLIFERAE* S5o\*  
*tani Utne flcidjbebcutenb mit T(s)a cellulosa, in*  
 6er fallen SBoraugfegun^ / Dag iebe 3e0e ein Heine\*  
 S5laSd)en fct>, n>ctc^eS turn ben gunac&ft ftcbcnben burd)|  
 eigene Sroifc&enräume fletrennt if!/ in twlc&en man  
 itbcgerleo ©efäge tta&rjune&pion` fltau&te, We *Meatus intercellulares*, unt) fctC *Ductus intercellulares*.

COMPLEXUS VASCULARIS, f. *ComplCXUS tubularis jfrnb.*

**C**OMPUCATU3, *sufammengefaltet, toa&*  
 in fid) **f**elbfl gefaltet id, 5. 93. Die flätter in Der  
**K**nospe bon VIBURNUM *Opulus*.

**C**OMPOSITIFLORE ®ártn\*/ unb COMPOSITIFLO\*  
 RES Dachend., Linné's Aggregate unb Composite.

COMPOSITUS, L., 5 u fa mute nge feQt, fta&  
 aus mejrerer Stbcilett bejtcftt, im ©^eitfa^c t>on eins  
 fad> (*simplex*) in ber erfien Sebeutung Mcfc^ Wors  
 te^. 9luf gcmiflfe Sbeile *an\$etoenbct hat c\$ febt ven*  
 fcftiebene SBebeutunfjc, *Anthurus compositus*, bee  
 aui me^rerer cinfad^n Deflect / \$. S» an AMARAN-  
 THUS *lividus*. *Bacca composiLa, ntnnt man/ 06'*  
 febon mie Unrest /. bie &ud)t ber &imbeere f bie  
**bloß** ecne % dttgat bon Acinis ift; — *Bui bus compo-  
 siAs an ban befannten \$noblauc&e; compositus*  
*Calyx, bet aug me&reren, in mebrere JXeiben jufam^*  
*mengestellten \$>fattd)tn befteft, tote an bet Oonnen\**  
**blume**, an ben SDifteln; •(• *Ant^odium unb P-*  
*rianthium; — Caulis compositus iff flynoitynt*  
**mit ramosus. Compositus Contextus ecl-**  
 tiosus, bos stifamffiegtfegte Sellengevoebe  
 6<(tcbt aug getten/ beren ©citenwänbe wteber ani tlc\*i  
 nen runben 3effen iufammengefct ft<b J \$• 9S. an NYM-  
 PHAŁA, SCIRPUS, SPARGANIUM, *an ben 23iumenblaf\**  
*texn bon CY<sup>OGLOSSUM</sup>, an ben ©amenfapfeln bon*  
*ANAGALLIS. Corolla composita , gfCtcfbebeufenfr*  
**mit Flos CQmpositus; Corymbus. compositus>**

ttenn (nad) *fayne*) bit aOgemeine 35tamenffiel fid) fb jertbetlt in t>erfd>tebcr^ 3efte, ba# mebrere ©olben\* irauben cntfleben / Me \$n>ar ein ©anjed bilben, fid) liber Dod), Da ft\* nid>t in gleicher #6bc fid) enben, unrerfctyeiben laffsen, rote an SORB us iucuparj'a; {?ompositus ft o s, ober geuwftnlicfyer *Compositi Ft ores* (tno nach £inn'e jufammenleßaufste 95lumen *Uggregati*) tn trdcben mebtere 'Múmcften auf emcm ganjett semetnfcfyafthictKn grucfcboDen eon einer „Haememen SBlumenfcefe eingefcblossen ftsem, unb ibre Staubbcutel in einen wa^enformigen górper tern>ac()fen b^bem OPfflbenotp begretft aber fottobl Otefe aW afle anDeren SMumen barunter / in tvelcben mtbrere Q3lumcben auf eincm f(einen 3' cfc fo Dtd>c ^ufammendeOrcinst ftnD, t)a^ fie nur cine vmtjtqe auti\$umad)en fd)eften» 6<sup>T</sup>omposfti ex flosculis regularibus et irregularibus, unb exfloribus irreguaribus finfc Glaftcn bet) K^y tinb K^tn. *Compositum Folium^* nennt jfLtnne ifa^jcniige, n>e an einem etnfad)en Slattfltele me^r als ein ein;r^ latt (leot; 2;ecanboUe Datfjenige, **welches** aus mebreren fo emanber eingefügten 2(>eilen bes steht, **viſt?** fikt> • tt?enn bad ^latt n>elf n>irb/ biefe Theile ohne aUe Serreiffan^»on einanber trennen laf^ fern 25iefe Sbeile nennt man Bl^tc^en ober f iebevt (fyen (*Foliola, Pinnulae*). ©ie fm̄b öfters fccep beme>ltd) auf bent demeinfcf>aftltcben **Blattstiele**, unb jumetleu fogqr mie 9lfterblättct)en t>erfeben« **Ues berbaupt** t(l ein *Folium compositum dasjenige*, **welches** mebr aid ein SMatt auf einem S&Iatt^celc hat, tt>te an ben 9Zofen / obit an trgenb einer anberen ges meinfcraftlfd>en S(acf>e; unb ein e **engtli^** so ges nannte a jufafttmengere^tea Blatt if{ jened/ bad nur etiie SKeibe Don Slätte^en an einem **gemeinschaftlis d)cn %iattiitlt ttå\$, beo votld)tm alfo ber gemeins fcbaftlicfc Slattlttel burc^aud einfad) iR, n>e an bent SBlatte bee Efftcc> Slud) jene flatter nennt man jufam^ mengesegte, {folia composita) bit, toitan ben**

Cactus, einanber cittfleugt finfc B&Uiarfrnenne abec aud> fcattfjeimac SMatt jufammcn|kfeßt (*Folium compositum*), bat in me&rere (Stifc&nitte ober happen ~~ge~~  
theilt iff. — *F rue tu s compositi fñt*) biejenigCn, welche aug jnm> obec mēf\*rcn sufamnunaetoaclfenett **Eherstöcken** f>erfd>iebener Stamen enfflanben fhb, *Composita Gemma*, \. **Bulbus und Tuber.** *Composita In Jlor esc entiq, fñtttn mcbtcre Slumen* ouf eincm nemtm^aftlidbm ©tiele obec Soben ffe&en. *Compositus Pedunculus* tñi f^non^m mitt rf-/fi<tt5, »ie bet) *Pilus compositus.* *Composita Radix* t|l (tfciC&bC&eutenb mitt Aggregata. CQVI-*positus racemusy iufammengefcte* Straub # wenti bie 3emeinfcl;aftlid)ca ^lumen(?icle (erfelben ft\* jei^ 5(leln/ die Oh SPIRAEA laevigala, an VKRATRUM ni>rum, unb jcber berfrfben eine 2raubc bflbet. JDc\* canbolle rec&nee &ierbec ben *Thrysus*, unb bic Hi<pe. *Composita Spadix iff an mc&rern Palmen.* *Composita Spied)* tt>enn mebrere Slc&rcn auf dnem se^ meinfc&zafittc&en äftwn gsiumenficde flebei/ j. 95\* GAREX arenaria, leporina, an bem befannttl TRITICUM *compositum;* *composita Spin a, an bm ftclfytn* bee STOKBE bep ben (Cemaureerh *Composita Vmhell a*, wertn jebec ©tra&l bee Solbc anfeinec ©pigc cin ©6lb\*en trågt, \. SB. an bee Wlobrc. - (7oife; po^itoe find a(g ftaroUte be^ Jimne unb anberen *bit* ©yngene(iftten. *Composita Specie's nenntmanabM* fiste btejenige2lrt/ ju welder me&reee5Bariefaten sebôrem  
COMPRESSO-PLANUM , flac^ ^ufammncngcbrücff/ fo baS *bit bwbtn* ©etten ^ar fefne QB&lbung ^abcu,  
**wie an HESPERIS matronalis.**

COMPRESSUS, 5 u fccm m e rt g c b r ü cf r / fagt man **bon** .-fefien Söcpern/ becen ©eitenffaßben brettec unb mējt genäbert flub <*Ai tljre* obere ober unfere §Iad>e / Deren Querbuc^fcbniff eine CBfipfe barbtetet; **fie** fe^ri aug/ aW tt>enn fie t>on bejben ©eiten jufammenge^ brurftworben mären. ©0 faben n̄ic etnen *Calyx*

*compressus an RHINANTHUS ; cauTis comp resus »*  
 toobeo aber immer b:e%ratbe ffum?>f fetm m<sup>f</sup>uffea / unb  
 bie jroei? gegen<sup>ü</sup>bersteftenben ©eiten *Had*), n>ie an LA-  
 1-HYKUS *latifolius*, unb efnen *Culm us compressus*,  
*an POA compressa*; *compressa Caps ala*, n>enn  
 Me jroeo flwntiberffebenben ©etten naftc an etnanber  
 treten; *compressa Cotyledon*, etn \$?ttel\$uftanb  
 jmifa;en bem aufocfbivoflenen unb btatt<sup>ä</sup>bnl<sup>c</sup>^en;  
*compressi Echini*, &on beoben ©citen flattgebrucft/  
**Qnetnigen MKDICAGO unbTRAPA nalans**; *compressum*  
*F il amentum an ORNITHOGALUM umbel lalum*;  
*compressum Folium*, L., n>enn t\$ fttner ©ubjlanj  
 nad) Dttfer aid breit ifl/ b. b\* tt>crti ber S)ur4)m^(Ter  
 steffelbe'n obn ber oberen S^cbe &ur untereu gr6@er if!  
 aid t)oif einent iRanbe ;um anberen / tdie an einigen  
**<Cräftuieri/ an CACALIA Jicoides.** *Comprassa frons*<sup>^</sup>  
 }ufammen))ebrucfier SBebel / n>enn er fo bunn aid em  
 gaben / unb t>on beooen ©eiten flacfr gebrucFt if}/ tt)e  
 an' *Fucus Fasciola*; *compressus Fructus*, an  
*ANETHUM Foemculum*; *compressum Germen* an  
*Rhinanthus*; *compressa Qlan dujta*, bit auf bei);  
 ben ©eiten {ufammengebrucft tfl; *compressum Legu-*  
*inen*, an *PHASEOLUS vulgar is*, *GLYCIRHIZA (subcQm-*  
*pressum* 'tfi ed an *Melilotus*; *compressus Petio-*  
*luq* an *POPULUS tremula*; *compressum Semen* an  
 ber iiinfe; *compressa Silicula uno S Hi qua* an  
*LUNARIA annua* unb *ARABIS* J *compressa Spica* an  
*HORDEUM Zeocriton*; *compressus Stipes* an *GHA-*  
*MAEROPS humilis*. SOfanJe ^flanjentbeile mcrben, ju^  
 ma( ber tPebel an ben Sllgcn, burcft bad Sroctnen  
 {ufammengebrucft.

GOINGATENATUS <sub>4</sub> Pettenfdrmfg / tt>ad trie bie @ie^  
 ber eiwr *SHU mit feinen Snben anemanber båt*]^t.

GQNCAVUS, i-r., a u e g e ^ d ^ It / be\$eicjnet fibers  
 bawt ecmad / bad mtieft ober eingebogen t(t, of>ne  
 jeDod} emeufiBinfel ju bilben. *din Folium conca-*  
*-vum*<sub>y</sub> em b<>6led *S3latt* ijI *baiJtnidt*, melted oben in

ber mttt tettitft Iff/ tt>ai bfteti gefc&ie&t, itemt ber Sianb enger id alt bie \$lād>t / lbie an DIPSACUS laci-niatm , an PLANTAGO major. ginige berlangen / ba\$ tin folium concavum auger ber S)bt)lur|Q an bee oberen ftlddbe tine Sffolbung an ber unteren babe. 9Ran Derfoecftfelt 'ofterg tin folium concavum met einent folium c ana lie ulatum. Sin concavum Petal-urn fcaben n>ir an ber SKaute unb tfirfefoe; einencon-cavus pile^s, ber Don feincr gntfie&ung an oben Dertieft iff/ an PEZIZA (man Dergeffe ntcfitt; ba\$ bit meiften ©c&ft>ämme im Slifer au^geböblte {)üte befbm^ men); em Btkceptaculum concavum^ tt)ie art ben Sonnenblumen in ber erffcn SSifufbe / an CREPW alp 'ma. (fin concavum Stigma , baS Idnglicfc ober runb unb oben l>obl ifl/ ftie an cinigen 25etld)cn; eine Umbel I a concava, bie oben an ibrer SIa^e Der^ tieft ober bo^l if{/ an ber SDfofro na\* bem SBerb!u5en. Concavus Umbilicus, went! er enfmeber ejne augen am eamen ange&tftere Snpptl ober Sranfe bil^ bet<sub>f</sub> feie an HELLEBORUS ; ober eine tiefe trtebferfor; mtge SKinne, bte Don ber aufieren 6\*a1e beHeibef iff, tt)iean CANNA. Concavac Valvae, an Gochlearia. Cotyledones conemvae pnban me^rerentyftonjen\*

CONCENTRICUS , C o Fl C t tl t X | f\* / \*U\$t/t T^ttM barbi, ntdjt Don \$lā\$en ober Jinien, bte urn einen 8emeinfc()aftli<en gjffttelpunct feerum gejogen ftnb, fonbern Don Sirtten, 6te Don aOen ©eiten na\* eincm ^uncte jufammenlaufen / ober, Derlängert, in einem Puncte jufammenfiogen würben.

CONCEPTACULUM, nannte finne eine emHawtge Samenhüllle , bie fl\* ber Wnge nac& h fintt, unb an welder bie ©amen nic&t befeligt finb» ©pater nannte er fxe fo Uiculus. Conceplacula spermatica nennt man bie fc&leimigen ©efage an ben tetat mien. Conceptaculum Seminum JflSmfc/ f Pe-ricarpium; [ a, Lo culaty\*^\*, sum, Co-

*cits. Sporangium , Perispermum Xltlb  
Styliscus.*

CONCOLOR, gleic& farbt'g, tenn trgenb *tma\$*,  
*bai* man Derglecfyf, un^eflecft if!/ unb gleicfyre garbe  
mit bemjentgen bat/ ftomit man *ti* Derglecljt. @o  
nennt man \$• S3. *Folia concoloria* biejeuigett, bie  
an i>rcr ober& unb untecen Slacfœ flleicfcfarbig ftnb,  
cm (Segenfage ton *discolor*, unb tine 25icJfe an ben  
3Roofen *concolor*, menn ftē mit bem Stic&tfie(e unb  
Qtatl einer(ei) Sarbe gat.

CONDUCTOR PRUCTIUCATIONIS ^>ebTD\*/ etn **Canal**  
ber burcf) ben @rifel fortläuft/ unb ft\* in bee **Nabels**  
fcf)nur ber Oamen enbet. @r i(t entmebec ganj obec  
njeniflften^ am unteren 2&eile t)om gcuc(>tfnoten free\*  
ftorgen.

CONDUPPLICANTIA FOLIA, L., ft>enn an iufammeng^  
fegten Slattern/ bie einanber segenüberfieben, tt>dbrent>  
ber ftac&t (tin Ocfllafe) bie 23lattcf)cn ftd) über bem  
gemeinfc^ aftlichen *flattfiuk* fo jufammcnlegcu, ba% fte  
ffcf) med)selfciti,vq mit i^rer *obttcn \$l6d)t* beru^ren f j.  
35\* bie COLUTEA.

GONDUPMCATUS, **boppeit MtQtnb**, \$u{▲m▲  
men g e f a l t e t / n)ad bet gange nacht boppe(t gus  
fammtn\$ck&t if!, fo bag ftd) bie Oeitentbeile becu^ren,  
unb ber Slanb berfelben aufmart^ fctf>t / tme bie Slat^  
ter an einem 2\trfd?baume. (Jine Jfno^pe nennt matt  
*conduplcata* L. (ober, nac^ iDfccan&oUe *conduplica^Va*). wenn bie flatter.nur ein 5)?al sufammenUe^  
gen in ber \$no\$pe / b. &• wenn fte fctf ni\*t unifaffen,  
fonbern nur mit ibren @eiten *bid)t* unb parallel nebett  
einanber (iegen/ n>ie an ber Yt|anbel, Zirtye, £\_u^  
4>e. ginJEmfc r^o tfi *condupiicatus*, u?enn fettt.  
£i3ur\$eld)en an ben Oeiten ober an bem SKige ber Ros-  
tylebonen anliegt ^ ober n>enn beffen *bfybt Schenfel*  
i>bcr Snben entveber gar nic&t / ober nur febr **wenig**  
Don einanber Uegcn.

CONFERTUS, CONGLOMERATUS, GLOMERATUS und AP-

**PROXIMATUS**, ḡc "brāng t, ge&rauef)\* foec & n̄bolh a(g  
**Synonyme**, urn im attflemeinen'anjuDeuten, Da§ ge\*  
 tmiffē ff)eile me&r ate gewoOnttcfc Dicfrt 6et> einanDer f?e\*  
 &tn. gnbeffen iff l)ierbe» Docb eintyer Unterfc&ieD, n>enn  
 aud) *conferla L.* unD *approximata folia* etner(et)  
 pnD / tt)ie an LINARIA vulgar is. *Confertum Amen\**  
*turn, bldfyt ift bag tfagcfitti' ^mx tot* ©cftuppeit  
 oīer Slumert fo tcc't fle&en/ Dag man Die ©pinDel  
**nidt** fe^en tfrntt röte an POPULUS tremula, SALIX ca-  
 prea. *Confertus Corymbus*, erné gel?^ufreoDer  
**dicht** JDolbentraubc t|l » 25. an ACHILLEA nobilis,  
 n>o Die 33lumen(lic(d)crt ttcf)t neben einanDer flebcn,  
 unD Die^Iumenfic^dletc^famDecfen/ feinenlecren^aunt  
 jmifcften fi\* laffen. *Conferti FI ores* an Den tf&e\*  
 nopojbien; *conferta Folia* xoit an LILIUM choice-  
 donicunty EUPHORBIA Cyparyssias, in tbtti DemSinne/  
 n>ie *Conferti Rami caulis*, DicfttHe&enDe 2lefte/ bit  
 unvCQtlma§|& ben ©famm tict beftgen / fo ba% tuenig  
 Stvifc^enraum übrcg bltibt, toie an CORNUS ma5? Buxus  
 sempervirens. (fjne *conferta Spica* ift an CAREJC  
 arenaria. *Conferta Umbella*, bidifift Die 25oIDe/  
 n>enn fit' title unD na^e an etnanDer fle^enDe **Haupts**  
 #10, bat, unD Die £6IDc&en dUId)faU\$ t>Me **dichts**  
**stehende** etra^en baben / fo Da§ jmif^en Den Slums  
 chen fein leerec SRaum bttibt, toU an DAUCUS Carota;  
*confertus Verticillus*, gebr&igtsteftenbeQ&uivt  
 .e nennt tyillbenovo mit recfet ^iejmiden/ an xotU  
 chen Die S5(umen fe(6(i fefr bid)t unD deDrān^e f?c5ett.  
**Für** erftere^ ein QSe^fpiel an NEPETA Cataria.

GONFLUENS^ s u f a m m e n f l i e f e n b / it)admtr  
 an Der Spige oDec an Det S&afii Detmac^fen ift. Sa^  
 &er *confluentes Nervi*, tvenn tinfad)t oDer menicj  
 «|i«9e SRerben an Der ©ptge ,ffc^ ju wreiniaen tffre6etr,  
 tt)orau< Dann/ wie an PYRETHRUM Tarthenium iu[amt  
 ntenfliefenbe Blätter entffe&em Berten^out netmf,  
 auf eine fonDecbare SBeife/ jene Fo/\* a confluentia,  
 bit fo Dicftt 6eo cinanDer fieftten/ Da6 Der t>ajn>ifc^ett

liegenbe Sfteil faff natft iff. *Confluenti-pimatum*  
*Folium, sufamtnenbangenb* geftebert., nenntmatt  
 em 35latt, n>enn jebetf SStättc&en am gcmeinf&aftlic&en  
 SMattffiele ju bem upteren fterab fid) aerlängcrt, unb  
 ftamit jufatnmenn>frtcj)(h *Confluenti-pinnata* *Frons*>  
 wenn etn gaub unten toaf>rt>aft geftebcrt / an bee ©pifce  
 aber gefieberf nefc^Itgt iff/ ft>ic an POLYPODIUM *lenui-*  
*foliunii* U. m^ a. — ©• a\* decursive pinnatum.  
*Confluentes* *Porl* an £öd)ttfc()n>ämmen ftibbtejentgen;  
 bie in gr6§erc Söcber jufammenfliegein

GONFORMIS, g I e i c t > f 6 r m i g , im ©cgenfage  
 ton *diffbrmisj* ton Slaftern ober SSIumenb(attern/<sub>x</sub>  
 bie \$Ieid)e ftiflM unb gorm babem *Confonnis* *Tor\**  
 £zo, in alien Jbetten biefelbe.

CONGESTUS, n>a^ bicftt unb tttoa\$ f)albt|iQtlfotmi&  
 Bet) etnanber ffe^t; nad) Berrt&arbt' / n>enn ffO bie  
 Xbetle betu^ren\* Eine *panicula conges la* (*densa*),  
 bit. Decbaltni^mägid mebrece, fefjr biele # SSIumen bat  
 Eine *Umbella congesta*^ iff an ALLIUM *sativum*.  
 Zuweilen f)ontm mit ag g regat us ^ appr ox i-  
 matus *confertus* unb *dens* us.

CONGLOBATUS , g t b 4 111, *MMI IOCL\$* ttttmCt füt^  
 3\$efle fu^clförmf^ jufammen^ebäuft fünb« @o iff art  
*HELIANTHUS tuberosus* bit SBurftel *QtbaUt*, tx>et( mcf)^  
 rece runbliche jlnoten nt\*t an SSCurjelfafcrn aneinanbet  
 ^ängen / fotfern auf 'einanber ftgen. *Conglobatae*  
*Cotyledones*, nennt man biejemgein/ bie in cine  
 <tufen glafte / intvenbig abér auf manc&erleo SSeife itt  
 ftaltcn (iegenbe jfugelgeffaU *QtbaUt* ftnb. *Conglo-*  
*batus flos bti pontebenx* unb bet Qleltcten iff ber  
 f'Zo5 *capitatus* bet) K«y^ unb *Compositus* *SAnnL*

CoNGLOMERAtus , 5 u f a m m e n g e f n ä u 11;  
*Conglomerdi Flores*, nennt ft'fme jene SSIumen/  
 bie an einem äfftgen 33(attffiele/ bic^t unb gebrängt/  
 abet unregednägig beo einanber ffe&en, unb einenme^c  
 ober mtnber runblid^en Sörper bilben, \$. \$. anbett  
 Amarant^en bet erffen Abtheilung. Bühard will,

**Jbaß We Flores congiomeraii jeDetfmal an Dec 6piße**  
 bet ©tengelS ftc^en. Sine *Spica conglomerata*  
 iff An ORIGANUM vulgare\* *Conglomerates* ttoixb  
 fieteöfrnttcfy al\$ ©pnongm t>on *glomeratus* gebrauc&t;  
 e\$ fottte a&er / im ©egenfafce Don *glomeraius* (ei'ri\*  
 fac^gefnault) jufammengePnauft be\$cicf;nen , fo Da#  
 Der .^nauf bt|) *conglomerates* au\$ me^recen j?nåu!m  
 bestünde.

GONGL'JTINATUS , jufammengefeimt / mennman  
 an Zbtikn bit ©tette i&rer Sufammenfügund noc^ t>at  
 aupen bemerft.

**CONICUS\***, *tegelftv mig*, Me emi 3<cfers>ut/  
 bit breitere S3affd naclt unfen\* dcin A men turn co-  
 nicum iff an SALIX iriandra <?. Einen tegelförmigen  
 9(nfa6 (*Apophysis conica*) nennt man **denjenigen**,  
 ter t>on Dec S3ud^fe getrennt, o^ne ©amen/ n>al\$en;  
 fbtmis f unD an bet Safitt t>erbünnt iff. Sin fegel\*  
 förmiger Sopf' *Capitulum conicum*) iff etlt?a^  
 in Die £ånge sejogen / unD an ber ©pifee ^erfcfjmålcrt,  
 tote an TI^IFOLIUM' *montanum* ufib rubens; *Citl*  
*Cornu conicum* iff an ORCHIS Morio; *tint conica*  
*Gale a* an ACONITUM cammarum; *tin* fegeförf\*  
 miger ©ecf el, unten roeit / naclt oben in eine runi^  
 licfee ©pige sulaufenb/ an TETRAPHIS pellucida;  
*UdtlfbtmiQ* iff bet fyut an ^Jiljen, n>enn ec aud; im  
 3lltec fegeförmig bletbt; eine *conica Radfo^la* an  
 fcjelen Smbrponen; *tin* liecep taculum conicum  
 Lj Da^ fcd> in Der 5D?ete in eine 6o(e ju^erunOetc  
 ©P<>se erfcebt, j/95. an MATRICARM *Chamomilla*;  
 eine co/i/ca Scabrities, toenn bie \$orfftn oDet  
 Mnebenbeiten / Die eine Oberffac&e fcftarf macfjen/ fe;  
 g^ örgi jmD; \$padix *conicus* an ACOKUS calaT  
 mus f ein Stro bilus *conicus* an PINUS syloestris.  
**Bartsy** aCorolla *conica* iff Die corolla cairipa-  
 nulata £tnne'6 an COWVOLVULUS. •

**Conidium** gint, f<sub>t</sub> *Propagulum* Willd.

CONIOECIUM iE&r&ftt/ f Sporangium Andre-  
aeae.

CONJUGATO-PALMATUM FOLIUM, f. *Conjugatum*.

CoNJUGATO-PINNATUM FOLIUM, f. *ConjUgalUTH*.

CONJUGATUS bcjeidjnef im affaemcinen g e p a a r t ,  
ju JttJepcn fiebenb. 60 i\$ *Capitulum conjugatum* an ANTHYIXIS *Vulneraria*, TRIFOLIUM ruhens.  
tyillbenovo unterfcbeibet tin verbunbenes 7S>latt  
(folium conjugatum) toon tincttt' Qt^vct|ttn  
Tf>|attt (folium hinaturn) babixxd), 5a§ an jencm  
bit btybtn Slrfttcfjett tintg gcjmeptcn fdllatut in borf\*  
jon(alec dUfytuns afttoåttt QtboQtn ffnb'; ffc ffnt) abec  
nicht immer abtvårt^ ^ebogen/ unb unferfcbetben ffcft  
vorzüglich fcaburc^, bag (re än ben bet)ben gegenuber;  
fle enden Seiten be« S5(aetfltele« efnjcln ffeben, unb  
nfcbt bcpbe an ber ©pig\*. SBco ^inné i|i eg ftnonom  
tnU binatum, inbm it fagt: *conjugatum folium*  
ift etn gefiebmeg S3latt mit smci)cn Slatfcfyen unb  
nicbt mebr. Ein fold)e\$ Sfaet 't! an OROBUS lathy-  
roides. Wad) TSüUiarb f6nnēn an eintm Qtpaattcn  
SSIlatfe C/o/. *conjugatum*) We 33(attd}en an bcc  
@j>i6e beg gemeinfcbaftlic^en asiattflldes, ober in ber  
SSIflte beffelben (teben / tt>ie an LATHYRUS odoraius,  
sylvestris; näch Jargione niir in bee SUfttte/ nie an  
bit ©pige. Uerbunben gcfiebert (*conjugate-pinnatum*) nennt £tnne' ein 35latt, fyenn ein 95lattfltefr  
ficb t^etit / unb jebec Sbétl ein geftefcertef slate bilbef/  
tt)ie an ACACIA\* farnesiana , DESMANTHUS d/Jfusus,  
MIMOSA pudica. 3lffgemeiner brücf JDecanboUe fid>  
^ierüber fo aug: *Conjugatum* ijL ein SBlatt / ivenn  
bet flemeinfcbaftliche SSIattffiel ficfr in jtoc 3lef?e tbettt/  
fcecen jeber tpieber mit S(attd;en auf bepben ©eiten  
6cfeßt if?; |t nad)bem biefc SlefTe entweber ^efieDert  
obec banbformis finb, nenut man fit *conjugato-pinnata*, n>ie an ber ACACIA arborea,' ober *conjugato-paljnata*. — *Conjugati* ober *Coadunati frue I us*  
*in gene re* finb jene, tpo me&rere ©amenbebältniffc

in etner unb Dttfclben gsiūt&c mit einanbcc twbunben fint)/ *Obec coadunali obtt conjugali in specie* ? tuenn fte auf cine eigene SOBeife (mint finfr / tpte an ACER, RUBUS. *Racemus conjugates*; ttH> JUKI) £raubcn auf einem SBlumendicIc ober bicht benfammen ffc^en / jfl an STAPHYLEA pinnata; unb tint *Spica conjugate\** an ANDROPOGON distachyos, n>0 Jtvei) tan ter Q3alld t>erbuut>ene 21e5ren an Der 6pt\$c ðef S3[att(lielc^ figen. *Conjugatae^* emicSamiltc t>on if on; ft rvaeco Dauber.

**CONJUNCTORIUM** Jg^tr^.^ ifi an bec ©aftung **XADRAEA** der fe&r flcine S>idtU btt bit %a\nt t>t\$ gj?au^ les ntcf)t 6eJ>qcfcn faim, fonDern nur sn>isc(en ^cn^elben an i)tt ©pige ftgt

**CONJUNCTUS**, s u f a m m e n g e f ü g t / tvenn §wen Söppec mit einem Zttfilt ibtti SRanbtt in tinanbev ges f«3t RnD. *ConjunctuYn Foliu*m iff ein gesiedertes S latt/ beffen Slattcfcen an »er S5a|i\$imt einander vers wachsen sind.

**CONNATO-PERFOLIATUM**, *vetxoad^fen : bur* φ: road?(en, i(l ein 95latt/ wenn eS burd:tt)aci?fen/ unb aus §wen verwachsene Slattern gefrilbet i|I / j. S3. LO-WICERA *Caprifolium*.

**CONNATUS**, reirpac^rert/ totnn dbnlidn. Theile fo surammaemacCifcn fint)/ £as fte ein;cln nicot mehr fegpegt tottbtn thnnntn. ©0 (tab 6CD attcn **Syngenes** fflten bie ©taubbeutel in tint \$8&re »ern>ac&fen/ (*An\* therae cowiatae*), bit man nic&t mit ^nlherae co-hærentes t>trtvtd)ftln. bayf. Suwetlen finb einzelne Kelchzähne t>crn>ac()fen/ mie bie oberen an COROMLLA **Emers**; bit Qtaubftiben fint) an btn WionabelpU'' fieri/ £)iabclp&i(ien unb PoIpabelpMfteri/ aucft an OXALIS untet cinanbev *Qtvtoacfytin*, unb an btn <g)v nanbviften mit bem ©taubtwfle. *Connata FoliaL.* toenn jmeo. *QtQtnubttfotnb* flatter an il)vtt S5aftg in S<sup>inf</sup> t)erma\*fen ftnb-, unb btn ©tciyel umfajfen, n>e die oberen f&latttt an LOWCEHA *caprifolium* , **Dipsa-**

cus; *bit* Oedf<sup>c</sup> iff Dercac&fen (*Connatum Indus i-*  
*um*), *tocntt* fie Die gruc&te gan& bic&t iimfcftlicgt/  
*unt*) fñb ttid)t bffnet, ttne an ONOCLKA sensibilis. *Con-*  
*nati Pedunculi* fñb jcne fleflenuberfle&enbe 93latt\*  
*ftteU/* bic mit i&rer t)m Stengel umfaffenben 95af\$ ju\*  
*fammen^enoacbfn* fñb« *Connatae stipulate* fñb  
*an ASTRAGALUS aduncus.* (£8 t(l gar fe^C oft f9nont)m  
*mit coalitus un) co adunatus.*

GONNECTICULUM, f. *Annulus FUwum*, Firm-  
*briidy Gyrus, SynploKium.*

CONNECTIVUM K<i./ jcnetf Organ, 6a^ bœ brpben  
*Fächer des Staubbeutel^ untcr einanDer wvbwbt.* <£\$  
*if! cjcm6Dnli\** fo fur;, ba\$ man e^ nicht kict)t nntm I  
*sc^eidet, unb jumeilen fe^It ed au^ gänjlicfc\** SBenu^  
*vorhanden if!/ fo fñb Me benben 5acfjer beg (Staub\**  
*beutels febc bcutlicf), unb bnvd)* eine 2lrt Don gabett  
*terbunben/ wie an ber 0albey.* 3n biefem gatte  
*nennt finnē bat.* *Connectivum Filamentum* unb  
*t)a^ mabre Filamentum, bU ©tige beffelben/ <?/\*-  
*pell us.* Sin jenen 6taubgefaßen, ain tvclficn bev  
*©taubfaben in feiner ®iitte geglicOert if!, if! bet ober%*  
*Theil vielleicht immec ein Connectivum.**

CONNEXUS, (eid^t Derroachfeit/ n>ie bie *Capsula*  
*connigia* an GOLCHICUM autumnale; *bit Petal a*  
*cortriexa* an OXALIS; bie S ^ e an bem Peristomium  
*von CONOSTOMUM.* \*

CONNIVENS, g e g e n c i n a n b e r g e b o g e n , toeift  
*die* Opisecn jef) einanber nd&ern, becu^ren/ rote bie  
*@taubbeurel unb bie Qtanbfäbcn an toultn S^ibQna^*  
*ntif!en.* *Conniventia Folia, titnnt man SSflatter/* bie  
*mit ibren Släcken sief) einanber naßcecn/* ober bie #ad)  
*nur mit ibren Qvtytn gedeneinanber einttaartg gebogen*  
*fñb.* *Hinne' neunt abn nur jene flatter Conniventia*  
*Folia,* gegenemanber geneigte flatter, bie bep bee  
*92ac^t (tm 6d)(afe)>* n>enn fie gegenübcrgcffeUt finO,  
*fict) mit fibrer oberen §lađ)e fo innig becübren, bag fte/*  
*rote \$n Atñpiex, nur ein \$(att iu bilben fñS>einen. Con-*

niventes Lamellae, ait me&rercil SSflätterfc&tvām\* mtn in ber^ugenb; Petal a conniventia fnt> fc&c beutlid) an TROLLIUS europaeus unb RUMEX; conniventia Phyll.a calycis, JMc&blattC&Cn an BRASSICA; unb i?eld)fcf)lippett (Squamae) an ARTEMISIA,-OtC connivenles Cotyledones btX) <£>cirtntt , ffnbfMC Folia equitantia 6e9 fnnt\ .

CONOIDFUS, fail Pegelformi'g; fo iff ber Sirobilus an'Prcus pine a,

CONSOCIATUS, s u f a m m e n g e f l e l l t , »cnnbcc^ l»unbene góper emanber berüftren, ^nbeffen nennen Cntge Dof) ?onsociatae Ant hera e biejfnfaen, tt)O me^rcre frepe @tau6beutcl auf cincm ©taubfaben (fe^en\*

CONSTRICHTIO , CONSTRUCTURA, bit &UUC f ftO <k|| bm 6onfert>en cine 2Jrt t>on 9tng fcd> bilbet, twbmd) bit \$altn jufau?men3efcf)nürt fterben.

GONSTRICTUS , vetengi, nad) bet &pi\$e auf ein; mal becbünnt/ »ie bie SRöbre beS if defter an AGRIMONIA,

CONSUTUS, s u f a m m e n g e n a^t ; wenn jufam^ mengefeste Görper mit ibren 31^&< fo aufeinanbec )>affen / bag man t>on au^en cine Qput t>on Srennung Jemerft, unb biefe 6pur i( bie 32atb (^u^ura).

CONTEXTUS, VCVW ebt; fo t'l an CONFERVA butbosa cine Fr ons coniesta, n>o febr t>iele fyaat\*; o^ec fabenförmise 3Bebe( au^ etner 9Qurje( cntfpringen, unb fig in tterfefyiebten \$Binteln Durc^freujert unb bttübven.

CONTEXTUS GELLULOSUS , (.Stratum cellulosu m.

CONTEXTUS MEMBRANACEUS, f. Complē xus membranaceus.

ComiGuus, anftebenb, ma^fobicht fitbt, ba\$ e\$ fift beonabe iu berixbren febeint, obne jebocb ait einanber'fefiubalten. <fm etacbel ift Cauli contiguus; ctn .Com Cauli conti.nuus, Contiguae Cotyledones^ bitmit ibren toneren ©citeit flacft an einanber lichen, fid> in aUen ^uncten b<sup>r</sup>üpf ten. Lamineae cojdiguae pileo vel stipili," find

*bU\$>lattd)tn, bit tnttotbty btn \$ut obet ben ©frunt fcefu&ten. Pileus contiguus, iff nad) Bülliard ein^ut, bet ff& 5fferS torn ©itunfe absteben lägt, foenn nämlicfc biefet fief nad) oben tmngt, unb gleicfc\* fam jufammengefelnürt if?, fo bag bet \$ut unb Strunf jtoep fterfefyiebene S&eile bilben\* Contiguus Stipes, tin, ©trunf, 'bec nut an ben ^ut an(l6gt/ nic^t in. benfethen fsbergegt\**

GONTINUATUS unb CONTINUUS, f o r t U u f e n b ,  
*toai nnttt etnanber t>ern>acf>fen ift, {ufammenfjanflt, ftätig tfl, toag obne gerreiffimd nlc^e getrennt werben fann; fonomjm mtt simplex in fetnec etffcn S3e^ beufling. Continuum Amentum unb continuus Anthurus , tooran tvenig nadte ©(cttcn Dorfommen/ ftif an SALIX vitellina, an AMARANTHUS parisiensis ftaync. Continua Apopfry sis, etn sufammen\* J><!n0enber 'Unfat}, bev mit ber 93uc^fe fe i>erbunben tjt, ba§ felbjl ©amen barin oerwafyrt werben, wie an DECRANUM slrumiferum; continuum Filum, get tabt ifl bttfcfotn an ben <£onfen>en, n>emn bie 3a^ fern/ bie ifrn bet Sänge nad> butcJ)laufen/ in tt)tet dlid)t|mQ nitQtnbm untcvbvod)cn obet aebemmt xotv, btn, obfd)on et stetc^ obet ungleicft gegliebett fepn fann\* Continuata Folia , nemrt man biejemgen, bie eine Sottfegung be^ 6fenge(\*) \$u f^n fc&etncn, tote beo eintgen Sltten Don Ficus. Bülliarb nennt abet jøe Slitter continua, bie burd)au^ einfac^ fmfc, unb uns umetbtocften Don t^rer Saft^ bM an bie @pige hinlaus fen; bep n>el\$en btt S3Iatt(iel butc^au^ nieft gegliebtf' tfi. Continua Frons , nic&t gegltébett/ tt)ie an CONFERRA cespitosa. Continuum In-dusium^ fortlauf? fenb iff bie iDecfc, toenn fte übet ein lange^ J?4uf<? (\*en ununtetbtoc&en bet {änge nad) ba()in(auft, I\* ?5. an PTERIS unb BLEGHNUM Continuae Lamellae, unb itoav tnttotbtt mit bem ^iite obet mit bem ©ttunfe {ufammenhangenb (*Pileo vel Pedunculo continuae*). Continuus Pileus > ipenn btt ©tttnf fikt^*

font in ben *but* überjugeben, mit bcfmfcaben eittm £5rper *n* bilben/ oben br.\*ifer ju n>erbcn fcfeéint; Cem-\*nuu5 <Soru5, forrlaufeu\* iff cm J?atifncn/ tt>cntt eg linienförmig t(?), unb uminferbroijcn fortlduft, trie an PTERIS *furcata* unb BLFCHNUM *occidentalis* **Un-** unrerbrocfcen ncnnnt man cine 5ief>re, an trctcber **durchs** aud fcine nacfte 6fe'e ju finben iff / mie *an*. TVPHA. *Confirm us Stipes*, Der in ben ^ut aberge()t 67on-*tinuus Thallus*, ftenn e'n fcftorf^ ober **weinsteins** artige^ Saub nccbt buri) 9?tfte gerrennf/ obcr tn seis nem Sufammen^ance untcrbrod)cn i(l, tote an **PARMELIA thallina**; *conlinuus fiamcnotosus Thai I us*, toenn Die SRinbe ntcbt burJ; r^nflformige SKilfe getrenne .ifi, tx>ie an **PARMELIA sarmentosa**.

### **Contorsiones, Verdre bungen, Entstellungen**

6er @lätter bwcd) 3f<fefte«(?ic6e\*

CONTOK'TUFLICATU\*, g@a;fittderi0£rfi\$[fjrigeft, 'wie }• S3. bie @djoten an SISYMBRIUM *contorium*; mefrere **Zotylebonen**.

CONTORTUS, *Qebvefytr* ^enn bit JKånbér obec bie @rätf)e fd)icf urn ii)rc 3Kt?fe brefren, ober ju **Drehen** ffreben; fo lnt) j. S. We @taubleatef (il/i/Ae-**rae**) nach bent 33echblü)cn an NERIUM , VINCA gebrett; fo ftnb bie @rannen Aristae) jutpcilen fpiralformirj gebrebt/ n>ie an AVRNA *tenuis*; bre XdpfWn an meftrē^ reft @fc^iben; bie SMumenfronen/ beren happen &leid)t fbvmig nad) elner @eife gebrebt finb (*Corollae con\* torlaey*, bit 3af>ue an bem 3J?aulc bcr 3?tooffrud)fe gan\$ tit icne SBolje }ufammengebref)t (*denies contorli*) toit an BARBULA; bie \$tud)tt a ) ULMARIA, **THALICRUM**; ber SKanb ciniger \$lumenb(atter; b\*e ^ülfen spiral- förmig gebrebt/ tpie anSconpiuRus *vermiculatus*. Die tpiirjel c(l flebrel)t an POLYGO^UM *Bistoria*.

COJ?TRACTU.ITAS , bie ^ahiQttit ft\* ;ufammenzu Jtc>cn, totro t>on eintgen ^ffanjen^oftologett ((aft Irritabilitas, He^barfeft/ gebraudjf. 2Int>cre bedies nen fid? biefe^ Slugbrutfc\*/ urn baburc^ bad **Zusammen-**

jie&en, toeldjecf an ben £>ejfnunflen aetoiffTer SKo&ren ober&k&er <S(att M^ fobalb bestfmmte SXetje auf dies felben voixUn, ju bejeic&ner\* Sincere/ wie Willdenow, ftegeicftnen baburcf <5>ygro8copicit&.

GONTRAGTUS, sufamme h ge j o g e r i / was wenig btoergiert, ffrjer unb fcftmäkr n>ct)« 60 nennt man eine Ktspe sufammeR^ejo^en, toenn bit S3(u^ menfiiele . gleic^fam naſe sebcucE( ju fei>n fc^einen; 'tin guffant) bcr fe&c n>ani)el6ar iff, fterih Me au^e^ bveltett \$ii\$pt bCV POA piiosa ifl nut sub an the si contracia, fpatit diffusa, unb bet) trtelen (Sräfern i(l e^ umgefbrt. Siucf) bie Oelenfe am tPebel ber 2tfgen unb (Tonfenoen n>erben nad> bem Xrocfncn ges wöhnlich sufammendeics^ oft wec^selweise zusammengenogen (jallernalim contracti), »ie an CONFERRA d{ffusa.

CONTRARIUS, wenn steep ^rgane fo aeflcflt flnb/ ta§ i^re Slcfyen (id) unter rec&ten 2Binfeln burcfyf\$nti' bcn» @. a. -Ad v e rs u m.

GONTRARIAfi VALVULAE DISSEPIMENTOj f« \* DISSepiment urn.

CONTRAVERSUS, f?tiigeti>etvbet/ noenn ber 3Janb ber etnen Slacfte nacf) bee Seite ber anberen gefeftrt f(T, CONUS Cournef., f. Strobilus.

CONVERGENS, \$ U {fittim t Hi CULf t nb , \$tQtM einanbergeneigt mit ber Opig. ©o convergens-SfM-na an DATURA Stramonium.

CON VERSUS , \$ u g e u > e n b e t , noenn jmei) Slacken mit ben @eifen nac& einanber fe^en^ unb paralleUaufen.

CONVEXUS, trbaben, in ber SRfftte aufgc6ogen, ohne jeboc^ etnen SBinfel ju 6i(ben. ©o ift tin \$(atf gewölbt , tt>enn bie 8lad>e beffelben großer aW bet Stanb if!/ unb baburc^ auf ber £)berflåd)e gen>ol6t/ auf ber unteren ^o^( n>irb, j. 35, am Kosmanne; man t>ern)ec^felt e£ aud)^ ofterd mit F o n u m gibbum. Eine Gale a convexa ifl " an ACONITUM Napellus. Kunt> (cor^eaum) nennt man einen jDecfel an ben

?9?oofen / ber tine em<\*8 etbabene ober &etotibte SMc&e fat / J. 95. an SPLACHNUM fastigia^m, ©n Pile us convexus, tin runber \$)VLt, iff an AGARICVS cam-pestris, n>o tt oben aucf) tin 9Uter nod) gen>6lbt iff, (Bcto5Ibt (Rceptaculum cQnvexum L.) nennt man etnen attgemeinen unb einfac^en Snic^t6ot)en, bee in Dec ^itte ettva^ erbaben iff/ n>ie an TANACETUM, CHRYSANTHEMUM, unb an btn CYATHEIS. *Silicula convexa*, toerin bit btx)btn filappen fift en mägigeti ^ogen cvhtbhf note an ALYSSUM mcanum; igrfcaben (donpexa) nennt man ecneS)oIbc (UmheUa), toenn bit mittltxtn. ©trablen fcb'r t>idt bep efnanber ffeften/ uni> (anger ober ^ober ffnb/ fb baft bit £)bevfiad)e bet Solbeu fe^r conDe^ fuselformtg gen>6lbt tvivb, toie an OENANTHE *Jistulosa*, CARUM *Carvi*. Convexus *Umbilicus*, bet entoebet alt Ucinct ©c^nabel aud bee £effa felbff gebilbet iff/ wie an MELAMPYRUM, obec aus einent ^figeld^en t>on fc) mammiger mei^lic^er @ub^ stan; beffeftt/ n>ie an ben iguptorbien,

CONVOLUTIVUS Unb CONVOLUTUS , J U f 4 HI ftt C fl ^ gerollt, auf fid) felbff aufgerottf, n>te eine tywcvf tute, fo bag bie obeve ©cite na<\$ innen fommt. SSei i ^ a m'e n conPoZumm iff e£ a^ec 9leicf)gültt9, o> bie (Settenrānbet nad) bent Sauc^e/ ober nad) bent SSticfen ju ein^emicfelt^ /inb<sub>t</sub> *Convolutus Cirrhosy* umgerollt<sub>#</sub> nennt man eine SRanfe, xotnn fie Kinge M(0et / ober regelmägt^ gemunben iff, nac^ bem ?aufe ber ©onne Don Off sen SQeffen / mobe? man fift felbff aid bie Slcftfe t>a^ ®efid>t gen ?O?jtag ^efe^rt benft. *Convoluta L. (Convolutiva foecanb) Folia*, til' tenfdfrmige Blätter, bie fo in ber £no£pe jufam\* mengeroflt liegen / ba§ irgenb cut JXanb (aber n<r eV ner) berfeibenaW Slcbfe bient, n>orauf ft\* ber übrige S&eil be\* Slatted aufroHt »ie eine SPaptertute/ i. 95. an 'ben 95ananengefa#fen. (£6 sibt aber aud) auger ber Snogpe jufammengeroate flatter, beren Kānber ber danjen idngt nac& eingerot't f?nb/ toit an AMWDO Qrenaria. *Convolula Gemma*, iVCnrt bie S3(attCr

gait; fdjnecftnförmig gcbrebt finb / tvfe an ben **Knospen** ber 2Iprtfofen/ too ein iftanb De3 \$latt?3 bm ber aw beren Setfe n>ie éme Zwtt umgtbt. <?tn convolutwn Pollen iff an BOP. K AGO . o'nc conyotuta Spat ha Ift an ARUM. *Convolutam Stigma*, eintDäctflgebo\* gen nnnt man eme getfoetlte TJarbe/ an roclcbtr Die **Epißen** r.ad) innen gerouUt finb / mte am ©afran.

**COORDINALIS**, na:t) }id>avb, aug elncc unb ben frfben natüflcf^en Samtlic.

COPULATIVA DISSKPIMEHTA, t>erb1ttbertbe @(^Ct^. be wan b e, twnn bie @ct>et6en>an^ i^C6?)micarptum\$ fid) n>cer t)on bee 2itf)fc, nod) t)on Den 'Bänben fie; i&rifi löfen iaffen; ttye bet) CAMPANULA, SAXIFKAGA, bet) ben 2iecf(a.

**CORACINUS**, rabe nf^tvar t

COR sEMiNts ©rctp, f. *Embryo* Uttb **Bias-tus**. Cor VegetaMlium i(! bie SBSame

**CORCULUM** L., bcr S^irti/ f. *Embryo* unb **Bias tus**.

•CoKnATO-LAMCEOLATUS, J> C T j f 6 T III'i ff/ Ur t ^ e t ^ t e n f 6 r m'i Q , am @r..nbe ber}f6rmigi; fo aud) bet):

CORDATO· OVATUS, fc e v j f 6 r m' t g s c yf6 r m i g.

CORDATO-SAOITTAIUS, l> et\$f &tmiQl pfeilt f ^ r m f g , mie an ARUM ^risarum.

**CORDATUS**, L., & e r 4 f 6 r m i g / b. t umgefē&tt trie ein \$erj an ben ©pielfarten; eof5cmtg ober läng; ltd?, an btr ?aff^ audgeranbet, mit jugerunbeten ©eU ten(ap&en. ?Dfan gebrauc^e e^ nur turn Sfadjm. 60 nennt man einen gtaubfaben berjfirmig (*corda-turn*), roenn er au^ebrcitet, nad) unten fefgig ju^ laufenb / unb nur oben auggeranbet (alfo eigentlid) boc& rcrfc&r^be«f6rmig / obcordatum) i|i/ §. SB\* an MAHRRNIA, POTAMOGKTON *perfoliatum*; ein *Folium cor da turn* an SYMPHYIUM *cordatum* LAMIUM *purpureum*; ettiC cord at a Frons an OPHIOGLOSSUM *reticulaiam*; B^tfc^ fil&rt eine Radix *cordata* auf, wovon mic aber ttin ^epfptel beEannt iff, Sine cor-

*data Siliqua (I'art COCHLEARIA ^officinalis, LEPIDIUM latifolium; cordata Spicula\ tin &er\$5r>mige» 2lebrd>en ifi an BRIZA maxima; Stigma cordalum an Raus.*

CORDIFORMIS, &er\$förmig. 5)an fottte es, ««c6 BuIIiarb, nur tum Sörperformen flebirauchen, We aud) Jtinné ^erjföcmige ©amen , *Semen cordi-/braze* nannte.

CORIACEUS, leberdrtt'ef, *bid unb jähe, von* einer ettua\* fefferen Sonfiftenj a(g 6(og ^äutig, @o nennf man Dag f£?xoti@, totnn eg fo jä&e i(l / Das^ au\* »cm SBaffer ermefc^^ eg moß leDerartig bltibt, *tin Albumen coriaceum*; Den Ari II us an btt \$X]x&fi fatnug *coriaceus*; ben £elcf? Jh GENTIANA pannonica, an AGROSIEMMA Calyx *coriaceus*; bit Sapfel art ASARUM *Capsula coriacea*, unt) eben fo Die J^ocuZa in manner S^ru^> Die flätter an MAGNOLIA, PRUNUS *Laurocerasus*) Folia *coriacea*; Dag8auban PELTIDEA caninay too eg bid, unDurdylififig unD ja^e iff/ Frons *coriacea*, cbtt beffer Thai I us *coriaceus*; bit \$ülfte an CERATONIA *Siliqua tin Legumen coriaceum*; bit Slug an Der Budje, Jgrc^e, eine Nux *coriacea*; ba\$ Put amen an btt XVaUnu\$; Die *Siliqua* an I^ATIS ; Den ja&en leDepartifieo Qttunt an BOLETUS perennis *Stipes coriaceus*, atlg txo\* dtntn \$afern. Sté r e^ a a t t mestrerei? ©amen iff aud) *coriacea*,

GORMOIDEUS (CAUDEX INTERMBDIUS)/ *ftitl&vtiQ*, iff Derjenige mittlere 6tocf / Der unter Der €rDe, tt Sorm eineg auffteigenDen @tocfeg Derbor^en |it&.

CORMOSAE PLANTAE, Die xnit tintvx -©tide ober ©tccfe (*Cormus*) t>edcfjn finD.

CORMUS, @ t i e l/ nad> tyiUbenoyL' derjenige Zbit Der ©emäc&fe, Der Dag ©anje ftnft 93l<ter, ianb, 6tu\$en/ SSolumen unD §rù#fe traflt €r be^ fl#fift alfo aUe jmolf Slrten Don Stengel/ alg aUgemei^ tier Seflrijf/ unter ft\*. iDecartbofle &at tPiÜbenoweit

nicflt gattj ridjtfe aerftanben, toenn et fflatifct, *Cormu\** &jeid)ne nur jenen £beil bet #rt^togamen, welder auger ber €rbe fid) beftnbet/ mit 3lu\$naſ>me ber grue\* tiffcationtſt&eile,

CORNFUS, *bovnartig*, ton ber (Sonfftſenj eineg £orne\$, bart/bicfct, weberfafertgnocft förmia, öffers et\* toad burc&fdmnenb\* 3o nennt man *bai áflige, t)axte unb btüd)iQC \$aub* an etir.gen Sic^en *T hall us corneus.* £>oygartig nennt man einen &<blau<fy (*utricul us corneus*), bet gefyauff in bem nad) ber 351utl>t fleif\*ig n>erbenben ^elcfte bee Kofe debt. Oefterg *bt\** iet\*net man baburcft nur £)ie Sarbe ober £)urcf;fcf)cm\* *taxUit.*

CORNICULAHTS, fJcf ^ ober 1> *ornavtig.* ©o nennt man \$• 95. ben faben (*Filum*) an ber Periploca, ber furj unb n>ie ein ^orn flebogm ift, term fSrmfg, *oorniculatum*; bie 2Decte an Equisetum aber (*acffSnńig* (*Indusium cōmiculatum*), *totil* fie malsenfötmig unt^ &ofl iff, unb (Samcnunb ^lumen einf^Uegt\*

GORNU, ^ o r n , nennt man fomobl ftornförmige SReftarien/ n>o eg gleic^bebeutenb iff mitt *Calcar*, trie on LINARIA, ORCHIS K. / al£ auch ben ©d)nabel an jtapfeln, toenn er frumm sebogen tf{/ n>ie an NIGRLLA *damascena*. 3acquum' nennt bie *f)ovnal)nlid)cn* 3ln^ fäge / in meld^e an btn *Qtapelien* bie &apuge fic^ en\* bet *Cornua*. 3ln (gamen if} e^ febt oft ber SKell des ©riffel^ / tDenn er gefrümmmt if!.

COKNUTUS, g e t örfit, mad mit einem Horne t>crfel>en ifi, J. S5> *cornuta An i her a* an ERICA, VACCINIUM yCor oil a postice c omul a att VIOLA J *Qornutum P ode Hum;* bad Saub iff bornfdnmig, n>enn ed nad) oben t>erbunut unb ju^efpi^t ifi.

COROLLA, £ I u m e n E r o n e, nennt *dinn̄t*, menu jn>c> ^(umeubecfen ba ftnb/ bie innece, bie meistens jarter, gefärbt, 4inb analoger 9?atuc mit ben Staubfabeu id/ n>^e aucfr mit ben Slattern berfelben ab-

twc&fefo. 9luc& de&en bie ©faubflefaſe entwber auf fcer inneren SBanb bee SMumenfcone, obe\* leſtece ent\* fpringt unmittelbac *an* jenem tyuncte , tto biefe in Dec SBlume fjerbortceten. @te id alfo nur eii? Slnbanflfet bee ©taubgefäge, bie fid) ſoffer\* in fie twwanbefo/ ft>te an ben gefaHten Slumen^ unb |5e Hit, too bie ©taubgefäge fe&Ien, merfietrf. @ie if! me mtf bee (Smbermte ber unten Hegenben Sbeile beberft/ unb bat nie ©aufl&ffnunflen. fcT)6nd> nennt bie geflrbre '95lu\* menbūle Bfu^enfrone. Courneforr *nennt, toit* oben / Don jnw Slumenberfen ^ bie mncre eine THAw menttone, unb, tt>enn nur eine fca ifi/ biejenifle. S3lu^ raenfrone / bU nic^t mit bent Sfcu\*tfnoten juſammen^ bāntf. 9D?an id nur bann flewig ^ t>a\$ tint Sblumen\* frone ba iff / n?enn juglei\* auc^ ein beutlic&er Stld) borbanben id. - 2>ai / tDa« €tnn^ an. ben ©rafern Corolla nannte, id beo 3ufficu Ca/^> " " ^ ^ ra" ffu/a 6C9 palifot Beaupoia\* SSep ben SKoofen nennt man Corolla jene un^emein jarte, \*aut, bie beti ©rijfel bi<t einf«liegt, unb in ber Srucrf in boppeſt ^erdnberter ©effalt jurucfbleibt. S9?an t>erleſte nte/ toai Untie 'xii)ti& bemerfte: »bti bie Slatur feine ©cense iwifeſeen deleſt unb S5lumenfrone flejogen bat: SLinné (teg bie Slumenfcone aug DemSBad\*/ ben^cl\* au^ bee 9Zinbe entdeben.

COROLLA GLUMA &inne, I Glume II a unft  
**Stragula\***

**COKOLLA** MICHBLX, {GlumeUuta unb £\* •  
**dicula.**

COROLLA MUSCORUM, f, Perimetrium.

COROLLA, (• Utricalus.

COROLLACEUS CALYX, tt>enn 9lmbe unb SBajl tn einer SBlumenbecfē tnit einanbec Decbunben finb/ »ie an ORNITHOGALUM; ubecfeaapt ein Stltir »» » rncc 811w anenfeone af>nUdſ id.

COROLLACBUS PLOS, f. ip A y n u \* »nb Peſa 2o ideus.

COROLLARCS CIRRHI , *I&gt;|U U|t txbl&t t V & t| t ten, xocnnbit SBlumenblatfer ober bie fflnfcftniffe ber SBlumenfrotft fid> in ein fp̄tralfonnig gerounbened Slnftāngfef fcerlängern, note an STROPHANTHUS.-*

COROLLATUS FLOS, *7\$>von enbluibe/ tt>enn ber Selcf) feblt / Die 35lumenfrone aber aorftanben ift.*

COROLLIFER , toad eine Slumenfoone ^at/ |. SB\* *Calyx corollifer.*

COROLLINUS, tvad einer Slumenfrone *ābnlid)* ifl/ ober }ur Slumenfrone gebōrt. £>efterd fpnomon mtt *Petaloideus*, mo ed um Calyx *ficfr* (>ant>elt\* CoroZ-7/na *glum a*, f\* *Glum a*.

COROLLOPHORUM /Xmt, ber untereum ben ^tuc^t^ fnoten berumlaufenbe S^eil bti tnneren \$erigomumd an MIRABILJS.

COROLLUŁA, BI um c n t r 5 n d ) c n / nennt matt bald eine Heine \$(ume / balb bie eigene Slumenfrone eines einzelnen SMumcftend einer jufammengefe§(eit S3Iume

CORONA, %tan\$, eine 58erbinbung t>on man^ nigralttg gebilbeten 6d)uppen ober Slnbāngfeln, bie 6ei> etntgcn Slumen an bem ©c^Iunbe ber 93(umenfrone ober bei ^ertgonimm / ober ba, mo an einem \$(umen\* blatte ber SRagel in bie Watte übergefft, t>orbanben ijt/ V 35\* an ben @ilenen/ tftarciffen, B^en & ouc nennt aurf) mit einigen 9ie(teren ben *Pappus*, ober bett fleinen \$tid) an ben ©cabtofcn/ Corona; Cargione bit Coma.' @. aufr *Stylostegium SJint* unb **Parapetala.**

CORONAHIUS, tvad ben jfranj btlbet.

CORONATUS, g e f r 6 n t , n>ad an feinem oberett Snbe mit einer 9Zei^e ton Slnbāngfeln t>on toai immet für einer SJrt umgeben *HI*; fo ill Due\* Svefle bed StU d>ed auf ber @t>is ber §rucf)t an LOMCERA cine *Bacca coronata*; an ASARUM eine *Capsula co~ronata*; an PHELLANDRIUM ēm *Fructus cotona\** tus; an ben 6i(enen ein *Pet alum fauce corona-*

*turn; an CALCITRAPA, CICHORIUM , EGHINOPS tin Pappus coronafus; an bm ©eabiofen ein Semen corvatum. Coronala Umhella f# radwantes flares. Coronalae xoaxtn <jne Slaffè 6e9 SJnné. © Co ma.*

CORONIFORME STIGMA, !>., etner Heinen 9?lu\* menfrone abnlic^ iff bée Sjavbe *an PYROLA*.

•^ORONULA, f# *Corona*; bie ©cftuflpen am ©cf)lunbe **Don ACROSTHMMA**. Sutwilen aut> fononpnt für *Pappus*, toit t8 &inni an ben ©cabtofcn nimmt, ale ben Sieft bti tUimn tfeldKtf.

CORPULOSA COROLLA, nenncn dntge *bitjeniQtn* &d)mttuvlinfi\$blumtu, *an xotX^tn bxt gaftne fd}mal t(t/ unt) §lūgel unb @\*i(fd)en bepna^e n>ic tine ©cfiaeibe umfaßt; j. S3. *an PHASEOLUS, TRIFOLJUM*.*

CORPITS LIGNEUM, <^oljcδrp e r / nennt matt jencn 2:t>cil bed ©tengeld ober ber SBunel ber ©ffoto\* lebonen/ ttelc^er jt>tfd>en bent 9Jiacfe unb ber SKinbe (tegt / unb burct) ttelc^en bie ©äfte bur(i>de&en / wā ^ renb ftc t>on ber OSUrscl in bie flätter fletaem §n sfftonototvUbonin ift ber ©tengel burc^au^ folj.

CORROSIVUS, ma^ 3unge unb ^?aut munb **macht, äzende**.

CORRUGATUS, \$ufammeitgerunj e 11; etn 3u(lanb / in n>elben ber SBebel manner Sllgen unb @onfert>en btt>m Srocfnen flerat^, unb ber hemerft tverben mug\*

CORTEX, Ht'n b e/ jcner J^eif beg ©ten^H^ unfr der 2Curjd an ben S>ifot9lebonen / toelc^er ben S}^|V körper umgibt/ ju gewiffen Setten be\* Sfa&re\*/ obec durch SRaceratton fid) kid)t (oelöfet/ unb burct) wek chen die ©äfte Don ben Slattern fterabfietgen. **G. Cutis.**

**Coaticalis**, »af an ber SKnbe iff. *Coriicalis Gemma*, eine £nodpe bie aud ber Rinbe fommt Cor- //co/e5 *Glandulae* £)efauf[ure, {Tori JDcait^ bolle) iinb coförmtie/ unter bem SRUrogfope beutlUfr

ficfrtbare 25c&er, *bit man* im Varentftptt &\*\* Scätter, t̄er 5^dd>e unb bet jungen Srtebc finbet, abet *fytti* nur an jcncn S&eilen, bfc^ fib fiber bee ;Oberflad)C ber grbe unb bc\$ Staffér\*\*' beftnben / ffe m&gen fo\* tt>ot>l jur SluSbunftung aW \$ur Sinfaugung bienem *Corticalis Parasitica*, *tint* ©c&marofcetpflanje, bie an berSKtnbe ftgt.

CORTICATUS L., unb CORTICOSUS, »a8 iftien^ ftenbfa fleifcbig obec bcepartid / augen mif einer bāvtet ren SXinbe überjogen / rinbig ffl, j» S5. *corticosum* *Antrum* bet) tfTCebicue, aug etner faftlofen rinben\* actigen 6ub(lanj/ n>ie an LAURUS *nobilis*; *bit tint* *bige T&ttsi* an GARCINIA *Mangosiana*, bee mit ei\* nee barren SXinbe überjogen i|i/ fo bag man fie nicftt {erbrücfen fann &it unterfd>eibet (fcb Don ber \$a»fel baOurd) / baf fte ncf>f auffprim^t, unb mit einerfaf\* tfflen 55Kafe angefaÜt ift, in ber bie ©amen Itegen; *bit* rīnbenartige 2\apfcl, tvenn bie äufere ^aut b^rt . Itnbbie innere *mid*) cf{, note an MAGNOLIA, bber bie dugere febmammig, bie innere bāutig *ift*, trie an ILLI-CIVM,*anisatum*) unb/ nrtd) (D^rrner\*n, ncf)t ouf^ fpringt'; bte rīnbenarttgç 6 u'l f e / beren äugere unb innere @ub|lan{ f>art unb (eberartig if?, unb t>on *tin*\* onber getrennt tverben fann; bie n'nbtge (&liet b e r b u l f e / n>enn bte äugere Kfnbe febr ftart <sub>unt></sub> fe0Iji9.il?, unb bie Sac&er mit einer weichen breoartiflen \*D?affe angefaÜt ftnb, *toit an* CASSIA *Fistula*; *bit* rīnbtge Surbtäfruc^t, bie etnefefjt feffe unb ftarte Sttnbe bat/ tt>ie GUGURBITA *lagenaria*; *Put amen* *corticatum an* IUGLANS; ber rīmbige *Qame* an THKLIGONUM, MILIUM, t̄o ber ©ame mit einer SKinbe umbūÜt iff (an (egterem umbūQt tt>n *bit* obere ©pdje) ijt jebocft innenmenbtg *tUn* fo toentd faffig, a|i bvi *Anlrum corticomm bti* fcffebicitd/ totltyti *bit* Bacca exsucca iff.

CORTINA, bie ^flfin^ette, ber @cfcleyer, ifl eine Sirt ton *dims* / ^« entmeber fabenf&rmig ober

fite|f&rmig , unD nac&Dem ec auffleſprungen i(l , am  
SianDe Deg fywtei, nicſſ abet, imē Der Sfing, am  
©trunfe bāgen bleibf. S3eo Perfoon fcorjūglicfc Die  
*Cortina arachnoidea.*

CORYMBOSUS, b' olbentvaubig, fta&eineQoU  
benttanbe bilDet/ 3\* S3. *Caulis corymlmsus*, an  
ERYTHRAEA *Centqurium*; *corymbosus Flo\$* an  
PYRETHRUM *Parthenium*; man nennt and) cine (fran;  
be bolbentraubtg (^a ce mu 5 *corymbosus*), *XOtnn*  
bet gemeinfcOaftlicfre Slumenftiel unD Die oberen SSlu^  
men|?ield}en mābrenD Der %liitf)C fid) fo terlāngern^  
Dag Die ©piſe Der £raube eine S)oldDenfraube *bilbet*,  
tote an DRABA cer/ia; unD etnen © tr a u g bolbem  
ttaubig, *toenn* Die unteren Slumcn(?iele lānger fñD  
al^ Die oberen / fo Dag faff aOe Quid) *hod*) Men, n?ie  
anTussiLAGO *spuria*. — Q. a\* *Fastigiatus*\*

CoRYMBUS, j D o I & e n t r a u b e / tt>ennauf einem  
Semetnfcbaflicben ^lummflicle mebrerebefonDere einfac^e  
oDer åflt^e/ in oerfcftieDener J&6&e entfpringen/ unD fief) aKe  
in jiemlicf) gleic^er J?6t)C enDigen/ fo Dag Die QSlumen eine  
me^r oDer *toenlQet* ebene £>berflacf)e bilDcn; 4>ayne.  
£)ie Slumenftele jñD folglic^ auffallenD ungleid) lang.  
SBenn mebrere \$!umen bepna^e rote in etner S)o(De fo  
flC)?cU( £ñD / Dag fie *oben* in einer unD Derfelben Sbtne  
ju fieben fommen/ Die \$(umenflie(e je&od) nfc&t au3  
cincm unD Demfelben 2)?itfpuncte *auilanfen*, n>ie }  
©• am JjoBunDer. £>ecanb. Slber Dann ware Co<  
rymbus fastigiatus ein ipieona^rttug. JDDecanboUc  
f^eitn ff)n bi« mit Cyma ju t>erit>ebWn / Don Der  
ſchon ©copoli fagte: Cyma non differt a Corymbo.  
Bey Pltniuia ifi Corymbus ein SBlütbeflonD / in toeU  
chem bie Sbiumen fopf \* oDer fugelförmty jufammense;  
ſtellt finD. Siefem ^egriffe na&erte ft\* ^tnne ~~an~~  
ta er fagte: M>ie' SolDentraube entflebt au« einer ~~Neb~~  
re" (6prengel fubftituierte nad) WiDbenoip Traube)  
toenn itbt ctñ\$e(ne ©lurne f c|ltdt t|I / unD DaDur\* |u

einer ebenmägfcjn S)bbt fommt / toie an SPIRAEA ^ u - lifolia, LEDUM , a.x. Den Siliquosis DOC Dec SKétf.

COSTA, Kipp e, nennt man ecbabene t)crt>or; fpcingenDe ©tcidje, Me aufr ben Scuchtfouflen cint^ gcr ©etoāc&fe, aitd) auf Den ©amen Der ©olDenge\* toårtfe /|. 35. am pümmel, fid) teigen, ;mD felbij auffbiebreren 55Wttevn / n>te an^Dea tfannen / t?]ufen, ftoelcften man *Folia cosiata* jufcfretbit/ D. t. gereifte oDer rippige Better; tvenn au^ Det^ 3Ritfelrippe t>tele 9IDern in geraDec Since parallel naclf Dem THanbc ftinfaufen, bid)t neben einanDer fte^en / tocniq übec Die jOberfläcbe emporragen/ unD nid)i in Stefle ffd> iert^ei(en» ^)tec nennt man Dann Die *Cosiae* (Befägbünbef\* See Wlitreln'ppe (*Costa media*) (ft abec Dec in Dec Stittc Dec Q9(attec befinDIic^e i^auptbünDel t>on Safecn / Den man an mancftem einfac^en^ \$(atte / tvie <in Dem tflanbelblatte, tJorjū^licf) abec an gefiebcrt geicbltgren Slättern, n>ie an Den llfyUetn, an Den garrnfrautcrn / unDan ASPIDIDM *Filix-mas*, btutlid) fecht. ©• lugum.

COSTATO-VENOSUM, trippi'g ḡc ^ b e r t , tt>entt/ nach\*<^aync/ aud Dec ^ittelrtpc, Dicfe ©efägbüttbel entfprin^cn, Die gecaDe unD parallel, abec n>st Dic^t neben emanDec nac^ Dem SKanbt bei Slatted binlau^ fen# einfad) ja fepn fc^eineii/ abec Dodö in febc feme .cftt (id) 5ertf)cilen/ Die tvieDec ålcg finD unD ein 3?c§ >illDen/ tote an UL^IUS, ALKUS.

COSTATUS, m& 3tippen t>at, n>fe Die flatter an 'Den (Tannpii/ Die ©amen an LIGUSTICUM unD me&ce^ cen ©o[Den,qe»ad)fem ©. Costa.

Cosr i FOR MITER, rt p p e n f d r m' t g / tvenn Die ©efägbuñDcl ftd) gar nid)t jecdfcln.

COTYLEDONES, L., @ a m'e n l a p p e r t oDecSo^ t y I e b o n e n; Die j:t)if\*en Dem geDecc&en unD &<hnāt belcfteu befedi^tcn gmeo ?appeti/ aug n>elc^en Dec ©a\* meaHcr S>ifoti)(eDonen beste^t/ n>te man an.einec auf^ sequoUenen 95o^ne ootc (fcbfe bcntlid) fifyu Slud Die\*

~~seg. Sappen~~, n>ot>on bet) bm SttonofoMebonen (foiebefl  
detH Dråner) nur einer, bet) t>en \$olt)fott)lebbnen (»ie  
bet) ben Slabelböljern), nieferere t>orf>aut>cit ftnb, entf  
tpicfcln fid) Me erfien flätter Dec \$flan,e, n>elc&e,  
toenn ffe Pctfc^f^ fmb / t>crfclbcn eine fc^ou juberettcte  
SKa&rung jufüfcren, ober, ttenn ffe fråuds jUib, Oie^  
felbe bafüt bereitcn. 3m lefeten galle', too bit flotD\*  
leOonen t)urc^ bag tfcimen in flätter umgeänbert  
tourbett/ \*ftn0fteeigentlic^e \*3amenblatter/ {Folia  
seminalia). Ktc^arb nennt &a£ obere £nbe bei Blas-  
tus, ba\$ fid) in cine &d)tibt vexlauQtvt, tveld)t bat  
Sebercften einf\$lie§t / Cotyledon.

COTYLEDONtoN CORPUS, lsQt?iebonenc6rf  
per, wenn bfe .Sotolebonen bid)t neben einanber fle^  
ben, unb fo mit ibrec inneren 6eite unter eittanber  
t>ertt)ad)fen ftnb / ba% fte.nuc eine SRaffé bilben-

COTYHFORJVUS 0aUab./ tt)te eine UntertafTe; bee  
rabförmioen SSIumenfrone fe^r a&nli\*/ abec mit a|xU  
rec^t fiefrenbem 9ianbe\*

CHASSIUSCULUS, beffen Sänge juc Stcfe (left W<  
|>h|t = 1 : 2.

CRASSUS, bid, wnn, Derbaftnigmagig juanbe\*  
ten ?Pflanjen unb Ocgänen, ber britte eifientH\* do  
perltcfte 2iurcftmejfcc gropec ifl aW bte betjben ubitsigen,  
tooburcft nuc Die \$an\$e unb ^ceite ber Oberflac&e U\*  
fttmmmt rttrb\* 60 nennt man ^ 95. Lamellae eras-  
\*ae, btcfe piatt\*en, bte <pia«\*en an AGARICUJJ  
Pleropus, ostrealus; Stylus crassus, etnen bi-  
\*en (Briffel Oenjenigen, bee furj/ wdlijcnf\*^ ^/ «\*»  
ro^br brett aW (ang tfl/ J. 35. an PELTARIA. 2IU LA-  
S£RPITIUM tl it crassiusculus unb bod) acumina-  
tus. Crassa Mar go pilei, bid ifl ber IXanb an  
beta £ute etuc^ 5Klse3, »enn ber Jput am Stanbe ebeti  
fo btct ift, aid in ber SRitte. Crassissimus iff,  
toenn bte ?onge jur Stcfe fid) @erbalt, »ie 1 ju 7r  
Defttrt ifi auci) blot ba^jenige crassus, toai jabecft.

CRATERAEFORMIS, b alp f« g e I f 6 r m i g,

}>o&l/ mif Derfc&taalerter 25aft\$/ unb mt( ~~genaden~~  
SBānben.

CRATER A E , f, *Cupulae.*

CRENAE, ungfitt>6&nlid)er *Crenatae*> **K**er-  
be jafrne/ roenn bie 3<Hne tfumpf / fafl jugerunbet,  
unb mit tfjrer @pi§e tveber gegen bit ©pige nocfc gegen  
bie ·SBajW beg 5>latte\$ gefe&rt ftnb, SRact einigen fol^  
len 'bie #erbe\$af>ne febr feic^t geben! Batfcb nennf  
^erbeja^nc folc^c ?appd)cn, am SKanbe *tlncl* 55latte^,  
beren bepbe Kanbltnicn g(etcf)f&rmig geneigt ftnb;  
**Bernbarbi/** n>enn ber S3orfprung einen SSogen/ bie  
Bucht etnen SBtnfel bilbet.

CRENATO-SERRATUM , geterbt t&gei&bnig,  
totnw bie SJu^fcfcnitte unb SBinfel be^ Kanbed **spisig**  
unb gerabelinig (tnb / unb fenfrecftt auf bem Slanbe **ste-**  
**hen**, tt)ie an PELARGONIUM *Barringtoni*.

CRENATUS, geFerb t/ voa\$ tferbejafjnef)at, tote  
**das** Blatt an PRIMULA *farinosa*^ CALTHA *palus-*  
*tris*; bie fnid)t an ib^n SKippen bet} CONIUM ma-  
cnlatum; bie piåttc^en {Laminae) an AGARICUS  
mammosus; bit ftippe (Lo6u«) an ORCHIS mo-  
ffio; bai Nectarium an Narcissus/ bag Blumen?  
blatt (P etalu ni) an LINUM usitatissimum , Di-  
ANTHUS chinemis; ber (Bniffel (^S/yZusJ an IKIS  
vcrsicolor , unb felbfl bie tflarbe {Stigma crena-  
lum). 3B\*nn bie jferbejabne eineg geferbten 95latte\$  
»an ber 6pi§e einen fleinen Tpi^tgen SBinfet btlbcn, n>ie  
an Den 2BurjeU>ldttern Don CAITHA *palustris*, fo nennt  
mart bitji fpi^'fl QCierbt, acute crenatum, unb  
im @Sgg\*nfofe^ ohtuse crenatum, flumpf Qthrbt.  
SBenn bie #erbe\$af>ne febr grog (tnb/ tote a« ben SBur;  
jelblättern ber BETONICA officinalis, fo nennt roan  
fie/ im Oegenfage bed'folgenben SJu^brucf^/ grob  
gefertbt (grosse crenatum).

CRENULATUS, fein ober flein geFerb t/  
ifl bad Diminutioum Don bem Dorigen, unb beutlic^

on *bjm iaixbt bon POLY PODIUM vulgare*, unbanber  
\$*p̄gg t̄on OHCHIS mascula*\*

**C**UEPITANS, *xoai tniflevt.*

**CUESCENTE-PINNATUM**, \$*Ullzl) ttl tt\|b Qtfitt*

**d̄er t̄**, nennf man em gefiebme\* *Sblatt, btfftn %>lått\**  
**chen** flegcn bſe ©pige ju groger ftwben, **n̄ie** POTEN-  
TILLA *anserina*\*

CRETACEAE, *yflattyn bit* nur im *tttibtottiQtn*  
Soben ,qet)ébcn; auch folc^e, bie tote mif *Sttibt iibeyf*.  
jogert fln^ \**Solum creiaceum* gilt auf? für **sehr**  
trccfen unb bürre\*

**Canis**, Kogl>^itr^ *tin ffetfe*\* ^aar/ mite ein  
Rößhaar, cf mag tuo immer (leben.

CUINITUS, *lanQbefyaart, Wai tintn langen*  
**Bart**, o&c lange ^aare &at, ttwm auch **Dœfe** ^aarc  
ton anberen *tbtln*, j, 35. (Brannen/ »ie an ELYMUS  
*crinitus* Schreb. (HORDEUM *jubatum*), PHLEUSC  
*crinitum* Schreb. (POJ-YPOGON *monspeliensis*) *Qtt*  
*bilbct totvbtn.*

CRISPABILIA FOLIA *an ben 3Koofcn^ fint> bititnit*  
*Qtn, bit bt\|m 2rodnen jufammeplaufeti; mite an Di-*  
*CRANUM crispum.*

GRISPUS, L., (rau^/ n̄af in fcine unb furje  
<£inf4)nittt jerfc^nitten if!, unb ft\* na\* t̄erfc&tct>enett  
'dliid)tun&tn t)inbtu\$t,falUt unb brebt. iDecanb: SBentt  
**das** Slatt at't \$cmf>f tvcttec i|b aid. in ber WitU, fo  
**das** e^ fid) in unregelmägige galtn Icgcn mug; roenn f  
nach £>ayne, bcv meHcnförmige SXanb bt& Sdlatteti^  
wieder in fleinertn jügerunbeten ober fpiftigen QBinfelit  
auf unb ab}eigt/ tple *an* MENTHA *crispa*, MALVA  
*crispa*; *an btm Nectarium Don* NARCISSI^ *minor.*,  
*Crispa Mi^go*, *tin* fraufer SSanb iff *an btm %uu*  
*tintt W\$cg, votnn ct* unregelmägig iDeaenföcmig 1(1;  
öfter^ iff ^ abcr auch fonom)m mit Marg-o in- obec  
*revoluta.* Crispi pili, totnn |a febr lang/ eingcroW  
unb gefdjlangelt finb, ttje an CENTAUREA. sonchifolia.  
totfttti iff bicfer guffanb t w i S&lattti nuv § Döñ frø:

*fitatf unb libf bann jene Slbarfen/ tie unter bem Stamen, Crispae, fcaufe/ befannf tfnb.*

CRISTA, 2\amm, eim rne&r ober minber^Ver, leberartifler ober forfartiger/ tiefaja&nter ober ge\* fcftlifcter glügel an bet @pifce, ober an bet SRatb etnk get gHumen&uaen / j. 93. *an bet ^ülfe son HEDYSA-RUM Crista gatl> Caput galli.* @cin SKanb ~~t>t~~ n>te jener ber flatter (>efch)richen» 2(ucf) bte Slügel an ben @amen ber Soften nennen dnige *Cristae*.

CRISTATUS, t a m m f S t m t'g, n>a^ etnen Aamm ^at / ober einem ^ehnbuf^e dfynlidb iff\* @re Sin; fcftnitte an bent ftamme fo^en 6cf jur 9)?itee obet iibec btefelbe retc^en. 60 nennt man etnen 6taubbeutel *tammf&rmig*, ivenn jtt)Ct) (nerDelarttge gesaffrnte 3pc; \$en an ber @eite ober an ber 25aji\* be^ @faubbeuteW ft§en/ {• 95. *an ERICA cinereaj tint Blume famm^ fōrmig*, n>enn einige SSIumenbläfter mif fammfJrmigen Slnftångfeln t>erfe^en ftnb / toit an POLTGALA *amara unb vulgarity* unb manege ^PfTanje bctgt blo§ **des** @tanbef t^rer Slunten tpesen Eammformig, toie **Ce-** LOS 1 A *cisiata*. *CriUaim* i(| an ben 9(umen|tte(en/ *toad fasciatum* an ben (Stengeln. *Crisiata graminæ* toaren eine Samtlie bep ben Slltem

CROCATUS, CROCEUS, f a f r a n g e l b , einfatee\* bunfele^ votbgelb, rote bie Starben am @afra, bf(SBlumen an HIERACIUM *aurantiacum*.

Cnocos in Sufammmfefcunacn *aui* bem @riedj)^ fcften / WaS *crocatus*.

CRUCIATIM OPPOSITUS, f. *Brachiatns*.

CRUCIATUS, f r e u j t r e t f e (le&en b,, toenn jmep in^lner unb berfelben €ene (eftnbad^e flegetP? iüberiebenbe ^arc Don Organen ~~fif~~ untetffcebten 9Bfn^ feln freujen. €O nannte man Blätter unb 2(efie unb 2fe&ren bfttrt freujwetfe (ic&cnb (*cruciata Folia, cruciali Rami> cruciatae Spicae*), tpend fie paarmetfe in etner unb berfelben gbene einanber fleflenitberfieben, 9luc& an STAVROPHORA ifi tin At\*

*c eptaculum crucial urn , b&i in 5orm einef flreujitf getbeiU tft. Cruciate Corolla f. cmci- f or mis unD au<\* dec us sat us , tvomittf oft OW wec&sel WnD.*

**CRUCIFERCS unD CHUCIFORMIS, Freu3f\$r#**  
 • n «9 / fagf dfcn mir toon \$!umenfronen / obfcron aucfr Blätter über'el «reuj ftef>cii, Die man Dann *decussata* Vnnt. Eine gjlumenfrone iff freujfonma.. (*CryiformisL.*), menn fie oier fllei^e/ felten ungimfre Slumenblättef 5af / Die je jx>e unD jwep einanDer w flenüber fteben^ »ie on Den JSLeppojen, am H^tige/ an Dec Hcspeis. tyflanjen met fol\*cn S5lumenfronen meiffene^ 2ctcaDi)namiflen, bilDenDie \$amil<sup>t</sup> tot *Cru\*ciformes* oDr *Cruciatae*. Xreujformige 6taubbcutcl fñD an GLECHOMA, wo fie fcfr fo fle^ flen einanDer neiflen / Da§ fie ein tfrcuj bilD^n. Sine freutfdrmige t^arbe i(i Diejcntge, Die in eier Went flefpalten *ift*, tpoDonje jroefl unD jweo einanDer *gegens* fiber fleben/ tt»e an *tlui&tn iBpilobieii/ an P*ENAE. *Cruci/erae* fñD etne OrDnung bep 3afTieu.

**CRUSTA ^>ebw. / Die áu^ere £aut ah Dem 6POP ranflium Der 3Roofe.**

**CRUSTACEA FRONS, CRUSTACEUSTHALLUS, rtrtl b e n a r t i g i(l Da^ laub an einiflen 2llflen, benne\* «u« anetnanDer HebenDen ^ugeUDen befte&t/ unD ant KanDe einige blattförmige ^rweiterunflen t>at, »ce«« LICHEN *Saxicola*, OPECRAPHA *pulverulenta*. 3?a\* ^ yne, n>enn e^ anrere eiçper wee eine SRnDe- mm tftbt. *CrustaceumPterigaeppium*, «W\* / «\* crustaoea, an Den Xfperifolien, wenn DieJJ *leicht* ^úaefebr Dün, unO Dur\* 2)rufen oDer SleIRn febreclid) iff:**

**Crustaceo-FOLIACEUS THALLUS , r1 « O « » • W-t i'g b U r t r i g , iff Da\$ taub an PARMELIA./enlt-^era, wenn e< Dur\*au<J auU fletnen jufammenDanaenj genDen Slatt\*cn beffebt / Die eine SXmDe hilpen, unft die am Umranse Dtutfitfer firD, aW im 3RiWfelDe-**

CRYPTANTHERAE, Die XIX (Staff\* Ut) Koyen ant  
©eber, Me tfrpptogamiften.

CRYPTOGAMIA, Rr pptogamie, 5flatJW fcie  
feine Deutfificcen ©efcfclecfctforgane fcaben, Die XXIV.  
SlftTe 6eo JSlinné.

CRYPTOGAM us, n>af in Die tfrgpWBamie geftorf.

CRYPTOS, KRYPTOS, verborgert/ in 3ufammen\*  
ſebgnflen auf Dem ©rie&isc&en / Daber \$. 95\* Cryp-  
ianthos.

CRYPTOSTEMON, Die U%U SJaffe bet) iT16n^, Die  
Kryptogamie, tote *Cryptostemonis bit*) (Blebitfc^.

CRYSTALLINUS. n>af n>ie Sroflatt Durct)ftcJ)tt8 iff,  
filanjt.

GUBITALIS, Don Dec Sänge bti %otbtvavmt\$, (*Cu-  
hilus*).

CUBITUS, Vovbevarm lang, Die UnQttiom  
dUtnbQQtn bit an bit Singerfpigen, ungefa&ir 17'',  
18'' - 22''.

CUCULLATUS, ?6pu\$\$enfdrmig oDer fap#  
pen form ig, ober *toai* eine ^apuje M; fo ill an  
ten meiflen Slrten t>on HYPNUM eine *Calyptra  
eucullata*, intern fie an Dem untern £bei( eine *tu  
toai* t>etengte SBalje / an bem oberen aber einen Iangen  
aufrectten oDer fc(>iefen fc&arf geft)i|ten ^egel 6illDet L  
onAsCLEPiAs etn fappnf<3rrm'ger S r a n j (*Cor0  
na cucuttata*) Der Den gan\$en Stempel Don often frer;  
ab/ n?ie eine *ftappe*. bebecft; ein (appenfdrmige^  
Bl^tt, idem ^erjformigc^ SBlatt, beffenbepbetaptn  
nad) auftoartd frumm gegeneinanber gebogen finD / fo  
Dag fie eine Sute oDer 9i6f)re ju bilben fcbeinen, Derett  
©pi@e ffegen Die ®aft£ ju gelegen eft/ toie an PELAR\*  
COMUM *cucullatum*. <ff tann aber aucl) etn anDere^  
altf etn berjfocmiseg ^ (art ein F. *cucullatum* merDen#  
toenn (id) feine ©eitenranDer an Der Safii ebenfo. bw  
den. Gtn *Petalum cucullatum*, oDer Dietmebr eft  
*Neotarium cucullatum* iff an **AQUILEGIA, Ace-**

**WITRUM.** (Sine *Spatha cucullalaffl an ARUM maculdtum*, unb eitl *Stigma cucullatum an IRIS\** SUPPI *eniff eg* (Synonym ton *calcaratus*.

CUCULLUS, 2 U p p e / ill eine 2lrf ton IReffarium welches eine^o&lenfatfförmigen/ freq Don aUmübvU gen S&eilen bee Silume abfie&enben Sörper bilbet / bee jumeilen furj ge(ticlt iff. JDtefe 9irt ton 9?cftarium if! en HELLEBOHUS, ACONITUM, ASCLEPIAS, in tvelcOem legtercn fein ^oni^faft barin Dorfommt. @. Auriculae Unb *Stipulae*.

CULM ACE us BULBUS , tt)ennr n>ie an etni^tt. ©ra^arten/ j> S5< HOLCUS *bulbosus*, bet unttvflt' Sb̄eil bt\$ fyalmel mit feincn ©c^eiben sicst t>erbictt/ unt>. eine 2(rt ton 3n>ie6e( ju biiben fc^eint.

CULMEUS, tva\$ am J?a(me flcf be fin bet; j . S3. *culmeum folium*, tin flmsclftanbiQti fdlatt an ROTTBOELLIA incurvala.

CITLMUS, L., So aim, ift bit ©ttngel ber ®ta\* fer; tt ift ttafjenförmtd unb fteUentveife mit bld)ttn Stnottn btfM, tvovau\* Die flatter entprin^em SSeo ten beutfd]enSoeantfern iff aucst *Calamus \$>a|m*.

CULTA, (Bartenlanb/ guter, umgegrabenec SBaben.

CULTRATUS yib CULTRIFORMIS, fttefferförm pint's/ t9irb<einer Unbcffimm^eU ftegen tvenfg mehr ebraucht.

CUNEATUS unb CUNEIFORMS, it i l f ö r s mt'9/ lan^licf)/ an bee @pige breit unb tfumpf (nacf) etnigen fogac gecabe abdefc^nitten/ unb fo(gii<\$ dreye ecfig/ nad) anbertn an bet ©pige jugerunbeO unb ges gen bie 95aft^ bin aDmäftlid terfcblmalert; fo haben ttir einen Ifeitformtgen @uubfaben an THALICTRUM, unb an bemjenigen/ bet an LOTUS tetragonolobm frei) fie&t; ein *Folium cuneiforme* anGu>BirLARu. vulgarise EUPHORBIA *helioscopia*; unb *Foliola cuneiformia* an LIGUSTICUM *Levisticum*; *cuneiformes Laciniae* bit flatter (inb an ACONITUM *Cammarum*, unb *cuneiforme Nectarium* di ail

SCMFERVITIM tec forum. 3t|totitn If! ti foiffitmttt  
tnit obconicus unt) /label I ifor m is.

CUNICUJATUS, gefrofclfeb1t, toa& eine\*<sup>2</sup>Jer\*  
fiefung bat, oce nad) tnnen wetter wirb.

CUPULA, tfUpfd) en, f Glans^Velta umb  
Scut ell a^ Cy a I hns unt) S c yp hull.

CUPULAEFORME R tCEKTACULUM, (tn b C (^ C Tl  
fdtmiger %f rucfctboben i(i an ten PEZIZIS.

CUPCJLAA&S Unt) CUPULATI PI LI, GLVNDULIFERI,  
bJc^jerf ormige <^aare, \$aare mit einec f>otkti  
£rufe an Der 6pi\$e, trie att ben Kufcertu

CUKVAKS, fic^ ttummcnb.

CURVATIVA FOLIA, et'n gebogene flutter,  
\*n toeldxn man/ n>ei fie fdwtal flnt/ in Der ^noeJpe  
faum ein 5üf^ereftfc>n betnerfr»

CUHVATUS, ge b e u g t, tcai ursprunglich gera^/  
und fpfier gefruimme muroe / t). c. einen Qlogen 6e^  
schreit. @o nenn: man em Operculum curva-  
turn, n>em t\$ tine boaenförmige JCümmund bildet,  
unt) ntcbi einerleQ sticbtung mit ber 6Di@e >at.

CUHviNERVES, ttumintfppfg/ttde*Stippen*  
&h itnmt, nnb 6e9na^e parallel mit ftem fRanbt bet  
SMastet finb, j. 8. an HEM EHOCAILIS japonica.

CURVUS, frumm, tra^ Don Oev feraben Unit  
ctotid)t, nnb tint Unmmt bilbtt, fr> e^ nun ein ^ al  
cbtt mtf)tm \$O?a^e. Ckir^a Semina, gePrümmte  
©amen.

CUSPIDATO-CORDATUS, g e f p 1 ^ t & erjfdr#  
mig.

CrspiDATrs, fei ngefp i'g t/ toad Ineine Hefne  
etwas fleife 3Bor(te (Cuspis) fi\$ enbet/ 5Decanb, unt)  
zugleich eine Dorgejodene 6»tge bat / tPt'Ub. 97aft  
Anderen nur fetngcfpi&t/ toit tint gattjettc, nad) anbe^  
ten mie eittem fyaare an Der @t>ige; nad) anbettn flv  
d)tnb. ifm Folium cuspidatum i(i nad) Jimné eine  
ii'èrf!u(ffge 6t?noni)mie Don acuminatum, mit  
tma6 fiedfer 6pi\$e; nac^ @pcenge( in Phil. hot. in

dne DfricmenfSrmfde 3pfge augfoufenb, unb nut bat  
**du** h Don pfriemenformig, *subulatum*, **verschieden**,  
**dag es** nicft waljcnfSn mig, /ere\$ iff; nacht **Hayne**,  
*mnn bie* ©pifje crinen fe&r fleinen SBinfel Mbef, fo  
bag eg borftpiormitg fic^ eilbet/ n>te ACER *laciniatum*;  
*nadt) Bern Tarbi DagjcniG/ tt> bee ipintercaith einen*  
*SBtnfel bilbet* En *Legumen cuspidatum* an  
TRIGONELIA *Foenu graecum*. 3utt?eilcn ja^It man  
auch btefe ®pl?en, mie an ALLIUM *sativum*, *too* bie  
*Filament a Iricuspidata* fñnb. *Rami cuspidate*  
fleifeepigre Sleffc, fñD an HYPNCM *cuspidatum*.  
*\$iad) JSitliiatb ift ed {wont)m mit acuminatus, nad)*  
anberen mit *mucronaius*.

CUSFIS, eine feme (anggefircfte unb *cttt>a& fleife*  
©piffe).

CUTICULA (5retD/ f. *Epidermis*.

CUTIS, &aut, bie SXtnbe einja&riger ?)fliatüien.  
Nach anfceren affeg n>ag unter ber Spibermtf liegt/ unb  
noch nid^e Jpolj iff.

**CYALINUS** GYANEUS (in Sufammenr^unaett aug  
dem Griechischen CYANOS) CYAN US, cm 5uuf cleg'\$lau>  
beynahe bent 3nMflojlra&le dlei(\$« Berlinerbfaу, f#  
*Caeru leus*.

CYATHIFORMJS, L., \* becfeerf 5r mig, n?enn  
eine unten maljenformige SXobre ftcb nftc^ obeit aOma^  
lid crtocitrt, unb ber SKanb gerabe *auftdjt*, *nUbt* ju;  
ruefgeboden if!/ unb *nid)t* sufammen^ejo^en, ipie an  
bet Slumenfrone **ton** SYMPHYTUM *officinale*. 25ci)  
anbeten iff *cyathiformis* Calyx tin Stttb, btV tllty  
an bet \$aft€ tunb / unb am 9fanbe &ani obet faum  
merflicfr geja^nt iff. Sin bec^erformtger *Qtdpwamm*  
(*Fungus cyathiformis* ober *scyphiformis*) iff an  
PEZIZA cpithoides. Sine becferformige i **Druſe**  
(*Glandula cyathiformis nectarifera*) iff an vielen  
25tC)jnamen, ©pmnogpermiffen unb an Sllperifolien,  
an meld>cn fie ftcf) bct) teif gen>orbenen @amen in iv<  
nen gtunen fatten (Sorptt oectoanbelt 2ln ber l^effef

if? eitt *Nectarium cyathiformej* |Xtib tin *Inq-*  
*lucrum cyathiforme* an CORNUCOPIAE.

CYATHUS, Be c b e r , if! efn becberförmégeS *Haut-*  
*gebithe*, bag *fde* auf ben SBebeln ber @attune MAR-  
*CHANTIA* beftnbet/ unb in toelc&em man 3frtföge *ant*  
*ttifft* &. a. *Cupula*.

CYCLICUS EWBRYO , beffen ©c&enfel einen *freisföre*  
*nttgen fRaum einfld)lie6en\**

CYLINDRACCO-COMPRESSA SILIQUA, *walzenartig zu:*  
*f^mmengebrücf / toie an CARDAMIME*

CYLINDRACEUS , fa (I t r a l ? e n f 5 r m i g / toad  
 ber ttaljcnfötmigen gorm *fcd* naf>ert, unb *bid* ijt,  
 j» 95. bag jfafedjen an CORYLUS, bad *Amentum cylindraceum* *Qtnantl* mirb; Wtēbte *Radix cylindracea* an DLCTAMNUS afff n>a(\$enformtd t(i/ unb bad *Recepta culum cylindraceum* an MATRICARIA J unb  
 ein *tuber cylindraceum* an NEOTTIA minor.

CYLINDRANTHERAKtDvtfcenborff. *Syngenesia*.

CYUNDRICUS, t r a l y e n f o r m i g / (6eo JDc^  
 canboQe gleic^bebeutnen mit *teres*) beffen Quer;  
 t)urcf)fd)nftte freife ton gleicfyem ©urc^meflfcr *fint*.  
*Semicylindricus*, *balvoal\$enfotmiQ*, ist das-  
 jent^e / baS einen bee Sânge nad^ gefpaltenen *Cylinder*  
 totfiellt, wo alfo *tint* @etfe cont>e^/ bte.anbere *flach*  
 jf{/ (Die «bad *Fiflum semicylindricum* an MESFM-  
 BRYANTHFMUM HOC/i/foru77i. ©o f)(it *cytJidrica Apo-*  
*physis*, einen waljenfotntam 31nfa§; ber ton bee  
 SSuc^re ge^rennt/ unb oftne ©amen ifi. *Amentum*  
 en *POPULUSYremu/a*; *Anthodium* an BALTIMORA;  
*Calyx* an DIANTHUS ; cyZ. *Capsula* an PRIMULA;  
 ,cy7. *Corolla* an ALOE *linguiformis*; cyl. *Co-*  
*tyledon*, ber einen bo&len gorþer btlbet; cyl. *Ca-*  
*uli* an ASPARAGUS; cyl. *Culmus* an TRjncuni; cyl. *Filiijn* an MESEMBRYANTHEMUM *hispidnm*; cyl. *Filamentum* an LILIUM; cyl. *Perichaetium* f.  
 conicum; cylindrici *Pili>* an SILEME *noctiflora*;  
 cyl. *To müm* an GUGUMIS *anguinus*; cyl. *Pode-*

**Hum;** cyL *Beceptac ulum* an MATRICARIA  
*Ct^lomilla;* cyL *Scabrities*, tpenn bit **lttcbt** ^  
&eifen an bit Oferflå\*é eineS SSlattei n>a!;etiformis  
**ftni);** cyZ. *S cap us* an PLANTAGO major; cyl. *Spa\**  
*dix* an CA^LA *palustris*; cyL *Spica* an PHLEUM  
*praleme*; cyL *Stipes* an AGARICUS *piperalus*; cyL  
*Strobilns* an PINUS *ahies*; cyL *Stylus* an CI-  
TRUS *auranlum*; cyL *Thee a.*

CYLINDROBASISTEMON tP^4>en&Orf, f, *Mona-*  
*delph i a.*

CYLINDRUS, EX><tl\$e, *cine* röftrenfērmige fcünne  
Serlängerung / toclcfcc an eintom ^ffanjen, n>r att  
SWIETENIA, MELIA, 6en ©tcmpel umgibt / unb i)ie  
©faubgefage am Sianbe/ ober am obercn S&edc t>er  
inneren gläcfte trågt.

CYMA, 2ffrerbolbe/ tt)^nn jweo obtt mtfaett  
Slumenfitèle ton bemfe!6en ^uncte au^eben, fid) be^  
nafo W^ontal autbveiten, unb obtn eine ober m^rere  
Siet^en 95lumen tragen / n>te j . 95\* ag SEDUM. *IDecanb.*  
SBtnntiiu X)olbe, fagt £iñne, **ftct** nic^t regelmagig^  
fonbern ofnc alle Orbnung jert&eilt; Jt>tmt mestrere  
Slumen/ fa^t er, mit *Qkid)h^n fdlnnmflicUn* auf  
einem *Qcmcin{d)aftlid)tn* ^ruc^tboDen fo gefieOt finb,  
tag Me erffferen auf einem unb bemfelben 9RUte(puncle/  
Die anberen abev bier unb ba cntfpringeu, fo entfetbf  
tine Hftecbolbe, U>U an VIBURNUM *Opulus*, 2Bemt  
fcie SSlumenfiele noebec einfa\*· |inb/ fagt ©prengcl  
Phil. hot. Linnaei/ no\$ au\$ tl nem flflittlpunete tnt\*  
fprinflm, unb boch eine Solbe ju bilben fc^emen, fo  
il e£ eine llftevbolbe. Willbenow **enDic** fast, eine  
Slfterbolbe entfte^e bann, ivenn ber ganje SBflut^enflanD  
groat einer Solbe af>nlt\*^tie^t / abet toeber bée ^aupt^  
blumenffiele no\$> bie ejnellen au^ einem unb bemfelbeaj  
^uncte enefpringen: bie £auptblumen|Itelc entrpvinflep  
bifit übereinanber/ unb fmb in unregelmägige 2le?e  
gethellt / t>ce an VIBURNUM *Opulus Mb* an SAMBUCUS  
**nigra.** SB^nn / mi) Bern^arbi / #e(!iclc SHutftm in

Den. SBinfeln ffefctt , twlcfre *bit* 3Ie(te tine\* gemein' fcfoaſtſicſten 35lutl>enſltéle\$ bilben, unb an ben @rffeen berfelbcn: —" 3Benn, nad> &afne, breo ober me&rere äjiige \$lumenfiréle au\$ emem \$unete entſpringen / unb fief) naſcfc · t>erfdjiebenen 9iid)tunaen fo t>cr6retten / bag bag @an\$t einer ſufammengefeſtm S)olbe bepm eeffen SInblicfe ä^niicf) iff, t>on btefer aber fcfc) baburd) uiu t^rr^etbet/ bag iftre befonberen SBlumenſltéle fid) ntc^t in &blbd)tn , fonbern obne 6c(Timmte OrD'^ung tn 2Jeffe grctbeilen. *Cyma* nennt man enMič^ noc^ bie *Tyrone*, b. I affe 9(efle unb Stveige berfelben {ufammengenom^ men/’ n>emt **fie** auf etnem narften unb einfac^en @ten^et ftt) t\\|.

### CYMBA, ♀ *Carina.*

CYMBIFORMIS, nad)cnf6tmiQ, emem ftaftnt abnlld); fo nennt man gumeilen *bai* @c&iffc^en (*Carina*) tin *Petalum cymbiforme*; *bit* @amen an CAENDULA officinalis Sent in a cymbiformia, f. a. *carinatus*.

CYMOSUS, **aftetbolbenf&tmig, toai (nacit** Bu^Urb me^rete) 9lftecbolben ttdgt. BAanni fyattt tint natürlicfte gamilie aW *Cymosae* aufgefieBt. Cy - mosus *Flos* Iff fononpm t)on *Cyma*.

CYNAROCEPHALAE , 2lrtifd)ofen ^ dbnlicbe @ewacffe; etne @(@affe beo VaiWant, unb eine Orbnung bet) Jüffieu.

CYNARRHODON, bie \$tucfyt bee Stoſe, bie ~~habnen-~~ hutte.

CYNOCEPHALOIDEAE COTYLJEDONES , bte juum **Theile** Dem Jtopfe etned *Jagb^unt)*^ mit ftangenben f)i)tm glctcf)en/ t>ie an MALVA, LAVATERA.

CYPHELLOA, Bed^er<^en, einefref^f&rmige@ru^ U/ bie aber mit etnem erfta&enen Stanbe umfd)riebent kt, unb bie man an bet unteren S'llfce be^ LICHEN sylvaticus (Sticta genannt) ftnbet. 9)?an fennt % ten <Ru\$en ntci)t 3U t>at etne anbere garbc al^ bee Thallus.

### CYSTA, ♀ *Cista.*

**CYTINIFORMIS** Journ cf; tern flelc&e an btn @ra\*  
nftäpfclu äbnlicft/ filocrenf&rrai fl tmb **vielspaltig.**

## D.

**DACRYOIDEA SEMINA** (Birtner, We bit &tflalt einer  
ftängenben X&råne ftabtn / an efncm €nbe runblicfr  
find / on bent anberen ftd> in eine ©pige enben.

DACIY'.OIDEA GKAMINA, eine Samilie &er (Srâfer  
**ben** Den, 2J(en.

**DAEDEALEUS, vevwotten;** *daedaleum* *Fo-*  
*lium* perrporren ntnnt man eln SPIatt / bag an bet  
©pige breiter, eingefestnitten unb fraud ffl; j. 95.  
*SCOLOPEJUBRIVM ojficmale, i\** *Daedaleae Lamel-*  
*lae, bit pl&rd)en vevwotten, bind)* &ucrmåbe  
unregelmågig »er6unDcn/ mie an DAEDALRA *quercina*.  
€^ i(l fpnonpm mit *labyrinthiformis*, unt> 6ejeid£>ntt  
tiid)t, mie BerFentour meonte/ irgenb efma^/ *toai*  
fct)r fd)6n unt> fünflUc^ sefcairt if?.

DtBiLis, fc^tpadb/ fagtman 9om@tengel/ toentt  
er )u Dunn unb jart ifl urn fid) aufrecfyt ju erftaken;  
ouc^ menn cr letd)t bric^t, rote an EQOISETUM *palu\$tre*,  
*SCIRPUS capillariSy RUBIA tinctorum.*

**DEBILITAS, &d>wā<be,** jener *Sranhttitiiuflanb*,  
in n>el<em eine «J)flan^ aug *toai* tmmer für einer Ur;  
**sache**, atte £&ecle (xingen läg\*.

**DECAFIDUS, unfd)idlid)** flatt *deccmfidus*.

**DECAGYNIA,** ber SRame jener Orbnungen^ Deren  
~flanzen gehn ©taubmege babtn: bafter

**DECAGYNUS, ^flanjm mit je&n Staubwegen.**

**DECALOBUS, unfd)jtflic^** flatt *Decent lob us.*

**DECANDRIA**, bie jePte Glaffe 6e» *Linn^.*^

**DECANI^P**, Pflanzen mit jcf)tt @taubgefagen.

**DECAFAATITUS**, unfe^ief (ic& fur *Decent p a r i t -*  
*i n s.*

**DECAPETALUS**, mit jebn SB(umcnb|ättern«

**DECAPHYLLUS CALTX**, ein htlynbl&ttTiQtt ftld), tote

*an HIBISCUS, ttlb ebenfo decaphyllum Involu\*  
crum an ARTEDIA.*

DLCFM in SSerbinbung mit anberen S5ei>tt>6rtcm be\*  
btutct, bat bagjetttoe, wag burct biefeS Sepmort be\*  
jeidjnet n>trb, jebnmal torbanben ifl; fo iff ein *Calyx<sub>f</sub>*  
*Ober Caul is decemangularis jeftnecfig; ein Calyx  
decemfidus, toie an Geuin , je^nfpahtig ; ein Verti-  
cillus decemflorus je^tolumtg ; etni Slatt decent\*  
jugum s^ttaarig; eine fiapfel decemloculan̄s jc^n^  
fâcherig*

**DECIDENS**, abfaflen b, n>a^ in geraber Sinle ju  
Boden fâllt.

**DECIDUUS**; abfallert b/ mirb fe^t oft mit c a -  
ducus, HnflHig t>erm^fe(t/ unb mug genau ba^  
.ton unterfc^ieben werben; fo i(I j- 95. *deciduus Ca-  
lyx* ein abfallenber tfelcft / ber mit ben SHumenblât\*  
tern JU^Utd) afcfâlt / ftie an BEHBERIS unb DATURA;  
eine *abfallenbe* BluntcnFrone / jbie nad? bem 93er^  
(luben *abfatit*, tt)ie an MELILOTUS, SCILLA; *decidua*  
*Folia*, flatter, bte tffeild tin @ommer^ wie  
an DAPHNE *Mezereum*, tfeeW erl tm ^erbffe *abfaU*  
lei)/ tt>ie an ben meifien unferer 99aume; *deciduus*  
*Pedunculus*, tjin Shunenfftel, ber &ug(eidy mit  
bet \$rud)t *abfatlt*, tt)te an PYRUS *Malus*; *deciduae*  
*Stipulae*, abfaffenbe Slfterblatter / bie lan^e Sett  
nad) ibrcr <£nmidelun&,' ober fur\$ tor ben Slattern  
at fatten / \$< ®- ^n ALNUS·*glutinosa*, PRUNUS cera-  
sus; *deciduae Siliculae* ober *Siliquae* > bit  
tor iftrer Oefnung abfaflct, toie an BUNIAS, MYA-  
CRUM; *deciduus Stylus\** ber flldcf) na(6 ber **Bes-  
fruchtung** qbfafit.

DECIMETRE, = 3'S iB<sup>w</sup> ~~ooo~~

**DECLINATUS** unb DEFLEXUS, niittm^pD**ecandolle**  
Tut fononpm/ unb nennt one\* fo, u>a€ boflenformig  
jurucffaQt; inbeffen M beefed SBort bet) terfebiebenett  
Organen terfebtetbene SBebeutung. @o nennt man einen  
Qunql n t e b e r g e b o g e n / n>enn erfo gegenbte  
Erbe geneist tft, bag fetn contejrer £ftteil nad> cben

fie&f (ttacfc \$>aynt *anfatiQ\** aufrec&f/ fc&ief in  
*bk* £6f>e ftetjt/ unD enDlicft (*id*) in einem SSogen gegen  
. We <§e feitmmmt)/ tt)ie an LYCIUM *Barbarum*, CON-  
VOLVULUS *tricolor*; a b to å r t s g e b o g e n nenntmati  
©taubfåben, Die nicfct aufrecfct fiefcen, fonDern all\*  
måhlig, ohne einen flarfen \$osen ju befc^reibett/ fift  
nach Dem obren oDeir nacl) Dem unteren X^eile ·Dec  
Blume beugen , {• 93. an PYROLA, AMARYLLIS ; decli-  
natim *Folium*, fabnformig nad) unten bthwtn,  
trtl&tt flinn& ali ubetflñffiQe ©pnonpmie. Tibrvårts  
gebogen ifl bet Zblumtnftitl an Dec MALVA *rotundi-*  
*folia*; abxvånte gebogen ifl bit ©d>oe an MALVA  
*rotundi/olia*; unD abwårte geneigt ifi Dr (&tift  
fel/ roenn er nad) Dec SrDe oDec ©eire fid) binneigt,  
tpie an AGAFANTHUS; declinala Thcca ifi Dicjeiii'ge,  
Die t>on Dec fenfred;ten Since abroeicbf. ©• a. Inclu-  
natus, Recurvus unD Retroflexus.

#### DECOLOR , farbenloti.

DECQMPOSITUS, b o p p e l r \$ u f a m m e n g e ;  
fe ^ t / nennt man Da^jenide/\*Delfen X^eile n>icDec ju;  
fammcngefct finD; fo i|i an AMARANTH us *caudatus*  
tin Anthurus decomposites, Dec au£ mefyrlren  
SBlumenfc^n?eisen jufammen^efe&t iff. F/o « dcom-  
poitus ifl bet) einigen fanonpm mit aggregatus; beo  
£inn c eineboppelr jufammengefete £lumC/tvenn/  
toie an SPHAERANTUUS, in einem \$cmein(d)aftHd)tn  
Kelhe, m?&rere Weinere aemeinfd^aftiic^e SttlAe mit  
vielen S5(umen futD, Folium decompositum L.,  
ist jedes Sblatt, totlfiti tintn einfac> gcticittcn Matt\*  
fficl t>at, Dessen 3le!e mefyrcere Sblattchm rra^cn, tvte  
das boppelt unD breymal geji>eyre BI « «/ bai  
doppelt dreyzåhliger DaS ge&reyt unD geftngert  
gesiederte ^ | d das doppelt gefteberre Blatt. Den  
nennt aucfc. ^es Blatt doppelt zusammengesetzt (d<sup>+</sup>  
compositum) an n>ekf>em Die 3erft)eUung des  
Slat.flielc^ unD Der fflattdym pntegtlmawd i|i, unt>  
nid;t teliimmt angefleben werDen fann, toit an mebw  
tm Jlaferpinien. Decompositus Fruetus, Dieau\$

me&ceren *tin* \*9?a( fd>on jufammenaefefcten grūfiten  
6e|icbt / roie ARTOCARPUS *incisa*; *decomposila In-*  
*florescentid*) weun mcf)ccre jufammengefegte  
.35lūtbenf.ānDe u>iebec auf einem semetnfd)af(ttd)cn S3o\*  
ben ober @tele fi&en. SDoppelr jufammengefeijt  
nennt man etne Straube/ *{flatemus decompositus}*)  
n>enn bet flemeinfdfraftlidje asfomenfiel tfdj in mef>rcre  
āflige 9JlunKn(tte(e tbeilt / tt>ot>on jcbct etnjclne 31ft  
tvieber ēne Sraubc btlbet, toie an SPIRAEA *laevigta*.  
iDoppelt 3urammengefei5t i(t etne 3(ef?re'/ n>enn tie  
eptnbcl fid) in met>rere mieber ^etf>eilte Qlekle t()i||t,  
n>ot>on jcfeec eine ei^ene 9lef>re bUDet / roie an GAREX  
*paniculata*. SE>i Surculm t(r ef 6fter^ fpnonpm mit  
*trip lieato-pinnatus*.

' DECORTICABILIS , aUCl) DSCORTICANS PILE US, ^ttt  
S}ut an einem 9>i(se ^ bee fid) fdjālt; beffen i?aut man  
mit ntef)r obctr minber 3Rūfte abjie^en fann» gbeit  
bUB flW ^Q^ ^lecorlicahilis Stipe s.

DECORTIGATUS, u^ne SKinbe/ obne SSebecfung, @ o  
nennt man an ORCHIS unb ASCLEPIAS bie 6tau66eute( unb  
bebecft (*Antherae decorlicatae*), twnn bit  
5)?aff'e bed \$(umenfiaubeg / o^ne ton etner fyaut bit  
beeft \$u fepn, in @c(laU eined länglichen **Klumpens**  
**zusammenhangt**.

DECRESSENS, *abnebtmnb*, *toai* gegen **bie Spīge**  
§u fleiner tDirb. @o nennt man ein gefieberres **Blatt**  
dbne^lttenb geflebert (*decrescentibus foliolis pin-y*  
*natum*), roenn bie Slatfc^en be(!o Hemer tt>erben# je  
naff>er fie gegeu bie @pi^e ju fommen / j- S3. an bee  
tDicfe.

DECUMBENS, n ie ber It'eg c n b / nennt man ei\*  
mn @tengei, bet anfanpd ta bit fi6be ftctgt/ bamt  
t sleid) ftieber nieberfaUc, unb gr6^t^S:t)Cile\* auf  
frbe bmgefllerst ifl / tt>ic an *TmuJPserpyllum*.  
*Decumbens Flos* ifi eine lie^enbe unb überbängenbe  
58lume, n>ie an Dielen StaDelpfiflen. *Decumbens*  
*Podetium*, t(t wit tin nieberliegenbec (Stengel ges

**lagert**, tlbt cbcttfo *decumbens* & urcu7u5 L., eitt  
an Die (Erbe angebrücftr SRootffengel / n?ie an Dm  
· HYPNIS. *Thullus decumbens* iff jenetf fabenarfige  
iaub, bat nid)t totit fiber ber 35afi\$ (id) nteberbeugf/  
fo ba\$ ti, too nid)t san%, bod) grōgfen ZhtxUi auf  
btm fibvptt Ue\$t, auf vodd)cm ti ^orfommt, xoit  
CORNICULARIA lojiata. 2\$ep Qcopoli **C** *decumbens*  
fynongm mitf *prostratus*.

DECURRENS FOLIUM L. , f>erablaufe nb iff tin  
93(aft, tvemf e^ fid/ unt) mit fciner %>afig xotit hbtt  
bitft binab am ©tengcl fid crffrcfcft; menn Ote 3In^  
bán^fel o^cr bit untztn £inf) nittt befflbtn mit btm  
©tcngel totit nnttv if) ttt 33afi\$/ ebtt n>enn We unferen  
Slnftāngfel Dec glač^e oter Der happen Doffelbei mit btm  
Sblatttitlt t>ermadſen fini). itfyvti iff fononpm mU  
btm totnii \$tbtaud) lid) en expansus *Petiolus*, toitb  
8ttobf) nlid) buvd) *decurrens in petiolum* a||\$tbt|X(iU  
toit an meftriren ([ineratien; trfltti iff an VEKBASCUM  
*Thapsus* unt) an ONOFORDON *Acanthium*; *Decurrenres*  
Lamellae, fwnjtbitty lattd) tn an tintm@cf}tvam^  
me am ©trunfe Dec Wngc nad) feinablaufen / rote an.  
AGARIGUS virgineusy MERULIUS. *Decurrens Ligula*  
iff ein Slattfrasutcben, bai tanm fid) tba† iff/ unt) tit\*  
nenmenbig in t>er <&d) tibt binablauft. *Decurrens P* «•  
dunculus xmb *Petiolus* iff ein Sfattffiel dDer  
Slumenffiel/ ber mit fñinem fielc, gemöbnlid) eineit  
Jfratl) am ©tenflel bcibenb/ an bemffilben^ n>eit untec  
Ttint ginfuguns binablauft/ unb toit tint er^abene  
State bavan erfefceint. *Decurrentes Stipulae* finO  
an GISTUS,

- DECURSIVUS, ^ e r a b f l i e g e n b ; tvenn blog bie  
SRippe éme« Slatted fecrabfauft, ober toemi oilme^c  
bit SBlattfeen jine^ jufammensefegten, ober tlef fleſt'er  
bert 9<fd)li§tlñ ^ latrf an bem gemeiuf#aftlicfKti9  
SBlattffiele obec an ber SKtttelrippe fterablaufen / two e\*  
bann nad) JElmie *decurvive pinnatum* iff. 3Ran uns  
terſcheidet inbeffm feltnntc • al^ ti Occ 3 R ^ werth

wåre, decursiva *Eolia* Don decurrentibus, unb sagt ge^ö&nlicfenu folia decursive p innata, Ober *Rhachis alata*, um folia decursiva ju 6e\* jeic&nen. *Decursiva folia*, in free SJebeutung einer *Rhachis alafa*, fyat ACHILLEA distant, unb and) JVIELIANTHUS major. Batfd? ttCnitt tin Folium decursive pinnatum badjenige / an welcfem t>ic an bent SHattfiele berablaufen&en Slaftcf)en fief) nicfy bcrü&rcn. SBenn fte ftcf) rotrflic^ berul)rca / fo nennt ec t̄f tin jufammengeflofTen geffe&ertes BJatt/ (c o 71/z u-*enti-pinnatum*). *Decursivus Stylus* nennt BuUiarb jenen ©rtffef, dec Don bee ©pifec bef Stud)t^ fnoten^ ju entfpringen fc^etnt / tint) an einer ^ante beffelben hii \$u jenem ^uncte binabWuft/ t̄er mlt bem Stabel bed ©amend correfponbiert/ \$ 35. an RIVINIA, ALLIONIA unb an benjenigen W^Htn, an me(cf;en bee ©arae immer nuc an ber @eite angef>cftet if}.

DECUSSATUS, a r m f ö r m i g/ £r e U3tt>eife, toenn bie \$aare g^enübcr^enbec Organe pc^ mit tbren Slc^fen unter redjtctj SBit^eln freujen, oftne in einer Sbenc ju liegen, fo bag alfo, luenn bit 9Icf)fe bed unteren \$aared Don 92orben gen @üben gefebrt if!, bie bed barauf folgcnben ton Oftflen SBejt gefe^rt iff, unb bie bti britten \$aared tow ber ton 92orben gen Øubeu u. f.f. *Vecussati Rami fiat*) fononpm mit *brachiati*. *Decussata Folia* L.? *decussatim-opposita*, frcujoeife' fle&enbe Blärec^ 4tennt man biejenigen/ bie in Dier SKeibcn fo an bem ©tengel fieben / bag < tpenn man benfelben Don oben ober · Don unfen 'Dertical betracf)tct, biefe flätter in gorm eined ^reused gefieDt ju fepn fc^einen/ ober bag fie ein &reuj bdt)en mürben^ men it man jmeij \$aare berfclbcn aneinanber rücten fönutc, o^nni&re SKicfttuns ju ånOern / ober bag -fie Dier n>ed)fe(ti>e(VI einanber &\* aenüberfrie^enbe Sieben ldn\$& bti ©tengeld i>mab bi(' den, n>ie an EUPHORIA *LaUxyriS*) VEROÑICA *decussar*

*la, LYSIMACHIA vulgaris. £)afjet ar& decussatim. ©• a. cr ucjforme.*

DRCUSSIVE PINNAT^M, f. *De cursive pinnatum* in *Becursivns.* S5ep^ptel iff nod) SIUM *Falcaria.*

DEFSCITIVI FLORES , finD beo tPa<\$enborf tie **Diß;** ciflen\*

DEFIKXUS, fcerabgebogen. @o ifi an **Ber-** BRRIS *vulg-aris bit* 3>aube berabgebogen; fo nemtt man Ote 2ic(Tc an ber ?<?rd)e ^erabgebogerr, 6a fie in tfnem ^o.qm herabbânaen / unfc cbeti fo t>te 31e ^m <tm ?J?oo^(lcn.qel t>on SPHAGNUM *palustre.* fyud) etnjelne {appen tfn Slättern nennf man *to hi deflexi;* tvic an ARTIM *maculatum.* 3\* ^ retroflexus. Slnbere nennm *aUti, xoai audmärtf sebo^en if!/ dejlexus.*

DEFLORATA STAMINA obtf DEFLOKATAE ANTHERAЕ nennt man triē 6taubgefâgc Dann / n>ann fu ifyvcn %>lut mmtiaub aati&eftaubt balscn, too fie bann iftet, toit an STACHYS, eine *anbm ia&e anncbcnicn.*

DEFOLIATION bag 91bfatten btt Staffer fm 5rù^ jabre unb fytbrie. \$ac& Jlinne' bev <Spatt)ezbfl mlt fcem na^e tintteUnbtn i&inUv. Defoliduo noiha f. **Efoliatio.**

DEFORMATIO, Jg nt fle'l'ung, jrgenb eine durch eine jufaUigc unb ftcttbare Urfacße fterbe^efubrte ,Versänderung in ber 5orm einiger £>rgane.

DEHISCRNS L.> a u f fp r t n g e n b / fvenn jufatm **grengeheftete** 2f)ef(e fid) an ben 37atben öjfnen, unb noch an einer <ffeUe eine 3eit über *einancbv Qcnafatt obtt* berbunben bleiben. Wan bemerft bet> Btaubbeuf teln unb ^apfcln / ob fie an bet epige ober an ber Seite ftc offnen / unb bafelbfl ben 95lumenfa»b unD We @amen audfttcum, apice lalereve dehiscens Anthera el Capsula). gvftCVti iff an SOLANUM, LEUCOJUM und PARIS, legtereS an AESCULUS Wppocaslanum ber Fall, unb an ben £ict>enen und @^w4mfnen. Baw & hiscens ifi bie ^apfd an BOCCONIA ; poris .dehiscens, buxdb ibtit\* «m SXficfen / Me «apfel an LWARU IIIO

an bin poropteriben; *rima dehiscens*, unb **jtoaf butd) tint Unit an bet** ©pige/ **an ben Qdpiematopu\*** riben; *irregulariter*, nad) ber Guere unb unregelmägig an ben ^ilicea. Sine *dehiscens Drupa* (auffprtn\* genbe G>retnfrud>t) ifi a\*t IUGLANS regia, n>o bit äugere leberartige ober bfcfe fyaut bet) t>oOfommener SRetfe aufreibg. Sin *Folium dehiscens* i(ian **SALICORNIAherbacea**; *tin dehiscens Indusium* an mehs recen garrhfräutcrn, tvobet) man 6ead)tet, ob ^ **nai**^ außen cbec nad) innen & offnet (*exterius dehiscens cbtt interius obtt bcflcr extrorsum unb- introrsum.*) <£|||*Legumen dehiscens* an MEILOTUS; ein *dehiscens feridium*, *tin ?erreiffenbc* Umfc^Iag i(l berjentge / bee in ©tiicfe serpla^t Sine *dehiscens S* **Hi qua** ijj an **SISYMBRIUM**; eine *dehiscens Spat ha* an ALLIUM.

DEHISCENTIA, jba« ?f u f f p r i n g e n , fener Slcf, butcf) welcften happen, bie ttgenb ein Organ etnfd>Itc^ fen; unb biebürct eine^abt^erbunbentoaren/ fic^o^ne Serreijfun^ ber *UnQt* biefer Slu^t nac^ t>on einanber &fnen; auc^ bie 9Irt unbSBelfe/ n>ie **etwas aufspringt**; fo springt bée jfapfel me^rerer ^ffanjen a) an ber **Spige** atifv unb {toar entmeber mit 4 3<^fnen / n>ie **DIANTHUS**, ober mit 5 Sa^ncn, n>ie ALSIMC , ober mit 10 Såhnen, tote CERASTIUM; ober b) an ber SBafig, unb &n>ar **entwbev** nad) breo ©eiten / n>ie TRIGLOCHIN , ober nacf fünf / »ie LEDUM; ober c) *an bm flantn* n>ie OXALIS) Ober d) burc^ Jöcfter, ttJle bie CAMPANULA; ober e) %& rijontal / ttie ANAGALLIS; ober f) *an ben @e(enfen/ toit aUt* ©lieberfrücfte, @. a, *dehiscens*.

DELIQUESCENTIA, verf4>t D'tn b en b/ nennt manbtn ©tengel/ n>enn er dfltg i(l, unb ft\* fo fe&r gertftetlt/ \*ag ber ^auptflamm fid) flanj in 2lele · **t>erliert**, unb fount mefir ju bemerfen if!, toie *an FEDIA dentata>LEDUM palustre*. Sben bieg gilt auc^ Don manner **Rispe**\* bie man ba^er *deliquescentia* nennt/ Kit an PANICUM *capillare*. ©• a- **Prolifer**.

### **DELQUIUM f, Emarginatura.**

DELTOIDES UIU> DELTOIDEUSLM beltaf<5rm̄g, iiennnt *fLinni balb* ein |aiitnf&vml\$ti SSlatt mit 4 QBinfeto/ bonft>elc&en bitfeniflen, Die jur ©ejte ffe&en, toon Der S&ajT5 minDer entfernt fnt>, afg *bit* übrigen, tote an **POPULUS nigra**^ ATRIPLEX *has fat a; balb* etlt 95laff / *bag* einen gérpec mit Drer) Slacken bilbtt, Dec an 6et)Dm QrnDen fid> itfpfyt, unDtm OuerDurcf)fcf)niffe cin ^rtd>ifd)C^ Delta bilDet, n>ie an MESGMBRYANTHRMUK *deltoideum*. £>ayne ncnnnt Dife^ 95latt *deltoides*, beltaarns, tint eg t>on Dem Deri^en folium delto 1-deum ju unferfcsteiDen\* 9?ad) B&U/arb iff em Delta' förmung 33fatt em rautenförmige^ DifTen ^ t n m an ber 35aft^ fo furj ift, Da§ baflfelbe bepnahe breoccfi^ fpird\*

DEMERSAF, aSafferpfansen/ 6ce immer unrer Dent SBafRc/ t>on Demfelben beDecft mac^fen, u n . t e r g a taud)t ftnD; {, S5> CERATOPHYLLUM, *demersum*. 3n^ i>effen unterfcsteiDet man DocO efnen *Caulis demersa* an UTRICULAMA, ton *Folium ,de7/tersum L*^ an Den POTAMOGHTONES J an RANUNCULITS *polypkillus* J unDfelbil/ im ©egenfafie Don *natam*, cine *Radix demersa*. \$ep Den meiflen if! eg fpnonpm mit **submersus**.

DEMISSHS, fpnonpm fon *humilis*, **was niedrig** 6ldbt, im ©egenfage »on el at us, j. S3. **BROWALLIA demissa**.

DENDRITICUS, b e n b r 1 r if4>/ nennt man efnen *Thallus*, n>cnn man an feinem llmfange ^ett>6f>nfc^ afluſle ^afern tvabrnimint, »ie an PARMBLIA *dendritica*.

D^NDROIDES, b a u m 4& n 11 df. ©0 nennt matt ait NRCKERA *dendroides* Den 9Koog(!en9eI bauma&nfic^/ weil er aiifrcfift fiebt / unb an Der 6pige érne 3D?enae bici;tjleben&er **Qtele** # »ie Die frone eineg Saumeg/ tragt.

### **©4 Fasc culatus.**

**blop** DENDROLOGIA, jenec. 2f>eil Der *f&oianlt*, *btt fid>* mit \$aumen **beschäftigt.**

**DENSUS, d̄t̄ t̄,** tt>ai bic&t ffe&t; tea\* bid)t iff feiner @ubfianj nad).

DENTATO-CILIATUM, wimpelig g e j l f r n t , n>ent 6fe 6pi\$e eine\* jeben Safneg mit einer SBimper 6efe\$t ift, tote an CNICUS oleraceus. 3n66efonbert nennt man bai *Peristoma duplex dentaio-ciliatum*, roenn Die SBJinbung augen mēf 3<\*bnen unb itu oenwenbig mit 2Bim?>em befegt iff, rvie an CUMACIUW.

DBNTATO-CRENATUM, tzrbsibnig, n>enn jeber 3abn On feiner 5>ałt< roteber einen fleinen runben 3abn \*f>at, »ie an SALVIA pratensis. SRa\* anbevm, wnn bit 3af>nt H̄em unb abgerunbet finb / unb btd>t fteben.

DENTATO-DEHISCENS, ? a t n f 5 r m t g \$err jfferi/ l^enn ber obere Zbeil {erplagt, unb ber übrige Sianb fpater mtint ju fc?n fc^eint, trie an AEGIDIUM, MAR. CHANTIA.

DENTATO-MEMBRANACEUM, nenntman bai *Peristoma duplex*, toenn bic OTUnbung beffötten augen mit 3afcnen, unb inn.cn mit einer Jjaut befe\$t iff.

DBNTATO-SERRATUM, figefd r m i g guibnt, »enn jeber 3a&n «n feiner Safig einen ober mebrere @dgejaf)ne M / miean VERONICA foliosa.

DENTATURA, f. *Denies.*

DENTATUS, getfimt, tpa< mit 3af>nen am ftanbe terfeben i(I; n>a^ am Slanbe mft Heinen dinfd)mttm t>erfef>en ifi, bie ni\*t über bie lefftten SerafHungen ber Stippen feicben, unb fenfre^t auf Dem ftanbe btifdltb tee ffeben- 3nbeffen bat a bed) an einselen S&eileit terWicbene Sebeutungen. (Ein gejabntcr btaubbeuf tel ift an TAX us *baccata*; eine ffejäimrea 2)crfblarr (firacua) an MELAMFYRUM; eine ge\$ā{mtetfjfc gean GRIMMIAJ eingc^ā^nter » d 0 iff berjenige/ ber au^ einer beflimmtten %maf)l oon 3<ibnen bejie&t, bie aber nie über ben tjerten £beil ber £ånge»be\* gatneu \$\*{\$& einbringen burfen, unb bee bann meiflen^ ges jabpt taerben; fo faflt man torn flelfcre am UOVSTR u u vtUt> Pierj^ntg/ \*oroJWc&e an ber VKRBKHA er sej

**fünfzähnig** u. f. fo. SBenn tie Sfnftfnitte bit 9tU ches o\*xer Die ffefc&blattc&en feteff wābnt flnb, man Prunella btv obere £inf#nitt, fo točt) bieg 6efonber\$ Ourt) *La ciniae* ober *Folio la calycis dentata* angegrten. j^ft ge?<fi>nr (*subdentatus*) if! ber flefcfr an LAVANDULA. (fin ge\$£tmrer *Qtengel*, btt an fe men @raff>cn mit ja()nförmitgen Sr^aben^eiten 6efe\$t iff/ iff an STAPELIA *concinna*, unb anbtxn *Qtappt* It'ert. *dentata Capsula*, bit an 5et ©ptōe lit 3<if>ne auffpringt/ ivelcste man ja^U; j. SB. *Capsula Sdentata* an LYCHNIS\* *Dentatae Coyledones*, bit an ben fKanbtt 'geja&nt flnb / tt>ie an btt Hiribe.-t<in ge\*Jfrntes Ulatt i{<' nad) &inné ba&ienlge, bat am StanDc ftorijontale t>on eirianDec entfernt ffe^ende <Spitgtn ponglcic^er Soniffenj mit DemSlatte^at/tviean btt PRIMULA vulgarh;, an t>er tPeŕrebe. <5e^H?n^ te Blattehr^ntrtc finb an ACHILLEA *millefolium* *dentatae Lamellae* an AGXRICVS *quinqueparti- las*; *dentatus Pappus* f. *paleaceus*; *dentatum Peristoma* y *Qtiabñtti* 3RauI/ wenn e^ mit 3äftntn ofcer SBim^rn t^rf^en iff. *Denlata Petala* obit *dentatus Limfus* gan\$ inter f&tbtutun&toit6eoDen Slättern. Sinege3<f{mte QOurjel {*Radix dentata*) iff cine fleiscfzte agige SBurjel mit ja^nförmlen SSer^ län^erungen, ober patrnoffefformid mit fettenförmiden &UtbCtlf L., ttü an CYMBIDIUM *Corallorrhiza*, 9XALIS# Seta *denlata* ijt eine UQtlfbtmi&t, btt tågenad) mit Saftnen 6efe\$te SBorfff/ wie an TORDY- LIUM *anthriscus*. On *Stigma dentatum*, eine **gezähnte** Warbē rait feinen Saftnen iff an GENTIANA. *acaulis*. (Bej^nre tlebenbltrec finb an VICIA Fa6a, unb gejflwte Slappen flnb an RUMBX *acn- tus*. 2)ie 'dentata Faux Cor oil ae »irb immer burch SReftarien Co gebiibefc SBenn nic>t ber ganje fKanb tit mi \$>latui aejafönt iff/ fo temerft man Me 6teOe/ tt?obie S^n^ t)orfommnett/ burch^ basi vd apice dca- tatum, unb saf>lt jutoeiUn aucht Me ^aftne.

DENTFS, § £ b n e , nennt man mebr *obit mtnber titft*, merflich son einanber abstebenb'e (Einfcfynitfe/ bēe jebuc<sup>^</sup> ben t>terten Zbtil be\* SurcbmefferS bed £)rgane<sup>^</sup> au/ todctcm st̄e ft§en, ntcbt überfebretten bürfen. ©ie fotten, nach 23fiUuxrb, fenfrec&f auf ber (£bene **stehen**, t)fe man ficht) burd? t&re ^3aftd gejogen benft / unb **tōn:n**en fpt<sup>^</sup>ig ober ffumpf fet)n, n>eld>e6 jeboe<sup>^</sup> aaejett besti:amt angegeben wtibtn mufi , fo nw jebe befonbere **Bildung** an tf>rct ® Mfec, @te fSnnen übrigen<sup>^</sup> gUtd) Ober ungleidE) (*acqualiter* ober *inaequalitcr dentatus*) an @r6gc feon. Barfcb erflārt bte 3af)ne an einem SBIatte al<sup>^</sup> ftppc&en / beren beobe Kanbltmen ungletc&e 3lid)t||n\$tn baben r unb n>ot>on bte Dorbere vtd)twt|H|Q gegen bic gān<sup>^</sup>Unte, bie bintere aber fd>ief Dorn>ārtd Qmd)ttt i|l . Scad) Bernbaibi'foa bte 35ud)t ber<sup>^</sup>abne etnet: *Sbo\$cn* btlben\* -QBenn (te fid) am j<sup>^</sup>e(d)e ober am Sfraiile cinee; S){oofed befinben / fo bat man 4 / 5 / 8/ i2jal>m'0e Jleicøe, unb 4 / 8 / 16/ 32så<sup>^</sup>m'ge VTIIIH ler 'ijecan&olle nennt *Dentes*, %&l>ne, bte (gin; fcftnitte an einem gefäftäftnten S81atte überbaupt/ ut<sup>^</sup>be<sup>^</sup> fonbere aber bann, votnn fie f!umpf, unb nut tftrr ©pt§e geqen bte ©ptge bc6 Slatted \$tUt)tt finb. *Denties fungorum f. Ech in i.*

DENTICULATUS , fefn ober Bleim **fle?dtneft**, tote **das Folium denticulatum** an HESPERIS maLronalis , TUSSILAGO tar/q<sup>^</sup>a; em fiftabnte\* SSIatt mit fkinen 5af>nen / toie bai ianb (From *denticulate*<sup>^</sup> on TRICHOST. *heterostichum*; bte Qaaxt (*Pilus denticulatus*) an SIECESBECKIA *orientalise* bit an liner @ette mif febr fletnen 3a<sup>^</sup>nd)en befeqt finb\*

DENUDATUS, ent b160t / etmti, ba& eftebem Ubt dt n>ar, unb jegt. nedt ifl. €intge nebmen t& für *nudus*.

DEOPERCULATAE nennen etnige bte £eþermoofe/ **Hepaticae**.

DCPAUPERATVS, toenn eine Solbe nur toenig ©trab<sup>^</sup> **Ien** bat/toie an SISON *amomum*, fo nennt man fie.

**wenigstrahlig**, tDem'gblumi'g, *Umb.ella depau-perata*.

DEPENDENS, t>erab & f n g e r t b , |va\$ glcfd)\* fam aufgebängt \$u fepn fcbehtnt/ unb gegen bü <frbe foerabfallt. @o\* ftnb Fo *Zia dependentia L.*, biejentgen, bte nut tftrer Saft£ t)em Senttbe / mit ber ©pige' Dec €rbe jugefebrt finb, toie bie oberen flatter an SINAPIS m'ora. 9lac^<DecanboHe finb *dependentia Folia* berabfyangenbe flatter, jene banDförmige ober fcbilbförmid` jufammcnoef^e flatter,. Die thre SSläte\* cbenbeo bee jRacbt (måbrenb bti <&d)last\$) gegen bie Scbe berabbangen lafftcn , tvie bie \$upinen tinb £)jcalte\ (Sin *dependens Involucrum* eine ab^ärtgenbe ^>ulle t(l an AETHUSA Cynapium^ YQO aUt S^iilUm blättchen ^erabbängen. Sin *KUooftenQel* mit nieber; hängenden Sleflcnift an SPHAGNUM.

DEPRESSO-THUNCATUM, n'teberg^brücf t  
**a b g eR ug** nennen man em SSlatt, totnn an bemfelben bovt, mo feine ©pi@e fei>n foH, eine ^låcbe ftcr finbtt, tie butd) £>t\xd tntfianben ju Um febënt; tt?ie an ALOE retusa.

DEPRESSUS, n'tebergebrucfr, n>enn^flanjen obec £)rgane berfelben fel)r furs unb etwag ectoeitert obec au^ebreitet fmb, fo bag man fagen fönnte/' ff< n>ären t>on oben fyevab niebergebrucft n>oct>en; Bern; frarbt nennt ba^jenige *depressum*, eingebrucft/ beffen UmcipgeigcnfSrmig Ifl. De prefi ^n\*, flacbgebrürfr, fagt man turn görpecn/ beren Guerburchfcbnitt fcien grøßer i(l a(^ ber Sängenburcbfcbnitt; Ote alfo au^fcf)cn, als n>enn fie t>on oben f>erab jufammenflcDrucft morben wåren. ©0 nennt man einen .^nfag platrgcbrucfr, feenn er t>on bec^ifcbfe gettennt^ oftne ©amen/ unb »on oben nadfr unten flad)gebrürft t(i / roie an POLV TRICHUM *commune*; em Blatt plattgcbrucft/ tt>enn ej flcifcbig unb eingebrucft, ober oben in bee gjfttce tttoai auggeboßlt ifl/ n>ie bie SSIättec t>on ALOE retusa an bee &pit\$. ©0 nennt man eine }n)ie^e(artige

tPur\$eM\*tt; obet miebergebrürft, twnn fie/ n>team GLADIOLUS *communis*, runt)/ unb breiter a(£ & if!, On *Stigma oblique depresso* ist an ACTAKA, DAPHNE; ein *Thatlus depresso* an PARMELIA *conspersa*, n>o ba\$ blattartige 2aub ffcb mcbr ober mtnbet ftetffffrmig augbteitet/ unb bie SMårtfoen be\*\* fel&en i^tcc SKicbtuns nad) ft\* bnt Diabten näbern\* &n ntebergebrucfter *tTioofiengel* (*Surculus depresso*) ist an HYPNUM *lutescens*, too bet untere, nad) anomn ber obere Sbeil auf bet Srbt niederliegt, bet obetc (nad) anberen bet untere) fcjstef aufn>att2 steigt. *Semina depresso* finb an CYNOGLOSSUM. Es iff and) hftti, obgletcb unrfcfaig, ft)nonr)m mtt concavut, impressus unb mtt humitis; fogac mtr tie^ ferdetenb, Denn man nennt jumeilen etnen *Corymbusy* èrne *Umbella depresso*, tOOctin fit tUftt ftt)t, <A6 mbttt.

DEHEGULARIS , nennen cmitge biejenigen Organe/ ttelcfje jtDifcten ber reflemaßtgen unb unreselmägigen Sotm bai Sitittl batten.

#### DERMA, U,Cortex.

DERMOBLISTAE', 4>autteime ftnb bieienisen/ n>o bet 3amenlappe in Ceflatt einet ^aut untese(md§i8 ^rpla^t / n>ie an ben meiiien ^Ujen\*

#### DEROSUS, ab genagt.

DESCENDENS, { u'n ab fte tger tb, toad bep goj tjontaUr Safid/ fi\* fleaen bie Ebe ftinab neigt @o ifl ber abttartdfietgenbe 6^ocf betjenige Xbeil bee. Cetoacfce, metier feine 3iid)tung jiad) abn>art^ ntmmmt, emmebet/ tote bep ben metffen Wanjen, in bie Srbe; obet in ben 5E6rpel, nrelbet i^m jur CrunDlage bient# tbie an ben Wwn, 3le\$ten ; obet in bie Coubftanj am beter (ebenbet^ffanjen/ tbie an btn eigentlichen 6d)ma^ xofyetn, bent VISCUM, bem LORANTHUS 2c. <ft toirb getvcbnlicf) H>ur?el genannt^ *Descendens Radicula* tie au\$ bent oftettn £6eUe bed Caraen^ emfptingt/ uufc mtt i6t(t <Sx>|\$t dbtoaxti geht.

**DESCENSUS Vfōcvititt, f. Badi\*.**

DESICCUUS PiLEus, .&ec £ u t etnetf ©cbwammeS,  
Dec t)oit felbfl t>evtvoc\$ntt, ober fid) trocfnen Idgt, ofyne  
unfenntlicfc ju nwben.

DESINENHA, Me %vt unb SBetfe / tote ein fkgan,  
ober irgenb ein Sappen jtc^ en&et/ \$• SB. *Antherae* i a -  
**4i desinentes in setas duas an IN^LA,**

DESMA, t P o I I e, iff efo tooQenartijjer/ 6cm ^aar^  
fōcmiden get>ercften af)nltcfrec górpert/ bcv ben ©amett  
an ASCLEPIAS, EPILOBIUM, umbūUt, tx>dder jeDett  
5}?a5f in eintr eiflcnen 5cu\*t6üfle fletfi/ tmtnucl)\* nacft  
iff / tvie an ben ©pngenefifien. S>tete SBofle t>ertrift  
life Die\*@telle eine\* jtdcfte^ Sin @ame/ ber Oaitüt  
urage6cn tfl/ iff nad) (Burner ein «Semen comatum.

**DESMOS f. Fasciculus.**

DETERMINATUS, bedimmr; fo fast man^ ber  
Thai I us fet) determinmalus, toenn fcin Umfaillfl au^f  
gezeichnet unb befftmmmt fcegrānjt i(l / benbritifc^ / obet  
durchQān t,(limilalus).

DCXTRORSUM TORTILIS Wife VOLXLBIUS, ttfatSi  
Qtwunben, flegcti ben Sauf ber 3onne/ mei(?en8  
burcf) 3 besetd)net; n>a« fid) t>on ber £in|en \$ur 3Jed>^  
ten aufroOt. 33fan mug jebocft ftierbeo fid> felbfl / bat  
©clfcltt gesen 2J?i<afl gefef)rt, aW bie 2ld)fe benfen/  
um ttjelcfee bie ^flange Hd) toinbtti \$• \$• CONVOLVU-  
LUS; bie <\$e/a an ENCALYPTA lanceolata.

**Dextrorsus, was ft\* fl<en bie recite Seite hin  
richtet:**

DIADELPHA STAMIHA, J W C^bt&b 11 i ge  
6 e a u b g e f £ 0 e / toenn bie ©taubgefäge mit ihren  
©taubfäben in {toed €rper Der»ac6fen(inb/ J. S3. ait  
der Wicke; ba^er

**DIADELPHIA**, bie XVI. tlaffe des Linné'schen  
Systems.

**DIANDRIA**, bit IL StaffTe bev £t'nné. ^ .

**DIANDRUS**, qjflanjen mit jweo ©taubgefagen.

DIANGE, BoerfxuiDe'\* XVI. glaffe. ~~Sodc Alios~~  
tte f>at *Diangiae*.

DIAJSTHUS, f, *biflorus*.

DIAPHANUS, £ al b b u r d ^ fid j t t g, xctnn man  
baburcr We ©egenflanbe aetrubt fiefrt. ©. *Pellucidum*.

DicAai'AE, %|fla|v<sub>9</sub>cn<sub>f</sub> beren grûd)te aug \$xep  
SSalgafpeln bcffelj!!/ & ®. NERIUM, VINCA.

DICHOGAMIA, ©prcngcl K c a ., eine 2Irt t>on  
S3efrud>tund in etnec 3n>itterblume, too tin Seuguna^  
tbetl fid) juerf{ entmicfelt, unb erfi n>enn biefer feime  
Seusundtraft terloren bat/. ein jmeDteg Seugunggoti  
gan feine 53cnfommcnt)eU cccetd)t, u. f. f. 9Qenn bie  
manntcben Seudung^organe fid) Dot ben n>tiblccf)en  
etttfalten/ fo nennt et bie§ *Dichogamia androgyna*,  
tm entgegengefegten Satte *Dichogamia gynandra*.

DICHOTOMALIS, fagt matt ben Slumen obcr Blus-  
fneniilielen/ bie in bent 3Binfel iiefan, toeld)tn ~~gwen~~  
gabelförmige · Slefle bilben.

DICHOTOMIA, i(l ber 9Btne(# totlfhtn jmepl gas  
belffitnig get^eilte 3lefle bilben; bie (Babel. Sluct bte  
gabelf&rmige obet jinft^e 3ercbei(ung überbaupt.

DicHOTOMis, L., *gabelattiQ*, \$votv\$in',  
tig, ifietn (Stengel/ bet/ trie an VISCUM album,  
FEDIA olitoria , LYCOPodium , bt^ auf bie f(einf!en  
SkfTe. immet fort in }n>9 getbeilt iff. *Dichotomus*  
*Corymb us ifl* an CORVMBIUM *glabrum*^ too bit  
gemeinfcf)aftlid)c \$lumenfhel dabelf&tmig ~~ff~~ in ~~gwen~~  
nut iftten ©pigen in berfelben Sbene gelegené ~~Yeste~~  
tf)ei(f. SDecabolle la%t nur maljmörmige Organe  
gabelförmig feon; ti gibt abet aucfc ein~~abelförmiges~~  
Tf>htt, namiid) ein jtoeytbetUgee 55Iatt/ beffen Sm  
febnitte (intenfförmig unb n>iebet jmeotbeilis / unb bann  
often\* nod) ein Wai }tfitt)theilid finb/ wie an RANUN\*  
CULUS *pcuccdanifolius*; unb eine *Fro ns dichotoma*  
tt>o ber ffiebel (i\* in jmet) Jbeile/ unb jeber ST^eil tt>ie?  
ber fort (n jtt>e9 jettbetlt/ n>ie an TAENITES *furcata*,  
*Dichotomus Peduhculus*, iff ein SMumenjftel, bee

sich iit gtttMItfie tfteilf/ tto&on jtbtt foietw, **unt**  
**öfters** nod) ein 3ftal unD ttie&cr in jmci Sieße getbeilt  
 itf/ {• \$3. CERASTIUM *dichotomum*. Die ho to ma  
*Radix*, tlt' fetten unb oft iufaflig; *dichotomus* Sty-  
*lus* iff ein \$nw)fj>altiser ©riffel, Difflēn 2lej?e wieder  
 iweofpaltifl finO / nue an COHNUTIA, **POLYGONUM**.  
 6i)tioni)m mit *bifurus*\*

DICLINIS uni)

DICLIMUS, ^Slumen mit getr^nnnten **Geschlefts**;  
 t)Clen / bfog mann(ici)e o&er blog metblic^e / ot>nt be\*  
 fonbere 3Jucf(i\*t auf §Dfon6cie oDer £>föcte / obtv tyw  
 U)\$amie. £tnne f>atte einji emcei^cne gamilie l)iclini<sub>m</sub>

Dicoccus, n>ag jtveo t>cr6unbcne (tarf getuölbte  
 ©amenjeUen tcägt, jcOe mit einem ©amen. 60 t>at  
 man fogar\* cine *Bacca dicocca*. *Q. Coccum*,

DICOTYLEDONES, ^flanjen mitb Wt) &a|nmlappux  
 obtt ©amenblattern; baber *dicotyledoma flapm*,  
*dieotyledoneum Semen*.

DiDYMfe, geboppelt, unb tttoait>evmad)(m\*  
 ©o f)at man einen geboppelten Qtaubbeutel (An-  
 them *didyma*), tvenn \$wt. @taubbcute( oerbunDen  
 ju fei)ll f€>enen / . n>ie an DIGITALIS *purpurea*, RA-  
 NUNCULUS; cincn *Calyx didymus* an btz **Malve**;  
 Cine *Capsula didyma* obit *FructuSj* Die zwen:  
 fäd)tu\$ cfl/ unfc auf jmen £apfe(n gebilbet ju fepn  
 fd^écnt/ an TMESIPTEAIS; ein *Pollen didymum* an  
 t>telen ^flanjen; tin *Germen didymum* an VERO-  
 KICA *Beccabunga*; Sent in a *didyma* an safi aUcn  
 Umbelliferis, unD *Siliculae didymae* an Bis-  
 cutella apuZa unt) *didyma*. B&0iar6 nennt nuc  
 fügelrunde oDet epförmige (Jorpcr, bte ju jtrepfen in  
 Eins t>ect)adifien fl'nt)/ *Corpora didyma*.

DIDYNAMIA, Die XIV\* efoffe DC\* «mnéT\*en S ^  
 fiemeg,

DIDYNAMUS, j w e y m l ^ t i g / tpenn Don fciec  
 @taubgefagen j«eo läager (tub, als die zwen übrigen.

DIFFERENS STRUCTURA, éttt QjflU, btt tOtl btttt  
natürlicfoen abweicfct

DIFFINITAS, n>enn b<sup>?</sup>e ©taubgefäge freoffnb.

DIFFOKMIS, *toai* ttfcbt tme geto&bnlic&/ oberniefctt  
file tcbformig gebtlbet 'ifl; fo baben mfr C/7za difforr  
mia an bem *Peristoma duplex*, twnn cine breitere  
tbtt *lan&tte* unD erne oter einige fecnere unt^reinanbec  
«bn>ecftfeln; erne ungeftalrere Blumenfrone, mentt  
bte 3?6bte jfc^ obenaUmäblich ermcttert/ unt> in unglefcbe  
Sappen jertt>eilt, n>ie Me äu§eren Slumenfronen an  
CENTAUREA *Cyanus*; étnen *Flos diffbrmis*> als  
9Ron(trofttät / bei> einfacben unO ract>enf6rmtgen **Blu**  
nienfronen/ tote Die pelori'en bei> Den *tinavitn*, unb  
überbaupt aid gefüUte, fproffenbe / t>öfe ober Derftüm^  
melte Slutbe. \*ei; ben 2llten maren bee Srrablenblu^  
~~m\*n~~ aDe ^ores *difformes*. *Vet(d)iebengebHbete*  
~~Bitter~~/ too S3latter ton t>erfd)tcDncr gorm auf emem  
tmb bemfelben ©tengel ftftten, n>ie an EUPHORBIA *he-*  
*terophylla*; *tin* ungleic^f&rmige^ Seberc^m, rnenn an  
einer unb berfelben \$ufammengefegten 2Mume bie **Ges**  
Orc^cn ton Derfc^iebener @eflalt finb/ n>te an **THAINS**  
ciA, too *ti* am SRanbe totcljäbm^, in ber 9JJitte ge^  
flielt unb feberartig tft; *Sem in a difformia, bit an*  
*eintt* unb berfelben ^flanje, tbeil^ tyrer ©eftalt, tbeilj  
iferer SJebent^eile megen auffadenb t>erfd>iebm ftnb.  
*Squamae difformès*, am tfelcfye ton ber CREPIS.  
SIM 9?ame einer 2Jrt jetgt ed 'ofterd an / bag biejenige  
2W /\*bej> ber ed gefegt n>irb, ben übrigen ju biefer  
(Sattung gebörigen Slrten nid)t å^nlief) iff. £>ie foge^  
tianntcn *Corollae difformes* bilbeten Crbnungen *bet*)  
*Unautfy*. @ *InaequaliSy radiatus* unb dispmr.

. DIFFUSUS, a u a g e b r e t r e t / voeitfaxoeit  
ft'8/ fo nennt man einen 3tengel *Caulis diffusus*,  
L., weitfowcifiQ / ber turm ber ffiutjei an ober ton  
ber 2afi6 an/ mebrere auggebreitete / abfiebenbe St^eige  
ttcibt; ber bod) aber nid>t breit ifi/ unb abfiebenbe  
fcflaffe 2lefle bat/ ttie TEUCRIUM *Scordium*, LA-

THYRUS *sativus*. \$>aynt fcerlangt/ bag an einem Caul is diffusus berSBinfel, ben bte 2lef!e oben mit bent @tengel bclDen/ bai 9)?itrel jroifc&en 45° unb 90° Mte. gene aungebrettrere Kfope/ note an MILIUM effusum, iff biejenige / beren Stamen ober Sfeftrcften langgefftett fñD/ unb beren tBlumeiifHele unter Viñem Winfel / ber jtptfe^en einem-reefcten unb fpigigen das Mittel bñt (ber fletnec i(! ali etn renter, unb grðfer als eñner t>on 45°)/ t>on etnanber abite^en. Weif schweifige 2fefie/ t>ic feftr meitobm @tcngel abfte^en, fo bag fie einen 3Sine( bilben, bee jn>ifd)en einem recbten 2Bine( unb einem ^alben rec^ten bat ytital f)iltf J<sub>k</sub> 95. an NIGELLA *arvensis*. Diffusus be\* Seicfynet nad^ 2Decanbolle a u4 etne dleicfyformig vers triebene garbe. @< Patentissimus.

DICITALIFORMIS, f i UQ Z v|>|| t f 0 V tW i <£ , ~~oder~~  
tote etne (anggejogene @locfe mit gerabem SRanbt.

DIGITALS, fo- lang aid ber ^eigefnger.

DIGIjilo -PINNATUM, g I f IF1 Qt 11! Q Cf 11 \*. bert, ttenn bven, Dier big fünf tinfad) gefteberte Staffer an bet 6pt|e eined gemeinfc&afdic^cu Slate ffieleg in einec Sbene tfefKn, miean MIMOSA pudica. (iine digUato-pinnata Frons if{ an ADIAKTUM radiatum.

DIGITATUS , gefingert, Ift, auf Sblafter ant getoanbt, nad) foecanbotte gleic^bebeutenb m(t pa-mati-pariitus; JDecanbolle mitt/ ba% man biefen^u^ scublog auf jene Organe antoenbe, weld&e banbf&p mige SKtpfen f)aben, unb mestr ober mtnber ttef in walzenf&rmirge/ fingeragnlic^e happen get^ei(t finb. @e^ wðbñd) nennf man aber nadf liñne' etn 93(att ge\* f i n g e r t , n>enn meferere (me&r alt brep) SSIattc^en mct i&rer 95afig an ber @pige eine\* gemeinfbaftlicseen Blattflfele\* flebeii/ n>ie an AESCULOS Wppo|asia» num, an LUPINUS. Einige rec^nen fogar txnfoiium linatum unter bie /o/\*a diffitaia. Etne geftngerte t Brzeif{ eine fleiffrigt/ an ber @pi\$e ettvatf {ufam;

mengeteuefce unb fiingerfSrmfg eingefc&nttene SBurjer,  
*tok bit SBurjfl t>on DIOSCOREA altcrnifolia^ OftCHis latifolia, maculata.* ©tie gefngerte 2febre i? an IsCHAF.MUM unt) SYNTHERISMA, ANDROPOGON JC. / tt>0 mefjrere ~~3e&nd>ett~~ an t>cr ©pige bed falmeS in einec unb Wfelbeft S6ene jmifcfen jmcp degenüberilebcnben fief) befinben.

DIGITUS, .f i h g e r , bie Sānge beft **Zeigefingers.**

DCGONUS CAULIS L., *ivoeygratiQ,* ein Stens gel mēt jweo nicftt gegeniibecflebenbcn ©rat^m\*

DIGYNIA, t)je ii, £)rbnung in t>ielan Jinné'fAen ©laffcn; 5Pffanjen mtt itt>ej) ©taubtteleflcn.

DIGYNUS, j ro ey to e i b t'g / ^Jflanjen mit jwep ©taubmegen\*

DILATATUS, au^g c b r c i t e t / offen unb er\* ~~itert~~, breiter fterbenb. ©o tf{ einf//omen-  
**t u m dilatum**, em auagbreiteter ©taufaben an ORNITHOGALUM, too er jufammengebci\* / unbgan\$ 6reU unb blattfomig erfdeinf. Sin «Sfn5i» *baseos dilatatus* ffl an ben SBlaftern ^on RHEUM *undulatum*.

DILUTE einem siSorte bepgefe&t/ bad eine §arbe be; seiebnet, *bttntct* bag biefe garbe febc (td)t iff{ / 5. 55. *dilute carneusy lid*tf\ei{<bfavben, *dilute purpureus*, lid?t purpurfarben.

DIMACROSTEM^ES tt><4>cnb./ f. *BidyituSkia.*

DIMIDIATO-CORDATVM, ^^Ib&er^f6rmig.

DIMIDIATO - OVATUM , } *Clb C ^ f & t ttl i Q f* bttS etnem f>alben / ber Sānge nad) cutjtvepgefcfjnitcneit \$t) t afynlid) iff, n>ie manner Kotolct^n.

DIMIDXATUS , *i)at* an t>ecfc(jiebenen drganen terfc^ie^ bene SBeb.eutung. *Arillus dimidiatus*, # eine talbe ©arnenbecfe^ bebecft ben ©amen nur balb, trie eine talb% **VThu^e** (*Calyptra dimidiata*) We ©pt§e bee 95nc)fe nuc" jucJ?alfte bebeeft/ tt>ie an ben metdert gjfoofem gin &dlbrunber Xopf ijl ©pnonpm mit *hemisphaen'cum*, unb auf ber untecen ©eite flacf. Sine t>dbe &üUe umgtbt ben ©tcngcl nuc juc ^a(ftc, **n>ie**

an CONIUM, AETHUSA, unb fe&lt folglicfc aneiner@eite\* ***Dimidiata Lamella***, f. *inaequalis*. Sin bdbcp jtoercben, iff eine 2lrt »cn felcfjartigem ge&ercben, bai nur Die £älfte ber (gpi&e be\$ feamentf umflibk Sin imlber 6^t if! nur balb tefferförmia, unb auf einer ©eite trie nut bem SSNeffc abgefcbnitten/ j. S3. an ***HYDNUM auriscalpium***. Sin ***Radius dimidi'lius*** entfieftt, tvenn bie (Sfrafrlcnblumen nur an einer &ieu ber ©cfteibe fle^en. Sine talbbebectre £lumenfd>ei6e if! eben b^ / *toai* eine einflappige (*Spatha univalvis*) if!/ n>enn **fie** bie 25lumen nur auf einer <&tite *btbcdt*, ttie *an* ARUM. Sin balber Qiisr! if! *btyjeniQt*, *ber*, ft>ie an ber MELISSA *officinalis*, ben Stengel nur jur Jjalfte umgibt.

DIMITTNS, nad) BüQiarb/ tvad nach au§cn freibf.

**DIMORPHUM FEHGOMi M**, *Titnwt man ben llmfc^Ia^* fteun er *Ur>* einer unb berfelben @attung ober 9Jrt ton ifeeperlet) § c^j^ cber an jt>ci) t>erfd>iebcnen *Bteam toovtommt*, **Wm an DICRAWUM scoparium**, **an TETRAPHFS pellucida**.

DIOECIA, *Die XXIL gfaffé bet) £tnné*.

DIOICUS, 5tpc y^lufi0/ ivenn auf einer ^Jflfanje 6(og männlicfte, auf einer anberen berfelben 2Jct blo^ n?eiblicbe SBjumen Dorfommen.

DIPETALUS, tvag nur jwei) 95lumenblätter &af; fo tfi eine *Carina dipetala* an ERYTHRINA, eine *Corolla dipetala* an CIRCAEA. ©Jan hat aucfo eine ***Co-*** »o?ia. *dipelala*. *Dipetalae* flnb aucht ein{ ***Gas milie ben Ray*** / »ie **We Dipelati regulares unb ir-regulares bet}** *Rivin.* \*

DIPHYLLUS, 3tp e yblattri g, foCte nad) etnisen etflentucft nur t>om ifclcfce gcbraud)t toerben /. unb nut ate *diphyllus Calyx* L., ttJie an PAPAVRR, CHFLIDONJUM ic. oorfomm, unb e^ toare bann aucht erlaubt/ **bajfelbe tum Spatha**, »ie *Spatha diphylla* an STRATIOTES, ton Involucrum, aW *Involucrump*, unb *Involucellum diphylmn L.*; tpie an EUPHOKBIA La\*

*thyris It., · b6t| Pappus, a(6 Pappus diphyllus zu  
ftrf>rauc&en / ben man an HEUANTHfecht. Sndessen  
flebraud)\* man e\$ auc&bon Cau f'15, roenn er wx ~~zwer~~  
flaſter hat, mie an ARNICA montana meiffend / on  
SGILLA lifolia; ton Pedunculus, toenn ec nur  
jme^ Staffer ^at, totē an GOMPHRENA ; Don Corona^ und  
man bdt fine Corona diphyllea an SILENE^ unb fp^  
gar tinen Cirrus diphyllus, tt>ie «n LATHTRUS  
odoratus.*

DIPHYTANTKAE ecne Sfafffe 6eo **Wachsenkorf**; die  
3)t6ciftat»

DIPLO, in Sufammenfclungen mit **griechischen Wör**  
ttrn (late DupZo, tote·

DIPLOPERISTOMII ^>ebtD. / DIPLOPERISTOMATI **Bris**  
bel/ DIPLOPOGONFS J)ecanb« / jene Slbt&eifung turn  
5D?oofen, Dereri 35ūc^fe an igrem 9)?aule naſe tnnen.  
QBimpertt, nad) augen Sâbne 6at

DIPLOSTEMONES Utib DIPLbSTEMONOPJSTALAE, ftjCtW  
fcie 3faubgefäß?e jtveo SJfa^l fo ffarf a flier 3^1 |inb,  
ali bic S5(umen6(ätter. Sine (Elaffe bet) jailer.

DFPSACEUS, ten 9Be6erbif{eIn á^nltd). *Dipsacei*  
tint gamſte bet) Vaillanr; eine£>rbnuns f>9 3uſTieu.

DIPTERUS, DIPTERYGIOS, J to evflüg elig, c/fip-  
terygia Semina^ ©amen mit jmeo Sl<feln, n>e an  
THAPSIA villosa.^ Dipt era Corolla, an fteUfter Jtjeo  
35Iumenb(ätter oorjüglcf) grog ffnD/ tote an SAXIFRAGA  
*sarmentosa\**

DIPVRHNUS, j treyferntg, *Dipyrena Bacca*  
nennt man eine 55eere, 'n?enn jeber ber jtt?et) barm em\*  
baleenen ©amen eine fo ftarte ®d)alc ^at, tote beo ber  
Slug/ nüt mit bem Unterfcftiebe, bag bie barte' Stinbe  
mit ber ^aut bed ©amend unjertrennlcf) ber6unben iff,  
n>rc an ben Seeren ber Xraube, unb tun>et(en felbil an  
einigen 3lej>feta. *Dipyrena Dm pa, tint Steinfrucht,*  
bit ttoei) 32ū(fe entftaſt.

**D**IRECTA IUDICULA, ein gerabe laufenbee **Wür**

5eld>en ncnnnt man baSjcntgc / bag mit ber Slcfotc bet Jfotplcboncn, fte mag gcrabe ober frumm fegrn, in *im net Sjic&tung* fortläuft."

DIHECTIQ, Ktcfct u *nQ*, bag StrtScn ciner *Pflanze* ober *cinei* Organetf ge^en efnen getoiffen SPunct.

DJSCALES FLOJIES; \$(umeit *bit in bee* ©c^eibe *eis* ner sufammen^efc^ten Slumc |?ef)en.

DISCED ENS, t>on émanber toétcbenb/ tvenn *zus* fammeiidcfcleCte £&ei(e fid) t>on einanbcr\*entferhen.

*DISCIFORMIS*, iff tm addemetriett fononom *mit* *Orlicularis*; *man* nennt jeboc> *bit* SUime an *POLYTRICHUM commune*, ZXntnflos *disciformfs*, *eine* Oernförmige BImne, ivctl fte an ber <3pi\$e des ©tended (te^t/ unb mit aitfgebreiteten Slattern ums 8egen iff. £g ifl oft fononpm mit:'

*DISCOIDEUS*, (d)eibenarti*Q*, ffynonpm *mit* *Jlosculosus*) ncnnnt man eine iufammencjcfegte S3(ume# bie aacin aud^oftrenförmfgen Slumcn beftebt/ feine ©trablen, férn banbförmtoe Slumen am SRanbe W, n>te EUPATORIUM, TANACETUM. 2>tc *tyflan^n*, *bit* folcfe SJlumen tragen / bilben 6ep Ka>> bie SlaffTe bee *Discoideae*, *bit* ©artner / Batfd). unb ^inne' aufy annabmen. *Discoidei Liehenes*, nennt man bieje; niaeit/ beren Sructtbebalter m(j( e j n c m na cften gefarb? ten 6c6ibenblätt(\$en bebecft/ unb^ ft\$ einem baffelbe umrängenben gaubranbe gefrkt "ftnb. ©ie *Lamina proügera* iff *discoidea*, tpenn jte" mit einem jfaub^ ^«nbc (*margo thai I odes*) umgeben dl / ber fiber bic\* felbe feinaugragt. *Biscqidea* 6'emina ftnb ni<\*t tell; fommen mnb, abet bid, plattgebrüft unb unbieafam/ Wie attAcTAEA, OENOTHERA.

DiscotoR, iinglei'4) *fathig*, bejeic^netflac&c Orflane / &cren eine ©eite cine / bic anbrc *cine* atipie Sarbe *bat*, j. 35. TRADESCANTIA *discolor*, obengvun, untenrotb; TUSSILACO *discolor*, oben ariiu, unteu tt>et\$. *Discolor Radius\** nennt man bcujentflcn, an n>c(c^em bie ©tra^fenblumen eine anbrc garbc haben

atd We ffilumcfjm in ber <Sc>Cīe. *Discolor The ca  
tint ton bem S<sup>^</sup>uc<sup>^</sup>tftiete unb Setfel t>crfcfeicbcn  
farbe bat*

**Disc RET i F\*UCTUS, getrennt**, nennt man jene unverbunbenen %frucfcte (*fmctus distincti*), beren me&rere gruc&tfnoten in einec \*unb berfelben Slume sich bepn&Ctt/ n>te an RANUNCULUS.

**DISCUS L«, ©c ^ e i.b e ,** bebeutct i) benmittleren **Theil** an icgent einer Slacfjc, baber: a) *ben mittUtm* Sbeil ejnet \$u|amp;cn^fcgten Slume/ bet blog aug r&brcnfocmigen Slumcftcn beffefet, j. 33. bad/ n>ad an bee 93(ume bee BELLIS *perennis*, bee 2(cferfamille gel6 ifi; b) ben SJJittelpunct an einec ©olbe, aneinem 2>olbenffrauct)e ober an einem ^opfc^en. (f6 iff ba&e? ©Dnonpm fur fruc^ttoben; im eigentlic&en ©tnne be; **zeichnet** ed abet eine *mebt* ober minbet flietfe^ige **Ers** b ben **Wt/** auff melc^ec bie Slumenblatter unb **Staub** gefage ober ber \$tix<t)ttnottn eingtfugt finb, j.55. am RHAMNUS, BORRAGO. 2) *Ql QCLnit Whfflad)\** cine\* Slatted ober eined blattdbnlic^en Sorperd, ©amen, im mittleren Z<sup>^</sup>tilt beffelben; aDed n>ad *nid)t dianb* iff; bad VTiittcIfelb; 5) ber obere fx<f)tbau bonjonfale, meiftend freidformifle S<sup>^</sup>eil in ben ©cfyilbcyen ber **Glechte**n (*pelia*), ber bit ©amen entftalt.

**Di SJUNCTUS^ getrennt.. ©o** nennt man bie gaft er ber ©ttrobbeutel an ORCHIS unb ASCLEPIAS *Loculi disjuncti*, n>cil fie totit Don einanber getrennf finb. *Fruc tus disjuncti* ftnb jene unrbunbenen grudje (*Fructus distincti*), bie aud me^reren Srucft\* fnothen t>erfd)iebener Slumen entffanben,. a(fo untet- f4>iebea P>b / j- »• bie S<sup>^</sup>Pfen ber ^tc^te-

**DISPAR, unglcid>Qep&avt, totnn Dongegen\*** überfffeenben Slattern bai eineSBIattaanj ©erfebieben ton bem anberen sebilbet iff, n>ie an etnigen Slrten turn MEJLASTOMA/ ober and) nur Ucinct, n>ie an BELLA- DONNA. Ziuch bejeic^net ed Unabnlidjfeit einerju einer gewiPn Gattung beg f gemPffange.

DisPERMITS, *ixoeyftmig, toa& an einemSBlu\**  
*tnenflele nur jtwp 6amen tva&t, torè afst UmbeWt-*  
*ferae unb Stellalae.*

DrsposiTio, *ble relative Use flemiffet Otgane in*  
*SBejug auf einanbet.*

D is RUM PENS ? j e r p l a r j e n b , wenn gufammeni  
 gefügte Slbeile nic&t an bet Sfstatl) auffpt ingen.

DISSECTUS L., \$erf# nütten, fononpm mit  
*laciniatus, SffetS aud) mit incisus nacht Jiili^*  
*Hé; ein S3ei)fpieL iff an GERANIUM dissectum.*

DISSEMINATIO , *bai Slu^teuen bet @amen;;*  
*Die Slrt / tt>ie bte Wanje nacht bet SKöfe ben @amen*  
*ausstreut, unb bie Seitt/ wann bie\$ gefc^iebt.*

DISSEPIMENTOSA GENICULA, 2f b f&f \*J e ftt t t  
**S**Φe id ett In b en , ftnb an jenen Sangen unb  
 (Jonfcrt)Crt, n>o bet; jebem 3ibfaße eine feine Guer;  
 twanb bie SKöre fc^(ießt/ fo bafi jebet Saben fo tuel  
 Sächet aK @ttebet &at/ töte an Fucus *Filum*, **Con-**  
**FERVA scrufMfa.**

DISSEPIMENTUM L. , @ ◊ 6 I b t W a It b / **ein**  
 fiend^nHc^ bauittger Sftcif, melc&et in bet fybbuncj beg  
 @amettgebäufe biefiaifyev tott einanbet trennf, unb  
 bet etne 2>et(angenmg bet Säcfyerbaut iff\* 9Ran **hat**  
*Dissepimenta longiludinalia, transversatia, val-*  
*\*>aria unb cttularia. SfnSbefonberJL iff Dissep-*  
*ment urn, @d>eibeix>anb, bie buiröe ^aut/ bie in*  
 ©c^otcn unb 6d)6t#en bet Eänge nafe binlauft/ umb  
 tte jjS^ic betfelben in snw £&c>e tbeitt/ Siefe  
 ©\*eibemanb ifx an unb fut fl\* alljeft paraOel rnit  
 ^» Slappen (*valvulis dissep intent o pa-*  
*parallel is); inbeijen fagt man boft gettofmlicfc nut*  
 5ann, b\_a§ fie mit ben T&appen parallel fey (*vah*  
*vulis dissepimento parallelis L.)> »^n bie*  
 ^lappen flfa\* fm&, unb bie 6\*elibett>anb mit benfrben  
 filcccd>c SBreite (>at; tuenn abet Die ©cbetbetvanb t\*mn>  
 let iff al^ bie j?(o^en / unb menn bieve fct)c etUbeit/  
 dttoolbtuwb ho\l fmb, fo bat bit btyben Naifa in .

*bit SRitte btt \$tud)t ju ffe&en f ommen, fo nennt man  
bjjfe ©c&ētbetoanb (EtuertDanb (*valvulis dhsepimento  
contrariis*). **Alt J)issepimentum finbet matt**  
aucfc bet) ben §arrnfräutern an BLANDOWIA.*

**DISSILIENS**, n>aſ mit (Setoalt unb mit groſer  
(glaſtſtſtat an bm 3?it&ett auffptingt; mie bie ©c^ote  
an GARDAMINE; bie Sapfel an EUPHORBIA *Lathys*-  
ris, an IMPATIEKS noZi tangcre.

**DISSIMILIS, unQleid)fdrmig. Dissimi-**  
**lis Pappus iff ft̄nonom mit diformis. Dissi-**  
**millima Perigonia, finb bt̄cjenſflen Umschlagblätz-**  
**ttt, roctc^e ton ben 6tense(b(attern fe^r verschieden**  
**finb.**

DisTANs,tn (Snffcrnuncj t>on irgenb **etwas.** **So**  
nennt man *Vaginae dist antes*, tm ©egenfage **von**  
arc/ac, jene ©\*eiben / bte an elnrgen ^Jffanjen bm  
©tengcl nut (oſe umgeben / o^ne t^n ju beru^ren;  
entfcrnte <Btutr[e(Fcr7iciZZi *dist antes*) (inb bie\*  
jenigen / bte in me&r aK gemo^nlic^ n#en Smifc^en^  
r&umeu t>on einanber enffernt (le^en/ note an STACHYS  
*sylvatica*. Slntre abcr, rote Berfenfcout, nennen  
jene Quir(e *distantes*, in n>e(c^en bte in bem Quirle  
felbfl t>or^anbenen 93(umen mit ton einanber entfernt  
jſeJjeu. *Stamina distantia* ft̄nb an beni fcHunjen,  
**Desters** al^J fpnoriom mit *remotus*.

DISTEMONE^, SPflansen mit awo ©taubgefägen.

**DISTICHUS, 3tp eyret&ig, sweyfe it̄g/**  
**iywitiB\* tinne nennt aelteAami distichi,**  
n>enn fte/ **fie** mögen t>o tmmer etnfleſuſlt fcon / gegett  
bte *pax*) entgesendefegten ©eiten *bti* ©tengeM gefebrit  
ftnb. 3n &inne& pkil. bot. ed. Willdenow, t(l  
*Caul is distichus* becjenige / beſfen 2lelle fcorijonta!  
finb\* Svpe^eflig |le&en nun *Ilefte* obec Bl&tcr/  
n>enn fie/ »te an THUJA, TAXUS, PINUS *Abies* fo  
ſeflcHrfnb, bag fte in einer unb berfelben <?bene auf  
ben ittep dedenüberſiebenben ©eiten bed ©tengett **ltes**  
**gen, fte m&aen übrigens^, einjeln b«ra\*t«/ wechſel;**

foeife ober *MQtimbtt ftefyn*. <fbm fo jjeftetfe Slefte an einem \$Roo\$flcn\$el *Qtbcn tintn Surculus dytichus*, unb *tbtn* fo aefMtte SSIiimc&en in einer2le&rc bclben etne<?/>>zca *disticha* L., n>fe an *HORDEUM distichum*; ober ein jtoeyjeili'ges 2fe&rc|>en/ n>enti fit\* *Me an CXTERUS*, in einem *lte|>rd)en cben* fo ae^ ftcflt fint>.

**DISTINCTUS**, ifi 6alb ftnonpm mit *manifeslus\** unO (ebeutet *beutlid*) ftcfytbax; *balb* Don /<sup>^</sup>er, unb bebtutet unbermad)fen, getrennt; *balb* Don *distans*, unb *bebeiitet* enffenu, fo nennt *man*. We *Apophysis. distinciay* abgefobert, tt>enn fie t>on bee SBüd>fe buvd) *tint Smifc^cp^aut* getrennt, unb o(>ne ©amen ifl; *bit Filament a distincta*, tm ©egenfage Don ben 3Rona</ ©ia^ unb ?Jol9abelp&tlen; *bit Fruct us distinctly totnn fit and) bet* ber SXéfe ber *Svufyt fid*) nicfyt unter einanber Dereinigen; *bit fSlåttt an MB-SEMBRYANTUEMUM bicolor Folia distinctay unt DertDoc^fene Wlåttt, unb bit S&lattt)tn an IASMINUM officinale Folio la distincta*, im @>egenfa(s)e Don *confluentia. Distincta femina et mas QCtvcnnt* i(l bie mānnlicfte unb tvctblicOc fdlnmt in GEAATONIA, als **Polygamist**.

**DISTYLUS**, f. *Dig-yno s,*

**DIURNUS**, toa& enttwfeer nut am **Lage ge hiebt;**

I 35. nur am Xage *bluf)t*, n>ie LYCHNIS *diuma*, ober <ur efnen Jag (and tt)a&rt. *Diurni Flores ephemera f^ag blunten / bie fid*) an einem unb bemfel^enSase \*ffhen unb fc^fiegen; j - 95. bfe HELIANTHEMUM. €enbie§ gift and) Don *btn Aequinoctialibus.*

**DIVARICATO-REFLEXA FOLIA** ObeC RAMI, &U8f flefperrt juruc^gef^fc^Iagcn, ntnnt man jene Slefte unb \$>lattt, bit unttt einem SQBnfd Don 150° Don ben 93erticaleu abfoeic&en.

**DIVARICATUS** L., auagefpreitet/ **a u s g e s f p e r r t** (\$>a?nt), auagebreiter (Willden.), ttenn bie Slefie aletd> tdi> ihrem Ursprunge ausginander

*fabtcn, fid) flatt t>cn einanber entfernen.* ©o nennt man einm (Stengel nad) tPillbenotD *ausgebveitet*, (*aivaricaius*) n>enn bie 9le(ie einen recftten SEBinfel mi\* bemfelben bilben^ SRaſt Bernfcarbi unb ©prengel aber, toenn ſſe unter emem SBJinfel Don i35°t>om ©ten\* **gel** abfte&en, alfo oben einen fhtmpfen, unten einen **ſpižigen** SBinfelbilben; anbere nennen wit t>oneinanber **ſtehende** Slefie / ober roeit auffeinanberfa&renbe / unter cnum fpjfciflen 2Bmfel entfpringenbe. **Slcftc/** mie *Batty, Kami divaricatL (fi)\ 35e)fjMCl* ifl an CICHOREUM **divaricatum, PINUS Abies. Folia divaricata^** in eben biefem ©inne / nac& Jy&yne, ftnb an PHLOMIS *tuherosa junacifir\** unter. ben ſiuirlen. Kō^Iímg läſt *Folia divaricata nut* um 4°° t>on ^^r ©enfred)ten abfteicOen. \$ine Auegefperre K'^P^ (*Panicula divaricata*) **ift, tt>U an AIRA caryophyllea, diejenige,** i>eren Slumenfliel unter einem fhtmpfen 9Binfel **aus** ber ©ptnbe( entfpriſingen, unb fid) gegen bie <**Erde herab** fenfen. f5ct) juſammengefegt geſtebertem S3(ātern *be\** merft man *bai* ©efperre in ber Seräffluna cimjelne 25Iattf?iele gemöbnlfc^ burcf) ben Slu^brud *divaricata ramificatio Foliorum^* tote an PHELLANDRIUM aqua-Ucum. gfarjuglicf) gabelförmig get^eilte ©en>ac^fe ftnb &fterf fparrig auegebreßtet.

\* DJVERGENS, a u s e t n a n b e r l a u f e n b / a u e ; g e b r e '11 e t; fö ifl ein *Caulis divergent* berjenige/ an roetcfyem bie **Slefie** oben einen fhtmpfen, unten einen ſpieigen 3Binfel bilben / tPillbenotr; nac^ ©prengel unb &ayne berjenige/ an welc)em bie Sleſle {>orijontal O^en; nac^ JDecanbolle / toenn ein 9l(1 t>on bem an; bern fid) entfernt 95cp eben biefem ftnb *divergentes Nervi* biejenigen/ bie ftd) fo jeraſfeln, baſ ſſe nad) alien tpuncten be^ Umfanged i)inlaufen; ^ier^er geſtören nac^ **5Djecanbolle/ bie Nervi pennati^ pedati, palmati, pel tali , Ir̄i/Zi. Divergentes Cotyledones** finb biejenigen / bie an ber \$afti\$ jtpat t>erbunben/ mit ber ©pige aber na\* cntgcgegefctcn ©^itcn flefefert

(tilt\* · *Divergent Fasciculus*, twitlt bit einjefoen SSlumen geflen bte ©pt§e fid) t>on einanbtt entferneq, tint) ganj in eben Wefer ©ebeutunfl gtbt e£ aucj) eirie *Umbella divergens*. *Divergenlia Folia*, menn an breoblaſtri<jcn Slattern tta&rcnb ber 3?ac&t (im ©c&lafe) We brep SBflattd^en lk& aufmärttf *ridjten*, \$c\* sen 6ie (Spifce ju ffc^ entfecnen/ an ber SBafig aber fidf) einanbec naftern/ j. S5. am MELILOTUS. Buſb liar& nennt, btejenigen 2(efle obtt SSlumenfltele bi'per^ gierenb / We t>on einem ^Juncte au^laufen/ unb bann feftc DeutIt\* au^eJnanber faſcren. ®c bemerft/ ba^ e« jutteUen fi>nont)m für *patulus* i#, unO 4ecter auc& für *divaricates*.

DIYERGENTI-DTYARICATA FOLIA, A U S g e b i r e i V  
t e t a u a g e f p e r t r t e flatter, We ſicht urn 1100  
ton ber ©enfrecftten entfernen.

DIVERSICOLOR, [dyedig, n>enn erné *Bathe an*  
We anbre srån\$t; n>enn bte 3tra^Ienb(umen cine anbre  
§ar6e f>aben+al\$ bte auf ber <Sd)tibe.

DivEnsiFonMis, tt>ai nntct ft) uná^tic^ ifl,  
unQlzifyfotmig, toie We Umfc)(agg6(after an  
MNIUM crudum.

DIVERSUS, nad) iDecanboIIe einer(et) mit va-  
riabilis unb varius.

DIVISURA, Jgtnd>ftitt/ f. *Lacinia*.

Diviṣu s, g e t ^ é 111. 3nf(>ef1fibere nennt man  
das 'S^tteif? get^eilt/ Alhumen divisum, ft)enn e^  
nach abge\$ogenen ©amenbauten / in jn>et ober felten  
mehrere Sbeite aufftingt; etnen Srucftfnoten getbeitlt/  
divis um Germ en, toenn btt grucftfnoten nrw ecnen  
©tiffel f>at / aþec aud mefjrcren untec einanber nfc^t  
tJewa^fenen gac&ern befteftt 95?an btelt bann p\$ftcr\$,  
tt>ie an ben tppenfonntflen Slumen / jebe« Sacft fur einen  
eigenen Sruc^tfnoten / unb fab frier gru\*tfnoten ffatt  
eter Stfc&cr, etnen Pedunculu>s divisus, ber cit  
me^rere Sbete getbeitlt .ifl/ tt)ie an ber iufammengefettt  
Sraube; eine falſ4>e VEursel get^eilt (fiadix no-

*tha divisa*), bie nic&t in bie (Srbe g?t>t, fonbern *an* ber bie Qsäig beg aufffei\$enben ©focfeg auf ©teinen ober anbefn ftörpern äjtig gct^etU. iff/ mie an *Fucus digital us*; *einC Spin a dhisa*, bie an ber ©ptge get&eilt iff/ n>ie an ben -itelc&fcftuppen ber (Salcitrapen; einen *Sty I u s divisus*, ber nid)t fiber bie £a(fte seitner *UnQt ton* oben fterab in jmct) ober me^rere *Theile getheilt ist*, mie an t>ieieu ?D?alt>accetu

DODECAEDRA TEL A CELJLULOSA, **das zwölfflächige Zellgewebe.**

DODECAFIDUS, unfc^tclic^ fuc dubdec im-fidu. *s<sub>m</sub>*

**DODECAGY\* us, zw 5 hōkē īg, was zwölf ©riffl hat.**

DODECANDRUS, \$ W 5 I fill £ IIIII' fl / was zwölf Staubgefäße hat.

DODECAPETALUS, ttit zwölf Blumenblättern.

DODEAPHYLLUS, jto61fb1£ttrig.

DODECASTEWONES, f. *Dodecandrus*.

DODRANS, @ p a n n e, bet 5Raum zwischen dem ©aumen unb bem fleinctt Singer, bet>be fo toett als möglich aug einanbec gefperct; cine £änge Don g^ un; gefähr; daher

DODRANTALIS, Cnt &P All tit Ufifl.

DOLABRIFORMIS, & p b c l f 6 r m i g. ©o. nennt £timé cin S5Iatt, bag fleifcfyi\$, jufammen^cbrfucft, an der ©pige girfelwnb, an bec cbern ©cite tontp, an der anbmt fc&ttetbig, unban bcr Sfiaft^ c>Unt>rifd> iff, 3\* S3. an MESEMBRYANTHEMUM *dolabriforme*. Bey ?DecanboHe ti aber ein SBlatt *dolabriforme*, tohelförrmg, toenn eg jufammengebcürft # zugeruntet, ({umpf; unb am SKurfn gegen bie 6pi6e hin feoefcria i|i 3itit>crc crflären eg fur aftfonmg.

DORS ALTS, irgenb ein Organ/ bag einem anbeten auf bem Murfcn ftebt/ JSB\* *Arista dorsalis*, tint rücfenWnbige ©raime/ bie untec bec ©ptge ober in bec mttt beg SBaJ geg befejligt iff, tpie an **AVENA**

*nuda saliva. Dorsalis dehis cen t ia, iff Ut) 25<tf4v  
i»enn on Den flfowen étner Statfl bit SXntfennatfce  
attein aufforinaen, Die tflappen feM «&« »lit \*«<sup>B</sup>  
SKanDnäfben n o\* jufammen&anaen.*

DORSATOS, *gethdt*, wenn *Uiiii&t fr&5&uuflen  
nac& btt @pi(se ju abnc^men.*

DOHSIFEKAE, DORSIGERA.G, DonSIFLORAEj  
farrnfrluter/ t«en Samen auf *btm* Dfisfn  
des Laubes liegen.

**DORSIPENDULA SEMINA**, bit an Dem SRurfen **des**  
**Samenaebäufe^** feangett/ wte an *btn* ORCHIS.

DoHSUM, Die untere@eite De^ f&lattt^bttUw  
bes| an ©amen Diejemge Qtitt, bit Dem simtlfflw  
überde&t; an Slumen und i^ren ^fteilen Die &u\$ttt  
©eite.

DHUPA, **6 te in fr u\*t, 'ifi eine Mug m«, einec  
Dicfen./ ffctfd^idcn, faftiaen ,oDec leDerartien tlawint  
lofen \$aut oDet gMaffe 6eDedt, wee an Per fftrfefte.  
D m p a jpiw'a, tt>ie an TAXUS *baccala*, Want  
Slug, Die \$ur ^alzte mU Dem fleifc&iaen gru^f6oDen  
»ec»acfll / unD DaDurct einer ©teinfrucftt a^nicft i»irD.  
JDDecanboIIe erflärt Die SilDuna einet 6feinfrucfa auf  
folgenDe SBeife: ©teinfrucft ijl tstm eine flfeif^ige  
gruc&t, Dieeiaen 6<>n (*Pyrena*) > *Hwleus*, *Ossi-*  
*culus* Cournef.) / D. b> *tin* bcin \* oDer fcoljartifle\*  
%aOf in (i\* einf««e§t, tote Die ffirfrte.. Sicfe 6ein?  
fcarte ^utte / Die Den ©amen einfcrUefit, bit SBanD  
\*er gacherhaut, beigt 6<D Diefec gru\*t, »je 6ep a«en  
Arten von 3 Ieif\*fru«fen()\*q e, ^PI\*\*'\*(f''-  
tamen), unD Da« fleifc&artifle &wtbt, .»el«e\* viest  
beinharte \$ülle, Die ©c^ale umfliche/ Da« *Sarcocar*\*  
p*jurif!* Da^ «a^ man fleift (Caro) nennt. S5en  
t>tn 2Ut<n· tl PruhU5 unD *Dm pa* glei\*6eDeutenD\*  
«eo ©irtner'n iff Die *Drupa* nut etnfami'ff/  
dicus »nD £&r(art ei'm unþ e *Wlio*.  
**DRUPACUM**, ifi 6(0 Richard eine Fruchthülle,**

*bmn* Snbofarf ftarf, unb mit einer ablödbaren taunt flctfc&ifl ju nennenben SKinbe überjogcn iff.

DRUPACEUS, cincr ©feinfructf å&nlicf), ober mag dne ©teinfrucftt bringf. ©o nenntvman einc £ulfle ficitfrnc&tå&nlicf), toenn unter einer Icberartiacn titc&t auffpringenben SJinbe ein 6cim obec forfartigcc jpern liegt; (leimfrud^tartige ©d>dr4>en bicjenigen/ bie eitte boppelte SXtnbe baben; einc åugere / n>eic^e obec f^atqptide/ unb eine innere )kttu, bit ben ©amen in gad)cc einfç^Hegt/ tote an BUNIAS.

DRUPIFERA, eine Samilie 6et> l&atfa.

DUC»LOSUM FOLIUM, nennt *KVMbenovo bait* jenige 951<sup>TM</sup>, t>a£ einrippig iff / unb in ber grëtte eineti fiurd^Iaufenben ©efagbünbel/ obec cine foſlcnanntc 9Kt^ fctrtppe bat.

DUCTUS CHYLIFERUS, &aftgarig, id tint fco&le SRippe Don ber m|tt txnti jeben ©amenlappen« bxi sum ©ifje beg ©\*nabel\*en« jmifc&en bem 9!)?arfe t)eße(6en unb bem S^tfc^e. <fr umgfbt bag Warf.

DUCTUS EXCRETOHII Kot^/ f. *Fructifera Tube rcula.*

DUCTUS INTERCELLULARES *Hint*, bit ftte bte Vasa revchentia *Qtlaxtxt*, abet fenfrec&t geffeot unb gr&ger alg biefelben finb. @ie ftnb eben fo **problematis** tfeeb trie bfe. •

DUCTUS<sup>#</sup>SPERMATICUS, jener ®ang, ber bee **bes** fru^tenbe SRdferie ton ber SJlarbe sum £abro po **fibrt.**

putcis, *toai nidbt* fc&arf iff, o^ne noc& ffi§ **ju** fepn/ tt)e EUPHORBIA cfa/c/s, unb tttt\* ffi§ **fl wie** J&ontg ober 3<<cfer. 2lu& tt>ag barnacfo riecfett.

DUMETUM, B ufd>, etn ©trauc& ber fe&r ntebrtg unb Don ber 93afi\$ an fe&r affig if?, ©after in *Dumetis*, unter 95ufc&en/ Sornfeeden.

DUMOSUS, . mit ©traucfrcm bebetft/ ober ecnem 93uf\*e, ©traucbe a&nli\*. — ©after *numosae*, tint Orbnung bet) ilmné, ton

DUMUS, f. *Dumetum.*

**DUODECIMFIDUS**, 5 w 61 f f p a I ti g, nit bet Reich  
an Lythrum.

**DUODENARIAB** Q?4<\$enborf, f. *Do decajidree.*

DUPLEX, boppelt. 60 *Ift* an PICRIS ein -rfn-thodium duplex, tt>eil Die aügerjlen Sittfcftnitte Son ben inneren burcj) ben 25au unb 3lu^6reUung t>er; fefitben fint. ©o i(? t>cr#\$dc& an M^LVA (na\* Bul^ lictrb aud) an POTENTILLA unfc GHUM) tveil ejn aufJerec unb innerer Jtld) t>or)anOcn if!/ cm *Calym duplex*; *Duplex Corolla* ot)?r *Flos*, cine boppclfe SSlumc nennt man bicjtniQt, bit b|x>et), DreQ/ t)ierma( fot>tcl S5(untcn6ldttcc &at r atf fte 6a6cn foj^L, n>ic an ben fogenanneen *Heufojen*, an bet HESPSB matronalis; *tine* boppelte iDecfe (*ddplex Indusium*) an SCOLOPENDRIUM, tt)o an jebec ©cite be£ fyäufd)cn\$ eine Secfe fejifigt; ein boppelter Umfcfcflag/ (^eri-^/um duplex), auf jtvep überethanber liegcnben £äuten, n>te art DIDERMA; etn *Perigonium* rfu-pZea: (t)a^ 6e9 Perigonium crflart mirb); em *duplex Peristoma*, rocn e^ cine boppelte SKei^e t)on 3å^ ncn f)at, cine fnnere unb eine dugere; eine boppelte Wulst/ an cinigen ©df)täammcn. *Duplex Dehiscencia*, iff beo £arf\$ ba^ Sluffpringen bee ^lappen fo\* wohl an ben 9lanb^ a(f SKutfennia^en.

DUPPLICATO-BINATUM FOLIUM, Ctl b O p p e l t g e :  
3 we y t e s Blatt / n>enn an jebec ©pfge eine^ ga: belförmig etheilten Blattstieles. zwey Blättchen sißen, wie 6eo me^reren deaden\* ©ononr)m mit bigem-  
nctt um unb b igem inum.

- DUPLICATO-CONVOLUTUS, b o P P C 11 Qt tO lit> nennt man etnen *Qotykbon*, xoenn bepbe hainter nad) bet innecn §lå\$e bin fpfralförmig eingecoOt ffnb\* Fo. 7m *duplicato convoluta* ftnb biegentgen / menn urn ein tutenffcrmifl gexoUtei S5Iatt/ ein anbere^ nad) eiñec anbecen Slic^tunfl ^erumgecoat iff.

DUPUCATO-CKEHATUM, d o p p e l t g e f e r b t,

twnn·jeber ftftfjoftn n>iet>er geferit iff, fetē an VERBA  
preJiata , RANUNCULUS *auricomus*.

DUPPLICATO - DENTATUM, b O p p d t 9C\$£&f1tf  
tt>enh jeber gabn érne\* Slatted tttheber ge\$á&nt iff, mie  
On TUSSILAGO *Petasites*.

DUPPLICATO-DIGITATUM/ft>erin jroeo oberme&rere  
gefngerte Slättern an ber <^ptge eine\* fleme(nfcf;aft;  
Itcfsten SSfattfiele^ / ober auf einem Vuncte ffecn.

ItoLICATO-KQUITANTIA FOLIA, XOCttl UIH StyCt) rCt^  
teabefliiaſter me^rere anDcre in g(eid>er gorm 6erumlieden.

DUPUCATO-INCISUM, boppelt ^erfc^mirtefi / tt>cmtt  
bit großgjtti Smfd>nUte ipieber in fleinere \$trtbetlt fmb.

flafter / toen tfoti) sesenußer{ebenbe eingerottte \$>laau  
Ut m'tt iftren gerodten @eiten in bee ^notfpe jufam\*  
mén(ogen, unb èn ber SOTtcc jmitfcbm ibnen ftct bcom  
Surd)fcf)nttte ba^ Slubiment beg Stengel jcigt

DHPLICATO-PINNAIUM, f. *Bipinnatum*.

DUPPLICATOREVOLUTA FOLIA, b O p p e l t JUr&cf^  
g e r o l l t e flatfer» toen bfe jurüefgerodten @ectett  
mit ber burc^d pollen gebilbeten Dtunbung jufammcit^  
(fogen / unb jtoifc^en ibnen fid> bat Rubiment btg  
**Stengels zeigt.**

DUPPLICATO-SERRATUM FOWUM, **gedoppelt gesägt**  
nennt man em fbXatt, toen jeber @å^ejabn beffelben  
toieber flefagt ift, »ie an VERONICA *longifolia*^ LY-  
COPUS *europaeus*.

DUPPLICATO-SPIRALIA, f. *Spiralia*.

DUPPLICATO - TERNATUM, f. &iltT It alVLTtl^

DUPPLICArus, g c b o p p e l t , ma^ boppelttoottynt  
ten If\* ®tn Ant rum *duplicatum* bet) tf]ebtcti8,  
toennin bemfelben anbere\$ru\$tf>ú(len/ Antra, Baccae,  
Pyrcna tc. eingefefc(often finb." Èen boppeltea X6pf\*  
<fecrt/ an ANTHYLLIS *vulneraria*; tint *Capsula*  
*duplicata* ift beo Wlebićus biejenige, beren trorfene  
**Klappen** geboppelt ftnb/ ober bie anbece trorfene @a^  
mengehäuse einf^Uegt / ober too tint auf ber anberen

**fist.** *Buplicali Cotyledon es, an. OU Malven*  
**und** ben '{Eetxabynamitften; *dupHcatus Flos, an*  
**bem** bie SBlumenblatter in·boppelter Slnja&l torfommen;  
*duplicatae Lamellae, tVCltt jcbei \$5lattd)tn ail\$*  
*WCQ Q&IXUXI bCle^t/ iOlt an AMANITA caesarea. 'Dib-*  
*plicata Radix hulbosa, ttWltl JltCO 3ft>tebel auf*  
*finanber fle^en / fo, t>aff eine aud ber anbetn gewachsen*  
*if{/ toie an ALLIUM sphaerocephalum, FARTILLARIA*  
*pyrenaica.*

DUPPLICATURA, Derbopplung, ©cftebbe **f. Vaginana s.**

DURATIO, bte Saucr eincr ^flan^t, t&cnad) fie  
 einjl&rtg CO), jweyjltrig (<T J); ausbauernb (^),  
**ober fclosig (Saum obec. 6trau\*) (£) iff.**

DURUM PUTAMEN, eine f?\*rre t^u^f^ale,  
 im ©egenfage Don jerbrecfyidfr / mie an ber birreren  
 SKanbel, im ©egenfa^e oon >ec Srac^maitbel (**putamene f^ga jli**).

DYNAMIA, DYNAMIS, tvenn Seinifle 6faubflefa§e  
 ländar finb *a|i anbtvt.*

£.

. £ vel EX in 23er6tnbung mét (ateinifc^en S33or(en  
 Sebeutet 'neiflen\* ben 2lf>gaug be^jeniseri/ tvaS bur A  
 bai nacfylfolgenbe 5Oort beseic^net toirb; j- 35.

EBRACTEATUS, oftne *ftzhtnt* ober JDecfbrotter/  
~~tie~~ *ebracteatus Pedunculus, ebracteatus Ra-*  
*\*mus, ebracteata Spica, an LAVANDUJ-A Spica;*  
**und** *ebracteatus Verticillus an AJ U G A rep tans,*  
**Eborinus, uhb EBURNEUS, n>tg n>ie SIfenbein/**  
**etwas** Qidnjeb unb in'd ©cl6lict)e gie^cnD.

ECALCARATUS, fportllO0/ fo *Corolla ecaU*  
*carat a a n VIOLA odor at a% \$ftt|fCl|& f^norim mU*  
*Ecaud a tus.*

ECALYCULATUS, f. *AjtJiyUllS.*

ECAUDATUS, of>ne ©c&meif/ oftne ©porn, j. '95.  
 ANTIRRHINUM *Cymbal aria.*

**i g o      E c u . E F I - .**

ECHINATUS, i g e ! f 6 r m i g , nüt ffcifcn dünnen, bic&fffebenbcn, uacf; aOfcn ©eitcn bingcfcf>rten Spfftm befcebrf/ n>ic cm Sgel, obcr tvtc Die grud)t Dec dafta\* men^ an n>clcf>cn bte (k^pfcl cine *CapsuLa echinata* iff. 3|n ALOË *echinata* jinb btč 33laſter mēt d5nfch>ctt rauben (Erbabenbeiten befegt; an ASCLEPIAS *syriaca* iff tOC. Fo I lie ul us *echinatus*; Cut *echinatus* Fu n-gnis iff HYDNUM, tint) Cli *Legumen echinatum* tj!afl^LYCYRRHiZA *echinata*. Pollen *echinatum* iff an MALVA, UtJ S em in a *echinata* ftnt) an CY-WOGLOSSUM officinale. — *Echintita Gramina* ftaren eilf SamtUe 6ct> ben alten ©raminDlogen\* ©. *Aculeatifs.*

ECHINUS, @ t a d > e l , tanggejogenc ^erDorragun^ gen an bet unteren £)6crfliad)e be^ ^ute^/ in ftelcfyen, n>ie bep t>cn &tad)clfd)m̄m|||tn, Die ©amen Iccgen. ©. *Hymenium muricatum unb Aculei.*

EcTOFOcoNis, jene Slbtfyeitang Don 9J?oofen, brie nur ein tin^ti augere^ ^criffomium / bie Sa^nc nacl) augen, ftaben.

ECTOSPERMAE, gonfcrtJCn 6ct> Dauber/ **roo** bie Srud)tf6rnrcr augen an ber SXoftre angcbrad)t finb; **Korb's** (feramien.

ECTYPA, p f l a n j e n a b b i ' u c f e / n a \* **Xnip's hofen's** banter; an ber SKuctfeite mitt ©d^tvarje ubers ffrid;ene ^ (Tanjcn wecken mittelf. einer ^reffe auf weiß fc\$ papier abgebrucft / tooburcft man eine ©tlbouette bet 9>flange crt)d[t.]

EDENTULUS, \$ a ^ n l o 6 / tm (Segenfage t>on ge^ jábnt/ meiffeng nur, n>enn anbere ju einer beffimmtent ©attung gct)6rtge 2Jrten geja^nt ftnb; { . 53. ALYSSUM *edentulum*, o&ne 3<&ne an ben ©taufäben.

EDUCTULOSA FOLIA) bep ben SMoefen 9leic&bebeu^ tenb *xait.cfasciculata* unb *enervia*.

EPASCICULATA f. *Enervia*.

\*E\*FIGURATUS, gefront/ ge\$iert. ©onennt man bit SRunbung (*Perist omium*) an ben Sftoofen

*Qttvbnt obec befegt (ejfiguratum T, foenn enfwebcc  
 obec obec Ccfolaucf) obec bepbe juflleid) miß ^nen  
 obee SQBimpecn obec mit einec bünnen £aut befegt fmb,  
 toocnad) manbieSTOOofe eint&eilt Efiguratus Thail-  
 lus, t>er\$iert, n>enn bie 5?oñnc&en betf me^U f?au6^  
 obec focnigen ianbti am llmfange in fleine blattatti Qt  
 Ausdehnungen iibecaeben / 5. 25. LECANORA teicholyta.  
**Röbling** nennt einen *Thallus* bann **figuriert**,  
 n>enn ec eiqtin d^f^Hgten obec gefran^fen U m A bat/  
 aug bac^jiefelföcmig iibeceinanbec Ite^cnben S ^uppen,  
 imb aud manijifaltid eingefcbniffeneir unb gefebtben  
 Stbfcfenitten unb gappen bejieftt. 3\* **Figuratus**.*

**EFFLORESCENTIA**, 6ep fiinne bie **Blützeit**, der  
 SRonatft bee S3(ü5e» S3eo anbecen festc ofe bie 2>auer.  
 bee 33lüt[KiCit / unb tvofl 'aucf) felbf? bee 2(ct be^ **Auf-**  
**blühens.** **C. Floresceritia.**

**EFFLUENS**, was herausfließt.

**EFFOLATIO**, bag iBntblattevn, gntlaubtn, Ttbnefy  
 men bee SSlattec. SBw einigen and) bad 2lbfcfeálen bee  
 SRinbe.

**EFFUSUS**, voeit aueQebteitet, fo ftat man  
 eine *Panicula ejfusa*, t&enn bie SBlumenfitéle bee  
 Dtifpe fo febe al\$ nuc tmmec moQlid) au^einanbee faty  
 ten / tine an MILIUM effusum, an SAGCHARUM offi-  
 cinarum; einen effusus *Thai I us*, unbefh'mmte\*  
 ^Laub bai hint beftimmmt au^geteiebnete Crenje an  
 feinem Umfange &lt/ »ie URCEOLARIA Hoffmannu

**EGLANDULOSUS**, obne SDcfifien; \$ 55. *Petiolus*  
*cglandulosus*, an ben meiffen @emäcbfen»

**EJECTUS**, terauegetoorfen, tva^ aud einem bo^lett  
**Corper** in einec Sogenlinie ju 33oben fallt.

**ELAIOS**, E, ON, ol ivenfatb e n» ,

**ELASTICE DEHISCENS**, DISSILIENS fagt man Don \tt  
 genb einec ^fiae, bie ibce happen plögli\* unb mit  
 (geroalt tvtg^n^icft/ unb i>a^ bavin £ntf)altene au^  
 ffnouf / i» S5.' Ant her a elastice dhsiliens an btn

tieffefn , Die (Tapfel an *Mn Veild>en*, Die Jpitlfe an OKOUUS, Die *Qdyotc* an CARDAMINE.

ELASTICITY , @ d> n e 11 £ r a f t / jene *ftvafit*, Duccft tt>elcbe tcgenD em Icbenbec oDec toDcr 2l)ctl etnec 9)fTanje unter getoiffTen UmftdnDen eine semtffe SKU&tung annimmt, J. S3. Die ifraft tvomit Die grüct)tc DccBak famřne / Die ©faubbeutel Dec PARIETARIA auffpringen\* *Qcf)vJHik* ^^anomene Dec <£(aſticität tvicber^o^Icn ſdie nie/ \_ fcincgflcn Die ?Jbánomene Der 3^wtabilität fajl immec r^un / mentgflcn^ naſe einigec 3eit.

ELATERES, © p r i n g f ä b e n ; jene ftaūtigen e(a^ ffffc^en SaDen / *mittlfi* tvelc^ec Die 6amcu, inDem Dieſe SaDen gc&refjt ftnD/ ſtcf) t)on Dec placenta, an n?cl\*erfie DaDuccf) ebeDem fejl^ ^altn .toutben, bet> tollcc Sieife. Ioi5fd&neaen. '3n^befonDece Dec 0 4> n c 11 c r an Den Jtapfeln Dec Sacrnfcáutec unb anDecec 5?ctn>toga\* miflem 6. *Catenula* i&ebwtg/ unD Ma/iu-brium.

ELATUS, &od^, aufgeridjet, bejeicftnet 5Pflanjen, Die länder ftnD / a(^ man eſ ibren ūbcigen Stmenfiønen nac^ glauben foKte. 2Decanb. @cbr oft fticD ed abec im ©egenfage t)on niebrig (*demissus*) \$tbvaud)t, n>te e^ ſin'ne 'bep BROWALLIA eZa^a unD demjssa . bcauc^te\*

tLEU'JHERANTHERAEjpa4>cnb./ too Die <&t<iubbtuttl nicf>t tcrmad)fcn ftnD.

ELF.UTHEROS, f. *Liberj* feet»

ELEUTHEIOSTEMONES, ^flanjen mtt unbecbunDenen ©taubgefa^en.

ELEVATUS, *aufGetidytct*, *aufgebogen* , balb fononQm mt̄t e r e c t u s , balD mt̄t a d s c c n - dens, ^ 95. *Spica elcvala* an AoRIMbMA *Eupatorium*;: *Margo clevata* an CLIRAHIA *idandica*- Bee eplac ul urn *clevatum* an AGH^LHA.

ELLIPANTHAE VX>ac|>eitb, ftnD fiinn'e'g ©ifictffen.

EujpsoiDEus, e 111 p fo 1 b i f d ), ein ^ocper / ⚡es- fen SängenDuccbfctyMtt tine SCipfeiDe bilDet.

**ELLIPTICUS**, ellptifcfc, *toai* cine regelmägige dttipfe barbict&et, b. &. cinen groffieren Jänge\* aW GuerburcbmcfiTcr &at / uub beffen Ut)bt <lnbm fd> flleidjuiäfrg Derfdjmälern, Bemfcarbi wtff c\$ blog ton @6rpern gebraudjr roiffeii / beren jQuerburdjfcfynitt tin \$reitf, beren SäugcnburcfjfcbnM after O'.alifi. 5D?aii gebraud)t ^ aber o(>ne Untcrfcl>ieb t)on @6rpern, rote \*<sup>on</sup> §ldc(Kn. ?eo Linñe phil. bot. t(l *Folium ellipticum*)x)l|ont)m mit ovale. SBeo ^ ^ b foil e^ fcftmälcr fepn/ qW `ecu folium ovale. ^ ~~co~~ po!f if! ein *Folium ovale badjmiQe*, beffen längens biirc^me(Tcr sicft {urn Jduérburc^mcffer t>crl)aff, n>e 1 : ½. &ayne nennt ein \$Iatt e(lip(tfcO/ menn c^ länglich ist, unb an benben <fnben burc^ gleicOc tfretfabfcfcmitte von Sleicfitem Surc&me(fer fo begräijjt wirbr ba§ bie Sehnen tiefec j?rc^abfd)nitte eimanber ju^cfe^rt ftnb. **Andere**, i. S\* Hōwling / nennen em ^Blatt' clliiptifc^ / bai UnQUd) ((?/ unb an beyben Snben fptgid suläuft/ int) bie wrbañtnigmägide Srette cine^ c^fönm'gcn Slatteg bat. Sinige bcnfen ~~ff~~ ein cUpttfcfyeg S3latt aid ein folcfrcd / an tvclc^cm bie ©eitcn in ber SSKite eine QBeile paraficllaufen ^ n>a^ aber nacf'ybir dUtuvciñtt QrQipfe unmög(ict) tfl. \$ct)fpiel eine^ e(liptifcl;en 35Iattc^ im er\* (len ©tnue t(l an POTAMOGETON natans. **Sin Fruc-*ius ellipticus*** ift an PASTINACA sutiva; eine tfifi-*c u/fi elliptica* an LUNAHIA. 2ln einigen 3J?oofm t(l auf) eine *Thee a elliptica*.

**ELONCATIO**, Periañgerung, ber 21c( beel £änger; **werdens**, be^ ^acbfea^ in bie *ia||\$t*.

**ELONGATUS**, verlängert/ beffen 2ān\$cnbutd)', messer fid> jujenem ber SBrette t>ectdlt »ie 1 : 3. Bern; l?arbi. gsag mit ©etpalt in bie Sänge gefogen iu' fcoa fc^eint JDecanb. ®o t(l §. SB. bie \$f>iebel&nHc&e aUurjel ber ^erbaseitlofe Iångli\* unb an ber epige langgefireft; fo iff Der tñnoflen (*Tuler*) an ASI>HODLUS *luteus* feng\*, walienförmig/ unb unten an\* bet ©pige langgejogen» fo id ber ^e!m an AGÖNITUM

*Cammarum* (anggef!recft *Elongatus complexus* *cellulosus* if! ein langgejogeneg 3ettengetoebe, beffen langgeffrecffe 3etten Heine an *brybcn* (Enben t>er\* fc&öffene (nic&t offene) SKo&ren bi(ben / fete im Jjolje unb. in ben Gefagen. *Elongata Cellula* &ub. langgefircste 3eHe/ f. *elongatus Comp lex us eelulosus*. *Elongati Pori* iTJirbel „ f. *corticales Pori*. *Elongata Tela cellulosa SJxH* *Complexuhs cellullosus, elongat u s.*

**ELYTRICULUS** tftecferf f. *Flosculus flori\** *compositi &inné.*

**EMARGINATURA**, f. *Emarginatus*.

**EMARGINATUS** L., aue *QCVa nb et, eingetctbt*, toenn'an irgenbeinem flaxen ifytik, an ber ©pige ober an ber Saftf beffelben/ ein Slu^fc^nitt Dorftanbeu if!, ber *nid)t big fiber* bie Watt *ttid)t .t)iefer ffinfestnitt* Oeigt bann: *Emarginaiura*. jBeo.Bern^arbi' if! ba€ aDein au^geranbee, *toad qm* (grunbe einen 2(u^f\*nttt hat (Bemöftnlidy bemerft man *ei gu^brucflief*)/ n>enn irgenb *tttoaS Basi emarginatum* if!, unb t>erfle&f, ol)ne biefen gufag, immer nur, bag *ttoai* an ber ©pi&e auggeranbet fep\* @o (at man }• 95. ein *Filamentum emarginatum* Ott ALLIUM *Porrumj* ein *emarginatum* *F o I i u m* ttycnitt bie ©pi^e einen t(einen Qlu^fc^nittimit jugerun^ beten 6eitentt>infeln bilbet/ an GLOBULARIA vulgaris, *Bvxvsbalearica*. \$Rat| unttvf< A)tit>tt a c ute unb obtuse *emarginatum*, je nac^bem ber (Einfclmitt einen fpi^igen ober flumpfen einbringnenben SBtnfel bilbet; anbere nennen *abet* bagjenige acute *emarginatum*, beffen fonf! Jugerunbete ©eitennotnfel, fpigig (inb, unb im engegengesetzten SaHe nennen fie irgenb *tttoat fhtmpf* auggranbet. 3J?an t>ertved)feit bier offenbar *Emarginatum mit Excisum*. (Em *emarginatum Labium Corollae*. if! an THYMUS; *emarginata Lacini a* an MSNTiiA. *Emarginata Ligula*, gerlnbelt if!

.eta 5Matt(jäufc&cn / ttcnn eg einjn fcic&ten Slugfdjmitt  
an ber <fpge &at. *Emarginata Petala* fittf) an  
CARUM *Carviy AGROSTEMMA Githagoi*; *tint emarginata Silicula* if? an Cocn LEARIA. *Emarginatum Stigma*, rottn tint abciefzugfe SRarbe einen 2lu&fc^m'ttba/ §. 35. aa CYNOGLOSSUM , MELIA.

EMBOLIFORMIS, ja p femf 5 r mi'g, tvenn 6fe  
Sân^cnDurd)f\*ntte manqclfSrmia / Die Ouer&urc^fc&nifte  
~~freisf~~<sup>f</sup>ntft iinb. 'Sorn&ar&i. • ,

EMBKYO , J E m b r v o ; © a m c n f e i m / jenec  
Theil bcr gPanDel, t>c^ kernel in Dem ©amen / Der in  
affert befrud'tcfcn ©amen cor^anDen ift, Der We neue  
?Pffanje berfcerjubrhiflen tm ©fan&e ifl/ unb per a(\*)  
Die "Vflanje tm fleitten betradjtet wcrDen fanm €r bil-  
bet einen fleinen gemöbnlia; wai^nföcmifich Cörper,  
bec# in feinec 3»ttte a» ejnem fleiftiflen 66rper (*Hy-  
poblastus* Hi\*O befeliiflf iff j tt>el<#ec felbff wieder mit  
bem gnbogperme tufantmtitbanaf / auS beffen frepen  
€ben oben bai Sebecc^en (*Plumula*) unb unten ba«  
fflJurjelc&en (*JRadicula*) entforingt. ©tefe beppen leſte^  
ren Sbeile jufammengRommeii/ bag .feberd^cn unb  
bat tDurtelcfen, nannteman&et)Dr'Xé!m, <?>erj;  
c^en (*Circulum*), btt mcttfensi an bee &du bet  
©atttenlappen ftfit / unb biefelbcn, tpeim i&rer jroep  
finb, oerbinbet. · gjjanbicg fteaud) 6 a m e n p f l < r i j \$ «  
d>en<sub>t</sub> *Plantula seminalis*.

EMERGENS, ? erauataudpenb, totnn eine  
?JTan5e aw« Dem Gaffer in 'bic tuft bertortrltt/ toie.bie  
meiflen ©ajTcrpflanjen jur 3«tt bcr 93luff>e\*

EHCRSUS , me fiber Dec O&erfladje be« 2Baffer\$,  
feltener ivag über ber glač&e eineg anberen Sorperg &er^  
twrragt. ©0 nennt man einen *Caulis emersus*, tin  
*Folium emersum*, tDentt (ie ubec ber Oberpadje  
bc^ SBaffertf |ief)en. ©0 ftnb an SISON inundatum  
bit flätter unter bem Staffer (*Folia submenu*) ftaar;  
förmic, bic fiber bem Staffer (*emersa*) (jingetteji \$tt  
fitbett. *Emersa piumula* ift tin fianj frei) in\*bem

©amen liesenbeg §eberc&en, fo bag man eg, n>entt  
man ben ©amen t^éclt, alfobalb seroafcr mirb/ tvie an'  
bet 93o&ne.

EMITTENS, bag/ n>a\$ trgenb etwag foerDorbringf/  
fceraugtreiben la§t, {. 95. *Filament a basi proces-  
\*um emittentia an OCYUMUM.*

EMORTUA COROLLA, bie abgeftorben ju fepn **scheint,**  
**gelblich** unb trocken if{/ trie ah ERICA *cinerea*.

### **EMULSIVUS, milchig.**

EMPHYSEMATOSOS FRUCTUS, fc^Iug (Bärtner vor,  
jene S^uc^te/ im ©egenfaee ton *inflatos*, ju **nens**  
**nen** / an toclcf?en / mte an CYSTIC A PNOS, tie Stinbe  
ter gruc^t nicht nur log iff, fonbern in einem merflfe  
chen 3n>ifc^enraume Don bem tnneren Sbetie fo **absteht**,  
**dass** bicfer nste cine jtvepte grucftt in i^r lieflf. ©. *Ve-  
si c ulo s us.*

ENDECANDRUS, ^3flanjen mU **11 Staubgefäßen**,  
**Die** fc&c felten (tub; 5. S3 HORTENSIA *mutabflis*.

EN DO, in 3ufammenfe§unflen mit griecftifcljen 2Bor\*  
tern ffatt *Intra*.

**ENDOCARPIUM**, %f <fd>erfraut/ bie innere **Haut**  
**der Fruchthüllé**, ober btejeniae ^aut, **welche die Fächer**  
fcilbet ©te if! *ten febr Derfc^iebener Dichtigkeit!*

ENDOPLEURA / bie irtnerfle ^>aut be^ ©amend/  
if{ bie unterRe Sage bet ©amen^aut; bie fcf) nut mit  
gRüfe ton bet Sleifcbfeaut trennen lägt, n>elbe fie an  
t(rer unteren unb tnneren 5Banb ganj umfleibet ©ie  
iff bep att i^rer 3artbeit uftburcbybringlicfy flegen ^tudt)i  
ti&ttit.

ENDORRHIZUS , ftenn bie 2Gurje(d)en aud ber 95a;  
fig beg Smbrpo entfieben, unb bie Ober^aut burcfcbo^  
ren. 3u(Tteu. g'ine f ruc^t beren Embrpo (*Itadicula*)  
einen ober mestrere 3iabiceflarfn6td)en etnfcf>lie§t, ot)ne  
felbfl eine ®urjel \$n bilben.

ENDOSPERMICUS Ktc^arb. 9Bag Snbofperm f)at  
©pnopnm mit *Albuminosus*.

**ENDOSPERMUM Richard; Albumen Gärtn.**;

*Terispermium* jfuffieu; ein from <£mbt\>)O Uu fc&iebener gérpcr, n>elc&er mēt bemelfren *ben* item eine\$ ©ameng bclbet.

ENERVIUM, *netvenloe*; *ein* %latt an **phas** nerogamen nemtt man *enervium*^ xoenn e\$, außer ber ©Httelrippe, feine Don bee 35afi\$ nad) bet ©pige fcinlaufenben ®efä§6ünbel t>at / j. \$• an PHLOX **pa-** *niculata*; an ?DJoofen btngegen unb anberen. **Cryptos** damtiien fcarf ein *Folium enerve* aud) feinè **Mittel-** rippe baben, j. 55. BARBULA *rigida*\* *an btn* meijien Ufoen\* ©» a» *Efasciculatum* unb *e duct a-* *lo sum*.

ENNFAGYNUS<sub>7</sub> ^PfTanjcn mtt neutti©tau6tt>^en»

**ENNEAGYNIA**<sub>7</sub> Orbnungen bet) 0 n n é, toe(c^e bte obigen **Wflanzen** begteifen.

ENNE.VNDRIA, tle IX. 6(affe bet) £ in n'c; daher

ENNEANDHUS, n e u n m d n n i g , mitneun **Staub-** defagen.

ENNEAPETALUS, S3(umen mit neun ®fumeitb(ättecn/ n'c jutvetlen bee €?ee.

ENNEAPHYLLUS, ^Jffanjcn mtt neun J?elc&6lftttd»en ober mit neun Slattern/ tote DENTARIA *emeaphylla*.

ENNEASTEMONES, f« *Enneandria*.

ENODIS, *inotenloB*, mi mebec @ (iebec.noc& Anoten bat, 5. S3« *Caul is enodis*, tDté an ben met' fien @eft)ac6(en« *Culm us enodis* an *Scmvvs cam-*, *pestris*. *Stip es enodis*^ an POLYPODIUM *vulgare*.

ENSATUS, f\* *Gladiatus*. *Ensatae* Xoattn tint haturlicste gamiHe bet) £inne unD 25^tf4>.

ENSIFORMIS L., fc^tDCr tfo r m i g , (£inf)tt>cvU förmiges %>latt iil bep &inne ein zweischneidiges ges- gen die Spi e verdünntes Blatt; ben Hayne dasjenige welcte\* lang ; (t^cf jufammendebcücf/ abgemenbet Caperium) ifi, un& Don ber bicteren »a|W gegen bie 6epben ^anten obec ©eitewänber *bin* foipobl aid gc^m bie 6m§e / m & in eine fcftacf6pi&e auiJfauft/ bün\* net unb fc(m<fec wcrd> / unb fid) me^r\* ober tminber

*tlnwätti frūmmf; j\* 95. IRIS arenaria , Pseudacorus , GLADIOLUS ; ehsiformia L e gum in a jñnb an DOLICHOS gladiatus; emi/ormis Stylus, \$u; fammenegebrüdf / fo, t>a§ Die begben Slacken nod). tine serfage SBölbuna bebalten unb jtocn fdjarfe ©cbneU ben an 6eit>en Siänbern entjtefeen / j\* 35. an Canna indica. ©a^er mtftcbt t>a^ Rostrum ensiforme an BRASSICA Erucasirum\* Bern^arbt nennt jcne S5rpel ensiformes, Deren Ouert)urd)fd)nittt bicjcnifle gorm gibt, bie er gēōprt nennt\* 6. aud> R ostratum.*

ENTOPOGONES, jene 2i6t6eilung t>on 9}oof^n / bie nuç ein iinjtgc^ tnnered ^eci^tomium/ 2Btmpern babcn.

EPUEMERUS, n>a^ nuc 24 ©tunben (and bonu^r\* *Ephemeri Floresy* Slumen bte ju cincr bemimm^ ten 6tanbe fid) öffnen/ abfaUcn, ober fid? n^ieber, je^ bod^ für inimir / ju einer bestimmtet 6tunbe fd>(ie6cn.

£ PI, tocnn e^ t>or einem SEorte ftcbt, bcjeicbnet bag ba^jenige, twobon bte JKebc ill / auf bm Organe (lefft, n>cicoe^ biefe^ 2Bort bejictjnet, \$. 95. F/05 *epiphyllus*; ober baS ein £)tfian au^ etnem anberen eiufprfnfl / J\* 28. *epirrhizus*, xoai an\* bet 3Bur\$el entspringt; *epipetalus*, toai ani bem 23lumcnblattc entspringt.

EPIBLASTUS *T&i<batb*, bai t>orbece 3lnb<sup>f</sup>agfe( beg Blajus an gemiffen ©ratfarten / b'a« ft\* meifiend in ber 3Ritte beffelben 6eftnbet.

EPICARFIUM, \$ruc^t&autrinbef ber ^autige Sbeit/ tt>elc(>er bte Srud)t aufjen umgibt/ into bie ©tette ber Ober&aut an berfelben t>ertritt, ©ie *Epicarpia*, fruc^t&edfcn bep Bern^arbi, fcerbalten fid) jur grud)t / tDie bte ©efcble\*tgtf>etle unb grudjtfnoten\* berfen jum *Gttmpl* - *Epicarpus Flos i. supercus*.

EPIDEMICUS MORBUS, eine Jtranf^eit bie me^rere ^5flanscit cincr 9lrt jugleich) befallt.

EFIDERMATICA CLANDULAE, £amet&erfe f. *Cor-*  
*ticalcs Pori. Epidermatici Pori Rubol\**  
*pfyi f. c orticales Pori.*

EPIDERMIS, ©berfcaut, bic femie/ flett>6j)intcf)  
 burc&fcfjcincnbe Slant, Die bie ganje £>6crffåd)e efaer  
 tyflanjc (auger bcr 3?arbe, tt>ic ciniflc bcmerfcn) urn\*  
 fleibee / fid> mebr ober mfnbcn *Uid>t lottvnntn* lågc  
 t>on Dem übvigm @emebe bet ^Jflanjc, unb bie åugcre  
 SBanb ber 'augeren 3eaen ju btlbenfcfeeint/ *Mld)tb|vcd)*  
 bie einmirfung ber 2uft unb ber 9(u^bünf{und erbärtet  
 t(^| Sin ber unteren @ette berfelben finbet man / n>enn  
 man ste ablofet/ ©purm ber eecbdecft/ toelc&c bic  
 3e(len beg Sedgemebeg bilbtn, bie ffe bebecft, tint) bic  
 fcucrf) Surc^en getrennt ftnb/ bie man jutvcilc für  
 ©efäge anfab / unb bit bie Vasa exhalantia <>eb^  
 ^»S'« ju fei;n febeinen\* ©ie bilDet juwilen/ buri\*  
 ffärfere Querfafern/ Querlagen/ bic ft\* übereinanber  
 abfcftålen laffen, wie an bet Sirfe. *Epidermis*  
*Seminis i&avtnev , tfl jene buinne £aut, bie auger*  
*ber Testa, ben sanjen ©amen um^ibt/ unb (id) nic*  
*Don freoen ©(frfen t>on ber 2ef?a ablofet, ©. Canti-*  
*cu/a Epicarpium, unb Pellicula Decan-*  
*bolle.*

EPI^AEAE COTYLEDON ES , fiber trhtfd>e £0^  
 t^Iebonert/ bie bepm A'eimcn ber ^flanjen juerft  
 aug ber (£ibe emporfleigen / uub entmeber birfe fJcifbijjc  
 happen bilben / toU an ben Botmen / ober blätteraftr\*  
 licfte Upvm, toit àn ber Sinbc. *Epigaece* f. ^/c-  
 x e obiastae.

EPIGONIA, (Defcfeled)t6t^ctlbccfeii ftnb  
 meiffend (>autige ^beile/ n>dd}C bic @efcblec()tgtbeilc.  
 nur auf einer ©eite umachen, Sic einjelen ©tucte,  
 autJ welc^en ste betoben, fmb bic. ©e ht q tqt &eil:  
 bedtnbl&ttev, *Phylla epigona* bei Bern:

EPIGYNUS, a u f b e in tPeibe/ iff cine Blus  
 menfrouc ober ftnb bi« ©taubdefagc, roenn ste auf ober

übet ben gtucfttbofen eingefügt ftnb, tveldjer in btefeui gaÜe mit bee SKobre beff ffeldjetf in einen Gorper om mad)fcn / unb folgliid) unter bem jfeldfoe befinbltcb ift; juweilen attcp / roenn bih @taub^cfaße unb oie 3Mumen; frone an jencr ©telle tfngcfüdt ftnb, mo cin nur gut \$alfte untec bem jMcfce befiabifcpēc Fruchtfrüchten (*Germen semi-inferum*) fid) toon bem ScW)C trennt. *Epigynus Calyx* f. superus. *Epigynus F Ios* 3jf|. f. *Gynandrus*; autf) »o bie Staubgefäße auf bent ©ciffel ju fepn fdjetnēn / rōcil fle baaitt ver- n?ad)fcn (inb/ tmie an ben iirdicn unb UMBEL LIFE. ~~as.~~

JLPIMENUS jTfedf./ & \*u'/ierttj.

EPIMETRALIA PHYULA , {> *Epimelrium*.

EPIMETKIUM, ^rūc^tfnotenbeef e Berns hatbi, meiftcn^ etn baütt^er/ jumeten aud) baat\* obct borftenförmuoer X()ei(/ wldjcx ben Srud)tfnoten auf einec @eite nmgibt £>ti 2f>eile / aug ^eld)cu fie be; fle&t/ ftnb bte vtruc^tfnotenbectblatter/ epimetralia Ph ylta.

EPIPETALUS, n)o bte ©taubaefäge auf ben 3(u\* ntentblättern figem

-EPIFHFRAGMA, S tr erg f e l l , eine jarte^ Don bent 3Naule au^laufenbe / unb quet fiber bte Sūcbfe defpannte \$aut / bte Dtefetbe fd)ließt- @ie fommt nur am POLYTRICHUM Uttb an GATHARINEA t>Ol

EPIPHYLLOSPERMAE , ' & *Dorsigeruej farm\** It & ur er, wo bte 6amen <mf bem Stüfen bed Laus bes sißen.

EPIPHYLLUS, n>ad auf bem %lattt i(?# fej) eSnun Sluifte ober 6cf>maro^crpflauic.

EPIRRHIZOS PARASITICA, eine ©cfymaroger\* pfTanje/ bte auf ber SBurgel (f@t.

EPISPERMA, f. *Spcrmmodermis*.

EPISPERMIUM Kf4\*/ (• \$permodermis.

EPJSP^RMICUS Jfiff. C *Exalb tuninos us.*

EPISPORANGIA FILICUMB^H^/ f. *Epigoni a-*  
IUtb *Indusium.*

**EPISTOMIUM, Mauldeckel Bernh., die Theile,**  
ft>eld;e bai Waul beDctfen.

**EPIXYLON**, cine (Sclijinarogerpflanse, Die auf ban Holze ii t.

**EQUITANTIA FOLIA, nannfe £tinné in philos. bot. micbie flafter in Der- jfnotfpe,- Deceit &eiten parallel gegen einanber geneigt jmb , fo Dag bie äufeDie eigentUcfn Folia equitativa; bann bit sémi- ample x a , .ample x a , unb conduplic ativa.** Sin reitenDeg 33latt (*Folium equitans*) nennt tDt'IIbenotD/ auger Dec Jtnogpe/ Da^jenige/ Da^ fcftroect; oDec lintcuformig i(? , unb an feinec 2>aftd eine fc^neiDenactifle festc tiefe Siinne bilbet, Decen Stfcfren an einanbec Itescn/- unb bat Damit Den @tenge( um\* fagt, trie bn **DRAÇAENA ensifolia, SISYRINCIIUM siriatum.** £>evnhatbi nennt eine §(<fcfyre reitenD / De^ ren^ec^tec unb (infer 3eitent^eil gegen einanDec set tct)tt, unD'einec ariDer^ft fo jugeroenDet iff, Dag Die tnittelfien fänflenDucd>meifer einanDer gegenübec jieften\* ERECTIUSCULUS, toat fid) Dem 9lufrec&ten näflect;

{• **Zb. 'Capsula cretiuscula an HEIXEBORUS,**

**ERECTO-CERKUA**, nennt man eine S&uc&fe/ Die am @runDe geraDe auffieigt, unb nur gegen bai <g||bt QV frümmt tuirb, tote an HYPNUM cuspidalum^ stellar turn\*

ERECTO-CONFERTIM RAMOSUS, *an freest Qti  
b r J n g t a f b 'g , ntnnt man emen sJttooSffengef, toentt  
er fricd)t, unb roenn awi alien Sbeitcn beffclben o&ne  
Orbnung b\l d)t beofammen fle&enDe Slcffe f>eit>orfommeu/  
Me parallel in bie \$df)\* fteigen, trie an LESKEA sericea.*

ERECTO-PATENS, *a<ifrcd^t Abflei? en b , n>a\$  
nut 30° ton ber @enfrec&ten a6(!e^t.*

.EREGTO-SECEDENS, nennt man eine *tflüfyt* ober  
*fyaubc, roenn* fie Our\* gletcfymägtgen @rucf ber **auf\***  
fc^medenben ftapftt in bie ^o^e geboben unb **abges**  
morfen n>irb.

ERECTUS, \* u f r e \$ t , i(i atterbing^ nad) **Betns**  
fcarbt ba^jenige, n>ad Don tinten nac^ oben in ber  
3lid)tun^ einer fenfrecfyteri ?inte fortläuft 3nbeffen *hat*  
ed in ber S3otant( nicft immer Mefen @inn; benn matt  
nennt an einem j)Silje einen *Annul us erectus*, mean  
er unten angemacfyen, oben fret) f(l, trie an AGARI-  
**c us conspurcatus;** étne *Ant her a ^recta* , ftenn  
fie mit ifrer ^affd an ber @piße be^ @taubfdbeng ftgt/  
Wte'an CAMPANULA, DATURA; einen *Calyx erec-*  
*tus* , befflen \$>idtdk)tn &t&tn einanber geneigt aufrec&t  
*lichen*, im @egenfage t>on patens, tote an BRASSICA.  
Ein aufrecftter @tencjel/ *Caul is erectus*, **iff** berje^  
ntge/ ber ntc^f ^oOfommen aber jteralid? fenfred^t if/  
J. 93. att VERB AS CUM, ERIGERON uniflorum; unb  
**'ebenfo erectus Culm us an SEC ALE;** *erectus Sur-*  
*culus an NECK ERA dendroides^JPqLYtRica UM com-*  
*mune;* unb *Rami erecti*, auf) bann/ toenn ber  
(Stengel wirflcf) nieber(åse/ n>ie an THYMUS S%opil-  
*lum*, unb *erecta Seta <yi HYPNUM velutinum\**  
*Erectus CorymJus an ACHILLEA millqfolium;*  
*erecta Filamenta ober Stamina, anMENTHA;*  
*erectus Flos an GEUM urhanum.* *Ercctum Fo-*  
Zinirn (unb 'folfllicft aud) *Petiolus*) i(l nad) finne^  
ba^jenige / bad ben fpigidften SBiufel mic bem Stengel  
**bildet**, (uoobet) man aber t>orautJfc̄en mug/ ba% ber  
**Stengel** felbfl *erectus fei))» Folium erectum ist*

& Kōfrl̄tng bagjtn'w, bai urn io° ten ber fenfrecfa  
 ten abn>eid)t, alfo ctnen fcl̄r fptijigen SBtnfel nac& auf\*  
 tt>art\$ mit bent (Stengel bilbct; nad> £>&y|e ri\$tiger,  
 roatf feine ©pige fo nafr oben fcl)rt, Dag feme 2W)fe  
 fid> bec fenf recftten na&ert , bee Stengel mag übrigen\*  
 toit immer sefieflt ober gelegen fcon, 5, £• OUMTHO\*  
 CAIUM *spathacgum*, .CONVALLARIA. *Polygouium*.  
**Sin erectum Lab tūrn j|)** Die Oberlippe ail' ORIGA-  
 NUM; **einc Panic ula erecta an MILIUM lendige-**  
**ruij^: tinereclus Pedun&ulus iff an SISYMBJUUM**  
**CaKmnnae; ein Pcrcic arpium erect urn an DA-**  
 TCJRA Stramonium. (Sine Sraule ift aufrec^t/ menn  
 (te jiemli\* fenfrecfjt fle^t, an\* ro'enn fie m\$taatnfaU\$  
 gatij gerabe ware/ **j. 95. SAGITTARIA sagitu/oUa,**  
**KIBES alpinum; lleceptac ulum columnare**  
**erectum t|t badjentijC/ melcbe^ au^ bee \$ajt£ ber Qap;**  
 fel entfpringt, unb aufn>ärtd sef)t, n>ie gewöhdlich.  
**Erectum Semen, ttJenn bee 9labe( am unteren Theile**  
 fief) befinbef, bie '9i\*fe be^ @amen^ mit jener bee Fruc^t  
 varadel läufef unb ba^ SB^^I^en bed Sinbrpo gegett  
 ben grud)t|}tcl ftebt/ trie an bet (Quint. *Erecta*  
*Spica*, bie serabe in bie £o6é ftef>t, n>ie an ALO-  
 rECU ll us ; ebenfo *erectus St ylus*. Blufrecftt i(| bad  
 Saub / ttemt ti, obee menn bie %abtn bie ed btlbet, fid>  
 fo nafr oben fc^rcn, bag fte fid) ber ©enfrecftten na^  
 been/ **5. 35\* USNEAf florida^ CORNICULARIA ^paeff-**  
 cca. T/icca *erecta^ xqtnn*. i^c Jängenbuccftmeffec  
 mit. ^em beonafre- fenfrec^ten grud>tffieU eine gerabe  
 Sinie bilbet/ **95eo Jtmne i|I erectus bit @eaenfa|**  
 ton volubilisy fpnomommit *rectus*.

ERICETA, ^eiberij trocfene frcce, baumlofe Ge-  
 genben, n?ocauf t)ocjüç(li^ J^eibefraut / ERICA, wächst.  
**Daher:**

ERICETWAE, ?Jflansen/ bie nur in ben Dünern,  
 auf i^eiben ttorfommen.

ERICEUS au\* EHINACEUS, mit (angen ti^famett

*bid>t ffestenben ©fac&efo, töte ein3gel, \$• 3\$. Pileus erinaceus an HYONUM.*

ERTGENS, ftd) *aufrytenb*, toenn ein me\* bergejtretfster £bcil aufrec&t n>irb.

EHION , f. *Lana*.

ERJSMA if! bet) tfecfer bie ©pinbel (*Rhachis*) an ben ©tafern,

EROSO-DENTICULATUS, du a g c b t T f e n g e \$ l f >; tie It/ n̄te bie ©dju^pen ait LYCOPODIUM clavatum.

ERO^US , a u a g e b t f f e n , tvenn etne ^ I ^ am gtanbe unreaelmagig geja^nt / o5er unreaelmagig th: tig til. *Erosum Folium* iji bei. £m n e' ein buchtis gef 55latt, bad am SRattbe n>teber neue Heine fluntpfe S3ucf)ten bat. Set) <^>ayne if! ci etnem boppelt gei)ai)nten 33latte af>nlt\$, abet mit unregetmagigen Ausschnitten unb SBmfeltt/ J. SB- SALVIA nilotica; ungleidb eins unb auggeftyiitten. 95et) BerrtDarbt ifl erosus, get nagt, ba^jeiige / moran bee Sorfprung eitten Wwittl, unb bte %udt) einen SSogen btlbet.

ERYTHROS, in 3ufammenfegungen afed bem Gries d)i(d)cn gleichbeutenb mit Ruber.

ESSENTIALIS CARACTER, b\$t vot^tniid^t Chas ratter, til einefefjr furje 25efcf)reibung bee (Sattung, Die bad Unterfc^elbenbe berfelben entl>alt.

ESTHEQSTOMI <^ebtt?./ fnb &te Apl o per is torn at i £rtbel; 3)?oofe mit etnem emfacfy besetzten Pes tifloma\*

ESURCULATI Musci, \$?oofe ohne Moosfengel, n̄te einige PHASCUM.

EUNUCHI FLORKS, fnb eigentKc^ (Io§ mānnlcfre Blütben obnç @taubbeutel. 9)?an nennt aber and mdnniidst SBlut&cn überftaupt, unb tvtiUid)\*, bit au£ Mangel bed ©riffeld ober bed gruchtfnotend fCjne Scuc^t Stingen, Eunuchi.

EVALVIS, ilappenlos, batyt Fructus evol- ves , tlappenlofe fruc^te, bie feine Stiawtn fyaben, nie aufspringen, wie Beeren, Steinfrüchte. Ran

hagabec too&I and) bem Segciffe t>ott einec Kapfel, ei\* nee i?ulfe unb einec ©cfyote n>ibecfpcec&enbe *Capsulas evolves, Legumina evalvia unto Siliqu\*a\$ evolves*, bie tt)ie an MENYANTHES, MYACRUM, CRAMBB, FUMARIA, mcf)c obec minbec becren^ obec {ttirifvud)tt obec *blattabnlid)* finb/ nic(t auffpeingen/ unb ungeöffuet abfatlen.

ETANESCENS, *vet[dywinbenb*, *ntnnt man* eine falfcfyte I^urjel/ n>enn bee abftáctg (leigenbe iStocf, töte an VJSCUM, LORANTHUS, unb an *an'ocvtn* Paras. *SitSk* in bem Sörper, auf toelc^em ec auflgt/ *versichendet.*

EVANIDUS NERVus, *vet(d}xvinbenb mnnt* man an SKoo^blättern eine Dftppc/ tvenn fie enttpbec fefr fucj if!/ unb nuc eiu Stnfang berfctben am Øruitbe *sich zeigt, oder n>cnn fie fid)* tn ber **Mitte des Blattes verliert.**

EVAPORATOAI P ORI ^>cbtT./ f. *cortiQ ales Port.*

EvKNiusifeabernloB, *toai* feme 9(bern 6at.

EVO#UTIO, (Enttyicfehing überl)aupt, **insbesondere** abec bte Sntfattung bee f no^pen unb flaßter.

Ex, in Sufammenfcfeyen^en au^ bem Safetnifcfyen *flatt E*, obec Exo in S^fammenfe^ungen *ani* bem &vkf d)tfd)tn *flatt Extra.*

ExALBUMiNOSUS (&ktn., ©amen o&ne ®t;n>ei^ EXALTATUS, fe^r )o4>/ forte! tvie el at us > & 0 d?, abec nod) in einem b^eren Ørabe. **Decand.**

EXANNULATUS, o&ne Ottug; fo bat man C a p . su *I as exannulatas* obec agyratas , b\$nen bee Ring fet)U/ an cinigen Sarrnfräutern/ unb einen *Stipes exannulatus* an ACARICUS peronatus unb croceus.

ExAPDPHysATiE, QRoofe o&ne 9lnfa§/ **Apophysis.**

EXARATUS, g e a c f e r t ^ nennt Bern^arbf **Vers** tiefunäcn an bee Qbctfiåd)t, bie nad) thnen abuehmen.

EXASPERATUS, r a u l ?, n>a^ erbabene Sdu^igfeitt t obec fleinc ^öcfec |>at. 60 ifi eine caufte SBorfle Me;

jtniderm £>i>crfiad)t mit Heinen erfcabcnc nut bent bemaffheten Sluge ftd)t&arcn tyuncten befc^t iff, \$• \$• HVPNU^I *Rulabulum*. <\$ If fonoñpm mit *JMuri-c alulum*.

**EXCAVATUS**, aus gefcöb U/ mctf?cn\$ fonoñpm Don concavus, &ster£ auf) &on ca i; us unb / a - veo atus.

**EXCEDENS**, etma^ tt>a^ ai|\$ cittern anbren hervor tritt / auf) n>a^ ^roget ober (anger iff o{£ etwas an- deres, J. 95- *Corolla excedens cauleman GENTIANA punrila*. - *Ncrvus excedens folium*^ ftenn bte S~~ch~~tel tippe an bet: Stafffptge bcrtvortrttt, unb fid) ~~in~~ eine Borste obec in etn S^aav enbet/ n>ie. an WEISSIA acu- ta s. GYMNOS.TOMUM ovaluin.

**EXCENTRALIS**, f. *Excenric us*.

**EXCENTRICUS**, crecutri'14>/ wainlifylmsgnu telpuncke gelegen ifl, J. 95. *excentricus*' *Embryo*\* trer jmar inner&alb be^ @)Delfre<J/ abec auger per ©a^ menac^fe lieiU, bach fo, bag Die SBanbc ber ©cftale fc& ni^t berubren 'fonnen ; *excentricus Stipes*, (auf\* fer @d)eetel(Kelts überfest e^ *V Dillbenow ctm\$ tpccn< trffd}*) menn ber 6trunf nid}t im Wittelpuncke bed £utctf flc&t. *Excenlicum Itec eptac ulum*, ncmtt man Da^jenige, n>e(c^e^ in feiner ^Serbinbuns mit ber grud)tad)fe fflebt.

**EXCIDCNS**, terausfallen b / n>a^ aud einent bobtin gorper bep (Eroffnung Deffelben gerabe fterab^ fattt-

**EXCISUR** ^ £titfd>rtttt, ber in bag \$( { < em; Dringenbe fpiše Winkl, mlfyn buttt) bat Ausschneiden eine^ £>vcjccce\$ entffanben ju fein febeint.

**E^cisus**, aueg efebnitten, n>enn Theile aus ber ftifa\* betaufleWnitten ju feipn fc&efnen, fo bag bte SJlanber emanber flcb ntc^t beru^ren Sen fserior\* ffebenben Sbeil. nennt Bernbarbi Vorfprung/ fro-minenia (Qwo^nlid) *Lacini a) bU* einfpr ingenb e Secre toirb Buç^t/ «Ji7iu5, audt ftjobjt *Excisura*

gtnannf. *Iluegefanitten* nennt man cm *Sblatt*, *bag* an ber Opifee einen grōgeten Slugfftnitt *bat* aid cm aufgeranbeteS, unb boffin Oeitenmīfel ftumpf obec fpffci9 jīnb; \$, 35. an AMARANTH us *Blitum*.

KVGAETIO, 2 f u s f o n b e r . i n g , *bn* natürlicste Slugflug ctnclJ tcrcit^ abgefobertest ober jubcreitetn **Gastes**.

EXCRETORIus, *ba&*, *toai* irgenb efluaS ausfonsdert; \$• 35. *JJuc I us excretorii*, bft pinfdfoc; nuaeu \$?axd)m an einigen Fucus wad) Kor&. 5(us^ foA mnb e <foaave; bit auf einer 25rufe flct)tnf unb der, den al\$ Slu^fonberuns^çanal bienen.

EXCURRENS, *bi|vd)laufenb*, *g l c i φ l a n g*, So nennt man cine Dieppe, bie bie gemje Länge des Blattes burd)(auft/ unb tveber Dor occ äußersten Spize aufhört / nocj) iiber biese ftinauslaufst.

EXEMBRYO NAT US, O^ie <gtlbVt)O, folglich ohne Oamen' unb tvabre @efd}le\*tct)cile.

EXERENS, *batjtnisef mi itQCnb ttmi* enthält; unb baffetfc twas hervorstehen, herausblicken lässt.

EXERHO, das Hervortreten, Hervorstehen, Hervortreiben. #:@. *Insertio*.

EXERTUS, hervorstebend, herausstehend, was aud irgenb einer ^6^le berborragt/ 5. B. Sta-7ll na exerla an ERICA herbacea, ini Gegensage ton inclusa.

EXFOLIATIO, f> *Efoliatio*.

Exicuu,' f leirt/ gilt ton ^Pfianjcun unb Don Orgonen befe(6en/ bie iventg itmfang fhabm.

EXILIS, f *gracilis* unb *minutus*.

EXORRHIZUS, menn bie aBürjelcften ganz in bem Embryo entmicfelt liegen, unb burcf) Da^ ^eimen nuc verlängert twrben jur wirflfcften SBurjel.

EXOSTOSIS, *I||sxo|x<be*, nennt man ftoljartige Höcker, bie Wn@tarfme?)l ent&alt<?n, mie { . 55. an **CUPRESSUS dislicha**.

**EXOTICUS**, *aualañbfd*), au\$ anbercn SBelt\* tbetlen.

**EXPANSUS**, a u s g e b r c i t e t; fo bat man einen *Petiolus expansus*, totnti btt SSlattfhel f& g^cn fete ©pige bin ermeitert, unb attmåbUg in Da^ gsfatt übergebt/ j. 95. **AJUGA repians**. **E\$** iji fpnonprn mit *Folium decurrens in petiolum*, toad flWoñnllic()er iT» **Exscapus**, fc^ aftlod/ obne ©ttel/ ©cftaft, **Stengel**, f# **ASTRAGALUS ex^capu.s.**

**Exstipulatus**, flr u/iflos, cin ?Jilj ofne ©tcunf/ j. 35, **BOLETUS quercinus**

**EXSTIPULATUS**, ofene Slfterblfattet / ober nicftt WKlit DCipac^fCh / J. 95- *Caulis exstipulatus an SILENK nutans; exstipulatus Eetiulus*, an mebceren HE-LIANIHEMUM unb CISTUS , btc barnach in Jtatgoricn gc^ theilt tottbln.

**Exsuccus**, obne gtcifeb unb ©aft; \$• S5»Bat?ca **exsucce**, bie eñe ttodcnc, ^äutige / (ebtrartige ober fc^mammige SKinbc bat, tote an tcr £tnbe. £6en To *Brupa exsucce* , an bee 9Jlanbe( / by Vius ; unb *Pepo exsuccus* an MoMORDic^bperculata. Sufceilen nennt man aud) *Folia exsueemim* Gegens faße Don *carnosa*, unb Sem in a *exsucce* hit @c\* genfq&e t<sup>o</sup>n laccata.

**EXTENDENS**, fic^ (tu a b e ^ n e n b , nenntBern\* {mrfeſt jebe ^flanje / bie einen grôgeren SKam einnimmt\*

**EXTENSA**, gebvauc(t ipecanbollc/ um trgenb et^ toai \$u bcjetd;ncrt, mad mitt Qefeatt quer^ ober bxtiu flejogca itf, atfo f?att d Hat at us.

**ExiERioR**, t)a^ ma^ augec()a(b eine^ anberenl^ör^ per\$ litct befinbet/ j. S5. *Calyx exterior an bet tfXzlye*, ber Heine augcre 5?e(d) untec bem innecett; bit' Petal a exleriora reflexa an ORCHIS mascula; bit Valvula exterior, tfelcfofpelje, an ben ©rafern.

**EXTERIUS DEHISCEMS INDUS1UM**, tVeHtt e^( Md) bttt SRanbe bvf Sblatttt bin sic ablofet, tvie an **Asple-W1UM**.

**EXTERNUS**, tt>a\$ fic& **an** irgenb *tttoai an btt* SlujV  
 fenfeite beftnbef. *Externum Albumen*, welcfjeS btn  
 Smbrpo fo in feiner ©ubffanj etnfcf>ltcgt, unb fo be\*  
 becft/ bag er auc& bann/ n>enn man bie ©amen&dute  
 abjfcf)\*, nocfr fcerffetft bleibt, unb erfi ffcbtbar n>irb/  
 toenn man *bai* &)tfm§ {erfc^neibet\*. *Externa*  
**Fades** f. *Habitus*. *Externus Funiculus*,  
 ba^jenige ©turf ber Sfcbelfcbnur / n>e(c^e\* bt£ §ur ©a^  
 menfc)ale Wuft. *Hilum externum*, *bit* meifiene?  
 anderq *Qtfitbtt*, ebene ober erftabenepber t>ertiefte ©tefte  
 ©amenfd)ale/ in n>e(d)e ber fnnere 92abe(frand ft\$ en\*  
 digl. • *Externum Per ig-oniumbtV&tbxoigift Ca-*  
*lyx*. *Exlernae Pseudoparasiticae* f. *Para-*  
*si tic a e. Secundinae seminis externae*, baju.  
 recsynete tTialpt'g&t bie dugere unb innere.3amen(>aut unb  
 bit Siebenbefleibungen / bie ttytn ober uneaten tytvU  
 carpien. *Externus Umbilicus* f. *Hilum*.

**EXTIMUS** j *toai* ganj augen / ober *toa\$ an btt* du;  
 kersten Spie steh.

**EXTRA** P i S3erbinbuns mit irgenb einem gßorte  
 bejeichnet, tag ba^jenige ^tt>ot>on bie Slebetf!, ffc&  
 auger bemjenigen befinbet/n)omit *bai* SQSaf e^ra in  
 9}erbinbund fiefrt.

**EXTRA-AXILLARIS**, f, *supra axillaris*.

**EXTRACTIVUM**, fouvoc. **tin** Principium imme-  
 diatum II. glaffe in ben ^ffonjem

**EXTRAFOHACEUS**, UUttt btUt \$5lattt fitfytlb / was  
 bicht unb nafoC unfer bem Sblattt bevbMtommt, wſe  
 btJIfSblumtnflitl *Pcduncul us exraqfoliaceus* ait  
 UVULARIA *amplexifolia*; *bit* S&lattanffytStipulae  
*extrafoliaceae*, tveoai unter bem Urfpru^e be\* %latu  
 ftiilti, n>ie an btt Hinbe. 3Kan nennt Jtber mo()l  
 auch *Pedunculi extrafoliacei* biejenigen/ *bit* balb  
 hohher balb tiefer auger bem %lattt>intrt fttbtn, unb fa  
 elltfiet)t ber *Racemus extra/oliaceus* an *SOLANUM*  
*nigrum*.

EXTRAWUS , fagt man toon jenem <embtt>o, bee jicfc aufJeeafeo be\$ \$Pecifperm\$ ((Enbogpecm) befttbet.

EXTRAVASATIO , Jrgiegung, ein franf&after Ausfluf? irgenb eineS @afte« an etnec \$fTan\$c-

EXTRORSUM DEHiscENs, neiint man eine ^apfel; die außen / am Kürfen auffspringt. .

EXTRORSUS, na\$ auitoaxM &tid) Ut, totebie Staubbeutel an bee law , Anther a exlrorsa Kf\*. Ben Bernhardi gebeutet e^ mit bet\* Sp@e abwärts sehend:

**ExulcPRATIO**, (Befcbwür, ein angefressener Thetl einer ^ffanje / ani bem eine 3au\*e fliegt.

EXUNGUICULATA PETALA , SBlumenblätter / twlc&en tec Slagel fehlt.

## F.

FACIBS EXTERNA, i(l fleß)O&nlte& bee Habitu\* <inec ^ffanje, eigentli\* aber ftnonpm mit Super<sup>^</sup>ficies.

^ACIETATUS, f I id) is, neñntBeflWWff einen 6&rper / bee beep unb me&e're gladden fat\* fie mögen in eine €cfe jufammenfiogen obee nic^e.

FACTITIUS CHARACTER, bee thnfilid)C Charak<sup>s</sup>ter, iH bee u?efentlt'\$e/ mit ^inju^atber Zahl und anberee minbee mic^tigee ©tngē.

FALCATUS, fic & elfS r m t g; toag flc&effiemig gereümmc iff; toenn námlí\* jwep ungfeid)e 55ogen fid) mit einem iftee\* €nben beruftren, unb mit ibren Ata; iiingennaci) einee ©eite binfe&en; fo i|Ua£ %latmn XYLOPHYLLA arbuscula ein *Folium falcatum*; fo i|l an MEmc^po falcatq We J&uffe ein Legumen *Jalcalum*\*; fofinb Cotyle dones falcalae, btejeni^ gen / bie flffeummt (arcua/ae) unb sugleid) anliegenb (accumbentes) finb. Fa/caM /•>/\*> finb fegelfoemifle Ouecfpcftige fyaatt, tt>ie an SALVU pratemis.

FALSINERVIA FOLIA, f5latttV, btUti fJUPfCtt feine

©efage f>a&cn / unt) aug blogen fcevlangeren 3etfeett>eben betfeben / n>te an ben (Eangarren.

FARCTUS nennt <Decant>olle irgenb etwag, was feine innere £6(jle 6at; genauer if! eg toot>l dagjenige, beffen £6&le auSgcfuſlt ift; fo iff im ©e^nfaj\* &on tubulosus mil) fistulosus eill *Caulis obev Culmu's* obec *Stipes farctuS*) n>enn cr mit SKarf auggefūHt tfl/ ttje an HOLCUS *sackaratus*, SAMBUCUS<sub>#</sub> *L O C U-lam ent c| obet Pericarpia tiberftaipt j̄inb/ar-*ç/a, auagefuHr, tt)fnn bcr neben Oeit ©amen noc^ iitte 9iaum, mit eiuer \$Xavt(ubflant> autigefhllt ifi, Wit an CASSIA *fistula*. SSet) Batfc^ fint) Pe r7e ar-p /a farcla fafti'ge ^fruc^te. *Podetium farctum* tin mavtigee (fieffeU, nennt man Oa^ienigc/ Ca\$ im bee gj?itfe fcfl iff, rate an alien Šlrten t)onSTEREoc\uloir.

FAIUNOSUS, m e & Ii 'g/ überbaupt nenne Bejn^ ??arb aOed Dad/ n>o jicmlief) gleicfyne Zbcile, bit hum cine QSicrtcl Stnic im £urcf)mefsei\* f)aben, nacf) alien Richtungen unter einanbec t>erbunt)en finb. *Albu-men* ~~h~~ am, ift ein £pn>et§, t)ad Dem Mehle å&lic ~~h~~ m n̄o s u m Legumen , eine £fifse, des ren ©amen mit einem mc>fiaen ©taube bebecft ſm^, tt)if an HYMENAEA *Courbaril*. *P ileus farinosus*.<sub>t</sub> tin beffaubter obec gepu&ecter fyut, ift an me^reren 95lätterfc&tt>ämmen. *Superficies farinosa*, be^ (iaubt ober gepuDert iji iüberbaupt aWeg/ Daff&n *Obev fladt*)c mit einec *mebU oOcr puOerartigen 6u6f?anj fibers fcerft i|i/ n>te {.* 93. We ffilatfer'an PRIMULA *farinosa*, CHÍ^PODIUM *bonus Henricus lt> <S.|n farin'osus Thallus* if! an UJRCEOLARIA *contorla farinosa^ too* cv aug fe&r jartem ©taube belief / Oeffn ^örncften ftf)t bi<i)t vcvbmbm ftnb, fo bag fie faufh .unferfdjic; ben ttjerbealötinien/ fift aberbocft abtoifdjen laffen

FASCIA; B i n b e / beieidjneuutveUeii eine bands fōrmis e Zeichnun ' bie QcfaxbtlH, t>. &. ber Länge nach feinablaufenbe / anberg aefarbte ©treifen. a^ cr D

FASCIATUS, eine Oberffäcfre/ bie eine breite Sinbe

t>acbttrt&et^gebānbert iff\* S5et> £fn ni iff aUt tint SPflanjc iine *Planta fasciata*, totnn jtoep ober me&rere junge 2lefle obec Stengel jufaHfg t>on tfrem Urfptunge an in einer unb berfelben borijontalen Qrbnc unter einat^Der oertoac&fen ftnb / fo bag einer berfelben gleicftfam aW 93inbe bient / unb sufammemjebrüeft totrb. 3(n ben (Tonfenoen nennt man^jene 21bfäge banb^ fdrrmg ,(Genicui a fasciata) bee etnien gegHeberen Sting DorfleOen/ bee twber tnnnenmenbfl bie.SR&bte t>a# fc^Iegt / nod) aufien merfficft er^a6en / unb fe&r vers fc^ieben · an t>erfc^tebenen 9lrten ge6ilbet ift.

FASCICULARIS, f. *Fasciculatum*. Stan ges (raucftt e^ getfobnlc^ nur 6et> *Fascicularia Recptacula* f. *Fascicularia Vasa pro pria*.

FASCICULARIA VASA PROPRIA W|itb. , būfc^elför; mige eīgentlf^e (Beflge finb Suſc^el t>on fletnen r&^rigen Seden/ bie parallel nebeu einanber lichen, unb ecnen ētgenen ©aftcnt^lten, n>ie an ben *Itpocyneen*.

FASCICULATIM RAMOSUS, gebūfd>elt/ nennt man tinen (Stengel an ben 3Roofen, an n>enpm^n>ie an NECKERA *dendroides*, me^rece Slefle au\$ etücr unb ber^ felben ©teUe &ert>ot\$ufommen fc^einen.

FASCICULATUS, būfcfcelfōrmig, nennt man 9JPanjent^eile, n>enn mebtere berfelben au^ einem tyuntt entfpdnden; 3n bfefem ©inni nannte £t'nné bte flatter anberCerc^e *Folia fasciculata*. ©jeSfleueren nen^ tun aber jene ^Matter an ben SKoofen *Folia fasciculataj totld)tmitdliwtn*, ober'mit @efā66ünbe(nt>erfe6enf!nb. *Fasciculatus Caulis* ijł btt) Qji'UbcnotD berJfce, beffen futse Slefle Heine Siinbel btlben\* *Fasciculati Flares* f. Fqs c iculus. *Fasciculala Fronsj* an ben Sangen/ toenn t>te(e ftaarf&rmiae SQebel aud ctner C\$ilbf6rmisen aCurjel ^ecbortreten / unb in @e^ ftalt eine^ SuſdjcW {ufammengebrandt ftnb/ tote an CONFERVA compact a. *Fasciculala. Panicula* butt? belartig, nennt man jene dii\$»c, beren einzelne 35lti\* mmfftele in gleic^en Entfernungen bait) auf biefer balb auf jener ©eite au& cinent unb bemfelben \$uncte. tnu

fprtngen; j. 95. an BROMUS teciomm. £ufd>elf6rmig  
cfleine 2Burjel/tt>enn me&rere (attdlic&e ober roaljenformifle  
fretfc^tge fnoflige SBurjeln an t&rer ©pige sufammeri\*  
Wngen, unt) folglicft aug einem SPuncte entflanben ju  
fcpn fcftinen / Wie an RANUNCULUS Ficaria.» *Spicæ  
græb*, *Spiculae fasciculatae*, ncnnnt man biejent;  
~~Halme~~ die ju mebralg ju jmeocn an ber @pige bei  
sammenstehen.eincS eingelneti 95Iumcn(lielc^en^ bid)t bty,

33ci) paltfor Beauvoie iff aber *Spica  
fasciculata* jene iufamraenflcfegfe Sleftre / beren 'Slebr^  
c64R t>on twfcbiebenen na&egele^cnen ^uncten au^laufcn/  
unb ftcty in bepna^e geraber SK(d;tun0 fort oerlangern/  
J. SB. DIGITARIA, SYNTHERISMA, GH^ORIS. @. a. F/a->  
**be Hum. *Fasciculatus Surculus* f. den\*  
droides.**

FASCICULUS, £'U f <fc e I, (jat n.ad) jSLillfie aufre^  
te, paraQcle, gletc^&o&e unb btd:tf!ebetrbe Slumen,  
tote an DIANTHUS barbatus. WadfCOillbtnovo bcftet)t  
(en / tfIFaflper @Pi&e be^ 6tendeU nfc^t auf einem  
^unte cntfpringett, unb g(eicf)c £ânge ftaben. S5et>  
jbecanbolle ffi (jingegen ein. F a s c i c u l u s , £uf4>el,  
n>enn bie Slumen btwafyt rofe am Selbenffrauge geflelle  
bte £5(umenftie(e jeboc^ fe^r fur} unb beonafye Don  
bemfelben tyuntu audlaufenb finb / n>ie an DIANTHUI  
carthusianorum) ttelcften aber aud) tPiIIbenotx> alt  
SBeDptel anfuftrt. S5ei> ^>ayne iff *Fasciculus*  
imeSufamtnen&aufund me&rerer langen \$(umen, bie  
mi^purjen/ nic^e aud einem \$uncte entfVringenbeit  
S3(umenffie(^enfe^r gebrângt in jiemlf& aufrecftter dUfy  
t|in\$ neben etnanber fleben, fo bag bie ©pigen ber  
âugeren ober unteren S3(umen hði)A Itegen.ald ber  
\$u<ct, ani totltytm bie S(umenfitelc&en J>ct innerett  
ober obereu SBlumen entfpringen. ©<t SSufcftel unter\*  
fc^etbet fi\* Don bem i&m^ aftnUcften Sopfe (*Capitu-  
luni*) baburcb/ bag man auc^ bep i^m bie 55(umen^  
stielchen an bet \$aft£ ftnbet/ ba fie ^iugcgen bci)m

· £opfe me&r oDer twnifler Dem SSRittelpuncte naſe **liegen.**  
*Fasciculus duetulorum* tfl Die SRittclippe oDer,  
 Dec ©efägbünDel an Den Slätern Der SWoſe. ©ie  
 ©lätter ani bm SBurjeln Der ©räfer, Die JXafenffotfe  
 WDen, ncntt man *Folia fasciculorum.*

FASTIGIATUS, *gltidpitDeiQig*<sup>1</sup>. erflärēn SDillbe\*  
 now, faavne unD ©prengel an ©teugel ttnD Sleſten  
 aW *Caul is fastigialis*, tint) ft ami fastigiali fo/  
 Dag m̄efri'cre etpfad>e unD jufammctnief^tc \*2lcle an ei'  
 nem @tense( alfe entfpýngen/ Dag fte oben in einor unD  
 Derfelben gbene mit Dem ©tengcf fid) enDen, Dag dffo,  
 n>enn Diefe 9lef?e an.t^rer 6pt6c %(umen tva&tn, tin  
*Corymhus* entfieſyt / toit an PYRETHRUM *corymbo-*  
*sumj* CAKLINA vulgaris. 33eo BeFFcntour tf{ aber  
**fastigiatuſ** oben ^ugefpī^t; bep ©copoli búfefcefc  
**förmig** aiifn)ärta(ij\*igenb / .iſte. an CUPUFSSUS Die  
 S(e)?e *Squxtmae fasligialae* lnD Die oberen ©d)up^  
 Jen an COSTUS arabicus , uD ettt *Thrysus fasti-*  
*giatus* t/I fononpm mit cojf-y m 6 o 5 U A

fAux, @ d) i u n b , Die Oeffnung DenUmpir/ oDer  
 Jbie ©rānje. jtt>tfd>cn dlbbn unD ©d)(ut|D, fomoftl an  
 Oem ^elcſte aW an Der Slumenfrone/ oDer am **Peri-**  
 flonium, e^ fet) nun Cra^ man Diefe SXofire fid> ent-  
 n>eDer b(og aid Don Den 3lāae(n *Qtbil&ct* Denft / oDer  
 Dag fte *toivHid*) &orftanDen ift. Sll^cmein nennt Bern\*  
 |?arbt' Die 6of)le @telle eineg offenen ^örper^ F a u x .

FAVEOLATUS, f. *Fav osus*. (Eittige debraucften tt  
 jedoch augfd)(ieglicf) t>om Sleſtarium/ tpenn es im  
 Kelche, in Der S(u)me, oDer fonfi in einem ~~an~~ den  
 Theile fid) ali eine ©rube jur Slufbetvabcung des  
 Honiges zeigt.

FAVILLA, iff bet) finne' Die befruc&tenbe Samen-  
 flüssigkeit, Die er für meſtlig f)iciu

FAVOSUS, \$ e l l i g , mit offncn etfigen Zellen ver-  
 feben / Die jenen eincg SBienenforbeS gleicſten / »ie an  
*Jleaep taculum favosum*, WO in jeDer Selle/ tPIC  
 an ONOPORDON, ein ©ame fifct. 2luc& Die Pori an

ben Sod&erpiljen nennt man *favosi*, *toenn* fie fefer grog fittb, unD *fid* *ben* 3eHen einer Jjomigtta&e na&ern,

FECULA, *Qtarimebl*, tfmylum.

FRLLEDS, *toai* bitter n>ie ©affe fc&metffc,

FEMINA, baS U>cib/ *bag wciblid^e*. ©rgannennt man badjcnige/ welc&ed bad neue Sffiesen in fid) fc^ficgt, unD e^ fo lange crf>a(fcn, bid ed im @tanbe tff, fid) fe(6(l \$u ernabtcn; alfo bet @tempel / ©taubweg, pifitUum.

FEMINEUS, **bad it>ad ein tt>cityic&e\$ Organ** *ffigf/ o^ne ein männltcbet ju^teid> ju babcn.* ©o tutftält ein *Amentum femineum* nur twiblicfte Seugungdt&Ctle note bie ^ \$at}ct)m an ben tPéiben, *Fcminea Co' r o 11 a, femineus Flos*, cine Slume, bie 6(06 *eis* nen ober mefyteve ©taubmege ent&alt Sin ben *Erype togamfflen* tll F / o s *femineus* biejenige SBtume/ *celo* C)e aud bem Pericha^tium, ber Corolla, bfC Paraphysis jinb ProphysU unb · bem Pistillum belle&f\* *Feminea Sp ica bieieniQe*, bie 6(06 weiblkfce Slumen enthä V& {. ®. an GAREXj lava, Oederi, Drymeya. *Femnea rlantata* en|xt toetblid)e 55lumen hat.

FENES TRA, {. *Cicalric ula, Hilum ex lev- jiurrij Umbilicus e xtemus.* \*

FEWESTRATAK COTYLEDONES „ nennt man biejenigen/ bie t>on Imefoteren runben 2bd)ttn Durd)bof)rt *finb*, tt>ie **an** MENISPERMUM *fenestratum*, **an** ttelbeit aucfr \$e~ minafenestrata ttoffommen/ ttlit %bd)Ctn , bit fid) in bie £oft[e bed &amen# bffnen.

FER, FEBUS, **f# at us**, toad jigenb etn^Organ TWgt/ in Sufammenfegungen mit *latelniffhen* 3C6rterit» *<fd* ;eigt auc^ an/ ba§, badjenige Organ/ beffen Nas men biefę ©ol&e angst)angt rnirb,. ton bemjemgen ges tragen n>trb/ bem bad jufammtngefegtt Wott aid *Bey* Wort jugegeben n>irb.; fo, ifl *Folium fioriferum* ein ®Iatt, bad bie ©fume tragt.

**was** FERRUINEUS, rotfbraiin, cm '95raun/ bad efe in'd ©elblic^e jicht, unb bem <fifenrojle glcid,'t.

FERXIUS, fagt man enttoeber ton SBlumen obet  
 ©tengeln / bit fruc&tbare ©amen bringen fönnen, alfo  
 entweber tDeiblicfce (\$) ober Stritter (\$) finb; ober  
 Don, befruc&teten ©amen.; ober / metap&orifd), Don  
 SPffonjen / bie fe&r Dielen ©amen brtngen / \$• S3. POA  
*fertilis*. <eben fo metapl)ocifc& nennt man aucft **Filamenta** ober **Stamina fertilia** biejettgén , an  
 totlbyn ftc^fruc6tbare3tattb(eutelbefiñben. ©• *Fr uctific ans.*'

FERULACEAE, fpnonpm mit *Umbelliferae*.

FERVIDAE PLANTAE, ^Pflanjen aui ^eigen Wnberm

FERVIDARIUM, ba^ &et'0e ^ a u e , fur \$flan?

Sen au^ ben ^ci{5cn (glimaten, bie flett eine Sempera;  
 tut Don ^ i5 bid + 17° tH\* forbern\*

**FifiRA TEGETABILIS**, p fI a ii 31 n fa fer / ein  
 S5dfd)e( Don @efagen unb Ianslic()en SeUen, bie innig  
 tinter eMtanber Derbunben ftnb / nnb n>egen ibrer *bifytv*  
*ten Qonffttni fide* siemlid) leic^t (od lofen laffen Don  
 idem benaci>barten S^engewebe^ jumal **durch Maceras**  
 tion, tpo fie bann mesr ober minber **fesle** ^ ~~abend~~ **bilden**.  
 S^urc^biefe Safern nebmen bie ©äfte b*der Pflanzen*  
 ^orjufllic^ t^ren 2BC3. 5B^<n biefe gafern in **blatts**  
 artige Organe einbringen / n>o fie fitcr öfterd serafle(n#  
 fo nennt man fie tteruen, 'Ktppen, *Nervi*.

FIBRARUM CONTEXTUS, nennett etnige ben Salt  
 Oer ?Jfl[anje.

FIBRIFORMIA YASA, ftnb *Ut*, *JQctubatbi* augers  
 ctbtmlid) bunnt fabenformige @efage / beren 20 big 30  
 erf! bie \$reite einer Sinie betragen / unb bie **äußerst**  
 laxtt f)äuti\$t QBanbe bilben.

FIBRILLA, f iferc^en/ h\*&t **würzel** **de**n,  
 ( Pur se If\*fern, bie toeigen ^aarförmigen **Würzels**  
 cfyen mit tt>tld)tn **faff** jebe SBurjel an ibrer **Oberfläche**  
 fcefegt ill/ auc^ bie Jtnollen unb. Stoiebeln. ©ie finbtn  
 ft\* aucf) offers an bem 3)7ittelf{ocfe unb an ber Saft£  
 bti aufftewenben/ trie an RANUNCULUS **bulbosus**.

FIBRILLATA RADIX, f a b t' g , netmf & wne jene SBurjel / bie feinen SBurjelfffocf & at, alfo blo§ aug SBurjelffafetn befic^t, trie bte fabenfSrmfge, faferige/ {taarförmigge SBuvjel. 3nbcfiēn fprtc^t er bocf Don einem *Tnjberjibrillatum*<sup>^</sup> an toelc&em ficfc SBurjel\* fafern befrnben / tt>ie an HEMEROCALLIS yia^a.

FIBRINA , ,f a f e r jl o f f / ein Principium immcdiatum IV. (gfojfe\*)

FIBROSUS, f a f e r t g / nennt ^ernfarbi' atteg ba\$itni&t, Odfctt nacht einer dtid)tun& bin au^gebe^nte Theile becenSMcfe jcboc^ éme95iertcaim;nid)t überjteigett darf, bee gänge nad) unter einanber aerbunben finb» SJ?an nennt aber tnSbefonbere *Caulis Jibrosus* jenen Stengel,.ber aug ftoljfiflen Safern 6elefet/ bie (5\* letcftt »on einanbec ttmnntn, aj>ct ntc^t abreiffeh laffen, fetj am <^>#nfe; *Contextus cellulosus ftbrosus* ben SBap/ obec bag flraffe 3eBflCtt>ebe; *D r u p a fibrosa*, tint @teinfruc^, bit, fo fbi<e f!e frisc& ist, in nichts ton bee *beevmavtiQCix*, unb n>emn^te trorfm ifi, innid)ti ton ber ^ftfafen unterfc^tiben ju fet)n febetnt, Don 6ei)ben aber fta^ bavin untevfefctbet, baj? i^re SRinbe flrogm J0Ci(^ au\$ ^o(^ obec beinartigen gafecn bcflibt, bie au^ bee ^ugfdgle entfpringen / toie an *Coccus nucifera*. gftefcme nennen bie§ JY u x *Jibrosa*. *Fi-* Iro5a *Radix* mar beo ben SIUen bie SBurjel des RAPHANUS, ber PASTINACA;, *btt*) &inne 'iji e^ Wog biejenige/ bie au^ mebreren SBurjelfafeim beflebt/ obne 5Bucjel(!ocf / toit an btn meifien ja;brigen @rafern. Fü-<sup>r o 4</sup> *H L ^ e c e p t a c u l u m i f t a n P O R T U L A C C A* unb an b^S^oreitgetD^feft. *Fibroſus*. *Utriculus* CrePir\* f. *Elongatus complexus cellulosus*. *Fibrosa Vasa*> f a f e r g e f l f e benft man ficht att ^oblc bünne au^ etnjelnen @liebern bt\* fttfytnbt €anå(e/ bie innenwenbig mit feinen %årchen in iftrer jugent) befegf ftnb, fenfrecftt burct aUe Theile bti ewacHtf fortlauen, unb ^uñbel bUben, ffcic^ m tvelc^en bie Spivafgcfäge oelegen ftnb.« 6K bilbtn. bie

**Jahresringe an bem ipolje- ®ian Wit fie ebtbtm für tie Slrterien bee ©etoadjfe.**

FIBULAEFORME PoDETium, Ctt fyi)HaUCflfÖrfll^ get (Beftelleifl nad) XVlllbenow bürnt/ runb/ unb an bee äugerffen. ©ptije fnoaenfSrmffl ernoeitert. Ⓛ foiltc aUevbin&\$ beffev voabenbeinfövmigee &c\leUe i)efj?en.

FICTA GENUA tiantttc jgLtttf' aRe diejenigen Gats tungen, bje n'td^ auf ben \$bau ber Fructificationswerf seuge segrünbet ftnb.

**Ficus**, f c t'g e / elite 2(n&äufung t)on einer SRenge t>on (fan'opfca / bte fid) in einem fleischigen unb fafti^en guicfttboben beftnben.

**FID us**, braucfet man in tttxt Sählen zusammenges fcfytttn SBJorten Hatt fissus. Ⓜ. Bifidus.

**FJGORA**, \*f tg u r / btn' itmcig einer Ebene, ver n>ec^fe(t man &fter£ mit 3orm / bte 6lo§ ben Cörpern

### FICURATUM , f Effiguratum.

FILA SEMJNIFERA PerjOO/l / f. Capilli.

FILA 'SUCCULKHT4, © a f t f a b c r t / burcf>jic6ffffie/ gegliederte, feime/ fabenfbxmigt, faffige CEörper^ in ben sogenannten Blüthen ber SKoofe/ Wcste &inne' fucSJlef? tarien ^telt. Ⓜ. Paraphyses un} Nectaria.

**FILAMENTOSUS**, fa b t g , n>a\$ meistr ober minber lange Saben bribed Ⓜo nennt man filamentous Co\*\* lex tus ^ faferige^ ©ciDcbe, ba\$jmi\$c, ba& bem 56a(lie na&e fömmf / aber bie S^Qen trennt ?0?an fnbet e^ in ter inneren<3ubftan§ ber ?fd)cncn unb tyflyfltt>eren @runb(aqe ed bilbet. ©ag faub/ filamentoscL^>ons ober Thaii usi mm c\$ and feinen Saben befiebt/ n>ie an me^rerer Usneen, USNEA jubata K. Fi7amentosa Radix, ifl ft>nonlm' mlt capillaris. ttlamcntos ae waren eine Slafse beo Pontcbera,

**FILAMENTUM**, @ t a u b f f b e f f i / bie fabenartige ©tu\$e bed ©taubbeutel^/ pt>er\*W fabenförmige <£>thU cl>en, ba^ ben (3taubbeute( ttå\$t, unb t>ern>anfer Natur mitten 33tument>laimifi« Sin benConfemit

iff ti ftnongm mit *Filum*; an bit\* 7\$&d)Q&tlerte, *Rivularia*, ncnn man bit degliefcerten, tinfad)tn *ObtV* aftijen frud)tf&i>en *Filamentafructijicania*, *Sporangia*, bit jtcf burcf i&re cjanje SJfaffe' &er\* brcitca, unt) t>eti ftabtn bee gealieberten 6onfert>en Sleidjen. 95et) ©copolit(l *Filamentum* berjenige SJjetl/ metier an *GHELIDONIUM* Oie happen verbins bet / tmb t^oran bit 6amen fhangen,

FiLIC^, farrnfraurer/ flhfl eite Ordnung der Sroptogamie 6ct jSlmné, Me aber jegt in mcbrece zerfallen if?. 55ei (Blebitfcfr' fint> c^ Die *Filicinae*. Bey Willdenow fint> nur noc^ jene **Filices** *Fili-ces* geblieben, an \vcl)tn ba£ iaub schneckenformig In Dec \$no«fye aufgerottt, unb mtificni an ftec Hitters feite mit sttingelfcn fificnben ^apftln' t>erfc&cn eft; |wtc<\$lmå\}t\$ auffringen,

FILIHERUM FOLIUM, fab en tvagcnb, ' t|l && ^>ayne tin 95Iatt, beffitti SRanb ft\* tbeilroeife abf lófet, unb in (Btfialt meBr ober nitttOet feiner §aben )dn^cn Mei&t/ tvie an YUCCA *Jilamentosa*.

FILIFOBMIS, faben formig, ein maljenfoc^ mitger gorper / bet fo fcfn ifi aid ein fiaben, unb ba^ bep gleic& t>ccf. SSJIt^aben einen *Caulis Jiliformis* an CuseUTA *europaea*; einen *Culmus Jiliformis* an SCIRPUS *campesiris*, IUNCUS *Jiliformis*; tin *Filap. entumjiliforme* an ARGEMOVTE; ein Fo-1ium *Jiliforme* an PLAWTAGO *Cynap's*; tint *Frons MHformis*, ber fo buñn toti tin fiabtn unb guweilert auch einfacb ifl/ an einigen Ueneecn / tin benCangen, an CERAMIUMFiYu/n; eine Par'aphysis *Jiliformis*, an eintgen 5Koofen; einen Pedunculus *Jiliformis* an nte&reren LATHYRus; eine Radix *Jibrillala Ji/i\_m forttnfs* an btn LEMNIS unb' bem LKPIDIU\* *alpi-num*; Pi tiMifornvs, ^a&enjwire/ an SCABIOSA *atropurpurea*; ciwWe ccp taculum *Jiliformean* ben meifien 5fagdjent »ie an btt BtrPe. Suc& 6ep ben ^c9Ptosami!en iff ait TRICHOIUKJ\* ein Rece-

*ptaculum filiform?*, bdi man bftvt mit *Columnula* Dttwecbfelf, tje bod) nie auger Dem 9D?ittelt>uncte btt SPericariumg ~~ft&L~~ Batfcfc'a*Jiliforme Reccpt a culum seminum laterale* ift ©copoli'6 *Filamenturn*. *Filiformis S cap us* ift an DRABA perwa; *Jiliformis Stipes* {in AGARICUS (*Omphalia*) *epiphyltus*; *filiformis Stylus* an AMARYLLIS. <gn *Stigma filiforms*\_if ait LAVATERA, ZEA, #<S^'pu-Z a filiformis ad^IELANTHus minor; tir, *filiformis Tub us Corollac ati* KAKMPFERIA. *Filiformes Confervac titxvxt* man bicjcmgen/ an tpelctcn Me grud)tförnct? in einem bcfonbern **gemeinschaftlichen ruchbehälter liegen.**

**FILIPENDULINUS**, fa&en&\$ngen&; fo nennen ~~anige~~ in^tefonbetc jme fnoUtgे igurjelit/ Die turd) ~~haben~~ jufammcn^ngcn, tvie an SPIRAEA *fi\$pendula*, *Radices fdipendulas..* 2lucf Den 6amen, Dec/ note an MAGNOLIA, an feinec 3ia6elfcf)nur au^bem gac^e^erau^ānflt/ uennen\* einige *Semen filipendulum\**

FILUM, jpaben/ ifl 6efl tP«Ubenow eine Slrt tan 9leftarium/ ein lander bicfer frautartiger €örper, tec &terf tpie an ben paffifloren, ben @cunb bee SBlume in dto\$et 5Inja(I t>erfcyltf& S3e9 Bern^arb i(i e^ atttS, toati fabenfocmts W> Sin ben tonfetven nennt Ko^Iing faben, *Filum, bit* äuferft#ünnen ^oblen.fabenformiden Siö^en, bie fte bilben; ^ n e n>Q abet nur *bit* émjchnett £^ei(e be£ |)W, unb *fabetv* förmigen 3Bebe(£/ tt mag fleçjliebcrt, gelenft, fnotig cber fortlaufcnb/ einfad) ober åfhg fepn/ ^aben ges ttannt fülfen, unb bee rð^renartigen füngegen Ko&ren (Tufti) nennen. ©• a..*Capillium, Filamentum* unb *FiZa succulenta*.

FIMBRIA, ©aur n ijl fononptn mit *Annulus filicum* tmb *muscorumi* jen<<cf)male ^autffretfen, Der mit fleinen Wutigen Sd^nen befe^t iff/ unb cm

©etfel Hegt & *toivft* burc& feinc .©fcneffraft *btn*  
JDecfel bee *S<sup>ü</sup>Buc&fe* a&.

FIMBRIATUS unb FIMBRICAI us, *g e b r å m i ^ g e s*  
f r a n ? t, mit ginfcfenitten am SKanbe/ tie nicjt *bis*  
juc gjfitte fle&en, Bernfcbarbi; mit langeñjifflen  
unb gefagten *3af»nm*, *fcecanb*; *md)* *anbeven*, o>ne  
83erlu(l &er Subffanj! eingefc&iiitttn. *Fimbridtum*  
*Folium*, i(t bci) Homing ein S1^L t)a^ mUctma^  
breifcn \$aar:n étngefagt iff. <<sup>^y</sup>~~y~~' erftart *ti aii*  
ein SBlatO beffm Sftanb Durc^ fc&c t>icte (Einfd)nitte tit  
Heine fc>ma(e Stpfel jcrtfjeilt iff, unb bemerff, bag ec  
*nod*) *Uin* folded 95Iatt tenne / fü&tff- a6ec t)orlåufi3  
**Die** breo unteren jfronenblatter Don. TROPAEOLUM aW  
SSepfpiel an. Sine *Jimhriata Radix bulbosa*, n>  
bie ^aut, bie bte S^tebel umgibt, fid) obe). in ^ra^  
fen *t%ott*, *ift* an GLADIOLUS communis unb *hirsulus*.  
*Pctala fiwLbriata* trie an MENYANTHES, ftnb fo^  
nonpm mit *ciliata*.

FIMETA, *WWlbaufen*, baftet

FIMETARiffs, *toaif* tOie AGARIGUS *fimetariuSy* auf  
QERTiffaufen tt>acfjt.

FIRMUS, *siavt*, nennt man einen Stengel *bet*  
*nut mit groter S)?ufe* ficfr jetreijfen la§t/ n?ie an VER-  
IUSGUM, LIMUM *usilatissimum*.

FISSURA, © p a l t e , ein (inienf&rmiget Smfc^nitt  
*bis* in. gj?itte obec bid auf bie Safid bed *Blattes*.  
*Hayne*: Als Krankheit bee *Mflange* heißt *Fissura*  
*Bluft*.

Fissus, g e f p a l t e n , tvenn bie Sappen/ in *wel*  
d)e etma\* getbeilt iff / nic&t übet bie ijdlfte/ bet 8ånge  
obet bee ffircite nacl), einbringen/ n>obep abet nod)  
*übrigens* bie SKanber ber 3iuffcOnitte gerabe / unb bie  
Buchten obec ^infefenitte formal fepn müfién / im. @e\*  
*gensage von l o b a t u m*. Man zählt gewöhnlich , zu-  
mat an ^e(c^ unb H^enfrone, bie 3a^l bet Slug'  
fcftnitte/ unb 6at fo^Rien *Calyx bifidus* an UTRI-  
SULARIA, *trifidus* an ALISMA, *quadrifidu\** an *Rhi-*

NANTUS „ u. f. tt).#; *multifidus* an HIBISCUS ; *t|||t Co - rolla bifida* an racbenförmigen Blumen; *trifida* an RFNKÁLMIAJ *quadrifida* an LIGUSTRUM U, f# ft. *maUifida'an* CACTUS, (Jin *Folium fissum* toixb theils burd) Slnftabe beg Orteg/ rco eg gefpalten iff, #. 58. *apice fissum*, (obfd>on cigentlic& jebeg gefpaltene Blatt a(g apice fissum betracfytet merben faun) t&cilg durch Sin^abe bdfcaftl bee 2Uigfd)nitte / obee happen genauee beftimmr^- 60 nennt man ein ^latt **3wey:** [paltig, (*hifidum*) *ba\$ einen* (£infld)uttt / unb **folgs** Idf> )toer> Slugfc^nitte obee Sappen odee 3'tpfcl bat, mie an SALISBURIA *adianlifolia,"* cùt S5latt **drcyspalrig,** (*irijidum*) *toenn* eg }met> @iufd;nittc unb **dren** Auss- fd)nitte obee S^ppen bat/ Me an ATHANASIA *annua*; fBnffpalr(0 (*quinquefidum*), tvenit eg.t>iee (rtnfdjnifte unb fünf 3lugfd)nitte bat / tt?ie ou t>ie(eu (Be(|iiien unb K^nunleln bie obeeeen 931attee / *an n>cld)cn* bie unteefWn rielfpaltig (*multifida*) fmb. (£bm fo be^ jcicf}net man and) bie (gpaltunge bee gefpaltenen 93(u^ menblättee (*P e t a l a fissa*, 62. *trifida* etc.). *F i s - siümfolium* ifl bet) B6rE^aufen unb Rolliing ettt fSlatt, bag fa(l bt's juni ®m n b e obee big jttc **Øx^** teleippe .cin^efefjntten ifl, unb beifsen Sappen am SRanbe geeaDe Sinien btlben; *bey* (Ptñbenotü unb **Hayne** aber bfiefeñ feine £nfcbnitte big über bie ~~f~~ritte gehen. *Fissa* Uad4x nennt man eine §afeen>ue\$e( ^|he sehr furz, unb an bee@pige jroei). tig beeot&eilig (fi, n>ce an PELTIDEA *canina*. (£infism§ *Stylus* if! derjenis fle/ bee an bee 6pi(\$e in ^et)^beci).obee me^eeee Theile gefpalten ifi, n>ie an CAMPAISLLA, an *ben* meifien Syn- genetffen unb tielen Sftonabelpfufctn, \* F m a *vagina* nennt man eine @cbeibe/ bie bee gänge nadý gefpalten ifi/ rote an t>ic(en Ørafcrn. *FiVsirs compltxus eel li^lo sus tTitrb.* f, *L.in^Ltus.*

**FISTULAF. SFIRALFS.** ffffft) b1i^B1^a t V O C h I C U- **riformia.**

FISTULOSUS, *tdbrig, boJ>l*, toaljenformig unb **höhl**, n̄ie eine glöte. 60 ftabtn **tx̄ir** c̄neu 6'auZzs *Jistulosus*, ber ganj o&ne *Sfitait* if! an CONIUM *maculatum*; ty><sup>f</sup> ben mciflch @rafern iff ber £afm &0&I; *tin Folium Jistulosum*, bag an bep&en (gnben ge\* fc&(ofen / roaljenformig unb &fI if!/ if! an ALHUM *fistulosum*. *Fistulosae LacunaCj* tofyviftC iiicten, bie fſch in bet Wtite 'JC^'Stcn^cW bjptben/ unb ben^ fclbcn jumeileii fefI macden / me cine .SI?^/ Onb in ben@rafern. @.a. *Lacunae*. &nro&renfSrmigeS @ef!effe/ *Jistulosum Fodetium*, finbet ficht anaUen BAEOMYCES. (Ein *Stipes Jistulosus* if! an AGARIGUS *Jimetarius*. ©. TKIU/OSUS.

FIXAE COTYLEDONES, fttt) bet) 8crfifrirbf biejen^ gen, die an ibrer @tettejiegen Weiben/ nt&t tu die Höhe gehoben n̄eben.

**FLABELLATUS**, facf>erfrrtt'g. 9^an nennt eine **Rispe** fac&erarfifl/ *Fanicula flabellata*, tvenn fie bufd)df&rmt3 if!/ unb menn bicfe S3ufctel in einer unb ierfelben (E&ene liegen, wie an *AIRA aquatic a.*

FLABELLIFORMIS „fadperformig.“ TOiUbenoxo nennteinSSlattfac&erfocmig/ *Folium flaheUiforme*, n̄em eg feilforinig unb an ber abgef!u6fen 6pi ge cm inal ober ofterg flefpalten ifi. \*ei) Borf&aufcn unO &pren&L. n̄ie 6ep Ho&Itng if! eg aber burcftaug fp^ nonom^p *Folium Cuneiforms* 2ln ton ^almett nennt man bie Fr ons *flabelliformis*, bin SCcbd fac&erformifl / tt>enn enfwebic an ber @pige beg @trun; fes me&rere lan^e @lattc^enfaf! freigfornfig ausges breitet stejen ober mcim berfelbefaf! freigrunb/ strahs lig gefaltet unb eingefc&niften if!, §. S. BORASAJS *fla-hellifer*, CORYPHA *rotundifolia*.

FLABELLUM, facfe.el, i! na\*. jai'ser/ *lint* unb <^a^ne jencc ^|ttbenf!anb/ an n̄eldrem ber 9^ meinschaftliche Blumen l verschwindend (*deliques-cens*) if!/ unb sicf an jtvep enfgegengefegten Seiten in breo ober «e^rere befonbere ^iumenftteie zertheilt,

toelc&e atte mit ibren gänfletiadtfen in einer unb berfel>ben Ebene lieflen/ twe'anSYNTHiiRisMA, an VKRATRUM viride. Set) £ubx»ig ifl e£ ftnonom mit *Caul is repens*.

FLACCIDUS, nennt man (Stengel unb SlumenfHefe, Me Don bem @en>id^te ier SBlumen berabgebogen mt'>btn<sub>f</sub> mci)t fyängenb al\$ fc^Iaff fin&. ^n einer anbere^SSebeutung (ft *fflaccidum Amentum*, X Ottitt bit SSfut^en lofe unb mit ton etnanbec (le^ca.

FLAOELLUM, @ ^ o'g h ' n g , ciu meiftenS faben^ förmiger, fyori\$onta(er / mit *Sblattttn* 6cfe|tcr ©trunt (Caudex), bee an feinem (Enbe oberfn ben %lattn)im feln, ober auf) an unbefümmten ©tcttcn, Stengel unb SBurjeln ttibit, n>ié an Srbbeeretn €^ n>irb oft für \**Stolo* unb *Sarment um flebrauc&t\**

FLAMMEUS, ein @e(b/ ba^ ing SRofye jie^t, p u e r s farben/ tt)e an ADONIS *flammea*. (B.Igneus.

FLAMMIFORMIS, f U m m e r t f o .r m \* g , ift bet) Bern&arbí bagjcnitgc, toa^ in bb 9)fitte ermeitert/ unb nach @runb unb @pige bin t>cx(d)mahu i|i.

FLAMMULATA COROLLA, iji bet) B^trn^arbí bieje^ 'nige/ menn an einer gebäuften ober jufammengefegten Slume obec an einer Solbe bie ©c^eibenblumen uns gef\$fteift, bie Slumen am Umfreife aber geschweift (tnb\* Sllfo t)a^/ tort man ebebem *Corolla radiata* hieß ,

FLAVBNS, FLAVESCENS, FLAVIDUS, ins **Gelbliche ziehend**, h>ai anfdngt gelb ju t^erben\*

FLAVO-VARIEGATUM , gelbunb flrüngeflerft/. **gelb: panac^tert\***

^FLAVOVIRENS, gelbli^ gr Sti/ t>on Slattern/ tie ind @elbflrüne gieben.

FLAVUS , ein xttoai blaffereg ©elb alt luteus, bem neapolitaner ®tlb.naf)t fommenl^tvce an HEMEROCALLIS *flava*.

\***Flexilis**, ti'c gfa m , tva^ fikt biegen l\$t, ohne

**¶ bttyn, meCHARA flexiUs i m Gcaensäze von fragilis.**

FLEXUOSUS, *fytif unb fcergebog en, fta\$ in abwe<sup>c</sup>fettiber 9licf)tun3 mestrere .aBinfel £ernk, (\$0; gen SDecanb.) btfbet. SBeg fiinne iff e<sup>t</sup>i *Caul is Jlexuosus?* ein &in\* unb *btyQebo&met* Stengel. Will benovo, bit Den *Caul is Jlexuosus.* Q^ En i e i ncnnnt / ccf(act i^n a(^ aufrcd)t, miD • fo nad<sup>e</sup> entges gendcfeßten Sfc^tungen ^cbcua^t, ro@ er etnc Menge fTumpfcr ^Btmfel bilbet. (*Si tann abet aud) tin Stegen:* 6cc ©tengel *Jlexuosus* fei)n. SiniflC tjerlflyigen / Da? attc 2Dinfel, (bamit man ibn ja nicf;t met *toriuosus*) aeroecbile)/ in einer unb berfelben *dbene 'UCQCIL'* (fin 55^t)fpitel ifl TRIFOLIUM *Jlexuosum.* *Flcxuosae' Co - tyledonesy* bit bttit, bftt\$ Dfcf, tflO Uad) ifri ^Plat^n jmar in bie Sán^c gerabe, in bie SBreite abcr ftumm unb nafr ber entsegenscfe^en ©cite gefrümmt finCulm us *Jlexuosus* el MC Ca u / \* s. *Flexuo - sae Lamellae* nennt man biejemaenf\*bie in %i\$; jag OtfaltCt pnb/ tt>ie Ol AGARICUS *Jimelarius,* Pe - duncut us *Jlexuosus* voitb trott £tfine altf fauonpin Ititt undulalus gcbraud)t an AMA ji. suec. 6^ uub POA zeyl. 46. Radix *Jlexosa* ift etnc Sflurjel/ bie immcc naclt entfl^engefe&tcn ©eitetp.^tn unb berflebo^ gen ift. (*tint Seta Jlexosa i'i an DICRANUM flex - uosuj/ti**

cqpkits, g e b e u g r , fo gefnünmf nac^ 3\$evnbavt, \*>i, ba\$ tint gerabe £tmie, bie man turn ecnem €nb|>uncte ber fititmnwQ ju bem anberen zieht, sentt ttd)t ftiben tohtbt.

FLOCCOSUS, floccig. 60 nennt £pilideno w bai faferige@efoe6e# ba\$ bem 95a|te aa^e f&nMk/ bef sen BtUtn abet getrennt finb/ nnb bat bit innett <Sub\* fianj bee 8td)enen unb beu ^JUje bilbee^ Context m floccosus, 3(u^ bi^|p6erflåd)e nennt man floecosa, nce an VHRBASCUM *Jlocosum*, roenn fi^ wit Wollen flotfcn überdeckt ift.

FLORAUS., *toai entmeber naU an ber SBtame fttfyt*  
 Ober SBlumen enf&alt. *Floralis bractea* ifi 6ep  
 manc&en Die Oc&uppe an ben Sapfen (*Strohiius*) bit  
 nicfft nur ffet>en bleibt, fonbern mit bem 3amen fort;  
*to&d)fl*, tofe an ben ^Icfctenjapfcn. gin *Folium*,  
*fiorale* iff ba^jenigC/ tag gunådrf an ber Sfume fieftt.  
 € n>irb ðftcrd mit *Bractea t>ertwcf)f\*lt*, { . 95. an  
 AJUGA. *Floralis Gemma*, tft btejemgē / We blog  
 SSflutsten eenfc&He&fr *Florale Hyperriaculum*,  
 nennt man Die fttiebe(n, bte fi\* in ber 95ffc^e emiger  
 iTnoblaucharten entmictelo. *fydaffr* ifi e^ fpnon^m mit  
*/Zori/er.*

FLORESCENTIA , i B I fi 11> e j c 1 1 , bit Qan^ Self,  
 währnb Wdcßer pc^ Me @faubbeutel tint) SRarben ent^  
 wickeln. @. *Efflorescentia*.

FLORIBUNDUS , n>ad Dfele / auçft *toai fc&one* 93(ymen  
 trågt. Sine Orbiting bet) Hi/ine tvaren We *Fiori-  
 bundae*.

FLORIFER, mad Stamen tragt *Caul is florifer%*  
*Ram us fiorifer*, im @egenfaße bee @tenael unb *btl*  
 Slefte, bie an einer SPfTanj b(c§ 2aub bringen. *Flori-  
 ferae f. frucliferae Gemmae* , Slutfrenfnodpen/  
 bie ®lumen/ abet feine @latter bringen:

FLORIFARA G^Hi, f. *Floralis tbtt Flori-  
 fer a.*

FLORUS ; mit einem ^orgeregten 3a(>(n>orte^teeich'  
 net bie 3a&l bee Stamen *an* einem (Stengel o^Pblu^  
 menjiiele, toie VIOLA *biflora*, in>eoblumtfled 33eilc&en/  
 CAPRATIV *biflora*, {toeo^tamige Saprarie K\*

FLOS, T&|utl>t, *Ulmt*, bit@taubgefageunb  
 Staubwee, bie CSefru^tung^tverfieige/ nebfl *bm*  
 Tellen / toelcste fie umfcuflm unb (lugen. (Luifge nen;  
 tien bU SBtamenfcone (*Corolla*) aBeinSStame/ gegen  
 alien Oprac^g gebrau\*. SAanni fagfe&r ric(g: »Fes  
 ex Anthera, Germinie ej6 tig mate nasci-  
 tur sWe tcumenta (SBlimenfröfe unb delef) adsin^  
 siveon.”

FiiOscuLosus FLOS , fynomjm in it *dis coideus*, *ffleibenattig*, nennt man *tint* 2Mume, bie alleinaug *tobvenfbvmi&cn* 9Jlumen beffefct, beren *©aym m bet* ', naſe gleic&e Sfsteile gefoalren ober aet&eilt iff.

FLOSCLUS, *Tfrlumdyen*, b'ejeic&net **überhaupt** jebe Heine 95fume; in einem engeren unb me&r **gewöhn** (icfyen ©inne aber jebe ctnjelnc ((eine Slume / **woraus** deine jufammengefegte QJfume *Ufrfyt*, **fle** ftp nu..: **fopf**: förmig ober (frafelenformifl/ fcgeibenaftigobergffcfyfeeift\*

FLUITANS , n>ag burc^aug im 3Bafier (!ebt / **n>ie** POTAMOGETON *fluitcms*. ©o nennt man ecnen *Surculus fluitans*, flte^enb/ fpenn er unter bem **Wasser** nttr an einem tyuncte befefitft iff/ *wb unttv bit Oberfläcf)e* beg 2Bafierg mit bemfelben **fortzuschwimmen** (tf;eint/ tt)ie an FONTINALIS , GYMNOSTOMUM *aquaticun*^

FLUVIALIS unb FLUVIATILIS, ^PfUnjen/ bie *XOXt RÄ-NUNCULUS fluviatili\$*, in gluffén leben / in einem (Tie; genbm, ungefafgenen SSJaffer, tvelc^eg fo tief.i(l, bag \*g riee dan} 's^Jrierf\* 30?an *ntnntfinviatile Acfuarium*, eiuen ti^en €anal mit fliegenbem Staffer um jc; ne ^Jffanjen }u jie^en / bie nur im Stugtpaffer flebei&em

FLUXIUS , ftnonom mit *c a due'us unb fuga\_x»*

FODXNAE, *bt\)* einigen ©ruben / bei) anberen S3~~erg~~; twrf e..

**FOECUNDATIO**, Be fr u d>t u n ^ jener **Akt, durch** ~~welchen das~~ mānnlidje Organ bem ^eirne fegen gcf.

**FOECUNDUS**, tvag befruc&ten fanrt unb *btfvud)tct werden fann; \$• 58, foecunda Ant her a, foecundum Stig-ma.*

FOEDUS, »ag tpibrfgäugffebt/ aud) aDfeufa&g **fid** anfü&It/ ober ried;t/ für (egtercg if? jeboc^ ingbe; fenbere

FOETIDUS , tt>ie STACHK *foetida;l?\*s\$i?LOK&foe-Lida.*

FOETUS VIVI , *Uyfid)mitbtl finb* bie *Propagincs*.

FOLIAGEO-COMPRESSUAI LEGUMEN , *bl&tt&fylU ch* . Sufammengebrucft/ iff bit **Hülse**, we ſe

fo ftoc& toirb/ bag fie etnem Slafte abnliscf jiebO n>ie  
Ctl btt CASSIA senna.

FOLIACEUS, *blattavtig*, · toad bit Native, bit  
gonfiftenj tint\* *fdlattti f»at*. @o iff foliaceurn  
Anthodium, toenn t>e S3l5ttc&en ober 6c&uN>m an  
bet ©pi&e fid> in blatta&uHc&e Sludbrettungcn enben.  
(So fint) biejentfien *Cotyledones foliaceae*, biC  
fe&r ffunne ftnb unb Slattern at>nlicf feben/ tote ari  
ter £mbe. SS?an f)at and) foliaceae. Gemmae^  
toenn bit ©djuppen unentmiddte flatter ftnb/ tote an  
DAPHNE mezereum. *Mucro scapi foliaceus* iff  
an AconuscaZaz/iu\*; Sine Ochre a/o/iaceaiflnacb  
XPiHbenotD biejenige / 8ie fid) in ein furjc^, linien'  
ober }friemenf6rmtfleg Slate enbigf\* *Foliaceum Sc-*  
*men*, tfi SAMARA ; *foliacea Stip ula* iff an SAM-  
Bucys *Ehulns*; *foliaceum Stigma qti* BIGNONIA  
*Catalpa*; *foliacea Frons a Ig arum obec folia-*  
*ceus Thallusj* toenn er baüt; ober (eberartig iff,  
obet einem 23(atfe abnelt/ rote an PA^IELIA scrobi-  
culaia,fraxineom 5D?an gebraufyt ^ter^ *folia-*  
*ceus flatt folios us, unb nod) 5fter\$ flatt / o -*  
*liaris*.

FOLIARIS , toad jum 35Totte <je&5rt, an ober auf  
temfelben ftebtj**ab** bat man. etnen *foliaris* *Cirrhos*  
ioenn bäd Slatt an feiner 3ptgt sicb in etne SRanfe em  
t)Ct/ tote an GLORIOSA superha, FLACELLAJ^. iVidi-  
ca; etne *foliaris Glandula*, (oft *folmHka Qtt*  
nannt), bte auf ben Slattern *ftft# ttib jtoar balb* an  
ben ©ag^abnen / toie an bet Wzfat, balb an btt S3a^  
fig bit Slatted/ toie an ter tfianbel, balb am Ku^  
den/ toie an TAMARIX, balb an ber Obfflad)t, toie  
an PINGUICULA, DROSERA; eine *Gemma foliarisy*  
bit blo\$. f&lattet, Unit Sno&wn cntbalt; cinen  
S3(amenf{tel btt auf btm SSlatte. fi^t, tote an  
RHUSCUS, XYLOPHYLLA; fo Ufiris Vetiolum^ ijl  
bet) Bern^arOt ber \$emeinrcoaftltd}e SBIattfliel ber  
Blo lichen etned boppelt iufamnicngcfe^teu Slatted; it

nennf i^tt BUttcfrenflieL ©ne foUaris liadicula  
Die am 35latte fi&f, tvenn Oa^ \$Iatt nmrjett; eine  
*S pina foUaris, flynnit mit spinosum Folium.*

FOLIATIO, iff bep £ in n̄e bie %ott unb SBeife/ tine  
bfe flatter in ber jfnotspe jufammengefaftef Uec|m> Ben  
-iDeambolJe if? *Fvlfaatio* ber 2lct / n>oburc^ eine Pflan-  
pe ftcb mit Slättern *btkibct* (Meg aucf) bet) Bernhardi  
unb n>iObenoiv) unb fer nec no^i afle flatter an eine?  
Vflanje sufammonaeuommem

FDLIATUS, b l ä t t r i g , tt>a8 SBflatter f>at, j . S5t ·  
*Caulis foliatus an GLADIOLUS comnium's; Pe-*  
*dun culus foliatus an ASTER lenuifolhrs. Sine*  
blättrige £rau6e/ *foliaius Racemus*, TOO flatter  
jt?ifd)en ben SBlumen jie&en / mie an LOBELIA *Cardu-*  
*nalis*, CHENOPODIUM *ambroi'sioides*; *folialum* <Se-  
men ifl am <?>open fpnomjm mit *foliaceus*.  
*Foliatus Thrysus*, ©.a, *Foliaceus,folia-*  
*rnis unb /0 //osus.*

FOLIFERA GEMMAE, 23 14 t t f fl 0 6 p Z l|, wores  
ani nuc Sroci^c mit Slattern / aber feine tinmen ents-  
stehen. **6. FoUaris.**

FOLUVORMIS, wad ber Sorm eine^ Slatted nahe  
kommt, §. SB. Stipulate foli/fomes f<sub>t</sub> foliaceae.

FO.LTOFLORIFERA GEMMA, CtnrktK>^C bie SSLife  
fer u^Slumen en^alf\*

IWIOLELLARIS PETIOLUS, T&l &tt| t| t| \$i tl  
ifl bei) Bernlrtröf ber eigene 95latt(liei ber \$Iattcften  
eincS boppelt jufammen^cfc^ten S3(at(etj.

FOLIOLELLULARIS PETIOLUS, ber ećgene 95latt^  
fiel ber ^lattftielc^ctt an einem t>rct)fad? jufammenge^  
fe&ten >Bla<e; ber B U111 e i n d^e n ff i e 1 bep Bern;  
(arbi.

FOLIOLELLULUM, B 1 «t 11 e'I ti \$ tU f W t|W  
fad>en flatter, ani toelc^en bte 95latttd)en an' einem  
breofacft jufammenaefe^ten SBlalte jufammenaefcljt ftnb;  
bte le\$ten Slattcften eine\* bregfacfc iufammengefgjiten  
Slatted JBemÜbi.

**FOLIOLUM, Blättlein,** We etnfacitft\* Blättchen, mcfce cia boppefc jufammenflefegeS 35latt bilbcn; alfo Die jmepten 2)Iatt#en an einem jufammen\* gefegten SSlatte, garner Me jufammenflefefcten Sttf\* c&en an ciucm breijfad) jufammengefefcten Slatfe; alfo ttoieber bit \$t>et)ten SMttcfoen an einem *bittyfad*) jufam\* Wngefegten Slatte\* 2jernbarbi.

**FOLIOLUM**, Bl^ti<^ e n) beigt jebed Heine cf^1 fac>c 95late bep ben iiufammengefc§tcu tlättcn;; aucf)^erfJc^t man Darunter jcbs flctnc 55latt 6a) ben an d^r &vit)t bci %lattfiuic\$ sufammengefegten Slattern/ unt) 6eo ben gefufken Sattei-n / aucf} jebe^ Heine em\* facfc SBlatt beo bem breofaci) gefcebereten Q>latte» Se o ^*Betniavbi ifl Foliolum itbtti tylbttidjen/ bat* an A; nem einfacf) obec jttKp bic? brep obr t>tc(fad) zusammen sefegten SUTte junäd>(l am gemeinfcf)afltcf>en Blatts flfcle bed iufammengcfeljten ®(att^ jflc^t. 3n einem unberen Ctnne nennt man *Foliolum calytis*, Xeld^bfättcbert, tie Cüfce, aud ttricfyen bee ^ d \* jufammencjfc§t .i({, n>enn fie fo auf *btm Wlummflhlt* cingelenft flnb/ ba8 fie ffc oftne gerreiflfunfl bat>on trennen laffcn, n>le an CIRCAEA , ACTAEA, ARGEMO- n; im entg^eu^feftfn gad\* aber/'tvenn bie Relch; blättchen &cvtoad)W flnb, unb ffc nid)t ofyne Zerreiss fung von einatiber trennen laffen/ nennt wan bm field) eüiblättn'g (*monophyllus*) unb nac^ JDe^fooHe ber auc^ ben einblättri^en field) axii me^rer en S&latt\* cften béltefcenb bctradjtet/ *gamophyllus*. 2Juc& bie SSWttd)en an ben <?>&Ucn (*Involucra*) flnb **Foliola.** ©a\* *Phyllumunb partmetra\** /ia, epf- Unb *hyfyogonialia*.

**FOLIOSUS**, riel blättrig/ n>a^ Diele flätter hat. sjfnbeffen W ti body eine dm \*W't 95ebeu; tung. ©o ifl *Amentum foliosum* fpnont)itt Hlit s qvamos ünt> Mil ail CA unit us, Wenn jWtfcfsten den |j Blüthen ©ectblätter ober 6d)uppm t>orfommen« *CatY x foliosus* <> nennt man benieniaen £elcb/ des,

fen SBfalc&en ben Slattern *am* ©fennel oDer an bett Sieffcn n̄flicfe flnb/ n̄ie an BUPHTHALMUM *aquaticum*, *spinosum*. *Capitulum foliosum* (fl eR flopfc&en, Oad an Oer Slatif mit Slattern umgeben i^ Me an TRIFOLiuM#p^a/cme, ANHYLLIS *vulneraria*; *Caulis foliosus*, tyié.an HIERACIUM /QKO-|5um, LILIUM *candidum* *Cirrhosus foliosus* an LATHYRUS *sativus*; *Involucrum foliosum*, bep fen \$(&'tt\$en 6e>eutent> grog fnt)/ tote qn NIGELLA *damascena*. *Foliosus Eacemus*, luenn JIPideCt ben Slumen flatter sicben tote ah \HJSSIUm *ebracteatum*, Ut) fbcnfo *Spicafoliosa* an CAR EX arenarža (Die abet lignt(tcj) *bractcata* i(t) / an PEDICULARIS *foliosa*; *foliosus Verticillws btx* <Ot bee S3afte mit Slattern um^uÖft iff/ an CM NO PODIUM *vulgarc.* ©• *Folia c eus uti*) *F oliatus*.

roLiiPAJius {\* *Fol iifcrus.*

FOLIUM, B U t r / cine ^etvöbnlt\* ^runc, häus tige/ Pac^e, ^onjontale ^lu^rectung einer ober mehres rer ^afern an t̄em ^opfc ier SBurjelv am 6tenge( ot̄er an Oen 2leflm, twoOurd) Die ^flatjjen ausdünsten, unt) 97a()runs dnfaulen. ©cine potmen jnt fo vers fc^ieben / t̄a§ man (ic& oft fragen jpub, mad an einer ?)ffanje »latt ij?»

FOJLLIGULUS, B ^l g f ^ p f e l / nannte £imu£ einfl ftie ^ru^t^uOe/ pie meijfend gepaart unt> eirt? Happig iff, unb Oer Sånge rweft auffpring{/ n̄ie an ben 2(aclepiaben» *Follicuii* nannte er ferner©efäge/ £ic mit £uft au^efüttt ftnb., n̄ie an ben 2Burie(n.bec UTRICULARIA, an ben Slattern ber ALDROVAKDA\* BuIIiarb 6efc^reist fie genaueral|einedepaarteSruc^t/ bie avi einembia^ an feine \$aft£ iwtftWlidtn :®riffe( ent; fle&t/ einfdc&rfg {t, unb aew6&nlcc> ber 2åti9\* nad) nach inneti/ felten an ber 6este, in einer Wnfleannath aufspringt/ an tvelcfter erne eielfamifle ^ e n t a figt/ bie bur\* t̄a§ Slnffprinflen frep tpirb, 6.flten fiften bie

<5amen am SKanbe bee SRatf)/ (meiffenS an me&reren Jitiien b'er 3nneut>anD Bernfc.) \$utotiltn aborticrt cin Sftcil bctf' @riffete. ` *Folliculi* nennen einige a u \* Die §Icifd>fta4>eln, bie auf bet Obcrflac&e be< SSlatfctf fpifcige unb fJeifc&ige £er&orragungen bilbai/ ft)eld)e toon bem 6tid)e bcr 3nfesten%errul>ren. *Folliculi* a f a « {ournef. f. *Induviae*, wenn ber jfclcf t bfc grudSit obcr ben ©amen üm&uBt, *Folliculi* finb enbli\* noc^ bet) eitu^en bie ©^elien ber ©räfer, lmbbie Sacf)er bcr ?(ntr>eren/ unb bet> ben^oofen finb *Foinculi* spcnaiici bie SBalge ober ©taubbeutel/ *Spermatocystidia*.      6. a. U « r i c u / u s ,  
G I andula.

- FONTKS, (Duellert/fugc^/belled/ reined, im^ iticrbar bmc&t:\$ OSaffer Don ntd)t bctract)tiicf)cr £iefe; **Daher**
- · FONTINALTS, FORTANUS, t)otr \$ffanjdl / bie itt ober an ben fjueflen tuac^fen / j. 95. MOWTXA *fonia-na*, *Hippuris*. •

FORAMEN (BretP. *{Micro pyle <£urpin}*) ein IUI bér ©eite b#cr Uiarbe ober bcS SRabclS flelgenec \$unct/. in i3Cdf>em jcue @efåge ftc^ enbeten, bie bie befruc^tenbe geucfttlfkeit juffibctm. — tleber&awtf jebe fleine X)effnung/ )^gB. bie föd?ec an ber ©amenfapfel des 50?obne^. Jr>ciuft^ fononpm mit Pon<sup>1</sup>.

FOHAMJNULOSUS, f, *Porosus*.

FORMA, fotm, ton Stbtpttn / ttie tfon\$Scf)cn.

FOBVICATUS, (feigr falb gewS1bt / n>ie jt 95.

ba^ *Labilim superius fornicalum* an LAMIUM, bie *Petal a forniciaria* an ORCIVS; balb wit JHappen (*fornicibus*) 6e(j|6t/ loie an mc^reran Ke pui fo:lien ber V. Slajfc TÖ) jSLimle, wo e^ bann auc^ öfs ttr\* f^nonow mit clausus ift.

FORNICES, Tslappen unb (Btvöolbe. In biefdin ©fime bie obere innct \$la<ht eine^ gewölbten Theiles; in jenem erne 3lrrtt?on SfZccfariuin/ (*Corona crassior*, *Nridontia*) toon fe&r t>erfcl>icbener

JBifbung *an* Wefc&jebenen 95lumen. 2Wb ffnb eff 23er/ lätiflerungen bee Gtibfianj.be\* Slumenblatte\*, btepftie^ menformide/ ben (Staubfäben äftnlicste dbvptt bilbeit/ tt)ic an SYMFHYTUM, BORRAGO, balbrunblfc&e/ fd)up^ pcnartfje SSerboppelungen be^ S3lumenblatte^/ bte nad) oben \$cuðolbt, unten bobl ftnb/ trie an MYOSOTIS K. (Eic ftocn *an* bee Ocffnung bee Slumenfeone / bie fie entmeberfdjUegen obee t>eeengern/ unb fc^fügen bie **Staubgefâße**.

FOSSAE, (Bräben; baruntec Derflaith £inné abcr fomo^l tDafiergrJben / bie fc^Iammigett \$oben (>a6cn, unb ffct^ mitt jieftenbem SBaffec sefuQc finb, al6 ilefrarien/ bie bfe gorm eine^ @anale£ nachbil: ben. 3m legteren galle n>irb e^ bft fuc *Fovca* ges nomttien.

FOVEA, (Brubbe, cine 9lrt Don SReffarium/ wel: cfciJ au^ einer fletnen SSertiefung jur 2lufna&mc unb 2(ufbcma()run9 be^ £ontoe6 befiebt/ bte man jutvcilc am #efc&e obec an bee SJlumetifrone (n?te frep UVULAJIA, FRITILLARIA)/ ober an'einem anberen Sfjcilc bet Slumc antrifft\* 3ebec menig merflic^e Sinbrud a§ einem \$lan\$enfr)ei(e ü6cr^aupt, n>ivb Auc^ oft (Brube genannt.

FOVEATUS, grub 10/ Wag mit 5Sertiefungen tttt Ubtn ift, bie nacht innen tveitec tverben.

%>VEOLA, (Bribdlen, in ber 93(umenfrone obec im #clcf)e, ober im Sruc&tfnoten befinbltcste Heine SSerfiefungen.

FOVEOLATUS, fe in grub 19/ toa& mit fieinen ©riibct)en, mit fieinen SinbrucEen t>crfel>ni ift.

**Fovilla**, dasjenige, was in em Blumenstaube, PolUn, entftalten ift / unb waPlie Sefrüchtuna bee ©amen Utoittt; tint ©ubpanj/ bie bem auge faum bemerfbar cjt, unb fibe bie man manc&erleg 3been sich mad)tt unb nod) mac&en »irbt

FRACTURA, Brubd b^ tine mecanic&e Verleßung,

Srennung ber feften 2&etle einer qjftauje nad) ber *Cives*  
re ot)ne 6c&trift.

FKAGILIS, 5 c r b r e d ) l t d ) / tt>a\$ Uic&t/ **ben**  
bee geringjten SBeugung jerbricljt, mte betr *Caulis*  
*fragilis* an CHAR A *fragility* SALTX *fragilis*; ba\$  
*Put amen fragile an bet 7\$rad}manbel*

FRAGOSUS, *t*nalltnb, *toai* untec 6eflimmtef ■  
Umfianben *tnaUt*, tote bad *Legumen an* COLUTEA.

FRAGRANS, wo\$>lvied>tni>, abec ffarfriec^enb/ **et:**  
naJ ben ^opf eumefymenb; j> SB. ber @cruel? bet **Tus**  
berofen, 3o»quiOert, t)ei!d?ieu

FREQUENs/^luft'g, fagt man ton **Pflanzen**,  
bie trgenbmio in grower SKenge toilb *toad)Un*.

• FHUBILI6 , s e r r e i t b b a r / SRan **bezeichne**^ das  
mit in^efonbere eine 5lrt 4>on flelfid^igem Sp toeige\*

FRICIDARIUM , @r a n g e r i e , ber 95ebältet für  
9(|pen/unb ttalt^nicf>e ^flanjert im Winter, too bee  
Semperatur immer jmifc^cit & i unb \* 5 & iff.

FRIGIDAE, <Pflanzen bie an febt fattten *Ovitn toad*' ,  
fen / nad) *Hinné* ben 50° am 100° S^ermometer *nid)t*  
Aragen. Yflan{en.bte im Storben tvad;fcn. S3ep ben  
SIKen/ 9>flan|ent »cl\*e fallen. @. *Hyperbo-*  
*raea: unb Glaciates*.

FRONDESCEN^, ixu ef^lagenb/ nad anfangt  
flatter ju entmccteln\*

FRONDESCEIHTIA, ba\$Hue{d>laQen<sub>f</sub> N( 3cit,  
tt>ann bit \$ffan)en ibu flatter *tntfttdcln*, S&eo eintgen  
fpnonpm mit *Vernatio*.

FRONDOSUS , tfl 6efl Jtinne' Phil. bbt. ber **Aus:**  
DrucE/ momit ec jene feltenen 3Rou(trpfataten **bezeichnet**,  
an tvelcften, eine jxflikferirenbe /Sljme aud> flatter  
freibt Set) ben irten n>ar t\* uierftaupt fononom  
mit belauhr. 3egt nennt man aber in^befonbere ben  
*Caiidex an* ben *Pahnen frondosus*; iinb *Cau-*  
*lis frondosus* tixxcn @tengel, ber/ tt>ie\*an EQUISE-  
1-UM *arvense*^ hint flatter / fonbern tttoai bcth  
**Glaube** (fronsy a&nlic&e^ tragt\* Culm us *frondo-*

sus, *tin* gar fe&r Jftiger Stengel/ bee u&etraff mtf ttei\*  
 nen SMAftern befe|t iff/ Me feime toa&ren Slätted fon\*  
 bern blattartge Slutfbreitungen ju feptt fc&etnen, .tt>ic  
 ail Kesri o *trijlorw*. *Frondosi Musci, flaubmoofe/*  
 nemit man jene SRoofe/ Me eine mit einem ©etfel t>cr^.  
 fe&ene 5?apfel ftacfett, unb beren flatter fe&r ttcin  
 \$nb. *Frondosi Pili, fcaHnaſtHatt*', bit itemtid  
 |wd) ftnD/ aamaſrligſpitHdſtuſaufen, unb Denn>e(c6ett  
 aug fleinen fnotigen ^ittelftūden nac^ f>erfd)ic&eneti  
 ©eiten bin, anbere fyatt au^Iaufen/ n>ie an VERBAS-  
 CUM*Thapsus*\* *Rivulariae frondosae*, bit WCbcU  
*fotmiQ* finb

FAONS, *fL&ub*, *nannit JLinne b̄tn* <Stamm bet  
 5)Salmc, Der/ tvie er fast/ au^ SSlattrn beffe6t^ bit  
 mit item Slfte, unb öfter\* aucf) mit ben Scfrud}tui^^  
 ttfeilen t>ermad}fcn ftnD; er bejeicbuete bamit <xud) bafr  
 jenige, n>ai man an ben ^rpptogamiflm überfyaupt  
*Haub* nennt. *tyillbcnovo* unferfc^eibet biefed iaub  
 baburcb / ba\$ (id) nid)t befüummt Caran angeben laſſTe,  
 n>o ber 6tenge( an bemfelben *aufl)kt*, unb too ti feibfi  
 anfängt\* Berntarbiï befiniert eg atf efnen meijlen£  
 båut^cu/ bünnen/ *toaQCtcd)tm*, jerfcfjnitteneit, tm  
 Umfange *bfttvi nod*) *tvti&fbmlstn Zf)til* t>on *btvfftic*  
 bener garbc, ber öftert unten 5ffürjdnf nie aber  
 ©lätter båit. 95eo ^ayrte ifl Fr o ^ s., IQpebel, eine  
 Selautftng / bie faft imnter anS einem 3tie(e entfprlngt/  
 nur felten Sortfäge jur gojfpfTanjuna ber ©emaf^fC/  
 n>tc an MARCHANTIA# meijlen^ aber ©amen unb  
 \*-&xud)te tx̄a\$t, öfterd and) obne biefe tv(d)tint, toic an  
 ben Palnien. SSei> biefen entmictelt ber SBebel fid)  
 fitt\$ au^ ber 6pi\$e bti ©t o d e A unb bie einjelen  
 £ycile beffelben / bie Siebern / ^?en gleic^fam mit  
 ban ©trunfe {ufammeiu htynt befjielt ben Slugbrutf  
*Frons*, XVtbei, nur bep ben plant unbj^e&ermoo^  
 fen / ber) ben Cangen / be? ben pilmen unb f atvm  
 fraurern. J8ei> ben ^Dbmoofen ueunen einige jeneti  
 ©tengel *Frens*, VPc&el/ cm wr̄cbem bie S5fatt«

in jmei) SRetfeen in *tintv* <£bene ffefcen, wit ~~aMIMD~~ s. Slu\* ber.im gru&jafvre blattfofe ©cfcaft beg EQUISE-TUM bēfit F r o n \$, tDebel/ bep ·einigen. 93ci> £in £ ffnb flatter tint) Stengel jufammengenommen *F r o n - des*. 35eo beu Sllten' t>icgen bie SSLäiter £er 35âumc **F r o n s.**

FRUCTESCENTIA , bie 3eit, toann eine gruc&t **ihr** reifen ©amen au^fc^uttett

FRUCTIFER, fr u d ^ t r r a g e n b ^ waS **Früchte** ü6er&aupt, *and) mi* gerabe jeßt. reife grucftte 6rinfl; man nennt fo einen ©tengel *Caulis fructifer.*, im ©egenfa^e berjenigen/ bie nt̄djt 35lumeit unb ?5rūc^te bringen/ unb ebenfo *fructiferi Rami*, biejenflett Sleffe / n>eld>e j?noa{pen tragen, bie Stamen unb Srūcfr̄te btingen. Oen fo nennt man an ben <£onfetvtn bic *Sporulae and) Grana fnicifera*, unb an ben Cangar; ten bie\$Barjen oter Sfucf}tfn6pfēr mēlche bie @amen ent^attcn/ *fruclifera Tubercul a.* *Calyx fructifer* an AGHIMONIA *Eupalorium*; *fruclifer Pendunculus* an MALTA *rotunda* K. ftnb\* in bem 3IU^ *Qtnblictt*, in tt>cIcl)C!ti fte reife ^rūcſte 6ringett, 6e^ fd>rieben. 3n eben biefem@inne iff:

FRUICIFICANS , fruefc r tragen b.

FRUICIFICATIO, pnb bet) £tnne jene S^eile/ toef? ^e jut grjeugunfl einer neuen \$flan?e gebSren, unb ttur ecne gewijfe 3tit an berfelben ffefcen bleibcri! & rennet ba\$u adſt Sfreile; Seld^/ BumenFrone, **Elektarium, Staubgefäß,** **rudthüle,** @ame, ^ruc^rboben. 2lud) bie Begarrungeperfobe ist *Fructificatio* bet) tDt'UbenotP/ bee 3eit^ **punkt**, too ber SIA ifiaub auf ben @uffe( gebracht tolbt. %>fy SDccanWHe ber 5fct ber **Befruchtung**, als 2Inalpgon ber Segattung beo ben Sftieren. **Ben Būliard** bie Seſt, too bie \$rucſt reift. Sluct bie periobe beg Keifeng berfelben. 3ur Sstructification be^ ben firoptogaimffen rennet *ttiUbtnow:* bie 2>(üf)e/

ben SSʃutbenjlajib/ bie §rud;t&fine, ben ©amen, bie S5aft\$.

FRUCTIFORMIS, frud^tā I;nhdb, tote ber Stud)tbobtn an-FRAGARIA, biē Blumen an ANACARDTUM, Die @4>eibe an QUASST.

FnucTUARiusjur Snicjjt 8Cl)kig.

FRUCTULDS , einzelne §riid)tc ciner jufammenge\* fegfen grucftt.

**Fauctus, Frucht,** ist ben Linné der Samen, et mas cine Sru\*e&fiae )abeh / oOer nicht. 3)?an vers fiebt aber jefet fonoo&I biefen / a|i bit 6amēn6ebaItVr m^ ii)vm SeHcftungen barunter. SDecanboUe 6egreiff uncr Fructus im eigentltc&en 6iniie-jeben6efruc^tcfm Sruchtfnoten / unb, im n>cUe7<n 6inne/# je5e SDJenge Don befruc^teten' grucfttfnoten / bit fid) aiif bcmfelben 95lumcn!tele beftnbien. ©emeinf)tn 6c}cicf)nef man flcb fcfyige / egbare Sruft}te t>erjufl^tvcifc mit bem dlamcn §rud;t/ **Fructus.**

FRUGIFER, f\* *Fruc tifer.*

FRUSTRANEDS , toad tergebend iL« *Frustranea Polygarnia.*) 6co finn^ eine Orbnung ber @gp\* getrefie/ in toelc^ec bie 33tomd)cn in bet ©djctbc 3mMer, bie am SSanbe aber SBciblid;e o()ne fatten ftnb.

FRUTESCEKS, flr<\*u<\$artig, tvag bag SWcttc! hält jtofcfKn einem 6trauc&e unb jtviceben einem fraut; artifler@Ctvdd)fe; roaiS anfançjt in tiitn ©trauc^ fiber\* JU geben. tPi'IlbenotD' fu&rt bie frulewentia Lit in neben ben palmen auf.

FRUTEX, 0 tr 4 u 4 >/ eine ^ffaitje mit Mjigem (mębvjabrtflem)\*6teuflel/ bee fid) ton bee S5afi\$ an {eraflelr (unb nicftt brepmal Wftt ali SRamtfboch Wirb. 5Decanb\*X *Frutices m in ores;* ^albftiāu; d^er / fi'nb bep tDillbenotD biejenigefi ©träudKr, bie blattreic&e 3n>eiae babenV fe&r bünne finb/ unb eineh bfinnen ^efagrtng an|'c%tn, bafyw nid;t jobe an bcr

5aft^ be\* gsiaftliielcS 6cpnMt^e 5?no»e enffalten unb  
nic&t lange bauern fftnnen; jie müffin ben Slbgang bee  
altni Slefle burfc neue Srtebe auf ben iBurjeln erfeceiu  
FRUTICETA , (&eftvāud>e, ©egenben bie blo§ mlt  
©traucfrern befegt fin\*.

FUUT cqsus, (irauc^artig, toag cinem ©tram  
4>e(/->ttfca:) ä&nUde ijl. ©afarfruticosus Caw  
Us unb Truricu\*, ton SSäumeu unb ©trnūd>ctti  
i>iCtfraud)å(rlirf) ftnb.. Fruticpsa Gramina^ firauci)^  
arr^ge (Brlfer, bet) VPi!lbenott>, bic einett fnoti^cu  
^àlm mét jerflreuten Slattern babcu, tni) too nur je;  
bee jfnoten 3Je?e treibt\*

FUUTICULOSUS, n>a^\*einen f(einett ©fraud) bilbef.  
Frnticulosus Thallus> icemi cv fabenformtf}^1/ auf^  
recf;t unb 'aftis ifl/ n?e an USNEA florida.

FIIUTICULUS, ein Heiner ©trauc^,

Fucus, C a n g e / ©eegetpac^fe/ bie sumerlert a&\*  
gefoberte 6lattd&nlid)e SlutfoceUuti0cn /. mei(fen\$ abet\*  
Enen flaxen gctippecn obec ungcriptca SBebel bilben.  
5Wan fagt, ba§ fit ifyvt Sefruc^tungiJmerfjcufle unb  
iftre S^&d)t in burcf;löcfterten SBarjen tvaQtn, bie in  
Heitien Slattern cimtlyiiUt ftnb.

FVGAX, frinfUItg, fi)nonjm mlt Cadu-  
cus; i. SB. fugax Annul us, tin Sting an etnem  
\$i({e/ ber t>erfcf)ft>int>et / fobalO biefer reif ifl, tote an  
AGARIOUS sanguincus; fugax Calyx am tflo(\*  
htyftigax Pappus; fugax P eriant hium, an  
CARD AM IN E impatient; fugaces Stipulae an  
ben Q>eiben. 3Ran gebraitc&t and), WtQuid)|xn&\$',  
toeife / fuggeior unb fugacissimus.

FULCRA, &th\*fn, ftbnac^ iiiwié' affebiejentflen  
^eile/bieeiner^fTafl^nitgen/ bie fie aber. metffentf t>erlie;  
ten tcmn, ofnc baburd) ju @runbe juge^cn. ©abin  
recfynet er bie Hftevbtittev, Die JDecf blätter, bie&fil;  
len, bie Silumenfcbetbe, befi SDorrt# ben &tad>d,  
bit &antt,. bie jDruße / bag ^baar. 3?ac5 tPiUbe\*  
now gehören nod) t>pju; bie 3fti6f\$lag\*f<\$uppe # bie

**Blattschelde**, biz £ute, bet Qfylawt), \$a\$ TSAatu (aútcf>en. £)iétričb bring\* and) Die Voiebel fciec&ec unb bie(Branne. 2?ad)XVMbenovo fmbFulcra an ben I&ryptoe&mm: Slipula, Auricula, Vagina, Ampulla, Volva, Annulus, Pileus, Lamella, Porus, Echinus, Papilla, Cyphella, Propagulum^ Soredium, Pnlvinulus, Peridium, Hymenium^ |\$ndusium, Propago, Cyathus, Gongylus, Palea> Pilus, Aculeus. 3?ac& foecanbolte finft abcv nut bicictuQtn ST&eile an 5m ©tentjrt einér ^flanje &nu t\$en , toM)t ba|x b|entn| urn fit / o&ne fpicalförmia gemunben ju fepn / tt>ie Die 9ianfm / o^ne ani anDerm Gbvpnn iRa^rund ju fau^m, n>ie 5ie SBurjeln des Epheu/ an auDecti 6enad)garten Sörpern.fefiju^aften. .

FULCHACEUS un& FIJLCHATUS , o e f i a Q t, was.

**Stügen** (at <fin Caul is fulcratus, fo »(e Kamus fulcratus i( Derjenige/ Dec Don oben 9BurjeIn 613 in Me €rDe fc^Idgt f Die i6n erfl ffu§ctt unD Dann neue ©tafmme n>erDen/ mie an HHIZOPHORA/.

FULCRXCEAK GEMMAE, DCCtl ©C^UPpen ttU^U^ enfmirfelten \$lattfiic(en btftcfan, Die am Stanbe mit Sbtattanfägen eingefagt ftnd; {, 9. DiePflaumen. FuZcrafus *Verticillus* y fpnonpm rait braoteatus.

\ **FULGURANS, bližend**, Dei: &6c5?e ®raD ton Glanz.

FULTCINEITS, fdb tP^rsl iΦ, Köbling.

FULIGINOSUS, nugbfau n, fd^wař^Ii d^ s braun, Bernhardi; beo anbcrm beraud>r, n>ie an einigen Lichenen.

FOLIGO, fpnonpm mit Uredfo.

FULVUS, ij! bep Jimné fafrjk g e l b / f e u e rs farben; beo iDecait&ofle Dag braungclb Dec Sßöls fe; 6ei) @prcngel 51'mmtbraun; 6er> Köbling rôtb, lic^. 3ia\* anbecen gelbbraun, leberfarbcn, of j; farbert. JSlimé gab ein SBepfpiel ton feinem fylvum an HEMEROCALLIS fulva.

FuMigAirrt , raud>gtau Bernfc,, brāunlicfc grau. S8ccDeid;t:

Fi osus, rau<fc erig, r u g i g , bet)K6&ling\* S3ct) SDecanbolle ein bimflereS ®vau a(£ ba^ gemetne, bem Skaut&grau ua^e.

**FUNDuS, Boben**, (5 r'u \* b , bee unfere innere Fläche.

FUNGI, Pil^e, @ 4) TO á in me, finD t)te allt 5SeIt tvo^tbetattnten SMnge, t>on n?dcf)eu abet: bev 23o^ taniUt nod) nic^t mcf?/ ma^ fie finb. CLUdem mad)teit fie eine fefyr naturlid)C ^>rbnuug / Me legfe uu tec ben ^rpptogamen; perfoon, ber ^n y to lo g e/ brac^fe t)jeſe Orbnung in &tte) fe&r natärlic^e Slbtfteilungen: *Angiocarp*y p/l\$e/ mit gefcbloifeue! grucfabc\* Sältern./bſe in ibrein ^nnceft mit fcien Camen aw, flefullt pnb., unb *Gym no carp i*, ffeifd)ige Cd;tvåm; me, bie ibre Camen auf einem offeuen Sfucf)tbef)å(ter, bcr Caram^aut, tragen. QptUbenotD brinst fie in t>ir gamtlien ; *Xylomyci*, *Fungi* *Gastromyci* unb\**Byssi*. Zit *Rungi*, ptljefiat)jcgt beotPi'U^ benoto jene tielgeftaltisen j?rt)ptogamiülen o(>ne Cten-gel/ Slatt/ Saub unb Sbadu^/ welc^e meiflen^ ad)U famige in iftrr cigenen Cubftans gelegene unb mit bent Cci;ur\$e bcDefte ^apfeln ^erborbtimsem

FUNGIFORMIS, dneitt ^flge á&nlicfo/-toie bicSriife (*fil andu la fungiformis*) an RICINUS *comniums*.

FUNGOAS; fc^ wain mart i'g/ t>on bee Sonji^ ftens eineg Cc^tt)amm^. @t ifi häufg fpnom mit spo ngi os u s unb snbwros a\$. Sin *fungo-sus Arillps*, au\$ emem fc(mainmtjen Sleifdje befe^ ftenb, iff an ACHOMA. *Fungosa Bac c a*, eine 23eere mit fdvammiaem^tyeifclje. Ein *Beceplaculum fungosum* ifl an HYOSCYAMUS,". NICOTIAN A.

FUNICULUS UMBILIOALIS, ^ a b e l f d ? nur , ein Saben, bee ton bent 33?utterfucf)ca autflauft, unb bei Camen baran brfi\$i\$t. Er befie^t aud jroet £()ei(cn, wobon 'der eine, ber 6i^ jur @anjenfd;a(e lauft/ ber

äugere, ber anbere / ber turn biefer ©teffe *Hi* jam %tUd)tn se&f / ber innereSRabelfranfl ifl. Sfeber befle&t au\$ j̄wēn ®efä§en, motion ber eine ben SRabrungsfloff/ ber anis bere *bic* befrucfjtenbt Seucfrtisfcct juſūbrt., ©0 oft, f<9t Krc^arb/ ber ©amcn^attec eine Jjier&orrasung *biU* bet, bte ben ©amen einfcbttcgt, unb fid) nur an einem \$unc te (Hi/um) ntit bemfelben Derbinbet, fo ift biefe ^ert>orragund bte *Wabelfcbnut*, ste mag ubriflend ftad immer für eine Jorm fyaben\*

FuRCA, f. *Die hotomia.*

FURCAE, f. i r m o . 9Kan bejeic^net jbamie Dor; }üg(ic\$ j̄t>et)^ ober bro)fpa((fee iDornen unb (ftad)dn, Wit an BERBERIS, RIBES,. GLEDITIONSCHIA.

FURCATUS ; g a b e l t g ; rut^ertfdrlmīg, fo ba§ nur bte @pt@e in 'me^rere 9(ele gctfecilt ifl. 9)?cm n>enbet e^ nur be^ n?a(\$enformitsen góvern an/ unb ja^lt bann ^emö^nllic^ bte 3léffe/ in tpelcfe etiva^ ^c; tfeeilU ifl/ unb nacl) beren 3abl *eSbi-tri-quadrifurculus* ftirb. *Furculus Caul is*, (fDatf/ oUC. 3ufa\$/ tneiflen^ af^ & // arc us'gilt) ifl baufig f^no^ npm met *lifidus* unb *dichotomus*, totē an DIANTHus *furcahis*. (fbtn,fo *furculus Surculus* an ben Sfstoofen. *Furcalia Fildmenta^* finb an PRUNELLA unb GRAMBE, *Furcalus Pilus* unb *furcala Seta*, finb an ber ©pi'e gabelförmig ges tfoeilte jjaare ober Sorfleit/ mfe an APAR\$I<A. *hispida*. Eine/urcato *Frons*, ML an IUNGERM AKNIA *furcata*.

FURFURACEUS, fU^Tn^rtīg/ wo bte Glâche mit Heinen ber jtleoe af)nlt(\*en ©c&uppen bebeett ist, lt>te an LICHEN *furfuraceus*.

FUSCO-VARIEGATUS, ft V H U n Q e fl C d t.

Fuscus, g e m e t'n b r a u n , bei WiUcenow ein SSrptii/ bandar! in'^ ©rauefcftimmtrf. »«) Bernb. taarbraun. g&e> jD^canSolIc ein jiemplt\* dunkles Braun, bai etn>aſ it)^. @ruñe iie^tt 3Jacf) aubecen dunh l bohfatben,

FUSIFORMIS, f p't n b e l f S r m f g ; eta *ditptt*, beffto D.ucrburd)fd)mitt freiSförmifl / 'unb beffcn gänger imrc&fcbnitt lanjettnförmig iff. Sin *fusiforme* *Folium* i\$ an CRASSULA *rubens*. Pili *fusiformes* Qd)ut}tribaare obcr Borften nennt man bieje\* nigen, fcfc&e fcorijontal auf enter 9BBar\$e aufft^cn/ n>ie am ^opfen. 'Sin *Pepofusiformis* i(| an Cucu-MisChale Sine Radix *fusiformis* ift etne dn, fa\*c fenfvec&t einbringenbe 8Burjel/ Die oben *bttma1>t* watjcnförmig i(l, unb na\* unten ft\* almaftlig Dcrbunnt, tote-an DAUCÙS *Carola*. ffin *Semen fusiforme* an SCANDIX. *Stipes fusiformis* an BOLETUS *luridus*.

FUSINUS, wal3cnf örmig/ abec an beobcn (fnben verschm dlerit.

## G:

GALA, mil^treif/ in 3tfainmenfeßungen au\* dem @ricd)if\*en.

GALBULUS, tfl bci) (B&tner'n cine gruc&t, toelcfe cntflebt / tuenn bie @\*uppen bed. wi'blicfien jfafec*ap\** in ©ejialt etner tfugel iufammendelteat finb/ unb *ben* bet Retfe enttoeber in ©ctilbe auffpringen/ n>ie *be*p ben Opreftten, obec in ©cftalt etner meic^en Seece jufammenwachfen/ note an IUNIPERUS. SBep ben ubru gen SBotanifxn ijl bteg tbefl\* cine *Bacca corticata*, t&eiW eineNua:, tbcIW *uitift* metfleng *Strobilus*,

GALFA, ^>elnt/ btjwhcr(ippe eincr ract)enfo^ nttsen ober matfertcn 95WW, toenntfe ettoad jufam^ wengebrücf i(l; aw\* bie oberen auf red) ten happen *eit* tter orc&iecirfifcn Slume (*Corolla orchidca*) unb. bee obere finfcfnitt etner unregelmäfigen 93Iumenfrone/ wenn er gewölbt i({/ unb bie \$efruct}tunggterf}euge bebecft/ &ejst oft CrS *Galea*. @. *Superius labium*.

GALCATUS unb GALEIFORMIS, . *toai* einen \$elm fyU ebcr t e l m f o r m t g geffaltct ifl; weé ber Sel\* an SCLTELLAUIA, t^Tcn snuubuna nüt eiucm Scctcl

**geschlossen**, anb fceffen Oberlippc nach Dec Quore \$u; fammengebrñct iff. *Galeata Corolla*, jebe S&lumt, beren £6erlij>pe ein£elm iff; *galeatum Luhuijil dtl RIIINANTHUS*.

**GALERICULA** f. *Cap illitt'um*.

**GALLAE**, (*Sallapfel*, *Uluitoudb'U* aint>erfcf)ie; benen S^eilm ber ^Jftanjeii / burd) ben\*6tic^ einec (&alhveepe (CYNIFS) e^eugt.

**GALLICUM ACIDUM**, ec<e yflanßenfâure/ berm Gitgenfcdyaft bic S^)mie Ic&it ;(5ajlu6f<!ure.

**GAMOPETALUS**, f. *Corolla monopctala* tinb *quinquep etala*.

**GAMOFHVLLUS**, f. *Calyx mon ophyllu s* imb *F oliolum*. *caly eis*.

**GANGLIONH PILI**, \$wi{d)enlëno p fh a a r e, fabcnförmigc obci: fc^elförmigc fyaatc mit fugelförmigen ^notcn, auf tvclc^en n>edtle^enbe ^aarc fid; *bcfi*w, ben / tote att VSRBASCUM *Blaltaria*.

**GANGRAENA**, ocr *f eud)t e J&ranb*, mennge^ stiffe q3flanjent^tJe feud^t unb metc^ ftcrtten / uub ju; legt cine G>dudC au^ieb'cu fallen.

**GASTEROMyGETEs** @ prengel, **Baußpilze** obcr:

**GASTEROMYCI EPi'UbenotD**, frøptogamische Ges n>ad)feo^oc @tenjjel, SSIatt, 8aub unb 2batf«^/ Oie m̄ tfercm 3nncren ganj mit Samen ober. @an<nge^ i'aufen angefudt, unb aUm mit bem Umfd)(ade bebcTf fmb.

**GAYACINA**, etn' PHBfcipium immcdiatumflji. **Classe** in ben ^fTaujcн nadl) iT^oinpf.

**GELATINA C^ompf./ ein Priincipium immadia-tum** iv. eiaflse in ben ^flanjen.

**GEJ.ATINOSO-CAITILACINEUS** J gtllicrt artig: Cnorpelig, ein SSRittebins i>^!f\*en Wa'erte nn|> ^norpcl, »ie. an# RIYULARIA und BATuACNO-SPERSILTM.

**GELATINOSUS**, gall errarri-g; ton Der Con-

fifienj einer & allctU, ober @aRerte ent&aff enb, ober bamit fiberjogen; \$• SB. *B a c c a gelatinosa*, bit eine gallertartige 3lu§tlfleit ent^alt/ an VISCUM ;*gelginosa* Fro ns,tin im naffen gufianbe toeic&er, elafiiufcjer, burchfcQeinenber 9Bebe(/ tote an ben fremellen. *Gelatinosus Thal-*  
*I us, mid) / elafitfcf}* unb burc()fc^etiienb. S)te' COL-  
LEMATA ^>offm. / PA RM ELIA *crispa, fascicularis*.  
*Gelatinosa Volv* a,-toenn bie 2Bulf! mit @allerte an^ gefüllt tft, tote an PHALLUS *irnpudicus*.

GELU Ctompf, ein Princip^um immediatum II. SlafTe in ben ^fTansen.

GfIMELLUS, GEMINATUS, GEMINUS , QCpddVtf load bicb't ju \$toeoen ntbtn einanber ftefyt'; j. SB..leu-  
lei *gemini* ober *geminati* an ACACIA *horrida* unb fcielen anberen / ROBINIA *Pseudacacia*; Antherae *gendnatae*, an CLEONIA; Bracteae *geminae* an SCUTELLARIA *plregrina*; Calyx *geminus* an MALTA; Capitulum *geminatum* an ANTHYLLIS; Cirrhi *gemini* an SMILAX *asperU*; *geminati* Dene-  
ies peristomii, locnn trimer jmci> unb {toep 6c9 ein^ aaberfiefien/ tOie an DiDYMODON; *gemini Flores* an TEUCRIUM *Scordium*; *gemini Floscnli* an SACCHARUM *officinarum*; *gemind Folia*, toelcted ctnge nur aid fpnonpm oon *binatus* betracyfen, fo bag namltc^ {mep SB(atfer an ber 3pi\$e etned 33(att; stieles stie&en/ tote an ZYGOPHYLLUM *Fabago*: anbere als flatter bejetc^n/ bie iijiner unb. becfeiben' @ct>et; bt ju jtoetjn bep einanber p|en/ toie an PIN us *syl-vestris*; anbere aid SBlattcr ,\*&ie olo§ na^e neben etn; anber fie&ett/ toie an SOLANUM *nigrum*; Fructus *gemini* an CERINTHB , ASCLEPIAS J Legumina *gemina*. an ASTRAGALUS *ammodytes* u. m. a. Ge-  
minatus *Pappus*, geboppeltd §eber\$cn/ bad aud jmet) emfac^en aber oerfcftiebenen 91rten ton *Pappus* beffe&t; s,-95. aud einem tinblättviQtn felchähnlichen äugetcn, unb einem £aavfcrmigen inncren 'an INULA

*Pulicaria; obit aug cinem felc&a&nlt;&en \*unb bovnU Qtn, Ut) GEKTAUREA Benedicta ; obcr auf einCitt ge\* ranbcldcn unt) feberarfiflen / bep GARLINA; geminati P edunciili, at! CALDASIA helerophylla (rfttfi BONPLANDIA gemimflora); inC geminala Radix bulb o sa an ERYTHROJVIUM Zfc/25 cdft/5 , tpo jtV^9 Smicbeln an i^rer %aftg {ufammenftangen; gcminatae Siliculae, an IBERIS, BISCUTEIXA; geminatae Spicae, an ANDROPOGON distachyon^ LycoPODIUM vulgare; geminatae S tipulae, ftO . DC Slfttvbfatttt tnanbtv QCQcnhbct ftet)cn, toie.an VICIA Faba. gSeoBerntarbi finD nuc jtwprci&tflc Oörpcr gepaart/ geminati, xotmx auf jct>cr 2RefcC einc ^leicfjc 2ln\$a(l t>erfel6en ftc^L Sllfa g(etc66et)eutent> mit jugus. € a, blnus wnb diiplicadus unb didy m u s.*

GEMINIFLORUS, f *Binifl o rns.*

*GEMMA, S n o e p e , (unet^cntlicf) 5?nopf) cfinacfr Linne ctit auf iem ©tengel bfttnblit^ti Hybernaculum, mlct)ti auf ©cOuppert 6cf?e^t /. fcte enemeOer un# cntrotrfcldc flatter/ 33latt(llic(er oOcr S3(attanfa@e, obec SUNbtntnoiptn tnibalcn. .Scorn wftm Srfd^emm ber; fel6cn itennt man fte ^ugen, 7&tnibatbi nennt Xnoapen mci(len< teffularifc^e / bod) and) tans\* ZfoiU, todefte ft\* am ©trunfc, qn t>cr 5Surjel unb am ©fam; me / juhjcilen fclbst an SMutbeutfteiUn befiuben. SJfatt nennt abet aurf) Wejeniaon Seime, bte an Dec SBurjcl ftnb/ unt) bie tcine Stattln. ftnb, Snodpen. 3m toeiteflcn ©tnnc beflretftTep. (B^rtner'n bie Xntepe, Gemma, bit eigentlid^e Tsnoept, unab feinenfifem-gyius, woju er Propago, ben eigentlic^en Gortgylus, unb bre Stctebci cec^net; im engecen ©tune nur bie BIutfcenfnoBpen, Oculi, im engf{en nur bie BUTtfnoapen # O c u I i foliiferi. ".*

*GEMMACEAE PROPAGINES, ftnb bet) Kotfr jene Corner an ben (fcramien, tic man beo eittigen ges giiebcn Slrltcn berfelben in ber inneren ©ubjianj eins*

jetn unb serffreuf antrifff, unb bie ben \$rud)tförnern der <£ onf erven gleicfoen / aber ntcfjtin befonbern grucht: fd)l5ud)en, fonbern in twiblicfoen .unb mānnlic&en **G**ns bitrbuen angetroffen werben.

**GEMMATIO**, iff 6e9 .ftiññ^ ber £ a u ber **Knospen**; Die 2lrt unb SgcifC/ tmie fie oug 5?la«crn/ **Blatt** anfageu, Slat^fielca unb 6d)uppen gebaut fmb; bct> S)ccaiibolle Dae; Qeffnen bet S£||o\$vtm, ti)tt gage, unb alie .^no^pen itber()aupt an einec ^Pflanjc jufammcu^ genotymen.

**GEMMIFORMJS**, fnoapcrt'form i'g , fo nennt man j. S3. bie mānnlicfyen 53lumert an ben **Moosen**, bie/. tvteam HYPNUM , nic^t am Sabe be^ **Stengels**, fonbern jut ©eite in ben 35Iattrutnfcln, trie **Knospen**, fi&en. ^

**GEMMIPARAE** \*>LANTA£, ^(**Tanjenbie Knospen** btia^cn: a(fo feime einjabrtgen / feine tropid^en. **Ben** anberén, \$Pflanjert / bie ftd) nur butd) ^no^eit/ nid}t durch 6amen fertpfTanjen\* (06 eS fotc^e **Pflanzen** gibt?).

**GEMM U LA** Hic^> / S n 6 6 f> ^ rt / jener Theil **dgs** Sebecc^cn^ / bet übtr unb \$n>ifd^en ben **Kotyledonen** \$tU\$tn tfl; · Die erf'e jtnodpe · Der 53flanjc. Oc^ tocbnltct) nennt man biefe Xfclbst fitnf) bai febercfeen, (plutnula) inbem man falfcftltd? glaube, bie **Samens** 6(åttfr enffprångeit t>oa bem ^a(fe bet 2Burjd , wåhs renb fte\*Dod? jebe^mal/ ttJCmi fltcict> ofrerg hur wenig batwn entferne / fid) übet 4pel6en beftnb. Gem- 7/in/a S n S e p ^ e r t / neinn&irtf <bm Slnfang eined ncnin tyftc&, ber in bem fflattnihl (tegf / unb au8 bentticbtn > obfdjon fd>r fleinen Slätern bejlebt

**GEMMTJi,ATio**, <fnfnrttfetung bet *Gemmula*.

**GENERATIO**, 2(ct bed 3\$(üben6.

**Genticus**, toat \$ti einer ©attung flet)6rt. *Generhum<sub>m</sub>Nomen<sub>7</sub>* bet 5)?abme, ber aaen ptonjen/ bie ju einer ©attunfl ge&Sien, eigen ill\* · ©o ftaben i\*

**G. alle 400 zur ©attung £n.\*ca ge56rt3Ctt ?)ffanscit  
Deu ©attungSnamen Erica.**

GENICULATUS, gelenfig, iff *btyhinne'* phil. bot. ed. Sprengel batfjehige/ tuatf gegliebert iff/ o(ne an ben ©Hebern aufgetrieben ober eingejogen ju • fei)n. 35cp tDillbenoto, Bernfcarbi unb ben meiffeti *hbtiQen* SSotanifern iff bamit bie 3fbee t>on einer \$rüm\* muns ober SBiegung in einen 9Sinfo( tierbunben, unb fo fdjeint e^ aud) jSLmné genommen ju ^aben bet) *Arista geniculata*, gelenEige ®ianne# bie in bee ®?c«e rait ernem ©elenfe berfe^en iff, woburd; ftē %ge^ bogentoirb, nrie am <^afer; %eniculaius^Caulis, ml*<i>t\$ VPillbenow fficnge n>ie '@prengel oben bet)* £inné erflarf, {• 95. HIPPUIUS yulgarb. Bat(ci) unb KōMtng rooDén aber, bag t)a^ eine €nbe bti ©liebeg bicfec fcp\*. \**Culmus geniculatus* iff fvno? ni)m mit *infract us*, an -4LOP£CURUS *geniculatum* *Fila geniculata Ctlavch fid*) to'U t>ie folflCttte Frons.. *Filamenta geniculaia*, ftnb\* (lit SALVIA. *Geniculata ?rons*, ncñnt tDillbenoto benjemigeii/ ber in ©clenfe abgetbeilt'tff, twobep tv nod) bemcrft, bag berjenige Sfyiil, mobie ©lieber u jumfengenzogen finb^ (gelenf, (*Geniculum*) fl<uanntroirb. Dies iff.abec beo ^ayite'n *articulaia^rons*, unb g'e\*.. Ienfig (*geniculata*) • iff bep biefem nur jene tPebel, 6eir fo in ©liefiec abgetbeilt iff/ bag ba, . »o \*iefe jufammengefusat ju fepn fcftetnen, berfclbe webec ^ingejogen nod) aufgetrfcb.en iff/ n>ie an C/«AMIMUM Mu m. *Geniculatus Pedun culus / bit* ©CtCtlfe unb 3lbäge bat, ober geSogen iff in einen St&nfcf/ tvtc «n ben meiffen ©eranien. -Pc/a/a *geniculato-patentia* jinbanlRis, *PiliunbSeta genitulata* fino fepelfonnige / burc^ Slbfa\$e getbeiWe £aare/ tt)ie an ben Surbiffen. *Radix geniculpta* bie in Gfliebec abget&eifl iff / a|xi welc&en SffiuWlfafern hervorbringend, j. s». an GUATIOLA/ \$aupfl ttivb *genicu-*

*latus mit articulatus, flexu osus , nodo-sus unb infractus . tjettoec&fekt.*

GENICULUM 3 (*Be lent*, jenet \$uncf / n>o jtoeo ©liebet eine^ flelenffgen Sbrilett jufammenflogen, Dec abcr toebet cin^cjo<5Cit, nod) aufoettieben fei)n barf. 9Ran fcettoec&felt e^ nid;t nut mit *Artie u I us und Nodus*, fotiOecn fclb^ raKinyu/ui, SBinfcl

GENITALIA, fficfc^Iec&tst^eile der **Pflans** Sen ; t)te ©taubgefa^e f>i(t>en ba\$ Genii ale masculinum an ben ^banerogamen / bie Qtaubwege bai Genital e femininum. S5ct) £en Jiaubmoofen ftnt) jene **Die Filamenla.** unb **Spermatocy stidia**, t>efc ba^ **Pistil ium.**

GENITURA, f. Po Z^en..

GENUS, © a t t f n g , bet 3nbedtiff t)on Wanjen einet flewffe'n ^rbnung / Die aemffe gKetfmale an ib^ren \$mctificltion\$be|kn mit einanbet gemein baben. *Genus summum*, btt) Kaj unb Kt'w'n ift *Zoume*\* fort's *Or do*, *JLinüee Clasiis*; *Genus subaltcr-jciuum* Kaj unb Kt>m ift ^ourjiefort'\* *Sectio*, flinné'e *Or do*.

GEOBLASTAE^ iEr bfeime, tt>o Die ©amen^ lappen untet bet <ftb,t bleibm, n>ie an bet: tt>tcfe, ffirbfe, ben (Brifrrn, «'.

GERMANICUM CLIMA,, b eu tf^es Slnta/ n^ne ^>ayrte ba\$ Jtlima 'afler jenet Sanbet an bet notblicfyen ^emt^pbare/ bie in Sutopa \$wtfld)cn bent 60° untf46°9?. 95./ in Slftenunb ametifa jmifyen bem 5i° unb 46° 3t. S3. liegen. S)ie ^Jflansen bife\* ^H^ ma\$ fpmmen bep tm\$ aKeim greocn fort

GERMEN, frud>t Bno. t e n , igyerflocf ifl 6et) JSlmé bet Slnfang (*rudimentum*) bet unteifen Srucfct in bet Slume, bet gtucfttbuffe n>ie bti ©ametr/ tvelcbet ju ber geit eorbauben ifl, too. bee ©taubbeufel ibrcn qjöBen autffffäuben. dt ifl jenet I&eil be« ©taul\* MM\*\* obec ©temped / .bet, bie ®aft£ befe(ben bilbef/ unb bie \$ubimentt bei: funft^ci? @amen ein f) (t^ ^.

*Hint nennt bie einjelen. ga&er be\* gruc&tfnotenS Germ in a. 2(nbere bejeid&nen mit bem SRamen Germen ben .Slnfang irgenb eineS neuen SBefenS ober ete net neuen Organeg im attgemeinen unb jumeilcn t)l)pot)tt tifc&en ©inne. · ©after ift Germen bet) ftnenfomo^J ber Seim an einem ©amen / al& aucfr .bie Seime Blasti an einer SSurjcl, unt> felbfl bie tfnogpe im weitesten ©inne. <S. Ovarium..*

**GERMINATIO**, ist ~~beg~~ jStinne bie 5 £ i V WcJc^e e(ne ^flange noting bat, bi\$ ffle unter gunfigen Itm^ fianben ju feimen anfdngt. Set) anberen ber. ?(ct be\$ j^eimen^/ in n>etc^n ctn iceifec 'geb&rig befruc^teter ©ame auffc^mittt, Unb fm Seberc^en aufmärt^ über bie &be txeibt. 2)ie Sauer\*be\* fleimeng wa^rt nad) iDecanboHe bi^ sum 3S\*rfc&tt>inben ber ,Rotolebonen/ bie abet nod) an manner btvtitd famentraflenben ^flanjc jumetlcn jugcgen finb.

~GIBBOSUS, GIBBUS, & 5 cfcrig/bu cfcli's ^ a ^ sich in ber 9D?itte plö^lit^ naç^ einer @eite f)in tetWcft / **Bernhardi**; mad unregelfna^id 6ier unb ba an einer ober an benben 3citen aufoetrieben ifr 2tn *Calyx gibbus*, ber gwotjnlicf) nnten unb am ®tunbe in ciae berborflebenbe runbe Sr&abtnbeit. aufgetrieben i|l/ id an TEUCRJUM *Botrys*; *Caul is. gibbus ifl f}nont)m mit nodosus an PELAAGONIUM *gibbosuin*; *gibbae Cotyledonesy* bie.erbabett/ aber tteber fab^ evsför mig, noch halbfugelför mig, noch halbwalzenförs mig ftnb; eine *Corolla basi gibba ifl* an VALEHIANA; ein *Folium gibbum, bai* auf beoben ®eU ten fefyr flarf \$etoδlb/ unb itic\$t Did länger aid breit ifl/ ifl an SEDUM acre, MESEMBRYANTHEMUM cchU natum; *gibbum ReCep taculum* an BELLIS; *S ilicula gibba* ober eigentlid) *Valvula gibba ifl* an COCHLEARIA/ unb einc *Siliqua gibba* an. **SISYMBRIUM Nasturtium.***

**GICANTEUS**, 'riefenm&gig. · Eine fchr hohe, zugleich aber auch nach allen Dimensionen Hath Pflanze.

GiLvtts, iff 6et> 4m̄nq' em @elb, bad fc& bem SKofffarbenen obec Orferfarbenen na&crt. S3et> anberen etn in'\$ SXotblidK \$iebeiibe\$ Slfcftgrau. 35et) anberen afdjgrau. 93eo ,ambiren faljilflelb. 3><>iel iff VER-RUCAJHA gifoia.

**GLABKLLUS** & *G.labriusculus*.

GLABEH, *unbebdavt, toa\$burcfcaug fein Haar hat* / im @eflcnfagc. jebet SJrt t>on baarigcc **Bekleidung**. Man t>ecn>ecfle eS 'ja nicst mit glatt, laevis, we c\$. nad> llinn&e @cpntionen leicfyt rnōgtid) māce; t>enh £im n̄c bc̄jiniert phil, l jot. ed. Willd. *Caulis glaberhtvatlftintvObetf&bt'dlQtlbilgevis)* iff/ J. 35\* IM PATTENS', unb *FolhiM\*glabrum;* »KOC& an seiner Oberflaifteglatt(/ae^e)ift, obitealleUnebenbc<t. " Erst an Cittfm an5cren £)r^> nr^o cr^>on 3lnftfbefen fpud)t (p. 2551. c.) ffccflt fr g I ah rum bem lomentosum gegen; fiber. Set) Bem^\*iff ^/afterfouonommit lubricum. Noch heute verwechselt man bei) bem 91u£btucfe 5 c - *m in a glabra*, bit man aU @amen beffnicr't, n>c(d>c tt>eber @lanj nocb ilnebenbeiteti &aben/ *Semina gla- hra mit laeyia; benn e\$ tann tttoai bbd)fi grus biges xxnbc^aavt, g I a ft e r fepn, fo n>je etn>ad glän^ zend glatce^/ ratiad} &a\*rig.* Etn Becepta- cù lum giabrumy barf ntc&t btog feme £aare, sonz been ancft feime @preublätte^cn baben.

GLABRATUS, n>ad fctne fyaaxt Derloren **hat**, **Fa b l i s t.**

GLABRETA , t ntnnt man &oc6(^enbe, ttodmt, bürce / t>on bzt&onne au^efengte, tttoai ebene **Pläze**.

GLABRITIES, DajJ Idbl feon.

GLABRIUSCULUS, tt>a\$ bepnabe unbefaart **ist**.

GLACIALES PLANTAE, ^Pflanjen awi bet **höchsten** Sltpencgiotn Set) mebreren fpnom)m mit *alp in a e frigidae VLlt> hyperb oreae\**

GLADI^TCJS, fib'e lf or m i g, n>enn trgenb ein (Sorpec febe jufanimengebrucft iff; un.b feme bet)ben @eitenfartten% fo flavf frerfrcrftmngen, bag fie bee

©c&tteibe eine\* ©c&wertw 'abnlcfr *toctbcn*. jDecanboile. SSct) 35l5ttern if? eg ftotfl oft 'fanbrnjin nut *en's i-forme*. *<in Legumen gladiatum* ift an #Do-LICHOS *gladiatus*. Cine *gladiata S Hi qua* fci)Cl. etnige an GLEOME *ardbica*.

GLANDACEUS, eic frelbraun, ttjeiglidjbraun.

GLANDIFORM is, e 'td>eIf 6 rmí g, ftad nad) bcm @runbe bin auf • einmai ffd> ©erbicft«

GLANDULA, 2 } r ü f e , ncnnnt man im aDdentei; ncñ ti-genD em Organ/ *bai tine* g(ufl'c^f<U abforIDertt fed. ©cttotmltcf) finQ ed faft *tydtlianbc* oboe · länglis &)t unt> bec^erformidt f(eifAi^ bicfe ^örpetd^en von terfc&fc̄tenec Sorm. 5KahTtennt,aucf> Heine Höcker, bit ©rufen å&nlie& flnb., Srfifem Mirbel unterschei bet Sellers. unb (Beflgbrüfen. 59?an trifft fie an ben t>erfc&iet>eoften Sweden bee SPftonjel *IGlandula nectarifera* f. *Nectaradenium*. Glandulat. *Sffuamosae* (*Buettatb* f. *Indu.sium*). N # -.

GLANDULATIO., id bet) linne affeS tiag ©rufe &eißt; bēe eigentlidben JDrfif'en unbbte *Follic^i* unb *Ulriculi*.

GLANDULU'ER, brüfig 1 brüfenträg.en&, ft)ag ©rufen tragt, \$• SB. bie *Filament a inter iota glandulifera* an LAURUS, *apice* an DICTAM-NUS. *Glanduliferi P il \$*, Die eihe obec mebcere ©rfo fen an ibrer©ptgeträgen,looker bann bltScabrities *glandulosd*, ttJie An KIBES *Grossularia ic.* &X)t|Ot ni)m mit

<sup>4</sup> GLANDULOSUS, brüfig, wa« ©rfif'en baU obec ft>ag aug Srufen befitbt; *glandulqsus Aril I us*, bee einec fleifcrtoen £)i?ufc flletc^t / in fteldjer ber 92a; 6el be« ©amen\* fifct, j : S3, XYLOPIA\* *Glandulosn Folium*, iff be^. jSLmne em Slqtt/ auf tt>elc&em Scufen fieen/ entmebecap ben e«seia^&nen/ tofe be» ben tPeiben unb ·iWianbelij:, ober an bcm Stiicfen, Die bei)UREWA; *glandulosus Petiolus\** 6ec met Drüsen besetzt ist, wie ati *Paukus Padus*. Ein

*glandulosum* *StigmU*, mtt ©ruf&ett/ bit eittCtt ©aft abfftnber 6efc§t, rose an POLYANTHES.

**GLANS**, i£id)el, nmnt man due flrifcyige unb **st rkmehlhaltige** Snuftt/ Me in *cincm* efnjaen gac&e einen einjigen" j?ern ent&alt, beren §ruc&tl)üUe **innig** mitt bem jferne gufammenfdngt/ unt> bie *anbtt* **Basis** in erne 21rt t>04t ieberneni 3^cy>fd)cti euioefegt ill / Die man *Cupula*, *ttapffyen* nennt / unb tt>e(cbe^ Don ben ©cftuppen ber ^itHe gebilbet tpirb. ®ttf)vtxt 95otanifec-tet^en bie ^tc^cl untec jene gc c&te/ bie fte ^Tug nennen. 3lnbere nenncn bie ^nic^te bee £u<\$e / ber <5>afehnug *Glans*. *Glandezbvand*)tn einige **flatt** *Glandulae*.

**GLAREOSAE**, \$(Tan\$en bie im ©c^utte tvac^ien; im ttodnen ©teinfleroffe.

**GLAUCINUS**, f. *Glaucus*.

**GLAUCUS?** (in Sufammenfegungen au^ bem @rt^ estifeften ^Zauco^). cm (Btaugr rt/ bad fid> bem **M ergr nen** n fyttL @r nlic^grau / ftie an GANNA **glauca**, ERYNCIUM *maritimum*, unb ben metflen **Seestrandspflanzen**.

**GLOBATUS**, f\* 'Globosus\*

**GLOBOSO-CLAVATA PARAPHRYSIS**, iu g 111 **g feu;** len f r m i g / ffl ber ©aftaben, toenn er auf tu\* aelisett©liebern beflefet/ ton beneh bie oberjlen am gr ^ten flub.

**GLOBOSUS**, \$ a g e 11 g , tt>ad, meftr obec minbet ber SJorm einer .ffu'gel fld> ndftert SBep Bern&arbi ijl *td baiitn'Wf* beffen ©run&fTa ^e ftcb in ben 21bfcf)niſt dner 5tuflel enbet 3J?an &at ein *globosum* *Amentum* an PLAT ANUS *occidental is*; tint Anther a *globosa.an* AESCULUS *Hippocasla'num*, MERCURIALIS; *tin Ant ho dium globosum an CENTAUREA eriopho^ra*, .CNICUS *eriophorus.;-* *globosa Ap ophysis* f n>enn .bcv fugelrunbe Slnfag t>on ber 33 d;fe getrennt# uub fianj obne ©amen ifc / n>ic an SPLAGHNUM \*j)hac-ricum; *globosa Eacca*, an .ber @ta<fcfelbeere j

*globosus* *Calyx* *an* HERMANNIA *hyssopifolia*; *globosum* *Capi* *tulum*, *an* NAUdLEA *aculeata*, COMPKREINA *globosa*; *glolosa* *Capsula* *an*, ANAGALLIS; *globosa* *Corolla*, *bit* *not* *tt>cnbt9* einblatfrjg, unb unten unb oben sufammcngejogen i(t, an HYAONTHUS *botryoides*; *globosus* *Fungus* *an* LYCOPKRDON *Bovista*; *globosa* *Glandula* *an* CHENOPODIUM; *globosa* *Glandula* *nectan/era* *an* BERBERIS -unb *an* fcielen Qfltquofen; *globosum* *Nectarium* ifimet; ftcn^ gleic^bcbeutenb mit bem tortgem *Globosum* *tomum* dbCC tielmc(r Pepo i(l- an CUCUMIS *colocynthis* imb Dudaim; *Radix* *glob o sa* (ft an etni^m ©orten Don *tDinttinttiQ* unb Hube, an BU^IUM *Bulbocastanum*. *Globosa* *Uadix* i(i bet) *tDiUbeñoxv*. ft>nonpmmit 5 uiro^unef a: On Rcccpfacii-h m *proprium*, *globosum* ift an LYSIMACHIA^ eirt a^nlC^e^ He ceptacul i»m co mmune an' ECHINOPS; *Semina* *globosa* finb bit Jgrbfen; efne «yilicula *globosa* ift an CRAMBE; 'erne *Spica glalosa* an TRIFOLIUM prutcnaz; tin *Sligma globosum* an PRIMULA; 'ett globosus *Strobilus* an IUNIPP. nus; ein *globosum* *Tuber* an SAXIFRAGA *granulata*, GLOBCILARES GLANDULAE, (guCttarb/ f. *Glandula globosa* unt) *Pollen* *glaucum*, Sen (Bucitarb für Sruffen ^fdt ^ n?enu er / toie an ATRIPLEX «nt) CHENOPDIVM, t&vnQ ttiitb. ' *Gloiularis scabrities nanntegdinne*, bey bemand)gl obul arts fugelig (*globosus*) unb mit finopfd>en befet^ttebeixtet

GLOBULI, Xn&pftytn, finb bep J&ttri^atbi weiffcn^ Neine feffulariscfte bi\*te SbeilC/ biemanoor^ iujH\* am Stengel unb an ben 95lattftielen finbet.— S5ei>tDi'Ubenow Heine fu3elf6rmige.frufienarfifile auSber 6ub? ftanj betJ *Thallus* erjeugte j?Sr»w, bie mit beffen SCarjen iufammengetoadjfen jnb, unb am gnbe(?e(>enbe/ ganje, ougfaDcnbe Srucfrfbebte bilben, bie nad) bem Slug; fatten an b<m \$baHug ber fici)cnc ein @rubcl)en jurutf; b f k / wie an LICHEN *farinaceus*, ISIDIUM, Auch dic

Jugelartige. Kapfel an ben ^ungermanm'en iff be»  
**Giecker Globulus.** @. a. *Glomcrulus.*

GLOBULOSUS , n>ag einec Heineq \$ugel aleidjt.

GLOCHIS , V P i b e r f c a f e n , ein ffcifeg ; f eincS  
**Haar** ttüt frurucfgefjdjagcnen ot>er jurucfgefrumm̄ten 9lc-  
 lien , juroetfen an bcr &pi%e pfeUfbrning, ober tloS  
 ji grürfgefriinimt / n>c ^n JVIYOSOTIS *Lappula*, AKGXUM  
*Lappa*. Sei> ©prcngcl tl eg cine fteife S5or(ie mit  
 jwriiifaefrūmmfcu feinen ^aren. ^cp anbrcn Heine  
 ©tacfjcfn mit boppelten SCibecfjafen. ©• *Ha THUS.*

GLOMLRATUS, qcinciult, tt>a8 in einen o&er in  
 mc^rere itnauel jufammcng^äuft i(l, toti bic SSfumen an  
 CAMPANULA glbmerata<sub>P</sub> ^ine glomerOla Cyma i(l  
 • an HORTENSIA ; eine *P an i cut a glomerala* , tu'enn  
 bit Witipt au\$ ^togen ^tiaueln (*Glornerulus*) btftcbt,  
 on DACTYLis *glomerala*.. SRan f)at ajid) einen *Ba-*  
*cemus gloweratusy* unh eine *Spica glomerala*  
 tft an URTICA dioica, PANICUM italicum. @. a<sub>P</sub>  
**Gonglomeratus, glo bos us, capitatus.**

GLOMERULATUS, IOCL\$ Hetne ^nauel ttd&t ober bilDet

GLOMERULUS , 7s 'n\*a u e I / eine \* Sufammenbäufung  
 fleiner unanfcftnltcftef / meifien& unQefiitltev obci tuv^  
 defneltet 23lumen in &c<la|t tivxi fteinen &opfeß / Don  
 tt)dct>ejn et nur hürdy feme iVlctnbcit unterfcijiet>en iff/  
 tbic an t>iclen (fbcnopobicn. 3. a. *Globuli*, tpU  
 bet) ben Sictencn bie *Glomemli iftttt* beigen. .g?ep  
**Bernhardi** iff *Glomerulus*, Snaul/ jene 3nflo^  
 rescenz/ in n?e!d;er jtgenbe 95iuff>cn in ben SStnfeln,  
 welche bie Sictfe eine^ Aemcinfdaftlic^eit 3(umennffie(ed  
 bilden / uhb an il)rcir@pi6en ftd) beftnbeh.

GLOMUS iTIartj»n , DoDfonimen cuube i?6pfc&en.

GLUMA, 45al g , Q p c l j e ', nannte /iinfie 'ben  
 jReidr> ber (Sräfcr im fēnec philosophia bot,, ei^e  
 S!rt t>on :>He an bec SSafitf ber.2let)rd)en, bie eine obfc  
 mehrere SBlumen in fid) fd)Iiegt/ tmb gctv6(>nlict) au^  
 zwen! uuglctc)cn ^tūcfeu beffe(t/ toow)ii 'b<^ emc inmiec  
 etwas über bent anbmin ffefec 3m Syst. Veg. n?ie in

Spec.pl. nennt er abet érne *Gjuma*, *bit* 2.ji\xere qaly x, 7\$eld), unb *bit* ajibere, *bit inn ere* (corolla) *j&lumenfrone*, unb lägt beybe auf *Qpel\$en*, *Vctt-vulae*, befie&en/ fo bag man'tm Seutfc&en jene Xeld>fpel3en / biefe @pel3en *bet* Blumenfrone nw ncn• fonnte. £>ie Xekfcfpe&e/ *Gluma Calyx* iff jumeifen nur etnfacb/ *chrieln*, unbimmer bkfer; die @pel3e ber *flumen\$vołe*, *G turn a \*Cor oil a bit* froſt meiftmd au\$ jn>ei) ©pdjcn, *bit jarſcr, roti%[||A>*, unb burcſſc&etnenb fink *Gluma* t(l auch eine Slrt ton ffibr|;art'6 *Anihostegium*, unb bejeid)net bie ©c^uppcn / bie bep einigen ^flanjen, n̄te am limcv̄s unb DIANTHUSJ unter bcm *lpha>re» fteidjt ftnb, unb* bie' fen ;um £f)et(e eiubūOen. Set) einigeu 37et/ereu fiub *bit* inneren ©peljen attein *Valvae*, *bit* auſger en\* blogifrap-/eae, unb *baſ* ©an^e *Glumae*. *Gluma calyx.* % *Teg me TV Palifot BeauP0t6/ unb Involućrum.* *Gluma Corolla* f. *Glumcllitla*.

GLUMACEI FLORES , bie S3(umen \*n ben ©rafern.

GLUMALIA PHYLLAJ Bern^» f\* *Calyxgluma*.

GLUMELLA Kfd)arb unb 3DeBt>eaujr/ ©pe13c ber Blumentrone, ^Iiwnen Oelje/ eine Slrt t?on ^erigonium bon 'a(ṇlīc)jer Sefd)affen5eit unb ftbnlicfyem fdaut toit bie J्यe(c^fpe(\$€/ aber crimer in jeber %(ume gunācfyji.an ben, ©enitalcm '@# oben *G I u ma Cor o II a fiintnv.* *S tragulum* Pali? fot 2\$eaupoie\*

GLUMEIJLULA JDeeveaujr\_f @ pe13 4> ^ ^ / tint Slrt t>on SReftarium urn.ben ©tempel/ ix>cld)e\$and) an t>itkn ©rafern mangelt / unb aug fc&r Hetnen ffcifcf>i^ flen 'Cfcuppen b(fxcl)L 3. *Lodicula* palifot BeAuv>oi6, *Squamae Hinne'* unb 3uf(ieu, Nectarium XDillbmoxo,\*perfoon/ Kidpatb; Co ro IIa 'Fideli.

Γεννητανο A G GREG AT US FLOtf, ift 6^1) ^Ltfirié bie 3feiue, mub ba« 2iel?rc^en an bm ©rafmi/ two

t>ie\$(umtn auf einem. fabenfötmiflen §ruc&tbo&en ffe\*  
bén/ unb an ber SSafis ton einer gemeinfc&afttclKn  
©pelje umfafif wrben. *Glumosae* ttaren eine **Gas**  
milie bep £imie\

GLUTEN J&Qmpe., 2†leber/ eiflentlicl) ein **uns**  
mitrelbarer Pflan3Cn(löff (*Principium immedia-*  
*lum.*); -im aljflcmeinen a&cr. jeber ^Jflanscnflfoff / **tar**  
**flebriger Beschaffenheit.**

GLUTINOSITAS , btc & I e b r i g f 6 i t.

GLUTIKOSFS, flcbriг'/ n>a^ rait eincc **fles**  
**brigen** Coterie übcrjogen ifi / btc <i\* nur im SBaffec  
auflöfen lägt/ trie *an* PRIMULA *glubnosa*. Sbcq  
Hinne- 'unb ^)ccahbolle fononpm mit **vìscous**.

©• a. *humid us*.

GNÖMONICUS EMBRYO., W i ni elf) at en f ot\*  
tnfg'ifl ein (Embryo, beffen ©tammefjm in eincin  
vcd)ten 5Btnfct. gebogen if!/ unb beffen 5Burjeld)cn in  
irgcnb ein?m ffiimpfen SBinfel mit ben **Kotyledonen**  
ftcfct

GONGYLANGIUM, Bruttbebałter, nach Berns  
^atrbt jencc STbefl an ben 6cf)tvämmtn, n^ekfjr bie  
23rtif cincfjlidgt.

GONGYLODFS, in gowt *titif* 5fopfc^ jugcrunbet,  
**vorzüglich** tom *Caudex inlermedius* unb *descen-*  
*dens*, ttjC an BRASSICA *gongyloides*.

GONGYLUS Onn^ unb ©artn., eine einfad)e blaff^  
lofe, fall fuselformiae frfie ^no^pe/ inner^alb bee  
Siinbe ber SKutter / bie flc& nuc bur\* Slltec ton &r  
treirift / njie an ben |X|ven unb C^ngem ©ie **soge-**  
nannten ..ffapfeln an ben (fer^nnien ffnb na<\$ (B^rtnerrt  
6log · *Gongyli carpomorphi*. - S5fl). 2(c^ariua iff  
bagjenfae / toobutd) bie ?5(ed)tcn fid) fortppfanjen, bloff  
*Gongylus*. €c t>erffc&t ^terunter fugelformige bunHe  
Jtörperecfren / bie fonjofel burc^ bie flanje innere ©ub?  
flan;, befoubert an ber 9i(nbe ber glecfjten, ate and)  
nic&f fclden auf ber £fcerflac&e serffreut fiinb, bie abet-

**dorzunglich häufig** in ben gruc&rte&alfern, (*Apothecid*) twrfommen. ©.a. *Spora* unb *S.em* en.

GONIODES, ecf īg; nad> Berntarbi, h>enn an dr̄em jſörper brep unb mestrere Släcken in einem 9)uncete zusammenstoßen.

GONOS obcr GONU\$, ecf īg, mft rundlichen stum; pfen @ratf)cn; in Sufammenfegunden mit Zahlwörteru, tvobtird) man Me Øraſſ^ ofcee (Sefeu jn^It, &/- t r i - te l r a gonus. (S) An gularis.

GONOPHORUM, eine Verlängerung des Receptacelum o^cr 5boru« / n>elc^e tam Grinde des Kelches oufffeigt, imti bie %lnmtnbl&ttic, tie etatibgefaffie und ©taubmedc trågt. 5Kan fiebt biefe« Or&an iam bcut? lidjfttn on' btn CAKIOPHYLLACEIS, befonbecg an ben ©(lenen.

GOSSYPINA S&Oftipf/ Ch Principium immmediatum II. (fl̄je in ben tpflanjen,

GRACILGSCKNS , fd)lant r nennf man bfe Zweige an ben 39)oofcn / n>enn fie in eine (ange t)ecbünnte Spize fcdfr enben, ttie an HYPNUM iriquetrum.

GRACI us, fd;I ant, ivaſ lani] unb būnn ober schmal i(l; i» 3, A men lum gracile^ būnn; bag lang unb fpafam mit <2d)uj>pen bebedtf unb berbått\* niſmåſig ju. feiner fånge fefrr bünne i(T/ toce an QUERCUS pedunculala.

GRAMINA, (Bråſcr; natürlic^e glaffen be» ben afteren SSotanifern.

GRAMINEUS, gr a s å h n l i d y.

GRAMINIFOLIUS^ was flatter ſpat/ wie ein Gras.

GRAMINOSA, ©r ^ a p l å g e , mit ©rdfern übers tt>acl)fe;ie ©tellen.

GRAMMA, f Line a.

GRAMIVIPODIUS, f Line atipes.

GRANATUM," ifi bei ©copoli bie boppeſſe, bide, bie bie (Samen ber (©ranatåpfcl umflibti bie auſere ifttoxU obev UbhavtiQ / bit inneve ſaſtig.

GRANDIFLORUS , g r o g b ' I u m i g , toai **größere**  
Slumen brfngt ate bit fcertoanbfen Slrfen; \$• SB. STA-  
**FELIA grandiflora.**

GRANDIS, f, *Magnus.*

GRANIFEJUJS/ n>a\$ fletne flornc&en fragt, tvie bie  
**Klappen** an RUM EX *acutus*.

GRANITICAE, ^Jflanjm Die nur auf ©ranitgebirgen  
**vorfommen.** 3\* ^5» GENTIANA *carinthiaca*.

GHANOSUS; E or n t g , n>enn flemlid) gleicste Jbetle  
**nach** alien 9tid)tungen ftn untec cinanDer tcrbunDen  
finb, unO i6c, S)urc^meffer ctma^ fiber erne SSierterf  
Since beträ^t. Bernfc\*

GRANULA f, *Sporulae* unb *fructifer a*  
*Granula* -, unt) *Tubercul a.* *Granulum* nennt  
man auch bée i?örnfyen an ben ^lappen dniger Sirten  
ton RUM EX.

GIIAKULATUS/ f ö r n i g , toai au& me^rerent tkit  
nen runben £5rnern btfitbt 60 if? bie OOurjel an  
SAX 1 FRAG A *granulala* , auf tkincfibTntmbcfiefynb.  
©copolt nennt bie tfnotten art ben SERbäpfeln eine B a-  
dix *granulata*\*, unb£atf4>n)ifl eine/? a dlxgranulctLa  
ffyuppiS unb jmtebefartig toiffem 6ie n>irb auc^ t)dv,  
fid tnit *Radix aggregata* nnb *dentata*, *Jilipen-*  
*dulina* unb *Luherosat>ertt>e<\$fe(t* *Granulatus Thal-*  
*lus*, tuenn, *bai iaub aui* beutlid). bemerfbaren an  
einander ^angenDen runben &3rnern *Hftcbt*, tote an  
PARMELIA *vitellinay* LECIDEA *uliginosa*. **Ben**  
Bernta chbi *Ift granulatus*, *Qc Utnt*, **das qnt ie/**  
beffen *Obtfafyt* mie an ber ©runDflac^e {ugerunbeten  
Srbo^ungen befegt t(.

GRANULIFEHUM CONCEPTACULUM, f> *Sporan-*  
*gium.*

GRANULOSUS f, GRANULATUS. *Germ in a gra-*  
*nulosa f. Propagincs.*

GRANUM, ifi beo ^>ebwig bie tnnere <^aut be£  
*Conceptacuum cm btn S)fcofenj* bep anberen **bed:**

wigs *Sporangium*; bei *anbwn SEfr&arb'a S porangidium*; bet) *anbcvm S em en*.

GRATUS, n>ag ar.flene&m rtec&t ober fcftmecft; \$.

### 85. OCYMUM gralissimum.

GKAVEOLENS, tli bet) *SAnni, mat naſc gaud) obec 9?otf rtecſtſ. S5ep cen SRauen i H^r a p e o l e n s, stark utti) bafyn meifle|i& mbcxlidj vicd)tnt>, j B Anethum graveolens, APIUM graveolens\**

GHISEUS, (Br a u/ cin bunHmg/ entschiedneres  
©rau ate 3lfc&grau; maufegrau bep 3&evn|>arbi, eias grau, pcrlgrau be© Koplimg / a>iÜbcnoto unt) Sprengel).

GROSSIFICATIO, bai f iu4>tanfei3en , das Anschwollen Ded ^ruc^tfnoteng naſc) t>orafi^gcaugencr S3efruct)tuns\* 92un merDcti, trie matt fa\$t / . bit <ft)tt in Qamm tievmnbilt. %eo ^Decanbolle t(i e^ ff?no^ tUm m'it Mat u ratio.

GROSS us, bid utibrunb, U^i^nti immer nur S^rper, nte ^laſcf>ctt, twl<\$e nad? alien bre\$ Cörperdis tnenfonen jiemli\*, jeDod) ſimmer t>erbt dltm\$magcl ges gen einander, groß ſind. Decand..

GRUMOSUS unt) GRUMULOSUS, brōcf elt'g, in fletne run&e ^affen getfmift; grobſötnig'. 55ep einigett iff e£ fogar flofreg. *Grumosum Albumen, ba& brScfeh'gc £rtDei0f ba\* jcoie Die Sfrotfrummcut aus ffetnen unrcgclmſſigen fid? berüftrenben f 6rndjen besteht, tote an ber 'SoEo^nu^ Grumosa Radix , i(! nach C^rgione bte 2Bur\$eI an MEDIC A GO intertexla, bit (tug tauter fleinen anetnanber^ängenben. ^nöſcfthen ju befleben fd;eint, in welc^e bie SBur^elfafern aufgetrie; gen pub\* 6ie ifl i^m fpnonprn met granulata Ra d i x<sub>m</sub>*

GUMMI, etn *Principium immedialurn* //. (Jlajfe in ben \$Y flatten

GUM MI KESINA, ein *Principium immediatum* HI. giaffe in ben pflanzen.

GUMMOSUS, *QutnmiavtiQ*, ten **Flüssigkeiten**, tie in ten tyffanjen entbalten fint,

GwrrATus, ge fie eft/ ein anterg gefärbteg 5D?abl auf irgent ciner %old)t, bag am SXante terflos\* fen ju fepn.fc^cint/ »ie an CISTUS *guti^atus*.

GUTTUH, (D u r g e I / 25 e 11 e/ Me fficrtfefung ton außen nad) hincn an fcer Unterlippe eintger ma^ fierten 95lumen / tine an ANTIRRHINUM, LINARIA.

GUTTURALIS, tp'a^ im ©c(lun&e brennt.

GYMNOCARPI/ f# *Fungi unb Pileus*.

GYMKOCIDIUM, *btt&ider*, bet untere Ma^ Theil einer ^oogborfste.

GYMKODISPERMAE, 5ppanjm ntit jttcp narf(cn ©amen beo Boer&aare. .

GYMKOMOKOSPERMAE, \$flan{en mit einem nacf; ten ©amen.

GYMNOPERISTOMASI, Bn'bcl/ SRoofe mit nacf^ tcr, ganjer Sttünntmng, o^ne *Sâbne*.

GYMNOPOLYSFERMAE, 5ffTanjn mf( tielen nachten Samen.

GYMNOS, in Sufammenfegungen mit firie\*ifcf)cn SBörtern . n acf r f. *Nudus*.

GYMKOSPERMIA, tie I. Orbnufig bet XIV. (Jfafie bet) *SLinnć*.

GYMNOSPERMUS, nacf tf a m i g , n>ag nacfte @amen trågt. giflenflicl) gibt e^ aber feime nacfte ©a\* men/, fcenn n>enn aud) ber 5'rud)(fnoten ftd), trie man sagt, bep Den natffamijen Vflanjen in (2amen terttan^ delt/ fo fiuD ^od) tie ©amen immer mit fyautcn bo fcecf. f. *Miorobasis*.

GY MNOTETRASPERMAE , Boert, / f. 3ftc rob as is.

GYMNOTHECIA, jenę glaffé ter ©c&rcämme bep perfoon, an ttelcften ter ^c^cbtboten / ter ©cfyroamm fclbf/ offen iH/ unt an einem gewiffen Ibeile tie ©a\* mentapfelfi/ *Thecas*, bertorbringt, oter mit einer famentragenten \$W*<i>t|QUIT* oter einem ©amenrcife befefft i|l.

CYNANDER, *mm baS &ta|xb\$cfa§§ auf btm* Ⓛrif> felft&f, n>e befl ben Ⓛrd)iben. tPeiblid^ mānnlūfc iff 6ei> SXector 0prengel fetne JDufeogamie (*D.icho-gamia gynandra*) ttwm bie twibfifcten 3eugungs; t&cile ffd> frū^c alf Die mānnlic&en auSbilbcn.

GYNANDRIA, bie XX. (Slafle cm 2inne'fc6eit **Gy-**  
tfcmc, unbOrbnungen tn Der XXI - XXU. Piaffe.

GYNE, obtt GYNOS. f. *fist ilium.*

GYNOBASICI FRUCTUS finb^iejcniflen/ bcreti **Gās**  
cfiec fo fe&c Don einanber cntfccnt fW>en, bag fie c6eit  
fo Diele fbgefoberte grūc^fe ju bilben ftyeinen/ *icbod*)  
auf ciner unb berfe(6en me&r ober minbec ertoeferten  
*Gynobasis* cincflcfuſt flub, n>c(d)e legtcrcbie SBajtg eine\*  
einjigen Ⓛriffcl^ iff. jDecanboIIe rennet- t>a&m bie  
*Sarcobasis* unb' bie *Microbasis*.

GYNOBASIS *Decand.* SBenn bie S3aſt̄l be^ **Griffels**  
an tveld)cr bie gādjcr be^ Srucfrfnoteng befeftigt **ſind**,  
bie baburd) ifjre 35efrud;tung *tzhalttn*, fe(yr aufgctcfbcu  
if?/ wie an ben *Ochna*.

GYNOCIDIUM Reefer unb. <?>offm./ eine Heine  
SinfcfymcOuna an her S5aſt^ ber 35orf?e ber ^oofe.

GYNOS f. *Famina* ober *Focminea*.

GYNOSTEGUJM, (Bcfid>Ied>rscüller bie *SphU*  
*Un* bertvefentlidSien^efruc^tun^&iDrgane: also **Keld**,  
BlumenFrone unb tTiefrauen ober *Parapetala*.

GYPSEUS f, *Calceus*.

GYRATUS, f. *Annulatm*, mif einem SKinge **verſe;**  
&n / töte bie \*apfe( ber tfloofe unb Sarrntriutcr\*

GYROMA, f. *Tr ica*.

GYROSA FRONS, menn bat ?au6 in **unregelmäßige**  
Salten jufammenaebrāngt ill/ toie an COLLEMA **gra-**  
**nulosa**,

GYRUS, Berrifc,, f. *A,inulus* . *Filicum>*  
*Symplokiem*.

## H.

HABITATIO, QPo&nort/ bte@feffe/tt>o<Pfton\$en  
gewöhnlich toacbfen; bet) Dielen cinerleo mit *Staiio*  
obtt *Locus nnb Patria*.

HABITUALIS CHARACTEB, \$\*tlttiCid)Cn/ bte from  
*Habitus*, Dom äugern Slnfeben berflcnommen finb.

HABITUS, OaS å u f e r e 2(nfe & en bet) ben  
älteren ^otanifcrn, bte tyboftofluomite *tinct* SPffanje;  
bet) £ m n é cine genniffit (5Ieid>formigfest t>ermanbcec  
tinb-'^H^einer unb berfelben @attung jjefeörfci er Pflanzen  
in \$e\$ud auf ben ^au bei @amend, auf bie 9ct Wurz  
jdn ju treiben, auf bie 3eräfilung unb Haltung;  
@(etd}f6rmigfeU im 35au ber ^nofpen/ flätter unb  
Slfterblätter / bet äugerensfleibuna/ ber&rüfen/ bed  
5)?i(cf)^ebcn^ / bed 3Mfutbenftanbef u. bgL

HAEMATINA *Chevr.*, tin *Principium immedia-tum* II. (Slaffé in ben ^JPanjen.

HAEMORRHAGIA, Blutfturj, ennt man  
Bet) ^ffanjen einen gro^en 53erlufl ber @dfte burd) 9In^  
Bobrung/ Sinfcbnefberi/ ober turd) Serfien ber SKinbe  
unb ibrer @efäge.

HAM AT us unb HAMOSUS, *bad?* iff/ toaf mit  
**Hacken** ober fegelförmigen (leifen an ber @pi&e i>admt  
förmig surüüidefrümmten i^aaren/ SBorjen ober 6ta^  
cheln be Ufyt ift, tcit FORSKOLEA, GRONOVIA scan-dens,  
GALIUM aparine; ober tt)a^ n>ie fyadtn \$tt  
ttummlft, J\* 35. bie @amen an GEUM al^ Semina  
hamata; bie an ber @pige gefrummte \$orjie aid <Se^a  
hamosay bit Spin a hamosa an PISONIA acu-/ea/a.  
£)ecanbolle mid/ bag bie @pige an ben  
Jpatfen ettoad btcfer fci)tt mufse. Sd ifi febr oft ft>no^  
tll)mmitt unc in a \*u\$, *reduncus* unb *recurrus*,  
fogar mit *incurvus*.

HAMOSO-DEN TÄTA E SETAE, qt^&^tltt %tXi  
g el borfie nenntman fegelförmigc, t)?r Sänge nad)  
mit Säbnen befegte B 0 r (I c n, beren Säbne mit **Hacken**  
. besetzt sind, tote an GAUCALIS *leptopkyila*. .

HAMUL.VTUS unb HAMULOSUS, tm ©tone turn  
*hamatusy tocnn bit \$adm tlein flnb.*

HAM us, £>aden, unterfc&ieb Jſitfinne' nidjt Don  
*Glochis;* it rennetfogarbarunterbie *Triglochides*  
 an MYOSOTIS *Lappula.* £>ie neurten unterfc&cibent&tt  
 ton *Glochis ali* eſtffeifc^ / fptgi^e^ / etnfacfec^, an der  
 ©pifce fcrafenförmig ober tpie etne 9(nge( *gefrümmtes*  
 ^aar, S5e> anberen if! er ein an ber p̄g e umaeboz  
 ^ener ffacfteltgec Sor(fa§, nüt an bee %tud)t ton  
*Xanthium* unb ft)nom)m mit U/icu5, gifan finbrt  
 ffe an ben Bl&tern ber PARIETARIA officinalis^  
 an ben *Tselpffyuppen* Don ARCTIUM *Lappa;* an  
 btt ftnd)t Don AGRIMONIA *Eupatorium;* an ben  
 @amen Don CAUCALIS *latffolia.*

**HAPLOSTEMONO-PETALAE**, cine Familie bei Was  
 ḡendorf

HASTATUS, fpicgf^ .r mig, bem pfeilformiflett  
 ähnlich, bod) fo, ba% bit happen an bet 93af!« mc>c  
 ausgebreitet/ unb faff fcñfrccſt auf ber 5)?ttclacf;fe ffe;  
 hen. ©ner Jjellebar^a^nHd^ Sin *Folium hastatum* nennt man bafjenige, melcl)e^ bre^ecfiS/ an ber  
 Saſte unb an ben Scitn etmad au^e^5(f/ unb mit  
 abffe&enben SCinfeln Derfe^en i(l/ wie an RUVEK  
*Ac'etosella*, ATRIPLEX *has tat a etc.*

HAUSTORIA nennt ©ccanbolle {(etne ^ođer^ bie  
 ftc^, n>ie an ber f I^sfetbe (Pii^cu/a) ^er unbba  
 am @tengel 6effnDett, unb tooburch tint tyflanie fid)  
 an einer anberen fiftWten, unb a||6 berfelben SRa^rung\*  
 Steven fann\*

HCBES, geflumpft/ ifi bet) Bern^arbi/ toenn  
 bie Sinteit bti Umriffle^ ber £)icfe in Sogē an einan;  
 ber fiofTeiu

HEBETATUS, bei JD̄ecanboUe/ttag nic&t fpic^ig ist.

**HEDERACEAE**, eine natürtcfre gamilie hex} fliinne.

**HEDERIFOLIUS**, Yoai flätter »ie Ep&eu &at; |:

**B. VERONICA hederifolia.** -

**HELIOTROPI** FLORES, we t&re 6cf)eibe immer naſc  
der Conne fe&ten.

HELVOLUS, ftrofcgelbr *bat* blaffefle ©elb/ Me  
am ©tro&e.

HEMI, in 3ufanmtenfe&ungen auf bemSriec&ifc&en  
flatt tSemī, Die *fyalfitt* ton irgenb etmatf/

HEMISPHAERICUS, I^ alb Fugelförm tg^ Don ber  
©cflaU cittec *Spalbtu\$tl* 3nDejſcn mug bo\* Die gage  
Diefir ^albfugel befttmmmt angiebett t^erben / o6\*naf)m^  
lid) fyre conte^e £)berflåd)e nad) oben oDet nad) untett  
Itegt; benn tDiUbenot&'a Scflrirung: 93unten fugelig,  
oben ffacy". gift nur ton *Anth odium hemisplueri-*  
cu77i, fyit an BELLIS *perenniS)* TANACETUM ;  
ton *Calyx hemisphericus* unb ton *Hcmisphcerica*  
*Corolla*, bit ton bet \$afid an fo ermcttert ij{/ bag  
fie einc \$albfugc( bi(bet. €6cn bief? gilt aud) ton  
*Ne c tarium hemispha/'ciuum* an NARCISSUS Jon-  
quilla. 2(llein bet) *Capitulum hemispharicum*,  
das ftnonpm mit *dimidiatum* ifl, i? bie obere  
Fläche bie gemölkte/ unb bilbet line J?albfugel/ unb bie  
unrere ifl pac^ / tt)ie an STAncri#ar7neria, PHYTEUMA  
*hemispharicum*, unb ebin fo bet) *R\*ec eptaculum*  
*hemisphcericum>* an VIKGIHA , unb heo *Umbel I a*  
*Kemisphterica^* ttttē an CAGHRYS *Libanotis*. Unbeffrltmf  
flttt) *Hemisphcericæ Cot yledones* toll!ommtn  
bafbfugelförmige ^otolcbonen\*

HEJNDECAGYNIA, Orbnungen 6ei> £inné, welche  
Pflanzen mit 11 ©taubmegen begreffen/ mad dabin  
gehört, ist

HENDECAGYNUΣ ; eifweibig.

HENDECAISDRIA, f. *Ende candria*.

HENPECANDRUS, f *Endecandrus*. HENDECAW-  
DRUS fd)eint tifctiget oXi *Endecandrus*, tote es ges  
wöhnltd) f>efjt.

HEPATICUS , 4 e 8 e r b t a u n , ein *buntli Braun*,  
das etwatS in'g SXoffte jte|gt. Oft fononpm mit b a d i a s.

*Hepatic a*, £ebermoofe, finD je&t bet) QOfQbenotD Jfrppfogamiffen mit einem belaubten @frunfc, Deren- in tflappen get&eiltt flapfeln t>on einer SSertfe **getragen werden.**

HEPTAGYNIA, £)rbnunflen be p£i nné, twlcfce *tyflant.* gen begreifen Die

**HEPTAGYNU**s sind, d. h., die sieben **Staubwege haben.**

HEPTANDRIA , bic VII. GaffTe in gfnne'e i p fijens syteme, welc&e Die ^Jflanjm bëflrcrft, Die HEPTANDRUS, siebenm&nniQ, b.f). mit sieben <Stai\bQtf<\$m t)en fe^ett ftn^

HEPTAPETALUS, mitsteben S3(umcnb(åt(ern»

HEPTAPHYLLUS , mitsteben&clcfrblaftcfyen/ ober mie Reßen **SBlattem/** 'tp te *Involucrum heplaphyllum* an LIGUSTICUM,

HEPTASTEMONES, f; *Hept'andrus\**

HERB A, S r a u t / eine .^Jflanje mit weicbem, -nur ein 3abc fiber bauern&en ©tenoel/ t>on ber Sonfifienj bet 35låttcr;- fiē mad ubridend ein^ jtt?eo^ oOer viels ja&rifi fepn. fjm ©egenfa^e t)on Den Witflen **Gewäch:** fen, unD ton glecfetten unD ^iljen.

Sen &inne' iff Herb a jeneC aud Der SBurjel ents fprinflenDe 2beil einer SPfttonje/ Welder Den 0 t a m m / Die £l£tter, Die ©tuijen unD Da£ HYBERNACULUM in sieb) begreiff. *Herb a.* foñnen alfo mcfce, trie es ges ft>6bnlic^ beißt/ biojl ein unD swe^a&dge Pflanzen ftyn, Denn JSlinné fa^t blog t>on

HERBACEAE. wbag e^ Diejeni^n Vflanjen waren, Die nur ein 3)?a^ in iftrem Je6cn ©amen bringen/ eg ittögen niin einji&rifle oDer srcewå&rtige feon\*/ u. beflimmt cine pictnta herb ace a nody genauer burcj Den (Be; flenfaßt)on lignosns unD frnticosus. *Herba-* ceus Caul is iff aBerDingg Derjenifle/ Der nur eitt Sa^r jbauert, unD Dabet) n>id& iff, unD fit) (eic^e Tc^neU Den lagt/ tt)ie an DAUCUS Carota, an LYTHRUM Salt- caria. Allein Letzteres ist ausdauernd (?C, rnfia e ; .

rer jtoewjā&ris (<? )• 95et) ben tfrflptoflamiften iff **her-**  
**fcaeea Frons tin** Frautarttger tDebel, mefjr'obec  
**tminber ^effctig;** non ber ©ubffans frautartiger ©e\*  
**wācf)fe/ h>ie bic imetffcn** (Eonfer&en, *Herbaceus*  
**be\$cicbnet fewer öftertf blofi** cīne grūnc Sarbe, n>ie an  
**ERICA · herlacea,** becen S3(umen tm *Qttbfitt* unb tm  
**SBinter fltūti finb,** auc^ ben (Braegerud).

H^RMAPHRODXTUS, g t c i t t e r / iff ein *Gbttoad*)&<sub>f</sub>  
**bad** bepbe ©cfc&Iec&fer in *einet* 95lume, ali Sftitter tm  
ei.qentlid)en ^erflanbe / ' ober *totni\${tn&* auf etnem  
©tamme a(f ^?on6ct(l oeretnt 2Jucf) bei) ben jfrppfo;  
**gamisten,** n>ie bei) WKRERA, BARTRAMIA, POHLIA,  
**SPLACHNUM** n>Q man 3^ttt btobatfyttt, b« ^ biejenigen  
**Theile** t>ecetnt gcfeben (>aben, bit man fonfi bcp ben  
SRoofen mānn(tcf)e unb n>ibltc^e @efc^(ec^eUe nennt.  
**5D**an bat etn *Hermaphnoditum Amentum,* *totnn*  
jebe @d)uppe 3n?ttterblūtf)en cntf)å(t, tt?ie an SALIX  
*hermaphroditica* unb ebenfo *hermaphrodita Spica*,  
bit au£ Iautec 3tx>ttterblumcn beflic&t/ rt>te an GAREX  
*hermaphrodita*^ im ©egenfage ber 6log mānnlicften  
unb blo^ metbUc&en unb ber anbco3t>nen 3leftcen an  
biefer (Sattung. 5l?an nennt aucfr / aber fc&r unei^ent;  
lief), bet) ben rtelffaufstften Wangett bicjentgen *herma-*  
*phroditi mas cult* · unb *feminei*, an t>eld>Ch \$t>at  
mānnncfte unb tvetbUdje ©efd)ted)t^t()etle t>orbanben/  
aber roecfyelfteife uufrud)tbar flnb; Die \$ bet) ben <f,  
bie cT.beo b en.\$; jene finb *hermaphroditic* biefe  
*hermaphrodita*.

HETEROGENEK HOMOTHALAMI nennf man biejenigen  
filed)ten, beren Srud^tbebalter gan\$ aud \$liatt i\nb 9Jfn^  
benfubf{an\$ gebilbet \$u *Umid)tint*, beren \$ru\$tbef)å(ter  
aber mit einer einen jfern einf^lieffenben *Stvnbidt* tttt  
fef)cn ftnb-

<sup>1</sup> HETEROMALLUS , toajS.auf DerWiebenen ©eiten / obec  
in \*erfd)iebenen SKcf>en enefpringt / aber bod) nur gegett  
etne eeite gefebrt/ alfo e i n f e i t t'g iff. 3)?an t>er;  
tvcc^fclt e^ ^äufi'd mit (Scçunrfas. ©o &at man

*Folia heteromalla* an *BRYUM heteromaUum*; eine *heteromalla* *Panicula*, *heteromallus* *Racemusj* unb *heteromalla* *Spica*. S5fy **Bernhardi** aber bejeic&net e\$ gerabe *bat gnegeaenflcfegte*; *Heteromallus* iff bep ibm ungletcb geridjtet, noenn me&rere £inttn nach t>erfd;iebenen SUchtungen hinges U\|tt ftib.

HBTEROIDEUS, Don étner anbern ©efialt als das ftorin tg entbalten t^ Kt4>.

HKTEHOMOIVPHA FOLIA, t>erfd>ieben gestals. tere Better, n>enn gesenüberflebenbe obec brci)fact)e Siätter turn Derfc^iebenec @e(ialt (tnb/ n>ie MELASTOMA *hcterophylla*, LASIOPBTALUM«

**HETEROPHYLLUS**, verschiedenblättrig, was Blätter tjoti t>erfc>tet>enen Socmen trågt; j. **B. CHRYSANTHEMUM** *heterophyUum*, RANUNCULUS *heterophyllus*\* *Helerophylla phyllophora* Monocotyledon iff biejemige ^flanje, becen ©amenbfatt in feiner gortn Don jener ber folgenbcn Siättcc a6n>eif>t/ mie an ASARUM , PARIS K. *Heterophylla bulbifera turmifera* Monocotyledon, XQ\|t 6eo ber Dori^en, 5.

#### £5. PHOENIX\*

HETEROS, in Safammenfegungen aud bem **Griechis** ffyen flatt *dissimilis* unb *variabilis*.

HETEROTOMUS, n>enn bie Sinfcftnitte regelmäfig a(n>ec&fe(nb unsUid) ober una&nlicf) flnb.

HETEROTROPUS, tin SmbrQO/ beffen SKicffung bie Slc&fc be^ 6amen^ quer ober fc&tef fc^neibet/ unb two f eine^ ber 6epben Snben genau rait bem ^abel (*Hi Cum*). correponbcert. *Kid*).

HEXAGONUS GAULIS, fe<^Bfe 111g/ f. *Gonos* Unb *Angu laris*.

HEXAGYNIA, bie VI. Orbnung t>on *tLinne's System*, in melc^e biejjenigen ^Jftanjcn ge&oren / bie

**H<sup>EXAGYNYUS</sup>** ^ 0 w e i 11 g, 0.6\* vxxt 6 Staubz wegen versehen finb\*

HEXANDRTA, bit VI. Glafie 6et> Zinné; Pflanzen, bie babtn gefooren, fint>:

HEXANDRUS, 6 mānnig, b. &/ SPffanjen mit 6 ©taubgefagen\*

**HEXPETALUS**, mit 6 SBlumenblätern, n>ie bie **Tulpe**.

**HEXAPHYLLUS**, tnit 6 5?elc&blätern / foie an **Berberis**; ober mit 6 Slättēn am ©tengel, ober in der **Hülle**, wie an HAKMANTHUS.

HEXAPODA, 31 after.

HEXAPTERUS, fec^eiffigclig/ mit 6 Flügeln besetzt, tt>ie étnigc ©amen bee iDoIbengew^f e.

HEXASTEMONES, f. *Hexandrus*.

HEXASTICHUS, f c d> 8 r é 111 g, n>a\$ in 6 Reihen steht, ober n>at 6 Stetbcn Don geniffen Jbeilen trägt. ©o cf! an HORDEUM hexastichum bit Sle&re elne Spica hexasticha, ba bit tinmen in 6 SReisten an t()t stehen.

HIANS, Pi a f f e n b , faflf man Don flelc^ unb S3lutnenfrone/. . n>cnn ber ©cfjlnub groger iff ali bit inncre ^>6f)luncj. 2Jn Dec jmct)feu 2Ibt^eilung ber <Si7i-7UO5OP tt)frb Calyx hians tm ©egenfage Don cZau-5U5 gebraucfrt/ tt>fc an GARDAMINE^ SISYMBRIUM, SINAPIS. gine Cor oil a hians ijl an MELAMPYRUM syl-vaticum. Shue!) ba\$, n>a^ unsen>öbntic5 defpatten ist, nennt man hians.

HILOFERUS, f. *Endopleura*.

HILUM, t l a b e l , jener \$unft ober.jene Marbe, an njelcftemi ober miter wetdjem ft\* ber Xeim ber ^Jflanjt befinbet Sin biefem \$unfte tvar bie 3Ra6et^ fcfnur befejiigt/ bur\* n>e(\*e ber ©ante in ber §tucf)t\* ^füllCf bie i&n um^a6, ange^eftet geivefen i(t. QRan vnterf\*ebet ben lu^eren unb tnncren 92a6e(: jenet ill meiffcnS anberf gefärbt, ober er^abeu ober Dertieft/ Mb bit Cinfenfunfl bt\$ aupcren \$labtl\$tan&t6; biefer ijl eine oft bunfler gefärzte fcfrvammise ober fnorpe^ lige grbaben^eit am ^effc^en/ in bie ber innere 3labe(\*

**strang** fief) enbigt, unb Uegt neben bem Sleuferen, obet nteiffeng ifym geaenüber. *Hilum* ofne Sufag bebeufet fall tmmcc Den fageren tf abel. Sftan **ste^t** iftn augett beutlicft an t>er ©aubo^ne, an ben ©amen t>er Six-PHYLEA **f, a.** *Cicalricula*, **unt)** *Umbilicus ex\*ternus tint)* *F enestra*.

HIRCINUS ober HIRCOSUS, (fogar HIRCANICUS) **was** nac() 95otf riecfyt; HYPERICUM *hircinum*.

HIRSUTCS, *taud)t>aariQ iff bet) £inné das FMomentum an TRADESCANTIA, an ANTHERICUM; die ^lumenProne an MENYANTHES, HYPERICUM, LASIAN-THUS, ©prengel phil. bot. erflarf e^ burcf) etma^ langc unt) efwad (leife J&aare. SPinbenotp unb **Hayne nahmen es** gar niceyt auf. S5cp Kdbling fil ivgenb **etwas rauch** obec *taud)baaviQ, toai bithtmit* langen fleifen ober menisflend barren ^aaren befegt ifl. Set) faecant bolle ifl e£ landftaarig. Set) Dietncb fang unb **weichs** ftaarrg / faff tt>ie *tottig*, (*villosus*). S5et) Bern^**ardi**, bee eS burc^ tt)tmpér«8 überfegt/ ifl *hirsutus* **das** jenige/ wag abffebenbe/ bi^famc, entfernte, **h5chstens** eine Sinte lange ^aare f)at. 9lm beften *cttlätt cf fid*) b\xvd) **jene-** ^ppanjen / bie *Mnn6* felbff *hirsuias* nannte / ft)te BETONICA *hirsuta*, MENTHA *hirsuta*, TURRITIS /\*IV-5u/a, GYTISUS *hirsutus*; *tg iff oft fpnompm ntit pi/.o- ; U J.* *Hinne' nennt ben ^elc^ an LEONTODON (APAR-GIA) tuberosum, hirsutus, unb bie flatter unb ben ©tenjcl an SCORZONERA, hirsuta; bieJjulfe\*an LATHYRUS odoratus ifl bet) ifrm Legumen hirsu turn.**

**HISPID**, tacfe n g , iff bet) £inné eitt **Stens-** gel/ bee tnit'ffeifen SBorffen befegt iff/ tvj c an **GALIUM Aparine**; etnBIart/ bag mit etwaiJ ffeifen fleb**rechlichen** jeeffreut ffebenben Socffett befc^t iff. <fr erflärt eg alg fpnomw t>on *strigosam*. tPi'IIbenotP/ fotym, Kötling, Borffcaufen, ©prengel erflaren eg burd) febr fucje ober furje ffeife £aare/ wte an Mvosous *arvensis*. **Bern&arbt** beffimmt *hispidus* *biivd)* **abstehende**, ffeife/ ftoc&ffeng eine Sinie (ange **Haare**.

JDecanbotle ftnitt bie *Qaatt ttmS* fang fja&en/ unb jerfireut, unb gebrecfilicfc. 3(nbcre rooUen an ber ^aft\* ber £aare SBertiefungen, \$8et> Batfcfc iff *ti* fynenmm nüt setosus. *flinni* nannte ein LFONTODON (APAR-CIA) *hispidum*; ben (Stengel unb bfe 55fätter an ECHIUM vulgarC) *hispida*| Die CAMPANULA *Cervicaria* Unb *thyrsoida*<sup>^</sup> *hhpida* etc.

HIRTUS, borflig ^ tflbei) tDrtlbenotD , &aync, foecanbolle, Kol;Img etne ObcrflactfC/ an ber bie ipaare mittclmägig (ang, aber febc flcif jtnb / tote an ECHIUM *vulgare*, (tpa3 £tnné *hispidum* nannte)\* ©prengel Phil. bot. Linn, tterlangf febt lange (*longissimi*) jleife \$aare. 9&e^ ©ccanbolle foDen bie etmt fur\$en \$aare jablrct\* fei)n; bep Borf<sup>^</sup><sup>^</sup>u<sup>^</sup> fen unb Kōthng follett fie uid)t jablrct\* fct)n, nicf)t bicf)t fl.e^en. Batfd<sup>^</sup> mitU, bag bie langen f!eifen ^aate QCbtatiQt flcbc, unb an ber 53 a ff ^ feine ^ertiefungen ^aben. Bernbarbi/ bee *hirtus*| borfiig, burd) g e m a & r t t übecfegt/ terlangt abjlebenbe ftetfe übec etne Stn̄te (ange ^aare. £>|t 33ebeitung t>on *hirtus* in *Zinne'e*. ©tnine tDirb fid) am beffen au^ ben Pflanzen erf Wren/ bie *tthirtas* nanntemie LEONTODON (THRINCIA) *hirtum*, GISTUS (HELIANTHEMUM) *hirtum*. Es tt>irb oftfalfd) oXi fpnom t>on *hispidus* gebraucf)t *Hirtus Caudex befinitrt KDiUbenow al& furjbor\** fits / Mi\* fur S<sup>m</sup> ffetfen^aaren bebecCt/ n>te an twfefcie\* benen fleinen au^lānbifcben §arrmfcaute?n.

HILCUS , f. H i a n 5.

HOLOGLOSSUS, tpag auf becganjen 3ange ©cfcferaacf hervorbringt.

HOLOSERICUS , nennt Bernbarbt p a p e I r 0 fe n\* f 4 > t c a 3 ; . 6ep Hinne' bejeiefcnnet e^ abec meiffen^ eine.feine feibenartige SCBoae/ bie gemiffe X^eile fibers iie&f; J. S5. PASSIFLORA *holosericca*.

HOMALLAPHYLLA , p I a 11 in o o f e / mit ejnem ^fafen auf ber Srbe angebrüctren SSebeU ber mit ntcfitt auffpringenben ^apfeii?/ bie entroebec uom Slnfange an

*tine* Oeffhung fcaben, ober immec flefcftlofen f?nt>/ befe&t ift.

HOMOGAMIA i(l beo SKectoc Sfprengef, wenn Die mānnlidjen unD n>eiblid)en ©efc&lec&t\$t&eile an ecnec SPffTanj ft\* aleicfaeitig enttoitfeln-

HOMOGENEI HOMOTHALAMI, 91f4)ft t / DeWn **Fruchs** beftälter ganj aud Dec 20?arf^ unO 9tin0enfubf?an^ **gebüs** det ju f\*9n fc^einm/ unb Die eine emformige/ beiiäubte oder btc^ecrc gleicftarttge @ubffanj ^aben.

**HOMOIDEUS**, tvad ebtн Diefelbe 6c(?a((, tvie fdne **Hülle &at**

HOMOIOS , HOMOS , in Sufammenfegunden aud Dem ©rie cbtfc&en (latt *Similis*.

HOMOMALLUS, *QUI<fy Qe t i<3)tet*, iDcntt mebrere Sinien nac^ einer SJic^tung fe^en. Oefterd fpnonpm mit *secundus; bit) l\$ernfyatbi mit heter o mall us.*

HOMOPHYLLA. BULBIFERA TURIONIFERA MONOCOTYLEDON ,n>ie bep Der §o(genDen; J.S. an BULBINE.

HOMOPHYLLA FHYLLOPHORA MONOCOTYLEDON , g1e 1 <^51 a tt f i g , nenne man Diejenige ^ffanje, Dcren @amenb(atter Den foteenDen af>n(i\* fint, n>tc an ARUM. CALLA.

HOMOTHALAMI, \$ 11 \$ t c n / **DeMn** **Sruchtbehälz** tec gan& au^ Dec 9Rac^ unD SKinDeufubjiant **gebildet** |u fepn fc^einen.

**sen** HOMOTRO^US, ein €mbct>0/ Dec/ o^ne fleraDe ju einedep Siic^tuna mit bem (S'amenferne. bat\* **Richard.**

HORAEI FRUCTUS, *Ob&t*, Slepfel / SSirnen.

HORDRACEAE, eine gamilie t'on ©rafecn **bey** Den alten ©cjminotogen.

HORAR\*US, n>añ nur eine StunDe laiyj Dauert

HORIZONTA LIS , t o r 15 o n t a I / t v a g e r e c b t ; toai mit t^r fenfrcc^ten ?ime einen rec&ten 5Binfel bilDeti mit Der Oberflac&e De^ SBaffer\* paraUel läuft ©o ifl ein Caud^jp horizontalis Derjenige, Dec n>afferec&t auf oDec untec Dec gcDe liegt, rote an

**POLYPODIUM -vulgare;** *tin Dissepimentum horizoulale* ffpnonpm mit transit ersale) ba& jenige/ toelcfred bie \$tud)t quer burdjfc&neibet; cin horizontalis Flabe 11 um U. **horizontale** F oliunty toenn bie Oberflacfe beg flatted eber t>es tOebels mit t>em (Stamme cmeri recfjten SBlnftl bilbct/ toic art LACTIJA virosa, SILPHIUM perfoUatum; **horizontalis Radix**, tt)ie Cau dex, unb **horizonlqlis Ramus** ra die is, tuenn bie Slefie ber iCurjd fjoutjon^ tal untecber (ivbz Ue^ett/ unb bicf)t untec bcrfelbm mit t(>ren SBui-jcIjaiem fortlaufcn, tote ati TRITICUM, repens.

HORIZONTALIA. *semina, totnn* bie 9lc^fe be\$ ©amend jene bed ©ameitdebäufed unter *toai innut* fütt einem SBinfet burcOfcfneibet / unb *bai* S8ür\$ckf)m Dée^ (Embn>o entmeber nà\* bee 5td>fe, obec nacf) ben SBånbén ber grucfft flefc&rt tfi; wie an ben 2&i:6ip fen, Culpen.

HÖRNU^J mad eben in ber 3a6red}eit I|l,  
HOAOLOGIUM FLORAE, cine 3ufammca(Mutt9  
Don ^fTanjcn, beren Slumen \$u einer bcftimmUn  
©tunbe bed faged ffcf) öffneu ober fc^lieffen.

HORSUM, wad audmårdt gcfe&rt i|i.  
HORTENSES ^Ptlan^nr bie man in &åvUn jie^»  
**HUMECTANS**, toad Seuc^tigfeit nacf) bem SRunbe  
zieht. **Bernhardi.**

HUMENS unb HUMIDUS, ^eucbt/ n>ie ber J&ut-  
an manc&en spilscett/ wenn er j?e(d feuc&t i(l. (fd i(i  
{utoeilen aufy fi)nonom mit glutinosus.

HUMILIS, niebvig, toad ffcf) toentg crf>c6f,  
tm ©c^enfafee ton e/^us. Scp £ernf?#rbi toad  
£idfr aid bgcf) ifh

HuMiFusus,ft)noni)m nacf) tPiÜbenotr miep^o-  
cumbens unb prostra/u5, toenn ber Stengel  
flanj pad) auf ber <erbe liegt / aber nic&t tourjelt, unb  
nad) alien SKicftfungen tyn \$\$ audbreitet; toie an  
**EUPHORBIA Chamcesyce\***

HUMOR, f, *Alimonia*.

HUMOSUMSOLUM, (Bartertboberi/ &r S<sup>t</sup>adt  
SJermefung t^ieri ;d>r unb fcesefabHifcfer £&eile entffan;  
&eu iff; einerlef<sup>l</sup> mit

HUMUS,

HYALINUS, *bnrd>fi%tiQ*, t<sup>o</sup>n ipaufen, bie  
fe&r fein unb fcurfoc^cinenb fint>, tvic ©la\$, m<sup>o</sup>ie bie  
(Scfyuppen an CATANANCHE *coerulea*.

HYBERNACULUM nannft £inne' übet^aupt aHc jene  
2f)Cile einec Vflan^ / tDdcfc Die juitgtn Srfebe einhüls  
Icn, uuD fie t<sup>o</sup>n QBinter ü6cr fcfyugtn: alfo Knospen  
unt) 3n>iebe(m 9J?an nennt aber au\* t<sup>o</sup> die Wintershäuser,  
worin man \$flanjen überwintert *Hybernacula*.

HYBERNALIS unt) HYBERNUS, f. *Hyemalis*.

HYBRIDITAS, TDerbaflarbierung, Kreuz  
\$ung/ jener 2tct, burc^ n?dd)cn bag mānnldSie Orgatt  
einec <Pla<sup>u</sup>se ben Actm einer ^Jflanje auS einer anDern  
©aftung o&cc art befruc^tet.

HYBRIDUS, 23 a ft a r b, bie ^ffanje, tvelc^e £urc^  
S5?fru\$tung jmeper 3iK)it>iDuen entflanben i(^ bit ju  
terfd)ict)enen ©anungen ober Slrtcu geh5ren. So  
nanntc man auf) Die Polygamiflen.

HYDRALGAE, fr yptog^mtfet) e Wassers  
getDacbf<sup>e</sup>/ au(\$ phycei, WUFucus, CERAMIUBI

HYDROCHARIDES, tint Xjrbnuna 6ep 3uflieu.

HYDROGERA VASA, f<sup>o</sup> spiralia vasa.

HYDROPARIDES, VPa ffcr fa tt<sup>n</sup> bei) VDHlbenow  
twit ffac^em, nicifi^ud nicht (nur an PJLULARIA) aiff^  
aeroDfem i'aüe, beren \$vüdtt an ber ^Burjel fügen,  
unbt)ottbent>erwäç()fenen ed)(ei)erd)engebi(betn^erben.

HYDRURATUM SACCHARUM, f<sup>o</sup> Sdt^charum.

HYEMALIS, ippa^en/ bie nur im SBinter bluf>ctt,  
j. 95. HELLEBORUS *hyemctlis*; obcr 9)banomcnc über;  
&aupt an ben Vflantetii/ bie nur im ffiBcenter *ftatt &aben*,

HYGROMETRICA INTORSIO, n>entt buccfc §eud)fiar  
 "Hit ttxoai gecabe/ t>wdf> SEcotfen&eit gefcūmmt obev  
 seftwnben n>tff> rote bte ©canne am £afec.

HYCHosconciTA's, jette Sraft<sup>1</sup>/ t&obuccfo ba\$3\*Kfl\*' fljebe im tobten obec lebenbigen 3i>ftanbt, Seucfotigfetf fo cinjujiebm unb aufjufaugen fircbt, bag e^ fid) mit (cm ba|fcl6e uni^e6cnbm f|Rittcl itbti \$ftaf>l cm **Gleich-** flcmicf)te bcfinbct/ unt> jtt?at in bcm 93er^dltmiffe # **als es die Natur dieses Gewebes gestattet.**

**HYLUM, HYLUS , f.Hilum.**

**HYMEN\* f. Membrana.**

HYMÉNIUM, Pers. Ueber^ug, **Samens-**  
**t a u t**, bie baufigc O6crfläc^e, Die an ben mciffen  
 ^Jiljcnen untenam § ute, obcc fonj! anbcraugcrcn obcr innen;  
 ten £6ci»påc&e/ töte an ben Glatximen, *Phalli's*,  
 sjjjorc&ehw unb SJeijen Die Scfcucfttunagmerfjeugc  
 unb.bic ©amen ttä&t. 3)?an jic^t **fie** nuc an ben natft^  
 frud)tiflcn ©c^måmmen, unb bier ifi **fie** entoeber  
*tin* pldttcfcen (*Lamella*), obet cine Kunjel (*Buga*)  
 obec ei#£o4> (*Porus*), em 6ta^el (*Eca'mus*),  
 obec eine Dparje (*Papilla*); fiebeftebt nacft perfoen  
 auf lautcr gebrängt beofammen fte&nenben ober *unttt*  
 fid) t>ectt)ac^fenen bem blogert 2luge nicfyt untcrfefcetb^  
 baren @amenfapfe(n).

HYMEN ODES, fta£ ^auta&ttlic^ ff{}; obet gemtfle  
 2f)d(e, bie fonfl 6lattartig, jefet bautå^nltcfe'fnb, j.  
**S5. ERODIUM hymenodes. Hymcnodes nttnt**  
 man ferner eine tybtbeHung eon iTloofen / beren gäftne  
 eine ^onjontale ^aut au^efpannt tragett/ bie flatt be£  
 SRauled bñen\*

HYMENOTHECIA, ^c&ftjdmme bet) perfoon/ an  
 tvelcben e i n # f ^ m e n z u m ffc^ befinbet.

**HYPEROBOREATE, f, frigid a.**

HYPHA, bie *Qaitz*, em meftc obec mtober *fa*  
 benfömiflec ^orper an ben ©cftimmelarten ber) **IX>XU^**  
*benoxo, bet flfeifd;i3 / n>afiëng obec fafecifl / unb fcec\**  
*fd)'ubm fiebo^en unb QCfoxmt if?, unb al£ QtUl bUntf*

**Beyspiele finb an RHIZOMORPHA, MONILIA, DEAIA-TIUM unb ERINEUM\***

HYPO, in Sufammenfescungen *cut bm* @riec&i\* schen, *toai untet* bemjentflen £)raane fid) beftnbet/ welches Cmrd) *bag* SBoct bejeicftnet toirb, *bag* mif *hypo* jufammenaefefct i|i; & » *hypophyllus*, *toai untet* Dem \$latte ^ t, obcr an *btt unUxtu Seite* befe(6en ftorfommf.

HYPOBLASTUS i(l ctn fletfcftigec \$6rper an der **Basis** cmtflct enbor^tjen Smbroonm, oDcr eine **Aus-dehnung** t>etTcl6en ftatt bet R adieu la. Er hängt an bem *Endospermium* fe(l/ unb bey *Blastus* i|l in tftm bet Sänge nac^. gelagerf\* € felbfl t(l feinec nmiteren entmfclung bepm ^eimen fabid-

HYPOCARPIA ^ ruc^> tun ter l agen, 6ei)Befrii; hardi. 6ie t?cr()alten ffc6 ju bef\* gructjt, n>te die Geschlechtstheilunterlagen sum @tempel.

HYPOCARPIUS »XOS ifl f^nonom mitt / fos **infirus** unb *Germcn superum*.

HYPOCRATERIFORMIS, p̄ta feni 1 **stelle** t f 6 r m' 1 g. £m'n'e erflart jene Slumcnfcone (# pcäfeit; ticctettccf6cmi<3/ Deceit @aum flafe ifl/ «nb auf etnec SRobce fte&t. £c nennt bie Blumenf/one an HELIOTROPIUM, MYOSOTIS ? ANDROSAGE, VINCA ^ unb bent *Held*) an MARRUBIUM *acclabulosum* *hypocra-* teriformis; bit SUEueren t>er(angcti/ batfbieprä\* fenttertellerförmige Slumenfrone au§ec bem flafyen @aume eine fc&r lanfle / serabe / ttjaljenföirmige SXofre habt toit an "PHLOX, bie nur fclcn epförm'i'd obec Seſrümmt ift.

HYPOGAEUS, unterivbfd), *toaii unfer\** *btt* Srbe 'et\* Hypoga ce Bla'sta, £eimt uij^ei' ber Crbe, bie Geo hi as tee tPiUbenOTO. Uypoga a Cotyledoncs, bit „ic au& bee Srbe emporffeiflen. @ie finb nur 6co eimgen @amen obne e^ uig, ffltten bit Testa DoHfommen a|xi<sub>f</sub> .xmb \*ilbeu bicfe **fleischige appen.**

HYPOGASTBIUM , bepQprengel pliil. bot. die *Stipula* an Den Sungermcmicn-

**HYPONALIA PHYLLO**, bit einjcfncn ©eūcfe Dec Geschlechtstheilunterlagen.

HYPOGONIA , **Geschlechtstheilunterlagen**, ftäutifle, unter Den **Geschlechtstheisen** befindliche Theile. Bernhardi.

HYPOGYNUS, unter *bem* tPete fteben, nad) 3uffieu unD Ktcfcairb, SBlummfrone *unb* ©(aubgefäge n>cnn fte i(!eu^ nüt ifrer Saft^ inner *bem fitud*)tnoun, *tbet unmittbat* urn jenen *tyiwtt tinQtfügt* fñD, an wlcfjem tec gruc^tfuotcn im ©runbe ber S&lume befefltgt tfl; ober 2tend tvenn fte an Dem unteren Specie Der QV metnfd)aftHd)en <&fut>t me^rerec ©rtffel eingeffügt fint>; oDer Zunif n>cnn fte in einer blog männlic^en Slume in Dem 9j?ittdpuuftre OerfcibCH/ oDec ringd urn Dtefeti \$unft/ tvenn ctn · 2lnfa§ t)on einem @riffel Dafelbf! fid) beftnDct / tingefüjt fw&. 3n Diefem gaQe Dürfen fteDec Die *Sblixmtnblatttt* nod) Dfj 6taubgefaße tveDer mit Dem @ ^él no\$ mit Dem £elc^e DerbunDen fepn\* *Flore Whypogyni* fñD C\*fo mC&t i m m ^ ^ o r c J in/e n.

. HYPOMENUS, Jfjetf. f. *inferus*.

HYPOPHYLLUM (*lint*, eine Heine ©cfteiDe/ aug Deren 9Blnfe( setpiffe ©laſter cntfprtnaen, trie i> SB. am **Spargel**.

HYPOPHYLLUS , eine ©c^maro^er ^Pflanje / Die nnitt Dem S5la<e fñM.

HYPOSERMATOCYSTIDIA , *Q p e v m & b c f* , a l t e t u n t tetlaQcn fñDbet) Berñf>arbt Heine^autige Theile, welche Dem ©permabebaltec aK Unterlagen Dienen.

HYPOSPORANGIUM , a u f11 Q e n b / nennt **Bernhardj** jene^ jnbuftuni/ tvcl^c^ Die gruc&tbe&ältec im SKiffclpuitfte Decft.

HYPO&TYLAE oLANDULAE, fuflelfSmuge oDer fyalb', fugclformtgc unDurd;ftd)ti.<ie ©rufen, Die auf einem tvafjenfcrmiflcn' pOcr twlstmwn Qttik {ifyen. ©if

fdjtoigert etaen me&r ober m̄nbec «ebe«gen obe'c (c&mie\*  
xiQtn (Baſt aui, txe am Cabacfe, an ben Hofeii/  
Pelargonien.

HysTERANTHEus VMani , toenn an einer ?)ffanje  
die flafter ſc& erfl lan&t nad) bev Zblütbe entwickeln,  
j, SBt an TUSSILAGO , an bet #<f>afel(laube.

### L untr J.

IASPATUS un6 IASPIDEUS, toai mlt furjett/ ſchmalen,  
vielfachen ©freifen panac^iert t|l

ICOSANDRIA, die XII. (Elaffc 6ci) tLinn'e', tocldt bit  
Pflanjen begreift , bic

ICOSANDRUS, j̄nb/ 5. & mder aW 19 ©tau69ef4ge  
^abenDie enttpieber aufbet BlumenFrone ober auf  
bem %tld)t an bet fnnecett SBanb btffclbtn aufi\$en»

Icterus, ® k̄b f ucht, das Qtblottben bcr 5Pfans  
gen dur Kälte.

IDYOGYNIA STAMINUM, f^nonom m̄t illonoc're unb  
Sioſie. Juſlſteu.

IDIOGYNUS FLOS, efnc 95Iumc/ die feiw weiblichen  
Geschlechttheile hatr a(fo mānnltd> i'R.

IDIOTHALAM, tnt ftlfytn t btm rjd &be &älter-  
ganj, fomo&( ber ©ubfian; aW Dec gar6e n̄cft t̄on beni  
Saube terfc^ieben ftnb»

JGNEUS, ,feuerf4rbeti/ ecu felles Rothgelb:  
SDecanbode.

IMBERBIS, o&ite Ba^ Uxntn 35art at'/  
in aOen SBobcutungen bed SBorte^ Barfta. @o i(l  
J. 93. rine ffategorie t̄on Jrides imberbes, beneit  
We ©aftfabmfef)len; fo nennt man Antherae im-  
lerbes btejenigtn/ bie nid)t gcgrannt ftnb; &(umen\*  
fronen imberbes, bit (eine QBimpmt baben K.

JMBRICANTIA FOLIA, ttwui bie ©lattc^en eined  
jufammengefegten Slatted ttd&renb her SRa<t (im-  
<3\*laſc) ftcf) an bem S3(attflie( ber Sange nad) anges-  
gen; unb \$n burc&aud fo bebecfen/ n̄it bie Ziegel

tin Sad), nur mit bem Unterfc&iebe / bag t^re ©pig\* nafr aufstoartS fle&t; § 5. bie MIMOSA sensitiva.

JMBUICATIVA, b a d>\$i e g e l f o r t m g fiberein\* <mber liegenb in bet £no6j>e, nennt JDecanbolle bte\* jenigen *fbUttt*, bie Hinri  in ber tfnodpe *imbricata* nennt/ unb bie na y  inne parallel mitgerabec Slac^e auf *cinanbct UtQtn. iDecznbolle exti t* fie ai^ fofo}e, beren Slnf nge fo  beretnanber liegen/ bag fie ffc^ n>e<4fe(n>efe *bcdcn*, unb me^t oXi 2 Stei^en 6i(ben> 92ac& Borfyaufen, n>enn jufammengelcate fla ter mit t>tt deffnuna ber SHanbet flegen einanber fe^en. S5e^ fpiele gab  nn  an SYRINGA, LIGUSTRUM.

JMBRICATUS, b act>51 e g e If 6 r m i g fagt matt Don  t>eHen/ b e ffc^ n>ecbfeln) tfe/ mie bie Siegel ant 2acf>e bebecken; s\* S3\* bte ^e(ct)fcbum>en an bee 2lcti; fd)ocfc, ober bie auf biese SEB fe bebedt ftnb; n>o a(fo Dec 5Bort>ert^il, ber einen \$lad)t btn ^tintertbeil ber anberen bedt. SBeffec m rbe man ti bietfeidyt burc^ 5 t e g c l b a d>f d r m i g , n>ieB^f^  becfef en; bentt t>oA, todt *imbricatus* i|t, steltt ntcfjt etnem 5D a^ 5tegel, fonbern einent Sieged auf) n>o&I einent ©d^t n beJbact>C 'a&nltcb\* *Imbricatus calyx* unb cauzis, nennt man einen ©tengel unb  e(c^/ bee mit fcactjiiegclf&rmia  bereinanber Uegenben 6d)up; pen bifyt bebecft if!/ n>ie an CENTAUREA *Scabiosa*, THUYA occidentalism TUSSILAGO *Farfara*.  nn  nennt abet in bicfem galle nid)t bm ©tengel *caul'is imbricatus*, fonbem bie SBlatter *folia imbricata*^ unb tcrtangt babeg, bag bie fla ter aufrec&t fenen. < Uri fo fpric^t er t cm *Floribus imbricatis, bad)*\* giegelfirmid  bereinanber lie^enben Slumen an LINARIA *vulgarise* unb t on *Spat his imhricalis* an MUSA, TRADESCANTIA\* — Sine *imbricatd Frons* (ober rni-bricatu  Thall us) ijl biejenige/ beren Slaffc&ett cber einfebuitte *bad)iitQtlfbtmi*&  ber einanber (iegen / tol t an LICHEN (PARMFXIA^ *parietinus crispus* RICCIA *crystalline* €nm *imbricatus Pile us*

'fjabtn frir auf *tine boppdtc* 2Beife: e m (**Tta&I** an AGARICUS *oslreatusj* fro **Die**  ufe felbfl bac&StellCb J ormis   er einanber lichen, unb ba/n an HYDNUM *imbricatum*, wo^ gie  c&uppen an bent einjelnen  ufe bac&siegelformig u ereinanbcr fle&en. S6cn Meg f nnte auc^ **t)oll tGr Radix butlosa imhricata** §dttn, **Die** man jeDocft nur 'tmkgtern @inne 'z mdr zcatanenn/ unt) aK fpnonpm t)on *squamosa* mm rnt/ **n c** ait LILIUM *bulbiferum*\* (**Sent inibricata Spi'ca^ fro** Die SMum n DacOjtgcelformi^   ere nanbcc (iegen / if! an ben mciflcn CARICES, n o man fie einfi aucf) Amenta *imbricata* nannte, — ffienn **Die SMatter** an irgenlr einetn 2f)Cile bac^jiiegclformi^   ereinanber liegeii/ iinb Oaburc^ SRdfKit bilbcit/ fo ja^It mtm **Diese JKef>cn/ ^unb fagf** 3 w c y re it ig, bac^3icgelf6rimig( i/ariam **imbricata**) frenn fie in stoey 9iei(en lieijen; **d re y=vier, f nf, sechsreihig dachziegelformig** (**tr - quadri- quinque- settieriam imbricata**). 35epsi>iele finD an THtrv^, JUWIFERUS, SANTOLINA, SEDUM.

**JMMARCI NATUS, o ne Sianb/ u ge andet.**  
@o nennt man einen grucftbebalter un#ranWt, **i marginatus, MMI betUmfaigt ijer  c&eibe weder** mit eineni eigenen/ noc^ mit einem fcemben SXanbe umgeben ifi.

IMMED 1 ATA INSERTIO, *uttmittlbare SEitw* f  g u n g , tt^crtn c t Organ burd^aud mit feinem *am btuh jufammenba ct* t>on bem^unfte ait/ **wo es fr^k bar &u feptt anfangt f bis an feine @pi@e. Decand.**

JMMEDIATA PRINCIPIA, **f# Princ ipia.**

**JMMERSUS, untev etaudjty im SBaffer vtt>,** 6orgen/ eingefenft\* *Jimmersa Plumula\** eingefenft ijt bag Seberf>en/ frenn e  sanj in bem @tamnd^en t>erborgen Iteflt.

**JMISSUS, ^ n g e f e g r ifi 6w Bern^ riii, nwtn** erne State mit *ibvcm* @runbt auf einem **S a n g u r e** ber anberen *xufyu*

JMMfTTATAE COTYLEDONES , UtIV tt itib t t t t

**Cotyledonen** ftnb an einiden *Leguminosis dicotyledonibus*.

JMPARES. *ungepaart*, fagt man t̄on E&eilen, bte in 2 9?clf>cn flc&m, uni> Vaare bilbeti / am Snbe aber dnen efnjdn ba ftc&enben 2(>cU Nben. Daher

*3mpar foliolum*, ba& \$(attd)en, das eins }dn an ter @pi^e eiuc^ flcftcberlc Slatted **dasteht**, iDic an bet Kofe, am ^ollunber bat oberste augccfle Ic6tc SSIattc^en; tint)

**JM PARI - PI NNATA POLIA**; *ungepaart gefies ber t*: tttenn cm ejclne^ 55lattd>ett am <ntc eines Wfitbtun· fSlatui fltly.

JMPELLUCIDUS, unbnd)id>t. ig, n?at and) nid)t bai fid)t burchfaDen laj?t. Bernhardi.

JMPENETRABILIS, unburd)br̄tnglich, wenn cm fo>ler Jtorper mit einer ununterbrocf)encn SBanO geschlossen ist. **Bernb.**

JMPERFECTUS, unv ollfoftl mtn, dem irgend etwas UW ©o nennt man einen Embryo unt>ott\* **fommett**, (*Embryo imperfectus*) totnn bai frepe SBürgeltfyen fe&tt, unb blog eine (eimenbe SRarbe \$u finben iff. *Imperfectus* ftos.^bxt nad) JSIrné mit 9led>te unter bie ju t^erbannenben Slu^br̄ufce. inbcm baburc^ ber 3%ei(; n>eld)er fefelt/ nid)t mtt ^efiimmt^ fedf tLigegeben iff; fo finbet matt *Flos imperfectus* fonottnm mitt *irregularis* unb *anomalus*, unb aud) mtt *apetalus*, *incompletus* unb *stamineus*. *igbtinfo* if! *Fructus imperfectus* balb etne grucbt, tit, c(tt ttefemltc&er £6eil feblt, balb etne §stud) / bie nicht bestud)tet murbe S&et Snaut / Hay, TMoin<sub>f</sub> ponterera waren bie foflenannnten *Imperfecti* unb *fmperfectae* Glaffen' unbOrbnunflen.

JMPERFORATUS, unbuc^lod^ert, ftcnn fein\* leerer 3t6tfc^enraum an irgenb etner ©tede oorftaubett i^ Sernih n?a^ fein So\* **hat**.

JMPLSTIO, *[ft beo JStinē bai gefüllt rcttben bit 2Mumcn, f. Plenus flos.*

JMPLEXUS, p e r f l o ^ t c n , n>enn jn> ober meljrere frumme Sinien in eiHanber greifen/ abir biefclbe SKdy\* tun9 fatten. Bernfc. Kām i mplexi fiñb an HYPNUM implexum, too man fie\* fuç fpnon^m mit c o wye r £ / ^a(t *Jmplexus Thai I us fitamentosus*, fceif od)ten, fabenartig, n>enn bie 2iefte pcfe in fpigidtn SSinfdn burcbfreuſt̄en unb bcrfifteen/ j . S3. GORNICULARIA *lanata*.

JMPLICATUS, e ī n g e l e g t , tvenn-ein Sfteil ·bet %ldd)t nad) bee O6ecfeite nntct einem sastnfe! umgc^ fc^Iagen iff. Bernt.

. JMPOSITUS, *aufgefet\$t, tottrn tint Unit mit* ibrem @runbe auf Me 6pi§e bee anberen 9tfg t if?• **Bernb.**

JMPRESSUS, eingebrcft, toad obef vertieft ist. 60 III **Folium impressum**, 6eo **Hayne dasjenige**, beffen obere Sl'a^e aurfschö< iff/ \$.35. ALOE carinaia. JSLmnén iff c^ ntebcrgbrücf f </e^ re5 5um. \$et) BorF^. foil eine @eite pertieft, bie anbere erftaben fbn.

JMPROPRIUS ANNULUS, iff nad) Bulli'arb *tin Mm*, ber nur ben dianb bt& S?utt\$ mit bem @trunfe fufammenfittet/ urn ben Suttitt Dec 8uft fo btel m6^ lief) abjuftalten; J. S3. an AGARICUS *colubrinus*.

J N, in Sufammenfegunden bebeutet meiffend/ bag etwas nicftt borftanben ift, }• S3\* *i nermis*, un bes wehrt; jumcifen jeboc^/ t)a§ etnoad mefr als ^ewöhns lich borftanben iff/ \$. SB. *incrassatus..* Otfitti audj ein Sinbcinsen/ \$. 58. *incisus, incurvus*.

JNAEQUABILIS THALLUS, ung! e i ð fl ð ð i g iff bad ?au6, tt>enn flicht ungleicfjformig t>ertste(te Herz borragungen auf ber f>&erfläfre bed rinbenartiaen 2au; bes befinben/ j . §5. LECIDEA *sanguinaria*.

**JNAEQUALIS**, ung le i ^ ; im @egenfage »on *aequalis*, unter ten meiffm S5e5<e&unßen 6effel6en/

bie jeboc& enftoicfeft tterben müffctt. 95et) Bernfarbv  
 t(l *inacqualis*, xoai nacl) alien SluSbe&nungen un\*  
 gleicf) i|l; in einjelen *fäften ifl* bie§ nidjt immer-  
*Jnaecfialis Calyx* ifl ecu \$Cldj, beffen Q?üifcl)ttitC  
 obec ©lätter nid>t Don gleicfoet ©tōge obet gotm fiub<sub>f</sub>  
 Mean HELIANTHEMUM, *an* VERONICA, fcotauggefegt/  
 (nad) gintgen) bag bte fleineren obec anber^ cicformten  
 €nfd)nitte ober flatter nfc^t redelmágfd abmecfyfeln,  
*toa& finne jebocf)* unter *Calyx inaequalis alter-*  
*Tiis minorifius* begceiff. g6en biefs gilt auc^ tum  
*Corolla inaequalis*, J. 95. BUTOMUS, *Jnaequalis*  
*Corolla universalis* obet *communis* ifl be? €ini^  
 gen/ n>enn bie Slunten am Umfange ober Sianbe  
 (@tra&le) ton anbirer \$orni finD, a(d bie in bee  
 ffflittt CSfccibc). 3((fo fpnont>m mit *radlatus*  
 unb *iliformis*. ginige recf;nen atte cacf>enformU  
 gen unb magferten S5(umen jur *Corolla inaequa-*  
*lis: Filamenta inaequalia*, bie nic&tglicft fang  
 ftnb/ trie *an LYCHNIS*, SILENE, ben £)t; unb *Xttoatyi*  
 namiflen. *Jnaquale Filum* an ben €onfttt>en ifl  
 berjentge/ ber nid)t übttaU gleic^en Surcfomefljpc f>aU  
*fnaquale Foliu*m, town bit tint ©cite bt& iblattei  
 art bee \$aft£ fid) totity an bem *Sblattfthk* fyinab fort-  
 fegt, aid bie anbece/ n>ie *an* ULMUS; aucO tvenn td  
 tine ©eite breiter ifl/ aW bie anbtu, ft>ie an BECONIA-  
*obliqua*. (T^ ifl a(fo fononpm mit *ohliquum* unb  
*subdimidialum*. *Jmcquales Lamella pileij*  
 ttenn nut einige Slattcften oom ©tnnttfte 6i6 jum dlanbe  
 ^inlauf^ri/ bie übrigen abec fon>oft( t>om ©frunfe a(^  
 t>mn SKanbe bet nut balb fo tteit laufen, n>ie an AGA-  
 BICUS *muscoides*; *an* MERULIUS *Cantharellus* K. *Ince-*  
*qualis mar go, unqleid) ifl bet dlanb an bem \$ute*  
*tinei tyilit&>* ttenn et nic^t übetaQ torn Sfittefpunfte  
 glcict)n?cit entfetnt ifl, et mag einen <5ttunt baben,  
 obet nicfy\* ©• *laciniata*. *Jnaquales peduncu\**  
*l i*, Slumenfiele t>oh ungleicfrer Jange. 'Jn\*qualia p c-  
 tala f. oben *Corolla incequalis*; *Jnaquales*

*port an btn \$?od)erfd)w  mmen, n>fim tkincu \$6#ec  
untct btn gr  seren t  rf ommen / t  te an BOLETUS suberosus.*

JNAEQUAJJTER NERVOSUM FOLIUM, *unglcid)ntrf  
x>iQ iff eitt SSlatt, untct fccflfen  ef  gb  ubcjn ctnge  
bidet (inb/ S.35. CONVALLARIA Polygonalum.*

JNAEQUALITER PUSNATUM, f# *interrupe pi71-  
na turn.*

JNAEQUALITER SERRATUM, *ungleitdp 96 f   01 /  
OH SPIRAEA tomentosa.*

JNAEQUIALTUS, iS^eite Don *ungleitc&ec ^S(>e.  
JNAEQUILATERUS, ungleic^fettig\* Sse> Qcot  
poll Wngec aW breiter. Jnuquilaterum folium  
tX>tIU. ift ba^ folium pterygoideum, &e&tD.  
das an cinec 6eUe furjer ift, tote an LESKBA pennqta.  
Jncequilaterwn triquetrum fo I ium, ungleit\$&  
seitig bvetfantiQ, tvenn bet £nttbnvd)fd>mitt tin un\*  
8Uicf)fdtaed  reject barffeUt/ ttne an MESEMBRYAN-  
THEMUM aurmtium.*

JNAEQUILATUS, t  on und(et(\$er Breite.

JNAEQUILONGUS, t  on ungleicftec F  nge.

JNAEQUIMAGHUS, totbtt nac& bee ian\$t nod) nach  
bet 95rcite gleicf).

JNAEQUIVALVIS, ailC^ JNAEQUIVALVATUS, ftJCnR die  
p-Happen fo tore bie  nftftniKe obec 35lattcf)en am Relch  
obec an bee Slumenfr  ne ungleic^ finb.

JNANGULATUS, 6eo B&lliarb, o(jne  fen» .

JNANIS, mar fig, fagtman from  tengel (Ca u-  
Iz^), torn S&lattt (Folium), unb tom @trunfe  
{Stipes} tvenn fie web ft Dodfommen Uet, nod) bid)t,  
fonbern mit einem feinen fe()c fcfcjammigcit 50?arfe  
au^gefukt ftnb/ tpi an HELIANTHUS luberous, AGA-  
RIGUS coccineus) SCIRPUS lacustris.

JNAPERTUS, iftblab fononi^m mit clausus; balb  
beitid)ntt & tttoai toai ftoftl ift/ unb.feine Deffnung  
hat, {«93. bie S^uc^t an CRAMI&.

JNCALYCATUS, nennt fuUiarb eine S5Iume ohne  
Blumenfr  ne, bic aud) tcinm field) ^t.

JNCANUS, *ffreisgtau*, *wetglic&gr&u)*  
*mit furjen meislid)en Jpaaren; \$ S3. an AKTEMISIA*  
*absynthium, CISTUS incanus. ££ t(f nad) £inné*  
*fpononpiQ mit tomcntosus, unb bet) iDietrich mit*  
*pulveruZen\*us,'befHubr. 3, Qanus.*

INCARNATUS, bunflcc aid flctfc^farben / *ahtt*  
*mriiQCt Ubtnbis alt ZRotf). SDecanb. f I e i f d^ f a tt*  
*ben bet) HS^Iing\**

JNCISO-CRENATUM, *ti figefcl) ni tttn g&*  
*tetbt, ltjcnn bie ^!cr6e\$ane cttvad totittt geben,*  
*tDie an ERODIUM ckamctdryoides.,*

JNCISO-DENTATUM, etngcfc^nf tt en **gezähnt**  
*finb bic happen an CARLINA vulgaris.*

JNCISO-SERRATUM, eingefc&nittte ngefigt/  
*tt>enn bie @a^eia^ne tiefcr ^ef)m, tote an GRATA ECUS*  
*aria.*

JNCISURA, igi nfd>nitt, eitt (tmienförmiger  
*(Etnfd)nitt / ber nut ben 9{anb bti Slatted jert^cilt\**  
*Hayne.*

JNCISUS, eingefd>nitten t(i ben Bernhardi  
*etwas, beffen gläc&e\_xlinienartige Sinfc^nitte bat/ fo*  
*da§ mit bet Sfteilung nid)t\$ Don ber §(ad)e felbfi t>e<*  
*Ioren gc^an^cn ifl. Jnbisum foliu m ifl nad) £tnne*  
*line überflugige @i)ncnt)mie t>on dissection unb*  
*laciniatum. Qcopoli toittc& babuvtf) befümmen,*  
*ba% er ]<x&t, bie happen foKcn fcarnal fepn; anbere*  
*tvoden/ bat ti tin Sbiatt bebeute, beffest Sinfd)nitte*  
*fcbma( unb (anger "ftnb, a|i £aW; anbere ttoDen\_f*  
*ba\$ ti unregelmagid gct^eilt bebeute / tofe bie £u(ten;*  
*blätter an ANEMONE coronaria; flinne' gab unf*  
*jebocb SBcpfpleie t>on btm, toai tt unter folium*  
*incisum totyfianb, an TEUCRIUM Chamadrys, RA-*  
*AUNCULUS auricomus; bit 95latcf>en an ANEMONE*  
*nemorosa unb ranunculoides finb berj Ifytnfo liola*  
*incisa. gjeo Borf^aufen unb btt> K5bh'ng i(l /nc/-*  
*sum folium mit tgefert Ja^ncn/ bie jeboc^ nic^t fo*

ſief gef>en/ ba\$ man fit iapptn nennen. fōnnte, **n̄ie** an LIGUSTICUM Levisticum. Rdfrlijs nennt jefocfc nod) ingbefftnDere ein Sblatt in^iſum, rocnn Die <5pi6e Durcr einen Sinfcrnitt/ Der aber mc&t Die Jpälfe Dei 93latte\$ errcic&t/ geDoppelt trirD. §j)?an pflegt Dort/ two man incisurn gebraucfrt/ npcf o&en £)vt, mo eſit^a^ eiiigefcftnitien ill (apice, basi, medio) unD Die 31 rt, tote e^ eingefd;nitten iff, fiumpf (obtuse) oDer fpī^ig (acute) oDec tīef (profunde) beliimmt anjujeigw

JNCLIKANS unD JNCLINATUS, genei'gt, tvcnn Die 5^urd;meffer Der Sreite einen fpigigen SSintcl mit Der SrDoberfl^e bilDeit/ Bern^arbi. SBd^ nic^t geraDe aufrec&t i|i, 5D«arib» Sine *Capsula indinata* (a(£ ft)noin;m mit obliqua unD ddinata) ifi an ten 9Xoofeu Diejenige/ Die mit Dem grud)tflicle einen (lumpfenSBcncfI bilDet. Sine *indinata Radicula Embryonis*, Deren 2ld)fe ffcfe mit Der 3lcfe Dec JtotoIeDonen unter einem ttcfytcn oDer\* fiumpfen ^Binfel terbinDet. Sine *indinata Radix* fcd̄en einige an jeDer fc^ief abtoatti fteigenDen SBurjel, trie an An^EERIA; *Stamina inc linuta*, etnfcarf gegen Dett @riffel geneigte @taubgefäge ftnD an **Hyoscyamus**. **f** ft fQnonnm mit *nutans*, *cernuns*, unD i7i-  
**urvus\***

JNCLUDENS , ei nf^lte^e nb/ nennt matt einen Sfreil, Der einen anDeren ganj umgibt. (So ftennt man einen *Calyx includens corollam btnf* jetticjen, Der/ tt>ie an PHALARIS, Die Slumenfrone gaty umgibt. S6en Die§'gilf Con *Corolla stamina indndens*, an einfgen ERICAE, hidudenlia folia, eiribUenbe Better, Die/ menn fie tved)fe(tt>eife ge; peat jinD/ bet) Der SRacfr (tm 6\*1afe) ft\* fo an Dm (Stengel anfefymtegen, Dag fte Die in Dem 931attrinfe( aelegene jfno^pen oDer Slumeeinbüttten / {• 95. Die SIDAE.

JNCLUSUS, eūigefcfcloffn/ wa^ toon Dent ^infd;ieffcnDen ganj umgeben wirD/ ntcfjt über bai

*dinWu^tnbt btmttadt; J. 35. Semen inclusun. cdlyce "bit) AGRIMONIA; inclusa Corolla an GAUEX; incluste Anthera an einigen ERICAE\**

JNCOMPLETUS, *unvollfla&big*, iuenn irgenb em Sfteil fci)It; ein ton *tinni* acrbannter SJugbrutf , t̄er *bod*) ofterg gabrauc&t nrnb. <5o &at man incompletus Aril I us, ber nur cinm 2f)ci(, jutvctlcu cineit febr fieinen Sbcil b^ 3amen& Ubt&t, n>ie an TURNER A bai bautiQt S5lattd)tn; bit Qtbowtltcn ©prcu^ fclattc^en 6CJ> PEDALIUM; Me (ebei'artige SgeHefbunc) 6et> MYRISTICA. *IncomplelaDissepimenta*, *bitnid)t loolltommm* ton étner SBanb bet ^apfel ober bee grud)tbüDe jur anbeten rcid)cn, n>ie bet) DATURA 5/mmo^imm, PAPAVEU; obec ton benen bet) DoQer SJeife/ ein Sbetl tcrfc&itnbef/ tt)te an SAPONARIA, SILENE, fo bag bann bée Sächet untkOktanbig crfd)Ci^ nen. Ein unsoUfHnbiger Jgbryo/ *incompletus Embryo*, tDenn cc aQein au^ bem fe!ft^enben 2Bürs jelcfsten befleſet. En FZo 5 *incompletus* 6ei; **Vaillant**, tf| t̄r FZos *apetalus* bt\$ Cournefort/ bet F/os *slamincus* bt\$ K^/ &er FZ05 *imperfectus* Don ^t'rín, Snaut, pontebera\* S3cp ben SReueren ift FZ05 *incompletus* bcrjcuigC/ bem entroeber Die Hlur menfrone / ober ber ^elc^, (nur biefer barf bc!) **Barts^** fe&lcn) ober bei>be\$ suslet\* fe&lf. 53?e&rere recfthen (Merger auc& baS ftá^Aen unb ben 3apfen. Seo anbeten jinb auc^ bie Siociften /lores *incomplcti*. *Incompleli Fructus* ftnfc, be9 einigen, uaeffe Srđdje/ bep anberen biejeniflcn/ an tvelkeen einifle ©amen ftfyUn. *Pistillum incompietum^* bem trgenb ein S&eil beſſilben febst. *Incompleta staminay*. bit nt\$t in geböriger 2lnjaf)l torbanben ftnb. *Incompletus verticillus* ift bet) mebreren fQnonpm mtt sevundus^ gjian ^at and) eilie *incompleta Vol v a.Jn complete* waren cine Slaffe 'bet) Koyciu INCONSPICUÜS, bebeutet balb ctwatf, tva^nidjt deutlich fichebar ist / balb etwas, was unansehnlich ist;

**jj, 95. LATHYRUS inconspicuus.** *Inconspicui pori\**, unfic&tbare ?)oren frnb biejenigen/ bie man bte&er nicfyt fcl)fn fomttt/ t>on tvlc&en man aber annimmt, bag fie au<5en am ?cUi]ctvebc ejiftieren / unb bie man alg ..Organe bee unmerflic&en 21u\$biinf?ung befradjtet, *Jne o n s pi-cnte* roaren cine Samilie bet) **Rnaut.**

**JNCRASSATUS, verdickt, was gegen die Spize** ju gunimtpt, 'bicter n>trb; über(>aupt abet/ *toai an* einer beflimmteii. ©tclfe (bie man benenne, j. S3. <?e-mi/ia *margine incrassata* an ben 2\$urbifTen) bicfec tt>irb. 3m frffen ©tnne i(l eine *Corolla in-crassata an LEVCOIUM; Pappus incrassalus an TRAGOPOGON;* *Pedunculus incrassatus f. clavatus* an TAGETES unb TRAGOPOGON; *Scap US in-crassatus an ORNITHOGALUM spathaceum.*

**JNCRUSTATUS, tncrufltrt/ ftenn bai** Pericarpium fo innig mét bem ©amen t>ermad)fcn if?, bag man bie etgenen JjiiOett beffdben nld)t unterfd^eiben **fann\*** @. a. *cprticatus.*

**JNCU BITUS, ijicumbvns, au f liege nb/ tvtnn eine** Stnie to irgenb einem ^uncle ifyut Sange auf bie (Spige etner anberen gefegt if?\* Bern^. n>a^ quer auf einem anberen lbei(e Itcgt, obcr benfelben an Dec. ©cite etn>a§ **bedeckt.** *Anthera incumhens unb versalilis iff bet)* Linne phil. bot. ed. Willdenow biejenige/ bie an tftrer ©eite befef?igt iff» S3cp JDecanboHe iff fte T9^ **tionom mit adnata, ob CZQktd) incumhens alii ba&t** ienige beflimmt/ tvad auf einem Sfrefc auflie^t, of>ne bamit t>ertvad)fen ju fepm Sep IPiUbenoto ift ber^ ienige ©taubbeutel *aufliesmb*, ber maserec^t ober <iu\* fefcief auf bem ©taubfaben ia. feiner Wiitu 6efef!igt tfi/ n>ie an DIMORPHA. *Jlinne* nannte bie @taub; beutel an AMARYLLIS unb OENOTHERA *Anther & incumbentes.* *Incumbentes* Coty led ones ^ tDetllt ber eine bem SRfitfen / ber anbere bem SSauc&e beg (5a\* **mens** &ugefeftrt tfl, fo b<\$ bie tt>e\*felfei«9e SSeruftriinfl^ **fläche** ber 2l\*fe ber ftrutft ober be« ©ameug parafel ift

JNCURVAHS, *fid) einxōartz trūmmen b.*

JNCURVATIO SPICAE: bafür fu&rt *fLinné* \*auf  
eine mir un&erfānblie&e SBeifc: PAPAVER *unb* LILIUM  
*mariagon* • an.

JNCURVATUS, ef ntrxSrta geFrūmmmt, twnn  
cine gefrūmmt? imē mit iftrer ©pige ffd> ecner anberen  
ndfycxt. Bernk 3?acf eimgen tfl i n c u ^ a U i t e r  
jtvepte ©rat) t>on SSeugung *an btm* ©ferigef, unb gegett  
ten Stengel ju. 9lac^ &aynt t(l *Incurvatum* Fo-  
lium, dntoavti gefrūmmt em *Sblatt*, *bainad*) obtn  
gcfvūmmt ifi, toie an MESEMBRYANTHEMUM *luna-*  
*tum*^ Inis *arenaria*^ LYCOPODIUM *clavaLum.*, (gin  
Surculub *incurvatus* iff fpnonont mit *inflexus*  
wxb ebenfo *fedunculus* an ben SKofen. *Incur-*  
*vatum Semen* ifl an CALENDULA *oijcinalis*.

JNCURVUS, eintDcfrrs geErūmmr, foofel  
nfctet ju unterfcsteiben t>on *incurvatus*, obfdjon  
cd befonber^ gebrauc^t nnrb\* ^ 6ef>eutet auf ^ unb.  
tiiroärtf gefrūmmt; in btefem ©tune if! ein i c a -  
leus *incurvus* an ACACIA *cajfra*; tint *Anthe-*  
*ra incurva*; *incurvus Calyx*, beffen SKö^ce nadt  
**einwärts** sefritmint ifl; *incurva Capsula*; *incur-*  
*vus Caulis*, *incurvus Culmus* an G AREX are-  
narja, xotnn mtfyxtxt ©tengcl mit i^rec @»ibt ftcl  
tiä^Crn; *incurva Fitamenta* an ATROV± *Bella-*  
*donna* y · *incurvum Folium*, tin aufrec&tett ^Blatt/  
ba\$ mit feiner ©pige gegen ben etengel ju auftcävti  
gebogen ifl^ · fi)noni)m mit *inflexnm*; *incurvi*  
Kami, toil *incurvum Folium*, an HYPXUM *Ion-*  
*girostrum*; *incurvum Pelatum* flegen btn (Sriffel  
foingebogen an ANC^ICA ; Jncmv a Set-a, ein get  
frūmmmt / bie &pibt gegen bie 95afiS gebogen/ n>ie  
an FUNARIA *hygrometrica*. Sger) 2)ccanbolle ifl  
C^ fr^nonprn mit i /i/Z ea·us, *intro curvus* und  
*introflexus*.

JNDEHISCENS , n i<fyt auf fp rtngenb\*

JNDENTATUS, ung e z ä b nt.

JNDICANS MACULA ifl beg SKerfor 0prengel ein farbiger SSlecfen obe; mebrere berfel&en auf'aerfc&iebe\* nen SSlumen/ welc&e tæ^ in bet SSlüme ausfc&nriegenbe £omg anjeigen, @.afra&[.

INDIGUM GLIMA, 'tnbifd>e\* 2 U't m a , fca^ 5?lima alto Sânber gfyifeften ben QBenbefreifen/ n>o cm 5Binter SXegenjeit if?, '^ffapjen biefec Unbet tcifm nfdst ein 'OTabl im ádoptifd^en j?ltma iſrc ©amcu^ Mb bertragen bet) un^ auc^ im ©ommer ba\$ ^repe nid;t.

JNDIFFERENTISMUS, bie erflen XIII. (Slaffen bty £t'n n é, tt>o man auf bie gán^c ber ©taubejefäge nid)t Slücfclc^t nimmt.

JNDIGENUS, ein^etimtf4>/^([btvachsfend, was in irgenb einem ?ant)e n>a^t/ obne ba% t\$. besonders gebaut rourbe. 3m @cgenfa@e tx>u. erotic u s.

JNDIGO, Ji?omp^., ein Principium immedia-tum II. glaffe in ben \$flan;en»

JNOIGOTICUS, t n b i g b l a u .

JNDISTINCTI NERYI, SKi^pen^ bfe enft>eber nid)t btutlid) ju feften, ober obne Orbnund defagert ftnb.

JNDIVISUM, Unger&eiTt/ id jmar notbmenbfg fpnonpm mit integer, qam, obet mit simplex in bee jmeoten Sebeutung beffelben; mirb aber inbeffen itor jumeilen noc^ \$?braud)t, Por^Iic^ im (Segens laſe t̄on fissum. ©O ßat jnan einen Ar ill u s indivisus> Caulis indivisus, ein Stengel ohne Slefrej Foliūm indiyisum, tin Sfaff öfne Ginc fc^nt(te; ètn Labium indivisum an OCYBUM K>

JNDUMENTUM, U e b e r \$ u g f ift bie · £)berb4ut unb ba^ ©amenoberbaut^n nebfl ben SfrWen, welche on iftm feftftgen\* Bcrn&arbú

JNDURESCENS STJPULÄ, ^r^l r t e n b e 3(fter; bl ä t t e r , bie öftet^ in ©tacbeln übergeben/ toie an einigen firauc&artigen ASTRAGALUS.

JNDUSIATUS, p e r r 4>!eyert/ mit einem ®d)leper; chen (indusium) berfebett/ tt>ie ber Sorits ihdusiar tus an ADIAMTUM reniformc unb pedatum.

JNDUSIUM *tjl fcty Optengel*, Linn. phil. boh  
ber 2\$el<& *btt Satmirautev*, be&bte ©amen&aufc&en  
*Ubtati* erne javte £aut/ Die bit 6amenicaufcftet -  
beff/ unb bep bet Steife ber <3amen\*£apfefo zerreift.  
JPi'Ubenow nennteS bieñDetfe/ <6<tyneba\$ **Schleyer**  
\*en. **Ser** Bern^arbi ffnb. ti bit **Perigonia**,  
**Epigonia** unb **Hypogonia Filicum**.

JNDUVIAE (*Jnduvice florales* (Torrent) bai  
XI e i b d>en, jene 2(>ci(e ber ^Slume, bie nac^ bem  
33erblu(cn noct) ubrig/. unb an ber **Grucht stehen**.  
397an nennf etne folcje Scuc^t *induviaius*.

JNERME, un&ewefer.t, x raffenloe, ohne  
©ratine/©fac^cl cbet Scrn; metiten^ nut im **Gegens**  
fafcc Don anberen 6emcf>ten Slrtcn/ bie ju eben ber  
©attune geb6?cn / ton totltyet man fagt f bag ein ge^  
**imfTer** 2beil *inermh fei)\** 60 bat man einen *Caudex*  
*inermis* an *POLYPODIUM arhorcum* j eincn *Can Us*  
*inermis* an *ROSA alpina*, einen *Cormus inermis*  
an *PHOENIX dactylifera*; einen *Stipes inermis* an  
**CORYPHA rolundifolia\*** *Jnerm e-Spino sum*  
ftei&t forte!/ afg ba§ bie etad;eln ober ©ptigen  
**weich** ftnb.

**JNFANTIAE** STATUS, sperxobe ber ^inbbeit/ bte erffe  
**Periode** bed ffiad)^^umc^ be^ gvucf)tfnoten&

JNFERMENTESCIBILK. SAGCHARUM ?, f, *S ace ha rum\**

JNFERUS, ein Organ/' bag u n t e r einem anberen  
**befindlich** iff. \$?<m bebijent. **fld** biefeg *fBottoi intbet*  
fonbepe be» bem *fielye*, n>enn berfelbe **fld** u n t e r  
bem \$md)tfnoten befinbett bet §rucj)tfnotcn alfo  
auf bem j?elcbe If?/ benn(*flyklyx inferus* unb **Ger-**  
7/ien *super urn* ftnb notbj>enbtde 39nom>men; in  
biefem Salic iff fon>obl ber ^el\* *ali bet* grucfjtfnoten  
frey n?le an ber jgrbbecre, ^u'nbecre; ebenfo beo  
ijem grucfjtfnoten; bieferiflein *Germ en infer um*  
ober *untet bem* Setcbe, tveun ber fie(d) auf bem;  
**selben**, alfo *ein Calyx super us* if{, unb in biefent  
**Falle if{ i^clf unb fitufyttnoUn mit tinanbtt toxtoaty**

fen. *Inferum Germ en iff nadfr & ulliarb efflenflic& baSjenige / Daf mie Der Stfbre Def \$clcf)c\$ in eineti unD Denfelben \$5rper t>cm>ac&fen iff, fb Dag ef affe anDere S&etle Dcr ®tume an fctner ©ptfste trågf. Es l|! alfo nid)C fanonpm toon Cstaty\* super.us bep Bùls Itarb. JJiec flc^t nadfr Journefort'a Slu^Drurf der ^cld> in Die S\$ue&t fiber. Eben scieg giU Don in/era Drupa; fte iff felten. mit emer Slatb t>erfel>en/ abec mciflcwi gefrSnt, oDec genabelt. Surcbau^ fononpm fñl> *Calyx inferusi* un& FZ05 in/eras. *Jnfenus Labi um*, bit Untcrlippe/ fceec.untere SbeilDeS 6au? meg einer racb?nf6rmtj)en o&er madfierten 95l<mc>/n/era obec *inferior pa gin a folii*, bit untere §lad)e cine\* 95l<mk> / ^ a R adieu I a, mnnbai ©firjelc^ein im ^eime ju unterfl tm eamen Iregt, oDec t>on bet epi§e Deffelben (5\* abfmartf beujjC fi(f<rum Recepiaculum>ba3 nntcv btv 3lwme bepnWi\* iff.*

*JNFERUS;* f. *hypogynus,* *hypocarpus\**

*JNFIRM us CAULIS,* f. *Dcblis.*

*JNFLATUS,* a u f g e b U f t r t/ menn jmtTc^ejt bet fnneren 2Ban& etneS jferper^ un& Dem Darin tpndlis c6en iförpcr ein leerec SRaum Dor&anDen iff. *Bernb.* n>a< ^ofl <>ie eine SSlate iff/ ni\*t au^'ef&at iff. >ffa^u5 *Calyx id an CUGUB\*LCJS Behcn;* *inflala Capsula an COLCHICUM autumnale;*\**inflata Corolla a|X CALCEOLARIA pinhata;* *Jnflalus FoL liculus an ASCLEPIAS;* *inflatum Lab ium inferius an CYPRIPEDIUM;* *inflatum Legumen an CYSTICAPNOS ,\** COIUTEA ; *Jnflata bo+culamella.* Die jtoifclKn'ficij unD ibren 6a»nenleere abffiebenDe 3mtfcl)enräume laffen. *Inflalus FeMolus,* btt in Dec SWitte Dicfec unD ftobt iff/ an TRAPA naianf. *Jnfata Silicula,* roenn Die ber^Der StUw^n sehr au/aetrieben finD/ >ie an MYAGRUM sativum> *ALYS-SUM utriculatum.* *jnfalus Tnallusy* ' b?nn em bcLUtavtideS itaub mner&alb &oftl iff/ wie an PARJUELIA *Physodes.* ©. a. *Ampullae eus, cavus, yentritic osus| vesiculosus.*

JNFLEXUS/ *einQebogen, ifibtt) Bernhardi*  
*ttnai, wnn emi £&eil D& glaçje nach ber Oberfcite*  
*untenf einem Sogen umgef&lagen if?, Sep £tinneé t(T*  
*inflexum fpnonpm mit incurvum; injlexum*  
*Folium, eln 95latt/ ba^ tfd). mit etner 6pi§e nadfr*  
*aufväctf frummt/ lt)U an ALOE mitraformh^ CA-*  
*CALIA Jicoidcs-. Inflexa Petal a, etn\* unb auf\*.*  
*tvårt^ gebogue SBlamenblätter stuD an Pi M PIN EL LA.*  
*Squama Calycis inflexct finb an ARCTIUM. In-*  
*flexus Pedunculus an ben 3J?oofen ifi Derjcmge/*  
*bee entmrter nur an Der ©pige fcacfenförmifl f oDec*  
*bcr ganjen gänge nac6 in einen 35ogcn gefrummt ifi.*

JNFLORESCENTIA bejeid)nt ein ?D:afl nac& JSLiind  
ben 33lutf)cñftauD, b. t). Die SBctfe, ftie tie SSLumen  
mittelf bed StumcntftelcS mit ber ^PfTanje t>erbunben  
jinb; ntd> ©ccan&olle bie ©efammt&ett unb bie U&t  
bet iDrgane, bie jut 93lutf>c gef)6rcn; bann auc^ bie  
X)perationen/ bie ba& \$(ufyen Dorbereiten obec 6cn>ir^  
fem SSep B^ntairbi {ft Jnflorescentia ba&  
33erf)åUni6 bee ^lütben^ ben Slutbenfiielcn unb beut  
93liit6enbaben. Hinni rec^nete juv 3uftore^cen{ nur  
ben Verlicillus unb Corymbus, bie <S/j/çä unb ^a-  
nicula, unb bie F/ores axillares. fafynt f)at nodE):  
bå^ Capiluliun y ben Glomerulus, bin Fasciculus ,  
btSpicula, bm flac&nus, He Umbel la unb Cyma,  
b&f Flabellum, ben Thrysus, Anthurus unb Spa-  
dixy ba£ Amentum, unb ben <Sorus. gegterer t|t  
nacft U>iUbenot»,\ nebfi Spica, Eacemus, unb Pa-  
nicula, bie ganje 3nflore^cenj ber ^rpptogamen\*

J N FOL i AT'us , f. Aphylus.

JNFRA, untec irgettb cttdad/ f. Hypo.

JN'FRACTUS, mi plöglf\* feine SJic&tunjj abbri^t^  
unb érne anbere annimmt. Infractus, eingPmcft  
iH bet) &ayne jcner ^?a(m, ber an feinein unteren 2f>eile  
£ntiefßrmig gcbogen (ft/ tute -an ROTTBOLLIA incurva-  
ta. Seo. CDiUb^now ijl e£ ft)ouui)m mit genieu-

*I at us. Sutoetlen fteigf e\$ and) ftatt unb plögfid) §u\* tūffleboflen/ n>ie Me Slumenfttele art SILENE infracta.*

JNFUNDJBULIFORMIS, *trid)terf&vmig*, III  
6eo £inné eine 25Jumcnfrouc, an mclcr ein (innge\*  
fe&cter) flegel auf einec SKofre fle&t/ tpie an PULMO-  
NARIA. <in field) t>on fccrfel&en Silfcuncj ifi ein **Za-**  
**Zya: infundibuliformiS) toxſt an APHYTEIA, — Will,**  
benon? mill/ Da§ Dec SKanD fid) üitmlid) ffad> aus;  
fcreite, road aber bet) einem aufgcfe^ten tfegel *nidjt*  
*feon 6atf.* ©m *Nectarium infundihuliformtj*  
abet aerfe&rt, i(l an AQUILEGIA. *JnfundibulifQr-*  
*mis Pile us an MEAULIUS Cantharcllus i(l eben fb>*  
9e6a.t; Me meiilen @c&n>amme a6cc befommen cnt  
Sllfer einen trtdjterfonnig Dertteften ^ut\* (Ein *infundi-*  
*buiiforme StigmfL ifl an einigen S8eilc(>en/ »ie an*  
**VIOLA tricolor.**

JNGRATUS, unangenebm fc^medenb.

JNNOVANDO-DIVISUS, f. *Prolifer.*

JNNOVANS CAULIS> erneuernb/ if! 6et> tPiU^  
bertoro etn 9Roo^|tenge(/ Dec fc&f etnfad) i(?) an fccro  
man aber Die 3adre^friebe unterfcjeiben faun, tvce art  
POLYTUICHUM f. *Prolifzr.*

JNNOVATIONES, *bit neuen Srtefie Ux> ben 5)?oo^*  
flengcln/ wnn ftē aii^e\$etd)net gebilDet fint)/. n>ie ait  
POLYTHICHUM *widulatum.* ©• *Prbljfi'eatio*  
**und Turio.**

JNODORTTS, n>ad feinen ©crucf) bat

JNORDIWATUS SORUS, n>enn bie ^rūcOtf/ tooraud  
das \$auf\$en beMt, obntOtbnimQ ^ufammenaebaiiff  
flnb/ nrte bep ben mciflcn fiattnhäuttn, ADIANTUM.

JNOSCULATIO, f. *Insetrio.*

JNPALPABILES PORI, Me gōc&er unfc^eīn^  
bar/ fo fkiit/ Ca§ mart fte mil blogem SUige faunt  
(emerfen fann.

JNSERTIO, £tr̄tf&fliiitg/ bie frcfiimmte 2age  
irgenb eined Xbeiled/ btn man fid) in einen anberen  
cingefäfit t>cnft. Sfefe 3^e iff abtr nic^t t>tc **richtige;**

man foHte tñelmefjt *bag* Organ, *fcai* man an cittern anDaren Organe ficio. einflef' uſt benft/ *ani* bemfelben berfcortretenb fid) aorffeilen, uni> t>felmebr, n̄ie (Cor\*<sup>1</sup> tea be ©erra rtet& / (Zatt *Insertio*, Exerfio, J£nt\* fprirüjen, <£>erpottireten , unb exsertus fiatt imer-

// F, ppropfert/ jene £anolung, Durct) weicbe t>te ^nD^pt obcr t)a^ 3tet^ cimee SSaumcd in \$crüftruns mtt Dc n 9}a(l eineg anbecen Saumcg t>crfcfet n)trD / mlt .n?e(citem Oiefelbe t>ermad)^t uni) fid) entvidelt. £>ie ^no^pe nennt man *bai* )luge| bat &et£ ba& Pfcopfreia/ (im SranjofffcOen fcepbc *Grefie*), ben 35aum, auf n>eld)ta man ppropft/ ben Wildling (*Sujetj. Insertio*)> **Ppropfung, Einfügung**, jener 5Ict, butcf t mclc^cn man trad>tet eine auf eitt anberc^ 3nbiwbuum fcerfefcte ^nffspe leben unb ft\* mtt. bemfelben t>erbinben ju mac^em ,

#### JNSTRUCTIONES MEDULLARES, f. *Radii Medullares\**

JNSTRUCTUS, efitgefftgr. \$Jlan betrac&tef f>kt vorzüglich ben £)vt, too tttoai eingefftgt if!; 06 \$. S3. die *Stamina calyci inserta* finb/ *perigyna*^ n̄te an ben pflaumen, Dber *Corolla inserta*, tote an PHIMULA {petalos temones) ober *Stylo inserta* (*gynandra*, *epigyna*, *stylostemo-ne*<sup>5</sup>, *stigmato-t temones*), obet' recepta-*cnlo inserta* (*thqlamosten*|ones) *hypogy*\* na-i bocr auf Slebenbjumenblattern (*parapetalo-stemones*). *Calyci inserta petala* finb an AGRI-MONIAV LYTHRUM. Slur bet)m \$lattf{iele fle&t matt auf · bie 9lrt bee (ftnfu^und/ unb *insertus Petiolus* if? bet) eiutgen ein *filattfliel*, bet unten t>evbidt<sub>f</sub> unb buxd) ein @elenf fo in bie SKinbt ein^efugt tfl/ bag ct/ wenn er abfaOt^ eine Sfarbe jurüdlägt, mie an DAPHNE Mezereum unb an mcftreren £upi>orbien; bep anberen ein ^lattjlid, ber *Sentient* am 24fe ober etamme ||%t, obec fo mtt (epben t>etbunbm ift, bag

feine ©runbfffac&e f einen ^rōgrett SKaum étnimmf / oli  
kfeine iDicfe betrāgt/ fcorjūglicfr im <§egenfaße t>on ad-  
natūs unb decurren s.

JNSIDENS, aufftjenb, roag ofnc beutlicren  
©rtel auf irgenb einem anbttcn S&eile aufffgt; j. 35.  
*Calyx germ in i insidens an, ASA.RUM , Flos fo J/o*  
*insidens, an HELLEOKUS hyemalis; Stamina t aſt o*  
*insidentia att DODECATHECKV,*

JNSIPI0US, faftig, abeu ofene ©efc^marf/ fab.

JNSJTITIA GENICULA, einge pfr opfte ^  
fāge oDcr tielmef)r ©licter, an Den Couerceix, tt)enn  
Ubcz obcze ®ltib in tcm unteren ju (lefen fd;cint / tvie  
an CONFERVA air a.

JNSTIPULATUS, f. *Exstipulatus.*

JNTRUCTUS, imit irgenb einem X^eile bersehen.

INTEGER, gfft\$ f tt)a^ gac tticft getheilt ist.

©0 ^at man etnen *Arillus integer*, o^ne attc SKifé  
unD Stnfctnitte/ fonom^m nut indivisus; cine  
tfajhvptra *Integra*, Ote jbie ©pige Oec. Būchse  
touffmmen ringdum^er bebeeft / tvie an GRIMMIÄ  
extincloria; eine *integra Brae Lea*, ganj bte //i-  
tegrum folium; einen *Ca.lyx integer*, embläti  
trig/ \*unb o^ne alle Jabnc unD Sinfc^nitte/ tote att  
GENIPA, HUJIIUJLUSJ einen *Caulis integer*, bee  
bei) tptÜdbnotD unb &aynt afriq i)?, beo bent man  
abec ben ^auptf^amm leicf)t big an bie 3pige versols  
flen tatittf toic an SOJLIDAGO virgaurca, PINUS syl-  
fe5/m. 4Beo Hōwling unb Borf&aufeñ verjenige,  
an tvelcbem feftc menige 3le?e bid^t bepfammen stehn.  
S5c9 On nne phil. bot. ifl *Caulis integer* jcner eins-  
facbe ©tenget/ bee bepna^e Dötfommen einfacf/ sim-  
plicissimusy ifl, unb faum einen 9l(l ftat/ n̄ie att  
GNAPHALIUM sylvaticum. ©ies iff <?>ayne's *Ca u-*  
*lis simplex. Integer Elater an bin Rapseln*  
elttfsep: Sebecmoofe^ *Integrum Folium.ifl bet) ilinné*  
ein uncjCtf)Cilte\$ \$>iatt (*indiviswp.*) oftne aQe Bucht,  
felbji tm ©eaenfage turn mierenformis unb herzförmig,

pfeilförmia u. *b&l; Ut) VDMbenoxv<sub>f</sub> mi hint Einz*  
*fdbnitte f>at; beo faaync totnn bai SBlatt feime bid in*  
*bat SWitrelfclb retc&enbe ©palten/ Sludfcfnitte obet*  
*ffiuc&ttn 6at; J. 25« POPULUS nigra. gin Labium*  
*integrum if? nad) £frtné an DIGITALIS purpurea*  
*bie Oberlippe; La me lite iniegra fñb fpnom)tn*  
*mlt ttcfuales; Ligula Intègra, bit feme Sin^*  
*fd^ntte 6at/ nöte an POA trMalis. Limb us co-*  
*rolla integer fdjctat fv)nont)m' mtt integerrimus*  
*zu seyn, fo ttie Pet alum integrum t\$ bfitti iff\**  
*Ein ganzes gebeccken/ Pappus integer, ift bit)*  
*einigen dasjemse/ bad ben ganjen ©c^citet bed <Sa;*  
*mend umgibt/ bet) tTiUbenovo badjemige Ulcbavtigt*  
*gcberdjen, bad am SRanbe nid)t cingcfdb>rtittcn ijt/ tote*  
*<m PYRETHRVM parthenifoliu'm\*L Radix integra*  
*bit nit in ibrem 3nneren bo)( rotrb; im @efienfage*  
*ton cava unb loculosa. Integer Stylus,*  
*fonenpm miff simplex.: 9?ad) (Bifrmer'h "barf er*  
*aber noc^ oben einige Jetcpte Sinfcbnitte f)ab.en^Jn^*  
*/e^ra vagina, yan|t ©c&etbe fft btejCtifiC/ tt>eld>e*  
*eine oodfommene JKobre btlbet. Sin ganger ttnivl*  
*integer Verticillus.tft berjenige/ ber ben Stengel.*  
*tinQinmbtt umgibt/ n>ie an LUPINus luteus, CLI-*  
*NOPODIUM vulgare\* (Sine integra Volva, gattjC*  
*QBulft/ iff btejentgc, bie bet) fter Sntmifcelutid bed*  
*©ct)U>ammed nid)t jerreiff/ n>ie an AGARICUS sepa-*  
*ratus. 2>cp 2)ecanboIIe iff integer\* n>ad am*  
*SRanbe bucc^aud nid)t etngefd>mtren obec fletf>etU t(l/*  
*alfo ^ tpnonpm mit integerrimus.*

JNTEGERRIMUS, vollkommen gan\$rftn\*  
 bi'9» Ein inlegerrimus Calyx if! bet) gimte' ber^  
 Jenige/ berweber Mffat, nod)mimpertg iff. Folium  
 intcgerrimum tf! btt) btn bemfelben tin SMatt/ belfett  
 ougerer Rant\* o5ne afUn 3a6n utib o5ne ade tferbe  
 ift/ im ©egenfa^e t>on geflgt, geferbt unb geslbnt/  
 tote an LIGUSTRUM, SYHINGA. Sin Pet alum in\*  
 legerrimum ift an RUTA graveotens.

JNTEGUMEKTA, £>uUen, £)ecf en, & Sute, in torfefoiebener 25ebeutung unb S5e\$ie&ung. *Jntegumenta f lor alia f. Tegumenta. Jntegumenta floris f. An th odium \$&?& Jntegumentum genitalium\*externum f. Perianthium. Jntegumentum Nectaris, Qafsi,* fcecf, aDeg ba^jenfge, tpoburcfc t>at in bem'SRectdrium ent&tattene Jjonigfaff tor Dem Slegen gefc^ugt n>irO; tie Sftatur ^at 'cine unenblic^e 0}?enge ton Sorric6tun^ den (n Mefer 2i6fict) an ben 25lumcn angebrac^t. *Jntegumenta* ftub' fct> Bern^arbt 'au^fd)l(églid) 6a; mcn&autc, ju toelc^en ec 4)U @amenfc^ale, Te^a, ia^ ^elld>en, *Pellicula, unb. ben Umfolaq, Arillus, recf)nt Inlegumenta Seminis accessor ia fittb feci) (&&ttne't'n Arillus unb Epi-dermis ober Culicula. Jntegumenta Seminis propria (£>&nn,, bit fyðuutt, wclfe ben 0amen; fern (Nucleus) fe(bfi umfletben/ unb nuc 6ei)m ffet; men pd> ton f'm (rennen, mann fie ton ben auf; fc&weDenben ^ot^Iebonen {erfpregt n>erben. ijicr^ec rennet (Bárrner bie fufere @amen&aut/ *Testa* > unbbk innere, f\* *interna Memhrana*, unb *Werispermium. Jntegumentum Seminis* ift btx> iTiebicua jebe \$efleibung be^ @amen^ auger bet *Testa*. & rennet fttér)ec aUe Slrten\* btf *Linnéi's* fc^en *Pericarpium*; bit SRebenbefleibungen des 6amend; bie falfc^en tymcatpicn, unb feine *integumenta seminis adnata*.*

JINTER, WTRA, 3 YD 1'f<^ e n / in 93er6inbung ntit frgenb einem SBortC/ bejetebnet, ba^ ba^jenige^ n>ot>ott bit fKtbt if{/ *ficO* jmifcOen bemjenigen fceftnbet, toemit tad 2Bort iñ^ra in S3er6inbung (!e^t; J- S3\* inira-foliaceusy \$wi{<t)en, jnner&alb ber Blätter,

JINTERCEPTUS, unter b u n b e n / toeqn (*id*) *tin fibvptv* in bee SRitte plögli\* Derbünnt # Bernfrarbu SQenn ejne ^6ft(ung burcf) ecfteibeftanbe ober S)ämme# tie Serengerunseti bilbm, bwltiti wn augeti ju fe^tt

finb / unb 6et) bec SReife fid) a6löfen / unfec6roc&en unb in gādjec getfeeilt toivb,. tote *Legumen isthmis intercep turn an CORONILLA, HTPPOCREPIS.*

JNTKRCRESCEKS , abt unb 311 nel?men b/ n>nit flaſter obec 2lefie bafb gifōger balb fleincr wecken.

INTERFOLIACEI FLORES, fimb nacl) £tinné dies jenigert / tfe jmtfcfteu <jc>enubcrf?ef)cnDen Slattern wechs fetocife scleUf fñhi>, nuē an bcu ASCLEPIAOEIS.

INTERGERINA GENICUL4, !tb[&t]e ttlit Scheis fcettm̄nben an &\*onfcrt>cn, n>cnn cine feime D.uermanb bit Slfyvt bet) jcJ>em 9l6faſe DerWUc^t/ fo bag ebm fo'ttèle gaſ^ec aW ©Uebet attffe&en, toU an Fucus filum. CONFERVA scruposa. '.©pnonpm mtt Ccnī-cvja dissepimentosa.

JNTNIOR, tt?a^ bent 9ftiffrtpunffe einer @ac^e tt&er fltf)t. *Intérior Calyx* an ALTHAEA ; fniehior Tunica (&&rtn. f. *Endopleura*. *Interior Valvula* biejentge 6pel;e be\$ fteld)t\$ obec bee S5lumcnfrone, bse na<£ bec ©pinbel bee 2le5ce obec be^ aebrç^en^ ^in jtſeftt.

JNTERIUS DEHISCENS, tt)a^ nad) tnnen auffpringt; J. S.&.intefaus dehiscens Capsula; interius dehiscens Jndusium^ tint Setfe/ bie Xiad) bit SJftttclrtp^e bin auffpringt/ tritē an ADIANTUM.

JINTERMEDIUS, mag jmif^en stvei) Sfteilen einer 53ffanjc bent 6tanbe obec ber germ nacl) in bec SRittC tjt. *Inlermedins Calyx* obec *intermedium Terjgoniu.m JyebvoiQ* btt irinece JJelc^ an einem boppeltett j?e(c&e\*. *Intermedius Caudex*, bec mitt\* lere ©tocf / bejenifle 2&eil etneS ©emācftfed/ metier t^ebec aufmāc^flctgenben nod) juro a6n?drt^ffetgenben **Stocke** ge^ÖCt/ toie an BRASSICA oleracea gongylo-des, CYCLAMEN europaum. *Intermediuta Ger-men*, foenn bec gcuc&tfnoten jmifc&en \$nei> ^elc^en/ lvie an LIMNAEA, obec {tyifeften ^eld) unb 55lumen^ frone, ft>ie 6eo ADOXA fic^ (efinbet. SRan id^lt fte

sehr off JU Um unttvtn, germen infernm.  
*Jntennedice pi ant a bei Bernforbt jillb Tbffitarbe\**  
*Sent in a intermedia lanceolata an CAENDULA officinalis.*

Jw TERNODIATUS . g e g ll e b e r t / bep Bernjarbi,  
 tpfn ein flöspec <wf tauter gletctjen obec bod) febc  
 a(olfd)en S&ciUtt feinec Sänge n a ^ jufaramengefge

JWTERNODIUM, 3 T<sup>h</sup> t fd> e fl f rt 0 t C H (I Ü **d**, ist  
 das Mittelstück zwischen zwey Knoten, oder zwischen  
 zwey Paaren turn %>latttn, oDer smifben jmco 0utr(en.

JNTEKNUS, t)a^ 3mtcre, n?a^ Oer Slcbfe ofier benis  
 5)?itte(puncte nä(er liegt, toa^ sicst inner^alb eineg  
 anbeten S^il^ btfinbtt 60 i({ 5. S. *Jntemum*  
*Albumen* ba^jeni^e, tocld^e^ tom Smbrpo umgeben,  
 unb ton Dtefem introber gatrs t)erborgen, ober mie txm  
 einem 9ltnge umfc^loffen roirt), fo Dag/ n>enn man Me  
 <§amenf>aut abjte^tr man ben blogen unbebecitjen **Ems**  
**6ct)**0 fiebt *Jnlernus Funiculus, bev}tni&e Theil*  
*btt 9?abelfct)nur/ tt>cl\*cr turn bet @amenfd>ale bis*  
*rum gelbken gebt Hilum internum f. Hilum.*  
*Jjderna membrana seminis iit bty Gärtnern*  
*jene J?aut/ tie tēn £ern junac^fl unb febt genau um-*  
*f let bet, ton bev Testa gem log gefrt> unb meistens*  
*^äutid/ felten fcftftammtd (fl 6ie M feime £effnun*  
*fonbern bilbet einen twUfommen gefc^loffenen &a&,*  
*durch beffen äußere Slac^e bit 3labe(fc^nut unb bit*  
*Nahrungsfl & äße laufen/ meid>e (fc auf eine unmerfo*  
*lic^e SBeife tn i&ret inneren ^öbluns öffnen. Sin t&c*  
*tfl bee ^>agcl, Chalaza. etc fc&U 6ftert/ fc&eint*  
*abec no\* öfter^ bloß \$u fe&len.*

JINTERNUM PERIANTHIUM ty&d>enborf f<sub>#</sub> Co\*  
*rolia, Blumenfrrone\**

JINTERNAL PERIGYNAKDUM, Reefer %>*Corola*  
*la, Blumenfroni.*

JINTERNAL PERIGONXTJM, ^>ebw»S f *Corolla,*  
*Blumenfrone,*

JINTERNAE PSETOOPARASITICAE f. *Parasitic* tt<  
 JNT\*RNAE SKCUNDINAE. Jpfc&er 8\*f)6rt das **Eyweiss**  
**(Albumen (Barm. *Perispermum* Züss.) und**  
**bet Spotter (*Vitellus* (Bärth)).**

JINTERUS UMBILICUS *seminis*, bet iſtſtcre **Yajjet**  
 bea ©amene, jener spunet, roo Die Siabelfcfomu: mit  
 f&ren @efäßen fn bie et^ene ^aut bed fterned eim  
 fcrtngt Sr liegt meiffeng unter bem Slcugcren; ju;  
 fteilen eiiDet ftcf aber Ote SRabelfcfrnur, nac^Dem fie  
 durd> bie äugere 'O)d)a(e beg @ameng ^cbcungen i(l<sub>f</sub>  
 art Dec entflegetigef^ten ©eite/ unb bilbet bafelbfl  
 tintn *Qtfavbtcn* runben %U&, ober eine Heine <£vf)abw  
 f)Cit, *Chalaza* bet) (6«rtner'n genannt.

JINTERPOSITUS, tt>ag gmifcberi abnlc^cn X^eiten un;  
**ähnliches hingestellt iff.**

JTERRDPTE PINNATIM / *Utlttbt \$d̄en gefiedert*  
 ifl ein sefiebertfg S3(att, jtt>ifd)cu beffen \$laſtcf>en ab;  
 it>ecbfelnb fic^ fleinere beffnben, n>fe an SPIRAEA **Fili-**  
**pendula**, AGRIMONIA.

JTERKUPTVS, *unttthtofytx, xociiabmec^fclnb*  
**nahe** imb *tolt* Don einanber *abftet>t*, B^n&./.ober  
 toad mit Sbetlen Sefegt f(T, bie fo gefiedt fmb; fo i(l  
 I- 55• bagjémge *inerruptum* *Amentum*^ ft>£ld)C\$  
 me^cere Slumett ober fc^uppen(ofe 3n?tfcf)cnrdume ^at /  
 ft)ie QUERCUS *pedunculata*. Sin *Anthurus* *inter-*  
*nipt*™, tmterbro<\$ener 0d>u>etf/ bee mebrere'blu^  
 tnenlofe 3mifcf>enraume ^at, tx>ie an AMARANTHUS *Uvi-*  
*das*. *Interruptum folium* nemt B&U. eitt 56(att/  
 fceffen Slad>e fo, tt>ie an bem *Folium continuum*,  
*tint kuibteitund* ber gRittefrippe nad) bepben @eiten  
 ^in tfi, bie aber# befonberg flcgen bie Saft6 **hin**,  
 Mirch Sinfc^nUte an ben ©cittn, tt?dcbe big tut **Mits-**  
 teUippe trfngen/ unterbcod)en toirb. 3Diese **Einschnitte**  
 <tnb immer Heiner a!g bag (Snbe bee %>lattflad)t, unb  
 flicgen an tf)tcn SRänbern immet mit bem SRanbe ber  
 SMattfladK {ufammen. *Interruptce Lamella* ftnb  
**synonym** mit *invquales*. *Jntcrrupli Sori* **ünd**

(inienformifle £aufcf)en, bie serabe focflaufen / lit i&rem Saufe aber iffetf unterbrod)en roerben, ab)Ct}C|i, tOlt an WOODWARDIA. gjne *interrupta Spica ist* friegenige, «« toelc&er jttHfc&en Den Slumen fid) leer\* SKaume jci^m, fo 0a§ Me 6pinDcI OaDurd; nacft ci^ fc^eint ©re Slumen fcürfen nbcv benn nid)t in Quiw (en flebem Eine *Spica interrupta tann* aucht fcure^ jn?ifd)cu ben Slum en fiebenbe flätter unterbroc^ett tOtVbm, tt>ie an MENTHA *sylvestris*.

JINTERSTINCTUS, burcf; trgenJ) eine (*Stitibuttoanb o&ec* SSecengerunfl getrennf obev abgefc^t, *Interstinctum feptis transversis-* f. *Loculosut. Jnler-*  
•*stincla vasa 2\$ilber&pcf (• moniliformia*  
**v o s a**

JINTERSTITIALFS ZONAE, 5 vd i j'D c n r i n g e / tuinfte xlingförmige Slbfä^e an ben gaben bee @onfert>eny bit ton ben ©amenrimgen (*Annulis Sporangiorum*) gebilbet tverben. 9)?an ftebt fie an CONFERVA *muralis*.

JINTERSTITIUM, ^xvifebentaum, ber 9iaum jtt>ff\*en jmep auf etnem brttten (iebenben Jtorpern\* *Interstitia foliorum*, bee SRaum \$mifc(;ett jme^ Slattern.

JINTERTEXTUS, r c r (I r i cf t / foenn me&rere 8inic» int)crfc^tcDcnen9vic^fung.cn in ejnanber greifen/ tvie j. 33. die j^tacbeln an bee J?n(fe oon MEDICAGO wtertexta.

JINTERVALVIA DISSEPIMENTA, jtotfe^en bin jffa^pen ftebenbe ©cfreiben>anbe/ tt>enri fie an bem jmifc&en bee SRa&t bee ^lappe befrnblicfcen demeinfdaftHd)en ©a^ menboden eingefult ftnb/ wie an BLGNOMA, G^AUCIUM, unb an alien toat)ttn<sub>m</sub> ®d)otcn, fto baß *Septum* banti natft t>aftet>t/ n>enn bie ^appens abfaOcu.

JNTESJINAE PARASITACEAE f. *Farasitica*.

INTORSIO FLANTARUM, bet) flinne bit **Bindung** otec Sre^uns einec ipflanje obee ibrer Sbei le nach einec sefoffen ®titt f. *dextrorsum* umb *sinistrorsum*. *Jnlorsio tyrgmetrkuj* f. *hygrometric a:*

Die £>ecfblättd>en an einigen Cräfern/ \$ S3\* an PANICUM viride unb an CYNOSURUS.

INVOLCRATUS, etn gefüllt, um^fillt, n>a\$ mit einem fußl)en ober mit einer S?üUc Drfe&en iff. ©o foaben n>ic einen iuvolucraius Calyx an CENTAUREA Benedicla; etn Capitulum involucratum, toenn eg an bet SSaftg mit Slättern umgeben ifl^ bie ton ben übrtgen Slättern ber ^flan^auffallenb tcr^ fd)icben unb ben \$ül!enblättct)en af)nlic5 ftnb/ n>ie att STATICE Armeria (ARMERIA vulgaris); einen involucratus Fructify ftenn ber Stucfytfnoten Don !JkU leti/ Die außer ber S3lumenfrone ober bem Relche UtQCn, fo umgeben if?/ bag er baburcfc enttveber gng / ober jum 2f)cile terborgen tfl; toie an GUPRESSUS, JUNIPERUS; écnt involucraia Nuxj it>cmn fte` ton bent ^elcbe ober ton ber 95urnenfrone ober Don bem 3?ef; tarium ober Don ber £üde ober ©c^uppe ein^efc^Ioffett ill/ tote an ber Saflame/ Bu4>e/ ifi4>e, an bent Sajrbaume\* Sttten involucralus Pe dunculus , tvenn er mit einer 3irt Don S)ecfb(attern umgeben ifl^ t>ie an ben pulfattllen; einen involucratus Verticillus ia eben bem (Sinne n>ie Capitulum involucratum, an CLINOPODIUM vulgare\*

JNVO^UCRUM, <?>u[Ie/ recfynete &<nné phil. bot. Cn 3)?abl uriter bie Fulcra, efn anber ^af)! unter blc Seld^e/ iiib befintert ed'alg: „biejenigen%lås ter, bie an ber 95aji\$ einer 2)olbe f?ebcn.“ Die flatter, bie an ber SafW ber grogen (ber allge; meinen) ©olbe fle&en^ unb biese umgeben/ nannte er Involucrum universale, allgentefue 4>uVe, uub btejenigen / bie an ber 95aft\$ ber tint\* ten 2)olben (W)en, (ber einjelnen; Me§ ct Involucrum partiale, befonberc <^ulle / '&&(Icben. Er jaßt^bte flatter an ber ^uÜe, unb batte fo ein Involucrutfi monophyllum, diphyllum, u, f. to\* big decapkyHum an ARTEDIA\* ©ie Sieueren ge^ foalhken Wuibtu&t 'nid}t immer tm @inne

**Linné's.** So ist ben Bernhardj *Involucrum commune* jene \$iiUe/ bte meſcrere QMimen gemeins fcf)ttfltd) limflibf/. Mb *Involucrum proprium* dies jcuiige, Die nur erne 35lume umbullf. Sewer iff he) tbm bann ein *Involucrum universal* fcor&anben, iſcann me&rere S}uttm tvicbcv tatt eiuer anberen mnge; ben WQdbCH/ utib *Involucrum partiale* if! **dieses** ntge Jpiille, MI umgeben miib. 60 oft alfo **das** &inr:efd>C / n i' oZu crum universal^ fe&lff/ **würde** bad *Involucrum partiale* Jum *Jns> olucrum nniversalc.* 9ec& tte&c tveic^t SDecanboſle t̄on bitfeit **Begriffen** a6. ^5cp i&m if! *Involucrum*, ^filfe, allgemeine H̄iitte/ elite flemiffe 3uramroenfleſſl und tort ^ ecblättern f(einen Slattern, bie }uuad;ft **untet** bee Slutne fieſ)Ci / (&fwrt aurt) too&l nur ein einjtſled 58latt) • roelc&e bie Slutne cber bie \$lunien junad)f{. umbiñHen, ©?an nennt fie 6alb ©cbuppen, 6alb ©prcußrrrcben/ balb Blartc^cn. iDecanboſle fct)ktgt Dot/ fie Immer nur ©ecfbarter ju nennen/ unb rennet ju ben £utten: S)ie ↗ 6114> c n / (*Jno\* lucella*), bie <5>^lsf rauſe (*collaria*), ben ge; mein f^ aftlic^en \*Xelct), bte Blunten^ f4>ci&e/ unb bie @pel\$e, *Involucrum Jlo~ris* mirb b&ufig fur *Anthodium*, unb *Involur crum fructus* fur *Pericarpium* gebraucht ©ad *Involucrum filicum* *Qmitl*) if! bad *Jndusiutn* ber beutfd)en 5?ri)ptogamo(0fien. *Involucrum gemma* Qoavtn. / bie riubfuartigen ©cQuppeu/ meſc^e bie eigenm Sbeile ber jfuoepc jleqcn augere \$efci)abi? fiungen fd)uf;en/ unb.blog mit ifyrer %oafid iufantmcu^ hängen, balb binfallig unb baſD 6ett>enb ſiuO. Die **binfälligen** / *Involucra gemma* cad up a finb bie *Ham en ia*, unb bie bleJbe/iben / *Involucrum gemma: stabile* {into bte <?>lure der, & wie; belartigen Propago. *Involucrum genitu-Hum*, f, *Perigonium* ^rhärt. Das Jnuo.

*lucrum genilalium masculorum an ben sjRoofcn, bCt Um{d)hg, iff bag Perianthium\**  
*©te Jnvolucra lignea iftalpi'g&i fitib bit Strata lignca, unb cutcf bin Slfng unt) Die SSulft an ben ©cl)noåmmen (jbmuzus unb Volva) betracfrtet man aid cine &ul'e an ben. ©c&toammen. Jnvolucrum i(i auchr bie allgemeine nid>t auffpringenbe S)aut, bic bte ©amen bet 3)?arfleaceen umgib# Unb gar fftr o/t d^ltcn Brae tea fui tin Jn v o I u crum.*

JN V O L U T I V A FOLIA, e't n g e r o l l t e B l o t t e r /  
 nenntjDecanboUebiejenfflcn/ bie0nne' in ber Snoepe  
*involuta nawnttt* toentt bie be^ben 9Idnber fid^.  
 nadf innen auf fid felbfl fptralf&rmig einroOen/ n>ic  
 am Tlpfelbauuie. ©letridt) tvta, bag bie ©pige  
 tufey tunen ^eroHt fer>

JN V O L U T U S, e i n g e r o l l t / nacl)eintart^seroUt;  
 mcim ein 2f)Cil bei\* S(åd)e bet £)berfcitc fpiralförmig  
 um(jcfcl)la3cu iff. 3nbeffen bat ed bocf jutpeilen etgene  
 35et>cutuu3cn. *Jnvoluta Cotyledones* nennt man  
 auchr bie uncntmicfeltcn ^ot^lebonen\* *Jnvoluum  
 folium* flans in ^ acmof)n(td)Crt Sebeutung auch  
 auger bee jfnoSpe/ wie an PINGUIOULA vulgaris,  
 BAHBULA rigida. 25ei) ben 53?oofen jeboct) bes  
 l immt cd tPiUbencm? aM ein 93latt, t)a^ mitt bet  
 @pt6e auf^ unb einfartg geroOt iff. *Jnvoluta^em-  
 ma ||>k involutiva Folia.* (£|n *involution* Pe-  
 talum iff an AMETHUM, mo eg jugleicb einwdctgunb  
 auftvårtg gerofit if» (Sin *involutes Pileus*, beffen  
 dauber aufgerodt merDen, n>ie an mancfyem ©d)mamme  
 tm 50CC. *Jnvoluta radicula Embryojiisy* noenn  
 fte felbfi bie 31d)fe bed £m6rt)o^ bilbet, unb bie tfo;  
 tplebopeit/ fo urn biefel6e gemicfelt ftnb/ bag fte ben  
 grôgten 2f>etl beg 2Bur\$efcbeng ber bergen. *Jnvoluum  
 Stigma,* ttenn bie Spigen etner get&eilten SJlarbe  
 nad) einfattg gerollt'finb, ©. *Convolutum.*

JN VOLVENS, e f n b'u 11 e n b , ir\$cnb ztcoai<sub>f</sub> bai  
 etwas anbered ein(juUt/ j. S5, *Corolla involve*<sup>TM</sup>

*Filamenta>toit bit Obeclippe an MONARDA. / n-volventia folia, stenn an 5>, blaſtti&tn SBläſſeſen toabrcnb bet 9lad)t (tm 3\*laſe) bie 5 95ſatt\*en ft\* aufwärts ci\*fen, naſf bee (Spige &tn ft\*' gegen einanbec neigen / tit bee SSRittc a6cc ft\* Don einanbec cntfern, fo daß ſte eine 2(rt t>on @emölbe bilben, ba& bte Sfumea ſchügt; z. B. an TRIFOLIUM incarnatum.*

Jovis SIGI^, z|., ba\$ %tii)tn, ba\$ eine 9Jflan\$e Veirenntere / au^bauere\*

JRREOULARIS, unregelmäßig iſt / bejeic&uef eih Organ/ beffen Jf>ei(e nid?t ade eimanbēc äf>nlic& ftnb. SQenn tnbeffen bife Uñq Widjtcit cine gemiffe 39m; metric befol^t/ J. \$., n>enn ein droſeced 3taubſefāg regelmäßig mit einem ((etneren abn>e\*fe(t/ fo Qibt bie§ Feme ilncegelmaſiglſeit / fonbern t>ie(me^ ſtie^clmagt^ Wt. JDecanb. Irregularis Corolla iſt bei Jltnné Otejeitſe^ beren 2:(>ci(e if>cer gittr, @rōge urtO 2?cr; bā(tni[Ten nad) t>erfc^teben ftnb/ n>ie bie Slumenfrone t>On AcoisiTuvr, LAMIUM. • 9IW irregularia Filamenta fu&rt ec bit @taubgefage an LONICERA an. Ben Bulltarb iſ{ ein Selc^ obec ^in; Blumenhont unregelmäßig, ir regular is, wenn bie Sfceile, woraus ſte beflebett/ in Sejus auf ben Slumen|lie( fc&ief fleben obcc.ftc^ fc^ief augbceiten/ unb menu ept^ tocbeſtpde bife £f)ci(c, ober n>enigflcn^ bo\* einicje, icbodr ttid)t regelmagig abmedjfelnb/ beucli\* tut^lcic^, obec einanbec tina&nlid) ftnb; obec roenn bie Siblje, bit bann gero5f>nlid) fc&ief auf bem SBIumeiſſielc fte^t / Quffadenb untjcſtaUet ifl/ obec ft\* in eineit un^U'tcl) fletfreilten dlanb t>erlan^ert / etutvebec nuc nad) cintt Sctte bin, obec na\* 2 gegeniibccfM)cnben @eiren / fo ba\$ bit Stnf\*nirte nie'in glel\*ec Sntfernund bon bem 5TOit(elpuncke bec OcfTnung bee Siobce obec bc\$ @runbe^ bec SMurae ju fieben fommen. Irregulurcs corolla polypeialte, unregdmd^tse vtelbl4& tr̄e Blumentronen ftnb beo €ni0Cii bicjcniflcn, an mclc&eu bie 33lumcublätter auftallenD mtgleid; ftnO

J&ier&et rec&nen fie bit *Corolla papilionacea?*  
*ringens polypelala*, unb *diptera*, ober *bialata*. Unb *Irregularis monopetala*, nnttQth  
 mäfg ifi cine einbltrige Blunienf rone, noenn Me  
 Jappen becfelben ungleicfc ober unäftnlicO ftnb. ©afjin  
 rec&nen \*fie bit *Corolla unilabiata*, *ligulata*<sup>^</sup>  
*bil ab iat a\ ringens*<sup>^</sup> *p ers onat a*, *cucul\**  
*lata*; un>. fogar *orchidea unqk ap Hi on a-*  
*aea*. 95e9 EDiUbenotD *Qibt cf dUx teine tinre\**  
 geliti40ige c in b II trr ige Blumenfrone; bei>  
*i^ra i(l bie Corolla irregularis btejentge*, Die a|xi  
 Diet\* ober mestreren 35lumcnblättern bcstefx, melcfje Don  
 terfc^ebener Sätire unb Seuguncj ftnb, fo ba\$ fit fid)  
*X|id)t UllUt bit Corolla rosacea, malvacea, cru-*  
*ciata*, *caryophyllacea*, *lUiacea*, *di-polypelala*,  
*papilionacea* unb *orchidea*, bie bci> t(m olfo aHt  
 vegclmägig ftnb/ bringen laffen\* *Jrregularis con-*  
*textus cellulosus VDiUbenoxo i(l ba^ unregels*  
 mä§ige SeDensemebe/ bat t>or\$üglc& in bee *Kryptos*  
 gamie b&c^fl mannigfaltis iff, an n>elcbem bie 3edcn  
 feine cegeima^ide Sorm baben. *Tela cellulosa*  
*irregularis bet) Bcrnfrarbi.* *Jrregularares Lacuna*,  
 bie man mitten in ben Slättern/ in ben §nid>tboben  
 iu a. Xbeilen ftnbct, bie t>ie( SeQgeroebe ent^alten.  
*Jrregularia locul amenta*, totnn fte, Utpleidy  
 tertbeilt/ an ber 3ruc&tad)fe nicht dleicbmagi^gegen  
 einanber gcueigt, nicht Don gletec^et ©rogc unb §orm  
 firth. *Jrregularia receptacula a'dris accidentalia*  
 ^.*Lacuna*. Q>.a\**anomalis* unb rf iffo rmis.

JR REGULAR HER, II tit t g 11IH I \$ I g; { . '95\*  
 · *irregulariter incisa Corolla*; *irregulariter de-*  
*hiscens caps til a*, quer, uub dyne Orbnung/ n>( an ben FiLICKS; *irregulariler dehiscens fructus*;  
*irregulariter dehiscens Peridium*, tin unregell  
 mäfig jerrct§enber Umfc^lag/ ber auf t>erf\$iebene Sirt  
 unb in ungletrfje 6tucfe jerrei^t/ tvte an NIDULARIA?  
 TRICHIUM\*

JRREPENS RADIX, tfl<sub>#</sub>6\*9 Batfcfr *tint* SBurjel,  
bie auf *bet <irbt ttidt)*

JRRITABILITAS, KeiQbarPett/ jene Kraft/  
tooburcft bag 3cGkngeipebt einer lebenben ?)ffanje/ tt>enn  
gewisse 3tef@e auf baffVlbe eimnirfen/ ft\* jufammen;  
zugiehen bermag. ff)ei!C/ an n>eld)en ffcf) bicfe Xcaft  
vorzüglich áullrt, nennf man bann fcorjuggmeifc  
reitzbar, írf^Pa6//e. So nennt man Die Otaub\*  
gefäße an' BERBERIS vulgaris, *Filamenta irri-*  
*tahilia; bit* 92av6e an MARTYNIA proboscidea *Stig-*  
*ma irrilabile.*

ISANTHERAE, 93ffanjctt / beren @tau6sefa0e **gleich**  
**lang** fmb.

ISEUTHYNTON, f, *ereclum.*

Isos in 3ufammcnfeßungen mit gniecftic^en Wörter  
tern bebeutet fot>W aW *a quails*, gleid?, 'u brc &upt.  
Sumdlen bebeutet ed jeboc^/ n>enn eg dor bem 92a;  
men trgenb eineg *Ot\$ane\$* fcftt, ba§ bagjenige/ bem  
eg Dorgefegt ifi, in &kid)tt 9(nja^( mit bemjentgen  
bor^anben i(l, toomit man bagfelbe t>erglcic^t; fo  
nennt jailer jene ^Jflianjen:

JSOSTEMONES, *bit tbttt fo v>|t|* @tau6gefäge *a|i*  
S5lumenb(ätter fyobtn. S3e^ anberen gingegen 6e\$eid)/  
net eg ^ffanjett, beren @tau6gefäge gletc^ (an^ ffaO.

**Lor** **H**MIS INTERCE1\*TUM , f. *JntCTCeptUSj* fyO  
*turn isthmis inter cep turn erf* (art i(i. 9J?an  
feat audt eitt *Isthmis interceptum folium* an  
CHARA. unb ZOSTERA, unt) eine *Isthmis intercepta-*  
*ftionsy mit tJcrcngerungen*, wenn ber .UBebel r66^  
ttnattid fortlauenb/ unb öfterg jufammejo^cn iff/  
fcocf) fo / ba^ feine \$&b(ung ni9)t unterbroc^en n>it»  
3. 25. CONFERVA *intestinalis* in tfjrcr ^3oUtommmf)tit.

ITALICUM CLIMA, *italienifd>e\** Zlima,  
ift Uy 4>aym bai ^Hma aaer Jánber, bie auf bee  
nörblicften ^emigr^ärre itoiftn bem 46 unb 33° 9?.  
SB. unb auf ber füblifcen • jmifefcen bem 45 unb 33°  
§• 35. (iesen. \$fTan)en aug biefem ^lima bertragen

gio

JMM. JMP.

n>o&l *ben* Cōommer *Ut)* ut\$ tm gre^n, mügen a&ec  
cm Cinter in *ba\$* falte <>aue (*Frigidarium*).

JUBA, 4Ti<fl>ne, me&rere langc br> einanber  
ftel>enbe.£aare ober feine Sorflct^unb Crannen/  
n>ie on HORDEUM *juhatum*. S5eo einigcn Sllten bejeeć^nce  
e^ *Panicula*.

JUCUNDUS i(l 6eo Bern&arbt IÜI erquirfmbec  
Cefc&macf.

JUGUM, Bl^ftc^en pa ar, jc beg^aar bepnafte  
ober tjo((ommen gcdenuüber(?^cnbec 25ia tt^cn etned  
gefieberten Slatted 5Wa n jáblt biefe Slatc^en, unb  
€^ält fo *tin folium hijugum, trijugum* K./ je  
nad)bem 2, ØK. \$la ttd)enpaare Dot^anDen finb. S3r>  
(Barrner. finb / u ^ a aud^ ble Ktpperi/ *Costa*,  
<uf ben Camen, j. 95. an bem *Umbelliferis*.

JULIFERAЕ, bet) *Hermann*, jailer unb 2ttlioni  
Pflanjm, m>dt)e 2\^c^en, *Iulos*, tragen\*

JULUS t{ fpnom mit *Amentum*. Set) (Bärt;  
nern bqeicf>net e£ jeboc^ bie länglic^e toeic^e 5\*rud)f/  
die aug bent/ n?a^ Jimnē *Amentum* nennt/ jutveilen  
entflebt.

JUNCIFOLIUS, tva^ Slätter n>te eln *Juncus fat*,  
tOit NARCISSUS *triandrus*.

JUSCULUM, J&rübe, ift bt) Bern^arbí line  
meifieng fd}leim^e SRaffC/ bie an tinmen ^U<^» bie  
S3cutbct)älter umfcf)Ue§t, nwé an P U A U V S *impullicus*\*

## K.

KERMESINUS, f4rmeftnrotl>, bet) Decand,  
KINIĆUM ACIDUIVI, C^tna flure/ cine Pflans  
zensdure, beren Cigenfc^aft bie S^mie (efrt\*

## L

LABELLUM, f~~k~~ Barb a unb Corolla orchideae.

LABIALIS, næf nur an ber Lippe. ©efc&macr erregt. Bernh.

LABIATIFLORUS, (*flos compositus*) *lipt*  
penfd r m i fl f j u f a m m e n g e f e r j t e SBlume,  
feenn Die SlumcfKtf 2 Nippon scaben.

LABIATUS, lippig, ifl ein einblättriger 5Ed>  
\*&r eine einblättrige SBlumenfrone/ beren ©c&lunb fief  
entnoeber na<fliper ©eite, ober narf) \$>d gesenüber;  
stehenden Schterldn^crf; tm erftcn Salle if! bet  
j?eld) ober bie Slumcnfronc etfiltppig,-2a&fa/u5,>  
^orju^meife/ obcr *unilabiatus*; im sn>ei)ten  
Satte flnb beobe jtpeylippig/ *bilabiatus*. S8d>  
fttnne' ijl *labiatus* fpnonfym mit *ringens*, unt)  
*personatus*, toofilt' ilinne 'nut *ringens* Qtbta||d)t  
toiffen 'ttnll. *Labiatu*s *Floscnlus*, (ippfenför;  
mtgea 93lūmd)en, n?enn bie \$6f)re jcbeiJ einjelneti  
Siūmc^en^ einer jufammengesc^ten 35lume fief) an bee  
©pi&e in 2 un^lefce 2ippen offnet. 'En *Stigma*  
*labiatum* i(l an MARTYNIA *proboscidea*. *La-*  
*biates* (tūb £)rbnan^n bep Courncfort unb Juff.,  
bfe flrogfen 5f>eiW SLmne's iDitynamiften 6e3retten.  
@< *Bilabiatus*.

LABIUM, £ ip p e ,bit WttianQtvimQbt\$< Sd)li|nt  
bti etnec einblättrigen 95(umenfrone ober eined tin\*  
blQjttWn tfe(<\$ef nacht einer ober nac^ jtoct) ge^cn^  
ubW&enben 9itcf)tun9en. 2)ie obere Sii>pe f>d§t ftx>of  
an ber \$Iumeni?rone/ bie entmeber rac^etffScmig ober  
magfiert ifl, n>te am 2\eld>e, ber metfiend gejabat i|?;  
*Labium superius*, (Dbeirlippé/ bie untere/ llfi;  
terhppe, *Labium inferius*; an erfterer heißt  
jene Jyt|m, *Galea*, bife suweilen B^ ^ / *Barba*.  
SBenn bte £)6er(ippe fcf>It, unb nur bie untere vor;  
^anben iff, fo nennf man ein^ fofc&e S3(umenfrone  
borjug^meife *Labi at a*.

LABYRINTHIFORMIS, t>ertt)orr, en d^°d^tt unb ge^  
ttunben ober gefurc&t/ ivic bie SBlattctjen anbett  
en.

LAC, VTWd), erne 31rt eigenen ©afteg, oder eine Slrt ton Smulfton/ Die fefor flftgid / undurchſchier- tienb/ uub nieifleit\* tt>ei\$/ rote 3Rilcf) ifl. atfemi ftc aucft gefärbt, j 33. gelb, tote an CH/LIDONIUM, iff, fo iff fie bodb bet (fenffffens nacl) He 3Rf(d) åbt?lic6«

LACERATIVUS, tft/ bep iDecanboIlle, n>a^ an Dec S5aff£ obev an Oer @pi@e tiefec aid itatnb anbtttim eiugerc&mitten ift. ^^

LACERATUS, sewiffen, tvenWTe Sinfc^nitte fe!6(l rateOer uttreselmägtl delappt ffnD.

LACEITUS, jcrrtfperi/ ^erfc^Itgt/ am SZanbe in nngicidjc Zbeile unorbmtlid) au& nnb tint geriffen; \$ S. lacerus Arillus<sub>y</sub> an FUMARIA Capnoides, MYRISTICA moschala. Calycis squama lacerce an CENTAUREA Iacea; Corol<sub>m</sub> la lac era bettn ©aum fet)r fein jerfd)ntttert ift, an SO LOAN FX LA; lacerum Folium > an SONCHUS lenerrimus, GREPIS lectorum; lacera Ligula an POA rigida; lacera Volva an ben metjlen 93il\$?n.

LACINIA, bei) Kdblmg 3lu6fd>n!tt/ bet) Willdenow Einstnitt, bei ipfel, ein Curd) £>ud)ten/ 2lu^fd>nitt obec ©palten an einem S3(atte ent({anbenec bert^orfprindenbec Sbefl / ber fdjmcd, unb burcft beonabe ^erabe 8tnnen b^rānjt ift, 2hud> an bent emblätfrigen Sitledje unb anr ber elnb(att|||ett SSIumcnfrone/ (felten an ber t)iclb(attrigen) nMte £iinne ba^jenige/ »oburc^ bicfe thtxlt a, 5, 4 und mehrspaltig itjerben/ L acinia iHinschnitte, ohne etwas genaues über tbten tlnterfd)teb zwischen Zahn unb Happen / Lob us, ju bemerken. 3eber bur<\$ ©paltung ober Sfjcifung ent({anbene 2beil bcrfelben ist ibm L acinia. 3 Lobus unb Limbus.

LACINIATUS, gefc bliQr, tpenn bee Vorsprung unb bie Sud)t 2Binfd bflben # unb bte Sbeilungen bis jur g>ittc#unb fiber biefelbe veitibtn, Bern&. SBenn bie @infd)nitte fo fctn u>b jaf)reic^ ffnb / bag man burcfr\* aus fctne Siccjclmaßiafcit baran toaf)tnnf)mm tann,

JDecanb. SBenn *tttoai am SRanbe in ungleic&e / lange unb female £&eile gee&eifl iff, unb Otefe S&eile wieder auf etne unregelmägige aueffe ger&cilf fmb.* Seç *Flos laciniatus* be\$ fournefort iff 6\*9 £inné F7o5 *multifidus* tin *Foffbm laciniatum* ift an BnASSicA *oleracea laciniata*, CICHORIUM *Endivia laciniala*. Es ifi off fpnotmm met incisum, dissectum und fogar mUfepřzspum. *Fetal a laciniata* finD on DIANTHUS *superbus*. faayne tOifl tin *Folium laciniatum* mtf) t an bem 8au6e bet %UtyUn, a|i an den i&fattetn anbem ©ewácf fe fmben\* *Laciniata mar go pilei* ifi an bem J^utem^cerec \$i(je. *Laciniatus foliaceus* Thai I us, 31'pfeltg' Ulttrtg, n>enn b*< i& Uub o^ne btftimmtt Otbnuns* in me&rere fcfc)mate S6e((^ a6gc^iU ift, bit toitbtt auf a^nlcc^e 2Jrf a u ^ 9cfcf>nit^n, unb an 6epben ©efftenranbern t>on fafl d^fc() (aufenben iiniin bt&tañit fint>/ tt)te an PARME-LIA *Prunastru*\*

LACINULATUM FOLIUM, mff t>iekf fldnen.unre^ gelmägigen Stnfcc^ntteen.

LACRYMIFORMES GLANDULAE, untett con&fr / oben ttouñnt. 3te litgtn nath bee Kicfjfung bee Skfrfe be^ 2^il^ / auf mefefjem fte Dorfommem

LACTARIA VASA , iT J il c b g e f a f e ; äugeiilbünne (5a^neben einanber finb erf! 1'' breit.) t)o(lfommeit fa^lftföcmigtge, einfacfte, gleid&btrfe ©efafse mit aupew orbentlicfc bünnen burc&ftc&tigen SBänben^ t>el\* e SKtlfca faff enf&alten. 6ce (le^en gebrängf/ unb 6ilben|afe^ tide SSünbef, bie man in bee Stinbe manc&ee SBueiebt wnb 6fengel/ felfen cm 9J?arfe beefelben unb ba nut etujcln, abtt and) in btn S3(ätteen noc? antrtffft, unb in ben Sluffonn Berntarbi.

LACTARIUM CAMBIUM, tfTULc&faft, ^n un^ 6uec&fi<fi,^ obee butffldbtintnbt weiffer obee gelbee ©aff in btn gRa^gefäicn, ber (untee SScegögeeung) aug Meinen an etnanbee gebeängten fuge(n ju befleften fc^eint, bie in einee Ourc^OcOfflen gliigiflfett fd^immen.

LACTESCENS, m't l\$ g e b e n b , tt>a<< 6\*9 ttgenb dnet SSetlegung einen weifjen obet. flelblic&en ©aft gfbf/ tt>le Die j£upforbien, bie £i4)orauen, (lac\* lesccntes bet) Uiorifon) bai QM^LIDONXUH , die AGAHICI *lactifluū*

LACTESCENTIA? bad SRilc&geben 6et> Pflanzen.

LACTEUS, ^n t i p t o e t ' 0 / matt roeff?/ etwas Durd)fct)etcnt) unb in'd ©elbli^e zielend Decand. In's Bläuliche Bernh. Ben Willdenow ist es sy: nonom *mit can did us.*

LACUNAE, £ ü cf e n , fint> na\* Wl'rbe! Höhlen, ttelcste tn Dem ^nneren Der ^flanje Durd) Zerreißung des Zellgewebes entlef>en. (Brett) nannte sie Röhren, Höhlen , aud) Ularföffnungen. Jtmf aber jufädige Jiuftbe&llcr, unb unterfcbetbet frier 3lrlen Derfelben; unregelmägige, rd^rige, regelm^tgc, sellige, S3eo tPiÜbenotc finb *Lacuna* ober /u&u/z jene iiucfetw Die meijieng nut in audegbtlbeten/ felten in jungen Pflanzen durch bie 91udbebnung bed.3tammed unbbad Zurückweichen bti SeOgeroebe\* acbllbet totvbtn. Sie bilben fenfre\$t burcf) ben ©tengel bin laufenbe Röhren, n>oton mniQfttni eine gemobnltcf; in bet ?O?tte fcorfommt/ tDiean SGIRPUS *palusiris*. SuiotiUn fint) mcbre btefer SRobren regelmägig t>crtf>eilt, tt>ie ait FOA *aquatica* unb an Den 93(atff{ie(en bet CAUNA , an tvelc&eu bie ©tellcn, n>o fpät(t>in biese Röhren ctfe^einen / in bet %uQtnb mit einet 9 rim en gftatmc angefuUt finb. 6e(ten finb fie tegelmägis f{etnr6tmig. 32ad> HmF unb 6ennebier finb fie mit atmogpftdi'tfcfyit £uft auggefuat.

LACUNOSUS, mi dtogete Surfeit &at, alt bai (log jedide\* 9Iucf), abet feftt metabifffcb / itgenb woa&, bem ein Sbeil feftlt. SDecanb\* ©0 gfbt eg *Lacunosa Cotyledones*, Die auf ifetet tnneten ©cite mit gtoben unb bicfen ftalm au^gefutc^t finb; ). 95<< an bet Bud>e/ unb einen *lacunosus Stipes*, bet auflet&alb Serttfunaen bat, n?ie an HELVELLA

*sulcata*. 3n einem anDeren ○inne nennt man aber *tin SSlatt t>ertieft# Folium lacunosum*, totnn es an feiner unteren glac&e jn>tfcf)ctt ben 2iDeru **Erhabens** (etten &at/ un(f ffi ,*Obevflåd*)t DaDurfe SBertiefungen er&alt *Lacunosus stipes*, an einigen SPcljen. *Lacunosus foliaceus T hall us*, grubi'S/ bl<ftting, wenn auf 6er oberen §(acOe t>tde (tarfe SSertiefung^u sich jetsctt, # au^fe^en/ aK ob fie *buvd*) *dinbvüde* tinti am ○runfcc *flad}tn* unb ebcnen jlörper^ entflan; den wåren, J. 55. an PARMELIA. *pulmonacea, fraxinea*. Bey einigen ijt e^ f^nonprn mit lôd^eñg., **grubig** unb gefurd>t.

LACUSTRES, Sppans^rt/ Me in @een (*Lacus*) b. f). in (Te^enbcm, reinem, fügen 2Ba(f<r, Dad nie 6i£ auf Den SoDen frcert / ober an btn Ufern Deffe(6en n>ac^fen/ *toit SCIRPUS- lacustris*. 2fn 6o(anifcf)ett @ärfen i(l *Lacustre Aquarium tin fitf)tnbt\$ \$8afftt mit titftm ®xunbt.*

LAETUS, It'^t/ Der Sarbe *nad*).

LAEVICATUS, fo egen unb *giatt, ba§ ti* anfangt JU glanjcn/ geglättet / J. S3« SPIRAEA *lavigata*.

LAEYIS, g Utt/ eberi/ oftne trgenb cine ^ m vorragung, unb o^ne trgenb eine 33crtiefung, alfo im Gegensaße Don geflrétf, gefurc^t, punctiert, ober gefriecfyelt; nic^t im @esenfaße Don bebaarr u./ Dem Dad unbebaarre/ (*glabrum*) entgegengefegt iff\* SAnne unfedcfieb *ti abtt 'nicff* Don *glabrum*. 33CJfpidc Don / «fft finb an *Calyptra la vis i bit* abec t&tllbenoto a(d feine daare ftabenb Dëftniert; an *Calyx lavis*, a(f gluma, an Tkin^UM vnZ-gore *hybernum*; an Dem *la vis Caudex intermedius* ton LILIUM *bulbiferum*; *Ice vis Cortex an SALIX Caprea* lave *Folium an STAICE Limonium*; lave Hymenium, o&ne affe ^erDprragunjen umD galten an PEZIZA, CLAVARIA; *lavis Margo*, U*lavisPi-leus* an Dem ^ute eined \$i(ied/ toenn' ec glatt, aber nicht glänzjt? i L *aviv ux;7 avisfydi x an*

MALTA *rotundifolia*; *Ice vis Seta*, fait an **vielen** Saubmoofen; *I a: vis Stipes* an AGARICUS *edulis*; *lave Tuber* an RANUNCULUS *Ficaria*, ORCHIS *Monò*.

LAGENATUS unb LAGENIFONWIS, fl a f4> e n^ f \$ r m i g , in bee SRitte fcerbümrt/ an bet ©pifce audgebreitet. *Lageniformis Pepo* an CUCUKBITA *lagenaria*| *lageniformis Radix* aqfinigen %toitt belli unb AnoQen; *lageniformis Vaginula* an SCHISTOSTEGA\*

LAMELLAE, p U t r c ^ c n , nennt man jene feinen ^autcben/ Die an einigen ^tljen (ben \$blatttpplltn, AGARICUS, AMANITA K.) an ber unteren ©etfe be^ ^ute^ t)on bent (Strunfe gegen ben SKanb ffrafylenförf; mis binlaufn. &ic beffe^en balbaud einec boppelteu/ balb a|ii einer etnfac^eih^aut/ umb entba(eenbie©amen (?) bee 9>U\$e. ©ie ^)aut/ bie fiebilbet/ iff fächerformig, unb lägt fid) /tt>ie ein 5åd}er entfalten. Stcfe^laftc^en femmen nie einje!n, fonbern in febr txelen £agen/ toot, bee nebeit einanber flcbcñ, n>ie bte flaſter in einem Sucfte\*

LAM ELL AT us, miſtylattfym (*lamella*) t>etfef)ttl, note \$• 93. *lamellatus Pile us.* Sluct toad in eine bünne \$latte pcf enbet/ toic *lamellatum Stigma* an GRATIOLA. 3< be9ben biefen S3ebeutungen ge\* f)taud)t man aud)

LAMELLOSUS, *I a meII6B.* 55ei Bern^ar^f bcjeicf)nct e^ aber J&etlc, beten J^öbe ntd)t über eine StérUinie beträgt/ bte fcorjugltcb nadf) jmep SRtcb; tungen auggebeftnt/ unb if>r grögten Slu^bebnung nadfc mitt-eimanbet Derbunben ftnb.

LAMINA, D U t t e , em Packet audgebreitetec 2f)eU trgenb eined Organed überbauyt/ fm @e; genfaſte bet S3affE be(felben. £>ecanbolle. Qfi> £inné tfl Lamina, platt e, fn^befonbere bee obereffacſte £bei( bed Q3(umenb(atted einer Dielblättrigen Blumenfrone, bee Don bem 3lage( getragen roirb. Ben LinE iff Lfcm^na, bat Btatr, abgefobert t>om Gesäß

*hhnbcl Utvad) Ut; unb bet) Pah'for JSeauvoi\* bitobm  
Qälftt bet flatter an ben ©rafern, b\|e bm fyalm nid)t  
md)r umfagt. Lamina proligera f. proligera.*

**LAMINOST^FC^LOAG iamcUcn fat (Lamella.)**

LANA, U?oHe, em n>eid)eS tooOena&nlic&e\*  
Spaax, bat aui (angen, tt?eicf)cn, micberti^cnben obec  
gefreugten ^aaren beliebf\* JEline beftnierte ite wd)t<sub>f</sub>  
fonbern fuf)t&blo\$ SALVIA unb SID^RITIS canarten-  
515, SALVIA Aelhiopis, MARRUBIUM, VEHBASCCM,  
STAGHYS, GAADUUS eriocephalus unb ONOPORDON  
al^ 33eofptcl an. S5ei? (Bårrner'n ifl eg fpnonpm mit  
*Desma.*

**LANAEFORMIS, wollenartig, was Bolle  
ausfieht.**

LANATUS, wo [fig, iff Ux) Jtmie ttxoai, bai  
xoxt mit ©Dinncnflett>eb^ überjogen ill; beo Willdenow  
etit>a^/ bai mit Mc^rcn, n>et(fen/ t>cafctf> ju unters  
fc^ctbcriDen/ (an^en (metcben/ t>c?:t)icbentlid) gefrümme-  
ten/ bicf)t flebenbeit/ <£>6me) ^aaren befeet if!; z. B.  
STACHYS lanata. Lanatus if{ bety Bernhardi  
etwas, wa^ abf{e5enbe/ sebrängte/ bicgfame, übec  
1\*\*\* tange Qaave )at. 25er Pappus latatus an  
CINERARIA glauca fat Cine tpetffc feß furje und  
t)id)te 23oae.

\*LANCEATUM folium, fpecrf6rmig iff ein  
SBlatt bep &avm, ftelcbeg tnebr ober minber lintern;  
förrnttg / unb an ber 28af\$ entmeber ab^eiuftt ober  
herzförmig ifl Siefe Sorm baben Die S3iättben be^  
Wedels an PTERIS spiculata unb atropurpurea.  
Hayne.

LANCEM.ATO-LINEARE, I AHje tte nf 5 T III t g  
linienfdrmig, mtf)t linienforraig/ ali lanzettens-  
förmig.

LANCEOLATO-OVATUM, (aIIJC11enf6rmig  
eyförmig, Ian}ettenformis an ber Q3aff^, eyförmig  
an ber 6pige/ nte an RUD\*KC&IA purpur.

LANCEOLATUS , *lancette n̄fotmiQ*, wenn  
*tttoai* länglichst (*oblongus*) unb an beyberi Enden  
 attmā&lig jugefpigf ifl, *tlitine*. *Lanceolatus* i(i  
 bet) Bernfrarbi *etwa&*, nad t̄on 2 £5feen eingefcfjloffen  
 tDirby melc&e Heine? fittb aid ein^alber jtceid/ unb  
 bU qtit iforec bo^len ©eite einanbet cje^enüberfleben /  
 fo baß ste an bee ©piftc unb am ©runbe in *SBinUln*  
 zusammenstoßen. *Bei Willdenow etas*, das von  
 unten an bid oben aDmdblig in 8piſcn jul^uft. 3Tao>  
 cinigen foil bie Srefte fletnre fet)n aid bie balbe länge;  
 naſc) ^>ayne foil bee Sitecfymeffec bee g^nge fdy ju  
 jenem ber Srētte an cinec *lanceolata Frons* DerbaU  
 ten ftie eimad mebr aid 5: 1. 3?ad) @copo(f abet  
 n>ie6: l. SBic baben *Echini lanceolati*; *Folium*  
*lanceolatum* an *PLANTAGO lanceolala*; einen *lanceo-*  
*lalus Fornix* an *SYMPHYTUM*; ein *lanceolatum*  
*Jnv olucellum* an *BUPLEURUM ranunculoides*;  
 ein *Labium lanceolatum* an ben Kef tar ſen turn  
*ACONITUM Napellus*; einen *Lob us lanceolatus*  
*Jolii an RICINUS communist* eine *lanceolata SiU*  
*qua. an ISATIS*, unb etne *lanceolata Spicula* att.  
*BROMus tectorum*; etne *lanceolata Stip ula* an  
*MELIANTHUS major*, *GLYCYRRHIZA echinata*; ein  
*sublanceolatum Semen* an *CALENDULA officinalis*.  
*Lanceolati e-chini*, bie/ naſc) &>illbenort>, iyſeu  
 breit, nad) oben admāblig fc^mákr. finb.

LANGUID ūs, matt, mattglanjenb. Bern^.

LANITSEHUSS f. *Lanatu.s\** 2itt ERIOPHORUM  
 il ein *Semen lanigcrum*.

LANUGINOSUS, ettvad ttolfig. Scf)r oft fpou;  
 tQnt Ifttt Ian at us,

LANUGO f. *Lana* unb *Pappus Tit)* Cournef.

LAPIDEUS, fletn^airt; fo ifl an *MYOSOTIS*  
 unb *LITHOSPERMUM tint Nux lapidea*. Shd^ einigc  
*Loculament a* finb *lapidea*.

LAI'IDOSAS, bte auf fteinigem 25cben/ auf einjel\*  
 tien Stumpfen wachsen.

LAPPACEUS, rait &acfenförmfgen Sorflen bcfee\*,  
WU bit ©amen att LAPPAGO racemo\$.a.

**LARVATA** *Corolla f. Personata.*

LATERA, &eiten, biejeniflen SbeUe, bfe auf  
finer obtt auf bee anberen ©eite bet 2lcfse liegetu  
2ln einem SSlatte bie Staume jtoifc&en ber Wtteltippc  
unb ben 6ct)ben ©eiterfranberti. *Latera Seminis*  
ffnb bep (Bärtner'n bie Släcken bee ©amen gttifeftett  
bem 9tucfen unb 35aud)e berfelben\*

LATERALIS, fe i're n (1 à n b'i g , irgenb ein Organ /  
bad an ber ©eite ciné^ tfitberen *flebt*; meiflen^ im  
©egenfage Don *terminal*™, • ©o iff etn *Amen-*  
*tum laterale* an *SALIX triandra* *Anthera late-*. •  
mlis, {eitw&vte befefigt; bie mit bet einen Sette  
auf ber @pige bei &taubfdbenS fejt ffef< tpie an  
GLECHOMA hederacea, PARIS nad) ffntfjen, obfd)O«  
aber nur bfe 5^<\*^ be^ @tau6bcutetf butd) eine **bars**  
über fter&orragenbe 23erlängcrung bee( ©taubfaben^ ges  
trennt finb. *Lateralis Bulb us, seitwärtsstehende*  
Svrt'ebel/ bie nid)t/ n>t 9cro6fynlic^ / au^ ber Mitte,  
fonbern Don ber ©eite flätter tweibt, \$. B. **ALLIUM**  
**Ampeloprasum.** *Lateralis Flos* if! bei Willdenow  
eine S5(umc, beren \$Iumenftie( auf Den Jmetgen fch  
finbet, too feime flätter finb/ alfo an ben vorjährigen  
Sr̄eben / tt>ie an DAPHNE, GERCIS. S3e9 ben SRoofen  
tft *Flos lateralis* meifleui fpnonpm rait *axil I a-*  
*ris.* (Eben fo ijl *Fructus lateralis* unb *Pedunculus* ju fcerffefjen. *Lateralis Glomerulus*,  
ber bort an ben Switfen ff@^ two einf! flätter *Han*\*  
bctif tMC an BOKHMERIA *ramiflora*. *Lateralis*  
*Pinna, jcbtf l&lattd)en* eine^ gepeberten Slatted in  
Sejufl auf ben gemeinfd^afrlcic^en Sfiiatrifiel. *Lateralis*  
*Porus, Oe(fnui9en aw bet ©eite ber .ffapfeta.* *La-*  
*teralis Racemus* an VERONICA *Chamadrys*. Ein  
*laterale Receptaculum cxcenlicum*, tt)enn die  
Samen nur an einer ©efte ber \$rud>t befcf!igt sind,  
und bann iff eg eiufeiti'd/ tote an AcTAEAfnb ben

**Hülsen**; ober ftenn bie ©amen *an* ben *btybtn gegen;*  
 überfse&enben ©eiten befeffigt fin\*, unb bann iff es  
 \$voeyfeitig, trie an GROSSULARIA unb an *btn Qdpoten*. *Laieralis Seta* iff .biejenige\* bie anfangg am  
 Snbeffanb/ aber *butd)* bit Srneuerung beg ©taßm\*  
*d)tn\$ feitfcärtg an* bie Saftg beg juingren ju ffefjen  
 fommt/ n̄ie an BRYUM *palustre*. (Sine *lateralis*  
*Spica*, *bit* 'an bem uorjafrigen Jjofje ffe&t/ iff att  
 CERATONIA *siliqua*; *tint Spina lateralis* an PRU-  
 NUS *spinosa*. (gin. *Stigma later ale*, *an* *btt* ©eitC  
 Deg @riffe(g ober beg Smcfytfnotentf, auc^ toenn ber  
 @riffe( fief) über bic 32arbe ^inaug oertdngert/ tote an  
 Vicia. Sin *Stipes lateralis*, *btt* *an* ber ©ette beg  
 £uteg peft befeffigt/ n̄ie an bem AGABICUS *Pleum-*  
*pus*. *Stipula laterales*, bie am Urfprungc .beg  
 -Slattffiefeg ffeben/ toit an ben Widen, gin *Sty-*  
*lus lateralis*, *an* *btt* ©eite beg Srucftfnoteng/ tfl  
 an HIRTELLA unb me)reren ^ülfenfrücfeten; eine *Um-*  
*bel I a lateralis* an SCANDIX *Cerefolium*.

LATERALITER SECEDENS ft *Oblique sece-*  
*dens*.

LATERATUS, feittg, *xotnn tin* fförper 3 unb  
 tnefr (inig iff natb *btm* Umriffe ber Sicfe).

LATERE DEHISCENS, *Ant her a unb Capsula* ;  
 an ber Qeite auffpcingenb. Srfereg ij^ an  
 LEUCOJUM, (egtereg an t>ielen tfapfetn. Sin latere  
*hians Calyx* iff an CANNADIS.

LATERIFL(5KUS, nennt man ^ (Tanjen, an toefd)ett  
 Me Slumen entmebcr an bem 9lanbe beg Sfoteg ober  
 an ber ©eite ber \_35afig. beg 95latreg am Stengel ffccfocn,  
 toit an SOLASUM. *Melongena*, *nigruntz SYMPHYTUM*  
*officinale*. gefjtereg Drifcffe *Hinne'* t>ut%

LATERFOLN *flores* aug, neben bem 35(atte ffe^  
 6enb/it>fe an LYCIUM *europceum*.

LATERINERVJUM *Folium* ober *Petalum*, feiten\*  
 neroig iff einS5latt o\*er §5Iumenblatt/ *xotnn bU:* **Haupt-**  
**tippen** ^jber ^auptneroeu *an bin* ©eiten ber **Mittel-**

## LAT. LAX.

rtppe entforingen, unb gegen ^n 3fanb des Blat.  
Sber beſ Slumenblatteſ bmlaufen.

LATP.RITIUS , b I a § in c n n i g r#.t 6 / in £ ©f Ib\*  
Hc(e SteſCnb /tote ait &Ch t)Crblu()lCn ADONIS miniala ,  
an Sinnien.

LVIKX, efn fcfeſeimigeſ ©efen, t>aſ 6et> einraen  
<§d)n>ammeii ben S'«c^t6obcn bebecft' 2»ei) J&evnb.  
bee 6f)Uije @af^ ber fid) auf Dcr. 3?ar(>e fint^et, bit  
t **är b e i n f e ſ u** )tigkeiſ.

LATIFOLIUS, breitb Ujjrfg; miriif \$ejug auf  
onbere 91 rten / bie fd)irialere ©lätter f>aben.

LATISSIMUS; a u \$ e v o r b e n t i i d ) j b r e i t , toentt  
tie SBrreee \$ur jtfnge ficfr bfr&alt tote 7 : 1 - **Bernb.**

LATIUSCCTLUS, errpae (>L\*^tr/ ipetjn bie Breite  
jur gänge fid) ier&alt tv(; ? 1. ^errnt.

LATO -LANCEOLATJ.TS ? J) r t ||%i 1 << J 6 f t £ H f 6 LV  
m i g , beffen Van^tu/25urc§meffér fief) \$um Surc^mctTer  
ber ©reite n>ie 2 : 1 , beo ber fanjettenform, terbrift;  
tt>ie bie Sinfc^nijtte ber SSfatter (an PAEONIA officinal  
h's. Bernfc.

LATUS, b r e i t / loai Utia&d)tlld) breUer aft lan^  
til\* £ie 23reite eined Zbtiti\* an einer tyftnje beftimmf  
ber Ouerburd)fd)nitt auf bie 2ld)fe beffelben/ b. b. jene  
?:"Mie, bie t?oii ber 2Burje( gegen bie ©j>iſe (auſt;  
j. ®. Legumen lajum an PARIVOA.

LAXIFLORUS, nienn bie 95lumen ah einer SEraube  
»ber 9lef)re 2c. xcit Don einanber entfemt auf langen  
**abſtehenden** S3lumenlie(en Men, tvte an **ARABIS**  
**thaliana.**

**Laxus, ſchlaff,** ifl btt) flinni fDnonpm mU  
**ſlaſcidus;** } ber anberen mit del His. Laxu\*  
vaulh if! b'ep tbillbenoio ein Stengel/ ber jtvat  
ITcif ftixri>t / abet burd) ben fl.ecingden J?au# ber55Jinbe3  
bin unb fter bcvoCQt mirb, trie air CAMPANULA hedera-  
<\*ca; bet) anberen ein ©fengel, beffen 2!e(?e bunn' und  
weit au^gebreitet finb. Laxus Contextu\$ ce **llu-**

|sus i(l beiJ EDillbenow bag · lotfere 3efflen>ebe,  
 das aug tueiten Setten jufammengefegt ifl, beren Safig  
 mi\* t>ett ©citcnfiLicf)cn fall émitter einen rec&ten SBinFet  
 bilbet. (fg iff irt 5cm SJRarfe n>ie in bemSBafle, unb  
 bilbet Die jjauptmaffe ber meiften ©eroácrfe. Laau 5  
 mirb \*uber^aupt im ©egenfage Don confertus,  
*sir ictus* tmb *rigidus QCbva\|xd)t Laxus Racemus* int> lava \$pica f. *laxiflorus*. ginige  
 t)Ci'lcf)eu aber Darantci' mit VPtUbenotp, bag · tjc  
 Scau6c ober. We 3lef>re Iciest bieflfain fetj\* *Utriculus laxus*, bee bm ©amcu flanj locftc cimfd)tie§t,  
 tt>ie an ADONIS, THALICTRTIM,

LECUS, @ 4>ilb, iff einc 3!rf t>on me&r ober  
 minbec plättetu @d)ilb/tt>elcf)cr an ben Smicbcln ben  
 it>af)rctt ©tcngcl bilbct, untm 2Burjc[», oben 33laUci:  
 un^ ^Iumen rreibt .

LE6UVLF^, ^> ft I fc / iff naclf £imfe, (Bärtner'n  
 u. a. ein "a Nappjstf Samcnge&áufC/ in n>elc6em bie  
 ©amett nui\* an eincr 3?atf> befeftfcjt ftnb. S5ei> Ule;  
 bicus 6effcf> eg aug 2 fcOmaUan^ac^cn ©c^aten, bit  
 toaserecfrt auf einanber (iegen / imb bep toller 9?cife  
 (td) fret) kffnen; bie @amen bftrfen uur an einer ©cite  
 unb. entroebec nur an einer ©djalc, ober tt>ecOf(e(metfe  
 an bet)ben/ befcfliflt fteben. 6paſcr gab er au\* bee  
 RICOTIA cine ^>ulfe» *Legumen* if! bet) ©copoli  
 eine auffprinsenbe/ cinfacfoe §úlft/ bie ©amen entbfalt/  
 bie an einer SRatf befektigt finD. *Legumen* spu~  
*Hum* <f>&tn. f. *Spurium*. «get). JDDecanboIIe ifl  
 te ^ u m e n , ^>61fe/ eine fjäutige/ meifleng2^ feltcti  
 5—4 Happise gcudjt, in n>eld>er ftcf) ber @riffe(!rand  
 in a Slrme ff>ctlt / bie an ber oberen 3?atf) paraQet  
 ^inlauf / fo bafi bie @amen an biefer 3?atf) tved;fel^  
 metfc bait) an ber einen ba(b an ber anberen *Siappc*  
 fígen. 95ei) Bern^arbi ijl *Legumen* jeber gcucf)^  
 be^ älter, an mtlfrem bie ©amen an einer Since feinec  
 Inneren SEBanb befeftift fmb\*

LEGUM INOSACAPSU LA iftebicue, *HI bat Legumen eva|vc bey finn6, cine &Mfi, bie nie auf\**  
*fpringt/, uni) tbcnfo leguminosu^Vericarpium*  
*V7)e&. ffieo (Bartn̄crn iff Capsula leguminosa*  
*beffett Legumen spurium.*

LENTICULA, jfiLinfe/ i(l etn Heiner runber oder  
 län^lid)er Slef / bcu man auf tcc nod) flatten. **Rinde**  
 ter Saüme ofterg walnmtmmt, uni> betfen Slatuv man  
 n|d)t Qtnau Unnt. (*Buēttjxtb nannU* fte *Glandula*  
*lenticularis.*

**LENTICULARIS**, lin fe n fö r n g i , wen j we p  
 £ u d e l s a b } d nitte, die flctncr finb alt cine S?albtu\$*d*,  
 auf etnanber gefefet pub. Bernl?. *Lemicuiaris glan-*  
*dula, lln{enfotmlde, fc bttUine, ju^eilen fc&tmütentbe*  
 &vufen/.n>ie an bec Unterfcite ber J&zopfenblatttr.

LENTIFERUS, Itnmfmörmige'jforpcc (racjcuD/ n>ic  
 einigc pejijen in c^rem ^ute.

LENTUS, 55&C/ unb **Ungfam**; j. S. BETULA  
*lenta*, unb *Aolumnatio lenla*.

LEPJCENA Ksd>arb f. *Glum a.*

LEPIDOTUS, fc t>ilbrig, tx>a^ met fWnen becfit  
 ffcftenben 6ci)u)>peu bebecfe if?/ fo bag bie gar6e Da^  
 fastc t>ccañbert miçby n?ie an ELAEACNUS *angusti/oia*.

**Lepis** tf{ 6CQ iiinf ciit tcoctcnc^ Sfiebenblatt in ber  
**Kniekehle** beg 33(atte& ©. auc^ *Squama*.

LEPKA, ber 2(u a f 4 9/ n>enn /un^e §Bäume mit  
 \$kd)tcn hbeviOQcn fi nb.

LEPROSUS. *Thallus; Cltl iailb, bat a|lt l|ld)t*  
*bcutlid) in unterfc6eibenben/ ungleic^ seftaltttm flcinctt*  
*jförucrn ober 6d}üppcben 6ef?c()t/ bie bic^t jufammen;*  
*bången, unb efne fcste £>ecfe 6ilben, n>te an LECIDEA*  
*punciata, toewn Oicfc auf 33aunu\*inben t)ocfommt, ist*  
*f **Abfarria**.*

LEPTOS f. *Grachis; et foirb nur in 3ufammeu\**  
*seßungen aug bem ©riec&if^eu »braucht.*

LEUCOXANTHON« rStbli'c bi bey **Köhling**.

Lcucos f. aZ6ns.

**Levis**, toa\*. leicfoter aW SBaffer iff.

LIBER, ber 2 ^ ft, ben man nut an Säumen unO Sfrau&ern ftnbet^beffe&t aug n>ctd)en faftreicfoen **Ges** fäßen; tje ffOr atle 3al>re ncu bilben unb zwischen Holz unb SKinbe aegen.' 3fm SBinter tfoeilt ec tfcb in gwen Oc&fc&ten, dne biinnere äugcre, tint) eine dichtere tnitere, turtle ju Oplfnt cr&ärtce. Sr bilbet Ninden: (agen/ tje ffch) leicfyt ablöfcn laffcti / unt) mie 23lattcc <it}C0 35ud)e^ &ber einanDec lichen\* Set) 6en frautar^ tigc'n Oc^acf)fcu fc^eint eiir SKincj Don Oefdgcu Me Oetette \*eS 55affc^ ju Dertretem <fr. bilDct Die \$lumen; frone.

LIBER, 'fre^, tyad mit seftifm anberett **Theile**, auger'mie ^emjenigen/ tvorauf c^ ff^ befinbet, vers bnwbtn ifl. @c ijl/ außer bep ben Syngeneji; fieii/ an ben meiffen ^Pflanjen bie Anthem cine Anther a lib era,, unb außer ben tTiwo^ iDta^ unb DoIyAbelptflenta^Filamcntumetft Filamentnm l(berum. Calyx libqr i|| bet) tiieUti fpnon^m mit Calyx inferus, über mit Germ en liberum, kai ntcft mit ber Siōbre beſ ^elcbeg Dermac^fen iJw fo ttnecm Receptaculum liberum, t>a^nur aneinem Enbe mit bee §rucf)t iufammucbångt/ meiflen^ ftmom) mit Re ceptacu I um columnare ifl, Opercu~IUTII liberum, Calyptra libera, iff ettt Oecfel ober eine \$au6e/ tvenn fie bcx> >oQec SZeife abfaQeh\* Dentes liberi an bem 5B?aufe ber 3Roofe (nb Zähne, bie burcf) feime Jjaut berbunben finb/ wie an Hypnum. Liberum Semen ift nacl Palifot Beauvois jener <Same an ben Orafra, an tueldjem die obece Cpelje nid)t angeroac&fen i|t; J. S3. an SACCHARUM,

LICHBNES, f 1^4>ten/ @emdtd?fe/ bie mit einem **Thallus** / (tPebel/ Jiaub) t>ecfet)en/ unb berenSfwc^ tifications. Theile in bem S^tla ger felbfl eingefenf t ftnb.

**LICIATUS**, brå^ti'g, n>enn frimtme Sinicn mit i^ren Sogen na\$ innen fe^en / unb in SSinfeln jufam; men|loſen. **Bernhardi.**

LTONEA PORTIO, WXcftpigjb. f. *Corpus ligneum*.

LIGNIFEB RAMUS, Cttt Slff/ ber mi\* #01j Ullfc **Kaub**,  
fettie 35lumen bring\* •.

LIGIVOSUS, fcoljiğ; fo nennt man einen ©tengel  
*Caulis lignosus*, |xnb tint%£uvtfi Radix lignosa,  
focnn fie aug feffem Jjofje beffe&en; erne tfapfel £ a p-  
s n / a *Ugnosa*, tocnn bif SRinbf fe^r ^art t(l, abec  
boct in \*Iappen auffprinfl/ n>ie an FAGU^; éime^ülfle  
*Legumen lignosum*, ttMtn Me jtlappen fo fyatt toit  
eine 9^ugfd)a(e finb nnb nic^t auffprtnflen/ n>ie an  
HVMENAEA; ein Receptaculum lig-nosum an  
GEDRPXA Ce/&a; *lignosa S em in a*, &amtn tillt  
**holzartiffr Quilt an.** PETIVERIA, vinb *Stipes Hgnosus*  
an tyalmcn, einigen garrnfräutern unt>6cf)h)am^  
men. *Lignosa Tela cellular is* |fl|ivb. f, *Cornplexus cellulosus*. *Lignosus* 6\$eicfnet **sunweis**  
fen auc^ Me garbe: &ol\$farben.

LIONUM, i^olj, &elge cm Slffgemeinen t>n **Holz**.  
f6rper/ otjer alltf, toa^ an t(er Pffanjc fefl if?, **Eigent-**  
**lid**) nennt man abetr nur *bai* 6015 / n>ad feine **ganje**  
\$arte txlangt bat, mi man Bern (£0/5 par/kit,  
oaur du bois) ntnnt Wn ben Sifotolet)onen (ie^t c\$  
in tec SRUte/ an ben SKonofotolebonen nac^ augen.

**LICULA, Blatthäutchen, Züngelchen**,  
meistens f)autige, feltener fnorpelige obtt (jaarförmige  
Theile / Die an ben @räfern bort ftgen/ n>o die ©\*eibe  
des fyaimrt in t>a^ 33latt ttber^ebt/ unb nur feltm  
in ber 3Ritte ber (e^teren ·(td) befinben/ ftenu biefe  
nur mit t^rem unteren S^eile ein^ @df)eibe um bm  
J?alm bilben.

LI©ULAE, 3 u^n g e I 4 > c n nemrt 3acquin be» ben  
0tapcIien bie Slffangfel./bie ton ber Saft^ ber £a;  
puge au^laufen/ mit btn Cörnern abtved)fehn, unb  
auf ber Slumenfröne au^ebrettet finb. 5Bc^ etnigen  
Ifl e^ auc^ fr>non»m mit Semiflo\$culu\$> *ligulalus* *Flos*.

**LIGULATUS, *banbformig, iungenfdr\****  
 ttiig/ *Qt[d>rceift*, (foil nur bet) SBlumen flebraucftt  
 toerben) mitt beonafc parattclctt ©eitenrābbern, &ecanb»  
*Ligulatiflores bet) Hinne'* ((Eotirnefort'\* *Semi-*  
*flosculosi*) fmb " biejcñigen jufammcngefegten  
 SSJumett/ beren 3>lumenfronen ber cinjelnrt SMfumcstett  
 attc *Had*) / banOformtg, unb *nad*) augett gefc&rt finb.  
**Ben** ben SReuercnt(t *ligulatus Flosculus* unb *Z^u-*  
*lata Corolla tint cinblattlQt* 93Jumcnfrone mit furjee  
 ·Röhrc, bie f&gt io eincn länglicften obcr linienförmigeu  
 ©aum enbet., ber mciflnd an bee 3pige flcjåbnelt i(?,  
 n>ie jebc^ cinjclne S3(itmd)en am *to votn^cfynz*, bit  
 S3(umenfrone an ARISTOLOCHIA. Sin df)nlc^ gebaute£  
 S^ectarium ober ^eriant^ium iff ein *Nectarium*  
**Ober Perianthium ligulatum^ tOXt an MYOSURUS.**  
**Ligulata radiatte jtnb bit FI ores radiati, toit**  
**an bet JUmiUe, Sinige ndmnen einen Flosculus**  
**ligulatus arc^f unilabiatus.** 3Ratt Decme^U e^  
**nicht mW lingulatum, unb linguiiforme.**

**LiouftiNus, setffggruñ\*** Bern&.

LILACEUS unb LILACINUS; *l l & f & t b t it, tin*  
**bläfles S3to(et/ auc an bem Silac\***

, LiLiAcnus, *toa& nad*) Silictt riec^t, ober mi n>te  
 dne Sclie \*8e6dut if!. Sine *Corolla liliacea* iff eine  
 meifieng 6/ felten 3 blåttiQt, ober 6 — 5 theUige obec  
 6 — 5 fpaltige Sdimenfrone of>ue j?e(c6 / beren SSiathtt  
 ober (ginfe^ntfle ettt>ai fleifcftig, unb beren gorm etmad  
 fllotfenförmig ifi. 3m erñten gaffe iff eine *Corolla*  
*polyjetala liliacea*, im JtfKJtett eine *monopeta-*  
*7 a liliaquea frorfcanben / WiUb.* Jufieu'e *Lilia* foUen  
 uur einen 6 t(>ei(igen ^e(cf) ^aben\*

LitaBAxus, g e fa^it m t / n>enn ber ©cljlunb efner  
 einblättrigen SBlumenfrone *nad*) alien ©eften bin **vers**  
 längert ifi. £iefe Serlanaerun^ i(i bann •

LIMBUS, *Qaum, bet) jSLlinne/(ber p6ere erwetis*  
 terte au^cbreitete Xbtifl etner einfac^en Blumenfrone:) **ben** ben tttueten• jener £6ei( bed ^elc^e^/.ber 9Jlu;

menfrohe ober *b<sup>^</sup> SPertgonium*, ber freit)/ gewöhnlich ougflebreitet uub bureaus fein 2f>eil ber Siöbre eft SBenn bcr ©aunt gefpalfen ober get&eitt ifl, fo tuerfen We Saftne unb (Einfconitte ic<. gejfi&lt. *Limhus*, f Iäd>e nennt JDecanbolle aud) jenen 2f)cil eineg Slat<sup>^</sup> teg ober 93(åtfc<sup>^</sup>eng/ bee burdfy' Die Qlu<sup>^</sup>brçitung bee Safern erjeu<sup>^</sup>t n>irb; mét anbern. SBorten / a([ef bag; jenige am Slatte, wag nid;t ^attfliel if!. *Limbus will Hayne and*) Don bee Oberffäcfye b/c 2)olbcn (Ta<sup>^</sup> *Straßlr Radius*, obec Kanb gedräiu1)t wijfen, 5)?an »ertt(ed)fett eg oft mit *Lamina* unb mit' *Ala*, tee ^åutigen (Etnfaffung einiger ©amen.

LIMITATUS DÅTERMINATUS THALLUS , *b u r d g r å n z t beftimmt*, n>enn bit Sedranjungen mebrerer Indis t<sup>^</sup>tbuen (id) berü.bren/ unb jmfcf)cn benfelben einc bunle £inte bemerft wirb / *toic an PARMELIA thallina*.

LINE\*, eine *tinit*, ber i2te 2f>e({ eineg SoUeg/ bit *UtiQt beg tleinm \$Ronb{d)tind)en\$* an ber 2Burje( beg 9?age(g ber Singer (nicfrt beg Daumeng) £inné. Sluc& fcftmale *Sånaenfiveifen*, bie ben **geometrischen** Sinien *an gein()eit na^e'fommem*

LINIALIS, *linialftrmig*, *toenn \*bit Seitens* tåber immer in gleic<sup>^</sup>er ^ntfernung bleiben. Bernfr. Silfo *bnvdfani* fpnonpm mit ber *Hinn'efyen* unb *aUt oemeinen* 35ebeutung *ton linear is*.

LINEARJ-BisERiALis f, *Lin'caris \$oru 5.*

LINEARI - LANCFOLATUS , II ü I C IT f 5 t Itl i'Q i I & tit *Settenformig*, lanjeffenformtg<sup>r</sup> aber an bet)ben <fnben bem £intenformisen fid) nä^ernb/ mie bie S3(åt^ ter an GHENOPODIUM *Scoparia*, unb btē SBlåttden an. POLYPODIUM *vulgare*,

LTNE ARI-SUBULATUM , (11\! t IX f 6 X fll i ff / P f 11' C fll^ f S r m i g , aber an bem äugerent <fnbe §uflefpißt.

LINEARIS, *l'i n i e n f c w m i g* / burd)ang flleic<sup>^</sup> (reit; jutvetlen jebod) an *beyben dnben ctn>ag t>er*; fd)målert, fitnné. SSon Sinné Sommentatoren *tciU* ber eine eg foil jugleicf) lang, ber anbere eg foa juu

gleich ftecb bebeufen. 95e9 iDvanbofle foffen **bende** Cube abfleffumpft · Ut)n. S&ep <?copoli iff *linearis* tine £imie brci'r, n>ie eg aud) nod) jefet an *Caulis linearis* einen faum 1'" breiten (Stengel *btitudinis*)ntU S5eo Bernfrarbi ifl eg eine *Hinie lang.* 3m &inn€\* fd)e;i €thne iſt tint 'Anthera linearis an OENO-THERA *biennis*, ein *lineare Folium* an ben Klellreft an LINARIA *vulgaris*; *linearis Frons* an GRAM-MITIS *linearis?* *linearia Genicula* an ben (Eon\* fcr&en, n>enn fte aW fcfr feine 8inien erfefcf)cmen, unb feine *Nbfane* bilben; *linearis Lacinia* an A^HILLEA *Millefolium*; *lineare Legumen* an TRIGONELLA *Fanu gracum}* *linearis Pappus paleaccaus* an TAGETES; *linearis Petiolus* an CITRUS *medico*; *linearis Philyra* fcfcmakc @treifetl/ *tolt* Arilius in *Philyras lineares sectus* an TETRACERA; *lineare* Weceptaculum an MENYANTHES; *linearis Sili(fua,* an AKABIS; *linearis Sorus*, btt tint Qttabt Unit bllbtt, tt>ie an PTERIS,- *lineari-biseriales* *Sori* ftnb *liniitn btmiQt S}aufd)tn*, bit jn>e gerabe/ mcf>r obec mtnbec p^aQele Sinien bilben; *linearis Sfladix*, wenn bee ^olben lang/ bunn# jufammengebrucft/ mit paradelen SKanbern eindefc^Iolfeit iff/ n>ie an ZOSTERA *marina*; *linearis Spica*, fef)C bann unb gleid) bid, n>iean LOLIUM *perenne*; *tbtn\** fi) *linearis Spicula^n VESTUCIL fluilans*; *linearis Stipes*, ant>k|cn Sarrnfräutern\*

**LINEATIPES**, was einen ge{cetften @fie( otct Fuß hat.

LINEATUS, geflrid>elt, dnt £)6erPac^C/ an it>e(c^cc man beutlid) Smien ma^rnimm / bie man tvofl sehr uneigentlich auch **Streifen** (*Striae*) nennt, Dec. Lin\* at us, *MniQ*, ein lImrt§ etnclc ^&tperg# bee von bra; unb meftrer Sinien eingefc^Ioffen tmrb. **Bernb.** 95e> tPiflbenow ili ein QSlatt geRnd^elt, *Folium lineatum*, votnn c\$ mit platten parallel laufenbcn **Ges** fäßbündeln, die von ber 9afte nad) oec **Spize** geben,

ganz ttnb bk&t burcfaogen iff. g}ad> anfreten fofteti  
 Diefc Stnien fein unb fccrtieft, nae& anberen einfac& unfr  
 anberg flefarbt, nady ©prengel fscr&onragenb / ndd)  
 anberen twber certiefc nod) er^a^en / fei>n\* S3ei>fpotf(e  
 finb an MELALEUCA *styphelioides*, GLADIOLUS COTW-  
 munis, \$et) *foecanbolle* tfl *lineatus* *Comple-*  
*xus cell ill osus n>cim* Die SBänbe £>uerUntcn haben,  
 bit bem 9infcf>eine nad) brüft^/ unb t>icacf\*(^fpalten  
 finb. *Lineata* *Vasa lymphatica* (nierte sym-  
 »f)attfd>e ©c fäge, beren SBänbe'mit fd)Cinbat Où lgen  
 iinUn befiebt, t>Utkid)t baselbst gefpalten f\nt>. 2Senit  
 tjicfe Simien ober S«^ ^n unt>odtommen ftnb fo nanntt  
 B erhardtreppengefdfje / mnn fte t>oUfommcr  
 waren, Ringgef e.

LINGUIFORMIS, LINGULATUS , J U II 0 0 II f 6 I<sup>1\*</sup>  
 m i g. 3)?an foflte e£ nur Don Slätern gtbrauci^etu  
 Ein *Folium lingulatum* tfl, md) *Hinne*, Cill  
*UnitnfbtmiQC\$ fttifd)i&c\$, cben ffacbt/ untcn ettoai  
 gewölbtes f an ber ©pige runb{u(aufenbe^/ amSKanbe  
 öfters fnorpeligetf/ Slatt/ wte an. ALOE *linguifor-*  
*mis*. \$Ran nennt abet aufc blog bautige flätter mit  
 einer (iumpfjugerunbefen ®pii\$t bftcti *lingulata* F.o-  
 lia, tt>ie an CAMPANULA *lingulata*. Bey Hayne  
 iff ein *Folium Unguiforme* elit langes, entweder  
 fafl ffad)?£ obec flad> bopt>e(t geroölbtet^/ ober auch  
 eingebrücfte^ Vblatt mit mefr ober mentger jugerundeter  
 3ptje / ftie an ALÖe *obscura carinala\** Willdenow  
 erf (art ed aid ein Slatt, beffen fänge jur Sreite tt>ie  
 3: I ft\* t>erf)alt/ gletc^brcit un& an ber ©ptje juge  
 runbet iff\**

LiRELLA, bai 6tr<<t>Ieiti/ ein s̄igendes,  
 (infenffirmtge^ meifien\* fd;»arje^ Srucftttofler/ ba^ f)itt  
 unb ber getogen t(l/ unb ffd) bur\* cine ber ganjeu  
 iancje nacht ^iniaufenbe ©palte pjfnet/ »ie an ber  
**Gattung OPEGRAHNA.**

LITHOTHECIA, bie V. X)rbnung ber 6d)tvdmme  
 bey perfoon, ©c^tvämme mit maunigfaltig aefla(tetcn

gruc&tbabcn, unb· n> Me S&ecJ m e me tltbn&t Geuch;  
tiafeit aufeclöfet fab,

' LirroRA. fitU) bei> £mn^ nur bie \$O?eerciJufer,  
mit fanbtigem faljtgem SBpben / too SBttib unb SBogen  
**herrschen**.

LITTPRALES, ^Jflfrtijcn/ bit am lifer beg Meeres,  
bet 6een unb ber glüfTe ftacfrfen/ j . 5 . GORRIGIOLA  
*littoralis.* iDecanboIIe.

**LITURATUS**, tvrb jutpeilcn gebraucftt/ urn \$U<ttn  
ober @trcffcn anjujetgcn/ bie fcaburd? cntf!anbcn ju  
fct)n fcfcetnen, baS man bie obete Sage ftegnafrm, urn  
bie untcre fiefjbar ju mad)cn.

**LIVIDUS**, ble^ gr a u / fc^Iagbraun bctj B^ n^»  
tt)ie bie blauen %|tdtn nad) Gontuffoneu; j. 53. bie  
untere SBlattfcicOe an SENEPIO *Uvidus*. Ma^ anderen  
**schmutzig gelb, blaßgraugrün.**

**LIXIVIOSUS**, U u g e n b a f t\*

**LOBATUS**, 1 a p p i g / if! nad) £inn'e irftenb ttoai >  
**das** big in bie 9Rittc in entfemt jtebenbe Jfoeife gct&eilt  
ist, n>cldje burch con&ejce SRanbcr ftegrán\$\*n>erbcn. 35e>  
**Bernhardi** iff ettt>ag lobium, tt>enn ber 53orfprung  
cincn \$o^en unb bie Sucf)t einen 5Binfel bilbet 93eo  
anberen foſl gerabe bie Q5uc^t feinen SBinfel, fonbern  
cine runblicf)c Suc^t bi(bcn» S3ei) Kōbtútg foU bee  
Lappen an der Spize stumpf senn. Ben Decandolle  
ifc irgenb tuvati gelappr ober lappi'g, toetin bie Ein^  
fcfynitte am 3ianbe ttefcr ftnb/ alg bie Såbne, unb  
n>enn man bie Stefc berfe(ben nbtvhaupt nid)t mit SBe#  
ffimmtf)eit angeben miO. 3eber Einfd)nitt ^eigt bantt  
**Lob us.** Wan Ht tin lobatum Albumen, ttKntt  
eg burch £ångeneinf6nitte in grôgere unter ffcf) gufam;  
men^a^ngenbe Zbtlt setrcnnt t(I; cine lobaia Cap-  
sula an RUTA; lobata kokyiedones, tvenn jeber  
i?auptloppa auf feiner äugerent glaf)e wiebcr in Heinere  
jert^eilt i(l; j. S3. an ber tPallnuf?. (fine lobata  
*Crista an btn Sjulftn einiger HEDYSARA; lobarius*  
*foliaccus Thallus, blattartig lappig,*

wenn bat Hctttatt'w iaub nur big jur fyalftc bnvtf) 2lugfd)mitfe in me&rerc S&eile abfletfoeilt ift, Die Don rtnanDer abtfe&eny unD ju bepDcn ©eifen flefoo&nlicft kurcf) SSogenttnien begränjf finD, ft>ie an PARMKLIA scrobiculata. *Lobatum Folium*, ein runDlid)CS ^fott, Dag Durd) 9lugfc&intte, Die nur 6i^ jut £å(ftt reichen, in mebtece ff>ei(e oDec happen jertbcilt tfl^ die ton einanDec abffc^cn, unD tmrct) Sogenlinien an, bÿden ©citen begränjt ftjccDen. -s\$Ran \$åblt Diese Sap\* pen, unD bat fo ein *Folium biobum*, mit einem 9to\$fd)nifte/ an PASSIFLORA lunata; trilobum, ntif 2 Slu^fc^nUten / an PASSIFLORA ^M&ero5a; <fui7\*quelobum, mit 4 9lugf(\$nttten / an ACER Platanoides; septemlobum mit 6 Slrifcfynitfen, On HEUCHERA americana\* *Lob ati Fructus* pnD bÿ (Bärtner'n Diejenjaen/ Die mcf)t oDer minDer tiefe Einschnifte babtn, Deren Sf)cile aber Doc^ an DerSlc^fe iufammenbängen/ uuD nie in gefd)loffet)e Qanze Gas men6eå(tnt|fe fic^ trennen. ©k ftnD entmeDer wahre lobati i>eri)j tottn fie Deutlicft auti jmer) oDer me ^ teren Sijtrflorfen beffeben, n?ie an ANNONA 7obata, oDer unec^te (lobati spurii) twnn ftē nur oberflac&; ldf> in happen get&eilt ftnD / rote an einfgen Veronitis. Sine lobata Panicula iff an PHALARISphleoides, wenn me^rere Heine Sle^rc^en in happen ju famm ^ ^ drängt fint> / Die Dann étne 2lej>re 6iIDen; ejn lobatum Receptaculum- an MARCHANTIA Chenopoda; eine lobata Silicula an BISCUTELLA auriculata.

LOBULUS, Dad £<fpp4>en d? nac& iHirbel bÿ jenen ^ftanjen/ Die man uneigentlid) ^onofotn^ leDonen nennt/ Dec jfttyte ^oeofeDon^ Der#etn>a^ ü6ec tem ersten Mt *Lobuli Corculi* ©. Cotyiedones.

LOBUS, Happen, tin Durct SJuc&fen, 2lu^ schnitts uDec ^Spalrcn entffanDener/ etma\* breiter/ (nicht fiber Die mtxc einDringenDer) Durc& 55ogenl^ nien ftegranjer S&tfi^ fn; e« nun an i>er Slumenfronc

ober am Piaffe. *Lobi sèminalcs* (Bfcufcen *mxb*  
*Lobi* (grew. f. *Cotyledones*. (giñtle twDcn *Lobus*  
 t>on L a c iñ?a baburcb untcrcd)Ct)cn/ ba§ jcner an ber  
**Eriße** ffumpf, bicfe fmgiä few foil.

**LOCULAMENTOSUM legumen per Sepimenta if?**  
**ben** tnebt'a is eine J?ülfC/ freren bepbe .Sflappcn inn\*  
 toenbig ber £ånge nacl) fcurd) ^ori^ontalc Ouern>änbe  
 tit tvabrc Såct)er getf>eilt tveibett/ in beren jebem **ein**,  
 felten jmci;, @amen lichen .

**LOCULAMENTUM, aUC^ LOCULUS** ((fCf . **nie**  
*Loculum) fad*), . bie inneren £ob(fungen in ber  
 &dd)t, in tucl^cr fic^ bie @amen *btfinben*, unb n)clde  
 t>on ginbtegungen obec 93crboppe(undcn ber nact)<innett  
 in ber \$ru<\$e ^er>or}cf>enben gacf)crf>aut gebilbet n>er;  
**Dfl.** £ec SKaum ^toifc^en ber @d>eibemanb / unb ber  
**Klappe.** Saber *locularis*, fading', toa& Sad>er  
**hat**, n>oget; man aber meiffend ein SBort Dorfegt/ n>eb  
**ches** bie 3abl Dcr Sad>er bc!immt# j. 95. *bi-trilo-*  
*cularis.* @O bat <sup>k</sup>Uut eine *Capsula unilocu\**  
*laris'y bilocularis* u. f. tt). *Sine Bacca unilocou-*  
*lariS) b i Jocular is u. f. ft>. Pomum quin(fuclocu-*  
*lare if?* am Slpfel. *Loculamentum s p urium* iitt  
 €)tt>eig iff mitten in bemfetyen, unb aHjeit **geschlossen**,  
 nur juroeilcn mit bem *Loculamentum verum* gus  
 fammenflicffenb. SBete unb 95au beffelben ifl **verschles**  
 ben; in ber ^ugenb be^ @amen^ i(l e^ mit einer fügett  
 {9tttppbc erfüdt/i bie cnbltd) berb ttirb unb t>erfcblmin^  
 bet/ unb im Sllter *bai \$adt*) aH\$eit ganj (eer **laßt.**  
 5D?an **ftnDet** el nor an MYRISTICA unb einigen **Dals**  
 men. *Loculamenlum verum* tin (Styfeyffe ifl **ties**  
 jenige £of)(C/ bie jur 21ufuaf)me bel ffmbrpo **dient.**  
 @ie ftnbet ft\* In jebem äugeren gpmeiffe / febtt **aber**  
**beo** bem inneren unb bet) bem einfettigen ^ntweder  
 gang, ober bilbet nur ein ffeine\* @rûbeben, ober **eine**  
 güt)C. *Loculi* nennt man *and*) bie bet)ben- **Gâde**  
 in- roelcbe ber @taubbeute( getbeilt ff{.

**LOCULARIS, fac^erig, f. I^oc « ?/**

LocuLATtis, menn èm fabler Skwt buub **3wi:**  
fcOenrdume / toclcftc mitber 2ld)fe paraUcf laufctt/ **(oder**  
**überhaupt**, jpecanboUe) infacl>cr *Qetfoilt ifi.*

L.ocuLicmuM Ki'd),, Cine SrucfctbūBe/Die roittett  
durch bie ftac&er auffspringt.

**LOCULOSUS**, *Caul is, f&dperig, ift.bei TDilh*  
**denono** ein ©tcngcl/ iu roclclKitt ciKtvbic Dad SD?af  
**oder** bie (**cere** ^öble Due\* Dunne Querljantc a&gct&eilt  
'ft/ luce an AIIUNDO *Phragnrites*, utit) ait mo&rcren  
lo[ben<jctvåd)fen. (gin *Folium loculosum* i|l 6c>  
0)i(IbenoiD fpnonpm mit *articulainm.*' Sine  
*loculosa Radix*, ttJte 6er .*Caulis locuiosus* **8e:**  
^ut, t(l an CICUTA virosa.

Locus, 6tanbort; er if! nacl) ber **Lage. gegen**  
©tnb unb ©onne / unD naci) 'Serfc^ie&cn&ett ter **Be:**  
W)affen6eU be« Soben^ &erfd)iebeu. -6. **Yatria**  
\$atio, unb HaAitafioj.iwrait man **ihn oft**  
**verwechselt.**

**LOCUSTA** nennf paltfot Beauroto *ba\$> toai* matt  
fctt **Hinn'e Spicula nannte**, *bai Htfyvfyt*n, *bai*  
*i balb* einblumifl / balD bielblitmig tft, uub beiTetf^liim;  
**hen** balb 3tvUter/ balb« blog männlic^e'ober Hog  
**weibliche**, balb pol9game\*\$umcf)en ftub.

**LOOICULA** i\l bet) 5?v. t>cm Beaavoie *bai, mi*  
**Nicheli Corolla**, jjt'nné *nwfrJiuftiCuSquant\**,  
**Willdenow**, Kufcarfc unb perfoon *Nectarium*,  
**Desvaux Glumellula**, *natmtc,' bie Ucinilt .unb*  
**innerste** ^ (untenbecfe an ber @ra^Mume / Die Die ®e\*  
nitaiien unmitcetbar *umsibt*. 6ie Jeficfct *auj* 1 — 3  
iarteti/ mcic^en' DiircbfbeineuDen J?autcn, Die ©tfiups  
Pen å()tt((c0/ unb intmer unter Dem gtaubmege ()inc)C;  
Heat fmb. .6ic fleben actv6()ulid; paraOet mit bem  
Srud)fffftten / finD mciftcn^ gcpaart/ airber 6eite bcc  
untcren epefjc, unb bebccfen *bai* ©c&iID\*eh (**Sou-**  
**lellum**).

**LOUACEA**, cine Samilie t<<. ©rafer bep Den alten  
**Graminolegen.**

LQMENTACEA FOLIA, gl I 'C b Ct & ū I f C tl 4 tt iff C  
 ©lätter, SBlafter, Dren SDcttelrippe fid) nur jerätfelt/  
 um Die 55lattfa&e \$u bilDen / Don ©telle }u ©tefe fid)  
 abet abfe&t Durd) ©elenfe, Die fie in eben fo fciele,  
 Stürf an ©tuif angefegte/ S&eKe trennen\* Sa^ Qxaiv  
 ejcnblatt gibt em fold)c^ geglieDerteg \$(att/ Da^ aus  
 2 (SfeDem fejtc^ J)ecanbolle.

. LOMENTUM, ©li e bereft I fe/ iff 6d> Wissd.  
 cine (ängliche \$n|d)t, Die jtvar au^ 2 tffoppen besteht,  
 ,6te augcrba!6 97abte btIDen, Die aber ntc/ rose Die  
 jpülfte auffspringt/ fonDem an Den fleinen Querwåns  
 ben (isthmis), Die ste in einfamige %ad)cv theisen,  
 an Dereri unteren Sstatf) Dec Same f?5t, fid) glieDertveife  
 ablbfc. €^ tff £tnine\* Le^ 11 men·is thm is in\*  
 lerceptujTii Lomentum i(l be?) Hoffmann ein  
 Gongylangium Lome ntifor me.

. LONGE UnD LONGISSIME ACUIMINATUM , \$t|)t  
 Iang \$iigefpt9^> ^^ bie fläffer an GEITIS  
 dgidentalis, \*Fic US religiosa.

LONGISSIMUS, aq^erorbent!id> U n g.  
 fcefien #<n^e jur 55reite lcfst t>erbäf / n>ie'2: 1.; \$. 25^  
*Amentum longissimum*" an PoPUL\*US; *longissi-*  
*jnus Calyx*, btv 2 — 3 3)ta&l lañjec il aid Die  
 23lumenfrone, unD ebenfo gegen Den field), *longissi-*  
*ma Corolla*, an GATESBAEA, SIPIIONANTIIUST  
 BBUNFELSIAS. *Lovgißima Filamenta*, an TRI-  
 CHOSTEMA 9 PLANTAGO. *Longissimus 31 u c rofolii*  
 an ACORUS *Calamus*. *Longissima Petala* art  
 11 uDBECKIA \*purpurea. *Longissimus Petiolus^*  
*tin fe&r lander 23lattfittet*, Der längter ff? aM Dad Slatt;  
 2< S3. an POTENTILLA a/&a; *longissima Radicula^*  
 Die (änger iff aid Die JfotoleDonen; *longissir^s S t y*  
*I us*, roeniaftend um Die fyalfit längcr aid Die 6taub;  
 jefäße/ §.56. an ZEA, CAMPANULA.

LONGITUDINALIS, Der Jan^e nacht. *Longitar*  
*dinalia Dissepimc.nla*, £angēnf4>Cibew4irfse/

Die nac& Dec ŠanfC Dec gcuc&t binfauftn *Longitudin*  
*cr lia Locudam enta*, J^aŋgefad^er/ brcit  
 §ad)cc nad) Dec aanjen gruc&tlin^c in ein\*c einfadjen  
 Šed)C aufcinaftDec figen. *Longiiudinale Receptaculum* an GENTIANA, *LongiLudinalis Šorus*,  
 tvenn ein (inienf&rmige\* \$auf\$en t>on t>r Saft^ bed  
 ?aube^ 6W jur 6pi§c gefet/ tt)ie an BLECHNUM,

LONGITUDINALITER, bCV H&nQt n&foy \*}• S3.  
*longitudinaliter dehisc&is\* Cap'sula*. 2in Den  
 Sarcnfräuterti i(! Dief? an MARAHIA, tuo Dann Durd)  
 fētefe^ 2lufreissen Ouerfrtd;er entlcf)cn. *Longitudinal*  
*liter Jissum Per idi urn*, Da^ t)Ct Dec (Spcge bW  
 juc 3>afif (irid)förmig jerreigt/ note an BICTYDIUM.  
*Loiigiludinaliter plica turn Folium, längefältig*,  
 tocnn bit Salten ton Der \$aft‡ nac^ Der ^ptlii s̄im  
 autflauen; \$ 95. v<<RATRUM nigrum.

LONGITUDO, Die i^nge, mirD don.Der @piße Dec  
 25aft^ lcvab ^enommen. 3<e if? wd)t felten fletncc alf  
 Die S3ceite. 9)?an unterfc^cdct bit abjbute Die Durch  
 Delt 9Raf?jab bcftimmt tvirD/ uni> Die relative ver-  
 SlicOen mit anDeren betutcfyarten Eheisen.

LONGIUSCULUS, etta^ (ñngcc als gewöhnlich,  
 t>ie Die Cu/mi qn AGROSTIS rubra.

LONGUS, Iang^ bejeidwf ittni Don ganjen  
 Pflanzen forooi( aid oon einjclnen £)rganm/ ba\$ tint  
 gewisse ^)flau?c, oDec ein den>ittTe Ot^au länder fei>  
 als Die DenuanDten ^Pffanjca und Die t>ert>anDten Ov  
 gane; 2ten^ ba% irgenD etu>ad me^c (aug ali bvclt fct)f  
 und ländec/ alf man ed feinec Srette nad) tttoavtw  
 fottte. £)ie £angc, (*Longiudo*) w'rt) .imrncc  
 bur\* jene Sichtung bc|limme, tuelcste ()fc ©efäge in  
 il)cem 4aufe ne()men, alfo Cjrd) Die EKtcbtuns Dei  
 SBac^tf)umc^ / Don tcr S2afid jur 6pi§e bin\* *Longum Amentum an SALIX vilellina*. *Longus Calyx*, Der langcc oDer ttjemgjitenS fo la||Q iff ali Die  
 \$lumcnfl'01K\ *Longus Pedunculus*, Dec länger

iff aW We §5fume. *Longus Petioins, tin* (anger ©lattfitel, ber fo lang *alt bai Q3l*(rtt, obcr toentgtfen\* %. btt SMattlänge lang iff, SRad) \$>&?nt längter. aW ft ber Sfilattlange, n>ie on LYSIMACBIA nemorum, Longi Hairni, bennal)\* fo lang alg ttc ©(Ctifld. Longus Stylus, ton 8lcid;er Singe nitt' ben ©taub\* gefäßen.

LOAA, bet) @cdpoli ber £&a(lu^ ber Sichenen.

LORATUS, r f e m t'g, n>etm Die gtnicti/ *bit* ben Umrif? bilben/ frumm ftnb, mfc i^ren 95c(jen nad) augctt f^eu/'uni) in ^Btnfdn {ufammenfioilen. Bernfr.

LORICA, p a n ; e r # etn teffTufarifcf)cr/ *bit* %||>itt fcd umfd;lkjfenber, nub mit brauncn-3micbc(61åttcr« åugerlid) better £biil, Dcr uur einigen Jwiebeln eigen ist. Bernb.

LORICATI FRUCTCS, (£>&ttl., %|\^ld)tt / die mit liner eigcnen'SIrt Don 6cl)upj>en bebceft finb;

LORULUM neunt 2(d^ariua einen fabenförmigten uub åfliQtn ZfaUui, be? fcfytaff au^gebretut unb hång- genb ift>

LUBRICUS, f4>I6pfr<9/ ^m ©efufcle nnb der, ©ubflanj nad)/ ftinn *tin* flügigec ^örper nid?t an btn Fürgern hängen bleibt.

LUCENS MARGO, an bent fyutt tinti tyllid, tvenn ftlefec aflein glän&t.

LUCIDUS, ftartQl&n\$tnbf.tt>tc mit eineni SirmifTeüberjog^n/ j. 58. We flätter an ILEX, CITRUS, bte (gamen an AMARAMTHUA; bci) tDinbenotD fgno\* n9m m t t n i i r f u j, bei jDccanbolle ynb 0prcngei aud) mit tplendcns.\* &c|) anberen fogac mit Iran spar ens,

LUCINOCTES FLO RES EPIIEMERT, fc&Qt Ull> ^l a d) t b i n m e n , bit fid) am Sage öffneu, finb be© ber SRad)t fcfcleffen. <£bt|| Oieg fltlit a u \* »6n beu atquinozialibus. JDCC^nb.

Lucus, &ain, Heine gemifefote SSalber mit hochs stämmigen Sgaumen obnc Unterbelj.

**LUMBICIFORMIS**, xvū r mā\$ n I t \$, fcie ait  
CLAYARTA *vermiculata*.

LUNATUM FOLIUM tft b<t) WiUbenovo eni 23 (art, fceffcn 0e>de Happen an bee \$afi£ in einer geraben etwas «u%6o^eoen time fie&en/ unt> fpigig julaufen, das abet an bet ©pi&e cunb iff, tote an PASSIFLORA ZU-\*iata<sub>y</sub> SAGITTARIA *obtusifolia*. 95ei) faaynt ffi eitt lunatum Folium, mOflbformt'S/ bag me&r 6rcrt o(g (ang, unb ton jmet) um5(eici)en in gleccfster ^ic^tun^ Kegenben/ an bcaben ©eiten mie i^rcn Snben, fi^ bet tu^renben Sogen fo begränjf iff, tm§ bie S5afi^ eine ^udK, tie 3pige eitt fteroortretenber Sogcn iff. (E^ iff nur an bm fiavtnhåUrn, n>ie an ADIANTUM lunulatum. S&tt) Berntarbi iff efftag lunatus> mon b fōr m t'g, tocnu bie Sucftt eincn ^ogen/ unb der SSorfpruug ju jebec 3eite cinen SBinfld briber\* Eine Anthera lunala iff an FRAGARIA; eine /u/iulata Car in a an POLYGALA myrtifolia ; ein Le ^ u\* men lunatum an MEDICAGO arborea; ein Sorus lunatusj be? einen fjalben So^n bffcfcrnbt, · rote ait LONCHITIS aun'ta. Sluct fononpm ntit

LUNULARIS unb genw&nlicjer LITNULATUS, t>a!b^ mond fōr mig. ©0 iff be? Hinné ein Slatt, bai beynahе runt), an t>cr %aftf au^eb^lt/ unb mu uad> rückwärts gefeheten ffiinfchn t>etfes)cu iff, Nach Des, candolle der nufevffc @rab ber nierenform^n Form.

LURIDUS, nad? citizen leberfarben; naO) antic\* ten ein fcftmugideg in'g (Selblic^e sicbenbe Scaun; auch braungrau, leiç^engelb bep Bern^atbí, ein sc^wärz liches Gelb.

LUTEOLUS, ein helles Gelb.

LUTEO-MACULATUS, gtlbQtflcdt, tOlt die SBlatter\*an AMARANTH us tricolor\*

LUTESCENS, iiVf @elbe iie&enb.

LUTEUS, gelb ubttftaupt/ unb »ie ©ummiguft, gelb, em mnc\* ©cib, jDecanboUe\* Sw aabn\*en tm

@el&, bat Mi SK&H&e jie&t, ^ontggelb, tote an CHELIDONIUM.

LUTOSUM SOLUM, £ e f c m b o & e n , fcon *sjd6cc*  
 Sfatfe/ fm feuc&fen 3u(?anbe efmag fcftlüpfrig nnb JU\*  
 fammenbångend, fm trocken aber jerreibUc&er a(f bee-  
 ðhonboden.

**LUXURIFNS** FLOS beg JSLtmté, i(l cine 23fame, beren  
 Oecfen (fcfc^ tint) Slumenfrone) ftct) fo fe^r tert>tel;  
 fältigen, bag t>aburc&\* felbfl Die ttefentlic&jien X^eile  
 fccffclbcn jerflfirt wr&en} ec recf;net Dabin ben *Flos*  
*multiplicatus*, *plenus nnb prolifer*. Uebfrftaupt  
**alles**, was trsenb einen £^ei( groger unb fetter aid  
 gewöhnlich hat 9(De finb 9)?oii(Trofitäten\*

LVMPHA ↗ *Alimonia*.

LYMPHAE DUCTUS (**BretP**) ↗ *Lymphatica vasa*.

LYMPHATICA (^asa) @efa§e/ We ttajferige obe\*  
 ttoc^ tomid au^earbeitete 6afte in fid) fu^ren. Oie  
 foDen nut an ber £)6erflacfte fid> ftnben. *Lympha-*  
*Uci Pili, i)mpbatifd)c Qaave, fabenffcrnige Sjaayc,*  
 obne Srufen, bie nur jur SSerme^rung ber augbün;  
*fitnbcn Oberflacfte 6e!?*tmmt ju feon fc^etnem

LYRATO-PINNATUS, *ley etartig gefiet*  
 bert / twin bai ungepaarte 95latc^en an ber <5pt@e  
 eine^ gefieberten\* Slatteg t>tel groger i|t aK bie ubrt;  
 gen S5lattcfjen / tme an ANTHILLIS *vulneraria*.

LYRATUM FOLIUM, ein **leyerförmiges**  
 T&Utt til bet) Hinne ba^jeni^e, bai nadt) bet £±nctt  
 fo in (Einfchnitte ge^eilt i(?, bag bie oberen grøget  
 ftnb, unb bie untmn me^r enffernt steben. Set) *Wayne*  
 iff eg ein gefiebert gefct>ltt3teB, obetr ein buchtiges  
 fdstatt, beifen augerftec 3ipfel fe&r flrog (bei) *Willdes*  
 vovoand) nod) runb) ifi/ n>ie an ERYSIMUM *Barba-*  
*rea*. S5ct> anberen ftnb jene gefiebert gelappten flatter /  
 (f. *pinnatilohatus*^ *leyerfotmig*, an meldjeti  
 bie iaptn an bet 6pi§e grog unb jufammenfltefienD/  
 tie unteren abeçflein/ itnt! big an bie 3Rittelrippe ges

fftrft ftnb. 95et) Bent&arbt ijl bag legerformifl/ ttorati  
fcer SSorfprung unb Die Sttcfyt Styjen **bilden.**

## M.

MACROCEPHALUS<sup>1</sup> ·j(l **6ei** Kid^arb ein **Embryo**,  
**dessen \$oti**)lebonen ineinen jforper orcinfgt fmfc>, be\*  
**weit** flrger ifi alg atteg ubrigc.

MACROPHYLLUS f, *Grandifolius*.

MACROPODUS tiennt Kid>arb **einen** £in6ri)0/ befft  
©ticlcf)en, **tuck&ed** Die fiotyleDonén trnflt ^ au^ einem  
bitfen QSutjclförpcr mit einem 9)Ta()lc **hervoordringt**,  
U\j bid/ und an feinem ^opfe **aufgetrieben.ist.**

MACROS in Sufantmenfegutigen. 6. *Ion^us*.

MACULA, ^lerf/ eine frc^formifle 6teHe/ We  
fine anbetre \$axbe bat ali bet StKil, tvorauf fie **ſtſe**  
**befindet.** Sn^befonbcrc bit gsaumflecten, 93futcrmaſ)lcr.

MACULATUS, geflerft, tvenn tué gläd>e mit  
**anders** gefärbten \$)uncten t>efest t|1f ttie an ORCHIS  
\*naculaia, latifolia bit 2?latter\* 3)?an t)cnpcd)fclt  
leg ofterg mit variegatum, urib Daſter befrimme  
c^ Bernbarbt Oaburcl / bag eine fiavbc t>on ber anbereu  
**eingeschlossen** toib. Bülliärb n>H tag man bie 3at)l  
^er glecfen anyebe; benn bc\l i^m **ift** bagjenige, n>ag  
fibcr()aupt t>iele Heine Stccfcu bat, o^ne Daſ man ·bie  
**ahl angibt,**

MAGULOSUS.

MAEANDRIFORMIS ANTHERA, **h in: und h erges**  
**bogen**, tvie an CUCURBITA.

MAGNUS, grog, unter benfetbenSéjebungen wie  
\***nimus** **51 gebrauc^en\*** **Magna Sem in a, übct**  
<sup>10</sup> grog/ in bie Sänge ober SBrcfte, rote bie <focc&  
**nug** unb bie @aubo(ne).

MAJOR, grower, n>irb in alien 35ejic&ungcu  
**wie minimus** gebtauc^t,

**MALICORIUM**, bie bei4&ar(en ©amen beg ©ranaf;  
apfels.

MALICUM ACIDUM, *Hpfelf&ure*.

MALLEOLUS, ©cféigling, *Crossete> tin*  
tteuet frie& mit einem ©tūce alten foljeg *an feiner*  
95afig, bet SBurjel fc^fagt, toenn man i;n in Die  
€rbe legt. .

MALLONANDRIA, fonanntetriebtua*Hinnēe* XL  
€laffe, Die JDobecanbrie, noegen ber unbclimmtcr  
Sa&I bee 3taubgefa&e fciefee (Slaffe).

MAXPIGHIACEI PILI *excretoriyy* ftamt Me  
2)rufe etn (>ort\$onfak\$ /?aar tragt, ba^ in Dec fflitt  
terfel6en befinDItd) ift, unb an feinen fe^ben Snbett  
dne geucfriflfert au^ffieffen lägt; {.

95. MALPIGHIA urens.

MALYACEA COROLLA ((I 6\*9 tPi'QbenotD eine  
fünf^Iättcige ^lumenfrone, beten SBIumenblätter meU  
fiend terfe^rt gerrfctma, an bet 95ajt langgcjogett  
unb ettoad t)ertva\*fm finb, fo bag. fte eine emblättrige  
SBIumenfrone .{u 6i(ben fc&einen/ tt)ie an'MALVA,  
ALTHAEA ro^ea.

MAMMILLARIS, MAMMILLATUS, MAMMILLOSTJS,  
MAMMOSUS, j i Q e n f S r m i g , n>a^ entn>ebet mit;  
f (einen jt^enformigen hbdcvn befdjt t(! / ober berg(ét(\$en /  
ober eine flto^ere einec S&tibctbxufi a^nlid^e 3it}t bilbct;  
utei(tenf fpnonpmmit umbonatus unb fe rr u c o -  
5a5. *Maitunillare folium^ XOtnn ttlCfjmc Dicfe*  
furje an bee ©pige sen>5(6te flätter bic^t bet)fam;  
raen fle&en/ ttie an STAPELIA mammüiaris. gReiffen\*  
fpnonpm mit vermosum bit) OXUBenotD. Ma-  
millares glandule\* an CROTON sebiferum. Mam-  
mosus pileus f. umbonatus. Mammosum oper~  
culum, toenn bie SBoßunden in ber 3Ritte mit einer  
Heinen ftalbrunben &f)abtnf»tit btft\$t fmt>, n>e an  
MNIUM stellare; mammiUatum Bectptaculum  
weic marzia.

MANGA *Jilamenta* f, sterilia.

MANIFESTOS, Wai btutUtf) uub Uitfytflytbat ilk»

MANNA f, *Saccharum*.

MAHUBRIA, &anbbaben, fb nennf man bit  
**Elateres** <mr#6ntcrfd)orfe.

MANus, jy&nbe, nannfen elntae attere, unfr  
 feI6|t nod) etnige neuere Sotanifer jene SRanfen, bie  
 to ttret Sect&etlung cine Sir\* turn ^at^/ ober Wetate&t:  
 ton ^3fote 6ilt>en / fete VITIS hederacea.

MARCESCENS COROLLA iff bep £tnné etne SSiu^  
 mcnfccone £ie binfc^mmbet, o^ne a6jufattter/ tvie an  
 CAMPANULA, ORCHIS> CUCUMIS, DAPHNE. Már\*  
*cescens* Calyx, voeltenb ift 6C9 tPiÜbClOW etn  
 deleft/ ber nacl) bem Slu^en termelft, nocfr· eine 3eit  
 lang bleiBt, cnbltcft abet abfaÜt, tote an PRUNUS,  
*ormeniaca*. %>Ct) fcecanbolle' abet ft etn Calyx  
*marcescens* Oerjenige/ bet/ o^ne nacl) bent S3er6lu^ett  
 objufaden, au^troefnet. S path a marcescens tñi  
 tcp tPiÜbenon> erne Slumenfc&eibe / £ie beom 2luf\*  
 6iut>eit / ober furj |>ot bemfelben mtvtlH, n>ie an  
 ALLIUM *oleraceum* (abtt nod) cine Stit (an^ fle^en  
 iUibt/ Kó^limg). *Stigma marcescens* utt> 5/y-  
 2u5, Die erfi tvelfca, bann abfattcn/ tote an PAUNUS  
*armeniaca*.

MARGARITACEUS, per I toe if; perfmutterartia  
 glänzend.

MARGINALIS, MARGINATUS, toa\* am 9lanbe  
 steht; roa\* einen &anb bilbt ober hat; n>a\* am SXanbc  
 ander\* gcfärbt tfl (2Jecanb.)\* ©o J>a6m mtr cine  
*marginata* ApophysiS am SPHAGNUM,\* etne mar.  
*ginata* Capsula festr oft ai\* fononom toon <Sa-  
 \*nara; etne Dehiscentia marginalise XOtX[n nut  
 tie etgentlichen SRanbnäte ber £(appen auffprtngen/  
 tote an tnelen j?apfe(n» *Marginalia dissepimenta*,  
 die Don ben eingebogenen SRdnbecn ber jf(as>pen enf^  
 fief)m, unb ba^ec a^eit boppelt ffnb/ obec au\* 2  
 flatten beffe&en; etn *marginaU Indusium*, n>enn  
 \*\* Don bee j^aut be\* SRanbe\* be\* %lattt£ entftthtfi  
 Wit an ADIANTUM; elnen *marginalus Pappus*,  
 bie ©a'menrinbe (l\*%ü6ec ben ©c&ettel be\* -

men\* *titU*, unb bafolbfl einen cintlatfriflen **Krang**  
**Don bet** ©eftalt ctncS £clde\$ bilbet/ n̄te 'an PY\*E-TIIRUM, · ETITULIA.; etncc *marginalis* *Pedunculus*,  
 bcr auf bcm Slattranbc ffe&t, mie an PHYIXANTHUS  
*EptphyUanthns*. *Marginata Semina*, bit tnti  
 totbtt am SKanbc *Hxbtdtt ft'nt*) / n̄ie CUCUHBITA, obce  
 tnit ctncr £aut cinflefagt/ n̄te an ARENARIA *maninas*  
 dint *marginata*. *Silicula* iff fononpm mit a/ata  
 ttnb *carinala*. *Marginalis Sorus*, ranbflanbtg t({  
 ciu i:aafct)cn, nocnn cS laug unt) Itiucnfönni^ i({/  
 unt> lān\$£ bcm *Siawbt fid*) f)in\$tcf)t, mie an PTER»  
*furcata*, oOcr menu mef)ccrc ^aufcf)en lans^ torn  
 JRanDe in etne Sielbe gefleUt ftith, mie an POLYSTICHUM  
*montanum*\* (£wt *marginalis* \$ q u a TH a if! ail CARLINA\*

MARGO , Hartb/ bit Xante, faelcfK Die 6et>ett  
 glaç^en ffacfter S:>cile bilDcn. iWarg-o *folii ifl* 6e>  
 ftfnne' ftcc aufierffe ©aunt beiJ flattened án btn ©citett  
 beffclben, obne alien Qirngiff in bit S5lattflå^e« 9)?att  
 nennt ein 25latt *Mar gine aculealum*, Wnn blog  
 bie 3iert>en obec 3?ippen be£ 53tatte^ ei^ärtet, a(£  
 ©tafc)clu, au^ Den happen/ Slbfd^httfen obtt Såbnctt  
 Deg Slatted f)ort>ortreten. 3}fan t)er^ecl}fclt eg oft mit  
*mar gin e spinosum*; *margine revolutum*, ftcntt  
 t)ic ©ett^n bc9 93Latte^ nacl) augen geroOt ffnb; 5. 35.  
 VACCINIUM VIYIS *id(ea*, CROCUS; *margine spinO"*  
 sum, ftenn Dtexim ffianbt bt& Slatted i)ttt>ovtaQtnbtn  
 (£dcn ob.ee groÙe 3at>ne jicf) in f)irte fiecf)cnv>e Sornen  
 fo eni)en / ba§ felbfl £ic 93(attfu6flan{ mit in ben £)ont  
**ausläuft**, wie an ILEX *Aquifolium*, QUERCUS 7/e^.  
**Die Margincs agrorurn s. Versurce** ()ält £iuné ben  
 gebünchten iBiefcn fllcicf).

**MARINAE PLANTAE**, (3 e c p f l a n ? e n , bie im  
 Meere wachsen, immer tom SBaffer 6cbectt finb/ imb  
 den Frost durchaus nici)t fcerti-agen, l> S3. Fucus,  
 ZOSTERA.

**MARITIMAE, S t r a n b ^ fla a j e n**, t>ie am ©tranbe

**des Meeres ttacf)fett/ n>ie CRAMBE *mctrithima*, ERYN-  
GIUM *maritimum*.**

MARTIS SIGNUM, *bai \$eid>en bee iTJara*, (f) foomit *iinne fowofj!* We mañnllic&en 5)lumen, a(£ Die imepjdbrtgcn flJffanjen beseic&nete.

MAS ober MASCULUS, g nt n'ii/ batfjenfoe, %ai bag SBeib befruc^tet, bem neuen SBefen {eben stbf\* 6e^c oft *and) bit mānnlifye Illume*.

MASCULINUS unt) MASCULUS , m £ n n 11 <^ ; *masculus Flos, mascula Pi ant a, cine 33(umC/ eine 5Pflanjo Die blof? mānnlldbt @efcf)(cc^t^et(e, bie nuc ©tau&gefäge, obec auc^ nur @taubbeute( Nt. ©abec tnasculum Amentum, mascula Spica, eitt ^a§d)en/ eine Slébre, mit blof? mdnnlicften 35lumcn/ tDie an ben mannlifyen tPetben/ Pappe.In; an bett 2kdf>ren ton CAREX Drymeja. Masculus flos ILinie. ©. auf) Abortiens.*

- MASSA, t Tlaffe/ biegRaferce/ tvelc&e t>on ber Oberflac^e eingefc^Iojfm iff.

MATRICALIS UTRICULUS, etn Heinec • länded) n>ab jenformigec / mit oielen grud)tförnern an^efüOtee ©c^faucft an ben tfonferpe/i/ ber in bee jusenblidjen Wanjc mit feinen 6cpf>cn Snben ben <fnben bee benac^bac^ten fo genaftert ifi, ba\$ atle in bem ganjen Saben nut eine ^aarformige \$Rof)U ju bilben fc^einen\* ©?tt ber Sett trennen fte fid) aber / tverben ieber für fid> mefrr ober minber iufammm^o^cn, unb bilben an ben Trennung^puncten burcftfcOeinene rfnflformige 2i6fa§c•

**MATURATIO**, 5a^ K e i f e n , ber Suftanb **eines Theiles** einer ^Pffanje / ber reif rotcb; auc& ber Zwis fescenraum \$n>idfb>en ber Sett ber S5efruc>tung unb t>et SJeife, road £imne Grossificatw, Zvadptseit nannte\*

MATURITAS, bie K e i f e / bie <fpoc&e über ber 3u; ftanb einer Sruc^t ober eine^ 6ammp^ / bir bie t>oOf)e Sncn>i(telung an ber 9)?utterpflan\$e crf)alten ^at, beren er fabid iff. 3»an erfennt biefe Sett ber SReife an bem ©amen baxan, 0a§ er fecit Staffer im tropfbaren Zu-

tfanbe mefir entftätt, alfa fc&twtet aid ffiaffec iff<sup>c</sup> **Bey einigen au\$ Maturatio.**

**Maturans**, ^ (Tanj<sup>e</sup>it bte am Sftotgen blüften, ober irgenb ein tybānomcn an etner \$ftan&e/ &a\$ ffcft tw\* am Morgen juträgt.

**MAXIMUS**, bat \*gr5gte, f. in 95esug auf feine Anwendung **Minimus\*** **Maxima Colyl edones** nennt man Mejcni^cn / bte mft if)rer sjjafTc / (menn fie flleid) febt ftein finb) t)te ganje @ameitbaut au^fūOen/ fo Dag bet) bet Ocffmmi betfetbtn nid)t\$ alt bit S\$M tykbonm unb ba\$ 5Buf\$eld)en ftd) tf\$st.

MEATUS INTERCELLULARES, Jreciranii6 (. Fa 5 a rev *ehentia Hedwig.*

**MEDIATA INSERTIO**, mittelbare Einfügung, wenn cm £)rgan naſe an feiner Q3af^ mit einem ant&ren jufammctifedrt^t/ todc&ef baffelbe gum Sftcile ju flügen fd)Cint

**MEDiacRw**, ntittetmi\$ iQf (fetl nur refatto/tint) ganj unter ben SejiefprungM/ ft)ie **minimus\*** 3\* 93\* **mediocre Amentum\*** **Mediocres Cotyledones**, bit fomohl ^ct Sang^ aW bet Strette nac^ Die @amenftya(e bcynabt, abet toegen bed forftanbenen €ptt)eigrt ni\*t ganj augfüllen. **Mediocris Calyx**, Don btt iāngt btt dtbfyt bet SHumenfrone. **Bernb.** Sänder aid Me dāifte btt ^umenftone. **Bortb.** **mediocris Petiolns**, fo (ans a(d bg s Blatt. **Bernb.** J>alb cbet % fo land att bad *flatt*, Bortt>

**MRDianFaRwis**, f. **Modioliformis.**

**MEDITERRANEAN**, ^ flanjm, t^elc^e {Wic^eft ben SBenbe; imb ^olatfreifen (eben. Bern ^ 95ep Borfc (aufen tfl ed bad AUnta bed fūlic^en guropa.

**MEDIUM**, btt t>on ben Snbt^eiUn eingefcbloffenf St&eil einet Wnie ober eined S&tpetd; J. 95. **Spadix medio stamini/eru**s an ARUM maculatum.

**MEDIUS**, toad in btt WRittt fle&t/ obet **zwischen** **Strey** @ingen bai Wiitttl halt, J. ». merfius **Nervus**, bet mittlete @efagbunbe( cined Slatted/ **Mittels**

**tittbt.** ©• A. *Costa media. Media Semina*> mittelmaßJig gtoge ©amen/ jtoifftyen einem 3ofle unb 2"/\*

MEDULLA, tXUr?, iff bag gen>&f>njc& weige auf mefct obet minbet toeiten Jeflen beffebenbe, *bath tvodcnc* unb balb faftige 3eBennett>ebe, bag in bent ©f^gef bee ©tfotpfefbonen in bee Sfltittebeffelben ineincm roal\* jenfötmigen Sanale eingefefyoffen ifl/ ben e^ gdn} ober Sum *Xfytih* ^au^futtt, *unb jur* (Ernafrung bfr ^no^pen unb bet jungen *Zmbc bunt.* (f4 feffff in *bin iBurjeln* afler ^flanjen, unb in ben ©te^tgeln be^ ^onofotolebenen/ aucfe bet) ©aflfcrpflian^n/ obfefrott man gemeinbin bte n>etd)e fc^mammtge STOalle in ber SRitte berfelben SRarf nennt. iDecanb\* (E^ beffe&t nad) *T&ttn|>. QMbbnlt*d) aug einem jtt>clffTdcfigcn SeDenge^ n>ebe, *bntd)* *toMji* nur fetten cinjcne ^ilc^gefcdge laufen. 23om 6p(inte umgeben i(l ti meiften^ grün; torn \$o(je umfc^loffen getvöbnlic^ n?ei§/ unb faftlofer. Sun>ei(en' **billet** *ti and*) tfammern.

MEDULLARIS SUBSTANIA THALLI, \*bit Vft&t **Fſa b;** *flan\$*, iff nac& *lify&uie* mergarfig/ faferig, **gefäß:** förmfg / jumeilen bärelic^/ abet bod) genoö&nlich **weicher** \*li bie 9tinbenubffan{/ in ber fie oerborgen (ieg. &iefe Safern ftnb einfac^e geffrecfte (Sanale t>on einem burd&ftc^tgen ^autc^en gebilbtt/ unb jerret§en int Sllter. *Medullaria Vasa* nannte man einff @tfaj?; fafecn / bie nie %unbe( bilben / unb foräge ober *bow* iontal *bnvd*) *bat* ®latt ober 3edengen>ebe *laufen*, #t& in ben gäuten bet @efdge wttbeilen, unb in bet äuge; ten J?aut ein jarte« Ke§ btlben. ©ic liegett ftc^ nie mit einet gefärbten Slugtgeit f&Oen/ unb *bod*) **f&Cet** man **fie** fur jutüeffufttenbe ©cfäge.

MEIOS, *xcenigct, bofyt* *Me} ostemones* jailer, menn Stamen twiget @taubgefäge &aben als Stamenblldter.

**MELAS,** f. *Aler unb Niger.*

**MELLEUS,** was. nach Honig schmeckt.

MELLIFERUSJ *toas S}oni& bringt/ foie Glandule\** *mellifera f. Nectarium, unl) ba\$ Re cephaculum poris melliferum an RUTA.*

MELLIGO, ter bcfannte £onigt&au an Pflanzen.

MELOMDA &id)» ☺• Pomum.

\*MEMDRA.NA, <£>aut, nennt man jebetf ffadje, parte, fcfir\* bicgfame Organ an ben ^flanjcn, e\$ mag übrigens ton »pa^ tmmer für einer 9}atar fepn. ~~Sc~~ bett Laubmoosen t{ bit i?aut, *Membrana*, ein zusams menhängender fdncrce gortfag t>e^ Sc^laud)es, der entweder nach obca n>upert</ obec burc^au^ o>ne SttJimpem un& faltifl/ gitterf&rmifl i|t/ mie beo FONTINALIS , oDec Ourc&bruc^en, mie an CIKCLIDIUM , *Qxoart*\* *Membrana fructificans f. Hymenium.*

AIEMBRANACEO - ANGULATUM LEGUMEN f# a Jl,\* U I tt-  
£o-alatum. *Membranaceo-bilocularia Semina*  
6lt GIRCAEA; *membranaceo - dentatum Peris to\**  
mium> fy&utid 9?{\$a{>nt, roenn Die 3 ^ üt ter innerett  
Reihe an Derafcldben unten fcure^ eine ^aut jufammctu  
hängen, n>te an BRÝUM-K.

JVIEMBRANACEUS , MEMBRANOSUS , ^ & U 11 g, von der  
Consisten; etner £auf. 92ac^ Bern^arbí ist. dasjenige  
i?aurtg/ beffen £urcf)fd)nitt (inienförmid if{. Sine  
*membranacea Ala an btn* ☺amen ton PINUS; eft  
*membranaccus Annul us, bit a||i Cintt ordentlichen*  
^aut bon eintt tt|x>a\$ fcjlett Sc^tur bcftet. *Mem-*  
*branaccus Aril I us, bit a|X\$ Cinc bünnen durch-*  
pcfttfCn ^)aut bestet&t / tt)ie an LEDUM ; *membrana-*  
*ceus Calyx, ot)||c Sieifcf)/ jcbof) nic^t obne 6aft/*  
*fyie an PHYSALIS Alaehmg;* *membranacea\*Capsu-*  
*Icsy bit aui einer pergaineiUartigen fyaut bestehen,*  
*toit an SPERGULA; membranaceus Caul is unb Pe-*  
*tiolusy bet fo feftr sufammeugebrucht t(I, bag er*  
*beonabe eine fyaut ju bilbtn fc^eint/ toie an CACTUS*  
*Phyllanthus; bC\)* tUUQCn i|i jebod^ and) ein *Caul is*  
*membranaceus berjenige, ber mitf bünnen fyantcn*  
bebeckt i(t. *Membranaceus Cortex seminisy bet*

*gutweilen* eine *Samara* bilbtt, *toiC* an *CARPINUS*, \$U\*  
 toeilen eine ffacfe SKanDctppe/ n>ie an *CYNOCLOSSUM*;  
*membranacea* *Epidermis seminis*, *tin bMnt&*  
*&aut< t)cn, n>eld)e\$* Me etgene Sarbe unD ©latte Dec  
*Testa* t>er&irgt, unD *balb* jotig unD bafD caul) iff, #mie  
*Oil CONVOLVULUS, GOSSYPIUM; membranaceum Fo-*  
*lrium, toai Win* beutjicbeg Sleif\* swiften ben bct>tett  
 Släcken cnti>blt, tote ah Den mijten Slattern. *Mem-*  
*branacea Gluma*, an *PHALARIS, BAIZA* unt) an  
 attbern ©rafern. Sin *Legumen membranaceum\**  
 toenn bie fyaut turd)(ic()ttd iff/ wit an *COLUTEA arb&-rescens*; *membranacea Loculamenta* an *btH*  
 ©ilenert; *membranaceus Margo*, fhäuttg iff &ec  
 Slant) an Dem £ufe tinti tyiltfi, tvenn er nod) etnen  
 2f)eil Don Der \$aut an ffc^ f>at, Die Die \$lattcf>en  
 bebecfte. 2luc^ Dec fräutige burdjfic^tige Slant) an eintgen  
 ©amen/ n>i^in PTELEA, iff *Mar.go membranacea*.  
*Membranaceus Pappus, tin* 6äuttgeg Sebercfrett/  
 n>enn Dec (Same etnen DeutUcften ^äutigen Sianb fyau  
*Membruaceum Pericarpium* na\$ £iftnc att  
*ULMUS. Membranaceum Receptac ulum, voie*  
 an *MARTYNIA» Membranacea S Hi qua und Si li-*  
*eu la an CARDAMINE, LUNARIA. MembranaceofSti\**  
*put a an ARENARIA rubra. Membranacea Testa,*  
 fte iff Die Dunnffe untec Den ubrigen, unD finbtUfid) an  
 Den fogenaunten nacften ©amen und Den tytyrenen  
 häufig. Zumcilen iff fie jart unD Durcbftcfetig/ toit  
*Spinnengewebe*, {, 55. am Keige; jutoeilen unDurc^  
 sichtig unD aff jerreibltd), an *MESSERSCHMIDIA*; jutpe^  
 len papierartis/ Uie ZEA Mays. *Spanfo* bilDet fie  
 glugel. *Membranaceus Thai I us, tttoai* Dunnec  
*ali* Dec (eDecartiAe, wnig jabe / unD tttoai Ducfc^ei;  
 nenD / aff blattartig, tote an *GETRARIA glauca*,  
*PARMELIA liliacea*. (gbtn fo *membranacea Frons*  
 an Den meiffen ll(i>en. *Membranacea valvuka*  
*gluma*; fo iff bct>. Den meiffen ©cafern Die innere.  
*Mcmbranosus Con text us* iff bep tDiHbenotP Dai

%&ut|&t fyHt^tbt, bai ani jarten Jjaufen Uficht, tit  
Sen ganjen if&rpet bilben, toie bet) ben **Conferuen-**  
sOefterg iff e\$ fgnonpm mitt coriaceu 5.

MEMBRANULA, ba\$ £>&utd>en, bie Heine £aut,  
on 6er fid) Die 3af>ne oOer SBimpern t>ef ^auleg beftn;  
fcen. *Membranula* Jftectfer f, *Indusium*.

MEMNOMUS COLOR, beinfc^mars/ bräunlc^ fcftwarj.

MENISCATA |xnb MENISCOIDEA S em in a, tnoribt  
ffirmigc 6ameti/ txnb jteac einfac& (*simpliciter*  
*meniscata*) voQiommcn ^Ifamoribförmig, toie an  
MENISPERMUM, otec boppclt Ijalbmonbförmig  
(*ulrinque meniscata*) auf fcepben ©eiten leicht  
ou^c&oblt. £6 iff ftier Don ^örpern bit 9lcbt.

MENSTRUALIS unb MENSTRUUS, toai etnen **Monath**  
fiber n>d^rt4 ft>a\$ aDe donate (ic^ etneuett.

MENTHACEUS, \*mun\$enartiQ, ^geruche.

MERCURU \$IGNUM, ba\$ Scidjen ^Wmercurius  
^ £ m i n e ' be\$cicf)nett bamit bie J^ermap&robien untec  
ten ^Jffanjen.

MERLDIANUS, eine ^Jffanje bie urn SD?it(ag blü^t /  
ober trgenb ein \$6anomen an etner Wanje, ba^ nut  
urn flSlittad statt bat

MESEWTEWFORMIS, g e f r 5 f e f 6 r m i g. @o nennt  
2u £ o o c bie ©taubbeutl an ben ftürbiflen/ bte ges  
tounbett flttb\* ©• *Mce andriformis*.

MESOMALE, fo nennen etntge ein Zwischenreich  
jtt>ifcf)en bent 3Rinera(; unb ^Jftan\$enrcfc^e, tvo{>m fie  
SPilje, Sonferben :c. ffeUen\*

JVIESOGLOSSUS, tt)a^ auf bee 3Kitfe bit Junge Ges  
fc^marf erregt Bern&«

MESPILUS, © te i n ^ p f e f , toenn bie Fächer  
fletnf>art ftnb / mie an bet tfitepel, am Granatapfel,  
totldftn man Balausta nannte, \*

METALLICUS, tva^ SKetaflglanj baf.

METEORICI FLORES, Slumen bie fic^ nid) f ju einer  
genau beffimmten ©tunbe 6ffnm'/ fonDern fru^r obtr

fpafet, je nac&bem bet Jpimmcl umfoolft/ Me tuft ttoden ober feuc&f, unt) ber &tud bet fttmogpbate ftwftr obct minbet flavt ift, tote CARLINA vulgaris. 2£>et>&ecanb. abet biejeni&en, bie ficfr in ibrejm Oeffnen «nO &d)lieifen enttvebet nad) bet S5ett>egutiQ bet dtbc urn Die ©oune, obet nad) bet vetftyiebenen SBittet rung vid)tm.

METRA £ernk ©• Germ en.

METRE = 5'/ U''' -22.  
1000.

METRGPHORUM, f vud)ttnotentr\$Qer, eln xunbet, fabenfotmiset Xotpet, bet ben grucfttfnotert tragt.

MICANS, fd ^ i m m e r n b , cin ©fanj, ben man an LAVATERA micans am beutUcfyfiett fte^t.

MICROBASIS JDDecanb\*# toenn bie Gynobas U Uht Utin, unb menig fteifc&tg i(T, unb jur Sett ber 53lut^e 4 ^it(icf) ton cinanbet a^efonberete Sachet tragt. ^>ierfcr gef)5rcn bie gruc^te bet guppenblumen imb mebreret Borragmeen, n>ek\$e man al\$ tyflanien mit 4 natftcn ©amen befeferieben M; Gymnospermce fLinne; Gymnotetrasperma Boerhaave.

MICROPHYLLUS f, parvifolius.

MICROPYLE, jene tleine Oeffnnnq, bee/ nacht Turs Put, ben Sblnmenflavib ju ben unbefruc&teten 6amm fu^tt. ©• Foramen\*

MICROS in Sufammenfegungen aud bem @rte<\$b fc^en (iatt parvus.

MILIARES GLANDULAE, ^albFugelforftu'ge obec baVbeyfttmig jufammen^c^aufte an ber Oberflac^e ft^enbe £)cufen/ n>ie an 'ben Slattern ber AMARYLLIS formosissima. QieMiliares glandule <£>UIK', tarb f« Corticales porL

MILLIMETRE = ~~~ einer £inte»

MINIAI'us, m e n n 1 g r 0 1 &, ein Sot&/ ba\* in'g @ef 6e |tef)t/ tViC an ADONIS miniata. 300 Cintflen if} eg fpno^ npym mit Zinnoberrot u. tymexanim u, ©afranfarben.

MINIMUS, *bai* 2U e i n fie gilt immier nur **Bejſfl**  
auf Me Mriflen \$u cben biefer ©attuug gebōrisen 3lrcit,  
*fc» cf* nun, *ba§* man ganje Srlten bamit fcejeiebnet/  
WU }. 53. LAPSANA *minima*, ORNITHOPUS *perpusillus*,  
©ber nur cinjelnc S^ctle einiger SJrtcn, \$. S5. &ie Pe-  
lala *minima* *ail bet* SILENE *inaperta*. LAPSANA  
*minima* ttairt cin 9Iufe unter ben SJfoofen, unb bée  
*Petal a minima* *btt* SILENE *inaperta* UOCiXtn Petala  
*maxima* an ben @agjnen»

MrisoRſ# *Minimus.*

MINORES *Frutices* f. *Frntices*.

MINUTANEUS, n?ag nur cine ?0?inu)e bauerf.

MINUTUS, f. *parvus*. *Minutes* Cotyledo-  
?ics, bte nic^t ben |>imtn Sfteil ber (Sröge beg 6a^  
inenS cmictKti/ mit frci;cm 9luqe oft fogar nid)t ju  
^rfennen fJub. *Minuta Jnvolucilla* an APIUM  
Petroselinum. *Minula Sem in a*, febl'^Cinc ©amen/  
fleiner a(^ Hnt Wbt finite / oft ffaubabfflc;, tvie an  
**CHARA**, PYROLA. ©pnonpm mit *ex Hi a.*

MISCELLANAE, tſc ttſlc OvnunQ btv Kryptogamie  
nach Schreber'n.

MITIS, f a n f t, bent ©etud^e unb @efd)madPe unb  
tern @efuf)(e nac^, im ©egenfage t̄on flcc&cnD, j. ^  
ONONIS *mUiSm*

MITRIFORMIS, f a p p e n f o r m t'g, luenn bie  
Slacfte am SQorbert&eile naclt ber Ot>erfette fpiralffcniig  
jufammenfleroat ij1/Bern^ Erne *mitriformis* Ca-  
lyptra tji btejénifle/ bie bloS einen (lumpfen jfeget  
(ilbet\*

MITRAEFORMIS, t> I f\$ 0 f f 6 £ £ P P e ft f 6 T lit I <J /  
Hvnnt P^Iifot Beauvofe bie ©peljen an eini^eu ©a^  
Itingen ber ©rafcr/ n̄ie an ALOPECURUS alpestrfs, too  
fie toic bie Slappen einer SStf^of^fappe fleflellt finb.

MIXTINERVIUM *Folium* über *Petalum*, vet\*  
mi(d)ttippig über permifcbtnerpig' i(l cin  
%latt über SJlumcnblatf, beffen 9?ert'en über Ruppen  
solwohl aus ber \$aft£ al^ <m den Seiten der Mittels

tippe enffpringen; *bai* Sängen\* unb Seitenrippen ober SKcc&cn bat/ rote an *ben* RHAMNUS.

**MIXTUS**, g e m e n g t , g e m i f d ^ t . *MixiaAre-*\* a, mit Sbon obcr -Sfalcfc ober SDammerbe gemtfebtec 33oben; m/a/fl? *Gemma*, t>entitfc^te ifnotfpen/ tie ^Blätter unb 2>lumen bringem iUiärta S · *Hi qua an ERUCARIA* ffirmer, bie unteit jtvepflap^ig unb oben gegliedert ijt; m/a^a Ta ^ a iTlrb. gepiifcbfe ©efäge bic an terfc^iebenm ©tcttcn i&cct: Sänge nact) puncticrt/ linim, obec fcjlraufcenförmig ftn^ iDecanbolle jtveifclt \*n d>rer (£fi(?cnj.

**MOBILIS**, b e w e g l i c h ; j. 95. *molilis* *Anim\** **Ius**, tin SXing am ©trunfe eined Sc^mamme^, bet fid) auf unb abfeyieften lagt, n>te an AGARICUS anti-<fuatus. *Mobilia Dissepimenta* f. *caduca*. 3- S5. an PLANTAGO bep boiler Sicife\* *Mobile Solum wenosum*, ^lugfanb / aug fc&r feinen lofen ^örncrn befieftener (^nb obne frembe 55ei)mifcfeung, unb *ben* bee SBtnb (eicftt tvegfübrt\*

**MODIOLIFORMIS**, @a!febury, n a b e f d r m t g ; n>ie bie SRabe an einem *SKabe*.

**MOLENDINACEUS**, w i . t x b m ull e nfih QeU g, twn< fic& sn>eo Slacken in einem ©urebmesser butebfebneiben. ^ em in a molendinacea pnb bep IPiUbenotD synos nym rait polyptera.

**MOLLIS**, tpet'd)/ tbeiW bepm Srucfe/ tbeiK ber> der 95erubrung ber £)betflacbe/ n>ie an GERANIUM molle. 3utt>etlen fDnonpm met inermis. *Mollis sima* an SIDA mollissima.

JfoLYBnos f< PI umbeus,

**MOMENTANEUS**, a u g e n 511 cf 116), mi bepläufig cine @ecunbe banntt.

**MONADRLPHA** *Stamina*, tt>enn bie ©faubgefafie mit ibrm ©taubfaben atte in einen Sbvftv verwachs fen finb, n>ic an ben SKafoen/ babec

**MONADELPHIA**, bit XVt Gla»i bit Linné'schen Systemes.

MONANDRIA, *tit I.* Gfofle *get tinni.* **Digffans**  
jen *bit bahin ge&ocen,* alfo nur em ©taubgefafo  
^a6en, finb

MONANDRUS,

MONANTHERAE, \$ROt|at|bt|t Ut) **Ludwig.**

MONILIFORMIS, perlenfcfrnurform iff/ obec  
ime bi\* ^atl>o{ifen fagen, rofenfran^fonm'g, n>enit  
mcf)rere át>nüid>e 2f>etle ^ine^ Organett fo t)>intereinaa;  
i>er gcffett fini>/ toie t)ie \$er(en an einira \$aU; obcr  
9Irm6ante/ oDer *bit* ^attrnofier an eincm fogenannnten  
Siofcnfranje / 2Decanb» 2Ba^ nac^ Dem Umfange ^c  
@eirenflact)fn ffd) öftcr^ &er&icft obec t>ert>unat, Bern&.  
©0 tfl **Caul** *is moniliformis* an CACTUS *monili-*  
*formis;* *tin Legumen moniliforme* an mefjrem  
*Lomentaceis;* *moniliformes Pili,* tUt\$Qliebrigc  
^aare./ beren einjclne @liebec fugelförmcs fmb, mie  
an SONCHUS *oleraceus*, SENEPIO *vulgciuis.* *Monili-*  
*formis Radix tuherosa,* betttt S:nouin an einet  
&d)t|UV ju f>atBCh fd)C(tten / tOlt an PELARGONIUM *trisle.*  
*Moniliformia* (*Vasa*) Bern&arbi, fedebanbfir;  
mige (Befäße, eine 3tetf>c cpförmmt^et, punctterter f  
tmcrf) O.uern>dnbe g^treuutec S^Kcu, rote ^eclen obec  
Korallen an tintm Sjaltibanbt getagert- S3?an finbet  
sie an ben @elenfm unb ifooten bee ^ffanjen.

MONO f *Mono\**.

MONO CARPI A, *tyflanitn, tie nut ein etn\$igef 5D?af*  
**S rüchte** tragen tornun, unb alfobalb nad>ber (lerben,  
atfo etnjatn'ge ^flanjen (*annuu*) ober sweyjaſt\*  
riige (*biennes*).

MONOCLINES, MONOCLINIA, bte StVtttCrpflanjCn tit  
ten erfçen 20 (Slaffen bep JS Linné a(Ie jufumimengenomen.

MONOCOTYLEDONES, *Mono c o t y Iz done ct*  
pi an tee, jene ^Dflanjen, bie bei)m Stuff ciracn nut  
einen beuflicfren 6amenlappen jeigem (Bárrner tf>çilt  
fte in ^éra, ndie bie ©rc^fben # Cyperotben, (Braſer #  
**Lilien**, @cítamineen/ pdmen :c\* unb in *spuriæ*,  
die augee bem eiuijacn j\$oto{ebon / ofc^v bem *einzigen*

<§amenblaffe oDer fabenf&rmigen 3d)o§e ftidjfg unter  
ttnanDer gemein foaben. *Monocotyledoneum Semen*,  
ein ©amen mit etnein t>offommen ganjen, entroeDer  
fcollfommon freocn / oDer wenig|tcn\$ nut feiner Dem  
53ür\$eld)cn aegcuüberfgeben Den Bette t>on Dem ñbrigen  
&erne des Gamend j}etr\*nnntetw Sm6rpo/ of>ne alien  
sichtbaren SRL6. *Monocotyloaeum verum Semen*  
ist em ©ante/ Deffen (Embnjo t>on feinec er?en ifnf\*  
stehung ait aug e:nem *tiwMcn* ^érpcr fiCbilDet, uni)  
aus *Mark*, uuD .Xut5cnfublbnj fo jufamnKtigcfest tf{,  
daz̄ beo einem jrten £ucrfct;mitte D^ f m&n;o Oiefe  
beyden Subtanzen unterschieden und vof;ommen ganz  
^fd;einen. Sinnéfagt/ Dte *MonocofyUdones* wårcn,  
strenge flenommen\* *Acoiytedones*, in&em Die *Rothles*  
ddnen inncr()alb ber S^men blieben.

MONOECIA, Die XXI. vftaffe *bey Hinné*, {« Dec  
alles gcf)6cf/ Jpag; *monol'cus* ifl.

MONOGAMIA ? eine auf^e^obene OrDnung der Syms  
Genesie bep £im?é , ju n)e(d>ec aQe^ ^cbörte, was

MONOCAMICUS, mar/ D. b / Die SMumm deutlich  
ton eiinatiDer getrennt bafte, (tt>a^ jeDoc^ bet) JASIONE,  
t ie inati Da^in brac^te / ntc^t Dec S^ ^ \*\*?\*)

MONOGRAPHIA, 93erc^reibung ton ^ffanjen, Die  
nur ju eincr unD Derfelben @attung gebören; j\* £5. Die  
*Geranibütige*; *efrbblidp'B Genii a me.*

MONOGYNIA, Die erfie Ordnung beo Den mijTett  
ftimne'fc^en ( I . - H H . ) eiajfen, roeld)e Die ^Panjen  
begreift, tit nur einen ©taubroeg in i^rer Slume  
enthalten , alfo

MONOGYN US , (fob\*

MoNoicas, eiut)auf?9/ n>enn mañnic^c unD ft)eib^  
liche 35lumen aaf .einer unD Derfethen ^flhin\$e torfommen.

MONOPERIANTHAE XV&d)enb.r *Sbluititn ·bit ent-*  
weder nur emeu SeUfr/ ooer nur *cink; umelFrone*  
haben.

MONOPETALOIDEAE, tyflanjen / beren SMumenfrone einbläftrig ju fet)n fc&eint. 95ep Den alten i({ *monopetaloides* fios fpnomjm mit *laciatus*.

MONOPETALUS , aug einem 5>lumenblatte beftefrenb. <fg toirb bfog t>on ber 95lumenfrone gebraucftt / foenn bie 33lumenbläfter fo innig untcr einanber t>ern>ad)fen ftnb, ba§ fie ntu\* ein eiujiaetf 33lumcnb(att ju bilben fd>einen / n>ie an BOHAGO; xvai t>ann' bC9 2DecanboIIe *gamo-petalum* iff. 23et) ben 21 (ten tvaren t>ce *Monopeiala* t>aufi\$ SamUien; t>orjuglid) beo Kit>m t>te *Monope-tala-regulares* uttb *irregularis*. *Monopetala lilia-cea* f. *liliacea*. ©. a. *polypetala*.

MoNoi'HYLLUs, eirtbl åt trig ; £mne' fübrt in fthCC Philos. bot. b(o§ einen *Calyx monophyllum* j IVe an DATURA, PRIMULA., attf; Cn *monophyHum* JnvtoIucrum, an BUPLEURUM ?CARUM ; einemono-phylla S pat ha an NARCISSUS, AR^BI; bie Steue^ ren baben nod) ein *Anthodium monophyllum* binjugeffiflt, an TAGETES JC\* unb eine *monophylla Corona*, n>C an bem iRectarium be^ NARCISSUS, bai bfog auf einem SBfatte beftefyt 2)iejen^en, bee' *Phy Ha* blog' fur Xelchblätter (*foliola calycis*) delten lafim, (gnnen (eine anbere Sebeufung gejiattem iDecanboIIe tn^befonbere bemecft fe&c rid)tig, bag man &6d>I unei<jcntitct> fast, ber ftelcfy fep big in bit g)?ttc gefpalfeu; unb bag man ricfytiger fagen ftürbe / bet ifelcf) ifl big jut 9)?itte t>ermacbfen. ' 3?ac^ i>m ijl nur jener j?e(\$ cinbl&tertg, ber aug einem einjigen S3(afte btflbt, bag burc^aug nid)t mit irgenb einem anberen t>ermacf)fcn iff. £r fagt aber nid)t, n>ie mart bieg Ietd)t uuD ftd}er erfennen mag. (Settoftnlicft fagt man ein 5?ctf> fet) eimbläfmg, tioenn er mit ber Blus menfrone {ufammenbängt/ obcr eine einbläftrige Blus menfrone etnfct>licgt; ober n>enn er bie 3taubgefđgt trägt; ober n>enn er mit bem Srucfttfnoten t>crtvad)fcrt iff; ober menu er gauj ober {urn Sfreile auelbauert\* *Hinne'* nannte einige ^flanjen/ bie nur ein \$(att am

Stengel obcv betcn nuc eintg am Staff fifele (jabot, während aertoanbtc Slrten beren me&rcre haben, monophy 11 a, rote FRACARIA monop/iylfa; **Halsler** nannte feine einblittrige Opbn)\$ OPHRYS mono-phyl'a, und t^neti fo<sup>n</sup>tcn Sftcucre in ben Senennungeit von OXALIS monophyllcL) CLEOME monophylla K\* MONOPHYTANTHAE bit) XOad^cnbotf jlnb &t nn ^ **Monocisten.**

MONOPTERYGIUS, 6ameu ttit einem **einzigem** Flügel / tt)ie an PINUS.

MONOPYRENU, e^nP^mi'g; j, jg# *Bacca toonopyrena, Drupa mdnppyrena an CERASUS.*

MONOS, in3ufammcnfc§unflenmtf dticd)ifd)cn 5Bðr\* tern, bebeutct/ Dag etn>agcinjelnDorfommt. e.l/n u\*.

MOSI'ERML^, einfam t^/ toa\$ nur cineft Samen in feiner Srud)^iae enttalf/ j. 95. Arillus \*\*\*ono8permus<sub>9</sub>an ALTHAEA; *Bacca mpnosperma* till HIRTELLA, *Capsula monosperma an GRO-\*\*OVIA; Drupa monosperma an PRUNUS; Le-5\*ii7iie/i monospermum an MELILOTUS indica*, \$Hiqua monosperma an FUMAHIA etc. Mono\* \*P\*ma fint &ier und Da 3l6tfteilungen- bep **Linné**, wie untcc ben ASPERIFOLHS. Sie SReueren Verstehen daruntec t>orjug<tt>ecre ftuwtfen i)ie @jräfer a(^ mo/io-\*Perma Vegalahilia; anbttt biejenigm/ t>o bet tint Wne gcuct>tfnoten ein feeder @ame über&aupt wirb^ .

MONOSTACPYOS, tt>a^ nuc eine Slebre &<tf/ toie **TAPSACUM monostachyon.**

MONOSTEMONES f *Monandria.*

MONOSTICHOS, etnret^tg/ ma^nur eine Reihe bildet.

MONOSTYLI f *Monogynia.*

MONOTHALAMA, (Sräfec aug bee erffen fiamilit **ben** palifot Beauvot'6/ too bit @ra^bfumd;e^ einer und berfelben 2l<fc aleid^förmig jufammcngefegt sind.

MONSTROSITAS, ^Honftro|it&t, @toning bee vegetabilischen Ocfonomtt toxmlid) in &nfi*i*)t auf

\$orm (aud) nebcnfoer ~~n>ft~~ auf 3aJ)t) ber **Organe**,  
oftne bag man Dicfc (Stöning einer sufaDigen fctjtbareit  
Urfac&e jufarcibcn fönnte. SBa3 fo gefialtet *ift*, ifi

MONSTJIOSUS, monftrd q^ ober ein

MON STRUM.

MONTANAE, SPflanjen, bie auf 23ergen tvacf)fen  
»o abet ber 3d)nee nicf?t imnur liegcn bleibt; j. 9«  
ARNICA, *monlana*.

MONTES, SS^rgC/ fcbr erbabene/ aber sanfter als  
Sllpen unt> nicfn fo ()od} auffTcigente **Gegenden**, die  
noc^ frurf)tblar (inb.

MoRBI PLANTARUM / Cterungen in *bit vQetabls*  
(tfcfittn Oefonomie/ Me fon>ob( auf Me feffett *ali* auf  
Me flufiigen S^eile ber ^flanjcn n?trfen, ohne bedeutende  
Sienberung bcr Soim

MOSCHATUS , nac^ 95ifam *vittynb*.

MUCIDUS, m o b e r i g , bent Cercue unb **Gt**  
fd)macfe nac&; bep einigen fd?immelig; **bey ande**  
rcn f4>leimig-

MUCILAGINOSUS , fcfc leim tg. *Mucilaginos*  
*Epidermis seminis*, bie ficht in dnc Cattcete auf  
l&fct / fete an ben Camen bet Qiiitten, Calbet) ic  
Colc)e Camen nennt man auch *Semina mucilaginosa*.  
*Mucilaginosi Succi*, tm SBaffet/ nid)t im **Wein**  
geiste auflöslich.

MUCILAGO, &d>leitn, tine bide, (m **Waffir**,  
nid)t im 5Seinflei^e, auflö^lidje Sluf?tgfett. *Mucilago*  
*Spharice f. lusculum*.

Mircosus, f^( et m t g' / ober met **Schleim**  
überjogen.

MUCRO , 3 a cf e n ; metflen^ runbe berbünnte grünt  
biegfame ntd?t fiedtenbe ftei(e / oorjugltd) am *Slant*)\*  
bet Clätter, Slfterblätter, unb anberer SBefleibungen,  
be^ Ctegel^/ and) ftotfl an Drcfc^teDnen ^etlen der  
2Mutbe, Bern^arb. Scp anberen eine fleine steift  
gerade Spize.

MtrcnoNATUS, *toai* einen *Mucro* fat S3e0  
**Willdenow** i(| éttt *Folium mucronaliqn* „eftl  
stechendes SBlatt, mcn an einec cunDen ©pifte ein  
borstenformiflerfcautacfigcc ©fac&el ffe&f, toie an  
AMARANTH US- *Blituril\*\* too t\$ a&ec tod)* nic^t flec^Cnt)  
ist. 35\*0 *Qptengel id ti tin fhimpfeS S8latt mlt*  
einer fleittcn @pigt# in n>eld)e Die ©ub(Tan\$ be\* Slat;  
tes nicht übergeht. *Gen ^ayne* cl eg Dann *m u-*  
*er o n a t u m , s t a g e l s p i z i g , tt>annan DecSpige*  
*eines* (Tumpfen \$ (atte£ cim Gor?cnförmijec frautartfgcc  
kurzer ©tac&el fid^ btfinbtt, toit an BUPLEURUM *fni-*  
*ticosum*. 3n *Hinne"e* philos. bot. ðf Dtcfe 2(rt ton  
55latt nfc^t erffart/ mit>effen nannte Jlinne Den *Calyx*  
an *SALVIA officinalis mucronatus*; Die ^apfel  
On *LINUM usitallssimum mucronata*; bit *Saff*CC  
an *ASPARAGUS acutifolius*, bit *Glum<e Corolla*  
an *PHALARIS paradoxa mucronata*; bit *Petal a*  
an *HESPERIS matronalisj* n>orau^ man erfe^en mag/  
tote unbefcmmt Dec *S&tQviff* Don *mucronatns toav,*  
*unb nod) ifl, fo n>ie auc^ au^ Den SRamen* *PENAEA*  
*mucronata*, *SALSOLA mucronata*, *SCHOENUS ma-*  
*cronatusy* *STATICE mucronata ic. it\** *Ope re u-*  
*l u m mucrona'tum ifl bet) VPiUbenotD On Deckel*  
*Dec ^anj platt ifl/ unD 66en in Dec 3Ritfe eine bors*  
*fienarttge <3pi\$f bat; bctf Kfyling ift eg fpnontftn wit*  
*v pieulatum, unb bctficbtut einen £>tcttl, btv in*  
*tar yilitte tint bovfitnavtiQt <S>i\$t obtt tintn U\$tU*  
*förmigen Soctfag bat/ Dec fütjer ift aid Dec ^orijon^*  
*tale Surc^meffec De^ Sécfeld/ ec mag (!umpf oDec*  
*fri&td f^n; tvte an PoLmgaiCHUM *nanum*, HYPNUM*  
*Qlopecurum unD reptans. ©he Paraphysis*  
*mucronata iff nad) QOin&enofP fiumpf/ unD enDtgf*  
*sc& mit tintt furjett S5or?e.*

MULTANGULARIS, vielecf\*&• *Multangu-*  
*laris CauMs, f# Angular is. Multangulare*  
*F o l i u m , tpenn eg turn mefeceden ©eitcn dnsfcfc)lo(fen*  
*^bir , unD Die 3at)l Decfelben ntdjt nut)r Oe(lånt)fd iff\**

◎ • *Angulatum* tutf bann bamit ffi<sup>n</sup>oni)m ifc MU«TENNIS, Y>telj£&r<sup>t</sup>g; (latt be\$ befanntett per ennis.

MULTIALATA *Semina*. ◎. *Polypi era*.

MULTICAPSULARES, \$f!an\$en/ beren ?5nūc^te me&\* rcre jfopfeln 6rcngen/ i&aren gamtliten bet) ben 5iltcn / Herrmann, ^naut u. bfL 95ei> Jtinne finb e^ die olhandristen Polygynisten,

**MULTICAULIS**, was me^rcre ©ten^cl treibt/ wie HELIANTHUS *tuberous*.

MuIT/cEPS, Pie if opfi'g, nenntt man einen SBur^elftocf / menn et 06en in mcbre 9lefie getbeilt tfl/ ou^ n>e(ct)en jaotlid) ncue Xricbe fommen/ tote an GEBANIUM *macrophyllum*.

MUT.TICOMPOSITO-PINNATUM , DIC1fA^> 5 ^ famm enge feQt geftebert, n>en ein &ufammetf gesetzt gefiedertes Slatt mefr ali brepfacf)^, obern>cnt^ stens t(cct)facf) jirammcngcfegt seftebert ifl, tx>ie art CONIUM *maculatum*.

MULTIGOM POSITO - TERNATU My t> I e I f a d} 3 w fa m m e n g e f e g t b r e y t t e i l i g , n>an der SSIatffiel an einem t)ret)facf^ jufammen^cfe^tcn drenzähf ItgenSIatte fid) no\* ftfter^ in tr^i XI^eii jcrtbcilt, wie an ben 2Bur\$dbfatttrn Don PEUCEOANUU ojfficinale, tint) ACTAE.4 *spicata*.

MULTICOMPOSITUS, Ptclfac^ \$ufam m enge s e z t . *Multicomposita Inflores centia*, wenn mehrere drenfach zusammengesetzte Blüthenstände wieder auf etn^m gemeinfc^aftlfc^en Sobtn obtt ©tide stehen. *Multicompostium Folium*, stenn m^rere drenfach zusammengesetzte fläffer auf etnem gemeinschaftlichen Blattstiele stehen.

MUTIDENTATUM f. *Dentatum*; §. 3. mult. *dentatum Per iahthium*.

MULTIFARIUS, vielzeiltig.

MULTIFER, was Sftec\* im 3a&reilu^t; !. 3. Me SRonattofen.

MULTIFIDUS, vielfpaltig f. *M\*su,m.* ©ce  
**Einschnitte** bürfen nid)t big an ben @runb reybett/ nacl) anbern nicft ein 3J?al>1 big an bie **O?tte**. nfeepfpiefe ftnb *Cirrus multifidus*, an ben SXeben; *Filamenta multifida* (fpnotujm mitt \**ramo sa*) ait CAROLiNEAprinceps ; ein *Folium multifidum* Perian-**thim** an ALTHAEA, ein *multifidus Stylus* ebett varan; t|*multifidum Stigma* an ARUM, *Limhus* oder *Corolla multifida* ifi an DIANTHUS IUlt)  
**SOLDANELLA.**

MULTIFLORUS, tuelblumi'g, tpag, n>enn **es nicht** ein &ufrl ijf/ oDcr tpenn man nic&t bVe **Zahl** bestimmt an&btn ftiD ober.fann/ me&r al£ 5 Stamen hält Obec tragt/ \$• S. *mulliflorum Amentum*, bai aus tie(en Stamen ober (Scftuppta befle&t, mte an SALIX *Caprea*, *Calyx multiflorus*, an ben ©cabio\* fen unb an btn metffen ©pngeneRllien; *Caulis multiflorus* an RANUNCULUS *polyanthemos*} eilt *Fasciculus multiflorus* an Di A NTH **us barhatus**; *gluma Calyx multiflora* an FESTUCA; *Pedunculus multiflorus* an ERODIUM *cicularium*, LATYRUS *latifolius*; man jaſ)It am t>ie(btamigcn Sta; men(Ite(e ^cra bie Stamen f n>enn t^re 2Jn;a^l beftānbis ifi h> S. *Pedunculus triflorus* an CAMPANULA *Trachelium* U. f. f.; *multiflorus Scapus* an PRITAULA *elatior*; *multiflora Spatha* an ALLIUM ; *multiflora Spicula* an BROMUS *tectorum*] *multiflorus Verticillus*, getto)n(cc& n>enn er mebr aW 10 Stamen Wi fonff jd^lt man bie Stamen unb fagt *Verticillus G-florus*, tcU an STACHYS **germanica**, *decemflorus* an LAMIUM *maculatum* u» dgsl.

MULTIJUGE-PINNATUM, Vitlpadt iQ 0 6fpe bert/toenn eirt gefi ebmeiS Slaft DieleSIåttc^enpaare f)af.

MuLTiLaBATuS, Ptellapp't'g/ f. *Lobatus*.

MULTILOCULARIS, vi elf Id^er ig^tn>admebrece **Fächer &At/ &> S< rnu&tilocularis Bacca** ait **Sor-**

jruiw *Lycopersicum*; *multilocularis Capsua* flt<sup>t</sup>  
*J\$YMPHAE^alba*; *multilocularis Drupa* nad) einif  
fletl an *ARTOCARPUS Multilpculare Lcgumcnj*  
ftielfacljerige \$u(fe# menn fie Durct fluern>dn&e tit  
jtoeo ob<r meSrere einfamile jjádjer getbeilt iff. AZiiJ-  
*iilocularis ffuar, multilocularis Pepo; mullilo\**  
*Uulare Pomum an PUNIGA. SO?an oewec^felt fe^c*  
oft *multi mlt pluri*.

**MULTIPARTIBILES** *fructus*, Welfacfc twr6untene  
**Früchte**, bte fid) in mtftme einfac^e t^eilen laffett/  
*XOIC an ARIS TOLOCHIA , HUH A.*

**MuLTiPARirrus**, *vitltbtUcf\**. @. *partitus\**  
©0 il J. S5 etne *Capsula multipartita*; tint  
*Cyma multipartita* an *VIBURNUM Opulus*; fill  
*multi part Hum Folium* an *THALICTRCM mains* ;  
ein *multiparlitum Periant hium antin|\$tn HIBIS-*  
*CUS Or außere JffelO; mullipartitus Stylus* an  
*MALVA*.

**MuLTm.Ex**, pïelfad ^, cm Oeflenfaec Don eitt^  
jefn unb boa einfacf. Sine *Corolla multiplex*  
iff naef) BerFentout eine tielt&eriige SBIumenfrone /  
ft)te an *CACTUS*; *multiplex Fructus* eine Srudjt/  
tie aug mebrerm / ju einct und berfelben S5(ume gebo^  
rtgen 5ru4)tfnotcn beRcbt / iDecanb.; ob^r\* bie aui  
meftreren 6a nenbebättmffen jufammen gefegt iff\* ®l rtn«  
*Multiplex Gcrmen*, roenn meftrere beutlicf) Don eit^  
anber gctrennte ga\*er t>or&anben ftnb/ unb jebeti feinen  
©rtffcl )at; *multiplex Pedunculus f. numc*  
*rosus*.

**MULTPLICATIO**, V e r m e & r u n g , jener 2lrf/  
burd) n?e(d)en überbaupt neue '^nbibibuen fterootf  
fle brad>t werben; aucf) bag (SefnUt; ob& off; werr & t  
eitrer: \*lume.

**MULTPLICATO - COMPOSITTM**, fHbt &H 3 **zahl**  
gufammengef&f. **6\*** *Multi-compositum*, unb  
*Supradecomp ositum\**

MULTIPLICATO-PINNATUM *FoliUTly vielfach\**  
*gefiede rr, tin tielfad) jufammendefegtttinb fitti*  
*regelmäßig gefiederter Slatt. <g. MuT??- unb*  
*S upradec ompositum\**

MULTPLICATUS, geffillt, toas meljr 2\$g(e &af/  
 als eg f>abn foflte; fcorjūalicfr ton jenen Slumen, Die  
 man gefüllte/ (*pleni*) voile boppelre (rfup/r  
 'e\*) unb tAlbgfUte (*semiduplices*) ntnnt,  
 ibecanbolle. JBLiné gbraucftt eg in feinec phil. hot.  
 nuc t>on ber 95kmcnfrone. Sin F/05 *mutiplicatus*  
 W bei ifm jener ^os *luxuriant, an roektem bie*  
 Stau6gefāße/ ntit Sbigna&me eintderweniger/ (sic^ inSIu^  
 tombläster Oerwanbeln/ unb eine ober \$nm; ober bret) Dfet^  
 hen (*flos duplicates, triplices, quadruples*)  
 von 33lumenblättern me)r bilben. \$>er f elc^ unb bie  
 Hülle bilben felsm eine voile Slume, ^05 *multiple*  
*catus; bit \$ont40efaße faff gar nie.* (£6 fuUctt ffc^  
 sowohl einblättrige Slumcn, tvie PRIMULA, DATURA,  
 als vidblättriSC tt>te HEPATIC A, ANEMONE. OCC jfdc^  
 füllt ffc6 jutvcilen an einigen 3?e(feh / unb -bilbet eine  
 SJcbre; bie Sdpengräfer fallen fid) nad) tiinnć, inbcm  
 bit Opeljen flatter werbem gin flefarbeer deleft, tuie  
 an PRIMULA calycantha, ift barum noch fein *Pe-*  
*ri anthium muUiplicatum.* gmige/ tt)fc IDiUbc^  
 nott), t)cjanaen, bag bet) DoDen Slumen no\* ber  
 @tempel ubtis fei>; bicg mag abet nur aDgemein t>t  
 einigen 3temi>eln in ejnellen Slumcfen ber @9nfle;  
 ^fiflen gelten/ bie man bann t>oll nennt.

MULTIRADIATUS, *vielfrabUQ, satf man fon>oSI*  
 \*on Otrabenblumen/ bie fe&r ^auftge QtabUnblüm\*  
 chen am SRarbe &aben/ a(6 Don S)o(ben/ bie fe^t fciele  
 Strahlen bringen/ itie an DAUCUS *Carota.*

MULTISERIALES SORT, fOttitt Mtfytitt fRtfyttn DDR  
 Häufchen so, wie bie *biseriales Sori* selagcrt. (tnb.

MULTISTAMINAE, 3>flanjen inU we&c ^1\* 10 Otaut;  
 gefäßen.

MULTIVALVIS, pielfUppfg, fo nennt man \$vüd)te, Qructus multivalves, bie tiee happen ftaben; unb Glum a multhalves ifelc&fpeljen, bie ju meſr a|i jtseuen tor)anben fmb, trie an UN-IOLA,

MUNIENTIA, fd>u5enbe Blatter, n>enn fte Jfix) ber !Racbt (im ©cblafe) lcf) nac& abmårt^ neigen/ Tim bie baruntec .fiebenben Slumen gletebfam \$u fc^u^ gen, Xoit an JMPATIENS noli tangere.

MURALES, 9Jflan\$en bie an SRauern (*Muri*) wachsen.

MURIATICUS, mi tiad) bet @ee riecfitt, wie Thiere unb Wanjen, bie man fo eben au^ berfelben herausjog. foecanb.

MURICATA f. Mur ices:

MURICATA *superficies*, to ei' <t>fUd>el' g, mit fel)t furjen ettwo\* weic^en (unb beeſm JDecanb.) etacfeln, n>te bie ©amengebaufe an RANUNCULUS muricatus bit ©amen an CYNOGLOSSUM, CAUCAUS. S5ei) Berntarbi if! *wuricatus* ftočEerifl, ivenn bie gefönten (Erbo^ungen na\* ber ©piſe abneſjmon. QBai mit Heinen fpautartigen ©tacfeeln befeſt id, 35orF6. ©tac^elig nennt U?iUbenoi» ein Anthodium, tomn bic SRaňbtt bet SBlättcften be& felben mit turjen fleifen ©tacfcefa, befeſit finb, tote an CKEFIS biermis; tin Legumen müricatum tfl an HEDYSARUM coronarium; tint muricata SL liqua an BUNIAS; etn muricatus Stipes, mit furjen toenig ^eroorragenben ©ta\$e(n, an meſtreren garrnfrautern\* .

MURICES, cine 'Slrt ton ©ornen, »Dramb̄enſd̄rs mitſle, oft Dielfeitige/ unregelmägige bustld)tn, wos tur\* bie Oberflac^e bec gruc&t rauft/ ebec vielmehr fc^arf ttirb, <&&ttn.

MUAICULATUS, ifl 6alb fonon^m mif warsig unb exasperatus, tttoai fcſtarf, ober mit Heinen ſter\* tocradenben ^unften befeſt/ rote bie Sbotftt cinigct SRoofe; balb tceſt^jlac^elig, n?enn bit Wargen

pfr̄tcmenförm̄t9' finb, toſe àn ben Slattern eit̄iger Sttoofe.

MURIFORMIS *iela eclulosa, mauerförs*  
*mígee Sellengetoobe, t̄t̄ bep Bernbarbi das-*  
*jentge/ too f̄ße 3effen Sparatteliptpebe frorjMlcn, oi-*  
*roit tbren gegenüberflebenbcn Slacken nad> etnec SRi*  
*tung an einanbev geret^t, nad) t̄cr attbercn abcr*  
*aufeinanber flefc^t fini)/ bag meifieitf Me \$&blung*  
*eit̄ee 3eae auf Die ©cOebemanb jtooper anberen ju*  
*fie^cn fommt. £^ iff vort>ü\$Ud) im J?oljc unb · im*  
*©pitnte-. . .*

MURINUS, *mäufe grau, auc^ porcelldn*  
*färben, KōHtng.*

MUSCARIFORMIS, *Rüfyavb, b c fc n f6 r m i g.*

MUSCARIUM, Cournef. / ein fcflaffer unregelmäßi-  
ger Doldenstraß.

Musci, iHoore/#(tnb f)tntc ju Sage bet) Wills  
benotr jene bc&fattertcu Srpptogamiett/ bte mit einec  
S5ud)fe t̄erfel>en finb, n>dd)e tf)re 97u@e unb i^rc>  
35ecfel ^at, unb bte ton 'etner 25or?e getragen mirb.  
3>fan nennt fie fcogl an\* jam Unterfc^tebe t̄on bett  
Jicbermoofen, *Hepatica, bit man* einfl  
*Musci hepatici nanntc, Jtaubmoofe, Mus-*  
*c?/rondosi. @ie bilbeten Don jebec eigene. £)r^*  
*nungen, bte balb Musci, balb Muscoidea bet)*  
*Gleditsch,* balb auf> Alu^coia, n>ie bep <^>err;  
mann bießen. . .

MUSCOLOGIA, iff jener <^anj et^ene Sbctt bee SBo\*  
tantf, ber ft\* augf\$Ues(tc(> mic Setrac^tung bee  
3)?oofe befdbaitgt\*

MUTABILIS, wed)(elnbf nennt man SSIumen,  
We ibre garbe wecfeln/ »ie bie HORTENSIA, GAURA  
mulabilis. @. Varius.

MUTATIO, 2(blnberung^ toenn nur einjelne  
^beife etned 3[nbtt]tbuum^ t̄on ber getoobnftc^en germ  
abtt>ei\*en fo ba\$ j., 95, etne asiume nur 4 SB fatter  
b^ngt, wa&renb ade u^ngen beren 5 ftabtn.

MUTICUS, urtbetrefcrt, *toai toeber* in ec̄te fcefonbere ^pige norf) in 'trgenb tttoai ©fedjenbeS au&lauft. ©o iff eine *Anthera muticd*, tm @e\* genfage ber gesrannten (*Erica*/ an *ERICA kerlacea*; tine *Valvula* obcr *Glum a mutica*, *Dorjuſſlid*) im Iffclcbe, tm ©egcnfaſee bet gegcanntn, an *PANICUM italicum*, *AIRA arundinacea*. (Etn *Calyx muticus*, n̄it ©e^enfage t̄on *spinosus*, an *SEKRATULA*; eſt *muticiis Bens s.Serratura* an *ASPIJ>IVMJilix mas*.

MUTILATIO, t)er ftumme lung/ ba^jeniege/ hjöburd) etne 53lume ein ./Jos

MUTILIUS obec MUTILUS, *v̄etftummelt*, *toitb, b.* b\* feine SMumenfrone *bilbet*, obfd)on fie etne gaben foDte/ n̄te btēg an ntefreren 2fpomoeen / ?HucU lien, S3toUlt/ (*BiUnetl*, an *CAMPANULA Pentagona* tc. ber ^aQ tf» Ueberbaupt tf{ aDed ba^jenise *muti l u s*, dem etn £6et( fe&lt.

MYCOLOGIA, jener £6et( ber Sotanif/ bee ſich ausschließlich mit Schwämmen beschäftigt.

MYOSUROIDEA, etne S^mitte unter ben ©rāfirn *Ut)* bm alten @ramino(ogen\*

MYRKHINUS, percellanfarbcn.

## N.

NACRIUS, pfa b jg/ f(l bet) Bernbarbī ein *fthtt X>tt nad*) bem Umicg ber Side / n̄enn Die Stnfen gerabe finb/ unb in Sogcn {ufammenflogen.

NAEVI, vntitterml^Ier/ Saumffecfeit/ bit burc^ Seclegund ber äuſeren \$aut entfie^en.

NANUS , » P until io.

NAPACEUS, geroofynlicher NAPIFORMIS, rübcrtf5^ fttj0» ©o nennt man ben *Caudex intermedius*, toenn er einer rü6cnartigen SBurjel á^nlid^ i(I/ f5\* aber über ber Srbe getgt/ n̄te an *BRASSICA oleracea*-*gOJigylodesy* am SoWrabiJ ^fne *Radix napifor*\*

*mis iff biejenifle, bit oben baudjig iff/ natf) unten abec  
in eine lanfle <Spi\$e flc& aerbünnt/ n>ie atufcec Sfcube/  
BRASSIGA ftapa. ©in Tuber napiforme iff tt<  
HEMEUO(%ILIS fiava.*

NARCOTICUS, berlubenb / foem @eru\$e un&  
i>& SBirfung im ^agen nad)«

NATANS, fdjTDimmenb, #l»a^ unten com'  
Wasser/ oben ton bcc 2Uft umgebcn iff. SJ?an bae  
einen Caulis natans an POLYG<WJM amphibium;  
etn Folium nalans an NYMPHAEA; und cinen 5 «r-  
culus nalans, bin Cinfee auc& fur Radix na-  
tans erflärn.

NATURALIS CHARACTER, ber nat& r i j ^ e €bavah  
tev bCQveift aHc nur trainer mSglic&cn ©attungiJmer^  
tnaf>U} alfo fotvobl ben Character essentialis, alg  
ben Character factitius. flut bit fficttnutbk,  
welche bic

NAURALISSIMA STRUCTURA •botblttbtt? b. 6. jener  
Bau bet 93I:tmC/ wefeftter fotvofyl nac^ 3a^( utt) ^ur>  
als nad) 93erbaltni§ unb £ase am ^aufigftcn t>orfonmit/  
verbcn im Character naturalis autfflefclflofTcn.

NAUCUS auc& Naucum, (&ärtn, f\* Put amen  
||nb Sar c ocarpium.

NAVICULARIS, nac^ en f6»rmfg, foenn an eincnt  
firtogenen jforper 6er recite unb linfe 6eitent6ei( nac&  
unten in einen £Binfel jufammenffogen / Bernf?. (?rma^,  
bad fo gefaltet ober t>ern>a\$fen iff/ bag auf einec ©ette  
eine S?ot)k, auf ber anberen eine beroorfpringettbe  
j^ante, ein tfiel entffe^t/ n>ie bag @cfjiffcfjen an ber  
Schmetterlingsblume (Secant), wie &ie jflappe an  
dem Schötkchen t>on £(>lagpi. <&, Carinatus.

NAUSEOSUS, bem ©erud&c unb ©efeftmade nach  
Ctfel erregenb; 5. 95: OLAX, POLYGALA Senega.

NEBULOSUS, nebelgrau.

NECESSARIA POLYGARIIA, n>enn an jufammend^  
fefeten Slumen bit \$£>liim\$cn in bit 6c^eibe blo9

**Staubgefäß**, affenfafftf audj nod) efnen unfcoWomme\* nen @tau&foeg, bit am JRanbe bingegen 6log Btanbs toe\$e ettf&alfen. 3, 33. tie IV. Orbnung tnjber @pn\* geneftete.

NECROSIS,, ber trocfene 25ran&, &a« **Schwarz**erden unb 25ertrocfnen Dec SSlafter,

NECTAR,<sup>^</sup> (in t>on @rufcn o&ec brffffgm **Oberflas** dyen,. Die fi<sup>^</sup>tu ben %efvud)tun\$\$;OvQatm|bcfini)ct|' obgefobereer @aft

NECTARIFERUS, t\$af Sjonis btveitet, abfonbert, Ober ttuf6eivabit *Neclarifera Filamenla* fa& jSlmné an LAURUS ; *nectariferus Fund us* an ALoë. *Nectarifera Glandula*, &a\*ftbru{e, jeneç Theil, n>ek&cr / 609 benmannigfaltcgdenS^men/ nxrf^ lich den Jponig abfonbect; bei t>tden ft;non)m mit Nectarium. ©.a. *cellulares Glandulce*. *Linea longitudinalis neclarifera* an LILIUM chalcedonicum. *Nectariferum Petalum*, tin SSuman\* bfatt mit einem SReftarium, ti mag n>o immcr batan befitlblid) fei)n/ n>fe an. FRITILLARIA. *Nectariferi Pori* oDec *Squama*, Heine loc&er obcr @ruben, au^ ftelc&en ^onid fdf>tx>igt; man ffnbet fie an ben t>erfdtieDen?en ff>eilen bet 95lume. *Squama nec tarifene*, Heine fc&uppenförmige fiøpttt, bit buvd) Heine. 26d)Ct Jpontg au^fc^tvigen, n>ie 5. S3. an RA HUNCULUS,

NECTARILYMA, ^ on i g f a f t b e c f e / ber Theil, fttfefyer ben ^onidfaft fotx>otl al^ ben £ontdfaft6e(>å(\* ttv bt dt, fo ba\$ ttin fRtgtn ftineinfatl. 2)a()in ge()5' ten bee Sranj/ Corona, an ben ©ilenen unb Agrostemmen an NARCISSUS K.; bie getvölbten Schuppen *Squama fornicala* an btn Slperf\* folien; bie Uläpfc^cn (UrceoZu\*) an ben@taub\* gefa\$en Don GEOSYA, ACHYRANTHES, PANCRATIUM K.; bie gerölbten Qtyuppen, bit bit 95afW be\* gruc&tfnotenS umgeben/ an CAMPANULA, ASPHODLB LUS x.; bie ^ortfäge ber @taubgefafje, tpie an

'ALYSSUM,- *bit & citibactive* im ©eunbe bee 95lumen\* frone/ *toit* an GERANIUM\*, PINGUICULA K.; *bit* <?>aare an ten ©taubfleſägen\*, n>ie an VEBBASCUM, iRADEsdifcTiA; juroeilen eine befonbee *<5>uUe*, n>ie an PASSIFLORA, *toofyl* auch) Die überbānflenbe SMumer\* frone felbft, n>ie an CAMPANULA, und Die iufammcnj foadjfenben obee juſammenbāngenben ©tcybbcutel, n>ie bet) aHen ©i)nflene(ljen unt> *bet*) SOLANUM; enbli\* nod) *bit* ©#mettcclin5\$bU\*mc unb *bit* rad)enföcmiae

### Blume.

NKCTAHIUM, *ftettatium*, & on f g g e f 2 £ f  
iener, j ^ i i *bit* S3(ume , welc&ee £onia abfonbcrt, *fli* mē.  
eigentlichen

engeeen ©tone, unt> ba&in fle&6cen bann 1. die Drüſen im ©tun&e be\* 5Eel#e\$ unb an *bit* SBajJ bit Slumen\* 6lāmt unt> @taub9ef<i§«/ wit an BERBERIS, ORQBANCHE, unfr an alien Setca&pnamitllen; 2. Die flefc tacfc^uppen an bet 35<|W t>et SSlumenftone / n>ie an SEDUM, C'DSCCTAJC; 5. *bai* fl\*pf\*en ober Bcd^ew <feen (UrceoZuO im ©cunbe bee SSlumcnftone, ivie an EUCOMIS, CIMICIFBCA; 4- \*\*\* Jpleifcfrring, bee ben Sruc^tfnoten bet 9fl>erffolicn ^ bet ©c^raet; terlings|i unb rat&enfotmitgen SBluraen umgibt; 5. *bit* fleischig br&ftgc Safi^ bee Slumcnblaffcr an IR "> FRIRAIA K. obet bet Jtel4>Mattet/ an P«.\*RGOHIDM, OENorHEaA «.; 6. ©tufcen in bet Rbbn bee \$lumenfrone obet an ben *fdlummUattvn*, wjan LILIOM, FRANKENIA; 7. Sortf<8e bee ©taubaefa0e, tote an VIOLA,.FOMARIA; 8. *tb<l)tt am \$tud)ttw>Un*, toie an COMVALLARIA , SPILLX ; 9. «»" ^'•att an 6w \*a({j5 Dee SBluroenfeone/ »ie an ANTIIRRHINUM, LQ-NICERA; 10. boniattaambe, *ttmi* robftaeJRæael, n>ie an RAKUNCULHS, ISOPVRUM, obee aucj itmt fiacre 3lāgel »ie an TROLLII/S, NYMPHAEA; 11. «in btüftget 5C&epet an bee @pt\$e bti 6porne^, n>ie an TROPAEOLDM, LINARIA; 13. atteeiet) »crfd)ieben^ 53otei(&tun8en an ACONITBM, NIGEI-H, Kaseda,

EUPHORBIA, ASCLEPIAS *it.* 3 m tt&eittren ©inne ges  
hören aber *and)* bit &ortfgbe&älter ;u ben 5TJcftarien/  
**nähmlich** : bag Nectcfradenium, bit Kectari\*  
theca, ba&Nectarilyma, unb NecWtristig-  
mcLi n>richte bei Bernfcarbi aflein Vlehabien, *hos*  
niggefäge fint> Uebcrtfes gibt t& nod) .sogenannit  
Nectan'a dubia, allerlco S&eifc in ben f&lwmctit  
ton n>elc()cn man ntcf)t wi§, toai man barar^ mad;ca  
foil; }. **S.** in ben Orcftibeh **an** KHAMERA und  
GLINUS , an bee ERICA ohbala llnbr., an DORAENA,  
COMMEHNA unb PARNASSIA. S^wfytz Qct)bxcn abet  
nac& ©prcngel/ nicftt bte ©rufen **an** LAURUS, ADE-  
NOSTEMON, DICTAMNUS; ttcfat bit bit &ta||b&Cfa\$t  
tragenbe Q3edjer **an** KLEINHOVIA unb STERCULIA;  
nid)t ^ad burct)(4einenbē A'r6nd)cu an ben^rāfem/  
an LITHOPHILA, LE\$TIBUDESIA HabiUarb.; nid)t bet  
©ad **an** ben "©amen ber CAREX; nid)t bee nāpfestet^  
fovmtge 2lnfang eine^ gruc^tfnoten^ an URTICA; nid)^  
tie brūfrg .fugcligc ©pigc au ben Qtanbbcntcln bit  
AD EN ANT HERA, bt\$ CEPHALOTUS H^biUcrt). unb  
**bt**i PEDALIUM; nid)t bee fieifc^fge fyudbtboden **an**  
WILDKNOWIJL ' ober ZOSTERA oceahwa. *finé*  
nannte *and)* aDe^ bagjenige in etner Blume, was  
fteber field), nod) Slumcnfron?, nod) Staubgefäß,  
nocf) ©taubmeg ift/ e^ mod)te einen fügen- ©aft auss  
fcfyftigen ober ntcf)t Nectarium. ©ie SReuerett  
nennen nar Sruffen, bte einen foldKtt / ober tva\$ immec  
für einen ©aft augfeyroigen/ tleErañen: alle übrigen,  
unter bent alteemeinen Cabmen 9leftaciens begriffenen  
sOrgane erfcielten befonbere \*enennungen. ©. a. c el-  
lulares *Qlandul a*, *Glumellula*, und  
*Urceolus*.

NECTARODENIUM, ^ on t g f a f t f l a c & e ^ jener  
Theil, auf btffm £>erflfäche ber ^onig liegt/ J&etnV.

NECTAROSTIGMA, ^ on i g f a f t j e i g e r , *Qf ts*  
**mahl**, bie »erf\*ieben gefärbten ©teHen, bte ben Jns  
fekten den Weg zum Honigsaftbehälter jetigen. Dabin

8d)ōren *bie* ©freifen unb glecfen *an ben* Delargorüert  
unb Dec!4>en unft. 3ri;a; *unb* manege *eigene* fc&5n  
*Qtfaxbtt* 2torrid)timcj an PASS 1 FLORA, NAPOLEONA.

NECHIOTHECA, £>onigfaftbeb&ltter, *bet*  
Theil, mld)tv *ben* Jj)onigfaft unb aucht bit £onfgfaffe  
fläche umgibt/bett Jjonig fammeft unb aufbema&rt'  
Dahin gebört ber ©porn an alien gefpornten Slumen;  
der Jpöcfer an bee jjluinenfrone ber. FUMARIA, bee  
Höcker an bee 95aft^ be^ \$ck|)t\$ beo CHEIRANTHUS,  
BISCUTELLA; meiflcn^ bie Saff^ einer jeben 23lumen^  
frone, unb bie £oblfe&lc (*Cuniculus*) im Kelche  
der onien.

NEMATOTHECIUM, bie 7U Samilte bee Schwämme  
bei Person, bei) toelcber ber ^rucfttboben in faben^  
förmig^e Sappcn auf mannigfattige 3lrt jerfeftntten ift.

NEMOBLASTAE, f a b e n f e i'm e flnb nacht tPilltf  
benow bep ben CSWoofen. Ob fie beo ben ^lecOtett  
aucht ftnb? 9in ben Jungermannien trifft man fte an\*  
3)ie ©ubflanj ber ©aamenlappen tfeeilt fld> in 2  
Själften, unb jerreift in anrcgelming^ei: fabenförmiger Gestalt.

NEMORA, nac^ £fnn^ nur 9Ba(ber am §uge bee  
Berge, mit fc^irammiger fc)marjer immer feud^(ee  
Erbe beDccft, too bie \$flan\$m, ftetS gegen ©onneunb  
SBinb gefd)itgt/ in iidmer feuc^ter £uft vegetieren.  
@ctx)6fnltcb ntmmmt man abet ncmus als Laubbolz  
im @egenfage t>ot sylva, ilabelbol\$.

NBMOROSAE, nimmt jDecanb. fät g(eic^6ebeutens  
tllit sylvaticce\*

NEPHROIQUEUS, ein nierenförmiger Jforper/ obee  
etwas, beffen 5)urcftf\*ni< n t e r e n f o r m i f l iff.

NEPHROSTA, tfecfer, bie 9lrf bon Suc&fe *an ben*  
£j>copobien/ bie (le<< boU ©taub iff/ unb bon ber  
man nofo nict wei^/ o& (ie ©taubbeutel ober jfapfcl iff.

NERVATUM, Qtnetvt, tt>enn bie £auptflefas\*  
tfinbel Winter (ober unter) bem ©runbe' be^ SSlatte\$  
f\*on getrennt fmt>, fo bag entroeber bie auStxftm Ges

fdgbünbel mid)t ncf SeOgeftbe Gebecft Mtbltn, obet Skid) aud bent ©tensel mebrere ©efäge in bat SBlatt laufen. CD?an beftyreibt fie ber 3a^l na c^frznit" valum :c. Bernfr.

NERVICERUM, bener'pt, tuenn bit Aauptgefaf?" 6ünbel crft fiber bent ©runbe bed a5(atte^ audetnanbec laufen: 9D?an jaf)lt (>ter bie @efä§bünbe(/ *trinervi-* gcrum :c. £ern{?.

NERVIS ober NERVIUM, ner pig, n>enn die **Haupt-** gefägbünbel gerabe im @runbe bed Slatted **auseinan-** ber (aufen. ®ftan jáblt bier bie ©efägbünOel, *tri-* nervium it., Bern&>

NERVOSUM FOLIUM if! bep Jifrtnć ein SBlatt^ **deffen** ©efägbünfccl b6\*(l etnfad) ftnb, unb ton />cc **Basis** gegen bie ®piše bin ofcne aae Sfelle fortlaufen, **wis** an PLANTAGO. VPtUbenoto überfegt ed burc& **ges** vipt, unb lablt btefe ©efägbünbel/ tooburcb er **eini** *Folium tri-quinque-septemnervium*> **dren** fünf;ftèbenrippised S&latt er^ält. (Sinise nennen nuf bann ein S3(att *nervosum*, tvenn bie EKippen ju^lcicO tvfyabtn finb\* S5ep Bern^arbi ifl *nervosumi netvbe*, tvenn ein ober ntefrere aud einem **punM** ent^ringenbe @efä£bünbel fi\* enffoeber gar **nicht**, \*ber bod) nur artertenformis teraffiigen. \$Ran **bestimmt** ed nach ber 3aft( ber ^aupt^efä§bünbel/ etnnerpt'd/ (u n *inervosum*)> ^VOCynetviQ<sub>f</sub> (6 *inervosum*)) unb nad) ber tveiteren ritppen^ne^ Ober aturW' **förmigen Zerästlung.**

NERVUS, an Slattern Kippe, an **Blumenblät** tern ttcHetc^t beffer rftevve, **WE** jene fabenformi^ Srbaben&eit/ biē man an ber oberen unb unteren 3(ac&\* ber flatter unb ber SBlutnenblätter ffnbet. SSian nenn bie in ber \$)iittt be\* 'Slatted fctnauflaufenbe gtippe/ tooburcft bai Slatt in jtvcp gleiche Sgeile gethei^ toirb/ tllirrelrippe (*Costa*), bie feineren SerafW' lungen, bie nad) ben Oeiten ^tnfaufen, aber fe&r ^ **Ademp** (*Vena*). Aus ben Ruppen entstehen die

**stechenden** @pi|en unb Säfcne, bie @tad&efo tmbSor\*  
 nen ber SSJntter. 6ie ftnb 3lbf6eilunflen be« SHaffc  
**stieeler**, ~~diante~~ \$(attfläcbe burc&laufen/ unb bag@felet  
**des Blamv** btlben, 5Benn bcr Slattftiel fe&It, fo  
 sommen btcfe JKippen born (Stengel &er. SBenn ffe  
 \*on bee 95af^ beg Slatted *an* bie <5pi&e **hinalufen**,  
**nennt man fie longitudinales Nervi, Längenrips**  
**Ptn**, unb @e:tenrippen / *Nervi laterales* > toenn  
 fie aug ben Eangenrippen entfprtnsen / unb fettvårtg  
 on ben 3tant) beg Slatte\* &tn(aufeq. ^ep Bernbarbi  
 finb *Nervi*, ^erften, ©c f a g b u n b c l, Kcp^  
**Ptn**, bie t>on bee S3aftg beg SHatteg big jur @pige  
 &ciffelen (aufen / o&ne |?d^ in 2leffe ju jert^eUen. *Nervi*  
*divergentes*, auseinanberfa&renbe Kippen,  
 toenn **fie** äftig ftnb/ fo bag **fie fid**) nacht wrfetriebenen  
 \$unften bee' Obcifffnc^e bin begeben\*

NEUTER, g e f c b J e ^ r e l o 6 , eine <pfanse, bie  
 feine ©efc&Iec&tgt;&eile ftat ^/ o s *neuter*, eine 95Iume  
 ofyne ©taubgefage unb ©faubtDe^e, rote bie äugereit  
**%Iumen an VIBURNUM Opulus, GENTAUREA Cyanus.**  
 Vt)fUbenovd bejeic^net **fie** mic %, Bern&arbt mit J.

**NIDOROSUS, NIDOSUS, nach) cinigen, n>ag tote**  
 ettvag ange^rannteg xitd)t, nad) anbecen n>ag nacht  
 faulen Spern ried)f.

**NIDULANS**, n i f l e n b / toag wté Spec im SReffe  
 liegt. **Man** flebrauc^t eg con ©amen/ bee in einec  
**brenhartigen** 93?affe fo (erffreut liegen/ bag i&re SRabel  
**nach** atten ©etten &in0efc&rt ftnb/ n>ie an NYMPHAEA;  
**und t>ann id eg auc^ fononpm mit vagus\* t,zu**  
**streut.** 3?ac& Doi'gt, tt>enn bie ©amen baufentveife  
**in** einer 95eere bepfammenliegrtt/ unb nicfot ficbtbac  
**durch** eine Sftafclf&nur angebeftet ffnb/ n>iefaf! *an*  
 ieber ivaOren. SSeere\* S0?an nennt aud) eine 3wie6eI  
 ^ if l c n b, n>enn **fie** unter ber aflflemeioen febe<fung  
 me^reft flcinece gwiebelc&en **einfd>ltcgt#** fo .bag **fie**  
 8leid)fam aug bjefen ju befieben f\*eint, tpi e an O**x-**  
**^ITHOGALUM spathaceunz.**

**NIGER**, g e m e t n fd>tt>ar\$, ein **Schwarz**, das effead tn'd ©raue jie&t, mœ Die gletfen att Dec SSlume Don Vicia Faba.

NIGREDO, fcftmarje garbe fiber&aupf.

NIGRESCF.NS unD NIGBICAHS , f d> tr> a r 311 DE>. jraulichfdjtoarj.

*Ni&BLO - MACULATUM*, f \$ XV d t J g t fi C Cf t; itU bit Sblatttt an ORCHIS unb HYPOCHAERIS macula la.

NIGRO-PUNCTATUM, **schwarz gedupfelt**, »ie Die flatter an Vms idæa.

Nisus FORMAnvus, Btlbungetríeb, das 3au6ertt)ort/ DaS ailed ttlavt, o^ne ettva^ ju fagen»

NITENS, mijlen^ NITIDUM folium, g Ld n 3 e n b / tfi bet) Onn^ ein Slatt, Da^ tor ©latte glanjenD {glabritie lucidum) iff/ tt)te an FERULA unb ANGELICA canadensis; htX) Borfyaufen un^ 2(^ 1 mg iff nitidum martgl&isenb, erne 2Jrt t>ott 7ii7en«, tvoruntec 6eobe, lucidum unb nifidum be&vtifcn. VDiUbenovo ttlavt nitidus ali eine foglattef)ber^ fldc^e, bag fie bie Sichtflrä&len jurucfmtrft, unb Da^er ein leu\$tenbef ober glanjenbe^ Slnfeben bat/ tote **Ilex Aquifolium**. Eg 6ebeutet aucf) fc)6n, nteblig^/ reisend. *Nitidus f.lucidus unb s'p lendens*.

NIVALES PLANTAE t({ iDecanboQe'i gleic^ bedeus tenb met *glaciales*.

NIVEITS, fc& ne etp e t'0/ bad retrnjle 3Beig. Nach **Einten** nonom mit c a n d / d u s.

NOCONAMJUM Reefer/ eine 3lrt ton ©porangium.

NOCTILUCES FLORES EPHEMERI, bie **öffnen** unb am Xage fc^Iuffcit/ tDie CONVOLVULUS purpureus. Sben bte§ giU aud} ton ben aquinoctiar lib us floribus.

NOCTURNUS, ^ffansen bie bep bet Sfoc&f 6Iu^n; irgenb ein \$()anomen an einer ?ppanje. Dad nut bet 9lad)t flatt ^at. 3\* 55» LYCHNIS nocturna, ^SILENB nocturnal ober ttad nur eine SRacft fiber bauert **No&i Mores cphemeris**, bit fi\* in einer und

fterfefoen 9iad&t Sffnen unb fcftliefTen, toſe \$. 33. OENO-  
THERA. Qftenbieggilt au\$ Don ben *aquinoctiali-  
bus flwtib u5\**

NOD^PTATES, Dcrwa^furtgcn ober tfjie\*  
bcrfcfc11ge, Me an einigen ©effen bertyffanjen,  
*bit baton aufeetrie&en wbtn, entffe&en, unb bit man A*  
fote an bent JUNCUS *articulatus*, uneigentlccO. **geglies**  
bert nemtt.

NODOSUS, *t no tig, m\$ flatt ^orra^enbe ®f,*  
(enfe f>at; *tomn* ber llmfang · bet ©eitenflac^en an  
crgenb tttoat **fid** pl5g(id) ertoieieertj {. S3. *Caul is  
nodosus an CHAEROPHYLLUM nodosum; Culm us  
nociosus an FESTUCA distachyos; Frons nodosa an  
CONFERVA JluvialiUs; nodosa Legumina^ ftemt  
bit beppen @c^a(en ber £ü(fe SSertieffnsen ^abctt / in  
toelcfyen bie @amen liegen / ofene bag biefe ^ertjefunscu  
tvieber 6efonbere @c0eibet9anbe batten; mte an PHASKO  
LUS vulgaris. Sbenbieg gilt aucf) Don Lomenta  
nodosa. Nodosi Pili, (ange feine mif Snoten ber;  
fe&ene ^Taare/ trie an ben tfefeben Don ACIJAANTHES  
lappacea. Nodosa Radix ait CONVALLARIA multi,  
flora, SCROPHULARIA nodosa; nodosus Stipes ait  
DJLNAA alata.*

NOVULOSA FOLIA, nennt man flatter *an* ben iawU  
moofen/ beren 5)arenclfji)m an ben 3era|ftungen bti  
Seflgeme&e^ ange^auft unb aufoetiieben if!/ n>ie an  
SFLACHNU4| *frdlichianum*.

NODUS , S n o t e n , jene ©tellen an einer ^Pflanje,  
an tpelcfter bie S^fern ft\* freugen, unb bai 3cU\$tt  
toebe anfqnittf fo ba\$ eine rinaformiye Ef>aben()eif  
baburd^ entffe^/ J. S5. bie jfnotett an ben @raferm  
*Nodus vitalis iamCLtt f. Collum. <ff ift fc^r*  
oft fononpm mitt *Geniculum*, unb auc^ fogac mit  
*Gemma*.

NON COHAERENTES DENTES, H'Id>t J II fa m i l i e u  
(J n g e n b , nennt man jene 3^ue am SJJaule ber  
SSRoofe, beren innere SKet^e san} fret) **ift**.

NON DEHISCENS PERIDIUM, *tOOctitt* *btt* **Umschlag**  
**niema&W serreiſt.**

**NOPHROSTA Reefer/ bai Sporangium am**  
**LYCOPERDON,**

NOTA, jrgenb *tin SRerfina&F\**

NOTATUS, *fk Maculatus.*

**NothaS, unlēt/ fononpm intt spurius>**  
**shells mtt hyhridus. Notha defoliation fine**  
ju frii&e, tmbernatūrlcye/ scmaUt^ātise (Sutblättcrung.  
**Notha Radix, untfytt 2CutjcI, n>em bit Basis des**  
auffiti\$tnbtn \$£util\$iodc\$ fid) erfeeitert uub **zertheilt**,  
Dem Oct^āc^fe baburcf) jur ^Sefefliguns bient / uub in  
ftiefec ^infi^t Die Octelle ^ec aBurjel t><trf<. e i e  
fcringt nte in ben 93oben, unb fd>eint bad @emād;fe  
tlicye mebr ju H6&t:en, a(^ bit anberen Zbtik btffclbcn.  
@ie iff meiffentf an CangAt'ten/ ^Iec^ten, Qtyxvåmt.  
men, unb an pairafetten.

NOVELLUS RAMUS f. *Turio\**

NOVEMLOCULARIS CAPSULA; neuftfāc^c rig.

NOVENATUMFOLIUM, neunj^ & Ii'g/ mit#9 SBfaf(;  
d)tn an bet Opigc beg Slattfieltf/ tofe bie unteren  
S3(fatter an GANNABIS sativa.

NIIBILIS, man nbar; j. 95. *Umbella nubilis*  
an PIMPINELLA peregrina, lofnii bie SBfumcfsten zum  
SBefruc^tund^acte eben reff n>erben\*

NUCAMENTUM f# Amentum.

NUCLEUS, bēt) (Bāt'tner'n Me SE^eite des Samens,  
bte in ben taūten eingefefrfoffen iiCQCn: das Eyweiß,  
ber iDotrer unb bet Embryo, in ben OamenftūKen  
einsefc^Ioffen. S5ep anberen ber Jtern ber ftu\$ unb  
atter Otein\* unb §leifdbfrūc&te» O• a\* *proligerus*  
*Nucleus\**

NUCULA, ftiig\$en, i(i naſfc ^DecanboHe erne  
Frucht mtt beinbarter fyhit, n>q(d)e tiur ein Sad) unb  
nur eimen jTern entfta(t; beren \$stud)tbūUc tocniq  
ober gar nfc&t t>om ^erne getrennt i(l, unb bie dfters  
'n eittfL J&uOe (tedt / S\* 33. bie ^afelnuf. Mehrere

**Botanifer** ntnntn and) biefe gruc&e &u\$ (**Nux**). f£>tx) anberen ifi *Nucula*, bit gruc&t einiger **Radi-** COUtt/ ttJtePiLULARii f.Spermafo-Cy stidium. 3\*9 K'tyrb tft e\$ jcbe Slug bed *Nuculanum*\* 33\*9 dnigen fynonpm iut *Pyrena*.

**NvcuLkNiuM**, (*Naculaine*) ntnnt **Ridjarb** tint \$stud)t, bit meftrere SRüge t>on 6e({tmmtec 2ln\$'af)l einf^Hegt/ ttclc^e in einer cinfac^en Stet^fm 5iè terticale Slc^fe ber 3rud)t^uffc scladert ftnO, btefeinen butd)bot)tttn *Slabtl* fat. <£\$ ift tint fltiffi'w fivuty an btvtn Spcge man feine ©pur t>on Den (EtntbeUun; den be^ JTclc(ed finbtt, mil Oiefer nfc^t met torn \$nid)tnottn iufammenbaigt. Sin 93et)fptel if! Die §ru<\$f Don ACHIAS *Sapota*\*

**NUDIFLORUS**, na cft blumi'g^pbne *Qtdblati* ttt, dflein ilinne' btfinitt SCILLA -manlima all *nudiflora*, brac/eis refractis.

**NUOISEXUALIS** ift nac^ Bfilharb ecne S5(ume# bit mbtt Slumenfrone nod) field), nod) £>ecftlätter **hat**; J\* S5. PAN DAN us.

NCTDIUSCULUS, fafl na cft

**NUDUS**, nadt, btitidbnnt im 9IDgemehten ettt)a^# was burc&aug feine 3ln&angfcl unb feine SEBaffen tat/ oder ind6efonbere ba&itnidt, btm irgenb cin Orflan feftte, Don melcfitem tjergteic^ung^meife bee SXebe ifl. <3o iff irgenb titoai nadt, im ©c^enfa^e Don fruttg, ober jottCL/ unb bann afcic&bebeutenb mit unb e^aart; tm ©egenfage ton f\$uppig ifl narft fc^uppenloe^ im (Segenfage Don bornig / unbetoe^rt; unb (8 im @egenfage Don frgenb einem Dor^anbenen Organe bo htid)t|tt ti itbti \$RaW bit 216foecrt()ert beffelben\* 3^ beffen fat bitfti SQort fo Die(e SSetfettungen unb 53e^ beutun^en, bag ti genauer bur\* Sepfpide erf (årt I9erben mug. 3)?an 5of ein vudum *Achenium*, totmx btt obere Z(jett beffelben jcf) meber in eine £aut, nocft in ^aare Deßlangre; ein nudum *Amentum* ohne £>ttfbllattd)tn unb <&d)uppwitint nuda Arista

twin ffe oJne affe *fyaan* iff, tole (in BROMUS *secalinus*; *tin nudum Ascidium*, toenn ift berJDecfelj febtt; cine mirfa *Calyptra*, obne £aare; echen Pally a- *nudus*, tottrx er ttintn *Calyculus*, fetye J?ütte/ ober feine £aare/ SBorffen, (Srannen it. fat; *tin nw dum Capitulumj* ofnc aUe I?uHe obec£)ecf6lättec/ obcc ©edborflen; einen CauZ/5 *nudus*, ofne aDe 93lätte^%)te an CACTUS, STAPELIA, CUSCUTA, nac^ £tnné; im tfcencjtfctt ©inne auct) o^ne ^ube^cenj # o)ue aDe ©cfuppen; einen *Culmus nudus*, ofne 35(ätte unt) SlattWeiDen; le^tere Sürfejt ^öc^flend fe^r furs feon; » 93. SCIRPUS *setaceus*, *campesiris*; *tint nuda Cyma*, ojne aUt ibt&blätte unb 2jftcrblätter- tt)ie an CORN us *sanguinea*; *tint Faux nuda*, ofnyt fltte 6c£ui>pcn, ^tappett/ J^aare; einen *Flos nudus*, 9tt btt) etni^en^ine Slnme otnc j?e(d), beo anberett eine 95lume .obne ^elc^ unt> Slumcnfrone, obne aDe jpüae ifl. £wné nannte in fcer ^e^anOrie nur *tddy*, lofe Q3umen *Flores nudL* Wnttt jurammensefeg^ ten flcablenf&rmitsen \$(umen nennt man aud) Mejeni gen nacft, n>elc^en bie 6trافتlenblüm\$en, bie ffe fonfi *babetl*, *ftfyln*, *toit* an PYHETHRUM *ParthcniuM*, ANTHEMIS K. jutt)ei(en *butd*) gultuc; ein *nudum Folium*, oftne \$aare/ obne aIe Sebcrfung; einen 7iai/a5 *Fructus*, btt ttebet t>am Jtelc^c noc^ ton btt SMunc umgeben if!/ tote ^trfc^en; ein *nudum Legumen*, ofne ^ebedung ton Jtelcft oberSlumen^ •frone/ mite an MELILOTUS *officinalis*; mt natftc 3?u? nucfa iVux, bie entpebec gar nicftt/ ober Don tinec faum ftc^tbaren *Obctbant* bttlibtt iff. 5D?at t>em>ef)^le, fte ntcfit mit jenem *nudum Semen*, btt in einec fn&cfemen ober beinbarten ©d^ale ein^efcfeloffTen iff/ bie feine £effa bUbet; mel\*e beo bee nactten 9lu6 erff unfer ber ©c&aie liegt, unb mit *nudum Putamen*, ofne affe anbere SBebefruuw im ©egenfa^e ton *vestitum mit fy&ntn* ober Jp&Uen umgeben; einen *nudus Pedunculus* unb *Petiolus*, ofylf alle

**A**fterblätter unb Secfblätter *unb* ©djuppen/ *Me an* CYTISUM , CYTISUS *nigricans*<sup>^</sup> *tin nudum Peri-*  
*ls torn a,* obne afle 3<ibne uub Jf>ert>orragungen J \*in\*n  
*Racemu-s.* *nudus,* im ©jime **poni** Pedunc ulus  
*nudus* an CYTISUS *nigricans,* STAPHYLEA *pinnula;*  
*tin Receptaculum nudum,* obne aUt Jjaare *unb*  
©preublattcbn *an* LACTUCA, LEONTODON; einen *Sea-*  
*pus nudus* an CONVALLARIA *majalis;* Semen TIZ-  
*dum jfl bep Mnne' tin ©ame obne Pericarpium,*  
*toie an atten Gymnospermis, an* TORMENTILLA, att  
HORDEUM *nudum;* (fttrenge genommen gtbt *ti* abet  
unter ben ?P()ancro<sup>^</sup>mcn feme nadttcn &amtn; *nad*)  
*tiinne'* ifhan btn ©amen ber ©oiflencfiffcn Semen  
*nudum nnb Pappus nullus fpnom);* einen *nudus*  
*Sorus, tctnn bai 3nbu(ium feblt;* §ne **Tiurfa** <Si/r-  
**7 u a,** obne Stftgef/ tvie an LEPIDIUM, eine *Spic à*  
*mida,* obne Serf blatter unb obne ©d)opf, nxe an  
LAVANDULASpica; einen mit/u\* *Stipes, an&d)tt>anit*  
*mm,* obne ©ctuppen unb obne 9tin<sup>^</sup>/ *voic an* AGARI-  
*cus castaneus* 35olton / nnb extinclorius ; an Dab  
men unb .farrnfräutern **et** *Stipes nudus tin*  
©frunf obne Sfugel/ ©cbuppen unb ©preublattcben •  
*tt)te an CORYPHA rotund/folia unb POLYPODIUM*  
*vulgare;* *tin nudus Tuber,* obue ^afcrt>et / ait  
RANUNCULUS *Ficaria;* *tint nuda Valvula Glu-*  
*ma,* ofne J?aare; ein *nudus Vert i c ill us,* obne  
atte 53fat<sup>^</sup>: unb Secfblätter/ tvie an MYRIOPHYLLUM  
*spicafunW*

NULLINERVIA FOLIA f: *enervia*<sup>^</sup>

NULLUS, irgenb etnja<sup>^</sup> toag febit; }. 55\* Ca/y.r  
*nullus,* obne ^eicb> *Pappus nullus,* **ohne**  
**Pappus.**

NUMEROSITS, jablreicht./ fm ©eflenfage **Don soli-**  
*tarius;* j. 35. Flo res nurnerosi. Numerosa La-  
mella an eim'gen SPiljeti/ rumerosa Petala an  
MESEMBRYANTHEMIJM , *numerosa Pistilha an*  
*Mroosen/* tpenn 20 unb mefrere in einer Jpiiae vereinigt

stehen / tote 6(9 ben MNIA. (Jbenfo <Se/« numeroste wenn aide in gleic&tt Slic&tung ani bem SJtooSftenfl^j iiuffteigenj nnmerosa Stamina an RIGIN us. ' '

Nu MMULARIUS, ftjnonpnt mit *orbicularis*.

NVPTIAE, bie 'Sefrucfotuna bcr @amen.

NUTANS, *hbevyangenb*, *nidenb*, n>em bit £intertf)ei( einer Since aufredjt/ bet oorbere tvage^ rccf)t flebt/ Bernimi-bi; mit ber 3pige nicbr@ebo,gen Borkh. 9Rittc(iulanb jmifcOca ber ^ecaben unb jn>^ schen t^r b^ngaben Sage nadf f)ecanbolle» Sin Caul is nulans unb Rami nut antes, bie, ftiC bC <Stengel anCoNVALL\RaAmajfa/M mit bee @pcfje gegen J)teErbe fefein; nutans Flos, an CONVALLARIA ma- jaZz'5; Nulans ifl btr) Bor^aufen ein §5(umen; stiel, bet fo u^e6ogen iff, bag bie \$luff>e juc Erbe sieht/ unb letc^t juruefgebogen toerben fann, o&ne 33rr/ Leitung bti 95(umenfie(t& Nulans Hue emus ifl Bet) &apne eine Sraube, becen oberer S^etl (6et) JPiUbenotD me^r atf bie i?å(fte) fo gefrummt ifl/ ftafrbie 6pi|e gegen bie dtbe jeigt/ tt)ie an MONOTnop.4. Hypopithys. Cbenfo nutans Panicula an BRO MUS tectorum, MELICA nulans; S pic a nutans an CAR EX at rat a; tint Thee a nutans \$ bit tintn rec&ten 3Biafe( bilbet/ n>ie an MNIUM crudum; eine JJmbella nutans an Pi M PIN ELL A peregrina bie junge 2>o(be. <E^ ivirb oft fur cemuus &cbta|xd)t.

NUTATIO, bat £)tct)tn bet ^flanjcnafleaeu bie Sonne.

NUTRITIO, genabrungr/ bie @efammtbeit affec \$unctionen, i>uvd) toeld)t tint ^PPanje ftf) ernä&rf/ unb t^r fcben fortbringt.

NUTRITIYA ORGANA, 3Jrn&l>rurtgeorgane> durc^ n>e(c^e bie Srnabrungr gefd)ie&t, ftnb bteSBurjef/ der @tengel unb bie 95Iattec, fcecanb.

Nux, tlu^/ ifl bet) linne' tint bein&arte Sru\*^ hüsle, bie gefyoftnttcb nid>t auffspringt, n>ie an bee Haselnusß; bet) @prengel pbil. bot. ein @ame^ ber

Pit txxm btinhattcn ©cfcale bebt dt if?. %ct) T&ttm  
 Pirbt / tocnn ber ©amenbebälter aug ciner oDec mtfp  
 reren einanber einf& lieffenben (jarten faftlofen @d)aleti  
 befiebt. 9Jep (Bfrtner'n em innenroenbia fcarfetJ/  
 nicfot \* ober nur augerd felten in jmeP jffapKn auf\*  
 fprtnseubeS Putamen. Jflus t(i nac^ Kufcarb eine  
 feoljartige o&cr bein&arte o&er fcfaiae Sru\*tf>uae/ btc  
 einenober me&rere ©amen einf& ltegf/ ivclc&eno\* fib^  
 bieg in i^re cigenc 4?äute fle&uflt ftnb. ©ie encfiebt  
 but<\$) eine S3erfnod)entng obcr 23er^o[jun9 ber tnnerett  
 3Ganb ber \$t|xd)t|)i|ttt<sub>f</sub> unb ifi für bie fieifcOigeit  
 Stucftte bat, wag bit innere oft fnorpelige abanb bee  
 ^apfeln füç bie trocfenen Srücfote iff. 6ef>c oft nennt  
 man eine 3?ug 2Jem o&er ©rein. Nux iff nad)  
 jpecan&olle eine Svucftt / bie^ tuie brie ©teinfruc&t,  
 einen Smx einfe^fiegt^ bet) tt>efd)cr aber b(gkS(eifd^/  
 t)a^ bie ©cl)ale umbullt, mcf)c leberavtig aw fleifc&te  
 if?- ©iefeg gleiftt) (Sarcocarpium) fceigt iV a u-  
 c u m bep ben 9?u(fen (Brou), roté 6eo ber SQaQnug/  
 ber 2Jlanbel. IV a\* nennt man auc^ ein{ Slrr&ott  
 Sapfen / bie ftd) t>on bem gcn>obnlict>eu Sirohilus nut  
 batmtcf) u^erfcf)eibet/ bag if)re ©ecfblätter ftf> an bee

fdrlmig ge|ce((t ftnD, roie an ber grucfyt ber Sopreffe\*  
 (Burner nennt biefe Srucfyt G a / 6 u / u s, unb bef^rcibt  
 fte aid ein epformiged forfarfi^ed ^eiicarpium / bag aug  
 fc^ilbforwn ©cttuppen bcfteW, bie fttal)li& gefireift,  
 unb in W SWritte mit etner ©pi§e tcrafen finb/ an  
 beren Enbe bann nod) 4 ober me&rere ©amen ftdngen\*  
 ©, G/ii/M unb Nucula.

## O.

OB &or einem SSeptoorfje bejefestnet das Umge;  
**fehrte** t>on ban, toag bag 9>ei;mort fcgen n>iO; es  
 tfi bag abgfürjte o i^er je. ©0 &eigt obcorda-  
 \*u\$ bag 53crfcf)t:tc t>on cordatus, alfo verfehrt herz;

*förmig, ben 2lu<sup>nd</sup> mit an bet <&\$i%ot, nidjt an be\**  
*S5afW/ mie an ben Slattern tum OXALIS.*

OBACCISUS, *vvtvtebrretiigeriffen.* Bernfc.

OBACIN ACIFORMIS, uerPebrtf&belfdrmtg,  
 foenn bee Umrig ber ©itfe maubdformf^ i(l. Bernb.

OB\NCLPS, *rerPebrr^rre^fc bneib ig, wenn*  
*der Umrig bet 2)icfe Derfe^rt (anjeaeuförmig tfl.*  
*Bernhardi.*

OBARCUATUS, *r cr Pebrt gebogen, tu mi bee*  
*er^abene Xbcil cintS 3i:ttl abfd)Mtte\$ wad) bet <£vbt*  
*ftc bt. Bernb.*

OBCAMPANILATUS, *vcvt efcr tglo cf enf 6 tmiq,*  
*totmx bit Qalbtugel auf Dem ^cgclflucfe (Tebt. Bernb\**

OBCANALICULATUS, *ve vtebrt getinnt, totnn*  
*tin dttinnteti Slatt nur untm Derfleßt ifl. Berni?.*

OBCORINATUS, *verEe & rt ge E telt, n>enn We*  
*Herb vorstbung auf bee oberen gldcbe (id) befinbet*  
*Bernb.*

OBCLAVATUS, *Der Pebr rfeiilen fdrmtg/ bie*  
*bieffre ©piße gegen bie Basis.*

OBCOCHLEARIFORMIS, *ve f P&e er t f en n f 0 r^;*  
*m i g, n>enn bee SirfeDiniett gesen bit ^ 6 e immec*  
*^töger tterbeti/ t)orau^efeßt, bag bie ginte nicfjt jtoep*  
*<fnbpunfte bae. Bernb\**

OBCOMPRESSUS, *n>enn ber Umriff.ber ©We WtUfyt*  
*ot>al rft. Bctnb.*

OBCONDUPPLICATUS, *VCtl tfyitS UfaWttt tllQtt*  
*Ieg t, x>erPebrn nad>eftf<5rmig, too ftc^ abec*  
*bie ©eitentbeite 6erübcen. Bernb-*

OBCONICUS, *p e t e b r t P e g e l f 5 r m i g, bie*  
*brdtcre 35afi^ nach oben gefebrt, unb bie @pi(se nad)*  
*unten. Sin Nectarium obconicum ifl an NAR-*  
*CISSUS minor.*

OBCON VOLUTUS, *re r P e b r t z u s a m m e n g e*  
*rollt, menn bie ganje Slac^e fo jufammenflcroat tsi,*  
*daß bie Unterfeite mi) innen steht.*

OBCOHDATUS, P£ r Je & rt Htr ^ f5 rmifl. ©•  
& Sin *ohcordatum Leg-umen* (st an POLYGALAJ  
*Petal a obcordata* an MALVA, LAVATERA; eine *ob-*  
*cordala S Hi qua an* THLASPU .

OBCUCULLATUS, pert e & rt tutenf < Srmig, n?enn  
bie giac^e am Jpintertsteile naci) ber Unterseite spirale  
förmig jufammengeroUt i(l. Bernt.

OBCUSPIDATUS, p ^ r Fc ^ rt gefpt ^ t. 2 ^ rn ^ «  
OBCYATHIFORMIS, perfefr rt be cber f5 rnig,  
lt>enn bie 9Sa(je auf bent jfecjcl flebt Bern&.

OBDELTOÏDEUS, perfel? rt belta formig / ~~tras~~  
peiifeft/ aber fo, bag bie bepben ^interen gleicfjen fcmitca  
gröger aid bie twrberen fñb~~s~~ Bernl?.

OBFLLIPTICITS, vCrf cfytclliptifc^ / Hæm  
jer .Qicfenburc^fc^nitt o>a( i(t, bie ganflenbur\*fc&ni<e  
fretfförmig fñb\* Bernb.

OBEMBOLIFORMIS ~~n o r p o~~ 3rmig,  
n>enn ber S)icfenburd^fc(;nitt freigförmig iff/ bie Läns  
genburcOfcfntitte aber feilförmig (tnb. Bernb.

OBEMARGINATUS, vert ebrt au s gerandet,  
an ber @pif?e mit einem 2lugfct)nitte. Bernb.

OBFAORMIS, ver fet rt fp in belförmig,  
tvenn bie lanaenburc^fcfniffe freiSförmig, unb ber grSgte  
JDicfenburc&fcfnitt berfebrtlanjettenförmig iff- Bcrn ^

OBGLOBOSUS, rer Fe fc rt fuge h g, »enn bie  
Spize fi\*Jn ben 5lbfc^ntt einer Kugel endigt. &rnß.

OBINUNDIRULIFORMIS ~~n o r p o~~ r f ö r;  
mig / n>enn ber bicfere i?egel auf Dem bünneren fige.  
Bernb.

OBLANCKOLATUS, re r Feb r tl an jettenf 6 r#  
mig, n>em bie \$mep Sogen, roeld)e bad lanjetten^  
fSrmifle SSlatf bilben / nic^t an ben OpiSen<sub>f</sub> fonbern  
an ben &eitn in SSinfefn {ufammenfloRn. Bernb.

OBLIQUE CORDATUM, fd> 1 e f t e r ^ f 6 rftll g, wenn  
ber eine Sappen an ber \$afft f^malcc ((1/ tuie an'  
CELTIS orientah's.

OBLIQUE DEPRI^M *Stig ma, |d)iefniebe&L:*  
*geð r ðdtt, an DAPHNE Mezereum.*

OBLIQUE DESGENDENS, f<£ t e f\$ b fie!gent) / o~~CC~~  
**hängend.**

OBLIQUE OVATW, fc^t cfC ffot mfg, toemt **die**  
 Cine Jþalfte be\$ Slatted, jumafolan Dec SBaftf/ fleinec  
 iflf tDie an CELTIS austral is.

OBLIQUE SECEDES *Calypla, 5, latcrali-*  
*ter secedens, tvcnn fealbirtc ©u^Cn fc^tef c&ec*  
*jut ©cite a6fa((en.*

**OBLIQUITAS** f lor is, ba\$ @4> i'ef (le^ en &  
**Blume**, unb jrnar an HITSSOFUS *Lophantus*, 3), an  
 PEDICULARIS ^#

OBLIQUUS, f4> i e f / if! nad) Bern^arbt/ n?a^ mit  
 fcer £)erfläd;e beif ScDe einca fd;iefen 2Btufcl 6i(t>et  
 unb mit^pec ©pi&cc sen JQimmd ftcl)t, 3a biefetri  
 ©tune i(t jn?ar *Caudex obliquus an mcfyi'eren fiaxvtv*  
 fráuterrt/ *Culm us obliquus an POA annua, unb*  
*Radi x obliqua an AEJHUSA Meum.* SIGfein fiber  
*Fotium obliquum* fmb Die Serminofogen nlcfrt eini^  
 SClIU obliquum *Folium tfi bep £irme' phil. bot.*  
 ed. Willd. em SSlatt/ beffen Sajt^ gen ^iig^l/ beffen  
*Spiße* gegen ben ^orijont ftct)t/ tvie airPROTEA,  
*FRITILLARIA.* 3n Sprengele 2lu^gabe i(l eg fpnonpiu  
 ttlt *incequaliler c ordutum, ncbcn obigCt*  
 S3cbe#ing. Sei) CDiQbenoxo unb Rölling unb a.  
 ifl ein *Folium obliquum, ftenn bieVbtls flad)*  
*wad) o6cn, bie @pige nad) bem Jgovijonte / bee SianC)*  
 bet ©pige aber nad) ber (Erbe fte()t, trie an POFULUS  
*tremula; bet) anberea and) fr)i|on|)m nut in a qualc,*  
*an einer ©eite ber QBaft^ me>r au^gebrcttet obei\* uxlan*  
*gert. Sci; ^ayne'n iff ein SBlatt obliquum Folium*  
*fc^iefgetvanbr/ ba& mit fetnem unteren 2)eile juge^*  
*tvanbt (adversum) mti fetnem cbeten abgetvanbt*  
*(aversum) ifl / tMC an MALALEUCA styphclioides.*  
*f&tt) aitberen i|i ein Folium verlicale, rnté an LAC-*  
*IUCA Scuriola, fin Folium obliqu urn; £Q andes*

ren if! eg etn SBtatt/ *bai an berSSaff\** fcorijontal if?/ llnb t)C(fcn Oetten nadf auf\* ober a6n>är^ gefe&rt f?nb> ivie an FRITILLARIA *imperialis*. 25atfd) nennt eim *Folium obliquum* batfjenrge/ beflen' SXanber flegen ben (Stengel gefeftrt finb, Slnbecen if? jebeg *fdlatt tin Folium obliquum*, ba8 nid)f gefcummt unb n?ebcc (ori\$onta( nod) vertical gegen ben Stengel flebe. 06-*liqua Ochrea*, *btvm dianb* auf eincc Ocite *cttoai verlängert if?\* Obliquum Rostrum* an bee O;d;ote von SINAPIS alba. *Thee a obliqua^ bit* ttlit tem **Fruchtstiele** einen (?umpfen SBinfci btlbet; fpnonpm mit *declinata unb inclinata*. *Obliquum Tuber*, lanflccfyunbgleic&fam etmad *fcf>tefgebogen/an GYPERUS esculentus*. (f\$ if?ofter^ fononpm mit^ or /us\* OBLITTERATO - UNINERVIUM ? tvenn bie SUtt elcippe

**3e6 Slatted nur an ber Saftt / obej: t>6d>jTeffPnur bis jur Witte bcS Sblattrt fidbtbat if? / unb bann t>tv{<A)toinbtU**

OBLITTERATUS, irgenb *ettvat/ tt>a& nnbcntlid*) if?, §. S& *verwifebt*, n>enn eine Seic^nung *an ben %<m btvn attmablifl jbre garbe Wrlierf*. *Oblilterata Foramina* ftnban bee j?apfe( t>on PAPAVER officinale.

OBL(M\*TUSCUS, *ettoai langltcf?*

OBLONGO-CORDATUS, a b f ~~er~~ ~~r~~ ~~g~~ ~~f~~ ~~q~~ ~~m~~ i g.

ORLONGO-ELUPTICUM, (a n^er ten fdr m i g/ an bepben (Enben sufammengerunbet. JDecanb.

OBLONGO - LANGEOLATUS , I & n gH (fy'A Cltis ^ ~~ens~~ f 6 r m i g ^ i n e SRittelform t>om SanjettenfSrmigen unb torn JangltC&Cn. £• S. an PRUNELLA *pemylvanica*,

OBLONGO -OVATUM , 1 a n g [ i <) e j? r u n b r mehr eprunD a\i lan&; \*). an ber S3afif länglich.

\*) Die Seminologen fint iibeu bie debeufun^ eincc ukommen« gesegten Kunstausdrudes getheilt. Einige wollen, daß das Wort, welches zuletzt gef<|t n>ich, ba^jenigc sep, welches der Sigui- obej Jocm am mcifTen enffpric^t; anfcert wollen, daß bad SBDct, n>eld)e^i;otrtU^gel)t/ bie 3i(bung bee Ba-

<sup>1</sup> It\* étnef X)inge^, unb j(ne6, tvel^e^ folg^ bie ftiftung der ©p ge auödrude.

OBLONGUS, *I'an Q lid*), *finnc' nannfc in fcinc& philosophia hot.* bim ©taubbcutel an bee £t!te eitn| *Ant her a oblonga,* uub eiti *F o li u m oblongum* fcaSjcnigc , *btftcn Sängcnburd)m\*flrcr urn einigc SRafcle* längcr iff, al\$ bcr DuerburcfomeflFei: unb ait bepben (En\* ben cngec ale cut 3irf\*(augfcl)mtt. Set) tPt'Ubenorp ifi *tin Folium obi on gum ba^jemgC/ an ttelcfttm* Die Svcitc jut gängc (tct t>crl)alt/ wie 1: 5; (fpato<sup>c</sup> fagt cr, rote 1: 2) eber Die Sreite *nod* geringer ift, tint) ©pi^e unt) %aft^ b^lt) ftumpf/ balb fpigig (nac^ Borf{?aufen jenc fpi^id/ btfcfc ilumpf) julaufcn. ^>ayne fegt bicfed 23crf)a(tui§ bee Scxitc jur *tān&t*, n>te 1 ju ettvad meijr *ali* 2, obec ntd)t t>ie( me^r *ali* 5/ Wte an LIMOSEIXA *aquatica*. gjep Bem^arbi' t(l fcagjemaelanglid) / an n>elc)cm bie länge jar *Brei* n>ie 2 : ^pid) t>cr^alt. Slnbece fegen btefes *Verhältnis* tvte 4: i/ *toit* 5: 1. B&Utárб noU burc^au^/ bag Me\* ©eiten parallel / unb bie (Enben (luntpf fepcu; inb|(fen erflart tPi'Ubenoto eine *Anthera oblonga* a(£ einen (angen an 6eoben <fnben {pit\$ig julaufenbtt *Qtaubbeutcl*, unb iDecanboUe nennt *oblong-us*, t>ag fctjmal/ mit cftvad gehünnnten (^benrañbern tfl/ fo bag e^ eine feftr lang gejoscne SHipfe mft (tumpfen Enben bilbet. El ill alfo bee ®uf>e roertf), nod) einiae ©epfpleie t>on *ollongum* aniuufüfcren. Amen- 111 jj^mblongum iff an SALIX *Caprea\$* eine *oblonga* BroWtea an MELISSA *ojjicinalis*| *tin ^jalyx oblongus* an ROSA *montana*; eine Capsula *oblonga* gn GERASTIUM *vulgatum*; *tin Folliculus oblongus* an NERIUM *Oleander*; *oblonga Frons*, bit @Heber an einigen @onfert>en, *Oblongus Ftuctu%* fft an CARUM \*Carvi; cine Glandul a neclarifera *oblonga* an HESPKRIS; eine Lacinia *oblonga folii* an ACONITUM *Cammarum*; *tin Legume n oh I on gum* an ASTRAGALUS *exscapus*; *tin oblongum Nectarium*, *tin Petalum oblongum* an CITRUS ; *tin Pileus oblongus* an eiiuflen ©c&wdmmen; cin

*oblonga Pinnula an ASPIDIUM Jilix mas; tin hlongum Pomum (bttf einigen fpnonpm mit ova\* im) an CUCURBITA Pepo ; tin oblongum (Semen an HHLIANTHUS (bt\)(&&rtn' n ftnb aUt Semina tercia, cylindrica, fusiformia, prismaticia, unb rostrata and) Semina ohlonga); etne oblonga S'licula an DRABA, oblonga Siliqua an SIN APIS nigra; txnfo oblonga Spicula an LOLIUM perenne, POA trivaiis; tin Stigma oblongum, bid unb länglicft/ an TRIOSTEUM; tin Tuber oblongum, art RANUNCULUS Ficaria\*-.*

OBLUWATUS, v er fe& ct mo nbf6 r m tg. Bern^.

OBMITRIFORMIS , t>er fe& rt tapp en fdr m i g, BernU., tt>enn Die ftifa am 3SorbcrtbciU nad) btt Xtvftitt fptralfformta iufaminengcroffe ijt. Bern&.

OBNAVLICULARIS, vttltfyttncidpinfjk<sup>m</sup> 19 / tuenn ber recite unb Itnfe ©eitentfteil nad^ben hi einen 2Binfcl iufammen|Io(fen- Bernb.

OBOVALIS, rcrfel>rt op\*!/ totnn 6ei> eyier Breifcn glädje bit btybtn &tittnv'anbtv dltity SUttiit abfc&nitte t>or(leaen, Bern&. SBe» B&Üiarb \$ bvltttt €n ^ oben.

OBOVATUS, t>er fe& rt e pri in &, tt)cnn 6~~er~~  
^tnferrant) etnen ffechneren JfrcWabfdjmitt barHcttf, a~~ls~~  
ber SBorberranb, Bernt. SBepfptele etneS Folium  
oboicum fmb an PRIMULA villosa, SEDUM ~~s~~ a~~am~~.  
3la<\* tl>il\*enow i(l e^ ftnonpm mtt spathVla-  
turn, <?>ebw. Semina obovata finfr an BELMS.  
Cine obovata Apophysis tvtlavt fipiÜbenOTO at\*  
ton ber SSwtffe fletrennt/ ofne 6amen, runb, unb an  
ber SajW Derbiinnfc Slu\* **Die Thee** a ijl an: eintflen  
SJpofen obovala.

OBOVIFORMIS, perfe& rte yffirtittfl/ tenn  
ber ©tcfettburc&fc&nitt freigformia, unb b*f* i j <sup>ng</sup> ~~ur~~ ^  
fctjntfte **verfehrten** <sup>rmig</sup> <sup>nd</sup> <sup>ern</sup> B&.

OBPARABOLICUS, *vevt e&rtparaboHfd>*.

**Ber**

OBPOMIFORMIS, *vitl e&rtapf elf 6rmf*

**Bernb.**

OBPRAEMORSUS, *perfefcrtabgeb tffen. Bb.*

'OBPYRAMIDALIS, . ver fefcrrp yram i ben\* fitmig, n>enn bee grSgte @itfenburc&fc&nitt einec ipyramide an bee Optfce ifl. **Bernb.**

OBRENIFORMIS, *.i>erf e&rt nierenförmig.*

**Ber**

OBRETUSUS, . perfe^rtniebergebrücf t.

**Bern**

OBRHOMBUS, *verfehttrautenfotmiQ,* cautenförmig, abec nut (iumtffen SBtnfeln am @runOe tinb an ber 6pigc. Bernb. .

OB^GITTATUS, t)erf e^rtpfet Ifo'trmig. B

OBWCHUS, b unf cl/ ttott garbefloff, aud) u ns burc^ft' ct)t'g, n>ie S. 95. *Ohscura frons;* die auf) im icbcnMgcn 3u(latt)e unburc^ficfttden stabtn an ten Sonfer^en. **Zuf** a(f o&scure, unbeutlt^/ fi>non) m mit

OBSOLETE *unb* OBSOLETUS, *unbeutlić^/ lift! mcrflic^, flein, J. SB obsoletus CalyMan RUBIA. tmctorum; Folia obsolete lobata an JuNGERMANNIA triloba, MALVA. rotundifolia; obsolete trigger Caulis, untJoBfommen bvtr)tant'3, mit tow ver&8tid)Mr fo bag bee Ouerburc^fc^nUt ein fpfrå; risches Srct)C(f bttbet, tote an NERIUM ottorum.*

OBSUBULATUS, *r erfe^rtpfriemenfor^ mffl\* Bernf?.*

- OBTECTO-VENOSUM, *bCrbecft g e a b e r t / tpenn über bie au& ber 93?lttelrippe entfprinsenben ®tt fafji>unbe( anbere cinfad>e aug ber 25aft\$ entfpingenbe ttjeglaufeii/ n>team ALJ SM\ Planta#o, scayne. 2Benn über. ein aberigeg %latt nod) bret) 9}crt>cn, bee au^ ber S3a^ fommen/ Iaufen/ unb gleid^fam barauf gefegf jufcpn fc^emen/ n>ie an ERYTHROXYLON Cocca.XOiUb>*

**OBTEGENS**, *vetbedenb, ttxnn tint \$lai<sup>4</sup>)t* M\*  
gnbere \$ani twbetft. Bernfr.

**OWORQUATUS**, *vert ebrtvevbrebt, totnn*  
*tint fcf)Cttclred)te gJac&e ttaaerec&f dm SSorbert&eifc ffef*  
*bre&t. Bern&,*

**OBTRUNCATUS**, *vertebtabgef\$nitten.*  
Bernfc.

**OBTUSAN GULUFF**, *Obtt OBTUSEANGULATUS*, ft II 111 p ff  
ID in Fell'g, *HI b\*9* Bernbarbi irflcnb ettt>a<J, Da<  
cinem SBinfel bil&et, &er grōger iff alS 90<sup>0</sup>. 3nt)effen  
gebrauc^t man c\* au\* **taou** 95Iatt|JieIm, ©tengeln 2c  
Dcren ^aneecn fhimpf/ ▷. b. nl\*c f\*neibenb ftnb, n?ie  
an CAREX'panicea. ttnb eben fo gebcaucftt man

**OBTUSE SERHATUM**, *(lum pfflef^ g t, lim au&*  
**«cutfen, bag biefe flerbci, 3a&nef ®n? un» 3lu<sup>#</sup>**  
**«ittte unb eageja^ne ffumpf finb\***

**OBTUSIUSCULUS**, *ett ca a (lumpf/ tt)ie bie*  
*Squama oltusiuscula an MATRICARIA Chamo-*  
*milla.*

**OBTUSUS**, fluropf. £inn^ fu^re phil. hot. \*aW  
SBet)fpUl etne^ CaZ^x *obtusus* jenen bet NYMPHAEA  
**unb GARCINIA an, unb beftnicrt aW ffumpfe\* SBlatty**  
F o / i a m W u m , baiJjenifle/ n>el\*e< bepnafce iit( einem «rei<augW>nitte an bit ©pifce ft\* enbet Se/ fanbe ft\* batan eine fleine ept&e, fo ware e< na<  
&inne obtusum cum acumine. 95ep <?ayne tfabe?<sup>1</sup>  
*obtusum Folium baiitni&t, btffm ©pi§e (TO in einen sugerunbeten obec (lumpfen SBinfel enbet, wte an HYPERICUM perforatum. Eine XZa oblusa iff an POLYGALA omara; etn Calcar obLusum att ACONITITM Napellus; tint Capsula obtusa an RHINANTIIUS; etn obtusus Dens calycis an ORO-\*us; obtusi Echini, ffumpf, an bee ©pige abge; tunbet; etn obtusum Folium an RUMEX obtusifolius, SEDUM album; obtuscr Lamella; obtw \*U5 Zofcus labii an ORCHIS mascula; obtusus tap pus an APULEJ A ; obtusus Lob us folii an*

*FICUS Carica*; *ohtusa Parapkysis*, fiumpf *Mb* am Enbe runb julaufenb; *obiusum Petalum* ao TROPAEOLUM; *obtusum Podetium*, fiumpf unO an ber Cpjie assertnbef; ofc/u« *Ramuli* an ben SWoofen, bie in eine flacfre/ juauerunbete, Ober audge\* &6&te <§plge *ficr* enbiflen, n>ie an HYPNUM *stellatum*; *ohtusa Spica* an MENTHA *piperila*; *obiusum Stigma* an (YSIMACHIA, ANDROMEDA; *obtusus Strobilus* an PINUS *Pima*; *oblusa Valvula*, an COCHLEARIA. *Obtusissima Folia* fnt an CORONILLA *glauca*.

OBVERSE f. *Ob.* *Obverse .cordatum etc\**  
f. *Obcordatum etc.*

OBVERSUM FOLIUM i|l Ux) £tnnē ft)nonim mlt vertic ale in btt S&ebeutung, bag Me Saffc fc)ma^L m|b bo^ angenommen n>irt, n>o |t%t bit Cpi6e iWr » 95» *obverse obtt verticaliter cordatum*. Sty) Bern&arbi iff *obversus* f<£iefgetc>enfcet, tt>cnn 2 Släcken mit ben Cteiten fcftief nad^ einanbec fe^cn\* *Obversus Situs umbilici*, toenbad SSürjeU cf)en bef (Enrico nad^ ber £effgiind be\* SRabed ju; gefehr

OBVOLUTUS, iff bet) Bern^árbi \*ineinanbet g.e stecft/ eon bem reitenben baburc) t>erfd)ieben / daß bt|ti £ang^Durd)me(Tcr Der einen glaç&e bee Slanb ber jnberen eiUflegen fle^t S3ep JDecanbolle (ft 06-^ or^ u 5 übergerolit/ ftenn irgenb tin Zt)til hbtt ben anberen übergeroUt iff. -*Obvoluta Cotyledones* fjabtn toil an bin Sifotpkboncn bet) HELXINE; ein *obvolutum Folium* in ber ilno^C/ obet eine *obvoluta Gemma* ifi 6cr> £inn^ bit|tM\$ Sage bed Slatted / in bee bie SKanber beffelben toecfesed tveife ben gcraben 92anb bed gegenüberfleftenben %latt *Ui* umfaffen, tvie an ben Helfen, an bee @albey / obec/ nxe VDin^enovo ed beutlic^er ttllått, toen jtvei) bobaiegenbe flätter, obne aufgeroUt ju seyn, in einanber geeifen/ fo bag na^mUc^ bit hohle Xinn

*bti* etnen ben Stanb *bet anbtvtn faſt.* 3n einent an&eren 6im?e *ncnnt* man irgent) einen 95lütbenf!an& 5 35. etne *Spica obvoluta>* tornn fie grôgten **Theils** in étnec (Sc&eiDe jiecft, toie an PHALARIS *aspera*.

OCCIDENTALS CLIMA ift *bt\)* *Hinne.* paS **Rlima** t)on ^oc^^Slmenfa Don <fanaba 6i^ SfortDa unf> mit . 3nbegriff t>on 3apan.

OCCJLUSUM SOLUM, *bit Slfpenn>5nbe,* *bit m|t* bicfttcn SBalOern unb tiefer *fittd* feuc^ter **Dammerde**. bebecht ffnb\*

OCCULTANJI, p e r b e r g c n b / berjenlge **Theil**, tt>ehrser etnen anbern in feinem Umfange fo **verbirgt**, bag man nur roenid t>on ibm bemerfen fann. 2Ba6 •fo terbor^en i(I/ ifl bann

OCCULTATUS, r e r b o r g e n \*

OCELLUS, 2f u g e / ein flccf/ (*Majbula*), beffen ^Riteelpunct ungefärbt iff, Der a(fo einen 3?m̄j billet/ iDecanb\* S^ fann aber auch bet 3J?UeelpuncC anberd gefärbt fcon, aid ber SKtnd/ unb bie Sllc^e auf melcher berfetbe ffcb befinbee.

OCH RACEus, ©c f e r g e l b / ein ©elb miſ ami S3Iaſ^brauo *semenst.* S5eo K^lt/ig ifi ed fgnonpni ttiit *ochroleuc us.*

OCHREA na\$ *VOMBENOXD,* *bit Zute,* *tin blaffe* föcmiser A&rpet/ bee bet) einigen ©räfecn .(»ie att GYPERUS) bie 2le?e bee 93lumen({ie(e/ unb be\* Dec (Sattund POLYGONUM (unb mebreren RUMEX) *bm* **Stengel** in @efia(t einer malgenförmisen 6cbeibe um^ gibt. ©• a. *Vagina.*

OCHROLEUCUS, *Qelbli<bwei\$,* *tin tttoai* schmußiges 35Ia^ei6, Dem SBetffen fe)c na&e fommenb; tote an SCABIOSA *ochroleuca.*

OCHROS, in 3ttfammenfebunden *ani bt*m ©riefti; fc^en, dleicftbebeutenb *tnitflavus.* ©ecanb.

OCHYROSTE.IA, SD?oofe tnit cirtfac>er SRunbung^ befaguns; bte *Estheostomi \$>cbvo., Aploperislomati* **Brid.**

OCREAE, 6 d ) t'e n e n , meiffenS fcecfē&rt U&tU  
fJrmifle fable DiantfoānDtge £&étle/ totldit Die ©igen  
Dec SBucjeln beDetcn. &crnb.

OCTANDHIA, Die VIII. glafie 6e> £tnne, twlcste  
Diejenigen ^Jffanjen begreift, Die

OCTANDRUS ftnD/ D. 6- 8 ©tavbgefäge baben.

OCTOFIDUS, in 8 Sfyeile sefpalten^mie Dec £elc^  
Ott TORMENTILLA.

QCTOFLORUS, 8. blumtg, n̄ie Dec octoflorus  
*Verticillus* an SIDERITIS *candicans*.

OCTOGYNIA, jene OrDnungen bci; itmné, tvclcfje  
Diejenigen ^Panjen bcgreifen/ Die

OCTOGYMuS, ac^t to e i b t g/ D.f). mlt 8 ©taub^  
wegen twfrben fnd.

OCTOLOCULAKIS, ac^tfld^erig iI Die 5top|  
an LNXJIM *Radiola*.'

OCTONA FOLIA, A<^tfa4>e Slattec/ Die ju 8  
in etnem Quirle urn Dett Stengel tfe&en, toit an GA-  
UUM verum.'

OCTONARIAE p I ant a y finb bet) VD<x<i>enb. Die\*  
ienigen/ Deren SlumenDecten in 8 £beile getbeilt ftnD/  
unt) Die 8 mannig ftnD.

OCTOPETALUS, nu't 8 S3(umen6lattern / tt>te  
DRY AS *octopetala*.

OCTOPHYLLUS , ac>t b 1411 r i g , mei(Ten^ t)om  
fteldjp unD t>on Dec ^nDe/ tote an CHLORA; em  
*octophyllum Pappus i(l an BELL-is.*

~~OCTOSPERMA~~; ~~a d f f a m i g~~ CAPSULA, an t>ulm S1^tm unD

OCTOSPORA, gifoofe mit 8 ©amen; Da&ec Die  
Gattun\$ *Octospora*.

OCTOSTEMONES, ft)nonpm mit *Octandria*,  
OCULUS, 2 t u g e nennt (B&vtney jene Knospen,  
Die entvcDec blog ^lutben, oDec S5(atcr unD Blüthen  
zugleich entMten. Bern^arbt nennt aber auch das,  
was ©4rtncr ^no^pe tm ftcensften ©inne nennt/  
Huge , jeDoch mit Dem Sufa^e, Slatterauge, 0 c u z us

*foliifer. SBeI jjubwig iff nut Die SMatttomfelfnodpe  
Oculu s>*

ODORATUS, *vied>eni>, ettoaS ba\$ trgenb eincn  
©erud) 5at. €l foirb and) öfterd aid ftnontjm Don fra-  
grans unD suaveolens% gebraucfrf.*

OFFIGINAMS, *xodi in Apotheken gebraucht wird.*

OFDES, *ade^ mad atif oides auf&t|)t, tfl dem-  
jenfgen å&nlid), n>a^ turd> bad/ bent 2C6rtc^en oides  
Dorgefegte 5Bort bejcidjnt mirb. 3\* \$• VICIA lathy-  
roidesi tint SBirfe/ bie bem LATHYHUS- å&nlt; Jfl.*

OLERACEAE, *<pflanicn, bie man baut/ obec bie  
fret) an 6e6autm \$iägen jum 93orfd)eine sommm\*  
3?atfirtcf>e gamilim beo Batfct) unb £iirte.*

OLEOSUS,-6^lig/ mi Dcbl entbale, obcr bar^  
nach fc^mccft.

OLEUM FIXUM, unb AETHEREUM , fetts unb  
**fl u ñ d r i g e ^ © e t l / Ch Principium immediatum**  
**III. Slaffe-**

OLIGANTHERAE, cine (Jfaffe 6et> Koyert.

OLIGOPHYLLUS, to enig blattrig.

OLIGOS, in 3ufammenfesungen aud bem @rfecf);  
fc^en bebeutet/ bag badjemge/ n>a^ burd^ bad SBort  
bt\$eid)net tvivb, totmit ed jufammeüdefegt if?, n^ #  
flenngec Wenge twrfommf.

OLIGOSPERMUS%> tverttg farttig, {.-58. Le-  
gume n oligospermum an MELIOTUS.

OLIVACEUS, olipeitgriin.

OLIVAHIUS, n>ad bie \$orro einer Oli^e 6at  
BuOiarb.

OIMPHALODIUM CürpiTi/ em hervorragender Punct  
meif!end in ber ?Q?tte ber SZarbe beftnt>kcf>, in welchem  
bie ernäftrenben (Sefäge (ic^ enbeten\*.

OPACIJS, matt/ faflt man bon Wfanjen/ bcren  
£berflaç&e bie 8ic&rfcaWen ntc&t jtirñcfwirft / unb baf)ec  
obne alien ©lauj i({; n>ie an ben meifien ^flanjen, j.  
S3, POTENTXLLA opaca. 23co K^&Img i(l ed iene

Slatffpijt an btn 9D?oofen, bte titl gleifcfc tint) Me garbe be\* Slatted hat

OPERCULARIS UU) OpERCUTATUS, titt titltm JDtfel t>erfecn, einen Secfel bilbenb / tme opercnlaris Ant her a an EPIPACTIS; operculatum Ascidium'y unb meiftcn^ baburd^ gcfd)loffcti/ tvcnn cr t>U SBaffer tp. *Operculata Capsula*, totm bit tfap\* fcl mit etnem 2>erfel ftd) offnet, n>ie an HYOSCYAMUS.

OPERCULUM, (JDccfel), em runber ^forper, bet bit Oefnung bet gsfic^fc t)crfd)[teſt, unb meiflend fret abfaUt. @r iff an ber ANDREAEA fefr fletn / unb ba nennt t>n iEbr^arr Conjunctorium; aud) etn meſt ober minber beroedlicyfier / blattartiger 2f>ei(/ bet inxotxUn Die 6a)[aud)e (Ascidia) fc^Ueft. *OpercuIo clausum*9f. *operculum*. ©• a. Epiſt omium.

OPERIENS, \$ub ecfen b/ n>enn ein S^eil ecneit anbertn an feiner .@pi^e t)er6irgt; n>aſ fo tetbor^cn iff/ iff

OPERTUS, b e b e eft/ Bern^

OPITULATORES ^>ebtD. 6. *Prosphyscsgbrb.* lie miblidocn SSlumen cm ben 5Koofcn, bie feine 3rud;t bringen.

OPLARIUM #ecf. ©• *Scyphus*.

•OPPOSITE PINNATUM, gegcngeffebert> mnn bie 55(atfd)m bed geftebrten Slatted paarmeife etnanber ^eflenüberfleben/ n>ie an ASTRAGALUS glycyphyllus, ROBINIA *Pseudo-Acacia*.

OPPOSITIFLORUS PEDUNCULUS, tenn bie ein&ct\* nen SBlumenfiele gerabe flegenüber fte^en, tx>ie an CORwus *masc*, VERONICA *Beccahunga*.

OPPOSITIFOLU FLORES finb bet) Ilinne biejenigen, bie bem Sblattt flerabe geflenuber tfe&en / n>ie an SOLAWUM *Dulcamara*, PHYTOLACCA, GERANIUM, tl)re 3 ^ floredcenj mag meld^e Unmet; SEraube aq SOLANUM, ^o(be an BUPLEURUM feon ic. Set), tyillbenovo if! bies§ *oppositifolius Pedunculus*. *Opposilifolim* Sti puia, totnn bet) n>ecf>fetfeitiflēn Slattern bie 2lf;

*Utblatttt* jttar in ber Oegenb *bit* UrfsprungeS be\* %latt'litU#, aber auf bcr anberen Oefte be\$ OtengelS. fleben / mie on MERCURIALIS annua. Set) einigen &eßt *oppositifolius* mit gegenuberfotecnenben Slattern.. Set) Ci'nné finb Me *oppositifolia* audt erie Un\* tecobt&eilung tec *Composite*.

OPPOSITIVAE \*PETIOLARES *gemma* \* ffatt *op pos-st'la* nennt Onnc bté ^no^pen an LIGISTRUM, JAS-MiNtTM, unb *oppositiva stipulacea* an RHAMJSUS *catharticus*.

OPPOSITUS, g e g c n ü b e r f i e ^ e n b / bejeic&net ein \$Rabl Wtt) Dr^ane, bie einanber dedenüberoeffedt iinb/ n̄te & 03. Fo//a *opposite*, ^enußer{e6enbe flatter an bent CORMJS *Mas*; ober *oppositi Flores an* RUPLLIA *ciliaia*, bie alfo ton ber Opi^e ober trott bet Saffc 0(etc^n>eU entfernt ({e^en; fernet *noti*), bag ein Organ (icf) tor bem anberen befinbet/ & 95. wemt ein OtauB^efai fie) tor einem Slumenbtatfe *btfinbtt*, fo faqjt man / ta^ Staubgefag (le>e Otm Slumenblatte gesenüber/ *Filamentaopposita* an URTICA. Endlic6 auf) ate fonont>m Oon *contrarius*; j. B. *Dissepimenta dtiecte valvii opposita*, die (Sc^eibetoânbe ben ^lappen gerabe entflegengefegt / at| EPILOBIUM, PHLOX, *Opposilh.* hoculamenta-, mm 2 fiatyt mit iftren Oeiten fo mit einanber ter; bunben finb / ba§ bie Ocbreibemanb bie Slcbfe ber gruc^t bur^r^neibet/ unb bie bepben gegenüber^enbett 98(inbe bcrfefben berüstrf. 3n^fl'cn fommen nod) einige etgene 93ebeutungen tor, j. ^5. *Albumen oppasU tum*, *Qegenfcitigee* obec einfeittge\* ®ot toct§ / tvenn ber (Embrpo an ber einen @eite litQt; *oppōsilum Amentum*, an SAUX. *monandra femina* unb *opposUus Cirrus aii* Onom)tn tor *oppo-silifolius*; *Opposita Cotyledones*, bren innere Eeiten jitar einanber ju^efet)rt finb/ aberroeaeen ber einsebogenen 9?anber (id) entweber gar ntd)t, ober niefjt in aQcn ^unctm^erubrens *opposiu jiami>*

ttenn ein 5lt bem anberen aeflenü6erf?ebf / fo ba§ htvbt  
fycftt mit t&rer SBajt an ben mtnhbetfiebenben ©eitcn  
bei ©tammetf jufammenttreffen , mle an CORNU\$ ; oppo-  
situs *Situs umbilici* ifi bie entgegengefegte ia\$t t>on  
obversus *Situs*. 3n *Hinn&B* phil. bot. ed. Willd.  
*finP Folia opposita* burc&aug *Folia decussalim*  
*oppcsita*, abet nfc&t me&r in ©prengePa.

### ORA f. Peristomium.

ORBICULARIS, tte ie> fd-r.mi'g / tt>entt ber SRanb  
einen Qodfommenen ^rei^ befd^reibt^Bern^ 25ei>  
fiinne' xoat ei

ORBICULATUS , unb ttir fyaben *orbiculatum* Fo-  
lium, bet Sitfur eined A'reife^ ^ictd> ober.na^e  
JEmmenb / Uie an PYROLA media, HYDROCOTYLE vul-  
garis. COTYLEDON *orbiculata*, in eben biefem ©inne  
unb fononpm mit *stellatus*, eine *Frons orbicu-*  
*lata* ober *Thallus orbiculatus* an LICHEN ( PAR-  
SIELIA) *prietinus* unb *saxatilis*; ein Legumen  
*orbiculatum* an MEDICAGO *orbicularis*; einen Pi-  
leus *orbicularis* ober *orbiculatus* an biefen ^iljett.  
*Orbiculata Semin'a finb* bie jfrabenaugftt/ bie ©a^  
men an TORDYLIUM; eine Sili&ula *orbiculata* tjl  
An CLYPEOLA unb PELTARIA; ein Stigma *orbicu-*  
*latum* aft BERBERIS *vulgaris*, LYTHRUM.

ORBICULUS, bai Cede revert/ ein flacfyeti'  
freidfbormid^ 5rud?t!ager, ba^ fief) in bem Umfcfylage  
(pvridium) bet Sftibularien befinbet S)ann auch  
fine Slrt fretfformiser fr^aben^eit<sub>f</sub> bie auf ber %aff^  
fcet SHumenfone ^ect>octcitt, unb bie ©cnitatfen urn;  
t>ufit/ toie an ben Qtapelien.

ORBILLA Acharius , ein flaches strahlenförmiges,  
fc^ilbförmige^ 3(pot^ectum / bai mit einer ©amenlage  
bei)c dt/ unb miffttiudgeranbet t(. (E^ i(t cigendic^ nur das  
Schüsselchen bet U^neen, unb fcon bem wahren  
Schüsselchen (*Scutella*) kaum verschieden.

ORCHIDEA COROLLA , eine 0 r d^ i 6 a r t i g C Blus-  
tttenfrone aennt 2^ecanbo»e biejenige ein6(åtrige

SHumenfrone, ober fagjenige ^errgotium, wlc&e\* tief in me&rere Sappetr ejct^élt **cfl**, ton n>e(c0en tie. oberen anfrec&t ffgeben, unb &elm (*Galea*) geigkeit/ ber untere augflebreitete Don mannigfaltifler ^orm after Dæ Unterlippe/ ber &att, (*Labellum*) fceigf.

ORDINATUS, *geotbnet* ftnb ber) Bernfmrbf jene t>erbunt>ene ^5rpier / Die To gefiellt ftnt), »a§ fle fotuo&l ber fânge a(^ t>er SMcfc naci) in finien ^ufammen^ fallen.

OHDO, ©rbnung. S)ie £>r&nungett toerten in **Linne**'fc^en 6p|tcme tf>ctr^ nacf) Der ga^I t>er **Staubswäge**, uho Dec 3abl *bet* ;@tau6gefage, unb **theils** nad() ©tettung/ ^age unt) SSerbinJ)un9 Ofefer **Theile** flebilbee. ©ie ftnt) Me erflen ?(br{>eilungen ciner €laffe 6eo *linne.*' 9Ba« bep £ifine' flaffe iff^ iff ber) Cournefort öffers ©rbtuing; iep Kay unb Rivm Genus *summum*. ©ie Orbnuri^en £tnn'e's ftnb 6ei> Cournefort *Sectio> Uj* Kay unb **Rivin** "Genus *suballcrnum*. *Or do if! mid)* öfferd **gleichbes** beutenb mit SXei&e; fo **fast** manj. S5\* bad *Peris torn a fer* einfacft obecboppeft gejabnt/ *ordine simpUci* ober *duplici dentarium*, je nacfbem bie 3^ne in einec ober in 2 SXetfen ffgeben. 9lucf> bet) ben. Shufyobieit ad>tttmm anf bie Slei^en {o r d i n e s ) bit ©c&uppeit ober Slåt^en\*

ORGANAELEMENTARIA, ( Brunnbbe danbt&effe nennt ©enebfer jene fe&r Hefneir 2&cile/ *bie* man lit" alien £rganen ber Vflanjen einanber af)n(id) ftnbet# unb bie gieicftfam bie £emente berfelben ju bilben fc^einen.

ORGASTICUS, ein @eruc^, ber O^d^ntuj nac^ bem tfopfe erregt.

ORGYA, S U f t e r , 6'/ ober SKann^ocft; *bafat*

ORGYALK, *toai* eine staffer lang iff.

ORIENTAL CLIMA, jened be^ nörblicften Slflew, **Sibiriens**, ber Xartarct) sum X&ciU, ©i;rten^ K»

**OriGOMA Neder f Propagoy unb Scyphus**  
iUt.MAHCHANTfA.

ORJHOTROPUS, eim geraber (Embryo\*/ bee etnerlep SWc&tung mitt bem ©amenforne bat: Ktcf\*

**Os, Faux unb Stoma unb Pen'st omium.**

**OSCILLATORIUS , f, Versatilis. Oscillatoria** etn @atfung bon Sonfcrt>en.

**OSMAZOMA Dauqu. / éta Principium immedio.-turn IV.** glaffe in ben SPflanjen.

**OSSEUS, b e t n ^ a r t / fnodjenarti^, tv'wbteSiaut,** Die manege Sáchet innetoenbiQ-au\$tkibtt; bit Nux an JUGLANS; **bdi Pntamen** an OLEA unb BUNIAS ; **bit Testa an mebrern 3amen.**

**OSSICULUM Journef\*** (• *Drupa*.

**OsTioLuvr,** bep Perfoon ber ©cfelumb bed ^erfbiumt an ben ©pbäctett.

**OVA, OVULA, \*fyerd)en, bit** jungen ©amen t)br ibrer SSefrucfttunfl,

**OVALE/OZIUM iff 6et>Ctniophil.bot.ed. Wiild.** fOttottpm mitt eHiptifcf), b. ft. (anger alg breit # unb ait 6e9ben Snben t>erf4malert» Eben fo if! ed (rep O)ill\* benono (ber ed *itbod*) an ber ©ptge aRetn gugerunbet few (åge) unb Dccanbollc. 95eo <ayne tfl o^a/c *Folium, ot>al,* bem eOiptifcben nabe fommenb/abec *babuvd) mffiiebin,* bag bie Safid unb *Die* <spige nicht ton Sogen/ fonbern t?on SBinrelu begranjt n)erbenf · bie bur\* bad Sufammenlaufen ber beoben **Seitenräns** 6er entfeben, *tön an LONICERA Pcriclymenum.* **Ben** K^Itng tft ed CDformig, unb an beoben (Enberleig)\* f&rmig gugerunbet/ tt>te an URTICA ureas, unb bteje; ntge *Silicula ifl bet)* ibm *ovalis^* unb btejenige 3(e\$re opa/i5 *Spica,* beren Umrig etnObat bilbet. *Oval is, oval, ifi bet)* Bern{?arbt/ toenn beo etner langen Slácfje ber 93orber; unb \$interranb flleicfje Aretdabfc^nitte btlben.

**OVALI- ELLIPTICUM, U n g l i d ,** an beoben Snbett zuggerundet.

OVABIUM £ubtmig, iDecanb, ||nb 3uff. f. Germeni Metr a 23ernt>. *Ovarium foecundaturn iff fUnnf\** *Pericarpium.*

O VATO -LANCEOLATUM , t \$ t U tit)'A CIU \$ tt ttM f 6 r m· i g / m\*b\* lanjettenformtg ate eprunb; an Dec ©afitf cprunb, roie an CLFMA™ iritegrifolia , bai fdlatt / unb Die Slebr^en an POA sudetica.

GVATO-QBLONGUM, e y tu ti b A a ii Q I i d>, mcfyt längli\* alt eDrunb; an bee \$afW eprunb / Me Die SHätter an LATHYRUS odoratus; bie fdeeven an bee Sraube.

OVATO- suButATUM, e yf6vni Qtprtemetu ftrmig, tme bie ^apfel einiflec davicet bep XVafr lenberg.

**Form** OVATUS, e yf^rmfff/ iff tortjenWe, tt>a« bie Ober giour. be« Sur\*fc&nitteg einrf dpet hat. **Bew** iDecanboOe t! ei eiltptiT^/ i^o\* ff<sup>b</sup>, sons 6er grogte D.ucrburcftme(rer ni\*e in ber 3D?tt Wahs bcrn unter ber SRitte lieflt. £^ fd;Heg(/ tme ovatli lenberg bemerft, immer ben SBfflrijf t>on ovatum e|n. &inn& befiniert in phil. Lot. eiii Folium ovalum altbailtnlgt, ba& lander ali breit ifl/ unb an ber Saftf cinen Jlrci^au^fc&nttt bilbet, ber groger iff alt jener an ber ©pige/ tvie an PHYTQLACCA decandra, an ORIGANUM vulgdre. JRadt ®c0poli fott jt\* an einem epformigen »Iarte bie iange jur ^reite oerbalten n>ie 1: h i nad> Barfcb = fe: f<sub>4</sub>. ©en JBegriff t>on ovatum evtiavt auch <?>ayne burc^ o^a/a Frons, langlid) unb mtt einem grogeren \$>ot gen an ber 33afi\$ aW an ber ©pige/ bie bur\* eiit aUmaf)Hse6 Sufammenfaufen ber ©eifenranber . gebilbct tvirb/ we an OPHJOGLOSSUM vulgatum. SGBr ^abett ferner ein ovalum Amentum an SALIX .Caprea unb cinerea; eine ovata Brae tea an LAVANDULA Spica; Cinen oealus Calyx an A^HILLEA; ein ovatum Cap itulum an TKIFOLIUM alpesre; tine ovat a Capsula an GAREX arenaria; einfn ova/u£ Fol\*

*licuVus an AsfLEPIAS; tin ovatum Legumen an MELILOTUS, CICER; eine ovata Radix an ORCHIS morio; tin ovatum Receptaculum an FRAGARIA; ettl ovatum Pericarpium an DATURA-Stramonium; tintn ovatu's Pileus, 10Cm tt frf) nic&t· auSbreitet/ fontxrн eine fafl epförmige @efia(t ontuummtvie an PHALLUSimpudicus; tint ovata SHi-o ula an CAJVIELINA sativu; tint ov&ta Spica an PHALARIS canariensis; tin ovatum unb lUQltld) acuminatum Sp\*ermatocystidium an SPHAGNUM; eine ovata Spicula an BRIZA media, BROMUS mollis; em Stigma ovatum an GENIPA; ein ovatus Strobilus an PIN us sylvestris.*

OVOIDEUS, e ^ f ö r m t g , em ^ ö rper/ belfen SaRgenOurdfyfcfrmitt eine epförmige Slac&e bilbet. @o ftnb fct>r oiele @amen.

OVULUM, bag SRubimnt bti @amcn^».

OVUM, ber @ame.

OXALICUM ACIDUM , @<tuerFIEeflur e.

## P.

PAGINA, tie ob'ere obec unfere **Fläche des Blattes** welche burc& ben Slu^bntcC *superior* ober *inferior* fcefltmmt bejeic^net n>irb. Zene fitty, auger bcp bem gebrebten S5lattc\_r gen i^immel, biefe gegen bie Erbe. £)ie OberfTaç^e' Don aaen. fTac^en tforpern. %>ernt>avbi übetftyd t\$ burc^ @eiten; bet) f&m if! ctnmaf) bie Unterseite *Pagina inferior* bUjenige / auf foelc&er eine glaçfje ruftf; bann bicjenige 6cite/ n>e(c^e / twnn bie %iäd)t fd)tittktd)t fltbt, nacft augcn, menn fte fragt\* red)t fle(t, iiacf) uneen/ unb tuenn fte fcnfrec^t stcht, nad) innen fiebt. *Pagina dextra* ifl bey Bernhardi bcejenige @cttc, bie, roenn bee Unterranb nad) nni 6tUf)ttift, xtd)ti liegt; bee anbeu tñi bie Unfe @cue-

PALACEUS, tt>enn Irgenb *tln.Xbtll nifit in ber 9D?i<e / fonberñ trgenbmo am EKanbi geffhgt rocrb; fa iff Cn *palaceum Folium*, ra nb ft i e<sup>l</sup>tg*, tt>eim free gsiattfliel an bem Sianbe beffelben eingeffigt iff/n>ie an ber ginbe, (Eicste 2c).

PALARIS, fagt man t>on ber SBurjel/ n>enn ftc in etner g?id)tung mlt Dem @tammc foctlauft/ Pf<!{?[: **wurzel ist.**

**P A L A T I N U S**, tvaiS am @aumen @efc^macE **herborz**

PALATUM, ifl ein J&6cfec/ **Dec fm <\$d)lunbt bet** unregclma^fcjm S5(umenfrone fttertwrragf., &mné phil. hot. ed. Willd.; in *Qprengel'e* Sluggabe abec b< 6ert>orragenbe S^eU einer, ma^fierfen Slum\*. @ep tPi&benotr cflber (B a u / n e n Die t>idif ^ert>orfte5cnt>e SBölbung ber Unterlppe, n>elc>e ben @c^lunb bee ma& fiechten 53(ftme fc^liegt 35ei> iDecanboUe ifl er bi< Uuterlippe einer rac^enformigen 951ume: S^cp *anbmn natüvlid)Ct* (benn mie femmt ber (Suwmen an Die Un^ terlippe.) ^er binterrober untere S^eil an ber ofcerep 2Banb etner magferten S3(ume/ ber meifien^ jottg / **runzlig ist.**

**P A L E A**, *Opteu blSttdfCttf* eine 2rt mehr ober minber fcautiger, fteifer, trocfener (Sdjuppen obec SDecfbflattcfcen, bie man jiwfc&en *ben \$ufaflimengefeßten SHumeti attev 21 r(, jun>cilen auf bem grücfittboden fin;* bet/ tote an ber 3Beberfarte, *an ber <gonnenb(ume. 21u^ bie fc^uppenarttgcn Sblatttyn am @trunfc eintger §arrnfrau(er ftrib ?)alea\** *Pal em nenrtt Palifot 2>eauvoi0 bie @peljen, bie/ meifien^ jmei)* an bee 3a^( / **Das Slragu lam bilben.** *C. Involucrum* **Unb Valvula.**

**P A L E A C E O - A R I S T A T U S** *pappus*, mifeinemgran; nenffirmigen @pteublattdjen/ an CATANANCHE.

**P A L E A C E O - C A P I L L A R I S** *pappus*, ber ein **haarförmiges** @preublattcf^en bxibtt, nit an **R O S E N I A**.

PALEACEO - FOLIACEUS *pappus*, *bit tin blattU attiQei&vveublattdfytn bilbet, toie an STYJLONKERUS* & «

PALEACEO-SETOSUS *papp us, tet tin borjiew axtiQrt* ©preublattfcen bilbct, nte an XERANTHEMUM,

PALEACEUS, f p r e m ' g, mit ©preu&lattc&en be\* fegt, ober aug ©preublattc&en bejW>ent, obec cinem fold>en 23latfc^cn abnltcf); fo if{ em *Caudex obct Stipes paleaceus*, *bit mit toitUn jartett/ flcinctt fpceuartigetr @d)uppen bebecft ifi/ an POLYPODIUM vulgare; tint Glum a pahacea an SCIIIOENUS unb CYPERUS; tin Pappus paleaceus, totnn fUint fd)uppenartige Slatfc^en (fiatt be^ flewo&bnltc^en S^ brcrf)ca^) um-bie ©pige be^ ©amend (fc^en# rote an BIDENS, TACETES. 9D?an ja^It gwo^nllic^ biefe Q3Eatt^ d)m, umb 6efd}rci6t igce 8^ur genau; eine paleacta Radix, toie bet Caudex obetr Stipes an fiavtm frautern; \*Rec epta culum paleaceurn^ totnn &pvtlblattd)tn auf bent \$rud)tboi>en fttf)tn, tvit an H ELI ANTII us, A NTH EM is. Paleacea Semina, linienförmig (anglicft/ jufammenflebrüfce / ctmg fieif, tinb tnnwenbig ganj au^gefudt/ mie an RHODODENDRON. Paleaceus FI os bet) Kftj? iff fononpm mit F/05 masculusj obtt abortiens.*

PALEOLA Ktc^arb f. *Glumelljila*.

PALLIDE FLAVENS, febc 6la§8d6/ MS SBeigc ziehend, Wie SCA^IOSA ochrolcuba.

PALLIDUS , bleicfr/ f. Achroos; hbetbanpt heller ali Qmbbnlid).

PALMAE, Pa I men, eiqe natürlic^e Samilic bey S^inni, unb Orbnung 6ep 3uffieu.

PALMAMS, quer ^anb^oc^, t. & = 3 Zoll ungefähr.

PAJLMATIFIDUS, fo&nbsfd r m i g; gefpalten.

— — LOBATUS y—— gelapp t. } Decand.

— — FARTITUS; — — getheilt. }

— — SKQTVS, — — Qt{<synit..}

PALMATUS, *lanbfdtmig*; j. 3% *Aculeus*  
**tmb** *S p in a Italmata an BERBERIS vulgaris unb*  
*CENTAURCA smchifoliay too* Diefc SBaffen big aw We  
 Sriftf fo gct&eilt ffnD/ 0a§ ffe aud raereren \$u beftet&en  
 fefyeinen. *Palmatum Folium*, fo nennt JSI'mne' eçu  
*Blatt*, bad ber *iān\$e nad*) in me^rere bci;tt^e gltictt  
*Theile bif jur Safitf fjin* (jet^eilt ifl/ *DaiVibl aber zus*  
*sammenhangt*, mie an Dem befannfen RHEUM *palmatum*. tDHIbenotp unb <^>a^ne erflären aid *palmatum* *Folium*, &anbfdrmigr, etn **rundliches**,  
 tmrtf) 2Iu^fd)nifU/ bie über Die Witte unb fafi btd juc  
 95afW recw-ften/ in 5/ 7/ 9 £6^e jecfd&nie^ncS ^3ratt ^  
 beffen S^eile ab(lc&en/ unb fid> n>ie bie gingec einec  
 •Oanb audbreitcn/ *tolt* an SIDA *napceafolia*, RICINUS *communis*. Sep S)ecanOoHe ^ftnb *Folia palmata*, ^anDformige Slatfer', .beren 35lättd)Ctt alle  
 an ber @t>i6e bed 5emfinfd)aftlfc^en Slattftfeled eins  
 gefügt ftnD, unb sugfetcfy |lc^ in einer unb berfetben <fbt||t  
 btflnbcn, n>ic bie Singer *an bet £anb*; j. 35- an HE-DERA *quinqefolia*. Wad) 2)ecanbolle i(l nur eitt  
*zusammengegtes* 95(att bctnbforinid. Sco Berntarbff  
 ff{ irgcnb eine 3 ^ \* ^ *palmaia*, roenn ber 2Sorfprung  
 wutf bie 9ud)t So^en bilben. 95eo iDecanboUe ftnb.  
*paimaii Nervi*, ^anbformige SKtppen, biejemgenf  
 n>enn aud ber \$af!d bei flatted me)rere audeinanbec  
 faftrenbe ^)auptrippen cnefie&cn / melc^e rote bie Singer an  
 einer ge&ffneten *fyanb* geffeKe *fwb*, j. 95. an bent SBein\*  
 tlatte, <fine *palmata Radix* ifl an ORCHIS 5a/7i~  
*hucina* unb *maculaia*, menn 2/ felteuer 3 (anglic^e  
 ftacbgebrücfte ^noOen an ber 6pt@e banbförmig **getheilt**  
 (inb/ unb oben jufammcnbängen.

PALMIFORMIS f. *Rup Liner vis.*

PALMINERIA FOLIA, *Siatrer mit handförmigen Slippen\**

PALMUS, bie ffac&e ^ anb, = 3 3oO/ über die  
 SBcete ber 4 Singer ber £anb.

PALUDES, B u m p f e , mit ©c&lamme angefü&t unb mit ffe&enbem SBaffer, bad tm (Stopimer auStrocfc net/ tm aBiptcr 6i^ auf ben ©runb auifriert.

PALUDOSAE wit) PAJ.USTRES, @umpfpfltn; \$en, tie in efimpfen, Sftoräften *toaffim*; }• S3; CARICES, SCIRPI, JUNCI.

PALUSTAE AQUARIUM, *Qumpf*, in botany fefcen ©ärten, einc mit ©d)lamm unb SBaffer ange^ füffte ©tube, Me aufy im ©ommer nic^t sans aug; troefnet.

PANDURAEFORME FOLIUM, geigenf6rmt<j, i(l nad) £inn^ eitt *iang|id)t*& unten brettereg, an Den ©ettCtt Detfctimalecte^ Slatt/ tote an EUPHORBIA c/a-thophora, CONVOLVULUS pemduratus. Sfad) &&ynt tin landlübti, in bet. ®Mtt . an beppen . @eiten mit einem bo^enfocmten 2ludfc^ntte ober mit einer 95ud)t Derfe^ne^ Slatt/ nte an EUPHORBIA cyalhophora. **Rad** BuUtarb ifl

PANDURATUS, (fobtel ali *panduraformis*) lan&lid), mit einem fefr breiten unb feljr tiefen Aus- fdjmitte ju jeber @ute; 3?ac^ Beru^arbt aUe^/ was in bee SJfitte fc^mal, am @runbe unb an bet Spise ertveitert ifl.

PANICEAE 7 eine Samilie ten ©rafern bep ben 9Iftten.

PANICULA, K ^ p c , if{ be# £inn^ eine auf t>^fcf)iebcn untergettetlt 93(umen(ii[e serfhreute Sruct^ fification. Slnbere beclaugeu lange etumenfleie an ent; fernt fle^enben SBlumen jur SKidpe. Sep tX>iUberiotD eniftttjt bit SXtdpe aui einer SJJenge einfac^er Stamen; fftele, bte auf meftc ober minber jert^eilten Sleflett stehen, fo bag bad ©anje eine länglidje Sigur erftält. Ben Höming, toenn eine9}?enge S(tirf)en auf ungleic^ zertheilten, meiftend itemli^ toeitlauftigen unb jiemltcf) (angen biegfamen 9Ieftten an einem langen ^auptfleie fte^t/ tote SYRINGA, 95et) SDecanbolle ifl Panicula, Ki'spe, wenn bie Slumen eine jufammenfcl^ fegte ftraube bilbm, bie unteren SSlumen aber (ånger

*Stfikl, t fdr aftfo/ unb auggebreitet fmb. fcournefort nannte afletf aflben @rafern SXWpe, n>aſ nic&e Sle&re tft. Panicula, Kispe, nennt palffot Beauoote jcne 3nfloreScen\$ / in n>el#er an b#epi(j.e DeS Jpal\* mcS DjeSIcffcbaibcjuriformira, unb flleic&fam in @tocfr fucrfen ūbercinanbcr 9e(lcHt fiiiD/ jeber 3l(1 abet? em S)?a&l obec mebrere SRabfe fl^fbeilt iff, j. 95. ait AVENA satfra. S5eo Bern^arbi enblt\* entffe&t eine SUUp'e, n>enn mcfrere unglei\* lang seffielte Q?lutbeu an ber (Setfc ēned Aemeinfc^aftnc^en S3(umen(Ite(ed fo befligt ftnb/ bag fie in feiner Sbene jufammea fommen.*

*PANICULATUS, vispenartig, riepenabnt lid) ober riepentragenj). Panicnlatus Caii\* I is, ber an ber @pige ft\* in tie(c SJcffe tfailt, tveld)t tt)teber tiele 9le(!c^en bilben/bie abcr feine flätter mtfo fonbern blo§'95lumen tragen/ tt>ie an RUMEX Acetoselta. Panieulati Floras, gSlumen, bie in SRWpe? fte^en. Paiucu/aif flami, Seffe/ bie (icfe toieber tit lame 3n>eifle jert&eilen / bie an ber @pige tuieber ge^ treiit finb / wnb fowobl SSIumen aW »ldrter tragen/ tX>t^in NICOTIANA, GYP&OPHIJ-A, CENTAUHKA paniculala. Paniculatus Spadix, Don ber @eflalt einet SRISpe Paiiculaia Spica, bfttti aU ftno\* npm für jufammenseſt unb ttrieber jufammengefcmc fDie an URTICA tfi'oica, SPIRAEA aruncus. Panicu/a/us Thrysus, wenn ft\* bU befonberen Blus menfficle in 2lef?e jertfeeilen / n>ie an LIGUST^UM vul Mrc, LYSIMACHIA thrysiflora. faniculata Gras mina, cine Samilie ber @rafer bep benSIUen-.*

*PAPIX-IONACEA coftOLLA? @d ? m ^ r terlings; »I u m e , iftbep ſinne eine Dterblattrifle unreflefraa^ge 95lumenfronC/berenuntereS SBlumenblatt nadbenfcvmca^ fceren obere^ auflWgenb iff, unb.beren @eitenblaſter dnjettt ftefcen. &ai untere 95lumeHblart id to\* 04>iffaen {Carina) toMti bie @taubgefage au unb 6taub»efl\* ttifolnntf unb einf&licfr, unb totltit\* au unb W\* ffl*

nen 95lumenbMtto%<sup>n</sup> *Ufttbt; bit jtoet*), an *btn* ©effen bed ©cbiffdjeng jlestenben SBlumenbläfllr ftnb bie flu\* gel (JZcr); unkbatf obere, geroöbnlid) bag grögte, SMumenblcrt t, btP^Fabnc (*Vexillum*) liegtatif ben Sliifldn tint) bem ©cfriffcfcen. "DecanboOe bctvad)tct *bit* Ec&mettcrlinflgblume alg aug 5 SBlumenblättern bcftcbcnb, inbem et bag €^iffcf)en *ali* aug 2 Q5fatt^ cfecn iufammcnjKfcgt fide t>or|lc(lt / n>ag c\$ and) in eintgcn nocnificru fallen tfr» 3nbe|Ktt fhaben ruir bod} auchy ootlfom^ men etublättrige @cbmetrter(inggblumen, *toit* an TAI-FOLIUM 2C. 25httiavb fprid)t Don *Lame I Us papiliaceisy* o)nc ftē ju erflafen / unb toic tviffm ncd)t/ tvad ec baruufer oec(te)t« *Papilionacea*, tint natürliche ^anilte-1et) £mne. (fran; unterfesjeb *Vapilionacew* c annex a nut Dewac&fenen/ unb soluta rait fret>en ©tanbgefäßien.

**PAPILIA**, etn fleiner, langgeflrecfster/ metc^cr / etwas fricftter ^)6tfcc, ber bie £)6erfl(acfté fterCcOtebenec £)rganc bebecft. 21n ben TELAEPHORIS fd)(ie§t er bie ©amen ein. *Papilla fungorum* finb ein totw&ti ippmenium/ flctnc runbe &f>abcnbtiUn an ber iffiter\* ffad>c ber i?üte ber \$il\$e> bte Scfruc^tun^^tbcil^en^ halten. Se9@copol!(tnbfopff5rmi0e/?aare *Pap illot.*

#### PAPILLARIS f. *Papillosus*.

#### PAPILLIFORME f. *Mammillatum*.

**PAPILLOSUS**, wařjig, mit Hecken ff eischligen **Warzen** an ber Oberflacfy. Ftp Bern^arb's **Chagris** nievt, tvenn bit dvWmsen, totld>t bit **Unebenheiten** ^ilben, fileid; bitf finb. 55cp Batfd^ if? ti fpnonpm mit fcr rucoius. *Papillosum Folium* ifi nac& **Linné** ein \$latt/ bag mit blaftgen ^)uncten bebecft iff\* Bei) @prengel rhit fleinen • SBar^cn. tPiÖbenotP fui>rt ALOI: *margaritifera* unb GYMNSTOMUM *Hedwigia* alſ SScofpiele an/ unb bep ti»m ifl au\* *Radix papillosa* tint fa(fd>e SBurjcl, bie aug roar\* jeuf5rmigen flefuen tynncun be|lcft, toobutd) bag @e; wächs auf ijclj ober etein feſſlt^t/ toie **van** ^armelien.

€lt %>ttfpid tinti *Folium papillosum* «u beet \$9?oofen, too *bai* SMbemeg ju fciucn ©rufscufofnc&en auffeetrieben iff/iff an HYPNUSI *ubietimim*. · *Papillus Pileus*, auf ber umfcren @a|^tmt Hduen run; *bin* <fr&abensteit\*n befcgt, tice an W 3{Sarjenfel)ft>am# men. *Papillosa Semtnia*^ mit biegfamen Scfjuppen ober ffeifctigen "(Sr)65um]cn n?ie an CIMICTFUGA, ERYNGIUM, GODON. Sin mcf)rcren ^*(Tanjca iff nud* ein *Stigma papillosum*, mit IWC&Ch 8leff(tlvac^ gen be^fet

PAPPIFORMIS *Lana*, JjaarC/ bU ben ©amen umgeben / loie a» ERIOPHORUM.

PAn»osus, mit einem \$appu^/ ober mit cittern *Desma* ©afe&er\* *Papposum Achenium*, tvenit ber obere £f)eil beffelben jic^ in eine fyaut obec in ^aare twWngert/ bie man-Pappu\* nennt. *Papposa Sennin a*, ©amen bie in ein £)edma, in %£ollc cin\$tt)ültt finb, n?ie an ASCLEPIAS. *Papposce*, fianuitcn bey tfloirtfon unb Sn^ut/ meiflen^ @9ideneftffen.

'PAPPUS, *untiQCntiid*) £>aartrone, febevt <5)tn, *Qamentvone* genannt/ bem man' fetnett 3?TOen *Pappus* (afsen foftte / iff nad) fLinnd'n tin feilartige6 ober ftaariged ^rohcJ)e» / mit melcbem bee Same fliegt (Er beffe^t aber auc^ au^ Sorffen, Qtte d)tln, &d)l}pptn, ffeb\* auf bem \$vnd)ttnottn, umgibt jebe£ 35lümcm^en, bem er alt JMdr bient/ unb iff meiffend einfad), felten boppeft ober breofac^\* SSaör; fc&einlic^ iff eg ein unenttticfelter *Seld*).

PAPULA, \*&|&ed)tn, *tin* runber, tvei\*er unb innenmenbfd n>a(ferifler £6der, ber burc^ ein 91ufrei^ ben ber Ober^aut gebilbet *toitb*. (Buettm̄b nannte bieg *Glandula utricularis*. 3ffan ffnbet fie am €i ^ fraute. @ic f6nnett/ nac^ Bern^arbi/ a6er and) (eec fepn/ unb me^rere ^otanifer nenuen *Papula tint*. 2Barje, bie Heinere SBdrjc^en auf Itct 6^

PAPULOSUM, blatttrig, iff iff bep 0prcngel unb tPUbenow das, was Linné *papillosum*

nannfe / mlt 35fadfoen befe&e / trie an **MESEMBRYAN-**  
**tfIEMUM hispidum.**

PARA, neben; \$• SB\* *Parapetatum*, Mes-  
benblumenblatt,

PARABOLICO^ORDATUS, parabolifdj & er 3s  
ffir mitg.

PARABOLICUM *Folium*, em' p a r d b o 11 f4> es  
Sfaft, eft ttact £inne etn 35late.,bad (anger ft als  
brett/ uttb Da^ ton ber SSaftd nacf) ber ©ptee hin  
in fin f>Q[bci]form^e^ Slatt fid) bcrf\*maicrt/ ty'e das  
t&latt an MARAUBIUM *Pseudodictamnus*. 55 C^  
^>^ne^v'nift cf eprunbi in ber 3Ritte etroa^ jufammen^  
gcjoAett/ fo bag bie 5?odcnlinie/ bie ed an jebet  
(Seite be^ranje/ aug 5 35ogcn jufammengcfe^t ill/ t>oti  
benen (id) bie an ber Saffc unO an ber @ptge nac^  
augen/ ber in ber 3Ritte aber nad) innen fefyrt/ wie  
an EUCALYPTUS *longifolia* bit unteren Slatter. ?a-  
rabolicus, iff bei) B^nb atbt/ ' n>o ber ^intercanb  
eincit Sogen mad)t\*

PARACARPIUM, nennt £mH dtten unentwicfeUen  
grud)tfnoten/ ober fcattjcnje Organ/ b ^ / 6eo ~~loß~~  
tnanndc^en ?lumen, bie fid) ntd)t geftörig entwiceln  
fonnten/ bte ©tede bed Sructtfnotend ju vertragen  
fc^eint 3?ad) Bern^arbi' foil ed fononom fet>n ntit  
femem *Parametrium*; bet) i>m pnb *Paracar\**  
*pi a*, t^ebenfruc^ttbeile / SfKilc, bie ftcb an ben  
grüferen bier unD ba beftnben/ unb meber *Pericarpia*  
ttod) *Epicarpia*, nod) • *Hypocarpia* ftnb\* Sa^in  
fieboren: *Pterygium*, *Desma*, *Cauda*> *Stro*\*  
*phiola*^ *Catenula*.

PARACOROLLA Jti'int f. *Cotona*\*

PARAGOMIA, ^ e b e n b l ü t b e n t b e f l c , ailed  
ba\$enige, mad ntd)t *Perigonium* if!, na\$bm(icj): bie  
'Parandria unb *Ptragynia*^ *Paranecta*\*  
*tia*. *Corona*, *Barba*, *Arista*, *Pedicellu*

PARACYKIA, ftebenfttempel/ S&eife, tx>elste  
bad Shftben unb ben @tanb ber ©eempel babtn, abet  
feeber ©amen nod} giarbenfeuchtgefett besitzen.

PARALLELOPIPEDA THECA, turn *bet \$orm tint8*  
**Parattelopipebetf**, beffén 3M<#en jebocfc flejå&Utoeben.

PARALLELS, gleich *clauenb*, fagt man >ott  
 Organest/ bie einerlei) Sftcfcfuna bgfcgn/ unb iiber&aupt  
 ton Sinfen / bie immet in glefc^et Sntfernung >ott  
 einanbtt bkiben. tyavalkle ©tfytibttoanbe parallela  
 Valvis dissepimenta, tcn gltcfyer Sreite mit Dec  
 8t6§ten Sreife bee Sruc^t/ tt)ie an LUNARIA, GHEI\*  
 RANTHus. ©. *Dissepiment nm.*

### PARAMETRUM *Lebenfruchtkenoten.*

**PARANDRIA**, *Lebenstaubgefäge*, Theile,  
 ftelcste 6a^ Sinfesten unb ben &tanb bet ©taubgefiae  
 6aben# aber fein \$oOcn entftalten.

**PARANECTARIA**, *Lebenhoniggefäge*, Theile  
 welche bai 3lnfesten unb ben 6tanb bee £on<3gefaf;e,  
 ober feinen ^onigfaft ftaben\*

PARAPETALOSTEMONES , eine Slafie **bet** Ui^rtç^/  
 Me bcejeriigen INTanjm 6^reift, beren 6taub^cfaße  
 auf bem 92eftartum eindefugt finb, benn

PARAPETALUM *ifi bc\j W\6nd) atlti batfjenigfc*  
*m\j t otter minbec ecnem \$(umenb(atte aftnlic^e an ecnec*  
*Brume, toai totbtt fitl<b noc^ Sdimenfrone iff, unb*  
*der Ges^Iec^t^eUe umf)uUt: bAi Nectarilyma,*  
*Paraneclarium, CoroWaria, ft)a£ fi.mn *  
 tfeftartum nannte, 06 ed gleic^ feinen ^onig abfon^  
 bert. Siefe 2fjei(e fd^einen me^r ober minber unenfc  
 toidltt ©taubgefafe\* .

PARAPHYSIPHORA *Calyptra*, tVMit bie SSuge  
 mit ©aftaben / *toit mit Qaaxtn befefct i{.* ©ononpm  
**Itiit subpiosa.**

PARAPHYSIS nennt tPiUbenotr bie FiZa sue-  
 culenta bef&ebn>ig, bi  feinen seglceberfen faftt\*  
 sen Saben {tvifc^en ben manjttcfren ®t{d)Ud)titf>tiltn,  
 ju beren Slu^bilbung unb Sorberung ber 35efrudf)fun8  
 fie ju btenen ftyintn. Sin ben toeiblichen Slut^cn finb  
 (le gro^tent&eiW ftaarformig, unb bilben/ mie ait  
 POLY- unb ORTHOTRXGHUM etne **Sift** ton **Haarsift**

auf *btm htdil* ber ~~SSucbfe~~. *Paraphyses an btn fy|ltn* nennt Bern&arbt 'faferige SE&eity, tt>eld)c' fid>jtoifcfthen ben SBrutb&efraltern befinben *Paraphyses Hint \*jnb Paranitria BerrtJ^*

PARASITICUS, ~~C~~(fc marotjer, n>aſ trgenb etnent anberen bie Slabrungr entziebt. *Parasiticus Caulis*, bee auf einer anberen tyffanje, nid)t in bet (Erbe tin; genourjelt If!, n>te EPIDENDRON, VISCBM. *Parasili-cu\$ pedunculusy tin* Slumeniliel/ ber auf bent mittleren 9?ert?en beti.SMatteg figt, tote an B^c us *Hypoglosum*. gj?an &at/ aber fe^r metap&orifd) # *parastiicum Solum*, einen ~~C~~cfrmarogetboden / ber aug noct) un&cnvetiten ^ffanjent^ilen befle^t/ J. 33 Me ~~C~~tämme, 9le|le, flätter ^SEBurjeln/ auf wefeten 3i)ina^ ror^erplansen ftgen. *Parasitica*, @c^maroQcr; Pflanjen, . bte auf anberen (ebenbigett ober tobten \$flan\$en n>ad)fen\* S>iegentgen/ bie auf lebenbigm 5)flanjen n>ad)fen, unb tbre SRafrunA unmittelbar aug bem ~~C~~afte berfelbcn jiefjen, n>ie j. S&\* VISCU, CUS-CUTA, 'ftnb ' etgcnrnid^c @d>maroQer (*Parasitic vera*); btejéngen bingesen/ bie auf lebenben V'f}jt |en macfjen^ unb nic^e atxi bem 3nneren berfelben/ fonbern nur turn ber äugeran ber dberflacfre beftifb^ icben geud>tigfeit ftd;%af>ren / n>ie J. 23- bie Stanide, "nb oberflacbli^e ~~C~~ct>marbQCr Pflan^en (*Parasit ica superjiciales*). SBeun elne Sd)maraſer; ^Pflan^e fid> in bent 3nneren ^fneC (ebenben ^ptanje entmidclt, unb don bem 6afte berfelben naf>rt, unb nur bann augeri an berfelben ^rfefjeinen tann, naci)bem fie bte Oberbaut biefer \$flan{e burd)bo^rt bat/ tote t>a\$ AECIDII4M, fo i|l ed eine innere ~~S~~chmarozers-pflan^C (*Parasitica interna*). SBen s̄ich bie <54>marober;<pflan\$e im bem ^nneren einer anbe\* ren 53fTait\$e jut 3eit beg 9(bflerben6, ober nacl) bent Sobe berfelben entmłcfelt/ unb bte £)berbaut biefer iobten ^Jflanje burcfrbobrt/ toie j. 9. bie NEMASVORAE, bie XYLOMA, fo iji fie eine innere 2 ~~tef~~;@ ^mas

**rotzer Pflanze** (*Pseudo-parasitica interna*). SBenn enbltcfc ©cftmarofcer \*\$Pflanzen nur auf tobten ^ffanjen ober £&eilen berfelben *Ubtn*, unb nic^e unter bie Spibermitf einbringen/ g>je {, 2>. ber AGA-**nic»s quercinusy** fo finb bie^äupere 2(fterfd>maro\*  
**ger** (*Pseudo parasitic a externe*)

PARASTADES £ m £ , unfruc^tbare ©taubfâben, bfe aus Atebreren SKeiben Don 3etlen befte^en/ n>elbe **zvis** fden ben Shimenblättern unb ©taubgefâßen gelegen fint) A S3. an PAS si FLORA, SFAAMANNIA.

WRASTAMINA nennt *tint* unentfttcfelte **Staubfâ**fâge, obec 2&ei(e Die ben ©taubgefâgen dt>nidß fint), abet nid)t Die gunctipnen becfelbcn ttrtrtten.

PAnASTYi.1 nennt £inF getvjITe unentmicflte ©fau6^ tvege, b e eciijten ©taubtwgen af)nlic^ fmb, aber ntcfit bie Sunctfonen berfelben leiflen. Bern^arbí nennt e« *Parastylum*.

PARENCHYMA, ^Ieifcfe, nennt man jeben teigi artfgen Sbeil an ben iPflangeti/ ber ani meic^em 3eH^ gemebe beflebt/ fete in ben Slättern unb *fivefyten*, im 0e^enfage Don Siemn; tn^befonbere ba^ Taftige SeUemebe bee Srücfte. 3In ben *filcdoun* bie gleicbar; tifie/ -fafi gaDertartige SRaffe ber toabren *fitwbtbfydttx*, worin bie §ru\$tforner <Ai Heine nacfte \$6rpee torfommen. *Parenchyma* (Bctr. f. *Stratum cellulosum*).

PARIA, p a a r e / je 2 unb 2 neben einanber fieftene Orgaue\* Wan ja^lt bann nur biefc Vaare.

PARIETALIS, an ber inneren 9Banb einer gew ^n; tab einf cfteriflen. §rudl)t (lej>enb, j. S. *parietalia Dissepimenta*, bit Don ber 2Jcfse fid). trennen, unb mit ben reifen §rud)tflassen iufammen&anflen, toie an ber  ulpe. *Parietalia Loculamenta*^ bie Don ber grucfytaebfe entfernt flefren, unb ftd) b(og an ben S anben beftnen. *Parietale Receptaculum* tin e;centaf\$erSrucfytboben/ tvenn bie ©amen inbre^ oder mebrere Sie&en ober auch ^Ocntf)alb(n an bm

taneren 2B<Snben *btt gruc&t befeftigt fmb*, *Kit an KESEDA, BUTOMUS; unb ben £)vd)btn.*

PABIKTBS, *tO&nbe*, aW ©tanborf ber tyflanjen im ©egenfage t>0% SRauern; aufy bte áugere obet tnnere glac&e an einem fyofrlen unb gem6(btcn jt&rper.

PARI-PINNATUM *folium*, gepaart gefte\* bert/ n>em efn gefieberetd 23(at( jmei) 93(áttc^en an bet 3piše ^at/ tt)(e an CASSIA Marylandica. ©9; non)mtt abrnpte pinnatum.

PARS CARNOSA f. *Parenchyma*.

PARTES STMILARES (5rCro f\* *Organa eiemcnaria Qeneb.*

PARTIALIS, *bai* Befonber e\* im ©eflenfa^e torn ^ Ilgerneinen, (*umversale*) beffen SfleU eff tf{/ unb fietf nur barauf gesogen. 3- 93\* *partialis Calyx*, jeber ein^elne jfeld) cinet }ufammenge5auftett ober jufammen^cfe^ten S3(ume/ tofe an ben ©cabiofen; *partialis Fructus unb partialis Gluma*, bieje^ nige, bie in ber *universalis* eingefyofTen ifi; *par-Hale Involucrum*, twnn eine *fyullt* t>on einec anberen umgeben tolxb, t>ie \*jutcid> me^rece um^ul^ bie \$u^Ue unrer jebem ejelnen £>5(bcben; unter jebem 93tumc^en einer jufammengefete^ten 93(ume) ©pndn^ht tritt *Invo lucellum*; *partialis Pedunculus unb Petiolus*, jeber eingelne auf einem gemein^ fc&aftlic&en S&Jumen^ ober SBIattfiele gefnb(icbe \$lu; tnen? ober SBIattfCteL *Pinna partialis* ifi bep Htnne jebed einfajcf) gefieberfe SSIatt an bem boppele gefieber; ten \$(atte ber ^imofen\* Unb biefe S5ebeueuns iff t9o^( bie ricbtdfie Don *partialis*, ba^ fonft fpnonpm mttr *proprius* t(F\* *Parialis RhaChis f. secundaria*. *Partiale Ueceptaculum*, toenn me&rere auf einem gemeinfchaftltcben Srud]tboben befeftigte 95lumen rrieber auf einem anberen grucf)tboben fieften # fo ifl berjenige/ ftorauf fie ftct ju oberfl befinben, *Jleceptaculum partiale\** *Parialis Situs germinum*, bie berfc^iebene Sntfernung / in .welder bie

§rud)tnofen aerfcbriefcencr 3>lumen Don *tmanbtt abt fte^en*. ***Partialis Urn bell a f. Umbellula.***

PARTIBILTS, t be t1bar, tva&, obne tm̄tflicft Sufammengefēt \$u fefln, jīcb 6cp ooUer SIze fe obnc merfUclje Serrcigung ttennen ldft/ ober fid> enblicfr Don felbfi trennt; *paMbiles Fructus, bit t̄or &et* Stcife t6Ui3 ganj ju fcfn fcfteten/ To bag man ftc für nt̄cftt \$ufammen9efeft fatten foCte, bc\|) t>eUtt Sttifc aber fid) of>ne alie SSerlegund tbeilcm

J^RTITUS, getfreilr, menn Die Sinfcfcnitte **bis** naftewn *bit »aft^;* oter bepnabe *bit an* Die **Mittels** rippe reicben/ obne jctoct) Dtefelbe ju 6\*rui)rcn. **Ran** nennt Dann Diefe Sinfcfmtte^ ungen>6&nlic() *Parti\* itonesi* meijlcns *Lacinia* ober *Lobi*, unb matt Jafflif fie. ®o bat man j. 95. einen *Calyx bi-par~tus* an CERATOCAapus; *tripartitus* an BHO~MEUA **u. f. tt>»** eine *Capsula bipartita an* OFHIORHIZA; eine *Corolla bipartita an* einigett racfrenförmiflen Slumen u. f. to. *Partita Cotyle\* done s, blattai)nlid)c* fott>lēbonen/ Die mebr **oder** ttjniger tief in gki\*e Jbeile getbetit (tnD. 3!)?an jáhlt **Die gtnfdjnitte.** *Partita Dissepimenta, bit an* Der Srucrtacftfe (of, unb bepnabe fcftmebenb (inb, n>tc an AsARtiM. *Parlitum Folium* i(l beQ JLfmie' eim 95(att / bad btf an Die \$aftf getbeilt if!. 5)?an **sable** Diefe £b\*i(c und fo totrD <in f&latt 2\* 5\* 5t 7, t>itls **tbeili9 (bi-tri-quince, multipartiturn)** ftte an EUPATORIUM *cannabinum*, GERANIUM if/s\* *sectum, pratense* K. Sinige Sleuere mottm Den 35c; driff nod!) Daburcb näber bcfliramcn, Daß fte Die Sin; febnitte oW linieriformig ft\* Denfen, und btn Umfan^ **De^ Slatted alt runb.** *Partitum Receptaculum* an MARCHANTIA, t̄om Umfanle bM jum **Mittelpunke** etngefebnitten.

PARTUS VIVUS f. *Vivip.arus.*

PARVUS, fletn. astrD in Denfelben **Beziehungen** toit *minimus* ftebraucht. 3. 83. *Perianthium par-*

vum <sub>m</sub> an LOIACEKA; Parva Cotyledones<sup>^</sup> bit nod) mic&t bte ftalbe ©rSge be\$ 6amen\$ 6.a6en, aber bod) grôger, ate ein SSscrif befelben finb. tarva Semina, jmifcfycn 2''' unb einec ^alben^ itvifcfteit bin ©amen bog SROftncS unb bet Campanula. Parvi Tubf Sfl\itb.<sub>f</sub> f. Elongalus Com" plexus cellulosus.

PASCUA, t P e t b e p II<sup>^</sup> e / ftnb unfruchtbarer, trocfener unb mefr fanbig a(d 2Biefen, £inné. Nies brig\*/ trocfnt/ fottntge unfrucf)tbare ©e^enbem ~~Pa~~ s-cuta, qjflan^ri/ bie nur auf SBeiben n>ad)fen.

PATETLA, k<sup>^</sup>apf/ @ c<sup>^</sup>üffcl<feen; ein flaches ntit etnem @amen(aget bebedui, aug einer ganj eiges nen 6ub(?anj ge6((bete^ Slpot^ecium.

PATELLA FORMIS Emfc r<sup>^</sup> o, aud etnem ft&r tltit nen 2Bur}elfniopf\*cn in eine runbe ffugel ausgedehnt. Patellceformes Glandules, ftapfferufen, flets fc^ige unburd)sicdtide fliellcfe cber gefielte Qvuf tn, bie feinen ©aft augfelltigen/ unb oft fe&r t>crfd)iei)ene Sornten baben. \$tan ftnbet fie an ben Sägezähnen bei: §Beiben / an. HYPERICUM.

PATELLA, teller<t)en, vI & p fch en\*, Ein kreisförmiges, offenes, erhabenes, siçendes Fruchtlager, ntit etnem eigcucn, nitfyt torn Saube berfommenbett Slanbe umgeben (JDecanb.)/ in n>ek^em bie ©amen freo/ nid)t n>te. an bem @\*ufTeld>en (Scut el I a) tn jfcpfeln einleid^toffen (iegen. 3\* 93. an ben £ect\* been <^. Cephalodium.

PATENS, abfle&en b, offcn, toai oftne regek ntägige Orbnung fid> 5ffnet ober auibttiut, pecanb. 9&aS mit bemjenigen/ tvomit a oeAunben ifi, nac^ oben einen Sfimfel Don bepläufig 45° — 50° bilbet\* SBit baben fo Ala patentes an TRIGONELLA; Ant ho\* dium patens, im @egenfage Don clausum unb connivens; tint Arista patens an BROMUS squarrosus, tf)t fit divaricata toitb i einen patens Calyx an SISYMBRIUM, SINAPIS, ARENARIA, too i6n ctttige aW

**flaſch** erftären; eincn *patens Caulis*, beffen Sleſle einen fp̄tigen beorialje rec&ten SBinfel mff *it>m bilben*, too bann eigcuſlich Die *Rami patentes* fiñb/ tote tin VACCIMUM *Myrtillusi* cine *patens Corolla* ait SCILLA; einen *patens Fasciculus an* eintgen 6iltf nen; pa^en5 *Folium* if! bet). £inne ein 95latt, bad einen fp̄fcigen SS̄nfel mit 5em ©tcngel biH>et; 6ep **Hayne**, wenn e^ mit bcm ©tengel nact) obetf ju etnen **W̄tnM** t̄on beoläufig 45° btlDet/ n̄ie on LIGUSTRUM *vulgare*; btt) *VDillbenow* an *ben* gffoofen ein **Blatt**, bai einen recJ?tm SBinfcl mit t̄em ©tengel **bildet**; eine pa/ens *Panicula an ALISMA tlanlago*; tin *patens Pedunculus an ERYSIMUM cheiranthoides*, ftoraug bann *Siliqua patentes* entfieyen; ein *patens Fetatum an IRKJ tin patens Vexillum an TJUGONELLA*.

PATENTI-DIVERGENS, xoai etnen SEBinfel t̄on Ut)f läufi's 70 ©rat)en **bilbet**.

PATENTISSIMUS, fail fyovi\$ontal; patentissima *Panicula*, fp̄nonpm ittit *diffusa*, btttn 95lu; t^In#le nad) oben einen SJtnfel jn>ifd)en 45 — 90\* *bilben / XOXt* an UNIOLA *paniculata*, GYPSOPHILA *poniculata*.

PATERAEFORMIS , fd} 4111\ f 5 r m I g , ft>U tint t ffac&e ©\*ale.

PATRIA, *Vaterlanb, b&S ianb* in feelc&em erne Sp̄fTanjc gemofnttd) tJorfommt. .{Decanbode nennt Dieg *Habitation ba bod) Hinne Die Stdtio Habitatio* nannte.

PATULUS, llttvab abfle&enb. ©copoli un& m. a\* erflarten e^ aber al^ fafl red)ttt>infdig, unt) fu^ren Die Slcffc t̄on Pmus Lar/r.al^ SScpfieC am t̄i & enow beftmmmt ti an ben Slattern bee. gftoofe ausdrücflic) bund) einen fp̄igtgen SEBtnfcl. &inne fp̄tcfet von *Calyx patulus an RANUNCULUS repens*; etnCtt *patulum os Corolla, an ALOF, PRIMULA; Petala patula an ^^ANNUS; Propagines palulee an*

**SEMPERVIVUM** *lectoram*, **Patulus** *Pedunc ulus ifl nad> S<sup>^</sup>inni berjenige / ber nafr alien ©eiten bin Slefcl fc&icht, fo ba% er entfernt jtefeenbe 95fomen trågt. £r if{ Cent gebrangten (*coarctatus*) entgegengefec\**

PAUCIFLORUS, a r m b l u m i g ; fo t(l cm Amen- turn *paucifloriun* nüt ftenigen ©(^uppeit an SALIX *retusa*; em *Caulis paucifiorns* an RANUNCULUS **polyphylluj**; tin *Faspiculus puuciflonis* an DIANTOUS *armeria*.

PAUCIKADIATUS, a r fit(Ir&l) 119 / mitt i#trgcit SRanbblum<\$en bet) jufammengefcteu Slumeit/ unb mte n>enigen ©tra^Ien an £)olbcit.

**PAUCISTAMINEAE**, ©ett>åd>fe/ bie niceyt über 5 Staubgefäße haben.

**PECTEN f Capillitium utb Trichidium.**

FECTINATUS, g e 3 a cf t / ifl bet) Bern^arbi cffca\*/ DefTen 2ludf\*ni<e am SKanbe nid)t big jur ©?itte xeicfyen, unb beren ^Oorfprung unb 93uctt 25ogcit bilben\* ©anj in einem anbern @inne :T abet an AGHILLEA *impaliens* unb *pectinata* bad @(aft *pectinata* ~~pinnatifidum~~, an GYNOSURUS bad *Involucrum pectinatum*, tt>etttt na^mlid^ an erflerem bie 3a(l)nd)en bed flattened/ an le&terero bie ®pcljd>eu, bie bie Qixtle bilben, f a m m f o f m i g finb, b. &. n>&e bie 3a&ne <m einem ^amme bic^e. neben einanber fie^en.

PECTORATUS, PECTOROSUS, b r u f t i g, {{ hej Bern{?arb' een>ad/ beffen Umrig frumme Sinçen bildet, bit mit ifytcn Sogen nac^ au^en feben/ unb in 33ogett iufamraenff&en. 2)a&er iripectomts etc.

PEDALINERVIA FOLIA, flatter mit^efugeen **Rippen**.

PEDALIS , i\* lang ober &och»

PEDATIFIDUM FOLIUM, f u g f p a I t t ' g , bem hands firmtgen 95tatee (*palmatum*) a^nltc^, aber baburct terfd>ieben, ba\$ bie ©eitenaugfeftmitft md)t fo tief eindringen, toobutd) ti bem gefugten S&latte cfyntti wird, wie an SAXU-RAGA *geranioides*<sub>M</sub>

PBDATI-LOBATUS,	<i>f ußformig lapt,</i>	<i>pig.</i>	{
- - FARTITUS,	- - getheilt.		
SECTUS,	gefclfknit.		}

Decand.

PEDATO-PINNATA *frons*, gefuf rgeftebert/  
toenn ber (*Btvunt in 2 toeit tōtt einanber abffc&enbe*  
*Slefte &ct\)tilt iff/ unb an ber ©pige fo tote an btt*  
*inneren ©ette eine\$ jeben Slftes gejieberfe SBebel |lei*  
*ten; tDie an ADIANTHUM pedatum.*

PIDATUs, gefuft/ beffcr fwffSrmig, Perfa-  
turn *Folium ncnn ILinne' tin afiidrt S3(aft / Daffert*  
*Weopaltger \$(aftfitè( nur an feiner inneren ©cite*  
*5)ldtfcōen tråflt/ Wé an ARUM, PASSIFLORA. Pedatum*  
*Folium, gefuft, n>em t)Cf S3fa(t|lcl fi\* in jmc>*  
*Sftette oter SUfe t^eilt/ bte nur an fcer @pi@e unb an*  
*ilyxct inneren 3eiee Slåttc^en tcagen, beren eine^ öfter^*  
*in ber Sfjeilung be^ \*Iatt(liele^ fle&t / roie an HELLE-*  
*BORUS niger. (fin defugted 95la(t 6at affo mni\$ftcn\$*  
*5, fel tener me^r al£ g flaßter, Set) iDecanb. finb*  
*pedaia Folia biCjCMQtn, beren \$>låttd)tn fo wie*  
~~die Läppen~~ ber einfad^en Qefu\$t\$mwtttn S3(atter ges-  
stellt sind. SRac^ it&m gibt e^ feine twirfUc^ gefußten  
Blätter unter btn {ufammensefegfen. *Pedati nervi,*  
*gefugte Kipf?en, n>em an ber S5afi^ ber Blatts*  
*flä\*e jmep fe^r meet au&fnanber fabrenbe ^auptrips*  
*pen entfiefyen, beren jebe an i|)ttt inneren 3eite anbere*  
*parallel/ unb fenfrec&e auf ber\*\$au»ttiwe fttbenbe*  
*Kippen trågt; {.* 95. am HELLEBORUS , iDecanb. Pcd-  
atus *Racemus*, ttenn bieSSIumen fo rate DieSbl&tu-  
chen am sefugtemf.(atte sjcflieK ftnb.

PEDEIENTIM^Wem eine 6efrä\$ticfyre Serânberung  
ziemli\* langt 3<it forberf.

PEDICELLATUS, gefltelt/ fagr man jttar in^6e^  
fonbere Dan 93(umen ober gcüc^ten, bie mie einem  
^lumenftielc^en t>erfe^en ftnb; man itennt aber fiber;  
ftaupt aUci gefliclt, toai mit einem feinen ©tielcftm  
versehen ((?• 3BllL&at f° ^ne Bacca pedialata .

an PASSIFLORA; elnen *pedicellatus* Cu *cullus* an ACONITUM; *pedicellatus* *Flos'* an COWALLARIA *majalis* unb *Flosculus* an SACCHARUM *qfficinarum*; *Cine pedicellata Gemma* an ben (Er(en; *pedicel-*  
*turn Germen* an CAPPARFS, EUPHORBIA; *pedicel-*  
*late Stipula* ffatt *petiolatte* & if{ alfo bait)  
fononont tttt *pedunculatus*, *balb mit stipita-*  
*tus*; fogar mif *petiolalus!*

PEDICELLUM, ift bet) Dalffbt Beauuoſs bte fletne @tfi^e jeDer @ra^blume/ jebec Sbeiluiw unt) Unferab^itung bee 3!e?e einer SKi^pe. S5co <^arne b'a& @atnenfltelc&en; f. a« *Pediculus* > *Pedun-*  
*culus proprius* unb *Seta*.

PEDICELLUS, DU einjetttet SBfumenfieldſten / bie ouf einent gemeinr^aſtſtcben Slumenflclele aufftgn; j» S3. bte SlumenOielc, bie jefce ein;elne 93lume bed gemeinen J^oOunberd tragen. *Pedicellus* ift jus toetlen. aux& ber 55fatt(?ie{ bet SBſtaſd^en eine^ zusam mengefegten flatted. 35i> Bern^arbi fnb *Pedi-*  
*cellihlutHnftid<ben, buhn̄t, fabenfornegeZfycile,*  
*totld)t jumeilen bteſen unb jenen 55ſutſ)ent()eil^p^ bet*  
*fontxr^ befe({tgen/ unb Don melcfjem fie óaltn ben*  
*SRa^men tefommen/ ?• 95. *Pedicelli Jilamentorum*.*

- PEDICHLATUS & *pedic el I at us* unb *pedun-*  
*culatus, and} stipitatus, benn man bat and)*  
*Cinen Pileus pediculatus.*

PEDICULUS gait<sup>0</sup> bep ben Sletercn balb für Pe-  
die el I us, balb für *Pedunculusj bci) ton* 3?eue;  
ten gilt er †taufig fur *Stipes* fotvo&l am *Pappus*,  
&ll an ben Od) roām men; audt bediten 92eftarien.

PEDUNGULARIS ^ Ci>r/iu5^1 Blumenjlif U  
T&anH, feenn ber 93(umcn(?td bte Slume *nid)t twit*  
*toidelt, unb fid) in cine 9tanfe Dermanbelt; tpenn bie*  
*SRanfe auf bent \$Iumenfhe(e aufffigt.*

PEDUNCULATUS ;g e (1 f e 11, ^umen ober S^Hte,  
tie met ecnem Zdlumenfick berfe(en fiiU). *Peduncu-*  
*latum Amentum, twin bie Spindel des Rägchens*

nicht big an bie 95tifi^ n?it gsiumen ober ©cftuppcn befefct if!; 5. 35. SALIX *triandra mas*. *Perigonum pedunculatum* an BRYUM ' androgynum iu Pedunculata Spica, ttie Ot LYCOPODJUM clavatum; fmlunculata U m bell a, tt>cnn bie ©tra&lcn antf ban demeittfcfyafflicOen Wattftick entfprin^cn, n>té an DAUCUS *Carola\ pedunculatus Vrlicillus>* fait an NEPETA *CaLaritti* iwnn 6ie SBlumcn mitW(l lan&ez mcf)rb(umt^cr S(umcn(?tcle quirlförmig urn ton @fenge ange(>eftet fuib. SuroeUen gilt *pedunculatus* (ba\$ f)a||fiQ mit *pedicellatus uttb pedicular lus* fononom iff) für *peduncularis*, j. SB, 5/-pulæ *pedunculate*, f?att *peduncular es*, oder *pedunculo adnala*.

PEDUNCULUS, Blumenj! el/ auch fruc^t\* (1te(; cine Sorffegung 6e^ ©tengel^ oDcir ier 21e(Tc, (n>enn glcicf) bem 53auc nac^ öftcr^ t>crfcf) tcbcu) bie unmittclbar cine ober mebrere 95(umcn tragt. 3m ießten ^alle t(l bit Sdimenfftel tmmer/ n>e j. 33, an bet 3obannig6eerc / ^ctbeilt, uitb bee unterc §Oeil if! bann Mt aBgemeine SSJlumcnfliel (*Pe du nc ul us commQlis*), unb bit trnrdj bie S^^eilung enf(?qnbcs wtn, obet auf bent adoemeinen \$(umenfiiie( auffgenbeit einjelnen \$>l\imtn{iUlt ftnb bie befonberen Slumeiu (liele^ (*PeTlujiculi partiales* obet *Pediccli*). \$bt) weiterec Sert&cihina pnb *Pedicelli*, Blumens flield>en, immer bicjenigen / bse mit btv fBlumt uns mittdbar in 33cr6inbun8 stehen. Nach Linné's Defis nition in phil. hot. foUtt bt Pedunculus folio sis beftyrieben! Obet finb afctn untec ben 2(flcrit bit Pedunculi squarnosi tttoai anberetf ali fo liosi? *Pedunculus*, *Pediculus*, *Petiolus* toattn Ut) btn 2Uten syne: 119m. © a. Seta.

PEJJOS f. *Lividu.3,*

PELLICULA JDecanb,, Pel; 4>\* "» <5o nennt Jjecanbolle einc fe&r jarte £aut, Die gewifſe ©ameit rinflgum&er umſūtlt/ unb jugleicſt £aare trāgt/ Die auf t>cm ©amen ju j̄gcn fcijenien; g. 95. bie ©aitua ber 35aumn>ottenflaube. SBenn Die £aare ctnjcln pK ftreut ffc&en/ fo erbalten fie feime befonbere SSenennung/ tvenn fie ft\$ aber an irgenb einem €nbe ber &at men befinben/ unb bafeftfi einen fleinen S5ūfd)el bilben/ fo nennt man fie @cfc>opf (*Coma*). Set) £m f ifi ed bad SeOc^en, etne mētieng feſr feine / unter bee €efta Uegenbe/ ben ©amen umfleibenbe *Sjaut*

PKLLITUS, ge{d>&lt, toai fo autffief)\*, aW 06 man ibm bie £>ber5aut toedsenommen ^attc / obec felbfi bie fyaut

PELLUCIDE PUBLICTATUM, butd>fd>einenb punh titvt, mit burc^fc^einenben ^unften, n̄ie an HYPB-RICUM perforatum.

PELLUCIDUS, b u r ^ f d ^ e t'n e n b / n>enn\*man nut bai £td)t, nt̄d)t bie @egenftānbe babutd^ mattne^men fann/ Bernt. Sin ben SRofen iff ein *Folium pellucidum* badjenige/ bai an bet ©pige feu^aren^ d}t)m bat/ ober fe&r menig^ unb grau obec Wg if!; aud) ein mic bucd^fd^einenDen ^unften Detfe^ene^ SMatt ifi *pellucidum*. *Pellucida Frons*, tt>em an etnigen Sonfert>en bie %aben im (ebenben 3uffanbe l>urd}fcf}cimenb ftnb. <£\$ gilt mand)eſm fur *diaphanus*.

PELORIA, eine Siffortnitāt an LINARIA.

PELTA, Qxfyilb, id bey Untie 'ein flac&eS 95e; fruchtungswurfjeuq, bag meif!eng am SKanbe beg ?au^ beg angeleimt tfl; 6ep Bem&arbyinc i^aut/ bie bit \$rutbefrä(ter entt>ā(t» Sin ben gtcfUIn i? eg ein etmag leberartigcg \$ offeneg/ (ānghc^eg ober linfenförmigeg/ flans Platteg/ ungefiielteg, am 9?anbe mit bem £aube (*ThaiI us*) t>ecmad)feneg gcud)tlager o^ne atte (£in; faffung/ oDer (>od>fleng mit einer jufdttflen fremben/ freofie&enbcn / nte feff anfcblieffenben/ unb fet)t fcftma; Un. aſoc feiner Gotten (Enttvicfelmyyff eg mit ciner

jarten Hebrigen Jpaut frebecft, bię fid) foäfer ablöfet\*  
 9J?an finbet eſf an ben ©cfcilbtragern (*Peltigeris*).  
 ©te *Pelt a* an ben MXar&anticn erfcferhen enawber  
 || £. bfnfdben \$f?attjen, rcelc&e gručf>te tra\*\*en, ober  
 danoeren. ©te finb &ter gefſtett ober ungestielt,  
 etfig ober geferbt unb unten balb\*fugelförmig, und  
 entbalten eitförmige 5?örper, bie bep einigen für An-  
 t&eren gelten, *btt*) anberen für j?etme etner befonberen2lrt»

**PELTATUS**, *ffyilbfotmig*, fast man t)on tpaS  
 immcr für etnem Sbeite etner SPffonie, beffen ©tuge  
 in ber^Rttte/ unb *nid)t* an bem £tanbe beffelben ein^  
 8<fügt iff. ©O iff eine *peltata Anthera an TAXUS*.  
*Peltatum Folium* naitnte £inńe 'ein Slatt, beffen  
 %lat:ilid *nid)t* am SKanbc ober an ber 33affcl fonoetn  
 in ber (SKate ber icnteren) Siic&e (*Discus*) beffeb  
 ben etngefügft iff / mie an NYMPHAEA. *Peltata Fo lia*,  
 fc)i(bfcrmtgc flaſter ffnb naſt *foecanbolle* nur *zus*  
 fammengefegte ©lätter, beren %lattd)cn an ber Spize  
 be^ gemetnfcfyafltcben ^lattffiele^ quirtformig gestellt  
 finb / tt>ie an ber STERCULIA *Ealanghas*. jDecanbolle  
 mei)ntg^a§ matt fie t)on *bm* (>anbformtgen Slattern  
 nicht i^erfd;eiben fotfte, worin *telfeid)t* re^t lat.  
*Peltata Frons*, an ben palmer, n?en'n bie. ©pige  
 bet ©trunfe\* mit ber Unterfeite b& mefer ober miubec  
 (rei^formigen SBebd^ berbuuben iff/ unb *bit* Stnfd;nttē  
 bei\$ leſt?ren nur fo tief finb, ba\$ nod) rin^ um *bit*  
 @pi(;e bed ©trunfc« ber 2Bebe( unf;rt)ci(t *bUibt*, toit  
 an CORYPHA *rotundifolia*. *Pel tat i Nervi*, *ſphi ld;*  
 f ö r m i g e *TMyptn*, wenn oon ber ©piſe b̄es Blatts  
 flieleg nad) alien j|ettm &in bt^ an.ben Umfret^ Rips  
 pen au^Iaufeti^ Pe t^ie bie ©peicfKn in etnem %abt  
 8^feat'finb; \$. 95. am TROPAEOLUM. Sin rae^rer  
 Sarrnfräutern iff ein *peltatum Indusium*, nmm  
 bie büune ©ecfe frei^förmig, unb in ber 3Ritte mit  
 cincm fleinen Saben befefftigt iff; unb bepnabc in *tbm*  
 btcfem ©inne ein *peltatum Jteceptaculum* an  
**MARCHANTIA**, EQUISETUM; *peltate Squama* fint> am

(EttbC bet 9Uff< "on EQUISETUM, att NYMPHAEA, PA-PAVER, i|i tmSligmapeUalum. *Peltati cephaloidei helerogenei* A t h a l a m i 2C<fcar./ rait fcbilbför# miaen unaetanbeten flett&hnlid) ja&nattia, § t<sup>ran</sup> H g Stūc&tbe&altern twefcene gtcc&ten.

PBLTIHERVIA FOLIA, SBUTtet tt>t schildförmigen

### Rippen.

**PENDULINUS**, I & n g t n b, wad aff\* S&nlic& hängt.

. PEBDULUS, &<5ngcnb, t>a« fo irstnDtto aanges batifit iff/ bag We SBaW na« oben, Die ©piße nacht üntēn iu (i<^n fommt, unb 6Uflfara ifl. ffl?an aebraufct c^ wrjādli\* »on 95lura<n / Occanb.; abet au\* bet) anderen <sup>g</sup> <sup>n</sup>, <sup>enc</sup>

rogerpfla 5 ! fcflta »4W 5&6« aW feine Spiße steht, m\* bie fret) berabbönsen, »te an CVMBIDIUM curtipendttZum, NECKERA curtipendula. *Pendulum Folium* anSiNAPis nigra, bie oberen flatter/ nntec einiaem SluffWsen; pmdull « a m /, t>ie an SAM\* babylonica, ffnb fpnonpm mit reflexi. *Pendula Badix mberosa*, wttui mebrere «noOcn but\* fabeiw fotmiA< SBür\$el\*en jufararaenbanaen / »ie OMPIRAEA *Pendula* f. fiUpendmUnuju <sup>Pendulum</sup> neceptaculum, ein freoer tnetflend <sup>ful</sup> <sup>nf</sup>ormis aet gcu\*tbaben, tet' »on ber ©tfge bet jfapfel ents fotinAt/ wnb n a\* ab»4trt flfbt / tsie an FRAXI <sup>nus</sup>, ARBUTUS. *Pendula Sem in a*, mtt ifttent obe«« Enbe anflebeftet, obet an bet 6ette tefTelben, tbre S»ifee aeAen bie SBoW flefe^tf; jum SE>eile ftnonom S.T n ! e r \* a\*. *Pendylus Thallus*, fabenffifmia unb faff fenfte«t feetab^anflenb, <sup>\*\*</sup>U . an PARMEUA *divaricala* unb 5armen«osa. Kndazä T A c c a , inenn ba^ Enbe bed 5tu<t|liete« fo -aeftummt rottb, bag bie jfapfel mtt bemfelben patattel tetabfnst - Uebtiägen\* iff aBetbing« CoroHa obec *Flos pendulus* an LATHRAEA *Squamaria*, unb au\* flanje 3 ^ floteScenjen, M *Corymbut tab Racemu\$* fmb pendu/t, Wit Ufctem an Ru>w rufram.

PENETRANS, & i n e t n b r i n g e r\* b , iff bt|)Benifc.  
wenn tin 5Pflan\$entf>eil au\$ eincm\*ttopfbavflu\*\$i&tn obcp  
gasförmigen 9D?cbium fid) in tin fe(i€\$ be&ibt.

— PENICILLATUS ttit) PENIGILLIFORMIS, **p i n s e l f ö r s**  
m i 0; I\* 95. *penicillifoAnis Pappus*, Oeffii Strahs  
len untett mcfer oDec minber nacht unb nur ^c<jcn Die-  
Spize (jtn mit admā^id (aitd» merbenben \$aarm  
gesiert finD, n>ie^n t>iclen ©nap&alieln Penicilla-  
turn *Stigma an POTERIUM sangnisorha* unb t>At  
Gräsern, toenn e^ au^ eincr OTen^e furjeu dicht ges-  
drängter flcfcOigcc gafcrn in ©effaK emrt Pincels  
Mbilbet ifi.

PENICILLUS, PinfeI/.(({{ 6C9 Bernfc. .^in Haar,  
das an feitier &>il}c met fleincn ^ärdjen befegt if?;  
bey anberen 95uf\*el Heiner fificer ^aarc/ bie sebrängt  
neben cinanber ftet)cn, unb Sür?enpinfo ju bilbm  
fheinen, wie an bim SarfC t>on ORCHIS militarise

**PENNATIFOLIA**, ^PfTanjcn mtt<sub>a</sub> lffffAerteit 95(a<ern  
5. \$• Die II, 9l6tr>et(und btr \$a(mcn,

M^ATus n>irb off fur p inn at us fle&rauc&f.  
*Pennati Nervi*, geftcbetttyflewen, bit an  
bcoben ©eiten ber SRittdrippe fo gcfWlt ffnb, note b<c  
SBart an einer gcber; j. Ss tm %latte tinci f&ivns  
baume^. *Pennaix jSeta*, ge^ e berte Bo rfte/i/  
an benen fritmärfd bie ^anje E^nge 5<n anbert fcincce  
95oi\*(!^n obec ^aare ji(wn *Pcnnati Surculi* an  
HYPNUMT. @. a, pIurnos us>

PENNIFORMIS, f. *Ruptine Wis.*

**PENNINERVIA** ^ LIA, flätter mit gefiebcrfen Nippen.

**PENTA**, als 2?orfcgfi)I6e bebcutet, ba\$ dasjenige  
was no\* fommt/ 5 SWabt ba iff; \$. 95.

PENTACOCCUS, mit 5 fibtnevn.

**PNTAFORA** *Pericarpiq*, %Vild)U mit 5 Klappen.

**PNTAGONUS** *CauHs*, 5 ftft^Cr (Stengel / (f. an-  
gularis). 2In LOBELIA *Cardinalis* | *pentagonus*  
*Calyx* an C<NOPODIUM, *pentagana* *Capsnla*. an  
OXALIS.

PKNTAGYNA, Orbnunflen in *Hinnfe* SfotTett/ welche  
jene ^ftonjen begreffen /. tje

.. PENTAGYNUS, 5 votibig finb/ ' b. & 5 ©taub\*  
wege haben.

PENTANDRIA, Me v. Staffe bet) *ILinné*, welche  
jene SPflanjen begreift, Me

PENTANDKUS finb / & \). 5 ©taubgefäge haben,  
5 manig 'ffnb.

PfcNTANuiAE, 5p(Hanjen mtt 5 S'apffln bei) Boerh.  
PFATANIKHAE HubvD. (• *Pent and r us*\*)

PFNTAPETAL^ *Corolla*, ctne Slumcnfcone mit  
5 SPlumenMäctern/ tote Die Srbbcere, aCe Umbettjferd  
« Sep ben 5llrentt?aren kit *Pentapetala* häufig  
Eaflèn unb £)rbntinden/ ttie bct> *Rivin* bie *Penta-*  
*petalce regular'es unb i r regul arcs.*

PLNTAPETALOIOES, eine etn^lattrige Slumenfroue  
mtt 5 etnfcfjmitten.

PENTAPHYLIUS, n?as 5 Slattec bat *Pentaphylius*  
*Calyx*, 5 blattiger Stld), an CISTUS, ADONIS,  
CERBEBA ; *pentaphylium* lvo luc rum, an DAU-  
CUS; *pentaphylius* Pappus an QEDFRIA,

PFNTAPTERA, &mtn mtt 5 gluaeln/ tote an eini;  
gen ^olbensetvac^fcn.

PMSTASPERMAE, ^flanjen mtt 5 ©amen»

PKNTASTEMONES f# *Pentandra*.

PKPO, Su'r b i g / i(l ber finite' ein fleifcf}tdeg  
^evfcarpium / beffen %åd)tx t)on Dec3lcf>fe cntfernt lichen,  
unb beffen @cimen an bee ^eripbechte ber grucbt geles-  
gen (tnb/ nste am ^ürbtffe. S)tefe 5^rucjt iff im Mit-  
fdpunfte bepnabe fofI / unb nut <n Umfange hart.  
P epo if! bep Bern&arbt eine Srucf)t< an n>ec'er Die  
<&amn überaK att tttr ^nnentoanb befefiigt finb.  
(Bårrner rec^nete ifrn unter bie Beeren.

PEPONIDA Kichard 1 f pepo.

PERAPETALUM, nennt ^nfind^ bte 5lnf)dngfel an bm  
Slumenblättern ober an ber Slumenfrone, » 35. bie  
§aben an bee SSlumenfrone t)on MENYANTHES.

PERAPHYLLUM nennt Wlōnd} bit fyōtftx, 2lu\$6rel\* tungen ober Sln&anflfel/ bic fr& auf Dem jfclcfre befin\* den, noie an bcr SCUTEIXARIA o&er am Perigonium - 35. an ben Qalfolen.

PERCKASSUS, fefcrbif; 2>icfe jur fiance fefe 4 - 6 ; 1.

PERCURENS, b\}td>laufenb, totnn tin un&bnt licher Theil von ^nem anbmn def\*tct>e< n>ir&/ abec zugleich mit i&ttrtm Dec sanjen Jnneren SBanO vers wachsen if?/ Bernb.

PERCURSUS, dur**φ** gelaufen, der Theil welcher b|xvi)laufm toivb, Bern^ ©ewobnli\* fteigt er über Iaufen, o. ^ unreflelmagig mit trgenD etva^ geleichs let/ J. S. lineolis, punctis. percursum.

**b le is**  
ben b. airilere^ gebraud)t man aeroō&nlid) t>on Blättern (perennantia Folia m LAURUS) oDer ande ren drganen/ Me 'md)f abfaHcn; perennis abtt ton ^/lanjeii/ Me (änger aid jmcp 3fa6re (eben\* SBemt nur t&rc QBurjel (e6t, fo tojeiebnet man ffe mit fcem Setcf)^ 6e^ Jupiter, 4, twnn abet auf) i^r 6tamnt lebt/ wie an @traūc^ern utt) &fpmen/ mit Oem 3<zi<d)Ctx bet 3aturnu6 %. <£\$ ift W> effereci {um Jfjctle mit persistent unb semperfirens Qkid)bei btuttnb.

PERPECTUS, pollfommen, jtbotfy meiflend · nur BeiUflSfsteife; j/ 95\* perfectus Embryo s. comp let us, bet fein frepe^ -2Burjelcfxn, bit fiotyUbot nen un& bai 8cbtvd)tn 1)at Perfecius Flos bei #ay, Hiv./ iftPtv flos Petal odes btS lourncf\* unb ILinie. SBa? JDecanbollt tint Slürnc, n>am fie deutlich / n>te alle übrigen, zusammengesetzt. ist.

PERFLUENS, dur**φ** fließend.

PERFOUATUS, butd}rca<bfcn> Willdenow nennt ric^tider Caul is perfcliatus, toai Hinnéperfoliatum Foliun nannt? tin 3>latt, 6cTen Saffd Oen @tenge( t>on atllett @etten quer umgifct/ wit an Bupleurum. ^ayne crflart ti a|i tin Sblatt, das

*nid)t an (cittern SRanbe mit bem ©fengel berbunben if?/ fonbern bag bicfer bc\|nabt in bet Sttitte burebbobrt. SDecanboIIe tte&t mir bann Folia perfoliala, toam^jmei) scaemtöcrffebenbe flatfer an t^rer S5af!4| fq fcoflfommcn fcerroaebfen finb , bag fie nur ein cin\* gigeg flanjeg SSLatt ju btlben fd;einen.*

PERFORAIUS, burcp16'd>er< ^ n>o Uere 3n>u fd)cnrdumc Dorbanben "ftnb, (Zetmfo; bod) fommt e£ mei&ng in etner met)r beffimmtrölsebcutund t>or. SBU\* ftf^en Cne Anl her a perforate\* an SOLANUM; perforate Colyledones an btn(£)t&fevn; perforata Dissep imcnia, in bee \$Ritte mit einec flajfen; ben OcfnmiQ , n)C an SAXIFRAGA , HYDRANGEA; unb perforata Folia in cttjem boppelten ©inner ein 5D?a&I atg mit t)urct)fd}etnenDc» tyhmften t)crfeben, fo bag eg aii\$(tet)t, aid. wäre e^ mit 9?aDclit burcftlocften / an HYPERICUM perforatum, unb bann alg fo t>om ©ten\* ges burcftyoftrt / ba§ eg fief) fret) urn bcnfelben brefyen Ia§t/ tt>ie an CRASSULA perfoliala; einen Pileus perforates, an ber ©pifee rait einem'8o\*e t>erfeben/ an PHALLUS impudlcus; ein perforatum B^ deli um, bag affig obejtfeb? <jjtd iff/ unb in ben SBin; fein bee 2l<le etn fod> bat / ifl an JIAEOMYCES rangiferinus. gj?an bat fogac ein Pollén perforatum.

PERGAMENUS, perg am entattiq.

PERI , r in gsumfce.

PERIAEDOEUM: i£br^ ijl fdn Perigonium ih-tcrmim.

PERIANTHIALIA 2\$ttk£l » Perianthium.

PERIANTHIUM, 2\$lumenbede, 2vePc^/ ifl 6e9 Linne eine 2lrt t>on ^elcb./ b:r nnmittelbav an bie Befruchtungsworfjeu^je anliegt. & 'unterfebeibet bag Ferianlhium fr u ctific alionis , ben S£ Clb / bet bie ©taubgefäge unb ben Srucbtfuoten emfcbliegt; bag Perianthium floris, bin SVld) / ber nur bie ©taub\* gefäge einf)Uegt, unb nidyt ben grucbtfnocn; bag Perianthium fruetus, bin 5fcl), ber ben gcuc^t^ jnotcn, aber ntd)t bie ©taubdefa^e einfcbUegt (Et

unterfchectbct eg from ©ecf6latte babur\*, bag eg,  
n>enigffeng bei reifer griicfct, tvenn ni#t früber/ t>er\*  
trocfnet/ roa^ bep ben Setfblättern nicht immer bee  
Sad ifh fcTitbel unb Brown bebienen ffO beMBor\*  
te^ *Perianthium* in eben bem ©inne/ in ttmd)Cin  
SJecan&olle *Perigonium* · flebcauf)t 95ep anbem  
ifl ^eld^ aW SHumenfrone f» *Perianthium extern*  
imm unb intetmk\*. \$ti) · £&r&aift if! eg fpnonpm  
mit J n ^ o cfllw\* Q5cp Bnbel i(l ber J^d; bee  
3mitterolumen ber Woofc Perzania A i^am, ^d die  
Theile beffelben fullb *Pcianthalia*.

PERIANTHODIUM unb PERASTHOIUUM Hint i(i Berns  
hardi's ferimetrium commune, fo ftie Ehrs  
hart's *Perianlhium*.

PERICARPICUS, 6e\$eid)net eisenHicft tfffei bag/ was  
jur grucfrt&uac flebort; Ki^arb nennt aber jene Qa\*  
men fo, bie in aleic&er SRi\*tund mit ber gruc&tbuHe  
gelegen finb. *Pcricarpica di|cctio iff b|C SXif\*  
tung in 95eu()* auf bie gruchtb&He»

PKRICARPIFQRMI A S emina, auc) lignosay  
&awM mit boljiger Sebedung/ »ie an PETIVERIA.

PERICARPIUM, ^ rpu4>t^ |T Ie, ©ameitge;  
l?äufe, ill b^e^liiné Dag mtt ©amen fcfymanaere  
Organ, bat blwben be? i&rcr SKeife ton ft\* gibt;  
bat ©ermen in ber 3Jeife\* fier&er fommen (Ha\*  
tPt'IIbenoto'6 ,3lugg. ber phil. bot.): *Utriculus,*  
*Samara,* *Follicnlus,* *Capsnla,* *Nux> Drnpa,*  
*Bdbca,* *Pomum,* *Pepo,* *Siliqua,* *Legumen, Theca.*  
3n ©prengcl<sup>1</sup>\*Sluggabe (wo F o // c u / u 5 , i Y u a ?  
imb Pe/)o n>egficlen) famen no\* binju: *Sirobilus>*  
*GalbuJus,* *Apothecium,* · *Pcridium,* *Hymenium,*  
*Vlriculus mahicalis,* unb *Spcnnatocystidium.* 3\$  
n>ei6 nicftt/ ttne^einigc bag . *Pericarpium fiinn&B,*  
b<xi aug bem S^tfnoten entftaubene ^erigpermum, bag  
©amen gefjaufe tn (Ircngerer Sebeutung nennen f5nnen.  
*Pericarpinm* i(! 6et> *WltbicuS Cine* gesclössene  
Raspel/ bie auc) bet) boiler SKeife ft\* ntcfot 6ffnet/ fons  
bern ton ©amen fret) tu ibv« ^6t)lc liegen bat ^

*sebbtt (B&ttner's §auu unb \$lfirfrud&f unb bit  
lbzifCn Capsule evalvesy unb QcopolVs Aril-  
lus. Sftlonty ncnut nur eme trofcne, nid)C auffprin\*  
flcnb^Srucfotbutte Pericarpium, t>ai ^ericarpiuit,  
überWrupt tl tñm Concept a cut urn Seminum.  
3?ac& Ricfcarf c bef?ef>t bad Pericarpium aud 3 hbcts  
einanDerlegenben mc^r oDer mtiiDcr rt4t>arcn Sftctlen:  
ic m i "p i - 6 ' a r c o - unD £ < d a / m. Nach Des  
canboUe iff Pericarpium h|| fW^cn@thnc alles  
væjed^a Æm @amen / wad nid)t j?ern iji; im engern  
Me al^ntetne Jpufle Deffelben. Sd iff fietg unD immec  
t>orbanDen/ obfcf)on cf jumeilen ju feftlen fct>ent\*<sub>r</sub> unb  
t>on tbm gc^t/ im 9lugenöli<fe ber 5>futl>o ber @niffel  
au& 35cp palifot ^eauvoie ifi ti bte äugerfie J^üQe  
bed @amend/ bte an ben @rafcen meifiend n|lt ber  
<Sd)ale (-Testa) jufammenfrängt/ unb baburc^ }ur Ca-  
riopsis n>ich. @te Pericarpia, fagt BernfN  
ter^alten ftcb jur grucfet/ trie bie @efctlec^tdt&eilc unb  
ScudE)t!noten^üDen jum @tempeL*

PERICARPIus/ n>ad jur Srucfe^ude ge^ort/ barauf  
t)orfommt, J\* S3. *pericarpia Spina* an TJKIPA  
*natansj* AESCULUS *Hippocastanum*.

PCRICHJLETIALIA FOLIA, bte %^tttt bt£ *Peri-  
ch cetium.*

PERICHAETIUM , tTiooefelc^, bet) jfubtxn'g Pe-  
rigonium, bit Sttit) bee SSRoofe art ber gcucftt ber;  
felbcn, an ben wctblichen SBlumen alfo. Howling\*

S3eo tPiUbcuow nub jDëcanboIIe ift aber *Peri-  
chatium* ubcrfjaupt etnc ^utte/ bieaqd fleinen jus  
ndcOil un(er ber Slume *befitiblifyen* Slattdjen *besteh*t,  
tvdcfje bie S9aftd ber grucfei unb ber \$efruc6tun0dfter&  
teuge ber 5Dfoofe umgeben. 2In ben manntic^en S3(u^  
men ftnb bie %oldtttt feiner, unb sen>5t)nUc& anberd aid  
fccp Den ftciblicften. 2luct bad 9ieceptaculutn an ben  
Silken unb an 3 u n g e r m a n n U natwten einige Pe-  
rich a tium.

PERICLADIUM £mE cine Sludfc^weifuns an ber  
Basis ber flatter/ roelcfre bie \$afid ber Sleile ober

ber SSlumenfiele umfagt/ **nfe** j. S3. an ben UmboU  
**lifer**.

PERIDIUM, ber Urticfctag, & aube bet) Bern;  
**hardi**, iff an ben \$il}en mitt èmsefcfjlossen Jru<sup>c</sup>t);  
ten jebe grroeiteruna be\* 6trutrfes / toerd<sup>d</sup>e Die gVRnms  
ten %cftu< t)tnn\$frOtQant in fcfir fcfefigt, unb t)te nuc  
beo i>oUer SReife fc& offnet/ Decanb. ©ie fcütmc auf  
DecfcfjeDene CB|t^ jcrrret§enDe fyaut Oec S3auchpilze,  
Gasteromy ci, untcr wetter Dec 6ame **liegt Wild.**

@. **Capsula nnb Tfwca.**

PERIDROMA rteder, ba& 2au<sup>i</sup> bit garflWfautcc  
**bey** fetner entiDirfeluns; Die Rhachis.

PERJEMBAYO Jüg. i(l.. fcfr DeuHtC^ an Mirabilis Jalappa.

PERIGONIUM 6d> £tnn^ tsft Se(cf) bet Sfrofe;  
**ben** <2>ebtctg juweHen Perichatium, fonfiabec t(l  
**ihm** **Perigonium externum** £el4>/ unt) **Perigonium internum** BlumenFrone; 6ct) anbern G/u-  
ma, 6e9 andem **Perianlhium Spermatocystidium**; bet) tfbtbatt **Peritedium**. **Perigonium nennt !ft>tHn** bit %lm||tnf>uUt, bit balb  
boppelt {duplex) i(l, tvenn fie au^ etnem Oeutli^  
cf)cn feld}e un& einer beutUc^en S3lumenfrone betfefj,  
j. S\* **Borragin officinalis**; **balb tinfad**), menu  
jMcfy unb SSlumenfrone fo unter einanbec ^ertoacO^  
fen fiitt)/-bag fie nuc eine etmige fyaut bilben. 3tt  
(cfttcrem \$aQe\* t( e^ eine etgentic^e \$lumenf>uae.  
Hint gebraucftt ben SSu^brud Pengontum jebeS 9WaM  
bort/ tro ti jweifel&aft t(l/ 06 Da^, n>af bit <3tnitat  
lien junarfifl umgibt/ f eld) ober Slumenfrone iff. Set)  
**SDecanboHe W Perigonium, tOCtit tttStld)** ftmtt  
ganjen £an^c nac^ mtt bm S3(umeublattern **verwachsen**  
ifi. S5et) Bern^arbi finb Perigonia, fcautifl oder  
haavt unb borllenartige urn bie ©efc^lecf)^t()ciU **BenOe**  
^uffen. Bern&arbi rennet babin: Calyx, pap-  
pus, Corolla, Gluma. — **SD:an** bat aufy bie  
4 - 7 flcinen feaelforaiaen ^Srperc&en auf ber Unter;

{tit\* ber fcftfbförmigen ©djuppen urn bctt bit ©c&uppe tragenben ©tiel *Pcrigonia* genannf/ ttml fie nad) in\* nen auffpringen. • ~~Zuc~~ bag/ tt>aS man an þen 3un\* ge p a t a n n' e n *Sitld*) nennt, iff *Pen'gonium*.

WRIGYNANDA Jftecfer, *baiPcrigonum* <&:&>  
*Perianthium*, *Tcgumentum* anberer, *tfiedtev*  
*f)at Perigynanda comnium's, exterior unb inferior*, rote anbece *Calyx community Calyx* unb  
*Corolla*.

~~■GYNIUM~~ JlmP iff Bern^arl>ra *Perimedium*, unb *Urceolus*.

PERIGYNUS, urn ben ©tempcl flefecn SSlumcnfrone unb ©faubgefajfe / toenn jic bcutlid) urn ben einfac^cn ober bielfac&en iiy, QlunOe bcr Slume frci> ba(?e()enben %tn)ttnotcn *QtlalQM*, unb Don Dec ftojtjre bc^ jfeld>c£ fcürctaug t>crfd>fcDen finb; tvenn fte fecnec an eiuer SStuitie / bieaQenfaQg blog ©taubgefaffe. *tii||tn\$stud*)V *Uxotcn bat, beutltd*) unb *totit ton* jenem ^Junfte enrfernt finb, ben ber ^ud^tfnoten emneftmen mfgte. Bñlll Nach JDecanboHe aucf) n>enn bie @taubgefaffe auf bent Relche ju ftgen fd)Cinert, tvctl fte mit (egterem verwachfen finb. S)enn 6i> tf>m i(t nid)t blog berjenise Relch *perigynus*, ber ben grucfttfnoten umgibt/ fonbern auch bet/ ber nut an ber S3aftg mit btn SMumenblättem ober mit ben ©(aubgefaffen t>ewad)fen iff. 3m leegen gaffe finb and) bit auf bent tfelcfye *cin^cfiigtcn &taub\** flefajfe *Stamina perigyna*. *Perigyna Stamina*, Staubgefaffe / bie an ben 3)ionofott)(ebonen Coalmen , *tllitw*, Sinfen :c.) urn btn ©rtffcl fterum^ *fltfycn*, unb enftveber in ber iBIumenfrone (*Calyx coloraius* Juss.) an ber SKofre ober auf *ben* gappen ber; felben eingefügt ftnb; an SifotQlebonen abet, n>enn bie S3(umenfrone *ftblt*, bem tfelcfje, tvie an POLYGO-hUM, ATRIPLEX, ober *bt\)* tielblättriger 93(umenfrone ben 3?å<jeln berfelbett/ tvie an SEMPERYIVUM, *an btn Schmetterlingsblumen* ic eingefügt ftnb\*

PERI MET RAH A *phylla*, *bit* S&eiU *bit* gruc&t\* faotenbu'Uc.

PERIMETRIUM , *£tud)ttnotenbhllle* , eirt foaitfiger *obit f>aavt unb borffcnformitfler Zt)til*, ~~maſcher~~ btn \$rud?ffnoten umgibf. £ern&#

PERINTEGER f, *integerrimus*.

PERIPHERIA, *bet Umfang, Umtig, bit iti* ntc, . mld)c trgeqO cine glad)e oDec emm ^orper ums flranjt/ unb *bit SiflUf unb Sorm beefdben beftmmmt*.

PERIPHERICUS> *ba^/ nad am Umfrei flieht*, obcr bcmfeI6en naſer liegt.

PtRiPHEmcyE *corolla*, *bit f8lamd)tn, bit an* £olben unb an juſammengebauften ober *zusammenges* fegten 35Iumm junacftfi am SKanbe fte^en. Bernb.

PCRIPHERICUS *Embryo, btv auſec b^c 2ld)fc* unb bem fi>n?eige bcr ganjen *UnQt* naſf; an bcr £3ant>

PERIPHORANTIUM Kic^arb f# *Calyx communi5, unb Involucrum*.

PERIPHYLLIA *flint, bit Oc&uppen, bee bm* gruc^tfnoten bee Cräfec umftüttem

PERIPODIUM ^>ebwig, j(l £tnne'6 *Perichn-Hum. Peripodium JEJ^r^ tje Vaginula* mu-scorum.

PKRISPERMA f. *Spermodermis*.

PERISPERMATOCYSTIDIA , &pevmabel>altev^iU len, meiftcnr' eaipttfcfte ftoble bunntoanbiege 1f)dkf tt>cld)t *bit &vttmabtbältt cmfc^liegen'*, oftne ffe }u bes feſiiflen. Bern&ar&j.

PERISPERMICUS *Embryo iff 6eo Rtc&arb vers* jenffle, ber unmittelbac Don ber Odjafe eingefc^roffTen, alfo obne ffl)»et§ if?. PERISPERMICUS KIC&> f. *Exalbuminosus. Perispermicusjuff. f. Albuminosus*.

PERISPERMIUM Jf&r&\ i>! &iime\*s *Peri carpi urn, Perispermium JufT» ffl Albumen* (5\*1 rtn. JB' anbeen iff e\$ fogar fpnonvm mit *Calypr a*.

nis jebec jtorjoer • ber ben Bamen frj> um&ibt, oljne mit &m anbeti ali burd) bie Sftabelfc&nur t>em>ac&fen ju fet>n; nadfc Ki^arb bie Stetnbede, jcneff £autcl)en, obet i n e i?uttc, n>oton ber ©ame, ber Stem julege umg~~l~~ if!

**PERISPHAEARIUM**, bie J&uffe bet toeiblifyen Sblumen an ben 3uugermannUn\*

**PERISPORANGIUM** <^ebtp: ifibai *Indusium*; *Perisporangium* B^rnt. abet ba& *Perigonium* filicuM\$& ein gortfag bee £>bccf>aut, bie anfangg bit \$rud)theik \$ani bedtf bann abet fid) Io^ %ebt/ uttb nad) augen obet nad^ innen obet xin^nm)tt fid) off net, unb nut in bee Sfttte befeligt bleibt. 6. a« / ^ o -lucrum unb *Episporangium*.

**PKRISPORIUM**, bad *Pericarpium*, bie %tud)tl)üttt Uy alien ^rvptogamiflen.

**PERISTOMA**, *Peristomium*, bie %affine an bet 5D?un^ung ber S3u(\*fe ber ^oofe; ber obttflz Zl)dl berfelben unter bent Qcdel; bat toai bie beffnung berfelbtn umsi6t. Sinige unterfetcioen &n>fd>on *Peristomaj* unb *Peristomium*, unb nennen biefc^ bat iTJaul, unb jene^ bie iTfanbung d^Befa; qung, ba\$ieni&e, mi um bad 3)?aul bcrumfie^t/ bie ^aut/ ober<bie Jabne 2c anbere umgefetrt *Peristoma* <5>e6i>. ifi *Peristomium* j£{?r^.

**PERITHECIUM** Perf\* Sa^ *Receptuculum* an btn ©d)n>ammen/ befonberg an ben barten/ n>o eg ol^ gaUertart^e 3D?affe bie &Ku&fe umgibt *Peritheciun* Tltyar. iff cine rinbenartye balb festr feime burc^tic^tige/ balb fnorpetige&etfe/ bie, toie elne SfJug/ einen ifern einf\*Iegt / unb fcieUeic&t >aufi einer^ eigncn SKaffe gebilbet iff\*

**PCRITROPVS**, gegen bch Umfang oberllmfrei^ hin gerid)te^ Kid>arb gebrauc&f biefen Stu^Druc( um Sa: men ju bigeicbnen, bie Don ber Skiffe ber Snt\*t ge: gen bie ©etttn bed *Pericarpinm* fringCricfyCt fuib.

**PERLATUS**, fefcr breic; Sreife jur Sänge wie  
4—6: 1. Bernfc.

PERLONGUS fe&r lAng; gänge jut SSReUe/ tote  
7—10: i. Bernfc.

**PERMEATUS** f, *Protensus.*

PHRocIDitJM Reefer ift *Pcrickalium tiin.*

PEROW.XTUS, geffi'efelr if! fin (Sfrunf aneinem SJWje, tvenn er t>on untcn bt^ jar 2?7tte Md>t mēt einer twoDe.iartidcn 9J?aTc überjogen if!/ bie auf cm 9ftaf)l a,ff)ort. noie an AGARICUS *peronatus*.

PERPENDICULARIS, fenfred?t/ j# S3. *nadix perpendictlan's*, Die in einfr Stic^tung tn 5ie (frt>e Drfngf/ »d \* e mic Dcr Oberflfa^e bet Staffer\* einen rec^cen SBinfel bilbet/ n>ie an COCHLEARIA 'Armaracia. *Decanbolle* betrac^tet fcie

PFRPENDJCULARITAS, aK eine^iflenfeftaff/ Me We meiften ^panjert befrgm, me&r ober minder fenfrcc^t auf bem ^orfjonfe ju fr^en.

**PERPETUUS**, wa unverändert bleibt.

**PERPUSILLUS**; fe^r. f leín, f. in 35ej<3 auf fefne Anwendung *minimus*.

**PERSISTENS**, *bleibenb*, tttoa\$, .toaf folange ober and) nod) l&ngtc blcibt al\$ bte 2^oelfc, n>oran e\* ani)e)eftet ifl; {. S3\* *persistem Annulus* an tinjen tyil]cnf AGARJCUS *mucidus*; *persistens Brae tea* an SAIATA *oijicinalis*; *persistens Calyx*, ber bt^ jur Sleife bcr Srncbf^flc^en blethC/ rote an ben meifien ^5pe. *rifolia Gymnospermce*, *Didynames Gymnospermce*; *persistens Capsula* an PA PAYER; *persistens Corolla* an RUM EX, *persistens Fo*. Hum, bai txid)t am (frt>e oeJ erf&en ©o.nmer\* a6^ faUt, meifien^ fpnonpm mit *perennans unb semperirens*; *persistens Folium* gilt nad) Hayne'n nur »om <SamenMatte, menn e« (t\* (ür Entwickelung ber Slumen blcibt, n>ie an POLVGONUM *Fagopyrum*. *Persifentes Fructus*, brcn Samen ober Samenhüllen auf btm 'Slumciiceiefigen bleibm.' *Persistem In volu-*

*crum an ASTRANTIA ; persistēt Pale a receptaculi an ANTHEMIS Cola; persistens Pappus an BIDENS. Persistens Pedunculus , ber lānger fit\* he[n]d[e]lebt , al\$ bit Srucfrt/ mē an CITRUS medico\**  
*Persistens Spatha an ALLIUM oleraceumi persistens Stipula, bit lānger bltibt al\$ bie flatter/ an PISUM , THAGACANTHA; persistens Stylus,*  
*[>cv nod) bet) riefer §ruct)t tiorbanDen tf{ / tote an LUNARIA annua; persistens Stigma an PA PAVER, NYMEJA; persistens Volvo.^ bit fo (ange bauitt alt TO Coftmamm, tote an AMMA^ITA casarea.*

PERSONATA *corolla, maetiette* Slur/zen;  
 Krone/ etne ein6lat(rigc rac^enformtge SMumc, bcrctt  
 (d)Iuttt) burcf) bte 6co&cn £(ppen (tint) t>orsujlic6 ^urc^ cinen \*§or;fa§ ~~ter~~ unteren) fefl gefc()ojTen i(?) tvie am **Löwenmaule.**

PERSON AT\*, 'etne naturlic^e ^amHie **Geoinne.**  
*SSnnē ttlättt inbeffen Flos labialis unb personatus Journ\* 'fur ringens> @. Larvatus.*

PERTENLIS, fe{?r bün̄n; längे }ur 2)(cfe/ tvie  
**20-50:** i, Bernt\*

PERTICATUS, fUngeli'g, bem **Saserigen ähnlich**, aber tje gafcrn (tnb über % Sinte bicf. **Bernb.**

PERTUSUS, eingeb o&rt/ n>enn eine SSertie; fund nad) tnnen *Qhidbrotit bltibt fern&*

PERTUSUM *folium, burd>(lo^en/ tt>enn Jfln\**  
 fc^en ben @efä§bunbeln bier unb bt bie obere unb untete Slatt^aut, nebfl attcm «pacenc^t)me fct)(t, fo fca§ e^ au^ftebt, alt toavt bai State jufatl^g bur^ f{open/ toie an DRACONTIUM pertusum, an PTEROKIA *porophyllum.*

PERVIUS, *of fen, totnn btt @d)Iunb fo Wit ift a(^ bie £6f)(e. Bernb. SSenn er burf) nichtg gcfcf)(op fen ijl; wenn man freo bntd) fann; Faua: per via an CERINTHE , ECHIUM.*

**Pes**, gug = i2// längē beg 55orberarmiJ; *Pes gebraucht ntautnSufammcnfegunsen öfterf flattSU pes.*

PETALATUS *f. Tctalodes.*

PETALIFORME *f. Pctaloideum.*

PFTALINUM *Nectariumy* *Cit* *SRiftariUtl 1 ba\$*  
auf *ben* *SMumenblattern* *fict* *befinbtt.*

PETALODES *Flos-*, eine ?3(ume mit 9ftnnen6fllRrR,  
*Zoutnef.* *SDN* ^elc^ und *Shimenblättern*. .Büll.

PETALOIDEUS, mag einem 3>lumenblatte ä&nlicf) i(l  
(auc& étner 58lumenfrone Büll.) {, 9\* *Labellum*  
*pelaloideum* an ILEMPFERIA, *Nectarium* *pelaloideuni*, *Stigma pelaloideum* an IRIS

PETAI<PESTIMONES (Blebirfcb unt) fcT]pnd>, \$fTan;  
jen Dereu @tau6defa|fe auf ben *SbUmenblättevn* ftgen.

PETALUM, Blumenblatf, erf (art £fnfc' al^  
eine blumcnfconcnarti^c S>ecfe Dec \$Iume. 3cf>cr S^eil,  
aud mdcf;em eine nicf;t éuibtartrige *Blumenfrone* be\*  
fitt)t, i(l *Petalum*. SKan jablt Die 95lumen6lätter  
ttac& Dec S3af&, Die £infc^nitfc Der eurilaftrigen Slu^  
menfrone abcr nacht bet tfliite berfelben\* ©tnD Die %Iu;  
ntenblätter t>ertoacbfffet/ fo entf?ef>t eine *Corolla* *mo-*  
*nopetala*, oDer nflcft 2?ecanboUe *gamopetala*.

PETIOLACEM *gemma*, xoenn Die ©cftuppen un;  
enftvicfelte \$(attffce(e fnxb, n>ie am 3htg6aumc.

PETIOLARIS, mag ju Dem 55latt(liele gebört, aud  
Dem S51attfftle entfpringt/ oDer auf Demfelbcn fe|?ft|t;  
j» 95, PETIOLARIS *Cirrhysy* xoenn Die SRanfe eitt  
terlängertec ^lattfliel f(l, oDcc an Dec Spt§e Deg ®tatt',  
ftielei fid) befinoet, tvie an Deo SBicfeii/ Srbfen; alfo  
*Solattfieltante*.

PJSHOLARES *Flo res* 53(unKn, Die mil ifyremSlu\*  
menfiele auf Dem Slattlitelep&en/ mie an HIBISCUS,  
TURNER\* befl Cintgett Slrten\* *Velioluris gemma*,  
im (Scgenfage t>on *stipulacea* an LICISTRUM, SA-  
LIX, *peliolaris Glandula*, ^ CASSIA, MIMOSA  
auf Dem Slatefliel\*

PETIOLARIS Pe June uZud, Der au\$\*Dem SRIaffe  
(tide entfprinflt / ftie an THESIUM ehracUatum. te-

*iiolaris Stipula*, twnn2lfster6lafter mff *bm* %>lattt  
ffielien twmadfjſen pnb/ n̄e an ASTRAGALUS, ober an  
Dem ^SBlattfiele unb (Stengel jugM)/ n̄ie an ber

*^VEXIOJ-ATUS*, gefli'elt/ wad mit einem 35lattfiele  
aerfe&en ill/ b. &. n̄enn ber fcautige Sfjeil nic&t bi^  
ju bem Orte binabffetst/ n̄o bcr Sbctl, ben man gefielt  
nennt^ angebeftet i(?. (ff [at abec aud; noc^ anbere  
%ebt Ut|l||QC|L *Peliolatum Ascidium* an bttn Snbe  
etned Slatted/ ttie bet) NEPENTHES destillatoria. i'e-  
tiolaium *Folium* iji bei) £iné ba^jcntge, bad an  
feiner Saffd am SRanbt einen 25latt(ltcl ^ t, note an btt  
5Papp^» 3« *Palaceus*. *Petiolate glandule\**, ft);  
nonptn mit süpitatz^ an DHOSERA, RICINUS. P*c/i'o-*  
*Zato stipulce f. pedicellatae*.

PFTIOLELLI^ @ tieleven; fo nennt ffern{?arbf  
bie @tide bee „8lfttlatut unb 9(fterb(dtt4)en/ ber  
@cfy(aud)?/ J^nopfc&en unb affer Sefleibungen bed  
@tenfield,

PETTOLULATUS, fa\$t man fton S3(attc5en eined  
{ufammengefegten f&latti, bie mit einem \$(attfiel;  
\$en terfe^en fnt)\*

### PETIOLULUS, f\* *Petiolas*.

PETIOLUS, B1^ttfltel/ i(l na\$ \$Ann& jener  
£^i( ober jene Slrt bed @tammed ober @tengeld/ tmrcfj  
tDdcben bad S3(att, nic^t bie S3(ume, mit biefem t>r^  
bunben toirk 6elten/ ttie an HIBISCUS unb TUR-  
KF:RA, ftnb 93(att unb \$rud)t {u^leid an einem unb bem;  
felben @tide. 25et)6^ne ijl *Petiolus*, Blartfltel,  
ein burc^ 3ertfrei(ung {>e^ (gtengeld / ober ber Slefte/ ober  
bed SBnrjeIfopfedent|lanbener/ mfeiner Strung ofterd  
mannidfaltig abtveic^enber. Sfttel, ber jeberjeit nur em  
S3(att an feiner &m\* tragt. 3ft biefed S3latt ntc^f  
ecnfacfr, uqb ,ftgenwbrere Heine 58lattcf>en auf ifrnd/  
(aid ber SSerlangerunfl ber SDfittelrippe/ n?o immer) fo  
ifl er ein allgcmemer Blattdtel/ {*Petiolus com-*  
*munis*) trie an bem ^oKunber/ an ber £fdK/ und

wtnn biefe fleineti Slactcoen toieber burd) eigene 93latf\* ffiele wit ibm ©erbunben ftnb, fo nennt man biefe be\* fonbere Blarrftiele (PcWoH *paniaies*). 2>iefe nennt iDecanbolle au\* *Peijoluli*. Slnbere nennefctfe **Petioli seen ndarii.**

**PETKOSAE, f. Lapidosa.**

^

**PHAENOGAMIA, f. ? h (MC r O g CMI Q.**

PHAEOS ani) PHAIOS in 3tffammenfe&.un\$en au«'b«m ©rtecl)trd)en, gUWbcDeutMb mtt *fuscul* unt> mit **nigricans**.

PHA<sup>A</sup>NGIFORMES Pili, (Bclciif&are / ~~perlens~~  
fcfenurformicj, unb (and unb f^arf gedKebrt, ~~mie~~ an  
TRADFSCANTJA.

PHANERANTHAE, VXM>. PHAWEKOCAMIA, unb oftert aud) tvobl PBAWEBOSTEMONES, gctv&bnlt^cr PH<sup>A</sup>NOGAMIA, im Besenfafje >on JJcoptogamlf, ~~Ges-~~  
wac&fe mit beutUA (!\*tbaren @ef\*Ie\*«^X)rg~~anen~~; ^ie er(!en XXIU ClafTen bet) £tone.

PHANES, *Phanerosj* glci\* bebentenb mit ma-7i//e5/u5 in Sufammenfcgungcn aui.bem ©rlec&lfc&en.

PHILYRA, cin "bunneg'Slatt; *Philyra convolute* t)om gotten/ bee au«ftert roie ein aeroatcS 31att

PHENICEUS foate cigcntcf) gletc()bebeuteiib mit *puniceum* fepn, toirb aber fut jene ©cbattcung be\* earrnin\* gebrauc^/ bie man *Vermilion* \*) nennt/ Dec\* einige, jumabl alte ©otanifct/ ncancn ba«# »a« Vab men "abnlc\* tfl/ *ph\*niceus*. 33co tPfflbenoip i(?) tg fononD'm mit fc&acla\*farben, coccinen\*, »a« abec *bat* rotb t>< ANAGALLIS *phanicca* nicftt ift;

\*.) €« Weinf taf, mit allct ?J\*tung für ton ©\*atfen ~~Kam~~  
Bert\* fcp'4 flefpcofcKn, fo »ie fcec ^dpfee ben Sfcon am  
~~besten~~ pcrftejt, fo bet \$if)l\*t bie gacbe. ©arum bebicnen  
wic unfi nitft ^et 5<rminolofite#bet Slactec? fflacum fpce-  
fen wic >on bur gacbe wic iener Siinbe, bee ba fagre,  
bie gavbe be^ 64atla(|) fäme ihm vor wie ber ^ einer  
Stompere?

*hex)* anbern fccigt e\$ bunfelrotb, purpurfarbcn / fogac  
**violet!**

PHORANTHIUM      Ruf>.      r      *Receptaculum*  
c <fpi in u n e\*

PHOBUS in Sufammenfefeunsen atig bem ©riec&t\*  
fc&en ffatt / e r , / c r u 5 , äud^ cm jtocflten ©imne t>tefe«  
Wortes.

**PHRAGMA** Linß f. *Transversale Dissepi-  
ment tun.*

PHRAMIGERA *Legumina* f. *multil ocu-  
laria.*

[RAGMIGERI pill' lymphalici, gegntbfrtt/ mit  
Querscheidewänden versehene lymphatische Haare.

PHTHIRIASW, we JSLaufefu4>t/ eine j?canfbkeit

PHYCEI, fpnonpm mit *Algce,* *hydralga*,  
cryptogamische Wassergewächse.

PHYLLINUM, Belaubung/ ncnnnt #>ayne jene  
verschieden gebildete Ausdehnung des aufsteigenden Stos-  
ckes/ Me man/ je nacfybem fie an t>crfd>teDcnen &v  
t\*>ad)fcn t>orfemmt, baib Haub, *Thatlus*, *bait)*  
tPcbel/ *Frons*, *balb* £l&td', *Folia* ntnnt  
Slud) rennet er nod) f)ierber Die blatta)nUd}cn ober ju  
ben Slattern seftöngcn Shbdngfcl / aW: bie Aftterbläts  
rcr/ (*Stipule*) bag (Dc^rd^en (^ur/c u l a),  
bie ^uefdjlagafdjuppe (*Ramentum*), bit Blatts  
fc^eibe (Fa*7*ia), bai BlAttbaurcben. {Ligu-  
la)y bie Cute (*Ochrea*), bit'Bnoepe'(*Gemma*)^  
ben <3fc>laud {*Ascidium*)^ bie ^lebenblarter (*Bra-  
clette*)j ben ©djopf (*Coma*), bte <£üle (/rtvo-  
lucrum), bie Biumenf4>eibe (*Spatha*), baß  
Schleyerchen (*Indusium*).

PHYLODES, roag einem Slatte a6nlic> iff.

PIJYLLODIUM ^ canbolle i(l ;éne Slit von Blatts  
(ielien 'an gemijTen \$ufammengefcgten obet fet>t ger-  
fd)nittenen Slattern/ ttcldjje fid) fo fet)r unb fo fd)nef

aus breiten bag fie bie gorm einig S3(atfc\$ annfcmen  
unb Die SBläfte&en fiftc nid>t writer entmitfeln lafien,  
rote an ben 2Icaciens aug Sftcu&ollanb, tieUeic^t auf  
On BUPLEURUM.

PHYLLOMORPH\*; *Tale a* nennt-palifbt Beaupofe  
bie 6petjen/ »cnn fie gepaact obec aesnibcrgefleae  
parallel an ber 3il>act)j^ eingefftgt ftnb.

PHYLLOPHORA *pi ant a monocotyledonea*,  
tttnn ber eine aufpebenbe ^otolebon cine wenigstens  
einigermaßen glattaf)nUd)c ©effalt (>af.

**P**HYLLUM überhaupt, als Kelch:  
Matt intibfonbtxe. (gmt^e moden bamit nur jene<sup>1</sup>  
£elcf>glätter bcjeic^ncn / bie b(attā()nUd) finb, Wit an  
ben3tofen» 6. *Folium unb calycis foliolum*.

PHYMATOIDEI *Ccenolhalami 2id>at. XDcLrt*  
jenfoi-migc .flec&ten/ &eren grucfttbe&älter n>ar\$en;  
förmifl äugericfr t>on bem 8aube gcbilbet finb/ unb  
cine tfernbecTe mit cincm fftnc, cber ein bloge^jtetm;  
bldttd)cn einfcoUegcn.

PHYTOLOGIA fpnonpm mit 35ot<yiif.

PICEUS, pec^fd ^warj, fc^warj unb filanjcnb.

PICROTOXINA BouIUy, ein *Principium imme-*  
*diatum ill.* glaffe in ben \$flan\$eu.

PICTUS, gemab It/ n>ad n>ebcr runbenocf; range  
Slecfen ftat jD^canb. SBaS fc&r groge, anberg gcif  
flccftc glecfen bat/ »ie ARIT<sub>M</sub> pictnm, SPiUb.

•PJLARIS *Pappus Hint f PHosus*.

PILIUTUS, Ober pileiformis, but9 ober  
fiipppe If 6 i'm i'g; fo netuit man fcag @^ib(\$en an  
einigen ?aubmoofen pileifonnis, vocnn eg am obern  
Sianbe unorbentlich sur&cf9Cfcl)la9Cn ift/ tt)ie an EN-  
CALYPTA vulgaris.

PILUS, <5>ut, i! 6e9^mine ein fcorijontol aus-  
gbreitetes iellercOen-an ben JJiiiC</ an \*cfl"en Unters-  
fcite. bie gSefrucftang^tccrfieuge Hesen; alfo ber Theil,  
welcher ben,@C^Wf3 (*Hymenium*) bcfctfjgt/ obec

forr&aupt jebe Slutfbrcitung beg 6trunfc\$ ber natft\*· frujbtigen ©cbtoāmme, toelcbe Dm Ueberjug obcr Me ©amenbaut fiūfct,

PILIDIUM, bad <?>ut4>en/ eitt freitfförmtgetf offend balbfugelformigctf Srud>tla^cr mit erbabenem ober flaxen SKanbe/ beffen äugerc&inbe ffc in &tanb cuflbSt; j. 55. an CALYGIUM. <fg i|i faff immcr &v flicit, unb fe|r oft fdjmarj.

PILIFERUM/ōZium, Ijaartragenb, toai an ber ©piſe ein ^aac bat; n>ic POLYTRICHUM pilifc\* mm. £em fpi^entragenben, (*apiculatum*) iāt)nlubr bod) fo, bag ber i>ert)ortretenbe 3?ct>e ooit toeigWS^e iff/ mie an GHIMMIA sudctica, tt>o ct tinfad), unb an BUYUM *macrocarpum*, two er afii^j i(I.

PIOSIUSCULUS, ettva^ bebaart.

PIOSUS, ^ e t a a r t, n>aſ mit ^aarcn, tan^ert, tt)eicben/ etnjelen incident ttmi gcbogenen b^arfSr; migen Saben an feiner ObecTacbe befe&t 'tf{; j. »: *pilosa Anthera* an LAMIUM; *pilosa Calyptra*, f. *Paraphysiphora*; *Caudex pilosus*, nw abet/ n>ie an einigcn ^arrnfräutern/ biefe^aare 6fter^ tit ©pi^cn fleincr 6d)uppm ftnb; *pilosum Filamentuni*) an VERB AS CUM; *pilosum F ol i um* i(l beo Jimné ein Slatt, an beffen Obevfläcbe beutticfyе (ange ^aare ftnb/ tote an GORTUSA, HIERACIUM *Pilosella*. <Sc>t uuglūcflicb nennt tPi'Ubenotx) 6cr> ben gRoofen ba^jenige SBlatt *Folium pilosum*, bat, tvie HYFWUM *macrocarpum*, d|lige Spaavc an ber Spīze hat. *Pilosus Pappus*; fraarformig ifiba^ **Federchen**, n>enn e^ au^ einfacben febr feinen ^aarett beflebt/ fpncnQin mit *simplex* ^ xoit an LACTUCA, SONCHUS; *Pollen pilosus*, aneinitjeti^flattjen; *Recep\*taculum pilosum* an GARTHAMUS; *Semen pilosum* an BARNADESIA; 3pic a *pilosa*, ttoenn bie SMūmchen rflit ^aarcn befe^t ftnb/ trie an LAGOTUS; *Stigma pilosum* an frielcn ©rafern. *Pilosa Verruca*, roarjenformige Srbobüngen mit einigen meg;

fte&enben £aaren/ nric an étnigen HFLIANTHEMUM.  
 &\$ tturb 'caufid' fur *hirsutus* aebr^ucfcf.

PILUS, <5>aar, uenntfinn̄ eiuen borflenförmigeti Slutffiiibcuns&Ganal an Dcr ^Pflanjc, <Dccanbolle abec im Slflflcmeinen afle ffeinen tpeictKnfaDenförmigen, **dea** ipaaren >cr S&fere áfctiUdjen 3lu^tvud}fc / Die cme clnc o^er mebreren aud Dem aUscmeinen 3^engewebē hers t)orfprinflenDen gcflen beffc&t. g^ gibt **Drüsenhaare**, auefonfcern&e <5>aarC/ lint) **Lymphatische Haare**. 3Decanb. unterfc>cfDct nid)t itvif\*cn Pi7u5 unO ViU I us, 3m enjern ©inne be&eutct ibm *Pilus*, **Haar**, ein oberfläd)lidK\$/ **wenig niederliegendes und etwas steifes Haar**.

### PINETA, Nadelwälder.

PINGUIS, fett/ 6{?Ii9/ Dem Oefübfe unt) Dem ©cfdjmacfe wad)\* 3lud) wa^ fi(\*) Oicf anfübU/ wie Die flafter bet gcafTulen unt) Dec fo^enannten **Planze tucculentce**\*

PINNA, fieber, jeDed Heine einMe 35laft **eines** flefieDerten Slatted; jeDef gefleDerte 95latf ein?« **dops** pelt 9effeDerten Slatted; jeDe« Doppett gefteDme **Blatt** einei Dcepfa\* gegeDerten SlatreS. Jtinné naniue Dieg bC\ Den SJRimofertJFihrid *parlialis*. ' ^Pinna ntant man auch Die gtfi'gern unfrucbtbareifgeDecbläftdjert ait Dca geramten^ n>ie Die Slefle eine^ **gefiederten Mooss stenge**.

**PINNATIFIDUM** - LYRITUM , qgfiedert get  
 schizzi: ley or -  
 blätter an VALERIANA -

**PINNATIFIDUM** f **5t,**  
 fieberfpalrt'0/ iff oep **£if^**-rin S5(att/ **das** <fuec in fcorijontale 1Aigli^e happen det&eitt Ij?; bep <?>ync aber, tvenn ein SSlatt Durd) Slueffcbnttc, die fafi btfjur g^ittelrippe-teiften / in mcbre auf fciefer jiemli\* fenfredjt (ie^enDe S lu^nitte aet&eiU iff, tpie Die obern Slätter an ScABitgK *an>ensis*. %ot\$ canboUe UUafyUt tt ai ein S&latt, DaTen Ruppen

gefiedert, unb beffm happen bi3 \$uc **Hälste ihrer**  
 Sreife aefpalttn ffnt>. **Re&nUc&** g«6ilb« flirt *pinnatir*  
*Jidte Colyledones* an GERANIUM *moschatum* %  
*bU pinnatzfida Frons* an POI.YPODXUM *vulgare*; **das**  
*pinnositidmn Involucrum* an DAUCUS> unb **die**  
*piniatifida Stipules* an VIOLA *tricolor*; *pinit-*  
*iijidus Thall us*, mit ttcfen Sinfcftnitten in Den 6Iato  
**förmī^en ^crlättderungen^** ©ijnonpm mit *semipifi-*  
*nal us.*

PINNATILOBATUS, gefjcbert g c l a p p t / **ton**  
 Slattern Derm 3Rcten QCfittmt, unb Deren happen  
 fcW auf cine Siefe an^f^niuen ftnt)/ tie man.nxDec  
 bcflimmen tann nod) mag.

PINNATI-PARTITUS , Qtfit b Ct t Qt t) t| It,  
 won Slattern, nxmt **Die diuppen flcftetxtt/ unb bit** **Sap-**  
 pen übtt bit @Ritt oet&eilt finb, rtynt **dag** Oad **Pa-**  
 rmcfrpma unferbroc^en tvåre.

**PixNATxSECTus / geftebert eingefc^nit^**  
**ten / ton Slattern btxm SRippen geftebert / unb berm**  
 Sappen bid an bie SDJitKlippe getbeilt flnb, fo baß  
 fclbfí bad ^arenc^pm biff flrtrennt iff.

